ОПАСНЫЕ БЕРЕГОВЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ОСНОВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ПРИБРЕЖНО-МОРСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Н.Г. Пашкова

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь
pashkovanataly@mail.ru

Аннотация. Проблема изучения строения и динамики морских берегов в пределах различных территорий давно стала одной из областей научного исследования в географической науке. Изучение же опасных геоморфологических процессов в пределах побережья является важнейшим аспектом не только для определения современного состояния берега, но и для прогноза их состояния в будущем. Использование в процессе анализа опасных береговых процессов перечня геоморфологических рисков с определением интенсивности их воздействия с применением бальной оценки способствует возможности создания стройной системы мер по берегозащите и установления путей наиболее рационального использования береговой зоны в хозяйственных и рекреационных целях.

В статье приводится перечень наиболее распространенных геоморфологических процессов, характерных для Крымского побережья и дается краткая характеристика каждого из них. Дано понятие геоморфологических рисков и обозначены особенности их проявления для прибрежно-морских территорий полуострова. Перечислены основные показатели оценки опасных геоморфологических процессов на прибрежно-морских территориях. Составлен перечень ведущих геоморфологических рисков, оказывающих наибольшее влияние на развитие рекреационно-хозяйственного комплекса прибрежных районов полуострова. Особое внимание в исследовании уделено Керченско-Таманской области. Дана краткая характеристика тектонического и геоморфологического строения территории, обозначены ее районы. Выделены ведущие опасные береговые геологические процессы и охарактеризованы особенности их проявления в границах рассматриваемого региона. Приведены общие рекомендации дальнейшего процесса устойчивого развития прибрежных территорий Керченско-Таманской области, основанные на особенностях ее геоморфологического строения и учитывающие перспективы интенсивного рекреационного освоения территории.

Ключевые слова: прибрежно-морские системы, опасные береговые процессы, геоморфологические риски, берег, побережье, береговая зона.

Целью исследования является определение важности изучения опасных геоморфологических процессов в пределах побережья и установление геоморфологических рисков, как основы для прогнозирования будущего стояния и развития, а также возможности использования каждого конкретного участка берега. Геоморфологические исследования побережий необходимо проводить, используя единую методику с учетом оценки геоморфологических рисков [1], что позволит зафиксировать динамические изменения, как во времени, так и в пространстве [2] и способствует разработке рекомендаций по управлению хозяйственно-рекреационным природопользованием с учетом опасных неблагоприятных явлений.

На протяжении всего Крымского морского побережья преобладающими геоморфологическими процессами являются абразия, гравитационные, оползневые, эрозионные, аккумулятивные, селевые процессы, а также явления заболачивания, засоления и выветривания [3]. Природные условия каждого отдельного района в сочетании с деятельностью человека создают обстановку, которая определяет характер и интенсивность новейших физико-геологических

явлений, многие из которых приводят к развитию опасных береговых процессов и оказывают значительное влияние на пути развития территории как в хозяйственных, так и в рекреационных целях.

Прибрежные территории активно подвергаются абразионным процессам. Волнообразная деятельность морских волн на скальные породы различного возраста приводит к выработке активного клифа, волноприбойных ниш, размыву берега, активизации гравитационных процессов, истощению пляжных территорий и др. Избирательное абрадирующее береговой линии, в зависимости от литологии слагающих пород, приводит к образованию мысов, выступов, бенчей или мелких заливов, бухт, ниш с характерными микроскульптурами.

Гравитационные процессы получили яркое проявление в виде обвалов и обрывов в зоне активного клифа. Они фиксируются в виде узкой полосы коллювиальных глыбовых навалов, иногда целых блоков и плит скальных пород в прибойной зоне. На отдельных участках отмечаются свежие стенки отрывов, зияющие трещины, что указывает на активность гравитационных процессов и в настоящее время.

В пределах Крымского побережья ярко представлены оползневые процессы. Оползневые блоки, поверхность которых достигает уровня моря, разрушаются под действием абразии. Размыв береговой линии в конкретных геологических условиях сопровождается оползневыми процессами, глубоко деформирующими неогеновые отложения (понт, мэотис), геоморфологическим отображением глубоких оползневых деформаций мэотических отложений является оползневой амфитеатр. Развитие оползневых процессов на побережье носит циклический характер, что обусловлено качественными изменениями в оползневой зоне, в процессе которых прибрежная часть плато теряет устойчивое состояние.

Эрозионные процессы широко развиваются по долинам балок и связаны, в основном, с деятельностью временных водотоков, меньшее значение (ввиду малой крутизны склонов) имеют плоскостной смыв (струйчатая эрозия). Основными факторами, способствующими развитию эрозионных процессов, являются неотектонические сводовые поднятия. Иногда эрозионные процессы обусловлены деятельностью человека – через понижение или повышение базиса эрозии посредством сооружения прудов; неправильным сбросом поливных вод. Процессы заболачивания обычно сезонные и развиты по периферии лиманов и озер, зависят от режима водного бассейна (волновых колебаний, ветрового нагона вод, просачивания морских вод через переуплотнения), проявляются также в устьевых частях впадающих балок. Процессы выветривания (физическое и химическое) наиболее активны на водоразделах и склонах, сложенных известняками под маломощным элювиальным слоем.

Без учета геоморфологических процессов, протекающих в пределах прибрежно-морских систем исследование береговой части было бы нецелесообразно. Учет же опасных геоморфологических процессов является крайне важным этапом изучения любого прибрежного района, так как их воздействие оказывает колоссальное влияние на изменения в прибрежной линии и может стать определяющим звеном в развитии территории.

При изучении прибрежно-морских систем на основании установления ведущих геоморфологических процессов и определения негативных, опасных их проявлений, для дальнейшего изучения берегов и возможности составления комплексной характеристики территории с учетом прикладного аспекта целесообразно выведения перечня геоморфологических рисков характерных для исследуемого участка. В наиболее общем виде понятие геоморфологического риска включает в себя вероятность активизации неблагоприятного или опасного геоморфо-

логического события, которое способно нанести ущерб хозяйственной, рекреационной и другим видам человеческой деятельности или объекту, что связано с характерными для данной территории геоморфологическими условиями.

Современные опасные береговые процессы являются основным источником природного риска и характеризуются особенно интенсивным проявлением в зоне сопряжения суша-море. Опасные береговые процессы обладают синергетическим характером проявлений и способны к провоцированию и усилению развития друг друга, что ведет к оказанию мультипликативного негативного эффекта на рекреационно-хозяйственную деятельность в зоне побережий. Особенностью проявления геоморфологических рисков на побережье является вероятность их проявления на конкретной территории, в определенное время (характеризуются сезонностью) и с определенными геоморфологическими характеристиками (скорость протекания, цикличность, площадь влияния, дальность перемещения, объемы геологического материала, вовлеченного в процесс и др.). Для наиболее четкой оценки геоморфологического риска необходимо учитывать следующие показатели: 1) генетические особенности процесса, определяющего данный риск; 2) пространственная повторяемость опасного процесса в пределах заданной территории; 3) временная частота проявления процесса; 4) площадной охват (размер) проявления процесса; 5) скорость проявления процесса. В ходе анализа опасных процессов, протекающих в береговой зоне, и при учете всех вышеперечисленных показателей формируется наиболее точный перечень ведущих геоморфологических рисков способных оказать воздействие или нанести ущерб ведению рекреационно-хозяйственной деятельности в пределах исследуемой территории.

Нами был составлен перечень ведущих геоморфологических рисков, наиболее часто проявляющихся в пределах Крымского побережья и влияние которых наиболее остро отражается на развитии хозяйственно-рекреационного комплекса в пределах Крымских берегов. Среди всех возможных геоморфологических рисков были выделены следующие:

- 1) Активные абразионные процессы;
- 2) Гравитационно-обвальные процессы;
- 3) Крутые уклоны подводного берегового склона;
- 4) Обрывистость берегов;
- 5) Значительная высота береговых клифов;
- 6) Незначительная ширина пляжей или их отсутствие.

На основе проведенного анализа исследуемой территории выполняется установление степени воздействия каждого из выделенных геоморфологиче-

ских рисков на развитие хозяйственно-рекреационного комплекса прибрежной территории, перечень которых изменяется в зависимости от преобладающих геоморфологических процессов, присущих заданной территории.

Керченско-Таманская область характеризуется расширенным рельефом геосинклинального типа [3]. Неотектонический режим в зоне сопряжения суша-море характеризуется преобладанием тенденции к опусканию морской береговой зоны. В районе шельфовой зоны отмечается наличие широких опущенных блоков с выровненным профилем аккумуляции и дифференциацией по отдельным блокам. В пределах рассматриваемой территории отмечается общее поднятие зоны суши. Данная область характеризуется ландшафтами кальциево-натриевого класса (Ca^{2+} , Na^{+}) с участками хлоридно-сульфатного класса ($\text{Cl}^{-}\text{-SO}_4^{2-}$) Керченской пологоволнистой холмистой равнины (керченские) на темно-каштановых грунтах и солонцеватых черноземах. Растительная компонента представлена естественными пустынно-степными бедно-разнотравными злаковыми группировками с наличием в приозерных котловинах галофитных лугов, а также на территории отмечается наличие агроландшафтов. Для территории характерна исключительная бедность подземными водами.

В пределах области можно выделить следующие районы: 1) Район Керченской грядово-холмистой расчлененной равнины с развитием инверсионных и грязевулканических форм; 2) Шельфовый район; 3) Район погребенных палеodelьт; 4) Район эрозионного, эрозионно-аккумулятивного и пологого Прикерченского сектора с наличием погребенных палеodelьт подводного продолжения пра-Дона и палеорек Приазовья, а также Кубанского палеоканьона.

Берега всей области сложены преимущественно комплексом неогена. Четвертичный покров представлен лессовидными суглинками и оползневыми накоплениями [3]. К ведущими процессами на акватории (шельф и континентальный склон) относит-

ся аккумуляция в условиях активно разрушаемых берегов. Рассматриваемая территория характеризуется эрозионно-аккумулятивным с развитием газовой выделений типом шельфа и аккумулятивно-эрозионным развитием наложенных контуров выноса на континентальном склоне. Преобладающим типом берега является абразионный и абразионно-оползневой.

Особенности территории позволили определить, что к ведущим опасным береговым геологическим процессам относятся абразия, обвально-оползневые процессы, оползни выдавливания. Широкое распространение в пределах данной области имеют оползни – в пределах рассматриваемой территории насчитывается более 100 оползневых участков площадью 4 кв. км. Таким образом наибольшую угрозу для данной территории представляют абразионные, склоновые и оползневые процессы. Абразионные процессы преимущественно представлены средним уровнем интенсивности, значительная оползневая активность и в проявлении склоновых процессов значительное место отведено линейной эрозии. С учетом такого развития береговых процессов отдельные участки берега нуждаются в проведении берегоукрепительных работ и исключения возможности капитального строительства сооружений вблизи уреза воды. Для наиболее рационального хозяйственно-рекреационного развития прибрежной территории необходимо учитывать геоморфологические риски, которые проявляются в виде негативных и опасных явлений, так как геолого-геоморфологические риски способны нанести наибольший урон хозяйственно-рекреационному природопользованию

Вывод: геоморфологические риски оказывают значительное влияние на развитие хозяйственно-рекреационного комплекса территории и для наиболее благоприятного его развития учет этих рисков является важно необходимым. Данная методика исследования может быть применена к каждому району Крымского побережья.

Список литературы

1. Симонов Ю.Г. Балльные оценки в прикладных географических исследованиях и пути их совершенствования. Вестник МГУ. Сер.5. География. 1997. Вып. 4. С. 7–10
2. Сафьянов Г.А. Динамика береговой зоны морей. М.:Изд-во МГУ, 1973. 174 с.
3. Леонтьев О.К., Никифоров Л.Г., Сафонов Г.А. Геоморфология морских берегов. М.: Изд-во МГУ, 1975. 385 с.

DANGEROUS COASTAL PROCESSES AS THE BASIS FOR DETERMINING GEOMORPHOLOGICAL PERILS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF COASTAL MARINE TERRITORIES

N.G. Pashkova

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol
pashkovanataly@mail.ru

Abstract. The problem of studying the structure and dynamics of sea shores within different territories has long been one of the areas of scientific research in geographical science. The study of dangerous geomorphological processes within the coast is the most important aspect not only to determine the current state of the coast, but also to predict their condition in the future. The use of a list of geomorphological risks in the process of analysis of hazardous coastal processes with the determination of the intensity of their impact with the use of ball assessment contributes to the possibility of creating a coherent system of measures for coastal protection and the establishment of ways of the most rational use of the coastal zone for economic and recreational purposes.

The article provides a list of the most common geomorphological processes characteristic of the Crimean coast and gives a brief description of each of them. The concept of geomorphological risks is given and the features of their manifestation for the coastal and marine areas of the Peninsula are indicated. The main indicators of assessment of hazardous geomorphological processes in coastal and marine areas are listed. A list of the leading geomorphological risks that have the greatest impact on the development of recreational and economic complex of the coastal areas of the Peninsula. Particular attention is paid to the study of the Kerch-Taman region. The short characteristic of tectonic and geomorphological structure of the territory is given, its areas are designated. The basic threat of coastal geological processes and describe features of their manifestation within the boundaries of the region. The General recommendations of the further process of sustainable development of coastal areas of the Kerch-Taman region, based on the features of its geomorphological structure and taking into account the prospects of intensive recreational development of the territory are given.

Keywords: coastal-marine systems, dangerous coastal processes, geomorphological peril, coast, coastal zone.

References

1. *Simonov Y.G.*, Score in applied geographic research and ways to improve them, «Vestnik» MGU. Ser.5. Geography, 7–10, №4 (1997) (in Russian).
2. *Saf'yanov G. A.*, Dynamics of the coastal zone of the seas, 174 p. (Moscow: MGU, 1973) (in Russian).
3. *Leontyev O.C., Nikiforov L.G., Safonov G.A.*, Geomorphology coasts, 385 p. (Moscow: MGU, 1975) (in Russian).