МЕЗО-РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДООХРАННОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

В.В. Пененко

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН,
Новосибирский государственный университет
penenko@sscc.ru

Аннотация. Обсуждаются вопросы изучения изменений климата и окружающей среды в городах и промышленных регионах с учетом природных и антропогенных воздействий. Основной целью исследований является создание методов и технологий математического моделирования для решения прямых и обратных задач с оценкой экологических перспектив и рисков, сфокусированных на проблемах городов и регионов Сибири. При разработке методов и технологий моделирования учитывается, что на города и промышленные регионы влияет эволюция крупномасштабных и долгосрочных изменений в системе Земли в сочетании с региональными и локальными воздействиями. В качестве примера разрабатываемых методик представлен один из сценариев численного моделирования для изучения влияния озера Байкал на гидрологический режим атмосферы прилегающих территорий.

Ключевые слова: численное моделирование, прогнозирование состояния окружающей среды, глобальные и региональные масштабы, вариационный подход, атмосферные процессы, Байкальский регион

1. Введение

Исследования эволюции климато-экологических процессов при различных воздействиях природного и техногенного происхождения активно развиваются в мире. В настоящее время они приобретают особую актуальность в критических условиях неустойчивости развития современного общества по отношению к здоровью людей и к охране окружающей среды.

Города и индустриально нагруженные регионы находятся в состоянии текущих изменений гидротермодинамических погодных условий и качества атмосферы, которые реализуются на фоне глобальных и долговременных процессов. Большие неопределенности остаются в оценках и в прогнозировании качества атмосферы и водных объектов. Для оценок первичных выбросов загрязняющих веществ и продуктов их трансформации требуются универсальные методы их мониторинга и системы оперативного прогнозирования. При этом особое значение приобретают методы решения обратных задач по выявлению ненаблюдаемых источников опасных первичных выбросов и токсичных продуктов их трансформации.

Здесь мы представляем методы совместного использования математических моделей гидротермодинамики и химических процессов с усвоением доступных данных их мониторинга для решения научных и практических задач природоохранного направления мезо-региональных масштабов [1,2].

2. Региональные задачи в контексте глобальных изменений

Обсуждаются проблемы исследования климато-экологических процессов в городах и индустри-

альных регионах с учетом природных и антропогенных воздействий. Основная цель – это разработка методов и технологий математического моделирования для решения прямых и обратных задач с оценкой экологических перспектив и рисков по тематике «Экология городов и регионов Сибири».

При разработке методов и технологий моделирования учитывается, что города и индустриальные регионы находятся в сфере влияния эволюции крупномасштабных и долговременных изменений в системе Земли в сочетании с региональными и локальными воздействиями. Для Сибирских регионов это, например, процессы типа интенсивного летнего Алтай-Саянского циклогенеза [3] и зимнего антициклона, а также процессы взаимодействий озера Байкал с окружающими его территориями (динамического, термического и влажностного характера). Причем, в свою очередь, Байкал представляет собой интенсивный источник и рецептор воздействий в климатической системе не только Сибири, но и всей Земли.

Соответственно, для городских агломераций, например, в Красноярске, в условиях местных региональных неоднородностей рельефа существуют значительные постоянные контрасты температуры в системе город – река. Зимой этот контраст около 20 градусов. По сути это рукотворный фактор климатического масштаба – незамерзающая полынья за плотиной ГЭС порядка 200 км. Не столь значимая, но подобная ситуация также и в Иркутске. В Новосибирске, при меньшем влиянии рельефа, это взаимодействие типа городской остров тепла –

река- водохранилище. При этом происходит формирование температурных инверсий с интенсивными техногенными воздействиями в результате значительных выбросов загрязняющих выбросов и образованием токсичных продуктов их трансформации.

Действия этих явлений мезо-регионального масштаба реализуются на фоне глобальных процессов, информацию о которых удобно учитывать с использованием методов усвоения данных. Заметим, что по оценке экспертов ВМО [4] существующие технологии прогнозирования гидрометеорологических ситуаций (погоды) имеют период заблаговременности порядка шести суток. Поэтому для задач природоохранного проектирования, ориентированных на будущее развитие сообщества, действия фоновых гидрометеорологических процессов мы предлагаем учитывать на основе многолетних данных Реанализа с помощью специальной методики. Для этих целей разрабатываются спектральные методы декомпозиции по масштабам процессов многомерных пространств данных глобального и регионального масштабов. При этом рассчитываются пространства главных факторов с фильтрацией механизмов типа погодных шумов.

3. Математические аспекты технологии моделирования

Для решения задач этого класса мы используем объединенные модели геофизической гидротермодинамики с моделями переноса и трансформации различных примесей в газовом и аэрозольном состояниях. При построении технологии моделирования мы исходим из тех позиций, что математические модели и данные мониторинга выражают разными средствами эволюцию одних и тех же процессов. Чтобы их объединить, мы используем вариационные принципы в формулировках со слабыми ограничениями.

Вариационные принципы мы организуем так, чтобы уравнения моделей процессов связать с использованием сопряженных функций с результатами наблюдений и целевыми функционалами прогнозирования в единую систему. В таком аспекте сопряженные функции выступают в роли распределенных множителей Лагранжа. При этом заметим, что для целей математического моделирования с усвоением результатов наблюдений требуются так называемые «модели наблюдений». Они представляют алгоритмы вычисления образов измеряемых данных через функции состояния моделей процессов. То есть преобразовывают информацию из класса функций состояния в пространства результатов наблюдений. Соответствующим

им сопряженные операторы преобразовывают обратно информацию из пространства данных измерений в пространство функций состояния процессов. Таким образом формируются прямые и обратные связи между результатами измерений и результатами расчета функций состояния процессов. В результате решения такого комплекса задач получаются три пространства искомым функций. Это функции состояния моделей, сопряженные функции и функции неопределенностей моделей процессов. Такая организация при использовании методов расщепления и декомпозиции с технологией конечных элементов/ объемов позволяет построить прямые (без итераций) методы усвоения данных от различных систем мониторинга. Основные из них: это контактные *in situ* наблюдения метеорологических элементов и концентраций различных примесей; наблюдения параметров атмосферы и примесей в верхних слоях. Значительный объем информации обеспечивают также наземные системы дистанционного зондирования и соответствующие спутниковые системы зондирования. Исчерпывающий обзор этих систем можно найти в [4].

4. Об одном сценарии по исследованию Байкальского региона

Рассмотрим один из сценариев численного моделирования по исследованию влияния озера Байкал на гидрологический режим атмосферы окружающих территорий. Катастрофические явления в атмосфере и гидрологическом режиме Забайкалья становятся все более частыми в последнее время. Так, в июле 2018 года обильные дожди, прошедшие в регионе, стали причиной выхода рек из берегов. Подтоплено множество домов, размыты дороги, разрушены мосты. Эвакуировано более 2 тысяч человек. В некоторых районах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации.

Причиной этого и других подобных явлений может быть комбинированное воздействие Алтай-Саянского циклогенеза [3] и влияние озера Байкал на гидрологический цикл атмосферы. При прохождении над озером уже насыщенная влагой атмосфера получает дополнительный приток влаги, что повышает влагосодержание атмосферного воздуха выше уровня насыщения. Это может стимулировать выпадение обильных осадков и приводить к последующим критическим ситуациям.

На рис.1 представлен результат одного из сценарных расчетов такого явления, когда при прохождении над озером Байкал произошло дополнительное увлажнение воздушной массы.

Рис. 1. Увеличение относительной влажности атмосферы (%) за счет влияния озера Байкал как источника дополнительной влаги.

В этом сценарии реализованы упомянутые выше положения об учете глобальных атмосферных процессов по данным Реанализа. Расчеты выполнены на основе мезо-региональной модели ИВМиМГ СО РАН.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИВМиМГ СО РАН № 0315-2016-0004 при поддержке проекта РФФИ 17-01-00137 в части разработки методов реализации мезо-региональной модели и проекта РФФИ 17-29-05044 по исследованию процессов в Байкальском регионе.

Список литературы

1. Пененко В.В., Цветова Е.А., Пененко А.В. Методы совместного использования моделей и данных наблюдений в рамках вариационного подхода для прогнозирования погоды и качества состава атмосферы Метеорология и гидрология 2015 № 6 с. 13–24.
2. Пененко В.В., Пененко А.В., Цветова Е.А. Вариационный подход к исследованию процессов геофизической гидротермодинамики с усвоением данных наблюдений//Прикладная механика и техническая физика. 2017. Т. 58. № 5 (345). С. 17–25.
3. Chen S.-J., Kuo Y.-H., Zhang P.Z., Kuo Q.-F. Synoptic climatology of cyclogenesis over East Asia, 1958–1987 // Mon. Wea. Rev. 1991, v.199, p.1407–1418.
4. Seamless Prediction of the Earth System: from Minutes to Months, WMO-No.1156, 471 (2015).

MESO-REGIONAL ENVIRONMENTAL FORECASTING

V.V. Penenko

Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics SB RAS,
Novosibirsk State University, Novosibirsk
penenko@sscc.ru

Abstract. Here we present the methods of joint use of mathematical models of hydrothermodynamics and chemical processes with the assimilation of the available data of their monitoring for solving scientific and practical problems of environment of meso-regional scales.

The problems of studying climate and environmental processes in cities and industrial regions with regard to natural and anthropogenic impacts are discussed. The main goal is to develop methods and technologies of mathematical modeling to solve direct and inverse problems with the assessment of environmental prospects and risks focused on the subject of "Ecology of cities and regions of Siberia".

Actions of the phenomena of the meso-regional scale are implemented against the background of global processes, information about which is convenient to take into account using data assimilation methods.

The development of modeling methods and technologies takes into account that cities and industrial regions are influenced by the evolution of large-scale and long-term changes in the Earth system in combination with regional and local impacts.

Therefore, for environmental design tasks, focused on the future development of the community, the actions of background hydrometeorological processes, we propose to take into account based on long-term Reanalysis data using a special technique. For this purpose, spectral methods of decomposition with respect to scale of the processes of multidimensional data spaces of global and regional scale are developed. The spaces of the main factors with filtering the weather noise are calculated.

One of the scenarios of numerical simulation for the study of the influence of Lake Baikal on the hydrological regime of the atmosphere of the surrounding areas is presented.

Keywords: numerical modeling, environmental prediction, global and regional scales, variational approach, atmospheric processes, Lake Baikal region

References

1. Penenko V.V., Tsvetova E.A., Penenko A.V. Methods based on the joint use of models and observational data in the framework of variational approach to forecasting weather and atmospheric composition quality// RUSSIAN METEOROLOGY AND HYDROLOGY, Volume: 40, Issue: 6, Pages: 365–373.
2. Penenko V.V., Penenko A.V. & Tsvetova E.A. Variational approach to the study of processes of geophysical hydro-thermodynamics with assimilation of observation data// J Appl Mech Tech Phy (2017) 58: 771–778.
3. Chen S.-J., Kuo Y.-H., Zhang P.Z., Kuo Q.-F. Synoptic climatology of cyclogenesis over East Asia, 1958–1987 // Mon. Wea. Rev. 1991, v.199, p.1407–1418.
4. Seamless Prediction of the Earth System: from Minutes to Months, WMO-No.1156, 471 (2015).