ОТ СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ К «КАТАСТРОФЕ МОЗГА»: БИОМАРКЕРЫ В КАЧЕСТВЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПРЕДИКТОРОВ

Грудень М. А., Шерстнев В. В.

ФБГНУ «НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина», Москва,
Россия
mgruden@mail.ru

Гипертоническая болезнь (ГБ), и как ее следствие, нарушение мозгового кровообращения, которое может манифестировать как инсульт, представляют собой серьезную медицинскую проблему, связанную с инвалидизацией и смертью пациентов. При этом, по классификации ВОЗ как «выраженная» артериальная гипертония (САД - выше 180 мм рт. ст., а ДАД - 150 мм рт. ст.), так и «мягкая» гипертония (САД - от 140 до 180 мм рт. ст., ДАД - от 90 до 105 мм рт. ст.) могут выступать в качестве основных факторов риска развития инсульта. В действительности, осуществить прогнозирование течения гипертонии на ранних этапах (стадия предгипертонии) возможно с помощью молекулярно-диагностического подхода, использующего биомаркирование, включающее в себя систему молекулярных факторов, которые принимают участие в регуляции артериального давления (АД), а также маркеры, отражающие активность нервной и иммунной систем. Целью данного исследования явилось изучение динамики концентрации ключевых молекулярных маркеров, включая полипептиды ангиотензин II (AngII), эндотелин (ET) и VEGF (сосудистая система), а также белки S100b, S100A9 и HLF (нервная система) и уровня аутоантител к ним (иммунная система) в сыворотке крови пациентов на стадиях нормотонии, предгипертонии, гипертонии, а также ишемического инсульта, а также выявление взаимосвязей между ними и основными факторами риска ГБ. В исследование были включены равновозрастные группы мужчин и женщин: 110 пациентов с оптимальным АД ($\leq 120 / 80$ мм рт.ст.; $44,8 \pm 11,3$ года), 98 пациентов с предгипертензией (АД = $120-139 / 80-89$ мм рт.ст.; $45,5 \pm 10,2$ года), 95 пациентов с эссенциальной гипертонией (АД $> 140/90$ мм рт.ст.; $48,5 \pm 14,2$ года) и 45 человек с ишемическим инсультом ($51,2 \pm 11,3$ года). Проведены клинические, биохимические и иммунохимические наблюдения пациентов, метод ELISA с использованием оригинальных и коммерческих тест-систем был применен для определения концентраций биомаркеров и титров антител. Статистический анализ данных проводился с использованием программы «Statistika-7» с использованием непараметрических методов (критерий Манна-Уитни), а также был проведен корреляционный анализ показателей биомаркеров и факторов риска ГБ. Обнаружена повышенная концентрация в крови пациентов AngII, ET (в 2,4 раза), VEGF (в 2,7 раза), S100A9 (в 3,5 раза) с предгипертензией, а также с гипертензивной болезнью и инсультом по сравнению с индивидуумами с оптимальным АД. Кроме того, у пациентов с гипертонией и инсультом наблюдалась повышенная концентрация S100b (в 5,5 раз). Стадия предгипертонии характеризовалась специфическим паттерном аутоантител к биомаркерам, который был сопоставим с состояниями гипертонии и инсульта. Основные результаты исследования позволили прояснить конкретные взаимосвязи между концентрациями биомаркеров и уровнями их аутоантител на доклинических стадиях гипертонии. Высокие уровни биомаркеров в крови связаны с риском

хронически повышенного АД, повышенного уровня липидов, малоподвижного / интеллектуального образа жизни, наследственностью по сердечно-сосудистым и цереброваскулярным расстройствам.

Финансовая поддержка РФФИ (ОГН), грант N 17-06-00707

FROM VASCULAR DECLINE TO BRAIN CATASTROPHE: APPLICATION OF BIOMARKERS AS A MOLECULAR PREDICTORS

Gruden M. A., Sherstnev V. V.

**P. K. Anokhin Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
mgruden@mail.ru**

Hypertension and, as its consequence, impaired cerebral circulation, which can manifest as a stroke, is a serious medical problem related to the disability and death of patients. At the same time, according to the World Health Organization classification, marked arterial hypertension (SAD is higher than 180 mm Hg and DAD is 150 mm Hg.), but also so-called mild hypertension (SAD from 140 to 180 mm Hg., DAD - from 90 to 105 mm Hg.) can act as the main risk factors for the development of stroke. In reality, to predict the progress of hypertension at early stages (pre-hypertension) is achievable with a molecular diagnostic approach using a system of biomarkers which are involved in blood pressure (BP) regulation and also a paralleled neural modulation of immunity. Such a prediction may also be useful in developing novel antihypertensive therapeutic strategies. We focused on examining key molecular markers including the polypeptides angiotensin II (AngII), endothelin (ET) and VEGF (vascular system), as well as the proteins S100b, S100A9 and HLF (nervous system) in relation to their serum concentrations and autoantibody levels at stages of pre-hypertension, hypertension and ischemic stroke. Additionally the main interlinks between biomarker and lipid metabolic concentrations, along with risk factors of hypertension in patients with pre-hypertension, hypertension and stroke were compared with age matched controls. Equal age matched groups of men and women: 110 subjects with optimal BP ($\leq 120/80$ mmHg, 44.8 ± 11.3 years), 98 patients (45.5 ± 10.2 years) with pre-hypertension (BP=120-139/80-89 mmHg), 95 patients with essential hypertension (BP $>140/90$ mmHg) and 45 individuals of the same age after ischemic stroke were recruited into the study. Clinical, biochemical and immunochemical observations were performed and ELISA was used to determine the concentrations of biomarkers and their antibody titers. Statistical data analysis was carried out using the Statistika-7 program employing non-parametric methods (Mann-Whitney test) and correlative analysis was also performed. Elevated blood concentrations of AngII, ET (2,4-fold), VEGF (2.7-fold), S100A9 (3.5 fold) were detected in participants with pre-hypertension along with hypertensive and stroke conditions in comparison to individuals with optimal BP. Additionally, patients with hypertension and stroke displayed an increased concentration of S100b (5.5 fold). The pre-hypertension stage was characterized by a specific pattern of autoantibodies to the biomarkers

which was comparable to the hypertension and stroke states. The main outcomes of study served to clarify the specific relationships between biomarker concentrations and their autoantibody levels at the pre-clinical stages of hypertension and stroke. High blood levels of biomarkers are associated with a risk of chronically elevated BP, raised lipid level, sedentary/intellectual lifestyle rather than a more physical work/life balance and heredity of specific cardio- and cerebrovascular disorders.

Financial support from RF R (OGN), grant N 17-06-00707