Leiomiomatosis peritoneal diseminada. Reporte de dos casos y revisión de la bibliografía

Disseminated peritoneal leiomyomatosis. Report of two cases and review of the literature

Moisés Enrique Lázaro-Jarquín,¹ Ángel Fomperoza-Torres²

Resumen

ANTECEDENTES: La leiomiomatosis peritoneal diseminada es una enfermedad poco frecuente; se caracteriza por nódulos de músculo liso, fibroblásticos y miofibroblásticos en las superficies peritoneales submesoteliales, de aspecto histológico benigno. Puede originarse a partir de metaplasia de células mesenquimales multipotenciales submesoteliales.

CASOS CLÍNICOS: *Primer caso:* paciente femenina de 48 años, con antecedentes de dos nódulos en la mama derecha y BIRADS II por mastografía. En la exploración física se advirtió un tumor abdominal que ocupaba casi todo el abdomen y otro en la fosa iliaca izquierda, móvil; a la altura de la mama derecha se palparon dos nódulos, uno en torno al cuadrante superior externo de 4 cm de diámetro, no adherido a planos profundos y no doloroso y otro de menor tamaño en el cuadrante inferior externo. *Segundo caso:* paciente femenina de 57 años, con antecedentes de ooforectomía izquierda, cesárea y salpingoclasia. El padecimiento se inició con dolor persistente localizado en el epigastrio que, posteriormente, emigró a la parte inferior del abdomen. El hallazgo de la neoplasia fue fortuito luego de un cuadro de apendicitis aguda.

CONCLUSIONES: Lo poco frecuente de esta enfermedad y la similitud de su comportamiento con algunas enfermedades malignas dificulta establecer el diagnóstico correcto. Conocer la enfermedad, sus factores de riesgo y sus probables manifestaciones o complicaciones clínicas resulta de utilidad para tener en mente el probable diagnóstico de esa enfermedad y tratarla a tiempo. A pesar de catalogarse como una neoplasia benigna puede generar diversas complicaciones.

PALABRAS CLAVE: Leiomiomatosis peritoneal; enfermedad rara; nódulos musculares; metaplasia; neoplasia abdominal; factores de riesgo; carcinoma ductal.

Abstract

BACKGROUND: Disseminated peritoneal leiomyomatosis is a rare disease; It is characterized by smooth muscle nodules, fibroblastic and myofibroblastic nodules on submesothelial peritoneal surfaces, with a benign histological appearance. It can originate from metaplasia of submesothelial multipotential mesenchymal cells.

CLINICAL CASES: *First case:* female patient of 48 years, with a history of two nodules in the right breast and BIRADS II by mammography. The physical examination revealed an abdominal tumor that occupied almost the entire abdomen and another in the left iliac fossa, mobile; At the level of the right breast, two nodules were palpated, one around the external superior quadrant of 4 cm in diameter, not adhered to deep, non-painful planes and the other smaller in the lower external quadrant. *Second case:* female patient of 57 years, with a history of left oophorectomy, cesarean section and salpingoclasia. The condition began with persistent pain located in the epigastrium, which subsequently migrated to the lower abdomen. The finding of the neoplasm was fortuitous after a picture of acute appendicitis.

CONCLUSIONS: The infrequency of this disease and the similarity of its behavior with some malignant diseases makes it difficult to establish the correct diagnosis. Knowing the disease, its risk factors and its probable manifestations or clinical complications is useful to keep in mind the probable diagnosis of that disease and treat it in time. Despite being classified as a benign neoplasm can generate various complications.

KEYWORDS: Peritoneal leiomyomatosis; Rare disease; Smooth muscle; Metaplasia; Abdominal neoplasms; Risk factors; ductal carcinoma.

¹ Universidad Veracruzana, Facultad de Medicina, campus Minatitlán, Veracruz, México.

² Hospital Regional Minatitlán de Petróleos Mexicanos, Minatitlán, Veracruz, México.

Recibido: 2 de octubre 2018

Aceptado: 9 de enero 2019

Correspondencia

Moisés Enrique Lázaro-Jarquín
moises.elj@gmail.com

Este artículo debe citarse como

Lázaro-Jarquín ME, Fomperoza-Torres A. Leiomiomatosis peritoneal diseminada. Reporte de dos casos y revisión de la bibliografía. Patología Rev Latinoam. 2019;57:1-6.
<https://doi.org/10.24245/patrl.v57id.2553>

ANTECEDENTES

La leiomiomatosis peritoneal diseminada es una enfermedad de baja frecuencia, excepcional, que se caracteriza por la existencia de nódulos de músculo liso, fibroblásticos y miofibroblásticos en las superficies peritoneales submesoteliales, de aspecto histológico benigno. La describieron por primera vez Willson y Peale, en 1952. Posteriormente fue nombrada leiomiomatosis peritoneal diseminada por Taubert y su grupo.¹

En la actualidad existen alrededor de 150 casos registrados en la bibliografía;² sin embargo, la verdadera prevalencia del trastorno sigue siendo vaga porque la mayoría de los pacientes cursan asintomáticos, lo que condiciona que la leiomiomatosis peritoneal diseminada sea una variante infradiagnosticada.

El diagnóstico se fundamenta en los antecedentes personales y en estudios de imagen (ecografía y TC); el diagnóstico definitivo es histológico. Son importantes las técnicas de punción dirigida porque en algunos casos condicionan la conducta terapéutica.³

La aparición de un carcinoma en el seno de un fibroadenoma sucede en 0.2-2% de los mismos. La posible transformación maligna del fibroadenoma es un tema controvertido durante mucho tiempo. Al parecer, la frecuencia de aparición de un carcinoma en el interior de un fibroadenoma es la misma que en el tejido mamario normal; entonces, no se trataría de una transformación maligna de un fibroadenoma sino del desarrollo simultáneo de ambas lesiones.⁴

CASO CLÍNICO 1

Paciente femenina de 48 años, con antecedente de dos nódulos en la mama derecha, con BI-RADS II por mastografía, cuyos síntomas iniciales fueron: dolor en la articulación coxofemoral izquierda que limitaba la deambulaci3n. En la

exploraci3n f3sica se detect3 un tumor abdominal que ocupaba casi todo el abdomen y otro en la fosa il3aca izquierda, m3vil. A la altura de la mama derecha se palparon dos n3dulos: uno en torno al cuadrante superior externo, de 4 cm de diámetro, no adherido a planos profundos y no doloroso. El otro, de menor tamaño en el cuadrante inferior externo. En el tacto rectal se palp3 una masa extr3nseca, lisa, de la que se tom3 una biopsia por aspiraci3n con aguja fina de ambos n3dulos mamarios, que se report3 como carcinoma ductal infiltrante.

La biometr3a hemática report3: anemia normoc3tica con hemoglobina de 9.3 g/dL. El ultrasonido de útero mostr3 m3ltiples imágenes nodulares de aspecto s3lido, bien definidas. La radiograf3a AP y tomograf3a axial simple de pelvis revelaron una lesi3n osteol3tica en la regi3n superointerna del acetábulo izquierdo, y en la regi3n del trocánter mayor (**Figura 1**). En la tomograf3a abdominal se encontr3 un tumor aparentemente dependiente del útero de 20 X 26 cm, que ocupaba la cavidad abdominal y rechazaba las asas intestinales.

Figura 2

Figura 1. TC. Lesi3n osteol3tica en torno de la regi3n acetabular izquierda.

Figura 2. TC. Tumor aparentemente dependiente del útero, que abarca casi la totalidad del abdomen y rechaza las asas intestinales.

Figura 3. Carcinoma ductal infiltrante, sin patrón específico, en el seno de un fibroadenoma mamario.

Debido a la existencia de múltiples nódulos de menos de 1 cm se decidió la histerectomía con salpingooforectomía bilateral y omentectomía parcial. Se pensó en un tumor maligno primario abdominal pero la biopsia con aguja fina reportó carcinoma ductal infiltrante, por eso se optó por la tumorectomía de las lesiones mamarias.

Los dos tumores mamarios fueron carcinoma ductal infiltrante, sin patrón específico grado histológico III, asociado con fibroadenomas mamarios (**Figura 3**). Durante la laparotomía se retiró el útero, que pesó 3462 g, deformado por múltiples nódulos que sobresalían de la serosa, el de mayor tamaño se desprendía del polo superior, midió 22 x 17 x 9 cm, con un nódulo accesorio de 11 x 7 x 4 cm al corte, bien delimitado, de aspecto cerebroide con haces arremolinados. Al abrir el cuerpo uterino, el miometrio se observó trabeculado, de aspecto cavernoso, con múltiples miomas intramurales. En el microscopio se observaron constituidos por fibras musculares lisas, sin atipias nucleares correspondientes a leiomiomas. El segmento de epiplón de 22 x 11 x 4 cm con nódulos menores a 1 cm que al corte eran sólidos, bien

delimitados, blancos: desde el punto de vista microscópico también correspondieron a neoplasias benignas de músculo liso. **Figura 4**

El tratamiento indicado fue: tamoxifeno y, posteriormente, quimioterapia con doxorrubicina y ciclofosfamida; al momento de enviar a publicación este reporte cursaba el segundo ciclo.

Figura 4. Tumoraciones en el epiplón constituidas por fibras musculares lisas, sin atipias nucleares.

CASO CLÍNICO 2

Paciente femenina de 57 años, con antecedentes de ooforectomía izquierda, cesárea y salpingoclasia. El padecimiento se inició con dolor persistente, localizado en el epigastrio que, posteriormente, emigró al abdomen inferior. Al momento de la exploración estaba neurológicamente íntegra, sin afectación cardiopulmonar, con abdomen globoso a expensas del panículo adiposo; ligera resistencia muscular en torno de la fosa iliaca derecha, signo de rebote, psoas, obturador, Rovsing, Capurro y talopercusión positivos. Giordano bilateral negativo, los miembros pélvicos sin edema, pulsos de tono normal, sin datos de respuesta inflamatoria sistémica.

Los estudios de laboratorio reportaron: 21400 μ L de leucocitos, 18,800 μ L de neutrófilos, 1100 μ L de linfocitos, HGB 12.0 g/dL, HTO 35.2%, 48,6000 μ L de plaquetas, amilasa 44 U/L, electrolitos séricos normales, TP 15 seg, TPT 30 seg. La tomografía de abdomen mostró líquido en la fosa iliaca derecha y proceso inflamatorio sugente de apendicitis aguda, sin evidencia de aire libre; se programó y realizó la apendicetomía, que transcurrió con complicaciones.

Durante la laparotomía se encontraron: hernia interna por adherencias de epiplón al tumor parametrial y necrosis de 80 cm de intestino delgado, por eso se efectuó la resección de ese segmento y se colocó una ileostomía. El segmento de epiplón retirado, de superficie lobulada, amarilla, con una lesión nodular de superficie lobulada blanca se reportó como tumor parametrial que, al corte, su superficie era sólida, blanca, de aspecto arremolinado y consistencia ahulada, con zonas pétreas, que resultó en un leiomioma parcialmente calcificado, de 4 x 3 x 2 cm. **Figura 5**

La paciente se citó a los cuatro meses para efectuarle la anastomosis intestinal. En esa intervención se encontraron múltiples adherencias

y debilidad de la aponeurosis. Se realizó adherenciólisis y anastomosis yeyuno yeyunal lateral. El posoperatorio cursó con dehiscencia e infección de la herida quirúrgica, seroma, fuga de anastomosis, hemorragia, fístula intestinal, sepsis abdominal y choque. Luego de dos semanas de hospitalización la paciente entró en estado de choque séptico, ingresó al área de cuidados intensivos y, desafortunadamente, falleció por esa complicación.

Figura 5. Fotomicrografía de la lesión resecada donde se observa una neoplasia benigna de músculo liso, con haces cortos de células fusiformes y núcleos vesiculosos, sin atipia correspondiente a leiomioma en epiplón.

DISCUSIÓN

La etiología y fisiopatología de la leiomiomatosis peritoneal diseminada aún no está del todo clara; varios autores han propuesto diversas teorías; algunos sugieren que se origina a partir de una metaplasia de células mesenquimales multipotenciales submesoteliales.⁵ Otros afirman que el estímulo para inducir la diferenciación del músculo liso es hormonal, genético o ambos. Esta hipótesis es persuasiva porque la leiomiomatosis

peritoneal diseminada ocurre, principalmente, en mujeres de edad reproductiva; las pruebas arrojan resultados de inmunorreactividad positiva para receptores de estrógeno y progesterona en las células de músculo liso.⁶

Muchas pacientes embarazadas o que tomaban anticonceptivos orales, posmenopáusicas con terapia de reemplazo hormonal, con tumores secretores de estrógeno o que estuvieron bajo tratamiento con tamoxifeno tuvieron regresión espontánea de la leiomiomatosis peritoneal diseminada después de la interrupción de agentes hormonales. Esto sugiere que existe mayor sensibilidad a los estrógenos en las pacientes susceptibles.⁷ También está descrito que en pacientes postembolización arterial uterina,⁸ histerectomía y salpingooforectomía sucedió lo mismo. En las pacientes a quienes se practica histerectomía laparoscópica con morcelación tumoral puede aumentar la potencialidad de la implantación y diseminación tumoral.⁹ La leiomiomatosis peritoneal diseminada puede aparecer, incluso, años después de la miomectomía o histerectomía.¹⁰

De acuerdo con la teoría genética, con base en el análisis clonal, ciertos autores sugieren que la leiomiomatosis peritoneal diseminada es el resultado de la implantación y proliferación de tejido benigno de músculo liso o células que se originan de un mioma uterino.¹¹ Una anomalía en el cromosoma X y en otros cromosomas, incluidos los cromosomas 6, 8, 7, 12, 18 y 22, puede indicar una patogénesis común entre los miomas uterinos y la leiomiomatosis peritoneal diseminada.¹²

La mayoría de las pacientes cursa asintomática. Cuando hay síntomas estos suelen ser inespecíficos e incluyen: dolor abdominal, malestar o incomodidad, sangrado del recto o la vagina, distensión abdominal o masas abdominales que pueden conducir a obstrucción intestinal.¹ En raras ocasiones los síntomas de malignidad,

como ascitis e inflamación de los ganglios linfáticos, pueden aparecer al momento del diagnóstico.⁹ Se ha asociado con endometriosis;¹³ se ha documentado relación de la leiomiomatosis peritoneal diseminada con otros tipos de tumores benignos y malignos, como el caso del leiomioma ovárico¹⁴ o como en nuestra paciente que cursó con carcinoma ductal infiltrante, con metástasis al hueso.

La detección preoperatoria de una leiomiomatosis peritoneal diseminada con procedimientos de imágenes, como ultrasonido abdominal, tomografía computada o resonancia magnética puede ser de utilidad, pero no es de gran ayuda para el diagnóstico diferencial con lesiones malignas.

La biopsia preoperatoria y el análisis histopatológico son decisivos para el diagnóstico; solo el examen histológico puede permitir el diagnóstico diferencial entre una leiomiomatosis peritoneal diseminada y leiomiosarcomas uterinos debido a su excepcional parecido clínico. Desde la perspectiva microscópica la leiomiomatosis peritoneal diseminada se caracteriza, típicamente, por células de músculo liso dispuestas en fascículos interdigitantes, con o sin figuras mitóticas y carecen de polimorfismo nuclear, hiper cromasia, necrosis de células tumorales y atipia celular, a diferencia de un leiomiosarcoma.⁵ Solo algunos casos raros sugieren una posible degeneración maligna.^{15, 16} En contraste, el leiomiosarcoma exhibe atipia nuclear, alto índice mitótico, necrosis de células tumorales e invasión.¹⁷

CONCLUSIONES

Lo poco frecuente de esta enfermedad y la similitud de su comportamiento con algunas lesiones malignas dificulta su correcto diagnóstico y tratamiento. Como en el primer caso reportado, se pensaba en un tumor maligno peritoneal y se atribuía a la causa de la metástasis ósea en la articulación coxofemoral; el tumor maligno es un carcinoma ductal infiltrante en el interior de

un fibroadenoma mamario. En el segundo caso el hallazgo fue fortuito después de un cuadro de apendicitis aguda. El conocimiento de esta enfermedad, sus factores de riesgo y sus probables manifestaciones o complicaciones clínicas es útil para tener en mente el probable diagnóstico de esta enfermedad y tratarla a tiempo; a pesar de considerarse una neoplasia benigna puede generar diversas complicaciones, como en el segundo caso que generó adherencias o en la peor de las situaciones: sufrir una transformación maligna.

REFERENCIAS

1. Ferrario L, et al. Leiomyomatosis peritonealis disseminata: A case report of recurrent presentation and literature review. *Int J Surg Case Rep* 2018; 49:25-29. <https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2018.06.004>
2. Taubert HD, Wissner SE, Haskins AL. Leiomyomatosis peritonealis disseminata; an unusual complication of genital leiomyomata. *Obstet Gynecol*.1965; 25(4): 561-74
3. Xuechuan H, et al. Two cases of leiomyomatosis peritonealis disseminata and Review of the Literature. *Obstet Gynecol Int J* 2017;6(1):1-2. doi: 10.15406/ogij.2017.06.001924.
4. Moreno J, et al. Carcinoma intraductal en el interior de un fibroadenoma. *Clin Invest Gin Obst* 2002;29(2):72-74. [https://doi.org/10.1016/S0210-573X\(02\)77152-9](https://doi.org/10.1016/S0210-573X(02)77152-9)
5. Psathas G, et al. Leiomyomatosis peritonealis disseminata: A case report and meticulous review of the literature. *Int J Surg Case Rep* 2017; 40:105-8. <https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2017.09.016>
6. Yuri T, et al. Leiomyomatosis Peritonealis Disseminata Positive for Progesterone Receptor. *Am J Case Rep* 2015; 16:300-4. <http://dx.doi.org/10.12659/AJCR.893570>.
7. Wondimu-Gebresellassie H. Leiomyomatosis peritonealis disseminata in postmenopausal women: a case report with review of literature. *Int Med Case Rep J* 2016; 9:309-12.
8. Batton KA, et al. Disseminated Peritoneal Leiomyomatosis After Uterine Artery Embolization. *Cardiovasc Intervent Radiol* 2018; 1:1-4. <https://doi.org/10.1007/s00270-018-2044-7>.
9. Parmar J, et al. Diagnostic Dilemma of Recurrent Disseminated Peritoneal Leiomyomatosis with Hypertrophied Omental Vessels: Imaging and embolization of omental branches with positive outcome. *Case Rep Obstet Gynecol* 2017; 1:1-5. <http://dx.doi.org/10.1155/2017/8427240>.
10. Nappi L, et al. Leiomyomatosis Peritonealis Disseminata (LPD) ten years after laparoscopic myomectomy associated with ascites and lymph nodes enlargement: a case report. *Int J Surg Case Rep* 2016; 25:1-3. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijscr.2016.05.017>.
11. Wu CH, et al. Leiomyomatosis peritonealis disseminata: A case report and review of the literature. *Molec Clin Oncol* 2016;4:957-958. <http://dx.doi.org/10.3892/mco.2016.848>.
12. Wu YT, et al. A Novel Molecular Cytogenetic Finding of Leiomyomatosis Peritonealis Disseminata. *Gynecol Obstet Invest* 2016;81:186-92. <http://dx.doi.org/10.1159/000381262>.
13. Yang R, et al. Leiomyomatosis peritonealis disseminata associated with endometriosis: A case report and review of the literature. *Oncol Letters* 2015; 9:717-20. <https://doi.org/10.3892/ol.2014.2741>.
14. Khangar B, et al. Coexisting leiomyomata peritonealis disseminata and ovarian leiomyoma. *J Mid-life Health* 2017; 8:45-47. doi: 10.4103/jmh.JMH_96_16
15. Zyla MM, et al. Leiomyomatosis peritonealis disseminata of unusual course with malignant transformation: case report. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2015;94(1):220-23. <https://doi.org/10.1111/aogs.12549>
16. Syed M, et al. Imaging findings in a rare case of leiomyomatosis peritonealis disseminata with malignant transformation. *Pol J Radiol* 2017;82(1):426-30. doi: 10.12659/PJR.902242
17. Chiu HCH, et al. Epithelial-Mesenchymal Transition with Malignant Transformation Leading Multiple Metastasis from Disseminated Peritoneal Leiomyomatosis. *J Clin Med* 2018;7(207):1-10. doi: 10.3390/jcm7080207