Biopsia por aspiración con aguja delgada de tórax, experiencia en un hospital de tercer nivel del Noreste de México

Aspiration biopsy with thin needle of thorax, experience in a tertiary hospital of the Northeast of Mexico

Griselda Martínez-Salazar,¹ Nancy Elena Guzmán-Delgado,¹ Rosa María Mejía-Bañuelos,¹ Amalia Castro-Rodríguez,¹ Talina Rubí González-Rocha,¹ José Juan Treviño-González,² Jorge Luis Valdez-Báez,² Pilar Carranza-Rosales³

Resumen

OBJETIVO: Reportar la experiencia en el diagnóstico de la biopsia por aspiración con aguja fina guiada por fluoroscopia en lesiones de tórax en un hospital de tercer nivel del IMSS.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio observacional, descriptivo y transversal que incluyó a pacientes atendidas entre octubre de 2016 y septiembre de 2017 con lesiones de tórax a quienes se tomó una biopsia por aspiración con aguja delgada, guiadas por fluoroscopia. Parámetros de estudio: edad, sexo, topografía y diagnóstico citopatológico. Los datos se reportan en frecuencias y porcentajes.

RESULTADOS: Se analizaron 167 biopsias: 109 (65.3%) de hombres y 58 (34.7%) de mujeres; edad promedio del grupo de estudio, 61 años (límites 19 y 86). El 55.6% (93/167) de las muestras fueron adecuadas para diagnóstico. Distribución: 83.8% (78/93) pulmón, 10.7% (10/93) mediastino, 4.3% (4/93) pleura y 1.0% (1/93) de ganglio linfático. El 83.8% (78/93) fueron malignas y 16.1% (15/93) benignas. Los diagnósticos de las neoplasias malignas fueron 25 (26.8%) adenocarcinomas de pulmón, 16 (17.2%) carcinomas de células no pequeñas, 14 (15%) neoplasias metastásicas, 13 (13.9%) carcinomas epidermoides, 4 (4.3%) linfomas, 3 (3.2%) carcinomas neuroendocrinos y 3 (3.2%) mesoteliomas. Las neoplasias benignas fueron: 4 (4.3%) timomas, los 11 (11.8%) restantes correspondieron a procesos de tipo inflamatorio.

CONCLUSIONES: La toma de biopsia por aspiración con aguja fina de lesiones de tórax requiere la participación de un equipo multidisciplinario. Su gran utilidad es evidente cuando se cuenta con el material adecuado que permite establecer diagnósticos patológicos asertivos, rápidos y con bajo índice de complicaciones, que se reflejen no solo en la disminución de los costos de la atención médica sino también en tratamiento oportuno que, finalmente, ofrezca mayor supervivencia a los pacientes.

PALABRAS CLAVE: Biopsia por aspiración con aguja fina; fluoroscopia; mediastino; pleura; ganglio linfático; adenocarcinoma de pulmón; carcinoma de células no pequeñas; neoplasia metastásica; linfoma; carcinoma neuroendocrino.

Abstract

OBJECTIVE: To report the experience in the diagnosis of fine needle aspiration biopsy guided by fluoroscopy in thoracic lesions in a tertiary level hospital of the IMSS.

MATERIALS AND METHODS: Observational, descriptive and cross-sectional study that included patients treated between October 2016 and September 2017 with chest lesions who underwent a thin needle aspiration biopsy, guided by fluoroscopy. Study parameters: age, sex, topography and cytopathological diagnosis. The data is reported in frequencies and percentages.

RESULTS: 167 biopsies were analyzed: 109 (65.3%) of men and 58 (34.7%) of women; average age of the study group, 61 years (limits 19 and 86). 55.6% (93/167) of the samples were suitable for diagnosis. Distribution: 83.8% (78/93) lung, 10.7% (10/93) mediastinum, 4.3% (4/93) pleura and 1.0% (1/93) lymph node. 83.8% (78/93) were malignant and 16.1% (15/93) were benign. Diagnoses of malignant neoplasms were

¹ Departamento de Patología.

² Departamento de Neumología.

³ Centro de Investigación Biomédica del Noreste.

Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiología 34, Instituto Mexicano del Seguro Social, Monterrey, Nuevo León, México.

Recibido: 30 de noviembre 2018.

Aceptado: 21 de enero 2019.

Correspondencia

Griselda Martínez Salazar
grismtz@yahoo.com.mx

Este artículo debe citarse como

Martínez-Salazar G, Guzmán-Delgado NE, Mejía-Bañuelos RM, y col. Biopsia por aspiración con aguja delgada de tórax, experiencia en un hospital de tercer nivel del Noreste de México. Patología Rev Latinoam. 2019;57:1-6. <https://doi.org/10.24245/patrl.v57id.2707>

25 (26.8%) lung adenocarcinomas, 16 (17.2%) non-small cell carcinomas, 14 (15%) metastatic neoplasms, 13 (13.9%) epidermoid carcinomas, 4 (4.3%) lymphomas, 3 (3.2%) neuroendocrine carcinomas and 3 (3.2%) mesotheliomas. The benign neoplasms were: 4 (4.3%) thymomas, the remaining 11 (11.8%) corresponded to inflammatory processes.

CONCLUSIONS: A fine needle aspiration biopsy of chest lesions requires the participation of a multidisciplinary team. Its great utility is evident when it has the right material to establish assertive pathological diagnoses, fast and with a low rate of complications, which are reflected not only in the reduction of the costs of medical care but also in timely treatment that finally, offer greater survival to patients.

KEYWORDS: Fine needle aspiration biopsy; Fluoroscopy; Mediastinum; Pleura; Lymph node; Lung adenocarcinoma; Cell carcinoma; Lymphoma; Neuroendocrine carcinoma.

ANTECEDENTES

La biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF) de lesiones de tórax se utiliza desde finales del siglo pasado; Lopes Cardozo y Franzen son los precursores de esta técnica.¹ Es un método importante para obtener muestras de lesiones de tórax: patología pulmonar, mediastínica, pleural y de la caja torácica. Es de gran utilidad en la confirmación diagnóstica de tumores benignos, malignos y lesiones inflamatorias e infecciosas. En muchos centros se ha convertido en la primera acción que debe efectuarse en casos de opacidades pulmonares periféricas. Puede alcanzar una sensibilidad de 70 a 97%. Tiene pocas complicaciones y permite diagnosticar, en poco tiempo, un aspecto de suma importancia en el uso de tratamientos más efectivos.^{2,3}

El objetivo del este trabajo fue: reportar la experiencia en el diagnóstico de la biopsia por aspiración con aguja fina guiada por fluoroscopia en lesiones de tórax en un hospital de tercer nivel del IMSS.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio observacional, descriptivo y transversal que incluyó pacientes con lesiones de

tórax, atendidos entre octubre de 2016 y septiembre del 2017, a quienes se tomó biopsia por aspiración con aguja delgada, guiada por fluoroscopia. La toma de la biopsia estuvo a cargo de médicos neumólogos, quienes efectuaron el procedimiento con aguja de Shiva calibre 22 G. En cada proceso se obtuvieron 2 cc de material hemático, que se fijó en formol al 10%. Además, se hicieron extendidos en 6 laminillas y se fijaron con alcohol de 90 grados. Esos materiales se enviaron al Departamento de Anatomía Patológica, donde los coágulos se procesaron con la técnica histológica de rutina y los extendidos citológicos se tiñeron con técnica de Papanicolaou. A los coágulos se les aplicaron tinciones de inmunohistoquímica o histoquímica, según lo ameritaba el caso.

RESULTADOS

Se revisaron 167 biopsias de aspirado con aguja fina; 55.6% (93/167) fueron de material adecuado y suficiente para establecer el diagnóstico anatomopatológico. En el **Cuadro 1** se resumen las características de la población estudiada.

En virtud de la frecuencia y manifestación clínica se seleccionaron los siguientes casos para su revisión:

Cuadro 1. Características del grupo en el que se tomó la biopsia por aspiración con aguja delgada

Característica	n	%
Hombres	19	65.3
Mujeres	58	34.7
Edad		
Promedio	61 años	
Rango	19 a 86	
Topografía		
Pulmón	78	83.8
Mediastino	10	10.7
Pleura	4	4.3
Ganglio linfático	1	1.0
Malignos	78	83.8
Diagnóstico:		
Adenocarcinoma pulmonar	25	26.8
Carcinoma de células no pequeñas	16	17.2
Metástasis	14	15
Carcinoma epidermoide	13	13.9
Carcinoma neuroendocrino	3	3.2
Linfoma	4	4.3
Mesotelioma	3	3.2
Benignas	15	16.1
Timoma	4	4.3
Proceso inflamatorio	11	11.8

Caso 1. Paciente masculino de 45 años, consultor de informática. Etilismo positivo. Inició con fiebre sin predominio de horario y, posteriormente, tuvo un cuadro diarreico. El tórax se encontró simétrico, con movimientos de amplexión y amplexación conservados, sin integrarse síndrome

pleuropulmonar. En los estudios de imagen se detectó un tumor mediastinal y en los de laboratorio neutropenia severa; por eso se hospitalizó e inició el tratamiento.

Caso 2. Paciente femenina de 70 años, ama de casa. Exposición a biomasa. Tabaquismo durante 40 años a razón de 1 cigarrillo diario, IT:1. Taquiarritmia en tratamiento con metoprolol. Inició con disnea y tos seca, sin predominio de horario. Sin pérdida de peso, ni dolor pleurítico. En la exploración física se integró el diagnóstico de síndrome pleuropulmonar por derrame pleural de 40%.

Caso 3. Paciente masculino de 79 años, chofer de camión de carga. Tabaquismo intenso a razón de 1 cajetilla diaria durante 50 años. EPOC en tratamiento, dispepsia y gastritis crónica, en tratamiento médico. Inició con tos, dolor torácico de tipo pleurítico, astenia, adinamia y pérdida de 4 kg.

Caso 4. Paciente femenina de 47 años, ortodoncista. Citología cervicovaginal y mamografía un año antes sin alteraciones. Inició con tos seca, cefalea holocraneana de inicio súbito con dolor 8-9/10 en la escala visual análoga. Adenopatías en el cuello y la región axilar izquierda, hepatomegalia a 2 cm del borde costal.

Caso 1. A) Radiografía de tórax. Ensanchamiento mediastinal con radiopacidad redondeada de bordes regulares a nivel hilar derecho. **B)** TAC de tórax simple. En la parte anterior del mediastino se observa una imagen hipodensa, de bordes regulares, bien definida, heterogénea, de 65 x 92 mm, con densidad promedio de 34 UH. **C)** BAAF con tinción de H y E. Se observan células neoplásicas de tipo fusocelular, sin datos de atipia y entremezclados con población linfocítica. **D)** Tinción de inmunohistoquímica. Positividad en las células neoplásicas para citoqueratina 5/6.

Diagnóstico anatomopatológico: timoma. Inmunohistoquímica, positivo para CK5/6, CD3, CD4.

Caso 2. A) TAC con lesiones nodulares pleurales de 1.7 cm; áreas hipodensas compatibles con derrame pleural. **B)** Citología con tinción de PAP. Se observan nidos bidimensionales y células dispersas, poliédricas, con núcleo excéntrico, con evidencia de nucléolo, bordes nítidos. **C)** Nidos de células neoplásicas cohesivas, con formación de estructuras papilares, núcleos excéntricos con abundante citoplasma. **D)** Tinción de inmunohistoquímica. Calretinina positiva.

Diagnóstico anatomopatológico: mesotelioma. Inmunohistoquímica, positivo para mesotelina, calretinina y CK5/. Negativo para TTF-1.

Caso 3. A) TAC. Evidencia de lesión pulmonar, de bordes irregulares, en contacto con la pleura y centro cavitado. **B)** Citología, PAP. Conglomerados celulares con núcleos hiper cromáticos, en tinta china, con prolongaciones citoplásmicas y acidofilia. **C)** Grupos de células con núcleo hiper cromático, nucléolo ausente, citoplasma acidófilo y extensa necrosis. **D)** Tinción de inmunohistoquímica. CK5/6 positiva.

Diagnóstico anatomopatológico: carcinoma epidermoide. Inmunohistoquímica, positiva para P63, CK5/6. Negativa para CK7, TTF-1.

Caso 4: **A)** Radiografía de tórax posteroanterior con presencia de lesión radiopaca con centro radiolúcido de 35x34mm en región hiliar izquierda de bordes irregulares. **B)** BAAF: Grupos celulares cohesivos, laxos, con aspecto pseudopapilar, grupos con estructuras acinares. **C)** Tinción de Inmunohistoquímica: TTF-1 positivo. **D)** Tinción de Inmunohistoquímica. CK7 positiva.

Diagnóstico anatomopatológico: Adenocarcinoma pulmonar. Inmunohistoquímica, positiva para TTF-1, NAPSIN A, CK7. Negativo para CK5/6.

Caso 5. Paciente femenina de 65 años, empleada doméstica desde hacía 8 años. Tabaquismo, alcoholismo y toxicomanías negadas. Inició con disnea progresiva, tos productiva con expectoración hialina y hemoptoicos.

Caso 5. **A)** Radiografía de tórax posteroanterior, a la altura del parénquima se observa radiopacidad en la región basal interna derecha, que no forma signo de la silueta, redondeada, heterogénea, con calcificaciones en su interior, de 68 X 72 mm. **B)** BAAF. Grupos de células epiteliales cuboides, sin datos de atipia. **C Y E)** BAAF. Matriz condral, con condrocitos y áreas con matriz mixoide.

Diagnóstico anatomopatológico: hamartoma pulmonar.

DISCUSIÓN

La utilidad diagnóstica de la biopsia por aspiración con aguja fina en lesiones de tórax, sobre todo las de pulmón y mediastino, radica en la obtención de material adecuado que permita establecer diagnósticos sin tener que exponer a los pacientes a estudios más invasivos.⁴

Cuando la selección de los pacientes es óptima, con una integración de un equipo de trabajo conformado por radiólogos, neumólogos y patólogos pueden emitirse diagnósticos asertivos, rápidos y de bajo costo.

El procedimiento se relaciona con pocas complicaciones, la más común es el dolor localizado en el sitio de la punción y neumotórax. Al ser menos

invasivo hay menor índice de complicaciones quirúrgicas y puede determinarse un tratamiento más oportuno, que aumente la supervivencia y mejore la calidad de vida.

REFERENCIAS

1. De Gregorio Ariza MA. La biopsia torácica percutánea. Un procedimiento eficaz y seguro en el diagnóstico neumológico. Arch Bronconeumol 1991; 27:108-14. [https://doi.org/10.1016/S0300-2896\(15\)31520-9](https://doi.org/10.1016/S0300-2896(15)31520-9)
2. Pandey DK, et al. Role of fine-needle aspiration cytology in evaluating mediastinal masses. Lung India 2009; 26:114-16. Este artículo fue rechazado en PubMed en el 2011. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2876695/>
3. Dong Z, et al. The value of cell block based on fine needle aspiration for lung cancer diagnosis. J Thorac Dis. 2017; 9(8):2375-82. doi: 10.21037/jtd.2017.07.91
4. Ramakant D, et al. Diagnostic evaluation of mediastinal lesions: Analysis of 144 cases. Lung India 2017; 34:341-8. doi: 10.4103/lungindia.lungindia_311_16