Somogy nagylepke faunájának katalógusa (Lepidoptera: Macrolepidoptera)

ÁBRAHÁM LEVENTE ÉS UHERKOVICH ÁKOS

ÁBRAHÁM L. & UHERKOVICH Á.: *Checklist of butterflies and larger moths of Somogy county (Lepidoptera: Macrolepidoptera)*

Abstract: Based on the literature of butterfly and larger moth fauna, the authors comply the checklist of the fauna of Somogy county and present the short history of the investigations carried out in this field. In 46 papers, they found data proving the occurrence of 973 species of Bombycioidea, Sphingoidea, Papilionoidea, Geometroidea, Noctuoidea taxa. A complete checklist is published, as well, with the relevant literary references.

Bevezetés

A lepkék a rovarok osztályának egyik legnépesebb rendjét képviselik, hazánkban fajsza­muk eléri a 3500-at.

A lepkék vizsgálatával foglalkozó gyűjtők elsősorban a színpompás nappali lepkéket tanulmányozták, de ezek hazai fajsza­ma nem éri el a kétszázat. A nappali lepkéktől teljesen eltérő gyűjtési módszert igénylő éjszakai lepkék már jóval kevesebb kutató és amatőr gyűjtő érdeklődését keltették fel, emellett gyűjtésük is körülményesebb, ezért az elterjedési adataik száma is jelentősen elmarad a nappali lepkék ismertté vált lelőhelyeinek számától.

Kutatásuk során a lepkéket – gyakorlati okok miatt – *Microlepidoptera* („moly­lepkék”) és *Macrolepidoptera* („nagylepkék”) csoportokra osztották, amely első­sorban a testméretekben megmutatkozó különbségeket tükrözte vissza. Mai szisztematikai tudásunk alapján ez a felosztási alap egyáltalán nem tekinthető tudományosnak, hiszen nem tükrözi a rend evolúcióját. Ámbár az egyes csoportok eltérő gyűjtési és vizsgálati módszereiben – de ezen túl mégis legin­kább a hagyományok miatt – napjainkig visszatükröződik ez a mesterséges fel­osztás. A taxonok nagy száma miatt a lepidopterológus kutatók pedig ennek a két csoportnak a feldolgozására specializálódtak. Ez természetesen a tudomá­nyos közleményekben is megjelenik. A fent említett okok miatt Somogy me­gye faunakatalógusának összeállításánál is a hagyományokat követve a Lepidoptera rendet két tanulmányban, mint a Microlepidopterák és Macrolepidopterák (*Bombycoidea*, *Sphingoidea*, *Papilionoidea*, *Geometroidea*, *Noctuoidea*) faunakatalógusa tesszük közzé.

Jelen tanulmánykötet publikálásának alapgondolata, a Magyar Birodalom Állatvilága (Fauna Regni Hungariae) „A Magyar Birodalomból eddig ismert állatok rendszeres lajstroma” alcímet viselő kötet még napjainkban is aktuális célkitűzé­seit próbálja követni, azzal a megszorítással, hogy a kötet első megjelentetése óta a könyvtárnyi mennyiségűre duzzadt faunisztikai irodalmat ilyen formá­ban hazánk­ból összefoglalni már nehezen lehetne, ezért azt rendszerezve, re­víziózva hazánk csak egy kis területéről, Somogy megyéből ismertetjük. A

megjelentetés aktualitását a millenniumi évforduló inspirálta.

Somogy megye lepkefaunájáról az első írásos információt a Fauna Regni Hungariae-ből ismerjük (ABAFI et al. 1899). A szerzők a kötet lepkékkel foglalkozó fejezetében 6 „nagylepke” fajt említettek meg Somogy területéről: „*Lycaena alciphron* – Com. Somogy, *Marumba quercus* – Com Somogy, *Zanclognatha tarsipennalis* – Zákány, *Idea laevigata* – Somogy-Szob (ma: Somogyszob), *Stegania dilectaria* - Barcs, Drávafok (a II. világháború előtt még Somogy megyéhez tartozott), *Lithina chlorosata* (= *patraria*) – Zákány”.

Sajnos, nem tudjuk, hogy ezeket a példányokat ki gyűjtötte és több esetben a lelőhely pontos közigazgatási egységét sem ismerjük, de a *Lycaena alciphron*, *Marumba quercus* és az *Idaea laevigata* a kutatások mai szintje alapján is figyelemre méltó adatnak számít.

Miért nem szerepelt több adat e nagyszerű munkában Somogy területéről?

Erre a kérdésre a lepidopterológiai kutatások hazai történetének vázlatos áttekintése adhatja meg a választ.

A történelmi Magyarországon Somogy megye területe hazánkban elfoglalt földrajzi helyzete és felszíni tagoltsága miatt nem hívta fel magára a gyűjtők és kutatók figyelmét, és kutatások nélkül is sejteni lehetett, hogy a Kárpátok vagy a Tenger-mellék faunisztikai szempontból érdekesebbnek ígérkezett a gyűjtők számára. Társadalmi okai is lehetnek a kutatás hiányának, mivel a 20. század fordulóján Somogyban nem élt egy olyan polgári réteg, aki anyagilag megengedhette volna magának, hogy hobbiként a lepkék gyűjtésével, vizsgálatával foglalkozzék. A lepkegyűjtés mindig is az egyik legdrágább rovarkutatási tevékenység volt. Így ismereteink az I. világháborúig szinte alig gyarapodtak. A Fauna Regni Hungariae megjelenése után a megye lepkefaunájának kutatásáról először báró ROTHSCILD (1909) tudósít. A Rovartani Lapok hasábjain 29 nagylepke fajról számol be, amelyet Fonyódon és Siófokon fogott Holz Márton.

A Trianoni Békeszerződés után a megváltozott magyar államhatárok már nem, vagy csak kevésbé tették lehetővé a hazai kutatók számára, hogy immár a környező országok magashegységeiben vagy a közeli mediterrán vidékeken végezzenek gyűjtőmunkát, ezért a zoológiai kutatások figyelme elsősorban a hazai közpéhegyvidékek felé irányult.

Az I. világháború alatt a Trencsénből származó Pazsiczky család kaposvári letelepedése a somogyi megyeszékhely Lepidoptera faunájának kutatásában pozitív változást hozott.

Először a Felvidéken élő jelentős gyűjtő, kutató és publikáló tevékenységet is folytató Pazsiczky Jenőnek (1876-1919) jelent meg egy közleménye 1917-ben a Rovartani Lapokban egy Kaposváron fogott abberitív *Spilosoma menthastri*-ről (= *lubricipeda*). A szerző sajnos tragikus hirtelenséggel fiatalon hunyt el. Unokaöccse, Pazsiczky Sándor (1881-1955) rajz- és természetrajz tanár volt a kaposvári Somsich Gimnáziumban. Tudós-kutatótanári tevékenysége mellett festőművészként is ismertté vált. Az ő tevékenységével kezdődött el az a korszak, melynek nagyon aktív időszaka a 30-40-es évekre esett; és Kaposvár entomológiai körökben jól ismert lepidopterológiai centrummá vált. Gyűjteményét a Magyar Természettudományi Múzeum (Budapest) őrzi. Sajnos, kutatásait nem publikálta, csupán néhány rövidebb közleményt írt (PAZSICZKY S. 1942). Ma már kinyomozhatatlan, hogyan kerültek a Somogy Megyei Múzeum könyvtárba azok a Rovartani Lapok, amelyek között feltételezhetően az ő és unokabátyja kézírásának nyomai láthatók.

Tanár lévén tudását magas színvonalon adta tovább, hiszen egész lepkésztársaság tevékenykedett körülötte és gyűjtőtársai remek gyűjteményeket állíthat-

1. ábra: Ibolyás tűzlepke (*Lycaena alciphron*) hím példánya, védett boglárka lepke faj Fotó: Ábrahám L.

2. ábra: Magyar színjátszólepke (*Apatura metis*) folyómenti puhafaligeterdők védett faja Fotó: Ábrahám L.

3. ábra: Nagy éjjeli pávaszem (*Saturnia pyri*) hazánk legnagyobb termetű fokozatosan gyérülő példányszámú éjjeli lepkéje Fotó: Ábrahám L.

4. ábra: Belső-Somogy homokvidékének jellegzetes kora őszi faja a védett bucskabagoly lepke (*Staurophora celsia*) Fotó: Ábrahám L.

tak fel a II. világháború előtt. Sajnos a háború nemcsak a gyűjteményekben végzett óriási pusztítást, hanem személyi tragédiát is okozott. A két világháború között a legaktívabb három kaposvári lepkegyűjtő Karvajszy István (1871-1943), Háromy Aladár (1878-1946), Ház Antal (1917?-1944?) volt, tudjuk meg PAZSICZKY S. (1947) megemlékezéséből. Sajnos, 5-10 ezres gyűjteményük részben megsemmisült (Hortobágyi Béla szóbeli közlése). Szintén ekkor pusztult el Hortobágyi Béla kb. 7 ezres rovargyűjteménye is; bár természet szeretetét megőrizte, de gyűjteményét egészségi állapota miatt nem állíthatta fel ismét.

A II. világháború előtt Somogy megye területét, különösen a Kis-Balatont, mivel azt zoológiai körökben ismert madár-paradicsomként tartották számon - több külföldi, elsősorban német gyűjtő kereste fel. Hazánkban először ekkor fogták itt az *Arytrura musculus*-t., amely azóta is nagy ritkaságnak számít. A Somogyban folyó intenzív gyűjtőmunka ellenére sajnos mégis nagyon kevés publikált adattal rendelkezünk a két világháború közötti időszakból (SZENT-IVÁNY 1938).

A II. világháború utáni időszak lepidopterológiai kutatásai, különösen Kaposvár környékének faunafeltárása Nattán Miklós (1910-1970) nevéhez fűződik. Mintegy 40 évi gyűjtőmunka során rendkívül értékes anyagot hagyott hátra, melyet halála után a pécsi Janus Pannonius Múzeum megvásárolt. Ebben több mint 17 ezer Macrolepidoptera példány található, amelyeket főleg Kaposvár környékén gyűjtött (Ábrahám 1990).

Nattán Miklós gyűjtőtevékenysége jelentősen kiszélesítette a Dél-Dunántúlról alkotott korabeli állatföldrajzi ismereteinket. Gyűjteményének adatait először KOVÁCS (1953, 1956) nagyszerű, a hazai nagylepke fauna elterjedéséről írt dolgozataiban publikálta, melyet újabb, hasonló témájú kiegészítő dolgozatok követtek (KOVÁCS 1954, 1955, 1957, 1958).

Nattán Miklós mellett egy fiatalabb lepkész generáció is tevékenykedett, akik elsősorban nappali lepkéket gyűjtöttek, tagjai voltak: Novacsek Péter (1937-2001), Kapussy László (gyűjteménye megsemmisült), Z. Horváth József (saját gyűjteménye jelenleg nincs).

A Somogy megyei Lepidoptera fauna kutatásának minőségileg egészen új átlomását jelentette az 1976-tól a Barcsi Borókásban tervszerűen megindult faunafeltárás (UHERKOVICH 1978c).

Ezzel párhuzamosan különösen a Balaton déli partvidéke csábított több lepidopterológus kutatót, ahol számottevő faunisztikai adatot gyűjtöttek össze (RÉZBÁNYAI 1972, BUSCHMANN 1985). A hazai faunát feldolgozó munkákban a megye területét is érintő információkra bukkanhatunk (GOZMÁNY 1968, 1970, FAZEKAS 1977, 1980, GYULAI P. et al. 1974, GYULAI I. et al. 1979, VOJNITS 1976, 1980).

Somogy megye Macrolepidoptera faunájának kutatásában azonban a legaktívabb szerepet Uherkovich Ákos munkássága jelenti (UHERKOVICH 1975, 1976a,b, 1978a,b,c,d, 1979, 1980a,b, 1981a,b,c 1983, 1984a,b, UHERKOVICH és ÁBRAHÁM 1995). Jól dokumentált vizsgálatainak hatalmas információtömeget hordoznak, munkássága eredményeképpen a Janus Pannonius Múzeum természetudományi gyűjteménye több tízezer nagylepke példányt őriz Somogy megye területéről. Ezek a kutatások a Barcsi Borókásban több mint egy évtizedig folytak, s ugyancsak hosszú évekig vizsgálta a Zselic nagylepkéit. Jelentős adatsort nyert Komlósd környékéről is, majd a somogyi Dráva mente nagylepkéit vizsgálta intenzíven, mintegy hat éven át Ábrahám Leventével. Belső-Somogy egyéb területein is vizsgálódott (Baláta-tó, Hedrehely, Mike stb.). Kutatásai és aktív kutatásszervező tevékenysége hozzájárult ahhoz, hogy a Drá-

va mentén több területet – elsősorban a Duna–Dráva Nemzeti Park területét – védetté nyilvánítsák.

1985-től kezdve a Somogy Megyei Múzeum Természettudományi Osztályának létrejöttével a megye faunájának kutatásában, így a lepidopterológiai vizsgálatokban is jelentős előrelépés történt, ugyanis a múzeum gyűjteményében ma már közel harmincezer nagylepke példány származik a Somogy megyei faunafeltáró kutatások bizonyító példányaiból (ÁBRAHÁM 1992a,b, 1998, ÁBRAHÁM és UHERKOVICH 1994, 1998).

A lepkék vizsgálata iránti érdeklődés ma sem csökkent Kaposvárott. Nagyon sok tehetséges iskolás diák érdeklődik komolyan a rovarok, elsősorban a nap-pali lepkék iránt. Többen az iskolapadból kikerülve is megőrizték érdeklődésüket, és ma is folytatnak gyűjtő tevékenységet. Feltétlenül meg kell említenünk Kollár Tamás nevét, aki több évig eredményesen gyűjtött a Zarányi-erdőben (Kaposvár). Kaposvárott ma a legnagyobb magángyűjteménnyel (3000 példány) Orsik Mihály rendelkezik, aki elsősorban Töröcske (Kaposvár-hoz tartozó település) faunáját vizsgálja és nevéhez fűződik az *Autographa bractea* és a *Aedias leucomelas* első somogyi példányainak megtalálása. Barcson a Drávavölgye középiskolában Malgay Viktor középiskolai tanár (erdész) vizsgálja a helyi lepkefaunát diákjaival. Középrigócon rendszeresen üzemeltetnek fénycsapdát és az iskolában nagyon komoly rovargyűjteményt, köztük lepkegyűjteményt állítottak fel.

Az elmúlt évtizedek során a megye több tájegységéről – elsősorban azokról, ahol a nagyobb természetvédelmi területek találhatók – rengeteg információ gyűlt össze: a Barcsi Borókás TK, a Duna–Dráva Nemzeti Park Dráva menti területei, a Zselici TK, a Boronka-melléki TK és a Látrány-puszta TT. Azonban szinte alig vannak adatok Külső-Somogyból.

Somogy megye teljes Macrolepidoptera faunájának mikrotaxonómiai, faunisztikai, állatföldrajzi, ökológiai és természetvédelmi feltárása és értékelése a következő kutatási évek, évtizedek feladata lesz, s ehhez talán a most összegzett faunalista összeállításával épp az első lépést tettük meg.

Somogyból ismert fajok jegyzéke

A fajlistában használt nevezéktan KARSHOLT & RAZOWSKI (1996) munkája alapján készült. A listában használt rövidítések:

- Abafi-Aigner 1899 - A 1899
 Abafi-Aigner 1917 - A 1917
 Ábrahám 1990 - Á 1990
 Ábrahám 1992a - Á 1992a
 Ábrahám 1992b - Á 1992b
 Ábrahám 1998 - Á 1998
 Ábrahám 1998-99 - Á 1998-99
 Ábrahám, Uherkovich 1994 - Á-U 1994
 Ábrahám, Uherkovich 1998 - Á-U 1998
 Buschmann 1985 - B 1985
 Fazekas 1977 - F 1977
 Gyulai I. et al. 1979 - GyI et al 1979
 Gyulai P. et al. 1974 - GyP et al 1974
 Kovács 1953 - K 1953
 Kovács 1954 - K 1954
 Kovács 1955 - K 1955
 Kovács 1956 - K 1956
 Kovács 1957 - K 1957
 Kovács 1958 - K 1958
 Kovács 1973 - K 1973
 Pazsiczky J 1916 - PJ 1916
 Pazsiczky S 1942 - PS 1942
 Rézbányai 1972 - Ré 1972
 Rotschild 1909 - Ro 1909
 Szent-Ivány 1938 - Sz 1938
 Thúröczy 1983-1984 - T 1983-1984
 Uherkovich 1975 - U 1975
 Uherkovich 1976a - U 1976a
 Uherkovich 1976b - U 1976b
 Uherkovich 1978a - U 1978a
 Uherkovich 1978b - U 1978b
 Uherkovich 1978c - U 1978c
 Uherkovich 1979 - U 1979
 Uherkovich 1980a - U 1980a
 Uherkovich 1980b - U 1980b
 Uherkovich 1981a - U 1981a
 Uherkovich 1981b - U 1981b
 Uherkovich 1981c - U 1981c
 Uherkovich 1983 - U 1983
 Uherkovich 1984a - U 1984a
 Uherkovich 1984b - U 1984b
 Uherkovich 1985 - U 1985
 Uherkovich, Ábrahám 1995 - U-Á 1995
 Varga 1981 - V. 1981
 Vojnits 1976 - V 1976
 Z. Horváth 1999 - H 1999

Lasiocampidae

Poecilocampinae

Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1981a; U 1981c;

Lasiocampinae

Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1978b; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Eriogaster rimicola (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1981a; U 1981c;

Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; U 1981a; U 1981c;

Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Lasiocampa (= *Pachygastris*) *trifolii* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a;

U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Macrotylacia rubi (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758) - K 1953; Téves határozás! Nincs példány.

Phyllodesma tremulifolia (Hübner, 1810) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U

1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Gastropacha populifolia (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Odonestis pruni (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Endromidae

Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Gyl et al 1979; GyP et al 1974; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U 1984a; U 1984b; U-Á 1995;

Saturniidae

Agliinae

Aglia tau (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1981a; U 1981c;

Saturniinae

Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Saturnia (=Eudia) pavonia (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Saturnia spini (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994;

Antheraea yamamai (Guérin-Méneville, 1861) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; GyP et al 1974; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U 1984b; U-Á 1995;

Lemoniidae

Lemonia dumi (Linnaeus, 1761) - Á 1992b; Á-U 1994; K 1953;

Lemonia taraxaci (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953;

Sphingidae

Smerinthinae

Marumba quercus (Denis & Schiffermüller, 1775) - A 1899; Á 1990; Á-U 1994; K 1953; K 1956; Ré 1972;

Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Laothoe populi (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Sphinginae

Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1979; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; PS 1942; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Sphinx ligustri Linnaeus, 1758; Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1979; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Macroglossinae

Hemaris tityus (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953;

Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758) - Á-U 1994; K 1953;

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) - Á-U 1994; K 1953;

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; Gyl et al 1979; K 1953; U 1976a; U

1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Hyles (=Celeiro) euphorbiae (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; PS 1942; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Hyles (=Celerio) galii (Rottemburg, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953;

Hyles (=Celerio) livornica (Esper, 1779) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1978a; U 1978c; U 1979; U 1981c; U-Á 1995;

Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Hesperiidae

Pyrginae

Erynnis tages (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Carcharodus alceae (Esper, 1780) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Carcharodus lavatherae (Esper, 1783) - Ré 1972;

Carcharodus floccifera (Zeller, 1847) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972;

Spialia orbifer (Hübner, 1823) - Á 1990;

Pyrgus carthami (Hübner, 1813) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; Ro 1909; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Pyrgus serratulae (Rambur, 1839) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972;

Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U-Á 1995;

Pyrgus alveus (Hübner, 1803) - A 1917; K 1953;

Heteropterinae

Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; PS 1942; Ré 1972; U 1976a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Hesperiinae

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1978c; U-Á 1995;

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) (=flavus) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Hesperia comma (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Ochlodes venata (Bremer & Grey, 1853) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Papilionidae

Parnassiinae

Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; Ré 1972; U-Á 1995;

Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a;

Papilioninae

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Papilio machaon Linnaeus, 1758; Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Pieridae

Dismorphiinae

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á 1998; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Leptidea reali Reissinger, 1989; Ábrahám 1999; Á-U 1998;

Leptidea morsei Fenton, 1881; Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1981a; U 1981c;

Pierinae

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U-Á 1995;

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Pieris napi (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Pontia edusa (Fabricius, 1777) (= *daphidice*) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Coliadinae

Colias erate (Esper, 1805) - Á 1992a; Á-U 1998;

Colias croceus (Fourcroy, 1785) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; Ro 1909; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Colias myrmidone (Esper, 1780) - K 1953

Colias chrysotheme (Esper, 1781) - Ré 1972;

Colias hyale (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Colias alfaciensis Ribbe, 1905 (= *australis*, Vrtý.) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; Ré 1972; U 1978a; U 1981c; U-Á 1995;

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; PS 1942; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Lycaenidae**Riodininae**

Hainearis lucina (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Lycaeninae

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) - Á 1990;

Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Lycaena dispar (Haworth, 1802) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) - Á-U 1994; K 1953;

Lycaena tityrus (Poda, 1761) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) - A 1899; K 1953;

Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; PS 1942; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U-Á 1995;

Lycaena thersamon (Esper, 1784) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972;

Thecla betulae (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972;

Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1981a; U 1981c;

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978c; U-Á 1995;

Satyrrium w-album (Knoch, 1782) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; PS 1942; Ré 1972;

Satyrrium pruni (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972;

Satyrrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775; Á 1992a; Á-U 1994; PS 1942;

Satyrrium ilicis (Esper, 1779) - Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Satyrrium acaciae (Fabricius, 1787) - Á 1990;

Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953;

Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767) - (= *Syntarocus telicanus*) - K 1953;

Cupido minimus (Fuessly, 1775) - Á-U 1994; K 1953; Ré 1972;

Cupido argiades (Pallas, 1771) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Cupido decolorata (Staudinger, 1886) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1981a; U 1981c;

Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U 1984b; U-Á 1995;

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Pseudophilotes (= *Lycaena*) *vicrama* (Moore, 1865) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Scolitantides orion (Pallas, 1771) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1981c; U-Á 1995;

Glaucopteryx alexis (Poda, 1761) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972;

Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816) - Ré 1972;

Maculinea arion (Linnaeus, 1758) - K 1953;

Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1998; B 1985; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1981c; U-Á 1995;

Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779) (= *arcas*) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; B 1985; GyI et al 1979; K 1956; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U-Á 1995;

Maculinea alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994;

Plebeius argus (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Plebeius idas (Linnaeus, 1761) - B 1985; K 1953;

Plebeius argyrognomon (Bergsträsser, 1779) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U-Á 1995;

Polyommatus semiargus (Rottemburg, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978b; U-Á 1995;

Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; Ré 1972;

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; PS 1942; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Polyommatus daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *meleager*) Á 1990; Á-U 1994; K 1953;

Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972;

Polyommatus coridon (Poda, 1761) - Á 1990; K 1953; Ré 1972;

Nymphalidae

Libytheinae

Libythea celtis (Laicharting, 1782) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; K 1955;

Heliconiinae

Agyrnys paphia (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; PS 1942; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972;

Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972;

Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *berecynthia*) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; Ro 1909; U 1976a; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; PS 1942; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1981c;

Boloria (= *Clossiana*) *selene* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; PS 1942; U 1976a; U 1976b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Boloria (= *Clossiana*) *dia* (Linnaeus, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Nymphalinae

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U-Á 1995;

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; PS 1942; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1979; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Inachis io (Linnaeus, 1758) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; PS 1942; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Polygona c-album (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; PS 1942; Ré 1972; Ro 1909; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; Ro 1909; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; H 1999; K 1953; PS 1942; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; H 1999; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; H 1999; K 1953;

Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *l-album*) - Á 1990; Á-U 1994; H 1999; K 1953;

Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; PS 1942; U 1981c; U-Á 1995;

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) - coll: SMM;

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; PS 1942; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Melitaea trivia (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1998; K 1953; PS 1942; Ré 1972; U 1976b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Melitaea didyma (Esper, 1778) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Melitaea diamina (Lang, 1789) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; PS 1942; U 1981c; U-Á 1995;

Melitaea aurelia Nickerl, 1850; Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; K 1953;

Melitaea britomartis Assmann, 1847; Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972;

U 1976a; U 1978c; U-Á 1995;

Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; PS 1942; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Limenitinae

Neptis sappho (Pallas, 1771) (= *aceris*) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Neptis rivularis (Scopoli, 1763) (= *lucilla*) - Á-U 1994; Gyl et al 1979; K 1953; U 1976a; U 1978c; U-Á 1995;

Apaturinae

Apatura metis Freyer, 1829; Á-U 1998; U-Á 1995;

Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1975; U 1976a; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Apatura iris (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953;

Satyrinae

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; Ro 1909; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Lopinga achine (Scopoli, 1763) - Á-U 1994; K 1953; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) (= *iphis*, Denis & Schiffermüller) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; Ro 1909; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758); Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; Ro 1909; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978c; U-Á 1995;

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Minois dryas (Scopoli, 1763) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; Ro 1909; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972;

Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) - Á-U 1994; K 1953; Ré 1972;

Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775) - K 1953; Ré 1972; Ro 1909;

Brintesia circe (Fabricius, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Chazara briseis (Linnaeus, 1764) - K 1953; Ré 1972;

Drepanidae

Thyatirinae

Thyatira batis (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Tethea ocularis (Linnaeus, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Tethea or (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Tethea fluctuosa (Hübner, 1803) - Á 1992a; Á-U 1994; GyI et al 1979; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1978c; U 1984a; U 1984b; U-Á 1995;

Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U 1984a; U-Á 1995;

Cymatophorima (= *Polyplocia*) *diluta* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1978a; U 1981a; U 1981c; U 1983;

Polyplocia ridens (Fabricius, 1787) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Asphalia (= *Polyplocia*) *ruficollis* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1978a; U 1981a; U 1981c;

Achlya (= *Polyplocia*) *flavicornis* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; GyI et al 1979; K 1953; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U 1984a; U-Á 1995;

Drepaninae

Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U 1983; U 1984a; U-Á 1995;

Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1981a; U 1981c;

Drepana curvatula (Borkhausen, 1790) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Drepana falcataria (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Sabra harpagula (Esper, 1786) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Cilix glaucata (Scopoli, 1763) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Geometridae

Archiearinae

Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; GyI et al 1979; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978c; U 1984a; U-Á 1995;

Archiearis notha (Hübner, 1803) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; U 1981a; U 1981c;

Archiearis puella (Esper, 1787) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953;

Ennominae

Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; PS 1942; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Calospilos sylvata (Scopoli, 1763) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Stegania (= *Lomographa*) *cararia* (Hübner, 1790) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U 1984b; U-Á 1995;

Stegania (= *Lomographa*) *dilectaria* (Hübner, 1790) - A 1899; Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Heliomata (= *Semiothisa*) *glarearia* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Macaria (= *Semiothisa*) *notata* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Macaria (= *Semiothisa*) *alternata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Macaria (= *Semiothisa*) *liturata* (Clerck, 1759) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1980a; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Macaria wauaria (Linnaeus, 1758) - Á-U 1994;

Macaria artesiaria (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953;

Chiasmia (= *Semiothisa*) *clathrata* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Narraga fasciolaria (Hufnagel, 1767) - K 1953;

Tephрина murinaria (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U-Á 1995;

Tephрина arenacearia (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Cepphis advenaria (Hübner, 1790) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U-Á 1995;

Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763) - A 1899; Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Pachycnemia hippocastanaria (Hübner, 1799) - K 1958;

Opisthographis luteolata (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983;

Epione repandaria (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Therapis flavicaria (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; PS 1942; Ré 1972; U 1976a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Eilicrinia cordiaria (Hübner, 1790) - Á 1990; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972;

Eilicrinia trinotata (Metzner, 1845) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; K 1956; Ré 1972;

Hypoxystis pluviana (Fabricius, 1787) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978b; U-Á 1995;

Apeira syringaria (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U 1983;

Ennomos erosaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *tiliaria*) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Ennomos quercaria (Hübner, 1813) - Á-U 1994; Á-U 1998;

Selenia dentaria (Fabricius, 1775) (= *bilinaria*) Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Selenia lunularia (Hübner, 1788) (= *lunaria*) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Artiora evonymaria (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Crocallis tusciaria (Bokhausen, 1793) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; Ré 1972;

Crocallis elinguarina (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Oourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Colotois pennaria (Linnaeus, 1761) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Angerona prunaria (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Apocheima (= *Phigalia*) *pilosaria* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *pedaria*) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Lycia hirtaria (Clerck, 1759) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Lycia (= *Nyssia*) *zonaria* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1978b; U-Á 1995;

Lycia pomonaria (Hübner, 1790) - Á 1992a; Á-U 1994; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Biston strataria (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Biston betularia (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; PS 1942; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Agriopis (= *Erannis*) *leucophaearia* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á

1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Agriopis (=Erannis) *bajaria* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Agriopis (=Erannis) *aurantiaria* (Hübner, 1799) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Agriopis (=Erannis) *marginaria* (Fabricius, 1776) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Erannis defoliaria (Clerck, 1759) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Synopsis sociaria (Hübner, 1799) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Paraboarmia viertlii (Bohatsch, 1883) - Ré 1972;

Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Cleora cinctaria (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Alcis repandata (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1981a; U 1981c;

Hypomecis (=Boarmia) *roboraria* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Hypomecis (=Boarmia) *punctinalis* (Scopoli, 1763) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Hypomecis (=Boarmia) *danieli* (Wehrli, 1932) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; U 1981c; U-Á 1995;

Fagivorina arenaria (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; K 1956; Ré 1972; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Ascotis selenaria (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; Ro 1909; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775) (=bistortata) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Paradarisa consonaria (Hübner, 1799) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; K 1958; U 1981a; U 1981c;

Parectropis (=Ectropis) *similaria* (Hufnagel, 1767) (=extersaria) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983;

Aethalura punctulata (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U 1984a; U-Á 1995;

Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Tephronia sepiaria (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1981c; U-Á 1995;

Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Lomographa (=Bapta) *bimaculata* (Fabricius, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Lomographa (=Bapta) *temerata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á

1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Theria rupicaprararia (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Campaea margaritata (Linnaeus, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1978c; U 1980a; U 1981a; U 1981c; Uherkovich 1984; U-Á 1995;

Gnophos fuvrata (Denis & Schiffermüller, 1775) - U 1978b; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Odontognophos dumetata (Treitschke, 1827) - K 1953; U 1978b;

Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1978b;

Siona lineata (Scopoli, 1763) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Chariaspilates formosaria (Eversmann, 1837) - K 1953; Sz 1938; U 1978b; V 1976

Aspilates gilvaria (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á-U 1998; K 1953; U 1978b; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Perconia strigillaria (Hübner, 1787) - Á-U 1994; U 1978b; U 1981a; U 1981c;

Oenochrominae

Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Alsophila aceraria (Denis & Schiffermüller, 1775) (=quadripunctaria) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Geometrinae

Aplasta ononaria (Fuessly, 1783) - U 1978b; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Geometra (=Hipparchus) *papilionaria* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b;

Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U 1984a; U-Á 1995;

Comibaena bajularia (Denis & Schiffermüller 1775) (=pustulata) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Antnechloris smaragdaria Fabricius, 1787) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; Ro 1909; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Hemithea aestivaria (Hübner, 1789) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; Ro 1909; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Chlorissa cloraria (Hübner, 1813) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1981c; U-Á 1995;

Chlorissa etruscaria (Zeller, 1849) (=pulmentaria) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978b;

Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Jodis lactearia (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Sterrhinae

Cyclophora (=Ephyra) *pendularia* (Clerck, 1759) (=orbicularia) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Cyclophora albiocellaria (Hübner, 1789) - Á 1990; K 1953; K 1956; Ré 1972; U 1978b;

Cyclophora annularia (Fabricius, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Cyclophora pupillaria (Hübner, 1799) - K 1953; U 1978b; U 1979;

Cyclophora ruficiliaria (Herrich-Schäffer, 1855) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Cyclophora porata (Linnaeus, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Cyclophora subpunctaria (Zeller, 1847) - Ré 1972; U 1978b;

Cyclophora linearia (Hübner, 1799) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Timandra (= *Calothyranis*) *comae* A. Schmidt, 1931 (= *amata*) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; Ro 1909; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Scopula immorata (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Scopula corrivalaria (Kretschmar, 1862) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; Ro 1909; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Scopula caricaria (Reutti, 1853) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K

1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Scopula umbelaria (Hübner, 1813) - Á 1992a; U 1978b;

Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Scopula virgulata (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Scopula ornata (Scopoli, 1763) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Scopula decorata (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; K 1953; U 1978b;

Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Scopula marginipunctata (Goeze, 1781) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1978a; U 1978b; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Scopula incanata (Linnaeus, 1758) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Scopula immutata (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Scopula flaccidaria (Zeller, 1852) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ro 1909; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Scopula floslactata (Haworth, 1809) - Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1978b; U-Á 1995;

Idaea (= *Sterrhia*) *rufaria* (Hübner, 1799) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Idaea (= *Sterrhia*) *ochrata* (Scopoli, 1763) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; Ro 1909; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Idaea (= *Sterrrha*) *serpentata* (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Idaea (= *Sterrrha*) *aureolaria* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á-U 1994; K 1953; U 1978b;

Idaea (= *Sterrrha*) *muricata* (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Idaea (= *Sterrrha*) *rusticata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981b; U 1983; U-Á 1995;

Idaea (= *Sterrrha*) *filicata* (Hübner, 1799) - Á 1992a; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b;

Idaea (= *Sterrrha*) *laevigata* (Scopoli, 1763) - A 1899; Á 1990; B 1985; K 1953; Ré 1972; U 1978b;

Idaea (= *Sterrrha*) *moniliata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Idaea (= *Sterrrha*) *sylvestraria* (Hübner, 1799) - Á 1990; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Idaea (= *Sterrrha*) *biselata* (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Idaea (= *Sterrrha*) *inquinata* (Scopoli, 1763) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; U 1978b;

Idaea (= *Sterrrha*) *dilutaria* (Hübner, 1799) - Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1978b;

Idaea (= *Sterrrha*) *fuscovenosa* (Goeze, 1781) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Idaea (= *Sterrrha*) *humiliata* (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U-Á 1995;

Idaea (= *Sterrrha*) *politaria* (Hübner, 1799) - Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Idaea (= *Sterrrha*) *seriata* (Schrank, 1802) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978b; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Idaea (= *Sterrrha*) *dimidiata* (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; Ro 1909; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Idaea (= *Sterrrha*) *subsericeata* (Haworth, 1809) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Idaea (= *Sterrrha*) *pallidata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; U 1978b;

Idaea (= *Sterrrha*) *trigeminata* (Haworth, 1809) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1978b; U-Á 1995;

Idaea (= *Sterrrha*) *nitidata* (Herrich-Schäffer, 1861) - U 1976a; U 1978b; U 1978c; U-Á 1995;

Idaea (= *Sterrrha*) *emarginata* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Idaea (= *Sterrrha*) *aversata* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Idaea (= *Sterrrha*) *rubraria* (Staudinger, 1901) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; U 1978b; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Idaea (= *Sterrrha*) *degeneraria* (Hübner, 1799) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Idaea (= *Sterrrha*) *straminata* (Borkhausen, 1794) (= *inornata*, Haworth) - Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Idaea (= *Sterrrha*) *deversaria* (Herrich-Schäffer, 1847) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1978b;

Larentiinae

Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767) (= *purpurata*) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U-Á 1995;

Cataclysmes rigata (Hübner, 1813) - Ré 1972; U 1978b;

Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b;

Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763) - Ré 1972; U 1978b;

Scotopteryx bipunctaria (Denis & Schiffermüller, 1775) - K 1953; U 1978b;

Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1978b; U 1981a; U 1981c;

Scotopteryx (= *Ortholita*) *mucronata* (Scopoli, 1763) - Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1978b;

Scotopteryx (= *Ortholita*) *luridata* (Hufnagel, 1767) (= *plumbaria*) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1998; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Orthonama (= *Cidaria*) *vittata* (Borkhausen, 1794) (= *lignata*) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Orthonama obstipata (Fabricius, 1794) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1978c; U 1979; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Xanthorhoe birivata (Borkhausen, 1794) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981b; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U-Á 1995;

Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984;

U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Xanthorhoe quadrifasciata (Clerck, 1759) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978b; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Catarhoe (= *Euphyia*) *rubidata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Catarhoe (= *Euphyia*) *cululata* (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Epirrhoe hastulata (Hübner, 1790) - Á 1992b; Á-U 1994; U 1978b;

Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Epirrhoe alternata (Müller, 1764) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Epirrhoe rivata (Hübner, 1813) - Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1978a; U 1978b; U 1981a; U 1981c;

Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794; Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Larentia clavaria (Haworth, 1809) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; U 1978b; U 1981c; U 1983; U 1984b; U-Á 1995;

Anticlea (= *Larentia*) *badiata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á-U 1994; K 1953; K

- 1956; Ré 1972; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Articlea derivata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1978b;
- Mesoleuca albicillata* (Linnaeus, 1758) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Pelurga comitata* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; Ro 1909; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Lampropteryx suffumata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1978b; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Cosmorhoe* (=Larentia) *ocellata* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Eulithis testata* (Linnaeus, 1761.) - Á 1990; K 1956; K 1958; U 1978b;
- Eulithis mellinata* (Fabricius, 1787) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; T 1983-1984; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U 1984b; U-Á 1995;
- Eulithis* (=Lygris) *pyraliata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Ecliptopera silaceata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Ecliptopera capitata* (Herrich-Schäffer, 1839) - Á 1990; Á-U 1994; U 1978b; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
- Chloroclysta siterata* (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981b; U 1981c;
- Cidaria fulvata* (Forster, 1771) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1978b; U 1981a; U 1981c;
- Plemyria* (=Larentia) *rubiginata* (Denis & Schiffermüller, 1775) (=bicolorata) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U 1984a; U-Á 1995;
- Pennithera firmata* (Hübner, 1822) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1980a; U 1981c; U-Á 1995;
- Thera obeliscata* (Hübner, 1787) - Á 1992a; Á-U 1994; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1980a; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Thera variata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; T 1983-1984; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1980a; U-Á 1995;
- Thera vetustata* (Denis & Schiffermüller, 1775) (=stragulata) - Gyl et al 1979; U 1978c; U 1980a;
- Thera juniperata* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1980a; U-Á 1995;
- Electrophaes corylata* (Thunberg, 1792) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Colostygia pectinataria* (Knoch, 1781) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Hydriomena furcata* (Thunberg, 1784) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; U 1978b; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
- Hydriomena impluviata* (Denis & Schiffermüller, 1775) (=coerulata) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U 1984a; U-Á 1995;
- Horisme vitalbata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1978b; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Horisme corticata* (Treitschke, 1835) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;
- Horisme tersata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Melanthia procellata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

- Pareulype berberata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U-Á 1995;
- Rheumaptera* (= *Calocalpe*) *cervinalis* (Scopoli, 1763) - Á 1990; Á-U 1994; T 1983-1984; U 1978b;
- Rheumaptera undulata* (Linnaeus, 1758) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; GyI et al 1979; U 1978a; U 1978b; U 1981a; U 1981c; U 1984a; U 1984b;
- Triphosa dubitata* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;
- Philereme vetulata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
- Philereme transversata* (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
- Euphyia* (= *Larentia*) *biangulata* (Haworth, 1809) (= *picata*) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Euphyia unangulata* (Haworth, 1809) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Epirrita* (= *Oporina*) *dilutata* (Denis & Schiffermüller, 1775; Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
- Epirrita christyi* (Allen, 1906) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1978b; U 1981a; U 1981c;
- Epirrita autumnata* (Borkhausen, 1794) - U 1976a; U 1978c; U 1980a; U 1984a; U 1984b; U-Á 1995;
- Operophtera brumata* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Operophtera fagata* (Scharfenberg, 1805) - Á-U 1998; U 1978b;
- Perizoma alchemillata* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Perizoma hydrata* (Treitschke, 1829) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Perizoma lugdunaria* (Herrich-Schäffer, 1855) - Á 1992b; Ré 1972; T 1983-1984; U 1978a; U 1978b; U 1981a;
- Perizoma bifaciata* (Haworth, 1809) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1978a; U 1978b; U 1981b; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Perizoma flavofasciata* (Thunberg, 1792) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Perizoma* (= *Coenotephira*) *sagittata* (Fabricius, 1787) - Á 1992a; Á-U 1994; U 1978b; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
- Perizoma parallelolineata* (Retzius, 1783) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; U 1978b;
- Eupithecia tenuiata* (Hübner, 1813) - Á 1990; Á-U 1994; F 1977; K 1953; U 1978b;
- Eupithecia inturbata* (Hübner, 1817) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; U 1978b; U 1981a; U 1981c; U 1985; U-Á 1995;
- Eupithecia haworthiata* Doubleday, 1856; Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; F 1977; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;
- Eupithecia plumbeolata* (Haworth, 1809) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; F 1977; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U-Á 1995;
- Eupithecia abietaria* (Goeze, 1781) (= *pini*) - Á-U 1998; U 1978b;
- Eupithecia liniata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; F 1977; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
- Eupithecia pulchellata* (Stephens, 1831) - F 1977; K 1953; U 1981c;
- Eupithecia pyreneata* Mabilie, 1871; Á 1990; Á-U 1994; U 1978b;
- Eupithecia laquaearia* Herrich-Schäffer, 1848; Á-U 1994; F 1977; K 1953; U 1978b; U-Á 1995;
- Eupithecia insigniata* (Hübner, 1790) - Á 1990; Á-U 1994; F 1977; K 1953; U 1978b;
- Eupithecia valerianata* (Hübner, 1813) - F 1977; K 1953; U 1978b;
- Eupithecia pygmaeata* (Hübner, 1799) (= *palustraria*) - Á 1990; Á-U 1994; F 1977;

- Eupithecia venosata* (Fabricius, 1787) - Á 1990; Á-U 1994; F 1977; K 1953; Ré 1972; U 1978b;
- Eupithecia silenicolata* Mabilles, 1867; F 1977; K 1953; U 1978b;
- Eupithecia centaureata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; F 1977; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U-Á 1995;
- Eupithecia gueneata* Milliere, 1862; Á 1990; Á-U 1994; F 1977; U 1978b;
- Eupithecia breviculata* (Donzel, 1837) - F 1977; Ré 1972; U 1978b;
- Eupithecia selinata* Herrich-Schäffer, 1861; Á 1990; Á-U 1994; F 1977; K 1953; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
- Eupithecia trisignaria* Herrich-Schäffer, 1848; F 1977; U 1978b;
- Eupithecia intricata* (Zetterstedt, 1839) - Á 1990; Á-U 1994; F 1977; Gyl et al 1979; K 1957; U 1978b; U 1978c; U 1980a; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;
- Eupithecia veratraria* Herrich-Schäffer, 1850; F 1977; U 1978b;
- Eupithecia absinthiata* (Clerck, 1759) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; F 1977; K 1953; K 1956; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
- Eupithecia catharinae* Vojnits, 1969; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; F 1977; Ré 1972; U 1978b; U 1981a;
- Eupithecia assimilata* Doubleday, 1856; Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; F 1977; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
- Eupithecia vulgata* (Haworth, 1809) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; F 1977; K 1953; Ré 1972; U 1978b; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;
- Eupithecia tripunctaria* Herrich-Schäffer, 1852; Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; F 1977; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
- Eupithecia denotata* (Hübner, 1813) - Á 1992b; Á-U 1994; F 1977; K 1953; U 1978b; U 1981a;
- Eupithecia subfuscata* (Haworth, 1809) (=castigata) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; F 1977; K 1953; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
- Eupithecia icterata* (Villers, 1789) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; F 1977; K 1953; Ré 1972; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Eupithecia succenturiata* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; F 1977; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Eupithecia orphnata* W. Petersen, 1909; U 1978b; U 1978c; U-Á 1995;
- Eupithecia semigraphata* Bruand, 1850; Á-U 1994; F 1977; K 1953; U 1978b;
- Eupithecia millefoliata* Rössler, 1866; Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; F 1977; K 1953; Ré 1972; U 1978b; U 1981a; U 1981c; U 1985; U-Á 1995;
- Eupithecia wettsteini* Vojnits, 1974; F 1977; U 1978b;
- Eupithecia simplicata* (Haworth, 1809) (=subnotata) - Á 1990; Á-U 1994; F 1977; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984;
- Eupithecia gemellata* Herrich-Schäffer, 1861; F 1977; U 1978b;
- Eupithecia graphata* (Treitschke, 1828) - F 1977; Ré 1972; U 1978b;
- Eupithecia indigata* (Hübner, 1813) - Á-U 1994; F 1977; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1980a; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
- Eupithecia pimpinellata* (Hübner, 1813) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; F 1977; Ré 1972; U 1978b;
- Eupithecia nanata* (Hübner, 1813) - F 1977; U 1978b; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;
- Eupithecia innotata* (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
- Eupithecia ochridata* Schütze & Pinker, 1968; F 1977; U 1976b; U 1978b;
- Eupithecia virgaureata* Doubleday, 1861; Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; F 1977; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
- Eupithecia abbreviata* Stephens, 1831; Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; F 1977; Gyl et al 1974; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
- Eupithecia dodoneata* Guenée, 1857; Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; F 1977; K 1953; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
- Eupithecia* (=Tephroclystia) pusillata (Denis & Schiffermüller, 1775) (=sobrinata) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1998; F 1977; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1980a; U-Á 1995;

- Eupithecia ericeata* (Rambur, 1833) - Á 1990; Á-U 1994; F 1977; K 1953; K 1958; U 1978b;
- Eupithecia lanceata* (Hübner, 1825) - U 1978b; U 1985; U-Á 1995;
- Eupithecia lariciata* (Freyer, 1841) - F 1977; Gyl et al 1979; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1980a; U-Á 1995;
- Eupithecia tantillaria* Boisduval, 1840; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; U 1978b; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;
- Gymnoscelis rufifasciata* (Haworth, 1809) (= *pumilata*) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; F 1977; K 1953; Ré 1972; U 1978b; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Chloroclystis v-ata* (Haworth, 1809) (= *coronata*) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; F 1977; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Rhinoprora* (= *Calliclystis*) *rectangulata* (Linnaeus, 1758) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; F 1977; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
- Rhinoprora chloerata* (Mabille, 1870) - Á-U 1998; F 1977; U 1978b; U 1985; U-Á 1995;
- Rhinoprora debiliata* (Hübner, 1817) - U 1978b; U 1981c;
- Anticollix sparsata* (Treitschke, 1828) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; F 1977; K 1953; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
- Aplocera* (= *Anaitis*) *plagiata* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; Ro 1909; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Aplocera* (= *Anaitis*) *efformata* (Guenée, 1857) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Lithostege griseata* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *asinata*) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; K 1956; Ré 1972; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;
- Lithostege farinata* (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
- Euchoeca nebulata* (Scopoli, 1763) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U 1984a; U-Á 1995;
- Asthena albulata* (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Asthena anseraria* (Herrich-Schäffer, 1855) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
- Hydrelia flammeolaria* (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1984a; U-Á 1995;
- Hydrelia sylvata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - U 1978b; U 1984a;
- Minoa murinata* (Scopoli, 1763) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
- Lobophora halterata* (Hufnagel, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
- Trichopteryx polycommata* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
- Trichopteryx carpinata* (Borkhausen, 1794) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;
- Pterapherapteryx sexalata* (Retzius, 1783) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Acasis viretata* (Hübner, 1799) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; Gyl et al 1979; K 1953; K 1958; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;
- Notodontidae**
- Thaumetopoeinae**
- Thaumetopoea processionea* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
- Pygaerinae**
- Clostera curtula* (Linnaeus, 1758) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Clostera pigra (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1992a; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1983; U-Á 1995;

Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Notodontinae

Cerura vinula (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Cerura erminea (Esper, 1783) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Furcula (= *Cerura*) *furcula* (Clerck, 1759) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1984a; U 1984b; U-Á 1995;

Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; Gyl et al 1979; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Furcula bifida (Brahm, 1787) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Dicranura ulmi (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; T 1983-1984; U 1978a; U 1981c;

Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Notodonta tritophus (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *phoebe*) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b;

U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *trimacula*) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766) (= *chaonia*) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Drymonia obliterata (Esper, 1785) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1981a; U 1981c; U 1985; U-Á 1995;

Drymonia querna (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Drymonia velitaris (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; U 1976a; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Pheosia tremula (Clerck, 1759) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Pheosia gnoma (Fabricius, 1776) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; Gyl et al 1979; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U 1983; U 1984a; U 1984b; U-Á 1995;

Pterostoma (= *Euchila*) *palpina* (Clerck, 1759) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; Ro 1909; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Ptilophora plumigera (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á-U 1998; U 1981b; U 1981c; U 1984a; U 1984b; U-Á 1995;

Ptilodon (= *Lophopteryx*) *capucina* (Linnaeus, 1758) (= *camellina*) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Ptilodon (= *Lophopteryx*) *cucullina* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *cuculla*) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a;

U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;
Gluphisia crenata (Esper, 1785) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Phalerinae

Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Phalera bucephaloides (Ochsenheimer, 1810) - Á 1990; K 1953; Ré 1972;

Peridea anceps (Goeze, 1781) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Heterocampinae

Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Spatalia argentina (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Noctuidae

Acronictinae

Oxicesta geographica (Fabricius, 1787) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972;

Moma alpium (Osbeck, 1778) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Acronicta (=Apatete) *alni* (Linnaeus, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; GyP et al 1974; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U 1983; U 1984a; U 1984b; U-Á 1995;

Acronicta (=Apatete) *cuspis* (Hübner, 1813) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; GyP et al 1974; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U 1984a; U-Á 1995;

Acronicta (=Apatete) *tridens* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Acronicta (=Apatete) *psi* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Acronicta (=Apatete) *aceris* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Acronicta (=Apatete) *leporina* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U 1983; U 1984a; U-Á 1995;

Acronicta (=Apatete) *megacephala* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Acronicta (=Apatete) *strigosa* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1998; GyP et al 1979; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981b; U 1981c; U 1983; U 1984b; U-Á 1995;

Acronicta (=Apatete) *auricoma* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Acronicta (=Apatete) *euphorbiae* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1978c; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Acronicta (=Apatete) *rumicis* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Simyra nervosa (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978c; U-Á 1995;

Simyra albovenosa (Goeze, 1781) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1973; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Bryophilinae

Cryphia receptricula (Hübner, 1803) (= *Bryophila strigula*) - U 1983;

Cryphia fraudatricula (Hübner, 1803) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Cryphia algae (Fabricius, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Cryphia raptricula (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1981c; U-Á 1995;

Hermiiniinae

Idia (= *Epizeuxis*) *calvaria* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1978b; U-Á 1995;

Simplicia rectalis (Eversmann, 1842) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Paracolax tristalis (Fabricius, 1794) (= *derivalis*) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Macrochilo (= *Herminia*) *cribrumalis* (Hübner, 1793) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Herminia grisealis (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *nemoralis*) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Herminia tenuialis (Rebel, 1899) - GyP et al 1974; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1978c; U 1981b; U 1981c; U 1983; U 1984b; U-Á 1995;

Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Polypogon gryphalis (Herrich-Schäffer, 1851) - Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; GyI et al 1979; GyP et al 1974; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U 1983; U 1984b; U-Á 1995;

Pechipogo (= *Herminia*) *strigilata* (Linnaeus, 1758) (= *barbalis*) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Zanclognatha zellerialis (Wocke, 1850) - Á 1990; *Zanclognatha* (= *Herminia*) *tarsipennalis* Treitschke, 1835; Á 1899; Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Strepsimaninae

Hypenodes (= *Schrankia*) *humidialis* Doubleday, 1850 (= *turfosalis*) - Á 1990; K 1953; K 1958;

Schrankia (= *Hypenodes*) *costaestrigalis* (Stephens, 1834) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Schrankia (= *Hypenodes*) *taenialis* (Hübner, 1809) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; U 1981b; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Catocalinae

Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1978a; U 1981c;

Catocala dilecta (Hübner, 1808) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953;

Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; U 1978a; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Catocala nupta (Linnaeus, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Catocala elocata (Esper, 1787) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1981c; U-Á 1995;

Catocala puerpera (Giorna, 1791) - Á 1990; K 1953; Ré 1972;

Catocala promissa (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1978a; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Catocala electa (Vieweg, 1790) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Catocala nymphagoga (Esper, 1787) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1978a; U 1978b; U 1981a; U 1981c;

Catocala hymenaea (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972;

Catocala (= *Ephesia*) *fulminea* (Scopoli, 1763) (= *paranympha*) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Minucia lunaris (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Dysgonia algira (Linnaeus, 1767) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; U 1979;

Prodotis (= *Grammodes*) *stolida* (Fabricius, 1775) - Á 1990; Á-U 1994;

Lygephila lusoria (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972;

Lygephila pastinum (Treitschke, 1826) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Lygephila cracca (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1978a; U 1981a; U 1981c;

Lygephila (= *Toxocampa*) *procax* (Hübner, 1813) (= *limosa*) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; K 1956; Ré 1972;

Catephia alchymista (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; U 1978a; U 1978b; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Aedia funesta (Esper, 1786) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758) - coll: SMM

Tyta (= *Tarache*) *luctuosa* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Callistege mi (Clerck, 1759) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; U 1976b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Arytrura musculus (Ménétriés, 1859) - K 1953;

Calpiniae

Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; U 1976a; U 1978c; U-Á 1995;

Hypeninae

Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Hypena rostralis (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Phytometra viridaria (Clerck, 1759) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Rivula sericealis (Scopoli, 1763) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Colobochyla salicalis (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Euteliinae

Eutelia adalatrix (Hübner, 1813) - Ré 1972;

Plusiinae

Euchalcia modestoides Poole, 1989 (=modesta) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953;

Euchalcia consona (Fabricius, 1787) - Á 1990; Á-U 1994;

Lamprotes c-aureum (Knoch, 1781) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Gyl et al 1979; K 1953; U 1976a; U 1978b; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Diachrysia chrysis (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Diachrysia nadeja (Oberthür, 1880) - U 1981b; U 1981c; U 1984b; U-Á 1995; V 1981;

Diachrysia zosimi (Hübner, 1822) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U-Á 1995;

Diachrysia chryson (Esper, 1789) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Gyp et al 1974; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1981a; U 1981c; U 1984b; U-Á 1995;

Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; PS 1942; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1979; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Plusia festucae (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Autographa gamma (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1979; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Autographa bractea (Denis & Schiffermüller, 1775) - coll: SMM

Autographa pulchrina (Haworth, 1809) (=c-aureum) - U 1981a; U 1981c; U 1984b;

Autographa jota (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1981a; U 1981c;

Trichoplusia ni (Hübner, 1803) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953;

Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789) - Á 1990; Á-U 1994; U 1979;

Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c;

U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Acontiinae

Emmelia trabealis (Scopoli, 1763) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Acontia (=Tarache) *lucida* (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Eustrotiinae

Protodeltote (=Jaspidia) *pygarga* (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Deltote (=Jaspidia) *deceptor* (Scopoli, 1763) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1978c; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Deltote (=Jaspidia) *uncula* (Clerck, 1759) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Deltote (=Jaspidia) *bankiana* (Fabricius, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Pseudeustrotia (=Deltote) *candidula* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Odice arcuinna (Hübner, 1790) - K 1953;
Calymma communimacula (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972;

Eublemma (=Porphyria) *minutata* (Fabricius, 1794) (=noctualis) - Á 1990; K 1953;

Eublemma ostrina (Hübner, 1808) - U 1978c; U 1979; U 1981c; U-Á 1995;

Eublemma parva (Hübner, 1808) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; K 1958;

Eublemma (= *Thalpocharis*) *purpurina* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Metachrostis dardouini (Boisduval, 1840) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953;

Trisateles emortualis (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Cuculiinae

Cucullia scopariae Dorfmeister, 1853; Á 1990; B 1985; K 1953; K 1958;

Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837; Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; U 1978a; U 1981a; U 1981c;

Cucullia argentea (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972;

Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1978a; U 1981a;

Cucullia lactucae (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1978a; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; Ro 1909; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Cucullia tanacetii (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á-U 1994; K 1953;

Shargacucullia scrophulariae (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Shargacucullia blattariae (Esper, 1790) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953;

Shargacucullia thapsiphaga (Treitschke, 1826) - Á 1990; K 1953;

Shargacucullia verbasci (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972;

Shargacucullia prenanthis (Boisduval, 1840) - Á 1990; Á-U 1994;

Calophasia lunula (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Calophasia opalina (Esper, 1793) (= *casta*) - K 1953; Ré 1972;

Amphipyridae

Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Amphipyra berbera Rungs, 1949; Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Ré 1972;

Amphipyra livida (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Psaphidinae

Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Lamprosticta culta (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á-U 1994; K 1953;

Dilobinae

Diloba (= *Episema*) *caeruleocephala* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Stiriinae

Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1978a; U 1981a; U 1981c; U 1985; U-Á 1995;

Aegle kaekeritziana (Hübner, 1799) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; K 1956; Ré 1972;

Heliothinae

Schinia cardui (Hübner, 1790) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953;

Schinia cognata (Freyer, 1833) - K 1953;

Schinia scutosa (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978c; U 1979; U-Á 1995;

Heliothis (=Chloridea) *viriplaca* (Hufnagel, 1766) (=dipsacea) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Heliothis maritima Graslin, 1855; Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Heliothis ononis (Denis & Schiffermüller, 1775) - K 1953;

Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1978c; U 1979; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Heliothis nubigera Herrich-Schäffer, 1851; Á-U 1998;

Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) - Á 1992a; Á-U 1994; U 1978a; U 1979; U 1981c;

Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972;

Hadeninae

Elaphria (=Agrotis) *venustula* (Hübner, 1790) - Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Acosmetia caliginosa (Hübner, 1813) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; K 1956; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Platyperigaea (=Caradrina) *kadenii* (Freyer, 1836) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Paradrina (=Caradrina) *clavipalpis* (Scopoli, 1763) (=quadripunctata) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Hoplodrina (=Caradrina) *octogenaria* (Goeze, 1781) (=alsines) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; Ro 1909; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Hoplodrina superstes (Ochsenheimer, 1816) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953;

Hoplodrina respersa (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1992b; Á-U 1994; Ré 1972;

Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Charanyca (=Meristis) *trigrammica* (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Atypha pulmonaris (Esper, 1790) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Spodoptera exigua (Hübner, 1808) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1978c; U 1979; U 1981c; U-Á 1995;

Chilodes maritima (Tauscher, 1806) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Athetis gluteosa (Treitschke, 1835) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Athetis furvula (Hübner, 1808) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978b; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Athetis pallustris (Hübner, 1808) - Á 1992b; *Proxenus lepigone* (Möschler, 1860) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; Ro 1909; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b;

U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Rusina ferruginea (Esper, 1785) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Mormo maura (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á-U 1994;

Polyphaenis sericata (Esper, 1787) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Thalophila matura (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1979; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Auchmis detersa (Esper, 1787) - Á-U 1994; Ré 1972;

Actinotia polyodon (Clerck, 1759) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Actinotia radiosa (Esper, 1804) - Á 1990; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Chloantha hyperici (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978c; U-Á 1995;

Calloptistria juvenina (Stoll, 1782 ??) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1978c; U 1983; U-Á 1995;

Eucarta amethystina (Hübner, 1803) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U 1984b; U-Á 1995;

Eucarta virgo (Treitschke, 1835) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K

1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978c; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Parastichtis suspecta (Hübner, 1817) - Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Parastichtis (= *Sidemia*) *ypsillon* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978b; U 1985; U-Á 1995;

Mesogona acetosellae (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Mesogona oxalina (Hübner, 1803) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767) - Á 1992a;

Cosmia affinis (Linnaeus, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Cosmia pyralina (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Atethmia centrargo (Haworth, 1809) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Atethmia ambusta (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994;

Xanthia (= *Cosmia*) *togata* (Esper, 1788) (= *lutea*) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Xanthia (= *Cosmia*) *aurago* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U

1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Xanthia (= *Cosmia*) *sulphurago* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *fulvago*) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Xanthia (= *Cosmia*) *icteritia* (Hufnagel, 1766) (= *fulvago*) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Xanthia (= *Cosmia*) *gilvago* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Xanthia (= *Cosmia*) *ocellaris* (Borkhausen, 1792) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; K 1956; Ré 1972; U 1976a; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Xanthia (= *Cosmia*) *citrago* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Agrochola *lychnidis* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1978a; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Agrochola *circellaris* (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Agrochola *lota* (Clerck, 1759) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Agrochola *macilentia* (Hübner, 1809) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Agrochola *nitida* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Agrochola *helvola* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Agrochola *humilis* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Agrochola *litura* (Linnaeus, 1758) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U

1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Agrochola *laevis* (Hübner, 1803) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953;

Spudaea *ruticilla* (Esper, 1791) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953;

Eupsilia *transversa* (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Jodia *croceago* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1981a; U 1981c;

Conistra *vaccinii* (Linnaeus, 1761) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Conistra *ligula* (Esper, 1791) - Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Conistra *rubiginosa* (Scopoli, 1763) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1978a; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Conistra *veronicae* (Hübner, 1813) - Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1978a;

Conistra *rubiginea* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Conistra *erythrocephala* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978b; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Orbona *fragariae* (Vieweg, 1790) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953;

Episema (= *Derthisa*) *glaucina* (Esper, 1789) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Episema (= *Derthisa*) *tersa* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *trimacula*) - Á-U 1994; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978b; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Cleoceris *scoriacea* (Esper, 1789) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; U 1978a; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Brachylomia *viminalis* (Fabricius, 1776) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; U-Á 1995;

Aporophyla *lutulenta* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; Ré 1972; U 1976a; U

1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Lithophane semibrunnea (Haworth, 1809) - Á-U 1994; K 1953;

Lithophane socia (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1984a; U-Á 1995;

Scotochrosta pulla (Denis & Schifferrmüller, 1775) - Á-U 1994; K 1953;

Xylena vetusta (Hübner, 1813) - Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1978b; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1981a; U 1981c;

Meganephria bimaculosa (Linnaeus, 1767) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953;

Allophytes oxyacanthae (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Rileyiana fovea (Treitschke, 1825) - Á 1990; K 1953;

Valeria oleagina (Denis & Schifferrmüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Dichonia aprilina (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Dichonia convergens (Denis & Schifferrmüller, 1775) - Á-U 1994; U 1978a; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775) (=protea) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1981a; U 1981c;

Dryobotodes monochroma (Esper, 1790) - Á 1990; Á-U 1994;

Ammoconia caecimacula (Denis & Schifferrmüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Polymixis polymita (Linnaeus, 1761) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Blepharita satura (Denis & Schifferrmüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Apamea sicula tallosi Kovács et Varga, 1969; Á 1992b; Á-U 1994; Gyl et al 1979; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Apamea lithoxyla (Denis & Schifferrmüller, 1775; Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Apamea sublustris (Esper, 1788) - Á 1992a; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Apamea crenata (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U 1984b; U-Á 1995;

Apamea epomidion (Haworth, 1809) (=charactera) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Apamea aquila Donzel, 1837; Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Apamea remissa (Hübner, 1809) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Apamea unanimis (Hübner, 1813) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Apamea illyria Freyer, 1846; Á-U 1994; U 1981a; U 1981c;

Apamea anceps (Denis & Schifferrmüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1978a; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Apamea sordens (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Apamea scolopacina (Esper, 1788) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Apamea ophiogramma (Esper, 1794) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U

1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Eremobina pabulatricula (Brahm, 1791) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Oligia strigilis (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Oligia versicolor (Borkhausen, 1792) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Oligia latruncula (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Mesoligia literosa (Haworth, 1809) - Á 1992b;

Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Photedes minima (Haworth, 1809) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Luperina testacea (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Rhizodra lutosa (Hübner, 1803) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Amphipoea ocula (Linnaeus, 1761) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; T 1983-1984; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Amphipoea fucosa (Freyer, 1830) - Á 1990; U-Á 1995;

Hydracra micacea (Esper, 1789) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Gortyna flavago (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Calamia tridens (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978c; U-Á 1995;

Staurophora celsia (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a;

Celaena leucostigma (Hübner, 1808) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Nonagria typhae (Thunberg, 1784) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Phragmatiphila nexa (Hübner, 1808) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; K 1958; U 1976a; U 1978b; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Archanara geminipuncta (Haworth, 1809) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Archanara neurica (Hübner, 1808) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; T 1983-1984; U 1978a; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Archanara dissoluta (Treitschke, 1825) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Archanara sparganii (Esper, 1790) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Archanara algae (Esper, 1789) (= *cannae*) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1978b; U 1985; U-Á 1995;

Sedina buettneri (E. Hering, 1858) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Chortodes (= *Arenostola*) *extrema* (Hübner, 1809) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Chortodes (= *Arenostola*) *fluxa* (Hübner, 1809) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Chortodes (= *Arenostola*) *pygmina* (Haworth, 1809) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Chortodes (= *Arenostola*) *morrisii* (Dale, 1837) - Ré 1972;

Discestra trifolii (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Discestra dianthi (Tauscher, 1809) - Á 1992b; Á-U 1994;

Lacanobia (= *Mamestra*) *w-latinum* (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Lacanobia (= *Mamestra*) *aliena* (Hübner, 1808) - U 1985; U-Á 1995;

Lacanobia (= *Mamestra*) *splendens* (Hübner, 1808) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Lacanobia (= *Mamestra*) *oleracea* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Lacanobia (= *Mamestra*) *thalassina* (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Lacanobia (= *Mamestra*) *contigua* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Lacanobia (= *Mamestra*) *suasa* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Hada plebeja (Linnaeus, 1761) (= *nana*) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; Ro 1909; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Aetheria dysodea (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Aetheria bicolorata (Hufnagel, 1766) - K 1953; U 1983; U-Á 1995;

Hadena bicurris (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K

1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Hadena confusa (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978b; U 1981b; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Hadena (= *Dianthoecia*) *rivularis* (Fabricius, 1775) (= *cucubali*) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U-Á 1995;

Hadena (= *Harmodia*) *perplexa* (Denis & Schiffermüller, 1775) (= *lepida*) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Hadena silenae (Hübner, 1822) - K 1953; Ré 1972;

Hadena (= *Epia*) *irregularis* (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1978c; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Sideridis (*Leucania*) *lamprea* (Schawerda, 1913) (= *evidens*) - Á-U 1998; U 1976a; U 1978c; U-Á 1995;

Sideridis albicolon (Hübner, 1813) - Á 1992a; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U-Á 1995;

Heliophobus reticulata (Goeze, 1781) - K 1953; K 1956; Ré 1972;

Conisania leinera (Freyer, 1836) - K 1953; Ré 1972;

Conisania (= *Hadena*) *luteago* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Melanchra (= *Mamestra*) *persicariae* (Linnaeus, 1761) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Melanchra (= *Mamestra*) *pisi* (Linnaeus, 1758) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Polia nebulosa (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Mythimna turca (Linnaeus, 1761) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Mythimna conigera (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Mythimna vitellina (Hübner, 1808) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; K 1956; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1979; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Mythimna pudorina (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Mythimna straminea (Treitschke, 1825) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; Ro 1909; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Mythimna impura (Hübner, 1808) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Mythimna pallens (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Mythimna obsoleta (Hübner, 1803) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Mythimna comma (Linnaeus, 1761) - Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; U 1976a; U 1978c; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Mythimna (=Senta) flammea (Curtis, 1828) (=stenopectera) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Mythimna l-album (Linnaeus, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Mythimna unipuncta (Haworth, 1809) - Á-U 1994; U 1981a; U 1981c;

Orthosia incerta (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Orthosia cruda (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Orthosia schmidtii (Diószeghy, 1935) - Á 1990; Á-U 1994; K 1956;

Orthosia miniosa (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Orthosia opima (Hübner, 1809) - Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Orthosia populeti (Fabricius, 1775) - Á-U 1994; K 1953; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) (=stabilis) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Orthosia gracilis (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Orthosia munda (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Panolis flammea (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1980a; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Egira (=Xilomyges) conspicillaris (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U

1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Perigrapha i-cinctum (Denis & Schiffermüller, 1775) - Ré 1972;

Hyssia cavernosa (Eversmann, 1842) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Tholera cespitis (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Tholera decimalis (Poda, 1761) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Eriopygodes imbecilla (Fabricius, 1794) - Ré 1972;

Axyia putris (Linnaeus, 1761) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Noctuinae

Ochroleptura flammatra (Denis & Schiffermüller, 1775) - K 1953;

Ochroleptura plecta (Linnaeus, 1761) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Diarsia brunnea (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1992b; Á-U 1994; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1984b; U-Á 1995;

Diarsia rubi (Vieweg, 1790) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Noctua pronuba Linnaeus, 1758; Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Noctua orbona (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; K 1956; Ré 1972; U 1976a; U 1978a;

Noctua interposita (Hübner, 1790) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; U 1978a; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Noctua comes Hübner, 1813; Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; Ré 1972; U 1981a;

Noctua fimbriata (Schreber, 1759) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Noctua janthina (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Noctua janthe (Borkhausen, 1792) - Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; U-Á 1995;

Noctua interjecta Hübner, 1803; U 1980b; U 1981c;

Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; Ré 1972; U 1976a; U 1978c; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Chersotis rectangula (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á-U 1994; K 1953;

Chersotis multangula (Hübner, 1803) - Á 1990; Á-U 1994;

Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766) - Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1981a; U 1981c;

Rhyacia lucipeta (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953;

Spaelotis ravidata (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978c; U-Á 1995;

Opigena polygona (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U-Á 1995;

Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Xestia (=Agrotis) *c-nigrum* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Xestia (=Agrotis) *ditrapezium* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; U 1976a;

Xestia (=Agrotis) *triangulum* (Hufnagel, 1766) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Xestia (=Agrotis) *baja* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Xestia (= *Agrotis*) *rhomboidea* (Esper, 1790) (= *stigmatica*) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Xestia (= *Agrotis*) *xanthographa* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Cerastis leucographa (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Naenia typica (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Anaplectoides prasina (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1992b; Á-U 1994; U 1981a; U 1981c; U 1984b; U-Á 1995;

Peridroma saucia (Hübner, 1808) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1979; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Parexarnis fugax (Treitschke, 1825) - Á 1990; Á-U 1994; K 1956; Ré 1972;

Actebia praecox (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; U 1978a; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Euxoa aquilina (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; K 1956; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1981c;

Euxoa hastifera (Donzel, 1847) - Ré 1972;

Euxoa temera (Hübner, 1808) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978c; U-Á 1995;

Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761) - Ré 1972;

Euxoa segnilis (Duponchel, 1836) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978c; U-Á 1995;

Euxoa tritici (Linnaeus, 1761) (= *epixantheia*) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978c; U-Á 1995;

Euxoa obelisca (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; Ré 1972; U 1976a; U 1978c; U-Á 1995;

Yigoga (= *Agrotis*) *signifera* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; T 1983-1984;

Yigoga (= *Agrotis*) *forcipula* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953;

Agrotis (= *Scotia*) *crassa* (Hübner, 1803) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1981c; U-Á 1995;

Agrotis (= *Scotia*) *puta* (Hübner, 1803) - Á 1990; Á 1998-99; Á-U 1994; K 1953; K 1958;

Agrotis (= *Scotia*) *ipsilon* (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1979; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Agrotis (= *Scotia*) *exclamationis* (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; Ro 1909; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Agrotis (= *Scotia*) *clavis* (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á-U 1994;

Agrotis (= *Scotia*) *segetum* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Agrotis (= *Scotia*) *vestigialis* (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Agrotis (= *Scotia*) *cinerea* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; K 1956; Ré 1972;

Pantheidae

Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Lymantriidae

Lymantriinae

Lymantria monacha (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Ocneria rubra (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972;

Calliteara (= *Dasychira*) *pudivunda* (Linnaeus, 1758) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Orgyia recens (Hübner, 1819) (= *gonostigma*) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Euproctis (= *Porthesia*) *similis* (Fuessly, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Penthophera morio (Linnaeus, 1767) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1978c; U-Á 1995;

Laelia coenosa (Hübner, 1808) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972;

Leucoma salicis (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Arctornis l-nigrum (Müller, 1764) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Nolidae

Nolinac

Meganola togatulalis (Hübner, 1798) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Meganola strigula (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Meganola (= *Roeselia*) *gigantula* (Staudinger, 1879) (= *kolbi*) - Á 1990; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Meganola (= *Roeselia*) *albula* (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Nola cucullatella (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1981a; U 1981c;

Nola (= *Celama*) *cicatricalis* (Treitschke, 1835) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Nola (= *Celama*) *aerugula* (Hübner, 1793) (= *centonalis*) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Nola chlamitulalis (Hübner, 1813) - Á 1992a; Á-U 1994; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1981b; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Chloeophorinae

Nycteola (= *Sarrothripus*) *revayana* (Scopoli, 1772) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; K 1954; K 1958; U 1976a; U 1978b; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Nycteola asiatica (Krulikovskiy, 1904) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1956; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1981a; U 1981b; U 1981c; U-Á 1995;

Nycteola siculana (Fuchs, 1899) - Á 1990; Á-U 1994; K 1956;

Bena bicolorana (Fuessly, 1775) - Á 1990; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1978a; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Pseudoips (= *Hylophila*) *prasinana* (Linnaeus, 1758) (= *fagana*) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Eariadinae

Earias clorana (Linnaeus, 1761) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Earias vernana (Fabricius, 1787) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Arctiidae

Lithosiinae

Thumatha senex (Hübner, 1808) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U

1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;
Mitochondria miniata (Forster, 1771) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Pelusia muscerda (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Pelusia obtusa (Herrich-Schäffer, 1847) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758) - Á 1990; K 1953;

Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Eilema depressa (Esper, 1787) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978a; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Eilema griseola (Hübner, 1803) - Á 1990; Á 1992a; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Eilema lurideola (Zincken, 1817) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Eilema complana (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Eilema caniola (Hübner, 1808) - Á 1990;

Eilema palliatella (Scopoli, 1763) - Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Eilema lutarella (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953;

Ré 1972; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Setina roscida (Denis & Schiffermüller, 1775) - Á 1990; K 1953; Ré 1972; U 1978a;

Syntominiinae

Amata phegea (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; PS 1942; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Arctiinae

Spiris (=Coscinia) *striata* (Linnaeus, 1758) - K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978b; U 1978c; U-Á 1995;

Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á-U 1994;

Ocnogyna parasita (Hübner, 1790) - Á 1990; K 1953; Ré 1972;

Chelis maculosa (Gerning, 1780) - Á 1990; K 1953; Ré 1972;

Watsonarctia casta (Esper, 1785) (=deserta) - Á 1990; Á-U 1994;

Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766) (=lubricipeda) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1983; U-Á 1995;

Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758) (=menhastri) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; K 1956; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Spilosoma urticae (Esper, 1789) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; PJ 1916; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Hyphantria cunea (Drury, 1773) - Á 1990; Á

1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Diaphora mendica (Clerck, 1759) - Á 1990; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; U 1976a; U 1978c; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758) - K 1953;

Arctia caja (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U

1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Arctia villica (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; T 1983-1984; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U 1983; U-Á 1995;

Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; T 1983-1984; U 1976a; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; Á-U 1998; K 1953; Ré 1972; U 1976a; U 1976b; U 1978a; U 1978b; U 1978c; U 1981a; U 1981c; U-Á 1995;

Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) - Á 1990; Á 1992a; Á 1992b; Á-U 1994; K 1953; U 1976a; U 1976b; U 1978c; U 1981c; U-Á 1995;

Köszönetnyilvánítás

A szerzők őszinte köszönetüket fejezik ki Paizs Ottó tanár úrnak (Nagybajom), hogy önzetlen segítséget nyújtott a rovarfajta szakirodalom átnézésében Somogy megyei adatok után kutatva.

1. táblázat: Somogy megye területéről ismert nagylepke fajok száma családok szerinti megoszlása

Család	Alcsalád	Fajszám	Család	Alcsalád	Fajszám
Lasiocampidae	Poecilocampinae	2	Notodontidae	Thaumetapoeinae	1
	Lasiocampinae	13		Pygaerinae	4
Endromidae		1		Notodontinae	22
Saturniidae	Agliinae	1		Phalerinae	3
	Saturniinae	4		Heterocampinae	3
Lemonidae		2	Noctuidae	Acronictinae	16
Sphingidae	Smerinthinae	4		Bryophilinae	4
	Sphinginae	4		Hermiinae	13
	Macroglossinae	10		Strepsimaninae	3
Hesperidae	Pyrginae	10		Catocalinae	26
	Heteropterinae	2		Calpinae	2
	Hesperinae	4		Hypeninae	6
Papilionidae	Parnassiinae	2		Euteliinae	1
	Papilioninae	2		Plusiinae	18
Pieridae	Dismorphiinae	3		Acontiinae	2
	Pierinae	6		Eustrotiinae	13
	Coliadinae	7		Cuculiinae	16
Lycaenidae	Riodininae	1		Amphipyryinae	4
	Lycaeninae	39		Psaphidinae	3
Nymphalidae	Libytheinae	1		Dilobinae	1
	Heliconiinae	9		Stiriinae	2
	Nymphalinae	20		Heliothinae	11
	Limenitinae	2		Hadeninae	196
	Apaturinae	3		Noctuinae	50
	Satyrinae	17	Pantheidae		1
Drepanidae	Thyatirinae	10	Lymantriidae	Lymantriinae	12
	Drepaninae	7	Nolidae	Nolinae	9
Geometridae	Archiearinae	3		Chloephorinae	5
	Ennominae	87		Eariadinae	2
	Oenochrominae	2	Arctiidae	Lithosiinae	17
	Geometrinae	12		Syntominae	2
	Sterrhinae	56		Arctiinae	19
	Larentiinae	145			

Irodalom

- ABAFI-AIGNER, L., PÁVEL, J. és UHRYK F. 1899: Ordo. Lepidoptera in: A Magyar Birodalom Állatvilága – Fauna Regni Hungariae. Budapest pp 1-82.
- ABAFI-AIGNER, L. 1917: Magyarország pillangói. – Rovartani Lapok 24: 115-124.
- ÁBRAHÁM, L. 1990: Nattán Miklós nagylepke-gyűjteménye (Lepidoptera) a pécsi Janus Pannonius Múzeumban. – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 34 (1989): 63-71.
- ÁBRAHÁM, L. 1992a: Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet nagylepkefaunájának természetvédelmi feltárása I. (Lepidoptera). – Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 7: 241-271.
- ÁBRAHÁM, L. 1992b: A Zselici Tájvédelmi Körzet Macrolepidoptera faunájának ismeretéhez (Lepidoptera). – Somogyi Múzeumok Közleményei 9: 293-306.
- ÁBRAHÁM, L. 1998: A Leptidea reali Reissinger, 1989 a hazai nappalilepke-fauna új tagja (Lepidoptera: Pieridae). – Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 9: 387-394.
- ÁBRAHÁM, L. 1998-1999: Az Agrotis puta (Hübner, 1803) újabb példánya a hazai bagolylepke-faunában (Lepidoptera: Noctuidae). – Fol Hist nat Mus. Matraensis 23: 249-251.
- ÁBRAHÁM, L., UHERKOVICH, Á. 1994: A Zselic nagylepkéi (Lepidoptera) I. Bevezetés és faunisztikai alapvetés. – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 38: (1993): 47-59.
- ÁBRAHÁM, L., UHERKOVICH, Á. 1998: A Dráva mente nagylepke faunája és jellegzetes élőhelyei (Lepidoptera). – Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 9: 359-385.
- BUSCHMANN, F. 1985: Néhány adat Balatonszántód és a Tihanyi-félsziget nagylepkefaunájához (Lepidoptera). – Folia ent. hung. 46 (1): 257-258.
- FAZEKAS, I. 1977: Adatok Dél-Dunántúl Eupithecini-faunájának elterjedéséhez és fenológiájához. – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 20-21 (1975-76): 49-56.
- GOZMÁNY, L. 1968: Nappali lepkék - Diurna. - Magyarország Állatvilága XVI. kötet 13: 1-204.
- GOZMÁNY, L. 1970: Bagolylepkék I - Noctuidae I. - Magyarország Állatvilága XVI. kötet 11: 1-151.
- GOZMÁNY, L. 1971: Megemlékezés Nattán Miklósról - Folia ent. hung. 24(2): 279-280.
- GYULAI, I., GYULAI, P., UHERKOVICH, Á., VARGA, Z. 1979: Újabb adatok a magyarországi nagylepkék elterjedéséhez II. (Lepidoptera). – Folia ent. hung. 32 (2): 219-227.
- GYULAI, P., UHERKOVICH, Á., VARGA, Z. 1974: Újabb adatok a magyarországi nagylepkék elterjedéséhez (Lepidoptera). – Folia ent. hung. 27 (2): 75-83.
- KARSHOLT, O. & RAZOWSKI, J. 1996: The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist. - Apollo Book, Stenstrup.
- KOVÁCS, L. 1953: A magyarországi nagylepkék és elterjedésük. – Folia ent. hung. 6: 76-165.
- KOVÁCS, L. 1954: Új fajok és fajváltozatok a magyar nagylepkefaunában. – Folia ent. hung. 7: 53-64.
- KOVÁCS, L. 1955: A lepke-fajok terjedésének kérdése. – Folia ent. hung. 8: 1-16.
- KOVÁCS, L. 1956: A magyarországi nagylepkék és elterjedésük II. – Folia ent. hung. 9: 89-140.
- KOVÁCS, L. 1957: A magyar nagylepkefauna gyarapodása 1956-ban. – Folia ent. hung. 10: 125-132.
- KOVÁCS, L. 1958: Változások a magyarországi nagylepkék adataiban a Fauna Regni Hungariae, illetőleg Abafi-Aigner lepkékönyvének megjelenése óta. – Folia ent. hung. 11: 309-365.
- PAZSICZKY, J. 1917: Spilosoma urticae Esp. ab. Alexandri Pázs. Elterjedéséhez. – Rovartani Lapok 24: 88.
- PAZSICZKY, S. 1942: Lepidopterológiai érdekességek Kaposvár környékéről. – Folia ent. hung. 7: 65-72.
- PAZSICZKY, S. 1947: Három kaposvári lepkész emlékezete - Folia ent. hung. 2(1): 1-3.
- RÉZBÁNYAI, L. 1972: Vizsgálatok a Balaton délkeleti (Balatonszábad-Zamárdi) partvidékének nagylepkefaunáján (Lep.). – Folia ent. hung. 25: 229-252.
- ROTHSCHILD, N. CH. 1909: Adatok Magyarország lepkéfaunájához. – Rovartani Lapok 16: 130-148.
- SZENT-IVÁNY, J. 1938: Lepidopterológiai jegyzetek I. – Folia ent. hung. 3: 113-115.
- THURÓCZY, Cs. 1983-84: Somogy megyei fénycsapdák Macrolepidoptera anyagának állatföldrajzi és rajzasdinamikai értékelése I. – A Vas Megyei Múzeumok Értesítője 17-18: 61-70.
- UHERKOVICH, Á. 1975: Apatura ilia nattani ssp. nov. Magyarországról (Lepidoptera: Nymphalidae). – Folia ent. hung. 27(1): 209-212.
- UHERKOVICH, Á. 1976a: Adatok a Dél-Dunántúl nagylepkefaunájához (Macrolepidoptera). – Folia ent. hung. p. 119-137.
- UHERKOVICH, Á. 1976b: Adatok a Drávasík nagylepkefaunájának (Macrolepidoptera) ismeretéhez. – A Vas Megyei Múzeumok Értesítője 5-6 (1971-72): 115-145.

- UHERKOVICH, Á. 1978a: Belső-Somogy és a Zselic határvidékének lepidopterológiai viszonyai (Lepidoptera). – Somogyi Múzeumok Közleményei 3: 503-538.
- UHERKOVICH, Á. 1978b: Komlósd környékének nagylepkefaunája (Macrolepidoptera). – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 22 (1977): 73-87.
- UHERKOVICH, Á. 1978c: A Barcsi Ősborókás nagylepkefaunája I. (Lepidoptera). – Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 1: 93-125.
- UHERKOVICH, Á. 1978d: Dél- és Nyugat-Dunántúl nagylepkéinek néhány állatföldrajzi kérdése. – Állattani Közlemények 65: 153-162
- UHERKOVICH, Á. 1979: Vándorlepke-megfigyelések a Dél-Dunántúlon, 1966-1977 (Lepidoptera). – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 23 (1978): 51-70.
- UHERKOVICH, Á. 1980a: A Dél- és Nyugat-Dunántúl túlevelűeken élő nagylepkéi (Lepidoptera) – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 24 (1979): 77-91.
- UHERKOVICH, Á. 1980b: A *Noctua interjecta* Hbn. magyarországi előfordulása (Lepidoptera: Noctuidae). – Folia ent. hung. 42 (2): 378.
- UHERKOVICH, Á. 1981a: A Zselici Tájvédelmi Körzet nagylepkefaunája. – Somogyi Múzeumok Közleményei 4 (1): 5-24.
- UHERKOVICH, Á. 1981b: A Barcsi Borókás nagylepkefaunája II. (Lepidoptera). – Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 2: 89-125.
- UHERKOVICH, Á. 1981c: Data to the Macrolepidoptera fauna of South Transdanubia (Lepidoptera) II. – Folia ent. hung. 42 (2): 239-252.
- UHERKOVICH, Á. 1983: A Barcsi Borókás nagylepkefaunája III. (Lepidoptera). – Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 3: 55-72.
- UHERKOVICH, Á. 1984a: Lepidoptera on birch and alder in South and West Transdanubia, Hungary. – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 28 (1983): 39-49.
- UHERKOVICH, Á. 1984b: Jelenkori terjedési jelenségek dél-dunántúli nagylepkéknél (Lepidoptera). – Állattani Közlemények 71: 165-176.
- UHERKOVICH, Á. 1985: Néhány további adat a Barcsi borókás nagylepke faunájához (Lepidoptera). – Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 5: 236-238.
- UHERKOVICH, Á. és ÁBRAHÁM, L. 1995: A nagylepke (Lepidoptera: Macrolepidoptera) kutatások faunisztikai eredményei a Dráva mentén. – Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 8: 139-159.
- VARGA Z. 1981: *Diachrysia nadeja* (Orberthur, 1880) - a hazai fauna új tagja Lepidoptera:, Noctuidae). Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 2: 127-131.
- VOJNITS, A. 1976: New Geometrid Subspecies from Hungary (Lepidoptera: Geometridae). – Folia ent. hung. 30 (1): 167-171.
- VOJNITS, A. 1980: Araszolólepkék I. - Geometridae I. - Magyarország Állatvilága XVI. kötet 14: 1-157.
- Z. HORVÁTH, J. 1999: A Zselic rovarvilága. – Erdészeti Lapok 9: 286.

Checklist of the butterfly and larger moth fauna of Somogy county (Lepidoptera: Macrolepidoptera)

LEVENTE ÁBRAHÁM & ÁKOS UHERKOVICH

The investigation of butterfly and larger moth fauna of Somogy county has nearly a 100 years of history. The first faunistical data from the county were published in *Fauna Regni Hungariae* (ABAFI et al 1899). Between the World Wars, several important collections were set up by private collectors, such as I. Karvajszky, A. Hámori, A. Ház, S. Pazsiczky. After the Second World War, M. Nattán carried out an intensive investigation in the area around Kaposvár for three decades. However, the rest of the county had not been researched until the mid-1970's (RÉZBÁNYAI 1972, UHERKOVICH, 1978). Á. Uherkovich led an intensive fieldwork organized by the Natural History Department of Janus Pannonius Museum that focused on the southern part of the county: the region alongside River Dráva, Zselic, and Inner Somogy.

After its foundation in 1985, the Natural History Department of Somogy County Museum joined this project and extended the butterfly and larger moth fauna investigation on the researched area (ÁBRAHÁM 1990, 1992 a, b, ÁBRAHÁM & UHERKOVICH 1994, 1998).

Until now, the occurrence of 973 butterfly and larger moth species has been reported in Somogy county. The authors of this paper present a complete checklist of the fauna with the cited literature as well.

Authors' address:

Dr. Levente ÁBRAHÁM
Natural History Department
Somogy County Museum
H-7400 Kaposvár
Fő utca 10. P.O. Box 70.
HUNGARY

Dr. Ákos UHERKOVICH
Natural History Department
Janus Pannonius Museum
H-7601 Pécs
P. O. Box 347.
HUNGARY