Somogy megye fürkészlegyeinek katalógusa (Diptera: Tachinidae)

TÓTH SÁNDOR

TÓTH S.: *Checklist of parasite flies of Somogy county (Diptera: Tachinidae)*

Abstract: The fauna list of Somogy county is based on the records of the faunistical research programs organized in this area [Barcsi Juniper woodland (MIHÁLYI & TÓTH 1985), Boronka-melléki Landscape Protection Area (TÓTH 1992) and the Duna-Dráva National Park (TÓTH 1995)]. According to these data and to an unpublished manuscript (TÓTH in print) the parasite fly fauna of Somogy county comprises 174 species at present. This is 41% of the presently known Hungarian fauna. From the rare species recorded in the county, the following ones are worth mentioning *Catharosia flavicornis* (Zetterstedt, 1859), *Dexiosoma canina* (Fabricius, 1781), *Gymnosoma rungsi* (Mesnil, 1952), *Thelaira leucozona* (Panzer, 1809), *Tlephusa cincta* (Rondani, 1859).

Bevezetés

A fürkészlegyek kivétel nélkül erősen alkalmazkodott belső paraziták, a legtöbb fajuk a lepkehernyókat fertőzi meg, de vannak fürkészlegy parazitái a hártyásszárnyúaknak, bogaraknak, poloskáknek, kabócáknek stb. is. A leghasznosabb rovarok közé tartoznak. Rendkívül fontos szerepük van a rovarok, de különösen az erdészeti kártevők leküzdésében. Jelentőségüket bizonyítja, hogy miután a gyapjaspille (*Lymantria dispar*) nagymértékben elszaporodott az Egyesült Államokban, Európából, elsősorban Magyarországról telepítették be a természetes ellenségeit, többek között fürkészlegyeket, a kártevő megfékezésére.

A fürkészlegyek kutatásának ennek ellenére – leszámítva néhány kártevő (pl. gyapjaslepke, amerikai fehér szövőlepke) parazitáit – Magyarországon nem volt komolyabb hagyománya. A Magyar Birodalom Állatvilága (Fauna Regni Hungariae) monográfiában (THALHAMMER 1899) mindössze 3 faj adatát találhatjuk Somogy megyéből: *Cylindromyia pusilla* (Meigen, 1824) = Őszöd (Balatonőszöd), *Dexiosoma canina* (Fabricius, 1781) = Barcs, *Senometopia excisa* (Fallén, 1820) = Barcs.

A Magyar Természettudományi Múzeum fürkészlegy gyűjteményét Mihályi Ferenc feldolgozta, de a faunisztikai adatokat nem közölte. A Magyarország Állatvilága sorozat fürkészlegyeket tárgyaló kötete (MIHÁLYI 1986) csak kivételesen említ Somogy megyéből lelőhelyet (pl. *Atylostoma tricolor*, Táranyból). Ezért Somogy megye faunalistájának összeállításához, elsősorban csak a megyében szervezett programok keretében gyűjtött fürkészlegy adatok állnak rendelkezésre. Ilyen program volt a Barcsi Borókás (MIHÁLYI és TÓTH 1985), a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet (TÓTH 1992) és a Duna-Dráva Nemzeti Park (TÓTH 1995) kutatása.

A Duna-Dráva Nemzeti Parkból, valamint Somogy megye egyéb részeiből (pl. Baláta, Zselic) származó kétszárnyú családok publikálatlan adataiból (be-

leértve a fürkészlegyeket is) összeállított, jelenleg kéziratban lévő dolgozat (TÓTH előkészületben) adatait is célszerű volt beépíteni a faunalistába. Ilyen formán összesen 174 faj alkotja Somogy megye jelenleg nyilvántartott fürkészlegy faunáját, ami elég jelentős szám, mivel kereken 41%-át teszi ki a 425 fajból álló ismert magyarországi faunának.

A megyéből számos ritkának tekinthető fürkészlegyet ismerünk. Ilyenek pl.: *Catharosia flavicornis* (Zetterstedt, 1859), *Dexiosoma canina* (Fabricius, 1781), *Gymnosoma rungsi* (Mesnil, 1952), *Thelaira leucozona* (Panzer, 1809), *Tlephusa cincta* (Rondani, 1859). További három faj azért emelhető ki, mert ezeket elsősorban hegyvidéki elemként tartjuk számon, így somogyi előfordulásuk állatföldrajzi szempontból is érdekes: *Nowickia ferox* (Panzer, 1809), *Phasia hemiptera* (Fabricius, 1794), *Siphona flavifrons* Staeger, 1849.

A Somogyból ismert fajok jegyzéke

- Acemya acuticornis* (Meigen, 1824) - Tóth 1995, Tóth (előkészületben)
- Actia crassicornis* (Meigen, 1824) - Mihályi – Tóth 1985, Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Actia infantula* (Zetterstedt, 1844) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben). Ritkább, főleg a hegyvidékeinkről ismert faj.
- Actia pilipennis* (Fallén, 1810) - Tóth 1992, 1995
- Aphria longilingua* Rondani, 1861 - Mihályi – Tóth 1985, Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben).
- Aphria longirostris* (Meigen, 1824) - Tóth 1992. Főleg hegyvidéken élő ritka faj.
- Aplomya confinis* (Fallén, 1820) - Mihályi – Tóth 1985, Tóth 1995, Tóth (előkészületben)
- Athrycia curvinervis* (Zetterstedt, 1844) - Mihályi – Tóth 1985. Ritka, Magyarországon korábban csak hegyvidékekről ismerték.
- Athrycia trepida* (Meigen, 1824) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Atylostoma tricolor* (Mik, 1884) - Tóth 1995, Tóth (előkészületben). Ritka, Mihályi (1986) Taranyból említi.
- Bessa parallela* (Meigen, 1824) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Bessa selecta* (Meigen, 1824) - Tóth 1992
- Besseria lateritia* (Meigen, 1824) - Tóth 1995. Ritka, Magyarországról kevés lelőhelyét ismerjük.
- Billaea irrorata* (Meigen, 1826) - Tóth 1992. Ritka, csak néhány lelőhelyről van adata.
- Billaea pectinata* (Meigen, 1826) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Billaea triangulifera* (Zetterstedt, 1844) - Tóth 1992, 1995. Ritka.
- Bithia spreta* (Meigen, 1824) - Tóth (előkészületben)
- Blepharipa pratensis* (Meigen, 1824) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Blepharipa schineri* (Mesnil, 1939) - Tóth 1995, Tóth (előkészületben)
- Blondelia nigripes* (Fallén, 1810) - Mihályi – Tóth 1985, Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Carcelia bombylans* (Robineau-Desvoidy, 1830) - Tóth 1995, Tóth (előkészületben)
- Carcelia falenaria* (Rondani, 1859) - Tóth 1992, 1995
- Carcelia lucorum* (Meigen, 1824) - Tóth 1995, Tóth (előkészületben)
- Catharosia flavicornis* (Zetterstedt, 1859) - Tóth 1995. Ritka, Magyarországon korábban csak Fótról ismertük az előfordulást.
- Catharosia pygmaea* (Fallén, 1815) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben). Ritka.
- Ceromya bicolor* (Meigen, 1824) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben). Ritka.
- Ceromya dorsigera* Herting, 1967 - Tóth 1992. Ritka, néhány hazai példánya homokvidékekről került elő.
- Ceromia silacea* (Meigen, 1824) - Mihályi – Tóth 1985, Tóth 1995, Tóth (előkészületben). Ritka.
- Chetogena filipalpis* Rondani, 1859 - Mihályi – Tóth 1985, 1995, Tóth (előkészületben)
- Chetogena obliquata* (Fallén, 1810) - Mihályi – Tóth 1985. Ritka, főleg vizes élőhelyeken találják.
- Chrysomopsis auratus* (Fallén, 1820) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)

1. ábra: Gyapjapille bábfürkész (*Blepharipa pratensis*) Fotó: Tóth S.

2. ábra: Szélespotrohú poloskafürkész (*Ectophasia crassipennis*) Fotó: Tóth S.

3. ábra: Karcsú poloskalég (*Cylindromyia brassicaria*) Fotó: Tóth S.

4. ábra: Gyapjaslepke fürkészlég (*Parasetigena silvestris*) lárvája elpusztult gyapjaslepke hernyóval Fotó: Tóth S.

- Citogaster globosa* (Fabricius, 1775) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995
- Clemelis pullata* (Meigen, 1824) - Tóth 1995
- Clytiomya continua* (Panzer, 1798) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Compsilura concinnata* (Meigen, 1824) - Tóth 1992, 1995
- Cylindromyia auriceps* (Meigen, 1838) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Cylindromyia bicolor* (Olivier, 1812) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Cylindromyia brassicaria* (Fabricius, 1775) - Tóth 1992, 1995
- Cylindromyia intermedia* (Meigen, 1824) - Tóth 1992, 1995
- Cylindromyia interrupta* (Meigen, 1824) - Tóth 1992, 1995
- Cylindromyia pilipes* (Loew, 1844) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995
- Cylindromyia pusilla* (Meigen, 1824) - Thalhammer 1899, Tóth 1995
- Cylindromyia xyloina* (Egger, 1860) - Tóth 1995. Ritka, korábbi adatai hegyvidékekről származnak.
- Cyzenis albicans* (Fallén, 1810) - Tóth (előkészületben)
- Dexia rustica* (Fabricius, 1775) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1995, Tóth (előkészületben)
- Dexiosoma canina* (Fabricius, 1781) - Thalhammer 1899 (Barcs). Ritka, Somogy megyében újabban nem sikerült gyűjteni, jelenlegi adatai a Bakony hegységből származnak.
- Dinera carinifrons* (Fallén, 1817) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995
- Drino vicina* (Zetterstedt, 1849) - Mihályi - Tóth 1985
- Dufouria chalybeata* (Meigen, 1824) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Ectophasia crassipennis* (Fabricius, 1794) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995
- Ectophasia oblonga* (Robineau-Desvoidy, 1830) - Tóth 1992, 1995
- Eliozeata helluo* (Fabricius, 1805) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Eliozeata pellucens* (Fallén, 1820) - Tóth 1992, 1995. Ritka, korábbi adatai hegyvidékekről származnak.
- Elomyia lateralis* (Meigen, 1824) - Tóth 1992, 1995
- Epicampocera succincta* (Meigen, 1824) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995
- Eriothrix argyreatus* (Meigen, 1824) - Tóth 1995, Tóth (előkészületben)
- Eriothrix rufomaculatus* (De Geer, 1776) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Ernestia rudis* (Fallén, 1810) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Ernestia puparum* (Fabricius, 1794) - Tóth 1992, 1995. Ritka.
- Erycia fatua* (Meigen, 1824) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1995
- Erycilla ferruginea* (Meigen, 1824) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992
- Erythrocerca nigripes* (Robineau-Desvoidy, 1830) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1995, Tóth (előkészületben)
- Eumea linearicornis* (Zetterstedt, 1844) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Eurithia caesia* (Fallén, 1810) - Tóth 1992, 1995
- Exorista glossatorum* (Rondani, 1859) - Tóth 1992. Ritka.
- Exorista larvarum* (Linnaeus, 1758) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1995, Tóth (előkészületben)
- Exorista rustica* (Fallén, 1810) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995
- Frontina laeta* (Meigen, 1824) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, Tóth (előkészületben)
- Gonia capitata* (De Geer, 1776) - Tóth 1992
- Gonia divisa* Meigen, 1826 - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Gonia ornata* Meigen, 1826 - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Gonia vacua* Meigen, 1826 - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Gymnochaeta viridis* (Fallén, 1810) - Tóth 1995, Tóth (előkészületben)
- Gymnosoma clavata* (Rohdendorf, 1947) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Gymnosoma costata* (Panzer, 1800) - Tóth 1995
- Gymnosoma dolycoridis* Dupuis, 1961 - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995
- Gymnosoma inornatum* Zimin, 1966 - Tóth 1995
- Gymnosoma nitens* Meigen, 1824 - Tóth 1995, Tóth (előkészületben)
- Gymnosoma nudifrons* Herting, 1966 - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Gymnosoma rotundatum* (Linnaeus, 1758) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995
- Gymnosoma rungsi* (Mesnil, 1952) - Mihályi - Tóth 1985. Ritka, a Barcsi Borókáson kívül a Kiskunságban gyűjtötték.

- Hemyda obscuripennis* (Meigen, 1824) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben). Ritka (Sopronból, Zemplén).
- Hemyda vittata* (Meigen, 1824) - Tóth 1995. Ritka, főleg hegyvidéken találták.
- Leskia aurea* (Fallén, 1820) - Tóth 1992, 1995
- Leucostoma anthracinum* (Meigen, 1824) - Tóth 1992
- Leucostoma simplex* (Fallén, 1815) - Tóth 1995, Tóth (előkészületben)
- Linnaemya fissiglobula* Pandellé, 1895 - Tóth 1992, 1995
- Linnaemya frater* (Rondani, 1859) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992
- Linnaemya impudica* (Rondani, 1859) - Tóth 1992, 1995
- Linnaemya media* Zimin, 1954 - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Linnaemya picta* (Meigen, 1824) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995
- Linnaemya tessellans* (Robineau-Desvoidy, 1830) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992
- Linnaemya vulpina* (Fallén, 1810) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Linnaemya zachvatkini* Zimin, 1954 - Mihályi - Tóth 1985
- Loewia phaeoptera* (Meigen, 1824) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Lydella grisescens* Robineau-Desvoidy, 1830 - Tóth (előkészületben)
- Lydella stabulans* (Meigen, 1824) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1995, Tóth (előkészületben)
- Lypha dubia* (Fallén, 1810) - Tóth 1992
- Macquartia tenebricosa* (Meigen, 1824) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Masicera silvatica* (Fallén, 1810) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Medina luctuosa* (Meigen, 1824) - Tóth 1992, 1995
- Medina separata* (Meigen, 1824) - Tóth 1992, 1995
- Meigenia dorsalis* (Meigen, 1824) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Meigenia incana* (Fallén, 1810) - Tóth 1992
- Meigenia mutabilis* (Fallén, 1810) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Meigenia uncinata* Mesnil, 1967 - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Meriana puparum* (Fabricius, 1794) - Tóth (előkészületben)
- Microphthalma europaea* Egger, 1860 - Tóth 1992, 1995
- Microsoma exigua* (Meigen, 1824) - Tóth 1992, 1995
- Mintho rufiventris* (Fallén, 1817) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1995, Tóth (előkészületben)
- Nemoraea pellucida* (Meigen, 1824) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995
- Nemorilla maculosa* (Meigen, 1824) - Tóth 1995
- Nilea hortulana* (Meigen, 1824) - Mihályi - Tóth 1985. Ritka, Mihályi (1986) Kaposvárról említi.
- Nowickia ferox* (Panzer, 1809) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992. Hegyvidéki fajként tartják számon, ezért mind a Barcsi Borókásban, mind a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben való gyűjtése érdekes adat.
- Oswaldia muscaria* (Fallén, 1810) - Tóth 1992
- Pales pavidus* (Meigen, 1824) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Parasetigena silvestris* (Robineau-Desvoidy, 1863) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1995, Tóth (előkészületben)
- Peleteria rubescens* (Robineau-Desvoidy, 1830) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995
- Peleteria varia* (Fabricius, 1794) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Peribaea tibialis* (Robineau-Desvoidy, 1851) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995
- Pericheta unicolor* (Fallén, 1820) - Tóth 1992. Ritka, főleg dunántúli lelőhelyeit ismerjük.
- Periscepsia carbonaria* (Panzer, [1798]) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Phania curvicauda* (Fallén, 1820) - Tóth 1992, 1995
- Phania funesta* (Meigen, 1824) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Phania incrassata* Pandellé, 1894 - Tóth 1992, 1995
- Phania thoracica* Meigen, 1824 - Tóth 1992, 1995
- Phasia aurigera* (Egger, 1860) - Tóth 1992, 1995
- Phasia barbifrons* (Girschner, 1887) - Tóth 1992, 1995
- Phasia hemiptera* (Fabricius, 1794) - Tóth 1995. Hegyvidéki fajként tartják számon, ezért Somogy megyei előfordulása figyelemre méltó.

- Phasia obesa* (Fabricius, 1798) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Phasia oblonga* (Robineau-Desvoidy, 1830) - Tóth (előkészületben)
- Phasia pusilla* Meigen, 1824 - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995
- Phasia subcoleoptrata* (Linné, 1767) - Tóth 1995, Tóth (előkészületben)
- Phebellia nigripalpis* (Robineau-Desvoidy, 1847) - Tóth 1995
- Phorocera obscura* (Fallén, 1810) - Tóth 1992, 1995
- Phrino vetula* (Meigen, 1824) - Tóth 1992, 1995
- Phryxe nemea* (Meigen, 1824) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992
- Phryxe vulgaris* (Fallén, 1810) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Phyllomyia volvulus* (Fabricius, 1794) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Prosenia siberita* (Fabricius, 1775) - Mihályi - Tóth 1985
- Pseudogonia parisiaca* (Robineau-Desvoidy, 1851) - Tóth 1992, 1995
- Ramonda prunaria* (Rondani, 1861) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Rondania fasciata* (Macquart, 1834) - Tóth 1995
- Senometopia excisa* (Fallén, 1820) - Thallhammer 1899 (Bárcs). Nem gyakori, főleg a síkságokon gyűjtötték
- Siphona cristata* (Fabricius, 1805) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Siphona flavifrons* Staeger, 1849 - Tóth 1995. Ritka, Somogy megyén kívül, hegyvidékeken fogtak belőle néhány példányt.
- Siphona geniculata* (De Geer, 1776) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Siphona hungarica* Andersen, 1984 - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Siphona maculata* Staeger in Zetterstedt, 1849 - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Siphona pauciseta* Rondani, 1865 - Tóth 1992, 1995
- Smidtia conspersa* (Meigen, 1824) - Tóth 1992, 1995
- Solieria fenestrata* (Meigen, 1824) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Solieria pacifica* (Meigen, 1824) - Tóth 1995, Tóth (előkészületben)
- Solieria vacua* (Rondani, 1861) - Tóth 1995. Ritka, kevés helyen gyűjtötték.
- Spallanzania hebes* (Fallén, 1820) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Spallanzania quadrimaculata* Herting, 1967 - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992
- Sturmia bella* (Meigen, 1824) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1995, Tóth (előkészületben)
- Tachina fera* (Linnaeus, 1761) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Tachina grossa* (Linnaeus, 1758) - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben). Ritka, kevés helyen gyűjtötték.
- Tachina lurida* (Fabricius, 1781) - Tóth 1992, 1995
- Tachina magnicornis* (Zetterstedt, 1844) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Tachina nupta* (Rondani, 1859) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Tachina praeceps* Meigen, 1824 - Tóth 1992
- Tachina ursina* Meigen, 1824 - Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Thelaira leucozona* (Panzer, 1809) - Tóth 1995. Ritka, Mihályi (1986) csak Tardról (Déli-Bükk) említi az előfordulását.
- Thelaira nigripes* (Fabricius, 1794) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Tlephusa cincinna* (Rondani, 1859) - Mihályi - Tóth 1985. Ritka, Mihályi (1986) csak a Bakonyból (Eplény) említi.
- Voria ruralis* (Fallén, 1810) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1992, 1995, Tóth (előkészületben)
- Wagneria cinctans* (Meigen, 1824) - Tóth 1992
- Winthemia cruentata* (Rondani, 1859) - Tóth 1992
- Winthemia quadripustulata* (Fabricius, 1794) - Mihályi - Tóth 1985, Tóth 1995
- Zaira cinerea* (Fallén, 1810) - Tóth 1995, Tóth (előkészületben)
- Zenillia libatrix* (Panzer, 1798) - Tóth 1995, Tóth (előkészületben)
- Zeuxia cinerea* Meigen, 1826 - Tóth (előkészületben)
- Zophomyia temula* (Scopoli, 1763) - Tóth 1992, 1995

Irodalom

- MIHÁLYI – TÓTH 1985: A Barcsi Borókás fürkészlégy faunája (Diptera: Tachinidae) – Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 5: 163–169.
- THALHAMMER J., 1899: Ordo. Diptera. – In: A Magyar Birodalom Állatvilága (Fauna Regni Hungariae), p. 76.
- TÓTH S. 1992: A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet fürkészlégy faunája (Diptera: Tachinidae) – Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 7: 315–329.
- TÓTH S. 1995: Adatok a Dráva mente kétszárnyú (Diptera) faunájához – Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 8: 161–172.
- TÓTH S. Adatok Somogy megye kétszárnyú (Diptera) faunájához – Somogy Megy. Múz. Közlem., (előkészületben)

Checklist of parasite flies of Somogy county (Diptera: Tachinidae)

SÁNDOR TÓTH

Although the parasite fly is one of the most useful species of insects, scientists in Hungary have never really focused their attention on this special species. In the monograph, Fauna Regni Hungariae (The Fauna of the Hungarian Empire, THALHAMMER, 1899) only the data of three species are mentioned: *Cylindromyia pusilla* (Meigen, 1824) = Őszöd (Balatonőszöd), *Dexiosoma canina* (Fabricius, 1781) = Barcs, *Senometopia excisa* (Fallén, 1820) = Barcs.

The fauna list of Somogy county was based on the available data on parasite flies collected during the programs organized in the area, for example, during the survey of Barcsi Juniper woodland (MIHÁLYI & TÓTH, 1985), Boronka-melléki Landscape Protection Area (TÓTH 1992) and the Duna-Dráva National Park (TÓTH 1995). As an additional source, a manuscript (TÓTH in print) containing unpublished data on the Duna-Dráva National Park and other parts of Somogy county (eg. Baláta, Zselic) was also used. According to these works, the parasite fly fauna of Somogy county consists of 174 species. This is a rather high number, equivalent to 41% of the Hungarian fauna comprising 425 species.

From the rare species recorded in the county the following ones can be mentioned: *Catharosia flavicornis* (Zetterstedt, 1859), *Dexiosoma canina* (Fabricius, 1781), *Gymnosoma rungsi* (Mesnil, 1952), *Thelaira leucozona* (Panzer, 1809), *Tlephusa cinctinna* (Rondani, 1859). Further three species are mentioned as monotonous faunistical elements: *Nowickia ferox* (Panzer, 1809), *Phasia hemiptera* (Fabricius, 1794), *Siphona flavifrons* Staeger, 1849.

Author's address:
Dr. Sándor TÓTH
H – 8420 Zirc
Széchenyi u. 2.
HUNGARY