A Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet és közvetlen környéke nagylepkéinek (Lepidoptera) áttekintése az 1965 óta végzett megfigyelések alapján

UHERKOVICH ÁKOS

H-7633 Pécs, Építők útja 3/b. I. 6.

e-mail: uhu941@gmail.com

UHERKOVICH, Á.: *Synopsis of the butterflies and larger moths (Lepidoptera) of the Western Mecsek Landscape Protection Area and environs, South Hungary – on the basis of the researches since 1965.*

Abstract: Author examined the macrolepidopterous fauna of the Western Mecsek Landscape Protection area and environs since the year 1965. He collected and studied the butterflies and larger moths of at least forty sites by diurnal collection, on lamps or by semiautomatic light traps. 763 species were detected, 74 of them are protected by law. Two species are protected to a greater extent: *Arytrura musculus* (Ménétriés, 1859) and *Iolana iolas* (Ochsenheimer, 1816). *A. musculus* was proved during the last decade only, and did not become a frequent species, while *I. iolas* was more frequent forty or fifty years ago. The biotopes of latter species have been decreased due both to the expansion of inhabited area and the change the vegetation. Population of several other protected and non-protected species have decreased or those disappeared. There are some, but fewer species which appeared during the last 20...30 years, and they became more or less frequent nowadays. All the collected species of the author and their collecting sites are listed. The protected species were shown by a larger table. The map of collecting sites and some biotope photos were also presented, further pictures of some protected species completed the paper.

Keywords: faunistics, long term investigation, protected species, Hungary

Bevezető

A Mecsek-hegység nyugati felén 2009-ben alakították ki a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi körzetet [a 4/2009. (IV. 10.) KvVM rendelettel], 10.315 hektáron, jóval a Kelet-Mecsek TK megalapítása (1977) után. A tájvédelmi körzet nyugatról keletre Bükkösdtől Pécs–Árpádtetőig, északon Orfűig, Abaligetig és Mánfaig, déli irányban pedig Cserkútig, illetve a Pécs feletti parkerdőig tart, és számos Natura 2000-es besorolású területet foglal magába.

Geológiai felépítése igen változatos, a permtől kezdve (homokkövek) számos földtörténeti korszak rányomta bélyegét erre a tájra (Lovász 1977). Legmagasabb pontja a Pécs felett magasodó Tubes (611 m), és ennél nem sokkal alacsonyabb a Jakab-hegy (592 m), viszont ennek az utóbbinak a kiterjedése és tömege jóval felülmúlja a Misina–Tubes csoportot. Helyenként nagyobb kiterjedésű karsztos felszínek alakultak ki. Mély völgyek erőteljesen tagolják, a völgyek egy részében állandó vízfolyással. Növény- és állatvilág felépítése rendkívül változatos, flórája és állatvilága nagyon sokszínű, ahogy azt több, alaposabban kikutatott élőlény-csoportról szóló cikk is bizonyítja. Az erdőségek nagy hányada különböző tölgyes társulás, ezek összetétele elsősorban a kőzet- és talajviszo-

nyoktól, valamint a kitettségétől függ. Jelentős területen találunk extrazonális bükkösöket, valamint büккеlegyes tölgyeseket is. A keményfás ligeterdők részaránya alacsony, völgyalji fekvésben lelhetők fel itt-ott, fűz-nyár liget pedig még kevesebb helyen.

E helyen nem említeném a korábbi botanikai és zoológiai eredményeket, legfeljebb érintőlegesen utalnék néhány eredményre a lepkék kutatásával kapcsolatban.

A Nyugat-Mecsek Tájvédelmi körzet területére, illetve annak közeli szomszédságára (kb. $\frac{1}{2}$ km-en belül) a nagy összefoglaló lepkészeti munkák (ABAFI-AIGNER 1907, VARGA 2012) alig adnak meg előfordulási adatokat. Már a XIX. században született néhány kisebb-nagyobb közlemény a pécsi Mecsek lepkéiről, amelyek egyes adatait fenntartással kell fogadnunk. Az is kétségtelen, hogy nemcsak a kutatók ismeretei voltak akkor hiányosabbak, hanem maga a fauna is meglehetősen sokat változott mintegy másfél évszázad alatt. A XX. század közepén Balogh Imre néhány publikációja foglalkozott a terület lepkéivel (pl. BALOGH 1956), valamint viszonylag sok elterjedési adatot találunk KOVÁCS (1953, 1956) két cikkében. Utóbbi adatok részben a XIX. századi publikációk revízió után elfogadható adatait tartalmazták, és a „pécsi Mecsekre” vonatkoznak.

Anyag és módszer

Magam több mint 50 éve, 1965 után kezdtem meg a mecseki lepkefauna tanulmányozását. Ez az első egy-két évben a nappali lepkékre (Diurna) korlátozódott, azonban a hetvenes években már rendszeresen vizsgáltam egyes pontok vagy részterületek teljes nagylepke-faunáját. Ennek eredményeképpen hamarosan összefoglaltam a Pécs feletti karsztbokorerdőkről nyert ismereteinket (UHERKOVICH 1978). Ez után egy tipikus, permi málladékon tenyésző cseres-tölgyesben végzett vizsgálatról írtam (UHERKOVICH 1980). A vizsgálat-sorozat keretében később sor került patak völgyi bükkösök illetve szurdokerdők faunájának feltárására is (UHERKOVICH 1984). Időközben egy igen tipikus, legelő helyén szukcesszióval létrejött, és folyamatosan változó, mozaikosan fejlődő tövisbozótban is dolgoztam (UHERKOVICH 1987). Az előbb idézett nagyobb publikációk mellett kisebb cikkek további adatokat is tartalmaztak, ezek felsorolásától itt eltekintek.

Az 1900-as évek utolsó másfél évtizedében, valamint a 2000-es években, egészen napjainkig (2017-ig) különböző intenzitással folytattam a szóban forgó terület lepkészeti kutatását. Összesen 29 lelőhelyen illetve lelőhely-csoportban (egymáshoz közel fekvő, hasonló adottságú gyűjtőpontokon) folyt a vizsgálat a tájvédelmi körzeten belül illetve annak közvetlen szomszédságában (1. ábra).

Ennek egyik jellemző helyszíne volt Pécs városának nyugati része felett elhelyezkedő Deindolok. Itt nappal és fényen megfigyelve sok (529) lepkefajt jegyeztem fel, illetve gyűjtöttem be. A lelőhely a parkerdő és a szőlők határvonalán van, alapvetően mészkővön, sekély termőtalajon. A parkerdő melegkedvelő tölgyes, ezüsthárssal, sommal, kevés gyertyánnal, vadkörtével, madárcseresznyével és madárberkenyével, a közelben néhány bükkal. Sok egykori szőlőparcella évtizedek óta magára hagyva elbozósodott vagy beerdősült, elsősorban virágos köris, veresgyűrűs som, húsos som, vadkörte, gyepürózsa, kökény, egybibés galagonya változatos állományai, valamint szőlő és gyümölcsfák maradványai alkotják a bozótot. A tisztásokon másodlagos gyepek képződtek, bennük sok kosborfélével. A művelés alatt álló telkeken a szokásos szőlő- és gyümölcstüvelvényeken kívül diszefák, díszbokrok találhatók, többféle tülevelűvel.

Ezen a ponton 1985 óta folyik a fauna felmérése. A kilencvenes évek közepéig, majd 2011-től az észlelt illetve gyűjtött lepkefajokról (többnyire kvantitatív) lista készült.

1. ábra: A Nyugat-Mecsek Tájvédelmi körzet és környéke jelen munkában szereplő lelőhelyei.

1 Abaliget, Nyáras-völgy; 2 Abaliget, üdülők; 3 Bakonya, erdészház; 4 Bakonya, Nagy-Rege; 5 Bakonya, Sás-völgy; 6 Bükkösd, Bükkösdi-völgy; 7 Bükkösd, Szentdomján; 8 Cserkút, Cserkúti-dombok; 9 Cserkút DK; 10 Cserkút, Szentmiklós; 11 Cserkút, vízmű és környéke; 12 Hetvehely, Bükkösdi-völgy; 13 Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; 14 Kővágószőlős, Petőc-akna; 15 Kővágótöttös, Bicsérdi-vízfolyás; 16 Kővágótöttös, Cserma-hegy; 17 Mánfa, Nagy-Mély-völgy; 18 Orfű, Cigány-hegy; 19 Orfű, Vörös-hegy; 20 Pécs, Árpádtető; 21 Pécs, Deindol; 22 Pécs, Éger-völgy; 23 Pécs, Kereszt-kunyhó; 24 Pécs, Mandulás; 25 Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; 26 Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; 27 Pécs, Remeterét; 28 Pécs, Tettye; 29 Pécs, Tubes.

A gyűjtést itt is – mint máshol az éjjeli nagylepkék esetében – higanygózlámpával végeztem (125 W), illetve sokszor használtam automata fénycsapdát különböző lámpa-típusokkal (80, 125 vagy 160 W, és 125 W „black light” higanygózlámpa). (2. ábra.)

A nyolcvanas évek első felének rendszeres gyűjtései (UHERKOVICH 1987) után mintegy harminc évvel, 2011 és 2017 között ismét rendszeresen gyűjtöttem Cserkúttól délnyugatra, a Cserkúti-dombok kőkeny-galagonya-rózsa bozótjának tisztásain, cseres-tölgyes erdő szomszédságában vagy pedig magában az erdőben. Az itteni gyűjtések nem titkolt célja éppen az volt, hogy a korábbi cserkúti vizsgálatok eredményeihez képest lássuk a fauna változását. Csaknem olyan nagy fajszerű anyagot nyertünk, mint a korábbi vizsgálatok alatt (389 illetve korábban 443 faj).

Egy hasonló, de még alig bozotosodott területen, ettől pár kilométerre, Kővágószőlőstől délnyugatra a 2010-es években két évig ugyancsak rendszeres mintavételek folytak, mérsékelt fajszerű (260 faj) kimutatásával.

A hetvenes években a bakonyai erdészháznál rendszeres személyes mintavételeim voltak, amelyek 247 fajt eredményeztek (UHERKOVICH 1980). Legújabbban pedig ettől a helytől délnyugatra, egy egykori legelőn – amely napjainkban egy „karbantartott” irtás (azaz nem engedik felnőni a cserjéket) – 2017-ben egész év folyamán rendszeresen mintáztam, ezek a gyűjtések összességében 262 fajt eredményeztek (4. ábra).

A mecsekszentkúti, egykori erdészháztól északnyugatra fekvő légakna környékén és tőle nyugatra – több ponton is – vizsgáloztam a 2010-es években, ennek eredménye 316 lepkefaj kimutatása volt.

2004-ben Bükkösd és Hetvehely környékének több pontján rendszeresen gyűjtöttem. A Bükkösd-völgyben, Bükkösd határában a fajsza 282 volt; Szentdomján körül és a Bükkösd-völgy hetvehelyi szakaszán – a kisebb mintaszámnak is köszönhetően – nem érte el a kétszázat.

Számos más pontot is felkerestem, kisebb-nagyobb rendszerességgel, de azokon a helyeken (vö. 1. ábra) az összesített fajsza általában 200 alatt maradt, nem a hely kisebb fajgazdagsága, hanem inkább az alacsony mintaszám miatt.

Külön meg kell említenem Ötvös Károly „gyűjtőtevékenységét”, aki fényképezőgéppel rendszeresen dokumentált az abaligeti üdülőterületen, a tájvédelmi körzet északi peremén. Esténként, higanygőzlámpával kivilágított terrasza éveken keresztül (2008-2017) fényképezte a berepülő lepkéket. A fényképeken szereplő fajok meghatározását magam vállaltam. A rendkívül jó, sőt sok esetben kifejezetten művészi színvonalú képek alapján a lepkék többségét meg tudtam határozni. Ilyen módon onnét 327 fajt azonosítottam 10 szezon alatt.

Eredmények

Ebben a fejezetben bemutatam az összes gyűjtött nagylepkéfajt, lelőhelyeikkel együtt. Több esetben két vagy több lelőhelyet – amelyek egymáshoz közel ($<0,5$ km) voltak és azonos település határába estek – összevontam. Mind a lámpás gyűjtéseknél, mind pedig a nappalilepke megfigyeléseknél nincs jelentősége, vagy legalábbis elhanyagolható pár száz méteres távolság, hiszen sok lepkefaj még ennél nagyobb távolságból kerülhet látókörünkbe (1. ábra).

Az anyag jellemzőbb és ritkább fajainak bizonyító példányai két múzeumi gyűjteménybe kerültek. A XX. századi anyag a pécsi Janus Pannonius Múzeum Természettudományi osztályának a gyűjteményében található, a kétezres években a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményét gyarapítottam jelentősebb, ezres nagyságrendű lepkeanyaggal.

Az lelőhelyek (vagy lelőhely-csoportok) mellett nem adom meg a gyűjtés dátumát, a gyűjtő személyét és a példányszámot sem. Ezt a terjedelem sem engedné meg, hiszen a gyakoribb fajok a rendszeresen kutatók pontokon akár 20-30 esetben is előkerültek. A gyűjtő legtöbb esetben maga a szerző, tehát ennek jelölése is felesleges, az Abaliget, üdülők „lelőhelyen” pedig Ötvös Károly fényképezett. A jegyzékben ugyancsak nem jelölöm, ha az adat már publikált. Négy nagyobb cikkem (UHERKOVICH 1978, 1980, 1984, 1987) – és néhány kisebb – számos lentebb idézett adatot tartalmaz.

Az elmúlt 50 év alatt a mértékadó nevezéktan többször is változott. Ezt figyelembe véve a jelenben legkorszerűbbnek számító „Magyarország nagylepkéi” című munka 2. kiadásának nevezéktanát illetve rendszerét követem (VARGA 2012). Több esetben, a fajjegyzék könnyebb használhatósága érdekében megadom a korábban használt (szinonim) neveket. Alcsalád neveket csak néhány nagyobb fajszaú család (Geometridae, Erebidae, Noctuidae, Nymphalidae) esetén tüntetek fel.

2. ábra: Hordozható fénycsapda Pécs Deindolban, a háttérben egy elhagyott szőlő helyén kiirtott bozót, mögötte melegkedvelő tölgyes.

3. ábra: A pécsi Tettye feletti meredek sziklás lejtő, a hetvenes évekbeli gyűjtések közelében.

4. ábra: Cseres-tölgyes irtása, az egyik rendszeresen felkeresett éjjeli gyűjtőhely (Bakonya, Nagy-Rege).

5. ábra: Völgyalji, középkorú keményfájú liget az abaligeti Nyáras-völgyben.

**6. ábra: Orfű, Cigány-hegy, a Lóri kulcsosházhoz vezető út.
Bükkelegyes gyertyános-tölgyes és irtása.**

7. ábra: Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola, az egykori légakna rekultivált helyszíne.

A gyűjtött fajok és elterjedési adataik

Lasiocampidae

Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) – Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós.

Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Éger-v.; Pécs, Tettye.

Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) – Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő.

Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758) – Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol.

Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Cserkúti-dombok.

Odonestis pruni (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK.

Lasiocampa trifolii ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Pachygastris t.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol.

Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) – Hetvehely, Bükkösd-v.

Gastropacha populifolia ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Cserkút, DK.

Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) – Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő.

Phyllosdesma tremulifolia (Hübner, 1810) (= *Epicnaptera t.*) – Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Petőc-akna; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Sphingidae

Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) – Cserkút, DK.

Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) (= *Herse c.*) – Abaliget, üdülők; Cserkút, DK; Pécs, Deindol.

Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 – Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Laothoe populi (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol.

Marumba quercus ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösd-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758) – Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

8. ábra: *Marumba quercus* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
(fotó: Uherkovich Ákos)

9. ábra: *Hyles livornica* (Esper, 1779)
(fotó: Ötvös Károly)

10. ábra: *Saturnia pyri* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
(fotó: Uherkovich Ákos)

11. ábra: *Agria tau* (Linnaeus, 1758)
(fotó: Ötvös Károly)

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bükkösd, Bükkösd-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) – Bakonya, erdészház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.

Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) (= *Pergesa e.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) (= *Pergesa p.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösd-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) (= *Celerio e.*) – Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Hyles livornica (Esper, 1779) – Pécs, Mandulás.

Saturniidae

Antherea yamamai (Guérin-Méneville, 1861) – Abaliget, üdülők; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Saturnia pavoniella (Scopoli, 1763) (= *Eudia pavonia* (Linnaeus, 1758)) – Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol.

Saturnia pyri ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Bükkösd, Bükkösd-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Aglia tau (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösd-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Drepanidae

Cilix glaucata (Scopoli, 1763) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Drepana curvatula (Borkhausen, 1790) – Abaliget, Nyáras-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Drepana falcataria (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Éger-v.

Sabra harpagula (Esper, 1786) (= *Drepana h.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház.

Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) (= *Drepana b.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775) (= *Drepana c.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Thyatiridae (Tetheidae)

Thyatira batis (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Tethea ocularis (Linnaeus, 1767) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Tethea or ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Petőc-akna; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761) (= *Tethea d.*) – Cserkút, DK.

Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Polyplocia ridens (Fabricius, 1787) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Cymatophorina diluta ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Polyplocia d.*) – Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Asphalia ruficollis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Polyplocia r.*) – Bakonya, erdőszház; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Geometridae**Archieariinae**

Archiearis notha (Hübner, 1803) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Orfű, Vörös-h.; Pécs, Deindol.

Orthostixinae

Orthostixis cribraria (Hübner, 1799) – Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Alsophilinae

Alsophila aescularia ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, erdőszház; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, vízmű környék; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Alsophila aceraria ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *quadripunctaria*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tettye.

Geometrinae

Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767) – Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós.

Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.

Comibaena bajularia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *pustulata*) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Pécs, Tubes.

Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787) (= *Antonechloris s.*, *Euchloris s.*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Jodis lactearia (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösd-v.; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Tettye.

Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Hemitha aestivaria (Hübner, 1789) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Chlorissa cloraria (Hübner, 1813) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Cserkút, Cserkúti-dombok; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol.

Phaioграмма etruscaria (Zeller, 1849) (= *Chlorissa pulmentaria*) – Bakonya, Nagy-Rege; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Sterrhinae

Idaea serpentata (Hufnagel, 1767) (*Idaea* = *Sterrrha*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösd-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Petőc-akna.

Idaea muricata (Hufnagel, 1767) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol.

Idaea rufaria (Hübner, 1799) – Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Idaea ochrata (Scopoli, 1763) – Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Idaea rusticata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Idaea filicata (Hübner, 1799) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Idaea moniliata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Idaea obsoletaria rufularia (Herrich-Schäffer, 1845) – Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Tettye.

Idaea inquinata (Scopoli, 1763) – Pécs, Deindol.

Idaea dilutaria (Hübner, 1799) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Tettye.

Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781) – Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Tettye.

Idaea humiliata (Hufnagel, 1767) – Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Idaea politaria (Hübner, 1799) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Idaea seriata (Schränk, 1802) (= *virgularia* (Hübner, 1799)) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Idaea subsericeata (Haworth, 1809) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Idaea pallidata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Pécs, Deindol.

Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Cserkút, DK; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Idaea trigeminata (Haworth, 1809) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Idaea biselata (Hufnagel, 1767) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Idaea emarginata (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők.

Idaea rubraria (Staudinger, 1901) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol.

Idaea aversata (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Idaea degeneraria (Hübner, 1799) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Idaea straminata (Borkhausen, 1794) (= *inornata*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol.

Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Scopula immorata (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Scopula caricaria (Reutti, 1853) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Hetvehely, Bükkösi-v.

Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Szentdomján; Hetvehely, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Scopula virgulata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Scopula ornata (Scopoli, 1763) – Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Pécs, Éger-v.

Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767) – Bakonya, erdészház; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Scopula incanata (Linnaeus, 1758) – Cserkút, Cserkúti-dombok.

Scopula marginepunctata (Goeze, 1781) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Scopula immutata (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v..

Scopula floslactata (Haworth, 1809) (= *S. lactata*) – Abaliget, Nyáras-v.; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Scopula subpunctaria (Herrich-Schäffer, 1847) – Pécs, Tettye.

Scopula flaccidaria (Zeller, 1852) – Abaliget, üdülők; Bükkösd, Szentdomján.

Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759) – Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Timandra comae Schmidt, 1931 (= *T. griseata*, *Calothyranis amata*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Cyclophora pendularia (Clerck, 1759) (= *orbicularia*) – Cserkút, DK; Pécs, Deindol.

Cyclophora albiocellaria (Hübner, 1789) – Bakonya, erdőszház; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.

Cyclophora annularia (Fabricius, 1775) (= *annulata* (Fabricius, 1775)) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897) – Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Kővágószőlős, Petőc-akna; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Cyclophora ruficiliaria (Herrich-Schäffer, 1855) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház.

Cyclophora porata (Linnaeus, 1767) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Pécs, Deindol.

Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Cyclophora linearia (Hübner, 1799) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767) – Pécs, Deindol.

Larentiinae

Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767) (= *L. purpurata*) – Cserkút, DK; Pécs, Deindol.

Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767) – Kővágószőlős, Kajdács-dűlő.

Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők.

Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763) – Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol.

Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767) (= *Ortholita plumbaria*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Cserma-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Orthonama vittata (Borkhausen, 1794) (= *O. lignata*) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós.

Orthonama obstipata (Fabricius, 1794) (= *Nycterosea o.*) – Cserkút, DK; Pécs, Deindol.

Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794) – Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Sás-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Xanthorhoe spadicearia ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház.

Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bükkösd, Bükkösd-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház.

Xanthorhoe quadrifasciata (Clerck, 1759) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Sás-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bükkösd, Bükkösd-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Catarhoe rubidata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Euphya r.*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767) (= *Euphya c.*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.

Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol.

Epirrhoe alternata (Müller, 1764) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösd-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Epirrhoe rivata (Hübner, 1813) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Epirrhoe galiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Euphya biangulata (Haworth, 1809) (= *E. picata*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794) (= *Euphya p.*) – Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) (= *Euphya b.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd; Bükkösd-v.; Kövágószőlős, Kajdács-dűlő; Kövágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Entephria caesiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Mánfa, Nagy-Mély-v.

Anticlea badiata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Earophila b.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, erdőszház; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, vízmű környék; Kövágószőlős, Kajdács-dűlő; Kövágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Anticlea derivata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Coenoteophria d.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kövágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bükkösd, Szentdomján; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.

Pelurga comitata (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Cserkút, DK; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Lampropteryx suffumata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bükkösd, Bükkösd-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.

Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) (= *Lampropteryx o.*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kövágószőlős, Kajdács-dűlő; Kövágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Eulithis mellinata (Fabricius, 1787) (= *Lygris m.*) – Abaliget, üdülők; Cserkút, DK; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol.

Eulithis pyraliata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Lygris p.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Ecliptopera silaceata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol.

Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767) – Kövágószőlős, Kajdács-dűlő; Kövágószőlős, Petőc-akna; Pécs, Deindol.

Cidaria fulvata (Forster, 1771) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Thera obeliscata (Hübner, 1787) – Pécs, Deindol.

Thera variata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Electrophaes corylata (Thunberg, 1792) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Tubes.

Colostygia pectinataria (Knoch, 1781) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kövágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Hydriomena impluviata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *H. coerulata*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Horisme vitalbata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Bükkösd, Bükkösd-v.; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kövágótöttös, Cserma-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Horisme tersata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösd-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kövágószőlős, Kajdács-dűlő;

Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Horisme corticata (Treitschke, 1835) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Melanthia procellata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszél; Bakonya, Sás-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszél; Pécs, Tettye.

Anticollis sparsata (Treitschke, 1828) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Szentdomján; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszél; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Philereme vetulata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bükkösd, Bükkösi-v.; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Philereme transversata (Hufnagel, 1767) – Abaliget, üdülők; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Tettye.

Epirrita dilutata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Oporinia d.*) – Bakonya, erdőszél; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Cserkút, vízmű környék; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tettye.

Epirrita christyi (Allen, 1906) (= *Oporinia ch.*) – Bakonya, erdőszél; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Éger-v.

Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszél; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tettye.

Operophtera fagata (Scharfenberg, 1805) – Bakonya, erdőszél; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Mesotype parallelolineata (Retzius, 1783) (= *Perizoma p.*) – Mánfa, Nagy-Mély-v.

Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol.

Perizoma hydrata (Treitschke, 1829) – Cserkút, DK; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Perizoma lugdunaria (Herrich-Schäffer, 1855) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Sás-v.; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol.

Perizoma bifaciata (Haworth, 1809) – Bakonya, erdőszél; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol.

Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809) (= *pumilata*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Chlorochystis v-ata (Haworth, 1809) (= *coronata*) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszél; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Pasiphila chloerata (Mabille, 1870) (= *Chlorochystis ch.*) – Pécs, Deindol.

Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758) (= *Chlorochystis r.*, *Rhinoprora r.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856 – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, erdőszél; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Eupithecia inturbata (Hübner, 1817) – Mánfa, Nagy-Mély-v.

Eupithecia linariata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, erdőszél; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

- Eupithecia pyreneata* Mabille, 1871 (= *pulchellata*) – Abaliget, üdülők; Pécs, Deindol.
- Eupithecia laquaearia* Herrich-Schäffer, 1848 – Mánfa, Nagy-Mély-v..
- Eupithecia plumbeolata* (Haworth, 1809) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.
- Eupithecia pygmaea* (Hübner, 1799) – Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol.
- Eupithecia venosata* (Fabricius, 1787) – Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.
- Eupithecia silenicolata* Mabille, 1867 – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.
- Eupithecia abbreviata* Stephens, 1831 – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.
- Eupithecia dodoneata* Guenée, 1857 – Bakonya, erdészház; Cserkút, DK; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.
- Eupithecia pusillata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *sobrinata*) – Bakonya, erdészház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.
- Eupithecia tripunctaria* Herrich-Schäffer, 1852 – Hetvehely, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.
- Eupithecia virgaureata* Doubleday, 1861 – Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház.
- Eupithecia lariciata* (Freyer, 1841) – Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Tettye.
- Eupithecia lanceata* (Hübner, 1825) – Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.
- Eupithecia selinata* Herrich-Schäffer, 1861 – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, erdészház; Mánfa, Nagy-Mély-v.
- Eupithecia pimpinellata* (Hübner, 1813) – Bakonya, Nagy-Rege; Kővágószőlős, Petőc-akna.
- Eupithecia innotata* (Hufnagel, 1767) – Bakonya, erdészház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.
- Eupithecia indigata* (Hübner, 1813) – Pécs, Tettye.
- Eupithecia centaureata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, erdészház; Cserkút, DK; Pécs, Deindol.
- Eupithecia insigniata* (Hübner, 1790) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.
- Eupithecia trisignaria* Herrich-Schäffer, 1848 – Abaliget, Nyáras-v.
- Eupithecia absinthiata* (Clerck, 1759) – Cserkút, DK; Mánfa, Nagy-Mély-v.
- Eupithecia assimilata* Doubleday, 1856 – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Mánfa, Nagy-Mély-v.
- Eupithecia denotata* (Hübner, 1813) – Mánfa, Nagy-Mély-v.
- Eupithecia millefoliata* Rössler, 1866 – Cserkút, DK; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.
- Eupithecia icterata* (Villers, 1789) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.
- Eupithecia succenturiata* (Linnaeus, 1758) – Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol.
- Eupithecia subfuscata* (Haworth, 1809) (= *castigata* Hübner, 1813) – Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol.
- Chesias rufata* (Fabricius, 1775) – Cserkút, DK.
- Aplocera plagiata* (Linnaeus, 1758) (= *Anaitis p.*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Aplocera efformata (Guenée, 1857) (= *Anaitis e.*) – Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol.

Lithostege griseata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, Nyáras-v.

Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Nagy-Rege; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol.

Asthenes albulata (Hufnagel, 1767) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Asthenes anseraria (Herrich-Schäffer, 1855) – Bükkösd, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Minoa murinata (Scopoli, 1763) – Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Tubes.

Lobophora halterata (Hufnagel, 1767) – Bakonya, erdőszház; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Trichopteryx polycommata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Nothopteryx p.*) – Bükkösd, Bükkösi-v.

Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794) (= *Nothopteryx c.*) – Bükkösd, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Petőc-akna.

Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783) (= *Mysticoptera s.*) – Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Hetvehely, Bükkösi-v.

Acasis viretata (Hübner, 1799) (= *Trichopteryx v.*) – Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Ennominae

Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Ligdia adustata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Stegania cararia (Hübner, 1790) (= *Lomographa c.*) – Bakonya, Nagy-Rege; Kővágószőlős, Petőc-akna; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház.

Stegania dilectaria (Hübner, 1790) (= *Lomographa d.*) – Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós.

Heliomata glarearia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Semiothisa g.*) – Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Macaria notata (Linnaeus, 1758) (= *Semiothisa n.*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Cserkút, DK; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Macaria alternata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Semiothisa a.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Macaria liturata (Clerck, 1759) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Cserkúti-dombok; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Macaria brunneata (Thunberg, 1784) (= *Itame fulvaria*) – Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) (= *Semiothisa c.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Tettye.

Tephрина arenacearia ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Cepphis advenaria (Hübner, 1790) – Bükkösd, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763) (= *Lithina ch.*) – Bakonya, erdészház; Cserkút, Cserkúti-dombok.

Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Sás-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Epione repandaria (Hufnagel, 1767) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Hetvehely, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol.

Therapis flavicaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol.

Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) – Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Eilicrinia cordiaria (Hübner, 1790) – Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján.

Hypoxystis pluviaria (Fabricius, 1787) – Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Hetvehely, Bükkösi-v.

Apeira syringaria (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767) – Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Cserkúti-dombok; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol.

Ennomos erosaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *E. tiliaria*) – Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Selenia dentaria (Fabricius, 1775) (= *S. bilunaria*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Tettye.

Selenia lunularia (Hübner, 1788) (= *lunaria*) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Artiora evonymaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, erdészház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Crocallya elinguaris (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol.

Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, erdészház; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Colotois pennaria (Linnaeus, 1761) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Tettye.

Angerona prunaria (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Apocheima hispidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, vízmű környék; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Apocheima pilosaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Phigalia p.*) – Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, DK; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Tettye.

Lycia hirtaria (Clerck, 1759) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Lycia pomonaria (Hübner, 1790) (= *Poecilopsis p.*) – Bakonya, erdészház; Pécs, Deindol.

Biston strataria (Hufnagel, 1767) – Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, vízmű környék; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Biston betularia (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Agriopsis leucophaearia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Erannis l.*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, vízmű környék; Orfű, Cigány-h.; Orfű, Vörös-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Tettye.

Agriopsis bajaran ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Erannis b.*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Cserkút, DK; Cserkút, vízmű környék; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Tettye.

Agriopsis aurantiaria (Hübner, 1799) (= *Erannis a.*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Cserkút, DK; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Agriopsis marginaria (Fabricius, 1776) (= *Erannis m.*) – Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, vízmű környék; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Orfű, Vörös-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Erannis defoliaria (Clerck, 1759) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tettye.

Synopsia sociaria (Hübner, 1799) – Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol.

Peribatodes rhomboidaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótötös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Selidosema brunnearia (Villers, 1789) (= *S. plumaria*) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő.

Cleora cinctaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Alcis repandata (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Hypomecis roboraria ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház.

Hypomecis danieli (Wehrli, 1932) (= *Boarmia d.*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763) (= *Boarmia p.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Fagivorina arenaria (Hufnagel, 1767) – Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház.

Ascotis selenaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Ectropis crepuscularia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *E. bistortata*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Parectropis similaria (Hufnagel, 1767) (= *Ectropis extersaria*) – Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Aethalura punctulata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Hetvehely, Bükkösi-v.

Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Bupalus piniarius (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Tettye.

Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Tubes.

Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775) (= *Bapta b.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Sás-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Lomographa temerata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Bapta t.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Theria rupicaprararia ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, DK; Cserkút, vízmű környék; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Campaea margaritata (Linnaeus, 1767) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdác-dűlő; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758) (= *prosapiaria*) – Abaliget, üdülők; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Gnophos furvata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Charissa obscurata ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Gnophos o.*) – Bakonya, erdőszház; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágótöttös, Cserma-h.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Siona lineata (Scopoli, 1763) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdác-dűlő; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Dyscia conspersaria ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Pécs, Tettye.

Perconia strigillaria (Hübner, 1787) – Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdác-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Notodontidae

Cerura erminea (Esper, 1783) (= *Dicranura e.*) – Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösi-v.

Furcula bifida (Brahm, 1787) (= *Harpyia b.*) – Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Szentmiklós.

Furcula furcula (Clerck, 1759) (= *Harpyia f.*) – Abaliget, üdülők; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.

Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775) (= *Hoplitis m.*, *Hybocampa m.*) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Dicranura ulmi ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Exaereta u.*) – Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdác-dűlő.

Drymonia velitaris (Hufnagel, 1766) (= *Ochrostigma v.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Szentmiklós.

Drymonia oblitterata (Esper, 1785) (= *Ochrostigma melagona*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Drymonia dodonaea ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *D. trimacula*) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, erdészház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Drymonia querna ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Gluphisia crenata (Esper, 1785) – Cserkút, DK.

Notodonta tritophus ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *phoebe* (Siebert, 1790)) – Abaliget, üdülők.

Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Pécs, Deindol.

Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) – Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Petőc-akna; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Peridea anceps (Goeze, 1781) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, erdészház; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház.

Pheosia tremula (Clerck, 1759) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösi-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Pterostoma palpina (Clerck, 1759) – Abaliget, üdülők; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Spatalia argentina ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) (= *Lophopteryx camelina*) – Abaliget, Nyáras-v.; Bükkösd, Szentdomján; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.

Ptilodon cucullina ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Lophopteryx cuculla*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Ptilophora plumigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Cserkút, DK; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő.

Phalera bucephaloides (Ochsenheimer, 1810) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758) – Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Clostera curtula (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Clostera pigra (Hufnagel, 1766) – Bakonya, erdészház; Bakonya, Sás-v.; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol.

Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758) – Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Erebidae (Noctuidae s.l.)

Rivulinae

Rivula sericealis (Scopoli, 1763) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Boletobiinae

Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol.

Hypenodinae

Schranksia taenialis (Hübner, 1809) – Cserkút, DK; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Aventiinae

Laspeyria flexula ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Cserma-h.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol.

Trisateles emortualis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Herminiinae

Simplicia rectalis (Eversmann, 1842) – Cserkút, DK.

Paracolax tristalis (Fabricius, 1794) (= *glaucinalis*, *derivalis*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793) (= *Chytolitha c.*) – Mánfa, Nagy-Mély-v.

Herminia tarsipennis Treitschke, 1835 (= *Zanclognatha t.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782) (= *Zanclognatha t.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Herminia grisealis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Zanclognatha g.*, *Z. nemoralis*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758) (= *Macrochilo t.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol.

12. ábra: *Phalera bucephaloides* (Ochsenheimer, 1810)
(fotó: Uherkovich Ákos)

13. ábra: *Arytrura musculus* (Ménétriés, 1859)
(fotó: Ötvös Károly)

14. ábra: *Acronicta leporina* (Linnaeus, 1758)
(fotó: Ötvös Károly)

15. ábra: *Aedia leucomelas* (Linnaeus, 1758)
(fotó: Ötvös Károly)

Polypogon gryphalis (Herrich-Schäffer, 1851) (= *Pechipogo* g.) – Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.
Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758) (= *Herminia barbaralis*) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, erdészház; Hetvehely, Bükkösd-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Hypeninae

Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösd-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Hypena rostralis (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Eublemminae

Calymma communimacula ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Pécs, Deindol.

Eublemma parva (Hübner, 1808) (= *Porphyria* p.) – Pécs, Deindol.

Eublemma purpurina ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Porphyria* p.) – Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Phytometrinae

Phytometra viridaria (Clerck, 1759) (= *Prothymia* v.) – Cserkút, DK; Pécs, Deindol.

Colobochyla salicalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, Nyáras-v.; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Orfű, Cigány-h.

Calpinae

Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Lymantriinae

Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Lymantria monacha (Linnaeus, 1758) – Bakonya, Sás-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Tettye.

Sphrageidus similis (Fuessly, 1775) (= *Euproctis* s., *Porthesia* s.) – Bükkösd, Szentdomján; Pécs, Deindol.

Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Orfű, Cigány-h.

Pentophora morio (Linnaeus, 1767) (= *Hypogymna* m.) – Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösd-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösd-v.

Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) (= *Dasychira* p.) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Tubes.

Arctornis l-nigrum (Müller, 1764) – Abaliget, üdülők; Bükkösd, Szentdomján; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágóttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol.

Leucoma salicis (Linnaeus, 1758) – Cserkút, Cserkúti-dombok.

Arctiinae

Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766) (= *S. lubricipeda*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Tettye.

Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758) (= *S. menthastris*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Spilosoma urticae (Esper, 1789) – Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Hyphantria cunea (Drury, 1773) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol.

Ocnogyna parasita (Hübner, 1790) – Pécs, Deindol.

Diaphora mendica (Clerck, 1759) (= *Cynia m.*) – Bakonya, erdészház; Kővágóttös, Cserma-h.; Pécs, Deindol.

Diaphora luctuosa (Geyer, 1833) (= *Cynia l.*) – Pécs, Deindol.

Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágóttös, Cserma-h.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Arctia caja (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Szentmiklós; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol.

Arctia villica (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758) – Bakonya, Nagy-Rege.

Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) (= *Panaxia d.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bükkösd, Szentdomján; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) (= *Panaxia q.*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v. Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágóttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) (= *Hypocrita j.*) – Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Árpád-tető.

Lithosiinae

Spiris striata (Linnaeus, 1758) (= *Coscinia s.*) – Cserkút, Cserkúti-dombok.

Miltochrista miniata (Forster, 1771) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758) – Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Thumatha senex (Hübner, 1808) (= *Comacla s.*) – Mánfa, Nagy-Mély-v.

Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766) – Bakonya, erdészház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758) – Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Eilema griseola (Hübner, 1803) – Abaliget, üdülők; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, DK; Pécs, Deindol.

Eilema depressa (Esper, [1787]) (= *Eilema deplana* (Esper, 1787)) – Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol.

Eilema lutarella (Linnaeus, 1758) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós.

Eilema lurideola (Zincken, 1817) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Eilema caniola (Hübner, 1808) – Pécs, Deindol.

Eilema palliatella (Scopoli, 1763) – Bakonya, Nagy-Rege; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Eilema complana (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösd-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Eilema pygmaeola pallifrons (Zeller, 1847) – Cserkút, Cserkúti-dombok.

Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) (= *Sysstropa s.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Syntominae

Amata phegea (Linnaeus, 1758) (= *Syntomis ph.*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Pécs, Deindol.

Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Catocalinae

Lygephila lusoria (Linnaeus, 1758) – Pécs, Deindol.

Lygephila viciae (Hübner, 1822) – Pécs, Deindol.

Lygephila craccae ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Lygephila procax (Hübner, 1813) (= *L. limosa*) – Bakonya, Nagy-Rege; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Arytrura musculus (Ménétriés, 1859) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Cserkúti-dombok.

Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) – Bakonya, erdészház; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Euclidia mi (Clerck, 1759) (= *Callistege m.*) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösd-v.; Pécs, Remete-rét.

Catephia alchymista ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, erdészház; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Minucia lunaris ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Dysgonia algira (Linnaeus, 1767) (= *Ophiusa a.*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Catocala fulminea (Scopoli, 1763) (= *C. paranympa*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol.

Catocala nymphagoga (Esper, 1787) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Petőc-akna; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Catocala hymenaea ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Catocala nupta (Linnaeus, 1767) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Catocala electa (Vieweg, 1790) – Abaliget, üdülők.

Catocala elocata (Esper, 1787) – Abaliget, üdülők.

Catocala promissa ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, Nagy-Rege.

Catocala dilecta (Hübner, 1808) – Pécs, Deindol.

Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) – Abaliget, üdülők; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Euteliidae

Eutelia adalatrix (Hübner, 1813) – Pécs, Tettye.

Nolidae

Meganola kolbi (Daniel, 1935) (= *Roeselia k.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Meganola strigula ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Roeselia s.*) – Bakonya, erdőszház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Meganola togatalis (Hübner, 1798) (= *Roeselia t.*) – Bakonya, erdőszház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK.

Meganola albula ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Roeselia a.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Nola aerugula (Hübner, 1793) (= *Celama centonalis*) – Abaliget, Nyáras-v.; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágótöttös, Cserma-h.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Nola cicatricalis (Treitschke, 1835) (= *Celama c.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház.

Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847) (= *Celama c.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Nagy-Rege; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Nola cristatula (Hübner, 1793) (= *Celama c.*) – Pécs, Deindol.

Nola chlamitulalis (Hübner, 1813) (= *Celama ch.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Orfű, Cigány-h.

Nola cucullatella (Linnaeus, 1758) – Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágótöttös, Cserma-h.; Pécs, Deindol.

Bena bicolorana (Fuessly, 1775) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758) (= *Hylophila fagana*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Earias clorana (Linnaeus, 1761) – Abaliget, üdülők; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösd-v.; Pécs, Deindol.

Earias vernana (Fabricius, 1787) – Cserkút, DK; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Nycteola revayana (Scopoli, 1772) – Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, DK; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.

Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904) – Cserkút, DK; Pécs, Deindol.

Noctuidae

Plusiinae

Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766) (= *triplasia* régen) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Abrostola asclepiadis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758) (= *trigemina*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Trichoplusia ni (Hübner, 1803) – Pécs, Deindol.

Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Diachrysia chryson (Esper, 1789) – Abaliget, üdülők.

Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) (= *Plusia ch.*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Tubes.

Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők.

Autographa gamma (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Autographa jota (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Plusia festucae (Linnaeus, 1758) – Cserkút, DK.

Eustrotiinae

Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766) (= *Jaspidia p.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Deltote deceptor (Scopoli, 1763) (= *Jaspidia d.*) Pécs, Tubes.

Deltote bankiana (Fabricius, 1775) (= *Eustrotia b.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Petőc-akna.

Acontiinae

Acontia lucida (Hufnagel, 1766) – Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol.

Acontia trabealis (Scopoli, 1763) (= *Emmelia t.*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösd-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Aedia funesta (Esper, 1786) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösd-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Kővágótöttös, Cserma-h.; Pécs, Deindol.

Pantheinae

Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Dilobinae

Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Cserkút, vízmű környék; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Acronictinae

Craniophora ligustri ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Moma alpium (Osbeck, 1778) – Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok.

Simyra nervosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Cserkút, DK.

Acronicta alni (Linnaeus, 1767) (*Acronicta* = *Apatele*) – Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Kővágószőlős, Petőc-akna; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Acronicta cuspid (Hübner, 1813) – Abaliget, üdülők.

Acronicta tridens ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Acronicta psi (Linnaeus, 1758) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol.

Acronicta strigosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, Nagy-Rege; Hetvehely, Bükkösd-v.

Acronicta auricoma ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Petőc-akna; Pécs, Deindol.

Acronicta euphorbiae ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, erdészház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós.

Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Acronicta aceris (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Kővágószőlős, Petőc-akna; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Acronicta leporina (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők.

Acronicta megacephala ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Metoponiinae

Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763) – Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Árpád-tető.

Tyta luctuosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Cuculliinae

Shargacucullia lychnitis (Rambur, 1833) – Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Orfű, Cigány-h.

Shargacucullia gozmanyi G. & L. Ronkay, 1994 – Cserkút, Cserkúti-dombok.

Shargacucullia verbasci (Linnaeus, 1758) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Pécs, Tettye.

Shargacucullia prenanthis (Boisduval, 1840) – Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Cucullia lactucae ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, Nyáras-v.; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós.

Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758) – Cserkút, DK; Pécs, Deindol.

Cucullia chamomillae ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Pécs, Deindol.

Oncocnemidinae

Calophasia lunula (Hufnagel, 1766) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Calophasia platyptera (Esper, 1788) – Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol.

Calophasia opalina (Esper, 1793) (= *casta*) – Pécs, Deindol.

Amphipyridae

Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Amphipyra berbera svensoni (Fletcher, 1968) – Abaliget, üdülők; Pécs, Deindol.

Amphipyra tragopogonis (Clerck, 1759) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Amphipyra livida ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol.

Psaphidinae

Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766) (= *Brachionycha s.*) – Bakonya, erdészház; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol.

Valeria oleagina ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Lamprosticta culta ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Meganephria bimaculosa (Linnaeus, 1767) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol.

Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Cserkút, vízmű környék; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Condicinae

Acosmetia caliginosa (Hübner, 1813) – Cserkút, Szentmiklós.

Eucarta amethystina (Hübner, 1803) (= *Telesilla a.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösd-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház.

Eucarta virgo (Treitschke, 1835) (= *Callagonia v.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Heliothinae

Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758) – Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Tettye.

Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Protoschinia scutosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Melicleptria s.*) – Orfű, Cigány-h.

Heliothis nubigera Herrich-Schäffer, 1851 – Abaliget, üdülők; Cserkút, DK; Pécs, Deindol.

Heliothis peltigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Pécs, Deindol.

Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766) (= *dipsacea* (Linnaeus, 1767)) – Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Tettye.

Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) (= *Heliothis a.*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Cserma-h.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Bryophilinae

Cryphia fraudatricula (Hübner, 1803) (= *Bryophila palliola*) – Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Cryphia algae (Fabricius, 1775) (= *Bryophila a.*) – Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Bryophila raptricula ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Bryophila r.*) – Cserkút, DK.

Bryophila felina (Eversmann, 1852) (= *B. raptricula*) – Abaliget, üdülők; Pécs, Deindol.

Eriopinae

Calloptistria juvenina (Stoll, 1782) – Kővágószőlős, Petőc-akna.

Xyleninae

Pseudeustrotia candidula ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Deltote*, *Eustrotia c.*) – Abaliget, üdülők. Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol.

Spodoptera exigua (Hübner, 1808) – Bakonya, Nagy-Rege; Pécs, Deindol.

Elaphria venustula (Hübner, 1790) (= *Agrotis v.*, *Haplotis v.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, erdészház. Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, Szentmiklós; Kővágótöttös, Cserma-h.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol.

Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766) – Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Pécs, Deindol.

Caradrina kadenii (Freyer, 1836) – Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Caradrina aspersa (Rambur, 1834) – Abaliget, üdülők; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Caradrina clavipalpis (Scopoli, 1763) – Bakonya, erdészház; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol.

Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) (= *H. alsines* (Brahm, 1891)) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Hoplodrina blanda ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Petőc-akna; Pécs, Deindol.

Hoplodrina superstes (Ochsenheimer, 1816) – Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Hoplodrina respersa ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Hoplodrina ambigua ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766) (= *Meristis t.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Rusina ferruginea (Esper, 1785) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Athetis gluteosa (Treitschke, 1835) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol.

Athetis furvula (Hübner, 1808) – Pécs, Deindol.

Athetis lepigone (Möschler, 1860) – Bakonya, Nagy-Rege.

Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház.

Polyphaena sericata (Esper, 1787) (= *viridis* (Villers, 1789)) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Thalophila matura (Hufnagel, 1766) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Cserma-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Actinotia polyodon (Clerck, 1759) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol.

Chloantha hyperici ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Actinotia h.*) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Auchmis detera (Esper, 1787) – Abaliget, üdülők.

Calamia tridens (Hufnagel, 1766) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós.

Gortyna flavago ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Hydraecia micacea (Esper, 1789) – Hetvehely, Bükkösi-v.

Hydraecia petasitis Doubleday, 1847 – Mánfa, Nagy-Mély-v.

Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós.

Luperina testacea ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Rhizedra lutosa (Hübner, 1803) – Kővágószőlős, Kajdács-dűlő.

Nonagria typhae (Thunberg, 1784) – Abaliget, üdülők.

Denticucullus pygmina (Haworth, 1809) (= *Chortodes*, *Arenostola* p.) – Pécs, Deindol.

Photedes fluxa (Hübner, 1809) (= *Chortodes* f., *Arenostola* f.) – Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Photedes minima (Haworth, 1809) – Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola;

Photedes extrema (Hübner, 1809) (= *Chortodes* e., *Arenostola* e.) – Bakonya, erdőszház; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol.

Globia sparganii (Esper, 1790) (= *Archana* s.) – Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Pabulatrix pabulatricula (Brahm, 1791) (= *Eremobina* p., *Apamea* p.) – Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) – Bakonya, erdőszház; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Apamea lithoxylaea ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Apamea remissa (Hübner, 1809) – Bakonya, Nagy-Rege; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Apamea sordens (Hufnagel, 1766) – Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol.

Apamea illyria Freyer, 1846 – Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol.

Loscopia scolopacina (Esper, 1788) (= *Apamea* s.) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Mesoligia furuncula ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, erdőszház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Oligia strigilis (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Oligia latruncula ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Oligia versicolor (Borkhausen, 1792) – Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Tettye.

Episema glaucina (Esper, 1789) – Cserkút, DK.

Episema tersa ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *trimacula*) – Cserkút, DK; Pécs, Deindol.

Cleoceris scoriacea (Esper, 1789) – Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol.

Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761) – Abaliget, üdülők; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő.

Ipimorpha subtusa ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Cserkút, Szentmiklós.

Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767) – Kővágószőlős, Kajdács-dűlő.

Cosmia affinis (Linnaeus, 1767) – Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Tettye.

Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Cosmia pyralina ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Cserkút, DK; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol.

Tiliacea citrigo (Linnaeus, 1758) (= *Cirrhia c.*, *Xanthia c.*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Tiliacea aurago ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Xanthia a.*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Tiliacea sulphurago ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Cirrhia fulvago* Clerck, 1759) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Lithophane socia (Hufnagel, 1766) (= *hepatica* Clerck, 1759) – Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Cserkút, vízmű környék; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Tettye.

Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758) – Cserkút, Cserkúti-dombok.

Xylena vetusta (Hübner, 1813) – Cserkút, DK.

Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Cserkút, vízmű környék; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Cserkút, vízmű környék; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Conistra ligula (Esper, 1791) – Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő.

Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763) (= *vau-punctatum*) – Abaliget, üdülők; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Cserkút, vízmű környék; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Conistra veronicae (Hübner, 1813) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Tettye.

Conistra rubiginea ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Conistra erythrocephala ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Cserkút, vízmű környék; Kővágószőlős, Petőc-akna;

Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Jodia croceago ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Cserkút, DK; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Agrochola lychnidis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, erdészház; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Agrochola nitida ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Agrochola humilis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, erdészház; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol.

Agrochola litura (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Tettye.

Agrochola helvola (Linnaeus, 1758) – Bakonya, erdészház; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Agrochola lota (Clerck, 1759) – Cserkút, DK; Pécs, Deindol.

Agrochola macilenta (Hübner, 1809) – Bakonya, erdészház; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Cserkút, vízmű környék; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, vízmű környék; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Agrochola laevis (Hübner, 1803) – Bakonya, erdészház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Cserma-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Cirrhia icteritia (Hufnagel, 1766) (= *Xanthia i.*) – Bakonya, erdészház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Pécs, Deindol.

Cirrhia gilvago ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Xanthia g.*) – Kővágószőlős, Petőc-akna.

Parastichtis suspecta (Hübner, 1817) – Cserkút, DK.

Apterogenum ypsilon ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Parastichtis y.*, *Sidemia y.*, *S. fissipuncta*) – Abaliget, üdülők; Cserkút, DK; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol.

Atypha pulmonaris (Esper, 1790) – Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Brachylomia vimalis (Fabricius, 1776) – Pécs, Deindol.

Dichonia convergens ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, erdészház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Griposia aprilina (Linnaeus, 1758) – Pécs, Deindol.

Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775) (= *protea* ([Denis & Schiffermüller], 1775)) – Bakonya, erdészház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Dryobotodes monochroma (Esper, 1790) – Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol.

Ammoconia caecimacula ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, erdészház; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Aporophyla lutulenta ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, erdészház; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol.

Polymixis polymita (Linnaeus, 1761) – Pécs, Deindol.

Blepharita satura ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Mniotype s.*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Tettye.

Mesogona acetosellae ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, erdészház; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Hadeninae

Mythimna turca (Linnaeus, 1761) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágótöttös, Cserma-h.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol.

Mythimna pudorina ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, Nyáras-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Orfű, Cigány-h.

Mythimna conigera ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Pécs, Deindol.

Mythimna pallens (Linnaeus, 1758) – Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Mythimna impura (Hübner, 1808) – Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós.

Mythimna straminea (Treitschke, 1825) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Cserkúti-dombok.

Mythimna vitellina (Hübner, 1808) – Abaliget, üdülők; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Mythimna albipuncta ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Mythimna l-album (Linnaeus, 1767) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Leucania comma (Linnaeus, 1761) – Bükkösd, Szentdomján.

Leucania obsoleta (Hübner, 1803) – Cserkút, DK; Pécs, Tettye.

Hadula trifolii (Hufnagel, 1766) (= *Discestra t.*) – Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Sideridis rivularis (Fabricius, 1775) (= *Hadena r.*, *H. cucubali*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol.

Conisania luteago ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Hadena l.*) – Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Polia nebulosa (Hufnagel, 1766) – Bakonya, erdészház.

Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761) (= *Mamestra p.*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Sás-v.; Cserkút, DK; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Ceramica pisi (Linnaeus, 1758) (= *Mamestra p.*) – Pécs, Deindol.

Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely,

Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház.

Lacanobia contigua ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós.

Lacanobia suasa ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Tettye.

Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766) (= *serena* ([Denis & Schiffermüller], 1775)) – Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol.

Hecatera dysodea ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Aetheria d.*) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol.

Hadena bicruris (Hufnagel, 1766) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Hadena confusa (Hufnagel, 1766) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós.

Hadena filigrana (Esper, 1788) (= *filigrana* (Esper, 1796)) – Kővágószőlős, Kajdács-dűlő.

Hadena perplexa ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *lepida*) – Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Panolis flammea ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Hetvehely, Bükkösd-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Orthosia incerta (Hufnagel, 1766) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösd-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Cserkút, vízmű környék; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Orthosia miniosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, Nyáras-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) (= *stabilis* ([Denis & Schiffermüller], 1775)) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösd-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, vízmű környék; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Orthosia cruda ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösd-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, vízmű környék; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Orthosia gracilis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, erdészház; Pécs, Árpád-tető.

Orthosia opima (Hübner, 1809) – Kővágószőlős, Kajdács-dűlő.

Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bükkösd, Bükkösd-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Cserkút, vízmű környék; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Anorthoa munda ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Orthosia m.*) – Bakonya, erdőszél; Bükkösd, Bükkösd-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, vízmű környék; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszél; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Perigrapha i-cinctum ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Pécs, Deindol.

Egira conspiciaris (Linnaeus, 1758) (= *Xylomiges c.*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszél; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösd-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszél; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Tholera cespitis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Cserkút, DK.

Tholera decimalis (Poda, 1761) – Abaliget, üdülők; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.

Noctuinae

Peridroma saucia (Hübner, 1808) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol.

Dichagyris signifera ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Yigoga s.*) – Cserkút, Szentmiklós.

Euxoa obelisca ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Euxoa temera (Hübner, 1808) – Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Euxoa aquilina ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós.

Euxoa tritici (Linnaeus, 1761) (= *crypta* (Dadd, 1927)) – Pécs, Deindol.

Agrotis cinerea ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszél; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösd-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszél; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Agrotis segetum ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszél; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszél; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Agrotis clavis (Hufnagel, 1766) – Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós.

Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszél; Bükkösd, Bükkösd-v.; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Axylia putris (Linnaeus, 1761) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszél; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösd-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdőszél; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösd-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszél; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Diarsia brunnea ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Mánfa, Nagy-Mély-v.

Diarsia rubi (Vieweg, 1790) – Abaliget, üdülők; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Tubes.

Cerastis rubricosa ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, erdőszél; Bükkösd, Bükkösd-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós;

Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Cerastis leucographa ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, Nyáras-v.; Bükkösd, Szentdomján; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Chersotis rectangula ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol.

Chersotis multangula (Hübner, 1803) – Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye.

Noctua pronuba Linnaeus, 1758 – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Noctua fimbriata (Schreber, 1759) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Noctua orbona (Hufnagel, 1766) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Noctua interposita (Hübner, 1790) – Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Noctua comes Hübner, 1813 – Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Noctua interjecta Hübner, 1803 – Bakonya, Nagy-Rege; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Noctua janthina ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Noctua janthe (Borkhausen, 1792) – Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol.

Epilecta linogrisea ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol.

Opigena polygona ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Pécs, Deindol.

Xestia baja ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Hetvehely, Bükkösi-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Xestia stigmatica (Hübner, 1813) (= *rhomboidea* (Esper, 1790)) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, DK; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol.

Xestia castanea (Esper, 1798) – Bakonya, erdészház; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol.

Xestia xanthographa ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Tettye.

Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, erdészház; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágószőlős, Petőc-akna; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Xestia triangulum (Hufnagel, 1766) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761) – Abaliget, üdülők; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, DK; Cserkút, Szentmiklós; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye.

Naenia typica (Linnaeus, 1758) – Hetvehely, Bükkösi-v.

Hesperiidae

Erynnis tages (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösdi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösdi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Carcharodus alceae (Esper, 1780) – Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Spialia orbifer (Hübner, 1823) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Pécs, Deindol; Pécs, Tubes.

Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösdi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösdi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mandulás; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Tubes.

Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910) – Pécs, Árpád-tető.

Pyrgus carthami (Hübner, 1813) (= *fritillarius*) – Pécs, Tubes.

Pyrgus alveus (Hübner, 1803) – Pécs, Árpád-tető.

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösdi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol.

Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) – Bükkösd, Bükkösdi-v.; Hetvehely, Bükkösdi-v.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Hesperia comma (Linnaeus, 1758) – Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Ochlodes sylvanus (Esper, 1779) (= *O. venata* (Bremer & Grey, 1853)) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösdi-v.; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Cserkúti-dombok; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Éger-v.; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) – Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösdi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Tubes.

Papilionidae

Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Cserkút, DK; Pécs, Deindol; Pécs, Tubes.

Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) – Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösdi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösdi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Papilio machaon Linnaeus, 1758 – Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösdi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Tubes.

Pieridae

Colias hyale (Linnaeus, 1758) – Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösdi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösdi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Colias alfajariensis Ribbe, 1905 (= *C. australis*) – Bükkösd, Bükkösdi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, DK; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Colias erate (Esper, 1805) – Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösdi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Pécs, Deindol.

Colias croceus (Fourcroy, 1785) – Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Tubes.

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Orfű, Vörös-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Leptidea morsei major Grund, 1905 – Abaliget, Nyáras-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Tubes.

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) – Cserkút, DK; Pécs, Tubes.

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) – Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Pieris napi (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Keresztkunyhó; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Pontia daplidice edusa (Fabricius, 1777) – Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mandulás; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Riodinidae

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösi-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Lycaenidae

Lycaena dispar rutila Werneburg, 1864 (= *Thersamonia d.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Árpád-tető.

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Lycaena thersamon (Esper, 1784) (= *Thersamonia t.*) – Abaliget, üdülők; Pécs, Deindol; Pécs, Tubes.

Lycaena tityrus (Poda, 1761) (= *Loweia t.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758) (= *Thecla qu.*, *Quercusia qu.*) – Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Tubes.

Thecla betulae (Linnaeus, 1758) – Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) – Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágótöttös, Cserma-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Satyrion w-album (Knoch, 1782) (= *Strymon w.*) – Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Éger-v.; Pécs, Remete-rét.

Satyrion pruni (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Pécs, Deindol.

Satyrion spini ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Strymon s.*) – Bükkösd, Bükkösi-v.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Tubes.

Satyrion ilicis (Esper, 1779) (= *Strymon i.*) – Bükkösd, Szentdomján; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Satyrion acaciae (Fabricius, 1787) (= *Strymon a.*) – Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) – Pécs, Deindol.

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) – Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Cupido minimus (Fuessly, 1775) – Bakonya, Sás-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Cupido argiades (Pallas, 1771) (= *Everes a.*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804) (= *Everes a.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Sás-v.; Hetvehely, Bükkösi-v.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Éger-v.

Cupido decolorata (Staudinger, 1886) (= *Everes d.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Sás-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Tubes.

Pseudophilotes schiffermuelleri (Hemming, 1929) (= *Philotes vicrama* (Moore, 1865)) – Cserkút, DK; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816) – Pécs, Deindol; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) – Bakonya, Nagy-Rege; Hetvehely, Bükkösi-v.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Plebeius argus (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Plebeius argyrognomon (Bergsträsser, 1779) (= *Lycæides a.*) – Bükkösd, Szentdomján; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Tubes.

Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Sás-v.; Cserkút, DK; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Mánfa, Nagy-Mély-v.;

Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Polyommatus dorylas ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Lysandra hylas*) – Pécs, Tubes.

Polyommatus daphnis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Meleageria d.*) – Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Tubes.

Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) (= *Lysandra b.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Nymphalidae

Libytheinae

Libythea celtis (Laicharting, 1782) – Cserkút, vízmű környék; Pécs, Deindol.

Limenitinae

Limenitis reducta Staudinger, 1901 – Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Neptis rivularis (Scopoli, 1763) – Abaliget, üdülők; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Neptis sappho (Pallas, 1771) (= *N. hylas*, *N. aceris*) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Sás-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Tubes.

Heliconiinae

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Argynnis adippe ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Fabriciana berecynthia*) – Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) (= *Mesoacidalia a.*) – Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) – Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Brenthis daphne ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Boloria dia (Linnaeus, 1767) (= *Clossiana d.*) – Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdészház; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) (= *Clossiana e.*) – Cserkút, DK; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Árpád-tető.

Boloria selene ([Denis & Schiffermüller], 1775) (= *Clossiana s.*) – Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Árpád-tető.

Apaturinae

Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Cserkúti-dombok; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Apatura iris (Linnaeus, 1758) – Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

16. ábra: *Papilio machaon* Linnaeus, 1758
(fotó: Uherkovich Ákos)

17. ábra: *Limenitis reducta* Staudinger, 1901
(fotó: Uherkovich Ákos)

17. ábra: *Nymphalis io* (Linnaeus, 1758)
(fotó: Uherkovich Ákos)

18. ábra: *Nymphalis polychloros* (Linnaeus, 1758)
(fotó: Ötvös Károly)

Nymphalinae

Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Hetvehely, Bükkösi-v.

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) – Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Tubes.

Melitaea didyma (Esper, 1778) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Éger-v.; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Abaliget, Nyáras-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Tubes.

Melitaea trivia ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösi-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Melitaea athalia (Rottenburg, 1775) (= *Mellicta a.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mandulás; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Melitaea aurelia Nickerl, 1850 (= *Mellicta a.*) – Cserkút, DK; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Remete-rét.

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösi-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Nymphalis io (Linnaeus, 1758) (= *Inachis i.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Kereszt-kunyhó; Pécs, Mecsekszentkút, erdősház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Nymphalis urticae (Linnaeus, 1758) (= *Aglais u.*) – Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, DK; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Tubes.

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Kereszt-kunyhó; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) (= *Eu Vanessa a.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Hetvehely, Bükkösi-v.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Nymphalis c-album (Linnaeus, 1758) (= *Polygonia c.*) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) (= *Cynthia c.*) – Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Kereszt-kunyhó; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Satyrinae

Pararge aegeria tircis (Godart, 1821) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdősház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tettye; Pécs, Tubes.

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) – Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Cserma-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) (= *iphis* ([Denis & Schiffermüller], 1775)) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Bükkösd, Szentdomján; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Bicsérdi-vízf.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, erdőszház; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767) – Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola.

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) – Abaliget, üdülők; Cserkút, Cserkúti-dombok; Hetvehely, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) – Abaliget, Nyáras-v.; Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bakonya, Sás-v.; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Kővágótöttös, Cserma-h.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Orfű, Cigány-h.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) – Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Kővágószőlős, Kajdács-dűlő; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mandulás; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Minois dryas (Scopoli, 1763) – Abaliget, üdülők; Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Mánfa, Nagy-Mély-v.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) – Bakonya, Nagy-Rege; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Arethusana arethusia ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Cserkút, DK; Pécs, Éger-v.; Pécs, Remete-rét; Pécs, Tubes.

Brintesia circe (Fabricius, 1775) – Bakonya, Nagy-Rege; Bükkösd, Bükkösi-v.; Cserkút, Cserkúti-dombok; Cserkút, DK; Hetvehely, Bükkösi-v.; Pécs, Árpád-tető; Pécs, Deindol; Pécs, Éger-v.; Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola; Pécs, Tubes.

Megvitatás

A fauna általános jellemzése

A tájvédelmi körzet teljes területén az elmúlt fél évszázadban végzett felméréseim eddig 763 fajt eredményeztek. Ezek megoszlása családonként a következő módon alakult (1. táblázat):

1. táblázat: A fajok száma a Nyugat-Mecsek TK-ban, családonként

Család	fajszám	Család	fajszám
Lasiocampidae	14	Nolidae	16
Sphingidae	13	Noctuidae	248
Saturniidae	4	Hesperiidae	13
Drepanidae	6	Papilionidae	4
Thyatridae	8	Pieridae	13
Geometridae	241	Riodinidae	1
Notodontidae	28	Lycaenidae	29
Erebidae	83	Nymphalidae	40
Eutelidae	1	Összesen:	763

A magas fajszám a változatos környezeti feltételek következménye, de emellett természetesen a rendszeres és kitartó gyűjtőmunka is szükséges volt hozzá. Például a Duna-Dráva Nemzeti park Dráva menti területeiről – ugyancsak sok ponton végzett rendszeres munka eredményeképpen 775 fajt ismerünk (ÁBRAHÁM, UHERKOVICH 1998), de ezen belül csupán az egykori Barcsi Tájvédelmi körzetből 712 faj vált ismertté (UHERKOVICH 1985). A kis kiterjedésű, de igen alaposan kutatott Villányi-hegységből 724 fajt mutattak ki (ÁBRAHÁM, UHERKOVICH 2000).

Mint mindenhol, itt is a nagy elterjedésű, széles ökológiai spektrumú fajok száma a legmagasabb, mennyiségi arányuk (dominanciájuk) pedig meghatározó.

Védett fajok

Az elmúlt mintegy 50 év alatt kimutatott 763 nagylepke-faj közel tizede, 74 faj áll törvényes védelem alatt (Magyar Közlöny 2015) (2. táblázat). Ezen belül két olyan faj is van, amelyek fokozottan védettek, ezek az *Arytrura musculus* és a *Iolana iolas*.

Az *Arytrura musculus* ismert „klasszikus” lelőhelye a Kis-Balatonon volt, ahol mintegy 7-8 évtizede fogták (KOVÁCS 1953). Később ismertté vált Bátorligetről, valamint Tihanyból és Debrecenből. Néhány évtizednek el kellett telnie, míg újabb helyeken bukant fel a kilencvenes években, ekkor kiterjedtebb kelet-magyarországi populációit fedezték fel, valamint egy állandóan működő erdészeti fénycsapda a Baranya megyei Sumonyban fogta a kilencvenes években, több alkalommal (NÉMETH, SZABÓKY 1998). A Nyírség déli részén több helyről számos példánya került elő az ezredforduló környékén (BARANYI 2003). A kétezres években a Dél-Dunántúlon több helyen mutatták ki, például a korábban igen alaposan kutatott Barcsi Tájvédelmi körzetben (MALGAY, BRUNNER 2011). Ezek után talán már nem is volt különösebben meglepő, hogy megfogtuk a Dél-Zselicben (UHERKOVICH, ÁBRAHÁM 2007), valamint a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi körzet két pontjáról került elő:

Cserkúton 2007. július 5-én fényre jött két példánya, számára eléggé alkalmatlannak tűnő száraz cseres-tölgyes szomszédságában, kökény-galagonya bozót tisztásán. A gyűjtőhely közelében, néhány száz méterre öreg fűzfák tenyésznek a Cserkúti-patak völgyében, talán ott fejlődtek a hernyók. Egy példányát újabban, 2015. július 4-én Abaligeten fényképezte le Ötvös Károly (8. ábra).

A fentiek mellett előkerült még Pécs déli részén, a Nagypostavölgyben is, itt 2008. június 4-én gyűjtötte Gergely Tibor. Ez utóbbi gyűjtőhelytől északra, a völgyfenéken kiterjedtebb füzes van. Még újabban a Dráva mentén, a cún-szaporcai holt-Dráva partján találkoztunk vele (2017. július 17.), ártéri ligeterdőben. Utóbbi négy előfordulása (Cserkút, Abaliget, Pécs-Nagypostavölgy, Szaporca) eddig publikálatlan volt.

A *Iolana iolas* a Pécs feletti, délies lejtőkön 50-60 éve igen gyakori volt. Azóta a számára alkalmas élőhelyek – azaz tápnövénye, a *Colutea arborescens* termőhelyei – erősen összezsugorodtak, részben a város terjeszkedése (déli lejtő kertjei, szőlői közül sok beépült), részben pedig a Misina-Tubes vonulat délnyugati lejtői és a Tettye környéke erdőtisztításainak beerdősülése miatt. Bár a lepkék manapság is rendszeresen láthatók például a Deindolokban – itt elhagyott szőlőkben sokfelé tenyészik a tápnövény – de az egyedszám erősen csökkent. A Tettye környékén évtizedek óta nem láttam, és nagyon megritkult a Tubes-láb kisebb tisztásain is.

A védett fajok többségét egyenként nem jellemezhetjük nagy számuk miatt, mivel ezt a dolgozat terjedelme nem teszi lehetővé. Az általánosan elterjedt és – legalábbis egyelőre – viszonylag gyakori fajokról nem érdemes említést tenni. Bár évtizedekkel ezelőtt senki sem hitte volna, hogy a *Nymphalis urticae* miatt aggódnunk kellene, napjainkra gyakorlatilag eltűnt. Több más védett faj is nagyon megritkult, vagy teljesen eltűnt, legalábbis a Nyugati-Mecsek területéről, mint például az *Acherontia atropos*, *Saturnia pyri* (10. ábra), *Dicranura ulmi*, *Ocnogyna parasita*, *Leptidea morsei major*, *Zerynthia polyxena*, *Lycaena thersamon*, *Satyrrium w-album*, *Pseudophilotes schiffermuelleri*, *Limenitis reducta* (16. ábra) vagy az *Arethusana arethus*. A védett fajok közül továbbiakat lehetne felsorolni itt, a védettséget nem élvezők közül szintén sokat nem láttunk itt évtizedek óta.

Egyes védett fajok csak egyetlen alkalommal kerültek elő, annak ellenére, hogy számos ponton – a következő felsorolt fajok élőhelyén is – rendszeres mintavételek, gyűjtések, megfigyelések voltak. Az *Entephria caesiata* egyetlen példánya a mánfai Kőlyuknál jött fényre, egyébként országosan is kivételesen ritkán fordul elő. Ugyanakkor a *Dyscia conspersaria* – amelynek egyetlen példányát a pécsi Tettyén fogtam még a hetvenes években – a szomszédos Villányi-hegységben még nem volt ritka mintegy 30 éve. Szintén egyetlen példányát láttuk a *Periphanes delphinii* fajnak.

Ezzel szemben több olyan, korlátozott elterjedése vagy populációinak veszélyeztetettsége miatt védelemben részesülő fajunk van, amelyek egyelőre még rendszeresen előfordulnak a tájvédelmi körzet területén.

Az elsősorban melegkedvelő tölgyesekben és molyhostölgyesekben élő, ezért viszonylag korlátozott elterjedésű *Marumba quercus* (9. ábra) az elmúlt években sem volt ritka: rajzási idejében rendszeresen és többfelé megfigyelhettük. Hasonlóan a látványos küllemű *Phalera bucephaloides* (13. ábra), amely egyik lelőhelyén – Pécs, Mecsekszentkút, Szunyola – kifejezetten gyakori, sőt időnként tömeges volt. A korábbi szakirodalomban – amelyet itt nem részletezek –, ritkán említett *Perconia strigillaria* a tájvédelmi körzetben (és attól északra, a Zselicben is) kifejezetten gyakori, rajzási ideje alatt csaknem mindenütt nagyobb számban látható, sőt, nappal is könnyen felzavarható az aljnövényzetből.

Az utóbbi évtizedekben többnyire csak a Mecsekben észlelt *Diaphora luctuosa* kis számban ugyan, de szinte évről-évre megjelenik, a Deindolokban április folyamán a legutóbbi években is láttuk egy-egy példányát. A *Iolana iolas* ugyancsak nem ritka ott, ahol tápnövénye is tenyészik.

Az alig több mint két évtizede leírt *Shargacucullia gozmanyi* G. & L. Ronkay 1994 a Bükkből, a Dunántúli-középhegységből, majd a Villányi-hegységből vált ismertté (ÁBRAHÁM, UHERKOVICH 2000). Azóta több újabb lelőhelye ismertté vált, de eddig még nem rajzolódott ki pontosan elterjedési területe a közeloakon fajokkal mutatott hasonlósága miatt. Mivel fényre csak nagyon gyengén reagál, ezért inkább hernyóit érdemes tápnövényén (*Verbascum phoenicem*) keresni.

A fokozott nedvesséigényű *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772) néhány példánya ugyan szárazabb élőhelyeken is előkerült, de alapvetően itt is a kissé nedvesebb helyek egyre ritkuló állata. A tájvédelmi körzet völgyeiben várható újabb előkerülése.

Tapasztalataim szerint az elmúlt évtizedek folyamán gyakoribbá vált például az *Euphydryas maturna*, *Satyrrium pruni*, *Drymonia velitaris* vagy *Melitaea trivia*. A gyakoriság növekedése a védett fajokon belül inkább kivételnek számít.

Más fajok eltűntek, majd újra megjelentek, azaz évtizedekig nem vagy alig fogtuk őket, napjainkban ismét számos példányukat észleltük. Egyik ilyen faj a *Polypogon gryphalis* (Láperdei karcsúbagoly), amely Bakonya körül, több ponton újabban ismét előkerült, előtte évtizedekig sehol sem láttuk, meg általában is nagyon kevés ismert elterjedési adata volt.

Több védett faj – pl. *Agria tau* (11. ábra), *Euplagia quadripunctaria*, *Autographa jota*, *Gonepteryx rhamni*, *Neptis sappho*, *Argynnis paphia*, *Brenthis daphne*, *Nymphalis io* (12. ábra), *Nymphalis polychloros* (18. ábra) vagy *Pyronia tithonus* – a tájvédelmi körzet területén korábban is gyakori volt (természetesen csak a számukra alkalmas biotópokban), napjainkban is nagyobb számban láthatók, így ezek nem tűnnek veszélyeztetettnek.

A korábbi szakirodalom két további fokozottan védett faj mecseki előfordulását is említi. Az *Erannis ankeraria* az ötvenes évek első felében a mai nevén Hotel Kikelet szállótól nyugatra fordult elő. Ugyanazon a helyen a nyolcvanas években rajzási idejében gyűjtöttem ott, de ez a faj másutt sem kerül elő.

A *Cucullia formosa* Rogenhofer, 1860 50-60 éve még élt a Tubesen. Lehetséges, hogy még ma is tenyészik ott, mindenesetre a fényre kevésbé reagáló imágóját nem láttam, a hernyót pedig nem kerestem.

Egyéb ritka és jellemző fajok

Az *Aedia leucomelas* a magyar fauna új faja – amelynek első példányai a kilencvenes években kerültek elő – a Mecseken is meghonosodott, és nem nagy számban, de többször és többfelé előkerült a kilencvenes évek közepétől kezdve. A szomszédos Villányi-hegységben fogtuk először (ÁBRAHÁM, UHERKOVICH 2000).

Hypoxystis pluviaria (Fabricius, 1787). Nyugat-Magyarországon elterjedt és gyakori, délkelet felé haladva gyakorisága erősen csökken. Baranyában fogták a Villányi-hegységben is (ÁBRAHÁM, UHERKOVICH 2000), majd a tájvédelmi körzet nyugati peremén is kimutattuk.

Nem kifejezetten a *Cerura erminea* (Esper, 1783) számára alkalmasak a tájvédelmi körzet élőhelyei. Míg például eléggé gyakorinak bizonyult a Dráva menti ligeterdőkben (UHERKOVICH, ÁBRAHÁM 1995), nem ritka a dél-baranyai keményfájú ligeterdőkben (Gilvánfa, Kisdobsza: UHERKOVICH 1977, 1990), ugyanakkor korábban jelentős számban észleltem egy homoki fehérnyárasban a Duna-Tisza-közi Ásotthalomnál. A Nyugat-Mecsekben ritka, ötven év alatt mindössze három helyen fogtuk egy-két példányát.

A *Lycia pomonaria* (Hübner, 1790)-t korábban a kifejezetten ritka fajok között tartották nyilván. Ebben valószínűleg az is közrejátszott, hogy rövig ideig, igen korai időpontban rajzik (sokszor már február második felében). A Nyugat-Mecsek TK-ben rendszerezen előkerült, napjainkban sem mondható ritkának, ha számára megfelelő helyen – töl-

gyesekben – és megfelelő időpontban keressük. Higanygőzlámpa fényére már alkonyatkor repül, nem ritkán akár 10-20 példányát is lehet látni egy este.

Az *Acronicta alni* is azon fajok közé tartozik, amelynek elterjedését korábban alig ismerték, hiszen első hazai előfordulását csak 1957-ben jelezték, és még a hetvenes-nyolcvanas években is alig volt bizonyítópéldány a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményében. Tapasztalataim szerint a Dél- és Nyugat-Dunántúl csaknem minden táján elterjedt és nem különösebben ritka, a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi körzetben több helyen számos példánya került elő. Nevével ellentétben („alni” = éger) nálunk minden bizonnyal polifág, tölgyön is élő faj.

Meg kell emlékeznünk a nagyon látványos küllemű *Antherea yamamai* mecseki térhódításáról is. KOVÁCS (1957) számolt be első hazai előfordulásáról. Két évtizeddel később már többfelé észlelték Vas, Zala és Somogy megyékben (UHERKOVICH 1978b). A Zselic baranyai részén a nyolcvanas évek elején helyenként már tömegesen fordult elő (UHERKOVICH 1982). A nyolcvanas évek végén vagy a kilencvenes években jelent meg a Mecsekben. Mintegy 20 évvel ezelőtt már többfelé előfordult, bár gyakorinak sehol sem mondható. Mecseki adatainak többsége a 2000-es évekből származik. Amíg régebbi előfordulási helyei inkább a síkvidéki kocsányos tölgyesek elterjedésével estek egybe, mára ennél sokkal szárazabb termőhelyeken is felbukkan, például a hegység délies lejtőin is, ahol minden valószínűség szerint nem kocsányos tölgyön, hanem valamelyik másik tölgy fajon fejlődik.

Vándorlepkék

Egy korábbi munkámban foglalkoztam a dél-dunántúli vándorlepkékkel (UHERKOVICH 1979). A lepkevándorlások egyes fajok esetén rendszeresek (pl. *Vanessa cardui*, *V. atalanta*, *Agrius convolvuli*), ezek a fajok minden évben rendszeresen és többnyire nagyobb egyedszámban vonulnak északra a Mediterráneumból a tavasz vége felé, vagy a nyár elején. E fajok itt fejlődő nemzedéke általában meglehetősen egyedgazdag.

Ezzel szemben más fajok csak az utóbbi években váltak rendszeres és tömeges vándorokká. Közülük is ki kell emelni a *Helicoverpa armigera* fajt, amely az elmúlt egy-két évtizedben vált tömeges vándorrá, mostanra a vándorlepkék közül a leggyakoribb, egy-egy este akár több tucatnyi példát láthatjuk lámpák körül. A két közelrokon faj, a *Heliothis nubigera* és a *H. peltigera* viszont észrevehetően megritkult.

A tájvédelmi körzet területén számos egyéb vándorlepké-faj jelent meg kisebb-nagyobb egyedszámban.

Kifejezetten ritkán láttuk az *Orthonama obstipata*, *Eublemma parva* és *Eublemma purpurina* fajokat, némelyikből csak egy-két példányt az elmúlt évtizedekben. Ugyanígy az *Acherontia atropos* is rendkívül ritkán jelenik meg, bizonyító példánya csak Cserkútról van, még a nyolcvanas évek elejéről.

A *Spodoptera exigua* vagy a *Peridroma saucia* időnként gyakori lehet, máskor évekig nem találkoztunk velük. Csak a legújabb időkben jelent meg itt a *Rhodometra sacraria*, *Trichoplusia ni* és a *Lampides boeticus*, bár más tájakon – például a Villányi-hegységben – egy-egy példányukkal már évtizedekkel ezelőtt is találkozhattunk. Mindhárom említett fajt a Pécs feletti Deindolokban láttuk az utóbbi egy-két évben. Ugyancsak nem volt régebbi adata a *Noctua interjecta* fajnak innét, bár első hazai felbukkanása (Hedrehely, Zselic: UHERKOVICH 1980b) óta néhányszor már gyűjtötték másutt. A tájvédelmi körzetben a kétezres években észleltük néhány példányát.

Úgy tűnik, hogy a *Colias croceus* is – amely évtizedekkel ezelőtt kifejezetten gyakori vagy tömeges volt – némileg visszaszorult.

A korábban inkább vándorlepkének tartott *Dysgonia algira* (GOZMÁNY 1970) szinte biztos, hogy nem vándor, hanem honos, helyben folyamatosan tenyésző faj, mert egye-

dei rendszeresen, gyakran, szinte kiszámíthatóan jelennek meg a legtöbb élőhelyen. Ugyancsak valószínűtlen a *Libythea celtis* vándorlepke-státusa, hiszen ez is eléggé rendszeresen – de az előbbinél sokkal ritkábban – látható, gyakran már kora tavasszal is, a többi áttelelő Nymphalidával együtt.

Meg kell jegyezni, hogy enyhe télen egy alkalommal januárban is láttunk *Vanessa atalanta*-t – kérdés, hogy a telelése a továbbiakban sikeres volt-e? Nem elképzelhetetlen, hogy egyes, nagyon enyhe teleken – néhány ilyen megfigyeltek már a Mecsekben az utóbbi egy-két évtizedben – némelyik vándorlepkének tartott állat imágója áttelel, és kora tavasszal is megfigyelhető. Erre utalnak bizonyos korai, márciusi-áprilisi vándorlepke észlelések.

Eltűnő és megjelenő fajok

Amint azt már említettük néhány védett faj kapcsán, több faj teljesen eltűnt vagy alaposan megritkult az elmúlt öt évtizedben, illetve mások csak ennek a vizsgálati időszaknak a vége felé jelentek meg a tájvédelmi körzet területén.

Az eltűnő fajok egyik példája a mostani vizsgálatokban ki sem mutatott (bár több esetben célzottan keresett) *Erannis ankeraria*. Ez a faj az ötvenes években még előfordult a pécsi Mecsekben, de sem a pontosan ismert „klasszikus” lelőhelyén, sem hasonló adottságokkal rendelkező élőhelyeken nem sikerült újabb példányaira lelnünk.

A védett fajok közül az *Iolana iolas* egyedszáma és elterjedési területe jelentősen csökkent, bár ez a faj még nem tűnt el. Viszont a védett *Ocnogyna parasita*, amelyik a nyolcvanas években még viszonylag magas egyedszámmal fordult elő a mintákban, a kilencvenes években megritkult és 1993 után már egyetlen példányát sem láttuk.

Hasonlóképpen nagyon látványos volt a *Perigrapha i-cinctum* teljes eltűnése a kilencvenes évek elején: 1991-ben került elő utolsó nyugat-mecseki példánya a Deindolokban. Ugyancsak szinte teljesen eltűntek – vagy legalábbis nagyon megritkultak – az *Apamea*-fajok, amelyek többsége fokozott nedvességigényű, leginkább magaskórósokra jellemző faj. Ugyancsak alig lehet látni a három *Photedes* fajt (*Ph. fluxa*, *Ph. minima*, *Ph. extrema*) a kilencvenes évek óta.

A *Diarsia brunnea* még a nyolcvanas években rendszeres volt az északi völgyekben (Nagy-Mély-völgy). Akkor úgy tűnt, hogy hasonlóan más nedvességkedvelő fajokhoz, terjedőben van. Az elmúlt 30 évben a terjedést regresszió váltotta fel, és ezt a fajt sem fogtuk sem a tájvédelmi körzetben, sem a másutt a környéken a Dél-Dunántúlon.

Nagyon sok olyan faj él a Nyugat-Mecsek TK-ben, amelyek mára megritkultak, vagy esetleg újabb példányokat nem is láttunk belőlük. A teljesség igénye nélkül néhány ilyen faj: *Pelurga comitata*, *Eulithis mellinata*, *Eupithecia subfuscata*, *Ourapteryx sambucaria*, *Synopsis sociaria*, *Fagivorina arenaria*, *Macaria brunneata*, *Mythimna conigera*, *M. impura* stb.

A vándorlepkék közül a halálfejes lepke (*Acherontia atropos*) gyakorlatilag teljesen eltűnt, a nyolcvanas évek óta nem láttuk itt. Ennek nemcsak helyi okai lehetnek, hanem eredeti élőhelyein, a Mediterráneumban is valószínűleg csökkent népessége.

A nappalilepkék közül eltűnőben van számos faj. A *Spialia orbifer*, *Carterocephalus palaemon*, *Heteropterus morpheus* és a *Cupido minimus* kilencvenes évek után nagyon megritkult illetve a legtöbb élőhelyéről eltűnt. Ezek ökológiai igényei meglehetősen különbözőek, mégis mindhárom napjainkra nagyon megritkult. Teljesen eltűnt a kilencvenes évek eleje óta a *Leptidea morsei major*, utolsó példányát 1991-ben láttam. Hasonlóan teljesen eltűnt nemcsak a tájvédelmi körzetből, hanem az egész Dél-Dunántúlról az *Aporia crataegi*. Utolsó példányait még a hatvanas években láttuk itt és a környéken. Ugyancsak eltűnőben van, az elmúlt 10-15 évben már nem láttam a *Polyommatus daphnis* és az *Argynnis adippe* fajokat.

A *Zerynthia polyxena* élőhelyei gyorsan változnak, attól függően, hogy a tápnövénye, a farkasalma hogyan jelenik meg illetve tűnik el. A Mecsek délies lejtőin fekvő szőlők a tápnövénynek illetve magának a lepkének is alkalmas étletteret biztosítanak, de a szőlők felhagyása után a tápnövény és ezzel együtt a lepke is eltűnik. Így a Deindolokban élő népes populáció is elszegényedett, 2010 körül már csak néha láttunk egy-egy példányt.

A *Neozephyrus quercus* ugyancsak megritkult az elmúlt néhány évben, de még így is számos példányát lehetett látni rajzási idejében.

Ugyancsak nagyon változó volt az utóbbi évtizedekben a *Parnassius mnemosyne* populációinak mérete. Néhány évvel ezelőtt csak egy-egy példányukat lehetett látni, mára egy kissé erősödtek ezek a populációk.

A fentiekkel szemben van néhány olyan faj – jóval kevesebb! – amelyeket vizsgálataim elején, a hatvanas-hertvenes, sőt még a nyolcvanas években sem gyűjtöttem. Jól ismert a *Colias erate* hazai megtelepedése. A vizsgálati területen a kilencvenes években észleltük először, azóta rendszeresen látjuk és nem ritka. Ugyancsak jól ismert a *Libythea celtis* eltűnése az ötvenes években, majd évtizedekkel későbbi újbóli megjelenése. A kétezres években a Nyugat-Mecsek TK-ben is több példányát láttuk, elsősorban kora tavaszi, áttelelő példányokat.

Az *Aedia leucomelas* és az *Antherea yamamai* húsz-harmic évvel ezelőtti megjelenéséről az előző alfejezetben már szóltam.

Az újonnan felbukkanó vagy sokkal gyakoribbá váló fajok közé olyanok is tartoznak, amelyek a fenyőfélék betelepítése nyomán tápnövényüket követik. Így például a *Thera variata*-nak korábban alig volt nyugat-mecseki adata, ma elég gyakorinak mondható, különösen, ha telepített lucfenyő vagy valami hasonló fenyő-faj található a közelben. Ugyanígy például a Deindolokban mostanában jelent meg a *Macaria liturata* is.

A polifág lombfogyasztó, de ennek ellenére meglehetősen ritka, imágó formában áttelelő *Chloroclysta siterata* hosszú idő után újra 2011-ben jelent meg, ekkor három helyen láttuk.

A fenti tendenciák a normálisnak tekinthető egyedszám-ingadozásokon túlmutatnak. A napfolt-tevékenységgel párhuzamba állítható egyedszám változásokról még a hetvenes években írtunk (VARGA, UHERKOVICH 1974). Ezek szerint, különösen egyes lombfogyasztók esetében (pl. *Operophtera brumata*, *Erannis defoliaria*, *Agriopsis aurantiaria*, *Dichonia convergens* stb.) egy szabályosságot mutató, 10-12 éves ciklus szerint változik az egyedszám. A maximumban (gradációban) az egyedszám a minimum-értékek tízszerese vagy akár többszázszorosa is lehet. Ennek pontos nyomkövetéséhez a fénycsapdák nagy tömegű anyagának feldolgozása szükséges, egyébként a ritkább mintavételek torzító hatása nagyobb lehet, mint a populációk méretváltozásai.

A fajsám – azaz a biodiverzitás – csökkenése évtizedek óta tartó folyamat. Ezen belül vannak időszakok, amikor bizonyos fajok, például egyes nedvességekdelvő vagy montán elemek átmenetileg visszatérhetnek, illetve populációik megerősödhetnek. Ilyen időszaknak tekinthető a hetvenes évek és nyolcvanas évek eleje. Azóta viszont sok fajt egyáltalán nem láthattunk. Hatalmas mennyiségű jegyzőkönyvi anyag és fénycsapdapló feldolgozásán keresztül viszont egyértelműen kimutatható lenne az egyes fajok megritkulása vagy eltűnésének ideje. De csak ennek a tájegységnek illetve tájvédelmi körzetnek az adatai is jól rávilágítanak a biodiverzitás erőteljes csökkenésére. Ezt a tényt egyértelműen a kedvezőtlen klímaváltozás egyik bizonyítékának tartom.

Köszönetnyilvánítás

Mindenekelőtt Nógrádi Sárának kell köszönetet mondanom a gyűjtésekben nyújtott segítségért. Ötvös Károly a rendelkezésemre bocsátotta művészi színvonalú lepkefotóit, amelyek legnagyobb része Abaligeten készült (néhány értékes fényképe pedig a tájvédelmi körzet más pontjain). Gergely Tibor a kétezres években sokszor részt vett és segített az éjszakai gyűjtésekben. Ábrahám Levente pedig ösztönzött jelen cikk megírására, és emellett hasznos segítséget nyújtott az egyes fajokról írtak kiegészítésére.

**2. táblázat: Védett és *fokozottan védett fajok
(a 66/2015 (X. 26.) FM rendelet 2. melléklete alapján)**

A faj tudományos neve szerzővel, évszámmal (jelen cikkben szereplő névvel)	A faj magyar neve	Természetvédelmi értéke HUF
<i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758)	Sárga gyapjasszövő	50 000
<i>Eriogaster lanestris</i> (Linnaeus, 1758)	Tavaszi gyapjasszövő	10 000
<i>Acherontia atropos</i> (Linnaeus, 1758)	Halálfejes lepke	10 000
<i>Marumba quercus</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Tölgyfaszender	10 000
<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	Törpészender	50 000
<i>Saturnia pavoniella</i> (Scopoli, 1763)	Kis pávaszem	10 000
<i>Saturnia pyri</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Nagy pávaszem	50 000
<i>Aglia tau</i> (Linnaeus, 1758)	T-betűs pávaszem	5 000
<i>Archiearis notha</i> (Hübner, 1803)	Vörhenyes nappaliaraszoló	5 000
<i>Orthostixis cribraria</i> (Hübner, 1799)	Pettyes fehéraraszoló	50 000
<i>Entephria caesiata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Szürke hegyiaraszoló	10 000
<i>Chesias rufata</i> (Fabricius, 1775)	Vöröses zanótaraszoló	10 000
<i>Dyscia conspersaria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Sziklaüröm-araszoló	5 000
<i>Perconia strigillaria</i> (Hübner, 1787)	Fehérszárnyú aranyaraszoló	10 000
<i>Dicranura ulmi</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Szilfa-púposszövő	5 000
<i>Drymonia velitaris</i> (Hufnagel, 1766)	Hegyi púposszövő	10 000
<i>Phalera bucephaloides</i> (Ochsenheimer, 1810)	Magyar púposszövő	10 000
<i>Polypogon gryphalis</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	Láperdei karcsúbagoly	5 000
<i>Ocnogyna parasita</i> (Hübner, 1790)	Csonkaszárný medvelepke	50 000
<i>Diaphora luctuosa</i> (Geyer, 1833)	Gyászos medvelepke	50 000
<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Csíkos medvelepke	5 000
<i>Tyria jacobaeae</i> (Linnaeus, 1758)	Jakabfü-lepke	5 000

A faj tudományos neve szerzővel, évszámmal (jelen cikkben szereplő névvel)	A faj magyar neve	Természeti- delmi értéke HUF
*<i>Arytrura musculus</i> (Ménétriés, 1859)	Keleti lápi bagoly	250 000
<i>Catocala dilecta</i> (Hübner, 1808)	Nagy öves bagoly	10 000
<i>Diachrysia chryson</i> (Esper, 1789)	Nagyfoltú arany bagoly	50 000
<i>Autographa jota</i> (Linnaeus, 1758)	i-betűs arany bagoly	10 000
<i>Shargacucullia gozmanyi</i> G. & L. Ronkay, 1994	Gozmány-csuklyás bagoly	10 000
<i>Shargacucullia prenanthis</i> (Boisduval, 1840)	Tavaszigörvélyfű-csuklyás bagoly	5 000
<i>Cucullia chamomillae</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Székfű-csuklyás bagoly	5 000
<i>Periphanes delphinii</i> (Linnaeus, 1758)	Szarkalábbagoly	10 000
<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	Tükrös busalepke	10 000
<i>Spialia orbifer</i> (Hübner, 1823)	Törpe busalepke	10 000
<i>Pyrgus alveus</i> (Hübner, 1803)	Hegyi busalepke	10 000
<i>Zerynthia polyxena</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Farkasalmalepke	50 000
<i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Kis apollólepke	50 000
<i>Iphiclide podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	Kardoslepke	10 000
<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	Fecskefarkú lepke	10 000
<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citromlepke	5 000
<i>Leptidea morsei major</i> Grund, 1905	Keleti mustárlepke	50 000
<i>Lycaena dispar rutila</i> Werneburg, 1864	Nagy tűzlepke	50 000
<i>Lycaena thersamon</i> (Esper, 1784)	Kis tűzlepke	10 000
<i>Neozephyrus quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Tölgyfalepke	5 000
<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	Nyírfa-csücsköslepke	5 000
<i>Satyrrium w-album</i> (Knoch, 1782)	Szilfa-csücsköslepke	10 000
<i>Satyrrium pruni</i> (Linnaeus, 1758)	Szilvafa-csücsköslepke	5 000
<i>Satyrrium spini</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kökény-csücsköslepke	10 000
<i>Satyrrium ilicis</i> (Esper, 1779)	Tölgyfa-csücsköslepke	10 000
<i>Cupido alcetas</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Palakék boglárka	5 000
<i>Cupido decolorata</i> (Staudinger, 1886)	Fakó boglárka	5 000
<i>Pseudophilotes schiffermuelleri</i> (Hemming, 1929)	Apró boglárka	10 000
*<i>Iolana iolas</i> (Ochsenheimer, 1816)	Magyar boglárka	250 000
<i>Glaucopsyche alexis</i> (Poda, 1761)	Nagyszemes boglárka	5 000
<i>Aricia agestis</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Szerecsenboglárka	5 000
<i>Libythea celtis</i> (Laicharting, 1782)	Csőröslepke	5 000
<i>Limenitis reducta</i> Staudinger, 1901	Kék lonclepke	50 000
<i>Neptis rivularis</i> (Scopoli, 1763)	Nagy fehérsávoslepke	10 000
<i>Neptis sappho</i> (Pallas, 1771)	Kis fehérsávoslepke	10 000
<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Nagy gyöngyházlepke	5 000
<i>Brenthis daphne</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Málna gyöngyházlepke	5 000
<i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Árvácska gyöngyházlepke	5 000

A faj tudományos neve szerzővel, évszámmal (jelen cikkben szereplő névvel)	A faj magyar neve	Természetvédelmi értéke HUF
<i>Boloria selene</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Fakó gyöngyházlepke	10 000
<i>Apatura ilia</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kis színjátészlepke	10 000
<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	Nagy színjátészlepke	50 000
<i>Euphydryas maturna</i> (Linnaeus, 1758)	Díszes tarkalepke	50 000
<i>Melitaea trivia</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Kis tarkalepke	5 000
<i>Melitaea aurelia</i> Nickerl, 1850	Recés tarkalepke	10 000
<i>Nymphalis io</i> (Linnaeus, 1758)	Nappali pávaszem	5 000
<i>Nymphalis urticae</i> (Linnaeus, 1758)	Kis róka-lepke	50 000
<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	Nagy róka-lepke	10 000
<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)	Gyászlepke	50 000
<i>Nymphalis c-album</i> (Linnaeus, 1758)	c-betűs lepke	5 000
<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Atalantalepke	5 000
<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767)	Kis ökörszemlepke	10 000
<i>Arethusa arethusa</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)	Közönséges szemeslepke	5 000

Irodalom

- ABAFI-AIGER L. 1907: Magyarország lepkéi. – Budapest, pp. 137+ XXXII.
- ÁBRAHÁM L. és UHERKOVICH Á. 1998: A Dráva mente nagylepkefaunája és jellegzetes élőhelyei. – Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 9: 359-385.
- ÁBRAHÁM, L. és UHERKOVICH Á. 2000: A nagylepke (Lepidoptera) fauna kutatásának eddigi eredményei a Villányi-hegységben. – Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 10: 309-339.
- BALOGH I. 1956: Őszi és tavaszi lepidopterológiai megfigyelések Pécsen. – Pécsi Pedagógiai Főiskola Évkönyve 1955/56: 1-5.
- BARANYI T. 2003: A keleti lápi bagoly (*Arytrura musculus*) és a Metelka-medvelepke (*Rhyaroides flavidus metelkanus*) előfordulásai a Dél-Nyírségben (Lepidoptera). – Folia entomologica hungarica 64: 357-361.
- GOZMÁNY L. 1970: Bagolylepkék I. Noctuidae I. – Fauna Hungariae 16 (11): 1-151.
- GYULAI I., GYULAI P., UHERKOVICH Á. és VARGA Z. 1979: Újabb adatok a magyarországi nagylepkék elterjedéséhez II. – Folia entomologica hungarica 32: 219-227.
- KOVÁCS L. 1953: A magyarországi nagylepkék és elterjedésük. – Folia entomologica hungarica 6: 77-184.
- KOVÁCS L. 1956: A magyarországi nagylepkék és elterjedésük, II. – Folia entomologica hungarica 9: 89-140.
- KOVÁCS L. 1957: A magyar nagylepkefauna gyarapodása 1956-ban. – Folia entomologica Hungarica 10: 125-132.
- LOVÁSZ Gy. 1977: Baranya megye természeti földrajza. – Baranya megyei Levéltár, Pécs, pp. 384.
- Magyar Közlöny, 2015. A földművelésügyi miniszter 66/2015 (X. 26.) FM rendelete az elköbzött védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 19/1997 (VII. 4.) KTM rendelet, valamint a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001 (V. 9.) KÖM rendelet módosításáról. – Magyar Közlöny 2015 (158): 20844–20949.
- MALGAY V. és BRUNNER J., L. 2011: Egy újabb adat a keleti lápi bagoly (*Arytrura musculus* Ménétris, 1859) hazai előfordulásához. – Natura Somogyiensis 19: 247-250.
- NÉMETH L. és SZABÓKY Cs. 1998: A keleti lápi bagoly (*Arytrura musculus* Ménétris, 1859) újabb hazai adatai (Lepidoptera: Noctuidae). – Folia entomologica hungarica 59: 310-313.
- UHERKOVICH Á. 1977: Adatok Baranya nagylepkefaunájának ismeretéhez V. A gilvánfai Szilas-erdő nagylepkéi. – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 19 (1974): 63-83.

- UHERKOVICH Á. 1978a: Adatok Baranya nagylepkefaunájának ismeretéhez VIII. Mecseki karsztbokorerdők nagylepkéi. – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1977) 22: 61-72.
- UHERKOVICH Á. 1978b: Komlósd környékének nagylepkefaunája (Macrolepidoptera). – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1977) 22: 73-87.
- UHERKOVICH Á. 1979: Vándorlepke-megfigyelések a Dél-Dunántúlon, 1966-1977 (Lepidoptera). – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1978) 23: 51-70.
- UHERKOVICH Á. 1980a: Adatok Baranya nagylepkefaunájának ismeretéhez X. Egy mecseki cseres-tölgyes nagylepkéi (epidoptera). – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1979) 24: 63-75.
- UHERKOVICH Á. 1980b: A *Noctua interjecta* Hbn. magyarországi előfordulása (Lepidoptera: Noctuidae). – *Folia entomologica hungarica* 41 (33): 378.
- UHERKOVICH, Á. 1981: Data to the Macrolepidoptera Fauna of South Transdanubia (Lepidoptera), II. – *Folia entomologica hungarica* 42 (34): 239-252.
- UHERKOVICH Á. 1982: A Zselic nagylepkefaunája II. Délkelet-Zselic (Lepidoptera). – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1980) 26: 33-50.
- UHERKOVICH Á. 1983: Az *Entephria caesiata* Den. et Schiff. mecseki előfordulásáról (Lepidoptera). – *Folia entomologica hungarica* 44: 340.
- UHERKOVICH Á. 1984: A mecseki Nagy-mély-völgy nagylepkefaunája és a Délnyugat-Dunántúl bükkön élő faunaelemei (Lepidoptera). – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1983) 28: 23-37.
- UHERKOVICH Á. 1985: Néhány további adat a Barcsi borókás nagylepke faunájához (Lepidoptera). – *Dunántúli Dolgozatok Természettudományi sorozat* 5: 236-238.
- UHERKOVICH Á. 1987: További lepkészeti adatok a Nyugati-Mecsekből (Lepidoptera). – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1985-86) 30-31: 23-32.
- UHERKOVICH Á. 1990: Kisdobsza nagylepkefaunája (Lepidoptera). – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 34 (1989): 73-80.
- UHERKOVICH Á. és ÁBRAHÁM L. 1995: A nagylepke (Lepidoptera: Macrolepidoptera) kutatások faunisztikai eredményei a Dráva mentén. – *Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat* 8: 139-159.
- UHERKOVICH Á. és ÁBRAHÁM L. 2007: A keleti lápibagolylepke – *Arytrura musculus* (Ménétriés, 1859) (Lepidoptera: Noctuidae) előfordulása a Zselicben. – *Natura Somogyiensis* (Kaposvár) 10: 361-363.
- VARGA Z. (ed.) 2012: Magyarország nagylepkéi. Macrolepidoptera of Hungary. 2nd Ed. – Heterocera Press, Budapest, pp. 256.
- VARGA, Z. és UHERKOVICH, Á. 1974: Die Anwendung der Lichtfallen in der ökologischen Landschaftsforschung. – *Folia entomologica hungarica* 27 (Suppl.): 159-171.