РЕГУЛЯТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИИ

**Владивосток
2021**

Владивостокский филиал
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания»
Научно-исследовательский институт медицинской климатологии
и восстановительного лечения

РЕГУЛЯТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИИ

Монография

Под общей редакцией Т.П. Новгородцевой

Владивосток

2021

УДК 616
ББК 54.12
Р32

Авторы:

Т.П. Новгородцева, Ю.К. Денисенко, О.Ю. Кытикова, М.В. Антонюк,
Т.А. Гвозденко, Т.И. Виткина, В.В. Кнышова, Н.В. Бочарова

Рецензенты:

Ю.М. Перельман, член-корреспондент РАН, д-р мед. наук, профессор;
Б.И. Гельцер, член-корреспондент РАН, д-р мед. наук, профессор

Регуляторные механизмы системного воспаления при респираторной патологии : монография / Т.П. Новгородцева, Ю.К. Денисенко, О.Ю. Кытикова, М.В. Антонюк, Т.А. Гвозденко, Т.И. Виткина, В.В. Кнышова, Н.В. Бочарова ; под. общ. ред. Т.П. Новгородцевой. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного федерального университета, 2021. – 278 с. : ил.
ISBN 978-5-7444-5052-6.
DOI <https://doi.org/10.24866/7444-5052-6>.

В монографии обсуждаются механизмы регуляции хронического воспаления при обструктивных заболеваниях органов дыхания – бронхиальной астме и хронической обструктивной болезни легких. В первой части суммированы современные взгляды различных авторов на роль сигнальных молекул и их рецепторов в механизмах регуляции иммунного и нейрогенного воспаления, рассматриваются взаимоотношения между Толл-подобными рецепторами, ядерными транскрипционными факторами, ионными каналами с транзиторным рецепторным потенциалом, регуляторными нейропептидами и нейротрофинами как перспективными молекулярными мишенями терапии хронических обструктивных заболеваний органов дыхания. Вторая часть издания посвящена собственным исследованиям авторского коллектива. Проведенные авторами изыскания показывают, что в основе формирования системной воспалительной реакции лежит целый комплекс нарушений регуляции внутри- и межклеточной сигнализации. Обсуждаются регуляторные механизмы иммунной, эндоканнабиноидной, липоксигеназной, нитроксидэргической систем, их общность и различия в поддержании системного воспаления при данных заболеваниях. Представлен новый взгляд авторов на регуляторную роль каждой сигнальной системы. Полученные авторским коллективом новые знания не только расширяют представления об этиопатогенезе заболеваний органов дыхания, но и способствует пониманию ключевых механизмов развития внелегочной патологии, индуцируемой хроническим воспалением.

Предназначена для ученых-биологов и медиков, врачей различных профилей.

УДК 616
ББК 54.12

ISBN 978-5-7444-5052-6

© ВФ ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ, 2021
© Оформление. ФГАОУ ВО ДВФУ, 2021

VLADIVOSTOK BRANCH OF FAR EASTERN SCIENTIFIC CENTER
OF PHYSIOLOGY AND PATHOLOGY OF RESPIRATION –
INSTITUTE OF MEDICAL CLIMATOLOGY
AND REHABILITATIVE TREATMENT

**REGULATORY MECHANISMS
OF SYSTEMIC INFLAMMATION
IN RESPIRATORY PATHOLOGY**

Monograph

Edited by T.P. Novgorodtseva

Vladivostok

2021

UDC 616
LBC 54.12
R35

Authors:

T.P. Novgorodtseva, Yu.K. Denisenko, O.Yu. Kytikova, M.V. Antonyuk,
T.A. Gvozdenko, T.I. Vitkina, V.V. Knyshova, N.V. Bocharova

Reviewers

Yu.M. Perelman, Corresponding Member of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor;
B.I. Geltser, Corresponding Member of the Russian
Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor

R35 **Regulatory mechanisms of systemic inflammation in respiratory pathology** : Monograph / T.P. Novgorodtseva, Yu.K. Denisenko, O.Yu. Kytikova, M.V. Antonyuk, T.A. Gvozdenko, T.I. Vitkina, V.V. Knyshova, N.V. Bocharova ; edited by T.P. Novgorodtseva. – Vladivostok : Publishing House of the Far Eastern Federal University, 2021. – 278 p. : il.
ISBN 978-5-7444-5052-6.
DOI <https://doi.org/10.24866/7444-5052-6>.

The publication discusses the regulatory mechanisms of chronic inflammation in obstructive respiratory diseases, such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease. The first part of the monograph summarizes the modern views of various authors on the role of signaling molecules and their receptors in the regulation of immune and neurogenic inflammation; describes the relationships between Toll-like receptors, nuclear transcription factors, transient receptor potential ion channels, regulatory neuropeptides, and neurotrophins, as promising molecular targets for therapy of chronic obstructive respiratory diseases. The second part of the monograph is devoted to the authors' own research. The studies carried out by the authors have shown that a complex of disturbances in the regulation of intra- and intercellular signaling underlies the formation of systemic inflammatory response. The regulatory mechanisms of the immune, endocannabinoid, lipoxygenase, and nitroxydergic systems; their commonality and differences in the maintenance of systemic inflammation in the diseases have been discussed. The authors' point of view on the regulatory role of the above-mentioned signaling systems has been presented. The new findings obtained by the team of authors not only broaden knowledge of the etiopathogenesis of respiratory diseases but also contributes to understanding the key mechanisms of the development of extrapulmonary pathology induced by chronic inflammation.

The monograph is intended for biologists, medical scientists, and medical professionals.

UDC 616
LBC 54.12

ISBN 978-5-7444-5052-6

© Institute of medical climatology and
rehabilitative treatment, 2021
© Typography. FEFU, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	11
Часть I	
ДИСФУНКЦИЯ СИГНАЛЬНЫХ МОЛЕКУЛ И ИХ РЕЦЕПТОРОВ В ПАТОФИЗИОЛОГИИ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ	16
<i>Глава 1</i>	
Ядерные транскрипционные факторы и Толл-подобные рецепторы в патогенезе хронического иммунного воспаления	20
<i>Ю.К. Денисенко, Т.П. Новгородцева, О.Ю. Кытикова</i>	
Ядерные транскрипционные факторы	20
Толл-подобные рецепторы	30
<i>Глава 2</i>	
Липиды как посредники в сигнальных механизмах хронического иммунного воспаления	44
<i>Т.П. Новгородцева, О.Ю. Кытикова, Ю.К. Денисенко, Т.А. Гвозденко</i>	
Роль липидных рафтов в механизмах клеточной сигнализации	44
Жирные кислоты как сигнальные молекулы для Толл-подобных рецепторов	47
Окисленные фосфолипиды как регуляторы активности Толл-подобных рецепторов	50
<i>Глава 3</i>	
Сигнальные молекулы и их рецепторы в модуляции активности воспалительного иммунного каскада	57
<i>О.Ю. Кытикова, Т.П. Новгородцева, Ю.К. Денисенко, Т.А. Гвозденко</i>	
Взаимоотношения провоспалительных и противовоспалительных ядерных транскрипционных факторов	57
Взаимоотношения Толл-подобных рецепторов и ядерных транскрипционных факторов	59

<i>Глава 4</i>	Механизмы развития и регуляции нейрогенного воспаления <i>О.Ю. Кытикова, Т.П. Новгородцева, Ю.К. Денисенко, М.В. Антонюк</i>	64
	Функционирование и регуляторная роль суперсемейства ионных каналов с транзиторным рецепторным потенциалом	64
	Экзогенные и эндогенные факторы модуляции активности ионных каналов с транзиторным рецепторным потенциалом	72
	Специфические регуляторы активности ионных каналов с транзиторным рецепторным потенциалом	77
	Регуляторные нейропептиды в патогенезе нейрогенного воспаления	78
	Нейротрофические факторы роста в патогенезе нейрогенного воспаления	86

<i>Часть II</i>	МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (собственные исследования)	94
------------------------	--	----

<i>Глава 1</i>	Иммунные механизмы регуляции воспалительной реакции <i>Т.И. Виткина, М.В. Антонюк, В.В. Кнышова</i>	94
	Регуляция воспалительной реакции при бронхиальной астме	95
	Особенности регуляции воспалительной реакции при хронической обструктивной болезни легких	105
	Взаимосвязь между клинико-функциональным фенотипом хронической обструктивной болезни легких и иммунным воспалением	123
	Прогнозирование риска развития обострений у больных хронической обструктивной болезни легких	136

<i>Глава 2</i>	Роль эндоканнабиноидной системы в регуляции иммунного ответа	141
	<i>Т.П. Новгородцева, Ю.К. Денисенко, О.Ю. Кытикова</i>	
	Экспрессия эндогенных каннабиноидных рецепторов в условиях активации иммунной системы	147
	Регуляция воспалительной реакции каннабиноидными рецепторами при хронической обструктивной болезни легких	153
	Регуляторные эффекты синтетических лигандов каннабиноидных рецепторов	158
<i>Глава 3</i>	Регуляция воспалительной реакции нитроксидэргической системой	165
	<i>Ю.К. Денисенко, Т.П. Новгородцева, Н.В. Бочарова</i>	
	Значение оксида азота в механизмах регуляции системной воспалительной реакции	171
<i>Глава 4</i>	Роль липидных медиаторов в развитии, прогрессировании и регуляции системного воспаления	177
	<i>Т.П. Новгородцева, Ю.К. Денисенко, М.В. Антонюк, Т.И. Виткина, Т.А. Гвозденко, В.В. Кнышова</i>	
	Патогенетическая значимость липидных медиаторов при респираторных заболеваниях	177
	Ассоциация метаболизма жирных кислот с системной воспалительной реакцией	180
	Роль модификации состава жирных кислот клеточных органелл в утяжелении хронических заболеваний органов дыхания	190
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	199
	СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	205
	ЛИТЕРАТУРА	217

CONTENTS

Introduction		11
<i>Part I</i>	THE DYSFUNCTION OF SIGNALING MOLECULES AND THEIR RECEPTORS IN THE PATHOPHYSIOLOGY OF INFLAMMATION IN CHRONIC OBSTRUCTIVE RESPIRATORY DISEASES	16
<i>Chapter 1</i>	Nuclear transcription factors and toll-like receptors in the pathogenesis of chronic immune inflammation	
	<i>Yu.K. Denisenko, T.P. Novgorodtseva, O.Yu. Kytikova</i>	20
	Nuclear transcription factors	20
	Toll-like receptors	30
<i>Chapter 2</i>	Lipids as messengers in signaling mechanisms of chronic immune inflammation	
	<i>T.P. Novgorodtseva, O.Yu. Kytikova, Yu.K. Denisenko, T.A. Gvozdenko</i>	44
	The role of lipid rafts in cell signaling mechanisms	44
	Fatty acids as signaling molecules for Toll-like receptors	47
	Oxidized phospholipids as regulators of Toll-like receptor activity	50
<i>Chapter 3</i>	Signaling molecules and their receptors in the modulation of inflammatory immune cascade activity	
	<i>O.Yu. Kytikova, T.P. Novgorodtseva, Yu.K. Denisenko, T.A. Gvozdenko</i>	57
	The relationships between pro-inflammatory and anti-inflammatory nuclear transcription factors	57
	The relationships between Toll-like receptors and nuclear transcription factors	59
<i>Chapter 4</i>	Mechanisms of the development and regulation of neuro-genic inflammation	
	<i>O.Yu. Kytikova, T.P. Novgorodtseva, Yu.K. Denisenko, M.V. Antonyuk</i>	64
	Functioning and the regulatory role of the transient receptor potential superfamily of ion channels	64
	Exogenous and endogenous factors modulating the activity of transient receptor potential ion channels	72

Specific regulators of the activity of transient receptor potential ion channels	77
Regulatory neuropeptides in the pathogenesis of neurogenic inflammation	78
Neurotrophic growth factors in the pathogenesis of neurogenic inflammation	86

Part II

REGULATORY MECHANISMS OF SYSTEMIC INFLAMMATION IN OBSTRUCTIVE RESPIRATORY DISEASES (the authors' own research)	94
---	----

<i>Chapter 1</i>	Regulatory immune mechanisms of inflammatory reaction <i>T.I. Vitkina, M.V. Antonyuk, V.V. Knyshova</i>	94
	The regulation of inflammatory response in asthma	95
	The features of the regulation of inflammatory response in chronic obstructive pulmonary disease	105
	The relationship between clinical and functional phenotype of COPD and immune inflammation	123
	The prediction of the risk of exacerbations in patients with COPD	136
<i>Chapter 2</i>	The role of the endocannabinoid system in the regulation of immune response <i>T.P. Novgorodtseva, Yu.K. Denisenko, O.Yu. Kytikova</i>	141
	The expression of endogenous cannabinoid receptors under conditions of the activation of the immune system	147
	The regulation of inflammatory response by cannabinoid receptors in chronic obstructive pulmonary disease	153
	Regulatory effects of synthetic cannabinoid receptor ligands	158
<i>Chapter 3</i>	The regulation of inflammatory reaction by the nitroxidergic system <i>Yu.K. Denisenko, T.P. Novgorodtseva, N.V. Bocharova</i>	165
	The role of nitric oxide in mechanisms of the regulation of systemic inflammatory response	171
<i>Chapter 4</i>	The role of lipid mediators in the development, progression and regulation of systemic inflammation <i>T.P. Novgorodtseva, Yu.K. Denisenko, M.V. Antonyuk, T.I. Vitkina, T.A. Gvozdenko, V. V. Knyshova</i>	177

The pathogenetic significance of lipid mediators in respiratory diseases	177
The association between fatty acid metabolism and systemic inflammatory response	180
The role of the modification of fatty acid composition of cell organelles in the deterioration of chronic respiratory diseases	190
CONCLUSION	199
LIST OF ABBREVIATIONS	205
REFERENCES	217

ВВЕДЕНИЕ

Обструктивные заболевания легких, в том числе бронхиальная астма (БА) и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) являются распространенными, хроническими и гетерогенными заболеваниями органов дыхания.

Бронхиальная астма — одно из самых распространенных заболеваний респираторной системы с высокой вариабельностью и прогрессирующим характером течения, обусловленными генетической предрасположенностью, влиянием природно-климатических и антропогенных факторов окружающей среды, а также повышенной способностью бронхов реагировать сразу на несколько триггерных факторов посредством развития бронхоспазма. Данное заболевание является тяжелым социально-экономическим бременем для системы здравоохранения. Усилия по поиску эффективных терапевтических стратегий для данной патологии не теряют своей актуальности многие десятилетия, что свидетельствует о многофакторности заболевания и сложности патофизиологических механизмов его развития [24; 329].

В классической форме БА представляет собой заболевание, проявляющееся обратимой обструкцией дыхательных путей и лимфоцитарным воспалением, характеризующимся подслизистым скоплением эозинофилов, продукцией IgE и развитием атопии. Основным механизмом воспаления при БА — иммунный. Клетки иммунной системы (эозинофилы, лимфоциты и нейтрофилы) могут взаимодействовать с эпителиальными клетками и вызывать гиперреактивность бронхов, гиперсекрецию слизи, ремоделирование дыхательных путей и их

стеноз [476]. Гетерогенность БА подчеркивается выделением различных фенотипов заболевания [5], которые, в частности, могут быть классифицированы в зависимости от типа воспаления и роли цитокинов Th2-профиля (Т-хелперы 2) в его формировании (интерлейкины 4, 5, 13 (IL-4, IL-5, IL-13)). Данные фенотипы делятся на две группы: БА с выраженным Th2-ответом (аллергическая, аспириновая, поздняя эозинофильная, БА с развитием бронхоспазма на физическую нагрузку) и БА, для которой участие Th2-клеток в развитии воспаления не характерно (ассоциированная с ожирением, нейтрофильная БА курильщиков, малогранулоцитарная, БА с очень поздним дебютом) [6]. Подобная гетерогенность свидетельствует о том, что в механизм воспаления дыхательных путей при БА могут быть вовлечены очень многие составляющие.

ХОБЛ – одно из хронических заболеваний с растущей распространенностью. Стратегии профилактики и лечения данной патологии в течение многих лет не претерпели кардинальных изменений. Нехватка эффективных методов лечения ХОБЛ является следствием недостаточного понимания патогенетических механизмов данного заболевания [224; 354].

ХОБЛ – заболевание, характеризующееся хроническим воспалением легких, эмфиземой и ремоделированием дыхательных путей, которые связаны с постоянным ограничением скорости воздушного потока и прогрессирующим снижением функции легких [78; 318]. В отличие от БА, ХОБЛ поражает взрослое население и часто связана с длительным воздействием сигаретного дыма или других химических веществ. Бронхиальная гиперреактивность является высоко чувствительным признаком БА, в то же время она часто ассоциируется и с ХОБЛ. Обструкция слизи также является характерной особенностью хронической обструктивной болезни легких. Многие клинические и экспериментальные исследования позволили установить связь между хронической воспалительной реакцией и ХОБЛ. Иммунные реакции, инициированные при воспалительном процессе бронхолегочной

системы, направлены на предотвращение дальнейшего повреждения легких [250]. Однако, локальное хроническое воспаление у больных ХОБЛ связано с аномальными иммунными реакциями, усугубляющими повреждение тканей, что приводит к ремоделированию легких [83; 147; 298]. В связи с этим особенно актуальным является изучение сигнальных путей, участвующих в модуляции хронического воспаления при ХОБЛ [98; 104].

Хроническое воспаление в периферических дыхательных путях обусловлено как врожденными, так и адаптивными иммунными реакциями, которые связаны между собой через дендритные клетки [98]. Воспалительный ответ при ХОБЛ отличается от аллергического воспаления, наблюдаемого при БА [128] и характеризуется участием таких клеток, как естественные киллеры и зрелые дендритные клетки, эозинофилы, Т-хелперные клетки 2 (Th2), нейтрофилы, макрофаги, врожденные лимфоидные клетки группы 2 (ILC2s) и интерлейкины IL-4, IL-5, IL-8, IL-1 β , IL-13 [86; 103; 105].

Нейтрофилы являются доминирующими циркулирующими лейкоцитами и представляют собой ключевой компонент врожденной иммунной системы. В ответ на действие инфекционного агента нейтрофилы из кровотока мигрируют в очаг инфекции, где используют различные механизмы для уничтожения патогенов. Это включает в себя фагоцитоз, дегрануляцию, производство активных форм кислорода, выработку хемокинов CXCL8 и лейкотриена (LT) B₄.

ХОБЛ характеризуется нейтрофильным воспалением дыхательных путей [349]. Роль нейтрофилов при ХОБЛ отличается от таковой при БА [71]. Нейтрофилия дыхательных путей является особенностью всех клинических фенотипов заболевания. Недавние исследования *in vitro* показали, что нарушение функции нейтрофилов при ХОБЛ способствует разрушению паренхимы легких. Активация нейтрофилов в легких и их высокое содержание коррелирует с выраженностью симптомов заболевания, плохим прогнозом [253; 350].

Дыхательные пути подвергаются воздействию экзогенных и эндогенных факторов, на которые одними из первых реагируют бронхиальные эпителиальные клетки, альвеолярные и интерстициальные макрофаги в лёгких [230]. Легочные макрофаги (ЛМ) являются важными иммунными эффекторными клетками, которые играют ключевую роль как во врожденных, так и в адаптивных иммунных реакциях. ЛМ обладают широким спектром функциональных свойств, которые включают фагоцитоз и производство сигнальных медиаторов [188]. Подобно макрофагам в других органах и тканях, они обладают естественной пластичностью и могут изменять фенотип в зависимости от микроокружения. Изменения фенотипа макрофагов легочной ткани вовлечены в хронические воспалительные реакции при ХОБЛ [301]. Бронхиальные эпителиальные клетки и ЛМ экспрессируют многочисленные врожденные иммунные рецепторы, направленные на распознавание и реагирование на микроорганизмы [155].

На сегодняшний день ясно, что в основе патофизиологических изменений при хронических обструктивных заболеваниях легких лежит локальное воспаление в дыхательных путях, приводящее к бронхиальной обструкции, деструктивным процессам в легочной паренхиме, ремоделированию легочной ткани, нарушению газообмена.

Наряду с развитием местного воспаления формируется системный воспалительный процесс, который рассматривается как платформа последующих патофизиологических изменений и системных эффектов, приводящих к внелегочным проявлениям заболевания [139; 461]. Согласно современным представлениям, воспалительная реакция развивается в ответ на системный характер воздействия повреждающего фактора или генерализацию маркеров повреждения: продуктов тканевого распада, микробных антигенов, аллергенов, протеолитических ферментов, изменения кислотно-щелочного равновесия, токсического накопления в кровотоке регуляторных медиаторов и гистогормонов воспаления.

В регуляторных механизмах системной воспалительной реакции участвует большое количество медиаторов воспаления. Первым дефектом, лежащим в основе развития системной воспалительной реакции является нарушение способности клеток синтезировать различные сигнальные молекулы – уникальные регуляторы межклеточного и межсистемного взаимодействия. Сигнальные молекулы обеспечивают согласованность действия иммунной, эндокринной, нервной систем в нормальных условиях, формируют ответ на патологические воздействия. Изучение сигнальных путей, участвующих в модуляции воспаления при хронических обструктивных заболеваниях легких, является актуальным направлением медико-биологических исследований.

Предлагаемая вниманию читателей монография обобщает результаты исследований НИИМКВЛ, а также других научных коллективов по проблеме регуляции системного воспаления при хронических обструктивных заболеваниях органов дыхания. Авторы ставили своей задачей представить современное состояние узловых вопросов проблемы и познакомить читателей с идеями и материалами, недостаточно освещенными в литературе. Изучение особенностей метаболизма арахидоновой кислоты, функции сигнальных систем, аспектов дисрегуляции межклеточных взаимодействий эффекторных клеток раскрывает сложные клеточно-молекулярные механизмы системного воспаления, обращает внимание на новые возможности прогнозирования осложнений и разработки медицинских технологий регуляции воспалительного процесса, профилактики и лечения заболеваний, сопряженных с воспалением.

В монографии использованы материалы, полученные в НИИМКВЛ и лаборатории сравнительной биохимии Национального научного центра морской биологии ДВО РАН. Авторы выражают глубокую признательность своим сотрудникам, коллегам, общение с которыми способствовало более глубокому и ясному пониманию проблемы.

Часть первая

ДИСФУНКЦИЯ СИГНАЛЬНЫХ МОЛЕКУЛ И ИХ РЕЦЕПТОРОВ В ПАТОФИЗИОЛОГИИ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ

Патогенетические особенности воспалительного процесса при хронических обструктивных заболеваниях легких объясняются характером иммунологического ответа с участием разнообразных клеток и медиаторов.

Инициаторами развития воспалительного процесса являются патоген-ассоциированные молекулярные структуры (pathogen-associated molecular pattern (PAMPs)) и молекулярные паттерны, ассоциированные с повреждением (damage-associated molecular pattern (DAMPs)). PAMPs и DAMPs – экзогенные и эндогенные лиганды толл-подобных рецепторов (TLRs), инициирующих запуск внутриклеточных сигнальных путей и активацию воспалительных генов в ответ на действие триггерных факторов. В настоящее время установлено, что не только вирусные и бактериальные инфекции, но и ряд неинфекционных воспалительных заболеваний, в частности ХОБЛ и БА, сопровождаются слабой активацией систем воспалительного ответа и развитием хронического воспаления, связанного с нарушениями в регуляции системы TLRs. Развитие асептического воспаления связано с индукцией синтеза провоспалительных цитокинов, метаболитов

арахидоновой кислоты, простагландинов, активных форм кислорода и азота. Наряду с активацией TLRs экзогенными и эндогенными лигандами (PAMPs, DAMPs), в последние годы активно изучается лиганд-независимая активация TLRs, которая происходит с участием липидов – холестерина, экзогенных и эндогенных жирных кислот, окисленных форм фосфолипидов (Ох-PLs), образованных в результате развития оксидативного стресса и запуска сигнального воспалительного каскада. Участие липидов в осуществлении TLR-опосредованной сигнализации и развитии воспаления при ХОБЛ и БА является новым направлением исследований, заслуживающим всестороннего изучения.

Сигнальные пути TLRs прежде всего направлены на активацию провоспалительных ядерных транскрипционных факторов, к которым относят активирующий протеин-1 (activator protein-1 (AP-1)) и ядерный фактор каппа В (nuclear factor-kappa В (NF-κВ)). В то же время, активность AP-1 и NF-κВ подавляется противовоспалительным ядерными транскрипционными факторами, к которым относят рецептор глюкокортикоидов (glucocorticoid receptor (GR)) и рецепторы, активирующие пролиферацию пероксисом (Peroxisome proliferatoractivated receptors (PPARs)). Взаимоотношения между провоспалительными и противовоспалительными ядерными факторами являются предметом пристального изучения в настоящее время, так как могут служить важной мишенью для разработки стратегий управления активностью воспалительного процесса при ХОБЛ и БА.

В настоящее время стало очевидно, что в патогенез ХОБЛ и БА вовлечены не только механизмы хронического воспаления, запускаемые иммунными реакциями, но и механизмы нейрогенного воспаления. Немиелинизированные, ноцицептивные С-волокна легких участвуют в сенсорной иннервации слизистой оболочки дыхательных путей. Стимуляция С-волокон сопровождается высвобождением нейропептидов (вещество Р (substance Р, SP), вазоактивный интестинальный пептид (vasoactive Intestinal Peptide, VIP), кальцитонин-ген-

регулирующий пептид (calcitonin gene related peptide, CGRP), тахикинины, нейропептид Y (NPY), бомбезины, гранины). При длительно протекающем воспалении дыхательных путей наблюдается дисбаланс между стимулирующими и ингибирующими нейропептидами.

Кашлевой рефлекс имеет сложный нейрогенный путь и регулируется блуждающими, чувствительными афферентными нервами, которые иннервируют дыхательные пути. Высокая чувствительность бронхов к действию природно-климатических факторов (низкая температура и повышенная влажность) также связана с нарушением регуляции чувствительных афферентных нервов дыхательных путей и развитием хронического нейрогенного воспаления.

Чувствительность ноцицепторов легких связана с активностью членов суперсемейства ионных каналов с транзиторным рецепторным потенциалом (Transient Receptor Potential channels – TRP). Активация TRP каналов, экспрессируемых в клетках, отличных от нейрональных, связана с преимущественным влиянием эндогенных факторов. Модуляция TRP каналов может быть обусловлена воздействием брадикинина, гистамина, фосфатидилинозитол-4,5-бифосфата (PIP₂), нейрокинина, простагландина E₂ (PGE₂). Изменения активности TRP также зависят от влияния биоактивных липидов, таких как фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин, холестерин, фосфатидилинозитол 4,5-бифосфат, полиненасыщенные жирные кислоты и эндоканнабиноиды, а также от изменений показателя кислотности pH, мембранного потенциала и внутриклеточной концентрации ионов кальция (Ca²⁺). Регуляция данных каналов различными стимулами делает их чрезвычайно привлекательной терапевтической мишенью.

Нейротрофины и их рецепторы играют важную роль в осуществлении сигнальных взаимосвязей между иммунными клетками и структурами нейросенсорной сети дыхательных путей. В механизмах воспаления и ремоделирования дыхательных путей особый вклад принадлежит представителям одного из подсемейств нейротрофических факторов роста – подсемейства нейротрофинов (NGF, BDNF,

NT3, NT4). Его участие в патофизиологических механизмах бронхолегочных заболеваний активно изучается.

Первая часть монографии посвящена теоретическим аспектам проблемы, обсуждаются современные взгляды различных авторов на роль сигнальных молекул и их рецепторов в механизмах регуляции иммунного и нейрогенного воспаления при обструктивных заболеваниях легких – бронхиальной астме и хронической обструктивной болезни легких.

Ядерные транскрипционные факторы и Толл-подобные рецепторы в патогенезе хронического иммунного воспаления

Ядерные транскрипционные факторы

Внутриклеточными триггерами воспалительной реакции на генном уровне являются ядерные транскрипционные факторы, представляющие собой группу внутриклеточных белков – регуляторов транскрипции генов. К *провоспалительным* транскрипционным факторам относят активирующий протеин-1 и ядерный фактор каппа В, к *противовоспалительным* – рецептор глюкокортикоидов и рецепторы, активирующие пролиферацию пероксисом.

Основные *провоспалительные* ядерные транскрипционные факторы AP-1 и NF-κB запускают процесс развития воспалительной реакции в ответ на влияние бактериальных липополисахаридов, провоспалительных цитокинов, жирных кислот и их производных. Активированные AP-1 и NF-κB транслоцируются в ядро клетки и координируют транскрипционное репрограммирование иммунных клеток, стимулируя экспрессию молекул воспаления.

Активирующий протеин-1

Активирующий протеин 1 является ключевым фактором транскрипции, который регулирует широкий спектр клеточных процессов, включая апоптоз, дифференцировку, миграцию и трансформацию клеток, а также участвует в экспрессии генов цитокинов [425]. Данный белок способен контролировать экспрессию цитокинов, таких как tumor necrosis factor α (TNF-α), интерлейкин 1, интерлейкин 2 и ряд других [445]. Протеин представлен 4 подтипами: Jun (v-Jun, c-Jun, JunB, JunD), Fos (v-Fos, c-Fos, FosB, Fra1, Fra2), ATF (ATF2, ATF3/LRF1, B-ATF, JDP1, and JDP2) и MAF (c-Maf, MafB, MafA, MafG/F/K, Nrl). Данные подтипы способны образовывать димеры. Несмотря на высокую степень структурной гомологии, димеры

проявляют различия в способности активировать или подавлять экспрессию генов, что предполагает их специфические регуляторные функции. Основными и наиболее изученными белками являются Jun и Fos.

Активность AP-1 индуцируется рядом физиологических и экологических стимулов (факторы роста, нейротрансмиттеры, полипептидные гормоны, цитокины, УФ-влияние, бактериальные и вирусные инфекции [508]. Воздействие данных триггеров запускает ряд клеточных каскадов и передает сигнал AP-1, что может приводить как к активации транскрипции генов-мишеней, так и к ее подавлению. AP-1 участвует в регуляции окислительного статуса, контролируя защитные гены через TRE-последовательности ДНК, к которым он высоко специфичен.

Ядерный фактор каппа В

Ядерный фактор каппа В – один из важнейших мессенджеров, стимулирующих экспрессию генов в ответ на провоспалительные стимулы. NF-κВ регулирует развитие и апоптоз клеток, модулирует иммунный ответ и развитие воспаления. Системное воспаление может быть оценено на основе многих воспалительных маркеров, таких как CRP, ILs, TNF-α и COX-2 [92]. Известно, что сигнализация NF-κВ играет важную роль в воспалительных реакциях. Сигнализация NF-κВ может быть активирована воспалительными молекулами; наоборот, активированная сигнализация NF-κВ может стимулировать секрецию большего количества воспалительных молекул. При блокировании сигнального пути NF-κВ экспрессия TNF-α и IL-6 снижается [61; 225]. Однако неясно, влияют ли уровни экспрессии генов семейства NF-κВ на воспалительные реакции.

В клетках млекопитающих есть пять известных членов семейства NF-κВ, к которым относятся RelA (p65), RelB, c-Rel, p50/p105 (NF-κВ 1) и p52/p100 (NF-κВ 2). В отсутствие активирующих влияний NF-κВ удерживается в протоплазме клетки ингибиторным белком (NF-κВ inhibitor (IκB)).

Активация NF-κB осуществляется рецепторами TNFR (Tumour necrosis factor receptor), TLR, IL-1R (Interleukin1receptor). Кроме того, данный фактор активируется при повреждении ДНК, развитии окислительного стресса. Посредством стимулирующих воздействий и с участием гетеродимерной киназы IκB (IκB kinase (IKK)) происходит активация NF-κB и деградация IκB. Активация NF-κB опосредуется каноническими (классическими) или неканоническими (неклассическими, альтернативными) путями, вызывая специфический генетический ответ. Канонический путь имеет решающее значение для активации врожденного иммунитета и ингибирования апоптоза. Активированный NF-κB транслоцируется в ядро и инициирует выработку медиаторов воспаления [422]. NF-κB-опосредованная индуцибельная синтаза оксида азота (iNOS) и циклооксигеназа-2 (COX-2) считаются особенно важными медиаторами в развитии и обострении легочного воспаления. Кроме того, экспрессия iNOS и COX-2 повышается за счет активированного NF-κB.

Противовоспалительные ядерные транскрипционные факторы GR и PPARs нивелируют процесс развития воспалительной реакции.

Рецептор глюкокортикоидов

Рецептор GR экспрессируется по всему организму и имеет несколько изоформ, наиболее изученными из которых являются GRα and GRβ [497]. Изоформа GRα опосредует транскрипционную активность GR, в то время как GRβ ингибирует активность GRα. Известно, что GR находится в цитоплазме клетки, но после связывания с глюкокортикоидным лигандом транслоцируется в ядро и взаимодействует со специфическими последовательностями ДНК, инициируя геномный ответ [226]. Как фактор транскрипции, GR опосредует транскрипцию многочисленных генов, участвующих в метаболических процессах и иммунных механизмах. Однако GR также подавляет транскрипцию без прямого взаимодействия с ДНК [240]. Действие глюкокортикостероидов (ГКС) реализуется за счет связывания с цитоплазматическим глюкокортикоидным рецептором [223].

Этот комплекс транслоцируется в ядро, где он реализует противовоспалительное действие путем транскрепрессии провоспалительных генов. Такая транскрепрессия является результатом связывания и ингибирования провоспалительных факторов транскрипции, в частности NF-κB. Ингибиторные эффекты глюкокортикоидов также реализуются через дезактивацию сигнала AP-1 (механизмы трансаактивации и транскрепрессии) [227]. Учитывая, что противовоспалительное действие ГКС реализуется за счет их связывания с GR [425], актуальность изучения данного рецептора обусловлена его способностью уменьшать степень выраженности воспалительной реакции в бронхолегочной системе.

Рецепторы, активирующие пролиферацию пероксисом

Рецепторы PPARs входят в суперсемейство 48 гормональных ядерных транскрипционных факторов, ответственных за метаболизм и энергетический гомеостаз клетки. Несмотря на то, что PPARs являются транскрипционными факторами, они также способны связывать и инактивировать различные белки. Связывание PPARs с NF-κB снижает провоспалительный ответ. В регуляции экспрессии PPAR участвуют митоген-активированные протеинкиназы (MAPK) p38 и JNK [397].

Известны 3 изомера: PPARα, PPARβ/δ и PPARγ [385]. Все изомеры PPARs экспрессируются в легочном эпителии, эндотелии, фибробластах, макрофагах и играют важную роль в гомеостазе бронхолегочной системы [398].

PPARα экспрессируется преимущественно в печени, почках, сердце, мышцах, жировой ткани, а также в эпителиальных клетках, макрофагах, лимфоцитах и дендритных клетках слизистой оболочки дыхательных путей [364]. Данный изомер стимулирует экспрессию генов ферментов, участвующих в β-окислении и регулирует метаболизм липидов, углеводов и аминокислот. Показано, что PPARα активируется полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК) и препаратами, используемыми для лечения дислипидемий.

PPAR β/δ экспрессируется в мозге, коже, жировой ткани, вовлечен в окисление жирных кислот и регуляцию в крови уровня глюкозы и холестерина. PPAR β/δ увеличивает экспрессию пируватдегидрогеназы киназы-4 и карнитин пальмитоилтрансферазы 1А, что усиливает интенсивность окисления жирных кислот. PPAR γ экспрессируется практически во всех тканях, хотя его исследования были сосредоточены на механизмах регуляции ими метаболизма глюкозы и липидов [385]. PPAR γ увеличивает концентрацию адипонектина и экспрессию глюкозных транспортеров 1 и 4 [370]. Связывание PPAR γ со специфическими лигандами регулирует транскрипцию генов-мишеней, ингибирует активацию иммунных клеток и экспрессию воспалительных факторов [369; 378].

Все PPARs имеют сходную структуру благодаря наличию лиганд-связывающего домена (LBD), который обеспечивает активацию PPARs жирными кислотами и их производными с 14 и более атомами углерода [385].

Во время развития воспалительной реакции PPARs активируются широким спектром метаболитов и синтетических активаторов (нативные и окисленные жирные кислоты и их производные (resolvin E1, neuroprotectin D1), тиазолидинодионы, глитазоны, фибраты, простагландины циклопентенона (PGA2 и 15d-PGJ2)). Известно, что ПНЖК и их метаболиты функционируют как агонисты PPAR γ [385]. Другими активаторами PPARs являются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Эндоканнабиноиды могут активировать PPAR $\alpha/\gamma/\delta$ рецепторы [328]. Было показано, что каннабиноиды, выступающие в качестве двойных агонистов PPAR γ и каннабиноидных рецепторов 2 типа (CB2), нивелируют хроническое воспаление [126]. Активация PPARs приводит к модуляции провоспалительной реакции, предотвращая ее чрезмерную активацию.

Ядерные транскрипционные факторы и БА. Повышенная экспрессия провоспалительного фактора AP-1 была обнаружена в дыхательных путях больных БА [445]. Кроме того, ген Muc5B, который

отвечает за выработку слизи в дыхательных путях, содержит сайт AP-1 в своем промоторе [465]. Поскольку AP-1 играет важную патофизиологическую роль в развитии многих хронических воспалительных заболеваний, в частности, БА, в настоящее время интенсивно изучаются его ингибиторы.

При аллергической БА NF-κB рассматривается как главный регулятор врожденных и адаптивных иммунных реакций. Кроме того, NF-κB регулирует гены, участвующие в воспалении дыхательных путей, связанном с БА. Стимуляция сигнального пути NF-κB способствует повышению экспрессии эпителиальных цитокинов слизистой оболочки, таких как IL-4 и TNF-α. Подтверждена роль NF-κB в ремоделировании дыхательных путей при БА [496]. Стоит отметить, что экспрессия NF-κB значительно повышена у пациентов с тяжелой БА [432]. Ингибирование активности NF-κB нивелирует воспаление и предотвращает ремоделирование дыхательных путей. Так, в исследовании J. Sun и соавт. было продемонстрировано, что метформин, используемый при терапии диабета 2 типа, посредством подавления сигнализации NF-κB уменьшает повреждение эпителиальных клеток бронхов, индуцированное липополисахаридом [456].

Можно заключить, что провоспалительные ядерные транскрипционные факторы играют значимую роль в патофизиологии хронического воспаления при БА и могут являться важной терапевтической мишенью.

Изучение функции противовоспалительного ядерного транскрипционного фактора GR при БА обусловлено тем фактом, что противовоспалительное действие ГКС реализуется посредством взаимоотношений с данным рецептором [425]. Кортикостероиды и бронходилататоры являются препаратами первой линии и наиболее часто используются для лечения типичных симптомов астмы и обострений. Однако при тяжелой БА, как и при ХОБЛ, ГКС неэффективны и предлагают незначительное клиническое улучшение, что объясняется окислительным стрессом и повреждением ДНК, которые

приводят к увеличению экспрессии воспалительных генов [287]. Кроме того, продолжительное введение ГКС приводит к многочисленным побочным эффектам, что снижает эффективность лечения и обуславливает актуальность дальнейшего изучения механизмов модуляции активности воспаления при БА.

Накопленные данные показали, что PPARs участвуют в патогенезе БА, и лиганд-индуцированная активация этих рецепторов эффективна в терапии данной патологии. Агонисты PPAR оказывают противовоспалительное действие путем подавления провоспалительных медиаторов и функций различных провоспалительных клеток, имеющих отношение к патофизиологии БА. В целом, активность каждого изомера PPAR связана с уменьшением воспалительной реакции при БА, тогда как нарушение экспрессии PPAR усугубляет воспаление и ремоделирование дыхательных путей.

Можно заключить, что противовоспалительные ядерные транскрипционные факторы (GR и PPAR) вовлечены в патогенез хронического воспаления при БА и должны быть предметом пристального изучения для разработки эффективных терапевтических стратегий БА.

Ядерные транскрипционные факторы и ХОБЛ. Мало известно об ассоциации уровней экспрессии генов семейства NF-κB с патогенезом ХОБЛ. В исследовании Liting Zhou и соавт. изучена взаимосвязь между экспрессией мРНК генов семейства NF-κB (NF-κB 1, NF-κB и c-REL), уровнями воспалительных молекул (COX-2, CRP, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12 и TNF-α) и ХОБЛ [359]. Было установлено, что чрезмерная экспрессия NF-κB 2 и c-REL связана с ХОБЛ. Гиперэкспрессия NF-κB 2 коррелирует с уровнями IL-1β, IL-8 и COX-2, тогда как гиперэкспрессия c-REL была связана с уровнем COX-2 [359].

Бронхиальные эпителиальные клетки и ЛМ экспрессируют недавно идентифицированную роман киназу MAP3K19 в легких и трахее человека и мыши, приводя к MAP3K19-зависимой NF-κB активации и секреции хемокинов CXCL-8, CCL-20 и CCL-7 [306].

Ингибирование MAP3K19 малыми интерферирующими РНК или низкомолекулярными ингибиторами купировало воспаление на мышинных моделях, уменьшая выраженность эмфизематозных изменений в паренхиме дыхательных путей. Очевидно, что MAP3K19 может быть ключевой молекулой в управлении активностью воспаления в легких в ответ на воздействие экзогенных (сигаретный дым, загрязнение воздуха, озон) и эндогенных источников (активированные нейтрофилы, макрофаги, эозинофилы и эпителиальные клетки, окислительный и осмотический стресс) [306]. Ингибирование MAP3K19 может представлять собой стратегию борьбы с ХОБЛ.

С NF-κB связан лиганд, индуцирующий апоптоз (Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL)). TRAIL представляет собой цитокин с воспалительными и апоптотическими свойствами. Воздействие сигаретного дыма на мышей увеличивало экспрессию TRAIL и его рецепторной РНК (мРНК). TRAIL и его мРНК были также увеличены при ХОБЛ у человека. У мышей с дефицитом TRAIL развивались спонтанные изменения дыхательных путей с увеличением толщины эпителиальных клеток и отложением коллагена. Терапевтическая нейтрализация TRAIL на ранней стадии ХОБЛ уменьшала воспаление легких и эмфиземоподобные изменения. Эти данные предоставляют дополнительные доказательства того, что TRAIL является основным воспалительным фактором при респираторных заболеваниях, в частности ХОБЛ [60].

Гиперсекреция слизи является важной патологической особенностью ХОБЛ. В запуск данного механизма вовлечены многие факторы, в частности, гены раннего ответа (immediately early genes, IEGs). Их продуктами являются факторы транскрипции, а также ряд цитоплазматических ферментов и секретируемых протеинов. Кодированные ими факторы транскрипции индуцируют экспрессию генов отсроченного ответа, ответственных за процессы пролиферации, дифференцировки, апоптоза. Наиболее изученными представителями являются семейства Fos, Jun, Myc и Egr.

Гиперсекреция слизи регулируется одним из представителей семейства Egr – фактором транскрипции Egr-1 (Early growth response factor 1). Так, в исследовании SB Wang и соавт. продемонстрировано, что экстракт сигаретного дыма индуцирует последовательную экспрессию Egr-1 и муцина 5AC (MUC5AC) в клетках бронхиального эпителия человека [189]. Одновременно наблюдалось увеличение экспрессии c-Jun и c-Fos, двух субъединиц AP-1, который также регулирует индуцированную сигаретным дымом выработку MUC5AC. Кроме того показано, что сигаретный дым также индуцировал физическое взаимодействие Egr-1 и AP-1. Совокупность имеющихся данных позволяет предположить, что Egr-1 имеет важное значение для индуцированной сигаретным дымом продукции MUC5AC в клетках бронхиального эпителия через взаимодействие и модуляцию AP-1. В этом случае данную мишень можно рассматривать в качестве новой терапевтической стратегии для ХОБЛ.

Активирующий фактор транскрипции 3 (ATF3) – ген адаптивного ответа, который участвует в различных клеточных процессах, в частности, в экспрессии индуцированного сигаретным дымом муцина 5AC посредством влияния на AP-1 [65]. Сигаретный дым способствует связыванию c-Jun и Fra1 с сайтом SPRR3-AP-1/TRE [145].

Дым биомассы, используемый для отопления помещений и приготовления пищи в странах с низким уровнем дохода, как и сигаретный, вызывает воспалительные реакции в клетках легких человека через сигнальные пути, участвующие в остром и хроническом воспалении легких. Дым биомассы навоза увеличивает продукцию нескольких провоспалительных цитокинов за счет активации AP-1 и арилгидрокарбонатного рецептора (AhR) [186].

Таким образом, провоспалительные ядерные транскрипционные факторы NF-κB и AP-1 вовлечены в развитие хронического воспаления при хронической обструктивной болезни легких. Изучение их активности открывает широкие перспективы в поиске стратегий управления заболеванием.

Что касается противовоспалительных ядерных транскрипционных факторов (GR и PPARs), то на сегодняшний день в терапии ХОБЛ используются ГКС, реализующие противовоспалительное действие за счет связывания с цитоплазматическим глюкокортикоидным рецептором GR путем транскрепрессии провоспалительных генов. Однако в практической медицине до настоящего времени сохраняется ряд нерешенных вопросов в отношении безопасности, эффективности их применения в качестве моно- и комбинированной терапии [75; 254; 403]. Ингаляционные ГКС имеют ограниченную эффективность в снижении обострений ХОБЛ и повышают риск развития пневмонии с помощью неизвестных механизмов [360].

Известно о снижении экспрессии PPAR γ в ткани легких, эпителиальных клетках и миелоидных дендритных клетках у пациентов с ХОБЛ [182; 435]. В экспериментальных исследованиях показано снижение уровня PPAR γ в макрофагах и эпителиальных клетках бронхов крыс при воздействии сигаретного дыма [73; 460]. Удаление PPAR γ из альвеолярных макрофагов приводило к воспалительным изменениям дыхательных путей [73; 460] и способствовало формированию эмфиземы [435]. Мыши с отсутствием PPAR показали повышенную восприимчивость к хронической эмфиземе с чрезмерным накоплением макрофагов [73].

В последнее время лиганд-индуцированная активация PPARs рассматривается в качестве эффективного способа в противовоспалительной терапии ХОБЛ [379; 472]. Обработка эпителиальных клеток синтетическими или эндогенными агонистами PPAR γ активирует экспрессию PPAR γ , подавляет секрецию воспалительных цитокинов [182]. Более поздние исследования показали, что лиганды PPAR γ снижают выработку провоспалительных цитокинов, включая фактор некроза опухоли- α и CCL5 в альвеолярных макрофагах при ХОБЛ. Синтетические агонисты PPAR γ увеличивали уровни генов M2, которые участвуют в противовоспалительных эффектах и восстановлении тканей, улучшали клиренс апоптотических нейтрофилов, ослабляли

нейтрофилию дыхательных путей на мышинной модели легочного воспаления, устойчивой к кортикостероидам, не приводя к увеличению легочной бактериальной нагрузки [413, 472]. Агонисты PPAR γ способны обратить вспять дисбаланс металлопротеаз/анти-меллопротеаз, связанный с эмфиземой [140, 413].

Эти данные свидетельствуют о том, что активация PPAR γ в местных дыхательных путях может быть эффективной стратегией терапии ХОБЛ.

Толл-подобные рецепторы

Обнаружение экзогенных или эндогенных молекул, образованных от патогенных микроорганизмов или ассоциированных с повреждением, а также последующая активация специфического иммунного ответа, направленного на их элиминацию, происходит с участием рецепторов распознавания паттерна или образ-распознающих рецепторов (pattern recognition receptors (PRRs)).

PRRs представляют собой мембранные белки, локализованные на поверхности клеток иммунной системы, которые активно способствуют обнаружению экзогенных или эндогенных молекул (молекулярных паттернов), образованных от патогенных микроорганизмов. Функционально рецепторы делятся на сигнальные толл-подобные рецепторы (TLRs) и эндоцитозные (маннозные рецепторы макрофагов).

В последнее время TLRs получают все больше внимания, поскольку являются центральными участниками как врожденных, так и адаптивных иммунных реакций. TLRs широко представлены на поверхности различных клеток иммунной системы [284], неиммунных клеток (фибробласты, эпителиальные клетки, кератиноциты)), а также стволовых клеток [407]. Эти рецепторы представляют собой первую линию защиты слизистой оболочки, участвуя в распознавании, обработке и устранении патогенных микроорганизмов, эндогенных молекул и аллергенов воздушной среды.

Согласно современным представлениям, TLRs играют иммуномодулирующую роль в развитии хронической бронхолегочной патологии [95, 74]. TLRs распознают патогены, локализованные внеклеточно или находящиеся в эндосомах. На сегодняшний день идентифицировано 13 TLRs млекопитающих (TLRs1–13). Стоит отметить, что TLR11, TLR12 и TLR13 не обнаружены у человека. Каждый из TLRs отвечает за распознавание определенного набора молекулярных паттернов. После синтеза TLR3, TLR7, TLR8 и TLR9 находятся в эндоплазматическом ретикулуме и переходят в эндолизосомный отдел клетки при ее активации (эндосомальные TLRs), в то время как TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6 и TLR10 локализуются только на плазматической мембране клеток (TLRs, экспрессируемые на клеточной мембране или поверхностные TLRs) [166]. Лигандами для поверхностных TLRs служат компоненты микробных мембран, бактериальные протеины и белки микроорганизмов, для эндосомальных TLRs – нуклеиновые кислоты вирусов. В распознавание лигандов в наибольшей степени вовлечены TLR2, TLR4, TLR7, TLR8, TLR9 [211].

В структуре TLR выделяют два основных домена: LRR домен (Leucine-Rich Repeat domain), отвечающий за связывание лиганда, и TIR домен (Toll/interleukin-1 receptor and Resistance domain), локализованный в цитоплазме и взаимодействующий с молекулами сигнальных путей [160]. TLRs (кроме TLR3) посредством TIR домена передают сигнал через адапторные молекулы на киназы, активирующие факторы NF- κ B, AP-1 и IRF [185]. К адапторным молекулам относят MyD88 (myeloid differentiation protein 88 (MyD88)), TIRAP (TIR-доменсодержащие адапторы), TICAM1 (TIR-domain-containing adapter-inducing interferon- β (TRIF)), TICAM2 (TIR-containing adapter molecule). Все TLRs реализуют свое действие через MyD88, кроме TLR3, передающего сигнал через TRIF. TLR4 активирует как MyD88-зависимые, так и TRIF-зависимые сигнальные пути, что делает его уникальным рецептором [160].

Таким образом, TLRs распознают значительное количество лигандов, что определяет научный интерес к их изучению в качестве перспективной терапевтической мишени при БА и ХОБЛ [211]. Стоит отметить, что модуляция TLRs-сигналикации может быть направлена как на активацию, так и на разрешение воспалительной реакции в дыхательных путях [178; 185].

Толл-подобные рецепторы и БА. Основным механизмом воспаления при БА – иммунный [370]. Клетки иммунной системы (эозинофилы, лимфоциты и нейтрофилы) могут взаимодействовать с эпителиальными клетками и вызывать гиперреактивность бронхов, гиперсекрецию слизи, ремоделирование дыхательных путей и их стеноз [24]. Антигенпрезентирующие дендритные клетки распознают аллергены и мигрируют в лимфатические узлы, где представляют антигены CD4 Т-лимфоцитам и индуцируют их дифференцировку в различные типы Т-хелперов (Th1, Th2, Th17). Направление дифференцировки Т-клеток происходит через взаимодействие с определенными рецепторами и активацию внутриклеточных сигнальных каскадов. Среди них наиболее важную роль в патогенезе хронического воспаления при БА играют TLRs [185]. Изучение функционирования TLRs может являться эффективным направлением для подавления воспаления, эозинофилии и гиперреактивности дыхательных путей, наблюдаемых при БА [95; 160; 161; 185; 281].

Механизм формирования атопического Th2-иммунного ответа при БА не до конца ясен, хотя известно, что в его развитие вовлечен ряд TLRs (TLR2, TLR4 и TLR6). Тучные клетки экспрессируют большинство поверхностных и эндосомальных TLRs и активно участвуют в аллергических реакциях посредством TLR-индуцированной секреции цитокинов и хемокинов, инициирующих Th2-иммунный ответ [458]. Стимуляция TLRs на эозинофилах также приводит к повышению их активности и высвобождению цитокинов [285]. Базофилы и нейтрофилы в свою очередь вносят вклад в развитие атопической и неатопической БА [239].

Так, активация базофильных TLRs поддерживает аллергические реакции за счет увеличения продукции IL-4, IL-8 и IL-13 [458]. Важной особенностью TLRs является их участие в развитии иммунного ответа на вирусные и бактериальные инфекции, вызывающие тяжелые обострения БА. Поэтому дефекты TLRs сигналинга ассоциированы как с развитием БА, так и с рецидивирующими вирусными инфекциями [95]. Было установлено, что стимуляция TLRs в эндотелиальных клетках и фибробластах, которые играют важную роль в воспалении дыхательных путей, резко влияет на фазу сенсibilизации [499]. Лигандированные TLRs индуцируют окислительный стресс, стимулируют высвобождение факторов роста и цитокинов, связанных с ремоделированием дыхательных путей [496]. Данные рецепторы опосредуют взаимодействие между врожденным, адаптивным иммунитетом и клеточным повреждением [184; 330; 501].

Растущее количество данных указывает на чрезвычайную роль TLRs в патофизиологии БА [95; 161; 185; 281]. Однако в настоящее время очевидная причастность TLRs к данному заболеванию не определена должным образом и нуждается в детализации [183]. Накопленные результаты свидетельствуют, что TLRs-сигнальный путь может быть направлен как на успешное нивелирование воспалительной реакции в дыхательных путях, так и на ее развитие и усугубление [178; 184; 185; 198]. Так, существует гигиеническая гипотеза (hygiene hypothesis), согласно которой некоторые микробные агенты, активирующие TLRs, могут участвовать в развитии БА и аллергопатологии [89; 467]. Бактериальные продукты также оказывают иммунорегуляторное действие при БА посредством рекрутирования регуляторных Т клеток (Treg) в дыхательные пути и активации дендритных клеток слизистой оболочки с помощью TLRs-зависимой сигнализации [274]. Текущие исследования подтверждают гипотезу, предполагающую что изменения микробиома в раннем возрасте также влияют на активацию TLRs, что приводит к повышению риска развития БА и аллергии [317].

Таким образом, увеличение заболеваемости аллергической БА может быть связано с модификацией микробиома, приводящей к aberrантной активации TLRs. В настоящее время в патогенезе БА активно изучается роль как эндосомальных TLRs, так и TLRs, экспрессируемых на клеточной мембране [161].

Наибольший интерес в патофизиологии БА представляют мембранные TLR2 и TLR4 [526]. Активация аллергенами рецепторов, экспрессируемых на клеточной мембране, сопровождается формированием Th2-ответа и развитием аллергического воспаления [74]. Активация агонистов TLR2 приводит как к ингибированию развития БА [178], так и может способствовать ее развитию [198]. Несмотря на важную роль TLR4 в индукции гиперчувствительности дыхательных путей [191], существенное значение в развитии БА отводится экспрессии MyD88 [255].

TLR2 является главным рецептором, распознающим компоненты клеточной стенки грамположительных бактерий и микобактерий [358]. Установлено, что экспрессия TLR2 у больных БА значительно выше, чем у здоровых лиц [505]. Некоторыми авторами подчеркивается особая важность членов подсемейства TLR2 в патофизиологии детской БА [281]. В исследовании J. Lv и соавт. была обнаружена активация TLR2, что приводит к рекрутингу циркулирующих базофилов в легкое через C-C хемокин лиганд-2 (C-C chemokine ligand-2 (CCL2)) [74]. Активация TLR2 увеличивала продукцию стромального лимфопоэтина тимуса (thymic stromal lymphopoietin (TSLP)) через NF-κB и JNK сигнальные пути, предрасполагая к инициации воспаления Th2-типа. И наоборот, дефицит TLR2 нарушал секрецию TSLP и CCL2, уменьшал инфильтрацию легочных базофилов и повышал устойчивость к развитию Th2-ответа. Данные результаты показывают провоспалительную роль эпителиальных клеток дыхательных путей, реализующуюся через TLR2-зависимую продукцию TSLP, которая имеет важное значение в терапии аллергической БА. В некоторых исследованиях показано, что воздействие TLR2 агонистов приводит

к ингибированию развития БА [63; 178]. В то же время результаты других исследований свидетельствовали о том, что активация данного рецептора может способствовать формированию аллергической БА [198]. Аналогично, добавление лиганда TLR2 (Pam3Cys) потенцировало аллергическую сенсibilизацию в экспериментальной модели БА [280]. Как отмечалось выше, бактериальные продукты оказывают иммунорегуляторное воздействие при БА посредством TLRs-зависимого сигналинга, особенно через TLR2 [274].

В исследовании SC. Eisenbarth и соавт. показано, что именно TLR4 необходимы для развития аллергической реакции [191]. Стимуляция TLR4 на тучных клетках усугубляет течение экспериментальной БА [266]. Среди факторов окружающей среды, которые могут влиять на развитие аллергических заболеваний, особое значение принадлежит эндотоксину (липополисахарид, LPS) [371]. Липополисахарид грамотрицательных бактерий является лигандом TLR4. Большинство природных аллергенов не только загрязнены LPS, но и имеют структурную гомологию с TLR4. Экспериментальные исследования подтвердили, что воздействие эндотоксина может не только защищать, но и индуцировать или усугублять течение астмы в зависимости от возраста животных в используемой экспериментальной модели, концентрации и периода воздействия эндотоксина [537]. Возраст – важный фактор, влияющий на TLR4-опосредованный Th2-ответ при воздействии липополисахарида. Как правило, инициация TLR4-сигнального пути во врожденных иммунных клетках сопровождается продукцией цитокинов, ассоциированных с Т-хелперами 1 типа и последующим развитием Th1/Th17 клеточного иммунитета [166]. В раннем возрасте активность TLR4 снижается, а иммунный баланс смещается в сторону Th2-типа иммунного ответа и сопровождается повышением риска развития аллергических заболеваний [206]. Так, воздействие LPS на новорожденных мышей ингибирует воспаление и гиперреактивность дыхательных путей, а также экспрессию цитокинов Th2-типа, что указывает на то, что воздействие антигена

может обеспечить толерантность и гипореактивность к аллергенам окружающей среды [537]. Было исследовано влияние аллергенов, полученных из грибов *Aspergillus* spp. на индукцию воспаления дыхательных путей [151]. Установлено, что именно TLR4 имеет важное значение для индукции воспаления грибковыми протеиназами [151]. Контакт с домашними животными, такими как кошки и собаки, также может значительно усугублять течение БА через стимуляцию TLR4 сигнализации [76]. Несмотря на результаты исследований, указывающих на важную роль TLR4 в индукции гиперчувствительности дыхательных путей [191], наиболее важное значение в развитии экспериментальной БА отводится молекуле MyD88 [255; 313; 191]. В то же время, некоторые исследования показали, что БА также развивается у TLR4-дефицитных или MyD88-дефицитных мышей.

Таким образом, активация аллергенами TLR2 и TLR4 сопровождается преимущественным формированием Th2-ответа и развитием аллергического воспаления. Стоит отметить, что TLR2 и TLR4 также вовлечены в формирование нейтрофильного воспаления, характерного для фенотипов БА с низким уровнем Th2-ответа, которое ассоциировано с более тяжелым течением заболевания.

Помимо TLR2 и TLR4, представляющих значительный научный интерес в связи с их вовлеченностью в патогенез БА, другие поверхностные TLR, также активно изучаются в последнее время. Так, в одних исследованиях установлено, что экспрессия TLR1 существенно повышается у больных БА [505]. Активация агонистов TLR1 ингибирует развитие данного заболевания [63; 178], в то время как активация данных рецепторов способствует его развитию [198]. Среди пациентов, страдающих тяжелой БА, выявлен более низкий уровень TLR5, в то время как экспрессия данного рецептора у пациентов с легкой степенью тяжести заболевания не отличалась от показателей здоровых лиц [307]. Установлено, что экспрессия TLR6 у больных БА значительно ниже по сравнению со здоровыми людьми [505]. В экспериментальных исследованиях показано, что агонисты TLR6

ослабляют хроническое аллергическое воспаление дыхательных путей [63]. В исследовании M. Korppi и S. Törmänen было установлено, что варианты генотипов TLR1 и TLR10 были связаны с большим риском развития БА после перенесенного бронхиолита в детском возрасте (в 5 – 7 и 11 – 13 лет) [281]. Таким образом, все TLRs, экспрессируемые на клеточной мембране, играют значимую роль в патофизиологии БА.

Клинические проявления БА являются результатом гиперреактивности дыхательных путей по отношению к различным триггерам, таким как аэроаллергены, вирусные и бактериальные компоненты, вызывающие тяжелые обострения БА. Важной особенностью TLRs является их участие в развитии иммунного ответа на вирусные инфекции, вызывающие обострения БА [95]. Все эндосомальные TLRs (TLR3, TLR7, TLR8, TLR9) распознают нуклеиновые кислоты микробов: TLR3 распознает двухцепочечную РНК, TLR7 и TLR8 – одноцепочечную РНК, а TLR9 – ДНК [291].

Возможным механизмом усиления воспаления дыхательных путей у больных БА в условиях вирусной инфекции является активация TLR3 [181]. Экспериментально установлено, что введение синтетического агониста TLR3 с вдыхаемым аллергеном приводит к развитию аллергических реакций [498].

TLR7/8, экспрессируемые в эозинофилах, также могут быть ответственны за обострение БА при развитии вирусной инфекции [285]. L. Hatchwell и соавт. была исследована роль TLR7 в обострении вирусной БА в эксперименте [503]. Установлено, что ингибирование экспрессии TLR7 у мышей с аллергической БА приводит к ускорению репликации риновируса, что поддерживает эозинофильное воспаление и гиперреактивность дыхательных путей. Функция TLR7 заключается в обеспечении противовирусной защиты дыхательных путей посредством распознавания вирусной РНК. Кроме того, экспрессия TLR7 у пациентов с тяжелой БА заметно ниже, чем у здоровых лиц [169].

В то же время эксперименты, проведенные *in vitro*, показывают, что стимуляция TLR7 в нервных волокнах дыхательных путей приводит к бронходилатации за счет производства оксида азота, подтверждая важную роль данного рецептора в физиологии и патологии бронхолегочной системы [504]. TLR8 обладает функциональной схожестью с TLR7, возможно в связи с этим его изучению не уделяется пристального внимания.

TLR9 главным образом представлен в разнообразных иммунных клетках [427]. Результаты ряда исследований показывают, что TLR9 имеет потенциал в качестве профилактической и терапевтической цели при БА, так как природными лигандами TLR9 служат участки ДНК бактерий и вирусов [291; 303]. Сообщается, что эпителиальные клетки дыхательных путей пациентов с БА продуцируют больше IL-25 в ответ на активацию TLR9 по сравнению со здоровыми людьми и это является ответом на активацию рецептора TLR9 [249]. Активация TLR9 способствует развитию Th1-типа иммунного ответа и снижению уровня цитокинов Th2-типа (IL-4, -5, -12; IL-1 β). Возможно, усиление Th1-типа иммунного ответа является механизмом, с помощью которого TLR9 ингибирует активацию воспаления Th2-типа [170]. Было показано, что запуск TLR 9 сигналинга подавляет развитие ремоделирования дыхательных путей. TLR9, экспрессируемый в эозинофилах, вовлечен в обострение БА, вызванное вирусной инфекцией [285]. Воздействие на TLR9 может в конечном итоге предотвратить воспаление дыхательных путей. В работе L. Shan и соавт. была выявлена взаимосвязь между полиморфизмом *TLR9/TLR7* генов и детской БА [190]. Применение агониста TLR9 подавляло развитие БА в эксперименте [534].

Таким образом, все эндосомальные TLRs связаны с индукцией астматического воспаления и его обострениями при наибольшей вовлеченности в данный процесс TLR7, TLR8, TLR9 [490]. Внутриклеточные TLRs вызывают преимущественно формирование Th1-ответа. Очевидно, что эндосомальные TLRs играют немаловажную роль

в патофизиологии БА и могут являться перспективной мишенью для купирования хронического воспаления дыхательных путей.

На основании представленных литературных данных можно заключить, что TLRs играют ключевую роль в обнаружении патогенов и реагировании на них. Существуют результаты исследований, свидетельствующие о том, что агонисты, адьюванты и антагонисты TLRs эффективны в лечении заболеваний дыхательных путей [184]. Так, воздействие на детей в раннем возрасте агонистов TLRs, особенно липополисахаридов, обуславливает развитие выраженной защиты от аллергических заболеваний в более позднем возрасте [317]. Известно, что агонисты TLRs действуют как адьюванты и благоприятствуют развитию Th1/Th17 иммунного ответа, поэтому используются для разработки вакцин [526]. Дальнейшее изучение роли TLRs в патогенезе БА является эффективным направлением современных исследований, требующим пристального внимания.

Таким образом, в патогенезе БА существенная роль принадлежит TLRs благодаря их способности к регуляции адаптивного Th-ответа. Важной особенностью TLRs является их участие в развитии иммунного ответа на вирусные и бактериальные инфекции, вызывающие обострение БА. Поэтому дефекты TLRs сигналинга связаны как с развитием БА, так и с рецидивирующими вирусными инфекциями. Хотя очевидная причастность данных рецепторов к БА нуждается в детализации, важная роль в патофизиологии данного заболевания отводится как эндосомальным TLRs, так и TLRs, экспрессируемым на клеточной мембране. Эндосомальные TLRs ассоциированы с индукцией астматического воспаления и его обострениями. Внутриклеточные TLRs вызывают преимущественно формирование Th1-ответа. Наибольший интерес в патофизиологии БА представляют TLR2 и TLR4, экспрессируемые на клеточной мембране. Активация аллергенами TLR2 и TLR4 сопровождается формированием Th2-ответа и развитием аллергического воспаления. Стоит отметить, что TLR2 и TLR4 также вовлечены в формирование нейтрофильного воспаления,

характерного для фенотипов БА с низким уровнем Th2-ответа, которое ассоциировано с более тяжелым течением заболевания.

Из-за участия TLRs во врожденном и адаптивном иммунитете эти рецепторы в настоящее время используются в качестве возможных мишеней для разработки лекарств. Поэтому изучение механизмов функционирования данных рецепторов и понимание путей, с помощью которых они участвуют в патогенезе БА, может способствовать появлению новых и эффективных стратегий контроля данного заболевания.

Толл-подобные рецепторы и ХОБЛ. Воздействие сигаретного дыма на легочные эпителиальные клетки способно стимулировать апоптоз, некроз и инициировать высвобождение DAMPs, таких как HMGB1, S100A6, S100A8 и HSP70 [258, 386]. Активные формы кислорода генерируются в клетках, подвергшихся воздействию сигаретного дыма и необходимы для индукции белка HIF-1 α , а также активации фосфоинозитид-3-киназы и митоген-активированных протеинкиназных путей. Кроме того, сигаретный дым активирует индуцируемый гипоксией фактор 1 (HIF-1) *in vitro* и *in vivo* соответственно. Очевидно, что HIF-1 играет важную роль в экспрессии генов, вовлеченных в ремоделирование мелких дыхательных путей [144].

Индукцированная сигаретным дымом гибель иммуногенных клеток эпителия дыхательных путей сопровождается запуском врожденных и адаптивных иммунных реакций при ХОБЛ [253]. Врожденные иммунные клетки распознают DAMPs посредством PRRs, к которым относятся TLRs, широко экспрессируемые в легких [164]. Это опосредует высвобождение воспалительных цитокинов, таких как CXCL8 [143]. Возникающая инфильтрация нейтрофилов, макрофагов и Т-клеток стимулирует дальнейшее высвобождение цитокинов, приводя к хроническому воспалительному состоянию в легких. Таким образом, DAMPs могут модулировать воспалительную реакцию после воздействия сигаретного дыма посредством влияния на активность TLRs, а следовательно – на воспаление при ХОБЛ [141].

Как эндосомальные, так и экспрессируемые на клеточной мембране TLRs играют важную роль в патофизиологии ХОБЛ и могут представлять значительный интерес для разработки терапевтически эффективных схем купирования хронического воспаления дыхательных путей.

Наибольший интерес в патофизиологии ХОБЛ среди TLRs, экспрессируемых на клеточной мембране (TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6 и TLR10), представляют TLR2 и TLR4. В исследовании Tatt Jhong Haw и соавт. было продемонстрировано, что экспрессия мРНК TLR2 и TLR4 была увеличена в дыхательных путях как при экспериментальной ХОБЛ, так и при ХОБЛ у человека [500].

Показано, что воздействие сигаретного дыма подавляло TLR-индуцированный синтез TNF- α , IL-6, IL-10. Анализ экспрессии генов показал, что сигаретный дым подавляет LPS-индуцированную транскрипцию TNF- α в альвеолярных макрофагах при ХОБЛ. Воздействие сигаретного дыма на продукцию LPS-индуцированных цитокинов было связано со снижением активности P38, ERK и p65. Сигаретный дым вызывал снижение врожденного иммунного ответа в альвеолярных макрофагах больных ХОБЛ, за исключением персистирующей продукции CXCL8. Это может быть механизм, с помощью которого альвеолярные макрофаги способствуют хемотаксису нейтрофилов в условиях окислительного стресса и бактериального воздействия.

Индуцированное сигаретным дымом хроническое воспаление легких оставалось при лечении TLR2- и TLR4-дефицитных мышей. У TLR2-дефицитных мышей сохранялись явления фиброза и увеличивался апоптоз клеток дыхательной системы, в то время как у TLR4-дефицитных мышей явления фиброза и интенсивность апоптоза клеток снижались. Эти результаты подчеркивают сложную роль TLR в патогенезе ХОБЛ и предполагают, что модуляция активности TLR2 и TLR4 может быть новой терапевтической стратегией для лечения ХОБЛ.

Экспрессия TLR2, TLR4 и цитоплазматического клеточного рецептора NLRP3 была значительно повышена во время обострения ХОБЛ. В совокупности эти данные свидетельствуют о том, что активация нейтрофилов и TLR взаимосвязаны и наблюдаются во время обострений ХОБЛ [148].

Эндосомальные TLRs (TLR3, TLR7, TLR8 и TLR9) также играют важную роль в патофизиологии хронического воспаления при ХОБЛ.

Особое внимание исследователей приковано к TLR-9 [121]. Известно, что сигаретный дым активирует сигнализацию TLR9 в нейтрофилах человека. TLR9 опосредует высвобождение воспалительных цитокинов, таких как CXCL8, и это может способствовать накоплению нейтрофилов и развитию хронического воспаления в дыхательных путях курильщиков [143]. Повышенная экспрессия TLR9 подавляется N-ацетилцистеином.

Результаты исследований W. Wu и соавт. продемонстрировали, что активное курение снижает экспрессию противовирусных цитокинов в клетках бронхиального эпителия. Этот эффект, вероятно, происходит через подавление сигаретным дымом специфического внутриклеточного рецептора распознавания паттерна RIG-I (retinoic acid-inducible protein I) и TLR3. Снижение реакций клеток эпителия легких RIG-I и TLR3 может быть основным механизмом, способствующим повышению риска и тяжести вирусных респираторных инфекций у курильщиков и вирусно-опосредованных обострений ХОБЛ [65].

Исторически бактериальные инфекции считались преобладающей инфекционной причиной обострений, однако эпидемиологические данные, показывающие большую частоту обострений в зимние месяцы, указывают на причинную роль вирусов [424]. Более поздние исследования показали наличие вирусов в 47-56% случаев обострений [157]. Пикорнавирусы являются наиболее часто выявляемым патогеном, за которым следуют грипп, парагрипп, РСВ и аденовирусы. Риновирусы являются наиболее частой причиной обострений при

ХОБЛ, кроме того, они повышают восприимчивость к вторичным бактериальным инфекциям [157]. Молекулярные компоненты бактерий и вирусов распознаются преимущественно эндосомальными PRRs, что приводит к инициации воспалительных процессов. РНК-вирусы первоначально воспринимаются через эндосомальный TLR3 (распознавание dsRNA) или эндосомальный TLR7/8 (распознавание ssRNA). TLR3 использует TIR домен, индуцирующий IFN- β (TRIF) для активации IkB-киназы, TBK-1, а также IKK- β , активирующей IRF-3 и NF- κ B – транскрипционные факторы, необходимые для экспрессии гена IFN- β . Врожденный иммунный ответ на риновирусы включает продукцию интерферонов типа I и III эпителиальными и иммунными клетками дыхательных путей. Их продукция в ответ на вирусную инфекцию нарушается при ХОБЛ и связана с повышенной тяжестью обострения. Экзогенный интерферон- β обращает эти эффекты вспять через ингибирование TLR3 [157].

Экспрессия TLR3 в воспалительных клетках может влиять на восприимчивость к обострению ХОБЛ [91]. Лица с обострениями имели более тяжелое течение ХОБЛ, увеличение уровня нейтрофилов в индуцированной мокроте и увеличение экспрессии гена TLR3. При этом продемонстрировано, что только увеличение фракции нейтрофилов, но не экспрессия гена TLR3, является значимым предиктором обострения ХОБЛ.

Во время вирусной инфекции активируются не только эндосомальные толл-подобные рецепторы, но и цитоплазматические рецепторы распознавания образов, известные как РНК-хеликазы. Многие исследования подчеркнули важность TLR3, TLR7/8 и РНК-хеликазы в обеспечении противовирусного иммунитета посредством индукции интерферона и воспаления при ХОБЛ [154].

Таким образом, дальнейшее изучение патофизиологической роли TLRs позволит модулировать активность воспалительного процесса.

Липиды как посредники в сигнальных механизмах хронического иммунного воспаления

Роль липидных рафтов в механизмах клеточной сигнализации

В настоящее время стало очевидным, что как вирусные и бактериальные инфекции, так и метаболические заболевания, такие как диабет 2 типа, атеросклероз и ожирение, а также ревматоидный артрит, аллергопатологии и ряд других неинфекционных воспалительных заболеваний сопровождаются слабой активацией систем воспалительного ответа и развитием хронического системного низкоинтенсивного воспаления [195, 506]. Такая реакция иммунной системы развивается в ответ на постоянно действующие триггерные факторы слабой интенсивности и характеризуется незначительным повышением активности иммунных клеток и уровня провоспалительных цитокинов. Как уже упоминалось, хроническое системное воспаление тесно связано с нарушениями в регуляции системы TLRs [506].

Наряду с активацией TLRs эндогенными лигандами (алларминами) в последние годы активно изучается лиганд-независимая активация TLRs, которая происходит с участием липидов – холестерина [416; 528], экзогенных и эндогенных жирных кислот [222; 417], окисленных форм фосфолипидов, образованных в результате развития оксидативного стресса при запуске сигнального каскада [412]. Участие липидов в осуществлении TLR-опосредованной сигнализации и развитии воспаления является новым направлением исследований, заслуживающим всестороннего изучения и детализации [222; 243; 390].

TLRs реализуют сигнальные функции в липидных рафтах, представляющих собой наноразмерные (10-200 нм), гетерогенные, высокодинамичные микродомены цитоплазматической мембраны, координирующие клеточные процессы посредством осуществления сигнализации [315].

Показана значимость липидных рафтов в реализации различных функций клеток млекопитающих и патогенных микроорганизмов [394]. За последние несколько лет была выяснена важность липидных рафтов в модуляции врожденных и приобретенных иммунных реакций [228]. Различные рецепторы, присутствующие на иммунных клетках, ассоциируются с липидными рафтами и инициируют сигнальные каскады, ведущие к воспалению [217]. Иными словами, липидные рафты работают в качестве платформ, на которых концентрируется ряд активированных после связывания с лигандами рецепторов [400].

Липидные рафты локализуются преимущественно на наружном слое плазматической мембраны и рассматриваются как продукт взаимодействия между холестерином, сфинголипидами и специфическими мембранными белками [450]. Формирование липидного рафта осуществляется липид-липидными, липид-белковыми и белок-белковыми взаимодействиями [434]. Холестерин легко встраивается между сфинголипидами, при этом его содержание в рафтах в несколько раз выше, чем в мембране, благодаря чему микрокластеры характеризуются большей высотой, ригидностью и упорядоченностью. Встраивание белков в липидный рафт сопровождается его стабилизацией, а последующее связывание лигандов со сфинголипидами активирует процесс передачи клеточного сигнала [297]. В настоящее время существуют 3 канонические модели рафтов: рафт с гетерогенной структурой, с однородной структурой и рафт, центр которого максимально обогащен холестерином и сфинголипидами. Рафты способны объединяться в более крупные структуры, при этом на мембране клетки могут одновременно существовать как микродомены, так и липидные платформы. Таким образом, рафты имеют как физические, так и функциональные особенности, и их изменения могут сопровождаться нарушениями клеточной сигнализации [277].

Липидный состав биомембран и физико-химические свойства липидных рафтов регулируются присутствием в них холестерина

[334], поддержанием ионного баланса кальция (Ca^{2+}) [489] и наличием насыщенных жирных кислот [296].

В липидных рафтах присутствуют кальциевые каналы, играющие важную роль в регуляции клеточных функций как в норме, так и при развитии патологии [113]. Разрушение липидных рафтов блокирует перемещение Ca^{2+} в клетках, что может оказывать существенное влияние на полноценность сигнальных каскадов [112].

Нарушение обмена холестерина также сопровождается разрушением или нарушением функции рафта и, соответственно, сигнальных путей клетки [528]. Отложение холестерина в мембранах макрофагов, целостность которых влияет на внутриклеточные процессы и различные метаболические реакции, является триггером для активации TLRs из-за инициированных в липидных рафтах изменений. В первую очередь активируется TLR4, позднее подключается TLR3 [459]. В ABCA1-макрофагах (ATP binding cassette protein A1 (ABCA1)) в ответ на действие LPS и специфических агонистов TLR2, TLR7 и TLR9 развивается провоспалительная реакция [305]. Липидные рафты ABCA1-дефицитных макрофагов характеризуются повышенным уровнем холестерина и активностью TLR4 и TLR9 после воздействия на клетки лигандов этих рецепторов. Это свидетельствует о том, что ABCA1 нивелирует воспаление, уменьшая активность TLRs за счет снижения уровня холестерина липидного рафта [64]. Показано, что для активации макрофагов необходима синтаза жирных кислот (fatty acid synthase (FASN)), активность которой регулируется белками, связывающими регуляторные элементы стерола ((sterol regulatory element-binding protein ((SREBP) [82]. Ингибирование FASN сопровождается расщеплением SREBP1 (одной из трех изоформ SREBP) и снижением уровня холестерина в клетке.

Примечательно, что отложение холестерина может также вызывать провоспалительные реакции в клетках с помощью TLR-независимых механизмов. Макрофаги, имеющие повышенный уровень холестерина в мембране, секретируют $\text{TNF}\alpha$ и IL-6 через

активацию стресс-индуцируемого белка CHOP (C/EBP homologous protein (CHOP)), участвующего в регуляции транскрипции, клеточного цикла и апоптоза [305].

Помимо холестерина, физико-химические свойства липидных рафтов регулируются жирными кислотами [375]. Данные Richard G. Carroll и соавт. подчеркивают тесную связь между синтезом холестерина и синтезом жирных кислот, которая играет важную роль в активации макрофагов и продукции провоспалительного интерлейкина 1 β [82]. В то же время, существуют данные, указывающие на то, что уровень сфинголипидов в липидных рафтах слабо зависит от изменения содержания холестерина, но чувствителен к состоянию цитоскелета [153; 446].

Сфинголипиды (церамиды и лизосфинголипиды) вносят структурный вклад в липидный бислой клеточных мембран, где связываются со стероидами с образованием липидных рафтов. Изменения уровня сфинголипидов влияет на активность сигнальных путей, которые они регулируют [130]. Сфинголипиды также являются медиаторами некоторых внеклеточных стимулов и типичными переносчиками белка [232]. Дисбаланс церамидов тесно взаимосвязан с нарушением TLR4-опосредованной аутофагии, что подтверждает вовлеченность производных жирных кислот в механизмы TLRs-сигнализации [133].

Жирные кислоты как сигнальные молекулы для Толл-подобных рецепторов

Как показано в ряде исследований, TLRs могут быть активированы эндогенными (аллармины) и экзогенными лигандами (патогены вирусов, бактерий, грибов). Наряду с каноническими способами активации TLRs через специфические лиганды существует лиганд-независимая активация TLRs, которая происходит с участием насыщенных жирных кислот (SFAs) [222, 417].

Способность SFAs (как экзогенных жирных кислот, поступающих с пищей, так и эндогенных, высвобождающихся из гепатоцитов и адипоцитов) активировать TLRs является предметом пристального изучения. По данным DH Hwang и соавт. активация TLRs с участием SFAs должна оцениваться именно в контексте их биофизических взаимоотношений в плазматической мембране, а не с позиций взаимодействия лиганда и рецептора [243].

SFAs, как и LPS, посредством воспалительного пути CD14-TLR4-MD2 способны инициировать развитие хронического воспаления. TLRs играет значительную роль и в патогенезе воспаления, опосредованного инсулинорезистентностью [381]. Изменение микрофлоры кишечника (которая является источником LPS) способствует активации TLRs посредством SFAs. Так, диета с высоким содержанием жиров приводит к изменению микрофлоры кишечника и активации TLR4 [418]. Терапевтическая модуляция микрофлоры кишечника повышает чувствительность к инсулину через TLRs-сигнализацию. Это наблюдение является чрезвычайно важным в отношении разработки новых терапевтических подходов к ожирению, инсулинорезистентности и диабету 2 типа.

SFAs активируют преимущественно TLR2 и TLR4 провоспалительные сигнальные пути, однако механизм такой избирательности полностью не ясен [256; 417]. Существуют результаты, демонстрирующие, что SFAs активируют только TLRs, содержащие липид-связывающие карманы (Lipid Binding Pocket). Так, JY Kang и соавт. делят TLRs на две подгруппы: первая включает LRR с тремя поддоменами (TLR1, TLR2, TLR4, TLR6, TLR10), вторая подгруппа включает LRR с одним поддоменом (TLR3, TLR5, TLR7, TLR8, TLR9) [271]. TLRs первой подгруппы в отличие от второй содержат липид-связывающие карманы, что создает структурные искажения на границах поддоменов первой подгруппы и способствует прямому взаимодействию SFAs ее рецепторами. SFAs индуцируют димеризацию и транслокацию TLR4 и TLR2 в липидные рафты плазматической

мембраны [222; 416]. Димеризация является важным условием активации TLRs и касается не только LRR домена, но и домена TIR [423]. Это сопровождается активацией сигнальных молекул, включая цитозольный фактор нейтрофилов 1 или p47-phox (neutrophil cytosolic factor 1) и MyD88 [243].

SFAs – агонисты, но не лиганды для TLRs, так как для активации TLR4 или TLR2 требуется более 100 мкм SFAs и данные значения шире диапазонов SFAs, достаточных для стимуляции TLRs под влиянием LPS. LPS являются производным SFAs и лигандом для TLR4 и TLR2. Продемонстрировано, что удаление этих жирных кислот приводит к потере их лигандной активности. На склонность к активации TLR2 и TLR4 может влиять баланс стимулирующих SFAs и ингибирующих PUFAs [243].

Известно, что TLRs могут быть ингибированы полиненасыщенными жирными кислотами (PUFAs) [222]. Все PUFAs, в частности n-3 PUFA – докозагексаеновая, ингибируют как индуцированную SFAs, так и TLR4/2 лиганд-индуцированную активацию TLR4 или TLR2 [256]. Около 50 PUFAs тормозят TLRs-сигнализацию путем ингибирования димеризации рецепторов и рекрутирования TLRs в липидных рафтах [209].

Обогащение макрофагов PUFAs (семейства n-3 и n-6) сопровождается ингибированием активности ядерного фактора NF-κB, опосредованной действием LPS, способствует увеличению фагоцитарной активности клеток, подавляет синтез провоспалительных цитокинов IL-1β, IL-6 и TNF-α [421].

Все PUFAs ингибируют как индуцированную SFAs, так и TLR4/2 лиганд-индуцированную активацию TLR4 или TLR2 [256; 417]. Так, PUFAs заметно изменяют структуру липидного рафта, содержащего TLR4 и его рецептор CD14 [421]. Вероятно, TLR4 и CD14 находятся вне липидных рафтов и рекрутируются в микродомены только при наличии стимуляции. В то же время, PUFAs практически не изменяют структуру липидного рафта, содержащего TLR2.

С. Hellwing и соавт. не обнаружили связи между обогащением макрофагов PUFAs и изменением активности TLR2 и его партнерами по димеризации – TLR1 и TLR6 [296]. Несмотря на то, что данные рецепторы тесно связаны с липидными рафтами, они менее чувствительны к реорганизации их структуры экзогенными жирными кислотами. Авторы данного исследования предположили, что TLR2, присутствующий в липидных рафтах нестимулированных клеток, может быть мономерным или быть связанным с TLR1 или TLR6. TLR2 может существовать как неактивный гетеродимер в отсутствие лиганда.

Таким образом, TLR2, TLR1 и TLR6, в отличие от TLR4 и CD14, находятся в липидных рафтах и при отсутствии стимуляции [243]. По данным DH. Hwang и соавт., PUFAs ингибирует активацию не только TLR4 и TLR2/1 или TLR2/6, но и других TLRs [243].

В целом, представленные данные свидетельствуют о том, что мишенью PUFAs являются не сайты связывания лигандов TLR, а липидные рафты, в которых происходит димеризация рецепторов. Разрушение липидных микродоменов макрофагов с помощью добавления PUFAs может быть эффективной стратегией, блокирующей передачу провоспалительных сигналов. Детализация существующих связей между жирными кислотами и TLRs позволит улучшить понимание механизмов, с помощью которых SFAs активируют, а PUFAs ингибируют провоспалительные сигнальные пути. Дальнейшее изучение механизма такой модуляции поможет разработать стратегию снижения риска хронических заболеваний, вызванных воспалительными реакциями, опосредованными TLRs.

Окисленные фосфолипиды как регуляторы активности Толл-подобных рецепторов

Рекрутирование TLRs в липидные рафты и их димеризация частично связаны с НАДФН-оксидазозависимой генерацией активных форм кислорода и образованием активных форм азота [412]. Развитие оксидативного стресса сопровождается образованием окисленных

форм фосфолипидов (Ох-PLs), которые являются маркерами различных хронических заболеваний и патологических состояний [327; 351]. Накопление в интима артерий липопротеинов низкой плотности сопровождается образованием Ох-PLs, способствующих развитию метаболических нарушений [327]. Метаболическая эндотоксемия, как результат диеты с высоким содержанием жиров приводит к развитию оксидативного стресса и образованию Ох-PLs, которые посредством воспалительных путей CD36-TLR4-TLR6 или CD14-TLR4-MD2 индуцируют развитие хронического воспаления [418]. Ох-PLs способны инициировать TLR4 воспалительный ответ как через MyD88-зависимые, так и через TRIF-зависимые сигнальные пути, что способствует экспрессии NF-κB и индукции медиаторов воспаления (цитокинов, хемокинов, адипонектинов), вовлеченных в развитие и прогрессирование хронических заболеваний (рис 1).

Кроме того, что Ох-PLs являются маркерами заболеваний, они обладают способностью регулировать врожденные и адаптивные иммунные реакции посредством их участия в осуществлении внутри клеточных сигнальных механизмов [302]. Помимо использования в качестве антигенов для естественных антител, Ох-PLs могут функционировать в качестве лигандов для рецепторов мусорщика (scavenger receptors) и С-реактивного белка [312]. Ох-PLs стимулируют несколько типов рецепторов, расположенных на поверхности клетки или в ядре, в том числе сопряженные с G-белками рецепторы (G protein-coupled receptor 120 (GPR120)), рецепторы тирозинкиназы, рецепторы PPARs (рецепторы, активированные пролифератором пероксисом (Peroxisome proliferator activated receptor (PPARγ и PPARα) и TLRs [165].

В настоящее время имеются научные данные, демонстрирующие не только провоспалительный, но и противовоспалительный эффект Ох-PLs, что открывает перспективы изучения их роли в качестве регуляторов специфической сигнальной функции липидного рафта [535].

Рис. 1. Схема активации провоспалительного TLRs сигналинга насыщенными жирными кислотами и окисленными фосфолипидами.

Насыщенные жирные кислоты (SFAs) и окисленные фосфолипиды (Ox-PLs) действуют как немикробные агонисты TLRs или косвенно стимулируют их активацию, вызывая воспалительный ответ. Комплекс CD14-TLR4-MD2 распознает SFA. Комплекс CD36-TLR4-TLR6 распознает Ox-PLs. Провоспалительный внутриклеточный сигналинг осуществляется через MyD88-зависимый и/или MyD88-независимый пути, что в свою очередь способствует экспрессии провоспалительных факторов транскрипции, таких как NF-κB, который играет решающую роль в индукции медиаторов воспаления (цитокины, хемокины или ко-стимулирующие молекулы), участвующих в развитии и прогрессировании многих хронических заболеваний.

COX2- циклооксигеназа 2.

Результаты исследований DR Voelker и соавт. показали, что поверхностно-активные фосфолипиды легких играют важную роль в регуляции инфекционных, а также врожденных иммунных процессов посредством ингибирующих взаимодействий с TLR2 и TLR4 [533]. Липидные аналоги поверхностно-активных фосфолипидов легких менее эффективны, однако демонстрируют выраженный ингибирующий эффект активации TLR4 и продукции TNF- α [449]. Известно, что ингибирование JNK- и ERK- путей в клетке блокирует продукцию TNF- α под действием TLR4.

Идентифицировано несколько видов Ох-PLs, которые обладают противовоспалительным и/или иммуносупрессивным эффектом за счет ингибирования активации TLRs [374]. В исследовании Р. Bretscher и соавт. показано, что модификация фосфолипида 1-пальмитоил-2-арахидоноил-sn-глицеро-3-фосфохолина (1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PAPC)) реактивным кислородом генерирует образование его окисленной формы с противовоспалительным эффектом независимо от используемого в экспериментальных условиях метода, хотя и с различной эффективностью и кинетикой. В то же время подчеркивается, что требуется определенная степень окисления PAPC [374]. Окисленный PAPC (Ох-PAPC) активирует синтез эндогенных, про-разрешающих простаноидов через ядерный фактор Nrf2 (transcription factor nuclear factor E2-related factor 2). Кроме того, Ох-PLs ингибируют окислительный взрыв в нейтрофильных гранулоцитах, не влияя на жизнеспособность или другие функции этих клеток. Таким образом, окисление PLs может служить обратной связью, предотвращающей повреждение тканей неконтролируемым окислительным взрывом.

Доказанным противовоспалительным эффектом Ох-PLs является их способность блокировать острые воспалительные реакции, индуцированные LPS. Вероятно, что Ох-PLs ингибируют действие LPS с помощью многокомпонентного механизма, нацеленного на несколько этапов распознавания LPS [99]. Существуют результаты

исследований, указывающие на то, что Ох-РАРС приводит к снижению экспрессии генов провоспалительных цитокинов лигандами TLR4 и TLR2 [362, 535]. Данный эффект может возникнуть из-за блокирования окисленными фосфолипидами взаимодействий LPS с LBP (лиганд-связывающий домен) и CD14 [362]. Кроме того, Ох-PLs ингибируют связывание LPS с MD-2. Решающее значение для представления рецептору TLR4 липополисахарида имеют LBP, CD14 и MD-2, поэтому инактивация этих белков ингибирует действие LPS. В дополнение к TLR4, CD14 представляет PAMPs бактерий для TLR2, объясняя, почему Ох-PLs ингибируют активацию TLR 2 и 4, но не других TLRs, которые являются CD14-независимыми. Ох-PLs также ингибируют образование сигнального комплекса TLR4 с рецепторами за счет нарушений структуры липидных рафтов [535]. Ох-PLs блокируют транслокацию рецепторного комплекса LPS в липидный рафт и изменяют распределение кавеолина-1 (caveolin-1) - представителя семейства белков, формирующих структуру кавеол и участвующих в процессах эндоцитоза, липидном обмене и регуляции сигнальных каскадов.

Предварительное воздействие Ох-PLs на дендритные клетки, вовлеченные в формирование адаптивного иммунного ответа за счет влияния на дифференцировку наивных CD4⁺ Т-клеток по типу Th1, ингибировало генерацию IFN- γ . Так как IFN- γ продуцирует Th1, нарушение его генерации способствует выработке Th2 Т-клеток, синтезирующих IL-4. В целом, эти результаты продемонстрировали сильную противовоспалительную активность Ох-PLs. Предположительно Ох-PLs могут влиять как на врожденные, так и на адаптивные иммунные реакции *in vivo*. Неизвестно, ингибируют ли Ох-PLs лиганд-индуцированную активацию других TLRs, таких как TLR9 [362]. Возможно, Ох-PLs имеют частичную агонистическую активность и низкоуровневые Ох-PLs могут блокировать механизм обратной связи при воспалении, в то время как участки локализованного или интенсивного накопления Ох-PLs могут приводить к его активации.

Таким образом, Ох-PLs являются не только маркерами заболеваний, но и обладают способностью регулировать врожденные и адаптивные иммунные реакции посредством их участия в осуществлении внутриклеточных сигнальных механизмов. Несоответствие между потенциальной про- и противовоспалительной биоактивностью ОхPLs до настоящего времени не разрешено и служит предметом дальнейших исследований.

Итак, TLRs – важный класс рецепторов, вовлеченных в инициацию воспалительного процесса. Данные рецепторы реализуют свое сигнальное действие в липидных рафтах, физико-химические свойства которых регулируются присутствием в них холестерина и жирных кислот. В настоящее время открываются перспективы изучения липидов и их окисленных форм в качестве регуляторов специфической функции липидного рафта и, соответственно, их роли в механизмах TLRs-сигнализации.

Главной особенностью TLRs является их участие в развитии провоспалительного иммунного ответа на вирусные и бактериальные инфекции. Экзогенные (PAMPs) и эндогенные (DAMPs) – инициаторы воспаления, запускают сигнальный лиганд-опосредованный механизм активации TLRs и синтеза провоспалительных цитокинов, хемокинов и белков острой фазы. В последние годы активно изучается лиганд-независимая регуляция функции TLRs, которая происходит с участием липидов – холестерина, жирных кислот, окисленных форм фосфолипидов. Роль липидов в осуществлении TLR-опосредованной сигнализации и регуляции иммунного ответа является новым направлением исследований, заслуживающим всестороннего изучения и детализации. Активно изучается лиганд-независимая активация TLRs, которая происходит с участием SFAs. Показано, что TLRs могут быть ингибированы PUFA, тем самым блокируя воспалительный процесс. Данная регуляторная способность жирных кислот может представлять интерес для разработки стратегий лечения хронических воспалительных заболеваний. Окисленные фосфолипиды способны

инициировать TLR4 воспалительный ответ через MyD88-зависимые и через TRIF-зависимые сигнальные пути. В то же время, для Oх-PLs характерна не только провоспалительная, но и противовоспалительная активность, что делает их привлекательной мишенью для дальнейшего изучения с целью разработки методов лечения хронических неинфекционных заболеваний.

Таким образом, липиды и их производные являются важным звеном, участвующим в регуляторных механизмах TLRs-сигнализации и опосредующим интенсивность воспалительных процессов. Дальнейшие исследования в этом направлении расширят понимание клеточно-молекулярных механизмов сигнальной коммуникации и межсистемной интеграции компонентов иммунной и липидной систем, позволят разработать инновационные технологии управления их функционированием.

**Сигнальные молекулы и их рецепторы в модуляции
активности воспалительного иммунного каскада**

***Взаимоотношения провоспалительных
и противовоспалительных ядерных
транскрипционных факторов***

Противовоспалительные факторы непосредственно влияют на некоторые гены и подавляют транскрипционную активность AP-1 и NF-κB.

Так, PPARs проявляют противовоспалительный эффект через ингибирование провоспалительного фактора NF-κB – ключевого регулятора иммунных и воспалительных реакций.

Влияние провоспалительных факторов на NF-κB сопровождается активацией синтеза простагландинов посредством образования арахидоновой кислоты и повышения активности COX-2. Арахидоновая кислота преобразуется в простагландины D₂ и E₂ (Prostaglandins PGD₂, PGE₂). Активация рецепторов PGE₂ также вызывает повышение уровня цАМФ и экспрессии COX-2. PGD₂ и PGE₂ преобразуются в 15d-PGJ₂ и PGA₂ соответственно, которые активируют PPARα и PPARγ. Активированные PPARs ингибируют активность NF-κB, что приводит к подавлению воспалительных реакций.

Увеличение экспрессии COX-2 может зависеть и от активации митоген-активированных каскадов протеинкиназы и фосфоинозитид-3-киназы (PI3K). Внеклеточная сигнальная киназа (ERK), JNK и P38 MAPK являются членами сигнальных путей MAPK. Арахидоновая кислота – источник синтеза эйкозаноидов за счет влияния липооксигеназы (lipoxygenases (LOX)), цитохрома P450 (cytochromes P450 (CYP)) или COX. Однако она сама, независимо от активности COX, LOX и CYP, способна вызывать окислительный стресс. Это приводит к активации JNK и NF-κB, что увеличивает экспрессию COX-2.

Возможные механизмы инактивации NF-κB включают прямое связывание PPARγ с NF-κB, которое приводит к протеолитической деградации NF-κB. [413; 451]. Косвенное влияние PPARs происходит за счет стимуляции выработки антиоксидантных ферментов и снижения концентрации активных форм кислорода, вовлеченных в патогенез воспаления.

Активация PPARβ/δ также нарушает функцию NF-κB. В результате воспалительные реакции, вызванные активацией рецептора TNFα, IL-1β или активацией TLR4, снижаются [485]. PPARα и PPARγ могут ингибировать ацетилирование NF-κB и, соответственно, активацию этого фактора [174]. Активация PPARα повышает экспрессию сиртуина 1 (SIRT1), который ингибирует функцию NF-κB [486]. Влияние PPARα на SIRT1 зависит от АМР-активированной протеинкиназы (АМРК). Активация АМРК приводит к фосфорилированию Р300, что снижает активность последнего фермента. Тем не менее SIRT1 и АМРК являются ферментами, которые активируют друг друга. Следовательно, нет точных данных о том, активирует ли PPARα SIRT1 напрямую или активация SIRT1 вызвана непосредственно активацией АМРК [484].

Установлено, что PPARα и PPARγ также повышают экспрессию IκBα – белка семейства IκB, связывающего NF-κB во время воспалительных реакций [448].

GR-опосредованная модуляция активности воспалительных генов обусловлена связыванием противовоспалительного фактора GR с провоспалительными транскрипционными факторами AP-1 и NF-κB.

Нарушение взаимоотношений между GR и NF-κB, обладающих противоположными механизмами действия, составляет важную часть инициации и прогрессирования хронического воспаления [110]. Кроме того, данные транскрипционные факторы могут быть основными кандидатами для развития воспалительной дисрегуляции из-за их быстрой активации и способности регулировать сотни генов одновременно [123]. Кроме того, GR является мощным ингибитором

активности AP-1, что обуславливает популярность его изучения в качестве мишени для противовоспалительной терапии [149].

Взаимоотношения Толл-подобных рецепторов и ядерных транскрипционных факторов

Сигнальные пути TLRs задействованы в активации *провоспалительных транскрипционных факторов*, таких как NF-κB (через IKKα/IKKβ), AP-1 (через MAPS) и IRF. TLRs вовлечены в механизм ремоделирования дыхательных путей [496] через активацию провоспалительного NF-κB [304]. TLR4 активирует NF-κB через MyD88-зависимые и MyD88-независимые пути, стимулируя продукцию провоспалительных факторов.

Существуют данные исследования, указывающие, что экспрессия TLR2 увеличивает продукцию TSLP через NF-κB и JNK сигнальные пути, предрасполагая к инициации воспаления Th2-типа, играющего важную роль в патогенезе БА [505]. Экспрессия TLR2 у больных БА значительно выше, чем у здоровых лиц. В то же время, дефицит TLR2 нарушает секрецию TSLP, блокируя развитие Th2-ответа. Данные результаты показывают провоспалительную роль эпителиальных клеток дыхательных путей, реализующуюся через TLR2-зависимую продукцию TSLP.

В исследовании Jiang H и соавт. показано, что существуют тесные взаимоотношения между TLR4, NF-κB и амфотерином или негистоновым ядерным белком (DNA-binding high-mobility group box 1 (HMGB-1)) [404]. Являясь важным эндогенным провоспалительным фактором, HMGB1 участвует в патогенезе многих заболеваний. Данный негистоновый хромосомный белок является сигнальной молекулой тревоги, вырабатываемой в результате инициации макрофагального ответа на провоспалительные стимулы и повреждение клеток [120]. Амфотерин относится к молекулярным паттернам, ассоциированным с повреждением (DAMPs). При нарушении функции клеток наблюдается пассивное высвобождение их содержимого, включая

HMGB1 во внеклеточную среду. Внеклеточный HMGB1 действует как аллармин, стимулируя активацию резидентных иммунных клеток [238]. Во внеклеточном пространстве HMGB1 реализует свое провоспалительное действие через TLRs или рецептор конечных продуктов гликирования белков (receptor for advanced glycation end products (RAGE)) [120]. RAGE является трансмембранным гликопротеином типа I, опосредующим различные физиологические функции [258]. Кроме того, данный рецептор является главным медиатором врожденного иммунного ответа, инициирующим развитие воспалительного процесса посредством индукции провоспалительных цитокинов и хемокинов [276]. Передача сигналов через RAGE активирует NF-κB, который, в свою очередь, поддерживает экспрессию RAGE [258]. Повреждение тканей при воспалительной реакции сопровождается выработкой лигандов RAGE, которые приводят к RAGE-опосредованному синтезу NF-κB p65 мРНК [276].

В результате такого взаимодействия HMGB1 с RAGE и TLRs происходит активация клеток сосудистого эндотелия, макрофагов и моноцитов, которые экспрессируют провоспалительные цитокины (IL-β, IL-10, IL-12, TNFα) через митоген-активированную протеинкиназу MAPK, ERK1/2 и NF-κB пути [177; 326]. Таким образом, HMGB1 инициирует молекулярную сигнализацию, которая завершается высвобождением провоспалительных цитокинов и развитием хронического воспаления.

HMGB1 является лигандом не только для TLRs и RAGE, но и триггерного рецептора, экспрессируемого на миелоидных клетках TREM-1 [438]. Активация TREM-1 является важным механизмом развития хронического воспаления. Активация TREM-1 сопровождается повышенной секрецией TNF-α, хемокинов и цитокинов (IL-6, IL-8 и IL-12). Кроме того, TREM-1 взаимодействует с TLR и RAGE.

В обзоре Vikas Mishra и соавт. были суммированы данные об участии TLRs и NF-κB в механизме обострения БА и их связи с окислительным стрессом [319]. При определенных концентрациях

активные формы кислорода могут влиять на клеточные сигнальные пути и молекулы на цитоплазматическом и ядерном уровнях. В этом контексте окислительная модуляция TLRs и NF-κB имеет важное значение для успешного терапевтического контроля астмы.

Сигаретный дым оказывает стимулирующее влияние на экспрессию VEGF – фактора роста эндотелия сосудов, который является одним из цитокинов, играющих решающую роль в тканевом ремоделировании дыхательных путей при ХОБЛ через сигнальный путь TLR4, MAPK и NF-κB в назальных фибробластах [142].

TLR-4, как основной триггер воспаления при ХОБЛ, активирует NF-κB, который стимулирует воспалительный ответ, индуцируя экспрессию провоспалительных и антиапоптотических генов [406]. NF-κB регулирует активность цитокинов, в том числе интерлейкина (IL)-1β, IL-6, IL-12 и фактора некроза опухоли (TNF-α), играющих важную роль при патологии дыхательных путей [422]. Кроме того, NF-κB является фактором транскрипции макрофагов M1 [353]. Продемонстрировано, что воспаление дыхательных путей купировалось за счет ингибирования сигнализации TLR4/NF-κB [363]. Очевидно, что взаимоотношения между TLR-4/NF-κB могут быть ключевым фактором инициации и прогрессирования воспаления при ХОБЛ [85; 264]. Кроме того, противовоспалительная активность ряда препаратов реализуется через сигнальный путь, включающий в себя TLR-4, NF-κB/IκB, MyD88, протеинкиназу P38, AP-1 [70; 384].

Таким образом, TLRs вовлечены в активацию провоспалительных транскрипционных факторов NF-κB и AP-1 и развитие хронического воспаления при БА и ХОБЛ.

Взаимоотношения Толл-подобных рецепторов и противовоспалительных ядерных транскрипционных факторов. Противовоспалительное действие ГКС реализуется за счет их связывания с GR, который подавляет активность транскрипционных факторов, регулирующих экспрессию NF-κB, AP-1 и IRF. Данный механизм известен как транскрепрессия и является основной мишенью для действия ГКС

[425]. С другой стороны, ГКС также подавляют TLR-сигнализацию через индукцию эндогенных ингибиторов (например, MKP-1 и GILZ) [123]. Важной мишенью действия ГКС является TLR-зависимая продукция интерферона. Так, введение ГКС сопровождалось усилением регуляции сигнального пути PPAR, что приводило к ослаблению/подавлению продукции TLR-зависимого интерферона [340]. Центральной воспалительной молекулой в PRR-путях, играющих значимую роль в индукции и прогрессировании воспаления, является рецептор NLRP3. TLR2 играет важную роль в регулировании воспаления посредством NLRP3 [487]. Вышеизложенное указывает на тесную связь противовоспалительных факторов GR и PPARs с TLRs.

В обзоре Nasim Dana и соавт. проанализированы взаимоотношения между PPARs и TLRs [165]. Интересно, что существует достаточно доказательств, демонстрирующих двусторонние взаимосвязи между TLRs и PPARs. Так, активация TLRs сопровождается гиперэкспрессией PPAR β/δ и подавлением активности PPAR α и PPAR γ через NF- κ B [397]. Эксперименты *in vitro* показали, что TLR4 участвует в прогрессировании иммуноглобулиновой нефропатии (IgAN) путем индукции провоспалительных цитокинов, агонисты PPAR γ оказывают противовоспалительное действие путем подавления экспрессии и активности TLR4 [502]. Активация PPAR γ подавляет пролиферацию и индуцирует апоптоз раковых клеток пищевода путем ингибирования TLR4-зависимого MAPK-пути [66]. Стоит отметить, что следствием ослабленной экспрессии PPARs является повышение уровня провоспалительных цитокинов и инициация воспалительной реакции [336]. Эти результаты показывают, что существует перекрестная связь между PPARs и TLRs, которая регулирует воспалительную реакцию при различных заболеваниях. Понимание противоположных регуляторных эффектов и связанных с ними механизмов влияния TLRs и PPAR на воспалительный сигнальный каскад является крайне важным и может привести к разработке альтернативных стратегий профилактики и лечения БА.

Представленные данные свидетельствуют, что как стимуляция PPARs может влиять на уровень экспрессии TLRs, так и TLRs обладают способностью модулировать экспрессию PPARs. Взаимоотношения между PPARs и TLRs и их способность оказывать влияние на активность NF-κB могут быть важной терапевтической мишенью в лечении БА.

В заключении следует отметить, что ядерные транскрипционные факторы являются регуляторами транскрипции генов, вовлеченных в модуляцию активности воспалительных процессов. Нарушение взаимоотношений между про- и противовоспалительными факторами результируется в инициации и прогрессировании хронического воспаления.

Толл-подобные рецепторы являются участниками врожденных и адаптивных иммунных реакций, также вовлеченных в инициацию воспаления. Модуляция TLRs-сигнализации может быть направлена как на активацию, так и на разрешение воспалительной реакции в дыхательных путях [330; 454]. Толл-подобные рецепторы модулируют воспалительный процесс посредством взаимодействия с PPARs, GR, NF-κB и AP-1. Если TLRs, NF-κB и AP-1 вовлечены в развитие воспаления, то взаимоотношения между TLRs, GR и PPARs способны его модулировать. Поэтому взаимосвязи между ядерными факторами и TLRs при хронических бронхолегочных заболеваниях активно изучаются в настоящее время [160].

Очевидно, что изучение регуляторной роли данных рецепторов, а также взаимоотношений между ядерными транскрипционными факторами и TLRs позволит найти альтернативные терапевтические подходы к терапии БА и ХОБЛ.

**Механизмы развития и регуляции
нейрогенного воспаления**

***Функционирование и регуляторная роль
суперсемейства ионных каналов с транзиторным
рецепторным потенциалом***

Дыхательные пути иннервированы адренергической, холинергической и неадренергической нехолинергической (NANC) нервными системами [311]. Немиелинизированные, ноцицептивные С-волокна легких участвуют в сенсорной иннервации слизистой оболочки дыхательных путей и ответственны за формирование основных защитных рефлексов при воздействии раздражителей [439]. Высокая чувствительность бронхов к действию природно-климатических факторов (низкая температура и повышенная влажность) также связана с нарушением регуляции чувствительных афферентных нервов дыхательных путей и развитием хронического «нейрогенного воспаления» [57]. Данным термином обозначается дисбаланс взаимоотношений между иммунными и нервными клетками [134]. SL. Foster и соавт. представлены данные, указывающие на важную роль ноцицепторов в управлении иммунными реакциями при воспалительных заболеваниях бронхолегочной системы [426]. Нейрогенное воспаление является одной из причин развития гиперреактивности бронхов, являющейся признаком не только БА, но и ХОБЛ. Кашлевой рефлекс также имеет сложный нейрогенный путь [292]. Таким образом, ноцицепторы участвуют в патогенезе воспаления дыхательных путей посредством инициации местного нейрогенного воспаления [162], индукции кашля, а также активации бронхоконстрикторного механизма [376].

В данном разделе монографии обобщена имеющаяся в литературе информация о существовании тесной взаимосвязи между иммунной и нервной системами и их вовлеченности в патогенез БА

и ХОБЛ. Исследование роли нейроиммунных механизмов в патофизиологии данных заболеваний позволит найти новые терапевтические цели в этой области исследований.

В настоящее время установлено, что чувствительность ноцицепторов легких связана с активностью нового класса мембранных белков – членов суперсемейства ионных каналов с транзиторным рецепторным потенциалом [292]. Представленные в литературе данные убедительно свидетельствуют о роли TRP каналов в инициации нейрогенного воспаления и формировании некоторых реакций респираторного тракта, обусловленных влиянием эндогенных и экзогенных факторов [111; 187; 324]. Очевидно, что актуальность изучения вопросов функционирования и регуляции каналов TRP несомненна, так как они могут быть перспективными молекулярными мишенями при терапии БА и ХОБЛ [176].

Характеристика ионных каналов с транзиторным рецепторным потенциалом, локализованных в бронхолегочной системе. Каналы TRP представляют собой обширную группу (суперсемейство) идентичных по структуре, но различных по выполняемым функциям интегральных мембранных белков, выполняющих функции ионных каналов и реагирующих на различные химические, термические и механические раздражители [519].

Суперсемейство TRP у млекопитающих состоит из 28 каналов, сгруппированных в шесть подсемейств, в каждом из которых выделяют несколько субъединиц: традиционные канонические (canonical (TRPC 1-7)), ваниллоидные (vanilloid (TRPV 1-6)), полицистиновые (polycystin (TRPP 1-3)), муколиптиновые (mucolipin (TRPML 1-3)), анкириновые (ankyrin (TRPA 1)) и меластатиновые (melastatin (TRPM 1-8)) [187; 324]. Кроме того, у беспозвоночных и рыб обнаружены подобные каноническим, но не воспринимающие механическое воздействие TRPN рецепторы (no mechanopotential).

TRP каналы экспрессируются преимущественно в нейрональных клетках [475; 451]. В то же время, некоторые каналы обнаружены

не только в нейронах, но и в других клетках, в частности в клетках респираторного тракта (в бронхиальном эпителии и эндотелии, гладкомышечных клетках, а также в немиелинизированных, ноцицептивных С-волокнах легких) [175; 451].

Наиболее изучены экспрессируемые в дыхательных путях каналы TRPA1, TRPV, TRPC, TRPM. Чувствительность ноцицепторов, вовлеченных в развитие нейрогенного воспаления в бронхолегочной системе, связана в значительной степени с активностью TRPA1 и TRPV1 [176].

TRPA1

Канал TRPA1 долгое время считался белком, в основном экспрессирующимся в ноцицепторах и воспринимающим внешние химические, физические и механические раздражители, инициирующие острую боль. Однако в последние годы было установлено его присутствие в Т-клетках, В-клетках, тучных клетках, а также в ноцицептивных С-волокнах легких, участвующих в патогенетических механизмах развития и прогрессирования бронхолегочной патологии [101]. TRPA1 вовлечен в запуск хронического воспаления дыхательных путей прежде всего в качестве защитного механизма легких наряду с TRPV1, однако его чрезмерная стимуляция активными формами кислорода и продуктами перекисного окисления липидов в условиях патологии или в результате влияния эндогенных раздражителей дыхательных путей (озон, акролеин и др.) может быть связана с развитием хронического воспаления [516]. TRPA1 активируется как гипоксией, так и гипероксией *in vitro* [515].

TRPV

Несмотря на то, что каналы TRPV преимущественно локализованы в ноцицептивных нейронах, они в значительном количестве присутствуют в сенсорных нервных волокнах дыхательных путей, на клетках бронхиального эпителия, тучных клетках, макрофагах и гладкомышечных клетках [442]. Данные каналы участвуют в синтезе провоспалительных медиаторов, гиперсекреции слизи и сокращении

гладкой мускулатуры бронхов [454]. С сенсibilизацией TRPV1 связывают высвобождение провоспалительных цитокинов, инициирующих хроническое воспаление дыхательных путей [295].

TRPV4 в настоящее время является одним из наиболее активно изучаемых каналов TRPV [163; 452]. TRPV4 широко экспрессируется в сердце, почках, коже, потовых железах, ноцицептивных нейронах, а так же в эпителиальных клетках бронхов и сенсорных нервных волокнах дыхательных путей [523; 451].

TRPC

TRPC каналы экспрессируются в различных тканях, однако для TRPC4 и TRPC5 преимущественной является локализация в нервной системе. Активация TRPC1 канала вовлечена в развитие воспаления и ремоделирования дыхательных путей [339; 196]. Кроме того, бронхоконстрикция и кашель, характерные для астматической реакции, также в свою очередь поддерживают высокое механическое напряжение в дыхательных путях, активируя TRPC1 и способствуя ремоделированию дыхательных путей [410].

TRPC6 экспрессируется в легочной ткани и активируется при развитии гипоксии [150], однако его роль в патофизиологии бронхолегочных заболеваний предстоит изучить. Установлено, что TRPC6 лишь незначительно экспрессируется в фибробластах. Наибольшая экспрессия характерна для миофибробластов и альвеолярных макрофагов [150], а также для нейтрофилов, которые мигрируют в ткани легких для борьбы с вторгающимися бактериями и вирусами [518]. Таким образом, каналы TRPC6 высоко экспрессируются в легочных тканях и являются перспективной мишенью для разработки терапевтических вариантов при заболеваниях легких.

TRPM

В настоящее время среди каналов TRPM активно изучается роль TRPM8 в воспалении и ремоделировании дыхательных путей при БА [176]. Недавние исследования показали, что TRPM8 экспрессируется не только в чувствительных нейронах, но и в различных органах

и тканях, включая эпителиальные и гладкомышечные клетки дыхательных путей [257]. Активация TRPM8 в эпителиальных клетках легких приводит к усилению экспрессии цитокинов, хемокинов и гиперсекреции слизи [257]. В то же время, провоспалительные медиаторы брадикинин и PGE2, как и изменение кислотности, наблюдаемое при воспалении, ингибируют активность канала.

Таким образом, TRPA1, TRPV1, TRPV4, TRPC1, TRPC6 и TRPM8 каналы экспрессируются в бронхолегочной системе, однако механизмы модуляции их активности нуждаются в дополнительном и всестороннем изучении.

Нарушение экспрессии ионных каналов с транзиторным рецепторным потенциалом в механизме развития БА. Результаты ряда исследований свидетельствуют о том, что сенсорные нервы дыхательных путей вовлечены в патогенез БА [439; 527]. Отмечено, что количество ноцицепторов существенно увеличивается у больных БА [333]. Кроме того, при данной патологии более плотная сеть волокон ноцицепторов локализуется вокруг малых дыхательных путей, дисфункция которых присутствует у подавляющего большинства пациентов, страдающих БА, чаще ассоциируясь с более тяжелым течением заболевания [129].

Существование взаимодействий между нейронами и иммунными клетками играют важную роль в патогенезе БА [197]. Аллергическая реакция связана с местным производством и высвобождением нейромедиаторов, поэтому нейрогенное воспаление может сопровождать уже имеющееся аллергическое воспаление. Как уже упоминалось, нейрогенное воспаление рассматривается как важная причина бронхиальной гиперреактивности при БА. В литературе встречается несколько крупных обзорных статей, посвященных данной проблеме [270; 426]. Так, в обзоре Н. Kabata и D. Artis описано наличие нейроиммунных взаимосвязей при БА и детализирован их вклад в патогенез данного заболевания [270]. Представлены доказательства участия цитокинов, нейропептидов и нейротрансмиттеров в кооперации

иммунных клеток и центральной, периферической, симпатической и парасимпатической нервной систем при БА.

TRP каналы вовлечены в воспалительные и структурные изменения респираторного тракта с развитием гиперреактивности бронхов и бронхоспазма [464]. При воздействии триггерных факторов происходит стимуляция периферических отделов ноцицептора и активация TRPV1 и TRPA1 каналов с высвобождением нейротрансмиттеров и развитием нейрогенного воспаления в дыхательных путях [292].

Экспрессия TRPV1 увеличивается при БА и более выражена при тяжелом, неконтролируемом течении заболевания [251]. Недавние исследования показали, что TRPA1 является основным триггером высвобождения нейропептидов при стимуляции периферических отделов ноцицептора, а также развития нейрогенного воспаления бронхиального дерева [138]. Так, экспрессия TRPA1 С-волоками дыхательных путей в результате триггерного влияния эндогенных факторов сопровождается притоком внеклеточных ионов Ca^{2+} и высвобождением провоспалительных нейропептидов (SP, CGRP, нейрокинин А) и развитием бронхоспазма [513]. Полагают, что активация рецептора TRPA1 является важным механизмом нейрогенного воспаления дыхательных путей, и антагонисты TRPA1 могут играть существенную роль в лечении БА [176]. Установлена роль каналов TRPA1 в активации сенсорных нервов легких и формировании бронхоконстрикции как при аллергической БА [62], так и БА без аллергического компонента [162]. Агонисты канала TRPV1 также вызывают бронхоконстрикцию у людей и животных посредством развития нейрогенного воспаления [295].

Несмотря на низкий уровень экспрессии TRPV1 в легочной ткани условно здоровых лиц [101], он повышен у пациентов с БА [108]. У больных, не ответивших на стандартную терапию данного заболевания, выявлено статистически значимое повышение экспрессии TRPV1 в бронхах по сравнению с больными, ответившими на лечение. Это предполагает значимую роль данных каналов при тяжелом,

трудноконтролируемом течении БА [251]. Бронхоспазм и астматические симптомы, развивающиеся в ответ на воздействие холодного воздуха и высокой влажности, обусловлены участием TRPV каналов (TRPV1, TRPV4 и вероятно TRPV2) в осморецепции [57; 520; 522; 389]. Нарушение осмоларности внутрибронхиальной среды сопровождается образованием продуктов перекисного окисления липидов, активацией тучных клеток, секрецией нейротрансмиттеров и цитокинов [483], опосредующих развитие бронхообструкции, нарушении деятельности мукоцилиарной системы и активации кашлевого рефлекса. Изменения структуры и функции мукоцилиарной системы вовлечены в формирование гиперреактивности дыхательных путей.

TRP-опосредованной индукции кашля при вдыхании раздражающих реагентов окружающей среды и при развитии бронхолегочной патологии уделяется особенно пристальное внимание [507]. С одной стороны, активация данных каналов в нервных окончаниях дыхательных путей приводит к стимуляции защитных рефлексов (кашель, повышение продукции слизи, усиление мукоцилиарного клиренса), с другой стороны, при определенных условиях это может являться патогенетической основой формирования заболевания [507; 464]. В патогенез кашлевого рефлекса вовлечен TRPV1 канал [507]. Высвобождение провоспалительных медиаторов, которые активируют или сенсибилизируют каналы TRPV1 (простагландин, брадикинин, метаболиты липоксигеназы), сопровождается появлением кашля [511]. Известно, что снижение уровня pH, наблюдаемое в пораженных дыхательных путях, также способствует активации каналов TRPV1. В этой связи, данные каналы рассматриваются как потенциальная фармакологическая мишень для противокашлевой терапии [176].

Ноцицептивные С-волокна легких, в которых экспрессируются TRP каналы, участвуют в иннервации слизистой оболочки дыхательных путей. При воздействии экзогенных и эндогенных триггерных факторов происходит стимуляция периферических отделов ноцицептора, активация TRP каналов с высвобождением нейротрансмиттеров

и развитием нейрогенного воспаления. Кроме того, дисфункция ионных каналов с транзиторным рецепторным составляет патогенетическую основу таких респираторных симптомов, как бронхоспазм и кашель.

Нарушение экспрессии ионных каналов с транзиторным рецепторным потенциалом в механизме развития ХОБЛ. В современной литературе представлены доказательства роли TRP каналов в качестве хемосенсоров и участников каскадов трансдукции сигналов в стресс-индуцированных клеточных реакциях. Продемонстрирована роль TRP каналов (TRPA1, TRPC6, TRPV1 и TRPV4) в патогенезе ХОБЛ [176]. В литературе обсуждаются недавно выявленные специфические модуляторы TRP каналов и их потенциал в качестве новых терапевтических агентов для ХОБЛ [176].

Известно, что TRPA1 вовлечен в развитие воспаления дыхательных путей [510]. Подавляющее большинство больных ХОБЛ являются курильщиками. Акролеин сигаретного дыма активирует TRPA1, и наблюдаемое при этом увеличение секреции IL-8 блокируется AP18 – антагонистом TRPA1 [409]. Активатор TRPV1 капсаицин повышал секрецию IL-8 [251] и индуцировал кашель у больных ХОБЛ по сравнению со здоровыми добровольцами путем активации нейронального TRPV1 [348]. Уровни мРНК TRPV1 и TRPV4 увеличивались при ХОБЛ, а индуцированное сигаретным дымом высвобождение АТФ из эпителиальных клеток бронхов ослаблялось блокаторами данных каналов [408]. Кроме того, повышенные уровни транскриптов TRPV4 ассоциированы с ХОБЛ, а TRPV4 высоко экспрессируется в альвеолярных макрофагах.

Хроническое воспаление дыхательных путей у больных ХОБЛ тесно связано с участием нейтрофилов [349]. TRPC6 экспрессируется в нейтрофилах и имеет важное значение для их миграции [518]. В то же время, TRPC6 активно экспрессируется в легочной ткани и активируется при развитии гипоксии [150]. Продемонстрировано, что уровень мРНК TRPC6 значительно повышен в макрофагах легких

курильщиков, в то время как экспрессия мРНК TRPC3 и TRPC7 была сходной по сравнению с некурящими [204].

Суммированные данные по вовлечению каналов TRP в развитие и прогрессирование ХОБЛ, свидетельствуют о чрезвычайной перспективности дальнейшего изучения данного направления исследований.

Экзогенные и эндогенные факторы модуляции активности ионных каналов с транзиторным рецепторным потенциалом

Активация TRP каналов, экспрессируемых в дыхательных путях, может быть обусловлена влиянием как экзогенных, так и эндогенных факторов. Ряд данных триггеров играет значимую роль в механизмах развития и прогрессирования БА [282; 327].

Основные отличия суперсемейства TRP от других семейств ионных каналов заключаются в их преобладающей локализации в нейрональных клетках и реакции на известные экзогенные раздражители, такие как температура, химические вещества, свет и звук [233; 519].

Активация TRP каналов, экспрессируемых в клетках, отличных от нейрональных, связана с преимущественным влиянием эндогенных факторов [175; 451]. Модуляция TRP каналов может быть обусловлена воздействием брадикинина, гистамина, фосфатидилинозитол-4,5-бифосфата (PIP2), нейрокинина, простагландина E2 (PGE2) [516]. Изменения активности TRP также зависят от влияния биоактивных липидов, таких как фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин, холестерин, фосфатидилинозитол 4,5-бифосфат, полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) и эндогенные каннабиноиды, а также от изменений показателя кислотности pH, мембранного потенциала и внутриклеточной концентрации ионов кальция (Ca²⁺) [231; 507].

Регуляция данных каналов различными стимулами делает их чрезвычайно привлекательной терапевтической мишенью.

Температура

Подсемейства TRP каналов прежде всего объединяет способность к активации температурными стимулами в достаточно широком диапазоне [233]. Температурный диапазон для активации TRPA1 и TRPM8 составляет 8 – 28°C, TRPV3 и TRPV4 отвечают за восприятие значений температуры в диапазоне 27 – 35°C, TRPV1 активируется еще более высокой температурой, а спектр активирующих температур для TRPV2 находится выше 52°C [519].

TRPA1 и TRPM8 активируются холодным воздухом [257; 516] – важным триггерным фактором развития тяжелой БА у больных с холодовой гиперреактивностью дыхательных путей [57; 260]. Результаты некоторых исследований показали, что холодный воздух индуцирует воспалительную реакцию дыхательных путей и развитие ремоделирования бронхов путем изменения экспрессии TRPA1 и TRPM8 [231].

Сочетание холодного воздуха и высокой влажности также сопровождается развитием бронхоспастической реакции и астмоподобных симптомов (кашель, хрипы, одышка) у больных БА, увеличивая частоту обострений и снижая контроль заболевания [67; 234]. Развитие бронхоспазма и астма-подобных симптомов в ответ на воздействие гипер- и гипоосмолярного экзогенного стимула опосредовано участием TRPV каналов (TRPV1, TRPV4 и вероятно TRPV2) в осморцепции. Очевидно, что разработка новых методов лечения обострений БА, вызванных влиянием холодного воздуха, должна проводиться в направлении регуляции активности TRPA1, TRPM8 и TRPV каналов.

В настоящее время данные каналы рассматриваются в качестве основных сенсоров, обеспечивающих рецепцию физико-химических стимулов внешней среды [257; 516].

Биоактивные липиды

Среди перечисленных эндогенных стимулов наиболее важную роль в активации каналов играют эндогенные каннабиноиды. Наиболее изучены два эндогенных каннабиноида, являющиеся производными арахидоновой кислоты (АК) – анандамид и 2-арахидоноилглицерол (2-АГ), а также каннабиноидные рецепторы первого и второго типов – CB1 и CB2 [396]. Эндоканнабиноиды, каннабиноидные рецепторы для психоактивного ингредиента марихуаны Δ^9 -тетрагидроканнабинола, а также ферментативные системы, участвующие в их синтезе, метаболизме и деградации представляют собой эндоканнабиноидную систему [290]. В дополнение к рецепторам CB оба эндоканнабиноида могут также связывать и активировать TRPV (TRPV1, TRPV2, TRPV3, TRPV4), TRPA1 и TRPM8 [331]. Анандамид был первым обнаруженным эндогенным агонистом TRPV1 и антагонистом TRPM8. 2-АГ также выполняет роль агониста канала TRPV1 [372]. Кроме того, Δ^9 -тетрагидроканнабинол влияет на TRPV2, TRPV3, TRPV4, TRPA1 и TRPM8.

Уровни циркулирующих эндоканнабиноидов значительно увеличиваются при БА [132; 415], а их способность к модуляции активности TRPV и TRPM8 каналов заслуживает пристального внимания.

Лизофосфолипиды, ПНЖК и PIP2 относят к факторам, способным модулировать активность TRP, в частности TRPM8. Однако, если лизофосфолипиды повышают температурный порог активации канала, то ПНЖК (арахидоновая, эйкозопентаеновая, докозогексаеновая) подавляют активацию канала холодом и ментолом. При условии высокой концентрации фосфолипида PIP2 активируется TRPM8 при температуре от 32 до 37°C.

Многочисленные исследования показали, что ионные каналы TRPV (TRPV1, TRPV4) чувствительны к уровню мембранного холестерина, который является одним из основных липидных компонентов плазматической мембраны большинства эукариотических клеток [58; 245; 246]. Нормальные уровни холестерина необходимы

для поддержания текучести мембраны, ее толщины и компартментализации доменов липида. Однако увеличение уровня мембранного холестерина лежит в основе развития дисфункции клеток и патологии организма [315; 400]. Физико-химические свойства липидных рафтов регулируются присутствием в них холестерина [334], поддержанием ионного баланса кальция [489] и наличием экзогенных жирных кислот [296]. Данные Richard G. Carroll и соавт. подчеркивают тесную связь между синтезом жирных кислот и синтезом холестерина [82]. Между мембранными белками липидного рафта и окружающего его бислоя происходит постоянный обмен, поэтому нарушение обмена холестерина сопровождается нарушением функции рафта и, соответственно, сигнальных путей клетки [528]. Существуют два механизма липид–белковых взаимодействий: специфические взаимодействия или изменения физико-химических свойств мембраны, влияющие на динамику ионных каналов [479].

Установлено, что каналы TRPV регулируются взаимодействиями холестерин-белок [293]. Совсем недавно несколько исследований позволили понять особенности взаимодействия холестерина и ионных каналов, определив ряд мотивов (две аминокислотные последовательности), которые отвечают за связывание холестерина [205; 246]. С одной стороны, холестерин может взаимодействовать с белком канала и регулировать его функцию в качестве конкретного лиганда, с другой – регулировать функции каналов, изменяя жесткость липидного бислоя, что в свою очередь влияет на функцию белка [383].

Очевидно, что эндоканнабиноиды, холестерин, лизофосфолипиды, ПНЖК и RIP2 способны модулировать активность TRPV каналов.

Показатель кислотности, мембранный потенциал и внутриклеточная концентрация ионов кальция

Изменения активности TRP также зависят от показателя кислотности pH, мембранного потенциала и внутриклеточной концентрации ионов Ca²⁺.

Воздействие триггерных факторов ведет к открытию канала за счет сдвига мембранного потенциала, необходимого для активации. Каналы TRP проницаемы для ионов натрия (Na^+), калия (K^+), магния (Mg^{2+}) и Ca^{2+} [367]. В то же время, каналы различных семейств обладают избирательной проницаемостью и могут быть проницаемы только для ионов Ca^{2+} , либо только для моновалентных катионов или вовсе не иметь валентной специфичности. Примечательно, что после активации канал может быть модулирован совершенно разными механизмами, предсказать которые на основе его принадлежности к определенному TRP подсемейству невозможно. Na^+ и K^+ принимают участие в регуляции бронхиальной проходимости и функций клеток, вовлеченных в развитие воспалительных изменений бронхолегочной системы. Ca^{2+} является мессенджером сигнальных каскадов, ответственных за синтез и секрецию воспалительных медиаторов, гиперсекрецию муцинов, сокращение гладкой мускулатуры бронхов [251]. Кроме того, при активации TRP наблюдается приток внеклеточных ионов Ca^{2+} и высвобождение нейропептидов в периферических тканях и спинном мозге, что опосредует развитие нейрогенного воспаления [513].

Каналы TRPV1, TRPV4, TRPM8, TRPC1, TRPA1 [251; 342] играют важную роль во внутриклеточной дисрегуляции Ca^{2+} . Стимуляция эпителиоцитов дыхательных путей липополисахаридами, входящими в состав стенки грамотрицательных бактерий и играющими решающую роль в иммунном ответе при БА, приводила к увеличению Ca^{2+} , опосредованному каналами TRPV4. Наблюдаемое при этом увеличение продукции оксида азота свидетельствовало о защитной роли TRPV4 [521]. Приток Ca^{2+} , вызванный активацией TRPC1, может регулировать и стимулировать пролиферацию, дифференцировку, секрецию и миграцию клеток, а также модулировать экспрессию хемокинов и цитокинов, таких как интерлейкин-13 (IL-13), матриксные металлопротеиназы-9 [196; 339].

Таким образом, активация TRP каналов, экспрессируемых в дыхательных путях, может быть обусловлена влиянием как экзогенных, так и эндогенных факторов. Ноцицепторы, вовлеченные в развитие нейрогенного воспаления, связаны с TRPA1 и TRPV1. Канал TRPV1 активируется влиянием гипер- и гипоосмолярного экзогенного стимула, эндогенными каннабиноидами и другими биоактивными липидами. Канал TRPA1 активируется холодом. Кроме того, изменения активности как TRPA1, так и TRPV1 зависят от показателя кислотности pH, мембранного потенциала и внутриклеточной концентрации ионов Ca^{2+} .

***Специфические регуляторы активности ионных каналов
с транзиторным рецепторным потенциалом***

Каналы TRP участвуют в процессах репарации (повышение проницаемости эндотелия, воспаление, дифференцировка миофибробластов), которые нарушаются при развитии воспалительного процесса в бронхолегочной системе. Поэтому, они могут являться перспективными целями фармакологической коррекции. Большинство соединений, испытанных в клинических фазах, нацелены на TRPV1 в качестве болеутоляющих препаратов, или на TRPV4, как препараты, применяющиеся для терапии отека легких. Только несколько препаратов обладают способностью регулировать активность TRPC6 и TRPA1 [176]. Так, в настоящее время активно изучаются специфические регуляторы каналов TRPC6 [420]. Флуфенамовая кислота (Flufenamic acid) является неспецифическим блокатором каналов TRPC/M/V и избирательно активирует TRPC6 и TRPA1 [420]. Анилин-тиазолы (Aniline-thiazoles) [470] блокируют каналы TRPC3 и TRPC6. Другое соединение под названием SAR7334 эффективно ингибировало TRPC6, а также TRPC3 и TRPC7 [179]. Более селективными блокаторами являются лароксильные производные (larixyl-derivates) [357], обладающие сродством к TRPC6 и TRPC3 [288].

Недавно был идентифицирован ингибитор BTDM, эффективный для TRPC3 и TRPC6 [453].

TRPA1 активируется множеством природных и искусственных соединений [420]. Наиболее интересно, что многие препараты, такие как каннабиноиды и ацетаминофен [514], апоморфин [87], оксалиплатин [68], десфлуран [332] и ряд других, также активируют TRPA1. Например, резольвин D2 значительно влияет на активность канала TRPA1 [402].

Были также разработаны многочисленные ингибиторы TRPV1 [420]. Показано, что ASBT102 ингибирует TRPV4 и TRPA1 [392]. Очень перспективны соединения, такие как AMG517 и AZD1386 [395]. Таким образом, терапевтическая ценность антагонистов TRPV1 все еще обсуждается [314; 512]. Применение антагонистов TRPV4 может вызывать множественные побочные эффекты [420]. Эпоксидэйкозатриеновая кислота (epoxyeicosatrienoic acids EET)) активно изучается в качестве эндогенного медиатора TRPV4 [84]. Бисандрографолид является селективным активатором TRPV4, который только слабо модулирует другие члены семейства ваниллоидов, такие как TRPV1, TRPV2 и TRPV3. GSK1016790A вызывает летальное падение артериального давления у мышей, кошек и собак. RN-1734 и GSK205 являются умеренными ингибиторами TRPV4.

Таким образом, специфические регуляторы каналов TRP должны активно изучаться для оценки перспектив их применения в терапии хронической бронхолегочной патологии.

Регуляторные нейропептиды в патогенезе нейрогенного воспаления

Нейропептиды представляют собой самый большой и самый разнообразный класс межклеточных сигнальных молекул в нервной системе, которые секретируются нейронами [241]. Нейропептиды не относятся к классическим представителям парасимпатической или

симпатической нервной системы и обозначаются как неадренергические нехолинергические пептиды [509]. Данные сигнальные молекулы обладают широким спектром регуляторных функций: от нейрогормонов и нейротрансмиттеров до нейромодуляторов [193; 241], что делает их актуальной мишенью для современных исследований в пульмонологии.

В легких человека обнаружено более 10 регуляторных нейропептидов, среди которых наиболее изучены: вещество Р (substance P, SP), вазоактивный интестинальный пептид (Vasoactive Intestinal Peptide, VIP) и кальцитонин-ген-регулирующий пептид (calcitonin gene related peptide, CGRP), тахикинины, нейропептид Y (NPY), бомбезины, гранины) [97]. Нейропептиды могут освобождаться и из периферических нейросекреторных клеток, расположенных в дистальных отделах дыхательных путей в непосредственной близости к микроциркуляторному кровеносному руслу и гладкой мускулатуре бронхов. Активация сенсорных нейронов при триггерных стимулах приводит через рефлекторные механизмы аксонов к высвобождению SP и CGRP в дыхательных путях [283]. Кроме того, дисбалансное соотношение между стимулирующими (SP) и ингибирующими (CGRP) нейропептидами при длительном воспалении дыхательных путей приводит к преобладанию стимулирующей среды в их слизистой оболочке [456].

Субстанция Р

Данный нейротрансмиттер нехолинергических возбуждающих нервов рассматривается в настоящее время как медиатор нейрогенного воспаления, способный вызывать отек, гиперсекрецию слизи и инициировать бронхоспазм [456]. Этот плеiotропный пептид со специфической нейронной активностью также является иммуномодулятором [456]. Протеазы тучных клеток могут усиливать нейрогенные воспалительные реакции, включая высвобождение SP [210]. Для SP выявлена способность стимулировать продукцию гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (GM-CSF),

который регулирует пролиферацию и дифференцировку клеток-предшественников моноцитов, нейтрофилов, макрофагов и дендритных клеток. SP обладает способностью стимулировать высвобождение провоспалительных цитокинов (интерлейкин 1 (IL-1), интерлейкин 6 (IL-6), интерлейкин 8 (IL-8), фактор некроза опухоли α (TNF α)) из эпителиальных клеток бронхов человека. Данные J. Zhuang и соавт. свидетельствуют о том, что IL-1 β может резко увеличить экспрессию SP и сосудистую проницаемость, через влияние на С-нервные волокна бронхов (PCFs), которые при активации способствуют высвобождению SP и вызывают бронхоспазм. IL-1 β , вводимый системно или локально в паренхиму легких, стимулирует PCFs [248]. SP также может индуцировать экспрессию интегрина ICAM-1, что способствует выживанию дендритных клеток.

Вазоактивный интестинальный пептид

VIP является основным нейротрансмиттером неадренергической-нехолинергической системы [388]. Будучи одним из самых распространенных нейропептидов человеческого тела, VIP экспрессируется в легких и в слизистой оболочке носа. Действие, опосредованное VIP, изменяется в зависимости от органа-мишени и наличия VIP-ассоциированного рецептора [532]. Данный пептид проявляет широкий спектр реакций путем взаимодействия с рецепторами (VIP receptor type-1 (VPAC-1), VIP receptor type-2 (VPAC-2), CRTH2 и PAC1, которые экспрессируются на эозинофилах, тучных клетках, нейтрофилах и лимфоцитах [411]. VPAC1 более распространен в легочной ткани и Т-лимфоцитах, тогда как VPAC2 – представлен в гладких мышцах, тучных клетках и слизистой оболочке бронхов. VPAC1 и VPAC2 являются рецепторами, связанными с G-белком, которые увеличивают уровень внутриклеточной цАМФ путем стимуляции аденилатциклазы [159]. В реализации эффектов нейропептидов важное значение имеет активность нейтральной эндопептидазы (NEP). NEP расщепляет и инактивирует нейропептиды. Они, в свою очередь, опосредуют гиперсекрецию слизи и сужение дыхательных путей [220].

Изменение активности NER также может иметь значение при обострении БА и ХОБЛ. VIP является эндогенным вазо- и бронходилататором [341]. С другой стороны, он обладает иммуномодулирующими функциями, которые включают подавление гуморального иммунного ответа, ингибирование процесса ремоделирования бронхов и воспаления. VIP ингибирует пролиферацию Т-лимфоцитов, влияет на дифференцировку Т-хелперов Th2/Th1, способствует индукции Tregs. Кроме того, имеются данные, свидетельствующие о том, что VIP подавляет Toll-подобный рецептор-4, играющий важную роль в системе врожденного иммунитета [259]. Имеются противоречивые данные о его влиянии на дегрануляцию тучных клеток и производство хемокинов [345].

Таким образом, будучи важной сигнальной молекулой нейроэндокринно-иммунной сети, VIP является привлекательной мишенью для поиска новых терапевтических стратегий хронической бронхолегочной патологии.

Кальцитонин-ген-регулирующий пептид

Кальцитонин-ген-регулирующий пептид представляет собой 37-аминокислотный нейропептид, который был открыт в результате альтернативной обработки РНК копий, полученных из гена кальцитонина, при этом мРНК. CGRP выявляется в клетках нервной системы, имеющих тесный контакт с кровеносными сосудами. CGRP экспрессируется клетками центральной и периферической нервной систем [316]. CGRP, высвобождаемый из нервных волокон дыхательных путей, действует как хемоаттрактант для CD4⁺ Т-лимфоцитов, CD8⁺ Т-лимфоцитов, эозинофилов, дендритных клеток [77]. CGRP действует путем стимуляции аденилатциклазы и накопления цАМФ, максимальную эффективность своего вазодилатирующего действия реализует на уровне микроциркуляторного русла. Кроме того, CGRP является мощным артериальным и венозным вазодилататором. Рецепторы CGRP играют важную роль в высвобождении некоторых провоспалительных цитокинов, хемокинов и воспалительных медиаторов.

Таким образом, CGRP как противовоспалительный медиатор, представляет собой новый и эффективный терапевтический инструмент при хронической бронхолегочной патологии.

Регуляторные нейропептиды и БА. На сегодняшний день очевидно, что в многогранный патогенез БА вовлечены не только механизмы воспаления, запускаемые аллергическими реакциями, но и механизмы нейрогенного воспаления с участием нейропептидов, которые играют важную роль в системе нервного контроля за тонусом бронхиального дерева.

Изучению роли регуляторных нейропептидов в патогенезе астмы посвящено небольшое количество обзорных статей [97; 341; 347]. В обзоре KR. Atanasova и LR. Reznikov LR. представлена информация об экспрессии некоторых нейропептидов (субстанция Р, вазоактивный интестинальный пептид, кальцитонин-ген-регулирующий пептид, тахикинины, нейропептид Y, бомбезины, гранины), способных влиять на патогенез ряда бронхолегочных заболеваний, в частности астмы [97]. Обобщены данные об известных и предполагаемых рецепторах, которые опосредуют их эффекты. Суммировано влияние нейропептидов на секрецию слизи при данной патологии. В статье К. Kaczyńska и соавт. дается краткий обзор функций ряда нейропептидов (лептин, вещество Р, нейротензин) в процессе нормального дыхания и при хронической патологии легких [346]. В обзорной статье АК. Verma и соавт. структурирована имеющаяся информация о вазоактивном интестинальном пептиде и детализирована его роль в рекрутировании воспалительных клеток при астме [341]. Нами суммированы имеющиеся в доступной литературе данные о вкладе отдельных, наиболее изученных нейропептидов (субстанция Р, вазоактивный интестинальный пептид, кальцитонин-ген-регулирующий пептид) в патогенез развития гиперреактивности бронхов при БА. Особое внимание уделяется изучению влияния нейропептидов на регуляцию иммунных механизмов при данной патологии.

Измененные уровни CGRP, VIP и SP при аллергическом воспалении влияют на регуляцию иммунных механизмов и, следовательно, вовлечены в патофизиологию БА [347]. Имеются ограниченные данные о роли нейропептидов в регуляции секреции слизи при БА [97].

По данным R. Ramalho и соавт. SP, действуя через свой рецептор нейрокинина-1 (NK1-R), играет важную роль в формировании фенотипа БА, сочетанной с ожирением [455]. В экспериментальной модели БА и ожирения блокада NK1-R сопровождалась нормализацией метаболических и системных биомаркеров, а также позитивным влиянием на аллергическую сенсibilизацию и воспалительный процесс в бронхах. Эти положительные эффекты выделяют данный нейротрансмиттер в качестве мишени с потенциальным клиническим интересом при данном фенотипе БА [455].

Астма – хроническое воспалительное заболевание, в патогенез которого вовлечены Th2-хелперы, Tregs, тучные клетки, эозинофилы, нейтрофилы, эпителиальные и эндотелиальные клетки, фибробласты и клетки гладкой мускулатуры. VIP влияет на все перечисленные клетки и является основным нейротрансмиттером неадренергической-нехолинергической системы [388]. С усиленной деградацией этого нейропептида может быть связано формирование гиперчувствительности дыхательных путей и рефлекторный бронхоспазм. В исследовании J. Wang и соавт. установлено, что VIP ингибирует ремоделирование дыхательных путей в условиях *in vivo* [530]. На мышинных моделях БА продемонстрировано, что дисбаланс Th17/Treg тесно связан с воспалением дыхательных путей и VIP нивелирует данное воспаление, регулируя дисбаланс Th17/Treg [273]. В исследовании S. Talbot и соавт. показано, что IL-5 действует непосредственно на ноцицепторы, вызывая высвобождение VIP, который стимулирует CD4(+)-лимфоциты и резидентные врожденные лимфоидные клетки 2 типа, создавая сигнальную петлю, которая способствует аллергическому воспалению [439].

В патофизиологию астмы вовлечен кальцитонин-ген-регулирующий пептид [482]. Увеличение экспрессии CGRP в эпителиальных клетках дыхательных путей наблюдалось у больных БА [344]. Кроме того, у больных БА отмечены повышенные уровни нейроэндокринных клеток легких (PNEC), которые находятся между эпителиальными клетками воздухоносных путей и респираторного отдела в непосредственной близости от врожденных лимфоидных клеток 2-группы (ILC2s), влияющих на продукцию цитокинов. PNECs действуют через CGRP, стимулируя ILC2 и усиливая аллергические реакции при БА [391]. Недавно было описано, что созревание и дифференцировка дендритных клеток, играющих ключевую роль при аллергической сенсibilизации у больных БА, модулируется CGRP [482]. CGRP ингибирует созревание дендритных клеток и аллерген-специфичные ответы Т-клеток, которые влияют на результат воспаления аллергических дыхательных путей в условиях *in vivo* [167]. Это свидетельствует о дополнительном механизме, с помощью которого нейромедиаторы влияют на реализацию локального иммунного ответа. Кроме того, продемонстрировано физиологическое значение CGRP в производстве интерлейкина-9 (IL-9), который является цитокином Th2 и участвует в процессах аллергического воспаления.

Можно заключить, что данные сигнальные молекулы могут быть актуальной мишенью для современных исследований в направлении терапии БА.

Регуляторные нейропептиды и ХОБЛ. Роль нервной системы при ХОБЛ активно изучается в настоящее время [469; 481]. Вероятно, нейрогенное воспаление способствует сужению дыхательных путей при ХОБЛ. Широкий спектр функций регуляторных нейропептидов также является предметом пристального изучения с позиций их вовлеченности в патофизиологию ХОБЛ [97].

Курение является основным фактором риска развития ХОБЛ [156]. Известно, что сигаретный дым индуцирует гиперпродукцию слизи через активацию сенсорных нервных волокон и индукцию

выработки нейротрансммиттера SP [146]. Его эффект опосредован взаимодействием с рецептором NK1. Активация данного рецептора индуцирует сужение гладкой мускулатуры дыхательных путей у человека. SP также оказывает прямое действие на бокаловидные клетки дыхательных путей и подслизистые железы через рецептор NK1, вызывая гиперсекрецию слизи [456]. Продемонстрировано, что концентрация SP повышена в мокроте больных ХОБЛ. В то же время концентрация данного нейропептида мокроты снижалась во время обострения ХОБЛ, что может объясняться угнетением их выработки в результате выраженной стимуляции сенсорных нервов [447].

Тахикинины представляют собой группу нейропептидов, которые ферментативно расщепляются с образованием биологически активных продуктов. Из них SP является наиболее изученным. Показано, что антагонисты рецепторов тахикинина уменьшают воспаление на животных моделях ХОБЛ [269], однако они могут быть небезопасны у больных ХОБЛ, имеющих легочную гипертензию из-за влияния SP на кровеносные сосуды.

Повышенный сывороточный уровень VIP является маркером обострений ХОБЛ [529]. Не было проведено ни одного исследования, в котором описывалось бы влияние VIP на экспрессию *mus5AC* или *mus5B* в дыхательных путях больных ХОБЛ. Только единичные исследования были посвящены изучению терапевтического потенциала VIP при ХОБЛ. Артериальная гипертензия является наиболее распространенным контролируемым заболеванием во всем мире. Новые возможные подходы к борьбе с высоким кровяным давлением включают применение аналога VIP (PB1046) [365]. Поскольку легочная гипертензия часто встречается при ХОБЛ, возможно, что PB1046 будет иметь клиническое преимущество в лечении ХОБЛ.

Повышенные концентрации CGRP также были выявлены в мокроте больных ХОБЛ [136]. Обнаружение измененной экспрессии рецептора CGRP в эпителиальных клетках дыхательных путей предполагает возможное влияние CGRP на экспрессию *mus5AC* и *mus5B*

при ХОБЛ. Обнаружена корреляционная связь между ХОБЛ и нервными волокнами дыхательных путей, синтезирующими CGRP [267].

Стоит отметить, что терапевтический потенциал антагонистов/блокаторов CGRP при ХОБЛ не изучался. Однако, учитывая, что CGRP может стимулировать сокращение гладкой мускулатуры в дыхательных путях человека и участвует в секреции слизи, предполагается значимость процессов ингибирования CGRP при ХОБЛ. Таким образом, необходимы дополнительные исследования, направленные на изучение преимуществ и последствий блокирования данного нейропептида при ХОБЛ.

Краткий анализ представленных литературных данных показывает, что регуляторные нейропептиды могут быть актуальной терапевтической мишенью при ХОБЛ.

Нейротрофические факторы роста в патогенезе нейрогенного воспаления

Известно, что персистирующее воспаление в бронхах приводит к структурным изменениям дыхательных путей, что играет определенную роль в формировании гиперреактивности бронхов. Наряду с пассивным ответом на бронхоконстрикторные стимулы (гиперреактивность бронхов), дыхательные пути подвергаются ремоделированию посредством увеличения массы гладких мышц дыхательных путей (гипертрофия и гиперплазия). Регулирование процессов ремоделирования гладкомышечных клеток может происходить с помощью ряда механизмов, включая цитокины и нейротрофические факторы роста, которые могут оказывать как отрицательное, так и положительное влияние. Нейротрофины и их рецепторы были недавно обнаружены в легких (бронхиальный и альвеолярный эпителий, гладкие мышцы, фибробласты и сосудистый эндотелий), что привлекло исследователей к изучению их, пока нераскрытой, роли в структуре и функции легких, а также в патофизиологических механизмах

бронхолегочных заболеваний [382]. Как показано рядом исследователей, нейротрофины играют важную роль в осуществлении сигнальных взаимосвязей между иммунными клетками и структурами нейросенсорной сети дыхательных путей [106; 382; 491].

Семейство нейротрофических факторов роста включает нейротрофин 3 (NT3), нейротрофин 4 (NT4), фактор роста нервных клеток (nerve growth factor – NGF), нейротрофический фактор мозга (brain-derived neurotrophic factor – BDNF), цилиарный нейротрофический фактор (ciliary neurotrophic factor – CNTF), глиальный нейротрофический фактор (Glial cell line-derived neurotrophic factor – GDNF), инсулиноподобные нейротрофические факторы (insulin-like growth factor-I/2 receptor – IGF1/2) и ряд других.

Нейротрофины делятся на три подсемейства. К подсемейству собственно нейротрофинов относят NGF, BDNF, NT3, NT4; к подсемейству глиального фактора – GDNF, Neurturin (NTR), Artemin (ART), Persephin (PSP); к подсемейству цилиарного (реснитчатого) фактора – CNTF, ингибирующий фактор лейкемии (LIF) и IL-6. В механизмах воспаления дыхательных путей особый вклад принадлежит представителям подсемейства нейротрофинов.

Подсемейство нейротрофинов

Важным аспектом действия NT, контролирующих функционирование структур всех отделов нервной системы, является тот факт, что они могут влиять на множество механизмов сигнализации, запуская строго специфичный каскад сигнальных реакций, определенный участком молекулы нейротрофина при соединении с рецептором, тем самым осуществляя контроль большинства патофизиологических процессов [118]. Нейротрофины опосредуют свое действие через взаимодействие с тирозинкиназными рецепторами (TrkA, TrkB, TrkC) и нетирозинкиназным низкоаффинным рецептором p75NTR. При этом, NGF преимущественно взаимодействует с TrkA, BDNF – с высокоаффинными TrkB-рецепторами, а также с низкоаффинным p75NTR-рецептором, NT3 с TrkC или с TrkA рецепторами [265].

BDNF продуцируется эпителиальными и гладкомышечными клетками, сенсорными нейронами и рядом иммунных клеток, которые вовлечены в патогенез бронхолегочных заболеваний [382]. Ряд данных свидетельствует о том, что триггерные факторы заболеваний дыхательных путей (изменения температуры и влажности, воздушные патогены, пыльца, частицы дыма или озон), способны усиливать экспрессию гладкомышечными клетками BDNF и его рецепторов [117]. Так, окислительный стресс, индуцированный сигаретным дымом, увеличивает экспрессию BDNF и его рецепторов в гладкомышечных клетках [117]. Интересно, что нейрокинины, такие как субстанция P, также усиливает экспрессию BDNF и его рецептора [343]. Предполагается роль BDNF в механизмах воспаления дыхательных путей, инициации процессов ремоделирования и гиперреактивности бронхов. Однако механизмы, с помощью которых BDNF влияет на гладкомышечные клетки, все еще не до конца изучены. Известно, что оба рецептора, с которыми преимущественно связывается BDNF (TrkB, p75NTR), активируют множественные сигнальные пути, включая ERK (сигнальный путь MAPK, названный по центральной MAP-киназе ERK (extracellular signal-regulated kinase)), PI3K/AKT/mTOR (внутриклеточный сигнальный путь, компонентами которого являются ферменты PI3K, киназы AKT и mTOR, фосфолипаза C, а в случае p75NTR – еще и ядерный фактор NF-κB) [118]. Вовлечение в механизм действия BDNF сигнальных путей ERK и PI3K/AKT/mTOR, ответственных за пролиферацию клеток, а также экспрессия TrkB и p75NTR в гладкомышечных клетках человека, предполагает влияние BDNF на пролиферацию гладкомышечных клеток [116; 118; 343; 517]. Исследованиями *Aravamudan B, et al.* также показано, что BDNF влияет на регуляцию Ca²⁺ в гладкомышечных клетках и потенцирует действие провоспалительного цитокина TNF-α на уровень Ca²⁺. Эффекты BDNF на пролиферацию гладкомышечных клеток, по-видимому, связаны с TrkB. Однако, несмотря на то, что p75NTR не оказывал существенного влияния на пролиферацию,

индуцированную BDNF, в контроле как TrkB, так и p75NTR снижали уровень пролиферативной активности клеток ниже исходного. Активация сигнального пути ERK1/2 является важным аспектом пролиферации гладкомышечных клеток. Активация NF-κB играет важную роль в опосредовании эффектов BDNF на клеточную пролиферацию. Вовлечение сигнального пути PI3K/AKT/mTOR, ответственного за пролиферацию клеток, в опосредованность эффектов BDNF на клеточную пролиферацию предполагает и альтернативный путь активации NF-κB.

Как важный фактор, связанный с патогенезом хронических бронхорегосных заболеваний, рассматривается NGF, который известен прежде всего своей ролью в физиологии и патологии нервной системы [382]. Повышенный уровень NGF является стимулом для возникновения длительного болевого синдрома, однако механизмы, лежащие в основе данных эффектов NGF, остаются неизвестными.

Таким образом, нейротрофины и их рецепторы играют важную роль в осуществлении сигнальных взаимосвязей между иммунными клетками и структурами нейросенсорной сети дыхательных путей.

Нейротрофические факторы роста и БА. Актуальность исследования эффектов BDNF в дыхательных путях заключается в недавнем появлении данных, свидетельствующих об увеличении уровня BDNF при БА, однако вопрос функциональной значимости повышенного уровня BDNF при данной патологии остается открытым [216]. Так как было обнаружено, что экспрессия BDNF возрастает при БА, предполагается роль BDNF в механизмах воспаления дыхательных путей, инициации процессов ремоделирования и гиперреактивности бронхов. Однако механизмы, с помощью которых BDNF влияет на гладкомышечные клетки, все еще не до конца изучены. Установленные В. Aravamudan и соавт. эффекты BDNF на пролиферацию гладкомышечных клеток, играющую важную роль при астме, по-видимому, связаны с TrkB. Однако, несмотря на то, что p75NTR не оказывал существенного влияния на пролиферацию,

индуцированную BDNF, в контроле как TrkB, так и p75NTR снижали уровень пролиферативной активности клеток ниже исходного.

В экспериментальных условиях была показана роль NGF в Th2-опосредованном иммунном ответе при БА [300; 338]. В исследовании ряда авторов подтверждено, что блокирование NGF вызывает ингибирование аллергического воспаления дыхательных путей на мышинной модели БА за счет модуляции баланса Th1 и Th2 ответа Т-клеток [114; 444]. Повышенные уровни экспрессии NGF наблюдаются у пациентов с БА после бронхиальной провокации с аллергеном и тесно связаны с тяжестью заболевания [401]. Так, результаты исследования JS. Kim и соавт. показали, что NGF коррелирует с уровнем эозинофилов, которые являются основными эффекторными клетками при БА [203]. Высокая экспрессия NGF и тканевого ингибитора металлопротеиназы-1 (tissue inhibitor of metalloproteinase-1 – TIMP-1), как и корреляция между ними у пациентов с БА, указывают на взаимосвязь между NGF и TIMP-1. В работе Н. Renz и соавт. показано, что NGF способствует развитию ремоделирования дыхательных путей при БА [401]. Однако стоит отметить, что механизм участия NGF в патофизиологии БА, остается не до конца изученным.

Заклячая представленные данные литературы, следует еще раз подчеркнуть, что гиперреактивность является прямым следствием нарушения нейрорегуляции бронхиального тонуса. Для поддержания гомеостаза легких существует несколько механизмов, в которые вовлечены нервные и иммунные клетки. В последнее десятилетие внимание направлено на изучение вклада взаимосвязи иммунологических и нейрогенных звеньев воспалительной реакции в механизм аллергического воспаления при БА. Иммунная система активирует сенсорные нейроны через воспалительные медиаторы, опосредуя развитие бронхоспазма при БА. И наоборот, нейроны взаимодействуют с иммунными клетками через нейротрансмиттеры или нейропептиды, модулируя развитие Th2-опосредованного иммунного ответа, ответственного за хронизацию воспаления.

Кроме того, аллергическая реакция связана с производством и высвобождением нейромедиаторов, поэтому нейрогенное воспаление может сопровождать и усугублять уже имеющееся аллергическое воспаление при БА.

На сегодняшний день очевидно, что в многогранный патогенез БА вовлечены не только механизмы воспаления, запускаемые аллергическими реакциями, но и механизмы нейрогенного воспаления с участием нейропептидов, которые играют важную роль в развитии гиперреактивности бронхов при БА. Наряду с пассивным ответом на бронхоконстрикторные стимулы (гиперреактивность бронхов), дыхательные пути подвергаются ремоделированию посредством увеличения массы гладких мышц дыхательных путей (гипертрофия и гиперплазия). Регулирование процессов ремоделирования гладкомышечных клеток может происходить с помощью ряда механизмов, включая нейротрофические факторы роста.

Представленная информация свидетельствует об имеющемся потенциале нейротрофинов в регуляторных механизмах БА.

Нейротрофические факторы роста и ХОБЛ. Потенциал BDNF, как важного физиологического и патофизиологического игрока и биомаркера ХОБЛ активно изучается.

Сывороточные уровни BDNF снижаются как при большом депрессивном расстройстве, так и при хронической депрессии [430]. Роль BDNF в депрессивных расстройствах была подтверждена нейротрофической гипотезой депрессии. Согласно этому, депрессия обусловлена дефицитом нейротрофина лимбической системы – эффекте, который может быть обращен вспять длительным приемом антидепрессантов [268]. Возможной связью между ХОБЛ и депрессией может быть иризин, экспрессия которого в скелетных мышцах и головном мозге связана с физической активностью. Нарушения настроения связаны с более низкими уровнями иризина в сыворотке крови [79]. Эта ассоциация была сильнее у пациентов с более низкими уровнями BDNF.

Данные результаты свидетельствуют о том, что иризин оказывает благоприятное влияние на настроение у пациентов с ХОБЛ, возможно, индуцируя экспрессию BDNF в мозге.

Важная роль отводится взаимосвязи депрессии, параметра индекса массы тела (ИМТ) и ХОБЛ [168]. Продемонстрировано, что объем форсированного выдоха за 1 сек (ОФВ1) и ИМТ коррелируют с более высокими уровнями BDNF [79]. Очевидно, что сывороточный иризин может оказывать как центральный эффект, связанный с настроением и мотивацией, так и периферический эффект на метаболические параметры (ИМТ, вес и уровни триглицеридов в сыворотке), и центральный эффект, связанный с настроением и мотивацией, основанной на действии.

Курение является наиважнейшим фактором риска ХОБЛ. Установлено, что уровни NGF повышены в бронхоальвеолярной лаважной жидкости мышей, подвергшихся воздействию никотина. Никотин увеличивал секрецию NGF в фибробластах легких *in vitro* дозозависимым образом и стимулировал ядерную транслокацию NF-κB, связывание p65 с промотором NGF и транскрипционную активность NF-κB [355].

Известно, что NGF участвует в патофизиологических механизмах развития инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом (RSV) [335]. Нейроиммунные взаимодействия, активированные в ходе развития данной инфекции, играют решающую роль в патофизиологии воспаления дыхательных путей. В частности, NGF и его рецептор TrkA чрезмерно экспрессируются в инфицированных RSV дыхательных путях, что приводит к развитию неспецифической гиперреактивности дыхательных путей, сопровождающей как БА, так и ХОБЛ. Кроме того, что RSV вмешивается в апоптотические пути эпителиальных клеток дыхательных путей хозяина через механизмы, опосредованные NGF.

Нейротрофины играют важную роль во реализации взаимодействия между иммунными клетками и нейросенсорной сетью

дыхательных путей. Нарушение данных регуляторных механизмов является составной частью патогенеза ХОБЛ. Стоит отметить, что регуляция активности нейротрофических факторов роста, вовлеченных в патогенез нейрогенного воспаления при ХОБЛ и БА, находится в стадии изучения.

В настоящей главе были суммированы современные взгляды исследователей на роль сигнальных молекул и их рецепторов в механизмах регуляции иммунного и нейрогенного воспаления при obstructивных заболеваниях легких – БА и ХОБЛ.

Актуальность дальнейшего изучения вопросов функционирования и регуляции взаимоотношений между TLRs, провоспалительными и противовоспалительными ядерными факторами, каналами TRP, регуляторными нейропептидами и нейротрофинами несомненна, так как они могут быть перспективными молекулярными мишенями при терапии ХОБЛ и БА.

Часть вторая

МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (собственные исследования)

Глава 1

Иммунные механизмы регуляции воспалительной реакции

Глава посвящена особенностям иммунного воспаления при БА и ХОБЛ. Приводятся результаты, полученные в Лаборатории биомедицинских исследований НИИМКВЛ, касающиеся роли иммунной системы в регуляции воспалительной реакции.

В собственных исследованиях активность воспалительного процесса определялась по состоянию клеточного звена иммунитета (Total CD3⁺, CD3⁺CD4⁺, CD3⁺CD8⁺, CD4⁺/CD8⁺, CD16⁺CD56⁺, CD19⁺, CD4⁺CD25⁺, CD4⁺HLA-DR). Субпопуляции Th1- и Th17-лимфоцитов у пациентов оценивали по уровню цитокинов в сыворотке крови. Интерлейкины 4, 6, 10, 17A, TNF- α , интерферон гамма (IFN- γ) определяли методом проточной цитометрии (тест-системы фирмы «BD», USA). Обработку данных проводили с использованием программы FCAP Array 3,0 BD USA. Концентрации трансформирующего фактора роста бета 1 (TGF- β 1) и IL-21 в сыворотке крови измеряли

иммуноферментным методом (тест-системы фирмы «R&D Systems», USA). Определяли экспрессию рецептора IL-6R (CD126⁺) на зрелых Т-лимфоцитах (CD3⁺) и Т-хелперах (CD4⁺) периферической крови методом проточной цитометрии с использованием реагентов фирмы BD (USA). Для статистической обработки данных использовали пакет прикладных программ «Statistica 8.0».

Регуляция воспалительной реакции при бронхиальной астме

Представления об иммунологических механизмах бронхиальной астмы постоянно углубляются, открываются новые их аспекты не только на клеточном, но и на молекулярном уровне. Различные медиаторы воспаления способны вызывать развитие основных клинических проявлений БА, таких как бронхоконстрикция, гиперсекреция слизи, отек слизистой оболочки бронхов, бронхиальная гиперреактивность. Динамика иммунологических параметров в определенной мере коррелирует с активностью воспаления и клиническими симптомами. Воздействие аллергенов и разнообразных неспецифических факторов на дыхательные пути провоцирует в сенсibilизированном организме развитие острых реакций в виде бронхоспазма, отека стенки бронхов, обтурации их просвета слизью. Хроническое аллергическое воспаление со временем приводит к ремоделированию бронхов [23; 36; 109, 480; 323; 524].

Несмотря на многообразие этиологических факторов и различия механизмов развития астмы на начальных этапах, конечные его звенья реализуются через одни и те же системы лейкоцитарных, нейрогенных и эпителиальных медиаторов [29; 40; 94]. Полагают, что БА прогрессирует за счет персистенции воспаления и/или нарушения репарационных механизмов. Важную роль в этих процессах играют клетки систем врожденного и приобретенного иммунитета. По современным представлениям, CD4⁺ Т-клетки играют решающую роль

в патогенезе БА [323]. Они составляют преобладающее большинство лимфоцитов, инфильтрирующих дыхательные пути у больных БА. Активизируя выброс цитокинов, CD4⁺ Т-клетки воздействуют на другие клетки, инициируя каскад воспалительных медиаторов.

Ранее важная роль при БА отводилась дисбалансу Th1/Th2 субпопуляций с превалированием последних. Однако в последние годы стало понятно, что эта теория не объясняет всех механизмов формирования воспаления при БА. Позже были охарактеризованы регуляторные Treg клетки, субпопуляции лимфоцитов секретирующие IL-17. Последние исследования свидетельствуют, что помимо Th2-клеток, Th1- и Th17-лимфоциты влияют на разные аспекты воспаления и бронхиальной гиперреактивности при БА [29; 38; 12]. Так, Chou et al. выявили слабую корреляцию гиперплазии бокаловидных клеток, важного маркера БА, с активностью Th2-лимфоцитов [466]. Авторами показано, что основным фактором, усиливающим продукцию муцина и гиперплазию бокаловидных клеток в бронхах больных БА, является IL-17. Было установлено, что Th17-лимфоциты по сравнению с Th2-лимфоцитами являются гораздо более значимой популяцией в формировании гиперплазии бокаловидных клеток. Повышенная концентрация IL-17 обнаружена в легких, мокроте и бронхоальвеолярном лаваже больных БА, а его уровень коррелировал со степенью бронхиальной гиперреактивности [215; 247]. Показано, что IL-17 влияет на местное воспаление, вызывая выброс провоспалительных цитокинов (TNF- α , IL-1, G-CSF, IL-6) и факторов хемотаксиса нейтрофилов (IL-8 и CXCL1), а также играет важную роль в отложении коллагена и ремоделировании дыхательных путей [215].

В лаборатории биомедицинских исследований НИИМКВЛ проведен анализ функциональной активности субпопуляций Th1, Th2 и Th17-лимфоцитов для установления особенностей воспалительного процесса у больных контролируемой и частично контролируемой БА. В исследовании на условиях добровольного информированного согласия участвовали 84 пациента с БА (35 мужчин и 49 женщин),

средний возраст составил $52,5 \pm 4,6$ года. Диагноз БА устанавливался в соответствии с классификацией и критериями международного консенсуса по вопросам диагностики и лечения БА [477]. Критериями включения являлись наличие у пациентов БА легкой степени тяжести контролируемого и частично контролируемого течения. У 46 % пациентов из 84 человек был отягощен семейный наследственный анамнез, что характеризовалось наличием аллергического ринита, атопического дерматита, экземы или БА у родственников. У 51 % пациентов были выявлены другие аллергические заболевания, сопровождающие течение БА (аллергический ринит, атопический дерматит, пищевая аллергия). Ведущими триггерами обострений БА по данным анамнеза являлись: контакт с аллергеном – 48 % случаев, вирусная инфекция – 22 %, пищевые продукты – 9 %, воздействие поллютантов и/или аэрозольных химикатов и/или табачного дыма – 21 %. БА с преимущественной сенсibilизацией к домашней пыли и аллергенам *Dermatophagoides* была выявлена у 47 % пациентов, БА с преимущественной сенсibilизацией к грибам рода *Cladosporium*, *Alternaria*, *Aspergillus* была выявлена у 19 % пациентов, БА с преимущественной сенсibilизацией к пыльце растений – у 24 % обследованных, БА с изолированной сенсibilизацией к пищевым аллергенам не встречалась и диагностировалась в комбинации с бытовой или пыльцевой сенсibilизацией в 15 % случаев. У 10 % пациентов с БА сенсibilизации выявлено не было.

Все пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от контроля симптомов и течения БА. В *I группе* вошло 45 человек (19 мужчин и 26 женщин) с контролируемым течением БА, средний возраст которых составил $50,7 \pm 3,7$ лет. Во *II группу* вошло 39 человек (16 мужчин и 23 женщины) с частично контролируемым течением БА, средний возраст которых составил $54,6 \pm 5,2$ лет. У пациентов в *I группе* наблюдения дневные симптомы наблюдались в виде приступов кашля не чаще 2 раз в неделю, купирующиеся самостоятельно, ночных пробуждений и ограничений физической активности из-за БА

выявлено не было. Показатели функции внешнего дыхания (ФВД) у пациентов *I группы* были следующие: объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) ≥ 80 % от должного, показатели пиковой скорости выдоха (ПСВ) у 100 % обследуемых находились в зеленой зоне с суточным разбросом $15 \pm 4,7$ л/мин ($p \leq 0,05$). Факторы риска неблагоприятных исходов БА в *I группе* обследуемых были представлены следующим образом: контакт с триггерами (аллергены) – 24,4 % больных, коморбидные состояния в виде аллергического ринита и/или пищевой аллергии – 55,6 % больных. У пациентов *II группы* наблюдения дневные симптомы наблюдались чаще 2 раз в неделю, периодически беспокоили приступы кашля в ночные или утренние часы, купирующиеся коротко действующими бета2-адреномиметиками. Данные ФВД у пациентов *II группы* были следующие: ОФВ1 78 – 65 % от должного зарегистрирован у 100 % пациентов, показатели ПСВ у 74,4 % обследуемых находились в зеленой зоне пикфлоуметрии с суточным разбросом $27,6 \pm 4$ л/мин ($p \leq 0,05$). У 25,6 % пациентов *II группы* наблюдения показатели ПСВ находились в желтой зоне пикфлоуметрии. Факторы риска неблагоприятных исходов БА в данной группе обследуемых были представлены контактом с триггерами – у 38,5 % больных, коморбидными состояниями в виде аллергического риносинусита, гастро-эзофагально-рефлюксной болезни (ГЭРБ) и ожирения – в 66,7 % случаев, курения – у 18 % обследуемых. При обследовании у 36% больных, вошедших во *II группу*, была выявлена плохая приверженность назначенной терапии.

В контрольную группу вошли 20 практически здоровых лиц (8 мужчин и 12 женщин), не курящих, с нормальной ФВД, средний возраст – $42,0 \pm 3,4$ года.

Результаты исследования субпопуляций Т-лимфоцитов показали наличие мультитипности Th иммунного ответа у больных БА, характер которой зависит от степени контроля заболевания (рис. 2, 3).

В стадии ремиссии заболевания у больных с контролируемым течением БА по сравнению с контрольной группой наблюдались

Рис. 2. Цитокиновый статус больных БА контролируемого течения (I группа) с разным типом Th иммунного ответа.

Примечание: данные представлены в % относительно контрольной группы (100%)

Рис. 3. Цитокиновый статус у больных БА частично контролируемого течения (II группа) с разным типом Th иммунного ответа.

Примечание: данные представлены в % относительно контрольной группы (100%)

выраженные изменения в состоянии цитокинового звена иммунной системы. В результате анализа в данной группе выявлено три Th-зависимых типа иммунного ответа – Th2, Th1/Th2 и Th1 (рис. 2, 3). С Th1 фенотипом было выявлено 18% пациентов, с Th2 – 62%, с Th1/Th2 – 20 % больных БА.

У больных *I группы* с Th1 типом иммунного ответа выявлено увеличение уровня TNF- α ($p \leq 0,05$), IFN- γ и IL-2 ($p \leq 0,001$) и снижение содержания IL-4 и IL-6 ($p \leq 0,001$). В данной подгруппе у 100 % больных подтверждена герпетическая инфекция, из них: вирусы простого герпеса-1,2 определены у 75 % больных, цитомегаловирус – у 12,5 % больных, вирус Эпштейна-Барра (ВЭБ) – у 25 % обследованных. Избыточная выработка Th1-цитокинов активирует клеточно-опосредованный цитотоксический иммунный ответ, обеспечивая защиту организма против внутриклеточных вирусов, но подавляет секрецию IL-4 и IL-6.

У пациентов *I группы* с Th2-зависимым иммунным ответом наблюдалось увеличение концентрации IL-4, IL-10 ($p \leq 0,001$), TNF- α ($p \leq 0,001$) и снижение уровня IFN- γ ($p \leq 0,001$) по сравнению с контрольной группой (рис. 1.1). У всех больных этой подгруппы установлено формирование гиперчувствительности к экзогенным аллергенам неинфекционного происхождения. Так, у 75 % больных выявляется бытовая сенсibilизация, у 21,4 % пациентов причиной приступов бронхиальной астмы являются грибковые аллергены. У 7,1 % больных зафиксирована смешанная сенсibilизация.

В *I группе* обследуемых с Th1/Th2 типом иммунного ответа обнаружена высокая концентрация IL-2, IL-4, IFN- γ и TNF- α ($p \leq 0,001$) по сравнению с контрольной группой (рис. 2.1.1). В данной подгруппе 55,6 % больных имели сенсibilизацию к домашней пыли и грибковую аллергию, у 33,3 % больных выявлена сенсibilизация к домашней пыли, у 66,7 % больных в анамнезе хронический тонзиллит, у 44,4 % хронический ларинготрахеит. У 77,8 % пациентов с Th1/Th2 типом иммунного ответа выявлено латентное течение ВЭБ-инфекции.

У больных частично контролируемой БА (*II группа*) также были выявлены три Th-зависимых типа иммунного ответа – Th2/Th17, Th1/Th17 и Th17. С Th2/Th17 фенотипом было выделено 49 % пациентов, с Th1/Th17 – 13% с Th17 – 37 % больных БА. Оценка цитокинового профиля у пациентов с частично контролируемой БА (рис. 2.1.2), позволила установить существенное возрастание уровня IL-17.

Основными изменениями цитокинового профиля больных *II группы* с Th2/Th17 типом иммунного ответа является увеличение TNF- α ($p \leq 0,001$) и IL-4 ($p \leq 0,001$). В присутствии IL-4 Th2-клетки могут перепрограммировать линию Т-клеток, экспрессирующих IL-10 ($p \leq 0,05$), которые способны стимулировать активацию IL-17A ($p \leq 0,001$). В данной подгруппе у всех пациентов установлена смешанная сенсibilизация бытовыми, пыльцевыми и грибковыми аллергенами.

Цитокиновый профиль пациентов *II группы* с Th1/Th17 типом иммунного ответа характеризовался высокими значениями IFN- γ ($p \leq 0,001$), TNF- α ($p \leq 0,001$) и IL-17A ($p \leq 0,05$) на фоне низкого уровня IL-4 ($p \leq 0,001$). Среди больных этой подгруппы выявлено самое большое число лиц, имеющих плохую приверженность к топической глюкокортикоидной терапии, одной из причин которой может быть сформированная резистентность к ГКС. В эту группу вошли пациенты с курением – 40 %, ожирением – 60 %, у всех больных подтверждена герпетическая инфекция.

Во *II группе* больных с Th17-зависимым типом иммунного ответа отмечалось высокое содержание IL-17A ($p \leq 0,001$), IL-6 ($p \leq 0,05$), TNF- α ($p \leq 0,001$), IL-2 ($p \leq 0,005$) и низкий уровень IFN- γ ($p \leq 0,001$). У всех больных была смешанная сенсibilизация аллергенами, с обострениями не менее 4-6 раз в год. В данной подгруппе пациенты с курением составили 78,5%. ожирением – 71,4%, хроническим тонзиллитом и ларинготрахеитом – 64,3% и 35,7% больных, соответственно. У 57,1 % больных подтверждена герпетическая инфекция, из них вирусы простого герпеса-1,2 типа у 80%, цитомегаловирус у 20%.

Таким образом, в наших исследованиях установлено наличие мультитипности Т-хелперного иммунного ответа у больных БА, характер которого зависит от степени контроля заболевания. У больных БА контролируемого течения были выявлены Th2, Th1/Th2 и Th1 типы иммунного ответа. В группе больных частично контролируемой БА установлены Th2/Th17, Th1/Th17 и Th17 типы иммунного ответа.

В течение длительного периода было принято считать, что аллергические респираторные заболевания, в том числе и БА, ассоциированы с превалированием Th2 типа иммунного ответа [51; 94]. Однако как наши, так и литературные данные свидетельствуют о том, что Th1 и Th2 иммунные ответы могут сосуществовать при астме [337; 235; 109]. Выявлена возможность продуцирования Th1- и Th2-цитокинов при БА. Показано, что Т-клетки, полученные у пациентов с астмой, синтезируют значительно больше IFN- γ на стимуляцию, без каких-либо различий в образовании IL-4. Это наблюдение привело к предположению о том, что при астме может происходить наложение Th1-зависимых иммунных реакций на Th2 аллерген специфические ответы.

Ключевыми цитокинами, вовлеченными в регуляцию дифференцировки Th субпопуляций, являются IFN- γ (ингибирует пролиферацию Th2 клонов, но не влияет на продукцию ими цитокинов) и IL-2 (индуцирует Т-клеточную пролиферацию, увеличивает число эффекторных клеток и требуется для оптимальной продукции IFN- γ). IL-2 – обязательный фактор для генерации Th1-клеток. Эти факты свидетельствуют, что IFN- γ и IL-2 можно рассматривать в качестве иммунорегуляторов, способных вмешиваться в клональную экспансию и эффекторные функции Th2-клеток. Кроме того, при нарушении синтеза IL-4 Th1-клетками происходит активация образования Th2-клеток из Th0-клеток, что приводит к восстановлению продукции IL-4. В итоге, баланс IL-4 и IL-2 обеспечивает дифференцировку Th0-клеток в Th1 и Th2 [441].

Таким образом, цитокины в ранней фазе воспаления влияют на функциональную дифференцировку наивных CD4⁺ Т-клеток. Это главная часть адаптивного иммунного ответа, обеспечивающая реакцию на антиген в виде продукции антител, либо активации макрофагов и Т-киллеров.

После встречи с антигеном и выполнения своей секреторной функции большинство Т-хелперов погибает. Часть из них становятся клетками памяти, сохраняя способность отвечать на антигены в течение всей жизни хозяина, причем доминирующий ответ по Th1 или Th2 пути сохраняется. У пациентов с атопией установлен феномен неравномерного апоптоза Th1 и Th2 эффекторных клеток [323], а именно преимущественное удаление циркулирующих клеток памяти и эффекторных Th1-клеток, особенно высоко экспрессирующих IFN- γ [262], и сохранение долгоживущих Th2-клеток. Поэтому большая вероятность, что через определенное время смешанный Th1 и Th2 тип перейдет в Th2 тип иммунного ответа. Развитие у больных БА Th1/Th2 фенотипа ассоциировано с наличием хронических очагов бактериальной инфекции и персистированием вирусной инфекции в организме. Его можно расценивать как смешанный переходный фенотип, который может служить индикатором утяжеления течения БА в последующем.

Наряду с Th1- и Th2-лимфоцитами, при БА значительную роль играют Th17-клетки. На мембране мононуклеарных клеток периферической крови больных с аллергической БА был обнаружен кластер дифференцировки Th2-клеток, продуцирующих IL-17 [59]. В других исследованиях показано, что число даблпозитивных клеток Th2/Th17 в бронхоальвеолярном лаваже коррелировало со сниженной функцией дыхательных путей и повышенной эозинофилией крови [137; 252]. Клинические и экспериментальные исследования позволяют предположить, что Th2-клетки могут приобретать Th2/Th17 фенотип. Свойство Th2-клеток приобретать Th17 подобную функцию

и синергизировать с Th1-клетками способствует формированию мультитипного Th иммунного ответа у пациентов с астмой [323].

В Th17-клетках образуется несколько цитокинов, включая IL-17, IL-6, TNF- α и IL-22. IL-17 индуцирует инфильтрацию эозинофилов и рекрутирование макрофагов при БА. Предполагается, что основные функции Th17-клеток связаны с привлечением и активацией нейтрофилов, что приводит к хронизации процесса. Эти клетки способствуют развитию патологического воспаления и играют негативную роль в течении заболевания [352; 405]. Th17-клетки образуются из «наивных» CD4⁺ Т-клеток под влиянием IL-6, IL-21, IL23 и TGF- β через STAT3-ROR γ t (signal transducer and activator of transcription 3/related orphan receptor γ t) путь и вызывают нейтрофилию при аллергической БА [158]. Тем самым нейтрофилы и эпителиальные клетки вовлекаются в реакции адаптивного иммунитета. В настоящее время считается, что иммунный ответ, развивающийся по Th17 типу, наиболее важен на начальных этапах тканевого воспаления и для защиты слизистых. Этот фенотип был выявлен у пациентов с частично контролируемой БА. Какой бы не был первоначальный фенотип, развитие Th17-зависимого иммунного ответа – это результат длительного системного персистирующего воспаления [11].

Изучение роли различных типов иммунного ответа у пациентов с контролируемым течением БА показало, что внутриклеточные инфекции индуцируют ответные реакции Th1-клеток, которые продуцируют IFN- γ и IL-2, и, тем самым, активируют микробицидные и цитотоксические механизмы. Формирование фенотипа Th1/Th2 ассоциировано с наличием хронических очагов бактериальной инфекции и персистированием вирусной инфекции в организме. В развитии частично контролируемой БА активация Th17-лимфоцитов способствует затяжному течению болезни. Основные функции Th17-клеток при БА связаны с привлечением и активацией нейтрофилов, в случае же хронизации процесса эти клетки способствуют развитию патологического воспаления и играют негативную роль в течении заболевания.

На смену прежнему представлению о решающей роли смещения Th1/Th2 баланса, приходит постепенное осознание того, что Th1/Th17 и Th2/Th17-опосредованные механизмы при БА представляют собой полярные крайности заболевания, при этом фенотипы пациентов колеблются между этими полюсами. Цитокины создают микроокружение для дифференцировки Th-клеток в том или ином направлении. Однако можно предположить, что каждому типу адаптивного иммунного ответа будет соответствовать и свой тип реагирования на уровне клеток врожденного и приобретенного иммунитета. Оценка интенсивности и характера воспаления при БА, основанная на анализе воспалительных маркеров, позволит улучшить диагностику заболевания и выбрать правильную тактику лечения.

Особенности регуляции воспалительной реакции при хронической обструктивной болезни легких

Прогрессирующее хроническое ограничение скорости воздушного потока при ХОБЛ складывается из 2-х основных патологических процессов: ремоделирование и сужение мелких дыхательных путей, проявляющиеся как наличие кашля с продукцией мокроты (хронический бронхит), и эмфизема легких, которая выражается в расширении дыхательных путей дистальнее терминальных бронхиол, ассоциированном с деструкцией стенок альвеол. Эти процессы вызваны хроническим воспалением на периферии легких [463].

Воспаление при ХОБЛ представляет собой комплексный иммунопатологический процесс, включающий реакции врожденного и приобретенного иммунитета, определяющие его хроническое течение. Воспалительный процесс, характерный для ХОБЛ, носит системный характер. Длительное раздражение дыхательных путей, вызванное курением и воздействием поллютантов, в первую очередь оказывает действие на клетки врожденного иммунитета – эпителиальные клетки, макрофаги, нейтрофилы, натуральные киллеры (NK),

которые связываются с их паттерн-распознающими рецепторами – Toll-подобными рецепторами, NOD-рецепторами и другими. Клетки эпителия реагируют на постоянные раздражители чрезмерной выработкой слизи, снижением количества легочного сурфактанта, уменьшением секреции защитных веществ и выделением цитокинов и хемокинов, обеспечивающих хемотаксис иммунных клеток в область воспаления. Другие клетки неспецифического иммунитета, активируясь при воздействии раздражителя, выделяют цитокины, ферменты и запускают воспалительные реакции с повреждением тканей легких. Реакции, запущенные клетками врожденного иммунитета, индуцируют адаптивный иммунный ответ с помощью антиген-презентирующих клеток (АПК). К последним относятся дендритные клетки и макрофаги, которые предоставляют антиген наивным Т-хелперным лимфоцитам (Th0) в лимфатических узлах, способствуя их дифференцировке. Активированные таким способом Th-клетки направляют адаптивный иммунный ответ по определенному пути, вовлекая различные эффекторные клетки. В результате образуются аутоантитела к эластину, в дыхательных путях происходит накопление Т-киллеров, повреждающих клетки эпителия с помощью перфоринов и гранзимов и другие иммунные реакции [37].

Наличие системного воспаления у больных ХОБЛ стабильного течения показано в мета-анализе W. Q. Gan, в котором было рассмотрено 14 исследований по изучению маркеров системного воспаления при ХОБЛ [90]. Взаимосвязь между местным бронхолегочным и системным воспалением осуществляют индуцированные из бронхолегочной системы в системную циркуляцию цитокины [431; 90; 480]. Цитокины обеспечивают регуляцию иммунного ответа за счет передачи сигнала клетке-мишени через специфический рецептор. Другим важным признаком системного воспалительного процесса являются клеточные факторы крови, среди которых особая роль отводится популяции Т-хелперов. В настоящее время рассматривают несколько типов адаптивного иммунного ответа, которые регулируются

разными популяциями Т-хелперов [49; 158; 536]. Различные субпопуляции Th-клеток способны управлять развитием иммунного ответа, активируя соответствующие эффекторные клетки. В свою очередь, дифференцировка той или иной субпопуляции Th зависит от цитокинового микроокружения. Th1-клетки, как правило, продуцируют IL-2, IL-12, TNF- α , IFN- γ и участвуют в опосредованных клетками воспалительных реакциях. Th2-клетки способствуют развитию реакций гуморального иммунного ответа, к которым относятся стимуляция продукции антител В-клетками, аллергические реакции с вовлечением тучных клеток и эозинофилов. Эти клетки преимущественно синтезируют IL-4, IL-5, IL-13. Th17-клетки в больших количествах продуцируют провоспалительный цитокин IL-17. Основное действие данного цитокина заключается в привлечении нейтрофилов в место воспаления и их активации, а также в усилении синтеза большинства цитокинов, особенно провоспалительных (TNF- α , IL-1 β , IFN- γ , IL-6 и др.). Th17-клетки участвуют в патогенезе воспалительных и аутоиммунных заболеваний, а также защищают организм от бактериальных, грибковых и вирусных инфекций. Функция Treg заключается в контроле иммунного ответа путем воздействия на эффекторные клетки с помощью IL-10, а также путем связывания IL-2, лимитирующего фактор роста Т-клеток. Выделяют два типа Treg: естественные (nTregs), образующиеся в тимусе, и индуцибельные (iTregs), формирующиеся в лимфатических узлах в ходе иммунного ответа.

Дифференцировка Th1 требует присутствия IL-12 и IFN- γ в среде во время антигенной стимуляции наивных CD4⁺ Т-клеток. IL-12 через активацию STAT1 (Signal Transducer and Activator of Transcription) и STAT4 запускает экспрессию главного транскрипционного фактора Th1-клеток – T-bet. Ключевым цитокином для формирования Th2 является IL-4, который необходим для активации транскрипционного фактора GATA3, определяющего направление дифференцировки наивных Т-клеток. При этом в сигналинге участвует STAT6. Факторами дифференцировки для Th17 являются TGF- β

совместно с IL-6 или IL-21. Эти сочетания цитокинов индуцируют экспрессию фактора транскрипции Retinoic acid-related orphan receptor γ (ROR γ t), определяющего транскрипционную программу IL-17-продуцирующих Т-клеток через фосфорилирование STAT3. IL-21 непосредственно производится Th17-клетками, обеспечивая самоподдержание клеточной субпопуляции. Также в процессе дифференцировки Th17 участвует IL-23, он стабилизирует дифференцировку Th17-клеток и участвует в дальнейшем процессе созревания Th17-клеток [4]. В среде, богатой IL-2 и TGF- β , Th0-клетки начинают производить фактор транскрипции FoxP3 (Forkhead box P3), который способствует возникновению иммуносупрессивных функций и формированию iTreg. В запуске синтеза FoxP3 участвует STAT5. Цитокины, критичные для формирования одних субпопуляций Th, могут ингибировать развитие других. Например, IFN- γ (Th1) и IL-4 (Th2) ингибируют дифференциацию Th17 и iTreg, а развитие Th2 подавляется цитокинами, способствующими развитию Th1 и Th17 [325; 115].

Следует отметить, что IL-6 является важным фактором для дифференциации субпопуляций Th. Во-первых, он способен сдвигать Th1/Th2 баланс в сторону Th2 двумя независимыми путями: либо путем запуска экспрессии IL-4 в наивных Т-хелперных клетках во время антигенной стимуляции, либо путем ингибирования передачи сигнала IFN- γ (фактор дифференцировки Th1) в этих клетках [366]. Во-вторых, IL-6 является переключателем Th17/iTreg баланса.

TGF- β – общий индуктор для Th17 и iTreg. Действуя на наивные Т-клетки, он индуцирует генерацию iTreg, но в присутствии IL-6 происходит снижение экспрессии FoxP3 и усиление экспрессии ROR γ t в этих клетках, что приводит к формированию Th17-клеток [242; 495]. При этом блокирование экспрессии FoxP3 происходит посредством IL-6 трансигналинга. Можно заключить, что IL-6 способен влиять на формирование иммунного ответа: будет ли он находиться в толерантном состоянии, либо перейдет в воспалительное состояние [242].

Исследованиями группы авторов показана нестабильность nTreg. При воспалении nTreg в присутствии IL-6 переходят в Th17 тип. iTreg, напротив, не проявляют такую пластичность и сохраняют супрессорную активность при воспалении [72].

Таким образом IL-6 оказывает супрессорную активность по отношению к Th1 и Treg и способствует развитию Th2 и Th17 фенотипов. Кроме того, IL-6 подавляет апоптоз клеток посредством индукции антиапоптотических регуляторов. Можно предположить, что IL-6 оказывает влияние на развитие хронических заболеваний путем сохранения Т-клеток на участках воспаления.

При ХОБЛ на фоне постоянного воздействия содержащихся в воздушной среде токсикантов, возникают нарушения работы компонентов системы иммунитета, в том числе и цитокиновой сети. Нарушение работы цитокиновой сети проявляется в дисбалансе про- и противовоспалительных цитокинов, который усугубляется с увеличением продолжительности заболевания и тяжести клинического течения. Исследователи, изучающие цитокиновую регуляцию при ХОБЛ, особо выделяют цитокины IL-1 β , IL-6, IL-8, IL-17, TNF- α , IFN- γ . Уровни этих цитокинов обычно повышены в крови у больных ХОБЛ, что свидетельствует об их значимости в развитии системного воспаления при этом заболевании [53; 536; 495]. IL-1 β – центральный медиатор врожденного иммунитета и воспаления, фактор активации макрофагов. Эффект TNF- α заключается в усилении миграции и хемотаксиса нейтрофилов, активации макрофагов. IFN- γ так же способствует активации макрофагов, усиливает продукцию TNF- α и IL-1 β , направляет дифференцировку CD4-клеток в сторону Th1. IL-1 β , TNF- α и IFN- γ относятся к провоспалительному цитокиновому звену. IL-8 служит хемокином для нейтрофилов, макрофагов и лимфоцитов. IL-17 главным образом обеспечивает привлечение нейтрофилов в область воспаления [536]. Противовоспалительные цитокины, такие как IL-4 и IL-10, также принимают участие в патогенетических реакциях при ХОБЛ, их основная задача – ограничить воспаление.

IL-6 регулирует дифференцировку Th-клеток и препятствует их апоптозу, способен проявлять как про-, так и противовоспалительные свойства [6; 8; 242; 495]. Для проведения сигнала внутрь клетки IL-6 должен связаться с двумя различными белками, которые вместе образуют общий рецептор, имеющий димерную структуру. Это гликопротеины молекулярной массой 80 кДа (IL-6R, CD126) и 130 кДа (gp130, CD130).

Рецептор IL-6R служит для распознавания связывания IL-6, а гликопротеин gp130 отвечает за передачу сигнала внутрь клетки. Рецептор gp130 экспрессирует большинство клеток организма, в то время как рецептор IL-6R в основном производят гепатоциты, нейтрофилы, моноциты/макрофаги и Т-клетки. Эти рецепторы могут существовать как в мембранной форме – IL-6R и gp130, так и в растворимой форме в биологических жидкостях человека – sIL-6R и sgp130. Известно, что генерация sIL-6R осуществляется двумя независимыми механизмами: путем ограниченного протеолиза с участием металлопротеиназ из семейства ADAM (a disintegrin and metalloproteinase), способных отщеплять внеклеточный фрагмент мембранных белков, и путем альтернативного сплайсинга мРНК [242].

Выделяют два основных типа IL-6 сигналинга: классический и трансигналинг. Первый осуществляется с помощью мембранной формы IL-6R, а второй – посредством sIL-6R. И в том, и в другом случае, при контакте sIL-6R или IL-6R с его лигандом формируется комплекс, который в дальнейшем взаимодействует с gp130 на клеточной поверхности, вызывая его димеризацию и запуск JAK/STAT сигнального каскада. Этот каскад работает по тому же принципу, что и при IL-4 сигналинге, за исключением того, что в передаче сигнала участвуют другие молекулы: JAK1/2, TYK2, STAT1, 3 и крайне редко STAT5. Помимо JAK/STAT сигнального пути, IL-6 способен запускать MAPK-путь, который контролирует пролиферацию и дифференцировку клеток. В ходе этого каскада, после взаимодействия IL-6

с рецептором происходит активация JAK-киназ и фосфорилирование адаптерного белка SHP2, который, в свою очередь, активирует ГТФазу Ras и индуцирует MAPK-каскад [242].

Следует обратить внимание на то, что комплекс IL-6/sIL-6R способен действовать на клетки, на поверхности которых присутствует только рецептор gp130, что значительно расширяет круг вовлекаемых клеток-мишеней. Таким образом, IL-6/sIL-6R комплекс действует как агонист, так как он активирует клеточные типы, которые не могут быть стимулированы одним только IL-6. Так как эффект IL-6 является результатом активации определенных генов, то разные клетки, обладая разным набором активированных генов, будут реагировать на него по-разному [242]. Кроме того, рядом авторов обнаружено, что эффект IL-6 зависит от механизма передачи сигнала. Регенеративная или противовоспалительная активность IL-6 опосредована классическим сигналингом, в то время как провоспалительные реакции, связанные с IL-6, протекают с помощью транссигналинга [7; 263].

В современной литературе большое количество научных публикаций посвящено изучению роли IL-6 в прогрессировании ХОБЛ. Согласно нашим исследованиям [6], а также результатам, полученным в других лабораториях [431; 242; 463; 495], повышенный системный уровень IL-6 является отличительной чертой ХОБЛ и коррелирует со степенью воспаления нижних дыхательных путей и снижением легочной функции. Это обуславливает значительный интерес ученых к изучению регуляторных механизмов IL-6 при ХОБЛ. В то же время исследований, посвященных изучению экспрессии рецептора IL-6R в крови больных ХОБЛ мы не обнаружили.

Многие исследователи предпринимали попытку охарактеризовать тип иммунного ответа у пациентов с ХОБЛ, но полученные результаты довольно противоречивы. В некоторых работах показано, что у пациентов с ХОБЛ преобладает Th1 модель иммунного ответа, в то время как в других публикациях выделен Th2 фенотип [495]. В ряде исследований обнаружено увеличение числа Th17

в периферической крови больных ХОБЛ, что говорит об усилении Th17 ответа [536; 158]. Th17-клетки производят провоспалительный цитокин IL-17, который способствует активации легочных фибробластов, эпителиальных клеток и клеток гладкой мускулатуры бронхов. После активации эти клетки экспрессируют цитокины IL-6, IL-8 и гранулоцитарно-колониестимулирующий фактор (G-CSF), вызывающие инфильтрацию дыхательных путей нейтрофилами и усиление их пролиферации. Нейтрофилы, в свою очередь, выделяют протеолитические ферменты, разрушающие паренхиму легких, тем самым снижая их функцию [158]. То есть, активация Th17 обеспечивают пролонгацию врожденного иммунного ответа, что обуславливает хронизацию воспаления.

Информация, касающаяся Т-регуляторного звена иммунной системы, неоднозначна. В ранних исследованиях описывается увеличение доли Treg в крови у пациентов с ХОБЛ, свидетельствующее о высокой степени активации супрессорного пути регуляции иммунного ответа [49]. При этом отмечается высокий уровень nTreg (CD4⁺CD25⁺). В более поздних работах показано снижение числа Treg в периферической крови пациентов с ХОБЛ в сравнении со здоровыми людьми [536]. В своем исследовании Li и соавт. установили отрицательную корреляцию между Th17 и Treg периферической крови пациентов с ХОБЛ стабильного течения. Этот факт указывает на то, что провоспалительные Th17 и противовоспалительные Treg подавляют друг друга с точки зрения дифференциации и функций. Нарушение баланса между Th17 и Treg при ХОБЛ может служить показателем, отражающим характер воспалительных реакций [294].

Несмотря на имеющийся в литературе массив данных, механизмы системного воспаления при ХОБЛ все еще остаются недостаточно изученными. Наиболее актуальным и перспективным является исследование регуляторных механизмов прогрессирования этой патологии респираторного тракта, необходимое для разработки терапевтических стратегий.

В наших исследованиях на условиях добровольного информированного согласия участвовали 160 пациентов (96 мужчин и 64 женщины), средний возраст которых составил $57,5 \pm 4,8$ года. Критериями разделения пациентов по группам была степень тяжести клинического течения ХОБЛ (GOLD, 2017) [10]. По клинико-функциональным вариантам пациенты разделялись по группам: 36 человек (28 %) с легкой степенью тяжести, 62 человека (48 %) со средней степенью и 30 человек (24 %) с тяжелой степенью течения ХОБЛ. На момент обследования пациенты не получали регулярной противовоспалительной терапии. Критериями исключения из исследования явилось наличие у пациентов острых инфекционных заболеваний, хронических заболеваний внутренних органов в фазе обострения, хронической сердечной недостаточности в стадии декомпенсации. В контрольную группу вошли 32 практически здоровых лиц (6 мужчин и 26 женщин), не курящих, с нормальной функцией внешнего дыхания, средний возраст – $42,0 \pm 3,4$ года.

Заболевания бронхолегочной системы диагностировали на основании данных анамнеза, объективного осмотра, пикфлоуметрии, спирографии с выполнением бронхолитического теста (спирограф "FUK.UDA", Япония), результатов тестов шкала одышки mMRC (Modified British Medical Research Council) и оценка качества жизни CAT (COPD Assessment Test), рентгенологического и лабораторного исследования. В соответствии с рекомендациями «Глобальной стратегии: диагностика, лечение и профилактика ХОБЛ» (2018) диагноз ХОБЛ выставляли при $\text{ОФВ}_1/\text{ФЖЕЛ} < 0,70$. По результатам спирографии у пациентов с легкой степенью тяжести ХОБЛ постбронходилатационный показатель ОФВ_1 составил $90,13 \pm 1,99$ %, по данным опроса определялась одышка в 1 балл по шкале mMRC и качество жизни в 4-6 баллов по тесту CAT. У пациентов со среднетяжелой степенью ХОБЛ показатель ОФВ_1 составил $73,9 \pm 2,56$ %, определялась одышка в 2 балла по шкале mMRC и качество жизни в 7-9 баллов по тесту CAT.

У пациентов с тяжелой степенью ХОБЛ показатель ОФВ₁ составил $48,6 \pm 1,76$ %, по шкале одышки mMRC определялись 2 балла и более, по тесту САТ – 10 баллов и более.

На основании изучения уровней циркулирующих про- и противовоспалительных цитокинов и их соотношений, характерных для определенных субпопуляций Th-клеток, выявлены преобладающие типы иммунного ответа при ХОБЛ – Th1 и Th17.

Результаты сравнительного анализа цитокинового профиля контрольной группы и больных ХОБЛ в соответствии с типом Th-ответа представлены в таблице 1.

В группе больных ХОБЛ легкой степени тяжести у 67 % пациентов (24 чел.) выявлено увеличение концентрации TNF- α и IFN- γ и снижение уровня IL-4 по сравнению с контрольной группой (табл.1). Дефицит IL-4 на фоне высокой концентрации провоспалительных цитокинов (TNF- α , IFN- γ) указывает на дифференцировку наивных Т-лимфоцитов по Th1-зависимому пути.

У 28 % пациентов (10 чел.) наблюдалось повышение уровня провоспалительных (IL-17 и IL-21) и противовоспалительных (IL-10, TGF- β 1) цитокинов, падение уровня IL-4 по сравнению с группой контроля. Это свидетельствует о формировании специфического цитокинового паттерна, приводящего к дифференцировке Т-хелперов 17 типа. У 5 % пациентов (2 чел.) наблюдалось повышение IL-17, IL-21, IFN- γ и TNF- α , что свидетельствует о равнозначной по силе активации Т-хелперов 1-го и 17-го типов. Повышение уровней IL-21, IL-6 и TGF- β 1, являющихся важнейшими факторами дифференцировки Th17-клеток, ведет к росту числа этих клеток при утяжелении течения ХОБЛ [536]. В свою очередь, Th17 клетки посредством продукции IL-17A, активируют синтез клетками врожденного иммунитета TNF- α , IL-6 и других провоспалительных факторов [242]. В то же время, продуцируемый Th17 клетками провоспалительный цитокин IL-17 способствует активации легочных фибробластов, эпителиальных клеток и клеток гладкой мускулатуры бронхов.

После активации эти клетки экспрессируют цитокины IL-6, IL-8 и гранулоцитарно-колониестимулирующий фактор (G-CSF), вызывающие инфильтрацию дыхательных путей нейтрофилами и усиление их пролиферации. Нейтрофилы, в свою очередь, выделяют протеолитические ферменты, разрушающие паренхиму легких, тем самым снижая их функцию [18; 158]. Таким образом, Th17 обеспечивают пролонгацию врожденного иммунного ответа, что обуславливает хронизацию воспаления.

В ходе настоящего исследования выявлены изменения в количественном содержании Т-клеток, несущих на своей поверхности IL-6R (CD126⁺) в зависимости от степени тяжести ХОБЛ (табл. 2). У пациентов с легким течением ХОБЛ наблюдалась тенденция к повышению процентного содержания CD4⁺-клеток, несущих на своей мембране IL-6R, в сравнении с группой контроля. У пациентов с Th1-зависимым иммунным ответом увеличилось количество CD4⁺CD126⁺ клеток на 37 % ($p < 0,05$) относительно контрольной группы. У пациентов с Th17-зависимым иммунным ответом возросло количество CD3⁺CD126⁺ клеток на 65% ($p < 0,05$), а с Th1/Th17 типом иммунного ответа – на 84% ($p < 0,05$) относительно контрольной группы. У больных ХОБЛ легкой степени тяжести определялось три Т-клеточных фенотипа иммунного ответа с превалированием Th1-зависимого варианта. Уровень экспрессии IL6-R при легком течении ХОБЛ наиболее выражен при Th1-зависимом типе иммунного ответа на CD4⁺CD126⁺ клетках, при Th17- и Th1/Th17 фенотипах – на CD3⁺CD126⁺ клетках.

В группе больных ХОБЛ средней степени тяжести в 39 % случаев (24 чел.) выявлен Th1 путь иммунного ответа. Этот путь характеризуется снижением уровня цитокинов IL-4, IL-21 и повышением продукции TNF- α и IFN- γ по сравнению с контрольной группой (табл. 1). У 34 % больных (21 чел.) установлен Th17 путь иммунного ответа, который поддерживается высокими значениями провоспалительных цитокинов IL-17A, IL-21 и противовоспалительных

Таблица 1

Показатели цитокинового статуса пациентов с ХОБЛ

Показатели, пг/мл	Контрольная группа, n=32	ХОБЛ легкая степень тяжести, n=36			ХОБЛ средняя степень тяжести, n=62			ХОБЛ тяжелая степень тяжести, n=30		
		Th1 путь, n=24	Th17 путь, n=10	Th1/Th17 путь, n=2	Th1 путь, n=24	Th17 путь, n=21	Th1/Th17 путь, n=17	Th1 путь, n=2	Th17 путь, n=13	Th1/Th17 путь, n=15
IL-4	77,9 (66,2-81,0)	45,4* (43,0-52,3)	59,3* (48,3-65,8)	63,4 (51,9-67,1)	56,2* (45,4-61,3)	62,4 (58,0-71,2)	39,8* (32,5-44,1)	64,3 (54,8-73,8)	81,2# (77,0-99,4)	92,7° (87,6-98,5)
IL-10	32,4 (31,1-33,7)	36,5 (29,0-41,0)	43,6* (36,3-46,1)	48,1*° (39,5-55,7)	59,6* (52,4-62,4)	58,9* (40,3-66,7)	47,2* (41,2-55,1)	39,7 (33,0-43,0)	69,8*# (61,0-92,1)	78,7*° (73,5-86,3)
IL-17A	378,4 (360,0-395,1)	402,0 (352,0-412,0)	605,3*# (601,9-620,5)	583,2*° (563,6-623,4)	419,7 (337,3-502,1)	541,1*# (508,1-725,0)	578,2*° (551,6-602,4)	364,4 (303,1-425,7)	640,1*# (526,1-705,3)	591,4*° (573,1-612,1)
IL-21	75,5 (74,0-82,0)	81,6 (72,3-92,4)	200,0*# (152,0-252,0)	157,2*° (148,3-192,6)	68,0 (52,0-80,0)	208,5*# (168,0-249,0)	186,4*° (171,9-198,2)	51,5* (48,0-55,0)	254,0*# (250,0-276,0)	212,9*° (201,7-223,6)
TNF-α	46,3 (43,2-48,9)	93,0* (89,6-107,5)	59,4*# (49,0-69,0)	70,8* (62,1-74,8)	59,9* (52,4-62,4)	55,7 (42,5-62,8)	64,8* (60,3-69,2)	146,7* (145,7-147,8)	70,2*# (60,0-94,0)	94,8*° (88,3-99,1)
IFN-γ	103,5 (91,6-105,4)	325,3* (308,1-344,0)	125,9# (114,0-151,0)	146,4° (142,9-154,3)	155,2* (125,9-187,3)	110,2 (107,5-138,0)	136,4 (130,7-145,3)	195,6* (191,5-209,6)	108,0# (102,0-161,1)	152,4* (149,4-179,4)
TGF-β1	150,0 (118,0-180,0)	162,0 (88,0-184,0)	180,0*# (175,0-275,0)	172,5 (159,3-183,6)	158,5 (145,0-205,0)	204,5*# (195,0-275,0)	187,2 (172,8-198,4)	215,0* (210,0-220,0)	280,0*# (240,0-340,0)	254,1* (231,5-284,4)
IL-6	38,2 (35,7-39,0)	40,0 (37,1-46,2)	78,1*# (64,7-80,3)	59,3 (54,2-66,1)	43,6 (37,0-53,6)	90,1*# (78,5-106,7)	73,7*° (69,5-79,2)	60,5* (52,7-62,7)	79,0*# (69,1-84,5)	85,8*° (72,9-89,3)

Примечание. Данные представлены в виде медианы (Me) и диапазона квартильных значений (LQ-UQ). * p – достоверность различий с контрольной группой ($p < 0,05$); # p – достоверность различий между показателями в группах больных с Th1 и Th17 типом иммунного ответа ($p < 0,05$); ° p – достоверность различий между показателями больных с Th1 и Th1/Th17 типами иммунного ответа ($p < 0,05$)

Таблица 2

Уровень экспрессии клеточного IL-6 рецептора на Т-клетках у пациентов с ХОБЛ

Показатели, %	Контрольная группа, n=32	ХОБЛ легкая степень тяжести, n=36			ХОБЛ средняя степень тяжести, n=52			ХОБЛ тяжелая степень тяжести, n=24		
		Th1 путь, n=24	Th17 путь, n=10	Th1/Th17 путь, n=2	Th1 путь, n=24	Th17 путь, n=21	Th1/Th17 путь, n=7	Th1 путь, n=6	Th17 путь, n=13	Th1/Th17 путь, n=5
CD3 ⁺ CD126 ⁺	2,25 (2,15-2,40)	2,80 (2,60-2,90)	3,72* (3,42-4,28)	4,15*** (3,82-4,64)	2,85* (2,70-3,10)	3,45* (2,99-3,84)	2,95 (2,83-3,40)	4,50***# (4,20-4,80)	6,90***## (6,10-7,90)	7,02***# (6,70-7,80)
CD4 ⁺ CD126 ⁺	1,75 (1,62-1,79)	2,4* (2,26-2,72)	2,58* (2,13-2,71)	2,19 (1,89-2,30)	1,50 (1,30-2,13)	3,79** (2,53-4,15)	2,36* (2,01-2,94)	3,70***# (3,40-4,20)	6,75***## (5,50-8,50)	5,20***## (5,40-6,89)

Примечания: данные представлены в виде медианы (Me) и диапазона квартильных значений (LQ-UQ)

* p – достоверность различий с контрольной группой (* - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001)

#p – достоверность различий между группами ХОБЛ легкой и тяжелой степени тяжести (# - p<0,05; ## - p<0,01)

– IL-10, TGF- β 1. У 27% пациентов (17 чел.) выявлен Th1/Th17 тип иммунного ответа с одновременной экспрессией IL-17A, IL-21 TNF- α и IFN- γ цитокинов. Среди пациентов ХОБЛ со среднетяжелым течением выявлено статистически значимое увеличение количества клеток с маркером CD126⁺ относительно контрольной группы (табл. 2). У пациентов с Th1-зависимым иммунным ответом на 27 % возросло количество CD3⁺CD126⁺ клеток относительно контрольной группы.

У пациентов с Th17 -зависимым иммунным ответом было отмечено увеличение в 2 раза ($p < 0,01$) количества CD4⁺CD126⁺ и на 53% ($p < 0,05$) CD3⁺CD126⁺ клеток относительно контрольной группы. У пациентов с Th1/Th17 типом иммунного ответа возросло количество как CD4⁺CD126⁺, так и CD3⁺CD126⁺ клеток – на 35 % ($p < 0,05$) и 31 % соответственно по сравнению с контрольной группой. У больных ХОБЛ среднетяжелой степени Th1, Th17 и Th1/Th17 типы иммунного ответа встречались в равных долях. Уровень экспрессии IL6-R при среднетяжелом течении ХОБЛ на зрелых Т-лимфоцитах и Т-хелперах в наибольшей степени возрастал при Th17 типе иммунного ответа.

Среди пациентов с тяжелой степенью ХОБЛ Th1 тип иммунного ответа, характеризующийся высоким уровнем TNF- α и IFN- γ на фоне низких значений IL-21, выявлен у 6 % (2 чел.) (табл. 1). У 43 % больных (13 чел.) диагностированы максимальные значения провоспалительных цитокинов IL-17, IL-21 и противовоспалительных – IL-10, TGF- β 1, что указывает на продуцирующую активацию Th17 лимфоцитов, играющих роль дирижера воспалительной реакции. У 50 % пациентов (15 чел.) данной группы преобладала экспрессия IL-17, IL-21, TNF- α и IFN- γ , характерная для Th1/Th17 типа иммунного ответа. Статистически значимое различие внутри группы по уровню исследуемых цитокинов выявлено для всех показателей. У пациентов тяжелого течения ХОБЛ с Th1-зависимым иммунным ответом определялось увеличение в 2 раза количества CD4⁺CD126⁺ клеток ($p < 0,001$) по сравнению с контрольной группой.

У пациентов с Th17-зависимым иммунным ответом отмечено значительное возрастание Т-клеток, экспрессирующих IL6-R относительно контрольной группы. В наибольшей степени увеличение затронуло Т-хелперы - на 286% ($p < 0,001$). У пациентов с Th1/Th17 типом иммунного ответа количество $CD4^+CD126^+$ клеток возросло на 212 % ($p < 0,001$), количество $CD3^+CD126^+$ – на 197 % ($p < 0,001$) по сравнению с контрольной группой. У больных ХОБЛ тяжелой степени преобладали Th17 и Th1/Th17 типы иммунного ответа. Уровень экспрессии IL-6R при тяжелом течении ХОБЛ увеличивается в 3 раза при Th17- и Th1/Th17- зависимых типах иммунного ответа. Отмечено наиболее значимое возрастание $CD4^+ CD126^+$ клеток при Th17 фенотипе.

Полученные данные показали, что по мере утяжеления ХОБЛ происходило увеличение числа Т-лимфоцитов, несущих на своей поверхности IL6-R. Это указывает на значимую роль IL6 в развитии системного воспалительного процесса при ХОБЛ. IL-6 является важным фактором для дифференциации субпопуляций Th клеток. Он обладает супрессорной активностью по отношению к Th1 и Treg и участвует в развитии Th17 типа иммунного ответа [6, 242]. Кроме того, IL-6 подавляет апоптоз клеток посредством индукции антиапоптотических регуляторов. Предполагается, что благодаря этому IL-6 способствует развитию хронических заболеваний, сохраняя Т-клетки на участках воспаления. Усиливая активность Т-лимфоцитов, IL-6 способствует утяжелению хронического интерстициального воспаления в легких с различными системными эффектами.

В ходе исследования выявлены особенности клинической картины у пациентов с ХОБЛ в зависимости от типа иммунного ответа (табл. 3). Так, у 59 % больных ХОБЛ с Th-1 фенотипом иммунного ответа одышка возникала при умеренных физических нагрузках, кашель с незначительным количеством мокроты слизистого характера беспокоил в период обострений. САТ тест превышал 10 баллов.

Таблица 3

Клинические проявления у больных ХОБЛ с Th-зависимыми типами иммунного ответа

Группы пациентов	Одышка, баллы	Кашель, баллы	Мокрота, баллы	САТ тест, сред. балл	Количество сопутствующих заболеваний	Количество обострений в год	ОФВ1, сред. %
Th1 тип n=50	1,5	1,5	1,5	14	1,5	1,5	65
Th1/Th17 тип n=34	2,5°	2,5°	3°	18°	3,5°	3,5°	53°
Th17 тип n=44	4* 4*	4* 4*	5* 5*	24* 24*	7* 7*	6,5* 6,5*	40* 40*

Примечания: * - $p < 0,05$ статистическая значимость различий между группами с Th1 и Th17 типами иммунного ответа.
° - $p < 0,05$ статистическая значимость различий между группами с Th1 и Th1/Th17 типами иммунного ответа.

Скорость воздушного потока (ОФВ1) у этих больных уменьшалась в среднем до 65 %. Течение заболевания характеризовалось развитием обострений 1-2 раза в год, чаще в холодное время года. Признаки сердечной недостаточности, развившейся на фоне артериальной гипертензии и ИБС, появлялись у каждого третьего пациента. У 64 % больных ХОБЛ с Th-1/Th-17 типом иммунного ответа течение заболевания характеризовалось одышкой при умеренных физических нагрузках (2 балла по шкале MRS), развитием обострений 3-4 раза в год. Скорость воздушного потока (ОФВ1) уменьшалась в среднем до 53 %. Выраженность симптомов (кашель, выделение мокроты) оцененные по САТ тесту соответствовали в среднем 18 баллам. Количество сопутствующих заболеваний увеличилось. К сердечно-сосудистым заболеваниям у каждого второго обследуемого добавились метаболические нарушения. Для 77 % больных ХОБЛ с Th17 типом иммунного ответа течение заболевания характеризовалось уменьшением скорости воздушного потока (ОФВ1) в среднем до 40 %, прогрессированием хронической дыхательной недостаточности (3-4 балла по шкале MRS), т.е. одышка беспокоила во время повседневной деятельности, при медленной ходьбе по ровной поверхности, уборке постели, одевании. Таких пациентов постоянно беспокоил кашель с большим количеством отделяемой мокроты часто гнойного характера, САТ тест более 20 баллов. Частота обострений у этих больных увеличилась до 5-7 раз в год. Среди сопутствующих заболеваний, которые беспокоили пациентов, в 100% случаев преобладали гипертоническая болезнь, ИБС, мерцательная аритмия, метаболический синдром, сахарный диабет и остеопороз. Таким образом, клинические проявления ХОБЛ при Th17 типе иммунного ответа отличаются от клинических проявлений при Th1 и Th1/Th17 типах иммунного ответа. При Th17 фенотипе увеличивается количество обострений заболевания в год, количество отделяемой мокроты, часто носящей гнойный характер, и количество сопутствующих заболеваний.

С учетом ведущей роли воспаления в патогенезе ХОБЛ, диагностика ключевых маркеров воспалительного процесса является первоочередной задачей. Результаты исследования показали, что по мере утяжеления клинического течения ХОБЛ возрастает число Th17 клеток и Т-клеток, экспрессирующих мембраносвязанный IL-6R, посредством которого происходит классическая передача сигнала в клетку. Известно, что при связывании IL-6 с IL-6R на поверхности Th лимфоцитов, в них запускается JAK/STAT сигнальный каскад, либо MAPK сигнальный путь, контролирующие пролиферацию и дифференцировку клеток [463, 495]. Эти сигнальные каскады регулируют дифференцировку Th, влияют на их выживаемость посредством запуска синтеза антиапоптотических регуляторов, модулируют продукцию эффекторных цитокинов этими клетками. Увеличение числа CD126 позитивных Т-клеток при прогрессировании ХОБЛ указывает на вовлечении в патогенез классического IL-6 сигнального пути.

Таким образом, в проведенном исследовании выявлены преобладающие типы Т-хелперного ответа на разных стадиях ХОБЛ стабильного течения - Th1, Th17 и Th1/Th17. При ХОБЛ легкой степени тяжести превалирует Th1-зависимый иммунный фенотип. Уровень экспрессии IL6-R представлен в большей степени на CD3⁺CD126⁺ клетках при Th1/Th17 фенотипе и CD4⁺CD126⁺ клетках при Th17 типе иммунного ответа. У больных ХОБЛ средней степени тяжести Th1, Th17 и Th1/Th17 типы иммунного ответа определяются в равных долях. Уровень экспрессии IL-6R на зрелых Т-лимфоцитах и Т-хелперах возрастает в наибольшей степени при Th17-зависимом иммунном ответе. У больных ХОБЛ с тяжелым течением преобладает иммунный ответ по Th17 и Th1/Th17 фенотипам. Экспрессия IL6-R увеличивается при Th17- и Th1/Th17- зависимых типах иммунного ответа, при этом отмечается наиболее значимое увеличение CD4⁺CD126⁺ клеток при Th17 фенотипе. Увеличение экспрессии IL-6R на Т-хелперах, вероятно, является дополнительным механизмом регуляции воспаления при утяжелении ХОБЛ.

У пациентов с ХОБЛ определяются особенности клинической картины, сопряженные с фенотипом иммунного ответа. При Th1 и Th1/Th17 фенотипах определяется умеренная степень ограничения скорости воздушного потока и умеренное влияние ХОБЛ на качество жизни пациента, что сопровождается редкими сезонными обострениями при Th1 фенотипе и частыми обострениями заболевания при Th1/Th17 фенотипе. У пациентов с Th17 фенотипом иммунного ответа определяется средняя степень тяжести ограничения скорости воздушного потока, выраженное влияние ХОБЛ на качество жизни пациента и частые обострения.

Результаты исследования демонстрируют, что на основе анализа уровня секреции цитокинов, играющих ключевую роль в организации воспалительного процесса, и экспрессии рецепторов можно определить степень активности основных эффекторных Т-клеток и фенотип воспаления. Это позволит прогнозировать течение хронического заболевания, исход воспаления и определить назначение адекватной терапии с целью предотвращения прогрессирования главных морфологических составляющих ХОБЛ – фиброза, эмфиземы и ремоделирования легких.

Взаимосвязь между клинико-функциональным фенотипом ХОБЛ и иммунным воспалением

Современные принципы лечения ХОБЛ построены на воспалительной модели заболевания, при этом не учитывается гетерогенность заболевания [1; 54; 37; 135]. Первая попытка разделить пациентов с ХОБЛ на группы в зависимости от особенностей течения заболевания и клинической картины была предпринята еще полвека назад, когда выделяли два типа болезни – бронхитический и эмфизематозный. Сегодня гетерогенность, характерная для данной патологии, поражает своим многообразием – начиная от морфологической картины и заканчивая прогнозом заболевания [42; 21]. Различные

клинические проявления хронической обструктивной болезни легких (фенотипы) свидетельствуют о различиях в клеточных механизмах развития данной патологии. Как уже упоминалось, воспаление при ХОБЛ носит характер комплексного иммунопатологического процесса, который включает ответные реакции врожденного и приобретенного иммунитета. Поддержание персистирующего воспаления в дыхательных путях при ХОБЛ сопровождается активацией воспалительных иммунокомпетентных клеток Т-хелперов. Популяция Th-клеток, включающая Th1, Th2, Th17 типы и др., посредством цитокинов активирует соответствующие эффекторные клетки, формируя определенный иммунорегуляторный путь [29; 52]. Важную роль в патофизиологии ХОБЛ играют цитокины, такие как интерлейкины (IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A), IFN- γ , TNF- α . Они определяют течение воспалительного процесса и создают условия для девиации типа Т-хелперного иммунного ответа [29; 52; 17; 431]. Воспаление, зависящее от Th1 типа клеток, развивается при прогрессировании ХОБЛ и сопряжено с гранулематозным инфильтративным типом воспаления. По некоторым данным, для ХОБЛ на начальных этапах наиболее характерен «нейтрофильный» тип воспаления, зависимый от Th17 типа клеток. Увеличение числа нейтрофилов и макрофагов в дыхательных путях и возрастание провоспалительных цитокинов, характеризуют формирование Th17 профиля, значительно повышающего риск обострений при ХОБЛ и ее прогрессирования [17; 493; 373].

Следует отметить, что при ХОБЛ встречаются как реакции гиперчувствительности Т-клеток, так и В-клеточный ответ против легочных аутоантигенов и инфекционных агентов, что в свою очередь обуславливает сложность и многообразие воспалительного процесса [37].

Детальное изучение регуляторных медиаторов системной воспалительной реакции в развитии ХОБЛ создает предпосылки для более точного понимания тех биологических механизмов, которые лежат в основе патологического процесса.

Это является важным фактором для разработки новых подходов диагностики и основой для фенотип-ориентированной противовоспалительной терапии.

С целью изучения зависимости между системным воспалением и клинико-функциональным фенотипом ХОБЛ проведено проспективное сравнительное исследование 83 пациентов ХОБЛ стабильного течения. Средний возраст пациентов составил $56,5 \pm 4,8$ года. Диагноз ХОБЛ выставлен в соответствии с Глобальной инициативой по хронической обструктивной болезни легких [478]. Исследование осуществлялось в соответствии с требованиями Хельсинкской декларации (пересмотр 2013 г.) с одобрения локального Биоэтического комитета на условиях добровольного информированного согласия.

Критерии включения: ХОБЛ легкой, средней и тяжелой степени тяжести стабильного течения, бронхитический и эмфизематозный фенотипы. Критериями исключения из исследования были: крайне тяжелая степень тяжести ХОБЛ, обострение ХОБЛ, наличие бронхиальной астмы, тяжелые декомпенсированные заболевания внутренних органов, наличие у пациентов острых и хронических инфекционно-воспалительных, аллергических и аутоиммунных заболеваний, гепатита алкогольной и вирусной этиологии, эндокринной патологии, ишемической болезни сердца, гипертонической болезни осложненного течения и выше 2 стадии, хронической сердечной недостаточности в стадии декомпенсации, наличие в анамнезе инфаркта миокарда или мозгового инсульта.

В зависимости от степени тяжести ХОБЛ сформированы 3 группы: в 1-ю группу вошли 27 пациентов легкой степени тяжести, во 2-ю группу – 35 пациентов средней степени тяжести и в 3-ю группу – 21 пациент тяжелой степени ХОБЛ. Распределение пациентов с учетом клинико-функционального фенотипа ХОБЛ (бронхитический и эмфизематозный) представлено на рисунке 4. Все пациенты ХОБЛ получали базисную терапию длительно действующими м-холиноблокаторами, а пациенты тяжелой степени ХОБЛ – длительно

действующие м-холиноблокаторы в сочетании с фиксированной комбинацией бета2-агонистов длительного действия и ингаляционных глюкокортикостероидов. У больных ХОБЛ, включенных в исследование из сопутствующей патологии в 21 % случаев диагностировали гипертоническую болезнь 2 стадии, неосложненного течения, в 37 % случаев – хронический поверхностный гастрит, не ассоциированный с *Helicobacter Pylori* и хронический дуоденит вне обострения, в 3 % случаев – хроническую язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе ремиссии.

В контрольную группу вошли 22 практически здоровых добровольца, некурящих, с нормальной функцией внешнего дыхания, средний возраст составил $52,0 \pm 3,4$ года.

Рис.4. Распределение пациентов в каждой группе ХОБЛ в зависимости от клинко-функциональных фенотипов

Клинико-лабораторное обследование проводили в соответствии со стандартами обследования пульмонологических больных. Для оценки симптомов основного заболевания проводилось тестирование с помощью валидизированных опросников: для оценки

выраженности одышки – модифицированный опросник mMRC (Modified British Medical Research Council) Британского медицинского исследовательского совета, для оценки влияния ХОБЛ на повседневную жизнь пациента и статус его здоровья – тест САТ (COPD Assessment Test).

Исследование функции внешнего дыхания проводилось на аппарате Master Screen Body (Care Fusion, Германия). Для определения степени тяжести ХОБЛ исследовали постбронходилатационные параметры: форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), ОФВ₁ и их расчетное соотношение (ОФВ₁/ФЖЕЛ). Для исследования обратимости обструкции использовали пробу с дозированным ингаляционным бронходилататором сальбутамолом в дозе 400 мкг. С помощью бодиплетизмографии исследованы статические легочные объемы и емкости: функциональная остаточная ёмкость (ФОЕ), остаточный объём лёгких (ООЛ), общая емкость легких (ОЕЛ), доля ООЛ в структуре ОЕЛ; а также бронхиальное сопротивление на вдохе и выдохе.

У пациентов ХОБЛ бронхитический фенотип выявлен в 45,8 % случаев (38 чел.), эмфизематозный тип – в 54,2 % (45 чел.). Бронхитический фенотип был установлен на основании клинической картины (кашель в основном в утренние часы с незначительным количеством слизистой мокроты) и данным бодиплетизмографии (отсутствие признаков «воздушной ловушки» и гиперинфляции). У пациентов с эмфизематозным фенотипом в клинической картине преобладала одышка при физической нагрузке, по данным бодиплетизмографии были выявлены признаки гиперинфляции (увеличение ФОЕ) и «воздушной ловушки» (увеличение ООЛ и доли ООЛ в структуре ОЕЛ).

Клиническая характеристика и распределение пациентов ХОБЛ с учетом степени тяжести и клинического фенотипа представлены в табл. 4. При ХОБЛ легкой степени тяжести (1 группа) преобладали пациенты с бронхитическим фенотипом (92,5 %), у которых в клинической картине доминирует продуктивный кашель и отсутствуют

Таблица 4

Клинико-функциональная характеристика пациентов с ХОБЛ в зависимости от фенотипа

Показатели	Группа контроля, n=22	ХОБЛ легкой степени (1-я группа), n=27		ХОБЛ средней степени (2-я группа), n=35		ХОБЛ тяжелой степени (3-я группа), n=21
		Бронхитический, 25 / 92,6	Эмфизематозный, 2 / 7,4	Бронхитический 13 / 37,1	Эмфизематозный 22 / 62,9	
Фенотип ХОБЛ, число пациентов n / %						Эмфизематозный 21 / 100
Статус курения, курящие/бывшие курящие	0/0	26/8	2/1	14/5	9/24	3/21
Индекс курения, пачек/лет	0	25,4 (19,4-29,7)	28,6 (20,2-32,1)	30,5 (25,3-35,1)	28,9 (23,2-34,8)	32,5 (27,5-37,8)
ОФВ ₁ после пробы с бронхолитиком	97,8 89,4 - 100,7	95,9 84,4 - 98,23	94,7 88,6-97,2	72,04*** 71,8 -75,8	#65,6 *** 57,63 -70,58	###42,4*** 39,08 -47,93
ОФВ ₁ /ФЖЕЛ после пробы	75,3 72,16-79,57	65,6 59,06-66,74	59,78 55,6-62,1	64,28 52,64-6,37	#54,74*** 49,09 -62,11	###43,05*** 39,88 -51,49
Бронх.сопротивление на вдохе, kPa*s/L	0,24 0,18-0,29	0,27 0,21-0,39	0,55 0,29-0,67	0,27 0,23 - 0,33	0,39 0,31 -0,5	0,34 0,3 -0,51
Бронх.сопротивление на выдохе, kPa*s/L	0,26 0,20-0,28	0,53 0,31-0,68	0,74 0,52-0,88	0,46 0,39-0,71	0,57 0,44- 0,81	0,34 0,3-0,51

Окончание таблицы 4

Е _{вдл} , % от должного	125 107,45-131,34	111 96,48-126,35	109,1 95,2-112,6	88,5 88,2 -94,8	85,7 78,95-103,48	#65,3 62,83-94,08
ФОВ, % от должного	105,6 101,13 -110,72	112,9 106,48 -123,75	166,9 142,6-178,8	109,35 100,65 -131,2	#148,3 135,88 -161,28	156,5 141 -214,78
ООЛ, % от должного	118,9 107,1-121,7	124,3 108,1-134,5	207,2 175,4-213,1	114,05 106,1 -122,4	#174,4 151,38 -199,98	#189 174,65- 262,23
ОЕЛ, % от должного	111,8 103,08- 119,23	111,8 103,08- 119,23	137,2 102,5-145,6	95,5 90,9-110,2	#122,3 109,78 -125,05	121,2 108,45 -145,25
ООЛ/ОЕЛ, %	102,4 93,28 - 108,9	104,7 95,18 - 111,7	144 124,7-161,2	115,65 99,5-122,5	#143,2 134,25 -152,13	#164 153,48 -171,38
САТ-тест, баллы	0	8,5 6 -12	9 7-15	13 11 -17	17 9 -21	18 13 -23
mMRC-тест, баллы	0	0 0-1	1 1-1	0 0-1	1 1-1	2 2-2
Количество обострений в течение года	0	0 0-1	1 1-1	1 1-1	1 1-2	2 2-3

Примечание: Данные представлены в виде медианы и диапазона квартильных значений.

Статистическая значимость различий относительно группы контроля: *** – $p < 0,001$. Статистическая значимость различий между фенотипами внутри группы ХОБЛ и между групп ХОБЛ средней и тяжелой степени с эмфизематозным фенотипом: # – $p < 0,05$, ## – $p < 0,01$, ### – $p < 0,001$.

признаки гиперинфляции и «воздушных ловушек». В 7,4 % случаев выявлены пациенты с эмфизематозным фенотипом, с одышкой при физической нагрузке, «воздушными ловушками» по данным бодиплетизмографии (увеличение ООЛ и доли ООЛ в структуре ОЕЛ) и признаками гиперинфляции (увеличение ФОЕ). У пациентов ХОБЛ легкой степени тяжести при эмфизематозном и бронхитическом фенотипах степень бронхиальной обструкции практически не отличалась. По результатам САТ-теста зарегистрированы невыраженные симптомы заболевания (менее 10 баллов) и количество обострений не более 1 в год.

При ХОБЛ средней степени тяжести (2 группа) доля пациентов с бронхитическим фенотипом снизилась до 37,1 %, а большинство (62,9 %) составили пациенты с эмфизематозным фенотипом. У пациентов ХОБЛ средней степени тяжести с эмфизематозным фенотипом наблюдались более выраженные признаки обструкции (ОФВ₁ ниже на 11 %, ОФВ₁/ФЖЕЛ – на 14 % ($p=0,04$) по сравнению с пациентами с бронхитическим фенотипом. У пациентов ХОБЛ средней степени независимо от фенотипа имелись выраженные симптомы заболевания (САТ-тест более 10 баллов), но качество жизни по данным САТ-теста у пациентов с эмфизематозным фенотипом на 24 % ниже, чем у пациентов с бронхитическим фенотипом.

При ХОБЛ тяжелой степени (3 группа) у всех пациентов имел место только эмфизематозный фенотип. У пациентов данной группы степень бронхиальной обструкции снижена по сравнению с пациентами с эмфизематозным фенотипом 2 группы (ОФВ₁ на 35%, ОФВ₁/ФЖЕЛ на 27 %, $p=0,003$). У пациентов 3-й группы емкость вдоха снижена на 31 % ($p=0,04$), ООЛ увеличен на 8 % ($p=0,04$), а доля ООЛ в структуре ОЕЛ – на 13 % ($p=0,001$) по сравнению с пациентами с эмфизематозным фенотипом 2-й группы, что свидетельствует о нарастании статической гиперинфляции у пациентов ХОБЛ тяжелой степени. Количество обострений в данной группе составило 2 и более в течение года.

Для выявления зависимости клинико-функционального фенотипа пациентов ХОБЛ от типа иммунного ответа проанализированы основные про- и противовоспалительные цитокины, определены коэффициенты их соотношения, на основании которых у обследованных пациентов установлены типы иммунного ответа на воспалительную реакцию (табл. 5).

При оценке показателей цитокинового статуса (табл. 5) в группе пациентов с ХОБЛ легкой степени тяжести в 50 % случаев отмечалось увеличение концентрации $\text{TNF-}\alpha$ в 2 раза ($p < 0,05$) и $\text{IFN-}\gamma$ в 3,1 раза ($p < 0,05$) и снижение уровня IL-4 в 1,7 раз ($p < 0,05$) по сравнению с контрольной группой. Высокая концентрация провоспалительного цитокина $\text{IFN-}\gamma$ и снижение IL-4 , выявленные у части пациентов с ХОБЛ легкой степени тяжести свидетельствуют об активации воспалительного процесса и указывают на дифференцировку наивных Т-лимфоцитов по Th1 -зависимому пути у данных пациентов. У такого же количества больных (50 %) ХОБЛ легкой степени тяжести наблюдалось повышение уровня провоспалительного IL-17A в 1,6 раз ($p < 0,05$) и противовоспалительного IL-10 в 1,3 раза ($p < 0,05$), снижение уровня IL-4 в 1,3 раза ($p < 0,05$) по сравнению с группой контроля, что указывало на формирование специфического цитокинового паттерна, приводящего к формированию Th17 типа иммунного ответа. Экспрессия $\text{TNF-}\alpha$ и $\text{IFN-}\gamma$ у данных пациентов незначительно увеличивалась по сравнению с группой контроля, но статистически значимо отличалась только у больных, дифференцируемых по Th1 пути иммунного ответа.

В группе больных ХОБЛ средней степени тяжести в 28 % случаев выявлен Th1 путь иммунного ответа за счет снижения уровня цитокина IL-4 в 1,4 раза ($p < 0,05$) и повышения продукции $\text{TNF-}\alpha$ в 1,3 раза ($p < 0,05$) и $\text{IFN-}\gamma$ в 1,5 раз ($p < 0,05$) по сравнению с контрольной группой. В 72 % случаев в данной группе пациентов отмечено статистически значимое повышение уровня IL-17A

и противовоспалительного цитокина IL-10 соответственно в 1,4 и 1,8 раза ($p < 0,05$), что характерно для Th17 типа иммунного ответа.

У всех пациентов ХОБЛ тяжелой степени диагностировали максимальные значения провоспалительного цитокина IL-17A (526,1-705,3 пг/мл, $p < 0,05$) и противовоспалительного – IL-10 (61,0-92,1 пг/мл, $p < 0,05$), что свидетельствует о преобладании Th17-зависимого пути.

Таблица 5

**Показатели цитокинового профиля у пациентов ХОБЛ
разной степени тяжести в зависимости от пути иммунного ответа**

Показатели, пг/мл	Группа контроля, n = 22	ХОБЛ легкой степени тяжести, n = 27		ХОБЛ средней степени тяжести, n = 35		ХОБЛ тяжелой степени, n = 21
		Th1-путь, n = 13	Th17-путь, n = 14	Th1-путь, n = 9	Th17-путь, n = 26	Th17-путь, n = 21
IL-4	77,9 (66,2-81,0)	45,4* (43,0-52,3)	59,3* (48,3-65,8)	56,2* (45,4-61,3)	62,4 (58,0-71,2)	81,2# (77,0-99,4)
IL-10	32,4 (31,1-33,7)	36,5 (29,0-41,0)	43,6* (36,3-46,1)	59,6* (52,4-62,4)	58,9* (40,3-66,7)	69,8# (61,0-92,1)
IL-17A	378,4 (360,0-395,1)	402,0 (352,0-412,0)	605,3*# (601,9-620,5)	419,7 (337,3-502,1)	541,1*# (508,1-725,0)	640,1*# (526,1-705,3)
TNF- α	46,3 (43,2-48,9)	93,0* (89,6-107,3)	59,4# (49,0-69,0)	59,9* (52,4-62,4)	55,7 (42,5-62,8)	70,2*# (60,0-94,0)
IFN- γ	103,5 (91,6-125,7)	325,3* (308,1-344,0)	125,9# (114,0-151,0)	155,2* (125,9-187,3)	110,2 (107,5-138,0)	108,0# (102,0-161,1)

Примечание. Данные представлены в виде медианы и диапазона квартильных значений.

* – $p < 0,05$ – достоверность различий относительно группы контроля (Манна–Уитни);

– $p < 0,05$ – статистическая значимость различий Th1- и Th17-путей относительно показателей группы больных ХОБЛ (Манна–Уитни).

На основании анализа цитокинового профиля, индексов баланса цитокинов установлено, что системное воспаление при бронхитическом фенотипе ХОБЛ регулируется преимущественно клетками Th1 (68 % случаев), при эмфизематозном фенотипе ХОБЛ – клетками Th17 типа иммунного ответа (86 % случаев) (рис. 5).

Рис. 5. Типы иммунного ответа у пациентов с бронхитическим и эмфизематозным фенотипами ХОБЛ (%)

В проведенном нами исследовании для пациентов с ХОБЛ легкой степени тяжести (ХОБЛ 1 ст.) с бронхитическим фенотипом в 50 % случаев определяется Th1 путь и в 40 % – Th17 путь иммунного ответа. При эмфизематозном фенотипе у пациентов ХОБЛ легкой степени тяжести (ХОБЛ 1 ст.) выявлен только Th17 путь иммунного ответа. У пациентов ХОБЛ средней степени тяжести (ХОБЛ 2 ст.) Th1 путь иммунного ответа выявлен в равных долях как при бронхитическом, так и при эмфизематозном фенотипе (по 14 %). При этом Th17 путь иммунного ответа имел место в 72 % случаев и только у больных с эмфизематозным фенотипом ХОБЛ. При ХОБЛ тяжелой

степени (ХОБЛ 3 ст.) у всех пациентов выявлен эмфизематозный фенотип и преобладание иммунного ответа по Th17 типу.

Для выявления зависимости клинического фенотипа у пациентов ХОБЛ разной степени тяжести от типа иммунного ответа проведен корреляционный анализ между показателями ФВД, исследуемыми цитокинами и индексами баланса цитокинов. У пациентов с преобладанием Th1 типа иммунного ответа выявлена сильная обратная корреляционная связь между противовоспалительным цитокином IL-10, отношением IFN- γ /IL-4 и функциональной остаточной емкостью легких ($r = -0,9$; $p = 0,037$) и между TNF- α и соотношением ООЛ/ОЕЛ ($r = -0,9$; $p = 0,037$). Обратная корреляционная связь позволяет сделать вывод, что увеличение этих цитокинов ассоциировано с уменьшением гиперинфляции и «воздушных ловушек». Это свидетельствует о том, что цитокины, формирующие Th1 путь иммунного ответа, не способствуют развитию гиперинфляции у пациентов ХОБЛ. На наш взгляд, значимое воздействие в данном случае оказывает компенсаторное повышение уровня IL-10, являющееся ответной реакцией на воспалительный процесс на ранних этапах развития ХОБЛ. Основными продуцентами являются Treg клетки, обеспечивающие подавление воспалительной реакции путем продуцирования IL-10.

У пациентов с ХОБЛ с преобладанием Th17 типа иммунного ответа выявлена прямая корреляционная связь между провоспалительным цитокином IL-17A и ОФВ₁ ($r = 0,75$; $p = 0,003$) и отношением ОФВ₁/ФЖЕЛ ($r = 0,65$; $p = 0,039$), т.е. увеличение этого цитокина способствует активации нейтрофилов и макрофагов в месте воспаления и развитию бронхиальной обструкции; обратная связь выявлена между IFN- γ /IL-17A и ФОЕ ($r = -0,58$; $p = 0,037$), что свидетельствует о влиянии поляризации Т-хелперного ответа по 17 типу на формирование гиперинфляции у больных ХОБЛ. По данным ряда авторов, одним из значимых проявлений Th17 типа иммунного ответа является смещение регуляторного баланса Th17/Treg, что обеспечивается конкурентными взаимоотношениями этих субпопуляций.

Дефицит регуляторных Т-клеток при ХОБЛ возрастает по мере прогрессирования патологии, что усугубляет ситуацию и способствует хронизации заболевания [156; 294; 463; 536].

Проведенное исследование показало, что по мере нарастания бронхиальной обструкции у пациентов с бронхитическим фенотипом ХОБЛ постепенно снижается количество цитокинов, продуцируемых Th1 клетками и происходит активация Th17 лимфоцитов, играющих важную роль в поддержании хронической воспалительной реакции. У пациентов с эмфизематозным фенотипом не зависимо от степени тяжести ХОБЛ преобладает иммунный ответ по Th17 типу, при котором провоспалительный цитокин IL-17A способствует активации легочных фибробластов, эпителиальных клеток и клеток гладкой мускулатуры бронхов. После активации эти клетки экспрессируют цитокины (IL-6, IL-8) и фактор G-CSF, вызывающие инфильтрацию дыхательных путей нейтрофилами и усиление их пролиферации. Выполняя свои эффекторные функции, они погибают, высвобождая большое количество биологически активных веществ (нейтрофильная эластаза, катепсин G, протеиназа 3 и матриксные металлопротеиназы), разрушающих паренхиму легких, тем самым снижая их функцию и усиливая хемотаксис иммунных клеток в очаг воспаления. Увеличение количества Th17 клеток ведет к пролонгации врожденного иммунного ответа и, как следствие, к усугублению воспаления при ХОБЛ [431; 279]. Таким образом, у пациентов с эмфизематозным фенотипом ХОБЛ и преобладанием Th17 пути иммунного ответа характерна более тяжелая степень бронхиальной обструкции, преобладание выраженных клинических симптомов заболевания по данным САТ-теста и частоты обострений заболевания в течение года по сравнению с пациентами с бронхитическим фенотипом и преобладанием Th1 пути иммунного ответа.

Определение фенотипа ХОБЛ и типа иммунного ответа уже на ранней стадии заболевания позволит прогнозировать течение и обосновать выбор фенотип-ориентированной терапии.

Прогнозирование риска развития обострений у больных ХОБЛ

В последние годы активно ведутся исследования по разработке способов ранней диагностики и прогнозирования течения ХОБЛ. В Глобальной стратегии диагностики, лечения и профилактики ХОБЛ выбор необходимого лечения основан на спирометрической классификации, клинической картине заболевания и риске развития обострений [478]. В то же время риск развития обострений является субъективным критерием, не подтвержденным лабораторной доказательной базой. Кроме того, выбор лечения не учитывает персонифицированный иммунологический фенотип воспаления, что не позволяет прогнозировать течение заболевания у этой категории пациентов.

Как уже упоминалось, в патогенезе ХОБЛ важным звеном является дисбаланс клеточного и гуморального звеньев иммунного ответа, обуславливающих «неадекватное течение» воспалительной реакции. Проведенные во Владивостокском филиале исследования позволили определить местный и системный цитокиновый профиль у больных ХОБЛ, которые, в свою очередь, определяют иммунологический фенотип системной воспалительной реакции [17; 43]. Поддержание персистирующего воспаления в дыхательных путях при ХОБЛ сопровождается преимущественно накоплением Т-лимфоцитов Th1 типа, главным регуляторным цитокином которых является IFN- γ , активирующий макрофаги и усиливающий фагоцитарную реакцию. Однако на начальных этапах тканевого воспаления и для защиты слизистых наиболее важен иммунный ответ, развивающийся по Th17 фенотипу. Дифференцировка Th17 клеток индуцируется интерлейкинами 17А и 21. Причем Th17 сами способны продуцировать IL-21, который образует аутокринную петлю и приводит к увеличению продукции IL-17А. С уровнем экспрессии IL-17А, по данным проведенных исследований, связана степень осложнения заболеваний бронхолегочной системы.

Нами сделана попытка определения риска развития обострений у пациентов с ХОБЛ разной степени тяжести по характеру адаптивного иммунного ответа для разработки медицинской технологии прогнозирования течения ХОБЛ.

На условиях информированного добровольного согласия в исследование включили 112 больных ХОБЛ (59 мужчин и 53 женщины, средний возраст $59,3 \pm 3,4$ лет). Группу контроля составили 32 человека (24 мужчины и 18 женщин, средний возраст $52,4 \pm 3,6$ лет), не имеющие хронической бронхолегочной патологии и аллергических заболеваний, с нормальной функцией внешнего дыхания, подтвержденной соответствующими клиническими и функциональными методами обследования.

Среди обследованных пациентов 36 человек имели легкую степень тяжести ХОБЛ (ОФВ₁ $86,3 \pm 2,1$ % и ОФВ₁ /ФЖЕЛ $67,6 \pm 1,5$ %), средняя длительность заболевания $9,7 \pm 2,3$ года, средний возраст $56 \pm 3,2$ лет. У 52 пациентов диагностирована ХОБЛ средней степени тяжести (ОФВ₁ $68,2 \pm 4,1$ % и ОФВ₁ /ФЖЕЛ $61,2 \pm 2,1$ %), средний возраст $59,2 \pm 2,9$ лет с длительностью заболевания $12,8 \pm 3,1$ лет. Остальные 24 обследованных имели тяжелое течение заболевания (ОФВ₁ $43,9 \pm 2,1$ %, ОФВ₁/ФЖЕЛ $57,3 \pm 2,1$ %), средний возраст $62,8 \pm 4,1$ года и среднюю длительность заболевания $18,2 \pm 2,5$ лет.

О характере течения и риске развития обострений у пациентов ХОБЛ судили по соотношению Th17/Th1. Соотношения цитокинов рассчитывали по формуле:

$$\text{Th17/Th1} = (\text{IL-17A} + \text{IL-21}) / (\text{IFN-}\gamma + \text{TNF}\alpha), \text{ где:}$$

- IL-17A и IL-21 – регуляторные цитокины Th17 клеток;
- IFN γ и TNF α – регуляторные цитокины Th1 клеток

У пациентов ХОБЛ разной степени тяжести выявлены изменения баланса цитокинов, характерных как для Th1, так и для Th17 типов иммунного ответа, которые формируются за счет активации различных клеток-эффекторов (табл. 6). По результатам анализа пациенты с легкой, средней и тяжелой степенью ХОБЛ были разделены на

две группы в зависимости от уровня цитокинов, характеризующих основные эффекторные Т-клетки. В первой группе – пациенты, имеющие активность цитокинов-индукторов Th1 клеток, во второй – Th17.

Среди больных ХОБЛ легкой степени тяжести преобладали пациенты с Th1 типом иммунного ответа (67 %, $p<0,05$), 33 % в этой группе ($p<0,001$) составили больные с Th17 типом воспаления. Среди больных ХОБЛ среднетяжелого течения Th1 тип иммунного ответа установлен в 46 % ($p<0,05$) и Th17 тип воспаления – в 54 % ($p<0,001$) случаев. В группе больных с тяжелым течением ХОБЛ у 75 % больных выявлен Th17 фенотип воспаления ($p<0,001$), против 25 % пациентов с Th1 фенотипом иммунного реагирования ($p<0,001$).

Таблица 6

Уровень секреции цитокинов для Th1 и Th17 клеток у пациентов с ХОБЛ ($M\pm m$)

Показатели Обследуемые	IL-21, пг/мл	IL-17, пг/мл	TNF α , пг/мл	IFN γ , пг/мл	IL-17A+ IL-21/ IFN γ + TNF α , у.е
Здоровые n=32	76,81 $\pm$ 0,52	338,37 $\pm$ 2,02	46,37 $\pm$ 0,33	106,56 $\pm$ 1,9	1,27 $\pm$ 0,01
ХОБЛ I (Th1), n=24	82,84 $\pm$ 1,69	435,15 $\pm$ 15,58	96,06 $\pm$ 1,99**	325,39 $\pm$ 4,79**	1,23 $\pm$ 0,03
ХОБЛ I (Th17), n=12	200,67 $\pm$ 15,82**	609,28 $\pm$ 3,62**	59,31 $\pm$ 14,06	143,65 $\pm$ 12,74*	*3,90 $\pm$ 0,01
ХОБЛ II (Th1), n=24	66,08 $\pm$ 3,45	424,85 $\pm$ 17,93*	59,09 $\pm$ 0,97	152,86 $\pm$ 8,81*	2,31 $\pm$ 0,02
ХОБЛ II (Th17), n=28	209,21 $\pm$ 8,03**	464,15 $\pm$ 32,37*	57,31 $\pm$ 2,87	115,43 $\pm$ 2,94	*3,90 $\pm$ 0,02
ХОБЛ III (Th1), n=6	51,5 $\pm$ 2,02*	364,45 $\pm$ 35,42	146,79 $\pm$ 0,62**	195,64 $\pm$ 2,34**	1,24 $\pm$ 0,04
ХОБЛ III (Th17), n=18	253,6 $\pm$ 27,02**	623,58 $\pm$ 69,75**	73,44 $\pm$ 10,07**	117,0 $\pm$ 33,21	**4,60 $\pm$ 0,02

Примечание: * – $p<0,05$; ** – $p<0,001$ достоверность различий в сравнении с группой здоровых.

Ответ по Th1 типу связан с активацией макрофагов и выработкой IFN- γ . При ответе по Th17 типу иммунного ответа активируются нейтрофилы, эпителиальные клетки и синтез IL-17A, IL-21. У пациентов ХОБЛ Th17 инфекционно-зависимый тип иммунного воспаления характеризовался выраженными нарушениями бронхиальной проходимости, рецидивирующим течением и высоким риском обострений заболевания. У пациентов с легким стабильным течением заболевания преобладал Th1 тип, у пациентов среднетяжелого течения ХОБЛ встречался как Th1-, так и Th17 тип, а у пациентов тяжелого течения ХОБЛ диагностировали в основном Th17 тип иммунного ответа.

Статистически значимая величина показателя $(IL17A+IL21)/(IFN\gamma+TNF\alpha)$ по отношению к группе здоровых выявлена только у пациентов с преобладанием Th17 типа иммунного ответа, независимо от степени тяжести ХОБЛ, и составила не менее 3,9 у.е. Статистически значимого значения соотношения $(IL17A+IL21)/(IFN\gamma+TNF\alpha)$ по отношению к группе здоровых у пациентов с преобладанием Th1 типа иммунного ответа, независимо от степени тяжести ХОБЛ, не выявлено.

В результате динамического наблюдения пациентов ХОБЛ в течение года установлено, что у пациентов с преобладанием цитокинов, свидетельствующих о девиации Th17 типа иммунного ответа и величины соотношения $Th17/Th1 \geq 3,90$ у.е., обострения заболевания составили более 2 раз в году, что согласно GOLD соответствует высокому риску обострения заболевания. Так, в течение года наблюдения у пациентов ХОБЛ легкой степени тяжести с Th17 типом иммунного реагирования количество обострений заболевания составили $2,3 \pm 0,2$ раза, при среднетяжелом течении ХОБЛ – $2,6 \pm 0,4$ раза и при тяжелой степени ХОБЛ – $2,9 \pm 0,5$ раз. У пациентов ХОБЛ с преобладанием цитокинов, свидетельствующих о девиации Th1 типа иммунного ответа и величины соотношения $Th17/Th1 \leq 3,89$ у.е., обострения

заболевания составили менее 2 раз в году, что согласно GOLD соответствует благоприятному течению и низкому риску обострения заболевания.

Полученные результаты доказали, что, определяя характер адаптивного иммунного ответа, можно прогнозировать течение ХОБЛ на разных стадиях его развития. По результатам проведенного исследования разработан «Способ прогнозирования инфекционного осложнения ХОБЛ» [44].

Роль эндоканнабиноидной системы в регуляции иммунного ответа

Важным звеном, участвующим в регуляторных механизмах иммунометаболического ответа клетки и опосредующим интенсивность воспалительных процессов, является особая сигнальная система – эндоканнабиноидная. Данная система является универсальной сигнальной системой, возникшей на ранних этапах эволюции и выполняющей важные регуляторные функции в организме всех позвоночных. Эндогенная каннабиноидная система включает в себя нейротрансмиттеры или эндоканнабиноиды, каннабиноидные рецепторы для психоактивного ингредиента марихуаны Δ^9 -тетрагидроканнабинола (Δ^9 -ТГК), а также ферментативные системы, участвующие в их синтезе, транспорте, метаболизме и деградации. Данная сигнальная система играет важную роль в регуляции функций мозга и физиологических процессов в организме, модулирует функции автономной нервной системы, иммунной системы и микроциркуляции [290]. Научный интерес к каннабиноидам возник в 60-е годы XX века, когда был обнаружен компонент конопли Δ^9 -ТГК. В конце 80-х годов в ткани мозга были выявлены специфические участки связывания для ТГК [213].

Эндоканнабиноиды являются эндогенными лигандами каннабиноидных рецепторов и представляют собой биоактивные липиды, высвобождаемые из клеточной мембраны при активации клетки. Эндоканнабиноиды включают в себя амиды, сложные эфиры и эфиры длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот. Наиболее изучены два эндоканнабиноида, являющихся производными арахидоновой кислоты – анандамид (N-арахидоноилэтаноламин) и 2-арахидоноилглицерол (2-АГ) [396]. В настоящее время детально исследованы каннабиноидные рецепторы периферического типа CB1 и CB2 (cannabinoid receptor 1 (CB1) и 2 (CB2)).

Однако последние научные данные свидетельствуют о существовании других каннабиноидных рецепторов, связанных с G-белками, которые расположены в ЦНС, кишечнике, печени, костях, скелетных мышцах и жировой ткани (например, GPR18, GPR55, GPR119 и ряд других) [309] (Рис. 6).

Рис. 6. Рецепторы эндоканнабиноидной системы и их локализация

Рецепторы CB1 экспрессируются в областях мозга, ответственные за двигательные и когнитивные функции, память, способность к обучению и развитие положительных эмоций. Данные рецепторы обнаружены в структурах головного и спинного мозга, участвующих в регуляции гомеостаза и репродукции, температуры тела, сна и бодрствования, периферических и висцеральных ощущений [474].

Активация рецепторов CB1 на концах бронхиального нерва оказывает бронхолитическое действие. Эндоканнабиноидные CB1 рецепторы также вовлечены в модуляцию энергетического гомеостаза [127] и присутствуют в периферических органах, участвующих в энергетическом обмене [236; 440]. CB1 рецепторы экспрессируются в белой и бурой жировой тканях, печени, скелетных мышцах и поджелудочной железе.

Рецепторы CB2 локализируются в лимфоидных органах, клетках иммунной системы и обладают иммунорегуляторными функциями. Экспрессия CB2 была зарегистрирована для В-клеток, моноцитов/макрофагов и эозинофилов. Активация CB2 рецептора приводит к снижению синтеза лейкотриенов и миграции лейкоцитов, а также снижению уровня Т-хелпера 2 (Th2) [309]. По данным МР. Motwani и соавт., селективный агонист CB2 рецептора продемонстрировал сильную противовоспалительную активность, опосредованную ингибированием хемоаттрактанта лейкоцитов лейкотриена В4 и антифагоцитарных простаноидов PGE2, тромбоксана В2 и простагландина F2 α [377].

Компоненты данной системы широко экспрессируются во многих центральных и периферических тканях и участвуют во множестве физиологических процессов. Хотя основные исследования, направленные на изучение вопросов функционирования эндоканнабиноидной системы, были акцентированы в области неврологии и психиатрии, многочисленные научные данные продемонстрировали важность данной системы при различных заболеваниях. Активно изучается терапевтический потенциал фитоканнабиноидов и эндоканнабиноидов при различных заболеваниях, таких как рак [212], болезнь Альцгеймера [310], рассеянный склероз [126], сердечно-сосудистые заболевания [219], хроническая боль [321], ожирение [415] и БА [132, 436].

Фармакология эндоканнабиноидов продолжает расширяться за счет идентификации новых сигнальных путей. Так, в дополнение к рецепторам CB оба эндоканнабиноида могут также связывать

и активировать некоторые ваниллоидные рецепторы, кроме того, 2-АГ является агонистом для нескольких подтипов семейства ядерных рецепторов PPAR [328]. Лиганды каннабиноидного рецептора также обнаружены в фитоканнабиноидах, в частности, Δ^9 -тетрагидроканнабиноле, продуцируемом растением каннабис [180].

Помимо большого количества лигандов и потенциальных рецепторов, сложность каннабиноидной передачи сигналов обусловлена часто наблюдаемым смещенным агонизмом (один рецептор демонстрирует предпочтение передачи сигналов среди его возможных путей). Кроме того, каннабиноидные рецепторы способны образовывать гетеромеры друг с другом или с другими рецепторами, связанными с G-белком [244].

Биосинтетические и катаболические пути метаболизма для обоих эндоканнабиноидов были детально изучены в последние годы [237]. Схема биосинтеза эндоканнабиноидов представлена на рисунке 7. Ферментативные системы, участвующие в синтезе, транспорте, метаболизме и деградации эндоканнабиноидов, включают ферменты, к которым относятся гидролизующая фосфолипаза D (hydrolyzing phospholipase D (NAPE-PLD)), N-ацил-фосфатидилэтаноламин-(N-acyl-phosphatidylethanolamine-(NAPE-)) и амид-гидролаза жирных кислот (fatty acid amide hydrolase (FAAH)), отвечающая за биосинтез и деградацию анандамида соответственно; sn-1-селективная диацилглицерол-липаза (sn-1 selective diacylglycerol lipase (DAGL)) и моноацилглицерол-липаза (monoacylglycerol lipase (MAGL)) ответственные за образование и гидролиз 2-АГ [172]. Таким образом, несмотря на то, что субстратом для биосинтеза обоих эндоканнабиноидов являются фосфолипиды (ФЛ), содержащие арахидоновую кислоту [20; 488], их уровни регулируются по-разному [100]. Повышенная экспрессия цистеинил лейкотриеновых рецепторов и синтетических ферментов направляет АК к провоспалительному 5-липоксигеназному пути, увеличивая выработку воспалительных лейкотриенов.

АК также образуется путем расщепления эндоканнабиноида и СВ2 лиганда 2-АГ амид-гидролазой жирных кислот или моноацилглицерол-липазой [396]. 2-АГ может служить субстратом для ферментов, которые метаболизируют свободную АК, включая COX2 и некоторые подтипы липоксигеназы [525].

Хотя эндоканнабиноиды могут быть измерены как в плазме, так и в сыворотке крови, есть доказательства того, что концентрации анандамида выше в сыворотке, чем в плазме, а концентрации 2-АГ более надежно измеряются в сыворотке [237]. Эндоканнабиноиды также могут быть количественно определены в других биологических образцах, включая слюну [194], волосы [173], сперму, грудное молоко и амниотическую жидкость [289]. Измерение уровня эндоканнабиноидов в данных биологических образцах встречаются в литературе гораздо реже, чем измерения в крови, однако они могут иметь важные преимущества в силу более легкой доступности получения.

Уровни циркулирующих эндоканнабиноидов значительно увеличиваются при ряде заболеваний, патогенетическим механизмом которых является системное воспаление. Например, уровни 2-АГ и анандамида повышаются при эндотоксическом шоке, циррозе печени, хроническом гепатите С и атеросклерозе [236]. Изучение эндогенных каннабиноидов, обнаружение путей их биосинтеза и высвобождения, мембранного транспорта и деградации привело к открытию основных биологических эффектов эндоканнабиноидной системы в организме [30; 31; 131; 171; 488]. В настоящее время известно, что эндоканнабиноиды способны регулировать различные физиологические процессы: поддержание тонуса гладкой мускулатуры сосудов и половых органов, агрегацию и адгезию тромбоцитов, свертываемость крови, высвобождение биологически активных веществ – медиаторов воспаления – цитокинов, эйкозаноидов, метаболитов оксида азота, монооксида углерода [25; 286].

Эндоканнабиноиды определяют выживаемость клеток, стимуляцию или подавление их роста, дифференциацию, функциональную

активность иммунного ответа [207; 457]. Все эти данные свидетельствуют о разнообразии биологических функций эндоканнабиноидной системы.

Рис. 7. Биохимический путь образования и деградации эндоканнабиноидов и биоактивных метаболитов арахидоновой кислоты

Однако роль эндоканнабиноидной системы в регуляции системного воспалительного процесса в настоящее время исследована недостаточно. Данная глава посвящена представлениям об эндоканнабиноидах, их рецепторах, механизмах действия и их роли в патофизиологии обструктивных заболеваний органов дыхания. Обсуждаются терапевтические перспективы и сложности, связанные с применением эндоканнабиноидов в медицине.

Экспрессия эндогенных каннабиноидных рецепторов в условиях активации иммунной системы

Локализация эндогенных каннабиноидных рецепторов. Локализация эндогенных рецепторов на иммунокомпетентных клетках изучалась в Лаборатории биомедицинских исследований НИИМКВЛ. Экспрессия каннабиноидных рецепторов на мононуклеарных лейкоцитах (МЛ) оценивалась при помощи соответствующих антител (Santa Cruz Biotechnology, США), результаты анализировались методом проточной цитофлюорометрии на проточном цитометре «FACSCalibur» (Becton Dickinson, США). Гейт (окно) популяции клеток устанавливали на основе комбинации прямого и бокового светорассеяния и размера клеток. При учете результатов подсчитывали 10 000 клеток в гейте.

В исследовании принимали участие 28 здоровых добровольцев в возрасте 23-55 лет ($32,2 \pm 8,2$ лет), из них 9 мужчин и 19 женщин. Цитометрический анализ мононуклеарных лейкоцитов здоровых доноров показал, что содержание клеток, экспрессирующих на своей поверхности дифференцирующий антиген к рецептору CB₂, составило более 90 % от всех исследуемых клеток, что свидетельствует об экспрессии CB₂ рецептора на поверхности МЛ. В то же время МЛ, экспрессирующие дифференцирующий антиген к CB₁ рецептору не были обнаружены (рис. 8). В связи с этим, наличие CB₂ рецепторов на МЛ может служить маркером лейкоцитарного пула клеток.

Рис. 8. Цитофлуориметрическое определение эндоканнабиноидных CB_2 -рецепторов у здоровых доноров

Примечание: А – гистограмма МЛ; Б – распределение МЛ по популяциям;

- I. Анализ проводился без использования гейтирования по рецепторам (CB_1 , CB_2);
- II. Анализ проводился с использованием гейтирования по CB_1 -рецептору;
- III. Анализ проводился с использованием гейтирования по CB_2 -рецептору

Ранее в исследованиях НИИМКВЛ было выявлено, что синтетические лиганды каннабиноидных рецепторов (WIN55,212-2 и анандамид) *in vitro* модулируют сигнальную функцию клеток иммунной системы через рецептор CB_2 [13; 14; 25; 28; 31]. Возможно, что интенсивность иммунного ответа опосредована активностью экспрессии CB_2 рецептора, подавляющего выработку провоспалительных цитокинов.

Для установления особенностей экспрессии CB_2 рецептора на иммунокомпетентных клетках при различных состояниях проведена стимуляция иммунной системы *in vivo* нагрузочными тестами [26; 31; 32]. Из совокупности современных методов, стимулирующих иммунный ответ, было выбрано два биофизических метода: обогащение

крови озono-кислородной смесью и интракорпоральное облучение крови. По данным ранее проведенных в НИИМКВЛ исследований оба метода влияют на изменение секреции цитокинов, активность клеток эндотелия микрососудов, сосудистых макрофагов, внутрисосудистых лейкоцитов и тромбоцитов, различных стромальных клеток в зоне микроциркуляторного русла. Иммуностимулирующий эффект *интракорпорального облучения крови* проявляется в поглощении клетками фотонов и переходе их в возбужденное состояние в результате как прямого взаимодействия энергии кванта с веществом клетки, так и изменения структуры липидного бислоя цитомембраны, увеличения биосинтеза нуклеиновых кислот, сигнальных молекул, активности экспрессии ферментов. Кроме того, образующиеся в крови фрагменты разрушенных и вновь синтезируемых белков могут играть роль антигенов, вызывая соответствующие иммунные реакции в организме. *Внутривенное введение озono-кислородной смеси* сопровождается повышением содержания озонидов в крови, способствующих окислению макромолекул (белки, липиды, ДНК), образованию пероксидов, которые и участвуют в развитии воспалительного процесса. В свою очередь, стимуляция клеток иммунной системы озонидами приводит к активации синтеза провоспалительных медиаторов (лейкотриены, простагландины), которые также обеспечивают формирование воспаления.

В зависимости от метода стимуляции были сформированы две группы. В 1-ую группу вошли лица, получавшие световую иммуностимуляцию (15 человек, из них 6 мужчин и 9 женщин). Лица, получавшие озонотерапию, составили 2-ую группу (13 человек, из них 3 мужчин и 10 женщин). Забор периферической крови проводили до облучения крови или введения озono-кислородной смеси и через три часа после процедуры. Как ранее было показано, при стимуляции *in vivo* увеличение концентрации провоспалительных цитокинов в крови наступает через 3 часа.

Исследование иммунологических и гематологических параметров периферической крови здоровых доноров показало прямое воздействие интракорпорального облучения крови и внутривенного введения озонированного физиологического раствора на активность иммунного ответа (табл.7).

Таблица 7

Динамика иммунологических параметров у здоровых доноров до и после стимуляции физическими методами ($M \pm m$)

Параметры	До воздействия физических методов, n=28	После воздействия физических методов	
		Группа 1 Интракорпоральное облучение крови, n=15	Группа 2 Внутривенное введение озоноркислородной смеси, n=13
Лейкоциты, Г/л	6,0±0,28	8,8±0,36*	7,6±0,28
Лимфоциты, %	27,5±1,34	29,5±1,58***	28,5±1,04**
CD3, %	45,0±4,9	49,77±1,57*	46,81±6,9
CD4, %	40,0±3,13	44,08±1,89	42±3,13
CD8, %	22±1,21	20,82±1,07	20±1,81
CD4/CD8, у.е.	1,8±0,08	2,20±0,05	2,1±0,01
CD22, %	24,85±1,3	28,5±1,47	26,85±2,3
CD16, %	17,5±1,06	19,28±1,26	18,9±2,12
CD25, %	9±0,8	12,55±1,05***	11,04±0,08**
HLA-DR, %	11,2±0,5	13,18±0,65**	12,2±0,15*
Фагоцитоз, %	60,2±1,41	88,5±1,46***	78,2±1,81***
ФР, у.е.	1,04±0,01	1,23±0,03***	1,22±0,02***
НСТ, %	13±1,07	17,6±0,75***	16±1,04***
НСТР, у.е.	1,31±0,74	1,83±0,09	1,61±0,24
ИАН, у.е.	0,12±0,03	0,18±0,01	0,16±0,05
ИАНР, у.е.	2,8±0,92	1,92±0,12	1,8±0,22
TNF-α, пг/мл	23±1,6	64,2±8,1***	43±4,6***
IL-8, пг/мл	115±12,6	218±22,8***	188±32,4***

Примечание: Достоверность в сравнении с группой до воздействия физических методов; *- $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$; *** - $p < 0,001$.

В обоих случаях при активации иммунной системы наблюдалось статистическое значимое повышение уровня провоспалительных цитокинов, количества клеток белой крови и фагоцитирующих нейтрофилов. Выбранные нами два метода, независимо от механизма их действия, имели однонаправленный эффект на реактивность иммунокомпетентных клеток.

Индукцирование клеток иммунной системы *in vivo* привело к снижению числа клеток экспрессирующих СВ₂ рецептор. В 1-ой группе после интракорпорального облучения крови наблюдалось снижение экспрессии СВ₂ рецептора на 30 % ($p < 0,001$), количество клеток, имеющих СВ₂ рецептор, составило менее 60 % (рис. 9).

Рис. 9. Экспрессия СВ₂-рецепторов после интракорпорального облучения крови

Примечание: А – гистограмма МЛ; Б – распределение МЛ по популяциям;

I. Анализ проводился без использования гейтирования по рецептору СВ₂;

II. Анализ проводился с использованием гейтирования по СВ₂ рецептору;

III. Анализ проводился с использованием гейтирования по СВ₂ рецептору после интракорпорального облучения крови.

Во 2-ой группе после внутривенного введения озono-кислородной смеси количество клеток, содержащих СВ₂ рецептор, также снизилось и не превышало 70 % ($p < 0,001$) (рис. 10).

Рис. 10. Экспрессия СВ₂ рецепторов после внутривенного введения озono-кислородной смеси

Примечание: А – гистограмма МЛ; Б – распределение МЛ по популяциям;

I. Без использования гейтирования по рецептору СВ₂;

II. С использованием гейтирования по СВ₂ рецептору;

III. С использованием гейтирования по СВ₂ рецептору после внутривенного введения озono-кислородной смеси

Таким образом в двух группах наблюдения отмечается снижение числа клеток, экспрессирующих СВ₂ рецептор. Вероятно, что такая однонаправленная реакция иммунной системы, независимо от механизма действия эффектора, свидетельствует об универсальности механизма иммунного ответа на флогген и формирование воспалительной реакции. В условиях нормы повышенная экспрессия СВ₂ рецептора способствует сохранению физиологического баланса между

синтезом про- и противовоспалительных медиаторов. Снижение экспрессии СВ₂ рецептора запускает программу лимитирования функции эндоканнабиноидной системы, что, напротив, приводит к активации иммунной системы.

Учитывая, что СВ₂ рецепторы обладают иммунодепрессирующим действием на синтез провоспалительных медиаторов, снижение их экспрессии под действием экзогенных иммуностимуляторов является первичной реакцией организма, которая запускает воспалительную реакцию и активирует иммунную систему. Возможно гиперреактивность иммунного ответа обусловлена активацией синтеза эндоканнабиноидов, обладающих блокирующим действием на экспрессию СВ₂ рецепторов.

Полученные данные свидетельствуют о значимой роли эндоканнабиноидной системы в регуляции иммунного ответа и могут быть использованы для разработки новых эффекторов, сдерживающих процесс воспаления через СВ₂ рецептор.

Регуляция воспалительной реакции каннабиноидными рецепторами при хронической обструктивной болезни легких

Исследован характер интеграции иммунной и эндоканнабиноидной систем в условиях воспаления у больных ХОБЛ различной степени тяжести. Обследовано 65 человек: 37 человек с диагнозом ХОБЛ I, II стадии в ремиссии, подтвержденном клиническими и лабораторными методами обследования и 28 здоровых добровольцев в возрасте 23-55 лет ($32,2 \pm 8,2$ лет), не курящих, с нормальной функцией внешнего дыхания (контрольная группа). Бронхиальная проходимость оценивалась по показателям ОФВ₁ и ФЖЕЛ, индексу ОФВ₁/ФЖЕЛ. За бронхиальную обструкцию принимались показатели ОФВ₁ < 80% и ОФВ₁/ФЖЕЛ < 70%. Среди больных ХОБЛ у 21 пациента установлена легкая степень нарушений функции внешнего дыхания – ОФВ₁ ($79,6 \pm 2,1$ %) и ОФВ₁/ФЖЕЛ ($77,6 \pm 1,5$ %),

средняя длительность заболевания у них была $7,2 \pm 1,8$ года, средний возраст $43,0 \pm 1,0$ лет. Показатели ОФВ1 ($58,2 \pm 4,1$ %) и ОФВ1/ФЖЕЛ $66,2 \pm 2,1$ %, соответствующие средней степени нарушений ФВД, имели 16 пациентов среднего возраста ($55,1 \pm 3,1$ лет) с длительностью заболевания $13,4 \pm 3,5$ года.

Активность воспалительного процесса оценивали по состоянию цитокинового статуса. Изучали содержание в сыворотке крови $\text{TNF}\alpha$, рецептора к $\text{TNF}\alpha$ I (s- $\text{TNF}\alpha$ RI (p55)), IL-8, основного фактора роста фибробластов (bFGF), трансформирующего фактора роста $\beta 1$ (TFG $\beta 1$).

Исследование цитокинового статуса у больных ХОБЛ выявило гиперцитокинемию (табл. 8).

Таблица 8

**Уровень цитокинов в сыворотке крови пациентов с ХОБЛ
в фазе ремиссии ($M \pm m$)**

Цитокины, пг/мл	Контрольная группа (здоровые), n = 28	Больные с ХОБЛ I стадии, n=21	Больные с ХОБЛ II стадии, n = 16
$\text{TNF}\alpha$	$2,6 \pm 0,1$	$4,3 \pm 0,3^{***}$	$*7,3 \pm 0,5^{***}$
s- $\text{TNF}\alpha$ RI (p55)	$789,1 \pm 7,1$	$1523,4 \pm 11,0^{***}$	$2269,2 \pm 13^{***}$
IL-8	$11,5 \pm 1,9$	$13,4 \pm 1,6$	$**5,8 \pm 0,9^*$
bFGF	$38,3 \pm 0,8$	$53,9 \pm 0,3^{***}$	$51,1 \pm 0,4^{***}$
TFG β	$1865,4 \pm 11,3$	$48145,0 \pm 20,6^{***}$	$42133,1 \pm 10,1^{***}$

Примечание: (*) – справа статистическая значимость различий относительно контрольной группы, слева – относительно группы больных с ХОБЛ I стадии: * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

У пациентов с ХОБЛ I стадии отмечались высокие значения TNF- α , s-TNF α -RI (p55), bFGF, TFG β по сравнению с группой контроля ($p < 0,001$ для всех показателей). Уровень IL-8 не отличался от показателя контрольной группы. При II стадии ХОБЛ наблюдалось нарастание содержания в сыворотке крови TNF- α и его рецептора по сравнению с больными ХОБЛ I стадии. При этом пациенты ХОБЛ II стадии имели низкий уровень IL-8, как относительно группы контроля, так и по сравнению с пациентами ХОБЛ I стадии. Содержание bFGF и TFG β в сыворотке крови у больных ХОБЛ II стадии было увеличено ($p < 0,001$) относительно здоровых лиц.

Полученные результаты исследования свидетельствуют о наличии системной воспалительной реакции у больных ХОБЛ. При этом, выявленные высокие значения TNF- α и s-TNF α -RI указывают на хронизацию процесса. Растворимый ингибитор (s-TNF α -RI) способствует длительному персистированию основного провоспалительного цитокина (TNF- α) в кровотоке, приводя к возникновению некупирующегося хронического воспаления. С утяжелением заболевания (ХОБЛ II стадии) происходит угнетение синтеза противовоспалительного цитокина – IL-8, что свидетельствует о дисбалансе между про- и противовоспалительными процессами и нарушении цитокиновой регуляции иммунного ответа. Показателем дисфункции цитокиновой регуляции у больных ХОБЛ II стадии также стало снижение синтеза TFG β при сохранении значений bFGF на уровне, характерном для легкой степени нарушений бронхиальной проходимости. Патологическая индукция синтеза bFGF на фоне угнетения образования TFG β способствует рецидивирующему течению хронического воспаления, активации процессов фиброгенеза, прогрессированию необратимой бронхиальной обструкции. Снижение образования TFG β свидетельствует об отсутствии должной регуляции хронического воспаления, которое усугубляется с утяжелением ХОБЛ.

Для выявления характера функционирования эндоканнабиноидной системы в условиях системного воспаления при ХОБЛ проведен

цитометрический анализ экспрессии СВ₂ рецептора на мононуклеарных лейкоцитах. Показано, что процентное содержание клеток, экспрессирующих на своей поверхности дифференцирующий антиген к рецептору СВ₂, зависит от персистенции патологического процесса ХОБЛ, что характеризует хронизацию воспаления (рис. 11).

У пациентов с I стадией ХОБЛ наблюдалось незначительное снижение числа лейкоцитов, экспрессирующих СВ₂ рецептор (до 86 % от всех исследуемых клеток, $p < 0,05$ в сравнении с контрольной группой). У больных ХОБЛ II стадией количество МЛ, экспрессирующих СВ₂ рецептор, значительно уменьшилось и составило 39 % от всех исследуемых клеток ($p < 0,001$). То есть, по мере утяжеления заболевания экспрессия СВ₂ рецептора снижается, что, возможно, является причиной дизрегуляции иммунного ответа и формирования системного воспаления.

Рис. 11. Количество мононуклеарных лейкоцитов (%), экспрессирующих СВ₂ рецептор у больных ХОБЛ разной степени тяжести

Примечание: (*) - статистическая значимость различий относительно контрольной группы: ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

В настоящее время известно несколько сигнальных механизмов через которые каннабиноидные СВ₂ рецепторы регулируют и контролируют реактивность иммунной системы: ингибирование

аденилатциклазы и снижение образования циклического аденозинмонофосфата (цАМФ); блокирование экспрессии ядерного фактора транскрипции NF-κB, запускающего активацию синтеза генов провоспалительных цитокинов; подавление активности митоген активированных белков (МАР). То есть, эндоканнабиноидная система через контролирование и ограничение активации NF-κB, МАР-киназных, цАМФ сигнальных путей регулирует интенсивность экспрессии интермедиатов воспаления [31; 107]. Наблюдаемая в серии исследований у больных ХОБЛ гиперцитокинемия согласуется с нарушением экспрессии СВ₂ рецептора. По мере утяжеления заболевания снижается количество иммунных клеток, экспрессирующих СВ₂ рецептор, усиливается дисбаланс в продукции цитокинов, что потенцирует формирование хронического воспаления. Так, снижение экспрессии СВ₂ рецептора при ХОБЛ I стадии сопровождается повышением образования провоспалительных (TNF-α, bFGF, TFGβ) цитокинов, что компенсируется сохранением нормальных значений цитокинов с иммуносупрессорной активностью (IL-8). Угнетение экспрессии СВ₂ рецептора при утяжелении заболевания (при ХОБЛ II стадии) сопровождается усилением дисбаланса продукции цитокинов в сторону увеличения TNF-α, bFGF, TFGβ и снижения IL-8. Принимая во внимание, что с уменьшением экспрессии СВ₂ рецептора усугубляется нарушение регуляции иммунного ответа и развивается хроническое системное воспаление, можно сделать заключение о реципрокном характере интеграции иммунной и эндоканнабиноидной систем в условиях воспаления: угнетение экспрессии иммунокомпетентными клетками СВ₂ рецептора при одновременной активации синтеза провоспалительных цитокинов [31; 56]. Таким образом, в механизмах регуляции воспалительной реакции огромное значение имеет блокада экспрессии СВ₂ рецептора или ее активация. Понимание этих механизмов будет способствовать разработке технологий селективной регуляции воспалительного процесса.

Регуляторные эффекты синтетических лигандов каннабиноидных рецепторов

Особый интерес для клинической фармакологии и фармакотерапии представляют методы и вещества, которые способны воздействовать на эндоканнабиноидную систему, подавляя ее провоспалительный ответ. В ранних исследованиях НИИМКВЛ было показано *in vitro*, что синтетические каннабиноиды – анандамид и WIN-55,212-2 ингибируют способность иммунных клеток экспрессировать IL-2, IL-8, TNF- α , при этом проявляя дозозависимое иммуносупрессорное действие [13; 15; 25; 28]. Одним из механизмов такой иммуносупрессии является способность лигандов CB₂ рецепторов ингибировать сигнальный путь, запускающий активацию комплекса toll-like рецепторов CD14/TLR4/MD2, приводящую к экспрессии провоспалительных цитокинов и детерминации Th1 иммунного ответа.

Также было изучено влияние синтетических лигандов каннабиноидных рецепторов на основные липидные медиаторы воспаления – эйкозаноиды – метаболиты арахидоновой кислоты [27].

Существует потенциальная взаимосвязь между сигнальной функцией эндоканнабиноидов и эйкозаноидов [20; 488]. Субстратом для биосинтеза эндоканнабиноидов, также, как и эйкозаноидов, служат фосфолипиды (ФЛ), содержащие арахидоновую кислоту [46; 119; 414]. Кроме того, и те, и другие используют одни и те же ферментные системы в процессе метаболизма [414]. Общность этих двух систем обуславливает их совместную роль в иммунных процессах.

Многочисленными исследованиями показано, что каскад воспалительных реакций сопровождается активацией синтеза эйкозаноидов (тромбоксаны, лейкотриены, простагландины), участвующих в вазоконстрикции, агрегации, стимуляции лейкоцитов на хемотаксис. Наиболее интенсивно синтез эйкозаноидов в организме человека осуществляется альвеолярными макрофагами, нейтрофилами и эозинофилами. Главным эффектом представителей эйкозаноидов

(лейкотриенов) является способность вызывать спазм гладкой мускулатуры бронхов, в 100-1000 раз превосходя по активности эквимоллярные количества гистамина. На настоящий момент существует относительно небольшое число фармакологических препаратов для контроля экспрессии провоспалительных эйкозаноидов, которые имеют ограниченную терапевтическую эффективность, особенно в наиболее тяжелых случаях заболевания. Ингибируя молекулярные события на начальной фазе иммунного ответа, они снижают собственные резервные возможности организма. В связи с этим крайне необходима разработка новых подходов для совершенствования контроля метаболических превращений арахидоновой кислоты.

Перспективными в этом отношении являются синтетические каннабиноиды. Так, анандамид способен стимулировать секрецию АК и ее метаболитов [393]. При гидролизе анандамида образуется свободная АК, которая затем может быть преобразована в эйкозаноиды в циклооксигеназных или липоксигеназных реакциях. Кроме того, эндогенные каннабиноиды могут сами подвергаться действию циклооксигеназы или липоксигеназы, что также приводит к образованию эйкозаноидов [278]. Следовательно, источником АК для синтеза эйкозаноидов могут быть не только фосфолипиды, содержащие АК, но и каннабиноиды. Возможно, обе реакции играют равнозначную роль в синтезе оксилипинов

В наших исследованиях *in vitro* использовались два синтетических агониста каннабиноидных рецепторов: **WIN 55,212-2** (R(+)-[2,3-dihydro-5-methyl-3-[(morpholinyl)methyl] pyrrolo [1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-yl]-(1-naphthalenyl) methadone mesylate) и **анандамид** (*N*-арахидоноилэтаноламид; arachidonic acid *N*-(hydroxyethyl)amide) фирмы Sigma-RBI (США). Дозозависимое влияние WIN 55,212-2 и анандамида на синтез эйкозаноидов анализировали в концентрациях 0,1; 1,0; 3,0 и 10,0 мкМ.

Результаты исследования показали, что уровень лейкотриена В₄ в цельной крови доноров находился в пределах 115 ± 8 пг/мл (рис.12).

Стимуляция клеток крови липополисахаридом способствовала увеличению концентрации лейкотриена В4 в 11 раз. Установлено, что синтетические лиганды каннабиноидных рецепторов дозозависимо блокируют липоксигеназный путь образования провоспалительного эйкозаноида – лейкотриена В4, оказывая тем самым супрессорный эффект на активность иммунной системы (рис. 12). В низких концентрациях 0,1 и 1,0 мкМ WIN 55,212-2 и анандамид не влияли на уровень секреции лейкотриена В4. Под действием WIN 55,212-2 в дозе 3,0 мкМ наблюдалось снижение уровня лейкотриена В4 на 42 % ($p < 0,001$). Анандамид в концентрации 3,0 мкМ уменьшал образование клетками крови лейкотриена В4 на 37 % ($p < 0,001$).

Рис. 12. Влияние WIN55,212 и анандамида на синтез лейкотриена В4

Примечание: достоверный ингибирующий эффект: *** $p < 0,001$.

Наибольшее ингибирующее влияние синтетических лигандов каннабиноидных рецепторов на выработку клетками крови провоспалительного оксипина выявлено в концентрации 10,0 мкМ. Так, продукция лейкотриена В4 под действием WIN55,212-2 в дозе 10,0 мкМ была снижена на 83 % ($p < 0,001$), под влиянием анандамида –

на 67 % ($p < 0,001$). Следовательно, WIN55,212-2 в дозе 10,0 мкМ в большей степени ингибирует синтез лейкотриена В4 клетками крови по сравнению с анандамидом. При этом WIN 55,212-2 и анандамид не влияли на синтез клетками крови тромбоксана В2 (рис.13).

Рис. 13. Влияние WIN55,212 и анандамида на синтез тромбоксана В2

Известно, что синтез лейкотриенов осуществляется по липоксигеназному пути метаболизма ЖК, тромбоксана – по циклооксигеназному. Полученные в эксперименте данные свидетельствуют, что синтетические каннабиноиды способны тормозить липоксигеназный путь биосинтеза эйкозаноидов, в результате чего угнетается образование провоспалительного медиатора – лейкотриена В4, что может нивелировать процесс воспаления. Тогда как синтез тромбоксана, по-видимому, осуществляется по механизмам, не затрагивающим эндоканнабиноидную систему. В работах S. Diaz показана способность синтетического каннабиноида (Δ^9 -ТГК) активировать метаболизм АК по липоксигеназному пути [471]. Этот эффект реализуется только при достаточно высоких концентрациях эндоканнабиноидных веществ (32 мкМ),

что в физиологических условиях осуществить не реально. Противоречивые данные о влиянии эндоканнабиноидов на метаболизм жирных кислот и синтез эйкозаноидов обусловлены различием в используемых дозах синтетических каннабиноидов, а также в их химическом строении. Кроме того, эффект действия синтетических лигандов каннабиноидных рецепторов на синтез провоспалительных медиаторов имеет ярко выраженный дозозависимый характер. Выявленное селективное влияние синтетических лигандов каннабиноидных рецепторов на экспрессию оксилипинов может быть использовано для разработки фармакологических препаратов целенаправленного иммуномодулирующего действия.

В целом можно заключить, что эндоканнабиноидная система способна регулировать уровень медиаторов воспаления, ограничивать их выделение, контролировать воспалительный процесс на стадии физиологической защиты.

Терапевтические перспективы и сложности, связанные с применением эндоканнабиноидов в медицине. Психоактивные свойства каннабиноидов хорошо известны, однако в настоящее время в научном мире существует некоторое противоречие в отношении целесообразности использования данных соединений в терапевтических целях, несмотря на имеющийся потенциал фитоканнабиноидов и эндоканнабиноидов при лечении различных заболеваний [126; 132; 219; 310; 321; 415; 436].

Данное противоречие обусловлено имеющимся спектром побочных эффектов каннабиноидов. Так, ограничением к клиническому применению каннабиноидов при болях является развитие побочных эффектов (сонливость, головокружение, нарушения речи, ухудшение памяти и спутанность сознания) при дозировках, обладающих терапевтической активностью [321, 433]. Исследования показывают, что ослабление активности эндоканнабиноидной системы через антагонизм CB1 рецептора является перспективной стратегией для лечения ожирения и метаболического синдрома [80]. Были предприняты

попытки обратить ожирение путем блокирования CB1 рецепторов римоабантом (rimonabant). Применение антагонистов CB1 рецепторов показало многообещающие результаты в лабораторных исследованиях, однако клинические испытания были прекращены из-за серьезных психических побочных эффектах [218; 437]. Установлено, что антагонисты центрального действия CB1 вызывают побочные эффекты, такие как депрессия и беспокойство. В настоящее время усилия направлены на оптимизацию поиска антагонистов и модуляторов CB1, которые имеют ограниченное проникновение в мозг и обладают периферическим действием. Активно изучаются новые антагонисты CB1 и CB2 рецепторов [88; 368]. Разработка новых лекарств, таких как ингибиторы амидгидролазы жирных кислот и нейтральные антагонисты CB1, обещает расширить спектр терапевтического применения каннабиноидов [69; 473]. С точки зрения стратегии разработки новых лекарств, очевидная задача состоит в том, чтобы избежать развития потенциальных психотропных побочных эффектов из-за активации CB1. С начала 2015 года было зарегистрировано около 30 новых изобретений, подчеркивающих важность изучения и перспективность терапевтического применения каннабиноидов [80].

Помимо побочных эффектов, сомнение в отношении целесообразности использования данных соединений в терапевтических целях обусловлено и наличием противоречащих друг другу результатов клинических исследований. Вероятно, что противоречивые эффекты, наблюдаемые в клинических испытаниях с использованием каннабиноидов, могут быть связаны с высокой разнородностью их рецепторов и сложностями каннабиноидной передачи сигналов [244]. Как было отмечено, каннабиноиды взаимодействуют не только с CB1 и CB2 рецепторами, но и с рецепторами GPR18 и GPR55. В связи с этим, необходимы дальнейшие исследования, нацеленные на изучение терапевтического потенциала каннабиноидов.

Проведенные исследования и анализ данных литературы являются попыткой обратить внимание исследователей на функцию

эндоканнабиноидной системы и эффективность применения эндоканнабиноидов в качестве терапевтических агентов при различных заболеваниях, в частности бронхолегочных, возможно и при их сочетанном течении. Эндоканнабиноидная система играет важную роль в регуляции обмена веществ на системном и клеточном уровнях и вовлечена в патогенез бронхолегочных заболеваний, в связи с чем может рассматриваться в качестве общего механизма и целенаправленного лекарственного воздействия. Обобщенные и представленные литературные данные свидетельствуют о терапевтическом потенциале эндоканнабиноидов и перспективности дальнейших исследований в данном направлении.

Регуляция воспалительной реакции нитроксидэргической системой

В последнее время особое внимание ученых направлено на изучение нитроксидэргической сигнальной системы, имеющей универсальные механизмы регуляции различных физиологических и патофизиологических процессов в организме [39; 200; 380]. Под нитроксидэргической системой организма понимают комплекс структур, способных при действии специфической группы ферментов к быстрой генерации мощного ауто- и паракринного медиатора – оксида азота.

Оксид азота (NO) до недавнего времени был известен преимущественно как токсичный и потенциально канцерогенный атмосферный газ. Однако возрастающее в последние годы количество исследований в области патофизиологии, биохимии и иммунологии убедительно показало, что NO синтезируется в живых организмах и является важнейшим универсальным биологическим медиатором, участвующим в развитии и реализации физиологических и патофизиологических процессов [22]. Оксид азота выполняет функцию вазодилатора, бронходилататора, нейротрансммиттера, ингибитора агрегации и адгезии тромбоцитов, регулятора пролиферации и миграции гладкомышечных клеток [9]. Подтверждена способность NO оказывать влияние на течение прооксидантных, антиоксидантных и иммунных процессов. Нарушение продукции NO сопровождается развитием эндотелиальной дисфункции, играющей важную роль в патогенезе атеросклероза, сахарного диабета, артериальной гипертензии, инфаркта миокарда и ряда других, социально-значимых заболеваний. Оксид азота является ключевым звеном в регуляции функций легких [55]. Известна роль стабильных метаболитов NO в патогенезе бронхиальной обструкции и прогрессировании хронического, системного воспаления при хронической бронхолегочной патологии, в частности, при ХОБЛ [202]. Широкий спектр биорегуляторного действия NO

делает перспективным изучение данного маркера не только при оценке состояния пациентов с хронической бронхолегочной патологией, но и его использовании в качестве мишени для разработки терапевтических программ [33].

В настоящее время NO отнесен к новому классу сигнальных молекул межклеточного взаимодействия. По структуре молекула NO является липофильной, обладающей высокореакционной способностью (свободный радикал), легко образующей ковалентные связи благодаря наличию неспаренного электрона и вступающей в реакции с кислородом, его радикалами и соединениями металлов с переменной валентностью. Взаимодействие NO с супероксид анионом (O_2^-) приводит к образованию чрезвычайно активного радикала – пероксинитритного аниона ($ONOO^-$) и пероксинитритной кислоты ($ONOOH$); с оксигемоглобином – к образованию метгемоглобина; с аминокислотами – S-нитрозоцистеина и 3-нитротирозина; с тиолами – S-нитрозотиолов и S-нитрозоглутатиона. Все продукты метаболизма оксида азота, за исключением пероксинитрита, выполняют функцию депо для NO. Эндогенный NO непрерывно синтезируется ферментативным путем в организме из аминокислоты L-аргинина под влиянием группы NO-синтаз (NOS), представляющих собой семейство цитохром P-450-подобных гемопротейнов. NO-синтаза имеет три известные в настоящее время изоформы: эндотелиальную (eNOS), нейрональную (nNOS) и макрофагальную или индуцибельную (iNOS или NOS-2). Эндотелиальную и нейрональную изоформы ввиду общих свойств называют конститутивной синтазой (cNOS), которая поддерживает физиологический уровень NO, не превышающий нескольких микромолей. Образование NO происходит в дискретном режиме и только при повышении концентрации кальция в NO-синтезирующей клетке. Индуцибельная NOS синтезируется в макрофагах, нейтрофилах, эндотелиальных, эпителиальных, гладкомышечных и тучных клетках через несколько часов после индукции бактериальными эндотоксинами, эндогенными и экзогенными прооксидантами или

провоспалительными цитокинами [380]. Индуцибельная NOS вырабатывает NO в непрерывном режиме, в течение длительного времени и в значительно больших количествах, чем в случае синтеза NO под влиянием конститутивной синтазы. Подобная необходимость возникает в случае обеспечения противомикробной защиты.

Нейрональная и эндотелиальная NO-синтазы являясь конститутивными, обычно присутствуют в физиологических условиях. Кроме того, эти ферменты являются кальций-зависимыми и могут производить только низкие количества оксида азота. Эндотелиальная NO-синтаза была впервые обнаружена в эндотелиальных клетках, а оксид азота, образованный этой изоформой, отвечает за поддержание сосудистого тонуса и предотвращение адгезии лейкоцитов и тромбоцитов к сосудистой стенке. Нейрональная изоформа NO-синтазы присутствует главным образом в нейронах и нервах, однако она также обнаружена в гладкомышечных клетках дыхательных путей и эпителиальных клетках. Оксид азота, полученный из этой изоформы фермента, действует как нейромодулятор/нейромедиатор в центральных и периферических нервах, вызывая бронходилатацию в гладких мышцах дыхательных путей [380].

Экспрессия индуцибельной формы синтазы происходит главным образом в патофизиологических процессах, что приводит к образованию большого количества оксида азота. Присутствие этой изоформы было продемонстрировано первоначально в макрофагах. Однако теперь хорошо известно, что индуцибельная NO-синтаза может действовать в различных тканях и органах, включая сосудистый эндотелий, оказывая различное действие в ответ на воспаление [93; 399]. Выработка индуцибельной NO-синтазы активируется бактериальными липополисахаридами и цитокинами, такими как TNF- α , IL-1 и IFN- γ , стимулируя образование наномолярных количеств NO.

В бронхолегочной системе синтезируются все изоформы синтазы оксида азота: eNOS – в эндотелии сосудов бронхов и эпителиальных клетках, nNOS – в холинергических и нехолинергических/

неадренергических нервах бронхов, эпителиальных клетках; iNOS или NOS-2 – практически во всех клетках при условии индуцирующего влияния цитокинов, эндотоксинов и прооксидантов. Таким образом, в легких оксид азота образуется в эндотелии артерий и вен, нейронах неадренэргической нехолинэргической ингибирующей нервной системы, эпителиоцитах, макрофагах, нейтрофилах и других клетках [356]. Продуцируемый индуцибельной NOS оксид азота наряду с защитным эффектом (расслабление гладких мышц бронхов, ослабление гиперчувствительности дыхательных путей), может оказывать цитотоксическое или цитостатическое действие на клетку при определенных условиях. Воспалительный процесс сопровождается чрезмерным накоплением продуктов метаболизма NO, являющихся сильнейшими прооксидантами, усугубляющими имеющееся воспаление дыхательных путей [9].

Высокие концентрации метаболитов оксида азота подавляют активность sNOS и растворимой гуанилатциклазы, что сопровождается увеличением содержания внутриклеточного кальция и приводит к развитию гиперреактивности дыхательных путей. Подобная полифункциональность NO до настоящего времени недостаточно ясна и может быть обусловлена значительной вариабельностью образования физиологически активных метаболитов в цикле оксида азота, обладающих различным биологическим действием.

NO играет ключевую роль практически во всех биологических аспектах респираторной системы и участвует в патофизиологии многих заболеваний органов дыхания. Патофизиологическая роль NO в заболеваниях бронхолегочной системы неоднозначна. Молекула NO может вызывать как положительный, так и отрицательный эффект в функционировании органов дыхания. Многие исследования показали, что NO проявляет защитное действие на дыхательные пути человека, через расслабление гладких мышц бронхов, ослабление гиперчувствительности дыхательных путей к стимулам бронхоконстрикторов, оказывая непосредственное бактерицидное действие и

цитотоксичность на опухолевые клетки. При этом также наблюдаются побочные эффекты NO, такие как вазодилатация бронхиального кровообращения, увеличение секреции в слизистой дыхательных путей, активация провоспалительных медиаторов, предрасполагающих к развитию гиперреактивности дыхательных путей. Оксид азота представляет собой высокореактивную молекулу (свободный радикал) и может проявлять окислительные свойства как непосредственно, так и через образование пероксинитрита [39; 200; 356; 380].

В патологии большое значение имеет, какая форма NO-синтазы ответственна за увеличение производства оксида азота. Так установлено, что активация конститутивных форм NO-синтазы благоприятно влияет на течение болезни, в то время как повышенное содержание индуцибельной формы в тканях является неблагоприятным фактором и имеет прямую корреляционную связь со степенью тяжести заболевания. Известно, что индуцибельная форма NO-синтазы, играет одну из ключевых ролей в модуляции воспалительного процесса. С одной стороны, продуцируемый индуцибельной формой оксид азота способствует привлечению в ткани нейтрофилов, моноцитов и эозинофилов, угнетает апоптоз этих важнейших эффекторов атопического воспаления и увеличивает экспрессию цитокинов. В свою очередь оксид азота, продуцируемый воспалительными клетками, способствует амплификации воспалительного ответа [356; 380]. Исследования *in vivo* на животных показали, что ингибирование индуцибельной NO-синтазы снижает гиперактивность дыхательных путей, вызванную аллергеном [81].

В литературе имеются данные о том, что высокие концентрации NO в эпителиальных или воспалительных клетках, образующиеся под воздействием цитокинов или эндотоксинов, подавляют активность конститутивной NO-синтазы и угнетают активность растворимой гуанилатциклазы, что приводит к уменьшению продукции циклического гуанозинмонофосфата, увеличению содержания внутриклеточного Ca^{2+} и, в конечном счете, к спазму дыхательных путей [356].

Как известно, повышенное содержание NO является наиболее ранним и достоверным признаком воспаления респираторной системы. В клинической практике широко применяется оценка содержания NO в выдыхаемом воздухе при различных хронических воспалительных заболеваниях органов дыхания [81]. На основании этих данных определяется степень тяжести процесса и эффективность лечебных мероприятий. Наиболее широкое применение данный метод получил при диагностике бронхиальной астмы. При хронической обструктивной болезни легких меньшее значение уделяется изучению NO в качестве диагностического критерия, поскольку в выдыхаемом воздухе пациентов с ХОБЛ отмечается незначительное повышение оксида азота и не наблюдается достоверной корреляции со степенью тяжести патологического процесса [199].

Стоит отметить, что представленные в научной литературе данные по исследованию оксида азота получены преимущественно по определению суммарных стабильных метаболитов NO в выдыхаемом воздухе, что в большей степени отражает функциональное состояние эпителиоцитов легких [41]. В литературе практически не представлены данные об изменении общего содержания NO в крови, отражающего общесистемный уровень в организме оксида азота.

Можно заключить, что оксид азота, как основной компонент нитроксидаергической системы, является важным биологическим медиатором множества физиологических и патофизиологических процессов в дыхательных путях и представляет большой интерес как регуляторный и диагностический инструмент при различных заболеваниях бронхолегочной системы.

Значение оксида азота в механизмах регуляции системной воспалительной реакции

Для выявления системного уровня оксида азота проводилась оценка его содержания в сыворотке крови здоровых и пациентов с респираторными патологиями неинфекционного генеза. *Определение стабильных метаболитов оксида азота* производилось согласно протоколу, утвержденному фирмой «Biogenesis» (Великобритания). Суммарную концентрацию метаболитов NO определяли фотометрическим методом на спектрофотометре («Biotek Power Wave», США). В качестве восстановителя нитратов в нитриты использовали порошок кадмия с последующей колOMETрической детекцией нитрата, образовавшего окрашенный продукт в результате реакции Грисса. Абсорбцию определяли при длине волны 546 нм [5; 275; 361]. Уровень метаболитов NO выражали в мкмоль/л.

Было исследовано 159 человек с бронхиальной астмой (группа БА) из них по степени контроля было выделено 3 группы: 35 человек с контролируемой бронхиальной астмой (группа БА 1), 103 – с частично контролируемой БА (группа БА 2) и 21 человек с неконтролируемым течением бронхиальной астмы (группа БА 3). Диагноз БА выставлялся на основании Глобальной стратегии лечения и профилактики БА [476, 477]. Пациентов с ХОБЛ было обследовано 85 человек (группа ХОБЛ) из них 26 человек с ХОБЛ I спирометрического класса стабильного течения (группа ХОБЛ 1), 37 – ХОБЛ II спирометрического класса стабильного течения (группа ХОБЛ 2) и 22 – ХОБЛ III спирометрического класса стабильного течения (ХОБЛ 3). Диагноз ХОБЛ выставлялся согласно Глобальной стратегии: диагностика, лечение и профилактика ХОБЛ [478]. С перекрестным синдромом БА/ХОБЛ исследовались 16 человек, имеющие в анамнезе частично контролируемую БА в сочетании с ХОБЛ II спирометрического класса стабильного течения. Для группы сравнения были обследовано 45 условно здоровых человек (группа контроля).

У пациентов с бронхиальной астмой установлено статистически значимое повышение содержания NO в сыворотке крови в 1,4 раза ($p < 0,01$) в сравнении с группой контроля (табл. 9).

Таблица 9

Содержание оксида азота в крови здоровых и больных лиц с хроническими заболеваниями органов дыхания, мкМ/л

№ п/п	Группы		Me ($X_{25}; X_{75}$)
1.	Контрольная		6,9 (4;8,2)
2.	БА	БА 1	8,05 (5,4; 14,1)
3.		БА 2	9,4 (6,1; 14,4) **
4.		БА 3	13,3 (6,7; 20,6) **
5.	ХОБЛ	ХОБЛ 1	8,4 (7,3; 10,5)
6.		ХОБЛ 2	9,4 (7,9; 14,6) *
7.		ХОБЛ 3	13,5 (8,8; 15,5) ***
8.	БА 2+ХОБЛ 2		9,8 (8; 13,2) *

Примечание: p – статистическая значимость различий относительно контрольной группы;

* – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

Распределение группы по степени контроля заболевания выявило, что при контролируемом течении бронхиальной астмы уровень NO не имеет статистически значимых различий с группой контроля, при частично контролируемом течении отмечается увеличение в 1,4 раза ($p < 0,01$). При неконтролируемом течении бронхиальной астмы содержание в крови NO возрастает в два раза в сравнении с группой контроля. Закономерное увеличение содержания оксида азота в крови у пациентов с бронхиальной астмой, согласуется с данными о повышении активности воспаления в дыхательных путях при утяжелении атопического процесса.

У больных ХОБЛ наблюдалось увеличение уровня NO в 1,2 раза в сравнении с контрольной группой. С увеличением степени тяжести ХОБЛ наблюдалось возрастание содержания NO с 8,4 мкМ/л при 1 (легкой) степени тяжести, до 9,4 мкМ/л при 2 (средней) и до 13,5 мкМ/л при 3 (тяжелой) степени ХОБЛ. Статистически значимое повышение количества оксида азота в крови при ХОБЛ относительно группы контроля отмечалось только при средней и тяжелой ХОБЛ соответственно в 1,4 и 2 раза ($p < 0,001$). Сопоставление результатов исследования между группами БА 1 и ХОБЛ 1, БА 2 и ХОБЛ 2, БА 3 и ХОБЛ 3 не выявило статистически значимых различий по уровню NO. Можно предположить, что заболевания органов дыхания, сопряженные с затруднением воздушного потока и воспалением, имеют общий вектор реагирования в производстве NO.

Для изучения уровня NO в крови при перекрестном синдроме БА/ХОБЛ обследовались больные, имеющие в анамнезе частично контролируемую БА в сочетании с ХОБЛ II спирометрического класса стабильного течения. В данной группе выявлено увеличение содержания оксида азота в крови больных в 1,4 раза ($p < 0,001$) в сравнении с группой контроля. При этом статистически значимых различий между группой больных с сочетанной патологией и группами БА 2 и ХОБЛ 2 не отмечено. Полученные результаты указывают на то, что коморбидное течение патологии не влияет на изменение уровня NO в крови, что может свидетельствовать об едином принципе регуляции нитроксидергической системы при бронхиальной астме и хронической обструктивной болезнью легких (табл.8, рис. 14).

В ряде исследований описано значительное увеличение уровня NO у пациентов с бронхиальной астмой в отличие от больных ХОБЛ, при этом экспрессия индуцибельной NO-синтазы в клетках дыхательных путей выявляется в одинаковой степени при этих заболеваниях [201]. Данный факт может быть объяснен влиянием табачного дыма. Как известно, развитие ХОБЛ неразрывно связано с наличием в анамнезе пациента курения.

Рис. 14. Уровень стабильных метаболитов оксида азота в крови здоровых и больных хроническими заболеваниями органов дыхания

Сигаретный дым влияет на различия в экспрессии изоформ NO-синтазы в тканях дыхательных путей. Так у курильщиков с ХОБЛ увеличена экспрессия нейрональной и индуцибельной NO-синтаз в периферической легочной ткани по сравнению с некурящими, тогда как экспрессия эндотелиальной NOS понижена [199; 200; 356]. Кроме того, оксид азота может выводиться из организма с выдыхаемым воздухом, либо метаболизироваться до нитрита и нитрата или взаимодействовать с супероксидом с образованием сильнейшего про-оксиданта – пероксинитрита [192]. Накопление токсичных свободных радикалов ведет к активации реакции перекисного окисления липидов клеточных мембран, расширению и углублению имеющегося воспаления дыхательных путей за счет увеличения сосудистой

проницаемости, появления воспалительного отека. Кроме того, NO не увеличивается в конденсате выдыхаемого воздуха у пациентов с ХОБЛ, так как высокий уровень окислительного стресса удаляет NO из газовой фазы [200]. Все это подтверждает тот факт, что окислительный стресс, вызываемый активными формами азота, играет определенную роль в патогенезе заболеваний респираторной системы и является важным фактором развития и прогрессирования ХОБЛ.

Хроническая обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма являются двумя основными, наиболее распространенными, хроническими воспалительными заболеваниями дыхательных путей с ограничением воздушного потока. Существует риск присоединения ХОБЛ у больных с бронхиальной астмой в возрасте после 40 лет. Данный факт может быть связан с имеющимся в анамнезе хроническим воздействием вредных частиц или газов, главным образом табачного дыма. Кроме того, БА может сама по себе явиться причиной формирования ХОБЛ [93]. Сочетание патологии в популяции пациентов с БА варьирует в широких пределах – от 15 % до 60 %, отражая изменения в зависимости от возрастной группы, выборки населения и тяжести бронхиальной астмы и ХОБЛ. Клиническая картина и ответ на терапию у пациентов с коморбидным течением БА и ХОБЛ могут отличаться от тех, которые имеются только при ХОБЛ или при БА [3; 81; 399; 494]. Наши исследования показали, что сочетанная патология сопровождается увеличением оксида азота в крови пациентов, сопоставимое с таковым у пациентов с «чистой» патологией БА или ХОБЛ (табл. 9, рис. 13).

Итак, заболевания органов дыхания, сопряженные с затруднением воздушного потока и воспалением, имеют общий вектор реагирования в производстве оксида азота. В пользу этого свидетельствует значительное повышение количества оксида азота в крови примерно в равной степени при БА, ХОБЛ и перекрестном синдроме БА/ХОБЛ. При этом отмечается рост уровня оксида азота пропорционально увеличению степени тяжести патологического процесса. Данный факт

дает основание предполагать о единых путях регуляции нитроксидергической системы при развитии хронических воспалительных заболеваний респираторной системы. Повышенное производство NO при бронхолегочных заболеваниях, является компенсаторным механизмом, направленным на поддержание сосудистого тонуса, защиту от агрегации тромбоцитов и сокращение спазма гладкой мускулатуры дыхательных путей, повышение резистентности к бронхоконстрикторам, бактерицидное действие. Однако на фоне воспаления и активации индуцибельной формы NO-синтазы происходит резкое увеличение производства оксида азота в клетках дыхательной системы. Высокий уровень NO может усиливать воспалительные процессы и вызывать повреждение дыхательных путей при ХОБЛ и бронхиальной астме. Особое значение повышенный уровень NO имеет в патогенезе ХОБЛ, поскольку в условиях данного заболевания происходит интенсификация окислительного стресса под влиянием активных форм азота, что является одним из определяющих факторов прогрессирования ХОБЛ.

Таким образом, значение нитроксидергической системы в развитии заболеваний органов дыхания является ключевым, охватывающим системное воздействие на многие физиологические процессы организма, в том числе воспаление, окислительный стресс, гладкомышечный и сосудистый тонус в дыхательных путях. Коррекция выработки оксида азота может быть использована для целенаправленного воздействия на воспалительную реакцию организма и предупреждение прогрессирования заболеваний.

Роль липидных медиаторов в развитии, прогрессировании и регуляции системного воспаления

Патогенетическая значимость липидных медиаторов при респираторных заболеваниях

Функции липидов в системе органов дыхания значительны и специфичны. В легких липиды выполняют роль поверхностно-активного фактора, регулятора соотношения вентиляции, перфузии, а также секреции сурфактанта. При этом бронхолегочные ткани характеризуются большой интенсивностью липидного метаболизма, связанного с синтезом основной структуры этого органа – сурфактанта.

В регуляции воспаления участвуют различные медиаторы липидной природы, в частности, эйкозаноиды (оксипирины), которые являются окисленными производными метаболизма жирных кислот – арахидоновой ($20:4n-6$), эйкозапентаеновой ($20:5n-3$), докозагексаеновой ($22:6n-3$) (рис. 15) [45; 387]. Образование оксипиринов может идти по трем биохимическим путям [468]. В циклооксигеназной реакции при участии фермента циклооксигеназы образуются тромбоксаны и простагландины. Фермент липоксигеназа катализирует липоксигеназный путь биосинтеза лейкотриенов. Цитохром P450 отвечает за образование гидроксикоизокотетраеновой (HETE), эпоксиэкозатриеновой (EET) и гидроксикоизокотетраеновой кислоты (HODE) по эпоксигеназному пути.

Существует несколько групп эйкозаноидов, к которым относят семейство простагландинов: простагландины (PG_2 , $PGF_2\alpha$, PGD_2 , $15d-PGJ_2$) – влияющие на тонус гладких мышц бронхов, мочеполовой, сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта; простациклин (prostacyclin, PGI_2) – подвид простагландинов, оказывающий ингибирующее влияние на агрегацию тромбоцитов и эффект вазодилатации; тромбоксаны – вызывающие сужение мелких сосудов;

семейство лейкотриенов – вызывающих сокращение мускулатуры бронхов и семейство эпоксинов, биологические эффекты которых связаны с развитием аллергии [19, 152, 261].

Оксилипины служат вторичными мессенджерами гидрофильных гормонов, контролируют сокращение гладкомышечной ткани (кровеносных сосудов, бронхов, матки), принимают участие в высвобождении продуктов внутриклеточного синтеза (гормонов, мукоидов), оказывают влияние на метаболизм костной ткани, периферическую нервную систему, иммунную систему, передвижение и агрегацию клеток (лейкоцитов и тромбоцитов), являются эффективными лигандами болевых рецепторов. Они действуют как локальные биорегуляторы на синтезирующие их клетки (аутокринное действие) и на соседние клетки (паракринное действие) путем связывания с мембранными рецепторами. Ключевая роль оксилипинов в этапах воспалительного процесса заключается в их способности инициировать острый воспалительный процесс, необходимый для активации иммунокомпетентных клеток и синтеза провоспалительных мессенджеров. Однако, как только число полиморфноядерных лейкоцитов в очаге воспаления снижается и падает уровень провоспалительных цитокинов изменяется метаболизм полиненасыщенных жирных кислот. Происходит переключение биосинтетических путей метаболизма жирных кислот от синтеза провоспалительных липидных медиаторов (лейкотриены и простагландины) к образованию проразрешающих липидных медиаторов (lipoxins (LX); resolvins (Rv); protectins (PD); maresins (MaR)), оказывающих противовоспалительное и цитопротективное действие, влияющих на разрешение воспалительной реакции посредством вовлечения иммунной системы [102; 125; 214; 387; 428; 429; 531]. Их называют «эндогенные специализированные проразрешающие медиаторы (specialized pro-resolving mediators, SPM)» [122; 492] (рис. 15). Изучение этих локально действующих липидных медиаторов открывает принципиально новые возможности в разработке эффективной терапевтической стратегии хронических

воспалительных заболеваний посредством коррекции процессов разрешения воспаления, а не его подавления на стадии инициации и развития [45; 272].

Рис. 15. Схема синтеза липидных медиаторов из полиненасыщенных жирных кислот

В патогенезе БА важную роль играют производные арахидоновой кислоты – цистеиновые лейкотриены и простагландин D₂. [443]. Они являются провоспалительными медиаторами, мощными бронхоконстрикторами, вызывают гиперреактивность и отек бронхов, изменяют секрецию слизи, участвуют в привлечении

Th2 клеток в дыхательные пути. В то время как метаболиты n-3 ЖК (Rv и PD) подавляют продукцию провоспалительных цитокинов, прооксидантов и активируют экспрессию антиоксидантных ферментов, способствуя разрешению воспалительной реакции, в частности, локализованной в слизистой оболочке верхних дыхательных путей.

Значение оксигеназных производных ЖК в патогенезе ХОБЛ менее изучено. Считается, что гиперсекреция слизи при ХОБЛ – это результат стимуляции лейкотриенами секретирующих клеток. В тоже время неактивность тучных клеток, главных продуцентов эйкозаноидов, является причиной отсутствия бронхоспазма.

Поскольку разрешение острого воспаления взаимосвязано с процессом переключения синтеза провоспалительных липидных медиаторов на образование проразрешающих метаболитов, баланс между n-6 и n-3 ЖК и продуктами их метаболизма тесно взаимосвязан с патогенезом хронических заболеваний органов дыхания [2; 322]. Как показано рядом исследований, нарушение состава и метаболизма ЖК и изменение профилей липидных медиаторов при заболеваниях органов дыхания сопровождается разбалансировкой регуляторных механизмов воспалительного процесса и способствует его хронизации [2; 96; 208; 221].

Изучение роли жирных кислот в формировании воспалительного процесса может стать отправной точкой для установления молекулярных и клеточных механизмов патогенеза, разработки способов диагностики и лечения заболеваний бронхолегочной системы.

Ассоциация метаболизма жирных кислот с системной воспалительной реакцией

В исследовании приняли участие 65 человек, из них 45 пациентов с заболеваниями бронхолегочной системы в период клинической ремиссии. Характер воспалительного процесса оценивали

по состоянию клеточного иммунитета, уровню секреции про- и противовоспалительных цитокинов, иммуноглобулина Е (IgE) в сыворотке крови. Определяли состав эстерифицированных и неэстерифицированных жирных кислот (НЭЖК) цитомембран методом высокоэффективной газо-жидкостной хроматографии. Уровень эйкозаноидов оценивали по количеству их стабильных метаболитов в сыворотке крови – тромбоксана В2 и лейкотриена В4 с использованием иммуноферментного анализа [2].

Анализ иммунологических показателей, подробно описанный в предыдущих разделах, выявил наличие нарушений различного характера во всех звеньях иммунной системы. Показано, что формирование персистирующего воспаления при БА и ХОБЛ происходит в результате нарушения разных регуляторных механизмов иммунного ответа. Течение системного воспаления в период ремиссии при БА продолжается по Th2 типу иммунного ответа, при ХОБЛ – по Th1 пути иммунной регуляции с привлечением провоспалительных реагенов и цитокинов (табл. 10).

Так у пациентов с контролируемой БА отмечалось угнетение Т-клеточного звена иммунитета (снижение абсолютного и относительного количества CD3⁺ клеток, цитотоксических Т-лимфоцитов CD3⁺, CD8⁺) и продукции IFN- γ , повышение уровня провоспалительных цитокинов (TNF- α , IL-4). Данные изменения свидетельствуют о сохранении воспалительного процесса в период ремиссии за счет поддержания активированного Th2 типа иммунного ответа. У больных ХОБЛ, напротив, выявили активацию Т-клеточного звена иммунитета по Th1 типу, на фоне истощения функциональной активности В-лимфоцитов. Наряду с изменениями в Т- и В-клеточном звене иммунитета у пациентов с ХОБЛ установлены нарушения секреции иммунорегуляторных субстанций – повышение в сыворотке крови уровня провоспалительных цитокинов TNF- α и IFN- γ ($p < 0,001$). Результаты исследования свидетельствуют о наличии хронического системного воспаления при заболеваниях органов дыхания в стадии ремиссии.

Таблица 10

Показатели иммунного статуса у пациентов с БА и ХОБЛ (М±m)

Показатели	Контрольная группа (n=20)	Группа больных БА (n=25)	Группа больных ХОБЛ (n=20)
Лейкоциты Г/л	5,66±0,11	5,57±0,13	*7,90±0,21
Лимфоциты, абс.	1727,73±102,31	1776,05±86,75	*2313,89±95,11 [#]
CD3 ⁺ , абс.	1217,72±91,21	1122,72±46,31	*1956,25±95,11 [#]
CD3 ⁺ CD4 ⁺ , абс.	763,13±28,69	723,47±35,28	*1385,75±51 [#]
CD3 ⁺ CD8 ⁺ , абс.	426,83±21,27	*336,99±14,10	*582,83±16,19 [#]
CD4 ⁺ /CD8 ⁺ , у.е.	2,01±0,03	*2,15±0,09	*2,40±0,04 [#]
CD19 ⁺ , абс.	203,33±19,11	*359,91±16,14	237,87±14,71 [#]
CD19 ⁺ CD56 ⁺ , абс.	257,86±10,25	*215,12±14,13	*328,75±18,12 [#]
TNF-α, пг/мл	18,32±1,20	*40,29±1,34	*48,51±1,35 [#]
IFN-γ, пг/мл	59,17±1,54	*26,99±1,41	*78,69±2,10 [#]
IL4, пг/мл	56,41±1,24	*90,42±5,21	*43,95±1,02 [#]
IgE, пг/мл	184,75±14,13	*515,92±41,12	200,04±17,14 [#]
ЛТВ4, пг/мл	10,35±1,41	*50,53±2,04	*18,00±1,29 [#]
ТХВ2, пг/мл	15,87±1,07	*34,77±2,17	*31,36±2,07 [#]

Примечание: (*) – статистическая значимость различий относительно контрольной группы,

* – $p < 0,001$; (#) – статистическая значимость различий относительно группы пациентов с БА, # – $p < 0,001$.

В составе незэтерифицированных жирных кислот плазмы крови обследованных выделено 37 индивидуальных компонентов – насыщенных, моноеновых и полиненасыщенных ЖК, нормального и изостроения с длиной цепи от C12 до C24, как с чётным, так и нечётным числом углеродных атомов.

Результаты исследования представлены в таблице 11.

Выявлены существенные различия в содержании насыщенных НЭЖК плазмы крови у больных БА. Установлено снижение относительного содержания лауриновой (12:0), миристиновой (14:0), пентадекановой (15:0), пальмитиновой (16:0) и стеариновой (18:0) ЖК.

Таблица 11

Содержание НЭЖК в плазме крови больных БА и ХОБЛ

Свободные жирные кислоты,	Контрольная группа (n=20)	Группа больных БА (n=25)	Группа больных ХОБЛ (n=20)
Насыщенные жирные кислоты			
12:0	0,65±0,14	***0,11±0,02	***0,15±0,06 [#]
14:0	0,96±0,16	***0,61±0,06	0,95±0,14 ^{##}
15:0	0,63±0,08	***0,16±0,01	***0,17±0,03
16:0	28,25±0,94	***20,35±0,46	***22,59±0,31 [#]
18:0	8,32±0,28	**7,03±0,24	**6,06±0,75
Мононенасыщенные жирные кислоты			
16:1n-9	0,78±0,08	*0,46±0,03	*0,53±0,03
16:1n-7	2,37±0,27	***1,29±0,07	2,14±0,34 ^{##}
18:1n-9	25,03±1,85	***15,28±0,56	***17,52±1,14
18:1n-7	2,04±0,19	*1,63±0,04	1,74±0,80
18:1n-5	0,28±0,03	0,23±0,02	0,28±0,01
Полиненасыщенные жирные кислоты			
18:2n-6	37,53±1,68	38,86±1,05	36,55±1,23
18:3n-3	0,94±0,08	**0,60±0,04	**0,54±0,07

Окончание таблицы 11

20:3n-6	0,20±0,01	*** 1,07±0,05	*** 1,17±0,93
20:4n-6	3,60±0,11	*** 6,71±0,30	*** 5,47±5,77
20:5n-3	0,49±0,05	*** 1,02±0,17	0,66±0,08###
22:4n-6	0,11±0,01	*** 0,21±0,03	* 0,15±0,08
22:5n-6	0,05±0,01	* 0,08±0,01	0,06±0,04
22:5n-3	0,61±0,02	0,50±0,02	0,42±0,03
22:6n-3	2,94±0,18	2,68±0,18	*** 1,64±0,10###

Примечание: (*) – статистическая значимость различий относительно контрольной группы:

* – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$. (#) – статистическая значимость различий относительно группы пациентов с БА: # – $p < 0,05$; ## – $p < 0,01$; ### – $p < 0,001$.

В таблицу не внесены отдельные представители ЖК, содержание которых не превышает 0,1 %. В основном это насыщенные ЖК нормального строения (10:0, 19:0, 22:0), некоторые моноеновые (14:1, 22:1), диеновые (18:2n-5/9), триеновые (20:3n-3) ЖК, полиеновые C24 ЖК.

В спектре моноеновых НЭЖК у больных БА обнаружено снижение доли пальмитолеиновой кислоты семейства n-7 (16:1n-7) и n-9 (16:1n-9), олеиновой кислоты (18:1n-9), октадекамоноеновой кислоты семейства n-7 (18:1n-7). Обращает внимание уменьшение доли α-линоленовой кислоты (18:3n-3) в плазме крови больных БА.

В пуле НЭЖК больных БА установлено повышение доли n-6 ПНЖК: дигомо-γ-линоленовой (20:3n-6), арахидоновой (20:4n-6) и ее метаболитов – докозатетраеновой (22:4n-6) и докозапентаеновой (22:5n-6) по сравнению с контрольной группой. Среди n-3 ПНЖК обнаружено накопление эйкозапентаеновой (20:5n-3).

В группе больных ХОБЛ изменение содержания насыщенных жирных кислот имело ту же направленность, что и при БА. Установлено снижение доли 12:0, 15:0, 16:0, 18:0 по сравнению с группой здоровых лиц. Вместе с тем доля жирных кислот насыщенных 12:0,

14:0, 16:0 в плазме крови больных ХОБЛ статистически значимо выше, чем в группе больных БА. У пациентов с ХОБЛ, так же, как и с БА, значения некоторых моноеновых ЖК (16:1n-9) и (18:1n-9) ниже, чем в контрольной группе. В составе ПНЖК у пациентов с ХОБЛ выявлено увеличение доли n-6 ПНЖК (20:3, 20:4, 22:4) по сравнению с группой контроля. У больных ХОБЛ содержание эйкозапентаеновой ЖК (20:5n-3) ниже, чем в группе с БА; докозагексаеновой ЖК (22:6n-3) значительно ниже, как по сравнению с группой контроля, так и с больными БА.

Таким образом, при изучении состава НЭЖК плазмы крови у больных БА и ХОБЛ выявлены однонаправленные изменения в количественной и качественной характеристике жирных кислот: падение доли насыщенных ЖК на фоне повышения уровня предшественников и метаболитов арахидоновой кислоты.

Состав ЖК мембраны эритроцитов у больных БА и ХОБЛ. Анализ количественного состава ЖК липидов мембран эритроцитов у пациентов с БА выявил увеличение доли насыщенных ЖК (12:0, 18:0) по сравнению с показателями здоровых лиц (табл. 12).

Таблица 12

Состав ЖК мембран эритроцитов у пациентов с БА и ХОБЛ

Жирные кислоты, % от суммы ЖК	Контрольная группа, n=20	Больные БА, n=25	Больные ХОБЛ, n=20
Насыщенные жирные кислоты			
12:0	0,13±0,01	***0,27±0,04	
14:0	0,39±0,03	0,44±0,04	0,34±0,01 [#]
15:0	0,17±0,01	0,18±0,01	***1,08±0,01 ^{###}
16:0	23,98±1,28	22,22±0,51	23,16±0,28
17:0	0,35±0,02	0,32±0,01	**0,25±0,03 ^{##}

Окончание таблицы 12

18:0	13,40±0,75	**17,52±0,28	*16,78±0,40
20:0	0,150±0,035	0,110±0,007	***0,46±0,04###
Мононенасыщенные жирные кислоты			
16:1n-9	0,21±0,05	**0,33±0,02	0,21±0,05#
16:1n-7	0,39±0,03	0,37±0,02	**0,53±0,05###
18:1n-9	14,84±0,84	13,89±0,27	15,49±0,73
18:1n-7	1,53±0,08	1,53±0,05	1,76±0,05
18:1n-5	0,32±0,02	0,40±0,03	0,36±0,14
20:1	0,34±0,07	0,26±0,01	0,23±0,03
Полиненасыщенные жирные кислоты			
18:2n-6	15,75±0,28	*13,88±0,37	**12,21±0,61
18:3n-3	0,20±0,02	*0,15±0,01	**0,13±0,03
20:3n-6	1,29±0,02	*1,21±0,03	*1,52±0,02
20:4n-6	12,95±0,25	**14,16±0,29	***18,26±0,50###
20:5n-3	1,23±0,04	***0,77±0,03	***0,56±0,06#
22:4n-6	2,37±0,09	*2,83±0,15	*3,18±0,11#
22:5n-6	0,37±0,01	***0,23±0,01	***0,46±0,07###
22:5n-3	1,99±0,02	2,04±0,09	*1,72±0,05#
22:6n-3	4,67±0,85	5,45±0,31	5,87±0,39

Примечание: (*) – статистическая значимость различий относительно контрольной группы:

* – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$. (#) – статистическая значимость различий относительно группы пациентов с БА: # – $p < 0,05$; ## – $p < 0,01$; ### – $p < 0,001$.

В таблицу не внесены отдельные представители ЖК, содержание которых не превышает 0,1 %. В основном это насыщенные ЖК нормального строения (10:0, 19:0, 22:0), некоторые моноеновые (14:1, 22:1), диеновые (18:2n-5/9) и триеновые (20:3n-3) ЖК, полиеновые C24 ЖК.

В пуле ПНЖК наблюдается снижение доли эссенциальных линолевой (18:2n-6) и α -линоленовой (18:3n-3) ЖК. У больных БА отмечено увеличение содержания арахидоновой кислоты (20:4n-6) – главного субстрата синтеза провоспалительных и бронхоконстрикторных эйкозаноидов – по сравнению с группой здоровых лиц. При этом доля основного антагониста арахидоновой ЖК – эйкозапентаеновой ЖК (20:5n-3), напротив, снижалась в 1,6 раза относительно контрольной группы.

У пациентов с ХОБЛ модификация состава ЖК мембран эритроцитов характеризовалась увеличением содержания насыщенных (15:0, 18:0, 20:0), n6 полиненасыщенных (20:4n-6, 22:4n-6) и дефицитом n3 полиненасыщенных (20:5n-3, 22:5n-3) ЖК.

Итак, как при БА, так и при ХОБЛ, хроническое воспаление ассоциируется со значительными и сходными изменениями состава жирных кислот клеточных мембран: накоплением насыщенных ЖК, арахидоновой ЖК, истощением пула эйкозапентаеновой кислоты. Накопление насыщенных ЖК в мембране клетки способствует увеличению жесткости липидного бислоя, что приводит к нарушению структурных и функциональных характеристик клетки, уменьшению ее текучести и активности мембраносвязанных ферментов, торможению связывания рецепторов с лигандами, повышает риск деструкции мембран и гибели клетки по механизму апоптоза или некроза.

Известно, что при бронхиальной астме усиливается синтез арахидоновой кислоты, что приводит к увеличению ее содержания в клеточных мембранах. Активация метаболических превращений в ряду ЖК семейства n-6 при бронхолегочной патологии подтверждается одновременным истощением уровня 18:2n-6 на фоне увеличения синтеза предшественников провоспалительных эйкозаноидов – 20:4n-6 и 22:4n-6. Несмотря на клиническую ремиссию БА и ХОБЛ, сохраняется воспалительный процесс, поддерживаемый, как показали результаты исследования, высоким содержанием n-6 полиненасыщенных ЖК.

Уровень эйкозаноидов плазмы крови больных БА и ХОБЛ. Результаты исследования состава ЖК плазмы и клеток крови характеризуют нарушения метаболических превращений ЖК. Повышенное содержание арахидоновой кислоты и ее метаболитов в мембране эритроцитов у лиц с патологией бронхолегочной системы может способствовать усилению продукции медиаторов воспаления (leukotriene B₄), бронхоконстрикторов (prostaglandin D₂, thromboxane B₂).

О патогенетической значимости выявленных нарушений состава ЖК свидетельствуют результаты изучения эйкозаноидов у больных с респираторной патологией. Выявлено увеличение уровня тромбоксана B₂ и лейкотриена B₄ в сыворотке крови больных БА и ХОБЛ в стадии ремиссии (рис. 16).

Рис. 16. Уровень эйкозаноидов в сыворотке крови больных БА и ХОБЛ

Примечание: (*) – статистическая значимость различий относительно контрольной группы:

* – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

В тоже время у больных с контролируемым течением БА повышение уровня лейкотриена B₄ было более выражено. Как показали исследования, течение хронического воспаления в период ремиссии

у больных ХОБЛ и БА опосредуется интенсивной продукцией провоспалительных и бронхоконстрикторных эйкозаноидов. Смещение динамического равновесия в сторону накопления предшественника провоспалительных эйкозаноидов ассоциируется с развитием и прогрессированием иммунных нарушений при ХОБЛ и БА, становится одной из главных причин формирования системного воспаления.

Таким образом, установленная модификация состава ЖК в плазме и мембране эритроцитов крови, нарушение синтеза их оксигенных производных свидетельствует о важном значении ЖК и их метаболитов в иммунометаболических механизмах формирования системной воспалительной реакции при хронических заболеваниях органов дыхания.

Несмотря на разность иммунологических механизмов регуляции системного воспаления, течение БА и ХОБЛ ассоциируется с односторонними изменениями состава ЖК плазмы и эритроцитарной мембраны, играющими ключевую роль в механизме формирования заболеваний легких. Патогенетическая значимость выявленной модификации ЖК обусловлена функциональной ролью липидов в клеточных структурах. ЖК выполняют в клетках главные функции – структурную и регуляторную. Дефицит в организме ПНЖК n-3 приводит к изменению физико-химических свойств клеточных мембран, нарушению функционирования мембраносвязанных ферментов и рецепторов, что способствует ухудшению структурно-функциональной состоятельности клетки. Регуляторная функция ПНЖК состоит в том, что они служат предшественниками для биосинтеза мощных клеточных биорегуляторов – эйкозаноидов, прорезолвинов. Эйкозаноиды локально регулируют функции эндотелия, гладкомышечных клеток, реакцию вазодилатации, агрегацию тромбоцитов, микроциркуляцию и воспаление. Участие эйкозаноидов в этапах воспалительного процесса обусловлена их способностью запускать острый воспалительный процесс необходимый для экспрессии провоспалительных мессенджеров и активации иммунных клеток.

Острые воспалительные реакции являются защитными, но без своевременного разрешения могут привести к хроническому воспалению. Бурное развитие липидомиики позволило идентифицировать новые липидные дериваты арахидоновой, эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот, участвующие в разрешении воспалительного процесса – проразрешающие медиаторы [124]. Предполагается, что эти медиаторы играют ключевую роль в сдерживании и разрешении воспаления. Обнаруженное нами снижение содержания 20:5n-3 в мембранах эритроцитов больных БА и ХОБЛ указывает на дефицит субстрата синтеза простаноидов 3-й серии и лейкотриенов 5-й серии, что формирует дисбаланс между про- и противовоспалительными, бронхоконстрикторными и бронходилатационными медиаторами жирных кислот.

Можно заключить, что поддержание системного хронического воспаления при заболеваниях легких осуществляется биологически активными метаболитами полиненасыщенных ЖК – провоспалительными эйкозаноидами. Выявленная ассоциация между модификацией состава ЖК и нарушением иммунных механизмов регуляции системного воспаления при ХОБЛ и БА свидетельствует о важном значении ЖК и их оксипроизводных в персистенции воспалительного процесса при заболеваниях бронхолегочной системы в период ремиссии.

Роль модификации состава жирных кислот клеточных органелл в утяжелении хронических заболеваний органов дыхания

В мультифакторном генезе хронических заболеваний органов дыхания ведущие роли принадлежат системным эффектам воспаления и окислительному стрессу [139]. На клеточно-молекулярном уровне индукция перечисленных выше патологических процессов может быть детерминирована нарушением ультраструктуры и функционирования важной клеточной органеллы – митохондрии (МХ).

Известно, что альтерация митохондриального аппарата клеток лежит в основе патогенеза ишемической болезни сердца, нейродегенеративных заболеваний, развития фиброзных изменений в печени и многих других патологических процессов [462]. Исследования в этой области, ведущиеся по всему миру, свидетельствуют об актуальности изучения МХ и процессов, протекающих в этих органеллах. Эффективное функционирование митохондрий связано с интегральной целостностью их мембранных структурных компонентов, важнейшими из которых являются жирные кислоты. Основной пул ЖК преимущественно вовлечен в окислительные энергетические процессы и поддержание мембранного гомеостаза митохондрий, что способствует нормальному функционированию всей клетки в целом [48; 50]. Можно предположить, что в ответ на изменение концентрации и соотношения ЖК происходит реорганизация липидного состава мембраны, которая и детерминирует повышение проницаемости мембраны митохондрии, развитие митохондриальной дисфункции и формирование гипоксии, окислительного стресса. Патологические нарушения состава ЖК мембран митохондрий проявляются в неспособности клеточной органеллы поддерживать электрохимический градиент ионов водорода на внутренней мембране, эффективно осуществлять окислительное фосфорилирование, производство АТФ и сбалансированный митохондриальный Ca^{2+} -ионный гомеостаз, несмотря на наличие кислорода и субстратов окисления [320]. Повышение проницаемости внутренней мембраны митохондрии является первым нарушением, за которым следует апоптоз клеток или их гибель по типу некроза [50]. Изучение процессов, протекающих в митохондриях, необходимо для понимания механизмов многих физиологических процессов и патофизиологических изменений в различных органах и тканях, в том числе при заболеваниях органов дыхания.

Для установления роли нарушения липидома клеточных органелл в прогрессировании хронических заболеваний органов дыхания изучена модификации состава жирных кислот мембран митохондрий

клеток крови у больных ХОБЛ разной степени тяжести и пациентов с контролируемой и частично контролируемой БА [48].

Состав жирных кислот мембран митохондрий больных ХОБЛ. В исследование включено 48 больных ХОБЛ стабильного течения легкой и средней степени тяжести (30 мужчин и 18 женщин; средний возраст 62 ± 4 года). Контрольную группу составили 29 практически здоровых лиц, не курящих, с нормальной функцией внешнего дыхания, среднего возраста 37 ± 5 лет. Митохондрии из клеток крови получали стандартным методом дифференциального центрифугирования в среде, содержащей сахарозу в концентрации 0,75М, 0,5% раствора бычьего сывороточного альбумина (BSA), 0,01М раствор фосфатного буфера. Анализ состава ЖК проводили методом ГЖХ.

У пациентов с ХОБЛ разной степени тяжести выявлялись однонаправленные изменения в содержании насыщенных (14:0, 16:0) и моноеновых ЖК (16:1n-9, 16:1n-7, 18:1n-9, 18:1n-7) (табл. 13). Максимальное снижение доли перечисленных выше кислот было установлено в группе пациентов ХОБЛ средней степени тяжести. В исследуемых группах больных ХОБЛ различия были выявлены среди основных полиненасыщенных жирных кислот как n-6, так и n-3 семейств. В частности, в мембране митохондрий выявлены высокие значения линолевой кислоты (18:2n-6) относительно здоровых пациентов. Однако, относительное содержание другой эссенциальной ЖК – α -линоленовой (18:3n-3) у лиц с ХОБЛ напротив значительно снижалось. Причем с утяжелением заболевания дефицит 18:3n-3 усиливался. Похожая картина выявлялась и в содержании других ПНЖК n-3 (20:5n-3, 22:5n-3, 22:6n-3) у пациентов с ХОБЛ. Динамика в уровнях ПНЖК n-6 характеризовалась значительным повышением доли арахидоновой кислоты (20:4n-6) у пациентов с ХОБЛ по сравнению с контрольной группой [16; 47; 48].

Обобщая данные об изменении в относительном содержании индивидуальных ПНЖК, можно отметить, что с утяжелением течения

бронхолегочной патологии усугубляется дефицит ПНЖК n-3 на фоне увеличения доли некоторых n-6 ПНЖК (20:4n-6, 22:4n-6). Суммарное значение процентного содержания ПНЖК n-3 в мембране митохондрий у лиц с ХОБЛ было пониженным, тогда как сумма ПНЖК n-6 повышалась более чем в 2 раза.

Таблица 13

Состав ЖК мембран митохондрий тромбоцитов у пациентов с ХОБЛ (М+m)

Жирные кислоты митохондрий, %	Контрольная группа, n = 29	Пациенты с ХОБЛ легкой степени тяжести, n=27	Пациенты с ХОБЛ средней степени тяжести, n=21
12:0	0,56±0,05	0,47±0,05	0,38±0,02*
14:0	2,90±0,16	2,17±0,18*	1,84±0,08* ⁺
16:0	28,25±0,75	23,89±1,02*	21,09±0,91*
18:0	18,71±0,33	20,06±1,85	19,06±1,04*
20:0	0,74±0,03	0,68±0,04	0,67±0,08
16:1n-9	1,65±0,07	0,98±0,12*	0,89±0,08* ⁺
16:1n-7	1,68±0,10	1,08±0,19*	1,04±0,19*
18:1n-9	14,39±0,43	13,03±0,80*	12,03±0,07*
18:1n-7	1,78±0,07	1,26±0,13*	1,22±0,09*
18:2n-6	6,06±0,72	10,81±1,24*	11,55±0,93*
18:3n-6	0,36±0,02	0,28±0,04*	0,23±0,01*
18:3n-3	0,51±0,04	0,31±0,05*	0,18±0,04* ⁺
20:3n-6	0,62±0,06	0,76±0,04	0,44±0,08* ⁺
20:4n-6	6,31±0,44	16,58±0,41*	16,31±0,41*
20:5n-3	0,80±0,07	0,47±0,10*	0,34±0,07*

Окончание таблицы 13

22:4n-6	0,83±0,09	1,35±0,18*	0,95±0,08 ^{×+}
22:5n-6	1,24±0,04	0,61±0,04*	0,41±0,05 ^{*+}
22:5n-3	0,67±0,06	0,28±0,05*	0,31±0,07 ^{*+}
22:6n-3	1,45±0,13	0,48±0,11*	0,56±0,09*
Сумма НЖК	51,16±2,51	42,27±1,14*	43,04±1,07*
Сумма МЖК	19,5±1,07	16,6±1,12*	15,45±1,04*
Сумма ПНЖК n-3	3,43±0,09	1,54±0,08*	1,39±0,04 ^{*+}
Сумма ПНЖК n-6	15,42±1,54	30,39±2,04*	29,89±2,31*

Примечание: (*) статистическая значимость различий относительно контрольной группы; (+) – статистическая значимость различий относительно пациентов с ХОБЛ легкой степени тяжести.

Анализ липидома митохондрий тромбоцитов больных ХОБЛ указывает на модификацию состава ЖК митохондриальных мембран при хронических заболеваниях органов дыхания. Изменение состава структурной составляющей митохондриальной мембраны логичным образом будет влиять на функциональную активность митохондрий и на способность адекватно выполнять присущие ей функции, в том числе энергетические и окислительно-восстановительные.

Состав жирных кислот мембраны митохондрий больных БА. В исследовании приняли участие 50 человек. Из них 20 пациентов с контролируемой БА, 10 – с частично контролируемой БА, принимавших базисную терапию, в возрасте 23 – 57 лет ($37,4 \pm 2,36$ лет). В контрольную группу вошли 20 здоровых добровольцев в возрасте 23 – 55 лет ($32,2 \pm 8,2$ лет), не курящих и никогда не куривших, без отягощенного аллергического анамнеза. Особенностью состава ЖК субклеточной мембраны у больных контролируемой БА стало истощение основного пула насыщенных жирных кислот (12:0, 14:0, 18:0) (табл. 14). Тогда как при БА частично контролируемого течения

установлено увеличение доли 14:0, 18:0. В обеих группах наблюдалось увеличение доли моноеновой ЖК 18:1n-9. Среди ПНЖК в мембране митохондрий больных БА не зависимо от степени тяжести отмечалось падение доли арахидоновой (20:4n-6), эйкозапентаеновой (20:5n-3), докозапентаеновой (22:5n-3 и докозатетраеновой (22:4n-6).

Таблица 14

Состав ЖК мембран митохондрий тромбоцитов у пациентов с бронхиальной астмой ($M \pm m$)

ЖК митохондрий, %	Контрольная группа, n = 20	Больные БА, n = 30	
		Контролируемая БА, n = 20	Частично контролируемая БА, n = 10
12:0	0,56±0,05	0,43±0,03**	—
14:0	2,90±0,16	2,19±0,10***	3,92±0,22***
16:0	28,25±0,75	29,08±0,94	29,69±0,54
18:0	18,71±0,33	14,75±0,74***	21,38±0,15*
20:0	0,69±0,04	0,80±0,04*	0,74±0,07
22:0	0,92±0,07	0,50±0,05***	0,49±0,05***
16:1n-9	1,65±0,07	1,06±0,10***	2,04±0,24***
16:1n-7	1,68±0,10	2,40±0,15***	1,44±0,11
18:1n-9	14,39±0,43	18,82±0,56***	18,89±0,9***
18:1n-7	1,78±0,07	1,65±0,12	1,56±0,13
18:2n-6	9,56±0,72	9,37±0,62	13,43±1,26***
18:3n-6	0,36±0,02	0,33±0,01	0,35±0,08
20:3n-6	0,62±0,06	0,44±0,14	—
20:4n-6	6,31±0,44	3,87±0,47***	2,56±0,21***

Окончание таблицы 14

22:4n-6	0,83±0,09	0,48±0,14**	0,59±0,13***
22:5n-6	0,24±0,04	0,20±0,06	0,10±0,01***
18:3n-3	0,51±0,04	0,53±0,04	0,32±0,03***
20:5n-3	0,80±0,07	0,64±0,06*	0,31±0,02***
22:5n-3	0,67±0,06	0,45±0,04***	0,26±0,06***
22:6n-3	1,45±0,13	1,45±0,20	0,62±0,06***

Примечание: (*) – статистическая значимость различий относительно контрольной группы:

* – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

Полученные результаты свидетельствуют о модификации состава ЖК мембран митохондрий у больных БА независимо от тяжести течения. В то же время выраженность и направленность этих изменений имела свои особенности. Так, при БА контролируемого течения в мембране митохондрий выявлено истощение уровня большинства насыщенных ЖК (12:0, 14:0, 18:0, 22:0) и некоторых полиненасыщенных ЖК (20:4n-6, 22:4n-6, 20:5n-3, 22:5n-3). Особенностью модификации состава ЖК мембран митохондрий тромбоцитов больных частично контролируемого течения БА стал выраженный дефицит ПНЖК в ряду n-3 и n-6 семейств на фоне накопления насыщенных (14:0, 18:0) и моноеновых (16:1n-9, 18:1n-9).

Одной из причин дефицита ПНЖК является интенсивное их расходование на синтез биологически активных медиаторов – эйкозаноидов, оказывающих мощный провоспалительный и бронхоконстрикторный эффекты. Многочисленными исследованиями показано, что при БА гиперсекреция лейкотриена, тромбоксана и простагландина обуславливает уменьшение уровня их предшественников в цитомембране. Нами впервые показано, что и мембрана митохондрий подвергается существенной реорганизации, что возможно, и обуславливает сложный механизм патогенеза БА.

С утяжелением заболевания увеличение дефицита ПНЖК в мембране митохондрий является логичным явлением, поскольку при частично контролируемой БА усложняется фармакологический контроль за регуляцией иммунных механизмов, в том числе и синтезом эйкозаноидов [10; 35; 47].

Выявленное снижение насыщенных ЖК в мембране клеточных органелл указывает на недостаток энергетического субстрата. Известно, что для митохондрий основным источником энергии и предпочтительными для окисления являются короткоцепочечные 6:0-10:0, среднецепочечные 12:0-14:0 и длинноцепочечная 16:0 насыщенные жирные кислоты. При недостатке вышеперечисленных жирных кислот митохондрии в качестве субстрата для β -окисления начинают использовать моноеновые кислоты и глюкозу. Возможно, накопление моноеновых кислот в митохондриальной мембране при БА – это проявление компенсаторной реакции в ответ на снижение доли среднецепочечных насыщенных ЖК, поскольку олеиновая, пальмитолеиновая кислоты являются следующими субстратами, которые митохондрии предпочитают окислять и для которых в митохондриях существуют все ферментные и транспортные системы. Однако, снижение насыщенности митохондриальной мембраны всегда свидетельствует об энергодефиците клетки в целом.

Дисбаланс в составе ЖК митохондриальной мембраны, формирующийся в условиях хронических заболеваний органов дыхания, приводит к существенной перестройке архитектоники крист митохондрий, нарушая, тем самым, структурно-функциональные свойства как самой клетки, так и ее субклеточных структур. Нарушение состава ЖК субклеточных мембран может обуславливать неспособность митохондрий поддерживать электрохимический градиент ионов водорода на внутренней мембране, с потерей способности эффективно осуществлять окислительное фосфорилирование, производство АТФ и сбалансированный митохондриальный Ca^{2+} ионный гомеостаз.

Выявленные изменения в структурно-функциональном состоянии митохондрий у лиц с ХОБЛ и БА свидетельствуют о нарушении энергетической активности, мембранной проницаемости и транспорта веществ, что является признаком формирования митохондриальной дисфункции. Все эти изменения детерминируют развитие гипоксии и гибель клетки по механизму апоптоза. Развитие клеточной гипоксии приводит к деструктивным процессам в ключевых структурных компонентах дыхательной системы – слизистой оболочке бронхиальных путей, и создают условия к формированию структурно-функциональной базы постоянного обструктивного состояния.

Можно заключить, что митохондриальная дисфункция, развивающаяся вследствие нарушения жирнокислотного состава мембран митохондрий, играет важную роль в механизме прогрессирования хронических заболеваний органов дыхания. Полученные результаты исследования необходимо учитывать при выборе способов профилактики и лечения больных с бронхолегочной патологией. При лечении пациентов с заболеваниями легких акцент должен быть сделан не только на воспалительный процесс, но и на предотвращение или устранение нарушений в митохондриях, энергетических и окислительно-восстановительных процессах клетки. Уточнение роли структурно-функционального состояния митохондрий в формировании заболеваний системы органов дыхания позволит своевременно выявлять риски развития и осложнения бронхиальной обструкции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких создают огромное экономическое бремя для общества. Нехватка эффективных методов лечения данных заболеваний является следствием недостаточного понимания патогенетических механизмов, лежащих в основе их формирования и прогрессирования. Благодаря современным достижениям молекулярной биологии, раскрыты многие механизмы воспалительного процесса. Основу БА и ХОБЛ составляет хроническое воспаление дыхательных путей, которое опосредовано различными клетками и медиаторами, а также изменениями активности их функций. Актуальным на сегодняшний день остается изучение сигнальных путей, участвующих в модуляции хронического воспаления, которые практически не раскрыты.

Среди множества биохимических медиаторов воспаления важную роль отводят цитокинам, эндоканнабиноидам, сигнальным молекулам нитроксидэргической и липоксигеназной систем, изучение которых позволяет выявить нарушения на клеточном и субклеточном уровнях.

Ключевую роль в воспалительном процессе играют цитокины, их растворимые и мембранные рецепторы. Они выполняют функции медиаторов иммунной системы, регулируют силу, продолжительность иммунного ответа и воспалительного процесса. Для защиты от избыточных проявлений системного воспаления в организме включаются механизмы контроля, опосредованные продукцией противовоспалительных цитокинов, растворимых ингибиторов провоспалительных цитокинов, индуцирующие

развитие глубокой иммунодепрессии. Клинически это проявляется хронизацией воспаления, нарушением процессов репарации, утяжелением течения заболевания.

Каскад цитокинопосредованных регуляторных нарушений сопровождается активацией синтеза эйкозаноидов, участвующих в вазоконстрикции, агрегации, стимуляции лейкоцитов на хемотаксис. При этом ключевая регуляторная роль отводится простагландинам, тромбоксанам и лейкотриенам, являющимся основными медиаторами воспалительного ответа на начальном этапе его формирования и недавно открытым новым классам биологически активных соединений – липидным медиаторам разрешения воспаления (резолвины, маресины, протектины, липоксины).

Главными субстратами биосинтеза эйкозаноидов является арахидоновая кислота, метаболиты которой обладают высокой провоспалительной, бронхо- и вазоконстрикторной активностью и жирные кислоты n-3 семейства – эйкозапентаеновая и докозагексаеновая. Эйкозаноиды, образованные из этих жирных кислот проявляют либо слабые провоспалительные свойства, либо противовоспалительные, вазодилатационные, антитромботические эффекты.

Модификация профиля ЖК в липидах цитомембран манифестирует не только изменение синтеза эйкозаноидов. Она является причиной нарушения физико-химических свойств плазматических мембран, понижения их жидкостности, экспрессии рецепторов, мембранной проницаемости и транспорта веществ. От состояния липидного каркаса мембраны и, соответственно, её жидкостности зависят многие функции иммунокомпетентных клеток: секреция, хемотаксис, чувствительность к микроорганизмам. В связи с чем модификация состава ЖК цитомембран является важным фактором нарушения регуляторных механизмов воспалительного процесса, развития и прогрессирования заболеваний органов дыхания.

Еще один важный метаболит арахидоновой кислоты, участвующий в регуляции биохимических и иммунных процессов клеток – анандамид. Этаноламид арахидоновой кислоты, или анандамид, идентифицирован как эндогенный лиганд каннабиноидных рецепторов. Эндоканнабиноидная система – это универсальная сигнальная система, выполняющая в организме важные функции – от регуляции баланса энергии, метаболизма углеводов и липидов до участия в реализации иммунного ответа. Клетки синтезируют различные молекулярные виды эндогенных каннабиноидов. Анандамид стимулирует секрецию арахидоновой кислоты и ее метаболитов. Именно эта способность эндогенных каннабиноидов влиять на метаболизм АК представляет определенную значимость в реализации иммунного ответа. Каннабиноидные рецепторы 2-го типа, которые локализуются главным образом на клетках иммунной системы, способны регулировать уровень медиаторов воспаления, ограничивать их выделение, контролировать воспалительный процесс на стадии физиологической защиты. При взаимодействии с производными арахидоновой кислоты CB2 рецепторы оказывают влияние на дифференцировку и активацию иммунокомпетентных клеток, выработку провоспалительных цитокинов и хемокинов. Все это свидетельствует об особом месте эндоканнабиноидной системы в регуляторных механизмах воспалительного процесса.

Важным звеном, участвующим в регуляторных механизмах иммунометаболического ответа клетки и опосредующим интенсивность воспалительных процессов, являются вторичные мессенджеры нитрооксидэргической системы. Эта сигнальная система имеет универсальные механизмы регуляции различных физиологических и патфизиологических процессов в организме. Оксид азота отнесен к новому классу сигнальных молекул, выполняет функцию регулятора прооксидантных, антиоксидантных, иммунных процессов.

NO играет ключевую роль практически во всех биологических аспектах респираторной системы и участвует в патофизиологии

многих заболеваний органов дыхания. Точная патофизиологическая роль NO в заболеваниях бронхолегочной системы неоднозначна.

В настоящее время стало очевидным, что не только вирусные и бактериальные инфекции, но и неинфекционные воспалительные заболевания сопровождаются активацией систем воспалительного ответа и развитием хронического воспаления, связанного с нарушением в регуляции системы Толл-подобных рецепторов. Как показывают современные исследования различных авторов, TLRs инициируют запуск внутриклеточных сигнальных путей и активацию воспалительных генов в ответ на действие триггерных факторов, к которым относят не только PAMPs и DAMPs, но и холестерин, экзогенные и эндогенные жирные кислоты, а также окисленные формы фосфолипидов. Сигнальные пути TLRs направлены на активацию провоспалительных ядерных транскрипционных факторов (AP-1 и NF-κB). В то же время, активность AP-1 и NF-κB подавляется противовоспалительными ядерными транскрипционными факторами (GR и PPARs). Взаимоотношения между TLRs, провоспалительными и противовоспалительными ядерными факторами могут служить важной мишенью для разработки стратегий управления активностью воспалительного процесса при ХОБЛ и БА.

В процессе развития воспаления PPARs и GR стимулируются рядом естественных и синтетических активаторов, что приводит к модуляции провоспалительной реакции и предотвращению ее чрезмерной активации. Значительный интерес представляет изучение терапевтической эффективности естественных агонистов PPARs (ПНЖК, эйкозаноиды, эндоканнабиноиды, эндогенные специализированные проразрешающие медиаторы) для разработки схем комбинированной терапии ХОБЛ и БА.

В патогенез ХОБЛ и БА вовлечены не только механизмы хронического воспаления, запускаемые иммунными реакциями, но и механизмы нейрогенного воспаления. Высокая чувствительность бронхов к действию природно-климатических факторов связана с нарушением

регуляции чувствительных афферентных нервов дыхательных путей и развитием хронического нейрогенного воспаления. Стимуляция С-волокон легких сопровождается высвобождением нейропептидов (SP, VIP, CGRP и др.). При длительно протекающем воспалении дыхательных путей наблюдается дисбаланс между стимулирующими и ингибирующими нейропептидами. Кашлевой рефлекс также имеет сложный нейрогенный путь и регулируется блуждающими, чувствительными афферентными нервами, которые иннервируют дыхательные пути. В механизмах воспаления и ремоделирования дыхательных путей особый вклад принадлежит представителям одного из подсемейств нейротрофических факторов роста – подсемейства нейротрофинов (NGF, BDNF, NT3, NT4). Его участие в патофизиологических механизмах развития нейроиммунного воспаления при бронхолегочных заболеваниях является предметом пристального изучения в настоящее время. Стоит отметить, что регуляция активности нейротрофических факторов роста и регуляторных нейропептидов, вовлеченных в патогенез нейрогенного воспаления при ХОБЛ и БА, находится в стадии изучения.

Чувствительность ноцицепторов легких связана с активностью каналов TRP. Активация TRP каналов, экспрессируемых в клетках, отличных от нейрональных, связана с преимущественным влиянием эндогенных факторов. Регуляция данных каналов различными эндогенными и экзогенными стимулами делает их чрезвычайно привлекательной терапевтической мишенью. Особый интерес представляет возможность применения специфических регуляторов активности ионных каналов с транзиторным рецепторным потенциалом в дыхательных путях.

Итак, в основе хронических заболеваний респираторной системы лежит системный воспалительный процесс, включающий комплекс иммунных и биохимических нарушений регуляции внутри- и межклеточной сигнализации, дисбаланс кооперативного взаимодействия клеток.

В настоящей монографии представлен взгляд авторов, а также суммированы современные представления других исследователей на участие сигнальных молекул и их рецепторов в регуляторных механизмах системного воспаления, их роль в контроле рисков развития и осложнения бронхиальной обструкции при ХОБЛ и БА. Актуальность дальнейшего изучения метаболических и сигнальных путей хронического воспаления несомненна для установления перспективных молекулярных мишеней терапии обструктивных заболеваний органов дыхания.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АГ –	арахидоноилглицерол
АК –	арахионовая кислота
АПК –	антиген-презентирующие клетки
БА -	бронхиальная астма
ВЭБ–	вирус Эпштейна-Барра
ГКС –	глюкокортикостероиды
ГТФаза Ras –	гуанозинтрифосфат-связывающая гидролаза семейства Ras
ГЭРБ –	гастро-эзофагально-рефлюксная болезнь
ДГК –	докозагексаеновая кислота
ЖК –	жирные кислоты
ИМТ –	индекс массы тела
ЛМ –	легочные макрофаги
МЛ –	моноклеарные лейкоциты
МХ –	митохондрии
НПВП –	нестероидные противовоспалительные препараты
НЭЖК –	неэстерифицированные жирные кислоты
ОЕЛ –	общая емкость легких
ООЛ –	остаточный объем лёгких
ОФВ1 –	объем форсированного выдоха за 1 сек
ПНЖК –	полиненасыщенные жирные кислоты
ПСВ –	пиковая скорость выдоха
ФВД –	функция внешнего дыхания
ФЖЕЛ –	форсированная жизненная емкость легких
ФЛ -	фосфолипиды
ФОЕ –	функциональная остаточная ёмкость
ХОБЛ –	хроническая обструктивная болезнь легких
цАМФ –	аденозинмонофосфат
ЭПК –	эйкозапентаеновая кислота
ABCA1 –	АТР-связывающий кассетный белок (от англ. АТР binding cassette protein A1)

ADAM –	дезинтегрин и металлопротеиназа (от англ. a disintegrin and metalloproteinase)
AhR –	арил-гидрокарбоновый рецептор (от англ. aryl hydrocarbon receptor)
AMPK –	аденозинмонофосфат-активируемая протеинкиназа (от англ. adenosine monophosphate-activated protein kinase)
AP-1 –	активирующий протеин-1 (от англ. activating protein-1)
ARTN –	лиганд для рецепторного комплекса GFR- альфа-3-RET, (от англ. Artemin)
ATF – (ATF2, ATF3/LRF1, B-ATF, JDP1, JDP2)	активирующие факторы транскрипции (от англ. activating transcription factors)
ATF3 –	активирующий фактор транскрипции 3 (от англ. activating transcription factors 3)
BDNF –	нейротрофический фактор головного мозга (от англ. brain-derived neurotrophic factor)
bFGF –	базовый фактор роста фибробластов (от англ. basic fibroblast growth factor)
BSA –	бычий сывороточный альбумин (от англ. bovine serum albumin)
CAT–	оценочный тест на ХОБЛ (от англ. COPD Assessment Test)
CB –	каннабиноидный рецептор (от англ. cannabinoid receptor)
CCL2, 5, 7, 8, 20 –	хемокиновый лиганд 2 с мотивом C-C (от англ. C-C motif chemokine ligand 2)
CGRP –	кальцитонин-ген-регулирующий пептид (от англ. calcitonin gene related peptide)
CHOP –	гомологичный белок C/EBP (от англ. C/EBP homologous protein)

CNTF –	цилиарный нейротрофический фактор (от англ. ciliary neurotrophic factor)
COX –	циклооксигеназа (от англ. cyclooxygenase)
CRP –	С-реактивный белок (от англ. C-reactive protein)
CYP –	цитохром Р450 (от англ. cytochrome P450)
DAMPs –	молекулярные паттерны ассоциированные с повреждением (от англ. damage associated molecular patterns)
dsRNA –	двухцепочечная РНК (от англ. double-stranded RNA)
EET –	эпоксиэйкозатриеновая кислота (от англ. epoxyeicosatrienoic acid)
Egr-1 –	фактор-1 раннего ростового ответа (от англ. Early growth response factor)
ERK –	внеклеточная сигнальная киназа (от англ. Extracellular signal regulated kinases)
FASN –	синтаза жирных кислот (от англ. fatty acid synthase)
Fos (v-Fos, c-Fos, FosB, Fra1, Fra2) –	субъединица фактора транскрипции AP-1
Fos, Jun, Muc, Egr –	семейство генов раннего ответа
FoxP3 –	фактор транскрипции (от англ. Forkhead box P3)
GATA –	транскрипционный фактор
G-CSF –	гранулоцитарно-колониестимулирующий фактор (от англ. granulocyte colony-stimulating factor)
GDNF –	глиальная клеточная линия производная нейротрофическому фактору (от англ. Glial cell line derived neurotrophic factor)

GM-CSF –	гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (от англ. granulocyte-macrophage colony- stimulating factor)
GR –	рецептор глюкокортикоидов (от англ. glucocorticoid receptor) HETE – гидроксййкозатетраеновая кислота (от англ. Hydroxyeicosatetraenoic acid)
HIF-1 α –	фактор 1 альфа, индуцируемый гипоксией (от англ. Hypoxia-inducible factor 1-alpha)
HMGB 1 –	1 негистоновый ядерный белок (от англ. high-mobility group protein box 1)
HODE –	гидроксййоктадекановая кислота (от англ. Hydroxyoctadecanoic acid)
HSP –	белок теплового шока (от англ. heat shock protein)
IEGs –	гены раннего ответа (от англ. immediately early genes)
IFN –	интерферон (от англ. interferon)
Ig –	иммуноглобулин (от англ. immunoglobulin)
IGF1/2 –	рецептор инсулиноподобного фактора роста- 1/2 (от англ. insulin-like growth factor-1/2 receptor)
IL-1R, IL-6R –	рецепторы интерлейкина (от англ. Interleukin- 1 receptor, Interleukin-6 receptor)
ILC2s –	врожденные лимфоидные клетки группы 2 (от англ. Innate lymphoid cells group 2)
ILs –	интерлейкины (от англ. Interleukins)
iNOS –	индуцибельная синтаза оксида азота (от англ. Inducible nitric oxide synthase)

IRF-3 –	регуляторный фактор интерферона 3 (от англ. Interferon regulatory factor-3)
IκB–	киназа ингибитор ядерного фактора каппа В белок
IKK –	гетеродимерная киназа IκB (от англ. IκB kinase)
JAK –	киназа Януса (от англ. Janus kinase)
JNK –	семейство протеинкиназ (от англ. c-Jun N-terminal kinases) Jun (v-Jun, c-Jun, JunB, JunD) – семейства бел- ков-активаторов фактора транскрипции
LBD –	связывающий домен лиганда (от англ. Ligand binding domain)
LBP-LPS –	связывающий белок липополисахарид (от англ. Lipopolysaccharide binding protein)
LIF –	фактор ингибирования лейкемии (от англ. Leukemia inhibitory factor)
LOX –	липоксигеназа (от англ. Lipoxygenase)
LPS –	липпополисахарид (от англ. Lipopolysaccharide)
LRR domain –	домен, обогащенный лейциновыми повторами (от англ. Leucine-rich repeat domain)
LT –	лейкотриены (от англ. Leukotrienes)
LTRAs –	антагонисты лейкотриеновых рецепторов (от англ. Leukotriene receptor antagonists)
LTSIs –	ингибиторы синтеза лейкотриенов (от англ. Leukotriene synthesis inhibitors)
LX –	липоксины (от англ. Lipoxins)
MAF (c-Maf, MafB, MafA, MafG/F/K) –	факторы транскрипции семейства Maf

MAP3K19 –	митоген-активируемая протеинкиназа киназа киназы 19 (от англ. Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 19)
MAPK –	митоген-активированные протеинкиназы (от англ. Mitogen-activated protein kinase)
MaR –	марезины
MD-2 –	фактор миелоидной дифференцировки-2 (Myeloid differentiation factor-2)
MRS –	модифицированная шкала Рэнкина (от англ. Modified Rankin Scale)
MUC5AC –	муцин, белок, кодирующийся у человека в ген <i>MUC5AC</i> (от англ. от англ. Mucin 5AC)
MyD88 —	миелоидная дифференцировка первичной реакции 88 (от англ. Myeloid differentiation primary response 88)
NANC –	неадренергическая нехолинергическая нервная система (от англ. Non-adrenergic Non-cholinergic transmitter)
NEP –	нейтральная эндопептидаза (от англ. Neutral endopeptidase)
NF-E2-Nrf2 –	связанный с ядерным фактором эритроид-2 фактор 2 (от англ. Nuclear factor erythroid-2 related factor-2)
NF-κB –	ядерный фактор каппа В (от англ. nuclear factor-каппа В)
NGF –	фактор роста нервных клеток (от англ. nerve growth factor)
NK cells –	естественные клетки-убийцы (от англ. Natural killer cells)

NK1-R (TACR-1) –	рецептор нейрокинина-1 (рецептор тахикинина) (от англ. Neurokinin-1 receptor (Tachykinin receptor))
NLRP3 –	узловой рецептор содержащий пириновый домен-3 (от англ. Nod-like receptor with pyrin domain containing-3)
NOS –	синтаза оксида азота (от англ. Nitric oxide synthase)
NPY –	нейропептид Y (от англ. Neuropeptide Y)
NT –	нейротрофин (от англ. Neurotrophin)
NTR –	Нейротурин (от англ. Neuroturin)
Ox-PLs –	окисленные формы фосфолипидов (от англ. Oxidized forms of phospholipids)
P38, ERK, p65 –	киназы, регулируемые внеклеточными сигналами (от англ. Extracellular signal-regulated kinases)
p47-phox (NCF1) –	цитозольный фактор нейтрофилов (от англ. Neutrophil cytosolic factor-1)
PAMPs –	патоген-ассоциированные молекулярные паттерны (от англ. Pathogen-associated molecular patterns)
РАРС –	фосфолипид: 1-пальмитоил-2-арахидоноил-sn-глицеро-3- фосфохолин (от англ. 1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3- phosphocholine)
PCFs –	пробиотические клеточные фрагменты (от англ. Probiotical cell fragments)
PD –	протектин
PGI2 –	простациклин - высокоактивный метаболит арахидоновой кислоты (от англ. prostacyclin)

PGs –	простагландины (от англ. prostaglandins)
PI3K –	фосфоинозитид-3-киназа (от англ. Phosphoinositide 3-kinases)
PIP2 –	фосфатидилинозитол 4,5-бисфосфат (от англ. Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (Ptdins (4,5) P2)
PLs –	фосфолипиды (от англ. Phospholipids)
PNEC –	нейроэндокринные клетки легких (от англ. Pulmonary neuroendocrine cells)
PPARs –	рецепторы, активирующие пролиферацию пероксисом (от англ. Peroxisome proliferator-activated receptors)
PRRs –	рецепторы распознавания образов (от англ. Pattern recognition receptors)
PSPN –	персефин (от англ. Persephin)
PUFAs –	полиненасыщенные жирные кислоты (от англ. Polyunsaturated fatty acids)
RAGE –	рецептор конечных продуктов гликирования (от англ. Receptor for advanced glycation end-products)
RelA (p65), RelB, c-Rel, p50/p105, p52/p100 –	члены семейства NF-κB1
RIG-1 –	ген-1, индуцируемый ретиноевой кислотой retinoic (от англ. Retinoic acid inducible gene-1)
RORγt –	орфанный рецептор, связанный с ретиноевой кислотой γt (от англ. Retinoic acid related orphan receptor γt)
RSV –	респираторно-синцитиальный вирус (от англ. Respiratory syncytial virus)
RVs –	резольвины (от англ. Resolvins)

S100 –	группа кальций-связывающих белков S100 (от англ. S100 calcium-binding proteins)
SFAs –	насыщенные жирные кислоты (от англ. Saturated fatty acids)
SHP2 –	область 2 домена гомологии Src содержащая фосфатаза-2 (от англ. Src homology region 2 domains containing phosphatase-2)
SIRT1 –	сиртуин-1 (от англ. Sirtuin-1)
SP –	ундекапептид - член семейства нейропептидов тахикинина (от англ. Substance P)
SPM –	эндогенные специализированные про- разрешающие медиаторы (от англ. Specialized pro-resolving mediators)
SREBP –	белок связывающий регуляторный элемент стерола (от англ. Sterol regulatory element- binding protein)
ssRNA –	вирус одноцепочечной РНК (или (+) вирус оцРНК) (от англ. single-stranded RNA)
STAT (1,3,4,5,6) –	сигнальный преобразователь и активатор бел- ков транскрипции (от англ. Signal Transducer and Activator of Transcription)
STAT3-ROR γ t –	преобразователь сигналов и активатор транскрипции-3 связанный с орфанным рецеп- тором γ t (от англ. Signal transducer and activa- tor of transcription3-related orphan receptor γ t)
TGF –	трансформирующий фактор роста (от англ. Transforming growth factor)
Th (Th0, Th1, Th2, Th17) –	Т-хелперные клетки (от англ. T helper cells)

TICAM 1,2 –	адаптерная молекула, содержащая домен TIR-1,2 (от англ. TIR domain-containing adapter molecule 1,2)
TIMP-1 –	тканевой ингибитор металлопротеиназы-1 (от англ. Tissue inhibitor of metalloproteinase-1)
TIR domain –	домен гомологии toll / интерлейкина-1 рецептора (от англ. Toll/interleukin-1 receptor homology domain)
TIRAP –	домен рецептора toll-интерлейкина 1 (TIR) содержащий адаптерный белок (от англ. Toll-interleukin 1 receptor (TIR) domain containing adaptor protein)
TLRs –	толл-подобные рецепторы (от англ. Toll-like receptors)
TNFR –	рецептор фактора некроза опухоли (от англ. Tumour necrosis factor receptor)
TNF- α –	фактор некроза опухоли α (от англ. Tumour necrosis factor α)
TRAIL –	фактор некроза опухоли связанный с апоптоз-индуцирующим лигандом (от англ. Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand)
TRE –	ТРА-чувствительный элемент (от англ. TPA-responsive element)
Treg cells –	регуляторные Т-клетки (естественные (nTregs), индуцибельные (iTregs))
TREM-1 –	запускающий рецептор, экспрессируемый на миелоидных клетках (от англ. Triggering receptor expressed on myeloid cells)
TRIF –	интерферон- β содержащий адаптер индуцирующий TIR-домен (от англ. TIR domain-containing adapter inducing IFN- β)

TrkA, TrkB, TrkC –	тирозинкиназные рецепторы (от англ. Tyrosine kinases receptors)
TRP –	транзиторный рецепторный потенциал (от англ. Transient Receptor Potential)
TRPA –	транзиторный рецепторный потенциал анкириновых (от англ. Transient receptor potential ankyrin)
TRPC –	канонические каналы с транзиторным рецепторным потенциалом (от англ. canonical Transient Receptor Potential channels)
TRPM –	меластатиновые каналы с транзиторным рецепторным потенциалом (от англ. melastatin Transient Receptor Potential channels)
TRPML –	муколиптиновые каналы с транзиторным рецепторным потенциалом (от англ. mucolipin Transient Receptor Potential channels)
TRPN –	не воспринимающие механическое воздействие транзиторные рецепторные потенциалы (от англ. no mechanopotential Transient Receptor Potential)
TRPP –channels	полицистиновые каналы с транзиторным рецепторным потенциалом (от англ. polycystin Transient Receptor Potential)
TRPV –	ваниллоидные каналы с транзиторным рецепторным потенциалом (от англ. vanilloid Transient Receptor Potential channels)
TSLP –	стромальный лимфопоэтин тимуса (от англ. Thymic stromal lymphopoietin)
TXs–	тромбоксаны (от англ. Thromboxanes)
ТYK –	тирозинкиназа (от англ. Tyrosine kinase)

Список сокращений

VEGF –	фактор роста эндотелия сосудов (от англ. Vascular endothelial growth factor)
VIP –	вазоактивный кишечинальный нейрорептид (от англ. Vasoactive intestinal peptide)
VPAC-1(2) –	вазоактивный кишечный пептидный рецептор (от англ. Vasoactive intestinal peptide receptor-1,2)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдеев, С.Н. Терапия ХОБЛ: все ли мы делаем для оптимального контроля заболевания / С.Н. Авдеев // Эффективная фармакотерапия. – 2013. - № 10. – С. 58–60.
2. Ассоциация метаболизма жирных кислот с системной воспалительной реакцией при хронических заболеваниях органов дыхания / Ю.К. Денисенко, Т.П. Новгородцева, Н.В. Жукова, [и др.] // Биомедицинская химия. – 2016. – Т. 62, № 3. – С. 341–347.
3. Белоглазов, В.А. Эффективность применения селективного ингибитора фосфодиэстеразы-4 в комплексной терапии больных с перекрестным синдромом бронхиальная астма/хроническая обструктивная болезнь легких / В.А. Белоглазов, Ю.О. Попенко, А.И. Гордиенко // Пульмонология. – 2015. – Т. 25, № 3. – С. 327–332.
4. Бережная, Н.М. Семейство интерлейкинов-17 / Н.М. Бережная, Р.И. Сепиашвили // Аллергология и иммунология. – 2015. – № 1. – С. 154–164.
5. Бочарова Н.В. Уровень метаболитов оксида азота в крови пациентов с хроническими заболеваниями органов дыхания / Н.В. Бочарова, Т.П. Новгородцева // Здоровье. Медицинская экология. Наука. – 2017. – Т. 71, № 4. – С. 27–31.
6. Виткина, Т.И. Изменение экспрессии рецептора к IL-6 на поверхности иммунокомпетентных клеток при прогрессировании хронической обструктивной болезни легких / Т.И. Виткина, Ю.К. Денисенко, К.А. Сидлецкая // Медицинская иммунология. – 2017. – Т. 19, № 2. – С. 191–196.
7. Виткина, Т.И. Роль интерлейкин-6 сигналинга в развитии системного воспаления при хронической обструктивной болезни легких / Т.И. Виткина, К.А. Сидлецкая // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. – Вып. 69. – 2018. – С. 97–106.
8. Виткина, Т.И. Уровни сывороточного IL-4 и экспрессия его рецептора на Т-хелперах периферической крови пациентов с хронической обструктивной болезнью легких / Т.И. Виткина, К.А. Сидлецкая,

- Е.Е. Минеева // Здоровье. Медицинская экология. Наука. – 2017. – Т. 71, № 4. – С. 40–44.
9. Граник, В.Г. Оксид азота: (NO). Новый путь к поиску лекарств / В.Г. Граник, Н.Б. Григорьев. - М.: Вузовская книга, 2015. – 360 с.
10. Значение жирных кислот в развитии митохондриальной дисфункции при бронхиальной астме / Ю.К. Денисенко, Т.П. Новгородцева, Т.И. Виткина, [и др.] // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – Т.10, № 2. – С. 205–209.
11. Иммунные механизмы формирования бронхиальной астмы контролируемого и частично контролируемого течения / Т.И. Виткина, Т.П. Новгородцева, Е.П. Калинина [и др.] // Медицинская иммунология. – 2019. – Т. 21, № 3. – С. 495–502.
12. Иммунологические маркеры неконтролируемого течения атопической бронхиальной астмы у детей / М.В. Смольникова, С.В. Смирнова, Н.А. Ильенкова, О.С. Коноплева // Медицинская иммунология. – 2017. – Т. 19, № 4. – С. 453–460.
13. Исаченко, Е.Г. Влияние лиганда каннабиноидного рецептора WIN 55,212-2 на выработку TNF- α человеческими мононуклеарными клетками / Е.Г. Исаченко, Т.И. Виткина, Е.В. Бердышев // Эксперим. и клин. фармакология. – 2004. – Т. 67, № 2. – С. 49–50.
14. Исаченко, Е.Г. Влияние лигандов каннабиноидных рецепторов WIN 55,212-2 и анандамида на выработку TNF- α и ИЛ-8 лейкоцитами крови здоровых лиц и больных с аллергопатологией / Е.Г. Исаченко, Т.И. Виткина, Е.В. Бердышев // Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2003. – № 2. – С. 86–91.
15. Исаченко, Е.Г. Дозозависимое действие лиганда каннабиноидных рецепторов анандамида на реактивность иммунокомпетентных клеток у здоровых доноров и лиц с аллергопатологией / Е.Г. Исаченко, Т.И. Виткина, Е.В. Бердышев // Здоровье. Мед. Экология. Наука. – 2003. - № 3–4. – С. 93–95.
16. К вопросу о митохондриальной дисфункции при хронической обструктивной болезни легких / Т.П. Новгородцева, Т.И. Виткина,

М.В. Антонюк, Н.В. Жукова // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. – 2016. – Вып. 60. – С. 28–33.

17. Калинина, Е.П. Иммунометаболические фенотипы хронической обструктивной болезни легких у мужчин / Е.П. Калинина, Е.Г. Лобанова, М.В. Антонюк // Медицинская иммунология. – 2014. – Т. 16, № 4. – С. 375–380.

18. Калинина, Е.П. Особенности цитокинового профиля у больных хронической обструктивной болезнью легких / Е.П. Калинина, Е.Г. Лобанова // Медицинская иммунология. – 2012. – Т. 14, № 6. – С. 501–506.

19. Караман (Денисенко), Ю.К. Нарушение синтеза эйкозаноидов у больных с метаболическим синдромом / Ю.К. Караман (Денисенко), Е.Г. Лобанова, Н.С. Юбицкая // Клиническая медицина. – 2010. – № 3. – С. 46–49.

20. Караман (Денисенко), Ю.К. Эндоканнабиноиды и эйкозаноиды: биосинтез, механизмы их взаимосвязи, роль в иммунных процессах / Ю.К. Караман (Денисенко), Е.Г. Лобанова // Медицинская иммунология. – 2013. – Т. 15, № 2. – С. 119–130.

21. Клинико-иммунологическое сопоставление при Th-зависимых механизмах иммунного ответа у больных хронической обструктивной болезнью легких / Е.П. Калинина, Т.И. Виткина, В.В. Кнышова [и др.] // Медицинская иммунология. – 2018. – Т. 20, № 6. – С. 855–864.

22. Кузнецова, В.Л. Оксид азота: свойства, биологическая роль, механизмы действия / В.Л. Кузнецова, А.Г. Соловьева // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4. – С. 462–472.

23. Курбачева, О.М. Фенотипы и эндотипы бронхиальной астмы: от патогенеза и клинической картины к выбору терапии / О.М. Курбачева, К.С. Павлова // Российский аллергологический журнал. – 2013. – № 1. – С. 15–24.

24. Кытикова, О.Ю. Современные аспекты распространенности хронических бронхолегочных заболеваний / О.Ю. Кытикова,

- Т.А. Гвозденко, М.В. Антонюк // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. – 2017. – Вып. 64. – С. 94–100.
25. Лобанова, Е.Г. Влияние лигандов каннабиноидных рецепторов на реактивность иммунокомпетентных клеток / Е.Г. Лобанова. - Изд. Lambert Academic Publishing. – 2011. – 117 с.
26. Лобанова, Е.Г. Влияние озонированного физиологического раствора на активность эндоканнабиноидной системы / Е.Г. Лобанова, Ю.К. Караман // Медицинский альманах. – 2013. – Т. 27, № 3. – С. 72–73.
27. Лобанова, Е.Г. Влияние синтетических лигандов каннабиноидных рецепторов на экспрессию эйкозаноидов *in vitro* / Е.Г. Лобанова // Бюлл. СО РАМН. – 2012. – Т. 32, № 2. – С. 5–8.
28. Лобанова, Е.Г. Действие синтетических лигандов каннабиноидных рецепторов на реактивность иммунокомпетентных клеток *in vitro* / Е.Г. Лобанова // Медицинская иммунология. – 2009. – Т. 11, № 2–3. – С. 261–264.
29. Лобанова, Е.Г. Особенности содержания цитокинов Th1- и Th17-лимфоцитов у лиц с хронической обструктивной болезнью легких / Е.Г. Лобанова, Е.П. Калинина, Ю.К. Денисенко // Медицинская иммунология. – 2016. – Т. 18, №3. – С. 287–290.
30. Лобанова, Е.Г. Роль эндоканнабиноидных рецепторов в регуляции иммунного ответа / Е.Г. Лобанова // Медицинская иммунология. – 2012. – Т. 14, № 3. – С. 189–194.
31. Лобанова, Е.Г. Участие эндоканнабиноидной системы в регуляции процессов воспаления / Е.Г. Лобанова // Труды института медицинской климатологии и восстановительного лечения /науч. ред.: Т.А. Гвозденко, Т.П. Новгородцева. – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2014. – С. 179–196.
32. Лобанова, Е.Г. Экспрессия эндоканнабиноидного периферического рецептора второго типа на иммунокомпетентных клетках при активации иммунной системы *in vivo* / Е.Г. Лобанова // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. – 2012. – Вып. 44. – С. 55–61.

-
33. Мартусевич, А.К. Генераторы оксида азота для медицинского применения: современное состояние вопроса / А.К. Мартусевич, А.В. Разумовский // Вятский медицинский вестник. – 2017. – № 1. – С. 43–47.
34. Метаболические аспекты взаимосвязи ожирения и бронхиальной астмы / О.Ю. Кытикова, М.В. Антонюк, Т.А. Гвозденко, Т.П. Новгородцева // Ожирение и метаболизм. – 2018. – Т. 15, № 4. – С. 9–14.
35. Морфо-функциональное состояние митохондрий клеток крови при бронхиальной астме / Ю.К. Денисенко, Т.П. Новгородцева, Е.В. Кондратьева [и др.] // Клиническая медицина. – 2015. – Т. 93, № 10. – С. 47–52.
36. Ненашева, Н.М. Фенотипы бронхиальной астмы и выбор терапии / Н.М. Ненашева // Практическая пульмонология. – 2014. – № 2. – С. 2–11.
37. Новиков, Д.К. Иммунологические фенотипы хронической обструктивной болезни легких: перспективы иммунокоррекции / Д.К. Новиков, О.В. Смирнова // Вестник ВГМУ. – 2014. – Т. 13. № 4. – С. 102–109.
38. Нурдина, М.С. Взаимосвязь уровня IL-17, IL-10 со степенью контроля бронхиальной астмы / М.С. Нурдина, В.И. Купаев // Вестник современной клинической медицины. – 2017. – Т. 10. № 3. – С. 35–38.
39. Окислительный стресс. Проксиданты и антиоксиданты / Е.Б. Меньщикова, В.З. Ланкин, Н.К. Зенков, И.А. Бондарь, Н.Ф. Круговых, В.А. Труфакин - М.: Фирма Слово. – 2006. – 556 с.
40. Особенности регуляции воспаления у пациентов с бронхиальной астмой / Е.Г. Лобанова, Е.П. Калинина, Ю.К. Денисенко, Т.И. Виткина // Аллергология и иммунология. – 2016. – Т. 17, № 1. – С. 33.
41. Особенности синтеза оксида азота у больных астмой и хронической обструктивной болезни легких / З.О. Дзускаева, Р.В. Еналдиева, С.А. Амбалова, [и др.] // Кубанский науч. мед. вестник. – 2015. – Т. 152, № 3. – С. 27–31.

42. Оценка риска развития обострений у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких / М.В. Антонюк, Т.П. Новгородцева, А.В. Юренко [и др.] // Здоровье. Медицинская экология. Наука. – 2017. – Т. 71, № 4. – С. 11–15.
43. Патент 2370773. Российская Федерация. МПК G01N 33/53 (2006.01). Способ прогноза прогрессирования хронической обструктивной болезни легких № 2008125586/15 заявл. 23.06.2008: опубл. 20.10.2009 / Е.П. Калинина, Е.Г. Лобанова, Е.М. Иванов – 5 с.
44. Патент № 2595853. Российская Федерация. МПК G01N 33/53 (2006.01) Способ прогнозирования инфекционного осложнения хронической обструктивной болезни легких Л № 2015132563/15 заявл. 04.08.2015: опубл. 27.08.2016 / Е.П. Калинина, Е.Г. Лобанова, Т.П. Новгородцева, М.В. Антонюк – 4с.
45. Перспективы использования природных алкил-глицеринов в таргетной терапии бронхиальной астмы, ассоциированной с ожирением (обзор литературы) / Т.П. Новгородцева, О Ю. Кытикова, Т А. Гвозденко, М.В. Антонюк // Сибирский научный медицинский журнал. – 2018. – Т. 38, № 6. – С. 103–110.
46. Сергеева, М.Г. Каскад арахидоновой кислоты / М.Г. Сергеева, А.Т. Варфоломеева. – М.: Народное образование. – 2006. – 256 с.
47. Состав жирных кислот мембран митохондрий тромбоцитов при хронических заболеваниях органов дыхания / Ю.К. Денисенко, Т.П. Новгородцева, Т.И. Виткина [и др.] // Клиническая медицина. – 2018. – Т. 96, № 4. – С. 343–347.
48. Спектр жирных кислот мембран митохондрий тромбоцитов больных хроническим необструктивным бронхитом / Ю.К. Денисенко, Т.И. Виткина, Т.П. Новгородцева [и др.] // Бюл. физиол. и патол. дыхания. – 2013. – Вып. 50. – С. 34–38.
49. Субпопуляции Т-регуляторных клеток при бронхиальной астме и гетерогенных фенотипах хронической обструктивной болезни легких / Н.А. Кириллова, И.А. Деев, Е.Э. Кремер [и др.] // Бюллетень сибирской медицины. – 2011. – № 1. – С. 48–54.

-
50. Титов, В.Н. Функция митохондрий, карнитин, коэнзим-А, жирные кислоты, глюкоза, цикл Рендла и инсулин. / В.Н. Титов // Клин. лаб. диагностика – 2012. – № 2. – С. 32–42.
51. Титова, Н.Д. Оценка иммунокорректирующего эффекта глюкозаминил-мурамилпептида при бронхиальной астме у детей / Н.Д. Титова, В.И. Новикова // Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2017. – № 1. – С. 31–36.
52. Т-клеточная иммунорегуляция и уровень цитокинов у больных хронической обструктивной болезнью легких / Е.Г. Лобанова, Е.П. Калинина, Т.И. Виткина [и др.] // Медицинская иммунология. – 2015. – № 17(S). – С. 69–70.
53. Уровень цитокинов в плазме крови некурящих и курящих пациентов с хронической обструктивной болезнью легких / А.Г. Кадушкин, А.Д. Таганович, Л.В. Картун [и др.] // Пульмонология. – 2013. – № 6. – С. 27–32.
54. Хроническая обструктивная болезнь легких: проблемы сегодняшнего дня / А.С. Белевский, А.А. Визель, С.К. Зырянов [и др.] // Практическая пульмонология. – 2015. – № 3. – С. 18–23.
55. Чернеховская, Н.Е. Роль оксида азота в патологии органов дыхания / Н.Е. Чернеховская, А.В. Поваляев // Эндоскопия. – 2012. – № 3. – С. 28–36.
56. Экспрессия иммунокомпетентными клетками эндоканнабиноидного CB2 рецептора при хронической обструктивной болезни легких / Е.Г. Лобанова, Ю.К. Караман, П.В. Борщев, Т.А. Гвозденко // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. – 2013. – Вып. 47. – С. 31–35.
57. Эффективность противовоспалительной терапии у пациентов с тяжелой формой бронхиальной астмы и холодовой гиперреактивностью дыхательных путей / А.Б. Пирогов, А.Г. Приходько, Д.А. Гассан [и др.] // Пульмонология. – 2018. – Т. 28. № 5. – С. 576–583.
58. A distinct mechanism for activating uncoupled nicotinic acetylcholine receptors / C.J.B. Da Costa, L. Dey, J.P.D. Therien, J.E. Baenziger //

Nat Chem Biol. – 2013, Vol. 9, 701. doi:10.1038/nchembio.1338.

59. A novel subset of CD4(+) T(H)2 memory/effector cells that produce inflammatory IL-17 cytokine and promote the exacerbation of chronic allergic asthma / Y.H. Wang, K.S. Voo, B. Liu et al // J Exp Med. 2010, Vol. 207(11), P. 2479–2491.

60. A pathogenic role for tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand in chronic obstructive pulmonary disease / T.J. Haw, M.R. Starkey, P.M. Nair et al // Mucosal Immunol. 2016, Vol. 9, P. 859–872. doi: 10.1038/mi.2015.111.

61. A polyphenol-rich pomegranate fruit extract suppresses NF- κ B and IL-6 expression by blocking the activation of IKK β and NIK in primary human chondrocytes / A. Haseeb, N.M. Khan, O.S. Ashruf, T.M. Haqqi // Phytother Res. 2017, Vol. 31, P. 778–782.

62. A role for sensory nerves in the late asthmatic response / K. Raemdonck, J. de Alba, M.A. Birrell et al // Thorax. 2012, Vol. 67, P. 19–25. doi: 10.1136/thoraxjnl-2011-200365.

63. A toll-like receptor 2/6 agonist reduces allergic airway inflammation in chronic respiratory sensitisation to Timothy grass pollen antigens / B. Fuchs, S. Knothe, S. Rochlitzer et al // Int Arch Allergy Immunol. 2010, Vol. 152, P. 131–139. doi: 10.1159/000265534.

64. ABCA1 and ABCG1 protect against oxidative stress-induced macrophage apoptosis during efferocytosis / L. Yvan-Charvet // Circulation research. 2010, Vol. 106, P. 1861–1869. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.110.217281.

65. Activating Transcription Factor 3 Is Essential for Cigarette Smoke-Induced Mucin Expression via Interaction with Activator Protein-1 / W. Wu et al // Am J Pathol. 2017, Vol. 187(2), P. 280–291. doi: 10.1016/j.ajpath.2016.10.012.

66. Activation of PPAR γ suppresses proliferation and induces apoptosis of esophageal cancer cells by inhibiting TLR4-dependent MAPK pathway / K. Wu, Y. Yang, D. Liu et al // Oncotarget. 2016, Vol. 7(28), P. 44572–82. doi: 10.18632/oncotarget.10067.

-
67. Activation of transient receptor potential ankyrin-1 (TRPA1) in lung cells by wood smoke particulate material / D. Shapiro, C.E. Deering-Rice, E.G. Romero et al // *Chem Res Toxicol*. 2013, Vol. 26, P. 750–758. doi: 10.1021/tx400024h.
68. Acute cold hypersensitivity characteristically induced by oxaliplatin is caused by the enhanced responsiveness of TRPA1 in mice / M. Zhao, K. Isami, S. Nakamura et al // *Mol Pain*. 2012, Vol. 8, 55. doi: 10.1186/1744-8069-8-55.
69. Adiponectin in asthma and obesity: protective agent or risk factor for more severe disease? / R. De Lima Azambuja, L.S.E. da Costa Santos Azambuja, S. Costa, R. Rufino // *Lung*. 2015, Vol. 193(5), P. 749–755. doi: 10.1007/s00408-015-9793-8.
70. Administration of chlorogenic acid alleviates spinal cord injury via TLR4/NF κ B and p38 signaling pathway anti inflammatory activity / D. Chen, D. Pan, S. Tang et al // *Mol Med Rep*. 2018, Vol. 17(1), P. 1340–1346. doi: 10.3892/mmr.2017.7987.
71. Advanced role of neutrophils in common respiratory diseases / J. Liu, Z. Pang, G. Wang et al // *J Immunol Res*. 2017, Vol. 2017, 6710278. doi: 10.1155/2017/6710278.
72. Advances in distinguishing natural from induced Foxp3(+) regulatory T cells / X. Lin, M. Chen, Y. Liu et al // *Int J Clin Exp Pathol*. 2013, Vol. 6(2), P. 116–123.
73. Airway epithelial cell PPAR γ modulates cigarette smoke-induced chemokine expression and emphysema susceptibility in mice / S.K. Solleti, D.M. Simon, S. Srisuma et al // *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol*. 2015, Vol. 309(3), P. 293–304. doi:10.1152/ajplung.00287.2014.
74. Airway epithelial TSLP production of TLR2 drives type 2 immunity in allergic airway inflammation / J. Lv, Q. Yu, J. Lv et al // *Europ J Immunol*. 2018, Vol. 48(11), P. 1838–1850. doi: 10.1002/eji.201847663.
75. Airway inflammation in COPD after long-term withdrawal of inhaled corticosteroids / L.I. Kunz, N.H. Ten Hacken, T.S. Lapperre et al // *Europ*

- Respir J. 2017, Vol. 49(1), 1600839. doi: 10.1183/13993003.00839-2016.
76. Allergens as immunomodulatory proteins: the cat dander protein Fel d 1 enhances TLR activation by lipid ligands / J. Herre, H. Gronlund, H. Brooks et al // J Immunol. 2013, Vol. 191, P. 1529–1535. doi: 10.4049/jimmunol.1300284.
77. Allergic airway inflammation induces the migration of dendritic cells into airway sensory ganglia / D.D. Le, S. Rochlitzer, A. Fischer et al // Respir Res. 2014, Vol. 15, 73. doi: 10.1186/1465-9921-15-73.
78. Altaf, M. Cost-effectiveness analysis of three different combinations of inhalers for severe and very severe chronic obstructive pulmonary disease patients at a tertiary care teaching hospital of South India / M. Altaf, A.M. Zubedi, F. Nazneen et al // Perspect Clin Res. 2015, № 6, P. 150–158.
79. Alteration of the irisin–brain-derived neurotrophic factor axis contributes to disturbance of mood in COPD patients / C. Papp, K. Pak, T. Erdei et al // Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017, Vol. 12, P. 2023–2033. doi: 10.2147/COPD.S135701.
80. Amato, G. A patent update on cannabinoid receptor 1 antagonists (2015-2018) / G. Amato, N.S. Khan, R. Maitra // Expert Opin Ther Pat. 2019, Vol. 29(4), P. 261–269. doi: 10.1080/13543776.2019.1597851.
81. An official ats clinical practice guideline: interpretation of exhaled nitric oxide levels (FeNO) for clinical applications / R.A. Dweik, P.B. Boggs, S.C. Erzurum et al // Am J Respir Crit Care Med. 2011, Vol. 184(5), P. 602–615. doi: 10.1164/rccm.9120-11ST.
82. An unexpected link between fatty acid synthase and cholesterol synthesis in proinflammatory macrophage activation / R.G. Carroll, Z. Zaslona, S. Galván-Peña et al // J Biol Chem. 2018, Vol. 293(15), P. 5509–5521. doi: 10.1074/jbc.RA118.001921.
83. Analysis of airway pathology in COPD using a combination of computed tomography, micro-computed tomography and histology / N. Tanabe, D.M. Vasilescu, M. Kirby et al // Europ Respir J. 2018, Vol. 51, 1701245. doi: 10.1183/13993003.01245-2017.

-
84. Anandamide and arachidonic acid use epoxyeicosatrienoic acids to activate TRPV4 channels / H. Watanabe, J. Vriens, J. Prenen et al // *Nature*. 2003, Vol. 424, P. 434–438. doi: 10.1038/nature01807.
85. Anti-inflammatory activity of dehydroandrographolide by TLR4/NF- κ B signaling pathway inhibition in bile duct-ligated mice / Z. Weng, Y. Chi, J. Xie et al // *Cell Physiol Biochem*. 2018, Vol. 49(3), P. 1083–1096. doi: 10.1159/000493292.
86. Antisense oligonucleotide treatment enhances the recovery of acute lung injury through IL-10-secreting M2-like macrophage-induced expansion of CD4⁺ regulatory T cells / Z. Guo, Z. Wen, A. Qin et al // *J Immunol*. 2013, Vol. 190, P. 4337–4348.
87. Apomorphine is a bimodal modulator of TRPA1 channels / A. Schulze, B. Oehler, N. Urban et al // *Mol Pharmacol*. 2013, Vol. 83, P. 542–551. doi: 10.1124/mol.112.081976.
88. Argueta, D.A. Peripheral endocannabinoid signaling controls hyperphagia in western diet-induced obesity / D.A. Argueta, N.V. DiPatrizio // *Physiol Behav*. 2017, Vol. 171, P. 32–39. doi: 10.1016/j.physbeh.2016.12.044.
89. Ashour, D.S. Toll-like receptor signaling in parasitic infections / D.S. Ashour // *Expert Rev Clin Immunol*. 2015, Vol. 11, P. 771–780. doi: 10.1586/1744666X.2015.1037286.
90. Association between chronic obstructive pulmonary disease and systemic inflammation: systematic review and meta-analysis / W.Q. Gan, S.F. Man, A. Senthilselvan, D.D. Sin // *Thorax*. 2004, Vol. 59(7), P. 574 – 580.
91. Association of COPD exacerbation frequency with gene expression of pattern recognition receptors in inflammatory cells in induced sputum / D. Kinose, E. Ogawa, M. Kudo et al // *Clin Respir J*. 2016, Vol. 10(1), P. 11–21. doi: 10.1111/crj.12171.
92. Association of high sensitive CRP level and COPD assessment test scores with clinically important predictive outcomes in stable COPD patients/ H. Ghobadi, N. Fouladi, K. Beukaghazadeh, K. Ansarin //

Tanaffos. 2015, Vol. 14, P. 34–41.

93. Asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) – differences and similarities / V. Cukic, V. Lovre, D. Dragisic, A. Ustamujic // *Mater Sociomed.* 2012, Vol. 24(2), P. 100–105. doi: 10.5455/msm.2012.24.100-105.

94. Asthma endotypes: a new approach to classification of disease entities within the asthma syndrome / J. Lötvall, C.A. Akdis, L.B. Bacharier et al // *J Allergy Clin Immunol.* 2011, Vol. 127(2), P. 355–360.

95. Asthma: An Undermined State of Immunodeficiency / E.A. Christou, G. Giardino, E. Stefanaki, F. Ladomenou // *Int Rev Immunol.* 2019, Vol. 38(2), P. 70–78. doi: 10.1080/08830185.2019.1588267.

96. Asthmatics exhibit altered oxylipin profiles compared to healthy individuals after subway air exposure / S.L. Lundström, B. Levänen, M. Nording et al // *PLoS One.* 2011, Vol. 6(8), P. 238–264.

97. Atanasova, K.R. Neuropeptides in asthma, chronic obstructive pulmonary disease and cystic fibrosis / K.R. Atanasova, L.R. Reznikov // *Respir Res.* 2018, Vol. 19, 149. doi: 10.1186/s12931-018-0846-4.

98. Autoimmunity and COPD: clinical implications / G. Caramori, P. Ruggeri, A. Di Stefano et al // *Chest.* 2018, Vol. 153, P. 1424–1431. doi: 10.1016/j.chest.2017.10.033.

99. Azzam, K.M. Crosstalk between reverse cholesterol transport and innate immunity / K.M. Azzam, M.B. Fessler // *Trends Endocrinol Metab.* 2012, Vol. 23, P. 169–178. doi: 10.1016/j.tem.2012.02.001

100. Baggelaar, M.P. 2-Arachidonoylglycerol: a signaling lipid with manifold actions in the brain / M.P. Baggelaar, M. Maccarrone, M. van der Stelt // *Prog Lipid Res.* 2018, Vol. 71, P. 1–17. doi: 10.1016/j.plipres.2018.05.002.

101. Banner, K.H. TRP channels: emerging targets for respiratory disease / K.H. Banner, F. Igney, C. Poll // *Pharmacol Ther.* 2011, Vol. 130, P. 371–384. doi: 10.1016/j.pharmthera.2011.03.005.

102. Barden, A.E. n-3 Fatty acid supplementation and proresolving mediators of inflammation / A.E. Barden, E. Mas, T.A Mori // *Curr Opin*

Lipidol. 2016, Vol. 27(1), P. 26–32.

103. Barnes, P.J. Immunology of asthma and chronic obstructive pulmonary disease / P.J. Barnes // *Nat Rev Immunol.* 2008, Vol. 8(3), P. 183-192.

104. Barnes, P.J. Mediators of chronic obstructive pulmonary disease / P.J. Barnes // *Pharmacol Rev.* 2004, Vol. 56, P. 515–548.

105. Barnes, P.J. Targeting cytokines to treat asthma and chronic obstructive pulmonary disease / P.J. Barnes // *Nat Rev Immunol.* 2018, Vol. 18, P. 454–466. doi: 10.1038/s41577-018-0006-6.

106. Barrios, J. Neurotrophins in Asthma / J. Barrios, X. Ai // *Curr Allergy Asthma Rep.* 2018, Vol. 18(2), P. 10. doi: 10.1007/s11882-018-0765-y.

107. Battista, N. The endocannabinoid system: an overview / N. Battista, M. Tommaso, M. Bari // *Front Behav Neurosci.* 2012, Vol. 6, 9 doi: 10.3389/fnbeh.2012.00009.

108. Baxter, M. The role of TRPV1 in tobacco smoke induced airway inflammation / M. Baxter, M.A. Birrell, M.G. Belvisi // *Am J Respir Crit Care Med.* 2012, Vol. 201, A6410. doi: 10.1164/ajrccm-conference.2012.185.1_MeetingAbstracts. A6410.

109. Becerra-Díaz, M. New perspectives on the regulation of type II inflammation in asthma / M. Becerra-Díaz, M. Wills-Karp, N.M. Heller // *F1000Res.* 2017, Vol. 6, 1014.

110. Bekhbat, M. Checks and Balances: the Glucocorticoid Receptor and NFκB in Good Times and Bad / M. Bekhbat, S.A. Rowson, G.N. Neigh // *Front Neuroendocrinol.* 2017, Vol. 46, P. 15–31. doi: 10.1016/j.yfrne.2017.05.001.

111. Belvisi, M.G. The emerging role of transient receptor potential channels in chronic lung disease / M.G. Belvisi, M.A. Birrell // *Europ Respir J.* 2017, Vol. 50(2). P. 1–15. doi: 10.1183/13993003.01357-2016.

112. Bian, X. Ca²⁺ releases E-Syt1 autoinhibition to couple ER-plasma membrane tethering with lipid transport / X. Bian, Y. Saheki, P. De Camilli // *EMBO J.* 2018. Vol. 37, P. 219–234. doi: 10.15252/embj.201797359.

113. Biwer, L.A. Endoplasmic reticulum mediated signaling in cellular microdomains / L.A. Biwer, B.E. Isakson // *Acta Physiol (Oxf)*. 2017, Vol. 219(1), P. 162–175. doi: 10.1111/apha.12675.
114. Blockage of nerve growth factor modulates T cell responses and inhibits allergic inflammation in a mouse model of asthma / Y. Shi, Y. Jin, W. Guo et al // *Inflamm Res*. 2012, Vol. 61(12), P. 1369-1378. doi: 10.1007/s00011-012-0538-3
115. Bocek, P. Interferon-g enhances both in vitro and in vivo priming of CD4⁺T cells for IL-4 production / P. Bocek, G. Foucras, W.E. Paul // *J Exp Med*. 2004, Vol. 199(12), P. 1619–1630.
116. Brain-derived neurotrophic factor enhances calcium regulatory mechanisms in human airway smooth muscle / A.J. Abcejo, V. Sathish, D.F. Smelter et al // *PloS One*. 2012, Vol. 7(8), P. 1–11. doi.org/10.1371/journal.pone.0044343.
117. Brain-derived neurotrophic factor in cigarette smoke-induced airway hyperreactivity / V. Sathish, S.K. Vanoosten, B.S. Miller et al // *Am J Respir Cell Mol Biol*. 2013, Vol. 48, P. 431–438.
118. Brain-derived neurotrophic factor induces proliferation of human airway smooth muscle cells / B. Aravamudan, M. Thompson, C. Pabelick, Y.S. Prakash // *J Cell Mol Med*. 2012, Vol. 16, P. 812–823.
119. Brash, A.R. Arachidonic acid as a bioactive molecule / A.R. Brash // *J Clin Invest*. 2001, Vol. 107, P. 1339–1345.
120. Brencicova, E. Nucleic acids and endosomal pattern recognition: how to tell friend from foe? / E. Brencicova, S.S. Diebold // *Front Cell Infect Microbiol*. 2013, Vol. 3, 37. doi: 10.3389/fcimb.2013.00037.
121. Bronchial inflammation and bacterial load in stable COPD is associated with TLR4 overexpression / A. Di Stefano, F.L. Ricciardolo, G. Caramori et al // *Europ Respir J*. 2017, Vol. 49, 1602006. doi: 10.1183/13993003.02006-2016.
122. Buckley, C.D. Proresolving Lipid Mediators and Mechanisms in the Resolution of Acute Inflammation / C.D. Buckley, D.W. Gilroy, C.N. Serhan // *Immunity*. 2014, Vol. 40(3), P. 315–327.

-
123. Busillo, J.M. The five Rs of glucocorticoid action during inflammation: ready, reinforce, repress, resolve, and restore / J.M. Busillo, J.A. Cidlowski // *Trends in Endocrinology and Metabolism*. 2013, Vol. 24, P. 109–119. doi: 10.1016/j.tem.2012.11.005.
124. Calder, P.C. N-3 fatty acids, inflammation and immunity: new mechanisms to explain old actions / P.C. Calder // *Proc Nutr Soc*. 2013, Vol. 72, P. 326–36.
125. Calder, P.C. Omega-3 fatty acids and inflammatory processes: from molecules to man / P.C. Calder // *Biochem Soc Trans*. 2017, Vol. 45(5), P. 1105–1115.
126. Cannabinoid derivatives acting as dual PPAR γ /CB2 agonists as therapeutic agents for systemic sclerosis / A. García-Martín, M. Garrido-Rodríguez, C. Navarrete et al // *Biochem Pharmacol*. 2019, Vol. 163, P. 321–334. doi: 10.1016/j.bcp.2019.02.029.
127. Cannabinoid facilitation of behavioral and biochemical hedonic taste responses / M.A. De Luca, M. Solinas, Z. Bimpisidis et al // *Neuropharmacology*. 2012, Vol. 63, P. 161–168. doi: 10.1016/j.neuropharm.2011.10.018.
128. Carolan, B.J. Clinical phenotypes of chronic obstructive pulmonary disease and asthma: Recent advances / B.J. Carolan, E.R. Sutherland // *J Allergy Clin Immunol*. 2013, Vol. 131(3), P. 627–634.
129. Carr, T.F. Small airways disease and severe asthma / T.F. Carr, R. Altisheh, M. Zitt // *World Allergy Organization Journal*. 2017, Vol. 10, 20.
130. Casares, D. Membrane Lipid Composition: Effect on Membrane and Organelle Structure, Function and Compartmentalization and Therapeutic Avenues / D. Casares, P.V. Escribá, C.A. Rosselló // *Int J Mol Sci*. 2019, Vol. 20, 2167. doi: 10.3390/ijms20092167.
131. CB1 and CB2 cannabinoid receptors differentially regulate the production of reactive oxygen species by macrophages / K.H. Han, S. Lim, J. Ryu et al // *J Cardiovasc Res*. 2009, Vol. 84(3), P. 378–386.

132. CB2 receptors regulate natural killer cells that limit allergic airway inflammation in a murine model of asthma / M.E. Ferrini, S. Hong, A. Stierle et al // *Allergy*. 2017, Vol. 72(6), P. 937–947. doi: 10.1111/all.13107.
133. Ceramide Imbalance and Impaired TLR4-Mediated Autophagy in BMDM of an ORMDL3-Overexpressing Mouse Model / K. Kiefer, J. Casas, R. García-López, R. Vicente // *Int J Mol Sci*. 2019, Vol. 20(6), 1391. doi: 10.3390/ijms20061391.
134. Changes of NGF pathway in allergic rhinoconjunctivitis: a conjunctival allergen challenge study / M. Sacchetti, M. Segatto, A. Bruscolini et al // *Allergy*. 2018, Vol. 74, P. 604–634. doi: 10.1111/all.13641.
135. Characteristics of COPD patients according to GOLD classification and clinical phenotypes in the Russian Federation: the SUPPORT trial / V.D. Arkhipov, D. Arkhipova, M. Miravittles et al // *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis*. 2017, Vol. 12, P. 3255–3262.
136. Chemosensory functions for pulmonary neuroendocrine cells / X. Gu, P.H. Karp, S.L. Brody et al // *Am J Respir Cell Mol Biol*. 2014, Vol. 50, P. 637–646. doi: 10.1165/rcmb.2013-0199OC.
137. Cheung, P.F.Y. Molecular mechanisms of cytokine and chemokine release from eosinophils activated by IL-17A, IL-17F, and IL-23: implication for Th17 lymphocytes-mediated allergic inflammation / P.F.Y. Cheung, C.K. Wong, C.W.K. Lam // *J Immunol*. 2008, Vol. 180(8), P. 5625–5635.
138. Chiu, I.M. Neurogenic inflammation and the peripheral nervous system in host defense and immunopathology / I.M. Chiu, C.A. von Hehn, C.J. Woolf // *Nat Neurosci*. 2012, Vol. 15, P. 1063–1067.
139. Chronic Obstructive Pulmonary Disease / Y. Hattab, S. Alhasans, M. Balaan, et al // *Crit Care Nurs Q*. 2016, Vol. 39(2), P. 124–304.
140. Churg, A. Series “matrix metalloproteinases in lung health and disease”: matrix metalloproteinases in COPD / A. Churg, S. Zhou, J.L. Wright // *Europ Respir J*. 2012, Vol. 39, P. 197–209.

-
141. Cigarette smoke exposure decreases CFLAR expression in the bronchial epithelium, augmenting susceptibility for lung epithelial cell death and DAMP release / A. Faiz, I.H. Heijink, C.J. Vermeulen et al // *Sci Rep*. 2018, Vol. 8(1), 12426. doi: 10.1038/s41598-018-30602-7.
142. Cigarette smoke extract increases vascular endothelial growth factor production via TLR4/ROS/MAPKs/NF-kappaB pathway in nasal fibroblast / J.M. Shin, J.H. Park, H.J. Kim et al // *Am J Rhinol Allergy*. 2017, Vol. 31. P. 78–84. 10.2500/ajra.2017.31.4415.
143. Cigarette smoke induces CXCL8 production by human neutrophils via activation of TLR9 receptor / E. Mortaz, I.M. Adcock, K. Ito, et al // *Europ Respir J*. 2010, Vol. 36(5), P. 1143–1154. doi: 10.1183/09031936.00062209.
144. Cigarette smoke reversibly activates hypoxia-inducible factor 1 in a reactive oxygen species-dependent manner / H. Daijo, Y. Hoshino, S. Kai et al // *Sci Rep*. 2016, Vol. 6, 34424. doi: 10.1038/srep34424.
145. Cigarette smoke upregulates SPRR3 by favoring c-Jun/Fra1 heterodimerization in human bronchial epithelial cells / X. Hu, N. Peng, F. Qi et al // *Future Oncol*. 2018. Vol. 14(25), P. 2599-2613. doi: 10.2217/fon-2018-0043.
146. Cigarette smoke-induced airway goblet cell secretion: dose-dependent differential nerve activation / H.P. Kuo, J.A. Rohde, P.J. Barnes, D.F. Rogers // *Am J Phys*. 1992, Vol. 263, P. 161–167.
147. Cigarette smoke-induced damage-associated molecular pattern release from necrotic neutrophils triggers proinflammatory mediator release / I.H. Heijink, S.D. Pouwels, C. Leijendekker et al // *Am J Respir Cell Mol Biol*. 2015, Vol. 52, P. 554–562. doi: 10.1165/rcmb.2013-0505OC.
148. Cigarette smoke-induced necroptosis and DAMP release trigger neutrophilic airway inflammation in mice / S.D. Pouwels, G.J. Zijlstra, M. van der Toorn et al // *Am J Physiol-Lung Cell Mol Physiol*. 2016, Vol. 310(4), P. 377–386. doi: 10.1152/ajplung.00174.2015.
149. Clark, A.R. Maps and legends: the quest for dissociated ligands of the glucocorticoid receptor / A.R. Clark, M.G. Belvisi // *Pharmacol Ther*.

150. 2012, Vol. 134, P. 54–67. doi: 10.1016/j.pharmthera.2011.12.004.
151. Classical transient receptor potential 6 (TRPC6) channels support myofibroblast differentiation and development of experimental pulmonary fibrosis / K. Hofmann, S. Fiedler, S. Vierkotten et al // *Biochim Biophys Acta*. 2017, Vol. 1863, P. 560–568. doi: 10.1016/j.bbadis.2016.12.002.
152. Cleavage of fibrinogen by proteinases elicits allergic responses through toll-like receptor 4 / V.O. Millien, W. Lu, J. Shaw et al // *Science*. 2013. Vol. 341(6147), P. 792–796. doi: 10.1126/science.1240342.
153. Composition of fatty acids in plasma and erythrocytes and eicosanoids level in patients with metabolic syndrome / T.P. Novgorodtseva, Yu.K. Karaman (Denisenko), N.V. Zhukova et al // *Lipids Health Dis*. 2011, Vol.10, 82.
154. Co-operation of TLR4 and raft proteins in LPS-induced pro-inflammatory signaling / A. Plociennikowska, A. Hromada-Judycka, K. Borzecka et al // *Cell Mol Life Sci*. 2015, Vol. 72, P. 557–581. doi: 10.1007/s00018-014-1762-5.
155. Coordinated role of TLR3, RIG-I and MDA5 in the innate response to rhinovirus in bronchial epithelium / L. Slater, N.W. Bartlett, J.J. Haas et al // *PLoS Pathog*. 2010, Vol. 6, e1001178. doi: 10.1371/journal.ppat.1001178.
156. COPD and stroke: are systemic inflammation and oxidative stress the missing links? / V. Austin, P.J. Crack, S. Bozinovski et al // *Clin Sci*. 2016, Vol. 130, P. 1039–1050. doi: 10.1042/CS20160043.
157. COPD immunopathology / G. Caramori, P. Casolari, A. Barczyk et al. // *Semin Immunopathol*. 2016, Vol. 38, P. 497–515. doi: 10.1007/s00281-016-0561-5.
158. Corticosteroid suppression of antiviral immunity increases bacterial loads and mucus production in COPD exacerbations / A. Singanayagam, N. Glanville, J.L. Girkin et al // *Nate Communicat*. 2018, Vol. 9(1), 2229. doi: 10.1038/s41467-018-04574-1.
159. Cosmi, L. Th17 regulating lower airway disease / L. Cosmi, F. Liotta

F. Annunziato // Curr opin allergy clinic immunol. 2016, Vol. 16(1), P. 1–6.

160. Couvineau, A. VPAC receptors: structure, molecular pharmacology and interaction with accessory proteins / A. Couvineau, M. Laburthe // Br J Pharmacol. 2012, Vol. 166, P. 42–50.

161. CpG-ODN shapes alum adjuvant activity signaling via MyD88 and IL-10 / L. Mirotti, R.W. Alberca Custodio, E. Gomes et al // Front Immunol. 2017, Vol. 8, 47. doi: 10.3389/fimmu.2017.00047.

162. Critical role of Toll-like receptors in pathophysiology of allergic asthma / S.S. Athari, S.M. Athari, F. Beyzay et al // Europ J Pharmacol. 2017, Vol. 808, P. 21–27. doi: 10.1016/j.ejphar.2016.11.047.

163. Crucial role of transient receptor potential ankyrin 1 and mast cells in induction of nonallergic airway hyperreactivity in mice / V. Hox, J.A. Vanoirbeek, Y.A. Alpizar et al // Am J Respir Crit Care Med. 2013, Vol. 187, P. 486–493.

164. Cryo-EM and X-ray structures of TRPV4 reveal insight into ion permeation and gating mechanisms / Z. Deng, N. Paknejad, G. Makshev et al // Nat Struct Mol Biol. 2018, Vol. 25, P. 252–260. doi: 10.1038/s41594-018-0037-5.

165. Damage-Associated Molecular Patterns and Myeloid-Derived Suppressor Cells in Bronchoalveolar Lavage Fluid in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients / B. Brajer-Luftmann, A. Nowicka, M. Kaczmarek et al // J Immunol Res. 2019, Vol. 2019, P. 1–9. doi: 10.1155/2019/9708769.

166. Dana, N. Crosstalk between Peroxisome Proliferator-Activated Receptors and Toll-Like Receptors: A Systematic Review / N. Dana, G. Vaseghi, Sh. Haghjooy -Javanmard // Adv Pharm Bull. 2019, Vl. 9(1). P. 12–21. doi: 10.15171/apb.2019.003.

167. De Nardo, D. Toll-like receptors: activation, signalling and transcriptional modulation / D. De Nardo // Cytokine. 2015, Vol. 74, P. 181–189. doi: 10.1016/j.cyto.2015.02.025.

168. Decreased Migration of Dendritic Cells into the Jugular-Nodose Ganglia by the CXCL12 Neutraligand Chalcone 4 in Ovalbumin-Sensitized Asthmatic Mice / S. Heck, F. Daubeuf, D.D. Le et al // *Neuro-immunomodulation*. 2017, Vol. 24(6), P. 331–340. doi: 10.1159/000487140.
169. Depression, body mass index, and chronic obstructive pulmonary disease – a holistic approach / G. Catalfo, L. Crea, T. Lo Castro et al // *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis*. 2016, Vol. 11, P. 239–249.
170. Determinants of divergent adaptive immune responses after airway sensitization with ligands of toll-like receptor 5 or toll-like receptor 9 / L.M. Lee, M. Ji, M. Sinha et al // *PLoS One*. 2016, Vol. 11(12), e0167693. doi: 10.1371/journal.pone.0167693.
171. Development of a novel severe triple allergen asthma model in mice which is resistant to dexamethasone and partially resistant to TLR7 and TLR9 agonist treatment / M.J. Duechs, C. Tilp, C. Tomsic et al // *PLoS One*. 2014, Vol. 9(3), e91223. doi: 10.1371/journal.pone.0091223.
172. Di Marzo, V. Endocannabinoids: synthesis and degradation / V. Di Marzo // *Rev Physiol Biochem Pharmacol*. 2008, Vol. 160, I. 1, P. 1289–1296.
173. Di Marzo, V. New approaches and challenges to targeting the endocannabinoid system / V. Di Marzo // *Nat Rev Drug Discov*. 2018, Vol. 17, P. 623–639. doi: 10.1038/nrd.2018.115.
174. Diagnostic value of concentration profiles of glucocorticosteroids and endocannabinoids in hair / A. Krumbholz, P. Anielski, N. Reisch et al // *Ther Drug Monit*. 2013, Vol. 35, P. 600–607. doi: 10.1097/FTD.0b013e3182953e43.
175. Diamant, G. Transcriptional control by NF- κ B: elongation in focus / G. Diamant, R. Dikstein // *Biochim Biophys Acta*. 2013, Vol. 1829, P. 937–945. doi: 10.1016/j.bbagr.2013.04.007.
176. Dietrich, A. Transient receptor potential (TRP) channels as molecular targets in lung toxicology and associated diseases / A. Dietrich,

-
- D. Steinritz, T. Gudermann // *Cell Calcium*. 2017, Vol. 67, P. 123–137. doi: 10.1016/j.ceca.2017.04.005.
177. Dietrich, A. Modulators of Transient Receptor Potential (TRP) Channels as Therapeutic Options in Lung Disease / A. Dietrich // *Pharmaceuticals (Basel)*. 2019, Vol. 12(1), 23. doi: 10.3390/ph12010023.
178. Differential activation of RAGE by HMGB1 modulates neutrophil associated NADPH oxidase activity and bacterial killing / J.M. Tadié, H.B. Bae, S. Banerjee et al // *Am J Physiol Cell Physiol*. 2012, Vol. 302(1), P. 249–256. doi: 10.1152/ajp-cell.00302.2011.
179. Differential effects of the toll-like receptor 2 agonists, PGN and Pam3CSK4 on anti-IgE induced human mast cell activation / Y. Yu, K.H. Yip, I. Tam et al // *PLoS One*. 2014, Vol. 9(11), e112989. doi: 10.1371/journal.pone.0112989.
180. Discovery and pharmacological characterization of a novel potent inhibitor of diacylglycerol-sensitive TRPC cation channels / T. Maier, M. Follmann, G. Hessler et al // *Br J Pharmacol*. 2015, Vol. 172, P. 3650–3660. doi: 10.1111/bph.13151.
181. Distinguishing intake of new synthetic cannabinoids ADB-PINACA and 5F-ADB-PINACA with human hepatocyte metabolites and high-resolution mass spectrometry / J. Carrier, X. Diao, K.B. Scheidweiler, M.A. Huestis // *Clin Chem*. 2017, Vol. 63, P. 1008–1021. doi: 10.1373/clinchem.2016.267575.
182. Double-stranded RNA exacerbates pulmonary allergic reaction through TLR3: implication of airway epithelium and dendritic cells / D. Torres, A. Dieudonne, B. Ryffel et al // *J Immunol*. 2010, Vol. 185, P. 451–459. doi: 10.4049/jimmunol.0902833.
183. Down-regulated peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARgamma) in lung epithelial cells promotes a PPARgamma agonist-reversible proinflammatory phenotype in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) / S.P. Lakshmi, A.T. Reddy, Y. Zhang et al // *J Biol Chem*. 2014, Vol. 289(10), P. 6383–6393. doi:10.1074/jbc.M113.536805.

184. Drexler, S.K. The role of toll-like receptors in chronic inflammation / S.K. Drexler, B.M. Foxwell // *Int J Biochem Cell Biol.* 2010, Vol. 42(4), P. 506–518. doi: 10.1016/j.biocel.2009.10.009.
185. Dual role of Toll-like receptors in asthma and chronic obstructive pulmonary disease / G.F. Bezemer, S. Sagar, J. van Bergenhenegouwen et al // *Pharmacol Rev.* 2012, Vol. 64(2), P. 337–58. doi: 10.1124/pr.111.004622.
186. Dual role of Toll-like receptors in human and experimental asthma models / A. Zakeri, M. Russo // *Front Immunol.* 2018, Vol. 9, 1027. doi: 10.3389/fimmu.2018.01027.
187. Dung biomass smoke activates inflammatory signaling pathways in human small airway epithelial cells / C.E. McCarthy, P.F. Duffney, R. Gelein, et al. // *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol.* 2016, Vol. 311(6), P. 1222–1233. doi: 10.1152/ajplung.00183.2016.
188. Dynamic NHERF interaction with TRPC4/5 proteins is required for channel gating by diacylglycerol / U. Storch, A.L. Forst, F. Pardatscher et al // *Proc Natl Acad Sci USA.* 2017, Vol. 114, P. 37–46. doi: 10.1073/pnas.1612263114.
189. Dysregulated functions of lung macrophage populations in COPD / T.S. Kapellos, K. Bassler, A.C. Aschenbrenner et al // *J Immunol Res.* 2018, Vol. 2018, 2349045. doi: 10.1155/2018/2349045.
190. Early growth response factor 1 is essential for cigarette smoke-induced MUC5AC expression in human bronchial epithelial cells / S.B. Wang, C. Zhang, X.C. Xu et al // *Biochem Biophys Res Commun.* 2017, Vol. 490(2), P. 147–154. doi: 10.1016/j.bbrc.2017.06.014.
191. Effects of Single-Nucleotide Polymorphisms in the TLR7 and TLR9 Genes of Asthmatic Children / L. Shan, P. Hou, X. Kang, Y. Shang // *Ann Clin Lab Sci.* 2018, Vol. 48(5), P. 601–607.
192. Eisenbarth, S.C. Lipopolysaccharide-enhanced, toll-like receptor 4-dependent T helper cell type 2 responses to inhaled antigen / S.C. Eisenbarth, D.A. Piggott, J.W. Huleatt et al // *J Exp Med.* 2002, Vol. 196, P. 1645–1651. doi: 10.1084/jem.20021340.

-
193. Elmasry, S.A. Role of oxidant–antioxidant imbalance in the pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease / S.A. Elmasry, M.A. Al-Azzawi // *Egyptian journal of chest diseases and tuberculosis*. 2015, Vol. 64(4), P. 813–820.
194. Elphick, M.R. Evolution of neuropeptide signalling systems / M.R. Elphick, O. Mirabeau, Dan Larhammar // *J Exp Biol*. 2018, Vol. 221(3), jeb151092. doi: 10.1242/jeb.151092.
195. Endocannabinoids measurement in human saliva as potential biomarker of obesity / I. Matia, B. Gatta-Cherifi, A. Tabarin et al // *PLoS One*. 2012, Vol. 7, e42399.
196. Engin, A.B. Adipocyte-Macrophage Cross-Talk in Obesity / A.B. Engin // *Adv Exp Med Biol*. 2017, Vol. 960, P. 327–343. doi: 10.1007/978-3-319-48382-5_14.
197. Enhanced store-operated Ca^{2+} -influx and ORAI1 expression in ventricular fibroblasts from human failing heart / G.R. Ross, T. Bajwa, Jr.S. Edwards et al // *Biology Open*. 2017, Vol. 6(3), P. 326–332.
198. Eosinophil recruitment to nasal nerves after allergen challenge in allergic rhinitis / M.A. Thornton, N. Akasheh, M.T. Walsh et al // *Clin Immunol*. 2013, Vol. 147, P. 50-57.
199. Eosinophil-derived neurotoxin acts as an alarmin to activate the TLR2-MyD88 signal pathway in dendritic cells and enhances Th2 immune responses / D. Yang, Q. Chen, S.B. Su et al // *J Exp Med*. 2008, Vol. 205(1), P. 79–90. doi: 10.1084/jem.20062027.
200. Exercise-induced changes in exhaled NO differentiates asthma with or without fixed airway obstruction from COPD with dynamic hyperinflation / H. Shu-Yi, Ch. Pai-Chien, W. Tsai-Yu et al // *Medicine (Baltimore)*. 2016, Vol. 95(15), e3400. doi: 10.1097/MD.0000000000003400.
201. Exhaled nitric oxide as a biomarker in COPD and related comorbidities / M. Malerba, A. Radaeli, A. Olivini et al // *Biomed Res Int*. 2014, Vol. 2014, 271918. doi: 10.1155/2014/271918.
202. Exhaled nitric oxide in chronic obstructive pulmonary disease: relationship to pulmonary function / K. Ansarin, J.M. Chatkin, I.M. Ferreira

- et al // *Europ Respir J*. 2001, Vol. 17, P. 934–938.
203. Exhaled nitric oxide in pulmonary diseases: a comprehensive review / P.J. Barnes, R.A. Dweik, A.F. Gelb et al // *Chest*. 2010, Vol. 138, P. 682–692.
204. Expression of nerve growth factor and matrix metalloproteinase-9/tissue inhibitor of metalloproteinase-1 in asthmatic patients / J.S. Kim, J.Y. Kang, J.H. Ha et al // *J Asthma*. 2013, Vol. 50, P. 712–717.
205. Expression of transient receptor potential C6 channels in human lung macrophages / T.K. Finney-Hayward, M.O. Popa et al // *Am J Respir Cell Mol Biol*. 2010, Vol. 43, P. 296–304. doi: 10.1165/rcmb.2008-0373OC.
206. Fantini, J. How cholesterol interacts with membrane proteins: an exploration of cholesterol-binding sites including CRAC, CARC and tilted domains / J. Fantini, F.J. Barrantes // *Front Physiol*. 2013, Vol. 4, 31 doi: 10.3389/fphys.2013.00031.
207. Farm dust and endotoxin protect against allergy through A20 induction in lung epithelial cells / M.J. Schuijs, M.A. Willart, K. Vergote et al // *Science*. 2015, Vol. 349, P. 1106–1110. doi: 10.1126/science.aac6623.
208. Farquhar-Smith, W.P. Administration of endocannabinoids prevents a referred hyperalgesia associated with inflammation of the urinary bladder / W.P. Farquhar-Smith, A.S. Rice // *Anesthesiology*. 2001, Vol. 94, P. 507–513.
209. Fatty acids from fish: the anti-inflammatory potential of long-chain omega-3 fatty acids / R. Wall, R.P. Ross, G.F. Fitzgerald, C. Stanton // *Nutr Rev*. 2010, Vol. 68, P. 280–289.
210. Fatty acids modulate Toll-like receptor 4 activation through regulation of receptor dimerization and recruitment into lipid rafts in a reactive oxygen species-dependent manner / S.W. Wong, M.J. Kwon, A.M. Choi et al // *J Biol Chem*. 2009, Vol. 284, P. 27384–92. doi: 10.1074/jbc.M109.044065.
211. Females have stronger neurogenic response than males after non-specific nasal challenge in patients with seasonal allergic rhinitis /

-
- D. Tomljenovic, T. Baudoin, Z.B. Megla et al // *Med Hypotheses*. 2018, Vol. 116, P. 114–118. doi: 10.1016/j.mehy.2018.04.021.
212. Flagellin suppresses experimental asthma by generating regulatory dendritic cells and T cells / J.U. Shim, S.E. Lee, W. Hwang et al // *J Allergy Clin Immunol*. 2016, Vol. 137, P. 426–435. doi: 10.1016/j.jaci.2015.07.010.
213. Fraguas-Sánchez, A.I. Insights into the effects of the endocannabinoid system in cancer: a review / A.I. Fraguas-Sánchez, C. Martín-Sabroso, A.I. Torres-Suárez // *Br J Pharmacol*. 2018, Vol. 175(13), P. 2566–2580. doi: 10.1111/bph.14331.
214. Freund, T.F. Role of Endogenous Cannabinoids in Synaptic Signaling / T.F. Freund, I. Katona, D. Piomelli // *Physiol Rev*. 2003, Vol. 83, P. 1017–1066.
215. Fullerton, J.N. Resolution of inflammation: a new therapeutic frontier / J.N. Fullerton, D.W. Gilroy // *Nat Rev Drug Discov*. 2016, Vol. 15(8), P. 551–567.
216. Gao, H. Pathological roles of neutrophil-mediated inflammation in asthma and its potential for therapy as a target / H. Gao, S. Ying, Y. Dai // *J Immunol*. 2017, Vol. 2017, 3743048.
217. Genetic variation in BDNF is associated with allergic asthma and allergic rhinitis in an ethnic Chinese population in Singapore / A.K. Andiappan, P.N. Parate, R. Anantharaman et al // *Cytokine*. 2011, Vol. 56(2), P. 218–223. doi: 10.1016/j.cyto.2011.05.008.
218. Georgieva, R. Docosahexaenoic acid promotes micron scale liquid-ordered domains. A comparison study of docosahexaenoic versus oleic acid containing phosphatidylcholine in raft-like mixtures / R. Georgieva, C. Chachaty, G. Staneva // *Biochim Biophys Acta*. 2015, Vol. 1848, P. 1424–1435. doi: 10.1016/j.bbamem.2015.02.027.
219. Gertsch, J. Cannabimimetic phytochemicals in the diet—an evolutionary link to food selection and metabolic stress adaptation? / J. Gertsch // *Br J Pharmacol*. 2017, Vol. 174, P. 1464–1483. doi: 10.1111/bph.13676.

220. Ghosh, M. Cannabis and Cardiovascular Disease / M. Ghosh, S. Naderi // *Curr Atheroscler Rep.* 2019, Vol. 21(6), 21. doi: 10.1007/s11883-019-0783-9.
221. Gimpl, G. Interaction of G Protein Coupled Receptors and Cholesterol / G. Gimpl // *Chem Phys Lipids.* 2016, Vol. 199, P. 61–73. doi: 10.1016/j.chemphyslip.2016.04.006.
222. Giudetti, A. Beneficial effects of n-3 PUFA on chronic airway inflammatory diseases / A. Giudetti, R. Cagnazzo // *Prostaglandins Other Lipid Mediat.* 2012, Vol. 99(3–4), P. 57–67.
223. Glass, C.K. Inflammation and lipid signaling in the etiology of insulin resistance / C.K. Glass, J.M. Olefsky // *Cell Metab.* 2012, Vol. 15, P. 635–645. doi: 10.1016/j.cmet.2012.04.001.
224. GLCCI1 rs37973: a potential genetic predictor of therapeutic response to inhaled corticosteroids in Chinese chronic obstructive pulmonary disease patients / Y. Lei, Y. Gao, J. Chen et al // *Sci Rep.* 2017, Vol. 7, 42552. doi: 10.1038/srep42552.
225. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease 2017 Report. GOLD Executive Summary / C.F. Vogelmeier, G.J. Criner, F.J. Martinez et al // *Am J Respir Crit Care Med.* 2017, Vol. 195, P. 557–582 10.1164/rccm.201701-0218PP.
226. Glossogyne tenuifolia extract inhibits TNF- α -induced expression of adhesion molecules in human umbilical vein endothelial cells via blocking the NF- κ B signaling pathway / C.F. Hsuan, H.F. Hsu, W.K. Tseng et al. // *Molecules.* 2015, Vol. 20, P. 16908–16923.
227. Glucocorticoid receptor control of transcription: precision and plasticity via allostery / E.R. Weikum, M.T. Knuesel, E.A. Ortlund, K.R. Yamamoto // *Nat Rev Mol Cell Biol.* 2017, Vol. 18, P. 159–174. doi: 10.1038/nrm.2016.152.
228. Glucocorticoid receptor inhibits Müller glial galectin-1 expression via DUSP1-dependent and -independent deactivation of AP-1 signalling / I. Hirose, A. Kanda, K. Noda, S. Ishida // *J Cell Mol Med.* 2019, Vol. 23(10), P. 6785-6796. doi: 10.1111/jcmm.14559.

-
229. Goñi, F.M. "Rafts": A nickname for putative transient nanodomains / F.M. Goñi // *Chem Phys Lipids*. 2019, Vol. 218, P. 34–39. doi: 10.1016/j.chemphyslip.2018.11.006.
230. Grape Seed Proanthocyanidin Inhibits Mucin Synthesis and Viral Replication by Suppression of AP-1 and NF- κ B via p38 MAPKs/JNK Signaling Pathways in Respiratory Syncytial Virus-Infected A549 Cells / J.W. Lee, Y.I. Kim, C.N. Im, et al // *J Agric Food Chem*. 2017. Vol. 65(22), P. 4472–4483. doi: 10.1021/acs.jafc.7b00923.
231. Hammad, H. Barrier epithelial cells and the control of type 2 immunity / H. Hammad, B.N. Lambrecht // *Immunity*. 2015, Vol. 43, P. 29–40. doi: 10.1016/j.immuni.2015.07.007.
232. Hansen, S.B. Lipid Agonism: The Pip2 Paradigm of Ligand-Gated Ion Channels / S.B. Hansen // *Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids*. 2015, Vol. 1851, P. 620–628. doi: 10.1016/j.bbalip.2015.01.011.
233. Harayama, T. Understanding the diversity of membrane lipid composition / T. Harayama, H. Riezman // *Nat Rev Mol Cell Biol*. 2018, Vol. 19, P. 281–296. doi: 10.1038/nrm.2017.138.
234. Hellmich, U.A. Structural biology of TRP channels / U.A. Hellmich, R. Gaudet // *Handb Exp Pharmacol*. 2014, Vol. 223, P. 963–990. doi: 10.1007/978-3-319-05161-1_10.
235. Heterogeneity of cough hypersensitivity mediated by TRPV1 and TRPA1 in patients with chronic refractory cough / L. Long, H. Yao, T. Jing et al // *Respir Res*. 2019, Vol. 20, 112. doi: 10.1186/s12931-019-1077-z.
236. High IFN- γ and low SLPI mark severe asthma in mice and humans / M. Raundhal, C. Morse, A. Khare et al // *J Clin Invest*. 2015, Vol. 125(8), P. 3037–3050.
237. Hillard, C.J. Circulating Endocannabinoids: From Whence Do They Come and Where are They Going? / C.J. Hillard // *Neuropsychopharmacology*. 2018, Vol. 43(1), P. 155–172. doi: 10.1038/npp.2017.130.
238. Hillard, C.J. The Endocannabinoid Signaling System in the CNS:
- 239.

- A Primer / C.J. Hillard // *Int Rev Neurobiol.* 2015, Vol. 125, P. 1–47. doi: 10.1016/bs.irn.2015.10.001.
240. HMGB1, an innate alarmin, plays a critical role in chronic inflammation of adipose tissue in obesity / J. Zhang, L. Zhang, S. Zhang et al // *Mol Cell Endocrinol.* 2017, Vol. 454, P. 103–111. doi: 10.1016/j.mce.2017.06.012.
241. House dust mite allergen regulates constitutive apoptosis of normal and asthmatic neutrophils via toll-like receptor 4 / D.H. Kim, E. Choi, J.S. Lee, et al // *PLoS One.* 2015, Vol. 10, e0125983. doi: 10.1371/journal.pone.0125983.
242. How glucocorticoid receptors modulate the activity of other transcription factors: a scope beyond tethering / D. Ratman, W. Vanden Berghe, L. Dejager, et al // *Mol Cell Endocrinol.* 2013, Vol. 380, P. 41–54. doi: 10.1016/j.mce.2012.12.014.
243. Hoyer. D. Neuropeptides and neuropeptide receptors: drug targets, and peptide and non-peptide ligands: a tribute to Prof. Dieter Seebach / D. Hoyer. T. Bartfai // *Chem Biodivers.* 2012, Vol. 9, P. 2367–2387.
244. Hunter, C.A. IL-6 as a keystone cytokine in health and disease / C.A. Hunter, S.A. Jones // *Nature immunology.* 2015, Vol. 16(5), P. 448–457.
245. Hwang, D.H. Mechanisms for the activation of Toll-like receptor 2/4 by saturated fatty acids and inhibition by docosahexaenoic acid / D.H. Hwang, J.A. Kim, J.Y. Lee // *Europ J Pharmacol.* 2016, Vol. 785, P. 24–35. doi: 10.1016/j.ejphar.2016.04.024.
246. Ibsen, M.S. Cannabinoid CB1 and CB2 receptor signaling and bias / M.S. Ibsen, M. Connor, M. Glass // *Cannabis Cannabinoid Res.* 2017, Vol. 2, P. 48–60. doi: 10.1089/can.2016.0037.
247. Identification of a binding motif in the S5 helix that confers cholesterol-sensitivity to TRPV1 / G. Picazo-Juarez, S. Romero-Suarez, A. Nieto-Posadas et al // *J Biol Chem.* 2011, Vol. 286, P. 24966–24976. doi: 10.1074/jbc.M111.237537.
248. Identification of novel cholesterol-binding regions in Kir2 channels /

-
- A. Rosenhouse-Dantsker, S. Noskov, S. Durdagi et al // *J Biol Chem.* 2013, Vol. 288, P. 31154–31164. doi:10.1074/jbc.M113.496117.
249. IL-17A enhances IL-13 activity by enhancing IL-13-induced signal transducer and activator of transcription 6 activation / S.L Hall., T. Baker, S. Lajoie, P.K. Richgels et al // *J Allergy Clin Immunol.* 2016, Vol. 139(2), P. 462–471.
250. IL-1beta acutely increases pulmonary SP and permeability without associated changes in airway resistance and ventilation in anesthetized rats / J. Zhuang, J. Xu, C. Zhang et al // *Respir Physiol Neurobiol.* 2011, Vol. 175, P. 12–19. doi: 10.1016/j.resp.2010.08.002.
251. IL-25 receptor expression on airway dendritic cells after allergen challenge in subjects with asthma / D. Tworek, S.G. Smith, B.M. Salter et al // *Am J Respir Crit Care Med.* 2016, Vol. 193(9), P. 957–964. doi: 10.1164/rccm.201509-1751OC.
252. Immune dysfunction in patients with chronic obstructive pulmonary disease / T.A. Bhat, L. Panzica, S.G. Kalathil, Y. Thanavala // *Ann Am Thorac Soc.* 2015, Vol. 12(S2), P. 169–75. 10.1513/AnnalsATS.201503-126AW.
253. Increased expression of bronchial epithelial transient receptor potential vanilloid 1 channels in patients with severe asthma / L.P. McGarvey, C.A. Butler, S. Stokesberry et al // *J Allergy Clin Immunol.* 2014, Vol. 133, P. 704–712.e4.
254. Increased frequency of dual-positive TH2/TH17 cells in bronchoalveolar lavage fluid characterizes a population of patients with severe asthma / C. Irvin, I. Zafar, J. Good et al // *J Allergy Clin Immunol.* 2014, Vol. 134(5), P. 1175–1186.
255. Increased neutrophil expression of pattern recognition receptors during COPD exacerbations / S.D Pouwels, W.H. van Geffen, M.R. Jonker et al // *Respirology.* 2017, Vol. 22(2), P. 401–404. doi: 10.1111/resp.12912.
256. Indacaterol–glycopyrronium versus Salmeterol–fluticasone for COPD / J.A. Wedzicha, D. Banerji, K.R. Chapman et al // *N Engl J Med.*

- 2016, Vol. 374(23), P. 2222–2234. doi: 10.1056/NEJMoa1516385.
257. Induction of the specific allergic immune response is independent of proteases from the fungus *Alternaria alternata* / O. Denis, M. Vincent, X. Havaux et al // *Am J Respir Crit Care Med*. 2013, Vol. 43, P. 907–917. doi: 10.1002/eji.201242630.
258. Inflammasome-mediated secretion of IL-1 β in human monocytes through TLR2 activation; modulation by dietary fatty acids / R.G. Snodgrass, S. Huang, I.W. Choi et al // *J Immunol*. 2013, Vol. 191, P. 4337–4347. doi: 10.4049/jimmunol.1300298.
259. Inflammatory effects of menthol vs. non-menthol cigarette smoke extract on human lung epithelial cells: a double-hit on TRPM8 by reactive oxygen species and menthol / A.H. Lin, M.H. Liu, H.B. Ko et al // *Front Physiol*. 2017, Vol. 8, 263. doi: 10.3389/fphys.2017.00263.
260. Inhibition of RAGE attenuates cigarette smoke-induced lung epithelial cell damage via RAGE-mediated Nrf2/DAMP signaling / H. Lee, J. Lee, S.H. Hong et al // *Front Pharmacol*. 2018, Vol. 9, 684. doi: 10.3389/fphar.2018.00684.
261. Inhibition of toll-like receptor 4 with vasoactive intestinal peptide attenuates liver ischemia-reperfusion injury / W. Jiang, W. Tang, Q. Geng, X. Xu // *Transplant Proc*. 2011, Vol. 43, P. 1462–1467.
262. Inhibition of transient receptor potential melastatin 8 alleviates airway inflammation and remodeling in a murine model of asthma with cold air stimulus / H. Liu, Q. Liu, L. Hua, J. Pan // *Acta Biochim Biophys Sin*. 2018. Vol. 50, P. 499–506. doi: 10.1093/abbs/gmy033.
263. Innes, J.K. Omega-6 fatty acids and inflammation / J.K. Innes, P.C. Calder // *Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids*. 2018, Vol. 132, P. 41–48. doi: 10.1016/j.plefa.2018.03.004.
264. Interferon-gamma-dependent inhibition of late allergic airway responses and eosinophilia by CD8 $^{+}$ gammadelta T cells / S. Isogai, A. Athiviraham, R.S. Fraser et al // *Immunology*. 2007, Vol. 122(2), P. 230–238.

-
265. Interleukin-6 signaling drives fibrosis in unresolved inflammation / C.A. Fielding, G.W. Jones, R.M. McLoughlin et al // *Immunity*. 2014, Vol. 40(1), P. 40–50. doi: 10.1016/j.immuni.2013.10.022.
266. Intermittent hypoxia simulating obstructive sleep apnea causes pulmonary inflammation and activates the Nrf2/HO-1 pathway / Y. Wang, Y. Chai, X. He et al // *Exp Ther Med*. 2017, Vol. 14(4), P. 3463–3470. doi: 10.3892/etm.2017.4971.
267. Intramuscular AAV delivery of NT-3 alters synaptic transmission to motoneurons in adult rats / J.C. Petruska, B. Kitay, V.S. Boyce et al // *Eur J Neurosci*. 2010, Vol. 32, P. 997–1005. doi: 10.1111/j.1460-9568.2010.07392.x.
268. Iwamura, C. Toll-like receptors in the respiratory system: their roles in inflammation / C. Iwamura, T. Nakayama // *Curr Allergy Asthma Rep*. 2008, Vol. 8, P. 7–13. doi: 10.1007/s11882-008-0003-0.
269. Jagged1 is the major regulator of notch-dependent cell fate in proximal airways / S. Zhang, A.J. Loch, F. Radtke et al // *Dev Dyn*. 2013, Vol. 242, P. 678–686. doi: 10.1002/dvdy.23965.
270. Jeon, S.W. Molecular neurobiology and promising new treatment in de-pression / S.W. Jeon, Y.K. Kim // *Int J Mol Sci*. 2016, Vol. 17(3), 381.
271. Joos, G.F. Airway inflammation and tachykinins: prospects for the development of tachykinin receptor antagonists / G.F. Joos, K.O. De Swert, R.A. Pauwels // *Eur J Pharma-col*. 2001, Vol. 429, P. 239–250. doi: 10.1016/S0014-2999(01)01323-1.
272. Kabata, H. Neuro-immune crosstalk and allergic inflammation / H. Kabata, D. Artis // *J Clin Invest*. 2019, Vol. 129(4), P. 1475–1482. doi: 10.1172/JCI124609.
273. Kang, J.Y. Structural biology of the Toll-like receptor family / J.Y. Kang, J.O. Lee // *Annu Rev Biochem*. 2011, Vol. 80, P. 917–941. doi: 10.1146/annurev-biochem-052909-141507.
274. Kasuga, K. Bioanalytical insights into mediator lipidomics / K. Kasuga, T. Suga, N. Mano // *J Pharm Biomed Anal*. 2015, Vol. 113, P. 151–162.

275. Ke, L.Q. Effects of vasoactive intestinal peptide on airway inflammation and Th17/Treg balance in asthmatic mice / L.Q. Ke, F.M. Wang, Y.C. Luo // *Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi*. 2017, Vol. 19(6), P. 699–704.
276. Kearney, S.C. Immunoregulatory and immunostimulatory responses of bacterial lysates in respiratory infections and asthma / S.C. Kearney, M. Dziekiewicz, W. Feleszko // *Ann Allergy Asthma Immunol*. 2015, Vol. 114, P. 364–369. doi: 10.1016/j.anai.2015.02.008.
277. Kharitonov, S.A. Biomarkers of some pulmonary diseases in exhaled breath / S.A. Kharitonov, P.J. Barnes // *Biomarkers*. 2002, Vol. 1(7), P. 1–32.
278. Kierdorf, K. RAGE regulation and signaling in inflammation and beyond / K. Kierdorf, G. Fritz // *J Leukoc Biol*. 2013, Vol. 94(1), P. 55–68. doi: 10.1189/jlb.1012519.
279. Kinoshita, M. Raft-based sphingomyelin interactions revealed by new fluorescent sphingomyelin analogs / M. Kinoshita // *J Cell Biol*. 2017, Vol. 216, P. 1183–1204. doi: 10.1083/jcb.201607086.
280. Klein, T.W. Cannabinoid receptors and the cytokine network / T.W. Klein, C. Newton, H. Friedman // *Adv Exp Med Biol*. 1998, 437, P. 215–222.
281. Koenderman, L. Future treatment in patients with chronic obstructive pulmonary disease: To reverse or not to reverse steroid resistance – that is the question / L. Koenderman, E. Chilvers // *J Allergy Clin Immunol*. 2014, Vol. 134(2), P. 323–324.
282. Kormann, M.S. Toll-like receptor heterodimer variants protect from childhood asthma / M.S. Kormann, M. Depner, D. Hartl et al // *J Allergy Clin Immunol*. 2008, Vol. 122, P. 86–92. doi: 10.1016/j.jaci.2008.04.039.
283. Korppi, M. Toll-like receptor 1 and 10 variations increase asthma risk and review highlights further research directions / M. Korppi, S. Törmänen // *Acta Paediatr*. 2019, Vol. 108(8), P. 1406–1410. doi: 10.1111/apa.14795.

-
284. Kudaibergenova, M. Lipid Roles in Herg Function and Interactions with Drugs / M. Kudaibergenova, L.L. Perissinotti, S.Y. Noskov // *Neurosci Lett*. 2018, Vol. 700, P. 70-77. doi: 10.1016/j.neulet.2018.05.019.
285. Kudo, M. Pathology of asthma / M. Kudo, Y. Ishigatsubo, I. Aoki // *Front Microbiol*. 2013, Vol. 4, 263. doi: 10.3389/fmicb.2013.00263.
286. Kumar, V. Toll-like receptors in the pathogenesis of neuroinflammation / V. Kumar // *J Neuroimmunol*. 2019, Vol. 332, P. 16–30. doi: 10.1016/j.jneuroim.2019.03.012.
287. Kvarnhammar, A.M. Pattern-recognition receptors in human eosinophils / A.M. Kvarnhammar, L.O. Cardell // *Immunology*. 2012, Vol. 136, P. 11–20. doi: 10.1111/j.1365-2567.2012.03556.x.
288. Kyrou, I. The endocannabinoid system as a target for the treatment of visceral obesity and metabolic syndrome / I. Kyrou, G. Valsamakis, C. Tsigos // *Ann NY Acad Sci*. 2006, Vol. 1083, P. 270–305.
289. Kytikova, O.Y. Oxidative DNA Damage in the Pathogenesis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Older Patients / O.Y. Kytikova, T.A. Gvozdenko, T.I. Vitkina // *Adv Gerontol*. 2017, Vol. 7(2), P. 163–165.
290. (+)-Larixol Congener with High Affinity and Subtype Selectivity toward TRPC6 / S. Hafner, F. Burg, M. Kannler et al // *ChemMedChem*. 2018, Vol. 13, P. 1028–1035. doi: 10.1002/cmdc.201800021.
291. Lam, P.M. Simultaneous measurement of three N-acyl ethanolamides in human bio-matrices using ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry / P.M. Lam, T.H. Marczylo, J.C. Konje // *Anal Bioanal Chem*. 2010, Vol. 398, P. 2089–2097. doi: 10.1007/s00216-010-4103-z.
292. Le Boisselier, R. Focus on cannabinoids and synthetic cannabinoids / R. Le Boisselier, J. Alexandre, V. Lelong-Boulouard, D. Debruyne // *Clin Pharmacol Ther*. 2017, Vol. 101, P. 220–229. doi: 10.1002/cpt.563.
293. Lee, B.L. Trafficking of endosomal toll-like receptors / B.L. Lee, G.M. Barton // *Trends Cell Biol*. 2014, Vol. 24, P. 360–369. doi: 10.1016/j.tcb.2013.12.002.

294. Lee, L.Y. Sensory nerves in lung and airways / L.Y. Lee, J. Yu // *Comp Physiol*. 2014, Vol. 4, P. 287–324.
295. Levitan, I. Cholesterol Binding to Ion Channels / I. Levitan, D.K. Singh, A. Rosenhouse-Dantsker // *Front Physiol*. 2014, Vol. 5, 65. doi: 10.3389/fphys.2014.00065.
296. Li, X.N. Imbalances of Th17 and Treg cells and their respective cytokines in COPD patients by disease stage / X.N. Li, X. Pan, D. Qiu // *Int J Clin Exper Med*. 2014, Vol. 7(12), 5324.
297. Linoleic acid metabolite drives severe asthma by causing airway epithelial injury / U. Mabalirajan, R. Rehman, T. Ahmad et al // *Sci Rep*. 2013, Vol. 3, 1349. doi: 10.1038/srep01349.
298. Lipid composition of membrane microdomains isolated detergent-free from PUFA supplemented RAW264.7 macrophages / C. Hellwing, F. Tigistu-Sahle, H. Fuhrmann et al // *J Cell Physiol*. 2018, Vol. 233(3), P. 2602–2612. doi: 10.1002/jcp.26138.
299. Lipid Raft Phase Modulation by Membrane-Anchored Proteins with Inherent Phase Separation Properties / Il-H. Lee, M.Y. Imanaka, E.H. Modahl, P.A. Torres-Ocampo // *ACS Omega*. 2019, Vol. 4(4), P. 6551–6559. doi: 10.1021/acsomega.9b00327.
300. Lloyd, C.M. Lung homeostasis: influence of age, microbes, and the immune system / C.M. Lloyd, B.J. Marsland // *Immunity*. 2017, Vol. 46, P. 549–561.
301. LPS induces phosphorylation of actin-regulatory proteins leading to actin reassembly and macrophage motility / G. Kleveta, K. Borzęcka, M. Zdioruk et al // *J Cell Biochem*. 2012, Vol. 113, P. 80–92. doi: 10.1002/jcb.23330.
302. Lung dendritic cells undergo maturation and polarization towards a T helper type 2-stimulating pheno-type in a mouse model of asthma: Role of nerve growth factor / Q. Qin, Zh. Wang, P. Pan, et al // *Exp Ther Med*. 2014. Vol. 8(5), P. 1402-1408.
303. Lung macrophage phenotypes and functional responses: role in the pathogenesis of COPD / K. Yamasaki, S.F.V. Eeden // *Int J Mol Sci*.

2018, Vol. 19(2), 582. doi: 10.3390/ijms19020582.

304. Lydic T.A. Lipidomics unveils the complexity of the lipidome in metabolic diseases / T.A. Lydic, Y.-H. Goo // *Clin Transl Med.* 2018, Vol. 7, 4. doi: 10.1186/s40169-018-0182-9.

305. Ma Huang Tang ameliorates bronchial asthma symptoms through the TLR9 pathway / J. Jiao, J. Wu, J. Wang et al // *Pharm Biol.* 2018, Vol. 56(1), P. 580–593. doi: 10.1080/13880209.2018.1517184.

306. MacLeod, H. T cell activation by TLRs: A role for TLRs in the adaptive immune response / H. MacLeod, L.M. Wetzler // *Sci STKE.* 2007, Vol. 2007, 48. doi: 10.1126/stke.4022007pe48.

307. Macrophage ABCA1 reduces MyD88-dependent Toll-like receptor trafficking to lipid rafts by reduction of lipid raft cholesterol / X. Zhu // *J Lipid Res.* 2010, Vol. 51, P. 3196–3206. doi: 10.1194/jlr.M006486.

308. MAP3K19 is a novel regulator of TGF- β signaling that impacts bleomycin-induced lung injury and pulmonary fibrosis / S.A. Boehme, K. Franz-Bacon, D.N. DiTirro et al // *PloS One.* 2016, Vol. 11(5), e0154874 doi: 10.1371/journal.pone.0154874.

309. Mapping of TLR5 and TLR7 in central and distal human airways and identification of reduced TLR expression in severe asthma / M.M. Shikhagaie, C.K. Andersson, M. Mori et al // *Clin Exp Allergy.* 2014, Vol. 44, P. 184–96. doi: 10.1111/cea.12176.

310. Márquez, L. Endocannabinoid system and bowel inflammation / L. Márquez, S. Abanades, M. Andreu // *Med Clin (Barc).* 2008, Vol. 131(13), P. 513–517.

311. Martín-Saldaña, S. Spontaneous cannabinoid receptor 2 (CB2) expression in the cochlea of adult albino rat and its up-regulation after cisplatin treatment / S. Martín-Saldaña, A. Trinidad, E. Ramil // *PLoS One.* 2016, Vol. 11, e0161954.

312. Maurya, N. Therapeutic applications of cannabinoids / N. Maurya, B.K. Velmurugan // *Chem Biol Interact.* 2018, Vol. 293, P. 77–88. doi: 10.1016/j.cbi.2018.07.018.

313. Mazzone, S.B. Vagal afferent innervation of the Airways in Health and Disease / S.B. Mazzone, B.J. Undem // *Physiol Rev.* 2016, Vol. 96, P. 975–1024. doi: 10.1152/physrev.00039.2015.
314. McCormick, S.P.A. Lipoprotein(a) catabolism: a case of multiple receptors / S.P.A. McCormick, W.J. Schneider // *Pathology.* 2019, Vol. 51(2), P. 155–164. doi: 10.1016/j.pathol.2018.11.003.
315. McSorley, H.J. Blockade of IL-33 release and suppression of type 2 innate lymphoid cell responses by helminth secreted products in airway allergy / H.J. McSorley, N.F. Blair, K.A. Smith et al // *Mucosal Immunol.* 2014, Vol. 7, P. 1068–1078. doi: 10.1038/mi.2013.123.
316. Medicinal Chemistry, Pharmacology, and Clinical Implications of TRPV1 Receptor Antagonists / M.A. Tabrizi, P.G. Baraldi, S. Baraldi et al // *Med Res Rev.* 2017, Vol. 37(4), P. 936–983. doi: 10.1002/med.21427.
317. Membrane raft association is a determinant of plasma membrane localization / B.B. Diaz-Rohrer, K.R. Levental, K. Simons et al. // *Proc Natl Acad Sci USA.* 2014, Vol. 111, P. 8500–8505. doi: 10.1073/pnas.1404582111.
318. Messlinger, K. The big CGRP flood - sources, sinks and signalling sites in the trigeminovascular system. / K. Messlinger // *J Headache Pain.* 2018, Vol. 19, 22. doi: 10.1186/s10194-018-0848-0.
319. Michels, K.R. TLR Activation and Allergic Disease: Early Life Microbiome and Treatment / K.R. Michels, N.W. Lukacs, W. Fonseca // *Curr Allergy Asthma Rep.* 2018, Vol. 18(11), 61. doi: 10.1007/s11882-018-0815-5.
320. Mirza, S. COPD guidelines: a review of the 2018 GOLD report / S. Mirza, R.D. Clay, M.A. Koslow, P.D. Scanlon // *Mayo Clinic Proceedings.* 2018, Vol. 93(10), P. 1488–1502. doi: 10.1016/j.mayocp.2018.05.026.
321. Mishra, V. Oxidative stress and cellular pathways of asthma and inflammation: Therapeutic strategies and pharmacological targets /

-
- V. Mishra, J. Banga, P. Silveyra // *Pharmacol Ther.* 2018, Vol. 181, P. 169–182. doi: 10.1016/j.pharmthera.2017.08.011.
322. Mitochondria in Lung Diseases / B. Aravamudan, M.A. Thompson, C.M. Pabelick, Y.S. Prakash // *Expert Rev Respir Med.* 2013, Vol. 7(6), P. 631–646.
323. Mlost, J. Role of endocannabinoid system in dopamine signalling within the reward circuits affected by chronic pain / J. Mlost, A. Wąsik, K. Starowicz // *Pharmacol Res.* 2019, Vol. 143, P. 40–47. doi: 10.1016/j.phrs.2019.02.029.
324. Modification of the fatty acid composition of the erythrocyte membrane in patients with chronic respiratory diseases / T.P. Novgorodtseva, Yu.K. Denisenko, N.V. Zhukova et al // *Lipids Health Dis.* 2013, Vol. 12, P. 117.
325. Moldaver, D.M. An update on lymphocyte subtypes in Asthma and Airway Disease / D.M. Moldaver, M. Larche, C.D. Rudulier // *Chest.* 2017, Vol. 151(5), P. 1122–1130.
326. Molecular insights into lipid-assisted Ca²⁺ regulation of the TRP channel Polycystin-2 / M. Wilkes, M.G. Madej, L. Kreuter et al // *Nat Struct Mol Biol.* 2017, Vol. 24, P. 123–130. doi: 10.1038/nsmb.3357.
327. Molecular mechanisms regulating Th1 immune responses / S.J. Szabo, B.M. Sullivan, S.L. Peng, L.H. Glimcher // *Annu Rev Immunol.* 2003, Vol. 21, P. 713–75.
328. Molecular signaling of the HMGB1/RAGE axis contributes to cholesteatoma pathogenesis / M.J. Szczepanski, M. Luczak, E. Olszewska et al // *J Mol Med (Berl).* 2015. Vol. 93, P. 305–314. doi: 10.1007/s00109-014-1217-3.
329. Molecular targets of fatty acid ethanolamides in asthma / O.Y. Kytikova, T.P. Novgorodtseva, M.V. Antonyuk et al / *Medicina.* 2019, Vol. 55(4), 87: doi: 10.3390/medicina55040087.
330. Morales, P. Towards a better understanding of the cannabinoid-related orphan receptors GPR3, GPR6, and GPR12 / P. Morales, I. Isawi,

- P.H. Reggio // *Drug Metab Rev.* 2018, Vol. 50, P. 74–93. doi: 10.1080/03602532.2018.1428616.
331. Moran, M.M. TRP Channels as Potential Drug Targets / M.M. Moran // *Annu Rev Pharmacol Toxicol.* 2018, Vol. 58, P. 309–330. doi: 10.1146/annurev-pharmtox-010617-052832.
332. Mukherjee, S. TLR2 and TLR4 mediated host immune responses in major infectious diseases: a review / S. Mukherjee, S. Karmakar, S.P. Babu // *Braz J Infect Dis.* 2016, Vol. 20, P. 193–204. doi: 10.1016/j.bjid.2015.10.011.
333. Muller, C. Cannabinoid Ligands Targeting TRP Channels / C. Muller, P. Morales, P.H. Reggio // *Front Mol Neurosci.* 2019, Vol. 11, 487. doi: 10.3389/fnmol.2018.00487.
334. Mutoh, T. Desflurane but not sevoflurane augments laryngeal C-fiber inputs to nucleus tractus solitarius neurons by activating transient receptor potential-A1 / T. Mutoh, Y. Taki, H. Tsubone // *Life Sci.* 2013, Vol. 92, P. 821–828. doi: 10.1016/j.lfs.2013.02.015.
335. Myers, A.C. Allergic inflammation-induced neuropeptide production in rapidly adapting afferent nerves in guinea pig airways / A.C. Myers, R. Kajekar, B.J. Undem // *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol.* 2002, Vol. 282, P. 775–781.
336. n-3 polyunsaturated fatty acids suppress CD4(+) T cell proliferation by altering phosphatidylinositol-(4,5)-bisphosphate [PI(4,5)P₂] organization / T.Y. Hou, R. Barhoumi, Y-Y. Fan et al // *Biochim Biophys Acta-Biomembranes.* 2016, Vol. 1858(1), P. 85–96. doi: 10.1016/j.bbamem.2015.10.009.
337. Nanoparticles increase human bronchial epithelial cell susceptibility to respiratory syncytial virus infection via nerve growth factor-induced autophagy / S. Chakraborty, V. Castranova, M.K. Perez, G. Piedimonte // *Physiol Rep.* 2017, Vol. 5(13), e13344. doi: 10.14814/phy2.13344.
338. Necela, B.M. Toll-like receptor 4 mediates cross-talk between peroxisome proliferator-activated receptor gamma and nuclear factor-kappaB in

-
- macrophages / B.M. Necela, W. Su, E.A. Thompson // *Immunology*. 2008, Vol. 125(3), P. 344–358. doi: 10.1111/j.1365-2567.2008.02849.x.
339. Necessary and sufficient role for helper T cells to prevent fungal dissemination in allergic lung disease / P.C. Porter, L. Roberts, A. Fields, et al // *Infect Immunity*. 2011, Vol. 79(11), P. 4459–4471.
340. Nerve growth factor exacerbates allergic lung inflammation and airway remodeling in a rat model of chronic asthma / Y.G. Yang, W.M. Tian, H. Zhang, et al // *Exp Ther Med*. 2013, Vol. 6(5), P. 1251–1258.
341. Nesin, V. TRPC1 / V. Nesin, L. Tsiokas // In: Nilius B., Flockerzi V. (eds) *Mammalian Transient Receptor Potential (TRP) Cation Channels*. Handb Exp Pharmacol. Springer, Berlin, Heidelberg, 2014, Vol. 222, P. 15–51. doi: 10.1007/978-3-642-54215-2_2.
342. Network analysis identifies a putative role for the PPAR and type 1 interferon pathways in glucocorticoid actions in asthmatics / D. Diez, S. Goto, J.V. Fahy et al // *BMC Med Genomics*. 2012, Vol. 5, 27. doi: 10.1186/1755-8794-5-27.
343. Neuroendocrine cells derived chemokine vasoactive intestinal polypeptide (VIP) in allergic diseases / A.K. Verma, M. Manohar, S.U. Venkateshaiah, A. Mishra // *Cytokine Growth Factor Rev*. 2017, Vol. 38, P. 37–48. doi: 10.1016/j.cytogfr.2017.09.002.
344. Neuro-immune interactions in chemical-induced airway hyperreactivity / F.C. Devos, B. Boonen, Y.A. Alpizar et al // *Europ Respir J*. 2016, Vol. 48, P. 380–392. doi: 10.1183/13993003.01778-2015.
345. Neurokinin-neurotrophin interactions in airway smooth muscle / L.W. Meuchel, A. Stewart, D.F. Smelter et al // *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol*. 2011, Vol. 301(1), P. 91–98.
346. Neuropeptide levels in nasal secretions from patients with and without chronic cough / K.G. Lim, M.A. Rank, H. Kita et al // *Ann Allergy Asthma Immunol*. 2011, Vol. 107(4), P. 360–363. doi: 10.1016/j.anai.2011.07.010.
347. Neuropeptides activate human mast cell degranulation and chemokine production / M. Kulka, C.H. Sheen, B.P. Tancowny et al //

Immunology. 2008, Vol. 123, P. 398–410.

348. Neuropeptides and breathing in health and disease / K. Kaczyńska, D. Zając, P. Wojciechowski et al // *Pulm Pharmacol Ther.* 2018, Vol. 48, P. 217–224. doi: 10.1016/j.pupt.2017.12.001.

349. Neuropeptides control the dynamic behavior of airway mucosal dendritic cells / S. Voedisch, S. Rochlitzer, T.Z. Veres et al // *PLoS One.* 2012, Vol. 7(9), e45951. doi: 10.1371/journal.pone.0045951.

350. Neuropenotypes in Airway Diseases. Insights from Translational Cough Studies / M.G. Belvisi, M.A. Birrell, S. Khalid et al // *Am J Respir Crit Care Med.* 2016, Vol. 193(12), P. 1364–1372. doi: 10.1164/rccm.201508-1602OC.

351. Neutrophil extracellular trap formation and extracellular DNA in sputum of stable COPD patients / F. Pedersen, S. Marwitz, O. Holz et al // *Respir Med.* 2015, Vol. 109(10), P. 1360–1362. doi: 10.1016/j.rmed.2015.08.008.

352. Neutrophil proteases alter the interleukin-22-receptor-dependent lung antimicrobial defence / A. Guillon, Y. Jouan, D. Brea et al // *Europ Respir J.* 2015, Vol. 46(3), P. 771–782. doi: 10.1183/09031936.00215114.

353. New Insights into the Role of Inflammation in the Pathogenesis of Atherosclerosis / Yu.Wu. Meng, Li. Chia-Jung, Hou Ming-Feng et al // *Int J Mol Sci.* 2017, Vol. 18(10), P. 2034–2040. doi: 10.3390/ijms18102034.

354. Newcomb, D.C. Th17-mediated inflammation in asthma / D.C. Newcomb, R.S. Peebles // *Curr. Opin. Immunol.* 2013, Vol. 25, P. 755–776.

355. NF- κ B signaling in inflammation / T. Liu, L. Zhang, D. Joo, S. Sun // *Sig Transduct Target Ther.* 2017, Vol. 2, 17023.

356. Ni, L. Roles of Myeloid and Lymphoid Cells in the Pathogenesis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease / L. Ni, Ch. Dong // *Front Immunol.* 2018, Vol. 9, 1431. doi: 10.3389/fimmu.2018.01431.

357. Nicotine Stimulates Nerve Growth Factor in Lung Fibroblasts through an NF κ B-Dependent Mechanism / W. Cherry, G. Kora,

M.B. Kaiser et al // PLoS One. 2014, Vol. 9(10). e109602. doi: 10.1371/journal.pone.0109602.

358. Nitric oxide synthase polymorphisms, gene expression and lung function in chronic obstructive pulmonary disease / F. Aminuddin, T.L. Hackett, D. Stefanowicz et al // BMC Pulm. Med. 2013, Vol. 13, 64. doi: 10.1186/1471-2466-13-64.

359. Novel pharmacological TRPC inhibitors block hypoxia-induced vasoconstriction / N. Urban, K. Hill, L. Wang et al // Cell Calcium. 2012, Vol. 51, P. 194–206. doi: 10.1016/j.ceca.2012.01.001.

360. Orchestration of NLRP3 inflammasome activation by ion fluxes / T. Gong, Y. Yang, T. Jin. et al // Trends Immunol. 2018, Vol. 39, P. 393–406.

361. Over-expression of nuclear factor- κ B family genes and inflammatory molecules is related to chronic obstructive pulmonary disease / L. Zhou, Y. Liu, X. Chen, et al // J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018, Vol. 13, P. 2131–2138. doi: 10.2147/COPD.S164151.

362. Overtreatment of COPD with Inhaled Corticosteroids – Implications for Safety and Costs: Cross-Sectional Observational Study / P. White, H. Thornton, H. Pinnock et al // PLoS One. 2013, Vol. 8. e75221.

363. Oxidation of ubiquinol by peroxynitrite: implication for protection of mitochondria against nitrosative damage / F. Schropfer, N. Riobo, M.C. Carreras, B. Alvarez // Biochem J. 2000, Vol. 349, P. 35–42.

364. Oxidized phospholipid inhibition of toll-like receptor (TLR) signaling is restricted to TLR2 and TLR4: roles for CD14, LPS-binding protein, and MD2 as targets for specificity of inhibition / C. Erridge, S. Kennedy, C.M. Spickett et al // J Biol Chem. 2008, Vol. 283, P. 24748–24759. doi: 10.1074/jbc.M800352200.

365. Paeonol ameliorates ovalbumin-induced asthma through the inhibition of TLR4/NF- κ B and MAPK signaling / Y. Tang, W. Huang, Q. Song et al // Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2018. Vol. 2018, 3063145. doi: 10.1155/2018/3063145.

366. Patel, B. Concerted redox modulation by sulforaphane alleviates diabetes and cardiometabolic syndrome / B. Patel, G.E. Mann, S.J. Chapple // *Free Radic Biol Med.* 2018, Vol. 122, P. 150–160. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2018.02.004.
367. Paulis, L. New developments in the pharmacological treatment of hypertension: dead-end or a glimmer at the horizon? / L. Paulis, R. Rajkovicova, F. Simko // *Curr Hypertens Rep.* 2015. Vol. 17, 42. doi: 10.1007/s11906-015-0557-x.
368. Peck, A. Plasticity of T-cell phenotype and function: the T helper type 17 example / A. Peck, E.D. Mellins // *Immunology.* 2010, Vol. 129(2), P. 147–153. doi:10.1111/j.1365-2567.2009.03189.x.
369. Peng, J.-B. TRPV5 and TRPV6 in transcellular Ca (2+) transport: Regulation, gene duplication, and polymorphisms in African populations / J.-B. Peng // *Adv Exp Med Boil.* 2011, Vol. 704, P. 239–275. doi: 10.1007/978-94-007-0265-3_14.
370. Peripheral endocannabinoids associated with energy expenditures in Native Americans of Southwestern heritage / S. Heinitz, A. Basolo, P. Piaggi et al // *J Clin Endocrinol Metab.* 2018, Vol. 103, P. 1077–1087. doi: 10.1210/jc.2017-02257.
371. Peroxisome Proliferator Activated Receptor gamma (PPAR γ) Agonist Rosiglitazone Ameliorate Airway Inflammation by Inhibiting Toll-Like Receptor 2 (TLR2)/Nod-Like Receptor with Pyrin Domain Containing 3 (NLRP3) Inflammatory Corpuscle Activation in Asthmatic Mice / Y. Cheng, S. Li, M. Wang et al // *Med Sci Monit.* 2018, Vol. 24, P. 9045–9053. doi: 10.12659/MSM.910766.
372. Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR γ) as a target for concurrent management of diabetes and obesity-related cancer / Q. Wang, M. Umar Imam, Z. Yida, F. Wang // *Curr Pharm Des.* 2017, Vol. 23, P. 3677–3688. doi: 10.1016/j.immuni.2015.11.015.
373. Perros, F. TLR4 signalling in pulmonary stromal cells is critical for inflammation and immunity in the airways / F. Perros, B.N. Lambrecht,

-
- H. Hammad // *Respir Res.* 2011, Vol. 2, 125. doi: 10.1186/1465-9921-12-125.
374. Petrosino, S. The pharmacology of palmitoylethanolamide and first data on the therapeutic efficacy of some of its new formulations / S. Petrosino, V. Di Marzo // *Br J Pharmacol.* 2017, Vol. 174. P. 1349–1365. doi: 10.1111/bph.13580.
375. Phenotypic and functional features of human Th17 cells / F. Annunziato, L. Cosmi, V. Santarlasci et al // *J Exp Med.* 2007, Vol. 204(8), P. 1849–1861.
376. Phospholipid oxidation generates potent anti-inflammatory lipid mediators that mimic structurally related pro-resolving eicosanoids by activating Nrf2 / P. Bretscher, J. Egger, A. Shamshiev et al // *EMBO Mol Med.* 2015, Vol. 7, P. 593–607. doi: 10.15252/emmm.201404702.
377. Pinot, M. Lipid cell biology. Polyunsaturated phospholipids facilitate membrane deformation and fission by endocytic proteins / M. Pinot, S. Vanni, H. Barelli // *Science.* 2014, Vol. 345, P. 693–697. doi: 10.1126/science.1255288.
378. Population of sensory neurons essential for asthmatic hyperreactivity of inflamed airways / D. Trankner, N. Hahne, K. Sugino et al // *Proceed Nation Acad Sci USA.* 2014, Vol. 111, P. 11515–11520.
379. Potent anti-inflammatory and pro-resolving effects of anabasum in a human model of self-resolving acute inflammation / M.P. Motwani, F. Bennett, P.C. Norris et al // *Clin Pharmacol Ther.* 2018, Vol. 104(4), P. 675–686. doi: 10.1002/cpt.980.
380. PPAR γ in dendritic cells and T cells drives pathogenic type-2 effector responses in lung inflammation / S.P. Nobs, S. Natali, L. Pohlmeier et al // *J Exp Med.* 2017, Vol. 214(10), P. 3015–3035. doi: 10.1084/jem.20162069.
381. PPAR γ signaling and metabolism: the good, the bad and the future / M. Ahmadian, J.M. Suh, N. Hah et al // *Nat Med.* 2013, Vol. 19(5), P. 557–566.

382. Prado, C.M. Nitric oxide in asthma physiopathology / C.M. Prado, M.A. Martins, I.F.L.C. Tibério // *ISRN Allergy*. 2011, Vol. 2011, 832560.
383. Prajapati, B. Understanding and modulating the Toll like Receptors (TLRs) and NOD like Receptors (NLRs) cross talk in type 2 diabetes / B. Prajapati, P.K. Jena, P. Rajput et al // *Curr Diabetes Rev*. 2014, Vol. 10(3), P. 190–200.
384. Prakash, Y.S. Neurotrophins in lung health and disease / Y.S. Prakash, M.A. Thompson, L. Meuchel // *Expert Rev Respir Med*. 2010, Vol. 4, P. 395–411.
385. Preferential Selection of Arginine at the Lipid-Water-Interface of Trpv1 During Vertebrate Evolution Correlates with Its Snorkeling Behaviour and Cholesterol Interaction / S. Saha, A. Ghosh, N. Tiwari et al // *Sci Rep*. 2017, Vol. 7, 16808. doi: 10.1038/s41598-017-16780-w.
386. Prenylated Stilbenoids Affect Inflammation by Inhibiting the NF- κ B/AP-1 Signaling Pathway and Cyclooxygenases and Lipoxygenase / J. Hošek, V. Leláková, P. Bobál et al // *J Nat Prod*. 2019, Vol. 82(7), P. 1839–1848. doi: 10.1021/acs.jnatprod.9b00081.
387. Probing the intermolecular interactions of PPAR γ -LBD with polyunsaturated fatty acids and their anti-inflammatory metabolites to infer most potential binding moieties / S. Muralikumar, U. Vetrivel, A. Narayanasamy, U.N. Das // *Lipids Health Dis*. 2017, Vol. 16, 17. doi: 10.1186/s12944-016-0404-3.
388. Pro-inflammatory effects of extracellular Hsp70 and cigarette smoke in primary airway epithelial cells from COPD patients / A. Hulina-Tomašković, I.H. Heijink, M.R. Jonker et al // *Biochimie*. 2019, Vol. 156, P. 47–58. doi: 10.1016/j.biochi.2018.09.010.
389. Pro-Resolving Lipid Mediators in the Pathophysiology of Asthma / O. Kytikova, T. Novgorodtseva, Y. Denisenko et al // *Medicina*. 2019, Vol. 55(6), 284. doi: 10.3390/medicina55060284.
390. Prospect of vasoactive intestinal peptide therapy for COPD/PAH and asthma: a review / D Wu, D. Lee, Y.K. Sung // *Respir Res*. 2011, Vol. 12, 45. doi: 10.1186/1465-9921-12-45.

-
391. Protease-activated receptor-2 (PAR2) and transient receptor potential Vanilloid 4 (TRPV4) coupling is required for sustained inflammatory signaling / D.P. Poole, S. Amadesi, N.A. Veldhuis et al // *J Biol Chem*. 2013, Vol. 2, P. 1–24. doi: 10.1074/jbc.M112.438184.
392. Proteome and secretome analysis reveals differential post-transcriptional regulation of Toll-like receptor responses / M. Koppenol-Raab, V. Sjoelund, N.P. Manes et al // *Mol Cell Proteomics*. 2017, Vol. 16, P. 172–186.
393. Pulmonary neuroendocrine cells amplify allergic asthma responses / P. Sui, D.L. Wiesner, J. Xu et al // *Science*. 2018, Vol. 360(6393), eaan8546. doi: 10.1126/science.aan8546.
394. (R)-(5-tert-butyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl)-3-(1H-indazol-4-yl)-urea (ABT-102) blocks polymodal activation of transient receptor potential vanilloid 1 receptors in vitro and heat-evoked firing of spinal dorsal horn neurons in vivo / C.S. Surowy, T.R. Neelands, B.R. Bianchi et al // *J Pharm Exp*. 2008, Vol. 326, P. 879–888. doi: 10.1124/jpet.108.138511.
395. Racz, I. Anandamide effects on 5-HT₃ receptors in vivo / I. Racz, M. Göthert, A. Zimmer // *Europ Pharmacol*. 2008, Vol. 596, P. 98–101.
396. Raft-Like Membrane Domains in Pathogenic Microorganisms / A.M. Farnoud, M.A. Toledo, B.J. Konopka et al // *Curr Top Membr*. 2015, Vol. 75, P. 233–268. doi: 10.1016/bs.ctm.2015.03.005.
397. Randomised clinical trial: The efficacy of a transient receptor potential vanilloid 1 antagonist AZD1386 in human oesophageal pain / A.L. Krarup, L. Ny, M. Astrand et al // *Aliment Pharm*. 2011, Vol. 33, P. 1113–1122. doi: 10.1111/j.1365-2036.2011.04629.x.
398. Regulation of inflammation by cannabinoids, the endocannabinoids 2-arachidonoyl-glycerol and arachidonoyl-ethanolamide, and their metabolites / C. Turcotte, F. Chouinard, J.S. Lefebvre, N. Flamand // *J Leuk Biol*. 2015, Vol. 97(6), P. 1049–1070. doi: 10.1189/jlb.3RU0115-021R.
399. Regulation of peroxisome proliferator-activated receptors (PPAR) α and γ of rat brain astrocytes in the course of activation by toll-like receptor agonists / D.V. Chistyakov, S.E. Aleshin,.

- A.A. Astakhova et al // J Neurochem. 2015, Vol. 134(1), P. 113–124. doi: 10.1111/jnc.13101
400. Rehan, V.K. PPAR γ Signaling Mediates the Evolution, Development, Homeostasis, and Repair of the Lung / V.K. Rehan, J.S. Torday // PPAR Res. 2012, Vol. 2012, 289867. doi: 10.1155/2012/289867.
401. Relationship between fractional exhaled nitric oxide level and efficacy of inhaled corticosteroid in asthma-COPD overlap syndrome patients with different disease severity / J.X. Feng, Y. Lin, J. Lin et al // J Korean Med Sci. 2017, Vol. 32(3), P. 439–447. doi: 10.3346/jkms.2017.32.3.439.
402. Remodeling of the postsynaptic plasma membrane during neural development / K. Tulodziecka, B.B. Diaz-Rohrer, M.M. Farley et al // Mol Biol Cell. 2016, Vol. 27, P. 3480–3489. doi: 10.1091/mbc.E16-06-0420.
403. Renz, H. Neurotrophins in chronic allergic airway inflammation and remodeling / H. Renz, A. Kiliç // Chem Immunol Allergy. 2012, Vol. 98, P. 100–117.
404. Resolvin D2 is a potent endogenous inhibitor for transient receptor potential subtype V1/A1, inflammatory pain, and spinal cord synaptic plasticity in mice: Distinct roles of resolvin D1, D2, and E1 / C.K. Park, Z.Z. Xu, T. Liu et al // J Neurosci. 2011, Vol. 31, P. 18433–18438. doi: 10.1523/JNEUROSCI.4192-11.2011.
405. Restoration of corticosteroid sensitivity in chronic obstructive pulmonary disease by inhibition of mammalian target of rapamycin / A. Mitani, K. Ito, C. Vuppusetty, P.J. Barnes, N. Mercado // Am J Respir Crit Care Med. 2016, Vol. 193, P. 143–153. doi: 10.1164/rccm.201503-0593OC.
406. Resveratrol protects against asthma-induced airway inflammation and remodeling by inhibiting the HMGB1/TLR4/NF- κ B pathway / H. Jiang, J. Duan, K. Xu, W. Zhang // Exp Ther Med. 2019, Vol. 18(1), P. 459–466. doi: 10.3892/etm.2019.7594.
407. Revisiting Type 2-high and Type 2-low airway inflammation in asthma: current knowledge and therapeutic implications / D. Robinson, M. Humbert, R. Buhl et al // Clin Exp Allergy. 2017, Vol. 47(2), P. 161–175.

-
408. Role of the inflammasome in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) / C. Colarusso, M. Terlizzi, A. Molino et al // *Oncotarget*. 2017, Vol. 8, P. 81813–81824. doi: 10.18632/oncotarget.17850.
409. Role of Toll-Like Receptors in Actuating Stem/Progenitor Cell Repair Mechanisms: Different Functions in Different Cells / F. Sallustio, C. Curci, A. Stasi et al // *Stem Cells Int*. 2019, 6795845. doi: 10.1155/2019/6795845.
410. Role of transient receptor potential and pannexin channels in cigarette smoke-triggered ATP release in the lung / M. Baxter, S. Eltom, B. Dekkak et al // *Thorax*. 2014, Vol. 69. P. 1080–1089. doi: 10.1136/thoraxjnl-2014-205467.
411. Role of TRPA1 in acute cardiopulmonary toxicity of inhaled acrolein / D.J. Conklin, P. Haberzettl, G. Jagatheesan et al // *Toxicol Appl Pharm*. 2016, Vol. 324, P. 61–72. doi: 10.1016/j.taap.2016.08.028.
412. Role of TRPC1 channels in pressure-mediated activation of airway remodeling / N. Li, Y. He, G. Yang et al // *Respir Res*. 2019, Vol. 20, 91. doi: 10.1186/s12931-019-1050-x.
413. Role of VPAC2 receptor in monocrotaline-induced pulmonary hypertension in rats / M. Koga, Y. Mizuno, I. Watanabe et al // *J Appl Physiol*. 2014, Vol. 117(4), P. 383-391. doi: 10.1152/japplphysiol.00861.2013.
414. Roles of Toll-Like Receptors in Nitroxidative Stress in Mammals / Y. Li, S.L. Deng, Z.X. Lian et al // *Cells*. 2019, Vol. 8(6), 576. doi: 10.3390/cells8060576.
415. Rosiglitazone attenuates the metalloprotease/anti-metalloprotease imbalance in emphysema induced by cigarette smoke: involvement of extracellular signal-regulated kinase and NFkappaB signaling / G. Hou, Y. Yin, D. Han et al // *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis*. 2015, Vol. 10, P. 715–724.
416. Rouzer, C.A. Endocannabinoid Oxygenation by Cyclooxygenases, Lipoxygenases, and Cytochromes P450: Cross-Talk between the Eicosanoid and Endocannabinoid Signaling Pathways / C.A. Rouzer, L.J. Marnett // *Chem Rev*. 2011, Vol. 111(10), P. 5899–5921.

417. Ruiz de Azua, I. Multiple endocannabinoid-mediated mechanisms in the regulation of energy homeostasis in brain and peripheral tissues / I. Ruiz de Azua, B. Lutz // *Cell Mol Life Sci.* 2019, Vol. 76, P. 1341–1363. doi: 10.1007/s00018-018-2994-6.
418. Ruyschaert, J.M. Role of lipid microdomains in TLR-mediated signaling / J.M. Ruyschaert, C. Loney // *Biochim Biophys Acta.* 2015, Vol. 1848, P. 1860–1867. doi: 10.1016/j.bbamem.2015.03.014.
419. Saturated fatty acids activate TLR-mediated proinflammatory signaling pathways / S. Huang, J.M. Rutkowski, R.G. Snodgrass et al // *J Lipid Res.* 2012, Vol. 53, P. 2002–2013. doi: 10.1194/jlr.D029546.
420. Saturated fatty acids trigger TLR4-mediated inflammatory response / D.M. Rocha, A.P. Caldas, L.L. Oliveira et al // *Atherosclerosis.* 2016, Vol. 244, P. 211–215. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.11.015.
421. Schaefer, L. Complexity of danger: the diverse nature of damage-associated molecular patterns / L. Schaefer // *The Journal of Biological Chemistry.* 2014. 289(51). P. 35237–35245. doi: 10.1074/jbc.R114.619304.
422. Schaefer, M. TRPs: Modulation by drug-like compounds / M. Schaefer // *Handb Exp Pharm.* 2014, Vol. 223, P. 1077–1106. doi: 10.1007/978-3-319-05161-1_15.
423. Schoeniger, A. LPS- or *Pseudomonas aeruginosa*-mediated activation of the macrophage TLR4 signaling cascade depends on membrane lipid composition / A. Schoeniger, H. Fuhrmann, J. Schumann // *Peer J.* 2016, Vol. 4, e1663. doi: 10.7717/peerj.1663.
424. Schuliga, M. NF-kappaB signaling in chronic inflammatory airway disease / M. Schuliga // *Biomolecules.* 2015, Vol. 5(3), P. 1266–1283. doi: 10.3390/biom5031266.
425. Scior, T. Reviewing and identifying amino acids of human, murine, canine and equine TLR4/MD-2 Receptor complexes conferring endotoxic Innate Immunity Activation by LPS/Lipid A, or antagonistic Effects by Eritoran, in Contrast to Species-Dependent modulation by Lipid Iva /

-
- T. Scior, C. Alexander, U. Zaehring // *Comput Struct Biotechnol J.* 2013, Vol. 5, e201302012. doi: 10.5936/csbj.201302012.
426. Seasonality and determinants of moderate and severe COPD exacerbations in the TORCH study / C.R. Jenkins, B. Celli, J.A. Anderson et al // *Europ Respir J.* 2012, Vol. 39, P. 38–45. doi: 10.1183/09031936.00194610.
427. Selective modulation of the glucocorticoid receptor can distinguish between transrepression of NF- κ B and AP-1 / K. De Bosscher, I.M. Beck, L. Dejager et al // *Cell Mol Life Sci.* 2014, Vol. 71(1), P. 143–163. doi: 10.1007/s00018-013-1367-4.
428. Sense and Immunity: Context-Dependent Neuro-Immune Interplay / S.L. Foster, C.R. Seehus, C.J. Woolf, S. Talbot // *Front Immunol.* 2017, Vol. 8, 1463. doi: 10.3389/fimmu.2017.01463.
429. Sequential activation of two pathogen-sensing pathways required for Type I interferon expression and resistance to an acute DNA virus infection / R.H. Xu, E.B. Wong, D. Rubio et al // *Immunity.* 2015, Vol. 43, P. 1148–1159.
430. Serhan, C.N. Resolution phase lipid mediators of inflammation: agonists of resolution / C.N. Serhan, N. Chiang // *Curr Opin Pharmacol.* 2013, Vol. 13(4), P. 632–640.
431. Serhan, C.N. Resolvins in inflammation: emergence of the pro-resolving superfamily of mediators / C.N. Serhan, B.D. Levy // *J Clin Invest.* 2018, Vol. 128(7), P. 2657–2669. doi: 10.1172/JCI97943.
432. Serum BDNF levels before and after the development of mood disorders: a case-control study in a population co-hort / K. Ihara, H. Yoshida, P.B. Jones et al // *Transl Psychiatry.* 2016, Vol. 6, e782.
433. Serum cytokine profiling and enrichment analysis reveal the involvement of immunological and inflammatory pathways in stable patients with chronic obstructive pulmonary disease / G. Bade, M.A. Khan, A.K. Srivastava et al // *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis.* 2014, Vol. 5(9), P. 759–773.

434. Severity of asthma: The role of CD25+, CD30+, NF-kappaB, and apoptotic markers / A.S. Abdulmir, H.S. Kadhim, R.R. Hafidh et al // *J Investig Allergol Clin Immunol*. 2009, Vol.19, I. 3, P. 218–24.
435. Sex hormones and systemic inflammation are modulators of the obese-asthma phenotype / H. Scott, P. Gibson, M. Garg et al // *Allergy*. 2016, Vol. 71(7), P. 1037–1047. doi: 10.1111/all.12891.
436. Sezgin, E. The mystery of membrane organization: composition, regulation and physiological relevance of lipid rafts / E. Sezgin, I. Levental, S. Mayor et al // *Rev Mol Cell Biol*. 2017, Vol. 18(6), P. 361–374. doi: 10.1038/nrm.2017.16.
437. Shan, M. Agonistic induction of PPARgamma reverses cigarette smoke-induced emphysema / M. Shan, R. You, X. Yuan et al // *J Clin Invest*. 2014, Vol. 124(3), P. 1371–1381. doi:10.1172/JCI70587.
438. Shang, V.C. The endogenous cannabinoid anandamide increases human airway epithelial cell permeability through an arachidonic acid metabolite / V.C. Shang, S.E. O'Sullivan, D.A. Kendall, R.E. Roberts // *Pharmacol Res*. 2016, Vol. 105, P. 152–163. doi: 10.1016/j.phrs.2016.01.023.
439. Shore, S.A. Obesity and asthma: possible mechanisms / S.A. Shore // *J Allergy Clin Immunol*. 2008, Vol. 121, P. 1087–1093. doi: 10.1016/j.jaci.2008.03.004.
440. Significant association of TREM-1 with HMGB1, TLRs and RAGE in the pathogenesis of insulin resistance in obese diabetic populations / S. Subramanian, P.K. Pallati, P. Sharma et al // *Am J Transl Res*. 2017, Vol. 9(7), P. 3224–3244.
441. Silencing Nociceptor Neurons Reduces Allergic Airway Inflammation / S. Talbot, R.E. Abdulnour, P.R. Burkett et al // *Neuron*. 2015, Vol. 87(2), P. 341–54. doi: 10.1016/j.neuron.2015.06.007.
442. Silvestri, C. The endocannabinoid system in energy homeostasis and the etiopathology of metabolic disorders / C. Silvestri, V. Di Marzo // *Cell Metab*. 2013, Vol. 17, P. 475–490.

-
443. Singh, A.K. Role of PD-L1 and PD-L2 in allergic diseases and asthma / A.K. Singh, P. Stock, O. Akbari // *Allergy*. 2011, Vol. 66(2), P. 155–162.
444. Singh, A.K. Structure and gating mechanism of the transient receptor potential channel TRPV3 / A.K. Singh, L.L. McGoldrick, A.I. Sobolevsky // *Nat Struct Mol Biol*. 2018, Vol. 25, P. 805–813. doi: 10.1038/s41594-018-0108-7.
445. Sirois, P. Leukotrienes: One step in our understanding of asthma / P. Sirois // *Respir Investig*. 2019, Vol. 57(2), P. 97–110. doi: 10.1016/j.resinv.2018.12.003.
446. Small interfering RNA targeting nerve growth factor alleviates allergic airway hyperresponsiveness / Y.L. Chen, H.Y. Huang, C.C. Lee, B.L. Chiang // *Mol Therapy - Nucleic Acids*. 2014, Vol. 3(4), P. 1–11. DOI: 10.1038/mtna.2014.11.
447. Small Molecule Inhibitors Targeting Activator Protein 1 (AP-1) / N. Ye, Y. Ding, Ch. Wild et al // *J Med Chem*. 2014, Vol. 57(16), P. 6930–6948. doi: 10.1021/jm5004733.
448. Sphingolipid domains in the plasma membranes of fibroblasts are not enriched with cholesterol / J.F. Frisz, H.A. Klitzing, K. Lou et al // *J Biol Chem*. 2013, Vol. 288, P. 16855–16861. doi: 10.1074/jbc.M113.473207.
449. Sputum substance P and neurokinin a are reduced during exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease / P. Boschetto, D. Miotto, I. Bononi et al // *Pulm Pharmacol Ther*. 2005, Vol. 18, P. 199–205. doi: 10.1016/j.pupt.2004.12.006.
450. Stimulation of nuclear receptor peroxisome proliferator-activated receptor- γ limits NF- κ B-dependent inflammation in mouse cystic fibrosis biliary epithelium / R. Scirpo, R. Fiorotto, A. Villani et al // *Hepatology*. 2015, Vol. 62, P. 1551–1562. doi: 10.1002/hep.28000.
451. Structural analogs of pulmonary surfactant phosphatidylglycerol inhibit Toll-like receptor 2 and 4 signaling / P. Kandasamy, M. Numata, B.K. Zemski et al // *J. Lipid Res*. 2016, Vol. 57, P. 993–1005. doi: 10.1194/jlr.M065201.

452. Structural determinants and functional consequences of protein affinity for membrane rafts / J.H. Lorent, B. Diaz-Rohrer, X. Lin et al // *Nat Commun.* 2017, Vol. 8, 1219. doi: 10.1038/s41467-017-01328-3.
453. Structure of the cold- and menthol-sensing ion channel TRPM8 / Y. Yin, M. Wu, L. Zubcevic et al // *Science.* 2018, Vol. 359, P. 237–241. doi: 10.1126/science.aan4325.
454. Structure of the mouse TRPC4 ion channel / J. Duan, J. Li, B. Zeng et al // *Nat Commun.* 2018, Vol. 9, 3102. doi: 10.1038/s41467-018-05247-9.
455. Structure of the receptor-activated human TRPC6 and TRPC3 ion channels / Q. Tang, W. Guo, L. Zheng et al // *Cell Res.* 2018, Vol. 28, P. 746–755. doi: 10.1038/s41422-018-0038-2.
456. Study on TRPV1-mediated mechanism for the hypersecretion of mucus in respiratory inflammation / J. Yang, H.M. Yu, X.D. Zhou et al // *Mol Immunol.* 2013, Vol. 53, P. 161–171.
457. Substance P antagonist improves both obesity and asthma in a mouse model / R. Ramalho, J. Almeida, M. Beltrão et al // *Allergy.* 2013, Vol. 68(1), P. 48–54. doi: 10.1111/all.12052.
458. Sun, J. Substance P at the neuro-immune crosstalk in the modulation of inflammation, asthma and antimicrobial host defense / J. Sun, M. Bhatia // *Inflamm Allergy Drug Targets.* 2014, Vol. 13, P. 112–120. doi: 10.2174/1871528113666140323202419.
459. Supersensitivity to anandamide and enhanced endogenous cannabinoid signaling in mice lacking fatty acid amide hydrolase / B.F. Cravatt, K. Demarest, M.P. Patricelli et al // *Proc Natl Acad Sci U S A.* 2001, Vol. 98(16), P. 9371–9376.
460. Suurmond, J. Differential TLR-induced cytokine production by human mast cells is amplified by FcεRI triggering / J. Suurmond, A.L. Dorjée, E.F. Knol et al // *Clin Exp Allergy.* 2015, Vol. 45, P. 788–796. doi: 10.1111/cea.12509.
461. Suzuki, M. High-density lipoprotein suppresses the type I interferon response, a family of potent antiviral immunoregulators, in macrophages

-
- challenged with lipopolysaccharide. / M. Suzuki // *Circulation*. 2010, Vol. 122, P. 1919–1927. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.110.961193.
462. Systemic analysis of PPARgamma in mouse macrophage populations reveals marked diversity in expression with critical roles in resolution of inflammation and airway immunity / E.L. Gautier, A. Chow, R. Spanbroek et al // *J Immunol*. 2012, Vol. 189, P. 2614–2624. doi: 10.4049/jimmunol.120049.
463. Systemic inflammation: methodological approaches to identification of the common pathological process / N.V. Zotova, V.A. Chereshev, E.Yu. Gusev // *PLoS One*. 2016, Vol. 11(5), e0155138.
464. Tait, S.W. Mitochondria and cell death: outer membrane permeabilization and beyond / S.W. Tait, D.R. Green // *Nat Rev Mol Cell Biol*. 2010, Vol. 11(9), P. 621–632.
465. Targeted anti-inflammatory therapeutics in asthma and chronic obstructive lung disease / A.L. Durham, G. Caramori, K.F. Chung, I.M. Adcock // *Transl Res*. 2016, Vol. 167(10), P. 192–203.
466. Taylor-Clark, T.E. Role of reactive oxygen species and TRP channels in the cough reflex / T.E. Taylor-Clark // *Cell Calcium*. 2016, Vol. 60, P. 155–162. doi: 10.1016/j.ceca.2016.03.007.
467. Teo, J.-L. AP-1 as a potential therapeutic target in allergic airways inflammation / J.-L. Teo, M. Kahn // *Drugs Future*. 2004, Vol. 29, P. 693–703.
468. TH2 and TH17 inflammatory pathways are reciprocally regulated in asthma / D.F. Choy, K.M. Hart, L.A. Borthwick et al // *Sci Transl Med*. 2015, Vol. 7, 301ra129.
469. The active contribution of toll-like receptors to allergic airway inflammation. *Int Immunopharmacol* / K. Chen, Y. Xiang, X. Yao et al // *J Int Immunopharmacol*. 2011, Vol. 11(10), P. 1391–1398. doi: 10.1016/j.intimp.2011.05.003.
470. The biosynthesis of prostaglandins / D.A. Van Dorp, R.K. Beerthuis, D.H. Nugeteren, H. Vonkeman // *Biophys Acta*. 1964, Vol. 90, 204 p.

471. The cholinergic anti-inflammatory pathway: an innovative treatment strategy for respiratory diseases and their comorbidities / M. Yamada, M. Ichinose // *Curr Opin Pharmacol.* 2018, Vol. 40, P. 18–25. doi: 10.1016/j.coph.2017.12.003.
472. The discovery of po-tent blockers of the canonical transient receptor channels, TRPC3 and TRPC6, based on an anilino-thiazole pharmacophore / D.G. Washburn, D.A. Holt, J. Dodson et al // *Bioorg Med Chem Lett.* 2013, Vol. 23, P. 4979–4984. doi: 10.1016/j.bmcl.2013.06.047.
473. The effect of delta-9-tetrahydrocannabinol on arachidonic acid metabolism in human peripheral blood mononuclear cells / S. Diaz, S. Specter, J.Y. Volanderhoek et al // *J Pharmacol Exp Ther.* 1994, Vol. 268, P. 1289–1296.
474. The effect of peroxisome proliferator-activated receptor- ligands on in vitro and in vivo models of COPD / S. Lea, J. Plumb, H. Metcalfe et al // *Europ Respir J.* 2013, Vol. 43(2), P. 409–420. doi:10.1183/09031936.00187812.
475. The endocannabinoid system as a target for addiction treatment: Trials and tribulations / M.E. Sloan, J.L. Gowin, V.A. Ramchandani et al // *Neuropharmacol.* 2017, Vol. 124, P. 73–83. doi: 10.1016/j.neuropharm.2017.05.031.
476. The endocannabinoid system: pivotal orchestrator of obesity and metabolic disease / W. Mazier, N. Saucisse, B. Gatta-Cherifi, D. Cota // *Trends Endocrinol Metab.* 2015, Vol. 26, P. 524–537. doi: 10.1016/j.tem.2015.07.007.
477. The First Extracellular Linker Is Important for Several Aspects of the Gating Mechanism of Human TRPA1 Channel / L. Marsakova, I. Barvik, V. Zima, et al // *Front Mol Neurosci.* 2017, Vol. 10, 16. doi: 10.3389/fnmol.2017.00016.
478. The Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2019. Available at: <http://www.ginasthma.org/>.

-
479. The Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2016. Available at: <http://www.ginasthma.org/>.
480. The Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2016. Available at: <http://www.goldcopd.com>.
481. The Influence of Cholesterol on Membrane Simulations Protein Structure, Function, and Dynamics Studied by Molecular Dynamics / J. Grouleff, S. J. Irudayam, K. K. Skeby, B. Schiott // *Biochim Biophys Acta Biomembr.* 2015, Vol. 1848, P. 1783–1795. doi: 10.1016/j.bbamem.2015.03.029.
482. The mechanisms of the regulation of immune response in patients with comorbidity of chronic obstructive pulmonary disease and asthma / E.P. Kalinina, Y.K. Denisenko, T.I. Vitkina et al // *Can Respir J.* 2016, Vol. 2016, 4503267. doi: 10.1155/2016/4503267.
483. The nervous system of airways and its remodeling in inflammatory lung diseases / K.J. Audrit, L. Delventhal, O. Aydin, C. Nassenstein // *Cell Tissue Res.* 2017, Vol. 367, P. 571–590. doi: 10.1007/s00441-016-2559-7.
484. The neuropeptide calcitonin gene-related peptide affects allergic airway inflammation by modulating dendritic cell function / S. Rochlitzer, T.Z. Veres, K. Kuhne et al // *Clin Exp Allergy.* 2011, Vol. 41, P. 1609–1621. doi: 10.1111/j.1365-2222.2011.03822.x.
485. The pathophysiological mechanisms underlying mucus hyper secretion induced by cold temperatures in cigarette smoke-exposed rats / M. Li, G. Yang, X.D. Zhou et al // *Int J Mol Med.* 2014, Vol. 33(1), P. 83–90.
486. The peroxisome proliferator-activated receptor γ agonist pioglitazone prevents NF- κ B activation in cisplatin nephrotoxicity through the reduction of p65 acetylation via the AMPK-SIRT1/p300 pathway / J. Zhang, Y. Zhang, F. Xiao et al // *Biochem Pharmacol.* 2016, Vol. 101, P. 100–111. doi: 10.1016/j.bcp.2015.11.027.
487. The PPAR β/δ agonist GW501516 attenuates peritonitis in peritoneal

fibrosis via inhibition of TAK1-NF κ B pathway in rats / X. Su, G. Zhou, Y. Wang et al // *Inflammation*. 2014, Vol. 37, P. 729–737. doi: 10.1007/s10753-013-9791-z.

488. The protective effect of fenofibrate against TNF- α -induced CD40 expression through SIRT1-mediated deacetylation of NF- κ B in endothelial cells / W. Wang, L. Bai, H. Qiao et al // *Inflammation*. 2014, Vol. 37, P. 177–185.

489. The receptor NLRP3 is a transcriptional regulator of T H 2 differentiation / M. Bruchard, C. Reb, V. Derangre et al // *Nat Immunol*. 2015, Vol. 16, P. 859–70.

490. The Role of Arachidonic Acid Metabolites (Endocannabinoids and Eicosanoids) in the Immune Processes: A Review / Yu.K. Denisenko, E.G. Lobanova, T.P. Novgorodtseva et al // *Int J Chem Biomed Sci*. 2015, Vol. 1(3), P. 70–78.

491. The role of cholesterol in driving iapp-membrane interactions / M.F.M. Sciacca, F. Lolicato, G. Di Mauro et al // *Biophys J*. 2016, Vol. 111(1), P. 140–151. doi: 10.1016/j.bpj.2016.05.050.

492. The role of endosomal toll-like receptors in asthma / A.I. Papaioannou, A. Spathis, K. Kostikas et al // *Europ J Pharmacol*. 2017, Vol. 808, P. 14–20. doi: 10.1016/j.ejphar.2016.09.033.

493. The Role of Neurotrophins in Inflammation and Allergy / S. Manti, P. Brown, M.K. Perez, G. Piedimonte // *Vitam Horm*. 2017, Vol. 104, P. 313–341. doi: 10.1016/bs.vh.2016.10.010.

494. The role of specialized pro-resolving mediators in maternal-fetal health / E. Elliott, C.K. Hanson, A.L. Anderson-Berry, T.M. Nordgren // *Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids*. 2017, Vol. 126, P. 98–104.

495. The role of T helper 17 (Th17) and regulatory T cells (Treg) in human organ transplantation and autoimmune disease / B. Afzali, G. Lombardi, R.I. Lecher, G.M. Lord // *Clin Exp Immunol*. 2007, Vol. 148(1), P. 32–46.

496. The value of fractionated exhaled nitric oxide in the diagnosis of asthma-chronic obstructive pulmonary disease overlap syndrome /

D.D. Deng, A.Y. Zhou, Q.C. Shuang, P. Chen // *Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi*. 2017, Vol. 40(2), P. 98–101. doi: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2017.02.004.

497. Therapeutic monoclonal antibodies for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease / M.G. Matera, C. Page, P. Rogliani et al // *Drugs*. 2016, Vol. 76(13), P. 1257 – 1270.

498. Tian, B. BRD4 Mediates NFkB-dependent Epithelial-Mesenchymal Transition and Pulmonary Fibrosis via Transcriptional Elongation / B. Tian, Y. Zhao, H. Sun et al // *Am J Physiol - Lung Cell Mol Physiol*. 2016, Vol. 311(6), P. 1183–1201 doi: 10.1152./ajplung.00224.2016.

499. Timmermans, S. A General Introduction to Glucocorticoid Biology / S. Timmermans, J. Souffriau, C. Libert // *Front Immunol*. 2019, Vol. 10, 1545. doi: 10.3389/fimmu.2019.01545.

500. TLR3 but not TLR7/8 ligand induces allergic sensitization to inhaled allergen / S. Reuter, N. Dehzad, H. Martin, L. Bohm et al // *J Immunol*. 2012, Vol. 188, P. 5123–5131. doi: 10.4049/jimmunol.1101618.

501. TLR4 signaling in stromal cells is critical for the initiation of allergic Th2 responses to inhaled antigen / A.M. Tan, H.C. Chen, P. Pochard et al // *J Immunol*. 2010, Vol. 184, P. 3535–3544. doi: 10.4049/jimmuno1.0900340.

502. Toll-like receptor 2 and 4 have opposing roles in the pathogenesis of cigarette smoke-induced chronic obstructive pulmonary disease / T.J. Haw, M.R. Starkey, S. Pavlidis et al // *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol*. 2018, Vol. 314(2), P. 298–317. doi: 10.1152/ajplung.00154.2017.

503. Toll-like receptor 4 (TLR-4) pathway promotes pulmonary inflammation in chronic intermittent hypoxia-induced obstructive sleep apnea / J. Yang, S. Wang, X. Gao et al // *Med Sci Monitor*. 2018, Vol. 24, P. 7152–7161. doi: 10.12659/MSM.910632.

504. Toll-like Receptor 4 Signaling Pathway in the Protective Effect of Pioglitazone on Experimental Immunoglobulin A Nephropathy / J.N. Zou, J. Xiao, S.S. Hu et al // *Chin Med J (Engl)*. 2017, Vol. 130(8), P. 906–13. doi: 10.4103/0366-6999.204101.

505. Toll-like receptor 7 governs interferon and inflammatory responses to rhinovirus and is suppressed by IL-5-induced lung eosinophilia / L. Hatchwell, A. Collison, J. Girkin et al // *Thorax*. 2015, Vol. 70, P. 854–861. doi: 10.1136/thoraxjnl-2014-205465.
506. Toll-like receptor 7 rapidly relaxes human airways / M.G. Drake, G.D. Scott, B.J. Proskocil et al // *Am J Respir Crit Care Med*. 2013, Vol. 188, P. 664–672. doi: 10.1164/rccm.201303-0442OC.
507. Toll-like receptor expression on peripheral blood mononuclear cells in asthmatics; implications for asthma management / E. Chun, S.H. Lee, S.Y. Lee et al // *J Clin Immunol*. 2010, Vol. 30, P. 459–464. doi: 10.1007/s10875-009-9363-z.
508. Toll-Like Receptors, Infections, and Rheumatoid Arthritis / M.I. Arleevskaya, R.V. Larionova, W.H. Brooks et al // *Clin Rev Allergy Immunol*. 2019, Vol. 58(2), P. 172–181. doi: 10.1007/s12016-019-08742-z.
509. Towards Understanding the Molecular Basis of Ion Channel Modulation by Lipids: Mechanistic Models and Current Paradigms / J.A. Poveda, A.M. Giudici, M.L. Renart et al // *Biochim Biophys Acta Biomembr*. 2017, Vol. 1859, P. 1507–1516. doi: 10.1016/j.bbamem.2017.04.003.
510. Transcription factor complex AP-1 mediates inflammation initiated by *Chlamydia pneumoniae* infection / A. Wang, M. Al-Kuhlani, S.C. Johnston et al // *Cell Microbiol*. 2013, Vol. 15, P. 779–794. doi: 10.1111/cmi.12071.
511. Transcriptomic identification of starfish neuropeptide precursors yields new insights into neuropeptide evolution / D.C. Semmens, O. Mira-beau, I. Moghul, R.P. Mahesh, Y. Wurm, M.R. Elphick // *Open Biol*. 2016, Vol. 6, 150224 doi:10.1098/rsob.150224.
512. Transient receptor potential ankyrin 1 channel localized to non-neuronal airway cells promotes non-neurogenic inflammation / R. Nassini, P. Pedretti, N. Moretto et al // *PLoS One*. 2012, Vol. 7, e42454. doi: 10.1371/journal.pone.0042454.
513. Transient receptor potential channels mediate the tussive response to prostaglandin E2 and bradykinin / M.S. Grace, M.A. Birrell, E. Dubuis

et al // *Thorax*. 2012, Vol. 67, P. 891–900. doi: 10.1136/thoraxjnl-2011-201443.

514. Transient receptor potential vanilloid type 1 antagonists: A patent review (2011–2014) / Y. Lee, S. Hong, M. Cui et al // *Expert Opin Ther Pat*. 2015, Vol. 25, P. 291–318. doi: 10.1517/13543776.2015.1008449.

515. TRPA1 and CGRP antagonists counteract vesicant-induced skin injury and inflammation / S. Achanta, N.R. Chintagari, M. Brackmann et al // *Toxicol Lett*. – 2018, Vol. 293, P. 140–148. doi: 10.1016/j.toxlet.2018.03.007.

516. TRPA1 mediates spinal antinociception induced by acetaminophen and the cannabinoid Delta(9)-tetrahydrocannabinol / D.A. Andersson, C. Gentry, L. Alenmyr et al // *Nat Commun*. 2011. Vol. 2, 551. doi: 10.1038/ncomms1559.

517. TRPA1 underlies a sensing mechanism for O₂ / N. Takahashi, T. Kuwaki, S. Kiyonaka et al // *Nat Chem Biol*. 2011, Vol. 7, P. 701–711. doi: 10.1038/nchembio.640.

518. TRPA1. *Handb* / P.M. Zygmunt, E.D. Hogestatt // *Exp Pharm*. 2014, Vol. 222, P. 583–630. doi: 10.1007/978-3-642-54215-2_23.

519. TRPC3 regulates release of brain-derived neurotrophic factor from human airway smooth muscle / P.K. Vohra, M.A. Thompson, V. Sathish et al // *Biochim Biophys Acta – Molecular Cell Research*. 2013, Vol. 1833(12), P. 2953–2960. doi: 10.1016/j.bbamcr.2013.07.019.

520. TRPC6 Regulates CXCR2-Mediated Chemotaxis of Murine Neutrophils / O. Lindemann, D. Umlauf, S. Frank et al // *Immunol*. 2013, Vol. 190, P. 5496–5505. doi: 10.4049/jimmunol.1201502.

521. TRPs in Tox: Involvement of Transient Receptor Potential-Channels in Chemical-Induced Organ Toxicity-A Structured Review / D. Steinritz, B. Stenger, A. Dietrich, et al // *Cells*. 2018, Vol. 7, 98. doi: 10.3390/cells7080098.

522. TRPV1 Structures in Nanodiscs Reveal Mechanisms of Ligand and Lipid Action / Y. Gao, E. Cao, D. Julius, Y. Cheng // *Nature*. 2016, Vol. 534, P. 347–351. doi: 10.1038/nature17964.

523. TRPV4 activation triggers protective responses to bacterial lipopolysaccharides in airway epithelial cells / Y.A. Alpizar, B. Boonen, A. Sanchez et al // *Nat. Commun.* 2017(8), 1059. doi: 10.1038/s41467-017-01201-3.
524. TRPV4 channel activity is modulated by direct interaction of the ankyrin domain to $\text{Pi}(4,5)\text{P}(2)$ / N. Takahashi, S. Hamada-Nakahara, Y. Itoh et al // *Nat Commun.* 2014, Vol. 5, 4994. doi: 10.1038/ncomms5994.
525. TRPV4 inhibition counteracts edema and inflammation and improves pulmonary function and oxygen saturation in chemically induced acute lung injury / S. Balakrishna, W. Song, S. Achanta et al // *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol.* 2014, Vol. 307, P. 158–172. doi: 10.1152/ajplung.00065.2014.
526. Urban air pollution, climate and its impact on asthma morbidity / L.V. Veremchuk V.I. Yankova, T.I. Vitkina et al // *Asian Pac J Trop Biomed.* 2016, Vol. 6(1), P. 76–79.
527. Urquhart, P. Endocannabinoids and their oxygenation by cyclooxygenases, lipoxygenases and other oxygenases / P. Urquhart, A. Nicolaou, D.F. Woodward // *Biochim Biophys Acta.* 2015, Vol. 1851, P. 366–376. doi: 10.1016/j.bbalip.2014.12.015.
528. Use of defined TLR ligands as adjuvants within human vaccines / M.S. Duthie, H.P. Windish, C.B. Fox, S.G. Reed // *Immunol Rev.* 2011, Vol. 239, P. 178–796. doi: 10.1111/j.1600-065X.2010.00978.x.
529. Vagotomy reverses established allergen-induced airway hyperreactivity to methacholine in the mouse / M.A. McAlexander, S.H. Gavett, M. Kollarik, B.J. Undem // *Respir Physiol Neurobiol.* 2015, Vol. 212–214, P. 20–24. doi: 10.1016/j.resp.2015.03.007.
530. Varshney, P. Lipid rafts in immune signalling: current progress and future perspective / P. Varshney, V. Yadav, N. Saini // *Immunology.* 2016, Vol. 149(1), P. 13–24. doi: 10.1111/imm.12617.
531. Vasoactive intestinal peptide for diagnosing exacerbation in chronic obstructive pulmonary disease / J. Mandal, M. Roth, L. Costa, et al // *Respiration.* 2015, Vol. 90, P. 357–368. doi: 10.1159/000439228.

-
532. Vasoactive intestinal peptide inhibits airway smooth muscle cell proliferation in a mouse model of asthma via the ERK1/2 signaling pathway / J. Wang, Y.X. Shang, X.X. Cai, L.Y. Liu // *Exp Cell Res*. 2018, Vol. 364(2), P. 168–174. doi: 10.1016/j.yexcr.2018.01.042.
533. Vik, A. Recent advances in the chemistry and biology of anti-inflammatory and specialized pro-resolving mediators biosynthesized from n-3 docosapentaenoic acid / A. Vik, J. Dalli, T.V. Hansen // *Bioorg Med Chem Lett*. 2017, Vol. 27(11), P. 2259–2266.
534. VIP regulates the development & proliferation of Treg in vivo in spleen / A.M. Szema, S.A. Hamidi, M.G. Golightly et al // *J Allergy Asthma Clin Immunol*. 2011, Vol. 7, 19. doi: 10.1186/1710-1492-7-19.
535. Voelker, D.R. Phospholipid regulation of innate immunity and respiratory viral infection / D.R. Voelker, M. Numata // *J Biol Chem*. 2019, Vol. 294(12), P. 4282–4289. doi: 10.1074/jbc.AW118.003229.
536. Vroman, H. TNF-alpha-induced protein 3 levels in lung dendritic cells instruct TH2 or TH17 cell differentiation in eosinophilic or neutrophilic asthma / H. Vroman, I.M. Bergen, J.A.C. van Hulst et al // *J Allergy Clin Immunol*. 2018, Vol. 141(5), P. 1620-1633. e12. doi: 10.1016/j.jaci.2017.08.012.
537. Walton, K.A. Specific phospholipid oxidation products inhibit ligand activation of toll-like receptors 4 and 2 / K.A. Walton, A.L. Cole, M. Yeh et al // *Arterioscler Thromb Vasc Biol*. 2003, Vol. 23, P. 1197–1203. doi: 10.1194/jlr.M600060-JLR200.
538. Wang, H. Imbalance of peripheral blood Th17 and Treg responses in patients with chronic obstructive pulmonary disease / H. Wang, H. Ying, S. Wang // *Clin Respir J*. 2015, Vol. 9(3), P. 330–341.
539. Wang, Y. Neonatal exposure with LPS and/or allergen prevents experimental allergic airways disease: development of tolerance using environmental antigens / Y. Wang, C. McCusker // *J Allergy Clin Immunol*. 2006, Vol. 118, P. 143–51. doi: 10.1016/j.jaci.2006.03.020.

Научное издание

**Новгородцева Татьяна Павловна
Денисенко Юлия Константиновна,
Кытикова Оксана Юрьевна и др.**

**Регуляторные механизмы
системного воспаления
при респираторной патологии**

Монография

Компьютерная верстка *В.А. Кнышов*
Дизайн обложки *Е.П. Давыгора*
При оформлении обложки использован
авторский рисунок Ю.К. Денисенко

Подписано в печать 1.06.2021 г.
Формат 60×84 / 16. Усл. печ. л. 16,16.
Тираж 500 экз. (1-й завод 1–50). Заказ 178.

Дальневосточный федеральный университет
690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10.

Отпечатано в Дальневосточном федеральном университете
690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10.

(Типография Издательства ДВФУ,
690091, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 10)