Применение феромонных ловушек на яровом рапсе для учёта численности капустной моли

С.А. Семеренко,

кандидат биологических наук

Н.А. Бушнева,

кандидат сельскохозяйственных наук

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК

Россия, 350038, г. Краснодар, ул. им. Филатова, д. 17

Тел.: (861) 275-85-13

E-mail: alkonost_s@mail.ru, protection@vniimk.ru

Для цитирования: Семеренко С.А., Бушнева Н.А. Применение феромонных ловушек на яровом рапсе для учёта численности капустной моли // Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. – 2018. – Вып. 4 (176). – С. 172–177.

Ключевые слова: рапс яровой, капустная моль, феромон, диспенсер, ловушки, насекомые-вредители, фитофаги.

Стратегия эффективной защиты ярового рапса заключается в своевременном выявлении имаго капустной моли в посеве. Использование феромонных ловушек является надёжным, позволяющим держать под контролем момент появления вредителя и его численность. Целью наших исследований являлось изучение активности феромонов капустной моли на различных диспенсерах для учёта сроков появления и численности этого фитофага. Феромонные ловушки устанавливали в посевах ярового рапса сортов Галант и Руян в фазе стеблевания растений. Они находились в посеве до созревания и уборки растений ярового рапса. В результате учётов 2017–2018 гг. было установлено, что в посеве ярового рапса летают бабочки капустной моли 1-й и 2-й генераций. В условиях 2017 г. самцы капустной моли отлавливались в феромонные ловушки со всеми испытанными видами диспенсеров. Отлов бабочек интенсивней проходил в ловушки с диспенсером Ф, наименьшим он был при использовании диспенсера РТ (белый). В 2018 г. лучшие результаты испытаний были отмечены в ловушках с диспенсером РТ (красный) (96 экз.). Хуже имаго капустной моли

отлавливались в ловушки с диспенсером РП (32 экз.). Установлено, что месторасположение феромонных ловушек в посеве ярового рапса не оказывает существенного влияния на отлов бабочек капустной моли. Результаты испытаний феромонных ловушек с разными диспенсерами заметно различаются между собой. Поэтому для получения достоверных данных испытания будут продолжены.

UDC 632.951: 632.952: 632.95.026.4

Application of pheromone traps on the spring rapeseed for the account of diamondback moth.

S.A. Semerenko, PhD in biology

N. A. Bushneva, PhD in agriculture

All-Russian Research Institute of Oil Crops by V.S. Pustovoi (VNIIMK)

17, Filatova str., Krasnodar, 350038, Russia

Tel.: (861) 275-85-13

E-mail: alkonost_s@mail.ru, protection@vniimk.ru

Key words: spring rape, diamondback moth, pheromone, dispenser, traps, insect pests, phytophages.

The strategy of an effective protection of spring rapeseed is concluded in the timely detection of imago diamondback moths on fields. The use of pheromone traps is reliable, allowing to control the moment of pest appearance and its numbers. The aim of our research was to study the activity of the pheromone of the diamondback moth on various dispensers to account dates of appearance and numbers of this phytophage. We installed the pheromone traps in sowings of spring rapeseed varieties Galant and Ruyan in the phase of stem extension. They were standing in sowings till ripening and harvesting of spring rapeseed. After accounts of 2017–2018 we founded that there are butterflies of the diamondback moth of the 1st and 2nd generations in the spring rapeseed sowings. Under the conditions of 2017, males of the diamondback moth were caught in pheromone traps with all tested dispensers. Catching butterflies was more intensely trapped with the dispenser F, the smallest one when using the dispenser RT (white). In 2018, the best test results were noted in the traps with the RT dispenser (red) (96 butterflies). Imagoes of diamondback moth were caught worse in traps with RP dispenser (32 butterflies). We been established locations of the pheromone traps in the spring rapeseed sowings did not have a significant effect on the catching of diamondback moth. The test results of the pheromone traps with various dispensers differed significantly. Therefore, to obtain reliable data the tests should be continued.

Введение. Как известно, третьей по своей значимости масличной культурой, после подсолнечника и сои, в Российской Федерации является рапс [1]. В последние годы идёт

тенденция стабильного увеличения площадей посевов под рапсом в России. Такое увеличение наблюдается исключительно за счет яровых посевов, что является вполне закономерным явлением, так как озимый рапс перезимовывает, как правило, только в Калининградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Однако и это происходит не каждый год. Возросший интерес производителей к яровому рапсу объясняется также высоким уровнем современных технологий, появлением новых сортов и гибридов, урожайность которых не уступает озимому рапсу, а генетический потенциал которых уже превышает 30 ц/га [2].

Средняя урожайность ярового рапса в России в 2013 г. составила 12,3 ц/га против 10,6 ц/га годом ранее. При этом в Северо-Западном округе, как и в предыдущие годы, урожайность была самая высокая – 24,6 ц/га. В Южном округе она составила 18,9 ц/га, Северо-Кавказском – 14,6 ц/га, Центральном – 12,8 ц/га [2].

Посевная площадь ярового рапса в 2018 г. в России превысила прогнозируемые Минсельхозом 1,05 млн га. Как показывают оперативные данные аграрного ведомства, площадь под этой культурой к 30 мая уже составляла почти 1,1 млн га, что на 4 % больше планового показателя и на 246 тыс. га, или на 29 %, больше, чем было засеяно по итогам посевной кампании в 2017 г. В Краснодарском крае яровым рапсом было засеяно 15122 га [3].

Увеличение площадей, занятых яровым рапсом, ставит актуальную задачу эффективной защиты его от вредных организмов (болезней, вредителей и сорняков). Одним из опасных вредителей ярового рапса является капустная моль (*Plutella maculipennis* Curt.), гусеницы которой наносят ощутимый ущерб, снижая урожай на 40–80 % [4; 5].

В зоне Нижнего Поволжья массовое размножение капустной моли наблюдалось в 2007 и 2009 гг. и при отсутствии защитных мероприятий растения ярового рапса повреждались на 70–80 %. При 100 %-ном заселении растений на одну учетную единицу приходилось от 5 до 9 гусениц моли [5]. В Омской области, по данным А.С. Холода и Е.Ф. Коренюка (2016), в условиях умеренно теплой, с большим количеством осадков погоды вегетационного периода 2015 г. наблюдалось массовое размножение капустной моли в посевах ярового рапса. За пять лет

наблюдений специалисты агрономической службы не отмечали такой численности и вредоносности фитофага. Капустной молью было заселено 70 % обследованных площадей ярового рапса, из них 98 % – с численностью выше экономического порога вредоносности. Вредителем был нанесен существенный урон урожаю рапса. На отдельных площадях отмечалась полная гибель посевов [6].

Для растений ярового рапса наиболее вредоносно первое и второе поколение капустной моли. Бабочки моли первого поколения появляются во второй декаде мая, отрождение гусениц наблюдается в первой декаде июня, что совпадает с фазой стеблевания ярового рапса. Лет бабочек второго поколения происходит в конце июня, а гусеницы заселяют растения в фазе цветения и питаются на них до созревания, повреждая как цветы, так и стручки. Питаясь на растениях, гусеницы капустной моли не проделывают на листьях рапса сквозные отверстия, они, повреждая лист снизу, соскабливают нижнюю кожицу и паренхиму, оставляют не тронутой кожицу с верхней стороны листа [7; 8] (рис. 1).

а
б
Рисунок 1 – Капустная моль (*Plutella maculipennis* Curt.) на яровом рапсе:
а) имаго капустной моли [9];
б) гусеницы, повреждающие лист [10]

Стратегия эффективной защиты рапса против капустной моли заключается в своевременном выявлении имаго вредителя и применении инсектицидов против гусениц фитофага в наиболее чувствительных 1–2-м возрастах. Все другие возраста гусениц моли устойчивы к воздействию пестицидов.

Широкое внедрение инсектицидов и их применение без учёта принципа действия на насекомое привело к тому, что вредители уничтожаются не полностью. Оставшиеся в живых фитофаги быстро размножаются, и на их потомство действие ядохимикатов уже никак не сказывается, то есть вырабатывается резистентность. Применение инсектицидов должно быть основано на экономическом пороге вредоносности (ЭПВ) фитофага. Под

экономическим порогом вредоносности понимают плотность популяции вредного организма, при которой экономически выгодно применять пестицид и затраты по его применению окупаются прибылью от сохраненного урожая. Важным преимуществом учета ЭПВ является возможность снижения рисков для человека и окружающей среды в случае отказа от обработки, когда численность вредителя ниже порогового значения [11; 12; 13].

Визуальные наблюдения за сроком появления фитофагов в посевах и их количеством часто приводят к ошибкам из-за того, что начало лёта имаго вредителей сильно зависит от погодных условий и, как правило, растянуто, а распределение насекомых в посевах происходит неравномерно. Поэтому только использование феромонных ловушек является надежным, современным и удобным для сельскохозяйственного производителя решением, позволяющим избежать указанных ошибок и держать под контролем момент появления вредителя и его численность.

В связи с этим целью наших исследований являлось изучение активности феромонов капустной моли на различных диспенсерах для учёта сроков появления и численности этого фитофага.

Материалы и методы. Материалом для написания статьи послужили результаты по испытанию феромонов для капустной моли на различных диспенсерах, предоставленных АО «Щёлково Агрохим», в 2017–2018 гг.

Феромонные ловушки устанавливали в посевах ярового рапса сортов Галант и Руян на втором отделении ФГБНУ ВНИИМК (посёлок Октябрьский) в фазе стеблевания растений. Ловушки находились в посевах до созревания и уборки растений ярового рапса.

Активность феромонов для фитофагов в посевах ярового рапса изучали по методикам в изложении В.Я. Исмаилова (1986) и Д.А. Колесовой (1987) [14; 15].

В 2017 г. испытывалось три вида диспенсеров: РТ (белый), РТ (красный) и Ф. На одном гектаре размещали по три ловушки (одна – в центре участка и две – по бокам) через 25 м друг от друга, при этом в каждую ловушку вкладывали по одному диспенсеру. Диспенсеры РТ (белый) и РТ (красный) меняли через 30 суток, а диспенсеры Ф вывешивались на весь сезон и не менялись. Каждый вид диспенсера испытывался в 3-кратной повторности, всего было выставлено 27 ловушек.

В 2018 г. испытывалось четыре вида диспенсеров: РП, РТ (красный), Т и Ф. На одном

гектаре размещали четыре ловушки (две по бокам участка) через 25 м друг от друга, в каждую ловушку вкладывали по одному диспенсеру. Диспенсеры РП и РТ (красный) меняли через 30 суток, Ф и Т вывешивались на весь сезон и не менялись. Каждый вид диспенсера испытывался в 3-кратной повторности, всего было выставлено 24 ловушки.

Подсчёт вредителей, пойманных в ловушки, в оба года исследований проводили один раз в неделю, по мере загрязнения вкладышей заменяли их чистыми.

Результаты и обсуждение. В результате учётов, проведённых в течение 2017–2018 гг., было установлено, что в посевах ярового рапса летают бабочки капустной моли 1-й и 2-й генераций.

В условиях 2017 г. пик численности бабочек 1-й генерации пришёлся на окончание 1-й декады июня, численность бабочек 2-й генерации начинала расти с окончания II-й декады июня до начала I-й декады июля.

На начальном этапе испытаний количество отловленных бабочек в ловушки с диспенсерами Ф и на РТ (белый) находилось примерно на одном уровне. В ловушках с диспенсером на РТ (красный) численность – была ниже, но в дальнейшем соотношение отловленных самцов в зависимости от диспенсера изменилось (рис. 2, 3).

Рисунок 2 – Динамика отлова бабочек самцов капустной моли в феромонные ловушки с разными диспенсерами (средние значения), 2017 г.

Из графика видно, что динамика отлова самцов капустной моли в ловушки с диспенсером РТ (белый) постепенно снижалась, и к окончанию срока действия феромона (19.06.2017 г.) количество бабочек на 1 ловушку в среднем составляло 34 экземпляра. После замены диспенсера наблюдалось некоторое

увеличение количества пойманных особей вредителя (30.06.2017 г.), однако по сравнению с другими вариантами оно было минимальным.

а

б

в

Рисунок 3 – Бабочки самцов капустной моли на вкладышах ловушек (ориг.): а – диспенсер РТ (белый); б – диспенсер РТ (красный); в – диспенсер Ф

Динамика отловленных бабочек в ловушки с диспенсером РТ (красный) с конца I-й декады июня начала расти и к истечению 21 суток не падала, это говорит о том, что феромон на диспенсере продолжал действовать. К началу II-й декады июля видно заметное снижение численности вредителя, это можно объяснить тем, что растения ярового рапса созрели и потеряли привлекательность для имаго фитофага.

Полученные данные показывают, что в ловушки с диспенсером Ф за весь период исследований отлавливалось наибольшее количество бабочек самцов капустной моли.

В результате наблюдений было установлено, что нет чётких различий в количестве пойманных бабочек вредителя в зависимости от места установки ловушек. В ловушки с диспенсером РТ (красный), установленные с

левого края поля, в среднем было поймано 104 экз./ловушку; в середине – 109 экз./ловушку; с правого края – 106 экз./ловушку (табл. 1).

Таблица 1

Количество бабочек самцов капустной моли, пойманных в ловушки с разными диспенсерами, в зависимости от места их установки в посевах ярового рапса

ВНИИМК, 2017 г.

Диспенсер	Дата учёта	Количество бабочек, экз./ловушку		
		левый край	середина	правый край
РТ (красный)	31.05	77	96	74
	9.06	98	61	62
	13.06	111	84	93
	19.06	132	117	121
	30.06	147	205	196
	11.07	63	96	91
	X	104,7	109	106
РТ (белый)	31.05	30	47	35
	9.06	119	102	94
	13.06	60	56	47
	19.06	35	37	31
	30.06	56	59	52
	11.07	21	32	15
	X	53	55	45
Ф	31.05	78	52	62
	9.06	110	113	119
	13.06	129	116	120
	19.06	154	125	129
	30.06	174	222	240
	11.07	183	144	185
	X	138	128	142

*x – среднее количество бабочек самцов капустной моли

Похожая закономерность выявлена и в варианте с диспенсером РТ (белый) – 53, 55 и 45 экз./ловушку соответственно. При осмотре ловушек с диспенсером Ф мы обнаружили небольшую разницу в количестве пойманных бабочек моли в зависимости от места их установки. Так, в среднем в ловушку, установленную в левом краю поля, отлавливалось 138, в середине – 128, а с правого края – 148 бабочек.

Учеты, проведённые в 2018 г., показали, что численность имаго капустной моли была несколько ниже по сравнению с 2017 г. Погодные условия 2018 г. существенно отличались от условий предыдущего года и были более засушливыми. Так, если в 2017 г. сумма осадков за период исследований составила 309,6 мм, то в 2018 г. она была на уровне 196,8 мм, что почти в два раза меньше показателя 2017 г. Максимальная температура воздуха 2017 г. по месяцам составляла: май – 20–27 °С; июнь – 27–32 и июль – 30–32 °С. В 2018 г. за тот же период этот показатель составил: 27–33 °С; 40–41 и 37–40 °С соответственно.

но, что выше верхних температурных значений развития капустной моли.

Пик численности бабочек 1-й генерации приходился на начало II-й декады июня, при 31,5 °С, что было ниже верхнего порога развития капустной моли (35–37 °С). Численность бабочек 2-й генерации достигала максимального значения к окончанию III-й декады июня – началу I-й декады июля, а затем начиналось заметное её снижение.

В начальный период испытаний количество отловленных бабочек в ловушки с диспенсерами РП, РТ (красный), Т и Ф находилось практически на одном уровне. Однако следует отметить, что в ловушках с диспенсером РП численность отловленных самцов была несколько ниже по сравнению с другими диспенсерами. Дальнейшие учёты показали, что это соотношение в зависимости от диспенсера изменилось (рис. 4).

Рисунок 4 – Динамика отлова самцов капустной моли на феромонные ловушки с разными диспенсерами (средние значения), 2018 г.

Данные графика показывают, что лучшие результаты по динамике отлова самцов капустной моли были отмечены в ловушках с диспенсером РТ (красный), где шло постепенное повышение численности имаго, и к окончанию 3-й декады июня она достигла 96 экз. Несколько ниже эти показатели были у других диспенсеров: Т – 79 экз./ловушку и Ф – 60 экз./ловушку. Хуже имаго капустной моли отлавливались в ловушки с диспенсером РП – 32 экз.

К середине I-ой декады июля наблюдалось заметное снижение численности вредителя в ловушках всех видов диспенсеров, отлов самцов в среднем составил 4,0–9,0 экз./ловушку.

В результате наблюдений было установлено, что также, как и в 2017 г., месторасположение ловушек в посеве не оказывало влияния на отлов самцов капустной моли (табл. 2).

Таблица 2

Количество бабочек самцов капустной моли, пойманных в ловушки с разными диспенсерами, в зависимости от места их установки в посеве ярового рапса

ВНИИМК, 2018 г.

Диспенсер	Дата учёта	Количество бабочек, экз./ловушку	
		левый край	правый край
РП	18.05	6,0	10,0
	25.05	9,0	10,0
	1.06	15,0	13,0
	11.06	16,0	16,0
	18.06	17,0	21,0
	26.06	29,0	36,0
	03.07	4,0	5,0
	10.07	6,0	6,0
	X	12,6	14,7
РТ (красный)	18.05	14,0	18,0
	25.05	19,0	18,0
	1.06	32,0	27,0
	11.06	49,0	39,0
	18.06	63,0	58,0
	26.06	103,0	90,0
	03.07	6,0	6,0
	10.07	7,0	7,0
	X	36,7	32,8
Т	18.05	3,0	8,0
	25.05	3,0	8,0
	1.06	3,0	12,0
	11.06	26,0	22,0
	18.06	36,0	27,0
	26.06	79,0	80,0
	03.07	8,0	9,0
	10.07	9,0	10,0
	X	20,8	22,2
Ф	18.05	3,0	12,0
	25.05	5,0	11,7
	1.06	10,0	15,0
	11.06	30,0	13,0
	18.06	41,0	14,7
	26.06	45,0	76,0
	03.07	9,0	11,0
	10.07	10,0	12,0
	X	19,1	20,7

*X – среднее количество бабочек самцов капустной моли

Выводы. 1. В результате учётов, проведённых с помощью феромонных ловушек в течение 2017–2018 гг., было установлено, что в посеве ярового рапса летают бабочки капустной моли 1-й и 2-й генераций.

2. В условиях 2017 г. самцы капустной моли отлавливались в феромонные ловушки со всеми испытанными видами диспенсеров. Отлов бабочек интенсивней происходил в ловушки с диспенсером Ф, наименьшим он был при использовании диспенсера РТ (белый).

3. В 2018 г. лучшие результаты испытаний по активности отлова самцов капустной моли были отмечены в ловушках с диспенсером РТ (красный) (96 экз.). Хуже имаго капустной

моли отлавливались в ловушки с диспенсером РП (32 экз.).

4. Установлено, что месторасположение феромонных ловушек в посеве ярового рапса не оказывает существенного влияния на отлов бабочек капустной моли.

Полученные в 2017–2018 гг. результаты испытаний феромонных ловушек с разными диспенсерами заметно различаются между собой. Поэтому для получения достоверных данных о биологической активности феромонов на разных видах диспенсеров испытания будут продолжены в 2019 г.

Список литературы

1. Лукомец В.М., Зеленцов С.В., Кривошлыков К.М. Перспективы и резервы расширения производства масличных культур в Российской Федерации // Масличные культуры. Науч.-тех. бюл. ВНИИМК. – 2015. – Вып. 4 (164). – С. 81–102.

2. Рапс в российских регионах // Мир пчеловодства. Интернет-журн. 28.02.2014. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.apeworld.ru/1393569763.html> (дата обращения: 10.09.18).

3. Посевы рапса превысили план // Зерно: Цены, аналитика, трейдинг 1.06.2018 г. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.grainprice.ru/news/tag/2/15347-posevnye-ploshchadi-yarovogo-rapsa> (дата обращения: 10.09.18).

4. Перспективная ресурсосберегающая технология производства ярового рапса: метод. рекомендации / В.В. Корпачев, В.П. Савенков, В.И. Горшков, С.А. Харламов и др. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2008. – 60 с.

5. Чурикова В.Г., Силаев А.И. Вредители ярового рапса в Нижнем Поволжье // Агро XXI. – 2010 – № 4–6. – С. 24–27.

6. Холод А.С., Кореньюк Е.Ф. Капустная моль – угроза посевам рапса в Омской области // Защита и карантин растений. – 2016. – № 5. – С. 32–33.

7. Рекомендации по возделыванию ярового рапса и сурепицы / С.Л. Горлов, С.Л. Голиков, А.С. Бушнев, В.Т. Пивень [и др.]. – Краснодар, 2006. – 39 с.

8. Шпаар Д. Возобновляемое растительное сырье. – СПб., Пушкин, 2006. – С. 58–12.

9. Капустная моль: [Электронный ресурс]. – URL <http://gdeklop.ru/mol/kapustnaya-mol> (дата обращения 10.09.18).

10. Как избавиться от моли: [Электронный ресурс]. – URL <http://klopsovet.ru/mol/kak-izbavitsya-ot-moli>. (дата обращения: 10.09.18).

11. Georgiou G.P. The Magnitude of the Resistance Problem // Pesticide Resistance. Strategies and Tactics for management. – National Academy Press, Washington, D.C., 1986. – P. 14–43.

12. Сухорученко Г.И. Резистентность вредных организмов к пестицидам – проблема защиты растений второй половины XX столетия в странах СНГ // Вестн. защиты раст. – 2001. – № 1. – С. 18–37.

13. Thacker J.R. An introduction to Arthropod Pest Control // Cambridge University Press, 2002. – P. 95.

14. Новый подход к регулированию численности насекомых с помощью синтетических половых феромонов / В.Я. Исмаилов, И.Н. Олещенко, В.Н. Орлов, А.В. Алексеенко // Химическая коммуникация насекомых. – Наука. – М., 1986. – С. 109–112.

15. Практическое применение синтетических половых феромонов в защите сельскохозяйственных культур от вредителей / Д.А. Колесова, Т.А. Рябчинская, П.Г. Чмырь, Л.А. Золотов // Инф. бюл. ВПС МОББ. – № 20. – 1987. – С. 46–53.

References

1. Lukomec V.M., Zelencov S.V., Krivoshlykov K.M. Perspektivy i rezervy rasshireniya proizvodstva maslichnykh kultur v Rossiyskoy Federacii // Maslichnye kulture. – 2015 – Vyp. 4 (164). – S. 81–102.

2. Raps v rossiyskikh regionah // Mir pchelovodstva. Internet-zhurn. 28.02.2014. URL: <http://www.apeworld.ru/1393569763.html> (data obrascheniya: 10.09.18).

3. Posevy rapsa prevysili plan // Zerno: Ceny, analitika, treyding. Elektronnyy resurs 1.06.2018 g. URL: <https://www.grainprice.ru/news/tag/2/15347-posevnye-ploshchadi-yarovogo-rapsa> (data obrascheniya: 10.09.18).

4. Perspektivnaya resursosberegayuschaya tehnologiya proizvodstva yarovogo rapsa / V.V. Korpachev, V.P. Savenkov, V.I. Gorshkov, S.A. Harlamov i dr. // Metod. rekomendacii. – M.: FGNU «Rosinformagroteh», 2008. – 60 s.

5. Churikova V.G., Silaev A.I. Vrediteli yarovogo rapsa v Nizhnem Povolzhe // Arpo XXI. – 2010 – № 4–6. – S. 24–27.

6. Holod A.S., Korenyuk E.F. Kapustnaya mol – ugroza posevam rapsa v Omskoy oblasti // Zashchita i karantin rasteniy, M.: – 2016. – № 5. – S. 32–33.

7. Rekomendacii po vozdelvaniyu yarovogo rapsa i surepicy / S.L. Gorlov, S.L. Golikov, A.S. Bushnev, V.T. Piven i dr. – Krasnodar, 2006. – 39 s.

8. Shpaar D. Vozobnovlyаемое rastitelnoe syre. – SPb., Pushkin, 2006. – S. 58–12.

9. Elektronnyy resurs URL <http://gdeklop.ru/mol/kapustnaya-mol> (data obrascheniya: 10.09.18).

10. Elektronnyy resurs URL <http://klopsovet.ru/mol/kak-izbavitsya-ot-moli>. (data obrascheniya: 10.09.18).

11. Georgiou G.P. The Magnitude of the Resistance Problem//Pesticide Resistance. Strategies and Tactics for management. National Academy Press, Washington, D.C. – 1986. – P. 14–43.

12. Suhoruchenko G.I. Rezistentnost vrednykh organizmov k pesti-cidam – problema zashchity rasteniy vtoroy poloviny HH stoletiya v stranah SNG // Vestn. Zashchity rast. 2001. – № 1. – S. 18–37.

13. Thacker J.R. An introduction to Arthropod Pest Control //Cambridge University Press, 2002. – P. 95.

14. Novyy podhod k regulirovaniyu chislenosti nasekomykh s pomoschyu sinteticheskikh polovykh feromonov / V.Ya. Ismailov, I.N. Oleschenko, V.N. Orlov, A.V. Alekseenko // Himicheskaya kommunikaciya nasekomykh. – Nauka, – M. – 1986. – S. 109–112.

15. Prakticheskoe primenenie sinteticheskikh polovykh feromonov v zashchite selskohozyaystvennykh kultur ot vreditel'ey / D.A. Kolesova, T.A. Ryabchinskaya, P.G. Chmyr, L.A. Zolotov // Inf. Byul. VPS MOBB. – № 20. –1987. – S.46–53 // Inf. Byul. VPS MOBB. – № 20. – 1987. – S. 46–53.

Получено: 11.09.2018 Принято: 06.11.2018

Received: 11.09.2018 Accepted: 06.11.2018