DEPÓSITOS E OCORRÊNCIAS DE OURO NO TERRENO ARQUEANO-PALEOPROTEROZOICO DE ALMAS-DIANÓPOLIS (TO): EVIDÊNCIAS DA IMPORTÂNCIA METALOGENÉTICA DO EVENTO BRASILIANO

RAUL MINAS KUYUMJIAN & JOSÉ OSWALDO DE ARAÚJO FILHO

Abstract *DEPOSITS AND GOLD OCCURRENCES IN THE ARCHEAN-PALEOPROTEROZOIC TERRANE OF ALMAS-DIANÓPOLIS, TOCANTINS: EVIDENCES FOR THE METALLOGENETIC IMPORTANCE OF THE BRASILIANO EVENT* The Almas-Dianópolis-Conceição do Tocantins gold deposits and occurrences were formed by hydrothermal processes and controlled by N35°-50°W, N40°-60°E and NS shear zones. These shear zones were possibly generated by two distinct Brasiliano/Pan African ~NS and ~EW compressions in different phases. Previously reported Brasiliano metallogenetic occurrences in similar tectonic environment in the Maciço de Goiás and Brasília Fold Belt enhance the importance of the Almas-Dianópolis gold deposits and occurrences.

Keywords: Almas-Dianópolis, gold, Brasiliano Event.

Resumo Os depósitos e ocorrências auríferas do terreno Almas-Dianópolis foram originados por processos hidrotermais em zonas de cisalhamento N35°-50°W, N40°-60°E e NS, reativadas, que caracterizam as últimas deformações brasileiras naquele terreno. A geração das zonas de cisalhamento anteriores as que alojam os depósitos auríferos foram, possivelmente, originadas por compressões ~NS e ~EW durante o Evento Brasiliano, ou herdadas de deformações pré-Brasilianas, com reativações durante o Brasiliano. Similarmente ao que se passa no Maciço de Goiás e na Faixa Brasília, as ocorrências auríferas indicam, também, no terreno Almas-Dianópolis, a importância metalogenética da deformação Brasileira.

Palavras-chave: Almas-Dianópolis, ouro, Evento Brasiliano.

INTRODUÇÃO Os primeiros trabalhos de exploração de ouro no terreno Almas-Dianópolis (TAD), porção extremo sul-sudeste do estado do Tocantins, foram desenvolvidos pelos bandeirantes nos séculos 17 e 18. Publicações referentes à geologia e depósitos de ouro (Vira-Saia II e Paiol) do TAD são de Correia Filho & Sá (1980), Padilha (1984), Silva *et al.* (1990), Ferrari & Choudhuri (2000) e Cruz & Kuyumjian (1998, 1999, 2000 e 2001). Além dos depósitos, o TAD hospeda várias ocorrências auríferas (Fig. 1), as quais foram enfocadas preliminarmente por Cruz & Kuyumjian (1999). O presente trabalho tem por objetivo fornecer dados complementares sobre tais ocorrências, relacionando-as a controles tectônicos regionais. A classificação e o modelo genético aqui adotados são preliminares, vez que sabemos da necessidade de mais dados de campo e de laboratórios para o refinamento das proposições.

CONTEXTO GEOLÓGICO O TAD faz parte do embasamento do setor norte da zona externa da Faixa Brasília, na porção leste da Província do Tocantins, e compreende domos de composição tonalítica-granodiorítica (granitóides) separados por faixas estreitas de seqüência metavulcanossedimentar de idade arqueana-paleoproterozóica (Cruz & Kuyumjian 1999) (Fig. 1). Os contatos entre os domos TTG e as rochas supracrustais por zonas de cisalhamento regionais de alto ângulo. A seqüência supracrustal compreende a unidade metavulcânica Formação Córrego do Paiol, constituída essencialmente de metabasalto almofadado, sobreposta pela unidade metassedimentar Formação Morro do Carneiro, que inclui xisto sericítico, localmente

carbonoso, metatufos ácido e intermediário, formação ferrífera bandada, *metachert*, quartzito e metaconglomerado. Os domos TTG apresentam filiação calcio-alcalina, compreendendo uma suíte de baixo Al_2O_3 (anfibólio granodiorito metaluminoso) e uma suíte de alto Al_2O_3 (biotita tonalito peraluminoso), posicionados em ambiente de subducção (Cruz & Kuyumjian 1996, 1998, Thomsen & Kuyumjian 1994). Pequenos corpos básicos-ultrabásicos e diques de diabásio são intrusivos nos domos TTG e rochas supracrustais.

Arthaud (1985) evidencia na região de Conceição do Tocantins duas fases de deformação. Uma fase é de natureza dúctil, de cisalhamento simples, contracional, provocando estiramento EW em seixos de quartzito conglomerático, e dobramento observado principalmente na formação ferrífera bandada, com eixos geralmente paralelos a Lx. A segunda fase, de cisalhamento puro, provocou crenulação com plano axial subvertical de direção NS. Sigmóides em seixos de quartzito conglomerático mostram transporte de SSW para NNE e de NW para SE (Arthaud, 1985). No depósito de ouro do Paiol, na mina homônima, metamorfismo regional da fácies anfibolito retrograda a xisto verde, caracteriza a fase D_{II} . A alteração hidrotermal caracteriza a fase D_{III+1} , relacionada a zonas de cisalhamento direcionais sinistrais. No depósito Paiol, especificamente, uma fase rúptil, à qual se associam juntas e falhas locais de distribuição radial aproximada, constitui a fase D_{III+2} (Ferrari & Choudury 2000). Cruz e Kuyumjian (1998), identificam duas fases de deformação que afetam o TAD: A primeira (D_{II}) diz respeito às relações estruturais entre os domos e as rochas supracrustais, cujas características são: (i) forma

elipsoidal preferencial dos domos em mapa; (ii) tendência da foliação dos domos de se tornar forte nos contatos com as rochas metavulcânicas da sequência (foliação S_n), passando a zonas de cisalhamento sub-verticais nestes contatos e penetrando as vulcânicas; (iii) dobras sin-cisalhamento de eixos verticais (dobras F_n), provocado por cisalhamento entre domos e rochas supracrustais, (iv) lineação mineral de estiramento (L_{xm}), sub-horizontal, provocada pela conformação da xistosidade ao formarem as dobras F_n e por cisalhamento intra-xistosidade.

Zonas de cisalhamento com direções preferenciais N20°-30°E, destal e N0°-10°E e N10°-20°W, a primeira sem movimento determinado, tendo traços maiores em mapa, as de tendência N10°-20°W localmente com movimento sinistral, têm lineações mineral de estiramento sub-horizontal e dobras sub-verticais e reclinadas. Veios de quartzo com alteração hidrotermal associada, são encontradas nas zonas de cisalhamento variando de N35°W a N40-60°E, com características rúpteis a rúptil-dúcteis, o que determina uma segunda fase D_{n+1} . O ângulo entre as zonas de cisalhamento sugere a existência de um par cisalhante (entre ~70° a 90°, não sendo típico de um par cisalhante de Coulomb), que se localizam preferencialmente nos limites domos/supracrustais, formando um padrão em Y. Especula-se a existência de uma fase D_{n+2} , baseada em estruturas reativadas de características preferencialmente rúpteis em veios contidos em zonas de cisalhamento de direções N35°-50°W sinistrais e N40°-70°E, destrais, embora não tenham sido observadas relações de truncamento entre os dois conjuntos e nem que existam mineralizações de ouro nos mesmos (Cruz & Kuyumjian 1999).

MODELO EVOLUTIVO TECTÔNICO SIMPLIFICADO

As zonas de cisalhamento inter-dômicas de alto ângulo, em geral se dispõem, em mapa, numa geometria em forma em Y no TDA. Esta geometria é uma aproximação da forma geral em cuspide das rochas supracrustais, de espessura menor, em relação aos domos, de espessura maior, em mapa. A forma retilínea do braço -NS da junção tríplice em Y, em mapa, caracteriza uma zona de cisalhamento direcional com cisalhamento subvertical, onde há milonitização de rochas granodioríticas e tonalíticas e xistificação de rochas supracrustais que assumem um mergulho subvertical entre os domos, e lineação mineral de estiramento, L_{xm} , sub-horizontal, em dobras subverticais a reclinadas. O mecanismo das zonas de cisalhamento tende a aplainar as bordas dos domos. As conexões dos padrões Y em mapa, gera uma geometria mais complexa, formando células hexagonais não regulares. A origem das junções tríplices em Y, deve-se, inicialmente, às formas dos domos, que especulamos alojados como corpos elípticos alongados e de áreas superficiais aproximadamente iguais, formando zonas de cisalhamento que ocorrem com ângulos de ~50°-60° e não de 120° como seria de se esperar numa célula hexagonal regular (Fig. 2). O padrão tectônico em Y, observado nas zonas de cisalhamento das rochas supracrustais interdômicas, estas menos resistentes que as dos domos TTG, não é um padrão comum, embora tenha sido observado no *greenschist belt* de Zimbabwe (Shakleton 1995).

Propomos que o padrão em Y atual tenha se formado por um fechamento de um ângulo >100° (120° se a célula hexagonal fosse regular) entre as zonas de cisalhamento. A história da deformação do TDA, iniciou-se com um sistema de cisalhamento sub-vertical, devido ao posicionamento das supracrustais seguida à formação das calhas inter-domos. Formaram-se três sistemas de zonas de cisalhamento, um mais longo, ~NS, e dois ou-

tros sistemas de zonas de cisalhamento de tendências de direções iniciais-N60°E e-N60°W, a princípio respectivamente sinistrais e destrais, devido ao efeito de s_2 sub-horizontal -NS, vez que a tensão s_1 foi a causadora do cisalhamento sub-vertical entre as supracrustais e os domos. Esta fase D_1 inicial atribuímos ser pré-brasileira. Uma segunda fase D_2 brasileira, poderá ter fechado o ângulo entre os sistemas de cisalhamento para ~70° a 90°, com as zonas de cisalhamento revertendo a cinemática, o sistema N35°-50°W, a princípio destal para sinistral, e o sistema N40°-70°E, a princípio sinistral para destal. Os domos se tornariam também mais elípticos, e a compressão s_1 girou para -WSW-ESE, caracterizando a compressão regional do ciclo orogênico brasileiro (COB), provavelmente no seu pico metamórfico, reativando zonas de cisalhamento pré-existent. Em D_2 , as estruturas são dúctil-rúpteis, na fácies anfibolito baixo a xisto verde-alto. Em D_2 ocorre hidrotermalismo, formando venulação abundante de quartzo por desvolatilização metamórfica. Enxames de veios de

Figura 1 – Mapa geológico do terreno Almas-Dianópolis, TO, integrado a partir dos mapas geológicos de Padilha (1984) e Cruz & Kuyumjian (1998), e de dados recentes obtidos pelo primeiro autor do presente artigo. As ocorrências de ouro são: 1-Córrego Recantinho; 2-Arroz; 3-Refresco; 4-Vieira; 5-Vira-Saia I; 6-Vira Saia II; 7-Olavo; 8-Mina Córrego do Paiol; 9-Fazenda Santo Elias; 10-Tapuios; 11-Jacu; 12-Urubú; 13-Lagarixa; 14-Terra Vermelha; 15-Fazenda Curral Queimado; 16 e 17-Fazenda Santaninha; 18-Fazenda Poço de Ouro; 19-Fazenda Misericórdia; 20-Cangalha; 21-São Felipe; 22-Tuna; 23-Furtuosa; 24-Piçarrão; 25-Fazenda Elegante; 26-Córrego Gavião; 27-Maria Pinta; 28-Gerseu; 29-Igrejinha; 30-Garimpo Cajazeira.

quartzo rúpteis, localmente penteados, e truncados por numerosas juntas, sugerem, no entanto, um posterior regime distensivo no interior de zonas de cisalhamento, numa fase D_3 . Os veios são raramente mineralizados para ouro e limita-nos a falta de observação das relações de truncamento entre sistemas de zonas de cisalhamento contendo os veios.

OCORRÊNCIAS AURÍFERAS Além do depósito Vira-Saia II (garimpo do Baiano), os tonalitos e granodioritos da porção norte do TAD hospedam as ocorrências auríferas Vira-Saia I, Lagartixa, Misericórdia, Lavrinha, Santo Elias, Garrafas, Pedro d'Ávila, Buzina, Vereda Comprida e Terra Vermelha. As mesmas são associadas a zonas de alteração hidrotermal, contendo veios de quartzo ou quartzo-carbonato, bordejados por caolinização e sericitização. A alteração é controlada por zonas de cisalhamento N50°-70°W (Pedro d'Ávila), N30°W (Vira-Saia I), N40°-70°E (Lagartixa, Misericórdia e Santo Elias), N10°E (Lavrinha), N30°E (Terra Vermelha) e, subordinadamente NS (Garrafas), com foliação milonítica geralmente vertical/subvertical. A paragênese de sulfetos, presente nos veios, mas localmente também nas zonas mais externas do halo de alteração, inclui pirita, arsenopirita, calcopirita e galena. Malaquita e azurita ocorrem esporadicamente, em superfícies de fraturas. O ouro ocorre essencialmente em veios de quartzo, na forma livre e/ou incluso em pirita. Os veios, de até 10 metros de espessura e até 80 metros de comprimento apresentam-se, localmente boudinados e/ou bifurcados em Y (garimpos Urubú e Lavrinhas). Quando constituídos de quartzo leitoso e quartzo escuro, as concentrações de ouro mais elevadas (2,50 ppm) ocorrem no segundo. No entanto, valores da ordem de 53 ppm Au e 100 ppm As foram obtidos em quartzo leitoso no garimpo Pedro d'Ávila. As concentrações mais elevadas de ouro estão presentes, em algumas ocorrências, nas zonas de estrangulamento dos veios.

As rochas metavulcânicas supracrustais, ou seja, o metabasalto da Formação Córrego do Paiol e metadacito da Formação Morro do Carneiro, hospedam várias ocorrências auríferas, entre elas Olavo, Arroz, Refresco, Vieira, Juí, Tapuios, Getúlio e Buzina, que são associadas a zonas de cisalhamento N10°-30°E e N20°-40°W. Veios de quartzo de até 1 metro de espessura, com direção N35°W/65°SW e, menos comumente NS e N80°E, subverticais, apresentam-se seccionados e, os de direção NS, geralmente ramificados segundo padrão Y. As principais concentrações auríferas, ouro livre na forma de grãos de dimensões em torno de 1 mm, ocorrem em pequenas cavidades nos veios e, menos comumente em estreitas faixas de cloritização (em metabasalto) e sericitização (em metariodacito) nas bordas dos veios. A paragênese de sulfetos inclui pirita, arsenopirita e, raramente, calcopirita. Covelita e malaquita são muito subordinadas.

As principais concentrações de ouro em rochas metassedimentares localizam-se na região de Conceição do Tocantins, porção sul do TAD, nos locais denominados de Cajazeira, Gerseu, Igrejinha e córrego Riachão. As principais concentrações auríferas ocorrem em milonitos com alteração hidrotermal associada, composta de carbonato, quartzo, clorita, sericita, estilpnomelano, cloritóide, turmalina, grunerita, magnetita, hematita, ilmenita e rutilo. As principais rochas submetidas à alteração hidrotermal e contendo concentrações auríferas mais elevadas são formação ferrífera bandada, *metachert* e xisto carbonoso. Os sulfetos são pirita, pirrotita, arsenopirita, calcopirita e esfalerita, e ocorrem na forma de disseminações e massas irregulares e vênulas na foliação, ou em veios de quartzo. Nos garimpos Igrejinha e Gerseu,

onde as foliações miloníticas têm atitudes, respectivamente, EW/45°S e N20°W/35°SW, concentrações auríferas estão presentes em zonas de alteração hidrotermal constituídas de quartzo, carbonato, mica branca, turmalina, clorita, magnetita e sulfetos. O ouro ocorre em veios de até 30 cm de espessura e segregações de quartzo. Os veios são comumente bordejados por clorita, clorita+carbonato e, mais externamente, carbonato, enquanto que as segregações geralmente contêm massas disformes de clorita e carbonato. As segregações são geralmente mais enriquecidas em sulfetos e apresentam as mais elevadas concentrações de ouro (0,56-27,5 ppm Au, 140 ppm Zn, 900 ppm Cu, 90 ppm Ni, 132 ppm Sr, 2035 ppm Ba, 0,8 ppm Bi, 0,3 ppm Sb, 1,4 ppm Te e 8,1 ppm Se). Na fazenda Elegante, as ocorrências de ouro são hospedadas por uma seqüência de cloritóide-quartzo-clorita xisto e formação ferrífera bandada, ambas contendo abundância de sulfetos disseminados, no contato entre granitóide e rochas supracrustais. Nas cabeceiras do córrego Riachão, proximidades da fazenda Elegante, o ouro (0,26 a 12 ppm) ocorre em veios de quartzo-carbonato-sulfetos em quartzo-clorita xisto feldspático, interpretado como sendo de metatufos andesítico, submetido a carbonatação, cloritização e sericitização associadas à foliação milonítica de atitudes médias N40°E/55°NW e N10°E/70°NW.

CONSIDERAÇÕES FINAIS A grande maioria dos depósitos e ocorrências de ouro do Maciço de Goiás e da Faixa Brasília localiza-se em zonas de cisalhamento brasileiras (Araújo Filho & Kuyumjian 1996, 2000). Todos os depósitos e ocorrências de ouro do TAD são hospedados por veios de quartzo com alteração hidrotermal associada, controlados por zonas de cisalhamento N35°-50°W, N40°-60°E e NS, que caracterizam as últimas fases

Figura 2 – Modelo teórico representativo do padrão de junção Y em mapa que, quando conectados, formam células hexagonais assimétricas. O modelo proposto pressupõe que os domos tenham semelhança de área, forma e provavelmente de volume. As zonas de cisalhamento inter-dômicas são inicialmente dúcteis, tornando-se dúctil-rúpteis nas fases finais do Brasileiro, com mergulhos fortes e com ângulos agudos de ~70° a 80° com as zonas de cisalhamento ~NE e ~NW e obtusos de ~120 a 130° destas com o braço NS. As setas, com indicação de σ_1 , dizem respeito à compressão Brasileira que deformou os domos, tornando-os mais elípticos e que reverteu a cinemática das zonas de cisalhamento, referidas no texto.

Museu Nacional, Rio de Janeiro, pelo método de traço de fissão. pp.:257-262

Basile Kotschoubey, Werner Truckenbrodt & J.M.C. Calaf. *Evolução geológica da porção meridional da Província Bauxitífera de Paragominas durante o Neógeno/Pleistoceno (Noroeste da Bacia de Grajaú, nordeste do Pará e extremo oeste do Maranhão)*. pp.:263-272

João Henrique Larizzatti e Sônia Maria Barros de Oliveira. *Evolução geoquímica e balanço de massa na formação e degradação de perfis lateríticos encoraçados na área da Fazenda Pison, vale do rio Tapajós, Amazônia Central*. pp.:273-284

Henrique Rosa & Saul B. Suslick. *Avaliação de descobertas de recursos petrolíferos: uma proposta de padronização*. pp.:285-295

NUMERO 3

Rodrigo Peternel, Rudolph Allard Johannes Trouw & Renata da Silva Schmitt. *Interferência entre duas faixas móveis neoproterozóicas: o caso das faixas Brasília e Ribeira no sudeste do Brasil*. pp.:297-310

Alessandro Batezelli, Newton Souza Gomes & José Alexandre de Jesus Perinotto. *Petrografia e evolução diagenética dos arenitos da porção norte e nordeste da Bacia Bauru (Cretáceo Superior)*. pp.:311-322

Waldir Renato Paradella, Izabel Cristina Franchitto Cecarelli, Silvia Luiz, Cleber Gonzales de Oliveira & Rosana Okida. *Geração de carta topográfica com estêro-pares Fine do RADARSAT-1 e dados ETM+ LANDSAT 7 em ambiente de relevo montanhoso na Região Amazônica (Serra dos Carajás, Pará)*. pp.:323-332

William Sallun Filho, Ginaldo Ademar da Cruz Campanha & Thomas Rich Fairchild. *Aspectos deformacionais em estromatólitos do Grupo Itaiacoca, a sul de Itapeva (SP)*. pp.:333-340

Ronaldo Mello Pereira, Ciro Alexandre Ávila, Reiner Neumann, Júlio César Mendes & Cândido Augusto Veloso Moura. *Rare metal oxide mineralization related to two nwoproterozoic tourmaline granites from the interference zone of the Ribeira and Brasília belts, Minas Gerais, Brazil*. pp.:341-350

Ana Olívia Barufi Franco, Peter Christian Hackspacher, Daniel Franço de Godoy, Luiz Felipe Brandini Ribeiro & Sandro Guedes. *História térmica do maciço alcalino de Poços de Caldas (SP/MG) e adjacências através da análise de datação por traços de fissão em apatitas*. pp.:351-358

Ana Maria Dreher, Roberto Perez Xavies & Sérgio Luiz Martini. *Fragmental rocks of the Igarapé Bahia Cu-Au deposit, Carajás Mineral Province, Brazil*. pp.:359-368

Carlos Vieira Portela Filho, Francisco José Fonseca Ferreira, Ernani Comparsco da Rosa Filho & Sidnei Pires Rostitolla. *Compartimentação magnética-estrutural do sistema Aqüífero Serra Geral e sua conectividade com o Sistema Aqüífero Guarani na região central do Arco de Ponta Grossa (Bacia do Paraná)*. pp.:369-381

Marcello G. Simões, Sabrina Coelho Rodrigues, Juliana de Moraes Leme & Marcos César Bissaro Júnior. *The settling pattern of brachiopod shells: stratigraphy and taphonomic implications to shell bed formation and paleoecology*. pp.:383-391

Vladimir de Araújo Távora, Valéria Fernanda Oliveira de Miranda, Luís Gustavo Ferreira Viegas & Paulo Henrique Ferreira Galvão. *Novos registros de crustáceos decápodes do Cenozóico (Paleoceno e Mioceno Inferior) do Brasil*. pp.:393-400

Vladimir de Araújo Távora, Valéria Fernanda Oliveira de Miranda & Marcelo Lima Pinto. *Estudo sistemático dos Calianassídeos (Crustacea - Decapoda) da Formação Maria Farinha (Paleoceno) Estado de Pernambuco*. pp.:401-406

Enéas Oliveira Lousada & José Elói Guimarães Campos. *Proposta de modelos hidrogeológicos conceituais aplicados aos aquíferos da região do Distrito Federal*. pp.:407-414

Evandro Luiz Klein, Edney M.S. Palheta, Bruno L.S. Pinheiro, Cândido A.V. Moura & Francisco A.M. Abreu. *Sistematização da litoestratigrafia do Cráton São Luiz e do Cinturão Gurupi*. pp.:415-418

Mário Luiz de Sá Carneiro Chaves, Mauro César Geraldês, Yuiji Sano & Luis Chambel. *Primeiros resultados da datação Pb-Pb em diamantes carbonados da Chapada Diamantina (BA) e Rio Jequitinhonha (MG), Serra do Espinhaço*. pp.:419-422

Débora Correia Rios, Herbert Conceição, Donald Wayne Davis, Maria de Lourdes da Silva Rosa & Moacyr Moura Marinho. *Expansão do magmatismo granítico pós-orogênico no Núcleo Serrinha (NE Bahia), Cráton do São Francisco: Idade U-Pb do Maciço Granítico Pedra Vermelha*. pp.:423-426

Kenitiro Suguio, Alethea Ernandes Martins Sallun & Emílio Alberto Amaral Soares. *Período Quaternário: "Quo Vadis"?*. pp.:427-432

Maria de Lourdes da Silva Rosa, Herbert Conceição, Rita Cunha Menezes Leal, Moacyr José Buenano Macambira, Marco Antonio Galarza, Elma Costa Oliveira, Moacyr Moura Marinho, Mônica Prigsheim da Cunha & Débora Correia Rios. *Idade U-Pb da mineralização do sodalita-sienito (Azul-Bahia) no stock litchfieldítico Itaju do Colônia, sul do Estado da Bahia*. pp.:433-436

NÚMERO 4

Simone Cerqueira Pereira Cruz, Fernando Flecha Alkmim & Leonardo Evangelista Lagoeiro. *Zona de cisalhamento do núcleo do anticlinório Gouveia, Cordilheira do Espinhaço, MG: geometria, cinemática e processos deformacionais*. pp.:441-452

Simone Cerqueira Pereira Cruz, Hanna Jordt-Evangelista & Fernando Flecha Alkmim. *Variações químicas e mineralógicas na Zona de Cisalhamento de Gouveia (MG) e suas implicações no processo de reativação tectônica*. pp.:453-462

Marcelo dos Santos Fernandes Ferreira, Marco Antônio Fonseca & Fernando Roberto Mendes Pires. *Pegmatitos mineralizados em água-marinha e topázio do Ponto do Marambaia, Minas Gerais: tipologia e relações com o Granito Caladão*. pp.:463-473

Alexandre Campana Vidal, Sidnei Pires Rostitolla & Chang Hung Kiang. *Análise de favorabilidade para exploração de água subterrânea na região do médio Tietê, Estado de São Paulo*. pp.:475-481

Guillermo Rafael Beltran Navarro & Antenor Zanardo. *Petrografia e geoquímica das rochas metaultramáficas da região de Mairipotaba, Cromínia e Pontalina, Goiás*. pp.:483-492

Tiago da Rocha Karniol & Rômulo Machado. *Análise microestrutural e de eixos-C de quartzo na seção Aimorés (MG)-Colatina (ES)*. pp.:493-502

Henrique Llacer Roig, Augusto Pinheiro de Moraes Rego, Elton Luiz Dantas, Paulo Roberto Meneses, Detlef Hanz Gert Walde & Simone M.LC Gioia. *Assinatura isotópica Sm-Nd de sedimentos em suspensão: implicações na caracterização da proveniência dos sedimentos do Rio Paraíba do Sul, SP*. pp.:503-514

quartzo rúpteis, localmente penteados, e truncados por numerosas juntas, sugerem, no entanto, um posterior regime distensivo no interior de zonas de cisalhamento, numa fase D_2 . Os veios são raramente mineralizados para ouro e limita-nos a falta de observação das relações de truncamento entre sistemas de zonas de cisalhamento contendo os veios.

OCORRÊNCIAS AURÍFERAS Além do depósito Vira-Saia II (garimpo do Baiano), os tonalitos e granodioritos da porção norte do TAD hospedam as ocorrências auríferas Vira-Saia I, Lagartixa, Misericórdia, Lavrinha, Santo Elias, Garrafas, Pedro d'Ávila, Buzina, Vereda Comprida e Terra Vermelha. As mesmas são associadas a zonas de alteração hidrotermal, contendo veios de quartzo ou quartzo-carbonato, bordejados por caolinização e sericitização. A alteração é controlada por zonas de cisalhamento N50°-70°W (Pedro d'Ávila), N30°W (Vira-Saia I), N40°-70°E (Lagartixa, Misericórdia e Santo Elias), N10°E (Lavrinha), N30°E (Terra Vermelha) e, subordinadamente NS (Garrafas), com foliação milonítica geralmente vertical/subvertical. A paragênese de sulfetos, presente nos veios, mas localmente também nas zonas mais externas do halo de alteração, inclui pirita, arsenopirita, calcopirita e galena. Malaquita e azurita ocorrem esporadicamente, em superfícies de fraturas. O ouro ocorre essencialmente em veios de quartzo, na forma livre e/ou incluso em pirita. Os veios, de até 10 metros de espessura e até 80 metros de comprimento apresentam-se, localmente boudinados e/ou bifurcados em Y (garimpos Urubú e Lavrinhas). Quando constituídos de quartzo leitoso e quartzo escuro, as concentrações de ouro mais elevadas (2,50 ppm) ocorrem no segundo. No entanto, valores da ordem de 53 ppm Au e 100 ppm As foram obtidos em quartzo leitoso no garimpo Pedro d'Ávila. As concentrações mais elevadas de ouro estão presentes, em algumas ocorrências, nas zonas de estrangulamento dos veios.

As rochas metavulcânicas supracrustais, ou seja, o metabasalto da Formação Córrego do Paiol e metadacito da Formação Morro do Carneiro, hospedam várias ocorrências auríferas, entre elas Olavo, Arroz, Refresco, Vieira, Juí, Tapuios, Getúlio e Buzina, que são associadas a zonas de cisalhamento N10°-30°E e N20°-40°W. Veios de quartzo de até 1 metro de espessura, com direção N35°W/65°SW e, menos comumente NS e N80°E, subverticais, apresentam-se seccionados e, os de direção NS, geralmente ramificados segundo padrão Y. As principais concentrações auríferas, ouro livre na forma de grãos de dimensões em torno de 1 mm, ocorrem em pequenas cavidades nos veios e, menos comumente em estreitas faixas de cloritização (em metabasalto) e sericitização (em metariodacito) nas bordas dos veios. A paragênese de sulfetos inclui pirita, arsenopirita e, raramente, calcopirita. Covelita e malaquita são muito subordinadas.

As principais concentrações de ouro em rochas metasedimentares localizam-se na região de Conceição do Tocantins, porção sul do TAD, nos locais denominados de Cajazeira, Gerseu, Igrejinha e córrego Riachão. As principais concentrações auríferas ocorrem em milonitos com alteração hidrotermal associada, composta de carbonato, quartzo, clorita, sericita, estilpnomelano, cloritóide, turmalina, grunerita, magnetita, hematita, ilmenita e rutilo. As principais rochas submetidas à alteração hidrotermal e contendo concentrações auríferas mais elevadas são formação ferrífera bandada, *metachert* e xisto carbonoso. Os sulfetos são pirita, pirrotita, arsenopirita, calcopirita e esfalerita, e ocorrem na forma de disseminações e massas irregulares e vênulas na foliação, ou em veios de quartzo. Nos garimpos Igrejinha e Gerseu,

onde as foliações miloníticas têm atitudes, respectivamente, EW/45°S e N20°W/35°SW, concentrações auríferas estão presentes em zonas de alteração hidrotermal constituídas de quartzo, carbonato, mica branca, turmalina, clorita, magnetita e sulfetos. O ouro ocorre em veios de até 30 cm de espessura e segregações de quartzo. Os veios são comumente bordejados por clorita, clorita+carbonato e, mais externamente, carbonato, enquanto que as segregações geralmente contêm massas disformes de clorita e carbonato. As segregações são geralmente mais enriquecidas em sulfetos e apresentam as mais elevadas concentrações de ouro (0,56-27,5 ppm Au, 140 ppm Zn, 900 ppm Cu, 90 ppm Ni, 132 ppm Sr, 2035 ppm Ba, 0,8 ppm Bi, 0,3 ppm Sb, 1,4 ppm Te e 8,1 ppm Se). Na fazenda Elegante, as ocorrências de ouro são hospedadas por uma seqüência de cloritóide-quartzo-clorita xisto e formação ferrífera bandada, ambas contendo abundância de sulfetos disseminados, no contato entre granitóide e rochas supracrustais. Nas cabeceiras do córrego Riachão, proximidades da fazenda Elegante, o ouro (0,26 a 12 ppm) ocorre em veios de quartzo-carbonato-sulfetos em quartzo-clorita xisto feldspático, interpretado como sendo de metatufo andesítico, submetido a carbonatação, cloritização e sericitização associadas à foliação milonítica de atitudes médias N40°E/55°NW e N10°E/70°NW.

CONSIDERAÇÕES FINAIS A grande maioria dos depósitos e ocorrências de ouro do Maciço de Goiás e da Faixa Brasília localiza-se em zonas de cisalhamento brasileiras (Araújo Filho & Kuyumjian 1996, 2000). Todos os depósitos e ocorrências de ouro do TAD são hospedados por veios de quartzo com alteração hidrotermal associada, controlados por zonas de cisalhamento N35°-50°W, N40°-60°E e NS, que caracterizam as últimas fases

Figura 2 – Modelo teórico representativo do padrão de junção Y em mapa que, quando conectados, formam células hexagonais assimétricas. O modelo proposto pressupõe que os domos tenham semelhança de área, forma e provavelmente de volume. As zonas de cisalhamento inter-dômicas são inicialmente dúcteis, tornando-se dúctil-rúpteis nas fases finais do Brasiliano, com mergulhos fortes e com ângulos agudos de ~70° a 80° com as zonas de cisalhamento ~NE e ~NW e obtusos de ~120 a 130° destas com o braço NS. As setas, com indicação de σ_1 , dizem respeito à compressão Brasiliana que deformou os domos, tornando-os mais elípticos e que reverteu a cinemática das zonas de cisalhamento, referidas no texto.

de deformação, de caráter rúptil-dúctil naquele terreno. Tais características levaram Cruz e Kuyumjian (1999) a classificar tais mineralizações como do tipo *lode gold*. Os sistemas de cisalhamento foram possivelmente gerados por compressões - NS e -EW durante o Ciclo Orogenético Brasileiro, ou geradas anteriormente e reativadas durante este ciclo. Com base em dados de campo, petrográficos, geotermobarométricos, geocronológicos (Ar-Ar) e isotópicos (Pb, C e O), Cruz (2001) e Cruz et al. (2001a,b) mostram que o depósito de ouro córego do Paiol formou-se durante o Ciclo Orogenético Brasileiro com a participação de fluidos hidrotermais gerados por desvolatilização

metamórfica e que carregaram metais tanto da crosta inferior quanto da crosta superior. Neste sentido, conjecturamos que as mineralizações enfocadas no presente trabalho correspondem às do tipo *orogenic gold*, o que confere importância metalogenética ao Ciclo Orogenético Brasileiro, resultante do processo de estruturação final da Faixa Brasília na borda oeste do Craton São Francisco ocidental.

Agradecimentos Os autores são gratos ao CNPq (Projeto Integrado, Proc. 464730/00-7) pelo suporte financeiro e ao Laboratório de Geoquímica do IG/UnB pelas análises químicas.

Referências

- Araújo Filho, J.O. de & Kuyumjian, R.M. 2000. Structurally-controlled gold occurrences in the southern Brasília fold-thrust belt of central and southeastern Goiás. *Rev. Bras. Geoc.*, **30**:289-292.
- Araújo Filho, J.O. de & Kuyumjian, R.M. 1996. Regional distribution and structural control of gold occurrences/deposits in the Goiás Massif and Brasília Belt. *Rev. Bras. Geoc.*, **26**:109-112.
- Arthaud, M.M. 1985. *Projeto Conceição do Norte*. Metais de Goiás. Relatório Interno. 32p.
- Borges, M.S. 1993. *Evolução tectono-estrutural da região de Dianópolis-Almas, SE do Estado do Tocantins*. Centro de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, Tese de Doutorado, 365p.
- Correia Filho, F.C.L. & Sá, A.M. 1980. *Projeto Natividade*. Goiânia, DNPM/CPRM. v. 6.
- Cruz, E.L.C.C. & Kuyumjian, R.M. 1996. Chemical characterization of metabasalts and granitoids from the Almas-Dianópolis granite-greenstone terrane, Central Brazil. In: SBG, Symp. Archean Terrane South American Platform, Brasília, *Extended Abstracts*, 53-54.
- Cruz, E.L.C.C. & Kuyumjian, R.M. 1999. Mineralizações auríferas filoneanas do terreno granito-greenstone do Tocantins. *Rev. Bras. Geoc.*, **29**:291-298.
- Cruz, E.L.C.C. & Kuyumjian, R.M. 1998. The Geology and tectonic evolution of the Tocantins granite-greenstone terrane: Almas-Dianópolis region, Tocantins State, central Brazil. *Rev. Bras. Geoci.*, **28**:173-182.
- Cruz, E.L.C.C. 2001. *A gênese e o contexto tectônico da mina Córrego Paiol, terreno Almas-Conceição: um depósito de ouro hospedado em anfibolito do embasamento da faixa de dobramentos Brasília*. Inst. Tese de Doutorado, IG/UnB, 183p.
- Cruz, E.L.C.C., Kuyumjian, R.M., Hagemann, S., McNaughton, N.J. 2001a. Metamorphic evolution and Ar-Ar geochronology of Córrego Paiol gold mine host amphibolites, Tocantins State: implications to mineralization timing. In: Simp. Geol. Amazônia, 7, Belém, *CD-ROM*.
- Cruz, E.L.C.C., Kuyumjian, R.M., McNaughton, N., Hagemann, S. 2001b. Pb-Pb, C and O isotopic evidence for deep and shallow crustal rocks contributing to the Córrego Paiol Gold Deposit (Tocantins State) hydrothermal system. In: Simp. Geol. Amazônia, 7, Belém, *CD-ROM*.
- Ferrari, M.A.D. & Choudhuri, A. 2000. Chemical and structural constraints on the Paiol gold deposit, Almas greenstone belt, Brazil. *Rev. Bras. Geoc.*, **33**:297-301.
- Padilha, J.L. 1984. Prospecção de ouro na região nordeste de Goiás: Projeto Pindorama-DOCEGEO. In: SBG/Núcleo Centro-Oeste, I Encontro Regional do Ouro de Goiás, *Anais*, 29-32.
- Shakelton, R.M. 1995. Tectonic evolution of greenstone belts. In: M.P. Coward & Ries, A.C (ed.) *Early Precambrian Processes*. Geological Society Special Publication, **95**:53-65.
- Silva, A. da, Souza, L.H. de, Ferreira, M.C.B. 1990. Alteração hidrotermal da sequência de rochas do alvo Córrego Paiol e mineralização aurífera associada. In: SBG, Congr. Bras. Geol., 36, Natal, *Anais*, 2:1129-1143.
- Thomsen, F.P.R. e Kuyumjian, R.M. 1994. Caracterização geoquímica preliminar das rochas granitóides da região de Conceição do Norte, TO. In: SBG, Núcleo-Centro- Oeste, IV Congr. Geologia do Centro-Oeste, *Resumos*, 26-27.

Manuscrito NB-065

Recebido em 25 de setembro de 2002

Revisão dos autores em 8 de novembro de 2005

Revisão aceita em 20 de novembro de 2005