DOI <https://doi.org/10.26661/2312-2056/2019-24/1-02>

УДК 581.116:630*5

ТРАНСPIРАЦIЯ ДЕРЕВОСТАНIВ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ТА ДУБА ЧЕРВОНОГО У ЗМIШАНИХ ТА ОДНОПОРIДНИХ НАСАДЖЕННЯХ СТЕПУ УКРАЇНИ

Криворучко А. П.

Дніпровський державний аграрно-економічний
університет

uspeshna18@gmail.com

Вивчено особливості транспірації деревостанів дуба звичайного (*Quercus robur* L.) та червоного (*Quercus rubra* L.) при зростанні у чистих та змішаних групах. Змішаний деревостан дуба звичайного характеризується вищою інтенсивністю транспірації порівняно з чистим. Така ж тенденція зберігається і у дуба червоного. Як у чистих, так і у змішаних деревостанах автохтонний вид має вищу активність транспірації, порівняно з показниками випаровування у дуба червоного.

Транспірація деревостану, дуб червоний, дуб звичайний

Значна кількість літературних джерел присвячена вивченню ходу транспірації окремих дерев, але їх досить мало щодо транспірації насаджень та деревостанів. Це питання має важливе значення для вирішення як ряду екологічних питань стану довкілля, так і для лісового господарства.

Відомо, що лісові масиви створюють свій специфічний мікроклімат [6, 22], який впливає як на прилеглі території, так і на інтенсивність транспірації [17]. Велике значення мають метеорологічні умови, особливо умови зволоження, освітлення та температурний режим [2, 7, 8, 23, 31]. Не останнє значення належить родючості ґрунту, яка також сильно позначається на продуктивності насаджень і відповідно на випаровуванні вологи рослинами.

Важливим чинником, який визначає величину транспірації є вік та густота деревостану [28]. Адже, згідно з даними деяких авторів [17, 26], високоповнотні насадження випаровують більше вологи ніж низькоповнотні.

Відомо, що існує тісна кореляція між накопиченням фітомаси та інтенсивністю транспірації [4, 12, 18]. Одна з провідних ролей при накопиченні зеленої маси рослин належить супутнім породам. Для дуба звичайного

найкращими супутніми породами є клен гостролистий і граб звичайний [9, 11, 24] та липа дрібнолиста [10, 11]. За такого сусідства дуб звичайний розвиває глибинну кореневу систему, що обумовлює його більшу стійкість і більш високу продуктивність [9]. Для дуба червоного найкращі супутні породи – модрина європейська та ясен звичайний [19]. Але ще недостатньо вирішене питання про вплив на фізіологічні показники представників роду *Quercus* як за їх сумісного зростання, так і з іншими деревними породами.

Мета роботи – розрахувати транспірацію чистих деревостанів дуба червоного й дуба звичайного в окремих насадженнях та при спільному їх зростанні.

Матеріали та методи дослідження

Інтенсивність транспірації визначали у змішаному насадженні – дуб червоний (*Quercus rubra* L.) та дуб звичайний (*Quercus robur* L.) зі співвідношенням порід 7:3, а також при зростанні цих порід в однопородних та змішаних групах. Вік насаджень 11 років. Індекс життєвого стану насадження визначали за В. А. Алексєєвим (1989), він становить 81,2 % та має статус «здоровий». Площа ділянки 1,6 га. Насадження зростає у межах м. Дніпро і може розглядатися як рекреаційна зона, тобто як міський ліс.

Обчислення величини середньодобової транспірації проводили на модельних деревах у чистих та змішаних групах, отримані дані потім перераховували на 1 га. Інтенсивність транспірації листків визначали методом швидкого зважування на електронних вагах ТВЕ-0,21-0,001 з їх експонуванням на розсіяному світлі протягом 5 хв. [3]. Транспірацію деревостану розраховували як добуток листової маси на кількість випарованої за вегетаційний сезон вологи з одиниці площі листка (з червня по вересень) [12]. Обчислення листової маси проводили за формулою запропонованою В. Г. Нестеровим та Б. М. Бобилевим (1967):

$$P = \frac{\pi}{4} \rho \left(l \sum D_j^2 + \frac{1}{3} l_1 D_{j+1}^2 \right),$$

де P – маса листків дерева, кг; ρ – маса листків в 1 м^3 крони, кг/м^3 ; D_j – діаметри крони, м; l – відстань між діаметрами крони, м; l_1 – довжина вершинки, м.

Результати оброблені за допомогою пакету програм Microsoft Office 2010.

Результати та їх обговорення

У досліджуваній нами період літо та осінь були посушливі з мінімальною кількістю опадів (131 мм), тоді як зимово-весняний період (січень–травень) їх випало понад норму 302 мм (норма – 211 мм). З огляду на це, існує певна невідповідність між ходом транспіраційної кривої та запасом води у ґрунті у досліджувані місяці. Так, у літній період випало більше опадів, але активність транспірації найбільш висока саме у вересні, особливо у дуба звичайного (рис. 1), хоча опади у цьому місяці були відсутні.

Таку велику інтенсивність випаровування у дуба звичайного на початку осені можна пояснити тільки завдяки будові кореневої системи, яка може використовувати ґрунтову вологу з більш глибинних шарів, що вже в дворічному віці сягає близько 2 м [5, 14, 21], а в 12-річному віці проникає на глибину 2,6 м [10, 14].

У модельних дерев дуба звичайного, що зростають у чистому деревостані, місячні втрати води на транспірацію поступово зростають з червня до вересня. Найбільшого значення цей показник досягає у вересні. У дуба червоного за цих умов значення втрат води практично не відрізняються одне від одного і крива ходу транспірації полого (рис. 1).

У змішаному деревостані у модельних дерев дуба звичайного зберігається такий самий характер кривої активності транспірації, як і у чистому, але вона проходить дещо вище. У дуба червоного спостерігається значне підвищення інтенсивності випаровування води порівняно з чистим деревостаном і графік представлений кривою, значення якої збільшуються з червня до вересня, з максимумом у вересні.

Л. А. Князева та К. І. Овчинникова [13] наводять дані про те, що витрати води насадженими на транспірацію визначаються здебільшого запасами води, накопиченої в

ґрунті у весняно-осінній період, а саме вони близькі до сумарного весняного запасу доступної води в кореневмісному шарі ґрунту.

Рисунок 1 – Середньодобова інтенсивність транспірації модельних дерев *Q. robur* та *Q. rubra* в місяці досліджень

Figure 1 – Month daily average transpiration ratio of *Q. robur* and *Q. rubra* model trees in months of investigation

На думку Ю. В. Карпечко [12], для об'єктивної оцінки середньої багаторічної транспірації корінних лісів та її вікової динаміки в похідних лісах доцільно використовувати в якості основного параметру масу листків, оскільки зміни маси листового апарату відбуваються узгоджено з природними змінами інших таксаційних характеристик насадження.

Для розрахунку та порівняння витрат води на транспірацію показники її активності обчислювали за умови зростання на 1 га однакової кількості дерев кожного виду. Так, чистий деревостан дуба звичайного випаровує за вегетаційний сезон 116,75 мм/га води, найменше у червні – 14,92 мм, найбільше у вересні – 41,77 мм (рис. 2). Загальна кількість випарованої води у чистому деревостані дуба червоного – 55,73 мм/га, що становить 47,73 % від цього показника у автохтонного виду. Величина кількості випарованої води залишається практично незмінною у всі

місяці дослідження та знаходиться в межах від 13,44 до 14,79 мм/га, що на 9,92; 46,27; 59,76 та 64,59 % менше аналогічних показників випаровування деревостану дуба звичайного.

Рисунок 2 – Транспірація чистих та змішаних деревостанів *Q. robur* і *Q. rubra*, мм/га

Figure 2 – Transpiration ratio of *Q. robur* and *Q. rubra* monocultures and mixed-species forests, mm/ha

У змішаному деревостані дуба звичайного зберігається така сама тенденція витрат води на випаровування, як і у чистому (рис. 2). Величина цього показника відносно чистого деревостану збільшується у червні – у 1,88, у липні – у 2,54, серпні – у 2,19, вересні – у 2,12 рази. Змішаний деревостан випаровує води за вегетаційний сезон на 120,42 % більше води ніж чистий.

У змішаному деревостані дуба червоного збільшується кількість випарованої вологи кронами з червня до вересня від 18,20 мм до 27,30 мм/га, тоді як у чистому ця величина практично не змінювалась протягом вегетаційного періоду (рис. 2). За вегетаційний сезон він транспірує на 62,34 % інтенсивніше порівняно з чистим. У порівнянні з середніми показниками транспірації змішаного деревостану дуба звичайного за відповідні місяці деревостан дуба червоного випаровує на 35,37; 66,04; 69,55 та 69,22 % менше вологи.

Отже, як чисті, так і змішані деревостани автохтонного виду випаровують значно більше вологи, ніж аналогічні деревостани інтродуцента. Змішані деревостани обох видів мають вищі показники активності транспірації порівняно з чистими. Такі високі показники транспірації дуба звичайного можна пояснити, як вже згадувалось вище, глибокою кореневою системою. Незважаючи на високу інтенсивність транспірації дуб звичайний є одним із стійких до посухи видів. Г. Н. Крисанов [16] пояснює таку його стійкість високою забезпеченістю вуглеводами, наявністю постійного резерву крохмалю, які забезпечують більш високу водоутримувальну здатність. У дуба червоного ж навпаки коренева система з добре розвиненими бічним корінням, яке може сягати в довжину на багато метрів [29], тому йому важче забезпечити себе вологою за посушливих умов. Проте, згідно з отриманими нами результатами [15] його листки мають більшу водоутримувальну здатність як у чистих, так і у змішаних групах, порівняно з дубом звичайним, що дає йому змогу адаптуватись до посушливих умов зростання.

Результати наших досліджень узгоджуються з даними Д. Форестера [27], який пише, що дерева в змішаних насадженнях здатні випаровувати більше вологи порівняно з чистими. Так, *Eucalyptus globulus* Labill. при спільному зростанні з *Acacia mearnsii* de Wildeman, характеризується інтенсивнішим ростом та активністю транспірації. Автор зазначає, що хоча, в цілому, рослини в змішаних насадженнях мають більші показники росту та активніший процес випаровування вологи кронами порівняно з особинами в однопородних, однак цю ситуацію доцільно розглядати для кожного насадження окремо.

У таблиці наведено показники інтенсивності транспірації у змішаному насадженні зі співвідношення порід дуба червоного до дуба звичайного як 7:3.

Загалом, середньодобова транспірація насадження двох видів за вегетацію становить $1,21 \pm 0,06$ мм/га. Слід зазначити, що Г. Р. Ейтінген [25] наводить дані про середньодобові витрати на транспірацію в степовій зоні дубовими насадженнями, які становлять 3,45 мм, що значно більше за отримані нами дані. Але при цьому автор не вказує ні віку

насаджень ні його складу. За вегетаційний період (червень–вересень) кількість випаруваної вологи насадженням досягає $147,20 \pm 7,35$ мм/га (табл.) при кількості дерев 1292 шт./га. За даними деяких авторів [13] в умовах сухого степу ця величина у деревостані дуба звичайного може коливатись від 61,7 до 97,3 мм/га, при кількості дерев на га понад дві тисячі.

Таблиця – Показники транспірації змішаного деревостану *Q. robur* та *Q. rubra*

Table – The indexes of transpiration of *Q. robur* and *Q. rubra* mixed-species forest

Вид	Кількість дерев на 1 га	Маса листків, т	Середньодобова транспірація деревостану в період вегетації, мм/га	Транспірація насадженням за вегетаційний період, мм/га
<i>Q. robur</i>	326	$0,949 \pm 0,04$	$0,45 \pm 0,02$	$54,49 \pm 2,72$
<i>Q. rubra</i>	966	$2,821 \pm 0,14$	$0,76 \pm 0,04$	$92,71 \pm 4,63$
Разом	1292	$3,760 \pm 0,18$	$1,21 \pm 0,06$	$147,20 \pm 7,35$

Отже, інтенсивність транспірації збільшується з червня до вересня у обох видів, як у чистих, так і у змішаних деревостанах. Чисті деревостани обох видів випаровують менше води порівняно зі змішаними. При цьому дуб звичайний у всіх випадках транспірує інтенсивніше ніж дуб червоний. Як вже згадувалась раніше, досліджуване насадження відноситься до міських лісів, які є надзвичайно важливими для збереження та захисту пластичності й адаптивності міських екосистем [32], за рахунок випаровування вологи зменшують температуру повітря в містах [30] та підвищує його вологість.

Висновки

1. У степових умовах хід транспірації у дуба червоного у чистому насадженні має майже сталий характер протягом вегетаційного сезону, тоді як у дуба звичайного – це крива з максимумом у вересні.

2. Змішані насадження обох видів випаровують більше вологи кронами, ніж однопородні. Рівень вологи, що випаровується кронами деревостанів міського лісу, позитивно

впливає на мікроклімат прилеглих територій в посушливих кліматичних умовах степу України.

3. Дуб звичайний, як на рівні модельних дерев, так і цілого деревостану, у однопородних та змішаних деревостанах випаровує більше вологи, ніж дуб червоний за цих самих умов.

Література:

1. Алексеев В. А. Диагностика жизненного состояния деревьев и древостоев. Лесоведение. 1989. № 4. С. 51–57.
2. Ахматов М. К. Дневной расход воды на транспирацию целым древесным растением. Universum: химия и биология. Электронный научный журнал. 2016. № 8(26). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dnevnoy-rashod-vody-na-transpiratsiyu-tselym-drevesnym-rasteniem>.
3. Бессонова В. П. Практикум з фізіології рослин. Дніпропетровськ, 2006. 316 с.
4. Бузыкин А. И., Исмаилов А. М., Суворова Г. Г., Щербатюк А. С. Оценка продуктивности деревьев и древостоев. Лесоведение. 1991. № 6. С. 16–25.
5. Бурдейний Є. В., Курка С. С. Створення і вирощування лісових культур дуба звичайного (*Quercus robur* L.) в ДП «Савранське лісове господарство». Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: мат. наук. конф. Умань, 2014. С. 57–59.
6. Генсірук С. А., Копій Л. І., Іваницький С. М. Збереження біорізноманіття лісових екосистем шляхом формування оптимальної лісистості в агроландшафтах України. Науковий вісник УкрДЛТУ. Серія лісове та садово-паркове господарство. Львів, 2000. Вип. 10.1. С. 53–56.
7. Гриб В. М., Гриб І. В. Формування наземних компонентів штучних соснових насаджень. Таврійський науковий вісник, 2013. № 84. С. 44–50.
8. Дьякова И. Н., Толстикова Т. Н. Оценка засухоустойчивости интродуцированных видов рода *Quercus*. Вестник Майкопского государственного технологического университета. Майкоп, 2011. Вып. 3. С. 33–39.
9. Журова Л. Т. Роль маяцких дубрав в охране окружающей среды Донецкого индустриального региона.

Відновлення порушених екосистем: мат. третьої міжнар. наук. конф. (м. Донецьк, 7–9 жовтня 2008). Донецьк, 2008. С. 206–209

10. Карпенко В. І. Взаємодія корневих систем дуба звичайного, ясена звичайного та підгінних порід. Науковий вісник УкрДЛТУ. Серія Лісове та садово-паркове господарство. Львів, 2000. Вип. 10.1. С. 103–108.

11. Карпенко В. І. Лісівничі властивості супутніх порід у дубових лісостанах лісостепу України. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво. Київ, 2013. Т.187, № 1. С. 248–253.

12. Карпечко Ю. В. Расчетный метод определения транспирации древостоев. Лесоведение. 2010. № 5. С. 65–71.

13. Князева Л. А., Овчинникова К. И. Транспирация древесных пород и кустарников в условиях уральского стационара. Искусственные насаждения и их водный режим в зоне каштановых почв. Москва: Изд-во «Наука», 1966. С. 126–140.

14. Копій Л. І., Фізик В. І., Копій С. Л., Агій В. О., Копій М. Л. Особливості поширення та продуктивність дубових лісів Закарпаття. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 25.1. С. 69–74.

15. Криворучко А. П., Бессонова В. П. Характеристика водного обмена листьев *Quercus robur* L. и *Quercus rubra* L. в чистых и смешанных группах. *Știința agricolă*. 2017. nr. 1. pp. 66–73.

16. Крысанов Г. Н. О физиологической устойчивости дуба черешчатого в условиях степной зоны Украины. Труды комплексной экспедиции ДГУ. Вопросы степного лесоведения. 1972. Вып. 2. С. 111–114.

17. Лир Х., Польстер Г., Фидлер Г.-И. Физиология древесных растений. Москва: Лесная промышленность, 1974. 424 с.

18. Лялько В. І., Левчик О. І., Сахацький О. І. Оцінка витрат води на транспірацію за космічними знімками для визначення водного балансу території. *Geoinformatika*. 2012. № 2 (42). С. 60–68.

19. Майборода В. А. Створення збалансованих лісових екосистем шляхом впровадження чистих та змішаних

насаджень дуба червоного. Збалансоване природокористування. Теорія та практика природокористування. 2016. № 1. С. 30–36.

20. Нестеров В. Г., Бобылев Б. Н. Объёмный метод определения веса листовой массы лесонасаждений. Доклады ТСХА. Агрохимия, физиология растений, почвоведение. Москва, 1967. Вып. 127. С. 293–296.

21. Остапчук О. С. Лісівничо-біологічні властивості дуба звичайного (*Quercus robur* L.). Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: мат. наук. конф. Умань, 2014. С. 118–121.

22. Ткач В. П., Кобець В. О., Румянцев М. Г. Кліматорегулювальні функції дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву. Лісівництво і агролісомеліорація. Харків: УкрНДІЛГА, 2016. Вип. 126. С. 59–68.

23. Филон Д. И. Влагодобеспеченность еловых древостоев Беларуси. Актуальные проблемы лесного комплекса. 2017. Вып. 49. С. 132–135.

24. Шпак Н. П., Шлапак В. П., Леонтьяк Г. П. Особливості культивування насаджень дуба звичайного за участю береки лікарської в умовах південного Поділля. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. Т. 27, № 3. С. 71–74.

25. Эйтинген Г. Р. Лесоводство. Москва: Гос. изд-во с.-х. лит., 1949. 368 с.

26. Asbjornsen H., Tomer M. D., Gomez-Cardenas M., Brudvig L. A., Grunau C. M., Schilling K. Tree and stand transpiration in a Midwestern bur oak savanna after elm encroachment and restoration thinning. *Forest Ecology and Management*. 2007. Vol. 247. pp. 209–219. Doi: 10.1016/j.foreco.2007.04.043.

27. Forrester D. I. Transpiration and water-use efficiency in mixed-species forests versus monocultures: effects of tree size, stand density and season. *Tree Physiology*. 2015. Vol. 35. pp. 289–304. Doi:10.1093/treephys/tpv011.

28. Lundblad M., Lindroth A. Stand transpiration and sapflow density in relation to weather, soil moisture and stand characteristics. *Basic and Applied Ecology*. 2002. Vol. 3, Is. 3. pp. 229–243.

29. Lyford W.H. Development of the root system of Northern Red oak (*Quercus rubra* L.). Harvard Forest Paper. 1980. № 21. 30 p.

30. Moss J. L., Doick K. J., Smith S., Shahrestani M. Influence of evaporative cooling by urban forests on cooling demand in cities Urban Forestry & Urban Greening. 2019. Vol. 37. pp. 65–73. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.07.023>.

31. Shen Q., Gao G., Fu B., Lu Y. Responses of shelterbelt stand transpiration to drought and groundwater variations in an arid inland river basin of Northwest China. Journal of Hydrology. 2015. Vol. 531. pp. 738–748. Doi: <http://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.10.053>.

32. Zheng Yu, Lan S., Chen W. Y., Chen X., Xu X., Chen Y., Dong J. Visual sensitivity versus ecological sensitivity: An application of GIS in urban forest park planning. Urban Forestry & Urban Greening. 2019. Vol. 41. pp. 139–149. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.03.010>.

TRANSPIRATION IN QUERCUS RUBRA AND QUERCUS ROBUR MIXED-SPECIES STAND VERSUS MONOCULTURES IN THE STEPPE OF UKRAINE

Krivoruchko A. P.

Dnipro State Agrarian and Economic University

uspeshna18@gmail.com

A large number of literary sources are devoted to studying the process of transpiration of individual trees, but they are relatively small in terms of stand and plantations transpiration. This question is important for solving a number of environmental issues for the environment and forestry.

The intensity of transpiration was determined in mixed-specied planting – red oak (*Quercus rubra* L.) and English oak (*Quercus robur* L.), ratio of species is 7:3, and in monocultures and mixed groups. Age of stand is 11 years. The index of the state of planting life was determined by V. A. Alekseyev (1989), it is 81.2 % and has a "healthy" status. The area of plot is 1.6 hectares. Plantation grows within the limits of the Dnipro City and can be considered as a recreational zone, that is, as urban forest.

The calculation of the average daily transpiration value was performed on model trees in pure and mixed groups, the resulting data were then converted to 1 hectare.

In order to calculate and compare the flow of water to transpiration, its activity indicators were calculated for the same number of trees of each species growing on 1 hectare. Thus, pure stand of English oak typically evaporates during the growing season at 116.75 mm / ha of moisture, the lowest quantity is in June – 14.92 mm, the highest is in September – 41.77 mm. The total amount of evaporated moisture in the pure stand of Red oak is 55.73 mm / ha, which is 47.73 % of this indicator in the autochthonous species. The amount of evaporated moisture remains practically unchanged during all months of the study and is in the range from 13.44 to 14.79 mm/ha, which is 9.92; 46.27; 59.76 and 64.59 % less than the similar rates of evaporation of the stand of English oak.

In the mixed-species stand of English oak, the same tendency of water consumption for evaporation as in monocultures is maintained. The value of this indicator relating to the monocultures increases in June – at 1.88, in July – to 2.54, in August – to 2.19, in September – to 2.12 times. Mixed stands evaporate during the growing season by 120.42 % more water than monocultures.

In the mixed stands of Red oak, the amount of evaporated moisture is increased from 18 to 20 mm per hectare from June to September, whereas in monocultures stand, this value did not change substantially during the growing season. During the growing season, it transits 62.34 % more water compared to the monocultures. Compared to the average transpiration rates of the mixed-species stand of English oak for the corresponding months, the stands of Red oak evaporate at 35.37; 66.04; 69.55 and 69.22 % less moisture.

Thus, both monocultures and mixed-species stands of the autochthonous species evaporate considerably more moisture than similar trees of the introduced oak. Mixed species of both species have higher transpiration activity rates compared to monocultures ones.

During the growing season (June-September), the amount of evaporated moisture in the planting reaches 147.20±7.35 mm/ha

with the number of trees 1292 pieces/ha (mixed-species ones, that has the ratio of species 7:3, the 7 pieces is Red oak, the 3 ones is English oak). According to some authors, under the conditions of dry steppe, this value in the English oak can be varied from 61.7 to 97.3 mm / ha, with more than two thousand trees per hectare.