CASOS CLÍNICOS EM MEDICINA VETERINÁRIA

GEYSA ALMEIDA VIANA
NORDMAN WALL BARBOSA DE CARVALHO FILHO
TIAGO DA SILVA TEÓFILO
(Organizadores)

VOLUME 1

CASOS CLÍNICOS EM MEDICINA VETERINÁRIA

GEYSA ALMEIDA VIANA
NORDMAN WALL BARBOSA DE CARVALHO FILHO
TIAGO DA SILVA TEÓFILO
(Organizadores)

VOLUME 1

2021 by Luminus Editora
Copyright do texto © Autores
Revisão – Corpo Editorial

Editora chefe

Profa. Dra. Mylena Andréa Oliveira Torres

Editor Adjunto

Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo

Diagramadora

Bruna Torres Alves

Equipe Editorial Ciências Agrárias

Dra. Amanda Vasconcelos Guimarães

Dra. Geysa Almeida Viana

Dr. Jael Soares Batista

Dra. Joicy Cortez de Sá Sousa

Dr. Rennan Herculano Rufino Moreira

Me. Taliane Maria da Silva Teófilo

Me. Tatiane Severo Silva

Dr. Tiago da Silva Teófilo

Esta obra está licenciada com
uma Licença Creative Commons.

Atribuição-Não Comercial-Sem
Derivações 4.0 Internacional.

DOI:

Luminus Editora

São Luís – Maranhão – Brasil

Telefone: +55 (98) 984138480

www.luminuseditora.com

contato@luminuseditora.com

APRESENTAÇÃO

Na prática da clínica veterinária, nos deparamos com casos clínicos que são atípicos do nosso dia a dia. Casos incomuns que merecem a divulgação e o reconhecimento científico. A obra “Casos Clínicos em Medicina Veterinária” congrega o esforço coletivo de diversos pesquisadores, professores e estudantes na área de clínica médica e cirúrgica veterinária.

O e-book é produto da experiência de Médicos Veterinários, estudantes, professores e pesquisadores que compartilham temas de grande importância para a medicina veterinária em diferentes espécies. Nesta primeira edição, foram abordados artigos em cães, gatos e macaco-prego, versando sobre áreas como oncologia, cardiologia, parasitologia e mais. São apresentados os casos clínicos, mostrando como os diversos exames e informações são interpretados dentro dos processos patológicos, como esses processos auxiliam no diagnóstico e estabelecimento de protocolos terapêuticos dos casos abordados.

Que nossos leitores possam apreciar essa obra e que possamos contribuir de alguma forma da disseminação do conhecimento científico. Nosso agradecimento a todos autores, colaboradores, revisores e a equipe da Luminus Editora, que fizeram com que essa publicação se tornasse realidade. Desejamos a todos uma boa leitura e aguardamos pelo volume 2...

Saudações,

Os Organizadores

OS ORGANIZADORES

Geysa Almeida Viana

Médica Veterinária pela Universidade Federal Rural do Semi-árido (UFERSA). Mestre e Doutora em Ciência Animal (UFERSA). Foi docente do curso de Medicina Veterinária no CEUJI-ULBRA em Ji-Paraná/RO e no Centro Universitário UNINTA, em Sobral/CE, onde atuou como Diretora técnica do Hospital Veterinário da instituição. Atua na Clínica Médica de Pequenos Animais e Animais Silvestres desde 2012. Atualmente é pesquisadora de pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas Amazônicos (PPGAA) na Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e cursando Aperfeiçoamento/Atualização em Clínica Médica de Pequenos Animais pela FUNEP na UNESP/Jaboticabal.

Nordman Wall Barbosa de Carvalho Filho

Médico Veterinário pela Universidade Estadual do Maranhão (1988), Mestre em Ciências Veterinárias (2008). Atualmente é professor assistente de Clínica Médica de Cães e Gatos e Deontologia da Universidade Estadual do Maranhão. Tem experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase em Cinotecnia, Criação de Cães de Raça Pura, atuando principalmente nos seguintes temas: clínica médica, cinofilia, deontologia e ética profissional.

Tiago da Silva Teófilo

Médico Veterinário pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, Mestre em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal de Lavras – UFLA, na área de Medicina da Produção Animal, Doutor em Ciência Animal pela UFERSA (2020), na área de Morfofisiologia e Biotecnologia Animal. Tem experiência na área de bioquímica, histologia e morfofisiologia da digestão, atuando na manipulação da absorção de ácidos graxos, bioquímica clínica e produção animal.

SUMÁRIO

Capítulo 1.....	1
Colangiocarcinoma extra-hepático em felino - relato de caso	
Doi:	
Capítulo 2.....	18
Hidrocefalia em um felino - Relato de caso	
Doi:	
Capítulo 3.....	28
Seminoma metastático em cão criptorquida – relato de caso	
Doi:	
Capítulo 4.....	46
Tumor venéreo transmissível cervical e oral em cão: relato de caso	
Doi:	
Capítulo 5.....	62
Urolitíase em canino – relato de caso	
Doi:	
Capítulo 6.....	78
Perfil Eletrolítico e avaliação eletrocardiográfica de cadelas com piometra	
Doi:	
Capítulo 7.....	94
Efeito antiarrítmico dos ácidos graxos ômega-3 em cão	
Doi:	
Capítulo 8.....	108
Ocorrência de Ancylostoma sp. em macaco-prego (Sapajus libidinosus) – relato de caso	
Doi:	
Índice Remissivo.....	121

CAPÍTULO 1

COLANGIOCARCINOMA EXTRA-HEPÁTICO EM FELINO - RELATO DE CASO

CHOLANGIOCARCINOMA EXTRA-LIVER IN FELINE - CASE REPORT

Juliana Souza Vaz

Médica Veterinária, CANTINHO DOS PETS, Curitiba-PR.

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1282-7158>

Geysa Almeida Viana

Docente Medicina Veterinária, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3339-446X>

Cinthya de Andrade Gujanwski

Mestranda em Cirurgia Veterinária - Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho – UNESP, Jaboticabal-SP.

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8533-3044>

Marcus Vinícius Silveira

Residente em Área Profissional de Saúde – Medicina Veterinária e Saúde (PRAPS – MVS), FCAV/UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de Jaboticabal SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4955-4202>

Aline Martins Venuto

Residente em Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2333-3281>

Arícia Débora Vasconcelos Fonsêca

Mestre em Ciências Veterinárias, Universidade Estadual do Ceará – UECE, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2240-7058>

Maria Janeila Carvalho Soares

Discente do curso de Medicina Veterinária, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3294-8798>

Débora Thays Silva Maia

Discente do curso de Medicina Veterinária, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9537-1837>

Andressa Nunes Mouta

Docente Medicina Veterinária, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0319-2696>

Felipe Rocha dos Santos

Docente Medicina Veterinária, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4099-3046>

*Autor correspondente, e-mail: geysaalmeidav@hotmail.com

RESUMO

A oncologia tem se destacado entre as diversas áreas da medicina veterinária em virtude da elevada incidência dessas patologias nas últimas décadas, sendo uma das principais causas de morte em animais de companhia. Os colangiocarcinomas são neoplasias malignas hepáticas primárias do ducto biliar e podem ser intra-hepáticos, extra-hepáticos ou da vesícula biliar. Eles normalmente surgem a partir do epitélio dos ductos intra-hepáticos, enquanto que neoplasias do ducto extra-hepático e da vesícula biliar são raras. Esta neoplasia ocorre em todas as espécies sendo descrita em gatos, ovinos, bovinos e aves de cativeiro. No presente relato de caso, atendeu-se um gato, com quatro anos de idade, pesando 3,350 kg, domiciliado, com acesso a rua, foi atendido na Clínica Escola de Medicina Veterinária (CEULJI/ULBRA) de Ji-Paraná-RO com histórico de êmese, apatia, emagrecimento progressivo e extremamente icterício. Foram solicitados os exames complementares: hemograma, bioquímico e exames de imagem, onde inicialmente o diagnóstico sugestivo foi de lipidose hepática. O tratamento foi iniciado e após nove dias de tratamento o mesmo veio a óbito. O proprietário autorizou a necropsia do animal, onde ao exame necroscópico foram observadas áreas peri-lobulares branqueacentas amareladas com exudato purulento no fígado, e na vesícula biliar foram observados nódulos firmes multifocais de 0,3 a 1,0 cm de diâmetro que obstruíam o fluxo da bile causando icterícia pós-hepática, além do espessamento dos ductos biliares. Amostras dos órgãos foram coletadas e enviados para o exame histopatológico onde foi diagnosticado colangiocarcinoma extra-hepático.

Palavras-chaves: oncologia; neoplasias; vesícula biliar.

ABSTRACT

The oncology has distinguished between different areas of veterinary medicine due to the high incidence of these diseases in recent decades, one of the leading causes of death in companion animals. Cholangiocarcinomas are primary liver malignancies of the bile duct and can be intrahepatic, extrahepatic or gallbladder. They typically arise from the epithelium of the intrahepatic ducts, while cancers of the extrahepatic duct and gallbladder are rare. This malignancy occurs in all species being described in cats, sheep, cattle and captive birds. In this case report, picked up one cat with four years of age, weighing 3.350 kg, domiciled with you lit street, seen at the School of Veterinary Medicine Clinic (CEULJI / ULBRA) of Ji-Paraná-RO with emesis history, apathy, progressive weight loss and extremely jaundiced. Additional tests were requested as CBC, biochemical and imaging tests, where initially the diagnosis was suggestive of hepatic lipidosis. Treatment was initiated and after nine days of treatment the same shaft died. The authorized owner of the animal autopsies where the necropsy were observed Peri-lobular areas branqueacentas yellowish purulent exudate with the liver and gall bladder were observed multifocal firm nodules of 0.3 to 1.0 cm in diameter obstructing the flow the bile causing jaundice after liver in addition to the thickening of the bile ducts. Samples of the organs were collected and sent for histopathological examination where he was diagnosed extrahepatic cholangiocarcinoma.

Keywords: oncology; câncer; gallbladder.

INTRODUÇÃO

A oncologia tem se destacado entre as diversas áreas da medicina veterinária em virtude da grande incidência dessas patologias nos últimos anos, sendo uma das principais causas de morte em animais de companhia (BONNETT *et al.*, 2005; BENTUBO *et al.*, 2007; FIGHERA *et al.*, 2008; TRAPP *et al.*, 2010).

Em pequenos animais podem ser observadas diversos tipos de neoplasias que podem variar geograficamente devido às diferenças de susceptibilidade e hábitos dos animais, aos fatores ambientais, sendo importante o desenvolvimento de estudos locais e regionais que permitam fornecer informações das principais desordens neoplásicas que são relevantes nas diferentes regiões (SOUZA, 2005).

Dentre as hepatopatias mais comuns que afetam os felinos incluem lipidose hepática, toxoplasmose, peritonite infecciosa felina (PIF), desvios portossistêmicos congênitos (shunts) e adquiridos, hepatopatias tóxicas, neoplasias e hepatopatias inflamatórias (NELSON e COUTO, 2006).

Os colangiocarcinomas são neoplasias malignas hepáticas primárias do ducto biliar e podem ser classificados como intra-hepáticos, extra-hepáticos ou da vesícula biliar (JHONSON; SHERDING, 2008). Estas neoplasias surgem normalmente a partir do epitélio dos ductos intra-hepáticos, enquanto neoplasias do ducto extra-hepático e da vesícula biliar são raras (FOSSUM, 2008). Esta enfermidade ocorre em todas as espécies (CARLTON, 1998), sendo descrita em gatos (JACOBS; SNYDER, 2007), ovinos, bovinos (POPP, 1990), aves de cativeiro (CRUZ *et al.*, 2008; GODOY *et al.*, 2009), humanos (CHEN, 1999) e equinos (REED *et al.*, 2000; MOCHIZUKI *et al.*, 2001).

Nos animais com neoplasias hepáticas, os achados hematológicos e bioquímicos são inespecíficos e indicativos de doença hepática e suas complicações. Os sinais clínicos inespecíficos associados a este tipo de neoplasia, como miastenia grave (NELSON; COUTO, 2006), anorexia e epistaxe, tornam o diagnóstico definitivo difícil e muitas vezes confirmado apenas após a necropsia do animal e exame anatomopatológico (DRUMOND *et al.*, 2010).

Diversos sinais clínicos e as observações do exame físico não são específicos, exceto para hepatomegalia difusa ou nodular. Eles incluem aqueles associados com disfunção hepática como icterícia, encefalopatia hepática, distensão abdominal e sangramento excessivo (BRUGMANN; HIGGINBOTHAM, 2010).

Segundo ROTHUIZEN e MEYER (2004) os achados hematológicos e bioquímicos nos cães e gatos com neoplasia hepática são inespecíficos e são indicativos de doença hepática e suas complicações.

No tratamento geral deve ser incluído fluidoterapia, prevenção de hipocalemia, manutenção do equilíbrio ácido-base, controle de hipoglicemia, suporte nutricional adequado, controle de hemorragias, de desequilíbrios metabólicos, de infecções, de convulsões, de complicações como ascite e edema, além de cuidados de enfermagem e analgesia (NELSON; COUTO, 2006).

Objetivou-se descrever um caso de colangiocarcinoma extra-hepático em um felino atendido na clínica escola de Medicina Veterinária de Centro Universitário Luterano de Ji-paraná/ ULBRA- Ji-paraná, destacando os sinais clínicos, os exames laboratoriais e de imagem realizados no animal após o atendimento, o tratamento, além das alterações macroscópicas observadas durante a necropsia e as alterações microscópicas observadas após exame histopatológico.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi desenvolvido na Clínica Escola de Medicina Veterinária do CEUJI/ULBRA, em Ji-Paraná-Ro, em agosto de 2015. O animal foi acompanhado durante o atendimento clínico e na realização dos exames laboratoriais e de ultrassonografia, no decorrer de todo o tratamento e após o seu óbito no exame necroscópico. Em seguida, foi realizada uma revisão de todo o prontuário do paciente para elaboração e publicação deste relato de caso, processo este devidamente autorizado pelo proprietário.

Após o óbito do animal, o proprietário concordou e assinou um termo de doação para que fosse realizado o exame necroscópico do animal, para auxiliar no diagnóstico definitivo sobre a causa do óbito. Com o diagnóstico definitivo de colangiocarcinoma extra-hepático, o proprietário foi informado sobre a causa do óbito do seu animal.

RELATO DE CASO

Um gato sem padrão racial definido, com quatro anos de idade, pesando 3,350 kg, domiciliado, com acesso a rua, foi atendido na Clínica Escola de Medicina Veterinária

(CEULJI/ULBRA) de Ji-Paraná-RO com histórico de êmese, apatia, emagrecimento progressivo e extremamente ictérico.

Durante o exame físico foi possível observar desidratação em torno de 8%, com pelagem opaca e ressecada, pele e mucosas muito ictéricas, temperatura retal de 38°C, linfonodos dentro da normalidade.

Foram solicitados exames complementares, hemograma e bioquímico (ALT, AST, ureia e creatinina). Os resultados laboratoriais demonstraram alterações no hemograma com série vermelha abaixo dos parâmetros normais, com valores de eritrócitos ($4,8 \times 10^6/\text{mm}^3$), hemoglobina (7,6 g/dl), hematócrito (23%), além da presença de trombocitose ($871 \times 10^3/\text{mm}^3$) e aumento nos níveis de proteínas plasmáticas totais ($>12 \text{ g/dl}$). No esfregaço sanguíneo foi possível observar hemácias em roualex e poiquilocitose. Os Exames bioquímicos demonstraram um aumento da concentração de ureia do sangue (187mg/dl), elevação nos valores de creatinina (2,5mg/dl), que seriam indícios de lesão renal, e uma elevação das enzimas hepáticas como aspartato amino transferase - AST ($>500\text{UI/L}$) e transaminase alanina amino transferase- ALT ($>500\text{UI/L}$), estas que poderiam apontar presença de lesão hepática.

Inicialmente o diagnóstico sugestivo foi de lipidose hepática, e o tratamento instituído ao paciente foi uma dieta com alto teor de proteínas, calorias e medicamentos como: ornitil® (1 ml/kg), bionew® (0,2/kg), furosemida (6 mg/kg), vitamina B12 (100 mg/dia), adevita® (100 mg/dia), monovin K (5 mg/kg), fluidoterapia com Solução fisiológica 0,9%, ranitidina (2,5mg/kg). Logo após o início do tratamento, o proprietário foi consultado e o mesmo informou que não estava conseguindo alimentar o animal, e que somente estava oferecendo leite de vaca administrado diretamente na boca com auxílio de uma seringa, e então imediatamente foi agendado o procedimento cirúrgico para introduzir uma sonda esofágica no animal, para que fosse realizada a alimentação forçada.

Nove dias após o primeiro atendimento do animal, foi realizada uma ultrassonografia para auxiliar no diagnóstico definitivo, e durante a sua realização foi possível observar os lobos hepático esquerdo e centrais aumentados com delineamento abaulado e ecogenicidade sugestiva de lipidose hepática, vasos porta-hepáticos com calibre normal, vesícula biliar repleta demonstrando massa em região interna com ecogenicidade heterogênea (Figura 1). Rins com arquitetura sem acometimento demonstrando-se íntegros, baço não visualizado no momento do exame devido à presença de gases em alças intestinais.

Figura 1. Vesícula biliar repleta demonstrando massa em região interna com ecogenicidade heterogênea.

Na radiografia foi observado hepatomegalia e contorno aumentado da vesícula biliar, presença de fecalomas e alças intestinais repletas de gases, colón e reto dilatados (Figura 2). Foi realizado um enema no animal utilizando óleo mineral e solução fisiológica, para auxiliá-lo a expelir os fecalomas que estavam presentes em grandes quantidades. Após o procedimento o animal teve uma parada cardiorespiratória, sendo revertida com a administração de adrenalina (1 ml), dexametaxona (1mg/ animal), massagem cardíaca e oxigenoterapia. Uma hora após a ressuscitação, o animal veio a óbito, com tentativas seguidas de novas ressuscitação sem êxito.

Figura 2. Hepatomegalia e contorno aumentado da vesícula biliar, presença de fecalomas e alças intestinais repletas de gases, colón e reto dilatados.

Após o óbito do animal, o proprietário autorizou a realização da necropsia do mesmo, onde esta foi realizada no laboratório de necropsia na Clínica Escola de Medicina Veterinária do CEULJI/UBRA onde observou-se várias alterações macroscópicas: no exame físico foi possível observar que o animal estava em condição nutricional ruim, a coloração das mucosas, pele e submucosa estavam intensamente amarelada (Figura 3), à abertura da cavidade abdominal foi observado o fígado com aumento intenso, com superfície lisa e brilhante, coloração vermelho escuro com áreas branqueacentas amareladas, multifocais coalescentes variando de 0,3 a 0,5 cm de diâmetro, á palpação o parênquima estava discretamente firme (Figura 4). Ao corte do fígado, observou-se áreas peri-lobulares branqueacentas amareladas com exudato purulento (Figura 5). A vesícula biliar estava repleta de gás, com coloração intensamente amarelada (Figura 4), com nódulos firmes multifocais de 0,3 a 1,0 cm de diâmetro (Figura 6). No baço foi possível visualizar aumento moderado de tamanho, coloração vermelha escura, superfície lisa e brilhante, com um nódulo branqueacento amarelada de 0,5cm de diâmetro (figura 7). Os rins apresentavam-se com coloração intensamente verde, com porção medular com coloração vermelha, superfície lisa e brilhante (Figura 8).

Figura 3. Animal em condição nutricional ruim, coloração das mucosas e pele intensamente amarelada.

Figura 4. Fígado com aumento intenso, superfície lisa e brilhante, coloração vermelha escuro com áreas branqueacentas amareladas, multifocais coalescentes variando de 0,3 a 0,5 cm de diâmetro, á palpação o parênquima estava discretamente firme. Vesícula biliar repleta de ar, com coloração intensamente amarelada e espessamento do ducto biliar com múltiplos nódulos císticos na parede.

Figura 5. Fígado com áreas peri-lobulares branqueacentas amareladas com exudato purulento.

Figura 6. Vesícula biliar com nódulos firmes multifocais de 0,3 a 1,0 cm de diâmetro.

Figura 7. Baço com aumento moderado de tamanho, coloração escura, superfície lisa e brilhante, com um nódulo branqueamento amarelado de 0,5cm de diâmetro.

Figura 8. Rim com coloração verde intensa, com porção medular de coloração vermelha, superfície lisa e brilhante.

Baseado nos achados macroscópicos o diagnóstico anatomopatológico foi Hepatopatia Crônica associada à icterícia, foram coletadas amostras do fígado, vesícula biliar, rins, baço, coração, pâncreas e pulmão, as amostras foram coletadas e fixadas em formalina 10%, e as mesmas foram encaminhadas para exame histopatológico no laboratório de histopatologia da Universidade Federal de Rondônia- UNIR na cidade Rolim de Moura- RO. Amostras de exudatos foram coletadas do fígado e vesícula biliar, as mesmas foram encaminhadas para o laboratório de análise microbiológica da Clínica Escola de Medicina Veterinária da Universidade Luterana de Ji-Paraná-RO.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os exames macroscópicos e microscópicos do fígado do animal foram consistentes com um diagnóstico de colangiocarcinoma extra-hepático. Na macroscopia o fígado apresentou aumento intenso, com superfície lisa e brilhante, coloração vermelha escuro com áreas branqueacentas amareladas, multifocais coalescentes variando de 0,3 a 0,5 cm de diâmetro, á palpação o parênquima estava discretamente firme (Figura 4). O exame microscópico revelou que o fígado estava apresentando múltiplas áreas de proliferação de célula neoplásicas em formas de ácinos, envolvidas por um estroma de tecido conjutivo. As massas tumorais estavam delimitadas por uma pseudo capsula de tecido conjutivo. Também foi possível observar áreas de necrose e infiltrado inflamatório mononuclear (linfócitos e plasmócitos) no interior dos tumores. As células neoplásicas apresentavam citoplasma escasso e núcleo vacuolizado bastante pleomórfico, proliferação de células tumorais em várias regiões do parênquima hepático, misturadas às trabéculas de hepatócitos.

No exame necroscópico, a vesícula biliar se apresentava repleta de gás, com coloração intensamente amarelada, múltiplos nódulos císticos, firmes e multifocais de 0,3 a 1,0 cm de diâmetro na sua parede, além do espessamento do ducto biliar, demonstrando a origem extra-hepática do colangiocarcinoma. Os nódulos localizados principalmente no colo da vesícula biliar levaram a obstrução do fluxo de bile, resultando em uma icterícia pós-hepática. Os fecalomas presentes no intestino e visualizados no Raio-x foram decorrentes do ressecamento das fezes ocasionados pela desidratação e ausência de bile, devido à obstrução do fluxo biliar pelos nódulos presentes na parte estreita (colo) da vesícula biliar. Em alguns casos de neoplasias é comum ocorrer fecaloma e estes se caracterizam por fezes ressecadas, compactadas e retidas no interior do intestino grosso (McGAVIN & ZACHARY, 2009). Microscopicamente foi

possível observar múltiplas áreas de tecido neoplásico em forma de ácinos distribuídos pela submucosa da vesícula biliar. As células tumorais possuíam citoplasma acidofílico e núcleo heterocromático na porção apical da célula, com pleomorfismo moderado. Os ácinos estavam envolvidos por um delicado estroma de tecido conjuntivo. Em diversas áreas observou-se proliferação celular para o interior da luz dos ácinos, formando agregados de células neoplásicas na luz (Figura 9).

Figura 9. Vesícula biliar com múltiplas áreas de tecido neoplásico em forma de ácinos distribuídos pela submucosa da vesícula biliar, 40x, HE (hematoxilina e eosina).

Segundo NELSON e COUTO (2006), as neoplasias hepatobiliares primárias são raras entre os felinos. Dentre as que causam doença clínica, o carcinoma colangiocelular (ducto biliar) e carcinoma hepatocelular são os mais relatados. Não há predisposição racial e a maioria dos gatos afetados tem mais de dez anos de idade (STONEHEWER, 2006).

Figura 10. Fígado com múltiplas áreas de proliferação de célula neoplásicas em formas de ácinos, envolvidas por um estroma de tecido conjuntivo, 25x, HE.

Os colangiocarcinomas são neoplasias malignas hepáticas primárias do ducto biliar e podem ser intra-hepáticos, extra-hepáticos ou da vesícula biliar (JHONSON; SHERDING, 2008). Eles normalmente surgem a partir do epitélio dos ductos intra-hepáticos, enquanto que neoplasias do ducto extra-hepático e da vesícula biliar são raras (FOSSUM, 2008). Esta neoplasia ocorre em todas as espécies (CARLTON, 1998), sendo descrita em gatos (JACOBS; SNYDER, 2007), ovinos, bovinos (POPP, 1990) e aves de cativeiro (CRUZ *et al.*, 2008; GODOY *et al.*, 2009).

ROTHUIZEN e MEYER (2004) salientam que os achados hematológicos e bioquímicos nos cães e gatos com neoplasia hepática não são específicos e são indicativos de doença hepática e suas complicações, corroborando com os achados laboratoriais do presente relato de caso.

Nas bioquímicas séricas notou-se aumento intenso das enzimas hepáticas ALT e AST. A ALT é uma enzima de extravasamento que está livre no citoplasma dos hepatócitos, esta enzima é essencialmente hepato específica para cães e gatos. O aumento da atividade sérica dessa enzima indica uma lesão celular liberando-a para a circulação. Pequenos aumentos da sua atividade não têm relevância, pois o grau da lesão hepática é responsável pelo aumento da atividade da ALT. Entre os testes de função hepática é considerado o mais comum e o melhor para detecção da lesão hepática (THRALL, 2007).

Na análise microbiológica do exudato purulento coletado do fígado e vesícula biliar, foi isolado *Salmonella* sp. A salmonelose clínica é incomum em cães e gatos embora muitos sorovares possam ser carreados por animais aparentemente normais. O desenvolvimento da doença dependerá do estado imunológico do hospedeiro e os fatores estressantes. A forma septicêmica é comum em bezerros e caracteriza-se por depressão, toxemia, febre, desidratação e fraqueza. A neoplasia associada ao quadro de anorexia do animal podem ter diminuído a imunidade do mesmo, ocasionando um quadro de septicemia, como já descrito em outras espécies, quadro esse que condiz com os sinais clínicos que o animal apresentou no momento do seu óbito.

Segundo MAMPRIM (2004), a imagem ultrassonográfica normal do fígado se apresenta com ecotextura homogênea, contorno e forma do parênquima regular. As lesões podem apresentar diferentes padrões: nódulo hipocogênico, hiperecogênico ou misto. As características como alteração de contorno e forma do órgão, presença de efusão peritoneal, aumento de linfonodos ou alterações em outros órgãos levam a uma maior suspeita de malignidade (MAMPRIM, M.J., 2004). O ultrassom não é capaz de definir o tipo celular das neoplasias, pois as imagens são interações de diversos componentes teciduais, justificando a grande variação de padrões. As lesões complexas, cavitárias (cistos com septações) podem ser correlacionadas à colangiocarcinoma ou hemangiossarcoma (MAMPRIM, M.J., 2004). No relato descrito, a imagem possui um padrão diferente, com vesícula biliar repleta demonstrando massa em região interna com ecogenicidade heterogênea, comprovando a necessidade da histopatologia para o diagnóstico definitivo. Apesar de não confirmar o diagnóstico de colangiocarcinoma, o exame ultrassonográfico é extremamente importante para identificar alterações em órgãos parenquimatosos, bem como direcionar outros exames complementares visando diagnóstico definitivo (MAMPRIM, M.J., 2004).

Neoplasias hepatobiliares primárias são consideradas raras em felinos, representando até 3,0% do total de neoplasias. O Colangiocarcinoma extra-hepáticos é uma neoplasia maligna de ducto biliar, pouco frequente em felinos. Geralmente estes tumores originam-se nos ductos intra-hepáticos, formando uma massa única ou múltiplos nódulos. Macroscopicamente são firmes, salientes e umbilicados. O prognóstico para animais acometidos é ruim, devido à ampla disseminação neoplásica antes da obtenção do diagnóstico, em decorrência de sua natureza infiltrativa e potencial metastático elevado.

O tratamento cirúrgico através da completa ressecção tumoral com margens livres cirúrgicas é o que oferece o melhor prognóstico (CHAMBERLAIN e BLUMGART, 2000), o uso de agentes quimioterápicos e radioterápicos no pós-operatório parece não alterar a

sobrevida nem o índice de recorrência, mesmo em casos de ressecção completa (JARNAGIN, 2000). Por outro lado, o tratamento cirúrgico radical pode ser contraindicado em algumas situações, como a presença de metástases à distância, a invasão da veia porta ou de estruturas vasculares adjacentes e a necessidade de ressecções hepáticas extensas (GAZZANIGA *et al.*, 2000).

CONCLUSÃO

As características macroscópicas e histopatológicas encontradas associadas aos sinais clínicos possibilitaram o diagnóstico da neoplasia como colangiocarcinoma extra-hepático. Esta neoplasia é incomum em outras espécies, e em gatos os relatos são infrequentes, sendo importante o conhecimento dos achados clínicos e patológicos para o diagnóstico preciso. As características macroscópicas e microscópicas do tumor foram semelhantes às descritas na literatura, possibilitando o diagnóstico da lesão. Neste caso o exame necroscópico foi importante para identificar a neoplasia causa da morte do animal, e os exames complementares laboratoriais e de imagem ajudaram na confirmação do diagnóstico definitivo.

Em animais, novos estudos ainda são necessários para melhorar e elucidar a patogênese do colangiocarcinoma. Até o momento, a terapia cirúrgica com margem de segurança, parece ser a melhor forma de possibilitar uma maior sobrevida com melhor qualidade de vida ao animal, porém o tratamento cirúrgico radical pode ser contraindicado em casos de metástases à distância, invasão da veia porta ou de estruturas adjacentes, e necessidades de ressecções hepáticas extensas.

REFERÊNCIAS

BENTUBO H.D.L. *et al.* Expectativa de vida e causas de morte em cães na área metropolitana de São Paulo (Brasil). **Ciência Rural**, v. 37, n. 4, p. 1021-1026, 2007.

BONNETT B.N. *et al.* Mortality in over 350,000 insured Swedish dogs from 1995-2000: I. Breed-, gender-, age- and cause-specific rates. **Acta Veterinaria Scandinavica**, v. 46, p. 105-120, 2005.

BRUGMANN, B.; HIGGINBOTHAM, M. L. Liver, gall bladder, and non-endocrine pancreatic tumors. In: HENRY, C. J.; HIGGINBOTHAM, M. L. **Cancer management in small animal practice**, Maryland Heights: Elsevier, 2010. cap. 22c, 259-264p.

CARLTON, W. W. **Patologia veterinária especial de Thomson**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 672 p.

CHAMBERLAIN, R. S. & BLUMGART, L. H. Hilar cholangiocarcinoma: a review and commentary. **Annals of Surgical Oncology**, v. 7, p. 55-66. 2000.

CHEN, M. F. Peripheral cholangiocarcinoma (Cholangiocellular carcinoma): clinical features, diagnosis and treatment. **Journal of Gastroenterology and Hepatology**, v. 14, p. 1449, 1999.

FIGHERA R. A. *et al.* Causas de morte e razões para eutanásia de cães da Mesorregião do Centro Ocidental Rio-Grandense (1965-2004). **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 28, n. 4, p. 223-230, 2008.

FOSSUM, T.W. **Cirurgia de Pequenos Animais**, 3ª Edição. Rio de Janeiro, Elsevier Brasil, 2008. 1632p.

GAZZANIGA, G. M. *et al.* Surgery for hilar cholangiocarcinoma: the Italian experience. **Journal Hepatobiliary Pancreat Surgical**, v. 7, p. 122-7, 2000.

GODOY, S. N. *et al.* Principais processos neoplásicos encontrados em psitacídeos mantidos em cativeiro. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, Rio de Janeiro, v. 29, n. 6, p. 445-451, 2009.

JARNAGIN, W. R. Cholangiocarcinoma of the extrahepatic bile ducts. **Seminars in Surgical Oncology**, v. 19, p. 156-76, 2000.

JHONSON, S. E. & SHERDING, R. G. Doenças do fígado e trato biliar. In: BIRCHARD, S. J.; SHERDING, R. G. **Manual Saunders clínica de pequenos animais**. 3. ed. São Paulo: Roca, 2008. cap. 71, 765-829p.

MAMPRIM, M. J. Fígado e Vesícula Biliar. In: CARVALHO, C. F. **Ultrassonografia em pequenos animais**. 1ª ed São Paulo: Roca, 2004. Cap 6, 51-74p.

MCGAVIN, D. M. & ZACHARY, J. F. **Bases da Patologia em Veterinária** 4ª edição, Rio de Janeiro, Elsevier, 2009. 1540p.

NELSON, W. R. & COUTO, C. G. **Manual de medicina interna de pequenos animais**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

POPP, J. A. Tumors of the liver, gall bladder, and pancreas. In: MOULTON, J. E. **Tumours in domestic animals**. London: University of California Press, 1990. cap. 7, 436-457p.

ROTHUIZEN, J & MEYER, H. P. Anamnese, Exame Físico e Sinais da Doença Hepática. In: ETTINGER, S. J. **Tratado de Medicina Veterinária Interna**. 5ª edição. Ed. Manole. 2004. São Paulo. Seção XI, 1342-1347p.

STONEHEWER, J. Fígado e Pâncreas. In: CHANDLER, E. A; GASKELL, C. J.; GASKELL, R. M. (Ed.). **Clínica e terapêutica em felinos** 3. ed. São Paulo: Roca, 2006, 358 – 372p.

THRALL, M. **Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária** 1 ed. Roca: São Paulo, 2007, 335-354p.

TRAPP S. M. *et al.* Causas de óbito e razões para eutanásia em uma população hospitalar de cães e gatos. **Braz. Journal of Veterinary Research and Animal Science**, v. 47, n. 5, p. 395-402, 2010.

CAPÍTULO 2

HIDROCEFALIA EM UM FELINO - RELATO DE CASO

HYDROCEPHALUS IN THE FELINE - CASE REPORT

Aline Joane Brito Padilha

Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária do HVU, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís - Ma

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3734-9498>

Liziane Gomes Carvalho

Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária do HVU, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís - Ma

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6730-6456>

Victória Conceição Faria

Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária do HVU, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís - Ma

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8454-1693>

Mylena Andréa Oliveira Torres

Docente do curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís - Ma.

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5021-3130>

Nordman Wall Barbosa de Carvalho Filho

Docente Medicina Veterinária, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís - Ma

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-868-5215>*

*Autor correspondente, e-mail: nordmanwall@gmail.com

RESUMO

A hidrocefalia é uma desordem multifatorial na dinâmica circulatória do fluido cerebrospinal e caracteriza-se por sua diminuição e consequente dilatação dos ventrículos cerebrais em relação à passagem imprópria do líquido cefalorraquidiano desde o seu sítio de produção, no interior do sistema ventricular, até o seu ponto de absorção na circulação sistêmica. Objetivou-se, com este trabalho, relatar um caso raro de paciente felino diagnosticado com hidrocefalia bilateral congênita, bem como, discutir sobre a qualidade e expectativa de vida desses pacientes. Foi atendido no Hospital Veterinário Universitário “Francisco Edilberto Uchoa Lopes, no dia 06 de dezembro de 2019, um felino, fêmea, pesando 800 gramas, de aproximadamente dois meses de idade, sem raça definida com histórico de incoordenação motora, vocalização e aumento da calota craniana. Ao exame físico geral, o paciente apresentava-se ativo, com normorexia e normodipsia, mucosas ocular e oral normocoradas, caquexia, desidratação estimada em 8%, temperatura retal de 37,2°C, linfonodos reativos, ausculta cardiopulmonar e palpação abdominal sem alterações. Baseado na anamnese e exame físico geral, suspeitou-se de hidrocefalia congênita. O paciente foi, então, submetido ao exame radiográfico nas posições dorso ventral e latero lateral do crânio, ultrassonografia craniana e tomografia computadorizada, cujo resultado revelou aumento significativo e simétrico dos ventrículos laterais direito e esquerdo, além do significativo aumento do terceiro e o quarto ventrículos, ocupando a maior parte do espaço intracraniano. Solicitou-se, ainda, exames complementares como hemograma e bioquímica sérica (Ureia, Creatinina, Alanina Aminotransferase e Proteínas Totais e Frações), bem como, testes de FIV e FeLV e sorologia para toxoplasmose. A hidrocefalia é uma patologia

crônica, incurável e rara em felinos, sendo a forma congênita a mais comum. O tratamento de suporte se baseia na utilização de corticosteroides e omeprazol reduzindo a pressão intracraniana pela diminuição do líquido cefalorraquidiano e proporcionando uma melhor qualidade de vida para o animal.

Palavras-chave: Hidrocefalia; felinos; Líquido cefalorraquidiano.

ABSTRACT

Hydrocephalus is multifactorial disorder in the circulatory dynamics of the cerebrospinal fluid and is characterized by its decrease and consequent dilation of the cerebral ventricles in relation to the improper passage of cerebrospinal fluid from its production site, within the ventricular system, to its point of absorption in systemic circulation. The objective of this study was to report a rare case of a feline patient diagnosed with congenital bilateral hydrocephalus, as well as to discuss the quality and life expectancy of these patients. Was treated at the University Veterinary Hospital “Francisco Edilberto Uchoa Lopes”, on december 6, 2019, a feline, female, weighing 800 grams, approximately two months old, of no defined breed, with a historic of motor incoordination, vocalization and an increase in the cap cranial. On general physical examination, the patient was active, with normorexia and normodipsia, normal colored ocular and oral mucosa, cachexia, dehydration estimated at 8%, rectal temperature of 37.2°, reactive lymph nodes, cardiopulmonary auscultation and abdominal palpation without changes. Based on history and general physical examination, congenital hydrocephalus was suspected. The patient was then submitted to radiographic examination in the dorsal ventral and lateral positions of the skull, cranial ultrasonography and computed tomography, the result of which revealed a significant and symmetrical enlargement of the right and left lateral ventricles, in addition to a significant enlargement of the third and fourth ventricles, occupying most of the intracranial space. Complementary tests were also requested, such as blood count and serum biotechnology (Urea, Creatinine, Alanine Aminotransferase and total proteins and Fractions), as well as FIV and FeLV, tests and serology for toxoplasmosis. Hydrocephalus is a chronic, incurable and rare condition in felines, the most common congenital form being. Supportive treatment is based on the use of corticosteroids and omeprazole, reducing intracranial pressure by decreasing the cerebrospinal fluid and providing a better quality of life for the animal.

Keywords: Hydrocephalus; feline; Cerebrospinal fluid.

INTRODUÇÃO

A hidrocefalia é uma desordem multifatorial na dinâmica circulatória do fluido cerebroespinal (FCS) e caracteriza-se por sua diminuição e consequente dilatação dos ventrículos cerebrais em relação à passagem imprópria do líquido cefalorraquidiano (LCR) desde o seu sítio de produção, no interior do sistema ventricular, até o seu ponto de absorção na circulação sistêmica (REKATE, 2009).

A forma mais frequentemente diagnosticada na rotina clínica é a hidrocefalia congênita. Esta, ocorre mais comumente em cães de raças pequena e miniatura como Maltês, Yorkshire

terrier, Buldogue inglês, Chihuahua, Lhasa apso, Pomerânio, Poodle, Pug, e Pequinês, dentro do primeiro ano de vida. Em felinos, essa condição é rara (DEWEY, 2002).

Entre os sinais clínicos observados na hidrocefalia, estão a incoordenação, paresia de membros, ataxia, hipermetria, comportamento anormal, bruxismo, deficiências auditivas e visuais, convulsões, agressividade, aumento de volume do crânio e/ou crânio em forma de cúpula, fontanela persistente, bem como, nistagmo, arreflexia e estrabismo ventrolateral bilateral (SPINOSA *et al.*, 2011).

O diagnóstico é fundamentado na avaliação dos sinais clínicos associada à anamnese e realização de exames de imagens, tais como, radiografia, tomografia e ultrassonografia da calota craniana (RIVERA *et al.*, 2006). A terapia médica envolve mecanismos para a diminuição da produção de LCR por meio da administração de anti-inflamatórios, anticonvulsivantes e/ou diuréticos, visando proporcionar maior qualidade de vida ao paciente (PERPÉTUA *et al.*, 2008). Objetivou-se, com este trabalho, relatar um caso raro de paciente felino diagnosticado com hidrocefalia bilateral congênita, bem como, discutir sobre a qualidade e expectativa de vida desses pacientes.

RELATO DE CASO

Foi atendido no Hospital Veterinário Universitário “Francisco Edilberto Uchoa Lopes, no dia 06 de dezembro de 2019, um felino, fêmea, pesando 800 gramas, de aproximadamente dois meses de idade, sem raça definida com histórico de incoordenação motora, vocalização e aumento da calota craniana. Segundo o tutor, o felino apresentava dificuldade para se alimentar desde o nascimento e tinha desenvolvimento atrasado quando comparado aos outros felinos da ninhada.

Ao exame físico geral, o paciente apresentava-se ativo, com normorexia e normodipsia, mucosas ocular e oral normocoradas, caquexia, desidratação estimada em 8%, temperatura retal de 37,2°C, linfonodos reativos, ausculta cardiopulmonar e palpação abdominal sem alterações. Foi observado, ainda, estrabismo ventro-lateral unilateral discreto, secreção ocular intensa, calota craniana abaulada e presença de fontanela persistente. O paciente apresentou quedas com rolamento e andar em círculos com constantes colisões contra obstáculos.

Figura 1. Paciente apresentando aumento da calota craniana frontalmente.

Baseado na anamnese e exame físico geral, suspeitou-se de hidrocefalia congênita. O paciente foi, então, submetido ao exame radiográfico nas posições dorso ventral e latero lateral do crânio e ultrassonografia craniana para elucidação da suspeita clínica. Solicitou-se, ainda, exames complementares a fim de avaliar as condições sistêmicas do animal, como hemograma e bioquímica sérica (Ureia, Creatinina, Alanina Aminotransferase e Proteínas Totais e Frações), bem como, testes de FIV e FeLV e sorologia para toxoplasmose.

Observou-se, ao exame radiográfico, adelgaçamento de osso parietal e abaulamento importante de calota craniana com evidente radiopacidade e fluido sobrepondo o crânio, sem evidências de circunvoluções cerebrais, sugestivo de hidrocefalia.

Figura 2. Radiografia do crânio do felino mostrando fontanelas abertas, defeito radiotransparentes na calota craniana.

A ultrassonografia revelou fontanelas persistentemente abertas, entretanto, este exame não se mostrou conclusivo e as imagens geradas não obtiveram qualidade digna de nota. Os exames complementares (hemograma, função renal e função hepática) estavam dentro da

normalidade e o paciente apresentou resultado negativo para toxoplasmose, e testes para FIV e FeLV.

Posteriormente, para elucidação diagnóstica, foi solicitado a tomografia computadorizada, cujo resultado revelou aumento significativo e simétrico dos ventrículos laterais direito e esquerdo, além do significativo aumento do terceiro e quarto ventrículos, ocupando a maior parte do espaço intracraniano. Há também redução significativa do parênquima encefálico, inclusive o cerebelo encontra-se reduzido em tamanho. Não há desvio de linha média. Líquido cefalorraquidiano com grau de atenuação radiográfica normal, oscilando entre 0 e 5 unidades Hounsfield. Ausência de sinais de presença de massa ou outro fator obstrutivo. A alteração está provavelmente relacionada a alteração congênita. Ausência de sinais de fratura de ossos cranianos. Fontanela bregmática não completamente fechada. Deformidade do crânio, apresentando-se proporcionalmente aumentado e assumindo aspecto arredondado, sugerindo associação com aumento da pressão intracraniana.

Figura 3. Imagem mostrando dilatação significativa do sistema ventricular, na forma simétrica dos ventrículos laterais direito e esquerdo, terceiro e quarto ventrículos.

Figura 4. Tomografia computadorizada de crânio demonstrando hidrocefalia grave, ventriculomegalia grave e hipotrofia do parênquima cerebral.

Após o diagnóstico definitivo de hidrocefalia congênita, optou-se pelo tratamento paliativo conforme foi descrito por Amude *et al.*, (2013); Thomas, (2010); Chrisman *et al.*, (2005), utilizando corticoideterapia com prednisolona (0,5mg/kg) BID por 7 dias, furosemida (1mg/kg BID) e omeprazol (10mg/kg) BID por 10 dias, tendo como principal objetivo a diminuição da produção de líquido cefalorraquidiano e consequentemente redução da pressão intracraniana. O animal relatado, respondeu bem ao protocolo paliativo instituído, que levou à remissão e controle dos sinais clínicos até a conclusão deste trabalho.

DISCUSSÃO

A hidrocefalia é caracterizada pelo aumento ventricular cerebral gerado por uma maior quantidade de líquido cefalorraquidiano (LCR) e pode acontecer com compressão ou atrofia secundária do tecido nervoso adjacente (NELSON & COUTO, 2010). Sua etiologia consiste em produção excessiva de líquido no plexo coroide, obstrução do fluxo pelo sistema ventricular ou espaço subaracnóideo e, por fim, em má absorção nos vilos aracnoides (CUNNINGHAM, 2008). A quantidade de LCR no crânio é ligada ao equilíbrio da taxa de formação, que é julgada constante e independente da pressão intracraniana, e a taxa de absorção (THOMAS, 2010).

De acordo com Chrisman *et al.* (2005), a hidrocefalia congênita ocorre na formação do sistema nervoso, ainda na vida fetal, evidenciando, ao nascer, alterações no desenvolvimento e volume do crânio, com aumento do seu diâmetro antes do fechamento das suturas cranianas. Segundo relato da tutora, o paciente apresentava alterações comportamentais e anatômicas desde o seu nascimento, incluindo aumento da calota craniana e dificuldade para se alimentar e locomover. Além, disso, constatou-se presença de fontanelas abertas. Frente aos achados clínicos e histórico do paciente, suspeitou-se de hidrocefalia congênita, forma mais comum na rotina clínica veterinária, segundo Festugatto *et al.* (2007).

Dependendo da etiologia e do grau das lesões encefálicas, os sinais da hidrocefalia podem não ser evidentes ou, na maioria dos casos, de evolução progressiva e incapacitante (TAYLOR, 2006). Ataxia, deficiências auditivas e visuais, cegueira, andar em círculos, convulsões, aumento de volume do crânio, paresia de membros, nistagmo, estrabismo ventro-lateral bilateral e ausência de reflexos são os sinais clínicos mais comumente descritos (FABRE *et al.*, 2016).

O paciente relatado, apesar de ativo e apetite normal, apresentava desenvolvimento tardio, mantendo-se caquético e com dificuldade na locomoção, apresentando quedas com rolamento, andar em círculo e colisões contra obstáculos, além de estrabismo ventro-lateral unilateral discreto, secreção ocular intensa e calota craniana abaulada. Tais características estão intimamente relacionadas à hidrocefalia congênita, reafirmando sua suspeita clínica.

Além de radiografia e ultrassonografia do crânio, solicitou-se tomografia computadorizada para confirmação da suspeita, pois, segundo Belotta *et al.*, (2013), exames de imagens como ultrassom e radiografias são úteis para auxiliar no diagnóstico, mas a tomografia computadorizada (TC) e/ou ressonância magnética (RM) são exames mais precisos. Neste caso, exames auxiliares foram de grande relevância para o direcionamento do diagnóstico, entretanto, a tomografia computadorizada mostrou-se um método rápido e confiável, com alta sensibilidade, avaliando o tamanho ventricular e o cérebro como um todo, diagnosticando, de forma precisa, hidrocefalia congênita no paciente.

O diagnóstico clínico e laboratorial precoce, bem como, medidas imediatas de tratamento podem ajudar a estabilizar o quadro clínico e proporcionar maior qualidade de vida (HIRSCHMANN *et al.*, 2008).

Embora a hidrocefalia comumente leve ao óbito antes do quarto mês de vida, existem relatos de pacientes que tiveram sobrevida maior que a estimada, principalmente, quando o diagnóstico é realizado precocemente e, imediatamente, instituído o tratamento de suporte (FESTUGATTO, 2007). Embora o paciente relatado tenha tido diagnóstico e tratamento instituído de forma tardia, com 4 meses de idade, foram apresentadas medidas para proporcionar maior qualidade de vida.

O tratamento da hidrocefalia sendo adquirida ou congênita, tem por finalidade reduzir a pressão intracraniana (PIC) tratar a origem da hidrocefalia, diminuir a produção de LCR ou aumenta a reabsorção do LCE. A abordagem médica a longo prazo dos animais com hidrocefalia e desenvolvem sinais neurológicos é projetado para limitar a produção de LCR e à redução da pressão intracraniana (TAYLOR, 2006).

O tratamento cirúrgico é indicado caso não haja manifestação de melhora em duas semanas, o procedimento cirúrgico consiste na colocação de um “shunt”, que desvia o LCR para a cavidade peritoneal. Apesar deste tipo de tratamento ser pouco descrito em animais já há relatos de casos bem-sucedidos (KIM *et al.*, 2006; WOO *et al.*, 2009; BAGLEY, 2007).

O prognóstico de quadros de hidrocefalia caracteriza-se normalmente considerado como desfavorável, com muitos casos culminando em óbito. Na hidrocefalia congênita, por exemplo, mesmo que o tratamento seja realizado precocemente, o prognóstico é reservado. (FIGHERA, 2008). O prognóstico é variável e dependente principalmente do grau de comprometimento neurológico (CHRISMAN *et al.*, 2005).

CONCLUSÃO

A hidrocefalia é uma patologia crônica, incurável e rara em felinos, sendo a forma congênita a mais comum. O tratamento de suporte se baseia na utilização de corticosteroides e omeprazol reduzindo a pressão intracraniana pela diminuição do líquido cefalorraquidiano e proporcionando uma melhor qualidade de vida para o animal.

REFERÊNCIAS

- AMUDE, A.M. *et al.* Therapeutic usage of omeprazole and corticoid in a dog with hydrocephalus unresponsive to conventional therapy. **Semina: Ciências Agrárias**, v. 34, n. 2, p. 805-810, 2013.
- BAGLEY, R. S. Syringomyelia: An emerging spinal disease in dogs. **Irish Veterinary Journal**, v. 60, n. 1, p. 35-39, 2007.
- BELOTTA, A. F.; MACHADO, V. M. V. & VULCANO, L. C. Diagnóstico da hidrocefalia em animais pela ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. **Veterinária e Zootecnia**, v. 20, p. 33- 41, 2013.
- CHRISMAN, C. *et al.* **Neurologia para o Clínico de Pequenos Animais**. São Paulo: Roca, 2005.
- CUNNINGHAN, J. G. **Tratado de fisiologia veterinária**. 4ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2008.
- DEWEY, C.W. External hydrocephalus in a dog with suspected bacterial Meningoencephalitis. **Journal of the American animal hospital association**. v. 38, nº 6, p. 563- 567, 2002.
- FABRE, L. *et al.* **O Uso da Tomografia Computadorizada no Diagnóstico de Hidrocefalia em Cães e Gatos**. 2016.
- FESTUGATTO, R. *et al.* Hidrocefalia Secundária a Meningoencefalite Bacteriana em Cão. **Acta Scientiae Veterinariae**, v. 35, supl. 2, p. 599- 600, 2007.

FIGHERA, R.A. **Causas de morte e razões para eutanásia de cães**. Tese de doutorado em Patologia Veterinária. Universidade Federal de Santa Maria. 174p. 2008.

HIRSCHMANN, L. C. *et al.* **A importância do diagnóstico precoce e tratamento no controle da hidrocefalia: relato de caso** [Internet]. In: Anais do 35º Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária; 2008; Gramado. Gramado: CONBRAVET; 2008 [cited 2014 Sept 21]. Available from: <http://www.sovergs.com.br/conbravet2008/anaais/cd/resumos/R0241-2.pdf>

KIM, H. *et al.* Application of ventriculoperitoneal shunt as a treatment for hydrocephalus in a dog with syringomyelia and Chiari I malformation. **Journal of veterinary science**, v. 7, n. 2, p. 203-206, 2006.

NELSON, R. W. & COUTO, G. C. **Medicina interna de pequenos animais**. 4º edição. Rio de Janeiro: Elsevier, p. 1024- 1025, 2010.

PERPÉTUA, P. C. G. *et al.* **Monitoramento clínico de um filhote de cão com hidrocefalia–relato de caso**. IV Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação Científica do Cesumar. 2008.

REKATE, H. L. A contemporary definition and classification of hydrocephalus. In: **Seminars in pediatric neurology**. WB Saunders, p. 9-15, Mar. 2009.

RIVERA, E. A. B; AMARAL, M. H & NASCIMENTO, V. P. **Ética e bioética aplicadas à medicina veterinária**. Goiânia: Editora UFG, p. 267- 98, 2006.

SPINOSA, H. S; GÓRNIK, S. L & BERNARDI, M. M. **Farmacologia aplicada à medicina veterinária**. 5a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

TAYLOR, S. M. **Medicina interna de pequenos animais**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2006.

THOMAS, W. B. Hydrocephalus in dogs and cats. **The Veterinary clinics of North American Small animal practice**, v. 40, n. 1, p. 143-159, 2010.

WOO, J.N. *et al.* Application of ventriculoperitoneal shunt placement through fontanelle in a hydrocephalus dog: a case report. **Veterinarni Medicina**, v. 54, n. 10, p. 498-500, 2009.

CAPÍTULO 3

SEMINOMA METASTÁTICO EM CÃO CRIPTORQUIDA – RELATO DE CASO

METASTATIC SEMINOMA IN A CRYPTORCHID DOG - CASE REPORT

Valfriso Rodrigues Albuquerque Junior

Médico Veterinário, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1105-5635>

Robson dos Anjos Honorato

Docente Medicina Veterinária, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6640-1363>

Geysa Almeida Viana

Docente Medicina Veterinária, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3339-446X>

Aline Martins Venuto

Residente em Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais, Centro universitário UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2333-3281>

Romério Alves Silva

Médico Veterinário, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2712-4495>

Ramuelly Olinda Cavalcante

Mestre em Ciências Veterinárias, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0119-9969>

Andressa Nunes Mouta

Docente Medicina Veterinária, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0319-2696>

Arícia Débora Vasconcelos Fonsêca

Mestre em Ciências Veterinárias, Universidade Estadual do Ceará – UECE, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2240-7058>

Vinícius de Queiroz Albuquerque

Mestre em Ciências Veterinárias, Universidade Estadual do Ceará – UECE, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9675-1500>

Felipe Rocha dos Santos

Docente Medicina Veterinária, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4099-3046>

*Autor correspondente, e-mail: geysaalmeidav@hotmail.com

RESUMO

A longevidade associada a uma maior exposição de cães e gatos a agentes cancerígenos têm aumentado a incidência de neoplasias, que hoje tem sido a principal causa de óbito nessas espécies. O criptorquidismo refere-se à ausência de um ou ambos os testículos na bolsa testicular, sendo uma patologia comum em cães que favorece o aparecimento de neoplasias testiculares. O presente trabalho tem por objetivo relatar um caso de seminoma testicular com metástase para linfonodos e peritônio, em um cão criptorquida da raça poodle, com 11 anos de idade, tendo como queixa principal um aumento de volume em região abdominal há cerca de um ano. Foram solicitados exames complementares como hemograma, bioquímicos, ultrassonografia e radiografia. O paciente foi encaminhado para o setor de clínica cirúrgica para realização de orquiectomia seguida de laparotomia exploratória para avaliação e possível exérese tumoral da massa difusa e testículo ectópico observados na imagem ultrassonográfica. Durante o procedimento cirúrgico foram coletadas amostras do testículo ectópico, linfonodos regionais e massa neoplásica na cavidade abdominal e encaminhadas para exame histopatológico. Macroscopicamente o testículo ectópico apresentava-se aumentado. Ao corte era macio com um nódulo bem circunscrito, brancacento, medindo 1,4 cm de diâmetro, de superfície discretamente elevada, compacta e homogênea. Microscopicamente observou-se obliteração difusa da arquitetura do testículo direito pela presença de células neoplásicas poliédricas altamente pleomórficas, arranjadas em um padrão sólido, citoplasma variando de escasso a moderado, levemente eosinofílico e por vezes vacuolizado. O núcleo era grande, com marcada anisocariose, com cromatina nuclear vesiculosa e até três nucléolos cunspícuos. Foram observadas até seis mitoses atípicas por campo, com focos de necrose e hemorragia em meio às células tumorais, associado a infiltrado inflamatório discreto e multifocal de linfócitos e plasmócitos. Havia na musculatura vários focos de dissecação das fibras musculares por infiltração de células neoplásicas semelhantes às observadas no testículo, assim como no seio subcapsular e na zona cortical do linfonodo. Baseado nessas observações macro e microscópicas foi possível afirmar que a neoplasia se tratava de um seminoma difuso com metástase para peritônio e linfonodo. A orquiectomia é essencial na prevenção principalmente em cães com testículos ectópicos, assim como os exames de imagem são fundamentais para evidenciar as alterações, porém o diagnóstico definitivo se dá através da avaliação histopatológica. Diante disso, esse relato demonstrou a importância em evidenciar um caso de seminoma em um cão com fatores ditos predisponentes, contribuindo com mais informações para o estudo dessas neoplasias testiculares em pequenos animais.

Palavras-chave: Histologia; Neoplasia; Testicular.

ABSTRACT

Longevity associated with increased dog and cat exposure to carcinogens has increased the incidence of cancer, which today has been the leading cause of death in these species. Cryptorchidism refers to the absence of one or both testicles in the testicular pouch, being a common pathology in dogs that favors the appearance of testicular neoplasms. The aim of the present study is to report a case of testicular seminoma with metastasis to lymph nodes and peritoneum in an 11-year-old poodle cryptorchid dog, whose main complaint was an increase in abdominal volume for about a year. Complementary exams were requested such as blood count, biochemistry, ultrasound and radiography. The patient was referred to the surgical clinic for orchiectomy followed by exploratory laparotomy for evaluation and possible tumor excision of the diffuse mass and ectopic testis observed on ultrasound imaging. During the surgical procedure, samples of the ectopic testis, regional lymph nodes and neoplastic mass in the

abdominal cavity were collected and sent for histopathological examination. Macroscopically the ectopic testis was enlarged. The cut was soft with a well-circumscribed, whitish nodule measuring 1.4 cm in diameter, discreetly large, compact and homogeneous in surface. Microscopically diffuse obliteration of the right testicular architecture was observed by the presence of highly pleomorphic polyhedral neoplastic cells arranged in a solid pattern, cytoplasm ranging from scarce to moderate, slightly eosinophilic and sometimes vacuolated. The nucleus was large, marked with anisocariosis, with vesicular nuclear chromatin and up to three conspicuous nucleoli. Up to six atypical mitoses per field were observed, with foci of necrosis and hemorrhage among tumor cells, associated with discrete and multifocal inflammatory infiltrate of lymphocytes and plasma cells. There were several foci of muscle fiber dissection by infiltration of neoplastic cells similar to those observed in the testis, as well as in the subcapsular sinus and cortical zone of the lymph node. Based on these macro and microscopic observations, it was possible to state that the neoplasm was a diffuse seminoma with metastasis to peritoneum and lymph node. The orchiectomy is essential in the prevention especially in dogs with ectopic testicles, as the imaging exams are fundamental to show the alterations, but the definitive diagnosis is made through the histopathological evaluation. Thus, this report demonstrated the importance of highlighting a case of seminoma in a dog with predisposing factors, contributing more information to the study of these testicular neoplasms in small animals.

Keywords: Histology; Neoplasia; Testiculate

INTRODUÇÃO

Em decorrência do avanço tecnológico na medicina veterinária, que tem evoluído muito com a precisão diagnóstica e terapêutica, a expectativa de vida dos animais de companhia tem aumentado consideravelmente, concomitante ao crescente aumento populacional que vem ocorrendo. Essa longevidade associada a uma maior exposição desses animais a agentes cancerígenos tem aumentado a incidência de neoplasias em cães e gatos, que hoje tem sido a principal causa de óbito nessas espécies (LOPES, 2011; BARROS *et al.*, 2017).

O criptorquidismo é uma falha durante a migração dos testículos em direção ao escroto, sendo uma alteração congênita de caráter hereditário, podendo ser uni ou bilateral, ocorrendo com maior frequência no testículo direito (Tannouz *et al.*, 2019). As raças mais acometidas são Chihuahua, Poodle, Husky Siberiano, Yorkshire e Pastor-de-shetland. O testículo ectópico pode se encontrar em região abdominal, no anel inguinal ou no subcutâneo em região inguinal. A probabilidade de um testículo ectópico desenvolver uma neoplasia é de 13,6 vezes maior quando comparado com testículos escrotais (DALECK *et al.*, 2016; SCHIABEL, 2018).

As neoplasias testiculares são comuns em cães e representam 90% das neoplasias do sistema reprodutivo nestes animais. A etiologia para o surgimento dessas neoplasias ainda não

está bem definida, mas já é sabido que existem alguns fatores predisponentes como idade, acometendo principalmente animais de 8 a 10 anos, raça e exposição à carcinogêneos ambientais (MARTÍ *et al.*, 2010). Os tipos neoplásicos mais comuns são os sertoliomas, seminomas e tumores das células de Leydig, porém tumores múltiplos ou mistos também podem ocorrer. Geralmente são benignos e apresentam um prognóstico favorável, sendo recomendada a orquiectomia como indicação terapêutica (LOPES, 2011).

O seminoma é elencado como o segundo tipo de tumor testicular mais comum em cães, ocorrendo principalmente em testículos ectópicos e em cães mais velhos. Geralmente sua descoberta é um achado incidental durante a orquiectomia ou necropsia, onde metástases podem aparecer em menos de 10% dos casos (DALECK *et al.*, 2016). Diante disso, o objetivo deste relato é evidenciar um caso de seminoma com metástase em linfonodo e peritônio, em um cão da raça poodle, com 11 anos de idade, que apresentava o testículo direito ectópico.

RELATO DE CASO

Histórico Clínico

Foi encaminhado ao setor de Clínica Médica do Hospital Veterinário do Centro Universitário INTA-UNINTA um cão domiciliado, da raça poodle, com 11 anos de idade, pesando 8kg com suspeita de hemoparasitose, no qual vinha sendo tratado com doxiciclina (7,5 mg/kg), complexo vitamínico (0,2 mL/kg), ranitidina (2 mg/kg) e dexametasona (0,5mg/kg) por 4 dias.

Foi relatado pelo tutor que o paciente apresentava um aumento progressivo de volume em região inguinal há cerca de 1 ano, e que além desse, apresentava outros sinais evidentes e mais recentes como constipação, anorexia e apatia, há cerca de 1 semana.

Exame Físico

Ao exame físico foi observado que o animal apresentava mucosas ocular e oral normocoradas, desidratação 8%, linfonodos submandibulares e poplíteos aumentados, frequência cardíaca (FC) de 102 batimentos por minuto, frequência respiratória (FR) de 47

movimentos respiratórios por minuto, temperatura de 38,2°C, tempo de preenchimento capilar (TPC) 2 segundos e auscultação cardíaca normofonética.

Na inspeção da região escrotal, detectou-se a ausência do testículo direito no saco escrotal e aumento de volume em região inguinal (Figura 1), suspeitando-se de um testículo ectópico. Na região inguinal observou-se o aumento de volume e o animal apresentava desconforto à palpação abdominal.

Figura 1. Paciente canino, raça poodle, 10 anos. (A) Aumento de volume em região inguinal (seta preta). (B) Aumento de volume em região inguinal em decorrência de um testículo ectópico (seta amarela). Testículo esquerdo em região escrotal (seta vermelha). **Fonte:** Acervo HOVET-UNINTA.

Exames Complementares

Foram solicitados exames complementares como hemograma completo (HC) e análises bioquímicas como alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (FA), proteína total (PT), ureia (Ur) e creatinina (Cr). Diante da suspeita de um testículo ectópico foi proposto a realização de uma Ultrassonografia Abdominal, onde o mesmo foi confirmado nas imagens (Figura 2).

Além do testículo ectópico também foi observado à presença de uma massa na cavidade abdominal (Figura 3), e diante da possibilidade de uma neoplasia foi sugerido uma radiografia

de tórax para avaliar a possibilidade de metástase em pulmão, o que agravaria o quadro anestésico durante a indicação de um possível procedimento cirúrgico.

Tratamento

Após realização dos exames de imagem o paciente foi encaminhado para o setor de clínica cirúrgica para realização de orquiectomia seguida de laparotomia exploratória para avaliação e possível exérese tumoral da massa observada na ultrassonografia.

Como protocolo anestésico, foi utilizado na medicação pré-anestésica (MPA), cetamina (5 mg/kg) e midazolam (0,3 mg/kg), a indução foi realizada com propofol (5 mg/kg) e manutenção com isoflurano. Foi realizada a orquiectomia do testículo escrotal, seguido por orquiectomia do testículo ectópico, que se encontrava em meio ao tecido subcutâneo de região inguinal, em seguida deu-se início a laparotomia exploratória.

Durante a laparotomia exploratória foi observada a presença de neoformação encapsulada com presença de conteúdo caseoso aderida ao omento, intestino grosso (colón descendente), rim esquerdo, ureteres e veia cava caudal, e devido a esses achados considerou-se o prognóstico do paciente desfavorável.

Devido à grande aderência e a alta vascularização da neoformação, associados ao elevado risco de contaminação cavitária e às condições clínicas do paciente, ao fim da cirurgia o animal teve uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito.

Durante a realização do procedimento cirúrgico foram coletadas amostras de testículo ectópico, linfonodos regionais e massa neoplásica na cavidade abdominal. As amostras foram fixadas em formol a 10% e encaminhadas para exame histopatológico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Podem ser acometidos por tumores testiculares em geral cães de diferentes idades, podendo variar de 2 a 19 anos, sendo a idade média de 9 a 12 anos. Alguns autores chegam a descrever a média de idade em números mais específicos como o relatado por Hohšteter *et al.* (2014), que estabeleceram uma média de 10,8 anos, corroborando a idade do paciente em questão, visto que o mesmo tinha 11 anos de idade ao momento do diagnóstico (MARTÍ *et al.*, 2010).

Na literatura algumas raças são consideradas predispostas às neoplasias testiculares como Boxer, Poodle, dentre outras, sendo compatível com a do paciente em questão. Segundo Silva (2014), a raça Poodle foi descrita como sendo a segunda raça mais frequente para esses tipos de neoplasias (14% dos casos), ficando atrás apenas de cães sem padrão racial definido (20% dos casos).

Alguns sinais clínicos apresentados pelo paciente do relato diferem dos dados descritos na literatura. Dugat *et al.*, (2015) descreveram febre intermitente como uma das alterações observadas, no entanto o paciente deste relato não apresentou hipertermia. Outras alterações encontradas corroboraram com o que foi encontrado pelo mesmo autor como incômodo e dor à palpação abdominal, aumento de volume abdominal e, inclusive com massa palpável em região caudal do abdome.

O paciente apresentava testículo direito ectópico, segundo Melo (2018) a ocorrência de criptorquidismo no testículo direito é mais comum quando comparado ao esquerdo. Essa é uma condição que de acordo com alguns autores está fortemente associada ao desenvolvimento de neoplasias testiculares em geral, incluindo o seminoma.

Alguns estudos demonstraram até 14 vezes mais chances de um criptorquida apresentar um tumor testicular em relação a um cão normal (DALECK *et al.*, 2016). O estudo de Liao *et al.* (2009), demonstrou que o seminoma é o tumor testicular mais comum em cães com testículo ectópico, já no estudo de Silva (2014) o tumor testicular mais encontrado nesse tipo de paciente foi o sertolioma. O tumor testicular encontrado no paciente relatado foi seminoma.

Nos exames complementares realizados não foram observadas alterações dignas de nota em hemograma, diferentemente de alterações onde se observa pancitopenia que foram descritas por Martí *et al.*, (2010). Porém, alterações discretas como anemia, linfopenia e trombocitopenia ocorreram (Tabela 1), onde segundo Peres (2012); Oliveira *et al.* (2012) manifestações semelhantes foram relatadas em pacientes com síndromes paraneoplásicas, em decorrência da produção e liberação de moléculas tumorais na corrente sanguínea.

Nas análises bioquímicas foi observado um aumento significativo no valor da fosfatase alcalina (Tabela 2), o que poderia ser justificado pelas alterações hepáticas evidenciadas durante as imagens ultrassonográficas, que demonstraram um fígado aumentado de tamanho, lobulações hepáticas com margens abauladas e superfície irregular, parênquima hepático hiperecogênico e textura heterogênea, apresentava também vascularização aumentada. Essa alteração hepática poderia ser explicada por um possível quadro de hemoparasitose que o animal apresentava (MEDEIROS 2009; COLOMBO-BREDA, 2018), concomitantemente ao criptorquidismo e a suposta neoplasia.

Tabela 1. Resultado Hemograma.

Hemograma	Resultado	Referência
Proteínas plasmáticas	7,6	5,0 – 8,0
Volume Globular (%)	28	37 – 52
Hemácias (x 10 ⁶ céls/μl)	4,0	5,6 – 7,7
Hemoglobina (g/dl)	9,3	13 – 18
Leucócitos (céls/ μl)	9.660	6.000 – 17.000
Neutrófilos	8.500	3.000 – 11.500
Eosinófilos	193	100 – 1.250
Linfócitos	676	1.000 – 4.800
Monócitos	289	150 – 1.350
Plaquetas (x 10 ³ /μl)	144	200 – 500

Fonte: Laboratório de Patologia Clínica HOVET-UNINTA (2019).

Tabela 2. Resultados Bioquímicos.

Bioquímicos	Resultado	Referência
Creatinina	0,6 mg/dL	0,5 – 1,5 mg/Dl
Ureia	23 mg/dL	15 – 40 mg/Dl
Albumina	2,6 g/dL	2,6 – 3,3 d/Dl
ALT	62 U/L	10 – 88 U/L
Fosfatase Alcalina	413 U/L	10 – 92 U/L

Fonte: Laboratório de Patologia Clínica HOVET-UNINTA (2019).

O exame ultrassonográfico da cavidade abdominal em pacientes oncológicos deve ser minucioso, com o objetivo de descartar possíveis diagnósticos diferenciais e/ou localizar possíveis metástases (MAGNE, 2000; PENNINCK *et al.*, 2003). Durante a realização do exame foi observado a presença de uma massa com parede irregular e textura heterogênea, ocupando o lado direito e esquerdo do abdômen caudal. A massa apresentava vascularização e parecia estar pressionando a vesícula urinária. O exame ultrassonográfico da estrutura comprimindo

alguns órgãos viscerais na região caudal do abdômen pode justificar a dor abdominal e a constipação.

Figura 2. Massa (seta amarela) ocupando tanto os lados direito e esquerdo do abdômen, com dimensões (4.47cm/5.92cm), amorfa, com parede irregular e textura heterogênea. **Fonte:** Acervo HOVET-UNINTA.

Assis (2015) descreveu como características ultrassonográficas de neoplasias testiculares estruturas apresentando padrão heterogêneo, aumento de tamanho testicular, e áreas hipoeoicas condizendo com o achado ultrassonográfico do paciente discutido neste caso. O exame ultrassonográfico pode ser usado como ferramenta complementar de diagnóstico e direcionamento clínico, mas apresenta como limitação a incapacidade de oferecer um diagnóstico preciso (MARTÍ *et al.*, 2010).

Figura 3. Testículo ectópico (seta verde), assimétrico, com contorno irregular, parênquima heterogêneo, ecogenicidade alterada, dimensões aumentadas e linha mediastinal não preservada. **Fonte:** Acervo HOVET-UNINTA.

Foram realizadas três projeções radiográficas: latero-lateral direita e esquerda e ventro-dorsal para avaliação de possíveis metástases. Este exame é o mais indicado para essa busca inicial, podendo a busca ser complementada com o uso de tomografia computadorizada, que apresenta grande sensibilidade por diferenciar pequenas atenuações dos raios-x e ser isenta de sobreposição (PINTO *et al.*, 2006). Nesse caso, não foram observadas metástases evidentes em região de tórax do animal após radiografia (Figura 4).

Figura 4. Radiografia em projeção latero-lateral direita, sem a presença de metástases evidentes. **Fonte:** Acervo HOVET-UNINTA.

Macroscopicamente o testículo ectópico apresentava-se aumentado de volume, medindo 3,5x2,1x1,5cm (Figura 5). Na superfície de corte tinha consistência macia com um nódulo bem circunscrito, brancacento, medindo 1,4cm de diâmetro, discretamente elevado, compacto e homogêneo (Figura 6). Os mesmos achados foram descritos por Daleck *et al.*, (2016).

Figura 5. Aspecto macroscópico do testículo: nota-se marcada redução do volume do esquerdo em comparação com o testículo direito ectópico, nesse é observado também que a superfície é irregular e com presença de nódulos. **Fonte:** Acervo HOVET-UNINTA.

Figura 6: Aspecto macroscópico de testículo ectópico com seminoma. Observa-se nódulo bem circunscrito, brancacento, de superfície discretamente elevada, compacta e homogênea. **Fonte:** Acervo HOVET-UNINTA.

Figura 7. Observa-se uma massa amorfa com conteúdo caseoso infiltrativo na musculatura da cavidade abdominal, removida durante procedimento cirúrgico. **Fonte:** Acervo HOVET-UNINTA.

Microscopicamente, observou-se obliteração difusa da arquitetura do testículo direito pela presença de células neoplásicas poliédricas altamente pleomórficas, arranjadas em um padrão sólido (Figura 8A). Essas células tinham citoplasma variando de escasso a moderado, levemente eosinofílico, por vezes vacuolizado. O núcleo era grande, com marcada anisocariose, com cromatina nuclear vesiculosa e até três nucléolos cunspícuos (Figura 8B).

Em maior aumento (40x) observaram-se uma média de até seis mitoses atípicas por campo. O estroma tumoral era fibrovascular, delicado e escasso. Havia focos de necrose e hemorragia em meio às células tumorais, associado a infiltrado inflamatório discreto e multifocal de linfócitos e plasmócitos. Adicionalmente foram observadas áreas de invasão da túnica albugínea e presença de êmbolos tumorais em vasos linfáticos testiculares. Achados microscópicos semelhantes foram relatados por LOPES (2011) e SILVA (2014) em seminomas testiculares.

Havia na musculatura vários focos de dissecação das fibras musculares por infiltração de células neoplásicas semelhantes às observadas no testículo (Figura 9). Assim, como no seio subcapsular e na zona cortical do linfonodo. Baseado nessas observações macro e microscópicas foi possível afirmar que a neoplasia se tratava de um seminoma difuso com metástase para peritônio e linfonodo.

Figura 8. Aspecto microscópico de um seminoma difuso em cão. (A) Observa-se obliteração difusa da arquitetura do testículo direito pela presença de células neoplásicas poliédricas altamente pleomórficas, arranjadas em um padrão sólido. Obj. 10x, H.E; (B) Observam-se células com citoplasma variando de escasso a moderado, levemente eosinofílico, por vezes vacuolizado. O núcleo era grande, com marcada anisocariose, com cromatina nuclear vesiculosa e nucléolos cunspícuos. Obj. 40x, H.E. **Fonte:** Acervo HOVET-UNINTA.

Figura 9. Aspecto microscópico de um seminoma difuso em cão. Nota-se infiltração de células tumorais no tecido muscular, além de foco de hemorragia em meio ao tecido adiposo adjacente. Obj. 5x, H.E. **Fonte:** Acervo HOVET-UNINTA.

CONCLUSÃO

O criptorquidismo é um fator predisponente para o aparecimento de neoplasias testiculares em cães, aumentando em 14% a probabilidade de desenvolvimento neoplásico, sendo comum em cães velhos. Geralmente apresentam caráter benigno com prognóstico favorável em que apenas 5 a 10% dos casos apresentam metástases e, estas quando presentes levam a um quadro desfavorável em decorrência de sua agressividade.

Estudos ainda são necessários para elucidar a etiologia das neoplasias testiculares, mas é fato que a orquiectomia é essencial na prevenção principalmente em cães com testículos ectópicos. Além disso, os exames de imagem são fundamentais para evidenciar as alterações, porém o diagnóstico definitivo se dá através da avaliação histopatológica.

Diante disso, esse relato demonstrou a importância em evidenciar um caso de seminoma com metástase em linfonodo e peritônio, em um cão com fatores ditos predisponentes, contribuindo com mais informações para o estudo dessas neoplasias testiculares.

REFERÊNCIAS

- ASSIS, A. R.; GARCIA, D. A. A. & FELICIANO, M. A. R. Sistema reprodutivo masculino. In: FELICIANO, M. A. R.; CANOLA, J. C.; VICENTE, W. R. R.; **Diagnóstico por imagem em cães e gatos**, 1ª Edição. São Paulo: MedVet Ltda, cap. 11, p. 390-397. 2015.
- BARROS, J.C.; ALEXANDRE, N.A.; CARVALHO, L.L.; COSTA, M.L.; NASCIMENTO, M.L.; STUPACK, E.C.; MARIANI, O.M.; JÚNIOR, D.P.; CALAZANS, S.G.; DIAS, F.G.G. **Perfil de cães geriátricos acometidos por neoplasias: estudo retrospectivo de 75 casos**. Anais do I Simpósio de Onco-Geriatria em pequenos animais, v. 16, n. 5, 2017.
- COLOMBO BREDÁ, J. *et al.* Hemoparasitoses em cães: análise de dados laboratoriais. **Revista Acadêmica: Ciência Animal**, [S.l.], v. 16, p. 1 - 8, 2018.
- DALECK, C. R.; SOUZA, F. F.; MARTINS, M. I. M.; NARDI, A. B.; Neoplasias do sistema reprodutivo masculino. In: DALECK, C. R.; DE NARDI, A. B.; RODASKI, S. **Oncologia em cães e gatos**, 2ª Edição. São Paulo: Roca, cap. 44, p. 813-835. 2016.
- DUGAT, D. R. *et al.* An Unusual Case of Metastatic Seminoma in a Dog. **Journal of the American Animal Hospital Association**, v. 51, n. 6, p. 401–406, 2015.
- HOHŠTETER, M. *et al.* Canine testicular tumors: two types of seminomas can be differentiated by immunohistochemistry. **BMC veterinary research**, v. 10, n.1, p.169, 2014.
- LIAO, A.T. *et al.* 12-Year retrospective study of canine testicular tumors. **Journal of Veterinary Medical Science**, v. 71, n.7, p. 919–923, 2009.
- LOPES, S. R. A. **Neoplasias testiculares em canídeos observadas no hospital veterinário Doutor Marques de Almeida**. Lisboa. 78 p. 2011.
- MAGNE, L. M. Gastrointestinal neoplasia. In: KIRK, R. W.; BONAGURA, J. D. **Kirk current veterinary XIII small animal practice**. 13 ed. Philadelphia: W. B. Saunders, p. 675- 676. 2000.
- MARTÍ, S. *et al.* Tumores testiculares caninos: a propósito de dos casos clínicos. **Clínica Veterinária de Pequenos Animais**, v. 30 n.3 p. 191-198, 2010.
- MEDEIROS, F. P. **Variação da ecogenicidade difusa em parênquima hepático homogêneo relacionada aos achados bioquímicos e hematológicos em cães**. 2009. XIV, 54 f. Originalmente apresentado como dissertação de mestrado-Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, 2009.
- MELO, F. O. **Estudo retrospectivo da casuística de criptorquidismo em cães e equinos no hospital veterinário no período de 2015 a 2018**. Areia. 31 p. 2018. Disponível em: <<https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/12461>>. Acesso em: 06 abr. 2019.
- OLIVEIRA, K. M.; HORTA, R. S.; SILVA, C. M. O.; LAVOR, M. S. L.; **Principais síndromes paraneoplásicas em cães e gatos**. Belo Horizonte. 16 p. 2012. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Rodrigo_Horta/publication/260192039_Principais_sindromes_paraneoplasicas_em_caes_e_gatos_Main_paraneoplastic_syndromes_in_dogs_and_cats/links/0f3175301217e1c071000000/Principais-sindromes-paraneoplasicas-em-caes-e-gatos-Main-paraneoplastic-syndromes-in-dogs-and-cats.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2019.
- PENNINCK, D. G. *et al.* Diagnostic value of ultrasonography in differentiating enteritis from intestinal neoplasia in dogs. **Veterinary Radiology & Ultrasound**, Raleigh, v. 44, n. 5, p. 570-575, 2003.
- PERES, C. M. **Síndromes paraneoplásicas em cães – Revisão de literatura**. Santa Maria, UFSM. p 1-53. 2012. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/13362/TCCE_RM_V_2012_PERES_CHAIANE.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 16 abr. 2019.

PINTO, A. C. B. C. F. et al. **Brazilian Journal of veterinary Research and animal Science**, São Paulo, v. 43, n. 1, p. 95-102, 2006.

SCHIABEL, M. D. **Avaliação das principais lesões testiculares de cães sem raça definida na região de Uberlândia-MG**. Minas Gerais: Universidade Federal de Uberlândia. 2018, p 1-47. Disponível em: <<https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/23354>>. Acesso em: 16 abr. 2019.

SILVA, J. M. **Expressão imuno-histoquímica de KI-67, COX 2, MMP-9 e P53 nos tumores testiculares caninos**. Araçatuba. 55 p. 2014. Disponível em: <<https://repositorio.unesp.br/handle/11449/128145>>. Acesso em: 02 mai. 2019.

TANNOUZ, V. G. S. *et al.*, **Is the right testis more affected by cryptorchidism than the left testis? An ultrasonographic approach in dogs of diferente sizes and breeds**. Rio de Janeiro. 17 p. 2019. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30835343>>. Acesso em: 02 mai. 2019.

CAPÍTULO 4

TUMOR VENÉREO TRANSMISSÍVEL CERVICAL E ORAL EM CÃO: RELATO DE CASO

CERVICAL AND ORAL TRANSMISSIBLE VENEREAL TUMOR IN A DOG: CASE REPORT

Samilly de Castro Azevedo

Médica Veterinária, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0890-2522>

Geysa Almeida Viana

Docente Medicina Veterinária, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3339-446X>

Robson dos Anjos Honorato

Docente Medicina Veterinária, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6640-1363>

Felipe Rocha dos Santos

Docente Medicina Veterinária, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4099-3046>

Vinícius de Queiroz Albuquerque

Mestre em Ciências Veterinárias, Universidade Estadual do Ceará – UECE, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9675-1500>

Aline Martins Venuto

Residente em Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2333-3281>

Romério Alves Silva

Médico Veterinário, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2712-4495>

Andressa Nunes Mouta

Docente Medicina Veterinária, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0319-2696>

Arícia Débora Vasconcelos Fonsêca

Mestre em Ciências Veterinárias, Universidade Estadual do Ceará – UECE, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2240-7058>

Valcleides Nascimento do Oriente

Mestrando em Biotecnologia, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7489-011X>

*Autor correspondente, e-mail: geysaalmeidav@hotmail.com

RESUMO

O tumor venéreo transmissível se caracteriza como uma neoplasia de células redondas, com aparecimentos majoritários em regiões genitais externas de cães fêmeas e machos. A principal transmissão ocorre em sua maioria por meio do coito, no qual ocorre a locação de células tumorais, ou em outros casos por meio de arranhaduras e lambeduras. Com isso, a população mais acometida é a de cães jovens sexualmente ativos e andarilhos, pois encontram-se nas ruas e são fator de risco para transmissão. A região acometida é principalmente a genital, sendo os casos extragenitais menos incidentes. A partir disso esse relato objetiva descrever o plano terapêutico de um cão, errante, SRD, com um ano e dois meses, diagnosticado com tumor venéreo transmissível em região cervical ventral. O cão foi atendido no Hospital Veterinário do Centro Universitário INTA (HOVET-UNINTA) com queixa inicial traumatológica relacionada a atropelamento por carro, no qual, durante seu internamento foi possível identificar nódulo da região cervical ventral direita e em região da gengiva do canino direito. A partir da inspeção na região peniana foi observado normalidade e nenhum sinal de massa. A citologia apresentou presença de células neoplásicas arredondadas, cromatina frouxa vacúolos citoplasmáticos, discreta presença de linfócitos e neutrófilos. Diante disso optou-se por um plano terapêutico envolvendo o processo cirúrgico de retirada da massa da região cervical associados a quatro sessões de quimioterapia utilizando vincristina na dose de 0,025 mg/kg. Com o tratamento observou-se regressão gradual das massas encontradas até a última sessão de quimioterapia ao qual o cão compareceu. A cirurgia para retirada do nódulo cervical ocorreu de forma programada sem complicações. Após cirurgia, o paciente não apresentou nenhum sinal de piora do quadro. Dessa forma, a massa tumoral foi removida em ampla margem, a partir de uma incisão de pele localizada em região ventral do pescoço. Com divulsão cortante de pele subcutânea e músculo externo cefálico com fechamento de três planos de sutura (muscular, cutâneo e subcutâneo). Como forma de prevenir a ocorrência de novas infecções de tumor venéreo transmissível o cão foi castrado, para assim diminuir os fatores de risco. Nesse contexto o cuidado prestado ao paciente pelo médico veterinário ao tumor venéreo transmissível possibilita maiores subsídios para uma prática assistencial da profissão baseadas em evidências científicas e que comprovem sua usabilidade na prática, oferecendo um maior direcionamento no papel assumido pelo médico veterinário durante sua assistência.

Palavras-Chave: Tumor Venéreo Transmissível; Cão; Neoplasia.

ABSTRACT

The transmissible venereal tumor is characterized as a neoplasm of round cells, with major appearances in external genital regions of female and male dogs. The main transmission occurs mostly through coitus, in which the tumor cells are located, or in other cases through scratches and licks. As a result, the most affected population is sexually active young dogs and walkers, as they are found on the streets and are a risk factor for transmission. The affected region is mainly the genital, with extragenital cases being less incident. Based on that, this report aims to describe the therapeutic plan of a dog, wandering, SRD, one year and two months diagnosed with Transmissible Venereal Tumor in the ventral cervical region. The dog was seen at the Veterinary Hospital of the INTA University Center (HOVET-UNINTA) with an initial traumatic complaint related to being run over by a car, in which, during his stay, it was possible to identify a nodule in the right ventral cervical region and in the canine gum region. From inspection on the penile region, normality and no sign of mass were observed. Cytology showed presence of rounded neoplastic cells, loose chromatin, cytoplasmic vacuoles, slight presence of

lymphocytes and neutrophils. Therefore, we opted for a therapeutic plan involving the surgical process of removing the mass from the cervical region associated with four chemotherapy sessions using vincristine at a dose of 0.025 mg / kg. With the treatment, there was a gradual regression of the masses found until the last chemotherapy session to which the dog attended. Surgery to remove the cervical nodule was programmed without complications. After surgery, the patient showed no sign of worsening. Thus, the tumor mass was removed in a wide margin, from a skin incision located in the ventral region of the neck. With sharp divulsion of subcutaneous skin and cephalic external muscle with closure of three suture planes (muscular, cutaneous and subcutaneous). As a way of preventing the occurrence of new infections of a transmissible venereal tumor, the dog was neutered, in order to reduce the risk factors. In this context, the care provided to the patient by the veterinarian to the transmissible venereal tumor allows greater subsidies for a care practice of the profession based on scientific evidence and that prove its usability in practice, offering a greater direction in the role assumed by the veterinarian during his care.

Keywords: Transmissible Venereal Tumor; Dog; Neoplasm.

INTRODUÇÃO

A ocorrência do tumor venéreo transmissível (TVT) na população de cães, principalmente naqueles em situação de rua (SCARABELLO *et al.*, 2019), tem sua transmissão dada normalmente pela prática do coito, mordeduras e lambeduras entre esses animais (ROJAS-ZERPA, 2014; VALENÇOLA *et al.*, 2015).

A área mais acometida e prevalente do tumor é a região genital, onde está largamente apresentada na literatura como o local de maior acometimento (RAMOS *et al.*, 2019). Contudo, é válido destacar que o TVT pode ocorrer em diferentes áreas do corpo, como: região ocular, cervical, cavidade nasal, cervical, dentre outros (CAMOLESE *et al.*, 2017; ARAÚJO, 2019; RAMOS, *et al.*, 2019), sendo dessa forma um tumor que se confunde com outros tipos de neoplasia, devido sua baixa incidência em locais extragenitais.

Em decorrência das células terem um alcance de implantação em diferentes locais do corpo, o tumor ocorre em outras áreas através da lambedura e arranhadura. Logo, um animal com TVT em região genital é capaz de desenvolver o tumor na região bucal a partir da lambedura da genitália (KUMAR *et al.*, 2018).

Os nódulos possuem características anatômicas e fisiológicas, no qual apresentam tamanhos variados, de coloração cinza pálida a vermelho escuro, formato nodular e consistência mole. São pouco circunscritos, não encapsulados, com característica de aderência a órgãos e visualizados principalmente em locais com áreas hemorrágicas e necróticas (FILGUEIRA *et al.*, 2010).

O tratamento do TVT pode variar de acordo com conduta terapêutica do profissional veterinário, bem como localização do tumor, porém a quimioterapia e o procedimento cirúrgico são comumente relatados na literatura como conduta padrão, variando em medicamentos utilizados, posologia, número de sessões, dentre outros fatores (CAMOLESE *et al.*, 2017; SOUSA *et al.*, 2018).

Dentre os possíveis tratamentos, a utilização de sulfato de vincristina é amplamente debatida entre autores como tratamento mais adequado ao TVT, por sua efetividade na remoção completa de células cancerígenas em sessões que variam de acordo com características específicas do animal (KUMAR *et al.*, 2018).

Esse relato descreve a ocorrência do TVT em uma área incomum que difere da genitália, considerada a mais comumente acometida, portanto, sendo de importante diagnóstico, bem como sobre a abordagem terapêutica e sistematização dos cuidados.

RELATO DE CASO

História Clínica

O primeiro atendimento do animal ocorreu no dia 28/01/2020 no Hospital Veterinário De Pequenos Animais UNINTA (HOVET – UNINTA). O cão, macho, Sem Raça Definida (SRD), não castrado, pelagem clara, peso 11,8 Kg, idade aproximada de um ano e seis meses, foi vítima de atropelamento por automóvel. Procedeu-se com a conduta de internação justificada como traumatologia.

Devido ser animal de rua não foi possível obter uma anamnese detalhada, ou história pregressa de saúde do animal.

Exame Físico

O paciente apresentava bom estado geral de saúde, clinicamente estável, mucosas rosadas, linfonodos normais, normohidratado, com tempo de perfusão capilar (TPC) de 2 segundos, nível de consciência alerta, escore corporal normal, comportamento dócil e sem presença de ectoparasitas visíveis.

Quanto à frequência cardíaca (FC), durante o exame físico, foi de 107 batimentos por minuto, com auscultação cardíaca normofonética e frequência respiratória (FR) de 72 movimentos por minuto, temperatura retal de 37,4°C.

No exame do membro posterior, na palpação foi observada dor, com prejuízo acentuado da marcha, possuindo dificuldade de locomoção. Foi observado um nódulo próximo ao

linfonodo da região cervical ventral direita (Figura 1) e na região gengival de canino direito (Figura 2) sem queixas de dor ao toque. A inspeção peniana não evidenciou lesões penianas e prepuciais (Figura 3).

O animal aceitou bem a dieta oral oferecida e não possuía anormalidades relacionado à diurese e evacuações.

Figura 1. Nódulo da Região Cervical Ventral Direita, Sobral - CE, 2020.

Figura 2. Nódulo em região de canino. Sobral - CE, 2020.

Figura 3. Exposição da Região Peniana demonstrando ausência de lesões ou nódulos, Sobral, 2020.

Exames Complementares

Durante a internação foram realizados periodicamente hemogramas a fim de analisar sua condição clínica. Para fins desse relato foram demonstrados o hemograma anterior à realização do procedimento cirúrgico de retirada da massa tumoral da região cervical superficial direita (tabela 1) e o último realizado antes de sua alta hospitalar (tabela 2).

Tabela 1. Resultado do Hemograma realizado no dia 12/02/2020. Sobral - CE, 2020.

HEMOGRAMA DIA 12/02/2020		
Avaliação do Plasma	Resultado	Referência
Aspecto Físico	Normal	Límpido e Incolor
Proteínas Plasmáticas (g/dL)	7,4	5,0 – 8,0
Eritograma	Resultado	Referência
Hemácias (X 10 ⁶ céls/μl)	4,3	5,6 – 7,7
Volume Globular (%)	30	37 – 52
Hemoglobina 9g/dL)	10	13 -18
VCM (fL)	69,8	61 – 77
CHCM (%)	33,3	30 – 36
LEUCOGRAMA		

Leucócitos (cél/s/ µl)	9.922	6.000 – 17.000
Neutrófilos		
Mielócitos	0	0
Metamielócitos	0	0
Bastonetes	0	0 – 300
Segmentados	77	3.000 – 11.500
Eosinófilos	3	100 – 1.250
Basófilos	0	Raro
Linfócitos	13	1.000 – 4.800
Monócitos	7	150 – 1.350
AVALIAÇÃO DAS PLAQUETAS		
Plaquetas (x 10³/µl)	154	200 – 500

Fonte: Acervo Hospital veterinário UNINTA, fevereiro, 2020.

Tabela 2 – Resultado do Hemograma realizado dia 05/03/2020. Sobral - CE, 2020.

HEMOGRAMA DIA 06/03/2020		
Avaliação do Plasma	Resultado	Referência
Aspecto Físico	Normal	Límpido e Incolor
Proteínas Plasmáticas (g/dL)	5,8	5,0 – 8,0
Eritograma	Resultado	Referência
Hemácias (X 10⁶ células/µL)	4,2	5,6 – 7,7
Volume Globular (%)	29	37 – 52
Hemoglobina 9g/dL)	9,6	13 -18
VCM (fL)	69	61 – 77
CHCM (%)	33,1	30 – 36
LEUCOGRAMA		
Leucócitos (cél/s/uL)	7.890	6.000 – 17.000
Neutrófilos		
Mielócitos	0	0
Metamielócitos	0	0
Bastonetes	0	0 – 300
Segmentados	6154,2	3.000 – 11.500
Eosinófilos	394,5	100 – 1.250

Basófilos	0	Raro
Linfócitos	789	1.000 – 4.800
Monócitos	552,3	150 – 1.350
AVALIAÇÃO DAS PLAQUETAS		
Plaquetas (X 103/uL)	234	200 – 500

Fonte: Acervo Hospital veterinário UNINTA, fevereiro, 2020.

Foi solicitado no dia 04/02/2020 um exame citológico dos nódulos em região cervical ventral (Figural 5 - A) e de canino (Figural 5 - B), no qual o resultado foi compatível com um tumor venéreo transmissível (TVT) em ambos. No laudo do exame constou: “Acentuada presença de células neoplásicas arredondadas, com cromatina frouxa e vacúolos citoplasmáticos, e discreta presença de linfócitos e neutrófilos”. É válido destacar que ambas as citologias evidenciaram a mesma descrição em relação aos achados.

Figura 5. Citologias: A - Nódulo cervical ventral direito, B- Nódulo Localizado em Canino, ambas evidenciaram acentuada presença de células neoplásicas arredondadas, com cromatina frouxa e vacúolos citoplasmáticos, e discreta presença de linfócitos e neutrófilos (SETA). Sobral, 2020.

A partir do observado foi solicitado e realizado uma ultrassonografia da região afim de identificar se o nódulo se encontrava aderido à musculatura. Não observado a adesão do nódulo, programou-se o procedimento cirúrgico para a retirada do mesmo.

Tratamento

A cirurgia para retirada do nódulo cervical ocorreu de forma programada. Após cirurgia, o paciente não apresentou nenhum sinal de complicação ou agravo relacionado ao tratamento cirúrgico ou medicamentoso.

Dessa forma, a massa tumoral de 1,3 cm foi removida em ampla margem, a partir de uma incisão de pele localizada em região ventrolateral do pescoço. Com divulsão cortante de pele subcutânea e músculo externo cefálico com fechamento de três planos de sutura (muscular, cutâneo e subcutâneo) (Figura 6).

Figura 6. Procedimento cirúrgico, A/B: Incisão de Pele com Ampla Margem: C: Dessecamento do tumor; D: Retirada do Tumor Sobral, 2020.

Após procedimento cirúrgico, o tratamento com cinco sessões de quimioterapia foi iniciado, no qual foi utilizado o quimioterápico vincristina com dose de 0,025 mg.kg, que foi adaptada segundo Rodaski e Nardi (2008) (ANEXO A). A programação planejada consistia na realização de cinco sessões semanais de quimioterapia, com posterior realização de exame citológico para identificar se ainda existia achados de células de TVT.

Contudo é valido destacar que após a quarta sessão houve fechamento do hospital, por conta do decreto estadual referente à situação de pandemia do coronavírus. Consequentemente o tratamento foi interrompido, e logo, não se sabe ao certo se foi possível realizar a completa erradicação do TVT.

Sendo assim, as sessões de quimioterapia ocorreram em quatro sessões agendadas, onde a 1ª sessão foi realizada no dia 21/02/2020, 2ª sessão no dia 28/02/2020, 3ª sessão no dia 06/03/2020, 4ª sessão no dia 13/03/2020.

Todo o tratamento foi financiado por uma agência não governamental que desempenha ação de cuidado e responsabilidade sobre animais de rua e abandonados. Em suma, a referida agência encontrou cuidador apto que realizou a adoção do cão. Sendo entregue ao novo dono a partir da segunda sessão de quimioterapia e alta hospitalar.

DISCUSSÃO

A entrada de pacientes de rua em hospitais veterinários por causas traumatológicas envolvendo violência ou acidentes de trânsito é frequente no Brasil, sendo válido destacar que mesmo o paciente adentrando o serviço por uma causa específica é fundamental uma minuciosa avaliação física para o paciente, afim de identificar achados que necessitem de tratamento (BAJA *et al.*, 2017).

Como exposto o paciente era um cão em situação de rua, fator que corrobora com a literatura científica, no qual observa-se que os casos de TVT são epidemiologicamente mais presentes em cães errantes, devido sua transmissão por ato sexual e ausência de cuidadores diretos que resulta em prática de ato sexual continuamente entre esses animais (ARAUJO, 2011).

Contudo, destaca-se que a área do corpo que geralmente é acometida poder variar entre os casos, mas em sua maioria a área genital é a mais acometida (FERNANDES *et al.*, 2015). Um estudo realizado com 24 cães diagnosticados com TVT em uma clínica veterinária identificou que quase 90% dos animais foram acometidos por TVT na região genital e os demais, tiveram apresentação cutânea (VILAÇA, 2016).

Casos de TVT em locais distintos são descritos na literatura devido sua especificidade, como o caso de um cão, macho, SRD, com presença de TVT em região ocular evoluindo com massa tumoral externa a cavidade do olho direito (GOMES *et al.*, 2017). Dessa forma, o achado do TVT em áreas que diferem da usualmente observada é de grande interesse, pois pode modificar protocolos de atendimento e tratamento.

A ocorrência de TVT em regiões que diferem da genitália podem ocorrer devido lambedura da região genital e posterior lambedura de outra região do corpo, bem como possíveis mordidas de outros animais decorrentes de brigas (MARQUES; GUESSER;

AMUDE, 2019). Isso pode justificar o TVT no paciente desse relato, no qual, em seu pênis não se obteve achados, porém na região da arcada dentária e pescoço apresentou-se TVT.

Estudo aponta pra importância de estudo de casos de TVT que diferem do usualmente visto, pois se faz importante o reconhecimento da patologia o quanto antes (GOMES *et al.*, 2017).

Outro caso com localização de TVT atípico foi evidenciado na literatura por um paciente canino inteiro, masculino, de 8 anos que estava internado em uma clínica veterinária em Santiago, onde o mesmo apresentou uma massa na terceira pálpebra que deslocava o olho lateralmente. Concomitante o cão apresentou massa na região peniana, no qual foi tratado com oito aplicações de vincristina (0,7 mg/m²) (ROSSLEY; RAMÍREZ, 2017). A região ocular tem sido evidenciada em outra literatura como local de acometimento de TVT em cães (ALCOFORADO, 2018).

Corroborando com a localização do TVT desse relato, um cão macho, sem raça definido (SRD), 4 anos, 5.2 Kg, apresentou lesão de caráter nodular em região cervical lateral esquerda (RAMOS *et al.*, 2019). Logo, embora o TVT tenha como áreas de maior acometimento a genital ele é capaz de ser manifestando em diferentes áreas corpóreas.

O exame citológico dos nódulos do animal desse relato demonstrou acentuada presença de células neoplásicas arredondadas, cromatina frouxa vacúolos citoplasmáticos, discreta presença de linfócitos e neutrófilos. Estudos com TVT que realizaram citologia como método diagnóstico identificaram os mesmos padrões celulares, o qual evidenciado células redondas com núcleo redondo, cromatina grosseira e nucléolo evidente, sendo compatíveis com TVT (MARQUES; GUESSER; AMUDE, 2019). Moura e seus colaboradores (2019) concordam que o TVT se apresenta na citologia como células redondas.

Ao avaliar as análises laboratoriais, observa-se que não houve alterações significativas que pudessem justificar uma mudança no protocolo de tratamento utilizado. Fato semelhante ocorreu em um estudo que tratou um cão de rua, de cinco anos de idade, sem raça definida que durante todo o tratamento não apresentou mudanças laboratoriais significativas (MENSINGEM; ZANCO; SILVA, 2016).

A utilização de sulfato de vincristina como tratamento quimioterápico para TVT é amplamente discutida por autores como um excelente quimioterápico que auxilia na regressão desse tumor (KUMAR *et al.*, 2018; FERREIRA *et al.*, 2010). Logo, a utilização desse medicamento tornou-se droga de escolha para essa patologia tratada nesse relato.

Como mencionado a dose utilizada foi 0,025 mg.kg, no entanto, é valido destacar que observa-se divergências quanto a condutas de dosagens, onde é visto diferentes dosagens do

mesmo medicamento. Visto que existem dois parâmetros distintos como m^2 ou Kg. Estudo realizado com um cão macho, pitbull, pesando 33 kg e com histórico de mordida por outro cão de rua que ocasionou o desenvolvimento de massa tumoral em região ocular e cervical ventral, no qual, para o tratamento desse caso foi utilizado a vincristina porem em dosagem de 0,75 mg/ m^2 , a cada 7 dias por 4 semanas (MARQUES; GUESSER; AMUDE, 2019).

Gomes e seus colaboradores (2017) realizaram um tratamento semelhante ao empregado nesse estudo para um caso de TVT em região ocular de um cão macho, SRD, no qual, foi utilizado sulfato de vincristina na dose de 0,025 mg.kg.

O padrão de utilização desse quimioterápico é considerado de 0,5 a 0,7 mg/ m^2 de superfície corporal, ou de 0,0125 a 0,025 mg/Kg, assim, o tratamento abordado corresponde ao protocolo. É valido acrescentar que a terapia deve ser sempre intravenosa e é padronizada semanalmente sendo necessária a realização contínua de exames laboratoriais afim de identificar possíveis alterações fisiológicas no animal (ECHER *et al.*, 2015).

Outro ponto importante a ser abordado é o acréscimo do procedimento cirúrgico no tratamento. Esse de fato é mais debatido sobre sua necessidade. Para Ramadinha *et al.* (2016) a incisão pode ser feita, porém o cirurgião e médico veterinário responsáveis pelo paciente devem levar em conta que somente o procedimento cirúrgico não garante cura devido altos índices de recidivas.

Com isso a associação do procedimento cirúrgico com o sulfato de vincristina foi uma abordagem interessante a ser utilizada, pois garante a retirada de grande percentual da massa tumoral no paciente e finaliza seu tratamento com a quimioterapia diminuindo as chances das células voltarem a se desenvolver. Para Fabiano (2017) a cirurgia não pode ser empregada como única forma de tratamento, sendo necessário somá-la a outra abordagem terapêutica.

Contudo, a realização de ato cirúrgico para TVT é amplamente questionada. Para Barbiere (2007) o ato cirúrgico pode causar grande transplantação de células de TVT do sítio cirúrgico para outros locais do corpo por contato das luvas e material operatório. Dessa forma, ao ato cirúrgico iria contribuir por seu um propagador da doença no animal, aumentando seus locais de acometimento.

É valido acrescentar que a realização da quimioterapia após o procedimento cirúrgico demonstra-se ser mais eficiente na prevenção e tratamento de TVT das células restantes, porém para regressão total da doença tem-se a recomendação de realização de mais duas sessões quimioterápicas após a regressão total do tumor seguida de um exame citológico (SCARABELLO; OLIVEIRA; LOPES, 2019). Isso não pode ocorrer devido fechamento da

clínica, logo, o paciente ficou com tratamento comprometido e tem maior possibilidade de reincidência.

O cão foi submetido a processo de castração durante a cirurgia de retirada do tumor como forma de melhorar o seu prognóstico. A realização de castração do animal é uma das ferramentas mais eficazes na prevenção de TVT, isso porque como mencionado o TVT usualmente é transmitido através do coito, dessa forma, a castração retira as gônadas no animal evitando que o mesmo entre em ciclos de cio novamente, resultando em diminuição da promiscuidade (PADILHA, 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A associação de cirurgia e sessões de quimioterapia em TVT não é observada na literatura de forma ampla, o que indica necessidade de estudar mais profundamente essa abordagem afim de identificar sua completa efetividade.

Tal processo de investigação favorece uma maior compreensão acerca da prática profissional do médico veterinário, fundamentando-se em um plano assistencial que visa um cuidado e tratamento seguro, científico e que valoriza o vínculo que deve ser estabelecido entre os protagonistas no processo do cuidar, promovendo uma atenção integral e uma interação efetiva no decorrer das fases do tratamento.

Dessa forma, a investigação contínua de mais achados no paciente evidenciou o TVT, isso se faz importante nos processos de trabalho, pois mostra que a equipe possui um olhar holístico, que avalia o paciente em sua integralidade e não apenas na sua queixa principal.

Nesse contexto o cuidado prestado ao paciente neste estudo pelo médico veterinário possibilita maiores subsídios para uma prática assistencial da profissão baseadas em evidências científicas e que comprovem sua usabilidade na prática, oferecendo um maior direcionamento no papel assumido pelo médico veterinário durante sua assistência, compreendendo as necessidades do paciente e identificando as melhores formas de se reverter uma situação de enfermidade encontrada de modo mais humanístico e integral.

Vale salientar que a ocorrência de TVT em região cervical, com ausência de achados na região genital difere do usualmente observado na literatura e na prática clínica. Dessa forma esse trabalho mostra evidências pouco debatidas e que podem auxiliar os profissionais atuantes para ampliar seu olhar, bem como, aplicar os conhecimentos aqui oferecidos.

REFERÊNCIAS

- ALCOFORADO, D.S. **Aspectos Clínico-Patológicos Do Tumor Venéreo Transmissível Canino Com Metástase Extragenital: Relato De Três Casos**. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal da Paraíba. 2018.
- ARAÚJO, C. G. B. **Tumor venéreo transmissível (TVT) em cavidade nasal em cão: relato de caso**. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal Rural de Pernambuco. Garanhuns, 2019.
- ARAUJO, M. R. **Estudo retrospectivo e prospectivo dos tumores cutâneos em cães e diferenciação dos tumores cutâneos de células redondas pela imuno-histoquímica**. Dissertação (Mestrado - Universidade Federal de Minas Gerais), Belo Horizonte, 2011.
- BAJA, K. G. *et al.* Projeto Castração De Cães E Gatos. In: **Ix Salão De Extensão (Canoas)**. v. 1, n.1, p, 01-02, 2017.
- CAMOLESE, L. C. *et al.* Tumor venéreo transmissível com metástases cutânea e ocular em cão: relato de caso. **Revista Unimar Ciências**, v. 25, n. 1-2, 2017
- ECHER, G. *et al.* Tumor venéreo transmissível em um canino sem raça definida. **Salão Do Conhecimento Unijuí, Jornada De Pesquisa**, v. 20, 2015.
- FABIANO, C. *et al.* Tumor venéreo transmissível. **Revista Conexão Eletrônica**, v.14, n.1, 2017
- FERNANDES, C. C. *et al.* Frequência de neoplasias cutâneas em cães atendidos no hospital veterinário da Universidade Federal de Uberlândia durante os anos 2000 a 2010. **Bioscience Journal**, v. 31, n. 2, 2015.
- FERREIRA, C. G. T. *et al.* Tumor venéreo transmissível canino (TVTC): Revisão de literatura. **PUBVET**, Londrina, n. 4, Art. 803, 2010.
- FILGUEIRA, K. D. Tumor venéreo transmissível canino com localização primária e única em cavidade oral. **Acta Scientiae Veterinariae**, v. 38, n. 1, p. 91-94, 2010.
- GOMES, F. E. M. *et al.* Tumor venéreo transmissível ocular em cão: relato de caso. **REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria**, v. 18, n. 11, p. 1-7, 2017.
- KUMAR, P. & DHAKA, K. Análise de desempenho do sistema de relé DF alimentado sem fio sob Nakagami- m fading. **IEEE Transactions on Vehicular Technology**, v. 67, n. 8, pág. 7073-7085, 2018.
- MARQUES, B. H.; GUESSER, B. D. & AMUDE, A. M. **Tumor Venéreo Transmissível Extragenital Transmitido Por Mordedura: Relato De Caso**. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal da Paraíba. 2019.
- MENSINGEM, S.; ZANCO, N. A. & SILVA, A. C. Tumor Venéreo Transmissível Cutâneo em Cão–Relato de Caso. In: **Medicina Veterinária**. 2016.
- MOURA, G. B. B. *et al.* O uso da citologia no diagnóstico de tumores palpáveis e de tecidos moles em cães e gatos/The use of cytology in the diagnosis of palpable tumors and soft tissues in dogs and cats. **Brazilian Journal of Animal and Environmental Research**, v. 2, n. 5, p. 1539-1548, 2019.
- SOUSA, L. L. F. *et al.* Tratamento quimioterápico para Tumor Venéreo Transmissível (TVT) em cão SRD–Relato de caso. In: **Escola de Ciências Médicas e da Saúde**. 2018.
- PADILHA, F. C. A. **Tumor Venéreo Transmissível (TVT): relato de um caso clínico**. Monografia. 2012. Universidade Federal Rural do Semiárido. Mossoró, 2012.
- RAMADINHA, R. R. *et al.* Resposta do tumor venéreo transmissível canino à quimioterapia com sulfato de vincristina e vimblastina. **Revista Brasileira de Medicina Veterinária**, v. 38, p. 65-69, 2016
- RAMOS, J. N. *et al.* Tumor venéreo transmissível cutâneo sem envolvimento genital em cão macho. **Veterinária e Zootecnia**, v. 26, p. 1-6, 2019.

RODASKI, S.; NARDI, R. B. Classificação dos quimioterápicos; Protocolos quimioterápicos anti neoplásicos. RODASKI, S.; NARDI, RB Quimioterapia Anti neoplásica em Cães e Gatos. 3ª reimpressão. **MedVet Livros**, v. 1, n.1, p. 68-75, 2008.

ROJAS-ZERPA, J. C. & YUSTA, J. M. Methodologies, technologies and applications for electric supply planning in rural remote areas. **Energy for Sustainable Development**, v. 20, n.1, p. 66-76, 2014.

SCARABELLO, R. D.; OLIVEIRA, Q. M. & LOPES, A. P. P. Tumor Venéreo Transmissível Em Cães Transmissible Venereal Tumor In Dogs. **JORNAL MedVetScience FCAA**, v. 1, n. 2, p. 63, 2019.

VILAÇA, M. R. **Ocorrência de tumor venéreo transmissível (TVT) em cães atendidos na Clínica de Medicina Veterinária (Climvet) do UNIFOR-MG, entre os anos de 2011 a 2015**. Trabalho de conclusão de Curso. Centro Universitário de Formiga. Minas Gerais. 2016.

CAPÍTULO 5

UROLITÍASE EM CANINO – RELATO DE CASO

CANINE UROLITHIASIS - CASE REPORT

Francisco Felipe Jorge

Médico Veterinário, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0422-4338>

Robério Ferreira Fiuza

Médico Veterinário, MSc., MEDVET - Multiclínica Veterinária, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4940-0588>

Robson dos Anjos Honorato

Docente Medicina Veterinária, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6640-1363>

Ramuelly Olinda Cavalcante

Mestre em Ciências Veterinárias, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0119-9969>

Valcledes Nascimento do Oriente

Mestrando em Biotecnologia, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7489-011X>

Cinthya de Andrade Gujanwski

Mestranda em Cirurgia Veterinária - Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho – UNESP, Jaboticabal-SP.

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8533-3044>

Geysa Almeida Viana

Docente Medicina Veterinária, Centro Universitário INTA – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3339-446X>

Denise Granato Chung

Docente Medicina Veterinária, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, UFAPE.

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2319-3960>

Erika Rafaelle Araújo Costa

Médica Veterinária, MEDVET - Multiclínica Veterinária, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8768-4633>

Arícia Débora Vasconcelos Fonsêca

Mestre em Ciências Veterinárias, Universidade Estadual do Ceará – UECE, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2240-7058>

*Autor correspondente, e-mail: geysaalmeidav@hotmail.com

RESUMO

O objetivo desse trabalho foi relatar um caso de urolitíase de um animal da espécie canina, raça pastor alemão, com oito meses de idade. No caso clínico relatado, o animal foi acompanhado desde a anamnese até a alta médica. O paciente apresentou polaquiúria, intensa disúria, algia abdominal, hipodpsia, hipofagia. Foram realizados tratamentos de suporte e o animal foi submetido a uretostomia pré-escrotal e cistotomia para remoção urólitos e sedimentos, sendo prescrita uma dieta adequada. Após 14 dias o animal retornou para a remoção dos pontos cirúrgicos, apresentando a urina com coloração normal e ausência de dor.

Palavras-chave: Urólito; Canino; Cistite; Trato urinário.

ABSTRACT

The objective of this work was to describe a case report of urolithiasis in an eight month old canine German shepherd. In the reported clinical case, the animal was followed from anamnesis to medical discharge. The patient presented with polyachuria, severe dysuria, abdominal pain, hypopsy, hypophagia. Supportive treatments were performed and the animal underwent pre-scrotal urethrostomy and cystotomy to remove uroliths and sediments, and an appropriate diet was prescribed. After 14 days, the animal returned for removal of the surgical stitches, presenting normal colored urine with no pain.

Keywords: Urolith; Canine; Cystitis; Urinary tract.

INTRODUÇÃO

A urolitíase é definida como a formação de sedimentos em qualquer porção do trato urinário. Esta ocorre devido a agregação de materiais cristalinos e matriciais, quando a urina se torna supersaturada com substâncias formadoras de cristais e pode ser composta de um ou mais tipos de minerais (LULICH *et al.*, 2016).

Em cães, a obstrução uretral ocorre frequentemente em machos e raramente em fêmeas, sendo observada com maior frequência em animais com seis a onze anos de idade. As principais raças acometidas são o Schnauzer miniatura, Lhasa apso, Yorkshire terrier, Bichon frisê, Shihtzu e Poodle. Os urólitos mais encontrados em cães são os de fosfato amoníaco magnésiano (estruvita) e oxalato de cálcio (RICK *et al.*, 2017).

Em cães machos o local mais comum de urólitos obstrutivos é na base do osso peniano, já em gatos machos, ao longo de toda uretra. Esta patologia pode causar sérios danos para os animais, se não for remediada de forma rápida e dependendo do caso, pode levar o animal ao óbito (GRAUER, 2015).

Os principais sinais clínicos observados em cães incluem hematúria, anúria, disúria e incontinência urinária. Em fêmeas é possível sentir os cálculos ao palpar a bexiga (INKELMAN *et al.*, 2012). O diagnóstico de urolitíase é baseado na anamnese, sinais clínicos e exames complementares, principalmente urinálise e os de imagem, como radiografia e ultrassonografia (SILVA; SILVA, 2011).

O tratamento da urolitíase pode ser clínico ou cirúrgico, dependendo de alguns fatores, mas principalmente da apresentação clínica. Em cálculos obstrutivos é essencial descomprimir a bexiga, o que pode ser feito com a passagem de sonda uretral ou por cistocentese. Pode-se, ainda, tentar deslocar o cálculo da região de estagnação por hidropulsão (PIGATTO *et al.*, 2011).

O tratamento clínico consiste na dissolução dos cálculos e interrupção do crescimento subsequente dos urólitos. A mudança da dieta é um dos métodos disponíveis para a redução da quantidade de cristalóides calculogênicos na urina (INKELMAN *et al.*, 2012). A abordagem cirúrgica deve ser considerada na impossibilidade de remoção do cálculo, a técnica de escolha depende da região e do tamanho dos urólitos. Quando localizado na uretra, por exemplo, a uretostomiaescrotal é mais indicada, por ser uma região onde anatomicamente a uretra é maior (FOSSUM, 2014).

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um caso de urolitíase em um cão da raça pastor alemão, com oito meses de idade e correlacionar os achados clínicos e laboratoriais com os dados da literatura.

RELATO DE CASO

Histórico Clínico – Anamnese

Foi atendido na MEDVET Multiclínica Veterinária, na cidade de Sobral-CE, um cão de oito meses da raça pastor alemão com 25 kg de peso, não castrado, que recebia como dieta de manutenção com ração comercial, oferecida três vezes ao dia, comprada a granel e água não filtrada. No momento da consulta o tutor referia que nas últimas 24 horas o animal estava apático e com sangramento pelo pênis (hematúria).

Anteriormente há esse quadro, havia apresentado sintomas como: polaquiúria, intensa disúria, dor abdominal (algia abdominal), diminuição na ingestão de água (hipodipsia) e diminuição na alimentação (hipofagia). Ausência de alteração nas fezes, assim como, ausência de quadros de êmese. Nessa ocasião, o animal foi atendido por outro profissional que

administrou Pencivet[®], antibiótico a base de penicilina, e vitaminaK[®] Ibase, 3 ml (SID), no entanto não houve remissão dos sintomas.

Frente à anamnese, o tutor referiu que o paciente possuía o hábito de beber água da piscina, e que desde o início do aparecimento dos sinais clínicos houve um aumento progressivo da região abdominal do paciente.

Exame Físico

Foram detectadas mucosas rosadas, linfonodos normais, normohidratação, com tempo de perfusão capilar (TPC) de 2 segundos, sensibilidade acentuada na região de bexiga, nível de consciência alerta, escore corporal normal, comportamento dócil e sem presença de ectoparasitas. A frequência cardíaca (FC) foi de 110 batimentos por minuto, com auscultação cardíaca normofonética e frequência respiratória (FR) de 75 movimentos por minuto, temperatura retal de 38,4°C, sem lesões penianas e prepuciais.

Frente aos achados clínicos foram solicitados: hemograma completo, urinálise e ultrassonografia abdominal. Para alívio e conforto do paciente foram administradas as seguintes medicações: dexametasona 0,2mg/kg [2mg/ml], SID, SC; dipirona 25mg/kg [500mg/ml] BID, SC; cloridrato de tramadol 2mg/kg [50mg/ml] TID, IM. Logo após foi realizada ultrassonografia e coleta do material para análise laboratorial.

Exames Complementares

Foram solicitados exames complementares como hemograma completo (HC) e análises bioquímicas como alanina aminotransferase (ALT) e creatinina (Cr). Diante da suspeita do aumento abdominal foi solicitada a realização de exame ultrassonográfico da região e realizada a coleta da urina para urinálise por meio de cistocentese. Os resultados de hemograma e bioquímica sérica apresentaram-se dentro do nível normal para a espécie, com exceção da Creatinina, que se encontrava de 2,3 mg/ dl (Tabela 1 e 2).

Tabela 1. Resultados do hemograma.

Hemograma	Resultado	Referência
Proteínas plasmáticas	7.8	5,0 – 8,0
Volume Globular (%)	42	37 – 52
Hemácias (x 10 ⁶ céls/μl)	6.3	5,6 – 7,7
Hemoglobina (g/dL)	14.7	13 – 18
Leucócitos (céls/μl)	8.800	6.000 – 17.000
Neutrófilos	6.688	3.000 – 11.500
Eosinófilos	0	100 – 1.250
Linfócitos	704	1.000 – 4.800
Monócitos	1408	150 – 1.350
Plaquetas (X10 ³ /μl)	190	200 – 500

Fonte: Laboratório de Patologia Clínica MEDVET Multiclínica Veterinária (2019).

Tabela 2. Resultados dos bioquímicos.

Bioquímicos	Resultado	Referência
Creatinina	2.3 mg/Dl	0,5 – 1,5 mg/Dl
ALT	52 U/L	10 – 88 U/L

Fonte: Laboratório de Patologia Clínica MEDVET Multiclínica Veterinária (2019).

Tabela 3. Resultados da urinálise.

Urinálise	Resultado	Referência
Cor	Enegrecida	Incolor a âmbar intenso
Aspecto	Escuro	Claro
pH	7,0	5,5-7,5
Leucócitos	Leve+	Negativo
Proteína	Moderado ++	Negativo
Sangue	Acentuado+++	Negativo

Fonte: Laboratório de Patologia Clínica MEDVET Multiclínica Veterinária (2019).

Tabela 4. Resultados da Microscopia do Sedimento.

Microscopia	Resultado
Cristalúria por fosfato de amônio-magnésio (estruvita)	++
Células Epiteliais	+++

Fonte: Laboratório de Patologia Clínica MEDVET Multiclínica Veterinária (2019).

No exame ultrassonográfico observaram-se alterações significativas na vesícula urinária. A mesma apresentava parede espessada, com presença de conteúdo anecogênico heterogêneo. Apresentava também estruturas hiperecóicas depositadas na porção ventral da bexiga e grandes quantidades de pontos hiperecogênicos que flutuavam ao balotamento, sugestivo de sedimento com cálculo depositado na região ventral, formando sombra acústica (Figura 1 – A/B).

A uretra estava dilatada com presença de estruturas hiperecogênicas formando sombra acústica. Constatou-se a presença de cálculos, com tamanho variado de 0,63cm até 0,97cm (figura 1 – A/B).

Os rins estavam em topografia habitual, com contornos regulares, arquitetura e ecogenicidade mantidas. Definição córtico-medular pouco alterada e presença de dilatação de pelve (figura 1 – C/D).

Figura 1 – Imagens ultrassonográficas. A: Sonograma longitudinal da vesícula urinária com intensa quantidade de sedimento urinário mostrando estrutura hiperecoica formadora de sombra acústica posterior, medindo 0,29 x 0,73 cm, (seta vermelha). B: Sonograma em corte longitudinal da bexiga contendo sedimento (cabeça de seta), estrutura hiperecoica formando sombra acústica posterior, medindo 0,97 cm. C: Sonograma em corte coronal do rim esquerdo. D: Sonograma em corte sagital com leve dilatação da pelve renal direita. **Fonte:** Acervo MEDVET Multiclínica Veterinária (2019).

Tratamento

Com os exames complementares confirmando de presença de urólitos na bexiga, uretra ou estenose de uretra, o paciente foi submetido a um jejum hídrico de 4 horas e sólido de 8 horas e encaminhado para o setor de clínica cirúrgica onde realizou-se a cistotomia seguida de uretrotomia.

Como protocolo anestésico, foi utilizado na medicação pré-anestésica (MPA), petidina [50mg/ml], 6 mg/kg, IM, na indução anestésica foi utilizado propofol [10mg/ml], 5 mg/kg, IV, associado a cetamina [100mg/ml] 0,5mg/kg, IV, e manutenção com isoflurano.

Foi realizado uretostomia pré-escrotal com intuito de remoção de cálculos alojados na uretra (figura 2). A incisão foi realizada na linha média ventral caudal ao prepúcio até o escroto. O músculo retrator foi identificado e afastado para expor a uretra. Fez-se em seguida uma incisão longitudinal na face ventral da uretra, sobre uma sonda uretral previamente inserida, posicionada caudalmente ao local de obstrução. Os cálculos foram removidos com uma pinça, e para garantir e assegurar que não haviam mais urólitos nas porções seguintes da uretra, a sonda foi direcionada até alcançar o lúmen da bexiga. A incisão da uretrotomia foi fechada com suturas interrompidas simples e fio vicryl 4-0.

Por haver urólitos na bexiga, procedeu-se com a cistotomia. Para auxiliar na retirada dos mesmos e para inspeção da bexiga foram colocadas suturas de ancoragem, colocadas em cada extremidade da incisão proposta. Durante o procedimento observou-se que a serosa vesical estava muito friável e a mucosa em alguns pontos tinham sinais de necrose, com muita secreção sanguinolenta e coágulos.

Depois de inspecionar, foi introduzido uma sonda uretral número 8 no sentido da vesícula urinária para uretra, para certificar-se da ausência de outros cálculos. A sutura da bexiga foi realizada em dois planos, com fio vicryl 4-0, com padrão simples contínuo.

O procedimento cirúrgico teve a duração aproximada de uma hora, sem intercorrências. O paciente ficou com a sonda uretral por mais 48 horas pós-cirurgia. Além disso, foi instituído o tratamento medicamentoso com: dexametasona [2mg/ml], 0,2mg/kg, SID, SC; dipirona [500mg/ml], 25mg/kg, BID, SC; cloridrato de tramadol [50mg/ml], 2mg/kg, TID, IM; ceftriaxona [200mg/ml], 50mg/kg, BID, IV e fluidoterapia com Ringer com Lactado, 5ml/kg/h, durante quatro dias. No quinto dia o paciente foi liberado para continuar o tratamento em casa, com as seguintes medicações, dexametasona 0,2 mg/kg, SID, VO, por 5 dias, dipirona [500mg/ml], 25 mg/kg, BID, VO, por 5 dias, cefalexina [500mg], 30 mg/kg, BID, por 8 dias e limpezas diárias da ferida cirúrgica até o retorno para retirada dos pontos cirúrgicos com 14 dias.

Os cálculos retirados (Figura 3) foram enviados para análise laboratorial e apresentaram na sua composição: carbonato, oxalato, fosfato, cálcio, magnésio e amônio (tabela 5).

Figura 2 – Procedimento cirúrgico. A – Realização da antissepsia, B – Colocação decampo operatório, com colocação de sonda uretral número 8. C/D – Exposição da bexiga, assim estando distendida com a serosa vesical friável. E – Mucosa com alguns pontos com sinais de necrose, com muita secreção sanguinolenta e coágulos sedimentos e cálculos. F – Cistorrafia.

Fonte: Acervo MEDVET Multiclínica Veterinária (2019).

Figura 3. Imagem dos cálculos retirados da bexiga e uretra, enviados para análise. **Fonte:** Acervo MEDVET – Multiclínica Veterinária (2019).

Após o período instituído de tratamento foram retirados os pontos e o paciente foi avaliado clinicamente. Por não apresentar quaisquer alterações, recebeu alta médica com recomendações de uma nova dieta de melhor qualidade e com restrição a ingestão de água da piscina.

Tabela 5. Resultado Exame Químico.

Exame Químico	Resultado
Carbonato	+++
Oxalato	+++
Fosfato	++
Cálcio	++
Magnésio	+
Amônio	++
Urato	Negativo
Cistina	Negativo

Fonte: Tecnologia em Sanidade Animal, TECSA – MG (2019).

DISCUSSÃO

Embora a literatura afirme que a maioria dos cães afetados pela urolitíase sejam das raças miniatura, como o Schnauzer, Lhasa apso, Yorkshire terrier, Bichon frisé, Shi-tzu e Poodle, e diagnosticada com maior frequência em pacientes entre seis e onze anos de idade (RICK *et al.*, 2017), o presente relato diverge e descreve a ocorrência em um cão, da raça pastor alemão, de oito meses de idade. Tal fato poder ter ocorrido devido a fatores nutricionais e hábitos comportamentais do animal.

De acordo com o que foi relatado pelo tutor, o animal ingeria água não potável, e às vezes, água da piscina tratada com cloro. A ingestão de determinadas substâncias, como o cloro, em excesso, pode levar a hiperclorêmia ou à diminuição da excreção de cloreto. Isso pode ocasionar acidose metabólica, levando por suavez a um efeito compensatório, de eliminação de íons H^+ e retenção bicarbonato, assim acidificando a urina. Alterações de pH urinário podem levar a formação de cálculos como os de urato de amônio (FOSSUM, 2014; SONAGLIO, 2012; RICK *et al.*, 2017).

Essa correlação poderia justificar a presença de urólitiase em um animal jovem, conforme relatado, no entanto na análise dos urólitos foi possível identificar mais de um tipo de mineral, onde na análise quantitativa observou-se maiores concentrações de carbonato, oxalato, fosfato, magnésio, cálcio e amônio, que normalmente são encontrados em vários índices de pH. A urinalise demonstrou que a urina apresentava um pH de 7, valor de referência considerado normal para a espécie canina, porém quando a urina foi coletada para análise o paciente já havia recebido fluidoterapia, antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos (SONAGLIO, 2012; RICK *et al.*, 2017).

Outra hipótese para a formação de urólitos no caso relatado poderia estar relacionada a dieta a qual o animal recebia, sendo ela baseada em ração comercial de baixa qualidade, segundo Monferdini e Oliveira (2009), no Brasil, a maior incidência de urólitos de estruvita em cães está relacionada intimamente com a dieta, pois há um maior percentual de cães e gatos consumindo alimentos caseiros. Além disso, cães e gatos alimentados com rações contendo baixo teor de umidade (secas) tendem a urinar com menor frequência e produzir uma quantidade menor de urina, porém mais concentrada, aumentando as chances de ocorrência da urolitíase.

Outro fator importante se dá pelo fato de que as dietas industrializadas brasileiras possuem em sua composição um teor proteico menor e uma maior concentração de cálcio,

fósforo e magnésio em relação a outros países. Essa composição de nutrientes pode induzir os animais a produzirem urina alcalina, predispondo ao aparecimento dos urólitos de estruvita (MONFERDINI; OLIVEIRA, 2009).

Os sinais clínicos da urolitíase variam conforme a localização, o tamanho e a quantidade de urólitos, os pacientes acometidos podem permanecer assintomáticos ou com sinais variados, sendo os mais comuns, polaciúria, disúria e hematúria (KAUFMANN *et al.*, 2011; MONFERDINI; OLIVEIRA, 2009).

Em caninos machos a localização mais comum de urólitos obstrutivos é na base do osso peniano (WESTROPP *et al.*, 2017; LULICH *et al.*, 2004). Pequenos cristais podem passar pela uretra e se alojar na região caudal do pênis, causando obstrução parcial ou total da uretra, provocando intensa dor no animal (MONFERDINI; OLIVEIRA, 2009). Quando obstrutivos os cálculos podem levar ao comprometimento dos rins e causar danos mecânicos nos órgãos onde se encontra (KAUFMANN *et al.*, 2011).

Corroborando com os dados citados anteriormente, no caso descrito havia presença de cálculos tanto na uretra peniana como na bexiga, assim como comprometimento de outras partes do sistema urinário, constatados a partir dos exames complementares de imagem e laboratoriais.

No exame ultrassonográfico os rins possuíam uma topografia habitual, com contornos regulares arquitetura e ecogênicidade mantidas, definição córtico-medular pouco alterada, mas havia dilatação de pelve. Já a uretra estava dilatada com presença de estruturas hiperecogênicas formando sombra acústica na região de osso peniano, com presença de cálculos, de tamanho variado de 0,29cm até 0,97cm.

A dilatação da pelve pode ocorrer em doenças congênitas, obstrução do fluxo urinário, pielonefrites e diurese. Na imagem ultrassonográfica de dilatação de pelve é característica a separação dos ecos do complexo ecogênico central por um espaço anecogênico que pode ser bem visualizado no corte transversal (CARVALHO, 2004).Esses detalhes foram observados também no caso relatado, muito provavelmente pela obstrução do fluxo urinário causada pelo cálculo.

Na cistite crônica a parede fica mais espessada e quando a cistite é aguda pode não causar alterações, todavia se sangue e pus estão presentes na urina, serão visualizados com ecos puntiformes em suspensão normal no exame ultrassonográfico. Sendo que coágulos podem ser por reações secundárias como traumas, infecção, neoplasia, e tendem a ser de ecotextura mista, irregulares, móveis e não ocorrendo a formação de sombra acústica (CARVALHO, 2004; GRAUER, 2010).

No exame ultrassonográfico do canino jovem foram observadas alterações significativas na vesícula urinária, como parede espessada, com presença de conteúdo anecogênico heterogêneo. Apresentando estruturas hiperecoicas depositadas na porção dependente da bexiga e grandes quantidades de pontos hiperecogênicos que flutuam ao balotamento, sugestivo de sedimento e com cálculo depositado na região dependente formando sombra acústica. Tais alterações podem ser decorrentes da ação mecânica dos urólitos na vesícula urinária e também pela reação inflamatória gerada pelos mesmos.

Os urólitos são identificados como imagens hiperecogênicas no lúmen vesical formando sombra acústica cuja intensidade pode variar com a composição e compactação do cálculo. Vários fatores podem mudar o aspecto do cálculo como a posição durante o balotamento e mudança de decúbito do paciente, somente nos casos graves pode estar aderido à parede (MAGALHÃES *et al.*, 2009; OLIVEIRA, 2010; CARVALHO, 2004). Essa correlação pode ser observada quando as imagens ultrassonográficas são comparadas com os urólitos retirados no procedimento cirúrgico. Foram retirados mais cálculos do que os visualizados e o tamanho também foi bastante variável.

Como já mencionado, a urolitíase pode alterar a dinâmica do sistema urinário, o que também pode ser observado através dos exames laboratoriais. Os valores da concentração sanguínea de creatinina encontravam-se um pouco aumentada, o que pode ser justificado pela obstrução uretral, assim como a dilatação da pelve renal, visualizada no exame de imagem, corroborando com as descrições de Carvalho (2004) afirmando que os urólitos são caracterizados pelo grande potencial de alterar a fisiologia renal.

O tratamento para urolitíase pode ser clínico ou cirúrgico, no entanto em casos de obstruções o tratamento cirúrgico é descrito na literatura como tratamento de escolha, já a técnica empregada depende da região e do tamanho do urólito. Em alguns casos, pode ser necessária a associação de técnicas (BARDELA *et al.*, 2007; STURION *et al.*, 2011; FOSSUM, 2014). No caso relatado, foram realizadas duas abordagens, uretrotomia pré-escrotal e cistotomia devido a presença de cálculos nas duas regiões.

Embora a cistotomia seja mais indicada comparada com a uretrotomia, pois nessa técnica há maior possibilidade de estenose pós-operatória (BARDELA *et al.*, 2007; FOSSUM, 2014), não foi possível remover o cálculo com manobras de hidropropulsão descrita na literatura.

Os cálculos removidos foram enviados para análise, conforme Ulrich *et al.* (2008), isso se torna importante para o planejamento do tratamento para evitar recidivas. Os urólitos mais comuns encontrados em cães e gatos são urato (incluindo urato de amônio, urato de sódio e

úrico ácido); cistina, magnésio e amôniofosfato e cálcio (oxalato de cálcio e fosfato de cálcio); urólitos compostos predominantemente de urato ou cistina; estruvita (fosfato de amônio e fosfato de magnésio) (WESTROPP *et al.*, 2017; LULICH *et al.*, 2004), justamente o que foi encontrado no paciente, obtidos através do exame químico qualitativo dos cálculos retirados no procedimento cirúrgico.

Os urólitos de estruvita são formados por magnésio, amônia e fosfato, e são conhecidos como os de maior ocorrência em animais domésticos. A infecção do trato urinário com bactérias produtoras de urease é uma das causas mais importantes para a formação desse tipo de cálculo. Seu aparecimento é mais provável em casos de urina alcalina (FOSSUM, 2014).

A análise laboratorial sugeriu cálculo de estruvita, no entanto o resultado da urinálise do presente caso mostrou leucocitose leve e ausência de bactéria o que pode descartar a possibilidade de ser essa causa da formação do cálculo. Entretanto, a urina foi coletada após a instituição de antibioticoterapia, com penicilina, que pode ter mascarado a presença de bactérias e alterações de pH.

O resultado da análise dos cálculos mostra a presença de inúmeros minerais, e embora haja hipóteses para a formação dos urólitos para o caso apresentado, nenhuma delas pode ser comprovada. Segundo Lulich (2004), a urolitíase pode ser acarretada por uma somatória de fatores, o que torna ainda mais difícil achar uma causa específica.

No entanto, a análise laboratorial do cálculo é importante para que o tratamento clínico possa ser planejado e que medidas de manejo sejam adotados afim de evitar recidivas. Dessa maneira, após os resultados laboratoriais o tutor foi instruído a mudar o manejo alimentar, oferecendo uma dieta de melhor qualidade, assim como oferecer água filtrada e impedir a ingestão de água da piscina.

CONCLUSÃO

Diferente do que é encontrado na literatura, o presente trabalho relatou a presença de urolitíase em um cão da raça pastor alemão de 8 meses. Hábitos alimentares e de manejo, podem justificar o aparecimento de urolitíase no paciente em questão, no entanto pela instituição do tratamento antes da realização dos exames complementares não é possível confirmar tal suposição.

REFERÊNCIAS

- BARDELA, G. T., *et al.* Ruptura de bexiga ocasionada por urolitíase – relato de caso. **Revista Científica Eletrônica Veterinária**, a. 4, n. 8, p.1-6, 2007.
- CARVALHO, C. F. **Ultrassonografia em Pequenos Animais**. 2004. ed. São Paulo: Roca, 2004. 365 p.
- FOSSUM, T. W. **Cirurgia de Pequenos Animais**. 4ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, p. 2004-2021, 2014.
- GRAUER, G. F. 2015. Manifestações clínicas dos distúrbios urinários; Urolitíase canina. In: Nelson, A. W. & Couto, C. G. (eds.) **Medicina Interna de Pequenos Animais**. Elsevier Editora, Rio de Janeiro.
- KAUFMANN, C.; NEVES, R. C. & HABERMANN, J. C. A. 2011. Doença do trato urinário inferior dos felinos. **Anuário da Produção Científica dos Cursos de Pós- Graduação**, 4, 193-214.
- LULICH, J. P. *et al.* ACVIM small animal consensus recommendations on the treatment and prevention of uroliths in dogs and cats. **Journal of veterinary internalmedicine**, v. 30, n. 5, p. 1564-1574, 2016.
- MAGALHÃES, F. J. R., *et al.* **Piometra e urolitíase vesical em cadela diagnosticado através da ultrassonografia abdominal: relato de caso**. In: JORNADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – JEPEX, 2009, IX, Pernambuco, 2009.
- MONFERDINI, R. P. & OLIVEIRA, J. Manejo nutricional para cães e gatos com urolitíase – revisão bibliográfica. **Acta Veterinaria Brasilica**, v. 3, n. 1, p. 1–4, 2009.
- OLIVEIRA, A. C. S. **Urolitíase canina**. 2010. 29f. Monografia (Especialização em Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais), Universidade Castelo Branco, Brasília, 2010.
- PIGATTO, J., *et al.* Cistolitectomia e ressecção de cisto renal por laparoscopia em uma cadela com aderências intraperitoneais: relato de caso. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**. v.63, n.4, p.858-865, 2011.
- RICK, G. W., *et al.* **Urolitíase em cães e gatos**. p. 705–714, 2017.
- RICK, G. W., *et al.* Urolitíase em cães e gatos. **PUBVET MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECCIA**, RS, v. 11, ed. 7, p. 705- 714, 2017.
- SILVA, T. P. D. & SILVA, F. L. Urolitíase vesical e uretral em um cão: diagnóstico e tratamento. **Enciclopédia Biosfera**, v.7, n.13, p. 970-976, 2011.
- SONAGLIO, F. **Distúrbios de potássio, sódio e cloro: in: disciplina transtornos metabólicos dos animais domésticos**. Programa de pós-graduação em ciências veterinárias, 2012, Rio Grande do Sul. 2012.
- STURION, D. J., *et al.* **Urolitíase em cães e gatos – revisão de literatura**. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FIO, X, 2011, Ourinhos, 2011.
- ULRICH, L. K., *et al.* Changing paradigms the frequency and management of canine compound uroliths Veterinary Clinic of North America: **Small Animal Practice**, Philadelphia, v.39, p41-53, 2008.
- WESTROPP, J. L. & LULICH, J. Medical management of urolithiasis. In: BSAVA Manual of Canine and Feline Nephrology and Urology. **BSAVA Library** p. 304-310. 2017.

CAPÍTULO 6

**PERFIL ELETROLÍTICO E AVALIAÇÃO
ELETROCARDIOGRÁFICA DE CADELAS COM PIOMETRA**

**ELECTROLYTIC PROFILE AND ELECTROCARDIOGRAPHIC EVALUATION OF
DOGS WITH PYOMETRA**

Gabrieli Americo da Silva

Universidade Federal da Fronteira Sul, Realeza - Paraná
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1387-5370>

Tainá Minuzzo

Universidade Federal da Fronteira Sul, Realeza - Paraná
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9248-0704>

Danielli de Oliveira Loeve

Universidade Federal da Fronteira Sul, Realeza - Paraná
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8248-3699>

Estela Dall'Agnol Gianezini

Universidade Federal da Fronteira Sul, Realeza - Paraná
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1446-3511>

Tatiana Champion

Universidade Federal da Fronteira Sul, Realeza - Paraná
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7346-1620>

*Autor correspondente, e-mail: tatiana.champion@uffs.edu.br

RESUMO

A piometra é uma afecção reprodutiva que acomete frequentemente cadelas, sendo que os distúrbios eletrolíticos presentes nesses pacientes são motivo de diversas complicações, podendo evoluir para a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS), agravando ainda mais o quadro clínico. O objetivo do trabalho foi avaliar o perfil eletrolítico de pacientes com piometra, correlacionando os achados com alterações eletrocardiográficas e presença de sinais clínicos e laboratoriais de SIRS. A pesquisa foi realizada com 13 pacientes atendidas na Superintendência Unidade Hospitalar Veterinária Universitária da Universidade Federal da Fronteira Sul (SUHVU-UFFS) com diagnóstico de piometra, submetidas a exame físico geral, colheita de sangue para dosagem de eletrólitos e leucograma, eletrocardiografia e caracterização de SIRS. Os valores obtidos foram analisados estatisticamente por meio de software específico, sendo submetidos ao teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e teste de associação de Fisher. Na eletrocardiografia, a maioria dos animais estudados apresentaram arritmia sinusal (61,7%), dois pacientes (15,3%) apresentaram ritmo sinusal e um (7,7%) apresentou bloqueio atrioventricular. Os parâmetros que mais se alteraram foram a duração de onda P e complexo QRS. A maioria dos animais apresentaram alguma alteração eletrolítica, sendo hipernatremia (30,7%), hiponatremia (30,7%), hipocalcemia (61,5%), hipocalemia (30,7%), hipercalemia

(30,7%), hipomagnesemia (15,3%) e hipermagnesemia (23%), não ocorrendo relação com a presença da SIRS, esta, presente em 58,3% dos casos. Conclui-se que a maioria dos pacientes com piometra apresentou alterações eletrolíticas e sinais clínicos relacionados ao quadro de SIRS. Os parâmetros eletrocardiográficos não foram suficientes a fim de auxiliar no diagnóstico de distúrbio eletrolítico. Quanto à predisposição a arritmias, verificou-se que a arritmia sinusal é a mais comum e que não está atrelada à SIRS. Assim, ressalta-se a importância da dosagem de eletrólitos em todos os casos de piometra e reforça-se a indicação de exame eletrocardiográfico na rotina.

Palavras-chave: Eletrocardiografia; Eletrólitos; Infecção uterina; Sistema cardiovascular; SIRS.

ABSTRACT

Pyometra is a reproductive disorder that often affects female dogs, and the electrolyte disturbances present in these patients are the reason for several complications, and may evolve into Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS), further aggravating the clinical condition. The aim of this study was to evaluate the electrolyte profile of patients with pyometra, correlating the findings with electrocardiographic alterations and the presence of clinical and laboratory signs of SIRS. The research was conducted with 13 patients seen at the Superintendence Veterinary University Hospital Unit of the Universidade Federal da Fronteira Sul (SUHVU-UFFS) with diagnosis of pyometra, submitted to a general physical examination, blood sampling for electrolyte and leukogram dosage, electrocardiography and characterization of SIRS. The values obtained were statistically analyzed using specific software, being subjected to the Kolmogorov-Smirnov normality test and Fisher's association test. In electrocardiography, most of the animals studied presented sinus arrhythmia (61.7%), two patients (15.3%) presented sinus rhythm and one (7.7%) presented atrioventricular block. The parameters that were most altered were P wave duration and QRS complex. Most of the animals presented some electrolytic alteration, being hypernatremia (30.7%), hyponatremia (30.7%), hypocalcemia (61.5%), hypokalemia (30.7%), hyperkalemia (30.7%), hypomagnesemia (15.3%), and hypermagnesemia (23%). We conclude that most patients with pyometra presented electrolytic alterations and clinical signs related to SIRS. The electrocardiographic parameters were not sufficient to help in the diagnosis of electrolyte disturbance. As for the predisposition to arrhythmias, it was verified that sinus arrhythmia is the most common and that it is not linked to SIRS. Thus, we emphasize the importance of electrolyte dosage in all cases of pyometra and reinforce the indication of routine electrocardiographic examination.

Keywords: Electrocardiography; Electrolytes; Uterin infection; Cardiovascular system; SRIS.

INTRODUÇÃO

Uma das afecções reprodutivas rotineiramente encontradas em cadelas é a piometra, que consiste em uma infecção uterina com conteúdo purulento associado principalmente à colonização de bactérias gram-negativas, sendo a *Escherichia coli* a mais frequente (ETTINGER & FELDMAN, 2008; KALENSKI, 2012; JITPEAN *et al.*, 2016). Dentre as causas, sabe-se que o estímulo de hormônios reprodutivos, como a progesterona sob o útero, torna o ambiente mais favorável à proliferação bacteriana, facilitando o desenvolvimento da piometra devido a fatores como aumento da secreção das glândulas endometriais, diminuição da miocontratilidade e redução da resposta imune da fêmea (WANKE & GOBELLO, 2006).

Os sinais clínicos podem variar de acordo com a evolução da doença, dentre eles destacam-se apatia, anorexia, êmese, desidratação, dor abdominal, poliúria, polidipsia e diarreia (MAMÃO *et al.*, 2015). Já os achados laboratoriais mais encontrados são leucocitose, neutrofilia, monocitose (JITPEAN *et al.*, 2014). O quadro clínico agrava-se quando se institui uma resposta inflamatória generalizada, denominada Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) que pode ser induzida, sobretudo, pela liberação de endotoxinas das bactérias (JITPEAN *et al.*, 2016). Em meio a essa grande circulação de antígenos pelo corpo do animal em sepse, a infecção pode disseminar-se para todos os órgãos, inclusive o miocárdio, desencadeando uma miocardite bacteriana grave (KALENSKI, 2012). O tratamento de eleição da piometra é a remoção cirúrgica do útero acometido, por meio de ovariosalpingohisterectomia (HEDLUND, 2005).

Sabe-se que a piometra pode cursar com distúrbios eletrolíticos e ácidos básicos, em decorrência das endotoxinas bacterianas, associada a desidratação e comprometimento orgânico (MAMÃO *et al.*, 2015). As desordens afetam a homeostasia dos fluidos corporais, bem como a osmolaridade dos meios extra e intracelulares, agravando a desidratação já presente. As cadelas com piometra frequentemente demonstram alterações com relação aos eletrólitos sódio (Na⁺) e potássio (K⁺), constatando-se respectivamente hiponatremia e hipocalemia (DIBARTOLA, 2011; MAMÃO *et al.*, 2015).

Nos cães, as disfunções eletrolíticas sugerem complicações cardíacas por meio de alterações eletrocardiográficas, adicionalmente outras condições clínicas podem agravar os distúrbios cardiovasculares, tais como choque e desequilíbrio ácido-base, além de déficit de contratilidade perante sepse. Desta forma, na piometra o animal está suscetível a todas estas

injúrias, comprometendo a atividade cardíaca e agravando ainda mais o quadro clínico (HEDLUND, 2005; HAGMAN *et al.*, 2007).

Dentre as principais alterações no eletrocardiograma (ECG) frente aos distúrbios acima citados estão: aumento de amplitude de onda T (sugerindo irregularidade de repolarização ventricular), aumento do intervalo QT (evidenciando anormalidades na despolarização e repolarização, e relacionado também a frequência cardíaca), desnível de segmento ST, com presença de infra ou supradesnivelamento e arritmias graves como arritmias ventriculares e bloqueios atrioventriculares (TILLEY, 1992; DUTRA, 2012).

Ademais, as anormalidades eletrolíticas aumentam os riscos dos procedimentos anestésicos devido a potencialização dos efeitos adversos dos fármacos utilizados, propiciando o aparecimento de arritmias, hipotensão e deficiências de coagulação. Por isso preconiza-se a estabilização do paciente a fim de tornar a cirurgia terapêutica mais segura (FANTONI & SHIH, 2017).

Sabendo-se então que a piometra cursa com distúrbios eletrolíticos aliados a um quadro de sepse que, além de prejudicarem o funcionamento regular do organismo alterando a homeostasia, podem ainda inferir alterações no traçado eletrocardiográfico, prejudicando a função cardíaca, é de interesse definir e conhecer a extensão da gravidade dessas alterações. Assim, este trabalho propôs relacionar os resultados obtidos com o perfil eletrolítico das cadelas com piometra, juntamente com as complicações cardíacas desses animais, definindo-se parâmetros para pesquisas que carecem desses resultados.

MATERIAL E MÉTODOS

A presente pesquisa seguiu-se mediante aprovação pela Comissão de Ética no Uso de Animais (nº 23205.00223/2017-67) e ocorreu na Superintendência Unidade Hospitalar Veterinária Universitária da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Realeza, Paraná. A seleção dos animais para a pesquisa consistiu em 13 fêmeas, não castradas, de raças variáveis, com peso entre 2 e 21,3 quilogramas, com idade entre 4 e 11 anos, previamente diagnosticadas com piometra em âmbito hospitalar, escolhidas de forma aleatória. Após autorização dos tutores, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, realizou-se em ambiente tranquilo, exame físico, coleta de sangue, avaliação eletrocardiográfica e caracterização de SIRS dos animais.

Os parâmetros avaliados ao exame físico foram: frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura retal, características de pulso femoral, coloração de mucosas, tempo de preenchimento capilar (TPC), estado de hidratação, peso, escore corporal, nível de consciência e avaliação da pressão arterial sistólica (PAS) mediante o uso de Doppler vascular portátil Microem (DV10 - Pastilha).

Após avaliação física, coletava-se 8 ml de sangue através de punção da veia jugular externa e distribuía-se em tubos de coleta, com e sem o anticoagulante ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), para posteriores dosagens eletrolíticas, realização de leucograma e confecção de lâminas por meio de esfregaço sanguíneo. O tubo sem anticoagulante foi mantido à temperatura ambiente para favorecer o processo de retração do coágulo.

Centrifugou-se as amostras em centrífuga (Sigma 3-16 L®, Sigma Laborzentrifugen GmbH, Alemanha) à 5000 rpm por 10 min e após obtenção do soro distribuiu-se em três microtubos tipo Eppendorf congelados a -18°C para posteriores dosagens eletrolíticas. A amostra com anticoagulante foi utilizada para realização do leucograma e confecção da lâmina através de esfregaço sanguíneo. Realizou-se a contagem do número total de leucócitos em câmara hemocitométrica, já a análise diferencial e avaliação morfológica foram analisadas em esfregaço sanguíneo corado com corante rápido tipo Romanowsky (Panotico Rápido LB - Laborclin Ltd, Pinhais, Brasil) em microscópio óptico de luz branca. Os eletrólitos foram dosados em soro por meio de kits comerciais (BIOTÉCNICA® - Varginha/MG, Brasil) em analisador bioquímico automático (Smart 200®, Biotécnica, Varginha/MG, Brasil). As concentrações de cálcio e magnésio foram determinadas por método colorimétrico e as de sódio e potássio por método enzimático.

Ademais, a avaliação eletrocardiográfica ocorreu em ambiente reservado, utilizando eletrocardiógrafo computadorizado (ECG_PC_TEB®). O registro eletrocardiográfico ocorreu por cinco minutos e foram avaliadas as derivações bipolares DI, DII, DIII; as unipolares aVL, aVR, aVF; as amplitudes de ondas P, R T e segmento ST; as durações de onda P, intervalo PR, intervalo QT, intervalo QT corrigido, complexo QRS e análise da frequência e ritmo cardíacos.

Os valores obtidos foram analisados estatisticamente por meio de software específico (Graphpadprism versão 5.0® para Windows – Graphad software, San Diego, CA.), sendo submetidos ao teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Posteriormente, os dados foram descritos em média $\pm$ desvio padrão e intervalo de confiança de 95%, e realizou-se teste de associação de Fisher para avaliar a relação entre os parâmetros analisados, considerando $p < 0,05$.

RESULTADOS

Ao exame eletrocardiográfico realizado antes da instituição de antibioticoterapia e fluidoterapia das cadelas com piometra identificou-se os dados com relação ao ritmo cardíaco observados na Tabela 1.

Tabela 1. Valores percentuais de ritmo cardíaco registrados dos parâmetros eletrocardiográficos de cadelas com piometra (n= 13) em avaliação antes da instituição de fluidoterapia e antibioticoterapia.

Ritmo	Nº de Animais
Sinusal	2 (15,3%)
Arritmia sinusal	5 (38,6%)
Arritmia sinusal com <i>sinus arrest</i>	1 (7,7%)
Taquicardia sinusal	2 (15,3%)
Taquicardia sinusal com marcapasso migratório	1 (7,7%)
Arritmia sinusal com com marcapasso migratório e <i>sinus arrest</i>	1 (7,7%)
Arritmia sinusal com marcapasso migratório, <i>sinus arrest</i> e BAV de 2ª grau Mobitz II	1 (7,7%)
Total	13 (100%)

BAV: Bloqueio atrioventricular.

A maioria dos animais avaliados (61,7%) apresentou arritmia sinusal (figura 1-A) este ritmo é um achado regular em cães e pode ou não estar associada à respiração do animal, denominando-se arritmia sinusal respiratória. Na taquicardia sinusal (figura 1-B) há elevação da frequência cardíaca com ritmo regular e foi evidenciada em dois (15,3%) dos animais. O marcapasso migratório, que normalmente acompanha a arritmia sinusal, foi verificado em três animais, já o *Sinus arrest* em dois (15,3%). Em apenas um (7,7%) animal foi identificado bloqueio atrioventricular de 2º grau classificado como *Mobitz* tipo II (figura 1-C).

Figura 1. Imagem de traçado eletrocardiográfico evidenciando arritmia sinusal (A), taquicardia sinusal (B) e bloqueio atrioventricular de 2º grau *Mobitz* tipo II em cadelas com piometra.

Os parâmetros eletrocardiográficos e amplitude e polaridade de onda T obtidos em avaliação antes da instituição de fluidoterapia e antibioticoterapia podem ser observados nas Tabelas 2 e 3 respectivamente.

Tabela 2. Valores de média $\pm$ desvio padrão e intervalo de confiança (IC) de 95% dos parâmetros eletrocardiográficos registrados de cadelas com piometra (n=13) em avaliação antes da instituição de fluidoterapia e antibioticoterapia.

Parâmetro ECG	Média $\pm$ DP (IC de 95%)
P (ms)	43 $\pm$ 4,04 (41,79 - 46,67)
PR (ms)	80 $\pm$ 14,01 (73,15 - 90,08)
QRS (ms)	60 $\pm$ 7,54 (53,13 - 62,25)
QT (ms)	193 $\pm$ 15,25 (183,9 - 202,3)
QTc	264 $\pm$ 36,85 (252,2 - 296,7)
P (mV)	0,21 $\pm$ 0,06 (0,18 - 0,26)
R (mV)	0,75 $\pm$ 0,61 (0,59 - 1,34)
ST (mV)	0,75 $\pm$ 0,61 (0,59 - 1,34)

FC: Frequência cardíaca; bpm: batimentos por minuto; ms: milissegundos; mV: milivolts

Tabela 3. Valores percentuais de ondas T, segundo sua polaridade e amplitude comparadas à onda R de cadelas com piometra (n=13), em avaliação antes da instituição de fluidoterapia e antibioticoterapia.

Polaridade e Amplitude comparada com a onda R	Nº de Animais
Menor que 25% da onda R e positiva	4 (30,8%)
Maior que 25% da onda R e positiva	4 (30,8%)
Menor que 25% da onda R e negativa	0 (0,0%)
Maior que 25% da onda R e negativa	0 (0,0%)
Menor que 25% da onda R e bifásica	0 (0,0%)
Maior que 25% da onda R e bifásica	1 (7,6%)
Total	13 (100%)

Considerando os valores estabelecidos por Wolf *et al.* (2000) verificou-se que os parâmetros eletrocardiográficos que mais se alteraram foram duração de onda P e complexo QRS. Quanto às amplitudes de ondas, apenas um animal apresentou supressão de onda R (0,15mV). Adicionalmente, verificou-se encurtamento do intervalo PR (58 ms) em um animal. Em relação à polaridade e amplitude de ondas T analisadas nos traçados pode-se constatar que a polaridade positiva foi mais visibilizada e que a maioria apresentava onda T menor que 25% da onda R. Dos animais avaliados nenhum apresentou supradesnivelamento de segmento ST, contrariamente, dois apresentaram infradesnivelamento.

Considerando os limites estabelecidos por Lunney & Ettinger (1997), Goodwin (2002) e Gabay (2003), os demais valores como amplitude de onda P, duração de QT e QT corrigido mantiveram-se dentro dos padrões para a espécie. O perfil eletrolítico das cadelas estudadas pode ser observado na Tabela 4 a seguir:

Tabela 4. Valores de média $\pm$ desvio padrão e intervalo de confiança (IC) de 95% da dosagem sérica de eletrólitos em cadelas com piometra (n=13) em avaliação antes da instituição de fluidoterapia e antibioticoterapia.

Eletrólito	Média $\pm$ DP (IC de 95%)
Sódio (mEq/L)	148 $\pm$ 16,45 (133,1 - 153)
Potássio (mEq/L)	4,8 $\pm$ 1,04 (4,4 - 5,7)
Cálcio (mg/dL)	8,7 $\pm$ 1,72 (7,5 - 9,6)
Magnésio (mg/dL)	2,2 $\pm$ 0,40 (1,9 - 2,4)

Ao analisar o perfil eletrolítico dos animais observou-se que os níveis de sódio apresentaram maior variação, destes, quatro (30,7%) animais apresentaram hipernatremia e quatro (30,7%) apresentaram hiponatremia. Ademais, evidenciou-se que o eletrólito mais comumente reduzido foi o cálcio, pois oito (61,5%) dos pacientes apresentaram-se em hipocalcemia. Quanto ao potássio, em quatro (30,7%) dos animais verificou-se hipocalcemia, e quatro (30,7%) também apresentaram hipercalemia. Adicionalmente, visualizou-se hipomagnesemia em dois (15,3%) dos animais e hipermagnesemia em três (23%).

Além da avaliação eletrocardiográfica e perfil eletrolítico os animais foram classificados em relação à Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) e ao observar a Tabela 5, em que os valores dos parâmetros avaliados foram descritos individualmente, constatou-se que sete (53,8%) dos animais avaliados estavam de fato em SIRS, sendo os parâmetros frequência respiratória e leucograma os mais frequentemente alterados.

Após análise estatística verificou-se que não houve significância entre as correlações dos valores de parâmetros eletrocardiográficos, SIRS e eletrólitos, considerando $p < 0,05$.

Tabela 5. Valores individuais dos parâmetros aferidos para classificação da SIRS de cadelas com piometra (n=13).

Parâmetro	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13
FC (bpm)	160	192*	120	136	136	72	56*	104	100	140	140	158	124
Fr(mpm)	46*	44*	52*	24	120*	72*	56*	80*	20*	56*	68*	20	48*
T°C (graus)	38,4	38,5	39,1	38,8	38,3	38,5	39,5*	37,7	38,2	38,6	37,4*	37,2	38,9
Leucócitos totais (x10 ³ µ/L)	15,1	28,7*	10,4	65,1*	7,4	17,8*	21,8*	27*	15,2	61*	33,3*	24,5*	11,8
SIRS	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não

FC: frequência cardíaca; bpm: batimento por minuto; FR: frequência respiratória; mpm: movimento por minuto; T°C: temperatura; SIRS: Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica; A: animal; *Valores divergentes dos limites normais para a espécie.

DISCUSSÃO

A arritmia sinusal visualizada na maioria dos animais é um achado regular em cães e se dá devido à atividade parassimpática no nodo sinoatrial (TILLEY & SMITH, 2008). Pode ou não estar associada à respiração do animal, denominando-se arritmia sinusal respiratória, na qual há elevação da frequência cardíaca na inspiração e redução na expiração, devido às oscilações do tônus vagal (WARE, 2013). Na taquicardia sinusal há elevação da frequência cardíaca com ritmo regular e dentre as causas mais comuns destacam-se a dor, stress, febre e toxinas, causas presentes nos quadros de piometra (FRANSSON *et al.*, 2007).

O marcapasso migratório, que normalmente acompanha a arritmia sinusal, consiste na oscilação de morfologia e polaridade de ondas P no traçado eletrocardiográfico, justifica-se pela migração na despolarização das células do nodo sinusal (MIROWSKI, 1966) e pode estar associado ao aumento do tônus parassimpático ou ainda miocardites e cardiomiopatias. Já o Sinus arrest trata-se de uma irregularidade na geração do impulso elétrico por redução do automatismo do nodo sinusal e pode ter miocardite, distúrbios eletrolíticos e estimulação vagal como etiologia (TILLEY, 1992; TILLEY & GOODWIN, 2000), nas fêmeas visualiza-se com maior frequência (CARVALHO *et al.*, 2009). Portanto, justifica-se o aparecimento de ambas as alterações nos 30,7% dos animais.

O bloqueio atrioventricular de 2º grau Mobitz tipo II identificado em um paciente se refere a uma falha na condução do estímulo elétrico dos átrios para os ventrículos, conduzindo apenas alguns complexos. É classificado em Mobitz tipo II, pois apresenta uma ou mais ondas P isoladas sem que haja aumento progressivo dos intervalos P-R precedentes (BRANCH *et al.*, 1975; WARE, 2007; TILLEY & SMITH, 2008).

Nos achados eletrocardiográficos o aumento na duração de onda P e complexo QRS sugerem sobrecarga atrioventricular esquerda, no entanto, apenas o ecodopplercardiograma poderia confirmar as suspeitas de alterações de câmaras cardíacas e, este, não foi realizado no presente estudo. A supressão de onda R pode ser verificada em pacientes hígidos, todavia também ocorre em casos de obesidade, efusão pleural, hipotireoidismo, lesão miocárdica, pneumotórax e edema pulmonar. A paciente apresentava-se com escore corporal adequado e nenhuma das afecções mencionadas foi identificada. Um animal apresentou um encurtamento de PR e pode-se suspeitar de um padrão de pré-excitação ventricular, como já descrito em humanos (ROSNER *et al.*, 1999) e animais (CARVALHO FILHO *et al.*, 2003).

Quanto à polaridade e amplitude de onda T, sabe-se que no eletrocardiograma a onda T corresponde a repolarização ventricular e em cães pode se apresentar positiva, negativa ou bifásica (JOHNSON & SWARTZ, 1988; TILLEY, 1992). Normalmente sua amplitude não deve ultrapassar ¼ da onda R, quando aumentada, sugerem-se distúrbios eletrolíticos, hipóxia do miocárdio e ou distúrbios na condução interventricular (TILLEY, 1992). Sabe-se que na piometra devido a sinais inespecíficos como vômito, diarreia e poliúria, os níveis de eletrólitos são alterados e podem inferir no traçado eletrocardiográfico alterações de amplitude de onda T e desnível de segmento ST (DIBARTOLA, 2011; DUTRA, 2015). No estudo dois pacientes apresentaram infradesnívelamento de ST e como sinais clínicos apresentaram poliúria e polidipsia.

Ao analisar o perfil eletrolítico dos animais observou-se tanto hipernatremia quanto hiponatremia. Justifica-se o aumento sérico dos níveis de sódio devido a desidratação hipotônica consequente dos episódios de êmese e diarreia apresentados pelos animais (MAMÃO *et al.*, 2015). Além disso, a *E. Coli* presente nos quadros de piometra tem capacidade de lesar os néfrons tornando-o incapaz de responder ao ADH. Entretanto, a ocorrência de hiponatremia também foi verificada, semelhante ao encontrado por Ferreira *et al.* (2010), os resultados sugerem que os pacientes com piometra podem apresentar uma hiposmolaridade sanguínea e hipovolemia devido à perdas para terceiro espaço de líquido livre juntamente aos eletrólitos (DIBARTOLA, 2011). Além disso, episódios de poliúria e polidipsia também

provocam perda de sódio (DIBARTOLA, 2011; STOCKAM & SCOTT, 2011), e esses sinais clínicos foram verificados nos animais do estudo.

Quanto ao cálcio, a hipocalcemia fora evidenciada em vários pacientes e pode ser atribuída à endotoxemia presente nos quadros de piometra (CARLSTEDT *et al.*, 2000). Em estudo realizado por Zaloga & Chernow (1987), que induziram endotoxemia com lipopolissacarídeos de *E. Coli* em cães, verificou-se redução das concentrações de cálcio ionizado e cálcio total e atribuiu-se à descoberta a hipovitaminose D. Quanto a hipercalcemia, não foi verificada nas cadelas do estudo. A hipercalcemia encontrada também foi visibilizada por Mamão *et al.* (2015), no entanto, fora identificado aumento da concentração sérica de potássio somente em um (5%) animal, no qual justificou-se em decorrência da hemoconcentração por desidratação.

A hipocalcemia frequentemente relatada (FERREIRA, 2006; MAMÃO, 2015) também foi identificada no presente estudo, estando associada aos episódios de emese e diarreia dos pacientes, ou ainda à alcalose metabólica e/ou translocação de potássio para as fibras musculares por meio da ação de toxinas bacterianas (DIBARTOLA, 2011; STOCKAM & SCOTT, 2011).

Adicionalmente, sabe-se que os níveis de potássio e cálcio estão relacionados com os níveis de magnésio devido à atividade de co-transporte deste íon (DIBARTOLA, 2011). O aumento da concentração de magnésio é normalmente associado à insuficiência renal ou administração exógena (DUTRA, 2012), contudo, os animais avaliados não receberam terapia com magnésio e não apresentaram elevação dos níveis de creatinina e uréia, porém não foi realizada urinálise ou outro exame complementar para avaliação de função renal para o estudo. Está relacionada com perdas gastrointestinais, deficiência dietética, uso de medicamentos como aminoglicosídeos ou diuréticos, entre outros fatores (LIMAYE *et al.*, 2011). As duas pacientes em que se verificou o distúrbio apresentavam afecção gastrointestinal e caquexia respectivamente, possíveis causas para depleção dos níveis de magnésio.

Para a classificação da SIRS foram avaliados critérios quanto à temperatura (hipertermia ou hipotermia), frequência cardíaca (taquicardia), frequência respiratória (taquipnéia) e leucograma (leucocitose ou leucopenia). Para serem considerados positivos deveriam preencher dois ou mais dos critérios previamente estabelecidos (PLUNKETT, 2006; ISOLA *et al.*, 2013). Ao observar a Tabela 5 constata-se que mais da metade dos animais avaliados (53,8%) estavam de fato em SIRS, corroborando com o encontrado por Hagman *et al.* (2009), que ao avaliar 53 cadelas, 57% apresentavam-se em SIRS.

Sabe-se que na piometra há liberação de mediadores inflamatórios que podem em um efeito cascata ativar outros mediadores e citocinas que culminam em uma reação sistêmica caracterizando a síndrome, esta, é desencadeada a partir da liberação de endotoxinas bacterianas que lesionam diretamente as células endoteliais por ativação e adesão descomedida de neutrófilos, cursando com aumento da permeabilidade vascular. Concomitantemente, ocorre a liberação de citocinas estimulada pelas próprias células de defesa, no qual se eleva o fator tecidual, participante da cascata de coagulação, e instala-se um quadro pró-coagulação que cursa com deposição de fibrinas na microcirculação predispondo o organismo a hipóxia tecidual em vários locais, além de aumentar o consumo de anticoagulantes naturais predispondo a instauração de coagulação intravascular disseminada (CID), agravando ainda mais o quadro clínico das pacientes (BARTON, 2007).

Por isso, estudos demonstram que estar ou não em SIRS é um fator determinante no prognóstico (BRADY & OTTO, 2001; FRANSSON *et al.*, 2007; HAGMAN *et al.*, 2009), isto é, quando em SIRS o prognóstico é sempre reservado, de modo que, a identificação precoce dos sinais característicos de SIRS é fundamental para instauração de tratamento de suporte rápido e eficiente.

CONCLUSÃO

Observou-se que 84,6% dos animais com piometra apresentaram pelo menos um eletrólito em desequilíbrio e que estar em SIRS não necessariamente altera o equilíbrio eletrolítico. Ademais, verificou-se que a amplitude de onda T e desnível de segmento ST, parâmetros que sugerem distúrbios eletrolíticos no eletrocardiograma, não são suficientes para o diagnóstico. Quanto à predisposição de pacientes com piometra à arritmias, verificou-se que a arritmia sinusal é a mais comum, e que não está atrelada à SIRS. Visto isso, ressalta-se a necessidade e a importância da dosagem de eletrólitos em todos os casos de piometra e reforça-se a indicação de exame eletrocardiográfico na rotina clínica veterinária.

REFERÊNCIAS

BARTON, L. **Sepsis and the Systemic Inflammatory Response Syndrome**. In: Fossum, T.W. *Small Animal Surgery*. St.Louis: Mosby, p.124, 2007.

- BRADY, C. A.; OTTO, C. M. Systemic inflammatory response syndrome, sepsis, and multiple organ dysfunction. **Veterinary Clinics: Small Animal Practice**, v. 31, n. 6, p. 1147-1162, 2001.
- BRANCH, C. E.; ROBERTSON, B. T.; WILLIAMS, J. C. Frequency of second-degree atrioventricular heart blocks in dogs. **American journal of veterinary research**, v.36, n. 7, p. 925-929, 1975.
- CARLSTEDT, F. *et al.* Hypocalcemia during porcine endotoxemic shock: effects of calcium administration. **Critical care medicine**, v. 28, n. 8, p. 2909-2914, 2000.
- CARVALHO, C. F. *et al.* Pre-operative electrocardiography evaluation in 474 dogs. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 61, n. 3, p. 590-597, 2009.
- CARVALHO FILHO, A. S. *et al.* Síndrome de Wolff-parkinson-white em cães. Relato de dois casos. **Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science**, v. 40, n. supl., p. 150-151, 2003.
- DIBARTOLA, S. P. Fluid, Electrolyte, and Acid-Base Disorders in Small Animal Practice-E-Book. Elsevier Health Sciences, 2011.
- DUTRA, V. F. *et al.* Desequilíbrios hidroeletrólitos na sala de emergência. **Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica**. São Paulo, v. 10, n. 5, p. 410-9, 2012.
- ETTINGER, S. J. & FELDMAN, E. C. **Tratado de medicina interna veterinária: doenças do cão e do gato**. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 2256.
- FANTONI, D. & SHIH, A. C. Perioperative Fluid Therapy. **Veterinary Clinics Of North America: Small Animal Practice**, v. 47, n. 2, p.423-434, 2017.
- FERREIRA, P. C. C. *et al.* Avaliação da terapia com fluido no período perioperatório da ovariossalpingohisterectomia, em cadelas com piometra e insuficiência renal aguda. **Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science**, v. 47, n. 4, p. 282-292, 2010.
- FRANSSON, B. A. *et al.* C-reactive protein, tumor necrosis factor α , and interleukin-6 in dogs with pyometra and SIRS. **Journal of veterinary emergency and critical care**, v. 17, n. 4, p. 373-381, 2007.
- GABAY, A. **Eletrocardiografia**. In: BELENERIAN, G. C.; MUCHA, C. J.; CAMACHO, A. A. Afecções cardiovasculares em pequenos animais. São Caetano do Sul – SP: Interbook Com. Imp. Livros Ltda., 2003, p. 46-51.
- GOODWIN, J. K. **Eletrocardiografia**. In: TILLEY, L. P.; GOODWIN, J. K. Manual de cardiologia para cães e gatos. São Paulo: Roca, 2002, p. 39-65.
- HAGMAN, R. *et al.* Blood lactate levels in 31 female dogs with pyometra. **Acta Veterinaria Scandinavica**, v. 51, n. 1, p. 2, 2009.
- HAGMAN, R. *et al.* Cardiac troponin I levels in canine pyometra. **Acta Veterinaria Scandinavica**, v. 49, n. 1, p. 6, 2007.
- HEDLUND, C.S. **Cirurgia dos Sistemas Reprodutivo e Genital**. In: FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais, Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 702-774.
- ISOLA, J. G. M. P. *et al.* Estudo descritivo da frequência de SIRS, sepse, sepse grave e choque séptico, diagnosticadas ao atendimento na sala de urgência, e relacionada com a mortalidade em cães com gastroenterite. **Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP**, v. 11, n. 2, p. 80-82, 2013.
- JITPEAN, S. *et al.* Closed cervix is associated with more severe illness in dogs with pyometra. **BMC veterinary research**, v. 13, n. 1, p. 11, 2016.
- JITPEAN, S. *et al.* Increased concentrations of Serum amyloid A in dogs with sepsis caused by pyometra. **BMC veterinary research**, v. 10, n. 1, p. 273, 2014.
- JITPEAN, S. *et al.* Outcome of pyometra in female dogs and predictors of peritonitis and prolonged postoperative hospitalization in surgically treated cases. **BMC veterinary research**, v. 10, n. 1, p. 6, 2014.

JOHNSON, R.; SWARTZ, M. H. **Eletrocardiografia: uma abordagem simplificada**. Rio de Janeiro: Guanabara S.A., 1988, p. 15-19.

KALENSKI, T.A. *et al.* Identificação das bactérias envolvidas na sepse grave de fêmeas caninas com piometra submetidas a ovariário-histerectomia terapêutica. **Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science**, v. 49, n. 2, p. 130-138, 2012.

LIMAYE, C. S. *et al.* Hypomagnesemia in critically ill medical patients. **Journal of the Association of Physicians of India**, v. 59, n. 1, p. 19-22, 2011.

LUNNEY, J.; ETTINGER, S. J. **Arritmias Cardíacas**. In: Tratado de medicina interna veterinária. São Paulo: Editora Manole Ltda., 1997, p. 1338-81.

MAMÃO, L. D. *et al.* Avaliação hemogasométrica em cadelas com piometra. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 67, n. 5, p. 1241-1248, 2015.

MIROWSKI, M. Left atrial rhythm: diagnostic criteria and differentiation from nodal arrhythmias. **American Journal of Cardiology**, v. 17, n. 2, p. 203-210, 1966.

PLUNKETT, S. J. **Procedimentos de emergência em pequenos animais**. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2006, p. 101-109.

ROSNER, M. H. *et al.* Electrocardiography in the patient with the Wolff-Parkinson-White syndrome: diagnostic and initial therapeutic issues. **The American journal of emergency medicine**, v. 17, n. 7, p. 705-714, 1999.

STOCKHAM, S.L.; SCOTT, M.A. **Gases sanguíneos, pH sanguíneo e diferença de íons fortes**. In: STOCKHAM, S.L.; SCOTT, M.A. Fundamentos de patologia clínica veterinária. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

TILLEY L. P.; SMITH F. W. K. **Electrocardiography**. In: OYAMA, M.A.; SLEEPER M.M.; SMITH F.W.K.; TILLEY JUNIOR L.P. Manual of canine and feline cardiology. Saunders Elsevier: Missouri, 2008. p.49-77.

TILLEY, L. P. **Essential of canine and feline electrocardiography**. 3. ed. Philadelphia: Lea & Febiger, 1992, 470p.

TILLEY, L.P. & GOODWIN, J. **Manual of canine and feline cardiology**. 3. ed. Philadelphia: WB Saunders, 2000, 560 p.

WANKE, M. M. & GOBELLO, C. **Reproduction en caninos y felinos domésticos**. Buenos Aires: Intermédica editorial, 2006, p. 309-315.

WARE, W. A. **Overview of electrocardiography**. In WARE, W.A. Cardiovascular Disease in Small Animal Medicine. London: Manson Publishing Ltd, 2007. p. 47-66.

WARE W. A. **Diagnostic tests for the cardiovascular system**. In: NELSON R.W.; COUTO, C.G. Small Animal Internal Medicine. 5. ed. Missouri: Elsevier, 2013. p.12-52.

WOLF, R.; CAMACHO, A. A. & SOUZA, R. C. A. Computerized electrocardiography in dogs. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 52, n. 6, p. 610-615, 2000.

ZALOGA, G. P. & CHERNOW, B. The multifactorial basis for hypocalcemia during sepsis: studies of the parathyroid hormone-vitamin D axis. **Annals of internal medicine**, v. 107, n. 1, p. 36-41, 1987.

CAPÍTULO 7

EFEITO ANTIARRÍTMICO DOS ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA-3 EM CÃO

ANTIARRHYTHMIC EFFECT OF OMEGA-3 FATTY ACIDS IN A DOG

Tainá Minuzzo

Universidade Federal da Fronteira Sul, Realeza - Paraná
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9248-0704>

Estela Dall'Agnol Gianezini

Universidade Federal da Fronteira Sul, Realeza - Paraná
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1446-3511>

Julia Pereira da Silva

Universidade Federal da Fronteira Sul, Realeza - Paraná
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0703-1542>

Danielli de Oliveira Loeve

Universidade Federal da Fronteira Sul, Realeza - Paraná
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8248-3699>

Stefanie Lazzaretti

Universidade Federal da Fronteira Sul, Realeza - Paraná
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1498-4891>

Matheus Felipe Souza Franco

Universidade Federal da Fronteira Sul, Realeza - Paraná
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3322-0267>

Tatiana Champion

Universidade Federal da Fronteira Sul, Realeza - Paraná
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7346-1620>

*Autor correspondente, e-mail: tatiana.champion@uffs.edu.br

RESUMO

Um complexo ventricular prematuro (VPC) é caracterizado por um batimento ectópico oriundo dos ventrículos, ocorrendo de forma precoce quando comparado a um ritmo preexistente. Sabe-se que VPC isolados apresentam alto potencial de progressão para arritmias mais graves, como taquicardia e fibrilação ventricular. O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso de uma canina, Labrador Retriever, com sete meses de idade, diagnosticada com complexos ventriculares prematuros isolados, por meio de uma avaliação eletrocardiográfica prévia à ovariossalpingohisterectomia eletiva. Dadas as alterações evidenciadas, optou-se pela realização do eletrocardiograma contínuo (Holter) para melhor avaliação cardíaca, onde verificou-se 8.135 batimentos ectópicos, isolados, com origem multifocal em ventrículo direito durante um período de 24 horas. Frente a isso, optou-se pela prescrição de ômega 3 na dosagem de 2000mg, uma vez ao dia, pela via oral. Após alguns meses da implementação do tratamento medicamentoso, observou-se melhora considerável do quadro, dada a redução das ectopias para

o número de um batimento em 24 horas, demonstrando desse modo, que a administração de ômega 3 possui propriedades antiarrítmicas.

Palavras-chave: Complexo Ventricular Prematuro; Eletrocardiograma; Holter.

ABSTRACT

A premature ventricular complex (PCV) is characterized by an ectopic beat coming from the ventricles, occurring earlier when compared to a preexisting rhythm. It is known that isolated VPC have a high potential for progression to more severe arrhythmias such as tachycardia and ventricular fibrillation. The present work aims to report the case of a seven-month-old Labrador Retriever, diagnosed with isolated premature ventricular complexes, through an electrocardiographic evaluation prior to elective ovariosalpingohysterectomy. Given the changes evidenced, we chose to perform continuous electrocardiogram (Holter) for a better cardiac assessment, where 8,135 isolated ectopic beats were found, with multifocal origin in the right ventricle during a 24-hour period. In view of this, we opted for the prescription of omega 3 at a dosage of 2000mg, once a day, orally. After a few months of drug treatment implementation, there was a considerable improvement in the condition, given the reduction of ectopia to the number of one beat in 24 hours, thus demonstrating that the administration of omega 3 in patients with CPV is beneficial.

Keywords: Premature ventricular complex; Electrocardiogram; Holter.

INTRODUÇÃO

Os complexos ventriculares prematuros (VPC) são as arritmias ventriculares mais comuns em cães (NOSZCYK-NOWAK *et al.*, 2017), sendo caracterizada por batimentos ectópicos oriundo dos ventrículos, os quais ocorrem de forma precoce quando comparado a um ritmo preexistente (GUYTON; HALL, 2006). Embora os VPC isolados rotineiramente não desencadeiam repercussões hemodinâmicas para os animais, os mesmos podem progredir para arritmias mais graves, como taquicardia e fibrilação ventricular (TILLEY; SMITH JR, 2007). Portanto, uma redução na sua ocorrência pode ser benéfica.

Estudos em humanos, têm demonstrando que o ômega 3 apresenta um alto potencial antiarrítmico subjacente a seu efeito cardioprotetor, capaz de reduzir a incidência de morte súbita ulterior à quadros de arritmia (DE LEÓN; GUPTA; MORÁN-PINZÓN, 2018; BUCHHORN; BAUMANN; WILLASCHEK, 2019; BUCHHORN; WILLASCHEK, 2019; DINICOLANTONIO; OKEEFE, 2020;). Contudo, estudos na medicina veterinária envolvendo o uso do ômega 3 para esse fim, ainda são escassos (NASCIUTTI *et al.*, 2021).

O objetivo deste trabalho, é relatar o caso de uma paciente canina, Labrador Retriever, com sete meses de idade, diagnosticada com complexos ventriculares prematuros isolados com

origem em ventrículo direito, que apresentou melhora relevante após a implementação de protocolo terapêutico contendo ácidos graxos ômega 3.

RELATO DE CASO

Foi atendida na Superintendência Unidade Hospitalar Veterinária da Universidade Federal da Fronteira Sul (SUHV - UFFS), para avaliação eletrocardiográfica prévia à ovariosalpingohisterectomia (OSH) eletiva, uma paciente da espécie canina, Labrador Retriever, com sete meses de idade, pesando 18 kg. A mesma não evidenciava alterações no exame físico e nem apresentava um histórico clínico condizente com adversidades envolvendo o sistema cardiovascular.

O exame eletrocardiográfico (ECG) foi realizado com a paciente devidamente posicionada em decúbito lateral direito e sem contenção farmacológica. Os dados foram obtidos por meio de eletrocardiógrafo digital (ECG PC -TEB®, versão 2.27), nas derivações DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF, com sensibilidade de 1 cm e 1 mV e velocidade de 25 mm/seg durante cinco minutos. Avaliou-se a frequência cardíaca, ritmo, eixo elétrico ventricular, medidas de amplitude (milivolts – mV) e duração (milissegundos – ms) de todas as ondas e intervalos na derivação DII (onda P, intervalo PR, complexo QRS, segmento ST, intervalo QT e onda T). Os valores propostos por Tilley, Smith Jr (2007) e Wolf, Camacho, Souza (2000) foram considerados como referências para a espécie.

O traçado eletrocardiográfico evidenciou arritmia sinusal com eixo elétrico ventricular de 25° (referência entre 40 – 100°), compatível com desvio de eixo à direita. Ademais, observou-se ciclos cardíacos precoces, isolados, com ausência de ondas P, sucedidos de complexos QRS bizarros e largos (duração de 73 ms) (referência até 60 ms), alterações essas, que condizem com o diagnóstico de complexos ventriculares prematuros isolados com origem multifocal em ventrículo direito, os quais totalizavam 53 batimentos em cinco minutos. As demais mensurações eletrocardiográficas, estavam dentro da normalidade (Figura 1).

Figura 1. Registro eletrocardiográfico obtido de uma fêmea Labrador Retriever, de sete meses de idade, durante avaliação pré-operatória. Observa-se arritmia sinusal associada a ocorrências de complexos ventriculares prematuros polimórficos isolados, com origem em ventrículo direito (derivação II, velocidade de 25 mm / 1 cm = 1 mV de sensibilidade).

Frente as alterações observadas no traçado eletrocardiográfico, optou-se pela realização do eletrocardiograma contínuo (Holter) para melhor avaliação cardíaca.

Para a execução do exame, utilizou-se o aparelho de Holter CardioLight® (Cardios Sistemas, São Paulo, Brasil), com sistema de eletrodos de 4 vias e 3 canais. A área de colocação dos eletrodos foi previamente tricotomizada, sucedida da assepsia com álcool 70%. Posteriormente, foi efetuado a colagem dos eletrodos respeitando o seguinte posicionamento: eletrodo branco, sobre o manúbrio; eletrodo verde, no quinto espaço intercostal direito; eletrodo preto, no sexto espaço intercostal esquerdo e eletrodo vermelho, sobre o processo xifóide. Com o auxílio de uma bandagem e esparadrapo, o aparelho foi fixado junto a coluna torácica do animal, onde permaneceu durante as 24 horas sucedentes. Após esse período, o exame foi interpretado com o auxílio do *software* CardioManager S540® (Cardios Sistemas, São Paulo, Brasil).

O exame demonstrou a presença de 8.135 ectopias ventriculares isoladas, com origem multifocal em ventrículo direito, durante todo o período de avaliação (Figura 2). Dada a problemática evidenciada, optou-se pela prescrição de ômega 3 (2000mg/SID/VO).

Figura 2. A) Número de ectopias ventriculares encontradas ao longo das 24 horas de monitoração com o Holter. B) Setas: Complexos ventriculares prematuros isolados, originados em focos distintos do ventrículo direito.

Dois meses após o início do tratamento com o ômega 3, realizou-se um novo exame eletrocardiográfico contínuo, o qual evidenciou melhora do quadro, dada a redução das ectopias ventriculares de 8.135 para 32 batimentos em 24 horas, embora tenha se mantido a originalidade dos impulsos em múltiplos focos do ventrículo direito (Figura 3). Devido a isso, optou-se por manter o tratamento que já havia sido prescrito para a paciente e acompanhamento semestralmente.

Figura 3. A) Número de ectopias ventriculares encontradas ao longo das 24 horas de monitoração com o Holter, após dois meses de tratamento com ômega 3. B e C) Setas: Complexos ventriculares prematuros isolados, com morfologias distintas um do outro, indicando a origem multifocal em ventrículo direito.

A última avaliação da paciente, evidenciou uma melhora considerável quando comparado ao quadro inicial, na medida que se observou apenas uma ectopia ventricular em 24

horas (Figura 4). Demonstrando dessa forma, a boa eficiência do ômega 3 no controle das arritmias ventriculares.

Figura 4. Número de ectopias ventriculares encontradas ao longo das 24 horas de monitoração com o Holter, após oito meses de tratamento com ômega 3.

DISCUSSÃO

Os batimentos com QRS alargado são frequentemente encontrados em um traçado eletrocardiográfico e apresentam como principais diferenciais diagnósticos, as ectopias ventriculares e ectopias supraventriculares com aberrância (PIMENTA; CURIMBABA; MOREIRA, 2009). Apesar da grande similaridade morfológica do complexo QRS entre essas alterações, ambas diferem em alguns critérios específicos (NOGUEIRA; PIMENTEL; ZIMERMAN, 2011).

Sabe-se que ectopias supraventriculares com aberrância apresentam prematuridade mínima, onda P sucedida de complexo QRS, QRS alargados que tendem a estreitar após alguns batimentos, bem como a presença de um batimento semelhante em outro local do traçado com o diagnóstico supraventricular. Em relação às ectopias ventriculares, estas apresentam batimentos prematuros com onda P ausente (FRIEDMANN, 2017).

Diante dessas considerações, verifica-se que a paciente do relato apresentava batimentos ventriculares, visto que todas as ectopias se comportavam de forma prematura e sem onda P precedente ao complexo QRS alargado, alterações essas que são denominadas como VPC, ou complexo ventricular prematuro (GUYTON; HALL, 2006).

Os VPCs têm origem abaixo do nó atrioventricular por meio de um impulso conduzido estritamente pelos cardiomiócitos do ventrículo (NELSON; COUTO, 2015). Os impulsos ectópicos não possuem acesso ao sistema de Purkinje, o que leva a propagação e ativação ventricular anormal, interferindo diretamente na duração do complexo QRS, que de modo geral, se apresenta mais prolongado que o comum (CUNNINGHAM; KLEIN, 2014). Esse tipo de padrão pode ser visto em números baixos em animais normais (<50 dentro de 24 horas monitoradas por Holter) (GUYTON; HALL, 2006; NELSON; COUTO, 2015), diferentemente do que foi observado no caso acima relatado, visto que foram encontrados 8.135 batimentos ectópicos em 24 horas na primeira avaliação por Holter.

Os complexos ventriculares prematuros podem ser classificados conforme a sua morfologia em, unifocal/monomórfico, quando o complexo QRS apresenta a mesma morfologia e polaridade durante todo exame (CARVALHO *et al.*, 2019) ou multifocal/polimórfico, quando o complexo QRS demonstra configurações divergentes de morfologia na amplitude e/ou polaridade durante o exame (CARVALHO *et al.*, 2019; NELSON; COUTO, 2015), situação essa evidenciada no presente relato de caso, que sugere que o impulso elétrico foi originado em vários locais diferentes. Ademais, VPCs multifocais

podem cursar com aumento da instabilidade elétrica e aumentar o potencial de degeneração resultando em uma arritmia maligna (NELSON; COUTO, 2015).

Dentre outras características que podem ser consideradas como critérios de malignidade, estão a morfologia do ritmo ventricular e a taxa de disparo de um VPC, portanto, em casos onde há disparo rápido de um VPC e este ocorre próximo ao pico da onda “T” anterior (fenômeno R-on-T), a despolarização durante esse intervalo pode viabilizar a ocorrência de fibrilação ventricular (ESTRADA; PARIAT, 2020), contudo esse fenômeno não foi observado no presente caso, de tal modo que o único critério de malignidade encontrado é a origem multifocal dos disparos ectópicos.

Quanto ao diagnóstico, a eletrocardiografia (ECG) é um método essencial para detecção de arritmias ventriculares (CARVALHO *et al.*, 2018), podendo ser realizado de diversas formas, por exemplo, no ECG curto realiza-se o monitoramento por até dez minutos ou com duração de um minuto repetidos a cada hora, mas, no geral, os traçados eletrocardiográficos mostram uma porção muito reduzida da atividade diária elétrica, e isso pode ser insuficiente para detectar arritmias transitórias, que podem ser variáveis e intermitentes, ou pode ainda subestimar a gravidade das mesmas (TESLENKO; FRIES; SELMIC, 2021, CARVALHO *et al.*, 2018). Apesar disso, é considerado uma medida importante de segurança para avaliar novos meios diagnósticos relacionados ao sistema cardiovascular (COOLS, 2011).

Os monitores Holters superam estas limitações do ECG curto, pois permitem a avaliação retrospectiva de toda a atividade elétrica cardíaca, sendo superior para diagnóstico de arritmias em cães (TESLENKO; FRIES; SELMIC, 2021). O eletrocardiograma ambulatorial de 24 horas (AECG) com gravador de monitoramento Holter é utilizado para avaliar cães quanto à presença de VPCs associados a cardiomiopatia dilatada oculta, doença cardiovascular congênita ou síncope (MEURS, 2001). Contudo, o Holter não permite uma interpretação em tempo real e tomada de decisão clínica em caso de emergências (TESLENKO; FRIES; SELMIC, 2021).

Já a radiotelemetria gravável tem capacidade de oferecer a mesma quantidade de informações que o Holter, além de estar imediatamente disponível em tempo real (TESLENKO; FRIES; SELMIC, 2021). Esta técnica tornou-se o padrão mundial na avaliação de ECG, viabilizando estudos de longo prazo do ECG sem qualquer interferência da anestesia ou manejo que provoque estresse (COOLS, 2011). A telemetria pode ser implantada, que é um método cirúrgico invasivo, ou pode ser aplicada externamente por novos sistemas de monitoração, sendo uma ferramenta inestimável para obter dados de ECG de alta qualidade (CHUI, 2009).

Foi realizado ECG curto na paciente do relato, o qual evidenciou 53 batimentos ectópicos em cinco minutos de monitoração. Devido ao fato de ter sido encontrado VPCs no

ECG curto, optou-se pela realização da monitorização com Holter durante 24 horas, com o objetivo de caracterizar a atividade elétrica cardíaca diária do paciente e para melhor avaliação. Como foi demonstrado anteriormente, a telemetria é também uma forma de monitoração contínua, a qual é indicada principalmente para animais que apresentem alterações de ritmo elétrico que ocasionem risco iminente de óbito (taquicardia ventricular sustentada e fibrilação ventricular), dado que o mesmo possibilita avaliar alterações eletrocardiográficas em tempo real, de modo a possibilitar a intervenção clínica de maneira rápida caso imprescindível. Contudo, a paciente do relato não apresentava histórico de manifestações clínicas condizentes com adversidades de ritmo cardíaco malignas, não necessitando desse modo, de um exame que a avaliasse em tempo real. Ainda, por se tratar de um método invasivo e não acessível na região do estudo, se tornou um método diagnóstico dispensável no presente caso, sendo o Holter o exame que atendeu melhor as exigências.

A terapêutica de ectopias ventriculares é abrangente e muito tem-se discutido a respeito da suplementação com ômega 3 no controle dessa arritmia (NASCIUTTI *et al.*, 2021). Efeitos benéficos foram notados através do seu uso em cães da raça Boxer, portadores de cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito, onde o número de VPCs, após o uso de ômega-3 durante 6 semanas, caiu de uma média de 543 para 193, demonstrando que o mesmo pode ser útil no tratamento da doença (SMITH *et al.*, 2007). Essa redução no número de VPCs também foi encontrada no paciente do presente relato, dada a diminuição de 8.135 ectopias para apenas um batimento em 24 horas, conforme evidenciado nas monitorações (Figura 4).

Acredita-se que o ômega-3 tenha efeitos indiretos sobre sistema nervoso autônomo, ocasionando a inibição dos canais de cálcio tipo L e canais de sódio rápidos dependentes de voltagem, embora haja necessidade de mais estudos (CHENG; SANTONI, 2008). Segundo Nasciutti *et al.* (2021) o ômega-3 possui propriedades cardioprotetoras e também se revelou eficaz no tratamento de cães com doença mixomatosa da valva mitral, embora não seja o caso do paciente do relato. A substância demonstrou-se benéfica quanto a medidas ecocardiográficas mais favoráveis (sobretudo quanto à sobrecarga de volume), redução do VHS (Vertebral Heart Size) e na redução em 2,96 vezes a chance de arritmias nesses pacientes, indicando, assim como visto no paciente do presente relato, amplas possibilidades do uso do ômega-3, tanto em pacientes com alterações cardíacas morfológicas quanto de condução elétrica (NASCIUTTI *et al.*, 2021).

Comparando os resultados do relato com os efeitos pró-arrítmicos descritos dos ácidos graxos ômega-3 nota-se uma inconsistência. Um intervalo QT aumentado pode prolongar o tempo sem contração cardíaca, o que induz potenciais de ação prematuros, exatamente o que

deseja evitar em um tratamento de um cão com arritmia (PANOULAS *et al.*, 2014). Analisando essa informação, o uso de ômega-3 significaria um risco para o animal, ao contrário do que foi observado após o tratamento. Foi utilizado a dose de 2000mg/SID/VO, a qual se enquadra em recomendações descritas na literatura, que é entre 500 a 2000 mg/animal/dia. Valendo-se da dose recomendada, não houve reações adversas ao tratamento, demonstrando uma segurança na aplicação do ômega 3 como opção terapêutica ao tratamento de arritmias (DOVE, 2001; GIANNICO *et al.*, 2013;).

Apesar desses estudos proporem efeitos pró-arrítmicos dos ácidos graxos ômega 3, as evidências dos benefícios antiarrítmicos são mais consolidadas na literatura (VON SCHACKY, 2008). As consequências positivas do ômega 3 são descritas em várias espécies e os estudos em cães têm bons resultados, como o paciente do relato, o que demonstra que as evidências pró-arrítmicas devem ser pesquisadas para serem melhor embasadas e elucidadas (SMITH *et al.*, 2007; DEN RUIJTER *et al.*, 2007).

CONCLUSÃO

A suplementação dietética com ácidos graxos ômega 3, contribuiu para a redução significativa no número de batimentos ectópicos em um cão diagnosticado com complexos ventriculares prematuros, evidenciando dessa forma, o efeito cardioprotetor da suplementação de EPA e DHA, com propriedades antiarrítmicas.

FONTES DE FINANCIAMENTO

Bolsa de estudo do Programa de Demanda Social – CAPES

Bolsa PIBIS – UFFS/ Fundação Araucária

REFERÊNCIAS

BUCHHORN, R.; BAUMANN, C. & WILLASCHEK, C. Alleviation of arrhythmia burden in children with frequent idiopathic premature ventricular contractions by omega-3-fatty acid supplementation. **International Journal of Cardiology**, v. 291, n. 15, p. 52 – 56, 2019.

BUCHHORN, R. & WILLASCHEK, C. Resolution of a therapy-resistant focal atrial tachycardia after omega-3 fatty acid supplementation. **Cardiology in the Young**, v. 29, n. 7, p. 989 – 992, 2019.

CARVALHO, E.R. *et al.* Cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito em cães da raça Boxer: atualidades no diagnóstico e tratamento. **Archives of Veterinary Science**, v. 23, n. 2, p. 1-16, 2018.

CARVALHO, E. R. *et al.* Prognostic value of coupling interval, prematurity index and heart rate variability in Boxer dogs. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 39, p. 635-642, 2019.

CHENG, J. W. M. & SANTONI, F. Omega-3 fatty acid: a role in the management of cardiac arrhythmias?. **Journal of Alternative and Complementary Medicine**, v. 14, n. 8, p. 965-974, 2008.

COOLS, F. *et al.* ECG arrhythmias in non-implanted vs. telemetry-implanted dogs: Need for screening before and sufficient recovery time after implantation. **Journal of Pharmacological and Toxicological Methods**, v. 64, n. 1, p. 60-67, 2011.

CUNNINGHAM, J. G. & KLEIN, B. G. **Tratado de Fisiologia Veterinária**. 5ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. p. 624.

DEN RUIJTER, H. M. *et al.* Pro-and antiarrhythmic properties of a diet rich in fish oil. **Cardiovascular research**, v. 73, n. 2, p. 316-325, 2007.

DHEIN, S.; MICHAELIS, B. & MOHR, F. W. Antiarrhythmic and electrophysiological effects of long-chain ω -3 polyunsaturated fatty acids. **Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology**, v. 371, n. 3, p. 202-211, 2005.

DINICOLANTONIO, J. J. & OKEEFE, J. The benefits of marine omega-3s for preventing arrhythmias. **Open Heart**, v. 7, n. e000904, p. 1 – 5, 2020.

DE LEÓN, E.G.; GUPTA, M.P.; MORÁN-PINZÓN, J.A. **Beneficial Effects of Omega-3 Fatty Acids on Cardiovascular Disease**. In: CABALLERO-GEORGE, C. Natural Products and Cardiovascular Health, Panama: CRC Press, 2018. p. 46.

DOVE, R. S. Nutritional therapy in the treatment of heart disease in dogs. **Alternative Medicine Review**, v. 6, Suppl., p. 38-45, 2001.

ESTRADA, A. H. & PARIAUT, R. **Ventricular Arrhythmias**. In: BRUYETTE, D. Clinical Small Animal Internal Medicine. Hoboken: Wiley – Blackwell, 2020. p. 199-204.

FRIEDMANN, A. A. Discutindo critérios para o diagnóstico de taquicardia ventricular. **Diagnóstico & Tratamento**, v. 22, n. 1, p. 35-38, 2017.

GIANNICO, A. T. *et al.* Suplementação alimentar para o paciente cardiopata – revisão de literatura. **Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária**, v. 11, n. 20, 2013.

GUYTON, A.C. & HALL, J.E. **Tratado de Fisiologia Médica**. 11º ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. p. 150 – 152.

MUNOZ, F.D.C. *et al.* Characteristics of premature ventricular complexes as correlates of reduced left ventricular systolic function: study of the burden, duration, coupling interval, morphology and site of origin of PVCs. **Journal of cardiovascular electrophysiology**, v. 22, n. 7, p. 791-798, 2011.

NASCIUTTI, P. R. *et al.* Protective effects of omega-3 fatty acids in dogs with myxomatous mitral valve disease stages B2 and C. **Plos One**, v. 16, n. 7, p. e0254887, 2021.

NELSON, R. & COUTO, C. G. **Medicina interna de pequenos animais**. 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2015. p. 4442.

NOGUEIRA, F.L.; PIMENTEL, M. & ZIMERMAN, L.I. Taquicardia com complexo QRS alargado: além do diagnóstico diferencial tradicional entre taquicardia ventricular versus taquicardia supraventricular com condução aberrante. **Revista da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul**, v. 19, n. 21, p. 1 - 6, 2011.

NOSZCYK-NOWAK, A. *et al.* Prevalence of arrhythmias in dogs examined between 2008 and 2014. **Journal of Veterinary Research**, v. 61, n. 1, p. 103-110, 2017.

PANOULAS, V. F. *et al.* Prolonged QTc interval predicts all-cause mortality in patients with rheumatoid arthritis: an association driven by high inflammatory burden. **Rheumatology**, v. 53, n. 1, p. 131-137, 2014.

PIMENTA, J.; CURIMBABA, J. & MOREIRA, J.M. Diagnóstico diferencial e tratamento das taquicardias com QRS largo. **Revista da Sociedade Brasileira de Cardiologia de São Paulo**, v. 19, n. 2, p. 150 - 161, 2009.

SMITH, C. E. *et al.* Omega-3 fatty acids in Boxer dogs with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. **Journal of Veterinary Internal Medicine**, v. 21, n. 2, p. 265-273, 2007.

TESLENKO, A.; FRIES, R.C. & SELMIC, L.E. Comparison of in-hospital continuous electrocardiography versus recordable Holter monitoring in dogs with ventricular arrhythmias. **Journal of Veterinary Emergency and Critical Care**, p 1-8, 2021.

TILLEY, L. P. & SMITH JR, F.W.K. **Electrocardiography**. In: TILLEY, L.P.; SMITH JR, F.W.K.; OYAMA, M.; SLEEPER, M.M. Manual of canine and feline cardiology. St Louis (MO): Saunders Elsevier, 2007, p. 49-77

MEURS, K. M. *et al.* Use of ambulatory electrocardiography for detection of ventricular premature complexes in healthy dogs. **Journal of the American Veterinary Medical Association**, v. 218, n. 8, p. 1291-1292, 2001.

VISCHER, A.S. *et al.* Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy in Boxer dogs: the diagnosis as a link to the human disease. **Acta Myologica**, v. 36, n. 3, p. 135-150, 2017.

VON SCHACKY, Clemens. Omega-3 fatty acids: antiarrhythmic, proarrhythmic or both?. **Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care**, v. 11, n. 2, p. 94-99, 2008.

WOLF, R.; CAMACHO, A.A. & SOUZA, R.C.A. Computerized electrocardiography in dogs. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária**, v. 52, n. 6, p. 610 – 615, 2000.

CAPÍTULO 8

OCORRÊNCIA DE *ANCYLOSTOMA SP.* EM MACACO-PREGO (*SAPAJUS LIBIDINOSUS*) – RELATO DE CASO
OCCURRENCE OF *ANCYLOSTOMA SP.* IN CAPUCHIN MONKEY (*SAPAJUS LIBIDINOSUS*) - CASE REPORT

Brenda Lopes Paiva

Mestranda em Biotecnologia, Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0776-7461>

Aline Martins Venuto

Residente em Saúde Animal integrada à Saúde Pública, Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2333-3281>

Maria Eduarda Rodrigues Martins Alves

Discente do curso de Medicina Veterinária, Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2445-1151>

Maria Janeila Carvalho Soares

Discente do curso de Medicina Veterinária, Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3294-8798>

Maria Perla Farias Marques

Discente do curso de Medicina Veterinária, Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4570-3995>

Antônio Matheus Gomes Pereira

Mestre em Biotecnologia, Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7421-8227>

Robson dos Anjos Honorato

Docente Medicina Veterinária, Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6640-1363>

Jessica Maria Leite dos Santos

Docente Medicina Veterinária, Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5505-9673>

Victor Alves Carneiro

Docente Mestrado Biotecnologia, Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0116-0957>

Geysa Almeida Viana

Docente Medicina Veterinária, Centro Universitário Inta – UNINTA, Sobral - CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3339-446X>

*Autor correspondente, e-mail: geysaalmeidav@hotmail.com

RESUMO

O estudo de parasitos gastrointestinais de primatas torna-se importante para o manejo da população e preservação da saúde de pessoas contactantes, visto que muitos desses parasitos possuem potencial zoonótico. A degradação de florestas promoveu um maior contato entre pessoas e animais silvestres, aumentando os riscos de transmissão dessas doenças. Neste contexto, o *Ancylostoma sp.* é considerado um dos helmintos nematódeos de ocorrência em primatas, causando alterações gastrointestinais, que vão depender do estado imunológico e nutricional do animal. O presente relato objetivou descrever um caso de ancilostomose em um macaco-prego, fêmea, da espécie *Sapajus libidinosus*, resgatado na cidade de Sobral, Ceará. Após o recebimento, o animal permaneceu sob cuidados intensivos, apresentando quadro de diarreia, desidratação, perda de peso, anemia, dentre outras alterações. Para diagnóstico, além de outros exames complementares, foi realizado o exame parasitológico de fezes, utilizando os métodos de sedimentação espontânea (Hoffman, Pons e Janner) e flutuação espontânea (Willis), com o objetivo de verificar presença de ovos pesados, como de trematódeos e cestódeos, e ovos leves como de *Ancylostoma sp.*, sendo ambos os métodos qualitativos. O resultado foi positivo para *Ancylostoma sp.* na técnica de Willis. Recomendou-se como medida terapêutica a associação de febendazol, pamoato de pirantel e praziquantel, seguida de repetição da técnica para avaliação da eficácia do tratamento, entretanto, no segundo exame coproparasitológico o animal permaneceu positivo para *Ancylostoma sp.* pelo método de Willis, iniciando-se então um novo protocolo terapêutico com Albendazol. Diante disso, esse relato confirmou a ocorrência da presença de *Ancylostoma sp.* em um macaco-prego fêmea, abordando sobre o tratamento e evidenciando a importância da manutenção da saúde dos primatas para conservação da espécie em colônias e cativeiro, diminuindo assim o risco de infecções cruzadas entre esses animais e o homem, que tem aumentado consideravelmente devido a degradação de seu habitat natural.

Palavras-chave: exame coproparasitológico; endoparasitose; primatas.

ABSTRACT

The study of gastrointestinal primate parasites becomes important for population management and health preservation of contacted people, since many of these parasites have zoonotic potential. Forest degradation has promoted greater contact between people and wild animals, increasing the risk of transmitting these diseases. In this context, *Ancylostoma sp.* it is considered one of the nematode helminths that occur in primates, causing gastrointestinal alterations, which will depend on the animal's immunological and nutritional status. This report aimed to describe a case of hookworm in a female capuchin monkey of the species *Sapajus libidinosus*, rescued in the city of Sobral, Ceará. Upon receipt, the animal remained under intensive care due to its debilitated state, presenting diarrhea, dehydration, weight loss, anemia, among other changes. For diagnosis, in addition to other complementary tests, the parasitological examination of feces was performed, using the methods of spontaneous sedimentation (Hoffman, Pons and Janner) and spontaneous fluctuation (Willis), in order to verify the presence of heavy eggs, such as trematodes and cestodes, and soft eggs such as *Ancylostoma sp.*, both being qualitative methods. The result was positive for *Ancylostoma sp.* in the Willis technique. The association of febendazole, pyrantel pamoate and praziquantel was recommended as a therapeutic measure, followed by repetition of the technique to evaluate the effectiveness of the treatment, however, in the second coproparasitological examination, the animal remained positive for *Ancylostoma sp.* by the Willis method, starting then a new

therapeutic protocol with Albendazol. Therefore, this report confirmed the occurrence of the presence of *Ancylostoma* sp. in a female capuchin monkey, addressing the treatment and highlighting the importance of maintaining the health of primates for conservation of the species in colonies and captivity, thus reducing the risk of cross-infection between these animals and humans, which has increased considerably due to degradation of its natural habitat.

Keywords: coproparasitological examination; endoparasitosis; primates.

INTRODUÇÃO

A degradação das florestas e fragmentação dos habitats dos primatas vem favorecendo o aparecimento de infecções parasitárias, visto que os animais passam a ocupar áreas menores e permanecem mais tempo no mesmo ambiente, aumentando a exposição a agentes patogênicos (MARTINS, 2002). Essa degradação acaba promovendo também uma maior proximidade entre os humanos e esses animais, fato este que aumenta a probabilidade de exposição desses agentes entre o homem e essas espécies, facilitando a transmissão de doenças (MARTINS, 2002; VERONA, 2008).

As endoparasitoses são enfermidades comuns em animais silvestres, entretanto, pesquisas que abordem essa temática ainda são relativamente escassas na medicina veterinária (VERONA; PISSINATTI, 2014; ALCÂNTARA *et al.*, 2016). São diversos os agentes parasitando primatas não humanos, todavia, a grande maioria está adaptada aos seus hospedeiros (VERONA, 2008).

Segundo Santos (2006), os animais acometidos podem não desenvolver sintomatologia clínica, apresentar manifestações graves ou até mesmo ocorrer o óbito, sendo as taxas de morbidade e mortalidade dependentes de fatores como a espécie do parasito, carga parasitária, estado nutricional e da resposta imunológica do hospedeiro (GOMES, 2011; VERONA; PISSINATTI, 2014).

Os primatas provavelmente são infectados por formas parasitárias infectantes encontradas no solo através de vegetais, frutas ou pela água (MUNENE *et al.*, 1998). Segundo Stuart *et al.* (1998) e Kindlovits; Kindlovits (2009), o *Ancylostoma* sp. é um dos helmintos de ocorrência em primatas, com potencial zoonótico, que apresenta um alto risco de infecção cruzada com o homem.

A ancilostomose causada pelo *Ancylostoma* sp. acomete diversas espécies como cães, gatos e primatas (ALCÂNTARA *et al.*, 2016). A doença pode se desenvolver de forma cutânea, pela penetração de larvas infectantes na pele, ou de forma sistêmica, quando se fixam ao

intestino delgado do hospedeiro e causam alterações gastrointestinais (QUADROS *et al.*, 2014). Dentre as espécies de *Ancylostoma sp.*, o *A. duodenale* é responsável por atingir o intestino delgado de humanos e primatas não humanos (KINDLOVITS; KINDLOVITS, 2009).

Diante disso, tornam-se importantes estudos sobre parasitos gastrointestinais em primatas não humanos, tanto para o manejo da colônia e conservação das espécies quanto para promover a saúde das pessoas contactantes, pois muitos desses parasitos são causadores de zoonoses (MUNENE *et al.*, 1998). Além disso, o acompanhamento dos sinais clínicos e tratamento, assim como as formas de controle, devem ser considerados, quando se trata de endoparasitoses que possam causar infecção cruzada entre o homem e primatas.

Neste contexto, o objetivo deste relato é descrever a ocorrência de um caso de ancilostomose, causada por *Ancylostoma sp.*, em um macaco-prego, fêmea, da espécie *Sapajus libidinosus*, resgatado e encaminhado para atendimento na cidade de Sobral, Ceará.

RELATO DE CASO

Foi recebido para atendimento um macaco-prego da espécie *Sapajus libidinosus*, resgatado pela Polícia Ambiental da cidade de Sobral-CE. O animal, identificado como fêmea, pesando 1 kg, foi encontrado no chão e com poucos reflexos. Por se tratar de um animal resgatado, não havia histórico prévio, sendo o exame físico realizado de forma minuciosa. Foi observado que o animal apresentava nível de consciência diminuído, apatia severa, caquexia, turgor cutâneo permanente, tempo de preenchimento capilar (TPC) de 3 segundos, pelos opacos e sem brilho e retração ocular, caracterizando desidratação intensa. O animal apresentava as extremidades frias, porém com temperatura corporal de 38,1°C, glicemia de 76 mg/dL e mucosas ocular e oral hipocoradas. Também foram observadas crostas em região periocular, lesões bilaterais em região palmar e plantar, além da presença de muitas formigas por todo corpo (Figura 1A).

Figura 1. A: Macaco-prego da espécie *Sapajus libidinous* resgatado pela Polícia Ambiental de Sobral, apresentando apatia e lesão em região palmar (seta vermelha). **B:** Animal apresentando sinais característicos de desidratação como pelagem opaca, sem brilho e enoftalmia (retração ocular). Apresenta também secreção mucopurulenta (seta amarela).

Nos primeiros dias de tratamento o animal apresentava dificuldades para manter-se em pé, com andar cambaleante e dificuldade de segurar objetos e alimentos. Além disso, nesse mesmo período o animal apresentou diarreia, secreção nasal e ocular com característica mucopurulenta.

Foram solicitados como exames complementares hemograma completo, análises bioquímicas como alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (FA), proteínas totais (PT) e frações (albumina e globulina), uréia e creatinina, além do exame parasitológico de fezes.

De acordo com os valores de referências disponíveis para a espécie foi possível observar que o animal apresentava como principais alterações anemia, neutropenia, e monocitose, além do número de leucócitos estarem próximo ao limite mínimo de referência (Tabela 1). Na interpretação dos exames bioquímicos, observaram-se níveis de ureia abaixo do valor de referência, fosfatase alcalina (FA) diminuída, aumento de creatinina, proteína total diminuída, bem como sua fração albumina (Tabela 2). No exame parasitológico de fezes foram observados a presença de ovos de *Ancylostoma sp.* (Figura 2).

Tabela 1. Resultado do hemograma completo realizado em macaco-prego fêmea com respectivos valores de referência para a espécie.

Hemograma	Resultado (%)	Resultado (cél/s/ μ l)	Verona; Pissinatti (2014)
Proteínas plasmáticas (g/dL)	7,6		
Volume Globular (%)	23		45 – 53
Hemoglobina (g/dL)	7,6		14 – 17
CHCM (%)	33,0		
Leucócitos (cél/s/ μ l)	5.382		5.000 – 24.000
Neutrófilos Segmentados	53	2852,46	55
Eosinófilos	0	0	
Linfócitos	40	2152,8	41
Monócitos	7	376,74	1,8
Plaquetas ($\times 10^3$ / μ L)	113		108 – 187

Observações: plasma discretamente hemolisado. Hemácias hipocoradas, anisocitose moderada, presença de Corpúsculos de Howell-Jolly e poiquilocitose discreta (codócitos). Presença de neutrófilos tóxicos, monócitos ativados e pontilhados basofílicos. **Fonte:** Acervo HOVET-UNINTA (2019).

Tabela 2 - Resultados dos exames bioquímicos realizados em macaco-prego (*Sapajus libidinosus*) e valores de referência para a espécie.

Bioquímicos	Resultado	Faverato <i>et al.</i> , (2016)
Creatinina (mg/dL)	1,16 mg/dL	0,50 – 0,98
Ureia (mg/dL)	12,30 mg/dL	19 – 49
Proteínas totais (g/dL)	0,54 g/dL	7,0 – 8,2
Globulina (g/dL)	0,46 g/dL	
Albumina (g/dL)	0,08 g/dL	3,3 – 4,8
ALT (U/L)	05,20 U/L	0 – 12
Fosfatase Alcalina (U/L)	07,60 U/L	41 – 456

Fonte: Acervo HOVET-UNINTA (2019)

Figura 2. Resultado de exame coproparasitológico com a utilização do método de Willis demonstrando a presença de ovos de *Ancylostoma sp.* (setas pretas) em um macaco-prego fêmea (*Sapajus libidinosus*). Objetiva de 10x.

A conduta terapêutica foi realizada de acordo com as manifestações clínicas e alterações laboratoriais apresentadas pelo animal. Devido às condições de desidratação e caquexia, realizou-se fluidoterapia associada à suplementação endovenosa constante, na taxa de 1 microgota a cada 3 segundo com ringer com lactato e Cloreto de sódio a 0,9%.

Os fármacos utilizados na terapia sintomática do animal foram: estimulador de apetite (Apevitin BC®) à base de ciproetptadina, tiamina e ribofavina, na dose de 0,1 mL/kg, a cada 12 horas; vitaminas do complexo B e C (Belcomplex® e Vitamina C gotas), nas doses de 2mL/animal e 200mg/animal respectivamente, a cada 24 horas. A acetilcisteína foi administrada como mucolítico na dose de 5mg/kg, a cada 12 horas, até a completa remissão dos sinais de secreção respiratória. O sucralfato foi utilizado como protetor gástrico na dose de 25mg/kg, a cada 12 horas e um antioxidante hepático e fitoterápico (Silimarina) foi administrado na dose de 25 mg/kg, a cada 24 horas.

Outros medicamentos foram administrados de acordo com as alterações laboratoriais apresentadas como, por exemplo, suplemento rico em vitaminas e ferro (Hemolitan Pet®) (1 gota/kg a cada 12 horas) devido à anemia, e um imunomodulador à base de timomodulina (Leucogen®), na dose de 2mL/animal a cada 12 horas.

Para melhora do quadro respiratório e da consistência das secreções foram realizadas nebulizações com NaCl a 0,9% e Dexametasona (5mL de solução fisiológica + 0,5 mL de dexametasona), além da utilização de antibióticos como Amoxicilina (11 mg/kg, a cada 12 horas) e Metronidazol (25 mg/kg, a cada 12 horas), utilizado como suporte também ao trato gastrointestinal. Devido aos episódios de diarreia observados, também foi oferecido leite fermentado rico em lactobacilos para auxiliar na melhora da restauração da microbiota intestinal. A limpeza das secreções oculares eram realizadas com solução fisiológica, e em seguida instilado colírio antibiótico composto de Tobramicina (Tobrex®) (1 gota/olho a cada 4 horas).

Foi administrado uma associação de Febendazol, Pamoato de Pirantel e Praziquantel (Vetmax plus®) na dose de 0,1 mL/kg, por 3 dias consecutivos, para o tratamento da ancilostomose, contudo, após o tratamento foi realizado um novo exame coproparasitológico seguindo a metodologia de Willis, e como resultado o animal permaneceu apresentando ovos de *Ancylostoma sp*, mesmo após esse protocolo terapêutico, sendo então iniciado uma nova conduta com outro anti-helmíntico recomendado para a espécie nessa doença (Albendazol, 25 mg/kg a cada 12 horas por 5 dias).

Por questões de logística e para o bem-estar do animal, ocorreu a translocação do mesmo para o Centro de Triagem de Animais Silvestres - CETAS de Fortaleza durante o segundo

protocolo terapêutico, não sendo então possível repetir um novo exame coproparasitológico após a sua conclusão.

DISCUSSÃO

O contato crescente dos seres humanos com animais domésticos e silvestres pode promover o aparecimento de doenças transmitidas, com grandes impactos na saúde pública (VERONA, 2008; CLEAVELAND, 2001), como é o caso das parasitoses. Assim como nos humanos, os nematódeos são um dos endoparasitas mais ocorrentes relatados em primatas (MUNENE *et al.*, 1998).

Comumente são encontrados parasitas gastrointestinais em primatas não humanos, tanto os cativos como os de vida livre (MARTIN-SOLANO, 2017). Esses animais são considerados vulneráveis aos efeitos causados pelas infecções parasitárias devido à permanência em grupos sociais fechados, facilitando a transmissão (STONER *et al.*, 2005).

O *Ancylostoma sp.* é um dos helmintos nematódeos dentre os mais comuns relatados em primatas não humanos, sendo responsável por causar a ancilostomose, uma doença que causa alterações gastrointestinais e possui risco de transmissão ao homem (STUART, 1998; KINDLOVITS; KINDLOVITS, 2009; CARMO, 2011). Alcântara *et al.* (2016) realizaram um estudo coproparasitológico em 22 amostras de fezes de macacos-prego da espécie *Cebus libidinosus* no Estado do Piauí e obtiveram, como resultados, a presença de parasitas do gênero *Ancylostoma* em 45% das amostras analisadas (10/22), através do método de Willis.

Em sua pesquisa por enteroparasitas na espécie *Alouatta guariba* (bugio-ruivo) em cativeiro, no Estado de Santa Catarina, Müller *et al.*, (2000) encontraram, em 165 amostras de fezes, protozoários e nematódeos, incluindo *Ancylostoma sp.* A presença desses parasitos confirmou que existem contaminações em cativeiro, ligadas ao contato com outros macacos, fezes, animais domésticos e até o homem. Segundo Kindlovits; Kindlovits (2009) as alterações clínicas apresentadas por primatas com ancilostomose incluem perda de peso, desidratação e diarreia, manifestações que corroboram com as apresentadas pelo paciente do relato.

De acordo com Moraes; Leite; Goulart (2008), a fixação de larvas adultas (L5) de *Ancylostoma sp.* na mucosa intestinal, por meio dos seus dentes da cápsula bucal, promovem ações traumáticas e lesões no intestino do hospedeiro. Essas lesões são responsáveis pela sintomatologia da ancilostomose ligada ao trato digestório, como diarreia e apetite perturbado causando hiperoxia e, por vezes, anorexia, alteração observada no paciente do relato. A

presença de muco nas fezes, descrita pelos mesmos autores, também corroboram com a manifestação apresentada pelo animal.

Os exames laboratoriais são de extrema importância para avaliar a saúde do animal, estado imunológico, auxiliar no diagnóstico e tratamento de patologias, além de mostrarem as evoluções clínicas do paciente (NAVES *et al.*, 2006; FLAIBAN *et al.*, 2008). De acordo com Lima *et al.* (2014) os parâmetros hematológicos e bioquímicos de primatas ainda são escassos e conflitantes. Segundo Taylor; Coop; Wall, (2017); Kindlovits; Kindlovits, (2009) as alterações hematológicas associadas à ancilostomose em primatas não humanos são semelhantes às observadas em humanos e outros animais, sendo destacada, principalmente, a anemia devido à atividade hematófaga do parasito.

Leite (2012) relata que a detecção de hipoalbuminemia está relacionada com a diminuição da capacidade de síntese da albumina pelo fígado, devido a uma hepatopatia ou por desnutrição, conforme o paciente do relato, que apresentava estado de condição corporal caquético simultaneamente a uma hipoalbuminemia. Alterações nos resultados de exames bioquímicos também foram observadas, como diminuição dos valores de FA, que pode estar relacionada com desnutrição, diarreia e anemia intensa, manifestações clínicas apresentadas pelo paciente.

No primeiro exame parasitológico de fezes, o animal apresentou ovos de *Ancylostoma sp.*, sendo então iniciado o protocolo com associação dos fármacos Febendazol, Pamoato de Pirantel e Praziquantel e recomendou-se a repetição da técnica ao final do tratamento. No segundo exame coproparasitológico o animal continuou apresentando grande quantidade de ovos de *Ancylostoma sp.* mesmo após o tratamento, entretanto, a bula do medicamento utilizado descreve que o mesmo possui ação contra *A. braziliense*, *A. caninum* e *A. tubaeforme*, não agindo contra *A. duodenale*, espécie esporadicamente relatada em primatas não humanos (KINDLOVITS; KINDLOVITS, 2009), podendo esse fato chamar atenção quanto a permanência da presença de ovos ainda após o primeiro protocolo terapêutico.

Medidas de controle e profilaxia devem ser adotadas ao entrar em contato com as fezes e o ambiente em que os animais possivelmente parasitados se encontram, devendo sempre fazer uso de luvas de procedimentos durante as atividades, para a manutenção da saúde dos contactantes (EVARISTO *et al.*, 2019). Além disso, é importante a descontaminação ambiental, visto que é uma doença que possui alto risco de infecção cruzada com o homem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo de endoparasitas em primatas torna-se importante por demonstrar os conhecimentos sobre o estado de saúde do animal e o potencial de infecções cruzadas entre primatas e humanos, entretanto, ainda são considerados relativamente escassos.

Diante disso, esse trabalho evidenciou a ocorrência da presença de *Ancylostoma sp.* em um macaco-prego fêmea, da espécie *Sapajus libidinosus*, demonstrando a importância dos cuidados de manejo e controle da doença para conservação da espécie em colônias e cativeiro, sempre considerando a importância do diagnóstico do parasita e tratamento adequado, objetivando-se, assim, a manutenção da saúde dos primatas e a diminuição do risco de infecções cruzadas entre o homem e esses animais, o qual tem aumentado consideravelmente devido a degradação de seu habitat natural.

REFERÊNCIAS

ALCÂNTARA, D. S. *et al.* Estudo coproparasitológico da espécie *Cebus libidinosus* (macaco-prego). **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v.68, n.6, p.1609- 1612, 2016.

CARMO, E. S. **Perfil das helmintíases zoonóticas de cães no município de Salvaterra-Pa.** Bélem, 2011. Originalmente apresentada como dissertação de mestrado. Universidade Federal do Pará, 2011.

CLEAVELAND, S. Diseases of humans and their domestic mammals: pathogen characteristics, host range and the risk of emergence. **Philosophical Transactions of the Royal Society of London B**, p. 991-999, 2001.

EVARISTO, T. A. *et al.* Frequência de *Ancylostoma spp.* em amostras fecais ambientais nas praças públicas de Pedro Osório, RS. **PUBVET**, v.13, n.4, p.1-7, 2019.

FLAIBAN, K. K. M. C. *et al.* Valores hematológicos de bugios pretos (*Alouatta caraya*) de vida livre da região do Alto Rio Paraná, sul do Brasil. **Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.**, v.61, n.3, p. 628-634, 2008.

GOMES, C. W. C. **Levantamento de helmintos gastrintestinais em primatas de vida livre e cativeiro na região de Grande Porto Alegre, RS.** Porto Alegre: UFRGS, 2011. P 1-33.

KINDLOVITS, A. & KIDLOVITS, L. M. **Clínica e Terapêutica em Primatas Neotropicais.** 2ª ed. Rio de Janeiro: L.F livros, 2009. 535 p.

LEITE, A. C. R. Ancylostomatidae. In: **Parasitologia Humana.** São Paulo: Editora Atheneu, 2012. cap 30. p. 281-289.

MARTIN-SOLANO, S. *et al.* Gastrointestinal parasites in captive and free-ranging *Cebus albifrons* in the Western Amazon, Ecuador. **International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife**, 2017.

MARTINS, S. S. **Efeitos de fragmentação de hábitat sobre a prevalência de parasitoses intestinais em *Alouatta belzebul* (Primates, Platyrrhini) na Amazônia Oriental.** Belém, 2002. Originalmente apresentada como dissertação de mestrado, Universidade Federal do Pará, 2002.

MORAES, R. G.; LEITE, I.C. & GOULART, E.G. **Parasitologia e Micologia Humana.** 5ªed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 589 p.

MÜLLER, G. C. K. *et al.* Levantamento preliminar de endoparasitas do tubo digestivo de bugios *Alouatta guariba clamitans*. **Neotrop. Primates** v.8, n.3, p. 107–108, 2000.

MUNENE, E. *et al.* Helminth and protozoan gastrointestinal tract parasites in captive and wild-trapped African non-human primates. **Veterinary Parasitology**, 1998.

NAVES, E.A. *et al.* VALORES HEMATOLÓGICOS DE MACACO PREGO (*Cebus apella* - Línnaeus, 1758) EM CATIVEIRO. **Biosci. J.**, v. 22, n. 2, p. 125-131, 2006.

QUADROS, R.M. *et al.* Ancylostoma spp. em cães de rua de Lages, Santa Catarina: variáveis epidemiológicas e coinfeção parasitária. **PUBVET**, Londrina, v. 8, n. 19, p. 1-12, 2014.

SANTOS, M.V.S. **Levantamento de helmintos intestinais em bugio-ruivo, *Alouatta guariba* (primates, atelidae) na mata Ribeirão Cachoeira, no distrito de Souza**s. São Paulo, 2006. Originalmente apresentada como dissertação de mestrado, Universidade Estadual de São Paulo, 2006.

STONER, K.E. *et al.* Infecciones de parásitos intestinales de primates: implicaciones para la conservación. **Universidad y Ciencia**, n. 2, p. 61-72, 2005.

STUART, M.D. Parasites of Wild Howlers (*Alouatta* spp.). **International Journal of Primatology**, v. 19, n. 3, 1998.

TAYLOR, M.A.; COOP, R.L.; WALL, R.L. **Parasitologia Veterinária**. 4ªed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 3789 p.

VERONA, C.E.D. **Parasitos em sagüi-de-tufo-branco (*Callithrix jacchus*) no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro, 2008. Originalmente apresentada como tese de mestrado, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, 2008.

VERONA, C. E.; PISSINATTI, A. Primatas do Novo Mundo (Sagui, Macaco-prego, Macaco-aranha, Bugio e Muriqui). In: **Tratado de animais selvagens**. 2ª ed. São Paulo: ROCA, 2014, cap. 34, p. 807-828.

Índice Remissivo

Ácidos graxos 95, 97, 104 e 105
Ancylostoma sp 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119 e 120
Animais silvestres 110, 111 e 116
Arritmias 96, 101, 103, 104 e 105
Calota craniana 19, 21, 22, 24 e 25
Canino 33, 49, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 64, 74, 75 e 93
Cão 26, 27, 29, 30, 32, 35, 42, 43, 47, 48, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 73, 76, 77, 92, 95 e 105
Células redondas 48, 57 e 60
Células tumorais 12, 13, 30, 41, 43 e 48
Cistite 64 e 74
Citologia 48, 54, 57 e 60
Colangiocarcinoma extra-hepático 2, 3, 5, 12, 15 e 16
Complexo Ventricular Prematuro 95 e 102
Ducto biliar 3, 4, 9, 12, 13, 14 e 15
Eletrocardiografia 79, 80, 92, 93 e 103
Eletrocardiograma 82, 89, 91, 95, 96, 98 e 103
Eletrólitos 79, 80, 81, 83, 87, 89 e 91
Endoparasitose 110 e 111
Exame coproparasitológico 110, 115, 116, 117 e 118
Felinos 4, 13, 15, 17, 20, 21, 26, 77 e 93
Gatos 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 30, 31, 44, 60, 61, 64, 73, 75, 77, 92 e 111
Hidrocefalia 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 27
Histologia 30
Holters 103
Infecção uterina 81
Líquido cefalorraquidiano 19, 20, 23, 24 e 26
Longevidade 30 e 31
Macaco-prego 109, 110, 112, 113, 114, 115, 119 e 120
Neoplasia 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 30, 31, 33, 35, 37, 42, 43, 44, 48, 49, 60 e 74
Oncologia 3, 4 e 44
Ovariosalpingohisterectomia 81, 95 e 97
Parasitos 32, 35, 44, 110, 111, 112, 117, 119 e 120
Piometra 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93
Primatas 110, 111, 112, 117, 118 e 120
Sistema cardiovascular 80, 97 e 103
Seminoma 29, 30, 31, 32, 35, 40, 41, 42, 43 e 44
Testicular 30, 31, 32, 34, 35, 37, 41, 43, 44 e 45
Trato urinário 64, 76 e 77
Tumor Venéreo Transmissível 47, 48, 49, 54, 60 e 61
Urólito 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75 e 76
Vesícula biliar 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 17
Zoonótico 110 e 111