ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS

JOYCE RESENDE DOS SANTOS GONÇALVES
MYLENA ANDRÉA OLIVEIRA TORRES
(ORGANIZADORAS)

ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS

JOYCE RESENDE DOS SANTOS GONÇALVES
MYLENA ANDRÉA OLIVEIRA TORRES
(ORGANIZADORAS)

2021 by Luminus Editora
Copyright do texto © Autores
Revisão – Corpo Editorial

Editora chefe

Profa. Dra. Mylena Andréa Oliveira Torres

Editor Adjunto

Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo

Diagramadora

Bruna Torres Alves

Esta obra está licenciada com uma
Licença Creative Commons.

Atribuição-Não Comercial-Sem
Derivações 4.0 Internacional.

DOI: <https://doi.org/10.29327/553933>

Equipe Editorial Ciências Biológicas e da Saúde

Dra. Adriana Sousa Rego

Dr. Adriano Filipe Barreto Grangeiro

Dr. Fabio Raphael Pascoti Bruhn

Dra. Mylena Andréa Oliveira Torres

Me. Raul Franklim de Carvalho Almeida

Me. Tatiana Cristina Fonseca Soares de Santana

Dr. Tayron Sousa Amaral

Me. Yuri Nascimento Fróes

Luminus Editora

São Luís – Maranhão – Brasil

Telefone: +55 (98) 984138480

www.luminuseditora.com

contato@luminuseditora.com

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Índices para catálogo sistemático:

Estudos epidemiológicos [livro eletrônico] /
organização Joyce Resende dos Santos
Gonçalves, Mylena Andréa Oliveira Torres. --
São Luís, MA: Luminus Editora, 2021.
PDF

Bibliografia.
ISBN 978-65-89948-07-0

1. Epidemiologia - Brasil 2. Saúde pública
I. Gonçalves, Joyce Resende dos Santos. II. Torres,
Mylena Andréa Oliveira.

21-91754

CDD-614.4
NLM-WA-100

Índices para catálogo sistemático:

1. Epidemiologia: Saúde pública 614.4
Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

APRESENTAÇÃO

Na epidemiologia, nos deparamos com uma ampla variedade de estudos sobre o processo saúde-doença tanto em seres humanos, como animais, que objetiva analisar a distribuição e os fatores determinantes das doenças, e eventos associados à saúde coletiva, sendo necessário um aprimoramento contínuo e estudos locais que possam subsidiar dados que contribuam com a identificação de fatores de risco e de populações susceptíveis.

A obra “Estudos Epidemiológicos” congrega a experiência de diversos pesquisadores, professores e estudantes na área de epidemiologia e saúde pública, que compartilham temas de grande importância para a área da saúde. Nesta primeira edição, foram abordados artigos com séries temporais, estudos de caso e mais. São apresentados capítulos versando sobre zoonoses, doenças transmitidas por vetores, como arboviroses, bem como estudos com idosos, gestantes, doenças sexualmente transmissíveis, qualidade de vida. Esperamos que os indicadores de saúde gerados nos trabalhos possam contribuir para entender e prevenir enfermidades, além de proporcionar o bem-estar das populações.

Agradecemos profundamente aos autores, pesquisadores, revisores e a equipe da Luminus Editora, que contribuíram para concretização dessa obra. Esperamos encorajar outros estudantes e profissionais a encontrar exemplos locais relevantes e contribuírem com o volume 2 desta obra. Desejamos uma ótima leitura a todos!

As organizadoras.

AS ORGANIZADORAS

Joyce Resende dos Santos Gonçalves

Acadêmica de Medicina pela Universidade Ceuma. Monitoria voluntária de Habilidades Médicas I (2019-2019). Ligante da Liga Acadêmica de Oncologia Clínica e Cirúrgica (LAOCC). Ligante da Liga Acadêmica de Semiologia e Medicina Interna (LASEMI). Membro do Doutores do Sorriso (Grupo de voluntários do curso de medicina da Universidade Ceuma) (2018-2019). Estudante no grupo de pesquisa: Grupo de Doenças Infecto-Parasitárias e Metabólicas (GDIPM), da Universidade Ceuma.

Mylena Andréa Oliveira Torres

Possui Graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Especialista em Saúde Pública pela Faculdade INTA, Mestre em Ciência Animal pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e Doutora em Biotecnologia pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Tem experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase a doenças Infecciosas, Saúde Pública, Histologia, Marketing Veterinário e Metodologia da Pesquisa. Pesquisadora dos Grupos de Pesquisas cadastrados no CNPq: Grupo de Doenças Infecto-Parasitárias e Metabólicas (GDIPM-UNICEUMA), Grupo de Imunopatologia (UEMA) e Grupo de Patogenicidade Microbiana (UNICEUMA). Atualmente é Professora de Histologia e Orientação de Monografia do curso de Medicina da Universidade Ceuma.

SUMÁRIO

Capítulo 1.....	1
Aspectos clínicos-epidemiológicos da leishmaniose tegumentar humana no município de São Luís, Maranhão, Brasil, no período de 2009 a 2019.	
Doi: https://doi.org/10.29327/553933.1-1	
Capítulo 2.....	12
Análise temporal dos casos reportados de leishmaniose visceral e coinfecção leishmaniose visceral-HIV na população do Rio Grande do Norte no período de 2010 a 2019	
Doi: https://doi.org/10.29327/553933.1-2	
Capítulo 3.....	27
Raiva Humana: Perfil clínico-epidemiológico no Estado do Maranhão, período de 2009 a 2019	
Doi: https://doi.org/10.29327/553933.1-3	
Capítulo 4.....	41
Perfil epidemiológico da doença de Chagas aguda no estado do Maranhão no período de 2010 a 2020.	
Doi: https://doi.org/10.29327/553933.1-4	
Capítulo 5.....	51
Perfil epidemiológico da tuberculose no estado do Maranhão no período de 2010 a 2020	
Doi: https://doi.org/10.29327/553933.1-5	
Capítulo 6.....	60
Perfil epidemiológico de sífilis em gestantes, na cidade de São Luís - MA, no período de 2010 a 2020	
Doi: https://doi.org/10.29327/553933.1-6	
Capítulo 7.....	69
Panorama da dor lombar em gestantes	
Doi: https://doi.org/10.29327/553933.1-7	
Capítulo 8.....	81
Avaliação da qualidade do sono em idosos	
Doi: https://doi.org/10.29327/553933.1-8	
Capítulo 9.....	97
Equilíbrio e o risco de quedas em idosos com diagnóstico de diabetes	
Doi: https://doi.org/10.29327/553933.1-9	
Capítulo 10.....	108
O uso inadequado de métodos contraceptivos como fator predisponente à gravidez na adolescência: um recorte no semiárido brasileiro	
Doi: https://doi.org/10.29327/553933.1-10	

Capítulo 11.....	123
-------------------------	------------

Avaliação do conhecimento de mulheres sobre diabetes mellitus

Doi: <https://doi.org/10.29327/553933.1-11>

Índice Remissivo.....	135
------------------------------	------------

CAPÍTULO 1

ASPECTOS CLÍNICOS-EPIDEMIOLÓGICOS
DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR HUMANA
NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, MARANHÃO,
BRASIL, NO PERÍODO DE 2009 A 2019

Capítulo 1

ASPECTOS CLÍNICOS-EPIDEMIOLÓGICOS DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR HUMANA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, MARANHÃO, BRASIL, NO PERÍODO DE 2009 A 2019

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF HUMAN TEGUMENTARY LEISHMANIASIS IN THE MUNICIPALITY OF SÃO LUÍS, MARANHÃO, BRAZIL, FROM 2009 TO 2019

Ruan Carlos Silva De Jesus

Biomédico, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4377-9707>

E-mail: ruansilvacarlos@outlook.com

Joyce Resende dos Santos Gonçalves

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0365-6382>

E-mail: joycesantosgoncalves@gmail.com

João Guilherme Nantes Araújo

Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2430-1081>

E-mail: joaonantesbio@gmail.com

Chrisley Batista Ramos dos Santos

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2857-2401>

E-mail: chrisleybatista@gmail.com

Lemuel Kalil da Silva Vieira

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6955-6619>

E-mail: lemuel115908@ceuma.com.br

Marcelly Kelmanny da Luz Sampaio

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6705-2233>

E-mail: marcellysampaio20@hotmail.com

Milena de Jesus Marinho Garcia de Oliveira

Faculdade Santa Teresinha -CEST, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0214-8346>

Email: mile.gmj@gmail.com

Yuri Nascimento Fróes

Docente do Curso de Farmácia da Faculdade Florence, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0928-0980>

E-mail: yurifroes@outlook.com

Mylena Andréa Oliveira Torres

Docente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5021-3130>

E-mail: mylena.torres@hotmail.com

Joicy Cortez de Sá Sousa

Pós-graduação em Biologia Microbiana, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8678-0244>

*Autor correspondente, e-mail: joicyvet@hotmail.com

RESUMO

As leishmanioses são caracterizadas como antropozoonoses de diferentes formas clínicas, causadas por protozoários do gênero *Leishmania*, transmitida por mosquitos flebotomíneos infectados. Em cerca de 85 países a leishmaniose tegumentar (LT) é caracterizada como uma questão de saúde pública, onde anualmente são notificados de 0,7 a 1,3 milhões de novos casos. Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa foi analisar os aspectos clínicos e epidemiológicos da Leishmaniose Tegumentar Humana no município de São Luís (MA), entre os anos de 2009 a 2019. Trata-se de um estudo descritivo, transversal e retrospectivo, onde foram utilizados dados de notificação, registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde (MS), sem identificação dos indivíduos pesquisados. Os dados mostraram registro de 430 casos confirmados de LT entre 2009-2019, sendo os homens mais acometidos (62%), de idade entre 20 e 39 anos (35%), cor parda (55,6%), escolaridade ignorado/Branco (25,5%) e residentes em zona rural (27,3%). Em relação aos aspectos clínicos, 96,5% dos pacientes notificados apresentavam a forma cutânea e 45,5% com evolução para cura. Desta forma, são necessárias ações mais eficientes no controle desta parasitose, com conscientização contínua e utilização de medidas profiláticas, em especial para o público detectado com maior notificação.

Palavras-chave: Leishmania; Antropozoonose; Endêmica; Negligenciada.

ABSTRACT

Leishmaniasis are characterized as anthroponoses of different clinical forms, caused by protozoa of the genus *Leishmania*, transmitted by the bite of infected sandflies (genus *Lutzomyia*). In about 85 countries cutaneous leishmaniasis (LT) is characterized as a public health issue, where 0.7 to 1.3 million new cases are reported annually. In this context, the objective of this research was to analyze the clinical and epidemiological aspects of Human Tegumentary Leishmaniasis in the city of São Luis (MA), between the years 2009 to 2019. This is a descriptive, cross-sectional and retrospective study, where they were used notification data, registered in the Notifiable Diseases Information System (SINAN) of the Ministry of Health (MS), without identifying the individuals surveyed. The data showed a record of 430 confirmed cases of LT between 2009-2019, with the men most affected (62%), aged between 20 and 39 years (35%), brown (55.6%), ignored education / White (25.5%) and residents in rural areas (27.3%). Regarding the clinical aspects, 96.5% of the notified patients had a cutaneous form and 45.5% evolved to cure. Thus, more efficient actions are needed in the control of this parasitosis, with continuous awareness and use of prophylactic measures, especially for the public detected with greater notification.

Keywords: *Leishmania*; Anthroponosis; Endemic; Neglected.

INTRODUÇÃO

As leishmanioses são caracterizadas como patologias infecciosas causadas por protozoários do gênero *Leishmania*, transmitida a partir da picada de mosquitos flebotomíneos (gênero *Lutzomyia*) infectados, acometendo seres humanos e animais (BLANCO; NASCIMENTO-JUNIOR, 2017). É uma zoonose de ampla ocorrência mundial, distribuindo-se nos quatro continentes (Ásia, Europa, África e América), com relatos históricos de sua existência desde a colonização (PEREIRA, 2017).

Trata-se de uma doença espectral, que de acordo com a espécie de *Leishmania* e resposta imunológica do indivíduo, pode apresentar diferentes formas clínicas. Dentre estas, duas formas clínicas tomam destaque, a Leishmaniose Visceral (LV) e a Leishmaniose Tegumentar (LT), tendo está, maior predominância no número de casos registrados a cada ano, e a LV sendo destacada como a forma mais grave (PELISSARI *et al.*, 2011; DA SILVA NEVES *et al.*, 2020).

A LT, também denominada Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), pelo próprio nome, tem seu predomínio nas Américas. Em cerca de 85 países a LT é caracterizada como uma questão de saúde pública, onde anualmente são notificados de 0,7 a 1,3 milhões de novos casos (BRASIL, 2021).

Em relação aos aspectos clínicos da LT, pontua-se quatro tipos: a leishmaniose cutânea (mais conhecida), mucosa, cutâneo-difusa e disseminada (CERUTTI *et al.*, 2017; BENCHIMOL, 2020). O aparecimento de lesões na pele são a maior característica dessa patologia, contendo aspectos eritêmicos, purulentos, ulcerados e em alguns casos a presença de nódulos e lesões em região de mucosa, dependendo da espécie de *Leishmania*. No Brasil as espécies mais importantes envolvidas no processo da LT são: *Leishmania (Leishmania) amazonensis*, *L. (Viannia) guyanensis* e *L. (V.) braziliensis* (LIMA *et al.*, 2007; MURBACK, 2011).

É importante destacar, que os casos mais graves, relacionados a forma severa da LT está ligada a *L. braziliensis*, causadora das formas mucosa e cutânea. Em todo o Brasil, poucos são os registros sobre hospedeiros silvestres que sirvam de fonte de infecção para a doença, sendo mais comumente cães, cavalos e gatos (GUIMARÃES *et al.*, 2008; COSTA, 2017).

Os casos que apresentam lesões cutâneas únicas, e que evoluem para cura com cicatrização espontânea, estão ligados a *L. amazonensis*, que tem seu predomínio na região da bacia amazônica, onde estão incluídas as florestas primárias e secundárias, que englobam as áreas do Amazonas, Pará, Rondônia e Sudoeste do Maranhão. Nesse tipo, os principais reservatórios da doença são roedores encontrados nessas áreas de mata, servindo de fonte de infecção para os mosquitos vetores da doença. *L. amazonensis* causa as formas de leishmaniose cutânea, cutaneomucosa e a mais recente, leishmaniose cutânea difusa enérgica (GUIMARÃES *et al.*, 2008; COSTA, 2017; CERUTTI *et al.*, 2017).

Sendo uma doença tropical de aspecto infeccioso, mas que não apresenta potencial para ser contagiosa, a LT mesmo com sua significativa endemicidade, é uma parasitose ainda muito negligenciada. Diante deste contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar os aspectos clínicos e epidemiológicos da leishmaniose tegumentar humana, no município de São Luís, Maranhão, Brasil, entre os anos de 2009 a 2019, afim de incitar os órgãos de saúde e a população, na adoção de medidas mais eficazes no controle da doença.

MATERIAL E MÉTODOS

Local do estudo

Esta pesquisa teve como local de estudo o Município de São Luís, capital do Estado do Maranhão. São Luís possui uma extensão territorial de aproximadamente 583,063 km² e sua população estimada em 1.108.975 habitantes no ano de 2020, estando em primeiro lugar, como a cidade com maior índice demográfico do Estado, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020).

Tipo de estudo

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, do tipo série de casos retrospectivo, utilizando-se de dados secundários, referente as notificações dos casos de Leishmaniose Tegumentar Humana (LT), no município de São Luís, no estado do Maranhão, no período de 2009 a 2019.

Obtenção dos dados

Foram utilizados os casos confirmados e notificados de LT, registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde (MS), na plataforma do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), sem identificação dos indivíduos pesquisados.

Variáveis analisadas

Os dados utilizados foram selecionados como “Casos confirmados por Unidade Federativa (UF) de infecção – São Luís/MA e o ano de diagnóstico. Além disso, selecionou-se variáveis sociodemográficas (sexo, faixa etária, raça, escolaridade, zona de residência) e variáveis clínicas, específicas da doença (tipo de entrada, critério de confirmação e evolução).

Análise estatística

Foi realizada estatística descritiva, organizada em cálculos de frequências simples e relativas. As informações coletadas foram tabuladas em banco de dados com a utilização do software Microsoft Excel 2013.

Parâmetros éticos

O trabalho em questão utilizou banco de dados secundários e de domínio público, portanto, dispensa a apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa, conforme determina a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 510, de 7 de abril de 2016.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O município de São Luís - MA, notificou um total de 430 casos confirmados tendo uma média de 43 casos confirmados por ano, de leishmaniose tegumentar em humanos, entre os anos de 2009 a 2019. Ressalta-se que 2016 foi o ano com maior número de registros da doença, contendo 30% dos números de casos (129/430) confirmados dessa série temporal de 10 anos. Em contrapartida, o ano de 2010 teve o menor número de notificações com 3,9% (17/430) confirmados (Tabela 1).

Tabela 1. Distribuição dos casos notificados e confirmados de Leishmaniose Tegumentar Humana (LT) por ano, porcentagem e incidência, conforme dados da população residente no município de São Luís – MA, entre 2009-2019.

Ano	Número de casos	%	População*	Incidência**
2009	21	4,9	-	-
2010	17	3,9	1.014.837	1,67
2011	27	6,4	-	-
2012	31	7,3	-	-
2013	34	7,9	-	-
2014	36	8,3	-	-
2015	39	9	-	-
2016	129	30	-	-
2017	39	6,7	-	-
2018	31	7,3	1.094.667	2,83
2019	36	8,3	1.101.884	3,26
Total	430	100	-	-

*População: Somente disponíveis no IBGE e IMESC os dados demográficos dos anos de 2010, 2018 e 2019.

**Incidência: número de casos LT sobre a população residente multiplicado por 100.000.

Fonte: DATASUS (2021).

É possível observar, de 2010 até 2016, um crescimento no número de casos confirmados de leishmaniose tegumentar em humanos, inicialmente discreto, contudo, com um pico no ano de 2016 (129 casos confirmados) e, notável decréscimo em 2017 (29 casos confirmados). Os anos subsequentes, 2018 e 2019, apresentaram percentuais crescentes, 7,3% e 8,3%, respectivamente. E ao se comparar o número de casos de 2009 e 2019, percebe-se que a doença continua com uma significativa notificação no município de São Luís - MA. Além disso, confrontando a incidência da doença nos anos de 2010, 2018 e 2019, ressaltando que a soma dos anos 2010, 2018 e 2019 (soma = 84 casos) e a soma da população desses anos (3.211.388), corresponderam há uma incidência de 2,61, percebe-se níveis crescentes desta incidência, sendo necessárias, portanto, a implementação de ações mais estratégicas e eficientes para o controle dessa parasitose.

Segundo o último boletim epidemiológico, em 2019 foram confirmados 15.484 casos novos de LT no Brasil e, destes, a maioria eram adultos jovens, na faixa etária de 20 a 49 anos (54,9%), do sexo masculino (75,2%) (Brasil, 2021). Dados estes que estão em concordância com os obtidos nesta pesquisa.

Na qual, do total de 430 casos confirmados entre os anos 2009 a 2019, verificou-se como mais acometidos os indivíduos: do sexo masculino, com 265 (62%) casos confirmados; faixa etária entre 20 a 39 anos, com 151 casos (35%) confirmados e de 40 a 59 anos com 98 (22,7%) casos confirmados; raça parda com predominância de 239 (55,6%) casos confirmados, seguido pela raça preta com 106 (24,7%) casos confirmados (Tabela 2).

Tabela 2. Perfil sociodemográfico dos casos notificados e confirmados de Leishmaniose Tegumentar Humana, no Município de São Luís -MA, período de 2009 a 2019.

VARIÁVEIS	Nº	%
SEXO		
Masculino	265	62
Feminino	165	38
FAIXA ETÁRIA		
< 1 ano	9	2
1 a 4 anos	19	4,4
5 a 9 anos	32	7,5
10 a 14 anos	35	9
15 a 19 anos	27	6
20 a 39 anos	151	35
40 a 59 anos	98	22,7
60 a 64 anos	19	4,4
65 a 69 anos	13	3
70 a 79 anos	18	4
80 e mais anos	9	2

RAÇA		
Ign/Branco	19	4,4
Branca	62	14,5
Preta	106	24,7
Amarela	2	0,4
Parda	239	55,6
Indígena	2	0,4
ESCOLARIDADE		
Ign/ Branco	109	25,5
Analfabeto	25	5,8
1 ^a a 4 ^a série IEF	76	17,6
4 ^a série EFC	49	11,4
5 ^a a 8 ^a série IEF	57	13,4
EFC	33	7,6
EMI	11	2,5
EMC	25	5,8
ESI	2	0,4
ESC	1	0,2
Não se aplica	42	9,8
ZONA DE RESIDÊNCIA		
Ign/ Branco	32	7,5
Urbana	147	34,1
Rural	246	57,3
Periurbana	5	1,1

Observações: Ign. (Ignorado); IEF (Incompleto Ensino Fundamental); EFC (Ensino Fundamental Completo); EMI (Ensino Médio Incompleto); EMC (Ensino Médio Completo); ESI (Ensino Superior Incompleto); ESC (Ensino Superior Completo).

Fonte: DATASUS (2021).

Em relação a escolaridade, os dados apontaram que a maioria estavam enquadrados no item ignorado/Branco, com 109 casos (25,5%), seguido do item de 1^a a 4^a série do Ensino Fundamental Incompleto (EFI), com 76 casos (17,6%), estando esta variável, portanto, caracterizada por pacientes de baixa escolaridade. Além disso, pontua-se o maior predomínio da doença na zona rural com 246 casos (57,3%) confirmados da parasitose (Tabela 2).

De acordo com LESSA *et al.*, (2007) a LT é destacada como uma das maiores endemias que existem no Brasil, tendo forte evidência em toda a América Latina. Estudos realizados por DA SILVA FONSECA *et al.*, (2014) e NEVES *et al.*, (2021), mostraram que essa doença acomete principalmente indivíduos do sexo masculino, de baixa escolaridade e que residem em áreas rurais, resultados estes em concordância com o perfil sociodemográfico apresentado nesta pesquisa.

Indivíduos que residem e/ou desenvolvem atividades na zona rural estão mais expostos a doença, visto que a população residente nesta área, por ser o habitat dos mosquitos flebotomíneos vetores (mosquito-palha), estarão constantemente mais susceptíveis. Áreas tropicais com climas de altas temperaturas estão diretamente envolvidos com a elevada ocorrência de flebotomíneos

causadores de LT em determinadas regiões, implicando uma atenção maior, quanto ao risco de infecção nesses locais (NEGRÃO, 2009).

De acordo com NEVES *et al.*, (2021) a incidência da doença na zona urbana está relacionada a falta de saneamento básico e falta de fiscalização sanitária por parte dos órgãos de saúde do município, associado também, aos casos onde há constante deslocamento da zona urbana para áreas rurais, por conta de trabalhos voltados a agricultura.

No tocante a variável tipo de entrada no sistema de notificação de LT, constatou-se predomínio dos casos novos, com 402 (93,5%) casos em contraste aos 21 (4,9%) casos por recidiva. Em relação a forma clínica os dados apontaram predominância para a forma cutânea da doença, com 415 casos (96,5%). Além dessas, outras variáveis analisadas foi o critério de confirmação da doença, com 327 casos (76%) confirmados por teste Clínico-Laboratorial e sobre a evolução da doença, verificou-se que a maioria dos pacientes, 45,5% evoluíram para cura (Tabela 3).

Tabela 3. Estratificação clínico-laboratorial dos casos notificados e confirmados de Leishmaniose Tegumentar Humana, no Município de São Luís - MA, período de 2009 a 2019.

VARIÁVEIS	Nº	%
TIPO DE ENTRADA		
Ign/ Branco	7	1,6
Caso novo	402	93,5
Recidiva	21	4,9
FORMA CLÍNICA		
Cutânea	415	96,5
Mucosa	15	3,5
CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO		
Clínico-Laboratorial	327	76
Clínico-epidemiológico	103	24
EVOLUÇÃO		
Ign/Branco	43	10
Cura	196	45,5
Abandono	5	1,1
Óbito por outra causa	4	0,8
Transferência	90	20,9
Mudança de Diagnóstico	92	21,7

Fonte: DATASUS (2021).

Segundo PONTELLO JUNIOR; GON; OGAMA (2013) a forma cutânea da LT é encontrada na maioria dos casos, pois é comum a partir dessa forma ocorrer evolução para a forma mucosa da doença, o que evidencia a predominância dos casos confirmados para essa forma clínica da patologia.

De acordo com PELISSARI *et al.*, (2011) a maioria das entradas por casos confirmados devido a recidiva, está relacionado há um tratamento ineficaz onde houve aplicação inferior das doses

recomendadas, sabendo-se que os antimoniais são os fármacos de principal escolha no tratamento dessa parasitose.

O diagnóstico clínico-laboratorial predomina, sendo o primeiro a ser realizado após a entrada do paciente infectado, o mais indicado para o diagnóstico desses tipos de infecções (parasitaria) é aquele onde esteja presente métodos de identificação direta do parasita, entretanto na LT o principal a ser executado e que contém grande especificidade é o teste de reação intradérmica (Teste de Montenegro), além da indicação de análise histopatológica, reação de cadeia da polimerase (PCR) e outros, para maiores confirmações (GUIMARÃES, 2008).

CONCLUSÃO

O presente estudo mostrou o aumento da incidência dos casos confirmados de LT no Município de São Luís, Maranhão, Brasil, entre os anos de 2009 a 2019. O perfil clínico-epidemiológico desses casos foi caracterizado pela predominância de homens, baixa escolaridade, adulto jovem, residente em zona rural e com LT cutânea.

Dentro desse contexto, faz-se necessário a implementação de ações mais estratégicas e eficientes para o controle da parasitose no município. Sugere-se, por exemplo, a distribuição de repelentes contra o mosquito, em especial para o público de maior incidência da doença, aliado a uma adequada conscientização da população.

REFERÊNCIAS

- BENCHIMOL, J. L. Leishmanioses do Novo Mundo numa perspectiva histórica e global, dos anos 1930 aos 1960. **Hist. ciênc. Saúde-Manguinhos**, p. 1-29, 2020.
- BRASIL. Ministério da saúde. Doenças tropicais negligenciadas. **Boletim epidemiológico**. Brasília – DF, pag. 1-76. Número especial/mar. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/marco/3/boletim_especial_doencas_negligenciadas.pdf. Acesso em: 26 de maio de 2021.
- BLANCO, V. R.; NASCIMENTO-JÚNIOR, N. M. Leishmaniose: Aspectos gerais relacionados com a doença, o ciclo do parasita, fármacos disponíveis, novos protótipos e vacinas. **Revista Virtual de Química**, v. 9, n. 3, p. 861-876, 2017.
- COSTA, A. T. Ecologia de flebotomíneos (*Diptera: Psychodidae, Phlebotominae*) em área de ocorrência de leishmanioses na terra indígena Xakriabá, Minas Gerais–Brasil. 2017.
- CERUTTI, P. H. P. *et al.* Métodos diagnósticos da leishmaniose tegumentar americana: uma revisão de literatura. **Revista de Patologia do Tocantins**, v. 4, n. 4, p. 55-59, 2017.
- DA SILVA FONSECA, E. *et al.* Spatial epidemiology of American cutaneous leishmaniasis in a municipality of west São Paulo State, Brazil. **Journal of vector borne diseases**, v. 51, n. 4, p. 271, 2014.

DA SILVA NEVES, R. L. *et al.* Distribuição espacial e aspectos epidemiológicos da Leishmaniose Tegumentar Americana no município de Imbé de Minas, leste do estado de Minas Gerais, Brasil. **Hygeia-Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde**, v. 16, p. 159-173, 2020.

GUIMARÃES, L. H. *et al.* Aspectos clínicos da leishmaniose tegumentar. **Gazeta Médica da Bahia**, v. 74, n. 1, 2008.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. São Luís do Maranhão. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ma/sao-luis/panorama>. Acessado em 22 de maio de 2021.

IMESC. Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos. São Luís - MA. Disponível em: <http://dataimesc.imesc.ma.gov.br/>. Acessado em 28 de maio de 2021.

LESSA, M. M. *et al.* Leishmaniose mucosa: aspectos clínicos e epidemiológicos. **Revista Brasileira de Otorrinolaringologia**, v. 73, n. 6, p. 843-847, 2007.

LIMA, E. B. *et al.* Tratamento da leishmaniose tegumentar americana. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 82, n. 2, p. 111-124, 2007.

Ministério da saúde, DATASUS. Tecnologia de informação a serviço do SUS. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br>. Acessado em 19 de maio de 2021.

MURBACK, N. D. N. *et al.* 55. INVESTIGAÇÃO. **Anais Brasileiro de Dermatologia**, v. 86, n. 1, p. 55-63, 2011.

NEGRÃO, G. N. Leishmaniose Tegumentar Americana: Aspectos geográficos Intervenientes Na ocorrência da enfermidade no município de Maringá, Paraná. **Hygeia-Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde**, v. 5, n. 8, 2009.

NEVES, R. L. *et al.* A follow-up study (2007–2018) on American Tegumentary Leishmaniasis in the municipality of Caratinga, Minas Gerais State, Brazil: Spatial analyses and sand fly collection. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, v. 15, n. 5, p. e0009429, 2021.

PELLISSARI, D. M. *et al.* Tratamento da leishmaniose visceral e leishmaniose tegumentar americana no Brasil. **Epidemiologia e serviços de saúde**, v. 20, n. 1, p. 107-110, 2011.

PEREIRA, P. S. *et al.* Atividades tripanocida, antileishmania e citotóxica do óleo essencial de *Rosmarinus officinalis* L in vitro. **Culturas e produtos industriais**, v. 109, p. 724-729, 2017.

PONTELLO JUNIOR, R.; GON, A. S.; OGAMA, A. American cutaneous leishmaniasis: epidemiological profile of patients treated in Londrina from 1998 to 2009. **Anais brasileiros de dermatologia**, v. 88, n. 5, p. 748-753, 2013.

CAPÍTULO 2

ANÁLISE TEMPORAL DOS CASOS
REPORTADOS DE LEISHMANIOSE VISCERAL E
COINFECÇÃO LEISHMANIOSE VISCERAL-HIV
NA POPULAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE
NO PERÍODO DE 2010 A 2019

Capítulo 2

ANÁLISE TEMPORAL DOS CASOS REPORTADOS DE LEISHMANIOSE VISCERAL E COINFECÇÃO LEISHMANIOSE VISCERAL-HIV NA POPULAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE NO PERÍODO DE 2010 A 2019

TEMPORAL ANALYSIS OF REPORTED CASES OF VISCERAL LEISHMANIASIS AND VISCERAL LEISHMANIASIS-HIV COINFECTION IN THE POPULATION OF RIO GRANDE DO NORTE IN THE PERIOD FROM 2010 TO 2019

João Vitor Soares Marçal

Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1229-8951>

E-mail: joao.marcal@alunos.ufersa.edu.br

Tammy Rodrigues

Departamento de Ciências da Saúde, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4317-5842>

E-mail: tammy.rodrigues@ufersa.edu.br

Andréa Taborda Ribas da Cunha

Departamento de Ciências da Saúde, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8320-066X>

E-mail: andrea.taborda@ufersa.edu.br

Henrique Carlos de Brito

Discente do Curso de Direito, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, RN

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0672-0872>

E-mail: henrique.hcb@gmail.com

Carlos Ygor Costa Martins

Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7667-1914>

E-mail: ygor.martins@alunos.ufersa.edu.br

Luzia Carla de Souza Soriano

Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1868-8109>

E-mail: luzia.soriano@alunos.ufersa.edu.br

Douglas Marques Zaratini

Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN.

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6568-2386>

E-mail: douglaszaratini18@gmail.com

Álvaro Vitor Fernandes de Lima

Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN.

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2257-5879>

E-mail: alvaro.lima@alunos.ufersa.edu.br

Fábio Raphael Pascoti Bruhn

Departamento de Veterinária Preventiva, Faculdade de Veterinária, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4191-965X>

E-mail: fabio_rpb@yahoo.com.br

Tiago da Silva Teófilo

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3021-0880>

E-mail: tiago.teofilo@ufersa.edu.br

RESUMO

A leishmaniose visceral é um importante problema de saúde pública na população do Rio Grande do Norte e a identificação de um perfil epidemiológico é de suma importância para o combate a essa condição e para o diagnóstico precoce. Objetivou-se com esse estudo investigar os casos notificados de leishmaniose visceral e sua coinfeção com o HIV na população norte-rio-grandense no período de 2010 a 2019. Justifica-se pela condição ser endêmica no Rio Grande do Norte. Realizou-se um estudo de caráter observacional de série temporal, no qual foram analisados dados secundários coletados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no período de 2010 a 2019. A incidência revelou-se uma leve tendência a aumento da leishmaniose visceral em números absolutos de 0,87% e uma diminuição em relação à incidência por 100.000 habitantes de 30,34%. No que se refere ao sexo, percebeu-se uma tendência de aumento da incidência em pessoas do sexo masculino de 2,93% e uma diminuição em pessoas do sexo feminino de 15,03%. Notou-se tendência à diminuição de 4,04% na faixa etária de 0-9 anos e uma pequena tendência a decrescimento de 0,74% na faixa de 10-19 anos, havendo um decrescimento um pouco maior na faixa etária de 20-39 anos de 3,51%. Com tendência a crescimento de 5,20% na faixa de 40-59 anos e um crescimento com maior significância estatística em indivíduos com 60 anos ou mais de 14,06%. Em relação à escolaridade houve um aumento de 13,01% no público de indivíduos notificados como analfabetos, um aumento também de 4,36% dos indivíduos que apresentam ensino fundamental completo ou incompleto. Os indivíduos com ensino médio completo ou incompleto ou superior notou-se uma tendência a queda de 1,79%, e tendência de decrescimento dos notificados como ignorados ou brancos de 4,76%. Na coinfeção LV-HIV, notou-se uma leve tendência a aumento de 0,69%, enquanto a incidência relativa houve decrescimento de 17,99, demonstrando uma tendência de aumento de 6,76 em masculinos e diminuição de 32,01% no público feminino. Além disso, a relação coinfeção LV-HIV/LV teve uma leve tendência à diminuição em 0,13%. A média de incidência da leishmaniose visceral por 100.000 habitantes em relação a casos confirmados por região de saúde, revelou uma maior média na região de saúde Metropolitana com 1,04 e menor nas regiões de saúde de Santa Cruz e Caicó ambas com 0,09. Em relação à microrregião, revelaram-se dados que mostram uma maior média na microrregião de Natal (0,87) e menor em Serra de Santana e Médio Oeste (0,01). O presente estudo evidencia a leishmaniose visceral como um importante problema de saúde pública do Rio Grande do Norte, uma vez que apesar de uma tendência a decrescimento numa análise geral, houve tendência a crescimento na população masculina geral e coinfectados com HIV, no grupo de indivíduos de 40 anos acima e de escolaridade analfabeta e ensino fundamental.

Palavras-chave: Leishmaniose visceral; Epidemiologia; Coinfeção com HIV.

ABSTRACT

Visceral leishmaniasis is an important public health problem in the population of the Rio Grande do Norte state. Identification of an epidemiological profile is of paramount importance to fighting this condition and for early diagnosis. The objective of this study was to investigate the reported cases of visceral leishmaniasis and its co-infection with HIV in the population of Rio Grande do Norte in the period from 2010 to 2019. It is justified because the condition is endemic in the state. An observational time-series study was carried out, in which secondary data collected from the Notifiable Diseases Information System (SINAN) were analyzed, from 2010 to 2019. The incidence revealed a slight tendency to increase visceral leishmaniasis in absolute numbers of 0.87% and a decrease in incidence per 100,000 inhabitants of 30.34%. Concerning sex, there was a tendency of incidence increase in males by 2.93% and decrease in females by 15.03%. The 0-9 age group showed a tendency to decrease by 4.04% and the 10-19 age group, a small tendency to decrease by 0.74%, with a slightly greater decrease in the 20-39 age group of 3.51%. Groups 40-59 and 60 or over showed, respectively, a tendency to increase by 5.20%, and growth with greater statistical significance by 14.06%. Regarding schooling, there was an increase of 13.01% in the public of individuals notified as illiterate and an increase of 4.36% of individuals with complete or incomplete elementary education. Individuals with complete or incomplete secondary education or higher showed a tendency to decrease by 1.79%. Those reported as ignored or left blank also showed a similar tendency of decrease by 4.76%. In the LV-HIV co-infection, there was a slight tendency to increase by 0.69%, while the relative incidence decreased by 17.99%, demonstrating an increase of 6.76% in males and a decrease of 32.01% in the female public. In addition, the LV-HIV / LV co-infection ratio showed a slight tendency to decrease by 0.13%. The mean incidence of visceral leishmaniasis per 100,000 inhabitants, concerning confirmed cases by health region, revealed a higher average in the Metropolitan health region with 1.04 and lower in region of Santa Cruz and Caicó both with 0.09. Regarding the microregion, a higher average in Natal (0.87), and smaller in Serra de Santana and the Middle West (0.01). The present study highlights visceral leishmaniasis as an important public health problem in the Rio Grande do Norte since, despite a tendency to decrease in general analysis, there was a tendency for growth in the general male population and co-infected with HIV, in the group of individuals over 40 years or older, and illiterate and elementary school.

Keywords: Visceral leishmaniasis; Epidemiology; HIV co-infection.

INTRODUÇÃO

As doenças tropicais negligenciadas (DTN) são enfermidades que apresentam em comum elevada morbidade e/ou letalidade, conduzindo a custos econômicos e sociais elevados, em virtude da capacidade dessas doenças de incapacitar e levar ao óbito (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014). Assim, investir no desenvolvimento de alternativas no controle é necessário e se configura como prioridade da Organização Mundial da Saúde (OMS) no intuito de proteger a vida de mais de 1,5 bilhão de pessoas afetadas por essas doenças pelo planeta (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014).

Uma das mais importantes doenças negligenciadas é a leishmaniose visceral (LV), que é uma enfermidade infecciosa com evolução crônica e sistêmica, cuja letalidade, em caso de não tratamento, pode chegar a 90% (BRITO *et al.*, 2014). Apesar da elevada letalidade, a maior parte das infecções

por *Leishmania infantum* em humanos são assintomáticas, sendo mais susceptíveis ao desenvolvimento dos sinais clínicos os indivíduos em situações socioeconômicas precárias e com deficiência imunológica, geralmente associadas à desnutrição e coinfeção pelo vírus causador da AIDS, principalmente, em situações em que o tratamento antiviral não é instituído de maneira eficaz (ALVAR *et al.*, 2012; ARGAW *et al.*, 2013; GRAMICCIA *et al.*, 2013). Essa situação justifica o fato de que, apesar de existir 98 países com casos relatados de leishmaniose no mundo, a maioria dos casos de leishmaniose visceral humana (LVH) se concentra nos países em desenvolvimento ou que convivem com grandes diferenças sociais como Brasil (ALVAR *et al.*, 2012).

De fato, no Brasil, a LV ainda constitui um grave problema de saúde pública (HOLCMAN *et al.*, 2013). No país, entre 1990 e 2013, houve 74.980 novos casos de LV, com incidência média anual de 3.124 casos, o que representou uma taxa de incidência (TI) média no país de 1,8 casos /100.000 habitantes, entre 1990 e 2013 (BRASIL, 2014).

É importante destacar ainda que a doença tem se expandido pelo país, principalmente ao meio urbano, em razão da alta densidade dos hospedeiros, crescimento urbano desordenado e a presença de extensas áreas de pobreza, riscos e vulnerabilidade social. No Brasil, uma das principais causas do aumento da mortalidade e morbidade da LV é a dificuldade dos serviços de saúde municipais em concretizar as orientações determinadas pelo Programa de Vigilância e Controle de Leishmaniose Visceral (PVC-LV), dando ênfase às relacionadas à estratificação de áreas de risco para realização de borrifações domiciliares e ao controle do cão soropositivo, por se tratarem de medidas caras e, ainda, pouco aceitas por parte da população.

No Rio Grande do Norte, foram notificados 474 casos confirmados de Leishmaniose Visceral em residentes do estado no período de 2007 a 2011, mostrando uma média de 94,8 casos por ano. A incidência média desse estudo foi de 3,02 casos por 100.000 habitantes (BARBOSA, 2013).

A Leishmaniose Visceral (LV) popularmente conhecida como calazar é uma condição infecciosa causada por um protozoário do gênero *Leishmania*, tendo como espécie mais comum nas américas o *Leishmania chagasi* (BRASIL, 2017). Considerada uma zoonose que pode acometer as pessoas, quando estas estão em contato com o ciclo de transmissão do parasita, sendo transmitida por meio de vetores como os insetos flebotomíneos (hematófagos), dando ênfase no Brasil a duas espécies relacionadas à transmissibilidade que são o *Lutzomia longipalpis* (mais comum) e *Lutzomia cruzi* popularmente conhecidos como mosquito-palha (BARBOSA, 2013).

Com este trabalho, objetivou-se realizar um levantamento de dados epidemiológicos dos casos notificados de pacientes com leishmaniose visceral e leishmaniose visceral e sua coinfeção com o HIV no período de 2010 a 2019 no estado do Rio Grande do Norte, tendo em vista o levantamento e

a disseminação informações essenciais para o planejamento de estratégias de prevenção e controle da doença.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se um estudo observacional de série temporal no período de 2010 a 2019, no qual foram analisados dados secundários coletados do SINAN, a partir do banco nacional de informações do Sistema Único de Saúde, pelo website <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/leishvrn.def>. As variáveis dependentes representaram a taxa de incidência de leishmaniose visceral e da coinfeção leishmaniose visceral-HIV no período de 2010 a 2019, calculadas utilizando o número de casos notificados por ano de diagnóstico, segundo orientado pelo SINAN, dividido pelo número de habitantes no mesmo período e por local de residência, utilizando a constante de 100.000. O número de habitantes do estado foi retirado dos dados do censo de 2010 e estimativas intercensitárias, disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No que se refere ao HIV, considerou-se portador da condição apenas a categoria notificada como HIV positivo. Quanto as variáveis independentes coletadas incluíram incidência geral, sexo (masculino e feminino), faixa etária (0-9; 10-19; 20-39; 40-59 e ≥ 60 anos), escolaridade, casos confirmados por região de saúde (CIR) de residência segundo ano de notificação, casos confirmados por microrregião do IBGE de residência segundo ano de notificação.

As informações foram sumarizadas através de medidas de incidência, de tendência central e de crescimento, assim como proporções e médias. Os dados foram tabulados em uma planilha eletrônica Microsoft Excel (versão 2010) e posteriormente analisados através do programa estatístico Statistical Package for the Social Science (SPSS) versão 20.0. Um modelo de regressão linear generalizada de Prais-Winsten foi utilizado para analisar as tendências de crescimento na série temporal, no período de 2010 a 2019. Utilizou-se também para a produção de figuras mapas o software QGIS versão 3.16.7. Assim, esse procedimento permitiu avaliar as variações como crescente, decrescentes ou estáveis, a partir da análise da medida de crescimento e do nível de significância ($p < 0,05$) e média dos anos estudados. A variação total foi calculada como a diferença, em proporção, do valor da incidência em 2010 com a de 2019. É válido ressaltar que para todos os testes considerou-se um nível de significância de 95%. Por se tratar da análise de dados secundários, impessoais e que estão disponíveis para consulta pública no tabnet do Sistema no Datasus, o presente estudo não necessitou de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa.

RESULTADOS

A tabela 1 expõe os dados, obtidos através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), da incidência bruta e relativa da leishmaniose visceral e de coinfecção leishmaniose visceral-HIV, além da relação entre as duas incidências. No recorte analisado, revelou-se uma leve tendência a aumento da incidência de leishmaniose visceral em números absolutos e uma tendência à diminuição em relação à incidência por 100.000 habitantes. A variação total para os casos de leishmaniose visceral teve um pequeno aumento em 0,87%, enquanto a incidência relativa teve tendência a decréscimo de 30,34%. Ao analisar as notificações em relação ao número de casos de coinfecção leishmaniose visceral-HIV, notou-se uma leve tendência a aumento de 0,69%, enquanto a incidência por 100.000 habitantes houve tendência à diminuição de 17,99. Além disso, a relação coinfecção LV-HIV/LV teve uma leve tendência à diminuição em 0,13% no período estudado, indicando uma manutenção da estatística do HIV na epidemiologia da leishmaniose visceral.

Tabela 1. Incidência dos casos notificados por leishmaniose visceral e por LV-HIV, Rio Grande do Norte, 2010-2019.

Ano	LV		LV Co-HIV		LV-HIV/LV
	Incidência Bruta	Incidência /100.000 hab	Incidência Bruta	Incidência /100.000 hab	
2010	85	2,68	10,00	0,32	11,76
2011	119	3,64	25,00	0,76	21,01
2012	95	2,88	13,00	0,39	13,68
2013	80	2,40	10,00	0,30	12,50
2014	101	3,00	9,00	0,27	8,91
2015	81	2,39	23,00	0,68	28,40
2016	88	2,57	30,00	0,88	34,09
2017	96	2,78	11,00	0,32	11,46
2018	96	2,76	24,00	0,69	25,00
2019	97	2,77	31,00	0,88	31,96
Variação	0,87	-30,34	0,69	-17,99	-0,13
<i>P</i>	0,01	0,02	0,55	0,70	0,74

LV: leishmaniose visceral; e hab: habitantes; Co: coinfecção.

A tabela 2 apresenta a incidência da leishmaniose visceral e da coinfecção LV-HIV por 100.000 habitantes por sexo no período de 2010 a 2019 analisados no trabalho. Percebeu-se uma tendência de aumento da incidência de leishmaniose em pessoas do sexo masculino de 2,93% e uma diminuição em pessoas do sexo feminino de 15,03%. Na incidência da coinfecção LV-HIV demonstrou uma tendência de aumento de 6,76 em masculinos e diminuição de 32,01% no público feminino, evidenciando uma melhora nos números no que tange a população feminina analisada.

Tabela 2. Incidência dos casos notificados por LV e LV-HIV por sexo, Rio Grande do Norte, 2010-2019.

Ano	Incidência de LV /100.000 hab		Incidência de LV Co-HIV /100.000 hab	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
2010	1,74	0,95	0,19	0,13
2011	2,41	1,22	0,64	0,12
2012	1,85	1,03	0,36	0,03
2013	1,65	0,75	0,21	0,09
2014	2,02	0,98	0,18	0,09
2015	1,68	0,71	0,50	0,18
2016	1,84	0,73	0,70	0,18
2017	1,80	0,99	0,26	0,06
2018	2,16	0,60	0,52	0,17
2019	1,97	0,80	0,74	0,14
Variação	2,93	-15,03	6,76	-32,01
<i>P</i>	0,57	0,08	0,27	0,28

LV: leishmaniose visceral; e hab: habitantes; Co: coinfeção.

A tabela 3 exibe a incidência da leishmaniose visceral por 100.000 habitantes em relação à faixa etária no período de 2010 a 2019. Percebeu-se uma tendência à diminuição de 4,04% na faixa etária de 0-9 anos e uma pequena tendência a decrescimento de 0,74% na faixa de 10-19 anos, havendo um decrescimento um pouco maior na faixa etária de 20-39 anos de 3,51%. O panorama se inverte nas faixas etárias um pouco mais avançadas com tendência a crescimento da LV no período analisado de 5,20% na faixa de 40-59 anos e um crescimento com maior significância estatística em indivíduos com 60 anos ou mais, chegando a 14,06%.

Tabela 3. Incidência dos casos notificados por leishmaniose visceral por faixa etária em anos, Rio Grande do Norte, 2010-2019.

Ano	Incidência de LV /100.000 hab - Faixa etária				
	0-9	10-19	20-39	40-59	≥ 60
2010	0,91	0,22	0,94	0,53	0,06
2011	1,19	0,24	1,25	0,67	0,24
2012	1,02	0,33	0,57	0,84	0,09
2013	0,75	0,27	0,75	0,45	0,18
2014	0,77	0,44	1,01	0,65	0,11
2015	0,38	0,26	0,91	0,50	0,32
2016	0,49	0,23	1,02	0,64	0,17
2017	1,01	0,26	0,75	0,52	0,23

2018	0,45	0,34	0,83	0,77	0,34
2019	0,57	0,14	0,76	1,05	0,22
Variação	-4,04	-0,74	-3,51	5,20	14,06
<i>P</i>	0,31	0,94	0,49	0,34	0,25

LV: leishmaniose visceral; e hab: habitantes.

A tabela 4 exibe os dados de incidência da leishmaniose visceral por 100.000 habitantes em relação à escolaridade dos casos notificados do período avaliado. Dessa forma, houve um aumento de casos notificados de 13,01% no público de indivíduos notificados como analfabetos, mostrando um aumento de maior significância dentro da variável escolaridade, notando um aumento também, porém mais discreto de 4,36% dos indivíduos notificados que apresentam ensino fundamental completo ou incompleto. Já em relação aos indivíduos notificados que apresentam ensino médio completo ou incompleto ou superior, notou-se uma tendência a queda de 1,79% no período avaliado, ocorrendo também uma tendência de decréscimo dos notificados como ignorados ou brancos de 4,76%.

Tabela 4. Incidência dos casos notificados por leishmaniose visceral por escolaridade, Rio Grande do Norte, 2010-2019.

Ano	Incidência de LV /100.000 hab – Escolaridade			
	Analfabeto	Ens. Fundamental	≥ Ens. Médio	Ig/Branco
2010	0,06	0,88	0,18	1,54
2011	0,18	1,25	0,36	1,83
2012	0,15	0,84	0,33	1,54
2013	0,21	0,87	0,21	1,11
2014	0,21	1,21	0,32	1,24
2015	0,23	1,00	0,40	0,73
2016	0,08	1,19	0,37	0,9
2017	0,23	1,01	0,26	1,27
2018	0,25	1,32	0,39	0,77
2019	0,34	1,16	0,39	0,85
Variação	13,01	4,36	-1,79	- 4,76
<i>P</i>	0,19	0,38	0,88	0,05

Ens: ensino; e hab: habitantes.

A figura 1 apresenta os dados da média de incidência da leishmaniose visceral por 100.000 habitantes em relação a casos confirmados por região de saúde (CIR) de residência de acordo com o ano de notificação de 2010 a 2019. Dessa forma, o estudo revelou uma média em ordem decrescente com a região de saúde Metropolitana com 1,04, região de saúde Mossoró com 0,52, região de saúde Pau dos Ferros 0,32, João Câmara com 0,26, São José de Mipibu com 0,22, Açu com 0,18 e região de saúde de Santa Cruz e Caicó ambas com 0,09.

Figura 1. Média da incidência de leishmaniose visceral por 100 mil habitantes, dos casos notificados confirmados, por região de saúde (CIR), de residência, Rio Grande do Norte, 2010 a 2019.

A figura 2 apresenta os dados da média de incidência da leishmaniose visceral por 100.000 habitantes em relação à microrregião do IBGE de residência no Rio Grande do Norte dos casos confirmados segundo o ano de notificação do período analisado. Assim, revelaram-se dados que mostram médias nas microrregiões em ordem decrescente de Natal (0,87), Mossoró (0,44), Macaíba (0,33), Vale do Açu (0,17), Pau dos Ferros (0,15), Agreste (0,10), Umarizal (0,08), Serra de São Miguel e Litoral Nordeste (0,07), Chapada do Apodi e Litoral Sul (0,06), Seridó Oriental e Borborema (0,05), Baixa Verde (0,04), Macau e Seridó ocidental (0,03), Angicos (0,02) e Serra de Santana e Médio Oeste (0,01).

Figura 2. Média da incidência de leishmaniose visceral por 100 mil habitantes, dos casos notificados confirmados, por microrregião IBGE de residência, Rio Grande do Norte, 2010 a 2019.

DISCUSSÃO

Os dados do estudo destacado exibem um leve aumento da incidência de leishmaniose visceral no Rio Grande do Norte no período de 2010 a 2019 no que se refere ao valor bruto, revelando uma diminuição dos casos notificados no valor em relação à incidência por 100.000 habitantes. Tal diminuição, baseada na análise relativa revelou-se à custa dos dados notificados no sexo feminino, nas faixas etárias que abrangem de 0-39 anos (0-9; 10-19; 20-39) e indivíduos que possuem ensino médio completo, incompleto e ensino superior completo ou incompleto. Em contraste, percebemos que a LV apresentou tendência a crescimento (análise por 100.000 hab) nos indivíduos do sexo masculino, na faixa etária de 40-59 anos, no grupo dos notificados que estão cursando ou que concluíram o ensino fundamental, tendo tendência à elevação mais significativa principalmente nos indivíduos com 60 anos ou mais e nos analfabetos.

Dessa forma, tal resultado corrobora com a relação do perfil epidemiológico e fatores de risco para a doença, tendo em vista que os indivíduos em situação de baixa imunológica o que pode ser comum na senilidade são mais susceptíveis ao desenvolvimento dos sinais clínicos (ALVAR *et al.*, 2012; ARGAW *et al.*, 2013; GRAMICCIA *et al.*, 2013). Segundo Argaw *et al.* (2013), ao estudar os fatores de risco para a LV, por meio de um estudo de caso-controle (150 casos e 300 controles), realizado entre residentes e migrantes de diversas regiões da Etiópia e Belo *et al.* (2013b), ao realizar

uma meta-análise dos estudos que avaliaram os fatores de risco associados à LV em humanos nas Américas, apresentando um caráter social como baixo nível educacional e pobreza.

No que se refere o decrescimento da incidência relativa da leishmaniose visceral comparando os dez anos estudados, é importante salientar que houve redução também da incidência média dos anos comparada (2,78) com a incidência média de um estudo feito no Rio Grande do Norte, no período de 2007 a 2011 com 474 casos notificados confirmados, mostrando 3,02 casos por 100.000 habitantes (BARBOSA, 2013). No Brasil, obteve-se uma taxa de incidência (TI) média de 1,8 casos /100.000 habitantes, entre 1990 e 2013 (BRASIL, 2014), mostrando que em relação a essa medida o estado do Rio Grande do Norte teve maiores números.

Tal resultado pode corroborar com uma possível redução de casos e uma melhora na aplicação das políticas de combate à leishmaniose visceral no Rio Grande do Norte, principalmente estimulada pelo novo Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral de 2014, no qual expõe medidas para redução dos casos e da disseminação da LV no país. Sendo essas medidas principalmente, o monitoramento do vetor nas residências e nos ambientes peridomiciliares, avaliação da distribuição sazonal e direcionamento de medidas de controle químico por meio de inseticidas (pulverizado ou por meio de colares impregnados) em determinadas épocas do ano (BRASIL, 2014). Além disso, preconiza inquéritos sorológicos em cães e, em caso de positividade, a eutanásia do reservatório, educação sanitária aos proprietários, sendo estes esclarecidos quanto à importância e formas de se controlar a doença, determinando, assim, a importância da avaliação da efetividade das ações propostas e adotadas pelos serviços de saúde (BRASIL, 2014). Ademais é válido ressaltar, que os dados podem estar revelando uma possível subnotificação de casos, o que pode estar dificultando o acompanhamento e análises epidemiológicas dessa condição.

Quando categorizada a população por escolaridade, nota-se uma variação crescente nos indivíduos com ensino fundamental completo ou incompleto e analfabetos sendo esses com maior variação da categoria o que pode ter relação com o aumento das chances de adquirir a LV desse grupo específico, com o analfabetismo classificado como fator de risco socioeconômico. Para Araújo *et al.* (2013), após estudar fatores de risco para LV em humanos relacionados a recursos urbanos (por exemplo de coleta de lixo) e socioeconômicas (como renda e escolaridade), por meio de análise espacial, 2007 a 2009 e Oliveira *et al.* (2006), ambos em Belo Horizonte, verificaram que um maior risco da LV está principalmente relacionado à baixa renda e nível educacional, além do número de cães infectados por habitantes e na vizinhança dos casos (MARGONARI *et al.*, 2006).

Dessa forma, no estrato dos indivíduos notificados que apresentam estar cursando ou concluído o ensino médio e/ou superior foi percebido uma variação decrescente, mostrando que grau de escolaridade é diretamente proporcional a uma menor chance de desenvolver sinais clínicos de

LV. Além disso, o maior grau de escolaridade tem relação com uma maior remuneração salarial. Assim, a presença de mosquito na cama, o fato de ser alfabetizado e consumo de carne pelo menos uma vez por mês são fatores de proteção, enquanto infecção por HIV, possuir residência feita de capim sob estrutura de madeira, baixa renda, chefe de família ser trabalhador, o hábito de dormir fora de casa, principalmente, durante a estação chuvosa e próximo a animais de produção e cães, são fatores de risco para LV em humanos (ARGAW *et al.*, 2013).

Esses fatores supracitados, apesar de estarem relacionados às características epidemiológicas inerentes ao local estudado, também estão presentes em outras regiões do mundo, principalmente, em situações de pobreza verificadas nas grandes cidades, indicam que, ao se adotar estratégias de controle para LV, devem-se considerar aquelas baseadas nos conceitos de ecoepidemiologia, portanto vinculadas a medidas de impacto sob a população, por exemplo, relacionadas à educação sanitária (ALVAR *et al.*, 2006; LOBO *et al.*, 2013; RIBEIRO *et al.*, 2013).

Quando observamos a incidência da coinfeção de leishmaniose visceral-HIV, notou-se uma leve tendência a aumento de 0,69%, enquanto a incidência por 100.000 habitantes houve tendência à diminuição de 17,99%. Dessa forma, de maneira geral acompanhou basicamente a redução relativa que ocorreu nos casos notificados de LV. Contudo, o público masculino apresentou tendência a aumento de 6,76%, sendo um aumento maior que no público masculino não soropositivo podendo se relacionar com a deficiência imune com fator de risco (ALVAR *et al.*, 2012; ARGAW *et al.*, 2013; FAUCHER *et al.*, 2012; GRAMICCIA *et al.*, 2013).

Porém, no sexo feminino não se constatou essa relação sendo necessária uma análise de adesão ao tratamento desses pacientes masculinos que convivem com o HIV, já que a terapia anti-HIV tem bons resultados, como também fatores culturais de melhor autocuidado do público feminino para fortalecer alguma hipótese, salientando-se que a subnotificação pode estar comprometendo a avaliação. Além disso, a relação coinfeção LV-HIV/LV mostrou uma leve tendência à diminuição em 0,13% no período estudado, indicando uma manutenção da estatística do HIV na epidemiologia da leishmaniose visceral.

No que tange às regiões de saúde, observou-se a metropolitana como a região com maior média dos casos notificados do período analisado. Dessa forma, levando em conta que as principais cidades dessa região como Natal e Parnamirim são as com maiores Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), sendo respectivamente 0,763 e 0,766 (IBGE, 2010), e a região de saúde de Caicó sendo a de menor média, porém com cidades com IDH menores como Caicó, Currais Novos e Parelhas, com 0,710, 0,691 e 0,676 respectivamente (IBGE, 2010), nota-se apesar de pouca diferença que em relação ao IDH ocorre uma discordância, tendo em vista que relativamente às populações dessas áreas da metropolitana deveriam ser menos atingidas. Essa, hipótese é levantada com base nos

fatores de risco para se infectar e desenvolver sinais clínicos da LV, sendo a vulnerabilidade socioeconômica um principal fator (ARAÚJO *et al.*, 2013).

Nas microrregiões a expressão dos dados foi parecida com a análise das regiões de saúde, sendo Natal e Mossoró com maiores médias, podendo elencar a mesma relação feita nas regiões de saúde. Contudo, é válido ressaltar que cidades com mais números de habitantes e aglomeração podem influenciar também no aumento relativo. Além disso, essas cidades maiores sofrem com o grande número de submoradias e favelas, segundo dados do IBGE do censo de 2010, 10% dos habitantes da cidade de Natal moram em favelas. Assim, é possível relacionar condições precárias de moradias e maiores casos de leishmaniose visceral (ALVAR, 2008). Por fim, é válido ressaltar que essas análises para serem mais completas demandariam avaliações de controle de vetor e animais que estão relacionados ao ciclo da doença, como organização urbana, se existe subnotificações em algumas dessas regiões de saúde e microrregiões do Rio Grande do Norte e entre outros fatores.

CONCLUSÃO

As análises sugerem que, de 2010 a 2019, o comportamento epidemiológico dos novos casos de notificação da leishmaniose visceral revelou uma leve tendência a aumento da leishmaniose visceral em números absolutos e uma diminuição em relação à incidência por 100.000 habitantes. No que se refere ao sexo, percebeu-se uma tendência de aumento da incidência em pessoas do sexo masculino e uma diminuição em no sexo feminino. Notou-se tendência à diminuição na faixa etária de 20-39 anos. O crescimento com maior significância estatística foi em indivíduos com 60 anos ou mais. Em relação à escolaridade houve um aumento no público de indivíduos notificados como analfabetos, um aumento também dos indivíduos que apresentam ensino fundamental completo ou incompleto. Os indivíduos com ensino médio completo ou incompleto ou superior notou-se uma tendência a queda. Isso pode demonstrar o caráter social e econômico da doença. Na coinfeção LV-HIV, notou-se uma leve tendência a aumento, enquanto a incidência relativa houve decrescimento de, demonstrando uma tendência de aumento em masculinos e diminuição de no público feminino. Além disso, a relação coinfeção LV-HIV/LV mostrou uma leve tendência à diminuição. A média de incidência da leishmaniose visceral por 100.000 habitantes em relação a casos confirmados por região de saúde, revelou uma maior média na região de saúde Metropolitana e menor nas regiões de saúde de Santa Cruz e Caicó. Em relação à microrregião, revelaram-se dados que mostram maior média na microrregião de Natal e menor nas microrregiões de Serra de Santana e Médio Oeste. O presente estudo evidencia a leishmaniose visceral como um importante problema de saúde pública do Rio Grande do Norte, uma vez que apesar de uma tendência a decrescimento numa análise geral, houve

tendência a crescimento na população masculina geral e coinfectados com HIV, no grupo de indivíduos de 40 anos acima e de escolaridade analfabeta e ensino fundamental.

REFERÊNCIAS

- ALVAR, Jorge *et al.* Leishmaniasis worldwide and global estimates of its incidence. **PloS one**, v. 7, n. 5, p. e35671, 2012.
- ALVAR, Jorge; YACTAYO, Sergio; BERN, Caryn. Leishmaniasis and poverty. **Trends in parasitology**, v. 22, n. 12, p. 552-557, 2006.
- ARGAW, D. *et al.* Risk factors for visceral leishmaniasis among residents and migrants in Kafta-Humera, Ethiopia. **PLoS Negl Trop Dis**, v. 7, n. 11, p. e2543, 2013.
- BARBOSA, Isabelle Ribeiro. Epidemiologia da leishmaniose visceral no estado do Rio Grande do Norte, Brasil. **Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção**, v. 3, n. 1, p. 17-21, 2013.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. **Guia de Vigilância em Saúde**. ed. atual. Brasília, 2017. Disponível em: <https://bit.ly/3aPh1G9>. Acesso em: 25 abril. 2021.
- BRITO, V. N. de *et al.* Aspectos epidemiológicos da leishmaniose visceral em Jaciara, Estado de Mato Grosso, Brasil, de 2003 a 2012. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, v. 23, n. 1, p. 63-68, 2014.
- DE ARAÚJO, V. E. M. *et al.* Relative risk of visceral leishmaniasis in Brazil: a spatial analysis in urban area. **PLoS Negl Trop Dis**, v. 7, n. 11, p. e2540, 2013.
- FAUCHER, B. *et al.* Heterogeneity of environments associated with transmission of visceral leishmaniasis in South-Eastern France and implication for control strategies. **PLoS Negl Trop Dis**, v. 6, n. 8, p. e1765, 2012.
- GRAMICCIA, M. *et al.* The burden of visceral leishmaniasis in Italy from 1982 to 2012: a retrospective analysis of the multi-annual epidemic that occurred from 1989 to 2009. **Eurosurveillance**, v. 18, n. 29, p. 20535, 2013.
- HOLCMAN, M. M. *et al.* Spatial and seasonal distribution of *Lutzomyia longipalpis* in Dracena, a city in the western region of the state of São Paulo, Brazil, that is endemic with visceral leishmaniasis. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 46, n. 6, p. 704-712, 2013.
- IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.
- LOBO, K. dos S. *et al.* Conhecimentos de estudantes sobre Leishmaniose Visceral em escolas públicas de Caxias, Maranhão, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 18, p. 2295-2300, 2013.
- MARGONARI, C. *et al.* Epidemiology of visceral leishmaniasis through spatial analysis, in Belo Horizonte municipality, state of Minas Gerais, Brazil. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, v. 101, n. 1, p. 31-38, 2006.
- OLIVEIRA, Ana Lúcia Lyrio de *et al.* Foco emergente de leishmaniose visceral em Mato Grosso do Sul. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 39, n. 5, p. 446-450, 2006.
- RIBEIRO, G. A. *et al.* LQB-118, an orally active pterocarpanquinone, induces selective oxidative stress and apoptosis in *Leishmania amazonensis*. **Journal of Antimicrobial Chemotherapy**, v. 68, n. 4, p. 789-799, 2013.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019 - Introduction to NTD 2030 Roadmap. Disponível em: https://www.who.int/neglected_diseases/mediacentre/Intro_to_Roadmap_Narrative_v3.pdf. Acesso em: 28 de abril de 2021.

CAPÍTULO 3

RAIVA HUMANA: PERFIL CLÍNICO-
EPIDEMIOLÓGICO NO ESTADO DO
MARANHÃO, PERÍODO DE 2009 A 2019

Capítulo 3

RAIVA HUMANA: PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO NO ESTADO DO MARANHÃO, PERÍODO DE 2009 A 2019

HUMAN RABIES: CLINICAL EPIDEMIOLOGICAL PROFILE IN THE STATE OF MARANHÃO, 2009 TO 2019

Joyce Resende dos Santos Gonçalves

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0365-6382>

E-mail: joycesantosgoncalves@gmail.com

Chrisley Batista Ramos dos Santos

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2857-2401>

E-mail: chrisleybatista@gmail.com

Lemuel Kalil da Silva Vieira

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6955-6619>

E-mail: lemuelkalil@hotmail.com

Marcely Kelmanny da Luz Sampaio

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6705-2233>

E-mail: marcellysampaio20@hotmail.com

João Guilherme Nantes Araújo

Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2430-1081>

E-mail: joaonantesbio@gmail.com

Ruan Carlos Silva De Jesus

Biomédico, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4377-9707>

E-mail: ruansilvacarlos@outlook.com

Milena de Jesus Marinho Garcia de Oliveira

Faculdade Santa Teresinha -CEST, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0214-8346>

Email: mile.gmj@gmail.com

Yuri Nascimento Fróes

Docente do Curso de Farmácia da Faculdade Florence, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0928-0980>

E-mail: yurifroes@outlook.com

Mylena Andréa Oliveira Torres

Docente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5021-3130>

E-mail: mylena.torres@hotmail.com

Flávio Eduardo Saraiva de Araújo

Departamento de Controle de Zoonoses do Maranhão, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6129-1599>

E-mail: flaviovet@outlook.com

Joicy Cortez de Sá Sousa

Pós-graduação em Biologia Microbiana, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8678-0244>

*Autor correspondente, e-mail: joicyvet@hotmail.com

RESUMO

A raiva é uma doença infecciosa viral de grande importância para a saúde pública, em especial devido a elevada letalidade, além dos altos custos decorrentes do tratamento pós-exposição e da assistência médica às pessoas expostas ao risco de adoecer e morrer. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 55.000 indivíduos vão a óbito anualmente, devido ao vírus da raiva. Nesse contexto, o objetivo desse estudo foi avaliar o perfil clínico-epidemiológico da Raiva Humana no Estado do Maranhão, no período de 2009 a 2019, conforme as variáveis sociodemográficas e específicas, além de caracterizar o atendimento antirrábico no Estado. Para tal, realizou-se um estudo epidemiológico, transversal, quantitativo e descritivo, tendo como fonte de estudo as notificações coletadas no Sistema Nacional de Informações de Agravos (SINAN) do Ministério da Saúde e no Departamento de Controle de Zoonoses do Estado do Maranhão. Constatou-se a notificação de oito casos de raiva em humanos, entre os anos de 2009 a 2019, sendo mais prevalente no sexo masculino (87,5%), faixa etária de 20 a 39 anos (75%), raça parda (87,5%), zona urbana (87,5%) e residentes nos municípios de São Luís, Vitória do Mearim e São José de Ribamar (25% cada). Além disso, pontua-se que o Maranhão apresentou 298.046 casos de atendimentos antirrábicos, ressaltando os maiores percentuais na região metropolitana (24,29%), zona urbana (71,50%), tipo de exposição - mordedura (87,16%), local do ferimento - membro inferior (45,57%), ferimento único (55,27%) e superficial (46,56%), espécie agressora - canina (82,97%), condição do animal agressor - sadio (68,41%), tratamento indicado - observação + vacina (62,76%), e motivo da interrupção do tratamento - abandono (10,15%). Dessa forma, urge a necessidade de medidas sanitárias e de profilaxia pré e pós-exposição adequadas para minimizar o contato humano com o vírus. Todo caso suspeito de raiva humana é de notificação compulsória, imediata, individual e, dada a gravidade da doença, enfatiza-se a importância do acompanhamento epidemiológico periódico da doença, com análise crítica dos dados e medidas profiláticas direcionadas, visto que, eficientes medidas de prevenção correspondem o ponto principal para eliminação da doença.

Palavras-chave: Raiva; Epidemiologia; Maranhão.

ABSTRACT

Rabies is a viral infectious disease of great importance to public health, especially due to its high lethality, in addition to the high costs resulting from post-exposure treatment and medical care for people exposed to the risk of falling ill and dying. According to the World Health Organization (WHO), around 55,000 individuals die annually from the rabies virus. In this context, the objective of this study was to evaluate the clinical and epidemiological profile of Human Rabies in the State of Maranhão, from 2009 to 2019, according to sociodemographic and specific variables, in addition to characterizing anti-rabies care in the State. To this end, an epidemiological, cross-sectional,

quantitative and descriptive study was carried out, using the notifications collected in the National Health Care Information System (SINAN) of the Ministry of Health and in the Department of Zoonoses Control of the State of Maranhão as a study source. Eight cases of rabies were reported in humans, between 2009 and 2019, being more prevalent in males (87.5%), aged between 20 and 39 years (75%), mixed race (87.5%), urban area (87.5%) and residents in the municipalities of São Luís, Vitória do Mearim and São José de Ribamar (25% each). In addition, it is pointed out that Maranhão had 298,046 cases of anti-rabies care, with the highest percentages in the metropolitan region (24.29%), urban area (71.50%), type of exposure - bite (87.16%), wound site - lower limb (45.57%), single wound (55.27%) and superficial (46.56%), aggressor species - canine (82.97%), condition of the aggressor animal - healthy (68.41%), indicated treatment - observation + vaccine (62.76%), and reason for treatment interruption - abandonment (10.15%). Thus, there is an urgent need for sanitary measures and adequate pre- and post-exposure prophylaxis to minimize human contact with the virus. Every suspected case of human rabies is of compulsory, immediate, individual notification and, given the severity of the disease, the importance of periodic epidemiological monitoring of the disease is emphasized, with critical analysis of data and targeted prophylactic measures, since efficient measures of prevention correspond to the main point of elimination of the disease.

Keywords: Anger; Epidemiology; Maranhão.

INTRODUÇÃO

As doenças infecciosas acometem a sociedade há muitos anos. No Brasil, no período anterior à implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), havia elevada incidência e mortalidade por doenças transmissíveis (DT). Contudo, nas últimas décadas obteve-se êxitos significativos na redução da incidência de muitas destas doenças, em especial, graças as eficazes ações de vigilância, prevenção e controle, que culminaram com a mudança do perfil epidemiológico da população brasileira (TEIXEIRA *et al.*, 2018).

Dentre as doenças infecciosas, ressalta-se a raiva, que é uma doença cosmopolita, presente em mais de 150 países. A cada ano, em todo o mundo, morrem aproximadamente 55 mil pessoas atingidas pela doença, principalmente na Ásia e na África, que são detentoras de 95% dos casos (WHO, 2019).

A raiva é uma antroponose, causada pelo vírus pertencente ao gênero *Lyssavirus*, família *Rhabdoviridae*, que possui ação neurotrópica, comprometendo, portanto, o sistema nervoso central (SNC), sendo caracterizada como uma encefalite progressiva e com letalidade de aproximadamente 100% (FAUQUET *et al.*, 2005; LIMA *et al.*, 2005; BRASIL, 2016).

A transmissão da doença ocorre por meio da inoculação do vírus através de mordedura, arranhadura, lambedura ou pelo contato da saliva infectada com as membranas mucosas. O período de incubação é variável conforme o local da infecção, de modo geral a evolução é rápida e o prognóstico é desfavorável (KOTAIT *et al.*, 2009).

Em resumo, há quatro ciclos epidemiológicos de transmissão: urbano (representado por cães e gatos); aéreo (que envolve morcegos de diferentes hábitos alimentares); rural (relacionado aos

animais de produção); e silvestre (apresentando várias espécies de animais reservatórios, dentre elas, saguis, cachorros do mato, raposas, guaxinins, etc.) (BRASIL, 2014).

No Brasil, relatam-se duas variantes principais do vírus rábico: variante 1, encontrada em caninos; e a variante 3, isolada de morcegos hematófagos (*Desmodus rotundus*) e nos casos de raiva em herbívoros. Além dessas, há relatos de outras variantes associadas a morcegos insetívoros e acometendo outros animais, como raposas e saguis (PÓVOAS *et al.*, 2012; VARGAS, ROMANO, MÉRCHEN-HAMANN, 2019).

Além disso, a implementação de políticas públicas visando a melhoria das ações de vigilância em saúde, promoveram um declínio progressivo na raiva humana transmitida por caninos, mas o vírus propagado por animais silvestres ganhou destaque, principalmente nas regiões do Norte e Nordeste do país, sendo responsável pela transmissão de 65,1% dos casos notificados (DUARTE *et al.*, 2021).

Segundo o Ministério da Saúde (MS), todo caso suspeito de raiva humana deve ser notificado de forma compulsória, imediata e individual, sendo imprescindível o preenchimento da ficha de notificação de atendimentos antirrâbicos humanos, cujas informações compiladas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). A profilaxia da doença é a principal medida de controle e, o esquema profilático de pós-exposição possui condutas que vão desde uma simples lavagem do local da agressão, com água e sabão, até o tratamento completo com soro e vacina (BRASIL, 2014).

Nas últimas décadas, a raiva humana tem sido progressivamente eliminada na maioria dos estados brasileiros, contudo no Estado do Maranhão, ainda são relatados casos da doença. Entre 2002 e 2012, foram notificados 126 casos de raiva em humanos e 109 casos de raiva canina, colocando o Estado do Maranhão entre os principais no cenário nacional da doença (BRASIL, 2016). De forma mais alarmante, ressaltam-se os anos: 2006, onde dos 6 casos de raiva humana notificados no Brasil, 5 (83,33%) ocorreram no Maranhão; e 2011, com notificação nacional de somente dois casos que ocorreram no Maranhão.

Nesse contexto, percebe-se o quão imprescindível é o acompanhamento epidemiológico da doença, em especial no estado Maranhão, que possui relevante ocorrência da mesma. Em posse da análise estatística dos dados epidemiológicos, órgãos e profissionais atuantes na saúde pública poderão discutir adequações no planejamento profilático da raiva no Estado, de modo a reduzir de forma significativa a incidência da mesma, visto que, eficientes medidas de prevenção correspondem o ponto principal para eliminação da doença.

MATERIAL E MÉTODOS

Local do estudo

Esta pesquisa teve como local de estudo o Estado do Maranhão. Este possui uma extensão territorial de aproximadamente 331.937,450 km² e 217 municípios. É o segundo maior estado da região Nordeste e sua população estimada em 7.153.262 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021).

Tipo de estudo

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, do tipo série de casos retrospectivo, utilizando-se de dados secundários, referente as notificações dos casos de raiva humana e os atendimentos antirrâbicos no estado do Maranhão, no período de 2009 a 2019.

Obtenção dos dados

Foram utilizados os casos confirmados e notificados de raiva humana, registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde (MS), na plataforma do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), sem identificação dos indivíduos pesquisados. Além disso, utilizou-se os dados de atendimento antirrábico registrados no Departamento de Controle de Zoonoses do Estado do Maranhão.

Variáveis analisadas

Os dados utilizados foram selecionados como “Casos confirmados” ou “Atendimentos antirrâbicos” por Unidade Federativa (UF), Estado Maranhão, e o ano de diagnóstico/atendimento. Foram avaliadas as seguintes variáveis epidemiológicas: sexo, faixa etária, raça, escolaridade, município de residência e zona de residência. Ademais, analisou-se o atendimento antirrábico através das treze seguintes variáveis: regional de residência, zona de residência, tipo de exposição, local de ferimento, número de ferimento, tipo de ferimento, espécie de animal agressora, condição do animal agressor, histórico de tratamento, tratamento indicado, condição final do animal, interrupção do tratamento e motivo da interrupção.

Análise estatística

Foi realizada estatística descritiva, organizada em cálculos de frequências simples e relativas. As informações coletadas foram tabuladas em banco de dados com a utilização do software Microsoft Excel 2013.

Parâmetros éticos

O trabalho em questão utilizou banco de dados secundários e de domínio público, portanto, dispensa a apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa, conforme determina a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 510, de 7 de abril de 2016.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período de 2009 a 2019, foram notificados no SINAN-MS oito casos de raiva em humanos no estado do Maranhão, sendo dois em 2009 (25%), um em 2011 (12,5%), dois em 2012 (25%) e três em 2013 (37,5%).

Quanto ao perfil sociodemográfico dos indivíduos notificados com Raiva, a Tabela 1 apresenta a distribuição segundo sexo, faixa etária, raça, escolaridade, município de residência e zona de residência.

Tabela 1: Distribuição dos casos de notificação de raiva em humanos (N=8), conforme variáveis sociodemográficas, Maranhão, Brasil, 2009-2019.

Variáveis	N	%
SEXO		
Masculino	7	87,5%
Feminino	1	12,5%
FAIXA ETÁRIA		
1 a 4 anos	1	12,5%
15 a 19 anos	1	12,5%
20 a 39 anos	6	75%
RAÇA		
Ign/ Branco	1	12,5%
Parda	7	87,5%
ESCOLARIDADE		
Ign/ Branco	5	62,5%
1ª 4ª série incompleta do ensino fundamental	2	25%
Não se aplica	1	12,5%

MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA		
São Luís	2	25%
Vitoria do Mearim	2	25%
São José de Ribamar	2	25%
Humberto de Campos	1	12,5%
Mirinzal	1	12,5%
ZONA DE RESIDÊNCIA		
Urbana	7	87,5%
Rural	1	12,5%

Constatou-se uma predominância em indivíduos do sexo masculino 87,5% (n=7), o que corrobora com outros estudos epidemiológicos no Brasil (CAVALCANTE, FLORENCIO, ALENCAR, 2017; SALVI *et al.*, 2018).

As notificações ocorreram com mais prevalência na faixa etária de 20 a 39 anos, 75% (n=6), diferente do que é retratado na literatura de (LIMA *et al.*, 2017; SALVI *et al.*, 2018), onde a maior prevalência foi entre crianças. Acredita-se que isto é devido as atividades laborais dos adultos, que pode torná-los mais expostos a agressões por animais, diretamente ao cuidar de animais domésticos ou ao se deslocar pelas vias públicas, bem como ao entrar em contato com animais silvestres.

A maioria das notificações no Brasil ocorreu em pessoas da raça/cor da pele branca (BRASIL, 2016), diferentemente, no Maranhão, houve predomínio dos pardos 87,5% (n=6).

Embora os municípios de residência tenham variado, a maior parte das notificações ocorreu em São Luís 25% (n=2), Vitória do Mearim 25% (n=2) e São José de Ribamar 25% (n=2). A zona urbana 87,5% (n=7) foi o local onde ocorreu a maioria das notificações, o que é compatível com os dados nacionais (BRASIL, 2016).

Segundo o Ministério da Saúde (MS), todo caso suspeito de raiva humana deve ser notificado de forma compulsória, imediata e individual, sendo imprescindível o preenchimento da ficha de notificação, cujas informações são compiladas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Diante dos fatos, aliado a alta letalidade do vírus, faz-se necessário analisar também os atendimentos antirrâbicos realizados no Estado nesse período de 10 anos (2009 a 2019).

No período de 2009 a 2019, o Maranhão apresentou 298.046 casos de atendimento antirrábico em humanos, sendo notado de modo geral um aumento gradativo no número de atendimentos, com destaque para os anos: 2017, 29.153 atendimentos (9,78%); 2018, 32.138 atendimentos (10,78%); e 2019, 34.340 atendimentos (11,52%) (figura 1).

Figura 1: Percentual de atendimentos antirrâbico em humanos, Maranhão, 2009 a 2019.

Quanto ao perfil clínico-demográfico dos atendimentos antirrâbicos no Estado do Maranhão, a Tabela 2 apresenta a distribuição conforme as treze variáveis analisadas.

Tabela 2: Perfil Clínico-demográfico dos atendimentos antirrâbicos em humanos, Maranhão, Brasil, 2009-2019.

Variáveis	N	%
REGIONAL DE SAÚDE		
Santa Inês - Região XI	16.539	5,55%
Metropolitana	72.393	24,29%
Imperatriz - Região XV	23.123	7,76%
Zé Doca - Região XII	14.085	4,73%
Caxias – Região XXVI	29.634	9,94%
Outras	142.272	47,73%
ZONA DE RESIDÊNCIA		
Ignorado/Branco	16.064	5,37%
Urbana	213.714	71,50%
Rural	66.602	22,28%
Peri Urbana	2.532	0,85%
TIPO DE EXPOSIÇÃO		
Contato indireto	7.396	2,48%
Arranhadura	41.137	13,80%
Lambadura	7.985	2,67%
Mordedura	259.780	87,16%
Outros	4.664	1,56%

LOCAL DO FERIMENTO		
Mucosa	8.293	2,78%
Cabeça e Pescoço	17.384	5,83%
Mãos e Pés	88.576	29,71%
Tronco	22.245	7,46%
Membros superiores	58.240	19,54%
Membros inferiores	135.830	45,57%
NÚMERO DE FERIMENTO		
Ignorado/ Branco	8.680	2,91%
Único	164.750	55,27%
Múltiplo	122.590	41,13%
Sem ferimento	2.026	0,67%
TIPO DE FERIMENTO		
Ferimento profundo	136.423	45,77%
Ferimento superficial	138.783	46,56%
Ferimento dilacerante	19.629	6,58%
ESPÉCIE ANIMAL AGRESSORA		
Ignorado/ Branco	101	0,03%
Canina	247.305	82,97%
Felina	38.629	12,96%
Quiróptera (morcego)	1.695	0,56%
Primata (macaco)	5.563	1,86%
Raposa	500	0,16%
Herbívoro doméstico	385	0,12%
Outra	3.868	1,30%
CONDIÇÃO DO ANIMAL AGRESSOR		
Ignorado/ Branco	101	0,03%
Sadio	185.957	68,41%
Suspeito	67.710	24,91%
Raivoso	3.281	1,20%
Morto/ Desaparecido	14.866	5,46%
HISTÓRICO DE TRATAMENTO		
Pré-exposição		
Ignorado/Branco	83.145	27,89%
Sim	11.561	3,87%
Não	203.340	68,22%
Pós-exposição		
Ignorado/Branco	85.901	28,82%
Sim	16.495	5,53%
Não	195.650	65,64%
TRATAMENTO INDICADO		
Ignorado/Branco	9.315	3,12%
Pré-Exposição	7.316	2,45%
Dispensa de tratamento	1.627	0,54%
Observação do animal	8.984	3,01%
Observação + Vacina	187.083	62,76%
Vacina	64.693	21,70%
Soro + Vacina	18.839	6,32%
Esquema de Reexposição	189	0,063%

CONDIÇÃO FINAL DO ANIMAL		
Ignorado/Branco	151.119	53,36%
Negativo raiva clínica	122.838	43,37%
Negativo raiva laboratorial	8.771	3,09%
Positivo raiva clínica	160	0,05%
Positivo raiva laboratorial	300	0,10%
INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO		
Ignorado/Branco	89.511	30,03%
Sim	38.155	12,80%
Não	170.380	57,16%
MOTIVO DA INTERRUPÇÃO		
Unidade de Saúde indicou	5.849	1,96%
Abandono	30.279	10,15%
Transferência	2.032	0,68%

A Regional de Saúde Metropolitana foi a que apresentou o maior índice entre as regionais (24,29%), sendo composta pelos municípios, Alcântara, Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Paço do Lumiar, Presidente Juscelino, Raposa, Rosário, Santa Rita, São José de Ribamar e São Luís. Ao analisar de modo individual a frequência de atendimentos antirrâbicos nestes municípios, destaca-se a cidade de São Luís, que apresentou 19,87% atendimentos (n=59230). Além disso, é válido ressaltar que os municípios de São Luís, São José de Ribamar e Paço do Lumiar apresentaram os maiores números de notificações nesses 10 anos. Salienta-se que juntos essa região Metropolitana possui uma população de 1.621.102 habitantes, correspondendo 22,66% da população residente no Estado.

O índice de atendimento antirrâbico por zona de residência no Maranhão apresentou os seguintes resultados, Ign/Branco 5,37% (n=16064), Urbana 71,50% (n=213714), Rural 22,28% (n=66602), Periurbana 0,85% (n=2532). Com maior relação de notificações na Zona Urbana. Esse resultado vai de encontro com os 67% casos de contaminação em zona rural de todo Brasil, no período de 2000 a 2017, que representa os 126/188 dos casos de notificação de raiva em humanos, sendo que a zona Urbana obteve um índice de 33% (n=62) (VARGAS, 2019).

Vale destacar que no período de 2000 a 2009, a região Nordeste liderava os casos de contaminação pelo vírus da raiva, 85/163 indivíduos contaminados, correspondendo a 52% casos desse período sobre as demais regiões nacionais (WADA, 2011). O coeficiente de incidência da região Nordeste subiu para 55%, resultado do estudo descritivo realizado nos anos de 2000 a 2017, ou seja, esse índice corresponde a 102/188 pessoas infectadas por essa antropozoonose (VARGAS, 2019).

A mordedura 87,16% (n=259.780) foi o tipo de exposição mais frequente, semelhante ao encontrado no cenário nacional Brasileiro (BRASIL, 2016), e em outros estudos realizados no país

(NASCIMENTO *et al.*, 2019). Diversos estudos relatam a mordedura como o tipo de exposição ao vírus rábico mais comum, por ser um mecanismo de defesa animal (BRASIL, 2016; NASCIMENTO *et al.*, 2019).

A localização preferencial das agressões foi nos membros inferiores 45,57% (n=135.830), assemelhando-se ao relatado por outros autores (CARVALHO; SILVA, 2007; VELOSO *et al.*, 2011) e a média nacional (BRASIL, 2016). Esse local é mais acessível para os animais, por estarem na mesma altura da linha de ataque animal, sendo sede de um grande número de agressões (ALONSO, 2005; BRASIL, 2016).

A principal espécie de animal agressor foi a canina 82,97% (n=247.305), semelhante ao relatado por outros autores (VELOSO *et al.*, 2011; FERRAZ *et al.*, 2013; NASCIMENTO *et al.*, 2019) e aos dados nacionais (BRASIL, 2016).

O predomínio de lesões superficiais 46,56% (n=138.783) no presente estudo foi encontrado também por (FRIAS *et al.*, 2012; GOMIDE-JUNIOR, 2013). Com predominância de ferimentos únicos 55,27% (n=164.750), dado similar ao encontrado por Veloso *et al.* (2011).

O tipo de atendimento “vacina em vítima” e “observação do animal agressor + vacina” 62,76% (n=187.083) foram os principais no Maranhão. Apenas uma pequena parcela dos atendimentos, menos de 6,32% (n=18.839), receberam “soro + vacina”. No país, o tipo de atendimento mais comum foi a “observação do animal agressor + vacina” (BRASIL, 2016). A “observação do animal agressor” e “vacina em vítima” foram os principais em Jaboticabal-SP (FRIAS, 2012).

A interrupção do tratamento ocorreu em 12,80% (n=38.155) dos atendimentos e o principal motivo foi o abandono, corroborando com o encontrado no cenário nacional (BRASIL, 2016), no estudo de Veloso *et al.* (2011) em Porto Alegre - RS, e de Nascimento *et al.* (2019) no município do Rio de Janeiro.

Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014) é de responsabilidade do serviço de saúde fazer a busca ativa imediata daqueles que não comparecerem para continuação da profilaxia antirrábica. É importante o fortalecimento da vigilância em saúde local, com o objetivo de diminuir o número de abandonos na profilaxia antirrábica e, consequentemente, serem conseguidos melhores resultados na finalização dos atendimentos.

CONCLUSÃO

A raiva humana representa, ainda hoje, um grave problema de saúde no Brasil e em vários países, principalmente pelo fato de ser uma doença de alta letalidade. Dessa forma, o investimento em programas de educação continuada com o propósito de aumentar o conhecimento acerca da

infecção dentre os profissionais de saúde constitui uma importante ação para reduzir sua incidência. Vale ressaltar, uma vez mais, neste âmbito, que o prognóstico da exposição ao vírus da raiva humana está intimamente relacionado às corretas medidas de profilaxia, seja através da soroterapia ou da vacinação.

Conclui-se que uma maior atenção das autoridades à implementação das ações de vigilância da raiva humana é necessária. Reforça-se ainda a necessidade da população em buscar atendimento em qualquer situação de agressão, bem como aos profissionais de saúde permanecerem atentos à avaliação e indicação adequada da profilaxia, quando esta, se fizer necessária.

Todo caso suspeito de raiva humana é de notificação compulsória, imediata, individual e, dada a gravidade da doença, enfatiza-se a importância do acompanhamento epidemiológico periódico da doença, com análise crítica dos dados e medidas profiláticas direcionadas, visto que, eficientes medidas de prevenção correspondem o ponto principal para eliminação da doença.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, M. F. *et al.* Resposta imune humoral de cães à vacina inativada, de cérebro de camundongos lactentes, utilizada nas campanhas anti-rábicas no Brasil. **Revista Saúde Pública**, São Paulo, v. 31, n. 5, p. 502-507, 1997.
- ALONSO, B. P. M. **Estudo dos casos de agressões por cães no município de Araraquara, estado de São Paulo, Brasil**. [Tese de doutorado]. Araraquara: Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 2005.
- BRASIL, Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS, **Doenças e Agravos de Notificação (RAIVA) - 2007 em diante (SINAN)**. Disponível em <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinanet/cnv/raivama.def>. [Acessado em 23 de março de 2020].
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Boletim Epidemiológico**. v. 47, n. 30. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Boletim epidemiológico: Perfil dos atendimentos antirrâbicos humanos, Brasil, 2009-2013**. Brasília: Ministério da Saúde, v. 4, n. 30, 2016.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 812 p.
- CARVALHO, C. C.; SILVA, B. T. F. Características epidemiológicas de acidentes por mordedura de cão atendidos em unidade básica de saúde no nordeste do Brasil. **Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde**, v. 20, n. 1, p. 17-21, 2007.
- CAVALCANTE, K. K.; FLORÊNCIO, C. M.; ALENCAR, C. H. Profilaxia antirrábica humana pós-exposição: características dos atendimentos no estado de Ceará, 2007-2015. **Journal Health Biology and Science**, v. 5, n. 4, p. 337-345, 2017.
- DA COSTA, Wagner A. Aspectos práticos na prevenção da raiva humana. **Jornal de Pediatria**, v. 75, n. Supl 1, p. S135, 1999.
- DUARTE, N.F.H. *et al.* Epidemiologia da Raiva Humana no Estado do Ceará, 1970 a 2019. **Revista de Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v.30, n.1, 2021.
- FAUQUET, C. M. *et al.* **Virus taxonomy**, p. 630-634, 2005. In: Eighth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses, Academic Press, San Diego, CA, 2005.
- FERNANDES, M. I. M. **Acidentes rábicos em município do norte do Paraná: uma análise do perfil, conduta e sistema de notificação** [dissertação]. Botucatu (SP): Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Medicina de Botucatu; 2013.

- FERRAZ, L. *et al.* Notificações dos atendimentos antirrábico humano: perfil das vítimas e dos acidentes. *Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde. Hygeia*, v. 9, n. 16, p. 182 - 189, 2013.
- FRIAS, D. F. R. **Profilaxia antirrábica humana: proposta de uma nova metodologia de ação.** [tese de doutorado]. Jaboticabal: Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, 2012.
- FRIAS, D. F. R.; NUNES, J. O. R.; CARVALHO, A. A. B. Caracterização de agravos causados por cães e gatos a seres humanos no município de Jaboticabal, São Paulo, durante o período de 2000 a 2009. *Archives of Veterinary Science*, v. 17, n. 3, p. 6-70, 2012.
- GOMES, A. P. *et al.* Raiva humana. *Revista Brasileira de Clínica Médica*, v. 10, n. 4, p. 334-40, 2012.
- GOMIDE JUNIOR, M. H. (2013). **Profilaxia da raiva humana em Luís Antônio, SP, Brasil: características das ocorrências e atenção médica prestada aos pacientes** (Dissertação de Mestrado em Saúde na Comunidade). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil.
- LAZARINI, S. R. F. Antigenic and genetic study of rabies virus isolated from humans in Brazil. In: **Anais do Seminário Internacional de Raiva**, 2003, São Paulo: Instituto Pasteur; 2003.
- LIMA, E. C. F. *et al.* Interações entre meio ambiente, atendimentos antirrábicos e acidentes por animais peçonhentos no município de Petrolina (PE). *Saúde Meio Ambiente*, v. 6, n. 1, p. 54-70, 2017.
- LIMA, E. F. *et al.* Sinais clínicos, distribuição das lesões no sistema nervoso central e epidemiologia da raiva em herbívoros na região Nordeste do Brasil. *Pesquisa Veterinária Brasileira*, v. 25, n. 4, p. 250-264, 2005.
- MALANCZYN, A. A.; SELOW, M. L. C.; TONIOLO, R. M. M. Análise das notificações de acidentes antirrábicos no município de Curitiba, nos últimos 3 anos. *Revista Dom Acadêmico*, v. 1, n.1, 2017.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). **Departamento de informática do SUS**, 2016 [Internet]. 2017 [citado 2017 mar 13]. Disponível em: <http://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude/ferramentas/tabwin>.
- NASCIMENTO, A. O. *et al.* Perfil epidemiológico do atendimento antirrábico humano em uma área de planejamento do município do Rio de Janeiro. *Revista Mineira de Enfermagem (REME)*, v. 23, e-1216, 2019.
- REICHMANN, M. L. A. B.; PINTO, H. B. F.; ARANTES, M. B.; SANTOS, M. B.; VIARO, O.; NUNES, V. F. P. **Educação e promoção da saúde no Programa de Controle da raiva.** São Paulo: Pasteur; 2000.
- SALVI, F. I. *et al.* Perfil epidemiológico dos atendimentos antirrábicos humanos no município de Chapecó, SC. *Revista Interdisciplinar de Estudos em Saúde*, v.7, n. 1, p. 176-186, 2018.
- SCHNEIDER, M. C. *et al.* Controle da raiva no Brasil de 1980 a 1990. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v.30, n.2, p. 196-203, 1996.
- SILVA, A. M. R. **Características do atendimento antirrábico humano no Estado de Santa Catarina, área considerada sob controle para a raiva no ciclo urbano -2002 a 2007** [Trabalho de Conclusão de Curso]. Florianópolis (SC): Departamento de Saúde Pública do Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Santa Catarina, 2007.
- SOUZA, D. N. *et al.* Phylogenetic analysis of rabies virus isolated from canids in North and Northeast Brazil. *Archives Virology*, v. 162, n. 1, p. 71- 7, 2017.
- VARGAS, Alexander; ROMANO, Alessandro Pecego Martins; MERCHÁN-HAMANN, Edgar. Raiva humana no Brasil: estudo descritivo, 2000-2017. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, v. 28, p. e2018275, 2019.
- VELOSO, R. D. Motivos de abandono do tratamento antirrábico humano pós-exposição em Porto Alegre (RS, Brasil). *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 16, n. 2, p.537-546, 2011.
- WADA, Marcelo Yoshito; ROCHA, Silene Manrique; MAIA-ELKHOURY, Ana Nilce Silveira. Situação da raiva no Brasil, 2000 a 2009. *Epidemiologia e serviços de saúde*, v. 20, n. 4, p. 509-518, 2011.

CAPÍTULO 4

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA DOENÇA DE
CHAGAS AGUDA NO ESTADO DO
MARANHÃO NO PERÍODO DE 2010 A 2020

Capítulo 4

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA DOENÇA DE CHAGAS AGUDA NO ESTADO DO MARANHÃO NO PERÍODO DE 2010 A 2020

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF ACUTE CHAGAS DISEASE IN THE STATE OF MARANHÃO FROM 2010 TO 2020

Joyce Resende dos Santos Gonçalves

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0365-6382>

*Autor correspondente, e-mail: joycesantosgoncalves@gmail.com

Antonio Edineudo Moreira de Sousa

Licenciatura em Educação Física pela Faculdade do Vale do Jaguaribe
Pedra Branca-CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5662-8249>

E-mail: edineudo_de_sousa@hotmail.com

Francisca Leilivânia Souza Albuquerque

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0114-5792>

E-mail: leilisvania_leilis@hotmail.com

João Guilherme Nantes Araújo

Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2430-1081>

E-mail: joaonantesbio@gmail.com

Letícia Chaves Vêras do Rosário

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5105-5157>

E-mail: leticiacveras@hotmail.com

Matheus Neves Araujo

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1674-7593>

E-mail: matheusnevesaraujo4@gmail.com

Samyr Jorge Barbieri Waquim

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5660-8419>

E-mail: samyrjbw@gmail.com

Vitória Teixeira da Silva

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9334-909X>

E-mail: vitoriateixeiratds04@outlook.com

Joicy Cortez de Sá Sousa

Pós-graduação em Biologia Microbiana, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8678-0244>

E-mail: joicyvet@hotmail.com

Mylena Andréa Oliveira Torres

Docente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5021-3130>

E-mail: mylena.torres@hotmail.com

RESUMO

Doença de Chagas (DC) ou Tripanossomíase americana é uma doença tropical parasitária causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*, é transmitida para seres humanos e outros mamíferos pelo inseto vetor conhecido como barbeiro. A DC representa uma condição infecciosa classificada como enfermidade negligenciada pela Organização Mundial da Saúde e está relacionada a falta de saneamento básico, dentre outros fatores. O objetivo do estudo foi analisar o perfil epidemiológico da Doença de Chagas Aguda no Estado do Maranhão, no período de 2010 a 2020. Trata-se de um estudo epidemiológico transversal, quantitativo, descritivo, tendo como base de estudo as notificações dos casos de Doença de Chagas Aguda, no estado do Maranhão, no período de 2010 a 2020, na qual foram utilizados dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde (MS), foram avaliadas as variáveis sexo, faixa etária, raça, escolaridade, município de residência e zona de residência. No período pesquisado, foram registrados 51 casos de Doença de Chagas Aguda no estado do Maranhão, sendo 10 em 2011 (19.60%), 1 em 2013 (1.96%), 1 em 2014 (1.96%), 9 em 2015 (17.64%), 2 em 2016 (3.92%), 1 em 2017 (1.96%), 25 em 2018 (49.01%), 2 em 2019 (3.92%). Foi mais prevalente no sexo masculino, 54.90% (n=28). A faixa etária mais acometida foi dos 20 aos 39 anos com 39.21% (n=20). A raça parda foi mais acometida 47.05% (n=24). Referente a escolaridade Ign/ branco foi prevalente 92.15% (n=47). Quanto aos municípios de residência, Pedro do Rosário foi mais acometido com 39.21% (n=20). A zona rural apresentou maior número de casos 78.43 (n=40). A Doença de Chagas é um problema de saúde pública e diante dos fatos, percebe-se a importância do acompanhamento epidemiológico da doença, pois eficientes medidas de prevenção correspondem o ponto principal para eliminação da doença.

Palavras-chave: Doença de Chagas Aguda; Perfil epidemiológico; Saúde pública.

ABSTRACT

Chagas disease (CD) or American Trypanosomiasis is a tropical parasitic disease caused by the protozoan *Trypanosoma cruzi*, transmitted to humans and other mammals by the vector insect known as the barber. CD represents an infectious condition classified as a neglected disease by the World Health Organization and is related to the lack of basic sanitation, among other factors. The aim of the study was to analyze the epidemiological profile of Acute Chagas Disease in the State of Maranhão, from 2010 to 2020. This is a cross-sectional, quantitative, descriptive epidemiological study, based on the notifications of cases of the disease of Chagas aguda, in the state of Maranhão, from 2010 to 2020, in which secondary data from the Information System for Notifiable Diseases (SINAN) of the Ministry of Health (MS) were used, the variables sex, age group, were evaluated. race, education, municipality of residence and area of residence. In the period studied, 51 cases of Acute Chagas Disease were registered in the state of Maranhão, 10 in 2011 (19.60%), 1 in 2013 (1.96%), 1 in 2014 (1.96%), 9 in 2015 (17.64%), 2 in 2016 (3.92%), 1 in 2017 (1.96%), 25 in 2018 (49.01%), 2 in 2019 (3.92%). It was more prevalent in males, 54.90% (n=28). The most affected age group was between 20 and 39 years old with 39.21% (n=20). The brown race was more affected 47.05% (n=24).

Regarding Ign/white education, 92.15% (n=47) was prevalent. As for the municipalities of residence, Pedro do Rosário was more affected with 39.21% (n=20). The rural area had the highest number of cases 78.43 (n=40). Chagas disease is a public health problem and, given the facts, the importance of epidemiological monitoring of the disease is perceived, as efficient prevention measures are the main point for eliminating the disease.

Keywords: Acute Chagas Disease; Epidemiological profile; Public health.

INTRODUÇÃO

A doença de Chagas (DC) é causada pelo protozoário parasita *Trypanosoma cruzi* que é transmitido pelas fezes de um inseto (triatoma) conhecido como barbeiro. O nome do parasita foi dado por seu descobridor, o cientista Carlos Chagas, em homenagem ao também cientista Oswaldo Cruz. É uma patologia de caráter infeccioso, com fase aguda e crônica, incluída dentro das enfermidades negligenciadas segundo a Organização Mundial de Saúde (DIAS *et al.*, 2016). As condições de pobreza e carência de opções terapêuticas eficazes e seguras estão intimamente relacionadas com tal fato, o que reforça a condição de endemia nos países do continente americano (SILVA, ANDRADE JÚNIOR & DANTAS, 2019).

A DC apresenta curso clínico bifásico, composto por uma fase aguda, ocasionalmente não identificada, evoluindo para a fase crônica. É considerada aguda quando o indivíduo apresenta febre prolongada (por mais de sete dias), associada ou não de edema de face ou de membros, exantema, adenomegalia, hepatomegalia, esplenomegalia, cardiopatia aguda (taquicardia, sinais de insuficiência cardíaca), manifestações hemorrágicas, icterícia, sinal de Romana ou chagoma de inoculação (BRASIL, 2017).

A fase aguda da DC é, na grande maioria dos casos, assintomática (90% dos casos), sendo caracterizada por elevada parasitemia, febre, mal-estar e a presença do sinal de Romanã, mais conhecido como ‘chagomas’, que são lesões oriundas de edema de mucosa ou edema cutâneo no local da inoculação. Em crianças, tende a apresentar-se de forma mais agressiva levando a complicações como miocardite e meningoencefalite, envolvendo bastante morbimortalidade (SILVA, AVIZ & MONTEIRO, 2020). Por não apresentar manifestações importantes, a fase aguda da DC costuma passar despercebida, levando a uma diminuição da quantidade de casos notificados nesta fase. Resultado disso é a prevalência do diagnóstico na fase crônica, onde a doença já pode manifestar-se nas formas indeterminada, cardíaca, digestiva ou cardiodigestiva no adulto, levando a internações recorrentes, licenças e óbitos precoces, ocasionando um grande impacto socioeconômico a esses pacientes (PINTO *et al.*, 2007; SANTOS, 2018).

Estima-se que 65 milhões de pessoas vivem sob o risco da infecção em países endêmicos das Américas, sendo 12.000 infectados anualmente (BRASIL, 2017).

A DC é um problema de saúde pública, sendo uma das principais doenças negligenciadas no Brasil e uma das quatro maiores causas de morte por doenças parasitárias e infecciosas (MARTINS-MELO *et al.*, 2014). Dessa forma, a identificação do perfil epidemiológico e a distribuição espacial da doença, são relevantes para gerar informações voltadas para a vigilância de saúde, no sentido de criar medidas intervencionistas para prevenir a doença e para identificar a necessidade de distribuição de recursos para aumentar o diagnóstico ainda na fase aguda e evitar a subnotificação. Considerando a magnitude do problema que a DC representa no âmbito da saúde pública e social, o objetivo do estudo foi analisar o perfil epidemiológico de pacientes portadores de Doença de Chagas Aguda no estado do Maranhão no período de 2010 a 2020.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se um estudo epidemiológico transversal, quantitativo, descritivo, tendo como base de estudo as notificações dos casos de Doença de Chagas Aguda, no estado do Maranhão, no período de 2010 a 2020. Foram utilizados dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde (MS). Foram avaliadas as seguintes variáveis: Ano de diagnóstico, Sexo, Faixa etária, Raça, Escolaridade, Município de residência e Zona de residência.

Os dados coletados foram tabulados no programa Microsoft Office Excel 2010, utilizando-se cálculos e construções de tabelas e gráficos, para posterior análise estatística descritiva simples.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período de 2010 a 2020 foram diagnosticados e notificados 51 casos de doença de chagas aguda no estado do Maranhão, sendo 0 em 2010, 10 em 2011 (19.60%), 0 em 2012, 1 em 2013 (1.96%), 1 em 2014 (1.96%), 9 em 2015 (17.64%), 2 em 2016 (3.92%), 1 em 2017 (1.96%), 25 em 2018 (49.01%), 2 em 2019 (3.92%). 0 em 2020 (figura 1).

Figura 1: Notificação dos casos de Doença de Chagas Aguda no Estado do Maranhão nos anos 2010 a 2020.

Fonte: SINAN – Ministério da saúde.

Quanto ao perfil sociodemográfico dos indivíduos notificados com Doença de Chagas Aguda, a Tabela 1 apresenta a distribuição segundo sexo, faixa etária, raça, escolaridade, município de residência e zona de residência.

Tabela 1: Distribuição dos casos de Doença de Chagas Aguda notificados entre 2010 e 2020, de acordo com características sociodemográficas no estado do Maranhão.

Variáveis	N	%
SEXO		
Masculino	28	54.90%
Feminino	23	45.09%
FAIXA ETÁRIA		
1-4 anos	4	7.84%
5-9 anos	6	11.76%
10-14 anos	4	7.84%
15-19 anos	2	3.92%
20-39 anos	20	39.21%
40-59 anos	11	21.56%
65-69 anos	2	3.92%
70-79 anos	2	3.92%
RAÇA		
Branca	10	19.60%
Parda	24	47.05%
Amarela	1	1.96%
Preta	16	31.37%
ESCOLARIDADE		
Ign/ Branco	47	92.15%
Nenhuma	4	7.84%

MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA		
Barra do Corda	3	5,88%
Caxias	2	3,92%
Porto Franco	1	1,96%
São Roberto	5	9,80%
Turiação	2	3,92%
Turilândia	11	21,56%
Alcântara	1	1,96%
Pedro do Rosário	20	39,21%
Pinheiro	3	5,88%
Santa Rita	1	1,96%
Imperatriz	1	1,96%
Palmeirândia	1	1,96%
ZONA DE RESIDÊNCIA		
Rural	40	78,43%
Urbana	11	21,56%

A prevalência da doença foi maior entre o sexo masculino, 54,90% (n=28) fato que coincide com a prevalência do estudo de Cardozo *et al* (2017).

Carvalho *et al.* (2003), em seu estudo, realizado em 9 municípios do estado de São Paulo, onde demonstrou que 55% dos acometidos eram homens. Malta (1996), em seu livro ‘Doença de Chagas’, após analisar inúmeros artigos, mostrou que a doença era mais prevalente no sexo masculino. Zicker (1998), em um estudo realizado na capital de Goiás, constatou que dos acometidos pela Doença de Chagas, 53,0% eram homens. Nobre (2001) obteve 58,0% dos infectados pertencentes ao sexo masculino.

A faixa etária predominante se concentrou entre 20 e 39 anos, com 39,21% (n=20), seguido de 40 a 59 anos com 21,56 (n=11). Esses dados são condizentes com outros estudos realizados em território brasileiro (ALENCAR *et al.*, 2020; BOZELLI *et al.*, 2006; CARDOZO *et al.*, 2017; PEREIRA *et al.*, 2017; RODRIGUES *et al.*, 2013; SILVA, ANDRADE JÚNIOR & DANTAS, 2019).

Isso sugere que possa existir relação entre atividade econômica, atividades laborais e os fatores de risco para transmissão da doença de chagas aguda. Esses dados são preocupantes, tendo em vista que estas faixas etárias são consideradas economicamente ativas e o seu adoecimento impacta negativamente no desenvolvimento das atividades devido comprometimento cardiovascular provocado pela doença, podendo resultar em mais absenteísmo e consequências socioeconômicas para o paciente e a família.

Quanto à raça, a cor parda predominou com 47,05% (n=24) dos casos. Fato semelhante foi observado em estudos similares, onde se observaram prevalências da cor parda tanto em estudos nacionais como na região Norte (ANDRADE *et al.* 2020; ALENCAR *et al.*, 2020). Além disso, a

grande presença da população parda na região norte e nordeste do país mostra-se com um forte fator para a explicação dessa grande prevalência de acometimento em específico desta etnia (BRASIL, 2021).

Ademais, é importante ressaltar que as desigualdades étnico-raciais em saúde no Brasil e em outros países possuem raízes em diferenças socioeconômicas, que se acumulam ao longo da vida de sucessivas gerações, levando a vivência em ambientes menos saudáveis, a assistência à saúde inadequada ou degradante além de experiências diretas de atos ou atitudes de discriminação, levando assim a efeitos próprios na saúde (PEARCE *et al.*, 2004).

No que diz respeito à escolaridade, o maior número de casos, 92,15% (n=47) do total não foram especificados no momento da notificação ou foram ignorados, e apenas 7,84% (n=4) dos casos com essa informação presente e com nenhuma escolaridade. Deve-se reforçar a importância para esta variável, assim como a demonstração do preenchimento prejudicado das fichas de notificação, sugerindo uma deficiência nos serviços de saúde. Ademais os casos que possuíam esta variável preenchida traziam como nenhuma escolaridade, demonstrando assim a vulnerabilidade social em que estão inseridos esses indivíduos.

Os municípios mais acometidos pela Doença de Chagas Aguda foram Pedro do Rosário 39.21% (n= 20), seguido de Turilândia 21.56% (n=11), São Roberto 9,80% (n=5), Barra do Corda e Pinheiro com 5.88% (n=3) cada, Caxias e Turiaçu com 3.92% (n=2) cada, Porto Franco, Alcântara, Santa Rita, Imperatriz e Palmeirândia com 1.96% (n=1) cada.

A doença de Chagas humana (DC) constitui uma endemia predominantemente rural, com a estimativa de prevalência da infecção de 16 a 18 milhões de indivíduos nos diversos países do continente americano, estando relacionada a fatores ambientais, sociais e políticos. As pessoas mais afetadas pela DC são as que vivem em condições precárias, o que favorece a presença dos insetos vetores (DIAS, 2011). Fato esse que corrobora com os resultados apresentados no estudo onde a Doença de Chagas Aguda acometeu (78.43%) (n=40) da população da zona rural.

CONCLUSÃO

Segundo seu histórico, a Doença de Chagas é uma doença de importância mundial, principalmente em países em desenvolvimento e em locais com baixos níveis socioeconômicos. No Estado do Maranhão, no período investigado (2010 a 2020), foram registrados 51 casos da doença, com maior prevalência no sexo masculino, na faixa etária de 20 a 39 anos, raça parda, escolaridade ign/branco, município de residência mais acometido foi Pedro do Rosário, seguido de Turilândia e a zona rural apresentou maior número de casos. Através desta pesquisa foi possível identificar o perfil

epidemiológico e a distribuição espacial da doença, fatores importantes para gerar informações voltadas para a vigilância de saúde.

Portanto, percebe-se que os dados de notificação são importantes e tem grande potencial de delimitar o risco quando são feitos de maneira correta, por isso, reforça-se a necessidade de preencher a ficha de notificação corretamente e com a informação da maior quantidade de dados possível e conhecidos.

REFERÊNCIAS

- ALENCAR, M. M. F. *et al.* Epidemiologia da Doença de Chagas aguda no Brasil de 2007 a 2018. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 10, p. e8449109120, 2020.
- ANDRADE, D.S. *et al.* Análise do perfil epidemiológico dos pacientes acometidos por doença de chagas aguda notificados em Araguaína – TO no período de 2007 a 2018. **Revista Cereus**, v. 12, n. 3, p. 212-227, 2020.
- BOZELLI, C. E. *et al.* Perfil clínico epidemiológico de pacientes com doença de Chagas no Hospital Universitário de Maringá, Paraná, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 22, n. 5, p. 1027–1034, 2006.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS. Informações de saúde (TABNET) – **Epidemiológicas e Morbidade**, 2021.
- CARDOZO, E. J. S. *et al.* Perfil epidemiológico dos portadores de doenças de chagas: Dos indicadores de risco ao processo de enfrentamento da doença. **Arquivos de Ciências da Saúde**, v. 24, n. 1, p. 41–46, 2017.
- CARVALHO, M. E. *et al.* Soroepidemiologia da tripanosomíase americana na região do litoral sul, São Paulo. **Revista Saúde Pública**, São Paulo, v. 37, n. 1, 2003.
- DIAS, J. C. P. Os primórdios do controle da doença de Chagas (em homenagem a Emmanuel Dias, pioneiro do controle, no centenário de seu nascimento). **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical** [online]. v. 44, supp. 2, p. 12-18, 2011.
- DIAS, J. C. P. *et al.* II Consenso Brasileiro em Doença de Chagas, 2015. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 25, p. 7-86, 2016.
- MALTA, J. **Doença de Chagas**. Ed. Savier, 1996.
- MARTINS-MELO, F. R., *et al.* Revisão sistemática: Prevalência da doença de Chagas em gestantes e transmissão congênita do *Trypanosoma cruzi* no Brasil: Uma revisão sistemática e meta-análise. **Tropical Medicine & International Health**, v. 19, n. 8, p. 943-957, 2014.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. **Guia de vigilância em saúde: volume único**. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2017. p. 441-61.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde. **Saúde Brasil 2017: uma análise da situação de saúde e os desafios para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável** [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2018 [citado 2019jun 17]. 426 p.
- NOBRE, I. F. O. **Estudo da Infecção Chagásica nos serviços de hemoterapia no Norte de Minas Gerais: perfil epidemiológico, métodos de triagem e ações de controle** (tese). Belo Horizonte: Faculdade de Medicina da UFMG; 2001.
- PEARCE, N., FOLIAKI, S., SPORLE, A.; CUNNINGHAM, C. (2004). Genetics, race, ethnicity, and health. **BMJ: British Medical Journal**, v. 328, n. 7447, p. 1070–1072, 2004.
- PEREIRA, C. M. L. *et al.* Perfil clínico e epidemiológico da doença de chagas aguda no estado de Minas Gerais. **Revista de Atenção à Saúde**, v. 15, n. 52, p. 49–54, 2017.

PINTO, A. Y. N. *et al.* Doença de chagas aguda grave autóctone da Amazônia brasileira. **Revista Paraense de Medicina**, v. 21, n. 2, 2007.

RODRIGUES, J. R. A. *et al.* Doença de Chagas Aguda no Estado do Maranhão, Brasil: Uma comparação entre os bancos de dados do SINAN e da FUNASA. **Journal of Management & Primary Health Care**, v. 4, n. 1, p. 3–9, 2013.

SANTOS, F. R. **Triagem neonatal para infecção da doença de chagas congênita: avaliação da prevalência ao nascer na região sul de Sergipe**. 75. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde). Universidade Federal de Sergipe, Aracaju-SE, 2018.

SILVA, A. P. DA, ANDRADE JÚNIOR, F. P. D.; DANTAS, B. B. Doença de Chagas: Perfil de morbidade hospitalar na Região do Nordeste Brasileiro. **Revista de Ciências da Saúde Nova Esperança**, v.17, n. 3, p. 08–17, 2019.

SILVA, G. G., AVIZ, G. B. D.; MONTEIRO, R. C. Perfil epidemiológico da Doença de Chagas aguda no Pará entre 2010 e 2017. Pará **Research Medical Journal**, v. 4, p. e29, 2020.

ZICKER, F; Chagas disease and social security, a case-control studies in an urban area, Goiás, Brazil. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo. v.22, 1998.

CAPÍTULO 5

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA TUBERCULOSE
NO ESTADO DO MARANHÃO NO PERÍODO DE
2010 A 2020

Capítulo 5

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA TUBERCULOSE NO ESTADO DO MARANHÃO NO PERÍODO DE 2010 A 2020

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF TUBERCULOSIS IN THE STATE OF MARANHÃO FROM 2010 TO 2020

Joyce Resende dos Santos Gonçalves

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0365-6382>

*Autor correspondente, e-mail: joycesantosgoncalves@gmail.com

Antonio Edineudo Moreira de Sousa

Licenciatura em Educação Física pela Faculdade do Vale do Jaguaribe
Pedra Branca-CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5662-8249>

E-mail: edineudo_de_sousa@hotmail.com

Francisca Leilivânia Souza Albuquerque

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0114-5792>

E-mail: leilisvania_leilis@hotmail.com

João Guilherme Nantes Araújo

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2430-1081>

E-mail: joaonantesbio@gmail.com

Letícia Chaves Vêras do Rosário

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5105-5157>

E-mail: leticiacveras@hotmail.com

Matheus Neves Araujo

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1674-7593>

E-mail: matheusnevesaraujo4@gmail.com

Samyr Jorge Barbieri Waquim

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5660-8419>

E-mail: samyrjbw@gmail.com

Vitória Teixeira da Silva

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9334-909X>

E-mail: vitoriateixeiratds04@outlook.com

Joicy Cortez de Sá Sousa

Pós-graduação em Biologia Microbiana, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8678-0244>

E-mail: joicyvet@hotmail.com

Mylena Andréa Oliveira Torres

Docente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5021-3130>

E-mail: mylena.torres@hotmail.com

RESUMO

A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa, transmitida de pessoa a pessoa através de gotículas de aerossóis, causada por um microrganismo chamado *Mycobacterium tuberculosis*, também denominado de bacilo de Koch (BAAR). A TB merece especial atenção dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo. Este trabalho objetivou avaliar os aspectos epidemiológicos da Tuberculose no período de 2010 a 2020, no Estado do Maranhão. Trata-se de um estudo epidemiológico transversal, cujo dados foram coletados do SINAN, dos casos de tuberculose entre os anos de 2010 a 2020, notificados no Maranhão. Foram avaliadas as variáveis ano de notificação segundo sexo, faixa etária, raça, escolaridade, zona de residência e tabagismo. No período de 2010 a 2020 foram diagnosticados e notificados 27.122 casos de tuberculose no estado do Maranhão, sendo 9.28% (n=2.518) em 2010, 9.53% (n=2.585) em 2011, 8.40% (n=2.280) em 2012, 8.70% (n=2.360) em 2013, 7.99% (n=2.168) em 2014, 8.4% (n=2.281) em 2015, 9.18% (n=2.492) em 2016, 9.23% (n=2.506) em 2017, 9.90% (n=2.686) em 2018, 9.97% (n=2.705) em 2019 e 9.36% (n=2.541) em 2020. Foi mais prevalente no sexo masculino, 64.84% (n=17.588). A faixa etária mais acometida foi dos 20 aos 39 anos com 42.94% (n=11.647). A raça parda foi mais acometida 70.58% (n=19.145). Referente a escolaridade 1ª a 4ª série incompleta do ensino fundamental foi prevalente 18.10% (n=4.910). A zona urbana apresentou maior número de casos 69.81% (n=18.936). Referente ao tabagismo, os dados apontaram: 46.24 % (n=12.543) Não, 43.97% (n=11.928) Ign/ Branco e 9.77% (n=2.651) Sim. Diante dos fatos, percebe-se a relevância da assistência epidemiológica da doença, pois medidas eficientes de prevenção e informação acerca do tema correspondem um ponto de extrema importância e grande magnitude.

Palavras-chave: Tuberculose; Aspectos epidemiológicos; Profissionais de saúde.

ABSTRACT

Tuberculosis (TB) is an infectious disease, transmitted from person to person through aerosol droplets, caused by a microorganism called *Mycobacterium tuberculosis*, also called Koch's bacillus (BAAR). TB deserves special attention from health professionals and society as a whole. This study aimed to evaluate the epidemiological aspects of Tuberculosis from 2010 to 2020, in the State of Maranhão. This is a cross-sectional epidemiological study, whose data were collected from SINAN, of tuberculosis cases between the years 2010 to 2020, notified in Maranhão. The variables year of notification according to sex, age group, race, education, area of residence and smoking were evaluated. From 2010 to 2020, 27,122 cases of tuberculosis were diagnosed and reported in the state of Maranhão, of which 9.28% (n=2,518) in 2010, 9.53% (n=2,585) in 2011, 8.40% (n=2,280) in 2012, 8.70% (n=2,360) in 2013, 7.99% (n=2,168) in 2014, 8.4% (n=2,281) in 2015, 9.18% (n=2,492) in 2016, 9.23% (n=2,506) in 2017, 9.90% (n=2,686) in 2018, 9.97% (n=2,705) in 2019 and 9.36% (n=2,541) in 2020. It was more prevalent in males, 64.84% (n=17,588). The most affected age group was between 20 and 39 years old with 42.94% (n=11,647). The brown race was more affected 70.58% (n=19,145). Regarding incomplete education from 1st to 4th grade of elementary school, 18.10%

(n=4,910) was prevalent. The urban area had the highest number of cases 69.81% (n=18,936). Regarding smoking, the data showed: 46.24% (n=12,543) No, 43.97% (n=11,928) Ign/ Branco and 9.77% (n=2,651) Yes. disease, as efficient prevention measures and information on the subject correspond to a point of extreme importance and great magnitude.

Keywords: Tuberculosis; Epidemiological aspects; Health professionals.

INTRODUÇÃO

A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa e endêmica, causada pelo *Mycobacterium tuberculosis* ou também conhecido como Bacilo de Koch (BK). É caracterizada por acometer principalmente os pulmões, entretanto também pode atingir outros órgãos sendo definida como forma extrapulmonar (MENDES *et al.*, 2021). Tem como fonte de transmissão as vias aéreas e possui altas taxas de mortalidade, entretanto, existem tratamentos fornecidos por serviços públicos de saúde e que demonstram um resultado satisfatório (ZAGO *et al.*, 2021).

A TB possui uma abrangência mundial e se apresenta entre uma das principais causas de mortalidade em países subdesenvolvidos, reconhecida como uma emergência de Saúde Pública pela Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo incentivadas a entrarem em políticas internacionais de saúde (MENDES *et al.*, 2021). O Brasil se encontra entre os 22 países com maior incidência dos casos de mortalidade pela mesma, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020), contando com aproximadamente 80% dos casos mundiais (MARTINS *et al.*, 2021).

Mesmo com o avanço das políticas públicas existentes no Brasil em combate a TB, algumas características marcantes do país propiciam ainda o aumento desses casos, como a desigualdade socioeconômica, falta de saneamento básico em muitas áreas urbanas e rurais, o difícil acesso aos sistemas de saúde e a falta de consistência no tratamento dos acometidos (MENDES *et al.*, 2021)

Além dos aspectos socioeconômicos apresentados pelos países subdesenvolvidos, uma das maiores preocupações são relacionadas ao acometimento de pessoas imunossuprimidas, onde a coinfeção, principalmente com portadores de HIV tem se mostrado alarmante (SAN PEDRO *et al.*, 2013). Segundo Mendes (2021), apesar dos avanços tecnológicos e dos sistemas de informação, aspectos básicos de higiene também demonstram ser importante fator para a transmissibilidade da doença, uma vez que, principalmente em populações mais carentes, o cuidado com a saúde pessoal e coletiva se mostra cada vez menos frequente devido à falta de informação e instrução com as quais estas pessoas tem acesso. Alertando também ao etilismo e tabagismo que são prejudiciais à saúde e fornecem um melhor ambiente para desenvolvimento de TB.

Em virtude da alta prevalência dessa patologia no país, o objetivo do estudo foi analisar o aspecto epidemiológico de pacientes portadores de Tuberculose no estado do Maranhão no período de 2010 a 2020.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se um estudo epidemiológico transversal, quantitativo, descritivo, tendo como base de estudo as notificações dos casos de Tuberculose, no estado do Maranhão, no período de 2010 a 2020. Foram utilizados dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde (MS). Foram avaliadas as seguintes variáveis: Ano de diagnóstico, Sexo, Faixa etária, Raça, Escolaridade, Zona de residência e Tabagismo.

Os dados coletados foram tabulados no programa Microsoft Office Excel 2010, utilizando-se cálculos e construções de tabelas e gráficos, para posterior análise estatística descritiva simples.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período de 2010 a 2020 foram diagnosticados e notificados 27.122 casos de tuberculose no estado do Maranhão, sendo 9.28% (n=2.518) em 2010, 9.53% (n=2.585) em 2011, 8.40% (n=2.280) em 2012, 8.70% (n=2.360) em 2013, 7.99% (n=2.168) em 2014, 8.41% (n=2.281) em 2015, 9.18% (n=2.492) em 2016, 9.23% (n=2.506) em 2017, 9.90% (n=2.686) em 2018 (9.90%), 9.97% (n=2.705) em 2019 e 9.36% (n=2.541) em 2020 (figura 1).

Figura 1: Notificação dos casos de Tuberculose no Estado do Maranhão nos anos 2010 a 2020.

Fonte: SINAN – Ministério da saúde.

Quanto ao perfil sociodemográfico dos indivíduos notificados com Tuberculose, a Tabela 1 apresenta a distribuição segundo sexo, faixa etária, raça, escolaridade, zona de residência e tabagismo.

Tabela 1: Distribuição dos casos de Tuberculose notificados entre 2010 e 2020, de acordo com características sociodemográficas no estado do Maranhão.

Variáveis	N	%
SEXO		
Masculino	17.588	64.84%
Feminino	9.537	35.16%
FAIXA ETÁRIA		
Ign/ Branco	10	0.036%
< 1 ano	189	0.69%
1-4 anos	120	0.44%
5-9 anos	151	0.55%
10-14 anos	353	1.30%
15-19 anos	1.673	6.16%
20-39 anos	11.647	42.94%
40-59 anos	8.075	29.77%
60-64 anos	1.364	5.02%
65-69 anos	1.112	4.09%
70-79 anos	1.705	6.28%
80 e +	723	2.66%
RAÇA		
Ign/ Branco	398	1.46%
Branca	3.342	12.32%
Preta	3.456	12.74%
Amarela	209	0.77%
Parda	19.145	70.58%
Indígena	572	2.10%
ESCOLARIDADE		
Ign/ Branco	2.800	10.32%
Analfabeto	3.243	11.95%
1ª a 4ª série incompleta EF	4.910	18.10%
4ª série completa EF	2.048	7.55%
5ª a 8ª série incompleta EF	4.437	16.35%
Ensino fundamental completo	1.724	6.35%
Ensino médio incompleto	2.103	7.75%
Ensino médio completo	4.295	15.83%
Educação Superior incompleta	496	1.82%
Educação superior completa	675	2.48%
Não se aplica	391	1.44%
ZONA DE RESIDÊNCIA		
Ign/Branco	718	2.64%
Urbana	18.936	69.81%
Rural	7.193	26.52%
Periurbana	275	1.01%
TABAGISMO		
Ign/ Branco	11.928	43.97%
Sim	2.651	9.77%
Não	12.543	46.24%

Ao se traçar o perfil dos indivíduos mais acometidos pela TB, torna-se claro que a maioria é do sexo masculino com 64.84% (n=17.58). O estudo de Pinto *et al.* (2017) realizado no município de São Paulo também encontrou resultado semelhante, onde houve uma maior incidência de TB nesse gênero. Tal fato é esclarecido pela grande exposição masculina às patologias infectocontagiosas devido ao tabagismo e ao alcoolismo e também pela carência de uso dos serviços de saúde e utilização de medidas preventivas por esse público (FONTES *et al.*, 2019; SANTOS & MARTINS, 2018).

Com relação a faixa etária, houve maior ocorrência entre indivíduos com idade entre 20 e 39 anos com 42.94% (n=.64). Corroborando com esse achado, no estudo de OLIVEIRA *et al.* (2018) essa faixa também demonstrou uma prevalência maior em comparação às outras, o que é justificado pela maior exposição à certas atividades durante essa fase da vida, como relações sexuais e uso de drogas injetáveis.

Ainda sobre a idade, a uma grande quantidade de casos em adultos entre 40-59 anos, sendo 29.77% (n=8.07) demonstra que a TB afeta principalmente a população economicamente ativa (SILVA *et al.*, 2017). A eficácia da vacina BCG diminui o risco dos indivíduos jovens se infectarem, entretanto a alta prevalência nos adultos pode ser associada a alguns fatores de risco, como a coinfeção de HIV/Aids. Já a incidência nos idosos está relacionada ao crescimento da expectativa de vida que propicia para que as cepas latentes obtidas no decorrer da vida se reativem de forma endógena (BARIOTO & ANVERSA, 2015).

Quanto à raça, a mais prevalente foi a parda com 70.58% (n=19.145). Corroborando com esta afirmação o estudo realizado por Tavares *et al.* (2020), onde 65,20% dos indivíduos eram da raça parda. De acordo com Pinto *et al.* (2017), a TB no Brasil associa-se sobretudo aos indivíduos pardos, pretos e indígenas, pois esses grupos ainda enfrentam obstáculos discriminatórios para usar os serviços de assistência à saúde e também para ter melhores condições de renda.

Quanto a variável escolaridade, em todos os níveis de instrução foram identificadas pessoas acometidas pela tuberculose, porém os maiores valores foram para o nível de 1ª a 4ª série incompleta do ensino fundamental com 18.10% (n=4.910), seguido da 5ª a 8ª série incompleta do ensino fundamental com 16.35% (n=4.437) e os menores valores foram para a educação superior incompleta com 1.82% (n=496) e completa com 2.48% (n=675). Confirmando a prerrogativa que a baixa escolaridade está relacionada ao pouco acesso à informação provocando alguma vulnerabilidade social, que pode ser refletida diretamente na saúde e nesse caso no aumento de caso de tuberculose (CAVALVANTE & SILVA, 2013).

A doença foi predominante na zona urbana, correspondendo a 69.81% (18.936) das notificações. Na zona rural e periurbana foram registrados, respectivamente 26.52% (7.193) e 1.01%

(275) dos casos. Em 2.64% (718) das ocorrências, a zona de residência não foi especificada. A predominância da zona urbana sobre a rural como área de residência dos indivíduos que adoeceram foi também encontrada em outros estudos (SANTOS, SILVA, RAMOS, 2005). Acrescenta-se o fato de que a maior subnotificação dos casos verificados na zona rural pode ter contribuído para tamanha diferença encontrada neste estudo.

Referente ao tabagismo, os dados apontaram: Não 46.24% (12.543), Ign/ Branco 43.97% (11.928) e Sim 9.77% (2.651).

A partir do presente estudo, foi possível observar que, no estado do Maranhão dentre o período analisado, foi possível obter-se uma média de 2.712 casos anuais de tuberculose, tendo uma prevalência em homens, pardos, com idades entre 20 a 39 anos e que não concluíram o ensino fundamental. Em conjunto com o que foi apresentado por autores como Mendes (2021), apesar da tecnologia de informação se expandir cada vez mais, a quantidade de pessoas que não tem acesso a essas informações é ainda mais expansiva.

Partindo dos dados apresentados e apesar de políticas de combate existentes no estado, mostra-se que a tuberculose vem se mantendo em uma constante, uma vez que, no período de estudo de 10 anos, o número de casos foi, de certa forma, constante, não havendo uma diminuição como se é esperado no combate.

Evidenciando a zona de residência prevalente, que foi a zona urbana, representa ainda mais o déficit no sistema público de saúde no estado, ressaltando a falta e distribuição de informação que deveria ser mais presente nessa região, tendo em vista o desenvolvimento presente na área em relação as zonas rurais.

CONCLUSÃO

É importante que haja uma intensificação nas políticas de combate à tuberculose no estado, buscando campanhas e abordagens que chamem a atenção da população para o número de casos e a importância que se deve ter no cuidado para o combate a erradicação da doença no estado. Vale chamar atenção também dos profissionais de saúde a respeito das notificações e dos cuidados multidisciplinares que devem haver no tratamento dos pacientes acometidos pela TB.

REFERÊNCIAS

BARIOTO, J. G.; ANVERSA, L. Perfil epidemiológico dos casos de tuberculose notificados no município de Bauru, estado de São Paulo, Brasil. **BEPA**, v. 12, n. 134, p. 01-11, 2015.

CAVALCANTE, O. F. E.; SILVA D M G V. Perfil de pessoas acometidas por tuberculose. **Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste**, v.14, n. 4, p. 720-9, 2013.

FONTES, G. J. F. *et al.* V. Perfil epidemiológico da tuberculose no Brasil no período de 2012 a 2016. **Revista Brasileira de Educação e Saúde**, v. 9, n. 1, p. 19-26, 2019.

MARTINS, J. P. *et al.* Perfil Epidemiológico dos Casos de Tuberculose Relacionado ao Abandono de Tratamento no Maranhão de 2017 a 2020. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v.7, n.6, p. 59102-59118, 2021.

MENDES, M. S. Análise espacial da tuberculose em menores de 15 anos de idade e risco socioeconômico: um estudo ecológico na Paraíba, 2007-2016. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 30, n. 3, p. e20201038, 2021.

MENDES, R. C. *et al.* Aspectos epidemiológicos da tuberculose no Município de Caxias, do Estado do Maranhão. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 3, e39810313284, 2021.

OLIVEIRA, L. B. *et al.* Análise epidemiológica da coinfeção tuberculose/HIV. **Cogitare Enfermagem**, v. 23, n. 1, p. 1-8, 2018.

PEREIRA, D. L. M. *et al.* Perfil temporal da tuberculose segundo raça/cor no Maranhão no período de 2015 a 2020. **Archives of Health**, Curitiba, v. 2, n. 4, p. 949-953, 2021.

PINTO, P. F. P. S. *et al.* Perfil epidemiológico da tuberculose no município de São Paulo de 2006 a 2013. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 20, n. 3, p. 549-557, 2017.

SAN PEDRO, A.; OLIVEIRA, R. M. Tuberculose e indicadores socioeconômicos: revisão sistemática da literatura. **Revista Panamericana de Salud Publica**, v. 33, n. 4, p. 294–301, 2013.

SANTOS, B. M.; SILVA, R. M.; RAMOS, L. D. Perfil epidemiológico da tuberculose em município de médio porte no intervalo de uma década. **Arquivos Catarinense de Medicina**, v. 34, n. 4, p. 53-8, 2005.

SANTOS, T. A.; MARTINS, M. M. F. Perfil dos casos de reingresso após abandono do tratamento da tuberculose em Salvador, Bahia, Brasil. **Caderno de Saúde Coletiva**, v. 26, n. 3, p. 233-240, 2018.

SILVA, M. S. *et al.* Sistema de informação em tuberculose: análise espacial da completude dos dados no estado do Paraná. **Revista da Escola de Enfermagem USP**, v. 55, p. e20200538, 2021.

SILVA, W. A. *et al.* Perfil epidemiológico dos casos notificados de tuberculose no Piauí nos anos de 2010 a 2014. **Revista Interdisciplinar**, v. 10, n. 3, p. 31-38, 2017.

TAVARES, C. M. *et al.* Tendência e caracterização epidemiológica da tuberculose em Alagoas, 2007-2016. **Caderno de Saúde Coletiva**, v. 28, n. 1, p. 107-115, 2020.

ZAGO, P. T. N. *et al.* Nursing actions promoting adherence to tuberculosis treatment: scoping review. **Revista da Escola de Enfermagem USP**, v. 55, p. e20200300, 2021.

CAPÍTULO 6

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE SÍFILIS EM
GESTANTES, NA CIDADE DE SÃO LUÍS - MA,
NO PERÍODO DE 2010 A 2020

Capítulo 6

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE SÍFILIS EM GESTANTES, NA CIDADE DE SÃO LUÍS - MA, NO PERÍODO DE 2010 A 2020

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF SYPHILIS IN PREGNANT WOMEN IN THE CITY OF SÃO LUÍS - MA, FROM 2010 TO 2020

Joyce Resende dos Santos Gonçalves

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0365-6382>

*Autor correspondente, e-mail: joycesantosgoncalves@gmail.com

Antonio Edineudo Moreira de Sousa

Licenciatura em Educação Física pela Faculdade do Vale do Jaguaribe, Pedra Branca, CE

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5662-8249>

E-mail: edineudo_de_sousa@hotmail.com

Francisca Leilivânia Souza Albuquerque

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0114-5792>

E-mail: leilivania_leilis@hotmail.com

João Guilherme Nantes Araújo

Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2430-1081>

E-mail: joaonantesbio@gmail.com

Letícia Chaves Vêras do Rosário

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5105-5157>

E-mail: leticiacveras@hotmail.com

Matheus Neves Araujo

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1674-7593>

E-mail: matheusnevesaraujo4@gmail.com

Samyr Jorge Barbieri Waquim

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5660-8419>

E-mail: samyrjbw@gmail.com

Vitória Teixeira da Silva

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9334-909X>

E-mail: vitoriateixeiratds04@outlook.com

Joicy Cortez de Sá Sousa

Pós-graduação em Biologia Microbiana, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8678-0244>

E-mail: joicyvet@hotmail.com

Mylena Andréa Oliveira Torres

Docente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5021-3130>

E-mail: mylena004822@ceuma.com.br

RESUMO

Dentre as infecções sexualmente transmissíveis (IST) mais comuns e perigosas encontra-se a Sífilis, que é uma doença infectocontagiosa sistêmica, de evolução crônica, provocada por uma espiroqueta, a *Treponema pallidum*, caracterizada por lesões cutâneas temporárias e sua transmissão ocorre por via sexual e transplacentária, constituindo uma ameaça ao feto, em decorrência do alto risco para o desenvolvimento da sífilis congênita. Apresenta prevalência significativa na população geral e ainda, nas gestantes. A sífilis na gestação é um grave problema de saúde pública, responsável por altos índices morbimortalidade intrauterina. As atuais recomendações do Ministério da Saúde (MS) para o rastreamento da sífilis durante o pré-natal devem ser realizadas na primeira consulta, ainda no primeiro trimestre, e no terceiro trimestre da gestação. O objetivo deste trabalho foi avaliar os aspectos epidemiológicos da Sífilis em gestantes na cidade de São Luís - MA, no período de 2010 a 2020. Trata-se de um estudo epidemiológico transversal, referente aos casos notificados de sífilis em gestantes na cidade de São Luís - MA, no período de 2010 a 2020. Foram utilizadas variáveis epidemiológicas (idade gestacional, faixa etária e escolaridade), cujos dados foram coletados no SINAN- MS. No período de estudado, foram registrados 1.828 casos de sífilis em gestantes na cidade de São Luís - MA. Registrou-se maior número de casos no 3º trimestre de gestação com 45,56% (n=833) dos casos, na faixa etária de 20 a 29 anos com 53,22% (n=973) e referente à escolaridade a predominância foi ensino médio completo com 39,44% (n=721). Dessa forma, conclui-se que a sífilis é uma das doenças sexualmente transmissíveis que causa maiores danos às gestantes e seus conceitos. Embora tenha agente etiológico conhecido, modo de transmissão estabelecido, tratamento eficaz e de baixo custo, com excelentes possibilidades de cura, ainda persiste como um grave problema de saúde pública.

Palavras-chave: Sífilis na gestação; Epidemiologia; Pré-natal.

ABSTRACT

Among the most common and dangerous sexually transmitted infections (STIs) is Syphilis, which is a systemic infectious disease of chronic evolution, caused by a spirochete, *Treponema pallidum*, characterized by temporary skin lesions and its transmission occurs sexually and transplacental, constituting a threat to the fetus, due to the high risk for the development of congenital syphilis. It has a significant prevalence in the general population and also in pregnant women. Syphilis during pregnancy is a serious public health problem, responsible for high rates of intrauterine morbidity and mortality. The current recommendations of the Ministry of Health (MS) for screening syphilis during prenatal care should be carried out in the first consultation, still in the first trimester, and in the third trimester of pregnancy. The objective of this study was to evaluate the epidemiological aspects of syphilis in pregnant women in the city of São Luís-MA, from 2010 to 2020. This is a cross-sectional epidemiological study, referring to reported cases of syphilis in pregnant women in the city of São

Luís -MA, from 2010 to 2020. Epidemiological variables (gestational age, age and education) were used, whose data were collected in the SINAN-MS. During the study period, 1,828 cases of syphilis in pregnant women were registered in the city of São Luís-MA. There was a greater number of cases in the 3rd trimester of pregnancy with 45.56% (n=833) of the cases, in the age group from 20 to 29 years old with 53.22% (n=973) and regarding education the predominance was complete high school with 39.44% (n=721). Thus, it is concluded that syphilis is one of the sexually transmitted diseases that cause greater damage to pregnant women and their fetuses. Although it has a known etiological agent, established mode of transmission, effective and low-cost treatment, with excellent cure possibilities, it still persists as a serious public health problem.

Keywords: Syphilis in pregnancy; Epidemiology; Prenatal care.

INTRODUÇÃO

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada pela *Treponema pallidum*, uma bactéria do grupo das espiroquetas. É uma doença de evolução crônica e tem as formas adquirida e congênita. Suas principais formas de transmissão são as vias sexual e vertical (LAFETÁ, 2016; COSTA, 2017).

O quadro clínico é variado nas questões da imunologia, patologia e das manifestações da doença, além de depender do tempo da aquisição da infecção, de forma que abrange as fases: primária, secundária, terciária e latente. A sífilis quando não tratada ou inadequadamente tratada na gestação pode ser transmitida por via transplacentária para o conceito, principalmente nas fases primária e secundária, podendo causar morte fetal, morte neonatal, baixo peso ao nascer, prematuridade ou a infecção congênita (PADOVANI; OLIVEIRA; PELLOSO, 2018; SOUZA; RODRIGUES; GOMES, 2018).

Observou-se o aumento da incidência da sífilis nas mulheres em idade fértil, principalmente as formas primária e secundária. Em conjunto, também ocorreu o aumento do número de notificações de sífilis gestacional, apesar de não ser um número real devido as subnotificações. Como consequência, a taxa de sífilis congênita também se elevou, atingindo 9 casos por mil nascidos vivos (NV) em 2018 (BRASIL, 2019).

O rastreamento da sífilis gestacional é feito no início do pré-natal. De acordo com o Ministério da Saúde, é feito um teste não treponêmico e um teste treponêmico. Com um destes dando reagente, o tratamento é iniciado e a droga de escolha é a penicilina benzatina (BRASIL, 2019).

Logo, apesar do rastreamento da sífilis durante a gestação e a prevenção da sífilis congênita serem prioridades para o Ministério da Saúde, os casos vêm aumentando ao longo dos anos (BRASIL, 2019). Dessa forma, destaca-se a importância do estudo do avanço da doença no Brasil.

Para tanto, o trabalho possui como objetivo avaliar os aspectos epidemiológicos da Sífilis em gestantes na cidade de São Luís - MA, no período de 2010 a 2020.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um estudo epidemiológico transversal, quantitativo, descritivo, tendo como base de estudo as notificações dos casos de sífilis em gestantes, na cidade de São Luís do estado do Maranhão, no período de 2010 a 2020. Foram utilizados dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde (MS).

Foram avaliadas as seguintes variáveis: Idade gestacional, Faixa etária e Escolaridade. Os dados coletados foram tabulados no programa Microsoft Office Excel 2016, utilizando-se não só a construção de cálculos e construções, como também de tabelas e gráficos, para posterior análise estatística descritiva simples.

RESULTADOS

No período de 2010 a 2020 foram diagnosticados e notificados 1.828 casos de sífilis em gestantes na cidade de São Luís, sendo 17 em 2010, 38 em 2011, 27 em 2012, 81 em 2013, 174 em 2014, 245 em 2015, 211 em 2016, 234 em 2017, 405 em 2018, 305 em 2019 e 91 em 2020 (figura 1).

Figura 1. Percentual do número de casos notificados de sífilis em gestantes, na cidade de São Luís - MA, no período de 2010 a 2020. Fonte: SINAN – Ministério da saúde.

Em relação à idade gestacional estratificada em trimestres mais afetadas pela sífilis em gestantes, têm-se o terceiro trimestre verificado o maior número de casos com 45.56% (n= 833), seguindo de segundo trimestre com 25.54% (n= 467) e, por fim, do primeiro trimestre o qual corrobora com 18.38% (n= 336) dos casos (tabela 1).

Tabela 1. Percentual do número de casos notificados de sífilis em gestantes estratificado por trimestre de idade gestacional, na cidade de São Luís - MA, no período de 2010 a 2020.

Variáveis	N	%
Idade gestacional		
1º trimestre	336	18,38%
2º trimestre	467	25,54%
3º trimestre	833	45,56%
idade gestacional ignorada	192	10,50%

Notam-se que as faixas etárias mais afetadas pela sífilis em gestantes são aquelas que englobam a população adulta, sendo verificado o maior número de casos na faixa de 20 a 29 anos de idade com 53.22% casos (n= 973), seguindo de 30 a 39 anos com 22.81% (n= 417), de 15 a 19 anos com 20.24% (n= 370), de 40 anos ou mais com 2.57% (n= 47), bem como de 10 a 14 anos totalizando 1.14% (n= 21) (tabela 2).

Tabela 2. Percentual da faixa etária de casos notificados de sífilis em gestantes, na cidade de São Luís - MA, no período de 2010 a 2020.

Variáveis	N	%
Faixa etária		
10 a 14 anos	21	1,14%
15 a 19 anos	370	20,24%
20 a 29 anos	973	53,22%
30 a 39 anos	417	22,81%
40 anos ou mais	47	2,57%

No que se refere ao grau de escolaridade das gestantes, a maior parte das pacientes apresentou o ensino médio completo com 39.44% (n= 721), seguido de ignorado com 21.11% (n= 386), 14.27% (n= 261) de ensino médio incompleto, 10.44% (n= 163) de ensino fundamental II incompleto, 8.91% (n= 163) de ensino fundamental completo, 2.24% (n= 41) da 4ª série completa, 1.58% (n= 29) de 1ª a 4ª série incompleta, 0.98% (n= 18) de ensino superior incompleto, 0.76% (n= 14) de ensino superior completo e, por fim, 0.21% (n= 4) de analfabeto (tabela 3).

Tabela 3. Percentual da escolaridade de casos notificados de sífilis em gestantes, na cidade de São Luís - MA, no período de 2010 a 2020.

Variáveis	N	%
Escolaridade		
analfabeto	4	0,21%
1ª a 4ª série incompleta	29	1,58%
4ª série completa	41	2,24%
5ª a 8ª série incompleta	191	10,44%

fundamental completo	63	8,91%
médio incompleto	261	14,27%
médio completo	721	39,44%
superior incompleto	18	0,98%
superior completo	14	0,76%
ignorado	386	21,11%

DISCUSSÃO

A sífilis é uma patologia ainda muito prevalente no Brasil e no mundo, persistindo como uma problemática de saúde pública. Há estimativa de que aproximadamente 2 milhões, dos 11 milhões de casos novos de sífilis, ocorram em gestantes, o que pode aumentar em 50% o risco da ocorrência de sífilis congênita (FERNANDES, 2021).

Das gestações ocorridas de 2010 a 2020, na cidade de São Luís, foram notificados 1.828 casos de sífilis na gestação. Houve discreto aumento no número de casos notificados, passando de 17 casos em 2011 para 27 em 2012. Entretanto, a taxa de detecção aumentou consideravelmente, de 81 casos no ano de 2013 para 405 casos em 2018, com progressiva diminuição de 305 casos em 2019 para 91 casos em 2020. O ano de 2010 foi o que apresentou o menor número de notificações com 17 no total.

Em pesquisa realizada por Padovani, Oliveira e Pelloso (2018), a qual associou características maternas, perinatais e epidemiológicas, observou-se que houve um aumento na taxa de detecção da sífilis em gestantes, quando comparado os anos de 2010 e 2014 na região Sul do Brasil, bem como uma variação de casos nos anos pesquisados, com decréscimo e posterior aumento de notificações.

No período do estudo, a maioria dos casos de sífilis em gestantes foi detectado em mães adultas sendo verificado o maior número de casos na faixa etária de 20 a 29 anos com 53.22% (n= 973), seguido de 30 a 39 anos 22.81% (n= 417) e de 15 a 19 anos 20.24% (n= 370). Resultados similares foram encontrados em estudo realizado por Tobias e Aquino (2020) nos municípios da região de saúde centro sul de Goiás entre 2007-2018, bem como no estudo feito por Fernandes *et al.* (2021) também na cidade de São Luís - MA.

Em relação ao grau de escolaridade das pacientes, a maior parte das pacientes apresentou o ensino médio completo com 39.44% (n= 721), seguido de ignorado com 21.11% (n= 386), 14.27% (n= 261) de ensino médio incompleto, 10.44% (n= 163) de ensino fundamental II incompleto, o que corrobora com a pesquisa realizada no Paraná, na qual 25% das mães tinham ensino fundamental incompleto, 25% ensino fundamental completo, 25% ensino médio incompleto e 25% ensino médio completo, evidenciando a baixa escolaridade das pacientes (PAGLIARI, 2016).

As gestantes foram diagnosticadas, em grande parte, no terceiro trimestre com 45.56% (n= 833), seguindo de segundo trimestre com 25.54% (n= 467) e por fim, 18.38% (n= 336) no primeiro trimestre, o que contrasta com o estudo feito por SILVA *et al.* (2020), o qual demonstra maior diagnóstico de sífilis na gestação no primeiro trimestre de gestação, reafirmando a importância da assistência pré-natal captar precocemente as gestantes, como estabelecida pelo Ministério da Saúde através da implantação da Rede Cegonha em 2011.

Quando adquirida durante a gestação, a sífilis pode levar ao abortamento espontâneo, morte fetal ou neonatal, prematuridade e graves danos à saúde do conceito, como o comprometimento oftalmológico, auditivo e neurológico. O não tratamento da infecção materna recente implica em contaminação do feto em 80 a 100% dos casos, enquanto a sífilis materna tardia não tratada pode acarretar infecção fetal com frequência de, aproximadamente, 30%. E mesmo após tratadas, as mulheres que tiveram sífilis durante a gestação apresentam um risco maior para resultados adversos quando comparadas com mulheres sem história de infecção (MAGALHÃES *et al.*, 2011).

O principal fator de risco para a sífilis congênita consiste no acompanhamento pré-natal inadequado, relacionado a cerca de 70 a 90% dos casos. Dentre os problemas relacionados ao atendimento pré-natal, destacam-se anamnese inadequada; sorologia para sífilis não realizada nos períodos preconizados; interpretação inadequada da sorologia para sífilis; não reconhecimento dos sinais maternos de sífilis; não tratamento do parceiro sexual, informações inadequadas veiculadas entre a equipe de assistência à saúde, além de baixa condições socioeconômicas e de escolaridade (MOTTA *et al.*, 2018).

A gestante com sífilis deve iniciar tratamento imediatamente, bem como suas parcerias sexuais. Desse modo, faz-se necessário o cumprimento das recomendações presentes no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais e no PCDT para a atenção integral às pessoas com ISTs. As medidas de controle devem abranger os momentos antes e durante a gravidez, assim como o tempo da internação para o parto ou curetagem por abortamento (TOBIAS; AQUINO, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Sífilis deve ser enfrentada com atenção e conscientização principalmente pela área médica e da saúde, já que o seu diagnóstico deve ser feito o mais rápido possível principalmente no que se refere a gestante.

A sífilis gestacional apresenta-se como um desafio da saúde pública que deve ser combatido. Na cidade de São Luís – MA foi observado no presente estudo o aumento da incidência da doença ao

longo dos anos, principalmente nas mulheres jovens em idade fértil entre 20 a 29 anos e com baixa escolaridade. Também foi constatado o diagnóstico tardio da gestante, apenas no 3º trimestre, o que é problemático visto a importância do diagnóstico e tratamento precoce para evitar a morbimortalidade do concepto e da mãe.

Dessa forma, conclui-se que para reduzir a prevalência de sífilis na gestação e da sífilis congênita, é essencial que os profissionais de saúde e a comunidade se sensibilizem sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento eficaz da mulher e de seu parceiro. À equipe multiprofissional cabe a realização de busca ativa das gestantes faltosas nas consultas de pré-natal, ações para a conscientização da população quanto aos riscos da prática sexual insegura e da importância do autocuidado, principalmente entre os mais vulneráveis.

REFERÊNCIAS

- BONI, S. M.; PAGLIARI, P. B. Incidência de sífilis congênita e sua prevalência em gestantes em um município do noroeste do Paraná. **Revista Saúde e Pesquisa**, v. 9, n. 3, p. 517-524, 2016.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais**. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.
- COSTA, C. V. DA *et al.* Sífilis congênita: repercussões e desafios. **Arquivos Catarinenses de Medicina**, v. 46, n. 3, p. 194-202, 2017.
- FERNANDES, J. F. V *et al.* Sífilis em gestantes residentes em São Luís, Maranhão: perfil e evolução de 2006 a 2018. **Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 2, p. 362-378, 2021.
- LAFETÁ, K. R. G. *et al.* Sífilis materna e congênita, subnotificação e difícil controle. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 19, n. 1, p. 63-74, 2016.
- MAGALHÃES, D. M. dos S. *et al.* A sífilis na gestação e sua influência na morbimortalidade materno-infantil. **Revista Comunicação em Ciências da Saúde**, v. 22, n. 1, p. 43-54, 2011.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE. DATASUS. **Sífilis Congênita** – Casos Confirmados Notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Brasil. 2020. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtmexe?sinanet/cnv/sifilisbr.def>. Acesso em: 17 set. 2021.
- MOTTA, I. A. *et al.* Sífilis congênita: por que sua prevalência continua tão alta? **Revista Medicina Minas Gerais**, v. 28, n. 6, e-S280610, 2018.
- PADOVANI, C.; OLIVEIRA, R. R.; PELLOSO, S. M. Sífilis na gestação: associação das características maternas e perinatais em região do sul do Brasil. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 26, e3019, 2018.
- SILVA, G. M. DA *et al.* Sífilis na gestante e congênita: perfil epidemiológico e prevalência. **Enfermaria Global**, n. 57, p. 122-136, 2020.
- SOUZA, B.S.O; RODRIGUES, R. M.; GOMES, R. M. L. Análise epidemiológica de casos notificados de sífilis. **Revista Sociedade Brasileira Clínica Médica**, Macaé, v. 16, n. 2, p. 94-98, 2018.
- TOBIAS, G. C.; AQUINO, E. C. de. Tendência de Sífilis em Gestante e Congênita nos municípios da Região de Saúde Centro Sul, Goiás, 2007-2018. **Revista de Atenção à Saúde**, São Caetano do Sul, v. 19, n. 68, p. 209-222, 2021.
- TORRES, R. G. *et al.* Syphilis in Pregnancy: The Reality in a Public Hospital. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 41, n. 2, p. 90-96, 2019.
- TSAI, S. M. D. *et al.* Syphilis in Pregnancy. **Obstetrical & gynecological survey**, n. 74, n. 9, p. 557–564, 2019.

CAPÍTULO 7

FREQUÊNCIA DE DOR LOMBAR EM GESTANTES

Capítulo 7

PANORAMA DA DOR LOMBAR EM GESTANTES

PANORAMA OF THE LOW BACK PAIN IN PREGNANT WOMEN

Lucinária Araújo Alves

Discente do curso de Fisioterapia, Universidade Ceuma, São Luís - MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7896-7882>

E-mail: lucinarya.alves.sb@hotmail.com

Aíla Maria Castro Dias

Discente do curso de Fisioterapia, Faculdade Santa Terezinha - CEST, São Luís - MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1621-0091>

E-mail: ailadiasfisio@gmail.com

Rosanna Maria Couto de Sá Monteiro

Docente do curso de Fisioterapia, Faculdade Santa Terezinha - CEST, São Luís - MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7255-1766>

E-mail: zannamaria@hotmail.com

Maria da Consolação Rios da Silva

Docente do curso de Fisioterapia, Faculdade Santa Terezinha - CEST, São Luís - MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7871-6928>

E-mail: mriossilva@yahoo.com.br

Alexssandra Alves Penha

Docente do curso de Fisioterapia, Faculdade Santa Terezinha - CEST, São Luís - MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2520-1282>

E-mail: alexssandra.alvsp@gmail.com

Camila Fernandes Lima

Docente do curso de Fisioterapia, Faculdade Santa Terezinha - CEST, São Luís - MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4543-5556>

E-mail: milapsicolima@gmail.com

Maria de Nazareth Mendes

Docente do curso de Fisioterapia, Faculdade Santa Terezinha - CEST, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1485-3106>

E-mail: nazarethmendes@hotmail.com

Tatiana Cristina Fonseca Soares de Santana

Docente do curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3469-3410>

E-mail: tatiana_iann@hotmail.com

Mylena Andréa Oliveira Torres

Docente do curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5021-3130>

E-mail: mylena004822@ceuma.com.br

Adriana Sousa Rego

Docente do curso de Fisioterapia, Faculdade Santa Terezinha - CEST, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2494-030X>

*Autor correspondente, e-mail: adricefs@yahoo.com.br

RESUMO

A gestante passa por inúmeras transformações, dentre elas as físicas e psicológicas, as quais transformam sua vida social, familiar e profissional. Nesse período surgem queixas que causam desconforto. Este trabalho objetivou avaliar a frequência de dor lombar em gestantes. É um estudo quantitativo, descritivo, transversal. O estudo foi realizado com 50 gestantes da Maternidade Maria do Amparo, localizada na cidade de São Luís - MA. Para pesquisa foram aplicados 03 questionários, sendo eles: sociodemográfico e clínico, a Escala Visual Analógica (EVA) e o questionário de Oswestry. A idade média foi de 27,2 anos ($DP \pm 5,9$), apresentando peso corpóreo antes da gestação de uma média de 63kg ($DP \pm 9,5$), e peso depois da gestação médio de 68kg ($DP \pm 14$), altura média 1,6m ($DP \pm 0,1$). Com relação as características clínicas, verificou-se que 42% eram primigestas, 74% já tiveram aborto, 54% estavam no terceiro trimestre de gestação, 36% sentem dor no final do dia, 30% relatam sentir dor no corpo todo e 66% relatou que o início da dor ocorreu com a gestação. Referente ao índice de incapacidade de Oswestry, observou-se 58% das gestantes apresentaram incapacidade mínima. Com relação ao nível de intensidade de dor conforme a Escala de EVA, verificou-se que 56% apresentaram dor moderada. Observou-se que a correlação entre a dor lombar e o peso, no qual foi de $R = 2$, apresentando uma significância fraca ($P = 0,4$). Conforme os resultados, a lombalgia é frequente no período gestacional, independentemente da idade gestacional. Apesar de comum, não deve ser vista como um agravo normal da gravidez, pois ocasiona grande repercussão à saúde da mulher no período gravídico-puerperal.

Palavras-chave: Gestante; Prevalência; Dor lombar.

ABSTRACT

Pregnant women go through numerous changes including physical and psychological ones, which transform their social, family and professional life. During this period there are complaints that cause discomfort. This study aimed to evaluate the frequency of low back pain in pregnant women. It is a quantitative, descriptive, cross-sectional study. The study was carried out with 50 pregnant women from the Maria do Amparo Maternity Hospital, located in the city of São Luís – MA. For research, 3 questionnaires were Applied, namely: sociodemographic and clinical, the Visual Analog Scale (VAS) and the Oswestry questionnaire. The mean age was 27,2 years ($SD \pm 5,9$), with an average body weight of 63kg ($SD \pm 9,5$) before pregnancy, and an average weight after pregnancy of 68kg ($SD \pm 14$), mean height 1,6m ($SD \pm 0,1$). Regarding clinical characteristics, it was found that 42% were primigravids, 74% had already had an abortion, 54% were in the third trimester of pregnancy, 36% felt pain at the end of the pregnancy day, 30% reported feeling pain throughout the body and 66% reported that the onset of color occurred with pregnancy. Regarding the Oswestry disability index,

58% of pregnant women were found to have minimal disability. Regarding the level of pain intensity according to the VAS scale, it was found that 56% had moderate pain. It was observed that the correlation between low back pain and weight, in which it was $R=2$, presenting a weak significance ($p=0,4$). According to the results, low back pain is frequent during pregnancy, regardless of gestational age. Although common, it should not be seen as a normal pregnancy problem, as it causes great repercussions on women's health in the pregnancy puerperal period.

Keywords: Pregnant; Prevalence; Backache.

INTRODUÇÃO

A fase gestacional representa um período especial para muitas mães, porém esse momento de magia e felicidade depara-se com uma sequência de mudanças. A mulher por estar gestante passa por uma diversidade de modificações, dentre elas as físicas e psicológicas, as quais transformam sua vida social, familiar e profissional (BOMFIM; MELRO, 2015).

A gravidez é um estado fisiológico natural, que não deve ser comparado a uma situação patológica, pois o progressivo crescimento do futuro bebê no útero da mãe e os múltiplos efeitos hormonais da gravidez, sobre todo o organismo costumam originar uma série de problemas muito comuns neste período (BARROS, 2018).

A gestação é considerada, por muitas mulheres, um período inovador de plena realização, em que a mulher passa a carregar dentro do seu ventre um ser, que ao longo dos meses vai desenvolvendo-se e mudando as estruturas corporais da mãe onde o útero inicia um processo de expansão ocasionando um aumento das curvaturas ósseas (BATISTA; HENSCHK; OLIVEIRA, 2017).

Durante a gestação, a mulher pode vir a apresentar sensações variáveis, que vão desde momentos prazerosos, até momentos desconfortáveis e incômodos. É um período de grandes transformações tanto físicas, como emocionais (NASCIMENTO & COSTA, 2015). O corpo da mulher se transforma para que ela possa abrigar seu bebê, alimentá-lo e permitir seu desenvolvimento até a hora do seu nascimento. Porém todas essas transformações podem trazer consequências que podem resultar em dor e limitações em sua vida diária. São várias mudanças que ocorrem no corpo da mulher durante o período gestacional a fim de promover uma melhor acomodação, nutrição e desenvolvimento do feto (DE BRITO *et al.*, 2014).

Os hormônios também são responsáveis pelas principais modificações ocorridas no corpo da mulher principalmente o estrogênio, a progesterona e a relaxina. A progesterona é responsável pelo aumento do tamanho do seio e produção do leite, aumentando neste período a fadiga, as paredes do útero engrossam, a temperatura basal e o ritmo respiratório aumentam. A relaxina tem como objetivo inibir a atividade uterina, amolecendo o tecido conectivo do sistema esquelético (MANN *et al.*, 2017).

Uma das principais mudanças ocorre no útero por seu constante crescimento. Sua posição anteriorizada dentro da cavidade abdominal, além do aumento no peso e no tamanho das mamas, estes fatores contribuem para o deslocamento da gravidade da mulher para cima e para frente, podendo acentuar lordose lombar e também promover uma anterversão pélvica. Para compensar esta hiperlordose a gestante aumenta a flexão anterior da coluna cervical transferindo o peso para a região dos calcâneos (ZAVARIZE *et al.*, 2014).

Sendo assim, conforme Carvalho *et al.* (2017), à medida que o bebê se desenvolve, ele cresce e aumenta de peso, além disso, há uma alteração hormonal importante, que, em associação com as mamas, é capaz de causar uma série de modificações posturais dentre elas pode-se citar as: hiperextensão de joelhos, aumento das curvaturas da coluna lombar e cervical, acompanhada com uma projeção de ombros. Portanto todas estas alterações acontecem na tentativa de compensar o novo centro de gravidade assumido pelo corpo. A dor lombar é uma dor incômoda responsável por causar grande desconforto na gestante, e que se agrava durante o período gestacional e atinge de 50 a 80% destas, e é uma das principais queixas de mulheres grávidas.

Nesse contexto, este estudo objetivou avaliar o panorama epidemiológico da dor lombar em gestantes.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, analítico, do tipo transversal. A pesquisa foi realizada em um ambulatório de atendimento público, localizada na cidade de São Luís – MA, com uma amostra de conveniência, não probabilística constituída por 50 gestantes. A população do estudo foi as gestantes que se encontravam no primeiro ao terceiro trimestre gestacional no local da pesquisa, realizando o seu pré-natal. Como critérios de inclusão, participaram as gestantes com idade entre 18 a 40 anos e gestantes do primeiro ao terceiro trimestre gestacional. Foram excluídas as gestantes que apresentassem alterações ortopédicas, gestantes com dificuldade auditiva (decorrente a pesquisadora não saber libras), doenças neurológicas e incapazes de responder a pesquisa.

Como instrumento de coleta de dados foi aplicado três questionários, sendo que o primeiro se refere ao aspecto sociodemográfico e clínico, composto por perguntas simples e objetivas, como: nome, peso, idade, altura, questões relacionadas a gestação, a presença ou não de lombalgia. O segundo foi para verificar a intensidade da dor no qual foi utilizado o questionário Oswestry para avaliação funcional da coluna lombar, a versão brasileira foi desenvolvida e validada para avaliar problemas nas costas e pernas que afetam a capacidade de realizar as atividades de vida diária. O questionário consiste em 10 seções com seis alternativas, com valores que variam de 0 a 5, se a

primeira afirmação for marcada o ponto é 0, se for a última o ponto é 5, as afirmações intermediárias são pontuadas de acordo com este rank e somadas ao final gerando o escore. A primeira pergunta avalia a intensidade da dor e as outras nove, o efeito da dor sobre as atividades diárias como: se vestir, tomar banho, elevar pesos, caminhar, quando está sentado, em pé, dormindo, em sua vida sexual e na locomoção.

O número de questões respondidas é multiplicado por 5, e o escore final é dividido pelo número resultante da multiplicação e em seguida multiplicado por 100, onde os valores finais são apresentados em porcentagem. É classificado como incapacidade mínima (0 – 20%), incapacidade moderada (21 - 40%), incapacidade severa (41 – 60%), paciente inválido (61 – 80%), e indivíduo restrito ao leito (81 – 100%).

A intensidade da dor foi avaliada por meio da Escala Numérica de Dor, enumerada de 0 a 10 cujos números relacionam-se com os sintomas, onde 0 é sem dor, 1 a 3 dor leve, 4 a 6 dor moderada e 7 a 10 equivale a dor forte ou grave.

Foi realizada uma análise descritiva, logo após, os dados coletados foram tabulados em uma planilha do programa Microsoft Office Excel 2016 e transferido para análise com o programa estatístico Stata-14. As variáveis foram apresentadas por meio de frequências absolutas e percentuais (variáveis qualitativas), médias, e desvio padrão ou medianas (variações quantitativas). Na análise da correlação entre peso e intensidade da dor foi utilizado o teste de correlação de Pearson. O coeficiente de correlação de Pearson (r) pode ser positivo ou negativo, e classificado com base nos seguintes parâmetros: correlação muito fraca 0 a 0,19; correlação fraca 0,20 a 0,39; correlação moderada 0,40 a 0,69; correlação forte 0,70 a 0,89 e correlação muito forte 0,90 a 1,00. Portanto, em todas as análises foi considerado significativo $p < 0,05$.

Este estudo foi baseado na resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde que regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos, sendo aprovado com o parecer nº 2.469.204 pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade CEUMA – UNICEUMA.

Os sujeitos envolvidos foram devidamente informados quanto a importância e objetivo da pesquisa, após aceitar participar, assinaram o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) sendo garantidos a possibilidade de não participação ou desistência, privacidade, confiabilidade e o anonimato dos participantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do respectivo estudo onde foram avaliadas 50 mulheres gestantes do primeiro ao terceiro trimestre gestacional, foi observado que a idade média foi de 27,2 anos ($DP \pm 5,9$),

apresentando peso corpóreo antes da gestação de uma média de 63kg (DP±9,5), e peso médio depois da gestação de 68kg (DP±14), altura média 1,6m (DP ±0,1).

Com relação aos aspectos clínicos (Tabela 1), verificou-se 42% eram primigestas, 74% já tiveram aborto, 54% estavam no terceiro trimestre de gestação, 36% sentem dor no final do dia, 30% relatam sentir dor no corpo todo e 66% relataram que início da dor ocorreu com a gestação.

Tabela 1. Aspectos clínicos das gestantes atendidas na Unidade Básica de Saúde.

Variáveis	n	%
Número de gestação		
Primigesta	21	42
Secundigesta	12	24
Multigesta	17	34
Aborto		
Sim	37	74
Não	13	26
Idade Gestacional		
Primeiro trimestre	5	10
Segundo trimestre	18	36
Terceiro	27	54
Dor		
Sim	44	88
Não	6	12
Dor no MMII		
Não sente	11	22
Início do dia	5	10
Final do dia	18	36
Todo o dia	16	32
Região da Dor		
Região anterior	12	24
Região lateral	5	10
Região posterior	8	16
Em todo membro	15	30
Não sente	10	20
Início da dor		
Antes da gestação	12	24
Com a gestação	33	66
Não sente	5	10
TOTAL	50	100

Fonte: Dados do autor (2019).

De acordo com os dados do estudo, observou-se que a prevalência elevada de gestantes que relataram sentir dor lombar, logo um resultado alarmante, visto que se trata de gestantes atendidas em pré-natal de baixo risco, sem a presença de características que frequentemente pioram a dor, como idade avançada e a obesidade. Nesse sentido, os dados do estudo estão concomitantes com o estudo realizado em 05 centros de saúde de Malawi, no qual das 404 entrevistadas, 62% mulheres grávidas

relataram ter lombalgia durante a gravidez atual (MANYOZO *et al.*, 2019). Em outra pesquisa realizada em um Centro de Atenção à Mulher com 97 gestantes, observaram que 68% relataram dor lombar (CARVALHO *et al.*, 2017).

Além disso, verificou-se que a maioria ressaltou que o surgimento da dor álgica foi no decorrer da gravidez. Logo, esses dados são concomitantes com o estudo de Krindges *et al.* (2018) realizado com 105 mulheres grávidas, sendo que 78% relataram lombalgia e 50% ressaltaram que a dor começou no período gestacional. Dados também semelhante com a pesquisa de Chang *et al.* (2011) realizado com 187 gestantes, onde 74,9% relataram que a dor teve início com a gravidez, e também o estudo de Madeira *et al.* (2013) com uma amostra de 269 gestantes, no qual 73% referiram dor lombar e 67,6% (n = 71) experimentou a dor no período gestacional.

De acordo com a região da dor, os resultados demonstraram que a maioria relatou dor em todos os membros, não local específico. Na pesquisa de Carvalho *et al.* (2017) também observaram que 56% das participantes não relataram uma região do corpo específica, mas todo ele, dado concomitante com a pesquisa em questão. Os autores justificam esse fato, devido algumas grávidas não conseguiram relatar exatamente a região que ocorre a dor, dificuldade a identificação do local exato ou por uma combinação de pontos diferentes de dor.

Entretanto, esses resultados vão de contra ao estudo de Manyozo *et al.* (2019) no qual a maioria (58%) das gestantes relataram sentirem dor na região dos glúteos e das pernas. Gomes *et al.* (2013) também observaram que 66,65% relataram dor pélvica posterior combinada a dor lombar, indicando a possibilidade de compressão de nervo ciático. Já na pesquisa de Nunes *et al.* (2019) das 79 gestantes entrevistadas da cidade de Coari, Amazonas, observaram que 39,4% relataram a região prevalente da dor foi a sacroilíaca. Os mesmos autores ressaltam que a distribuição anatômica da dor é variável, entretanto, geralmente ocorre entre a região sacro ilíaca (pélvica posterior), região lombar e quadril.

Este fato pode ser explicado devido a maioria das gestantes estarem no terceiro trimestre gestacional. A literatura reforça essa afirmação, onde a dor se inicia neste período da gravidez, devido ao aumento do peso que requer uma reorganização na mecânica corporal da gestante e pelas alterações da flexibilidade da coluna (KRINDGES *et al.*, 2018). Entretanto, segundo Nakawatase, Alves e Filone (2015) não existe uma relação direta com o terceiro trimestre gestacional e a lombalgia, pois a incidência dos sintomas dolorosos na região lombar pode estar presente em qualquer período gestacional e, dependendo do grau de dor e peso, podendo perpetuar por anos após o parto.

Existem outros fatores que podem intervir na dor lombar no decorrer do período gestacional, como sobrepeso e obesidade, instabilidade da articulação sacro ilíaca, sedentarismo, posturas

incorretas, hábitos de vida, dor prévia. Santos *et al.* (2019) cita a idade como fator para a dor lombar, no qual quanto mais jovem, maior a chance de desenvolver lombalgia na gestação

Com relação à frequência, na maior parte das pesquisadas, a dor ocorria diariamente e principalmente ao final do dia. Dados semelhante com as pesquisas de Carvalho *et al.* (2017) e Madeira *et al.* (2013), que a frequência da dor era diariamente, respectivamente 59% e 53,5%. De acordo com a literatura, a com frequência diária de dor lombar afeta negativamente a capacidade da gestante de realizar as atividades da vida diária, como autocuidado, andar, sentar e engajar-se em atividades sexuais. Essas limitações funcionais também estão associadas à redução da qualidade de vida e redução da produtividade entre mulheres grávidas (MANYOZO *et al.*, 2019).

Na tabela 2, referente ao índice de incapacidade de Oswestry, observou-se 58% das gestantes apresentaram incapacidade mínima.

Tabela 2. Classificação segundo o índice de incapacidade de Oswestry.

Variáveis	n	%
Classificação		
Incapacidade mínima	29	58
Incapacidade moderada	20	40
Incapacidade intensa	1	2
TOTAL	50	100

Fonte: Dados do autor (2019).

Com base na análise da incapacidade pelo QIO, houve predomínio da incapacidade mínima, apesar das maiorias das gestantes apresentarem dor lombar moderada. Dados concomitantes de Santos *et al.* (2019) realizada com 39 gestantes do Projeto de Extensão “Gestação, Vida e Saúde” da Paróquia Santa Rita, Bauru/SP, de acordo com os escores apontados pelo Questionário de incapacidade funcional “Oswestry” demonstrou que 56,4% apresentaram incapacidade mínima, apesar que 89,7% relatou dor lombar moderada. Contudo, na pesquisa de Landgraf (2017) observaram que 80,4% relataram a lombalgia, porém não a consideraram incapacitante, de acordo com o Questionário de incapacidade funcional “Oswestry”.

Na tabela 3, com relação ao nível de intensidade de dor conforme a Escala de EVA, verificou-se que 56% apresentaram dor moderada.

Tabela 3. Apresentação do nível de atividade da dor em gestantes conforme a Escala de EVA.

Variáveis	N	%
Intensidade da dor		
Não sente	5	10
Leve	2	4
Moderada	28	56

Intensa	15	30
TOTAL	50	100

Fonte: Dados do autor (2019).

Com relação a escala de EVA, verificou-se que a maioria apresentou dor moderada, resultado semelhante com as pesquisas de Araújo *et al.* (2018) com 07 grávidas e de Rodrigues *et al.* (2012) com 645 gestantes norte-americanas, teve predominância de intensidade moderada, ambos estudos utilizaram a escala EVA. Já na pesquisa de Krindges *et al.* (2018) com relação à intensidade verificada pela EVA foi mais prevalente a categoria leve. Os autores justificam essa variação de intensidade de dor, devido que a dor pode ser não somente física, mas também associado a fatores emocionais, afetivos, cognitivos e comportamentais das gestantes.

Quanto a correlação entre os escores do peso corporal e os escores da EVA pelo coeficiente de correlação de Pearson, observou-se que existe uma correlação fraca $R = 0,20$ entre o peso e a dor lombar, porém os resultados foram considerados significativos $p = 0,4$.

Portanto, os resultados demonstram que o fisioterapeuta e toda a equipe de saúde devem estar atentos a dor lombar durante a gravidez, visto que esses sintomas algícos no período gestacional têm como consequência a diminuição na qualidade de vida, além de afetar o aspecto emocional da gestante. Portanto, é importante que o fisioterapeuta desenvolva atividades com enfoque individual e coletivo em grupos de gestantes, além de trabalhar juntamente com a equipe multiprofissional no período do pré-natal, visando possibilitar a gestante a aquisição de novos comportamentos e mudança de estilo de vida. Assim, o trabalho desse profissional nos centros de saúde vai além da assistência à reabilitação, mas na elaboração de ações de prevenção de patologias, promoção e recuperação da saúde, considerando os fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais que podem intervir no processo saúde-doença (SANTOS *et al.*, 2019; MANYOZO *et al.*, 2019; KRINDGES *et al.*, 2018).

Vale salientar, que o presente estudo teve algumas limitações, dentre elas a indisposição das gestantes para participar da pesquisa, devido à realização de pré-natal tardio algumas gestantes apresentaram dificuldades para informar peso, altura, idade gestacional, a pressa para ir embora da maternidade corroboraram para que dificultasse a coleta de dados.

CONCLUSÃO

Encontrou-se no presente estudo uma prevalência elevada de grávidas com lombalgia, independentemente da idade gestacional, sendo que a frequência da dor é diária entre as participantes. Observou-se também que a intensidade da dor, conforme a Escala de EVA, foi moderada, contudo, quando verificado a análise da incapacidade pelo QIO, observou-se que a maioria apresentou

incapacidade mínima. Ressalta-se que houve correlação significativa entre o peso e a dor lombar. Conforme os resultados, a lombalgia é frequente no período gestacional, independentemente da idade gestacional. Apesar de comum, não deve ser vista como um agravo normal da gravidez, pois ocasiona grande repercussão à saúde da mulher no período gravídico-puerperal. Logo, deve-se incentivar a promoção de saúde da mulher gestante, principalmente visando melhorar a qualidade de vida num período delicado e especial para a mulher, visto que a lombalgia interfere intensamente na vida das gestantes.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, I. D. D. *et al.* Efeito do método pilates em mulheres com lombalgia: estudo de casos. **Revista Intercâmbio**, v. 11, p. 86-96, 2018.
- BATISTA, A. A. S.; HENSCHKE, N.; OLIVEIRA, V. C. Prevalence of low back pain in different educational levels: a systematic review. **Fisioterapia em Movimento**, v. 30, n. 1, p.351-361, 2017.
- BOMFIM, I. Q. M.; MELRO, B. C. F. Estudo comparativo da função sexual em mulheres durante o período gestacional. **Científica Ciências Biológicas e da Saúde**, v. 16, n. 4, p.277-288, 2015.
- CBARROS, F. L.; SOUZA, F. R.; COUTO, M. D. *et al.* Efeito do tratamento hidroterápico na dor lombar e qualidade de vida de gestante: estudo de caso. **Colloquium Vitae**, v.10, n., 1, p. 74-79, 2018.
- CHANG, H-Y *et al.* The experience of and coping with lumbopelvic pain among pregnant women in Taiwan. **Pain Medicine**, v. 12, n. 6, p. 846-853, 2011.
- CARVALHO, M. E. C. C. *et al.* Lombalgia na gestação. **Brazilian Journal of Anesthesiology**, v. 67, n. 3, p. 266-270, 2017.
- DE BRITO, J. V. S. *et al.* Lombalgia: prevalência e repercussões na qualidade de vida de gestantes. **Revista de Enfermagem UFSM**, v.4, n. 2, p. 254-264, 2014.
- GOMES, M. R. DE A. *et al.* Lombalgia gestacional: prevalência e características clínicas em um grupo de gestantes. **Revista Dor**, v. 14, n. 2, p. 114-117, 2013.
- KRINDGES, K. *et al.* Lombalgia gestacional: prevalência e incapacidade em gestantes atendidas na rede pública de saúde no município de Juína/MT. **Fisioterapia Brasil**, v. 19, n. 6, 2018.
- LANDGRAF, Fernanda Massari. **Diástase abdominal, capacidade funcional, estabilidade pélvica e dor lombar em gestantes**. Dissertação (Mestrado) – Universidade do Sagrado Coração, Bauru, São Paulo. 2017.
- MADEIRA, H. G. R. *et al.* Incapacidade e fatores associados à lombalgia durante a gravidez. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 35, n. 12, p. 541-548, 2013.
- MANN, L. *et al.* Influência dos sistemas sensoriais na manutenção do equilíbrio em gestantes. **Fisioterapia em Movimento**, v. 24, n. 2, P. 315-325,2017.
- MANYOZO, Steven. Low back pain during pregnancy: Prevalence, risk factors and association with daily activities among pregnant women in urban Blantyre, Malawi. **Malawi Medical Journal**, v. 31, n. 1, p. 71-76, 2019.
- NASCIMENTO, P. R. C.; COSTA, L. O.P. Prevalência da dor lombar no Brasil: uma revisão sistemática. **Caderno de Saúde Pública**, v. 31, n. 6, p.1141-1156, jun. 2015.

NAKAWATASE, D.; ALVES, V. L. DOS S.; FILONI, E. Prevalência de dor lombar e qualidade de vida no terceiro trimestre de gestação, **Revista Brasileira de Qualidade de Vida**, v. 6, n. 2, p. 89-102, 2015.

NUNES, C. M. *et al.* Caracterização da dor lombar em mulheres grávidas na cidade de Coari-Amazonas. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 11, n. 9, e318, 2019.

RODRIGUES, W. *et al.* Lombalgia na gravidez: impacto nas atividades de vida diárias. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, v. 4, n. 2, 2012.

SANTOS, T. B. *et al.* Existe relação entre dor lombar, diástase abdominal e capacidade funcional em gestantes? **Brazilian Journal of Health Review**, v. 2, n. 3, p. 1980-1999, 2019.

SANTOS, M. M.; GALLO, A. P. Lombalgia gestacional: prevalência e características de um programa pré-natal. **Arquivo Brasileiro de Ciências da Saúde**, v. 35, n. 3, p. 174-179, 2015.

ZAVARIZE, S. F. *et al.* Dor lombar crônica: implicações do perfil criativo como estratégia de enfrentamento. **Journal of Management and Primary Health Care**, v. 5, n. 2, p. 188-194, 2014.

CAPÍTULO 8

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO EM IDOSOS

Capítulo 8

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO EM IDOSOS EVALUATION OF QUALITY OF THE SLEEP IN SENIORS

Ivana Regina Ribeiro Machado

Discente do curso de Fisioterapia, Faculdade Santa Terezinha - CEST, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7892-8544>

E-mail: ribivana@hotmail.com

Poliana da Silva Rêgo Furtado

Discente do curso de Medicina, Discente do Mestrado de Saúde e Meio-Ambiente, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4140-627X>

E-mail: polianarego@hotmail.com

Thayla Thais Jatahy Pereira

Docente do curso de Fisioterapia, Faculdade Santa Terezinha - CEST, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1518-4661>

E-mail: taylajatahy@gmail.com

Janaina Maiana Abreu Barbosa

Docente do curso de Nutrição, Universidade Ceuma e Faculdade Santa Terezinha - CEST, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5263-6586>

E-mail: jana_mayana@hotmail.com

José newton Lacet vieira

Docente do curso de Fisioterapia, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <http://orcid.org/0000-0003-2095-068X>

E-mail: newtonlacet@hotmail.com

Maria de Nazareth Mendes

Docente do curso de Fisioterapia, Faculdade Santa Terezinha - CEST, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1485-3106>

E-mail: nazarethmendes@hotmail.com

Maria José Silva Andrade

Docente do curso de Fisioterapia, Faculdade Santa Terezinha - CEST, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9712-3298>

E-mail: maria.jose@cest.edu.br

Tatiana Cristina Fonseca Soares de Santana

Docente do curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3469-3410>

E-mail: tatiana_iann@hotmail.com

Mylena Andréa Oliveira Torres

Docente do curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5021-3130>

E-mail: mylena004822@ceuma.com.br

Adriana Sousa Rego

Docente do curso de Fisioterapia, Faculdade Santa Terezinha - CEST, São Luís, MA

RESUMO

O envelhecimento tornou-se um fator importante nas principais sociedades desenvolvidas e em desenvolvimento, com isso, esse processo de envelhecimento traz inúmeras complicações nas funções gerais do organismo, tais alterações são perceptíveis na qualidade do sono, no controle postural e na redução da prática de atividades físicas. Diante desse contexto, o objetivou-se avaliar o perfil sociodemográfico e clínico dos idosos participantes de uma associação na comunidade em São Luís - MA. A pesquisa trata-se de um estudo transversal e quantitativo, composta por 67 idosos de ambos os sexos, realizada no período de janeiro a fevereiro de 2020, cuja coleta de dados foi realizada através de um questionário semiestruturado, seguido pelo Índice de Qualidade do Sono *Pittsburgh* (PSQI) e Questionário *Baecke* Modificado para Idoso (QBMI), analisada pelo programa Stata 14. Os resultados evidenciaram que 68,18% da amostra estudada apresentou uma qualidade de sono ruim nos últimos 30 dias, sendo que, quando questionados sobre a qualidade subjetiva do sono, 64,18% da amostra avaliou seu sono como boa qualidade, visto que 86,57% apresentaram os distúrbios do sono entre 1, 2 e 3 vezes na semana, assim 78,79% foram classificados como idosos fisicamente inativos. Mediante a pesquisa, foi possível perceber a necessidade de uma atuação da equipe multiprofissional na investigação dos distúrbios do sono e da inatividade física desses participantes, visando a promoção da saúde e melhor qualidade de vida.

Palavras-chave: Envelhecimento; Qualidade do sono; Atividade física; Pastoral da Pessoa Idosa.

ABSTRACT

Aging has become an important factor in major developed and developing societies, that this aging process brings numerous complications in the general functions of the body. Such changes are noticeable in sleep quality, postural control and reduced physical activity. In this context, the objective was to evaluate the sociodemographic and clinical profile of the elderly participating in an association in the Community in São Luís – Ma. The research is a cross-sectional and quantitative study, consisting of 67 elderly of both sexes, carried out from January to February 2020, the collection data was carried out through a semi-structured questionnaire, followed by the Sleep Quality Index *Pittsburgh* (PSQI) and Quis *Baecke* Modified to Elderly (QBMI), analyzed by the program Stata 14. The results showed that 68.18% of the studied sample had poor sleep quality in the last 30 days, and When asked about the subjective quality of sleep, 64.18% of the sample rated their sleep as good quality, since 86.57% had sleep disorders between 1, 2 and 3 times a week, thus 78.79% were classified as physically inactive elderly. Through the research, it was possible to perceive the need for a multidisciplinary team to work in the investigation of sleep disorders and physical inactivity of these participants, aiming at promoting health and better quality of life.

Keywords: Aging; Quality of the sleep; Physical activity; Seniors Pastors

INTRODUÇÃO

Atualmente, o envelhecimento tornou-se um fator importante nas principais sociedades desenvolvidas e em desenvolvimento, sendo um dos grandes desafios, visto que a esperança média de vida supere os 80 anos. No entanto, esse processo de envelhecimento traz inúmeras complicações nas funções gerais do organismo, dificultando no cumprimento das atividades de vida diária (AVD's),

prejudicando na qualidade de vida e saúde mental desses indivíduos (SILVA *et al.*, 2012; FERREIRA *et al.*, 2019).

A população brasileira envelhece de maneira rápida e intensa. De acordo com os dados do IBGE, essa população idosa é constituída por 29.374 milhões de pessoas, com um total de 14,3% da população total brasileira. Por outro lado, esse crescimento retrata uma conquista social fruto de melhores condições de vida, novas tecnologias médicas proporcionando uma expansão do acesso a serviços preventivos e curativos, dentre outros determinantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).

No entanto, é perceptível no envelhecimento humano alterações na qualidade do sono, sendo umas das reclamações mais frequentes e que influenciam nas mudanças psicológicas, sociais e físicas entre esses indivíduos (OLIVEIRA *et al.*, 2010), a diminuição da agilidade para o controle da postura e, conseqüentemente, da marcha (CARVALHO *et al.*, 2011), como também uma redução de atividades físicas e do comportamento cognitivo dos mesmos (PRINCE *et al.*, 2013).

O tema deste estudo tem importância por apresentar, atualmente, um aumento do número de pessoas da terceira idade no mundo, principalmente, no Brasil, onde a taxa de mortalidade e natalidade diminuíram. Assim, cada vez mais idosos estão a procura por melhores condições de vida, incluindo a manutenção de suas necessidades básicas, como também a sua inserção e convívio com o meio familiar e social, buscando proporcionar uma melhor qualidade de vida (SOUSA *et al.*, 2018).

Diante disso, ressalta a suma importância em pesquisar sobre o assunto, por se tratar de uma questão de saúde pública, em que os determinantes no processo de envelhecimento mostram-se um fator na qualidade de vida desses indivíduos. Portanto, é necessário que essa população venha a ter uma melhor assistência à saúde, visando intervenções de prevenção de agravos e promoção da saúde, com a finalidade de proporcionar a manutenção da funcionalidade para uma independência e autonomia, gerando um envelhecimento saudável e ativo.

Portanto, objetivou-se com essa pesquisa avaliar o perfil sociodemográfico e clínico dos idosos participantes de uma comunidade localizada em São Luís - MA.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa transversal e quantitativa. A amostra foi composta por integrantes do grupo de uma associação de um bairro de São Luís. Portanto, a população de idosos cadastrados foi de 70 idosos.

Para realização desta pesquisa, foram utilizados os seguintes materiais: um questionário das características sociodemográficas e clínicas em idosos, trena, balança da marca Personal Scale®, índice de Qualidade do Sono Pittsburgh – PSQI e um questionário Baecke Modificado para Idoso –

QBMI. A realização da coleta dos dados ocorreu durante um encontro com os idosos, coordenadores e os líderes comunitários, onde foi realizado uma palestra explicando sobre os objetivos da pesquisa, como também, falando sobre assuntos do envelhecimento, sono e atividade física. Posteriormente, explicou sobre o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e nessa mesma oportunidade, diante da aceitação em participar da pesquisa por meio do TCLE foi aplicado os questionários em forma de entrevista.

O Índice de Qualidade do Sono Pittsburgh (PSQI) é uma ferramenta autoaplicável usada para avaliação da qualidade do sono e de prováveis distúrbios no último mês. Foi desenvolvido por Buysse e colaboradores em 1989 e validado no Brasil, em população adulta, por Bertolazi *et al.* (2011) (PASSOS *et al.*, 2017). Os escores dos sete componentes são somados e o total oscila entre 0 a 21 pontos. Pontuações de 0 a 4 indicam sono de qualidade boa, pontuações de 5 a 10 indicam qualidade de sono ruim, pontuações acima de 10 indicam presença de distúrbios do sono (BORNHAUSEN; KESSLER; GASPERIN, 2018).

O Questionário Baecke Modificado para Idoso (QBMI) avalia os níveis de Atividade Física dos Idosos, foi utilizada a versão sugerida por Mazo *et al.* (2001) que inclui 12 questões relacionadas a três domínios.

Após a coleta dos dados, os mesmos foram tabulados no Microsoft Excel 2016, e em seguida analisados e interpretados, através do programa Stata 14, e apresentados através de tabelas em estatística descritiva. Para verificar possíveis correlações entre as características socioeconômicas e demográficas, número de comorbidades com atividade física e o escore do sono utilizou-se o teste de Correlação de Pearson nas análises entre variáveis quantitativas (bivariadas) e Correlação de Spearman nas correlações em que uma das variáveis era ordinal. As correlações foram estabelecidas segundo a convenção de interpretação dos valores do coeficiente adotada de que valores $0 \leq |r| < 0,3$ apontam correlação fraca, valores $0,3 \leq |r| < 0,5$ referem correlação moderada e valores $0,5 \leq |r| \leq 1,0$ indicam correlação forte entre as variáveis (COHEN, 1988). O nível de significância para os testes foi de 0,05% ($p < 0,05$).

A pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética e Pesquisa sob parecer nº 1.516.257 e foi realizada de acordo com a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), sobre aspectos éticos e legais que aprovam diretrizes e normas para desenvolvimento de pesquisa com seres humanos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra estudada foi composta por 67 idosos participantes da Pastoral da Pessoa Idosa, ambos os sexos e residentes da sede no município de São Luís, Maranhão. Em relação aos aspectos

sociodemográficos e clínico, é possível observar na tabela 1 a caracterização quanto ao sexo, idade, estado civil, números de residentes por domicílio, raça e doenças de base, em que percebe-se que 62,69% (n=42) dos indivíduos são do sexo feminino, 38,33% (n=46) estão na faixa etária de 70 a 79 anos com média de 72 anos e 3 meses, 46,27% (n=31) são casados, 83,58% (n=56) não moram só e 37,31% (n=25) indivíduos moram com 2 a 3 residentes, como também 37,31% (n=25) com 4 a 5 residentes por domicílio, 44,78% (n=30) são pardos, 62,69% (n=42) são hipertensos e 68,66% (n=54) classificaram como ter outros tipos de doenças de base.

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica e clínica dos idosos (n=67).

Variáveis	N	%
Sexo		
Feminino	42	62,69
Masculino	25	37,31
Idade		
60 + 69	29	24,17
70 + 79	46	38,33
80 +	45	37,50
Estado Civil		
Solteiro(a)	15	22,39
Casado(a)	31	46,27
Divorciado(a)	4	5,97
Viúvo(a)	17	25,37
Mora só		
Sim	11	16,42
Não	56	83,58
Quantidade de residentes		
2 – 3	25	37,31
4 – 5	25	37,31
6 – 7	4	5,97
8 +	2	2,99
Raça		
Branca	16	23,88
Negra	21	31,34
Parda	30	44,78
Doença de Base		
Hipertensão	42	62,69
Diabetes	17	25,37
Artrite	16	23,88
Obesidade	2	2,99
(Artrose, Osteoporose, Câncer)	54	68,66
TOTAL	67	100

Melo *et al.* (2019) na sua população investigada, dos quais quase 70% dos entrevistados tinham entre 60 e 69 anos de idade, o que difere um pouco dos resultados deste estudo, verificou uma

predominância do sexo feminino com 72%, identificou-se que 53,6% eram casados, em torno de 60% desses idosos viviam com o cônjuge, filho ou neto, caracterizando uma população que não mora só.

Ressalta-se que pessoas idosas do sexo feminino ocupam uma presença maioritária nos grupos de convivência correlaciona-se a sua participação em atividades como um estímulo ao bem-estar e ao aumento da longevidade, em contrapartida, a população masculina pouco se interessa em cuidar da sua saúde (PEREIRA *et al.*, 2016).

Benevides *et al.* (2019), pontuou no seu estudo com uma amostra de 59 idosos de uma instituição de longa permanência que a maioria dos idosos (61%) possui hipertensão arterial sistêmica e 23,7% possuem Diabetes Mellitus. Após levantamento, verificou-se que a incidência de Diabetes Mellitus e a prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica aumenta de acordo com a idade da população.

A Tabela 2 apresenta os aspectos socioeconômicos cuja as informações são sobre escolaridade, profissão anterior e atual, renda familiar e se divide renda, e a quantidade de membros os quais dividem, logo, 52,24% (n=35) da amostra apresentam grau de escolaridade do ensino fundamental incompleto, visto que muitos tiveram que abandonar a escola para trabalhar na atividade rural, 65,67% (n=44) eram lavradores e 73,13% (n=49) são aposentados, 73,13% (n=49) tem renda de até 1 salário mínimo, 67,16% (n=45) divide a renda e 35,82% (n=24) com uma quantidade de 1 a 2 membros.

Tabela 2. Distribuição das características socioeconômicas dos idosos (n=67).

Variáveis	N	%
Escolaridade		
Analfabeto	14	20,90
Ens. Fundamental Incompleto	35	52,24
Ens. Fundamental Completo	10	14,93
Ens. Médio Incompleto	2	2,99
Ens. Médio Completo	3	4,48
Outros	3	4,48
Profissão anterior		
Lavrador	44	65,67
Doméstica	3	4,48
Pescador	8	11,94
Téc. Enfermagem	1	1,49
Funcionário Público	3	4,48
Professor	2	2,99
Marisqueiro	2	2,99
Coletor/Gari	1	1,49

Profissão atual		
Aposentado	49	73,13
Aposentado/pensionista	14	20,90
Não-aposentado	4	5,97
Renda		
Até 1 salário mínimo	49	73,13
De 1 a 2 salários mínimo	17	25,37
3 salários mínimos ou mais	1	1,49
Divide Renda		
Sim	45	67,16
Não	22	32,84
Quantidade de pessoas com que divide a renda		
1 – 2	24	35,82
3 – 4	17	25,37
5 – 6	2	2,99
7 – 8	2	2,99
TOTAL	67	100

Ressalta-se no estudo de Vieira *et al.* (2017), o baixo nível de escolaridade cujo a maioria dos idosos (66,27%) tinha o ensino fundamental incompleto, visto que a não continuidade dos estudos tinha como motivo a dificuldade do restrito acesso às escolas e a precisão de trabalhar para ajudar no sustento da família, o que é notado também nesta pesquisa.

Analisa-se nesta pesquisa o baixo nível socioeconômico que é determinada pela baixa renda familiar que contribui para a sobrevivência dessa população. Do mesmo modo, a pesquisa de Silva *et al.* (2019) mostra-se semelhante aos achados desta pesquisa, pois apresentou uma predominância de 45,1% de idosos com renda de um salário mínimo.

Na pesquisa de Pinto *et al.* (2016), 91,8% idosos pesquisados eram aposentados, entretanto, 35% da amostra alegaram permanecer exercendo alguma atividade laboral. O que justifica a amostra estudada cujos idosos eram a maioria aposentados, mas ainda continuavam com as suas atividades laborais, uma vez que a população da cidade vive da pesca e agricultura para a manter o sustento da família. Sendo que é uma situação comum no cenário rural brasileiro.

Observa-se na Tabela 3 a caracterização dos hábitos de vida que investiga a prática de atividade física, tabagismo e consumo de bebidas alcóolicas, em que 77,61% (n=52) não praticam atividade física, 98,51% (n=66) não fazem uso de tabagismo, 89,55% (n=60) não fazem uso de bebidas alcóolicas.

Pletsch da Luz *et al.* (2014), verificou em sua pesquisa em relação aos hábitos de vida dos idosos, em que constatou que 85,6% não consumia bebidas alcoólicas. Além disso, 85,6% não tinham o hábito de fumar. E quando questionados sobre a atividade física, 48,3% dos idosos não tinham uma prática regular. Comumente, coincidem com os resultados desta pesquisa.

Tabela 3. Variáveis dos hábitos de vida dos idosos participantes da Pastoral da Pessoa Idosa da sede do município de São Luís – MA, 2020 (n=67).

Variáveis	N	%
Atividade Física		
Sim	14	20,90
Não	52	77,61
Nega	1	1,49
Tabagismo		
Sim	1	1,49
Não	66	98,51
Bebidas Alcoólicas		
Sim	7	10,45
Não	60	89,55
TOTAL	67	100

O resultado desta pesquisa tornar-se um fator positivo, pois o alcoolismo caracteriza um determinante problema de saúde pública, já que os idosos são mais propícios a tornarem-se mais vulneráveis ao consumo de álcool e tabaco. Ressalta-se que os idosos apresentam muitos problemas de saúde, e o consumo de vários medicamentos que, por vezes, são combinados com as substâncias nocivas contidas no fumo e álcool, o que os tornam mais susceptíveis a interações medicamentosas quanto alimentares, ocasiona uma grande dificuldade de recuperação e interação social (SENGER *et al.*, 2011).

A Tabela 4 mostra as variáveis antropométricas da amostra estudada, onde observa-se que o valor mínimo para o peso é de 40,5kg e o máximo de 88,7kg, tendo como média 60.1kg, para a altura observa-se mínimo de 140cm e máximo de 176cm, tendo como média 1.5cm, o que configura uma amostra com sobrepeso (IMC = 28.9kg/m²).

Tabela 4. Variáveis antropométricas dos idosos participantes da Pastoral da Pessoa Idosa da sede do município de São Luís – MA, 2020 (n=67).

Variáveis	V. Min	Ma	V. Max	DP
Idade (anos)	60	72,3	86	7,5
Peso (kg)	40.5	60.1	88.7	11.5
Altura (cm)	1.4	1.5	1.76	0.08
IMC (kg/m ²)	17.05	28.9	298.9	33.7

A Tabela 5 apresenta o resultado total referentes ao escore global do PSQI e do Baecke. Observa-se que a qualidade do sono dos idosos participantes mostrou-se que 68,18% (n=45) apresentam uma qualidade do sono ruim com pontuações maiores que 5. Em relação aos níveis de atividade física, nota-se que 78,79% (n=52) da amostra é composta por idosos fisicamente inativos.

Tabela 5. Resultado total do Índice de Qualidade do Sono de *Pittsburgh* (PSQI) e Questionário *Baecke* Modificado para Idoso (QBMI).

Variáveis	N	%
PSQI		
Qualidade do sono boa	10	15,15
Qualidade do sono ruim	45	68,18
Presença de distúrbios do sono	11	16,67
QBMI		
Fisicamente Ativas	14	21,21
Fisicamente Inativas	52	78,79
TOTAL	67	100

Contudo, aos achados neste estudo obtidos do escore global do PSQI dos idosos participantes, cujo os resultados são analisados pela soma de todos os componentes do PSQI. Corroborando com estes resultados está o estudo de Magalhães *et al.* (2017), que buscou avaliar a sonolência diurna e a qualidade do sono em idosos e sua influência na qualidade de vida em participantes da Universidade Aberta da Terceira Idade (UniATI) em uma amostra de 128 idosos, em que 69,6% dos idosos apresentaram uma pontuação superior a 5, indicando um sono ruim ou de má qualidade. Similarmente, Monteiro e Ceolim (2014) em sua pesquisa realizada em enfermarias clínicas e cirúrgicas de um hospital universitário do interior do Estado de São Paulo, observou a qualidade do sono em 160 idosos, do qual 69,4% foram qualificados com sono de má qualidade apresentando escore total maior do que cinco pontos e 30,6% com sono de boa qualidade de acordo com o PSQI.

Segundo Araújo e Ceolim (2010), os idosos não entendiam como prejudiciais era os distúrbios ditos como normais no envelhecimento à sua qualidade do sono, por exemplo, as interrupções do sono, despertares precoces e o sentir dores. No entanto, esses episódios são abordados como distúrbios conforme o padrão de sono do adulto jovem e bem aceitos enquanto se envelhece. Ao mesmo tempo, questiona-se que há uma diferença na percepção da qualidade do sono entre o idoso e a visão do profissional, não sendo sugerida pela literatura. Mugeiro (2011), comenta que a avaliação do sono é indispensável para o programa de ações de saúde, ponderando seu efeito na qualidade de vida do idoso e no seu bem-estar.

Em relação aos níveis de atividade física, observa-se na Tabela 5 o resultado total do somatório do escores do Questionário Baecke Modificado para Idoso, cujo a amostra foi classificada em dois grupos em que 78,79% (n=52) dos participantes apresentaram como fisicamente inativos. No entanto, os resultados da pesquisa de De Souza *et al.* (2018), que analisou os fatores associados aos níveis de atividade física em mulheres idosas que frequentam grupos sociais para idosos, avaliou os níveis de atividade física que revelou 69,9% mulheres idosas eram fisicamente inativas e 30,1% eram

ativas. O que podemos comparar com os resultados desta pesquisa, pois a prevalência eram de idosas as quais eram mais participativas do grupo da Pastoral da Pessoa Idosa e as que mais relataram realizar atividade física.

Silva *et al.* (2012) menciona que a elevada prevalência de inatividade física nessa população é devida, em partes, pelo crescimento da automação, uso de transporte motorizado e o acesso à tecnologia de mídia como televisão, internet. E, outra, possivelmente os idosos tenham uma percepção subjetiva do seu estado de saúde para uma importância maior na inatividade física do que a própria presença da doença em si (SOUZA; FILLENBAUM; BLAY, 2015).

Entretanto, praticar atividade física regularmente possibilita a redução de efeitos negativos ocasionados pelo processo de envelhecimento, e isso, retarda algumas restrições advindas das atividades de vida diária (CAVALLI *et al.*, 2014). A atividade física além de contribuir fisiologicamente e funcionalmente, ao mesmo tempo, influencia na autoestima dos idosos, sendo assim, uma motivação para mantê-los ativamente na sociedade em que vivem (VICENTE; SANTOS, 2013).

A Tabela 6 apresenta os resultados dos 7 componentes do PSQI dos 67 idosos participantes desta pesquisa. Quando perguntados sobre a qualidade subjetiva do sono, 64,18% (n=43) da amostra avaliou a qualidade geral do seu sono como boa, 35,82% (n=24) demoravam menos que 15 minutos para adormecer a noite ou latência do sono. Em relação a quantidade de horas dormidas 34,33% (n=23) dormiam mais de 7h por noite, 91,04% (n=61) tiveram uma eficiência habitual do sono maior que 85%, 86,57% (n=58) apresentaram ter distúrbio do sono 1, 2 e 3 vezes na semana, 13,43% (n=9) relataram fazer uso de medicação para dormir três vezes na semana e 43,28% (n=29) referiram nenhuma disfunção durante o dia.

Tabela 6. Componentes do índice da qualidade do sono de Pittsburgh dos idosos (n=67).

Variáveis	N	%
Qualidade Subjetiva do sono		
Muito boa	9	13,43
Boa	43	64,18
Ruim	14	20,90
Muito Ruim	1	1,49
Latência do Sono (minutos)		
≤ 15	24	35,82
16 a 30	20	29,85
31 a 60	21	31,34
≥ 60	2	2,99
Duração do Sono (horas)		
> 7	23	34,33
6 a 7	22	32,84
5 a 6	11	16,42

< 5	11	16,42
Eficiência Habitual do Sono (%)		
> 85%	61	91,04
75 a 84%	6	8,96
65 a 74%	0	0
< 65%	0	0
Distúrbio do Sono		
Nenhuma vez	0	0
Menos de 1 vez/sem	9	13,43
1 a 2 vezes/sem	52	77,61
3 vezes/sem	6	8,96
Uso de Medicação para dormir		
Nenhuma vez	52	77,61
Menos de 1 vez/sem	1	1,49
1 a 2 vezes/sem	5	7,46
3 vezes/sem	9	13,43
Disfunção durante o dia		
Nenhuma	29	43,28
Pequena	28	41,79
Moderada	9	13,43
Muita	1	1,49
TOTAL	67	100

Bornhausen; Kessler e Gasperin (2018), na sua pesquisa com 43 voluntários com diagnóstico clínico de doença arterial coronariana (DAC) encontraram resultados semelhantes aos resultados obtidos nesta pesquisa em relação a qualidade subjetiva do sono, identificando que 76,74% da amostra relata como sono bom. Silva *et al.* (2012), quando avaliou a qualidade do sono de 65 indivíduos, analisou que 84,6% dos idosos estudados qualificaram como muito boa ou boa o seu sono.

A duração do sono foi avaliada em relação a quantidade de horas dormidas por noite. Corroborando com esta pesquisa, Bornhausen; Kessler e Gasperin (2018) avaliou que 65,12% atingiram escore muito bom, ou seja, dormiam mais de 7 horas por noite. Segundo Santos *et al.* (2013), a duração do sono necessária para um adulto é em torno de sete horas de sono e tende a diminuir com o avanço da idade. Já para Drager *et al.* (2018), comenta que a predominância dos estudos pondera uma média normal de horas de sono por noite entre 7 e 8 horas. Ressalta-se que o número de horas dormidas pode variar de um indivíduo para outro, sendo que algumas pessoas se apresentam descansadas depois de terem um número menor de horas de sono. Porém, quando não se dormem bem, podem apresentar alterações de humor e irritabilidade, sonolência diurna, déficit de desempenho cognitivo e motor, resultando em danos nas funções diárias (TASKAR; HIRSHKOWITZ, 2003; SANTOS *et al.*, 2013; DRAGER *et al.*, 2018)

Analisando os distúrbios do sono, ou seja, menciona-se ao acordar no meio da noite. Os resultados deste estudo mostraram que 86,57% (n=58) apresentaram os distúrbios do sono entre 1, 2

e 3 vezes na semana, dentre os distúrbios, destacam-se o levantar à noite para ir ao banheiro (97,02%), despertar no meio da noite ou de madrugada (95,52%), sentia muito calor (85,08%), sentia muito frio (59,7%), tossia ou roncava alto (47,77%), tinha dor (56,72). Corroborando com estes resultados, Bornhausen; Kessler e Gasperin (2018) evidenciou que 88,30% da amostra atingiu o escore referindo que tiveram distúrbios de sono entre 1, 2 ou 3 vezes na semana durante o mês. O mesmo autor comenta que a qualidade do sono ruim se concerne as escassas horas de sono dormidas, problemas de iniciar o sono e manter e intercorrência de micro despertares, e, portanto, não alcançar o sono REM.

Avaliou sobre a disfunção durante o dia, cujos participantes apresentavam dificuldades para permanecer acordado no último mês. Bornhausen; Kessler e Gasperin (2018), refere que 39,53% relataram não ter problemas em manterem-se acordados durante o dia. Silva et al. (2012) também encontrou em seus estudos que 98% dos idosos negaram sobre a ocorrência de sonolência diurna e distúrbios durante o dia.

Quando correlacionada as características sociodemográficas/ antropométricas e clínicas com escores de atividade física foram observados: quanto maior idade menor o escore de atividade física que significa que quando a idade aumenta os indivíduos realizam menos atividade física. Entretanto, quando o número de comorbidades aumenta o indivíduo pratica mais atividade física. As outras variáveis não apresentaram correlação (Tabela 7).

Tabela 7. Correlação entre características sociodemográficas/antropométricas/clínica e nível de Atividade Física e Sono.

Variável	Atividade Física		Sono	
	R	p-valor	r	p-valor
Idade	-0,44	0,02*	-0,07	0,56
IMC	0,04	0,97	-0,13	0,28
Renda	-0,03	0,75	0,16	0,17
Escolaridade	0,09	0,43	0,14	0,25
Número de comorbidades	0,35	0,03*	0,01	0,93
Escore do sono	-0,07	0,54	-	-

*P-valor significativo $\leq 0,05$

Assemelha-se a estes resultados o estudo de De Souza *et al.* (2018), em que após a análise dos dados sociodemográficos, mostrou a idade como uma única variável diferente na comparação de idosas ativas e inativas, no entanto, a atividade física torna-se mais difícil à proporção que envelhecem. O mesmo encontra-se nos resultados de Souza; Fillenbaum e Blay (2015), cuja grandeza de idosas ativas diminuiu com o acréscimo da idade.

Observa-se que os idosos praticavam mais atividade física à medida que aumentava as comorbidades, isso ocorre devido aos benefícios que a prática de atividade física proporciona, mencionando assim a sua realização a partir de orientações dos profissionais da saúde.

É notório em diversos estudos a associação da saúde com os hábitos e comportamentos adotados durante a vida. Consequentemente, no estudo de Oliveira Filho; Netto-Oliveira e Oliveira (2012) houve uma prevalência da irregularidade no padrão do sono e na inatividade física de professores de uma IES pública do Sul do Brasil, em que podem ocasionar muitas repercussões no ser humano, por exemplo, o mau desempenho cognitivo e distúrbios psicológicos, predisposição a alterações no metabolismo e no sistema endócrino. Portanto, indivíduos que dormem mal possuem uma tendência maior a ter morbidades, acarretando pouca perspectiva de vida e um envelhecimento acelerado.

Os resultados obtidos através do escore global do Índice de Qualidade do Sono Pittsburgh (PSQI) evidenciaram que 68,18% da amostra estudada apresentou uma qualidade de sono ruim nos últimos 30 dias, sendo que quando questionados sobre a qualidade subjetiva do sono, 64,18% da amostra avaliou o seu, como de boa qualidade, visto que 86,57% apresentaram os distúrbios do sono entre 1, 2 e 3 vezes na semana. Percebe-se assim a discordância entre o escore global do PSQI e as respostas dos indivíduos participantes quanto a qualidade do sono, no entanto, gera questionamentos que não foram respondidos nesta pesquisa, carecendo assim de realizar estudos sobre o tema.

Os resultados dos escores totais do Questionário Baecke Modificado para Idoso (QBMI) apontam que a maioria dos idosos não realizavam atividade física, sendo que 78,79% da amostra estudada foram classificados como idosos fisicamente inativos, sendo que não obtiveram nível o bastante para serem caracterizados como ativo, o que pode propiciar a um comprometimento a curto e longo prazo da sua saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O envelhecimento tornou-se um fator importante nas principais sociedades desenvolvidas e em desenvolvimento, com isso, esse processo de envelhecimento traz inúmeras complicações nas funções gerais do organismo, tais alterações são perceptíveis na qualidade do sono e na redução da prática de atividades físicas dos idosos participantes da Pastoral da Pessoa Idosa de São Luís - MA.

Com base nesses resultados encontrados nesse estudo, foi possível perceber a necessidade de uma atuação da equipe multiprofissional na investigação dos distúrbios do sono e da inatividade física desses participantes, e consequentemente, um tratamento adequado com ênfase na diminuição de tais complicações referentes ao sono e a inatividade física. Para tanto, é necessário que haja estratégias

específicas que estimule na adoção de um estilo de vida ativo em idosos, visando a promoção da saúde e melhor qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, C. L. DE O.; CEOLIM, M. F. Qualidade do sono de idosos residentes em instituição de longa permanência. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 44, n. 3, 2010.
- BENEVIDES, K. G. C. B. *et al.* Quadro clínico de idosos em uma instituição de longa permanência. **Revista de Enfermagem da UFPE On Line.**, Recife, v.13, n.3, p.594-603, 2019.
- BERTOLAZI, A. N. *et al.* Validation of the Brazilian Portuguese version of the Pittsburgh sleep quality index. **Sleep Medicine**, v. 12, n. 1, p. 70-5, 2011.
- BORNHAUSEN, A.; KESSLER, R. M. G.; GASPERIN, S. I. Qualidade subjetiva do sono em cardiopatas isquêmicos crônico. **Insuficiência Cardíaca**, v. 13, n. 3, p. 110-117, 2018.
- CARVALHO, E. M. S. *et al.* A postura do idoso e suas implicações clínicas. **Geriatria & Gerontologia**, v. 5, n. 3, p. 170-4, 2011.
- CAVALLI, A. S. *et al.* Motivation of elderly people to engage in physical exercising: a comparative study between two universitybased programs - Brazil and Portugal. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 17, n. 2, p. 255-264, 2014.
- COHEN, J. **Statistical Power analysis for the behavioral sciences**. Hillsdale, N. J, 2nd ed. Lawrence Erlbaum Associates, p. 567. 1988.
- DE SOUZA, F. *et al.* Relationships between physical activity, quality of life, and age in women attending social groups for the elderly. **Scientia Medica**, v. 28, n. 4, 2018.
- DRAGER, L. F. *et al.* 1º Posicionamento Brasileiro sobre o Impacto dos Distúrbios de Sono nas Doenças Cardiovasculares da Sociedade Brasileira de Cardiologia. **Arquivos Brasileiro de Cardiologia**, São Paulo, v. 111, n. 2, 2018.
- Exercícios físicos garantem qualidade de vida a idosos. **Ministério da Saúde**, 2019. Disponível em: <<http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/53940-idosos-que-praticam-exercicios-fisicos-tem-mais-qualidade-de-vida>>. Acesso em: 22 mar. 2020.
- FERREIRA, H. G. *et al.* Perfis de idosos Praticantes de Atividades Prazerosas. **Psico-USF**, Bragança Paulista, v. 24, n. 3, p. 541-553, jul/set. 2019.
- MAGALHÃES, A.C. R, *et al.* Sono e qualidade de vida em idosos. **Revista Educação e Saúde**, v. 5, n. 2, p. 94-104, 2017.
- MAZO, G. Z. *et al.* Concurrent validity and reliability (Test-retest) of Modified Baecke Questionnaire for older adults. **Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde.**, v. 6, n. 1, p. 5-11, 2001.
- MELO, E. G. *et al.* Perfil sociodemográfico e clínico de idosos com diabetes. **Revista de Enfermagem da UFPE On Line.**, Recife, v.13, n.3, p.707-14, 2019.
- MONTEIRO, N. T.; CEOLIM, M. F. Qualidade do sono de idosos no domicílio e na hospitalização. **Texto & Contexto Enfermagem**, Florianópolis, v. 23, n. 2, p. 354-64, 2014.
- MUGEIRO, M.J.C. **Qualidade do sono nos idosos**. Instituto politécnico de Viseu, Escola Superior de Saúde de Viseu, Portugal. 2011. 181 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem de Reabilitação), 2011.
- OLIVEIRA, B.H.D. *et al.* Relações entre padrão do sono, saúde percebida e variáveis socioeconômicas em uma amostra de idosos residentes na comunidade - Estudo PENSA. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v.15, n.3, p.851-60, 2010.
- OLIVEIRA FILHO, A. D.; NETTO-OLIVEIRA, E. R.; OLIVEIRA, A. A. B. Qualidade de vida e fatores de risco de professores universitários. **Revista de Educação Física.**, v. 23, n. 1, p. 57-67, 2012.

- PASSOS, M. H. P. *et al.* Confiabilidade e validade da versão brasileira do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh em adolescentes. **Jornal de Pediatria (Rio J.)**, Porto Alegre, v. 93, n. 2, 2017.
- PEREIRA, M. C. A. *et al.* Contribuições da socialização e das políticas públicas para a promoção do envelhecimento saudável: uma revisão de literatura. **Revista Brasileira de Promoção em Saúde**, Fortaleza, v.29, n.1, p.124-131, 2016.
- PINTO, A. H. *et al.* Capacidade funcional para atividades da vida diária de idosos da Estratégia de Saúde da Família da zona rural. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 21, n. 11, p. 3545-3555, 2016.
- PLETSCH DA LUZ, E. *et al.* Perfil sociodemográfico e de hábitos de vida da população idosa de um município da região norte do Rio Grande do Sul, Brasil. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, v.17, n.2, p.303-314, 2014.
- PRINCE, M. *et al.* The global prevalence of dementia: A systematic review and metaanalysis. **Alzheimer's Dement**, v.9, n.1, p.63-75, 2013.
- SANTOS, A. A. *et al.* Sono, fragilidade e cognição: estudo multicêntrico com idosos brasileiros. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 66, n. 3, p. 351-7, 2013.
- Saúde da pessoa idosa: prevenção e promoção à saúde integral. **Ministério da Saúde**, 2019. Disponível em: <<https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-da-pessoa-idosa>>. Acesso em: 15 dez. 2019
- SENGER, A. E. V. *et al.* Alcoolismo e tabagismo em idosos: relação com ingestão alimentar e aspectos socioeconômicos. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 14, n. 4, p.713-9, 2011.
- SILBER, M.H. *et al.* The visual scoring of sleep in adults. **Journal of Clinical Sleep Medicine**. v. 3, n. 2, 2007.
- SILVA, A. T. M. *et al.* Religiosidade e espiritualidade relacionadas às variáveis sociodemográficas, econômicas e de saúde entre idosos. **REME – Revista Mineira de Enfermagem**, 2019.
- SILVA, J. M. N. DA *et al.* Avaliação da qualidade de sono em idosos não institucionalizados. **ConScientiae Saúde**, Terezina – PI, v.11, n.1, p.29-36, 2012.
- SILVA, L. J. *et al.* Association between levels of physical activity and use of medication among older women. **Caderno de Saúde Pública.**, v. 28, n. 3, p. 463-71, 2012.
- SOUZA, A. M.; FILLENBAUM, G.G.; BLAY, S. L. Prevalence and correlates of physical inactivity among older adults in Rio Grande do Sul, Brazil. **PLoS One.**, v.10, n.2, 2015.
- TASKAR, V.; HIRSHKOWITZ, M. Health effects of sleep deprivation. **Clinical Pulmonary Medicine**, v. 10, n. 1, p. 47-52, 2003.
- VICENTE, F. R.; SANTOS, S. M. A. Avaliação multidimensional dos determinantes do envelhecimento ativo em idosos de um município de Santa Catarina. **Texto & Contexto Enfermagem**, v. 22, n. 2, p. 370-8, 2013.

CAPÍTULO 9

EQUILÍBRIO E O RISCO DE QUEDAS EM
IDOSOS COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES

Capítulo 9

EQUILÍBRIO E O RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES

BALANCE AND THE RISK OF FALLS IN ELDERLY WITH DIABETES DIAGNOSIS

Bruno Maylon Ribeiro Moraes

Discente do Curso de Fisioterapia da Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9353-7258>

E-mail: brunomaylo3n@outlook.com

Jéssica Mayara Mendes Araújo

Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia, Rede Bionorte, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6964-1963>

E-mail: jessicamendesaraujo1@hotmail.com

Kleber de Jesus Serrão Mendes

Discente do curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2220-2589>

E-mail: kdjs.mendes@gmail.com

Pedro Cunha Mendes Neto

Discente do curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4484-6828>

E-mail: Pedro.netoneto21@gmail.com

Maria Erivânia Alves de Araújo

Docente do curso Fisioterapia, Unidade de Ensino Superior Dom Bosco, São Luís, MA

<https://orcid.org/0000-0001-7717-9975>

E-mail: erivania_70@hotmail.com

Joicy Cortez de Sá Sousa

Pós-graduação em Biologia Microbiana, Universidade Ceuma, São Luís, MA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8678-0244>

E-mail: joicyvet@hotmail.com

Adriana Sousa Rego

Docente do curso de Fisioterapia, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2494-030X>

E-mail: adricefs@yahoo.com.br

Mylena Andréa Oliveira Torres

Docente do curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5021-3130>

E-mail: mylena.torres@hotmail.com

Tatiana Cristina Fonseca Soares de Santana

Docente do curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3469-3410>

*Autor correspondente, e-mail: tatiana_iann@hotmail.com

RESUMO

O diabetes mellitus é uma doença crônica causada pela hipoglicemia podendo ocasionar falência dos órgãos, deficiências osteomioarticulares, dificuldades na realização de tarefas diárias, sendo uma doença de incidência crescente em todo o mundo. Os portadores de diabetes sofrem com complicações como dificuldades na marcha, alterações de sensibilidade, principalmente nos pés trazendo risco de queda, sendo que tais fatores comprometem a realização das suas atividades de vida diária. Tendo em vista as limitações diante do estudo, o fisioterapeuta é um profissional capacitado a intervir antes e durante o acometimento, já que é um profissional que atua na prevenção, no tratamento e na reabilitação. Esta pesquisa objetivou avaliar o equilíbrio e o risco de queda em idosos com diabetes mellitus tipo 2. Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo do tipo transversal realizado com 40 idosos moradores de comunidades da cidade de São Luís, que apresentavam diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Para avaliação do equilíbrio foi utilizado o teste de Tinetti, e para avaliação do risco de quedas utilizou-se o teste de *Timed up and go* e a força muscular foi avaliada através do sistema de graduação de força muscular de Oxford. Constatou prevalência do gênero feminino com 55% (n=22), a média de idade foi de 74 para o sexo feminino e 72 para o masculino com o desvio padrão aproximado para ambos os sexos de 7. Além disso, foi encontrado grau de força moderado, alto índice de desequilíbrio e consequente risco de queda elevado, acometido pela velhice e agravados pelo diabetes. Portanto, a avaliação do risco de queda demonstrou predominância de valores e scores baixos caracterizando o perfil dos idosos desta pesquisa como diabéticos propensos ao risco de quedas e instabilidades no equilíbrio, tais achados deste grupo podem ser sugeridos como base para futuros estudos em que se poderá ter a correlação e uma significância fidedigna entre o equilíbrio e o risco de queda em idosos diabéticos

Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 2; Déficit de equilíbrio; Idosos.

ABSTRACT

Diabetes mellitus is a chronic disease caused by hypoglycemia, which can lead to organ failure, musculoskeletal deficiencies, difficulties in performing difficult tasks, being a disease caused worldwide. People with diabetes suffer from complications such as gait difficulties, changes in sensitivity, especially in the feet that cause a risk of falling, and these factors are affected by the performance of activities of daily living. Given the external permissions of the study, the physiotherapist is a qualified professional to intervene before the follow-up and during the follow-up, is already a professional who works in the prevention of treatment and rehabilitation. The objective this Search was evaluate the balance and the risk of occurrence of elderly with type 2 diabetes. This is a descriptive, quantitative cross-sectional study conducted with 40 elderly from communities of the city of São Luís, who have a diagnosis of diabetes mellitus. 2. To assess balance, the Tinetti test was used, and to assess the risk of falls used in the Timed up and go test, a muscle strength was assessed using the Oxford muscle strength grading system. It found a prevalence of females with 55% (n=22), the mean age was 74 for females and 72 for males with the approximate standard deviation for both genders of 7. Furthermore, it was found a moderate degree of strength, high imbalance index and consequent risk of high increase, affected by old age and aggravated by diabetes. Therefore, the assessment of the risk of falling showed a predominance of low values and scores characterizing the profile of the elderly in this study as diabetics prone to laughter from falls and instabilities in balance, such finding from this group can be suggested as a basis for future studies in which it will be possible to have a correlation and a reliable significance between balance and the risk of falling in elderly diabetics.

Keywords: Diabetes mellitus type 2; Balance deficit; Seniors.

INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus (DM) é uma das doenças mais frequentes no mundo. Apesar de não ser transmissível, traz sérios danos à sociedade, sendo a quarta maior causadora de problemas gradativos às redes de saúde do Brasil e do mundo. Em 2014, haviam 120 milhões de diabéticos em todo o mundo e em 2025 a perspectiva é que esse número chegue a 300 milhões de pessoas com DM (BERTONHI; DIAS, 2018).

O DM é uma alteração que ocorre no organismo causado pela alta quantidade de glicemia. Quando o plasma sofre uma sobrecarga de glicose, os órgãos começam um processo de degeneração crônica trazendo consigo a falência de múltiplos órgãos, na qual os mais visíveis afetados são os rins, olhos, coração e vasos sanguíneos (TOSTA, 2018).

O desequilíbrio postural tem relação etiológicas e pode manifestar com instabilidade desvio de marcha e quedas constante, sendo que o DM é um fator de risco a queda e apresenta mais de 400 fatores associados, tornando-se dificultoso a identificação de fatores-chave na qual indica que a perda de força muscular está relacionada a diabetes e ao equilíbrio, e leva a um aumento de risco de queda (PORTO, 2018).

Há 3 tipos mais comuns de DM: tipo 1, o tipo 2 e o gestacional. O diabetes tipo 1 é na maioria das vezes causado por uma reação autoimune na qual o sistema imunológico entra em conflito com as células beta pancreáticas, que são responsáveis por produzir insulina no organismo. A doença acomete principalmente crianças e adultos jovens (VALENTIM, 2018).

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é caracterizada por alterações que ocorrem na ação e na secreção de insulina que em baixo nível se torna insuficiente para controlar a ação de glicose pelo fígado ou promove a capacitação de glicose pelo músculo esquelético (PEREIRA, 2011).

Sendo esta patologia causadora de grandes impactos socioeconômicos atingindo milhares de pessoas nas últimas décadas e com estimativa para o aumento do número de casos. Dentre a neuropatia diabética, a neuropatia autonômica vascular, é um problema comum do DM2 que leva a grandes índices de mortalidade e morbidade (BREDEK; SPOSITO, 2019).

Uma consequência frequente entre os portadores de DM é o déficit de equilíbrio e o risco de queda o que leva a um comprometimento da qualidade de vida destes indivíduos, limitando suas atividades de vida diárias (PORTES, 2015).

É importante que o paciente com DM tenha o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar para que não haja complicações futuras, como cegueira e insuficiência renal, deixando o paciente incapacitado de realizar suas atividades de vida diária. A fisioterapia irá intervir nos distúrbios osteomioarticulares mais frequentes, como comprometimento da sensibilidade plantar e as alterações na deambulação. Os recursos adotados serão treino de marcha e equilíbrio e ainda

melhora da propriocepção. O fisioterapeuta é o profissional de extrema importância pois dispõe de habilidades específicas da sua área, que evitam esses problemas (SOUSA *et al.*, 2018).

As chances de queda aumentam devido a vários fatores, entre eles a neuropatia diabética, a qual tem relação direta com controle glicêmico, perda de sensibilidade cutânea plantar direta e a queixa de desequilíbrio (PINHEIRO; MELO; CARVALHO, 2012).

A alteração de força muscular nos membros inferiores traz limitações na mobilidade articular que consequentemente podem ocasionar complicações como prejuízos no plano dinâmico da estabilidade durante a marcha (MARTINELLI *et al.*, 2014).

Tendo em vista as complicações ocasionadas pelo diabetes na população idosa, sobretudo em relação as alterações cinético-funcionais que comprometem a força muscular e equilíbrio destes indivíduos, torna-se importante identificar as possíveis alterações de equilíbrio e risco de quedas como forma de otimizar as condutas preventivas e terapêuticas adotadas, melhorando a qualidade de vida desta população. Diante do exposto, esta pesquisa objetivou avaliar o equilíbrio e o risco de queda em idosos com diabetes mellitus tipo 2.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo do tipo transversal. O estudo descritivo vai observar registrar descrever características de um determinado fenômeno que se relaciona aquela população, sem analisar o mérito do seu conteúdo (FONTELLES *et al.*, 2009).

A amostra foi composta por 40 idosos com idade entre 60 a 95 anos, com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, residentes na cidade de São Luís, Maranhão. Os critérios de inclusão foram indivíduos de ambos os sexos que realizassem controle glicêmico. Os critérios de exclusão foram idosos com déficit cognitivo, labirintite e com dificuldades severas de locomoção, que utilizassem bengala ou andador. Inicialmente os idosos foram abordados em centros comunitários e casas de apoio localizadas na comunidade, havendo ainda abordagens domiciliares. Em um primeiro momento foi realizado questionário sociodemográfico com perguntas diretamente ao participante sobre estado civil, idade, sexo, em seguida foi realizada avaliação do equilíbrio e marcha utilizando-se como instrumento, o teste de Tinetti.

Para avaliar o equilíbrio estático o teste de Tinetti iniciou com o paciente em pé, foi pedido para o participante que sentasse em uma cadeira sem apoio para os braços, e por meio da observação do pesquisador o teste pode ser realizado e pontuado de acordo com o desempenho de cada participante: no item [1] se o participante inclinasse ou deslizasse na cadeira a pontuação seria (0), caso estivesse estável, seguro, pontuação (1). Item [2], depois foi observado o levantar da cadeira, se

o participante fosse incapaz a pontuação seria (0), se caso fosse capaz usando membros superiores com auxílio, pontuação (1), se fosse capaz sem usar membros superiores pontuação (2). Item [3], tentativas de levantar, se fosse incapaz de levantar da cadeira pontuação (0), mais de uma tentativa pontuação (1), única tentativa de levantar da cadeira (2). Item [4] Equilíbrio em pé imediato nos primeiros 5 segundos, desequilibrado (0), estável ou usa suporte (1), estável sem suporte (2). Item [5] Equilíbrio em pé, desequilibrado (0), suporte ou base de sustentação de 12 cm (1), sem suporte e base estreita (2). Item [6], desequilíbrio no esterno, participante em bipedestação com os pés o mais próximo possível, o examinador empurra suavemente na altura do esterno, com a palma da mão 3x seguida, se o participante começar a cair (0), cambaleia (1), estável (2). Item [7], olhos fechados (mesma posição do item 6) instável (0), estável (1). Item [8], paciente fez um giro de 360 graus em posição bípede, instabilidade (0), passos descontinuados (1), continuidade (2). Item [9] sentar inseguro não avalia bem a distância, cai na cadeira (0), usa os braços ou não tem movimentos suaves (1), seguro, movimentos suaves (2).

O teste de Tinetti para avaliar a marcha foi realizado em um espaço onde o participante pudesse realizar a marcha em velocidade confortável, no local não tinha interferência que pudessem prejudicar o teste, o piso onde foi realizado era plano, cerâmica sem antiderrapante, os participantes realizaram o teste de marcha descalços para que não houvesse nenhum tipo de alteração no resultado.

Na avaliação do item [10] iniciar a marcha imediato e após o comando qualquer hesitação ou múltiplas tentativas para iniciar (0), sem hesitação (1). Item [11] comprimento e altura dos passos, pé direito não ultrapassa o pé esquerdo (0), pé direito ultrapassa pé esquerdo (1), pé direito não sai completamente do chão (0), pé direito sai completamente do chão (1), pé esquerdo não ultrapassa pé direito (0), pé esquerdo ultrapassa o pé direito (1), pé esquerdo não sai completamente do chão (0), pé esquerdo sai completamente do chão (1).

No item [12] simetria dos passos, passos diferentes (0), passos semelhantes (1). Item [13] continuidade dos passos, parados ou passos descontínuos (0), passos contínuos (1). Item [14] direção, desvio nítido (0) desvio moderado (1) seguiu linha reta sem apoio (2). Item [15] tronco, balanço grave ou uso de apoio com mão na cintura ou pernas (0), flexão dos joelhos ou abertura dos braços (1), sem flexão sem uso dos braços de apoio (2). Item [16] distância do tornozelo, separados (0), quase se tocam quando andam (2).

A contagem para cada exercício varia de 0 a 1 ou de 0 a 2 sendo a pontuação maior 12 pontos para marcha, e 16 para equilíbrio estático, somando o total de 28, quando há acordo com o

desempenho do paciente, sendo quanto maior a pontuação menos o déficit de equilíbrio e menor as alterações na marcha (FREITAS *et al.*, 2017).

Outro teste realizado foi o teste de força muscular no sistema de graduação de Oxford nos quadríceps, que é dado em 6 graus de força muscular onde, grau 0 significava sem contração muscular; grau 1 apresentava traços ou vestígios de contração muscular, mas sem movimentos; grau 2 contração muscular precária com movimento a favor da gravidade; grau 3 contração muscular regular contra a gravidade sem resistência; grau 4 contração muscular boa com resistência moderada e grau 5 contração muscular normal com resistência máxima.

O idoso sentado foi orientado a realizar uma extensão de joelho por 3 segundos com resistência elevada, avaliando o grau de força muscular a partir do grau possível de ser realizado em cada idoso. Foi utilizado o teste de *Timed up and go* onde o paciente iniciou o teste de nível de risco de queda em uma cadeira sem apoio lateral para os braços e com apoio para as costas, logo em seguida foi dado o comando de levante e marche junto com o início da cronometragem, participante realizou caminhada três metros com passos seguros e confortáveis, girou 180°, retornou e sentou-se na cadeira, foi parado o cronômetro, sendo considerado como normal a realização do teste em até 10 segundos; valores entre 11-20 segundos indica idosos com deficiência ou frágeis, com independência parcial e com baixo risco de quedas; tempos acima de 20 segundos indica um idoso com risco maior de quedas decorrentes de uma importante deficiência na mobilidade e no equilíbrio.

Inicialmente foi realizada uma análise descritiva. As variáveis quantitativas foram descritas por média e desvio padrão (média $\pm$ DP). As variáveis qualitativas foram apresentadas por meio de contagens absolutas e percentuais. A análise dos dados foi realizada através do software Excel do pacote Office da Microsoft pacote 2016.

Este estudo será baseado na resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde que regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos. Os participantes foram devidamente informados e esclarecidos quanto à importância e objetivo da pesquisa e havendo aceitação para sua participação, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi garantido a possibilidade de não participar na pesquisa ou desistência, a privacidade, confiabilidade e o anonimato dos participantes.

Esta pesquisa foi iniciada após aprovação do comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Ceuma –UNICEUMA, sob número do parecer: 2.452.185.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em relação ao gênero o presente estudo constatou prevalência do gênero feminino de 55% (n=22), enquanto do sexo masculino foi de 45% (n=18). Tais achados são parecidos com os estudos de Chagas (2018), realizado com 45 idosos de um centro comunitário em Fortaleza - CE, onde 64,4 % eram do gênero feminino e 35,6% do gênero masculino, onde os idosos foram avaliados afim de se ter uma análise da relação do equilíbrio corporal com o risco de quedas.

A média de idade foi de 74 para o sexo feminino e 72 para o masculino com o desvio padrão aproximado para ambos os sexos de 7.

Tabela 1. Dados sociodemográficos de idosos de 60 a 90, referente ao sexo a média de idade com o desvio padrão, porcentagem relacionada ao número de idosos de cada sexo.

Sexo	N	%	Média	DP
Feminino	22	55	74	6,66
Masculino	18	45	72	7,54

n: número de idosos; %: porcentagem referente ao sexo; média: média da idade dos idosos; DP: desvio padrão da média de idade.

Neste presente estudo quantificou 7 indivíduos do sexo masculino para score 6 no teste de marcha, já a quantificação para o sexo feminino é de 5 indivíduos para o score de 7. Quanto ao teste de equilíbrio quantifica-se o maior número de 5 indivíduos do sexo masculino para o maior score de 9. Já a quantificação do sexo feminino maior foi de 7 indivíduos para o maior score de 7. Ambos os sexos apresentaram score baixo segundo o teste de Tinetti. Apresentando score abaixo de 19 pontos como mostra na tabela 2.

Tabela 2. Quantidade de idosos por score no teste de Tinetti para marcha e para equilíbrio estático.

Teste	Escore													
Score - teste de Tinetti/marcha	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	-	-	-	-
Masculino	1	0	3	7	1	1	3	1	1	0	-	-	-	-
Feminino	2	1	4	4	5	2	1	3	0	0	-	-	-	-
Score - teste de Tinetti/equilíbrio	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	-	-
Masculino	0	0	1	2	2	0	5	1	0	3	1	3	-	-
Feminino	0	0	2	1	7	2	3	2	1	2	0	2	-	-

O presente estudo mostrou alto risco de queda em uma quantidade significativa de participantes com diabetes mellitus que apresentavam escore inferior a 28 pontos no teste de Tinetti,

que corrobora com estudo de Piovensan (2015), de que os idosos do sexo feminino apresentam alto índice de risco de queda, com escore inferior a 28 pontos do teste de Tinetti.

Na tabela 3 mostra as variáveis segundo o sexo sobre o tempo de caminhada, o qual mostrou que entre os idosos da pesquisa do sexo masculino, para a maioria deles o tempo foi de -10s, que é considerado pelo teste que não há risco de queda e para a maioria do sexo feminino, o tempo foi de 10 a 19s, resultado diferente do sexo masculino, este apresentou segundo o teste *timed up and go* que estas idosas possuem mais chance de risco de queda, resultado que é esperado entre idosos frágeis e/ou com deficiência. O estudo de Martinez (2016), identificou uma margem no qual os homens tiveram o tempo médio melhor que as mulheres, estudo este que foi realizado pelo mesmo teste desta pesquisa, o *Timed Up and Go*. Sugerindo-se que os idosos do sexo feminino possam está mais propensa ao risco de queda que os idosos do sexo masculino.

Tabela 3. Variáveis segundo o sexo sobre o tempo no teste de caminhada para o risco de queda do teste *Timed Up And Go*.

Variáveis/sexo	-10s	10 a 19s	20 a 29s	30 a >
Masculino	10	7	0	1
Feminino	3	14	4	1

No último teste realizado, foi para força muscular pelo sistema de graduação de Oxford, foi verificado o musculo quadríceps de ambos os membros inferiores, no qual no sexo masculino encontrou em maior quantidade, o grau 4 entre os idosos desta pesquisa que totalizam 7 entre os 18 idosos pesquisados. Já no sexo feminino foi encontrado em maior quantidade entre elas, o grau 3 correspondentes a 12 idosas do total de 22 pesquisadas (tabela 4).

Tabela 4. Variável referente ao grau de força muscular do musculo quadríceps direito e esquerdo pelo sistema de graduação de força muscular de Oxford.

Variáveis	grau 0	grau 1	grau 2	grau 3	grau 4	grau 5
Sexo masculino				5	7	6
Sexo feminino				12	9	1

A pesquisa de Ijzerman (2012) feita com idosos diabéticos e não diabéticos mostrou que ambos tinham perda da força muscular nos membros inferiores, podendo ser esta perda ocasionada pela idade, condição e hábitos de vida e a pratica de atividades físicas, uma correlação entre diabéticos e não diabéticos implementaria neste estudo para possivelmente se obter tal correlação que se torna de grande importância para a área da saúde afim de se prevenir ou tratar disfunções que possam causar

quedas e possivelmente fraturas ainda mais no público alvo deste pesquisa, idosos diabéticos a cima de 60 anos.

Exercícios e controle dos fatores de riscos são indispensáveis para se obter uma melhora tanto funcional quando preventiva principalmente nos idosos diabéticos evitando complicações, Lauret (2014) fala em seu estudo que educação em saúde tem sido um aliado enquanto a isso, a associação de programas de exercícios supervisionados.

CONCLUSÃO

A avaliação do risco de queda demonstrou predominância de valores e scores baixos caracterizando o perfil dos idosos desta pesquisa como diabéticos propensos ao risco de quedas e instabilidades no equilíbrio, tais achados deste grupo podem ser sugeridos como base para futuros estudos em que se poderá ter a correlação e uma significância fidedigna entre o equilíbrio e o risco de queda em idosos diabéticos.

A dificuldade de se encontrar idosos diabéticos acima de 60 anos, e que aceitassem participar da pesquisa limitou a quantidade de dados, assim como a utilização dos testes em locais apropriados. A correlação entre artigos também foi limitante para dados conclusivos pela dificuldade de se achar pesquisas parecidas ou na mesma linha de pesquisa. Sobretudo esta pesquisa sugere novos estudos para evidenciar os dados principalmente entre idosos diabéticos e não diabéticos, a intervenção do fisioterapeuta é de extrema importância nesses casos de risco de queda, afim de se evitar prejuízos para a qualidade de vida, meio social e psicológico em idosos diabéticos.

REFERÊNCIAS

BERTONHI, L. G.; DIAS, J. C. R. Diabetes mellitus tipo 2. Aspectos clínicos, tratamento e formato de documento eletrônico. **Revista Ciências Nutricionais Online**, v. 2, n. 2, p.1-10, 2018.

BREDER, I. S. S.; SPOSITO, A. C. Neuropatia autonômica cardiovascular em pacientes diabéticos tipo 2. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 65, n. 1, p. 56-60, 2019.

CHAGAS, D. L. *et al.* Relação entre o equilíbrio corporal e o risco de quedas em idosos de um projeto social de Fortaleza-CE. RBPFEEX - **Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício**, v. 12, n. 76, p. 547-555, 2018.

FONTELLES, M. J. *et al.* Metodologia da pesquisa científica: diretrizes para a elaboração de um protocolo de pesquisa. **Revista Paraense de Medicina**, Pará, 2009.

FREITAS, E. V. *et al.* **Tratado de geriatria e gerontologia**, 4ªed. Rio de Janeiro. 2002.

IJZERMAN, TH. *et al.* Lower extremity muscle strength is reduced in people with type 2 diabetes, with and without polyneuropathy, and is associated with impaired mobility and reduced quality of life. **Diabetes Research Clinical Practice**, v.3, n. 95, p345-351, 2012.

- KARUKA, A. H. *et al.* Análise da concordância entre instrumentos de avaliação do equilíbrio corporal em idosos. **Revista Brasileira de Fisioterapia**, São Carlos, v. 15, n. 6, p. 460-466, 2011.
- LAURET, G.J. *et al.* Modes of exercise training for intermitente claudication. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, v. 4, n. 7, 2014.
- LUCHA, M. O. *et al.* Impacto de um programa de corpo-mente baseado em exercícios de fisioterapia e técnicas psicológicas no bem-estar psicológico de uma população de pacientes diabéticos tipo 2. **University Psychology**, Bogotá, v. 16, n. 1, p. 122-134, 2017.
- MARTINELLI, R. A. *et al.* Alterações dos parâmetros da marcha e déficit sensório-motor associado à neuropatia diabética periférica. **Acta Fisiátrica**, v. 21, n. 1, p. 36-40, 2014.
- MARTINEZ, B, P. *et al.* Segurança e reprodutibilidade do teste de *timed up and go* em idosos hospitalizados. **Revista Brasileira de Medicina Esportiva**, v. 22, n. 5, p. 408-411, 2016.
- PEREIRA, R. A relação entre dislipidemia e diabetes mellitus tipo 2. **Cadernos UniFOA**, Três Poços, v. 6, n. 17, p. 89-94, 2011.
- PINHEIRO, H. A; MELO, G. F; CARVALHO, G. A. Ptofobia, depressão e história de quedas em idosos com neuropatia diabética atendidos no Distrito Federal. **Revista Kairós Gerontologia**, São Paulo, v. 15, n. 5, p. 44-56x, 2012.
- PIOVENSAN, A. C. *et al.* Avaliação do teste de tinetti e mini-exame do estado mental em idosas moradoras da comunidade Roberto Binatto, Santa Maria (RS). **Revista Kairós Gerontologia**, v.18, n. 1, p. 341-352, 2015.
- PORTES, L. H. Abordagem do fisioterapeuta no diabetes mellitus: revisão de literatura. **Arquivos de Ciências da Saúde**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 3, p. 9-14, 2015.
- PORTO, E. P. *et al.* Equilíbrio postural e acidentes por quedas em diabéticos e não diabéticos. **Revista Brasileira de Saúde Funcional**. Capoiuruçu, v. 5, n. 2, p. 31-33, 2018.
- PRADO, R. P., Desempenho de idosos do sexo masculino na escala de equilíbrio e marcha de Tinetti. **Fisioterapia Brasil**, v. 10, n. 6, p. 408-413, 2009.
- SOUSA, A. L.; PARDONO, E. Comparação da força muscular lombar antes e após o treinamento de força intendo entre indivíduos sedentários saudáveis e com Diabetes tipo 2 acometidos de lombalgia inespecífica. **Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício**, v. 0, n. 51, p. 48-54, 2015.
- SOUSA, J. S. *et al.* Atuação da fisioterapia na prevenção de úlceras do pé diabético. **Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente**. Ariquemes: FAEMA, v. 9, n. 1, 2018.
- TOSTA, A. M. *et al.* Avaliação da função pulmonar em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 submetidos à cirurgia metabólica. **Fisioterapia em movimento**, Curitiba, v. 31, e003120, 2018.
- VALENTIM, F. B. **Abordagem da Saúde Pública da Associação do Conhecimento, Condição Periodontal e Controle Glicêmico de Pacientes Diabéticos Tipo 2**. 2018. Tese (Doutorado de Mestrado em Clínica Odontológica) - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências de Saúde, Espírito Santo, 2018. 133 f.
- WEINERT, Letícia Scherz et al. Diabetes gestacional: um algoritmo de tratamento multidisciplinar. **Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia**, São Paulo, v. 55, n. 7, p. 435-445, 2011.

CAPÍTULO 10

O USO INADEQUADO DE MÉTODOS
CONTRACEPTIVOS COMO FATOR
PREDISPONENTE À GRAVIDEZ NA
ADOLESCÊNCIA: UM RECORTE NO
SEMIÁRIDO BRASILEIRO

Capítulo 10

O USO INADEQUADO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS COMO FATOR PREDISPONENTE À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: UM RECORTE NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO

THE INAPPROPRIATE USE OF CONTRACEPTIVE METHODS AS A PREDISPOSING FACTOR TO TEENAGE PREGNANCY: A CUT OUT IN THE BRAZILIAN SEMI-ARID

Luzia Carla de Souza Soriano

Departamento de Ciências da Saúde, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1868-8109>

E-mail: luziacarla97@gmail.com

Andrea Taborda Ribas da Cunha

Departamento de Ciências da Saúde, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8320-066X>

E-mail: andrea.taborda@ufersa.edu.br

Débora Maria Marques Bezerra

Departamento de Ciências da Saúde, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4588-7365>

E-mail: debora.dmmmb@gmail.com

Carlos Ygor Costa Martins

Departamento de Ciências da Saúde, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7667-1914>

E-mail: ygor.martins@alunos.ufersa.edu.br

João Vitor Soares Marçal

Departamento de Ciências da Saúde, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1229-8951>

E-mail: joao.marcal@alunos.ufersa.edu.br

Gabriel Nicolás de Melo Dias

Departamento de Ciências da Saúde, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1935-8582>

E-mail: gabrielnicolas@gmail.com

Luciana Carla Freitas Rodrigues

Departamento de Ciências da Saúde, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7515-2728>

E-mail: lucianacfr2@gmail.com

Álvaro Vitor Fernandes de Lima

Departamento de Ciências da Saúde, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2257-5879>

E-mail: alvaro.lima@alunos.ufersa.edu.br

RESUMO

A adolescência é um período da vida marcado por alterações físicas, psicológicas e sociais na qual o indivíduo se torna vulnerável à fatores externos e internos que moldam seu comportamento e personalidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente considera como direitos do adolescente a autonomia e o direito à saúde integral, incluindo a sexual e reprodutiva. A educação sexual para os jovens impacta no desenvolvimento de uma vida sexual saudável e no uso correto e seguro de contraceptivos, principal chave para a prevenção da gravidez indesejada na adolescência, evento que impacta diretamente na saúde, nas relações sociais e perspectivas futuras da mulher. A pesquisa teve como objetivo determinar e analisar o uso prévio de métodos contraceptivos por adolescentes de 15 a 19 anos de idade em atendimento pré-natal no ambulatório Mãe Primavera. Trata-se de um estudo transversal exploratório realizado em Mossoró, Rio Grande do Norte, no período de maio a novembro de 2019, envolvendo a participação de 32 voluntárias, que responderam a um formulário. As informações obtidas foram analisadas através de estatística simples utilizando o programa Excel. O estudo revelou que as adolescentes conhecem os métodos contraceptivos, mas ainda não possuem conhecimento suficiente sobre como utilizá-los corretamente, tendo como consequência a gravidez não planejada.

Palavras-chave: Contracepção; Adolescente; Gravidez na Adolescência; Saúde sexual e Reprodutiva.

ABSTRACT

Adolescence is a period of life marked by physical, psychological and social changes in which the individual becomes vulnerable to external and internal elements that mold behavior and personality. The Brazilian Statute of the Child and the Adolescent considers autonomy and access to integral health, including sexual and reproductive health, as rights of the adolescent. Sexual education for the teenagers impacts in the development of a healthy sexual life and in correct use of contraceptives, seems to be the main key for prevention of unwanted pregnancy in adolescence, an event that impacts directly in health, social relationships and future perspectives for women. This is a transversal exploratory research that took place in Mossoró, Rio Grande do Norte, from May to November 2019, involving 32 volunteers that answered a questionnaire. The information was analyzed using simple statistics in the program Excel. The study shows that adolescents know contraceptive methods, but still have poor knowledge of the correct use of them, consequently developing unwanted pregnancy.

Keywords: Contraception; Adolescent; Pregnancy in Adolescence; Sexual and Reproductive Health.

INTRODUÇÃO

A adolescência, um ciclo de vida fundamental para o ser humano, é repleta de desenvolvimento e formação de caráter. Por ser uma fase tão importante da vida, crianças e adolescentes necessitam ter seus Direitos Humanos assegurados. No Brasil, um dos passos mais importantes para a garantia desses direitos foi a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que rege o art. 227 da Constituição Federal (CF) de 1988. O artigo estabelece que adolescentes e crianças são sujeitos de direitos, modificando a percepção anterior de que meninos e meninas seriam propriedade de seus pais (BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). Ainda que o adolescente seja um indivíduo em desenvolvimento físico e psicológico, o ECA, em seu art. 17, prevê a preservação

da imagem, identidade, autonomia, valor, ideias, crenças e objetos pessoais da criança e do adolescente.

Em consonância com a Conferência Internacional Sobre População e Desenvolvimento, sediada no Cairo, em 1994, da qual o Brasil fez parte, é direito de todo adolescente o acesso à educação em saúde sexual e reprodutiva, bem como o acesso a métodos anticoncepcionais (MAC) seguros (BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).

É importante, nesse contexto, ressaltar que a sexualidade é um componente impactante na vida do ser humano, que inclui não só aspectos biológicos, mas também psíquicos, culturais, sociais e afetivos; não se restringindo apenas à função reprodutiva (BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). Dessa forma, percebe-se a notoriedade de iniciativas que construam um conceito salubre de sexualidade, especialmente no tocante ao conhecimento acerca de métodos contraceptivos.

Entre as adolescentes do sexo feminino, especialmente, a necessidade do conhecimento acerca de práticas que evitem uma gravidez indesejada é imperiosa para esse tipo de idealização - demanda que se impõe de acordo com o art. 8º do ECA, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, no qual se assegura às mulheres o acesso a políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo.

A IV Conferência Mundial sobre a Mulher, em 1995, deu um dos passos iniciais ao discutir sobre a inclusão dos direitos sexuais como parte dos princípios dos Direitos Humanos:

Os direitos humanos das mulheres incluem seu direito a ter controle e decidir livre e responsavelmente sobre questões relacionadas à sua sexualidade, incluindo a saúde sexual e reprodutiva, livre de coação, discriminação e violência. Relacionamentos igualitários entre homens e mulheres nas questões referentes às relações sexuais e à reprodução, inclusive o pleno respeito pela integridade da pessoa, requerem respeito mútuo, consentimento e divisão de responsabilidades sobre o comportamento sexual e suas consequências (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1995).

A afirmação acima evoca uma reflexão acerca da assimetria nas relações entre homens e mulheres, principalmente no contexto da adolescência. A necessidade de relações mais igualitárias se evidencia, por exemplo, no fato de que muitas meninas acabam tendo a sua primeira relação sexual ao serem pressionadas para satisfazer o parceiro (BELO & SILVA, 2004).

Numa pesquisa realizada em Campinas por Belo e Silva (2004), a média de idade para a ocorrência da primeira relação sexual foi 14 anos e cerca de 45,5% das entrevistadas não utilizaram MAC, o que diminui o tempo de intervalo entre a sexarca (primeira relação sexual) e a ocorrência da gravidez. No geral, as adolescentes possuíam conhecimento sobre os métodos contraceptivos

disponíveis, porém não sabiam o suficiente sobre sua utilização adequada. Os métodos mais usados foram os contraceptivos orais e o preservativo masculino.

De acordo com o art. 8º da Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que regulamenta planejamento familiar no Brasil, devem ser oferecidos todos os métodos e técnicas de contracepção cientificamente aceitos, garantindo a liberdade de opção. Em um estudo brasileiro realizado em 2005, apenas 14% das jovens na faixa etária de 15 a 19 anos estavam utilizando algum contraceptivo na época (BARREIROS, GUAZZELLI & MORON, 2005). A compreensão sobre como acessar e utilizar de forma correta os métodos contraceptivos disponíveis é fundamental para iniciar o planejamento familiar das mulheres, e deve ser feito o mais cedo possível, antes do início da vida sexual, para que esta seja saudável e segura.

O presente estudo tem como finalidade avaliar se a baixa adesão aos métodos contraceptivos está relacionada ao aumento da incidência de gravidez na adolescência, levando a consequências como abandono escolar, analisando o uso de contracepção antes da ocorrência da gestação, caracterizar o perfil sociodemográfico, o passado ginecológico e obstétrico das pacientes, verificar o uso correto dos métodos contraceptivos, analisar possíveis fatores associados à ocorrência da gravidez e identificar possíveis barreiras no acesso ao planejamento familiar na atenção primária.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), número CAAE 09003919.3.0000.5294, conforme resolução nº 466/2012. O consentimento das participantes foi feito através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), previamente explicado e detalhado. As participantes menores de 18 anos assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido TALE, após consentimento de seus responsáveis através do TCLE.

O campo da pesquisa foi o ambulatório de pré-natal de adolescentes do projeto “Mãe Primavera”, sediado na Faculdade de Ciências da Saúde (FACS) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Esse local foi escolhido por ter suporte de uma equipe multiprofissional, o que minimiza os riscos para os jovens que responderam o formulário, pois possibilita um ambiente seguro devido ao apoio de profissionais habilitados a atender jovens em situação de vulnerabilidade.

O estudo é do tipo transversal exploratório e teve como instrumento de pesquisa um formulário aplicado pelas pesquisadoras. Foram entrevistadas 32 jovens, correspondendo ao número

de pacientes atendidas no período de maio a novembro de 2019. Após a coleta, os dados foram tabulados na ferramenta Excel, e avaliados posteriormente através de análise estatística simples. A aplicação do formulário foi feita em ambiente reservado, oferecendo privacidade à participante do estudo. O formulário foi dividido em dados socioeconômicos, ginecológicos, obstétricos e escolares.

Os critérios de inclusão foram as pacientes gestantes na faixa etária de 15 a 19 anos que estivessem realizando o pré-natal pelo projeto “Mãe Primavera”, da FACS, sendo acompanhadas por equipe multiprofissional formada por médico, nutricionista e assistente social e que aceitaram participar da pesquisa. Foram excluídas da amostra adolescentes que apresentem, diagnosticadas por profissional médico, patologias neurológicas ou alterações comportamentais e/ou psicológicas que impossibilitem o preenchimento do formulário. Também não foram incluídas na amostra gestantes com 14 anos de idade ou menos, pois a relação sexual com menores de 14 anos se configura como estupro de vulnerável (de acordo com artigo 217-A do Código Penal) ou adolescentes que não aceitem participar da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A maioria das adolescentes (59,39%) tinham entre 17 e 19 anos de idade (Tabela 1). Em relação à situação conjugal, solteiras ou participantes de união estável foram preponderantes (75%). Estes achados são semelhantes aos encontrados no estudo de Belo e Silva (2004).

A maior parte das adolescentes que responderam o formulário possuíam pais separados (46,88%). Cerca de 10% das participantes eram órfãs de pai ou de mãe (Tabela 1). Na vigência de gestação indesejada ou sem apoio familiar, verifica-se associação à ocorrência de aborto ilegal, uma das principais causas de óbito por intercorrências relacionadas à gravidez (TABORDA *et al.*, 2014).

Constata-se, também, que quanto menor a escolaridade e a renda familiar, maior tende a ser a taxa de fecundidade de jovens de 15 a 19 anos (Tabela 1). A exclusão social e a pobreza podem tanto ser causas como consequências de uma gravidez precoce (BARALDI *et al.*, 2007), corroborando com os achados do formulário aplicado no presente estudo, já que a maioria das gestantes tinha uma renda familiar de 1 a 2 salários mínimos (62,50%) e ainda não tinham concluído o ensino fundamental ou médio (50% e 37,50%, respectivamente).

A porcentagem das participantes que abandonaram a escola devido à gestação foi de 37,50% (Tabela 1), em concordância com os dados obtidos em estudos como o de Belo e Silva (2004), que também constataram que a gravidez precoce contribui para a falta de perspectiva profissional. Todavia, a maioria das entrevistas visavam dar continuidade aos estudos após o parto. Por diversos

motivos, dentre eles a maior exigência do mercado de trabalho, a baixa escolaridade das adolescentes acaba perpetuando a situação de pobreza tanto para a mãe quanto para o filho (BARALDI *et al.*, 2007).

Tabela 1. Dados sociodemográficos e econômicos.

Variável	Respostas	Resultado (%)
Raça	Parda	11 (34,38)
	Preta	10 (31,25)
	Branca	11 (34,38)
Idade	5 anos	6 (18,75)
	6 anos	7 (21,88)
	17 anos	5 (15,63)
	18 anos	5 (15,63)
	19 anos	9 (28,13)
Estado civil	União estável	12 (37,50)
	Casada	8 (25)
	Solteira	12 (37,50)
Situação conjugal dos pais	União estável	3 (9,38)
	Casados	10 (31,25)
	Separados	15 (46,88)
	Mãe viúva	1 (3,13)
	Pai viúvo	2 (6,25)
	Sem informação	1 (3,13)
Escolaridade	Ensino fundamental completo	2 (6,25)
	Ensino fundamental incompleto	16 (50)
	Ensino médio completo	2 (6,25)
	Ensino médio incompleto	12 (37,50)
Renda familiar	< 1 SM	4 (12,50)
	≥ 1 SM e ≤ 2 SM	20 (62,50)
	≥ 3 SM	2 (6,25)
	Sem informação	6 (18,75%)
Abandono escolar devido a gestação	Sim	12 (37,50)
	Não	20 (62,50)
Planeja voltar a estudar após o parto	Sim	30 (93,75)
	Não	2 (6,25)
Educação sexual na escola	Sim	23 (71,88)
	Não	9 (28,13)

Ainda em relação aos dados escolares, a maioria das participantes relataram que haviam experienciado aulas sobre educação sexual na escola (Tabela 1). A falta de participação da escola e dos serviços de saúde no processo educacional é uma das razões para a gravidez precoce (PARAGUASSÚ *et al.*, 2005).

De modo geral, as adolescentes tiveram a menarca com 12 anos de idade ou menos (75%), e a primeira relação sexual com menos de 15 anos de idade (53,13%) (Tabela 2). Um detalhe importante para destacar é a associação entre a menarca e sexarca precoces a uma maior vulnerabilidade a infecções sexualmente transmissíveis e à gravidez (DUARTE *et al.*, 2011).

A maior parte teve a primeira gestação com mais de 15 anos de idade (62,50%) e 37,50% com 15 anos ou menos. Predominaram as adolescentes que tiveram uma gestação na vida (68,75%), enquanto 31,25% tiveram mais de uma gestação (Tabela 2). Diante dessa realidade, destaca-se que mulheres cuja maternidade é concebida ainda na adolescência têm uma tendência a ter um maior número de filhos durante sua idade reprodutiva (FERREIRA *et al.*, 2012).

Em relação ao intervalo de tempo entre a sexarca e a ocorrência da primeira gestação, a maioria das entrevistadas relatou um intervalo de um ano (34,38%), enquanto 25% tiveram sua primeira gestação com menos de um ano (Tabela 2). A falta de planejamento familiar tende a diminuir esse intervalo. Quanto mais precoce a sexarca, maior tende a ser o número de gestações e de parceiros sexuais (MARANHÃO *et al.*, 2017). Geralmente, após início da vida sexual, elas levam ao menos um ano para procurar utilizar um método contraceptivo, e, enquanto isso, a gravidez não planejada tende a ocorrer até o 6º mês de exposição sexual sem contracepção regular e correta (RAMOS, 2000).

Das gestantes que tinham duas gestações ou mais, 80% não planejou a gravidez anterior. A mesma porcentagem se repete na gravidez atual. Fatores próprios da adolescência, tais como alterações anatomo-metabólicas e sociopsicológicas, e da vivência sexual, ainda em formação, tornam essa fase da vida como uma das mais vulneráveis, inclusive para o desenvolvimento de uma gravidez indesejada (DUARTE *et al.*, 2011; NETO *et al.*, 2007).

A primeira gestação, geralmente, não é desejada nem tampouco planejada. Se ocorrer uma segunda, provavelmente está também não será. A vivência de uma nova gestação não costuma ser eficaz para despertar nas jovens um senso de responsabilidade em relação às consequências de sua vida sexual (MANFREDO, CANO & SANTOS, 2012), por isso, a principal medida para evitar a reincidência da gravidez é a utilização correta de MAC (ALBUQUERQUE *et al.*, 2017).

Quando questionadas sobre os motivos que levaram à gestação, a maioria das jovens relataram que nunca haviam refletido sobre o assunto ou que simplesmente não sabiam relatar. Alguns motivos relatados foram falta de prevenção, despreparo, relações difíceis com a família, falta de informação sobre a gravidez, desconhecimento sobre métodos contraceptivos e vontade de engravidar.

Tabela 2. Resultados dos dados ginecológicos e obstétricos.

Variável	Respostas	Resultado (%)
Idade da sexarca	< 15 anos	17 (53,13)
	≥ 15 anos	15 (46,88)
Idade da menarca	≤ 12 anos	24 (75)
	> 12 anos	8 (25)
Idade da primeira gestação	≤ 15 anos	12 (37,50)
	> 15 anos	20 (62,50)
Intervalo de tempo entre a sexarca e a primeira gestação	< 1 ano	8 (25)
	1 ano	11 (34,38)
	2 anos	4 (12,50)
	> 2 anos	9 (28,13)
Número de gestações	1	22 (68,75)
	> 1	10 (31,25)
Planejamento da gravidez anterior (n= 10)	Sim	2 (20)
	Não	8 (80)
Planejamento da gravidez atual	Sim	8 (25)
	Não	24 (75)
Percepção sobre motivos para a ocorrência da gravidez	Sim	15 (46,88)
	Não	17 (53,13)

Belo e Silva (2004) destacaram o não uso de MAC como motivo para ocorrência da gestação. Alguns dos motivos para esta prática estão o desconhecimento sobre o método, a recusa do uso pelo parceiro e o pensamento de que “não engravidaria” ou que não esperava ter relações sexuais naquele momento da vida. Outros autores relataram como justificativa dada pelos jovens para não utilizar contracepção o desejo de engravidar do casal (TEIXEIRA *et al.*, 2006).

A maioria relatou não utilizar MAC antes da sexarca (53,13%). Dentro do grupo que utilizou (46,88%), o método mais utilizado foi o preservativo masculino (66,67%), seguido do ACO (26,67%) e anticoncepcional injetável mensal (6,67%) (Tabela 3).

No grupo das gestantes com mais de uma gestação, apenas 30% estavam utilizando MAC antes da gravidez anterior. O método mais utilizado foi, novamente, o preservativo masculino (33,33%), seguido do anticoncepcional injetável mensal (33,33%) e outros métodos (33,33%), como método de emergência. Metade das participantes relataram utilizar algum MAC antes da gestação atual, sendo o ACO o mais utilizado (50%), seguido de anticoncepcional injetável mensal (31,25%) e preservativo masculino (18,75%) (Tabela 3).

Tabela 3. Resultados dos dados sobre contracepção e acesso a métodos contraceptivos.

Variável	Respostas	Resultado (%)
Uso de MAC antes da sexarca	Sim	15 (46,88)
	Não	17 (53,13)
Tipo de MAC antes da sexarca (n= 15)	Preservativo masculino	10 (66,67)
	ACO	4 (26,67)
	Anticoncepcional injetável mensal	1 (6,67)
	DIU	-
	Outros	-
Uso de MAC antes da gestação anterior (n= 10)	Sim	3 (30)
	Não	7 (70)
Tipo de MAC antes da gestação anterior (n= 3)	Preservativo masculino	1 (33,33)
	ACO	-
	Anticoncepcional injetável mensal	1 (33,33)
	DIU	-
	Outros	1 (33,33)
Uso de MAC antes da gestação atual	Sim	16 (50)
	Não	16 (50)
Tipo de MAC antes da gestação atual (n= 16)	Preservativo masculino	3 (18,75)
	ACO	8 (50)
	Anticoncepcional injetável mensal	5 (31,25)
	DIU	-
	Outros	-
Modo de utilização do MAC (n=26)	Uso perfeito	11 (42,31)
	Uso típico*	15 (57,69)
Percepção do período fértil	Sim	6 (18,75)
	Não	24 (75)
	Não sei o que é período fértil	2 (6,25)
Obtenção de informações sobre MAC	Mãe	9 (28,13)
	Amigos	3 (9,38)
	Médicos	4 (12,50)
	Enfermeiros	7 (21,88)
	Outros	9 (28,13)
Procura por MAC na atenção primária	Sim	13 (40,63)
	Não	19 (59,38)
Acesso aos MAC buscados na atenção primária (n= 13)	Sim	11 (84,62)
	Não	2 (15,38)
Constrangimento ou vergonha ao buscar por MAC	Sim	13 (40,63)
	Não	19 (59,38)
Há um acolhimento adequado para adolescentes que buscam por MAC?	Sim	22 (68,75)
	Não	8 (25)
	Sem informação	2 (6,25)

MAC: método anticoncepcional; ACO: anticoncepcional combinado oral; DIU: dispositivo intrauterino.

* Uso típico: utilização incorreta do método em todas as relações sexuais; ou uso correto, mas não utilizava em todas as relações sexuais; ou não havia uso de métodos em todas as relações sexuais.

Um estudo realizado em Campinas, com 156 adolescentes grávidas com menos de 19 anos, encontrou uma taxa de uso de contraceptivos na primeira relação de 54,5%, sendo o mais utilizado o preservativo masculino (87,1%), em seguida o ACO (10,6%) e coito interrompido (2,4%). As principais alegações das participantes que não utilizaram MAC foram não ter pensando na hora (32,4%), não esperar pela relação no momento (12,7%), não conhecer nenhum MAC (11,3%), rejeição de uso pelo parceiro (8,5%) ou não se importavam em ficar grávida (8,5%) (BELO e SILVA, 2004).

A taxa de falha do preservativo masculino é alta, chegando a 18%, perdendo apenas para métodos comportamentais (análise do muco cervical e coito interrompido, por exemplo). O ACO possui taxa de falha de 9%, o anticoncepcional injetável 6% e o DIU de cobre 0,8% (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS; COMMITTEE ON ADOLESCENCE, 2014).

As participantes que já haviam feito uso de algum MAC ao longo da vida foram questionadas sobre seu modo de utilização. Era considerado uso perfeito quando o método contraceptivo havia sido utilizado corretamente, de acordo com as suas instruções, em todas as relações sexuais. O uso típico era considerado quando o uso do método era correto ou não em todas as relações sexuais; quando havia utilização em todas as relações, mas nem sempre corretamente; ou a não utilização do método contraceptivo em todas as relações sexuais.

A maioria das respostas correspondiam ao uso típico (57,69%) (Tabela 3). Na análise das respostas sobre uso perfeito ou típico dos MAC, as gestantes que fizeram uso perfeito, ou seja, seguia as instruções do MAC e utilizava em todas as relações sexuais, geralmente engravidaram após a interrupção abrupta dos métodos, sem a substituição por um novo MAC.

Apesar de conhecerem a definição de período fértil, as participantes não tinham percepção de quando este período ocorria (75%), e uma pequena parte não sabia definir o que é o período fértil (6,25%) (Tabela 3). No estudo de Belo e Silva (2004), foi identificado que 11,5% das jovens não sabiam identificar corretamente o período fértil.

O uso de Métodos Contraceptivos Reversíveis de Longa Duração ou *Long-Acting Reversible Contraception* (LARC) pode ser uma estratégia a ser adotada para evitar uma gravidez indesejada ou precoce, já que muitas adolescentes não possuem uma adesão a longo prazo de MAC ou faz um uso inadequada destes. O uso de LARCs demonstra uma taxa de continuação maior do que outros métodos, além de prevenir, de maneira segura, a repetição de uma gravidez na adolescência (ALBUQUERQUE *et al.*, 2017).

O DIU de cobre é uma ótima opção, já que é acessível, inclusive pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Embora existam dúvidas sobre seu uso em adolescentes, é uma boa alternativa para adolescentes, devido a sua alta eficácia e baixíssima taxa de falha. O uso de DIU em adolescentes,

bem como em nulíparas no geral, tem sido recomendado como primeira linha por diversas entidades médicas, pois o nível de complicações é semelhante ao de mulheres de outras faixas etárias ou ao de multíparas (MACHADO, 2018). A inserção do DIU no pós-parto imediato é mais eficaz do que esperar durante quatro a seis semanas para realizar sua colocação, sem resultados significativos sobre efeitos adversos relatados tanto para a lactante quanto para o lactente (ALBUQUERQUE *et al.*, 2017).

No que diz respeito à fonte de informação sobre contracepção, as entrevistadas costumam buscar informações com suas mães (28,13%), amigos (9,38%) e médicos (12,50%). Contrapondo esse resultado, outro estudo constatou que a maior fonte de informação sobre métodos contraceptivos eram os amigos (70,6%), bem como meios de comunicação como televisão (33,1%) e através da escola (35,3%) (BARREIROS, GUAZZELLI & MORON, 2005). Já

Sobre a busca por métodos contraceptivos na atenção primária à saúde (APS), 59,98% das participantes negaram a procura de MAC em Unidades Básicas de Saúde. Dentre as adolescentes que buscaram por anticoncepção na APS, 84,62% obtiveram acesso. Segundo o art. 9º da Lei 9.263, de 12 de janeiro de 1996, devem ser oferecidos métodos e técnicas de contracepção para as pessoas, sendo responsabilidade de todos os níveis do SUS a garantia da assistência à concepção e à contracepção.

Das adolescentes entrevistadas, 59,38% não se sentem constrangidas ao buscar por um MAC. Questionadas sobre a existência de um acolhimento adequado para adolescentes que estão em busca de contracepção, 68,75% afirmaram que sim.

Por fim, destaca-se que, mesmo com acesso à informação, as adolescentes gestantes não costumam realizar contracepção corretamente. Não só informações mudam a prática contraceptiva dos adolescentes, mas também motivações pessoais, que podem influenciar na maior ou menor utilização. Dentre essas influências, está a questão de gênero, pois a mulher acaba se tornando submissa na escolha do método anticoncepcional utilizado. Entretanto, quando a mulher se prepara para a prática sexual, isto pode ser visto com maus olhos. Outros obstáculos que diminuem o uso de contracepção são a dificuldade de acesso, ou vergonha e medo de ir aos serviços de saúde em busca destes, além de crenças sobre efeitos adversos (BRANDÃO, 2009; PATIAS & DIAS, 2014).

CONCLUSÃO

Os achados da pesquisa responderam à hipótese levantada inicialmente. Foi identificado que o mau uso de métodos contraceptivos levou à gravidez em um curto intervalo de tempo após o início da vida sexual das adolescentes entrevistadas. Além disso, muitas das adolescentes entrevistadas engravidaram pouco tempo após a interrupção abrupta do método contraceptivo, sem

acompanhamento profissional e aconselhamento contraceptivo. A ocorrência da gestação impactou na vida da adolescente, inclusive nas taxas de abandono escolar. Entretanto, a maioria das adolescentes possuía perspectivas futuras no âmbito educacional.

A maior parte das adolescentes analisadas possuíam acesso a métodos anticoncepcionais, porém não tinham informações e habilidades suficientes para fazer um uso adequado destes.

O estudo demonstra a importância de se considerar a saúde sexual e reprodutiva como parte da saúde integral do indivíduo, além de apontar a necessidade de adoção de novas estratégias para abordar a saúde do adolescente, acolhendo-o de forma não julgadora para auxiliá-lo no início de uma vida sexual segura e saudável.

Apesar da existência de políticas públicas mais recentes que desaprovam ou são resistentes à educação sexual dentro das escolas, ou até se limitam a oferecer apenas a opção de abstinência sexual para os jovens, é indispensável criar um vínculo entre os territórios de saúde e os espaços que os adolescentes mais frequentam, especialmente o ambiente escolar. Deve-se reforçar ainda mais a importância das ações de educação em saúde e educação reprodutiva sexual, inclusive dentro das escolas, e, de preferência, em conjunto com as equipes de saúde, pois apesar de os adolescentes possuírem certo acesso à métodos contraceptivos, ainda carecem de conhecimento do seu próprio corpo e de informações de qualidade e confiáveis. Além disso, é preciso desenvolver ações de saúde direcionadas aos adolescentes e jovens que foquem na autonomia, autocuidado e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis.

O impacto do trabalho é considerável, pois mostra a realidade e perspectivas das adolescentes da cidade de Mossoró, primeiro passo para desenvolver projetos e ações de saúde voltados para este público. Por fim, deve-se reconhecer a amostra limitada do estudo, necessitando de estudos posteriores para reforçar ou contestar as informações encontradas na pesquisa.

REFERÊNCIAS

- ALBUQUERQUE, A. P. D. S. *et al.* Prevalência da gravidez de repetição rápida e fatores associados em adolescentes de Caruaru, Pernambuco. **Revista Brasileira de Saúde Materna e Infantil**, Recife, v. 17, n. 2, p. 347-354, 2017.
- AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS; COMMITTEE ON ADOLESCENCE. Contraception for Adolescents. **Pediatrics**, Itasca, v. 134, n. 4, 2014.
- BARALDI, A. C. P. *et al.* Adolescent pregnancy: a comparative study between mothers who use public and private health systems. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 15, n. spe, p. 799-805, 2007.
- BARREIROS, F. A.; GUAZZELLI, C. A. F.; MORON, A. F. Conhecimento básico de adolescentes escolarizados sobre métodos anticoncepcionais. **Adolescente e Saúde**, v. 2, n. 1, p. 11-16, 2005.
- BELO, M. A. V.; SILVA, J. L. P. E. Conhecimento, atitude e prática sobre métodos anticoncepcionais entre adolescentes gestantes. **Revista Saúde Pública**, São Paulo, v. 38, n. 4, p. 479-487, agosto 2004.

- BERLOFI, L. M. *et al.* Prevenção da reincidência de gravidez em adolescentes: efeitos de um Programa de Planejamento Familiar. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 19, n. 2, p. 196-200, junho 2006.
- BITZER, J. *et al.* Targeting factors for change: contraceptive counselling and care of female adolescents. **The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care**, v. 21, n. 6, p. 417-430, dezembro 2016.
- BRANDÃO, E. R. Desafios da contracepção juvenil: interseções entre gênero, sexualidade e saúde. **Ciência & saúde coletiva**, v. 14, n. 4, p. 1063-1071, 2009.
- BRASIL. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 16 jul. 1990.
- BRASIL. Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996. Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 15 jan. 1996.
- BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Saúde sexual e saúde reprodutiva**. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.
- CADETE, M. M. M.; BOEMER, M. R. **Adolescência ao processo de adolecer (tese)**. São Paulo: Escola de Enfermagem USP, 1994.
- CANO, M. A. T.; FERRIANI, M. D. G. C.; GOMES, R. Sexualidade na adolescência: um estudo bibliográfico. **Revista Latinoam Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 8, n. 2, p. 18-24, 2000.
- CHIAVEGATTO FILHO, A. D.; KAWACHI, I. Income inequality is associated with adolescent fertility in Brazil: a longitudinal multilevel analysis of 5,565 municipalities. **BMC Public Health**, Londres, v. 15, n. 1, p. 103-, 2015.
- CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. **Código de ética médica**: resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 2010.
- DUARTE, H. H. S. *et al.* Utilização de métodos contraceptivos por adolescentes do sexo feminino da Comunidade Restinga e Extremo Sul. **Revista Paulista de Pediatria**, São Paulo, v. 29, n. 4, p. 572–576, 2011.
- FEBRASGO. Contracepção reversível de longa ação. **Série Orientações e Recomendações FEBRASGO**, v. 3, n. 1, 2016.
- FEBRASGO; SBP. Contracepção e ética: diretrizes atuais durante a adolescência. **Adolescente e Saúde**, v. 2, n. 2, p. 6-7, 2005.
- FERREIRA, C. L. *et al.* Repetição de gravidez na adolescência: estudos sobre a prática contraceptiva em adolescentes. **Estudos e Pesquisas em Psicologia**, v. 12, n. 1, p. 188-204, 2012.
- KEARNEY, M. S.; LEVINE, P. B. Income inequality and early nonmarital childbearing. **Journal of Human Resources**, Madison, v. 49, n. 1, p. 1-31, 2014.
- LEWIS, L. N. *et al.* Predictors of sexual intercourse and rapid-repeat pregnancy among teenage mothers: an Australian prospective longitudinal study. **Medical Journal of Australia**, v. 193, n. 6, p. 338–342, 2010.
- LINS, L. C. S.; PEREIRA, E. M. D.; LIRA, I. V. D. Como anda a educação sexual dos jovens. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 41, n. 2, p. 123-131, 1988.
- MACHADO, R. B. Anticoncepção para adolescentes. **Série Orientações e recomendações FEBRASGO**, São Paulo, n. 9, p. 1-28, 2017.
- MACHADO, R. B. **Uso de dispositivos intrauterinos (DIU) em nulíparas**. FEBRASGO. São Paulo, p. 13. 2018.
- MANFREDO, V. A.; CANO, M. A. T.; SANTOS, B. M. D. O. Reincidência de gravidez em adolescentes: retrato de uma realidade. **Revista de Atenção Primária a Saúde**, v. 2, p. 15, 2012.
- MARANHÃO, T. A. *et al.* Repercussão da iniciação sexual na vida sexual e reprodutiva de jovens de capital do Nordeste brasileiro. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, n. 12, p. 4083-4094, 2017.
- NAÇÕES UNIDAS. **Relatório da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento**. Cairo. 1994.
- NETO, F. R. G. X. *et al.* Gravidez na adolescência: motivos e percepções de adolescentes. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 60, n. 3, p. 279-285, 2007.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **IV Conferência mundial sobre a mulher**. Plataforma de ação. Pequim: ONU, 1995.

- PARAGUASSÚ, A. L. C. B. *et al.* Situação sociodemográfica e de saúde reprodutiva pré e pós-gestacional de adolescentes, Feira de Santana, Bahia, Brasil. **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, p. 373-380, 2005.
- PATIAS, N. D.; DIAS, A. C. G. Sexarca, informação e uso de métodos contraceptivos: comparação entre adolescentes. **Psico-USF**, Itatiba, v. 19, n. 1, p. 13-22, 2014.
- PINHEIRO, Y. T.; PEREIRA, N. H.; FREITAS, G. D. D. M. Fatores associados à gravidez em adolescentes de um município do nordeste do Brasil. **Caderno de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 27, n. 4, p. 363-367, 2019.
- RAMOS, L. O. Anticoncepção na adolescência. In: HALBE, H. W. **Tratado de ginecologia**. São Paulo: Roca, 2000. p. 896-902.
- SPINDOLA, T.; SILVA, L. F. F. D. Perfil epidemiológico de adolescentes atendidas no pré-natal de um hospital universitário, v. 13, n. 1, p. 99-107, 2009. **Escola Anna Nery Revista de Enfermagem**, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, p. 99-107, 2009.
- TABORDA, J. A. *et al.* Consequências da gravidez na adolescência para as meninas considerando-se as diferenças socioeconômicas entre elas. **Caderno de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 1, p. 16-24, 2014.
- TEIXEIRA, A. M. F. B. *et al.* Adolescentes e uso de preservativos: as escolhas dos jovens de três capitais brasileiras na iniciação e na última relação sexual. **Caderno de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 7, p. 1385-1396, 2006.
- VAZ, R. F.; MONTEIRO, D. L. M.; RODRIGUES, N. C. P. Trends of teenage pregnancy in Brazil, 2000-2011. **Revista da Associação de Medicina Brasileira**, São Paulo, v. 62, n. 4, p. 330-335, 2016.
- VIVANCOS, R. *et al.* School-based sex education is associated with reduced risky sexual behaviour and sexually transmitted infections in young adults. **Public Health**, Liverpool, v. 127, n. 1, p. 53-57, 2013.

CAPÍTULO 11

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE MULHERES SOBRE DIABETES MELLITUS

Capítulo 11

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE MULHERES SOBRE DIABETES MELLITUS

EVALUATION OF THE KNOWLEDGE OF WOMEN ABOUT DIABETES MELLITUS

Diego da Silva Cariolano

Discente do Curso de Medicina da Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3742-7908>

E-mail: diegoscariolano@gmail.com

Antônio Carlos Salim Braide

Discente do Curso de Medicina da Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2520-6828>

E-mail: tbsalim@icloud.com

Alfredo Ramalho Pereira Neto

Discente do Curso de Medicina da Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6602-2005>

E-mail: alfredoramalho1@gmail.com

Rebecca Lima Silva

Discente do Curso de Medicina da Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8779-4488>

E-mail: rebeccalima_@hotmail.com

Mylena Andréa Oliveira Torres

Docente do curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5021-3130>

*Autor correspondente, e-mail: mylena.torres@hotmail.com

RESUMO

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica que exige cuidados contínuos e formas para o controle da glicemia e diminuição dos riscos multifatoriais de curto e longo prazo, e atinge mais de 382 milhões de pessoas em todo o mundo. Esta pesquisa objetivou avaliar o conhecimento de indivíduos do gênero feminino sobre o diabetes mellitus em uma comunidade no município de São Luís - MA. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, transversal e quantitativo. Foi realizado no período de janeiro de 2021 a setembro de 2021 e a pesquisa foi composta por uma amostra de 50 indivíduos do gênero feminino residentes no bairro Novo Angelim em São Luís - MA. Foram feitas entrevistas domiciliares com aplicação de uma ficha sobre os dados sociodemográficos e um questionário validado DKN-A que avaliará o conhecimento desses indivíduos sobre o diabetes *mellitus*. Observou-se que a faixa etária de 27 a 36 anos foi a de maior incidência, com 38% (n=19), seguida da de 17 a 26 anos com 26% (n=13) e a idade média foi de 34,08 anos (DP± 12,9). Quanto ao nível de escolaridade, 50% (n=25) possuem o ensino médio e 46% (n=23) o ensino superior. Em

relação ao estado civil, 52% (n=26) são solteiras e 34% (n=17) são casadas, e na variável ocupação 76% (n=38) trabalham. Em relação aos hábitos de vida, 76% (n=38) não fazem uso de medicamentos, 56% (n=28) praticam atividade física e dentre estas, 46% (n=26) praticam com duração entre 30 e 50 minutos. Em relação ao fumo, 100% (n=50) relataram que não são adeptas a prática. Quanto ao consumo de bebidas alcoólicas, 84% (n=42) não consomem e 80% (n=40) não apresentam outra patologia além da diabetes mellitus. No que se refere ao questionário validado DKN-A, a maioria das mulheres demonstraram conhecimento a respeito da doença. Portanto, observamos nessa pesquisa que a maioria das mulheres entrevistadas possuem conhecimento sobre a DM, demonstrado nas respostas apresentadas no questionário, sendo elas portadoras ou não de DM. Porém, vale ressaltar que uma parte do público alvo ainda detém um certo déficit de conhecimento dos conceitos mais básicos em relação a enfermidade.

Palavras-chave: Conhecimento; Diabetes mellitus; Educação em saúde.

ABSTRACT

Diabetes Mellitus is a chronic disease that requires continuous care and ways to control blood glucose and reduce short and long-term multifactorial risks, and affects more than 382 million people worldwide. This research aimed to assess the knowledge of female individuals about diabetes mellitus in a community in the city of São Luís - MA. This is a descriptive, cross-sectional and quantitative epidemiological study. It was carried out from January 2021 to September 2021 and the research consisted of a sample of 50 female individuals living in the Novo Angelim neighborhood in São Luís - MA. Household interviews were conducted with application of a form on sociodemographic data and a validated DKN-A questionnaire that will assess these individuals' knowledge about diabetes mellitus. It was observed that the age group from 27 to 36 years old had the highest incidence, with 38% (n=19), followed by 17 to 26 years old with 26% (n=13) and the average age was 34, 08 years (SD± 12.9). As for the level of education, 50% (n=25) have completed secondary education and 46% (n=23) have completed higher education. Regarding marital status, 52% (n=26) are single and 34% (n=17) are married, and in the variable occupation 76% (n=38) work. Regarding lifestyle, 76% (n=38) do not use medication, 56% (n=28) practice physical activity and among these, 46% (n=26) practice it lasting between 30 and 50 minutes. Regarding smoking, 100% (n=50) reported that they are not adept at the practice. As for the consumption of alcoholic beverages, 84% (n=42) do not consume it and 80% (n=40) do not have any other pathology besides diabetes mellitus. With regard to the validated DKN-A questionnaire, most women demonstrated knowledge about the disease. Therefore, we observed in this research that most of the women interviewed have knowledge about DM, demonstrated in the answers given in the questionnaire, whether they have DM or not. However, it is noteworthy that a part of the target audience still has a certain deficit of knowledge of the most basic concepts in relation to the disease.

Keywords: Knowledge; Diabetes mellitus; Health education.

INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica que exige cuidados contínuos e formas para o controle da glicemia e diminuição dos riscos multifatoriais de curto e longo prazo. Segundo a Federação Internacional do Diabetes (IDF), o DM atinge mais de 382 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo 90% destas próprias do tipo 2 (DM2). A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) sobre a

prevalência de análise médica de diabetes em adultos efetivada em 2013 aferiu que cerca de 9 milhões de pessoas são portadores dessa doença no Brasil, sendo 3,5 milhões delas com idade igual ou superior a 65 anos (MACÊDO *et al.*, 2017).

A diminuição ou a eliminação da insulina causa hiperglicemia, poliúria e alterações metabólicas que dão, como efeito, a redução do peso corporal. Em minúcia, tecidos sensíveis à insulina, como não conseguem usar a glicose, passam a metabolizar sobretudo gorduras em vez de carboidratos, carreando quadros graves de cetoacidose diabética com indigência de internação hospitalar. Como a insulina é um hormônio anabólico, sua carência beneficia quadros catabólicos como lipólise, proteólise e glicogenólise. A diminuição de peso causada por esse processo pode vir acompanhada de desidratação, náuseas, êmese, além de complicações microvasculares devido ao diabetes e o risco de morte. A omissão da dose de insulina, por si só, pode ocasionar o advento precoce (quatro anos ou menos de doença) de complicações crônicas como a retinopatia, neuropatia e nefropatia (RIBEIRO *et al.*, 2021).

Estudos epidemiológicos de base populacional podem cooperar com o programa e gestão do campo, ao abastecerem dados representativos sobre fatos pertinentes à saúde. As estimações cooperam para consignar a dimensão dos problemas, permitindo fornecimento realístico de insumos. Por sua vez, a consignação dos fatores adjuntos às doenças tolera a identificação de grupos populacionais mais vulneráveis dar subsídio a preparação de artifícios e atuações voltadas a minimizar suas implicações (DIAS-DA-COSTA *et al.*, 2015).

Estudos como este são de total relevância para a população geral e comunidade científica que tem este dever para com os seus conhecimentos e para com a sociedade já que toda e qualquer formação tem o objetivo de fazer com que bem comum seja alcançado. Falar de diabetes não é um paradigma, e sim uma necessidade que tem muitas vezes custado vidas que poderiam ser salvas com atitudes de atenção básica, onde os primeiros cuidados em saúde deve-se a educação e informação.

Este estudo buscou avaliar o conhecimento das mulheres sobre o Diabetes *Mellitus* em uma comunidade no município de São Luís - MA.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, transversal e quantitativo. Foi realizado no período de janeiro de 2021 a setembro de 2021 e foi composta por uma amostra de 50 indivíduos do sexo feminino residentes no bairro Novo Angelim em São Luís - MA. Os critérios de inclusão foram mulheres que residiam no município e eram pacientes do Posto de Saúde do bairro Novo Angelim, que tinham idade entre 18 a 80 anos e que se disponibilizem a responder o questionário da pesquisa

e assinassem o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). Como critérios de exclusão foram mulheres que apresentarem problemas de origem neurológica e cognitiva que poderiam interferir nas informações prestadas para o estudo.

Inicialmente as participantes serão esclarecidas sobre o teor da pesquisa e aquelas que aceitaram participar assinaram o TCLE. Posteriormente, a coleta de dados realizada no Posto de Saúde com os indivíduos que buscavam atendimento médico e que atendiam aos critérios da pesquisa, mediante o questionário validado DKN-A (Diabetes Knowledge Questionnaire) que contém perguntas acerca do conhecimento e da atitude sobre o Diabetes mellitus.

Foi utilizada a versão portuguesa do questionário DKN-A, sendo o mesmo um questionário autoaplicável constando de 15 itens de resposta de múltipla escolha acerca de diferentes aspectos relacionados ao conhecimento geral de diabetes. Apresenta cinco amplas categorias: fisiologia básica, incluindo a ação da insulina; hipoglicemia; grupos de alimentos e suas substituições; gerenciamento do diabetes na intercorrência de alguma outra doença, e ainda princípios gerais dos cuidados da doença.

A escala de medida utilizada é de 0 - 15. É atribuído escore um (1) para resposta correta e zero (0) para incorreta. Os itens de 1 a 12 requerem uma única resposta correta. Para os itens de 13 a 15 duas respostas são corretas e todas devem ser conferidas para obter o escore um (1). Um escore maior que oito indica conhecimento acerca de diabetes mellitus e com um escore abaixo de oito significa conhecimento insatisfatório. Para a coleta de dados sócio demográficos será utilizada uma ficha de autoria do pesquisador contendo perguntas relacionadas a idade, estado civil, escolaridade e ocupação.

Este estudo foi baseado na resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde que regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos. Foram garantidos a possibilidade de não participação na pesquisa ou desistência, a privacidade, confiabilidade e o anonimato dos participantes.

Esta pesquisa foi iniciada após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade CEUMA – UNICEUMA, sob parecer consubstanciado nº 4.520.864.

Os dados obtidos foram tabulados e analisados em uma planilha eletrônica no Excel. As variáveis qualitativas foram apresentadas por meio de frequências absolutas e relativas. Os dados coletados foram analisados através do programa estatístico SPSS 20.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra do estudo foi composta de 50 indivíduos do gênero feminino. A tabela 1 reporta os dados referentes ao perfil sociodemográfico das mulheres entrevistadas. Observou-se que a faixa

etária de 27 a 36 anos foi a de maior incidência, com 38% (n=19), seguida da de 17 a 26 anos com 26% (n=13) e a idade média foi de 34,08 anos (DP $\pm$ 12,9). Quanto ao nível de escolaridade, 50% (n=25) possuem o ensino médio e 46% (n=23) o ensino superior. Em relação ao estado civil, 52% (n=26) são solteiras e 34% (n=17) são casadas, e na variável ocupação 76% (n=38) trabalham.

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica das mulheres participantes da pesquisa, São Luís - Ma, 2021.

Variáveis	N	%
Idade		
17-26 anos	13	26
27-36 anos	19	38
37-46 anos	12	24
47-56 anos	2	4
57-66 anos	3	6
67-78 anos	1	2
Escolaridade		
Ensino fundamental	2	4
Ensino médio	25	50
Ensino superior	23	46
Estado civil		
Casada	17	34
Divorciada	3	6
Solteira	26	52
Viúva	3	6
Outra	1	2
Ocupação		
Aposentada	2	4
Do lar	3	6
Trabalha	38	76
Outra	7	14

Fonte: Dados do autor (2021).

Dias da Costa *et al.* (2020), observaram em sua pesquisa que 24,5% das mulheres entrevistadas tinham entre 40 e 49 anos, 18% apresentavam ensino fundamental e 63,8 % eram casada ou estavam em união estável, dados esses que divergem com os encontrados nesta pesquisa, onde 38% das mulheres apresentaram faixa etária de 27 a 36 anos, 50% das possuem ensino médio e 52% estão solteiras. Quanto a ocupação 76% das mulheres trabalham, o que corrobora com os resultados de Dias da Costa *et al.* (2020), onde 56,1% das mulheres trabalhavam.

Em pesquisa realizada por Sousa *et al.* (2015), no que se refere ao estado civil, 53,0% das mulheres eram casadas e 88,0% trabalham, dados que são semelhantes à nossa pesquisa somente na ocupação.

A tabela 2 apresenta as variáveis sobre os hábitos de vida das mulheres entrevistadas. Observamos que 76% (n=38) não fazem uso de medicamentos, 56% (n=28) praticam atividade física e dentre estas, 46% (n=26) praticam com duração entre 30 e 50 minutos. Em relação ao fumo, 100% (n=50) relataram que não são adeptas a prática. Quanto ao consumo de bebidas alcoólicas, 84% (n=42) não consomem e 80% (n=40) não apresentam outra patologia além da diabetes mellitus.

Tabela 2. Variáveis dos hábitos de vida das mulheres participantes da pesquisa, São Luís - Ma, 2021.

Variáveis	N	%
Faz uso de algum medicamento		
Sim	12	24
Não	38	76
Pratica atividade física		
Sim	28	56
Não	22	44
Duração diária da atividade física		
Menos de 30 minutos	5	10
Entre 30 e 50 minutos	23	46
Fuma		
Sim	-	-
Não	50	100
Consome bebida alcoólica		
Sim	8	16
Não	42	84
Possui outra patologia que não seja DM		
Sim	10	20
Não	40	80

Fonte: Dados do autor (2021).

Dias da Costa *et al.* (2020), verificaram os hábitos de vida e relataram que 18,5% das mulheres eram fumantes, 97,0% não fazem uso excessivo de álcool e 85,6% não foram classificadas como fisicamente ativas no lazer. Resultados que divergem dessa pesquisa quanto ao fumo, pois 100% não fazem uso e quanto as práticas de atividades físicas, onde 56% praticam atividades físicas. Quanto a não fazerem uso excessivo de álcool, os dados estão semelhantes aos nossos, pois 84% disseram não consumir álcool. Em estudo feito por Flor e Campos (2017), o hábito de fumar não apresentou relevância, o que corrobora com este estudo, em que todas as mulheres entrevistadas não fumam.

Mayer-Davis *et al.* (1998), relataram em sua pesquisa que a ocorrência de diabetes tem sido associada ao sedentarismo, independentemente da condição nutricional e que a prática regular de exercícios físicos pode prevenir e controlar a diabetes, pois a manutenção ou diminuição do peso corporal, diminui a resistência à insulina, melhora do controle glicêmico e pode reduzir o risco das complicações associada a esse agravo. Flor e Campos (2017) relataram na sua pesquisa que os

indivíduos obesos e sedentários foram, duas vezes mais acometidos pelo DM quando comparados com aqueles que não apresentavam tais características.

Em relação se o diabetes está associado a outras patologias, como hipertensão arterial e dislipidemias, os achados estão de acordo com os achados de Flor e Campos (2017).

A tabela 3 se refere ao questionário validado DKN-A (Diabetes Knowledge Questionnaire) que contém perguntas acerca do conhecimento e da atitude sobre o Diabetes mellitus, sendo que 80% (n=40) responderam corretamente que o açúcar é alto no diabetes sem controle. Quanto ao quesito das afirmativas verdadeiras, 82% (n=41) afirmaram que o controle mal feito da diabetes pode ressaltar numa chance maior de complicações mais tarde. Em relação a faixa de variação normal de glicose no sangue, 72% (n=36) marcaram a alternativa correta que é 70-110mg/dl.

Quanto ao principal componente da manteiga, 86% (n=43) estavam certas quando responderam que é gordura. Em relação ao principal composto do arroz, 90% (n=45) responderam corretamente que é carboidrato. No que se refere a presença de cetona na urina, 46% (n=23) disseram que é um mal sinal, certamente, o que se justifica pois na ausência da glicose que precisa ser degradada e usada como combustível para a célula, a gordura estará sendo degradada, o que resultará na presença de cetona na urina.

Tabela 3. Diabetes Knowledge Questionnaire (DKN-A) parte I, São Luís – Ma, 2021.

Variáveis	N	%
No diabetes sem controle, o açúcar no sangue é?		
Normal	6	12
Alto	40	80
Baixo	2	4
Não sei	2	4
Qual das afirmações é verdadeira?		
O controle mal feito da diabetes pode resultar numa chance maior de complicações mais tarde	41	82
É melhor apresentar um pouco de açúcar na urina para evitar a hipoglicemia	3	6
Não importa se sua diabetes não está sob controle desde que você não entre em coma	1	2
Não sei	5	10
A faixa de variação normal de glicose no sangue é de?		
50-200mg/dl	3	6
70-110mg/dl	36	72
70-140mg/dl	3	6
Não sei	8	16
A manteiga é composta principalmente de?		
Gordura	43	86
Minerais e vitaminas	2	4
Carboidratos	2	4
Proteínas	1	2

Não sei	2	4
O arroz é composto principalmente de?		
Carboidratos	45	90
Proteínas	2	4
Minerais e vitaminas	1	2
Não sei	2	4
A presença de cetona na urina é?		
Encontrado normalmente em quem tem diabetes	9	18
Um mal sinal	23	46
Não sei	18	36

Fonte: Dados do autor (2021).

Em pesquisas desenvolvidas por Oliveira e Zanetti (2011), encontraram resultados insatisfatórios em relação ao conhecimento sobre os grupos de alimentos do questionário DKN-A (Diabetes Knowledge Questionnaire), o que difere dos resultados da nossa pesquisa, onde a maioria das mulheres demonstraram conhecimento nesse quesito. Rodrigues (2011) obteve resultado de conhecimento insatisfatório quanto ao conhecimento do DKN-A (Diabetes Knowledge Questionnaire), pois 66,67% não responderam as questões corretas.

A tabela 4 reporta a continuidade do questionário validado DKN-A (Diabetes Knowledge Questionnaire).

Tabela 4. Diabetes Knowledge Questionnaire (DKN-A) parte II, São Luís – Ma, 2021.

Variáveis	N	%
Quais das possíveis complicações abaixo não estão geralmente associadas a diabetes?		
Alterações nos pulmões	36	72
Alterações visuais	10	20
Alterações nos rins	2	4
Não sei	2	4
Se uma pessoa que está tomando insulina apresenta uma taxa alta de açúcar no sangue ou na urina, assim como presença de cetonas, ela deve?		
Manter a mesma quantidade de insulina e a mesma dieta, e fazer um exame de sangue e de urina mais tarde	15	30
Aumentar a insulina	15	30
Diminuir a insulina	11	22
Não sei	9	18
Se uma pessoa com diabetes está tomando insulina e fica doente ou não consegue comer a dieta receitada, o que deve ser feito?		
Ela deve usar hipoglicemiantes oral para diabetes em vez de insulina	7	14
Ela deve continuar a tomar insulina	27	54
Ela deve parar de tomar insulina imediatamente	8	16
Não sei	8	16
Se você sente que a hipoglicemia está começando a aumentar você deve?		
Comer ou beber algo doce imediatamente	32	64
Tomar insulina ou hipoglicemiantes oral imediatamente	9	18
Deitar-se e descansar imediatamente	2	4

Não sei	7	14
Você pode comer o quanto quiser dos seguintes alimentos:		
Alface e agrião	42	84
Maçã	3	6
Não sei	5	10
A hipoglicemia é causada por?		
Excesso de insulina	11	22
Pouca quantidade de insulina	29	58
Pouco exercício	9	18
Não sei	1	2
Um quilo é?		
Uma unidade de peso, pouco mais que duas gramas	5	10
Uma unidade de peso	3	6
Uma unidade de peso igual a 1000 gramas	29	58
Igual a 1000 gramas, uma unidade de energia	1	2
Igual a 1000 gramas	6	12
Igual a 1000 gramas, um pouco mais que duas gramas	5	10
Não sei	1	2
Duas das seguintes substituições estão corretas:		
Um pão francês é igual a quatro biscoitos de água e sal; um ovo é igual a uma porção de carne moída	23	46
Um pão francês é igual a quatro biscoitos de água e sal	2	4
Um copo de leite é igual a um copo de suco de laranja	2	4
Um ovo é igual a uma porção de carne moída; uma sopa de macarrão é igual uma sopa de legumes	2	4
Um pão francês é igual a quatro biscoitos de água e sal; um copo de leite é igual um copo de suco de laranja	9	18
Não sei	12	24
E se eu não estiver com vontade de comer o pão francês permitido na minha dieta para o café da manhã, eu posso:		
Comer quatro biscoitos de água e sal; trocar por dois pães de queijo médios	11	22
Comer uma fatia de queijo	1	2
Comer quatro biscoitos de água e sal	21	42
Comer quatro biscoitos de água e sal; comer uma fatia de queijo	7	14
Uma sopa de macarrão é igual uma sopa de legumes	1	2
Comer quatro biscoitos de água e sal; deixa pra lá	1	2
Não sei	8	16

Fonte: Dados do autor (2021).

No que se refere as possíveis complicações que não estão geralmente associadas a diabetes, 72% (n=36) responderam corretamente que eram alterações nos pulmões, Já no quesito se uma pessoa que está tomando insulina e apresenta uma taxa alta de açúcar no sangue ou na urina, assim como presença de cetonas, o que ela deve fazer, 30% (n=15) responderam de forma equivocada que deve manter a mesma quantidade de insulina e a mesma dieta, e fazer um exame de sangue e de urina mais tarde, e 30% (n=15) responderam que devem aumentar a insulina, o que seria a resposta certa. Ao contrário do presente trabalho, um estudo de Ribeirão preto mostrou o uso de apenas insulina em 8,7% do público, o que demonstra falta de conhecimento sobre a doença do grupo pesquisado (FARIA, 2088). Na questão se uma pessoa com diabetes está tomando insulina e fica doente ou não consegue

comer a dieta receitada, 54% (n=27) responderam que devem continuar a tomar insulina, que é a conduta a ser tomada.

Quando questionadas se percebem que o estado hiperglicêmico está se iniciando e qual a conduta a ser tomada, 64% (n=32) marcaram a resposta correta, que devem comer ou beber algo doce imediatamente. No que se refere sobre a quantidade dos alimentos que podem comer à vontade, 84% (n=42) marcaram alface e agrião, alimentos que realmente auxiliam no controle do açúcar no sangue. Quando questionadas qual é a causa da hipoglicemia, 58% (n=29) relataram que é por baixa quantidade de insulina, discordando da resposta correta que é o excesso de insulina. Um estudo sobre Diabetes na América Latina mostrou que 78% das pessoas com DM apresenta controle glicêmico inadequado, caracterizado por glicemia venosa de jejum maior que 110mg/dl (LUTOFO, 2013). Na questão o que é um quilo, 58% (n=29) acertaram ser uma unidade de peso igual a 1000 gramas. Dentre as substituições ofertadas, 46% (n=23) escolheram a opção correta que é um pão francês é igual a quatro biscoitos de água e sal e um ovo é igual a uma porção de carne moída. Em relação a questão se eu não estiver com vontade de comer o pão francês permitido na minha dieta para o café da manhã, eu posso substituir por outro alimento, 42% (n=21) disseram que comeriam quatro biscoitos de água e sal, sendo essa a assertiva correta. Diante do exposto constata-se que os nossos achados estão de acordo com os estudos nacionais e internacionais sobre o conhecimento do paciente quanto ao manejo da doença (ADA, 2011).

CONCLUSÃO

Tendo em vista os aspectos observados, é possível afirmar que, a maioria das mulheres entrevistadas possuem conhecimento sobre a DM, demonstrado nas respostas apresentadas no questionário, o que evidencia o bom conhecimento das mulheres sobre a doença, sendo elas portadoras ou não de DM, vale ainda ressaltar que boa parte do público alvo ainda detém um certo déficit de conhecimento dos conceitos mais básicos em relação a enfermidade.

Mostra-se essencial por parte do poder público, principalmente na atenção básica de saúde prestada pelas unidades básicas de saúde implementar e fortalecer a oferta de informação através de folhetos, palestras e até mensagens via aplicativo de WhatsApp para reforçar o conhecimento sobre o diabetes mellitus de forma a ajudar na prevenção e tratamento da mesma, o que evitaria até mesmo a ida sem necessidade do indivíduo a unidade de saúde.

REFERÊNCIAS

- ADA, American Diabetes Association. **Diagnóstico e Classificação de Diabetes Mellitus Diabetes Care**, janeiro; v. 34, Suplemento 1, p. S62 - S69, 2011.
- DIAS-DA-COSTA, J. S. *et al.* Prevalência de diabetes mellitus autorreferido em mulheres e fatores associados: estudo de base populacional em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, 2015. **Epidemiologia e Serviços de Saúde [online]**, v. 29, n. 2, e2019407, 2020.
- FARIA, B. N. *et al.* Efeitos da adição de monensina ou propilenoglicol à polpa cítrica na degradabilidade dos carboidratos totais e na produção cumulativa de gases in vitro. **Arquivos Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 60, n. 3, p. 691-697, 2008.
- FLOR, Luisa Sorio; CAMPOS, Monica Rodrigues. Prevalência de diabetes *mellitus* e fatores associados na população adulta brasileira: evidências de um inquérito de base populacional. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 20, n. 1, p. 16-29, 2017.
- LOTUFO, Paulo Andrade. Construção do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil). **Revista de Saúde Pública [online]**, v. 47, n. Suppl 2, p. 3-9., 2013.
- MACÊDO, E. M. P. *et al.* Efeito de sessão aguda de Pilates no solo e na água sobre a glicemia de mulheres portadoras de diabetes tipo 2. **Fisioterapia Brasil**, v. 18, n. 1, p. 47-55, 2017.
- MAYER-DAVIS, E. J. *et al.* Intensity and amount of physical activity in relation to insulin sensitivity: the Insulin Resistance Atherosclerosis Study. **Jama**, v. 279, n. 9, p. 669-74, 1998.
- OLIVEIRA, K. C. S.; ZANETTI, M. L. Conhecimento e atitude de usuários com diabetes mellitus em um Serviço de Atenção Básica à Saúde. **Revista da Escola de Enfermagem USP**, v. 45, n. 4, p. 862-8, 201.
- RIBEIRO, L. B. *et al.* A relação entre a mulher com diabetes e o seu corpo: o risco da diabulimia. **Escola Anna Nery [online]**, v. 25, n. 4, e20200270, 202.
- RODRIGUES, Flávia Fernanda Luchetti. **Conhecimento e atitudes de usuários com diabetes mellitus em uma Unidade Básica Distrital de Saúde de Ribeirão Preto São Paulo**. Dissertação. Mestrado em Enfermagem Fundamental, 2011.
- SOUSA, M. R. *et al.* Questionário dos Conhecimentos da Diabetes (QCD): propriedades psicométricas. **Revista Portuguesa de Saúde Pública**, v. 33, n. 1, p. 33-41, 2015.

Índice Remissivo

Aborto 71, 75 e 113
Antropozoonose 3, 30 e 37
Atividade física 95, 128, 128 e 129
Barbeiro 43 e 44
Calazar 16
Coinfecção 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 54, 57 e 59
Contraceptivo 109, 110, 111, 112, 115, 117, 118, 119, 120, 121 e 122
Déficit de equilíbrio 99, 100 e 103
Diabetes 86, 81, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 106, 107, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133 e 134
Doença de Chagas 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50
Doença tropical 4 e 43
Dor 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 90 e 93
Envelhecimento 83, 84, 85, 90, 91, 94 e 96
Equilíbrio 98, 99, 10, 101, 102, 103, 104, 106 e 107
Escolaridade 3, 5, 8, 10, 14, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 43, 45, 46, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 87, 88, 93, 113, 114, 124, 127 e 128
Gestante 49, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 113, 115, 116, 118, 119 e 120
Gravidez 67, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 120, 121 e 122
HIV 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 40, 54, 57, 59, 67, e 68
Idoso 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106 e 107
Incidência 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 37, 39, 54, 57, 63, 67, 68, 76, 87, 99, 112, 115, 123, 124 e 127
Índice de incapacidade 71 e 77
Índice de qualidade do sono 83, 84, 85, 90, 94 e 96
Infecção 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 30, 39, 44, 48, 49, 50, 54, 57, 59, 63 e 67
Leishmania 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 26
Leishmaniose tegumentar 9, 10 e 11
Leishmaniose visceral 4, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26
Lesões cutâneas 4 e 62
Letalidade 15, 29, 30, 34 e 38
Lombalgia 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 107
Lyssavirus 30
Maranhão 2, 4, 5, 10, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 64, 68, 85 e 101
Mycobacterium 53 e 54
Negligenciada 3, 5, 10, 15, 43, 44 e 45
Parasita 3, 10, 16 e 44
Pele 4, 10 e 34
Políticas públicas 31, 54, 96 e 120
Pré-natal 62, 63, 68, 73, 75, 78, 80, 110, 112, 113 e 122
Prevalência 34, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 57, 58, 62, 68, 71, 75, 78, 79, 80, 87, 91, 94, 99, 120, 125 e 134
Protozoário 3, 4, 16, 43 e 44
Queda 14, 20, 25, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106 e 107
Raiva 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39 e 40
Rio Grande do Norte 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 110 e 112
Saliva 30
Saúde pública 3, 4, 14, 16, 25, 29, 31, 39, 40, 43, 45, 49, 50, 54, 62, 66, 67, 79, 84, 89, 96, 107, 120, 122 e 134
Sexual 62, 63, 67, 68, 74, 79, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 121 e 122
Sociodemográfica 5, 29, 33, 46, 56, 84, 86, 93, 96, 122 e 128
Sono 82, 83, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95 e 96
Tabagismo 53, 54, 55, 56, 57, 58, 88, 89 e 96
Teste de Tinetti 99, 101, 102, 104, 105 e 107
Treponema 62 e 63
Tuberculose 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59
Vetor 4, 8, 16, 23, 25, 433 e 48
Viral 29
Zoonose 3, 4, 16, 29, 30, 32 e 37