SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA

ADRIANA SOUSA REGO
ANDRESSA FERNANDA DOS SANTOS MELO OLIVEIRA
LEOBRUNO REVEL TORRES FERREIRA
(ORGANIZADORES)

SAÚDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA

ADRIANA SOUSA REGO
ANDRESSA FERNANDA DOS SANTOS MELO OLIVEIRA
LEOBRUNO REVEL TORRES FERREIRA
(ORGANIZADORES)

2021 by Luminus Editora
Copyright do texto © Autores
Revisão – Corpo Editorial

Editora chefe

Profa. Dra. Mylena Andréa Oliveira Torres

Editor Adjunto

Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo

Diagramadora

Bruna Torres Alves

Esta obra está licenciada com uma
Licença Creative Commons.

Atribuição-Não Comercial-Sem
Derivações 4.0 Internacional.

DOI: <https://doi.org/10.29327/554846>

Equipe Editorial Ciências Biológicas e da Saúde

Dra. Adriana Sousa Rego

Dr. Adriano Filipe Barreto Grangeiro

Dr. Fabio Raphael Pascoti Bruhn

Dra. Mylena Andréa Oliveira Torres

Me. Raul Franklim de Carvalho Almeida

Me. Tatiana Cristina Fonseca Soares de Santana

Dr. Tayron Sousa Amaral

Me. Yuri Nascimento Fróes

Luminus Editora

São Luís – Maranhão – Brasil

Telefone: +55 (98) 984138480

www.luminuseditora.com

contato@luminuseditora.com

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Índices para catálogo sistemático:

Saúde mental e qualidade de vida [livro
eletrônico] / Adriana Sousa Rego, Andressa
Fernanda dos Santos Melo Oliveira, Leobruno Revil
Torres Ferreira (organizadores). -- São Luís, MA :
Luminus Editora, 2021.

PDF

Vários autores.

Bibliografia.

ISBN 978-65-89948-05-6

1. Ansiedade 2. Ansiedade em crianças 3. Burnout
(Psicologia) 4. Coronavírus (COVID-19) - Pandemia
5. Gravidez - Abuso de drogas 6. Psicopatias
7. Qualidade de vida 8. Saúde mental 9. Transtorno do
déficit de atenção com hiperatividade 10. Transtornos
do espectro autista I. Rego, Adriana Sousa.
II. Oliveira, Andressa Fernanda dos Santos Melo.
III. Ferreira, Leobruno Revil Torres.

21-95863

CDD-616.89

Índices para catálogo sistemático

1. Saúde mental : Qualidade de vida: Ciências médicas 616.89

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/ 9427

APRESENTAÇÃO

A Saúde Mental está diretamente relacionada ao bem-estar físico e psicológico do indivíduo, guardando relação da forma como cada pessoa analisa e interpreta as variáveis sociais que o circundam. Então, saber lidar com emoções agradáveis e desagradáveis, reagir e ter harmonia a eles não é uma tarefa fácil. São fatores que impactam diretamente na qualidade de vida psicológica de cada cidadão contemporâneo. É normal o ser humano possuir ambições, ideias e planos para o futuro, mas as frustrações e as dificuldades no percurso de cada aprovação requerem um equilíbrio mental consolidado.

A obra “Saúde mental e qualidade de vida”, busca contemplar as principais patologias psicológicas que impactam na saúde mental das pessoas, correlacionando as questões sociais comuns em tempos de pandemia e instabilidade global. Com isso, temas que outrora seriam pouco abordados, na atualidade se faz necessário como: “Os transtornos do Déficit de atenção com hiperatividade em mulheres” perpassando por questões que impactam na vivência social das pessoas, “Avaliação do nível de consciência e a Percepção emocional de pacientes com covid-19” e chegando a temas mais corriqueiros, mas não menos importantes, como “Traumas na infância” e o “Abuso de drogas na gestação”.

Agradecemos aos autores, pesquisadores, revisores e a equipe da Luminus Editora, que contribuíram para a concretização dessa obra. Convidamos aos Leitores para deleitar-se do presente livro e que o conhecimento gerado aqui possa agregar na formação acadêmica e pessoal do leitor. Desejamos um excelente aprendizado a todos!

Os organizadores.

OS ORGANIZADORES

Adriana Sousa Rego

Possui graduação em Fisioterapia pela Universidade de Fortaleza (1991), mestrado em Saúde Materno Infantil pela Universidade Federal do Maranhão (2006) e doutorado em SAÚDE COLETIVA pela Universidade Federal do Maranhão (2014). Atualmente é professor titular, membro do comitê de autoavaliação da Universidade Ceuma e do núcleo docente estruturante da Universidade Ceuma. É Coordenadora do Mestrado de Saúde e Meio-Ambiente da Universidade Ceuma.

Andressa Fernanda dos Santos Melo Oliveira

Atualmente é acadêmica de medicina da Universidade Uniceuma, em São Luís- MA, ocupa cargo de vice-presidente na Liga Acadêmica de Psiquiatria do Maranhão (LAPMA) e é membra efetiva da Liga Acadêmica de Atenção Primária e Educação em Saúde (LAAPES) e da Liga Acadêmica Maranhense de Clínica Cirúrgica (LAMACC).

Leobruno Revil Torres Ferreira

Possui graduação em Administração de Empresas pela UNDB (2013). Atualmente acadêmico de medicina da Universidade Ceuma (2019-2024). Possui MBA em Administração Hospitalar UNOPAR (2019). Possui especialização em Saúde Coletiva pela UCDB (2019) e Saúde Pública pela UCDB (2019). É Fundador e Presidente do Grupo de Trabalho Comunitário Lagoverdense - GTCL (2016-2021). Está Vice-Presidente Liga de Cirurgia Geral - LACIGE e do Centro Acadêmico de Medicina - CAMUC (2021). É Ligante das Liga de Radiologia - LAR e Liga de Clínica Médica - LACLIM (2021) e Tesoureiro da Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Cirurgia - ABLAC Cap. Maranhão (2021-2022). É Monitor da disciplina de Anatomia (2021-2022). Pós-graduando em Gestão Pública Municipal pela UFMA (2021-2022). Está Vice-Presidente da Associação dos Estudantes de Medicina do Maranhão - AEMMA (2021-2022). É Bolsista Remunerado da FAPEMA (2021-2022).

SUMÁRIO

Capítulo 1.....	1
Transtorno de Ansiedade em Crianças	
DOI: https://doi.org/10.29327/554846.1-1	
Capítulo 2.....	18
Diagnóstico Precoce no Transtorno do Espectro Autista: Dificuldades e sua Importância	
DOI: https://doi.org/10.29327/554846.1-2	
Capítulo 3.....	25
Síndrome de Burnout e a Pandemia	
DOI: https://doi.org/10.29327/554846.1-3	
Capítulo 4.....	35
Relação dos Traumas na Infância e o Transtorno da Personalidade Antissocial na Psiquiatria Forense	
DOI: https://doi.org/10.29327/554846.1-4	
Capítulo 5.....	47
Abuso de Drogas no Período Gestacional: Implicações ao Recém-Nascido	
DOI: https://doi.org/10.29327/554846.1-5	
Capítulo 6.....	57
Avaliação de Nível de Consciência e Percepção Emocional de Pacientes com Covid-19	
DOI: https://doi.org/10.29327/554846.1-6	
Capítulo 7.....	67
Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade em Mulheres	
DOI: https://doi.org/10.29327/554846.1-7	
Índice Remissivo.....	74

CAPÍTULO 1

TRANSTORNO DE ANSIEDADE EM CRIANÇAS

Capítulo 1

TRANSTORNO DE ANSIEDADE EM CRIANÇAS

DISORDER OF ANXIETY IN CHILDREN

Ana Paula Diniz Alves

Discente do curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1522-1610>

*Autor correspondente e-mail: apdalves@yahoo.com.br

Ana Valéria Brandão de Sá Costa

Discente do curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5593-9942>

E-mail: anavaleriabrandao@hotmail.com

Elisianne Bezerra Mousinho

Discente do curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-47034577>

E-mail: elisianne22@yahoo.com.br

José da Costa Goulart Neto

Discente do curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4909-8371>

E-mail: goulart87@hotmail.com

Jamilly Rodrigues Lemos

Discente do curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3102-4553>

E-mail: jamillylemoss@gmail.com

Letícia Chaves Vêras do Rosário

Discente do curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5105-5157>

E-mail: leticiacveras@hotmail.com

Bárbara Luysla Silva Curvina

Discente do curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2392-4324>

E-mail: barbaracurvina@hotmail.com

Dinamara Azevedo Pires Leal

Discente do curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2573-6271>

E-mail: dinazevedo@hotmail.com

Denise Ribeiro Guimaraes Borges Salgado

Discente do curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6753-6673>

E-mail: denise.salgado@hotmail.com

Suzane Milhomem Bandeira de Melo

Discente do curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2282-9026>

E-mail: milhomemsuzane@gmail.com

RESUMO

O objetivo deste artigo foi avaliar as principais causas da ansiedade em crianças e discutir os tratamentos mais atuais. Foi feita uma revisão integrativa da literatura. Este tipo de estudo é importante pois permite, através da revisão e interpretação dos dados, expandir os conhecimentos teóricos, além de auxiliar e orientar investigações futuras sobre o tema explorado. A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados eletrônica *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE via PubMed). Para a busca, foram realizadas duas pesquisas, com diferentes combinações. Na primeira, foram utilizadas as palavras-chave “ansiedade”, “crianças” e “etiologia” ou “anxiety”, “children” e “etiology”. Já na segunda pesquisa, foi usada a combinação: “ansiedade”, “crianças” e “tratamento” ou “anxiety”, “children” e “treatment”. Em ambas as pesquisas, as palavras-chave foram unidas pelo agente booleano *AND*, no modo avançado de busca. Os critérios de inclusão foram estudos publicados na íntegra nos últimos 5 anos (2016 a 2021), em português ou inglês. Foram excluídas revisões de literatura, estudos incompletos, escritos em outras línguas e que não abordassem especificamente a temática buscada. Como resultados observamos que as causas da ansiedade em crianças envolvem diversos fatores, incluindo a predisposição genética e fatores sociais. Já em relação ao tratamento de transtornos de ansiedade em crianças, é possível observar que terapias cognitivas estão entre os principais métodos de tratamento dessa condição. Essas metodologias podem ser consideradas como eficazes tratamentos de baixo custo para crianças com transtornos de ansiedade e, sua implementação no atendimento clínico de rotina deve contribuir para reduzir a lacuna atual entre a demanda e a disponibilidade de intervenções baseadas em evidências.

Palavras-chave: Ansiedade; Crianças; Tratamento.

ABSTRACT

The aim of this article was to assess the main causes of anxiety in children and to discuss the most current treatments. An integrative literature review was carried out. This type of study is important as it allows, through the review and interpretation of data, to expand theoretical knowledge, in addition to helping and guiding future investigations on the topic explored. The search for articles was performed in the electronic databases *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) and *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE via PubMed). For the search, two surveys were carried out, with different combinations. In the first, the keywords “anxiety”, “children” and “etiology” or “anxiety”, “children” and “etiology” were used. In the second survey, the combination: “anxiety”, “children” and “treatment” or “anxiety”, “children” and “treatment” was used. In both searches, the keywords were joined by the Boolean *AND* agent, in the advanced search mode. Inclusion criteria were studies published in full in the last 5 years (2016 to 2021), in Portuguese or English. Literature reviews, incomplete studies, written in other languages and that did not specifically address the searched topic were excluded. With the result we observe that the causes of anxiety in children involve several factors, including genetic predisposition and social factors. Regarding the treatment of anxiety disorders in children, it is possible to observe that cognitive therapies are among the main methods of treating this condition. These methodologies can be considered as effective low-cost treatments for children with anxiety disorders and their implementation in routine clinical care should contribute to reducing the current gap between demand and availability of evidence-based interventions.

Keywords: Anxiety; Kids; Treatment.

INTRODUÇÃO

Os transtornos de ansiedade estão entre as variantes mais comuns da psicopatologia. Os transtornos de ansiedade são compostos por uma diversidade de sintomas que se apresentam de forma semelhante no início, curso e duração em todos os indivíduos que apresentam a condição. Embora a classificação de cada transtorno de ansiedade usando grupos de sintomas únicos e mutuamente exclusivos seria ideal, muitas vezes isso não é possível. Há uma sobreposição considerável de sintomas entre os transtornos de ansiedade, conforme evidenciado por altas taxas de comorbidade (BROWN *et al.*, 2017).

Na atualidade, a ansiedade é definida como um estado que promove manifestações psicológicas subjetivas, incluindo sentimentos de medo ou terror, fobias, preocupações demasiadas, ruminações obsessivas, experiências irreais ou despersonalização, entre outras. Estas manifestações, geralmente, ocorrem em associação a sintomas físicos e somáticos, como palpitações, tremores, hiperventilação, sudorese, hipotonia muscular e outros (OLIVEIRA *et al.*, 2015).

As estimativas de prevalência da ansiedade ao longo da vida variam de 6% a 12%, e a idade típica de início ocorre na infância e adolescência, ou seja, antes dos 18 anos (BROWN *et al.*, 2017). Isso significa que tais estados anteriormente mencionados podem ocorrer já em crianças. Nos últimos anos, muitos estudos objetivaram identificar e compreender melhor as características de sintomas relacionados à ansiedade na população pediátrica. Assim, nesse grupo, a expressão de sintomas foi relacionada à mudança da ansiedade de acordo com as fases do desenvolvimento infantil, o que muitas vezes pode dificultar a identificação da condição (OLIVEIRA *et al.*, 2015).

Tegethoff *et al.* (2015) mostraram que a combinação de doenças físicas e o aparecimento de transtornos de ansiedade é comum, ocorrendo em cerca de 21% da população. Além disso, para muitas doenças físicas, o risco de desenvolvimento de ansiedade, muitas vezes, encontrava-se maior do que o risco de outros transtornos mentais. A experiência de ansiedade é altamente significativa por si só e está associada a mau prognóstico se não tratada, além do desenvolvimento de outros problemas de saúde mental e implicações psicossociais significativas, como desempenho acadêmico comprometido e relacionamento prejudicado com companheiros (COBHAM *et al.*, 2020).

A ansiedade pode estar associada a problemas futuros de saúde mental, como por exemplo, uso excessivo de medicamentos ou desenvolvimento de transtornos bipolares. Atrelada à ansiedade, a depressão costuma ocorrer com a condição e tal comorbidade é considerada de ocorrência comum em crianças e adolescentes (GARBER & WEERSING, 2010). Entre os jovens com depressão, os transtornos de ansiedade são os transtornos de saúde mental comórbidos mais comuns, com estimativas de comorbidade variando de 15% a 75%. Já em jovens com transtornos de ansiedade, as

taxas de transtornos depressivos comórbidos são geralmente mais baixas, variando de 10% a 15% (CUMMINGS, CAPORINO & KENDALL, 2014).

Transtornos de ansiedade (especialmente ansiedade generalizada) são altamente comórbidos entre si e com outros transtornos psiquiátricos, incluindo depressão, transtorno bipolar, déficit de atenção ou hiperatividade (TDAH), déficit de aprendizagem ou linguagem, déficits comportamentais, transtorno obsessivo-compulsivo e de alimentação, entre outros (WALTER *et al.*, 2020). Assim, quando em comorbidade com outra condição pode aumentar as chances do indivíduo em relação a algumas necessidades, como a utilização de serviços de saúde mental, maior probabilidade de tentativas de suicídio, exibição de períodos de deficiência, maior insatisfação com a vida, menos satisfação no trabalho e menos estabilidade social. Além disso, estes indivíduos também tendem a apresentar mais problemas de saúde física e são menos propensos a frequentar a escola (CUMMINGS, CAPORINO & KENDALL, 2014).

Entre os principais fatores de risco para a ansiedade está a inibição comportamental, que é um temperamento caracterizado na primeira infância por reações negativas à novidade, incluindo congelamento (também conhecido como *freezing*), angústia e retraimento em novas situações, além de evitação de contextos ou pessoas não familiares. Assim, crianças e adolescentes com histórico de inibição comportamental possuem maiores riscos de exibirem comportamentos ansiosos, como por exemplo, retraimento social e uma variedade de sintomas de ansiedade (FOX *et al.*, 2021). Além deste, o transtorno de ansiedade também pode ser prenunciado por hiper-reatividade autonômica, afetividade negativa, fatores parentais, exposições estressantes, traumas e apego inseguro (WALTER *et al.*, 2020). Dessa forma, estas características identificadas de forma prévia, em crianças, podem auxiliar em tratamentos da inibição comportamental já instalada e de forma preventiva à ansiedade.

Apesar disso, é possível tratar a ansiedade de forma eficaz em crianças, contudo, apenas metade dos jovens que precisam de tratamento de saúde mental recebem algum cuidado e uma menor parte recebe cuidados baseados em evidências (SALONER, CARSON & COOK, 2014). Neste contexto, processos de avaliação e identificação da ansiedade em crianças, poderiam ter um impacto substancial na elaboração de tratamentos eficazes, promovendo assim, melhores resultados a crianças com essa condição. Ainda, a divulgação de estudos que colaboram para o desenvolvimento dessa área se faz essencial, de forma que o conteúdo esteja disponível a uma maior gama de profissionais envolvidos no tratamento de transtornos de ansiedade. A partir disso, o objetivo desta revisão foi avaliar as principais causas da ansiedade em crianças e discutir os tratamentos mais atuais.

MATERIAL E MÉTODOS

Para a realização deste estudo foi feita uma revisão integrativa da literatura. Este tipo de estudo é importante pois permite, através da revisão e interpretação dos dados, expandir os conhecimentos teóricos, além de auxiliar e orientar investigações futuras sobre o tema explorado. A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados eletrônica *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE via PubMed). Para a busca, foram realizadas duas pesquisas, com diferentes combinações. Na primeira, foram utilizadas as palavras-chave “ansiedade”, “crianças” e “etiologia” ou “anxiety”, “children” e “etiology”. Já na segunda pesquisa, foi usada a combinação: “ansiedade”, “crianças” e “tratamento” ou “anxiety”, “children” e “treatment”. Em ambas as pesquisas, as palavras-chave foram unidas pelo agente booleano *AND*, no modo avançado de busca. Os critérios de inclusão foram estudos publicados na íntegra nos últimos 5 anos (2016 a 2021), em português ou inglês. Foram excluídas revisões de literatura, estudos incompletos, escritos em outras línguas e que não abordassem especificamente a temática buscada.

RESULTADOS

A primeira pesquisa, sobre as causas da ansiedade em crianças, resultou na identificação de 13.987 publicações em ambas as bases de dados pesquisadas, sendo 3 na SciELO e 13.984 na PubMed. Destes, 62 foram selecionados para leitura dos títulos e resumos, sendo 24 excluídos da amostra, por não se enquadrarem nos critérios de seleção. Depois, 20 publicações foram selecionadas para leitura integral, sendo o restante excluído da amostra. Destes, foram selecionadas 4 publicações para serem incluídas no presente estudo. A figura 1 apresenta o fluxograma de análise das publicações encontradas.

Figura 1. Fluxograma dos estudos revisados.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir da seleção dos estudos, a tabela 1 apresenta os principais dados das publicações selecionadas, referente a autoria e ano de publicação, a amostra do estudo, os métodos ou testes utilizados e os desfechos principais.

Tabela 1. Seleção dos estudos incluídos na amostra do estudo sobre as causas da ansiedade em crianças.

Autoria (ano)	Amostra	Métodos/Testes	Desfechos
Liu, He e Zhang (2021)	N = 37 genes relacionados à ansiedade e 23 genes relacionados a respostas às terapias cognitivo-comportamentais.	Análise da especificidade de tipo de célula em dados de transcriptoma de célula única, por meio de um método de enriquecimento de expressão ponderada.	Os neurônios serotonérgicos estão envolvidos na etiologia e na terapia genética dos transtornos de ansiedade.
Lindberg et al. (2020)	N = 12.507 crianças de 6 a 17 anos.	Comparação de crianças obesas x peso normal após diagnóstico de ansiedade ou depressão.	A obesidade está associada ao risco de ansiedade e depressão em crianças e adolescentes.
Mohammadi et al. (2020)	N = 29.709 crianças e adolescentes de 6 a 18 anos.	Avaliação da prevalência, variáveis sociodemográficas e comorbidade de distúrbio de ansiedade generalizada.	Os preditores significativos foram: idade, sexo, história materna de hospitalização psiquiátrica, educação da mãe e residência. Os participantes com esses fatores de risco tinham entre 0,23-2,91 vezes

			mais probabilidade de apresentar ansiedade.
Poirier et al. (2016)	N = 521 gêmeos monozigóticos (sendo 264 meninas; 87% de ascendência europeia).	Análise do gene-ambiente (rGE), os sintomas de ansiedade e a qualidade da amizade percebida.	Crianças com uma forte tendência genética para a ansiedade eram mais propensas a ter amigos ansiosos do que amigos não ansiosos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Já em relação a segunda pesquisa, sobre os tratamentos da ansiedade em crianças, a busca resultou na identificação de 22.699 publicações em ambas as bases de dados pesquisadas, sendo 60 na SciELO e 22.639 na PubMed. Destes, 57 foram selecionados para leitura dos títulos e resumos, sendo 15 excluídos da amostra, por não se enquadrarem nos critérios de seleção. Depois, 23 publicações foram selecionadas para leitura integral, sendo o restante excluído da amostra. Destes, foram selecionadas 5 publicações para serem incluídas no presente estudo. A figura 2 apresenta o fluxograma de análise das publicações encontradas.

Figura 2. Fluxograma dos estudos revisados.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Assim, depois da seleção dos estudos, os principais dados das publicações selecionadas seguem apresentados na tabela 2, de acordo com a autoria e ano de publicação, a amostra do estudo, os métodos ou testes utilizados e os desfechos principais.

Tabela 2. Seleção dos estudos incluídos na amostra sobre os tratamentos da ansiedade em crianças.

Autoria (ano)	Amostra	Métodos/Testes	Desfechos
Wood et al. (2020)	N = 167 crianças, de 7 a 13 anos, com TEA e ansiedade mal adaptativa e interferente.	Aplicação de terapia cognitivo-comportamental.	A intervenção foi eficaz para crianças com TEA e ansiedade interferente, e uma abordagem adaptada mostrou vantagens adicionais.
Jolstedt et al. (2018)	N = 131 crianças, de 8 a 12 anos com diagnóstico de um transtorno de ansiedade principal.	Realização de Terapia cognitivo-comportamental fornecida pela Internet ou brincadeiras dirigidas por crianças transmitidas pela Internet (ICBT).	A classificação de gravidade do transtorno de ansiedade principal melhorou significativamente em ambos os grupos, com melhores resultados do grupo ICBT.
McKinnon et al. (2018)	N = 1.253 crianças de 5 a 12 anos, com diagnósticos de transtornos de ansiedade.	Aplicação de terapia cognitivo-comportamental individual, em grupo ou guiada pelos pais.	Os dados sugerem um maior benefício clínico da terapia individual em crianças com fobia específica.
Li et al. (2016)	N = 304 crianças hospitalizadas, entre 3 e 12 anos.	Realização de intervenções lúdicas em 154 crianças e cuidados habituais em 150 crianças.	Crianças que receberam as intervenções lúdicas no hospital exibiram menos emoções negativas e menores níveis de ansiedade.
Vasa et al. (2016)	Dados científicos disponíveis sobre tratamentos de ansiedade, tanto em jovens com TEA e jovens com desenvolvimento típico.	Elaboração de recomendações clínicas.	As recomendações de tratamento incluem psicoeducação, coordenação de cuidados e terapia cognitivo-comportamental modificada.

Fonte: Elaborado pelo autor.

DISCUSSÃO

A partir dos resultados referentes aos artigos incluídos na amostra do estudo, é possível observar poucos estudos atuais focando na avaliação das causas e de tratamentos para o transtorno de ansiedade em crianças, nas bases de dados pesquisadas. Em relação a primeira pesquisa, contata-se que a tendência para novos estudos se encontra na área da genética ou na biologia molecular, a fim de identificar fatores individuais ou ontogênicos associados ao desenvolvimento da condição. Já na segunda pesquisa, também se constata a escassez de estudos sobre tratamentos para a ansiedade em

crianças, nas referidas bases de dados. A discussão destes pontos foi realizada em forma de tópico e segue abaixo.

As causas da ansiedade em crianças

A ansiedade é um dos problemas de saúde mental mais prevalentes na juventude. Em uma amostra representativa de 1.420 crianças de 9 a 13 anos de idade, Costello *et al.* (2003) descobriram que 4,6% das crianças de 9 a 10 anos sofrem de transtorno de ansiedade. Além de causar sofrimento psicológico significativo, a ansiedade está associada a dificuldades de adaptação na escola, bem como a relações familiares e de pares problemáticas (POIRIER *et al.*, 2016).

A literatura tem mostrado efeitos atenuantes das relações de amizade no desenvolvimento de problemas internalizantes, que podem variar dependendo das características dos amigos. Neste contexto, ter amigos deprimidos foi associado a um risco aumentado de apresentar as mesmas dificuldades emocionais (SCHWARTZ-METTE & ROSE, 2012). A partir disso, Poirier *et al.* (2016) avaliaram a existência de uma correlação gene-ambiente (rGE), causando uma disposição genética para ansiedade em que colocaria as crianças em risco de ter amigos ansiosos ou não ter amigos recíprocos. Os resultados indicaram que, de acordo com a rGE, as crianças com uma forte tendência genética para a ansiedade eram mais propensas a ter amigos ansiosos do que amigos não ansiosos. Além disso, controlando seu risco genético de ansiedade, crianças com amigos ansiosos mostraram níveis mais altos de sintomas de ansiedade do que crianças com amigos não ansiosos, mas não diferiram daquelas sem amigos recíprocos. Análises adicionais sugeriram um possível contágio de sintomas de ansiedade entre melhores amigos recíprocos quando as características negativas percebidas da amizade eram altas.

Mohammadi *et al.* (2020) mostraram uma taxa significativa de transtorno de ansiedade generalizada ao longo da vida de um indivíduo, com alguns preditores significativos, incluindo idade, sexo, história materna de hospitalização psiquiátrica, educação da mãe e residência. Os participantes com esses fatores de risco tinham entre 0,23-2,91 vezes mais probabilidade de apresentar transtorno de ansiedade generalizada. Os autores discutem que o conhecimento dos preditores e da comorbidade de transtorno de ansiedade generalizada pode ser usado na prevenção desta condição em crianças e adolescentes.

Já Lindberg *et al.* (2020) mostraram que a obesidade, independentemente de outros fatores de risco, está associada ao risco de ansiedade e depressão em crianças e adolescentes. Ainda, os pesquisadores encontraram taxas aumentadas de fatores de risco bem estabelecidos para ansiedade e depressão, como distúrbios neuropsiquiátricos e baixo nível socioeconômico, em crianças com

obesidade. No entanto, o risco de ansiedade e depressão permaneceu significativamente aumentado em crianças e adolescentes com obesidade, mesmo após levar esses fatores em consideração.

A ligação entre obesidade e ansiedade e depressão pode ocorrer devido a fatores ambientais, fisiológicos e/ou genéticos compartilhados. A obesidade está associada a uma inflamação subclínica sistêmica e estresse oxidativo, implicados como importantes fatores etiológicos da depressão (BERK *et al.*, 2013). Além disso, alguns genótipos do gene FTO (um gene associado à massa gorda e à obesidade) foram associados ao risco de obesidade e depressão. Outro fator a levar em consideração é o efeito sobre o peso corporal de potenciais tratamentos farmacológicos para ansiedade e depressão. A prescrição de ansiolíticos e antidepressivos para crianças e adolescentes aumentou rapidamente na última década. Alguns desses medicamentos têm sido associados ao risco de perda e ganho de peso, com grande variação entre os indivíduos (REEKIE *et al.*, 2015).

Por fim, Liu, He e Zhang (2021) encontraram 29 genes específicos associados ao transtorno de ansiedade. Notavelmente, os resultados indicam que os neurônios serotoninérgicos estão significativamente associados a genes relacionados ao transtorno de ansiedade e à terapia cognitivo-comportamental (TCC), apesar dos dois conjuntos de genes não apresentarem sobreposição. Essas observações fornecem evidências de que os neurônios serotoninérgicos estão envolvidos na etiologia e na terapia genética dos transtornos de ansiedade. Além disso, os resultados também mostraram que os neurônios serotoninérgicos estão associados a genes específicos da ansiedade, fornecendo um achado complementar que se opõe a estudos anteriores que não encontraram evidências para a associação entre neurônios serotoninérgicos e transtornos psiquiátricos por meio da mesma estratégia. Em resumo, este estudo descobriu que os neurônios serotoninérgicos estão envolvidos na etiologia e na terapia genética da ansiedade, fornecendo informações sobre sua base genética e celular.

A compreensão da base biológica desses genes relacionados a doenças pode auxiliar no desenvolvimento de terapêuticas adequadas. Estudos recentes revelaram que tipos de células específicos em tecidos cerebrais estão associados a doenças neurológicas (BRYOIS, *et al.*, 2020), incluindo transtorno depressivo maior, transtorno bipolar, neuroticismo, transtornos do espectro autista (TEA), esquizofrenia, doença de Alzheimer e Mal de Parkinson. Esses estudos não apenas destacaram o envolvimento de tipos de células cerebrais em doenças neurológicas, mas também forneceram um método empírico denominado enriquecimento de tipo celular de expressão, para investigar a base celular de genes relacionados a doenças neurológicas em transcriptomas unicelulares em cérebros de camundongos. Assim, incentiva-se a realização de mais estudos que avaliam as bases biológicas dos transtornos de ansiedade.

Os tratamentos da ansiedade em crianças

Os sintomas de transtornos de ansiedade geralmente se originam na infância, quando a propensão à ansiedade se manifesta como inibição comportamental, um traço de temperamento marcado por angústia ou evitação em situações desconhecidas. A inibição comportamental durante a primeira infância está associada a transtornos de ansiedade mais tarde na vida. Assim, intervir na primeira infância tem o potencial de minimizar o sofrimento individual e tensão econômica associados à psicopatologia de longo prazo (BAYER *et al.*, 2011).

Apesar disso, alguns jovens, como indivíduos com TEA, enfrentam barreiras no acesso a tratamento de saúde mental oportuno e apropriado, o que coloca demandas crescentes sobre os prestadores de cuidados primários para gerenciar a ansiedade nessas crianças. O tratamento da ansiedade em jovens com TEA pode ser mais desafiador do que em indivíduos com desenvolvimento normal, devido a deficiências cognitivas e de linguagem, comunicação comprometida de emoções, sintomas sobrepostos entre ansiedade e TEA, e expressões comportamentais únicas de ansiedade na população de TEA (VASA *et al.*, 2014).

A partir disso, Vasa *et al.* (2016) realizaram um estudo em que auxiliaram no desenvolvimento de uma abordagem sistemática para a avaliação da ansiedade em crianças com TEA, além de fornecerem recomendações de tratamento e ajudarem os médicos a decidirem quando encaminhar a um especialista em saúde mental. Em relação ao tratamento, os autores sugerem que, as crianças devem ser avaliadas e, se a ansiedade clínica persistir apesar de aliviar as fontes potenciais de ansiedade ou se os estressores não puderem ser modificados imediatamente, o tratamento é recomendado. Os médicos e os pais devem decidir juntos qual será a melhor abordagem de tratamento. Devem ser exploradas as barreiras de tratamento potenciais (por exemplo, restrições de seguro, horários de trabalho dos pais, acesso a provedores e questões de transporte). Devido aos dados de tratamento limitados em indivíduos com TEA, um algoritmo de tratamento específico não é oferecido, mas várias recomendações de tratamento são apresentadas com a ressalva de que os médicos adaptam o tratamento com base nas circunstâncias da criança e da família e no julgamento clínico.

Vários programas de TCC foram adaptados para as características do TEA (WOOD *et al.*, 2015), porém alcançar uma mudança generalizável de sintomas em jovens com TEA tem sido um desafio em alguns programas de tratamento. Ainda, fatores contextuais que causam ansiedade (por exemplo, desafios de comunicação social, estressores associados ao TEA) necessitam de um tratamento psicológico que aborde esses fatores contextuais. Assim, os estudos iniciais sobre essa temática sugerem que a TCC é uma modalidade promissora para o tratamento da ansiedade em jovens

com TEA, bem como indivíduos normativos, mas algumas limitações do estudo impedem conclusões de eficácia, incluindo estudos com pequenas amostras (HUNSCHE & KERNS, 2019).

A partir disso, um estudo mais recente realizado por Wood *et al.* (2020) avaliou a eficácia de 2 versões de TCC, que incluíram uma versão de TCC adaptada e outra TCC padrão de prática, para ansiedade em jovens com TEA, a fim de testar a eficácia relativa do tratamento e o efeito da TCC sobre sintomas de ansiedade, gravidade dos sintomas de TEA e funcionamento adaptativo. Os achados indicam que ambas as versões são benéficas para crianças com TEA e ansiedade desadaptativa. Ambas as condições de TCC tiveram efeitos positivos, contudo um programa de TCC adaptado (BIACA) superou a TCC padrão de prática e tratamentos regulares, de acordo com medidas de resultados primários e relatos dos pais acerca os sintomas de desregulação emocional associados, sintomas de comunicação social e funcionamento adaptativo.

Portanto, ambas as condições de TCC alcançaram taxas mais altas de resposta positiva ao tratamento no Clinical Global Impression – Improvement (cada um maior que 80%) em comparação a tratamentos regulares (11%). O benefício relativo da TCC adaptada em relação à TCC padrão de prática foi moderado em termos de tamanho do efeito para a medida de desfecho primário, com vantagens adicionais em termos de efeitos na comunicação social sintomas e resultados adaptativos. O fato de os grupos não diferirem nas pontuações no meio do tratamento sugere a necessidade de intervenção contínua para acessar todos os benefícios (WOOD *et al.*, 2020).

Li *et al.* (2016) mostrou que crianças em internação que receberam intervenções lúdicas em um hospital, exibiram menos emoções negativas e experimentaram níveis mais baixos de ansiedade do que as crianças que receberam cuidados habituais. Os resultados deste estudo enfatizam a importância de incorporar intervenções hospitalares lúdicas para fornecer cuidados holísticos e de qualidade para aliviar a carga psicológica de crianças hospitalizadas. No estudo, a maioria das crianças entrevistadas relatou que as intervenções lúdicas hospitalares ajudaram a aliviar sua ansiedade, pois ganharam mais conhecimento sobre sua doença e se familiarizaram com os procedimentos médicos. Além disso, as crianças também ficavam satisfeitas em saber que a maioria dos procedimentos médicos ou de enfermagem não lhes causaria dor, ou que qualquer dor que pudesse ocorrer seria bem controlada. Mais importante, as crianças gostavam de brincar no hospital e consideravam as atividades divertidas e interessantes.

Embora os resultados gerais apoiem essas intervenções na redução da ansiedade e das emoções negativas das crianças, é essencial garantir o potencial de implementação de tais intervenções em ambientes clínicos. Permitir flexibilidade de horários para as intervenções com sessões repetidas é fundamental para garantir que as crianças hospitalizadas possam praticar atividades lúdicas. As crianças do estudo em questão somente foram convidadas a participar das

atividades lúdicas quando não estavam ocupadas com nenhum procedimento médico e de enfermagem. Seria prático, portanto, que os profissionais de saúde considerassem a incorporação do brincar hospitalar como um preparo psicológico de rotina para a criança sob seus cuidados (LI *et al.*, 2016).

Geralmente, as decisões sobre a melhor maneira de alocar crianças para tratamentos de ansiedade infantil são atualmente mal compreendidas. Assim, McKinnon *et al.* (2018) avaliaram se as respostas clínicas à TCC em grupo ou guiada pelos pais, são influenciadas pelo diagnóstico primário de ansiedade da criança. Os resultados mostraram que não houve diferença entre os três formatos de tratamento para crianças com transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizada ou transtorno de ansiedade de separação primários. No entanto, a TCC individual foi melhor do que a TCC guiada pelos pais para fobia específica em termos de melhora dos sintomas e taxas de remissão.

A TCC individual também teve um desempenho melhor do que a TCC de grupo para fobia específica na análise de mudança de gravidade clínica, mas não na análise de remissão (após a correção para testes múltiplos). A interação entre o diagnóstico (fobia específica vs. outros transtornos de ansiedade) e o formato do tratamento (TCC individual vs. outros tratamentos de TCC) nas mudanças na gravidade clínica foi significativa, com as análises sugerindo que isso não foi devido à gravidade basal dos sintomas, diferenças de local ou vieses na alocação de tratamento (MCKINNON *et al.*, 2018).

Existem alguns caminhos importantes para pesquisas futuras. Um próximo passo importante seria comparar a eficácia da TCC individual com os tratamentos de TCC de uma sessão amplamente usados para jovens fóbicos. Como a abordagem de agrupamento do referido estudo oferece menos controle experimental do que pode ser obtido a partir de um único grupo experimental, há uma necessidade de ensaios clínicos randomizados em grande escala com períodos de acompanhamento de longo prazo abordando as diferenças no formato de tratamento. Esses estudos também devem medir processos cognitivos e biológicos importantes que podem estar impulsionando respostas diferenciais aos formatos de tratamento de TCC (MCKINNON *et al.*, 2018).

Já Jolstedt *et al.* (2018) realizaram um dos maiores estudos randomizados para avaliar a eficácia da terapia cognitivo-comportamental fornecida pela Internet (TCCI), guiada por terapeuta para transtornos de ansiedade pediátricos, em comparação com uma intervenção de controle ativo. Os pesquisadores mostraram que um programa de TCCI de 12 semanas, com apoio limitado do terapeuta online, foi mais eficaz do que o controle ativo (fornecido pela Internet, porém com brincadeira dirigida à criança), em termos de gravidade dos sintomas avaliados pelo médico, funcionamento global, remissão e ansiedade da criança avaliada pelos pais. Após o período de

tratamento de 12 semanas, 48% dos participantes designados para TCCI não cumpriam mais seu diagnóstico principal de transtorno de ansiedade pediátrica, em comparação com 15% designados para o controle ativo. Os ganhos do tratamento foram mantidos por pelo menos 3 meses após o final do tratamento, quando 70% dos participantes designados para a TCCI não preenchiam mais os critérios para seu principal transtorno de ansiedade.

Apesar destes importantes resultados, a TCCI não deve ser vista como um substituto para a TCC tradicional face a face, mas sim como uma alternativa que pode ajudar a aumentar o acesso a tratamentos baseados em evidências para crianças com transtornos de ansiedade. Ainda, este método não é adequado para transtorno de ansiedade complexo, porém, pode ser útil em um modelo de tratamento escalonado, no qual crianças com transtornos de ansiedade leves a moderados podem receber TCCI como tratamento de primeira linha, administrado por terapeutas que não são necessariamente especialistas em transtornos de ansiedade e, portanto, liberando recursos para problemas mais graves e casos complexos (JOLSTEDT *et al.*, 2018).

O tempo médio de apoio do terapeuta para TCCI é de cerca de 25 minutos por participante por semana (incluindo o tempo gasto com a criança e os pais), o que é aproximadamente um terço do tempo necessário para a TCC presencial padrão. A TCCI também tem potencial para eliminar barreiras logísticas, uma vez que as famílias não precisam se deslocar até uma clínica para receber tratamento. Este tipo de terapia poderia, portanto, ser particularmente útil em áreas rurais ou escassamente povoadas, onde há pouco acesso a terapeutas treinados (JOLSTEDT *et al.*, 2018).

Por fim, qualquer intervenção precoce, projetada para prevenir doenças mentais e promover uma boa saúde mental, é um foco importante para a população em geral. Dessa forma, os terapeutas envolvidos em pesquisas clínicas com supervisão de especialistas devem estar bem preparados para implementar os diferentes métodos em crianças com transtornos de ansiedade. Para isso, é necessária a elaboração de mais pesquisas clínicas que investiguem conceitos já existentes ou novas ideias sobre tratamentos voltados à ansiedade. Além disso, se faz importante o treinamento e orientação clínica de profissionais diretamente envolvidos com os pacientes, de forma a potencializar os efeitos das terapias aplicadas (WOOD *et al.*, 2020).

CONCLUSÕES

A partir deste estudo é possível concluir que as causas da ansiedade em crianças envolvem diversos fatores, incluindo a predisposição genética e fatores sociais. Já em relação ao tratamento de transtornos de ansiedade em crianças, é possível observar que terapias cognitivas estão entre os principais métodos de tratamento dessa condição. Essas metodologias podem ser consideradas como

eficazes tratamentos de baixo custo para crianças com transtornos de ansiedade e, sua implementação no atendimento clínico de rotina deve contribuir para reduzir a lacuna atual entre a demanda e a disponibilidade de intervenções baseadas em evidências. As respostas positivas podem ser alcançadas após a realização de TCCs baseadas em manuais, fornecida por terapeutas com treinamento modesto e supervisão semanal.

REFERÊNCIAS

- BAYER, J. K. *et al.* Translational research to prevent internalizing problems early in childhood. **Depression and Anxiety**, New York, v. 28, n. 1, p. 50–57, 2011.
- BERK, M. *et al.* So depression is an inflammatory disease, but where does the inflammation come from? **BMC Medicine**, London, v. 11, p. 200, 2013.
- BROWN, W. J. *et al.* A review of sleep disturbance in children and adolescents with anxiety. **Journal of Sleep Research**, Oxford, v. 27, n. 3, p. 1-18, 2017.
- BRYOIS, J. *et al.* Genetic identification of cell types underlying brain complex traits yields insights into the etiology of Parkinson's disease. **Nature Genetics**, New York, v. 52, p. 482–493, 2020.
- COBHAM, V. E. *et al.* Systematic Review: Anxiety in Children and Adolescents With Chronic Medical Conditions. **Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry**, Baltimore, v. 59, n. 5, p. 595-618, 2020.
- COSTELLO, E. J. *et al.* Prevalence and development of psychiatric disorders in childhood and adolescence. **Archives of General Psychiatry**, Chicago, v. 60, p. 837–844, 2003.
- CUMMINGS, C. M.; CAPORINO, N. E.; KENDALL, P. C. Comorbidity of Anxiety and Depression in Children and Adolescents: 20 Years After. **Psychological Bulletin**, Washington, v. 140, n. 3, p. 816-845, 2014.
- FOX, N. A. *et al.* Understanding the Emergence of Social Anxiety in Children With Behavioral Inhibition. **Biological Psychiatry**, New York, v. 89, n. 7, p. 681-689, 2021.
- GARBER, J.; WEERSING, V. R. Comorbidity of anxiety and depression in youth: Implications for treatment and prevention. **Clinical Psychology: Science and Practice**, [S. l.], v. 17, p. 293–306, 2010.
- HUNSCHE, M. C.; KERNS, C. M. Update on the effectiveness of psychotherapy for anxiety disorders in children and adolescents with ASD. **Bulletin of the Menninger Clinic**, Topeka, v. 83, n. 3, p. 326-352, 2019.
- JOLSTEDT, M. *et al.* Efficacy and cost-effectiveness of therapist-guided internet cognitive behavioural therapy for paediatric anxiety disorders: a single-centre, single-blind, randomised controlled trial. **The Lancet. Child & Adolescent Health**, [S. l.], 2018.
- LI, W. H. C. Play interventions to reduce anxiety and negative emotions in hospitalized children. **BMC Pediatrics**, London, v. 16, p. 36, 2016.
- LINDBERG, L. *et al.* Anxiety and depression in children and adolescents with obesity: a nationwide study in Sweden. **BMC Medicine**, London, v. 18, n. 1, p. 30, 2020.
- LIU, H.-K.; HE, S.-J.; ZHANG, J.-G. A bioinformatic study revealed serotonergic neurons are involved in the etiology and therapygenetics of anxiety disorders. **Translational Psychiatry**, [S. l.], v. 11, n. 297, 2021.
- MCKINNON, A. *et al.* The impact of treatment delivery format on response to cognitive behaviour therapy for preadolescent children with anxiety disorders. **Journal of Child Psychology and Psychiatry**, [S. l.], v. 59, n. 7, p. 763-772, 2018.

- MOHAMMADI, M. R. *et al.* Generalized anxiety disorder: Prevalence, predictors, and comorbidity in children and adolescents. **Journal of Anxiety Disorders**, Elmsford, v. 73, p. 102234, 2020.
- OLIVEIRA, M. T. *et al.* Sleep bruxism and anxiety level in children. **Brazilian Oral Research**, São Paulo, v. 29, n. 1, 2015.
- POIRIER, C. S. *et al.* Friendship Experiences and Anxiety Among Children: A Genetically Informed Study. **Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology**, [S. l.], v. 0, n. 0, p. 1–13, 2016.
- REEKIE, J. *et al.* The effect of antidepressants and antipsychotics on weight gain in children and adolescents. **Obesity Reviews**, Oxford, v. 16, n. 7, p. 566–580, 2015.
- SALONER, B.; CARSON, N.; COOK, B. L. Episodes of mental health treatment among a nationally representative sample of children and adolescents. **Medical Care Research and Review**, Thousand Oaks, v. 71, n. 3, p. 261-279, 2014.
- SCHWARTZ-METTE, R. A.; ROSE, A. J. Co-rumination mediates contagion of internalizing symptoms within youths' friendships. **Developmental Psychology**, Washington, v. 48, p. 1355–1365, 2012.
- TEGETHOFF, M. *et al.* Association between mental disorders and physical diseases in adolescents from a nationally representative cohort. **Psychosomatic Medicine**, New York, v. 77, p. 319-332, 2015.
- VASA, R. A. *et al.* A systematic review of treatments for anxiety in youth with autism spectrum disorders. **Journal of Autism and Developmental Disorders**, New York, v. 44, n. 12, p. 3215–3229, 2014.
- VASA, R. A. Assessment and Treatment of Anxiety in Youth With Autism Spectrum Disorders. **Pediatrics**, Evanston, v. 137, suppl. 2, p. S115-S123, 2016.
- WALTER, H. J. *et al.* Clinical Practice Guideline for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Anxiety Disorders. **Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry**, Baltimore, v. 59, n. 10, p. 1107-1124, 2020.
- WOOD, J. J. *et al.* Cognitive Behavioral Treatments for Anxiety in Children With Autism Spectrum Disorder: A Randomized Clinical Trial. **JAMA Psychiatry**, Chicago, v. 77, n. 5, p. 474-483, 2020.
- WOOD, J. J. *et al.* Cognitive behavioral therapy for early adolescents with autism spectrum disorders and clinical anxiety: a randomized, controlled trial. **Behavior Therapy**, New York, v. 46, n. 1, p. 7-19, 2015.

CAPÍTULO 2

DIAGNÓSTICO PRECOCE NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: DIFICULDADES E SUA IMPORTÂNCIA

Capítulo 2

DIAGNÓSTICO PRECOCE NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: DIFICULDADES E SUA IMPORTÂNCIA

EARLY DIAGNOSIS IN AUTISTIC SPECTRUM DISORDER: DIFFICULTIES AND THEIR IMPORTANCE

Nádia Maria Gomes Rios Ribeiro

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid; <https://orcid.org/0000-0002-3692-8113>

E-mail: nadiagmrios@gmail.com

Daniel Vitor dos Santos Rodrigues

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid; <https://orcid.org/0000-0003-1164-5034>

E-mail: daniel_vitor@live.com

Rebeca Silva de Melo

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid; <https://orcid.org/0000-0002-1773-4292>

E-mail: rebecasmelo@hotmail.com

Michelle Rahbani Martins de Araújo

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid; <https://orcid.org/0000-0002-9321-3392>

E-mail: micharahbani@gmail.com

João Pedro Costa Junger

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid; <https://orcid.org/0000-0002-5184-1470>

E-mail: jp.junger13@gmail.com

Marcos Fernando Camara Maranhão

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid; <https://orcid.org/0000-0003-1568-4997>

E-mail: marcosmfcm@gmail.com

Mylena Diniz Silva

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid; <https://orcid.org/0000-0003-4995-0608>

E-mail: mylennadinizs@gmail.com

Gustavo Ribeiro Feres Moraes Rego

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid; <https://orcid.org/0000-0001-7332-3466>

E-mail: gustavorfmr@gmail.com

Alexandre Carvalho Costa Júnior

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid; <https://orcid.org/0000-0002-5856-236X>

Helena Aragão Batalha

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3780-4243>

Email: batalhahelena@gmail.com

RESUMO

O termo autista é usado para designar os indivíduos que se enquadram dentro do transtorno do espectro autista. Esses, apresentam um transtorno de desenvolvimento que, a depender do seu grau, implica dificuldades na vida cotidianas e no desenvolvimento de atividades básicas. Esta pesquisa objetivou relatar a importância e as dificuldades do diagnóstico precoce no Transtorno do Espectro Autista. Utilizou-se como método de pesquisa de Revisão Integrativa da Literatura, a partir de consultas nas bases de dados do google acadêmico, Scielo e Lilacs. Utilizou-se os descritores autismos, dificuldades no diagnóstico e a importância de identificar de forma precoce a criança autista. A pesquisa do material bibliográfico foi conduzida em três etapas e posteriormente, foi feito uma análise criteriosa acerca dos artigos escolhidos. Foram encontrados 13 artigos e selecionados, ao total, sete estudos. Os artigos tratam sobre a importância do diagnóstico do autismo nos primeiros 36 meses de vida da criança, para o seu desenvolvimento psicossocial. Contudo, os estudos e pesquisas mostram como os profissionais e a população ainda pouco conhecem os sinais e sintomas que podem se manifestar, como também a que profissional procurar diante disso. Dessa forma, ter conhecimento dos possíveis entraves e dificuldades no processo de diagnóstico se faz essencial para um bom desenvolvimento e qualidade de vida da criança que está no Espectro.

Palavras-chave: Autismo; Identificação; Acolhimento; Diagnóstico.

ABSTRACT

The term autistic is used to designate individuals who fall within the autistic spectrum disorder. These have a developmental disorder that, depending on its degree, implies difficulties in daily life and in the development of basic activities. This research aimed to report the importance and difficulties of early diagnosis in Autistic Spectrum Disorder. It was used as a research method of Integrative Literature Review, based on queries in the academic google, Scielo and Lilacs databases. The descriptors autism, difficulties in diagnosis and the importance of early identification of the autistic child were used. The bibliographic material research was conducted in three stages and later, a careful analysis of the chosen articles was carried out. Fourteen articles were found and a total of seven studies were selected. They deal with the importance of diagnosing autism in the first 36 months of a child's life, for their psychosocial development. However, studies and research show how professionals and the population still know little about the signs and symptoms that may manifest themselves, as well as which professional to look for in the face of this. Thus, being aware of the possible obstacles and difficulties in the diagnosis process is essential for a good development and quality of life for the child who is on the Spectrum.

Keywords: Autism; Identification; Reception; Diagnosis.

INTRODUÇÃO

O autismo é definido como um transtorno complexo de desenvolvimento, do ponto de vista comportamental, com diferentes etiologias que se manifestam em graus diferentes de gravidade. O seu desenvolvimento é principalmente na infância, predominantemente até os três anos de idade. Dentre suas características estão o prejuízo persistente de comunicação e interesse social, bem como nos comportamentos que podem incluir os interesses e os padrões de atividade, limitando e prejudicando o funcionamento diário do indivíduo (CARDOSO, 2019).

O transtorno apresenta etiologia desconhecida, contudo, é hoje considerada uma síndrome multifatorial. Alguns fatores já foram levantados na tentativa de buscar uma etiologia, tais como idade materna avançada, prevalência familiar, hábitos alimentares e estilo de vida, como também o consumo de substâncias durante a gestação. Contudo, ainda não é possível correlacionar um padrão a prevalência do transtorno (FARO, 2019).

Na última década, ocorreu um aumento do número de diagnóstico de crianças portadoras de Transtorno do Espectro Autista (TEA) (UNTOIGLICH, 2013). Estudos relatam a incidência do Autismo infantil entre 2 a 5 casos a cada 10.000 crianças (COOK JR, 1997). Segundo dados do Center of Diseases Control and Prevention (CDC) (2018), órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, existe hoje um caso de autismo a cada 110 pessoas. Dessa forma, estima-se que o Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, possua cerca de 2 milhões de autistas.

Contudo, apesar do expressivo número, as pessoas que possuem o espectro autista ainda sofrem para encontrar atendimento e acolhimento adequado. Isso é explicado em parte, pela dificuldade de interação social e cognitivo dos portadores do transtorno, que possuem limitações de ordem mental, física, sensória e emocional, aliado ao preparo precário de muitas unidades de saúde ao redor do país, a profissionais e a população ainda pouco informados quanto as limitações e perspectivas daqueles que estão dentro do Espectro autista. Esta pesquisa objetivou relatar a importância do diagnóstico precoce e as suas dificuldades no Transtorno do Espectro Autista.

MATERIAL E MÉTODOS

Utilizou-se como método de pesquisa de Revisão Integrativa da Literatura, a partir de consultas nas bases de dados google acadêmico, *Scientific Eletronic Library On-line* (SciELO) e Lilacs. Utilizou-se os descritores autismos, dificuldades no diagnóstico e a importância de identificar de forma precoce a criança autista. A pesquisa do material bibliográfico foi conduzida em três etapas. Na primeira etapa definiram-se o assunto e o período de publicação, dentre 1997 a 2020. Na segunda

etapa, estabeleceram-se os critérios de inclusão dos estudos: artigo escrito em língua inglesa, espanhola ou portuguesa; responder à questão de pesquisa sobre acolhimento a pacientes autistas; responder à questão sobre identificação de paciente autistas. Na terceira etapa, artigos que se adequaram aos critérios foram pré-selecionados, com base no título e no resumo. Posteriormente, foi feito uma análise criteriosa acerca dos artigos escolhidos. Foram encontrados 13 artigos e selecionados, ao total, sete estudos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a revisão dos artigos selecionados, constatou-se que há pouca informação sobre o transtorno por parte da população de forma geral e dos profissionais da área de saúde, sendo um grande entrave no diagnóstico nos primeiros 36 meses de vida, como é preconizado pelo CID-10 (OMS, 1993) e o DSM-V (APA, 2013). Segundo Santos *et al.* (2015) a dificuldade dos profissionais de saúde vem da falta de contato e reconhecimento das manifestações precoces do TEA. Jendrieck e De Oliveira (2017) pontuam como a família ainda apresenta dificuldade em notar os primeiros sintomas e apenas quando a criança adentra na escola essas características são notadas e percebe-se a necessidade de ajuda. Outro ponto importante, abordado por Santos *et al.* (2020) é a falta de um método diagnóstico padrão ouro, apesar do DSM V (APA, 2013) fornecer critérios, o TEA é amplo e suas manifestações são vastas e possuem intensidades diferentes.

Segundo o DSM-V (APA, 2013) o transtorno do Espectro Autista apresenta seus sintomas logo na infância, nos primeiros anos de vida. Os seus sintomas podem variar de leve a grave, conforme o grau de comprometimento e apoio necessário para o seu desenvolvimento. Podendo ter indivíduos com grandes limitações e outros que levam a vida muito próxima a daqueles que não possuem essa desordem (CAMPOS, 2015).

Usualmente, a criança portadora de TEA manifesta os primeiros sintomas nos primeiros 36 meses. Sendo a incapacidade de manter contato visual, o modo diferente de brincar, a incapacidade de ligação social e jogos em grupos, os sintomas que primeiro geram preocupação e a necessidade de procurar um diagnóstico (PINTO, 2016).

É perceptível que há um desencontro dentre os profissionais da saúde quanto ao diagnóstico, o manejo e a percepção das dificuldades da criança autista. A priori, os primeiros a perceberem que há um atraso no desenvolvimento da criança é a escola. Onde a criança pode demonstrar dificuldade em interagir com outras, atraso de fala, socialização e responder a comandos. Porém, o atraso no desenvolvimento cognitivo é comumente atribuído a outras causas, devido à falta de informação e conhecimento sobre o transtorno do espectro autista (JENDRIECK & DE OLIVEIRA, 2017).

Ademais, ao procurarem médicos para que possa ser feito o diagnóstico e entenderem o atraso de desenvolvimento, a especialidade médica procurada usualmente é o pediatra, responsável por atender o público infantil. Porém, é comum que a criança seja referenciada a outras especialidades sem que seja feita orientações quanto os estímulos e adaptações necessárias. Perdendo, assim, tempo essencial de estímulo e desenvolvimento (SANTOS, 2015).

Mesmo que o diagnóstico seja clínico, ainda há um desencontro em quem é o responsável por fazê-lo. Já que comumente acaba por ser um diagnóstico de exclusão, em que se procura descartar outras possíveis causas para os sinais e sintomas que a criança apresenta. É importante ressaltar, que o diagnóstico deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, porém, na ausência desta, pode ser realizado por um neuropediatra ou psicólogo (SILVA, 2018)

A formação do conhecimento, principalmente na área da saúde, ainda é construída de forma subdividida, ou seja, de maneira especializada e pouco abrangente, o que expõe a deficiência no zelo ao indivíduo. Além do mais, muitos trabalhos de cunho acadêmico que possuem afinidade com o Transtorno do Espectro Autista limitam-se a regiões circunscritas da saúde como Pediatria, Psicologia, Fonoaudiologia e entre outras, em detrimento de uma abordagem integral que o paciente com TEA necessita (FURTADO, BRAYNER & SILVA, 2014).

É contundente a necessidade de mais estudo sobre o tema por parte dos profissionais. Até pelos diferentes graus de comprometimento existentes dentro do espectro. Segundo Silva e Mulick (2009), houve nos últimos anos um avanço imenso no tocante ao diagnóstico e identificação precoce do autismo. Para o CID-10 (OMS, 1993) e o DSM-V (APA, 2013) a criança com autismo deve ser diagnosticada até os 36 meses de idade. Contudo, a desinformação e o desencontro de informações como as relatadas a cima, dificultam e o atrasam, levando o fracasso no desenvolvimento de habilidades como compartilhar prazer, interesses, realizações pessoais e assim, a convivência com seus pares.

CONCLUSÃO

É possível perceber a dificuldade em diagnosticar e dar procedência ao tratamento de forma adequada, haja visto as particularidades que envolvem o tratamento da criança autista. Além disso, ainda há o despreparo dos profissionais de atendimento em seus diversos níveis. A começar pelo diagnóstico da criança pertencente ao espectro, pois é um transtorno de desenvolvimento que engloba diversos níveis, do leve ao mais severo. Ademais, é um transtorno que começou a ser estudado relativamente há pouco tempo.

Portanto, como os demais transtornos de desenvolvimento que acometem crianças, o diagnóstico precoce e o seguimento do tratamento são essenciais para o desenvolvimento mais

próximo da normalidade dessas crianças. Sendo necessário uma equipe multidisciplinar preparada e que tenha conhecimento dos sinais e sintomas.

REFERÊNCIAS

- AMERICAN PSYCHIATRY ASSOCIATION (APA). **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais-DSM-V**. Porto Alegre: Artmed, 2014.
- CARDOSO, A. A. *et al.* **Transtorno do Espectro do Autismo**. Manual de Orientação, n.5, 2019.
- COOK JR, Edwin H. *et al.* Autism or atypical autism in maternally but not paternally derived proximal 15q duplication. **American journal of human genetics**, v. 60, n. 4, p. 928, 1997.
- FARO, K. C. A. *et al.* Autismo e mães com e sem estresse: análise da sobrecarga materna e do suporte familiar. **Psico**, v. 50, n. 2, p. e30080-e30080, 2019.
- FURTADO, Luis Achilles; BRAYNER, José Clauber; DA SILVA, Lucas Silveira. Transtornos globais do desenvolvimento e saúde pública: uma revisão integrativa. **Percorso Acadêmico**, p. 283-297, 2014.
- JENDREIECK, Céres; DE OLIVEIRA. Dificuldades encontradas pelos profissionais da saúde ao realizar diagnóstico precoce de autismo. **Psicologia argumento**, v. 32, p.77, 2017.
- PESSIM, Larissa Estanislau; FONSECA, B.; RODRIGUES, Bárbara Cristina. Transtornos do espectro autista: importância e dificuldade do diagnóstico precoce. **Revista FAEF**, v. 3, n. 14, p. 7-28, 2015.
- PINTO, R. N. M. *et al.* Autismo infantil: impacto do diagnóstico e repercussões nas relações familiares. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 37, 2016.
- SANTOS, Ana Letícia Vieira. Diagnóstico precoce do autismo: dificuldades e importância. **Renome**, v. 4, n. 1, p. 23-24, 2015
- SIEGEL, J. D. *et al.* **Center of Diseases Control and Prevention (CDC)**. Management of multidrug-resistant organisms in healthcare settings, 2006.
- SILVA, B. S. *et al.* Dificuldade no diagnóstico precoce do transtorno do espectro autista e seu impacto no âmbito familiar. **CIPEEX**, v. 2, p. 1086-1098, 2018.
- SILVA, M.; MULICK, J. A. Diagnosticando o Transtorno Autista: Aspectos Fundamentais e Considerações Práticas. **Psicologia Ciência e Profissão**, v. 29, n. 1, 116- 131, 2009.
- UNTOIGLICH, Gisela. Las oportunidades clínicas con niños con signos de autismo y sus padres. **Estilos da clínica**, v. 18, n. 3, p. 543-558, 2013.

CAPÍTULO 3

SÍNDROME DE BURNOUT E A PANDEMIA

Capítulo 3

SÍNDROME DE BURNOUT E A PANDEMIA

BURNOUT SYNDROME AND THE PANDEMIC

Ana Valéria Brandão de Sá Costa

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5593-9942>

E-mail: anavaleriabrandao@hotmail.com

Camila Angelo Vidal de Figueiredo

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8889-2549>

E-mail: camilavidal6@icloud.com

Camila Coelho Chaves Gaspar

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7281-5968>

E-mail: camilaccgaspar@hotmail.com

Carmen Augusta Leite Rocha

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4806-0646>

E-mail: carminhaugusta@hotmail.com

Flávia Mariana da Silva Santos

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <http://orcid.org/0000-0003-0774-1533>

E-mail: flaviamarianad@gmail.com

Gabriel Neves Ezon Ferraz

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8151-4737>

E-mail: gabrielezon@gmail.com

Gustavo Soares Gomes Barros Fonseca

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7287-1409>

E-mail: gustavosgbf@gmail.com

Izabely Lima Assunção

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8262-9192>

*Autor correspondente e-mail: izabelyyyyy@gmail.com

João Gabriel Duarte

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6861-1778>

E-mail: duartejgds123@gmail.com

Lara Emannuely Alves Ferreira

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4445-3656>

E-mail: laraalvesferreira@icloud.com

Letícia Carvalho Martins

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1651-3148>

E-mail: leticm02@gmail.com

Lorena de Souza Ribeiro

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8215-5510>

E-mail: lorennaribeiros123@gmail.com

Maria Eduarda Mendes Gomes

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8297-9467>

E-mail: m.eduardamendes@hotmail.com

Vanessa Carolina de Araújo Muniz

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0998-0036>

E-mail: vanessacarolinaa.muniz@gmail.com

Yasmin Gama Machado Fernandes Ribeiro

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2245-1692>

E-mail: yasmingmmachado@gmail.com

Luciana Cabral da Silva

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9865-4963>

E-mail: lucianacabral04gmail.com

RESUMO

A pandemia provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 manifestou inúmeros impactos sociais, econômicos e humanitários. Estas complicações são resultado do desconhecimento acerca dos mecanismos de ação, detecção e tratamento de um vírus que, em tão pouco tempo, provocou várias mortes e fez com que países do mundo todo adotassem medidas restritivas de isolamento social no intuito de evitar o contágio e, consequentemente, os danos físicos provocados pela doença. Entretanto, tais condutas de distanciamento trouxeram à tona sentimentos como medo e tensão, e colocaram em pauta a importância da saúde mental durante a pandemia. Assim, o referente artigo possui como objetivo demonstrar a relação entre a saúde mental e a Síndrome de Burnout durante o período de pandemia da COVID-19 e, utilizando um método de revisão integrativa, construiu uma relação entre o psicológico dos indivíduos e a chamada Síndrome de *Burnout* (SB), a qual é considerada como um distúrbio mental que se desenvolve principalmente em profissionais da área da saúde. Tal transtorno é caracterizado por provocar exaustão emocional, despersonalização e reduzida realização profissional naqueles que são acometidos por ele. Diante disso, concluiu-se que a SB foi causada pelas medidas de confinamento durante a pandemia, afetando as pessoas de forma democrática, independentemente da classe social e/ou faixa etária, além de se reconhecer a importância da adoção de medidas que visem a redução do desgaste e estresse emocional dos trabalhadores.

Palavras-chave: Síndrome de *Burnout*; COVID-19; Saúde Mental

ABSTRACT

The pandemic caused by the new SARS-CoV-2 coronavirus has had numerous social, economic and humanitarian impacts. These complications are the result of the lack of knowledge regarding the mechanisms of action, detection and treatment of a virus that, in such a short time, caused several deaths and forced countries around the world to adopt restrictive measures of social isolation aiming to avoid contamination and, consequently, the physical damage caused by the disease. However, these distancing measures brought up feelings such as fear and strain, emphasizing the importance of mental health during the pandemic. Thus, this article aims to demonstrate the relationship between mental health and Burnout Syndrome during the COVID-19 pandemic period and, using an integrative review method, built a relationship between the psychological aspects of individuals and the so-called Syndrome Burnout (SB), which is considered a mental disorder that develops mainly in health professionals. This disorder is characterized by its symptoms of emotional exhaustion, depersonalization and reduced professional fulfillment in those affected by it. Therefore, it was concluded that BS was caused by containment measures during the pandemic, affecting people in a democratic way, regardless of social status and/or age group, also recognizing the importance of adopting measures in order to reduce the emotional wear and stress of workers.

Keywords: Descriptors Burnout Syndrome; COVID-19; Mental health.

INTRODUÇÃO

Em 2020, foi declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a pandemia do COVID-19, ocasionada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. O vírus, ainda pouco conhecido, apresentou diversas manifestações clínicas, desde casos assintomáticos à severas síndromes de dificuldade respiratória aguda grave e falência múltipla de órgãos (TALEVI *et al.*, 2020). Devido à natureza imprevisível dos danos físicos causados pelo COVID-19, inexistência terapêutica e alto potencial de transmissibilidade, diversos países adotaram medidas restritivas de confinamento como bloqueios regionais, fechamento de empresas, escolas e universidades, isolamento e distanciamento social (SHUJA *et al.*, 2020; AQUINO *et al.*, 2020).

As intervenções foram implementadas com a finalidade de diminuir o contágio da doença e consequentemente reduzir a sobrecarga dos sistemas de saúde, melhorando a assistência médica aos casos ativos e acarretando na queda da mortalidade (AQUINO *et al.*, 2020). Contudo, as medidas restritivas e o isolamento social trazem consigo impactos psicológicos, prejudicando a saúde mental dos indivíduos, independentemente da faixa etária (JAVED *et al.*, 2020).

A OMS conceitua o termo saúde mental como um bem-estar emocional, psicológico e social, no qual o indivíduo apresenta pensamentos e emoções positivas, produtividade no trabalho, desenvolve habilidades e participa de integrações sociais (GALDERISI *et al.*, 2017). Dessa maneira, há diferentes situações que podem afetar a saúde da mente, como por exemplo trabalho excessivo,

problemas pessoais, relacionamentos conturbados, não-aceitação e exclusão social, uso de drogas (TALEVI *et al.*, 2020).

Considerando o contexto de pandemia em que há a predominância de emoções como medo, preocupação com familiares, estresse juntamente com a aplicação das medidas restritivas de isolamento que geram sentimentos como perda de liberdade por estar confinado em casa, solidão pelo afastamento de seus entes queridos, angústia e ansiedade, acarretando em grande impacto na saúde mental da população geral (TALEVI *et al.*, 2020; JAVED *et al.*, 2020).

Diante do cenário causado pela pandemia da COVID-19, além de todos os prejuízos que o isolamento e a quarentena causaram à saúde mental da população, verificou-se também que, a tensão, provocada pelo medo e pelas incertezas desse momento, e a sensação de sobrecarga que estiveram presentes durante esse período pandêmico, contribuem para o surgimento de impactos negativos na esfera psicológica dos indivíduos. Portanto, pelo fato de não se ter conhecimento absoluto acerca da COVID-19, assim como de tratamentos específicos, é esperado que os indivíduos passem a ter momentos de pânico e ansiedade (SHUJA *et al.*, 2020), que, conseqüentemente, influenciam no estresse e cansaço mental.

Um estudo feito através de formulários online para verificar os níveis de ansiedade, estresse e depressão entre os indivíduos durante a quarentena da COVID-19, constatou que 57,4% das pessoas que preencheram o questionário apresentavam sinais de estresse, que podiam variar de leve a extremamente severo (SHAH *et al.*, 2021). Logo, verifica-se como a pandemia tem sido capaz de afetar a saúde mental da população, podendo resultar em impactos em diversos âmbitos como o social e o laboral.

Quando o estresse causado pela vida profissional coloca o indivíduo em um estado de intensa exaustão mental, tem-se o Burnout, que é atualmente reconhecido como sendo um distúrbio mental. Dessa forma, os portadores da Síndrome de Burnout sentem-se incompetentes e incapazes de concluir tarefas, assim como também possuem a sensação de não possuírem controle e estarem insatisfeitos com o trabalho (LACY & CHAN, 2018). O público no qual ela é mais observada é composto pelos profissionais da saúde, e pode surgir em qualquer estágio de suas carreiras, interferindo na forma como eles atuam (BRIDGEMAN, BRIDGEMAN & BARONE, 2017).

Sendo assim, pelo fato dessa síndrome também ser causada por estresse em âmbitos psicológicos, o presente trabalho possui como objetivo demonstrar a relação entre a saúde mental e a Síndrome de Burnout durante o período de pandemia da COVID-19.

MATERIAL E MÉTODOS

O desenvolvimento do artigo se deu posterior a uma revisão bibliográfica, observando a relevância dos materiais com o tema, tendo em perspectiva a intenção de compreender pela visão de outros autores, os aspectos que rodeiam a relação que existe entre a saúde mental e a síndrome de Burnout durante a pandemia da COVID-19.

O presente artigo trata-se de uma revisão integrativa, uma vez que esse método possui favorecimento pela disposição e forma de análise dos artigos científicos permitindo uma maior compreensão acerca do tema proposto da incidência da síndrome de Burnout em relação com a saúde mental no decorrer da pandemia da COVID-19.

A definição dos critérios de inclusão consiste em artigos em língua portuguesa e inglesa, entre os anos 2017 e 2021, que estejam condizentes com o tema, de forma a serem selecionados pela banca de autores, além de sua pesquisa utilizando os descritores estabelecidos (saúde mental, Covid-19 e síndrome de Burnout) nas plataformas *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Google Scholar e PubMed. Como critérios de exclusão, adotou-se artigos incompletos ou indisponíveis, trabalhos que tangenciavam acerca do tema, repetições de artigos e resumos, trabalhos não publicados oficialmente e aqueles que a banca não avaliou como viáveis para construção do raciocínio acerca do tema.

Concomitante ao supracitado, após a definição dos critérios, a pesquisa fora realizada com os descritores “saúde mental”, “Covid-19” e “síndrome de Burnout”, onde foram encontrados, ao todo, 32 artigos, porém apenas 5 contemplaram os critérios de inclusão para estudo.

RESULTADOS

Ao todo, foram utilizados 5 artigos para o estudo em questão, relacionados à SB tanto antes da pandemia quanto durante, com observações apresentadas no quadro 1.

Quadro 1. Relação da Síndrome de Burnout e a pandemia.

AUTOR	TÍTULO	OBSERVAÇÕES
TALEVI, D. <i>et al.</i>	Mental health outcomes of the COVID-19 pandemic	Há fatores que acarretam à síndrome: excesso de trabalho, relacionamentos conturbados, uso de drogas, exclusão social.

SHUJA, K. H. <i>et al.</i>	COVID-19 Pandemic and Impending Global Mental Health Implications	Devido à gravidade da doença e pelo desconhecimento de suas causas e consequências e tratamento o COVID-19 gerou pânico e ansiedade nos indivíduos.
AQUINO, ESTELA M. L. <i>et al.</i>	Medidas de distanciamento social no controle da pandemia de COVID-19: potenciais impactos e desafios no Brasil.	Causas que geraram a síndrome do burnout durante a pandemia foram as medidas de confinamento
JAVED, B. <i>et al.</i>	The coronavirus (COVID-19) pandemic's impact on mental health	O impacto do isolamento social gerou impactos na saúde mental das pessoas de forma democrática, independentemente da faixa etária.
GALDERISI, S. <i>et al.</i>	A proposed new definition of mental health	A OMS classificada de forma interseccional a saúde mental. Abrange o equilíbrio emocional, social, profissional do ser humano.

DISCUSSÃO

A síndrome de Burnout (SB) é um processo que se desenvolve na interação de características do ambiente de trabalho e características pessoais. É um problema que atinge profissionais em serviço, principalmente aqueles voltados para atividades de cuidado com outros, no qual a oferta do cuidado ou serviço frequentemente ocorre em situações de mudanças emocionais. Ajudar outras pessoas sempre foi reconhecido como objetivo nobre, mas apenas recentemente tem-se dado atenção para os custos emocionais da realização do objetivo. O exercício das profissões que envolvem o cuidado implica em uma relação permeada de ambiguidades, como conviver com a tênue distinção entre envolver-se profissional e não pessoalmente na ajuda ao outro (OLIVEIRA *et al.*, 2002).

A SB, em uma perspectiva psicossocial, tem se definido como uma síndrome cujos sintomas são sentimentos de esgotamento emocional, despersonalização e baixa realização pessoal no trabalho. As principais características dessas dimensões são: exaustão emocional, que ocorre quando o indivíduo percebe não possuir mais condições de despender a energia que o seu trabalho requer. Algumas das causas apontadas para a exaustão são a sobrecarga de atividades e o conflito pessoal nas relações, entre outras.

A Despersonalização é considerada uma dimensão típica da SB e um elemento que distingue essa síndrome do estresse. Originalmente apresenta-se como uma maneira do profissional se defender da carga emocional derivada do contato direto com o outro. Devido a isso, desencadeiam-se atitudes insensíveis em relação às pessoas nas funções que desempenha, ou seja, o indivíduo cria uma barreira para não permitir a influência dos problemas e sofrimentos alheios em sua vida. O profissional em Burnout acaba agindo com cinismo, rigidez ou até mesmo ignorando o sentimento da outra pessoa.

Reduzida realização profissional, a qual ocorre na sensação de insatisfação que a pessoa passa a ter com ela própria e com a execução de seus trabalhos, derivando daí sentimentos de incompetência e baixa autoestima (MOURA, FURTADO & SOBRAL, 2020).

Esses sintomas devem ser entendidos como uma resposta ao estresse laboral que aparece quando falham as estratégias funcionais de enfrentamento. Esse enfrentamento pode ser entendido como sendo o conjunto de esforços que uma pessoa desenvolve para manejar ou lidar com as solicitações externas ou internas, que são avaliadas por ela como excessivas ou acima de suas possibilidades. Assim, essa síndrome é considerada um passo intermediário na relação estresse-consequências do estresse de forma que, se permanece durante um longo tempo, o estresse laboral terá consequências nocivas para o indivíduo, sob a forma de enfermidade, falta de saúde, com alterações psicossomáticas (alterações cardiorrespiratórias, gastrite e úlcera, dificuldade para dormir, náuseas), e para organização trabalhista (deterioração do rendimento ou da qualidade de trabalho) (PEGÔ, 2016).

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho (Abresst), médico e gestor em saúde, Ricardo Pacheco, a pandemia tem sido muito prejudicial a toda a sociedade e os trabalhadores têm sofrido grande parte desses impactos. Por isso, agir e minimizar esse cenário é também uma responsabilidade das empresas, pois cabe a elas fomentar a saúde, segurança e qualidade de vida das suas equipes. O emocional das pessoas tem sido fortemente abalado pelo isolamento social, as incertezas do futuro, a pressão para alcançar resultados, as dificuldades do trabalho remoto, entre outros pontos (RIBEIRO, VIEIRA & NAKA, 2020).

Dados de pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em que analisou o impacto da pandemia e do isolamento social na saúde mental dos trabalhadores essenciais durante a pandemia identificou que 47,3% desses trabalhadores, no Brasil e na Espanha, foram afetados com ansiedade e depressão (DANTAS, 2021).

A PEBMED, uma *healthtech* de conteúdo para médicos, também conduziu recentemente um estudo que revelou a presença de sinais do *Burnout* em 78% dos profissionais de saúde no período da

pandemia. Segundo a pesquisa, a prevalência foi de 79% entre médicos, 74% entre enfermeiros e 64% entre técnicos de enfermagem (RIBEIRO, VIEIRA & NAKA, 2020).

A SB tem sido tratada como uma importante questão de saúde pública. É um dos agravos ocupacionais de caráter psicossocial mais importantes na sociedade atual. *Burnout* é considerado um sério processo de deterioração da qualidade de vida do trabalhador, tendo em vista suas graves implicações para a saúde física e mental (BATISTA *et al.*, 2010).

Uma das medidas importantes para prevenir a Síndrome de *Burnout*, de acordo com o médico Ricardo Pacheco, é a implantação de adequações para que o chamado novo normal funcione tanto agora quanto depois da pandemia. Para ele é extremamente necessário que a saúde mental dos trabalhadores seja um dos itens de maior atenção por parte das empresas, incluindo o treinamento dos líderes e a criação de novas ações para diminuir os problemas emocionais da equipe, além de acompanhar de perto a saúde de cada funcionário.

Do âmbito do poder judiciário, o *Burnout* é caracterizado como uma doença ocupacional de diagnóstico complexo, ligada a diversos fatores laborais e ao meio ambiente de trabalho que, dentro do atual contexto pandêmico, passa a ser rodeado de intenso estresse e elevada pressão. Nesse contexto, há uma desvalorização da qualidade de vida, da saúde e do lazer (MOURA, FURTADO & SOBRAL, 2020)

CONCLUSÃO

Diante do presente estudo, foram evidenciados como fatores agravantes para a Síndrome de Burnout dentro do atual cenário pandêmico da COVID-19 a incerteza em relação à doença, o medo de parentes se contaminarem e o desconhecimento das causas, consequências e tratamentos, fatores esses que, associados às medidas restritivas, isolamento social e dificuldades do trabalho remoto, contribuem para o surgimento de sentimentos de esgotamento emocional, despersonalização, incompetência, sensação de sobrecarga e baixa realização pessoal no trabalho, prejudicando a saúde física e mental dos indivíduos. Dessa forma, salienta-se a importância de medidas que possibilitem o bem estar dos trabalhadores, priorizando o acompanhamento de suas condições psicológicas e emocionais, para que possam tratar a saúde mental como prioridade.

Tendo em vista que a síndrome de *Burnout* pode ocasionar graves implicações físicas e mentais, como estresse emocional, queda na produtividade, alterações psicossomáticas e até mesmo episódios de crises de pânico e ansiedade, surge a necessidade de uma adaptação por parte das empresas, para que, principalmente durante o período de pandemia, os impactos a saúde mental dos colaboradores sejam minimizados. Nesse sentido, devem ser adotadas medidas como a capacitação

dos líderes, de forma que o tratamento com suas equipes mitigue as possibilidades de desgaste e estresse emocional, além de promover treinamentos e ações visando a criação de medidas tanto para a prevenção, quanto para o combate da síndrome de Burnout no ambiente de trabalho, acompanhando de perto a saúde de cada funcionário e promovendo, assim, melhores condições de trabalho e qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

- AQUINO, ESTELA M. L. *et al.* Medidas de distanciamento social no controle da pandemia de COVID-19: potenciais impactos e desafios no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva [online]**. v. 25, n.1, pág. 2423-2446, 2020.
- BATISTA, J. B. V. *et al.* Prevalência da Síndrome de Burnout e fatores sociodemográficos e laborais em professores de escolas municipais da cidade de João Pessoa, PB. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 13, n. 3, p. 502–512, 2010.
- BRIDGEMAN, P. J., BRIDGEMAN, M. B., & BARONE, J. Burnout syndrome among healthcare professionals. **American Journal of Health-System Pharmacy**. v. 75, n. 3, p. 147–152, 2017.
- DANTAS, Eder Samuel Oliveira. Saúde mental dos profissionais de saúde no Brasil no contexto da pandemia por Covid-19. **Interface- Comunicação, Saúde, Educação**. São Paulo. v. 25 (Supl.1): p. 2000-203, 2021.
- GALDERISI, S. *et al.* A proposed new definition of mental health. Propozycja nowej definicji zdrowia psychicznego. **Psychiatria polska**, v. 51, n. 3, p. 407–411, 2017.
- JAVED, B. *et al.* The coronavirus (COVID-19) pandemic's impact on mental health. **The International journal of health planning and management**, v. 35, n. 5, p. 993-996, 2020.
- LACY, B. E., CHAN, J. L. Physician Burnout: The Hidden Health Care Crisis. **Clinical Gastroenterology and Hepatology**, v. 16, n. 3, p. 311–317, 2018.
- MOURA DE, E. C.; FURTADO, L.; SOBRAL, F. Epidemia de Burnout durante a Pandemia de Covid-19: O papel da LMX na redução do Burnout dos médicos. **Revista de Administração de Empresas- FGV**. São Paulo. v.60, n. 6, p. 426-436, 2020.
- BORGES, L. O. *et al.* A síndrome de burnout e os valores organizacionais: um estudo comparativo em hospitais universitários. **Psicologia: Reflexão e Crítica**, v. 15, p. 189-200, 2002.
- PÊGO, F. P. L. E; PÊGO, D. R. Síndrome de Burnout. **Revista Brasileira de Medicina do Trabalho**, v. 14, n. 2, p. 171–176, 2016.
- RIBEIRO, L. M.; VIEIRA, T. A. & NAKA, K. S. Síndrome de burnout em profissionais de saúde antes e durante a pandemia da COVID-19. **Revista Eletrônica Acervo de Saúde**. Pará. v. 12, n 11, p. 1-10, 2020.
- SHAH S.M.A, et al. Responses and Associated Correlates of Depression, Anxiety and Stress in a Global Population, During the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic. **Community Ment Health Journal**. v. 57, n. 1, p.101-110, 2021.
- SHUJA, K. H. *et al.* COVID-19 Pandemic and Impending Global Mental Health Implications. **Psychiatria Danubina**, v. 32, n.1, p. 32–35. 2020.
- TALEVI, D. *et al.* Mental health outcomes of the COVID-19 pandemic. **Rivista di Psichiatria**, v. 55, n. 3, pág.137–144, 2020.

CAPÍTULO 4

**RELAÇÃO DOS TRAUMAS NA INFÂNCIA E O
TRANSTORNO DA PERSONALIDADE
ANTISSOCIAL NA PSIQUIATRIA FORENSE**

Capítulo 4

RELAÇÃO DOS TRAUMAS NA INFÂNCIA E O TRANSTORNO DA PERSONALIDADE ANTISOCIAL NA PSIQUIATRIA FORENSE

LIST OF CHILDHOOD TRAUMA AND THE ANTISOCIAL PERSONALITY DISORDER IN FORENSIC PSYCHIATRY

Andressa Fernanda Dos Santos Melo Oliveira

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9777-4920>

*Autor correspondente, e-mail: andressasantos2012@yahoo.com.br

Amanda Cordeiro Santos

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6118-5983>

E-mail: amandacordeiros14@gmail.com

Iris Maria Pereira Pacheco

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5538-7984>

E-mail: irismariapp@hotmail.com

Isabel Alice Ramos Fonseca

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2603-5442>

E-mail: isabelfonseca10@hotmail.com

Luiza Vitória de Sousa Barros Fonseca

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0852-5309>

E-mail: lv.luizah@hotmail.com

Maria Fernanda Campos Fonseca

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3121-6077>

E-mail: maria.fernanda.baby@hotmail.com

Mariana Veras Carvalho Branco

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8482-7117>

E-mail: marianabranco3004@gmail.com

Priscila Gomes Silva Serpa

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4874-2583>

E-mail: priscilagomess91@outlook.com

Nátalia Murad Schmitt

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3048>

E-mail: Natália.murad@hotmail.com

Valdemiro Freitas Neto

Discente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-07467-2583>

E-mail: Freitastrabalhos@gmail.com

Mylena Andréa Oliveira Torres

Docente do Curso de Medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5021-3130>

E-mail: mylena.torres@hotmail.com

RESUMO

Personalidade consiste na quantidade de traços comportamentais do indivíduo que organiza os sistemas físicos, fisiológicos, psíquicos e morais de forma que, interligados, determinam a individualidade de cada ser, assim um transtorno de personalidade é detectado quando esses traços fogem do padrão típico, gerando prejuízo aos próprios indivíduos ou a terceiros que estão ao seu redor. Dessa forma, perante a incidência criminal relacionada a indivíduos com esse transtorno antissocial secundário, o presente estudo tem como objetivo entender a relação dos traumas na infância e o transtorno de personalidade antissocial dentro da psiquiatria forense. O estudo vigente aborda uma revisão integrativa de literatura, realizada por meio de um acervo bibliográfico de artigos científicos, através de uma base de dados das plataformas Google Scholar, *Scientific Electronic Library On-line* (SciELO) e PubMed. Os artigos utilizados datam de 2010 à 2021, são de línguas portuguesa e inglesa e estão diretamente relacionados com o tema “Traumas na infância e o transtorno de personalidade antissocial na psiquiatria forense”. A escolha dos artigos usados para essa revisão integrativa foi realizada por meio da leitura do título, resumo e dos artigos completos encontrados de acordo com a metodologia dessa revisão de literatura. De acordo com o mecanismo de busca foram encontrados 70 resultados. Desses, apenas 12 artigos foram utilizados para a produção do presente estudo, uma vez que os outros não se encaixavam nos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. Portanto, a psiquiatria forense não reconhece que o transtorno de personalidade antissocial deva ser visto como psicopatia, ainda que haja várias semelhanças, para ela não há um pensamento em comum em relação aos psiquiatras a respeito dos comportamentos de indivíduos que possuem o transtorno de personalidade, sobretudo o antissocial.

Palavras-chave: Transtorno de personalidade antissocial; Psicopatia; Forense; Crimes.

ABSTRACT

Personality consists in the number of individual behavioral traits that organizes the physical, physiological, psychological and moral systems and, interconnected, they determine the individuality of each being. Although, a personality disorder is detected when these traits deviate from the typical pattern, causing harm to the individuals or to third parties around them. With the criminal incidence related to individuals with secondary antisocial disorder, the present study wants to understand the relationship between childhood trauma and antisocial personality disorder within forensic psychiatry. The current study is about an integrative literature review, carried out through a bibliographic collection of scientific articles, through a database of Google Scholar, Scientific Electronic Library On-line (SciELO) and PubMed platforms. The articles used date from 2010 to 2021, are in Portuguese and English and are directly related to the topic “Childhood trauma and antisocial personality disorder

in forensic psychiatry”. The choice of articles used for this integrative review was performed by reading the title, abstract and full articles found in accordance with the methodology of this literature review. According to the search engine, 70 results were found. Of these, only 12 articles were used for the production of this study, since the others did not fit the established inclusion and exclusion criteria. Therefore, forensic psychiatry does not recognize that antisocial personality disorder should be seen as psychopathy, even though there are several similarities, for it there is no common thought in relation to psychiatrists regarding the behavior of individuals who have the personality disorder, especially the antisocial.

Keywords: Antisocial personality disorder; Psychopathy; Forensic; Crimes.

INTRODUÇÃO

O Transtorno de Personalidade Antissocial (TPAS) é definido, pelo DSM-V, como um padrão difuso de desconsideração por si e pelos outros e por violação dos direitos alheios, sendo os critérios diagnósticos os que seguem: fracasso em ajustar-se as normas, tendência à falsidade, impulsividade, ou fracasso em fazer planos para o futuro, irritabilidade, descaso pela segurança própria ou dos outros, irresponsabilidade e ausência de remorso (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). A presença de dados que comprovam que crianças e jovens vítimas de experiências traumáticas incluindo abusos físicos e psicológicos concluem que são potencialmente mais vulneráveis a apresentarem traços e condutas antissociais, e que estes na vida adulta podem ser determinantes para ações delitivas associadas à violência, abuso de drogas, comportamentos destrutivos e criminosos.

Há aqueles indivíduos que apresentam comportamentos e condutas antissociais, mas que não se enquadram em todos os critérios para TPAS, que segundo o DMS-V, é necessário a presença de três ou mais dos itens elencados acima e com início antes dos 15 anos (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). Além disso a prevalência de comportamentos antissociais é maior do que o TPAS, o que não configura necessariamente um transtorno, mas sim um comportamento que pode estar presente em pessoas com ausência de patologias mentais.

Ademais, também há autores que utilizam a personalidade antissocial associada a psicopatia, que é um caso mais grave de comportamento, e atribui aos indivíduos maior probabilidade de reincidirem no contexto criminal e baixas possibilidades de reabilitação. A maioria dos psicopatas satisfazem os critérios para TPAS, não se pode dizer que todos os indivíduos com TPAS são psicopatas.

A existência de bases que apontam o comportamento antissocial e criminalidade como resultado de inúmeros fatores ambientais para TPAS como exposição intrauterina a composições tóxicas, complicações perinatais, descaso na infância, abuso e relações familiares prejudiciais, demonstram que dentre os fatores predisponentes para o desenvolvimento de condutas delitivas estão

baixa condição socioeconômica, separação conjugal ou pais solteiros, família numerosa, déficit de atenção, baixo QI, abandono escolar e doença mental dos genitores.

Diversos estudos comprovam a existência da relação entre a qualidade do vínculo parenteral na infância e seu papel fundamental no desenvolvimento de comportamentos e condutas antissociais na vida adulta, além da ausência de acompanhamento parenteral levam a maior probabilidade de desenvolver traços antissociais, resultando que uma boa qualidade no vínculo entre pais e filhos são determinantes protetores contra TPAS no futuro.

Por essa razão ter consciência que sintomas desse transtorno podem ser identificados ainda no período da infância, pode auxiliar muitos pais a darem uma educação e buscar um tratamento diferenciado para seus filhos, com a intenção de que lhes seja ensinado a diferença entre o certo e o errado, e que por mais que o errado ofereça determinado prazer, as atitudes erradas não devem ser praticadas.

Os indivíduos acometidos pelo transtorno de personalidade antissocial como sendo pessoas impossibilitadas de ter uma relação afetuosa, não têm misericórdia, se valem de mentiras, ilusões e trapagens para lesar os outros, até mesmo quem nunca lhe fez nenhum mal, percebendo dessa forma o quão sem caráter são esses indivíduos (SADALLA, 2017).

Dessa forma, as pessoas acometidas por esse transtorno possuem uma conduta que pode ser considerada hostil ou desrespeitosa, podendo infringir o direito alheio, não detém ampla tolerância a frustração, acusando em todos os casos outras pessoas ou a própria sociedade por atos cometidos exclusivamente por elas.

Tendo em vista que os portadores deste transtorno possuem o claro discernimento para a compreensão da realidade, muito embora não tenham controle sobre a prevalência da emoção em face da razão. Seguindo esse entendimento esses transtornos envolvem a desarmonia da afetividade e da excitabilidade com integração deficitária dos impulsos, das atitudes e das condutas, manifestando-se no relacionamento interpessoal.

As analogias presentes entre o transtorno da personalidade antissocial e a psicopatia são várias, ambos os sujeitos abordados tendem a ser invasivos, evidenciam indisciplina, anarquia total, entre outros costumes. Dessa forma, observa-se a associação da psicopatia a um defeito de caráter pelo grau de consideração aos outros. As pessoas que têm deficiência de caráter são insensíveis às necessidades alheias, condição que obedece a um espectro de manifestação: do sujeito ambicioso até o pior dos perversos cruéis (FIORELL; MANGINI, 2020).

Percebe-se então que esse indivíduo não se enquadra na categoria de portador de doença mental, porém encontra-se à margem da normalidade psicoemocional e comportamental. Precisa

então que os profissionais da saúde e do direito possuam uma certa cautela e parcimônia na avaliação e características peculiares.

Assim sendo, a psiquiatria forense não reconhece que o transtorno de personalidade antissocial deva ser visto como psicopatia, ainda que haja várias semelhanças, para ela não há um pensamento em comum em relação aos psiquiatras a respeito dos comportamentos de indivíduos que possuem o transtorno de personalidade, sobretudo o antissocial. Dessa forma, esse artigo tem como objetivo abordar sobre a relação entre os traumas vividos na infância e desenvolvimento do transtorno antisocial no âmbito da psiquiatria forense.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo vigente aborda uma revisão integrativa de literatura, realizada por meio de um acervo bibliográfico de artigos científicos, através de uma base de dados das plataformas Google Scholar, *Scientific Eletronic Library On-line* (SciELO) e PubMed. Os artigos utilizados datam de 2010 à 2021, são de línguas portuguesa e inglesa e estão diretamente relacionados com o tema “Traumas na infância e o transtorno de personalidade antissocial na psiquiatria forense”

Os descritores empregados acompanham o DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) e o Medical Subject Headings (MeSH) no idioma português e inglês, na devida ordem: Traumas na infância (childhood's trauma), transtorno de personalidade (personality disorder), psiquiatria forense (psychiatry forensic).

Nessa revisão de caráter integrativo, foi colocado como critérios de exclusão: revisões de literatura, resumos em eventos, artigos que não cumpriram os critérios de inclusão e artigos duplicados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados dos artigos pesquisados apresentam-se no quadro 1. A escolha dos artigos usados para essa revisão integrativa foi realizada por meio da leitura do título, resumo e dos artigos completos encontrados de acordo com a metodologia dessa revisão de literatura. De acordo com o mecanismo de busca foram encontrados 70 resultados. Desses, apenas 12 artigos foram utilizados para a produção do presente estudo, uma vez que os outros não se encaixavam nos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos.

Quadro 1. Principais Resultados dos artigos selecionados para o estudo.

Autor, ano	Título	Objetivo	Observações
ALMEIDA <i>et al</i>, 2019.	Trauma na infância, transtornos psiquiátricos e conduta antissocial em mulheres: avaliação dos níveis de concentração sérica de BDNF.	Avaliar variáveis sociodemográficas, clínicas e neurobiológicas em mulheres encarceradas.	O estudo revelou, que a presença de transtornos psiquiátricos e a exposição a eventos traumáticos precoces são altamente prevalentes em amostras femininas forenses, representando um grave problema de saúde pública.
OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2019.	Psicopatas e o direito penal brasileiro	Problematizar a questão referente aos agentes portadores do transtorno de personalidade conhecido como psicopatia, e logo, analisar qual o papel do Estado frente à penalização desses agentes.	O estudo revelou, que existem possíveis fatores desencadeantes do transtorno de personalidade antissocial, dentre eles traumas na infância mostram-se intimamente relacionados.
CARDONA GOMES & MARTINS DE ALMEIDA, 2010.	Psicopatia em homens e mulheres.	Discutir as características da psicopatia e, de forma específica, buscar identificar as diferenças existentes entre os sexos.	O estudo concluiu que, os fatores psicológicos, também responsáveis pelo desenvolvimento da psicopatia envolvem as vivências infantis e juvenis desses indivíduos. Essas vivências somadas a mais uma série de fatores podem levar ao enrijecimento do indivíduo e favorecer o desenvolvimento do transtorno de personalidade antissocial.
ERICKSEN & LEMOS MORAIS DO NASCIMENTO, 2018.	Psicopatia, infância e (ir)reversibilidade	Analisar as características dos transtornos de conduta infanto-juvenil com potência a prática criminal.	O estudo concluiu, que o desenvolvimento da psicopatia pode começar por transtornos de conduta ainda na infância e adolescência e que devem ser considerados pela psiquiatria forense.
BORZUK, 2014.	O fortalecimento das explicações naturais para os fenômenos sociais ligados ao crime.	Investigar a natureza das pesquisas que tem como objeto o Transtorno de Personalidade Antissocial e o Comportamento Criminoso no Brasil	O estudo revelou, que a criminalidade pode estar relacionada a fatores anatômicos ou/e funcionais do cérebro, indivíduos portadores dos transtornos de personalidade antissocial e fatores econômicos.

MARTA & MAZZONI, 2010.	Assassinos em série: uma análise legal e psicológica	Analisar quem são, aspectos psicológicos, como devem ser julgados, punidos e tratados os seriais killers.	O estudo concluiu, que os assassinos em série com transtorno de personalidade antissocial, poderiam apresentar o quadro devido consequências psicológicas das vivências sociais e familiares ao longo da vida.
RIOS, 2019.	Crianças e adolescentes psicopatas: transtorno de conduta e suas punições.	Abordar diretamente a vida de uma criança em si, e quais os aspectos que pode influenciar para o desenvolvimento ou a descoberta da psicopatia ainda na infância.	O estudo revelou, que a psicopatia grave pode estar intimamente ligada a traumas na infância como abuso emocional, sexual, físico, negligência, violência, conflitos e separação dos pais.
REBESCHINI, 2017.	Trauma na infância e transtornos de personalidade na vida adulta: relações e diagnósticos	Verificar e discutir traumas na infância e a importância da avaliação, assim como intervenções, ainda na infância a fim de prevenir o desenvolvimento de possíveis transtornos na fase adulta.	O estudo revelou que a exposição de traumas na infância são fatores de risco que podem explicar o desenvolvimento de transtornos da personalidade, havendo necessidade de expandir métodos diagnósticos no Brasil, assim como o tratamento, pois são de grande incidência clínica.
TELLES, FOLINO & TABORDA, 2011.	Incidência de conduta violenta e antissocial em população psiquiátrica forense	Informar a incidência de conduta violenta e antissocial em uma população manicomial e descrever a implementação de um método de registro sistematizado desse fenômeno.	O estudo relatou e destacou a incidência de comportamento violento e antissocial durante o dia, sendo utilizadas intervenções e medir a ocorrência de conduta violenta e antissocial em uma população psiquiátrica forense.
MITJAVILA & MATHES, 2012.	A psiquiatria e a medicalização dos anormais: O papel da noção de transtorno de personalidade antissocial	Analisar a trajetória recente do conceito de transtorno de personalidade antissocial (TPA) no campo da psiquiatria enquanto categoria nosológica que revela algumas das principais tendências contemporâneas dos processos de medicalização da vida social	O estudo examinou a categoria TPA como uma das manifestações do desenvolvimento da noção de “transtorno”, eficiente para estender de maneira considerável os domínios da medicina muito além do campo patológico.

RODRIGUES, 2020.	A Influência de Experiências de Maus-Tratos na Infância nas Várias Dimensões da Psicopatia.	Esclarecer a relação dos maus-tratos na infância e adolescência e as dimensões da psicopatia e de que modo são diferentes entre homens e mulheres	O estudo destaca e evidencia relação dos abusos na infância com as perturbações de personalidade e psicopatia, relatando tipos específicos de maus tratos enquanto fatores etiológicos relevantes para o desenvolvimento dos vários fenótipos da personalidade psicopática.
BINS & TABORDA, 2016.	Psicopatia: influências ambientais, interações biossociais e questões éticas	Abordar a relação e interação da psicopatia entre fatores genéticos, biológicos, ambientais, sociais e psicodinâmicos	O estudo abordou que estressores ambientais são influenciados por vários fatores, não só genética, como ambientais e que a interação entre esses fatores se dá de maneira complexa e ainda pouco entendida, acarretando inúmeros dilemas éticos para o profissional forense

Fonte: Próprio autor.

Por ser definido por um padrão difuso de desconsideração por si e pelos outros e por violação dos direitos alheios, o transtorno de personalidade antissocial tem influência na psiquiatria forense por fazer parte do diagnóstico de pessoas que cometeram crimes. Ao estudar os artigos, foram encontradas diversas definições sobre os fatores responsáveis por esse transtorno. Fatores associados a questões psicológicas que fizeram parte da vida do indivíduo estão relacionados, como episódios traumáticos, além de vivências durante a infância. Traumas na infância mostram-se intimamente relacionados com o desenvolvimento do transtorno de personalidade antissocial (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2019).

Dos artigos selecionados, quatro autores abordam sobre a incidência da psicopatia relacionada também com a infância e outros fatores, sendo caracterizada inicialmente como transtorno de conduta em menores de dezoito anos. Além das questões psicológicas e sociais envolvidas, os psicopatas também possuem prejuízos emocionais ligados ao córtex pré-frontal. Nesse sentido, a criminalidade pode estar relacionada a fatores anatômicos ou/e funcionais do cérebro (BORZUK, 2014) e ligado a traumas na infância como abuso emocional, sexual, físico, negligência, violência, conflitos e separação dos pais (RIOS, 2019). Nesse caso, é considerada psicopatia grave e contribui consideravelmente para os casos analisados judicialmente.

A importância da identificação dos sintomas ainda na infância foi um dos assuntos mais abordados, sendo o tema escolhido por três autores. Os principais sintomas encontrados foram observados no comportamento, como manipulação, mentiras, impulsividade e agressão. Os cuidados

durante essa fase impedem maior manifestação na fase adulta, principalmente se houver acompanhamento por parte dos pais. Desses, dois artigos discorreram sobre a necessidade de expandir métodos diagnósticos e tratamento no Brasil, pois são de grande incidência clínica (REBESCHINI, 2017). Entre os fatores diagnosticados na infância, os traumas continuam sendo os principais e devem ser considerados pela psiquiatria forense (ERICKSEN & LEMOS MORAIS DO NASCIMENTO, 2018).

Dois autores abordaram a íntima relação entre maus tratos na infância e alterações psiquiátricas de personalidade e psicopatia que têm sido expressas durante o desenvolvimento psíquico e comportamental do indivíduo. O grau elevado de abusos e negligência parenterais, além da idade da criança estão associados à intensidade da psicopatia e dos problemas de conduta. Os diferentes tipos de abuso resultam em resposta distintas relacionadas aos transtornos desencadeados. A literatura fala que maus tratos físicos estão ligados ao desenvolvimento de características antissociais. O abuso emocional está associado a traços de frieza emocional e psicopatia em geral, este tipo é o mais comum. E por fim, o abuso sexual pode desencadear distúrbios de conduta na juventude e, em casos mais graves, psicopatias por facetas sexuais (RODRIGUES, 2020).

Somente um dos artigos estudados trouxe a forte correlação entre fatores ambientais e traços de psicopatia no indivíduo afetado. O modelo clássico biopsíquico-social traz como principais responsáveis por essa alteração psíquica, fatores genéticos e neurobiológicos. Na atualidade, tem-se visto que estressores ambientais podem influenciar fatores biológicos, independente do acometimento genético, trazendo consigo repercussões no desenvolvimento da psicopatia. Esses estressores atuam na expressão gênica, alterando o padrão do cérebro e desenvolvendo traços psicopáticos, acarretando elevado risco para essa patologia (BINS & TABORDA, 2016). É complexa a relação entre fatores genéticos, ambientais, sociais, biológicos e psicodinâmicos e pouco entendida no meio científico, mas está clara a mínima relação multifatorial para o desenvolvimento do quadro no paciente com necessidades de auxílio da equipe multiprofissional para o manejo de casos relacionados à psicopatia (MITJAVILA & MATHES, 2012).

Não é fácil concluir a conceituação do termo psicopata, uma vez que vários autores se referem ao termo de formas tão distintas. Apesar de o termo significar doença da mente (na origem: *psyche* = mente; *pathos* = doença), o termo pode dar uma falsa impressão de que estamos lidando somente com doentes mentais, mas esses indivíduos não são considerados loucos e não sofrem com qualquer tipo de perturbações (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2019).

Alguns transtornos de personalidade colocam o indivíduo mais frequentemente em confronto com a lei, como é o caso do transtorno de personalidade antissocial (TPAS). A relação entre TPAS e o construto psicopatia é controversa: alguns consideram TPAS e psicopatia como o mesmo

transtorno, no entanto, apesar dos muitos aspectos comuns e áreas de intersecção, os termos não são intercambiáveis. Na psicopatia, há um predomínio de perturbações relacionais e emocionais, já no TPAS, predominam as perturbações comportamentais. A maioria dos indivíduos psicopatas tem diagnóstico de TPAS, mas o inverso não é verdadeiro (BINS & TABORDA, 2016).

Psicopatas, são agentes que não internalizaram a lei, que transgridam com facilidade e sem qualquer sentimento de culpa ou preocupação com as consequências de seus atos. Por isso, pode-se dizer que não são regidos pelas definições de certo ou errado, não possuindo, por muitas vezes, senso de ética, na qual está baseada as relações emocionais do homem médio (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2019).

No que toca à relação entre maus-tratos na infância e psicopatia, estudos reportam que crianças abusadas e negligenciadas apresentam valores mais altos de psicopatia na adolescência e idade adulta, revelando que eventos traumáticos durante a infância se relacionam de modo diferente com traços psicopáticos entre homens e mulheres. Em particular, o abuso sexual está associado à severidade dos níveis de psicopatia e ao desenvolvimento de traços tanto de manipulação, quanto de egocentrismo (RODRIGUES, 2020).

CONCLUSÃO

Portanto, a psiquiatria forense não reconhece que o transtorno de personalidade antissocial deva ser visto como psicopatia, ainda que haja várias semelhanças, para ela não há um pensamento em comum em relação aos psiquiatras a respeito dos comportamentos de indivíduos que possuem o transtorno de personalidade, sobretudo o antissocial.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **DSM-5 – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders**. 5ª ed. Arlington: American Psychiatric Association, 2013.

ALMEIDA, H. D. DE C. B. *et al.* **Trauma na infância, transtornos psiquiátricos e conduta antissocial em mulheres: avaliação dos níveis de concentração sérica de BDNF**. 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufcspa.edu.br/jspui/handle/123456789/1641>.

BINS, H; TABORDA, J. Psicopatia: influências ambientais, interações biossociais e questões éticas. **Debates em Psiquiatria**, v. 6, n. 1, p. 8-15, 2016.

BORZUK, Cristiane Souza. **O fortalecimento das explicações naturais para os fenômenos sociais ligados ao crime**. 2014. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47131/tde-20102014-124502/en.php>

CARDONA GOMES, Cema; MARTINS DE ALMEIDA, Rosa Maria, Psicopatia em homens e mulheres. **Arquivos Brasileiros de Psicologia [Internet]**, v. 62, n. 1, p.13-21, 2010.

ERICKSEN, L.; LEMOS MORAIS DO NASCIMENTO, M. C. Psicopatia, infância e (ir) reversibilidade. **Revista FIDES**, v. 9, n. 1, p. 77-100, 2018.

FIGUEIREDO, A. L. *et al.* Childhood trauma and its association with mood disorders in adulthood: a systematic review. **Psicologia em Revista**, v. 19, n. 3, p. 480-496, 2013.

FIORELLI, José O. MANGINI, Rosana C. R. **Psicologia Jurídica**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

MARTA, Taís Nader; MAZZONI, Henata Mariana de O. Assassinos em série: uma análise legal e psicológica. **Pensar-Revista de Ciências Jurídicas**, v. 15, n. 1, p. 303-322, 2010.

MITJAVILA, M.; MATHES, P. A psiquiatria e a medicalização dos anormais: o papel da noção de transtorno de personalidade antissocial. **INTERthesis: Revista Internacional Interdisciplinar**, v. 9, n. 2, p. 84-100, 2012.

OLIVEIRA, Mayara Aparecida Cesar de; OLIVEIRA, Fernando Aparecido Alves de. Psicopatas e o direito penal brasileiro. 2019. Disponível em: <http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/3596>.

REBESCHINI, Carol. Trauma na infância e transtornos da personalidade na vida adulta: relações e diagnósticos. **Saúde e Desenvolvimento Humano**, v. 5, n. 2, p. 67-74, 2017.

RIOS, Dayane Ribeiro. Crianças e adolescentes psicopatas: transtorno de conduta e suas punições. 2019. Monografia. Faculdade Vale do Cricaré. Disponível em: <https://repositorio.ivc.br/handle/123456789/95>

RODRIGUES, I. T. DE S. **A Influência de Experiências de Maus-Tratos na Infância nas Várias Dimensões da Psicopatia**. 2020. Dissertação de Mestrado. Universidade do Porto. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/131527/2/436856.pdf>

SADALLA, Nachara Palmeira. **Psicopata, Imputabilidade Penal e Psicopatia**: a outra face no espelho. 1ª edição. Lumen Juris, 2017.

TELLES, L; FOLINO, J; TABORDA, J. Incidência de conduta violenta e antissocial em população psiquiátrica forense. **Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul**, v. 33, p. 03-07, 2011.

CAPÍTULO 5

ABUSO DE DROGAS NO PERÍODO GESTACIONAL: IMPLICAÇÕES AO RECÉM- NASCIDO

Capítulo 5

ABUSO DE DROGAS NO PERÍODO GESTACIONAL: IMPLICAÇÕES AO RECÉM-NASCIDO

DRUG ABUSE IN THE PREGANCY PERIOD: IMPLICATIONS ON THE NEWBORN

Andressa Fernanda dos Santos Melo Oliveira

Discente do curso de medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9777-4920>

*Autor correspondente, e-mail: andressasantos2012@yahoo.com.br

Júlia Leite Xavier Bertrand

Discente do curso de medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2788-6871>

E-mail: juubertrand@gmail.com

Mariana Veras Carvalho Branco

Discente do curso de medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8482-7117>

E-mail: marianabranco3004@gmail.com

Maria Fernanda Campos Fonseca

Discente do curso de medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3121-6077>

E-mail: maria.fernanda.baby@hotmail.com

Bruna Luise de Almeida Carvalho

Discente do curso de medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8808-5111>

E-mail: brunawar@hotmail.com

Valdemiro Freitas Neto

Discente do curso de medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0747-2583>

E-mail: Freitastrabalhos@gmail.com

Aline Duailibe Mendonça Felix

Discente do curso de medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8210-5698>

E-mail: aline.dmf@hotmail.com

Vitória Carvalho Lima

Discente do curso de medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3404-7694>

E-mail: vitoria.carvalho.lima@hotmail.com

Luiza Vitória de Sousa Barros Fonseca

Discente do curso de medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0852-5309>

E-mail: lv.luizah@hotmail.com

Ana Clara de Almeida Mendes

Discente do curso de medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4989-1778>
E-mail: anamendesclara30@gmail.com

Mylena Andréa Oliveira Torres

Docente do curso de medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5021-3130>
E-mail: mylena.torres@hotmail.com

RESUMO

O presente trabalho apresenta uma revisão integrativa que busca demonstrar a relação entre a abstinência do uso de drogas em mulheres grávidas e suas consequências para o neonato. Para o entendimento do tema, foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados Google Scholar e *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), a partir dos seguintes descritores localizados pelo DeCs e MeSH; gestação, neonato e crack, incluindo artigos em inglês e português que sejam pertinentes ao tema. O consumo de drogas durante a gravidez, gera implicações para o binômio mãe/feto, uma vez que ao atravessarem a barreira placentária podem acarretar em alterações na fase intrauterina, como Crescimento Intrauterino Retardado (CIUR), microcefalia e prematuridade. Além disso, dentre as implicações para os neonatos podemos apontar baixo peso ao nascer, maior predisposição para doenças e infecções de vias respiratórias e efeitos teratogênicos. Pela mesma razão, a principal consequência do uso de substâncias psicoativas durante a gestação é a síndrome da abstinência fetal, na qual o recém-nascido desenvolve sintomas como irritação, hipertonicidade, agitação, alteração de humor, sucção sem controle e impraticabilidade de consolo. Portanto, fica evidente que o abuso de substâncias psicoativas pode trazer graves consequências tanto para a mãe quanto para o feto, tornando-se um problema de saúde pública.

Keywords: Gestação; Neonato; Crack.

ABSTRACT

This paper presents an integrative review that aims to demonstrate the relationship between abstinence from drug use in pregnant women and its consequences for the neonate. To understand the theme, a literature search was conducted in the Google Scholar and Scientific Electronic Library Online (SciELO) databases, based on the following descriptors located by DeCs and MeSH; pregnancy, neonate, and crack, including articles in English and Portuguese that are pertinent to the theme. The consumption of drugs during pregnancy has implications for the mother/fetus binomial, once they cross the placental barrier they can cause alterations in the intrauterine phase, such as Intrauterine Growth Retardation (IUGR), microcephaly and prematurity. Furthermore, among the implications for neonates are low birth weight, increased predisposition to respiratory tract diseases and infections, and teratogenic effects. For the same reason, the main consequence of psychoactive substance use during pregnancy is fetal abstinence syndrome, in which the newborn develops symptoms such as irritation, hypertonicity, agitation, mood swings, uncontrolled sucking, and impractical consoling. Therefore, it is evident that the abuse of psychoactive substances can bring serious consequences to both the mother and the fetus, becoming a public health problem.

Keywords: Gestation; Neonate; Crack.

INTRODUÇÃO

A gestação compreende um processo que produz diversas alterações no organismo materno com o objetivo fundamental de adequá-lo às necessidades orgânicas específicas do complexo materno-fetal e do parto (REIS, 1993). Para isso, estrutura-se a circulação fetal, pois através dela, a placenta, assumindo as funções de intestinos (suprimento de nutrientes), rins (retirada dos produtos de degradação) e pulmões (trocas gasosas), conecta o feto ao meio externo. Desse modo, através dos vasos sanguíneos do cordão umbilical, o feto recebe todo o apoio de oxigênio e nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. No entanto, essa conexão também permite a passagem de substâncias nocivas ao feto, como as drogas (MATTOS, 1997).

Ao que se refere ao uso de drogas, as quais são definidas como qualquer substância natural ou sintética capaz de modificar funções orgânicas quando introduzidas no organismo, nota-se um aumento do seu consumo atingindo mulheres em idade fértil, ou seja, que estão propensas a engravidar (MAIA, PEREIRA & MENEZES, 2015). Dentre as substâncias ilícitas apresentadas a esse público feminino, as mais consumidas são o crack e a cocaína, drogas psicoestimulantes que podem acelerar a atividade do Sistema Nervoso Central (KASSADA *et al.*, 2013).

No contexto da gravidez, o abuso de drogas no período gestacional gera implicações tanto para a mãe, quanto para o bebê. Visto que, ao atravessarem a barreira placentária, as drogas podem comprometer irreversivelmente a integridade do binômio mãe/feto (RUGOLO *et al.*, 2000). Dentre essas perturbações, algumas são possíveis de observar ainda no período intrauterino - Crescimento Intrauterino Retardado (CIUR), microcefalia e prematuridade - mas também fora dele, já no recém-nascido. Dentre as implicações para o recém-nascido (RN), estão presentes: nascimento de baixo peso, maior predisposição para doenças e infecções de vias respiratórias, Síndrome da Abstinência Neonatal, diminuição do perímetro encefálico e efeitos teratogênicos – malformações físicas e cardíacas, podendo afetar também o tecido cerebral (MAIA, PEREIRA & MENEZES, 2015).

Neste capítulo objetivamos abordar de forma mais profunda sobre as implicações geradas ao recém-nascido pelo abuso no consumo das drogas no período gestacional.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo configura-se como uma revisão integrativa realizada por meio de levantamento bibliográfico nas bases de dados: *Google Scholar e Scientific Eletronic Library On-line (SciELO)*. Os descritores utilizados na pesquisa seguiram o *DeCs (Descritores em Saúde)* e o *Medical Subject Headings (MeSH)*, nos idiomas português e inglês, utilizando os seguintes termos: “gestação” (gestation), “neonato” (neonate) e “crack” (crack). Desta busca, foram encontrados 368 artigos, posteriormente submetidos aos critérios de seleção.

Os critérios de inclusão foram: artigos publicados entre os anos de 2017 e 2021, nas línguas portuguesa e inglesa, que abordavam o tema: Abuso de drogas no período gestacional: implicações ao recém-nascido. Os critérios de exclusão foram: resumos em eventos, artigos que não cumpriam os critérios de inclusão supracitados e artigos duplicados.

Com isso, a seleção resultou em 10 artigos que foram submetidos à análise seletiva, exploratória e interpretativa para coletar os dados para este estudo. Os resultados foram apresentados em um quadro, de forma a identificar as obras e ordenar o conteúdo estudado.

RESULTADOS

Os resultados dos artigos avaliados estão expostos no quadro 1. A seleção dos artigos utilizados para essa revisão integrativa foi realizada por meio da leitura do título, resumo e dos artigos completos encontrados a partir da metodologia dessa revisão de literatura. De acordo com o mecanismo de busca foram encontrados os resultados. Desses, apenas 10 artigos foram utilizados para a produção do presente estudo, uma vez que os outros não se encaixavam nos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos.

Quadro 1: Avaliação dos artigos utilizados na pesquisa.

Autor, ano	Título	Objetivo	Observações
SANTOS, Lorena Cardoso de Oliveira, 2019.	Complicações do neonato com dependência química na gestação: revisão de literatura	Analisar quais as complicações causadas ao neonato de mulheres usuárias de drogas durante o período gestacional.	O uso de drogas no período gestacional pode trazer complicações tanto para a gestante quanto para o feto e é necessário que o diagnóstico prévio seja feito durante a consulta pré-natal. Essas complicações trazem dados geralmente irreversíveis.
RIBEIRO, Julia, 2018.	Consequências do uso e abuso da cocaína/crack na gestação	Descrever o uso e abuso da cocaína/crack durante a gestação e suas consequências causadas na saúde da mulher e da criança.	O consumo de cocaína pela população feminina está aumentando cada vez mais, inclusive durante a gestação, sendo considerado um problema grave de saúde pública.
CUNHA, Verônica	Uso de cocaína durante a gestação: riscos e complicações maternas e	Analisar o uso de cocaína durante a gestação, associado com maior	O uso da cocaína traz um impacto direto na saúde da mãe e da

Barros Da, 2021.	fetais e as consequências pós-parto	incidência de abortos espontâneos por descolamento de placenta, nascimentos prematuros e baixo peso neonatal.	criança e é associado com diversos fatores como comorbidades psiquiátricas, pobreza, isolamento social, trauma e violência doméstica.
OLIVEIRA JUNIOR, Hercilio, 2018.	Alterações neurocognitivas e morfométricas cerebrais associadas ao uso do crack	Investigar alterações diferenciais em substância cinzenta cerebral (SC) e prejuízos neurocognitivos entre usuários de crack (CRACK), cocaína inalada (COC) e controles.	Usuários de crack apresentam alterações mais graves em região pré-frontal e prejuízos em funções cognitivas como auto-monitorização e funções executivas quando comparados a usuários de cocaína inalada.
SILVA, Isabella, 2018.	Uso de crack durante a gestação e prematuridade: análise de peso ao nascer e tamanho para a idade gestacional	Analisar, a partir dos nascidos vivos no Hospital São Vicente de Paulo, localizado em Passo Fundo/RS, o peso ao nascer e o tamanho adequado para a idade gestacional dos neonatos de mães referidas como usuárias crônicas de crack.	O desfecho de prematuridade estava exposto nas gestações relacionadas ao uso de crack, assim como o baixo peso ao nascer. Não se encontrou relação entre uso da droga durante a gestação e tamanho inadequado para idade gestacional.
MOUKBEL, 2021.	Efeitos da exposição à cocaína ou crack sobre recém-nascidos de gestantes usuárias	Caracterizar as gestantes usuárias de cocaína-crack e investigar as alterações encontradas nos RN expostos.	Gestantes em uso de drogas apresentaram intensa associação com alta incidência de infecções sexualmente transmissíveis. Recém-nascidos expostos à cocaína-crack durante a gestação possuem maiores morbidades que a população geral.
BARBOSA, et al., 2018.	Repercussões anatomofisiológicas em recém-nascidos expostos a drogas ilícitas no período gestacional: revisão narrativa	Realizar uma revisão de literatura acerca das repercussões anatomofisiológicas em recém-nascidos causados pelo uso de drogas ilícitas no período gestacional.	Um recém-nascido em situação de risco para drogas pode resultar em diversas alterações neurológicas, comportamentais, respiratórias, cardiovasculares, físicas e cinético-funcionais, podendo ser permanentes.

BRAGHINI, Fernanda, 2017.	Uso de tabaco por mães no período da gestação e amamentação: relação do consumo de tabaco pelos filhos quando adultos e análise química do leite materno	Observar a relação do tabagismo materno durante a gestação e/ou amamentação com a iniciação do filho ao tabaco quando adulto, bem como realizar uma análise química do leite materno de mães fumantes, fumantes passivas e não fumantes.	Fatores externos podem levar a iniciação do indivíduo ao consumo do tabaco, porém, o hábito das mães fumantes parece ter relação direta com a iniciação do filho ao tabaco.
BARBOSA, Sandra Mary Silva, 2018.	Alterações neurocomportamentais e padrão postural de recém-nascidos expostos às drogas ilícitas durante o período gestacional	Caracterizar as alterações neurocomportamentais e o padrão postural de recém-nascidos expostos às drogas ilícitas durante o período gestacional.	O estudo revelou que na avaliação neurocomportamental dos RNs é comum o padrão postural em extensão contínua dos membros e tronco.
MOURA, Thaís Cristina Silva, 2017.	Tabagismo e gestação: sobre a responsabilização civil da gestante	Analisar as diversas consequências do tabagismo na gestação segundo pesquisas médico-científicas atuais. Na análise da relação jurídica, relacionou-se tais decorrências aos conceitos de dano, causalidade, perda de chances, imputabilidade e ponderação.	O estudo mostrou que, em relação à gestante tabagista, a possibilidade de aplicação da responsabilidade civil passa necessariamente pelo nexo de imputação da culpa.

DISCUSSÃO

O uso de drogas vem ultrapassando as margens da sociedade e os domínios de controle policial, envolvendo não somente aspectos políticos, mas também médicos, tornando-se, atualmente, um dos mais graves problemas de saúde pública a nível mundial (SANTOS, 2019).

No contexto da gravidez, o uso e a dependência de psicoestimulantes durante a gravidez pode ter consequências físicas graves tanto para a mãe quanto para o feto, tornando-se um grave problema de saúde pública (RIBEIRO, 2018).

Os transtornos psiquiátricos encontrados pelo uso de crack e cocaína, no geral, foram:

- Transtornos de humor
- Transtorno de personalidades
- Transtorno do controle de impulsos;
- Transtornos psicóticos

- Déficit de atenção
- Ansiedade

Em nível global, o consumo de drogas parece ser um evento comum durante a gestação. A prevalência do uso da cocaína, assim como de seu produto alcalinizado, o crack, tem aumentado na população obstétrica nas últimas décadas. Existem pesquisas estimativas que 10% das mulheres norte-americanas consumiram cocaína durante a gravidez, tendo ocorrido complicações, tanto maternas quanto perinatais (CUNHA, 2021).

Uma das principais consequências do uso de substâncias psicoativas durante o período gestacional é a geração da síndrome de abstinência fetal, em que o neonato irá desenvolver sintomas característicos como irritação, hipertonicidade (aumento anormal do tônus da musculatura), agitação, alteração de humor, sucção sem controle e impraticabilidade de consolo. Os sintomas de abstinência podem ser do período fetal ao período neonatal, podendo se manifesta desde o nascimento, em algumas horas, tendo com pico entre o 3º e 14º dias de vida. Em casos extremos, pode apresentar sinais e sintomas clínicos de uso de drogas e metabólitos, percebidos na circulação RN. Vale ressaltar que, os recém-nascidos de mães toxicodependentes em sua maioria são prematuros, com restrição de crescimento intrauterino, apresentam a elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca, e baixo peso (CUNHA, 2021).

O consumo de substâncias dessa dimensão permite que o consumo maior de tais drogas coloque o feto subalterno à mãe, isto é, o bebê possui intensas e maiores consequências. Isso corre em virtude de uma maior exposição fetal, devido ao metabolismo e eliminação serem mais lentos, fazendo com que o líquido amniótico permaneça impregnado dessa substância. Como consequência, pode provocar sofrimento fetal com a presença de mecônio no líquido amniótico, colocando em risco a vida do feto e causando complicações na vida do recém-nascido (OLIVEIRA JUNIOR, 2018).

O desenvolvimento da exposição das crianças a drogas durante a gravidez, demonstrou que há uma mudança de longo prazo, como um quociente baixo Inteligência, dificuldades cognitivas, desatenção, dificuldades de aprendizagem, oscilações de humor e interação, e complicações neuromotoras (OLIVEIRA JÚNIOR, 2018).

Ademais, vale ressaltar que o consumo da cocaína/crack entre as gestantes teve um aumento considerável. Com base no estudo transversal, associado ao coorte pré-natal a partir do estudo de coorte BRISA Foram encontrados resultados de prevalência de 1,45% para o uso de drogas ilícitas, 22,32% para o uso de bebidas alcóolicas e 4,22% para tabaco. A idade média das mães era entre 20-34 anos de idade, 81% do nível de escolaridade variou de 9 a 11 anos de estudos e 75,55% não concluíram o ensino médio e/ou curso técnico e superior (BOTELHO, ROCHA & MELO, 2013).

A cocaína é derivada da planta *Erythroxylon coca*, pode ser administrada em pó, injetada se for diluída em água ou pelo fumo, na sua forma mais bruta, conhecida como crack, que é o resultado da mistura de cocaína com bicarbonato de sódio e/ou amônia, apresenta-se em formas de pequenas pedras e são consumidas em “cachimbos”. Ambos trazem a mesma sensação, o consumo do crack é maior devido ao baixo custo se comparado com a cocaína (forma mais pura), aumentam o estado de alerta, a euforia (capacidade de realizar qualquer atividade sem a sensação de esgotamento físico), sensação de bem-estar devido sua atuação no sistema de recompensa, atuam bloqueando o transporte de dopamina, logo, trazem a sensação de prazer.

Entretanto, possuem efeitos como ataques de pânico e ansiedade, taquicardia, tremores, dilatação das pupilas dos olhos e em relação aos recém-nascidos, além das consequências citadas mais acima, foi notado uma grande quantidade de baixo APGAR, desenvolvimento neuropsicomotor atrasado, desnutrição e baixo peso, malformação congênita e microcefalia. As alterações neurológicas e comportamentais não podem ser consideradas permanente, porém acredita-se no prejuízo funcional em longo prazo (BARBOSA *et al.*, 2018).

Acresce que, o uso do tabaco visto em menor escala na gestação, traz consigo prejuízos severos bem como qualquer outra substância psicoativa. Segundo Braghini (2017), há uma porcentagem significativamente maior para filhos desenvolverem o vício do tabaco por influência direta dos pais, principalmente quando a mãe faz o consumo. O tabaco não somente acarreta prejuízos na gestação, mas tem poder exercido ligado ao aleitamento. O leite quando comparado entre os das mães usuárias e não usuárias pode-se notar presença de substâncias que alteram na composição química, dentre elas foi visto maior acidez, com alteração no pH, nível de sódio elevado e baixo teor de proteína, causando prejuízo na alimentação e nutrição do lactente. Ademais, vale ressaltar que, o primeiro contato do filho com a nicotina, sendo ele ainda no período gestacional ou no pós-parto (amamentação ou fumo passivo), pode resultar em dependência por memória, o que aumenta a chance de após o seu completo desenvolvimento (vida adulta) possa ser usuário regular do tabaco (BRAGHINI, 2017).

CONCLUSÃO

O uso de drogas é reconhecidamente um dos maiores desafios da saúde no mundo. O consumo no período gestacional é ainda mais preocupante pois prejudica diretamente o feto em desenvolvimento. Os sintomas da abstinência podem se apresentar no período fetal e/ou neonatal. Contudo, com a prematuridade, baixo peso ao nascer, restrição do crescimento intrauterino, mal formação congênita, baixo APGAR, microcefalia e atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor, são fatores relatados como desfecho ao uso de drogas na fase gestacional.

REFERÊNCIAS

- BARBOSA, S. M. S. et al. Repercussões anatomofisiológicas em recém-nascidos expostos a drogas ilícitas no período gestacional: revisão narrativa. **Revista de Medicina da UFC**, v. 58, n. 4, p. 46-51, 2018.
- BARBOSA, Sandra Mary Silva. **Alterações neurocomportamentais e padrão postural de recém-nascidos expostos às drogas ilícitas durante o período gestacional**. Dissertação, Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade Federal do Ceará, 78p., 2018.
- BOTELHO, Ana Paula Machado; ROCHA, Regina da Cunha; MELO, Victor Hugo. Uso e dependência de cocaína/crack na gestação, parto e puerpério **FEMINA**, v. 41, n. 1, 2013.
- BRAGHINI, Fernanda. **Uso de tabaco por mães no período da gestação e amamentação: relação do consumo de tabaco pelos filhos quando adultos e análise química do leite materno**. Dissertação, Universidade Cesumar, 117p., 2017.
- CUNHA, Verônica Barros Da. **Uso de cocaína durante a gestação: riscos e complicações maternas e fetais e as consequências pós-parto**. Monografia, Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, Universidade Federal de São Paulo, 42p., 2021.
- KASSADA, D. S. *et al.* Prevalência do uso de drogas de abuso por gestantes. **Acta Paulista de Enfermagem**. v. 26, n. 5, p 468, 2013.
- MAIA, Jair Alves; PEREIRA, Leonardo Assunção; MENEZES, Fernanda de Alcântara. Consequências do uso de drogas durante a gravidez, **Revista Enfermagem Contemporânea**. v 4, n 2, p 122, julho de 2015.
- MATTOS, Sandra S. Fisiologia da Circulação Fetal e Diagnóstico das Alterações Funcionais do Coração do Feto. **Arquivos Brasileiro de Cardiologia**, v 69, n. 3, p 205, 1997.
- MOUKBEL, Yasmin Ciamaricone. **Efeitos da exposição à cocaína ou crack sobre recém-nascidos de gestantes usuárias**. Dissertação, Faculdade de Medicina, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 64p., 2021.
- MOURA, Thaís Cristina Silva. **Tabagismo e gestação: sobre a responsabilização civil da gestante**. Dissertação, Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal de Uberlândia, 147p., 2017.
- OLIVEIRA JUNIOR, Hercilio Pereira de. **Alterações neurocognitivas e morfométricas cerebrais associadas ao uso do crack**. Tese de Doutorado. Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 170p., 2018.
- REIS, G. F. F. Alterações Fisiológicas Maternas da Gravidez. **Revista Brasileira de Anestesiologia**, v 43, n 1, p 3, 1993.
- RIBEIRO, Julia. **Consequências do uso e abuso da cocaína/crack na gestação**. Monografia, Especialização de Enfermagem em Pediatria e Neonatologia, Escola Baiana de Medicina, 18p., 2018.
- RUGOLO L.M.S.*et al.* **Manual de Neonatologia**. São Paulo: Revinter, 2000.
- SANTOS, Lorena Cardoso de Oliveira. **Complicações do neonato com dependência química na gestação: revisão de literatura**. Monografia. Universidade Católica de Salvador, UCSAL, 23p., 2019.
- SILVA, Isabella Gatto Pires. **Uso de crack durante a gestação e prematuridade: análise de peso ao nascer e tamanho para a idade gestacional**. Monografia, Universidade Federal da Fronteira Sul, 51p., 2018.

CAPÍTULO 6

AVALIAÇÃO DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA E PERCEPÇÃO EMOCIONAL DE PACIENTES COM COVID-19

Capítulo 6

AValiação de Nível de Consciência e Percepção Emocional de Pacientes com COVID-19

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF CONSCIOUSNESS AND EMOTIONAL PERCEPTION OF PATIENTS WITH COVID-19

Bianca de Melo Ferro

Acadêmica de Medicina, Laboratório de Neurociências e do Comportamento, Universidade Ceuma, São Luís, MA.

<https://orcid.org/0000-0001-513015953>

E-mail: bferro.br@gmail.com

Hyasmin Bomfim Paranhos

Acadêmica de Medicina, Laboratório de Neurociências e do Comportamento, Universidade Ceuma, São Luís, MA.

<https://orcid.org/0000-0002-4270-1740>

E-mail: hyasmin.b.p@gmail.com

Emmanuel Nazareno de Lima Ferro

Bacharel em Ciências da Computação, São Luís, MA.

<https://orcid.org/0000-0003-4724-0434>

E-mail: emmanuel.ferro@gmail.com

Ana Paula Costa Linhares

Acadêmica de Medicina, Laboratório de Neurociências e do Comportamento, Universidade Ceuma, São Luís, MA.

<https://orcid.org/0000-0002-7260-5450>

E-mail: anapaulacostalinhaires3@gmail.com

Melissa dos Santos Costa

Acadêmica de Enfermagem, Laboratório de Neurociências e do Comportamento, Universidade Ceuma, São Luís, MA.

<https://orcid.org/0000-0002-8364-0761>

E-mail: melissacostaa2@gmail.com

Kaline dos Santos Kishishita Castro

Acadêmica de Medicina, Laboratório de Neurociências e do Comportamento, Universidade Ceuma, São Luís, MA.

<https://orcid.org/0000-0002-9863-2596>

E-mail: kalinecastro2011@gmail.com

Eliza Maria da Costa Brito Lacerda

Docente de Graduação e Pós-Graduação, Laboratório de Neurociências e do Comportamento, Universidade Ceuma, São Luís, MA.

<https://orcid.org/0000-0002-8525-205X>

*Autor correspondente, e-mail: eliza004568@ceuma.com.br

RESUMO

A COVID-19 pode ocasionar acometimentos neurológicos e emocionais graves, nesses casos, se faz necessária a utilização de um mecanismo de avaliação desses padrões para acompanhamento da evolução de pacientes em seu tempo de internação. A Escala de Coma de Glasgow e questionários sobre a impressão de pacientes a respeito de seu estado podem ser mecanismo úteis e acessíveis para

essa avaliação. Dessa forma o objetivo desse estudo foi fazer uma avaliação epidemiológica dos níveis de consciência e autopercepção emocional de pacientes com COVID-19. Para tanto esse trabalho correspondeu à um estudo observacional transversal que avaliou um banco de dados com 1886 registros de prontuários de pessoas internadas diagnosticadas com COVID-19 de um hospital de grande porte em uma capital da Amazônia Legal. Observou-se que os pacientes foram avaliados através da escala de Glasgow para determinar os níveis de consciência e por um questionário de queixas para avaliar a percepção emocional. A maioria dos pacientes possuiu níveis de consciência normal, porém mais de 20% da amostra demonstrou resultados na escala de Glasgow condizentes com uma alteração encefálica severa. Além disso, observou-se que 14% dos pacientes internados apresentavam queixa de medo e ansiedade, dados que eram maiores em pacientes que passaram por muitas transferências. Esses dados corroboram com a informação de que cerca de 20% dos pacientes apresentou algum sintoma neuropsicológico durante a internação por COVID-19.

Palavras-chave: COVID-19; Escala de Coma de Glasgow; Queixa emocional.

ABSTRACT

COVID-19 can cause serious neurological and emotional affections, in these cases, it is necessary to use a mechanism to assess these patterns to monitor the evolution of patients during their hospital stay. The Glasgow Coma Scale and questionnaires on patients' impressions of their status can be a useful and accessible mechanism for this assessment. Thus, the aim of this study was to carry out an epidemiological assessment of the levels of awareness and emotional self-perception of patients with COVID-19. Therefore, this work corresponded to a cross-sectional observational study that evaluated a database with 1886 records of hospitalized people diagnosed with COVID-19 in a large hospital in a capital of the Legal Amazon. It was observed that patients were assessed using the Glasgow scale to determine levels of awareness and a complaints questionnaire to assess emotional perception. Most patients had normal levels of consciousness, but more than 20% of the sample showed results on the Glasgow scale consistent with a severe brain disorder. In addition, it was observed that 14% of hospitalized patients complained of fear and anxiety, data that were higher in patients who underwent many transfers. These data corroborate the information that about 20% of patients had some neuropsychological symptoms during hospitalization for COVID-19.

Keywords: COVID-19; Glasgow Coma Scale; Emotional complaint.

INTRODUÇÃO

COVID-19 é uma doença grave que acomete diversas pessoas ao redor do mundo apresentando sintomas respiratórios e sistêmicos com rápida evolução, podendo causar respostas inflamatórias exacerbadas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). A COVID-19 é ocasionada por infecção pelo vírus SARS-CoV-2 que pode resultar em síndrome respiratória aguda severa que é caracterizada por sintomas respiratórios e gastrointestinais, atualmente estão relacionando também tal doença a acometimentos neurológicos (DA GAMA & CAVALCANTE, 2020).

Sobre sua apresentação clínica, pode ser uma doença com sintomas gripais comuns, com sintomas leves (maioria dos casos), sem desenvolver pneumonia viral ou hipóxia, sintomas moderados (cerca de 15%), com sinais clínicos de pneumonia mas com saturação de O₂ no sangue

maior que 90% ou com sintomas graves (5% dos pacientes), com sinais clínicos de pneumonia (febre, tosse, dispneia, taquipneia) além de uma saturação de oxigênio no sangue periférico menor que 90%, frequência respiratória maior que 30 respirações/minuto ou distúrbio respiratório grave (SILVA FILHO *et al.*, 2021).

Os sintomas neurológicos podem ocorrer em qualquer pessoa contaminada e serem decorrentes de grandes impactos no cérebro e doenças neurológicas possivelmente fatais (DA GAMA & CAVALCANTE, 2020). Sobre os acometimentos neurológicos, há a dúvida se estes são irreversíveis ou não (DA GAMA & CAVALCANTE, 2020). Dentre os sintomas mais comuns são encontrados tontura, anosmia ou hiposmia, hipogeusia ou ageusia, disgeusia, cefaleia, neuralgia, encefalopatia, doenças cerebrovasculares agudas, alteração no nível de consciência e lesão muscular esquelética (SILVA *et al.*, 2020).

Existem muitas ferramentas usadas para a avaliação neurológica dos pacientes, para avaliação dos níveis de consciência, o padrão ouro é a escala de coma de Glasgow que faz uma avaliação com base nas respostas motoras, verbais e oculares (SOUSA & SANTOS, 2021). Em pacientes internados com quadros graves de SARS-CoV-2, foi de extrema importância essa avaliação para o melhor acompanhamento da evolução e prognóstico dos mesmos.

Além disso, a pandemia de COVID-19 considerada, em 2020, uma emergência de saúde global, afetou principalmente indivíduos mais vulneráveis e pessoas que possuem queixas emocionais devido a todo o processo de isolamento, incerteza e sofrimento ocasionado pelo adoecimento e suas sequelas (MUKHTAR & RANA, 2020).

Os transtornos mentais tem características diferentes e se apresentam em sua maioria no cotidiano da pessoa, interferindo em suas relações psicossociais. Sendo assim, os transtornos de ansiedade podem ser subdivididos em tipos diferentes que partilham características como medo anormal acerca do presente, preocupação excessiva acerca do futuro e perturbações comportamentais. (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). Já o medo está relacionado ao comportamento emocional referente a uma possibilidade de perigo, seja ela real ou noticiada (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).

As doenças mentais estão fortemente relacionadas a sintomas físicos, pois podem ser manifestadas associadamente à sudorese intensa, dores de cabeça, irritabilidade, insônia, tensão muscular, etc. Portanto, pessoas que já foram diagnosticadas com algum transtorno psiquiátrico e adquirem COVID-19 acabam por enfrentarem sintomas que emergem da associação entre a infecção e suas condições mentais, o que pode prejudicar o prognóstico desses pacientes (DRUSS, 2020).

Desse modo, durante a pandemia de COVID-19, notou-se o gradual aumento das notificações de queixas emocionais o que torna importante compreender o impacto dos sintomas sobre o

prognóstico das pessoas acometidas pela COVID-19. Além disso, estudos que demonstrem um impacto mais direto da infecção por SARS-CoV-2 sobre o sistema nervoso ainda são muito raros, e pouco se sabe sobre dados epidemiológicos desses acometimentos nos pacientes. Este trabalho teve como objetivo fazer uma avaliação epidemiológica dos o nível de consciência e queixas emocionais de pacientes internados com COVID-19 em um hospital de referência de uma capital na Amazônia Legal.

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho trata-se de um estudo observacional transversal, onde foi analisado um banco de dados de um hospital de grande porte, referência em atendimento para COVID-19 em uma capital da Amazônia Legal. O banco de dados apresentou 1886 registros de pacientes diagnosticados com COVID no período de 17 de março de 2020 à 04 de dezembro de 2020. Foram analisados os seguintes dados disponíveis nos prontuários: pontuação na escala de Glasgow (somente 1877 pacientes passaram por esta avaliação), queixa emocional quanto a percepção de medo e ansiedade por parte do paciente, tempo de internação, idade e sexo. Esses dados passaram por uma análise estatística descritiva.

Esses dados foram colhidos de um hospital de referência numa capital da Amazônia legal e estava aprovado pelo CEP_CEUMA: 4.315.245. A amostra foi subdividida em 4 grupos de desfecho e avaliada por comparação de frequências de sintomas psicológicos.

RESULTADOS

Cerca de 1877 pacientes foram avaliados utilizando a escala de Glasgow, dentre os pacientes avaliados a idade variou de 0 a 96 anos, sendo 888 do sexo feminino e 991 do sexo masculino e 7 pessoas não relataram o sexo. Dentre aqueles que realizaram o teste de Glasgow o tempo de internação variou de 1 a 195 dias.

Todos os 1.886 foram estudados quanto as queixas emocionais (medo, ou ansiedade, ou medo e ansiedade) e o desfecho clínico da doença (alta por melhora n=1508; óbito n= 354; evasão n=3; transferência n=11, ainda sem desfecho ou desfecho ignorado n=8).

Os dados mostram que houve uma repetição na aplicação da escala de Glasgow e que o número de repetições acontecia de acordo com o tempo que os pacientes ficavam internados, de maneira que somente 125 pessoas realizaram a avaliação apenas uma vez, 1285 realizaram de 2 a 10 vezes e 467 realizaram mais de 10 vezes, considerando cada repetição como um evento único foram realizados 16327 testes.

De todos os pacientes que foram submetidos ao teste 69,70% (11380 resultados) obtiveram nota 15 (normal), 4,03% (658 resultados) obtiveram nota de 14 a 13 (disfunção encefálica leve), 4,88% (798 resultados) obtiveram nota de 12 a 9 (disfunção encefálica moderada) e 21,38% (3491 resultados) obtiveram nota de 8 a 3 (disfunção encefálica severa) (Tabela 1).

A média de nota da Escala de Coma de Glasgow para pacientes com Covid-19 foi 12 com desvio padrão 4,74.

Tabela 1. Relação entre a pontuação da Escala de Coma de Glasgow, a frequência e o significado da pontuação.

Pontuação Glasgow	Frequência	Significado
3 – 8	3491	Disfunção/lesão encefálica severa
9 – 14	1456	Disfunção/lesão encefálica moderada
15	11380	Normal

Em relação entre o desfecho clínico de pacientes internados com COVID-19 e sintomas psicológicos no momento da internação, observou-se que pacientes com desfecho de evasão e pacientes ainda sem desfecho ou com desfecho ignorado não apresentaram queixa psicológica na internação. Pacientes que posteriormente passaram por transferência apresentaram maior frequência (28%) de queixa psicológica relacionadas à medo e ansiedade no momento da internação quando comparados aos outros grupos. Pacientes com posterior alta por melhora apresentaram menor frequência de queixa psicológica no momento da internação (16,7%) (Tabela 2).

Tabela 2. Frequência de sintomas neurológicos por desfecho clínico de pacientes.

Desfecho	N	Ansiedade	Medo/ansiedade	Medo	Sem sintomas psicológicos
Alta por melhora	1508	104 (6,9%)	115 (7,62%)	28 (1,9 %)	1256 (83,3%)
Ainda sem desfecho	5	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (100%)
Desfecho ignorado	3	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (100%)
Alta por evasão	3	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (100%)
Óbito	354	19 (5,4%)			292 (82,5%)
Transferência com COVID-19.	11	1 (9,1%)	1 (9,1%)	1 (9,1%)	8 (72%)

DISCUSSÃO

Na atual pesquisa, foram feitos testes para avaliar o nível de consciência em alguns pacientes com COVID-19 internados no hospital referência na região Norte. A avaliação do nível de consciência de um paciente é de extrema importância para saber qual o melhor tratamento e prognóstico do mesmo. Essa ferramenta de avaliação utilizada é uma escala clássica desenvolvida em 1974 na Universidade de Glasgow, a Escala de Coma de Glasgow (ECG) e corresponde à um instrumento neurológico barato e eficaz, e costuma ser utilizada para medir nível de consciência em pacientes traumatizados (KOIZUMI & ARAÚJO, 2005; SOUZA *et al.*, 2021).

Tendo em vista a praticidade e eficácia dessa escala, ela foi a escolhida para ser utilizada nesse hospital de referência como uma forma de avaliando da progressão de pessoas internadas com quadro grave de COVID-19.

Nossos achados demonstram que cerca de 70% dos pacientes tiveram pontuação de níveis de consciência normal para a escala de Glasgow, significando que possuíam resposta motora, verbal e ocular. Apesar disso, a literatura descreve que dentre os acometimentos no SNC, os sintomas mais comuns são neuralgia, encefalopatia, doenças cerebrovasculares agudas, alteração no nível de consciência e lesão muscular esquelética (SILVA *et al.*, 2020) que podem estar relacionados aos mais de 20% dos resultados apresentaram alteração encefálica grave, de acordo com os critérios avaliados na escala de Glasgow.

Algumas pesquisas apontam, ainda, que em casos mais graves de COVID-19, a encefalopatia se mostrou um dos principais sintomas manifestados no SNC, podendo dar origem a alterações metabólicas, hipóxia e isquemia (BARRETO *et al.*, 2021).

Apesar dos resultados observados na escala, é necessário ter muito cuidado com fatores de confusão que podem estar relacionados a uma pontuação alta na escala, como sedação, o uso de relaxantes musculares de curta duração, hipotermia, hipotensão, hipóxia, intubação endotraqueal/traqueostomia e edema palpebral (KOIZUMI & ARAÚJO, 2005). Nesses casos, não é indicado compensar a falta de abertura dos olhos ou a perda da resposta verbal em pacientes com trauma periorbital ou intubados, respectivamente (LIZ *et al.*, 2012).

Além disso, em 2018, foi divulgada na 10ª edição do livro Advanced Trauma Life Support (ATLS 10) a atualização da ECG que incluiu a pesquisa do reflexo pupilar (ECG-P) aos testes de resposta ocular, verbal e motora. Essa atualização tornou a escala um instrumento ainda mais amplo e completo para os métodos de classificação dos cuidados emergenciais do Protocolo de Manchester, sistema de triagem que classifica pacientes quanto ao risco. Dessa forma é possível que o valor da escala chegue a 1 (DE ALMEIDA SILVA & CUNHA, 2020).

Nosso estudo utilizou um banco de dados com 16.327 resultados do teste da escala de Glasgow de 1.877 pacientes e foi observado que o tempo de internação variou de 1 à 195 dias e tal parâmetro explica a maior ou menor quantidade de testes por paciente. A repetição da aplicação da escala acontecia de acordo com a gravidade dos casos e tempo de internação.

Em relação às queixas emocionais, o presente estudo mostra a relação entre queixas mentais e o prognóstico dos pacientes de COVID-19. Quanto as queixas psíquicas, foram usados como referência a ansiedade e o medo os quais apresentam sintomas de exacerbação da preocupação acerca de um perigo iminente ou ilusório que pode acontecer no momento atual ou futuramente (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).

Quando pacientes relatam que sentem medo, ansiedade, tristeza ou todos esses sintomas, geralmente eles se apresentam de forma diferente dos transtornos psíquicos os quais são considerados sensações excessivas que persistem por períodos além do esperado e prejudicam as atividades diárias da pessoa, diferentemente do medo e da ansiedade que ocorrem casualmente e desencadeiam sensações momentâneas (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).

Evidências sugerem que a saúde mental da população em geral piorou no ano de 2020, frisando que a pandemia, devido a todos os seus aspectos conturbadores psicológicos, sociais e econômicos acabou gerando novos casos de queixas emocionais e intensificando as preexistentes (KAR *et al.*, 2020).

A população que adoeceu durante esse momento delicado apresentou sentimentos como rancor, raiva, por vezes se sentiam sozinhos e responsabilizavam terceiros por todo o sofrimento vivenciado. Assim, a soma de sentimentos e sensações como essas levava o ser humano a ter um “mental breakdown”, também conhecido como uma crise mental (KAR *et al.*, 2020).

Estudos foram realizados com base em profissionais da saúde que estavam trabalhando em um hospital durante o começo da pandemia e em sua maioria tinham contato com pacientes positivados para COVID-19. Os resultados destacaram que, em geral, os trabalhadores que tinham contado com os pacientes e continuavam residindo em suas casas obtiveram altos riscos de ter psicopatologias como o aumento significativo da ansiedade, evento no qual pode ser devido ao medo de infectar seus familiares ou receio do preconceito exercido pela sociedade acerca da doença (KUKI *et al.*, 2020).

Nesse estudo, os autores se basearam em um paciente diagnosticado com COVID-19 que precisou ser internado em isolamento devido a febre, fraqueza e tosse. Esse paciente não apresentou febre e nem sintomas respiratórios durante o período de internação, porém desenvolveu ansiedade e insônia levando a uma tentativa de suicídio, o que gerou a transferência para o centro cirúrgico e alas de trauma, mostrando que os pacientes que passam pelo processo de internação ficam com problemas

emocionais que podem ser agravados por sintomas físicos os quais aumentam também o número de transferências hospitalares e piora no quadro do paciente (EPSTEIN *et al.*, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível observar que houve preocupação com sintomas neurológico e emocionais de pacientes internados com COVID-19 na Amazônia Legal. Os pacientes foram submetidos à avaliação pela escala de Glasgow e um questionário de queixas.

Observou-se que cerca de 20% da amostra apresentou resultado de nível de consciência condizente com alteração encefálica severa e cerca de 14% apresentou queixa de medo e / ou ansiedade.

O método de análise realizado é, de forma mais geral, rústico pois captura condições extremas, e mesmo assim foi capaz de descrever importantes danos envolvendo o sistema nervoso o que nos faz sugerir que os pacientes com COVID-19 precisam ser melhor investigados quando a presença de danos nas funções neurológicas e psicológicas.

Mais estudos envolvendo essa temática precisam ser descritos.

FONTES DE FINANCIAMENTO

FAPEMA-COVID-19-00778/20.

REFERÊNCIAS

AMERICAN COLLEGE OF SURGIONS COMMITTEE ON TRAUMA. **Advanced Trauma Life Support – ATLS**. 10 ed., 2018.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5**. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. P. 189.

BARRETO, A. D., *et al.* Encefalopatia relacionada a covid-19: Uma revisão narrativa. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 5, pp. 21193-21203, 2021.

DA GAMA, B. D. S.; CAVALCANTE, K. N. Pandemia do covid-19: acometimento neurológico e os impactos cerebrais. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 6, 01 nov. 2020.

DE ALMEIDA SILVA, L. C.; CUNHA, J. Importância da atualização da escala de coma de Glasgow e inclusão da avaliação pupilar em sua aplicabilidade ao protocolo de manchester. **In Anais do Congresso Regional de Emergências Médicas (CREMED-CO)**, n. 3, 2020.

DRUSS, Benjamin G. Addressing the COVID-19 pandemic in populations with serious mental illness. **JAMA psychiatry**, v. 77, n. 9, p. 891-892, 2020.

KAR, S. K. *et al.* Coping with mental health challenges during COVID-19. In: **Coronavirus disease 2019 (COVID-19)**. Springer, Singapore, 2020. p. 199-213.

KOIZUMI, M. S.; ARAÚJO, G. L. D. Escala de Coma de Glasgow: subestimação em pacientes com respostas verbais impedidas. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 18, n. 2, pp. 136-142, 2005.

KUKI, K. *et al.* Effects of contact with COVID-19 patients on the mental health of workers in a psychiatric hospital. **Psychiatry and Clinical Neurosciences**, 2020.

LIZ, N. A., ARENT, A.; NAZÁRIO, N. O. Características clínicas e análise dos fatores preditivos de letalidade em pacientes com Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) admitidos em Unidade de Tratamento Intensivo. **Arquivos Catarinenses de Medicina (ACM)**, v. 41, n. 1, 2012.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Disponível em: http://www.coronavirus.ms.gov.br/?page_id=31. Acesso em: 29 de novembro de 2021.

MUKHTAR, Sonia; RANA, Waleed. COVID-19 and individuals with mental illness in psychiatric facilities. **Psychiatry research**, v. 289, p. 113075, 2020.

SILVA FILHO, P. S. da P. *et al.* Pneumonia caused by COVID-19 and the importance of diagnosis as a benefit for treatment. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 5, p. e14710514600, 2021.

SILVA, M. R., *et al.* Complicações Neurológicas do SARS-CoV-2. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 5, p. 14810-14829, 21 out. 2020.

SOUSA, L. M. de.; SANTOS, M. V. F. dos. Application of the Glasgow coma scale: a bibliometric analysis of publications in the field of Nursing. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 14, p. e48101421643, 2021.

SOUZA-COUTO, D.; SILVA, N. B. da.; CARDOSO, E. J. R. Health students' knowledge assessment on the Glasgow Coma Scale at the University of Minas Gerais. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 9, p. e2410917798, 2021.

VELAVAN, Thirumalaisamy P.; MEYER, Christian G. The COVID-19 epidemic. **Tropical medicine & international health**, v. 25, n. 3, p. 278, 2020.

CAPÍTULO 7

TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE EM MULHERES

Capítulo 7

TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE EM MULHERES

ATTENTION DEFICT DISORDER WITH HYPERACTIVITY IN WOMEN

Beatriz Barrozo Gonzalez Oliveira

Discente do curso de medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9496-3435>

E-mail: bbgo2000@yahoo.com.br

Andressa Fernanda dos Santos Melo Oliveira

Discente do curso de medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9777-4920>

E-mail: andressasantos2012@yahoo.com.br

Ana Caroline Batista Veras

Discente do curso de medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5270-2990>

E-mail: carolveras1705@gmail.com

Bruna Gonçalves Dantas de Almeida

Discente do curso de medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1874-7968>

E-mail: brunaalmeidag@icloud.com

Maria Isabella Farias de Araújo

Discente do curso de medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

<https://orcid.org/0000-0002-8639-7912>

E-mail: isabellafdaraujo@outlook.com

Mylena Andréa Oliveira Torres

Docente do curso de medicina, Universidade Ceuma, São Luís, MA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5021-3130>

*Autor correspondente e-mail: mylena.torres@hotmail.com

RESUMO

O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) é uma síndrome neurocomportamental definida pela presença persistente de hiperatividade, desatenção e impulsividade. Isso interfere no desenvolvimento cognitivo dos indivíduos e pode ocasionar transtornos de cunho motor e comportamental, cujos primeiros sintomas surgem, geralmente, na infância e se estendem até a idade adulta. Objetivou-se evidenciar o descaso na validação de sintomas específicos do sexo feminino no momento do diagnóstico de TDAH. O método de estudo tratou-se de uma revisão integrativa de literatura, realizada por meio de um acervo bibliográfico de artigos científicos, através de uma base de dados das plataformas Google Scholar, *Scientific Eletronic Library On-line* (SciELO) e *PubMed*. Os artigos utilizados datam de 2019 à 2021, são de línguas portuguesa e inglesa e estão diretamente relacionados com o tema “Implicações diagnósticas do TDAH em mulheres adultas”. Foi averiguado que meninas são menos diagnosticadas na infância, pois apesar de apresentarem demais características como a desatenção, humor lábil e desprendimento, não apresentam elevado grau de

hiperatividade como o sexo masculino, fato que mascara a doença no sexo feminino. Portanto é possível inferir que devido a tais características há indícios de subdiagnóstico de TDAH no sexo feminino por conta de dificuldades em encaixar esse público dentro dos critérios diagnósticos, que por sua vez, estão voltados a realizar aferências ao gênero masculino, logo, é necessário fomentar estudos sobre o tema, no intuito de reduzir as lacunas pertinentes ao diagnóstico do TDAH em mulheres, além de permitir seu diagnóstico precoce, para que a terapia seja instituída de forma célere, de forma a evitar danos ao desenvolvimento neuropsicomotor destas pacientes e potencializar o ganho de qualidade de vida.

Palavras-chave: Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Sexo feminino. Clínica. Diagnóstico.

ABSTRACT

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a neurobehavioral syndrome defined by the persistent presence of hyperactivity, inattention, impulsivity. This interferes with the cognitive development of individuals and can cause motor and behavioral disorders, whose first symptoms usually appear in childhood and extend into adulthood. The objective was to show the neglect in the validation of specific female symptoms at the time of ADHD diagnosis. The study method was an integrative literature review, carried out through a bibliographic collection of scientific articles, through a database of the platforms Google Scholar, Scientific Electronic Library On-line (SciELO) and PubMed. The articles used date from 2019 to 2021, are in Portuguese and English and are directly related to the topic “Diagnostic implications of ADHD in adult women”. It was found that girls are less diagnosed in childhood, as despite having other characteristics such as inattention, labile mood and detachment, they do not show a high degree of hyperactivity as males do, a fact that masks the disease in females. Therefore, it is possible to infer that, due to such characteristics, there is evidence of underdiagnosis of ADHD in females due to difficulties in fitting this audience into the diagnostic criteria, which in turn, are aimed at making afferents to the male gender, therefore, it is necessary to promote studies on the subject, in order to reduce the gaps relevant to the diagnosis of ADHD in women, in addition to allowing its early diagnosis, so that the therapy can be instituted quickly, in order to avoid damage to the neuropsychomotor development of these patients and enhance the gain of quality of life.

Keywords: Attention deficit disorder with hyperactivity. Womankind. Clinic. Diagnosis.

INTRODUÇÃO

O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) é uma síndrome neurocomportamental que é definida pela presença persistente de hiperatividade, desatenção impulsividade. Isso interfere no desenvolvimento cognitivo dos indivíduos e pode ocasionar transtornos de cunho motor e comportamental, além disso, esta desordem, geralmente, tem início na infância e se estende até a idade adulta (DE ANDRADE; VASCONCELOS, 2018).

Junto a isso, a etiopatogenia do TDAH é diversa e corresponde ao alinhamento de múltiplos fatores, que podem ser divididos em endógenos e exógenos. Os endógenos, ou genéticos estão associados a genes como DAT (gene transportador de dopamina) e DRD4 (gene que codifica o receptor de dopamina) (BOLAT *et al.*, 2020). Já os exógenos são os: pré-natais, perinatais e pós-

natais, estes eventos exógenos estão ligados a doenças materno-fetais durante o período gravídopuerperal, uso de substâncias psicoativas ou drogas ilícitas e alterações do estado fisiológico materno (WINKLER, 2016; COPETTI; ARAUJO; GRIMAILOFF, 2021).

Nessa ótica, o TDAH pode ser considerado um dos agravos mais comuns durante o neurodesenvolvimento encontrados na infância, a nível global, esta patologia possui prevalência de 5,3 %, e no Brasil esta taxa chega a 13%. No entanto, ainda há divergências, entre os grupos populacionais estudados, visto que a proporção de TDAH entre homens e mulher é de 2:1. Além disso, em classes sociais menos favorecidas economicamente, as taxas de crianças que apresentam TDAH pode ser ainda maior, como de estudos que apresentam proporções de até 10 homens para uma mulher (OLIVEIRA; CAVALCANTE; PALHARES, 2018).

Nesse contexto, há teorias que elucidam a discrepância entre os gêneros quanto a presença de TDAH, sendo que uma teoria está ligada a questões hormonais que influenciam a produção de neurotransmissores e a outra está ligada a falta de percepção da doença em meninas, pois, geralmente esse grupo não apresenta a hiperatividade junto ao déficit de atenção, o que posterga o diagnóstico ou o torna inexistente, visto que a doença é confundida com um traço de personalidade (LARA, 2019).

Quanto a teoria hormonal, esta parte do princípio que os andrógenos que atuam na regulação da ação dos neurotransmissores e neuromoduladores atua no surgimento da doença, visto que a exposição a inibidores androgênicos durante o desenvolvimento pode levar ao TDAH. Estudos indicam que mulheres com a síndrome do ovário policístico (SOP), bem como suas filhas, apresentam taxas mais elevadas de TDAH, isso ocorre devido a resposta genômica ao receptor de andrógeno (RA), que é um fator de transcrição ativado pelo hormônio (SILVERIA JUNIOR & BAU, 2018). Por outro lado, há a hipótese do subdiagnóstico do TDAH em mulheres devido à ausência da hiperatividade e o não relacionamento da desatenção feminina com causas patológicas (LARA, 2019).

Portanto, objetivou-se evidenciar o descaso na validação de sintomas específicos do sexo feminino no momento do diagnóstico de TDAH. Além de poucos estudos que reportem sobre a efetividade dos tratamentos disponíveis em meninas, pois estas apresentam seu TDAH de uma forma diferente, então irão reagir de outra forma, quando comparadas ao sexo masculino.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo vigente aborda uma revisão integrativa de literatura, realizada por meio de um acervo bibliográfico de artigos científicos, através de uma base de dados das plataformas Google Scholar, *Scientific Eletronic Library On-line* (SciELO) e *PubMed*. Os artigos utilizados datam de 2019 à 2021,

são de línguas portuguesa e inglesa e estão diretamente relacionados com o tema “Implicações diagnósticas do TDAH em mulheres adultas”.

Os descritores empregados acompanham o DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) e o Medical Subject Headings (MeSH) no idioma português e inglês, na devida ordem: diagnóstico (diagnostic), TDAH (ADHD), mulheres (women), adultas (Adults). Como critérios de exclusão foram descartadas revisões de literatura, resumos em eventos, artigos que não cumpriram os critérios de inclusão e artigos duplicados. Foram encontrados cerca de 81 artigos com esses descritores, no entanto foram usados 10 artigos para a produção deste capítulo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com os artigos estudados, podemos observar que o TDAH envolve sintomas de inatenção, hiperatividade e impulsividade, afetando a capacidade de funcionamento e desenvolvimento em diversos aspectos da vida do paciente, assim como foi citado acima. Entretanto, pouco se discute acerca da diferença entre os sexos, fazendo com que um grande número de meninas fique sem diagnóstico, o que resulta em maiores consequências no âmbito social, educacional e na saúde mental dessas meninas (LOYER CARBONNEAU *et al.*, 2020).

Os artigos analisados demonstraram que as meninas são menos diagnosticadas na infância por apresentarem, geralmente: variação de humor, desatenção, falta de agitação e desprendimento. Ou seja, elas apresentam menos sintomas hiperativos e menores dificuldades de inibição de resposta motora, que são mais comuns no sexo masculino, os quais são a base do método diagnóstico do DSM-5 (YOUNG *et al.*, 2020).

O tipo de TDAH mais comum no sexo feminino é o com Apresentação Predominantemente Desatenta acompanhado de alterações do humor, o que causa seu enquadramento em diagnósticos errôneos de transtornos de humor, como depressão e ansiedade. Os critérios de avaliação também deixam de lado o efeito que variações hormonais presentes em meninas e mulheres, como menstruação, gravidez e menopausa, tem sobre os medicamentos (KLEFSJÖ *et al.*, 2020). A tabela 1 reporta os critérios diagnósticos de TDAH do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da American Psychiatric Association, DSM-5.

Tabela 1. Critérios diagnósticos de TDAH, DSM-5.

Critérios diagnósticos para TDAH de acordo com o DSM-5

Desatenção

Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido
Frequentemente têm dificuldade de manter atenção em tarefas lúdicas

Frequentemente não escuta quando alguém lhe dirige a palavra
Frequentemente não consegue terminar trabalhos iniciados ou seguir instruções até o final
Frequentemente perde coisas de necessidade diária
Facilmente distraído
Esquece de atividades do dia-a-dia

Hiperatividade e impulsividade

Frequentemente batuca ou remexe mãos ou pés quando sentado
Frequentemente levanta em situações que devia permanecer sentado
Frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações inapropriadas

Incapaz de desenvolver atividades de lazer calmamente

Se sente desconfortável em ficar parado
Fala demais
Dificuldade de esperar a vez de falar ou de realizar alguma atividade

Fonte: DSM-5.

Devido a esse diagnóstico impreciso, essas meninas crescem com piores desenvolvimentos acadêmicos e cognitivos, pois estas não vão ser medicadas devidamente. É importante ressaltar, que a principal linha de ação para o tratamento do TDAH é a farmacoterapia, sendo está eficaz na diminuição dos sintomas, no melhoramento da funcionalidade diária e qualidade de vida deste paciente (KOK *et al.*, 2020).

Para o tratamento de TDAH existem duas linhas: estimulantes e não estimulantes. A eficiência de não estimulantes, como Atomoxetina (ATX), é muito mais significativa em meninas, diminuindo a severidade de seus sintomas, quando comparado com os estimulantes (como Metilfenidato, medicamento preferível meninos com TDAH), pois o sexo feminino já é um fator de risco para alterar a eficiência de uma droga, devido aos níveis de estrogênio e progesterona alterados durante o ciclo menstrual da mulher. O ATX além de agir sobre os sintomas mais clássicos do transtorno, também atuou sobre as variações de humor, que se apresentam muito intensas no sexo feminino com TDAH (KOK *et al.*, 2020).

O sexo feminino também tende a apresentar maiores problemas e alterações comportamentais nas áreas de relação social e psicosssexual, do que o masculino, o qual se apresenta mais perturbado ou violento. As consequências do diagnóstico tardio nessa parcela da população são avassaladoras devido a essas áreas afetadas, na maioria dos casos, impedindo que mulheres com TDAH criem relações interpessoais saudáveis, resultando em mecanismos de enfrentamento desestruturados, como baixa autoestima, autoflagelo e ansiedade. O que pode resultar em desenvolvimento de quadros concomitantes de transtorno de humor, além de tendências suicidas e alterações de autonomia e autorregulação (YOUNG *et al.*, 2020).

CONCLUSÃO

Portanto, ainda existe uma lacuna no que diz respeito à conduta do TDAH em relação as demandas do sexo feminino. O que se observa é uma gama extensa de protocolos voltados às necessidades sintomáticas masculinas, padronizando a formação de diagnóstico e tratamento, o que consequentemente prejudica a percepção desse transtorno nas mulheres.

Nesse sentido, é extremamente necessário o aumento do número de estudos acerca desse tema, uma vez que ainda existe uma dificuldade em contemplar o grupo feminino e suprir as necessidades que elas apresentam. Além de buscar diminuir o sofrimento desnecessário e a negligência dos sintomas femininos.

REFERÊNCIAS

BOLAT, H. *et al.* DRD4 genotyping may differentiate symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder and sluggish cognitive tempo. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 42, p. 630-637, 2020.

COPETTI, Juliana; ARAUJO, Renata Brasil; GRIMAILOFF, Lucila. **Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (tdah) e transtorno por uso de substâncias**. Diretrizes para o Diagnóstico e Tratamento de Comorbidades Psiquiátricas e Transtornos por Uso de Substâncias, 2021.

DE ANDRADE, Paula Faria Souza Mussi; VASCONCELOS, Marcio Moacyr. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. **Residência Pediátrica**, v. 8, p. 64-71, 2018.

LARA, Marcus Vinicius Soares de. **Análise das diferenças neuroquímicas e neurofuncionais entre hemisférios cerebrais em ambos os sexos do modelo murino do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade**. Monografia, Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 54p., 2019.

LOYER CARBONNEAU, M. *et al.* Meta-Analysis of Sex Differences in ADHD Symptoms and Associated Cognitive Deficits. **Journal of Attention Disorders**, p. 1087054720923736, 2020

KLEFSJÖ, U. *et al.* The road to diagnosis and treatment in girls and boys with ADHD—gender differences in the diagnostic process. **Nordic journal of psychiatry**, p. 1-5, 2020.

KOK, F. M. *et al.* The female side of pharmacotherapy for ADHD—A systematic literature review. **PloS one**, v. 15, n. 9, p. e0239257, 2020.

OLIVEIRA, Cristina Camargo de; CAVALCANTE, Jorge Lopes; PALHARES, Marina Silveira. Características motoras de escolares com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, v. 26, p. 590-600, 2018.

SILVEIRA JUNIOR, Jorge Luís; BAU, Claiton Henrique Dotto. **Genes relacionados à resposta androgênica e o transtorno de déficit de atenção/hiperatividade**. Anais, XXX Salão de Iniciação Científica da UFRGS, 2018.

WINKLER, Cristina. **Associação entre o polimorfismo DRD4 120pb e uso de substâncias entre adultos com TDAH**. Anais, XXVIII Salão de Iniciação Científica da UFRGS, 2016.

YOUNG, S. *et al.* Females with ADHD: An expert consensus statement taking a lifespan approach providing guidance for the identification and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in girls and women. **BMC Psychiatry**, v. 20, n. 1, p. 1-27, 2020.

Índice remissivo

Abstinência 49, 50, 54, 55
Acolhimento 20, 21, 22
Ansiedade 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 29, 30, 32, 54, 60, 61, 62, 64
Autismo 20, 21, 23
Clínica 11, 12, 14, 15, 44
COVID-19 27, 28, 29, 30, 31, 33, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
Crack 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
Crianças 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 38, 42, 45, 54, 70
Crimes 37, 43
Depressão 4, 5, 7, 10, 11, 29, 32, 71
Deprimidos 10
Diagnóstico 7, 9, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 38, 42, 43, 44, 45, 51, 68, 69, 70, 71, 72, 73
Disposição genética 3, 10, 15
Doença de Alzheimer 11
Doenças neurológicas 11, 60
Drogas 29, 30, 38, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 70
Equipe multidisciplinar 23, 24
Escala de Coma de Glasgow 59, 60, 62, 63
Esgotamento emocional 31, 33
Esquizofrenia 11
Forense 37, 40, 42, 43, 44, 45
Gestação 21, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
Humor 49, 53, 54, 68, 71, 72
Identificação 4, 5, 6, 8, 20, 22, 23, 43
Infância 4, 5, 12, 21, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 68, 69, 70, 71
Intervenções baseadas em evidências 3, 16
Intervenções lúdicas 9, 13
Irritabilidade 38, 60
Isolamento social 27, 28, 31, 32, 33, 52
Lesão encefálica 62
Neonato 49, 51, 54
Nível de consciência 58, 60, 61, 63, 65
Pandemia 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 60, 61, 64
Percepção emocional 58, 59
Psicopatas 38, 41, 42, 43, 45
Psicopatia 39, 41, 42, 43, 44, 45
Psicopatologia 4, 12, 64
Psíquicos 37, 64
Queixa emocional 59, 61
Saúde Mental 4, 5, 10, 12, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 64, 71
Sexo feminino 61, 68, 69, 70, 71, 72
Síndrome de *Burnout* 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34
Síndrome multifatorial 21
Terapia cognitivo-comportamental 9, 11, 14
Transtorno bipolar 5, 11
Transtorno de humor 72
Transtorno de personalidade antissocial 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade 68, 69
Tratamento 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 27, 29, 30, 33, 34, 39, 42, 44, 63, 70, 72, 73
Traumas na infância 37, 40, 41, 42, 43