УДК 635.64:631.155.3

DOI 10.30679/2219-5335-2021-2-68-297-307

**ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
НА ТОВАРНОЕ КАЧЕСТВО
И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
СВЕЖИХ ТОМАТОВ
ПРИ ХРАНЕНИИ**

Киселева Наталия Владимировна
канд. хим. наук, доцент
доцент кафедры
аналитической химии
e-mail: lab284b@mail.ru

*Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Кубанский государственный
университет», Краснодар, Россия*

Степнова Алевтина Сергеевна
старший эксперт
отдела методологии
и оптимизации процессов
e-mail: alevtina31.07@mail.ru

АО «Тандер», Краснодар, Россия

В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований по влиянию температурных режимов от плюс 4 до плюс 22 °С на товарное качество, органолептические показатели и потери свежих томатов сорта Торбаш при хранении. Оценка товарного качества и количественных потерь осуществлялась экспертным методом. В результате проведенных исследований установлено, что наилучшее товарное качество свежие томаты сохраняли на 2-е сутки хранения при температурных режимах от +4 до +12 °С, на 10-е сутки хранения – при температурных режимах от +6 до +12 °С. Исследовано влияние температурных режимов хранения томатов на количественные потери: при температуре +4, +16-+22 °С микробиологические потери превышали таковые в результате естественной

UDC 635.64:631.155.3

DOI 10.30679/2219-5335-2021-2-68-297-307

**THE EFFECT
OF TEMPERATURE
ON PRODUCT QUALITY
AND ORGANOLEPTIC QUALITY
OF FRESH TOMATOES
DURING STORAGE**

Kiseleva Nataliya Vladimirovna
Cand. Chem. Sci., Docent
Associate Professor of Analytical
Chemistry Department
e-mail: lab284b@mail.ru

*Federal State
Budgetary Educational
Institution of Higher Education
«Kuban State University»,
Krasnodar, Russia*

Stepnova Alevtina Sergeyevna
Senior Expert
of Methodology and Processes
Optimization Department
e-mail: alevtina31.07@mail.ru

JSC «Tander», Krasnodar, Russia

This paper presents the results of experimental studies of the temperature conditions influence during storage from +4 to +22 °C on the commodity quality, organoleptic parameters and losses of fresh tomatoes of the Torbash variety. The assessment of commodity quality and quantitative losses was carried out by the expert method. As a result of the studies, carried out it was found that the best commodity quality of fresh tomatoes was preserved on the 2nd day of storage at temperatures from +4 to +12 °C, and on the 10th day of storage at temperatures from +6 to +12 °C. The influence of storage temperature conditions the quantitative losses was studied: in the temperature conditions +4, +16-+22 °C, the microbiological losses of tomatoes

убыли. Максимальное значение по микробиологическим потерям зафиксировано при режимах хранения +18 °C – 9,4 %, минимальное значение – при +16 °C (5,5 %). Наибольшее количество потерь от естественной убыли томатов наблюдалось при +14 °C, минимальное – при +22 °C. Оценку таких показателей качества, как форма, внешний вид, окраска, запах, свежесть, вкус и целостность плодов проводили с помощью 10-ти балльной органолептической шкалы. В результате исследований установлено, что органолептические показатели в температурном диапазоне от +4 до +16 °C томаты сохраняли свою стабильность до 6-8-го дня периода хранения, при высоких температурах (+22, +20 °C) наблюдалось наибольшее изменение органолептических показателей плодов на 10-е сутки хранения.

Ключевые слова: ТОМАТЫ, ТОВАРНОЕ КАЧЕСТВО, ПОТЕРИ, ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

exceeded the losses ones due to natural loss. The maximum value for microbiological losses was recorded at storage mode of +18 °C – 9,4 %, the minimum value – at +16 °C (5,5 %). The greatest number of tomato's losses from natural loss was observed at +14 °C, the minimum – at +22 °C. Quality indicators such as shape, appearance, color, smell, freshness, taste and integrity of fruits were evaluated using a 10-point organoleptic scale. As a result of the studies, it was found that the organoleptic parameters in the temperature range from +4 to +16 °C the tomatoes remained stable until the 6-8 day of the storage period, at high temperatures (+22, +20 °C), the greatest change in the fruits organoleptic parameters was observed on the 10th day during storage.

Key words: TOMATOES, COMMODITY QUALITY, LOSSES, ORGANOLEPTIC INDICATORS

Введение. Томаты (*Solanum lycopersicum* L.) являются экономически важным видом плодовоовощной продукции, выращиваемой во всем мире и употребляемой как в свежем, так и в переработанном виде [1-3]. В силу своих биологических особенностей томаты не являются объектами длительного хранения, однако на практике их приходится хранить некоторое время, необходимое для заготовки, транспортировки и реализации продукции, в течение которого возможно снижение качества и товарных свойств плодов [4, 5].

Чувствительность данного вида продукции к климатическим условиям приводит к созреванию и размягчению плодов после сбора урожая [6], а это, в свою очередь, ухудшает качество и восприимчивость плодов к заражению патогенами; одним из наиболее распространенных является *Alternaria alternata* [7-10]. Также свежие томаты склонны к повышенной потере воды, что значительно сокращает срок их хранения и отрицательно влияет на качество [11, 12].

Потребители все чаще жалуются на вкус свежих томатов [13-15]. Сенсорные качества являются решающим фактором при оценке качества продукции, потому что они влияют на сенсорное восприятие и покупательский выбор потребителей [3]. Ввиду этого, аромат у томатов приобретает все большее значение не только для потребителей, но и для производителей данного вида продукции [16]. На аромат свежих томатов оказывают влияние очень многие факторы как химического состава плодов (летучие компоненты, сахар, кислоты и др.), так и биологические особенности потребителя, к которым относятся визуальные и текстурные сигналы мозга человека [17]. Помимо этого велико влияние сорта на восприятие вкуса [13, 14].

Целью данного исследования являлось изучение влияния температурных режимов при хранении на товарное качество, количественные потери и органолептические показатели качества свежих томатов.

Объекты и методы исследований. Работа выполнена в ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия» (г. Краснодар). Объектами исследования являлись импортные томаты сорта Торбаш (Турция), имеющие розовую окраску и товарный тип в зависимости от формы – ребристый, без видимых повреждений.

Плоды имели красную степень зрелости, калибр от 50 до 80 мм и относились к первому товарному сорту. Каждая партия доставлялась морским транспортом в рефрижераторной тележке до границы РФ и автомобильным транспортом на территории страны (прямой доставкой до конечного распределительного центра). Плоды были упакованы в ящики из гофрированного картона (по ГОСТ 9142–2014), хранение томатов осуществлялось в нерегулируемой газовой среде, без отклонений от рекомендуемой температуры. Партии соответствовали фитосанитарным нормам, выращивались одним импортером в защищенном грунте и приобретались для исследований в розничной сети с остаточным сроком жизни от 14 до 18 суток.

Каждую партию томатов (всего 12 партий) выдерживали в термостате в нерегулируемой газовой среде при определенной температуре (от +4 до +22 °С с шагом 2 °С) в течение 10 дней. Показатели качества определяли экспертным методом по партиям количеством 10 штук в соответствии со стандартом ЕЭК ООН FFV-36, касающимся сбыта и контроля товарного качества томатов [18]. Качество сорта и количественные потери, выраженные в %, оценивали 7 экспертов. Оценку органолептических показателей томатов проводили с применением 10-ти балльной шкалы профильным методом [19]; были оценены форма, внешний вид, окраска, запах, свежесть и целостность [20].

В таблице 1 представлены средние значения, характеризующие товарное качество свежих томатов сорта Торбаш (процент выхода стандартной и не стандартной продукции, абсолютный отход) по 12 партиям. Под стандартной продукцией понимается продукция первого и второго сорта согласно стандарту ЕЭК ООН FFV-36 по сбыту и реализации свежих плодов [18].

Обсуждение результатов. До закладки на хранение весь томат относился к категории первого сорта, то есть его товарное качество составляло 100 % категории «стандарт». По результатам проведенных исследований (см. табл. 1), наилучшее товарное качество свежие томаты сохраняют на 2-е сутки хранения, при температурных режимах от +4 до +12 °С (по причине отсутствия класса «не стандарт» и «абсолютный отход»). Наибольшее количество абсолютного отхода на 2-е сутки зафиксировано при температуре +20 °С – 6,8 %, а образование не стандартной продукции – при +22 °С – 10,1 %.

На 10-е сутки хранения абсолютный отход отсутствовал при температурных режимах от +6 до +12 °С, наибольшее его количество образовывалось при +14 °С – 16,9 %. На 10-е сутки хранения нестандартная продукция была обнаружена при всех температурных режимах хранения, при этом наибольшее значение было зарегистрировано при +4 °С и составило 24,6 %.

**Таблица 1 – Изменение товарных качеств свежих томатов
в процессе хранения при различных температурных режимах**

Температура хранения, °С		Товарное качество, %		
		стандарт	не стандарт	абсолютный отход
4	2-е сутки хранения	100	-	-
	10-е сутки хранения	62,0	24,6	13,4
6	2-е сутки хранения	100	-	-
	10-е сутки хранения	97,8	2,2	-
8	2-е сутки хранения	100	-	-
	10-е сутки хранения	98,2	1,8	-
10	2-е сутки хранения	100	-	-
	10-е сутки хранения	97,5	2,5	-
12	2-е сутки хранения	100	-	-
	10-е сутки хранения	93,4	6,6	-
14	2-е сутки хранения	94,4	5,6	-
	10-е сутки хранения	73,5	9,6	16,9
16	2-е сутки хранения	95,1	2,3	2,6
	10-е сутки хранения	73,6	16,1	10,3
18	2-е сутки хранения	91,9	3,9	4,2
	10-е сутки хранения	74,8	9,5	15,7
20	2-е сутки хранения	84,7	8,5	6,8
	10-е сутки хранения	74,4	16,2	9,4
22	2-е сутки хранения	83,9	10,1	6,0
	10-е сутки хранения	70,3	18,7	11,0

На следующем этапе исследования представляло интерес изучить влияние температуры хранения на величину потерь свежих томатов. В таблице 2 представлены средние значения, иллюстрирующие потери свежих томатов сорта Торбаш по 12 партиям на 10-е сутки при хранении в различных температурных режимах.

Таблица 2 – Количественные потери свежих томатов в процессе хранения при различных температурных режимах

Температура хранения, °С	Общие потери, %	Потери в результате естественной убыли, %	Потери в результате микробиологической порчи, %
4	13,4	5,6	7,8
14	16,9	9,3	7,6
16	10,3	4,8	5,5
18	15,7	6,3	9,4
20	9,4	3,8	5,6
22	11,0	2,7	8,3

Таким образом, было установлено, что при хранении свежих томатов в температурных режимах +4, +16-+ 22 °С микробиологические потери превышают потери в результате естественной убыли. Максимальное значение по микробиологическим потерям зафиксировано при +18 °С – 9,4 %, минимальное – при +16 °С (5,5 %). Наибольшее количество потерь от естественной убыли наблюдалось при +14 °С, минимальное – при +22 °С.

Результаты исследования (средние значения) органолептических показателей качества свежих томатов при хранении в течение 10 суток в различных температурных режимах приведены в таблице 3 (оценка показателей производилась через каждые 2-е суток, представлен диапазон изменений показателей со 2-го по 10-й день хранения). До закладки на хранение балльная оценка томатов по органолептическим показателям, таким как запах, внешний вид, окраска, форма, целостность, свежесть, составляла 10,0, по вкусу была несколько ниже – 9,0.

Оценка вкуса томатов была возможна не во всем периоде хранения по причине ухудшения физиологического состояния плодов и появления микробиологической порчи. Из приведенных в таблице 3 данных следует, что на 2-е сутки хранения наилучшее качество по всем органолептическим показателям наблюдалось при температурных режимах от +4 до +16 °С (запах, внешний вид, окраска, форма, целостность и свежесть составили 10,0 баллов, вкус – 9,0). Эти же органолептические показатели в указанном температурном диапазоне сохраняют свою стабильность до 6-8-го дня хранения.

Таблица 3 – Органолептические показатели томатов при различных температурных режимах хранения

Температура, °С		Показатели						
		Запах	Вкус	Внешний вид	Окраска	Форма	Целостность	Свежесть
4	2-е сутки хранения	10,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	10-е сутки хранения	8,0	7,0	9,8	10,0	9,2	10,0	9,8
6	2-е сутки хранения	10,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	10-е сутки хранения	8,8	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0	9,7
8	2-е сутки хранения	10,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	10-е сутки хранения	10,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10	2-е сутки хранения	10,0	9,0	10,0	10,0		10,0	10,0
	10-е сутки хранения	9,7	8,0	9,7	10,0	10,0	9,8	9,7
12	2-е сутки хранения	10,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	10-е сутки хранения	9,2	8,2	9,5	9,7	9,8	9,7	9,6
14	2-е сутки хранения	10,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	10-е сутки хранения	7,8	5,7	7,2	8,0	8,2	8,3	7,3
16	2-е сутки хранения	10,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	10-е сутки хранения	9,0	8,0	8,0	8,2	9,8	9,3	9,4
18	2-е сутки хранения	9,8	8,8	9,5	9,6	9,7	10,0	10,0
	10-е сутки хранения	7,8	6,8	7,4	7,5	7,4	8,4	8,4
20	2-е сутки хранения	9,5	8,5	9,5	9,8	9,8	9,9	9,7
	10-е сутки хранения	7,5	6,7	7,5	7,3	7,3	7,2	6,5
22	2-е сутки хранения	9,0	9,0	9,2	9,4	9,4	10,0	9,6
	10-е сутки хранения	5,0	-	5,2	5,4	6,3	6,3	6,4

При высоких температурах (+22, +20 °С) наибольшее изменение органолептических показателей в процессе хранения наблюдалось на 10-е сутки. Максимальное изменение балльной оценки в 5,0 единиц наблюдалось по запаху во временном промежутке от момента до закладки на хранение и в конце периода хранения (10-е сутки) в температурном режиме +22 °С, не-

сколько меньше (4,8 баллов) при этой же температуре хранения данное отклонение у плодов по внешнему виду.

На рисунке представлены профилограммы по органолептическим показателям томатов, имеющих балльную оценку менее 8 при хранении в различных температурных условиях.

а) – при температуре +14 °С; б) – при температуре +18 °С; в) – при температуре +20 °С;
г) – при температуре +22 °С; д) – при температуре +4 °С

Рис. Динамика изменения значений органолептических показателей качества томатов в процессе хранения при различных температурных режимах

Выводы. Получены экспериментальные данные о влиянии температуры на товарное качество, величину потерь и органолептические показатели качества свежих томатов сорта Торбаш при хранении. Установлено, что наилучшее товарное качество на 10-е сутки томаты сохраняют при температурных режимах от +6 до +12 °С. Отмечено превышение микробиологических потерь плодов над потерями от естественной убыли в температурных режимах +4, +16-+22 °С.

В результате исследований также установлено, что органолептические показатели в температурном диапазоне от +4 до +16 °С сохраняли свою стабильность до 6-8-го дня хранения, а при высоких температурах (+22, +20 °С) наблюдалось наибольшее изменение органолептических показателей томатов на 10-е сутки.

Литература

1. Li J., Fu Y., Yan J., et al. Forced air precooling enhanced storage quality by activating the antioxidant system of mango fruits // *Journal of Food Quality*. 2019. P. 1–12.
2. Li Q., Li J., Li H., et al. Physicochemical properties and functional bioactivities of different bonding state polysaccharides extracted from tomato fruit fruits // *Carbohydrate Polymers*. 2019. P. 181–190.
3. Li X., Tsuta M., Hayakawa F., et al. Estimating the sensory qualities of tomatoes using visible and near-infrared spectroscopy and interpretation based on gas chromatography–mass spectrometry metabolomics // *Food Chemistry*. 2021. № 343. P. 1.
4. Масловский С.А, Терешонкова Т.А., Ушакова М.И. Качество и пригодность к кратковременному хранению новых сортов и гибридов томата // *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*. 2014. № 1–1. С. 64.
5. Li Q., Xie F., Zhao Y., et. al. Inhibitory effect of postharvest yeast mannan treatment on *Alternaria* rot of tomato fruit involving the enhancement of hemicellulose polysaccharides and antioxidant metabolism // *Scientia Horticulturae*. 2021. № 277. P. 1.
6. Safari Z. S., Ding P., Nakasha J. J., et. al. Combining Chitosan and Vanillin to Retain Postharvest Quality of Tomato Fruit during Ambient Temperature Storage // *Coatings*. 2020. Vol. 10. № 12. P. 1.
7. Sanchez-Dominguez D., Rios M.Y., Castillo-Ocampo P., et. al. Cytological and biochemical changes induced by chitosan in the pathosystem *Alternaria alternata*–tomato // *Pesticide Biochemistry Physiology*. 2011. Vol. 99. № 3. P. 250–255.
8. Barreto T.A., Andrade S. C. A., Maciel J.F., et. al. A chitosan coating containing essential oil from *Origanum vulgare* L. to control postharvest mold infections and keep the quality of cherry tomato fruit // *Frontiers in Microbiology*. 2016. Vol. 7. № 1724. P. 1–14.

9. Estiarte N., Crespo-Sempere A., Marin S., et. al. Effect of 1- methylcyclopropene on the development of black mold disease and its potential effect on alternariol and alternariolmonomethyl ether biosynthesis on tomatoes infected with *Alternaria alternata* // *International Journal of Food Microbiology*. 2016. № 236. P. 74–82.
10. Black-Solis J., Ventura-Aguilar R.I., Correa-Pacheco Z., et. al. Preharvest use of biodegradable polyester nets added with cinnamon essential oil and the effect on the storage life of tomatoes and the development of *Alternaria alternata* // *Scientia Horticulturae*. 2019. № 245. P. 65–73.
11. Onopiuk A., Poftorak A., Wojtasik- Kalinowska I., et. al. Impact of the storage atmosphere enriched with ozone on the quality of *Lycopersicon esculentum* tomatoes // *Food Processing and Preservation*. 2019. P. 2.
12. Vigya M., Ghan S. A., Neeru D. Chapter 14-Sodium and calcium hypochlorite as postharvest disinfectants for fruits and vegetables / M. Vigya, // *Postharvest Disinfection of Fruits and Vegetables*. 2018. P. 253–272.
13. Tieman D., Bliss P., McIntyre L. M., et. al. The chemical interactions underlying tomato flavor preferences // *Current Biology*. 2012. Vol. 22. № 11. P. 1035–1039.
14. Tieman D., Zhu G., Resende M. F., et. al. A chemical genetic roadmap to improved tomato flavor // *Science*. 2017. Vol. 335. № 6323. P. 391–394.
15. Zhang B., Tieman D. M., Jiao C., et. al. Chillinginduced tomato flavor loss is associated with altered volatile synthesis and transient changes in DNA methylation // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 2016. № 113(44). P. 12580–12585.
16. Piombino P., Sinesio F., Moneta E., et. al. Investigating physicochemical, volatile and sensory parameters playing a positive or a negative role on tomato liking // *Food Research International*. 2013. Vol. 50. № 1. P. 409–419.
17. Kanski L., Naumann M., Pawelzik E. Flavor-related quality attributes of ripe tomatoes are not significantly affected under two common household conditions // *Frontiers in Plant Science*. 2020. № 11. P. 1–14.
18. Стандарт ЕЭК ООН FV-36, касающийся сбыта и контроля товарного качества томатов. Нью-Йорк и Женева, 2017. 1-10 с.
19. Миколайчик И.Н., Морозова Л.А., Субботина Н.А. Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки: учебное пособие. СПб.: Лань, 2019. 105 с.
20. Николаева М.А. Товароведение плодов и овощей. М.: Экономика, 1990. 288 с.

References

1. Li J., Fu Y., Yan J., et al. Forced air precooling enhanced storage quality by activating the antioxidant system of mango fruits // *Journal of Food Quality*. 2019. P. 1–12.
2. Li Q., Li J., Li H., et al. Physicochemical properties and functional bioactivities of different bonding state polysaccharides extracted from tomato fruit fruits // *Carbohydrate Polymers*. 2019. P. 181–190.
3. Li X., Tsuta M., Hayakawa F., et al. Estimating the sensory qualities of tomatoes using visible and nearinfrared spectroscopy and interpretation based on gas chromatography–mass spectrometry metabolomics // *Food Chemistry*. 2021. № 343. P. 1.
4. Maslovskij S.A, Tereshonkova T.A., Ushakova M.I. Kachestvo i prigodnost' k kratkovremennomu hraneniyu novykh sortov i gibridov tomata // *Aktual'nye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk*. 2014. № 1–1. S. 64.
5. Li Q., Xie F., Zhao Y., et. al. Inhibitory effect of postharvest yeast mannan treatment on *Alternaria* rot of tomato fruit involving the enhancement of hemicellulose polysaccharides and antioxidant metabolism // *Scientia Horticulturae*. 2021. № 277. P. 1.

6. Safari Z. S., Ding P., Nakasha J. J., et. al. Combining Chitosan and Vanillin to Retain Postharvest Quality of Tomato Fruit during Ambient Temperature Storage // *Coatings*. 2020. Vol. 10. № 12. P. 1.
7. Sanchez-Dominguez D., Rios M.Y., Castillo-Ocampo P., et. al. Cytological and biochemical changes induced by chitosan in the pathosystem *Alternaria alternata*–tomato // *Pesticide Biochemistry Physiology*. 2011. Vol. 99. № 3. P. 250–255.
8. Barreto T.A., Andrade S. C. A., Maciel J.F., et. al. A chitosan coating containing essential oil from *Origanum vulgare* L. to control postharvest mold infections and keep the quality of cherry tomato fruit // *Frontiers in Microbiology*. 2016. Vol. 7. № 1724. P. 1–14.
9. Estiarte N., Crespo-Sempere A., Marin S., et. al. Effect of 1- methylcyclopropene on the development of black mold disease and its potential effect on alternariol and alternariolmonomethyl ether biosynthesis on tomatoes infected with *Alternaria alternata* // *International Journal of Food Microbiology*. 2016. № 236. P. 74–82.
10. Black-Solis J., Ventura-Aguilar R.I., Correa-Pacheco Z., et. al. Preharvest use of biodegradable polyester nets added with cinnamon essential oil and the effect on the storage life of tomatoes and the development of *Alternaria alternata* // *Scientia Horticulturae*. 2019. № 245. P. 65–73.
11. Onopiuk A., Poftorak A., Wojtasik- Kalinowska I., et. al. Impact of the storage atmosphere enriched with ozone on the quality of *Lycopersicon esculentum* tomatoes // *Food Processing and Preservation*. 2019. P. 2.
12. Vigya M., Ghan S. A., Neeru D. Chapter 14-Sodium and calcium hypochlorite as postharvest disinfectants for fruits and vegetables / M. Vigya, // *Postharvest Disinfection of Fruits and Vegetables*. 2018. P. 253–272.
13. Tieman D., Bliss P., McIntyre L. M., et. al. The chemical interactions underlying tomato flavor preferences // *Current Biology*. 2012. Vol. 22. № 11. P. 1035–1039.
14. Tieman D., Zhu G., Resende M. F., et. al. A chemical genetic roadmap to improved tomato flavor // *Science*. 2017. Vol. 335. № 6323. P. 391–394.
15. Zhang B., Tieman D. M., Jiao C., et. al. Chillinginduced tomato flavor loss is associated with altered volatile synthesis and transient changes in DNA methylation // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 2016. № 113(44). P. 12580–12585.
16. Piombino P., Sinesio F., Moneta E., et. al. Investigating physico-chemical, volatile and sensory parameters playing a positive or a negative role on tomato liking // *Food Research International*. 2013. Vol. 50. № 1. P. 409–419.
17. Kanski L., Naumann M., Pawelzik E. Flavor-related quality attributes of ripe tomatoes are not significantly affected under two common household conditions // *Frontiers in Plant Science*. 2020. № 11. P. 1–14.
18. Standart EEK OON FFV-36, kasayushchijsya sbyta i kontrolya tovarnogo kachestva tomatov. N'yu-Jork i Zheneva, 2017. 1-10 s.
19. Mikolajchik I.N., Morozova L.A., Subbotina N.A. Tekhnohimicheskij kontrol' sel'skohozyajstvennogo syr'ya i produktov pererabotki: uchebnoe posobie. SPb.: Lan', 2019. 105 c.
20. Nikolaeva M.A. Tovarovedenie plodov i ovoshchej. M.: Ekonomika, 1990. 288 s.