ЭКОБИОТЕХ

ISSN 2618-964X

<http://ecobiotech-journal.ru>

БИОРАЗНООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ-ДЕСТРУКТОРОВ ФЕНОЛА И ЕГО ХЛОРИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПОЧВ ПРОМЗОНЫ Г. УФЫ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ОТХОДАМИ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

**Жарикова Н.В., Ясаков Т.Р., Коробов В.В.,
Журенко Е.Ю.**

Уфимский Институт биологии Уфимского федерального
исследовательского центра РАН
E-mail: puzzle111@yandex.ru

Проведен анализ 7-ми почвенных проб промзоны г.Уфы Республики Башкортостан, который показал, что в исследуемых бактериальных популяциях преобладали актиномицеты. Из данных почвенных образцов было выделено 56 штаммов бактерий. Среди них: деструкторов фенола – 31; 2,4-ДХФ – 28; 4-ХФУК – 29; 2,4-Д – 26 и 2,4,5-Т – 20 культур, соответственно. С увеличением степени галогенирования субстрата наблюдалось уменьшение количества штаммов-деструкторов, способных к его конверсии.

Ключевые слова: биodeградация, фенол, 2,4-дихлорфенол (2,4-ДХФ), 4-хлорфеноксиуксусная кислота (4-ХФУК), 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д), 2,4,5-трихлорфеноксиуксусная кислота (2,4,5-Т)

BIODIVERSITY OF THE BACTERIA DEGRADERS OF PHENOL AND ITS CHLORINATED DERIVATIVES WHICH WERE ISOLATED FROM THE SOILS (INDUSTRIAL ZONE, UFA CITY) CONTAMINATED WITH CHEMICAL WASTE

**Zharikova N.V., Iasakov T.R., Korobov V.V.,
Zhurenko E.I.**

Ufa Institute of Biology of the Ufa Federal Research Centre
of the Russian Academy of Sciences, Ufa
E-mail: puzzle111@yandex.ru

The analysis of 7 soil samples from the industrial zone of Ufa city (Republic of Bashkortostan) showed prevalence of a actinomycetes in the bacterial populations. The 56 bacterial strains were isolated from these soil samples. Among them phenol degraders were – 31, 2,4-DCP – 28, 4-CPA – 29, 2,4-D – 26, and 2,4,5-T – 20 cultures, respectively. With an increase of the degree of substrate chlorination, a decrease in the number of degrader strains capable of its conversion was observed.

Keywords: biodegradation, phenol, 2,4-dichlorophenol (2,4-DCP), 4-chlorophenoxyacetic acid (4-CPA), 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5-T)

Поступила в редакцию: 11.07.2019

DOI: 10.31163/2618-964X-2019-2-4-416-419

ВВЕДЕНИЕ

Фенол и его хлорированные производные широко используются в качестве противомикробных средств, пестицидов древесных консервантов, а также для синтеза красителей и лекарств [Czaplicka, 2004, Olaniran and Igbinsosa, 2011]. Они представляют опасность для окружающей среды и здоровья человека вследствие своих канцерогенных, мутагенных и цитотоксических свойств [Czaplicka, 2004, Igbinsosa et al., 2013]. Из-за устойчивости к микробному разложению соединения данной группы стали широко распространенными загрязнителями окружающей среды, однако был выделен ряд бактериальных культур, способных к их разложению [Маркушева и др., 2004, см. ссылки обзоров Arora and Bae, 2014, Olaniran and Igbinsosa, 2011, Жарикова и др., 2017]. Биологическая трансформация фенола и его хлорпроизводных микроорганизмами является эффективным и экологически чистым методом решения проблем загрязнения окружающей среды, вызванных этими соединениями [Czaplicka, 2004]

Цель работы – выделение из почвы, загрязненной отходами химического производства, новых бактериальных штаммов, способных к конверсии фенола и его хлорированных производных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В настоящей работе были использованы образцы почв, отобранные методом случайных проб на территории промышленной зоны г.Уфы.

Образцы почвы предварительно подсушили при комнатной температуре в течение 48 ч. Бактерии, использующие органические формы азота, выявляли на мясо-пептонном агаре (МПА) как описано ранее [Журенко и др., 2003]. Для учета бациллярных форм применяли смешанный агар: МПА +сусло-агар в соотношении 1:1. Актиномицеты как микроорганизмы, способные использовать минеральные формы азота, выявляли на крахмал-аммиачном агаре (КАА).

Выделение чистых культур бактерий из образцов почвы было проведено по методу Р. Коха, при этом чистота культуры оценивалась визуальным и микроскопическим способами. Почвенную суспензию из соответствующего разведения (10^{-3} - 10^{-4}) высевали на МПА и КАА. Для выявления бациллярных форм разведение 10^{-2} предварительно пастеризовали при 70°C 15 мин и затем высевали на МПА +сусло-агар (1:1) [Теппер и др., 2004].

Оценки роста изолятов на феноле и его хлорированных производных проводили на минимальной солевой среде М9 (г/л): – 0.1; Na_2HPO_4 – 6.0; KH_2PO_4 – 3.0; NaCl – 0.5; NH_4Cl – 1.0, раздельно содержащей в качестве единственного источника углерода фенол, 2,4-дихлорфенол (2,4-ДХФ), 4-хлорфеноксиуксусную кислоту (4-ХФУК), 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту (2,4-Д) и 2,4,5-трихлорфеноксиуксусную кислоту (2,4,5-Т) в конечной концентрации 100 мг/л. Культивирование проводили в 3 мл среды при температуре 28°C в течении 14 дней.

Все эксперименты проводили в пяти повторностях. Статистическую обработку полученных результатов выполняли по методу Фишера-Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В начале работы с территории промышленной зоны г.Уфы Республики Башкортостан были отобраны семь образцов почвы. Затем был проведен анализ состава бактериальных популяций этих почвенных образцов, результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительный анализ бактериальных групп почв промышленной зоны г. Уфы Республики Башкортостан

обозначение почвенной пробы	количество КОЕ в 1г абсолютно сухой почвы (n)		
	бактерии, (n x 10^3)	спорообразующие бактерии, (n x 10^2)	актиномицеты, (n x 10^3)
№3	1±0.22	0	53±1.66
№4	0	4±0.4	22±0.33
№5	8±0.4	2±0.6	75±0.2
№6	0	0	20±0.4
№7	6±0.33	20±0.8	40±1.2
Яма	42±0.4	0	55±1.04
Завод ТСХ	4±1.2	0	38±1.0

Бактерии, использующие органические формы азота изолированные на МПА, не были обнаружены в пробах №4 и №6. В остальных пробах, кроме образца, обозначенного «Яма», они присутствовали в незначительном количестве.

Спорообразующие бактерии не были выявлены в пробах №3 и №6, а также в образцах, обозначенных «Яма» и «Завод ТСХ». Из оставшихся трех проб в значительном количестве эта группа бактерий была обнаружена только в образце №7.

Больше всего актиномицетов было изолировано из пробы №5, однако и в остальных шести образцах они присутствовали в большом количестве.

В дальнейшем по методу Р. Коха из различающихся колоний было выделено 56 чистых культур бактерий (табл.2). Подавляющее большинство бактериальных изолятов было получено из проб №№3-5 и образца, обозначенного «Завод ТСХ». Из пробы №6 было выделено два штамма, а из образцов №7 и «Яма» - по одному.

Затем была проведена оценка способностей этих бактериальных изолятов использовать фенол и его хлорированные производные в качестве единственных источников углерода и энергии. Эксперименты проводилась на минимальной среде М9, отдельно содержащей фенол, 2,4-ДХФ, 4-ХФУК, 2,4-Д и 2,4,5-Т (табл.2).

Таблица 2. Количество бактериальных изолятов, использующих фенол и его хлорированные производные

обозначение почвенной пробы	Всего выделено штаммов	Из них используют				
		фенол	2,4-ДХФ	4-ХФУК	2,4-Д	2,4,5-Т
№3	13	9	6	7	6	1
№4	11	10	8	6	5	4
№5	17	8	9	5	5	5
№6	2	1	1	2	2	2
№7	1	0	0	1	1	1
Яма	1	0	0	0	0	0
Завод ТСХ	11	3	4	8	7	7

Из 56 бактериальных изолятов, выделенных из семи почвенных образцов, были способны использовать фенол – 31, 2,4-ДХФ – 28, 4-ХФУК – 29, 2,4-Д – 26 и 2,4,5-Т – 20 культур, соответственно.

Деструкторы фенола и, в меньшей степени, 2,4-ДХФ превалировали в пробах №№3-5. К конверсии феноксикислот, особенно более галогенированных (2,4-Д и 2,4,5-Т), были способны заметно меньше изолятов из данных образцов.

Больше всего деструкторов хлорфеноксикислот присутствовало в образце, обозначенным «Завод ТСХ», из 11 культур - 8 росли на 4-ХФУК, и по 7 - на 2,4-Д и 2,4,5-Т.

Из образца №6 обе культуры метаболизировали хлорфеноксикислоты и только одна еще дополнительно фенол и 2,4-ДХФ.

Единственный изолят пробы №7 осуществлял деградацию всех трех хлорфеноксикислот, но не мог использовать фенол и 2,4-ДХФ.

Один штамм, выделенный из образца «Яма», оказался не способным к конверсии фенола и его хлорпроизводных.

ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ состава бактериальных популяций семи почвенных проб отобранных с территории промышленной зоны г.Уфы Республики Башкортостан (табл.1) показал, что в исследуемых бактериальных популяциях преобладали актиномицеты. Из данных таблицы 1 видно, что все представленные почвенные образцы кроме №7 были обеднены присутствием бациллярных форм. То же самое можно сказать и о бактериях, использующих органические формы азота, которые в значительном количестве присутствовали также только в одной пробе «Яма». Такая обедненность почвенных популяций бактерий промзоны г. Уфы, скорее всего, является следствием высокой техногенной нагрузки.

Оценка способностей 56 выделенных бактериальных культур использовать фенол и его хлорированные производные в качестве единственных источников углерода и энергии выявила наибольшее количество деструкторов фенола – 31 штамм. С увеличением степени хлорирования субстрата наблюдалось постепенное уменьшение количества штаммов-деструкторов, способных к его конверсии. Меньше всего оказалось бактериальных культур, способных использовать 2,4,5-Т – 20 штаммов.

Известно, что токсичность хлорпроизводных фенола зависит не только от степени хлорирования молекулы субстрата, но и от положения атомов хлора относительно гидроксильной группы. Токсичность субстрата увеличивается при наличии хлор-заместителя в 3-, 4- и 5-позиции [Czaplicka, 2004]. Данное обстоятельство, скорее всего, и является причиной, по которой наблюдалось уменьшение количество изолятов, способных использовать хлорированные феноксиуксусные кислоты в ряду 4-ХФУК, 2,4-Д и 2,4,5-Т.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жарикова Н.В., Ясаков Т.Р., Журенко Е.Ю., Коробов В.В., Маркушева Т.В. Бактериальные гены инициации деградации 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, кодирующие α -кетоглутаратзависимую диоксигеназную активность // Успехи современной биологии. 2017. Т. 137. № 5. С. 514–528. <https://doi.org/10.7868/S0042132417050076>.
2. Журенко Е.Ю., Маркушева Т.В., Галкин Е.Г., Коробов В.В., Жарикова Н.В., Гафиятова Л.Р. // *Glucobacter oxydans* IBRB-2T – деструктор 2,4,5-трихлорфеноксиуксусной кислоты // Биотехнология. 2003. № 6. С. 67–71.
3. Маркушева Т.В., Журенко Е.Ю., Галкин Е.Г., Коробов В.В., Жарикова Н.В., Гафиятова Л.Р. Идентификация и характеристика плазмиды штамма *Aeromonas hydrophila* IBRB-36 4CRA, несущей гены катаболизма хлорфеноксиуксусных кислот // Генетика. 2004. Т. 40. № 11. С. 1469–1476.
4. Теппер Е.З., Шильникова В.К., Переверзева Г.И. Практикум по микробиологии. М.: Дрофа. 2004. 256 с.
5. Arora P.K., Bae H. Bacterial degradation of chlorophenols and their derivatives // Microb. Cell. Fact. 2014. V. 13:31 <https://doi.org/10.1186/1475-2859-13-31>.
6. Czaplicka M. Sources and transformations of chlorophenols in the natural environment // Sci. Total. Environ. 2004 V. 322. №1–3. P. 21–39. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2003.09.015>
7. Igbinosa E.O., Odjadjare E.E., Chigor V.N., Igbinosa I.H., Emoghene A.O., Ekhaize F.O., Igiehon N.O., Idemudia O.G: Toxicological profile of chlorophenols and their derivatives in the environment: the public health perspective // The Scientific World Journal. 2013. V. 2013. P. 1–11. <https://doi.org/10.1155/2013/460215>.
8. Olaniran A.O., Igbinosa E.O. Chlorophenols and other related derivatives of environmental concern: properties, distribution and microbial degradation processes // Chemosphere. 2011. V. 83. P. 1297–1306. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2011.04.009>