DOI: 10.31279/2222-9345-2018-7-30-130-133
УДК 633.15:631.82:664.2(470.54/.58)

Е. А. Дёмин, Д. И. Ерёмин

Demin E. A., Eremin D. I.

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА И КРАХМАЛА В ЗЕРНЕ КУКУРУЗЫ, ВЫРАЩИВАЕМОЙ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ЗАУРАЛЬЯ

INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON PROTEIN AND STARCH CONTENT IN CORN GRAIN GROWN IN FOREST-STEPPE ZONE OF TRANS-URALS

Развитие животноводства в России и в Тюменской области в частности набирает интенсивные темпы. Это приводит к необходимости увеличения кормовой базы. Сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в области, не могут в полной мере обеспечить бесперебойное питание высокоэнергетическим кормом сельскохозяйственных животных на протяжении всего года. Кукуруза показала себя как перспективная культура. Целью исследований было установить влияние минеральных удобрений на содержание белка и крахмала в зерне кукурузы. Исследования проводили в 2016–2017 гг. в лесостепной зоне Тюменской области. Схема опыта предусматривала варианты с внесением минеральных удобрений на планируемую урожайность до 6,0 т/га зерна. На естественном агрофоне содержание белка в зерне кукурузы достигает 11,1 %. Внесение минеральных удобрений положительно сказывается на содержании белка в зерне кукурузы, где его значения увеличиваются до 13,5 %. Максимальный сбор сырого протеина при этом составляет 680 кг/га. Содержание крахмала на варианте без использования минеральных удобрений достигало 62,4 %, а сбор с 1 гектара – 2530 кг. Повышение уровня минерального питания обеспечивает закономерное увеличение содержания крахмала в зерне и его сбор с урожаем.

Ключевые слова: кукуруза, зерно, питательная ценность, белок, крахмал, минеральные удобрения, Зауралье.

The development of animal husbandry in Russia and the Tyumen region in particular is gaining momentum. This leads to the need to increase the feed base. Crops grown in the region cannot fully provide uninterrupted nutrition with high-energy feed of farm animals throughout the year. Maize proved to be a promising culture. The aim of the research was to determine the effect of fertilizers on the protein and starch content in corn grain. Research was carried out in 2016–2017 in the forest-steppe zone of the Tyumen region. The scheme of experience provided for options with the introduction of mineral fertilizers on the planned yield up to 6.0 t/ha of grain. On natural soil fertility, protein content in corn grain reaches of 11.1 %. Application of mineral fertilizers has a positive effect on the protein content in maize grain, where its values increase to 13.5 %. Maximum fee of crude protein in this case is 680 kg/ha. starch Content in the variant without the use of fertilizer was achieved in 62.4 %, and the harvest from 1 ha – 2530 kg. Increasing the level of mineral nutrition provides a natural increase in the starch content in the grain and its collection with the harvest.

Key words: corn, grain, nutritional value, protein, starch, mineral fertilizers, Zauralie.

Дёмин Евгений Александрович – аспирант кафедры почвоведения и агрохимии ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» г. Тюмень
Тел.: 8-952-672-83-92
E-mail: gambitn2013@yandex.ru

Demin Evgenii Aleksandrovich – Post-graduate student of the Department of Soil Science and Agrochemistry FSBEI HE «Northern Trans-Ural State Agricultural University» Tyumen
Tel.: 8-952-672-83-92
E-mail: gambitn2013@yandex.ru

Ерёмин Дмитрий Иванович – доктор биологических наук, профессор кафедры почвоведения и агрохимии ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» г. Тюмень
Тел.: 8-912-927-13-86
E-mail: soil-tyumen@yandex.ru

Eremin Dmitrii Ivanovich – Doctor of Biology Science, Professor Department of Soil Science and Agrochemistry FSBEI HE «Northern Trans-Ural State Agricultural University» Tyumen
Tel.: 8-912-927-13-86
E-mail: soil-tyumen@yandex.ru

Зерно кукурузы благодаря сбалансированному сочетанию всех необходимых для хорошего развития животных компонентов питания [1, 2] делает ее необходимым ингредиентом при создании сбалансированных по питательности кормов [3, 4].

Исследователи, разрабатывающие рационы, утверждают, что зерно кукурузы пригодно для кормления всех видов сельскохозяйствен-

ных животных и птицы. При этом они отмечают положительную тенденцию в развитии и наборе массы животных. М. А. Суслова и Н. М. Ширнина со своими коллегами подтверждают, что при поедании жвачными животными плющеной консервированной кукурузы повышается интенсивность пищеварительных процессов, что положительно сказывается на продуктивности животных [5, 6].

Одной из основных проблем при выращивании кукурузы на зерно в условиях лесостепной зоны Зауралья являются холодные почвы. Из-за большой глубины промерзания в зимний период пахотный слой чернозема выщелоченного остается слабо прогретым даже к концу весны. Это затрудняет потребление питательных веществ в начале развития кукурузы, что негативно влияет на урожайность и качество зерна.

Цель наших исследований установить влияние минеральных удобрений на содержание белка и крахмала в зерне кукурузы.

Исследования проводились в Тюменской области, Заводоуковском районе, на территории ЗАО «Центральное». Климатические условия района характеризуются как достаточно теплые и в меру увлажненные. Количество осадков, выпадающих за год, достигает 374 мм, при этом на теплый период приходится не более 62 %. Сумма активных температур в различные годы варьирует в пределах 1950–2100 °С. В наиболее благоприятные годы достигает 2500 °С. Среднесуточная температура воздуха в период посевной кампании составляет около 10 °С и увеличивается к июню до 19–20 °С, после чего начинает плавно понижаться до 10–11 °С к концу сентября. На территории района нередко бывают заморозки, чаще всего весной – приходится на 2 декаду мая, осенью – на 2–3-ю декады сентября.

Почва – чернозем сильновыщелоченный маломощный тяжелосуглинистый, сформировавшийся на карбонатных лессовидных суглинках. Данный подтип является наиболее плодородным среди остальных зональных почв Северного Зауралья [7, 8].

Схема опыта предусматривала внесение минеральных удобрений на планируемую урожайность зерна кукурузы. Дозы удобрений рассчитывались ежегодно с учетом фактических запасов доступных питательных веществ в весенний период (табл.). В опыте использовали аммиачную селитру и диаммофоску.

После уборки овса проводили отвальную обработку плугами на глубину 23–25 см. Весной боронили в два следа зубowymi боронами БЗСС-1,0. Минеральные удобрения врезали сеялками СЗП-3,6 на глубину заделки семян, после чего проводили культивацию КПС-4. Сеяли сеялкой точного высева СУПН-8А с нормой высева 70 тыс. растений на гектар. В 2016 году сеяли гибрид Ладожский 148, в 2017 году – Об-

ский 140. Эти гибриды относятся к одной группе созревания (ФАО 150) и схожи по своим биологическим особенностям. Смена гибрида не приводит к искажению результатов агрохимических исследований.

В период уборки проводили учет биологической урожайности зерна в четырехкратной повторности, на каждом повторении отбирали початки с 50 растений. После чего определяли уборочную влажность зерна термостатно-весовым способом. Обмолот початков проводили при достижении стандартной влажности (14 %) вручную с отдельным взвешиванием каждой повторности. Определение сырого протеина в зерне кукурузы проводили методом Кьельдаля (ГОСТ 51417); крахмал определяли по ГОСТ 10845–98. Статистическую обработку данных проводили по Доспехову с использованием Excel.

Питательная ценность зерна кукурузы обусловлена определенными компонентами. Наиболее важными являются белок, крахмал и жиры [9]. В нашем исследовании установлено, что при выращивании кукурузы на естественном агрофоне содержание белка в зерне достигало 11,1 % при НСР₀₅ 0,3 %. Сбор сырого протеина с одного гектара составил 450 кг (рис. 1).

Внесение минеральных удобрений на планируемую урожайность 4,0 т/га зерна кукурузы обеспечивало увеличение сырого протеина до 13,5 %, где сбор белка достигал 653 кг. На варианте с планируемой урожайностью 5,0 т/га зерна кукурузы содержание белка за годы исследований в среднем достигало 10,7 %, а сбор составлял не более 563 кг. Снижение содержания и сбора белка на этом варианте объясняется произошедшим дисбалансом питательных веществ в одном из годов исследования [9]. На варианте с максимальным агрофоном сбор белка составил 680 кг при содержании в зерне 11,7 % от сухого вещества.

Содержание крахмала в зерне кукурузы, выращиваемой на вариантах без использования минеральных удобрений, составляло 62,4%, его сбор с гектара при этом был 2530 кг (рис. 2).

Внесение минеральных удобрений на планируемую урожайность 4,0 т/га зерна кукурузы способствовало повышению содержания крахмала до 65,3 % при сборе 3170 кг.

Таблица – Дозы минеральных удобрений для получения планируемой урожайности кукурузы, кг/га д. в.

Вариант	2016			2017		
	N	P	K	N	P	K
Контроль	0	0	0	0	0	0
NPK на 4,0 т/га	80	60	60	60	60	60
NPK на 5,0 т/га	110	80	80	80	100	100
NPK на 6,0 т/га	150	100	100	120	120	120

Рисунок 1 – Влияние минеральных удобрений на содержание (%) и сбор белка зерном кукурузы (кг/га), 2016–2017 гг.

Рисунок 2 – Влияние минеральных удобрений на содержание (%) и сбор крахмала зерном кукурузы (кг/га), 2016–2017 гг.

Дальнейшее увеличение уровня питания на планируемую урожайность 5,0 т/га зерна кукурузы обеспечивало повышение этого показателя на 2,3 %. Благодаря высокой урожайности зерна кукурузы, сбор крахмала на этом варианте оказался на 26 % выше, чем на контроле. На максимальном агрофоне содержание и сбор крахмала были значительно выше контроля.

На естественном агрофоне сбор сырого протеина урожаем зерна кукурузы составлял не более 450 кг при содержании белка в 11 %. Минеральные удобрения способствовали по-

вышению этого показателя до 13,5 % лишь на варианте, где планировалось получение 4,0 т/га зерна кукурузы. Максимальный сбор сырого протеина был на варианте с максимальным агрофоном – 680 кг. Содержание крахмала в зерне кукурузы, выращиваемой без использования минеральных удобрений, составляло 62,4 %, его сбор при этом достигал 2530 кг. Повышение уровня питания обеспечило увеличение содержания крахмала в зерне до 69,3 %, где сбор достигал максимальной величины – 4014 кг.

Литература

1. Суслова М. А., Ширнина Н. М., Резниченко В. Г. Эффективность использования зерна кукурузы в составе рационов при выращивании молодняка крупного рогатого скота // Вестник мясного скотоводства. 2009. Т. 2, № 62. С. 151–155.

References

1. Suslova M. A., Shirnina N. M., Reznichenko V. G. Efficiency of the use of corn grain in rations during the cultivation of young cattle // Bulletin of beef cattle breeding. 2009. T. 2, № 62. P. 151–155.

2. Биологические аспекты гибридного семеноводства кукурузы в лесостепи Зауралья / А. Э. Панфилов, А. И. Супрунов, Н. И. Казакова, Е. С. Иванова // АПК России. 2017. № 5. С. 1122–1127.
3. Миллер Е. И., Рзаева В. В., Миллер С. С. Засоренность посевов и урожай кукурузы по основной обработке почвы в Западной Сибири // Агропродовольственная политика России. 2017. № 10 (70). С. 104–108.
4. Еремина Д. В., Дёмин Е. А. Агроэкономическое обоснование выращивания кукурузы на зерно в лесостепной зоне Зауралья // Агропродовольственная политика России. 2016. № 12 (60). С. 27–30.
5. Суслова М. А., Ширнина Н. М., Чаплыгина Л. А. Влияние использования плющеной консервированной кукурузы в составе рациона на процессы пищеварения в рубце молодняка крупного рогатого скота // Вестник мясного скотоводства. 2010. Т. 2, № 63. С. 98–103.
6. Использование зернофуража из кукурузы, заготовленного по разной технологии, в кормлении бычков, выращиваемых на мясо / Н. М. Ширнина, М. А. Суслова, Б. Х. Галиев, К. Ш. Картеkenov // Вестник мясного скотоводства. 2011. Т. 1, № 64. С. 112–118.
7. Ренев Е. П., Ерёмин Д. И., Ерёмин Д. В. Оценка основных показателей плодородия почв, наиболее пригодных для расширения пахотных угодий в Тюменской области // Достижения науки и техники АПК. 2017. Т. 31, № 4. С. 27–31.
8. Еремин Д. И., Груздева Н. А. Агрогенные изменения плотности серых лесных почв в Северном Зауралье // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2017. Т. 47, № 5. С. 13–22.
9. Татаркина Н. И., Пономарева Е. А. Эффективность использования плющеного зерна в рационах молодняка крупного рогатого скота // Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. 2008. № 4. С. 9–13.
2. Biological aspects of hybrid maize seed growing in the forest-steppe of Zauralye / A. E. Panfilov, A. I. Suprunov, N. I. Kazakova, E. S. Ivanova // Agro-industrial complex of Russia. 2017. № 5. P. 1122–1127.
3. Miller E. I., Rzaeva V. V., Miller S. S. Weediness of crops and corn yield by basic soil cultivation in Western Siberia // Agrofood policy of Russia. 2017. № 10 (70). P. 104–108.
4. Eremina D. V., Demin E. A. Agroeconomic substantiation of maize cultivation for grain in the forest-steppe zone of Zauralye // Agrofood policy of Russia. 2016. № 12 (60). P. 27–30.
5. Suslova M. A., Shirnina N. M., Chaplygin L. A. Influence of the use of crushed canned corn in the ration on the processes of digestion in the rumen of young cattle // Bulletin of beef cattle breeding. 2010. T. 2, № 63. P. 98–103.
6. Use of grain fodder from corn harvested by different technology in feeding bull-calves, grown for meat / N. M. Shirnina, M. A. Suslova, B. Kh. Galiev, K. Sh. Kartekenov // Bulletin of beef cattle breeding. 2011. T. 1, № 64. P. 112–118.
7. RENEV E. P., EREMIN D. I., EREMIN D. V. Assessment of the main indicators of soil fertility, the most suitable for expanding arable land in the Tyumen region // Achievements of science and technology of the agroindustrial complex. 2017. V. 31, № 4. P. 27–31.
8. Eremin D. I., Gruzdeva N. A. Agrogenic changes in the density of gray forest soils in the northern Trans-Ural region // Siberian Bulletin of Agricultural Science. 2017. T. 47, № 5. P. 13–22. DOI: 10.26898/0370-8799-2017-5-2.
9. Tatarkina N. I., Ponomareva E. A. Efficiency of using plush grain in rations of young cattle // Feeding of farm animals and fodder production. 2008. № 4. P. 9–13.