УДК 630*17:582.47:630*231(470.57)

И.Р. Мухаметдинов, К.М. Габдрахимов

ВОЗОБНОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ ЮЖНОГО УРАЛА ПО ТИПАМ ЛЕСА*Ключевые слова: сосна обыкновенная; воспроизводство лесов; тип леса; подрост.*

Введение. Леса Урала относятся к обособленному природно-экономическому району с разнообразными лесорастительными условиями, тяготеют к крупным промышленным центрам и обеспечивают древесиной, выполняя в то же время многообразные водоохранно-защитные функции. Перспективы развития лесозаготовок и задачи рационального использования лесных ресурсов определяют особое направление в организации лесного хозяйства и систему мероприятий по восстановлению лесов в этом районе [1, 4].

Актуальность восстановления горных лесов Южного Урала не вызывает сомнений. Основное внимание в последнее время уделяется посадке лесных культур, однако нельзя игнорировать возможности и преимущества естественного лесовосстановления [2, 3]. Естественное возобновление имеет ряд преимуществ. Прежде всего, это формирование сложных многокомпонентных насаждений, более близких к материнским древостоям, включая нижние ярусы растительности, в частности, кустарнички (брусника, черника, клюква и др.), что очень важно для восстановления лесов как экологических систем. Обеспечивается также полное восстановление всех экологических функций леса (климаторегулирующих, водоохранно-почвозащитных, рекреационных, санитарно-гигиенических).

Цель исследования. Анализ естественного возобновления сосны обыкновенной под пологом леса на территории Южного Урала Республики Башкортостан.

Объекты исследования и обсуждение результатов. Проведенные натурные исследования сосновых насаждений на территории Южного Урала Республики Башкортостан показывают, что естественное возобновление сосны обыкновенной под пологом леса зависит прежде всего от качества условий местопроизрастания, состава и полноты материнского древостоя.

В злаковом, снытьево-костяничковом, широколиственном, зеленомошниковом типах леса количество подроста достигает хорошего уровня при полноте древостоя 0,5–0,7, II–III-класса бонитета. По данным таблицы 1 видно, что в широколиственном типе леса независимо от состава материнского древостоя количество подроста сосны примерно одинаково. В снытьево-костяничковом типе леса с увеличением доли сосны в составе материнского древостоя увеличивается количество соснового подроста, а с увеличением лиственных пород – уменьшается. В злаковом типе леса нет четкой зависимости между составом древостоя, количеством подроста и долей ее участия в видовом составе. В этом случае решающую роль сыграли другие факторы.

Таблица 1 Возобновительный потенциал сосновых древостоев на территории Южного Урала

Таксационный показатель древостоя				Характеристика подраста				
класс бонитета	полнота	состав	площадь исследования, га	состав	количество, тыс. шт./га		А ср, лет	Н ср, м
					всего	сосны		
Тип леса – злаковый								
2	0,5	5С4Б1Ос	8,1	10С	1,7	1,7	30	4,6
	0,6	5С5Б+С	3,8	7С3П	4,5	3,1	30	4,5
	0,7	8С2Б	61,8	10С	1,6	1,6	25	3,7
	0,8	9С1Б	2,0	10С	1,0	1,0	25	3,5
Итого	0,70	8С2Б+Ос	75,7	10С+П	1,8	1,7	26	3,8
3	0,5	6С4Б	22,7	6С3Б1Лп	1,9	1,1	25	2,8
	0,7	8С2Б	10,8	10С	5,6	5,6	29	4,6
	0,8	8С2Б	31,5	10С	2,2	2,2	23	3,4
	0,9	6С4Б+Ос	25,1	10С	1,0	1,0	25	3,7
Итого	0,74	7С3Б+Ос	90,1	10С+Б+Лп	2,2	2,0	25	3,5
Всего	0,72	7С3Б+Ос	165,8	10С+П+Б+Лп	2,0	1,9	25	3,6
Тип леса – снытьево-костяничниковый								
2	0,3	9С1Б	26,6	10С	1	1	15	2
	0,5	5С5Б	5,6	10С	0,5	0,5	25	4,0
	0,6	6С4Б	3,1	10С	1,5	1,5	20	2,5
	0,7	9С1Б	15,2	10С	2,8	2,8	22	3,8
Итого	0,46	8С2Б	50,5	10С	1,5	1,5	19	2,8
3	0,3	10С	7,1	3С4Б3Ос	2,5	0,7	10	2,5
	0,6	7С3Б	43,4	10С	1,2	1,2	21	2,0
	0,7	8С2Б	28,8	9С1П	1,6	1,6	22	2,3
Итого	0,6	8С2Б	79,3	9С1П+Б+Ос	1,5	1,3	20	2,2
Всего	0,56	8С2Б	129,8	9С1П+Б+Ос	1,5	1,3	20	2,4
Тип леса – широколиственный								
2	0,4	6С2Б2Ос+Б	1,6	10С	1,0	1,0	30	3,8
	0,6	9С1Б	4,6	10С	1,2	1,2	31	4,3
	0,7	9С1Б	10,3	10С	1,0	1,0	40	6,0
	0,8	8С2Б	20,9	10С	0,7	0,7	35	4,5
Итого	0,7	9С1Б+Ос	37,4	10С	1,3	1,3	35	4,8
3	0,3	7С3Б	16,0	10С	0,6	0,6	10	1,4
	0,4	7С2Л1Б	3,3	10С	1,0	1,0	35	4,0
	0,5	7С2Б1Ос	22,0	10С	2,2	2,2	22	3,1
	0,6	8С2Б	39,7	10С	1,0	1,0	23	2,9
	0,7	6С4Б	4,2	10С	2,0	2,0	20	2,0
Итого	0,5	7С2Б1Ос+Л	85,2	10С	1,3	1,3	21	2,7
Всего	0,56	8С2Б+Л+Ос	122,6	10С	1,3	1,3	25	3,3
Тип леса – зеленомошниковый								
2	0,4	10С+Л	13,2	10С	1	1	40	4
	0,6	10С	4,1	10С	2,5	2,5	30	2,0
	0,7	9С1Б	20,3	10С	1,5	1,5	41	4,2
	0,9	9С1Л+Б	26,4	10С	0,5	0,5	40	4
Итого	0,7	9С1Б+Л	64	10С	1,0	1,0	40	3,9
3	0,3	8С2Б	28,1	5С5Б	0,5	0,25	3	0,5
	0,4	10С	1,5	10С	4,0	4,0	45	7,0
	0,6	10С+Л+Б	38,2	10С	1,5	1,5	35	4,0
	0,7	10С	33,9	10С	1,7	1,7	27	3,7
	0,8	6С2Л2Б	19,5	10С	1,0	1,0	40	5,0
	1,0	9С1Л+Б	57,7	10С	0,5	0,5	30	4,0
Итого	0,7	9С1Л+Б	178,9	10С	1,0	1,0	27	3,5
Всего	0,70	9С1Л+Б	242,9	10С	1,0	1,0	31	3,6
Тип леса – чернично-брусничный								
2	0,6	8С2Б	17,4	9С1Б	2,5	2,3	18	3,2
	0,7	9С1Б	91,4	10С	1,4	1,4	15	2,6
	0,8	7С3Б	11,0	7С3Б	1,5	1,1	27	3,0
	0,9	6С4Б	23,0	9С1Б	1,5	1,3	15	1,5
Итого	0,8	8С2Б	125,4	10С	1,8	1,7	16	2,5
3	0,5	10С+Л	9,2	10 С	1,0	1,0	45	4,0
	0,7	10С	11,4	10 С	1,0	1,0	45	4,0
	0,8	10С+Б	34,6	10 С	2,0	2,0	10	1,5
Итого	0,7	10С	55,2	10С	1,6	1,6	23	2,4
Всего	0,77	9С1Б	180,6	10С	1,7	1,7	18	2,5

Успешность появления самосева зависит от доброкачественности сосняков. В свою очередь, семеношение во многом зависит от условий добротности местопроизрастания. Но в богатых условиях местопроизрастания подрост сосны испытывает сильную конкуренцию со стороны бурно разрастающегося подростка лиственных пород.

В злаковых типах леса максимальное возобновление сосны происходит при III классе бонитета древостоя при полноте 0,7. Максимальное количество подростка сосны в снытьево-костяничниковом типе леса – 2200 шт./га при II классе бонитета и полноте 0,7. Неплохое возобновление в широколиственном типе леса при III классе бонитета при полноте 0,5 с количеством подростка 2500 шт./га. Решающую роль сыграла полнота насаждений, которая уменьшила конкуренцию со стороны травяно-кустарникового яруса.

Таким образом, в широколиственном типе леса самое максимальное количество подростка на-

блюдается при полноте 0,5–2,2 тыс. шт./га. В то же время с уменьшением полноты древостоя наблюдается увеличение доли сосны в составе подростка, что связано с достаточным для естественного возобновления сосны поступающего света под полог. В снытьевом и злаковом типах леса нет четкой зависимости между количеством подростка и полнотой насаждения. Следует отметить, что оптимальной для естественного возобновления сосны является полнота от 0,4 до 0,7, но хорошие результаты возобновления вероятны при полноте 0,8 в чернично-брусничном типе леса.

Вывод. На территории Южного Урала возможно восстановление естественных сосняков путем сохранения имеющегося подростка под пологом леса совместно с мероприятиями по содействию естественному возобновлению различной интенсивности в зависимости от типов леса.

Библиографический список

1. Габдрахимов, К.М. Воспроизводство и повышение экологической продуктивности лесов Южного Урала [Текст] / К.М. Габдрахимов, И.Г. Сабирзянов. М.: МГУЛ, 2006. 310 с.

2. Габдрахимов, К.М. Воспроизводство сосняков Южного Урала [Текст] / К.М. Габдрахимов. М.: МГУЛ, 2002. 104 с.

3. Залесов, С.В. Научное обоснование системы лесоводственных мероприятий по повы-

шению продуктивности сосновых лесов Урала [Текст]: автореферат дисс. ... док. с.-х. наук / С.В. Залесов. Екатеринбург, 2000. 37 с.

4. Хайретдинов, А.Ф. Белебеевская возвышенность [Текст] / А.Ф. Хайретдинов. Уфа: Башкиргиздат, 1987. 160 с.

Сведения об авторах

1. **Мухаметдинов Ильшат Рифатович**, старший научный сотрудник, АНО «Институт рационального природопользования», г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: mux_il@mail.ru.

2. **Габдрахимов Камиль Махматович**, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры лесоводства и ландшафтного дизайна, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: 8 (347) 2521377, e-mail: gabdrakhimov@mail.ru.

В данной статье представлен анализ естественного воспроизводства сосновых лесов Южного Урала. При этом воспроизводство лесов рассматривается как природный комплекс одновременного восстановления на различных типах леса древостоя, флоры и фауны, что делает его необходимым для разработки практических приемов и методов для создания новых лесов и стро-

гого научного подхода к восстановлению биогеоценозов на Южном Урале. Установлено, что на территории Южного Урала возможно восстановление естественных сосняков путем сохранения имеющегося подростка под пологом леса совместно с мероприятиями по содействию естественному возобновлению различной интенсивности в зависимости от типов леса.

I. Muhamedinov, K. Gabdrakhimov

REFORESTATION CAPACITY OF PINE STANDS IN SOUTHERN URAL ACCORDING TO FOREST TYPES

Key words: pine; reforestation; forest type; new growth.

Authors' personal details

1. **Muhamedinov Il'shat**, senior researcher, autonomous non-commercial enterprise «Institute of rational use of natural resources», Ufa, 50-letiya Otyabrya st., 34, e-mail: myx_il@mail.ru.

2. **Gabdrakhimov Kamil**, Doctor of agricultural sciences, professor of the Forestry and Landscape Design chair, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Otyabrya st., 34, phone: 8 (347) 2521377, e-mail: gabdrahimov@mail.ru.

This article presents an analysis of natural regeneration of pine forests in South Urals. Moreover, reforestation is considered as a natural complex of simultaneous recovery of forest plantations, flora and fauna in different types of forests that makes it

necessary to develop both practical techniques and methods to create new forests and strict scientific approach to biogeocenosis restoration in South Ural.

© Мухаметдинов И.Р., Габдрахимов К.М.