ВЕСТНИК

БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

1 (49)
2019

ISSN 1684-7628

ОТРАСЛИ НАУК

технические
сельскохозяйственные
ветеринарные

**ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
В КАТАЛОГЕ «ИЗДАНИЯ ОРГАНОВ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ»
ОАО АГЕНТСТВО «РОСПЕЧАТЬ»**

66024

**Каталожная цена подписки
за полугодие – 700 рублей**

Выходит один раз в квартал

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук

СОДЕРЖАНИЕ

Агрономия

- DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-7-12
Э.А. Галимова, А.Ф. Аминев, А.Р. Ишбирдин
Влияние средств химической защиты растений
на вариабельность параметров мягкой пшеницы
сорта Саратовская 55 в условиях Башкирского Зауралья7
- DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-12-19
Ю.Н. Зубарев, Я.В. Субботина, М.А. Пластун
Влияние нормы посева и сортов многолетних злаковых трав
отечественной селекции на качество газонов
в Среднем Предуралье12
- DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-20-26
А.А. Казак, Ю.П. Логинов
Использование камеры искусственного климата
для размножения гибридов первого поколения
в зимний период20
- DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-26-32
Л.П. Кокина, Л.М. Щеклеина
Биологические свойства семян ячменя
в зависимости от сроков уборки26
- DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-33-36
Ю.Ю. Рогожникова, С.Н. Косников
Повышение конкурентоспособности
растениеводческой отрасли Краснодарского края.....33
- DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-37-41
И.Н. Романова, С.Е. Терентьев, Н.В. Птицына,
С.Н. Глушаков, М.И. Перепичай
Пути увеличения урожайности и качества зерна озимой тритикале
Консул37
- DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-41-46
М.В. Савченко, Г.Д. Кравченко, Н.А. Каширина
Видовой состав сорной растительности
в агроценозе лаванды узколистной в зависимости
от способа обработки междурядий.....41
- DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-47-49
В.В. Тунгрикова, Т.А. Филиппова
Периоды и онтогенетические состояния популяции
Symphytum officinale L. в условиях Приангарья.....47

**Ветеринария
и Зоотехния**

DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-50-55	
Г.Р. Хасанова, Г.М. Рахимова, Р.Ф. Исаев	
Влияние природных регуляторов роста при совместном применении с различными пестицидами на урожайность и фитосанитарное состояние посевов яровой пшеницы.....	50
DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-55-62	
С.Д. Батанов, И.А. Баранова, О.С. Старостина	
Модель прогнозирования молочной продуктивности коров по их экстерьерным особенностям.....	55
DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-62-70	
Г.С. Мишуковская, М.Г. Гиниятуллин, Т.Н. Кузнецова, Е.А. Смольникова, А.И. Науразбаева, Ш.Ш. Гиниятуллин	
Результаты садковых опытов по использованию пробиотиков в подкормке пчел	62
DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-70-75	
А.М. Мусаев	
Возрастные изменения репродуктивных органов японского перепела, выращенного в естественных ритмах активности и покоя	70
DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-76-80	
Е.Р. Нуралиев	
Мочекислый диатез кур.....	76
DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-81-87	
А.А. Роженцев, М.А. Роженцев, С.А. Лобанов	
Морфофункциональные изменения мозжечка крыс при кровопотере	81
DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-87-99	
Е.Н. Сковородин	
Влияние течения беременности на эмбриогенез яичников крупного рогатого скота.....	87
DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-99-104	
Р.Ш. Фахрутдинова, И.А. Афонина, Ю.В. Чудинова	
Полноценное кормление племенных бычков породы галловей в летне-пастбищный период в условиях Томской области	99
DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-104-110	
А.Ф. Хабиров	
Морфо-биохимические показатели крови у цыплят-бройлеров при включении в рацион кормовой добавки «Нормосил»	104
DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-111-116	
А.В. Харламов, А.Н. Фролов, О.А. Завьялов	
Влияние коррекции обменного пула йода и селена, оцененного по химическому составу шерсти, на гормональный статус коров	111
DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-117-121	
М.А. Шаймухаметов, А.И. Иванов, Р.Г. Фазлаев	
Мониторинг эпизоотической ситуации по эшерихиозу в Республике Башкортостан	117
DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-121-126	
И.А. Гайнуллин	
Влияние условий эксплуатации на интенсивность износа гусеницы трактора Т-170М1.03-53	121

**Процессы и машины
агроинженерных
систем**

DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-126-132

И.Р. Кафиев, Р.Р. Нугуманов

Моделирование теплового состояния
двухстороннего линейного асинхронного двигателя 126

DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-133-140

С.Г. Мударисов, А.В. Шарафутдинов

Обоснование конструктивно-технологических параметров
горизонтального распределителя пневматической сеялки 133

РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

Science Index

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
eLIBRARY.RU

AGRIS

Полные тексты статей доступны на сайте электронной научной библиотеки eLIBRARY.RU:
<http://elibrary.ru> и на сайте www.bsau.ru

DOI журнала: 10.31563/1684-7628

DOI выпуска: 10.31563/1684-7628-2019-49-1

Главный редактор: И.И. Габитов, д-р техн. наук, профессор

Заместители главного редактора: Р.Р. Султанова, д-р с.-х. наук, профессор
И.В. Чудов, д-р биол. наук, доцент

Редакционная коллегия: Х. Арнс, проф., д-р экономики (Германия); Р.М. Баширов, член-корр. АН РБ, д-р техн. наук, профессор; В.В. Гимранов, д-р вет. наук, профессор; М. Грингс, проф., д-р сельского хозяйства (Германия); Ф.С. Амиршоев, д-р биол. наук, профессор (Таджикистан); Р.Р. Исмагилов, член-корр. АН РБ, д-р с.-х. наук, профессор; К. Канненберг, д-р экон. наук (Польша); Ж.К. Керималиев, д-р вет. наук (Кыргызстан); Д.Д. Лукманов, д-р экон. наук, доцент; С.Г. Мударисов, член-корр. АН РБ, д-р техн. наук, профессор; Х.Х. Тагиров, д-р с.-х. наук, профессор; Н.К. Мазитов, д-р с.-х. наук, профессор, член-корр. РАН (Республика Татарстан); А.А. Стекольников, д-р вет. наук, профессор, академик РАН (Санкт-Петербург); И.О. Чанышев, д-р с.-х. наук

Адрес учредителя,
издателя и редакции:
450001, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 34
Тел./факс: (347) 228-15-11
E-mail: vestnik-bsau@mail.ru

www.vestnik.bsau.ru

ISSN 1684-7628

Редактор: **Н.А. Николаенко**
Технический и художественный редактор: **А.Е. Дереева**
Подписано в печать **15.03.2019**. Формат бумаги 60×84/8
Усл.-печ. л. **16,27**. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».
Печать трафаретная. Заказ **881**. Тираж **300** экз.
РИО ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ
450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, каб. 109

© ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 2019

Журнал зарегистрирован
в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор),
регистрационный номер
ПИ № ФС77-67713
от 10.11.2016

CONTENTS

Agronomics

- E. Galimova, A. Aminev, A. Ishbirdin
Effect of chemical plant protection products
on Saratovskaya 55 soft wheat variability in conditions
of the Bashkir Trans-ural region7
- Yu. Zubarev, Ya. Subbotina, M. Plastun
An effect of seeding rate and varieties
of perennial grain grasses of domestic selection on quality
of lawns in the Middle Cis-Ural region.....12
- A. Kazak, Yu. Loginov
Using a camera of artificial climate to reproduce hybrids
of the first generation during the winter period.....20
- L. Kokina, L. Shchekleina
Biological features of barley seeds depending
on harvest time26
- Yu. Rogozhnikova, S. Kosnikov
Estimating competitiveness of plant growing
of farm enterprises in the Krasnodar region.....33
- I. Romanova, S. Terentev, N. Ptitsyna, S. Glushakov, M. Perepichay
Ways to increase yields and quality
of winter triticale Consul grain.....37
- M. Savchenko, G. Kravchenko, N. Kachirina
Weed species composition
in true lavender agrocenosis depending
on the intertillage method.....41
- V. Tungrikova, T. Philippova
Periods and ontogenetic conditions of *Symphytum officinale* L.
in conditions of the Angara region47
- G. Khasanova, G. Rakhimova, R. Isaev
Influence of natural growth regulators with joint application
with different herbicides on yield and phytosanitary state
of spring wheat sowings50

Veterinary and animal science

- S. Batanov, I. Baranova, O. Starostina
Prediction model for milk production of cows
by their exterior features55
- G. Mishukovskaya, M. Giniyatullin, T. Kuznetsova,
E. Smolnikova, A. Nauzrabaeva, Sh. Giniyatullin
Results of cage experiences on use
of probiotics in feeding of bees62

	A. Musayev	Age-related changes of reproductive organs of japanese quails reared under natural rhythms of activity and rest.....	70
	E. Nuraliev	Urine acid diathesis in hens.....	76
	A. Rozhentsev, M. Rozhentsev, S. Lobanov	Morphological and functional changes of rat cerebellum at blood loss	81
	E. Skovorodin	The effect gestation course on embryogenesis of ovaries in cattle	87
	R. Fakhrutdinova, I. Afonina, Y. Chudinova	Full feeding of galloway breeding bulls in the summer grazing period in conditions of the Tomsk region	99
	A. Khabirov	Morpho-biochemical indicators of blood in broiler chickens when their diet is added with fodder supplement «Normosil».....	104
	A. Kharlamov, A. Frolov, O. Zavyalov	Effect of correction of the exchange pool of iodine and selenium estimated by the chemical composition of wool on the hormonal status of cows.....	111
	M. Shaymuhametov, A. Ivanov, R. Fazlaev	Monitoring epizootic situation on escherihosis in the Republic of Bashkortostan	117
Processes and machinery of agroengineering systems	I. Gainullin	Influence of operation conditions on caterpillar band wear rate of T-170M1.03-53 tractor.....	121
	I. Kafiev, R. Nugumanov	Modeling a thermal state of a double-sided linear induction motor	126
	S. Mudarisov, A. Sharafutdinov	Justification of constructive and technological parameters of the horizontal distributor of the pneumatic seeder	133

Editor-in-chief: I. Gabitov, Dr. tech. sci., Professor

Deputy Editor-in-chief: R. Sultanova, Dr. agr. sci.,
I. Chudov, Dr. biol. sci.

Editorial board: H. Arenz, Prof. Dr. oec. habil. (Germany); R. Bashirov, Corresponding Member AS RB, Dr. tech. sci., Professor; V. Gimranov, Dr. vet. sci., Professor; M. Grings, Prof. Dr. agr. habil. (Germany); F. Amirshoyev, Dr. biol. sci., Professor (Tajikistan); R. Ismagilov, Corresponding Member AS RB, Dr. agr. sci., Professor; K. Kannenberg, Dr. econ. sci. (Poland); Z. Kerimaliev, Dr. vet. sci. (Kyrgyz Republic); D. Lukmanov, Dr. econ. sci.; S. Mudarisov, Corresponding Member AS RB, Dr. tech. sci., Professor; H. Tagirov, Dr. agr. sci., Professor; N. Mazitov, Dr. agr. sci., Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences (Republic of Tatarstan); A. Stekolnikov, Dr. vet. sci., Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences (St. Petersburg); I. Chanyshiev, Dr. agr. sci.

Editorial Office Address:

34, 50-letia October St.,
Ufa, 450001

Tel.: (347) 228-15-11

E-mail: vestnik-bsau@mail.ru

ISSN 1684-7628

Publishing house FSEI HE Bashkir SAU

Printed FSEI HE Bashkir SAU

Editor: ***N. Nikolaenko***

Technical editor, corrector, make-up: ***A. Dereeva***

© FSEI HE Bashkir SAU, 2019

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ НА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА САРАТОВСКАЯ 55 В УСЛОВИЯХ БАШКИРСКОГО ЗАУРАЛЬЯ

Ключевые слова: мягкая пшеница; сорт Саратовская 55; вариабельность признаков; пестициды.

Введение. Яровая пшеница – одна из ведущих мировых культур, сортовое разнообразие которой очень велико. Одним из районированных в Республике Башкортостан является сорт мягкой яровой пшеницы Саратовская 55 – среднеспелый с высокой зерновой продуктивностью, засухоустойчив, среднеустойчив к полеганию. Возделывание пшеницы предполагает применение современных пестицидов, в том числе гербицидов для сокращения потерь урожая, связанных с засорением посевов. При применении СХЗР необходимо учитывать, что токсическому воздействию препаратов подвержены не только целевые объекты, но и культурные растения. Например, гербициды в зависимости от вида, сроков применения и дозы могут как повреждать культурные растения [3, 11, 13, 14], так и оказывать стимулирующее воздействие, в т. ч. повышать урожайность [2, 4–9]. Поэтому существует необходимость изучения влияния СХЗР на возделываемые растения, т. к. при оптимальной схеме применения можно значительно снизить риск угнетения культуры и даже повысить ее урожайность. В литературе имеются сведения о способности гербицидов оказывать положительное воздействие на морфогенез пшеницы. Они способны повысить продуктивную кустистость, биомассу растения, массу и число зерен в колосе и, как следствие, урожайность культуры в целом. Чаще всего авторы объясняют это снижением засоренности посевов и созданием тем самым более благоприятных условий для развития культуры [2, 4–9]. Средства химической защиты растений могут оказывать отрицательное воздействие на морфогенез пшеницы: это проявляется в уродливости колоса и колосовых чешуй, образовании стерильной пыльцы, кратковременном обесцвечивании листьев, увеличении доли аномальных зерен, уменьшении длины соломины, укорачивании междоузлий, уменьшении площади флагового листа и преждевременном старении листьев [3, 11, 13, 14]. В то же время пшеница способна проявлять устойчивость к воздействию гербицидов [1, 10, 12, 15–17].

Цель исследования – выявление закономерностей морфогенетических реакций культуры, в т. ч. признаков структуры урожая, на применяемые в интенсивных технологиях растениеводства средства химической защиты растений (СХЗР) для прогнозирования и управления урожаем.

Методика исследований. Для изучения нами были выбраны гербициды Чисталан (действующее вещество 2,4-Д (2-этилгексильный эфир), дикамба), Октапон (действующее вещество 2,4-Д (2-этилгексильный эфир), 2,4-Д (диметиламинная соль)) и обладающие пестицидным действием полисульфид калия и полисульфид кальция, которые впервые проходят испытания, и в литературе нет широкого освещения их влияния на вредителей и болезни растений. Все вещества применялись в форме концентрата эмульсии. Каждый препарат испытывался в вариантах без прополки и с ручной прополкой для выделения влияния изучаемых гербицидов и полисульфидов на параметры растения пшеницы с исключением их опосредованного влияния через засоренность. В наших опытах каждый вариант был представлен 3-кратной повторностью. Площадь делянок – 1 кв. м. Полевые исследования проводили в производственных посевах Баймакского ОПХ Башкирского НИИСХ (с. Куянтаево). Для опытов с СХЗР отводился участок, однородный по почвенным условиям и выровненный по рельефу. Видовой состав преобладающих на участке сорняков был типичным для региона и соответствовал спектру действия испытываемых гербицидов. На всей отводимой под опыт площади участка размещался один и тот же предшественник – яровая пшеница. Обработку растений проводили в безветренную погоду или при очень слабом ветре (1–3 м/с). Расположение делянок было рендомизированным и обеспечивало наибольший охват каждым вариантом всей пестроты опытного участка. Применение СХЗР в опытах осуществляли в фазу кущения. Для Чисталана и Октапона были выбраны дозы 0,2; 0,4 и 0,6 л/га, а для полисульфида калия и полисульфида кальция – 2,5; 5 и

10 л/га. В качестве контроля взяты участки без прополки и применения СХЗР.

Для оценки внутри- и межпопуляционной изменчивости в каждом варианте опыта случайным образом отбирали по 30 генеративных растений. У каждого растения исследовали следующие морфологические признаки: высота растения, длина междоузлий (счет от верхнего междоузлия), относительная длина верхнего (с флаговым листом) междоузлия (отношение длины междоузлия к высоте растения), длина влагалищ листьев, длина листовых пластинок, ширина листовых пластинок, длина колоса, число колосков, число зерен в колосе, масса зерен в колосе, средняя масса зерновки. Линейные параметры измеряли с точностью до 1 мм (ширина листовой пластинки – до 0,1 мм). Общую изменчивость оценивали по коэффициенту вариации признака, расчет достоверности различий средних значений и вариабельности признаков в выборках производили по t-критерию Стьюдента с достоверностью 95 %. Статистическая обработка первичных данных производилась с использованием программ Statistica и Excel.

Результаты и обсуждение. Итоговые данные по расчетам средних значений и вариабельности некоторых параметров морфологической структуры растений представлены в таблицах 1 и 2. Действие гербицида Чисталан на пшеницу по сравнению с контролем выражается общим статистически значимым снижением значений большинства морфологических параметров и параметров структуры урожая. Мы наблюдали значимое сокращение числа междоузлий в вариантах опыта с прополкой в дозе 0,4 и 0,6 л/га (в опыте 3 междоузлия, в контроле – 4). Такие параметры, как высота растения, длина влагалища первого листа, длина пластинки флагового листа и длина колоса закономерно выше в вариантах без прополки, чем соответствующие показатели в вариантах с прополкой. Видимо, это происходит из-за наложения на растения дополнительного стресса в связи с перегревом и пересыханием поверхности почвы в междурядьях после ручной прополки. Также наблюдается снижение значений морфологических параметров и параметров структуры урожая по сравнению с контролем при применении гербицида Октапон. Показатели средней длины первого междоузлия и средней длины пластинки флагового листа достоверно меньше в вариантах с прополкой, чем без нее. Длина колоса, число колосков в колосе, число зерен в колосе достоверно возрастают с увеличением дозы препарата. Если сравнить действие двух гербицидов, то видно, что средние морфологические показа-

тели и показатели структуры урожая при применении Чисталана значимо выше, чем при обработке Октапоном. При воздействии полисульфида калия наблюдается интересная особенность в формировании средних показателей таких параметров, как высота растения, длина конечного междоузлия, длина пластинки флагового листа, длина колоса. Здесь в вариантах с прополкой значения параметров при применении низких и высоких доз препарата, как правило, выше, чем при средних дозах. С увеличением дозы полисульфида калия (в пределах вариантов опыта) достоверно увеличиваются средняя масса зерен, ширина флагового листа, причем эти параметры всегда выше в вариантах опыта с прополкой. При этом во всех вариантах с применением полисульфида калия значения параметров значимо ниже, чем в контроле. Число колосков в вариантах без прополки всегда значимо выше. При воздействии полисульфида кальция длина первого междоузлия достоверно меньше в вариантах обработки растений малыми и высокими дозами с прополкой, а в средней дозе препарата прополка увеличивает данный показатель. Во всех вариантах с полисульфидом кальция значение высоты растений достоверно снижается при проведении ручной прополки. Длина влагалища первого листа, длина пластинки флагового листа достоверно уменьшаются с увеличением дозы. Прополка также уменьшает эти показатели. Средняя длина колоса при средних и высоких дозах препарата выше в вариантах с прополкой, чем в вариантах без прополки. Число колосков в колосе в вариантах без прополки достоверно повышается с увеличением дозы препарата. Масса зерен в колосе в вариантах с ручной прополкой достоверно увеличивается с повышением дозы препарата. Таблица 2 показывает достоверное увеличение изменчивости исследуемых признаков в большинстве вариантов опыта по сравнению с контролем, что указывает на дестабилизацию в развитии признаков, вызванную стрессирующим действием препаратов. Среди признаков структуры урожая только число колосков в колосе не показало значимых изменений вариабельности значений признака.

Выводы. Во всех вариантах опыта с применением гербицидов, как правило, наблюдается достоверное снижение средних значений всех параметров по сравнению с контролем. Единственный морфологический признак, который увеличивается по сравнению с контролем, – это длина влагалища нижнего листа, что наблюдается по причине внесения гербицида в фазу кущения пшеницы, когда и формируется данный признак.

Таблица 1 Средние значения и ошибки признаков растений мягкой пшеницы в условиях эксперимента

Вещество	Дозы (л/га)	Признаки и единицы их измерения									
		Высота растения, см	Длина междоузлия первого листа, см	Длина влагалища первого листа, см	Длина пластинки флагового листа, см	Ширина пластинки флагового листа, см	Длина колоса, см	Число колосков в колосе,	Число зерен в колосе, шт.	Масса зерен колоса, г	Сред. масса зерновки, г
Чистотлан	0,25 Б	63,2 ± 0,7	28,8 ± 0,4	11,3 ± 0,2*	10,2 ± 0,5*	0,5 ± 0,01	6,9 ± 0,1	12,1 ± 0,2	26,0 ± 0,7	0,8 ± 0,03	0,03 ± 0,0005
	0,25 П	57,8 ± 0,6	24,4 ± 0,5	10,8 ± 0,2	7,9 ± 0,3	0,4 ± 0,01*	6,6 ± 0,9	12,3 ± 1,6	26,1 ± 5,5	0,8 ± 0,03	0,03 ± 0,0008
	0,4 Б	64,9 ± 0,7	28,2 ± 0,5	12,1 ± 0,2	9,2 ± 0,3	0,5 ± 0,01*	7,3 ± 0,1	13,2 ± 0,2	29,30,8	0,9 ± 0,01	0,03 ± 0,0007
	0,4 П	60,8 ± 0,7	25,7 ± 0,6	11,5 ± 0,1	8,7 ± 0,3	0,5 ± 0,01*	7,0 ± 0,1	12,7 ± 0,2	27,8 ± 0,6	0,8 ± 0,03	0,03 ± 0,0005
	0,6 Б	62,3 ± 0,7	28,6 ± 0,4	11,9 ± 0,2	8,9 ± 0,2	0,5 ± 0,01*	7,5 ± 0,1	13,4 ± 0,2	27,9 ± 0,7	0,9 ± 0,03	0,03 ± 0,0005
	0,6 П	62,7 ± 0,7	27,9 ± 0,5	11,3 ± 0,1	8,6 ± 0,3	0,5 ± 0,01*	7,4 ± 0,1	13,2 ± 0,2	28,8 ± 0,7	0,9 ± 0,03	0,03 ± 0,0005
Октапон	0,25 Б	60,0 ± 0,7	26,6 ± 0,6	11,1 ± 0,2	8,2 ± 0,3	0,4 ± 0,01	6,5 ± 0,1	11,5 ± 0,2	22,8 ± 0,7	0,7 ± 0,02	0,03 ± 0,001
	0,25 П	59,5 ± 0,7	26,1 ± 0,5	10,9 ± 0,2	7,8 ± 0,3	0,4 ± 0,01	7,0 ± 0,1	13,1 ± 0,1	26,3 ± 0,7	0,8 ± 0,03	0,03 ± 0,0005
	0,4 Б	60,2 ± 0,7	27,2 ± 0,5	11,1 ± 0,2	8,6 ± 0,2	0,4 ± 0,01	7,1 ± 0,1	12,8 ± 0,2	26,2 ± 0,7	0,8 ± 0,03	0,03 ± 0,001
	0,4 П	60,3 ± 0,8	26,9 ± 0,6	11,2 ± 0,2	8,0 ± 0,3	0,4 ± 0,01	6,9 ± 0,1	12,7 ± 0,2	27,0 ± 0,7	0,8 ± 0,03	0,03 ± 0,0006
	0,6 Б	60,6 ± 0,7	26,6 ± 0,5	11,1 ± 0,1	8,6 ± 0,2	0,4 ± 0,01	7,1 ± 0,1	13,0 ± 0,2	25,8 ± 0,6	0,8 ± 0,03	0,03 ± 0,001
	0,6 П	61,3 ± 0,6	26,0 ± 0,5	11,0 ± 0,2	7,6 ± 0,3	0,5 ± 0,01	7,0 ± 0,1	12,9 ± 0,2	27,1 ± 0,7	0,8 ± 0,03	0,03 ± 0,0005
Полисульфид калия	2,5 Б	59,6 ± 0,6	25,2 ± 0,5	10,7 ± 0,2	7,8 ± 0,3	0,4 ± 0,01	6,7 ± 0,1	12,9 ± 0,2	24,0 ± 0,7	0,7 ± 0,03	0,03 ± 0,0001
	2,5 П	60,6 ± 0,8	25,8 ± 0,8	11,1 ± 0,2	9,0 ± 0,4	0,4 ± 0,01	6,9 ± 0,1	12,9 ± 0,2	26,9 ± 0,6	0,8 ± 0,03	0,03 ± 0,001
	5 Б	63,1 ± 0,6	27,0 ± 0,6	11,4 ± 0,2	8,9 ± 0,3	0,4 ± 0,01	7,0 ± 0,1	13,5 ± 0,2*	27,3 ± 0,7	0,8 ± 0,03	0,03 ± 0,0001
	5 П	59,2 ± 0,7	24,9 ± 0,5	10,9 ± 0,1	8,2 ± 0,2	0,5 ± 0,01*	6,9 ± 0,1	12,6 ± 0,2	25,5 ± 0,7	0,8 ± 0,03	0,03 ± 0,0005
	10 Б	62,0 ± 0,7	25,8 ± 0,6	11,3 ± 0,1	8,4 ± 0,2	0,4 ± 0,01	7,1 ± 0,1	13,5 ± 0,2*	27,7 ± 0,7	0,8 ± 0,03	0,03 ± 0,0001
	10 П	63,0 ± 0,6	26,8 ± 0,5	11,5 ± 0,2	8,6 ± 0,3	0,5 ± 0,01	7,2 ± 0,1	12,9 ± 0,2	27,3 ± 0,7	0,9 ± 0,03	0,03 ± 0,001
Полисульфид кальция	2,5 Б	59,6 ± 0,6	25,7 ± 0,5	11,1 ± 0,1	8,5 ± 0,3	0,4 ± 0,01	6,7 ± 0,1	12,7 ± 0,2	23,6 ± 0,6	0,7 ± 0,03	0,03 ± 0,001
	2,5 П	57,8 ± 0,8	23,3 ± 0,5	10,8 ± 0,1	8,2 ± 0,3	0,4 ± 0,01	6,7 ± 0,1	13,4 ± 0,2	24,4 ± 0,7	0,7 ± 0,03	0,03 ± 0,001
	5 Б	58,8 ± 0,8	24,1 ± 0,6	10,7 ± 0,2	7,9 ± 0,3	0,4 ± 0,01	6,7 ± 0,1	12,9 ± 0,2	25,7 ± 0,7	0,8 ± 0,03	0,03 ± 0,0004
	5 П	58,8 ± 0,5	24,5 ± 0,5	10,7 ± 0,2	7,6 ± 0,3	0,4 ± 0,01	6,8 ± 0,1	13,5 ± 0,2	25,7 ± 0,6	0,8 ± 0,03	0,03 ± 0,001
	10 Б	59,8 ± 0,7	25,3 ± 0,6	10,8 ± 0,2	8,3 ± 0,3	0,5 ± 0,01	6,7 ± 0,1	13,1 ± 0,2	24,5 ± 0,7	0,7 ± 0,03	0,03 ± 0,001
	10 П	59,4 ± 0,6	23,9 ± 0,5	10,7 ± 0,1	8,2 ± 0,3	0,4 ± 0,01	6,8 ± 0,1	13,3 ± 0,1	25,2 ± 0,6	0,8 ± 0,02	0,03 ± 0,0005
Контроль		68,8 ± 0,8	30,8 ± 0,6	12,8 ± 0,3	11,9 ± 0,8	0,5 ± 0,01	8,0 ± 0,1	14,2 ± 0,3	32,9 ± 1,1	1,2 ± 0,1	0,4 ± 0,001

Примечание: * – различия средних значений от контроля статистически не значимы. П – варианты опыта с прополкой, Б – без прополки.

Таблица 2 Вариабельность признаков (V, %) растений мягкой пшеницы
в условиях эксперимента

Вещество	Дозы, л/га	Высота расте- ния, см	Длина междоузлия первого ли- ста, см	Длина влага- лица пер- вого ли- ста, см	Длина пла- стинки флагов. ли- ста, см	Ширина пластинки флагов. листа, см	Длина колоса, см	Число ко- лосков в колосе, шт.	Число зер- ен в ко- лосе, шт.	Масса зер- ен в ко- лосе, г	Сред. масса зер- новки, г
Чисталан	0,25 Б	9,9 ± 0,1	14,5 ± 0,1	13,1 ± 0,1*	37,4 ± 0,1	14,4 ± 0,1*	13,3 ± 0,1	15,0 ± 0,1	24,7 ± 0,1	33,1 ± 0,2	14,6 ± 0,1
	0,25 П	9,4 ± 0,1	19,0 ± 0,1	13,3 ± 0,1*	25,7 ± 0,1	16,6 ± 0,1*	14,2 ± 0,1	14,8 ± 0,1*	27,8 ± 0,2	38,8 ± 0,2	23,3 ± 0,1
	0,4 Б	10,1 ± 0,1	17,2 ± 0,1	13,4 ± 0,1*	27,5 ± 0,2	13,9 ± 0,1*	13,4 ± 0,1	13,3 ± 0,1*	24,4 ± 0,1	35,2 ± 0,2	21,6 ± 0,1
	0,4 П	10,7 ± 0,1	22,6 ± 0,1	12,0 ± 0,1*	19,6 ± 0,1*	19,8 ± 0,1	12,7 ± 0,1	12,4 ± 0,1*	19,8 ± 0,1*	30,9 ± 0,2	16,7 ± 0,1
	0,6 Б	10,6 ± 0,1	12,8 ± 0,1	11,9 ± 0,2*	20,3 ± 0,1*	14,1 ± 0,1*	12,1 ± 0,1	11,7 ± 0,1*	11,3 ± 0,1	23,7 ± 0,1	32,0 ± 0,2
	0,6 П	10,8 ± 0,1	17,7 ± 0,1	12,6 ± 0,1*	22,7 ± 0,1*	15,0 ± 0,1*	13,5 ± 0,1	13,8 ± 0,1	24,7 ± 0,1	31,5 ± 0,2	15,0 ± 0,1
Октапон	0,25 Б	11,0 ± 0,1	20,7 ± 0,1	13,4 ± 0,1*	27,3 ± 0,2	17,6 ± 0,1	15,3 ± 0,1	17,0 ± 0,1	28,7 ± 0,2	34,8 ± 0,2	34,5 ± 0,1
	0,25 П	11,9 ± 0,1	19,5 ± 0,1	14,9 ± 0,1	24,4 ± 0,1	13,4 ± 0,1*	13,8 ± 0,1	10,7 ± 0,1*	25,3 ± 0,1	33,0 ± 0,2	15,3 ± 0,1
	0,4 Б	11,7 ± 0,1	17,6 ± 0,1	14,5 ± 0,1	21,1 ± 0,1*	19,1 ± 0,1	12,3 ± 0,1	15,4 ± 0,1	24,3 ± 0,1	35,6 ± 0,2	30,5 ± 0,2
	0,4 П	11,9 ± 0,1	20,4 ± 0,1	14,1 ± 0,1*	26,2 ± 0,1	16,0 ± 0,1	14,4 ± 0,1	15,0 ± 0,1	24,3 ± 0,1	36,3 ± 0,2	19,1 ± 0,1
	0,6 Б	10,9 ± 0,1	18,8 ± 0,1	11,6 ± 0,1*	21,2 ± 0,1*	21,0 ± 0,1	12,1 ± 0,1	12,7 ± 0,1*	23,1 ± 0,1	32,5 ± 0,2	16,8 ± 0,1
	0,6 П	9,4 ± 0,1	17,0 ± 0,1	14,3 ± 0,1*	23,0 ± 0,1*	16,9 ± 0,1	13,0 ± 0,1	13,1 ± 0,1*	22,5 ± 0,1	29,2 ± 0,2*	14,8 ± 0,1
Полисульфид калия	2,5 Б	9,9 ± 0,1	19,7 ± 0,1	13,9 ± 0,1*	25,5 ± 0,1	18,1 ± 0,1	14,9 ± 0,1	13,1 ± 0,1*	27,6 ± 0,2	37,6 ± 0,2	22,4 ± 0,1
	2,5 П	12,4 ± 0,1	30,8 ± 0,2	13,8 ± 0,1*	26,1 ± 0,1	15,8 ± 0,1	12,6 ± 0,1	12,5 ± 0,1*	23,0 ± 0,1	33,0 ± 0,2	18,3 ± 0,1
	5 Б	9,4 ± 0,1	19,8 ± 0,1	15,1 ± 0,1	22,1 ± 0,1*	16,1 ± 0,1	12,2 ± 0,1	11,1 ± 0,1*	24,4 ± 0,1	31,0 ± 0,2	18,4 ± 0,1
	5 П	10,4 ± 0,1	18,9 ± 0,1	12,1 ± 0,1*	20,3 ± 0,1*	14,0 ± 0,1*	13,6 ± 0,1	15,1 ± 0,1	25,9 ± 0,1	33,7 ± 0,2	16,1 ± 0,1
	10 Б	10,8 ± 0,1	20,4 ± 0,1	12,6 ± 0,1	22,3 ± 0,1	17,5 ± 0,1	13,2 ± 0,1	13,5 ± 0,1	27,7 ± 0,1	34,7 ± 0,2	17,3 ± 0,1
	10 П	9,4 ± 0,1	17,2 ± 0,1	20,0 ± 0,1	22,8 ± 0,1	12,7 ± 0,1*	12,2 ± 0,1	13,1 ± 0,1*	22,9 ± 0,1	29,2 ± 0,2*	22,7 ± 0,1
Полисульфид кальция	2,5 Б	9,1 ± 0,1	18,9 ± 0,1	12,6 ± 0,1*	22,8 ± 0,1*	15,7 ± 0,1	13,7 ± 0,1	12,9 ± 0,1*	25,3 ± 0,1	34,1 ± 0,2	18,4 ± 0,1
	2,5 П	13,5 ± 0,1	20,5 ± 0,1	12,4 ± 0,1*	26,3 ± 0,1	20,9 ± 0,1	12,9 ± 0,1	12,3 ± 0,1*	27,0 ± 0,2	35,4 ± 0,2	17,1 ± 0,1
	5 Б	12,4 ± 0,1	24,4 ± 0,1	14,9 ± 0,1	21,9 ± 0,1*	14,3 ± 0,1*	13,6 ± 0,1	12,6 ± 0,1*	25,5 ± 0,1	31,6 ± 0,2	13,9 ± 0,1
	5 П	8,4 ± 0,1	17,9 ± 0,1	15,5 ± 0,1	21,1 ± 0,1*	18,0 ± 0,1	11,8 ± 0,1	11,1 ± 0,1*	23,9 ± 0,1	33,9 ± 0,2	34,0 ± 0,2
	10 Б	11,8 ± 0,1	22,5 ± 0,1	15,9 ± 0,1	24,3 ± 0,1	11,8 ± 0,1*	14,5 ± 0,1	13,8 ± 0,1	26,4 ± 0,1	33,8 ± 0,2	19,0 ± 0,1
	10 П	9,1 ± 0,1	19,1 ± 0,1	11,4 ± 0,1*	22,0 ± 0,1*	15,4 ± 0,1	12,1 ± 0,1	9,6 ± 0,1*	23,6 ± 0,1	29,3 ± 0,2*	13,8 ± 0,1
Контроль		6,5 ± 0,1	10,1 ± 0,1	11,7 ± 0,1	18,9 ± 0,1	12,4 ± 0,1	9,1 ± 0,1	11,1 ± 0,1	17,5 ± 0,1	24,6 ± 0,1	10,2 ± 0,1

Примечание: * – различия средних значений от контроля статистически не значимы. П – варианты опыта с прополкой, Б – без прополки.

Препараты с пестицидным действием полисульфида калия и полисульфида кальция при повышении дозы не всегда вызывают линейный ответ в формировании признаков вегетативной сферы и структуры урожая, причем степень выраженности действия препаратов зависит и от фактора прополки. В целом изученные морфологические параметры уменьшаются при применении СХЗР в ряду Чисталан, Октапон, полисульфид калия, полисульфид кальция. Изменчивость (CV) признаков по сравнению с

контролем возрастает во всех вариантах опыта для таких параметров, как высота растения, длина междоузлия первого листа и, что особенно важно, для признаков структуры урожая – число и масса зерен в колосе, масса зерновки. Проведенные нами исследования показали неоднозначное влияние средств химической защиты растений на параметры мягкой пшеницы сорта Саратовская 55 в условиях относящегося к региону рискованного земледелия Башкирского Зауралья.

Библиографический список

1. Долженко, В.И. Сортовая устойчивость зерновых культур к новым гербицидам [Текст] / В.И. Долженко, А.А. Петунова, Т.А. Маханькова, Е.Ф. Коренюк, Е.И. Кириленко, С.И. Редюк // *Агро XXI*. 2008. № 4-6. С. 37–41.
2. Доронин, В.Г. Системы защиты яровой пшеницы от сорняков и болезней в условиях юга Западной Сибири [Текст] / В.Г. Доронин, Е.Н. Ледовский // *Вестник Алтайского государственного аграрного университета*. 2011. Т. 78. № 4. С. 9–13.
3. Козлова, Е.В. Реакция мужского гаметофита пшеницы на обработку посевов гербицидом Секатор Турбо и его смесью с Гепардом Экстра [Текст] / Е.В. Козлова, О.В. Злотникова // *Вестник Красноярского государственного аграрного университета*. 2012. № 12. С. 95–99.
4. Маркс, Е.И. Влияние аммиачной селитры и диалена на площадь листовой поверхности и биомассу растений пшеницы [Текст] / Е.И. Маркс, Г.А. Маринкина // *Вестник Новосибирского государственного аграрного университета*. 2014. Т. 1. № 30. С. 30–33.
5. Москвитин, А.С. Влияние азотных удобрений и гербицидов на засоренность посевов и урожайность яровой пшеницы [Текст] / А.С. Москвитин // *Защита и карантин растений*. 2010. № 5. С. 28–29.
6. Мрясова, Л.М. Динамика сорных растений в агрофитоценозе яровой пшеницы [Текст] / Л.М. Мрясова, Р.Н. Галиахметов // *Защита и карантин растений*. 2011. № 7. С. 30–32.
7. Олешко, В.П. Влияние элементов технологии возделывания на урожайность и качество зерна яровой мягкой пшеницы в условиях юга Западной Сибири [Текст] / В.П. Олешко, А.А. Гаркуша, Н.И. Лихачев, С.В. Усенко // *Достижения науки и техники АПК*. 2011. № 6. С. 34.
8. Пасько, Т.И. Гербициды на озимой пшенице [Текст] / Т.И. Пасько // *Известия Оренбургского государственного аграрного университета*. 2015. № 3 (53). С. 32–34.
9. Пуртов, Д.В. Контроль сорного компонента в агрофитоценозе яровой пшеницы с помощью гербицида «Пума Плюс» [Текст] / Д.В. Пуртов, Н.А. Резанов, Н.А. Рендов, Е.В. Некрасова, С.И. Мозылева // *Вестник Омского государственного аграрного университета*. 2015. № 2 (18). С. 13.
10. Чернуха, В.Г. Биологическое обоснование применения современных гербицидов в ценозе яровой пшеницы Поволжья и северо-западного региона [Текст]: дис. ... канд. биол. наук / В.Г. Чернуха. Санкт-Петербург, 2010. 138 с.
11. Domaradski K. Influence of herbicide and application timing on *Alopecurus myosuroides* control in winter wheat in Poland. *Z. Pflanzenschutz*. 2006. Spec. Issue 20. P. 817–821.
12. Kieloch R. Rola Henryka Sensitivity of winter wheat cultivars to selected herbicides. *Journal of plant protection research*. 2010. Т. 50. № 1. P. 35–40.
13. Nowicka Barbara Rola Henryka Oddziaływanie na herbicydów na wybrane odmiany pszenicy ozimej. *Post. ochr. rosl*. 1997. 37. № 2. P. 254–256.
14. Orr J., Canevari M., Jackson L., Wennig R., Carner R., Nishimoto G. Postemergence herbicides and application time affect wheat yields. *California Agriculture*. 1996. Т. 50. № 4. P. 32–36.
15. Chueca M.C., Villarroja, Escorial, Garcia-Baudin. Inheritance of tolerance to metribuzin in durum wheat. *Weed research*. Oxford. 2000. Т. 40. № 3. P. 293–300.
16. Хазиев, Ф.Х. Содержание органического вещества в почве в зависимости от обработки, севооборота и урожайности культур [Текст] / Ф.Х. Хазиев, Ф.Я. Багаутдинов, А.Х. Мукатанов // *Агрохимия*. 1985. № 8. С. 70.
17. Зайцев, Г.А. Особенности строения корневых систем *Pinus Sylvestris* L. и *Larix Sukaczewii* Dyl. в условиях Уфимского промышленного центра [Текст] / Г.А. Зайцев, А.Ю. Кулагин, Ф.Я. Багаутдинов // *Экология*. 2001. № 4. С. 307–309.

Сведения об авторах

1. **Галимова Эльвира Анфировна**, соискатель кафедры физиологии человека и общей биологии, ФБГОУ ВО Башкирский ГУ, 450076, Уфа, ул. Заки Валиди, 32, e-mail: homai3@mail.ru.

2. **Аmineв Алишер Фаритович**, аспирант кафедры физиологии человека и общей биологии, ФБГОУ ВО Башкирский ГУ, 450076, Уфа, ул. Заки Валиди, 32.

3. **Ишбирдин Айрат Римович**, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и общей биологии, ФБГОУ ВО Башкирский ГУ, 450076, Уфа, ул. Заки Валиди, 32, e-mail: ishbirdin@mail.ru.

В статье представлены результаты исследований влияния средств химической защиты на морфологические параметры мягкой пшеницы

сорта Саратовская 55 в условиях Башкирского Зауралья, относящегося к региону рискованного земледелия.

E. Galimova, A. Aminev, A. Ishbirdin

EFFECT OF CHEMICAL PLANT PROTECTION PRODUCTS ON SARATOVSKAYA 55 SOFT WHEAT VARIABILITY IN CONDITIONS OF THE BASHKIR TRANS-URAL REGION

Key words: *soft wheat; Saratovskaya 55 variety; characteristics variability; herbicides; pesticides.*

Authors' personal details

1. **Galimova Elvira**, external Post-graduate student of the human physiology and common biology department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State University», 450076, Ufa, Zaki Validy St., 32, e-mail: homai3@mail.ru.

2. **Aminev Alisher**, Post-graduate student of the human physiology and common biology department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State University», 450076, Ufa, Zaki Validy St., 32.

3. **Ishbirdin Ayrat**, Doctor of biological sciences, professor of the human physiology and common biology department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State University», 450076, Ufa, Zaki Validy St., 32, e-mail: ishbirdin@mail.ru.

The paper presents the research results on effect of chemical plant protection products on morphological parameters of Saratovskaya 55 soft wheat in

conditions of the Bashkir Trans-Ural region being referred to the region of risky farming.

© Галимова Э.А., Аминев А.Ф., Ишбирдин А.Р.

УДК 635.928

DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-12-19

Ю.Н. Зубарев, Я.В. Субботина, М.А. Пластун

ВЛИЯНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА И СОРТОВ МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ НА КАЧЕСТВО ГАЗОНОВ В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ

Ключевые слова: *овсяница луговая; овсяница красная; газон; норма высева; качество газонов.*

Введение. Газоны являются неотъемлемой частью современного города. Они находят широкое применение в ландшафтном оформлении садов и парков, в том числе служат фоном для размещения древесной растительности и цветочных растений, и самостоятельно оформляют территории. При этом нет ничего сложнее, чем

создание настоящего газона, а затем поддержание его в течение многих лет без потери привлекательности. Злаковые травы сортов зарубежной селекции не всегда подходят для агроклиматических особенностей Предуралья. Продолжительный период с отрицательными температурами, ранние заморозки без снежного покрова,

снижение всхожести и выживаемости, повреждение растения из-за стресса негативно влияют на выживаемость таких газонов и являются основными причинами снижения их качества [3, 4, 7, 12–15].

Цель исследования – внедрение в широкую практику адаптированных трав российской селекции для создания долговечных обыкновенных газонов в Предуралье.

Материалы и условия исследований. В Пермском крае на учебном опытно-научном поле Пермского государственного аграрно-технологического университета имени Д.Н. Прянишникова проводился опыт: «Влияние нормы высева на качество газонов». Изучались фактор А – газонный агрофитоценоз: А₁ – овсяница красная Стелла (ОК Стелла); А₂ – овсяница луговая Людмила (ОЛ Людмила); А₃ – овсяница луговая Надежда (ОЛ Надежда); А₄ – овсяница красная Стелла + овсяница луговая Надежда (ОК Стелла + ОЛ Надежда); А₅ – овсяница луговая Людмила + овсяница луговая Надежда (ОЛ Людмила + ОЛ Надежда); А₆ – овсяница красная Стелла + овсяница луговая Надежда (ОК Стелла + ОЛ Надежда); А₇ – овсяница красная Стелла + овсяница луговая Людмила + овсяница луговая Надежда (ОК Стелла + ОЛ Людмила + ОЛ Надежда). Фактор В – норма высева: В₁ – рекомендуемая для вида злаковых трав (НБР); В₂ – увеличенная от рекомендуемой на 15 % (НБР + 15 %); В₃ – сниженная от рекомендуемой на 15 % (НБР – 15 %).

Опыт закладывался на дерново-слабоподзолистой среднесуглинистой почве. Содержание гумуса 2,4 %; подвижного фосфора – 300 мг и обменного калия – 200 мг на один кг почвы, рН солевой вытяжки 5,0. Интервал стрижки – 14 дней на высоту 5–6 см. Площадь делянки по фактору В 8 м², повторность в опыте четырёхкратная. Подготовка почвы перед посевом состояла из ранневесеннего боронования и предпосевной культивации; предпосевное боронование в два следа с прикатыванием для выравнивания и уплотнения почвы проводили за полторы недели до закладки газона. Мульчирование поверхности почвы до и после посева (7,5 кг/м²). Норма высева: овсяница луговая – 18 г/м², овсяница красная – 13,3 г/м². Посев проводили вручную. Стрижка осуществлялась газонокосилкой MTD YM 6018 SPS.

Климатические особенности Среднего Предуралья и факторы формирования газонных травостоев. На качество газонного покрытия влияет множество факторов: высота и интервал стрижки, биологические особенности трав, сортовые особенности, погодные условия [3, 4, 7, 8,

13]. Погодные условия Пермского края отмечаются неравномерностью выпадения осадков за вегетацию и продолжительным периодом возвратов холодов весной, иногда до конца первой декады июня, что достаточно сильно влияет на качество травостоев, а также на динамику отрастания после стрижки.

На климатические особенности Среднего Предуралья в значительной степени оказывают влияние западные ветры, дующие с побережья Атлантического океана. Из-за смены теплых и холодных потоков погода нередко меняется в течение не только недели, но и суток [5]. Большую роль в формировании климата Пермской области играют Уральские горы, которые задерживают влажные массы воздуха, приходящие с Атлантического океана [6]. Край разделен на несколько агроклиматических районов. В почвенно-климатическом отношении наши исследования проводились в благоприятном районе, где устойчивый переход температуры воздуха через +5 °С, характеризующий начало вегетационного периода, наблюдается в конце апреля, а осенью период перехода температуры ниже +5 °С отмечается в конце сентября. Продолжительность безморозного периода варьирует от 80 дней в восточной, до 120 дней в западной части края. Самым теплым месяцем является июль при температуре +16–18°; а самым холодным – январь. Среднегодовое количество осадков на территории края изменяется от 450 мм на западе и юго-западе до 1000 мм на северо-востоке. Большая часть влаги выпадает в теплое время года, количество дней с осадками на территории края варьирует от 190–200 до 220 мм [1]. Снежный покров достаточно мощный. Устойчивый снежный покров устанавливается 27–30 октября на севере и 6–9 ноября на юге и держится в среднем 170–190 дней. Сход снега наблюдается обычно с 25 апреля по 4 мая. В качестве количественной характеристики увлажнения вегетационного периода был рассчитан гидротермический коэффициент (ГТК, таблица 1). Степень засушливости периода определялась по шкале: 1,5 – избыточно влажный; ГТК > 1,3 – газонные травостои сохраняются в декоративном состоянии практически без полива; при ГТК = 0,1...0,7 – соответственно засушливое и крайне засушливое состояние – происходит замедление роста и выгорание газонного травостоя, и для поддержания его в вегетирующем состоянии необходимо регулярное орошение [2].

Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, насколько разные были вегетационные периоды в годы исследований. В 2015 году влагообеспеченность варьировала от засушливого

(0,2) до избыточно влажного (2,3–9,1); второй год исследований (2016) – засушливый; третий год исследований (2017) – избыточно увлажнен-

ный. Всё это создало неблагоприятные условия для формирования газонных покрытий отличного качества первого года жизни.

Таблица 1 Гидротермический коэффициент в годы проведения исследований

Месяц	Декада	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Среднее
Май	1	0,2	0,4	1,7	1,6
	2	2,3	0,4	1,5	0,2
	3	1,3	0,0	1,9	1,8
Июнь	1	1,3	2,4	5,2	1,6
	2	0,9	0,0	1,9	1,3
	3	1,1	3,7	3,0	1,6
Июль	1	2,6	0,0	5,8	1,2
	2	2,7	0,6	1,7	1,2
	3	3,0	0,2	4,4	1,7
Август	1	3,5	0,3	0,9	0,1
	2	6,3	0,0	2,3	1,6
	3	9,1	1,7	0,8	1,9
Сентябрь	1	1,2	3,9	4,0	1,8
	2	0,7	1,1	0,3	2,4
	3	0,2	0,3	4,3	3,2

Вегетационный период 2015 г. в Пермском крае был исключительно дождливым, прохладным. Средняя температура воздуха за летний период составила +15,5 °С, что примерно на 1,3 °С ниже климатической нормы. Абсолютный максимум температуры воздуха в Перми за лето 2015 г. составил +33,1° (23 июня). Это несколько выше среднееголетнего максимума. Абсолютный минимум температуры воздуха за лето в Перми +2,7° (24 августа). В связи с аномальными погодными условиями и длительным подготовительным периодом из-за переувлажнения почвы закладка газонов проводилась в начале июня, в засушливое и жаркое время, что отрицательно сказалось на всхожести злаковых трав при всех нормах высева. Вегетационный период 2016 г. (второй год жизни газонов) сильно отличался от среднееголетних показателей. Год выдался очень жарким с малым количеством осадков, в связи с этим количество стрижек пришлось сократить, что отрицательно сказалось на интенсивности кущения злаковых трав. Третий год исследований (2017) характеризовался пониженными температурами и большим количеством выпавших осадков. Наибольшая температура была во второй декаде июня и второй-третьей декадах июля и составляла 24 °С, превышая среднееголетний показатель на 7,6, 5,6 и 6,3 °С. Наименьшая температура в третьей декаде сентября –8 °С, отклонение от среднееголетних данных составило –3,4 °С). Сумма по-

ложительных температур за вегетацию превышает среднееголетние данные.

Влияние нормы высева на качество газонов. Оценку качества газонного покрытия проводят по шести основным показателям: однородность травостоя и его плотность, текстура, габитус растений, выровненность и цвет. А.А. Лаптев предложил оценивать побегообразование газонов по шестибальной шкале, а общую декоративность – по пятибальной. Таким образом, наивысшей оценки заслуживает газон со 100 % проективным покрытием и сомкнуто-диффузным характером размещения побегов. При оценке общей декоративности учитывают интенсивность окраски, текстуру листьев, скорость появления всходов и отрастания после скашивания, сроки весеннего и осеннего формирования травостоя [4].

Результаты исследований. В первый год исследований (рисунок 1), несмотря на неблагоприятные погодные условия, качество газонов варьировало от удовлетворительного до хорошего. Сомкнуто-мозаичный травостой получен в газонных покрытиях с преобладанием овсяницы красной Стелла. При рекомендуемой норме высева проводился монополев овсяницы красной Стелла и смесь овсяница красная Стелла + овсяница луговая Людмила; при повышенной норме высева – смесь овсяница красная Стелла + овсяница луговая Надежда. Самое плохое покрытие в первый год жизни сформирова-

лось при посеве овсяницы луговой Надежда с пониженной нормой посева.

В первый год жизни из-за переувлажнения в период вегетации злаковые травы развивались более медленно, что и сказалось на качестве травостоев. С мая по сентябрь выпало на 172 мм

осадков больше по сравнению со среднесезонными показателями, что не позволило проводить стрижки с постоянной регулярностью, это напрямую повлияло на плохое кущение изучаемых травостоев и, как следствие, на снижение качества газонного покрытия.

Рисунок 1
Влияние нормы посева на качество газонов
из злаковых трав отечественной селекции первого года жизни, 2015 г.

Рисунок 2
Влияние нормы посева на качество газонов
из злаковых трав отечественной селекции первого года жизни, 2016 г.

Вегетационный период 2016 года (второй год жизни) был противоположным 2015 г. Жаркое и засушливое лето не очень благоприятно сказалось на качестве газонов.

В городских пространствах газоны являются ключевыми элементами для рекреационного и декоративного использования. Тем не менее получение высококачественных газонных трав оказывается проблемой во многих регионах в условиях стресса засухи. В целом виды овсяниц достаточно устойчивы к засушливым периодам, но такие периоды сказываются на декоративности травостоя [10, 11]. По данным Л.А. Гречушкиной-Сухоруковой (2010), при величине ГТК 0,1–0,7 происходит замедление роста и выгорание газонного травостоя, при этом необходимо приостановить стрижки, чтобы не повредить газонное покрытие [2]. ГТК мая, июня и июля 2016 г. составил 0,2–0,6 (таблица 1). Недостаток осадков в период отрастания газонов в весенний

период, а затем в период вегетации не позволил овсяницам полностью развиваться. Несмотря на то, что сформировался плотный травостой, декоративность вследствие засушливого периода была не достаточно хорошей, что не позволило по всем вариантам исследований сформировать качество газонного покрытия на высоком уровне. В частности, овсяница луговая Людмила, овсяница луговая Надежда и смесь овсяница луговая Людмила + овсяница луговая Надежда сформировали травостой только удовлетворительного и хорошего качества.

Третий год жизни газонов (2017) характеризовался теплой и влажной погодой, что позволило почти во всех вариантах исследований сформировать покрытие высшего качества при повышенной и пониженной нормах высева. Из овсяницы красной Стелла сформировался газон высшего качества при всех изучаемых нормах высева.

Рисунок 3
Влияние нормы высева на качество газонов
из злаковых трав отечественной селекции первого года жизни, 2017 г.

Таким образом, независимо от нормы высева газонные покрытия, содержащие в своём составе овсяницу красную Стелла, формируют травостой хорошего и отличного качества с первых лет жизни.

Наиболее важной частью газонного травостоя в почвоукрепительных целях является прочно связанная, хорошо развитая дернина.

Мощность (толщину) дернины определяли на 2 и 3 годах жизни изучаемых газонов. Ко второму году исследований (таблица 2) мощность дернины сформировалась до 76 мм (повышенная норма высева). Овсяница красная Стелла обеспечила наиболее мощную дернину – 65 мм ($НСР_{05} = 2$). Самая «тонкая» дернина сформировалась в газонах с овсяницей луговой Людмила,

особенно при пониженной норме высева 53–56 мм. К третьему году исследований (2017) мощность дернины составила 62–86 мм. Прирост составил от 7 до 20 мм по опыту, наибольшее увеличение мощности дернины составило в вариантах с пониженной нормой высева в среднем на 14 мм. Для определения прочности дернового покрытия выявлено значение усилия, необходимого для разрыва в горизонтальном направлении, при помощи динамометра, закрепленного с комплексом металлических зажимов для удерживания дернины. Оценка проводилась по шкале, предложенной В.А. Тюльдюковым [3, 8]. Дернина второго года жизни во всех вариантах была хорошего качества¹ (0,149–0,162 кг/см²). К третьему году жизни прочность дернины на разрыв увеличилась до 0,151–0,181 кг/см², но не во всех вариантах. В смесях овсяница луговая Надежда + овсяница луговая Людмила и овсяница красная Стелла + овсяница луговая Надежда

показатель снизился на 0,005–0,008 кг/см². Все изучаемые газоны уже ко второму году жизни образовали устойчивую дернину хорошего качества при всех вариантах величины нормы высева.

К третьему году жизни устойчивость дернины на разрыв количественно увеличилась при сохранении группы оценки качества («хорошо»). В работах J.B. Baerd [9] связность дернины газонных покрытий выражается в Н/см² и считается нормальной прочностью от 2,5 и более Н/см². Следовательно, связность дернины второго и третьего года жизни – плохая. Усилие, необходимое для разрыва дернины, выраженное в Н/см², в исследованиях в среднем за 2016–2017 гг. получено в интервале 1,54–1,62 соответственно. Исследования прочности дернины на разрыв подтверждают приведенные выше данные о том, что сорта отечественной селекции способны формировать газонные покрытия хорошего качества при невысоких нормах высева.

Таблица 2 Мощность дернины в зависимости от нормы высева, мм

Агрофитоценоз, сорт	Норма высева			Среднее по А
	НВ _Р	НВ _Р + 15 %	НВ _Р – 15 %	
Второй год жизни, 2016 г.				
ОК Стелла	62	76	58	65
ОЛ Людмила	53	70	53	59
ОЛ Надежда	55	72	57	61
ОК Стелла + ОЛ Людмила	58	76	53	62
ОЛ Надежда + ОЛ Людмила	58	70	55	61
ОК Стелла + ОЛ Надежда	60	70	60	63
ОК Стелла + ОЛ Людмила + ОЛ Надежда	55	72	56	61
Среднее	67	76	58	–
НСР ⁰⁵ частных различий агрофитоценозов		5		
НСР ⁰⁵ частных различий нормы высева		3		
НСР ₀₅ главных эффектов агрофитоценозов		2		
НСР ₀₅ главных эффектов нормы высева		1		
Третий год жизни, 2017 г.				
ОК Стелла	72	86	68	75
ОЛ Людмила	63	80	62	68
ОЛ Надежда	67	79	71	72
ОК Стелла + ОЛ Людмила	68	83	73	75
ОЛ Надежда + ОЛ Людмила	68	80	67	72
ОК Стелла + ОЛ Надежда	75	80	80	78
ОК Стелла + ОЛ Людмила + ОЛ Надежда	68	81	70	73
Среднее	80	86	68	–
НСР ⁰⁵ частных различий агрофитоценозов		5		
НСР ⁰⁵ частных различий нормы высева		4		
НСР ₀₅ главных эффектов агрофитоценозов		2		
НСР ₀₅ главных эффектов нормы высева		2		

Выводы. Независимо от нормы высева газонные покрытия, содержащие овсяницу

красную Стелла, формируют травостои хорошего и отличного качества с первых лет жизни.

¹ Оценка качества дернового покрытия: отличное > 0,2 кг/см²; хорошее 0,13...0,20 кг/см²; удовлетворительное 0,06...0,13 кг/см²; плохое < 0,06 кг/см² [2].

Понижение нормы высева на 15 % не позволяет формировать в первый год жизни газоны хорошего качества, особенно одновидовые посевы овсяницы луговой и её смеси. При формировании газонных покрытий норму высева следует выбирать в зависимости от сортов злаковых трав. При посеве овсяницы красной Стелла следует применять как рекомендуемую, так и повышенную нормы высева; при посеве овсяницы луговой Надежда – повышенную норму высева, овсяницы луговой Людмила – пониженную

норму высева. Доказано, что сорта отечественной селекции Стелла, Людмила, Надежда позволяют в Среднем Предуралье формировать газоны хорошего качества с первого года жизни. Все изучаемые газоны уже ко второму году жизни образовали устойчивую дернину хорошего качества во всех вариантах нормы высева. К третьему году жизни устойчивость дернины на разрыв группы качества «хорошо» возросла до 0,165 кг/см².

Библиографический список

1. Агроклиматический справочник по Пермской области [Текст]. Ленинград: Гидрометеиздат, 1959. 132 с.
2. Гречушкина-Сухорукова, Л.А. К вопросу интродукционного прогноза выращивания газонных трав в Степной зоне [электронный ресурс] / Л.А. Гречушкина-Сухорукова // Вестник ВГУ. Серия: география. Геоэкология. Режим доступа: <http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/geograph/2010/02/2010-0>.
3. Кобозев, И.В. Проведение полевых опытов по формированию газонов и оценка их качества [Текст]: учебное пособие / И.В. Кобозев, Н.Л. Латифов, З.М. Уразбахтин. М.: МСХА, 2002. 82 с.
4. Лаптев, А.А. Газоны [Текст] / А.А. Лаптев. Киев: Наук. думка, 1983. С. 176.
5. Минерально-сырьевые ресурсы Пермского края [Текст]: энциклопедия / Гл. ред. А.И. Кудряшов. Пермь: Книжная площадь, 2006. 463 с.
6. Назаров, Н.Н. География. Пермская область [Текст] / Н.Н. Назаров, М.Д. Шарыгин. Пермь: Книжный мир, 1999. 250 с.
7. Субботина, Я.В. Газоны в Пермском крае [Текст] / Я.В. Субботина, Ю.Н. Зубарев // Пермь: Пермская ГСХА, 2010. 87 с.
8. Тюльдюков, В.А. Газоноведение и озеленение населенных территорий [Текст] / В.А. Тюльдюков, И.В. Кобозев, Н.В. Парахин. М.: КолосС, 2002. 264 с.
9. Baerd J.B., Rieke P.E., Turgeon A.J., Vargas J.M. Annual blugrass (*Poa Annua* L.) Description, adaptation, culture and control. Michigan State University Agric. Exp. Stn. EastLansing, MI. 1978. 352 p.
10. Blum A. Crop responses to drought and the interpretation of adaptation. *Plant Growth Regulation*. 1996. № 20. P. 135–148.
11. Caturegli L., Grossi N., Saltari M., Gaetani M., Magni S., Nikolopoulou A.E., Bonari E., Volterrani M. Spectral reflectance of tall fescue (*Festuca Arundinacea* Schreb.) under different irrigation and nitrogen conditions. *J. Agriculture and Agricultural Science Procedia*. 2015. № 4. P. 59–67.
12. Daneshmand F., Arvin M., Keramat B., Momeni N. The effect of salinity stress and salicylic acid on seed germination parameters and growth of maize (*Zea mays* L.) in field condition. *J. Plant Process and Function*. 2012. № 1. P. 56–70.
13. Jeremy M., Masonb M., Ambrusa A. Urban greenspace is associated with reduced psychological stress among adolescents. *J. A Geographic Ecological Momentary Assessment (GEMA) analysis of activity space Landscape and Urban Planning Volume 174*, 2018. P. 1–9.
14. Lerman S.B., Contosta A.R., Milam J., Bang C. To mow or to mow less: Lawn mowing frequency affects bee abundance and diversity in suburban yards. *J. Biological Conservation*. Volume 221. May 2018. P. 160–174.
15. Soltani A., Gholipoor M., Zeinali E. Seed reserve utilization and seedling growth of wheat as affected by drought and salinity. *Journal of Environmental and Experimental Botany*. 2006. № 55. P. 195–200.

Сведения об авторах

1. **Зубарев Юрий Николаевич**, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, зав. кафедрой общего земледелия и защиты растений, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, тел.: +7 (342) 2179410, e-mail: zemledel@pgsha.ru.
2. **Субботина Яна Владимировна**, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, доцент кафедры общего земледелия и защиты растений, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, тел.: +7 (342) 2179410, e-mail: zemledel@pgsha.ru.

3. **Пластун Мария Александровна**, ассистент кафедры ландшафтной архитектуры и лесного хозяйства, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, тел.: +7 (342) 2179410, e-mail: zemledel@pgsha.ru.

Травянистый дерновый покров газона является одним из незаменимых элементов любого зелёного строительства; во многих случаях газон является и самостоятельной формой озеленения. Ковер свежей мягкой травы при правильном уходе декоративен весь сезон, он прекрасно сочетается с зеленью кустов и деревьев. Однако не всегда предлагаемые сорта и нормы высева соответствуют климатическим особенностям конкретных регионов, поэтому важно для каждого региона подбирать многолетние злаковые травы с соответствующей нормой высева. Преобладающие на рынке сорта трав иностранной селекции для создания газонов зачастую не подходят для суровых продолжительных зим большей части Российской Федерации, и в частности

для Среднего Предуралья, где для создания на основе сортов многолетних злаковых трав отечественной селекции долголетних газонов рекомендуются одновидовые посевы овсяницы красной Стелла и двухвидовый посев овсяница красная Стелла + овсяница луговая Людмила. Нормы высева зависят от выбора злакового агрофитоценоза и целей создания газонного покрытия. При формировании газонных покрытий следует выбрать норму высева в зависимости от сорта злаковых трав. При посеве овсяницы красной Стелла лучше придерживаться повышенной нормы высева или рекомендуемой. Для овсяницы луговой Надежда лучше повышенная норма высева, а для овсяницы луговой Людмила – пониженная.

Yu. Zubarev, Ya. Subbotina, M. Plastun

AN EFFECT OF SEEDING RATE AND VARIETIES OF PERENNIAL GRAIN GRASSES OF DOMESTIC SELECTION ON QUALITY OF LAWNS IN THE MIDDLE CIS-URAL REGION

Key words: meadow fescue; red fescue; lawn; seeding rate; lawn quality.

Authors' personal details

1. **Zubarev Yury**, Doctor of agricultural sciences, professor, head of the Land Cultivation and Plant Protection department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Perm Agro-Technological University, phone: +7 (342) 2179410, e-mail: zemledel@pgsha.ru.

2. **Subbotina Yana**, Candidate of agricultural sciences, professor, head of the Land Cultivation and Plant Protection department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Perm Agro-Technological University, phone: +7 (342) 2179410, e-mail: zemledel@pgsha.ru.

3. **Plastun Mariya**, teaching assistant of the Landscape Architecture and Forestry department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Perm Agro-Technological University, phone: +7 (342) 2179410, e-mail: zemledel@pgsha.ru.

Grass turf cover of lawns is one of essential elements of any green construction; in many applications the lawn is an independent form of urban greening. Covering of fresh soft grass being treated correctly goes together with green bushes and trees. However, recommended varieties and seeding rates don't always satisfy climatic peculiarities of certain geographic areas. Therefore it is important to choose perennial grain grasses with specified seeding rates for every region. Grass varieties of foreign selection predominant at the market do not often match severe prolonged winters of the greater part of the Russian Federation, particularly the middle Cis-Ural region. To make long-term lawns on the

basis of the perennial grain grasses of domestic selection on this area one-species seedings of red fescue Stella and two-species seeding of red fescue Stella plus meadow fescue Lyudmila are recommended. Seeding rate depends on the choice of grain agrophytocenosis and on the aim to create a lawn cover. When forming a lawn cover it is necessary to choose the seeding rate in dependence with a variety of grain grasses. At seeding the red fescue Stella it is better to follow an increased seeding rate or a recommended one. Thus for meadow fescue Nadyezhda an increased seeding rate is more productive, though for meadow fescue Lyudmila on the contrary a decreased one does better.

© Зубарев Ю.Н., Я Субботина.В., Пластун М.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ ИСКУССТВЕННОГО КЛИМАТА ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ ГИБРИДОВ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Ключевые слова: пшеница; гибридные семена; размножение в зимний период; ускорение селекционного процесса.

Введение. Известно, что на создание нового сорта пшеницы и других сельскохозяйственных культур уходит 14–15 лет и более, поэтому сокращение отмеченного периода – одна из основных задач селекции [5, 6, 7, 11, 15]. Необходимо отметить, что в прошлом веке эта проблема решалась централизованно на федеральном уровне. При многих селекцентрах и НИИ функционировали зимние теплицы и фитотроны, в том числе и в Сибири: СибНИИСХ (г. Омск), Институт физики (г. Красноярск), СИФИБР (г. Иркутск). Одному из авторов статьи довелось в то время размножать селекционный материал в зимний период и по ускоренной программе создать сорта пшеницы Тюменская 80, Ангара 86, которые высевались в Восточной и Западной Сибири много лет. Ускорению селекционного процесса уделялось во второй половине прошлого века особое внимание. В южной части Узбекистана (Ангорский район) был организован репродукционный участок для размножения селекционного материала в зимний период. Учёные селекционеры Сибири ежегодно размножали ценный селекционный материал в фитотронах и на юге Узбекской Республики. Интенсивно развивалась селекция растений в Сибири. За короткий период времени была выведена серия ценных и сильных сортов пшеницы, многие из которых по сей день являются надёжной основой для производства зерна продовольственного использования. Кроме того, созданные сорта хорошо адаптированы к суровым сибирским условиям. Они являются ценным генофондом для дальнейшего развития селекции пшеницы. Новые сорта сибирской селекции вытеснили из посевов региона зарубежные сорта и продолжают сохранять своё преимущество [1, 4, 8, 9, 12]. С переходом к рынку отработанная система ускоренного размножения селекционного материала нарушена, поэтому селекционеры вынуждены, как и прежде, создавать новые сорта за длительный период времени, искать различные пути для ускорения селекционного процесса [2, 9, 10, 13, 14].

Цель исследований – размножить в зимний период в установке искусственного климата и освещения СИФИБР (г. Иркутск) семена первого гибридного поколения яровой мягкой пшеницы.

Методика проведения исследований. От каждой гибридной комбинации семена в количестве 20 шт. высевали зимой 2016–2017 гг. в металлические сосуды площадью 314 см². При этом площадь питания одного растения составила 15,7 см². Для заполнения сосудов бралась тёмно-серая почва с парового поля, далее она смешивалась с песком и торфом в соотношении 1:1:1. С учётом содержания в ней элементов питания их вносили дополнительно для получения планируемой урожайности зерна 500 г с метра квадратного (в пересчёте). В течение всего вегетационного периода влажность почвы в сосудах поддерживалась на уровне 70–80 % ПВ, температура воздуха – на уровне 20–22 °С.

С целью экономии электроэнергии режим работы вегетационной камеры приближен к полевым условиям. Это позволило к концу марта 2017 г. получить семена F₁, а 20 мая этого же года заложить на опытном поле ГАУ Северного Зауралья (г. Тюмень) гибридный питомник по схеме: материнский сорт – F₁–F₂ – отцовский сорт.

Результаты исследований и обсуждение. Растения гибридных комбинаций пшеницы по-разному реагировали на режим работы камеры искусственного климата и освещения. Хорошо проходили рост и развитие растений гибридных комбинаций Новосибирская 31 × Омская 37, Омская 36 × Лютеценс 70, Новосибирская 31 × Лютеценс 70, Омская 36 × Омская 37, Тюменская юбилейная × Омская 37, Новосибирская 31 × Тюменская 80, Икар × Омская 37, Икар × Новосибирская 31. Слабый рост и развитие растений отмечены в комбинациях Ирень × Лютеценс 70, Ирень × Новосибирская 31, Тюменская юбилейная × Тюменская 80, Ирень × Тюменская 80, Ирень × Омская 37, Омская 36 × Новосибирская 31. Остальные гибридные комбинации

ции росли и развивались вполне удовлетворительно.

Для более полного представления о состоянии гибридных растений в условиях искусственного климата и освещения проанализирована продолжительность межфазных периодов (таблица 1). В условиях искусственного климата и освещения продолжительность периода посев – всходы изменялась от 6 суток у гибридных ком-

бинаций Ирень × Тюменская 80, Ирень × Новосибирская 31, Тюменская юбилейная × Новосибирская 31, Новосибирская 31 × Тюменская 80 до 9 суток у комбинаций Омская 36 × Омская 37, Икар × Лютесценс 70, Икар × Омская 37. Делать вывод о преимуществе гибридных комбинаций с коротким периодом посев-всходы пока рано, потому что во втором поколении в ходе расщепления ситуация может сильно измениться.

Таблица 1 Продолжительность межфазных периодов

Гибридная комбинация	Период, суток			
	посев – всходы	всходы – колошение	колошение – спелость	всходы – спелость
Ирень × Тюменская 80	6	40	40	80
Омская 36 × Тюменская 80	8	45	42	87
Тюменская юбилейная × Тюменская 80	7	40	39	79
Омская 36 × Лютесценс 70	8	48	42	90
Тюменская юбилейная × Лютесценс 70	7	41	44	85
Ирень × Лютесценс 70	8	39	42	81
Омская 36 × Омская 37	9	46	38	84
Тюменская юбилейная × Омская 37	7	46	43	89
Ирень × Новосибирская 31	6	39	42	81
Тюменская юбилейная × Новосибирская 31	6	45	40	85
Тюменская юбилейная × Ирень	7	41	39	80
Тюменская 80 × Омская 36	7	40	42	82
Икар × Тюменская 80	8	45	48	94
Новосибирская 31 × Тюменская 80	6	46	41	87
Икар × Лютесценс 70	9	42	42	84
Новосибирская 31 × Лютесценс 70	7	46	43	89
Икар × Омская 37	9	45	46	91
Ирень × Омская 37	8	40	42	82
Омская 36 × Новосибирская 31	7	41	39	80
Новосибирская 31 × Омская 37	8	49	43	92
Икар × Новосибирская 31	8	45	45	90

Межфазный период всходы – колошение играет важную роль в жизни пшеничного растения. В это время закладывается основа будущего урожая. В фазу кущения у растений образуются узловые корни и дополнительные стебли, а также закладывается колос. Более продолжительный период всходы – колошение способствует получению колоса с большим количеством зёрен. Продолжительный период всходы-колошение был у гибридных комбинаций Омская 36 × Лютесценс 70, Новосибирская 31 × Омская 37 и составил 48–49 суток. Самый короткий период отмечен у гибридных комбинаций Ирень × Лютесценс 70 и Ирень × Новосибирская 31 (39 суток). Остальные гибридные комбинации имели продолжительность анализируемого межфазного периода от 40 до 46 суток. Продолжительность межфазного периода колошение-спелость изменялась от 38 суток у комбинации Омская 36 × Омская 37 до 48 суток у комбинации Икар × Тюменская 80. В целом вегетационный период варьировал от 79 до 94 суток. Самым коротким он был у комбинаций Тю-

менская юбилейная × Тюменская 80, Ирень × Тюменская 80, Тюменская юбилейная × Ирень, Омская 36 × Новосибирская 31 и составил 79–80 суток. Максимальный (90–94 суток) вегетационный период отмечен у гибридных комбинаций Омская 36 × Лютесценс 70, Икар × Тюменская 80, Икар × Омская 37, Новосибирская 31 × Омская 37, Икар × Новосибирская 31.

Высота растений пшеницы контролируется генетически, но её проявление во многом зависит от условий выращивания [4, 6, 7, 8]. Прогресс селекции в создании сортов пшеницы, устойчивых к полеганию, вполне очевиден. При размножении гибридных семян яровой пшеницы в условиях искусственного климата установлено, что в зависимости от родительских сортов высота гибридных растений варьировала от 88 см в комбинации Икар × Тюменская 80 до 113 см в комбинации Омская 36 × Лютесценс 70 (таблица 2). Устойчивость растений пшеницы к полеганию зависит не только от высоты растений, но и от длины нижних междоузлий. У рас-

тений гибридных комбинаций длина первого снизу междоузлия изменялась от 1,8 см в комбинации Тюменская 80 × Новосибирская 31 до 3,6 см в комбинации Омская 36 × Омская 37. Длина второго снизу междоузлия изменялась от 5,7 см в комбинации Икар × Тюменская 80 до 7,8 см в комбинациях Омская 36 × Тюменская 80, Омская 36 × Новосибирская 31. Относительно небольшая длина нижних междоузлий и средняя высота растений обеспечили высокую устойчивость к полеганию. Основная часть гибридных комбинаций оценена 7–9 баллами, исключение составили комбинации скрещивания Омская 36 × Лютеценс 70, Омская 36 × Новосибирская 31, Новосибирская 31 × Омская 37, которые оценены 5 баллами, то есть растения этих комбинаций проявили склонность к полеганию, но не исключено, что и в них во втором поколении могут быть устойчивые к полеганию растения.

Площадь листьев – основа формирования урожайности зерна пшеницы. Связь между отмеченными признаками в условиях Тюменской области и Сибири в целом тесная положительная ($r = 0,72 \pm 0,6...0,89 \pm 0,4$). Селекционеры придают большое значение изучению площади листьев, их конструкции и расположению относительно стебля. Растения гибридных комбинаций по-разному реагировали на условия искусственного климата в зимний период. При этом

площадь листьев одного растения изменялась от 39,4 см² в комбинации Ирень × Новосибирская 31 до 71,6 см² в комбинации Новосибирская 31 × Омская 37. В условиях искусственного климата гибридные комбинации отличались формированием структурных элементов урожайности. Одни сформировали больше продуктивных стеблей, вторые – количество зёрен в колосе, третьи – крупность зерна (таблица 3).

При формировании гибридных семян нарушается процесс мейоза, и многие комбинации имеют низкую всхожесть. К ним относятся Тюменская юбилейная × Лютеценс 70, Ирень × Лютеценс 70, Ирень × Новосибирская 31, Тюменская 80 × Омская 36, Ирень × Омская 37, Тюменская юбилейная × Тюменская 80 и др. Отработанный режим выращивания растений пшеницы в зимний период позволил получить в основном один продуктивный стебель на растении. Озернёность колоса у гибридных комбинаций изменялась от 15 штук у Ирень × Тюменская 80, Тюменская юбилейная × Лютеценс 70 до 22 штук в комбинациях Тюменская 80 × Омская 36, Новосибирская 31 × Омская 37, Икар × Новосибирская 31. Масса 1000 зёрен у гибридных комбинаций была достаточно высокой и составила 31,2–43,1 г, за исключением комбинаций скрещивания Тюменская юбилейная × Тюменская 80, Омская 36 × Омская 37, Тюменская юбилейная × Ирень, у которых масса 1000 зёрен составила 25,4–29,5.

Таблица 2 Показатели гибридных растений пшеницы в условиях искусственного климата, 2016–2017 гг.

Гибридная комбинация	Высота растений, см	Длина нижних междоузлий, см		Устойчивость к полеганию, балл	Площадь листьев растения, см ²
		первого	второго		
Ирень × Тюменская 80	102 ± 5	3,2 ± 0,4	7,5 ± 0,3	7	43,5
Омская 36 × Тюменская 80	109 ± 7	3,4 ± 0,2	7,8 ± 0,5	7	56,1
Тюменская юбилейная × Тюменская 80	94 ± 4	2,7 ± 0,3	6,2 ± 0,5	9	41,8
Омская 36 × Лютеценс 70	113 ± 6	3,5 ± 0,4	7,4 ± 0,3	5	65,2
Тюменская юбилейная × Лютеценс 70	98 ± 3	2,9 ± 0,5	6,7 ± 0,4	9	49,4
Ирень × Лютеценс 70	106 ± 5	3,3 ± 0,3	7,6 ± 0,5	5	41,6
Омская 36 × Омская 37	110 ± 4	3,6 ± 0,5	7,4 ± 0,3	5	63,1
Тюменская юбилейная × Омская 37	96 ± 3	2,3 ± 0,2	5,9 ± 0,5	9	63,9
Ирень × Новосибирская 31	108 ± 5	3,2 ± 0,4	7,3 ± 0,2	7	39,4
Тюменская юбилейная × Новосибирская 31	92 ± 4	1,8 ± 0,3	6,1 ± 0,5	9	53,6
Тюменская юбилейная × Ирень	90 ± 3	2,1 ± 0,2	6,0 ± 0,2	9	50,3
Тюменская 80 × Омская 36	97 ± 4	2,4 ± 0,1	6,4 ± 0,3	9	64,2
Икар × Тюменская 80	88 ± 6	1,9 ± 0,3	5,7 ± 0,4	9	51,9
Новосибирская 31 × Тюменская 80	105 ± 3	2,8 ± 0,5	7,0 ± 0,2	7	58,4
Икар × Лютеценс 70	91 ± 2	2,4 ± 0,3	6,2 ± 0,3	9	62,6
Новосибирская 31 × Лютеценс 70	110 ± 5	2,7 ± 0,2	7,5 ± 0,5	5	64,8
Икар × Омская 37	95 ± 3	2,2 ± 0,1	6,0 ± 0,2	9	56,8
Ирень × Омская 37	107 ± 5	3,1 ± 0,4	7,3 ± 0,3	7	51,3
Омская 36 × Новосибирская 31	112 ± 6	3,5 ± 0,3	7,8 ± 0,4	5	54,1
Новосибирская 31 × Омская 37	109 ± 4	2,7 ± 0,4	7,6 ± 0,2	5	71,6
Икар × Новосибирская 31	93 ± 3	2,6 ± 0,2	5,8 ± 0,3	9	55,2

Таблица 3 Структура урожайности и урожайность гибридных комбинаций пшеницы

Гибридная комбинация	Количество, шт.		Масса, г			Урожайность с м ² , г (в пересчёте)
	продуктивных стеблей в сосуде	зёрен в колосе	1000 зёрен	зерна с колоса	зерна с сосуда	
Ирень × Тюменская 80	13	15	33,5	0,53	6,1	194
Омская 36 × Тюменская 80	18	19	35,4	0,62	11,1	353
Тюменская юбилейная × Тюменская 80	11	19	27,9	0,51	5,7	181
Омская 36 × Лютесценс 70	20	20	35,9	0,69	13,9	443
Тюменская юбилейная × Лютесценс 70	8	15	37,6	1,12	9	287
Ирень × Лютесценс 70	7	16	35,9	0,54	3,8	121
Омская 36 × Омская 37	27	20	25,4	0,49	13,2	420
Тюменская юбилейная × Омская 37	19	20	35,7	0,67	13,2	420
Ирень × Новосибирская 31	8	16	35,4	0,48	3,8	121
Тюменская юбилейная × Новосибирская 31	17	20	32,4	0,63	10,8	344
Тюменская юбилейная × Ирень	15	19	29,5	0,57	8,6	274
Тюменская 80 × Омская 36	12	22	34,3	0,71	8,5	271
Икар × Тюменская 80	14	18	43,1	0,75	10,5	334
Новосибирская 31 × Тюменская 80	17	21	33,5	0,71	12,1	385
Икар × Лютесценс 70	13	18	35,7	0,64	8,3	264
Новосибирская 31 × Лютесценс 70	20	19	35,8	0,67	13,5	430
Икар × Омская 37	16	18	40,9	0,73	11,7	373
Ирень × Омская 37	11	19	35,7	0,65	7,2	230
Омская 36 × Новосибирская 31	13	20	31,2	0,61	7,9	252
Новосибирская 31 × Омская 37	19	22	37,3	0,79	15,2	484
Икар × Новосибирская 31	17	22	38,2	0,67	11,7	373

Максимальную массу зерна с колоса (1,12 г) сформировали растения гибридной комбинации Тюменская юбилейная × Лютесценс 70, мини-

мальную (0,48 г) – растения комбинации скрещивания Ирень × Новосибирская 31. Остальные комбинации занимали промежуточное положение.

Таблица 4 Коэффициент размножения семян гибридных комбинаций яровой пшеницы в камере искусственного климата в зимний период

№ п/п	Гибридная комбинация	Посеяно зёрен в сосуд, шт.	Получено зёрен после уборки, шт.	Полевая всхожесть, %	Коэффициент размножения
1.	Ирень × Тюменская 80	20	192	91,4	9,6
2.	Омская 36 × Тюменская 80	20	326	87,2	16,3
3.	Тюменская юбилейная × Тюменская 80	20	213	84,1	10,6
4.	Омская 36 × Лютесценс 70	20	394	76,9	19,7
5.	Тюменская юбилейная × Лютесценс 70	20	119	92,3	5,9
6.	Ирень × Лютесценс 70	20	110	89,7	5,5
7.	Омская 36 × Омская 37	20	531	81,3	26,5
8.	Тюменская юбилейная × Омская 37	20	377	79,1	18,8
9.	Ирень × Новосибирская 31	20	126	90,8	6,3
10.	Тюменская юбилейная × Новосибирская 31	20	340	76,4	17,0
11.	Тюменская юбилейная × Ирень	20	296	82,5	14,8
12.	Тюменская 80 × Омская 36	20	254	91,3	12,7
13.	Икар × Тюменская 80	20	252	87,9	12,6
14.	Новосибирская 31 × Тюменская 80	14	364	75,8	26,0
15.	Икар × Лютесценс 70	20	241	90,5	12,0
16.	Новосибирская 31 × Лютесценс 70	20	384	83,1	19,2
17.	Икар × Омская 37	20	291	89,3	14,5
18.	Ирень × Омская 37	20	211	87,8	10,5
19.	Омская 36 × Новосибирская 31	20	264	91,4	13,2
20.	Новосибирская 31 × Омская 37	20	413	78,2	20,6
21.	Икар × Новосибирская 31	20	313	85,1	15,6

Из проанализированных структурных элементов складывается масса зерна с сосуда, которая варьирует в широких пределах от 3,8 г в ком-

бинациях Ирень × Лютесценс 79, Ирень × Новосибирская 31 до 15,2 г в комбинации Новосибирская 31 × Омская 37. В пересчёте на квадратный

метр урожайность изменялась от 121 г в комбинациях Ирень × Лютесценс 70, Ирень × Новосибирская 31 до 484 г в комбинации Новосибирская 31 × Омская 37.

При выращивании гибридных растений в условиях искусственного климата важно получить высокий коэффициент размножения семян. Следует отметить, что у размножаемых гибридных комбинаций (таблица 4) он варьировал от 5,5 у Ирень × Лютесценс 70 до 26 у Новосибир-

ская 31 × Тюменская 80 и Омская 36 × Омская 37.

Вывод. Ускорение селекционного процесса – основной путь к сокращению срока сорто-смены и повышению урожайности зерна пшеницы в регионе. Выращивание гибридных семян в зимний период в условиях искусственного климата позволило получить коэффициент размножения 5,5–26,5 и сократить селекционный процесс на один год.

Библиографический список

1. Абрамов, Н.В. Тюменская юбилейная [Текст] / Н.В. Абрамов, А.А. Казак, Ю.П. Логинов, Г.В. Тоболова, В.П. Шаманин, Л.И. Якубышина. Патент на селекционное достижение RU 8831 01.12.2014.
2. Войников, В.К. Устойчивость растений к стрессам [Текст] // В.К. Войников, Е.Г. Рихванов, А.К. Глянько, Н.В. Дорофеев // История науки и техники. 2011. № 7. С. 29–35.
3. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта [Текст] / Б.А. Доспехов. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
4. Драгавцев, В.А. Инновационные технологии селекции растений: продуктивность и урожай [Текст] / В.А. Драгавцев // Агроэкосистемы в естественных и регулируемых условиях: от теоретической модели к практике прецизионного управления. Материалы Всероссийской научной конференции (с международным участием). 2016. С. 37–45.
5. Жученко, А.А. Адаптивная система селекции растений. Эколого-генетические основы [Текст] / А.А. Жученко. М.: Рос. ун-т дружбы народов, 2001. Т. 1. 782 с.
6. Зыкин, В.А. Экологически-адаптивная селекция яровой мягкой пшеницы [Текст]: методические рекомендации / В.А. Зыкин, Р.Р. Исмагилов, Р.К. Кадилов, Р.С. Кираев, Л.М. Ахиярова, Р.М. Сатарова, И.А. Белан, Ю.В. Колмаков, Н.А. Калашник. Уфа: Башкирский ГАУ, 2010. 54 с.
7. Лихенко, И.Е. Селекция яровой мягкой пшеницы для условий Северного Зауралья [Текст]: автореф. дис. ... докт. с.-х. н. / И.Е. Лихенко // Тюменская государственная сельскохозяйственная академия. Тюмень, 2004.
8. Логинов, Ю.П. Стратегия развития селекции яровой пшеницы в условиях современного земледелия [Текст] / Ю.П. Логинов, А.А. Казак, С.Н. Яценко // Концепции фундаментальных и прикладных научных исследований. Сборник статей международной научно-практической конференции: в 4 частях. 2017. С. 29–36.
9. Логинов, Ю.П. Многобиотипные сорта яровой пшеницы – резерв повышения урожайности и качества зерна в Тюменской области [Текст] / Ю.П. Логинов, А.А. Казак, Л.И. Якубышина // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2018. № 4 (72). С. 43–45.
10. Мальчиков, П.Н. Эффективность оценки адаптивности сортов твердой пшеницы в зависимости от действия совокупностей условий среды [Текст] / П.Н. Мальчиков, М.Г. Мясникова, М.А. Розова, А.И. Зиборов, В.В. Немченко, И.В. Фомина, Н.Ю. Петров, Т.В. Оганян // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2015. Т. 17. № 4-3. С. 492–499.
11. Моисеева, К.В. Этапы селекционной работы по яровой пшенице в Северном Зауралье [Текст] / К.В. Моисеева // Селекция растений: прошлое, настоящее и будущее. Сборник материалов I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвящённой 140-летию НИУ «БелГУ» и 100-летию со дня рождения селекционера, ученого и педагога, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Щелоковой Зои Ивановны. 2017. С. 121–122.
12. Моисеева, К.В. Сорт как элемент технологии производства конкурентоспособного зерна [Текст] / К.В. Моисеева // XVII Сатпаевские чтения. Материалы Международной научной конференции молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников. 2017. С. 253–257.
13. Пушкарёв, Д.В. Изменчивость климатических факторов и урожайности сортов яровой мягкой пшеницы в степной зоне Омской области [Текст] / Д.В. Пушкарёв, А.С. Чурсин, О.Г. Кузьмин, Ю.С. Краснова, И.И. Каракоз, В.П. Шаманин // Вестник Омского государственного аграрного университета. 2018. № 2 (30). С. 39–45.
14. Шеломенцева, Т.В. Генетический потенциал яровой мягкой пшеницы на продуктивность [Текст] / Т.В. Шеломенцева // Селекция сельскохозяйственных культур на высокий ге-

нетический потенциал, урожай и качество. Тюмень, 2012. С. 100–104.

15. Юдин, А.А. Селекция яровой мягкой пшеницы в условиях Иркутской области [Текст]

/ А.А. Юдин, Г.М. Мануйлова, Т.В. Константинова // Вестник ИрГСХА. 2017. № 78. С. 26.

Сведения об авторах

1. **Казак Анастасия Афонасьевна**, заведующий кафедрой технологии производства, хранения и переработки продукции растениеводства, кандидат сельскохозяйственных наук, ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Агротехнологический институт, 625041, Россия, г. Тюмень, e-mail: kazaknastenska@rambler.ru.

2. **Логинов Юрий Павлович**, профессор кафедры технологии производства, хранения и переработки продукции растениеводства, доктор сельскохозяйственных наук, ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Агротехнологический институт, 625041, Россия, г. Тюмень, тел.: (3425) 62-58-28.

Создание сорта пшеницы в естественных условиях происходит за 14–15 лет и более. В условиях рынка это слишком долго, потому что требования к сортам меняются быстро. Основной путь решения проблемы – ускорение селекционного процесса за счёт размножения семян в зимний период в регионах с тёплым климатом или в установках искусственного климата и освещения. Проанализированы результаты размножения гибридных семян пшеницы в камере искусственного климата СИФИБР (г. Иркутск) в зимний период 2016–2017 гг. С целью экономии электроэнергии режим работы камеры приближен к полевым условиям. Он обеспечил вполне нормальный рост и развитие растений пшеницы. При этом продолжительность межфазного периода всходы-колошение в зависимости от комбинации скрещивания изменялась от 39 до 49 суток, периода колошение-спелость – от 38 до 48 суток. В целом вегетационный период составил 79–94 суток. Растения имели стебель средней высоты (88–113 см), укороченные нижние междоузлия (1,8–3,6 см первое, 5,7–7,8 см второе) и

хорошо развитую листовую поверхность (39,4–71,6 см²). Многие гибридные комбинации устойчивы к полеганию и оценены 7–9 баллами. Продуктивная кустистость составила 1,1–1,5, озёрность колоса – 15–22 шт., масса 1000 зёрен – 25,4–43,1 г. Зерно было хорошо выполненное, стекловидное. Урожайность зерна в пересчёте на метр квадратный изменялась от 121 г у комбинаций Ирень × Лютецес 70, Ирень × Новосибирская 31 до 484 г у комбинации Новосибирская 31 × Омская 37. Коэффициент размножения составил 5,5–26,5. В зависимости от гибридной комбинации семена имели полевую всхожесть от 75,8 % в комбинации Новосибирская 31 × Тюменская 80 до 92,3 % в комбинации Тюменская юбилейная × Лютеценс 70. Размножение гибридных семян в зимний период в камере искусственного климата и освещения позволило в следующем году после гибридизации получить в поле второе гибридное поколение и провести отбор ценных родоначальных растений.

A. Kazak, Yu. Loginov

USING A CAMERA OF ARTIFICIAL CLIMATE TO REPRODUCE HYBRIDS OF THE FIRST GENERATION DURING THE WINTER PERIOD

Key words: wheat; hybrid seeds; reproduction during the winter period; acceleration of selection process.

Authors' personal details

1. **Kazak Anastasia**, Candidate of agricultural sciences, head of the Crop production, storage and processing technology department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education State agricultural university of the Northern Trans-Ural region, Agrotechnology Institute of Technology, 625041, Russia, Tyumen, e-mail: kazaknastenska@rambler.ru.

2. **Loginov Yury**, Doctor of agricultural sciences, professor of the Crop production, storage and processing technology department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education State agricultural university of the Northern Trans-Ural region, Agrotechnology, 625041, Russia, Tyumen, phone: (3425) 62-58-28.

It takes 14–15 years and more to develop a new wheat variety under natural conditions. It's too long for a market economy, thus variety requirements are changing quickly. The main solution of the problem is to accelerate the selection process due to reproduction of seeds during the winter period in regions with warm climate or in installations of artificial climate and lighting. There are results of reproduction of hybrid wheat seeds in the camera of artificial climate SIFIBR (Irkutsk) conducted during the winter period of 2016–2017. To reduce electric power costs, the camera operated close to field conditions. It provided quite normal growth and development of wheat. At the same time, duration of the interphase period germination-heading changed from 39 to 49 days depending on a crossing combination and from 38 to 48 days depending on the period heading-ripeness. In general the vegetative period was 79–94 days. Plants had a stalk of the average height (88–113 cm), the shortened lower internodes (the

first internode being 1,8–3,6 cm, the second one 5,7–7,8 cm) and well developed leaf surface (39,4–71,6 cm²). Many hybrid combinations are lodging resistant and are estimated by 7–9 points. Tilling capacity is 1,–1,5, grain content makes 15–22 pieces, the mass of 1000 grains – 25,4–43,1. Grain was well made and vitreous. Grain productivity in terms of square meter changed from 121 g at combinations of Iren × Lyutetses 70, Iren × Novosibirskaya 31, up to 484 g at a combination Novosibirsk 31 × Omskaya 37. The reproduction coefficient was 5,5–26,5. Depending on a hybrid combination seeds had field viability from 75,8 % for combination Novosibirsk 31 × Tyumenskaya 80 up to 92,3 % for combination Tyumen anniversary × the Lutescent 70. Reproduction of hybrid seeds in the camera of artificial climate and lighting during the winter period allowed to receive the second hybrid generation and to make selection of valuable parent plants next year after hybridization.

© Казак А.А., Логинов Ю.П.

УДК 633.16:631.526.32

DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-26-32

Л.П. Кокина, Л.М. Щеклеина

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕМЯН ЯЧМЕНЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ УБОРКИ

Ключевые слова: ячмень; семена; сроки уборки; урожайность; травмирование; энергия прорастания; всхожесть; корневые гнили.

Введение. Стабилизация и повышение урожайности и качества семян посредством точного применения усовершенствованных элементов технологии возделывания являются актуальными [1, 2]. Значительное влияние на величину урожая, биологические свойства семян и качество зерна оказывают сроки уборки. При их установлении следует учитывать особенности сорта и культуры, так как каждый сорт имеет свой оптимальный срок уборки (начало и продолжительность) [3, 4]. При выборе сроков уборки на семеноводческих посевах недостаточно установить их влияние на величину урожая, поскольку гораздо важнее знать, как они

повлияют на посевные качества семян. Несвоевременная и неорганизованная уборка может повлечь за собой их ухудшение вследствие преждевременной остановки притока сухих веществ в зерно, биохимических процессов распада органических веществ зерна, синтеза высокомолекулярных соединений, сопровождающегося выделением воды, что приводит к порче семян в результате жизнедеятельности бактерий и грибов, населяющих их поверхность [5].

Ранее нашими исследованиями [6] установлено, что одной из главных причин ухудшения посевных качеств семян (энергии прорастания и лабораторной всхожести) является травмирование

ние зерна при уборке. Как правило, всходы, полученные от травмированных семян, появляются медленнее, имеют менее мощную корневую систему и слабую силу роста. Неравномерность всходов и слабый первоначальный рост растений отражается на дальнейшем их развитии и формировании урожая [7].

Семена ячменя являются также источником сохранения спор и мицелия многих возбудителей болезней: пыльной головки (*Ustilago nuda* Jens), каменной (*U. hordei* Pers.) и черной (*U. nigra* Tarke), корневых гнилей (виды *Bipolaris* spp. и *Fusarium* spp.), пятнистостей листьев (сетчатой – *Dreschlera teres* Shoem., полосатой – *D. graminea* Shoem., темно-бурой – *Bipolaris sorokiniana* (Sacc.) Shoem., ринхоспориоза – *Rhynchosporium secalis* Davis), плесневения семян (виды *Alternaria* spp., *Aspergillus* spp., *Cladosporium* spp., *Penicillium* spp.) [8]. Особенно опасны фузариозы, альтернариозы, аспергиллезы, приводящие к потере более 40 % урожая зерновых культур [9]. Потери от них тем выше, чем ниже культура земледелия. Заболевания может проявляться во все фазы вегетации и вызывать гибель всходов, отставание в росте, отмирание стеблей и щуплость зерна. У растений снижается количество нормально развитых корней, нарушается связь между подземными и надземными органами, ухудшается обеспечение питательными веществами и, как следствие, на 50–75 % падает продуктивность растений, а также ухудшается качество зерна [10].

В связи с этим для совершенствования технологий возделывания и получения высококачественных семян ячменя большое практическое значение имеют исследования по выявлению факторов, негативно влияющих на биологические свойства семян.

Цель исследования – провести анализ урожайности, травмирования и фитосанитарного состояния семян сорта ячменя Родник Прикамья, обусловленного разными сроками уборки.

Материал и методы исследования. Экспериментальная работа выполнена на опытном поле ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока в 2015–2017 гг. Объектом исследований был новый сорт ярового ячменя селекции ФАНЦ Северо-Востока Родник Прикамья. Сорт двурядного типа (*Hordeum vulgare* L., *sensu lato*.), относится к разновидности *nutans*. Родник Прикамья высокоурожайный, характеризуется высокими продуктивной кустистостью и массой зерна с растения, а также крупным, хорошо выполненным зерном. Включен в список ценных по качеству

сортот Российской Федерации и Государственный реестр охраняемых селекционных достижений по 4 региону районирования; возделывается в Кировской области, Пермском крае, республиках Удмуртия и Марий Эл.

Закладку полевого опыта проводили в соответствии с Методикой государственного испытания [8]. Основную и предпосевную обработки почвы осуществляли в соответствии с зональными рекомендациями [9]. Посев проводили селекционной сеялкой СКС-6-10. Площадь делянки 7,5 м², повторность четырехкратная. Норма высева 5 млн всхожих зёрен на гектар. Уборку проводили комбайном «Сампо-130».

В опыте изучали 4 срока уборки с интервалом 5 дней: I срок – ранний, фаза восковой спелости; II срок – оптимальный, фаза начала полной спелости (контроль); III срок – через 5 дней от оптимального срока; IV срок – через 10 дней от оптимального срока.

Подработку зерна проводили на машине СМ-0,15. Посевные качества определяли после прохождения семенами периода послеуборочного дозревания (через 3 месяца после уборки). Травмирование семян оценивали по установленной методике [10].

Учет корневых гнилей проводили в лабораторных условиях по методике ВИЗР [11]. Оценивали поражение растений и развитие корневых гнилей, длину и массу корневой системы и зелёной массы проростков, лабораторную всхожесть семян.

Погодные условия 2015–2017 гг. в период вегетации были весьма контрастными по влаго- и теплообеспеченности (ГТК: 1,50 – 2015 г., 1,08 – 2016 г., 2,13 – 2017 г.). Обильные осадки и температура ниже климатической нормы в июле и августе 2015 г. увеличили продолжительность созревания и усложнили условия уборки. Аномально жаркая (до +34 °C), сухая погода во II декаде июля и августе 2016 г. привела к снижению потенциально возможной урожайности ячменя. Весь вегетационный период 2017 г. характеризовался избыточным увлажнением (на 2–89 %) и относительно холодной погодой в первой половине вегетации.

Результаты и обсуждение. В результате исследований выявлено ежегодное достоверное повышение урожайности при уборке ячменя в оптимальные сроки, т. е. при полной спелости зерна (таблица 1). В среднем за три года она составила 3,24 т/га, что выше других опытных вариантов на 0,15–0,41 т/га. Наименьшая урожайность сорта Родник Прикамья (в среднем

2,83 т/га) была при ранней уборке – в фазу восковой спелости зерна. Выявленная тенденция в динамике продукционного потенциала сорта сохранялась независимо от климатических условий вегетации растений.

При анализе степени травмирования семян в среднем за три года выявлено, что видимые повреждения (макротравмы) наиболее часто наблюдались у семян, убранных в фазу восковой спелости (I срок уборки; рисунок 1).

Таблица 1 Урожайность сорта ячменя Родник Прикамья в зависимости от сроков уборки

Срок уборки	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Среднее
I	4,52	2,55	1,43	2,83
II – контроль	4,99	2,93	1,80	3,24
III	4,84	2,66	1,77	3,09
IV	4,82	2,46	1,73	3,00
В среднем по году	4,79	2,65	1,68	–
НСР ₀₅	0,14	0,17	0,29	0,21

Рисунок 1

Влияние сроков уборки на травмирование семян ячменя:

1 – поврежден зародыш; 2 – повреждена оболочка зерна; 3 – поврежден эндосперм;
4 – общее количество семян с макротравмами

Совокупная доля таких семян составила в этом варианте 20,0 %. В дальнейшем происходило постепенное снижение травмирования, а наименьшим оно было в III срок уборки (10,0 %). При анализе характера явного травмирования выявлено, что сильнее всего повреждалась оболочка зерна. Количество семян с таким нарушением в зависимости от срока уборки составило от 67,5 до 74,4 % по отношению к общему числу семян с макротравмами. Повреждение эндосперма у семян увеличилось к III сроку уборки.

В наших исследованиях обнаружена достоверная ($r = 0,60^*$) корреляция между урожайностью и совокупным травмированием семян при уборке, что свидетельствует о необходимости постоянного контроля над регулировкой зерноуборочных комбайнов при уборке семенных посевов.

В отличие от явного травмирования относительно меньшее количество микротравм (82,0 %) обнаружено у семян, убранных в фазу восковой спелости. По мере созревания количество микротравм увеличивалось и достигло максимума (90,5 %) к III сроку уборки (рисунок 2).

Оценка посевных качеств показала, что наиболее высокие показатели энергии прорастания и лабораторной всхожести были у семян III срока уборки, которые составили соответственно 94,0 и 96,0 %. Наихудшие значения этих признаков (91,0 и 92,5 %) получены у семян поздней уборки.

В ходе фитопатологического анализа выявлено значительное влияние сроков уборки ячменя на инфицированность 14-дневных проростков и их биометрические признаки (таблица 2). Наибольшее количество пораженных проростков (в среднем по срокам уборки 32,2 %) об-

наружено у семян, полученных в 2015 г. при достаточной влагообеспеченности в период вегетации (ГТК – 1,50). Однако развитие болезни в этих условиях было минимальным для опыта (в среднем 4,6 %), а наибольшим – у проростков, полученных из семян избыточно-увлажненного

2017 г. (в среднем 11,8 %), поскольку растения становятся более чувствительны к инфекции. В засушливых условиях 2016 г. поражение было достоверно ($P \geq 0,05$) меньше и составило в среднем 20,1 % при уровне развития болезни 6,0 %.

Рисунок 2
Влияние сроков уборки на посевные качества семян ячменя

Таблица 2 Влияние сроков уборки и условий вегетации года на проявление корневых гнилей у проростков ячменя

Срок уборки (А)	Год урожая (В)	Поражение, %	Развитие болезни, %
I	2015 г.	15,1	1,9
II – контроль		27,4	2,7
III		45,5	7,6
IV		40,6	6,2
среднее		32,2	4,6
I	2016 г.	20,1	5,0
II – контроль		11,3	2,8
III		25,8	9,3
IV		23,0	6,9
среднее		20,1	6,0
I	2017 г.	30,7	10,8
II – контроль		20,5	9,2
III		38,8	15,1
IV		30,0	12,0
среднее		30,0	11,8
НСР ₀₅ фактор А		3,9	1,9
НСР ₀₅ фактор В		3,6	1,5
НСР ₀₅ фактор АВ		6,4	2,4

Что касается ростовых процессов, то наибольшая биомасса зародышевых корней и листьев получена у растений, выращенных из семян урожая 2016 г., что может быть обуслов-

лено относительно благоприятными погодными условиями в период налива зерна и физиологическим созреванием его в полевых условиях (таблица 3).

Таблица 3 Биометрических показатели проростков ячменя

Срок уборки (А)	Год урожая (В)	Корневая система		Листовая пластинка	
		длина, см	масса, г	длина, см	масса, г
I	2015 г.	17,3	3,2	14,2	2,8
II – контроль		15,9	4,3	14,3	3,0
III		13,6	3,7	11,8	2,3
IV		15,9	4,0	9,5	1,5
среднее		15,7	3,8	12,5	2,4
I	2016 г.	18,7	2,1	12,4	2,8
II – контроль		20,1	3,5	15,8	3,2
III		16,5	3,3	9,5	2,3
IV		19,6	2,2	15,9	3,5
среднее		18,7	2,8	13,4	2,9
I	2017 г.	18,8	3,2	13,5	2,2
II – контроль		16,9	2,9	11,0	1,9
III		17,0	3,5	15,4	2,8
IV		16,6	1,9	11,7	3,0
среднее		17,3	2,9	12,9	2,5
HCP ₀₅ фактор А		0,5	0,4	–	–
HCP ₀₅ фактор В		0,5	–	1,1	0,3
HCP ₀₅ фактор АВ		0,9	0,7	2,2	0,7

Специфичное действие инфицированности семян на биометрию проростков просматривается и в коэффициентах корреляции (таблица 4). В 2015 и 2016 гг. связь между иммунологическими и биометрическими показателями в основном отрицательная ($r = -0,68 \dots -0,95$), в 2017 г. – положительная ($r = 0,88 \dots 0,95$).

На инфицированность проростков влияли также сроки уборки растений. Общей для разных условий вегетации тенденцией является то, что задержка с уборкой влечет более интенсивное заражение зерна свежего урожая патогенными и сапрофитными грибами, в том числе и возбудителями корневых инфекций. Снижение поражения и развития, корневых гнилей выяв-

лено у семян при первых двух сроках уборки. Это особенно четко проявилось у семян, полученных в благоприятных условиях вегетации 2015 г. Поражение корневой системы составило 15,1 и 27,4 %, развитие болезни – 1,9 и 2,7 % при состоянии признаков у проростков поздней уборки 40,6 и 6,2 %. В экстремальных по влагообеспеченности условиях влияние сроков уборки на инфицированность зерна не так очевидно. Например, в 2016 г. выявленные изменения в поражении корневой системы проростков в основном незначимы, а в 2017 г. состояние иммунологических признаков в крайних опытных вариантах было примерно равнозначным.

Таблица 4 Зависимость между пораженностью корневой системы проростков ячменя и биометрическими признаками растений

Признак	Год урожая	Коэффициент корреляции (r) между			
		длиной корней	массой корней	длиной листьев	массой листьев
Поражение	2015	-0,87*	0,43	-0,77	-0,68
	2016	-0,95*	0,20	-0,85*	-0,77
	2017	0,39	0,88*	0,95*	0,08
Развитие болезни	2015	-0,85*	0,18	-0,80	-0,72
	2016	-0,94*	0,33	-0,83	-0,78
	2017	0,22	0,91*	0,89*	0,02

* значимо на 5 % уровне.

Выводы. Оптимальной для получения кондиционных семян ячменя Родник Прикамья является уборка в фазу полной спелости. Урожайность сорта в этом варианте получена в среднем за 3 года на 0,15–0,41 т/га больше других опытных вариантов. Запоздывание с уборкой гарантированно ведет к повышению инфицированности семян ячменя возбудителями корневых инфекций. Это особенно проявляется у семян,

сформированных в относительно благоприятных условиях вегетации, где инфицированность при уборке в III и IV срок увеличилась относительно второго (контрольного) срока на 12,8–18,1 %. Формирование зерна в условиях избыточного увлажнения существенно усиливает интенсивность поражения проростков, а недостаток влаги в период вегетации снижает развитие инфекции.

Библиографический список

1. Бельтюков, Л.П. Сорт, технология, урожай [Текст] / Л.П. Бельтюков. Ростов-на-Дону: Книга, 2002. 176 с.
2. Noworolnik K. Morphological characters, plant phenology and yield of spring barley (*Hordeum sativum* L.) depending on cultivar properties and sowing date. J. Acta Agrobotanica. 2012. V.65 (2). P. 171–176.
3. Филиппов, Е.Г. Урожайность и качество ярового ячменя в зависимости от сроков и способов уборки [Текст] / Е.Г. Филиппов, Н.И. Матвиевская, А.Н. Федченко, В.Б. Хронюк // Научное обеспечение производства зерна России. Зерноград. Ростов на Дону: Книга, 2004. С. 290–294.
4. Magan S., Avinash C., Rakesh K., Deepa J., Pooja G.S. and Meena V.K. Dual purpose barley as affected by date of sowing, varieties and stage of harvesting-A review. J. Agricultural Reviews. 2017. V. 38. I. 2. P. 159–164. (doi:10.18805/ag.v38i02.7948).
5. Баталова, Г.А. Овес в Волго-Вятском регионе [Текст] / Г.А. Баталова // Киров: Орма, 2013. 288 с.
6. Назарова, Н.Н. Влияние влажности зерна при уборке на урожайность и посевные качества семян ячменя [Текст] / Н.Н. Назарова, И.Н. Щенникова // Достижения науки и техники АПК. 2011. № 4. С. 46–47.
7. Еров, Ю.В. Система семеноводства зерновых культур [Текст] / Ю.В. Еров, Т.Г. Хадеев, М.Д. Исаев, Д.З. Салахияев. Казань, 2005. 328 с.
8. Долженко, В.И. Протравливание семян зерновых культур [Текст] / В.И. Долженко, Г.И. Сухорученко, Л.Д. Гришечкина, Л.А. Буркова, А.И. Силаев, З.Д. Здрожевская, Е.Б. Белых, А.С. Комарова // Защита и карантин растений. Приложение. 2014. № 2. 91 с.
9. Logrieco A., Rizzo A., Ferracane R., Ritieni A. Occurrence of beauvericin and enniatins in wheat affected by *Fusarium avenaceum* head blight. Appl. Environ. Microb. 2002. 68 (1). P. 82–85. (doi: 10.1128/AEM.68.1.82-85.2002).
10. Родина, Н.А. Селекция ячменя на Северо-Востоке Нечерноземья [Текст] / Н.А. Родина. Киров: Зональный НИИСХ Северо-Востока, 2006. 488 с.
11. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [Текст]. М., 1985. Вып. 2. Ч. 2. 230 с.
12. Дёмшин, С.Л. Техника для обработки почвы и посева в условиях Евро-Северо-Востока России [Текст] / С.Л. Дёмшин // Инновации в сельском хозяйстве. 2016. № 3 (18). С. 17–24.
13. Травмирование семян и его предупреждение [Текст] / Под общ. ред. доктора с.-х. наук проф. И.Г. Строны. М.: Колос, 1972. 160 с.
14. Бенкен, А.А. Лабораторная оценка болезнеустойчивых растений и паразитических свойств возбудителей обыкновенной корневой гнили злаков [Текст] / А.А. Бенкен, В.Н. Хрустовская // Труды ВИЗР. 1977. С. 9–13.

Сведения об авторах

1. **Кокина Лариса Павловна**, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории ячменя, ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого», 610007, Россия, г. Киров, ул. Ленина, д. 166-а.

2. **Щеклеина Люция Муллахметовна**, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунитета и защиты растений, ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого», 610007, Россия, г. Киров, ул. Ленина, д. 166-а, e-mail: immunitet@fanc-sv.ru.

Приведены результаты исследований 2015–2017 гг. на опытном поле ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока по совершенствованию технологии возделывания ярового ячменя сорта Родник Прикамья. Цель исследований заключалась в установлении оптимального срока уборки для получения высокого урожая кондиционных семян в условиях Волго-Вятского региона. Схема полевого опыта: 1 срок уборки – восковая спелость, три последующих – с интервалом в 5 дней; контроль – второй срок уборки. Наблюдения и учётывали проводили в соответствии с рекомендуемыми методиками. В среднем за 3 года установлено неравнозначное влияние сроков уборки на урожайность семян ячменя сорта Родник Прикамья и их качество. Выявлено достоверное по отношению к контролю снижение урожайности как при раннем сроке уборки (0,41 т/га), так и с его задержкой на 10 дней

(0,24 т/га). При этом установлена достоверная ($r = 0,60^*$) зависимость между урожайностью и травмированием семян при уборке, что повышает требования к контролю регулировки зерноуборочных комбайнов при уборке семенных посевов. Установлено, что по мере созревания семян количество видимых повреждений семян снижается, а микротравм – увеличивается. Уборка в течение 10 дней после наступления восковой спелости гарантирует получение семян с наиболее высокими показателями энергии прорастания и лабораторной всхожести. Выявлено, что задержка с уборкой влечет более интенсивное заражение зерна патогенными и сапрофитными грибами, в т. ч. и возбудителями корневых инфекций. Семена первых двух сроков уборки характеризовались меньшим поражением растений и развитием корневых гнилей.

L. Kokina, L. Shchekleina

BIOLOGICAL FEATURES OF BARLEY SEEDS DEPENDING ON HARVEST TIME

Key words: *barley; seeds; harvest time; yield; damage; germination; root rots.*

Authors' personal details

1. **Kokina Larisa**, Candidate of agricultural sciences, senior researcher of the barley laboratory, North-East Federal Agricultural Research Center named after N.B. Rudnitsky, 610007, Russia, Kirov, Lenin street, 166-a.

2. **Shchekleina Lucia**, Candidate of agricultural sciences, senior researcher of the barley laboratory, North-East Federal Agricultural Research Center named after N.B. Rudnitsky, 610007, Russia, Kirov, Lenin street, 166-a, e-mail: pachem.andrey@mail.ru.

The paper describes the research on cultivation technology development for spring barley of Rodnik Prikamya variety conducted at the experimental field of the North-East Federal Agricultural Research Centre in 2015–2017. The aim of studies was to estimate better harvest time to get higher yield of standard seeds under conditions of the Volga-Vyatka region. The scheme of the field experiment was as follows: the first harvest time – wax maturity, three following terms – with 5-day intervals. The second harvest time was control. Observations and registrations were conducted according to recommended methods. For average three years there was uneven influence of harvest time on seed productivity of Rodnik Prikamya barley and its

quality. There was significant decrease in productivity both at the first harvest time (0,41 t/ha) and at 10-day delay (0,24 t/ha) compared to the control. There is strong correlation ($r = 0,60$) between productivity and the seed damage rate. It requires adjustment of combine harvesters at harvesting seed sowings. As seeds mature their visible damage reduces, but micro-damage increases. Seed harvesting within 10 days after wax maturity provides getting seeds with highest germination energy and laboratory germination. Delay in harvest time is found to result in higher rate of seed contamination with pathogen and saprophytic fungi including root infection agents. Seeds of the first two harvest times had lower level of plant disease and root rot.

© Кокина Л.П., Щеклеина Л.М.

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Ключевые слова: конкурентоспособность; анализ рынка; посевная площадь; инвестиции; финансовое состояние; предприятие; зернохранилище.

Введение. Крупнейшим звеном агропромышленного комплекса Российской Федерации является сельское хозяйство Краснодарского края. Его доля в составе валового регионального продукта составляет 12 %. Основополагающими факторами развития данной территории выступают благоприятные природно-климатические условия, трудовые ресурсы, а также техническое оснащение. Все это позволяет производить продукцию, соответствующую высоким нормам и требованиям стандартов.

Цель исследования – оценка показателей, характеризующих развитие растениеводческой отрасли Краснодарского края, для повышения экономической эффективности сельскохозяйственной продукции и стабилизации производственного рынка.

Обсуждение результатов. Для повышения экономической эффективности сельскохозяйственной продукции и стабилизации производственного рынка Краснодарского края необходимо целенаправленное и оптимальное использование преимуществ региона, усиление большинства конкурентных позиций предприятий агропромышленного комплекса.

Посевная площадь Краснодарского края с каждым годом растет, за последние пять лет она увеличилась на 39,7 тыс. га (1,1 %). Валовой сбор зерна и зернобобовых по краю увеличился на 2070 тыс. т (17,2 %). Повышение урожайности зерновых и зернобобовых культур связано с оптимальным выбором сортов растений, ухода за посевами, правильного применения технологий при возделывании культур (таблица 1).

Таблица 1 Показатели, характеризующие развитие растениеводческой отрасли Краснодарского края

Показатель	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. к 2013 г., %
Произведено сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, млн руб.	254710	286518	365753	402846	364726	143,2
в том числе растениеводства	184477	206336	275765	303490	260176	141,0
Вся посевная площадь, тыс. га	3657,1	3657,7	3679,0	3693,3	3696,8	101,1
в том числе зерновые и зернобобовые культуры	2389,5	2410,6	2450,9	2477,4	2461,8	103,0
– озимые зерновые культуры	1532,6	1560,0	1607,4	1599,9	1542,4	100,6
из них пшеница	1386,6	1397,7	1470,2	1452,2	1401,2	101,1
– яровые зерновые и зернобобовые культуры	856,9	850,6	843,5	877,5	919,4	107,3
из них кукуруза на зерно	620,7	622,1	621,5	649,8	685,5	110,4
Валовые сборы зерновых и зернобобовых культур, всего, тыс. т	12038	12871	13711	13979	14108	117,2
из них: – пшеница озимая	6516	6953	7642	8452	8487	130,2
– кукуруза на зерно	1395	3293	3310	3327	3574	256,2
– ячмень озимый	931	752	789	793	776	83,4
– ячмень яровой	132	179	190	146	144	109,1
– рис	828	727	823	845	815	98,4

В Российской Федерации по размеру площадей Краснодарский край находится на пятом месте, здесь наблюдается наибольшая отдача с единицы площади благодаря благоприятным климатическим условиям. Но в некоторых районах региона имеется риск дефицита мощностей хранения зерна. Для обеспечения достойного развития отрасли растениеводства необходимо

не только увеличение производства зерна, но и сокращение его потерь на всех стадиях. Эта задача должна решаться как увеличением валового сбора, так и улучшением качества послеуборочной обработки и хранения.

Нестабильная ситуация сложилась на рынке элеваторов. Аграрии жалуются, что негде хранить хорошие урожаи последних лет. Далеко не

все элеваторы могут качественно делать свою работу. Не более 1/4 элеваторов имеют сертификаты соответствия требованиям действующей нормативной документации Российской Федерации и далеко не все стремятся их получить.

Если сравнить соотношение цены и качества, то самым оптимальным вариантом хранения зерновых культур для современного сельскохозяйственного предприятия является типовое хранилище ангарного типа. Такие зернохранилища имеют быстровозводимые бескаркасные конструкции, которые изготавливаются из оцинкованной стали, поэтому подходят для предприятий с различным уровнем дохода.

На данный момент в Брюховецком районе функционирует незначительное количество зернохранилищ, а именно:

– ОАО «Брюховецкий элеватор». Его мощность составляет 38,5 тыс. т единовременного хранения;

– элеватор им. Суворова. Мощность по единовременному хранению зерна – до 20 тыс. т.

Данных мощностей достаточно лишь для 1/6 доли урожая. Для полного обеспечения, например, Брюховецкого района современными зернохранилищами необходимо построить пять элеваторов.

Хранилища ангарного типа multifunctional и могут использоваться не только для приема и хранения, но также для досушивания и охлаждения зерна. Подобные сооружения подходят для любых природно-климатических условий, могут быть установлены в любой географической точке. Ангар может быть оборудо-

ван разнообразной системой контроля режима хранения зерна. Для возведения такой конструкции потребуется минимум временных затрат и финансовых вложений. Это обусловлено тем, что ангара – это бескаркасные строения, а отказ от каркаса делает его строительство в два раза дешевле. Зерно будет надежно защищено от всех негативных внутренних и внешних факторов.

Ангарные зернохранилища способны обеспечить сельхозпроизводителя герметичным строением, устойчивым к коррозии. Для возведения арки непосредственно на стройплощадке при помощи специальных машин, которые формируют панели, изготавливаются дугообразные стены ангара. Для производства панелей используется оцинкованная сталь, либо сталь, которая покрыта другим специальным антикоррозийным покрытием.

На данный момент весьма велики (от 5 до 10 %) потери зерна при его перевозке от поля до элеваторов, построенных ранее. Расстояние перевозки составляет в среднем 50–100 км, что определяет значительные расходы ГСМ и высокую амортизацию транспортных средств. Планируется инвестировать 4,5 млн руб. на строительство зернохранилища ангарного типа (таблица 2). Дополнительный денежный эффект составит 2,5 млн руб., срок реализации проекта 5 лет. Планируемый чистый доход с каждым годом будет расти на 6 %, ставка дисконта составит 21 % (с учетом темпа инфляции, минимальной нормы прибыли кредитора и поправки на риск проекта).

Таблица 2 Расчет чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта

Показатель	Интервал планирования					
	0/2019 г.	1/2019 г.	2/2019 г.	3/2019 г.	4/2019 г.	5/2019 г.
Инвестиции, тыс. руб.	4500	–	–	–	–	–
Чистый денежный поток, тыс. руб.	–	2500	2650	2809	2977,54	3156,19
Коэффициент дисконтирования	1	0,826	0,683	0,564	0,466	0,385
Чистый дисконтированный денежный поток	–	2065	1809,95	1584,28	1387,53	1215,13
То же нарастающим итогом	–	–2435	–625,05	+959,23	2346,76	3561,89

Исходя из данных таблицы 2, по следующей формуле можно рассчитать чистую приведенную стоимость:

$$NPV = \sum PV - I, \quad (1)$$

где PV – чистый дисконтированный денежный поток; I – инвестиции.

$$NPV = 8061,89 - 4500 = 3561,89 \text{ тыс. руб.}$$

Это разница между суммой чистого дисконтированного денежного потока и инвестициями. В нашем проекте она равна 3561,89 тыс. руб. Положительная величина NPV означает, что при данной процентной ставке проект обеспечивает

избыток относительно исходных инвестиций. Денежные потоки по предлагаемому проекту покрывают расходы.

Коэффициент, показывающий минимальный приемлемый уровень доходности или максимально допустимый риск по инвестиционному проекту, называется внутренней нормой доходности. Она определяет максимально приемлемую ставку дисконта, при которой можно инвестировать средства без каких-либо потерь для собственника (таблица 3).

Таблица 3 Расчет внутренней нормы доходности инвестиционного проекта

Год	Чистый дисконтированный денежный поток	Коэффициент дисконтирования (21 %)	Чистый дисконтированный доход	Коэффициент дисконтирования (50 %)	Чистый дисконтированный доход
0	–4500	1	–4500	1	–4500
1	2500	0,826	2065	0,667	1567,5
2	2650	0,683	1809,95	0,444	1176,2
3	2809	0,564	1584,28	0,296	831,5
4	2977,54	0,466	1387,53	0,198	508,6
5	3156,19	0,385	1215,13	0,132	416,2
NPV	–		3561,89	–	–181,8

Формула для расчета внутренней нормы доходности (IRR) имеет вид:

$$IRR = r_1 + (r_2 - r_1) * \frac{NPV(r_1)}{NPV(r_1) - (NPV(r_2))}, \quad (2)$$

где r_1 , r_2 – различные значения дисконтной ставки при условии $r_1 < r_2$,

$$IRR = 21 + (50 - 21) \times \frac{3565,89}{3565,89 - (-181,8)} = 48,59 \%$$

Расчеты показали, что внутренняя норма доходности равна 48,59 %. Так как $IRR = 48,59 \%$, а $r_1 = 21 \%$, то эффективность данного проекта составит 27,59 %. Если чистая приведенная стоимость показывает абсолютное значение полученного дохода, то внутренняя норма доходности позволяет оценить доходность на единицу вложенного капитала в процентах, что более

удобно при анализе эффективности проектов. Показатель выявляет ожидаемую норму доходности (рентабельность инвестиций) или максимально допустимый уровень инвестиционных затрат.

Вывод. На основе анализа показателей, характеризующих развитие растениеводческой отрасли Краснодарского края, предложены мероприятия по улучшению конкурентоспособности предприятий и дальнейшему развитию рынка зерновой продукции. Внедрение многофункциональных зернохранилищ будет способствовать не только снижению затрат на хранение, сушку, очистку, транспортировку зерна, но и повышению конкурентоспособности самого предприятия, что дает ему реальную возможность выполнять свои функциональные обязанности.

Библиографический список

1. Тихонова, А.В. Финансовая поддержка аграрного сектора экономики как фактор обеспечения импортозамещения и продовольственной безопасности [Текст] / А.В. Тихонова. М.: КноРус, 2018. 208 с.
2. Самыгин, Д.Ю. Стратегическая модель субсидирования сельского хозяйства [Текст] / Д.Ю. Самыгин, Н.Г. Барышников. М.: КноРус, 2017. 152 с.
3. Величко, М.В. Экономика инновационного развития [Текст] / М.В. Величко, В.А. Ефимов, В.М. Зазнобин. М.: Концептуал, 2018. 586 с.
4. Роуден, М. Корпоративная идентичность [Текст] / М. Роуден. М.: Добрая книга, 2017. 296 с.
5. Портер, М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов [Текст] / М. Портер. К.: Альпина Паблишер, 2015. 453 с.
6. Рудык, Н. Методы защиты от враждебного поглощения [Текст] / Н. Рудык. М.: Дело, 2015. 384 с.
7. Федотова, Н.Г. Производство, хранение и переработка продукции растениеводства в сельской усадьбе [Текст]: учебник. 1-е изд. / Н.Г. Федотова. М.: Academia, 2016. 336 с.

Сведения об авторах

1. **Рогожникова Юлия Юрьевна**, студентка экономического факультета, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, e-mail: rogozhnikova-yulia@mail.ru.
2. **Косников Сергей Николаевич**, кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.

В последнее время все более актуальной становится проблема повышения конкурентоспособности компании и ее адаптация к постоянно

меняющемуся рынку. В статье рассмотрено крупнейшее звено агропромышленного комплекса Российской Федерации – сельское хозяй-

ство Краснодарского края, доля которого в составе валового регионального продукта составляет 12 %. В статье выделены основные направления повышения экономической эффективности, стабилизации производственного рынка края, оптимальное использование преимуществ региона, таких, как благоприятные природно-климатические условия, трудовые ресурсы, а также техническое оснащение. Показан альтернативный путь развития отрасли растениеводства, увеличение производства зерна за счет сокращения его потерь на всех стадиях производства. Решением этой проблемы является хранилище ангарного типа. Многофункциональные зернохранилища могут использоваться не только для приема и хранения, но также для досушивания и охлаждения зерна. Подобные сооружения подходят для любых природно-климатических условий, могут быть установлены в

любой географической точке, не несут больших финансовых вложений. Ангар может быть оборудован разнообразной системой контроля режима хранения зерна, на возведение такой конструкции потребуется минимум временных затрат. Предложены мероприятия по улучшению конкурентоспособности, рассчитан минимальный приемлемый уровень доходности и максимально допустимый риск по инвестиционному проекту для дальнейшего развития и захвата большей доли рынка зерновой продукции, что поспособствует не только снижению затрат на хранение, сушку, очистку, транспортировку зерна, но и повышению конкурентоспособности предприятий и даст им реальную возможность выполнять свои функциональные обязанности. Проект будет являться полностью рациональным, а главное – прибыльным мероприятием для предприятия с любым уровнем дохода.

Yu. Rogozhnikova, S. Kosnikov

ESTIMATING COMPETITIVENESS OF PLANT GROWING OF FARM ENTERPRISES IN THE KRASNODAR REGION

Key words: *competitiveness; market analysis; acreage; investments; financial condition; enterprise; granary.*

Authors' personal details

1. **Rogozhnikova Yulia**, 4th year student of the Faculty of Economics, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kuban State Agrarian University», Krasnodar, Kalinina St., 13, e-mail: rogozhnikova-yulia@mail.ru.

2. **Kosnikov Sergey**, Candidate of economic sciences, Associate Professor, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kuban State Agrarian University», Krasnodar, Kalinina St., 13.

Recently, the problem of increasing the competitiveness of a company and its adaptation to a constantly changing market has become increasingly urgent. The paper considers the largest link of the agro-industrial complex of the Russian Federation – agriculture of the Krasnodar Territory. Its share in the gross regional product is 12 %. The paper highlights the main directions to improve economic efficiency, stabilization of the regional production market, the optimal use of the advantages of the region such as favorable climatic conditions, labor resources, as well as technical equipment. An alternative way of development of the plant growing industry is shown. Production of grain can be raised due to reduced losses at all stages of production. The solution to this problem is hangar storage. Multifunctional granaries can be used not only for receiving and storing, but also for drying and cooling the

grain. Such facilities are suitable for any natural and climatic conditions, can be installed in any geographical point, do not require large financial investments. A hangar can be equipped with a diverse system of monitoring the mode of grain storage. Its construction requires minimum time. There are proposed measures to improve competitiveness, the minimum acceptable level of profitability and the maximum allowable risk for investment projects were calculated for further development and capturing a larger share of the grain market. That will reduce the costs on storing, drying, cleaning, transportation of grain as well as increase competitiveness of enterprises that will have a real opportunity to perform their duties. The project will be completely rational. Moreover, it will be profitable for an enterprise with any income level.

ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И КАЧЕСТВА ЗЕРНА ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ КОНСУЛ

Ключевые слова: озимая тритикале; сорт; удобрения; норма высева; сроки посева; качество; урожайность.

Ведение. В условиях Западной части Центрального региона России посевы зерновых культур должны составлять не менее 35–40 % площади пашни с соотношением в структуре посевов озимых и яровых зерновых культур 50 : 50. В настоящее время доля озимых зерновых составляет лишь 30–35 %, что приводит к затягиванию ярового сева, снижению внедрения новых перспективных и конкурентоспособных культур [1]. Современные сорта озимых культур обладают достаточно высокой урожайностью и качеством зерна, пригодного не только на фуражные, но и на продовольственные и технические цели [2]. Одной из таких культур является озимая тритикале, которая превосходит по продуктивности озимую рожь и не уступает озимой пшенице. Многие современные сорта тритикале по пищевым качествам превосходят пшеницу, а по хлебопекарным – озимую рожь [3]. Внедрение новых сортов озимой тритикале и разработка для них сортовой агротехники и элементов современных систем агромероприятий, направленных на улучшение формирования густоты стояния, перезимовки, элементов структуры урожая, является актуальным, в том числе и для Смоленской области.

Цель исследований – изучение формирования урожайности и качества зерна озимой тритикале Консул в зависимости от абиотических и биотических условий выращивания и оценка пригодности зерна на хлебопекарные и технические (спирт) цели.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в 2015–2018 годы на опытном поле ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА в шестипольном севообороте: занятый пар, озимые зерновые, яровые зерновые, люпин, картофель, яровые зерновые на дерново-подзолистой среднесуглинистой среднеокультуренной слабнокислой почве (pH_{KCl} – 5,8). Содержание элементов минерального питания: гумус – 2,01 %; подвижный фосфор – 148 мг/кг; обменный калий – 165 мг/кг абсолютно сухой почвы.

Опыт по изучению отзывчивости озимой тритикале Консул на дозы и сроки внесения азотных удобрений включал следующие схемы

внесения: 1) контроль – фон (P120K90); 2) N30 + 60 + 30P120K90; 3) N60 + 30 + 30P120K90; 4) N0 + 120 + 0P120K90; 5) N0 + 60 + 0P120K90; 6) N60 + 0 + 60P120K90. Азотные удобрения вносились под предпосевную культивацию и ранней весной.

Опыт 2 по изучению сроков посева включал следующие варианты: ранний срок посева 25–30 августа; последующие четыре срока с интервалом 5–6 дней.

В опыте 3 изучалось 5 норм высева 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 млн всхожих семян на гектар при раннем сроке посева 2–6 сентября и позднем 18–22 сентября.

Опыты были заложены в 4-кратной повторности. Общая площадь делянки – 35 м²; учетная – 25 м². Предшественником в опытах был занятый пар. Агротехника в опытах общепринятая для Нечерноземной зоны, кроме изучаемых вариантов.

Все наблюдения за ростом и развитием растений проводили согласно общеизвестным методикам (М.К. Каюмов, 1989; И.С. Шатилов, 1978; Б.Р. Доспехов, 1935; Госсортиспытания, 1989).

Показатели качества зерна (физические, химические, технологические) определяли согласно ГОСТам: масса 1000 зерен по ГОСТу 12042-89; натура по ГОСТу 10840-64; крахмал по ГОСТу 10845-98; число падения по Хагбергу-Пертену по ГОСТу 27676-88; содержание белка по ГОСТу 10846-91; влажность зерна по ГОСТу 13586.5-93.

Погодные условия в годы исследований были различными. Зима 2015–2016 гг. была теплой. Весенне-летний период 2016 года был наиболее благоприятным для условий формирования урожайности тритикале. Климатические условия 2017 года характеризовались как засушливые, а 2018 года – увлажненные. Эти различия по годам позволили дать объективную оценку влияния изучаемых агроприемов на урожайность и качество зерна озимой тритикале в условиях Западной части Центрального региона России.

Результаты исследования. Формирование урожайности озимой тритикале тесно связано с

числом растений перед уборкой, которые отражают такие показатели, как полевая всхожесть, перезимовка и весенне-летняя выживаемость растений. В наших исследованиях в среднем за три года полевая всхожесть озимой тритикале Консул колебалась от 81 до 87 % и в большей степени зависела от влажности почвы в слое 0–10 см, чем от изучаемых агроприемов (таблицы 1–3). Ранний срок посева, пониженные нормы высева в 4 млн всходов зерен/га имели тенденцию к снижению этого показателя на 2–3 %.

Для озимой тритикале большое значение имеет состояние растений и их развитие перед уходом в зиму. Растения, прошедшие две стадии закали, хорошо переносят суровые условия зимнего покоя. Нами выявлено, что существенное влияние на перезимовку растений тритикале Консул оказали сроки посева. В вариантах раннего и позднего сроков посева она снижалась от-

носительно второго срока соответственно на 5–8 %, что в первом случае связано с перерастанием растений, а во втором – с неполным прохождением фазы закали (таблица 1).

Предпосевное внесение азотных удобрений в дозе 30 кг/га действующего вещества способствовало лучшему осеннему развитию и кущению растений и улучшению прохождения перезимовки на 1–3 % (таблица 2). В целом перезимовка озимой тритикале Консул была высокой и достигала 70–74 %. Наибольшая весенне-летняя выживаемость растений (82–86 %) была при внесении азотных удобрений по схемам N30 + 60 + 30 и N0 + 60 + 60; при посеве во второй и третий сроки и норме высева 4,5–5,0 млн всхожих семян. Ранние и поздние сроки посева, разреженные и загущенные посевы, а также варианты без внесения азотных удобрений и разовое их внесение снижали выживаемость на 4–21 %.

Таблица 1 Влияние сроков посева на урожайность и качество зерна озимой тритикале Консул, среднее за 3 года

Показатель	Срок посева				
	26–31.08	1–6.09	7–11.09	12–17.09	18–22.09
Полевая всхожесть, %	82	85	84	84	82
Перезимовка, %	69	74	73	71	66
Выживаемость, %	76	82	82	80	71
Число растений перед уборкой, шт./м ²	236	256	250	240	219
Урожайность, т/га	5,01	6,38	6,22	4,82	2,94
Натура, г/л	754	765	760	750	742
М 1000 зерен, г	44,17	44,53	44,49	44,11	42,74
Содержание белка, %;	12,22	12,40	12,42	12,39	12,11
Число падения, ед.	192	213	210	190	168
Содержание крахмала, %	76,32	75,14	75,10	76,01	76,49

Таблица 2 Продуктивность и качество зерна озимой тритикале Консул в зависимости от уровня минерального питания, среднее за 3 года

Показатель		К (фон РК)	Дозы и сроки внесения азотных удобрений + фон					
			30 + 60 + 30	60 + 30 + 30	0 + 120 + 0	60 + 60 + 0	0 + 60 + 60	60 + 0 + 60
Количество растений, шт/м ² :	при всходах	515	515	521	510	518	516	522
	после перезимовки	323	361	356	321	352	341	349
	перед уборкой	212	298	255	216	250	268	240
Полевая всхожесть, %		86	86	87	85	86	86	87
Перезимовка, %		69	73	71	68	70	69	70
Выживаемость, %		65	86	81	70	77	82	72
Сохранность, %		35	49	48	38	42	43	41
Урожайность, т/га		1,72	5,84	5,62	2,87	4,81	5,70	4,51
Натура, г/л		704	760	758	710	724	761	720
М1000 зерен, г		42,73	46,37	46,24	43,33	44,27	46,20	44,00
Содержание белка, %		10,11	11,72	11,66	10,66	11,10	11,70	11,80
Число падения, ед.		112	202	200	114	169	204	186
Содержание крахмала, %		76,31	75,11	75,19	77,80	76,12	74,53	76,04

Как показали исследования, изучаемые агроприемы повлияли на формирование густоты

стояния растений перед уборкой. Наибольшее число растений было при посеве в период с 2 по

7 сентября и составило 250–256 шт./м². Внесение минеральных удобрений относительно контроля повышало густоту растений на 8–41 %.

Урожайность зерна является конечным основным показателем оценки сорта и агроприема. В наших исследованиях урожайность зерна

сорта озимой тритикале Консул колебалась от 1,72 до 6,38 т/га и зависела от изучаемых агроприемов. Более благоприятные условия для формирования урожайности складывались при посеве во второй (6,38 т/га) и третий (6,22 т/га) сроки посева.

Таблица 3 Урожайность и качество озимой тритикале Консул в зависимости от норм высева при разных сроках посева, среднее за 3 года

Показатель	Нормы высева, млн шт./га				
	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Полевая всхожесть, %	<u>84</u> 81	<u>85</u> 83	<u>86</u> 83	<u>87</u> 84	<u>85</u> 84
Перезимовка, %	<u>70</u> 66	<u>73</u> 68	<u>73</u> 68	<u>72</u> 67	<u>70</u> 67
Выживаемость, %	<u>82</u> 73	<u>83</u> 73	<u>83</u> 73	<u>81</u> 72	<u>80</u> 72
Урожайность, т/га	<u>5,72</u> 1,96	<u>6,10</u> 2,64	<u>6,29</u> 2,98	<u>6,32</u> 3,20	<u>6,34</u> 3,26
Количество растений перед уборкой, шт./м ²	<u>193</u> 160	<u>232</u> 185	<u>260</u> 209	<u>279</u> 223	<u>285</u> 243
Натура, г/л	<u>744</u> 690	<u>756</u> 710	<u>760</u> 708	<u>759</u> 684	<u>756</u> 677
М 1000 зерен, г	<u>45,31</u> 43,21	<u>45,20</u> 43,54	<u>44,89</u> 43,43	<u>44,76</u> 42,86	<u>43,33</u> 42,07
Содержание белка, %	<u>12,83</u> 11,11	<u>12,78</u> 11,34	<u>12,76</u> 11,22	<u>12,51</u> 10,86	<u>12,15</u> 10,74
Число падения, ед.	<u>187</u> 162	<u>199</u> 169	<u>202</u> 172	<u>200</u> 168	<u>186</u> 157
Содержание крахмала, %	<u>75,17</u> 78,09	<u>75,23</u> 77,93	<u>74,89</u> 78,12	<u>76,11</u> 77,81	<u>76,72</u> 77,21

Ранние и поздние сроки посева снижали урожайность до 27 %, то есть поздние сроки посева с 15 сентября неприемлемы для посева озимой тритикале сорта Консул. Это связано с низкой перезимовкой и сохранностью растений к уборке (таблица 1). Внесение удобрений способствовало повышению урожайности от 0,14 до 4,12 т/га, наибольшая она была (5,84–5,70 т/га) при внесении минеральных удобрений по схемам N30 + 60 + 30P120K90 и N0 + 60 + 60P120K90 кг/га действующего вещества (таблица 2). Оптимальная густота стеблестоя, продуктивная кустистость, продуктивность колоса формируют потенциальную урожайность сорта, его генетическую и экологическую пластичность и адаптивность. Основным регулятором этих показателей являются нормы высева. В наших исследованиях наибольшая урожайность в среднем за три года была на ранних сроках посева при нормах высева 5,0–5,5 млн всхожих семян на гектар и составила 6,29–6,32 т/га; при позднем сроке посева оптимальная норма высева была 5,5 млн всхожих семян на гектар с уровнем урожайности 3,20 т/га. Элементы структуры урожайности отражают уровень урожайности. Лучшие условия формирования складывались во всех опытах при втором сроке (2–

5 сентября) при внесении азотных удобрений по схеме: N30 + 60 + 30 с нормой высева 5,0–5,5 млн шт./га и составили по числу продуктивных стеблей 345–487 шт.; продуктивной кустистости – 1,69–2,01 ед.; массе зерна с колоса – 1,42–1,87 г.

Корреляционным и регрессионным анализами выявлена сильная зависимость урожая от продуктивного стеблестоя, кустистости, массы зерна с колоса, коэффициенты корреляции (r) составили 0,66; 0,72; 0,74.

Без качественного анализа зерна нет полной оценки сорта и его использования. Наибольшие значения массы 1000 зерен и натуры были при ранних сроках посева и составили соответственно 44,17–44,53 г; 754–765 г/л; при дробном внесении азотных удобрений, особенно с подкормкой в фазу выхода в трубку по схемам N30 + 60 + 30, N0 + 60 + 60: 46,37–46,20 г; 760–761 г/л. Как в вариантах с поздними сроками посева, так и без удобрений и подкормки в фазу «выхода в трубку» масса 1000 зерен и натура снижались на 8–12 %.

Из изучаемых агроприемов на технологические показатели зерна в большей степени оказали влияние минеральные удобрения, чем сроки посева и нормы высева. Так, содержание

белка, крахмала и число падения были более высокими и оптимальными при дробном внесении азотных удобрений по схеме $N_{30} + 60 + 30P_{120}K_{90}$ кг/га и составили соответственно 11,72 %; 75,11 %; 298 ед. (таблица 2). При загущенных и разреженных посевах имела тенденция к снижению физических, химических и технологических свойств зерна, что связано с большей разноточностью зерна в колосе.

Следует отметить, что по физическим, химическим и технологическим показателям зерно озимой тритикале Консул пригодно на продовольственные и технические (спиртовые, пивоваренные) цели.

На хлебопекарные цели пригодно зерно только с ранних сроков посева при дробном внесении азотных удобрений по схемам $N_{30} + 60 + 30P_{120}K_{90}$, $N_0 + 60 + 60P_{120}K_{90}$ кг/га и нормами высева 4,5–5,5 млн шт./га.

Вывод. В условиях Смоленской области на дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах сорт озимой тритикале Консул обладает высокой экологической пластичностью и адаптивностью с уровнем урожайности более 6,5 т/га и качеством зерна, пригодного на продовольственные и технологические цели.

Библиографический список

1. Глушаков, С.Н. Роль азотных удобрений при возделывании интенсивных сортов озимой тритикале [Текст] / С.Н. Глушаков, И.Н. Романова, Р.В. Степуров // Продовольственная безопасность: от зависимости к самостоятельности. Материалы международной научно-практической конференции. Смоленск: Смоленская ГСХА, 2017. С. 24–27.

2. Торики, В.Е. Сравнительная характеристика урожайности и качества зерна сортов озимой тритикале, возделываемой в Юго-Западной части Центрального региона России [Текст] / В.Е. Торики, О.В. Мельникова, И.Н. Яценко //

Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК. Материалы XIV Международной научной конференции. Брянск, 2017. С. 526–531.

3. Романова, И.Н. Формирование продуктивности зерновых культур в зависимости от условий выращивания [Текст] / И.Н. Романова, М.И. Перепичай, А.А. Перегонцева, Р.В. Степуров // Инновационный путь развития АПК. Сборник научных трудов по материалам XXXIX Международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава. Ярославль: Ярославская ГСХА, 2016. С. 94–99.

Сведения об авторах

1. **Романова Ираида Николаевна**, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия», 214000, Россия, г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 10/2.

2. **Терентьев Сергей Евгеньевич**, кандидат сельскохозяйственных наук, ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия», 214000, Россия, г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 10/2.

3. **Птицына Наталья Васильевна**, кандидат сельскохозяйственных наук, ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия», 214000, Россия, г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 10/2.

4. **Глушаков Сергей Николаевич**, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия», 214000, Россия, г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 10/2.

5. **Перепичай Марина Игоревна**, кандидат сельскохозяйственных наук, ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия», 214000, Россия, г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 10/2.

В результате исследований, проведенных в течение нескольких лет (2015–2018 гг.), установлено, что сорт озимой тритикале Консул обладает высокой экологической пластичностью и адаптивностью с уровнем урожайности более 6,5 т/га. По физическим, химическим и технологическим показателям зерно озимой тритикале

Консул пригодно на продовольственные и технические (спиртовые, пивоваренные) цели. На хлебопекарные цели пригодно только зерно с ранних сроков посева при дробном внесении азотных удобрений по схемам $N_{30} + 60 + 30P_{120}K_{90}$, $N_0 + 60 + 60P_{120}K_{90}$ кг/га и нормами высева 4,5–5,5 млн шт./га.

WAYS TO INCREASE YIELDS AND QUALITY OF WINTER TRITICALE CONSUL GRAIN

Key words: winter triticale; variety; fertilizers; seeding rate; sowing time; quality; yield.

Authors' personal details

1. **Romanova Iraida**, Doctor of agricultural sciences, professor, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Smolensk State Agricultural Academy», 214000, Russia, Smolensk, Bolshaya Sovetskaya str., 10/2.

2. **Terentev Sergey**, Candidate of Agricultural Sciences, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Smolensk State Agricultural Academy», 214000, Russia, Smolensk, Bolshaya Sovetskaya str., 10/2.

3. **Ptitsyna Natalya**, Candidate of Agricultural Sciences, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Smolensk State Agricultural Academy», 214000, Russia, Smolensk, Bolshaya Sovetskaya str., 10/2.

4. **Glushakov Sergey**, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Smolensk State Agricultural Academy», 214000, Russia, Smolensk, Bolshaya Sovetskaya str., 10/2.

5. **Perepichay Marina**, Candidate of Agricultural Sciences, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Smolensk State Agricultural Academy», 214000, Russia, Smolensk, Bolshaya Sovetskaya str., 10/2.

As a result of the research conducted for several years (2015–2018), it was found that Consul has high environmental plasticity and can generate yields of more than 6,5 t/ha. According to the physical, chemical and technological indicators, the winter triticale Consul grain is suitable for food and

technological (alcohol, brewing) purposes. For baking purposes grain from early sowing dates is suitable with fractional application of nitrogen fertilizers according to the schemes $N_{30} + 60 + 30P_{120}K_{90}$, $N_0 + 60 + 60P_{120}K_{90}$ kg/ha and seeding rates of 4,5–5,5 million units/ha.

© Романова И.Н., Терентьев С.Е., Птицына Н.В., Глушаков С.Н., Перепечай М.И.

УДК 631.535.633.812.754

DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-41-46

М.В. Савченко, Г.Д. Кравченко, Н.А. Каширина

ВИДОВОЙ СОСТАВ СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В АГРОЦЕНОЗЕ ЛАВАНДЫ УЗКОЛИСТНОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ОБРАБОТКИ МЕЖДУРЯДИЙ

Ключевые слова: эфирносы; лаванда узколистная Степная; культивация; мульчирование почвы; сорная растительность; фазы вегетации; пырей ползучий; щетинник зеленый.

Введение. В настоящее время эфиромасличные культуры, занимая небольшие площади в мире, обеспечивают высокую прибыльность сельскохозяйственного производства. Спрос на их сырье и продукты переработки на мировом рынке с каждым годом возрастает, что влечет за собой необходимость увеличения объема продукции.

Эфиромасличная отрасль в Крыму может стать локомотивом развития региона, так как Крым является оптимальной зоной для их выращивания. Особенно актуально это в свете государственной политики, направленной на импортозамещение.

Выращиваются эфирносы для получения эфирного масла, биологически активных ве-

ществ, а также как пряные культуры для пищевой промышленности [1]. Ежегодная потребность экономики России в такой продукции составляет примерно 4–6 тыс. т [2]. Лаванда узколистная – это высокорентабельная эфиромасличная культура, эфирное масло которой широко используется в парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности. Одной из основных проблем в технологии возделывания данной культуры является сорная растительность [3]. Сорняки наносят большой вред культурным растениям, понижая их урожайность и качество продукции. Наиболее вредоносными считаются многолетние корневищные – пырей ползучий *Elytrigia repens* L. и корнеотпрысковые – осот розовый *Cirsium arvense* L., осот полевой *Sonchus arvensis* L., вьюнок полевой *Convolvulus arvensis* L., так как они имеют высокий коэффициент размножения за счет вегетативных органов [4]. Большой объем корневой системы этих растений поглощает из почвы значительное количество органических и минеральных элементов. В опытах В.Ф. Ладонина и А.М. Алиева установлено, что если численность сорняков достигает 100–200 шт./м², то вынос ими минеральных элементов составляет 60–140 кг/га азота, 100–140 кг/га калия и 20–30 кг/га фосфора [5].

Менее вредоносными являются эфемеры – вероника плющелистная *Veronica hederifolia* L., яснотка пурпурная *Lamium purpureum* L., ярутка полевая *Thlaspi arvense* L. и др., а также всходы однолетних сорняков – злаки *Gramineae*, мак-самосейка *Papaver rhoeas* L.

Мониторинг видового состава сорных растений в агроценозах культурных растений позволяет корректировать технологию возделывания и совершенствовать методы борьбы с ними. Так, в исследованиях А.С. Кононова [6] выявлено, что наиболее распространенными и вредоносными сорняками в посевах люпина Нечерноземной зоны России являются пырей ползучий *Elytrigia repens* L., щирица запрокинутая *Amaranthus retroflexus* L. и сурепка обыкновенная *Barbarea vulgaris* L. Н.М. Тишков и А.А. Дряхлов [7] изучали видовой состав сорных растений в посевах льна масличного и выявили, что из всех встречающихся наиболее многочисленными были амброзия полыннолистная *Ambrosia artemisiifolia* L., дурнишник обыкновенный *Xanthium strumarium* L. и осот полевой *Sonchus arvensis* L. В опытах Л.П. Савчука и Е.А. Меркушева [8] на шалфее мускатном установлено, что самыми вредоносными в посевах данного эфи-

роноса были амброзия полыннолистная *Ambrosia artemisiifolia* L., вьюнок полевой *Convolvulus arvensis* L. и двойчатка лучистая *Bifora radians* Bieb., которые оказались устойчивыми к некоторым группам гербицидов.

В технологии возделывания лаванды узколистной в качестве способа ухода за междурядьями традиционно применяют культивацию 2–3 раза за вегетацию [9]. В литературе имеются данные о положительных результатах борьбы с сорной растительностью в посевах культурных растений методом мульчирования междурядий соломой зерновых культур. В исследованиях В.А. Скрипина [10] мульчирование почвы соломой озимой пшеницы снижало количество сорных растений на опытных полях сахарной свеклы в среднем на 14–23 %. Мульча из соломы овса слоем 10–15 см почти на 50 % подавляла рост широколиственных и мелкосемянных сорняков в агроценозах овощных и зерновых культур [11, 12].

Цель исследований – определение степени засоренности, видового и количественного состава сорных растений в зависимости от способа ухода за междурядьями в агроценозе лаванды узколистной сорта Степная.

Условия исследований. Исследования проводили в 2017–2018 гг. в научном севообороте лаборатории агротехнологических приемов возделывания отдела эфиромасличных и лекарственных растений ФГБУН «НИИСХ Крыма», в с. Крымская Роза Белогорского р-на Республики Крым. Лаванда узколистная 2004 года посадки, сорт Степная.

Территория проведения исследований относится к Предгорной зоне Крыма. Климат зоны умеренно-континентальный. Опытный участок расположен в теплом и недостаточно влажном агроклиматическом районе Крыма; подрайон – северный с умеренно мягкой зимой. Почва научного севооборота – предгорный карбонатный чернозем, тяжело-суглинистый по механическому составу, на делювиальных глинах, с содержанием гумуса в пахотном горизонте до 3,4 %. Гумусовый горизонт рыхлый, мощность его составляет 22–25 см [13].

Метеорологические условия в 2017 и 2018 гг. для эфиромасличных культур в целом были благоприятными. В первый год исследований в начале вегетации (апрель – май) в среднем наблюдались регулярные осадки и оптимальный температурный режим. Количество осадков в этот период составило 158 мм, средняя температура воздуха +13,9 °С. Второй год характеризо-

вался длительным засушливым периодом и более высокими температурами (в среднем $+16,4\text{ }^{\circ}\text{C}$).

В период бутонизации и цветения в 2017 году (июнь – июль) выпало 57 мм осадков, а температура воздуха в среднем составила $+19,5\text{ }^{\circ}\text{C}$. В 2018 году в этот период наблюдались экстремальные метеорологические условия: осадков не было, а средняя температура воздуха составила $+20,4\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Материалы и методы исследований. Анализ видового состава сорной растительности в зависимости от способа обработки междурядий в агроценозе лаванды узколистной сорта Степная проводили в фазы начала вегетации и массовой бутонизации, используя рамку площадью 1 м^2 , в трехкратной повторности. Схема опыта включала 2 варианта:

1. Культивация (контроль; 2–3 раза по необходимости);
2. Мульчирование (солома пшеницы слоем 20–30 см).

Общая площадь опыта – $0,16\text{ га}$. Учетная площадь элементарной делянки – 12 м^2 . Повторности расположены трехрядно, варианты – систематически в пределах повторности. Учеты, наблюдения, лабораторно-аналитические исследования проводили в соответствии с существующей научно-технической документацией и методическими указаниями [14, 15]. Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы Statistica 6.

Результаты исследований. Сорная растительность в период вегетации лаванды узколистной представлена различными видами. Более разнообразный видовой состав отмечен на делянках с применением культивации. Установлено, что в этом варианте опыта основными сорными растениями в начале вегетации были всходы однолетних сорняков – щетинник зеленый *Setaria viridis* L. и эфемер – вероника плющелистная *Veronica hederifolia* L. Вредоносность щетинника незначительна, но при массовых всходах может в некоторой степени иссушать почву [7]. На делянках с мульчированной почвой наиболее распространенным был пырей ползучий *Elytrigia repens* L. Это многолетнее корневищное сорное растение, которое является наиболее вредоносным и трудно истребляемым на полях культурных растений. В 2017 г. в фазе начала вегетации численность щетинника зеленого в варианте с культивацией междурядий составляла $89 \pm 4\text{ шт./м}^2$, а вероники плющелистной – $20 \pm 3\text{ шт./м}^2$. Количество пырея ползучего составило $28 \pm 3\text{ шт./м}^2$. В варианте с приме-

нем метода мульчирования численность пырея ползучего варьировала в пределах $110 \pm 5\text{ шт./м}^2$, а щетинника зеленого – $35 \pm 3\text{ шт./м}^2$. Другие сорные растения были менее распространены. В варианте с культивацией количество сорняков в этот период было значительно выше, чем при мульчировании ($180 \pm 16\text{ шт./м}^2$; при мульчировании – 150 ± 11) (таблица 1).

Второй год исследований характеризовался более засушливыми агрометеорологическими условиями, поэтому количество сорняков на опытном участке было меньше. При общей численности $133 \pm 13\text{ шт./м}^2$ сорных растений в варианте с применением культиваций междурядий количество щетинника зеленого в этом году составляло $70 \pm 3\text{ шт./м}^2$, вероники плющелистной – $16 \pm 2\text{ шт./м}^2$, а пырея ползучего – $20 \pm 2\text{ шт./м}^2$. При мульчировании почвы общая численность сорняков составила $123 \pm 8\text{ шт./м}^2$, из них пырея ползучего – $93 \pm 4\text{ шт./м}^2$, а щетинника зеленого – $26 \pm 2\text{ шт./м}^2$.

Распространенность пырея ползучего в варианте с применением метода мульчирования почвы можно объяснить тем, что при культивации междурядий фреза трактора частично подрезает корневища пырея, препятствуя его распространению, а в этом случае рост и развитие данного сорняка ничем не ограничивается. При благоприятных условиях произрастания длина корневищ пырея может достигать 495 м на 1 м^2 пахотного горизонта, масса – 2,9 кг, а число вегетативных почек – 26 тыс. [4].

В фазе бутонизации лаванды узколистной основными сорными растениями в варианте с культивацией междурядий также оставался щетинник зеленый *Setaria viridis* L., а при мульчировании почвы – пырей ползучий *Elytrigia repens* L. В этот период на делянках с применением обоих способов обработки междурядий распространились такие многолетние корнеотпрысковые сорные растения, как осот розовый *Cirsium arvense* L. и выюнок полевой *Convolvulus arvensis* L. В 2017 г. количество щетинника зеленого в фазу бутонизации в варианте с культивацией составило $93 \pm 5\text{ шт./м}^2$, при мульчировании – $23 \pm 2\text{ шт./м}^2$. Численность пырея ползучего при первом варианте опыта составило $36 \pm 2\text{ шт./м}^2$, а при втором – $118 \pm 4\text{ шт./м}^2$. На делянках с культивацией осот розовый и выюнок полевой были менее распространены – $9 \pm 1\text{ шт./м}^2$ и $5 \pm 1\text{ шт./м}^2$, чем при мульчировании почвы: $12 \pm 1\text{ шт./м}^2$ и $9 \pm 1\text{ шт./м}^2$. В варианте с мульчированием наблюдались более высокие темпы размножения сорняков. К моменту наступления

фазы бутонизации общее количество сорных растений при культивации составило 177 ± 18 шт./м², при мульчировании – 185 ± 14 шт./м². На второй год исследований (2018 г.) в этот период наблюдалась аналогичная закономерность, однако вследствие продолжительного засушливого весенне-летнего периода количество сорных растений было меньше. Численность щетинника зеленого в варианте с культивацией составила 82 ± 3 шт./м², при мульчировании – 20 ± 2 шт./м². Ко-

личество пырея ползучего в первом варианте опыта составило 31 ± 2 шт./м², а во втором – 106 ± 4 шт./м². Наибольшее количество осота розового и выюнка полевого в этом году также отмечено в варианте с мульчированной почвой – 8 ± 1 шт./м² и 6 ± 1 шт./м² (при культивации – 5 ± 1 шт./м² и 3 ± 1 шт./м² соответственно). Общее количество сорняков в первом варианте опыта составило 142 ± 15 шт./м², во втором – 155 ± 13 шт./м².

Таблица 1 Видовой состав сорной растительности в агроценозе лаванды узколистной сорта Степная

№ п/п	Вид сорного растения	Обработка междурядий					
		культивация			мульчирования		
		год		Среднее	год		Среднее
		2017	2018		2017	2018	
Фаза «начало вегетации»							
1	Пырей ползучий (<i>Elytrigia repens</i> L.)	28 ± 3	20 ± 2	24 ± 3	110 ± 5	93 ± 4	102 ± 5
2	Осот розовый (<i>Cirsium arvense</i> L.)	7 ± 1	2 ± 1	5 ± 1	2 ± 1	2 ± 1	2 ± 1
3	Вьюнок полевой (<i>Convolvulus arvensis</i> L.)	2 ± 1	2 ± 1	2 ± 1	–	–	–
4	Щетинник зеленый (<i>Setaria viridis</i> L.)	89 ± 4	70 ± 3	80 ± 4	35 ± 3	26 ± 2	31 ± 3
5	Вероника плющелистная (<i>Veronica hederifolia</i> L.)	20 ± 3	16 ± 2	18 ± 3	1 ± 1	–	1 ± 1
6	Резак обыкновенный (<i>Falcaria vulgaris</i> L.)	16 ± 2	11 ± 2	14 ± 2	2 ± 1	2 ± 1	2 ± 1
7	Цикорий обыкновенный (<i>Cichorium intybus</i> L.)	11 ± 1	7 ± 1	9 ± 1	–	–	–
8	Мак самосейка (<i>Papaver rhoeas</i> L.)	7 ± 1	5 ± 1	6 ± 1	–	–	–
Всего		180 ± 16	133 ± 13	158 ± 16	150 ± 11	123 ± 8	138 ± 11
Фаза «бутонизация»							
1	Пырей ползучий (<i>Elytrigia repens</i> L.)	36 ± 2	31 ± 2	34 ± 2	118 ± 4	106 ± 4	112 ± 4
2	Осот розовый (<i>Cirsium arvense</i> L.)	9 ± 1	5 ± 1	7 ± 1	12 ± 1	8 ± 1	10 ± 1
3	Вьюнок полевой (<i>Convolvulus arvensis</i> L.)	5 ± 1	3 ± 1	4 ± 1	9 ± 1	6 ± 1	8 ± 1
4	Осот полевой (<i>Sonchus arvensis</i> L.)	6 ± 1	3 ± 1	5 ± 1	10 ± 1	7 ± 1	9 ± 1
5	Щетинник зеленый (<i>Setaria viridis</i> L.)	93 ± 5	82 ± 3	88 ± 4	23 ± 2	20 ± 2	22 ± 2
6	Резак обыкновенный (<i>Falcaria vulgaris</i> L.)	15 ± 1	12 ± 1	14 ± 1	5 ± 1	4 ± 1	5 ± 1
7	Щирица (амарант) запрокинутая (<i>Amaranthus retroflexus</i> L.)	4 ± 1	1 ± 1	3 ± 1	1 ± 1	–	1 ± 1
8	Гречишка вьюнковая (<i>Fallopia convolvulus</i> L.)	3 ± 1	1 ± 1	2 ± 1	3 ± 1	1 ± 1	2 ± 1
9	Подорожник большой (<i>Plantago major</i> L.)	1 ± 1	–	1 ± 1	3 ± 1	2 ± 1	3 ± 1
10	Очный цвет полевой (<i>Anagallis arvensis</i> L.)	2 ± 1	1 ± 1	2 ± 1	–	–	–
11	Лебеда белая (<i>Atriplex cana</i> L.)	1 ± 1	1 ± 1	1 ± 1	–	–	–
12	Пролестник однолетний (<i>Mercurialis annua</i> L.)	1 ± 1	1 ± 1	1 ± 1	–	–	–
13	Одуванчик лекарственный (<i>Taraxacum officinale</i> L.)	1 ± 1	1 ± 1	1 ± 1	1 ± 1	1 ± 1	1 ± 1
Всего		177 ± 18	142 ± 15	163 ± 17	185 ± 14	155 ± 13	173 ± 14

Проведенные исследования показали, что традиционный способ обработки междурядий, а именно культивация является предпочтительным способом обработки междурядий в агроценозе лаванды узколистной сорта Степная. Мульчирование почвы соломой зерновых культур способствует распространению наиболее вредоносных корневищных и корнеотпрысковых сорных растений, в частности таких, как пырей ползучий *Elytrigia repens* L., осот розовый *Cirsium arvense* L. и выюнок полевой *Convolvulus arvensis* L., а кроме того – ускоренному темпу размножения сорных растений.

Выводы. Наиболее оптимальным способом обработки междурядий в агроценозе лаванды узколистной сорта Степная является культивация. Мульчирование почвы соломой зерновых культур способствует ускоренному темпу размножения сорных растений и распространению наиболее вредоносных корневищных и корнеотпрысковых. Наиболее распространенным сорным растением при культивации междурядий был щетинник зеленый (*Setaria viridis* L.) (89 ± 4 шт./м² и 70 ± 3 шт./м² в начале вегетации и 93 ± 5 шт./м² и 82 ± 3 шт./м² в фазу бутонизации в 2017 и 2018 гг. соответственно), при мульчи-

ровании – пырей ползучий (*Elytrigia repens* L.) (110 ± 5 шт./м² и 93 ± 4 шт./м² в начале вегетации

и 118 ± 4 шт./м² и 106 ± 4 шт./м² в фазу бутонизации в 2017 и 2018 гг. соответственно).

Библиографический список

1. Назаренко, Л.Г. Эфиромасличные, пряно-ароматические и лекарственные растения [Текст] / Л.Г. Назаренко, Л.А. Бугаенко. Симферополь: Таврия, 2003. 201 с.
2. Данные таможенной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:3790776612628454::NO>.
3. Паштецкий, В.С. Эфиромасличная отрасль Крыма. Вчера, сегодня, завтра [Текст] / В.С. Паштецкий, Н.В. Невкрытая, А.В. Мишнев, Л.Г. Назаренко. Симферополь: Ариал, 2017. 305 с.
4. Гунькина, В.Ю. Сорные растения и меры борьбы с ними [Текст] / В.Ю. Гунькина // Концепт. 2016. Т. 11. С. 311–315.
5. Ладонин, В.Ф. Комплексное применение гербицидов и удобрений в интенсивном земледелии [Текст] / В.Ф. Ладонин, А.М. Алиев. М., 1972. 271 с.
6. Кононов, А.С. Видовой состав сорняков и их вредоносность в посевах люпина [Текст] / А.С. Кононов // Бюллетень Брянского отделения РБО. 2013. № 2 (2). С. 88–96.
7. Конкурентоспособность льна масличного по отношению к сорнякам в зависимости от засоренности посевов и видового их состава [Текст] / Н.М. Тишков, А.А. Дряхлов // Научно-технический бюллетень ВНИИ масличных культур. 2005. Вып. 1 (132). С. 115–120.
8. Эффективность гербицидов при разных сроках сева шалфея мускатного [Текст] / Л.П. Савчук, Е.А. Меркушев // Научные труды Южного филиала Национального университета биоресурсов и природопользования Украины «Крымский агротехнологический университет». 2012. № 149. С. 61–66.
9. Технологические карты промышленного возделывания эфиромасличных культур на период 1994–2000 гг. [Текст]. Симферополь, 1993. 99 с.
10. Скрипин, В.А. Агроэкологическая эффективность мульчирования почвы соломой при возделывании сахарной свеклы в Центральном Черноземье [Текст]: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / В.А. Скрипин. Курск, 2005. 20 с.
11. Liebman M., Mohler C. Weeds and the soil environment. J. Ecological management of agricultural weeds. New York: Cambridge University Press, 2001. P. 233–236.
12. Anderson R.L. An ecological approach to strengthen weed management in the semiarid Great Plains. Adv. Agron, 2003. 340 p.
13. Половицкий, И.Я. Почвы Крыма и повышение их плодородия [Текст] / И.Я. Половицкий, П.Г. Гусев. Симферополь: Таврия, 1987. 151 с.
14. Методика полевых опытов по агротехнике эфиромасличных культур [Текст]: сборник научных трудов. Симферополь: ВНИИЭМК, 1972. 149 с.
15. Адиньяев, Э.Д. Учебно-методическое пособие по проведению исследований в агрономии [Текст]: учеб. пособие / Э.Д. Адиньяев, А.А. Абаев, Н.Л. Адаев. Владикавказ: Литера, 2013. 651 с.

Сведения об авторах

1. **Савченко Марина Вячеславовна**, младший научный сотрудник, отдел эфиромасличных и лекарственных культур, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 150, e-mail: shell0709@mail.ru.
2. **Кравченко Галина Дмитриевна**, научный сотрудник, отдел эфиромасличных и лекарственных культур, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 150.
3. **Каширина Наталья Александровна**, младший научный сотрудник, отдел эфиромасличных и лекарственных культур, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 150.

В статье приведены результаты исследования видового разнообразия сорной растительности на посадках лаванды узколистной сорта Степная в зависимости от способа ухода за междурядьями. Опыты проводили на опытном поле

лаборатории агротехнологических приемов возделывания отдела эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма», в с. Крымская Роза Белогорского р-на Республики Крым. Общая площадь опытного участка

0,16 га. Учетная площадь элементарной делянки – 12 м². Повторности расположены трехрядно, варианты – систематически в пределах повторности. Культивацию применяли 2–3 раза по необходимости, мульчировали 1 раз ранней весной до начала отрастания. Учеты проводили двукратно в течение периода вегетации (фазы «начало вегетации» и «массовая бутонизация»), используя рамку площадью 1 м² в трехкратной повторности. Цель работы – определить видовой и количественный состав сорных растений в зависимости от способа ухода за междурядьями в агроценозе лаванды узколистной сорта Степная. В результате исследований выявлено, что наиболее оптимальным способом обработки междурядий в агроценозе лаванды узколистной

сорта Степная является культивация. Мульчирование почвы соломой зерновых культур способствует ускоренному темпу размножения сорных растений и распространению наиболее вредных корневищных и корнеотпрысковых. Наиболее распространенным сорным растением при культивации междурядий был щетинник зеленый (*Setaria viridis* L.) (89 ± 4 шт./м² и 70 ± 3 шт./м² в начале вегетации и 93 ± 5 шт./м² и 82 ± 3 шт./м² в фазу бутонизации в 2017 и 2018 гг. соответственно), при мульчировании – пырей ползучий (*Elytrigia repens* L.) (110 ± 5 шт./м² и 93 ± 4 шт./м² в начале вегетации и 118 ± 4 шт./м² и 106 ± 4 шт./м² в фазу бутонизации в 2017 и 2018 гг. соответственно).

M. Savchenko, G. Kravchenko, N. Kachirina

WEED SPECIES COMPOSITION IN TRUE LAVENDER AGROCENOSIS DEPENDING ON THE INTERTILLAGE METHOD

Key words: *essential-oil-bearing plant; true field lavender; cultivation; mulching; weed vegetation; vegetation phases; coach grass; green bristle grass.*

Authors' personal details

1. **Savchenko Marina**, Junior Researcher, Department of essential oils and medicinal crops, Research Agricultural Institute of Crimea, 295493, Russia, Republic of Crimea, Simferopol, Kievskaya St., 150, e-mail: shell0709@mail.ru.

2. **Kravchenko Galina**, Researcher, Department of essential oils and medicinal crops, Research Agricultural Institute of Crimea, 295493, Russia, Republic of Crimea, Simferopol, Kievskaya St., 150.

3. **Kashirina Natalia**, Junior researcher, Department of essential oils and medicinal crops, Research Agricultural Institute of Crimea, 295493, Russia, Republic of Crimea, Simferopol, Kievskaya St., 150.

The paper presents the research results of weed species variety on true lavender plantations depending on the intertillage method. The experiments were carried out on the experimental field of the soil tillage laboratory of the Department of essential oil and medicinal crops in the Research Agricultural Institute of Crimea located in the village of Krymskaya Rosa, Belogorsky district, Republic of Crimea. The total area of the experimental plot is 0,16 ha. The declared area of the standard plot is 12 м². Replications are located in three-rows, variants systematically within replications. The plot was cultivated for 2–3 times, if necessary. Mulching was done once in early spring before aftergrowing. Records were carried out twice during the growing season («beginning of the growing season» and «mass budding» phases), using one-meter-sized frame in

triple repetition. The aim of the work is to determine the species and quantitative composition of weeds depending on the intertillage method in true lavender agroecocenosis. The studies revealed that the best method to till interrows in true lavender agroecocenosis was the cultivation. The most common weed plant in this variant of the experiment was green bristle (*Setaria viridis* L.) (89 ± 4 PCs/m² and 70 ± 3 PCs/m² at the beginning of vegetation and 93 ± 5 PCs/m² and 82 ± 3 PCs/m² in budding phase in 2017 and 2018, respectively). Mulching of soil with straw of grain crops contributed to the spread of the most harmful rhizome weed – coach grass (*Elytrigia repens* L.) (110 ± 5 PCs/m² and 93 ± 4 PCs/m² at the beginning of vegetation and 118 ± 4 PCs/m² and 106 ± 4 PCs/m² in the budding phase in 2017 and 2018, respectively).

© Савченко М.В., Кравченко Г.Д., Каширина Н.А.

ПЕРИОДЫ И ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИИ *SYMPHYTUM OFFICINALE* L. В УСЛОВИЯХ ПРИАНГАРЬЯ

Ключевые слова: окопник лекарственный; онтогенез; латентный; виргинильный; генеративный; возрастная группа; долголетие.

Введение. Естественные луговые сообщества в сельском хозяйстве используются в качестве сенокосных и пастбищных угодий. Продуктивность природных лугов зависит от множества факторов и поэтому не отличается постоянством. Для успешного развития животноводства требуется высокоэффективная, стабильная кормовая база, которая должна использовать не только естественные луговые ценозы, но и сеянные агроценозы. Кроме того, среди представителей дикорастущей флоры необходимо постоянно вести поиск перспективных видов растений, обладающих высокой продуктивностью и ценными кормовыми качествами, а также характеризующихся способностью адаптироваться к местным климатическим условиям. Интродукции должны вводиться в культуру только после всестороннего изучения биологических особенностей, после исключения возможных вредных последствий [1].

Представители рода *Symphytum* (окопник) относятся к семейству *Boraginaceae* (Бурачниковые). Ареал распространения видов обширный – от Средиземноморья до Кавказа и Западной Сибири. До сороковых годов некоторые виды окопника выращивали на значительных площадях в Белоруссии, России. Окопник жесткий и окопник бродячий введены в культуру в ряде районов Европы и Восточной Азии, так как эти виды растений богаты белком и являются ценными кормовыми растениями. На Кавказе окопник жесткий также введен в культуру как кормовое растение. Наряду с лекарственными веществами окопник в фазу бутонизации – цветения содержит 21,2 % протеина, до 19,5 % клетчатки. Кроме того, в нем содержатся каротин (60–100 мг/кг), аскорбиновая кислота (150–300 мг/кг), витамины В₁, В₆, В₁₂, Е, никотиновая кислота и алкалоиды (до 0,13 %). Все это делает зеленую массу высокопитательной и ценной, особенно для свиней, птицы, овец и коз. Из зеленой массы можно приготовить травяную муку, гранулы и силос. Окопник может использоваться в качестве декоративной и медоносной культуры [3].

Цель и задачи. Целью работы является изучение окопника лекарственного для последующего введения в культуру. При этом решалась следующая задача: биоморфологическая характеристика этапов онтогенеза.

Методы исследования. При популяционных исследованиях окопника основные этапы онтогенеза определены по методике Т.А. Работнова [6] с учетом дополнений, предложенных А.А. Урановым [5] и др. Методика фенологических наблюдений проводилась по И.Н. Бейдеману, тип жизненной формы окопника лекарственного определяли по классификации И.Г. Серебрякова.

Результаты и обсуждения. В онтогенезе окопника лекарственного выделены периоды онтогенеза: латентный, виргинильный и генеративный. Не выделен постегенеративный период, что свидетельствует о длительном жизненном цикле окопника.

При изучении окопника лекарственного выделена группа проростков, которые характеризуются смешанным питанием (веществ семени и собственной ассимиляции за счет семядольных листьев); проростки характеризуются наличием зародышевых структур: семядолей, первичного (зародышевого) корня и побега.

Проростки через определенный промежуток времени переходят на следующий этап онтогенетического развития, которое называется ювенильным. Ювенильные растения характеризуются простотой организации, отсутствием признаков и свойств, присущих взрослым растениям, наличием листьев иной формы и расположения, чем у взрослых особей. У ювенильных особей отсутствует ветвление, сохраняются некоторые зародышевые признаки (зародышевый корень), но уже нет связи с семенем, семядоли отсутствуют.

Далее растение переходит в имматурное состояние, которое характеризуются наличием свойств и признаков, переходных от ювенильных растений к взрослым: развитием листьев и корневой системы полувзрослого типа, появляются отдельные черты взрослых растений, начинается ветвление побегов (рисунок 1).

Рисунок 1
Имматурное состояние окопника

При дальнейшем развитии у растений появляются основные черты, типичные для взрослых растений данного вида. Форма и размеры листьев не отличаются от генеративных особей, продолжается рост корневой системы, усиливается ветвление по сравнению с имматурными, но отсутствуют генеративные органы.

Затем у растений наступает генеративный период. В этом периоде у растений выделены три генеративных состояния. Первая группа – это молодые генеративные растения, у которых впервые формируются генеративные органы, наблюдается цветение и созревание семян. У молодых генеративных растений преобладают процессы нарастания над отмиранием.

Средневозрастные генеративные характеризуются уравниванием процессов новообразования и отмирания. Средневозрастным особям свойственна максимальная продуктивность

надземной и подземной биомассы, а также максимальная семенная продуктивность. Процессы отмирания и нарастания у этой группы уравниваются.

Старые генеративные особи характеризуются преобладанием процессов отмирания над процессом новообразования: резким снижением генеративной функции, ослаблением процессов в корне и побегообразования, которые могут привести к смене жизненной формы растений [6].

Вывод. Поскольку не выделены сенильные особи, популяцию окопника можно назвать не полночленной. Но эту популяцию следует считать нормальной, так как в ней присутствуют все особи вергинильного и продуктивного периодов онтогенеза. Окопник проходит все этапы онтогенеза и тем самым прекрасно подходит для введения в культуру.

Библиографический список

1. Андреев, Н.Г. Луговое и полевое кормопроизводство [Текст]: учебник для вузов / Н.Г. Андреев. М.: Колос, 1971. 495 с.
2. Горшкова, А.А. Биоморфология и продуктивность степных растений Забайкалья [Текст] /

А.А. Горшкова, Н.В. Федоскин, И.А. Лукина, А.П. Полюшкин; отв. ред. А.А. Горшкова. Новосибирск: Наука, 1979. 127 с.

3. Ларин, И.В. Луговое и пастбищное хозяйство [Текст] / И.В. Ларин. Л.: Колос, 1969. 550 с.

4. Раменский, Л.Г. Избранные работы. Проблемы и методы изучения растительного покрова [Текст] / Л.Г. Раменский. Л.: Наука, 1971. 340 с.

5. Уранов, А.А. Большой жизненный цикл и возрастной спектр ценопопуляций цветковых растений [Текст] / А.А. Уранов // Тезисы докладов V делегатского съезда. Киев: Всес. бот. об-ва, 1973. 36 с.

6. Работнов, Т.А. Определение возрастного состава популяций видов в сообществе [Текст] / Т.А. Работнов // Полевая геоботаника. М. – Л.: Наука, 1964. 144 с.

7. Фролов, М.В. Экология лугов Западного участка зоны БАМ [Текст] / М.В. Фролов, В.А. Давыдов, Н.А. Журавлева; отв. ред. Р.К. Саляев; АН СССР, СО, Сиб. ин-т физиологии и биохимии растений. Новосибирск: Наука, 1986. 177 с.

Сведения об авторах

1. **Тунгрикова Валерия Владиславовна**, аспирант кафедры ботаники, плодоводства и ландшафтной архитектуры агрономического факультета, Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, 664038, Россия, Иркутская область, пос. Молодежный, e-mail: vtungrikova@bk.ru.

2. **Филиппова Татьяна Александровна**, аспирант кафедры ботаники, плодоводства и ландшафтной архитектуры, агрономического факультета, Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, 664038, Россия, Иркутская область, пос. Молодежный, e-mail: ya.filipova0204@yandex.ru.

В рассматриваемой статье приводятся данные по изучению популяции окопника лекарственного. Окопник лекарственный является ценным лекарственным, декоративным и кормовым растением. Выделены периоды онтогенеза: латентный, виргинильный и генеративный. Изучены онтогенетические состояния окопника ле-

карственного в большом жизненном цикле. Выделены биоморфологические признаки, служащие основой для отнесения растения к той или иной возрастной группе. Определен тип популяции. На основе ценопопуляционных исследований выявлено, что окопник лекарственный характеризуется продуктивным долголетием.

V. Tungrikova, T. Philippova

PERIODS AND ONTOGENETIC CONDITIONS OF *SYMPHYTUM OFFICINALE* L. IN CONDITIONS OF THE ANGARA REGION

Key words: *Symphytum officinale* L.; ontogenesis; latent; virgin; generative; age group; longevity.

Authors' personal details

1. **Tungrikova Valeria**, Post-graduate student of the Botany, horticulture and landscape gardening department of the Agronomy faculty, Irkutsk state agrarian University named after A.A. Ezhevsky, 664038, Russia, Irkutsk region, Molodezny settlement, e-mail: lera-im@mail.ru.

2. **Filippova Tatiana**, Post-graduate student of the Botany, horticulture and landscape gardening department of the Agronomy faculty, Irkutsk state agrarian University named after A.A. Ezhevsky, 664038, Russia, Irkutsk region, Molodezny settlement, e-mail: ya.filipova0204@yandex.ru.

The paper presents data on studies of comfrey population. *Symphytum officinale* L. is a valuable medicinal, ornamental and fodder plant. There are the following periods of ontogenesis: latent, virgin and generative. Ontogenetic conditions of *Symphytum officinale* L. in the big life cycle are studied.

Biomorphological characteristics that serve as the basis for classification of plants to one or the other age group are distinguished. The type of population is defined. On the basis of cenopopulation studies *Symphytum officinale* L. is found to be characterized by productive longevity.

© Тунгрикова В.В., Филиппова Т.А.

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРИМЕНЕНИИ С РАЗЛИЧНЫМИ ПЕСТИЦИДАМИ НА УРОЖАЙНОСТЬ И ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕВОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

Ключевые слова: *природные регуляторы роста; гербициды; экологизация сельского хозяйства; сорные растения; фитопатогены; яровая пшеница.*

Введение. Одним из подходов для решения задачи получения экологически чистой сельскохозяйственной продукции является использование природных регуляторов роста растений.

Современные технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур часто предусматривают использование композиций из различных регуляторов роста и пестицидов в баковых смесях. Как было показано в ряде работ [1–3], при научно-обоснованном подборе химических и биологических средств защиты растений их совместное применение способствует снижению дозы химических средств защиты растений и сокращению кратности обработок, что позволяет повысить эффективность, расширить спектр действия и увеличить период действия используемых препаратов, а также снизить экологическую нагрузку на агроэкосистему.

Совместное применение природных регуляторов роста растений и гербицидов способствует уменьшению риска возникновения устойчивости к пестицидам и снижению химической нагрузки на почвенную биоту, а также быстрому выходу растений из состояния стресса после воздействия химических препаратов. Кроме того, уменьшение пестицидной нагрузки на агроэкосистему является одним из способов повышения экономической эффективности производства растениеводческой продукции главным образом за счет снижения затрат на приобретение химических средств защиты растений [4–6].

При составлении баковых смесей учитывают, прежде всего, совместимость препаратов, особенности обрабатываемой культуры, фазы развития культуры, видовой состав сорных растений и уровень засоренности посевов. Совместное применение пестицидов с регуляторами роста позволяет снизить токсичность химических соединений за счет повышения собственной комплексной устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды.

Цель и задачи исследований. В современной системе защиты растений применяется до-

вольно большой спектр химических средств и препаратов биологического происхождения. Поэтому изучение влияния композиций, составленных из различных природных и химических препаратов, на сорта яровой пшеницы и компоненты агрофитоценозов представляет практический интерес.

В задачи исследования входило изучение биометрических параметров растений, определение урожайности, развитие возбудителей болезней, анализ качества зерна пшеницы, а также учет динамики видового состава сорной растительности.

Условия, материалы и методы исследований. Исследования проводились в полевые сезоны 2015–2016 гг. на опытных полях Учебного научного центра (УНЦ) Башкирский ГАУ, расположенных в южной лесостепной зоне Республики Башкортостан, и хозяйствах Башкирского Зауралья. В качестве компонентов композиций были использованы препараты Богатый NPK 5:6:9 + МЭ, Бионекс-Кеми NPK 40:0:0 + Mg, Гуми-90М, Гуми-20 производства ООО НВП «БашИнком». Первый представляет собой комплексное биоактивированное гуминовое удобрение с полным набором макро- и микроэлементов, второй – комплексное биоактивированное удобрение с азотом, микроэлементами и биофунгицидом Фитоспорин-М; Гуми-90М и Гуми-20 – биоактивированные по молекулярному весу соли БМВ – гуминовых кислот [1, 2]. В качестве химического компонента были использованы гербициды Гранат производства АО «Щелково Агрохим», Аксиал производства «Syngenta», Чисталан и Октиген производства АКХ-Агро ГУ НИТИГ АН РБ, Луварам производства ООО «Марус», Магнум производства Фирма «Август». Гранат является гербицидом системного действия, предназначенным для борьбы с двудольными сорными растениями, Аксиал – с одностольными злаковыми сорняками, Луварам, Чисталан, Октиген и Магнум – препараты для борьбы с однолетними и некоторыми многолетними двудольными сорняками.

Опыты проводились в условиях УНЦ Башкирский ГАУ, размеры площадей составляли 1,8 га, размещение вариантов – последовательное, повторность 3-кратная. Обработку изучаемыми препаратами проводили в фазе кущения. Схема опыта включала следующие варианты: А (контроль) – без обработки; Б – Гранат (20 г/га) + Аксиал (1 л/га) + Богатый NPK 5:6:9 + МЭ (1 л/га) + Бионекс-Кеми NPK + Mg 40:0:0 + 0,7 (3 кг/га); В – Гранат (20 г/га) + Аксиал (1 л/га) + Бионекс-Кеми NPK + Mg 40:0:0 + 0,7 (3 кг/га); Г – Гранат (20 г/га) + Аксиал (1 л/га) + Богатый NPK 5:6:9 + МЭ (1 л/га).

Схема производственных опытов в районах Республики Башкортостан приведена в таблице 3.

По стандартным методикам в период вегетации проводили фенологические наблюдения, учет распространенности и интенсивности развития болезней, а также изучение видового состава сорной растительности. По окончании вегетационного периода проводили учет элементов структуры урожайности пшеницы [7, 8, 9].

Результаты исследований и их обсуждение. Большое значение на формирование урожая оказывает фотосинтетическая деятельность растений. Основным ассимилирующим органом являются листья, также в этом процессе участвуют стебель, колос, ости. При этом значение каждого из органов в процессе фотосинтеза зависит от этапа развития растений.

По мнению многих исследователей, до 90–95 % абсолютно сухого вещества урожая создается благодаря фотосинтезу листьев. Основная ассимилирующая поверхность растений пшеницы формируется в основном за счет двух верхних листьев. У злаковых культур флаговый лист обладает самой высокой фотосинтетиче-

ской активностью по сравнению с другими ассимилирующими органами и тесно коррелирует с продуктивностью колоса.

Применение регуляторов роста в смеси с гербицидами способствовало повышению абсолютно сухого веса флагового листа в варианте Б на 40 % по сравнению вариантами В и Г. По сравнению с контролем прирост сухой массы растения в варианте Б составил 4,5 %, тогда как в вариантах В и Г этот показатель уменьшился на 37 и 34 % соответственно. Число продуктивных стеблей на одном растении пшеницы в варианте Б превышает данный показатель вариантов В и Г (таблица 1).

Таким образом, совместное применение двух гербицидов с регуляторами роста Богатый NPK 5:6:9 + МЭ и Бионекс-Кеми NPK + Mg 40:0:0 способствует мобилизации работы фотосинтетического аппарата, о чем свидетельствует увеличение абсолютно сухого веса флагового листа.

Прибавка сухого веса побега в варианте Б является результатом активизации ассимиляционной деятельности растений пшеницы.

Вероятно, использование неспецифических протекторов – природных регуляторов роста приводит к снижению токсичности гербицидов у растений пшеницы. Об этом свидетельствуют данные таблицы 2. Сохранность и продуктивная кустистость растений, а также число зерен в колосе и масса 1000 семян превышают показатели контроля во всех вариантах опыта.

Синергетический эффект применения двух регуляторов роста на фоне двух гербицидов (вариант Б) отразился на урожайности, которая в варианте Б превысила на 26,7 % контроль, на 18,5 % – вариант В и на 8,5 % – вариант Г.

Таблица 1 Биометрические показатели растений яровой пшеницы в фазу выхода в трубку*

Вариант	Число стеблей на одном растении, шт.	Абсолютно сухой вес флагового листа, г	Абсолютно сухой вес побегов, г
А	1,17	0,040	1,26
Б	1,17	0,045	1,32
В	1,02	0,025	0,79
Г	1,12	0,025	0,82

* Примечание: здесь и в других таблицах приводятся средние данные за 2015–2016 гг.

Таблица 2 Влияние совместного применения регуляторов роста и гербицидов на структуру урожайности зерна яровой пшеницы (УНЦ Башкирский ГАУ, Уфимский р-н РБ, 2015–2016 гг.)

Вариант	Число растений, шт./м ²	Число продуктивных стеблей, шт./м ²	Число зерен в колосе, шт.	Масса 1000 зерен, г	Урожайность,	
					т/га	±
А	311	317	24,0	30,5	2,32	–
Б	318	349	26,1	32,3	2,94	0,62
В	314	329	24,3	31,0	2,48	0,16
Г	318	343	25,3	31,2	2,71	0,39
НСР _{0,5}	–	–	–	–	0,15	–

Результаты производственных испытаний, проведённых в различных почвенно-климатических зонах РБ, где вариантами опыта были обработка семян и посевов различных сортов пшеницы препаратом Гуми в смеси с протравителями и гербицидами, также свидетельствовали об эффективности применения баковых смесей природных регуляторов роста и пестицидов (таблица 3). Во всех опытах урожайность превышала контроль. Особенно эффективными при обработке оказались композиции: Фундазол + Гуми-90М/Чисталан + Гуми-20; Тирам + Гуми-90М/Чисталан + Магнум + Гуми-20; Тирам + Гуми-90М/ Магнум + Гуми-20.

Известно, что гуминовые вещества, взаимодействуя с полезной микрофлорой почвы, обеспечивают важнейшие функции, необходимые

для реализации формирования максимально возможной продуктивности растений и, прежде всего, за счет процесса фотосинтеза. Кроме того, по-видимому, немаловажную роль сыграло действие природного регулятора роста Гуми различных препаративных форм в качестве антистрессора по отношению к применённым пестицидам.

Важным показателем технологического качества муки пшеницы является содержание белка и качества клейковины. Повышению качества зерна пшеницы с 4 до 3 класса, а также увеличению содержания белка по сравнению с контролем по вариантам опыта, по-видимому, способствовало применение природного регулятора роста Гуми, несмотря на использование химических средств защиты растений.

Таблица 3 Хозяйственная эффективность совместного применения регулятора роста Гуми в смесях с протравителями семян и гербицидами на яровой пшенице

Способ обработки		Урожайность, ц/га		Прибавка		Качество зерна				
протравливание семян	обработка гербицидами	контроль	опыт	ц/га	%	клейковина, %		группа ИДК	класс зерна	
						контроль	опыт		контроль	опыт
Яровая пшеница «Симбирка», СПК «Октябрь» Аургазинского р-на										
Фундазол (0,3 кг/т) + Тирам (0,5 кг/т) + Гуми-90М (0,1 кг/т)	Луварам (1,5 л/га) + Гуми-20 (0,3 л/га)	16,4	18,1	1,7	11	20,9	22,1	2	4	4
Яровая пшеница «Казахстанская-10», агрофирма «Родина» Гафурийского р-на										
Фундазол (0,3 кг/т) + Гуми-90М (0,1 кг/т)	Чисталан (1 л/га) + Гуми-20 (0,3 л/га)	16,0	20,0	4,0	25	18,5	21,4	2	4	4
Яровая пшеница «Симбирка», Стерлитамакский сельхозтехникум										
Витал (2 л/т) + Гуми-90М (0,1 кг/т)	Октиген (0,6 л/га) + Гуми-20 (0,3 л/га)	25,8	28,6	2,8	11	21,5	22,9	2	4	4
Яровая пшеница «Симбирка», СПК «Акъяр» Хайбуллинского р-на										
Тирам (0,5 л/т) + Гуми-90М (0,1 кг/т)	Чисталан (1 л/га) + Магнум (6 г/га) + Гуми-20 (0,3 л/га)	10,5	12,2	1,7	16	24,0	26,8	1	3	3
Яровая пшеница «Саратовская-55», ОПХ «Баймакское» Баймакского р-на										
Актамыр (2,5 л/т) + Гуми-90М (0,1 кг/т)	Луварам (1,5 л/га) + Гуми-20 (0,3 л/га)	27,6	31,3	3,7	13	24,0	26,0	1	3	3
Яровая пшеница «Саратовская-55», СПК «Зилаирский» Баймакского р-на										
Тирам (0,5 л/т) + Гуми-90М (0,1 кг/т)	Магнум (6 г/га) + Гуми-20 (0,3 л/га)	18,0	20,7	2,7	15	21,5	23,8	1	4	3

Таблица 4 Степень развития болезней в посевах яровой пшеницы в разных вариантах опыта (%)

Вариант	Бурая ржавчина, %		Корневые гнили, %	
	распространение	интенсивность	распространение	интенсивность
А	75,0	8,8	82,0	26,5
Б	50,0	5,8	59,0	18,9
В	65,2	5,8	64,8	19,9
Г	66,7	6,7	58,0	20,5

Фитосанитарное состояние посевов. Как правило, применение химических средств для контроля фитосанитарного состояния посевов

приводит к резкому снижению почвенной биоты и потенциала самого растения. Часто при этом на растениях развиваются различные болезни,

которые могут приводить к значительным потерям урожая. В настоящее время у пшеницы выявлено более 30-ти болезней, вызываемых грибными, бактериальными и вирусными патогенами. Среди них на Южном Урале наиболее вредоносными представителями являются бурая ржавчина и корневая гниль [10–12].

Результаты наших исследований показали, что обработка растений в фазе кущения композициями регуляторов роста с гербицидами оказала существенное влияние на устойчивость растений пшеницы к возбудителям этих болезней (таблица 4).

Применение биопрепаратов Бионекс-Кеми NPK 40:0:0 + Mg и Богатый NPK 5:6:9 + МЭ, в составе которых содержатся споры эндофитной бактерии *Bacillus subtilis* (штамм 26Д), в баковой смеси с гербицидами (вариант Б), способствует снижению распространенности и интенсивности развития корневых гнилей и бурой ржавчины. Данный эффект явился результатом улучшения физиологического состояния культуры под влиянием регуляторов роста.

Анализ видового состава сорных видов растений в разных вариантах опыта показал, что при применении баковых смесей происходит изменение видового богатства, флористического состава и проективного покрытия сорно-полевого сообщества (таблица 5). Общий видовой состав сорного компонента представлен 19 видами растений. Во всех вариантах опыта в сообщ-

ествах преобладает *Щирица запрокинутая* (*Amaranthus retroflexus*) – однолетний вид, хорошо адаптированный и устойчивый к гербицидам. Наибольшее обилие этого вида характерно для контроля (3 балл), в других вариантах опыта он встречается с более низким количеством (1 балл). С различным постоянством во всех вариантах опыта встретились 4 вида – злаковые однолетники *Просо обыкновенное* (*Panicum miliaceum*) и *Овсяг обыкновенный* (*Avena fatua*), быстрорастущий полиморфный вид – *Марь белая* (*Chenopodium album*) и устойчивый к обработке почв корневищный вид – *Вьюнок полевой* (*Convolvulus arvensis*).

Во всех вариантах опыта произошло снижение видового богатства сорно-полевых сообществ по сравнению с контролем. Наименьшее число сорных видов зафиксировано в варианте Б (6 видов на 100 м²), наибольшее – в контроле (17 видов на 100 м²). Из ценофлоры сообществ (варианта А) при действии препаратов (варианты Б, В, Г) полностью выпали 9 видов, среди которых двудольные злостные сорняки *Бодяк щетинистый* (*Cirsium setosum*), *Осокор полевой* (*Sonchus arvensis*) и др., хорошо уничтожающиеся гербицидами.

Таким образом, на подавление сорных растений действует гербицидный компонент смеси, в то время как биоконпоненты баковой смеси позволяют быстрее преодолевают «гербицидную яму» за счет усиления ростовых процессов культурных растений.

Таблица 5 Основные виды сорных растений в различных вариантах опыта (УНЦ Башкирский ГАУ)

Вид	Варианты опыта			
	А	Б	В	Г
Среднее число видов на 100 м ²	17	6	8	9
Проективное покрытие пшеницы	80	90	70	70
Проективное покрытие сорных растений	15	5	10	10
Щирица запрокинутая (<i>Amaranthus retroflexus</i> L.)	3	1	1	1
Просо обыкновенное (<i>Panicum miliaceum</i> L.)	1	+	+	+
Овсяг обыкновенный (<i>Avena fatua</i> L.)	+	г	г	+
Вьюнок полевой (<i>Convolvulus arvensis</i> L.)	+	г	+	+
Марь белая (<i>Chenopodium album</i> L.)	+	+	+	+
Дрема белая (<i>Melandrium album</i> Garcke)	г	–	г	г
Гречишка вьюнковая (<i>Fallopia convolvulus</i> A. Love)	+	г	+	–

Выводы. Природные регуляторы роста при совместном использовании с протравителями при предпосевной обработке семян и внекорневой обработке посевов яровой пшеницы способствуют ускорению роста и развития растений, повышению устойчивости растений к корневым и листовым болезням, более быстрому преодо-

лению «гербицидной ямы», а также снижению численности и проективного покрытия сорных растений. Используемые природные регуляторы роста дают преимущества для развития культурных растений, сохраняя продуктивный потенциал и тем самым повышая их урожайность.

Библиографический список

1. Сергеев, В.С. Антистрессовая технология защиты сельскохозяйственных культур [Текст] / В.С. Сергеев // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2012. № 10. С. 33–36.
2. Результаты исследований эффективности применения биоактивированных удобрений и гербицидов на посевах яровой пшеницы сорта «Ватан» [Текст] / Г.Р. Хасанова, Г.М. Рахимова, В.С. Сергеев, Р.Ф. Исаев // Интеграция науки и высшего образования в области био- и органической химии и биотехнологии. IX Всероссийская научная интернет-конференция / Редколл.: Р.А. Исмаков и др. Уфа: РИЦ УГНТУ, 2015. С. 133–134.
3. Технология использования антистрессовых регуляторов роста и биофунгицидов совместно с протравителями семян и гербицидами на зерновых культурах [Текст]: рекомендации. 2-е изд. Уфа: Гилем, 2004. 44 с.
4. Сумароков, А.М. Показатель восстановления биотического потенциала агроэкосистем при уменьшении пестицидных нагрузок [Текст] / А.М. Сумароков, А.В. Жуков // Біологічний вісник МДПУ. 2013. № 3. С. 83–108.
5. El-Kabbany S., Rashed M.M., Zayed M.A. Monitoring of the pesticide levels in some water supplies and agricultural lands, in El-Haram, Gisa (A.R.E.). J. Hazardous Mater. 2000. Vol. 72, № 1. P. 11–21.
6. Астарханов, И.Р. Влияние пестицидной нагрузки на окружающую среду и пути его снижения [Текст] / И.Р. Астарханов, Т.Н. Ашурбекова, З.М. Рамазанова // Проблемы развития АПК региона. 2014. Т. 20, № 4 (20). С. 49–52.
7. Методические указания по государственным испытаниям фунгицидов, антибиотиков и протравителей семян сельскохозяйственных культур [Текст] / Под ред. К.В. Новожилова. М., 1985. 89 с.
8. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) [Текст] / Б.А. Доспехов. М.: Альянс, 2014. 351 с.
9. Миркин, Б.М. Современное состояние основных концепций науки о растительности [Текст] / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова. Уфа: Гилем, 2012. 488 с.
10. Гилязетдинов, Ш.Я. Эффективность антистрессовых препаратов и биофунгицидов в системе защиты сельскохозяйственных культур от неблагоприятных абиотических и биотических факторов [Текст] / Ш.Я. Гилязетдинов (отв. ред.), А.Х. Нугуманов, Л.И. Пусенкова. Уфа: Гилем, 2008. 372 с.
11. Лухменев, В.П. Повышение хозяйственной и экономической эффективности протравителей семян, гербицидов и фунгицидов на Южном Урале [Текст] / В.П. Лухменев // Эффективность гербицидов и фунгицидов при совместном применении с антистрессовыми регуляторами роста на зерновых культурах (опыт и рекомендации). Уфа: Гилем, 2003. С.43–49.
12. Хасанова, Г.Р. Флористический состав сегетальных сообществ Республики Башкортостан [Текст] / Г.Р. Хасанова, С.М. Ямалов, В.В. Корчев // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2014. № 2. С. 38–41.

Сведения об авторах

1. **Хасанова Гульназ Римовна**, кандидат биологических наук, доцент, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 2785611, e-mail: gulnazrim@yandex.ru.
2. **Рахимова Гузэль Маратовна**, кандидат биологических наук, доцент, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 2785611, e-mail: RGM_63@mail.ru.
3. **Исаев Рустем Фидиевич**, кандидат биологических наук, доцент, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 2785611, e-mail: isaevrf31@gmail.com.

В статье приведены результаты исследований влияния композиций природных регуляторов роста растений и гербицидов в баковых смесях на рост и развитие, повышение устойчивости к заболеваниям и уровень засоренности в посевах различных сортов яровой пшеницы. Показано, что используемые препараты, обладая про-

текторными свойствами против токсического действия пестицидов, повышают эффективность последних, обеспечивают преимущество для развития культурных растений, способствуют сохранению растений и повышению их урожайности.

INFLUENCE OF NATURAL GROWTH REGULATORS WITH JOINT APPLICATION WITH DIFFERENT HERBICIDES ON YIELD AND PHYTOSANITARY STATE OF SPRING WHEAT SOWINGS

Key words: *natural growth regulators; herbicides; greening of agriculture; weeds; phytopathogens; spring wheat.*

Authors' personal details

1. **Khasanova Gulnaz**, Candidate of biological sciences, associate professor, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Otyabrya st., 34, phone: +7 (347) 2785611, e-mail: gulnazrim@yandex.ru.

2. **Rakhimova Guzel**, Candidate of biological sciences, associate professor, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Otyabrya st., 34, phone: +7 (347) 2785611, e-mail: RGM_63@mail.ru.

3. **Isaev Rustem**, Candidate of biological sciences, associate professor, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Otyabrya st., 34, phone: +7 (347) 2785611, e-mail: isaevrf31@gmail.com.

The paper presents the results of studies on the effect of compositions of natural plant growth regulators and herbicides in tank mixtures on growth and development, higher resistance to diseases and the weed rate in plantings of different varieties of spring wheat. The used preparations are shown to have

protective properties against the toxic effect of pesticides, increase efficiency of the latter, provide an advantage for further development of cultivated plants, contribute to the conservation of plants and increase their yield.

© Хасанова Г.Р., Рахимова Г.М., Исаев Р.Ф.

УДК 636.2.061.034

DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-55-62

С.Д. Батанов, И.А. Баранова, О.С. Старостина

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ ПО ИХ ЭКСТЕРЬЕРНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ

Ключевые слова: *индекс типа телосложения коров; экстерьер; селекционно-генетические параметры; молочная продуктивность коров.*

Введение. На современном этапе развития животноводства в России, как и во всем мире, с целью производства достаточного количества качественной молочной продукции все большее значение приобретают мероприятия, направленные на повышение продуктивности сельскохозяйственных животных и рациональное использование племенных ресурсов мирового генофонда [1]. При разведении молочного скота большое внимание уделяется оценке животных по экстерьеру, так как внешний вид животного и его внутренние свойства тесно связаны с молочной продуктивностью. Взаимосвязь между экстерье-

ром и продуктивностью животных выявили еще первые животноводы, создававшие местные породы скота методом народной селекции. Один из основоположников учения об экстерьере, английский скотозаводчик Р. Беквелл, в XVIII веке выдвигал идеи о создании модельных животных с идеальным экстерьером для каждого направления продуктивности. Идеи Беквелла в России развивал отечественный животновод М.Г. Ливанов в XIX столетии [2]. Создание высокопродуктивного молочного стада крупного рогатого скота, характеризующегося хорошим здоровьем и длительным сроком эксплуатации, невозможно

без систематической оценки животных по экстерьеру и типу телосложения [3–5].

Во всех странах с развитым молочным скотоводством (США, Канада, Япония, Европейские страны) тип телосложения наряду с показателями молочной продуктивности является главным селекционным признаком при совершенствовании молочных пород [6]. Тип молочной коровы был разработан американскими селекционерами для голштинской породы. Такой тип обеспечивает высокую молочную продуктивность при сохранении здоровья животных в процессе интенсивного использования и может служить моделью для молочной коровы и в нашей стране. Признаки телосложения тесно связаны с экономической ценностью молочного скота и эффективностью его разведения. Правильная оценка и анализ признаков телосложения необходимы для получения и определения генетических достоинств животного [7]. Производственный тип животного рассматривается как интегрированный признак, обусловленный комплексом наследственных и средовых факторов. Такие животные в наибольшей степени приспособлены к конкретным условиям среды и оптимально реализуют свой генетический потенциал [4, 8]. В настоящее время в большинстве стран с развитым молочным скотоводством для оценки типа экстерьера скота используют линейный метод. Он позволяет получить объективную оценку отдельных животных, групп животных и стад в целом, вести корректирующий подбор для устранения выявленных недостатков экстерьера животных и таким образом влиять на тип телосложения [9].

Профессор В.О. Витт для оценки экстерьера и установления типа телосложения рекомендовал брать такие промеры, соотношение которых, мало меняясь с возрастом животного, могло бы характеризовать наследственный тип, присущий данной группе животных. При этом он считал, что для вычисления индексов телосложения необходимо выбирать соотношения таких промеров, которые в процессе онтогенетического развития изменялись бы параллельно, а сам индекс оставался бы относительно постоянным [2]. Следовательно, основной целью селекционной работы является ускорение генетического прогресса в популяциях животных по комплексу селекционных признаков за минимально вероятный промежуток времени. Это возможно при создании комплексной многофункциональной системы, которая включает в себя как оптимизацию методов селекции, так и создание паратипических условий, благоприятствующих максимальному проявлению генетического потенци-

ала животных [10, 11]. Селекция по показателям экстерьера, связанная с улучшением производственного типа, является основополагающей в вопросах уменьшения вынужденной выбраковки животных [12]. Поэтому в общем перечне факторов, влияющих на эффективность использования коров, следует учитывать такой фактор, как тип телосложения [13].

В связи с этим **целью** наших **исследований** являлось изучение динамики и изменения селекционно-генетических параметров экстерьерных показателей и определение факторов, влияющих на формирование продуктивных качеств и типа телосложения коров в популяции голштинизированного черно-пестрого и холмогорского скота Удмуртской Республики.

Материалы и методы исследования. Научные исследования проводились в 2016–2018 гг. на коровах черно-пестрой и холмогорской пород в племенных предприятиях Удмуртской Республики. Сведения о сельскохозяйственных предприятиях представлены в таблице 1. Объем выборочной совокупности животных составил 450 коров в возрасте 2 лактаций и старше. Животные оценивались в период с 90-го по 150-й день лактации с помощью измерения и расчета экстерьерного индекса типа телосложения. У коров с помощью измерительных инструментов (мерная лента, мерная палка, циркуль) были взяты следующие промеры: высота в холке, полуобхват груди за лопатками, прямая длина туловища, полуобхват тазобедренной области, обхват пясти. Для более полной оценки типа телосложения животных был рассчитан экстерьерный индекс по формуле, разработанной С.Д. Батановым и И.А. Барановой:

$$ИТ = \frac{\sqrt{(2 \cdot ПОГ + 2 \cdot ПОТБ + ПДТ) \cdot ОП}}{ВХ}, \quad (1)$$

где ИТ – индекс телосложения; ПОГ – полуобхват груди, см; ПОТБ – полуобхват тазобедренной области, см; ПДТ – прямая длина туловища, см; ОП – обхват пясти, см; ВХ – высота в холке, см.

Молочную продуктивность оценивали по таким показателям, как удой за 305 дней последней законченной лактации, кг, массовая доля жира (МДЖ), % и белка (МДБ), %. При использовании этих показателей был рассчитан продуктивный индекс по формуле:

$$ПИ = \frac{Уд \cdot (МДЖф + МДБф)}{Жб + Бб}, \quad (2)$$

где ПИ – продуктивный индекс, кг; МДЖф – фактическая массовая доля жира, %; МДБф – фактическая массовая доля белка, %; Жб – базисная норма массовой доли жира молока (3,4 %); Бб – базисная норма массовой доли белка (3,0 %).

Таблица 1 Сведения о продуктивных показателях молочного стада

Наименование предприятия, район	Объем совокупной выборки, голов	Общее поголовье		Продуктивность		
		всего	в т. ч. коров	среднегодовой удой, кг	содержание в молоке, %	
					жира	белка
Холмогорская порода						
АО «Путь Ильича», Завьяловский	80	2027	794	6300	3,72	3,02
СПК «Чутырский», Игринский	87	2226	845	7560	3,71	3,09
Черно-пестрая порода						
АО «Учхоз «Июльское», Ижевская ГСХА	88	2500	860	6600	4,10	3,08
СПК (колхоз) «Удмуртия», Вавожский	195	5785	1910	7424	3,94	3,19

На основе исходных данных проведен расчет селекционно-генетических параметров показателей экстерьера (1) и продуктивности коров (2) в исследуемой популяции. Между всеми показателями оценки экстерьера, типа телосложения и молочной продуктивности животных была определена взаимосвязь путем расчета коэффициента корреляции. Основные данные по происхождению молочной продуктивности животных были взяты из форм зоотехнического и племенного учета, а также из электронной базы «СЕЛЭКС». Все опытное поголовье коров находилось в оптимальных условиях кормления и содержания в соответствии с основными зоотехническими и зооигиеническими требованиями. Обработка экспериментальных данных проводилась по методике вариационной статистики [14] с помощью программы математического моделирования MATLAB.

Результаты исследований. В совершенствовании продуктивных качеств животных большое значение имеет выявление особей желательного типа телосложения. При этом важная роль придается экстерьеру. Экстерьерный тип как внешнее выражение конституции животного следует рассматривать во всей сложности его взаимосвязи с продуктивными качествами, комплексно, с позиции целостности организма [15]. В России широкое распространение получил молочный скот черно-пестрой породы (более 55 % от общей численности крупного рогатого скота), при разведении которого специалисты уделяют повышенное внимание увеличению молочной продуктивности животных, способности их к раздоя и эффективной оплате корма продукцией.

Характеристика экстерьерно-конституциональных особенностей животных черно-пестрой и холмогорской популяций крупного рогатого скота, разводимого в Удмуртской республике

(таблица 2), показала, что путем селекционно-племенной работы специалистами получены животные с определенными экстерьерными признаками и телосложением, которые обладают отличительными особенностями в стадах молочных коров. Коровы АО «Учхоз «Июльское» Ижевской ГСХА характеризуются более компактным телосложением с хорошо развитой грудной и тазовой областями по сравнению с молочным стадом СПК (колхоз) «Удмуртия». Они превосходили по величине таких промеров, как полуобхват груди (на 2,8 %, $P < 0,05$) и полуобхват тазобедренной области (на 1,2 %), уступая по прямой длине туловища (на 2,5 %, $P < 0,01$) при незначительной разнице в высоте в холке (на 0,7 %). В популяции холмогорской породы более компактные животные выявлены в молочном стаде АО «Путь Ильича». Исследуемые поголовья АО «Путь Ильича» по сравнению с СПК «Чутырский» превосходили последние по величине полуобхвата тазобедренной области (на 1,2 %), имея достоверно ($P < 0,05$) меньшую величину прямой длины туловища (на 1,7 %).

Разработанная нами формула позволила провести комплексную оценку экстерьера в числовом выражении. Средний экстерьерный индекс типа телосложения в изучаемой выборке коров является величиной относительно постоянной и варьируется между молочными стадами в пределах 1,7 %.

Селекционно-генетические параметры признаков молочной продуктивности представлены в таблице 3.

Исследования молочной продуктивности в совокупной выборке показали, что в популяции черно-пестрой породы достоверно ($P < 0,001$) более высокий (на 19,8 %) удой за 305 дней лактации и продуктивный индекс (на 19,2 %) был у коров СПК (колхоз) «Удмуртия» при незначи-

тельной разнице по среднему содержанию жира и белка в молоке. В популяции холмогорской породы достоверно ($P < 0,01$) более высокий удой (на 14,9 %) и продуктивный индекс (на 14,6 %) выявлен у коров в стаде СПК «Чутырский». При этом следует отметить, что резуль-

таты оценки качественных показателей молока показали высокое содержание жира (на 0,06 %; $P < 0,05$) и низкое содержание белка (на 0,04 %; $P < 0,01$) в молоке коров АО «Путь Ильича» по сравнению с содержанием жира и белка в молоке коров СПК «Чутырский».

Таблица 2 Селекционно-генетические параметры признаков телосложения молочных коров

Наименование предприятия	Показатель	$\bar{x} \pm \Delta\bar{x}$	Lim (min–max)	Cv, %
Холмогорская порода				
АО «Путь Ильича» Завьяловский район	Высота в холке, см	141,30 ± 0,56	(131–152)	3,04
	Прямая длина туловища, см	166,00 ± 0,76	(155–176)	3,49
	Полуобхват груди, см	102,409 ± 0,57	(92–110,5)	4,21
	Полуобхват тазобедренной области, см	109,70 ± 0,41	(101–117)	2,88
	Обхват пясти, см	20,60 ± 0,11	(19–20)	3,94
	Индекс телосложения	0,780 ± 0,002	(0,750–0,822)	2,16
СПК «Чутырский» Игринский район	Высота в холке, см	141,50 ± 0,50	(132–153)	2,50
	Прямая длина туловища, см	168,80 ± 0,80	(154–179)	3,30
	Полуобхват груди, см	102,30 ± 0,54	(91–110)	3,72
	Полуобхват тазобедренной области, см	108,40 ± 0,43	(103–117)	2,70
	Обхват пясти, см	20,70 ± 0,10	(19–22)	3,41
	Индекс телосложения	0,782 ± 0,003	(0,727–0,820)	2,41
Черно-пестрая порода				
АО «Учхоз «Июльское» Ижевской ГСХА	Высота в холке, см	141,30 ± 0,75	(130–149)	3,22
	Прямая длина туловища, см	161,40 ± 1,22*	(145,5–179,5)	4,60
	Полуобхват груди, см	107,30 ± 0,77**	(98–117)	4,38
	Полуобхват тазобедренной области, см	110,50 ± 0,58	(103–120)	3,18
	Обхват пясти, см	20,50 ± 0,13	(19–22)	3,84
	Индекс телосложения	0,783 ± 0,005	(0,731–0,858)	3,61
СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожский район	Высота в холке, см	139,30 ± 0,77	(132–146)	2,82
	Прямая длина туловища, см	165,50 ± 1,10	(152–175)	3,40
	Полуобхват груди, см	104,30 ± 0,74	(97–114)	3,63
	Полуобхват тазобедренной области, см	109,20 ± 0,93	(100–120)	2,85
	Обхват пясти, см	20,70 ± 0,12	(20–22)	3,04
	Индекс телосложения	0,792 ± 0,004	(0,766–0,847)	2,33

* $P < 0,05$; ** $P < 0,01$.

По признакам телосложения молочные коровы имеют относительно не высокую изменчивость. Установлено, что наименее изменчивы такие признаки, как рост животного (2,50–3,22 %) и полуобхват тазобедренной области (2,70–3,18 %). Максимальной изменчивостью отличались длина животного (3,30–4,60 %) и полуобхват груди (3,63–4,38 %). По показателям, характеризующим молочную продуктивность, высоким уровнем изменчивости характеризуются удой за 305 дней лактации (15,83–17,78 %) и продуктивный индекс (15,72–17,74 %). По этим признакам возможен более успешный отбор, чем по признакам с низким коэффициентом изменчивости.

Признаки экстерьера и продуктивности молочного скота характеризуются определенной взаимосвязью между собой (таблица 4). Многие признаки положительно или отрицательно связаны друг с другом. При этом взаимосвязь между признаками может быть сильной или слабой.

Между основными промерами, характеризующими экстерьерные особенности животных, выявлена положительная и довольно сильная связь в следующих величинах: «высота в холке – полуобхват тазобедренной области» – 0,47; «высота в холке – полуобхват груди» – 0,32. При этом слабая связь выявлена между высотой в холке и прямой длиной туловища (0,21), прямой длиной туловища и полуобхватом груди (0,14),

прямой длиной туловища и полуобхватом тазобедренной области (0,22).

Выявлена положительная взаимосвязь между экстерьерным индексом телосложения и промерами, характеризующими степень развития корпуса животного (прямая длина туло-

вища, полуобхват груди, полуобхват тазобедренной области), которая варьировалась в пределах от 0,03 до 0,27. Логичной является сильная отрицательная связь ($r = -0,56$) между экстерьерным индексом телосложения и ростом животного.

Таблица 3 Селекционно-генетические параметры признаков молочной продуктивности коров

Предприятие, район	Показатель	$\bar{x} \pm \Delta\bar{x}$	Lim (min–max)	Cv, %
Холмогорская порода				
АО «Путь Ильича» Завьяловский район	Удой за лактацию, кг	6925,90 $\pm$ 164,80**	(4617–11707)	15,83
	Содержание жира в молоке, %	3,81 $\pm$ 0,02*	(3,27–4,58)	4,68
	Содержание белка в молоке, %	3,11 $\pm$ 0,01**	(2,97–3,32)	2,50
	Продуктивный индекс, кг	7488,60 $\pm$ 176,70**	(5992,10–12457,00)	15,72
СПК «Чутырский» Игринский район	Удой за лактацию, кг	7959,60 $\pm$ 176,83	(5820–10736)	17,78
	Содержание жира в молоке, %	3,75 $\pm$ 0,03	(3,13–4,53)	5,99
	Содержание белка в молоке, %	3,15 $\pm$ 0,01	(3–3,32)	2,19
	Продуктивный индекс, кг	8584,90 $\pm$ 182,70	(6566,10–11306,40)	17,08
Черно-пестрая порода				
АО «Учхоз «Июльское» Ижевской ГСХА	Удой за лактацию, кг	6563,80 $\pm$ 161,50***	(5073–8597)	16,20
	Содержание жира в молоке, %	4,28 $\pm$ 0,07	(3,44–5,26)	9,63
	Содержание белка в молоке, %	3,16 $\pm$ 0,02	(2,87–3,34)	3,22
	Продуктивный индекс, кг	7630,40 $\pm$ 204,80***	(5383,70–9847,70)	17,68
СПК (колхоз) «Удмуртия» Вавожский район	Удой за лактацию, кг	7864,20 $\pm$ 282,10	(5129–11289)	17,78
	Содержание жира в молоке, %	4,24 $\pm$ 0,07	(3,53–4,85)	8,52
	Содержание белка в молоке, %	3,16 $\pm$ 0,02	(2,80–3,29)	3,57
	Продуктивный индекс, кг	9093,00 $\pm$ 324,00	(5804,50–12806,00)	17,74

* $P < 0,05$; ** $P < 0,01$; *** $P < 0,001$.

Таблица 4 Взаимосвязь показателей экстерьера и молочной продуктивности

Показатель*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1,00	0,21	0,32	0,47	0,45	–0,56	–0,07	–0,08	–0,09	–0,11
2	0,21	1,00	0,14	0,22	0,31	0,27	0,08	–0,21	–0,08	0,02
3	0,32	0,14	1,00	0,29	0,31	0,24	–0,04	0,24	0,04	0,02
4	0,47	0,22	0,29	1,00	0,30	0,03	–0,01	–0,19	0,11	–0,06
5	0,45	0,31	0,31	0,30	1,00	0,39	0,06	–0,01	–0,06	0,06
6	–0,56	0,27	0,24	0,03	0,39	1,00	0,13	0,07	0,08	0,16
7	–0,07	0,08	–0,04	–0,01	0,06	0,13	1,00	–0,18	–0,06	0,97
8	–0,08	–0,21	0,24	–0,19	–0,01	0,07	–0,18	1,00	–0,11	0,07
9	–0,09	–0,08	0,04	0,11	–0,06	0,08	–0,06	–0,11	1,00	–0,03
10	–0,11	0,02	0,02	–0,06	0,06	0,16	0,97	0,07	–0,03	1,00

* 1 – высота в холке; 2 – прямая длина туловища; 3 – полуобхват груди; 4 – полуобхват тазобедренной области; 5 – обхват пясти; 6 – индекс телосложения; 7 – удой за лактацию; 8 – содержание жира в молоке; 9 – содержание белка в молоке; 10 – продуктивный индекс.

В таблице 4 приведена величина связи между удоём и МДЖ, между удоём и МДБ, между процентом жира и процентом белка в молоке, а также связи между удоём и продуктивным индексом, между удоём и экстерьерным индексом телосложения. Установлено, что в целом по подконтрольному поголовью связь между

удоем и качественным составом молока была отрицательной ($r = -0,18$ и $-0,06$ соответственно). Содержание жира и белка связано слабой отрицательной корреляцией ($r = -0,11$). На продуктивный индекс сильное ($r = 0,97$) положительное влияние оказывает удой коров при отсутствии взаимосвязи с МДЖ и МДБ в молоке.

Связь между удоем, качественными показателями молока и экстерьерными признаками была слабой или вообще отсутствовала (r от $-0,21$ до $+0,24$). В то же время следует отметить слабую ($r = +0,16$) положительную корреляционную связь между экстерьерным индексом телосложения и продуктивным индексом.

Исследованиями установлено, что сила влияния фактора «среда» на удой и продуктивный

индекс имеет среднюю величину и составляет 28,6 % и 26,3 % при относительно низком влиянии на МДЖ и МДБ в молоке – 4,1 % и 5,8 % соответственно. На экстерьерный индекс типа телосложения среда оказывает незначительное влияние и величина его составляет 10 %, что является свидетельством в большей степени наследственной обусловленности формирования признаков телосложения (таблица 5).

Таблица 5 Однофакторный дисперсионный анализ результатов исследований

Результативный признак	Показатель силы влияния фактора «среда», η_x^2	Доверительные границы показателя силы влияния η_x^2	Достоверность Р
Индекс типа телосложения	$0,100 \pm 0,016$	(0,055–0,143)	0,01
Удой за лактацию	$0,286 \pm 0,010$	(0,251–0,321)	0,01
Жир	$0,041 \pm 0,011$	(0,019–0,063)	0,01
Белок	$0,058 \pm 0,017$	(0,021–0,095)	0,05
Продуктивный индекс	$0,263 \pm 0,013$	(0,227–0,300)	0,01

Таким образом, меняющиеся быстрыми темпами технологии в области молочного скотоводства и формирование генетического разнообразия признаков вынуждают специалистов выбирать новые более современные методы совершенствования и ускорения селекционных и технологических процессов. Результатами исследований установлено, что в настоящее время путем целенаправленной селекции сформированы

популяции молочного скота со схожими экстерьерными характеристиками и с признаками молочного типа телосложения. Выявленная взаимосвязь между экстерьерными и продуктивными признаками молочного скота, а также правильное применение результатов оценки будет способствовать повышению удоев коров и качественных показателей молока.

Библиографический список

1. Мартынова, Е.Н. Химический состав молока в зависимости от генотипа животного [Текст] / Е.Н. Мартынова, С.Д. Батанов // Аграрная наука. 2004. № 9. С. 24.
2. Арзуманян, Е.А. Основы экстерьера крупного рогатого скота [Текст] / Е.А. Арзуманян. М.: Сельхозиздат, 1957. 305 с.
3. Brade W., Brade E. The stature of Holstein cows – a critical review. Tieraerztliche Umschau. 2017. № 73 (3). С. 74–84.
4. Батанов, С. Влияние происхождения коров на продолжительность хозяйственного использования [Текст] / С. Батанов, Г. Березкина, Е. Шкарупа // Молочное и мясное скотоводство. 2012. № 3. С. 19–21.
5. Бабайлова, Г.П. Молочная продуктивность и пожизненный удой коров черно-пестрой породы разных типов телосложения [Текст] / Г.П. Бабайлова, Т.И. Березина // Зоотехния. 2014. № 2. С. 15–17.
6. Brade W. Body size of Holstein cows – A critical analysis from the point of view of breeding and animal welfare. Berichteueber Lanwirtschaft. 2017. № 95 (3).
7. Харитонов, С.Н. Совершенствование системы оценки молочного скота по комплексу экстерьерных показателей [Текст] / С.Н. Харитонов, И.Н. Янчуков, А.Н. Ермилов // Известия ТСХА. 2011. № 4. С. 103–113.
8. Батанов, С.Д. Молочная продуктивность первотелок разной стрессоустойчивости [Текст] / С.Д. Батанов, О.С. Старостина // Зоотехния. 2005. № 2. С. 18–19.
9. Лефлер, Т.Ф. Характеристика экстерьера методом промеров и индексов телосложения [Текст] / Т.Ф. Лефлер, В.В. Багаев // Вестник КрасГАУ. 2014. № 9. С. 142–146.
10. Суллер, И.Л. Селекция крупного рогатого скота молочных пород [Текст] / И.Л. Суллер. СПб.: Проспект науки, 2012. 139 с.
11. Контэ, А.Ф. Изменчивость селекционно-генетических параметров линейной оценки типа телосложения дочерей быков популяции голшти-низированного черно-пестрого скота [Текст] / А.Ф. Контэ, С.Н. Харитонов, А.А. Сермягин и др. // Молочное и мясное скотоводство. 2017. № 8. С. 3–9.

12. Шаталов, С.В. Экстерьер высокоинтенсивного молочного скота [Текст] / С.В. Шаталов, В.С. Шаталов, В.К. Томилин и др. // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2013. № 91. С. 1238–1248.

13. Зубриянов, В.Ф. Экстерьер и продуктивность черно-пестрого скота поволжского типа [Текст] / В.Ф. Зубриянов, В.В. Ляшенко, И.М. Морозов // Зоотехния. 2001. № 4. С.4–6.

14. Плохинский, Н.А. Биометрия [Текст] / Н.А. Плохинский. М.: Издательство московского университета, 1970. 369 с.

15. Прожерин, В.П. Линейная оценка экстерьера коров холмогорской породы [Текст] / В.П. Прожерин, Б.П. Завертяев, В.Л. Ялуга, Ю.М. Мохнаткина // Зоотехния. 2008. № 12. С. 3–4.

Сведения об авторах

1. **Батанов Степан Дмитриевич**, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой технологии переработки продукции животноводства, проректор по дополнительному образованию, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, Ижевск, ул. Студенческая, 11, тел.: 8 (3412) 58-64-11, e-mail: stepanbatanov@mail.ru.

2. **Баранова Ирина Андреевна**, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры автоматизированного электропривода, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, Ижевск, ул. Студенческая, 11, e-mail: zykina_i@mail.ru.

3. **Старостина Ольга Степановна**, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры технологии переработки продукции животноводства, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, Ижевск, ул. Студенческая, 11, e-mail: starostina636@yandex.ru.

Создание высокопродуктивных стад скота молочного направления продуктивности, характеризующихся хорошим здоровьем и длительным сроком эксплуатации, невозможно без систематической оценки животных по экстерьеру и типу телосложения. Целью наших исследований явилось изучение особенностей телосложения коров черно-пестрой и холмогорской пород, определение селекционно-генетических параметров и взаимосвязи экстерьерных показателей с молочной продуктивностью, а также расчет силы влияния внешних факторов на формирование изучаемых биологических особенностей подконтрольного поголовья. Научные исследования проводились в 2016–2018 гг. на коровах черно-пестрой и холмогорской пород. На основе исходных данных проведен расчет селекционно-генетических параметров показателей экстерьера и продуктивности коров в исследуемой популяции. Между всеми показателями оценки экстерьера, типа телосложения и молочной продуктивности животных была определена взаимосвязь путем расчета коэффициента корреляции. Результаты исследований показывают, что по признакам телосложения молочные коровы имеют относительно невысокую изменчивость. Установлено, что наименее изменчивы такие признаки, как рост животного (2,50–3,22 %) и полуобхват тазобедренной области (2,70–3,18 %). Максимальной изменчивостью отлича-

лись длина животного (3,30–4,60 %) и полуобхват груди (3,63–4,38 %). По показателям, характеризующим молочную продуктивность, высоким уровнем изменчивости характеризуются удой за 305 дней лактации (15,83–17,78 %) и продуктивный индекс (15,72–17,74 %). Связь между удоем, качественными показателями молока и экстерьерными признаками была слабой или вообще отсутствовала (r от $-0,21$ до $+0,24$). В то же время следует отметить слабую ($r = +0,16$) положительную корреляционную связь между экстерьерным индексом телосложения и продуктивным индексом. Исследованиями установлено, что сила влияния фактора «среда» на удой и продуктивный индекс имеет среднюю величину и составляет 28,6 % и 26,3 % при относительно низком влиянии на массовую долю жира и белка в молоке – 4,1 % и 5,8 % соответственно. На экстерьерный индекс типа телосложения среда оказывает незначительное влияние и величина его составляет 10 %, что является свидетельством в большей степени наследственной обусловленности формирования признаков телосложения. Следовательно, внедрение в практику молочного скота современных методов оценки коров по экстерьерному типу позволит выявить и отобрать животных желательного молочного типа и повысить эффективность селекции.

PREDICTION MODEL FOR MILK PRODUCTION OF COWS BY THEIR EXTERIOR FEATURES

Key words: cow body type index; exterior; selection and genetic parameters; milk production of cows.

Authors' personal details

1. **Batanov Stepan**, Doctor of agricultural sciences, professor, Head of the «Technology of Livestock Products Processing» department, Vice-rector for additional education, Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, Studencheskaya street, 11, phone: 8 (3412) 58-64-11, e-mail: stepanbatanov@mail.ru.

2. **Baranova Irina**, Candidate of physical and mathematical sciences, associate professor of the «Automated Electric Drive» department, Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, Studencheskaya street, 11, e-mail: zykina_i@mail.ru.

3. **Starostina Olga**, Candidate of agricultural sciences, associate professor of the «Technology of Livestock Products Processing» department, Izhevsk State Agricultural Department Academy, Izhevsk, Studencheskaya street, 11, e-mail: starostina636@yandex.ru.

To develop high-yield dairy cattle characterized by good health and long production cycle is impossible without a regular assessment of exterior characteristics and body type of animals. In our research we aimed to study specific constitution features of cows of the black-and-white and Kholmogory breeds, identify selection and genetic parameters and correlation between exterior parameters and milk production, as well as estimate the influence of external factors on biological features of the studied livestock. The research was conducted on the cows of the black-and-white and Kholmogory breeds in 2016–2018. The initial data was used to calculate the selection and genetic parameters of exterior and production activity of dairy cows in the studied population. By calculating the correlation index, we identified the correlation between all assessment parameters of exterior, body type and milk production ability of cows. The study results reveal relatively low variability of body types among dairy cows. It is found that such features as the cow height (2,50–3,22 %) and the hip width (2,70–3,18 %) are the least variable parameters. The maximum variable

parameters are body length (3,30–4,60 %) and chest girth (3,63–4,38 %). Among parameters characterizing the milk production, a high level of variability is shown by the milk yield per 305 days of lactation (15,83–17,78 %) and the yield index (15,72–17,74 %). The correlation between the milk yield, milk quality and exterior features was either weak or there was no correlation at all (r from $-0,21$ to $+0,24$). At the same time, it is important to note a weak ($r = +0,16$) positive correlation between the exterior index of body and the yield index. The research finds that the influence of the environmental factor on the milk yield and the yield index is mean and amounts to 28,6 % and 26,3 % with a relatively low influence on the mass fraction of fat and protein in milk – 4,1 % and 5,8 %, respectively. The environment has low influence (10 %) on the exterior index of body type. It proves that body development mostly depends on heredity. Thus, modern methods to assess dairy cows by their exterior type will make it possible to identify and select the cattle of the desired dairy type and improve selection efficiency.

© Батанов С.Д., Баранова И.А., Старостина О.С.

УДК 638. 144.52

DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-62-70

Г.С. Мишуковская, М.Г. Гиниятуллин, Т.Н. Кузнецова,
Е.А. Смольникова, А.И. Науразбаева, Ш.Ш. Гиниятуллин

РЕЗУЛЬТАТЫ САДКОВЫХ ОПЫТОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОБИОТИКОВ В ПОДКОРМКЕ ПЧЕЛ

Ключевые слова: пчелиные семьи; пробиотик; кормовая добавка; динамика гибели пчел; садковые опыты.

Введение. Поддержание пчелиных семей в здоровом состоянии в течение всего года является одной из главных задач практического пчеловодства. Множество факторов оказывают негативное влияние на здоровье пчел: состояние окружающей среды, недостаточное или несбалансированное кормление, заболевания различной этиологии. Ужесточение требований к качеству продукции пчеловодства, ее экологической чистоте ограничивает возможность использования различных химиотерапевтических средств для профилактики болезней пчел. В качестве альтернативы рассматривается возможность использования микробиологических препаратов на основе нормальной микрофлоры кишечника пчел для стимуляции иммунной системы. Использование пробиотиков в кормлении животных способствует развитию полезной микрофлоры, заселяющей желудочно-кишечный тракт, нормализации процессов переваривания и всасывания пищи. Микроорганизмы, входящие в состав пробиотиков, осуществляют синтез аминокислот, витаминов В, С, Д, Е, К, бактериоцинов, подавляющих развитие патогенов, участвуют в обезвреживании токсинов [6, 8]. В ветеринарии пробиотики используют для коррекции микробоценоза кишечника после антибиотико- и химиотерапии, для стимуляции неспецифического иммунитета, профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний [3, 9]. Большинство пробиотиков созданы на основе молочнокислых и бифидобактерий, входящих в состав нормальной микрофлоры кишечника, и считаются экологически безвредными. Определенный интерес представляют и микробиологические препараты на основе спорообразующих бактерий, которые также обладают пробиотической активностью [5, 7]. И прежде всего это бактерии рода *Bacillus*, который объединяет группу строго аэробных или факультативно анаэробных грамположительных микроорганизмов, образующих термоустойчивые эндоспоры. *Bacillus* spp. обладают высокой кислотоустойчивостью, более устойчивы к действию высоких и низких температур [11]. Они проявляют иммуномодулирующие и антиоксидантные свойства и также обладают антогонистической активностью по отношению к патогенным микроорганизмам [12].

В настоящее время пробиотические препараты находят применение и в практике пчеловодства. Так, Jay D. Evans and Dawn L. Lopez [13] обнаружили высокий уровень иРНК двух антибактериальных липидов при скормливания личинкам пчел как спор *Paenibacillus larvae larvae*,

так и смеси непатогенных бактерий, и предположили, что данные смеси можно использовать в качестве пробиотиков для повышения иммунитета медоносных пчел на стадии личинки и более поздних стадиях развития [13].

Wu M. et al. выявили ингибирующую активность одного из штаммов рода *Bacillus* против *Melissococcus plutonius* – возбудителя европейского гнильца [17]. Ряд штаммов *Bacillus subtilis* проявляют подобную активность в отношении *Ascosphaera apis* – возбудителя аскосфероза пчел [14]. Применение пробиотиков ветом-1,1 и ветом-3 для обработки пчел методами скормливания и орошения также способствует снижению степени поражения расплода возбудителем аскосфероза и не оказывает отрицательного влияния на физиологическое состояние пчелиных семей [1]. Выявлено снижение смертности при нозематозе под действием пробиотиков, содержащих *Saccharomyces cerevisiae* var. *boulardii* и *Pediococcus acidilactici* на 20–40 % при использовании их как в профилактических, так и в лечебных целях [16]. В то же время в исследованиях Andrearczyk S. et al. [10] скормливание пробиотиков, содержащих лактобактерии и дрожжи, семьям пчел, пораженных нозематозом, привело к повышению уровня смертности по сравнению с контролем (чистый сахарный сироп). Авторы связывают этот факт со снижением pH в кишечнике пчел под действием пробиотиков, что благоприятствует развитию *Nosema* spp. Есть данные и о положительном влиянии пробиотиков на хозяйственно полезные признаки пчелиных семей [2]. При комплексном использовании пробиотиков (молочная и уксусная кислоты) и пробиотиков (*Enterobiotics* or *Enterolactis* Plus) отмечен значительный рост количества печатного расплода в пчелиных семьях по сравнению с контрольными группами, увеличение силы семей и медопродуктивности. Рост прироста от реализации продукции при этом составил от 14,22 до 45,97 % [15]. Таким образом, не вызывает сомнений стимулирующий эффект бактериальных препаратов, используемых в пчеловодстве. Тем не менее поиски оптимального состава пробиотиков, выделение новых штаммов, обладающих антогонистической активностью против возбудителей бактериальных и вирусных инфекций пчел, высокой инвертазной активностью, способствующих лучшей сохранности пчелиных семей в условиях континентального климата Республики Башкортостан с длительными холодными зимами, является актуальной проблемой современного пчеловодства.

Имеются данные о том, что включение в рацион гуминовой пищевой добавки способствует росту продуктивности сельскохозяйственных животных [4]. В настоящее время нет сведений об использовании гуминовых кислот в практике пчеловодства. Однако положительный эффект, который они оказывают на позвоночных животных, позволяет предположить возможность использования их и в этой отрасли.

Цель и задачи исследований. Целью работы являлось изучение влияния новых пробиотических препаратов, разработанных ООО НВП «БашИнком», и гуминовых кислот на динамику гибели рабочих пчел в садковых опытах.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: выявить влияние пробиотических кормовых добавок на динамику гибели и продолжительность жизни рабочих пчел в сад-

ковых опытах; изучить влияние пробиотиков на микробиоценоз кишечника пчел.

Материалы и методы исследования. Исследования проведены в лаборатории пчеловодства ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ. Изучено влияние кормовых добавок на основе пробиотиков на сохранность пчел в садках. Садки заселяли пчелами 1–3 суточного возраста (по 50 шт. в каждом). Одновозрастных пчел получали с помощью сетчатого изолятора. Садки делили на 5 групп по 3 садка в каждой. Пчелы контрольной группы в качестве подкормки получали 50 %-ный сахарный сироп, пчелы опытных групп – сироп с пробиотическими кормовыми добавками в дозе 2 мл на 1 л сиропа: опытная 1 – СпасиПчел, опытная 2 – Нормосил 1, опытная 3 – ПчелоНормоСил, опытная 4 – Сахаромицеты.

Рисунок 1
Динамика гибели пчел в садках (1 серия опытов)

Результаты исследования, их обсуждение. На 2-е сутки эксперимента, как показали результаты исследований, началась гибель пчел в контроле, где пчелы получали чистый сахарный сироп, а также в 1-й и 2-й группах. В последующие дни в этих группах количество погибших пчел возросло (рисунок 1).

Однако динамика гибели пчел в группах неодинакова. В контроле резкий отход пчел регистрировали на 8-е сутки эксперимента, гибель

73 % пчел – на 12-е сутки. В 1-й и 2-й опытных группах также отмечена значительная гибель пчел на 8-е сутки, однако в последующие дни этот процесс замедлился, и отход 60–70 % пчел отмечен на 15-е и 16-е сутки опыта соответственно. В 4-й опытной группе регистрировали два пика гибели пчел в садках: на 15-е и 18-е сутки. В этой группе отход более 60 % пчел наблюдали на 20-е сутки эксперимента. Лучшие результаты по выживаемости пчел в садковых

опытах получены в 3-й опытной группе, где подкормку проводили сахарным сиропом с использованием кормовой добавки ПчелоНормоСил. Первые погибшие пчелы здесь отмечены на 5-е сутки после начала подкормки. В данной группе не выявлено резких пиков гибели пчел, отход происходил постепенно и завершился на 23-е сутки эксперимента.

По завершении эксперимента определяли среднюю продолжительность жизни пчел в сад-

ках. В контрольной группе она составила 9,1 суток после начала подкормки. В опытных группах этот показатель достоверно превышал контрольное значение. В 1-й и 2-й группах он превышал контроль в 1,4 раза ($P \geq 0,005$), в 4-й группе – в 1,7 раз ($P \geq 0,001$). Наибольшая продолжительность жизни рабочих пчел в садковых опытах зарегистрирована в 3-й опытной группе, где она была в 2,1 раза выше, чем в контроле (рисунок 2).

Рисунок 2
Продолжительность жизни рабочих пчел в садках

Рисунок 3
Расход корма на 1 пчелу в сутки

Достоверных различий в расходе воды в группах не выявлено. В опытных группах зарегистрирован больший расход корма, чем в контроле (рисунок 3). Во 2-й опытной группе различия с контролем были недостоверны. Однако в 1-й опытной группе этот показатель превышал контрольное значение в 1,4, в 4-й – в 1,6 раза ($P \geq 0,05$). Максимальное потребление корма (в 2 раза выше, чем в контроле) зарегистрировано в 3-й опытной группе. Пчелы охотно потребляют сахарный сироп с изучаемыми добавками.

Во второй серии садковых опытов изучали влияние на организм пчел следующей группы

пробиотиков, а также гуминовых препаратов и экстракта полыни. Пчелы контрольной группы в качестве подкормки получали 50 %-ный сахарный сироп. Эта группа служила контролем. Пчелам опытных групп скармливали сироп с кормовыми добавками: опытная 1 – *Pseudomonas*, опытная 2 – *Bacillus thuringiensis*, опытная 3 – Апиврач, опытная 4 – экстракт полыни, опытная 5 – раствор Гуми 2,5 %, опытная 6 – раствор Гуми 5 %, опытная 7 – раствор Гуми 10 %. Как показали результаты исследований, в контрольной группе выявлено два пика гибели пчел: на 3-и и на 11-е сутки эксперимента (рисунок 4). Отход пчел продолжался до 14-х суток.

Рисунок 4
Динамика гибели пчел в садковых опытах (2 серия опытов)

При использовании в подкормке бактерий *Pseudomonas* и *Bac.thuringiensis* массовая гибель пчел началась уже на 7-е сутки после подкормки, и к 12-м суткам отход был уже завершен. При добавлении в сахарный сироп экстракта полыни достоверных различий с контрольной группой не выявлено, однако в этой группе массовая гибель началась позже – на 11-е сутки эксперимента. В садках, где в подкормку добавляли три штамма *Bacillus subtilis* (Апиврач), отход пчел происходил постепенно без резких пиков и завершился позже, чем в контроле и других опытных группах. Наибольшая продолжительность жизни пчел в садковых опытах выявлена при добавлении в сахарный сироп культур кормовой добавки Апиврач и экстракта полыни (рисунок 5). В

этих группах она составила 12,6 и 12,4 суток соответственно, что на 17 и 15 % больше, чем в контроле. В 3-й опытной группе (Апиврач) различия с контролем носят достоверный характер ($P \geq 0,05$).

При подкормке пчел сахарным сиропом с добавлением гуминового препарата в различной концентрации продолжительность жизни пчел была ниже контрольных значений: при концентрации 2,5 % – на 2,7 суток, 5 % – на 5,4 сут. При концентрации 10 % на третьи сутки эксперимента наблюдали гибель 100 % пчел в садках. Причем в первых двух группах корм пчелы использовали очень неохотно, в третьей группе – не брали совсем.

Достоверных различий в расходе корма и воды в группах не выявлено.

Таким образом, анализ полученных результатов показал, что использование в подкормке пчел культур кормовой добавки АпиВрач и экстракта полыни способствует стимуляции процессов жизнедеятельности в организме медоносных пчел и увеличению общей продолжительности жизни; бактерий *Pseudomonas* – не оказывает влияния на показатель продолжительности жизни пчел; бактерий *Bac. thuringiensis* – приводит к незначительному сокращению продолжительности жизни рабочих пчел; препаратов гуми в концентрациях 2,5–10 % – оказывает токсическое действие на пчел и приводит к гибели (в концентрации 10 %) либо заметному сокращению продолжительности жизни рабочих пчел (в концентрации 2,5–5 %).

В ходе проведения садковых опытов изучали влияние кормовых добавок на микробиоценоз кишечника пчел. В микрофлоре изолированного кишечника были выявлены бифидо- и лактобактерии, энтерококки, эшерихии, дрожжеподобные грибы. На фоне препарата СпасиПчел отмечено увеличение бацилл в кишечнике до 10^6 степени. В контроле содержалось от 0 до 10^4 .

Молочнокислые бактерии в пределах контроля – 10^6 и 10^4 . Отмечается снижение содержания кишечной палочки с 10^8 в контроле до 10^3 и переход из лактозонегативной (патогенной) формы в лактозопозитивную (непатогенную) форму. После применения препарата ПчелоНормоСил наблюдается рост количества молочнокислых бактерий с 10^5 до 10^6 , снижение энтеробактерий. Одновременно отмечалось уменьшение концентрации кишечной палочки с 10^8 до 10^5 и переход ее из лактозонегативной формы в лактозопозитивную форму. Полынь не оказывает влияние на микробиоценоз кишечника. Варианты с Гуми негативно сказываются на микробиоценозе кишечника. Кишечная палочка находится в лактозонегативной форме. Наблюдается отсутствие лактобактерий и присутствие дрожжей. Кишечники по морфологии темные, рвутся, плохо достаются из тела пчелы. *Bacillus thuringiensis* и *Pseudomonas* не оказывают положительной динамики на микробиоценоз кишечника. Кишечная палочка содержится в 1×10^8 и 1×10^9 степени, в лактозонегативной форме. Высокое содержание энтеробактерий $2,7 \times 10^8$ и $3,0 \times 10^4$. Высокая степень $5,9 \times 10^6$ дрожжей.

Рисунок 5
Продолжительность жизни пчел в садках (2 серия опытов)

Выводы. В ходе проведенных исследований выявлено положительное влияние кормовых добавок СпасиПчел, ПчелоНормоСил и АпиВрач на динамику гибели рабочих пчел в садковых опытах. Включение их в состав подкормки способствовало достоверному увеличению продол-

жительности жизни пчел. При использовании этих пробиотиков отмечался рост молочнокислых и бифидобактерий в кишечнике пчел, снижение количества кишечной палочки и переход ее из лактозонегативной в лактозопозитивную (непатогенную) форму.

Библиографический список

1. Домацкая, Т.Ф. Возможность применения пробиотиков для лечения аскасфероза [Текст] / Т.Ф. Домацкая // Пчеловодство. 2016. № 1. С. 32–36.
2. Мишуковская, Г.С. Пробиотическая кормовая добавка «Ветоспорин Ж» [Текст] / Г.С. Мишуковская, Н.Р. Мурзабаев // Пчеловодство. 2014. № 7. С. 14–16.
3. Панин, А.Н. Пробиотики – неотъемлемый компонент рационального кормления животных [Текст] / А.Н. Панин, Н.И. Малик // Ветеринария. 2006. № 7. С. 21–23.
4. Перминова, И.В. Гуминовые вещества – вызов химикам XXI века [Текст] / И.В. Перминова // Химия и жизнь. 2008. № 1. С. 50.
5. Пшеничная, Е.А. Положительная роль стимулирующих подкормок [Текст] / Е.А. Пшеничная // Пчеловодство. 2010. № 2. С. 14–15.
6. Соколенко, Г.Г. Пробиотики в рациональном кормлении животных [Текст] / Г.Г. Соколенко, Б.П. Лазарев, С.В. Миньченко/ Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания. 2015. № 1 (5). С. 72–78.
7. Туктаров, В.Р. Средство для стимуляции физиологических функций у пчел и защиты их от инфекционных заболеваний [Текст]: пат. 2380406 Российская Федерация / В.Р. Туктаров, Т.Н. Кузнецова, Г.С. Мишуковская, Н.А. Уразбахтина, Р.М. Хайруллин; заявл. 08.08.2007.
8. Хазиахметов, Ф.С. Влияние пробиотика Витафорт на микробиоценозы фекалий молодняка сельскохозяйственных животных [Текст] / Ф.С. Хазиахметов, А.Ф. Хабиров, Р.Х. Авзалов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2016. № 4 (60). С. 216–219.
9. Цапалова, Г.Р. Изменение микробиоценоза кишечника и живой массы при применении пробиотиков у гусят-бройлеров [Текст] / Г.Р. Цапалова, А.Ф. Хабиров / Перспективы инновационного развития АПК. Материалы Международной научно-практической конференции. Уфа, 2014. С. 419–423.
10. Andrearczyk S. et al. (2014) Influence of a probiotic on mortality, sugar syrup ingestion and infection of honeybees with *Nosema* spp. under laboratory assessment. *Med Weter* 70:762–765.
11. Bader J., Albin A., and Stahl, U. (2012). Spore-forming bacteria and their utilisation as probiotics. *Benef. Microbes* 3, 67–75.
12. Elshaghabe F.M.F., Rokana N., Gulhane R.D., Sharma C., Panwar H. *Bacillus* As Potential Probiotics: Status, Concerns, and Future Perspectives. *Front. Microbiol.*, 10 August 2017 *Front. Microbiol.*
13. Evans JD & DL Lopez (2004) Bacterial probiotics induce an immune response in the honey bee (Hymenoptera: Apidae). *J Econ Entomol.* 97 (3):752–6.
14. Omar M.O.M., Moustafa A.M., Ansari M.J. et al. Antagonistic Effect of Gut Bacteria in the Hybrid Carniolan Honey Bee, *Apis Mellifera Carnica*, Against *Ascosphaera Apis*, the Causal Organism of Chalkbrood Disease. *Journal of Apicultural Science*. 2014. V. 58. P. 17–27.
15. Pătruică S., Mot D. (2013) Economic benefits of using prebiotic and probiotic products as supplements in stimulation feeds administered to bee colonies. *Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences*. V. 37, pp. 259–263.
16. Université Laval. Probiotics to protect bees from an infection associated with colony collapse disorder. *Science Daily*, 17 May 2018. www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180517113819.htm.
17. Wu M., Sugimura Y., Iwata K., Takaya N., et al. Inhibitory Effect of Gut Bacteria from the Japanese Honey Bee, *Apis cerana japonica*, Against *Melissococcus plutonius*, the Causal Agent of European Foulbrood Disease. *Journal of Insect Science* · July 2014, Vol. 14. Article 129.

Сведения об авторах

1. **Мишуковская Галина Сергеевна**, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии, биохимии и кормления животных, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: mishukovskaya@mail.ru.
2. **Гиниятуллин Марат Гиндуллинович**, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры пчеловодства, частной зоотехнии и разведения животных, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, 50-летия Октября, 34, e-mail: 0803marat@mail.ru.
3. **Кузнецова Татьяна Николаевна**, кандидат биологических наук, главный научный сотрудник, ООО НВП «БашИнком», г. Уфа, ул. К. Маркса, 37, корп. 1, тел.: (347) 271-53-27, e-mail: mikhail-spiridonov@yandex.ru.

4. **Смольникова Елена Алексеевна**, кандидат сельскохозяйственных наук, ст. преподаватель кафедры физиологии, биохимии и кормления животных, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: selenaa64@mail.ru.

5. **Наурызбаева Айгуль Ильдаровна**, магистрант кафедры физиологии, биохимии и кормления животных, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: naurazbaeva.aigul@mail.ru.

6. **Гиниятуллин Шайдулла Шарифуллович**, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры физиологии, биохимии и кормления животных, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, 50-летия Октября, 34, e-mail: ginufa@mail.ru.

Ужесточение требований к качеству продукции пчеловодства, ее экологической чистоте ограничивает возможность использования различных химиотерапевтических средств для профилактики болезней пчел. В качестве альтернативы рассматривается возможность использования микробиологических препаратов на основе нормальной микрофлоры кишечника пчел для стимуляции иммунной системы и повышения продуктивности пчелиных семей. Целью работы являлось изучение влияния новых пробиотических препаратов, разработанных ООО НВП «БашИнком» и гуминовых кислот на динамику гибели рабочих пчел в садковых опытах. Пчелы контрольной группы в качестве подкормки получали 50 %-ный сахарный сироп. Пчелы опытных групп – сироп с пробиотическими кормовыми добавками в дозе 2 мл на 1 л сиропа: СпасиПчел, Нормосил 1, ПчелоНормоСил, Сахаромицеты, *Pseudomonas*, *Bacillus thuringiensis*, Апиврач, экстракт полыни, а также препараты

гуминовых кислот в концентрациях 2,5; 5 и 10 %. Достоверное превышение продолжительности жизни пчел в садковых опытах выявлено при добавлении в сахарный сироп кормовых добавок СпасиПчел, Нормосил 1, ПчелоНормоСил, Сахаромицеты, АпиВрач и экстракта полыни. Максимальная продолжительность установлена в группах, получавших кормовые добавки ПчелоНормоСил и АпиВрач. Добавление препаратов гуминовых кислот в сахарный сироп в концентрациях 2,5–10 % привело к гибели пчел либо заметному сокращению продолжительности жизни. В микрофлоре изолированного кишечника пчел были выявлены бифидо- и лактобактерии, энтерококки, эшерихии, дрожжеподобные грибы. При использовании пробиотиков СпасиПчел, ПчелоНормоСил и АпиВрач в кишечнике пчел отмечается рост молочнокислых и бифидобактерий, снижение количества кишечной палочки и переход ее из лактозонегативной в лактозопозитивную (непатогенную) форму.

G. Mishukovskaya, M. Giniyatullin, T. Kuznetsova, E. Smolnikova, A. Naurzabaeva, Sh. Giniyatullin

RESULTS OF CAGE EXPERIENCES ON USE OF PROBIOTICS IN FEEDING OF BEES

Key words: *honeybee colonies; probiotics; feed additive, bee mortality; cage experiments.*

Authors' personal details

1. **Mishukovskaya Galina**, Doctor of biological sciences, professor of the Animal Physiology, Biochemistry and Feeding department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Otyabrya St., 34, e-mail: mishukovskaya@mail.ru.

2. **Giniyatullin Marat**, Doctor of biological sciences, professor of the Animal Physiology, Biochemistry and Feeding department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Otyabrya St., 34, e-mail: 0803marat@mail.ru.

3. **Kuznetsova Tatyana**, Candidate of biological sciences, chief researcher of the innovative enterprise «BashInkom», Ufa, K. Marx St., 37, Building 1, phone: (347) 271-53-27, e-mail: mikhail-spiridonov@yandex.ru.

4. **Smolnikova Elena**, Candidate of agricultural sciences, senior lecturer of the Animal Physiology, Biochemistry and Feeding department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Otyabrya St., 34, e-mail: selenaa64@mail.ru.

5. **Naurzabaeva Aygul**, Master's degree student of the Animal Physiology, Biochemistry and Feeding department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University». 450001, Ufa, 50-letiya Otyabrya St., 34, e-mail: naurazbaeva.aigul@mail.ru.

6. **Giniyatullin Shaidulla**, Doctor of Biological Sciences, Professor of the Chair of Physiology, Biochemistry and Feeding of Animals, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Otyabrya str., 34, e-mail: ginufa@mail.ru.

Tightening of requirements for beekeeping products quality and their ecological purity limits possible use of different chemotherapeutic agents to prevent bee diseases. Microbiological preparations based on the normal intestinal microflora of bees to stimulate the immune system and increase the productivity of bee colonies are considered as an alternative. The aim of the work was to study the effect of new probiotic preparations developed by scientific and innovative enterprise «BashInkom» as well as impact of humic acids on the mortality dynamics of working bees in cage experiments. The bees of the control group received a 50 % sugar syrup as a top dressing. The bees of the experimental groups got syrup with probiotic feed additives in a dose of 2 ml per 1 liter of syrup: SpasiPhel, Normosil 1, PcheloNormosil, *Saccharomyces*, *Pseudomonas*, *Bacillus thuringiensis*, ApiVrach, sagebrush extract, as well as humic acid prepara-

tions in concentration of 2,5; 5 % and 10 %. A significant increase in the lifespan of bees in cage experiments was revealed by adding SpasiPhel, Normosil 1, PcheloNormosil, *Saccharomyces*, ApiVrach and sagebrush extract to sugar syrup. The maximum lifespan is found for the groups that received the PheloNormoSil and ApiVrach feed additives. Adding humic acid preparations to sugar syrup at concentrations of 2,5–10 % resulted in the death of bees or a noticeable reduction in life expectancy. In the microflora of the isolated intestine of bees, bifidobacteria and lactobacilli, enterococci, *Escherichia*, and yeast-like fungi were detected. When using probiotics SpasiPchel, PcheloNormoSil and ApiVrach, the growth of lactic acid and bifidobacteria is observed in the intestines of bees, a decrease in the number of *E. coli* in the intestine and its transition from lactose-negative to lactose-positive (non-pathogenic) form.

© Мишуковская Г.С., Гиниятуллин М.Г., Кузнецова Т.Н.,
Смольникова Е.А., Науразбаева А.И., Гиниятуллин Ш.Ш.

УДК 598.2/9.15.57.034.5.03

DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-70-75

А.М. Мусаев

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ ЯПОНСКОГО ПЕРЕПЕЛА, ВЫРАЩЕННОГО В ЕСТЕСТВЕННЫХ РИТМАХ АКТИВНОСТИ И ПОКОЯ

Ключевые слова: *рост; развитие; ритм; оплодотворение; активность; масса; семенники; яичники; покой.*

Введение. Существуют многочисленные биоритмы, которые по длительности циклов совпадают с соответствующими геофизическими ритмами. Периодичность длины, дня и освещения на протяжении всей эволюции является наиболее точно воспроизводимым внешним сигналом времени. Суточная периодичность жизнедеятельности у животных наиболее четко выражается в смене фазы двигательной активности и относительного покоя. К внешним причинам относятся такие факторы внешней среды, которым характерна наибольшая регулярность повторения, например суточные и годовые колебания длины дня, освещенности, температуры и др. Поэтому в природных условиях

именно режим освещения, соотношение длительности дня и ночи, является важнейшим синхронизатором суточных и годовых ритмов жизнедеятельности [3]. В естественных условиях в связи с сезонными изменениями длины дня сдвигается и время суточной активности и покоя. На протяжении активной части суток интенсивность деятельности птиц обычно носит фазовый характер. Куриные птицы в период выкармливания птенцов и вождения выводков наиболее активны в утренние часы, затем их активность снижается и вновь повышается [5]. Несовпадение суточного ритма с длительностью астрономических суток открывает возможность некоторого сдвига ритмов активности в порядке

синхронизации их с естественной сменой условий в закрытых помещениях [7].

Целью исследований являлось увеличение репродуктивной активности японского перепела, выращенного в закрытых помещениях, путем применения естественного ритма активности и покоя.

Задачей исследований является изучение влияния естественного ритма активности и покоя на репродуктивную систему японских перепелов, выращенных в закрытых помещениях.

Материалы и методы исследований. Рост, развитие морфофункционального состояния яичника и семенника японских перепелок изучали в виварии биологического факультета Бакинского государственного университета. В экспериментальных и контрольных группах содержалось по 300 голов птиц. Проведено четыре цикла испытаний. Контрольные перепела содержались в разработанном световом режиме [8], состоящем из дневного – 16 часов и ночного – 8 часов. Экспериментальные группы содержались в измененной периодичности астрономических суток: первый дневной – 8 часов, первый ночной – 4 часа, второй дневной – 8 часов, второй ночной – 4 часа [6].

Периодичность светового и ночного ритма контролировалась автоматически с помощью реле времени. Как в естественных условиях, начало и конец светового режима обеспечивали плавно: рассвет и закат в помещениях имели продолжительность 30 минут. В каждой группе с увеличением возраста перепелат состав и количество корма были идентичны. Ежедневный прирост перепелат изучали, начиная с суточного возраста до начала яйценосного периода. В конце каждой недели проводили взвешивание перепелат и выявляли среднесуточный привес. Процент выживания перепелат в каждой группе был установлен с учетом количества ежедневно гибнущих перепелат.

Сравнительно изучали репродуктивные свойства (морфологические параметры семенника и яичника, половая активность, оплодотворение яиц). Вскрытие перепелов проводилось в возрасте 1; 30; 60; 90; 120; 360 суток. Выбранные возрасты характеризуют определенные этапы индивидуального развития и физиологического состояния птиц. Интенсивность копуляции в период яйцекладки у контрольных групп считали по числу спариваний в начале, в середине и в конце светлой части суток (16 час) в течение одного часа; у опытных групп – в начале, в середине и в конце двух светлых периодов в течение одного часа. У опытных и контрольных

групп после инкубации (по 300 яиц) определяли оплодотворение по числу вылупившихся перепелов.

Результаты исследований. У перепелов развитие яичника в возрасте 7–21 суток происходит в основном на клеточном уровне. В 30-суточном возрасте цвет яичника оранжевый, заметно формирование фолликулов. В центральной части яичника почти все ооциты окружены фолликулярным эпителием. Подавляющая часть фолликулов находится в периоде малого роста. В 49-суточном возрасте яичник ярко-оранжевого цвета, гроздевидный. Часть фолликулов в стадии быстрого роста. В 60-суточном возрасте – ярко-оранжевого цвета, гроздевидный. Количество быстрого роста остается одинаковым в сравнении с 49-суточным возрастом (таблица 1). В 120-суточном возрасте цвет яичника ярко-оранжевый. Имеет гроздевидную форму. Но количество роста фолликулов становится меньше. В 360-суточном возрасте масса яичника увеличивается по сравнению с 8-месячным возрастом. Яичник ярко-оранжевого цвета, гроздевидный. Количество фолликулов становится меньше. В результате проведенных исследований выявлено, что масса яичника растет за счет желточных фолликулов. Продолжается увеличение яйцевода. В 120 и 360 суток яичник сохраняет основные черты строения, характерные для половозрелых птиц. У молодых 30-дневных перепелов, еще не вступивших в стадию половой зрелости, измененный суточный ритм не вызывает увеличения веса и объема яичника. После достижения 30 суток физический рост семенников ускоряется. До начала полового созревания индивидуальная изменчивость относительного веса гонад у опытных групп составляет $1,1 \pm 0,045$, а у контрольных $1,14 \pm 0,043$. Возрастание относительного веса яичника начинается у контрольных групп в период между 37–45 днями, у опытных – между 40–49 днями. С возрастанием относительного веса у обеих групп перепелов половая зрелость выражается пением самцов и свистом самок. У 49-дневных перепелов, выращенных в применяемом световом режиме, наблюдается лучшее развитие яичника. Абсолютная масса яичника опытных групп перепелов превышала соответствующие показатели на 2,27 г. У 60-дневных перепелов эта разница была в пользу контрольных групп на 2,8 г. У 90-дневных перепелов разница между яичниками достигла 0,63 г в пользу опытных групп. Масса яичника опытных групп в 120 и 360 суток превышала аналогичный показатель контроля на 1,45 и 1,68 г.

Таблица 1 Возрастные изменения массы яичника опытных и контрольных групп перепелов

Возраст птицы (сут).	Опытная партия	Контрольная партия
1	0,004 ± 0,01	0,004 ± 0,01
30	1,1 ± 0,045	1,14 ± 0,045
49	5,97 ± 0,41	3,7 ± 0,43
60	6,3 ± 0,45	9,1 ± 0,01
90	6,23 ± 1,11	5,6 ± 0,04
120	5,65 ± 0,81	4,2 ± 0,01
360	6,78 ± 0,89	5,1 ± 0,01
Количество инкубированных яиц, шт.	200	200
Оплодотворение яиц, %	91	85
Сохранность, %	98,3	98,3

При изучении возрастных изменений гонад выявили, что масса яичника в период массовой яйцекладки у перепелов опытных групп больше на 1,68 г. У опытных групп пищевая активность возрастала в начале и в конце каждого 8-часового освещения, среднесуточный привес превышал на 0,16 г, средняя живая масса была больше на 5,76 г. Интенсивность копуляции в период яйцекладки на 6–8 спариваний больше. Высокая половая активность подтверждается результатом инкубации. У опытных групп яиц оплодотворение больше на 6,0 %, чем у яиц контрольных групп. Сравнительно коротким постэмбриональным периодом роста репродуктивных органов отличаются контрольные (с 1 по 90 сутки) и опытные группы перепелов. Результаты проведенных исследований позволяют утверждать, что применяемый суточный ритм вызывает у перепелов статически достоверные увеличения яичника. Период роста яичника опытных групп намного продолжительнее, чем у контроля (с 1 по 120 сутки). Количество быстрого роста фолликулов остается

у контроля до 90 суток, а у опытных групп – до 120 суток. У контрольных групп с 120-суточного возраста количество растущих фолликулов уменьшается до годовалого возраста. Такая же тенденция отмечена у опытных групп.

При изучении возрастных изменений гонад выявили, что масса яичника в период яйцекладки у опытных групп перепелов выше на 2,9 г. У перепелов развитие семенников в возрасте 7–21 суток происходит в основном на клеточном уровне. У молодых 30-дневных перепелов, еще не вступивших в стадию половой зрелости, измененный суточный ритм не вызывает увеличения веса и объема семенника. После достижения 35 суток физический рост семенников ускоряется. До начала полового созревания индивидуальная изменчивость относительного веса гонад у опытных групп составляет $1,2 \pm 0,8904$, а у контрольных $1,4 \pm 0,8903$. Возрастные изменения относительного веса семенника начинаются у контрольных групп в период между 37–45 днями, у опытных – 42–49 днями (таблица 2).

Таблица 2 Репродуктивные показатели семенников опытных и контрольных групп перепелов

Технологические показатели	Опытная партия		Контрольная партия	
Живая масса, г	227,9		222,4	
Масса семенников, г	Сутки	Масса (г)	Сутки	Масса (г)
	30	0,3	30	0,3
	49	2,35	49	2,60
	60	5,57	60	3,41
	90	7,2	90	6,3
	120	7,6	120	7,4
Количество инкубир. яиц, шт.	300		300	
Оплодотворение яиц, %	91		85	
Сохранность, %	98,3		98,3	

В этот период у обеих групп масса семенника варьирует от 201,3 мг до 304,3 мг. У 49-дневных контрольных перепелов, выращенных в применяемом (дневной – 16 часов) световом режиме, наблюдается достоверно лучшее развитие семенника. Абсолютная масса семенника

контрольных групп перепелов превышала соответствующие показатели на 0,25 г. У 60-дневных перепелов эта разница была в пользу опытных групп на 0,16 г. У 90-дневных перепелов разница между группами достигла до 0,9 г в пользу опытных групп. До годовалого возраста

аналогичные результаты получены в пользу опытных групп перепелов (таблица 2).

Известно, что низкий рост яичника связан с неравномерным ростом внутренних органов. В эмбриональный период быстрее растут кожа, мышцы, сердце и кишечник, а такие органы, как семенники, яичники, печень, легкие, трахея и головной мозг, имеют низкие коэффициенты роста [2]. Ряд авторов [3] исследовали связь ритмичности роста не только с внутренними, но и с внешними факторами (свет, температура, влажность, давление и т. д.). Например, снижение интенсивности роста цыплят соответствует повышению температуры и давлению воздуха, а усиление роста совпадало с увеличением этих показателей. Обнаружено, что период снижения интенсивности роста цыплят соответствует увеличению или сокращению светового дня в одних астрономических сутках. В период выращивания увеличение светового дня стимулирует половое созревание молодок, но задерживает их рост, вызывает раннюю яйцекладку, затем снижает дальнейшую продуктивность [4].

Приостановка роста массы в постэмбриональном развитии наблюдается в период формирования брачной активности самцов у обеих групп перепелов. Первый брачный крик петухов контрольных групп отмечен на 43 сутки выращивания, а у опытных птиц – на 48 сутки. Токующий самец вытягивается вверх, поднимает голову и, закинув ее назад, издает крик. В период яйцекладки опытные группы интенсивно токут в начале каждой светлой части суток. Контрольные перепела токут хаотично в любое время дня. Начало яйцекладки птиц контрольных групп опережало опытные группы на двое суток. Интенсивность копуляции в период яйцекладки у опытных групп за световой день составило на 6–8 спариваний больше. К концу светового дня (16 час) у контрольных групп интенсивность копуляции не превышает в среднем двух спариваний в течение часа. Для проверки результатов, полученных в ходе экспериментов, были проведены научно-производственные опыты на значительно большем количестве яиц с учетом оплодотворения. Как видно из таблицы 2, высокая половая активность подтверждается результатами инкубации яиц обеих групп птиц. У яиц опытных групп оплодотворение больше на 6,0 %, чем у контрольных.

В настоящее время фотопериодические реакции обнаружены в той или иной степени практически у всех видов животных. Ритмы активности описаны для многих видов птиц в естественных условиях [3, 10]. У куриных птиц суточная активность включает два пика: один пик после рассвета, второй – перед закатом. Такой двух-

вершинный профиль характерен для многих частных форм поведения, включая кормление, пение, ухаживание и спаривание [5, 10]. Расположение этих пиков активности в природных условиях частично связано с меняющимся временем наступления рассвета и вечерних сумерек. Длительность дня в остальное время суток играет значительную роль. В связи с сезонными изменениями длины дня сдвигается и время суточной активности. У зимующих в умеренных широтах Азербайджана птиц в месяцы с наиболее коротким днем активность начинается (относительно времени восхода солнца) раньше, чем в летнее время [5]. В естественных условиях это легко объясняется необходимостью компенсации высоких энергозатрат организма при укороченном зимнем дне [3]. На протяжении длины дня интенсивность деятельности животных носит обычно фазовый характер. Например, куриные птицы в период репродуктивного цикла, при выкармливании птенцов, в период вожделения выводка наиболее активны в утренние часы, затем их активность снижается и вновь повышается перед закатом [5, 10]. При выращивании в двух дневных и двух ночных ритмах пищевая активность высока в начале и в конце каждого 8-часового дневного ритма. А у контрольных групп, выращенных в 16-часовом ритме, пищевая активность не высокая.

Результаты проведенных исследований позволяют утверждать, что применяемый суточный ритм вызывает у перепелов статистически достоверные увеличения яичника и семенника. Сравнительно коротким постэмбриональным периодом роста репродуктивных органов отличаются контрольные группы (с 1 по 90 сутки). Период роста яичника перепелов опытных групп намного продолжительнее, чем у контрольных (с 1 по 120 сутки). Количество быстрого роста фолликулов сохраняется у контрольных групп до 90 суток, а у опытных – до 120 суток. У птиц контрольных групп с 120-суточного возраста количество растущих фолликулов уменьшается до годовалого возраста. Такая тенденция отмечена и у птиц опытных групп.

При изучении возрастных изменений гонад выявили, что масса яичника в период яйцекладки у опытных групп перепелов выше на 2,9 г. Возрастание относительного веса семенника начинается у птиц контрольных групп в период между 37–45 днями, у опытных – в период 42–49 дней. У 49-дневных птиц контрольных групп отмечено сравнительно лучшее развитие семенника. Начиная с 60-дневного возраста и до годовалого возраста, эта разница была в пользу опытных групп. Опираясь на собранные данные, можно сказать, что рост репродуктивных орга-

нов заканчивается вместе с ростом организма перепелов.

В естественных условиях ритмы дневной двигательной активности птиц носят фазовый характер. Известно, что циклы действия кортизола, гормоны роста (ГР), пролактина, гонадотропинов тесно связаны с ритмом сна и бодрствования. Секреция гормона роста повышается во время и после полуденных эпизодов сна. Ритмы дневной активности и ночного покоя у птиц регулируются эпифизом. Гормоном-посредником, доносящим руководящие сигналы до органов и тканей, является мелатонин. При этом характер ответа регулируется не только уровнем гормона в крови, но и продолжительностью его ночной секреции. Кроме этого, мелатонин обеспечивает адаптацию эндогенных биоритмов к постоянно меняющимся условиям внешней среды. Степень интенсивности метаболизма мелатонина зависит от освещенности. Поэтому под влиянием света синтез мелатонина угнетается, а в темноте увеличивается [1, 9]. Темнота или недостаток света в помещении приводят к недоразвитию гипофиза и уменьшению гормональной активности. Напротив, круглосуточное освещение ведет к перенапряжению функции эндокринной системы в целом, особенно половых желез [10].

Во время наблюдения за последовательными изменениями семенника у опытных групп перепелов установлено, что у птиц, выращенных в новых суточных ритмах, в ночные часы стимулируются функции гонад и активизиру-

ются обменные процессы в организме. Результаты проведенных исследований позволяют утверждать, что новый суточный ритм вызывает у перепелов статистически достоверное увеличение роста семенника и яичника.

Выводы. Естественный ритм активности и покоя куриных птиц, воздействуя, как внешний раздражитель, оказывает положительное влияние на центральную нервную систему птиц и на функциональное состояние эндокринных органов, в частности гипофиза и эпифиза. Несовпадение суточного ритма с длительностью астрономических суток в закрытых помещениях открывает возможность некоторого сдвига ритмов активности в порядке синхронизации их с естественной сменой условий в каждом конкретном районе в разные периоды года. Полученные результаты свидетельствуют о том, что применяемый новый суточный ритм в два дня и две ночи представляет собой биологический раздражитель, соответствующий образу жизни птиц, направленный на повышение их продуктивности. Применение естественного ритма активности и покоя куриных птиц в закрытых помещениях увеличивает морфофункциональное состояние семенника и яичника. Совпадение наследственной суточной периодичности с ритмом, обусловленным внешними факторами, благоприятно отражается на развитии организма. При умелом использовании естественного ритма активности и покоя в сочетании с искусственным позволяет добиваться высоких результатов.

Библиографический список

1. Анисимов, В.Н. Эпифиз, биоритмы и старения организма [Текст] / В.Н. Анисимов // Успехи физиологических наук. 2008. Т. 39. № 4. С. 40–65.
2. Баранов, В.С. Внешняя среда и развивающийся организм [Текст] / В.С. Баранов, В.П. Божкова, Э.Я. Граевский и др. М.: Наука, 1977. 384 с.
3. Биологические ритмы [Текст] / Под ред. А. Ашоффа. М.: Мир, 1984. Т. 2. 408 с.
4. Кабакчиев, М. Влияние различных световых режимов на яйценоскость и качество кур-несушек [Текст] / М. Кабакчиев // Животноводческие науки. 2008. № 4. С. 73–77.
5. Мусаев, А.М. Семейство фазановые [Текст] / А.М. Мусаев, И.Р. Бабаев // Животный мир Азербайджана. Т. III. Баку: Элм, 2000. С. 318–327.
6. Мусаев, А.М. Увеличение производительности птиц, выращенных в закрытых помещениях [Текст] / А.М. Мусаев, Я.Я. Ельчуев, А.М. Мусаев, А.Г. Алиев // Патент Азербай-

джанской Республики на изобретения. № I-2007 0031 от 12.02.2007. Баку, 2004. № 2. С. 27.

7. Мусаев, А.М. Экологические основы использования искусственного фоторежима для повышения половой активности птиц, выращенных в закрытых помещениях [Текст] / А.М. Мусаев // Современные проблемы биологии и экологии. Материалы докладов Международной научно-практической конференции. Махачкала, 2011. С. 178–180.

8. Пигарева, М.Д. Перепеловодство [Текст] / М.Д. Пигарева, Г.Д. Афанасьев. М., 1989. 104 с.

9. Чернышева, М.П. Гормональный фактор пространства и времени внутренней среды организма [Текст] / М.П. Чернышева, А.Д. Ноздрачев // СПб.: Наука, 2006. 248 с.

10. Чопикашвили, Л.В. Биоритмы репродуктивной активности в живой природе [Текст] / Л.В. Чопикашвили, Л.А. Бобылева, Е.Г. Пухаева и др. // Мат. Рос. съезда по хронобиологии и хрономедицины. Владикавказ, 2008. С. 177–178.

Мусаев Автандил Муса оглы, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории биостимуляторов биологического факультета, Бакинский государственный университет, Азербайджан, Аз-1148, г. Баку, ул. З. Халилова, 23, e-mail: Musayevavtandil@yahoo.com.

В работе приведен краткий анализ воздействия естественного ритма активности и покоя куриных птиц на развитие, активность, морфологические параметры семенника, яичника и оплодотворения яиц японского перепела в закрытых помещениях. Установлено, что у перепелат, еще не вступивших в стадию половой зрелости, естественный суточный ритм не вызывает увеличение объема семенника и яичника. Возрастание относительного веса семенников начинается у контрольных групп в период между 37 и 45 сутками, а у опытных – между 45 и 49 сутками. Возрастание относительного веса яичника начинается у контрольных групп в период между 49 и 60 сутками, а у опытных – начиная с 49 суток до годовалого возраста. У 49-суточных перепелов контрольных групп масса се-

менника превышала аналогичный показатель птиц опытных групп на 0,25 г. У 60-суточных перепелов разница была в пользу опытных групп – 0,26 г, а у 90-суточных – в пользу опытных – 0,9 г. У 49-суточных перепелов контрольных групп масса яичника превышала опытные группы на 2,8 г. У 90-суточных перепелов разница в пользу опытных групп составила 0,63 г, а в 120 суток – 1,45 г и у 360-суточных она составляла 1,68 г в пользу опытных групп. В остальные дни выращивания разница между группами была незначительна. Половая активность и частота спаривания у самцов опытных перепелов были больше на 6-8 раз в сутки, оплодотворение яиц было выше на 6,0 %. Указанные технологические показатели достигались без дополнительных затрат на корма.

A. Musayev

AGE-RELATED CHANGES OF REPRODUCTIVE ORGANS OF JAPANESE QUAILS REARED UNDER NATURAL RHYTHMS OF ACTIVITY AND REST

Key words: *growth; development; rhythm; fertilization; activity; weight; ovary; dormancy.*

Authors' personal details

Musayev Avtandil, Candidate of biological sciences, senior researcher of the Biostimulator Laboratory of the Biology Faculty, Baku State University, Az-1148, Azerbaijan, Baku, Z. Khalilov st., 23, e-mail: Musayevavtandil@yahoo.com.

The paper presents a brief analysis of the impact of the natural rhythm of poultry activity and dormancy on development, activity, morphological parameters of testis, ovary and fertilization of Japanese quails kept indoors. It was found that the natural day-night rhythm of quails under the puberty stage does not cause an increase in the volume of the testis and ovary. The relative weight of testes rises within 37 and 45 days in the control groups, and 45 and 49 days in the experimental group. Higher relative weight of the ovary starts between 49 and 60 days in the control groups, and from 49 days to one year in the experimental. Testis weight of 49-day-old quails in the control groups exceeded

the experimental one by 0,25 g. The difference for 60-day-old quails was in favor of the experimental groups by 0,26 g, and it reached 0,9 g on the 90th day. Ovary weight of 49-day-old quails in the control groups exceeded the experimental one by 2,8 g. The difference for 90-day-old quails was in favor of the experimental groups by 0,63 g, and it reached 1,45 g on the 120th day and 1,68 g on the 360th day. In the remaining days the difference between the groups was negligible. Sexual activity and mating frequency of experimental male quails were higher at 6–8 matings per day, fertilization was higher by 6,0 %. These process parameters were achieved with no additional feed costs.

МОЧЕКИСЛЫЙ ДИАТЕЗ КУР

Ключевые слова: подагра; висцеральная подагра; мочекаменная болезнь; ураты.

Введение. Почки в организме птицы играют важнейшую роль, поскольку при нарушении их функционирования концентрация мочевой кислоты повышается, и она откладывается там, где происходит циркуляция крови, в виде кристаллов кальция и натрия (уратов), которые могут вызвать закупорку мочеточников и клоаки, в результате чего моча задерживается, что в свою очередь вызывает отравление мочевиной и даже летальный исход. Наиболее распространенная причина нарушения функционирования почек – поражение эпителия почечных канальцев из-за недостатка в рационе кур витамина А. Часто функции почек у кур нарушены при дефиците в кормах витаминов В6 или В12. Еще одна причина – действие вредных для организма химических соединений, в частности протравы для зерна, бикарбоната или гидрокарбоната натрия, эндотоксинов микроорганизмов, прежде всего грибов. Мочекислый диатез может быть спровоцирован переохлаждением цыплят после выборки из лотков инкубатора и в первые дни выращивания, а также постоянной нехваткой питьевой воды. К поражению почек приводит скормливание цыплятам комбикормов с высоким содержанием кальция и недостатком усвояемого фосфора [1]. Почки, поражённые уратами, становятся припухлыми, покрываются белым налётом. Мелкообразный налёт при почечной подагре фиксируется и на других органах брюшной полости, сердечной сорочке, диафрагме. При тяжёлых формах висцеральной подагры ураты в виде точечных меловых отложений можно заметить повсеместно во всей брюшной полости [2]. Диагностировать заболевание достаточно трудно. Во внимание следует принимать биохимические показатели крови (повышение концентрации мочевой кислоты) и клиническую картину почек, сердца, печени, воздухоносных мешков, наличие меловых налётов и точечных отложений уратов в брюшной полости [3]. Подагра рассматриваемого типа может возникнуть как результат длительного избытка уровня кальция в составе рациона у подращенной птицы. Обычно такой избыток фиксируется уже при концентрации кальция более 1,2 % от массы комбикорма [4].

Почечную подагру в противовес избытку кальция может вызвать и недостаток фосфора. Нехватка фосфора на фоне нормального поступ-

ления кальция в организм чревата необоснованным расширением кальций-фосфорного соотношения за пределы границ 1,5 : 1. В этом случае использование кальция на рост костяка и продукционные цели резко уменьшается, а количество минерала, поступающего в почки для выведения из организма, многократно растёт. Почки не справляются с такой напряжённой кальций-выделительной функцией, что и приводит к развитию подагры [4].

Хорошо известен эффект роста образования мочевой кислоты в организме на фоне протеинового перекорма или при значительном избытке какой-либо незаменимой аминокислоты. Излишний глицин напрямую включается в синтез мочевой кислоты и резко повышает объём её накопления в организме [5]. Среди кормовых токсикозов необходимо обратить внимание на такие токсины, как охратоксин, ооспорин и цитринин. Считается, что именно эти кормовые токсины, попадающие с недоброкачественными кормами в организм птицы, обладают выраженным нефротоксическим эффектом, очень схожим по признакам с висцеральной подагрой описанной выше этиологии. Поэтому, выясняя причины дисфункции почек у молодняка, следует обязательно дополнительно исследовать ситуацию по состоянию загрязнённости кормов указанными выше микотоксинами. Причиной почечного токсикоза у молодняка птицы может стать неправильное, бессистемное использование антибиотиков, сульфаниламидов, аминоклизидов [6].

Высокая минерализация воды – выше 0,3–0,4 % – не является прямой причиной подагры у птицы, но именно этот фактор усиливает эффект всех описанных выше причин. Кроме того, лечение и профилактика подагры в условиях высокой минерализации воды существенно затруднены и малоэффективны. В систему профилактики подагры у птицы входят мероприятия по изучению наличия микотоксинов в кормах и их обеззараживанию [6].

Материалы и методы исследования. Производственные опыты проводили в 2010–2016 гг. на птицефабрике агрофирмы «АКАС» Зеленского района Западно-Казахстанской области. Опыты были опробованы на птице поголовья яичных кроссов «Хайсекс Браун» коричневого, «Родонит-3» и «Ник Браун». В опытном

птичнике (цех № 6) было размещено 7765 голов, в контрольном птичнике (цех № 2) – 7760 голов птиц поголовья. В процессе обработки руководствовались инструкциями по применению препаратов в ветеринарии. Условия содержания и кормления в контрольной и опытной группах аналогичны. Производственные опыты проводили на промышленных птицефабриках по производству пищевых куриных яиц в Республике Казахстан у кур кроссов «Хайсекс Браун» коричневый, «Родонит-3» и «Ник Браун».

При появлении у птицы признаков мочекишечного диатеза необходимо выяснить причину, пересмотреть множество факторов: технологические параметры выращивания ремонтного молодняка, программу кормления и вакцину профилактики инфекционного бронхита и болезни Гамборо, исключить другие вирусные и бактериальные инфекции.

Особое внимание во время исследований обратили на содержание микотоксинов и ядохимикатов в кормах. Стремилась устранить все факторы, способствующие развитию подагры у птиц. Наибольшее значение имеет упорядочение белкового питания с учетом возраста, продуктивности, состояния птицы. Особенно следует придерживаться норм протеинового питания в продуктивный период кур. Белковый минимум – это то количество белка, которое необходимо для поддержания азотистого равновесия в организме. Курице живым весом 2–2,2 кг с яй-

ценоскостью 200 яиц рекомендуется 14–16 г протеина в сутки или 8,5–9 г на 1 кг живого веса. Корма животного происхождения (мясокостная, рыбная мука) как источник белка для взрослой птицы не превышала 7–10 %, для молодняка – 10–12 %. Влажность кормов не должна превышать 12 %, чтобы не способствовать микробиологическим процессам. Для исключения инфекционного бронхита, болезни Гамборо, других вирусных и бактериальных инфекций материал отправили в областную ветеринарную лабораторию. Рассмотрели программу кормления. В районной лаборатории исследовали корма на содержание микотоксинов, плесени и ядохимикатов. Больной птице выпаивали 0,25 %-ный водный раствор уротропина, использовали методику ошелачивания кормов: из расчета 3 кг двууглекислой соды на 1 т корма скармливали обогащенные корма 10–15 дней, затем делали перерыв 5–7 дней и вновь скармливали корма с содой.

Результаты исследований. У кур клинические признаки характерны подагре, в острой стадии было выражено расстройство кишечника, фекальные массы окрашены в белый цвет, нарушалось общее состояние, уменьшался прием корма, наступал цианоз гребня. У некоторых кур понижалась яйценоскость. При суставной форме подагры у кур отмечались нарушения движения, опухания суставов с наличием местной температуры. Чаще поражались скакательные суставы и суставы фаланг пальцев (рисунок 1).

Рисунок 1

Поражение скакательных суставов, суставов фаланг пальцев при суставной форме подагры у кур

Позднее кожа пораженных участков суставов приобретала серо-белую окраску, иногда происходило вскрытие абсцесса, вытекали бело-

ватые гипсоподобные массы. В полости сустава находили меловидные наложения, разрыхленные, или в виде плотного слоя. Хрящи суставов

почти всегда свободны от уратов, иногда имеют некротические очаги. В суставах, пораженных подагрой, ураты пронизывают поверхностный слой. Выявлялось развитие острых приступов воспаления в данных местах поражения, образование подагрических гранул и подагрических «шишек» – тофусов – обычно вокруг суставов. Как правило, подагра может довольно долго протекать бессимптомно. Помимо появления узелков белого цвета вокруг суставов также появляется отек, а жилки становятся красными, всё это причиняет птице невыносимую боль. Для отличия суставной формы подагры от бактериальной инфекции возможно применение мурексидной пробы (рисунок 8). К небольшому кусочку узелка добавляют каплю уксусной кислоты, подогревают над пламенем и добавляют каплю нашатырного спирта, вызывающего пурпурно-красное окрашивание. Если добавить каплю гидроксида калия или натрия – наблюдается пурпурное окрашивание узелка.

Подагру часто отмечали и во время эмбрионального развития. Мочекислые соли откладывались в провизорных органах (аллантаином

мешке, амнионе), почках, серозных оболочках. У выведенных цыплят отмечалась высокая смертность в первые дни, отказ от корма, профузный понос, склеивание клоаки выделяющимися каловыми массами. Для профилактики подагры цыплят не позже 8 часов после вывода доставляли в цеха. Перед транспортировкой обрабатывали аэрозолями витаминов, глюкозой.

Почки при висцеральной подагре поражаются регулярно. При внимательном осмотре в почках заметны кристаллы мочекислых солей в виде меловидных беловатых очажков или полосчатых отложений. Различают два вида поражения почек: белые дольчатые отложения в паренхиме ткани почек и сливающиеся поверхностные узелковые очаги. Почки как бы припудрены мелким кристаллическим порошком. Иногда у эмбрионов и цыплят, погибших от подагры, почки имеют вид малины за счет скопления мочекислых солей, мочеточник содержит слизисто-белые массы и сильно расширен, иногда ураты выглядят как плотные меловидные образования. Ураты могут заполнять мелкие отводящие каналы почек (рисунок 2).

Рисунок 2
Ураты в мелких отводящих канальцах почек

регулярно видны поражения в виде припудривания поверхности перикарда и эпикарда, в тяжелых случаях – это гипсовидные сплошные наложения. Серозные оболочки печени, селезенки, легких, воздухоносных мешков и кишечника также покрыты мочекислыми солями. Были случаи склеивания эпикарда с перикардом

(рисунок 3). Ураты в паренхиме внутренних органов встречаются также в виде очажков, пронизывающих печень, селезенку, сердечную мускулатуру, эндокард, эндотелий крупных сосудов, кишечник. Ураты обнаруживали также в подкожной клетчатке. Клетки сердечной мышцы, как правило, не содержат уратов.

Рисунок 3
Склеивание эпикарда с перикардом

В почках видна интерстициальная отечность. Мочекислый диатез птицы (подагра, висцеральная подагра, мочекаменная болезнь) поражает чаще всего кур яичного типа в возрасте 100–180 дней, а также однодневных цыплят и даже эмбрионы. Причиной заболевания птицы мочекислым диатезом (подагра, висцеральная подагра, мочекаменная болезнь) на птицефабрике агрофирмы «Акас» Зеленского района было наличие в кормовой пшенице плесени. При поедании птицей разных возрастов комби-

кормов с плесневелой пшеницей болезнь проявлялась по-разному. В цехе № 1-10 куры в возрасте 230–240 дней клиники и патологоанатомических изменений подагры не наблюдали, и падеж в сравнении с № 2-6-цехами был в 4–5 раза меньше. В последних цехах падеж от подагры ежедневно доходил до 20-50 голов (таблицы 1 и 2). Куры до 100 дней в цехе № 21 не проявляли признаков подагры. Проявилась болезнь в возрасте 110–115 дней, когда их перевели в цех несушек № 20 (таблица 3).

Таблица 1 Сравнительный анализ падежа и сохранности кур при мочекислым диатезе подагре в возрасте 230–240 дней в цехе № 1 и в возрасте 180–190 дней в цехе № 2

Месяц	Цех № 1, 230–240 дней	Падёж, гол.	% падежа	% сохранности	Цех № 2, 180–190 дней	Падёж, гол.	% падежа	% сохранности
Апрель	6695	74	1,1 ± 0,12	98,9 ± 0,12	7760	448	5,77 ± 0,26	94,2 ± 0,26
Май	6621	59	0,89 ± 0,011	99,1 ± 0,011	7312	255	3,48 ± 0,21	96,1 ± 0,21
Июнь	6562	56	1 ± 0,12	99 ± 0,12	7057	81	1,14 ± 0,12	98,7 ± 0,12
Итого	6506	189	2,82 ± 0,20	97,2 ± 0,20	6976	784	10,1 ± 0,34	89,9 ± 0,34

Задача любого ветеринарного врача – профилактика возникновения болезни, а если она проявилась, то лечение. Положительный, но незначительный результат дали добавки в корм цыплятам витамина А, интровита, выпаивание 2 %-ного

раствора сахара и глюкозы, также 2–3 кг метионина в течение 2 недель и ежедневно аэрозоль витамина С. При начальных признаках подагры птицу можно вылечить, в запущенных случаях результативность лечения незначительная.

Таблица 2 Сравнительный анализ падежа и сохранности кур при мочекислым диатезе (подагре) в возрасте 230–240 дней в цехе № 10 и в возрасте 180–190 дней в цехе № 6

Месяц	Цех № 10, 230–240 дней	Падёж, гол.	% падежа	% сохранности	Цех № 6, 180–190 дней	Падёж, гол.	% падежа	% сохранности
Апрель	6735	69	1,0 ± 0,12	98,9 ± 0,12	7725	456	5,9 ± 0,021	94 ± 0,021
Май	6666	39	0,5 ± 0,01	99,5 ± 0,011	7269	271	3,72 ± 0,012	96,2 ± 0,012
Июнь	6627	34	0,9 ± 0,12	99 ± 0,12	6998	76	1,08 ± 0,014	98,3 ± 0,014
Итого	6593	142	2,1 ± 0,17	97,9 ± 0,17	6922	803	10,39 ± 0,35	89,6 ± 0,35

Таблица 3 Сравнительный анализ падежа и сохранности цыплят при мочекислым диатезе (подагре) в возрасте 90–100 дней в цехе № 21 и в возрасте 120–130 дней в цехе № 20

Месяц	Цех № 21, 90–100 дней	Падёж, гол.	% падежа	% сохранности	Цех № 20, 120–130 дней	Падёж, гол.	% падежа	% сохранности
Апрель	45068	678	–	98,5 ± 0,005	–	–	–	–
Май	–	–	–	–	44390	2726	6,14 ± 0,082	93,8 ± 0,082
Июнь	–	–	–	–	41664	2364	5,67 ± 0,10	94,5 ± 0,10
Итого	45068	678	1,5 ± 0,05	98,5 ± 0,05	39300	5768	14,67 ± 0,17	87,2 ± 0,17

Вывод. Мочекислый диатез птицы (подагра, висцеральная подагра, мочекаменная болезнь) поражает чаще всего кур яичного типа в возрасте 100–180 дней, а также однодневных цыплят и даже эмбрионы. Причиной заболевания подагры у кур-несушек кросса Родонит-3 явилось нарушение технологии кормления. При поедании птицей разных возрастов комбикормов с плесневелой пшеницей болезнь проявлялась по-

разному, падеж от подагры ежедневно в цехах доходил до 20–30 голов. После проведения вышеперечисленных методов лечения – добавки в корм витамина А, выпаивания 0,25 %-ного водного раствора уротропина – падеж от подагры сократился в 2–3 раза. При появлении у птицы признаков мочекислового диатеза надо прежде всего выяснить причину и устранить ее.

Библиографический список

1. Бессарабов, Б.Ф. Болезни птиц [Текст]: учебное пособие / Б.Ф. Бессарабов, И.И. Мельникова, Н.К. Сушкова, С.Ю. Садчиков. СПб.: Лань, 2009. С. 335–340.
2. Бессарабов, Б.Ф. Незаразные болезни птицы [Текст] / Б.Ф. Бессарабов. М.: КолосС, 2007. 175 с.
3. Бакулин, В.А. Болезни птиц [Текст] / В.А. Бакулин. СПб., 2006. 688 с.
4. Фисинин, В.И. Научные основы кормления сельскохозяйственной птицы [Текст] / В.И. Фисинин, И.А. Егоров, Т.М. Околелова, Ш.А. Имангулов. Сергиев Посад, 2009. 350 с.
5. Имангулов, Ш.А. Мочекислый диатез, подагра, мочекаменная болезнь птицы [Текст] / Ш.А. Имангулов, Т.Т. Папазян, А.Ш. Кавтарашвили. Сергиев Посад, 2001. 51 с.
6. Кожемяка, Н. Нарушение обмена мочевой кислоты у кур [Текст] / Н. Кожемяка // Птицеводство. 2004. № 12. С. 25–26.

Сведения об авторе

Нуралиев Ерис Рахимгалиевич, кандидат биологических наук, главный ветеринарный врач птицефабрики, ТОО агрофирма «АКАС», Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, e-mail: Nuraliev-71@mail.ru.

Причиной заболевания подагрой у кур несушек кросса Родонит-3 в ТОО агрофирме «АКАС» Западно-Казахстанской области явилось нарушение технологии кормления. При поедании птицей разных возрастов комбикормов с плесневелой пшеницей болезнь проявлялась по-разному. В цехах 1-10 у кур в возрасте 230–240 дней клиники и патологоанатомических изменений подагры не наблюдали, и падеж в сравнении с курами цехов 2-6 в возрасте 130–140 дней был в 4–5 раз меньше. В последних цехах падеж от подагры ежедневно доходил до 20–

50 голов. Курочки до 100 дней цеха 21 также не проявляли признаков подагры, пока им не исполнилось 110–115 дней и их перевели в цех несушек 20. Мочекислый диатез птицы (подагра, висцеральная подагра, мочекаменная болезнь) поражает чаще всего кур яичного типа в возрасте 100–180 дней, а также однодневных цыплят и даже эмбрионы. После проведения перечисленных методов лечения – добавки в корм витамина А, выпаивания 0,25 %-ным водным раствором уротропина – падеж от подагры сократился в 2–3 раза.

E. Nuraliev

URINE ACID DIATHESIS IN HENS

Key words: *gout; visceral gout; urolithiasis; Urate.*

Authors' personal details

Nuraliev Eris, Candidate of biological sciences, chief veterinary doctor of the poultry factory, limited partnership «AKAS», West Kazakhstan region, the Republic of Kazakhstan, e-mail: Nuraliev-71@mail.ru.

Violation of the feeding technology in the LLP «AKAS» in the West Kazakhstan region resulted in gout in laying hens of the Rodonit-3 cross. The disease manifested in different ways for the poultry consuming fodder with moldy wheat. In shop floors № 1-10 hens at the age of 230–240 days didn't have any clinic and pathological changes in gout, and the mortality rate was 4–5 times less in comparison with hens aged 130–140 days in the shop floors № 2-6. In the latter shop floors 20–50 hens died from gout

daily. Hens in the shop floor № 21 being under the age of 100 days didn't show any signs of gout until they reached 110–115 days and were transferred to the shop floor of the laying hens № 20. Urine acid diathesis in hens (gout, visceral gout, and urolithiasis) strikes mostly the egg-typed hens at the age of 100–180 days, as well as one-day chickens, and even embryos. After treatment by adding vitamin A to the fodder, giving 0,25 % aqueous solution of hexamine, the deaths from gout was decreased by 2–3 times.

© Нуралиев Е.Р.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОЗЖЕЧКА КРЫС ПРИ КРОВОПОТЕРЕ

Ключевые слова: мозжечок; кровопотеря; гликозаминогликаны; нейрон; криостатные срезы; клетка Пуркинье.

Введение. В нашей стране травмы являются четвертой по значимости причиной смертности среди всех возрастных категорий (в процентном выражении это составляет примерно 6 % от общего числа смертей) и наиболее распространенной причиной смерти детей старше одного года, подростков и взрослых в возрасте до 44 лет. Вследствие травм, а именно ударов, ушибов, порезов, переломов и т. д. чаще всего наступает кровотечение. Необходимо отметить, что в 50 % смертельных случаев пациенты умирают в пределах нескольких минут с момента получения травмы, что происходит либо непосредственно на месте происшествия, либо по дороге в больницу. Причиной такой смерти, как правило, являются большая потеря крови или тяжелые неврологические повреждения [6, 10]. Кровопотеря вызывает значительное изменение в центральной нервной системе. Это сказывается на функционировании мозжечка, который отвечает за высококоординированные движения, а также участвует в реализации адаптивных механизмов в мышечной и нервной тканях. Явления кровопотери различают по длительности и характеру. Длительная или обильная кровопотеря приводит к развитию патологических состояний и заболеваний. Даже после прекращения действия негативного фактора произошедшие перестройки в нервной системе сохраняются в течение длительного времени [1, 3–5, 9].

Целью исследования является выявление морфофункциональных изменений мозжечка крыс при кровопотере.

Материалы и методы исследования. При изучении моделируемой кровопотери на крысах использовались семьдесят пять половозрелых животных. Крысы, отобранные в эксперименте, объединялись в группы по 13–15 животных (Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 33044-2014 Принципы надлежащей лабораторной практики). Моделирование острой кровопотери проводили на крысах породы Вистар массой 220–230 грамм, выращенных и содержавшихся в виварии с соблюдением Международных рекомендаций Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых при экспериментальных исследованиях

(1986). Все животные имели неограниченный доступ к воде и пище (Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53434-2009, Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.06.2003 г. № 267).

Острая кровопотеря воспроизведена на 60 крысах, в каждой серии опытов использовано по 15 крыс (самцов – 45, самок – 15) по методике, разработанной И.П. Западнюк и соавторами [2, 8]. Группа контроля состояла из пятнадцати животных, находившихся в обычных условиях вивария.

Животных оперировали в стерильных условиях под общей анестезией этиловым эфиром для наркоза; рассекали кожу в области внутренней поверхности бедра, выделяли бедренные сосуды, которые пунктировали иглой, извлекая кровь в объеме 5–7 мл. Величина кровопотери составила $36,5 \pm 1,1$ % от объема циркулирующей крови (ОЦК), что приравнивается к кровопотере тяжелой степени. Образцы тканей у всех исследованных животных забирали для исследований. Животные выводились из эксперимента после моделирования кровопотери через 1 час, 3 часа, 6 часов и 12 часов. Выведение животных из эксперимента проводилось путем передозировки наркоза. Затем осуществлялось декапитация всех исследуемых животных. Далее вскрывалась полость черепа крыс и забирался головной мозг целиком. Проводили измерения и взвешивание головного мозга. Затем отделяли мозжечок, помещали в формалин для фиксации и последующего проведения гистологических исследований. Для гистохимических исследований, направленных на выявление гликозаминогликанов, использовались криостатные срезы по методикам, описанным Г.А. Меркуловым [7, 8]. Все проводимые нами экспериментальные исследования на крысах породы Вистар осуществлялись в динамике. При этом уделялось внимание состоянию животного, двигательной активности, поведению, особенностям их реакции на различные внешние раздражители (другие крысы, вода и пища, световые и шумовые раздражители). Изучение микропрепаратов, фоторегистрацию и морфометрические исследования проводили с использованием светооптиче-

ских микроскопов «Leica DMLA» и «JENAMED-2», цифровой фотокамеры «Leica DC-500», системы интерактивного изображения «Видеотест» (Россия, вариант 3). Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью операционной системы Windows 7 с использованием программ Microsoft Office 2010.

Результаты исследований. Изучение ткани мозжечка в условиях моделирования острой кровопотери позволяет проследить морфологические изменения уже в течение первого часа. В этих условиях наблюдаются структурно-функциональные изменения, затрагивающие разные клеточные элементы мозжечка и окружающий их межклеточный матрикс. Анализ морфоструктурных данных показывает относительную неоднородность структуры нейронов мозжечка. В некоторых участках нейроны имеют размытость контуров с нарушением их четкости, с явлениями легкого набухания. В других участках мозжечка располагаются нейроны, имеющие относительно четкие контуры, практически не отличающиеся от нейронов, входящих в группу контроля. У части нейронов мозжечка прослеживаются явления гетерогенности окрашивания их цитоплазмы и ядра. Это является показателем особенности реагирования нейронов на экстремальный фактор и их функциональными особенностями.

Нейроны мозжечка, расположенные в молекулярном слое, ганглиозном слое и в слое клеток-зерен, характеризуются неоднородным клеточным составом и отношению к восприятию красителей. Среди этих клеток выявляются относительно светлые нейроны, часть клеток имеет более выраженное окрашивание, среди них выявляются промежуточные формы. На гистологических препаратах ткани мозжечка является неоднородность восприятия нейронами красителей и характеризуется выраженным мозаичным рисунком. Гистохимические исследования мозжечка крыс в условиях острой кровопотери позволяют выявить особенности реактивности клеточных элементов в зависимости от интенсивности их окрашивания. Анализ полученных результатов позволяет отразить некоторые особенности динамики разных классов гликозаминогликанов, находящихся в межклеточных пространствах разных слоев мозжечка. На криостатных срезах одинаковой толщины в ткани мозжечка прослеживаются разные нейроны, расположенные по его слоям. На срезах мозжечка, окрашенных толуидиновым синим или метиленовой синью, в течение первого часа после острой кровопотери выявляются нейроны с относительно четкими контурами, расположенные по слоям. При изучении срезов

мозжечка на препаратах достаточно четко выявляются крупные нейроны, расположенные в виде групп в ганглиозном слое. Эти клетки представлены нейронами Пуркинье, различающимися по форме. Нейроны данной группы имеют четко выраженный гликокаликс, расположенный на поверхности клеточной мембраны. Цитоплазма этих нейронов представлена в виде гетерогенной структуры, различающейся размерами, занимаемой площадью и интенсивностью окрашивания. Это структурно-функциональное образование нейронов представляет собой вещество Ниссля (тигроидное вещество). Изучаемое нами вещество Ниссля имеет неодинаковую интенсивность окрашивания в разных нейронах. Эти структурные особенности рассматриваются нами как различия в функциональном состоянии исследуемых нейронов.

В нейронах Пуркинье, практически в его центральных отделах, располагается ядро. Оно имеет относительно бледное окрашивание по сравнению с окружающей цитоплазмой. Ядра этих клеток имеют округлую или слегка овальную форму. Внутри ядер содержится относительно гомогенная структура, равномерно распределенная. Внутри ядра располагается ядрышко, имеющее интенсивное окрашивание по сравнению с нуклеоплазмой. Ядрышки, как правило, располагаются в центральных отделах ядра. На криостатных срезах довольно четко прослеживаются отростки нейронов, расположенные в разных его слоях на значительном расстоянии. Аксоны клеток Пуркинье располагаются практически во всех отделах молекулярного слоя и тесно контактируют с другими нейронами. Отростки клеток Пуркинье, расположенные в зернистом слое, трудно различимы. Характерной особенностью молекулярного слоя является небольшое содержание нейронов и преобладание отростков и межклеточного матрикса. Все это способствует слабому восприятию красителей.

В этот период нейроны, расположенные в зернистом слое, представлены клетками округлой, а в некоторых случаях и овальной формы. Отростки у этих клеток были трудно различимы. Цитоплазма нейронов зернистого слоя имела очень интенсивное окрашивание. Клетки зерна тесно располагались по отношению друг к другу.

Кровеносные сосуды, расположенные в ткани мозжечка, были распределены в разных его слоях неравномерно. Относительно высокое содержание сосудов микроциркуляторного русла наблюдалось в зернистом и ганглиозном слоях. Различия в содержании кровеносных сосудов составляли приблизительно 150–300 %.

Вокруг этих кровеносных сосудов наблюдались участки просветлений. Эти периваскулярные зоны имели неравномерный характер на своем протяжении, в них наблюдались участки сужений и расширений. Сосуды микроциркуляторного русла на некоторых участках приобретали извитой характер.

Анализ криостатных срезов при окрашивании альциановым синим при разных рН и молярностях позволил дифференцировать гликозаминогликаны на сульфатированные и несulfатированные. Среди несulfатированных гликозаминогликанов определялись гиалуриновая кислота и хондроитин, которые различались между собой по степени метилирования и действия на них фермента гиалуронидазы. Процентный состав гиалуриновой кислоты был около 22,7 %. По сравнению с группой контроля данное соединение возросло практически на 6,5 %.

Сульфатированные гликозаминогликаны были представлены разными соединениями, различающимися по своей структуре и степени сульфатации. Среди них нам удалось дифференцировать следующие сульфатированные формы: хондроитин-4-сульфат, хондроитин-6-сульфат, гепарин, гепарансульфат. Содержание хондроитин-4-сульфата составляло 19,5 % (в группе контроля это соединение содержалось в количестве 14,3 %), в то же время хондроитин-6-сульфат – 17,8 % (в группе контроля данное соединение составило 11,7 %). Группа высокосulfатированных гликозаминогликанов в виде гепарина и гепарансульфата составляли 7,4 % (в контроле содержание соединений этой группы составило 6,3 %).

К концу третьего часа в ткани мозжечка наблюдались слабовыраженные явления отека. Кровеносные сосуды микроциркуляторного русла характеризовались явлениями периваскулярного отека, практически не отличающегося от первого часа после острой кровопотери. Все звенья кровеносных сосудов микроциркуляторного русла были четко контурированы. На гистологических срезах можно было различить разные фрагменты сосудов микроциркуляторного русла, участвующих в его формировании. Эти кровеносные сосуды имели извитой вид и неравномерный просвет на своем протяжении. Вокруг них прослеживались явления периваскулярного отека. Этот феномен был представлен участками просветлений, расположенных вокруг кровеносных сосудов и окружающих ткань мозжечка.

Достаточно четко фрагменты кровеносных сосудов микроциркуляторного русла выявлялись в молекулярном и ганглиозном слоях.

Фрагменты кровеносных сосудов не одинаково окрашивались красителями. Нами это объясняется неравномерностью распределения разных классов гликозаминогликанов сульфатированных и несulfатированных форм в ткани мозжечка.

Нейроны, расположенные в ганглиозном слое, имели разную чувствительность к красителям и характеризовались неодинаковой степенью окраски. Нейроны Пуркинье, расположенные около фрагментов кровеносных сосудов микроциркуляторного русла, имели менее интенсивное окрашивание по сравнению с отделенно расположенными клетками. Нейроны, находящиеся вблизи кровеносных капилляров, на своей поверхности имели гликокаликс бледно-голубоватого оттенка, плохо воспринимавший красители. Цитоплазма этих нейронов в своем составе содержала тигроидное вещество, намного слабее воспринимающая красители по сравнению с предыдущим периодом. В цитоплазме выявлялась неоднородная структура, различающаяся по составу, интенсивности окрашивания, занимаемому объему.

Практически в центре нейрона располагалось ядро округлой формы. Границы ядра имели относительно четкие контуры. Голубоватая окраска нуклеоплазмы была менее интенсивной по сравнению с цитоплазмой, а состав нуклеоплазмы – относительно однородный. Внутри ядра прослеживались ядрышки в количестве от одного до трех, различающиеся между собой по плотности, размерам, чувствительности к красителям.

Нейроны, расположенные в зернистом слое, имели достаточно хорошую чувствительность к красителям. Поверхность этих клеток хорошо окрашивалась метиленовой синью и придавала клеткам сочный вид. Клетки зерна, расположенные в зернистом слое, располагались на небольшом расстоянии друг от друга, местами тесно контактируя между собой и с нейронами, расположенными в других слоях. Количество нейронов, расположенных в зернистом слое, практически не изменялось по сравнению с ранее исследованным периодом.

В молекулярном слое коры мозжечка выявлялось небольшое количество нейронов, расположенных между отростками нейронов зернистого и молекулярного слоев. Межклеточный матрикс имел тенденцию к слабому восприятию окрашивания (рисунок 1). Некоторые фрагменты отростков клеток сохраняли на своей поверхности белково-полисахаридный материал, входящий в состав гликокаликса.

Комплексное изучение состава и содержания несulfатированных и сульфатированных

форм гликозаминогликанов позволило проследить особенности их динамики. Содержание несulfатированных гликозаминогликанов к третьему часу эксперимента составило 24,7 %, среди соединений этой группы в основном преобладала гиалуроновая кислота.

Среди sulfатированных форм гликозаминогликанов преобладали хондроэтин-4-сulfаты, которые составили 25,6 %. При дифференцированном анализе было выявлено достаточно вы-

сокое содержание другой группы sulfатированных гликозаминогликанов в виде хондроэтин-6-сulfатов, содержание которых в этот период составило 22,5 %. Среди всех гликозаминогликанов содержание его высокосulfатированных форм гепарансulfата и гепарина составило 9,1 %. К шестому часу эксперимента в ткани мозжечка сохранялись явления изменения тинкториальных свойств коры мозжечка (рисунок 2).

Рисунок 1
Фрагмент ткани мозжечка крысы. Слои мозжечка.
Гранулярный слой – А, ганглиозный слой – Б, молекулярный слой – В (через 3 часа после кровопотери).
Окраска толуидиновым синим. Об. 20. Ок. 10

Рисунок 2
Фрагмент ткани мозжечка крысы. Слои мозжечка.
Гранулярный слой – А, ганглиозный слой – Б, молекулярный слой – В (через 6 часов после кровопотери).
Окраска толуидиновым синим. Об. 20. Ок. 10

Динамика гликозаминогликанов в этот период имела тенденцию к увеличению содержания sulfатированных форм. Среди этих соединений преобладали хондроэтин-4-сulfаты. Со-

держание гиалуроновой кислоты возрастало незначительно и составляло 26,1 %. Эти несulfатированные формы гликозаминогликанов имели склонность к более выраженному лизису со сто-

роны тестикулярной гиалуронидазы по сравнению с более ранними периодами. Среди сульфатированных форм гликозаминогликанов хондроэтин-4-сульфаты составляли 33,8 %. Дифференцированное применение тестикулярной и бактериальной гиалуронидаз позволяет отметить изменение скорости их влияния на эту сульфатированную форму гликозаминогликанов. Использование тестикулярной гиалуронидазы показало незначительное увеличение скорости лизиса хондроэтин-4-сульфата. В то же время применение бактериальной гиалуронидазы показало возрастание скорости лизиса в 1,85 раза по сравнению с более ранним периодом.

Исследования состава гликозаминогликанов и выявление среди них хондроэтин-6-сульфатов позволяет отметить, что содержание этих форм составляло 27,3 %. Использование метилирования для контроля сульфатированных форм гликозаминогликанов выявляет изменение интенсивности окрашивания в растворах с толуидиновым синим при низких молярностях – 0,2–0,4 $MgCl_2$.

Выявление содержания высокосульфатированных форм гликозаминогликанов в коре моз-

жечка показывает их незначительное увеличение до 11,8 %. Для дифференцированного контроля этих гликозаминогликанов проводилось метилирование. При этом было обнаружено снижение интенсивности окрашивания срезов, полученных из коры мозжечка. К концу двенадцатого часа в коре мозжечка наблюдались изменения в сосудах микроциркуляторного русла. Анализ гистохимических препаратов показывает, что в этот период в ткани мозжечка прослеживается неравномерное распределение гликозаминогликанов, различное их соотношение по составу и классам. Определение содержания несulfатированных гликозаминогликанов в коре мозжечка позволяет отметить существенное возрастание этих форм по сравнению с предыдущим сроком практически на пятьдесят процентов. При этом можно отметить, что содержание гиалуроновой кислоты возросло почти до 39,5 %. Результаты гистохимического анализа показывают существенное возрастание несulfатированных гликозаминогликанов к 12 часу эксперимента, а максимальное увеличение сульфатированных прослеживалось к 6 часу эксперимента с последующим их снижением (таблица 1).

Таблица 1 Соотношение классов ГАГ в мозжечке крыс при кровопотере, %

Наименование	Контрольная группа	Часы			
		1	3	6	12
Гиалуроно́вая кислота	16,1	22,7	24,7	26,1	39,5
Хондроитин-4-сульфат	14,3	19,5	25,6	33,8	33,2
Хондроитин-6-сульфат	11,7	17,8	22,5	27,3	21,2
Гепарансульфат	6,3	7,4	9,1	11,8	7,9

Рисунок 3
Процентное соотношение классов гликозаминогликанов в мозжечке крыс при кровопотере

Анализ сульфатированных форм гликозаминогликанов позволяет отметить, что содержание хондроэтин-4-сульфата в этот период практически не изменилось и составило 33,2 %. Более детальный анализ сульфатированных гликозаминогликанов показывает, что хондроэтин-6-сульфаты имели тенденцию к снижению содержания до 21,2 %. Исследование содержания гепарансульфата и гепарина позволило проследить их уменьшение практически на треть, что составило 7,9 %.

Сопоставление основных классов гликозаминогликанов при моделировании острой кровопотери представлено на рисунке 3.

Вывод. Экспериментальная кровопотеря вызывала в мозжечке изменения со стороны сосудов микроциркуляторного русла. Они проявлялись явлениями дилатации, замедлением кровотока, периваскулярными отеками. В ткани моз-

жечка наблюдались явления изменения структуры нейронов. Для нейронов были характерны явления перичеселлюлярного отека, набухания клеток. В более поздние сроки прослеживалась миграция нейронов из одного слоя в другой.

Данные гистохимических исследований показывают изменения тинкториальных свойств клеток. В нейронах прослеживались явления нарушения обмена веществ. Результаты гистохимического анализа разных классов гликозаминогликанов показывают существенное возращание несulfатированных гликозаминогликанов к 12 часу эксперимента, а максимальное увеличение сульфатированных прослеживалось к 6 часу эксперимента с последующим их снижением. Данные морфофункциональные изменения нами рассматриваются как компенсаторные процессы.

Библиографический список

1. Аврущенко, М.Ш. Изменения популяции клеток Пуркинье мозжечка в динамике постреанимационного периода, после остановки системного кровообращения [Текст] / М.Ш. Аврущенко, А.В. Афанасьева // Современные методы диагностики и лечения в реаниматологии. 2009. С. 5–7.
2. Западнюк, И.П. Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в эксперименте [Текст] / И.П. Западнюк, В.И. Западнюк, Е.А. Захария, Б.В. Западнюк. Киев: Вища школа, 1983. 383 с.
3. Влияние гипоксии на организм [Текст] / С.А. Лобанов, И.В. Шишкин, Н.О. Кузнецова, А.А. Малагина, З.Р. Хисматуллина, Е.В. Насырова, М.А. Роженцев, А.А. Роженцев, З.Р. Мансурова // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. 2017. № 2 (42). С. 12–27.
4. Влияние гликозаминогликанов на структуру мозжечка при гипоксии [Текст] / И.В. Шишкин, С.А. Лобанов, З.Р. Хисматуллина // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2016. № 4 (40). С. 77–83.
5. Кондратюк, К.Л. Нейрорадиологические предикторы исхода внутримозговых кровоизлияний в мозжечок в остром периоде [Текст] / К.Л. Кондратюк // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. 2015. № 2 (26). С. 15–24.
6. Острая кровопотеря: регионарный кровоток и микроциркуляция (обзор, часть I) [Текст] / В.В. Мороз, И.А. Рыжков // Общая реаниматология. 2016. Т. 12. № 2. С. 66–89.
7. Меркулов, Г.А. Курс патогистологической техники [Текст] / Г.А. Меркулов. 4-е изд. Л.: Медицина, 1969. С. 156–165, 171–172.
8. Семченко, В.В. Гистологическая техника [Текст]: учебное пособие / В.В. Семченко, С.А. Барашкова, В.Н. Ноздрин, В.Н. Артемьев. 3-е изд., доп. и перераб. Омск – Орел: Омская областная типография, 2006. 290 с.
9. Ультроструктурные изменения нейронов мозжечка крыс при гипоксии [Текст] / С.А. Лобанов, Е.В. Насырова, А.А. Роженцев // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2017. № 3 (43). С. 31–36.
10. Armstrong C., Hawkes R. Pattern formation in the cerebellum: colloquium series on the developing brain, lecture 11. Series editor M. McCarthy. Morgan and Claypool life sciences. 2014. P. 85.

Сведения об авторах

1. **Роженцев Алексей Алексеевич**, аспирант первого года обучения кафедры охраны здоровья и БЖД, ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3А, e-mail: ufa.darts@yandex.ru.
2. **Роженцев Михаил Алексеевич**, аспирант первого года обучения кафедры охраны здоровья и БЖД, ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3А, e-mail: handboll-misha@mail.ru.

3. **Лобанов Сергей Александрович**, доктор медицинских наук, профессор, кафедра охраны здоровья и БЖД, ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3А, e-mail: lobanovprof@yandex.ru.

Статья раскрывает некоторые особенности, происходящие в мозжечке крыс при кровопотере. В результате экспериментальных исследований уже в первые часы после острой кровопотери

выявлены изменения со стороны микроциркуляторного русла. Приведены данные изменения содержания разных классов гликозаминогликанов.

A. Rozhentsev, M. Rozhentsev, S. Lobanov

MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL CHANGES OF RAT CEREBELLUM AT BLOOD LOSS

Key words: *cerebellum; blood loss; glycosaminoglycans; neuron; cryostatic sections; Purkinje cell.*

Authors' personal details

1. **Rozhentsev Alexey**, first year Post-graduate student of the Health protection and life safety department, Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla, 450008, Republic of Bashkortostan, Ufa, Oktyabrskaya Revolutsia st., 3A, e-mail: ufa.darts@yandex.ru.

2. **Rozhentsev Mikhail**, first year Post-graduate student of the Health protection and life safety department, Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla, 450008, Republic of Bashkortostan, Ufa, Oktyabrskaya Revolutsia st., 3A, e-mail: handboll-misha@mail.ru.

3. **Lobanov Sergey**, Doctor of medical sciences, professor of the Health protection and life safety department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla», 450008, Republic of Bashkortostan, Ufa, Oktyabrskaya Revolutsia st., 3A, e-mail: lobanovprof@yandex.ru.

The paper reveals some features that occur in the cerebellum of rats at blood loss. As the result of experimental studies in the first hours after acute

blood loss there are changes in the microcirculatory bloodstream. There are changes in the content of different classes of glycosaminoglycans.

© Роженцев А.А., Роженцев М.А., Лобанов С.А.

УДК 619:591.465.31:636.2

DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-87-99

Е.Н. Сковородин

ВЛИЯНИЕ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА ЭМБРИОГЕНЕЗ ЯИЧНИКОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Ключевые слова: *эмбриональное развитие; яичники плода; морфогенез яичников; коровы; патология обмена веществ.*

Введение. Ущерб от бесплодия крупного рогатого скота очень значителен. В США и ряде стран Западной Европы ежегодный уровень выбраковки коров достигает 34 % в основном за счет длительного бесплодия [37]. Восполнить эти потери можно лишь интенсивным вводом в маточное стадо первотелок. Этот процесс сдерживают следующие факторы. Во-первых, у них гораздо чаще, чем у полновозрастных коров,

возникают проблемы с оплодотворением. Во-вторых, в сельхозпредприятиях Российской Федерации наступление половой и физиологической зрелости у телок нередко задерживается на срок от шести до двенадцати месяцев [38], а при позднем вступлении телок в пору продуктивной жизни потребность в них возрастает до 50 % от числа основного стада, что является следствием не только скудного кормления растущих живот-

ных, но и врожденным бесплодием, имеющим генетическую природу или обусловленным болезнями беременных [37]. К числу внешних факторов, предрасполагающих к возникновению болезней беременных, следует, прежде всего, отнести погрешности в кормлении, включая общее голодание, хронический дефицит тех или иных питательных веществ, недоброкачественные корма, содержащие ядовитые вещества, микотоксины и т. д. Развивающаяся при этом фетоплацентарная недостаточность проявляется не только абортами, но и нарушениями в развитии плода (гипотрофия, иммунодефициты и т. п.) [39], а также последующим снижением способности телок к оплодотворению вследствие аномалий половых органов [28, 30].

Цель исследования – изучить функциональную морфологию овариальных желез в пренатальном онтогенезе в норме и при патологии обмена веществ у коров-матерей. Научная новизна настоящей работы заключается в том, что впервые с помощью комплекса макроскопических, морфометрических, гистологических, гистохимических и электронно-микроскопических методов проведено подробное комплексное исследование формирования яичников крупного рогатого скота в пренатальном онтогенезе в норме и при патологии течения беременности у коров-матерей. Изучено распространение аномалий и пороков развития органов размножения телок. Впервые описаны поликистоз яичников плодов крупного рогатого скота как форма гиперплазии овариальных желез, а также подробно изучены причины и морфологические проявления гипоплазии яичников, связанные с нарушениями в системе мать – плацента – плод. Представленное многолетнее исследование позволяет внести ясность в эти вопросы и разработать конкретные практические меры профилактики врожденного бесплодия.

Из литературы известно, что нормальное развитие яичников в эмбриональный период в дальнейшем определяет плодовитость и репродуктивную функцию половозрелого животного [9, 26]. Например, аномалии внутриутробного развития крупного рогатого скота могут проявляться снижением количества полноценных примордиальных фолликулов, что ведет к снижению полноценных эмбрионов [14]. Гонады вначале обладают лабильной организацией, затем формируются яичники или семенники [20, 27]. Развитие репродуктивных органов – это сложный процесс, реализующийся на протяжении нескольких стадий онтогенеза. Выяснение механизмов органогенеза позволяет четко определять этиопатогенез аномалий и уродств репродуктивной системы, следовательно, целена-

правленно профилактировать эти патологические процессы.

Первым этапом половой дифференциации является момент оплодотворения, когда половая хромосома спермия определяет генетический пол зиготы. Этот этап является первой критической фазой дивергентной дифференциации пола, когда изменение числа хромосом может приводить к уродствам и нарушениям воспроизводительной функции в дальнейшем. Второй этап – это появление морфологических признаков соматического пола.

Мезонефрические протоки и парамезонефрические (мюллеровы) протоки [16]. Под влиянием тестостерона мезонефрические протоки развиваются в семявыводящие каналы, формируются предстательная и пузырьковидная железы. Под действием мюллерова ингибирующего фактора дегенерируют парамезонефрические протоки [21]. Вероятно, этот фактор ингибирует развитие овариальных желез [23].

Индифферентные гонады содержат мигрировавшие гоноциты, а также клетки покровного эпителия, соединительнотканной мезенхимы и мезонефроса. Последний оказывает влияние на дальнейшую эволюцию соматических элементов и половых клеток в зачатках гонад [16].

Формирование гонад у крупного рогатого скота происходит в конце первого месяца развития у эмбрионов длиной тела 8–11 мм. Первые гоноциты в гонадах этого вида животных обнаруживаются у зародышей 13 мм длиной, то есть возрастом 30 суток [16]. Дифференциация в сторону яичников у эмбрионов начинается в конце зародышевого периода. Она увеличивается в размерах за счет роста эпителия и мезенхимной основы. К тридцати пяти суткам в гонаде обнаруживаются зачатковый эпителий, мезенхима с развивающимися эпителиальными тяжами и гоноцитами [16]. В этот период из клеток мезонефрического происхождения, иммигрирующих в гонады зародыша, развивается сеть яичника [16]. У шестинедельного эмбриона коровы гонады уже дифференцированы по полу. Весь орган заполнен корковым веществом от покровного эпителия, стромы и до мезонефроса, на котором яичник зафиксирован. К началу седьмой недели происходит отделение органа от мезонефроса и формирование сосудистой ножки яичника (мезовариума) [18].

У полуторамесячных плодов половые железы отделены от мезонефроса, но связаны с ним воротами овариальной железы [18]. Позднее овариальные железы отличаются от семенников по гистологическим признакам. Очень рано, задолго до формирования фолликулов у коров яичники начинают продуцировать стеро-

идные гормоны. При этом в зачатке яичников формируются клеточные тяжи, состоящие из соматических клеток, оогоний. По гистологическому строению в этот период зачатки гонад самок и самцов пола становятся весьма схожими. Наличие в зачатке тестикула Лейдиговских клеток – единственный гистологический критерий, позволяющий различить пол зачатка гонады [2]. Происходит линейное увеличение объема яичника во время пренатального онтогенеза [28–30]. Масса яичника у зародышей увеличивается быстрее, чем масса тела. У крыс, к примеру, эти процессы после рождения идут параллельно [4].

Исследователи констатировали вариабельность макроскопической структуры яичников, особенно в последний месяц беременности. Рост и развитие фолликулов у телочек-эмбрионов начинает очень рано. Значительная часть фолликулов, не достигая даже вторичной структуры, атрезиируются, но некоторая часть их превращается в третичные фолликулы, достигая 4 мм в диаметре. Овуляции автор не наблюдал [10].

Период интенсивного роста яичников описывают у 6–8-месячных плодов крупного рогатого скота. Отмечают развитие фолликулов вплоть до полного созревания и овуляции, без формирования лютеиновых структур. Овариальные железы зародышей напоминают в этот период яичники половозрелого животного. К третьему месяцу эмбриогенеза происходит начало массового роста фолликулов вплоть до образования полости, видимой невооруженным глазом [14].

У плодов шестимесячного возраста фолликулы видны на поверхности яичников. У некоторых животных они могут быть заполнены кровью. Однако указывается, что у некоторых шестимесячных плодов встречаются органы, в которых не обнаруживают развитых фолликулов, что свидетельствует о большой вариабельности. У новорожденных яичники уже хорошо развиты и достигают размеров более восемнадцати мм, что придает их поверхности пузырчатый вид. Фолликулы достигают пяти миллиметров в диаметре, но большинство их подвергается заполнению полости соединительнотканными элементами, придающими им вид рубца (облитерация). Вероятно, это можно рассматривать как признак начала эндокринной функции овариальных желез, необходимой для формирования всего организма самки [32].

Некоторые исследователи отмечали формирование в яичниках 7–8-месячных плодов макроскопически выявляемых полостных фолликулов. Облитерационной и кистозной атрезии подвергались вторичные и третичные фолликулы к девяти месяцам. Поэтому паренхима коркового вещества гонад не содержала растущих и созре-

вающих фолликулов [35]. Значительное количество фолликулов у поздних плодов крупного рогатого скота были в состоянии атрезии. Только часть из них подвергалась лютеинизации. Лютеиновые атретические тела у плодов образованы гипертрофированными клетками теки и гранулезы. По своей структуре эти атретические тела напоминали желтые тела половозрелых животных [12].

Представленная статья посвящена изучению формирования и развития овариальных желез крупного рогатого скота в эмбриогенезе у здоровых коров-матерей и при патологии обмена веществ.

Материал и методы. В хозяйствах исследовали рационы кормления и условия содержания коров. Клиническое состояние животных определяли стандартными методами, а состояние обмена веществ подтверждали с помощью биохимического исследования крови. Отбирали животных и классифицировали их на следующие группы (таблица 1). Первая группа – коровы без патологии обмена веществ и полученные от них плоды и новорожденные телята ($n = 91$). Вторая группа – коровы, кормление которых было энергетически неполноценным, рационами, несбалансированными по основным питательным элементам, содержащиеся без активного движения, с признаками нарушения обмена веществ (кетоз, нарушения минерального обмена, гиповитаминоз А), подтвержденные биохимическим исследованиям крови, полученные от них плоды и новорожденные телята ($n = 71$).

На мясокомбинате после убоя проводили тщательное исследование туш и органов коров и полученных от них плодов. Возраст плодов определяли по дате осеменения коровы, уточняли по массе и длине тела от основания хвоста до затылочной кости (crown-rump length). Новорожденных телят в возрасте до пятнадцати суток убивали для последующих органометрических, гистологических, гистохимических и электронномикроскопических исследований. Все эксперименты были проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации (Закон РФ «О ветеринарии»; Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья 245. «Жестокое обращение с животными»; Приказ министерства здравоохранения СССР № 755 от 12 августа 1977 «О мерах по дальнейшему совершенствованию организационных форм работы с использованием экспериментальных животных») и с учетом Европейской конвенции по защите домашних животных (Council of Europe – ETS no. 125 – European Convention for the Protection of Pet Animals) [40, 41, 42, 43]. Материал фиксировали в жидкости Карнуа, обезвоживали в спиртах

возрастающей концентрации и заливали в парафин. На ротормном микротоме получали срезы толщиной 5 мкм и после депарафинации окрашивали их гематоксилином-эозином и по Паппенгейму. Коллагеновые волокна обнаруживали по ван Гизону, по Маллори. Дезоксирибонуклеопротеиды и рибонуклеопротеиды выявляли в срезах по Браше и Эйнарсону, по Фельгену, гли-

коген и нейтральные гликопротеиды выявляли по МакМанусу, кислые гликозаминогликаны определяли по Сидмену. После фиксации в жидком азоте в криостате получали срезы и в них гистоэнзимологически, с подсчетом количества гранул на стандартной площади среза, определяли активность щелочной и кислой фосфатазы по Берстону [22].

Таблица 1 Характеристика использованного материала

Возраст плодов и телят	Первая группа	Вторая группа
Ранний и средний этап пренатального онтогенеза		
От 20 до 90 суток	10	10
Поздний этап пренатального онтогенеза		
3 месяца	10	5
4 месяца	10	5
5 месяцев	10	5
6 месяцев	11	10
7 месяцев	10	7
8 месяцев	10	7
9 месяцев	10	7
Всего плодов	81	56
Новорожденные телята		
1–14 суток после рождения	10	15
Всего животных	91	71

Для электронной микроскопии материал фиксировали в охлажденном 2,5 % глютаральдегиде на фосфатном буфере с pH 7,3. Фиксировали в 1 % растворе осмиевой кислоты на фосфатном буфере. Кусочки заливали в эпон-аралдит. Ультратонкие срезы монтировали, контрастировали цитратом свинца и просматривали в

$$\text{объем яичника} = (4/3 \pi) \times (0,5 \times \text{Дл.}) \times (0,5 \times \text{Шр.}) \times (0,5 \times \text{Тлщ.}),$$

где Дл. – длина, Шр. – ширина, Тлщ. – толщина органа [30].

Для статистического анализа использовали критерии Стьюдента, Т-критерия Уайта, Х-критерия Ван-дер-Вардена в зависимости от распределения.

Результаты исследований и их обсуждение. Установили, что индифферентные гонады бычков и телочек закладываются в начале пренатального онтогенеза на двадцатые – тридцать четвертые сутки в виде выпячиваний вентромедиальной поверхности мезонефросов. В них различается целомический эпителий, мезенхимная основа, синусоидные капилляры и оогонии. Гонады быстро растут за счет митотического деления клеток. Морфологически яичники можно различить у 34–45-суточных зародышей. Они содержат основные структуры органа: мезовариум, корковое вещество с сетью, мозговое вещество, покровный эпителий.

электронном микроскопе ЭМФ-100И при увеличении на 6000–22000. У ранних эмбрионов получали с дорсо-каудальной части туловища серийные срезы. У более старших плодов определяли линейные показатели овариальных желез. Объем овариальных желез плодов рассчитывали по предложенной нами формуле:

Поскольку последующее формирование и развитие яичников определяется интенсивным митотическим делением оогоний и вступлением их в профазу I мейоза, формированием яйценосных шаров, плотность расположения половых клеток в корковом веществе к трем месяцам внутриутробного периода значительно увеличивается. У четырехмесячных плодов в глубоких зонах коркового и мозгового вещества формируются фолликулы. К рождению фолликулярные стадии половых клеток преобладают, а оогонии, расположенные в яйценосных шарах, исчезают. Электронно-микроскопическое и гистохимическое исследование развивающихся фолликулов свидетельствует об асинхронном оогенезе у плодов крупного рогатого скота. В яичниках обнаруживаются половые клетки на нескольких стадиях профазы I мейоза с разным морфофункциональным состоянием ядра (рисунки 1–6).

Рисунок 1
Яичник 6-мес. плода. Ооцит на стадии диктиотены профазы I мейоза. Ув. 12000

Рисунок 2
Яичник 7-мес. плода. Ооцит на стадии диплотены профазы I мейоза. Ув. 12000

Рисунок 3
Примордиальный фолликул 7-мес. плода. Ооцит окружен фолликулярными клетками. Ув. 12000

Рисунок 4
Ооцит 9-мес. плода на стадии диплотены профазы I мейоза. Ув. 12000

Рисунок 5
Электронная микрофотография коркового вещества Ооцит яичника 9-мес. плода. Ув. 22000

Рисунок 6
Яичник 7-мес. плода. Цитоплазматические включения в ядре ооцита. Ув. 22000

Апоптоз половых клеток начинается после сорока пяти суток плодного развития и регистрируется в дальнейшем на протяжении всей жизни. Интенсивность программируемой гибели обеспечивает постепенное исчезновение оогоний и ооцитов в составе яйценосных шаров, отбор растущих фолликулов, из которых в дальнейшем формируются антральные стадии пузырьков. Апоптоз половых клеток проявляется нарушениями мейотических преобразований ядра и цитоплазмы, а при патологии – наличием аномальных включений (рисунки 7, 8). Необходимо отметить, что при патологии основную роль в исчезновении половых клеток играет морфофункциональное состояние гистиона фолликула, непосредственно влияющее на развитие этих структур (рисунки 9–12).

В конце шестого месяца внутриутробного развития плода в яичниках невооруженным гла-

зом можно увидеть единичные полостные фолликулы. Мы считаем, что это нормальные структуры, развитие и инволюция которых играет важную роль в формировании коркового и мозгового вещества овариальных желез. Исследовали наличие асимметрии в развитии овариальных желез. Для этого мы определяли массу и объем правого и левого яичников, начиная с трехмесячного возраста плода. Правый яичник тяжелее и крупнее, чем левый. Разница достоверна при $P < 0,05$. Особенно это выражено с момента интенсивного развития полостных фолликулов (7 месяцев внутриутробного развития). Многослойные и полостные фолликулы подвергаются различным формам атрезии. Установили, что заполнение полости овариальных фолликулов плодов крупного рогатого скота может протекать двумя путями. Первый тип, наиболее часто встречающийся, – облитерационный.

Рисунок 7
Миелопо-добные включения в цитоплазме ооцита.
Ув. 22000

Рисунок 8
Ядро и цитоплазма ооцита в первичном фолликуле
новорожденной телки. Ув. 12000

Рисунок 9
Фолликул новорожденной телки.
Ооцит, фолликулоцит, базальная мембрана
и окружающая соединительная ткань. Ув. 8000

Рисунок 10
Межклеточные контакты
в первичном фолликуле новорожденной телки.
Ув. 12000

Рисунок 11
Первичный фолликул новорожденной телки.
Прозрачная зона и микроворсинки. Ув. 10000

Рисунок 12
Фолликулярные клетки, окружающие
близко расположенные ооциты. Ув. 10000

Он характеризуется дистрофией и атрофией фолликулоцитов и заполнением полости соединительной тканью. Второй тип – лютеинизация – характеризуется гиперплазией клеточных элементов гранулезы и внутренней теки. Клеточные элементы этих структур заполняют полость пузырька. Этот тип атрезии мы обнаруживали в последний месяц стельности, когда фолликулы яичника плода становятся достаточно крупными. Описанную многими авторами так называемую кистозную атрезии мы не обнаруживали, хотя формирование кист при патологии возможно.

По нашим данным, покровный эпителий не участвует в формировании структур коркового и мозгового вещества яичников. Эпителиоциты выполняют секреторную функцию. Интенсив-

ность секреции определяется уровнем гормонов, секретируемых яичниками, что ярко проявляется при патологии. В этом случае эпителий и подлежащая белочная оболочка формирует структуры, напоминающие вдавления, каналы, инклюзионные кисты или выступающие над поверхностью образования типа папиллом.

Сеть яичника (производная мезонефроса) формируется на самых ранних стадиях пренатального онтогенеза. В два месяца пренатального развития в ней можно определить следующие части: внутрияичниковую, соединяющую и внеяичниковую. В дальнейшие периоды онтогенеза они сохраняются и развиваются пропорционально размерам органа и выполняют, прежде всего, экскреторную функцию. Активизация внутрияичниковой части сети при формирова-

нии фолликулов косвенно может свидетельствовать о её участии в формировании основных структур яичника.

При патологии обмена веществ у коров-матерей, у поздних плодов развивается гипоплазия овариальных желез (рисунок 13). Яичники характеризуются маленькими величиной и массой, отсутствием в них антральных фолликулов, массовым исчезновением генеративных элементов, гаметопатиями.

У трех коров с острыми интоксикациями обнаружили увеличение количества и величины антральных фолликулов в яичниках плодов, сопровождающееся их кистозными изменениями (рисунок 14), и кровоизлияния в полость фолликулов. По нашему мнению, эти изменения

Рисунок 13
Влагалище, матка и яичники 9-мес. плода.
Гипоплазия яичников плода

можно рассматривать как форму гиперплазии интерстициальной ткани овариальных желез или, другими словами, как поликистоз яичников плода, связанный с нарушением гормональных взаимоотношений между матерью и плодом (фетоплацентарная недостаточность).

В нашей работе мы исследовали формирование яичника как целостного органа. Для этого применяли комплекс органомерических, гистологических, гистохимических и электронно-микроскопических методов с учетом течения стельности у коров-матерей. Это позволило нам интегрировать результаты, полученные на разных уровнях исследования, и представить формирование овариальной железы в целом с учетом сложных внутриорганных связей.

Рисунок 14
Влагалище, матка и яичники 9-мес. плода.
Поликистоз яичников плода

Из литературы до сих пор не совсем ясно, как формируются органы размножения самок на ранних этапах онтогенеза. По нашим данным, появление первичных недифференцированных гонад у коров происходит в эмбриогенезе довольно рано. Уже у двадцатисуточных плодов можно обнаружить пролиферацию целомического эпителия на поверхности мезонефроса. В гонадах эмбрионов, не имеющих признаков пола, уже выявляется мезенхимная основа, единичные оогонии, целомический эпителий, формируются синусоидные капилляры. Это подтверждается и исследованиями других авторов, которые обнаруживали эти образования у эмбрионов в несколько иные сроки эмбриогенеза [16]. Очень важно отвергнуть представление о том, что гонады формируются позднее других органов, поскольку половая дифференциация тела и органов начинается довольно рано и на этот процесс влияют разные гормональные профили самок и самцов.

Позднее у сорокапятисуточных эмбрионов гонады интенсивно растут и дифференцируются в яичники или семенники, что происходит на фоне регрессии первичной почки. В яичниках появляются основные структуры органа: мезовариум, корковое и мозговое вещество с сетью

яичника, покровный эпителий. На этом основании по гистологическим признакам их можно отличить от семенников [18].

Мы впервые определили в этом возрасте объем яичника с помощью объемной реконструкции серийных срезов, абсолютный и относительный объемы коркового и мозгового вещества, плотность расположения половых клеток. К двум месяцам масса и объем яичников заметно увеличиваются. Больше всего растет объем мозгового вещества по отношению к корковому, что связано с выполнением трофической функции. В корковом веществе интенсивно делятся оогонии, число которых значительно увеличивается (в 6 раз). Некоторые авторы рассматривают покровный эпителий как «зародышевый», формирующий «эпителиальные тяжи» и даже генеративные элементы. Гистохимическое и электронно-микроскопическое исследования свидетельствуют о том, что даже на ранних стадиях развития плода он имеет мезотелиальный характер и обладает выраженной секреторной активностью [16]. Признаков разрастания покровного эпителия вглубь яичника между клетками мезенхимы или участие его в гаметогенезе мы не обнаружили. В органе четко различается поверхностная зона, где происходит ми-

тотическое размножение половых клеток, и сосудистая мозговая зона.

У млекопитающих в течение всей репродуктивной жизни подавляющее большинство половых клеток гибнет. В исследованиях, посвященных динамике этого процесса, в яичниках плодов млекопитающих выявлены волны дегенерации [33, 34]. Однако описание механизмов элиминации половых клеток противоречивы [8]. Мы установили, что к двум месяцам внутриутробного развития около 2 % оогоний имеют признаки деструкции ядра и цитоплазмы. Интенсивность и морфология этого процесса в дальнейшем имеют в каждом возрастном периоде выраженные особенности.

Средний этап пренатального онтогенеза характеризуется формированием основных структур овариальных желез. Уже появляется и эндокринная функция овариальных желез, которую мы констатировали с помощью гистохимических и гистоэнзимологических методов. Биохимические исследования других авторов свидетельствуют о способности к образованию стероидных гормонов в этот период. В небольшом количестве образуется тестостерон, андростендиол, эстрон и отмечается значительный уровень эстрадиола [2, 4]. Эмбриологи и патологи склонны рассматривать некоторые моменты развития зародыша, как «критические». Во время этих фаз качественно меняется структура и функция биологических систем, а организм становится крайне чувствителен к неблагоприятным факторам, нарушающим гомеостаз и течение беременности [20, 27].

Мы выделяем три критические фазы развития репродуктивной системы от оплодотворения до двухмесячного возраста плода. Первая критическая стадия – это оплодотворение. При нарушении числа хромосом или при неполноценности гамет может произойти не только гибель зиготы, но и возникнуть химеризм по XY-хромосомам, мономия Тернера, гоносомальные анеуплоидии, X-трисомии и т. п. Давно доказано внегонадное происхождение половых клеток [36]. На протяжении всего изученного периода онтогенеза мы на своих препаратах не наблюдали гаметогенез из стромальных овариальных структур, покровного эпителия других компонентов зачатков. Первичные половые клетки мигрируют в гонады из желточного мешка эндодермы [10, 11, 12]. Это происходит у крупного рогатого скота в первый месяц внутриутробного развития. Данную стадию мы рассматриваем как вторую критическую фазу, т. к. в это время могут возникать нарушения миграции гонотицитов и гаметогенеза. Третьей критической фазой

является установление гонадного пола в возрасте сорок пять суток, когда могут развиваться гермафродитизм и фримартинизм.

Во время позднего, завершающего этапа эмбрионального развития происходят не менее значительные события. Прежде всего, это выражается в формировании примордиальных, первичных, вторичных и даже третичных фолликулов. После колонизации зачатков гонад первичными половыми клетками, деления их и вступления в профазу I мейоза ооциты переходят на стадию диплотены. Начинается процесс фолликулообразования [31, 35].

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что к трем месяцам внутриутробного развития половые клетки в корковом веществе яичников располагаются очень тесно, поскольку оогонии и ооциты находятся в составе яйценосных шаров. Тщательное морфологическое исследование серийных срезов яичника не позволяет утверждать, что в этом периоде формируются фолликулы; это соответствует результатам, полученными другими авторами [1, 14, 32]. Примордиальные фолликулы, по нашим данным, появляются у четырехмесячных плодов, хотя в составе яйценосных шаров преобладают оогонии и ооциты. В дальнейшем происходит асинхронное вступление ооцитов в фолликулярную стадию. Их переход в стадию диплотены профазы I мейоза, формирование фолликулярной оболочки выражаются яркими структурными изменениями. Центральное положение занимает ядро. В связи со значительной транскрипционной активностью, накоплением ДНК происходит деконденсация хромосом. Активно функционируют ядрышки, которые характеризуются нуклеонемной структурой. Увеличивается число и дифференциация органелл в цитоплазме. Появляется наиболее характерная структура примордиальных ооцитов – парануклеарный комплекс. Заметно повышается активность окислительно-восстановительных и гидролитических ферментов. Растет объем ядра и цитоплазмы.

Большинство половых клеток к семимесячному возрасту окружены фолликулярным эпителием, дифференцируется их ультраструктура. Увеличивается степень конденсации хромосом. Теряют нуклеонемную структуру и становятся более осмиофильными ядрышки. Появляется комплекс дилатаций в ядерной оболочке. Вероятно, наблюдаемые внутри дилатаций включения могут быть предварительной стадией в продукции предшественников митохондриальных телец [8].

Наличие так называемых «капюшоноподобных» крист митохондрий, по нашим данным, является видовой особенностью ооцитов плодов крупного рогатого скота. Подобные своеобразные митохондрии и небольшое количество крист в них свидетельствует о том, что они выполняют большое количество побочных функций [7]. Изменения ядерно-цитоплазматических отношений в ооцитах примордиальных фолликулов сопровождаются изменением взаимоотношений с фолликулярными клетками. Последние располагаются в тесной связи с клетками, не имеют специальных примыкающих структур и отделяют половые клетки от окружающей соединительной ткани коркового вещества. Фолликулярные клетки не богаты органеллами и их ультраструктура и гистохимия свидетельствуют о невысокой функциональной активности.

Фолликулогенез сопровождается перестройкой стромально-сосудистого компонента органа. К четырехмесячному возрасту корковое вещество занимает две трети объема яичника, что происходит на фоне умеренного роста массы и объема органа. В дальнейшем отмечается неравномерный ускоренный рост мозгового вещества органа. А ближе к рождению увеличение объема коркового вещества снова опережает рост мозгового вещества. Меняется структура соединительной стромы ткани. При наличии яйценосных шаров межклеточное вещество слабо развито. При появлении фолликулов, особенно антральных, происходит развитие волокнистого компонента соединительной ткани, ускоряется рост мозгового вещества, сосудов и нервов органа. У четырехмесячных плодов группы половых клеток окружены общей соединительнотканной оболочкой, а к концу внутриутробного периода каждый фолликул имеет собственную гранулезу и текальную оболочку. Развитие фолликулов стимулирует рост стромально-сосудистого компонента органа. Она, в свою очередь, выполняя опорную и трофическую функцию, обеспечивает дифференциацию и сохранение пула половых клеток [5, 17]. Развитие мозгового вещества также направлено на выполнение трофической функции. Образование примордиальных фолликулов, а затем и антральных фолликулов невозможно без качественной перестройки соединительной ткани, выполняющей механическую, трофическую, защитную и структурно образовательную функции [24].

Проведенное нами комплексное многоуровневое морфологическое исследование соединительной ткани, окружающей фолликулы, свидетельствует о том, что она отличается от обычной

рыхлой соединительной ткани других органов. Она характеризуется, прежде всего, присутствием малодифференцированных соединительнотканых клеток. Последние имеют выраженную отростчатую форму, округлое, богатое эухроматином ядро и в то же время содержат мало рибонуклеопротеидов в цитоплазме. Исследователи рассматривают подобные клетки как бластоподобные или, точнее, фибробластоподобные клетки, которые способны развиваться в интерстициальные клетки [16]. Видимо, тканевые структуры, окружающие ооцит, правильно рассматривать как своеобразный гематофолликулярный барьер, альтеративные изменения которого могут приводить к массовой гибели фолликулов [5]. Что мы и наблюдали у поздних плодов, полученных от коров с патологией обмена веществ. Кормление этих животных было энергетически неполноценным и не сбалансированно по основным питательным веществам. Диагностировали недоразвитие органов размножения плодов, и прежде всего яичников. Эти изменения можно рассматривать как гипоплазию. В органах сохраняются структуры, обнаруживаемые только в раннем эмбриональном развитии (оогонии, яйценосные шары) и, в свою очередь, замедляется развитие фолликулов. Гипоплазия органов пищеварения и центральных органов иммунитета подробно описана исследователями у телят-гипотрофиков. Гипоплазия органов размножения детально описана нами впервые, хотя известны генетически обусловленные гипоплазии яичников у шведского скота.

При патологии первичные изменения мы обнаруживали в гранулезе. Они являлись дистрофическими, отличались исчезновением характерных для этих клеток межклеточных контактов. Фолликулоциты перестают делиться, прозрачная зона утолщается, ооцит подвергается пикнозу. В соединительной ткани текальной оболочки отмечали явления гемостаза, отека, мукоидного и фибриноидного набухания.

У плодов, полученных от коров, содержащихся на сбалансированном рационе и в оптимальных условиях содержания, без патологии обмена веществ и нарушений течения беременности, исчезновение непустых фолликулов не носит массовый характер. Оно обусловлено, прежде всего, нарушением мейотических преобразований ядра. Ранее мы показали, что у телок, которые родились от коров, получавших избыточное количество силоса в сухостойный период, а также при хроническом фузариотоксикозе и при гиподинамии, могут наблюдаться недоразвитие полового аппарата и задержка полового созревания [30]. В этом плане большое

значение имеет знание закономерностей формирования антральных фолликулов у коров. Данные из литературных источников не вносят ясность в вопрос, когда полостные фолликулы формируются, развиваются и как исчезает их полость [6, 13, 19, 28]. По нашим данным, полость в фолликулах начинает формироваться уже у шестимесячных плодов, но обычно макроскопически они не обнаруживаются. Затем этот процесс нарастает и у девятимесячных плодов невооруженным глазом обнаруживается до трех третичных фолликулов. Их величина может достигать 4 мм в диаметре.

На основании обнаружения у поздних плодов полостных фолликулов с развитой внутренней текой определении гистохимических характеристик продуцирующих гормоны структур (присутствие суданофильных и ШИК-позитивных включений, активность фосфатаз) можно сделать вывод, что гипоталамо-гипофизарно-яичниковая система плода активно работает в последней трети стельности, половые железы активно синтезируют гормоны уже в начале их формирования и дифференцировки [2, 9].

Три фактора определяют развитие антральных фолликулов у плодов: гонадотропины адеиногипофиза матери, хориогонины плаценты, собственные гонадотропные гормоны зародыша. О разном уровне этих гормонов свидетельствует выраженная вариабельность строения овариальных желез плода в отношении формирования пузырьков. Крайней степенью гиперстимуляции роста овариальных фолликулов является впервые описанный нами у крупного рогатого скота поликистоз яичников плода, который является формой гиперплазии фолликулярного аппарата. Аналогичные изменения описаны у других млекопитающих (лошади, жирафы) и человека [3].

А вот у поздних плодов, полученных от коров с хроническими формами патологии обмена веществ, мы обнаружили отсутствие третичных фолликулов, задержку инволюции эмбриональных структур, массовую дегенерацию первичных фолликулов. Рано проявляются признаки атрезии, вследствие чего третичные фолликулы не успевают сформироваться до размеров видимых макроскопически. Гистохимическое исследование

свидетельствует о гипоплазии гормональноактивной текальной ткани и выраженном снижении ее эндокринной функции.

Выводы. Установили, что индифферентные гонады крупного рогатого скота закладываются в конце зародышевого этапа (20–34 сутки пренатального развития). У 34–45-суточных зародышей они дифференцируются в яичники и содержат основные дефинитивные структуры органа. Дальнейшее развитие яичников определяется активным митотическим делением оогоний и формированием яйценосных шаров. У 4-месячных плодов на границе коркового и мозгового вещества начинают формироваться фолликулы. У 6–9-месячных телок ооциты и окружающие их структуры достигают дефинитивного состояния. Апоптоз половых клеток начинается уже у 45-суточных зародышей, регистрируется на всем протяжении пренатального онтогенеза и определяется изменением структуры ядра. При патологии основную роль в исчезновении генеративных изменений играют нарушения структуры сосудисто-тканевого окружения. В норме после шести месяцев внутриутробного развития в яичниках появляются единичные полостные фолликулы, которые определяются макроскопически. При острых формах патологии беременности наблюдается поликистоз яичников, а при нарушении обмена веществ у коров-матерей у поздних плодов развивается гипоплазия овариальных желез. Последняя у новорожденных теллят, перенесших желудочно-кишечные заболевания, прогрессирует и может принимать необратимый характер. Таким образом, при разработке биотехнологических методов воспроизводства крупного рогатого скота, биологически активных и химиотерапевтических препаратов, рационов, технологий кормления и содержания стельных коров необходимо учитывать, что определенные сроки беременности являются «критическими» для формирования овариальных желез плода. Это время оплодотворения и образования зиготы, формирования индифферентных гонад и миграции гоноцитов (20–34-е сутки), дивергентной дифференциации пола (34–45-е сутки), начала формирования примордиальных фолликулов (4 месяца), образования антральных фолликулов (6–7 месяцев).

Библиографический список

1. Aerts, J.M. Ovarian follicular dynamics. A review with emphasis on the bovine species. Part II: Antral development, exogenous influence and future prospects / J.M. Aerts, P.E. Bols // *Reprod. Domest Anim.* 2010. V. 45. P. 180–187.

2. Allen, J.J. Regulation of steroidogenesis in fetal bovine ovaries: differential effects of LH and FSH / J.J. Allen, S.L. Herrick, J.E. Fortune // *Journal of molecular endocrinology.* 2016. V. 57. P. 275–286.

3. Barreto, R.S.N. Reproductive system development in male and female horse embryos and fetuses: Gonadal hyperplasia revisited / R.S.N. Barreto, P. Romagnoli, A.M. Mess // *Theriogenology*. 2018. V. 108. P. 118–126.
4. Burkhart, M.N. Morphological development and characterization of aromatase and estrogen receptors alpha and beta in fetal ovaries of cattle from days 110 to 250 / M.N. Burkhart, J.L. Juengel, P.R. Smith, D.A. Heath, G.A. Perry // *Anim. Reprod. Sci.* 2010. V. 117. P. 43–54.
5. Clara, C.M. Apoptosis in ovarian granulosa cells of cattle: Morphological features and clearance by homologous phagocytosis / C.M. Clara, C.P. Romina, A. Maruri // *Acta histochemica*. 2015. V. 117. P. 92–103.
6. Danilovic, L. Z-cells and oogonia/oocytes in the advanced process of autophagy are the dominant altered cells in the ovaries of hypothyroid newborn rats / L. Danilovic // *Acta Veterinaria*. 2017. V. 67. P. 92–106.
7. Edmund, S. *Cytology*. (Third edition) / S. Cibas Edmund, S. Barbara, M.D. Ducatman. 2009. 257 p.
8. Fair, T. Oocyte ultrastructure in bovine primordial to early tertiary follicles / T. Fair, S.C.J. Hulshof, P. Hyttel // *Anatomy and embryology*. 1997. V. 195. P. 327–336.
9. Faraidoon, A.M.A. An abattoir study of the congenital abnormalities of ovaries and uterine tubes in slaughtered non-pregnant cows in sulaimani province / A.M.A. Faraidoon // *Сел. хоз-во – проблемы и перспективы* / Гродн. гос. аграр. ун-т. 2016. Т. 33. С. 132–141.
10. Fortune, J.E. The ovarian follicular reserve in cattle: What regulates its formation and size? / J.E. Fortune, M.Y. Yang, J.J. Allen // *Journal of animal science*. 2013. V. 91. P. 3041–3050.
11. Fortune, J.E. In vitro and in vivo regulation of follicular formation and activation in cattle / J.E. Fortune, M.Y. Yang, W. Muruvi // *Reproduction, fertility and development*. 2011. V. 23. P. 15–22.
12. Fortune, J.E. The earliest stages of follicular development: Follicle formation and activation: / J.E. Fortune, M.Y. Yang, W. Muruvi // *8th International Symposium on Reproduction in Domestic Ruminants*. Anchorage, AK, 2010. Society of Reproduction and Fertility. 2010. V. 67. P. 203–216.
13. Hummitzsch, K. A new model of development of the mammalian ovary and follicles / K. Hummitzsch, H.F. Irving-Rodgers, N. Hatzirodos // *PLOS ONE* 8578. FEB 7. 2013.
14. Ireland, J.J. Follicle numbers are highly repeatable within individual animals but are inversely correlated with FSH concentrations and the proportion of good-quality embryos after ovarian stimulation in cattle / J.J. Ireland, F. Ward, F. Jimenez-Krassel, J.L. Ireland, G.W. Smith // *Hum. Reprod.* 2007. V. 22. P. 1687–1695.
15. Kenngott R., Sinowatz F. Expression and distribution of intermediate-filament proteins and laminin during the development of the bovine Mullerian duct / R. Kenngott, F. Sinowatz // *Anat. Histol. Embryol.* 2008. V. 37. P. 223–230.
16. Kenngott, R. The role of ovarian surface epithelium in folliculogenesis during fetal development of the bovine ovary: a histological and immunohistochemical study / R. Kenngott, M. Vermehren, K. Ebach, F. Sinowatz // *Sexual Development*. 2013. V. 7. P. 180–195.
17. Kranc, W. Selected molecular and physiological aspects of mammalian ovarian granulosa cells in primary culture / W. Kranc // *Med. veter.* 2016. V. 72. P. 723–727.
18. Kurilo, L.F. Development of ovaries in bovine fetuses / L.F. Kurilo, N.P. Tepliakova, G.V. Lavrikova // *Ontogenez*. 1987. V. 18. P. 500–506.
19. Leung, P.C.K. *The Ovary* / P.C.K. Leung, E.Y. Adashi. Academic Press, San Diego 2003. 250 p.
20. McGeady, T.A. *Veterinary Embryology*. 2nd edition / T.A. McGeady, P.J. Quinn, E.S. Fitzpatrick. 2017. 260 p.
21. Monniaux, D. Regulation of anti-Mullerian hormone production in domestic animals / D. Monniaux, L. Drouilhet, C. Rico // *Reproduction fertility and development*. 2013. V. 25. P. 1–16.
22. Mulisch M., Welsch U. *Romeis Mikroskopische Technik*, ed 18. 2010. 345 p.
23. Pankhurst, M.W. Anti-Mullerian hormone overexpression restricts preantral ovarian follicle survival / M. Mulisch, U. Welsch // *Journal of endocrinology*. 2018. V. 237. P. 153–163.
24. Rehfeld, A. *Compendium of histology. A Theoretical and practical guide* / A. Rehfeld, M. Nylander, K. Karnov. 2017. 158 p.
25. Rodriguez, F.M. Role of component of the insulin-like growth factor system in the early stages of ovarian follicular persistence in cattle / F.M. Rodriguez // *Journal of comparative pathology*. 2017. V. 157. P. 2–3.
26. Sarraj, M.A. Mammalian fetal ovarian development: consequences for health and disease / M.A. Sarraj, A.E. Drummond // *Reproduction*. 2012. V. 143. P. 151–163.
27. Scott, F. Gilbert. *Developmental biology*. Tenth edition / F. Gilbert Scott. 2013.
28. Skovorodin, E.N. Development of the genital organs of the heifers in prenatal ontogenesis / Evgeny N. Skovorodin // *Evgeny N. Agricultural Biology*. 1997. № 6. P. 61–66.

29. Skovorodin, E.N. Ultrastructural pathology of the oocyte in cattle / Evgeny N. Skovorodin // Veterinary Medicine Journal. 1997. № 2. P. 42–45.
30. Skovorodin, E.N. Morphogenesis of Bovine Ovaries in Prenatal Ontogenesis in Norm and in Pathology of Metabolism in Cows-Mothers / Evgeny N. Skovorodin et al // J. of Engineering and Applied Sciences. 2018. V. 13. Issue 11 Si. P. 8768–8781.
31. Smits J.E., Cortvrindt R.G. The earliest stages of folliculogenesis in vitro / J.E. Smits, R.G. Cortvrindt // Reproduction. 2002. V. 123. P. 185–202.
32. Tanaka, Y. Appearance and number of follicles and change in the concentration of serum FSH in female bovine fetuses / Y. Tanaka, K. Nakada, M. Moriyoshi, Y. Sawamukai // Reproduction. 2001. V. 121. P. 777–782.
33. Tilly, J.L. Apoptosis and ovarian function / J.L. Tilly // Rev. Reprod. 1996. № 1. P. 162–172.
34. Vaskivuo, T.E. Apoptosis in the human ovary / T.E. Vaskivuo, J.S. Tapanainen // Reprod. Biomed Online. 2003. V. 6. P. 24–35.
35. Yang, M.Y. The capacity of primordial follicles in fetal bovine ovaries to initiate growth in vitro develops during mid-gestation and is associated with meiotic arrest of oocytes / M.Y. Yang, J.E. Fortune // Biol. Reprod. 2008. V. 78. P. 1153–1161.
36. Zayed, A.E. Prenatal development of murine gonads with special reference to germ cell differentiation: a morphological and immunohistochemical study / A.E. Zayed, M.M. Abd-Elnaeim, S. Abd-Elghaffar, A. Hild, R. Brehm, K. Steger // Andrologia. 2007. V. 39. P. 93–100.
37. Полянцев, Н.И. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения [Текст] / Н.И. Полянцев. Москва, 2015. 480 с.
38. Скориков, В.Н. Акушерская и гинекологическая патология у коров-первотелок симментальской породы при разном возрасте ввода их в воспроизводство [Текст] / В.Н. Скориков, А.Г. Нежданов, В.И. Михалев // Ветеринария. 2017. № 1. С. 38–41.
39. Михалёв, В.И. Профилактика задержки внутриутробного развития и гибели эмбрионов у коров [Текст] / В.И. Михалёв, Е.Г. Лозовая, А.Г. Нежданов, С.М. Юдин // Ветеринария. 2017. № 11. С. 47–50.
40. О ветеринарии [Текст]: Закон РФ.
41. Жестокое обращение с животными [Текст]: статья 245 // Уголовный кодекс Российской Федерации.
42. О мерах по дальнейшему совершенствованию организационных форм работы с использованием экспериментальных животных [Текст]: приказ министерства здравоохранения СССР № 755 от 12 августа 1977 г.
43. Council of Europe – ETS no. 125 – European Convention for the Protection of Pet Animals.

Сведения об авторе

Сковородин Евгений Николаевич, доктор ветеринарных наук, профессор, зав. кафедрой морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: (347) 228-28-77, e-mail: skovorodinen@mail.ru.

Хотя многие аспекты эмбрионального развития яичников изучены, но относительно мало известно о влиянии течения беременности на формирование яичников плодов. Цель данного исследования – изучить функциональную морфологию овариальных желез в пренатальном онтогенезе в норме и при патологии обмена веществ у коров-матерей. По нашим данным, гонады у бычков и телочек закладываются в начале пренатального онтогенеза на тридцать четвертые сутки на поверхности мезонефросов. У телочек к сорока пяти суткам они дифференцируются в яичники и содержат все основные структуры органа. Оогенез у плодов коров протекает не синхронно. В яичниках можно обнаружить ооциты на разных стадиях профазы I мейоза и с разной ультраструктурой хроматина. В конце шестого ме-

сяца пренатального развития в овариальных железах появляются единичные полостные фолликулы, которые можно увидеть невооруженным глазом. По нашему мнению, развитие и инволюция этих нормальных структур играют существенную роль в морфогенезе яичников. Исчезновение полости третичных фолликулов яичников плодов крупного рогатого скота протекает двумя путями: облитерационным и по типу лютеинизации. При хронических заболеваниях стельных коров в последнюю треть беременности у поздних плодов развивается гипоплазия органов размножения, а при острых заболеваниях обнаруживается увеличение количества и величины антральных фолликулов в яичниках плодов, подвергающихся кистозным изменениям (поликистоз яичников плода).

THE EFFECT GESTATION COURSE ON EMBRYOGENESIS OF OVARIES IN CATTLE

Key words: *embryonic development; fetal ovary; ovarian morphogenesis; cows, metabolism pathology.*

Authors' personal details

Skovorodin Evgeny, Doctor of veterinary sciences, professor, head of the Morphology, pathology, pharmacology and noncontagious diseases department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letia Octiabria St., 34, phone: +7 (347) 228-28-77, e-mail: skovorodinen@mail.ru.

Although many aspects of embryonic ovarian development have been studied, relatively little is known about the effect of gestation on fetal ovary formation. The objective of this investigation was to study the functional morphology of ovarian glands in prenatal ontogenesis in norm and in pathology of metabolism in cows-mothers. According to our data, gonads in bull-calves and in cow calves are laid at the beginning of prenatal ontogenesis on the thirty-fourth day on the surface of mesonephros. By the forty-fifth day, in cow calves they differentiate into ovaries and contain all the basic structures of the organ. Ontogenesis in the fetuses of cows is not synchronous. Oocytes can be detected in ovaries at different stages of the first meiotic division prophase and with different

chromatin ultrastructure. At the end of the sixth month of prenatal development in the ovarian glands, there appear single cavitory follicles which can be seen with the naked eye. In our opinion, the development and involution of these normal structures play an important role in ovarian morphogenesis. Disappearance of the cavity of the tertiary follicles of the ovaries of the bovine cattle fetuses proceeds in two ways: obliteration and luteinization. In chronic diseases of pregnant cows at the last stage of pregnancy, late fetuses develop hypoplasia of reproductive organs, and in acute diseases, an increase in the number and size of antral follicles in the ovaries of fetuses subjected to cystic changes (polycystosis of the fetal ovaries) is found.

© Сковородин Е.Н.

УДК 636.2

DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-99-104

Р.Ш. Фахрутдинова, И.А. Афолина, Ю.В. Чудинова

ПОЛНОЦЕННОЕ КОРМЛЕНИЕ ПЛЕМЕННЫХ БЫЧКОВ ПОРОДЫ ГАЛЛОВЕЙ В ЛЕТНЕ-ПАСТБИЩНЫЙ ПЕРИОД В УСЛОВИЯХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ключевые слова: *галловей; бычки; кормление; рацион; пастбищная трава.*

Введение. Природно-климатические условия Томской области способствуют развитию специализированного мясного скотоводства. Благоприятствует этому и объективно сложившаяся структура кормовой базы, в которой более 75 % занимают грубые, сочные и пастбищные корма, имеются значительные площади естественных угодий для выпаса скота [1, 2].

Томская область и Национальный союз производителей говядины заключили соглашение, в рамках которого на территории региона планируется реализовать пилотный проект создания новой модели развития мясного скотоводства на основе кластерного подхода.

Программа кластерной модели направлена на развитие сельских территорий на Севере, которая предполагает вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозугодий, наращивание поголовья крупного рогатого скота и обеспечение региона высококачественной говядиной [3, 4].

В рамках реализации концепции уже в текущем году в регионе создано пять новых фермерских хозяйств, а к 2019 году – свыше 30. К 2025 году на территории региона будут действовать более 300 мясных фермерских хозяйств, вовлеченных в кооперацию. У Томской области есть все для реализации данной модели: инвестиционный потенциал, большое количество экологи-

чески чистых пастбищ. Имеется стартовое поголовье, которое недавно пополнилось новой перспективной мясной породой – галловейской [5, 6, 7, 8].

Племенной скот мясной породы планируется завозить в регион из Алтайского края. В настоящее время в Томской области отрасль мясного скотоводства находится на начальной стадии развития, но в области уже имеется положительный опыт работы именно с мясным скотом: действуют 3 племенных хозяйства по развитию мясной породы герефорда с общим поголовьем 1670 голов. А всего мясное стадо в области насчитывает 8,7 тыс. голов.

Цель и задачи исследований. Целью исследований является оценка полноценности кормления племенных быков породы галловей в летне-пастбищный период в условиях Томской области.

Задачи:

- исследование химического состава и питательной ценности пастбищных трав;
- определение урожайности пастбищных культур;
- изучение продуктивных показателей бычков породы галловей;
- экономическая эффективность выращивания племенных бычков породы галловей в различных почвенно-климатических зонах Томской области.

Условия, материалы и методы исследований. Объектом исследования являлись племенные бычки породы галловей в возрасте 16 месяцев, пастбищные травы, результат исследований химического состава пастбищных трав.

Экспериментальные исследования проводились в период со 2 июня по 2 сентября 2017 года в условиях разных почвенно-климатических зон Томской области на примере трех сельскохозяйственных предприятий: ООО «Спас» Томского района, КФХ «Летяжье» Кожевниковского района и КФХ «Синицын» Колпашевского района.

Бычки породы галловей поступили в сельскохозяйственные предприятия в годовалом возрасте средней живой массой 300 кг, к началу летнего периода (16 мес.), животные были с неодинаковой живой массой. Бычков содержали на откормочной площадке, где им скармливали пастбищную траву в расчете на 100 кг живой массы – 6,0 кг и подкормку концентратами – 0,5 кг, сено скармливали 4 кг в сутки на голову, соли поваренной – 60 г/гол.

В течение опыта вносили корректировку в существующий рацион с учетом потребностей молодняка.

Живую массу оценивали путем индивидуального ежемесячного взвешивания животных утром до кормления. На основании динамики живой массы подопытного животного рассчитали среднесуточный прирост [9, 10].

Отбор и исследование образцов кормов и пастбищной травы был проведен по общепринятым методикам согласно метрологическим требованиям в оценке полученных результатов, что позволило сравнивать полученные результаты с нормативными показателями и с данными других авторов.

Экономическую эффективность выращивания ремонтных бычков галловейской породы определяли на основе учета всех сложившихся затрат и выручки, полученной от реализации животных, вычисляли прибыль и рентабельность выращивания по изучаемым группам племенных бычков.

Статистическую обработку материалов по результатам проведенных исследований проводили на компьютере методом вариационной статистики, достоверность полученных данных рассчитали по С. Стьюденту.

Результаты исследований. Успешное развитие мясного скотоводства зависит от укрепления кормовой базы. Известно, что питание оказывает на организм животного гораздо большее влияние, чем порода и происхождение.

Правильная организация кормления племенных бычков в летний период играет огромную роль в укреплении их здоровья [11, 12].

Специализированная мясная порода галловей обладает целым рядом качеств, отличающих ее от других пород мясного направления, а именно, галловей могут поедать грубую траву, сено, отходы зернового производства.

Как утверждают создатели породы, основа питания галловейского скота ничем не отличается от кормов остальных коров и представляет собой разнотравье и сеяное сено. Кроме этого, для них выращивают также пшеницу, кормовые бобы, ячмень, люпин и овёс, которые используют и как траву, и как зерносмесь. Основным кормом в летний период является зеленая трава – дешевый источник важнейших питательных веществ, необходимых для организма животных. Современное животноводство выдвигает все более жесткие требования к качеству кормов. Необходимо, чтобы они, прежде всего, обеспечивали животных достаточным количеством белка, а точнее, сырым протеином – наиболее важным составляющим качественного корма [13].

Анализируя химический состав пастбищных кормов, необходимо отметить, что наиболее питательны зеленые корма в условиях КФХ «Летяжье» Кожевниковского района, где concentra-

ция протеина (3,39 %) выше на 3,9 % по сравнению с этим показателем ООО «Спас», при этом наименьшая концентрация (2,52 %) в зеленой массе КФХ «Синицын» Колпашевского района. Исследования показали ту же тенденцию по со-

держанию каротина. Концентрация клетчатки в пастбищной траве всех исследуемых пастбищ колебалась в пределах от 29,3 до 31,2 %, что свидетельствовало о перезрелости трав на период скармливания животным (таблица 1).

Таблица 1 Химический состав и питательная ценность пастбищных культур

Предприятие	Вид корма	Содержится				
		Сухое вещ-во, %	К.ед.	Протеин, %	Клетчатка, % (в сух. в-ве)	Каротин, мг/кг
КФХ «Летяжье»	Зел. масса (злак + люцерна)	25,1 ± 0,2	0,16 ± 0,01	3,39 ± 0,2**	29,3 ± 0,2*	16 ± 0,3*
ООО «Спас»	Зеленая масса (злак + клеv. кр.)	25,4 ± 0,4	0,15 ± 0,01	3,26 ± 0,1**	42,6 ± 0,1*	2 ± 0,1*
КФХ «Синицын»	Зел. масса (злаковое разнотравье)	26,2 ± 0,2	0,14 ± 0,01	2,52 ± 0,1**	31,2 ± 0,1*	11 ± 0,1*

Примечание: разница достоверна при * P ≥ 0,95; ** P ≥ 0,01.

Важнейшим показателем экономической оценки кормовых культур является их урожайность [14]. Увеличение выхода кормовых единиц и переваримого протеина с 1 га позволяет производить необходимый объем кормов на меньшей площади. Чем выше урожайность, тем меньше затраты труда и материально-денежных средств на единицу продукции. Следовательно, при высоких урожаях эффективнее используются кормовая площадь, трудовые и материальные ресурсы.

По данным исследований, урожайность пастбищных трав находилась в зависимости от места произрастания и вида кормовых культур. Так, урожайность пастбищных трав КФХ «Летяжье» была выше по сравнению с данными из ООО «Спас» Томского района на 7,34 % и на 5,41 %, чем в КФХ «Синицын» Колпашевского района, что способствовало повышению сбора переваримого протеина с 1 га пастбища на 7,64 % по сравнению с ООО «Спас» и на 29,7 % чем в КФХ «Синицын» (таблица 2).

Таблица 2 Результаты оценки пастбищных трав по урожайности

Наименование	Сбор з/м с га, ц	Содержится в 1 кг корма			Приходится протеина на кормовую единицу	Сбор с 1 га, ц		
		К. ед.	Перевар. протеин	КПЕ		К. ед.	Перевар. протеина	КПЕ
КФХ «Летяжье»	98,1 ± 2,1	0,16 ± 0,01	27,12 ± 0,3	0,22 ± 0,01	169 ± 3,2	15,6 ± 0,01	2,66 ± 0,1	21,6 ± 0,2
ООО «Спас» Томский район	90,9 ± 3,0	0,15 ± 0,01	22,08 ± 0,4	0,19 ± 0,01	147 ± 2,0	13,6 ± 0,01	2,19 ± 0,2	18,8 ± 0,1
КФХ «Синицын» Колпашевский район	92,8 ± 1,5	0,14 ± 0,01	20,16 ± 0,3	0,17 ± 0,01	144 ± 2,1	12,9 ± 0,01	1,87 ± 0,1	15,9 ± 0,1

Примечание: разница достоверна при P ≤ 0,05.

Проведенный анализ свидетельствовал о положительном влиянии пастбищных трав на рост и развитие животных. В возрасте 19 месяцев были различия в весовом росте бычков сравниваемых групп. Так бычки, содержащиеся в КФХ «Летяжье» Кожевниковского района, пре-

восходили сверстников из ООО «Спас» на 13 кг, животных из КФХ «Синицын» – на 24 кг, при этом среднесуточный прирост живой массы бычков из КФХ «Летяжье» превосходил на 3,53 % показатели сверстников из других предприятий (таблица 3).

Таблица 3 Динамика живой массы бычков породы галловей

Возраст, мес.	Наименование		
	ООО «Спас», Томский район	КФХ «Летяжье», Кожевниковский район	КФХ «Синицын», Колпашевский район
16	380 ± 6,5	390 ± 5,9	369 ± 5,4
17	432 ± 5,2	451 ± 5,7	411 ± 5,0
18	457 ± 5,1	470 ± 2,5	429 ± 1,7
19	462 ± 5,9	475 ± 5,1	451 ± 5,1
Среднесуточный прирост, г	881,7 ± 3,9	914,0 ± 5,1	881,7 ± 4,9

Примечание: разница достоверна при P ≤ 0,05.

Увеличение прибыли при выращивании бычков в условиях КФХ «Летяжье» на 14,47 % способствовало повышению уровня рентабель-

ности на 2,85 % по сравнению с этими показателями предприятий ООО «Спас» и КФХ «Синицын» (таблица 4).

Таблица 4 Экономическая эффективность выращивания племенных бычков до 19-месячного возраста (в расчете на 1 голову с учетом затрат на содержание)

Показатель	Наименование		
	ООО «Спас» Томский район	КФХ «Летяжье» Кожевниковский район	КФХ «Синицын» Колпашевский район
Продолжительность периода, сутки	93	93	93
Среднесуточный прирост, г	881,7	914,0	881,7
Валовый прирост живой массы, кг	82,0	85,0	82,0
Себестоимость 1 кг живой массы, руб.	169,0	165,0	169,00
Общая себестоимость прироста живой массы, руб.	13858,0	14028,0	13858,0
Реализационная стоимость килограмма прироста живой массы, руб.	200	200	200
Реализационная стоимость общего прироста, руб.	16400,0	17000,0	16400,0
Прибыль, руб.	2542,0	2972,0	2542,0
Уровень рентабельности, %	18,34	21,19	18,34

Выводы. 1. Концентрация протеина была выше в пастбищных кормах в условиях КФХ «Летяжье» Кожевниковского района на 3,9 % по сравнению с этим показателем ООО «Спас» и на 25,64 % чем КФХ «Синицын» Колпашевского района.

2. Концентрация клетчатки в кормах всех предприятий колебалась в пределах от 29,3 до 31,2 %, при норме 20–25 %.

3. Урожайность пастбищных трав КФХ «Летяжье» была выше по сравнению с данными из ООО «Спас» Томского района на 7,34 % и на 5,41 %, чем в КФХ «Синицын» Колпашевского района, что способствовало повышению сбора переваримого протеина с 1 га пастбища на

7,64 % по сравнению с ООО «Спас» и на 29,7 % чем в КФХ «Синицын».

4. Бычки, содержащиеся в КФХ «Летяжье» Кожевниковского района, превосходили сверстников из ООО «Спас» на 13 кг, животных из КФХ «Синицын» – на 24 кг, среднесуточный прирост живой массы бычков из КФХ «Летяжье» превосходил на 3,53 % показатели сверстников других предприятий.

5. Увеличение прибыли при выращивании бычков в условиях КФХ «Летяжье» на 14,47 % способствовало повышению уровня рентабельности на 2,85 % по сравнению с этими показателями предприятий ООО «Спас» и КФХ «Синицын».

Библиографический список

1. Амерханов, Х.А. Племенная база мясных пород основа мясного скотоводства [Текст] / Х.А. Амерханов, Д.Л. Левантин, И.М. Дунин // Зоотехния. 2011. № 11. С. 6–9.

2. Баранников, И.А. Технология интенсивного животноводства [Текст] / А.И. Баранников, В.Н. Приступа, Ю. Колосов. Ростов н/Д: Феникс. 2008. 608 с.

3. Белоусов, А.М. Интродукция галловейского скота в Россию и пути его совершенствования [Текст]: автореф. дис. ... д-ра с.-х наук. Краснодар, 2014. 52 с.

4. Виктор, П.И. Методика и организация зоотехнических опытов [Текст] / П.И. Виктор, В.К. Менькин. М.: Агропромиздат, 1991. 120 с.

5. Горелик, Л.Ш. Мясная продуктивность бычков разных пород [Текст] / Л.Ш. Горелик, О.В. Ребезов, М.Б. Горелик // Молодой ученый. 2014. № 10. С. 117–119.

6. Джапаридзе, Т.Г. Россия должна стать страной развитого животноводства [Текст] /

Г.Г. Джапаридзе // Главный зоотехник. 2006. № 9. С. 2–6.

7. Дунин, И. Перспективы и риски развития мясного скотоводства в Российской Федерации [Текст] / И. Дунин, А. Кочетков // Молочное и мясное скотоводство. 2013. № 6. С. 2–5.

8. Дунин, И. Результаты функционирования отрасли мясного скотоводства в Российской Федерации [Текст] / И. Дунин, В. Шаркаев, А. Кочетков // Молочное и мясное скотоводство. 2011. № 5. С. 2–5.

9. Заднепрянский, И.П. Результаты и перспективы использования лучшего мирового генофонда в мясном скотоводстве [Текст] // Проблемы мясного скотоводства: сб. науч. тр. ВНИИМС. Оренбург, 2013. Вып. 48. С. 17–25.

10. Зелепухина, А.Г. Мясное скотоводство [Текст]: монография / Под ред. А.Г. Зелепухина, В.И. Левахина. Оренбург: ОГУ, 2000. С. 210–249.

11. Калашников, А.П. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных

[Текст] / А.П. Калашников, В.И. Фисинин, В.В. Цеденов, Н.Г. Первов, Н.И. Клейменов [и др.]. М.: Джангар, 2003. 455 с.

12. Костомахин, Н.М. Скотоводство [Текст]: учебник / Н.М. Костомахин. СПб: Лань, 2013. 432 с.

13. Ранделина, В.В. Особенности использования породных ресурсов крупного рогатого

скота в повышении эффективности системных технологий производства говядины [Текст]: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / В.В. Ранделина. Волгоград, 2002. 25 с.

14. Руководство по анализам кормов [Текст]. М.: Колос, 1982. 72 с.

Сведения об авторах

1. **Фахрутдинова Раиса Шакирьяновна**, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры охотоведения и зоотехнии Томского сельскохозяйственного института – филиала ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Томск, ул. Мичурина, 88, тел.: (3822) 73-73-97, e-mail: zootehnik_tshi@mail.ru.

2. **Афониная Ирина Анатольевна**, кандидат биологических наук, доцент кафедры охотоведения и зоотехнии Томского сельскохозяйственного института – филиала ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Томск, ул. Мичурина, 88, тел.: (3822) 73-73-97, e-mail: afonina_ia@mail.ru.

3. **Чудинова Юлия Валерьевна**, доктор биологических наук, доцент, заместитель директора по научно-исследовательской работе Томского сельскохозяйственного института – филиала ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Томск, ул. К. Маркса, 19, СибНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН, Томск, тел.: (3822) 51-57-05, e-mail: nauka_tshi@mail.ru.

По данным исследований по изучению полноценного кормления племенных быков породы галловей в условиях разных почвенно-климатических зон Томской области, наиболее питательны были зеленые корма в условиях КФХ «Летяжье» Кожениковского района, где концентрация протеина составила 16,0 %, что выше на 14–47 % по сравнению с этим показателем других предприятий. Концентрация клетчатки в пастбищной траве колебалась в пределах от 29,3 до 31,2 %, что свидетельствовало о перезрелости пастбищных трав на период скармливания животным. Урожайность пастбищных трав КФХ «Летяжье» также была выше по сравнению с данными из КФХ «Плут» Молчановского района на 2,76 % и на 28,75 %, чем в КФХ «Калугина» Шегарского района. Однако концентрация переваримого протеина пастбищного корма в КФХ «Калугина» Шегарского района была выше, что позволило повысить кормопроотеино-

вые единицы (КПЕ) пастбищной травы на 16,24 % по сравнению с показателем КФХ «Летяжье» и на 42,31 % чем в ООО «Спас» Томского района. О положительном влиянии пастбищных трав на рост и развитие племенных бычков свидетельствует большая живая масса животных КФХ «Летяжье» Кожениковского района по сравнению со сверстниками из ООО «Спас» на 13 кг, из КФХ «Синицын» – на 24 кг, бычков предприятий КФХ «Плут» и КФХ «Калугина» – на 85 и 95 кг соответственно. Среднесуточный прирост был также выше у бычков КФХ «Летяжье» по сравнению со сверстниками на 13–95 кг. Прибыль, полученная при выращивании быков в условиях КФХ «Летяжье» и КФХ «Синицын», способствовала более высокому уровню рентабельности в этих предприятиях и была выше, чем в КФХ «Калугина», в 4,5 раза, в ООО «Спас» Томского района – на 2,86 % и КФХ «Плут» Молчановского района – на 3,01 %.

R. Fakhrutdinova, I. Afonina, Y. Chudinova

FULL FEEDING OF GALLOWAY BREEDING BULLS IN THE SUMMER GRAZING PERIOD IN CONDITIONS OF THE TOMSK REGION

Key words: *Galloway cattle; bull calves; feeding; diet; pasture grass.*

Authors' personal details

1. **Fakhrutdinova Raisa**, Candidate of agricultural sciences, associate professor of the Hunting and Animal Science department, Tomsk Agricultural Institute, branch of the Novosibirsk State Agrarian University, Tomsk, Michurin St., 88, phone: (3822) 73-73-97, e-mail: zootehnik_tshi@mail.ru.

2. **Afonina Irina**, Candidate of biological sciences, associate professor of the Hunting and Animal Science department, Tomsk Agricultural Institute, branch of the Novosibirsk State Agrarian University, Tomsk, Michurin St., 88, phone: (3822) 73-73-97, e-mail: afonina_ia@mail.ru.

3. **Chudinova Julia**, Doctor of biological sciences, associate professor, Vice-director of Tomsk Agricultural Institute for Research, Tomsk Agricultural Institute, branch of the Novosibirsk State Agrarian University, Tomsk, Karl Marx St., 19, phone: (3822) 51-57-05, e-mail: nauka_tshi@mail.ru.

According to researches on full feeding of Gal-loway breeding bulls in conditions of different soil and climatic zones of the Tomsk region green forages were the most nutritious in the Letyazhye peasant farm with protein concentration being 16,0 % that it is higher by 14–47 % compared to the same indicator in other enterprises. Fibre concentration in pasture grass ranged from 29,3 up to 31,2 % that demonstrated overmature of pasture herbs for animal feeding.

Pasture grass capacity in Letyazhye farm was also higher by 2,76 % compared to the data of Plyut farm in the Molchanovsky district and by 28,75 %, than in Kalugin farm in the Shegarsky district. However, concentration of digestible protein in pasture forage in Kalugin farm of the Shegarsky district was higher. It enabled to raise fodder protein of pasture grass by 16,24 % in comparison with an indicator of

Letyazhye farm and by 42,31 % than in LLC Spas of the Tomsk district.

Positive effect of pasture grass on growth and development of breeding bull calves is proved with the big live weight of animals in Letyazhye farm of the Kozhevnikovsky district. It was more by 13 kg compared to the animals of LLC Spas, by 24 kg than in Sinitsyn farm, by 85 and 95 kg respectively than bull calves of the Plyut and Kalugin farms. The average daily weight gain had the same tendencies for bull-calves of Letyazhye farm being more by 13–95 kg.

The profit from breeding bulls in conditions of Letyazhye and Sinitsyn farms promoted higher level of profitability in these enterprises and was higher by 4,5 times than in Kalugin farm, by 2,86 % in LLC Spas of the Tomsk district and by 3,01 % in Plyut farm of the Molchanovsky district.

© Фахрутдинова Р.Ш., Афонина И.А., Чудинова Ю.В.

УДК 636.5.084:577(470.57)

DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-104-110

А.Ф. Хабиров

МОРФО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОН КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «НОРМОСИЛ»

Ключевые слова: морфо-биохимические показатели крови; цыплята-бройлеры кросса Arbor Acres; альбумин-глобулиновый коэффициент; минеральные вещества.

Введение. Общемировой тенденцией производства птицеводческой продукции является акцент на технологии безопасного производства, который проявляется в отказе от использования антибиотиков при выращивании сельскохозяйственных животных и птицы [1]. Однако такой подход на сегодняшний день разделяют не все производители сельскохозяйственной продукции в мире. Так, с 2006 года действует полный запрет на использование кормовых антибиотиков в странах ЕС. При этом первой европейской страной, запретившей использование кормовых антибиотиков, была Великобритания. Этот запрет был введен ещё в 1971 году и распространялся на антибиотики, которые использовались при лечении людей. В 1986 году в Швеции была создана Шведская Вестготская модель, в основе

которой лежал отказ от использования любых антибиотических стимуляторов роста и введен полный запрет на них. Вместе с тем на сегодняшний день самыми крупными потребителями антибиотиков в животноводстве являются США, которые применяют антибиотики при кормлении 80 % поголовья птицы, 75 % поголовья свиней и молочного крупного рогатого скота. Аналогичный подход демонстрируют производители животноводческой продукции стран Африки и Южной Америки [2].

Российские производители животноводческой продукции все больше ориентируются на поиск альтернативных путей решения, главным из них является применение пробиотических препаратов, в основе которых лежат живые формы бактерий с ярко выраженным антагониз-

мом к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам в организме животных [3–5]. Их использование с первых дней жизни позволяет нормализовать состав кишечной микрофлоры и защитить от патогенной. Бактерии, входящие в состав пробиотиков, способствуют лучшей переваримости кормов и усвоению их организмом животных [6–8]. Спектр препаратов данной группы постоянно расширяется, на рынок выходят новые пробиотические добавки, требующие оценки эффективности их применения. К их числу относится новая пробиотическая добавка «Нормосил», включающая смесь живых культур, в том числе штаммов молочнокислых бактерий: *Lactobacillus brevis* Б-3 (ВКПМ В 6338), *Lactobacillus plantarum* 8P-A3 (В 11007), *Lactobacillus acidophilus* 457 (В 2213), *Enterococcus faecium* УДС 86 (ВКПМ В-4054) и энтеросорбент.

Цель исследования заключалась в оценке влияния пробиотической кормовой добавки «Нормосил» на морфо-биохимические показатели крови у цыплят-бройлеров. В **задачу исследований** входило оценить динамику изменений морфологических показателей крови, биохимических показателей сыворотки крови и содержания минеральных веществ.

Условия, материалы и методы исследования. Исследования проведены в ООО «Стерлибашевская птицеферма» Республики Башкортостан на цыплятах-бройлерах кросса Arbor Acres. Были сформированы 5 групп из цыплят-бройлеров суточного возраста по 35 голов в каждой, выращиваемых напольно в течение 42 дней (таблица 1). Препарат «Нормосил» задавался цыплятам-бройлерам с питьевой водой из расчета 1 мл на 1 кг живого веса птицы.

Таблица 1 Схема научно-хозяйственного опыта, n = 35

Группа	Особенности кормления	Период дачи препарата
Контрольная	Основной рацион	1–42
Опытная I	Основной рацион + «Нормосил» в дозе 1×10^7 КОЕ/мл	1–42
Опытная II	Основной рацион + «Нормосил» в дозе 1×10^7 КОЕ/мл	1–10, 15–24, 29–38
Опытная III	Основной рацион + «Нормосил» в дозе 1×10^6 КОЕ/мл	1–42
Опытная IV	Основной рацион + «Нормосил» в дозе 1×10^6 КОЕ/мл	1–10, 15–24, 29–38

Исследование цельной крови и сыворотки было проведено в условиях ветеринарного центра ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, ГБУ Башкирская научно-производственная ветеринарная лаборатория. Взятие крови у цыплят-бройлеров осуществляли в 21-дневном и 40-дневном воз-

расте из крыловой вены с внутренней стороны крыла над локтевым сочленением. Биохимические показатели крови определяли с использованием реактивов компании «Витал Диагностика» на полуавтоматическом биохимическом анализаторе Stat Fax 3300.

Таблица 2 Морфологическая картина крови цыплят-бройлеров при включении в рацион пробиотической кормовой добавки «Нормосил» ($M \pm m$, n = 5)

Показатель	Группа				
	контрольная	опытная I	опытная II	опытная III	опытная IV
21 сутки					
Эритроциты, $10^{12}/л$	$2,14 \pm 0,47$	$2,24 \pm 0,64$	$2,26 \pm 0,67$	$2,33 \pm 0,42$	$2,44 \pm 0,57$
Гемоглобин, г/л	$101,2 \pm 12,4$	$108,4 \pm 8,9$	$107,8 \pm 10,5$	$111,6 \pm 12,6$	$105,8 \pm 13,2$
Лейкоциты, $10^9/л$	$29,7 \pm 2,34$	$34,6 \pm 2,51$	$31,2 \pm 1,37$	$32,5 \pm 2,41$	$31,58 \pm 2,19$
40 суток					
Эритроциты, $10^{12}/л$	$2,31 \pm 0,42$	$2,22 \pm 0,36$	$2,24 \pm 0,63$	$2,28 \pm 0,37$	$2,36 \pm 0,58$
Гемоглобин, г/л	$103,3 \pm 9,6$	$106,9 \pm 7,2$	$104,5 \pm 11,03$	$108,3 \pm 9,7$	$114,5 \pm 10,6$
Лейкоциты, $10^9/л$	$27,3 \pm 1,63$	$28,9 \pm 1,21$	$26,4 \pm 1,72$	$27,6 \pm 2,34$	$29,2 \pm 3,14$

Результаты исследования. Говоря о механизме влияния пробиотических препаратов на систему крови, мы исходим из того, что основное действие микроорганизмов, входящих в состав пробиотиков, реализуется посредством подавления численности патогенной микрофлоры и стимуляции иммунитета организма хозяина, влияния на микробный антагонизм через увеличение или снижение ферментативной активности. Вместе с тем следует иметь в виду, что в со-

ставе пробиотиков значительная доля биологически активных веществ приходится на витамины группы В, вследствие чего пробиотики по сути являются бактериально-витаминными препаратами.

Результаты проведенных исследований указывают на то, что микроорганизмы, входящие в состав «Нормосила», в процессе своей жизнедеятельности в организме хозяина оказывают определенное влияние на морфологическую

картину крови (таблица 2). Можно утверждать, что использование пробиотической кормовой добавки «Нормосил» в концентрации 1×10^6 КОЕ/мл независимо от периодичности дачи оказывает более выраженный эритропоэтический эффект, поскольку в опытной III-ей и опытной IV-ой группах количество эритроцитов в крови в 21-дневном возрасте превышало значения контрольной группы на 8,9 % и 14,1 % соответственно. В то время как аналогичные значения опытной I-ой и опытной II-ой групп были выше в этом возрасте только на 4,7 % и 5,6 % соответственно.

Концентрация гемоглобина также имела устойчивую тенденцию превышения значения во всех опытных группах при сравнении с контролем. При этом наибольшее превосходство было характерно для опытной III-ей группы – 10,3 %, что указывает на лучший эффект от использования препарата в концентрации 1×10^6 КОЕ/мл. Ежедневная и периодическая дача препарата в концентрации 1×10^7 КОЕ/мл обеспечила увеличение концентрации гемоглобина только на 7,2 % и 6,6 % соответственно.

Количественный состав лейкоцитов во всех группах находился в пределах физиологической нормы. Тенденция увеличения количества лейкоцитов характерна для всех опытных групп. При этом более выраженный лейкопоэтический эффект отмечался при ежедневной даче «Нормосила» в опытной I-ой (10^7 КОЕ/мл) – на 16,5 % и в опытной III-ей – на 9,5 % (10^6 КОЕ/мл) группах. В данном случае следует различать природу увеличения количества лейкоцитов, которая может иметь форму как реакционного лейкоцитоза, так и патологического лейкоцитоза, возникающего в том числе в процессе воспалительных заболеваний, вызываемых микроорганизмами. Отсутствие достоверных различий и согласованность с приведенными ниже данными анализа биохимических показателей дают основание предполагать отсутствие в организме птицы патологических состояний.

Для картины крови в 40-дневном возрасте при сравнении с 21-суточным обнаруживается общая тенденция снижения значений всех ис-

следуемых показателей, что в целом отражает особенности роста птицы, который характеризуется наибольшей интенсивностью в период 20–30 суток. В 40-дневном возрасте применение «Нормосила» в концентрации 10^7 КОЕ/мл обеспечило увеличение концентрации гемоглобина на 4,9 % при ежедневной и на 10,9 % – при периодической даче. Аналогичные значения при использовании «Нормосила» в концентрации 10^6 КОЕ/мл составили 3,5 % и 1,2 % соответственно. Увеличение количества эритроцитов на 2,2 % было установлено только в крови цыплят-бройлеров опытной IV-ой группы. Сравнительно больший лейкопоэтический эффект был характерен для опытной I-ой – 5,9 % и опытной IV-ой групп – 7,0 %.

Обобщая данные по динамике морфологических показателей крови в 21-дневном и 40-дневном возрасте, можно отметить, что введение в организм пробиотической кормовой добавки «Нормосил» имеет тенденцию к стимулированию гемопоэза в части гемоглобинопоэза и лейкопоэза. Полученные данные находятся в положительной корреляционной связи с данными по динамике прироста живой массы всей подопытной птицы. Изменение биохимических показателей крови при использовании пробиотиков наиболее объективно отражает физиолого-биохимические процессы в целом, так как эти показатели являются компонентами динамически циркулирующей системы. При этом наибольшее внимание следует уделять обменным процессам, ключевым из которых является протеиновое питание, поскольку оно во многом лимитирует продуктивность животных и птицы.

С деятельностью белков связаны все основные проявления жизни: раздражимость, сократимость, способность к росту, развитию, размножению, активной регуляции своего состава и функций, приспособляемость к среде, пищеварение и выделение конечных продуктов обмена.

Результаты исследования биохимических показателей в сыворотке крови цыплят-бройлеров исследуемых групп в 40-дневном возрасте представлены в таблице 3.

Таблица 3 Биохимические показатели сыворотки крови цыплят-бройлеров при включении в рацион пробиотической кормовой добавки «Нормосил» ($M \pm m$, $n = 5$)

Показатель	Группа				
	контроль	опытная I	опытная II	опытная III	опытная IV
Глюкоза, ммоль/л	$11,76 \pm 1,12$	$9,7 \pm 1,1$	$11,1 \pm 0,34$	$13,2 \pm 1,24$	$13,8 \pm 1,18$
Общий белок, г/л	$31,57 \pm 0,99$	$25,1 \pm 3,15$	$32,36 \pm 1,76$	$31,72 \pm 1,26$	$33,36 \pm 1,44$
АсАТ, Ед/л	$512 \pm 82,2$	$486 \pm 105,0$	$514 \pm 93,6$	$417 \pm 91,7$	$507 \pm 88,4$
АлАТ, Ед/л	$17,15 \pm 0,57$	$16,4 \pm 1,39$	$19,0 \pm 1,81$	$17,08 \pm 0,52$	$17,66 \pm 1,22$
Щелочная фосфатаза, Ед/л	$2913,5 \pm 243,0$	$2349,3 \pm 527,9$	$3458,3 \pm 329,7$	$2245,8 \pm 224,0^*$	$2457,6 \pm 387,4$

Примечание: здесь и далее разность достоверна при * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$.

Включение в рацион цыплят-бройлеров пробиотической кормовой добавки «Нормосил» в концентрации 1×10^6 КОЕ/мл обеспечивает активизацию обмена углеводов в организме, что проявляется в увеличении концентрации глюкозы в крови на 12,3 % при ежедневной даче препарата и на 17,4 % при периодической даче. Аналогичные данные в группах цыплят-бройлеров, получавших «Нормосил» в концентрации 1×10^7 КОЕ/мл, были на 21,3 % и 6,0 % ниже, чем в контрольной группе птицы. Тенденция активизации белкового обмена наиболее выражена у цыплят-бройлеров опытной III-ей и IV-ой групп, на что указывает увеличение содержания общего белка в сыворотке крови на 0,5 % и 5,7 % соответственно. В опытной II-ой группе содержание общего белка было выше на 2,5 %, в то время как у цыплят-бройлеров опытной I-ой группы данный показатель был ниже, чем в контроле, на 25,8 %.

Как известно АсАТ – это фермент, участвующий в белковом обмене. Он выполняет ряд важных функций, одна из которых – участие в строительстве клеточных мембран и синтез аминокислот. Наибольшее количество АсАТ обнаруживается в тканях сердца, печени, почек, мышцах, нервной ткани. Это связано с тем, что обменные процессы в этих тканях протекают более активно, а клетки нуждаются в постоянном обновлении и поддержании их структуры. Как только клетки этих органов начинают разрушаться, фермент активно выделяется в кровь, поэтому его уровень в сыворотке крови повышается. Если же клетки остаются целыми и функционируют нормально, то уровень АсАТ остается стабильным. По данным наших исследований установлено, что бактериальный состав пробиотической добавки «Нормосил» в процессе своей жизнедеятельности не приводит к деструктивным действиям на ткани сердца и печени организма цыплят-бройлеров, поскольку полученные значения АсАТ в группе цыплят-бройлеров, получавших «Нормосил» в концентрации 1×10^6 КОЕ/мл, варьировали в пределах 417–507 Ед/л, а в группе цыплят-бройлеров с концентрацией препарата 1×10^7 КОЕ/мл – от 486 до 514 Ед/л против $512 \pm 82,2$ Ед/л в контроле. Очевидно, что чрезмерное содержание в сыворотке крови АсАТ также свидетельствует о развитии патологии органа, в клетках которого обнаруживается его самое большое количество. Причиной увеличения АсАТ бывают, как правило, патологии печени. Анализ содержания АсАТ показывает, что, несмотря на имеющуюся тенденцию превышения значения данного показателя в опытной IV-ой группе на 3,0 %, а в опытной II-ой группе – на 10,8 % по сравнению с контролем, они носят недостоверный харак-

тер, находясь при этом в границах физиологической нормы по данному показателю. Анализ содержания обоих исследуемых ферментов позволяет заключить, что выраженного токсического действия компонентов препарата «Нормосил» на организм цыплят-бройлеров за период выращивания не установлено.

Щелочная фосфатаза представляет собой фермент, который участвует в процессе гидролиза. С помощью него происходит дефосфорилирование белковых молекул и нуклеотидов. В организме животного данный фермент обнаруживается во многих тканях, особенно в слизистой кишечника. Его содержание определяется при подозрении на патологию печени и почек. Следует отметить, что значительное увеличение активности щелочной фосфатазы наблюдается в том числе при кишечных и бактериальных инфекциях. Содержание щелочной фосфатазы в сыворотке крови цыплят-бройлеров опытной III-ей группы было меньше, чем в контроле, на 29,8 % ($p < 0,05$), в опытной I-ой группе – на 24,1 %, в опытной IV-ой группе – на 18,6 %. Только в опытной II-ой группе содержание щелочной фосфатазы превышало значение контрольной группы на 18,7 % при отсутствии достоверного характера различий. Полученные данные позволяют привести ещё один аргумент в пользу отсутствия токсического эффекта компонентов пробиотической кормовой добавки «Нормосил» при введении их в организм цыплят-бройлеров опытных групп.

Важную роль в реализации питательной функции крови играют содержащиеся в плазме липиды и белки. Основными плазменными белками являются альбумины, глобулины и фибриноген. Определение альбумина имеет большее значение, чем анализ общего белка. При самых разнообразных патологических процессах (хронических инфекциях, травмах костной системы и так далее) снижение концентрации альбуминов носит, как правило, универсальный характер. Это может обуславливаться переходом альбуминов в ткани вследствие повышения проницаемости стенок сосудов, снижения интенсивности синтеза альбуминов в почечной ткани, ускорения их распада и превращения в другие белки, в частности в глобулины, содержание которых в связи с этим возрастает. Результаты исследования белкового спектра сыворотки крови у цыплят-бройлеров 40-дневного возраста при введении в организм пробиотической кормовой добавки «Нормосил» представлены в таблице 4. Установлено, что при включении в рацион пробиотической кормовой добавки «Нормосил» в сыворотке крови цыплят-бройлеров опытных групп отмечается тенденция увеличения альбуминов от 1,7 % в опытной II-ой группе до 15,7 % в опытной I-ой группе птицы.

Анализ глобулиновых фракций показывает, что содержание γ -глобулинов в контрольной группе цыплят-бройлеров составило $31,8 \pm 2,86 \%$, что выше значений опытной I-ой группы на $35,9 \%$ ($p < 0,05$), опытной II-ой группы на $14,4 \%$, опытной III-ей группы на $7,1 \%$. В свою очередь, содержание γ -глобулинов в опытной IV-ой группе составило $34,5 \%$, что больше значения контрольной птицы на $8,5 \%$. Однако утверждать о наличии факта хронических воспалительных процессов в организме птицы нет целесообразности, поскольку данное превышение не носит достоверного характера, кроме того, не подтверждается коррелирующими с ним показателями, которые были представлены ранее. Говоря об альбумин-глобулиновом коэффициенте, следует сделать акцент на том, что значительное уменьшение коэффициента характерно для заболеваний печени, сопровождающихся снижением

синтеза альбуминов, а также при выведении альбуминов с мочой при нарушениях функции почек. В наших исследованиях значение альбумин-глобулинового коэффициента в опытных II-ой и III-ей группах было близко к единице, а в опытных I-ой и IV-ой оно составляло $1,3$. В контрольной группе значение коэффициента составило $0,9$. Интерпретируя полученные данные, мы исходим из того, что при высоких нагрузках на печень регистрируются низкие величины альбумин-глобулинового коэффициента, которые вызваны снижением активности процессов синтеза альбуминов, увеличением содержания γ -глобулинов и в меньшей степени – β -глобулинов. Таким образом, можно констатировать, что пробиотическая кормовая добавка «Нормосил» выступает в определенной степени фактором, снижающим напряжение в работе печени, т. е. условно обладает гепатопротекторными качествами.

Таблица 4 Белковые фракции в сыворотке крови цыплят-бройлеров при включении в рацион пробиотической кормовой добавки «Нормосил» ($M \pm m$, $n = 5$)

Показатель		Группа				
		контроль	опытная I	опытная II	опытная III	опытная IV
Альбумины		$48,6 \pm 3,12$	$56,2 \pm 4,18$	$49,4 \pm 5,22$	$50,4 \pm 4,84$	$55,6 \pm 4,76$
Глобулины:	α -	$15,2 \pm 1,24$	$18,6 \pm 1,84$	$20,6 \pm 2,15^*$	$16,5 \pm 2,34$	$5,8 \pm 0,46^{***}$
	β -	$4,4 \pm 0,46$	$1,8 \pm 0,33^{***}$	$2,2 \pm 0,64^{**}$	$3,4 \pm 0,71$	$4,1 \pm 0,66$
	γ -	$31,8 \pm 2,86$	$23,4 \pm 1,75^*$	$27,8 \pm 2,29$	$29,7 \pm 2,43$	$34,5 \pm 4,17$

Важнейшим элементом для организма птицы является, несомненно, кальций. Он необходим для формирования костной ткани. Кальций содержится в виде углекислых и фосфорнокислых солей в костях, необходим для нормального функционирования сердечной, нервной, мышечной деятельности, повышает защитные функции организма, регулирует репродуктивные функции птицы. Фосфор является одним из основных структурных элементов организма.

Все виды обмена в организме непосредственно связаны с превращением фосфорной кислоты. Присутствие фосфора в крови птицы носит формы органических и неорганических соединений. Он является активным участником буферных систем, участвует в реакциях обмена веществ. Благодаря его наличию обеспечиваются кишечная абсорбция и гликолиз. Для всасывания фосфора необходимо присутствие ионов Ca^{2+} в химусе (таблица 5).

Таблица 5 Динамика содержания минеральных веществ в сыворотке крови цыплят-бройлеров при использовании пробиотической кормовой добавки «Нормосил», ($M \pm m$, $n = 5$)

Показатель	Группа				
	контроль	опытная I	опытная II	опытная III	опытная IV
Натрий, ммоль/л	$169,2 \pm 8,8$	$168 \pm 7,28$	$166 \pm 5,13$	$172,7 \pm 9,8$	$177,6 \pm 10,3$
Калий, ммоль/л	$8,08 \pm 0,82$	$8,35 \pm 1,09$	$10,95 \pm 3,55$	$9,45 \pm 1,52$	$10,77 \pm 2,42$
Кальций, ммоль/л	$0,52 \pm 0,03$	$0,47 \pm 0,08$	$0,6 \pm 0,04$	$0,56 \pm 0,02$	$0,63 \pm 0,04^*$
Фосфор неорганический, ммоль/л	$0,451 \pm 0,04$	$0,355 \pm 0,05$	$0,294 \pm 0,02^{**}$	$0,581 \pm 0,04^*$	$0,358 \pm 0,02$

Анализ полученных результатов показывает, что при использовании пробиотической кормовой добавки «Нормосил» в организме цыплят-бройлеров изменяется активность минерального обмена. Так, использование «Нормосила» в концентрации 1×10^6 КОЕ/мл при ежедневной и периодической даче обеспечивает повышение содержания натрия в сыворотке крови цыплят-бройлеров опытных III-ей и IV-ой групп на $2,1 \%$ и $5,0 \%$; калия – на $17,0$ и $33,3 \%$;

кальция – на $7,7$ и $21,2 \%$ ($p < 0,05$) соответственно. Применение препарата в концентрации 1×10^7 КОЕ/мл при ежедневной и периодической даче способствует повышению содержания калия в сыворотке крови цыплят-бройлеров опытных I-ой и II-ой групп на $3,4$ и $35,6 \%$; кальция в опытной II-ой группе – на $15,4 \%$. По содержанию неорганического фосфора картина неоднозначная, проявляется в более низких значениях в опытной I-ой группе на $21,3 \%$, в опытной II-ой

группе – на 34,8 % ($p < 0,05$) и в опытной IV-ой группе – на 20,6 % при сравнении с контролем. При этом показатели опытной III-ей группы превышали значения не только остальных опытных групп, но и контрольной – на 28,8 %.

Обобщая данные анализа минерального обмена, можно констатировать, что при использовании пробиотической кормовой добавки «Нормосил» отмечается тенденция активизации минерального обмена в части обмена натрия, калия и кальция с тенденцией пониженного обмена фосфора. В порядке обсуждения по вопросу обмена неорганического фосфора можно отметить, что это соединение присутствует в сыворотке крови в виде анионов. Определение количественного значения этого элемента необходимо, как правило, для оценки состояния фосфорно-кальциевого баланса. Роль неорганического фосфора заключается в регуляции кислотно-основного баланса; кроме того, фосфаты принимают участие как в процессе метаболизма основных питательных веществ, так и в образовании других соединений, необходимых для совершения обменных процессов. Одной из возможных причин более низкого содержания фосфатов может быть либо недостаточное поступление в организм витамина D, либо нарушение всасывания фосфатов в ЖКТ цыплят-бройлеров.

Выводы. Включение в рацион цыплят-бройлеров пробиотической кормовой добавки «Нормосил» в концентрации 1×10^6 КОЕ/мл при выращивании напольно до 42-дневного возраста показывает лучший эффект относительно концентрации препарата 1×10^7 КОЕ/мл. Так, у цыплят-бройлеров при ежедневной и периодической даче «Нормосила» в 21-дневном возрасте увеличивается содержание в крови эритроцитов на 5,6 и 14,1 %; гемоглобина в 40-дневном возрасте – на 4,9 и 10,9 % соответственно. В сыворотке крови цыплят-бройлеров в 40-дневном возрасте повышается относительно данных контрольной группы содержание глюкозы на 12,3 и 17,4 %; общего белка – на 0,5 и 5,7 %; альбуминов – на 3,7 и 14,4 %; натрия – на 2,1 и 5,0 %; калия – на 17,0 и 33,3 %; кальция – на 7,7 % и 21,2 % ($p < 0,05$) соответственно. Значение альбумин-глобулинового коэффициента составляет соответственно 1,02 и 1,25. Установлены отсутствие негативного влияния компонентов препарата на организм птицы и активизация в организме цыплят-бройлеров белкового и углеводного обмена. Это обеспечивается повышением активности протеолитических и амилолитических ферментов, образующихся в процессе жизнедеятельности микроорганизмов-пробионтов, что повышает усвояемость компонентов комбикорма, обеспечивая большую энергию роста молодняка птицы.

Библиографический список

1. Ashayerizadeh O., Dastar B., Samadi F., Khomeiri M., Yamchi A., Zerehdaran. Effects of Lactobacillus-based probiotic on performance, gut microflora, hematology and intestinal morphology in young broiler chicken challenged with *Salmonella Typhimurium*. Poultry Science Journal, 2016, 4 (2): 157–165.
2. Жиганова, Л.П. Использование антибиотиков в сельскохозяйственном производстве США и стран Европейского Сообщества [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.portal-slovo.ru/impressionism/36424.php>. 16.06.2018.
3. Цапалова, Г.Р. Эффективность применения пробиотиков Витафорт и Лактобифадол при выращивании гусят [Текст] / Г.Р. Цапалова, А.В. Цапалов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2016. № 2. С. 85–88.
4. Хазиахметов, Ф.С. Использование пробиотика «Витафорт» в рационах молодняка сельскохозяйственных животных [Текст] / Ф.С. Хазиахметов, А.Е. Андреева, А.А. Камилъянов // Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Материалы Меж-

дународной научно-практической конференции. 2013. С. 72–74.

5. Хаматнуров, А.С. Морфофункциональные изменения печени цыплят при применении пробиотика «Витафорт» [Текст] / А.С. Хаматнуров, Р.Х. Авзалов, С.Б. Ганиев // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2013. № 3 (27). С. 84–86.

6. Адуллина, Г.Ф. Динамика живой массы утят при скормливании им витаминно-аминокислотного препарата Чиктоник [Текст] / Г.Ф. Адуллина, А.Е. Андреева, Х.Г. Ишмуратов // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2014. № 1 (29). С. 41–45.

7. Чудов, И.В. Реализация синбиотического эффекта в системе выращивания цыплят, с применением пребиотика «Ориган» [Текст] / И.В. Чудов, А.Ф. Исмагилова // Российский электронный научный журнал. 2013. № 5 (5). С. 140–153.

8. Шарипов, А.Р. Перспективы разработки новых лекарственных средств на основе бисизоникотиноата бетулина, оценка его биологической активности и параметров острой токсичности [Текст] / А.Р. Шарипов, И.В. Чудов // В сбор-

Сведения об авторе

Хабиров Айрат Фаритович, кандидат биологических наук, заведующий кафедрой физиологии, биохимии и кормления животных, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 228-07-73, e-mail: xaifa@mail.ru.

Представлены результаты напольного выращивания цыплят-бройлеров кросса Arbor Acres в условиях ООО «Стерлибашевская птицеферма» Республики Башкортостан с суточного до 42-дневного возраста при использовании пробиотической кормовой добавки «Нормосил», включающей смесь живых культур: *Lactobacillus brevis B-3* (ВКПМ В 6338), *Lactobacillus plantarum 8P-A3* (В 11007), *Lactobacillus acidophilus 457* (В 2213), *Enterococcus faecium УДС 86* (ВКПМ В-4054) и энтеросорбент. Цыплятам-бройлерам с питьевой водой задавалась пробиотическая кормовая добавка «Нормосил» в концентрации 1×10^7 и 1×10^6 КОЕ/мл ежедневно и в этих же концентрациях – периодически (1–10, 15–24, 29–38 дни) из расчета 1 мл на 1 кг живого веса птицы. Включение в рацион цыплят-бройлеров пробио-

тической кормовой добавки «Нормосил» в концентрации 1×10^6 КОЕ/мл имеет лучший эффект относительно использования концентрации препарата 1×10^7 КОЕ/мл. У цыплят-бройлеров при ежедневной и периодической даче пробиотической кормовой добавки «Нормосил» в 21-дневном возрасте увеличивается содержание в крови эритроцитов на 5,6 и 14,1 %; гемоглобина в 40-дневном возрасте – на 4,9 и 10,9 % соответственно. В сыворотке крови цыплят-бройлеров в 40-дневном возрасте повышается относительно контроля содержание глюкозы на 12,3 и 17,4 %; общего белка – на 0,5 и 5,7 %; альбуминов – на 3,7 и 14,4 %; натрия – на 2,1 и 5,0 %; калия – на 17,0 и 33,3 %; кальция – на 7,7 и 21,2 % ($p < 0,05$) соответственно. Альбумин-глобулиновый коэффициент составляет соответственно 1,02 и 1,25.

A. Khabirov

MORPHO-BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN BROILER CHICKENS WHEN THEIR DIET IS ADDED WITH FODDER SUPPLEMENT «NORMOSIL»

Key words: morpho-biochemical indicators of blood; Arbor Acres broiler chickens; albumin-globulin coefficient; minerals.

Authors' personal details

Khabirov Airat, Candidate of biological sciences, head of the department of Physiology, Biochemistry and Feeding of Animals, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letia Octiabria St., 34, phone: +7 (347) 228-07-73, e-mail: xaifa@mail.ru.

The paper provides the results of growing Arbor Acres broiler chickens in conditions of the «Sterlibashevskaya Poultry Farm» LLC of the Republic of Bashkortostan from the age of 1 to 42 days. Chickens were fed with probiotic fodder additive «Normosil» including a mixture of live cultures: *Lactobacillus brevis B-3* (VKPM В 6338), *Lactobacillus plantarum 8P-A3* (В 11007), *Lactobacillus acidophilus 457* (В 2213), *Enterococcus faecium УДС 86* (VKPM В-4054) and enterosorbent. Probiotic fodder additive «Normosil» was given to broiler chickens with drinking water in a concentration of 1×10^7 and 1×10^6 CFU/ml daily and at the same concentrations periodically (1–10, 15–24, 29–38 day) at a rate of 1 ml per 1 kg of live weight of poultry. The results of the studies indicate that using probiotic fodder addi-

tive «Normosil» in the diet of broiler chickens in 1×10^6 CFU/ml concentrations has a comparatively better effect than the use of a 1×10^7 CFU/ml concentration. The blood content of chickens being fed with probiotic fodder additive «Normosil» daily and periodically changes. There is higher erythrocyte content by 5,6 % and 14,1 % at the age of 21 days; higher hemoglobin by 4,9 % and 10,9 % at the age of 40 days. Compared to the control group in the blood serum of broiler chickens at the age of 40 days the glucose content increases by 12,3 % and 17,4 %; total protein by 0,5 % and 5,7 %; albumin by 3,7 % and 14,4 %; sodium by 2,1 % and 5,0 %; potassium by 17,0 % and 33,3 %; calcium by 7,7 % and 21,2 % ($p < 0,05$). The albumin-globulin coefficient is 1,02 and 1,25 correspondently.

ВЛИЯНИЕ КОРРЕКЦИИ ОБМЕННОГО ПУЛА ЙОДА И СЕЛЕНА, ОЦЕНЕННОГО ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ ШЕРСТИ, НА ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС КОРОВ

Ключевые слова: крупный рогатый скот; коровы; элементный статус; кровь; гормональный статус; йод; селен.

Введение. Адаптация импортного скота к определенной биогеохимической провинции – это сложный и длительный процесс, сопровождающийся структурной перестройкой метаболического и иммунного профиля организма животных, связанный в начальный период со стрессовыми факторами, которые в первую очередь отражаются на их воспроизводительной функции [1]. Воспроизводительная способность является одним из основных показателей приспособленности организма к новым условиям кормления, содержания и особенностям местного климата [2]. Неблагоприятные факторы содержания, кормления, неправильно организованные роды и другое вызывают нарушения обмена веществ и нейроэндокринных механизмов регуляции воспроизводительной функции, которые приводят к заболеваниям, проявляющимся во время и сразу после родов; это связано с подавлением иммунитета, повышенной восприимчивостью к инфекциям [3, 4]. Это приводит к задержке сроков возобновления половых циклов и служит основной причиной бесплодия коров. Клинико-гинекологическое исследование на 31–60 сутки после отела выявляет неактивные яичники, уменьшенные в размерах, имеющие плоскую форму, дряблую, иногда плотную консистенцию, без каких-либо образований (желтых тел или фолликулов на разных стадиях развития) [5, 6]. Большое значение в поддержании здоровья животных и человека придают жизненно важным макро- и микроэлементам. Оренбургская область относится к селен- и йоддефицитной биогеохимической провинции [7]. Йод и селен функционально связаны между собой, поскольку последний входит в состав фермента йодтирониндейодиназы, обеспечивающего трансформацию тироксина в трийодтиронин. Недостаток в организме этих двух микроэлементов может служить одним из главных факторов риска в провоцировании йоддефицитных состояний [8]. Дефицит селена вызывает симптомы гипотиреозидизма, вследствие чего снижается уровень обменных процессов в организме и невозможна полная реализация генетического потенциала продуктивности животных и птицы [9].

Цель исследования – изучить влияние двукратной внутримышечной инъекции препарата микроэлементов на гормональный статус коров.

Материал и методы исследования. Объект исследования – коровы герефордской породы канадской селекции, возраст 4–5 лет (2–3 отёл), живая масса $548,4 \pm 12,3$ кг. Обслуживание животных и экспериментальные исследования были выполнены в соответствии с инструкциями и рекомендациями Russian Regulations, 1987 (Order No.755 on 12.08.1977 the USSR Ministry of Health) and «The Guide for Care and Use of Laboratory Animals (National Academy Press Washington, D.C. 1996)». При выполнении исследований были предприняты усилия, чтобы свести к минимуму страдания животных и количество используемых образцов.

Схема эксперимента. Исследования проведены на коровах ($n = 48$) герефордской породы с низкими воспроизводительными способностями (не пришли в охоту более 2 месяцев после отёла), от которых на основании результатов анализа содержания в шерсти йода и селена ниже установленной нормы (ниже 25 процента, $I < 0,28$ мг/кг, $Se < 0,58$ мг/кг) [10] отобрали 30 голов. Животных разделили по принципу аналогов на 2 группы – контрольную ($n = 15$) и опытную ($n = 15$). Опытным животным на 1 и 10 сутки внутримышечно вводили по 10 мл коммерческий препарат, содержащий в 1 мл: йод – 5,5–7,5 мг, селен в органической форме – 0,07–0,09 мг (соответствует 0,16–0,20 мг селенита натрия), железо (Fe^{3+}) – 16–20 мг. Скот принадлежит ООО СП «Колос» Оренбургской области. В период проведения опыта рацион животных включал: сено естественных угодий – 8 кг, сенаж люцерновый – 6 кг, концентраты: смесь ячменя, пшеницы, овса, – 3,0 кг, в нем содержалось ОЭ – 106,2 МДж, сухого вещества – 12,1 кг, переводимого протеина – 1092 г.

Отбор проб крови производили на 1, 14 и 28 сутки эксперимента утром до кормления и поения из хвостовой вены на уровне средней трети тела 2–5 хвостовых позвонков в вакуумные пробирки.

Оборудование и технические средства.

Кровь для биохимических исследований отбирали в вакуумные пробирки APEXLAB с активатором свертывания фирмы Hebei Xinl Sky & Tech Co., Ltd, иглы для забора крови Bodywin. Гормональный статус определялся на универсальном автоматическом фотометре BioTek ELx 800 (производитель – «BioTek Instruments Inc.», США). Биохимический анализ крови осуществлялся с помощью автоматического биохимического анализатора CS-T240 (производитель – «Dirui Industrial Co., Ltd.», Китай). Биохимический анализ проводился с использованием коммерческих биохимических наборов для ветеринарии ДиаВетТест (производитель – Россия) и коммерческих биохимических наборов Randox (производитель – США) в условиях ЦКП ФНЦ БСТ РАН (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПФ59 от 12.10.2015 г). Отбор образцов шерсти проводили согласно ранее разработанной методике [11] при помощи беспроводной машинки для стрижки коров, лошадей и мелких животных Heiniger Saphir (Швейцария) с длиной остатка от корня не более 1,8 мм.

Ультразвуковую диагностику коров на определение стельности и бесплодности проводили при помощи ветеринарного УЗИ-сканера IMAGO S с ректальным секторным датчиком DB 355 M.

Статистическая обработка. Для проверки гипотезы о нормальности распределения количественных признаков применяли критерий Шапиро – Уилка. Достоверность различий проверяли при помощи U-критерия Манна – Уитни. Во всех процедурах статистического анализа рассчитывали достигнутый уровень значимости (p), при этом критический уровень значимости в данном исследовании принимался меньшим или равным 0,05. Для обработки данных использовали пакет прикладных программ Statistica 10.0 («Stat Soft Inc.», США).

Результаты и обсуждение полученных результатов. Анализ результатов биохимических показателей сыворотки крови коров с низкими воспроизводительными способностями показал статистически значимые изменения по исследуемым признакам после внутримышечного введения йод-селен содержащего препарата (рисунки 1, 2).

В периферической крови коров через 14 дней эксперимента отмечалось достоверное увеличение содержания мочевины на 33,0 % ($P \leq 0,01$), АСТ – на 5,2 % ($P \leq 0,05$) при меньшем содержании мочевой кислоты на 8,9 % ($P \leq 0,01$), холестерина – на 68,06 % ($P \leq 0,001$) по сравнению с началом эксперимента. На 28 сутки экспе-

римента наблюдалось еще большее изменение биохимических показателей сыворотки крови по сравнению с исходными: произошло увеличение содержания фосфора на 86,0 % ($P \leq 0,001$), триглицеридов – на 41,0 % ($P \leq 0,001$), мочевины – на 37,6 % ($P \leq 0,001$), АЛТ – на 20,0 % ($P \leq 0,01$), креатинина – 15,3 % ($P \leq 0,01$), глюкозы – на 11,2 % ($P \leq 0,01$), щелочной фосфатазы – на 10,4 % ($P \leq 0,01$), АСТ – на 10,4 % ($P \leq 0,01$), альбуминов – на 7,1 % ($P \leq 0,05$), общего белка – на 5,9 % ($P \leq 0,05$), кальция – на 5,6 % ($P \leq 0,05$) при снижении холинэстеразы на 9,6 % ($P \leq 0,05$), билирубина прямого – на 16,4 % ($P \leq 0,01$), холестерина – на 39,6 % ($P \leq 0,001$), магния – на 56,2 % ($P \leq 0,01$), гамма-глутамилтрансферазы – на 80,7 % ($P \leq 0,001$). Построение элементного профиля коров с низкими воспроизводительными качествами при введении препарата микроэлементов позволило оценить изменения в гормональном статусе животных (рисунки 3, 4).

По большинству изучаемых гормонов получены статистически не достоверные данные, исключением являются тироксин и эстрадиол. Гормоны щитовидной железы являются жизненно важными для нормального течения беременности, для дифференциации эмбриональных органов, особенно плаценты [12–14]. В нашем исследовании коррекция йод-селенового статуса коров путем ввода им микроэлементной добавки позволила повысить концентрацию в сыворотке крови тироксина на 22,0 ($P \geq 0,05$) и 55,3 % ($P \leq 0,001$), трийодтиронина на 28,8 ($P \geq 0,05$) и 87,3 ($P \geq 0,05$) % соответственно на 14 и 28 сутки. Это может быть объяснено как действием самой добавки, так и изменением периода лактации [15]. Повышение эстрадиола на 21,0 ($P \geq 0,05$) и 24,3 % ($P \leq 0,05$) на 14 и 28 сутки указывает на половую охоту (организм готовится к овуляции); не оказывая прямого действия на овуляцию, этот гормон регулирует менструальный цикл, подготавливает слизистую оболочку матки к внедрению оплодотворенной яйцеклетки, что в нашем исследовании является решающим фактором [16].

Выявленная в нашем эксперименте устойчивая тенденция к повышению уровня пролактина, кортизола, тестостерона в сыворотке крови коров, помимо введения корректирующего препарата, могло быть следствием изменения срока лактации [17]. Обнаружена обратная связь фолликулостимулирующего (ФСГ) и адренокортикотропного гормонов (АКТГ), повышение второго свидетельствует о стрессовом состоянии животного, которое ведет к снижению уровня первого.

Рисунок 1
Биохимические показатели крови коров с низкими воспроизводительными способностями при использовании корректирующей добавки

Рисунок 2
Биохимические показатели крови коров с низкими воспроизводительными способностями при использовании корректирующей добавки

Рисунок 3
Элементный профиль коров герефордской породы на 14 день эксперимента по сравнению с постановкой на опыт, %

Рисунок 4
Элементный профиль коров герефордской породы на 28 сутки эксперимента по сравнению с постановкой на опыт, %

В нашем опыте снижение АКГТ способствовало росту ФСГ, что еще раз указывает на положительное действие микроэлементной добавки. Полученные нами данные подтверждаются исследованиями А.Г. Патюкова [18]. Оценка элементного состава шерсти у подопытных животных на 28 сутки установила, что введение корректирующей добавки микроэлементов позволяет повысить по отношению к моменту постановки на опыт обменный пул йода и селена, средние значения концентраций которых вошли в пределы допустимых значений (25–75 перцентиль).

Выводы. Внутримышечное введение препарата, содержащего комплекс эссенциальных микроэлементов, коровам с низкими воспроизводительными качествами способствует изменению гормонального статуса животных с увеличением концентрации в сыворотке крови Т₃, Т₄, Эстрадиола, в шерсти – йода и селена.

Исследования выполнены в соответствии с планом НИР на 2018–2020 гг. ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН (№ 0761-2018-0005).

Библиографический список

- Голиков, А.Н. Физиологическая адаптация животных [Текст] / А.Н. Голиков // Ветеринария. 1988. № 11. С. 55–58.
- Ключникова, Н.Ф. Аспекты повышения оплодотворяемости коров [Текст] / Н.Ф. Ключникова. Хабаровск, 2006. 256 с.
- Mallard B.A., Dekkers J.C., Ireland M.J. et al. Alteration in immune responsiveness during the peripartum period and its ramification on dairy cows and calf health. *Journal of Dairy Science*. 1998; 81 (2): 589–595.
- Persson Waller K. Mammary gland immunology around parturition. Influence of stress, nutrition and genetics. *Advances in Experimental Medicine and Biology*. 2000; 480: 3488–3497.
- Тяпугин, Е.А. Теория и практика интенсификации репродуктивной активности в молочном скотоводстве [Текст] / Е.А. Тяпугин. Вологда, 2008. 451 с.
- Захаров, П.Г. Стимуляция половых функций у коров [Текст] / П.Г. Захаров, Е.П. Захаров, Н.И. Петров, Р.С. Сираджинов // РацВет Инфформ. 2006. № 2. С. 21–22.
- Мирошников, С.А. Гигиеническая оценка селенового статуса Оренбургского региона [Текст] / С.А. Мирошников, Т.И. Бурцева, Н.А. Голубкина, С.В. Нотова, А.В. Скальный, О.И. Бурлуцкая // Вестник Оренбургского государственного университета. 2008. № 12 (94). С. 95–98.
- Larsen P.R., Berry M.J. Nutritional and hormonal regulation of thyroid hormone deiodinases. *Ann. Res. Nutr.* 1995. Vol. 15. P. 323–352.
- Решетник, Л.А. Биогеохимическое и клиническое значение селена для здоровья человека [Текст] / Л.А. Решетник, Е.О. Парфенова // Микроэлементы в медицине. 2001. № 2. С. 2–8.
- Харламов, А.В. Элементный статус коров мясного направления продуктивности в Оренбургской области [Текст] / А.В. Харламов, А.Н. Фролов, О.А. Завьялов, И.В. Маркова // Животноводство и кормопроизводство. 2018. № 1 (101). С. 51–58.
- Method of sampling beef cattle hair for assessment of elemental profile / S.A. Miroshnikov, A.V. Kharlamov, O.A. Zavyalov, A.N. Frolov, I.P. Bolodurina, O. Arapova, G. Duskaev // *Pakistan Journal of Nutrition*. 2015. T. 14. № 9. P. 632–636.
- Forhead A.J., Fowden A.L. Thyroid hormones in fetal growth and prepartum maturation, *J. Endocrinol.* 221 (2014) R87–R103.

13. Micke G.C., Sullivan T.M., Kennaway D.J., Hernandez-Medrano J., Perry V.E. Maternal endocrine adaptation throughout pregnancy to nutrient manipulation: consequences for sexually dimorphic programming of thyroid hormones and development of their progeny, *Theriogenology* 83 (2015) 604–615.

14. Ashkar F.A., Semple E., Schmidt C.H., St. John E., Bartlewski P.M., King W. Thyroid hormone supplementation improves bovine embryo development in vitro. *Hum Reprod.* 2010; 25: 334–344. doi: 10.1093/humrep/dep394.

15. Pezzi C., Accorsi P.A., Vigo D., Govoni N., Gaiani R. 5'-Deiodinase activity and circulating thyronines in lactating cows. *J Dairy Sci.* 2003; 86: 152–158. doi: 10.3168/jds.S0022-0302(03)73595-4.

16. Подвалюк, Д.В. Содержание прогестерона и эстрадиола-17 β в течение полового цикла у кобыл [Текст] / Д.В. Подвалюк, Ю.Д. Подва-

люк // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена Знак почета государственная академия ветеринарной медицины». 2015. Т. 51. № 1-1. С. 113–115.

17. Симонов, М.Р. Гормональный статус молочных коров до- и послеотельного периодов [Текст] / М.Р. Симонов, В.В. Влизло, В.И. Буяк, И.М. Петрух // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена Знак почета государственная академия ветеринарной медицины». 2017. Т. 53. № 2. С. 132–137.

18. Патюков, А.Г. Взаимосвязь содержания ключевых стресс-лимитирующих гормонов с показателями свободнорадикального окисления биомолекул в крови коров на разных стадиях репродуктивного цикла [Текст] / А.Г. Патюков, И.П. Степанова, Я.С. Макарова, В.В. Мутак // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4. С. 501.

Сведения об авторах

1. **Харламов Анатолий Васильевич**, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий отделом технологии мясного скотоводства и производства говядины, ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий Российской академии наук», 460000, г. Оренбург, ул. 9 Января, 29, тел.: 8 (3532) 43-46-78, e-mail: vniims.or@mail.ru

2. **Фролов Алексей Николаевич**, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник отдела технологии мясного скотоводства и производства говядины, ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий Российской академии наук», 460000, г. Оренбург, ул. 9 Января, 29, тел.: 8 (3532) 43-46-78, e-mail: forleh@mail.ru.

3. **Завьялов Олег Александрович**, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник отдела технологии мясного скотоводства и производства говядины, ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий Российской академии наук», 460000, г. Оренбург, ул. 9 Января, 29, тел.: 8 (3532) 43-46-78, e-mail: oleg-zavyalov83@mail.ru.

В статье представлены данные влияния парентерального введения препарата микроэлементов на гормональный статус и биохимические показатели крови коров. Исследования проведены на коровах герефордской породы, принадлежащих ООО СП «Колос» Оренбургской области ($n = 30$). Критерием отбора животных было дефицитное содержание йода и селена в шерсти ($I < 0,28$ мг/кг, $Se < 0,58$ мг/кг) и низкие воспроизводительные способности (не пришли в охоту более 2 месяцев). Животных разделили по принципу аналогов на 2 группы – контрольную ($n = 15$) и опытную ($n = 15$). Опытным животным на 1 и 10 сутки внутримышечно вводили по 10 мл коммерческого препарата, содержащего в 1 мл: йод – 5,5–7,5 мг, селен в органической форме – 0,07–0,09 мг (соответствует 0,16–0,20 мг селенита натрия), железо (Fe^{3+}) – 16–20 мг. Отбор проб крови производили на 1, 14 и 28 сутки эксперимента. В период проведения опыта рацион животных включал: сено естественных угодий – 8 кг, сенаж люцерновый –

6 кг, концентраты: смесь ячменя, пшеницы, овса – 3,0 кг, в нем содержалось ОЭ 106,2 МДж, сухого вещества – 12,1 кг, переводимого протеина – 1092 г. Биохимические показатели крови выявили, что на 14 день эксперимента наблюдалось достоверное увеличение содержания мочевины на 33,0 %, АСТ – на 5,2 % со снижением гамма-глутамилтрансферазы на 6,7 %, мочевой кислоты на – 8,9 %, холестерина – на 68,1 %. На 28 сутки увеличилось содержание триглицеридов на 41,0 %, мочевины – на 37,6 %, АЛТ – на 20,0 %, креатинина – 15,3 %, глюкозы – на 11,2 %, щелочной фосфатазы – на 10,4 %, АСТ – на 10,4 %, альбуминов – на 7,1 %, общего белка – на 5,9 % при снижении холинэстеразы на 9,6 %, прямого билирубина – на 16,4 %, холестерина – на 39,6 %, гамма-глутамилтрансферазы – на 80,7 % по сравнению с началом эксперимента. По большинству изучаемых гормонов: трийодтиронину, ФСГ, тестостерону, кортизолу, пролактину, ДГЭА-С, АКГТ, – получены статистически не достоверные данные, исклю-

чением являются тироксин, концентрация которого в сыворотке крови увеличилась на 22,0 и 55,3 % и эстрадиола – на 21,0 и 24,3 % соответственно на 14 и 28 сутки. Введение добавки микроэлементов позволяет производить коррекцию

обменного пула йода и селена, оценённого по концентрации в шерсти с холки, средние значения которых на 28 сутки вошли в пределы допустимых значений (25–75 процентиль).

A. Kharlamov, A. Frolov, O. Zavyalov

EFFECT OF CORRECTION OF THE EXCHANGE POOL OF IODINE AND SELENIUM ESTIMATED BY THE CHEMICAL COMPOSITION OF WOOL ON THE HORMONAL STATUS OF COWS

Key words: *cattle; cows; elemental status; blood; hormonal status; iodine; selenium.*

Authors' personal details

1. **Kharlamov Anatoly**, Doctor of agricultural sciences, professor, head of the Beef Cattle Breeding and Production Technology department, Federal Scientific Center of Biological Systems and Agrotechnologies of the Russian Academy of Sciences, 460000, Orenburg, Deviatoe Yanvary St., 29, phone: 8 (3532) 43-46-78, e-mail: vniims.or@mail.ru.

2. **Frolov Aleksey**, Candidate of agricultural sciences, senior researcher of the Beef Cattle Breeding and Production Technology department, Federal Scientific Center of Biological Systems and Agrotechnologies of the Russian Academy of Sciences, 460000, Orenburg, Deviatoe Yanvary St., 29, phone: 8 (3532) 43-46-78, e-mail: forleh@mail.ru.

3. **Zavyalov Oleg**, Candidate of agricultural sciences, senior researcher of the Beef Cattle Breeding and Production Technology department, Federal Scientific Center of Biological Systems and Agrotechnologies of the Russian Academy of Sciences, 460000, Orenburg, Deviatoe Yanvary St., 29, phone: 8 (3532) 43-46-78, e-mail: oleg-zavyalov83@mail.ru.

The article presents data on the effect of parenteral administration of the preparation of trace elements on hormonal status and biochemical indices of cows blood. The studies were carried out on Hereford cows belonging to LLC Kolos of the Orenburg Region (n = 30). The criterion for selecting animals was the deficit content of iodine and selenium in wool (I < 0,28 mg/kg, Se < 0,58 mg/kg) and low reproductive ability (did not go hunting more than 2 months). The animals were divided according to the principle of analogs into 2 groups – control (n = 15) and experimental (n = 15). Experimental animals were injected intramuscularly with 10 ml of a commercial preparation containing 1 ml of iodine in the first and 10th days: iodine 5,5–7,5 mg, selenium in an organic form 0,07–0,09 mg (corresponding to 0,16–0,20 mg of sodium selenite), iron (Fe³⁺) – 16–20 mg. Blood samples were taken on days 1, 14 and 28 of the experiment. During the experiment, the animal diet included: hay of natural lands – 8 kg, alfalfa haylage – 6 kg, concentrates: barley, wheat, oats, – 3,0 kg, it contained OE – 106,2 MJ, dry matter – 12,1 kg, the transferred protein – 1092 g. Biochemical blood indices showed that on the 14th day

of the experiment there was a significant increase in the urea content by 33,0 %, AST – by 5,2 %, with a decrease in gamma-glutamyltransferase by 6,7 %, uric acid by 8,9 %, cholesterol – by 68,1 %. On the 28th day, the content increased: triglycerides by 41,0 %, urea by 37,6 %, ALT by 20,0 %, creatinine by 15,3 %, glucose by 11,2 %, alkaline phosphatase by 10,4 %, AST – 10,4 %, albumin – 7,1 %, total protein – 5,9 %, with a decrease in cholinesterase by 9,6 %, direct bilirubin – by 16,4 %, cholesterol – by 39,6 %, gamma-glutamyltransferase – by 80,7 % compared to the beginning of the experiment. For most of the hormones studied: triiodothyronine, FSH, testosterone, cortisol, prolactin, DHEA-C, and ACTH, statistically unreliable data were obtained, except that thyroxine concentration in serum increased by 22,0 and 55,3 % and estradiol by 21,0 and 24,3 %, respectively, on days 14 and 28. The introduction of trace elements addition allows to correct the exchange pool of iodine and selenium, estimated by the concentration in the wool from the withers, the average values of which on the 28th day entered the limits of acceptable values (25–75 percentile).

МОНИТОРИНГ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ЭШЕРИХИОЗУ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Ключевые слова: телята; эшерихиоз; эпизоотология; мониторинг; этиология.

Введение. Скотоводство в нашей стране остается перспективным направлением. Успешному развитию этой отрасли препятствуют различные факторы, в том числе различные заболевания, поэтому сохранность молодняка является актуальной задачей для ветеринарной науки и практики [1, 2]. Одно из основных мест среди заболеваний новорожденных животных занимают желудочно-кишечные, к которым относится и эшерихиоз, чаще всего протекающий с признаками диареи, интоксикации, септицемии, расстройства сердечнососудистой и центральной нервной систем [6, 7]. Эпизоотический процесс при эшерихиозе зависит не только от источников инфекции и восприимчивых телят, но и от различных факторов, таких, как несоблюдение ветеринарно-санитарных, зоогигиенических норм, разнообразные погрешности при содержании и кормлении коров-матерей, несвоевременная выпойка молозива, содержание молодняка с взрослым поголовьем, несоблюдения правила «все пусто – все занято», а также неконтролируемое введение антибиотиков без определения чувствительности патогена к нему, что способствует появлению антибиотикорезистентных бактерий [3, 5, 10]. Широкому спектру распространения эшерихиоза способствуют большое количество имеющихся серотипов данного заболевания, что также затрудняет проведение своевременных терапевтических мероприятий [4, 9]. В связи с этим изучение эпизоотической распространенности и этиологической структуры заболевания является актуальной задачей ветеринарной науки и практики.

Целью исследования является изучение особенностей эпизоотического распространения, этиологической структуры и нозологиче-

ского профиля эшерихиоза молодняка крупного рогатого скота в Республике Башкортостан с 2004 по 2016 годы.

Материалы и методы исследований. Для изучения нозологического профиля по инфекционным заболеваниям молодняка крупного рогатого скота нами была проанализирована документация ветеринарной отчетности лабораторий в ГБУ Башкирская научно-производственная ветеринарная лаборатория по 54 районам с 2004 по 2016 годы, в частности это годовые отчеты, сопроводительные документы, где были представлены сведения о положительных случаях по бактериальным заболеваниям. Последовательность и приемы эпизоотологического исследования, а также математический расчет интенсивных и экстенсивных показателей проведены согласно «Методическим указаниям по эпизоотологическому исследованию» [2]. Показатели сезонности эшерихиоза устанавливали как средние значения (М) и ошибки средних значений ($\pm m$) за весь период исследования. Полученные данные подвергнуты статической обработке методами вариационной статистики с проверкой достоверности результатов с помощью критерия Стьюдента и уровня значимости (Р) по специально разработанным программам Word 2007 и Excel 2007.

Результаты исследований. В результате проведенных исследований нами установлено, что нозологический профиль инфекционных болезней молодняка крупного рогатого скота представлен семью нозологическими единицами: эшерихиозом, пастереллезом, сальмонеллезом, диплококкозом, стрептококкозом, псевдомонозом, злокачественным отеком. Результаты исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1 Нозологический профиль по заболеваниям телят в Республике Башкортостан в 2004–2016 годы

№ п/п	Болезнь	Неблагополучные пункты	Заболевшие животные, гол.
1	Эшерихиоз	644	828
2	Пастереллез	455	579
3	Сальмонеллез	287	303
4	Диплококкоз	214	278
5	Стрептококкоз	132	395
6	Псевдомоноз	91	167
7	Злокачественный отек	74	80
	Всего	1890	2630

За двенадцать лет количество неблагополучных пунктов по заболеваниям телят составило 1890. Общее количество выявленных заболевших животных по семи наиболее распространенным заболеваниям составило 2630 голов. Удельный вес по неблагополучным пунктам и заболевшим животным по отношению к общим показателям был следующий: эшерихиоз 34,07 % (644) и 31,48 % (828); пастереллез

24,07 % (455) и 22,01 % (579); сальмонеллез 15,19 % (287) и 11,52 % (303); диплококкоз 11,32 % (214) и 10,57 % (278); стрептококкоз 6,94 % (132) и 15,02 % (395); псевдомоназ 4,81 % (91) и 6,35 % (167); злокачественный отек 3,92 % (74) и 3,04 % (80). Это позволило нам установить, что эшерихиоз занимает лидирующие позиции по заболеваемости.

Таблица 2 Интенсивность эпизоотических показателей эшерихиоза в Республике Башкортостан за 2004–2016 годы

Год	Неблагополучные пункты			Заболеваемость			Смертность		
	количество	M ± m	P	количество	M ± m	P	количество	M ± m	P
2004	83	2,51 ± 1,85	< 0,1	103	3,22 ± 1,95	< 0,05	9	2,36 ± 0,16	< 0,01
2005	98	2,65 ± 2,34	< 0,1	86	2,21 ± 2,1	< 0,1	31	2,44 ± 0,51	< 0,01
2006	73	2,43 ± 1,35	< 0,05	66	2,28 ± 2,14	< 0,1	29	2,72 ± 0,35	< 0,1
2007	70	2,19 ± 1,51	< 0,1	102	3,19 ± 1,78	< 0,05	11	1,48 ± 0,2	< 0,1
2008	61	2,03 ± 1,48	< 0,1	72	2,23 ± 1,23	< 0,05	22	1,88 ± 0,9	< 0,01
2009	76	2,71 ± 2,26	< 0,1	85	3,03 ± 2,2	< 0,1	13	2,4 ± 0,42	< 0,01
2010	52	2,08 ± 1,32	< 0,1	65	2,4 ± 1,14	< 0,01	25	2,8 ± 0,46	< 0,01
2011	67	2,48 ± 1,67	< 0,1	79	2,74 ± 1,78	< 0,01	17	2,81 ± 0,63	< 0,01
2012	31	1,47 ± 0,59	< 0,01	47	2,24 ± 1,06	< 0,01	13	1,2 ± 0,11	< 0,01
2013	28	2,54 ± 2,16	< 0,1	45	3,64 ± 2,3	< 0,1	11	1,4 ± 0,23	< 0,1
2014	18	2,25 ± 1,48	< 0,1	29	3,63 ± 1,94	< 0,05	14	2,6 ± 0,43	< 0,01
2015	16	2,01 ± 0,5	< 0,001	21	2,62 ± 0,79	< 0,01	7	2,01 ± 0,18	< 0,01
2016	20	1,83 ± 1,32	< 0,1	28	3 ± 1,73	< 0,05	9	2,1 ± 0,37	< 0,01

Рисунок 1

Динамика эпизоотологических показателей по эшерихиозу телят в Республике Башкортостан с 2004 по 2016 годы

Изучение эпизоотологической обстановки по эшерихиозу телят в Республике Башкортостан дало нам возможность выявить статистику по неблагополучным пунктам, заболеваемости и смертности (таблица 2) в 2004–2016 годы. Установлено, что наибольшее количество неблагополучных пунктов по эшерихиозу выявлено в 2005 году в количестве 98, а наименьшее количество 16 в 2015 году. Наивысший показатель по заболе-

ваемости в количестве 103 головы был установлен в 2004 году, а наименьший – 21 – в 2015 году. Наибольший показатель смертности от эшерихиоза установлен в 2004 году в количестве 31 головы, а наименьший показатель – в 2014 году в количестве 7 голов соответственно. Определение динамики заболеваемости молодняка крупного рогатого скота проводили с 2004 по 2016 годы. Показатели представлены в таблице 3.

Средний показатель заболеваемости ($M \pm m$) за двенадцать лет наиболее высок в феврале ($102,9 \pm 11,7$) и марте ($103,3 \pm 9,1$), что связано с массовыми отёлами в хозяйствах, после чего происходит спад до ноября ($19,5 \pm 3,5$). Все полученные данные были представлены как забо-

леваемость на сто тысяч голов. Циркуляции заболевания в хозяйствах республики в течение долгого срока способствуют проявлению широкого спектра серотипов данного заболевания, что в свою очередь затрудняет своевременное проведение терапевтических мероприятий.

Таблица 3 Динамика заболеваемости телят по эшерихиозу за 2004–2016 годы

Месяц	Год													M ± m	P
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
	Заболеваемость на 100 тыс. голов														
Январь	36,3	17,9	25,62	29,02	24,3	18,2	12,5	56,9	20,4	9,1	37,2	19,73	20,3	25,2 ± 1,9	< 0,001
Февраль	140,1	125,1	109	197,4	85	151,8	75,3	138,2	74,8	72,6	46,55	49,31	71	102,9 ± 11,7	< 0,001
Март	88,21	60	96,07	150,93	103,2	164	106,6	163	62	109	9,31	108,5	121,7	103,3 ± 9,1	< 0,001
Апрель	145,3	83,4	64,1	58,1	115,3	91,1	50,2	122	62	72,6	65,16	60	71	81,6 ± 10,1	< 0,001
Май	5,2	23,8	32,02	17,41	6,07	12,1	37,6	24,4	13,6	9,07	18,6	19,7	30,4	19,23 ± 3,2	< 0,001
Июнь	10,38	11,9	6,4	11,61	12,1	12,1	6,3	16,3	13,6	18,1	27,9	9,86	20,3	12,82 ± 0,7	< 0,001
Июль	5,2	6	12,81	23,22	6,07	12,1	6,3	8,1	20,4	9,07	18,6	9,86	10,14	11,37 ± 2,1	< 0,001
Август	5,2	11,9	6,4	5,8	12,1	6,07	12,5	16,3	13,6	9,07	9,31	19,7	10,14	10,5 ± 0,95	< 0,001
Сентябрь	10,38	6	12,81	11,61	6,07	6,07	12,5	8,1	13,6	18,1	9,31	9,86	10,14	10,3 ± 0,87	< 0,001
Октябрь	5,2	11,9	16,4	5,8	12,1	12,1	6,3	40,7	6,8	9,07	9,31	9,86	10,14	12,01 ± 1,3	< 0,001
Ноябрь	26	11,9	12,81	40,63	12,1	6,07	25,1	16,3	13,6	9,07	18,6	30,6	30,4	19,5 ± 3,5	< 0,001
Декабрь	62,3	89,35	44,83	46,4	36,41	42,5	43,9	8,1	47,6	36,3	18,6	40	71	42,2 ± 3,8	< 0,001

В результате изучения полученных данных о бактериологических исследованиях, проведенных в районных и ветеринарных лабораториях, было выявлено двенадцать О-серотипов. Мы получили следующие показатели, которые представлены в процентах по частоте встречаемости ($M \pm m$): O115 – 15,26 %; O126 – 12,22 %; O141 – 11,64 %; O147 – 10,8 %; O26 – 9,69 %; O138 – 9,43 %; O8 – 9,22 %; O1 – 8,53 %; O101 – 6,64 %; O41 – 6,04 %; O19 – 5,21 %; O117 – 3,79 %. Стоит отметить, что в 2012 г. не были обнаружены серотипы O101, O138 и O147; в 2013 году – O101, O126 и O141; в 2014 – O138; в 2015 – O126 и O147; в 2016 году – O1 и O117. Исследования показали, что за двенадцать лет были выявлены штаммы эшерихий, имеющие энтеротоксигенные свойства, их обнаружено четыре: K88 – 50,07 %; F41 – 42,12 %; K99 – 37,59 %; 987P – 26,15 %. Часть серотипов эшерихий не были обнаружены: серотип 987P не установлен с 2004 по 2008, 2010, 2012, 2013, 2015 и 2016 годы; серотип K99 не установлен 2004 по 2006 годы; серотип F41 не обнаружен с 2008 по 2010, 2012, 2014, 2015 годы; серотип K88 не установлен в 2007 и 2016 годах.

Заключение. Среди инфекционных заболеваний молодняка крупного рогатого скота наибольший удельный вес по числу неблагополучных пунктов и количеству заболевших животных имеет эшерихиоз 644 (34,07 %) и 828 (31,48 %), который регистрируется в течение всего года. Наибольшее количество пунктов по заболеваемости эшерихиозом зафиксировано в 2005 году: 98, а наименьшее – в 2015 году – 16 пунктов, кроме того, наибольшее количество заболевших животных зафиксировано в 2004 году – 103 головы, а наименьшее – в 2015 году – 21 голова; по количеству павших животных в 2004 году 31 голова, наименьшее количество – в 2014 году – 7 голов. Установлено, что с 2004 по 2016 годы этиологическая структура эшерихиоза телят имеет широкое распространение и представлена двенадцатью О- и четырьмя энтеротоксигенными серотипами, где наиболее встречающимся являются O115 – 15,26 %; O126 – 12,22 %; O141 – 11,64 %; O147 – 10,8 %; K88 – 50,07 %; F41 – 42,12 %; K99 – 37,59 %; 987P – 26,15 %.

Библиографический список

1. Алимов, А.М. Изучение антибактериальных и противогрибковых свойств препарата «Роксацин» [Текст] / А.М. Алимов, Л.О. Амирова, Д.Р. Амиров / Учёные записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана. 2010. Т. 201. С. 18–23.

2. Бакулов, И.А. Методические указания по эпизоотологическому исследованию [Текст] / Сост. И.А. Бакулов и др. // Министерство сельского хозяйства СССР, Всесоюзный научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии, Всесоюзный инсти-

тут экспериментальной ветеринарии. М.: Колос, 1982. 17 с.

3. Волкова, М.В. Применение экспериментальной вакцины против эшерихиоза сельскохозяйственных животных [Текст] / М.В. Волкова, М.Л. Малинин // Вестник УГСХА. 2014. № 4 (28). С. 70–73.

4. Иванов, А.И. Колибактериоз сельскохозяйственных животных и птиц в Республике Башкортостан [Текст] / А.И. Иванов, М.А. Шаймухаметов, Я.Р. Байзитова // Актуальные направления животноводства и ветеринарной медицины: всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. Уфа: Башкирский ГАУ, 2014. С. 268–270.

5. Иванов, А.И. Мониторинг эпизоотической ситуации, диагностика и лечебно-профилактические мероприятия при колибактериозе (эшерихиозе) телят [Текст] / А.И. Иванов, И.Б. Баймурзин // Вестник БГАУ. 2010. № 4. С. 24–31.

6. Ким, Р.Е. Иммунологический статус телят и способы его коррекции [Текст] / Р.Е. Ким, Е.П. Сисягина, Г.Р. Реджепова, З.Я. Косорлукова, П.Н. Сисягин, Ю.Н. Федоров // Ветеринарная патология. 2005. № 4. С. 119–122.

7. Сетдеков, Р.А. Изучение профилактической эффективности субъединичной противоколибактериозной вакцины в неблагополучном по эшерихиозу телят хозяйстве [Текст] / Р.А. Сет-

деков // Ученые записки Казанской ГАУ им. Н.Э. Баумана. 2015. Т. 221. № 1. С. 201–204.

8. Тимошина, С.В. Изучение заболеваемости в хозяйствах Вологодской области и применение пробиотического препарата при профилактике желудочно-кишечных заболеваний молодняка крупного рогатого скота [Текст] / С.В. Тимошина, И.Н. Симанова, В.Н. Макарова, О.Б. Бадеева, М.В. Корюкина // Приоритетные научные направления в XXI веке: международная (заочная) научно-практическая конференция. Прага, 2016. С. 97–108.

9. Miko A., Rivas M., Bentancor A., Delannoy S., Fach P., Beutin L. Emerging types of shigotoxin producing *E. coli* (STEC) O178 present in cattle, deer and humans from Argentina and Germany. *J. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*. 2014. Vol. 4. P. 1–14.

10. Mulvey M.R., Susky E., McCracken M., Morck D.W., Read R.R. Similar cytotoxin-resistance plasmids circulating in *Escherichia coli* from human and animal sources. *J. Veterinary Microbiology*. 2009. № 3/4. P. 279–287.

11. Qadis A.Q., Goya S., Yatsu M., Kimura A., Ichijo T., Sato S. Immune-stimulatory effects of a bacteria-based probiotic on peripheral leukocyte subpopulations and cytokine mRNA expression levels in scouring Holstein calves. *J. Vet Med Sci*. 2014. Vol. 76. P. 677–684.

Сведения об авторах

1. **Шаймухаметов Марат Андреевич**, соискатель кафедры инфекционных болезней, зоогигиены и ветсанэкспертизы, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: a23b12c90@bk.ru.

2. **Иванов Александр Ильич**, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры инфекционных болезней, зоогигиены и ветсанэкспертизы, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: rugarchev@mail.ru.

3. **Фазлаев Рафкат Галимович**, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры инфекционных болезней, зоогигиены и ветсанэкспертизы, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: fazlaev52@mail.ru.

В данной статье представлены результаты исследований по эпизоотологическому, этиологическому и нозологическому состоянию эшерихиоза в Республике Башкортостан с 2004 по 2016 годы. Установили, что эшерихиоз занимает

лидирующее место среди заболеваний молодняка крупного рогатого скота. Широкому спектру распространения способствует большое количество серотипов; кроме того, существует сезонность данного заболевания.

M. Shaymuhametov, A. Ivanov, R. Fazlaev

MONITORING EPIZOOTIC SITUATION ON ESCHERIHOSIS IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Key words: *calves; escherihosis; epizootology; monitoring; etiology.*

Authors' personal details

1. **Shaimukhametov Marat**, Post-graduate of the Infectious diseases, animal sanitation and veterinary expertise department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letia Octiabria St., 34, e-mail: a23b12c90@bk.ru.

2. **Ivanov Aleksandr**, Doctor of veterinary science, professor of the Infectious diseases, animal sanitation and veterinary expertise department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letia Octiabria St., 34, e-mail: pugapchev@mail.ru.

3. **Fazlaev Rafkat**, Doctor of veterinary science, Professor of the Department of Infectious Diseases zoogigieny, and vetsanekspertizy, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 50 year October Str., 34, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia, e-mail: fazlaev52@mail.ru.

The given paper presents the results of the research on epizootological, etiological and nosological state of escherichiosis in the Republic of Bashkortostan conducted from 2004 to 2016. Colibacillosis is found to be at the leading place among the

diseases of young cattle. A wide range of serotypes contributes to a wide spread of the disease. In addition, the seasonal dynamics of the disease has been identified.

© Шаймухаметов М.А., Иванов А.И., Фазлаев Р.Г.

УДК 629.033

DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-121-126

И.А. Гайнуллин

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗНОСА ГУСЕНИЦЫ ТРАКТОРА Т-170М1.03-53

Ключевые слова: гусеничный движитель; опорные катки; трак; геометрические параметры почвозацепов; почва; износ.

Введение. В последние годы на полях используются мощные тяжелые тракторы [1], что приводит не только к увеличению производительности машинно-тракторных агрегатов, но также и к повышению нагрузки на систему «двигатель – почва». Увеличение нагрузки на движитель снижает надежность его работы, а интенсивное воздействие на почву ухудшает ее свойства, что отрицательно отразилось в плодородии почв [2–5]. Целесообразно весной при закрытии влаги, предпосевной обработке и посеве сельскохозяйственных культур в основном применять тракторы с гусеничным движителем.

Из анализа данных о надежности основных частей, систем гусеничных тракторов определено, что 43 % всех отказов приходится на ходовую часть трактора. Гусеничная цепь (гусеница) – самый дорогостоящий, металлоемкий и трудоемкий в изготовлении элемент ходовой части гусеничного трактора. Реализуемая мощность трактора во многом зависит от конструкции, размеров и геометрии гусеницы, а также его применения в разных типах почвогрунтов.

При эксплуатации гусеничный движитель работает в условиях высоких динамических нагрузок, так как непосредственно взаимодействует с почвой и воспринимает все воздействия со стороны почвы на трактор [6, 7]. Высокий уровень динамической нагруженности движителя определяет и высокую металлоемкость ходовой части. У гусеничных тракторов масса гусениц составляет 12–15 % массы машины, а масса ходовой части иногда достигает 30 % [7]. Стоимость гусениц составляет в пределах 8,0... 10,0 % от стоимости трактора, а отказы гусеничных лент – 60...75 % от всех отказов ходовой части.

Для тракторов высокого тягового класса используются разные типы профиля башмака, которые различаются между собой длиной, шириной, высотой и геометрией почвозацепа [1]. Башмаки для гусениц тракторов изготавливаются из специальных башмачных профилей. Оригинальный широкий профиль и средняя высота почвозацепа используются для тракторов тягового класса 15 и 20 кН с шагом звена 216 мм и 228 мм. ТБ-1 – стандартная ширина профиля и

длина почвозацепа для тракторов тягового класса 10 и 15 кН с шагом звена 203 мм и 216 мм. ТБ-4 – мощный профиль и высокий почвозацеп, для тракторов тягового класса 15 кН с шагом звена 216 мм, который имеет повышенную износостойкость (рисунок 1).

Одним из направлений снижения уплотнения почвы является увеличение ширины гусеницы трактора. Уширение гусениц трактора Т-170М1.03-53 достигается путем установки на звеньях гусеничной цепи ассиметричных башмаков с шириной 600 мм (вместо 500 мм).

Рисунок 1
Основные размеры башмаков (траков), выполненные из специальных профилей:
1 – оригинальный профиль; 2 – профиль ТБ1; 3 – профиль ТБ4

Цель исследований: оценить влияния условий эксплуатации на интенсивность износа ассиметричной гусеницы с шириной 600 мм трактора Т-170М1.03-53 с шестью опорными катками гусеничной тележки.

Условия, материалы и методы исследования. В качестве объекта испытаний рассматривался процесс функционирования машинно-тракторных агрегатов на базе гусеничного трактора Т-170М1.03-55 на бороновании, культивации и выполнении хозяйственных, бульдозерно-планировочных работ, буртовке и трамбовке сенажа и силоса в агрегате с бульдозером. Бульдозерно-планировочные работы проводились на грунтах I, II категорий. Испытания трактора проводились в соответствии с требованиями ГОСТ 25836-83, ГОСТ 7057-2001, ГОСТ 23734-98, ГОСТ Р 27.403-2009, РД 50-204-87, РД 50-690-89 [8–13] и с учетом научных работ авторов [14–17, 20–22]. Техническое обслуживание трактора заключалось в периодической проверке, подтяжке, смазке и регулировании его механизмов [18].

Износ грунтозацепов, по данным микрометра, измерялся штангенциркулем ШЦ-1-125-0,1. При микрометраже износ определяли как разность первоначального размера почвозацепа и размера после некоторого срока ее работы. Плотность грунта определялась ударником ДорНИИ. Твердость почвы определялась почвенным твердомером Ревякина. Обработка экспериментальных данных и проверка адекватности регрессионных моделей производились с применением программ Mathcad и Excel [19].

Результаты исследования. Результаты замеров износа гусеничных траков и их математическая обработка представлены в таблице 1 и на рисунке 2.

За период испытаний экспериментального трактора Т-170М1.03-55 общая наработка составила 850-моторочасов, средняя наработка на отказ – 23 моторочаса. Установлено, что основная причина повышенного износа почвозацепов гусеницы трактора Т-170М1.03-55 – неравномерное распределение вертикальных нагрузок по длине почвозацепа и опорной поверхности ходовой части. Асимметрия траков приводит к неравномерной укладке гусеницы в процессе движения, вызывая тем самым неравномерный износ почвозацепа башмака. Внутренняя сторона почвозацепа изнашивается интенсивнее, чем наружная. Увеличивается момент сопротивления повороту трактора, вызванный удлинением базы трактора и асимметрией гусеничных траков. Разница высот внутренней и наружной сторон износа правой гусеницы составляет от 1,0 до 7,0 мм с математическим ожиданием 3,7 мм, а левой гусеницы – от 3,5 до 11,5 мм с математическим ожиданием 7,54 мм.

Неравномерно разный износ левой и правой гусениц обусловлен распределением сосредоточенных и неравномерных нагрузок на первый и шестой опорные катки ходовой части в зависимости от применения типа сельскохозяйственного орудия или бульдозерного агрегата.

Рисунок 2

Схема укладки гусеницы трактора: 1 – опорный каток; 2 – звено гусеницы; 3 – башмак (трак) гусеницы; P – вертикальная нагрузка действующая на опорный каток, кН; h_1 – высота наружной стороны грунтозацепа, мм; h_2 – высота внутренней стороны грунтозацепа, мм

Таблица 1 Результаты замеров износа почвозацепов трактора Т-170М1.03-53

№	Правая гусеница			Левая гусеница		
	Высота наружной стороны грунтозацепа, h_1 , мм	Высота внутренней стороны грунтозацепа, h_2 , мм	Разница высот внутренней и наружной сторон, мм	Высота наружной стороны грунтозацепа, h_1 , мм	Высота внутренней стороны грунтозацепа, h_2 , мм	Разница высот внутренней и наружной сторон, мм
1	67,5	64,5	3,0	62,0	59,0	3,0
2	70,0	64,5	5,5	63,0	56,0	7,0
3	64,0	62,0	2,0	63,0	56,0	7,0
4	67,0	63,0	4,0	63,0	56,3	6,7
5	65,0	62,0	3,0	62,8	57,0	5,8
6	65,0	62,0	3,0	67,0	55,5	11,5
7	64,0	62,0	2,0	62,0	56,0	6,0
8	63,5	62,0	1,5	64,0	56,0	8,0
9	63,8	62,0	1,8	63,5	56,0	7,5
10	66,0	60,0	6,0	61,0	56,0	5,0
11	63,0	62,0	1,0	66,0	55,5	10,5
12	63,5	61,5	2,0	65,0	56,0	9,0
13	64,5	62,0	2,5	64,0	56,0	8,0
14	64,0	61,8	2,2	63,5	56,2	7,3
15	64,0	63,0	1,0	65,0	57,0	8,0
16	67,0	65,0	2,0	65,0	57,0	8,0
17	66,5	63,0	3,5	63,6	58,0	5,6
18	68,0	66,0	2,0	62,5	56,5	6,0
19	71,0	65,0	6,0	67,0	56,0	11,0
20	69,0	65,0	4,0	62,0	56,0	6,0
21	72,0	65,0	7,0	64,0	58,0	6,0
22	68,0	65,0	3,0	65,0	56,0	9,0
23	70,0	65,0	5,0	62,0	56,0	6,0
24	68,0	64,0	4,0	63,0	57,0	6,0
25	69,0	63,0	6,0	62,0	56,0	6,0
Математическое ожидание			3,70	–	–	7,54
Дисперсия			3,04	–	–	3,56
Среднеквадратическое отклонение			1,74	–	–	1,89
Асимметрия распределения			0,113	–	–	0,061
Экспесс распределения			–2,75	–	–	–2,77
Коэффициент распределения			0,47	–	–	0,25

Снижение момента сопротивления повороту трактора достигается путем замены 6-катковой тележки на 5-катковую, а нагрузки на опорные катки и силы сопротивления самоперемещению

трактора – установкой 6 катков на 5-катковую ходовую тележку. Можно обеспечить существенно равномерный износ гусеничной цепи путем чередования сельскохозяйственных и

бульдозерных работ. В условиях эксплуатации изношенный асимметричный трак гусеницы вос-

станавливается наплавлением или приваркой профильных прутков.

Рисунок 3
Функции распределения износов почвозацепов гусениц трактора Т-170М1.03-53:
а – правая гусеница; б – левая гусеница

Выводы. На основании проведенных исследований установлено влияние условий эксплуатации на интенсивность износа асимметричной гусеницы трактора Т-170М1.03-53. Асимметрия траков приводит к неравномерной укладке гусеницы в процессе движения, вызывая тем самым неравномерный износ почвозацепа башмака. При этом разница высот внутренней и наружной сторон износа правой гусеницы составляет от 1,0 до 7,0 мм с математическим ожиданием 3,7 мм, а левой гусеницы – от 3,5 до 11,5 мм с математическим ожиданием 7,54 мм. Неравномерный износ левой и правой гусениц обусловлен распределением сосредоточенных и неодинаковых нагрузок на первый и шестой опорные катки ходовой части в зависимости от применения типа сельскохозяйственного орудия или бульдозерного агрегата.

Существенно равномерный износ гусеничной цепи можно обеспечить путем чередования сельскохозяйственных и бульдозерных работ. В условиях эксплуатации восстановление изношенного асимметричного трака гусеницы достигается наплавлением или приваркой профильным прутком.

Для улучшения работы гусеничного движителя трактора Т-170М1.03-55 рекомендуется внедрить следующие мероприятия: снижение момента сопротивления повороту трактора (путем замены 6-катковой тележки на 5-катковую), уменьшение нагрузки на опорные катки и силы сопротивления самопередвижению трактора (установить 6 катков на 5-катковую ходовую тележку); проработка возможности установки уширенного симметричного трака гусеницы.

Библиографический список

1. Окунев, Г.А. Эксплуатационно-технологические показатели тракторов общего назначения [Текст]: монография / Г.А. Окунев, С.Д. Шепелев, Н.А. Кузнецов, В.Л. Астафьев. Челябинск: ЧГАА, 2014. 184 с.
2. Гайнуллин, И.А. Улучшение энергетических и экологических показателей гусеничного движителя трактора Т-170М1.03-55 [Текст] / И.А. Гайнуллин, А.Р. Зайнуллин // Достижения науки и техники АПК. 2017. Т. 31. № 2. С. 69–72.
3. Гайнуллин, И.А. Влияние конструктивных параметров движителей и нагрузочных режимов тракторов на почву [Электронный ресурс] / И.А. Гайнуллин, А.Р. Зайнуллин // Фундаментальные исследования. 2017. № 2. С. 31–36. Режим доступа: <http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=41352> (дата обращения: 10.01.2019).
4. Гайнуллин, И.А. Экспериментальное исследование влияния скорости движения гусеничного трактора на уплотнение почвы [Электронный ресурс] / И.А. Гайнуллин // Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 3 (57). С. 29–31. Режим доступа: <http://research-journal.org/technical/eksperimentalnoe-issledovanie-vliyaniya-skorosti-dvizheniya-gusenichnogo-traktora-na-uplotnenie-pochvy/> DOI: 10.23670/IRJ.2017.57.021 (дата обращения: 10.01.2019).
5. Исследование влияния расположения опорных катков гусеничной тележки (эллипсный обвод) на тягово-динамические показатели трактора Б 10.01.01.7В (Т-170М1.03-53) [Текст]: Отчет о НИР / Отв. исп. И.А. Гайнуллин. Челябинск, 2001. Арх. № 148. 63 с.
6. Наумов, Е.С. Ходовая система гусеничного трактора [Текст]: учебное пособие / Е.С. Наумов, В.Ф. Платонов, В.М. Шарипов,

Ю.С. Щетинин, И.М. Эглит; под общ. ред. В.М. Шарипова. М.: МГТУ «МАМИ», 2011. 64 с.

7. Мельник, С.В. Научные основы обеспечения надежности и долговечности ходовых систем гусеничных машин [Текст]: монография / С.В. Мельник, В.П. Расщупкин, А.И. Громовик, Г.А. Голощапов. Омск: СибАДИ, 2009. 91 с.

8. ГОСТ 25836-83. Тракторы. Виды и программы испытаний [Текст]. М.: Изд-во стандартов, 2003. 28 с.

9. ГОСТ 7057-2001. Тракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний [Текст]. М.: Изд-во стандартов, 2002. 11 с.

10. ГОСТ 23734-98. Тракторы промышленные. Методы испытаний [Текст]. М.: Издательство стандартов, 1999. 16 с.

11. ГОСТ Р 27.403-2009. Надежность в технике. Планы испытаний для контроля вероятности безотказной работы [Текст]. М.: Стандартинформ, 2010. 16 с.

12. РД 50-204-87. Методические указания. Надежность в технике. Сбор и обработка информации о надежности изделий в эксплуатации. Основные положения [Текст]. М.: Изд-во стандартов, 1987. 16 с.

13. РД 50-690-89. Методические указания. Надежность в технике. Методы оценки показателей надежности по экспериментальным данным [Текст]. М.: Изд-во стандартов, 1990. 136 с.

14. Левитанус, А.Д. Ускоренные испытания тракторов, их узлов и агрегатов [Текст] / А.Д. Левитанус. М.: Машиностроение, 1973. 208 с.

15. Болотин, В.В. Прогнозирование ресурса машин и конструкций [Текст] / В.В. Болотин. М.: Машиностроение, 1984. 312 с.

16. Лейфер, Л.А. Методы прогнозирования остаточного ресурса машин и их программное обеспечение [Текст] / Л.А. Лейфер. М.: Знание, 1988. 60 с.

17. Решетов, Д.Н. Надежность машин [Текст] / Д.Н. Решетов, А.С. Иванов, В.З. Фадеев. М.: Высшая школа, 1988. 238 с.

18. Черноиванов, В.И. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве [Текст]: учебное пособие / В.И. Черноиванов, В.В. Бледных, А.Э. Северный, С.А. Барышников, Н.С. Белоглазов, В.А. Борисенко, Ю.А. Гурьянов, Н.К. Долгушкин, А.Г. Дорошенко, А.В. Егоров, Д.И. Есаков, Е.В. Зубова, Г.С. Игнатъев, А.В. Колчин, В.М. Корнеев, В.Г. Куранов, В.Н. Лосев, В.П. Лялякин, Н.М. Машрабов, В.М. Михлин, Н.А. Николаев, А.К. Ольховацкий, Л.М. Пильщиков, Ю.М. Пруденко, М.А. Халфин; под ред. В.И. Черноиванова. Москва – Челябинск, 2003. 2-е изд., перераб. и доп. 292 с.

19. Тюрин, Ю.Н. Статистический анализ данных на компьютере [Текст] / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров; под ред. В.Э. Фигурнова. М.: Инфра-М, 1998. 528 с.

20. Сайфуллин, Р.Н. Восстановление и упрочнение автотракторных деталей электроконтактной приваркой металлических материалов [Текст] / Р.Н. Сайфуллин, Н.М. Юнусбаев, Р.Ш. Набиуллин // Вестник Башкирского ГАУ. 2016. № 3 (39). С. 89–93.

21. Gabitov, I. Evaluation of the Efficiency of Mechanized Technological Processes of Agricultural Production / I. Gabitov, S. Mudarisov, I. Gafurov, A. Ableeva, A. Negovora, M. Davletshin, Z. Rakhimov, R. Khamaletdinov, V. Martynov and G. Yukhin // Journal of Engineering and Applied Sciences. 2018. V. 13. P. 8338–8345.

22. Rakhimov, Z. Mathematical Description of the Mechanical Erosion Process in Sloping Fields / Z. Rakhimov, S. Mudarisov, I. Gabitov, I. Rakhimov, R. Rakhimov, I. Farkhutdinov, M. Tanylbaev, I. Valiullin, M. Yamaletdinov and R. Aminov // Journal of Engineering and Applied Sciences. 2018. V. 13. P. 6505–6511.

Сведения об авторе

Гайнуллин Ильшат Анварович, ORCID: 0000-0003-4280-1095, кандидат технических наук, доцент, Институт развития образования Республики Башкортостан, 450005, г. Уфа, ул. Мингажева, 120, e-mail: gainullin_ia@mail.ru.

Одним из направлений снижения уплотнения почвы является увеличение ширины гусеницы трактора. Уширение гусениц трактора Т-170М1.03-53 достигается путем установки на звенья гусеничной цепи ассиметричных башмаков. Асимметрия траков приводит к неравномерной укладке гусеницы в процессе движения, вызывая тем самым неравномерный же износ почвозацепа башмака. При этом разница высот внутренней и наружной сторон износа правой

гусеницы составляет от 1,0 до 7,0 мм с математическим ожиданием 3,7 мм, а левой гусеницы – от 3,5 до 11,5 мм с математическим ожиданием 7,54 мм. Неравномерный износ левой и правой гусениц обусловлен распределением сосредоточенных и разных нагрузок на первый и шестой опорные катки ходовой части в зависимости от применения типа сельскохозяйственного орудия или бульдозерного агрегата. Существенно равномерный износ гусеничной цепи можно

обеспечить путем чередования сельскохозяйственных и бульдозерных работ. Для улучшения работы гусеничного движителя трактора Т-170М1.03-55 необходимо снизить момент сопротивления повороту трактора (путем замены 6-катковой тележки на 5-катковую), нагрузку на опорные катки и уменьшить силу сопротивле-

ния самопередвижению трактора (установить 6 катков на 5-катковую ходовую тележку), проработать возможность установки уширенного симметричного трака гусеницы. В условиях эксплуатации восстановление изношенного ассиметричного трака гусеницы достигается наплавлением или приваркой профильным прутком.

I. Gainullin

INFLUENCE OF OPERATION CONDITIONS ON CATERPILLAR BAND WEAR RATE OF T-170M1.03-53 TRACTOR

Key words: *caterpillar mover; road wheels; truck; geometric parameters of lugs; soil; reliability; wearout.*

Authors' personal details

Gainullin Ilshat, ORCID: 0000-0003-4280-1095, Candidate of technical sciences, assistant professor, the Institute for the development of education of the Republic of Bashkortostan, 450005, Ufa, Mingazhev St., 120, e-mail: gainullin_ia@mail.ru.

One of the ways to reduce soil compaction is increasing the width of the tractor tracks. Making T-170M1.03-53 tractor's caterpillar bands wider is achieved by installing asymmetrical shoes on the track chain links. The asymmetry of the tracks leads to uneven laying of the track in the process of movement, causing uneven wearout of the track. The height difference between the inner and outer sides of a track wearout is from 1,0 to 7,0 mm with a mathematical expectation of 3,7 mm for the right track and from 3,5 to 11,5 mm with a mathematical expectation of 7,54 mm for the left one. Uneven different wearout of the left and right tracks is due to the distribution of concentrated and uneven loads on the first and sixth support rollers of the chassis, de-

pending on the type of agricultural implements or bulldozer unit applied. Even wearout of the track chain can be achieved by alternating agricultural and bulldozer work. To improve the operation of caterpillar mover of T-170M1.03-55 tractor it is necessary to reduce the moment of resistance to rotation of the tractor (by replacing the 6-rollers with 5-track rollers), the load on the support rollers and to reduce the resistance of tractor's self-movement (set of 6 rollers to 5-roller track frame), to study the possibility of installing the extended symmetric track. Under operating conditions, restoration of worn asymmetrical track is achieved by welding or welding with a profile rod.

© Гайнуллин И.А.

УДК 621.313.33

DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-126-132

И.Р. Кафиев, Р.Р. Нугуманов

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ДВУХСТОРОННЕГО ЛИНЕЙНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Ключевые слова: *тепловое состояние; математическая модель; двухсторонний линейный асинхронный двигатель; схема замещения; устройство для помола зерна с жерновыми.*

Введение. Линейные асинхронные двигатели (ЛАД) благодаря своим преимуществам пе-

ред вращающимися машинами, такими, как конструктивная простота, отсутствие электриче-

ского контакта со вторичным элементом (ВЭ), возможность получения большого диапазона линейных скоростей и перемещений без использования кинематических связей, находят все более широкое применение в приводах сельскохозяйственных машин. На их основе разработаны: транспортер влажного сахара [1]; установка, предназначенная для сепарации зернового материала [2]; режущий аппарат, который может быть использован в кормоуборочных машинах [3]; насосная установка для применения в системах водоснабжения сельскохозяйственных предприятий [4] и т. д. Одной из распространенных причин отказов асинхронных двигателей является повреждение обмоток, которое обусловлено

тепловым старением изоляции [5]. Поэтому большой интерес представляет моделирование теплового состояния двухстороннего ЛАД.

Цель исследования: определение математическим моделированием изменение температуры составных частей двухстороннего ЛАД в приводе устройства для помола зерна с жерновыми.

Задачи исследования: разработать математическую модель теплового состояния двухстороннего ЛАД и программу, реализующую данную модель; с использованием предложенной модели определить, как изменяется температура составных частей двухстороннего ЛАД в приводе устройства для помола зерна с жерновыми.

Рисунок 1

Конструкция ЛАД в приводе устройства для помола зерна с жерновыми:

1 – корпус; 2 – загрузочный бункер; 3 – приемные емкости; 4 – ось; 5, 6 – индукторы ЛАД; 7 – вторичный элемент ЛАД, выполненный в виде диска; 8 – верхний жернов; 9 – нижний жернов; 10 – подшипниковая опора; I, II, III, IV – мелющие поверхности жерновов

Условия, материалы и методы исследования. Объектом исследования является двухсторонний плоский ЛАД, используемый в приводе устройства для помола зерна с жерновыми, конструкция которого приведена на рисунке 1 [6]. Характеристики двигателя: фазное напряжение – 220 В; частота питающей сети – 50 Гц; мощность – 4,0 кВт; коэффициент полезного действия $\eta = 0,6$; номинальное скольжение $S = 0,3$; режим работы – продолжительный (S1); класс изоляции – F. Двухсторонний ЛАД состоит из двух одинаковых индукторов и ВЭ, расположенного между индукторами. Габаритные размеры индукторов – 168 × 168 × 45 мм. ВЭ представляет собой алюминиевый диск наружным диаметром 0,7 м и толщиной 0,004 м. Между индук-

торами и ВЭ одинаковый воздушный зазор, равный 0,002 м. Параметры жерновой мельницы: диаметр жерновов – 0,2 м; масса подвижного жернова мельницы $m = 2,8$ кг; коэффициент вязкого трения (зерно яровой пшеницы в рабочем зазоре) $\beta = 49,5$ Н·с/м; скорость движения потока зерна $V_2 = 3,74$ м/с; сила сухого трения (коэффициент трения продукта и камня $f_c = 0,71$) $F_{сmp} = 19,75$ Н.

Математическое описание теплового состояния ЛАД проводим в соответствии с принятыми допущениями: теплоемкости составных частей двигателя постоянны; ВЭ вращается с постоянной линейной скоростью; температура окружающей среды принимается постоянной и равной 40 °С; подача зернового материала из

загрузочного бункера производится после выхода ЛАД в установившийся режим.

Эквивалентная тепловая схема замещения ЛАД представлена на рисунке 2.

Рисунок 2

Тепловая схема замещения двухстороннего линейного ЛАД:

1 – обмотка первого индуктора; 2 – сердечник первого индуктора; 3 – вторичный элемент (вторичная цепь) ЛАД; 4 – обмотка второго индуктора; 5 – сердечник второго индуктора; G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 – тепловые проводимости от обмотки и сердечника первого индуктора, ВЭ, обмотки и сердечника второго индуктора во внешнюю среду; $G_{12}, G_{23}, G_{31}, G_{34}, G_{45}, G_{53}$ – тепловые проводимости между составными частями ЛАД

Результаты исследования. Разработанная математическая модель теплового состояния

двухстороннего ЛАД – это система из пяти уравнений:

$$\begin{cases} C_1 \frac{d\theta_1}{dt} = P_1 - G_1\theta_1 + G_{12}(\theta_2 - \theta_1) + G_{31}(\theta_3 - \theta_1); \\ C_2 \frac{d\theta_2}{dt} = P_2 - G_2\theta_2 + G_{12}(\theta_1 - \theta_2) + G_{23}(\theta_3 - \theta_2); \\ C_3 \frac{d\theta_3}{dt} = P_3 - G_3\theta_3 + G_{23}(\theta_2 - \theta_3) + G_{13}(\theta_1 - \theta_3) + G_{34}(\theta_4 - \theta_3) + G_{35}(\theta_5 - \theta_3); \\ C_4 \frac{d\theta_4}{dt} = P_4 - G_4\theta_4 + G_{45}(\theta_5 - \theta_4) + G_{34}(\theta_3 - \theta_4); \\ C_5 \frac{d\theta_5}{dt} = P_5 - G_5\theta_5 + G_{45}(\theta_4 - \theta_5) + G_{53}(\theta_3 - \theta_5), \end{cases} \quad (1)$$

где $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5$ – соответственно превышение температуры обмотки и сердечника первого индуктора, ВЭ, обмотки и сердечника второго индуктора относительно температуры окружающей среды, °С; P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 – соответственно выделяемые тепловые мощности обмоткой и сердечником первого индуктора, ВЭ, обмоткой и сердечником второго индуктора, Вт; C_1, C_2, C_3, C_4, C_5 – теплоемкости составных частей ЛАД, Дж/°С; G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 – тепловые проводимости обмотки первого индуктора, сердечника первого индуктора, ВЭ, обмотки второго индуктора, сердечника второго индуктора в окружающую среду, Вт/°С; $G_{12}, G_{23}, G_{31}, G_{34}, G_{45}, G_{53}$ – тепловые проводимости между составными частями двигателя, Вт/°С.

На основе предложенной математической модели разработана программа в среде моделирования Matlab (Simulink), которая приведена на рисунке 3.

Результаты расчетов параметров модели по методикам, представленным в [7] и [8], приведены в таблицах 1–3.

Параметры модели P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 определены с использованием электрической Т-образной схемы замещения ЛАД, приведенной на рисунке 4 [9]. Расчет параметров эквивалентной электрической схемы двухстороннего ЛАД проводился в соответствии с формульными зависимостями, приведенными в [10] и [11]. Результаты расчетов приведены в таблице 4.

Потери мощностей на составных частях двухстороннего ЛАД определялись в соответствии с методиками, приведенными в [12] и [13–19] (таблица 5). Подставляя рассчитанные параметры в разработанную программу и принимая температуру окружающей среды равной 40 °С, получаем графики изменения температур элементов двухстороннего ЛАД (рисунок 5).

Рисунок 3
Программа в среде моделирования Matlab (Simulink)

Таблица 1 Результаты расчетов теплоемкостей составных частей ЛАД

Параметр	Теплоемкости составных частей ЛАД				
	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5
Значение, Дж/°C	588	1895	2775	588	1895

Таблица 2 Результаты расчетов тепловых проводимостей от составных частей ЛАД
во внешнюю среду

Параметр	Тепловые проводимости от составных частей ЛАД во внешнюю среду				
	G_1	G_2	G_3	G_4	G_5
Значение, Вт/°C	10,4	15,6	32,0	10,4	15,6

Таблица 3 Результаты расчетов тепловых проводимостей между составными частями двухстороннего ЛАД

Параметр	Тепловые проводимости между составными частями ЛАД					
	G_{12}	G_{23}	G_{31}	G_{34}	G_{45}	G_{53}
Значение, Вт/°С	53,34	0,095	0,105	0,105	53,34	0,095

Рисунок 4

T – образная электрическая схема двухстороннего ЛАД: R_1 и X_1 – активное и реактивное сопротивления обмотки первичной цепи; R'_2 и X'_2 – приведенные активное и реактивное сопротивления вторичной цепи; X_m – индуктивное сопротивление взаимоиндукции между первичной и вторичной цепями; S – скольжение; $\dot{U}_1$ – фазное напряжение; $\dot{i}_1$ – ток первичной цепи; $\dot{i}_2$ – приведенный ток вторичной цепи; $\dot{i}_m$ – намагничивающий ток

Таблица 4 Результаты расчетов параметров эквивалентной электрической схемы ЛАД

Параметр	Сопротивления эквивалентной электрической схемы ЛАД				
	R_1	X_1	R'_2	X'_2	X_m
Значение, Ом	1,56	6,9	5,49	11,56	8,94

Таблица 5 Потери мощностей на составных частях ЛАД

Параметр	Потери мощностей на составных частях ЛАД				
	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
Значение, Вт	652,0	26,7	226,3	652,0	26,7

Рисунок 5

График изменения температуры элементов двухстороннего ЛАД

Выводы. Во время работы жерновой мельницы наиболее подверженным перегреву элементом являются обмотки индукторов ЛАД, температура которых в установившемся режиме достигает 70 °С; температура сердечников в установившемся режиме составляет 63 °С, а температура вторичного элемента – 47,3 °С; после начала работы устройства для помола зерна

с жерновами постоянный тепловой режим на составных частях двухстороннего ЛАД устанавливается через 13 минут; результаты моделирования могут быть использованы при проведении тепловых расчетов на стадии проектирования двухстороннего линейного асинхронного двигателя для привода устройства для помола зерна с жерновами.

Библиографический список

1. Акчурин, С.В. Инерционный транспортер влажного сахара на базе линейного асинхронного двигателя с подвижным индуктором [Текст] / С.В. Акчурин, А.В. Линенко // Достижения науки – агропромышленному производству: материалы ЛП международной научно-технической конференции. Челябинск: Челябинская ГАА, 2013. С. 89–96.
2. Туктаров, М.Ф. Экспериментальная установка зерноочистительной машины на базе плоского линейного электропривода [Текст] / М.Ф. Туктаров // Молодежная наука и АПК: проблемы и перспективы. Материалы международной научно-практической конференции молодых ученых, посвященной 80-летию ФГОУ ВПО Башкирский ГАУ. Уфа: Башкирский ГАУ, 2010. С. 84–86.
3. Аипов, Р.С. Разработка электропривода косилок с возвратно-поступательным движением ножевых полос [Текст] / Р.С. Аипов, Д.Е. Валишин, Д.С. Леонтьев // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2014. № 1 (29). С. 68–73.
4. Валишин, Д.Е. Применение линейного асинхронного двигателя для привода насосной установки [Текст] / Д.Е. Валишин // Научное обеспечение развития АПК в современных условиях: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Ижевск: Ижевская ГСХА. 2011. С. 56–60.
5. Котеленец, Н.Ф. Испытания и надежность электрических машин [Текст] / Н.Ф. Котеленец, Н.Л. Кузнецов. М.: Высшая школа, 1988. 232 с.
6. Аипов, Р.С. Устройство для измельчения зерна с безредукторным асинхронным двигателем в приводе [Текст] / Р.С. Аипов, Р.Р. Нугуманов // Наука молодых – инновационному развитию АПК: материалы VI Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых. Уфа: Башкирский ГАУ, 2013. С. 197–202.
7. Копылов, И.П. Проектирование электрических машин [Текст]: учебник для бакалавров / И.П. Копылов; отв. ред. И.П. Копылов. 4-е изд., пер. и доп. М.: Юрайт, 2017. 767 с.
8. Филиппов, И.Ф. Теплообмен в электрических машинах [Текст] / И.Ф. Филиппов. Л.: Энергоатомиздат, 1986. 256 с.
9. Веселовский, О.Н. Линейные асинхронные двигатели [Текст]: учебное пособие / О.Н. Веселовский, А.Ю. Коняев, Ф.Н. Сарапулов. М.: Энергоатомиздат, 1991. 256 с.
10. Аипов, Р.С. Линейные электрические машины и приводы на их основе [Текст] / Р.С. Аипов. Уфа: Башкирский ГАУ, 2003. 201 с.
11. Аипов, Р.С. Линейные электрические машины и линейные асинхронные электроприводы технологических машин [Текст]: монография / Р.С. Аипов, А.В. Линенко. Уфа: Башкирский ГАУ, 2013. 308 с.
12. Сарапулов, Ф.Н. Электротехнологическая виртуальная лаборатория [Текст]: учебное пособие / Ф.Н. Сарапулов, С.Ф. Сарапулов, Д.Н. Томашевский. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2003. 233 с.
13. Сарапулов, Ф.Н. Развитие математических моделей тепловых процессов в линейных асинхронных двигателях [Текст] / Ф.Н. Сарапулов, В.В. Гоман // Электротехника. 2009. № 8. С. 17–22.
14. Linenko, A. Experimental Vibro-Centrifugal Grain Separator with Linear Asynchronous Electric Drive / A. Linenko, R. Aipov, R. Yarullin, I. Gabitov, M. Tuktarov, S. Mudarisov, V. Kabashov, T. Kamalov, V. Gilvanov and B. Khalilov // Journal of Engineering and Applied Sciences. 2018. V. 13. P. 6551–6557.
15. Yarullin, R. Adjustable Driver of Grain Cleaning Vibro-Machine with Vertical Axis of Eccentric Masses Rotation / R. Yarullin, R. Aipov, I. Gabitov, A. Linenko, S. Akchurin, R. Safin, S. Mudarisov, E. Khasanov, Z. Rakhimov, Z. Rakhimov and I. Masalimov // Journal of Engineering and Applied Sciences. 2018. V. 13. P. 6398–6406.
16. Aipov, R. Mechatronic System Linear Swing Vibrating Screen of a Grain Cleaner / R. Aipov, R.B. Yarullin, I.I. Gabitov, S.G. Mudarisov, A.V. Linenko, M.N. Farhshatov, E.R. Khasanov, F.Z. Gabdrifikov, G.P. Yukhin and R.R. Ga-

liullin // Journal of Engineering and Applied Sciences. 2018. V. 13. P. 6473–6477.

17. Gabitov, I. Risk Reduction of Thermal Damages of Units in Machinery Heat Preparation for Load Acceptance / I. Gabitov, A. Negovora, E. Khasanov, R. Galiullin, M. Farhshatov, R. Khamaletdinov, V. Martynov, D. Gusev, N. Yunusbaev and M. Razyapov // Journal of Engineering and Applied Sciences. 2019. V. 14. P. 709–716.

18. Gabitov, I. Diagnostics and Regulation of Fuel Equipment of Diesels on Stands with Injection

to Medium with Counter-Pressure / I. Gabitov, S. Insafuddinov, D. Kharisov, F. Safin, A. Negovora, N. Yunusbaev, A. Akhmetov, T. Farhutdinov and A. Sharafiev // Journal of Engineering and Applied Sciences. 2018. V.13. P. 8782–8788.

19. Gabdrifkov, F. Control System for Pre-Start Heating of a Diesel Engine/ F. Gabdrifkov, U. Galiakberov, E. Gaysin, M. Abrarov and V. Gindullin // Journal of Engineering and Applied Sciences. 2018. V. 13. P. 8836–8842.

Сведения об авторах

1. **Кафиев Иршат Рашитович**, кандидат технических наук, доцент кафедры электрических машин и электрооборудования, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: kafiev02@mail.ru.

2. **Нугуманов Раушан Римович**, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры электрических машин и электрооборудования, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: nugraush@rambler.ru.

Статья посвящена моделированию теплового состояния составных частей плоского двухстороннего линейного асинхронного двигателя в приводе устройства для помола зерна с жерновыми. В работе выбрана тепловая схема замещения данного двигателя, разработана математическая модель теплового состояния двигателя и программа в среде моделирования Matlab (Simulink). С применением разработанной про-

граммы получены графические зависимости изменения температур составных частей двухстороннего линейного асинхронного двигателя. Результаты моделирования могут быть использованы при проведении тепловых расчетов на стадии проектирования двухстороннего линейного асинхронного двигателя привода устройства для помола зерна с жерновыми.

I. Kafiev, R. Nugumanov

MODELING A THERMAL STATE OF A DOUBLE-SIDED LINEAR INDUCTION MOTOR

Key words: *thermal state; mathematical model; double-sided linear induction motor; equivalent circuit; device for grinding grain with millstones.*

Authors' personal details

1. **Kafiev Irshat**, Candidate of technical sciences, assistant professor of the Electric Machines and Equipment department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, e-mail: kafiev02@mail.ru.

2. **Nugumanov Raushan**, Candidate of technical sciences, senior lecturer of the Electric Machines and Equipment department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, e-mail: nugraush@rambler.ru.

The paper is devoted to modeling thermal state of flat two-sided linear induction motor parts in the drive of a grain grinder with millstones. The authors took a thermal equivalent circuit for this engine, developed a mathematical model of the thermal state of the engine and a program in the Matlab simulation environment (Simulink). Using the developed

program graphical dependences of the temperature changes in two-sided linear asynchronous motor are obtained. The simulation results can be used for thermal calculations at the stage of designing a double-sided linear induction motor for grain grinding with millstones.

© Кафиев И.Р., Нугуманов Р.Р.

ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СЕЯЛКИ

Ключевые слова: *горизонтальный распределитель семян; пневматическая зерновая сеялка; воздушно-зерновая смесь; неравномерность распределения семян.*

Введение. Современные комбинированные, широкозахватные посевные агрегаты при работе на больших скоростях для высокой производительности требуют более точного и равномерного распределения семян по всей ширине захвата. Функцию равномерного распределения семян выполняет пневматическое распределительное устройство зерновых сеялок. Однако недостатком таких устройств является неравномерное распределение из-за несовершенства конструктивных параметров распределительных устройств.

Процесс распределения зернового материала по патрубкам достаточно сложен, с чем и связано малое количество теоретических исследований закономерности распределения частиц по отводящим патрубкам. В основном все исследования распределителей сводятся к определению неравномерности распределения зернового материала как основного показателя работы или к совершенствованию параметров работы распределительных систем, а также отдельных конструктивных элементов.

В.С. Астахов в своих исследованиях обосновал возможность равномерного распределения в горизонтальных распределительных устройствах. Его работа была посвящена изучению влияния на процесс высева зернового материала конструктивных параметров распределения [1, 2].

Ю.Г. Вожи установил влияние формы выпускного патрубка пневматического аппарата на качество рассева сыпучих минеральных удобрений, а также изменчивости траекторий движения [3].

В работах Н.Т. Хлызова [10] для расчета давления и скорости воздуха в трубопроводах и скорости воздушного потока в распределительной системе сеялки использованы уравнения Навье – Стокса, описывающие динамику воздушного потока без учета наличия семян. Численная реализация модели проведена с помощью программного пакета ANSYS модуля Fluent Flow.

С.Г. Мударисов, И.Д. Бадретдинов и А.В. Шарафутдинов [5] провели численную реализацию

модели движения воздушного потока в распределительной системе зерновой пневматической сеялки. Для описания движения воздушного потока использованы уравнения Навье – Стокса для несжимаемой среды и k-ε-модель турбулентности. Реализация модели произведена в программе FlowVision.

В последующем С.Г. Мударисовым и З.С. Рахимовым [6, 13] обоснованы условия применения математических моделей газовой динамики двухфазных течений для описания работы пневматической распределительной системы зерновой сеялки.

Yatskul & Lemiere [14–18] провели экспериментальное теоретическое исследование пневматической транспортирующей системы зерновой сеялки. В работе предлагается метод измерения концентрации потока и скорости воздуха, позволяющий оптимизировать существующие сеялки или обосновать параметры новой.

В работах М.В. Пятаева [7] рассмотрены вопросы повышения равномерности распределения семян по семяпроводам пневматических зерновых сеялок на основе совершенствования режима работы и конструктивных параметров распределителей вертикального типа.

Проанализировав результаты исследований вышеуказанных авторов, можно сделать вывод, что в данный момент отсутствуют единые рекомендации по конструктивно-технологической реализации распределителей горизонтального типа. Это подчеркивает теоретическую и практическую актуальность темы.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что для обеспечения равномерности распределения по отводящим патрубкам оптимальным является горизонтальный распределитель, имеющий отклонения боковых стенок на некоторый угол и с формой верхней стенки в виде параболической кривой. Согласно результатам исследования А.С. Сентюрова [1] и проведенного анализа, предполагается, что распределительное устройство в подобной конфигурации менее энергоемко, проще по конструкции и позволяет установить отводящие патрубки в ряд, благодаря чему будет иметь относительно малое аэро-

динамическое сопротивление и минимально травмировать семенной материал при распределении по патрубкам.

Цель исследования – повышение качества распределения семян путем совершенствования горизонтального распределителя зерновой пневматической сеялки.

Условия, материалы и методы. В ходе исследования были использованы классические методы теоретической механики, а также компьютерное моделирование газодинамических процессов в программном комплексе FlowVision, где осуществляются поверочные расчеты на основе полных нелинейных уравнений Навье – Стокса с учетом эффектов турбулентности. Экспериментальные исследования в лабораторных и производственных условиях выполнены с использованием стандартных и частных методик с применением методов планирования эксперимента.

Результаты и обсуждение. Предложено новое горизонтальное распределительное устройство для пневматической зерновой смеси, содержащее подводящий трубопровод,

расширяющийся раструб, состоящий из верхней и нижней стенок, боковых стенок, установленных в виде расширяющегося раструба от входа к выходам под соответствующим углом, и отводящих патрубков. Распределитель работает следующим образом: в процессе работы воздушно-зерновая смесь попадает по подводящему трубопроводу в распределительное устройство и равномерно распределяется по всему объему, далее по отводящим патрубкам попадает в семяпроводы.

Для обоснования конструктивно-технологических параметров предложенного горизонтального распределительного устройства сеялки необходимо смоделировать движение воздушно-зерновой смеси.

При моделировании было установлено, что воздушно-зерновая смесь при выходе из патрубка в резко расширяющийся канал отклоняется на некоторый угол в зависимости от скорости движения воздуха (рисунок 1). В результате были определены углы отклонения векторов скорости движения воздушно-зерновой смеси от первоначального направления движения [11].

Рисунок 1
Движение воздушно-зерновой смеси при выходе из трубопровода

Воздушно-зерновая смесь при выходе из пневмопровода в зависимости от скорости потока v_g отклоняется на угол в пределах $33...36^\circ$. Зависимости угла движения воздушно-зерновой смеси от скорости воздушного потока приведены на рисунке 2.

Скорость воздушного потока v_v , создаваемого вентилятором зерновой сеялки, должна изменяться в пределах $12...15$ м/с. Для данного

диапазона согласно графику (рисунок 2) среднее значение угла отклонения γ векторов скоростей составляет 34° . В связи с этим для уменьшения сопротивления воздушно-зерновой смеси боковых стенок распределителя необходимо устанавливать их в виде расширяющегося раструба от входа к выходам под углом 34° .

Следующим этапом было моделирование процесса движения воздушно-зерновой смеси в

вертикальной плоскости с заданием различных значений скорости воздушного потока v_g .

Для уменьшения сопротивления верхней стенки распределителя воздушному потоку и соударений семян форма ее поверхности должна описывать верхнюю траекторию движения. На рисунке 3 представлен график, построенный по координатам крайней верхней траектории воздушно-зерновой смеси для скорости воздуха на входе в пневмопровод $v_g = 15$ м/с. Данная ско-

рость является оптимальной для пневматических систем зерновых сеялок и рекомендована в своих работах А.П. Шевченко [12]. Полученный график с наименьшей погрешностью аппроксимируется уравнением параболического вида третьей степени:

$$h = a \cdot L^3 - b \cdot L^2 + cL + d, \quad (1)$$

где a, b, c, d – эмпирические коэффициенты; h, L – координаты верхней стенки распределителя по высоте и длине.

Рисунок 2

Зависимость угла движения воздушно-зерновой смеси от скорости воздушного потока

Рисунок 3

График кривизны траектории верхней поверхности

Рисунок 4

Траектория движения воздушно-зерновой смеси при скорости 15 м/с

Визуализация движения воздушно-зерновой смеси в смоделированном распределительном устройстве с формой верхней стенки в виде параболической кривой показала, что при повышении скорости воздушного потока v_g внутри распределителя наблюдается возникновение турбулентности потока. А на рабочих скоростях до 15 м/с воздушно-зерновая смесь движется без завихрений, причем верхние слои описывают форму стенки (рисунок 4). Данное обстоятельство доказывает правильность перехода при выборе формы верхней стенки распределителя. Полученные результаты схожи с работой Н.П. Крючина [4] и других авторов, которые установили зависимость изменения равномерности воздушно-зерновой смеси из-за различия семян по физико-механическим свойствам, взаимодействия семян со стенками, разного времени движения зернового материала до почвы, а также изменчивости траекторий движения семян.

На рисунке 3 приведена зависимость дальности полета семян L_c от рабочей скорости воздушного потока v_g . С увеличением скорости воздушного потока дальность полета семян растет по параболической зависимости, что свидетельствует о росте динамической составляющей их сопротивления, зависящей от квадрата скорости.

В процессе работы распределителя его длина должна быть такой, чтобы семена в процессе движения попадали без удара о верхнюю стенку и дно в выходные семяпроводы. Если длина распределителя будет чрезмерно большой, то семена будут падать на дно, что может привести, во-первых, к их травмированию;

во-вторых, после соударения нарушится их распределение. В коротком распределителе, наоборот, семена будут ударяться о верхнюю стенку. Аналогичные исследования влияния скорости и соударений с поверхностями в вертикальном распределителе представлены в работе М.В. Пятаева [8].

Для обоснования формы выходной части распределителя с учетом установленных его форм боковых и верхних стенок, а также длины созданы модели с различными геометрическими формами стенок выходных патрубков. В качестве крайних геометрических форм для оценки равномерности распределения приняты наиболее простые фигуры в виде плоскости и поверхности второго порядка, описанной по дуге окружности.

При визуализации расчетов рассматриваемых моделей (рисунок 5) видно, что давление воздушного потока внутри распределяется неравномерно, что, в свою очередь, приводит к неравномерности давления по его выходам.

Использование полукруглой выходной стенки (рисунок 6) несколько улучшает картину распределения давлений, однако все равно не обеспечивает должную равномерность. Коэффициент вариации давления по выходным семяпроводам, согласно расчетам, для распределителя с плоской формой выходных стенок доходит до 0,25, а с полукруглой формой составляет 0,20. При такой неравномерности давления воздушного потока по семяпроводам распределитель не сможет обеспечить требуемое качество распределения семян по рядкам, которое, по агротребованиям, не должно превышать 5 %.

Рисунок 5
Распределитель с плоской формой стенки – заливка из давления

Рисунок 6
Распределитель с полукруглой формой стенки – заливка из давления

В качестве критериев оценки качества распределения семян в разработанной модели нами были выбраны среднеквадратическое отклонение давления P_{cp} по выходам и коэффициент его вариации v_p . Чем равномернее будет давление на выходах распределителя, тем равномернее семена будут распределяться по рядкам.

При конструировании криволинейных поверхностей для обеспечения равномерности их нагружения используются различные геометрические формы.

Для плоских криволинейных фигур наиболее предпочтительной является «цепная линия», т. к. она изгибается лишь в одной плоскости.

Уравнение цепной линии в прямоугольных декартовых координатах имеет вид:

$$y = \frac{p}{2} \left(e^{x/p} + e^{-x/p} \right) = p \cdot ch \frac{x}{p}, \quad (2)$$

где $ch \frac{x}{p}$ – гиперболический косинус своего аргумента; p – значение ординаты вершины цепной линии.

По уравнению цепной линии (2) получена криволинейная стенка уточненной модели распределительного устройства.

По результатам расчета (рисунок 7) видно, что уточненная модель имеет более равномерное распределение давления по выходам.

Рисунок 7

Уточненная модель распределительного устройства – заливка из давления

Полученные конструктивно-технологические параметры горизонтального распределителя семян позволяют вести дальнейшую работу по совершенствованию технологического процесса высева семян и повысить равномерность распределения семенного материала по рабочим органам. Данные результаты положительно скажутся на урожайности зерновых и снижении затрат на производство сельскохозяйственной продукции.

Выводы. На основе реализованной в программном комплексе FlowVision математической модели горизонтального пневматического распределителя установлено, что качеству распределения семян наиболее полно отвечает распределительное устройство в виде расширяю-

щегося раструба от входа к выходам под углом 34° с криволинейной формой выходной части в виде плоской трансцендентной кривой.

Однако в процессе моделирования работы распределителя было установлено, что зерновая смесь оказывает обратное влияние на воздушный поток. Вследствие этого возникает турбулентность потока, приводящая к нарушению технологического процесса и неравномерности распределения семенного материала по семяпроводам. Для решения данной задачи необходимо в последующем предусмотреть установку дополнительных вставок или рассекателей для устранения турбулентности потока и выравнивания давления и скорости движения воздушно-зерновой смеси.

Библиографический список

1. Астахов, В.С. Принципиально новые распределители семян [Текст] / В.С. Астахов,

А.С. Сентюров // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 1994. № 10.

2. Астахов, В.С. Анализ пневматических централизованных высевальных систем [Текст] / В.С. Астахов // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 1997. № 10.
3. Вожик, Ю.Г. Влияние формы выпускного патрубка пневматического аппарата на качество рассева сыпучих минеральных удобрений [Текст] / Ю.Г. Вожик // Механизация и электрификация сельского хозяйства. Киев: Урожай, 1970. Вып. 4.
4. Крючин, Н.П. Разработка и обоснование параметров горизонтального распределителя семян для пневматического посева [Текст] / Н.П. Крючин, А.Н. Андреев // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. 2013. № 3. С. 3–8.
5. Мударисов, С.Г. Моделирование распределителя семян пневматической сеялки [Текст] / С.Г. Мударисов, И.Д. Бадретдинов, А.В. Шарафутдинов // Механизация сельского хозяйства. 2010. № 3. С. 8–9.
6. Мударисов, С.Г. Обоснование параметров двухфазного течения «воздух – семена» при математическом описании работы пневматической системы зерновой сеялки [Текст] / С.Г. Мударисов, З.С. Рахимов // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2014. № 4 (32). С. 85–91.
7. Пятаев, М.В. Результаты теоретического исследования процесса распределения посевного материала вертикальным распределителем при работе агрегата на склонах [Текст] / М.В. Пятаев // АПК России. 2017. Т. 24. № 2. С. 431–436.
8. Пятаев, М.В. Изучение процесса движения частиц посевного материала по направлению в распределителе пневматической зерновой сеялки [Текст] / М.В. Пятаев // Вестник КрасГАУ. 2011. № 1. С. 152–157.
9. Рахимов, З.С. Обоснование параметров пневматической системы транспортирования семян и удобрений почвообрабатывающего посевного агрегата [Текст] / З.С. Рахимов, Н.Т. Хлызов, И.Р. Рахимов и др. // АПК России. 2017. Т. 24. № 1. С. 91–104.
10. Хлызов, Н.Т. Анализ технологического процесса пневматической высевальной системы зерновой сеялки [Текст] / Н.Т. Хлызов, М.В. Фомина, Е.А. Джапаров // Известия Международной академии аграрного образования. 2013. № 17. С. 131–134.
11. Шарафутдинов, А.В. Обоснование конструктивно-технологических параметров распределительного устройства пневматической системы сеялки [Текст] / А.В. Шарафутдинов // Известия Международной академии аграрного образования. 2013. № 17. С. 140–145.
12. Шевченко, А.П. Обоснование пневматического высевального аппарата с горизонтальным распределением движения семян [Текст] / А.П. Шевченко, И.О. Коробкин // Актуальные вопросы научного обеспечения АПК в работах молодых ученых: материалы междунар. науч.-практ. конф. молодых учёных Россельхозакадемии (г. Омск, 7–8 июля 2010 г.) / Рос. акад. с.-х. наук, Сиб. науч.-исслед. ин-т с.-х. Омск, 2010. С. 102–105.
13. Mudarisov S., Khasanov E., Rakhimov Z., Gabitov I., Badretdinov I., Farchutdinov I., Gallyamov F., (...), Jarullin R. Specifying two-phase flow in modeling pneumatic systems performance of farm machines (2017). Journal of Mechanical Engineering Research and Developments, 40 (4), pp. 706–715.
14. Yatskul A., Lemièrre J.P., Cointault F. Influence of the divider head functioning conditions and geometry on the seed's distribution and accuracy of the air-seeder. J. Biosystems Engineering. 2017. № 161. P. 120–134.
15. Yatskul A.I., Lemièrre J.P. Experimental determination of flow concentration for pneumatic conveying systems of air-seeders. INMATEH-Agricultural Engineering. 2014. № 44 (3). P. 17–24.
16. Martynov, V. Reasoning Barley Grain Drying Modes for Vacuum-Infrared Drying Machines / V. Martynov, I. Gabitov, Kh. Karimov, I. Masalimov, V. Permyakov, I. Ganeev, I. Saitov and B. Saitov // Journal of Engineering and Applied Sciences. 2018. V. 13. P. 8803–8811.
17. Mudarisov, S. Specifying Two-Phase Flow in Modeling Pneumatic Systems Performance of Farm Machines / S. Mudarisov, E. Khasanov, Z. Rakhimov, I. Gabitov, I. Badretdinov, I. Farchutdinov, F. Gallyamov, M. Davletshin, R. Aipov, R. Jarullin // Journal of Mechanical Engineering Research and Developments. 2017. V. 40. № 4. P. 706–715.
18. Rakhimov, Z. Reasoning a Construction Diagram and Parameters of Tillers for Primary Cultivation / Z. Rakhimov, S. Mudarisov, I. Gabitov, R. Rakhimov, I. Rakhimov, V. Alyabiev, L. Tarkhova, I. Farkhutdinov, A. Mukhametdinov and R. Gareev // Journal of Engineering and Applied Sciences. 2018. V. 13. P. 8812–8818.

1. **Мударисов Салават Гумерович**, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой строительно-дорожных, коммунальных и сельскохозяйственных машин, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, к. 206/1, тел.: (347) 228-91-66, e-mail: salavam@gmail.com.

2. **Шарафутдинов Азат Вилевич**, кандидат технических наук, доцент кафедры строительно-дорожных, коммунальных и сельскохозяйственных машин, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, к. 155/1, тел.: (347) 228-06-17, e-mail: meh-fak@yandex.ru.

Целью исследования является обоснование конструктивно-технологических параметров горизонтального распределителя пневматической сеялки. В исследовании выполнен анализ результатов лабораторных и полевых экспериментов. Приведены основные экспериментальные зависимости и установленные рациональные параметры горизонтального распределительного устройства. Моделирование работы горизонтального распределительного устройства позволило установить, что воздушно-зерновая смесь при выходе из патрубка в зависимости от скорости на входе отклоняется на некоторый угол γ в пределах $33...36^\circ$. Обоснование длины распределителя и формы его поверхностей производи-

лось из условия снижения сопротивления внутренних стенок воздушному потоку и соударения об них семян. Обоснование формы выходной части распределителя производилось по критерию равномерности распределения давлений по семяпроводам. Наиболее предпочтительным по равномерности распределения является криволинейная форма в виде плоской трансцендентной кривой, т. к. коэффициент вариации давления в этом случае ниже по сравнению с другими формами. Полученные результаты позволили определить оптимальные конструктивные параметры горизонтального распределителя пневматической сеялки с целью повышения качества распределения семян.

S. Mudarisov, A. Sharafutdinov

JUSTIFICATION OF CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF THE HORIZONTAL DISTRIBUTOR OF THE PNEUMATIC SEEDER

Keywords: *horizontal seed distributor; pneumatic grain seeder; air-grain mixture; uneven distribution of seeds.*

Authors' personal details

1. **Mudarisov Salavat**, Doctor of technical sciences, Professor, Head of the Department of Road Construction, Municipal and Agricultural Machines, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 206/1, 34, 50-letiya Oktyabrya str., Ufa, phone: (347) 228-91-66, e-mail: salavam@gmail.com.

2. **Sharafutdinov Azat**, Candidate of technical sciences, Associate Professor of the Department of Road Construction, Municipal and Agricultural Machines, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 155/1, 34, 50-letiya Oktyabrya str., Ufa, phone: (347) 228-06-17; e-mail: meh-fak@yandex.ru.

The purpose of the study is to justify the constructive and technological parameters of the horizontal distributor of a pneumatic seeder. The study analyzes the results of laboratory and field experiments. The main experimental dependences and the established rational parameters of the horizontal distribution device are given, the main physical and mechanical properties and the geometric parameters

of the seeds are determined. The modeling of the operation of a horizontal switchgear, allowed to establish that the air-grain mixture at the exit from the nozzle, depending on the speed at the entrance, deviates by some angle γ within $33...36^\circ$. The justification of the length of the distributor and the shape of its surfaces was made from the condition of reducing the resistance of the internal walls to the air

flow and the impact of seeds on them. Substantiation of the form of the output part of the distributor was carried out according to the criterion of the uniformity of pressure distribution over the seed tubes. The most preferable in terms of the uniformity of distribution is a curvilinear form as a flat transcen-

dental curve, since the coefficient of pressure variation in this case is lower compared to other forms. The obtained results allowed to determine the optimal constructive parameters of the horizontal distributor of a pneumatic seeder, in order to improve the quality of seed distribution.

© Мударисов С.Г., Шарафутдинов А.В.

Требования к научным статьям и условия публикации

Для публикации в научном периодическом (4 номера в год) издании – журнале «Вестник Башкирского государственного аграрного университета» (далее по тексту: Журнал) принимается ранее не опубликованное автором (авторами) произведение по отраслям наук: **05.00.00 Технические науки, 06.00.00 Сельскохозяйственные науки и Ветеринарные науки по группам специальностей: 05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем, 06.01.00 Агрономия, 06.02.00 Ветеринария и Зоотехния.** Статья должна быть актуальной, содержать постановку научной задачи (проблемы), описание собственных результатов исследования и состоять из следующих блоков: *введение; цель и задачи исследования; условия, материалы и методы исследования; результаты исследования; выводы.*

В редакцию авторы предоставляют:

✓ Материалы публикации в электронной форме в редакторе Word с расширением *.rtf, оригинал статьи, подписанный авторами – почтой.

✓ Отчет о проверке рукописи статьи в программе «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru). *При оригинальности работы менее 75 % она возвращается на доработку.*

✓ Лицензионный договор с автором(ами) о передаче исключительных прав сроком на 5 лет издательству Башкирского ГАУ. Образец договора, размещенный на сайте Журнала www.vestnik.bsau.ru, заполняется, подписывается автором(ми) в 2-х экземплярах и пересылается в сканированной форме по электронной почте в редакцию Журнала со статьей, а оригиналы договора – почтой.

✓ Выписку из протокола заседания кафедры или научного отдела о рекомендации статьи для публикации в Журнале, заверенную подписью и печатью организации

Правила оформления статьи:

1. Объем статьи 8–15 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, размер – 14 кегль, межстрочный интервал – 1,0; абзац – 0,9 см; поля 20 мм со всех сторон.

2. Рисунки, схемы и графики в черно-белом цвете предоставляются в электронном виде, включенными в текст, в стандартных графических форматах с обязательной подрисовочной подписью, и отдельными файлами с расширением *.jpeg, *.tif.

3. Таблицы предоставляются в редакторе Word, шрифт размером – 12 кегль. **Формулы и математические символы** в тексте набираются в стандартном редакторе формул Microsoft Equation; формулы нумеруются, после формулы приводится расшифровка символов, содержащихся в ней, в том порядке, в котором символы расположены в формуле.

4. На первой странице указываются: индекс по универсальной десятичной классификации (УДК) – слева в верхнем углу; на следующей строке – инициалы, фамилия автора (авторов); на следующей строке – название статьи на русском языке заглавными буквами; на следующей строке – ключевые слова или словосочетания (не менее 5) на русском языке (слова отделяются друг от друга точкой с запятой).

5. Далее по порядку следует текст статьи.

6. В конце статьи оформляется библиографический список (15–20 источников, **самоцитирование – не более 20 %**) в соответствии с ГОСТ 7.1-2003; ссылки на источники в тексте приводятся в квадратных скобках, например [1]; в библиографическом списке приводятся только те источники, на которые есть ссылка в тексте.

7. Сведения об авторе (авторах) на русском языке: фамилия, имя, отчество (полностью), ORCID (при наличии), ученая степень, ученое звание, должность, название организации, служебный адрес, телефон, e-mail.

8. Аннотация на русском языке (200–250 слов). НЕ повторяется название статьи. НЕ разбивается на абзацы. Структура аннотации кратко отражает структуру работы. Вводная часть минимальна. Изложение результатов содержит КОНКРЕТНЫЕ сведения (выводы, рекомендации и т. п.). Нежелательно использовать аббревиатуры и сложные элементы форматирования (например, верхние и нижние индексы). Избегайте использования вводных слов и оборотов! Числительные, если не являются первым словом, передаются цифрами. Все русские аббревиатуры передаются в расшифрованном виде, если у них нет устойчивых аналогов в англ. яз. (допускается: ВТО – WTO, ФАО – FAO и т. п.).

9. Инициалы, фамилии авторов на английском языке. При переводе на английский язык недопустимо использование машинного перевода!

10. Название статьи на английском языке.

11. Ключевые слова на английском языке.

12. Сведения об авторе (авторах) на английском языке.

13. Аннотация на английском языке.

Материалы в электронном виде необходимо направлять по e-mail: vestnik-bsau@mail.ru. Материалы в печатном виде направляются по адресу: 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, каб. 139, редакция Журнала «Вестник Башкирского государственного аграрного университета». Представленные в редакцию рукописи авторам не возвращаются.

Несоответствие представленных материалов по одному из выше перечисленных пунктов может служить основанием для отказа в публикации.

Все рукописи, представляемые авторами для публикации в Журнале, подлежат проверке в системе «Антиплагиат.ВУЗ» для выявления возможных некорректных заимствований с последующим прохождением института рецензирования (экспертной оценки), по результатам чего редакционная коллегия принимает окончательное решение о целесообразности опубликования поданных автором материалов. Информацию о прохождении статьи можно получить по телефону (347) 228-15-11.

Отчет о проверке рукописи статьи в системе «Антиплагиат.ВУЗ» хранится в издательстве в течение срока действия лицензионного договора.

За фактологическую сторону поданных в редакцию материалов юридическую и иную ответственность несут авторы. Редакция оставляет за собой право вносить редакционные изменения и производить сокращение в статье. Корректур статей авторам не предоставляется.

Плата за публикацию статьи в Журнале, в том числе с аспирантов, не взимается.

Подробная информация о журнале и требованиях к статьям размещена на сайте: www.vestnik.bsau.ru.