ВЕСТНИК

БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

16+

1 (53)
2020

ISSN 1684-7628

ОТРАСЛИ НАУК

технические

сельскохозяйственные

ветеринарные

**ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
В КАТАЛОГЕ «ИЗДАНИЯ ОРГАНОВ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ»
ОАО АГЕНТСТВО «РОСПЕЧАТЬ»**

66024

**Каталожная цена подписки
за полугодие – 700 рублей**

Выходит один раз в квартал

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук

СОДЕРЖАНИЕ

Агрономия

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-7-12

А.Н. Бондаренко

Адаптивность различных гибридов огурца при возделывании
в условиях капельного орошения Астраханской области.....7

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-12-20

А.П. Жидкин, М.А. Комиссаров

Эрозионно-аккумулятивные микроструктуры почвенного покрова
в лесостепной зоне Предуралья Республики Башкортостан.....12

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-20-26

Б.С. Мурзабулатов, И.С. Миннихметов, О.Н. Лыкасов

Мониторинг лесорастительных свойств почв лесных питомников
Зауралья Республики Башкортостан.....20

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-27-33

Н.Ю. Николаева, Х.Х. Тагиров

Анализ содержания подвижных форм меди и марганца
в пахотных почвах Томской области27

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-33-39

Д.О. Обозова, С.Н. Косников

Фунгициды как эффективное средство защиты
сельскохозяйственных культур и их интегральная оценка.....33

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-39-44

Л.В. Уфимцева, Н.В. Глаз

Совершенствование элементов технологии производства
саженцев груши в контейнерах39

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-44-50

И.Ш. Фатыхов, Ч.М. Исламова, Е.Ю. Колесникова

Экологическая пластичность и стабильность сортов яровой
пшеницы на госсортоучастках Удмуртской Республики.....44

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-51-55

Ю.А. Янбаев, С.Ю. Бахтина, Р.Ю. Янбаев,

Б. Деген, А.А. Габитова, А.А. Тагирова

Полиморфизм локусов SNP в российских популяциях
дуба черешчатого51

Ветеринария и Зоотехния

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-55-61

А.А. Астраханцев

Эффективность производства мяса цыплят-бройлеров
при различных способах и сроках выращивания.....55

	DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-61-66	
	А.А. Башаров, А.Р. Гайфуллина, Б.Р. Шагивалеев	
	Влияние пребиотической кормовой добавки «ВетоКислинка» на микробиоценоз желудочно-кишечного тракта телят молочного периода	61
	DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-66-70	
	Н.М. Губайдуллин, В.И. Косилов, И.Р. Газеев, Е.М. Ермолова	
	Влияние скрещивания красного степного и черно-пестрого скота с симменталами на качество мясной продукции помесного молодняка	66
	DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-70-78	
	И.Ю. Долматова, И.Н. Ганиева, Т.В. Кононенко, Ф.Р. Валитов	
	Взаимосвязь полиморфных генов пролактина и соматотропина крупного рогатого скота с молочной продуктивностью.....	70
	DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-78-82	
	С.Г. Исламова	
	Молочное козоводство в Республике Башкортостан	78
	DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-82-89	
	А.С. Ишимгузина, В.Р. Туктаров	
	Из опыта морфометрического исследования башкирских пчел при помощи компьютерной программы «Порода по крыльям»	82
	DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-89-93	
	А.А. Ламанов, Л.А. Зубаирова, Ю.Н. Чернышенко	
	Химический состав мясной продукции в зависимости от технологии содержания бычков разных пород	89
	DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-93-99	
	А.С. Литонина, А.Г. Кудрин	
	Селекция айрширского скота Вологодской области на продуктивное долголетие.....	93
	DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-99-106	
	Г.С. Мишуковская, М.Г. Гиниятуллин, Д.В. Шелехов, Е.А. Смольникова, А.И. Науразбаева	
	Эффективность пробиотических кормовых добавок при осенней подкормке пчелиных семей	99
	DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-106-110	
	М.Т. Сабитов, А.Р. Фархутдинова, И.М. Фархутдинов, М.Г. Маликова	
	Экономическая эффективность скармливания комплексной минерально-витаминной кормовой добавки «Надежда» в составе рациона телят	106
	DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-110-114	
	Д.И. Синельщикова, Л.В. Клетикова, А.Н. Мартынов	
	Ионный состав крови телят при ante- и неонатальном введении биологически активной добавки	110
	DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-114-125	
	Е.Н. Сквородин, Г.В. Базекин, Г.З. Бронникова, О.В. Дюдьбин	
	Морфологическое обоснование применения антиоксидантов при выращивании птицы.....	114
Процессы и машины агроинженерных систем	DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-125-131	
	А.В. Богданов, В.В. Евченко, С.Ю. Попова	
	Определение времени снижения концентрации озона до уровня ПДК при обосновании параметров установки для предпосевной обработки семян	125

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-131-141

А.И. Егоров, Д.П. Юхин

Оценка негативного воздействия деминерализованной воды на здоровье человека и инженерные коммуникации, посредством участия баромембранной технологии в удалении кремния и бора..... 131

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-142-148

Э.Р. Хасанов, Р.Р. Камалетдинов, Д.И. Маскулов, Р.З. Мусин

Разработка операционной технологии предпосевной обработки семян козлятника экспериментальным скарификатором..... 142

РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

Science Index

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
eLIBRARY.RU

AGRIS

Полные тексты статей доступны на сайте электронной научной библиотеки eLIBRARY.RU:
<http://elibrary.ru> и на сайте www.bsau.ru

DOI журнала: 10.31563/1684-7628

DOI выпуска: 10.31563/1684-7628-2020-53-1

Главный редактор:

И.И. Габитов, д-р техн. наук, профессор

Заместители главного редактора:

Р.Р. Султанова, д-р с.-х. наук, профессор

И.В. Чудов, д-р биол. наук, доцент

Редакционная коллегия:

Р.М. Баширов, член-корр. АН РБ, д-р техн. наук, профессор; В.В. Гимранов, д-р вет. наук, профессор; М. Грингс, проф., д-р сельского хозяйства (Германия); Б. Деген, доктор, профессор (Германия); Ф.С. Амиршоев, д-р биол. наук, профессор (Таджикистан); Р.Р. Исмагилов, член-корр. АН РБ, д-р с.-х. наук, профессор; К. Канненберг, д-р экон. наук (Польша); Ж.К. Керималиев, д-р вет. наук (Кыргызстан); С.А. Родин, д-р с.-х. наук, профессор, академик РАН (Москва); С.Г. Мударисов, член-корр. АН РБ, д-р техн. наук, профессор; Х.Х. Тагиров, д-р с.-х. наук, профессор; Н.К. Мазитов, д-р с.-х. наук, профессор, член-корр. РАН (Республика Татарстан); А.А. Стекольников, д-р вет. наук, профессор, академик РАН (Санкт-Петербург); И.О. Чанышев, д-р с.-х. наук; Ю.А. Янбаев, д-р биол. наук, профессор

Адрес учредителя,
издателя и редакции:

450001, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 34
Тел./факс: (347) 228-15-11
E-mail: vestnik-bsau@mail.ru

www.vestnik.bsau.ru

ISSN 1684-7628

Редактор: **Н.А. Николаенко**

Технический и художественный редактор: **А.Е. Дереева**

Подписано в печать **27.03.2020**. Формат бумаги 60×84/8

Усл.-печ. л. **17,20**. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».

Печать трафаретная. Заказ **216**. Тираж **300** экз.

РИО ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ

450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, каб. 109

© ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 2020

Журнал зарегистрирован
в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор),
регистрационный номер
ПИ № ФС77-67713
от 10.11.2016

CONTENTS

Agronomics

- A. Bondarenko
Adaptability of various cucumber hybrids cultivated
under drip irrigation in Astrakhan region.....7
- A. Zhidkin, M. Comissarov
Erosion and accumulation microstructures of soil cover
in the forest-steppe zone of the Cis-Urals, the Republic
of Bashkortostan.....12
- B. Murzabulatov, I. Minniakhmetov, O. Lykasov
Monitoring of forest soil properties of forest nurseries
of the Trans-Urals of the Republic of Bashkortostan.....20
- N. Nikolaeva, Kh. Tagirov
Analysis of the content of copper and manganese mobile forms
in arable soils of Tomsk region27
- D. Obozova, S. Kosnikov
Integral assessment of fungicides as an effective means
of protection of agricultural crops33
- L. Ufimtseva, N. Glaz
Improvement of the technology elements of production
of pear seedlings in containers39
- I. Fatykhov, Ch. Islamova, E. Kolesnikova
Environmental plasticity and stability of wheat varieties
in the state variety plots of Udmurt Republic.....44
- R. Yanbaev, S. Bakhtina, Y. Yanbaev,
B. Degen, A. Gabitova, A. Tagirova
Polymorphism of SNP loci in russian populations
of the pedunculate oak.....51

Veterinary and animal science

- A. Astrakhantsev
Efficiency in broiler chicken meat production
under various methods and periods of raising.....55
- A. Basharov, A. Gayfullina, B. Shagivaleev
Effect of the prebiotic feed additive «VetoKislinka»
on the microbiocenosis of the gastrointestinal tract
in calves of the birth-to-weaning period.....61
- N. Gubaidullin, V. Kosilov, I. Gazeev, E. Yermolova
Effect of crossing red steppe and black-and-white cattle
with simmentals on the quality of meat products obtained
from the crossbred young stock.....66

	I. Dolmatova, I. Ganieva, T. Kononenko, F. Valitov Relationship of polymorphic prolactin genes and growth hormones in dairy cattle.....	70
	S. Islamova Dairy goat breeding in the Republic of Bashkortostan	78
	A. Isimguzhina, V. Tuktarov From experience of morphometric study of bashkir bees with the help of the computer program «Breed by wings»	82
	A. Lamanov, L. Zubairova, Y. Chernyshenko Chemical composition of meat products depending on the keeping technology of bull calves of different cattle breeds	89
	A. Litonina, A. Kudrin Selection of ayrshir cattle of the Vologda region for productive longevity	93
	G. Mishukovskaya, M. Giniyatullin, D. Shelekhov, E. Smolnikova, A. Naurazbaeva Effectiveness of probiotic feed supplement for autumn feeding of honey bees.....	99
	M. Sabitov, A. Farkhutdinova, I. Farkhutdinov, M. Malikova Economic efficiency of complex mineral and vitamin feed supplement «Nadezhda» in the diet of calves	106
	D. Sinelshchikova, L. Kletikova, A. Martynov Ion composition of calves blood in ante- and neonatal injection of biologically active supplement.....	110
	E. Skovorodin, G. Bazekin, G. Bronnikova, O. Diudbin Morphological justification of the use of antioxidants for growing poultry	114
Processes and machinery of agroengineering systems	A. Bogdanov, V. Evchenko, S. Popova Timing the reduction of the ozone concentration to MAC level when providing a rationale for the parameters of the presowing seed treatment machine	125
	A. Egorov, D. Yukhin Negative effect of demineralised water on human health and process utilities due to baromembrane technology of silicon and boron removal.....	131
	E. Khasanov, R. Kamaletdinov, D. Maskulov, R. Musin Development of operational technology for preseeding treatment of seeds of goatline with experimental scarificator	142
Editor-in-chief:	I. Gabitov, Dr. tech. sci., Professor	
Deputy Editor-in-chief:	R. Sultanova, Dr. agr. sci., I. Chudov, Dr. biol. sci.	
Editorial board:	R. Bashirov, Corresponding Member AS RB, Dr. tech. sci., Professor; V. Gimranov, Dr. vet. sci., Professor; M. Grings, Prof. Dr. agr. habil. (Germany); B. Degen, Dr., Professor (Germany); F. Amirshoyev, Dr. biol. sci., Professor (Tajikistan); R. Ismagilov, Corresponding Member AS RB, Dr. agr. sci., Professor; K. Kannenberg, Dr. econ. sci. (Poland); Z. Kerimaliev, Dr. vet. sci. (Kyrgyz Republic); S. Rodin, Dr. agr. sci., Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences (Moscow);	

S. Mudarisov, Corresponding Member AS RB, Dr. tech. sci., Professor; H. Tagirov, Dr. agr. sci., Professor; N. Mazitov, Dr. agr. sci., Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences (Republic of Tatarstan); A. Stekolnikov, Dr. vet. sci., Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences (St. Petersburg); I. Chanyshchev, Dr. agr. sci.; Y. Yanbaev, Dr. biol. sci., Professor

Editorial Office Address:

34, 50-letia October St.,
Ufa, 450001

Tel.: (347) 228-15-11

E-mail: vestnik-bsau@mail.ru

ISSN 1684-7628

Publishing house FSEI HE Bashkir SAU

Printed FSEI HE Bashkir SAU

Editor: **N. Nikolaenko**

Technical editor, corrector, make-up: **A. Dereeva**

© FSEI HE Bashkir SAU, 2020

АДАПТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ГИБРИДОВ ОГУРЦА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ В УСЛОВИЯХ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ключевые слова: *гибрид; огурец; минеральное питание; листовые обработки; коэффициент адаптивности; доля урожайности.*

Введение. В настоящее время известно широкое разнообразие веществ, оказывающих регуляторное действие на рост и развитие тыквенных культур [5–8; 10–15].

Целью проводимых исследований являлась разработка технологии возделывания гибридов огурцов на основе оптимизации уровня минерального питания и применения ростостимулирующих препаратов.

В задачи исследований входило выявление наиболее перспективных для условий севера Астраханской области гибридов огурцов, обладающих значительным уровнем потенциальной урожайности и коэффициентом адаптивности, при использовании внекорневых (лиловых) обработок ростостимулирующими препаратами и минеральных подкормок.

Материалы и методы исследований. В ходе научно-исследовательской работы был заложен трехфакторный полевой опыт методом расщепленных делянок на культуре огурец. Повторность опыта – трехкратная. **Фактором А** являлись гибриды огурца: Музыкальные пальчики F₁; Куколка F₁; Русский стиль F₁; Моя симпатия F₁; Мадемуазель F₁. **Фактор В** – уровень минерального питания: N₅₅P₅₃K₃₈, N₁₁₀P₁₀₅K₇₅ и **фактор С** – стимуляторы роста: Витазим; Мегафол. Общая площадь под изучением культуры **огурца** – 271,6 м². Площадь делянки под сорт – 22,5 м²; площадь делянки под 1 внекорневую обработку – 6,3 м². Густота посадки огурцов при одностороннем размещении растений относительно поливной ленты – 20,0 тыс./га. Схема посадки – 2,80 × 0,7 м. Способ посева – вручную (семена); способ полива – система капельного орошения.

Для выполнения поставленных задач проводились следующие полевые учеты, наблюдения и измерения с использованием методики полевого опыта Доспехова Б.А. 1985 г. [2] и опытного дела в растениеводстве Никитенко Г.Ф. 1982 г. [9], а также методики опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве под редакцией Белика В.Ф. [1].

Варианты опыта

1. Контроль – без удобрений.
2. N₅₅P₅₃K₃₈.

3. N₁₁₀P₁₀₅K₇₅.
4. N₅₅P₅₃K₃₈ + Витазим.
5. N₅₅P₅₃K₃₈ + Мегафол.
6. N₁₁₀P₁₀₅K₇₅ + Витазим.
7. N₁₁₀P₁₀₅K₇₅ + Мегафол.

Внекорневые обработки на огурцах были проведены в фазу 1-й настоящий лист, цветение, плодообразование согласно рекомендуемым нормам от товаропроизводителя.

Результаты исследования. В ходе проведенного изучения высокие показатели урожайности по возделыванию различных гибридов огурцов были отмечены на максимальном уровне у гибридов Моя симпатия F₁, Куколка F₁ и Музыкальные пальчики F₁, о чем свидетельствует таблица 1.

Для получения более объективной информации об адаптивности изучаемых гибридов огурцов был рассчитан коэффициент адаптивности по методу Л.А. Животкова [3] как на контрольном варианте, так и на высокоурожайных вариантах N₁₁₀P₁₀₅K₇₅ + Витазим и N₁₁₀P₁₀₅K₇₅ + Мегафол. Доля относительно среднесортной урожайности и средний коэффициент адаптивности представлены в таблицах 2–4. По полученному среднему коэффициенту адаптивности можно судить о продуктивных возможностях изучаемых гибридов.

В проведенных исследованиях по возделыванию гибридов огурцов на контрольном варианте высокоурожайными за весь период изучения 2016–2018 гг. оказались Моя симпатия F₁, Музыкальные пальчики F₁ и Куколка F₁ с урожайностью от 32,4 до 56,2 т/га. При этом доля урожайности относительно среднесортной варьировала от 73,2 до 209 % в 2016 году, от 75,3 до 209 % в 2017 году и от 110,3 до 182,1 % в 2018 году. Коэффициент адаптивности составлял в среднем за годы изучения по выделенным гибридам 1,06–1,81, что говорит о достаточно высокой степени адаптивности этих гибридов к условиям аридного климата Астраханской области (таблица 2).

Для определения стабильности сортов / гибридов было рассчитано среднее квадратичное отклонение от линий регрессии (R²). По данному показателю все изучаемые гибриды огур-

цов отличались изменчивостью по коэффициенту адаптивности от условий их выращивания, но обладали средней стабильностью по урожайности плодов. Среднесортная/гибридная урожайность на контрольном варианте находилась в диапазоне 29,2–33,2 т/га при $R^2 = 0,56$. На ва-

риантах $N_{110}P_{105}K_{75} + \text{Витазим}$ урожайность была на уровне 60,4–76,4 т/га и $N_{110}P_{105}K_{75} + \text{Мегафол}$ 64,58–76,1 т/га. При таких показателях на варианте $N_{110}P_{105}K_{75} + \text{Витазим}$ $R^2 = 0,32$, на варианте $N_{110}P_{105}K_{75} + \text{Мегафол}$ $R^2 = 0,33$ (таблицы 2, 3, 4, рисунки 1, 2, 3).

Таблица 1 Урожайность гибридов огурцов, 2016–2018 гг.

Гибрид	Вариант	Урожайность, т/га		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Мадемуазель F1	Контроль (без обработки)	17,3	22,0	6,2
	$N_{55}P_{53}K_{38}$	23,2	27,8	12,2
	$N_{110}P_{105}K_{75}$	23,3	27,9	13,9
	$N_{55}P_{53}K_{38} + \text{Витазим}$	33,5	37,2	16,7
	$N_{55}P_{53}K_{38} + \text{Мегафол}$	28,2	31,8	15,7
	$N_{110}P_{105}K_{75} + \text{Витазим}$	57,5	63,6	19,7
	$N_{110}P_{105}K_{75} + \text{Мегафол}$	55,5	61,6	17,2
Моя симпатия F1	Контроль (без обработки)	65,8	69,4	33,3
	$N_{55}P_{53}K_{38}$	86,8	90,5	44,6
	$N_{110}P_{105}K_{75}$	92,6	96,2	50,5
	$N_{55}P_{53}K_{38} + \text{Витазим}$	106,9	111,4	58,2
	$N_{55}P_{53}K_{38} + \text{Мегафол}$	96,3	102,3	55,1
	$N_{110}P_{105}K_{75} + \text{Витазим}$	117,0	123,1	111,7
	$N_{110}P_{105}K_{75} + \text{Мегафол}$	115,6	120,2	60,5
Русский стиль F1	Контроль (без обработки)	18,5	22,2	9,8
	$N_{55}P_{53}K_{38}$	38,4	43,0	45,0
	$N_{110}P_{105}K_{75}$	40,4	44,1	49,6
	$N_{55}P_{53}K_{38} + \text{Витазим}$	67,0	73,1	55,9
	$N_{55}P_{53}K_{38} + \text{Мегафол}$	48,1	57,0	49,9
	$N_{110}P_{105}K_{75} + \text{Витазим}$	73,7	77,2	75,7
	$N_{110}P_{105}K_{75} + \text{Мегафол}$	71,2	75,0	61,8
Куколка F1	Контроль (без обработки)	21,4	25,0	55,0
	$N_{55}P_{53}K_{38}$	22,3	25,3	62,0
	$N_{110}P_{105}K_{75}$	38,1	41,8	62,9
	$N_{55}P_{53}K_{38} + \text{Витазим}$	40,0	44,5	66,0
	$N_{55}P_{53}K_{38} + \text{Мегафол}$	38,5	43,1	64,3
	$N_{110}P_{105}K_{75} + \text{Витазим}$	47,5	52,0	81,9
	$N_{110}P_{105}K_{75} + \text{Мегафол}$	41,4	46,0	78,9
Музыкальные пальчики F1	Контроль (без обработки)	23,0	27,5	46,7
	$N_{55}P_{53}K_{38}$	39,6	42,6	60,9
	$N_{110}P_{105}K_{75}$	43,2	47,8	63,9
	$N_{55}P_{53}K_{38} + \text{Витазим}$	50,7	54,3	70,5
	$N_{55}P_{53}K_{38} + \text{Мегафол}$	48,0	52,5	66,0
	$N_{110}P_{105}K_{75} + \text{Витазим}$	60,1	64,6	92,8
	$N_{110}P_{105}K_{75} + \text{Мегафол}$	51,2	54,3	88,4
НСР 05 А	—	10,2	11,01	9,8
НСР 05 В	—	12,5	10,9	9,4
НСР 05 С	—	10,4	13,3	10,0
НСР 05 АВ	—	8,2	7,8	8,1
НСР 05 АС	—	7,1	7,4	7,3
НСР 05 ВС	—	6,3	8,1	7,4

Таблица 2 Коэффициент адаптивности гибридов огурцов на контрольном варианте

Гибрид	Урожайность, т/га				Доля урожайности относительно среднесортной (%)			Коэффициент адаптивности			
	2016	2017	2018	среднее за 2016–2018 гг.	2016	2017	2018	2016	2017	2018	среднее за 2016–2018 гг.
Мадемуазель F1	17,3	22,0	6,2	15,2	59,2	66,3	20,5	0,59	0,66	0,21	0,49
Моя симпатия F1	65,8	69,4	33,3	56,2	225,3	209,0	110,3	2,25	2,09	1,10	1,81
Русский стиль F1	18,5	22,2	9,8	16,8	63,3	66,9	32,5	0,63	0,67	0,33	0,54
Куколка F1	21,4	25,0	55,0	33,8	73,2	75,3	182,1	0,73	0,75	1,82	1,10
Музыкальные пальчики F1	23,0	27,5	46,7	32,4	78,8	82,8	154,6	0,79	0,83	1,55	1,06
Среднесортная / гибридная урожайность	29,2	33,2	30,2	30,9	100	100	100	1,0	1,0	1,0	1,0

Рисунок 1
Результаты регрессионного анализа коэффициента адаптивности гибридов огурцов на контрольном варианте (без обработок)

В целом проведенный анализ расчета коэффициента адаптивности высокоурожайных вариантов с использованием трехкратной листовой обработки препаратами Мегафол и Витазим по фазам вегетации на фоне вносимого уровня минерального питания из расчета $N_{110}P_{105}K_{75}$ по-

казал, что коэффициент у гибридов Моя симпатия F₁, Музыкальные пальчики F₁ и Куколка F₁ находился в диапазоне от 0,81 до 1,56, что также подтверждает высокую степень адаптивности изучаемых гибридов.

Таблица 3 Коэффициент адаптивности гибридов огурцов на варианте $N_{110}P_{105}K_{75}$ + Витазим

Гибрид	Урожайность, т/га			Доля урожайности относительно среднесортной (%)			Коэффициент адаптивности			
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Среднее за 2016–2018 гг.
Мадмуазель F ₁	57,5	63,6	19,7	95,2	83,5	25,8	0,95	0,84	0,26	0,68
Моя симпатия F ₁	117,0	123,1	111,7	193,7	161,8	146,2	1,61	1,61	1,46	1,56
Русский стиль F ₁	73,7	77,2	75,7	122,0	101,4	99,1	1,01	1,01	0,99	1,00
Куколка F ₁	47,5	52,0	81,9	78,6	68,3	107,2	0,68	0,68	1,07	0,81
Музыкальные пальчики F ₁	6,1	64,4	92,8	10,1	84,6	121,5	0,85	0,84	1,21	0,97
Среднесортная / гибридная урожайность	60,4	76,1	76,4	100	100	100	1,0	1,0	1,0	1,0

Рисунок 2
Результаты регрессионного анализа коэффициента адаптивности гибридов огурцов на варианте $N_{110}P_{105}K_{75}$ + Витазим

Таблица 4 Коэффициент адаптивности гибридов огурцов на варианте N₁₁₀P₁₀₅K₇₅ + Мегафол

Гибрид	Урожайность, т/га			Доля урожайности относительно средне-сортовой (%)			Коэффициент адаптивности			
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Среднее за 2016–2018 гг.
Мадемуазель F ₁	65,8	69,4	33,3	95,3	95,1	51,6	0,95	0,95	0,52	0,81
Моя симпатия F ₁	115,6	120,2	60,5	167,3	164,7	93,7	1,64	1,64	0,94	1,41
Русский стиль F ₁	71,2	75,0	61,8	103,1	102,8	95,7	1,02	1,02	0,96	1,00
Куколка F ₁	41,4	46,0	78,9	60,0	63,0	122,2	0,63	0,63	1,22	0,83
Музыкальные пальчики F ₁	51,2	54,3	88,4	74,2	74,4	136,9	0,74	0,74	1,37	0,95
Среднесортная / гибридная урожайность	69,04	72,98	64,58	100	100	100	1,0	1,0	1,0	1,0

Рисунок 3

Результаты регрессионного анализа коэффициента адаптивности гибридов огурцов на варианте N₁₁₀P₁₀₅K₇₅ + Мегафол

Выводы. На основании проведенного анализа были выявлены наиболее продуктивные гибриды огурцов, адаптированные к условиям аридного климата Астраханской области с получением стабильной урожайности. Наиболее стабильным по урожайности и адаптированным для возделывания в Астраханской области среди изучаемых оказался гибрид Моя симпатия F₁. Он имеет самый высокий показатель адаптивно-

сти (К. А. = 1,81 %) на контроле, (К. А. = 1,56) на варианте N₁₁₀P₁₀₅K₇₅ + Витазим и (К. А. = 1,41) на варианте N₁₁₀P₁₀₅K₇₅ + Мегафол. Гибриды Куколка F₁ и Музыкальные пальчики F₁ на контрольном варианте имели коэффициент адаптивности (К. А.) = 1,10–1,55. На варианте N₁₁₀P₁₀₅K₇₅ + Витазим (К. А.) был равен 1,07–1,21 и на варианте N₁₁₀P₁₀₅K₇₅ + Мегафол 1,22–1,37.

Библиографический список

1. Белик, В.Ф. Методика в овощеводстве и бахчеводстве [Текст] / В.Ф. Белик. М.: Колос, 1982. С. 32–35.
2. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта [Текст] / Б.А. Доспехов. М.: Агропромиздат, 1985. 315 с.
3. Животков, Л.А. Методика выявления потенциальной продуктивности и адаптивности сортов и селекционных форм озимой пшеницы по показателю «Урожайность» [Текст] / Л.А. Животков, З.А. Морозова, Л.И. Секатуева // Селекция и семеноводство. 1994. № 2. С. 3–6.
4. Звонкова, И.Ю. Урожайность и параметры экологической адаптивности гибридов

огурца агрофирмы «Седек» при капельном орошении в условиях Северо-Западного Прикаспия [Текст] / И.Ю. Звонкова, В.Н. Павленко, Т.В. Мухоморова, Е.В. Полхина / Вестник Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова. 2017. № 4. С. 20–24.

5. Костин, В.И. Регуляторы роста и развития растений [Текст] / В.И. Костин, Е.Н. Офицеров. М., 2010. 189 с.

6. Кравцова, Д.В. Разработка технологических приемов возделывания огурца при капельном орошении в условиях дельты Волги [Текст]: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Д.В. Кравцова. Астрахань, 2006. 24 с.

7. Литвинов, С.С. Система удобрения кабачка на аллювиально-луговых почвах Московской области [Текст] / С.С. Литвинов, А.А. Коломиец // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2014. № 8 (118). С. 9–12.

8. Мамонов, Е.В. Применение регуляторов роста растений на культурах семейства тыквенные (cucurbitaceae) [Текст] / Е.В. Мамонов, Г.А. Старых, А.В. Гончаров // Известия ТСХА. 2012. Вып. 2. С. 94–99.

9. Опытное дело в полеводстве [Текст] / Под общ. ред. Г.Ф. Никитенко. М.: Сельхозиздат, 1982. 190 с.

10. Осинкин, В.В. Водосберегающие технологии выращивания кабачков и столовой свеклы при капельном орошении на юге России [Текст] / В.В. Осинкин, И.А. Коваленко, Е.А. Ходяков // Международный научный журнал. 2014. № 7-1 (26). С. 69.

11. Тараканов, Г.И. Овощеводство открытого грунта [Текст] / Г.И. Тараканов, Н.В. Борисов, В.В. Климов. М.: Колос, 2012. 303 с.

12. Чернышева, Н.Н. Создание нового гибрида кабачка цукини для Западной Сибири [Текст] / Н.Н. Чернышева, В.Г. Высочин, Д.П. Ощепко // Вестник КрасГАУ. 2016. № 3. С. 80–84.

13. Яковлев, А.Ф. Регуляторы роста и эффективность их применения [Текст]: учебное пособие / А.Ф. Яковлев. М.: МСХА, 2012. 31 с.

14. Якушкина, Н.И. Сопровождение по программе «Регуляторы роста растений» [Текст]: тез. докл. / Н.И. Якушкина, А.М. Сивцова, А.А. Тарасенкова. М., 2011. 24 с.

15. Chistyakov A.A., Yakovleva Ye.N., Vorobyov N.N., Monakhos G.F. Seed production of butternut squash. J. Kartoffel I ovoshi. 2013. № 5. P. 32–33.

Сведения об авторе

Бондаренко Анастасия Николаевна, кандидат географических наук, зав. лабораторией агротехнологий овощных культур, ФГБНУ «ПАФНЦ РАН», 416251, Астраханская область, Черноярский район, кв-л Северный, 8, e-mail: pniaz@mail.ru, bondarenko-a.n@mail.ru (ORSIDID № 0000-0003-4816-5667).

На сегодняшний день получение высоких урожаев овощных культур является первоочередной задачей АПК Астраханской области. Достижение поставленной цели невозможно без внедрения новых агротехнологических приемов их возделывания. Одним из способов решения этой задачи, позволяющим добиться вышеуказанного результата, является использование на всех стадиях вегетации овощных культур ростостимулирующих препаратов и современных гибридов отечественной селекции. Впервые в течение 2016–2018 гг. в условиях землепользования ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр РАН» на орошаемом участке в двухфакторном полевом опыте были выявлены наиболее перспективные для условий севера Астраханской области варианты с фоновым внесением минерального питания в дозе $N_{110}P_{105}K_{75}$, а также внекорневые обработки стимуляторами роста в период вегетации растений огурца в условиях капельного орошения. Основ-

ное содержание статьи составляет анализ урожайных данных и коэффициент адаптивности различных гибридов огурца при применении стимуляторов роста на фоне внесения различных уровней минерального питания. Полученные в ходе изучения результаты по возделыванию гибридов огурцов на фоне внесения различных норм минеральных удобрений в комплексе с внекорневыми (листовыми) обработками выявили высокие показатели урожайности, соответственно и доли урожайности относительно среднесортной (%), а также коэффициента адаптивности на вариантах $N_{110}P_{105}K_{75}$ + Мегафол и $N_{110}P_{105}K_{75}$ + Витазим. Гибриды огурца Моя симпатия F₁, Музыкальные пальчики и Куколка по итогам трех лет изучения были максимально продуктивны относительно всех остальных изучаемых гибридов, что особенно проявилось при повышенной дозе минерального питания $N_{110}P_{105}K_{75}$ в комплексе с листовыми обработками.

A. Bondarenko

ADAPTABILITY OF VARIOUS CUCUMBER UNDER DRIP IRRIGATION IN ASTRAKHAN REGION

Key words: *hybrid; cucumber; mineral nutrition; leaf treatments; coefficient of adaptability; share of yield.*

Anastasia Bondarenko, Candidate of Geographical Sciences, head of the laboratory of Agricultural Technologies of Vegetable Crops, Caspian Agrarian Federal Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, 416251, Astrakhan region, Chernoyarsky district, Severny kvartal, 8, e-mail: pniiiaz@mail.ru, bondarenko-a.n@mail.ru (ORSIDID # 0000-0003-4816-5667).

Currently, obtaining high vegetable yields is a priority for the agro-industrial complex in Astrakhan region. This aim can be reached only through introduction of new agricultural cultivation techniques. One of the ways to meet the challenge is application of growth-stimulating products and advanced hybrids of domestic selection at all stages of crop vegetation. For the first time in 2016–2018, the two-factor field experiment conducted at «Caspian agrarian federal scientific centre of the Russian Academy of Sciences» revealed the most promising variants for the North of Astrakhan region. The variant combined background introduction of mineral nutrition at $N_{110}P_{105}K_{75}$, as well as foliar treatment with growth stimulants during the growing season of cucumbers under drip irrigation. The paper deals

with the analysis of yield data and the adaptability coefficient of various cucumber hybrids against growth stimulants combined with different levels of mineral nutrition. The study on the cultivation of cucumber hybrids under various doses of mineral fertilizers combined with foliar (leaf) treatments showed that the variants $N_{110}P_{105}K_{75}$ + Megafol and $N_{110}P_{105}K_{75}$ + Vitazim had both high yield indices and yield shares relative to the average index (%) and adaptability coefficient. Cucumber hybrids «Moya simpatiya F₁ (My sympathy F₁)», «Muzykalnye pal'chiki (Musical fingers)» and Kukolka (Baby doll) were the most productive compared to all other studied hybrids. The productivity was especially evident at the increased dose of mineral nutrition $N_{110}P_{105}K_{75}$ in combination with leaf treatments.

© Бондаренко А.Н.

УДК 631.459; 631.6.02

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-12-20

А.П. Жидкин, М.А. Комиссаров

ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ПРЕДУРАЛЬЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Ключевые слова: комбинация; карст; ложбина; эродированность почвенного покрова; чернозем; пашина.

Введение. Республика Башкортостан (РБ) является одним из самых критичных регионов в России по интенсивности эрозии почв, согласно Государственному докладу [4]. Развитию эрозионных процессов в РБ способствуют его физико-географические особенности. Прежде всего, для региона характерна сильная расчлененность рельефа, более 42 % сельскохозяйственных угодий расположено на склонах крутизной 1–5° [3]. В значительной степени развита ливневая эрозия в связи с частой повторяемостью ливневых осадков, которая составляет 37,3 % от суммы годовых [12]. Суровые и снежные зимы, глубокое промерзание почвы способствуют также развитию эрозии почв в период весеннего снеготаяния [6].

Данный регион имеет богатую историю изучения эрозии почв. Однако эти исследования проводили преимущественно в масштабе макро-рельефа. Особенности протекания эрозионно-

аккумулятивных процессов в рельефе более крупного порядка (мезо- и микрорельефе), а также влияние этих процессов на почвенный покров практически не изучены в РБ [16]. Широко известно, что эрозионно-аккумулятивные процессы связаны непосредственно с микро- и мезорельефом, которые определяют направление движения водных потоков и пространственный рисунок ареалов эродированных и намывных почв. В работе [14] на примере детального изучения малого водосбора показаны черноземные комплексы и их связь с микрорельефом на Среднерусской возвышенности. Установлено, что состав, генезис и морфология микроструктур почвенного покрова зависят от условий эродированности и увлажнения почв на различных элементах мезо- и микрорельефа. М.И. Фишманом выделены различные типы микроструктур почвенного покрова: аккумулятивно-эрозионный тип, приуроченный к небольшим ложбинам или

зонам аккумуляции наносов, и эрозионно-карбонатный тип, относящийся к участкам крутых сильнорасчлененных склонов. Данные типы микроструктур имеют широкое распространение на территории Среднерусской возвышенности.

Мезо- и микрорельеф Южного Урала и Предуралья существенно отличается от Среднерусской возвышенности, преимущественно это связано с развитием суффозионных процессов, т. е. карста. В РБ карстующиеся породы распространены на около 50 % территории. Почти 30 % площади в РБ поражено поверхностными карстопроявлениями, около 45 % городского и не менее 20 % сельского населения проживает в районах развития карста. Ежегодно здесь фиксируется образование десятков новых провалов, один раз в 5–6 лет возникают аномально крупные провалы диаметром более 15 м и глубиной > 10 м [11]. В результате этого лесостепная зона Предуралья и, в частности, Уфимский район РБ характеризуются выраженным мезо- и микрорельефом, формирование которого обусловлено комплексным воздействием различных экзогенных процессов. Многочисленные эрозионные ложбины и карстовые просадки характеризуются многообразием форм, размеров и выраженностью в рельефе. Ввиду их большого количества они тем или иным образом вовлечены в состав сельскохозяйственных угодий.

Традиционные исследования почвенного покрова, как правило, опираются на редкую сеть почвенных разрезов без учета мезо- и микрорельефа. Согласно [8], почвенные обследования 10000 масштаба должны проводиться с заложением одного почвенного разреза на 10–25 га в зависимости от категории сложности территории. Фактически современные почвенные обследования в РБ [15] проводятся с учетом заложения 1 разреза на несколько сотен га. Сложно оценить качество интерполяции почвенных свойств при проведении такого рода почвенных обследований в условиях дефицита информации о мезо- и микроструктурах почвенного покрова.

Цель исследования – детальное изучение и картографирование почвенного покрова ключевых участков в лесостепной зоне Предуралья РБ с целью выявления состава почвенных комбинаций, долевого участия почв разной степени эродированности и роли эрозионно-аккумулятивных/суффозионных процессов в формировании микроструктур почвенного покрова.

Объекты и методы исследования. Ключевые участки были выбраны в пределах Уфимского района РБ. Территория исследования характеризуется умеренно континентальным, достаточно влажным климатом со среднегодовой

температурой воздуха +3,8 °С. Гидротермический коэффициент Селянинова составляет 1,0–1,2. Среднегодовое количество осадков – 589 мм, около трети из них выпадает в твердом виде [1]. Почвы участков представлены черноземами глинисто-иллювиальными (*Luvic Chernozems (Aric, Pachic)*). Этот тип почвы является наиболее распространенным в Южном Предуралье, более 70 % из них сформированы на склонах 1–7° [9].

Участок «Начапкино» (54.849851 с. ш., 55.719941 в. д.) расположен в непосредственной близости от одноименной деревни и характеризуется высоким эрозионным потенциалом рельефа в связи с юго-восточной экспозицией склона, высокими максимальными уклонами до 7 градусов, длинной протяженностью линий тока – около 1 км. Форма склона выпукло-вогнутая. На обследуемом участке площадью ~ 1 км² присутствуют многочисленные нераспахиваемые карстовые воронки (10 штук) разного размера и глубины, располагающиеся в различных частях склона. Рельеф участка осложнен большим количеством распахиваемых ложбин и небольшими слабо выраженными в рельефе карстовыми просадками. Густая сеть ложбин простирается от верхней до нижней части склона и образует сложный рисунок. Некоторые ложбины отклоняются от направления падения склона мезорельефа на 30–45 градусов в восточном направлении. Вероятно, образование таких ложбин обусловлено воздействием группы экзогенных процессов (эрозии и суффозии). Некоторые ложбины начинаются широкими овальными понижениями, напоминающими карстовые просадки. На участке «Начапкино» было изучено 39 почвенных профилей. Точки закладывали по 4 катенам, а также дополнительно между катенами в наиболее характерных частях ложбин и распахиваемых карстовых понижений.

Ключевой участок «Подымалово» (54.7573 92 с. ш., 55.760632 в. д.) расположен в 10 км севернее от участка «Начапкино», в 1,5 км к юго-западу от д. Подымалово. Участок характеризуется схожей с «Начапкино» морфологией склонов: выпукло-вогнутой формой, протяженностью около 1 км, максимальной крутизной около 6 градусов. Однако экспозиция склона участка «Подымалово» – северная. На участке присутствуют многочисленные субпараллельные ложбины, густота которых приблизительно соответствует густоте ложбин участка «Начапкино». Стоит отметить, что карст в «Подымалово» выражен значительно слабее и в пределах исследуемого участка присутствует только одна нераспахиваемая просадка в нижней (выполо-

женной) части склона. Основные точки опробования закладывали внутри и параллельно по краевой части ложбин. Всего на участке «Подымалово» было исследовано 30 почвенных профилей.

На водораздельных плоских участках в зонах отсутствия интенсивной эрозии (между изучаемыми объектами «Начапкино» и «Подымалово») были заложены точки опробования с целью выявления эталонных мощностей гумусовых горизонтов почв.

Результаты исследования. На основе результатов полевых исследований почвенного покрова, топокарт и разновозрастных космических снимков были составлены детальные почвенные карты распахиваемых территорий ключевых участков (рисунки 1 и 2). Данные карты наглядно демонстрируют пространственные особенности микроструктур почвенного покрова исследованных ключевых участков, формирование которых во многом обусловлено эрозионно-аккумулятивными процессами.

Разделение черноземов по степени эродированности проводили согласно [5] следующим

образом: слабосмытые – смыто до 30 % первоначальной мощности гумусовых горизонтов $A_1 + A_1B$; среднесмытые – гумусовые горизонты смыты на 30–50 %, сильносмытые – смыта большая часть (более 50 %) $A_1 + A_1B$. Выделение степени намытости почв проведено на основе авторского подхода (аналогичное подходу определения степени эродированности почв): слабо намытые – намыто до 30 % первоначальной мощности гумусовых горизонтов $A_1 + A_1B$; средне намытые – гумусовые горизонты увеличены на 30–50 %, сильно намытые – намыто больше более 50 % первоначальной мощности $A_1 + A_1B$.

Выбор эталона незэродированной почвы является существенной проблемой [13]. В нашем исследовании за эталон были взяты почвы, расположенные на широких плоских водораздельных участках, немного удаленных от ключевых участков. В обоих случаях мощности гумусовых горизонтов эталонных почв составили около 60 см. Таким образом, были введены следующие критерии степени эродированности и намытости почв (таблица 1).

Таблица 1 Критерии степени эродированности и намытости почв для исследованных ключевых участков

Степень эродированности или намытости	Сильно намытые	Средне намытые	Слабо намытые	Слабозэродированные	Среднезэродированные	Сильнозэродированные
Мощность гумусовых горизонтов ($A_1 + A_1B$)	> 90 см	78–90 см	60–78 см	42–60 см	30–42 см	< 30 см

Рисунок 1
Почвенная карта распахиваемой территории участка «Начапкино»

Рисунок 2
Почвенная карта распахиваемой территории участка «Подымалово»

На ключевом участке «Начапкино» основная часть исследованной территории занята черноземами типичными и выщелоченными слабо эродированными (рисунок 1). Черноземы типичные преимущественно приурочены к восточной части территории исследования. Вероятно, близкое залегание карбонатов к дневной поверхности здесь обусловлено слабым вымыванием талыми и ливневыми водными потоками, а именно в связи с перехватом водного стока карстовой просадкой, расположенной в верхней части склона. Также черноземы типичные локально встречаются в средней и нижней частях склонов в центральной части участка исследования. В западной части встречаются исключительно черноземы выщелоченные, что, вероятно, обусловлено гранулометрическим составом почв, в отличие от остальной части участка. Здесь черноземы имеют более легкий среднесуглинистый опесчаненный состав. Вероятно, это способствует лучшей инфильтрации поступающих атмосферных осадков вглубь почвенных профилей и выщелачиванию из них карбонатов. На почвенной карте черноземы типичные отображены в комбинации с черноземами выщелоченными, поскольку они встречаются локально и не образуют ареалов с четко выраженными границами.

Неглубокое залегание карбонатов в почвах участка «Начапкино» выявлено также для сильноэродированных почв, в некоторых случаях вскипание от 10 % HCl проявлялось даже с поверхности (северо-западная часть участка).

Сильно- и среднеэродированные почвы на участке «Начапкино» приурочены исключительно к распахиваемым ложбинам и карстовым просадкам.

Области аккумуляции наносов на участке «Начапкино» приурочены к конусам выноса ложбин и верхним частям нераспахиваемых карстовых просадок.

На ключевом участке «Подымалово» микроструктуры почвенного покрова отличаются от рассмотренного выше участка «Начапкино». Почти все почвы представлены черноземами выщелоченными, чернозем типичный был встречен только в одной точке (рисунок 2, $A_1 + A_1B = 85$). Преобладание черноземов выщелоченных, вероятно, обусловлено северной экспозицией склона участка «Подымалово». Экспозиционные различия в почвенном покрове подтверждают литературные данные [7, 10].

На участке «Подымалово» отсутствуют сильноэродированные почвы. Однако среднеэродированные почвы распространены намного более широко, чем на участке «Подымалово», и формируют протяженные ареалы в нижних наиболее крутых (до 7 градусов) частях склонов участка.

Наибольший контраст в проявлении эрозионно-аккумулятивных процессов изученных участков проявляется в почвенном покрове ложбин. На участке «Начапкино» почвы почти всех ложбин средне- и сильноэродированы, а на участке «Подымалово» в ложбинах отмечается практически повсеместная аккумуляция наносов.

Влияние мезо- и микрорельефа на почвенный покров проявляется при анализе мощностей гумусовых горизонтов почв на обоих участках. Выявлены существенные различия в мощностях гумусовых горизонтов почв на участках склонов с отсутствием выраженных ложбин и карстовых просадок, а также в самих ложбинах и карстовых просадках. На участках склонов с отсутствием геоморфологических проявлений на поверхности почвы варьирование мощностей гумусовых горизонтов относительно небольшое. На ключевом участке «Начапкино» мощности горизонта A_1 варьируют от 20 до 43 см, а горизонта A_1B – от 35 до 78 см; при этом коэффициенты вариации (V) мощностей гумусовых гори-

зонтов A_1 и A_1B были в средней категории ($V \sim 20\%$) (таблица 2, рисунок 3), несмотря на относительно высокий эрозионный потенциал рельефа, обусловленный большими уклонами (до 6–7 градусов). На ключевом участке «Подымалово» мощности горизонта A_1 варьируют от 14 до 38 см, а горизонта A_1B – от 41 до 85 см; статистическая степень рассеивания мощностей гумусовых горизонтов A_1 и A_1B составила около 30 %. Таким образом, на участках с ненарушенным рельефом и без видимых на поверхности проявлений экзогенных процессов (ложбин, оврагов, карстовых воронок и т. п.) мощности гумусово-аккумулятивных горизонтов оказались статистически однородными ($V < 30\%$).

Таблица 2 Коэффициенты вариации мощностей гумусовых горизонтов почв ключевых участков

Участок	Горизонт	Вне ложбин и просадок		В ложбинах		В просадках	
		профилей, шт.	коэффициент вариации	профилей, шт.	коэффициент вариации	профилей, шт.	коэффициент вариации
Начапкино	A_1	18	19,4 %	10	65,1 %	11	99,5 %
	$A_1 + A_1B$		19,4 %		81,4 %		47,8 %
Подымалово	A_1	8	29,5 %	11	75,4 %	–	–
	$A_1 + A_1B$		28,1 %		36,1 %

Рисунок 3

Мощность горизонта A_1 в почвах участков «Начапкино» (а) и «Подымалово» (б). Столбиками показаны средние арифметические значения, стрелками – минимальное и максимальное

Внутри распахиваемых ложбин и карстовых просадок отмечается существенно более высокое варьирование мощностей гумусовых горизонтов A_1 (до 65 см на участке «Начапкино» и 91 см на участке «Подымалово») и A_1B (до 135 см на участке «Начапкино» и 103 см на участке «Подымалово»). При этом коэффициенты вариации мощностей гумусовых горизонтов почв внутри распахиваемых ложбин и карстовых просадок существенно (в несколько раз) выше, чем вне ложбин и просадок.

Наиболее контрастные морфологические свойства почв выявлены внутри крупных распахиваемых ложбин и карстовых просадок. Так, на участке «Начапкино» мощности горизонта A_1 варьируют от 0 до 86 см, а A_1B – от 40 до 150 см; совокупность мощностей гумусовых горизонтов A_1 и A_1B при этом характеризуется как неоднородная, то есть отношение стандартного отклонения к среднему – высокое ($V > 30\%$).

Условия формирования почв в исследованных карстовых просадках участка «Начапкино» отличаются. В карстовой просадке № 1 (восточная часть участка) в условиях водозастойного типа водного режима формируются переувлажненные глеевые почвы, состоящие из перегнойного и глеевого горизонтов. В группе, состоящей из нескольких карстовых просадок № 3 (южная часть участка), формируются черноземы с мощными гумусовыми горизонтами, в нижней части склона перекрытыми мощными (до 150 см) намытыми горизонтами. Доставка наносов в данную часть просадки происходит по протяженной, хорошо выраженной в рельефе ложбине. Эта ложбина пересекает основной склон под углом и перехватывает значительную часть

наносов, смываемых с верхней части склона в результате плоскостного смыва.

В целом можно отметить, что все нераспахиваемые ложбины и карстовые просадки в той или иной степени подвержены поступлению наносов, смываемых с вышележащих распахиваемых земель. В условиях промывного типа водного режима почв аккумуляция наносов четко маркируется по слоистости, иногда наличию светлых (белесоватых) прослоев, а также включениям веток, камней, мусора и других артефактов. В полугидроморфных и гидроморф-

ных условиях формируются лугово-черноземные почвы с гумусово-перегнойным горизонтом, в котором отличить наносы от погребенной почвы затруднительно.

Дополнительно была проведена оценка пространственных параметров ареалов выделенных почв и почвенных комбинаций. В программе ArcGIS 10.1 были посчитаны площади почвенных ареалов и долевое участие распахиваемых почв разной степени эродированности и намытости, а также не распахиваемых почв карстовых просадок и ложбин (рисунок 4).

Рисунок 4
Долевое участие распахиваемых почв разной степени эродированности и намытости, не распахиваемых почв карстовых просадок и ложбин

На обоих участках доминируют слабо эродированные почвы (рисунок 4). Сильно- и среднеэродированные почвы имеют четкую локализацию на обоих участках (на участке «Начапкино» – в распахиваемых ложбинах и карстовых просадках; на участке «Подымалово» – в нижних, наиболее крутых частях склонов). Долевое участие сильно- и среднеэродированных почв на исследованных участках отличается. На участке «Начапкино», несмотря на южную экспозицию, сильно- и среднеэродированные почвы занимают менее 2 % территории исследования, на участке «Подымалово» сильноэродированные почвы не обнаружены, а среднеэродированные занимают почти пятую часть территории. Ареалы намытых почв также имеют четкую локализацию. Долевое участие намытых почв на участке «Начапкино» невелико, лишь около 1,5 %, основные области разгрузки наносов приходятся на нераспахиваемые карстовые просадки и овражно-балочную сеть. На участке «Подымалово» значительная часть наносов аккумулируется в пределах пашни в днищах распахиваемых ложбин и карстовых просадок, долевое участие намытых почв составляет более 7 %.

Выводы. Проведенные детальные исследования на ключевых участках свидетельствуют о выраженных связях между рельефом (разного порядка) и структурой почвенного покрова исследованных территорий. Ведущим агентом

трансформации почвенного покрова в лесостепной зоне Предуралья является комплекс эрозионно-аккумулятивных, экзогенных и суффозионных процессов. Наиболее значительные изменения приурочены к мезо- и микропонижениям рельефа.

Карстовые понижения являются преимущественно зонами аккумуляции наносов, в особенности залуженные участки, не распахиваемые в настоящее время. Распахиваемые ложбины на одном из участков являются преимущественно зонами интенсивной эрозии почв; на другом участке – преимущественно зонами аккумуляции наносов. Необходимо дальнейшее более подробное изучение эрозионно-аккумулятивных процессов в ложбинах для объяснения выявленных на ключевых участках различий. Возможно, различия обусловлены разницей в экспозиции и морфологии склонов либо периодическим чередованием процессов эрозии и аккумуляции наносов во времени [17].

Выявлены незначительные различия в мощностях гумусовых горизонтов почв на участках склонов с отсутствием ложбин и карстовых просадок, и существенные – при их наличии. Коэффициенты вариации мощностей горизонтов A_1 и A_{1B} в карстовых просадках в 2,5–5 раз выше, а в ложбинах – в 1,5–4 раза выше, чем на участках склонов с отсутствием выраженных ложбин и карстовых просадок, при этом средние по участ-

кам мощности гумусовых горизонтов слабо отличаются на разных элементах рельефа.

Суммарные площади эродированных и намывных почв в пределах распаханых понижений рельефа относительно невысоки и составили менее 10 % от площади пашни в пределах ключевых участков. Эти показатели, выявленные для лесостепных участков РБ, существенно ниже литературных данных для Среднерусской возвышенности (согласно данным [14]). Полученные результаты свидетельствуют, что погрешности картографирования эродированности почвенного покрова лесостепной зоны РБ

без учета мезо- и микрорельефа должны быть относительно невелики (менее 10 %) в случае заложения сети почвенных разрезов вне ложбин, потяжин и карстовых понижений. Однако при картировании таких участков с выраженным мезо- и микрорельефом на склонах рекомендуется указывать вероятностное долевое участие средне-, сильноэродированных и намывных почв в составе почвенных комбинаций.

Благодарность. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-35-20011.

Библиографический список

1. Абдрахманов, Р.Ф. Водно-балансовая станция [Текст] / Р.Ф. Абдрахманов, Б.Н. Батанов, И.М. Габбасова и др. Уфа: Башкирский ГАУ, 2002. 82 с.
2. Габбасова, И.М. Изменение эродированных почв во времени в зависимости от их сельскохозяйственного использования в Южном Предуралье [Текст] / И.М. Габбасова, Р.Р. Сулейманов, И.К. Хабилов, М.А. Комиссаров, М. Фрюауф, П. Либельт, Т.Т. Гарипов, Л.В. Сидорова, Ф.Х. Хазиев // Почвоведение. 2016. № 10. С. 1277–1283.
3. Габбасова, И.М. Распространение, типология и оценка состояния деградированных почв Республики Башкортостан [Текст] / И.М. Габбасова, И.К. Хабилов // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2010. № 2. С. 3–11.
4. О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2005 г. [Текст]: Государственный доклад. М.: Министерство природных ресурсов Российской Федерации, 2006.
5. Классификация и диагностика почв СССР [Текст] / Сост. чл.-кор. ВАСХНИЛ В.В. Егоров, профессора В.М. Фридланд, Е.Н. Иванова и др.; Почв. институт им. В. В. Докучаева. Москва: Колос, 1977. 223 с.
6. Комиссаров, М.А. Эрозия почв при снеготаянии на пологих склонах в Южном Предуралье [Текст] / М.А. Комиссаров, И.М. Габбасова // Почвоведение. 2014. № 6. С. 734–743.
7. Лучицкая, О.А. Плодородие почв и рельеф [Текст] / О.А. Лучицкая, В.Н. Башкин // Почвоведение. 1994. № 9. С. 75–79.
8. Общесоюзная инструкция по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных почвенных карт землепользований [Текст]: [Утв. 23 VI 1972 г.] / Министерство сельского хозяйства СССР. Гл. упр. землепользования и землеустройства. М.: Колос, 1973. 95 с.
9. Почвы Башкортостана, Т. 1: Эколого-генетическая и агропроизводственная характеристика [Текст] / Ф.Х. Хазиев, А.Х. Мукастанов, И.К. Хабилов, Г.А. Кольцова, И.М. Габбасова, Р.Я. Рамазанов. Уфа: Гилем, 1995. 384 с.
10. Проценко, Е.П. Базовые свойства и режимы почв полярно ориентированных склонов [Текст]: автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук: 06.01.03 / Е.П. Проценко; Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии. Курск, 2004. 46 с.
11. Смирнов, А.И. Гис-технологии в изучении опасных геологических процессов южного Урала и Предуралья [Текст] / А.И. Смирнов, В.Н. Дурнаева, Р.Ф. Абдрахманов // Геологический вестник. 2018. № 3. С. 137–143.
12. Соболев, Н.В. Влияние различной интенсивности дождей и крутизны склонов на развитие эрозии почв в Южном Предуралье (модельный опыт) [Текст] / Н.В. Соболев, И.М. Габбасова, М.А. Комиссаров // Почвоведение. 2017. № 9. С. 1134–1140.
13. Современные проблемы эрозиоведения [Текст]: Recent developments in erosion science / Ф.Н. Лисецкий, А.А. Светличный, С.Г. Черный; Нац. исслед. ун-т «Белгородский гос. ун-т», Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Николаевский гос. аграрный ун-т; под ред. А.А. Светличного. Белгород: Константа, 2012. 455 с.
14. Фишман, М.И. Черноземные комплексы и их связь с рельефом на Среднерусской возвышенности [Текст] / М.И. Фишман // Почвоведение. 1977. № 5. С. 17–30.
15. Хасанов, А.Н. Современное состояние плодородия почв агроландшафтов южной лесостепи Республики Башкортостан [Текст]: дис. ... канд. биол. наук: 03.02.13 / Хасанов Айрат Науратович; Башкирский ГАУ. Уфа, 2019. 143 с.
16. Шамшурина, Е.Н. Эрозионные процессы на территории Республики Башкортостан: история изучения и современное состояние [Текст] /

Е.Н. Шамшурина, М.А. Комиссаров, А.П. Жидкин // Закономерности проявления эрозионных и русловых процессов в различных природных условиях: материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием. Москва, 2019. С. 412–414.

17. Belyaev V.R., Golosov V.N., Sidorchuk A.Yu., Wallbrink P.J., Murray A.S. A comparison of methods for evaluating soil redistribution in the severely eroded Stavropol region, southern European Russia. *J. Geomorphology*. 2005. V. 65 (3-4). P. 173–193.

Сведения об авторах

1. **Жидкин Андрей Петрович**, orcid.org/0000-0003-3995-9203, кандидат географических наук, старший научный сотрудник кафедры геохимии ландшафтов и географии почв, географический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1; старший научный сотрудник Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 7, стр. 2, e-mail: gidkin@mail.ru.

2. **Комиссаров Михаил Александрович**, orcid.org/0000-0001-6135-7212, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории почвоведения, Уфимский Институт биологии УФИЦ РАН, 450054, г. Уфа, пр. Октября, 69, e-mail: mkomissarov@list.ru.

Проведены детальные исследования почвенного покрова на двух ключевых участках, расположенных в лесостепной зоне Республики Башкортостан. Выявлено, что ведущим фактором формирования микроструктур почвенного покрова (МПП) являются эрозионно-аккумулятивные и суффозионные процессы, широко развитые в данном регионе. Наиболее значительные отклонения в свойствах почв приурочены к мезо- и микропонижениям рельефа. Варьирование мощностей гумусовых горизонтов почв внутри ложбин и карстовых просадок в несколько раз выше, чем на участках склонов без выраженных мезо- и микропонижений. Помимо изменения в степени эродированности почв со-

став комбинаций МПП обусловлен водным режимом почв и глубиной залегания карбонатов, также связанных с мезо- и микрорельефом. Особенности формирования МПП в ложбинах требуют дополнительного и более детального исследования, поскольку эрозионные процессы в них протекают разнонаправленно на разных ключевых участках. Карстовые просадки на исследованных ключевых участках являются преимущественно зонами аккумуляции наносов. Общая площадь эродированных и намытых почв в пределах распаханых понижений рельефа относительно невысока и составила менее 10 % от площади пашни в пределах исследованных участков.

A. Zhidkin, M. Comissarov

EROSION AND ACCUMULATION MICROSTRUCTURES OF SOIL COVER IN THE FOREST-STEPPE ZONE OF THE CIS-URALS, THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Key words: *combination; karst; hollow; erosion degree of the soil cover; black soil; arable land.*

Authors' personal details

1. **Andrey Zhidkin**, orcid.org/0000-0003-3995-9203, Candidate of Geographical Sciences, senior researcher at the Department of Landscape Geochemistry and Soil Geography, Faculty of Geography, Lomonosov Moscow State University, 119991, Moscow, Leninskie Gory, 1; senior researcher at Soil Institute named after V.V. Dokuchaev, 119017, Moscow, Pyzhevsky pereulok, 7, bld. 2, e-mail: gidkin@mail.ru.

2. **Mikhail Komissarov**, orcid.org/0000-0001-6135-7212, Candidate of Biological Sciences, senior researcher of the laboratory of Soil Science, Ufa Institute of Biology, UFRS RAS, 450054, Ufa, prospect Oktyabrya, 69, e-mail: mkomissarov@list.ru.

A detailed study of soil cover was carried out in two key areas located in the forest-steppe zone of the Republic of Bashkortostan (RB). The study revealed that erosion-accumulative and suffusion processes, that are widely developed in this region, are

the leading factor in the formation of soil cover microstructures (SCM). The most significant deviations in soil properties are confined to meso- and micro-lowering of the relief. The variation in the thicknesses of the humus horizons of soils inside the

hollows and karst subsidences is several times higher than in the sections of the slopes without marked meso- and microdepressions. In addition to changes in the degree of soil erosion, the composition of SCM combinations is determined by the water regime of soils and the depth of carbonates occurrence, which are also associated with the meso- and microrelief. Features of the SCM in the hollows

require additional and more detailed research, since multidirectional erosion processes can take place at different key sites. Karst subsidence in the studied areas is mainly represented by sediment accumulation zones. The total area of eroded and reclaimed soils within the range of ploughed relief depressions is relatively low and is less than 10 % of the arable land within the studied areas.

© Жидкин А.П., Комиссаров М.А.

УДК 631.4:630*322.22(470.57)

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-20-26

Б.С. Мурзабулатов, И.С. Миннихметов, О.Н. Лыкасов

МОНИТОРИНГ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПОЧВ ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКОВ ЗАУРАЛЬЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Ключевые слова: почва; деградация почвы; плодородие почвы; лесной питомник; агроландшафт.

Введение. Создание искусственных лесных насаждений на всех территориях является основным фактором связывания углекислого газа в различных сельскохозяйственных зонах [19]. Рост содержания гумуса в почвах наблюдается при самозаращении лесными насаждениями пахотных земель [1], уменьшение содержания – при посадке леса на пастбищах и лугах; также положительный баланс гумуса – при количестве осадков до 800–1000 мм, отрицательный – более 1000 мм. Таким образом, при посадке леса на деградированных почвах сельскохозяйственных угодий происходит положительная динамика баланса гумуса при оптимальных увлажнении и наличия в насаждениях травянистого покрова. Также посадка леса оказывает воздействие на состав почвенно-поглощающего комплекса. Многие исследователи отмечают, что под хвойными насаждениями с увеличением влажности почв и возраста леса происходит увеличение кислотности почв [20]. В работах С.И. Коржинского [5], М.Е. Ткаченко [16, 17], К.П. Горшенина [2] изучены признаки деградации почв. Под древесными насаждениями уменьшается содержание гумуса, увеличивается кислотность, ухудшается структура почвы. Многие исследователи акцентировали внимание на положительном влиянии лесных культур на свойства исходных почв, поэтому не включали эти показатели в признаки их деградации [7, 8]. К признакам деградации почв относили улучшение водно-физических и физических показателей, увеличение мощности гумусового горизонта, выщелачивание легкорас-

творимых солей [3, 4, 8, 13, 15, 18]. Высокая увлажнённость может приводить к заметной деградации почвы, сформировавшейся под травяной растительностью. Выявлено существенное изменение свойств горно-луговых почв плато Ай-Петри под влиянием искусственных лесных насаждений (сосны, берёзы, лиственницы), созданных на Крымских нагорьях в середине прошлого столетия. Под лесной растительностью произошло увеличение доли крупных агрегатов в составе почвенной структуры, уменьшение гумусированности, увеличение кислотности и содержания железа из органоминеральных соединений по сравнению с почвами под луговой растительностью [6]. В Республике Башкортостан (РБ) происходит нарушение природной экологической системы при добыче строительных материалов, полезных ископаемых в месторождениях, а также при интенсивной вырубке лесов. Леса – возобновляемый ресурс, который восстанавливается медленно и малоценными в хозяйственном отношении породами в связи с климатическими, почвенными и антропогенными факторами. Поэтому актуальным направлением является воспроизводство лесных насаждений высококачественным посадочным материалом, выращенным в лесных питомниках.

Цель и задачи исследования. Выявление изменений лесорастительных свойств почв лесных питомников Зауралья РБ при выращивании посадочного материала, создании лесоагроландшафтов, моделировании антропогенно-преобразованных земель.

Условия, материалы и методы исследования. В Зауралье РБ почти во всех лесничествах имеются лесные питомники (рисунок 1). Площадь многих из них не менее 10 га. Только в Баймакском лесничестве 8 лесных питомников (Баймакский, Иткуловский, Крепостной, Сибайский, Темясовский, Юлукский и др.), которые ежегодно обеспечивают посадочным материалом для посадки на лесокультурной площади.

Рисунок 1

Расположение лесных питомников Зауралья РБ: №№ 53, 54, 55 – Ургунские; № 90 – Абзелиловский; № 91 – Кирдасовский; № 95 – Темясовский; № 98 – Иткуловский; № 101 – Сибайский; № 106 – Баймакский; № 115 – Самарский; № 116 – Степной

Питомники в организационно-экономическом плане отвечают основным условиям, предусмотренным положениями и ГОСТами.

Результаты исследования. Ведение хозяйства в лесных питомниках имеет специфические

особенности. Прежде всего, это более интенсивное механическое воздействие при частой обработке почвы и особенно при выкопке посадочного материала. Другая особенность – практически полное отчуждение растительной массы и вынос гумусированного мелкозёма. Этот вынос сеянцами берёзы повислой 1,5-годовалого возраста в количестве 1,0 млн шт./га составил до 12 т почвы и 5 т с 1 га органического вещества. Все это за короткий период времени приводит к серьёзным деградационным изменениям в почве.

Интенсивное использование почв в лесных питомниках вызвало много негативных явлений в пахотном слое: уменьшение содержания гумуса, кальция, ухудшение физико-химических свойств, подкисление, снижение активности ферментов и, как следствие, истощение почвы и т. п. [9–12]. Поэтому в почвах питомников необходимо создавать другие условия почвообразования по сравнению с природными. Лесные питомники Зауралья РБ включают: 9 типов, 19 подтипов и 51 разновидностей. В лесных питомниках выращивают сеянцы и саженцы разного возраста следующих пород: арония черноплодная, барбарис обыкновенный, берёза повислая, вяз перистоветвистый, клён остролистный и татарский, лиственница Сукачёва, тополь balsamic и пирамидальный, смородина чёрная, сосна обыкновенная и другие. В основном практикуется интродукция (введение) ели сибирской и колючей (голубой формы), бузины чёрной и красной (сибирская) и других видов. Многие лесные питомники примыкают к лесным массивам, что позволяет успешно выращивать сеянцы сосны обыкновенной, лиственницы Сукачёва и другие виды. Специалисты продолжают работы по акклиматизации завезённых в республику экзотов – интродуцентов, различных форм кипарисовых, можжевельниковых и других пород. Сидеральный пар засеивается бобовыми травами (люпин многолетний, донник белый и другие). Выращивание посадочного материала в посевном отделении питомников производится по системе четырехпольного севооборота с чистым гербицидными и сидеральными парами. Для защитного лесоразведения хорошо зарекомендовал себя клён остролистный. Размножается клён семенами, порослью, отводками, черенками и делением. Семена клёна созревают в конце августа – сентябре. При осеннем высеве крылаток клёна весной появляются дружные всходы, а для весеннего посева семена необходимо в течение одного месяца стратифицировать при температуре +5 °С или выдерживать под снегом в течение 45–60 дней. Семена протравливают пестицидами, высеивают сеялкой СЛП-М по ленточной трехстрочной схеме в широкие бороздки. Глу-

бина заделки семян 3,0–4,0 см. Норма высева семян 1 класса качества составляет 480 кг на 1 га. Сеянцы вяза перистоветвистого широко используются для лесопосадочных работ. Сбор семян производился с деревьев и ценных гибридов, сохранившихся в посадках. Семена вяза не имеют семенного покоя и не требуют специальной подготовки. Посев вяза производится летом свежесобранными протравленными семенами. Глубина заделки семян составляет 1,5–2,0 см.

Норма высева семян 1 класса качества – 160 кг/га. Агротехника выращивания сеянцев вяза разработана в Баймакском и Сибайском питомниках. Достигнут довольно высокий выход посадочного материала – 1,1 млн шт./га (Самарский питомник, 2001). В конце вегетационного периода произведен учёт 2-летних сеянцев клёна ясенелистного, вяза мелколистного, берёзы повислой и лиственницы Сукачёва (таблицы 1, 2).

Таблица 1 Средние биометрические показатели 2-летних сеянцев

Выход с 1 га, млн шт.	Высота надземной части, см	Толщина стволика у корневой шейки, мм	Длина корня, см	Вес растения, г
клён ясенелистный, 2-летка				
3,6	54,0	5,5	63,0	7,14
вяз мелколистный, 2-летка				
2,4	83,0	7,4	96,0	14,0
берёза повислая				
0,9	2,4	83,0	7,4	96,0
лиственница Сукачёва				
1,2	39,0	3,2	47,0	5,2

Таблица 2 Эколого-лесоводственные показатели сеянцев

Название почв, гранулометрический состав	Выращиваемая порода, возраст	Эколого-лесоводственные показатели		Выход стандартных сеянцев, млн шт./га
		высота, см	диаметр корневой шейки, мм	
Бурангуловский питомник, ГАУ РБ «Абзелиловский лесхоз», квартал 45, в 3 км от с. Бурангулово на северо-восток. Площадь общая 3,0 га				
Агрочернозём глинисто-иллювиальный тяжелосуглинистый	лиственница 2-лет	20,5	3,0	0,65
	ель 3-лет	21,2	3,1	1,2
Кулукасовский питомник, ГАУ РБ «Абзелиловский лесхоз», квартал 62, в 0,5 км от с. Кулукасово на юго-запад. Площадь общая 8,2 га				
Агрочернозём глинисто-иллювиальный тяжелосуглинистый	лиственница 2-лет	22,5	3,1	0,7
	берёза 2-лет	30,1	4,0	0,5
Кидрясовский питомник, ГАУ РБ «Абзелиловский лесхоз», квартал 31. Площадь 4,0 га				
Агролитозём тёмногумусовый глинистый	ель 3-лет	22,3	3,0	1,2
Темясовский питомник, ГАУ РБ «Баймакский лесхоз», квартал 51. Площадь общая 4,8 га				
Агрочернозём глинисто-иллювиальный тяжелосуглинистый	лиственница 2-лет	26,8	3,2	1,1
	берёза 2-лет			
Иткуловский питомник, ГАУ РБ «Баймакский лесхоз», квартал 8,4 км от с. Иткулово на запад. Площадь 10,0 га				
Агрочернозём глинисто-иллювиальный тяжелосуглинистый	лиственница 2-лет	31,0	3,6	1,8
	ель 3-лет	23,8	3,5	2,0
	берёза 2-лет	43,4	5,2	0,5
Сибайский питомник, ГАУ РБ «Баймакский лесхоз», 3 км от г. Сибай на северо-восток. Площадь 10,0 га				
Агрочернозём глинисто-иллювиальный тяжелосуглинистый	лиственница 2-лет	25,1	2,8	0,8
	вяз 2-лет	36,9	3,3	0,6
Крепостной питомник, ГАУ РБ «Баймакский лесхоз», квартал 7. Площадь общая 3,8 га				
Агролитозём тёмногумусовый тяжелосуглинистый	сосна 2-лет	15,5	2,9	1,8
Баймакский п-к, ГАУ РБ «Баймакский лесхоз», в 5 км от г. Баймак на юг. Площадь 10,6 га				
Агрочернозём сегрегационный (обыкновенный) глинистый	лиственница 2-лет	24,9	3,2	0,9
	клён 1–2 лет	36,8	4,3	1,2
Юлукский питомник, ГАУ РБ «Баймакский лесхоз». Площадь 3,1 га				
Аллювиальная тёмногумусная тяжелосуглинистая	берёза 2-лет	32,3	3,1	0,6
	сосна 2-лет	17,2	2,7	1,7
Самарский питомник, ГАУ РБ «Хайбуллинский лесхоз», 0,4 км от с. Самарское. Площадь 4,5 га				
Агрочернозём текстурно-карбонатный (южный) глинистый	берёза 2-лет	27,5	3,1	0,5
Ургунский питомник, ГАУ РБ «Учалинский лесхоз», квартал 46, рядом с оз. Ургун. Площадь 10,8 га				
Агрочернозём гидрометаморфизированный тяжелосуглинистый	сосна 2-лет	19,3	3,3	2,9
	лиственница 2-лет	29,5	3,5	0,82

Результаты исследования показывают, что высота сеянцев и диаметр корневой шейки в значительной степени превышают показатели, предусмотренные в ОСТах [14]. Они соответствуют параметрам укрупнённых саженцев (таблица 1). Исследования показали, что интенсивное использование почв лесных питомников вызывает ряд негативных явлений в антропогенно-преобразованном слое (пахотном): дегумификацию, ухудшение водно-физических свойств, обескальцинирование, снижение активности ферментов, подкисление или подщелачивание, и, как следствие, истощение почвы и нарушение режимов питания растений. Установлено, что сельскохозяйственное использование почв в пашне, во-первых, способствует образованию на месте различных генетических горизонтов в естественных природных условиях одного гомогенного (однородного) гумусового горизонта (пахотный) определенной мощности, что нивелирует (выравнивает) природное разнообразие почвенного покрова. Во-вторых, уничтожение естественных биоценозов и создание агросистем приводит к выравниванию свойств почв в пахотных горизонтах.

Изучение свойства почв под воздействием различных антропогенных и природных факторов проведено в мониторинговых стационарах – лесных питомниках, в которых все агротехнические приемы проводились на высоком агротехническом уровне. Эти лесные питомники функционируют на агрочернозёмах, среднесуглинистых почвах, которые являются преобладающими в условиях Башкирского Предуралья и Зауралья РБ. В современных климатических условиях в почвах лесных питомников, как и в других природных средах, происходят значительные изменения в связи с усиливающимся антропогенным воздействием. Одним из

основных показателей деградационного процесса является потеря гумуса. Во всех лесных питомниках Зауралья проводились несколько туров агрохимических исследований. Данные содержания гумуса, реакции среды $pH_{\text{сол.}}$, подвижных форм фосфора и калия, полученные путём прямого сопоставления разновременных (1965–2012 гг.) данных по фиксированным объектам – питомникам-стационарам, показали значительные изменения в пахотном слое в агрочернозёмах глинисто-иллювиальных типичных (выщелоченных) почвах под антропогенным воздействием. Динамика содержания гумуса в пахотном слое почв в трёх наиболее продуктивных питомников приведена на рисунке 2. В результате антропогенного воздействия на почву питомников выявлена динамика содержания гумуса, реакции среды ($pH_{\text{сол.}}$), подвижных форм P_2O_5 и обменного K_2O . В антропогенно-преобразованном или пахотном слое почвы Иткуловского лесного питомника в начальный период освоения содержание гумуса было наибольшее (14,3 %), в первый период произошло постепенное уменьшение – на 0,16 % в год, в последующем – 0,1 %. К четвертому периоду наблюдений происходит увеличение гумуса, а далее его доза снижается. Для гомогенного слоя почв Абзелиловского лесного питомника после освоения произошло резкое снижение гумуса на 0,58 % в год, а затем незначительное повышение – 0,03 %, в последующем значительное повышение – 0,2 % в год. В почвах Сибайского питомника, как показали исследования, произошло постепенное уменьшение содержания гумуса в пахотном слое. Динамика содержания гумуса, реакции среды ($pH_{\text{сол.}}$), подвижных форм фосфора и калия в агрочернозёмах Сибайского и Абзелиловского питомников приводится на рисунках 3 и 4.

Рисунок 2
Динамика содержания гумуса в агрочернозёмах глинисто-иллювиальных типичных

Рисунок 3
Динамика содержания гумуса, реакции среды ($pH_{\text{сол}}$), подвижных форм фосфора и калия в агрочернозёмах Сибайского питомника

Рисунок 4
Динамика содержания гумуса, реакции среды ($pH_{\text{сол}}$), подвижных форм фосфора и калия в агрочернозёмах. Абзелиловский питомник

Как видно из рисунков 3, 4, изменения реакции почвенной среды и содержания гумуса происходят медленнее, чем подвижных форм фосфора и обменного калия. Установлено, что даже при ведении хозяйства на высоком технологическом уровне тенденция уменьшения содержания гумуса в исследованных почвах сохраняется. Долговременные и усиленные технологии возделывания лесопосадочного материала приводят к деградационным процессам почв в резуль-

тате выноса плодородного мелкозёма с биомассой отчуждаемых саженцев. Следует отметить, что в Зауралье в последние годы отмечается снижение объёмов создания защитных лесных полос, овражно-балочных и других лесомелиоративных насаждений. В большинстве хозяйств, по имеющимся данным, плодородие почв уменьшается. В связи с интенсивным использованием почвенный покров изменился в сторону ухудшения, поэтому некоторые лесные питом-

ники временно не функционируют, т. е. заняты многолетними травами.

Выводы. Почвы лесных питомников достаточно благоприятны для роста и развития древесных растений. Выявленные тенденции проявления эволюционных изменений почв лесных питомников в результате антропогенных воздействий позволили разработать научно-обоснованные технологии выращивания посадочного материала, способствующего установле-

нию равновесия в агроландшафтах. Сохранение устойчивости почв и почвенного покрова достигается своевременной и качественной обработкой, внедрением травопольных севооборотов, рациональным подбором древесных пород и кустарников, внесением органических удобрений, включая нетрадиционные, внесением микоризной земли, нормированным орошением посевов при недостатке влаги.

Библиографический список

1. Баева, Л.А. Искусственные лесонасаждения в Крыму [Текст] / Л.А. Баева, Л.Я. Гаркуша // Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2009. Вып. 20. С. 134–145.
2. Горшенин, К.П. Влияние лесных посадок на химико-морфологическое строение чернозема [Текст] / К.П. Горшенин // Почвоведение. 1924. № 3-4. С. 41–48.
3. Господарская, Н.Д. Почвопреобразующее влияние широких лесополос в сухой степи [Текст] / Н.Д. Господарская, В.И. Ерусалимский // Почвоведение. 1980. № 11. С. 109–116.
4. Гурин, П.Д. Влияние лесопосадок и длительного сельскохозяйственного использования на свойства южных черноземов [Текст] / П.Д. Гурин, Б.Ф. Апарин, Е.Ю. Сухачева // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2012. Сер. 3. Вып. 2. С. 109–119.
5. Коржинский, С.И. Предварительный отчет о почвенных и геоботанических исследованиях 1886 г. в губерниях Казанской, Пермской, Вятской [Текст] / С.И. Коржинский // Тр. О-ва естествоиспытателей при Импер. Казанском ун-те. Казань, 1887. Т. 18. Вып. 6. 72 с.
6. Костенко, И.В. Влияние искусственных лесных насаждений на горно-луговые почвы Крыма [Текст] / И.В. Костенко // Почвоведение. 2018. № 5. С. 515–525.
7. Кретинин, В.М. Влияние лесомелиорации на аккумуляцию гумуса и биофильных элементов в почвах различных природных зон России [Текст] / В.М. Кретинин // Почвоведение. 2004. № 6. С. 745–751.
8. Мигунова, Е.С. О характере почвообразования под пологом широколиственных древесных насаждений в черноземной зоне [Текст] / Е.С. Мигунова // Научн. докл. высшей школы. Биологические науки. 1960. № 1. С. 177–183.
9. Мурзабулатов, Б.С. Баланс элементов минерального питания в выщелоченном черноземе при внесении удобрений в условиях Зауралья Республики Башкортостан [Текст] / Б.С. Мурзабулатов, И.С. Миннихметов // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2013. № 3 (27). С. 22–24.
10. Мурзабулатов, Б.С. Изменения агрохимических показателей пахотных почв Зауралья при длительном сельскохозяйственном использовании [Текст] / Б.С. Мурзабулатов, И.С. Миннихметов // Инновации, экобезопасность, техника и технологии в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции: материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Уфа, 2012. С. 234–236.
11. Мурзабулатов, Б.С. Оценка плодородия пахотных земель Зауралья Республики Башкортостан [Текст] / Б.С. Мурзабулатов, И.С. Миннихметов // Инновации, экобезопасность, техника и технологии в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции: материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Уфа, 2012. С. 236–237.
12. Мурзабулатов, Б.С. Плодородие выщелоченного чернозема и баланс питания при различных системах удобрений в Зауралье Республики Башкортостан [Текст] / Б.С. Мурзабулатов, И.С. Миннихметов // Научное обеспечение устойчивого развития АПК: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Уфа, 2011. С. 54–56.
13. Мустафаев, Х.М. Изменение свойств обыкновенного чернозема под лесными полосами различного возраста в межполосном пространстве [Текст] / Х.М. Мустафаев // Почвоведение. 1957. № 6. С. 102–107.
14. ОСТ 56-98-93. Отраслевой стандарт. Сеянцы и саженцы основных древесных и кустарниковых пород. Технические условия [Текст]. 39 с.
15. Стадниченко, В.Г. Почвы искусственных лесов Степной зоны Украины [Текст] / В.Г. Стадниченко // Искусственные леса Степной зоны Украины. Харьков: Харьковский гос. ун-т, 1960. С. 75–84.
16. Ткаченко, М.Е. О роли леса в почвообразовании [Текст] / М.Е. Ткаченко // Изв. Лесного ин-та. Санкт-Петербург, 1908. Вып. XVIII. С. 85–198.

17. Ткаченко, М.Е. Влияние отдельных древесных пород на почву [Текст] / М.Е. Ткаченко // Почвоведение. 1939. № 10. С. 3–16.

18. Травлеев, А.П. Лес как фактор почвообразования [Текст] / А.П. Травлеев, Н.А. Белова // Грунтознавство. 2008. Т. 9. № 3–4. С. 6–26.

19. Федоров, Б.Г. Экономико-экологические аспекты выбросов углекислого газа в атмосферу

[Текст] / Б.Г. Федоров // Проблемы прогнозирования. 2004. № 5. С. 86–100.

20. Хакимов, Ф.И. Изменение свойств серых лесных почв под насаждениями лиственницы [Текст] / Ф.И. Хакимов, М.П. Волокитин, Н.П. Сыроижко // Почвоведение. 2005. № 6. С. 653–663.

Сведения об авторах

1. **Мурзабулатов Булат Салаватович**, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры кадастра недвижимости и геодезии, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 299-91-23, e-mail: bulatmurza@bk.ru.

2. **Миннихметов Ирек Сарварович**, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры кадастра недвижимости и геодезии, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 228-08-71, e-mail: irek1109@mail.ru.

3. **Лыкасов Олег Николаевич**, ассистент кафедры кадастра недвижимости и геодезии, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: onlyc0soft@mail.ru.

Сеянцы и саженцы древесных растений, плодово-ягодных и декоративных кустарников, выращенные в оптимальных условиях питания, смогут создавать такую пространственно-функциональную архитектуру в экосистеме, которая предупреждала бы возникновение нарушенных

свойств почв. Полученные результаты необходимы для моделирования антропогенно-преобразованных земель, а также для создания агролесоландшафтов для комфортного отдыха и проживания людей.

B. Murzabulatov, I. Minniakhmetov, O. Lykasov

MONITORING OF FOREST SOIL PROPERTIES OF FOREST NURSERIES OF THE TRANS-URALS OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Key words: *soil; soil degradation; soil fertility; forest nursery; agrolandscape.*

Authors' personal details

1. **Murzabulatov Bulat**, Candidate of Agricultural Sciences, associate professor of the Chair of Real Estate Cadastre and Geodesy, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Ocyabrya str., 34, phone: +7 (347) 299-91-23, e-mail: bulatmurza@bk.ru.

2. **Minniakhmetov Irek**, Candidate of Agricultural Sciences, associate professor of the Chair of Real Estate Cadastre and Geodesy, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Ocyabrya str., 34, phone: +7 (347) 228-08-71, e-mail: irek1109@mail.ru.

3. **Lukashov Oleg**, assistant of the Chair of Real Estate Cadastre and Geodesy, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Ocyabrya str., 34, e-mail: onlyc0soft@mail.ru.

Seedlings and young trees of woody plants, fruit and ornamental shrubs grown in optimal conditions of nutrition will be able to create such a spatial and functional architecture in the ecosystem, which would prevent the occurrence of disturbed soil

properties. They are also necessary for modeling anthropogenically transformed lands, as well as for creating agro-forest landscapes for comfortable rest and accomodation of people.

© Мурзабулатов Б.С., Миннихметов И.С., Лыкасов О.Н.

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ФОРМ МЕДИ И МАРГАНЦА В ПАХОТНЫХ ПОЧВАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ключевые слова: микроэлементы; подвижные формы; медь; марганец; серые лесные почвы; пахотные почвы.

Введение. Успешное возделывание сельскохозяйственных культур, в том числе кормового назначения, во многом зависит от агрохимического состояния почвы. Содержание питательных веществ в доступной для растений форме дает представление об эффективном плодородии почв. По количеству подвижных соединений микроэлементов можно судить об обеспеченности ими растений.

На содержание микроэлементов в почвах оказывают существенное влияние направленность процессов почвообразования и их концентрация в материнской породе. При почвообразовании определяющее значение имеют биогенная аккумуляция и миграция элементов. Также значительную роль играет хозяйственная деятельность человека. Известно, что длительное применение минеральных удобрений приводит к изменению кислотно-основных свойств почв и содержания органического вещества [5]. Увеличение кислотности почвы может способствовать усилению подвижности микроэлементов и доступности их растениям [8]. Имеются исследования о влиянии механической обработки почвы на обеспеченность растений микроэлементами [15].

Проведена оценка микроэлементного состава пахотных почв АО «Агрохолдинг «Томский» (Томский район) и его подразделения ООО «АПК «Первомайское» (Первомайский район). По данным на 2018 год площадь пахотных земель составила 11612 га (70 % пашни в Первомайском, 30 % – в Томском районе), возделывают зерновые, зернобобовые и кормовые культуры [18].

Первомайский район расположен в северо-восточной части, Томский район – в юго-восточной части Томской области.

Климат данной местности характеризуется как резко континентальный, с теплым летом и холодной зимой, равномерным увлажнением, довольно резкими изменениями элементов погоды в сравнительно короткий промежуток времени. Сумма температур за период с температурами выше 10° составляет 1763°. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 114 дней. Среднегодовое количество

осадков 535 мм, они выпадают неравномерно, периодами. Снежный покров появляется в октябре и сохраняется до начала мая. Средняя высота снежного покрова в поле достигает 57 см [6].

Почвенный покров составляют серые лесные и темно-серые лесные почвы средне- и тяжелосуглинистого гранулометрического состава. На территории ООО «АПК «Первомайское» встречаются светло-серые лесные почвы.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является оценка содержания подвижных форм микроэлементов (меди и марганца) в пахотных почвах Первомайского и Томского районов Томской области.

Задачи:

1. Проанализировать результаты агрохимического обследования почв.
2. Выявить особенности распределения подвижных форм меди и марганца в почвах сельскохозяйственных угодий.
3. Оценить обеспеченность пахотных почв данными микроэлементами.

Условия, материалы и методы исследования. Объектами исследования являются почвы пашни АО «Агрохолдинг «Томский» (Томский район) и его подразделения ООО «АПК «Первомайское» (Первомайский район) Томской области.

В ходе исследований были обобщены результаты агрохимического обследования почв, проведенного сотрудниками Станции агрохимической службы «Томская». Почвенные образцы отбирали тростевым буром с использованием «Методических указаний по проведению комплексного агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий» [12], ГОСТ 28168-89 Почвы. Отбор проб [1]. Содержание подвижных соединений меди и марганца определяли по методу Пейве и Ринькиса в модификации ЦИНАО [3, 2].

Статистическая обработка данных проведена с использованием офисного программного комплекса «Microsoft Office» в программе «Excel» («Microsoft», США).

Результаты исследования. Для полной оценки микроэлементного состава почв пашни

необходимо учитывать агрохимические свойства данных почв (таблица 1).

Почвы ООО «АПК «Первомайское» характеризуются высоким содержанием гумуса, слабокислой реакцией почвенного раствора, низким содержанием нитратного азота, высокой обеспеченностью подвижным фосфором и обменным калием.

Также обнаружена значительная вариабельность накопления нитратной формы азота и обменного калия. Вероятно, это обстоятельство объясняется высокой подвижностью данных форм элементов питания и способностью легко переходить в почвенный раствор, что привело к неравномерному их распределению на полях хозяйства.

Почвы АО «Агрохолдинг «Томский» относятся к средне- и сильногумусированным, обладают слабокислой реакцией почвенного раствора, высокой обеспеченностью подвижным фосфором, характеризуются повышенным содержанием обменного калия и низким содержанием нитратного азота.

При оценке содержания подвижных форм меди и марганца в почвах (таблица 2) обнаружены схожие средние значения их накопления, но различные пределы варьирования. В почвах ООО «АПК «Первомайское» выявлено максимальное значение коэффициента вариации в распределении марганца, что может свидетельствовать о высокой его подвижности.

Таблица 1 Вариационно-статистические показатели агрохимического состояния пахотных почв

Показатель	n	Среднее	Пределы варьирования	Ошибка среднего	Стандартное отклонение	Коэффициент вариации, %
ООО «АПК «Первомайское»						
Гумус, %	51	5,18	1,75–10,0	0,28	1,99	38
pH	259	5,25	4,4–7,2	0,02	0,39	7
Гидролитическая кислотность (Нг), мг/экв на 100 г почвы	51	3,96	0,5–6,5	0,17	1,21	31
NO ₃ , мг/кг	51	5,7	1,7–24,6	0,66	4,68	82
P ₂ O ₅ , мг/кг	259	201,40	87–500	3,33	53,62	27
K ₂ O, мг/кг	259	121,68	16–1155	5,88	94,60	78
АО «Агрохолдинг «Томский»						
Гумус, %	25	5,0	2,8–12,9	0,42	2,13	42
pH	117	5,5	4,0–7,0	0,04	0,47	9
Гидролитическая кислотность (Нг), мг/экв на 100 г почвы	24	2,28	0,4–3,7	0,18	0,86	38
NO ₃ , мг/кг	9	5,92	3,9–10,2	0,77	2,29	39
P ₂ O ₅ , мг/кг	123	180,72	70–660	6,60	73,23	41
K ₂ O, мг/кг	123	115	43–312	5,01	55,54	48

Таблица 2 Вариационно-статистические показатели содержания микроэлементов в пахотных почвах

Показатель	n	Среднее	Пределы варьирования	Ошибка среднего	Стандартное отклонение	Коэффициент вариации, %
Почвы ООО «АПК «Первомайское»						
Cu, мг/кг	48	6,48	4,2–9,7	0,16	1,11	17
Mn, мг/кг	48	23,63	9–81	1,90	13,15	56
Почвы АО «Агрохолдинг «Томский»						
Cu, мг/кг	24	6,79	5,6–8,2	0,14	0,69	10
Mn, мг/кг	24	23,25	18–37	0,83	4,09	18

При проведении корреляционного анализа в почвах ООО «АПК «Первомайское» выявлена заметная зависимость распределения подвижных форм марганца от величины pH ($r = 0,57$).

Подобная закономерность обнаружена рядом авторов в почвах южной части Средней Сибири [13], которые указывают также на зависимость количества данного элемента от окислительно-восстановительного потенциала, валового содержания, гранулометрического состава, условий увлажнения и биологических особенностей сельскохозяйственных культур.

В почвах АО «Агрохолдинг «Томский» нами выявлена заметная корреляционная зави-

симость распределения подвижных форм марганца от величины pH ($r = 0,64$) и обратная связь с гидролитической кислотностью ($r = -0,69$).

Многие авторы отмечают существенное влияние величины pH на распределение подвижных форм меди ($r = -0,71$ – $0,69$) [4, 5]. В наших исследованиях такой зависимости не обнаружено, однако выявлено наибольшее накопление данного элемента в темно-серых и светло-серых лесных почвах по сравнению с серыми почвами.

При оценке содержания микроэлементов по подтипам почв (таблица 3) было установлено, что в светло-серой лесной почве ООО «АПК

«Первомайское» содержание марганца в 2 раза ниже по сравнению с другими подтипами, что

может свидетельствовать о преимущественно биогенном накоплении данного элемента.

Таблица 3 Содержание подвижных форм меди и марганца в подтипах серых лесных почв

Подтип почвы	ООО «АПК «Первомайское»		АО «Агрохолдинг «Томский»	
	Сu, мг/кг	Mn, мг/кг	Сu, мг/кг	Mn, мг/кг
Светло-серая лесная	6,60	12	–	–
Серая лесная	6,45	24,13	6,8	22,75
Темно-серая лесная	6,55	23,33	6,83	25,75

Обеспеченность почв микроэлементами оказывает существенное влияние на формирование урожая и его качественные показатели. При низком уровне их содержания в почве дополнительное внесение микроэлементов повышает урожай зерновых на 10–20 %. При определенных усло-

виях данные элементы могут оказаться лимитирующим фактором в формировании урожая.

Распределение площадей пашни по обеспеченности подвижными формами микроэлементов в рассматриваемых хозяйствах представлено в таблицах 4 и 5.

Таблица 4 Группировка почв сельскохозяйственных угодий ООО «АПК «Первомайское» Первомайского района по содержанию подвижных форм микроэлементов

№ п/п	Площадь поля, га	Площадь по содержанию (мг/кг) подвижных форм меди, га			Средневзвешенное значение, мг/кг	Площадь по содержанию (мг/кг) подвижных форм марганца, га			Средневзвешенное значение, мг/кг
		низкое	среднее	высокое		низкое	среднее	высокое	
		< 1,5	1,6–3,3	> 3,3		< 30	31–70	> 70	
1	20	–	–	20	6,6	20	–	–	12
2	18,9	–	–	18,9	4,2	18,9	–	–	13
3	20,1	–	–	20,1	6,2	20,1	–	–	15
4	20,1	–	–	20,1	6,4	20,1	–	–	12
5	19,48	–	–	19,48	5,9	19,48	–	–	11
6	20,3	–	–	20,3	6,6	20,3	–	–	9
7	22,47	–	–	22,47	6,7	22,47	–	–	14
8	40	–	–	40	5,9	40	–	–	23
9	20,09	–	–	20,09	6,6	20,09	–	–	14
10	39,91	–	–	39,91	5,6	39,91	–	–	13
11	18,93	–	–	18,93	8,1	18,93	–	–	16
12	20	–	–	20	7,1	20	–	–	18
13	30,89	–	–	30,89	7,1	30,89	–	–	14
14	51,91	–	–	51,91	7,0	51,91	–	–	20
15	18,2	–	–	18,2	7,2	18,2	–	–	19
16	38,37	–	–	38,37	5,8	38,37	–	–	16
17	20	–	–	20	7,7	20	–	–	23
18	36,35	–	–	36,35	6,3	36,35	–	–	29
19	19,92	–	–	19,92	7,7	–	19,92	–	35
20	20,2	–	–	20,2	5,3	20,2	–	–	27
21	61,08	–	–	61,08	5,8	20	41,08	–	35
22	12,89	–	–	12,89	5,7	12,89	–	–	17
23	20	–	–	20	6,9	20	–	–	20
24	20,79	–	–	20,79	4,8	20,79	–	–	18
25	19,98	–	–	19,98	6,2	–	19,98	–	37
26	19,9	–	–	19,9	5,9	19,9	–	–	20
27	24,93	–	–	24,93	6,1	24,93	–	–	19
28	50,42	–	–	50,42	6,4	–	30,42	20	59
29	42,65	–	–	42,65	6,1	42,65	–	–	21
30	29,27	–	–	29,27	7,5	–	29,27	–	43
31	19,5	–	–	19,5	7,4	19,5	–	–	23
32	21,2	–	–	21,2	6,9	21,2	–	–	18
33	20,18	–	–	20,18	9,7	20,18	–	–	28
34	29,44	–	–	29,44	9,6	–	29,44	–	43
35	20,22	–	–	20,22	6,3	–	20,22	–	32
36	22,38	–	–	22,38	5,1	22,38	–	–	20
Итого	950,95	–	–	950,95	6,5 ± 0,16	740,62	190,33	20	23,6 ± 1,90

Было установлено, что все пахотные почвы ООО «АПК «Первомайское» характеризуются высоким содержанием подвижной меди и преобладающая часть почв – низким содержанием подвижного марганца.

Подобная тенденция наблюдается и в почвах АО «Агрохолдинг «Томский».

Высокое содержание подвижной меди характерно для пахотного слоя серых лесных почв Чувашской Республики [14]. Серые лесные почвы Западной Сибири обладают высокой и средней степенью обеспеченности подвижными формами меди [9].

Известно, что избыток меди в почве может вызывать хлороз и поражение корневой системы. Кроме того, это часто приводит к недостаточному питанию растений железом [17]. Высокие концентрации меди проявляют токсичное действие на растения. Это может привести к замедлению развития растения, появлению бурых пятен на нижних листьях и их отмиранию.

Имеются данные, что подвижные соединения меди концентрируются в прикорневой зоне растений больше, чем в остальной массе почвы, причем наиболее интенсивное накопление характерно для периода цветения растений [11].

Таблица 5 Группировка почв сельскохозяйственных угодий АО «Агрохолдинг «Томский» Томского района по содержанию подвижных форм микроэлементов

№ п/п	Площадь поля, га	Площадь по содержанию (мг/кг) подвижных форм меди, га			Средневзвешенное значение, мг/кг	Площадь по содержанию (мг/кг) подвижных форм марганца, га			Средневзвешенное значение, мг/кг
		низкое	среднее	высокое		низкое	среднее	высокое	
		< 1,5	1,6–3,3	> 3,3		< 30	31–70	> 70	
1	20,1	–	–	20,1	6,7	20,1	–	–	23
2	17,4	–	–	17,4	6,7	17,4	–	–	21
3	31,8	–	–	31,8	6,9	31,8	–	–	26
4	22,3	–	–	22,3	6,9	22,3	–	–	21
5	36,2	–	–	36,2	6,9	36,2	–	–	27
6	20	–	–	20	7	20	–	–	23
7	20,1	–	–	20,1	6,8	20,1	–	–	21
8	23,1	–	–	23,1	6,4	23,1	–	–	21
9	40	–	–	40	7,1	20	20	–	31
10	40,4	–	–	40,4	6,5	40,4	–	–	22
11	33,3	–	–	33,3	6,3	33,3	–	–	21
12	64,8	–	–	64,8	6,3	64,8	–	–	22
13	27,3	–	–	27,3	6	27,3	–	–	22
14	19,5	–	–	19,5	7,5	19,5	–	–	18
15	40	–	–	40	7,7	40	–	–	26
16	20	–	–	20	7,6	20	–	–	21
Итого	476,3	–	–	476,3	6,8 ± 0,14	456,3	20	–	23,2 ± 0,83

Роль отдельных факторов в содержании и распределении подвижных форм меди разными авторами трактуется по-разному. Одни отводят определяющую роль наличию тонкодисперсной фракции [7], другие отмечают тесную положительную связь с количеством гумуса [16]. Рядом авторов установлена отрицательная корреляция с подвижными формами фосфора ($r = -0,51$) [19].

Высокая степень обеспеченности почв подвижной формой меди может быть связана с дополнительным ее поступлением с органическими удобрениями и средствами химизации земледелия.

В то же время имеются данные, что систематическое применение органических и минеральных удобрений провоцирует снижение подвижности микроэлементов. Так, повышенные дозы NPK и одновременное применение извести понижают количество подвижного марганца [10].

Низкое содержание подвижного марганца, обнаруженное в исследуемых почвах, можно

объяснить рыхлым состоянием пахотных горизонтов, поскольку усиление аэрации почвы при ее рыхлении способствует уменьшению количества данного элемента, либо недостаточным увлажнением почв, поскольку в засушливые годы обычно возникает потребность в нем.

В почвах Новосибирской области дефицит марганца обнаружен в легких по гранулометрическому составу почвах, при нейтральной и щелочной реакции почвенного раствора и повышенной концентрации в них кальция [9].

Выводы. Оценка содержания подвижных форм меди и марганца в пахотных почвах АО «Агрохолдинг «Томский» Томского района и его подразделения ООО «АПК «Первомайское» Первомайского района Томской области показала схожие средние значения их накопления, но разные пределы варьирования. Обнаружена заметная зависимость распределения подвижного марганца от величины pH, а в почвах Томского района – также обратная зависимость от гидролитической кислотности.

Распределение микроэлементов по подтипам почв показало снижение содержания марганца в 2 раза в светло-серых лесных почвах Первомайского района по сравнению с серыми и темно-серыми лесными почвами.

При анализе степени обеспеченности микроэлементами выявлено, что пахотные почвы рас-

считываемых хозяйств характеризуются высоким содержанием подвижной меди и низким содержанием подвижного марганца. Для восполнения недостатка марганца можно порекомендовать применение микроудобрений или препаратов, имеющих в своем составе микроэлементы.

Библиографический список

1. ГОСТ 28168-89 Почвы. Отбор проб. Введ. 1990-04-01 [Электронный ресурс]. М.: Стандартиформ, 2008. 6 с. Режим доступа: <https://internet-law.ru/gosts/gost/38689/> (дата обращения 04.10.2019).
2. ГОСТ Р 50682-94 Почвы. Определение подвижных соединений марганца по методу Пейве и Ринькиса в модификации ЦИНАО. Введ. 30-06-1995. [Электронный ресурс]. М.: Госстандарт России, 1994. 12 с. Режим доступа: <https://internet-law.ru/gosts/gost/38355/> (дата обращения 25.10.2019).
3. ГОСТ Р 50684-94 Почвы. Определение подвижных соединений меди по методу Пейве и Ринькиса в модификации ЦИНАО. Введ. 23-06-1994. [Электронный ресурс]. М.: Госстандарт России, 1994. 10 с. Режим доступа: http://www.infosait.ru/Pages_gost/18938.htm (дата обращения 25.10.2019).
4. Азаренко, Ю.А. Особенности биогеохимии микроэлементов (Mn, Cu, Zn, Co, Mo, B) в ландшафтах Омского Прииртышья [Текст] / Ю.А. Азаренко // Биогеохимия химических элементов и соединений в природных средах: материалы Международной школы-семинара молодых исследователей. Тюмень, 2014. С. 142–147.
5. Дильмухаметова, И.К. Фракционное распределение соединений меди и цинка в дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве при длительном применении минеральных удобрений и известковании [Текст] / И.К. Дильмухаметова, Л.К. Назарова, В.А. Романенков, Н.А. Кирпичников // Агрохимия. 2019. № 4. С. 39–45.
6. Евсеева, Н.С. География Томской области (природные условия и ресурсы) [Текст] / Н.С. Евсеева. Томск: Томский ун-т, 2001. 223 с.
7. Ильин, В.Б. Биогеохимия и агрохимия микроэлементов (Mn, Cu, Mo, B) в южной части Западной Сибири [Текст] / В.Б. Ильин. Новосибирск: Наука, 1973. С. 89–258.
8. Ильин, В.Б. Тяжелые металлы в системе почва – растение [Текст] / В.Б. Ильин. Новосибирск: Наука, 1991. 150 с.
9. Ильин, В.Б. Микроэлементы и тяжелые металлы в почвах и растениях Новосибирской области [Текст] / В.Б. Ильин, А.И. Сысо. Новосибирск: СО РАН, 2001. 229 с.
10. Клышевская, С.В. Изменение содержания микроэлементов в почвах при агромелиорации [Текст] / С.В. Клышевская // Вестник КрасГАУ. 2010. № 10. С. 45–48.
11. Кожевникова, Н.М. Содержание и распределение подвижных форм меди и цинка в микроразонах прикорневого слоя почвы пастбищного ценоза в техногенных ландшафтах Джидинского вольфрамо-молибденового комбината [Текст] / Н.М. Кожевникова, А.И. Куликов // Вестник Бурятской Государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. Улан-Удэ, 2010. 1 (18). С. 90–95.
12. Методические указания по проведению комплексного агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий [Текст]. М.: Центр научно-технической информации, пропаганды и рекламы, 1994. 96 с.
13. Побилат, А.Е. Марганец в почвах и растениях южной части Средней Сибири [Текст] / А.Е. Побилат, Е.И. Волошин // Микроэлементы в медицине. 2017. № 18 (2). С. 43–47. DOI: 10.19112/2413-6174-2017-18-2-43-47.
14. Смирнова, А.Н. Содержание микроэлементов в серых лесных почвах Чувашской Республики [Текст] / А.Н. Смирнова, О.А. Васильев // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2012. № 3. С. 11–14.
15. Смуров, С.И. Влияние способов основной обработки почвы на содержание микроэлементов [Текст] / С.И. Смуров, Г.С. Агафонов, О.В. Григоров, Н.В. Шелухина // Достижения науки и техники АПК. 2014. № 5. С. 5–7.
16. Сысо, А.И. Закономерности распределения химических элементов в почвообразующих породах и почвах Западной Сибири [Текст] / А.И. Сысо. Новосибирск: СО РАН, 2007. С. 158–235.
17. Туев, Н.А. Микробиологические процессы гумусообразования [Текст] / Н.А. Туев. М.: Агропромиздат, 1989. 239 с.
18. Акционерное общество «Агрохолдинг «Томский» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://agrotom.ru/agrotom_plant (дата обращения 19.10.2019).
19. Vlček Vítězslav, Pohanka Miroslav. 2018. Adsorption Of Copper in Soil and its Dependence on Physical and Chemical Properties. Acta Univer-

Сведения об авторах

1. **Николаева Наталия Юрьевна**, кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой агрономии, технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции Томского сельскохозяйственного института-филиала ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, 634050, г. Томск, ул. К. Маркса, 19, тел. +7 (3822) 53-23-61, e-mail: agrocafedra@mail.ru.

2. **Тагиров Хамит Харисович**, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой технологии мясных, молочных продуктов и химии, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 248-28-70, e-mail: tagirov-57@mail.ru.

В статье представлен анализ содержания подвижных форм меди и марганца в почвах сельскохозяйственных угодий АО «Агрохолдинг «Томский» (Томский район) и ООО «АПК «Первомайское» (Первомайский район), расположенных в юго-восточной и северо-восточной части Томской области соответственно. Почвенный покров составляют серые лесные и темно-серые лесные почвы средне- и тяжелосуглинистого гранулометрического состава. На территории ООО «АПК «Первомайское» встречаются светло-серые лесные почвы. В ходе исследований установлено, что среднее содержание данных элементов существенно не различается (количество подвижной меди 6,48–6,79 мг/кг, подвижного марганца 23,25–23,63 мг/кг), однако в почвах Первомайского района обнаружена значительная вариабельность в распределении марганца. При проведении статистической обработки данных выявлена заметная корреляционная зависимость

накопления подвижного марганца от величины pH, а в почвах Томского района – также обратная зависимость от гидролитической кислотности. Распределение микроэлементов по подтипам почв показало снижение содержания марганца в 2 раза в менее гумусированных светло-серых лесных почвах Первомайского района по сравнению с серыми и темно-серыми лесными почвами. При группировке почв сельскохозяйственных угодий по содержанию подвижных форм микроэлементов было установлено, что почвы рассматриваемых хозяйств характеризуются высокой обеспеченностью подвижной медью и низкой – подвижным марганцем. Избыток меди может быть связан с дополнительным ее поступлением с органическими удобрениями и средствами химизации земледелия. Для восполнения недостатка марганца можно порекомендовать применение микроудобрений или препаратов, имеющих в своем составе микроэлементы.

N. Nikolaeva, Kh. Tagirov

ANALYSIS OF THE CONTENT OF COPPER AND MANGANESE MOBILE FORMS IN ARABLE SOILS OF TOMSK REGION

Key words: *microelements; mobile forms; copper; manganese; gray forest soils; arable soils.*

Authors' personal details

1. **Nikolaeva Natalia**, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Agronomy, Production Technology and Processing of Agricultural Products of Tomsk Agricultural Institute-Branch of Novosibirsk State Agrarian University, 634050, Tomsk, K. Marx St., 19, phone: +7 (3822) 53-23-61, e-mail: agrocafedra@mail.ru.

2. **Tagirov Khamit**, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Head of the Department of Technology of Meat, Dairy Products and Chemistry, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, phone: +7 (347) 248-28-70, e-mail: tagirov-57@mail.ru.

The article presents an analysis of the copper and manganese mobile forms in agricultural soils of Tomsk Agroholding JSC (Tomsk Region) and Pervomayskoye Agricultural Complex LLC (Pervomaysky District) located in the southeastern and

northeastern parts of Tomsk Oblast, respectively. The soil cover is gray forest and dark gray forest soils of medium and heavy loam granulometric composition. Light gray forest soils are found on the territory of LLC «Agricultural Complex «Pervo-

maiskoye». The studies found that the average content of these elements does not differ critically (the amount of mobile copper is 6,48–6,79 mg/kg, mobile manganese is 23,25–23,63 mg/kg), but significant variability was found in the soils of Pervomaisky district in the distribution of manganese. The statistical processing of the data revealed a noticeable correlation between the accumulation of mobile manganese and the pH value, an inverse dependence on hydrolytic acidity was established in the soils of Tomsk region. The distribution of trace elements among soil subtypes showed a 2-fold decrease in manganese content in less humous light

gray forest soils of Pervomaisky region compared with gray and dark gray forest soils. When grouping the soils of agricultural lands according to the content of mobile forms of microelements, it was found that the soils of the considered farms were characterised by a *средствами химизации* of mobile copper and a low content of mobile manganese. The excess copper may be associated with its additional introduction to the soil together with organic fertilizers and chemicals. To compensate for the deficiency of manganese, application of micronutrient fertilizers or preparations containing micronutrients can be recommended.

© Николаева Н.Ю., Тагиров Х.Х.

ГРНТИ 20.23.15

УДК 025.48[537:621.315.592]

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-33-39

Д.О. Обозова, С.Н. Косников

ФУНГИЦИДЫ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И ИХ ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

Ключевые слова: *фунгициды; средство защиты; сельскохозяйственные культуры; эффективность; интегральная оценка.*

Введение. Россия является одним из крупнейших экспортеров зерновых культур в мире. По прогнозам, на конец 2019 г. всего по России будет обмолочено около 123 млн т зерна с площади 45,1 млн га зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы – 77,9 млн т зерна при урожайности 28,3 ц/га. Благодаря таким результатам Россия продолжает занимать лидирующие позиции по экспорту зерна среди других крупнейших стран-экспортеров. Главным фактором, способствовавшим выходу России на первое место, является рекордный уровень урожайности пшеницы на юге страны, в том числе Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край. Российскую пшеницу покупают более 130 стран, крупнейшими потребителями являются Египет, Турция, Иран и Саудовская Аравия [1, 2]. Это говорит о том, что собранный урожай пшеницы является важнейшим фактором, определяющим общую ситуацию на мировом рынке: спрос, цены, объемы экспорта. В исторической перспективе за последние 55 лет сбор урожая пшеницы в мире вырос в 3 раза. Причем этот рост был обеспечен, прежде всего, ростом урожайности [3]. Наряду с экспортом пшеницы Россия находится в топ-10 стран-экспортеров ячменя. Эта культура имеет как продовольственное, так и промышленное значение [4, 5]. Ключевым потре-

бителем российского ячменя является Саудовская Аравия, в больших объемах ячмень отправляется в Иран, Иорданию, Турцию, Алжир, Израиль, Ливию, Азербайджан, Кипр, Кувейт и ряд других стран [6]. Немаловажным фактором, влияющим на валовой сбор зерна, является размер посевной площади, а также качество почвы и погодные условия [7]. Ростовская область лидирует по размеру посевных площадей пшеницы в России и занимает 9,6 % всех площадей, тогда как в Краснодарском крае это значение составляет 5,4 %, по данным Росстата (рисунок 1). На рисунке 2 приводится урожайность пшеницы по регионам России. Лидирующее место занимает Краснодарский край. Стоит учесть, что Курская область, занимающая второе место, отстаёт от Краснодарского края на 17 ц/га, что является довольно существенной разницей. Из наиболее урожайных регионов также можно выделить Орловскую область и Ставропольский край. В конце 2019 г. в России собрано 16 789,9 тыс. т, а в рейтинге регионов по сбору ячменя Краснодарский край занимает 5 место. Как и в случае с пшеницей, Краснодарский край занимает первое место по урожайности ячменя за 2019 г., которая составляет 53,8 ц/га (рисунок 3). Второе место также занимает Курская область, где урожайность составила 39,3 ц/га.

Рисунок 1
Структура посевных площадей пшеницы в России в 2018 г., %

Рисунок 2
Урожайность пшеницы в 2019 г., ц с 1 га

Рисунок 3
Урожайность ячменя в 2019 г., ц с 1 га

Именно высокий уровень урожайности пшеницы и ячменя в Краснодарском крае является решающим фактором, который влияет на валовой сбор зерна, и в рейтинге регионов по сбору пшеницы по состоянию на начало 4 квартала 2019 г. Краснодарский край занимает второе место, собрав 8965,3 тыс. т зерна, и уступает Ростовской области на 1 тыс. т. На урожайность зерновых культур могут влиять такие факторы, как инфекционные и неинфекционные болезни, различного рода вредители, сорняки, неплодородная или плохо обработанная почва, неправильный севооборот, и другие [8]. Примерами листостебельных заболеваний и болезней колоса являются бурая листовая ржавчина, желтая ржавчина злаков, мучнистая роса, септориоз листьев. Болезни сельскохозяйственных культур довольно опасны для будущего урожая, поэтому был создан целый ряд различных средств защиты [9, 10]. Фунгициды – это вещества химического или биологического происхождения, которые подавляют развитие грибковых болезней; они воздействуют на процессы метаболизма патогена, а также стимулируют защитные механизмы в организме культурных растений [11, 12]. На рынке представлены фунгициды различных производителей, одними из самых популярных являются препараты компании АО

«Байер». Для борьбы с болезнями озимой пшеницы у компании АО «Байер» представлено 17 вариантов средств, которые различаются по видам заболеваний.

Цель исследования – поиск наиболее эффективного фунгицида обработки для борьбы с болезнями озимой пшеницы путем проведения интегральной оценки фунгицидов производителя компании АО «Байер», которые направлены против листостебельных заболеваний и болезней колоса.

Методика исследования. Оценка, проводимая на базе интегрального показателя, охватывает практически все стороны изучаемых средств защиты растений, она позволяет быстро и объективно получить представление об объектах исследования – комплексах фунгицидов, определить их слабые и сильные стороны [13, 14]. Методика интегральной оценки состоит из нескольких последовательных этапов: сбор исходной информации, стандартизация показателей, расчёт значений параметров интегрального показателя, дифференцирование интегрального показателя, ранжирование показателей интегральной оценки.

В таблице 1 представлены показатели комплексов фунгицидной обработки озимой пшеницы, по которым будет проводиться оценка.

Таблица 1 Основные показатели комплексов фунгицидов, применяемых для обработки озимой пшеницы

Показатель	Фунгицид				
	Фалькон (флаг)	Солигор (флаг) Прозаро (колос)	Солигор (кущ) Прозаро (колос)	Инпут (кущ) Прозаро (колос)	Инпут (кущ) Солигор (флаг) Прозаро (колос)
Урожайность					
Урожайность, ц/га	82,6	88,1	88,8	89,6	90,7
Прибавка	0	5,5	6,2	7	8,1
2013	56	62	62	62	66
2014	77	82	82	82	84
2015	59	64	64	64	62
2017	73	79	79	79	82
2018	83	89	89	89	91
Средняя урожайность за 2013–2018 гг.	70	75,7	75,7	75,7	77
Прибавка за 2013–2018 гг.	0	5,7	5,7	5,7	7,1
Экономическая эффективность					
Стоимость обработки, руб.	1452	5300	5300	5740	7160
Условно чистая прибыль к стандарту, руб.	0	2752	3592	4112	4012

Результаты исследования. Для обработки озимой пшеницы рассмотрено 5 комплексов фунгицидов от компании АО «Байер». Варианты обработки 2–5 являются комплексными, так как проводятся на разных этапах прорастания культур. Вариант с «Фальконом» принимается за стандарт, так как с контролем без обработок сравнения не проводятся, обработка проводится на этапе флагового листа. Урожайность пшеницы при таком варианте обработки в 2018 г. составила 82,6 ц/га, стоимость обработки

– 1452 руб. за упаковку. Вторым вариантом обработки предусматривает использование средства «Солигор» на этапе флагового листа, затем во время колошения – средства «Прозаро». При таком комплексе обработки урожайность увеличится до 88,1 ц/га, условно чистая прибыль к стандарту составит 2752 руб. Стоимость обработки – 5300 руб. Третий вариант включает в себя использование препарата «Солигор» на этапе кущения и «Прозаро» на этапе колошения. Стоимость этого варианта обработки такая же,

как у предыдущего, однако условно чистая прибыль гораздо выше – 3592 руб. Отмечается также повышение урожайности на 0,7 ц/га в сравнении с предыдущим вариантом. Четвертый комплекс: «Инпут» на этапе кушения и «Прозаро» во время колошения, стоимость обработки 5740 руб., условно чистая прибыль к стандарту 4112 руб., урожайность 89,6 ц/га. Последний вариант предусматривает трёхкратную обработку

препаратами «Инпут», «Солигор», «Прозаро» на этапах кушения, флагового листа и колошения соответственно. При таком комплексе защиты имеет место самый высокий уровень урожайности по группе – 90,7 ц/га, при этом обработка также является самой дорогой – 7160 руб. Условно чистая прибыль к стандарту составила 4012 руб., что на 100 руб. ниже предыдущего варианта.

Таблица 2 Основные характеристики фунгицидов, применяемых для обработки озимого ячменя

Показатель	Фунгицид				
	Фалькон (флаг)	Зантара (флаг)	Зантара (трубка) Прозаро (цветен)	Фалькон (кушен) Солигор (флаг)	Солигор (кушен) Зантара (флаг)
Урожайность					
Урожайность, ц/га	83,9	90,5	88,8	96,8	92,4
Прибавка	0	6,6	12,9	8,5	9
2013	62	76	76	76	76
2014	57	61	61	63	63
2015	64	70	70	74	74
2017	51	54	54	56	56
2018	84	91	91	93	93
Средняя урожайность за 2013–18 гг.	63,1	69,5	69,5	71,7	71,7
Прибавка за 2013–2018 гг.	0	6,4	6,4	8,6	8,6
Экономическая эффективность					
Стоимость обработки	1452	2560	6460	3495	4090
Условно чистая прибыль к стандарту	0	5492	7892	6457	6362

В случае с вариантами обработки ячменя озимого «Фалькон» также берётся за стандарт и проводится на этапе флагового листа, при этом урожайность составит 83,9 ц/га, а стоимость обработки – 1452 руб. Следующий вариант: «Зантара» используется на том же этапе, однако урожайность заметно больше, чем у «Фалькона», – 90,5 ц/га. Стоимость обработки составила 2560 руб., условно чистая прибыль к стандарту – 5492 руб. Остальные варианты обработки являются комплексными. Третий вариант обработки включает в себя использование препаратов «Прозаро» на этапе трубкования и «Прозаро» на этапе цветения, условно чистая прибыль к стандарту составит 7892 руб., однако урожайность в сравнении с предыдущим вариантом ниже: 88,8 ц/га, стоимость обработки – 6460 руб., что значительно выше, чем во втором варианте. Следующий комплекс состоит из средств «Фалькон», используемого на этапе кушения, а также «Солигор» на этапе флагового листа. Этот вариант значительно дешевле предыдущего: 3495 руб., урожайность выше: 96,8 ц/га, однако условно чистая прибыль составляет 6457 руб., что на 1435 руб. меньше, чем у третьего комплекса. Последний вариант обработки «Солигор» на этапе кушения и «Зантара» на этапе флагового листа предусматривает урожайность в 92,4 ц/га, условно чистую прибыль 6362 руб., стоимость обработки составит 4090 руб.

На втором этапе была проведена стандартизация показателей методом сравнения показателя с эталонным по формуле 1.

$$x = \frac{x_i}{x_{\max}}, \quad (1)$$

где x – стандартизированный (нормированный) показатель; x_i – показатель, который необходимо нормировать; $x_{\max}$ – значение показателя эталонного комплекса защиты.

Стоит учесть, что некоторые показатели имеют обратную направленность, это означает, что при снижении значения значимость показателя будет увеличиваться [15]. В нашем случае к числу таких показателей относится стоимость обработки. Для такого вида показателей было использована формула 2.

$$x = \frac{x_{\min}}{x_i}, \quad (2)$$

где $x_{\min}$ – значение показателя эталонного объекта.

На третьем этапе были рассчитаны значения параметров интегрального показателя с использованием метода аддитивной свертки. Результаты расчёта значений параметров представлены на рисунках 4 и 5.

Выводы. Интегральная оценка средств защиты озимой пшеницы показала, что наиболее эффективным вариантом является самый последний – «Инпут» (кушение), «Солигор» (флаговый лист), «Прозаро» (колошение), его интегральная оценка составила 10,15. При довольно высокой стоимости обработки в сравнении с остальными вариантами и не самым большим показателем условно чистой прибыли пятый вариант отличается высоким уровнем урожайности. Четвёртый вариант «Инпут» (кушение),

«Прозаро» (колошение) является не менее эффективным, так как при использовании данного способа обработки условно чистая прибыль к стандарту самая высокая по группе – 4112 руб.,

урожайность также находится на довольно высоком уровне – 89,6 ц/га, интегральная оценка составила 9,75.

Рисунок 4
Интегральные оценки средств защиты пшеницы озимой

Рисунок 5
Интегральные оценки средств защиты ячменя озимого

Наименьшую оценку получил самый первый вариант обработки, который брался за стандарт, его оценка составляет 7,31.

В случае с озимым ячменем наилучшим способом обработки, согласно результатам интегральной оценки, оказался предпоследний вариант «Фалькон» (кушение), «Прозаро» (флаговый лист), его оценка составила 9,89. Этот способ отличается высоким уровнем урожайности: 96,8 ц/га при стоимости обработки 3495 руб. Ближайшими к эталонному по результату интегральной оценки являются 3 и 5 комплексы, в которых оценки составили 9,71 и 9,81 соответ-

ственно. Наименее оптимальным оказался также первый вариант обработки, который принимался за контрольный, среди остальных параметров он заметно отстаёт.

Результаты исследования выявили, что наиболее значимым показателем, по которому определили результат интегральной оценки средств защиты, является показатель урожайности. Фунгициды от компании АО «Байер» являются эффективным способом борьбы с болезнями озимой пшеницы и озимого ячменя, который обеспечит наилучшую урожайность и будет удобен в соотношении цена – качество.

Библиографический список

1. Раевская, А.В. Российский экспорт зерна в современных условиях [Электронный ресурс] / А.В. Раевская, Н.А. Каширина // Вестник

ФГОУ ВПО Брянская ГСХА. 2017. № 3 (61). Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-eksport-zerna-v-sovremennyh-usloviyah>.

2. Мировой рынок пшеницы, роль и место России на этом рынке [Электронный ресурс] // Международный независимый институт аграрной политики. Режим доступа: <https://agrovesti.net/lib/industries/cereals/mirovoj-rynok-pshenitsy-rol-i-mesto-rossii-na-etom-rynke.html>.

3. Качутова, А.А. Эффективное производство зерна – основа продовольственной безопасности страны [Электронный ресурс] / А.А. Качутова // Вестник НГИЭИ. 2013. № 3 (22). Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnoe-proizvodstvo-zerna-osnova-prodovolstvennoy-bezopasnosti-strany>.

4. Агафонов, А.В. Значение производства ячменя в экономике и социальном развитии агропромышленного комплекса [Текст] / А.В. Агафонов // Вестник НГИЭИ. 2012.

5. Посевные площади, валовые сборы и урожайность ячменя в России. Итоги 2018 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ab-centre.ru/news/posevnye-ploschadi-valovye-sbory-i-urozhaynost-yachmenya-v-rossii-itogi-2018-goda>.

6. Кулеватова, Т.Б. О качестве зерна озимой пшеницы [Электронный ресурс] / Т.Б. Кулеватова, Л.В. Андреева, Д.В. Кайргалиев, Е.А. Лихолетов // Известия НВ АУК. 2014. № 4 (36). Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-kachestve-zerna-ozimoy-pshenitsy>.

7. Стамо, П.Д. Применение фунгицидов должно быть рациональным [Электронный ресурс] / П.Д. Стамо, О.В. Кузнецова // Защита и карантин растений. 2012. № 2. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-fungitsidov-dolzno-byt-ratsionalnym>.

8. Семеренко, С.А. Экология и защита растений [Электронный ресурс] / С.А. Семеренко // Масличные культуры. 2015. № 4 (164). Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekologiya-i-zaschita-rasteniy>.

9. АО «Байер» [Электронный ресурс]: официальный сайт компании. Режим доступа: <https://www.cropscience.bayer.ru>.

10. Шагеев, Д.А. Методика интегральной оценки качества и эффективности управления

дисбалансом целевых характеристик развития предприятия [Электронный ресурс] / Д.А. Шагеев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2014. № 3. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-integralnoy-otsenki-kachestva-i-effektivnosti-upravleniya-disbalansom-tselevykh-harakteristik-razvitiya-predpriyatiya>.

11. Хилевский, В.А. Фунгициды для защиты яблони от комплекса фитопатогенов [Электронный ресурс] / В.А. Хилевский // Вестник ОрелГАУ. 2015. № 5. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/fungitsidy-dlya-zaschity-yablони-ot-kompleksa-fitopatogenov>.

12. Гришечкина, Л.Д. Современные фунгициды для интегрированных систем защиты зерновых культур от комплекса фитопатогенов [Электронный ресурс] / Л.Д. Гришечкина, В.И. Долженко // Вестник ОрелГАУ. 2012. № 6. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-fungitsidy-dlya-integrirovannykh-sistem-zaschity-zernovykh-kultur-ot-kompleksa-fitopatogenov>.

13. Бутовец, Е.С. Многокритериальная оценка сортов сои на заключительном этапе селекции [Электронный ресурс] / Е.С. Бутовец // Дальневосточный аграрный вестник. 2015. № 2 (34). Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mnogokriterialnaya-otsenka-sortov-soi-na-zaklyuchitelnom-etape-selektcii>.

14. Кулеватова, Т.Б. О качестве зерна озимой пшеницы [Электронный ресурс] / Т.Б. Кулеватова, Л.В. Андреева, Д.В. Кайргалиев, Е.А. Лихолетов // Известия НВ АУК. 2014. № 4 (36). Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-kachestve-zerna-ozimoy-pshenitsy>.

15. Волкова, Л.В. Оценка сортов яровой мягкой пшеницы по урожайности и адаптивным свойствам [Электронный ресурс] / Л.В. Волкова, В.М. Гирева // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2017. № 4 (59). Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-sortov-yarovoy-myagkoy-pshenitsy-po-urozhaynosti-i-adaptivnym-svoystvam> (дата обращения: 10.12.2019).

Сведения об авторах

1. **Обозова Диана Олеговна**, обучающаяся факультета прикладной информатики, ФГБОУ «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина», г. Краснодар, ул. Калинина, 13, e-mail: obozova.99@mail.ru.

2. **Косников Сергей Николаевич**, доцент кафедры экономической кибернетики, ФГБОУ «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина», г. Краснодар, ул. Калинина, 13.

Стремительное развитие агротехнологий способствует появлению современных средств эффективной биологической и химической защиты растений. Благодаря таким средствам наблюдается заметное повышение урожайности, однако в данном случае на результат может

влиять множество факторов, например, погодные условия, качество почвы, сорта и многие другие. В статье рассматривается тема химических средств защиты культурных растений, а именно озимой пшеницы и озимого ячменя. Отмечается важность повышения урожайности

сельскохозяйственных культур как для экономики региона, так и для страны в целом. Одним из способов повышения урожайности выступает защита растений от болезней посредством использования фунгицидов. Исследования были проведены на основе результатов проекта «Бай-Арена» компании АО «Байер» для культур, произрастающих на территории Краснодарского края. В рамках данного проекта специалистами компании проводится демонстрация высокоэффективных технологий в области защиты культурных растений. Были собраны основные зна-

чения показателей в результате использования различных комплексов фунгицидной защиты, с помощью метода интегральной оценки составлена характеристика каждого способа защиты, приведены результаты интегральной оценки подобных средств на примере продукции компании АО «Байер» и составлена характеристика наиболее эффективного средства защиты для пшеницы озимой и ячменя озимого. Выявлен наиболее значимый параметр по группе, который в большей мере влияет на результат интегральной оценки.

D. Obozova, S. Kosnikov

INTEGRAL ASSESSMENT OF FUNGICIDES AS AN EFFECTIVE MEANS OF PROTECTION OF AGRICULTURAL CROPS

Key words: *fungicides; remedy; crops; efficiency; integral assessment.*

Authors' personal details

1. **Obozova Diana**, student of the Faculty of Applied Informatics, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar, Kalinina str., 13, e-mail: obozova.99@mail.ru.

2. **Kosnikov Sergey**, associate professor of the Department of Economic Cybernetics, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar, Kalinina str., 13.

The rapid development of agricultural technologies contributes to the emergence of modern means of effective biological and chemical plant protection. Thanks to such tools, a noticeable increase in productivity is observed. However, in this case, the result can be affected by many factors, for example, weather conditions, quality of soil, varieties and many others. The article discusses the topic of chemical means of protection of cultivated plants, namely winter wheat and winter barley. The importance of increasing crop yields both for the economy of the region and for the country as a whole is noted. One of the ways to increase productivity is to protect plants from diseases through the use of fungicides. The studies were conducted based on the results of

the BayAren project of Bayer JSC for crops growing in the Krasnodar Territory. Within the framework of this project, the company's specialists are demonstrating highly effective technologies used by the company in the field of crop protection. The main values of the indicators were collected as a result of using various complexes of fungicidal protection, using the integral assessment method. The characteristics of each protection method were compiled, the results of an integrated evaluation of similar products were compiled using Bayer products as an example, and the most effective protective product for winter wheat and barley was found. The most significant parameter in the group was revealed, which to a greater extent affects the result of the integral assessment.

© Обозова Д.О., Косников С.Н.

УДК 634.1/7:631.53.03

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-39-44

Л.В. Уфимцева, Н.В. Глаз

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА САЖЕНЦЕВ ГРУШИ В КОНТЕЙНЕРАХ

Ключевые слова: *почвогрунт; груша; торф; гидрогель; удобрение пролонгированного действия.*

Введение. Традиции размножения садовых растений в контейнерах уходят корнями вглубь

веков. Бурное развитие «контейнерной культуры» получило во второй половине двадцатого

столетия на фоне интенсификации садоводства, развития принципиально новых направлений в ландшафтном дизайне [1]. В настоящее время в садоводстве и зеленом благоустройстве все шире используется технология выращивания саженцев с закрытой корневой системой в малообъемных контейнерах. При этом существенно возрастает временной интервал для реализации и высадки саженцев в открытый грунт, облегчается уход, повышается количество получаемых саженцев с единицы площади, а также улучшается сохранность саженцев в период хранения и реализации [2–4]. При выращивании посадочного материала с закрытой корневой системой наряду со свойствами плодородия большую роль играет технологичность грунтов, их стерильность и свобода от семян сорных растений [5–6]. Для получения качественного посадочного материала плодово-ягодных и декоративных культур с использованием малообъемных контейнеров большое значение имеет подбор оптимального соотношения компонентов почвогрунтов, длительное время обеспечивающих растения питательными элементами, влагой и кислородом. Создание благоприятного водно-воздушного режима в условиях ограниченного объема посадочного контейнера является определяющим при выращивании саженцев с закрытой корневой системой. Для предотвращения уплотнения грунта используются такие компоненты почвенного скелета, как керамзит, вермикулит и крупный песок. В качестве влагоемкого компонента используются верховой торф малой минерализации и различные агрогели [7–8]. Важным компонентом почвогрунта является удобрение пролонгированного действия [5].

Цель исследований – совершенствование состава почвогрунта как элемента технологии производства саженцев груши при выращивании их в малообъемных контейнерах.

Условия, материалы и методы. Исследования проведены в 2016–2018 гг. в Южно-Уральском научно-исследовательском институте садоводства и картофелеводства – филиале ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН» в рамках выполнения государственного задания по теме «Теория и принципы разработки и формирования технологий возделывания экономически значимых сельскохозяйственных культур в целях конструирования высокопродуктивных агрофитоценозов и агроэкосистем». Объектом исследований служили саженцы районированного на Урале летнего сорта груши челябинской селекции – Красуля. Саженцы были получены способом зимней прививки способом «улучшенная копулировка». Гидрогель «Аквасин» был

предоставлен для опыта ООО «Сингер» в рамках договора о сотрудничестве и изучался нами в 2017 и 2018 гг.

Опыты закладывали в трехкратной повторности по 15 растений в каждом варианте. Высадка растений производилась в контейнеры из полиэтилена объемом 1 литр.

Удобрение длительного действия Basacote 6M в своем составе содержит: 16 % азота (N), 8 % фосфора (P_2O_5), 12 % калия (K_2O), 2 % магния (MgO), 5 % серы (S), а также микроэлементы в хелатной форме: бор (B) – 0,02 %, медь (Cu) – 0,05 %, железо (Fe) – 0,4 %, марганец (Mn) – 0,06 %, молибден (Mo) – 0,015 % и цинк (Zn) – 0,02 %. Данное удобрение имеет государственную сертификацию на территории Российской Федерации (свидетельство от 20.02.2013 г. № 2526) [9, 10]. Изучаемая норма внесения в почвосмесь составляла 0,5 %.

При приготовлении почвогрунта в качестве влагоемкого органического наполнителя использовался переходный торф фракции измельчения от 0 до 20 мм. Гидрогель марки «Аквасин», разработанный отечественными учеными, изучался в качестве регулятора водоудерживающей способности и для улучшения физических свойств комбинируемых почвосмесей [11].

В течение вегетационного периода и перед посадкой в соответствии с ГОСТ 27753.2-88 в почвогрунтах определялись ионометрически pH водной вытяжки, по ГОСТ 27753.6-88 определяли содержание водорастворимого калия ионометрически, фотометрически с реактивом Гетри (экстрагент этанол), содержание хлорофилла (a + b) по ГОСТ 27753.5-88, определялось содержание водорастворимого фосфора, по ГОСТ 27753.8-88 фотометрически с реактивом Несслера – содержание аммонийного азота, по ГОСТ 27753.7-88 ионометрически содержание нитратного азота, по ГОСТ Р 53135-2008 на основе биометрических показателей длины вегетативного прироста и диаметра штамба оценивалась товарность полученных саженцев [12]. Технология ухода за саженцами выполнялась по общепринятой схеме в биоклиматических условиях северной лесостепи Южного Зауралья.

Схема опыта. 1. Почва и торф переходный в соотношении 4 : 1 (базовая смесь, контроль); 2. Базовая смесь + Базакот 6 М (5 г/л); 3. Базовая смесь + Базакот 6 М (5 г/л) + Гидрогель (1 г/л); 4. Базовая смесь + Гидрогель (1 г/л); 5. Почва, перегной и торф в соотношении 2,5 : 1,5 : 1; 6. Почва, перегной и торф (в соотношении 2,5 : 1,5 : 1) + Базакот 6 М (5 г/л).

Результаты исследований и их обсуждение. Чернозем выщелоченный, используемый для приготовления почвогрунтов, характеризо-

вался следующими показателями: рН солевой вытяжки – 5,5, содержание подвижного фосфора – 56,5 мг/кг, обменного калия – 201 мг/кг, обменного аммония – 46,1 мг/кг, нитратного азота – 11,0 мг/кг почвы.

Почвогрунты в вариантах опыта характеризовались слабокислой реакцией почвенного раствора. На контроле (базовая смесь) содержание минерального азота составило 73,6 мг/кг. Добавление в состав почвогрунта гидрогеля увеличивало этот показатель незначительно (до 75,5 мг/кг), а удобрения пролонгированного действия – на 83 % (135,7 мг/кг). Наибольшее содержание водорастворимого фосфора и калия отмечалось в варианте совместного применения Базакота и гидрогеля – 34,6 и 56,7 мг/кг (контроль – 22,1 и 33,3 мг/кг соответственно).

Состав почвенной смеси оказывал существенное влияние на характер биометрических показателей развития и фотосинтетической активности листового аппарата саженцев груши (таблица 1).

Введение перегноя в состав почвогрунта в 2016 г. не обеспечило повышение качества посадочного материала, в связи с этим в последующие годы исследований данный компонент не испытывался. Оптимальным для выращивания саженцев груши с закрытой корневой системой оказался вариант почвогрунта почва + торф

(4 : 1) + Базакот (5 г/л). В среднем за 3 года исследований внесение удобрения пролонгированного действия увеличивало длину вегетативного прироста саженцев груши на 36,4 %, площадь листьев – на 51,1 %, диаметра штамба – на 52,2 % по сравнению с контролем. Сбалансированный комплекс элементов питания обеспечил повышение концентрации хлорофилла (a + b) в листьях в среднем на 21,4 %. Исследования показали, что введение в состав почвосмеси гидрогеля не имело положительного эффекта по сравнению с оптимальным вариантом (почва + торф в соотношении 4 : 1 + Базакот, 5 г/л). По нашему мнению, использование гидрогеля для улучшения влагоемкости оправдано только в случае выраженной периодичности полива. Тогда как в условиях стабильной влагообеспеченности в течение вегетационного периода применение гидрогеля нецелесообразно.

В таблице 2 приведено распределение саженцев груши по высоте в условиях 2018 году. В 2017 г., а также в 2016 г. по первому и второму вариантам характер распределения саженцев был аналогичным.

Рентабельность производства посадочного материала определяется выходом саженцев первого и второго товарных сортов в течение вегетационного периода (таблица 3).

Таблица 1 Развитие саженцев груши на различных составах почвосмесей в малообъемных контейнерах

Вариант опыта	Площадь листьев, см ²	Длина прироста, см	Диаметр штамба, мм	Содержание хлорофилла в листьях, %
2016 г.				
Почва + торф (4 : 1)	13,24	44,0	4,0	1,53
Почва + торф (4 : 1) + Базакот (5 г/л)	28,33	66,6	5,4	1,65
Почва + торф + перегной (2,5 : 1,5 : 1)	16,9	48,8	5,0	1,62
Почва + торф + перегной (2,5 : 1,5 : 1) + Базакот (5 г/л)	22,9	63,5	6,3	1,60
НСР ₀₅	5,15	4,6	0,4	0,02
2017 г.				
Почва + торф (4 : 1)	27,78	63,0	5,1	1,74
Почва + торф (4 : 1) + Базакот (5 г/л)	34,52	90,0	8,1	2,16
Почва + торф (4 : 1) + Гидрогель (1 г/л)	34,03	90,0	8,1	1,90
Почва + торф (4 : 1) + Базакот (5 г/л) + Гидрогель (1 г/л)	35,71	81,0	7,2	2,19
НСР ₀₅	4,78	7,2	0,5	0,05
2018 г.				
Почва + торф (4 : 1)	27,4	76,3	4,7	1,69
Почва + торф (4 : 1) + Базакот (5 г/л)	40,5	93,5	7,5	2,21
Почва + торф (4 : 1) + Гидрогель (1 г/л)	34,5	85,0	7,7	1,85
Почва + торф (4 : 1) + Базакот (5 г/л) + Гидрогель (1 г/л)	38,9	75,8	4,6	2,11
НСР ₀₅	2,8	7,9	0,47	0,16

Таблица 2 Распределение саженцев с закрытой корневой системой по вегетативному приросту, % (2018 г.)

Вариант опыта	Длина вегетативного прироста, см				
	0–19	20–39	40–59	60–79	≥ 80
Почва + торф (4 : 1)	6,4	29,8	42,5	17,0	4,3
Почва + торф (4 : 1) + Базакот (5 г/л)	4,6	25,6	16,3	39,5	14,0
Почва + торф (4 : 1) + Гидрогель (1 г/л)	4,6	23,2	27,9	23,2	21,1
Почва + торф (4 : 1) + Базакот (5 г/л) + Гидрогель (1 г/л)	10,5	38,5	26,0	21,0	4,0

Таблица 3 Выход стандартных саженцев груши, %

Вариант опыта	Доля саженцев 1 и 2 товарных сортов, %			
	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Среднее
Почва + торф (4 : 1)	7,8	23,3	21,3	17,5
Почва + торф (4 : 1) + Базакот (5 г/л)	48,5	66,8	53,5	56,3
Почва + торф (4 : 1) + Гидрогель (1 г/л)	–	44,8	44,3	44,6
Почва + торф (4 : 1) + Базакот (5 г/л) + Гидрогель (1 г/л)	–	72,7	25,0	48,9
Почва + торф + перегной (2,5 : 1,5 : 1)	3,0	–	–	3,0
Почва + торф + перегной (2,5 : 1,5 : 1) + Базакот (5 г/л)	35,3	–	–	35,3

Примечание. Варианты с перегноем в 2017 и 2018 гг., а с гидрогелем в 2016 г. не изучались.

В варианте использования почвосмеси с добавлением удобрения Базакот отмечено повышение товарности (то есть пригодности саженцев к реализации в первый год выращивания) в среднем до 56,3 %, что в 3,2 раза больше, чем на контроле. Применение гидрогеля Аквасин обеспечивало двукратное увеличение выхода товарных саженцев груши по сравнению с контролем (в среднем за 2017–2018 гг.) – с 22,3 до 44,6 %. Совместное использование Базакота и гидрогеля в составе почвогрунта для выращивания саженцев груши достоверно повышало долю товарных саженцев по сравнению с применением одного Базакота только в условиях 2017 года (с 66,8 до 72,7 %). Оценка экономической эффективности использования изучаемых компонентов почвогрунта при выращивании саженцев груши с закрытой корневой системой показало, что максимальную рентабельность в условиях 2018 года обеспечило применение удобрения пролонгированного действия Базакот 6М в качестве стабилизатора минерального питания. Рентабельность производства саженцев в этом варианте составила 103 %. Для сравнения в варианте

совместного использования удобрения Базакот 6М и гидрогеля Аквасин это показатель составил 65 %, а в варианте применения базовой смеси производство саженцев в условиях 2018 г. был нерентабельным.

Выводы. Применение удобрения пролонгированного действия Базакот марки 6М в составе почвогрунта при выращивании саженцев груши с закрытой корневой системой в малообъемных контейнерах оказывает положительное влияние на рост и развития саженцев груши, увеличивая длину вегетативного прироста в среднем на 36,4 %, площадь листьев – на 51,1 %, диаметр штамба – на 52,2 % по сравнению с контролем. Выход товарных саженцев по сравнению с вариантом использования базовой смеси (почва + торф в соотношении 4 : 1) при этом увеличился в 3,2 раза. Рентабельность производства саженцев в этом варианте в условиях 2018 года составила 103 %. Использование гидрогеля для улучшения влагоемкости почвогрунтов обеспечивало двукратное увеличение выхода товарных саженцев груши по сравнению с контролем (в среднем за 2017–2018 гг.) – с 22,3 до 44,6 %.

Библиографический список

- Куликов, И.М. Основные направления инновационного развития садоводства и питомниководства в России [Текст] / И.М. Куликов, В.Ф. Воробьев, В.В. Хроменко, С.Н. Коновалов, Г.И. Кадыкало, А.Ю. Павлова, Н.Ю. Джура, А.В. Лисина, В.Г. Селиванов. М., 2017. 132 с.
- Цепляев, А.Н. Опыт выращивания посадочного материала с ЗКС по системе «горшок в горшке» (POT-IN-POT) [Текст] / А.Н. Цепляев // Развитие идей Г.Ф. Морозова при переходе к устойчивому лесопользованию: материалы международной научно-технической юбилейной конференции. Воронеж, 2017. С. 242–244.
- Цепляев, А.Н. Особенности контейнерного выращивания растений в условиях Центрально-Черноземного региона [Текст] / А.Н. Цепляев // Питомники России: инновации и импортозамещение. Сборник докладов IX ежегодной конференции Ассоциации производителей посадочного материала. М.: АППМ, 2016. С. 67–70.
- Раджабов, А.А. Разработка элементов технологии выращивания саженцев яблони в контейнерах [Текст] / А.А. Раджабов, А.А. Никитенко // Плодоводство и ягодоводство России. 2017. Т. 51. С. 216–222.
- Глаз, Н.В. Перспективы применения удобрения пролонгируемого действия Basacote при выращивании посадочного материала в контейнерах [Текст] / Н.В. Глаз, Л.В. Уфимцева // Агрохимический вестник. 2018. № 3. С. 12–14.
- Никитенко, А.А. Влияние состава субстрата на содержание основных питательных элементов в листьях побегов яблони [Текст] / А.А. Никитенко // Плодоводство и ягодоводство России. 2017. Т. 48. № 2. С. 213–216.
- Уфимцева, Л.В. Применение гидрогеля при выращивании саженцев в контейнерах [Текст] / Л.В. Уфимцева, Н.В. Глаз, А.С. Мелихова // Ученые заметки ТОГУ. 2018. Т. 9. № 2. С. 746–752.

8. Васильев, А.А. Влияние глауконита на минеральное питание растений картофеля [Текст] / А.А. Васильев // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2014. № 3 (31). С. 17–20.

9. Trenkel M.E. Slow- and controlled-release and stabilized fertilizers: an option for enhancing nutrient use efficiency in agriculture. Paris: IFA, 2010. 160 p.

10. Сертификаты на удобрения COMPO [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.agbina-compo.ru/info/613> (дата обращения 03.08.2018).

11. Гидрогель [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.tdsinger.ru> (дата обращения 03.08.2018).

12. Куликов, И.М. Инновационные технологии возделывания плодовых и ягодных культур [Текст]: методические рекомендации / И.М. Куликов, В.Ф. Воробьев, С.Е. Головин, В.В. Хроменко, А.Ю. Павлова, Н.Ю. Джура, Е.А. Туть, В.А. Шевкун, С.Н. Коновалов, Г.И. Кадыкало, А.В. Лисина, О.Г. Грибоедова, В.Ф. Федоренко, В.Г. Селиванов, С.Н. Юдина. М., 2016. 228 с.

Сведения об авторах

1. **Уфимцева Лариса Викторовна**, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией инструментальных методов исследования, Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН, 620142, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 112, корп. А, e-mail: uyniisk@mail.ru.

2. **Глаз Николай Владимирович**, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник отдела садоводства, Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН, 620142, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 112, корп. А, e-mail: kartofel_chel@mail.ru.

Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства – филиал ФГБНУ УрФАН ИЦ УрО РАН в 2016–2018 гг. провел исследования по совершенствованию технологии производства саженцев груши с закрытой корневой системой. Изучено влияние состава почвогрунта на фотосинтетическую активность листового аппарата, вегетативный прирост и диаметр штамба саженцев груши при выращивании в контейнерах. Установлено, что введение в состав почвогрунта перегноя не влияет на качество посадочного материала. Совместное применение Базакота и гидрогеля в условиях стабильного обеспечения влагой нецелесообразно. Оптимальным вариантом для выращивания саженцев груши в малообъемных

контейнерах оказался почвогрунт, состоящий из почвы и переходного торфа в соотношении 4 : 1 с добавлением удобрения длительного действия Базакот 6М. Применение Базакота (5 г/л) в среднем за 3 года увеличивало длину вегетативного прироста на 36,4 %, площадь листьев – на 51,1 %, диаметр штамба – на 52,2 %, выход товарных саженцев – в 3,2 раза по сравнению с контролем. Применение гидрогеля Аквасин сопровождалось двукратным увеличением выхода товарных саженцев груши по сравнению с контролем (в среднем за 2017–2018 гг.) – с 22,3 до 44,6 %. Наибольшая рентабельность производства в условиях 2018 г. отмечена в варианте применении удобрения пролонгированного действия Базакот – 103 %.

L. Ufimtseva, N. Glaz

IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGY ELEMENTS OF PRODUCTION OF PEAR SEEDLINGS IN CONTAINERS

Key words: *soil mixture; pear; peat; hydrogel; controlled-release fertilizer.*

Authors' personal details

1. **Ufimtseva Larisa**, Candidate of Biological Sciences, Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 620142, Ekaterinburg, Belinsky str., 112 A, e-mail: uyniisk@mail.ru.

2. **Glaz Nikolay**, Candidate of Agricultural of Sciences, Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 620142, Ekaterinburg, Belinsky str., 112 A, e-mail: kartofel_chel@mail.ru.

The South Ural Research Institute of Horticulture and Potato – a branch of the Ural Federal Agrar-

ian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences in 2016–2018 con-

ducted research on improving the technology of production of pear seedlings with a closed root system. The influence of the soil composition on the photosynthetic activity of the leaf apparatus, the vegetative growth and the diameter of the stem of pear seedlings when grown in containers was studied. It was established that the introduction of humus in the soil does not affect the quality of planting material. The combined use of Bazakot and hydrogel in conditions of stable moisture supply is impractical. The best option for growing pear seedlings in small containers was a soil mixture composed of soil and transitional peat in a ratio of 4 : 1

with the addition of long-acting fertilizer Bazakot 6M. The use of Bazakot (5 g/l) on average over 3 years increased the length of vegetative growth by 36,4 %, leaf area – 51,1 %, the diameter of the stem – 52,2 %, the yield of marketable seedlings – 3,2 times compared to control. The use of Aquasin hydrogel was accompanied by a twofold increase in the yield of marketable pear seedlings compared with the control (on average for 2017–2018) – from 22,3 to 44,6 %. The highest profitability of production under the conditions of 2018 was noted in the variant of applying Bazakot prolonged-action fertilizer – 103 %.

© Уфимцева Л.В., Глаз Н.В.

УДК 633.11«321»:631.526.32(470.51)

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-44-50

И.Ш. Фатыхов, Ч.М. Исламова, Е.Ю. Колесникова

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ НА ГОССОРТОУЧАСТКАХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ключевые слова: яровая пшеница; сорт; урожайность; индекс среды; экологическая пластичность и стабильность; стрессоустойчивость.

Введение. Условия внешней среды оказывают существенное влияние на развитие хозяйственно-ценных признаков и свойств сортов, определяющих их продуктивность. В неблагоприятных почвенно-климатических условиях все большее значение приобретает не только потенциальная продуктивность сортов, но и их экологическая устойчивость. В связи с этим устойчивый рост урожая сельскохозяйственных культур при разнообразии почвенно-климатических условий по зонам страны тесно связан с созданием и внедрением в производство сортов, отличающихся не только потенциально высокой продуктивностью, но и высокой экологической стабильностью и пластичностью [2].

Важнейшим хозяйственно-ценным признаком сорта пшеницы является урожайность, которая характеризует взаимодействие генотипа со средой и сортовых признаков между собой. Формирование урожая является результатом устойчивости возделываемой культуры к изменяющимся в процессе вегетации экологическим условиям среды [2, 3, 7]. Оценка урожайного потенциала сорта и его реакции на изменяющиеся условия выращивания может быть определена только в конкретных агроэкологических условиях. Учёт параметров адаптивности имеет значение и для Среднего Предуралья, где урожайность яровой пшеницы сильно варьирует по годам [1].

Возделывание яровой мягкой пшеницы в Удмуртской Республике ведётся в разнообразных абиотических условиях. Сорта яровой пшеницы даже в благоприятных зонах их возделывания не в полной мере проявляют свой генетически обусловленный потенциал [6]. Стрессовые метеорологические и погодные условия – объективные факторы природы, их нельзя изменить и нужно лишь учитывать при размещении посевов и подборе сортов возделываемой культуры. Целесообразно возделывать не только сорта, имеющие очень высокий потенциал продуктивности посевов, но и сорта, формирующие стабильную урожайность зерна [10]. В условиях Среднего Предуралья достаточно полно изучена реакция на абиотические факторы зерновых культур [1, 9–13], льна-долгунца [8]. В связи с этим была проведена оценка параметров экологической пластичности и стабильности 10 сортов яровой пшеницы, включенных в Государственный реестр селекционных достижений и допущенных к использованию по Удмуртской Республике: Горноуральская, Иргина, Красноуфимская, Омская 36, Свеча, Симбирцит, Черноземноуральская 2, Экада 109, – и сорта Тулайловская Надежда, включенного в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Волго-Вятскому региону [9].

Цель исследований: оценить адаптивные свойства сортов яровой пшеницы на госсортоучастках Удмуртской Республики.

Задачи исследований: провести анализ урожайности, массы 1000 зерен, высоты растений и вегетационного периода у сортов яровой пшеницы за 2015–2017 гг.; оценить параметры экологической пластичности, стабильности и адаптивности сортов яровой пшеницы.

Условия, материалы и методы исследований. Объект исследования – сорта яровой пшеницы, проходившие испытания в 2015–2017 гг. на госсортоучастках в трех агроклиматических зонах Удмуртской Республики: северной – Бале-зинский и Глазовский ГСУ; центральной – Увинский ГСУ; южной – Сарапульский и Можгинский ГСУ [9]. Метеорологические условия 3-х лет исследований отличались друг от друга и от средних многолетних. В 2015 г. май и июнь были тёплыми и засушливыми, июль и август – прохладными и влажными. Вегетационный период 2016 г. характеризовался как жаркий и острозасушливый, 2017 г. – прохладный и влажный, июнь и июль отличались холодной погодой и избыточным увлажнением. Разнообразие и контрастность погодных условий в годы исследований позволили более объективно оценить

изучаемые сорта. Почва на Глазовском и Можгинском ГСУ – дерново-среднеподзолистая среднесуглинистая, на Балезинском ГСУ – дерново-сильноподзолистая тяжелосуглинистая, на Увинском ГСУ – дерново-сильноподзолистая супесчаная, на Сарапульском ГСУ – светло-серая лесная тяжелосуглинистая. Пахотный слой средней степени окультуренности: содержание гумуса 2,1–2,6 % – среднее, подвижного фосфора 101–251 мг/кг – повышенное и высокое, обменного калия 100–300 мг/кг – повышенное и очень высокое. Показатели пластичности и стабильности сортов яровой пшеницы рассчитывали по методике S. Eberhart и W. Russel [15] в изложении В.А. Зыкина и др. [4].

Результаты исследований. Изучаемые сорта яровой пшеницы имели урожайность 9,6 ц/га (Тулайловская надежда) и 48,2 ц/га (Горноуральская) в 2015 г.; 10,1 ц/га (Экада 109) и 56,8 ц/га (Ульяновская 105) в 2016 г.; 12,6 ц/га (Тулайловская надежда) и 58,4 ц/га (Тулайловская надежда) в 2017 г. Индекс условий среды (Ij) по годам изменялся от –11,4 до +11,8 (таблица 1).

Таблица 1 Урожайность сортов яровой пшеницы на ГСУ Удмуртской Республики, ц/га

Сорт	Бале-зинский ГСУ	Глазовский ГСУ	Увинский ГСУ	Сарапульский ГСУ	Можгинский ГСУ	Среднее
2015 г.						
Омская 36	11,9	20,3	35,1	40,4	34,8	28,5
Горноуральская	15,9	21,8	32,4	48,2	35,1	30,7
Иргина	17,5	17,2	30,8	39,4	29,7	26,9
Свеча	19,1	22,2	31,2	39,2	32,8	28,9
Симбирцит	15,4	20,8	34,2	45,0	37,6	30,6
Красноуфимская 100	16,6	23,0	31,6	45,5	28,5	29,0
Тулайловская надежда	9,6	21,9	32,3	52,6	23,1	27,9
Ульяновская 105	13,6	24,2	34,0	49,0	35,9	31,3
Черноземноуральская 2	19,0	19,9	37,3	46,3	41,3	32,8
Экада 109	15,4	22,2	31,9	47,9	35,3	30,5
Индекс среды Ij	–2,3	–1,3	5,1	–3,3	–11,2	–
2016 г.						
Омская 36	20,2	10,7	18,4	50,6	44,6	28,9
Горноуральская	22,2	11,2	14,6	45,5	45,6	27,8
Иргина	20,1	10,9	13,0	43,0	40,6	25,5
Свеча	23,7	11,9	14,3	45,9	43,2	27,8
Симбирцит	21,2	14,4	16,9	51,2	47,1	30,2
Красноуфимская 100	22,0	10,0	14,4	54,9	47,5	29,8
Тулайловская надежда	23,7	13,8	17,9	53,5	52,7	32,3
Ульяновская 105	27,5	13,5	21,0	56,4	56,8	35,0
Черноземноуральская 2	21,5	15,2	18,1	53,0	55,7	32,7
Экада 109	18,5	10,1	17,0	48,3	46,7	28,1
Индекс среды Ij	4,4	–10,5	–11,4	1,5	3,5	–
2017 г.						
Омская 36	14,6	31,3	35,4	44,4	48,1	34,8
Горноуральская	13,6	36,2	27,2	53,7	49,3	36,0
Иргина	14,5	30,0	28,2	49,2	46,2	33,6
Свеча	13,2	33,6	30,8	52,3	44,0	34,8
Симбирцит	17,5	34,6	38,0	47,2	52,5	38,0
Красноуфимская 100	16,6	36,8	35,2	56,9	55,0	40,1
Тулайловская надежда	12,6	31,2	34,0	57,2	58,4	38,7
Ульяновская 105	17,1	36,5	38,0	49,1	57,5	39,6
Черноземноуральская 2	20,7	39,1	40,0	49,4	58,0	41,4
Экада 109	14,4	35,3	36,5	45,5	53,2	37,0
Индекс среды Ij	–2,2	11,8	6,3	1,8	7,7	–

Анализ урожайности зерна 2015 г. показал, что из 10 изучаемых сортов яровой пшеницы в среднем по госсортоучасткам относительно наибольшую продуктивность сформировали сорта Черноземноуральская 2 (32,8 ц/га) и Ульяновская 105 (31,3 ц/га). Наиболее благоприятные условия складывались на Увинском госсортоучастке, где индекс среды равнялся +5,1.

В 2016 г. относительно худшие абиотические условия при испытании сортов яровой пшеницы сложились на Глазовском и Увинском ГСУ, где индекс среды равнялся –10,5 и –11,4 соответственно. На данных госсортоучастках сорта имели наименьшую урожайность: 10–

21 ц/га. Наибольшую урожайность – 35 ц/га и 32,7 ц/га соответственно – сформировали сорта Ульяновская 105 и Черноземноуральская 2. Наиболее благоприятные абиотические условия для сортов яровой пшеницы оказались в 2017 г., индекс условий среды составил +1,8–11,8, кроме северного Бalezинского госсортоучастка ($I_j = -2,2$). Наибольшая урожайность (41,4 ц/га) наблюдалась у сорта Черноземноуральская 2.

В среднем за годы исследований (2015–2017 гг.) по госсортоучасткам наименьшая урожайность (28,7 ц/га) была у сорта Иргина и наибольшая (35,6 ц/га) – у сорта Черноземноуральская 2 (таблица 2).

Таблица 2 Урожайность сортов яровой пшеницы на ГСУ Удмуртской Республики, среднее 2015–2017 гг., ц/га

Сорт	Балезинский ГСУ	Глазовский ГСУ	Увинский ГСУ	Сарапульский ГСУ	Можгинский ГСУ	Среднее
Омская 36	15,6	20,8	29,6	45,1	42,5	30,7
Горноуральская	17,2	23,1	24,7	49,1	43,3	31,5
Иргина	17,4	19,4	24,0	43,9	38,8	28,7
Свеча	18,7	22,6	25,4	45,8	40,0	30,5
Симбирцит	18,0	23,3	29,7	47,8	45,7	32,9
Красноуфимская 100	18,4	23,3	27,1	52,4	43,7	33,0
Тулайловская надежда	15,3	22,3	28,1	54,4	44,7	33,0
Ульяновская 105	19,4	24,7	31,0	51,5	50,1	35,3
Черноземноуральская 2	20,4	24,7	31,8	49,6	51,7	35,6
Экада 109	16,1	22,5	28,5	47,2	45,1	31,9
Среднее	17,6	22,7	28,0	48,7	44,6	–

В среднем наибольшую урожайность зерна сорта яровой пшеницы (44,6–48,7 ц/га) сформировали в южной агроклиматической зоне (Сарапульский и Можгинский ГСУ), где складываются относительно более благоприятные условия для роста и развития в период вегетации. Наименьшая продуктивность сортов отмечена в северной зоне (Балезинский и Глазовский ГСУ), где урожайность была на уровне 17,6–22,7 ц/га.

Об адаптивности сортов к условиям среды, в первую очередь, судят по экологической пластичности и стабильности их урожайности. Экологическая пластичность – способность формировать высокую и качественную урожайность в различных почвенно-климатических, погодных и агротехнических условиях [5]. Высокой экологической пластичностью отличались сорта Омская 36 ($b_i = 1,05$) на Балезинском ГСУ; Свеча ($b_i = 0,97$) и Ульяновская 105 ($b_i = 1,03$) на Глазовском ГСУ; Омская 36 ($b_i = 0,98$) и Экада 101 ($b_i = 1,01$) на Увинском ГСУ; Черноземноуральская 2 ($b_i = 0,95$) на Сарапульском ГСУ; сорта Черноземноуральская 2 ($b_i = 0,91$) и Экада 109 ($b_i = 0,91$) на Можгинском ГСУ (таблица 3). К сортам полуинтенсивного типа, которые при оптимальных условиях формируют высокую урожайность, а при неблагоприятных абиотических условиях и низком агрофоне снижают урожайность, можно отнести сорта Тулайловская надежда, Горноуральская и Красноуфимская

100 ($b_i < 1$). К сортам интенсивного типа, которые стабильны по урожайности и при неблагоприятных условиях не снижают ее ($b_i > 1$), отнесены сорта Иргина, Симбирцит. Стабильность (Sd^2) – адаптивная реакция генотипа, приводящая к соответствию изменений состояния признаков и свойств организма изменениям условий внешней среды, характеризующая степень его устойчивости. Чем меньше отклонение коэффициента стабильности от нуля, тем стабильнее сорт [5]. Самый низкий показатель стабильности отмечен у сортов Красноуфимская 100 – на Балезинском ГСУ (0,00); Горноуральская – на Глазовском ГСУ (0,06); Тулайловская надежда (0,17) – на Увинском ГСУ, Красноуфимская 100 (1,06) – на Сарапульском и у сортов Омская 36 (0,18) и Горноуральская (0,18) – на Можгинском ГСУ.

При разных метеорологических условиях в период вегетации сортов яровой пшеницы важным показателем для сортов является их устойчивость к стрессу (засухе, высокой температуре воздуха, избыточному увлажнению и др.). На основании проведенных исследований было установлено, что самую высокую устойчивость к стрессу имеют сорта яровой пшеницы – Черноземноуральская (–2,5 ц/га) на Балезинском ГСУ; Тулайловская надежда – на Глазовском и Увинском ГСУ (–17,4 ц/га; –16,1 ц/га соответственно); Экада 109 (–2,8 ц/га) на Сарапульском ГСУ и Свеча (–11,2 ц/га) на Можгинском ГСУ.

Таблица 3 Коэффициенты экологической пластичности и адаптивности сортов яровой пшеницы на ГСУ Удмуртской Республики (в среднем за 2015–2017 гг.)

Сорт	Параметр экологической пластичности		Параметр адаптивности		
	коэффициент пластичности, b_i	коэффициент стабильности, Sd^2	стрессоустойчивость, $Y_2 - Y_1$, ц/га	средняя урожайность, $(Y_1 + Y_2) / 2$, ц/га	размах урожайности, d , %
Балезинский ГСУ					
Омская 36	1,05	3,42	–8,3	15,6	41,1
Горноуральская	1,12	2,86	–8,6	17,2	38,7
Иргина	0,62	4,65	–5,6	17,4	27,9
Свеча	1,13	17,95	–10,5	18,7	44,3
Симбирцит	0,72	2,09	–5,8	18,0	27,4
Красноуфимская 100	0,82	0,00	–5,4	18,4	32,5
Тулайловская надежда	1,91	4,05	–14,1	15,3	59,5
Ульяновская 105	1,84	5,62	–13,9	19,4	50,5
Черноземноуральская 2	0,25	1,41	–2,5	20,4	11,6
Экада 109	0,54	0,54	–4,1	16,1	22,2
Глазовский ГСУ					
Омская 36	0,92	0,82	–20,6	20,8	65,8
Горноуральская	1,12	0,06	–25	23,1	69,1
Иргина	0,87	1,62	–19,1	19,4	63,7
Свеча	0,97	1,23	–21,7	22,6	64,6
Симбирцит	0,92	2,43	–20,2	23,3	58,4
Красноуфимская 100	1,19	2,54	–26,8	23,3	72,8
Тулайловская надежда	0,78	0,58	–17,4	22,3	55,8
Ульяновская 105	1,03	0,99	–23	24,7	63,0
Черноземноуральская 2	1,10	17,45	–23,9	24,7	61,1
Экада 109	1,12	1,96	–25,2	22,5	71,4
Увинский ГСУ					
Омская 36	0,98	0,43	–17,0	29,6	48,0
Горноуральская	0,87	19,82	–17,8	24,7	54,9
Иргина	1,76	135,84	–17,8	24,0	57,8
Свеча	0,97	1,30	–16,9	25,4	54,2
Симбирцит	1,13	2,87	–21,1	29,7	55,5
Красноуфимская 100	1,12	2,44	–20,8	27,1	59,1
Тулайловская надежда	0,89	0,17	–16,1	28,1	47,4
Ульяновская 105	0,88	4,21	–17,0	31,0	44,7
Черноземноуральская 2	1,20	0,72	–21,9	31,8	54,8
Экада 109	1,01	5,58	–19,5	28,5	53,4
Сарапульский ГСУ					
Омская 36	1,37	21,53	–10,2	45,1	20,2
Горноуральская	0,34	32,96	–8,2	49,1	15,3
Иргина	1,38	17,09	–9,8	43,9	19,9
Свеча	2,02	17,29	–13,1	45,8	25,0
Симбирцит	0,81	8,88	–6,2	47,8	12,1
Красноуфимская 100	2,09	1,06	–11,4	52,4	20,0
Тулайловская надежда	0,58	6,31	–4,6	54,4	8,0
Ульяновская 105	0,69	28,03	–7,4	51,5	13,1
Черноземноуральская 2	0,95	7,41	–6,7	49,6	12,6
Экада 109	1,22	3,77	–2,8	47,2	5,8
Можгинский ГСУ					
Омская 36	0,70	0,18	–13,3	42,5	27,7
Горноуральская	0,75	0,18	–14,2	43,3	28,8
Иргина	0,84	2,28	–16,5	38,8	35,7
Свеча	0,63	1,71	–11,2	40,0	25,5
Симбирцит	0,75	2,66	–14,9	45,7	28,4
Красноуфимская 100	1,38	1,60	–26,5	43,7	48,2
Тулайловская надежда	1,91	2,73	–35,3	44,7	60,4
Ульяновская 105	1,22	10,10	–21,6	50,1	37,6
Черноземноуральская 2	0,91	1,19	–16,7	51,7	28,8
Экада 109	0,91	3,87	–17,9	45,1	33,6

Максимальное соотношение между генотипом и факторами среды определяется средней урожайностью сорта в контрастных (стрессовых и нестрессовых) условиях $(Y_1 + Y_2 / 2)$. По данному показателю на Балезинском ГСУ выделился сорт Черноземноуральская 2 (20,4 ц/га),

на Глазовском ГСУ – сорта Ульяновская 105 и Экада 109 (24,7 ц/га), на Увинском ГСУ – сорт Черноземноуральская (31,8 ц/га), на Сарапульском ГСУ – сорт Тулайловская надежда (54,4 ц/га) и на Можгинском ГСУ – сорт Черноземноуральская 2 (51,7 ц/га).

Размах урожайности показывает отношение разницы между наибольшей и минимальной урожайностью сорта к наибольшей урожайности. Чем ниже показатель, тем стабильнее урожайность сорта в конкретных условиях [3]. Минимальное значение размаха урожайности имели сорта, возделываемые в южном агроклиматическом районе, – Экада 109 (5,8 %), Тулайловская надежда (8,0 %), Симбирцит (12,1 %). Погодные условия вегетационного периода оказывали влияние на массы 1000 зерен и высоту

растений (таблица 4). Относительно высокую массу 1000 зерен (39,1 г) имел сорт Омская 36, меньший данный показатель (32,6 г) был у сорта Иргина. За годы исследований высота растений у сортов яровой пшеницы варьировала от 70 до 112 см. В среднем по госсортоучасткам наибольшая высота растений (96 см) сформировалась у сорта Экада 109, наименьшая (90 см) – у сорта Омская 36. Вегетационный период сортов яровой пшеницы изменяется в зависимости от сорта и погодных условий и колеблется от 75 до 96 дней.

Таблица 4 Основные показатели сортов яровой пшеницы (масса 1000 зерен, высота растений, вегетационный период) на ГСУ Удмуртской Республики за 2015–2017 гг.

Сорт	Балезинский ГСУ	Глазовский ГСУ	Увинский ГСУ	Сарапульский ГСУ	Можгинский ГСУ	Среднее
Масса 1000 зерен, г						
Омская 36	33,3	40,5	39,7	41,9	40,0	39,1
Горноуральская	31,2	39,2	31,3	35,9	34,5	34,4
Иргина	31,0	31,2	33,8	35,7	31,3	32,6
Свеча	33,0	39,7	34,0	37,9	34,4	35,8
Симбирцит	35,8	39,3	39,3	38,8	40,8	38,8
Красноуфимская 100	34,3	40,8	36,2	41,7	38,4	38,3
Тулайловская надежда	31,7	38,6	36,2	41,2	36,9	36,9
Ульяновская 105	32,8	39,1	34,9	38,5	34,7	36,0
Черноземноуральская 2	34,0	43,5	37,1	39,9	36,7	38,2
Экада 109	33,5	40,5	38,3	40,4	39,0	38,3
Высота растений, см						
Омская 36	79	94	78	92	109	90
Горноуральская	79	88	72	87	94	84
Иргина	82	80	74	92	96	85
Свеча	83	85	78	98	100	89
Симбирцит	94	92	76	101	112	95
Красноуфимская 100	82	91	70	99	102	89
Тулайловская надежда	86	89	70	102	96	89
Ульяновская 105	98	91	75	103	101	94
Черноземноуральская 2	87	91	74	100	101	91
Экада 109	90	97	76	105	112	96
Вегетационный период, дни						
Омская 36	81	86	87	86	79	84
Горноуральская	76	82	85	84	73	80
Иргина	75	77	83	84	72	78
Свеча	75	80	87	84	73	80
Симбирцит	83	87	91	86	78	85
Красноуфимская 100	83	85	91	87	77	85
Тулайловская надежда	85	86	94	90	80	87
Ульяновская 105	84	86	95	90	80	87
Черноземноуральская 2	84	87	94	88	78	86
Экада 109	85	91	92	87	78	87

Заключение. За годы исследований (2015–2017 гг.) по госсортоучасткам наименьшая средняя урожайность (28,7 ц/га) была у сорта Иргина и наибольшая (35,6 ц/га) – у сорта Черноземноуральская 2. Высокой экологической пластичностью отличались сорта Омская 36 ($b_i = 1,05$) на Балезинском ГСУ; Свеча ($b_i = 0,97$) и Ульяновская 105 ($b_i = 1,03$) на Глазовском ГСУ; Омская 36 ($b_i = 0,98$) и Экада 101 ($b_i = 1,01$) на Увинском ГСУ; Черноземноуральская 2 ($b_i = 0,95$) на Сарапульском ГСУ; сорта Черноземноуральская 2 ($b_i = 0,91$) и Экада 109 ($b_i = 0,91$) на Можгинском ГСУ. Самый низкий показатель стабильности

отмечен у сортов Красноуфимская 100 на Балезинском ГСУ (0,00); Горноуральская на Глазовском ГСУ (0,06); Тулайловская надежда на Увинском ГСУ (0,17) и у сортов Омская и Горноуральская на Можгинском ГСУ (0,18). Относительно высокую массу 1000 зерен (39,1 г) имел сорт Омская 36, меньший данный показатель (32,6 г) был у сорта Иргина. В среднем по госсортоучасткам наибольшая высота растений (96 см) сформировалась у сорта Экада 109, наименьшая (90 см) – у сорта Омская 36. Короткой продолжительностью вегетационного периода (78 дней) отличился сорт Иргина.

Библиографический список

1. Елисеев, С.Л. К вопросу о методике оценки адаптивности сортов полевых культур [Текст] / С.Л. Елисеев // Научно-технологическое развитие, моделирование, управление и решения для автоматизации деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей региона: материалы научно-практической конференции. Пермь: Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова, 2017. С. 46–49.
2. Жученко, А.А. Экологическая генетика культурных растений (адаптация, рекомбинация, агробиоценоз) [Текст] / А.А. Жученко. Казань, 1980. 558 с.
3. Зыкин, В.А. Основы повышения адаптивности сортов яровой пшеницы в Западной Сибири [Текст] / В.А. Зыкин // Вестник РАСХН. 1992. № 2. С. 23–26.
4. Зыкин, В.А. Методика расчета и оценки параметров экологической пластичности сельскохозяйственных растений [Текст] / В.А. Зыкин и др. Уфа: Башкирский ГАУ, 2005. 100 с.
5. Кадилов, Р.К. Потенциал яровой пшеницы сорта Ватан и его реализация в условиях Предуральской степи Республики Башкортостан [Текст] / Р.К. Кадилов, Р.Р. Исмагилов // Вестник Академии наук Республики Башкортостан. 2014. Т. 19. № 4. С. 50–56.
6. Исмагилов, Р.Р. Основные факторы формирования качества продукции растениеводства [Текст] / Р.Р. Исмагилов // Качество продукции растениеводства и приемы его повышения. Уфа: Башкирский ГАУ, 1998. С. 3–7.
7. Исмагилов, Р.Р. Экологическая пластичность сортов озимой ржи по урожайности и качеству зерна [Текст] / Р.Р. Исмагилов, А.Г. Галикеев // Качество и технология производства продукции растениеводства: сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Башкирский государственный аграрный университет. Уфа, 2011. С. 122–123.
8. Корепанова, Е.В. Реакция сортов льна-долгунца на абиотические условия Среднего Предуралья формированием урожайности [Текст] / Е.В. Корепанова, М.П. Маслова, В.Н. Гореева // Достижения науки и техники АПК. 2014. Т. 28. № 8. С. 44–46.
9. Результаты государственного сортоиспытания и сельскохозяйственных культур за 2015–2017 гг. [Текст]. Можга, 2017. 92 с.
10. Рябова, Т.Н. Экологическая пластичность и стабильность селекционных образцов овса полевного [Текст] / Т.Н. Рябова, И.Ш. Фатыхов, В.Г. Колесникова // Инновации в науке, технике и технологиях: материалы Всероссийской науч.-практ. конф. (28–30 апреля 2014 г.). Ижевск: Удмуртский университет, 2014. С. 226–228.
11. Фатыхов, И.Ш. Интенсивная технология возделывания яровой пшеницы в Предуралье [Текст] / И.Ш. Фатыхов. Ижевск: ИжГСХА, 1996. 58 с.
12. Фатыхов, И.Ш. Экологическая реакция сортов ярового ячменя на абиотические условия [Текст] / И.Ш. Фатыхов // Научное и кадровое обеспечение АПК для продовольственного импортозамещения: материалы Всероссийской научно-практической конференции / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия». Ижевск, 2016. С. 117–124.
13. Фатыхов, И.Ш. Реакция яровой пшеницы Ирень на абиотические условия химическим составом зерна [Текст] / И.Ш. Фатыхов, Е.В. Корепанова, Б.Б. Борисов // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2017. Т. 12. № 2 (44). С. 42–47.
14. Хабилов, И.К. Изменение качества зерна яровой пшеницы в зависимости от свойств почвы [Текст] / И.К. Хабилов, Р.Р. Исмагилов, А.А. Нигматьянов // Качество и технология производства продукции растениеводства: сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Башкирский государственный аграрный университет. Уфа, 2011. С. 181–183.
15. Eberhart S.A., Russell W.A. Stability parameters for comparing varieties. Crop Sci. 1966. № 1. Vol. 6. P. 36–40.

Сведения об авторах

1. **Фатыхов Ильдус Шамилович**, доктор сельскохозяйственных наук, ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 426069, Российская Федерация, г. Ижевск, ул. Кирова, 16, e-mail: nir210@mail.ru.
2. **Исламова Чулпан Марсовна**, кандидат сельскохозяйственных наук, ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 426069, Российская Федерация, г. Ижевск, ул. Кирова, 16, e-mail: Chulpanislamova_85@mail.ru.
3. **Колесникова Елена Юрьевна**, аспирант кафедры растениеводства, ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 426069, Российская Федерация, г. Ижевск, ул. Кирова, 16, e-mail: nir210@mail.ru.

Приведена оценка сортов яровой пшеницы по урожайности на госсортоучастках Удмуртской Республики и параметрам экологической

пластичности по результатам трехлетнего испытания (2015–2017 гг.) в трех агроклиматических зонах Удмуртской Республики: северной – Бале-

зинский и Глазовский ГСУ; центральной – Увинский ГСУ; южной – Сарапульский и Можгинский ГСУ. Исследована экологическая пластичность и стабильность 10 сортов яровой пшеницы, включенных в Государственный реестр селекционных достижений и допущенных к использованию по Удмуртской Республике: Горноуральская, Иргина, Красноуфимская, Омская 36, Свеча, Симбирцит, Черноземноуральская 2, Экада 109 и сорт, включенный в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Волго-Вятскому региону, – Тулайловская Надежда. Относительно более благоприятными по абиотическим условиям для Увинского ($I_j = 6,3$), Сарапульского ($I_j = 1,8$), Можгинского ($I_j = 7,7$) и Глазовского ($I_j = 11,8$) госсортоучастков был 2017 г., для Бalezинского ($I_j = 4,4$) – 2016 г. На основании проведенных исследований выделились

сорта Ульяновская 105 и Черноземноуральская 2, которые обладают относительно большей (31,3–39,6 и 32,8–41,4 ц/га соответственно) средней урожайностью. Высокой экологической пластичностью отличались сорта Омская 36 (1,05) на Бalezинском ГСУ; Свеча (0,97) и Ульяновская 105 (1,03) на Глазовском ГСУ; Омская 36 (0,98) и Экада 101 (1,01) на Увинском ГСУ; Черноземноуральская 2 (0,95) на Сарапульском ГСУ; сорта Черноземноуральская 2 (0,91) и Экада 109 (0,91) на Можгинском ГСУ. Высокой стабильностью в условиях северного агроклиматического района выделились сорта Красноуфимская 100 (0,00) и Горноуральская (0,06); центрального – Тулайловская надежда (0,17) и южного – Омская 36 (0,18) и Горноуральская (0,18). Относительно лучшей стрессоустойчивостью (2,8 ц/га) на Увинском ГСУ обладал сорт Тулайловская надежда.

I. Fatykhov, Ch. Islamova, E. Kolesnikova

ENVIRONMENTAL PLASTICITY AND STABILITY OF WHEAT VARIETIES IN THE STATE VARIETY PLOTS OF UDMURT REPUBLIC

Key words: *spring wheat; variety; yield; environment index; environmental plasticity and stability; stress resistance.*

Authors' personal details

1. **Fatykhov Ildus**, Doctor of Agricultural Sciences, Izhevsk State Agricultural Academy, 426033, Russian Federation, Izhevsk, Kirov Str., 16, e-mail: nir210@mail.ru.

2. **Islamova Chulpan**, Candidate of Agricultural Sciences, Department of Plant Cultivation, Izhevsk State Agricultural Academy, 426033, Russian Federation, Izhevsk, Kirov Str, 16, e-mail: Chulpanislamova_85@mail.ru.

3. **Kolesnikova Elena**, Pos-tgraduate Student, Department of Plant Production, Izhevsk State Agricultural Academy, 426033, Russian Federation, Izhevsk, Kirov Str, 16, e-mail: nir210@mail.ru.

The assessment of spring wheat varieties according to yield and parameters of environmental plasticity is given based on the results of a three-year test (2015–2017) in three agroclimatic zones of the Udmurt Republic: the northern – Balezinsky and Glazovsky State Variety Plots (SVP); central – Uvinsky SVP; southern – Sarapulsky and Mozhginsky SVP. The ecological plasticity and stability of 10 varieties of spring wheat included in the State Register of Varieties Achievements and Approved for Use in the Udmurt Republic: Gornouralskaya, Irgina, Krasnoufimskaya, Omskaya 36, Svecha, Simbirtsit, Chernemournouralskaya 2, Ekada 109 and the variety included in the State Register of Varieties Achievements and Approved for Use in the Volga-Vyatka region – Tulailovskaya Hope. As for abiotic conditions, a more favorable for Uvinsky ($I_j = 6,3$), Sarapulsky ($I_j = 1,8$), Mozhginsky ($I_j = 7,7$) and Glazovsky ($I_j = 11,8$) of the state-owned sites was the year 2017, for Balezinsky ($I_j = 4,4$) – 2016.

On the basis of the studies carried out, the Ulyanovskaya 105 and Chernozemnouralskaya 2 varieties were distinguished, which have relatively higher (31,3–39,6 and 32,8–41,4 c/ha, respectively) average yield. Omsk 36 (1,05) varieties in the Balezinsky SVP differed in high ecological plasticity; Candle (0,97) and Ulyanovskaya 105 (1,03) at the Glazovsky SVP; Omskaya 36 (0,98) and Ekada 101 (1,01) at Uvinsky SVP; Chernozemnouralskaya 2 (0,95) at the Sarapulsky SVP; varieties Chernozem-Nouralskaya 2 (0,91) and Ekada 109 (0,91) on Mozhginsky SVP. The varieties Krasnoufimskaya 100 (0,00) and Gornouralskaya (0,06) were distinguished by high stability in the conditions of the northern agroclimatic region, central – Tulailovskaya Nadezhda (0,17) and the southern – Omsk 36 (0,18) and Gornouralsk (0,18). The variety Tulailovskaya Nadezhda had relatively better stress tolerance (2,8 c/ha) at Uvinsky SVP.

© Фатыхов И.Ш., Исламова Ч.М., Колесникова Е.Ю.

ПОЛИМОРФИЗМ ЛОКУСОВ SNP В РОССИЙСКИХ ПОПУЛЯЦИЯХ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО

Ключевые слова: дуб черешчатый; однонуклеотидный полиморфизм; генетическое разнообразие.

Введение. В результате длительного негативного воздействия комплекса климатических, энтомологических, фитопатологических и антропогенных факторов у дуба черешчатого (*Quercus robur* L.) наблюдается существенное ухудшение состояния насаждений, особенно на восточной части ареала в Европейской части России [1]. В условиях глобального изменения климата и усиления воздействия человека на окружающую среду актуальным научным и практически значимым вопросом становится изучение состояния, воспроизводства и динамики генофонда вида – важного природного ресурса, который определяет потенциальную приспособленность и, в конечном счете, их выживаемость в долгосрочном плане [4, 5, 11]. Такие исследования результативнее проводить в широком спектре природно-климатических зонах (разных лесных районах), так как проблемы сохранения устойчивости и продуктивности дубрав и лесов с участием дуба черешчатого не ограничиваются региональными масштабами. Их информативность существенно повышается при использовании инновационных ДНК-технологий нового поколения (Next Generation Sequencing, NGS), позволяющих оценивать разнообразие генофонда на уровне всего генома [17]. К настоящему времени генофонд дуба черешчатого в стране изучен лишь на региональном уровне – например, с использованием изоферментных маркеров [2], ISSR-анализа [3] и микросателлитных локусов [7]. Технологии секвенирования нового поколения, позволившие исследовать генетику дубов на основе идентификации десятков тысяч и миллионов локусов [13] однонуклеотидных полиморфизмов (Single nucleotide polymorphism, SNP), в отношении российских видов дуба еще не применялись.

Целью данной работы является представление первых результатов изучения генетического разнообразия SNP-локусов дуба черешчатого российской части ареала с применением набора генетических маркеров, разработанных с использованием NGS. **Задачами исследования** служили определение полиморфизма популяций и уровня межпопуляционной подразделенности вида в пределах этой территории, общая оценка информативности локусов для характеристики генофонда у исследуемого вида.

Материал и методы. Для проведения лабораторных экспериментов из камбия деревьев репродуктивного возраста с использованием модифицированного протокола [8] выделена ДНК. Для разработки SNP-маркеров использованы 95 образцов двух видов дуба (*Q. robur* и *Q. petraea* Liebl.), представляющих популяции Австрии, Белоруссии, Бельгии, Венгрии, Великобритании, Германии, Дании, Польши, Словакии, Турции, Украины и России. Такой подход позволяет выявить информативные SNP со сравнительно большими «географическими» сигналами генетических данных за счет выявления общего диапазона генетической изменчивости [6]. Анализы всех образцов, кроме российских, проведены по проекту WKF-WF04-22WC411101 Федерального министерства Германии по продовольствию и сельскому хозяйству и Федерального министерства Германии по окружающей среде, охране природы и ядерной безопасности (исполнители Б. Деген, С. Blanc-Jolivet, Mader M. и Guichoux E.). Российские образцы исследованы за счет гранта Российского научного фонда № 19-16-00084 (исполнители Б. Деген, Ю.А. Янбаев, С.Ю. Бахтина, Р.Ю. Янбаев). Секвенирование проведено компанией Floragenex (Портланд, США) с использованием технологии ddRAD (Double Digest Restriction site associated DNA) [13]. Среди 26074 выявленных локусов нами отобраны 3648, обладающих вблизи SNP минимальной фланкирующей областью в 50 пар нуклеотидов и имеющих не более двух соседствующих однонуклеотидных полиморфизмов. Дальнейшая оптимизация набора происходила за счет удаления локусов, не прошедших 10 %-ный порог валидности и имеющих частоту одного аллеля менее 1 %. При отборе маркеров для снижения вероятности встречи парapatрических локусов учитывали также локусы с относительно высокой ожидаемой гетерозиготностью и положительным коэффициентом инбридинга. Для выявления SNP с наибольшим вкладом в дифференциацию популяций дополнительно проведен дискриминантный анализ. Все эти работы выполнялись в среде R 3.6.0 для Windows, в том числе с использованием пакетов vcfr, poppr, adegenet и hierfstat. В результате для дизайна четырех мультиплексов MassARRAY® iPLEX™ (Assay Design Suite v2.0 [Agena Bioscience™, Сан Диего, США]) отобраны 130 локу-

сов. Генотипирование осуществлялось с участием M. Massot при поддержке грантов ANR-10-EQPX-16 в Genome Transcriptome Facility (Бордо, Франция). Оно проведено на платформе MassARRAY® iPLEX™ (Agena Bioscience™) с применением iPLEX™ GOLD chemistry и с интерпретацией спектров на Typer Viewer v.4.0.24.71 (Agena Bioscience™). В конечном счете для изучения генофонда популяций дуба черешчатого был осуществлен отбор из 119 локусов SNP.

На всей Европейской части России в природных насаждениях, а также в лесных культурах Западной Сибири в летний полевой сезон 2019 г. заложены 82 пробные площади. В каждой из них отобраны по 30 деревьев, расположенных друг от друга на расстоянии не менее 50 м для минимизации эффекта семейной пространственной кластеризации. Часть этих деревьев (190 растений из 19 насаждений) использована в данной работе для тестирования разработанного набора локусов SNP. Для статистической обработки результатов исследования использованы наблюдаемая (H_O) и ожидаемая (H_S) гетерозиготность [14], параметры F-статистики Райта F_{IS} и F_{ST} [18], показатель дифференциации между популяциями δ_T [9]. Уровень значимости использованных показателей тестировался при 10000 рандомизациях. Все вычисления проводились с использованием программы GDA_NT (Б. Деген, неопубл.) и Fstat [12]. Для генетической кластеризации выборок (выявления генетических групп) использовались программа STRUCTURE версии 2.3.4 [16] и метод ΔK [10].

Результаты исследования. Отобранные локусы достаточно качественно амплифицируются (в среднем $97,2 \pm 0,8 \%$), причем более половины (56,3 %) – полностью. Из исследованных 119 локусов полиморфными были 95 (79,8 %). Наблюдается превышение средней наблюдаемой гетерозиготности популяций ($0,270 \pm 0,003$) над ожидаемым значением ($0,253 \pm 0,003$). Эти показатели варьируются между популяциями незначительно (коэффициенты вариации по 5,6 %). В то же время в большей части популяций гетерозиготность находится вне 95 %-ного доверительного интервала средних значений H_O и H_S ($0,263$ – $0,278$ и $0,246$ – $0,260$ соответственно). Эта картина наблюдается в 73,7 % (H_O) и 47,4 % (H_S) выборок. При этом популяции с повышенной или пониженной гетерозиготностью наблюдаются как в пространственно фрагментированных небольших дубравах (степная зона на юге России, насаждения на северной границе ареала), так и в лесных районах с относительно большой представленностью дуба черешчатого.

Выборки представляют дубравы 17 регионов России: Республику Башкортостан (пробная площадь 2), Республику Марий Эл (8), Удмуртскую Республику (16), Владимирскую (17) Волгоградскую (3, 19), Вологодскую (18), Воронежскую (1), Кировскую (4), Костромскую (5), Ленинградскую (6), Липецкую (7), Оренбургскую (10), Орловскую (9), Пензенскую (11), Псковскую (12), Самарскую (13, 14) и Тверскую (15) области.

Рисунок 1
Кластеризация выборок при $K = 3$ (наверху рисунка) и $K = 9$ (нижняя часть)

Несмотря на обширность этой территории, уровень межпопуляционной дифференциации имеет сравнительно невысокий, но статистически значимый ($p < 0,05$) уровень ($F_{ST} = 0.03$). «Географический» сигнал имеют 32 % частот аллелей. Проведенная кластеризация (рисунок 1) в целом показывает относительно высокое сходство популяций в пределах всей исследованной части ареала. В то же время на разных уровнях кластеризации выделяются дубравы со своеобразным генофондом (наиболее наглядные примеры – выборка 14 при $K = 2$; 5 и 8 при $K = 9$). Этот феномен доказывает, что один и тот же регион и/или лесосеменной район включает популяции с различающимися генофондами. Например, насаждения Самарской области (пробные площади 13 и 14) отнесены к одному и тому же лесосеменному району. Более точные сведения об этом можно будет получить после завершения анализа полиморфизма и генетической изменчивости дуба черешчатого на всех 82 пробных площадях.

Выводы. Несмотря на сокращение площадей и ухудшение состояния дубрав у дуба черешчатого на территории России поддерживается сравнительно высокий уровень гетерозиготности популяций по локусам SNP. Кластеризация популяций на 32 % связана с их географическим положением. Обнаруживаются выборки со своеобразным генофондом, выделяющиеся своей гетерозиготностью и/или частотами аллелей. Это явление обуславливает необходимость ведения лесного хозяйства в дубравах на популяционной основе.

Первые результаты исследования показывают перспективность разработанных генетических маркеров для выявления генетически своеобразных популяций, уточнения лесосеменного районирования, ведения лесного семеноводства на научной основе и решения других вопросов, значимых для инновационного развития лесного хозяйства.

Исследование проведено за счет гранта Российского научного фонда № 19-16-00084.

Библиографический список

1. Бугаев, В.А. Дубравы лесостепи [Текст] / В.А. Бугаев, А.Л. Мусиевский, В.В. Царалунга. Воронеж, 2013. 217 с.
2. Янбаев, Ю.А. Экологическая обусловленность межпопуляционной генетической дифференциации дуба черешчатого на Южном Урале [Текст] / Ю.А. Янбаев, А.А. Габитова, С.В. Боронникова // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2012. № 2. С. 63–65.
3. Янбаев, Р.Ю. ISSR-анализ полиморфизма ДНК дуба черешчатого: аргументы в пользу использования для лесовосстановления семян местных насаждений [Текст] / Р.Ю. Янбаев, А.А. Габитова, Р.Р. Султанова, С.В. Боронникова, Ю.А. Янбаев // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2017. Т. 63 (1). С. 220–222.
4. Султанова, Р.Р. Нектарные липняки [Текст] / Р.Р. Султанова, Р.М. Мустафин, А.Ф. Хайретдинов. Уфа: Башкирский ГАУ, 2002. 125 с.
5. Султанова, Р.Р. Лесоводственные методы формирования нектарных липняков на Южном Урале [Текст]: автореферат дис. ... доктора сельскохозяйственных наук / Р.Р. Султанова. Екатеринбург: Уральский государственный лесотехнический университет, 2005. 42 с.
6. Blanc-Jolivet C., Yanbaev Y., Kersten B., Degen B. A set of SNP markers for timber tracking of *Larix* spp. in Europe and Russia. *J. Forestry*. 2018. Vol. 91 (5): 614–628. doi:10.1093/forestry/cpy020.
7. Degen B., Yanbaev R., Yanbaev Y. Genetic differentiation of *Quercus robur* in the South-Ural. *J. Silvae Genetica*. 2019. Vol. 68 (1). PP. 111–115.
8. Dumolin S., Demesure B., Petit R.J. (1995) Inheritance of chloroplast and mitochondrial genomes in 119 pedunculate oak investigated with an efficient PCR method. *J. Theoretical and Applied Genetics*. 1995. Vol. 91. PP. 1253–1256.
9. Gregorius, H.R. The relationship between the concepts of genetic diversity and differentiation. *J. Theoretical and Applied Genetics*. 1987. Vol. 74. PP. 397–401.
10. Evanno G., Regnaut S., Goudet J. Detecting the number of clusters of individuals using the software structure: a simulation study. *J. Molecular Ecology*. 2005. Vol. 14. PP. 2611–2620.
11. Gregorius H., Degen B., König A. Problems in the analysis of genetic differentiation among populations – a case study in *Quercus robur*. *J. Silvae Genetica*. 2007. Vol. 56 (3-4). PP. 190–199.
12. Goudet J., Raymond M., deMeeus T., Rousset F. Testing differentiation in diploid populations. *J. Genetics*. 1996. Vol. 144 (4). PP. 1933–1940.
13. Leroy, T., Rougemont Q., Dupouey J.L., Bodenes C., Lalanne C., Belser C., Labadie K., Le Provost G., Aury J.M., Kremer A., Plomion C. Massive postglacial gene flow between European white oaks uncovered genes underlying species barriers. *J. New Phytologist*. 2018. Vol. 15. <https://doi.org/10.1111/nph.16039>.
14. Nei M. *Molecular Evolutionary Genetics*. Columbia University Press. 1987.

15. Peterson B.K., Weber J.N., Kay E.H., Fisher H.S., Hoekstra H.E. Double Digest RADseq: An inexpensive method for de novo SNP discovery and genotyping in model and non-model species. J. Plos One. 2012. Vol. 7. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0037135>.

16. Pritchard J.K., Stephens M., Donnelly P. Inference of population structure using multilocus genotype data. J. Genetics. 2000. Vol. 155. PP. 945–959.

17. Schröder H., Mader M., Degen B., Kersten B., Cronn R., Yanbaev Y.A., Jennings T. Development of molecular markers for determining continental origin of wood white oaks (*Quercus* L., sect. *Quercus*). J. PLoS one. 2016. № 6. doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0158221>.

18. Weir B.S., Cockerham C.C. Estimating F-Statistics for the Analysis of Population-Structure. J. Evolution. 1984. Vol. 38. Vol. 1358–1370.

Сведения об авторах

1. **Ямбаев Юлай Аглямович**, доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории генетических ресурсов, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: Yanbaev_ua@mail.ru.

2. **Бахтина Светлана Юрьевна**, инженер лаборатории генетических ресурсов, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: Svetlana.Bakhtina@inbox.ru.

3. **Ямбаев Руслан Юлаевич**, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории генетических ресурсов, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: Ruslan.Yanbaev@list.ru.

4. **Деген Бернд**, доктор наук, профессор, директор Института лесной генетики Института фон Тюнена, Германия, г. Гроссгансдорф, Сикер Ландштрассе-2, e-mail: Bernd.Degen@thuenen.de.

5. **Габитова Айгуль Айдаровна**, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории генетических ресурсов, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: abigabi@yandex.ru.

6. **Тагирова Альбина Алековна**, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории генетических ресурсов, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: albom@inbox.ru.

Приведены первые результаты изучения полиморфизма 119 локусов SNP в 19 популяциях дуба черешчатого (*Quercus robur* L.) на восточной части ареала в Европейской части России. Несмотря на сокращение площадей и ухудшение состояния дубрав у вида, на территории России поддерживается сравнительно высокий уровень наблюдаемой ($H_o = 0,270 \pm 0,003$, изменения в пределах 0,237–0,291) и ожидаемой ($H_s = 0,253 \pm 0,003$, 0,219–0,272) гетерозиготности популяций. Межпопуляционная подразделенность выражена на уровне $F_{ST} = 0,030$ и статистически достоверна. Кластеризация популяций на 32 %

связана с их географическим положением. Обнаружены выборки со своеобразным генофондом, выделяющиеся своей гетерозиготностью и / или частотами аллелей. Это явление обуславливает необходимость ведения лесного хозяйства в дубравах на популяционной основе. Результаты исследования показывают перспективность разработанных генетических маркеров для выявления генетически своеобразных популяций, уточнения лесосеменного районирования, ведения лесного семеноводства на научной основе и решения других вопросов, значимых для инновационного развития лесного хозяйства.

R. Yanbaev, S. Bakhtina, Y. Yanbaev, B. Degen, A. Gabitova, A. Tagirova

POLYMORPHISM OF SNP LOCI IN RUSSIAN POPULATIONS OF THE PEDUNCULATE OAK

Key words: pedunculate oak; single nucleotide polymorphism; genetic variability.

Authors' personal details

1. **Yanbaev Yulay**, Doctor of biological sciences, professor, leading researcher of the laboratory of genetic resources, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Ocyabrya str., 34, e-mail: Yanbaev_ua@mail.ru.

2. **Bakhtina Svetlana**, engineer of the laboratory of genetic resources, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Ocyabrya str., 34, e-mail: Svetlana.Bakhtina@inbox.ru.

3. **Yanbaev Ruslan**, Candidate of agrarian sciences, senior researcher of the laboratory of genetic resources, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Ocityabrya str., 34, e-mail: Ruslan.Yanbaev@list.ru.

4. **Degen Bernd**, Doctor, professor, director of the Thuenen institute of forest genetics, Germany, Grosshansdorf, Sieker Landstrasse-2, e-mail: Bernd.Degen@thuenen.de.

5. **Gabitova Aygul**, Candidate of biological sciences, senior researcher of the laboratory of genetic resources, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Ocityabrya str., 34, e-mail: abigabi@yandex.ru.

6. **Tagirova Albina**, Candidate of biological sciences, senior researcher of the laboratory of genetic resources, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Ocityabrya str., 34, e-mail: albom@inbox.ru.

First results of the study on polymorphism of 119 SNP loci in 19 populations of pedunculate oak (*Quercus robur* L.) in the eastern part of its distribution range in European part of Russia are presented. The species has a relatively high level of observed ($H_o = 0,270 \pm 0,003$, changes within 0,237–0,291) and expected ($H_s = 0,253 \pm 0,003$, 0,219–0,272) heterozygosity of populations. The differentiation among populations was on the level $F_{ST} = 0,030$ and statistically significant. Clustering of populations is related to their geographical location

by 32 %. Stands with a peculiar gene pool were found which are different by their heterozygosity and/or allele frequencies. This phenomenon necessitates to carry out forest management in oak forests on the population basis. Results of the study show the prospects of the developed genetic markers for identifying genetically distinct populations, clarifying forest seed zoning, conducting forest seed production on a scientific basis, and solving other issues which are important for the innovative development of forestry.

© Янбаев Ю.А., Бахтина С.Ю., Янбаев Р.Ю., Деген Б., Габитова А.А., Тагирова А.А.

УДК 636.5.033.083

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-55-61

А.А. Астраханцев

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ И СРОКАХ ВЫРАЩИВАНИЯ

Ключевые слова: цыплята-бройлеры; напольная технология; выращивание в клетках; выход мяса; плотность посадки.

Введение. Птицеводческие предприятия практикуют напольный и клеточный способы выращивания цыплят-бройлеров. Для обоих вариантов разработаны свои технологические приемы, позволяющие производить максимальные объемы мяса птицы. При этом выбор конкретного способа выращивания во многом зависит от условий и возможностей птицеводческих предприятий. Результаты исследований ученых и опыт работы практиков птицеводства пока не дают однозначного ответа на вопрос, какой способ выращивания лучше. Срок откорма цыплят-бройлеров также является важным технологическим параметром, определяющим выход мяса и весовую категорию тушки птицы. Как способ, так и сроки выращивания цыплят-бройлеров оказывают влияние на эффективность производства мяса. В связи с этим актуальными представляются вопросы оценки эффективности производства мяса цыплят-бройлеров, выращенных при напольном или клеточном способах с различной продолжительностью откорма [7].

Цель исследования: оценить эффективность производства мяса цыплят-бройлеров при различных способах и сроках выращивания.

Для раскрытия цели были выделены следующие **задачи:**

- изучить основные показатели продуктивности цыплят-бройлеров;
- оценить показатели выхода мяса в живой массе с 1 м² производственной площади помещения;
- рассчитать основные технологические параметры производства мяса цыплят-бройлеров в исследуемых группах и вариантах;
- провести экономическую оценку полученных результатов.

Условия, материалы и методы исследования. Исследование осуществляли согласно методическим рекомендациям ФНЦ «ВНИТИП» РАН [9]. Объектами исследования были партии цыплят-бройлеров кросса «Росс 308», выращивание которых проходило в условиях ООО «Удмуртская птицефабрика» Удмуртской Респуб-

лики. В ходе исследования были сформированы две группы птицы. В состав первой группы входили 93 партии цыплят-бройлеров, содержание которых было организовано на полу с использованием глубокой подстилки из древесных опилок. Птицы второй группы (93 партии) выращивались в клеточных батареях «AviMax» компании «Big Dutchman» в четырехъярусном исполнении. Внутри каждой группы были выделены различные варианты, которые отличались продолжительностью выращивания бройлеров, – 36, 37, 38, 39 и 40 суток. В результате была оценена реализация продуктивного потенциала при двух технологиях с учетом сроков выращивания. Кормление партий бройлеров в исследуемых группах осуществляли спе-

циализированными комбикормами производства ООО «ГКЗ». Нормирование рецептов комбикормов проводили с учетом рекомендуемых параметров согласно рекомендациям по работе с соответствующим кроссом [9]. Весь цифровой материал был обработан методами вариационной статистики с использованием программы Microsoft Excel.

Результаты исследования. В процессе выращивания мясной птицы основное внимание обращают на формирование живой массы в процессе роста и развития, а также на затраты корма на 1 кг живой массы. Перечисленные показатели являются ключевыми факторами при оценке способов и сроков выращивания цыплят-бройлеров (таблица 1).

Таблица 1 Основные показатели продуктивности цыплят-бройлеров

Показатель	Срок выращивания, суток				
	36	37	38	39	40
1 группа – напольное выращивание					
Живая масса, г	2152 ± 29,9	2211 ± 13,6**	2270 ± 19,5**	2335 ± 16,4**	2394 ± 20,8*
Среднесуточный прирост живой массы, г	58,3 ± 0,81	58,5 ± 0,37*	58,6 ± 0,51*	58,7 ± 0,42*	58,7 ± 0,51*
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг	1,70 ± 0,014	1,70 ± 0,011**	1,74 ± 0,015*	1,77 ± 0,012**	1,80 ± 0,016*
2 группа – выращивание в клетках					
Живая масса, г	2098 ± 16,3	2167 ± 8,8	2214 ± 9,2	2280 ± 11,5	2329 ± 14,3
Среднесуточный прирост живой массы, г	57,1 ± 0,48	57,3 ± 0,23	57,3 ± 0,24	57,6 ± 0,29	57,2 ± 0,31
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг	1,68 ± 0,024	1,74 ± 0,007	1,78 ± 0,008	1,81 ± 0,010	1,85 ± 0,011

Примечание: Достоверность разности оценена между 1 и 2 группами при * $p \leq 0,05$, ** $p \leq 0,01$, *** $p \leq 0,001$.

При напольном и клеточном выращивании птицы на протяжении 36 суток не отмечено достоверного превосходства по величинам живой массы и среднесуточного прироста и затрат кормов на 1 кг живой массы. Дальнейшее увеличение сроков выращивания дало достоверную разность по живой массе в пользу первой группы. Разница составила 44, 56, 55 и 65 г при сроках 37, 38, 39 и 40 суток соответственно. Такая же тенденция наблюдалась и по показателю среднесуточного прироста живой массы бройлеров. Разница составила 1,2, 1,3, 1,1 и 1,5 г при сроках 37, 38, 39 и 40 суток соответственно. В вариантах выращивания бройлеров на протяжении 37, 38, 39 и 40 суток зафиксированы достоверно меньшие затраты кормов на 0,04, 0,04, 0,04 и 0,05 кг соответственно. При этом превосходство

по данному показателю принадлежит птице, выращенной на полу. Это объяснимо, прежде всего, различием в изучаемых группах и вариантах по скорости роста и формирования живой массы. При этом количество задаваемого корма бройлерам при различных технологиях выращивания было одинаковым.

Использование клеточного и напольного способов выращивания цыплят-бройлеров имеет свои особенности. В частности, клеточное выращивание, по сравнению с напольным, позволяет использовать большую плотность посадки птицы в расчете на 1 м² производственной площади. Следовательно, при клеточном выращивании будут выше значения показателей выхода продукции с единицы производственной площади (таблица 2).

Таблица 2 Выход цыплят-бройлеров с 1 м² производственной площади

Показатель	Срок выращивания, суток				
	36	37	38	39	40
1 группа – напольное выращивание					
Плотность посадки, голов	19,0 ± 0,35	18,8 ± 0,25	18,8 ± 0,28	18,5 ± 0,29	18,7 ± 0,32
Выход товарного бройлера, голов	17,7 ± 0,37	17,5 ± 0,26	17,3 ± 0,29	17,3 ± 0,32	17,3 ± 0,31
Выход мяса в живой массе, кг	38,0 ± 0,88	38,7 ± 0,67	39,2 ± 0,70	40,5 ± 0,79	41,3 ± 0,79
2 группа – выращивание в клетках					
Плотность посадки, голов	27,6 ± 0,56	27,1 ± 0,35	26,9 ± 0,34	27,4 ± 0,33	26,8 ± 0,35
Выход товарного бройлера, голов	25,7 ± 0,61	25,0 ± 0,32	25,0 ± 0,32	25,1 ± 0,33	24,2 ± 0,35
Выход мяса в живой массе, кг	54,0 ± 1,30	55,2 ± 0,72	55,4 ± 0,80	57,2 ± 0,84	56,3 ± 0,97

Плотность посадки цыплят в первой группе была на уровне 18,5–19,0 гол/м² и в рассматриваемых возрастных вариантах не имела достоверных различий. Выход товарного бройлера составил 17,3–17,7 гол/м². На фоне увеличения живой массы бройлеров с возрастом и отсутствием достоверной разницы по выходу товарного поголовья в технологических вариантах выход мяса в живой массе постепенно возрастал с 38,0 до 41,3 кг. Плотность посадки птицы во второй группе была на уровне 26,8–27,6 гол/м² и в рассматриваемых возрастных вариантах также не имела достоверных различий. Выход товарного бройлера составила 24,2–25,7 гол/м². Выход мяса в живой массе в технологических вариан-

тах при клеточном выращивании колебался с 54,0 до 57,2 кг. За счет изначально большей величины плотности посадки цыплят при клеточном выращивании сравнивать между собой первую и вторую группы по выходу бройлеров и мяса в живой массе с 1 м² производственной площади не имеет смысла. При клеточном выращивании данные показатели всегда будут выше.

При выявлении оптимального технологического варианта выращивания цыплят-бройлеров целесообразно произвести расчеты по производству мяса (таблица 3). Данный расчет позволит найти количество продукции, произведенной за календарный год в исследуемых технологических вариантах содержания птицы.

Таблица 3 Расчеты производства мяса цыплят-бройлеров при клеточной и напольной технологиях с разными сроками выращивания

Показатель	Срок выращивания, суток				
	36	37	38	39	40
1 группа – напольное выращивание					
Продолжительность выращивания цыплят-бройлеров, суток	36	37	38	39	40
Профилактический перерыв, суток	21	21	21	21	21
Продолжительность производственного цикла, суток	57	58	59	60	61
Количество производственных циклов за год	6,40	6,29	6,19	6,08	5,98
Выход мяса в живой массе с 1 м ² производственной площади, кг за 1 цикл	38,0	38,7	39,2	40,5	41,3
Выход мяса в живой массе с 1 м ² производственной площади за год, кг	243,2	243,4	242,6	246,2	247,0
Убойный выход, %	72,9	72,9	73,3	73,3	73,3
Выход мяса в убойной массе с 1 м ² производственной площади за год, кг	177,3	177,4	177,8	180,5	181,1
2 группа – выращивание в клетках					
Продолжительность выращивания цыплят-бройлеров, суток	36	37	38	39	40
Профилактический перерыв, суток	21	21	21	21	21
Продолжительность производственного цикла, суток	57	58	59	60	61
Количество производственных циклов за год	6,40	6,29	6,19	6,08	5,98
Выход мяса в живой массе с 1 м ² производственной площади, кг за 1 цикл	54,0	55,2	55,4	57,2	56,3
Выход мяса в живой массе с 1 м ² производственной площади за год, кг	345,6	347,2	342,9	347,8	336,7
Убойный выход, %	72,8	72,6	72,8	73,5	73,6
Выход мяса в убойной массе с 1 м ² производственной площади за год, кг	251,6	252,1	249,6	255,6	247,8

По данным технологического расчета производства мяса цыплят-бройлеров с разными сроками выращивания, закономерно повышается продолжительность производственного цикла с 57 до 61 суток при одинаковой величине профилактического перерыва – 21 сутки. Соответственно в исследуемых вариантах выращивания изменяется количество производственных циклов за год с 6,4 при сроке выращивания 36 суток до 5,98 при сроке 40 суток. Выход мяса в живой массе с 1 м² производственной площади выше во второй группе при клеточной технологии выращивания цыплят-бройлеров. При этом большее значение данного показателя было в варианте выращивания на протяжении 39 суток – 57,2 кг. В первой группе выход мяса в живой массе был больше при выращивании птицы на протяжении 40 суток – 41,3 кг. Как в первой, так и во второй группе выход мяса в живой массе с 1 м² производственной площади имел меньшую величину в варианте выращивания на протяжении 36 су-

ток. Их значение было 38 и 54 кг соответственно.

Выход мяса в живой массе с 1 м² производственной площади за год имеет наибольшие величины при клеточной технологии выращивания – 336,7–347,8 кг. Большее значение данного показателя также было в варианте выращивания на протяжении 39 суток – 347,8 кг. В первой группе выход мяса в живой массе с 1 м² производственной площади за год составил 242,6–247 кг и был больше при выращивании птицы на протяжении 40 суток – 247 кг. Если в первой группе низким выходом живой массы с 1 м² характеризовались бройлеры со сроком выращивания 38 суток (242,6 кг), то во второй группе меньший выход зафиксирован у птицы, выращиваемой 40 суток (336,7 кг).

Убойный выход тушек в первой группе повысился с 72,9 % в возрастных вариантах 36–37 суток выращивания до 73,3 % в остальных возрастных вариантах. Во второй группе мини-

мальное значение убойного выхода было в возрастном варианте 37 суток (72,6 %). В вариантах 36 и 38 суток убойный выход составил 72,8 %, а далее с повышением сроков выращивания он увеличился до 73,5–73,6 %. Выход мяса в убойной массе 1 м² производственной площади за год имел схожую тенденцию с показателем выхода мяса в живой массе 1 м² производственной площади за год.

Выявление оптимального технологического варианта выращивания цыплят-бройлеров требует проведения экономической оценки. Расчет параметров экономической оценки производили с учетом вычисленных ранее показателей продуктивности цыплят-бройлеров и выхода мяса в убойной массе с 1 м² производственной площади птичников. Цену реализации 1 кг убойной массы бройлеров рассчитали на основании дан-

ных годовых отчетов о производственно-экономической деятельности ООО «Удмуртская птицефабрика». Себестоимость 1 кг убойной массы в группах и различных технологических вариантах вычислили с учетом фактически произведенных затрат по следующим статьям: стоимость суточного цыпленка, затраты на корма, затраты на выращивание, оплата труда персонала, затраты на энергоносители и ветеринарное обслуживание и другие. Учитывали затраты на покупку и амортизацию технологического оборудования при напольном и клеточном выращивании птицы. В первой группе также были учтены затраты на подстилочный материал (древесные опилки). Результаты экономической оценки производства мяса цыплят-бройлеров в расчете на 1 м² производственной площади за год сведены в таблицу 4.

Таблица 4 Показатели экономической оценки производства мяса цыплят-бройлеров в расчете на 1 м² производственной площади за год

Показатель	Срок выращивания, суток				
	36	37	38	39	40
1 группа – напольное выращивание					
Выход мяса в убойной массе, кг	177,3	177,4	177,8	180,5	181,1
Цена реализации 1 кг убойной массы, руб.	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
Выручка от реализации убойной массы, тыс. руб.	16,49	16,50	16,54	16,79	16,84
Себестоимость 1 кг убойной массы, руб.	75,20	75,62	76,46	77,10	77,73
Затраты на производство убойной массы, тыс. руб.	13,33	13,41	13,59	13,92	14,08
Прибыль, тыс. руб.	3,16	3,09	2,95	2,87	2,76
Уровень рентабельности, %	23,71	23,04	21,71	20,62	19,6
2 группа – выращивание в клетках					
Выход мяса в убойной массе, кг	251,6	252,1	249,6	255,6	247,8
Цена реализации 1 кг убойной массы, руб.	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
Выручка от реализации убойной массы, тыс. руб.	23,40	23,45	23,21	23,77	23,05
Себестоимость 1 кг убойной массы, руб.	73,62	74,46	75,31	75,94	76,79
Затраты на производство убойной массы, тыс. руб.	18,52	18,77	18,80	19,41	19,03
Прибыль, тыс. руб.	4,88	4,68	4,41	4,36	4,02
Уровень рентабельности, %	26,35	24,93	23,46	22,46	21,12

В первой группе при выращивании на глубокой подстилке с повышением выхода мяса в убойной массе с 1 м² производственной площади за год закономерно увеличилась выручка от ее реализации с 16,49 до 16,84 тыс. рублей. Однако и себестоимость 1 кг убойной массы в исследуемых возрастных вариантах также повысилась с 75,2 до 77,73 рублей. Прежде всего повышение себестоимости 1 кг убойной массы было связано с увеличением затрат кормов на 1 кг прироста с повышением срока выращивания бройлеров. Рост показателя себестоимости закономерно обеспечил увеличение затрат на производство убойной массы с 1 м² производственной площади за год. Затраты на производство изменились с 13,33 тыс. рублей при сроке выращивания 36 суток до 14,08 тыс. рублей при сроке выращивания 40 суток. Повышение производственных затрат в исследуемых вариантах было в пределах 80–330 рублей при увеличении сро-

ков выращивания. Максимальная прибыль и уровень рентабельности зафиксированы в первом возрастном варианте. Их величины составили 3,16 тыс. рублей и 23,71 % соответственно. С повышением срока выращивания происходило постепенное снижение значений прибыли и уровня рентабельности. Так в варианте выращивания цыплят-бройлеров на протяжении 40 дней прибыль составила лишь 2,76 тыс. рублей, а уровень рентабельности – 19,6 %.

Во второй группе при выращивании в клеточных батареях «Avimax» большая выручка от реализации мяса в убойной массе с 1 м² производственной площади за год была в варианте 39 суток – 23,77 тыс. рублей. Она была обусловлена высоким выходом мяса в убойной массе, который составил 255,6 кг. В технологических вариантах выращивания бройлеров 36, 37 и 38 суток выручка от реализации мяса была ниже, чем в 39 суток, на 370, 320 и 560 рублей соответ-

ственно. Низкой выручка от реализации оказалась в последнем возрастном варианте – 23,05 тыс. рублей – за счет меньшего выхода мяса в убойной массе – 247,8 кг. Как и в первой группе, себестоимость 1 кг убойной массы в исследуемых возрастных вариантах повышалась с 73,62 до 76,79 рублей. Повышение себестоимости 1 кг убойной массы также было связано с увеличением затрат кормов на 1 кг прироста при увеличении срока выращивания цыплят-бройлеров. Минимальными затратами на производство 1 кг убойной массы характеризовался вариант с меньшим сроком выращивания – 36 суток. Их величина составила 18,52 тыс. рублей, что ниже, чем в остальных вариантах, на 250–890 рублей. Большая величина производственных затрат была при выращивании птицы на протяжении 39 суток – 19,41 тыс. рублей. Высоким значением прибыли и уровнем рентабельности характеризовался вариант со сроком выращивания 36 суток: 4,88 тыс. рублей и 26,35 % соответственно. Это обусловлено низкой себестоимостью 1 кг мяса в убойной массе (73,62 рубля) и средним значением выручки при его реализации (23,4 тыс. рублей). В остальных возрастных вариантах с повышением срока выращивания наблюдалось снижение прибыли и уровня рентабельности на 50–340 рублей и 0,05–0,34 % соответственно. При этом меньшие прибыль и уровень рентабельности были при сроке выращивания 40 суток.

Сравнивая показатели экономической оценки между первой и второй группами при аналогичных сроках выращивания, можно сказать следующее. Цена реализации мяса в убойной массе во всех технологических вариантах и вне зависимости от технологии выращивания птицы была одинаковой и составила 93 рубля за

1 кг. Большей выручкой от реализации мяса во всех возрастных вариантах характеризовалась вторая группа. Данный факт закономерен, так как при клеточном выращивании выход мяса в убойной массе с 1 м² производственной площади выше, чем при напольном содержании бройлеров. Себестоимость 1 кг убойной массы оказалась ниже во всех технологических вариантах второй группы на 0,94–1,58 рублей по сравнению с первой группой. При этом разница в себестоимости сокращалась с повышением сроков выращивания птицы. Более высокая себестоимость мяса при напольном выращивании в первую очередь обусловлена меньшим выходом мяса с 1 м² производственной площади в таких птичниках. Затраты на производство убойной массы были выше во второй группе на 4,95–5,49 рублей за 1 кг. Однако прибыль от реализации мяса также была выше во второй группе на 1,26–1,72 тыс. рублей с каждого квадратного метра производственной площади. Во всех возрастных вариантах уровни рентабельности производства мяса были больше при клеточном выращивании птицы. Разница по уровням рентабельности между группами составила 1,52–2,64 %.

Выводы. При увеличении сроков выращивания бройлеров рост показателя выхода мяса с 1 м² производственной площади за год был зафиксирован лишь при напольной технологии. При клеточной технологии не выявлено четких тенденций к увеличению или снижению выхода мяса с 1 м² производственной площади за год. Экономически целесообразнее производить мясо при клеточном выращивании цыплят-бройлеров. Большие прибыль и уровень рентабельности получены при сроке выращивания 36 суток вне зависимости от способа содержания.

Библиографический список

1. Астраханцев, А.А. Влияние сроков выращивания цыплят-бройлеров на продуктивные качества и эффективность производства мяса [Текст] / А.А. Астраханцев, И.Н. Ворошилов // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2014. № 3 (27). С. 92–96.
2. Астраханцев, А.А. Влияние плотности посадки на продуктивность цыплят-бройлеров при различных сроках выращивания [Текст] / А.А. Астраханцев // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2015. № 1 (33). С. 45–48.
3. Астраханцев, А.А. Продуктивность цыплят-бройлеров при различных технологических вариантах выращивания [Текст] / А.А. Астраханцев // Птицеводство. 2019. № 1. С. 26–30.
4. Буяров, А.С. Эффективность современных технологий выращивания цыплят-бройлеров [Текст] / А.С. Буяров, А.С. Подчуфарова // Агротехника и энергообеспечение. 2017. № 1. Т. 1. С. 11–18.
5. Гадиев, Р.Р. Продуктивные качества цыплят-бройлеров при различных технологиях выращивания [Текст] / Р.Р. Гадиев, А.Б. Чарыев // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2015. № 6 (56). С. 164–166.
6. Гадиев, Р.Р. Интенсификация производства мяса цыплят-бройлеров [Текст]: монография / Р.Р. Гадиев, А.Б. Чарыев. Уфа: Башкирский ГАУ, 2017. 224 с.
7. Гайнуллина, М.К. Современные проблемы технологии производства мяса цыплят-

бройлеров [Текст] / М.К. Гайнуллина, А.Л. Капитонова // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 2012. Т. 212. С. 273–276.

8. Кулова, Ф.М. Влияние различных способов содержания цыплят-бройлеров на динамику живой массы [Текст] / Ф.М. Кулова, А.Н. Карапетян // Аграрная наука: поиск, проблемы, решения: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, доктора сельскохозяйственных наук, профессора В.М. Куликова, 8–10 дек. 2015 г. Волгоград: Волгоградский государственный аграрный университет, 2015. С. 269–271.

9. Методика проведения исследований по технологии производства яиц и мяса птицы [Текст] / Под ред. В.С. Лукашенко. Сергиев Посад: ВНИТИП, 2015. 103 с.

10. Продуктивность и качество мяса бройлеров при различных способах и сроках выращивания [Текст] / В.И. Фисинин, В.С. Лукашенко, И.П. Салеева [и др.] // Птицеводство. 2017. № 11. С. 2–5.

11. Роженцов, А.Л. Эффективность технологии выращивания цыплят-бройлеров различных кроссов [Текст] / А.Л. Роженцов, С.Ю. Смо-

ленцев // Ветеринарный врач. 2019. № 1. С. 55–59.

12. Руководство по выращиванию бройлерного поголовья ROSS 308. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.aviagen.com/assets/Tech_Center/Ross-Broiler-Handbook-2014-RU.pdf (дата обращения 21.11.2019).

13. Садовов, Н.А. Сравнительная характеристика клеточного и напольного способов содержания цыплят-бройлеров [Текст] / Н.А. Садовов, В.И. Микулич // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. 2015. № 18-1. С. 166–167.

14. Юдин, М.Ф. Технология содержания бройлеров [Текст] / М.Ф. Юдин, Ю.В. Матросова, Д.С. Брюханов // Актуальные вопросы биотехнологии и ветеринарной медицины: теория и практика: материалы национальной науч. конф. Института ветеринарной медицины, 24–25 мая 2018 г. Троицк: Южно-Уральский государственный аграрный университет, 2018. С. 174–178.

15. Яськова, Е.В. Эффективность современных технологий выращивания цыплят-бройлеров [Текст] / Е.В. Яськова, О.Н. Сахно, А.В. Лыткина // Биология в сельском хозяйстве. 2015. № 2. С. 47–58.

Сведения об авторе

Астраханцев Антон Анатольевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры частного животноводства, ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 11, 426000, e-mail: antonzif@list.ru.

Птицеводческие предприятия практикуют напольный и клеточный способы выращивания цыплят-бройлеров. Для обоих вариантов разработаны свои технологические приемы, позволяющие производить максимальные объемы мяса птицы. При этом выбор конкретного способа выращивания во многом зависит от условий и возможностей птицеводческих предприятий. Нами оценена эффективность производства мяса цыплят-бройлеров при напольном и клеточном способах с учетом сроков выращивания (36–40 суток). Исследование проводили в ООО «Удмуртская птицефабрика» на цыплятах-бройлерах кросса «Росс 308». Сформированы две группы птицы: 1 группа – содержание бройлеров на полу с использованием глубокой подстилки, 2 группа – содержание птицы в клеточных батареях «AviMax» в четырехъярусном исполнении. Внутри каждой группы были выделены различные варианты, которые отличались продолжительностью выращивания бройлеров: 36, 37, 38, 39 и 40 суток. На продуктивность

цыплят-бройлеров оказали влияние способы содержания: напольный и клеточный. При напольном содержании птицы имеют большую интенсивность роста, чем при клеточном, на протяжении 37–40 суток выращивания. В вариантах выращивания бройлеров на протяжении 37, 38, 39 и 40 суток зафиксированы достоверно меньшие затраты кормов на 1 кг прироста живой массы. При увеличении сроков выращивания бройлеров рост показателя выхода мяса с 1 м² производственной площади за год был зафиксирован лишь при напольной технологии. При клеточной технологии не выявлено четких тенденций к увеличению или снижению выхода мяса с 1 м² производственной площади за год. Экономически целесообразнее производить мясо при клеточном выращивании цыплят-бройлеров. В разрезе технологических вариантов большая прибыль и уровень рентабельности получены при сроке выращивания 36 суток вне зависимости от клеточной или напольной системы содержания.

EFFICIENCY IN BROILER CHICKEN MEAT PRODUCTION UNDER VARIOUS METHODS AND PERIODS OF RAISING

Key words: broiler chickens; floor technology; in-cage raising; meat yield; floor space per bird.

Authors' personal details

Astrakhantsev Anton, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Private Animal Husbandry, Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, Studentskaya St., 11, 426000, e-mail: antonzif@list.ru.

Poultry farms practise floor and in-cage technologies of raising broiler chickens. Based on the technologies we have developed our own techniques that can result in maximum poultry meat yields. The method of raising chickens depends largely on the conditions and productive potential of poultry farms. We have evaluated the efficiency of broiler chicken meat production under both floor and in-cage methods and considered the length of raising (36–40 days). The study was conducted based on ООО (LLC) «Udmurt poultry farm». The broiler chickens of «Ross 308» cross were studied. Two groups were formed: Broiler chickens of group 1 were kept on the floor using deep bedding; broiler chickens of group 2 were kept in Avimax 4-tier batteries. Different variants were identified within each group; the variants differed in the length of raising, they were 36, 37, 38,

39 and 40 days. The method of keeping (floor and in-cage) influenced the productivity of broiler chickens. The floor technology resulted in a greater growth rate than the in-cage method when broiler chickens were raised for 37–40 days. The variants where broiler chickens were bred for 37, 38, 39 and 40 days demonstrated significantly lower feed costs per 1 kg of live weight gain. When the period of raising was increased the floor technology showed higher meat yields per 1 m² floor space per year. The in-cage technology did not result in any significant trends for an increase or decrease in the meat yield per 1 m² floor space per year. Still, the in-cage technology is considered economically viable for raising broiler chickens. A larger income and higher profitability are obtained when broiler chickens are bred for 36 days, regardless of the floor and in-cage keeping conditions.

© Астраханцев А.А.

УДК 636.2.053.084.087.8

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-61-66

А.А. Башаров, А.Р. Гайфулина, Б.Р. Шагивалеев

ВЛИЯНИЕ ПРЕБИОТИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ВЕТОКИСЛИНКА» НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ТЕЛЯТ МОЛОЧНОГО ПЕРИОДА

Ключевые слова: телята молочного периода; пребиотик «ВетоКислинка»; органические кислоты; микрофлора фекалий; среднесуточный прирост; расход кормов.

Введение. Для нормализации естественной микрофлоры кишечника животных и птицы вводят такие препараты, как пребиотики. В желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), в тонком отделе кишечника эти субстраты выступают питательной средой для кишечных микроорганизмов [1]. Лактулоза – основной пребиотик – поступает в организм млекопитающих с молоком с первых дней жизни [2]. В организме сельскохозяйственных животных и птицы пищевые волокна мембранных растений, свеклы, моркови, пектин, отруби выполняют большую роль по улучшению моторики желудочно-кишечного тракта, адсорбированию токсинов, а также предотвращают запоры и нормализуют микрофлору [3–7].

Основной компонент препаратов, которые относятся к пребиотикам – органические кислоты, а именно селацид, асид лак, филакс, физал, селко-АПС, и др. Эффект от использования пребиотических препаратов по результативности использования в рационе животных и птицы в рационе животных и птицы не уступает антибиотикам кормового и ветеринарного назначения. Их преимущество состоит в том, что они не вызывают побочных факторов в организме живых существ. Примерные дозировки пребиотиков составляют по препаратам: у селацида – 1–5 кг, асид лак – 3 кг/т комбикорма филакс – 0,5 кг, селко-АПС – 2–3 кг физал – 1–3 кг [8–9].

Органические кислоты отличаются химическим составом, однако обладают идентичным механизмом воздействия на живой организм. Влияют на уровень pH граммотрицательных бактерий внутри клеток, разрушают клеточные оболочки данных микроорганизмов и угнетают ход метаболизма. В то же время кислоты связаны с энергетическим потенциалом и аккумуляцией токсичных анионов бактерий [10, 11]. По итогам опытных данных было установлено, что действие веществ усиливается при комплексном применении. Например, при комплексном применении фумаровой, муравьиной, фосфорной кислот было установлено изменение pH среды в сторону уменьшения. Данное явление связано с различными химическими свойствами, в том числе с константами диссоциации этих кислот, так наблюдается распад при разных уровнях pH в отделах ЖКТ и оказывается регулятивное воздействие на pH, обеззараживающее воздействие на *E. coli* и *Salmonella*. Органические кислоты (лимонная, молочная, масляная) эффективно влияют на функционирование ферментов поджелудочной железы.

ООО «НВП БашИнком» (Уфа, 2019) разработало и рекомендовало животноводству новую кормовую добавку пребиотического действия «ВетоКислинка» производства по ТУ 10.91.10-120-20672718-2019. Пребиотик «ВетоКислинка» активен для снижения уровня патогенной и условно-патогенной микрофлоры ЖКТ животных и птицы. Используется с добавлением в воду для поения, с целью оптимизации хода пищеварения у сельскохозяйственных животных, в том числе и у телят молочного периода. Создана на основе действующего действующих веществ и сульфата меди, органических кислот: уксусной, муравьиной, пропионовой, молочной, лимонной, стабилизатора глицина и растворителя, которые добавляются в воду в определенных дозах, обычно это 0,8–1,0 л подкислителя на тонну водопроводной воды (pH = 7,0), для поддержания оптимального pH воды (5,0–6,0). Использование при кормлении телят молочного периода подкислителей (пребиотиков) – резерв повышения качества питьевой воды, молочных кормов, развития полезной микрофлоры кишечника, что в конечном счете увеличивает продуктивные качества сельскохозяйственных животных и птицы.

Цель работы: изучение влияния пребиотика «ВетоКислинка» на микробиоценоз ЖКТ и интенсивность роста телят молочного периода.

Методика исследований. Исследования выполнены в ООО Агрофирма «Николаевская» МР Уфимский район Республики Башкортостан в течение 83 дней на телятах молочного периода черно-пестрой породы. На телятах был использован пребиотик «ВетоКислинка» от ООО «НВП «БашИнком».

В научно-хозяйственных опытах телят разделили на четыре группы, подбор животных вели методом пар-аналогов. 10 голов телят (6–10 дней от рождения) в каждой группе разного пола (50 % бычки + 50 % телочки). Условия содержания и кормления в различных группах идентичны принятому в хозяйствах рационом. Телята первой группы (контроль) получали базовый рацион (БР) без пребиотика.

Таблица 1 Доза пребиотика на 1 л питьевой воды

Группа	Дозировка пребиотика, мл
1 (контрольная)	Без добавления препарата
2 опытная	0,8
3 опытная	1,0
4 опытная	1,2

Добавку «ВетоКислинка» предварительно разбавляли питьевой водой в пропорции 1 : 3. В период эксперимента в целом выпоено на одну голову 18 л цельного молока, 323 л заменителя цельного молока «Евролак Турбо», скормлено 17,5 кг вико-овсяного сена, а также 30,8 кг разнотравного сенажа и 85,4 кг смеси концентратов. В расчете на энергетическую кормовую единицу (ЭКЕ) израсходовано 148 г перевариваемого протеина.

В ходе научно-хозяйственного опыта один раз в месяц, в одно и то же время, за два часа до кормления телят взвешивали.

При исследовании состава микробиоценоза желудочно-кишечного тракта телят молочного периода на 83-й день опыта одновременно проводили типизацию микроорганизмов, а именно лакто-, бифидобактерий и эшерихий. Фекальные образцы собирали из прямой кишки в стерильных резиновых перчатках в стерильные пластиковые пробирки и помещали их в морозильную камеру при –20 °С до анализа на количество кишечной палочки, лакто- и бифидобактерий. In vitro выживаемость и подсчет *E. coli* определяли по методике Gue et al. (2006).

Статистический анализ выполнен с использованием программы Statistica 10 (компания Stat soft). Количественные данные представлены в виде среднего показателя и ошибки средней ($\bar{X} \pm Sx$). О достоверности межгрупповых различий судили с помощью значения критерия t Стьюдента. Различия в сравниваемых группах считались статистически значимыми при уровне ошибки первого уровня (p) менее 0,05.

Результаты исследований. Определено, что в результате кормления пребиотиком «ВетоКислинка» телят третьей опытной группы – в дозе добавки 1,0 мл на 1 л питьевой воды при pH воды 6,0; телят четвертой группы – 1,2 мл / 1 л питьевой воды при pH воды 5,4 произошло повышение в образцах фекалий количества лактобактерий на 30,0–46,4 % и бифидобактерий на 32,5–42,5 % соответственно при снижении эше-

рихии на 27,7–29,0 % ($p < 0,05$) по сравнению с контролем, где рН воды было 7,36. При введении пребиотика в дозе 0,8 мл / 1 л питьевой воды (рН воды 6,75) разница в показателях изменения количества микрофлоры оказалась статистически не достоверной (рисунок 1).

Заболеваний и падежа за время проведения научно-хозяйственного опыта в контроле и под-

опытных группах не отмечено: сохранность телят составила 100 %. По сравнению с контролем среднесуточный прирост телят в третьей опытной группе составил 9,8 % (рисунок 2); данное изменение живой массы наблюдалось при снижении количества кормов на 8,8 % на 1 кг живой массы (рисунок 3).

Рисунок 1
Микробиоценоз фекалий телят в 3-месячном возрасте, млн КОЕ/г ($X \pm Sx$, $n = 3$)

Рисунок 2
Изменение среднесуточного прироста телят по группам, г

Рисунок 3
Расход кормов в ЭКЕ на 1 кг прироста телят

Выводы. Исследованиями установлена эффективность доз пребиотической кормовой добавки «ВетоКислинка». Доза в 1 мл / 1 л питьевой воды, использованная в третьей опытной группе, оказала наибольшее положительное воздействие на микробный пейзаж фекалий у телят, что подтверждено статистически. Определено

достоверное увеличение численности нормофлоры: лактобактерий и бифидобактерий, а также снижение эшерихий. В третьей экспериментальной группе среднесуточный прирост телят был значительно выше – на 9,8 %, а расход кормов снизился на 8,8 % при сравнении с контролем.

Библиографический список

1. Долженкова, Г.М. Особенности потребления и использования энергии рационов при применении комплексной добавки Биодарин в кормлении коров [Текст] / Г.М. Долженкова, Н.Г. Гатауллин, Х.Х. Тагиров // Животноводство и кормопроизводство. 2017. № 2 (98). С. 73–78.
2. Железко, А.Ф. Зоогигиеническое обоснование введения органических подкислителей в рацион телят [Текст] / А.Ф. Железко // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. 2018. № 21-1. С. 267–273.
3. Камильянов, А.А. Влияние пробиотика Витафорт на продуктивные, морфологические и биохимические показатели крови ягнят [Текст] / А.А. Камильянов, Ф.С. Хазиахметов // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5. С. 753.
4. Камильянов, А.А. Рост и развитие ягнят при использовании пробиотика «Витафорт» [Текст] / А.А. Камильянов, Ф.С. Хазиахметов // Вестник Башкирского ГАУ. 2014. № 4. С. 54–56.
5. Кормление сельскохозяйственной птицы [Текст] / Ф.С. Хазиахметов, Х.Г. Ишмуратов, А.Е. Андреева, Г.М. Казбулатов. Уфа: Башкирский ГАУ, 2011. 132 с.
6. Фаритов, Т.А. Практическое собаководство [Текст] / Т.А. Фаритов, Ф.С. Хазиахметов, Е.А. Платонов. СПб.: Лань, 2012. 448 с.
7. Хабилов, А.Ф. Влияние пробиотика Витафорт на состав и динамику кишечной микрофлоры гусят-бройлеров и поросят-отъемышей [Текст] / А.Ф. Хабилов, Ф.С. Хазиахметов // Состояние и перспективы увеличения производства высококачественной продукции сельского хозяйства: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Уфа: Башкирский ГАУ, 2015. С. 94–97.
8. Хазиахметов, Ф.С. Интенсификация производства свинины при использовании нетрадиционных кормов и добавок [Текст] / Ф.С. Хазиахметов. Уфа, 2006. 225 с.
9. Хазиахметов, Ф.С. Рациональное кормление животных [Текст] / Ф.С. Хазиахметов. СПб.: Лань, 2017. 364 с.
10. Хапцева, О.Ж. Влияние подкислителя на микрофлору желудочно-кишечного тракта телят [Текст] / О.Ж. Хапцева // Вестник ветеринарии. 2011. № 4 (59). С. 35–36.
11. Influence of probiotics «Stimix Zoostim» on the microflora of faeces, hematological indica-

tors and intensivity of growth of calves of the dairy period. Khaziakhmetov F., Khabirov A., Rebezov M., Basharov A., Ziangulov I., Okuskhanova E.

International Journal of Veterinary Science. 2018. Т. 7. № 4. С. 178–181.

Сведения об авторах

1. **Башаров Алмаз Агиянович**, старший преподаватель кафедры физиологии, биохимии и кормления животных, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: bashalmaz@mail.ru.

2. **Гайфуллина Альфия Равильевна**, аспирант кафедры физиологии, биохимии и кормления животных, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: alfiya.gayfullina.1993@mail.ru.

3. **Шагивалеев Булат Рауфович**, магистрант кафедры физиологии, биохимии и кормления животных, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: shagivaleev.96@mail.ru.

Рассмотрено влияние пребиотической кормовой добавки «ВетоКислинка» на микрофлору фекалий и активность роста телят молочного возраста. Телята группы «контроль» получали базовый рацион без пребиотика. Телятам опытных групп в базовый рацион ежедневно добавляли пребиотик «ВетоКислинка» в дозах 0,8; 1,0 и 1,2 мл в расчете на 1 л питьевой воды с 6–10-до 90-дневного возраста, периодичность – ежедневно 2 раза в сутки (по 50 % суточной нормы). Установлено, что наиболее эффективной дозировкой пребиотической кормовой добавки «ВетоКислинка» является доза 1 мл на 1 л питьевой

воды (третья опытная группа), которая оказала положительное воздействие на микробный пейзаж фекалий у телят. Увеличение численности нормофлоры – лактобактерий и бифидобактерий, а также снижение эшерихий статистически достоверно. Заболеваний и падежа за время проведения научно-хозяйственного опыта в контрольной и подопытных группах не отмечено. Сохранность – 100 %. Показатели среднесуточного прироста телят третьей опытной группы превосходили первую контрольную на 9,8 %, затраты кормов на 1 кг живой массы снижены на 8,8 %.

A. Basharov, A. Gayfullina, B. Shagivaleev

EFFECT OF THE PREBIOTIC FEED ADDITIVE «VETOKISLINKA» ON THE MICROBIocenosis OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN CALVES OF THE BIRTH-TO-WEANING PERIOD

Key words: calves of the birth-to-weaning period; prebiotic additive "VetoKislinka"; organic acids; fecal microflora; average daily weight gain; feed consumption.

Authors' personal details

1. **Basharov Almaz**, Senior Lecturer of the Department of Physiology, Biochemistry and Animal Feeding, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Otyabrya str., 34, e-mail: bashalmaz@mail.ru.

2. **Gaifullina Alfiya**, Post-graduate student of the Department of Physiology, Biochemistry and Animal Feeding, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Otyabrya str., 34, e-mail: alfiya.gayfullina.1993@mail.ru.

3. **Shagivaleev Bulat**, master's degree student of the Department of Physiology, Biochemistry and Animal Feeding, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Otyabrya str., 34, e-mail: shagivaleev.96@mail.ru.

The study considers the effect of the prebiotic feed additive «VetoKislinka» on the faecal microflora and growth activity in calves of the birth-to-weaning period. Calves of the control group received a basic diet without a prebiotic supplement. The prebiotic «Vetokislinka» was added daily to the basic diet for calves of the test groups at doses of

0,8, 1,0 and 1,2 ml per 1 liter of drinking water twice a day (50 % of the daily rate), daily from the age of 6–10 to 90 days. The study found that the dose of 1 ml / 1 liter of drinking water (given to the third test group) was the most effective; the given dose of the prebiotic additive had a positive effect on the microbial landscape of faeces in calves. Both an in-

creased number of lactobacilli and bifidobacteria and a decreased number of Escherichia demonstrated statistical significance. No disease or death cases were reported in the control and test groups during the scientific and farm-based experiment.

© Башаров А.А., Гайфулина А.Р., Шагивалеев Б.Р.

Liveability of calves was 100 %. The third test group exceeded the control group in the average daily weight gain by 9,8 %, and feed costs per 1 kg of live weight were 8,8 % lower.

УДК 636.082

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-66-70

Н.М. Губайдуллин, В.И. Косилов, И.Р. Газеев, Е.М. Ермолова

ВЛИЯНИЕ СКРЕЩИВАНИЯ КРАСНОГО СТЕПНОГО И ЧЕРНО-ПЕСТРОГО СКОТА С СИММЕНТАЛАМИ НА КАЧЕСТВО МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ПОМЕСНОГО МОЛОДНЯКА

Ключевые слова: скотоводство; симментальская порода; помеси бычки; мясная туша; морфологический состав.

Введение. В настоящее время обеспечение населения страны высококачественными, биологическими полноценными продуктами питания является основной задачей агропромышленного комплекса Российской Федерации [1–6]. С этой целью необходимо задействовать ресурсы всех отраслей АПК. Отмечается дефицит мясного сырья, являющегося основным источником полноценного белка [7–10]. Для увеличения объемов ее производства необходимо добиваться рационального использования генетических ресурсов отрасли скотоводства. Перспективным в решении этой задачи является использование различного рода помесей, полученных при межпородном скрещивании скота разного направления продуктивности.

В последнее время внимание селекционеров привлекает симментальская порода скота. Она отличается комплексом хозяйственнополезных признаков. Это в первую очередь высокая интенсивность роста на протяжении длительного периода выращивания и, как следствие этого, достижение большой живой массы, великорослость, широкое, глубокое и растянутое туловище, высококачественное, биологически полноценное мясо – говядина. Эти ценные качества симментальская порода устойчиво передает потомству как при чистопородном разведении, так и межпородном скрещивании.

На Южном Урале в молочном скотоводстве используются животные красной степной и черно-пестрой пород. Выбранжированные по разным причинам из основного стада коровы этих пород при условии сохранения воспроизводительной способности могут служить основой при получении помесного молодняка. Эти животные при интенсивном выращивании могут

стать источником получения мясного сырья высокого качества.

Целью исследования являлась оценка качественных показателей мясной продукции от чистопородных и помесных бычков.

Условия, материалы и методы исследования. При проведении экспериментальной части работы объектом исследования являлись чистопородные бычки симментальской породы (I группа), помеси $\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ красная степная (II группа), помеси $\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ черно-пестрая (III группа). Бычки всех генотипов содержались при круглогодичном стойловом выращивании на откормочной площадке ЗАО «Маяк» Оренбургской области. В 18-месячном возрасте по методике ВАСХНИЛ, ВИЖ, ВНИИМП (1977) был проведен контрольный убой по 3 бычка из каждой группы. При этом были получены туши I категории упитанности массой: I группа – 287,9 кг, II группа – 266,1 кг, III группа – 300,3 кг.

С целью оценки качества мясной продукции, полученной при убое бычков разных генотипов, была проведена обвалка правых полутуш и жиловка мякоти. По результатам обвалки и жиловки был определен морфологический состав полутуши и соотношения тканей в ней.

Результаты исследования. Полученные данные и их анализ свидетельствуют о влиянии генотипа на массу полутуши (таблица 1).

При этом максимальной её величиной отличались помеси ($\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ черно-пестрая) III группы. Чистопородные бычки симментальские бычки I группы и помесный молодняк ($\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ красная степная) II группы уступали им по массе полутуши на 7,8 кг (5,5 %, $P < 0,01$) и 17,9 кг (13,6 %, $P < 0,001$) соответ-

ственно. В свою очередь чистопородные бычки симментальской породы I группы превосходили помесей (помеси $\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ красная степная) II группы по величине анализируемого показателя на 10,1 кг (7,7 %, $P < 0,01$).

Отмечено влияние генотипа бычков на качество мясной полутуши, о чем свидетельствует выход ее съедобной части – мякоти. При этом наблюдалось лидирующее положение помесных бычков ($\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ черно-пестрая) III группы по выходу мякоти. Достаточно отметить, что их преимущество над чистопородными

бычками симментальской породы I группы по абсолютной массе мякоти составляло 8,1 кг (7,3 %, $P < 0,01$), относительной – 1,3 %. Превосходство над помесным молодняком ($\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ красная степная) II группы на величине анализируемых показателей было более существенным и составляло соответственно 17,9 (17,6 %, $P < 0,001$) и 2,7 %. Характерно, что минимальной величиной как абсолютной, так и относительной массой мякоти полутуши отличались помесные (помеси $\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ красная степная) бычки II группы.

Таблица 1 Морфологический состав полутуши бычков подопытных групп в возрасте 18 мес.

Показатель		Группа					
		I		II		III	
		показатель					
		X ± Sx	C _v	X ± Sx	C _v	X ± Sx	C _v
Масса полутуши, кг		141,9 ± 2,14	2,43	131,8 ± 2,28	2,56	149,7 ± 2,21	2,43
Мякоть	кг	111,4 ± 2,01	2,33	101,6 ± 2,12	2,47	119,5 ± 2,23	2,54
	%	78,5 ± 0,43	1,14	77,1 ± 0,52	1,36	79,8 ± 0,55	1,46
в т. ч. мышечная ткань	кг	93,8 ± 1,12	1,81	85,7 ± 1,24	1,93	101,5 ± 1,36	2,02
	%	66,1 ± 0,66	1,10	65,0 ± 0,72	1,94	67,8 ± 0,70	1,82
в т. ч. жировая ткань	кг	17,6 ± 0,94	1,92	15,9 ± 0,96	1,97	18,0 ± 0,99	2,10
	%	12,4 ± 0,33	1,28	12,1 ± 0,43	1,84	12,0 ± 0,40	1,77
Кости	кг	25,8 ± 0,89	1,33	23,8 ± 0,94	1,90	25,9 ± 0,99	1,97
	%	18,2 ± 0,64	1,10	18,1 ± 0,77	1,43	17,3 ± 0,82	1,73
Хрящи и сухожилия	кг	4,7 ± 0,11	1,02	6,4 ± 0,21	1,36	4,3 ± 0,24	1,49
	%	3,3 ± 0,10	1,05	4,8 ± 0,16	1,24	2,9 ± 0,14	1,18

Они уступали чистопородным бычкам симментальской породы I группы по абсолютной массе мякоти на 9,8 % (9,6 %, $P < 0,01$), относительной – на 1,4 %.

При анализе выхода мышечной ткани полутуши установлены такие же межгрупповые различия, что и по массе мякоти. При этом максимальной как абсолютной, так и относительной массой мышечной ткани отличались помеси ($\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ черно-пестрая) III группы. Чистопородные бычки симментальской породы I группы и ее полукровные помеси с красным степным скотом II группы уступали им по величине первого показателя соответственно на 7,7 кг (8,2 %, $P < 0,01$) и 15,8 кг (18,4 %, $P < 0,001$), второго – на 1,7 % и 2,8 %. В свою очередь чистопородный симментальский молодняк I группы превосходил помесей ($\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ красная степная) II группы по абсолютной массе мышечной ткани на 8,1 кг (9,4 %, $P < 0,01$), относительной массе – на 1,1 %.

Что касается жировой ткани и соединительно-тканых образований, то существенных межгрупповых различий не отмечалось.

Костная ткань является одним из основных структурных элементов мясной туши. Большое ее содержание снижает качество мяса. В то же время плохое развитие костной ткани оказывает отрицательное влияние на выраженность мясности туши.

Полученные данные морфологического состава полутуши и их анализ свидетельствуют, что минимальной абсолютной массой костной ткани отличались помеси ($\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ красная степная) II группы. У чистопородных бычков симментальской породы и помесного молодняка ($\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ черно-пестрая) III группы изучаемый показатель находился практически на одном уровне и был выше, чем у помесных сверстников ($\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ красная степная) II группы на 2,0–2,1 кг (11,0–11,6 %, $P < 0,06$).

Установлено, что минимальным удельным весом костной ткани отличались полутуши помесных бычков ($\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ черно-пестрая) III группы. У чистопородных бычков симментальской породы I группы и помесей ($\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ красная степная) II группы относительная масса костей полутуши была больше на 0,8–0,9 %.

Качество мясной туши характеризуется не только массой и удельным весом отдельных ее тканей, но и их соотношением. Полученные нами данные свидетельствуют о влиянии генотипа бычков на этот признак (таблица 2).

Достаточно информативным показателем при комплексной оценке качества мясной туши является выход мякоти туши на 1 кг костей или индекс мясности. Установлено преимущество помесного молодняка ($\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ черно-

пестрая) III группы. Чистопородные быки симментальской породы I группы и помеси помесей ($\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ красная степная) уступали им по индексу мясности на 0,29 кг (6,7 %) и 0,34 кг (8,0 %) соответственно.

Аналогичные межгрупповые различия установлены и по выходу съедобной части туши на

100 кг предубойной живой массы. Так помесные бычки ($\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ черно-пестрая) III группы превосходили чистопородных бычков симментальской породы I группы и помесей ($\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ красная степная) II группы по величине анализируемого показателя соответственно на 1,64 кг (3,8 %) и 2,05 кг (6,3 %).

Таблица 2 Выход мякоти туши бычков подопытных групп в 18 мес., кг

Показатель	Группа					
	I		II		III	
	показатель					
	X ± Sx	Cv	X ± Sx	Cv	X ± Sx	Cv
Выход мякоти на 1 кг костей (индекс мясности)	4,32 ± 0,06	1,22	4,27 ± 0,08	1,36	4,61 ± 0,10	1,42
Выход мякоти на 100 кг предубойной живой массы, кг	43,32 ± 2,43	2,14	42,31 ± 2,88	2,94	44,96 ± 2,78	2,79
Соотношение съедобной и несъедобной частей туши	3,65 ± 0,07	1,28	3,36 ± 0,09	1,43	3,96 ± 0,11	1,59

При анализе показателей, характеризующих соотношение съедобной и несъедобной частей туши, установлен такой же ранг распределения подопытных групп бычков, что по индексу мясности и выходу мякоти на 100 кг предубойной живой массы. Достаточно отметить, что чистопородные бычки симментальской породы I группы и помесный молодняк (помеси $\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ красная степная) II группы уступали помесам (помеси $\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ черно-пестрая) III группы по соотношению съедобной и несъедобной частей туши на 0,31 кг (8,5 %) и 0,60 кг (17,8 %).

Полученные материалы свидетельствуют, что минимальной величиной показателей, характеризующих качество мясной туши, отлича-

лись помесные бычки ($\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ красная степная) II группы.

Они уступали чистопородным бычкам симментальской породы I группы по индексу мясности на 0,03 кг (0,7 %), выходу мякоти на 100 кг предубойной живой массы – на 1,01 кг (2,4 %), соотношению съедобной и несъедобной частей туши – на 0,29 кг (8,6 %).

Вывод. Мясная продукция, полученная при убое чистопородных и помесных бычков, отличалась высокими качественными показателями. Об этом свидетельствует морфологический состав туши, соотношения ее тканей. При этом более высоким качеством отличались туши бычков симментальской породы и ее полукровных помесей с черно-пестрым скотом.

Библиографический список

1. Заднепрянский, И.П. Особенности роста и развития бычков мясных, комбинированных пород и помесей [Текст] / И.П. Заднепрянский, В.И. Косилов, С.С. Жаймышева, В.А. Швынденков // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2012. № 6 (38). С. 105–107.
2. Кудинов, В. Убойные качества бычков при разных рационах [Текст] / В. Кудинов, С. Жаймышева // Комбикорма. 2008. № 1. С. 71.
3. Косилов, В.И. Эффективность двух-трехпородного скрещивания скота [Текст] / В.И. Косилов, С.И. Мироненко // Молочное и мясное скотоводство. 2005. № 1. С. 11–12.
4. Швынденков, В.А. Сравнительная оценка мясной продуктивности и качества мяса чистопородных и помесных бычков [Текст] / В.А. Швынденков, С.С. Жаймышева, Л.Г. Сурундаева // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2007. № 1 (13). С. 98–103.
5. Жаймышева, С.С. Влияние пробиотической добавки биодарин на пищевую ценность

мясной продукции тёлочек симментальской породы [Текст] / С.С. Жаймышева, А.В. Харламов, Н.М. Губайдуллин, М.Г. Гиниятуллин // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2018. № 2 (70). С. 212–215.

6. Kayumov F.G., Kosilov V.I., Gerasimov N.P., Bykova O.A. The effect of snp polymorphisms in growth hormone gene on weight and linear growth in crossbred red angus $\times$ kalmyk heifers. Digital agriculture – development strategy. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (ISPC 2019). Advances in Intelligent Systems Research. 2019. P. 325–328.

7. Mironova I.V., Kosilov V.I., Nigmatyanov A.A., Saifullin R.R., Senchenko O.V., Chali-rachmanov E.R., Chernenkov E.N. Nutrient and energy digestibility in cows fed the energy supplement «felucen». I Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2018. Vol. 9. No 6. P. 18–25.

8. Fatkullin R.R., Ermolova E.M., Kosilov V.I., Matrosova Yu.V., Chulichkova S.A. Biochemical Status of Animal Organism Under Condi-

tions of Technogenic Agroecosystem. Advances in Engineering Research. 2018. Vol. 151. P. 182–186.

9. Sedykh T.A., Gizatullin R.S., Kosilov V.I., Chudov I.V., Andreeva A.V., Giniyatullin M.G., Islamova S.G., Tagirov Kh. Kh., Kalashnikova L.A. Adapting australianhereford cattle to the conditions of the southern urals. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2018. Vol. 9. No 3. P. 885–898.

10. Tyulebaev S.D., Kadyshcheva M.D., Litovchenko V.G., Kosilov V.I., Gabidulin V.M. The use

single-nucleotide polymorphism in creating a cross-line of meat Simmentals. Conference on innovations in Agricultural and Rural development: IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2019. № 341.

11. Жаймышева, С.С. Влияние пробиотической добавки биодарин на пищевую ценность мясной продукции тёлочек симментальской породы [Текст] / С.С. Жаймышева, А.В. Харламов, Н.М. Губайдуллин, М.Г. Гиниятуллин // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2018. № 2 (70). С. 212–215.

Сведения об авторах

1. **Губайдуллин Наиль Мирзаханович**, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: ngubaidullin@yandex.ru.

2. **Косилов Владимир Иванович**, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ, 460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18, e-mail: kosilov_vi@bk.ru, ORCID 0000-4754-1771.

3. **Газеев Игорь Рамилович**, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: gazeevigor@yandex.ru.

4. **Ермолова Евгения Михайлова**, доктор сельскохозяйственных наук, доцент, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, 13, e-mail: zhe1748@mail.ru.

В статье приводятся результаты оценки качества мясной продукции, полученной при убое бычков симментальской породы (I группа), ее помесей со скотом красной степной ($\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ красная степная – II группа) и черно-пестрой ($\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ черно-пестрая – III группа) пород. При этом учитывались показатели морфологического состава туши и соотношение отдельных ее тканей. Установлено преимущество помесей III группы над чистопородными бычками симментальской породы I группы по абсолютной массе мякоти: 8,1 кг (7,3 %, $P < 0,01$), относительной – 1,3 %. Превосходство над помесным молодняком ($\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ красная степная) II группы по величине анализируемых показателей было более существенным и составляло соответственно 17,9 (17,6 %, $P <$

0,001) и 2,7 %. Чистопородные бычки симментальской породы I группы и ее полукровные помеси с красным степным скотом II группы уступали им по величине первого показателя соответственно на 7,7 кг (8,2 %, $P < 0,01$) и 15,8 кг (18,4 %, $P < 0,001$), второго – на 1,7 % и 2,8 %. В свою очередь чистопородный симментальский молодняк I группы превосходил помесей ($\frac{1}{2}$ симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ красная степная) II группы по абсолютной массе мышечной ткани на 8,1 кг (9,4 %, $P < 0,01$), относительной массе – на 1,1 %.

Чистопородные бычки симментальской породы I группы и помеси (S симментал $\times$ $\frac{1}{2}$ красная степная) уступали помесным бычкам III группы по индексу мясности на 0,29 кг (6,7 %) и 0,34 кг (8,0 %) соответственно.

N. Gubaidullin, V. Kosilov, I. Gazeev, E. Yermolova

EFFECT OF CROSSING RED STEPPE AND BLACK-AND-WHITE CATTLE WITH SIMMENTALS ON THE QUALITY OF MEAT PRODUCTS OBTAINED FROM THE CROSSBRED YOUNG STOCK

Key words: cattle breeding; Simmental breed; crossbreed steers; meat carcass; morphological composition.

Authors' personal details

1. **Gubaidullin Nail**, Doctor of Agriculture, Professor, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, e-mail: ngubaidullin@yandex.ru.

2. **Kosilov Vladimir**, Doctor of Agriculture, Professor, Orenburg State Agrarian University, 460014, Orenburg, Chelyuskintsev St., 18, e-mail: kosilov_vi@bk.ru, ORCID 0000-4754-1771.

3. **Gazeev Igor**, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, e-mail: gazeevigor@yandex.ru.

4. **Yermolova Evgenia**, Doctor of Agriculture, Associate Professor, South Ural State Agrarian University, 457100, Chelyabinsk region, Troitsk, Gagarina St., 13, e-mail: zhe1748@mail.ru.

The paper discusses the results of assessing quality of meat products obtained from Simmental steers (group 1), the cross-breeds with red steppe ($\frac{1}{2}$ Simmental $\times$ $\frac{1}{2}$ red steppe – group 2) and black-and-white ($\frac{1}{2}$ Simmental $\times$ $\frac{1}{2}$ black-and-white group 3) breeds. The assessment considered morphological composition of the carcass and the ratio of specific tissues. The absolute weight of flesh meat in group 3 exceeded the index in group 1 by 8,1 kg (7,3 %, $P < 0,01$), the relative weight of flesh meat in group 3 was 1,3 % higher than that in group 1. Group 3 exceeded group 2 ($\frac{1}{2}$ Simmental $\times$ $\frac{1}{2}$ red steppe) in the same indices by 17,9 (17,6 %, $P < 0,001$) and 2,7 %, respectively. The pure-bred Simmental steers of group

1 and the crossbreed steers ($\frac{1}{2}$ Simmental $\times$ $\frac{1}{2}$ red steppe) of group 2 had indices of the absolute flesh weight 7 kg (8,2 %, $P < 0,01$) and 15,8 kg (18,4 %, $P < 0,001$) lower, respectively, the indices of the relative flesh weight were 1,7 % and 2,8 % lower in groups 1 and 2, respectively. The pure-bred Simmental steers of group 1 had indices of absolute muscle weight 8,1 kg (9,4 %, $P < 0,01$) higher than the cross-breeds ($\frac{1}{2}$ Simmental $\times$ $\frac{1}{2}$ red steppe) of group 2 and the relative weight index in group 1 was 1,1 % higher.

The pure-bred Simmental steers of group 1 and the crossbreeds ($\frac{1}{2}$ Simmental $\times$ $\frac{1}{2}$ red steppe) of group 2 had the meat index 0,29 kg (6,7 %) and 0,34 kg (8,0 %) lower than the steers of group 3.

© Губайдуллин Н.М., Косилов В.И., Газеев И.Р., Ермолова Е.М.

УДК 636.2.034

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-70-78

И.Ю. Долматова, И.Н. Ганиева, Т.В. Кононенко, Ф.Р. Валитов

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛИМОРФНЫХ ГЕНОВ ПРОЛАКТИНА И СОМАТОТРОПИНА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА С МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ

Ключевые слова: пролактин; соматотропин гормон; полиморфные гены; аллели; генотип; ПЦР-ПДРФ; молочная продуктивность; крупный рогатый скот.

Введение. Гормоны пролактин и соматотропин по строению и биологическим свойствам имеют общие черты и объединены в одно семейство белковых гормонов [1], синтез которых происходит в гипофизе. Гормоны принимают участие в инициации и поддержании лактации у млекопитающих, в связи с чем детерминирующие их полиморфные гены рассматриваются в качестве потенциальных генетических маркеров молочной продуктивности крупного рогатого скота.

Соматотропный гормон стимулирует рост организма за счёт активизации и нормализации обмена веществ – необходим в период постнатального роста и развития для нормализации углеводного, липидного, азотного и минерального обмена. В его белковой молекуле, которая продуцируется передней долей гипофиза, у разных видов животных насчитывается 190–199 аминокислотных остатков. Ген гормона роста (*GH*) локализован на 19-й хромосоме, имеет размер 1800 п. н. и состоит из пяти экзонов и четырех интронов [2]. Для изучения ассоциаций с признаками молочной продуктивности используются два одонуклеотидных полиморфизма гена *GH*: полиморфизм в экзоне 5, выявляемый с использованием рестриктазы *AluI*, и полиморфизм в ин-

троне 3, выявляемый при помощи рестриктазы *MspI*. Наличие *AluI*-полиморфного сайта пятого экзона обусловлено нуклеотидной заменой $C \rightarrow G$, что приводит к аминокислотной замене ($Leu \rightarrow Val$) в белковом продукте в позиции 127 (соответствующие аллели GH^L и GH^V) [3]. *MspI*-полиморфизм третьего интрона (аллели GH^C и GH^D) не связан с аминокислотными заменами в пептидной цепи гормона роста.

Биологическое действие пролактина (или лютеотропного гормона) заключается в его влиянии на воспроизводительные функции. Он регулирует процессы дифференцировки клеток эпителия в молочной железе и её развитие, регулирует функцию желтого тела, стимулирует процесс молокообразования в период лактации. Гормон также стимулирует накопление аминокислот для синтеза молочных белков и глюкозы для синтеза лактозы и жира [4]. У крупного рогатого скота пролактин состоит из единичной полипептидной цепи, содержащей 199 аминокислотных остатков [5]. Ген пролактина (*PRL*) у крупного рогатого скота локализован на 23 хромосоме и состоит из пяти экзонов и четырех интронов [8]. Полиморфизм 103 кодона экзона 3, обусловленный нуклеотидной заменой $A \rightarrow G$,

приводит к появлению полиморфного *RsaI*-сайта рестрикции.

В последнее десятилетие опубликовано достаточно много научных исследований, посвященных изучению взаимосвязи полиморфных вариантов генов *GH* и *PRL* с признаками молочной продуктивности крупного рогатого скота [3–21], причём полученные результаты являются довольно противоречивыми. Так, по данным одних исследователей, не обнаруживается никаких статистически значимых различий в продуктивности между коровами костромской породы с различными генотипами по генам *GH* и *PRL* [6]. По данным других, удой коров холмогорской породы убывает в ряду генотипов $GH^{LL} > GH^{LV} > GH^{VV}$. При этом наибольший выход молочного жира отмечен у животных с генотипом GH^{LV} [7]. По данным Харзиновой В.Р. и соавт. [8], напротив, коровы коров чёрно-пёстрой породы с генотипом GH^{VV} достоверно превосходили своих сверстниц с другими генотипами по уровню удоя (на 1047 кг) и количеству молочного белка. В исследованиях Позовниковой М.В. с соавт. [9] показано, что у коров айрширской породы удой за 100 дней лактации был выше у животных с генотипом GH^{VV} , за 305 дней не выявлено различий между генотипами, а у голштинизированных чёрно-пестрых коров по величине удоёв преобладают коровы с генотипами GH^{LL} . Высокое процентное содержание жира отмечено авторами у гетерозиготных голштинизированных чёрно-пестрых коров с генотипами GH^{LV} . Такая же отчетливая тенденция выявлена и для коров ярославской породы [10].

Относительно влияния генотипической принадлежности по гену *PRL* на показатели молочной продуктивности литературные данные также довольно разноречивы [2]. При этом рядом исследователей показано, что наивысший удой, массовую долю жира и выход молочного жира имеют голштинские, голштинизированные чёрно-пестрые и айрширские коровы с генотипами PRL^{AA} и PRL^{AB} [11, 12], как и коровы холмогорской и симментальской пород, разводимые в Якутии [13]. Напротив, в работах Хабибрахмановой Я.А. [14], Джапаридзе Г.М. [5], Зиннатовой Ф.Ф. с соавт. [15], Горячевой Т.С. и Гончаренко Г.М. [16], Тюлькина С.В. с соавт. [17], Некрасова Д.К. с соавт. [18] продемонстрировано, что коровы различных пород с геноти-

пом PRL^{BB} имели наиболее высокие показатели удоя и молочного жира. При этом по другим показателям молочной продуктивности достоверных различий выявлено не было.

Полученные противоречивые данные свидетельствуют о том, что для внедрения маркерной селекции в практическое животноводство требуется широкое обстоятельное изучение генофонда отечественных пород. Расширение исследований в этом направлении будет способствовать повышению интенсивности селекционного совершенствования отечественных пород крупного рогатого скота.

Цель исследования – анализ влияния полиморфизма генов *GH* и *PRL*, а также их комплексных генотипов на показатели молочной продуктивности коров черно-пестрой и бестужевской пород.

Материалы и методы исследования. Исследования проведены в племенных хозяйствах РБ на однородных выборках коров-первотелок чёрно-пёстрой породы из ООО АП им. Калинина Стерлитамакского района ($n = 200$) и бестужевской породы из ООО «Идель» Нуримановского района ($n = 150$). Данные о молочной продуктивности получены из электронной базы данных ИАС «Селэкс». Состав молока анализировали с использованием прибора «Лактан 700М».

Образцы ДНК для выявления генотипов животных по генам *PRL* и *GH* методом ПЦР-ПДРФ выделяли из цельной крови с использованием набора «ДНК-Экстрен» (ООО «Syntol»).

Последовательность олигонуклеотидных праймеров (ООО «Syntol»), размеры ампликонов изучаемых генов и их рестрикционных фрагментов представлены в таблице 1.

Электрофорез продуктов рестрикции проводили в 7 % ПААГе с добавлением бромистого этидия в буфере $0,5 \times TBE$. Для анализа изображения гелей была использована геледокументирующая система Gel Doc XR и прилагаемое к ней программное обеспечение Image Lab версия 2.0 «DNA-analyser». В качестве маркера молекулярных масс использовали маркер pUC19 / MspI, предоставленный фирмой «СибЭнзим».

Стандартная статистическая обработка экспериментальных данных проводилась с использованием программного приложения «Excel» из пакета «Microsoft Office».

Таблица 1 Олигонуклеотидные праймеры и характеристика аллельных вариантов генов *GH* и *PRL* у крупного рогатого скота

Ген	Нуклеотидная последовательность праймера	Размер ампликона, п. н / рестриктаза	Генотипы на основании ПДРФ		
<i>PRL</i>	gccttcacagaagtcgttggttttc	156/ <i>RsaI</i>	<i>PRL</i> ^{AA}	<i>PRL</i> ^{AB}	<i>PRL</i> ^{BB}
	cgagtccttatgagcttgattctt		156	156, 82, 74	82, 74
<i>GH</i> , интрон 3	agaatgagggccagcgaatc	768/ <i>MspI</i>	<i>GH</i> ^{CC}	<i>GH</i> ^{CD}	<i>GH</i> ^{DD}
	gtcgtcacttgccgatgtttg		612, 93, 63	705, 612, 93, 63	705, 63
<i>GH</i> , экзон 5	ccgtgtctatgagaagc	428/ <i>AluI</i>	<i>GH</i> ^{LL}	<i>GH</i> ^{LV}	<i>GH</i> ^{VV}
	gttcttgagcagcgct		265, 96	265, 147, 96	265, 147

Результаты исследования. В таблице 2 представлены частоты аллелей и генотипов по генам *PRL* и *GH* в изученных группах коров чёрно-пёстрой и бестужевской пород. У коров чёрно-пёстрой породы наиболее часто встречающимся является генотип PRL^{AA} , а наименее частый генотип – PRL^{BB} . Доля распространенности аллеля PRL^B составляет в среднем 0,14, и в целом эта цифра близка к наблюдаемым частотам у чёрно-пёстрой породы по литературным данным: 0,2 и 0,15 [16]. У бестужевских коров наиболее частым является гетерозиготный генотип PRL^{AB} (0,635); частоты аллелей PRL^A и PRL^B составляют соответственно 0,6 и 0,4. Межпородные различия по частоте аллеля PRL^A , оцененные по критерию Стьюдента, являются достоверными ($t_d = 6,4$; $p < 0,001$).

Генетическая структура разных пород крупного рогатого скота по гену *PRL* изучалась многими исследователями. Так, согласно данным Удиной И.Г. с соавт. [19], у горбатовской красной, айрширской и чёрно-пёстрой пород частота аллеля PRL^A составляет соответственно 0,91, 0,86 и 0,80; при этом у всех трех изученных пород генотип PRL^{BB} не был обнаружен. Примерно такие же частоты (0,95, 0,61 и 0,65 соответственно) выявлены для аллеля PRL^A Хатами С.Р. с соавт. [20] у российской чёрно-пёстрой, немецкой чёрно-пёстрой и ярославской пород.

Alipanah M. et al. [21] показали, что у чёрно-пёстрой и красно-пёстрой пород частоты аллелей PRL^A составляют 0,71 и 0,79 соответственно, а по данным Горячевой Т.С., Гончаренко Г.М. [16], у коров чёрно-пёстрой породы частота аллеля PRL^A составила 0,85. По данным Тюлькина С.В. с соавт. [17], у коров холмогорской породы татарстанского типа частоты аллелей PRL^A и PRL^B находятся в диапазоне 0,87–0,90 и 0,10–0,13 соответственно.

Также довольно значительно различаются изученные породы и по частоте генотипов и аллелей *MspI*- и *AluI*-полиморфных сайтов гена *GH*. Так, рассматривая однонуклеотидный полиморфизм *MspI*-рестрикционного сайта интрона 4, можно отметить, что частота гетерозиготных генотипов (GH^{CD}) в выборке коров чёрно-пёстрой породы (0,660) в два раза выше

по сравнению с выборкой коров бестужевской породы (0,325). Генотип GH^{DD} с одинаковой частотой выявляется у обеих пород (0,19 и 0,22 соответственно у чёрно-пёстрых и бестужевских коров), а генотип GH^{CC} у бестужевских коров встречается в три раза чаще (0,455) по сравнению с чёрно-пёстрыми (0,160). По частоте аллелей GH^C и GH^D наблюдаются определённые межпородные различия, а именно: практически одинаковая их частота у чёрно-пёстрых коров (0,49 и 0,51) и почти двукратное преобладание частоты аллеля GH^C над частотой аллеля GH^D у бестужевских (0,62 и 0,38 соответственно).

В экзоне 5 *AluI*-рестрикционного сайта гена *GH* частоты гетерозиготного генотипа GH^{LV} в выборках обеих пород являются одинаковыми (0,625 и 0,590 соответственно у чёрно-пёстрых и бестужевских коров). А вот по частотам обоих гомозиготных генотипов выявлены довольно значительные межпородные различия, а именно: частота генотипа GH^{LL} у коров чёрно-пёстрой породы в два раза выше (0,195), чем у коров бестужевской породы (0,085), а частота генотипа GH^{VV} , напротив, в два раза ниже (0,180 и 0,325 соответственно). Частота аллеля GH^L у чёрно-пёстрых коров почти равна частоте аллеля GH^V (0,51 и 0,49 соответственно), а у бестужевских коров аллель GH^V является наиболее частым (0,62), тогда как для аллеля GH^L частота составляет 0,38.

В исследованиях Хатами С.Р. с соавторами было показано, что в выборке крупного рогатого скота российской черно-пестрой породы частота аллеля GH^L составляет 0,625 (при этом частоты генотипов GH^{LL} и GH^{LV} приблизительно равны и составляют соответственно 40,6 и 43,8 %). Выборка немецкой черно-пестрой породы, по данным этих же авторов, характеризуется относительно небольшим (25 %) содержанием гетерозигот GH^{LV} . Частота аллеля GH^L в этой выборке самая высокая – 0,81, а частота аллеля GH^V – самая низкая – 0,19 [2, 20]. У помесных первотёлок чёрно-пёстрой и голштинской пород и у коров холмогорской породы татарстанского типа частота аллелей GH^L и GH^V и составила 0,86–0,90 и 0,10–0,14 соответственно [17].

Таблица 2 Частоты встречаемости аллелей и генотипов по генам *PRL* и *GH* у исследованных пород

Ген	Генотип	Частота генотипа		Частота аллелей		
		Ч/п.	Бест.	Аллель	Ч/п.	Бест.
<i>PRL</i>	PRL^{AA}	0,764	0,286	PRL^A PRL^B	0,86 ± 0,01 0,14 ± 0,01	0,60 ± 0,04 0,40 ± 0,04
	PRL^{AB}	0,196	0,635			
	PRL^{BB}	0,042	0,790			
<i>GH</i> интрон 4	GH^{CC}	0,160	0,455	GH^C GH^D	0,49 ± 0,04 0,51 ± 0,04	0,62 ± 0,03 0,38 ± 0,03
	GH^{CD}	0,660	0,325			
	GH^{DD}	0,190	0,220			
<i>GH</i> экзон 5	GH^{LL}	0,195	0,085	GH^L GH^V	0,51 ± 0,03 0,49 ± 0,03	0,38 ± 0,03 0,62 ± 0,03
	GH^{LV}	0,625	0,590			
	GH^{VV}	0,180	0,325			

Анализ молочной продуктивности коров с разными генотипами по генам *PRL* и *GH* в вы-

борках чёрно-пёстрой и бестужевской пород представлен в таблицах 3–5.

Таблица 3 Молочная продуктивность коров чёрно-пёстрой и бестужевской пород с различными генотипами по гену *PRL*

Показатель	Генотип			Разница между генотипами		
	<i>PRL^{AA}</i>	<i>PRL^{AB}</i>	<i>PRL^{BB}</i>	<i>PRL^{AA} / PRL^{AB}</i>	<i>PRL^{AA} / PRL^{BB}</i>	<i>PRL^{AB} / PRL^{BB}</i>
Чёрно-пестрая порода						
Удой, кг	3925,5 ± 85,5	4039,1 ± 78,2	4350,2 ± 92,6	–113,6	–424,7**	–311,1*
Жир, %	3,85 ± 0,03	3,80 ± 0,04	3,71 ± 0,02	+0,05	+0,09**	+0,14**
Молочный жир, кг	151,1 ± 3,63	153,5 ± 4,75	161,4 ± 4,62	–2,4	–10,3*	–7,9
Белок, %	3,50 ± 0,01	3,45 ± 0,02	3,36 ± 0,04	+0,05	+0,14	+0,09
Бестужевская порода						
Удой, кг	3625,3 ± 107,8	3728,4 ± 89,4	4136,98 ± 105,3	–103,1	–511,6*	–408,5*
Жир, %	3,83 ± 0,05	3,82 ± 0,03	3,84 ± 0,04	0,01	0,01	0,02
Молочный жир, кг	138,8 ± 4,25	142,4 ± 4,4	158,8 ± 6,5	–3,6	–20,0**	–16,4*
Белок, %	3,48 ± 0,04	3,47 ± 0,03	3,49 ± 0,05	+0,01	–0,01	–0,02

Примечание: Различия по критерию Стьюдента * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$.

Таблица 4 Молочная продуктивность коров чёрно-пёстрой и бестужевской пород с различными генотипами по *MspI*-полиморфному сайту гена *GH*

Показатель	Генотип по <i>MspI</i> -полиморфному сайту гена <i>GH</i>			Разница между генотипами		
	<i>GH^{CC}</i>	<i>GH^{CD}</i>	<i>GH^{DD}</i>	<i>GH^{CC} / GH^{CD}</i>	<i>GH^{CC} / GH^{DD}</i>	<i>GH^{CD} / GH^{DD}</i>
Чёрно-пестрая порода						
Удой, кг	3583,1 ± 97,8	4195,1 ± 105,9	4536,3 ± 92,5	–612,0***	–953,2***	–341,2*
Жир, %	3,69 ± 0,04	3,86 ± 0,03	3,79 ± 0,04	–0,17**	–0,10*	+0,07
Молочный жир, кг	132,2 ± 8,7	158,9 ± 8,3	171,9 ± 7,5	–20,6*	–28,8*	–8,2
Белок, %	3,18 ± 0,04	3,32 ± 0,05	3,26 ± 0,03	–0,14	–0,08	+0,06
Бестужевская порода						
Удой, кг	3651,1 ± 77,81	3833,5 ± 72,62	4007,7 ± 105,21	–182,4*	–356,6**	–174,2
Жир, %	3,71 ± 0,03	3,90 ± 0,05	3,82 ± 0,04	–0,19**	–0,11*	+0,08
Молочный жир, кг	135,5 ± 8,6	149,5 ± 8,4	153,1 ± 7,5	–14,0	–17,6	+3,6
Белок, %	3,20 ± 0,03	3,36 ± 0,03	3,29 ± 0,03	–0,16	–0,09	+0,07

Таблица 5 Молочная продуктивность коров чёрно-пёстрой и бестужевской пород с различными генотипами по *AluI*-полиморфному сайту гена *GH*

Показатель	Генотип по <i>AluI</i> -полиморфному сайту гена <i>GH</i>			Разница между генотипами		
	<i>GH^{LL}</i>	<i>GH^{LV}</i>	<i>GH^{VV}</i>	<i>GH^{LL} / GH^{LV}</i>	<i>GH^{LL} / GH^{VV}</i>	<i>GH^{LV} / GH^{VV}</i>
Чёрно-пестрая порода						
Удой, кг	3905,6 ± 77,2	4353,7 ± 80,4	4054,1 ± 61,8	–448,1***	–148,5	+300,6**
Жир, %	3,64 ± 0,03	3,86 ± 0,04	3,70 ± 0,05	–0,22**	–0,15*	+0,07
Молочный жир, кг	142,2 ± 4,7	168,0 ± 7,2	153,7 ± 5,7	–25,8**	–10,5	+14,3
Белок, %	3,17 ± 0,05	3,35 ± 0,04	3,22 ± 0,03	–0,18	–0,05	+0,13
Бестужевская порода						
Удой, кг	3752,4 ± 102,65	3856,5 ± 51,36	3884,3 ± 112,71	–104,1	–131,9	–27,8
Жир, %	3,70 ± 0,04	3,91 ± 0,04	3,83 ± 0,04	–0,21**	–0,13**	+0,08
Молочный жир, кг	128,5 ± 4,7	183,9 ± 7,4	138,4 ± 6,6	–12,0	–9,9	+2,1
Белок, %	3,19 ± 0,06	3,36 ± 0,05	3,30 ± 0,04	–0,17	–0,11	+0,06

Из таблиц следует, что в среднем за первую лактацию чёрно-пестрые коровы по величине удоев несколько (на 274,1 кг) превышают бестужевских, зато в молоке бестужевских коров содержание жира и белка несколько выше (на 0,04 % и 0,03 % соответственно). Вместе с тем отмечены довольно значительные внутривидовые различия по названным характеристикам молочной продуктивности между группами животных с разными генотипами по изучаемым генам.

Так, при анализе влияния полиморфизма гена *PRL* на показатели молочной продуктивности можно видеть (таблица 3), что наибольшими удоями характеризуются коровы с генотипами

PRL^{BB}, причем различия в пользу данного генотипа являются значительными, достоверными и составляют 424,7 кг ($p < 0,01$) и 311,1 кг ($p < 0,05$) соответственно по отношению к генотипам *PRL^{AA}* и *PRL^{AB}*. Массовая доля жира на 0,05 % ($p > 0,05$) и 0,09 % ($p < 0,001$) больше в молоке коров с генотипами *PRL^{AA}* по сравнению с генотипами *PRL^{AB}* и *PRL^{BB}*. Различия между генотипами *PRL^{AB}* и *PRL^{BB}* составляют 0,14 % ($p < 0,01$) в пользу первого. Больший выход молочного жира наблюдается от коров с более высокими удоями (генотип *PRL^{BB}*). Разница в пользу данного генотипа составляет 10,3 кг ($p < 0,05$) и 7,9 кг по сравнению с генотипами *PRL^{AA}* и

PRL^{AB} . Коровы с генотипами PRL^{AA} и PRL^{AB} по выходу молочного жира не различаются.

Описанные закономерности зависимости удоя от генотипа по гену PRL также отмечены и для коров бестужевской породы, у которых наивысшие удои имеют животные с генотипом PRL^{BB} . По сравнению с коровами генотипов PRL^{AA} и PRL^{AB} у них удои выше соответственно на 511,6 кг ($p < 0,01$) и 408,5 кг ($p < 0,01$). Молоко коров разных генотипов не различается по массовой доле белка жира, а большее количество молочного жира, которое коррелирует, как известно, с величиной надоев, получено от коров с генотипами PRL^{AB} и PRL^{BB} .

Данные по молочной продуктивности коров чёрно-пёстрой и бестужевской пород с различными генотипами по $MspI$ - и $AluI$ -рестрикционному полиморфизму гена GH представлены в таблицах 4 и 5.

Влияние полиморфизма по $MspI$ -полиморфному сайту гена GH на показатели молочной продуктивности характеризуется тем, что у обеих изученных пород величина удоев убывает в ряду генотипов в следующем порядке: $GH^{DD} \rightarrow GH^{CD} \rightarrow GH^{CC}$. При этом разница в пользу генотипа GH^{DD} по отношению к GH^{CD} составляет соответственно для коров чёрно-пёстрой и бестужевской пород 341,2 кг ($p < 0,05$) и 174,2 кг, а по отношению к генотипу GH^{CC} – 953,2 кг ($p < 0,001$) и 356,6 кг ($p < 0,01$). Также достоверна разница по величине удоя и между генотипами GH^{CC} и GH^{CD} , составляющая 612,0 кг ($p < 0,001$) у черно-пестрой и 182,4 кг ($p < 0,05$) у бестужевской. Массовая доля жира выше в молоке коров с гетерозиготным генотипом GH^{CD} (3,86 % и 3,90 % соответственно у чёрно-пёстрых и бестужевских пород) и самая низкая (3,69 % и 3,71 %) – у коров обеих пород с генотипом GH^{CC} . Выход молочного жира больше у коров чёрно-пёстрой породы с генотипами GH^{CD} и GH^{DD} ; бестужевские коровы с разной генотипической принадлежностью по $MspI$ -полиморфному сайту гена GH по выходу молочного жира практически не имеют различий.

Влияние полиморфизма по $AluI$ -полиморфному сайту гена GH на показатели молочной продуктивности (таблица 5) наиболее очевидным выглядит в выборке коров чёрно-пёстрой породы. Наименьшие удои и жирномолочность у них имеет молоко коров с генотипом GH^{LL} (3905,6 кг 3,64 % соответственно). А гетерозиготы GH^{LV} характеризуются более высокими удоями (4353,7 кг), содержанием жира в молоке (3,86 %) и выходом молочного жира (168 кг). По отношению к генотипам GH^{LL} и GH^{VV} преобладание по названным показателям соответственно составляет: по удою – на 448,1 кг ($p < 0,001$) и 300,6 кг ($p < 0,01$); по массовой доле жира –

0,22 % ($p < 0,01$) и 0,07 %; по выходу молочного жира – 25,8 кг ($p < 0,001$) и 14,3 кг.

При анализе изученных показателей молочной продуктивности в связи с $AluI$ -рестрикционным полиморфизмом гена GH у коров бестужевской породы не выявлено достоверных различий по величине удоев и выходу молочного жира. Значимые различия в выборке коров бестужевской породы отмечены только для массовой доли жира в молоке, которая, как и у коров чёрно-пестрой породы, выше у носителей генотипов GH^{LV} (3,91 %). Этот показатель выше на 0,21 % по сравнению с генотипом GH^{LL} и на 0,08 % – по сравнению с генотипом GH^{VV} .

Таким образом, в каждом из исследованных полиморфных локусов, предположительно влияющих на молочную продуктивность, нами выявлены «повышающие» и «понижающие» генотипы, которые ассоциированы с более высокими или, напротив, более низкими удоями. Более точной генетической идентификацией животных с точки зрения практической селекции является выявление у них наиболее благоприятных сочетаний этих генотипов, что и стало следующим этапом нашего анализа. Всего в исследованных выборках коров обеих пород выявлено 20 различных комбинаций генотипов по гену PRL и двум полиморфным сайтам гена GH , причём частота половины из них не превышает 3 % (таблицы 6 и 7). Продуктивность коров с различными комбинациями генотипов сравнивали со средними показателями выборок.

Продуктивность чёрно-пёстрых коров (таблица 6) с наиболее часто встречающимися (по 19,2 %) комбинациями генов находятся примерно на уровне среднего показателя по изученной группе (4104,9 кг $\pm$ 119,7 кг). Это генотипы $PRL^{AA}GH^{LV}GH^{CD}$ и $PRL^{AA}GH^{VV}GH^{CC}$. Надой коров с этими генотипами составляют 4002,2 кг и 3853,7 кг соответственно. Надой, достоверно более высокие по сравнению со средним уровнем, имеют коровы с генотипами $PRL^{AB}GH^{LV}GH^{CD}$ (4650,2 кг), $PRL^{BB}GH^{LV}GH^{CD}$ (4762,0 кг), $PRL^{AB}GH^{LV}GH^{DD}$ (4660,2 кг), $PRL^{AB}GH^{VV}GH^{CD}$ (4861,0 кг) и $PRL^{BB}GH^{VV}GH^{CD}$ (4711,2 кг). Следует отметить, что названных «повышающих» генотипов в исследованном стаде коров немного (их частота не выше 5 %).

«Понижающими» генотипами можно назвать следующие: $PRL^{AA}GH^{LL}GH^{CC}$, $PRL^{AA}GH^{LL}GH^{CD}$, $PRL^{AA}GH^{LV}GH^{CC}$, $PRL^{AA}GH^{LL}GH^{DD}$ и $PRL^{AB}GH^{LL}GH^{CC}$. Надой этих коров находится в пределах от 3324 кг до 3737 кг, т. е. довольно значительно ниже среднего уровня.

Из таблицы 7 видим, что в выборке коров бестужевской породы наиболее часто выявляемым является тригетерозиготный генотип $PRL^{AB}GH^{LV}$

GH^{CD} (27,2 %). Величина удоев у этих коров превышает средний показатель выборки на 476,4 кг и 4307,2 кг. Следует отметить, что показатели надоев выше среднего также отмечаются у тех коров, в генотипах которых комбинируются аллели PRL^B , GH^V и GH^D . Таковыми генотипами являются: $PRL^{AB}GH^{VV}GH^{CD}$ (частота – 6,8 %, надой – 4023,4) и $PRL^{BB}GH^{LV}GH^{DD}$ (частота – 1,6 %, надой – 4652,5 кг). Коровы, имеющие гомозиготный по аллелям PRL^A , GH^L и GH^C генотип, характеризуются надоями ниже среднего показателя выборки на 240,1 кг, а генотип $PRL^{AA}GH^{LV}GH^{CC}$ – является «понижающим» на 330,6 кг.

надой – 4023,4) и $PRL^{BB}GH^{LV}GH^{DD}$ (частота – 1,6 %, надой – 4652,5 кг). Коровы, имеющие гомозиготный по аллелям PRL^A , GH^L и GH^C генотип, характеризуются надоями ниже среднего показателя выборки на 240,1 кг, а генотип $PRL^{AA}GH^{LV}GH^{CC}$ – является «понижающим» на 330,6 кг.

Таблица 6 Молочная продуктивность коров черно-пестрой породы с комплексными генотипами по генам PRL и GH

№	Генотип	Частота, %	Удой, кг	Жирность, %
1	$PRL^{AA}GH^{LL}GH^{CC}$	5,2	3420,3 ± 156,4**	3,75 ± 0,01
2	$PRL^{AA}GH^{VV}GH^{DD}$	3,6	4113,7 ± 134,3	3,75 ± 0,02
3	$PRL^{AA}GH^{LL}GH^{CD}$	0,8	3615,2 ± 124,6**	3,77 ± 0,01
4	$PRL^{AA}GH^{LV}GH^{CD}$	19,2	4002,2 ± 55,3	3,78 ± 0,03
5	$PRL^{AA}GH^{LV}GH^{CC}$	7,6	3644,7 ± 106,7**	3,76 ± 0,01
6	$PRL^{AB}GH^{LV}GH^{CD}$	4,3	4650,2 ± 91,7***	3,79 ± 0,01
7	$PRL^{BB}GH^{LV}GH^{CD}$	1,2	4762,0 ± 117,2***	3,78 ± 0,02
8	$PRL^{AB}GH^{LV}GH^{DD}$	5,3	4660,2 ± 91,7***	3,79 ± 0,01
9	$PRL^{AA}GH^{LV}GH^{DD}$	8,4	4343,8 ± 147,4*	3,77 ± 0,01
10	$PRL^{AB}GH^{VV}GH^{CD}$	0,9	4861,0 ± 146,1**	3,77 ± 0,01
11	$PRL^{AB}GH^{VV}GH^{DD}$	2,0	4559,7 ± 151,3*	3,77 ± 0,01
12	$PRL^{AA}GH^{LL}GH^{DD}$	0,8	3737,0 ± 89,3*	3,80 ± 0,01*
13	$PRL^{AB}GH^{LL}GH^{CC}$	1,2	3324,0 ± 146,0***	3,78 ± 0,01
14	$PRL^{AB}GH^{LV}GH^{CC}$	2,6	3754,4 ± 148,7*	3,77 ± 0,01
15	$PRL^{AA}GH^{LV}GH^{DD}$	8,4	4353,8 ± 147,3	3,77 ± 0,01
16	$PRL^{AA}GH^{VV}GH^{CC}$	19,2	3858,7 ± 134,3	3,75 ± 0,02
17	$PRL^{AA}GH^{VV}GH^{CD}$	2,0	3980,3 ± 124,5	3,79 ± 0,05
18	$PRL^{AB}GH^{VV}GH^{CC}$	4,2	3832,7 ± 84,4	3,77 ± 0,02
19	$PRL^{BB}GH^{VV}GH^{CD}$	1,8	4711,2 ± 110,3**	3,78 ± 0,01
20	$PRL^{BB}GH^{LL}GH^{CD}$	1,2	3920,5 ± 87,7*	3,75 ± 0,01
В среднем			4104,9 ± 119,7	3,77 ± 0,01

Примечание: достоверность различий по критерию Стьюдента указана в сравнении со средним показателем по стаду: * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

Таблица 7 Продуктивность коров бестужевской породы с комплексными генотипами по генам PRL и GH

№	Генотип	Частота, %	Удой, кг	Жирность, %
1	$PRL^{AA}GH^{LL}GH^{CC}$	2,8	3590,7 ± 131,9	3,83 ± 0,04
2	$PRL^{AA}GH^{VV}GH^{DD}$	3,1	3936,9 ± 99,1	3,85 ± 0,01
3	$PRL^{AA}GH^{LL}GH^{CD}$	3,2	3692,9 ± 150,6	3,81 ± 0,02
4	$PRL^{AA}GH^{LV}GH^{CD}$	8,4	3627,6 ± 57,1	3,79 ± 0,01
5	$PRL^{AA}GH^{LV}GH^{CC}$	1,0	3500,2 ± 81,0**	3,85 ± 0,05
6	$PRL^{AB}GH^{LV}GH^{CD}$	27,2	4307,2 ± 135,5*	3,82 ± 0,01
7	$PRL^{BB}GH^{LV}GH^{CD}$	1,9	3882,3 ± 192,2	3,82 ± 0,09
8	$PRL^{AB}GH^{LV}GH^{DD}$	6,6	3995,4 ± 113,4	3,86 ± 0,03
9	$PRL^{AA}GH^{LV}GH^{DD}$	3,2	3697,9 ± 181,9	3,78 ± 0,02
10	$PRL^{AB}GH^{VV}GH^{CD}$	6,8	4023,4 ± 147,8	3,77 ± 0,03
11	$PRL^{AB}GH^{VV}GH^{DD}$	8,2	3943,5 ± 117,1	3,73 ± 0,03
12	$PRL^{AB}GH^{LL}GH^{CD}$	3,8	3807,8 ± 72,2	3,84 ± 0,04
13	$PRL^{AB}GH^{LL}GH^{CC}$	6,4	3606,8 ± 132,1	3,81 ± 0,03
14	$PRL^{AB}GH^{LV}GH^{CC}$	4,0	3555,6 ± 115,3	3,89 ± 0,05
15	$PRL^{BB}GH^{LV}GH^{DD}$	1,6	4652,5 ± 197,5***	3,73 ± 0,01
16	$PRL^{AA}GH^{LV}GH^{DD}$	4,6	3697,9 ± 181,9	3,78 ± 0,02
17	$PRL^{AA}GH^{VV}GH^{CC}$	1,6	3656,5 ± 121,5	3,75 ± 0,05
18	$PRL^{BB}GH^{LL}GH^{CD}$	1,6	3748,5 ± 123,5	3,92 ± 0,08
19	$PRL^{BB}GH^{VV}GH^{CD}$	2,8	3995,2 ± 99,0	3,73 ± 0,03
20	$PRL^{AA}GH^{VV}GH^{CD}$	1,2	3697,7 ± 131,7	3,86 ± 0,06
В среднем			3830,8 ± 129,1	3,81 ± 0,04

Примечание: достоверность различий по критерию Стьюдента указана в сравнении со средней по стаду: * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$.

Выводы. В результате проведенного исследования показано, что аллели GH^V $AluI$ -рестрик-

ционного сайта, GH^D $MspI$ -рестрикционного сайта гена гормона роста (GH) и PRL^B гена про-

лактина крупного рогатого скота являются благоприятными с точки зрения хозяйственной ценности.

Выявлены также комплексные генотипы одновременно с учетом нескольких генов, повышающие уровень молочной продуктивности. Такими генотипами, проявляющими положительный эффект в отношении удоя у обеих ис-

следованных пород, являются $PRL^{AB}GH^{LV(VV)}GH^{CD}$ и $PRL^{BB}GH^{LV}GH^{DD(CD)}$.

Полученные результаты могут стать важным звеном в селекционной работе, способствующим формированию генофонда плановых пород крупного рогатого скота с необходимыми генными сочетаниями.

Библиографический список

1. Бакл, Д. Гормоны животных [Текст] / Д. Бакл. М.: Мир, 1986. С. 31–32.
2. Chung E.R., Chung E.R., Rhim T.J., Han S.K. Associations between PCR-RFLP marker soft growth hormone and prolactin genes and production traits in dairy cattle. Korean J. of Animal Science. 1996. V. 38. P. 321–336.
3. Балацкий, В.Н. Генетический полиморфизм соматотропина и ассоциация его аллелей с количественными признаками животных [Текст] / В.Н. Балацкий // Сельскохозяйственная биология. 1998. № 4. С. 43–54.
4. Тараненко, А.Г. Пролактин и лактация [Текст] / А.Г. Тараненко. М.: Агропромиздат, 1987. 128 с.
5. Джапаридзе, Г.М. Полиморфизм генов молочных белков и гормонов у коров голштинской породы [Текст]: дис. ... канд. биол. наук: 06.02.07 / Г.М. Джапаридзе. Лесные Поляны: ВНИИплем, 2013. 24 с.
6. Лазебная, И.В. Полиморфизм генов гормона роста GH и пролактина PRL и изучение его связи с процентным содержанием жира в молоке у коров костромской породы [Текст] / И.В. Лазебная, О.Е. Лазебный, М.Н. Рузина, Г.А. Бадин, Г.Е. Сулимова // Сельскохозяйственная биология. 2011 № 4. С. 46–51.
7. Багаль, И.Е. Молочная продуктивность коров холмогорской породы с разными генотипами генов гормонов [Текст] / И.Е. Багаль, В.Л. Ялуга, И.Ю. Павлова, Л.А. Калашникова // Зоотехния. 2015. № 9. С. 23–26.
8. Харзинова, В.Р. Полиморфизм ДНК-маркеров DGAT1, TG5 и GH в связи с линейной принадлежностью и уровнем молочной продуктивности коров чёрно-пёстрой породы [Текст] / В.Р. Харзинова, Н.А. Зиновьева, Е.А. Гладырь // Проблемы биологии продуктивных животных. 2011. № 1. С. 73–77.
9. Позовникова, М.В. Генетическая структура коров молочных пород по ДНК-маркерам и влияние их генотипов на молочную продуктивность [Текст] / М.В. Позовникова, О.В. Тулинова, Г.Н. Сердюк, И.А. Погорельский // Молочное и мясное скотоводство. 2016. № 2. С. 8–13.
10. Максименко, В.Ф. Молекулярно-генетические особенности по генам гормона роста и пролактина ярославской породы скота [Текст] / В.Ф. Максименко, Н.С. Фураева // Вестник АПК Верхневолжья. 2013. № 4 (24). С. 43–45.
11. Позовникова, М.В. Ассоциация однонуклеотидных полиморфизмов генов-кандидатов PRL и β -LG с хозяйственно-полезными признаками у коров черно-пестрой породы [Текст] / М.В. Позовникова, Г.Н. Сердюк, О.В. Митрофанова // Генетика и разведение животных. 2017. № 4. С. 31–36.
12. Юльметьева, Ю.Р. Влияние генетических аспектов на динамику молочной продуктивности голштинского скота [Текст] / Ю.Р. Юльметьева, Ф.Ф. Зиннатова, Е.Н. Рачкова // Достижения науки и техники АПК. 2015. Т. 29. № 11. С. 99–101.
13. Павлова, Н.И. Полиморфизм генов CSN3, LGB и PRL у крупного рогатого скота, разводимого в Республике Саха (Якутия) [Текст] / Н.И. Павлова, Н.П. Филипова, А.В. Чугунов, В.В. Додохов // Достижения науки и техники АПК. 2016. Т. 30. № 11. С. 103–106.
14. Хабибрахманова, Я.А. Полиморфизм генов молочных белков и гормонов крупного рогатого скота [Текст]: дис. ... канд. биол. наук. Лесные Поляны Московской области: ВНИИплем, 2009. 20 с.
15. Зиннатова, Ф.Ф. Влияние породы и генотипа по генам CSN3, DGAT1, PRL, LGB на молочную продуктивность крупного рогатого скота [Текст] / Ф.Ф. Зиннатова, Ш.К. Шакиров, Ю.Р. Юльметьева // Вестник РАСХН. 2012. № 6. С. 65–67.
16. Горячева, Т.С. Генетические варианты казеина и пролактина в связи с молочной продуктивностью коров черно-пестрой породы [Текст] / Т.С. Горячева, Г.М. Гончаренко // Сельскохозяйственная биология. 2010. № 4. С. 51–54.
17. Tyul'kin S.V., Akhmetov T.M., Valiulina E.F., Vafin R.R. Polymorphism of Somatotropin, Prolactin, Leptin, and Thyreoglobulin Genes in Bulls. Russian Journal of Genetics: Applied Research, 2013. V. 3. № 3. P. 222–224.
18. Некрасов, Д.К. Взаимосвязь полиморфных вариантов генов пролактина, гормона роста и каппа-казеина с молочной продуктивностью коров ярославской породы [Текст] / Д.К. Некрасов, А.Е. Колганов, Л.А. Калашникова, А.В. Се-

машкин // Аграрный вестник Верхневолжья, 2017. № 1 (18). С. 40–48.

19. Удина, И.Г. Полиморфизм гена пролактина (микросателлиты, ПЦР-ПДРФ) у крупного рогатого скота [Текст] / И.Г. Удина, С.О. Туркова, Г.Е. Сулимова // Генетика. 2001. Т. 37. № 4. С. 511–516.

20. Хатами, С.Р. ДНК-полиморфизм генов гормона роста и пролактина у ярославского и

черно-пестрого скота в связи с молочной продуктивностью [Текст] / С.Р. Хатами, О.Е. Лазебный, Г.Е. Сулимова // Генетик. 2005. Т. 41. № 2. С. 229–236.

21. Alipanah M., Kalashnikova L.A., Rodionov G.V. Kappa-casein and PRL-RSAI genotypic frequencies in two Russian cattlebreeds. Arch. Zootech. 2008. № 57 (218). P. 131–138.

Сведения об авторах

1. **Долматова Ирина Юрьевна**, доктор биологических наук, профессор, зав. лабораторией молекулярной генетики, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: dolmat@list.ru.

2. **Ганиева Ильнура Нурисламовна**, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: ilnura78@mail.ru.

3. **Конonenko Татьяна Владимировна**, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: alecsei168@yandex.ru.

4. **Валитов Фарит Равилович**, доктор сельскохозяйственных наук, доцент, зав. кафедрой пчеловодства, частной зоотехнии и разведения животных, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: fvalitov@mail.ru.

Приводятся результаты исследований полиморфизма генов пролактина (*PRL*) и соматотропина (*GH*) в связи с молочной продуктивностью крупного рогатого скота чёрно-пёстрой и бестужевской пород. Полиморфизм генов выявлен методом ПЦР-ПДРФ. Установлены частоты аллелей и генотипов по исследованным генам. Выявлена общая тенденция взаимосвязи молочной продуктивности коров как чёрно-пёстрой, так и бестужевской пород с их генотипической принадлежностью по обоим исследованным генам, которая заключается в том, что гомозиготные коровы с генотипами *PRL^{AA}* являются наименее обильномолочными по сравнению с коровами, имеющими другие генотипы (*PRL^{BB}* и *PRL^{AB}*). Описанное соотношение характерно как для величины удоев, так и для количества молочного жира. Массовая доля жира больше в молоке коров с генотипами *PRL^{AA}* по сравнению с генотипами *PRL^{AB}* и *PRL^{BB}*. Также показано, что аллели *GH^V* *AluI*-полиморфного сайта, *GH^D* *MspI*-поли-

морфного сайта гена гормона роста (*GH*) и *PRL^B* гена пролактина крупного рогатого скота являются благоприятными с точки зрения хозяйственной ценности. Выявлены также комплексные генотипы одновременно с учетом нескольких генов, повышающие уровень молочной продуктивности. Такими генотипами, проявляющими положительный эффект в отношении удоя у обеих исследованных пород, являются *GH^{LV(VV)}GH^{CD}PRL^{AB}* и *GH^{LV}GH^{DD(CD)}PRL^{BB}*. Также проведено определение взаимосвязи комплексных генотипов по генам *PRL* и *GH* с показателями молочной продуктивности. Среди обеих изученных пород выявлены комплексные генотипы, ассоциированные как с повышенной (выше среднего), так и с пониженной (ниже среднего) продуктивностью. Полученные результаты могут стать важным звеном в селекционной работе, способствующим формированию генофонда плановых пород крупного рогатого скота с необходимыми генными сочетаниями.

I. Dolmatova, I. Ganieva, T. Kononenko, F. Valitov

RELATIONSHIP OF POLYMORPHIC PROLACTIN GENES AND GROWTH HORMONES IN DAIRY CATTLE

Key words: prolactin; growth (somatotropin) hormone; polymorphic genes; alleles; genotype; PCR-RFLP; dairy productivity; cattle.

Authors' personal details

1. **Dolmatova Irina**, Doctor of Biology, Professor, Head of the Laboratory of Molecular Genetics, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, e-mail: dolmat@list.ru.

2. **Ganieva Ilhura**, Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher at the laboratory of molecular genetics, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, e-mail: ilnura78@mail.ru.

3. **Kononenko Tatyana**, Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher of the laboratory of Molecular Genetics, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, e-mail: alecsei168@yandex.ru.

4. **Valitov Farit**, Doctor of Agriculture, Associate Professor, Head of the Department of Beekeeping, Private Animal Husbandry and Animal Breeding, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, e-mail: fvalitov@mail.ru.

The article reports the study findings on polymorphism of the prolactin (*PRL*) and somatotropin (*GH*) genes in connection with the dairy productivity of black-and-white and Bestuzhev cattle breeds. The PCR-RFLP method was used to reveal the gene polymorphism. The study established allele frequencies in the genes. The study also revealed a broad tendency for the relationship of milk productivity in both the black-and-white and Bestuzhev breeds with their *PRL* and *GH* genotypes. The genotype identity suggests that the homozygotic cows with the *PRL*^{AA} genotypes feature lower milk productivity compared to the cows with other genotypes (*PRL*^{BB} and *PRL*^{AB}). The described ratio was true for both milk yields and milk fat. The fat mass fraction was greater in the milk of cows with the genotype *PRL*^{AA} compared to the genotype *PRL*^{AB} and *PRL*^{BB}. The study showed that the alleles of

GH^V*AluI* polymorphic site, *GH*^D*MspI* polymorphic site of the growth hormone (*GH*) gene, and the *PRL*^B prolactin gene in the cattle were productive in terms of economic value. Complex genotypes with several genes at the same time were identified. These genotypes can increase the level of milk productivity. The following genotypes demonstrated a positive effect on milk yields in the two breeds: *GH*^{LV(VV)}*GH*^{CD}*PRL*^{AB} and *GH*^{LV}*GH*^{DD(CD)}*PRL*^{BB}.

The relationship of the complex genotypes based on the *PRL* and *GH* genes with milk productivity indices was also determined. The study identified complex genotypes associated with both higher (above average) and lower (below average) productivity indices in the two breeds. The findings can be helpful in breeding practices as they may foster the gene pool formation of the planned cattle breeds with the specific gene combinations.

© Долматова И.Ю., Ганиева И.Н., Кононенко Т.В., Валитов Ф.Р.

УДК 636.3.082

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-78-82

С.Г. Исламова

МОЛОЧНОЕ КОЗОВОДСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Ключевые слова: козы; зааненская порода; бонитировка; живая масса; продуктивность; экстерьер; конституция.

Введение. В последние годы во многих странах мира значительное развитие получило молочное козоводство. Одно из первых мест по численности коз занимает Китай. В Европе самое большое поголовье коз; в Греции при населении не более 6 млн человек содержатся почти 4 млн коз. Известно, что большинство долгожителей живут в местах, где люди потребляют много козьего молока, например, в Южной Африке и на Балканах. Во Франции ежегодно производится свыше 300 тыс. тонн козьего молока, из которого получают великолепные сыры. Активно занимаются разведением коз испанцы, немцы, итальянцы, англичане, аргентинцы, бразильцы. Многочисленная литература отечественных и зарубежных авторов свидетель-

ствует о том, что молочное козоводство – одно из перспективных отраслей животноводства. Однако в Российской Федерации в целом, и в РБ в частности эта отрасль развита крайне слабо. Хотя за последнее десятилетие наметились определённые подвижки в лучшую сторону. У нас в республике молочное козоводство представлено лишь небольшими стадами в Уфимском, Благовещенском, Шаранском и некоторых других районах [1–5].

Целью исследований явилась комплексная оценка племенных и продуктивных качеств коз зааненской породы.

Материал и методы исследований. Объектом исследований было стадо коз зааненской породы ООО «СБТ-Агро» Уфимского района

РБ. Материалом служили данные первичного зоотехнического и племенного учета, годовые отчеты хозяйства, действующие положения, инструкции. Промеры у животных брали мерными инструментами (мерная палка, мерный циркуль, мерная лента). Цифровой материал статистически обработан на ПК программе Microsoft Excel.

Результаты исследований. ООО «СБТ-Агро» начало заниматься разведением коз сравнительно недавно, поголовье животных относительно небольшое. Впервые завоз чистопородного молодняка коз зааненской породы осуществили в 2015–2016 годах из ЗАО «Племенной завод Приневский» Ленинградской области. В возрасте 6–7 месяцев их живая масса была в среднем 27–40 кг. Удой их матерей составил 500–1000 кг при жирности молока 3,0–4,8 %. Всё завезенное поголовье животных соответствовало бонитировочному классу элита. На начало 2019 года в стаде хозяйства насчитывалось 179 голов, в том числе 118 козوماتок. В

структуре стада на их долю приходится 65,9 %, причем маток первой лактации всего 108 голов. По классному составу имеющееся маточное поголовье коз соответствует требованиям племенного хозяйства. Ниже приводятся данные бонитировки за последний год. По итогам бонитировки всё поголовье стада, принадлежащее ООО «СБТ-Агро», – чистопородное, голландской селекции. Животные заводской упитанности, соответствуют требованиям, предъявляемым козам этой породы (таблица 1).

По итогам бонитировки поголовье коз, содержащихся в хозяйстве, отнесено к бонитировочным классам элита-рекорд, элита и первому. При этом основная масса животных соответствует высшим классам. Так, доля козوماتок класса элита – 92,4 %, козочек – 90,3 %.

Оптимальные условия кормления и содержания позволяют хозяйству добиваться высоких показателей молочной продуктивности (таблица 2).

Таблица 1 Породный и классный состав поголовья коз

Группа животных	Всего пробон. голов	в том числе				Животные класса элита, %
		ч/п и IV покол.	по бонитировочным классам			
			элита	I кл.	II кл.	
Всего коз, в том числе:	179	179	165	14	—	92,2
Козлы-произв. основн.	3	3	3	—	—	100
Козлы ремонтные	6	6	6	—	—	100
Козоматки	118	118	109	9	—	92,4
Козочки тек. года рождения	52	52	47	14	—	90,3

Таблица 2 Молочная продуктивность козوماتок ООО «СБТ-Агро»

Показатель	Продуктивность		
	в среднем по стаду	в т. ч. по бонитировочным классам	
		элита	первый
Удой, кг	805	809,9	746
в том числе: I лактация	785	789	746
II лактация	997	997	–
III лактация	1193	1193	–
Содержание жира, %	3,52	3,52	3,52
Содержание белка, %	2,93	2,93	2,93
Удой коз племенного ядра, кг	879	879	–

Средний удой в расчете на 1 козу в целом по стаду в 2018 году достиг 805 кг, жирность – 3,52 %, белкомолочность – 2,93 %. Как и ожидалось, козы старших возрастов в стаде проявили более высокую продуктивность. Однако их численность в настоящее время небольшая, и они могут значительно повлиять на средние показатели стада. Естественно, козы за первую лактацию дали несколько меньше молока, чем полновозрастные животные. Молочная продуктивность животных племенного ядра находится на уровне 879 кг в расчете на голову. При целенаправленном ведении селекционно-племенной работы можно ожидать дальнейшего увеличения удоя по стаду в целом.

При достаточно высоком по стаду удое молока содержание в нем жира также было выше стандартных показателей.

Важным резервом дальнейшего повышения молочной продуктивности служит наличие в стаде высокопродуктивных коз-рекордисток. При грамотном подборе к ним козлов-производителей и организации направленного выращивания полученного приплода можно через них достаточно эффективно повлиять на молочную продуктивность всего стада хозяйства. Как выяснилось, в стаде коз с удоем более 900 килограммов в год насчитывается не менее 30 голов. Среди них есть очень ценные в племенном отношении животные: козы Марта 7114 с годовым

удоем 1204 кг, Аннегре 4637 – 1193, Марта 7222 – 1117 кг, Марта 7165 – 1017, Марта 7204 – 1106 кг и другие. Все эти животные молодые, следовательно, перспективные.

Кроме этих коз, в стаде много других высокоудойных животных, которые могут оказать значительное влияние на показатели, если организовать ежегодное получение от них козлят, правильно их выращивать и таким образом увеличить численность животных, генетически направленных на высокую продуктивность. Эффект от содержания высокопродуктивных коз еще поднимется, если организовать полноценный раздой, создать им оптимальные условия ухода и содержания. Практикой и научными исследованиями доказано, что при прочих равных условиях крупные животные проявляют более высокую продуктивность, нежели козы с меньшей живой массой. Поэтому разводить более крупных коз, соответствующих стандарту породы, выгоднее, чем более мелких с плохо развитым телосложением.

Нами проанализированы результаты взвешивания коз (таблица 3).

Анализируя материалы, приведенные в таблице, следует отметить, что в целом живая масса животных несколько отличается от параметров стандарта. При этом можно подчеркнуть, что прослеживается такая тенденция, когда живая масса молодняка довольно существенно превышает минимальные требования первого класса

племенных животных молочного направления продуктивности. В то же время и живая масса взрослых коз достаточно высока. Показатели маточного поголовья, а также козлов-производителей намного выше минимальных требований для животных первого бонитировочного класса как по существующему, так и по новому стандарту. В хозяйстве резервы по увеличению живой массы животных, особенно молодняка, не исчерпаны. Специалистам общества необходимо и в дальнейшем больше внимания обращать на вопросы выращивания молодняка, в том числе для ремонта стада.

Оценка животных по экстерьеру и конституции является важной составляющей в комплексной системе селекции. Экстерьер сельскохозяйственных животных, в том числе, разумеется, и коз, является внешним проявлением конституции и в полной мере характеризует их племенные, продуктивные и адаптационные возможности.

Экстерьерная оценка молочных коз наряду с показателями продуктивности, прежде всего молочной, является важным селекционным признаком, который широко используется в селекционном процессе по совершенствованию пород. Изучение уровня взаимосвязей между удоем молока и линейными признаками имеет важное значение.

В связи с этим мы проанализировали показатели промеров статей тела, характеризующие экстерьерные особенности коз (таблица 4).

Таблица 3 Живая масса маточного поголовья коз ООО «СБТ-Агро»

Половозрастная группа	Миним. требов. (стандарт), кг		Кол-во, гол.	Средняя живая масса, кг	Разница со стандартом породы, кг
	1986 года*	2018 года**			
Козочки 7 месяцев	25	32	52	38	18,6–11,6
Козоматки взрослые	50	55	118	55,6	5,6–0,6
в т. ч. плем. ядра	–	–	60	57	–
Козлы ремонтные	–	–	6	51,6	–
Козлы взрослые	80	80	3	86	6

Примечания: * «Инструкции по бонитировке пуховых, шерстных и молочных коз с основами племенной работы, утвержденной Государственным Агропромышленным комитетом СССР (Госагропромом СССР) 14 апреля 1986 года».

** Проект Приказа Министерства сельского хозяйства РФ «Об утверждении порядка и условий проведения бонитировки племенных коз молочного направления продуктивности» (подготовлен Минсельхозом России 16.01.2018 г., размещен в интернете).

Таблица 4 Промеры туловища молочных коз ООО «СБТ-Агро», см

Промер		Козлы-производители	Козоматки	Молодняк коз
Высота в	холке	91,7 ± 1,7	81,6 ± 1,9	69,4 ± 1,6
	крестце	90,3 ± 1,9	85,4 ± 1,7	70,5 ± 1,5
Глубина	груди	37,3 ± 0,8	33,8 ± 0,6	24,6 ± 0,4
		26,9 ± 0,3	20,8 ± 0,4	16,2 ± 0,2
Ширина в	маклоках	18,0 ± 0,2	17,8 ± 0,5	14,0 ± 0,3
	тазобедренных суст.	21,7 ± 0,2	22,0 ± 0,4	17,2 ± 0,2
	седалищных буграх	10,7 ± 0,1	10,0 ± 0,1	6,2 ± 0,1
Косая длина туловища		100,7 ± 1,7	94,4 ± 3,1	74,5 ± 2,1
Обхват	груди	105,0 ± 1,5	103,6 ± 1,3	77,4 ± 0,9
	пясти	12,7 ± 0,2	9,8 ± 0,7	8,4 ± 0,4
Полуобхват зада		70,7 ± 1,7	51,0 ± 1,5	43,6 ± 1,6
Длина	головы	25,0 ± 0,5	21,4 ± 0,7	19,0 ± 0,3
		18,7 ± 0,7	14,8 ± 0,2	12,8 ± 0,3

Результаты измерения свидетельствуют о хорошо выраженном половом диморфизме животных, о возрастных изменениях статей тела коз. Наиболее высокие показатели промеров имеют козлы-производители по сравнению с другими половозрастными группами животных. Так, по высоте в холке, который характеризует прежде всего величину животного, козлы превосходят козomatок на 12 %, молодняк – на 32 %.

Основные показатели промеров соответствуют литературным данным коз зааненской породы.

В отличие от абсолютных промеров туловища индексы строения тела являются довольно ценным материалом для объективной оценки конкретного животного. По ним можно судить о пропорциональности развития тела животного,

о конституциональных его особенностях, о степени недоразвития.

Характеризуя животных, к примеру, по высоконогости, можно констатировать, что с возрастом у животных изменяются пропорции тела. Так, молодняк рождается высоконогим, с коротким, не глубоким и не широким туловищем. А с возрастом при нормальном развитии в оптимальных условиях содержания происходит рост организма в длину, ширину и глубину, о чем свидетельствуют данные таблицы 5.

Вычисленные показатели основных индексов телосложения коз хозяйства также подтверждают пропорциональное развитие всех статей туловища животных разных половозрастных групп, соответствие их молочному производственному типу.

Таблица 5 Индексы телосложения коз различных половозрастных групп, %

Индекс	Козлы-производители	Козоматки	Молодняк коз
Длинноногости (высоконогости)	59	58	64
Растянутости	110	116	107
Тазо-грудной	149	117	116
Грудной	72	61	66
Костистости	14	12	12
Сбитости	104	110	104

Таким образом, исходя из результатов наших исследований и согласно имеющимся литературным данным, можно отметить, что козы «СБТ-Агро» по основным экстерьерным показателям значительно превосходят животных мно-

гих ведущих племенных хозяйств страны. Козы хозяйства гармонично развиты, без серьезных экстерьерных недостатков, способны проявить высокую молочную продуктивность.

Библиографический список

1. Амерханов, Х.А. Развитие овцеводства и козоводства будет идти вперед по нарастающей [Текст] / Х.А. Амерханов // Актуальные аспекты ведения овцеводства и козоводства в современных условиях. М.: Росинформагротех, 2012. С. 117.
2. Владимиров, Н.И. Некоторые экстерьерные особенности молочных коз с учетом лактации [Текст] / Н.И. Владимиров, Е.М. Зуева // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2017. № 1 (147). С. 100–104.

3. Исламов, Ф.А. Содержание коз [Текст]: учебное пособие / Ф.А. Исламов, С.Г. Исламова. Уфа: Гилем, 2007. 182 с.
4. Исламова, С.Г. Разведение молочных коз [Текст]: рекомендации. Уфа: Башкирский ГАУ, 2018. 40 с.
5. Мороз, В.А. Овцеводство и козоводство [Текст]: учебники и учебные пособия для высших учебных заведений / В.А. Мороз. Ставрополь: кн. изд-во, 2002. 453 с.

Сведения об авторе

Исламова София Гизатовна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры пчеловодства, частной зоотехнии и разведения животных, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г.Уфа, ул. 50-летия Октября, 34.

Приведены результаты оценки племенных и продуктивных качеств стада коз зааненской породы. Исходя из результатов наших исследований и согласно имеющимся литературным данным, можно отметить, что козы «СБТ-Агро» по основным экстерьерным показателям значи-

тельно превосходят животных многих ведущих племенных хозяйств страны. Козы хозяйства гармонично развиты, без серьезных экстерьерных недостатков, способны проявить высокую молочную продуктивность. Вычисленные показатели основных индексов телосложения коз хо-

зййства также подтверждают пропорциональное развитие всех статей туловища животных раз-

ных половозрастных групп, соответствие их молочному производственному типу.

S. Islamova

DAIRY GOAT BREEDING IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Key words: *goats; Saanen breed; valuation; live weight; productivity; exterior; goat's body type.*

Authors' personal details

Islamova Sofia, Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the Department of Beekeeping, Private Animal Husbandry and animal breeding, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34.

The article reports the results of assessing breeding and productive qualities of the Saanen goat flock. Based on the available literature resources and study findings the author points out that by the main exterior features goats (on «SBT-Agro» farm) are better than the animals raised on most of the leading farms in Russia. The goats of the farm are

reported to have good body structure, without any serious exterior deficiency, and possess high milk production potential. The indices associated with the body type confirmed the balanced body features of the goats belonging to different sex and age groups and identified their milk production type.

© Исламова С.Г.

УДК 638.12

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-82-89

А.С. Ишимгужина, В.Р. Туктаров

ИЗ ОПЫТА МОРФОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БАШКИРСКИХ ПЧЕЛ ПРИ ПОМОЩИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОРОДА ПО КРЫЛЬЯМ»

Ключевые слова: *кубитальный индекс; гантельный индекс; дискоидальное смещение; программа «Порода по крыльям»; бурзянская бортевая пчела; метисация.*

Введение. Одной из актуальных задач ученых-пчеловодов Республики Башкортостан является разработка методов сохранения генофонда бурзянской бортевой пчелы. Как показывают полевые исследования, нарастающая с каждым годом метисация этих пчел вызвана, главным образом, завозом в районы ее обитания других пчелиных пород и популяций [3, 15–17]. Для разработки эффективных мер по сохранению этой пчелы нужна постоянно обновляющаяся информация о степени «засоренности» ее генофонда. Такую задачу традиционно выполняет мониторинг, направленный на определение породности пчел на исследуемой территории. Это довольно трудоемкая работа, связанная с генетическими исследованиями или морфометрическими измерениями внешнего строения пчел. 5–6 лет тому назад стали появляться компьютерные программы исследования породности, позволяющие применение новых методов определения вида пчелы и ускоряющие обработку

большого массива собранной информации. Самой известной из них является программа «Порода по крыльям.xls», разработанная А.Б. Карташевым в среде Excel [7, 9]. Она позволяет быстро определить породность пчелы по крыльевым показателям (дискоидальное смещение, кубитальный и гантельный индексы). Однако эта в целом эффективная программа имеет ряд недостатков: а) она рассчитана на исследование только 100 крыльев (т. е. примерно 2–3 пробы); б) программа может считать одну и ту же пчелу два и иногда даже три раза из-за того, что у каждой породы морфометрические показатели выражаются в определенном диапазоне. Периодически какие-то показатели у разных пчел оказываются в одном и том же интервале, что является основанием их отнесения и к одной, и к другой группе; в) программа рассчитана на определение принадлежности пчелы только к одной из четырех наиболее часто встречающихся в России популяций (среднерусской, кавказской, кра-

инской и итальянской). Поскольку бурзянская бортевая пчела официально не присутствует в программе как популяция, то она не позволяет применять ее адресно по отношению к объекту нашего исследования. Например, А.М. Ишемгулов считает пчелу «Башкирскую», созданную на основе бурзянской бортевой, отдельной породой, что подтверждено и патентом РФ [5, 6, 11]. По этой причине возникла необходимость внесения изменений в программу «Порода по крыльям.xls» для мониторинга в районе исторического обитания этой аборигенной пчелы.

Целью исследования является проведение мониторинга пчел Бурзянского района Республики Башкортостан при помощи модернизированной программы «Порода по крыльям» для выяснения степени метисации бурзянской бортевой пчелы и выявления доли пчел других пород и популяций на исследуемой территории.

Для достижения этой цели были поставлены следующие **задачи**:

1. Усовершенствовать программу «Порода по крыльям.xls», приспособив ее к исследованию бурзянской бортевой пчелы и расширив ее возможности для анализа не менее 10000 тыс. пчел.

2. Провести сравнительный анализ 40 проб (1320 крыльев) чистопородной бурзянской пчелы традиционным методом (при помощи микроскопа) и методом компьютерного анализа с целью уточнения ее крыльевых показателей.

3. Исследовать не менее 320 пчелиных семей, обитающих на территории Бурзянского района Республики Башкортостан, с целью выяснения доли бурзянской бортевой пчелы в районе исследования.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужили 10857 правых передних крыльев пчел из 329 пчелиных семей, расположенных в населенных пунктах Бурзянского района Республики Башкортостан (территории исторического обитания бурзянской бортевой пчелы): д. Кутаново – 80, д. Максютново – 14, д. Иргизлы – 170, Гадельгареево – 14, д. Новосубхангулово – 2, с. Старосубхангулово – 1, Кiekбаево – 8, Исламбаево – 17, Галиакберово – 23 пчелиных семей. Исследование полученного материала проводилось с 01.06.2019 по 31.08.2019 года, главным образом, с использованием модернизированной компьютерной программы «Порода по крыльямVB», в которой используется геометрический способ определения породности по трем показателям правого переднего крыла: дискоидальное смещение, кубитальный и гантельный индексы. Исходными данными для работы программы являются координаты восьми точек на пересечениях жилок крыла.

Рисунок 1

Изображение правого переднего крыла пчелы с поставленными точками для компьютерного анализа

Исследование осуществлялось в следующей последовательности: отделенные при помощи пинцета крылья укладывали в ряд на прозрачную липкую ленту длиной 17–18 см верхней кромкой вниз, после чего прижимали к белой плотной бумаге формата А4. На одном листке, как правило, уместается 24 пробы по 33 шт. (792 крыла).

Рисунок 2

Крылья пчелы, подготовленные для сканирования и анализа при помощи компьютерной программы

Каждую пробу помещали в сканер с разрешением не менее 2400 dpi. Как правило, из каждой пробы мы выбирали 30 наиболее качественно приклеенных крыльев (в каждой пробе отбраковывали при помощи программы по три крыла. Таким образом, в совокупности обрабатывали не 10857 крыла, а 9870). Работа с их изображением (увеличение размера, расста-

новка точек в местах пересечения жилок, запуск программы и получение результата) позволяет получить общий вывод по пробе, представленный в виде круговой диаграммы, в которой в процентном выражении показаны породы пчел, к которым принадлежат исследованные крылья.

Чтобы модернизировать программу «Порода по крыльям.xls» для ее целенаправленного применения при определении доли бурзянской бортовой пчелы в районе исследования и степени ее метисации, проведена работа по уточнению ее крыльевых показателей по двум методикам: а) по общепринятой морфометрической методике; б) при помощи программы «Порода по крыльям.xls». Однако абсолютно точное сравнение полученных по этим методикам результатов невозможно, поскольку:

а) по традиционной методике дискоидальное смещение не выражается в числовом выражении из-за трудности его измерения при помощи микроскопа, а программа А.Б. Карташева позволяет это сделать;

б) существует разница между этими методиками в расчетах кубитального индекса: автор программы «Порода по крыльям.xls» основывается на позиционировании точек на крыле, принятой Ф. Руттнером и его последователями, и вводит поправочный коэффициент, рассчитываемый по формуле:

$KI_a = 1 : KI_r \cdot (0,0381 \cdot KI_r + 0,9982) \cdot 100 \%$,
где KI_a – кубитальный индекс по Алпатову, KI_r – кубитальный индекс по Руттнеру [8];

в) по общепринятой методике гантельный индекс, всегда коррелирующий с дискоидальным смещением [1; 13; 14], не учитывается, а по

методике Карташева он учитывается и выражается при помощи чисел.

Для уточнения крыльевых показателей бурзянской пчелы было отобрано для исследования 40 проб (1200 крыльев) чистопородных рабочих пчел. Полученные диапазоны показателей кубитального индекса, гантельного индекса, дискоидального смещения были использованы для замены традиционных крыльевых показателей для среднерусской пчелы, которые применяются в базовой программе, разработанной А.Б. Карташевым. Также были внесены изменения в генератор счетчика программы с целью расширения ее возможностей для обработки крыльевых показателей десятков тысяч пчел. Еще одно изменение связано с отражением доли неопознанных пчел: в модернизированной программе «Порода по крыльямВВ» в итоговую диаграмму включены и результаты, выражающие процентное соотношение неопознанных компьютером крыльев, что не предусмотрено базовой программой. Такое новшество позволяет наглядно демонстрировать долю гибридных пчел или же принадлежащих к иным, не внесенным в программу, породам.

Результаты исследования. Для уточнения крыльевых показателей бурзянской бортовой пчелы были отобраны 1200 штук качественно приклеенных крыльев (40 проб) чистопородных бурзянских пчел. Пчелы были выбраны в четырех населенных пунктах Бурзянского района: Галиакберово (9 проб), Гадельгареево (25 проб), Кiekбаево (5 проб), Кутаново (11 проб). Результаты исследования представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 Обобщенный результат исследования крыльев бурзянской бортовой пчелы по традиционной методике

Населенные пункты	Количество крыльев	Кубитальный индекс	Дискоидальное смещение		
			положит.	отриц.	нейтральн.
Галиакберово	270	70,6	–	90,0	10,0
Гадельгареево	750	65,0	16,7	80,0	3,3
Кiekбаево	150	80,1	10,0	83,3	6,7
Кутаново	330	63,9	8,1	86,7	5,2
Всего	1200	69,9	8,7	85,0	6,3

Таблица 2 Обобщенный результат исследования крыльев бурзянской бортовой пчелы по программе «Порода по крыльям.xps»

Населенные пункты	Количество крыльев	Не опозн. крылья	Кубитальн. индекс	Дискоид. смещение	Гантельный индекс
Галиакберово	270	13,3	52,3–71,2	–0,477	0,941
Гадельгареево	750	23,3	48,9–64,4	–5,109	0,894
Кiekбаево	150	16,7	50,1–101,7	–3,181	0,789
Кутаново	330	14,5	49,6–72,3	–4,758	0,880
Всего	1200	16,9	50,2–77,4	–4,817	0,795

Программа «Порода по крыльям.xps» рассчитана на определение принадлежности исследуемых пчел к четырем породам: среднерусской

(в программе она задана под именем «Mellifera»), кавказской («Caucasica»), итальянской («Ligustica») и краинской («Carnica»). Поэтому

если среди исследованных встречаются пчелы другой породы, то программа их не распознает. Не распознает она и пчел-гибридов, крыльевые показатели которых выходят за пределы введенных в программу показателей чистопородных пчел. Сравнение таблицы 2 с таблицей 1 показывает, что кубитальный индекс исследованных нами бурзянских бортевых пчел не всегда совпадает с показателями среднерусской пчелы, содержащимися в инструкции по бонитировке пчелиных семей Министерства Российской Федерации, где эта цифра колеблется от 60 до 65 % [4]. Результаты показывают, что существуют небольшие отклонения от принятых для среднерусской пчелы стандартов и по гантельному индексу. Это позволяет считать, что исследованные нами пчелы относятся к отдельной популяции, распространенной в Бурзянском районе Республики Башкортостан. В «Государственном реестре охраняемых селекционных достижений» «Бур-

зянская бортевая» отнесена к породному типу, что подтверждено и патентом [2, с. 19; 12]. Но являются ли исследованные нами пчелы из частных пасек результатом селекции, что позволило бы считать их породой или породным типом? Мы отбирали чистопородных пчел из пасек, хозяева которых не покупали искусственно выведенных маток. Следовательно, эти пчелы относятся к популяции бурзянская бортевая пчела.

Полученные нами крыльевые показатели чистопородных бурзянских пчел были использованы для модернизации программы «Порода по крыльям.xps»: из нее были удалены крыльевые показатели среднерусской пчелы («Mellifera»), вместо которых внесены показатели бурзянской пчелы («MelliferaBB»). Разницу в определении породности при помощи базовой и обновленной программы рассмотрим на примере одной пробы, взятой в частной пасеке в с. Старосубхангулово.

Рисунок 3
Результат определения видов пчел программой «Порода по крыльям.xps»

Результат, отраженный на рисунке 3, показывает, что в исследуемой пробе нет пчел краинской и итальянской пород, но есть пчелы кавказской породы (20 %). Доля среднерусской пчелы составляет 66,7 %. Сумма этих двух чисел не равна 100 %. Следовательно, оставшиеся 13,3 % пчел программа не идентифицировала.

Это означает, что они, скорее всего, гибридные или же принадлежат к каким-то другим породам или популяциям.

Рассмотрим результаты обработки той же пробы при помощи программы «Порода по крыльямBB»:

Рисунок 4
Результат определения видов пчел по программе «Порода по крыльямBB»

Сравнение результатов, отраженных на рисунках 3 и 4, позволяет сделать вывод, что часть

среднерусских пчел (3,4 %) модернизированная программа выводит из кластера, образованного

по признакам среднерусской пчелы. Это произошло из-за того, что показатели среднерусской и бурзянской пчелы, несмотря на их схожесть, не всегда совпадают. В диаграмме, сформированной новой программой, определена и доля неидентифицированных пчел (16,7 %). Этот показатель больше, чем в результатах, полученных при помощи базовой программы (рисунок 3), что указывает на то, что часть среднерусских пчел (3,4 %), имеющих несколько иные крыльевые показатели, чем бурзянские, отнесены к

другой – не содержащейся в новой программе – породе или же к гибридным.

Внесенные изменения в генератор счетчика программы «Порода по крыльямВВ» позволяют объединять и обобщать результаты исследования в целом по пасеке, нескольким пасекам и по району исследования. Так, к примеру, выглядят обобщенные результаты исследования, проведенные в населенном пункте Киекбаево (8 проб, 240 крыльев).

Рисунок 5

Обобщенные результаты идентификации исследуемых пчел по восьми пробам, взятым в д. Киекбаево

Если же обобщить результаты исследования по всем населенным пунктам (329 проб, 9870

крыльев), то получаем следующий результат:

Рисунок 6

Обобщенный результат исследования видов пчел в 329 частных пасеках Бурзянского района Республики Башкортостан

Выводы. Несмотря на ряд недостатков, компьютерные программы исследования пчел имеют и преимущества, которые проявляются как при обработке массива собранной информации, так и в измерительных процедурах. В частности, программа «Порода по крыльям.xls» позволяет решить две важные задачи: а) облегчить морфометрическое исследование крыльевых показателей пчел; б) ускорить процесс классификации исследованных пчел по породам и степень их метисации. Недостатки этой программы: а) она рассчитана на одновременное исследование от 1 до 100 крыльев; б) выявляет долю только 4 пород пчел: если крыльевые по-

казатели пчелы не соответствуют показателям этих пород, он относит ее к неопознанным. Однако эта программа устроена таким образом, что допускает внесение изменений: в частности, нами были заменены крыльевые показатели (дискоидальное смещение, кубитальный и гантельный индексы) среднерусской пчелы на показатели бурзянской бортовой пчелы. Был изменен и генератор счетчика программы, что позволило объединять результаты исследования по пчелиным семьям, пасекам, населенным пунктам в один итоговый результат. Чтобы отличить модернизированную программу от базовой, мы назвали ее «Порода по крыльямВВ». Одним из

перспективных направлений ее дальнейшей модификации для адресного исследования пчел Бурзянского района Республики Башкортостан является замена показателей редко встречающийся там краинской пчелы на показатели украинской степной, близкой по морфотипу к среднерусской популяции. Еще патриарх отечественного пчеловодства Г.А. Кожевников отмечал большое сходство украинской и среднерусской пчелы. Как он писал, «внешних признаков, по которым можно было бы без ошибки отличить украинскую пчелу от обыкновенной среднерусской, не имеются» [10, с. 31].

Библиографический список

1. Верещака, И. Гантельный индекс [Текст] / И. Верещака, В. Киселев // Пчеловодство. 2004. № 8. С. 18–19.
2. Государственный реестр охраняемых селекционных достижений [Текст]: официальное издание. М.: Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений, 2013. 148 с.
3. Ильясов, Р.А. Мониторинг (2004–2015 годы) генофонда темной лесной пчелы бурзянской популяции *Apis mellifera mellifera* [Текст] / Р.А. Ильясов, А.В. Поскряков, А.Г. Николенко // Изучение природы Башкортостана и проблемы пчеловодства: сб. ст. Уфа: Информреклама, 2016. С. 148–161.
4. Инструкция по бонитировке пчелиных семей [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://old.mcx.ru/documents/document/v7_show_print/6271.191.htm (дата обращения: 06.10.2019).
5. Ишемгулов, А.М. Башкирская пчела покоряет мир [Текст] / А.М. Ишемгулов // Пчеловодство. 2015. № 5. С. 6–8.
6. Ишемгулов, А.М. Башкирская пчела – ценнейший генофонд [Текст] / А.М. Ишемгулов, Ю.Г. Исхаков, Р.Н. Каипкулов // Пчеловодство. 2012. № 3. С. 54–56.
7. Ишимгузина, А.С. Классификация пчел призаповедной зоны заповедника «Шульган-Таш» при помощи компьютерной программы «Порода по крыльям» [Текст] / А.С. Ишимгузина // Проблемы научной мысли. 2019. Vol. 3. № 8. С. 3–5.
8. Карташев, А.Б. О формуле перевода кубитального индекса в проценты [Электронный ресурс] / А.Б. Карташев. Режим доступа: https://beessib.ucoz.ru/publ/pchely/o_formule_perevoda_kubitalnogo_indeksa_v_procenty/4-1-0-17 (дата обращения: 05.10.2019).
9. Карташев, А.Б. «Порода по крыльям. xls», программное обеспечение для определения породной принадлежности исследуемых пчел по жилкованию крыла [Электронный ресурс] / А.Б. Карташев. Режим доступа: <http://www.pchelovod.info/index.php?download=1938> (дата обращения: 08.09.2019).
10. Кожевников, Г.А. Породы пчел [Текст] / Г.А. Кожевников // Пчеловодство. 1966. № 12. С. 29–32.
11. Башкирская пчела [Текст]: патент РФ 3206 от 02.10.2006 г. / А.М. Ишемгулов, И.В. Шафиков, М.Г. Гиниятуллин, Т.Ф. Абдулов, Ф.А. Шакиров, В.Х. Зулъкарнаев, Р.Х. Кинзябаев, Ф.Ф. Тулумбаев, Г.С. Шангараева, В.И. Хусаинова, И.И. Буранбаев, Р.Н. Каипкулов, Ю.Г. Исхаков, И.С. Суюнов, И.Р. Тимирьянов // Государственный реестр охраняемых селекционных достижений (официальное издание). М.: Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений, 2012. 421 с.
12. Бурзянская бортевая [Текст]: патент РФ 5956 от 14.06.2011 г. / И.В. Шафиков, Л.Н. Савушкина, А.Р. Ишбирдин, М.Н. Косарев, А.А. Саттарова, Е.М. Петров, Р.Ш. Халиуллин, А.Я. Шарипов, Ф.Г. Юмагузин, Ю.А. Янбаев // Государственный реестр охраняемых селекционных достижений (Официальное издание). М.: Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений, 2012. 421 с.
13. Саттаров, В.Н. Некоторые аспекты оценки морфометрических признаков медоносной пчелы [Текст] / В.Н. Саттаров, В.Р. Туктаров, М.Г. Мигранов, И.М. Борисов, А.Ф. Хабиров // Пчеловодство. 2010. № 7. С. 10–11.
14. Саттаров, В.Н. Морфотипная структура популяции медоносных пчел (*Apis mellifera*) на территории Республики Башкортостан [Текст] / В.Н. Саттаров, В.Р. Туктаров, Н.Ф. Мухаметова, Л.Ф. Биглова, Г.Н. Шакирова, Н.Е. Земскова // Фундаментальные исследования. 2014. № 5-3. С. 515–518.
15. Туктаров, В.Р. Классификация бурзянских бортевых пчел по морфологическим признакам [Текст] / В.Р. Туктаров, Ф.Г. Юмагузин,

А.Г. Маннапов, А.С. Ишимгузина // Морфология. 2019. Т. 155. № 2. С. 283–284.

16. Шарипов, А.Я. Оценка чистопородности бурзянских пчел [Текст] / А.Я. Шарипов // Пчеловодство. 2019. № 3. С. 26–28.

17. Юмагузин, Ф.Г. Состояние генофонда бурзянской бортовой пчелы [Текст] / Ф.Г. Юмагузин, А.Н. Талипов // Изучение природы Башкортостана и проблемы пчеловодства: сб. ст. Уфа: Информреклама, 2016. С. 186–191.

Сведения об авторах

1. **Ишимгузина Арина Салиховна**, аспирант кафедры пчеловодства, частной зоотехнии и разведения животных, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: nefakt94@mail.ru.

2. **Туктаров Варис Рафкатович**, доктор биологических наук, профессор кафедры пчеловодства, частной зоотехнии и разведения животных, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: t.varis@mail.ru.

В статье излагаются результаты морфометрического исследования пчел, обитающих на территории Бурзянского района Республики Башкортостан, при помощи компьютерной программы «Порода по крыльям.xls» и ее модернизированного варианта. Суть исследования заключалась в определении породности пчел по трем крыльевым показателям: дискоидальному смещению, кубитальному и гантельному индексам. Модернизация этой программы была вызвана потребностью ее применения для исследования бурзянской бортовой пчелы, которая имеет ряд морфологических особенностей, не совпадающих полностью с морфометрическими характеристиками среднерусской пчелы. С этой целью показатели среднерусской пчелы были заменены на показатели бурзянской пчелы. Кроме того, были расширены возможности обработки исследуемого материала: если базовая программа рассчитана на обработку не более

100 крыльев, то ее модернизированный вариант позволяет объединять результаты исследования по пасакам, населенным пунктам и в целом по району (от 100 единиц до десятков тысяч). Преимущество исследований при помощи программы над традиционным методом определения породности пчелы заключается и в том, что она позволяет выразить дискоидальное смещение в числовом диапазоне, что способствует увеличению точности результатов. Итоги исследования также подтверждают точку зрения, согласно которой бурзянская бортовая пчела является популяцией, очень близкой по морфологическим показателям к среднерусской пчеле. Выявлена угроза сохранению этой аборигенной пчелы: ее доля среди исследованных нами пчел составляет всего 57,4 %. В качестве главной угрозы рассматривается наличие в районе исследования большого количества пчел кавказской популяции (13,5 %).

A. Isimguzhina, V. Tuktarov

FROM EXPERIENCE OF MORPHOMETRIC STUDY OF BASHKIR BEES WITH THE HELP OF THE COMPUTER PROGRAM «BREED BY WINGS»

Key words: *the cubital index; the hantel index; the discoidal shift; a computer program «Breed by wings»; wild hive bee of burzyan; crossbreeding.*

Authors' personal details

1. **Ishimguzhina Arina**, Post-graduate student of the department of the Bee Keeping, Private Animal Science and Animal breeding department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, e-mail: nefakt94@mail.ru.

2. **Tuktarov Varis**, Doctor of biological sciences, professor of the Bee Keeping, Private Animal Science and Animal breeding department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, e-mail: t.varis@mail.ru.

The article presents the results of morphometric study of bees living on the territory of Burzyan district of the Republic of Bashkortostan using the computer program «Breed by wings.xls» and its upgraded version. The essence of the study was to de-

termine the breed of bees by three wing indicators – cubital index, the hantel index, the discoidal shifting. The modernization of this program was caused by the need for its application for the study of the Burzyan bee, which has a number of morphological

features that do not coincide completely with the morphometric characteristics of the Central Russian bee. The indicators of the Central Russian bee were replaced by the indicators of the Burzyan bee. In addition, the possibilities of processing the studied material were expanded: the original program is designed for processing no more than 100 wings, then its modernized version allows combining the results of the study on apiaries, settlements and in the whole area (from 100 units to tens of thousands). The advantage of research using the program over the traditional method of determining the breed of

bees is that it allows to express the discoidal displacement in the numerical range, which makes it possible to increase the accuracy of the results. The results of the study also confirm the point of view, according to which the Burzyan bee is a breed very close in morphological parameters to the Central Russian bee. The threat to saving of this native bee has been identified: its share among the bees studied by us is only 57,4 %. The presence of a large number of Caucasian bees in the study area (13,5 %) is considered as the main threat.

© Ишимгужина А.С., Туктаров В.Р.

УДК 636.033:637.5

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-89-93

А.А. Ламанов, Л.А. Зубаирова, Ю.Н. Чернышенко

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ БЫЧКОВ РАЗНЫХ ПОРОД

Ключевые слова: бычки; порода; черно-пестрая; бестужевская; симментальская; технология содержания; говядина; химический состав.

Введение. Одной из важных задач агропромышленного комплекса является максимальное удовлетворение потребности населения в продуктах питания животного происхождения, в частности в мясной продукции отечественного производства. При этом особо остро стоит вопрос обеспечения населения страны высококачественной говядиной. В этом аспекте важная роль отводится интенсивному развитию скотоводства. Нарращивание производства высококачественного мяса должно осуществляться на основе всех имеющихся резервов, в том числе за счет увеличения поголовья скота, укрепления кормовой базы, повышения качества заготавливаемых кормов, применения ресурсосберегающих технологий, снижения себестоимости, затрат труда, кормов и средств на единицу продукции [3–5, 7, 9, 10]. Существенного увеличения производства говядины можно добиться за счет процесса интенсификации животноводства прежде всего путем создания условий для повышения уровня продуктивности животных и максимального использования генетического потенциала скота как отечественной, так и зарубежной селекции [2, 6, 8]. Пищевая ценность говядины определяется наличием в нем макро- и микронутриентов, необходимых для организма человека. Поэтому для определения питательных и вкусовых качеств говядины важным является изучение химического состава мякотной части туши.

Объекты, материалы и методы исследований. Для проведения научно-хозяйственного опыта по принципу аналогов с учетом породы, пола и живой массы были подобраны 90 голов 8-месячных бычков молочного и комбинированного направлений продуктивности, из которых сформированы 6 групп: первая и четвёртая – чёрно-пёстрая, вторая и пятая – бестужевская, третья и шестая – симментальская породы. Первые три группы содержались на откормочной площадке с выгульно-кормовым двором и помещением лёгкого типа; 4, 5, 6 группы – в помещении, беспривязно, по 15 голов в каждой клетке, при свободном доступе к автопоилкам и кормушкам.

Контрольный убой 18-месячных бычков для оценки мясной продуктивности проводился согласно «Методическим рекомендациям по оценке мясной продуктивности и качества мяса». Физико-химические показатели мяса изучались по общепринятым методикам [1]: содержание влаги в образцах путем высушивания навески до постоянной массы при температуре 150 ± 2 °С; содержание белка – методом Кьельдаля с последующим фотометрированием проб; содержание жира – экстрагированием сухой навески эфиром в аппарате Сокслета, золы – сжиганием в муфельной печи. Энергетическую ценность мяса определяли расчетным путем по формуле В.А. Александрова.

Результаты исследований. Качество мяса во многом обуславливается его химическим составом. Мясо, полученное от бычков, содержащихся в период откорма в помещении, отличалось наибольшим содержанием сухого вещества, в том числе и жира (рисунок 1). Их преимуществу по содержанию сухого вещества в средней пробе фарша над сверстниками, содержащимися на площадке, составляло 2,07–2,21 %. Эти различия обусловлены, вероятно, различной степенью жиросотложения в организме подопытных животных.

Рисунок 1
Химический состав средней пробы мясного фарша, %

Белок и жир – основные компоненты мяса, которые определяют его пищевую ценность, а также влияют на качественную структуру мяса. Их количественные и качественные показатели определяют биологическую полноценность мяса. В проведенном исследовании от подопытных бычков получено мясо с достаточно высоким содержанием питательных веществ. По относительному содержанию белка и жира в мякотной части туши у изучаемых групп животных достоверной разницы не установлено. Так, соотношение белок : жир в мышечной ткани у подопытных бычков I группы составило 1 : 0,53, II – 1 : 0,54, III – 1 : 0,55, IV – 1 : 0,66, V – 1 : 0,67 и VI – 1 : 0,67. При этом в мясе животных, содержащихся в помещении, наблюдалось наиболее оптимальное соотношение белок: жир в мышечной ткани. В качестве критерия оценки спелости или зрелости мяса используют соотношение влаги и жира в мякоти туши. Оптимальным считается соотношение воды и жира в пределах 15–20 %. Согласно полученным данным, от бычков I, II, III групп в возрасте 18 мес получено мясо с соотношением влаги и жира в пределах 13,81–14,35 %, а у бычков IV, V, VI групп этот показатель был равен 17,65–18,09 %. Необходимо отметить, что в породном аспекте более зрелое мясо было получено от бычков симментальской породы. Известно, что на энергетическую ценность мяса оказывает влияние различное содержание белка и жира в мякоти туш подопытных животных. По этому показателю мясо бычков IV, V, VI групп характеризовалось боль-

шей величиной энергетической ценности. Относительно высоким содержанием белка (21,46–21,73 %) и небольшим количеством жира (0,77–1,01 %) характеризуется длинная мышца спины в отличие от средней пробы мякоти (рисунок 2).

При оценке качества мясной продукции, получаемой при убойе и переработке скота, большое значение имеют жировые отложения. Они представлены жировой тканью, отделенной от туши и внутренних органов убойного животного. Химический состав жира зависит не только от видовых и физиологических особенностей животного, но и определяется местом локализации, генетическими особенностями, условиями откорма и содержания.

Результаты химического анализа жировой ткани свидетельствуют, что ее свойства зависят и от породной принадлежности, и от технологии содержания (таблица 1).

По содержанию жира некоторое преимущество было у животных I, II, III групп. Эта разница с показателями животных IV, V, VI групп составляла 0,81–1,78 %. Более высокий уровень жира у бычков I, II, III групп, по-видимому, объясняется защитной функцией организма животных к действию пониженных температур окружающей среды. При анализе химического состава подкожного и межмышечного жиров выявлено, что они отличны по своему качественному составу от околопочечного жира и характеризуются более высоким содержанием сухого вещества и белка.

Рисунок 2
Химический состав длинной мышцы спины

Таблица 1 Химический состав жировой ткани подопытных бычков, %

Вид жира	Группа	Показатель			
		сухое вещество	белок	жир	энергетическая ценность 1 кг жира-сырца, МДж
Околопочечный жир-сырец	I	86,50 ± 1,17	2,03 ± 0,27	84,28 ± 1,21	33,16
	II	86,80 ± 0,86	1,55 ± 0,69	85,05 ± 0,85	33,38
	III	87,93 ± 1,25	1,59 ± 0,55	86,12 ± 0,92	33,81
	IV	85,69 ± 1,42	2,21 ± 0,68	83,25 ± 0,48	32,79
	V	85,88 ± 1,06	2,14 ± 0,74	83,55 ± 3,17	32,90
	VI	86,15 ± 1,05	2,50 ± 1,11	83,45 ± 2,19	33,00
Подкожная жировая ткань	I	86,65 ± 1,09	4,93 ± 0,18	81,39 ± 1,34	32,54
	II	87,02 ± 1,23	5,63 ± 0,32	81,10 ± 1,55	32,54
	III	87,39 ± 1,21	5,67 ± 0,29	81,42 ± 1,44	32,68
	IV	86,52 ± 1,00	5,18 ± 0,16	81,05 ± 1,18	32,45
	V	87,64 ± 1,21	5,82 ± 0,24	81,54 ± 1,09	32,75
	VI	87,59 ± 1,19	5,79 ± 0,29	81,50 ± 0,92	32,73
Межмышечная жировая ткань	I	84,87 ± 1,41	2,26 ± 0,33	82,38 ± 1,58	32,46
	II	85,14 ± 0,97	2,72 ± 0,13	83,24 ± 1,69	32,89
	III	85,82 ± 1,13	2,53 ± 0,25	84,01 ± 1,45	33,85
	IV	84,64 ± 1,21	2,53 ± 0,08	82,89 ± 1,53	32,71
	V	85,32 ± 1,11	2,96 ± 0,24	83,17 ± 1,34	32,89
	VI	85,41 ± 1,09	2,89 ± 0,09	83,29 ± 1,29	32,93

Полученные данные свидетельствуют о том, что у бычков всех групп наименьшее количество чистого жира обнаружено в подкожной жировой ткани, среднее – в межмышечной, а самое большое – в околопочечной жировой ткани. Наибольшим выходом белка и жира в тушах обладали бычки симментальской породы, средним – бестужевской и наименьшим – чёрно-пёстрой. Что касается межгрупповых различий по концентрации энергии в 1 кг жировой ткани, то независимо от места её локализации они были

адекватны различиям по концентрации химически чистого жира в средней пробе мяса и длинной мышцы спины бычков разных генотипов, содержащимся в неодинаковых условиях.

Заключение. Химический состав мясной продукции зависит и от генотипа, и от условий содержания животных. Содержание бычков в помещении позволяет получить от них мясную продукцию с более высокими показателями пищевой ценности, отвечающую современным требованиям рынка.

Библиографический список

1. Антипова, Л.В. Методы исследования мяса и мясных продуктов [Текст] / Л.В. Антипова, И.А. Глотова, И.А. Рогов // М.: Колос, 2001. 376 с.
2. Губайдуллин, И. Мясная продуктивность молодняка черно-пестрой и симментальской пород при различных технологиях содер-

жания [Текст] / И. Губайдуллин, Г. Шагиев, Х. Тагиров // Молочное и мясное скотоводство. 2010. № 6. С. 19–21.

3. Диетические корма, ароматические и вкусовые добавки при выращивании молодняка сельскохозяйственных животных [Текст]: практическое руководство / Хазиахметов Ф.С. [и

др.]; Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, Башкирский государственный аграрный университет, Башкирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, закрытое акционерное общество «Экопрод». Уфа, 2006. 36 с.

4. Исхаков, Р.С. Продуктивность молодняка при различных технологиях содержания [Текст] / Р.С. Исхаков, Х.Х. Тагиров, Н.М. Губайдуллин // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. 2015. № 1. С. 147–150.

5. Методические рекомендации по использованию пробиотических, энергетических, витаминных и минеральных добавок в кормлении сельскохозяйственных животных [Текст] / И.В. Миронова [и др.]; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный аграрный университет». Уфа, 2016. 136 с.

6. Организация производства говядины при различных технологиях содержания мяс-

ного скота [Текст] / Р.С. Гизатуллин, Ф.С. Хазиахметов, Т.А. Седых и др. Уфа: Башкирский ГАУ, 2014. 48 с.

7. Тагиров, Х.Х. Факторы, влияющие на мясную продуктивность молодняка крупного рогатого скота [Текст] / Х.Х. Тагиров, Н.В. Гизатова // Вестник мясного скотоводства. 2009. Т. 2. № 62. С. 164–171.

8. Тагиров, Х.Х. Качество мясной продукции молодняка различного генотипа и физиологического состояния [Текст] / Х.Х. Тагиров, Р.С. Юсупов // Молочное и мясное скотоводство. 2013. № 4. С. 5.

9. Эффективность производства говядины при различных технологиях доращивания и откорма [Текст] / А.В. Харламов, О.А. Завьялов, А.Н. Фролов, М.Я. Курилкина, В.Л. Королёв // Вестник мясного скотоводства. 2017. № 2 (98). С. 93–99.

10. Khaziakhmetov F.S. [and others]. Effect of probiotics on calves, weaned pigs and lamb growth. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2018. Т. 9. № 3. С. 866–870.

Сведения об авторах

1. **Ламанов Артём Андреевич**, соискатель кафедры технологии мясных, молочных продуктов и химии, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: kafedra.tmm@yandex.ru.

2. **Зубаирова Лилия Альбертовна**, кандидат технических наук, доцент кафедры технологии мясных, молочных продуктов и химии, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: lilija14@mail.ru.

3. **Чернышенко Юлия Николаевна**, кандидат химических наук, доцент кафедры технологии мясных, молочных продуктов и химии, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: chernishenko-j@mail.ru.

В статье представлена сравнительная оценка химического состава говядины от бычков чёрнопёстрой, симментальской и бестужевской пород при различной технологии доращивания и откорма в условиях Южного Урала. В ходе исследований установлено, что в съедобных частях тела бычков, которые содержались в помещении, отложилось больше белка и жира по сравнению со сверстниками с откормплощадки на 0,91–1,83 кг. Мясо животных всех исследуемых групп характеризовалось оптимальным соотно-

шением белка и жира и обладало хорошими качественными характеристиками. Соотношение белок : жир в мышечной ткани у подопытных бычков I группы составило 1 : 0,53, II – 1 : 0,54, III – 1 : 0,55, IV – 1 : 0,66, V – 1 : 0,67 и VI – 1 : 0,67. Наибольшим выходом белка и жира в тушах обладали бычки симментальской породы, средним – бестужевской и наименьшим – чёрнопёстрой. Наименьшее количество чистого жира обнаружено в подкожной жировой ткани, наибольшее – в окологречном жире.

A. Lamanov, L. Zubairova, Y. Chernyshenko

CHEMICAL COMPOSITION OF MEAT PRODUCTS DEPENDING ON THE KEEPING TECHNOLOGY OF BULL CALVES OF DIFFERENT CATTLE BREEDS

Key words: beef; bull calves; Black-and-white; Bestuzhev and Simmental; chemical composition.

Authors' personal details

1. **Lamanov Artyom**, Graduate Student of the Meat and Milk Technology department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, e-mail: kafedra.tmm@yandex.ru.

2. **Zubairova Liliya**, Candidate of Technical Sciences, assistant professor of the Meat and Milk Technology department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, e-mail: lilija14@mail.ru.

3. **Chernyshenko Yuliya**, Candidate of Chemical sciences, assistant professor of the Meat and Milk Technology department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, e-mail: chernishenko-j@mail.ru.

The article presents a comparative assessment of the chemical composition of beef from bull calves of black-and-white, Simmental and Bestuzhev breeds with different technologies for growing and fattening in the conditions of the South Urals. In the course of studies, it was found that in the edible parts of the body of the bull calves that were kept indoors contained more protein and fat compared to peers from the feeding area by 0,91–1,83 kg. The meat of animals of all the studied groups was characterized by an optimal ratio of pro-

tein and fat and had good quality characteristics, which meets the requirements of a modern beef consumer. Thus, the ratio of protein and fat in muscle tissue in experimental calves of group I was 1 : 0,53, II – 1 : 0,54, III – 1 : 0,55, IV – 1 : 0,66, V – 1 : 0,67 and VI – 1 : 0,67. The highest yield of protein and fat in the carcasses was in the calves of the Simmental breed, the average in Bestuzhev and the smallest in black-and-white. The smallest amount of pure fat is found in subcutaneous adipose tissue, the largest – in perinephric fat.

© Ламанов А.А., Зубаирова Л.А., Чернышенко Ю.Н.

УДК 636.2.034

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-93-99

А.С. Литонина, А.Г. Кудрин

СЕЛЕКЦИЯ АЙРШИРСКОГО СКОТА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Ключевые слова: айрширская порода; селекция; быки-производители; сроки продуктивного использования; пожизненная молочная продуктивность.

Введение. Современное молочное скотоводство находится перед сменой приоритетов в его развитии. Если до сих пор главным было повышение молочной продуктивности, то в настоящее время на первый план выходят проблемы продуктивной жизни коров и воспроизводства стада. По мере того, как все больше стран переходят на интенсивное ведение отрасли, повышая продуктивные качества животных, проблема воспроизведения молодняка становится глобальной и, соответственно, разрешимой только путем принципиально нового решения, прорыва в научном плане [1].

С ростом продуктивности коров растет экономическая эффективность производства молока. Поэтому бизнес имеет тенденцию увеличивать продуктивность коров, но при этом происходит уменьшение количества телят, получаемых за календарный год от 100 коров, то есть снижается интенсивность воспроизводства [2]. Значительно снизилась продолжительность использования маточного поголовья. Этот показатель является одним из ценных экономических и селекционных признаков, от которого, в свою очередь, зависит количество получаемой про-

дукции на один день жизни животного, оценка его племенных качеств, величина и скорость ремонта стада, окупаемость затрат на выращивание телок. При разведении пород скота молочного направления обычно не стоял вопрос о продолжительности жизни или хозяйственного использования коров. В племенных хозяйствах, как правило, большинство коров использовали по 5–6 и более лактаций [3].

В последнее время в стадах со средним удоем за 305 дней лактации продуктивное долголетие коров составляет в Германии 3,65 лактации, а в России во многих хозяйствах коровы используются менее 2,5 лактации. Этой короткой продуктивной фазы недостаточно для рентабельного производства молока, поскольку большинство коров до третьей лактации ещё не достигают наивысшей продуктивности. Генетический потенциал коров не используется в полной мере из-за чрезмерной интенсификации и нарушения технологических процессов, особенно неоправданной продолжительности выращивания тёлочек и поздней их случки. При удое 4000–5000 кг молока затраты на выращивание первотёлочек окупаются за 2–3 года, а при удое 3000 кг

молока – за 4–5 лактаций. Среди факторов, способствующих долголетнему продуктивному использованию коров, прежде всего можно выделить причины паратипической природы, которые необходимо постоянно учитывать в зоотехнической работе [4].

Долгоживущая молочная корова с высокой продуктивностью оставляет больше хороших потомков, чем менее долголетняя матка. Однако высокий уровень выбраковки животных приводит к тому, что из стада выводятся коровы, не достигшие максимальной продуктивности. При этом происходит быстрая смена поколений и снижается селекционный дифференциал, то есть разница между продуктивностью коров племенного ядра и средней продуктивностью стада [5]. Короткий срок производственного использования высокопродуктивных коров и их высокая амортизация требуют ежегодного ввода в основное стадо до 30 и более процентов первотелок, что становится невозможным при низком выходе телят и их плохой сохранности. Нехватка нетелей приводит к отсутствию элемента отбора в селекционной работе, а также животных для племпродажи и в конечном счете сокращению поголовья [6].

Возникает острая необходимость вести селекцию на создание отечественных высокопродуктивных пород, линий, типов и стад животных. Эту работу можно считать успешной только тогда, когда повышение показателей продуктивности получено при сохранении здоровья или долголетнем периоде использования [7]. Поэтому высокоудойных и длительно лактирующих особей следует рассматривать как наиболее соответствующих целям разведения молочного скота в современных условиях. Высокая пожизненная продуктивность является следствием хорошего развития и функционирования всех органов и систем жизнедеятельности организма коровы. А это имеет важное значение для совершенствования животных [8, 9].

По мнению многих авторов (Стрекозова Н.И., Сивкина Н.В. (2014), Лебедько Е.Я. (2003)), экономически целесообразно использовать коров не менее четырех лактаций [9–12]. Преждевременная выбраковка высокопродуктивных коров из стада снижает надежность оценки животных по продуктивным и племенным качествам, так как от них остается мало потомков. Поэтому проблема сохранности и увеличения долголетия продуктивного использования высокопродуктивных коров находится на первом месте в программах селекции молочного скота России и зарубежных стран, кроме того, коровы-долгожительницы, как правило, отличаются крепкой конституцией, устойчивостью к заболеваниям,

хорошими воспроизводительными качествами и развитым выменем. Отбор ремонтного молодняка от таких животных является одним из основных факторов роста молочной продуктивности, так как эти коровы являются родоначальниками ценных семейств и матерями быков-улучшателей [9].

Первый завоз айрширского скота в количестве 19 нетелей и одного быка-производителя из Московской области в Вологодскую был осуществлен в 1965 году в совхоз «Красная Звезда» [13]. Последующее поступление животных происходило в 1967–1985 годах из Финляндии. Результаты разведения айрширов показали хорошие акклиматизационные способности животных в условиях Вологодской области, при этом скот сохранил присущие ему особенности: сочетание высоких надоев и жирномолочности, экономичность производства молока. Надой коров совхоза «Красная Звезда» с 1970 по 1977 год увеличился с 3869 до 4797 кг молока. В 1977 году было принято решение об утверждении совхоза «Майский» дочерним хозяйством совхоза «Красная Звезда» по разведению скота айрширской породы. Комплектование стада продолжалось с 1977 по 1988 год, всего из совхоза «Красная Звезда» завезли 942 телки. Дойное стадо айрширской породы совхоза «Майский» планомерно увеличивалось и в 1988 году составило 483 коровы с надоем 4269 кг молока жирностью 4,19 %. В 1990 году от коров айрширской породы получили рекордный надой в совхозе «Красная Звезда» – 5144 кг молока, совхозе «Майский» – 4630 кг молока [14].

Цель исследований – выявить влияние места рождения производителей айрширской породы на долголетие и пожизненную продуктивность их дочерей.

Методика исследований. В племзаводах Вологодской области с 1981 по 2016 год получено более 150 быков-производителей айрширской породы, которые как использовались в хозяйствах, так и закупались племпредприятиями области и за её пределами [15]. По данным баз «Селэкс» СХПК «Агрофирма «Красная Звезда» и СХПК «Племзавод «Майский», в которых содержится все племенное поголовье айрширской породы Вологодской области, сформирована выборка, включающая 1948 голов. Полученный массив коров разбит на группы в зависимости от места рождения их отцов. В изучаемых группах исследовали пожизненную продуктивность (удой на 1 лактацию, на 1 дойный день, в том числе переведенный на базисную жирность) и долголетие по последней законченной лактации. Также проведена оценка быков-производителей по номеру последней законченной лактации и

суточному удою базисной жирности на один дойный день у дочерей. Данные первичного учета подвергались статистической обработке с применением программы Microsoft Excel с последующим установлением достоверности полученных результатов по критерию Стьюдента.

Результаты исследований и их обсуждение. В разрезе селекции изучено производственное использование дочерей быков айрширской породы (таблица 1). Самым продолжительным периодом использования характеризуются дочери, полученные от быков из Ярославской области, – 4 законченные лактации, что на 38,9 % достоверно ($p > 0,999$) выше средних по популяции значений. Более трех лактаций в стаде содержатся дочери от производителей, место рождения которых – Вологодская область и Фин-

ляндия. Низкая продолжительность использования отмечается у коров от быков, происходящих из Канады и Московской области – 2,21 и 2,06 лактаций соответственно. Их показатель достоверно ($p > 0,999$) ниже средних по популяции на 23,3–28,5 %. Между дочерьми импортных и отечественных производителей по числу лактаций различий не обнаруживается. Рассчитав надой на одну лактацию, выявили, что лучшие показатели – 9738 кг – характерны для дочерей от быков ленинградской селекции, на 11,9 % выше среднепопуляционных параметров. Второе место занимают дочери производителей, полученных в Финляндии, с надоем 9047 кг на одну лактацию, что на 4,0 % выше средних значений. Достоверной разности между лидерами и популяцией не обнаружено.

Таблица 1 Производственное использование дочерей быков различной селекции

Селекция		Кол-во голов	Номер ПЗЛ*		Надой на 1 лактацию, кг		Удой на 1 дойный день, кг		Удой на 1 дойный день базисной жирности, кг	
			$X \pm m_x$	Cv, %	$X \pm m_x$	Cv, %	$X \pm m_x$	Cv, %	$X \pm m_x$	Cv, %
Российская		1144	2,88 ± 0,04	51,7	8567 ± 124	23,8	23,8 ± 0,2	14,2	30,1 ± 0,3	16,0
в т. ч.	Вологодская	559	3,17 ± 0,06***	45,2	8415 ± 155	21,4	23,6 ± 0,3	14,0	29,4 ± 0,4*	15,3
	Московская	361	2,06 ± 0,06***	55,7	8904 ± 263	27,1	24,6 ± 0,4	13,8	31,7 ± 0,5**	15,2
	Ленинградская	61	2,70 ± 0,09	26,4	9738 ± 510*	20,3	24,6 ± 0,9	14,7	31,7 ± 1,5	18,6
	Ярославская	126	4,00 ± 0,15***	41,6	7856 ± 273**	20,9	22,4 ± 0,5***	13,4	28,1 ± 0,7***	14,3
Зарубежная		552	2,87 ± 0,06	46,4	9035 ± 162	22,5	31,0 ± 1,3***	51,9	30,3 ± 0,3	14,5
в т. ч.	Канадская	140	2,21 ± 0,06***	30,1	8994 ± 371	24,7	31,9 ± 1,8***	33,1	29,6 ± 0,8	16,2
	Финская	412	3,09 ± 0,07**	46,1	9047 ± 180	21,9	30,7 ± 1,6***	56,9	30,5 ± 0,4	14,0
Среднее по популяции		1948	2,88 ± 0,03	52,0	8703 ± 93	23,7	24,1 ± 0,1	13,9	30,3 ± 0,2	15,5

* Последняя законченная лактация.

* $P \geq 0,95$, ** $P \geq 0,99$, *** $P \geq 0,999$.

Достоверно ($p > 0,99$) низкой молочностью в расчете на одну лактацию обладают дочери быков, происходящих из Ярославской области, – по изучаемому показателю уступают средним данным по популяции на 10 %.

В целом дочери от импортных быков на одну лактацию продуцируют достоверно ($p > 0,95$) больше молока на 468 кг (на 5,5 %), чем коровы, отцы которых получены на территории России.

Для того чтобы учесть и количество дойных дней, и молочность оцениваемых потомков, используют такой показатель, как средний удой на один дойный день. В проведенных исследованиях лучшим показателем удоя на один дойный день обладают дочери быков канадской и финской селекции. Достоверное ($p > 0,999$) превосходство этих групп над средними значениями

составляет 32,4 % и 27,4 % соответственно. Низким удоем на один дойный день характеризуются потомки производителей ярославской селекции, на 7 % достоверно ($p > 0,999$) ниже среднепопуляционных параметров.

В разрезе селекции дочери от зарубежных быков достоверно ($p > 0,999$) превосходят по удою на один дойный день на 7,2 кг молока коров от отцов из России.

Для объективной оценки продуктивных качеств исследуемых животных не стоит забывать о жирномолочности, так как айрширская порода известна высоким содержанием массовой доли жира в молоке. С этой целью применяют показатель продуктивности базисной (3,4 %) жирности. По среднему удою базисной жирности на один дойный день лучшими группами являются

дочери быков из Московской и Ленинградской областей, их показатель выше средних значений на 4,6 %. Достоверная разность ($p > 0,99$) обнаруживается в случае сравнения с популяцией дочерей производителей московской селекции. Достоверно ($p > 0,999$) низким удоом базисной жирности на один дойный день 28,1 кг обладают дочери производителей, происходящих из Ярославской области.

Разница по показателю молочности, переведенной на базисную жирность и рассчитанной на один дойный день, между группами дочерей от быков импортной и отечественной селекций незначительна (0,2 кг) и не достоверна.

Быки, потомство которых составляет племенную базу вологодской популяции айрширского скота, оценены по долголетию дочерей (рисунок 1).

Рисунок 1
Характеристика быков-производителей по номеру последней законченной лактации дочерей

Самым достоверно ($p > 0,999$) продолжительным сроком хозяйственного использования более 7 лактаций характеризуются дочери быка Славный 1366 из Ярославской области, что в 2,5 раза выше средних значений по популяции. Дочери быков вологодской селекции (Адмирал 10351, Аир 15, Завет 13 и Завиток 404) находятся в стаде в возрасте более 5 лактаций. Продолжительностью жизни выше 4 лактаций отличались дочери производителей из Финляндии, таких как Верти 90181, Онни 127, Урхо 420 и потомки от быков Трон 725 и Фурор 10343 из Вологодской области.

Дочери быков Алку 1134 и Мармелада 556 используются всего 1,5 лактации, что достоверно ($p > 0,999$) на 48 % ниже, чем в среднем по выборке. Также с продолжительностью менее двух лактаций выделяются дочери Арво 680, Дамира 1019, Тарифа 263, Утеса 202.

Для объективной оценки пожизненных продуктивных качеств дочерей быков рассчитан и

представлен на рисунке 2 средний суточный удои базисной жирности на один дойный день.

Потомки канадского быка Хьюмор 328 и финского быка Хукко 173 отличаются достоверно ($p > 0,999$) высоким суточным удоом базисной жирности на один дойный день свыше 40 кг, что на 41,9 % и 37,0 % выше среднепопуляционных значений.

Дочери производителей вологодской селекции Завета 13 и его сына Завитка 404 с долголетием более 5 лактаций характеризуются низкой пожизненной продуктивностью, удои базисной жирности на один дойный день составил 25,2 и 26,1 кг соответственно. Разность со средними параметрами по популяции составляла от 4,2 до 5,1 кг и является достоверной ($p > 0,999$).

Выводы. В результате проведенных исследований установлены достоверные различия показателей пожизненного использования коров, происходящих от быков разной селекции. Для повышения долголетия предпочтительно ис-

пользовать в селекции быков, происходящих из Вологодской и Ярославской областей при условии совершенствования системы кормления и

содержания. Производители из Московской и Ленинградской областей повышают массовую долю жира в популяции.

Рисунок 2
Средний суточный удой базисной жирности на один дойный день дочерей разных производителей

По продолжительности жизни дочерей следует выделить таких быков, как Славный 1366, Адмирал 10351, Завиток 404, Аир 15 и Завет 13. По удою базисной жирности на один дойный день лучшими оказались дочери быков Хьюмор 328, Хукко 173, Силач 1592, Кентавр 522, Аромат 111, Волан 106202505, показатель составил от 37,3 до 43 кг.

Таким образом, дочери быков различной селекции имеют значительные отличия по показателям пожизненного использования, что необходимо учитывать при дальнейшей селекционно-племенной работе с популяцией айрширского скота Вологодской области.

Библиографический список

- Новотольская, О.П. Устойчивость айрширских коров разного происхождения к нарушениям репродуктивной системы [Текст] / О.П. Новотольская // Молочное и мясное скотоводство. 2014. № 2. С. 27–29.
- Кольцов, Д.Н. Современные проблемы воспроизводства крупного рогатого скота Смоленской области [Текст] / Д.Н. Кольцов, А.С. Герасимова, О.В. Татуева, С.И. Кононенко // Сб. науч. тр. СКНИИЖ. 2014. Т. 1. № 3. С. 70–75.
- Смирнова, Ю.М. Влияние генотипа на долголетие и пожизненную продуктивность коров [Электронный ресурс] / Ю.М. Смирнова, А.В. Платонов. DOI: 10.15838/alt.2019.2.3.1 // Агрозоотехника. 2019. Т. 2. № 3. С. 1–9. Режим доступа: <http://azt-journal.ru/article/28337> (дата обращения 15.11.2019).
- Кудрин, А.Г. Сроки продуктивного использования молочных коров [Текст] / А.Г. Кудрин, Ю.П. Загороднев. Мичуринск: МичГАУ, 2010. 130 с.
- Кургузкин, В.Н. О некоторых факторах, продлевающих продуктивное использование коров [Текст] / В.Н. Кургузкин, О.Б. Филипова, Е.Ф. Саранчина // Наука в центральной России. 2015. № 4 (16). С. 41–48.
- Бабенко, О.В. Проблемы воспроизводства стада КРС [Текст] / О.В. Бабенко // Главный зоотехник. 2005. № 5. С. 18–21.

7. Козырев, С.Г. Резистентность и молочная продуктивность коров черно-пестрой породы разного генотипа [Текст]: автореф. дис. ... канд. с-х. наук / С.Г. Козырев. Владикавказ, 2000. 23 с.

8. Дедов, М.Д. Особенности коров с высокой пожизненной продуктивностью [Текст] / М.Д. Дедов, Н.В. Сивкин // Зоотехния. 2004. № 10. С. 2–4.

9. Тихомиров, И.А. Продуктивное долголетие коров и анализ причин их выбытия [Электронный ресурс] / И.А. Тихомиров, В.П. Аксенова, О.Л. Андрухина // Вестник Всероссийского научно-исследовательского института механизации животноводства. 2016. № 1 (21). С. 64–72. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/produktivnoe-dolgoletie-korov-i-analiz-prichin-ih-vybytiya> (дата обращения 15.11.2019).

10. Стрекозов, Н.И. Продуктивное долголетие коров при голштинизации черно-пестрого скота [Текст] / Н.И. Стрекозов, Н.В. Сивкин // Генетика и разведение животных. 2014. № 2. С. 11–16.

11. Кононов, В.П. Проблема совместимости высокой молочной продуктивности, воспроизводительной способности и продуктивной жизни коров в современном скотоводстве [Электронный ресурс] / В.П. Кононов // Farm Animals.

2013. № 1. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-sovmestimosti-vysokoy-molochnoy-produktivnosti-vosproizvoditelnoy-sposobnosti-i-produktivnoy-zhizni-korov-v-sovremennom> (дата обращения: 29.11.2019).

12. Селекционно-генетическая и эколого-технологическая валентность молочных коров к длительному продуктивному использованию [Текст] / Коллектив авторов; под общ. ред. академика МАНЕБ Е.Я. Лебедько. Брянск: БГСХА, 2012. 276 с.

13. Абрамова, Н.И. Создаваемый Вологодский тип айрширской породы [Текст] / Н.И. Абрамова, Л.Н. Богорадова // Перспективы развития айрширской породы крупного рогатого скота в России: сборник научных трудов. 2008. С. 8–13.

14. Абрамова, Н.И. История формирования айрширской породы и современное ее состояние в России и Вологодской области [Текст] / Н.И. Абрамова, Л.Н. Богорадова, Г.С. Власова, И.А. Суслова // Аграрная наука на современном этапе: состояние, проблемы, перспективы. 2018. С. 49–57.

15. Совершенствование молочного скота в Вологодской области [Текст] / А.Г. Кудрин, Г.В. Хабарова, А.И. Абрамов, А.С. Литонина. Вологда – Молочное, 2015. 147 с.

Сведения об авторах

1. **Литонина Анастасия Сергеевна**, научный сотрудник лаборатории биоэкономики и устойчивого развития, ФГБУН «ВолНЦ РАН», 160014, г. Вологда, ул. Горького, 56А, тел.: +7 (8172) 59-78-25, e-mail: litoninaas@mail.ru.

2. **Кудрин Александр Григорьевич**, доктор биологических наук, профессор кафедры зоотехнии и биологии, ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина», 160555, г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д. 2, тел.: +7 (8172) 52-57-30, e-mail: kudrin230949@yandex.ru.

В статье представлено влияние места рождения производителей айрширской популяции Вологодской области на пожизненную продуктивность и сроки использования их дочерей в племенных заводах СХПК «Агрофирма «Красная Звезда» и СХПК «Племзавод «Майский». Продолжительным периодом использования характеризуются дочери от быков из Ярославской области – 4 законченных лактации, что на 38,9 % выше средних по популяции значений. Более трех лактаций в стаде содержатся дочери от производителей, место рождения которых – Вологодская область и Финляндия. Лучшие показатели надоя на одну лактацию 9738 кг характерны для дочерей от быков ленинградской селекции, на 11,9 % выше среднепопуляционных параметров. По среднему удою базисной жирности на один дойный день лучшими группами являются дочери быков из Московской и Ленин-

градской областей, их показатель выше средних значений на 4,6 %. Для повышения долголетия предпочтительно использовать в селекции быков, происходящих из Вологодской и Ярославской областей при условии совершенствования системы кормления и содержания. Производители из Московской и Ленинградской областей повышают массовую долю жира в популяции. Выявлено влияние быков-производителей на производственное использование дочерей. По продолжительности жизни дочерей следует выделить таких быков, как Славный 1366, Адмирал 10351, Завиток 404, Аир 15 и Завет 13. По удою базисной жирности на один дойный день лучшими оказались дочери быков Хьюмор 328, Хукко 173, Силач 1592, Кентавр 522, Аромат 111, Волан 106202505; показатель составил от 37,3 кг до 43 кг.

SELECTION OF AYRSHIR CATTLE OF THE VOLOGDA REGION FOR PRODUCTIVE LONGEVITY

Key words: *ayrshire breed; breeding; bulls; useful lives; lifetime milk yield.*

Authors' personal details

1. **Litonina Anastasia**, researcher, Vologda Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 160014, Vologda, Gorky Street, 56A, phone: +7 (8172) 59-78-25, e-mail: litoninaas@mail.ru.

2. **Kudrin Alexandr**, Doctor of Biological Sciences, Professor, the Chair of Zootechnics and Biology, Vereshchagin Vologda State Dairy Farming Academy, 160555, Vologda, Molochnoe, Shmidta Street, 2, phone: +7 (8172) 52-57-30, e-mail: kudrin230949@yandex.ru.

This article shows the impact of a birthplace of Ayrshire population producers of the Vologda area on a lifelong productivity and time periods of their daughters' usage at breeding factories Agrofirma «Krasnaya Zvezda» and Breeding Factory «Maiskii». The prolonged period of usage is typical for daughters of bulls from the Yaroslavl area – 4 finished lactations, which is 38,9 % higher than average population values. More than 3 lactations are typical for daughters of producers, who were born in the Vologda area and Finland. The best yield results per single lactation (9,738 kg) are typical for daughters of the Leningrad selection bulls: the number is 11,9 % higher than average population parameters. According to average yield of basic fatness per one yield day, the best groups are daughters of

bulls from the Moscow and Leningrad areas: the indicator exceeds average values by 4,6 %. In order to increase longevity, it is advisable, on condition of improving feeding and maintenance systems, to use bulls from the Vologda and Yaroslavl areas in the selection. Producers from the Moscow and Leningrad areas increase a mass share of fat in population. The influence of bulls-producers on productive usage of daughters is stated. According to daughters' life expectancy parameter, we need to mention the following bulls: Slavnyi 1366, Admiral 10351, Zavitok 404, Air 15, and Zavet 13. According to yield of basic fatness per one yield day parameter, the best bulls' daughters are Kh'yumor 328, Khukko 173, Silach 1592, Kentavr 522, Aromat 111, Volan 106202505: the indicator was between 37,3 kg and 43 kg.

© Литонина А.С., Кудрин А.Г.

УДК 638.144.52

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-99-106

Г.С. Мишуковская, М.Г. Гиниятуллин, Д.В. Шелехов, Е.А. Смольникова, А.И. Науразбаева

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОБИОТИЧЕСКИХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК ПРИ ОСЕННЕЙ ПОДКОРМКЕ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ

Ключевые слова: *медоносные пчелы; осенние подкормки; зимовка пчел; пробиотики; сила семей; печатный расплод.*

Введение. Осенние подкормки пчелиных семей предназначены для решения следующих задач: стимуляция яйцекладки маток, восполнение дефицита корма и профилактика болезней пчел. Ужесточение требований к качеству продукции пчеловодства, её экологической чистоте ограничивает возможность применения для профилактики заболеваний химиотерапевтических средств. В качестве альтернативы рассматривается возможность использования микробиологических препаратов, созданных на основе нормальной микрофлоры кишечника пчел для укрепления иммунной системы. Пробиотики ис-

пользуют в разных отраслях животноводства для профилактики и лечения дисбактериозов, нормализации микрофлоры пищеварительного тракта после лечения антибиотиками или антибактериальными химиотерапевтическими средствами, стимуляции неспецифического иммунитета [15, 16]. Ряд авторов отмечают повышение продуктивности при подкормке семей пчел сахарным сиропом, обогащенным культурами *Lactobacillus salivarius* и *B. subtilis subtilis*, и снижение титра поражения *Nosema sp.* и *Varroa sp.* по сравнению с контролем [14, 21]. Отмечено также стимулирующее влияние пробиотиков на

яйценоскость пчелиных маток и увеличение силы семей [5, 8, 9]. Имеются сведения об укреплении иммунитета пчел под действием пробиотических препаратов. Так, о повышении устойчивости пчел к *P. larvae* под воздействием пробиотиков свидетельствуют результаты исследований Daisley B.A. *et al.* [12]. Они выявили стимулирующее действие пробиотиков на экспрессию гена Defensin-1 – пептида, играющего ключевую роль в защите организма пчел против этой инфекции. По данным Arredondo D. *et al.* (2019), *Lactobacillus kunkeei*, выделенная из кишечника пчел, снижает смертность личинок, пораженных *P. larvae*, и количество спор *N. ceranae* у взрослых особей [7]. При подкормке сахарным сиропом с препаратом апиник, содержащим *L. acidophilus* и экстракт дрожжей *Saccharomyces cerevisiae* в кишечном тракте пчел, отмечено повышение значения уровня лактобактерий, снижение количества условно-патогенной микрофлоры, стафилококков, дрожжевых и плесневых грибов [4]. Использование этого препарата влияет на сохранность пчел и оптимальный расход корм в зимний период, способствует интенсивному наращиванию силы семей в период весеннего развития [1].

От состояния микробиоты кишечника зависит не только здоровье пчел, но и в целом благополучие пчелиной семьи [10, 20]. На состав ее оказывают влияние различные факторы: источники корма (растения-медоносы), фитонциды растений, пестициды, лекарственные препараты, используемые в пчеловодстве. Подавляя развитие одних видов бактерий и стимулируя развитие других, эти факторы могут вносить определенный дисбаланс в функционирование кишечника. Для пчел характерны также и сезонные изменения в составе микрофлоры кишечника. Следствием недостатка корма и температурного стресса является снижение иммунитета пчел [17, 18]. Кроме того, отсутствие у пчел возможности опорожнения толстой кишки в безоблетный период формирует фактор риска развития у них инфекционных заболеваний. Состояние микробиоценоза у пчел, идущих в зиму, во многом определяет их выживаемость во время зимовки. В связи с этим **целью** наших **исследований** явилась оценка влияния осенней подкормки с использованием новых пробиотических кормовых добавок на качество зимовки пчелиных семей.

Материалы и методы. Исследования проводили в 2018–2019 гг. на учебно-опытной пасеке Башкирского государственного аграрного университета.

Влияние кормовых добавок на жизнедеятельность пчел определяли по их сохранности в

садках в лабораторных условиях. Пчел суточного возраста, полученных из одной семьи с помощью сетчатого изолятора, заселяли в садки по 55 шт. в каждый. Садки делили на группы по 3 садка в каждой. Контрольная группа получала 60 %-ный сахарный сироп (СС), опытным давали сироп с кормовыми добавками: 1 и 2 опытные группы – пробиотики СпасиПчел и ПчелоНормосил в дозе 2 мл на 0,5 л сахарного сиропа.

Используемые в наших исследованиях пробиотические кормовые добавки разработаны ООО «НВП БашИнком». В состав кормовой добавки СпасиПчел входит 2 штамма бактерий *Bacillus subtilis*. ПчелоНормосил содержит лактобактерии, бифидобактерии и пребиотик арабиногалактан (иммуномодулятор из хвои лиственницы сибирской).

С целью изучения влияния пробиотиков на качество зимовки сформировали 3 группы по 10 семей пчел в каждой группе. В первой декаде сентября 2018 г. проводили подкормку семей. В контрольной группе семьям давали чистый 60 %-ный сахарный сироп. Пчелам опытных групп скармливали сироп с кормовыми добавками: опытной 1 – СпасиПчел в дозе 2 мл на пчелиную семью, опытной 2 – ПчелоНормосил в такой же дозировке. Подкормку осуществляли с интервалами 3 дня по 0,5 л на пчелиную семью вечером, заливая в боковые кормушки. Учет состояния пчелиных семей после подкормки проводили дважды – осенью 2018 г. перед постановкой их в зимовник и в первой декаде апреля 2019 г. после выставки. В ходе учета определяли силу семей в улочках, количество печатного расплода в гнездах с помощью рамки-сетки со сторонами квадратов 5 × 5 см, вмещающих по 100 пчелиных ячеек. Расход корма рассчитывали по разности массы ульев до постановки в зимовник и после выставки.

Уровень развития жирового тела рабочих пчел оценивали по методике А. Маурицио [19]. Все полученные данные обработаны методами вариационной статистики.

Результаты исследований. Изучение влияния пробиотиков на продолжительность жизни пчел в садках в условиях лаборатории показало, что при добавлении к сахарному сиропу кормовой добавки СпасиПчел отход особей происходил медленнее, чем в контроле, и через две недели после начала эксперимента этот показатель составил 26 % – на 12,2 % меньше контрольного значения (рисунок 1). К концу опыта на 25-е сутки после начала подкормки в этой группе погибло лишь 50 % пчел, на 27,8 % меньше, чем в контроле. При использовании кормовой добавки ПчелоНормосил разность с контролем составила в эти сроки 9,7 % и 10,4 % соответственно.

Рисунок 1
Динамика гибели пчел в садках при подкормке пробиотиками

В контрольной группе продолжительность жизни пчел в садках составила в среднем 14,6 суток. В опытных группах этот показатель достоверно превышал контрольное значение в 1,2 раза (СпасиПчел) и 1,14 раза (Пчелонормосил). Расход корма на одну пчелу в сутки в этих группах был ниже контрольного значения в 1,4 и 1,1 раза соответственно.

Пасечные опыты по оценке эффективности осенней подкормки были заложены в начале сентября 2018 года. Для этого провели учет состояния пчелиных семей и сформировали опытные и контрольную группу. На начало опыта (до подкормки) пчелиные семьи имели силу от 8 до 10 улочек, соторамок в гнезде 8–11 шт., в том числе соторамок с расплодом – 4–6 шт., количество углеводного корма составляло 9–12 кг. В ноябре перед постановкой пчел в зимовник вновь провели взвешивание улочек и осмотр пчелиных семей. Во всех семьях наблюдали значительное сокращение силы после отхода летних пчел. Наибольший показатель силы при этом был зарегистрирован в семьях 1-й опытной группы, он превосходил контрольное значение на 24 %. Семьи 2-й опытной группы по силе на 20 % уступали контролю.

Оценка степени развития жирового тела пчел также показала лучшие результаты в 1-й опытной группе (рисунок 2). У пчел этой группы уровень развития жирового тела был больше в среднем на 25,4 %, чем у пчел контрольной группы, во 2-й опытной – выше на 17,5 %. Повторная оценка, проведенная в декабре 2018 года, подтвердила данные об увеличении степени развития этого органа у пчел опытных групп, хотя разность с контролем была несколько ниже – 19 % и 9,1 % соответственно.

Таким образом, использование пробиотика СпасиПчел в осенней подкормке оказало положительное влияние на подготовку семей пчел к зимовке. Рабочие пчелы 1-й опытной группы

накопили больше запасных питательных веществ в теле, а семьи в целом ушли в зиму более сильными. Во второй половине ноября ульи с пчелами занесли в полуподземный зимовник. В течение всего периода зимовки температуру воздуха в зимовнике поддерживали в пределах $0 \pm 5^{\circ}\text{C}$, относительную влажность на уровне 70–85 %. Выставку пчелиных семей из зимовника весной 2019 года осуществили в начале апреля. После выставки провели взвешивание улочек и осмотр пчелиных семей. В контрольной группе гнездо одной пчелиной семьи за период зимовки было сильно оплодотворено, в ней отсутствовала матка. Сила семьи составила одну улочку. В связи с этим она была объединена с другой в пределах группы. В 1-й опытной группе отмечена гибель одной пчелиной семьи из-за недостатка корма в зоне расположения зимнего клуба пчел. Во 2-й опытной группе в одной семье отсутствовала матка, в связи с чем семья была объединена с другой семьей из этой группы. Таким образом, в каждой группе после зимовки потеряно по одной семье пчел.

Сила семей контрольной группы после выставки из зимовника составила 5,0 улочек (рисунок 3). Семьи 1-й опытной группы по этому показателю превосходили контроль на 21,3 %, 2-й опытной – уступали на 14,9 %.

Максимальное количество подмора в гнездах пчел выявлено в 1-й опытной группе, что можно объяснить большим количеством особей в этих семьях. Минимальное – во 2-й опытной (таблица 1). По показателю расхода корма за период зимовки из расчета на одну пчелиную семью в 1-й опытной группе заметных различий с контролем не выявлено. Во 2-й опытной он был меньше контрольного значения на 1,5 кг (на 22,1 %). Из расчета на 1 улочку пчел меньше всего корма за период зимовки израсходовали семьи, получавшие в осенней подкормке пробиотик СпасиПчел – на 0,31 кг (22,0 %) меньше,

чем контрольные семьи. Во 2-й опытной группе (ПчелоНормосил) разность с контролем по этому показателю составила 0,14 кг (9,9 %).

Наиболее объективным показателем качества зимовки является количество выращиваемого расплода в пчелиной семье в весенний период. По данным учета, после выставки из зи-

мовника количество печатного расплода в контрольной группе в среднем составило 61,3 сотен ячеек. Максимальный показатель, зарегистрированный в семьях, получавших с подкормкой пробиотик СпасиПчел, – на 58,7 % выше контрольного значения. В семьях, получавших пробиотик ПчелоНормосил, он был выше на 23,5 %.

Рисунок 2
Степень развития жирового тела пчел при подкормке пробиотиками

Рисунок 3
Сила пчелиных семей до и после зимовки (ноябрь 2018 г., апрель, 2019 г.)

Таблица 1 Результаты зимовки пчелиных семей

Показатель	Группа пчелиных семей (вид подкормки)		
	контроль (СС)	1 (СС + СпасиПчел)	2 (СС + ПчелоНормосил)
Масса подмора, г	73,0 ± 6,9	83,0 ± 7,4	52,0 ± 4,6
Расход корма, кг:	на 1 семью пчел	6,8 ± 0,4	6,7 ± 0,1
	на 1 улочку пчел	1,41 ± 0,4	1,1 ± 0,1
Количество печатного расплода, сотни ячеек	61,3 ± 9,9	97,3 ± 12,0	75,7 ± 9,8

Обсуждение результатов. Использование осенних подкормок в пчеловодстве направлено на пополнение кормовых запасов, необходимых пчелиной семье, чтобы благополучно пережить длительный безмедосборный период. Как правило, при этом сахарный сироп обогащают биологически активными веществами, способствующими оптимизации процессов жизнедеятель-

ности пчел при подготовке к зимовке. В наших исследованиях для этой цели мы использовали пробиотические кормовые добавки нового поколения, разработанные ООО «НВП БашИнком» СпасиПчел и ПчелоНормосил. Первая из них содержит 2 штамма бактерий *Bacillus subtilis*, вторая – лактобактерии, бифидобактерии и пребиотик арабиногалактан (иммуномодулятор из хвои

лиственницы сибирской). Результаты садковых опытов свидетельствуют об отсутствии токсического влияния этих кормовых добавок на организм пчел. В опытных группах, напротив, отмечено увеличение продолжительности жизни пчел, по сравнению с контролем, что согласуется с данными О.С. Ларионовой [1] и El Khouly S. *et al.* [13]. Как показали результаты исследований, использование пробиотика СпасиПчел в осенней подкормке оказало положительное влияние на подготовку семей к зимовке. Рабочие пчелы, получавшие эту подкормку, накопили больше запасных питательных веществ в теле, о чем свидетельствует более высокий уровень развития жирового тела пчел – в среднем на 25,4 % выше, чем у пчел контрольной группы. Это согласуется с результатами исследований О.С. Ларионовой с соавт., по данным которых осенние подкормки пчелиных семей сахарным сиропом с добавлением микробиологического препарата апиник повышают уровень белкового, липидного и углеводного обмена, увеличивая сырую и сухую массу тела, содержание в организме жира и азота [1]. Результаты зимовки пчелиных семей во многом зависят от количества молодых пчел, выращенных в конце лета, и общей силы пчелиной семьи. Сильные семьи с большим количеством молодых пчел хорошо переносят зимовку и весной быстрее набирают кондицию. В 1-й опытной группе, получавшей пробиотик СпасиПчел, пчелиные семьи перед постановкой в зимовник по силе опережали контрольную группу на 24 %. Семьи 2-й опытной группы (ПчелоНормосил) по силе несколько уступали контролю. О положительном влиянии пробиотиков на основе *Bacillus subtilis* на силу семьи есть сведения в работах D.C. Sabaté *et al.* [21], и M.C. Audisio [8].

Весной после выставки из зимовника семьи 1-й опытной группы сохраняли преимущества по силе по сравнению с контролем и 2-й опытной группой. Это может быть связано с укреплением иммунного статуса организма пчел, снижением содержания условно-патогенной микрофлоры в кишечнике насекомых [4], уменьшением каловой нагрузки у пчел сильных семей [2].

При подкормке ПчелоНормосилом сила семей после выставки несколько уступала контролю. Однако необходимо отметить, что семьи

2-й опытной группы за безоблетный период меньше ослабли по сравнению с семьями контрольной группы. Если в контроле процент ослабления семей составлял 13,2 %, то во 2-й опытной этот показатель составил лишь 7 %. В этой группе отмечено и минимальное количество подмора. Максимальное его количество выявлено в гнездах 1-й опытной группы, что можно объяснить большим количеством пчел в этих семьях.

Действие пробиотических добавок в составе осенних подкормок проявилось и в превосходстве пчелиных семей по количеству расплода в семье. По этому показателю пчелосемьи 1-й и 2-й опытных групп превосходили семьи контрольной группы на 58,7 % и 23,5 % соответственно.

Одним из важных показателей при оценке результатов зимовки является расход корма пчелиной семьей за зимний период. К концу зимовки, когда в семьях появляется расплод, потребление корма значительно возрастает. Это связано, прежде всего, с затратами энергии на обогрев гнезда. Чем сильнее семья, тем меньше энергии она тратит на поддержание оптимальной для расплода температуры воздуха в зоне расположения зимнего клуба пчел. В наших опытах расход корма на улочку пчел в более сильных семьях 1-й опытной группы был на 22 % меньше контроля. Подобные результаты получены Е.А. Пшеничной, использовавшей в осенней подкормке препарат Эраконд в сочетании с пробиотиком Ветом 1.1 [6].

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о том, что осенние подкормки пчелиных семей с добавлением пробиотика СпасиПчел на основе *Bacillus subtilis* способствуют увеличению продолжительности жизни рабочих пчел, накоплению резервных веществ в организме, сохранению силы семей и экономному расходу корма в период зимовки пчел. Кормовая добавка ПчелоНормосил на основе лакто- и бифидобактерий не оказала заметного влияния на показатели силы семей и расхода корма, но способствовала улучшению воспроизводительных качеств, о чем свидетельствует увеличение количества печатного расплода в семьях весной после выставки из зимовника по сравнению с контролем.

Библиографический список

1. Ларионова, О.С. Пути оптимизации гомеостаза и микроценоза пчел при содержании семей в ульях различного типа [Текст]: автореф. дис. ... докт. биол. наук / О.С. Ларионова. М., 2012. 43 с.

2. Лойко, И.М. Эффективность использования продуктов пчеловодства для повышения энергии роста и естественных защитных сил организма телят [Текст] / И.М. Лойко, А. Г. Щепеткова // Современные технологии сельскохо-

зяйственного производства. Материалы XV межд. науч.-практ. конф. (Гродно, 18 мая 2012 года). Гродно, 2012. Ч. 1. С. 391–393.

3. Маннапов, А.Г. Развитие и продуктивные показатели семей пчел при использовании пробиотического препарата Апиник [Текст] / А.Г. Маннапов, О. С. Ларионова // Зоотехния : теорет. и науч.-практ. журн. 2011. № 9. С. 29–30. ISSN 0235-2478.

4. Маннапов, А.Г. Влияние препарата апиник на иммунологические и микробиологические показатели пчел [Текст] / А.Г. Маннапов, Н.Д. Московская // Пчеловодство. 2019. № 4. С. 19.

5. Мишуковская, Г.С. Применение пробиотиков для повышения продуктивности темной лесной пчелы башкирской популяции [Текст] / Г.С. Мишуковская // Темная лесная пчела *Apis mellifera mellifera* L. Республики Башкортостан. Уфа, 2015. С. 193–197.

6. Пшеничная, Е.А. Стимулирующие подкормки и зимовка пчел [Текст] / Е.А. Пшеничная // Пчеловодство. 2010. № 10. С. 14–15.

7. Arredondo D., Castelli L., Porrini M.P., Garrido P.M., Eguaras M.J., Zunino P., Antúnez K. *Lactobacillus kunkeei* strains decreased the infection by honey bee pathogens *Paenibacillus larvae* and *Nosema ceranae*. *Benef. Microbes*. 2018 Feb 27; 9 (2): 279–290. doi: 10.3920/BM2017.0075.

8. Audisio M.C. (2017) Gram-Positive Bacteria with Probiotic Potential for the *Apis mellifera* L. Honey Bee: The Experience in the Northwest of Argentina. *Probiotics & Antimicro. Prot.* 9, 22–31 doi:10.1007/s12602-016-9231-0.

9. Bleau N., Derome N., Giovenazzo P. (2019). The effects of probiotics on winter survival, spring development and gut microbiota of the honey bee (*Apis mellifera*) in Quebec, Canada. 46th API-MONDIA – International Apicultural Congress Congress – Montréal – Canada – Proceedings.

10. Bonilla-Rosso, German & Engel, Philipp. (2018). Functional roles and metabolic niches in the honey bee gut microbiota. *Current opinion in microbiology*. 43. 69–76. doi:10.1016/j.mib.2017.12.009.

11. Daisley B., Trinder M., McDowell T. *et al.* (2017). Neonicotinoid-induced pathogen susceptibility is mitigated by *Lactobacillus plantarum* immune stimulation in a *Drosophila melanogaster* model. *Scientific Reports*. 7. 2703. doi:10.1038/S41598-017-02806-w.

12. Daisley B.A., Pitek A.P., Chmiel J.A. *et al.* (2019). Novel probiotic approach. *ISME J.* doi:10.1038/s41396-019-0541-6.

13. El Khoury S., Rousseau A., Lecoœur A., Cheaib B., Bouslama S., Mercier P.-L., Demey V., Castex M., Giovenazzo P. and Derome N. (2018). Deleterious Interaction Between Honeybees (*Apis mellifera*) and its Microsporidian Intracellular Parasite *Nosema ceranae* Was Mitigated by Administering Either Endogenous or Allochthonous Gut Microbiota Strains. *Front. Ecol. Evol.* 6:58. doi:10.3389/fevo.2018.00058.

14. Fanciotti M.N., Tejerina M., Benítez-Ahrendts M.R. and Audisio M.C. (2018). Honey yield of different commercial apiaries treated with *Lactobacillus salivarius* A3iob, a new bee-probiotic strain. *Beneficial Microbes*, 9, 291–298.

15. Khaziakhmetov F.S., Khabirov A.F., Avzalov R.Kh., Tsapalova G.R., Rebezov M.B., Tagirov Kh.Kh., Giniyatullin Sh.Sh., Ishmuratov Kh.G., Mishukovskaya G.S., Gafarova F.M., Yessimbekov Zh.S. (2018) Effect of probiotics on calves, weaned pigs and lamb growth. *Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences*. T. 9. № 3. С. 866–870.

16. Khaziakhmetov F.S., Khabirov A.F., Avzalov R.Kh., Tsapalova G.R., Rebezov M.B., Tagirov Kh.Kh., Giniyatullin Sh.Sh., Ishmuratov Kh.G., Mishukovskaya G.S., Gafarova F.M., Esimbekov Zh.S. (2018) Valuable effect of using probiotics in poultry farming. *Annual Research & Review in Biology*. T. 25. № 1. С. 1–7.

17. Lucie Kešnerová, Olivier Emery, Michaël Troilo, Joanito Liberti, Berra Erkosar and Philipp Engel (2019). Gut microbiota structure differs between honeybees in winter and summer, *The ISME Journal*, 10.1038/s41396-019-0568-8.

18. Maes P.W., Rodrigues P.A., Oliver R., Mott B.M., Anderson K.E. (2016) Diet-related gut bacterial dysbiosis correlates with impaired development, increased mortality and *Nosema* disease in the honeybee (*Apis mellifera*). *Mol. Ecol.* 25: 5439–5450.

19. Maurizio A. Pollenernahrung und Lebensvorgänge bei der Honigbiene (*Apis mellifera*) Landwirtschaft. Jahrschweis. 1954. 68. p. 115–182.

20. Raymann K., Moran N.A. (2018). The role of the gut microbiome in health and disease of adult honey bee workers. *Curr Opin Insect Sci.*; 26: 97–104.

21. Sabate D.C., Cruz M.S., Benítez-Ahrendts M.R. and Audisio M.C. (2012). Beneficial effects of *Bacillus subtilis* subsp. *subtilis* Mori2, a honey-associated strain, on honeybee colony performance. *Probiotics and Antimicrobial Proteins*, 4, 39–46.

Сведения об авторах

1. **Мишуковская Галина Сергеевна**, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии, биохимии и кормления животных, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 228-07-73, e-mail: mishukovskaya@mail.ru.

2. **Гиниятуллин Марат Гиндуллинович**, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры пчеловодства, частной зоотехнии и разведения животных, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 252-72-52, e-mail: 0803MARAT@mail.ru.

3. **Шелехов Дмитрий Викторович**, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры пчеловодства, частной зоотехнии и разведения животных, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 252-72-52, e-mail: shelehov_d_v@mail.ru.

4. **Смошникова Елена Алексеевна**, кандидат сельскохозяйственных наук, ст. преподаватель кафедры физиологии, биохимии и кормления животных, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 228-07-73, e-mail: selenaa64@mail.ru.

5. **Науразбаева Айгуль Ильдаровна**, магистрант кафедры физиологии, биохимии и кормления животных, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 228-07-73, e-mail: naurazbaeva.aigul@mail.ru.

Для поддержания здоровья семьи и восполнения дефицита корма используют осенние подкормки, содержащие сахарный сироп в комбинации с различными биологически активными добавками для профилактики болезней пчел. Ужесточение требований к качеству продукции пчеловодства, её экологической чистоте ограничивает возможность применения для этой цели химиотерапевтических средств. В качестве альтернативы рассматривается возможность использования микробиологических препаратов, созданных на основе нормальной микрофлоры кишечника пчел для стимуляции иммунной системы. В статье приводятся данные о влиянии осенней подкормки пчелиных семей сахарным сиропом, обогащенным пробиотическими кормовыми добавками СпасиПчел (*Bacillus subtilis*) и ПчелоНормосил (лакто- и бифидобактерии). В садковых опытах при подкормке пробиотиками продолжительность жизни пчел достоверно превышала контрольное значение – в 1,2 раза (СпасиПчел) и 1,14 раза (ПчелоНормосил). Обогащение сахарного сиропа кормовой добавкой СпасиПчел во время осенней подкормки способ-

ствовало лучшей подготовке семей пчел к зимовке. По силе семей перед постановкой в зимовник они превосходили контроль на 24 %, по уровню развития жирового тела рабочих пчел – на 25,4 %. Весной после выставки из зимовника они сохраняли превосходство по силе на 21,3 %, количеству печатного расплода – на 58,7 %, расход корма за период зимовки на одну улочку в этих семьях был меньше на 22 %. Кормовая добавка ПчелоНормосил на основе лакто- и бифидобактерий не оказала заметного влияния на показатель силы семей и расход корма, но способствовала улучшению воспроизводительных качеств, о чем свидетельствует увеличение количества печатного расплода в семьях весной после выставки из зимовника на 23,5 % по сравнению с контролем. Результаты исследований подтверждают возможность использования пробиотических кормовых добавок в осенней подкормке пчел. Требуются дальнейшие исследования по изысканию оптимального состава пробиотиков, способствующих лучшей сохранности пчелиных семей за период зимовки.

G. Mishukovskaya, M. Giniyatullin, D. Shelekhov, E. Smolnikova, A. Naurazbaeva

EFFECTIVENESS OF PROBIOTIC FEED SUPPLEMENT FOR AUTUMN FEEDING OF HONEY BEES

Key words: honeybees; autumn feeding; overwintering; probiotics; strength of families; sealed brood.

Authors' personal details

1. **Mishukovskaya Galina**, Doctor of Biology, Professor of the Department of Physiology, Biochemistry and Animal Feeding, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, phone: +7 (347) 228-07-73, e-mail: mishukovskaya@mail.ru.

2. **Giniyatullin Marat**, Doctor of Agriculture, Professor of the Department of Beekeeping, Private Animal Husbandry and Animal Breeding, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, phone: +7 (347) 252-72-52, e-mail: 0803MARAT@mail.ru

3. **Shelekhov Dmitriy**, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of beekeeping, Private Animal Husbandry and Animal Breeding, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, phone: +7 (347) 252-72-52, e-mail: shelehov_d_v@mail.ru.

4. **Smolnikova Elena**, Candidate of Agricultural Sciences, Senior Lecturer of the Department of Physiology, Biochemistry and Animal Feeding, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, phone: +7 (347) 228-07-73, e-mail: selenaa64@mail.ru.

5. **Naurazbaeva Aigul**, master's degree student of the Department of Physiology, Biochemistry And Animal Feeding, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, phone: +7 (347) 228-07-73, e-mail: naurazbaeva.aigul@mail.ru.

In autumn honey bees are provided with feeds containing sugar syrup in combination with various biologically active disease prevention supplements to maintain the health of the honey bee family and make up for the lack of feed. Since the requirements for the quality of bee products and their environmental cleanliness have become even more rigid the use of chemotherapeutic agents is limited for this purpose. Microbiological products may be alternatively applied; the products are based on the normal intestinal microflora of bees to stimulate the immune system. The paper discusses the effect of autumn feeding of bee families with sugar syrup enriched with probiotic feed supplements «SpasiPchel» (*Bacillus subtilis*) and «PcheloNormosil» (lacto- and bifidobacteria). The cage-type experiments showed that life expectancy of honey bees significantly exceeded the control value when they were fed probiotic supplements (1,2 times when added «SpasiPchel» and 1,14 times when added «PcheloNormosil»). Adding the feed supplement «SpasiPchel» to the sugar syrup in autumn feeding

of honey bees was a more effective way to prepare bee families for overwintering. Before putting the families in in-door wintering sheds the family strength indices exceeded the control figures by 24 %, the fat body growth indices of working bees exceeded the control figures by 25,4 %. In spring when brought out from the wintering sheds the families remained 21,3 % stronger, the number of sealed brood was 58,7 % larger, the feed consumption for the winter period per seam of bees between two combs was 22 % lower. The feed supplement «PcheloNormosil» based on lactic and bifidobacteria did not have a noticeable effect on the strength of families and feed consumption, but improved their reproductive properties. In spring the sealed brood in the families was 23,5 % higher than in the control. The study results confirm that probiotic feed supplements can be effectively used in the autumn feeding of honey bees. Further studies are required to find the optimal composition of probiotics that foster preservation of bee families during the wintering period.

© Мишуковская Г.С., Гиниятуллин М.Г., Шелехов Д.В., Смольникова Е.А., Науразбаева А.И.

УДК 636.22/.28.084.413

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-106-110

М.Т. Сабитов, А.Р. Фархутдинова, И.М. Фархутдинов, М.Г. Маликова

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКАРМЛИВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МИНЕРАЛЬНО-ВИТАМИННОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «НАДЕЖДА» В СОСТАВЕ РАЦИОНА ТЕЛЯТ

Ключевые слова: кормовая добавка; цеолит природный; сапропель; молодняк крупного рогатого скота; валовый прирост; себестоимость; прибыль; рентабельность выращивания.

Введение. Минеральные добавки играют важную роль в организации полноценного питания, повышении продуктивности и эффективности отрасли животноводства в целом [6, 7, 11]. Для балансирования рационов кормления по минеральным веществам в последние годы на практике применяются различные нетрадиционные местные природные добавки с богатым минеральным составом, такие как бентонит, сапропель, цеолит, магнезит, известняк [7, 2].

Использование нетрадиционных минеральных подкормок в рационах животных экономи-

чески выгодно, так как многие из них по физико-химическим свойствам являются уникальными.

В нашем случае мы отдаем предпочтение природному цеолиту Башкирского происхождения, механизм действия которых в организме животных представляет большой интерес: в результате обменных процессов высвобождаются макро- и микроэлементы, являющиеся дополнительным источником минеральных веществ в рационе, находясь в более доступной форме для организма животных.

В опытах на откармливаемом молодняке крупного рогатого скота М.Д. Чамухой (1992) изучалось воздействие цеолитсодержащих пород Шивиртуйского, Пегасского, Холинского месторождений [13]. Установлено, что при добавке в рацион цеолитовых туфов переваримость питательных веществ повышается на 4–7 %. В исследованиях ряда авторов [3, 4, 14, 15] указывается, что практическое значение цеолитовых туфов при скормливания жвачным животным заключается в уменьшении токсического действия высокой концентрации аммиака в содержимом рубца при повышенном поступлении азотистых веществ с кормами [5], увеличении прироста живой массы [1, 12], снижению концентрации тяжелых металлов и хлорорганических пестицидов в мясном сырье [8].

При разработке рецептов комплексной минерально-витаминной кормовой добавки «Надежда» (КМВКД) нами были учтены рекомендуемые нормативы, а также фактическое содержание указанных элементов в кормах и дефицит в рационах. В состав КМВКД были введены: готовые витаминные смеси А, Д и Е, обесфторенный фосфат, мел кормовой, сера кормовая, магnezит, цеолит природный и соли микроэлементов – меди, цинка, марганца и кобальта [9].

Целью исследований было определение экономической эффективности скормливания комплексной минерально-витаминной кормовой добавки «Надежда» в составе рациона телят, разработанной сотрудниками отдела животноводства Башкирского НИИСХ УФИЦ РАН под руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора Маликовой М.Г.

Для решения поставленной цели определяли:

- уровень обеспеченности телят минеральными веществами за счет используемых кормов рациона;
- экономическую эффективность их использования в рационах телят.

Материал и методика исследований.

Научно-хозяйственный опыт проводили в ФГУП «Уфимское» Уфимского района Республики Башкортостан на клинически здоровых телятах черно-пестрой породы в возрасте 5,5 мес., отобранных по методу аналогов, из которых сформировали 4 группы телят по 10 голов, одинаковых по возрасту, живой массе и породе [10]. Продолжительность опыта составила 90 дней. Животные контрольной группы получали основной рацион (ОР) + отдельные минеральные подкормки (мел, соль, премикс П-62); I опытной группы – ОР + КМВКД по рецепту № 1; II – ОР + КМВКД по рецепту № 2, III группы – ОР + КМВКД по рецепту № 3.

Комплексная минерально-витаминная кормовая добавка создана на основе обесфторенного фосфата, мела кормового, цеолита природного (Тузбекского месторождения Республики Башкортостан), сапропеля, серы кормовой, магnezита, соли поваренной, солей макро- и микроэлементов, витаминов А, Д, Е, которые, поступая в организм, корректируют обмен веществ. Природный цеолит, входящий в состав добавки, обладает ионообменными, детоксицирующими, улучшающим функционирование печени и почек свойствами, нормализует выработку ферментов и деятельность желудочно-кишечного тракта.

Результаты исследований и их обсуждение. Для определения экономической эффективности использования КМВКД в рационах телят были использованы результаты ежемесячных взвешиваний, материалы годовых отчетов по расходу кормов за 2017–2018 гг.

Определение валового и среднесуточного прироста телят проводили ежемесячно. По результатам научно-хозяйственного опыта установлено, что скормливание КМВКД в рационах телят оказало положительное влияние на прирост живой массы подопытных животных (таблица 1).

Таблица 1 Живая масса и среднесуточный прирост подопытных телят

Группа	Живая масса, кг		Валовый прирост, кг	Среднесуточный прирост, г	В % к контрольной
	при постановке на опыт	при снятии с опыта			
контрольная	147,5 ± 1,55	215,0 ± 2,13	67,5	750,0	100,0
I–О	148,0 ± 2,11	222,0 ± 2,48	74,0	822,2*	109,63
II–О	150,2 ± 2,52	226,7 ± 2,52	76,5	850,0**	113,3
III–О	146,5 ± 2,28	230,6 ± 2,32	84,1	934,4***	124,6

* P < 0,05, ** P < 0,01, *** P < 0,001.

По данным таблицы 1 видно, что животные всех опытных групп, получавшие комплексную минерально-витаминную кормовую добавку «Надежда», превосходили контрольных по живой массе. Наибольший прирост живой массы отмечен у молодняка III опытной группы. При этом

эти телята увеличили живую массу за три месяца на 84,1 кг, когда как их аналоги из контрольной группы – лишь на 67,5 кг, а из I и II опытной групп – на 74,0 кг и на 76,5 кг соответственно.

По данным контрольных взвешиваний подопытных животных установлено, что у молод-

няка контрольной группы, потреблявшего с основным рационом отдельные минеральные подкормки [6], среднесуточный прирост составил 750 г, а в I группе, получавшей подкормку по рецепту № 1, прирост живой массы составил 822,2 г, во II – 850 г, в III – 934,4 г. При этом

прирост живой массы в опытных группах на 9,63; 13,3; 24,6 % больше, чем у животных контрольной группы.

Экономическая эффективность скормливания телятам комплексных минерально-витаминных кормовых добавок отражена в таблице 2.

Таблица 2 Эффективность использования КМВКД в рационах телят

Показатель	Группа животных			
	контрольная	I-опытная	II-опытная	III-опытная
Количество животных в опыте, гол.	10	10	10	10
Среднесуточный прирост, г	750	822,2	850	934,4
Валовой прирост на 1 гол, кг	67,5	74,0	76,5	84,1
Валовой прирост, ц	6,75	7,4	7,65	8,41
Затрачено кормов: ЭКЕ	562	540	495	452,7
1 кг прироста, корм. ед.	6,23	6,0	5,5	5,03
Общие затраты, тыс. руб.	37125	39000	38320	38333
В том числе на добавки	–	187,8	119,90	121,25
Себестоимость 1 ц прироста, ц	5500	5270	5009	4558
Выручка	45563	49606	49430	50961
Прибыль, тыс. руб.	8438	10606	11110	12628
Рентабельность выращивания, %	22,7	27,1	28,9	32,94

Примечание: * $P < 0,05$.

Закключение. Экономический анализ результатов исследований показал, что все испытуемые КМВКД, изготовленные по рецептам № 1, № 2, № 3, оказали положительное влияние, т. е. ответные реакции организма на обменные процессы в организме телят. Применение их обеспечило повышение среднесуточных приростов живой массы на 9,63 %, 13,3 и 24,6 % по сравнению с контрольными: на получение 1 кг прироста живой массы израсходовано в контрольной группе кормовых единиц 6,23, сырого протеина 1014 г, в том числе переваримого 768 г, в первой опытной соответственно 6,0; 936,5; 709,0; второй соответственно 5,5; 902 и 684; в третьей 5,03; 816,6 и 627 г, и способствовало снижению кормовых единиц – в сравнении с контрольными животными на 9,63; 12,3 и

24,4 %; сырого протеина на 7,64; 11,0 и 18,5 %, в том числе протеина на 7,66; 16,67 и 18,36 %.

При этом себестоимость 1 ц прироста живой массы в опытных группах была ниже на 4,18 %; 8,93 и 17,13 % и получено дополнительной прибыли больше на 2168; 2672 и 4190 рублей, а рентабельность – выше соответственно на 4,4; 6,2 и 10,24 %.

Вывод. Использование комплексной минерально-витаминной кормовой добавки в рационах телят для установления баланса по недостающим элементам питания, изготовленной по 3 рецептам, оказалось эффективнее, чем применение в контрольной группе отдельных минеральных добавок. Причем комплексная минерально-витаминная кормовая добавка, изготовленная по рецепту № 3, оказалась наиболее эффективной.

Библиографический список

1. Васильев, В.Ф. Влияние цеолитов Холлинского месторождения на продуктивность и физиологическое состояние бычков при выращивании и откорме [Текст] / В.Ф. Васильев, В.Н. Струганов, И.С. Козлов, И.Д. Амаров // Природные цеолиты в народном хозяйстве: тез. докл. Всесоюз. совещ. Новосибирск, 1990. С. 119–120.
2. Гадиев, Р.Р. Использование нетрадиционных кормов в птицеводстве [Текст] / Р.Р. Гадиев, Ч.Р. Галина // Science, Technology And Innovative Technologies In The Prosperous Epoch Of The Powerful State. Материалы Международной научной конференции. 2018. С. 186–187.
3. Гарсина, Г. Использование природных цеолитов в кормлении крупного рогатого скота

- [Текст] / Г. Гарсина, А. Элиас, М. Влас и др. // Тезисы докладов симпозиума по применению природных цеолитов в животноводстве и растениеводстве. Тбилиси: Мецнисеребра, 1984. С. 31–33.
4. Ларина, Н.А. Использование цеолитов в кормлении молочного скота [Текст] / Н.А. Ларина // Доклады ВАСХНИЛ СО Кемеровского НИИ сельского хозяйства. Новосибирск, 1990. С. 5–68.
5. Лачуга, Ю.Ф. Владоаккумулирующие технологии, техника для обработки почв и использование минеральных удобрений в экстремальных условиях [Текст] / Ю.Ф. Лачуга и др. Рязань, 2014. 264 с.
6. Маликова, М.Г. Премиксы из цеолита для коров [Текст] / М.Г. Маликова, Ф.М. Шага-

лиев // Животноводство России. 2016. № 10. С. 43–44.

7. Маликова, М.Г. Применение премиксов на основе цеолита из местных ресурсов в рационах коров [Текст] / М.Г. Маликова, Ф.М. Шагалиев // Научное обеспечение инновационного развития агропромышленного комплекса регионов РФ. Материалы международной научно-практической конференции. 2018. С. 829–835.

8. Милиахметов, Ф.Г. Технологические аспекты производства экологически чистой говядины [Текст]: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.02.04 / Ф.Г. Милиахметов. Уфа, 2001. 23 с.

9. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных [Текст]: справочное пособие / А.П. Калашников [и др.]; под ред. А.П. Калашникова, В.И. Фисина, В.В. Щеглова, Н.И. Клейменова. 3-е издание, переработанное и дополненное. М., 2003. 456 с.

10. Овсянников, А.И. Методика постановки опытов по переваримости кормов [Текст] / А.И. Овсянников // Основы опытного дела в животноводстве. М., Колос, 1976. С. 131–136.

11. Сабитов, М.Т. Влияние комплексной минерально-витаминной кормовой добавки «Надежда» на прирост телят [Текст] / М.Т. Сабитов, М.Г. Маликова, А.Р. Фархутдинова, Н.Г. Фенченко, Н.И. Хайруллина // Молочное и мясное скотоводство. 2019. № 4. С. 31–34.

12. Фаритов, Т.А. Использование кормовых добавок в животноводстве [Текст] / Т.А. Фаритов. Уфа: Башкирский ГАУ, 2002. 156 с.

13. Чамуха, М.Д. Организация комплексных исследований по научному обеспечению развития животноводства [Текст] / М.Д. Чамуха // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 1992. № 4. С. 26–30.

14. Paska I., Soltes V., Vavrol L. et al. Zeolity a moznosti ich Vyuzitia v Chove osipanych Nas Chov, 41. 1981. P. 206–207.

15. Stephenson R.G., Huff J.L., Krebs G., Howitt C.J. Effect of molasses sodium bentonite and zeolite an urea toxicity. Austral J. Arg. Res. 1992. Vol. 43. № 2. P. 301–314.

Сведения об авторах

1. **Сабитов Мунир Тимергалиевич**, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий отделом животноводства, старший научный сотрудник, Башкирский НИИСХ УФИЦ РАН, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 19, тел.: +7 (347) 224-07-08, e-mail: malikowa1941@yandex.ru.

2. **Фархутдинова Альбина Робертовна**, ветеринарный врач отдела животноводства, Башкирский НИИСХ УФИЦ РАН, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 19, тел.: +7 (347) 224-07-08, e-mail: alfarhutdinova1984@yandex.ru.

3. **Фархутдинов Ильдар Мавляирович**, кандидат технических наук, доцент кафедры строительно-дорожных, коммунальных и сельскохозяйственных машин, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: ildar1702@mail.ru.

4. **Маликова Марьям Гумаровна**, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник отдела животноводства, Башкирский НИИСХ УФИЦ РАН, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 19, тел.: +7 (347) 224-07-08, e-mail: malikowa1941@yandex.ru.

Изучена и научно обоснована целесообразность использования в рационах телят чернопестрой породы комплексной минерально-витаминной кормовой добавки «Надежда» (далее – КМВКД). КМВКД – это кормовая добавка, содержащая в своем составе такие компоненты, как цеолит природный, сапропель, обесфторенный фосфат, мел кормовой, сера кормовая, магnezит, соль поваренная, соли макро- и микроэлементов, витамины А, Д, Е. Перед постановкой животных на опыт изучалась кормовая база и химический состав кормов, используемых в хозяйстве. В кормах установлено пониженное содержание кальция, фосфора, магния, серы, марганца, меди, цинка и кобальта. При этом соотношение питательных и минеральных веществ, степень их доступности для усвоения организмом не обеспечивает удовлетворения потребности в них. В экспериментальных исследованиях,

проведенных на четырех аналогичных группах телят (по 10 голов в каждой), изучалось влияние включения в их рацион КМВКД по рецептам №№ 1, 2 и 3, рассчитывалась экономическая эффективность их скармливания. Выяснено влияние такого кормления телят на валовый и среднесуточный приросты живой массы. Экономическими расчетами установлено, что рентабельность выращивания телят, получавших подкормку по рецепту № 1, в сравнении с животными контрольной группы, получавшими отдельные минеральные добавки (соль поваренная, мел кормовой), увеличилось на 4,40 %; соответственно по рецепту № 2 – на 6,20 %, по рецепту № 3 – на 10,24 %. Следовательно, наиболее эффективной оказалась комплексная минерально-витаминная кормовая добавка, изготовленная по рецепту № 3.

ECONOMIC EFFICIENCY OF COMPLEX MINERAL AND VITAMIN FEED SUPPLEMENT «NADEZHDA» IN THE DIET OF CALVES

Key words: *feed supplement; natural zeolite; sapropel; young cattle; gross growth; cost; profit; profitability of cultivation.*

Authors' personal details

1. **Sabitov Munir**, Candidate of Agricultural Sciences, head of the Department of animal husbandry, senior researcher, Bashkir Scientific Research Institute of Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, 450059, Republic of Bashkortostan, Ufa, R. Sorge str., 19, phone: +7 (347) 224-07-08, e-mail: malikowa1941@yandex.ru.

2. **Farkhutdinova Albina**, veterinarian of the Department of animal husbandry, Bashkir Scientific Research Institute of Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, 450059, Republic of Bashkortostan, Ufa, R. Sorge str., 19, phone: +7 (347) 224-07-08, e-mail: alfarhutdinova1984@yandex.ru.

3. **Farkhutdinov Ildar**, Candidate of Technical Sciences, associate professor of the department of Road Construction, Municipal and Agricultural Machines, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, e-mail: ildar1702@mail.ru.

4. **Malikova Maryam**, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, chief researcher of the Department of animal husbandry, Bashkir Scientific Research Institute of Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, 450059, Republic of Bashkortostan, Ufa, R. Sorge str., 19, phone: +7 (347) 224-07-08, e-mail: malikowa1941@yandex.ru.

The expediency of using the complex mineral and vitamin feed supplement «Nadezhda» (CMVFS) in the diets of calves of black-and-white breed has been studied and scientifically substantiated. CMVFS is a feed supplement containing in its composition such components as natural zeolite, sapropel, fluorinated phosphate, feed chalk, feed sulfur, magnesite, table salt, salts of macro- and microelements, vitamins – A, D, E. Before setting the animals on the experiment, their fodder base and its chemical composition used on the farm were studied. The feeds were low in calcium, phosphorus, magnesium, sulfur, manganese, copper, zinc and cobalt. At the same time, the ratio of nutrients and minerals, the degree of their availability for assimilation by the body does not provide their need. In

experimental studies conducted on four similar groups of calves (10 heads each), the influence of inclusion of CMVFS in their diet according to the recipe No. 1, No. 2 and No. 3 was studied and the economic efficiency of their feeding was calculated. The influence of such feeding of calves on gross and average daily gain of live weight is found out. The economic calculations established that the profitability of growing calves receiving feeding recipe No. 1, in comparison with the animals of the control group receiving separate mineral supplements (salt, chalk aft), increased 4,40 %; the recipe № 2 – 6,20 %, the recipe No. 3 – 10,24 %. Therefore, the most effective was a complex mineral and vitamin feed supplement, made according to the recipe number 3.

© Сабитов М.Т., Фархутдинова А.Р., Фархутдинов И.М., Маликова М.Г.

УДК 619:616-053:616-008

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-110-114

Д.И. Синельщикова, Л.В. Клетикова, А.Н. Мартынов

ИОННЫЙ СОСТАВ КРОВИ ТЕЛЯТ ПРИ АНТЕ- И НЕОНАТАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ

Ключевые слова: *телята; гомеостаз; ионы; биологически активная добавка; антенатальное и неонатальное введение.*

Введение. Постоянный режим внутренней среды обеспечивает функционирование организма как единой биологической системы [11; 13]. Сохранение гомеостаза основано на потреб-

лении и выведении воды и минеральных солей, где основными катионами выступают натрий, калий, кальций и магний, а анионами – хлор и фосфаты.

Ионы натрия определяют объем внеклеточной жидкости, включая циркулирующую и депонированную кровь, лимфу, ликвор, желудочный и кишечный сок, жидкости серозных полостей [15]. Калий в свою очередь определяет биологическую активность клеток, формирование клеточных потенциалов действия и поддержание нервно-мышечной возбудимости и проводимости [2]. Кальций обеспечивает необходимую степень возбудимости нервной и мышечной ткани, участвует в свертывании крови [14]. Будучи кофактором множества ферментов, магний имеет отношение более чем к 300 биохимическим реакциям. Он необходим для нормального функционирования натрий-калий-АТФазного и кальций-АТФазного насосов. Соотношение внутриклеточного Са и Mg определяет внутриклеточный гомеостаз и антиоксидантную защиту клетки [1; 3]. В то же время все виды обмена в организме неразрывно связаны с превращением фосфорной кислоты, благодаря фосфорилированию осуществляется кишечная адсорбция, гликолиз, прямое окисление углеводов, транспорт липидов, обмен аминокислот и т. д. [9]. Хлор активизирует фермент амилазу, участвует в синтезе соляной кислоты, улучшает работу печени, обеспечивает постоянство осмотического давления, поддерживает нормальное артериальное давление, содействует выведению мочевины [12]. Все ионы входят в состав костной ткани. Недостаток натрия и хлора вызывает потерю аппетита и задержку роста у молодых животных. Продолжительная кальциемия приводит к остеопорозу, остеомалации и родильному парезу у коров. Гипокалиемия сопровождается миопатией, фатальным проявлением которой является рабдомиолиз. Снижение энергетического потенциала и продуктивности возникают при нехватке фосфатов. Дефицит магния сочетается с другими состояниями ионной недостаточности [4; 7; 8].

Исходя из важности электролитов для организма животных и особенно молодняка, **целью настоящего исследования** было изучение влияния биологически активной добавки, примененной в ante- и неонатальный период, на содержание ионов в крови у телят.

Условия, материалы и методы исследования. Для достижения цели сформировали 2 группы коров костромской породы в возрасте 3–4 лет. Первая группа (n = 10) служила контролем и получала стандартный рацион, принятый в хозяйстве [10], вторая – опытная группа (n = 20) – получала к основному рациону добавку, содержащую низкомолекулярные пептиды, нуклеозиды и нуклеотиды в дозе 0,1 г/кг живой массы, один раз в день в течение пяти суток до отела.

У всех телят, полученных от экспериментальных коров, до первой выпойки молозива от-

бирали пробы крови из яремной вены и анализировали содержание ионов Na, Cl, K, P, Ca и Mg.

Затем сформировали три группы телят. Контролем служили телята, полученные от первой группы коров (n = 10). Опытные группы телят, вторую и третью, сформировали от коров второй группы, получившей биологически активную добавку. Вторая группа телят (n = 10) получала в течение молозивного периода 1 раз в день биологически активную добавку в дозе 0,1 г/кг живой массы. Третья группа (n = 10), как и первая, в течение обозначенного периода получала молозиво согласно схеме выпойки. После окончания молозивного периода (5 дней) у телят повторно провели оценку ионного состава крови.

Эксперимент проведен в течение летнего и раннего осеннего периодов. Коровы и телята содержались в одинаковых условиях. Клинический осмотр животных, включенных в эксперимент, проводили дважды в день.

Лабораторные исследования выполнены на кафедре акушерства, хирургии и незаразных болезней животных Ивановской ГСХА. Сыворотку крови телят исследовали в течение 2–3 часов после взятия на биохимическом анализаторе BA-88A «Semi-auto Chemistry Analyzer» и анализаторе электролитов i-SMART 30 Vet. Биометрическую обработку результатов проводили с помощью табличного процессора Excel.

Результаты исследования. Анализ ионов в сыворотке крови новорожденных телят выявил тенденцию к повышению натрия, хлора, кальция и магния и снижению калия и фосфора в опытных группах, где в период внутриутробного развития коровам-матерям вводили дополнительно к основному рациону биологически активную добавку. Известно, что примененная добавка содержит низкомолекулярные пептиды, нуклеозиды и нуклеотиды, которые при дефиците питательных веществ в клетке способствуют синтезу адаптивных ферментов и внутриклеточных вторичных посредников индуцирующих сложный, согласованный каскад биохимических реакций, необходимый для усвоения поступившего корма и поддержания, таким образом, гомеостаза.

В результате у новорожденных телят опытных групп соотношение натрия и хлора, натрия и калия, калия и магния, кальция и фосфора составило 1,4 : 1; 24,7 : 1; 5,9 : 1 и 1,37 : 1 соответственно, тогда как в контрольной группе пропорция несколько иная: 1,3 : 1; 22,6 : 1; 6,6 : 1 и 0,87 : 1 (таблица). Изменение соотношения ионов приводит к изменению pH крови, нарушению реабсорбции веществ в почках, вызывает конформационные изменения белка [6]. Недостаточность буферных систем крови у новорожденных, обусловленная ионным дефицитом, может привести к развитию метаболического ацидоза.

Таблица Содержание ионов в сыворотке крови телят, ммоль/л, $M \pm m$, $n = 10$

Ионы	Новорожденные телята			Телята 5-суточного возраста		
	1 группа	2 группа	3 группа	1 группа	2 группа	3 группа
Na	131,27 ± 2,06	137,33 ± 0,47	136,88 ± 0,34	108,17 ± 1,27**	138,20 ± 0,41	135,25 ± 0,31
Cl	96,48 ± 1,31	99,53 ± 0,73	100,13 ± 0,94	80,48 ± 0,47**	106,37 ± 0,83**	97,15 ± 0,77
K	5,80 ± 0,06	5,54 ± 0,07	5,50 ± 0,02	3,38 ± 0,12**	4,70 ± 0,05**	5,78 ± 0,09*
Ca	2,13 ± 0,06	2,23 ± 0,08	2,35 ± 0,06	2,00 ± 0,04*	2,58 ± 0,02**	1,98 ± 0,02**
P	2,45 ± 0,22	1,67 ± 0,05	1,68 ± 0,10	2,12 ± 0,06**	1,53 ± 0,02**	2,00 ± 0,07**
Mg	0,88 ± 0,08	0,95 ± 0,04	0,92 ± 0,05	0,90 ± 0,06	1,07 ± 0,02**	0,83 ± 0,05**

Примечание: по отношению к новорожденным * $p \geq 0,05$; в остальных случаях ** $p \leq 0,05$.

У телят контрольной группы по завершении молозивного периода отмечено снижение ионов натрия на 17,6 %, хлора на 16,6 %, калия на 41,7 %, кальция на 6,1 %, фосфора на 13,5 %.

У телят второй группы, получивших биологически активную добавку, наметилась тенденция к увеличению содержания в крови натрия, повышению хлора на 6,9 %, кальция на 15,7 %, магния на 12,6 % и снижение калия на 15,2 % и фосфора на 8,4 %.

У телят третьей группы, получивших биологически активную добавку лишь в позднем антенатальном периоде, отмечена тенденция к снижению натрия, хлора и кальция, а также снижению магния на 9,8 % наряду с повышением фосфора на 19,0 % и калия на 5,0 %.

Известно, что дисбаланс ионов (туболопатия) в раннем постэмбриональном периоде обусловлен несовершенством структуры мембранных белков-носителей, ферментной системы, чувствительности рецепторов клеток к действию гормонов, дефицитом витаминов, и в первую очередь D. В то же время снижение фосфат-ионов в сыворотке крови обусловлено их вовлечением в процессы синтеза, фосфорилирования и дефосфорилирования промежуточных соединений. Что касается калия, то переход на экзогенное питание стимулирует функционирование гормонов, оказывающих влияние на его распределение между внутри- и внеклеточной средами и ускоряющих переход в клетки.

У телят всех группы отмечается изменение соотношения натрия и хлора, натрия и калия, калия и магния, кальция и фосфора, а именно у контрольных телят пропорция составила 1,34 : 1; 32,0 : 1; 3,76 : 1 и 0,91 : 1. У телят 2

группы взаимоотношение между натрием и хлором равно 1,30 : 1; натрием и калием – 29,4 : 1; калием и магнием – 4,39 : 1; кальцием и фосфором – 1,69 : 1, у телят 3 группы соответственно 1,39 : 1; 23,4 : 1; 6,96 : 1 и 0,99 : 1.

У телят контрольной группы наиболее выраженное изменение (по сравнению с первоначальными данными) произошло в соотношении натрия и калия, калия и магния; у телят второй группы отмечены сдвиги в отношении натрия и калия; калия и магния; кальция и фосфора; в третьей группе – между кальцием и фосфором.

Во всех группах телят отмечены изменения в соотношении калия и магния, что, вероятно, обусловлено нестабильностью функционирования натрий-калиевого насоса из-за истощения запасов магний-зависимой Na^+-K^+-ATP азы накапливающего ионы калия внутри клеток [5].

Заключение. У новорожденных телят опытных групп содержание в сыворотке крови ионов натрия, хлора, кальция и магния было больше, чем в контрольной группе. У телят третьей группы по сравнению с контрольной группой по завершении молозивного периода концентрация натрия, хлора и калия была выше. Пятисуточные телята второй группы по содержанию ионов натрия, хлора, кальция и магния превосходили аналогов из контрольной и третьей группы.

Полученные результаты дают основание сделать выводы о стимулирующем влиянии биологически активной добавки, содержащей низкомолекулярные пептиды, нуклеозиды и нуклеотиды, на ионный обмен; антенатальное и раннее постнатальное применение препарата способствует увеличению Na, Cl, Ca и Mg в сыворотке крови.

Библиографический список

1. Барышникова, Г.А. Дисбаланс электролитов и его роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний [Текст] / Г.А. Барышникова, С.А. Чорбинская, И.И. Степанова // Эффективная фармакотерапия. 2019. Т. 15. № 20. С. 54–60.
2. Барышникова, Г.А. Дефицит калия и магния, их роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний и возможность коррекции

[Текст] / Г.А. Барышникова, С.А. Чорбинская, И.И. Степанова, О.Е. Блохина // Consilium Medicum. 2019. № 21 (1). С. 67–73.

3. Белоконова, Н.А. Мониторинг состояния водного и электролитного баланса организма [Текст] / Н.А. Белоконова, Л.Г. Полушина, Р.П. Лелекова // Здоровье населения и среда обитания. 2016. № 7. С. 8–11.

4. Былова, Н.А. Калия и магния аспарагинат в практике терапевта [Текст] / Н.А. Былова // Трудный пациент. 2013. № 1. Том 11. С. 21–24.

5. Гапонова, Н.И. Нарушения калий-магниевого гомеостаза в клинической практике: коррекция сбалансированным раствором калия и магния аспарагината [Текст] / Н.И. Гапонова, В.Р. Абдрахманов, В.А. Кадышев, А.Ю. Соколов // Лечащий врач. 2014. № 2. С. 27–30.

6. Дементьева, И.И. Исследование кислотно-основного равновесия [Текст] / И.И. Дементьева; под ред. В.В. Меньшикова // Клиническая лабораторная аналитика. М.: Лабинформ-РАМЛД, 2000. Т. 3. С. 349–361.

7. Калашников, Н.П. Регуляция обмена воды и электролитов (калия, натрия и хлора) в организме телок [Текст]: автореф. дис. ... канд. биол. наук / Н.П. Калашников. Боровск, 1985. 22 с.

8. Костюченко, Л.Н. Нарушения калий-магниевого гомеостаза и его коррекция в ходе нутриционной поддержке гастроэнтерологического профиля [Текст] / Л.Н. Костюченко // Трудный пациент. 2010. № 10. Том 8. С. 40–47.

9. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики [Текст]: справочник / Под ред. И.П. Кондрахина. М.: КолосС, 2004. 520 с.

10. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных [Текст]: справочное пособие. 3-е издание переработанное и дополненное / Под ред. А.П. Калашникова, В.И. Фиси-

нина, В.В. Щеглова, Н.И. Клейменова. Москва: Россельхозакадемия, 2003. 456 с.

11. Синельщикова, Д.И. Диагностика ионного статуса и биохимических показателей крови высокопродуктивных стельных сухостойных коров АО «Вергуза» [Текст] / Д.И. Синельщикова, Л.В. Клетикова, А.Н. Мартынов // Аграрная наука в условиях модернизации и инновационного развития АПК России. Сборник материалов Всероссийской научно-методической конференции с международным участием, посвященной 100-летию высшего аграрного образования в Ивановской области (28–29 ноября 2019, Иваново). Иваново: Ивановская ГСХА, 2018. С. 502–505.

12. Тимофеева, А.А. Физиологическое значение хлора в организме [Электронный ресурс] / А.А. Тимофеева, Н.А. Любин // Концепт: научно-методический электронный журнал. 2017. Т. 39. С. 361–365. Режим доступа: <http://e-koncept.ru/2017/970399.htm>.

13. Трифонова, Т.А. Прикладная экология [Текст] / Т.А. Трифонова, Н.В. Селиванова, Н.В. Мищенко. М.: Академический проект; Гаудеамус, 2007. 384 с.

14. Шапиро, Я.С. Биологическая химия [Текст]: учебное пособие / Я.С. Шапиро. СПб: ЭЛБИ-СПб, 2004. С. 44–45.

15. Litvitsky P.F. Ion Exchange Disorders. *Voprosy sovremennoi pediatrii – Current Pediatrics*. 2015; 14 (3): 349–357.

Сведения об авторах

1. **Синельщикова Дарья Ивановна**, аспирант, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева», 153012, г. Иваново, ул. Советская, д. 45, тел.: +7 (4932) 32-81-44, e-mail: rektorat@ivgsha.ru.

2. **Клетикова Людмила Владимировна**, доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры акушерства, хирургии и незаразных болезней животных, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева», 153012, г. Иваново, ул. Советская, д. 45, тел.: +7 (4932) 32-81-44, e-mail: rektorat@ivgsha.ru.

3. **Мартынов Александр Николаевич**, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры акушерства, хирургии и незаразных болезней животных, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева», 153012, г. Иваново, ул. Советская, д. 45, тел.: +7 (4932) 32-81-44, e-mail: rektorat@ivgsha.ru.

Значимым показателем в обеспечении гомеостаза является ионный состав крови. Целью исследования явилось изучение динамики ионов у телят при ante- и неонатальном применении добавки, содержащей низкомолекулярные пептиды, нуклеозиды и нуклеотиды. Определение в сыворотке крови Na, Cl, K, Ca, P, Mg выполнено на биохимическом анализаторе BA-88A «Semi-auto Chemistry Analyzer» и анализаторе электролитов i-SMART 30 Vet. В результате применения антенатальной добавки у новорожденных

телят опытных групп концентрация ионов Na, Cl, Ca, P, Mg в сыворотке крови выше по сравнению с контрольными, а их соотношение отвечает физиологическим нормам. Введение добавки телятам в течение всего молозивного периода стимулировало ионный обмен, способствовало повышению энергетического потенциала и содержания Na, Cl, K, Ca, и Mg. У телят, получивших добавку лишь в антенатальный период, в сыворотке крови было высокое содержание K и P на фоне снижения концентрации

ионов Na, Cl, Ca и Mg. У контрольной группы телят установлено снижение уровня ионов, что свидетельствует о незрелости буферных и ферментных систем, белков-носителей, чувствительности рецепторов клеток к действию гормонов, дефиците витаминов. Таким образом, антенатальная профилактика, основанная на

введении в течение 5 суток коровам-матерям и новорожденным телятам добавки, содержащей низкомолекулярные пептиды, нуклеозиды и нуклеотиды в дозе 0,1 г/кг живой массы, способствовала стимуляции метаболических процессов, повышению концентрации ионов в сывотке крови, их утилизации и реутилизации.

D. Sinelshchikova, L. Kletikova, A. Martynov

ION COMPOSITION OF CALVES BLOOD IN ANTE- AND NEONATAL INJECTION OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUPPLEMENT

Key words: *calves; homeostasis; ions; dietary supplement; antenatal and neonatal use.*

Authors' personal details

1. **Sinelshchikova Daria**, graduate student, Ivanovo State Agricultural Academy named after D. Belyaev, 153012, Ivanovo, Sovetskaya st., 45, phone: +7 (4932) 32-81-44, e-mail: rektorat@ivgsha.ru.

2. **Kletikova Lyudmila**, Doctor of Biological Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Obstetrics, Surgery and Non-communicable Animal Diseases, Ivanovo State Agricultural Academy named after D. Belyaev, 153012, Ivanovo, Sovetskaya st., 45, phone: +7 (4932) 32-81-44, e-mail: rektorat@ivgsha.ru.

3. **Martynov Alexander**, Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor of the Department of Obstetrics, Surgery and Non-communicable Animal Diseases, Ivanovo State Agricultural Academy named after D. Belyaev, 153012, Ivanovo, Sovetskaya st., 45, phone: +7 (4932) 32-81-44, e-mail: rektorat@ivgsha.ru.

The ionic composition of the blood is important in maintaining homeostasis. The purpose of research was to study the dynamics of ions in calves in antenatal and neonatal use of supplement that contains low-molecular peptides, nucleosides and nucleotides. We used a biochemical analyzer BA-88A «Semi-auto Chemistry Analyzer» and an electrolyte analyzer i-SMART 30 Vet to determine Na, Cl, K, Ca, P in blood serum. As a result of antenatal use of supplement in newborn calves of experimental groups concentration of ions Na, Cl, Ca, P, Mg in blood serum is higher than in control ones, and their ratio meets physiological standards. The use of the supplement during the entire colostrum period stimulated ion exchange, increased the energy potential and the content of Na, Cl, K, Ca, and

Mg. Blood serum of calves who received the supplement only in the antenatal period was characterized by a high content of K and P and the ion concentration of Na, Cl, Ca and Mg was decreased. The control group of calves has a decrease in the level of ions, and it indicates the immaturity of buffer and enzyme systems, proteins-carriers, the sensitivity of cell receptors to the action of hormones, and a vitamin deficiency. Thus, antenatal and neonatal prevention based on the supplement containing low molecular peptides, nucleosides and nucleotides at a dose of 0,1 g/kg for mother cows and newborn calves within 5 days helped to stimulate metabolic processes, the concentration of ions in the blood serum was increased as well as their utilization and reutilization.

© Синельщикова Д.И., Клетикова Л.В., Мартынов А.Н.

УДК 636.087.7:636.5

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-114-125

Е.Н. Сковородин, Г.В. Базекин, Г.З. Бронникова, О.В. Дюдьбин

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ПТИЦЫ

Ключевые слова: *гуси; утки; перепела; морфология; печень; ультраструктура; гепатоциты; антиоксиданты; селен; диизопропиламмоний дихлорацетат.*

Введение. Изучение биохимических процессов в организме птиц и их морфологических

проявлений способствует созданию новых видов кормов и кормовых добавок, которые мак-

симально подходят каждому отдельному виду и породе [2, 8, 9, 11–13, 19, 31]. В этом отношении перспективным, особенно для Республики Башкортостан, эндемической зоны, где регистрируют дефицит селена, йода, цинка, кобальта и марганца [5], является изучение влияния кормовых добавок, содержащих натуральные антиоксиданты [2, 3, 17, 26, 27, 33]. Синтетические антиоксиданты благодаря своей низкой стоимости и удобству скармливания имеют большие перспективы [15, 21, 22, 23]. Например, диизопропиламмоний дихлорацетат, сходный с пангамовой кислотой, обладает липотропным действием и тем самым стимулирует рост птицы, повышает резистентность, предотвращает развитие дистрофических изменений в паренхиматозных органах [35]. Это вещество – дипромоний, используемый в медицине (пат. 369752, Швейцария; пат. 1105877, Германия; пат. 862248, Великобритания; пат. 1295338, Франция), – довольно дорогой, что не позволяет применять его в птицеводстве.

Разработан довольно дешевый способ синтеза диизопропиламмония дихлорацетата медицинского качества – Диронакс (пат. 2480212, Российская Федерация) для использования его при лечении животных как гепатопротектора и в качестве кормовой добавки [32]. Действие этого препарата на птиц мясных пород изучено недостаточно [30].

Мы впервые с помощью комплекса морфометрических, гистохимических и электронно-микроскопических методов исследовали печень мускусных уток, гусей венгерской белой породы и перепелов при откорме и на фоне применения антиоксидантов. Мы выбрали печень в качестве индикатора уровня метаболизма и наличия патологических процессов у мясных птиц при откорме, влияния на этот орган антиоксидантов [4, 7, 12, 15, 16, 18–20, 25]. Впервые установлены закономерности роста и развития птиц мясных пород, роста массы печени этих птиц на фоне применения кормовых добавок, содержащих селен и диизопропиламмоний дихлорацетат. Описаны макроскопические и гистологические изменения у птиц мясных пород, подробно изучена ультраструктура гепатоцитов птиц на фоне применения антиоксидантов. Представленное многолетнее исследование позволяет внести ясность в эти вопросы и разработать конкретные практические меры профилактики гепатопатий и повысить эффективность откорма птиц мясных пород.

Цель исследования – изучить влияние кормовых добавок, содержащих натуральные антиоксиданты (Солвимин Селен) и синтетический антиоксидант диизопропиламмония дихлорацетат (Диронакс).

Материал и методы. Объектом исследования служили мускусные утки, гуси белой венгерской породы, перепела, содержащиеся в виварии университета. Все эксперименты были проведены в соответствии с законодательством РФ и гуманными принципами. Использовали современные объективные морфологические методы исследования: анатомические (динамика массы тела, взвешивание, препарирование и описание анатомических особенностей органов мускусных уток, гусей венгерской белой породы и перепелов), органометрические (масса и размеры органов), гистологические, гистохимические и электронно-микроскопические методы морфологического анализа.

Птиц после вылупления разделили на контрольную и две опытные группы. Контрольная группа (по 40 птиц каждого вида) получала обычный рацион в соответствии с видом и возрастом. Утятам, гусятам и перепелятам первой опытной группы (по 30 птиц каждого вида) с водой давали диизопропиламмоний дихлорацетат, синтезированный в ООО «Базис» (г. Уфа) – Диронакс. Утятам, гусятам и перепелятам второй опытной группы (по 30 птиц каждого вида) с первого дня по 60-е сутки выпаивали поливитаминный препарат, содержащий органическую форму селена – Солвимин Селен. Взвешивание птиц и печени проводили на электронных весах с погрешностью измерений 0,02 грамма. Для морфометрических, гистологических и электронно-микроскопических исследований проводили убой птиц в суточном возрасте, в 15-ти суточном возрасте, месячном и двухмесячном возрасте постэмбрионального онтогенеза. Сроки убоя экспериментальных птиц определяли с учетом критических фаз роста массы тела и формирования печени [33, 34, 37]. Для изучения микроскопических изменений в печени опытных и контрольных птиц кусочки печени фиксировали в 10 % нейтрализованном формалине, жидкостях Буэна и Карнуа, заливали в парафиновые блоки. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином, по Мак-Манусу, суданом III, суданом черным В. Ультратонкие срезы готовили на ультратоме LKB-III 8800 и изучали в трансмиссионном электронном микроскопе JEM-1011CX II.

Относительный прирост массы тела и печени определяли по формуле Броди. Цитометрические измерения проводили с помощью программы ImageJ. Ядерно-цитоплазматическое отношение определяли делением объема ядра на объем гепатоцита. Статистическую достоверность этого показателя определяли с помощью t-критерия Стьюдента. Из-за относительно небольшого числа групп птиц и отклонений от нормального распределения переменных про-

вели ранговый анализ с помощью непараметрического критерия Краскелла – Уоллиса.

Результаты исследований. Относительный прирост массы птиц умеренный в первые 15 суток и достигает 90–110 %. В последующие 15 суток он максимален и достигает 150–180 %. К концу эксперимента этот показатель снижается до 60–80 %. Установили, что применение антиоксидантов способствует увеличению привесов массы тела птиц мясных пород по сравнению с контрольными группами (на 5–10 %). Этот эффект наиболее выражен при использовании кормовой добавки, содержащей селен (разница достоверна при $P < 5 \%$).

Масса печени по сравнению с ростом массы тела увеличивалась синхронно. Относительный прирост массы до 15-ти суток после вылупления печени был умеренный, от 15-ти до 30-ти – максимальный, особенно у перепелов. К 60-ти суткам этот показатель снижался в 2 (утки и гуси) и 3 (перепела) раза. На рост печени больший эф-

фект оказывает Солвимин Селен, по сравнению с препаратом Диронакс (разница между опытными группами недостоверна при $P < 5 \%$).

У птиц контрольной группы выявляли следующие морфологические изменения. Печень суточных утят, гусят и перепелов имеет охряно-желтый цвет. Дольчатость не выражена. Строма плохо различима. Относительный объем паренхимы печени у вылупившихся птенцов максимальный. Это создает ложное впечатление жировой дистрофии органа.

При фиксации печени в жидкости Карнуа цитоплазма гепатоцитов пеннистая, вакуолизированная (таблица 1), содержит мало гликогена. При фиксации в жидкости Буэна или при постепенном повышении концентрации формалина от 3 до 10 % этот эффект не выражен. При предфиксации в глютаральдегиде и окраске полутонких срезов мы не выявляли подобной микроскопической картины. Вакуоли представлены фосфолипидами.

Таблица 1 Морфологические изменения в печени у суточных птиц (по 10 птиц в группе)

Тип морфологических изменений		Кол-во птиц с изменениями		
		утки	гуси	перепела
A	Вакуолизация цитоплазмы	10	10	10
B	Паренхиматозная дистрофия	2	0	1
C	Жировая дистрофия	2	1	1
D	Пролиферация соединительной ткани	0	0	0
E	Внеклеточная дистрофия и фиброз стромы	0	0	0
F	Ядерно-цитоплазматическое отношение	$0,046 \pm 0,002$	$0,038 \pm 0,001$	$0,072 \pm 0,005$

Кроме того, у 1–2 % птенцов (таблица 1) отмечали набухание и помутнение цитоплазмы, появление и накопление в цитоплазме мелкой ацидофильной зернистости белковой природы. При этом границы клеток и очертания ядер различимы с трудом.

Ядерно-цитоплазматическое отношение у суточных утят составляет $0,046 \pm 0,002$. Этот показатель у гусят ниже и достигает $0,038 \pm 0,001$. У перепелов он максимальный и равен $0,072 \pm 0,005$ (разница между группами достоверна при $P < 5 \%$). Это объясняется разным уровнем зрелости вылупившихся птенцов и уровнем белкового обмена.

Ядра гепатоцитов лежат эксцентрично. Внешняя и внутренняя мембраны оболочки с широким неровным пространством, с расширениями и сужениями около ядерных пор, несколько вакуолизированные. Со стороны цитоплазмы много рибосом. Хроматин краевой. В центре ядра одно, реже два ядрышка. Хроматин в нуклеоплазме мелкодисперсный. Ядрышки с преобладанием гранулярного компонента, с небольшими участками плотного фибриллярного вещества. Зернистая цитоплазматическая сеть в виде плоских цистерн из плотно упакованных мембран. Они расположены вокруг одной из

сторон митохондрий дугообразно. Митохондрии имеют округлую форму. Они располагаются около ядра, на синусоидальном или билиарном поле. Количество крист небольшое. Это свидетельствует о преобладании анаэробного дыхания. В некоторых гепатоцитах митохондрии крупные, их мембраны как бы растягиваются, расслаиваются, кристы неравномерно утолщаются и укорачиваются, матрикс органелл просветляется с появлением прозрачных вакуолей и вакуолизацией митохондрий.

К пятнадцати суткам у контрольных птиц удельный объем паренхимы печени у всех исследованных видов птиц уменьшается за счет роста объема стромы органа. При повышенной наполненности кровью просветы кровеносных сосудов небольшие. Это связано с регуляцией кровообращения в гистионе. Печеночные дольки выражены за счет темных гепатоцитов, расположенных по периферии, и утолщения коллагеновых волокон (таблица 2).

Гепатоциты со светлыми ядрами с четким хроматином в виде тонкой полоски по краю. Ядрышко лежит в центре и имеет слабо выраженную ретикулярную структуру. Ядра лежат в центре, реже эксцентрично. Ядерно-плазматическое отношение у утят составляет $0,049 \pm 0,003$;

у гусят – $0,041 \pm 0,002$; у перепелов – $0,078 \pm 0,006$. Эти показатели по сравнению с суточным возрастом достоверно увеличились.

У 30–40 % птиц контрольной группы диагностировали признаки внутриклеточной дистрофии, которые более выражены, чем у суточных птенцов. В цитоплазме гепатоцитов 2–4 % птиц обнаруживается мелкокапельное ожирение. У 4–6 % птиц обнаруживали дезорганизацию соединительной ткани стромы органов и сосудов, которая характеризовалась базофилией и метакромазией волокон и основного вещества, стимуляцией лимфоидных узелков в этой зоне.

Ядрышки крупные. Заметно больше в гепатоцитах становится митохондрий. Зернистая цитоплазматическая сеть увеличивается. Плотность гранул гликогена увеличивается. Они располагаются группами в отдельных участках цитоплазмы. Липиды имеют в виде округлых ка-

пель с полосчатой электронной плотностью. Это свидетельствует о преобладании в них триглицеридов, что подтверждается окраской суданом III (таблица 2).

У птиц, получавших Диронакс, структура печени к 15-суточному возрасту характеризуется увеличением относительного объема стромы за счет роста сосудистого элемента и развития соединительной ткани (таблица 2), что проявляется в меньшей степени по сравнению с контролем (таблица 2). Гепатоциты приобретают многоугольную форму. Их цитоплазма однородная. Отдельные клетки содержат мелкие капли нейтральных жиров и расположены на периферии долек (таблица 2). Ядра лежат в центре. Вокруг сосудов триады скопления лимфоидных клеток. Среднее ядерно-плазматическое отношение составляет у утят – $0,051 \pm 0,004$; у гусят – $0,043 \pm 0,003$; у перепелов – $0,076 \pm 0,006$.

Таблица 2 Морфологические изменения в печени у 15-суточных птиц (по 10 птиц в группе)

Тип морфологических изменений		Группа	Количество птиц с изменениями в печени		
			утки	гуси	перепела
А	Вакуолизация цитоплазмы	Контроль	8	6	8
		Диронакс	6	5	4
		С. Селен	4	3	4
В	Паренхиматозная дистрофия	Контроль	4	4	3
		Диронакс	2	2	2
		С. Селен	1	1	1
С	Жировая дистрофия	Контроль	3	4	2
		Диронакс	2	2	1
		С. Селен	1	1	1
D	Пролиферация соединительной ткани	Контроль	6	8	7
		Диронакс	4	3	4
		С. Селен	3	4	2
Е	Внеклеточная дистрофия и фиброз стромы	Контроль	5	4	6
		Диронакс	2	1	1
		С. Селен	1	2	2
F	Ядерно-цитоплазматическое отношение	Контроль	$0,049 \pm 0,003$	$0,041 \pm 0,002$	$0,078 \pm 0,006$
		Диронакс	$0,051 \pm 0,004$	$0,043 \pm 0,003$	$0,076 \pm 0,006$
		С. Селен	$0,054 \pm 0,004^*$	$0,046 \pm 0,003^*$	$0,079 \pm 0,007^*$

* достоверная разница с контролем ($P < 5 \%$).

У птиц, которые получали Солвимин Селен, к 15-суточному возрасту объем паренхимы печени снижается достоверно. В гепатоцитах уменьшается количество и величина капель липидов. Ядра лежат в центре. Среднее ядерно-плазматическое отношение составляет у утят – $0,054 \pm 0,004$; у гусят – $0,046 \pm 0,003$; у перепелов – $0,079 \pm 0,007$. Это достоверно выше по сравнению с контролем и с предыдущей опытной группой.

К одному месяцу снижается относительный объем паренхимы за счет роста гепатоцитов, а не их гиперплазии, развития стромы, изменения размеров капилляров и пространств между клетками. В поле зрения микроскопа видно больше центральных вен и триад, что связано с формированием печеночных долек и пролиферацией

соединительной ткани, возможно с фиброзными изменениями стенок сосудов и желчных протоков (таблица 3).

Почти у всех птиц диагностировали вакуолизацию цитоплазмы, белково-жировую дистрофию гепатоцитов, в области триад коагуляцию основного вещества, набухание и частичный распад коллагеновых волокон, плазморрагию с пропитыванием соединительной ткани эозинофильным веществом (таблица 3).

Ядра гепатоцитов имеют разную величину, округлые. В ядрах расположены одно-два крупных ядрышка, имеющих ретикулярную структуру. Среднее ядерно-плазматическое отношение составляет у утят – $0,044 \pm 0,003$; у гусят – $0,031 \pm 0,002$; у перепелов – $0,059 \pm 0,004$, что ниже по сравнению с 15-суточным возрастом.

Таблица 3 Морфологические изменения в печени у 30-суточных птиц (по 10 птиц в группе)

Тип морфологических изменений		Группа	Количество птиц с изменениями в печени		
			утки	гуси	перепела
А	Вакуолизация цитоплазмы	Контроль	9	8	9
		Диронакс	4	3	3
		С. Селен	2	2	2
В	Паренхиматозная дистрофия	Контроль	8	9	7
		Диронакс	1	2	1
		С. Селен	0	1	0
С	Жировая дистрофия	Контроль	7	8	6
		Диронакс	1	1	1
		С. Селен	0	0	0
D	Пролиферация соединительной ткани	Контроль	8	9	8
		Диронакс	2	3	2
		С. Селен	3	4	2
Е	Внеклеточная дистрофия и фиброз стромы	Контроль	7	6	8
		Диронакс	1	1	0
		С. Селен	0	1	0
F	Ядерно-цитоплазматическое отношение	Контроль	0,044 ± 0,003	0,031 ± 0,002	0,059 ± 0,004
		Диронакс	0,048 ± 0,004	0,039 ± 0,003*	0,071 ± 0,006*
		С. Селен	0,049 ± 0,005*	0,038 ± 0,003*	0,073 ± 0,006*

* достоверная разница с контролем ($P < 5\%$).

Цитоплазма содержит мелкие вакуоли и нейтральные жиры, зернистая. А на периферии дольки располагаются гепатоциты с каплями липидов. Неясно выражены границы гепатоцитов. Клетки несколько увеличены. Причем степень набухания гепатоцитов неодинакова. Особенно это выражено вдали от центра дольки. При большом увеличении устанавливается характер изменений цитоплазмы и ядер эпителиальных клеток.

У гусей гепатоциты достаточно крупные, с зернистой цитоплазмой и признаками жировой дистрофии. Под капсулой органа вакуолизация цитоплазмы гепатоцитов более выражена. Митохондрии диаметром до 1 мкм, округлые. Они располагаются около ядра, реже у синусоидального или билиарного полюса. Митохондрии с небольшим числом узких, параллельно расположенных мелких крист, простирающихся в сторону матрикса. Матрикс митохондрий гранулированный, электронно-плотный.

У уток в непосредственной близости от ядра гепатоцитов отчетливо видны расширенные ячейки зернистой цитоплазматической сети. Митохондрии набухшие, без крист. Причем сильнее это выражено по периферии клетки. Цитоплазма представляет собой полосы. Здесь же разбросаны сравнительно мелкие ячейки зернистой цитоплазматической сети. Ближе к цитоплазматической мембране находятся небольшие лизосомы, имеющие овальную форму черного цвета. Гликогена мало. Они располагаются в отдельных зонах цитоплазмы. Липиды в гепатоцитах в виде округлых капель средней величины. Они имеют характерную полосчатую электронную плотность вследствие преобладания в них балластных триглицеридов и нейтральных жиров.

Гепатоциты перепелов представляют собой полигональную клетку диаметром 5–10 мкм. Синусоидальный и билиарный полюса различаются характером расположения органелл. Цитоплазма гепатоцитов характеризуется наличием большого количества митохондрий. Они округлой или вытянутой формы диаметром от 1–1,5 мкм и длинной на продольных срезах до 3 мкм. Встречаются гантелевидные, вероятно делящиеся митохондрии. При этом в некоторых гепатоцитах преобладают митохондрии округлой формы, в других – вытянутые до нескольких микрон. Это объясняется однонаправленностью митохондриальной сети в гепатоцитах вытянутой формы и плотным расположением митохондриальных тяжей, что характерно для печени перепелов.

Митохондрии имеют типичное строение. Внутри имеется значительное число расширенных, коротких крист. Некоторые из них выглядят светлыми, а в митохондриях относительно светлого матрикса – темными со светлой серединой. В светлых гепатоцитах чаще встречаются митохондрии небольшой величины с множеством мелких крист. Мы наблюдали большее количество митохондрий и большую величину этих ультраструктур в крупных клетках с крупным светлым ядром и ядрышком гранулированного типа. В двуядерных гепатоцитах больше крупных митохондрий.

В гепатоцитах перепелов очень хорошо выражена цитоплазматическая сеть в виде небольших отграниченных мембранных канальцев и везикул. ЗЦС перепелов представлена главным образом плоскими цистернами, лежащими чаще всего близко к митохондриям, окружая их частично или полукругом, образуя своеобразную

«шапочку», или вокруг митохондрии в виде кольца. Последняя картина чаще наблюдается в двуядерных гепатоцитах. Если в срезе видны удлинённые митохондрии, профили ЗЦС располагаются близко между ними в виде тяжей. Описанная картина является видовой особенностью гепатоцитов перепелов. В отличие от млекопитающих ЗЦС гепатоцитов перепелов фрагментирована и не образует структур из параллельно лежащих мембран.

Кроме того, в цитоплазме гепатоцитов перепелов встречаются: лизосомы, периксомы, пластинчатый комплекс, филаментозные структуры, липиды, гликоген. Но наибольшую информативность для оценки функционального состояния гепатоцитов имеет ядро и располагающееся в нем структуры и ядрышко.

Объем паренхимы печени птиц месячного возраста, получавших Диронакс, достоверно снижается, но этот показатель остается выше по сравнению с контролем. Среднее ядерно-плазматическое отношение у месячных птиц этой группы составляет у утят – $0,048 \pm 0,004$; у гусят – $0,039 \pm 0,003$; у перепелов – $0,071 \pm 0,006$. По сравнению с контролем, у гусей и перепелов ЯПО достоверно выше (при $P < 5\%$). Капли липидов, зернистость цитоплазмы встречается только у 10 % птиц. На фоне пролиферации соединительной ткани признаки стромально-сосудистой дистрофии обнаруживали у 10 % уток и гусей (таблица 3).

В ядре хроматин мелкодисперсный низкой электронной плотности лежит диффузно. Плотный хроматин различается в виде от краевого маргинального. Гранулярная цитоплазматическая сеть выражена, равномерно лежит по всей цитоплазме. Цистерны разделены, даже фрагментированы, не образуют пакеты параллельных мембран. На мембранах большое количество рибосом. Гладкая цитоплазматическая сеть мелкая, расположена ближе к периферии.

В гепатоцитах утят, получавших селен, митохондрий больше. Они овальные или неправильной формы с ответвлениями. Содержат много радиально лежащих крист. Их матрикс электронно-плотный гранулированный. Увеличивается плотность внутримитохондриальных крист. «Темных» гепатоцитов заметно больше. Они отвечают за синтетическую активность печени, содержат более крупную зернистую эндоплазматическую сеть, мало профилей гладкого эндоплазматического ретикулума. В них больше рибосом и полисом и хорошо развит пластинчатый комплекс. В цитоплазме больше гранул гликогена, лучше развита сеть митохондрий. Последние более крупные, и их число в 2–3 раза превышает таковое в «светлых» гепатоцитах.

Печень птиц, получавших препарат селена, имеет четкую архитектуру. Тканевые структуры в ней выражены. Строма и паренхима хорошо развиты. Атрофические, дистрофические изменения, признаки патологии крово- и лимфообращения отсутствуют. Гепатоциты имеют крупные светлые ядра. Ободок хроматина четкий и лежит по периферии ядра и округлым структурированным ядрышком в центре. Некоторые гепатоциты содержат по 2–3 небольших ядрышка. Довольно часто можно встретить гипертрофированные двуядерные гепатоциты. Цитоплазма гепатоцитов имеет мелкозернистую структуру, не содержит нейтральных жиров. На фоне роста и развития соединительной ткани незначительно снижается объем паренхимы. Среднее ядерно-плазматическое отношение составляет у утят – $0,049 \pm 0,005$; у гусят – $0,039 \pm 0,003$; у перепелов – $0,073 \pm 0,006$, что несколько ниже по сравнению с 15-суточным возрастом, несколько выше по сравнению с суточным возрастом, достоверно выше (при $P < 5\%$), чем в контроле.

К двухмесячному возрасту печень птиц контрольной группы уже имеет дефинитивную структуру. Объем паренхимы печени снижается не только за счет пролиферации соединительной ткани, но и за счет фиброзных изменений, особенно в области триад вокруг желчных протоков и кровеносных сосудов. Среднее ядерно-плазматическое отношение достоверно снижается у утят до $0,043 \pm 0,003$; у гусят – до $0,029 \pm 0,002$; у перепелов – до $0,053 \pm 0,004$. Это ниже по сравнению со всеми предыдущими возрастными периодами (таблица 4).

У двухмесячных птиц происходит утолщение коллагеновых волокон. Образуется много тонких ретикулиновых волокон. Стенки сосудов утолщены за счет мукоидного набухания волокон и межклеточного вещества. Это сопровождается застойными явлениями. Лимфоидные клетки лежат по ходу кровеносных сосудов в виде ограниченных фолликулов без формирования капсулы. Лимфатические узелки имеют не большой размер.

«Балки» и «клубочки» в печени не определяются. Ярко выражена декомпозиция гепатоцитов. Просветы сосудов сужены за счет набухания гепатоцитов. Цитоплазма имеет сетчатую структуру и содержит капли жира. В перемычках между ячейками видны остатки цитоплазмы с мембранами в состоянии декомпозиции. Ядра находятся в центре, но они несколько уменьшены или сморщены.

К двухмесячному возрасту в контрольной группе гусей печень характеризуется дифференцированной структурой, коллагеновые волокна

тесно взаимосвязаны, что доказывает развитие фиброзных изменений органа. Структура печеночных пластинок нарушена, ярко выражена

дискомплексация клеточных элементов паренхимы. Просвет сосудов сужен. Выражена сетчатость и зернистость цитоплазмы вокруг ядра.

Таблица 4 Морфологические изменения в печени у 60-суточных птиц (по 10 птиц в группе)

Тип морфологических изменений		Группа	Количество птиц с изменениями в печени		
			утки	гуси	перепела
А	Вакуолизация цитоплазмы	Контроль	10	10	9
		Диронакс	2	2	1
		С. Селен	1	0	1
В	Паренхиматозная дистрофия	Контроль	9	8	8
		Диронакс	0	1	0
		С. Селен	0	0	0
С	Жировая дистрофия	Контроль	8	9	8
		Диронакс	1	2	1
		С. Селен	0	1	0
D	Пролиферация соединительной ткани	Контроль	10	10	10
		Диронакс	2	2	1
		С. Селен	3	4	2
Е	Внеклеточная дистрофия и фиброз стромы	Контроль	8	7	9
		Диронакс	1	1	2
		С. Селен	0	1	0
F	Ядерно-цитоплазматическое отношение	Контроль	0,043 ± 0,003	0,029 ± 0,002	0,053 ± 0,004
		Диронакс	0,042 ± 0,003	0,034 ± 0,002*	0,064 ± 0,005*
		С. Селен	0,046 ± 0,005*	0,032 ± 0,002	0,069 ± 0,007*

* достоверная разница с контролем (P < 5 %).

При электронно-микроскопическом исследовании гепатоцитов отмечали выраженные изменения митохондрий. В гепатоцитах часто встречаются рыхло сопряженные митохондрии – набухшие, рыхлые, отежные митохондрии, у которых имеются разрушения мембран. Реже видны слабо сопряженные митохондрии. Они больших размеров, рисунок крист сглажен, имеются обширные разрушения мембран и просветление матрикса. Изменяется эндоплазматическая сеть и рибосомы. Гранулярная эндоплазматическая сеть гиперплазированная, агранулярная – фрагментированная с расширенными профилями или с признаками редукции. Некоторые клетки набухают и в них появляются миелоидные фигуры.

У двухмесячных птиц, получавших Диронакс, «балочно-клубочковая» организация органа сохранена. Лимфоидные узелки небольшие, но структурированные. Строма выражена хорошо. У 10–20 % птиц наблюдается вакуолизация цитоплазмы гепатоцитов, имеются признаки белково-жировой дистрофии (таблица 4). Не диагностируются фиброзные изменения и стромальная дистрофия. Относительный объем паренхимы достоверно выше. Ядра гепатоцитов крупные, с расположенным по периферии ядра гетерохроматином. Ядрышко мелкое, имеет ретикулярную структуру и расположено в центре. Внутريدольковые синусоидные капилляры четко выражены с единичными эритроцитами в просвете. Форма гепатоцитов многогранная.

Ядра гепатоцитов крупные, светлые, с крупным центральным расположенным ядрышком,

расположены несколько эксцентрично. Среднее ядерно-плазматическое отношение уменьшается и составляет у уток – 0,042 ± 0,003; у гусей – 0,034 ± 0,002; у перепелов – 0,064 ± 0,005, что у гусей и перепелов достоверно выше по сравнению с контролем.

У двухмесячных мускусных уток, получавших селеносодержащую подкормку, объем паренхимы ниже контрольной группы. Среднее ядерно-плазматическое отношение у птиц этой группы составляет: у уток – 0,046 ± 0,005; у гусей – 0,032 ± 0,002; у перепелов – 0,069 ± 0,007. Это достоверно ниже по сравнению с предыдущими возрастными периодами у перепелов, но достоверно выше по сравнению с группой, получавшей Диронакс.

Ультраструктурные отличия в гепатоцитах по сравнению с контрольной группой следующие. В цитоплазме митохондрий заметно больше, они с короткими кристами, просветленным матриксом, округлые. Об активизации в них энергозависимых функций свидетельствует набухание некоторых из них. Много светлых пузырьков и цистерн образуется расширенными полостями цитоплазматической сети. Гранулярная цитоплазматическая сеть располагается вокруг митохондрий. Гликогена по сравнению с контролем мало, и гранулы диспергированные. Ядра гепатоцитов светлые. Содержат одно-два хорошо организованных ядрышка. Заметно увеличивается доля мелкодисперсного хроматина, что связано с высокой степенью дифференциации и синтетической активностью. Для гусей

этой опытной группы характерно увеличение гликогена и снижение количества нейтрального жира.

Обсуждение полученных результатов. Известно, что после вылупления наступает критическая фаза, связанная с резким переходом с эндогенного типа питания, который осуществляется за счет липидов яйца, на питание за счет белков и углеводов, поступающих с кормом [34, 37]. При этом происходит существенная структурная перестройка печени [16, 19, 29].

Проведя тщательное макро- и микроскопическое, электронно-микроскопическое исследование печени суточных утят, гусят и перепелат, мы установили, что имеется незавершенная дифференциация паренхимы. Но гепатоциты обладают высокой синтетической активностью. Она развивается за счет эндогенных запасов питательных веществ клеток – фосфолипидов и липопротеидов, которые мы выявили при помощи гистохимических реакций.

M. Gesek et al. [16] исследовали печень цыплят-бройлеров на 3-й день после вылупления и установили, что у 100 % птиц наблюдается вакуолярная и жировая дегенерация гепатоцитов. У 80 % цыплят генетической линии Rossa 308 венотный застой. Аналогичные данные были получены Д.Ю. Гришиной [29], изучавшей печень бройлеров, Н. Namodi [13], исследовавшим печень трех видов птиц. Это согласуется с данными наших исследований, проведенными на мясных птицах (утки, гуси и перепела).

Следовательно, уже с первых дней жизни необходимо применять быстро усвояемый и оперативно действующий микроэлемент, имеющий антиоксидантное действие, – селен. Эффективными могут быть также эндогенные антиоксиданты прямого и непрямого действия типа тиоктовой (липоевой) кислоты.

В дальнейшие возрастные периоды в обмене веществ происходят существенные изменения: снижается содержание липидов, они локализуются в гепатоцитах периферической и средней зон дольки. Видимо, после вылупления происходит интенсивный гидролиз жира, который используется как энергетический материал. Наши данные согласуются с результатами исследований других авторов. По данным M. Gesek et al. [16], к десяти и семнадцати суткам постэмбрионального онтогенеза в печени бройлеров диагностируются паренхиматозная дегенерация и вакуолярная дистрофия, венотная гиперемия, пролиферация желчных протоков, гипертрофия эндотелиальных клеток и гипертрофия мышечных клеток артерий. Только у половины цыплят обнаруживали жировую дегенерацию, инфильтрацию лимфоидными клетками соединительной ткани, окружающей желчные и кровенос-

ные сосуды. Эти изменения авторы объясняют субклинической инфекцией, вызванной *C. perfringens* и вирусами, вызывающими холангиогепатит, а также поступлением с кормом афлотоксинов [1, 4, 10, 24].

К месячному, и еще в большей степени к двухмесячному возрасту у птиц контрольной группы увеличение массы печени сопровождается гипертрофией клеток, преобладающей над их пролиферацией, что согласуется с литературными данными [4, 29]. Относительный объем стромы достоверно увеличивается. В паренхиме печени обнаруживаются лимфоидные инфильтраты и кровоизлияния, напоминающие очаги экстремедуллярного кроветворения. На 45 сутки у перепелов на фоне высокого уровня сырого протеина в рационе наблюдается жировая дистрофия, некроз гепатоцитов [15]. Гистопатологию печени у птиц при оксидативном стрессе описали J. Osičková et al. [20]. V. Paskova et al. [21], изучив печень перепелов, установили, что этот орган, выполняющий детоксикационную функцию, первый поражается при оксидативном стрессе. Аналогичные данные получили Vitula F. et al. [28] при микоплазмозе куропаток.

Японские перепела очень чувствительны к геморрагическому синдрому жирной печени (FLHS), и комбинации липотропных и антиоксидантных пищевых добавок обладают защитным действием в отношении этого заболевания [25]. Исследования [14] показали, что в Турции использование цинка в качестве антиоксиданта имело защитное действие от вредного воздействия кадмия на клетки печени. Селен является фактором, который защищает печень, сердце и аорту от риска ожирения у крыс и перепелов, которым скормливали рацион с высоким содержанием жиров [6, 7].

На основании электронно-микроскопического анализа можно сделать вывод, что не инфильтрация и трансформация, а декомпозиция (липофанероз) преобладает среди механизмов развития дистрофии. Видимым проявлением метаболических нарушений является накопление липидов и их неполная утилизация при снижении глюконеогенеза. Несомненно, это и приводит к появлению в клетках высокого уровня перекисей [8], поскольку птиц выращивали в эндемической зоне с недостатком селена [5]. По данным M. Gesek et al. [16], чаще всего ультраструктурные нарушения обнаруживают в митохондриях и гранулярном эндоплазматическом ретикулуле.

Необходимо отметить, что использование комплексного селеносодержащего препарата Солвимин Селен и гепатопротектора Диронакс корректирует закономерности метаболизма. Селеносодержащий препарат в большей степени,

чем гепатопротектор, нормализует структуру печени. Более полно используются липиды в качестве энергетического материала.

Это согласуется с данными литературы. По сведениям Д.А. Шишкиной [36], селеноорганические вещества оказывают влияние на рост живой массы гусей китайской серой породы и нормализуют структуру печени, способствуют компенсации жировой дистрофии печени. Это происходит за счет более полного использования липидов в качестве источника энергии. Аналогичные данные получены и другими авторами, изучавшими влияние селена на морфологию печени [2, 11, 15, 17, 26, 33]. Эта перспективная тема продолжает изучаться и дальше [27]. Влияние препарата Диронакс на рост и развитие птиц мясных пород изучено недостаточно [30, 33].

Выводы. Анализ морфологических параметров печени мясных птиц позволяет нам выделить конкретные этапы постэмбрионального развития. Первый этап начинается в первые дни после вылупления. При этом происходят выраженные изменения обмена веществ, связанного с переходом с эндогенного на экзогенный тип их поступления. Этот этап можно оценить как критический. Второй этап начинается с 15-суточного возраста, продолжается до 30 суток. В это время идёт интенсивное структурное и гистофизиологическое развитие органа. Третий этап начинается с 30-суточного возраста, когда печень достигает дефинитивного уровня развития.

На фоне некачественных кормов, недостаточного поступления природных антиоксидантов в паренхиматозных органах и прежде всего в печени происходит развитие паренхиматозной, жировой, стромально-сосудистой дистрофий. При этом преобладает трансформация компонентов жира и перекисного окисления липидов мембран. Вследствие недостаточной или не-

полной утилизации эндогенных метаболитов начинается аккумуляция естественных для птиц продуктов – липидов, что проявляется выраженными клеточными проявлениями метаболических нарушений. Компенсаторные возможности печени по отношению к воздействию этих факторов снижаются, что приводит к дальнейшему развитию указанных патологических процессов, вплоть до альтеративных и фиброзных изменений.

Проведенные исследования позволили изучить положительное влияние антиоксидантов, входящих в поливитаминную селеносодержащую кормовую добавку (Солвимин Селен), и нового отечественного препарата на основе диизопропиламмония дихлорацетата (Диронакс) на рост и развитие птиц мясных пород (мускусные утки, гуси венгерской белой породы, перепела), морфофункциональное состояние печени, что позволило предложить следующие практические рекомендации. Использование синтетических антиоксидантов позволяет оптимизировать структуру печени в направлении полного использования липидов в качестве энергетического вещества. Это препятствует развитию в органе нарушений клеточных механизмов метаболизма, ведущим к структурным изменениям, и вносит существенные коррективы в установленные закономерности органогенеза печени птиц.

Нами подтверждена высокая биологическая и профилактическая активность препарата Солвимин Селен уже в первый месяц постэмбрионального эмбриогенеза. Диизопропиламмоний дихлорацетат оказывает гепатопротекторное действие, препятствуя развитию жировой дистрофии гепатоцитов и последующих фиброзных изменений стромы печени, но этот эффект наблюдается в более поздние сроки по сравнению с Солвимином Селеном.

Библиографический список

1. Abeera, M. Effect of vitamin E and Selenium as immuno modulators on induced aflatoxicosis in broiler birds / M. Abeera, R. Asif, A.K. Imtiaz, H. Azhar // Pak. J. Life Soc. Sci. 2009. 7 (1), 31–34.
2. Aluwong, T. Effect of yeast probiotic on growth, antioxidant enzyme activities and malondialdehyde concentration of broiler chickens / T. Aluwong, M. Kawu, M. Raji et al. // Antioxidants 2013. 2 (4), 326–339.
3. An, B. Effects of dietary supplementation with detoxified *Rhus verniciflua* sap on egg production, yolk lipid and intestinal microflora in laying hens / B. An, J. Kim, L. Zheng, B. Moon, K. Lee // Asian Australas J. Anim. Sci. 2018. 31 (1): 86.
4. Asok, K. Hepato nephropathology associated with inclusion body hepatitis complicated with citrinin mycotoxicosis in a broiler farm / K. Asok, P. Munusamy, S. Latheef et al. // Veterinary World. 2018. 11: 112–117.
5. Asylbaev, I. Bioaccumulation of Chemical Elements by Old-Aged Pine Trees in the Southern Urals / I. Asylbaev, I. Gabbasova, I. Khabirov et al. // Journal of Engineering and Applied Sciences. 2018. 13: 8746–8751.
6. Attia, Y.A. Effect of oil source and antioxidant supplementations on growth performance and meat quality of Japanese quail males / Y.A. Attia, A.E. Abd-el-Hamid, F.A. Abd-elghany, H.I. Habiba // Proceedings of the EPC 2006 XII European Poultry Conference, Verona, Italy. 2006.
7. Attia, H.F. Protective effect of vitamin E and selenium on the liver, heart and aorta / H.F. At-

tia, M.M. Soliman, T.A. Ismail // *Journal of Veterinary Anatomy*. 2012. 5 (1). 17–29.

8. Bagautdinov, A. Assessment of the Antioxidant Properties of Plant and Chemical Origin Dietary Supplements in the Model Test System / A. Bagautdinov, V. Baymatov, D. Gildikov et al. // *Journal of Engineering and Applied Sciences*. 2018. 13: 6576–6583.

9. Byoung-Ki, A. Effects of dietary supplementation with detoxified *Rhus verniciflua* sap on egg production, yolk lipid and intestinal microflora in laying hens / A. Byoung-Ki, Je-Hun Kim, Lan Zheng et al. // *Asian-Australasian journal of Animal Sciences*, 2018; T. 31, N 1. P. 86–90.

10. Ednes, F.W. Effect of dietary selenium on small intestine villus integrity in reovirus-challenged broilers / F.W. Ednes, J. Read-snyder, A.H. Cantor, A.J. Pescatore, J.L. Pierce // *International Journal Poultry Science*. 2009. 8 (9): 829–835.

11. Ipek, A. The effect of vitamin E and vitamin C on the performance of Japanese quails (*Coturnix coturnix japonica*) reared under heat stress during growth and egg production period / A. Ipek, O. Canbolat, A. Karabulut // *Asian-Australian Journal of Animal Science*. 2007. 20 (2): 252–256.

12. Fletcher OJ (eds.): *Avian Histopathology*. 4th ed. AAAP, Jacksonville, FL. 2016.

13. Hamodi, H.M. Comparative Anatomical, Histological and Histochemical Study of the Liver in Three Species of Birds / H.M. Hamodi, Ali A. Abed, Ameer M. Taha // *Raf. J. Sci.*, 2013. Vol. 24. № 5. PP. 12–23.

14. Holovská, K. Morphological changes in the liver and the response of antioxidant enzymes after turkeys' chronic exposure to cadmium / K. Holovská, A. Sobeková, V. Almajšiová, V. Cigánková // *Polish Journal of Environmental Studies*. 2013. 22 (5): 1371–1379.

15. Jafargolipour, M. Effects of antioxidants consumption and low protein diets on liver and intestine histopathology and performance of Japanese quails (*coturnix coturnix japonica*) / M. Jafargolipour, T. Vahdatpour, H. Mahmoodpour, S. Vahdatpour // *Animal Research International*. 2017. 14 (1): 2683–2690.

16. Gesek, M. Morphological pattern of the livers of different lines of broiler chickens during rearing / M. Gesek, J. Szarek, I. Otrocka-Domagala et al. // *Szynaka Veterinarni Medicina*. 2013. 58, (1): 16–24.

17. Lukaszewicz, E. Effect of dietary selenium and vitamin E on chemical and fatty acids composition of goose meat and liver / E. Lukaszewicz, A. Kowalczyk, A. Jerysz // *Animal science papers and rep. Polish acad. of sciences, Inst. of genetics and animal breeding*. 2016. 34: 181–193.

18. Mariappan, A., Munusamy, P., Latheef, S., Singh, S. and Dhama, K. (2018) Hepato nephropathy associated with inclusion body hepatitis complicated with citrinin mycotoxicosis in a broiler farm. / A. Mariappan, P. Munusamy, S. Latheef et al. // *Vet. World*. 2018. 11 (2): 112.

19. Nasrin, M. Gross and histological studies of digestive tract of broilers during postnatal growth and development / M. Nasrin, M. Siddiqi, M.A. Masum, M.A. Wares // *Journal of Bangladesh Agricultural University*. 2012. 10 (1): 69–77.

20. Osičková, J. Oxidative stress and liver damage in birds exposed to diclofenac and lead / J. Osičková, H. Bandouchová, V. Kováčová, J. Král, L. Novotný et al. // *Acta Veterinaria. Brno*. 2014. 83 (4): 299–304.

21. Paskova, V. Combined exposure of Japanese quails to cyanotoxins, Newcastle virus and lead: oxidative stress responses / V. Paskova, H. Paskerova, J. Pikula et al. *Ecotoxicology and Environmental Safety*. 2011. 74 (7): 2082–2090.

22. Rahal, A. Oxidative stress, prooxidants, and antioxidants: the interplay / A. Rahal, A. Kumar, V. Singh, B. Yadav et al. // *BioMed. Res*. 2014. Int. 19.

23. Rudik, V. The effect of preparations of BioR and butofan on the functional state of the liver and some indicators of productivity in quails for fattening / V. Rudik, V. Hudumak, N. Pavlichenko et al. // *Stiinta Agric*. 2018. № 2: 129–137.

24. Salema, R. Effect of probiotic supplement on aflatoxicosis and gene expression in the liver of broiler chicken / Ramadan Salema, Nagwan El-Habashib, E. Sabreen et al. // *Environmental Toxicology and Pharmacology*. 2018. 60. 118–127.

25. Spurlock, M.E. and Savage, J.E. (1993). Effect of dietary protein and selected antioxidants on fatty liver hemorrhagic syndrome induced in Japanese quail // *Poultry Science*. 1993. 72 (11): 2095–2105.

26. Surai, P.F. Natural antioxidants in poultry nutrition: New developments // *Proceedings of the 16th European Symposium on Poultry Nutrition*, Strasbourg, France, 26–30 August 2007. P. 669–675.

27. Surai, P.F. Selenium in poultry nutrition: From sodium selenite to organic selenium sources (Review) / P.F. Surai, I.I. Kochish, V.I. Fisinin, O.A. Velichko // *Journal of Poultry Science*. 2018. V. 55, Issue 2, 79–93.

28. Vitula, F. *Mycoplasma gallisepticum* infection in the grey partridge *Perdix perdix*: outbreak description, histopathology, biochemistry and antioxidant parameters / F. Vitula, L. Peckova, H. Bandouchova et al. // *BMC Veterinary Research*. 2011. 7 (1): 34.

29. Гришина, Д.Ю. Морфологические и морфометрические показатели печени бройлеров [Текст] / Д.Ю. Гришина, Х. Баймишев // Птицеводство. 2007. № 8. С. 36–37.

30. Губайдуллин, А.С. Влияние гепатопротектора Диронакс на рост и развитие гусей [Текст] / А.С. Губайдуллин, Е.Н. Сковородин, Б.П. Струнин, И.Р. Кильметова // Ветеринария Кубани. 2015. № 5. С. 20–21.

31. Деблик, А.Г. Влияние пробиотиков на морфологию органов иммунитета цыплят [Текст] / А.Г. Деблик, Е.Н. Сковородин // Птица и птицепродукты. 2007. № 1. С. 51–53.

32. Кильметова, И.Р. Гепатозащитные свойства нового препарата диронакс при экспериментальном гепатите [Текст] / Кильметова И.Р., Сковородин Е.Н., Дударев А.А. // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2015. № 2 (34). С. 47–50.

33. Сковородин, Е.Н. Влияние препаратов Солвимин Селен и Селемаг на рост и развитие мускусных уток [Текст] / Е.Н. Сковородин, В.Д. Давлетова, О.В. Дюдьбин // Ветеринария. 2013. № 9. С. 16–20.

34. Тельцов, Л.П. Значение критических фаз в развитии органов [Текст] / Л.П. Тельцов, В.А. Столяров, Е.Н. Сковородин // Морфофункциональный статус млекопитающих и птиц: материалы 3-й научной конференции морфологов. 1995. С. 10–11.

35. Шах-Меликян, Т.А. Фармако-токсикологическая оценка препарата Дипромоний-М [Текст]: автореф. дис. ... канд. ветеринар. наук: 06.02.03 / Т.А. Шах-Меликян. Краснодар, 2012. 18 с.

36. Шишкина, Д.А. Морфология печени гусей китайской серой породы на фоне применения селеноорганического препарата ДАФС-25К [Текст]: автореф. дис. ... канд. вет. наук: 16.00.02 / Д.А. Шишкина. М., 2016. 16 с.

37. Шумилов, И.А. Морфофункциональный анализ застенных пищеварительных желез кур кросса Шейвер-2000 с учетом критических фаз развития [Текст]: автореф. дис. ... канд. ветеринар. наук: 06.02.01 / И.А. Шумилов. Москва, 2018. 23 с.

Сведения об авторах

1. **Сковородин Евгений Николаевич**, доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 228-28-77, e-mail: skovorodinen@mail.ru.

2. **Базекин Георгий Вячеславович**, кандидат биологических наук, доцент, декан факультета биотехнологий и ветеринарной медицины, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 228-28-77, e-mail: george.bazekin@rambler.ru.

3. **Бронникова Гузель Замилевна**, аспирант, кафедра морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 228-28-77, e-mail: bronnikova.g@bashkortostan.ru.

4. **Дюдьбин Олег Вячеславович**, кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 228-28-77, e-mail: d-oleg7@mail.ru.

Цель данного исследования – изучить влияние кормовых добавок, содержащих натуральные антиоксиданты (Е-селен) и синтетический антиоксидант (диизопропиламмония дихлорид). Проведенные комплексные исследования позволили установить положительное влияние антиоксидантов на рост и развитие птиц мясных пород (мускусные утки, гуси венгерской белой породы, перепела), масса тела которых по сравнению с контролем увеличилась на 5–10 %. Применение антиоксидантов предотвращает развитие жировой, вакуольной и паренхиматозной дистрофии, некроз гепатоцитов и эпителиальных клеток желчных протоков, пролиферацию соединительной ткани с последующим ее

фиброзом. Ультроструктурные исследования гепатоцитов птиц контрольной группы выявили нарушения структуры митохондрии и зернистой эндоплазматической сети. Митохондрии подверглись набуханию, полиморфизму, пролиферации и повреждению. Антиоксиданты предотвращают дефрагментацию и ацинарную трансформацию гранулярного эндоплазматического ретикулума, вакуолизацию, появление липидных капель и цитоплазматических миелоноподобных структур. Это исследование показало, что эффективнее применять быстродействующий натуральный поливитаминный антиоксидантный комплекс, содержащий селен, начиная с первых дней постэмбрионального онтогенеза.

MORPHOLOGICAL JUSTIFICATION OF THE USE OF ANTIOXIDANTS FOR GROWING POULTRY

Key words: *geese; ducks; quails; morphology; liver; ultrastructure; hepatocytes; antioxidants; selenium; diisopropylammonium dichloroacetate.*

Authors' personal details

1. **Skovorodin Evgeny**, Doctor of Veterinary Sciences, Professor, head of Department of morphology, pathology, pharmacy and noncontagious diseases, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, phone: +7 (347) 228-28-77, e-mail: skovorodinen@mail.ru.

2. **Bazekin George**, Candidate of Biological Sciences, Dean of faculty of biotechnology and veterinary medicine, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, phone: +7 (347) 228-28-77, e-mail: george.bazekin@rambler.ru.

3. **Bronnikova Guzel**, Post-graduate student, Department of morphology, pathology, pharmacy and noncontagious diseases, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, phone: +7 (347) 228-28-77, e-mail: bronnikova.g@bashkortostan.ru.

4. **Dyudbin Oleg**, Candidate of Veterinary Sciences, senior lecturer, Department of morphology, pathology, pharmacy and noncontagious diseases, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, phone: +7 (347) 228-28-77, e-mail: d-oleg7@mail.ru.

The study objective is to examine the impact of feed supplements, containing natural antioxidants (selenium) and synthetic antioxidant (diisopropylammonium dichloroacetate). The performed studies allowed to determine positive influence of the antioxidants on growth and development of the meat poultry (musky ducks, geese of the Hungarian white breed, quail), whose body mass increased by 5–10 % in comparison with the control parameters. The use of antioxidants prevents from development of fatty, hydropic and parenchymal degeneration, hepatocyte and epithelial cells, necrosis of the bile ducts, connective tissue proliferation with its further

fibrosis. The ultrastructural hepatocytes studies of the control group poultry showed the disorders of the mitochondria structure and granular endoplasmic reticulum. The mitochondria underwent intumescence, polymorphism, proliferation and damage. The antioxidants prevent defragmentation and acinar transformation of the granular endoplasmic reticulum, vacuolization, emerging of lipid drops and cytoplasmic myelin-like structures. This study showed that it is more effective to use a well-digested, fast-acting multivitamin antioxidant complex with selenium immediately after hatching.

© Сковородин Е.Н., Базекин Г.В., Бронникова Г.З., Дюдьбин О.В.

УДК 631.53.01:612.014.464

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-125-131

А.В. Богданов, В.В. Евченко, С.Ю. Попова

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ СНИЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ОЗОНА ДО УРОВНЯ ПДК ПРИ ОБОСНОВАНИИ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН

Ключевые слова: *обработка семян; озono-воздушная смесь; озонирование; генератор озона; режимы обработки, предельно-допустимая концентрация.*

Увеличение объемов продовольственной продукции растениеводства непосредственно

связано с повышением урожайности сельскохозяйственных культур. Повышение урожайности

зависит от многих факторов, в том числе от всхожести семян той или иной сельскохозяйственной культуры. Одним из путей, увеличивающих всхожесть, является предпосевная обработка семян [1–5]. Существуют различные методы предпосевной обработки семян: биологические, химические и физические. Все они оказывают стимулирующее влияние на семена, что приводит к повышению их всхожести, росту и развитию растений, и следовательно, урожайности самих культур [6–10].

Одним из экологически чистых и экономически выгодных направлений является озонирование семян, которое относится к физическим методам предпосевной обработки [11–16]. Но озонирование семян требует обоснования режимов обработки и повышенной безопасности, так как высокие концентрации озона могут нанести ущерб здоровью человека (обслуживающему персоналу) вплоть до получения профессиональных заболеваний.

Для обоснования режимов обработки семян озоном нами разработана соответствующая установка (рисунок 1), на которую получен патент на полезную модель [17]. Установка включает в себя камеру для обработки семян озоном 7, выполненную из герметичного короба с плотно закрывающейся крышкой 4. Внутри установки расположены генератор озона 2 с газопроводом 3, съемные контейнеры 9 для размещения семян, датчик 8, передающий информацию о концентрации газа на блок управления 1. Также имеются устройства 10 и 6 соответственно для выпуска озono-воздушной смеси и впуска воздуха. Устройство впуска воздуха 6 соединено с вентилятором 5 [17, 18].

Работа установки (рисунок 1) начинается с того, что семена в отдельных съемных контейнерах 9 (чашки Петри) располагают в камере для обработки 7 и герметично закрывают крышкой 4. После этого приводится в действие генератор озона 2, и озон направляется через газопровод 3 в камеру для обработки семян 7. При этом устройство 10 выпуска озono-воздушной смеси находится в открытом состоянии, а устройство 6 впуска воздуха – в закрытом. Далее озон вытесняет воздух из камеры обработки 7 в атмосферу через устройство 10. Концентрация озона в камере обработки 7 повышается. С датчика 8, находящегося в камере для обработки 7, передается информация о концентрации озона на блок управления 1. Когда концентрация озона становится равной требуемой величине, устройство 10 выпуска озono-воздушной смеси переводится в закрытое состояние. Семена определенное время подвергаются озонированию. После окончания озонирования продувается камера обра-

ботки 7. При этом включается вентилятор 5, а устройства 10 и 6 для выпуска озono-воздушной смеси и впуска воздуха переводятся в открытые состояния. Когда концентрация озона в камере обработки 7 становится равной предельно допустимой концентрации (ПДК), открывается крышка 4 для извлечения семян [17, 18].

Рисунок 1

Схема установки для озонирования семян: 1 – блок управления; 2 – генератор озона; 3 – газопровод; 4 – крышка; 5 – вентилятор; 6 – устройство впуска воздуха; 7 – камера для обработки; 8 – датчик; 9 – съемные контейнеры; 10 – устройство выпуска озono-воздушной смеси

Обоснование основных параметров установки прежде всего сводится к определению:

- объема камеры для обработки семян, позволяющего проводить исследования в соответствии с ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести» [19];

- времени снижения концентрации озона в камере обработки до уровня ПДК после проведения озонирования семян.

Объем камеры V_k для обработки семян можно рассчитать по ранее полученной нами формуле [18]:

$$V_k = (4 \cdot d_n + 5 \cdot \ell) \cdot (d_n + 2 \cdot \ell) \cdot (h_c + h), \quad (1)$$

где d_n – диаметр чашки Петри, м ($d_n = 0,11$ м); ℓ – расстояние между чашками Петри и расстояние от стенок камеры для обработки семян озоном до чашек Петри, м ($\ell = 0,01$ м); h_c – высота генератора озона, м ($h_c = 0,2$ м); h – запас высоты в камере для обработки семян озоном, м ($h = 0,05$ м).

С учетом численных значений объем камеры V_k , подсчитанный по формуле (1), составит $0,016 \text{ м}^3$ ($V_k = 0,016 \text{ м}^3$).

Найденный объем камеры V_k также важен для определения времени снижения концентрации озона в камере озонирования до уровня ПДК после проведения обработки семян. Дело в том, что обработка семян озоном проводится

при концентрациях, которые существенно выше ПДК. При этом предельно-допустимая концентрация озона составляет 0,1 мг/м³ [20]. В связи с этим для исключения повреждения здоровья обслуживающего персонала поднимать крышку установки с целью извлечения семян после их обработки допускается только при снижении концентрации озона до значения ПДК. Это достигается включением вентилятора установки на определенное время и переводом устройств для выпуска озono-воздушной смеси и впуска воздуха в открытые состояния. При этом подаваемый вентилятором воздух вытеснит озono-воздушную смесь из камеры озонирования за определенное время.

Время снижения концентрации озона до уровня ПДК после проведения озонирования можно определить по выведенной нами теоретической зависимости [18]:

$$t_c = k \cdot \frac{c \cdot V_k}{\Pi_6}, \quad (2)$$

где t_c – время, необходимое для снижения концентрации озона до ПДК после проведения обработки семян, мин; Π_6 – производительность вентилятора, м³/мин; c – концентрация озона при обработке семян, мг/м³; k – коэффициент пропорциональности, учитывающий конструкцию установки, проходные сечения шлангов и вентиля и др., м³/мг.

Для расчета времени t_c по зависимости (2) необходимо знать численные значения концентрации озона, объема камеры озонирования, производительности вентилятора, а также коэффициента пропорциональности k . Коэффициент k можно определить на основе экспериментальных исследований с предлагаемой установкой (рисунок 2).

Рисунок 2

Установка для озонирования семян: 1 – камера для обработки семян; 2 – съемные контейнеры; 3 – газоанализатор озона «Сигнал-4Э»; 4 – вентиль выпуска озono-воздушной смеси; 5 – вентиль впуска воздуха

Для определения времени снижения концентрации озона до уровня ПДК в камере для обработки семян эксперименты проводились следующим образом. При герметично закрытой крышке включался генератор озона типа GL-3188, расположенный в тыльной части установки для озонирования семян. После достижения заданной концентрации озона генератор отключался. Открывались вентили впуска воздуха и выпуска озono-воздушной смеси, включался вентилятор и с помощью секундомера механического СОПпр-2а-3 регистрировалось время

снижения концентрации озона до уровня ПДК. Концентрация озона в камере для обработки семян фиксировалась с помощью газоанализатора озона «Сигнал-4Э».

Экспериментальные исследования по определению времени снижения концентрации озона до уровня ПДК в камере для обработки семян проводились при концентрациях озона 9 мг/м³, 6 мг/м³ и 3 мг/м³, используемых при исследованиях, с четырехкратной повторностью. Средние значения результатов экспериментов представлены в таблице 1.

Таблица 1 Время снижения концентрации озона до уровня ПДК в камере для обработки семян при концентрациях озона 9 мг/м³, 6 мг/м³ и 3 мг/м³

Концентрация озона c , мг/м ³	9	6	3
Время снижения концентрации озона до уровня ПДК после проведения озонирования в камере для обработки семян t_c , мин	1,38	1,14	0,57

Как видно из таблицы 1, время снижения концентрации до уровня ПДК зависит от концентрации озона в камере для обработки семян. По данным таблицы 1 с помощью системы MS Excel был построен график зависимости времени снижения концентрации озона до уровня ПДК в камере для обработки семян (рисунок 3). Для большей наглядности при построении графика также использовалась точка, соответствующая концентрации озона $c = 0$ мг/м³ (при от-

сутствии озона в камере для обработки семян). При этом время снижения концентрации озона было принято равным нулю.

Рисунок 3 показывает, что с повышением концентрации озона в камере для обработки семян время t_c увеличивается. Причем наблюдается линейная зависимость, подчиняющаяся уравнению регрессии:

$$t_c = 0,157 \cdot c + 0,066. \quad (3)$$

Рисунок 3
Время снижения концентрации озона до уровня ПДК в камере для обработки семян

На основании полученных результатов можно определить коэффициент пропорциональности k , который найдется из формулы (2):

$$k = \frac{t_c \cdot \Pi_6}{c \cdot V_k}. \quad (4)$$

Решая совместно уравнение (3) и равенство (4) при концентрациях озона 9 мг/м³, 6 мг/м³ и 3 мг/м³, получим среднее значение коэффициента пропорциональности k при производительности вентилятора $\Pi_6 = 32,5$ м³/мин и объеме камеры для обработки семян озоном $V_k = 0,016$ м³. При этом величина коэффициента пропорциональности k составляет 346,4 м³/мг ($k = 346,4$ м³/мг).

Полученное значение коэффициента пропорциональности k позволяет сравнить теоретическую (2) и экспериментальную (3) зависимости (рисунок 4).

Как видно из рисунка 4, теоретическая и экспериментальная прямые имеют небольшие расхождения (не более 6 %) в диапазоне концентраций озона (от 3 мг/м³ до 9 мг/м³), используемых при исследованиях. Поэтому предложенную теоретическую зависимость (3) можно применять для расчета времени снижения концентрации озона до уровня ПДК в камере для обработки семян.

Рисунок 4
Время снижения концентрации озона до уровня ПДК в камере для обработки семян (по теоретической и экспериментальной зависимостям)

Нужно отметить, что рассчитанное по формуле (2) время t_c уже использовалось при проведении экспериментов для обоснования режимов озонирования семян кабачка [21].

Обоснование режимов озонирования посредством рассматриваемой установки необхо-

димо для предпосевной обработки различных семян на промышленных устройствах. Обработка семян при обоснованных режимах озонирования позволит повысить их всхожесть и урожайность сельскохозяйственных культур.

Библиографический список

1. Огнев, В.Н. Применение экологически безопасных способов предпосевной обработки семян для защиты ярового ячменя против корневых гнилей [Текст] / В.Н. Огнев // Научный потенциал – аграрному производству: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (26–29 февр. 2008 г.) / ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА. Ижевск: Ижевская ГСХА, 2008. Т. 1. С. 172–176.
2. Оленюк, А.А. Анализ методов повышения урожайности культурных растений [Электронный ресурс] / А.А. Оленюк, Л.Н. Михайлова, А.Н. Мороз. Режим доступа: http://old.khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_129/48.pdf (дата обращения: 11.12.2019).
3. Пат. 2248111 РФ МПК⁷ A01C 1/00. Способ обработки семян сельскохозяйственных культур [Текст] / Д.А. Нормов, С.В. Оськин, А.А. Шевченко, Е.А. Сапунова; заявитель и патентообладатель Кубанский Государственный аграрный университет. № 2003123158; заявл. 22.07.2003; опубл. 20.03.2005. Бюл. № 8.
4. Савельев, В.А. Предпосевная обработка семян зерновых культур [Текст]: монография / В.А. Савельев. Саратов: Вузовское образование, 2014. 197 с.
5. Старухин, Р.С. Метод предпосевной обработки семян с использованием эллиптического электромагнитного поля [Текст] / Р.С. Старухин, И.В. Белицын, О.И. Хомутов // Ползуновский вестник. 2009. № 4. С. 97–103.
6. Влияние лазерной обработки на семена яровой пшеницы [Электронный ресурс] / О.Г. Долговых, В.В. Красильников, Р.Р. Газдинов // Инженерный вестник Дона: электрон. науч. журн. Режим доступа: <http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1422> (дата обращения: 11.12.2019).
7. Володин, В.И. Стимуляция прорастания семян с помощью ультразвука и гиббереллина [Текст]: автореф. дис. ... канд. биол. наук / В.И. Володин. Л., 1963.
8. Высоцкая, Е.А. Анализ технологических приемов и технических средств предпосевной обработки семян биопрепаратами [Текст] / Е.А. Высоцкая, М.А. Крекотень // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2015. № 4 (47). Ч. 2. С. 100–104.
9. Как помочь семенам расти [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.activestudy.info/kak-pomoch-semenam-rasti> (дата обращения: 11.12.2019).
10. Евченко, В.В. Анализ методов предпосевной обработки семян [Текст] / В.В. Евченко // Сервис технических систем – основы безопасного функционирования машин и оборудования предприятий АПК. Материалы международной научно-практической конференции Института агроинженерии. Челябинск: Южноуральский ГАУ, 2018. С. 333–338.
11. Богданов, А.В. Теоретические предпосылки к изучению вопроса озонирования семян [Текст] / А.В. Богданов, Е.Е. Евченко // Молочнохозяйственный вестник. 2018. № 1 (29). С. 8–16.
12. Авдеева, В.Н. Обработка семян пшеницы озоном с целью повышения их посевных качеств [Текст] / В.Н. Авдеева, Ю.А. Безгина // Sworld: сб. науч. тр. 2015. Т. 17. № 2. С. 25–29.
13. Горский, И.В. Обработка семян пшеницы озонированным воздухом [Текст]: дис. ... канд. техн. наук / И.В. Горский. М., 2004.
14. Дубцова, А.А. Особенности проявления ростовых процессов семян льна после озонирования [Текст] / А.А. Дубцова // Научные и инновационные разработки молодых ученых-агроэков. 2015. С. 68–72.
15. Нормов, Д.А. Применение озона для предпосевной обработки семян [Текст] / Д.А. Нормов, Е.А. Федоренко // Сахарная свёкла. 2009. № 1. С. 17–24.
16. Шевченко, А.А. Параметры электроозонирования для предпосевной обработки семян кукурузы [Текст]: автореф. дис. ... канд. техн. наук / А.А. Шевченко. Краснодар, 2005.
17. Пат. 186528 РФ МПК⁷ A01C 1/00. Установка для озонирования семян [Текст] / А.В. Богданов, В.В. Евченко, В.В. Колягин, С.Ю. Попова; заявитель и патентообладатель Южно-Уральский государственный аграрный университет. № 2018127950, заявл. 30.07.2018; опубл. 23.01.2019, бюл. № 3.
18. Богданов, А.В. Обоснование установки озонирования семян для определения рациональных режимов их обработки и повышения безопасности обслуживающего персонала [Текст] / А.В. Богданов, В.В. Евченко, С.Ю. Попова // АПК России. 2019. Т. 26. № 4. С. 500–504.

19. ГОСТ 12038-84. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести [Текст].

20. ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны [Текст].

21. Bogdanov A.V., Evchenko V.V., Popova S.Yu. Experimental studies on vegetable marrow seeds ozonation using laboratory equipment: E3S Web of Conferences (international Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment, ICMTMTE 2019; Sevastopol), volume 126, 00002, 30 October 2019.

Сведения об авторах

1. **Богданов Андрей Владимирович**, доктор технических наук, доцент, профессор кафедры технического сервиса машин, оборудования и безопасности жизнедеятельности, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет», 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 75, тел.: +7 (351) 265-56-08, e-mail: bav-64@mail.ru.

2. **Евченко Виктория Вадимовна**, аспирант кафедры технического сервиса машин, оборудования и безопасности жизнедеятельности, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет», 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 75, тел.: +7 (351) 265-56-08, e-mail: vikylya1992-11@mail.ru.

3. **Попова Светлана Юрьевна**, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры технического сервиса машин, оборудования и безопасности жизнедеятельности, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет», 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 75, тел.: +7 (351) 265-56-08, e-mail: vetochka.79@mail.ru.

Увеличение объемов продовольственной продукции растениеводства непосредственно связано с повышением урожайности сельскохозяйственных культур. Повышение урожайности зависит от многих факторов, в том числе от всхожести семян той или иной сельскохозяйственной культуры. Одним из путей, увеличивающих всхожесть, является предпосевная обработка семян. Экологически чистым и экономически выгодным направлением считается озонирование семян, которое относится к физическим методам предпосевной обработки. Но озонирование семян требует обоснования режимов обработки и повышенной безопасности, так как высокие концентрации озона могут нанести ущерб здоровью человека. Для обоснования режимов обработки семян озоном авторами статьи разработана соответствующая установка, на которую получен патент на полезную модель. В статье приводятся схема и принцип работы установки. Экспериментальным путем определено время снижения кон-

центрации озона в камере озонирования до уровня ПДК при нагнетании воздуха посредством вентилятора. Получены соответствующие уравнения регрессии и найден коэффициент пропорциональности для ранее полученной теоретической зависимости. Это позволяет рассчитывать время снижения концентрации до уровня ПДК в зависимости от начальной концентрации озона в камере обработки семян предлагаемой установки, объема самой камеры и производительности вентилятора. Зная величину времени снижения концентрации озона до уровня ПДК, можно безопасно проводить экспериментальные исследования по обоснованию режимов озонирования семян различных сельскохозяйственных культур. Рассчитанное время снижения концентрации уже использовалось при проведении экспериментов для обоснования режимов озонирования семян кабачка. При этом эксперименты были проведены без нанесения ущерба здоровью обслуживающему персоналу.

A. Bogdanov, V. Evchenko, S. Popova

TIMING THE REDUCTION OF THE OZONE CONCENTRATION TO MAC LEVEL WHEN PROVIDING A RATIONALE FOR THE PARAMETERS OF THE PRESOWING SEED TREATMENT MACHINE

Key words: seed treatment; ozone-air mixture; ozonation; ozone generator; treatment modes, maximum allowable concentration (MAC).

Authors' personal details

1. **Bogdanov Andrey**, Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Technical Maintenance, of Machinery, Equipment and Life Safety, South Ural State Agrarian University, 454080, Chelyabinsk, prospect Lenina, 75, phone: +7 (351) 265-56-08, e-mail: bav-64@mail.ru.

2. **Evchenko Victoria**, Post-graduate student of the Department of Technical Maintenance, of Machinery, Equipment and Life Safety, South Ural State Agrarian University, 454080, Chelyabinsk, prospect Lenina, 75, phone: +7 (351) 265-56-08, e-mail: vikylya1992-11@mail.ru.

3. **Popova Svetlana**, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Technical Maintenance, of Machinery, Equipment and Life Safety, South Ural State Agrarian University, 454080, Chelyabinsk, prospect Lenina, 75, phone: +7 (351) 265-56-08, e-mail: vetochka.79@mail.ru.

The increase in crop food production is directly related to the increase in crop yields. Higher yields depend on many factors, including seed germination of a specific crop. Pre-sowing seed treatment is one of the ways to increase seed germination. Ozone treatment of seeds is an environmentally friendly and cost-effective technique. The method belongs to the physical methods of pre-sowing treatment. Ozone treatment of seeds requires a rationale for the treatment modes and safety provisions. To provide the rationale a machine for the ozone treatment of seeds was developed. The machine is patented as a utility model. The paper provides a description of the machine design and operation. The experiment has resulted in timing the reduction of the ozone

concentration in the ozone treatment chamber to the MAC level when air is forced by the fan. The corresponding regression equations were deduced and the proportionality coefficient for the previously obtained theoretical dependence was found. They help time the reduction of the ozone concentration to the MAC level depending on the initial concentration of ozone in the seed treatment chamber, the chamber capacity, and the fan performance. With the right timing, experimental studies on justifying ozone treatment modes in various crops can be safely conducted. The timing was successfully used to justify an ozone treatment mode for marrow squash seeds. The experiment was conducted without damage to the personnel's health.

© Богданов А.В., Евченко В.В., Попова С.Ю.

УДК 628.1, 663.63

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-53-1-131-141

А.И. Егоров, Д.П. Юхин

ОЦЕНКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ, ПОСРЕДСТВОМ УЧАСТИЯ БАРОМЕМБРАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В УДАЛЕНИИ КРЕМНИЯ И БОРА

Ключевые слова: *очистка воды; водоподготовка; природная вода; соли; кремний; бор; обескремнивание; обесборивание; баромембранный метод; обратный осмос; деминерализация; обессоливание; питьевая вода; здоровье человека; коррозионность; агрессивность; нестабильность воды; стабилизационная обработка; минерализация воды; индекс карбонатного насыщения (Ланжелье); модельные организмы; контроль качества воды.*

Введение. Вода – это основа жизни на Земле и незаменимый энергетический ресурс для огромного количества технологий во всех отраслях промышленности. Общий объем ресурсов пресных вод Российской Федерации оценивается в 7770,6 км³, который постоянно сокращается.

«Доступ к безопасной воде – универсальная необходимость... и основное право человека», – задекларировала директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гру Харлем Брунтланн в речи, посвященной Международному водному дню 22 марта 2001 г., сфокусировав внимание на актуальности этой проблемы. В течение последних 50 лет ВОЗ занимается каче-

ством питьевой воды и его влиянием на здоровье людей. Одна из основных целей ВОЗ и ее членов состоит в обеспечении соблюдения права человека на доступ к питьевой воде: «Все люди независимо от стадии развития и социальных, классовых или экономических условий имеют право на источник безопасной питьевой воды». Основная функция ВОЗ в достижении этой цели – «предлагать нормы и давать рекомендации в отношении международных вопросов влияния качества воды на здоровье» [1].

В результате антропогенного влияния на окружающую среду с появлением новых отраслей промышленности и современных технологий, совершенствования существующих техно-

логических процессов в настоящее время возрастают и требования к уровню подготовки воды, используемой различными потребителями по назначению.

Для технологических процессов некоторых промышленных предприятий требования к качеству воды еще более «жесткие», чем к воде, используемой в питьевых целях. В частности, глубоко обессоленная вода широко используется предприятиями электронной и радиотехнической промышленности (для промывки некоторых видов продукции) и прочими [2].

Водоносные горизонты в большинстве случаев характеризуются повышенным содержанием железа, йода, брома, марганца, стронция и других нормируемых микроэлементов, однако существующая «стандартная» обработка подземных вод ограничивается, как правило, обеззараживанием, а иногда обезжелезиванием и деманганацией. Одной из важных причин, ограничивающих широкое использование «подземных» пресных вод является наличие в них кремния и бора. Около 60–65 % добываемого природного водного ресурса из подземных источников приходится на кремниевые и борсодержащие воды. На значительной части территории Российской Федерации (Сибирь, Дальний Восток, Кавказ и другие регионы) содержание кремния и бора в природных водах превышает установленные гигиеническими нормативами требования по ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и ГН 2.1.5.2280-07 «Дополнения к изменению в ГН 2.1.5.1315-03» более 10 мг/дм³ (по кремнию) и более 0,5 мг/дм³ (по бору), что автоматически делает их непригодными для употребления в питьевых целях по СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества (Минздрав России)», указывая на их комплексную дополнительную очистку.

Мировой практикой давно доказано, что кремний является для человека незаменимым микроэлементом. Его можно обнаружить в крови, мышечной и костной тканях. По сути, он является строительным материалом, необходимым для образования и роста соединительной ткани человеческого организма (суставов, костей, кожи и т. д.). Также он помогает усвоению поступивших в организм минеральных элементов, способствует улучшению обмена веществ и транспортировке электрических сигналов по нервным волокнам.

Кремний попадает в организм человека вместе с потребленной пищей и водой, причем дан-

ный элемент наиболее продуктивно усваивается из состава жидкости (т. е. водной части).

Зарубежными руководящими документами (директивой ВОЗ, USEPA, ЕС), например, содержание кремния в питьевой воде не нормируется. Это вызвано отсутствием данных о токсичности этого элемента и его негативном влиянии на организм человека. Кремний (Si^{4+}) по существу не является ядом в случае перорального приема. Порог токсичности, который может вызвать летальный исход для организма человека (по кремнию), составляет 500 мг/день.

Кремний и бор широко распространены в природе, а системы водоподготовки, снижающие их концентрацию в воде, обладают зачастую высокой первоначальной стоимостью и являются затратными в обслуживании. Исходя из этого, потребность в глубокой очистке воды от кремния и бора в частном жилом секторе, где соблюдение норматива контролируется водопользователем в основном в индивидуальном порядке, зачастую отсутствует. Однако в процессе водоподготовки для промышленного сектора, организаций массового производства воды (в том числе коммерческого и технологического характера) соблюдение нормативного показателя по кремнию и бору является категорически обязательным требованием к качеству.

Для технических вод промышленного производства показатель, например, кремний нормируется отдельными руководящими документами. В первую очередь это относится к воде, используемой в производстве пищевых продуктов (алкогольных и безалкогольных напитков). Также норматив по содержанию кремния введен для питательной воды паросиловых котлов, так как кремний может являться источником образования силикатных отложений.

В случае превышения установленных нормативов в большинстве ситуаций возникает совершенно непростая задача очистки воды от кремния и бора при максимальном сохранении естественных минеральных компонентов (ингредиентов), «зарожденных» в природной воде.

Условия, материалы и методы исследования. Обескремнивание воды в сфере водоснабжения достигается известными методами [3]:

- осаждением известью;
- сорбцией гидроксидами железа, алюминия, оксидом или гидроксидом магния;
- фильтрованием через магнезиальный сорбент;
- фильтрованием через активный оксид алюминия и бокситы (с регенерацией загрузки 0,1 % раствором едкого натрия);
- обработкой воды перманганатом калия в слабощелочной среде, с коагулированием полиоксихлоридом алюминия марки «Аква-Аурат»;

- электрокоагулированием (на практике не нашел аудиторию для широкого применения);
- ионным обменом;
- мембранным разделением (обратным осмосом).

Выбор метода обескремнивания (удаления «силикатов») подземной природной воды с последующим использованием в питьевых целях зависит от требований, предъявляемых к концентрации кремниевых соединений в воде, определенного физико-химического состава, производительности установки, глубины очистки, выделенной площади под строительство, местных условий эксплуатации, с учетом потребности в регенерации или полной замене «очистного» материала, утилизации промывных вод, отработанных регенерационных растворов и осадков.

Обесборивание воды в сфере водоснабжения достигается известными методами, ориентированными на извлечение «бора» в основном из концентрированных рассолов:

- экстракцией;
- соосаждением и осаждением;
- электродиализом;
- ионным обменом;
- мембранным разделением (обратным осмосом).

Максимальная степень удаления (обессоливания, деминерализации) растворенных компонентов из воды обеспечивается обратноосмотическими мембранами высокого давления.

Рассмотрим подробнее в качестве доочистки питьевой воды очень современный на сегодняшний день и часто применяемый метод мембранного разделения («обратного осмоса»).

Обратный осмос (от греч. *osmos* «толчок, давление») – процесс глубокого извлечения растворенных веществ из воды мембранным методом с размерами частиц загрязнений 0,001–0,0001 мкм. Обратный осмос (размеры пор 1–15 Ангстрем, рабочее давление 0,5–8,0 МПа) применяется для деминерализации воды и задерживает практически все ионы на 92–99 %, а при двухступенчатой системе – до 99,9 %. Радиус молекулы воды составляет 1,36 Ангстрем.

Принцип действия основан на прохождении потока воды под давлением через полупроницаемые селективные мембраны. В результате этого поток воды разделяется на два направления: одна часть воды (чистый продукт (фильтрат) – «permeate») практически полностью обессоливается и поступает на целевое использование, а другая часть, содержащая соли (рассол, ретентат – «concentrate»), отводится в канализацию. Таким образом, в мембранном процессе, в отличие от фильтрации, происходит раз-

деление исходного потока смеси на два направления – очищенный пермеат и задержанный мембраной концентрат (т. е. узел мембранной фильтрации имеет один вход и два выхода, где часть воды постоянно расходуется на очистку мембраны).

Способность полупроницаемых мембран задерживать ионы растворенных веществ совпадает с рядом увеличения их энергии гидратации: $H^+ < NO_3^- < J^- < Br^- < Cl^- < K^+ < F^- < Na^+ < SO_4^{2-} < Ba^{2+} < Ca^{2+} < Mg^{2+} < Cd^{2+} < Zn^{2+} < Al^{3+} < Fe^{3+}$.

Лучше всех задерживаются (труднее проходят или вовсе не проникают через поры полупроницаемой мембраны) многовалентные ионы [4].

Научной теорией и производственной практической деятельностью подтверждены существенные недостатки «обратноосмотического» метода подготовки питьевой воды:

- отсутствие минералов в воде (высокая очистная способность) – глубокое обессоливание. Ухудшение органолептических (вкусовых) свойств воды;
- высокие требования к качеству воды перед подачей на установку «обратного осмоса» (определенные условия применения обратного осмоса [4]);
- неспособность в очистке воды от летучих веществ органического происхождения и остаточного хлора (размер данных микроэлементов меньше молекулы воды, поэтому наблюдается их проскакивание сквозь поры мембран);
- образование труднорастворимого осадка в теле мембраны (вероятен риск кальматации, закупоривания, относительного сдвига слоев рулона (так называемого эффекта «телескопинга»));
- большая «габаритность» общей установочной системы;
- высокая начальная стоимость и последующие эксплуатационные затраты;
- применение не дешевых малораспространенных реагентов для регенерации и определенные трудности с утилизацией регенерационных вод;
- недостаточно высокая производительность готовой продукции по «пермеату» (фильтрату);
- высокие потери ввиду особого принципа действия установки (систематический сброс промывной воды в канализацию). Образуется большой объем «концентрата» (20–25 % от всего объема поступающей на очистку воды);
- непрерывный режим работы установки (т. е. некоторые сложности при проведении ТО/ТР ввиду ограничения во временной остановке процесса);

- высокая чувствительность мембран к окислителям (хлору и озону), pH^+ и $T, ^\circ\text{C}$ воды;
- высокая чувствительность мембран к высушиванию и ошибкам персонала при консервации;
- непродолжительный срок службы мембранных элементов (особенно в случае серьезных нарушений эксплуатационных требований завода-изготовителя и условий их консервации).

Вода после глубокой обратноосмотической очистки, пройдя полупроницаемую мембрану аппарата, освобождается от растворенных солей (жизненно важных микро- и макроэлементов).

Специалистам в области водоподготовки должно быть хорошо известно, что качество питьевой воды непосредственно зависит от водисточника, эффективности барьерной функции водоочистной станции, технического и санитарного состояния транспортной системы.

Рисунок 1

Визуализация фильтрующей способности в зависимости от выбранного метода очистки воды

Медико-экологические аспекты питьевого водоснабжения. Результаты широкого круга целенаправленных научных исследований, проводимых во многих странах мира, позволяют говорить о сформировавшейся глобальной проблеме дефицита качественной воды, отражающегося на состоянии здоровья населения в связи с использованием некондиционных (обедненных солями) питьевых вод поверхностных и подземных источников. Серьезность ситуации заставила Генеральную Ассамблею ООН объявить 2005–2015 гг. Международным десятилетием действий «Вода для жизни».

Всем известно, что весь перечень нормируемых вредных химических веществ построен по принципу «не более» и еще не учитывает последствий использования вод, отличающихся «дефицитом» содержания ряда природных элементов. В то же время материалы ВОЗ отмечают

связь между возросшим количеством сердечно-сосудистых заболеваний с последующим летальным исходом и потреблением мягкой воды (бедной кальцием и магнием, посредством воздействия, например, баромембранной технологии («обратного осмоса») в удалении кремния и бора). Установлено, что ее потребление может привести к повышенному риску переломов, нейродегенеративным изменениям и некоторым видам рака. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 25–30 % выше среди людей, употребляющих для питья мягкую воду, содержащую менее 75 миллиграммов кальция и магния в одном литре воды. Еще в середине 1970-х годов Национальным исследовательским экологическим центром (г. Цинциннати) на основе данных, относящихся к 135 городам США, была показана отчетливая тенденция к уменьшению общего числа сердечно-сосудистых заболеваний по

мере роста жесткости потребляемой питьевой воды. Эти исследования, проводимые на «модельных организмах», касаются изучения влияния состава подземных вод на развитие гипертонии и атеросклеротического процесса. Изучение длительного действия питьевых вод с различным уровнем Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Pb^{4+} , Cd^{2+} позволило выявить доминирующую роль Cd^{2+} в формировании устойчивых гипертонических тенденций при сочетании его с повышенным содержанием Ca^{2+} и Mg^{2+} . Обратное соотношение концентрации взятых элементов приводило к тенденции понижения кровяного давления. Роль остальных элементов оказалась малозначимой. В то же время значительное снижение содержания Ca^{2+} в питьевой воде с повышенным содержанием Na^+ приводило к повышению кровяного давления по сравнению с тем, где количество кальция было на обычном уровне. Эти опыты явились основанием для суждений о защитной роли Ca^{2+} питьевых вод по отношению к гипертоническому воздействию других элементов (Na^+ , Cd^{2+}). Кроме того, было показано, что потребление мягких вод, содержащих Cd^{2+} и Pb^{4+} , способствовало развитию атеросклероза и повышению содержания холестерина в плазме крови. Присутствие в водах Ca^{2+} в количестве 100 мг/дм³ оказывало защитное («протекторное») действие по отношению к Cd^{2+} и Pb^{4+} , вызывающим атеросклеротические эффекты. Потребление только кальцинированных вод ($\text{Ca}^{2+} = 100$ мг/дм³), не содержащих иных ценных элементов, нарушало обмен липопротеинов и приводило к появлению атеросклеротических бляшек в аорте «модельных организмов» [5].

Возможные риски и последствия для здоровья и жизни человека, возникающие при употреблении деминерализованной или слабодеминерализованной воды в питьевых целях. В докладе Франтишека Козишека (Национальный институт общественного здоровья Республика Чехия) «Последствия для здоровья, возникающие при употреблении деминерализованной питьевой воды», представленном на встрече экспертов ВОЗ в 2003 году, говорится: искусственно обработанная деминерализованная вода, которую изначально получали методом дистилляции, а затем методом обратного осмоса, должна использоваться исключительно для промышленных, технических, лабораторных и иных целей [6] (т. е. не пищевых, не питьевых).

Немецкое Общество Питания пришло к подобным выводам и рекомендовало воздержаться от употребления дистиллированной воды. Общество в своем докладе поясняет, что жидкости человеческого организма всегда содержат элек-

тролиты (калий и натрий), концентрация которых находится под контролем самого организма. Всасывание воды эпителием кишечника происходит при участии ионов натрия. Если человек выпивает деминерализованную воду, кишечник вынужден «добавлять» ионы Na^+ к этой воде (т. е. возникают безвозвратные потери), извлекая их из организма и повышая дефицит полезных компонентов. Жидкость никогда не выделяется из организма в виде чистой воды, параллельно человек теряет и электролиты, поэтому необходимо пополнять их запас, употребляя пищу и качественную воду.

В процессе приготовления пищи на мягкой воде, прошедшей глубокий уровень очистки после установки «обратного осмоса», из продуктов (овощи, мясо, злаки) до 60 % теряются важные и полезные элементы.

Изначально было понятно, что «осмотически обработанная» вода является непригодной для потребления в пищу без дополнительного комплексного обогащения минеральными веществами, так как:

- деминерализованная вода имеет «бедные» и неприятные вкусовые характеристики;
- деминерализованная вода не является безопасной и полезной для здоровья и жизни;
- деминерализованная вода очень агрессивна и нестабильна, ее необходимо нейтрализовать, в противном случае подача ее в распределительную сеть будет сопровождаться негативными последствиями.

Утверждение о полезности «дистиллята» американскими учёными может быть принято только в случае кратковременного употребления в пищу такой воды и в малых количествах. Употребление дистиллированной воды плохо влияет на внутренние биохимические процессы организма человека. В частности, нарушается солевой баланс, выполняющий важнейшую функцию среди других обменных процессов биологического организма.

Солевой баланс отвечает за правильное сочетание количества и качества солей в физиологических и анатомических структурах человека. Нарушение этого баланса в большую сторону приводит к отложению солей, а в меньшую – к истончению тканей и, как следствие, к неправильной их работе.

Истончение костной ткани из-за нехватки солей делает кости хрупкими, и далее возможен целый спектр заболеваний, связанный с изменениями организма человека. Истончение хрящевой ткани делает хрящ менее эластичным, что в свою очередь приводит к истиранию его стенок и очень болезненным последующим заболеваниям.

Описывая другие симптомы, возникающие вследствие нехватки минералов в организме человека, можно перечислить ряд серьёзных расстройств:

- дефицит магния в организме вызывает прерывистое сердцебиение, мышечные судороги, гормональный дисбаланс, пародонтоз, повышенное кровяное давление;

- дефицит железа в организме вызывает анемию и синдром повышенной усталости;

- дефицит меди в организме вызывает дисфункцию щитовидной железы, ухудшение пищеварения, быстрое возникновение гематом. Поскольку большинство ферментов в почках являются зависимыми от меди, то его недостаток вызывает неправильную работу печени;

- дефицит цинка в организме вызывает анорексию, кожные расстройства, снижает либидо и ухудшает «вкусно-обонятельный» процесс;

- дефицит йода в организме вызывает сгущение желчи в желчном пузыре и дисфункции щитовидной железы;

- дефицит минеральных веществ (в том числе, фтор) в питьевой воде негативно сказывается на состоянии зубной эмали и т. д.

Как мы видим, минеральные микроэлементы, необходимые для сбалансированного обмена веществ, невозможно на 100 % восполнить биологическими добавками или какой-либо пищей, поскольку данные соли находятся в соединении с молекулами воды, которые обеспечивают доставку микроэлементов через мембраны тканей органов человека.

Если «обратноосмотическую» воду после воздействия мембранного метода пытаться минерализовать, т. е. обогатить полезными микроэлементами, которые прошли через поры полупроницаемой мембраны, то придется выполнять малоэффективные и практически непрерывные действия:

- во-первых, это двойная работа восполнения отнятого (т. е. натурального содержимого природного происхождения);

- во-вторых, минерализация «обратноосмотической» воды не обеспечивает в нужной мере гармоничного сочетания микроэлементов в водном соединении (имеет сниженный полезный эффект).

Представляется рациональным использовать системы очистки воды, которые позволяют минимизировать комплекс мер по восстановлению качества продукта. Всегда удобнее пользоваться продуктом, который не отнимает лишнего времени, обеспечивает надёжный и полезный результат.

На одной из рабочих встреч по подготовке руководства по качеству питьевой воды ВОЗ

рассмотрела вопрос о том, каким должен быть оптимальный минеральный состав деминерализованной воды. Эксперты сделали акцент на возможных неблагоприятных последствиях употребления воды, из которой удален ряд веществ, всегда присутствующих в натуральной питьевой воде. В конце 70-х годов ВОЗ стала спонсором исследований, которые могли бы дать основополагающую информацию для выпуска руководства по качеству обессоленной воды. Исследование проводилось группой ученых из Института общественного здоровья имени А.Н. Сытина и Академией Медицинских Наук СССР под руководством профессора Сидоренко и доктора медицинских наук Рахманина. В 1980 году был опубликован итоговый отчет в виде внутреннего рабочего документа. Он содержал следующий вывод: «Деминерализованная (обессоленная) вода имеет не только неудовлетворительные органолептические показатели, но и оказывает неблагоприятное влияние на организм человека и животных».

В рамках Отчета ВОЗ 1980 года было отмечено: «Употребление питьевой воды с низкой минерализацией способствует вымыванию солей из организма. Изменения водно-солевого баланса в организме человека были отмечены не только при употреблении деминерализованной воды, но и воды со слабой минерализацией от 50 до 75 мг/дм³».

После аналитической оценки гигиенических, органолептических свойств и иной информации ученые выдали полезные рекомендации по составу «обратноосмотической» воды:

- минерализация: 200–400 мг/дм³ (для хлоридно-сульфатных вод);

- минерализация: 250–500 мг/дм³ (для гидрокарбонатных вод).

Основываясь на доступных и достоверных данных, ученые-исследователи рекомендовали следующие концентрации кальция, магния и величину жесткости воды для питьевых целей:

- для магния: минимум 10 мг/дм³, оптимальное содержание 20–30 мг/дм³;

- для кальция: минимум 20 мг/дм³, оптимальное содержание около 50 (в диапазоне от 40 до 80) мг/дм³;

- для общей жесткости (суммарное содержание солей кальция и магния): 2–4 ммоль/дм³.

Рекомендации ученых-исследователей были основаны на экспериментальных данных, участие в которых принимали «модельные организмы» (крысы, собаки) и непосредственно «люди-добровольцы».

В процессе эксперимента учеными были изучены многие показатели: динамика массы

тела, метаболизм (основной и азота), ферментная активность, водно-солевой обмен и его регуляторная функция, содержание минеральных веществ в тканях и жидкостях организма, гематокритное число и активность антидиуретического гормона.

Институт медицины Национальной Академии наук США рекомендует суммарную дозу потребления фтора (из всех пищевых источников) 0,05 мг/кг массы тела человека, аргументируя это тем, что прием такого количества фтора (F^-) минимизирует риск заболевания кариесом, не провоцируя иных побочных отрицательных эффектов (например, флюороза). Необходимо еще учитывать местные климатические условия, в которых потребляется вода, обогащенная F^- .

За последние три десятилетия деминерализация получила широкое распространение как метод обеспечения «питьевой» водой и массового ее потребления. В мире существует свыше 11 тысяч предприятий, выпускающих деминерализованную и слабодеминерализованную воду. Суммарный выпуск готовой продукции оценивается в 6 миллиардов галлонов (22,7 млрд литров) воды в день. В некоторых регионах, таких как Средневосточная и Западная Азия, этим способом производится более половины всей питьевой воды. Как правило, деминерализованная вода подвергается дальнейшей обработке: в нее добавляют различные соли, перемешивают («купажируют») с малыми объемами сильноминерализованной воды для улучшения вкусовых характеристик и придания некоторых полезных свойств и уменьшения агрессивности по отношению к распределительным сетям и сантехническому оборудованию. Тем не менее, деминерализованные воды могут сильно различаться по своему составу, например, по минимальному содержанию минеральных солей.

Потенциальная возможность негативного воздействия деминерализованной воды на здоровье человека заинтересовала не только страны, в которых остро ощущается нехватка питьевой воды, но и те локации, где наиболее «популярны» бытовые системы ее обработки, а также использование «бутилированной» продукции. Некоторые марки «бутилированной» питьевой воды представляют собой деминерализованную воду, немного обогащенную минеральными веществами для «придания» ей благоприятных вкусовых характеристик.

Возможные негативные последствия от систематического употребления деминерализованной воды в питьевых целях:

- отрицательное воздействие на слизистую оболочку кишечника, желудочно-кишечный

тракт, метаболизм и гомеостаз минеральных веществ, и другие функции организма;

- недостаточное поступление (или полное прекращение) в организм кальция и магния;
- недостаточное поступление ряда жизненно важных «макро- и микроэлементов»;
- потери кальция, магния и других ценных элементов в процессе приготовления пищи;
- поступление в организм токсичных металлов.

В контексте вышесказанного производство и обеспечение водой, обедненной солями и минералами (после «обратного осмоса»), направлено вразрез с ключевой концепцией: «Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу, должна иметь благоприятные органолептические свойства и обязательно быть полезной для здоровья человека и животных».

Многие крупнейшие государственные и коммерческие компании в рамках собственной разработанной Политики «в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» при осуществлении всех видов деятельности признают приоритетом жизнь и здоровье работников перед результатами производственной и экономической деятельности.

Возможные последствия от воздействия деминерализованной воды на состояние инженерных коммуникаций (сетей холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения). Основные проблемы, возникающие при эксплуатации инженерных систем, – накипеобразование (отложение солей), коррозия (поглощение тела металла) и микробиологическое обрастание (биопрцессы).

Для предотвращения негативных процессов, влияющих на работу систем водоснабжения и теплоснабжения, требуется специальная обработка (подготовка) воды, выбор методов которой обусловлен такими ключевыми специфическими показателями качества, как агрессивность и коррозионность.

Понятие «коррозионность» относится к коррозионным свойствам воды, характеризующим отношение раствора к металлу трубопроводной системы и емкостных сооружений. Коррозионность (абсолютная) обусловлена химическим составом и температурой воды.

Оценка коррозионно-опасных и накипеобразующих развитых свойств воды основана на рассмотрении карбонатного равновесия с учетом влияния температуры воды и общей минерализации (солесодержания).

Одним из широко распространенных расчетных критериев оценки стабильности воды и в

настоящее время является индекс карбонатного насыщения (индекс Ланжелье, I_L):

$$I_L = pH - pH_s,$$

где pH – величина водородного показателя (pH) исходной воды, ед. pH^+ ; pH_s – величина pH равновесного насыщения воды карбонатом кальция, ед. pH^+ .

В 1936 году американский ученый Ланжелье (W.F. Langelier) предложил использовать разработанную им формулу для оценки стабильности (термостабильности) раствора (таблица 1).

При величине $I_L = 0$ вода считается стабильной, при $I_L < 0$ – вода агрессивна, при $I_L > 0$ – вода пересыщена по карбонату кальция (имеет склонность к образованию накипи $CaCO_3$).

Возможные негативные последствия от воздействия деминерализованной воды:

- снижение качества воды посредством растворения металла из тела трубопроводов;
- сокращение срока эксплуатации трубопроводного транспорта и емкостных сооружений (старение, износ, «эрозия металла», ослабление прочностных характеристик и прочее);
- утечки питьевой воды из сети (рост безвозвратных потерь в окружающую среду и снижение рентабельности производственного процесса);
- негативное воздействие на окружающую среду при утечках в сети и коррозии металла.

В период эксплуатации систем и сооружений по добыче сырой и подготовке питьевой воды производился отбор проб и лабораторный контроль показателей качества «исходной и питьевой» воды с анализом ее стабильности, агрессивности (согласно таблице X.3 – Степень агрессивного воздействия жидких неорганических сред на металлические конструкции по СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»), оценкой коррозионности в отношении тела металла трубопроводов и емкостных сооружений. В рамках установленной методики по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» произведен практический расчет (таблица 1) показателя насыщения $CaCO_3$ двух проб воды на основании полученных результатов химико-аналитического (лабораторного) контроля качества.

Результаты исследования и обсуждение.

Исходя из полученных расчетно-эксплуатационных значений, наблюдаем следующее. В соответствии со шкалой $-3,0 < I_L < +3,0$ (таблица 2) даже природная вода выходит за пределы минимального оценочного критерия «индекса Ланжелье» на 11 %. Поэтому исходная и очищенная вода относятся к средам с «чрезвычайно высокой коррозией» (подтверждением этому также является низкая минерализация (таблица 1)) – способность воды к поглощению.

Таблица 1 Результаты измерений и расчета индекса карбонатного насыщения

Назначение водного ресурса	Фактические характеристики, свойства воды и расчетные показатели	Величина	Индекс Ланжелье (LSI)
Исходная (природная) вода «до очистки» (по проекту относится к «ультрапресной воде»)	Водородный показатель, ед. pH^+	6,60	–3,33
	Общее солесодержание (TDS), мг/дм ³	52,00	
	Жесткость по $CaCO_3$, мг/дм ³	12,02	
	Щелочность по $CaCO_3$, мг/дм ³	16,03	
	Температура, °C (по шкале Цельсия)	7,20	
	A (расчетный показатель)	0,0716	
	B (расчетный показатель)	2,4392	
	C (расчетный показатель)	0,6800	
I_{L1} («до очистки») = $pH - pH_{S1} = 6,6 - ((9,3 + 0,0716 + 2,4392) - (0,6800 + 1,2050)) \approx -3,33$		1,2050	
Очищенная (питьевая) вода «после очистки» (баромембранные технологии («обратный осмос») не применялись в процессе водоподготовки)	Водородный показатель, ед. pH^+	6,50	–3,59
	Общее солесодержание (TDS), мг/дм ³	51,20	
	Жесткость по $CaCO_3$, мг/дм ³	8,02	
	Щелочность по $CaCO_3$, мг/дм ³	15,63	
	Температура, °C (по шкале Цельсия)	8,20	
	A (расчетный показатель)	0,0709	
	B (расчетный показатель)	2,4189	
	C (расчетный показатель)	0,5040	
I_{L2} («после очистки») = $pH - pH_{S2} = 6,5 - ((9,3 + 0,0709 + 2,4189) - (0,5040 + 1,1940)) \approx -3,59$		1,1940	

Также необходимо учесть, что наряду с фактической нестабильностью воды (проявлением агрессивности, коррозионности) в водных средах систем водоснабжения и теплоснабжения также содержится растворенный кислород, ко-

торый соответственно сохраняет свое присутствие и усиливает влияние жидкости на металлические поверхности контакта в момент нагрева теплоносителя (например, для нужд теплоснабжения ($t^0_{\text{воды}} = +70-95$ °C) и горячего

хозяйственно-питьевого водоснабжения ($t_{\text{воды}}^0 = +60\text{--}75\text{ }^{\circ}\text{C}$)) и имеет высокую концентрацию O_2 , в 150–200 раз превышающую нормативное значение (по растворенному кислороду – для «закрытых» систем отопления: 0,05 мг/кг). С учетом полученных данных (таблица 1), агрессивное действие воды в сочетании с повышенной температурой (в процессе ее подогрева) и в присутствии растворенного кислорода / углекислоты CO_2 , существенно ускоряет деструкцию (сокращение полезного ресурса, повышение

амортизации): котлоагрегатов, теплообменных аппаратов, инженерных металлических сетей горячего водоснабжения и внутренней поверхности емкостных сооружений хранения воды (для слабо подогретых сред: $+18\text{--}25\text{ }^{\circ}\text{C}$), что в свою очередь будет сопровождаться незапланированным капитальным ремонтом систем и сооружений жизнеобеспечения, дополнительным расходованием денежных средств компании и соответственно снижением общей рентабельности по результатам данной эксплуатации.

Таблица 2 Нормативные значения для оценки индекса карбонатного насыщения

Индекс Ланжелье (LSI)	Характер, степень воздействия водной среды (раствора)
+3,0	Чрезвычайно высокое накипеобразование
+2,0	Очень высокое накипеобразование
+1,0	Серьезное накипеобразование
+0,5	Тенденция к накипеобразованию
+0,2	Легкое накипеобразование
0,0	Стабильный раствор
–0,2	Очень легкая степень коррозии
–0,5	Легкая степень коррозии
–1,0	Тенденция к коррозии
–2,0	Очень высокая коррозия
–3,0	Чрезвычайно высокая коррозия

Одним из альтернативных вариантов в искусственной обработке воды, заключающейся в повышении ее минерализации и снижении агрессивности, коррозионной активности, является технологическое решение по «стабилизационной обработке» (с добавлением, например, суспензии гашеной извести $\text{Ca}(\text{OH})_2$ или Na_2CO_3) и параллельному «ингибированию трубопроводов» (например, раствором триполифосфата натрия), дозированием химических реагентов для корректировки индекса карбонатного насыщения (Ланжелье) в воде с ориентацией его в комфортную зону (рабочий диапазон) и систематическим выполнением мониторинга «чувствительности» величины водородного показателя. Оптимальная величина индекса карбонатного насыщения находится зачастую в интервале значений от 0,0 до +0,2 (уточнение производится по результатам практической деятельности в соответствии с местными и иными условиями) – относится к стабильной воде. Стабильность – это свойство воды не выделять и не растворять осадок карбоната кальция. При нарушении стабильности вода способна растворять защитные пленки на внутренней поверхности трубопроводов в результате появления в воде угольной кислоты / CO_2 в агрессивной форме, что наблюдается в работе.

Согласно расчетно-эксплуатационным результатам, вода изначально имеет отрицательный показатель (индекс) карбонатного насыщения, который еще «до очистки: $-3,33$ » ниже на 11 % нормативно-минимального значения « $-3,0$ » (таблица 2), а «после очистки» снижается еще на

7,81 % от исходной величины и составляет « $-3,59$ ». Это подчеркивает рост степени агрессивности, коррозионной активности воды по отношению к металлу транспортной системы при условии максимального сохранения первоначального состава в процессе ее обработки (по проекту предусмотрено: химическая обработка воды реагентами (окислитель (озон), коагулянт, флокулянт) и доочистка посредством напорных механических каркасно-засыпных фильтров: песок (I-я ступень), цеолит (II-я ступень) и уголь активный сорбционный «АГ-3» (III-я ступень).

В рамках предмета обсуждения данной работы, связанной с удалением, в частности, кремния (кремниевой кислоты) из природной воды, целесообразно переориентировать свое внимание с первоначального выбора (на перспективу) метода «обратного осмоса» в сторону адаптации на установке более гуманного варианта ее обработки (рисунок 1), расположенного на пограничном уровне очистки «микрофильтрация – ультрафильтрация» (0,03–0,06 мкм).

Выводы. Анализ данных литературных источников [1–6] и расчетно-эксплуатационных результатов, представленных в работе, позволяет более глубоко проникнуть в суть проблемы и прийти к выводу о целесообразности сохранения полезных и безопасных для здоровья и жизни человека, безвредных (в техническом отношении) для инженерных коммуникаций свойств воды, а сторонникам производства «идеально чистой (деминерализованной) воды» рекомендуется вовлекать и строго соблюдать

технологии искусственной минерализации с подбором правильного состава (рецептуры) минеральных ингредиентов в зависимости от климатических и иных условий, водных проблем региона, употребляющего питьевую продукцию, и соответственно от требований СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» в случае применения баромембранной технологии («обратного осмоса высокого давления») в удалении, например, кремния и бора.

Учитывая изложенные научно-исследовательские [5–6] и полученные производственно-эксплуатационные (таблица 1) фактические результаты, очень глубокий метод «деминерализации» воды (в случае, например, удаления избыточного кремния и бора с применением «обратного осмоса высокого давления») может быть губительным в отношении здоровья человека и повлечет к необратимым сложным последствиям в сфере жизнеобеспечения и производства. Поэтому, чтобы понизить порог концентрации кремния в фильтрате обрабатываемой воды с 12–15 мг/дм³ до 10 мг/дм³ и менее, не обязательно привлекать в водоподготовке «мощные» баромембранные технологии с высокой селективной способностью. Целесообразным действием в подборе методов очистки считается ориентирование на наиболее «гуманные» и в то же время эффективные варианты в отношении минимизации «стрессового» воздействия на солевой состав, свойства обрабатываемой воды.

Каждый из нас также должен понимать, что максимально сохранив природные свойства, состав воды в процессе ее подготовки для питьевых нужд, мы никогда не восстановим в полной мере утраченную жизненно важную и полезную ее ценность даже посредством профессиональной искусственной обработки (минерализации, кондиционирования), которую в нее изначально заложила «природа». Тем более, если обратиться к источнику [4], по уровню задержания растворенных и иных загрязнений «обратный осмос» расположен в самом конце «технологической очистной линейки» (рисунок 1), держа устойчивый курс на получение высокого показателя КПД очистки с самой высокой степенью обессоливания – до 98–99 %.

Концепция данного метода автоматически формирует выражение: «Лучшее – враг хорошего!»

Поэтому крайне важно найти равновесный баланс / компромисс между степенью (глубиной) очистки воды, здоровьем человека и комфортным функционированием инженерных коммуникаций, извлекая из этого основные ценности для каждой из сторон в конкретном эксплуатационном регионе.

Коллеги, надеюсь, после такого никто из нас не останется равнодушным к здоровью людей и техническому состоянию коммуникаций, сохранив и то, и другое, как общественно значимые и незаменимые жизненные ценности, приложив к производству питьевой воды свои профессионализм и душу!

Библиографический список

1. Зуев, Е.Т. Питьевая и минеральная вода. Требования мировых и европейских стандартов к качеству и безопасности [Текст] / Е.Т. Зуев, Г.С. Фомин. М.: Протектор, 2003. 320 с., ил.
2. Латышева, Е.А. Обессоливание воды [Текст]: учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта / Сост.: Е.А. Латышева, Е.А. Мезенева, С.В. Колобова. Вологда: ВоГУ, 2016. 56 с.
3. Фесенко, Л.Н. К выбору метода удаления бора из кремнийсодержащих артезианских вод [Текст] / Л.Н. Фесенко, Р.В. Федотов, С.И. Игнатенко // Водоснабжение и водоотведение Мегаполиса. II-я Международная конференция, посвященная памяти академика РАН С.В. Яковлева. М., 2011. 338–345 с.
4. Беликов, С.Е. Водоподготовка [Текст]: справочник / Под ред. д. т. н., действительного члена Академии промышленной экологии С.Е. Беликова. М.: Аква-Терм, 2007. 240 с.
5. Эльпинер, Л.И. Медико-экологические аспекты кризиса питьевого водоснабжения: гигиена и санитария [Текст] / Л.И. Эльпинер. М., 2013. 38–44 с.
6. Всемирная организация здравоохранения. Нутриенты в питьевой воде. Вода, санитария, охрана здоровья и окружающей среды: вред деминерализованной воды – TestAqua [Текст]. Женева, 2005. 50 с.

Сведения об авторах

1. **Егоров Александр Иванович**, соискатель, руководитель группы по обслуживанию оборудования водоснабжения и водоотведения, ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», ПАО «Газпром», e-mail: alex.shtorm@mail.ru.

2. **Юхин Дмитрий Петрович**, кандидат технических наук, доцент кафедры теплоэнергетики и физики, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 34, e-mail: amelenteva@mail.ru.

В работе внимание сосредоточено на общественно значимых аспектах: оценка возможных последствий для здоровья и жизни человека при длительном употреблении в питьевых целях «деминерализованной» или, наоборот, «модифицированной» (с корректированным минеральным составом, искусственно обогащенной солями) воды; оценка достаточности минимального, а также оптимального содержания важных для человека элементов (минералов) в питьевой воде с целью удовлетворения качества продукции технологическим, санитарным и иным нормам, исключая вред здоровью и жизни человека; оценка негативного воздействия «деминерализованной» воды на инженерные коммуникации (сети холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения). Описана вероятность ком-

плексного негативного воздействия «деминерализованной» воды на здоровье и жизнь человека и инженерные коммуникации (трубопроводный транспорт) готовой питьевой продукции, произведенной посредством участия баромембранной технологии (в частности, метода «обратного осмоса высокого давления»), с привязкой к технологическому процессу «обескремнивания и обесборивания» подземной природной воды. Произведены литературный обзор, оценка результатов химико-аналитического контроля фактического водного ресурса «до и после очистки», расчет с анализом индекса карбонатного насыщения (Ланжелье) и оценка необходимости перспективной адаптации «обратного осмоса» на действующей блочно-модульной типовой станции очистки природной воды.

A. Egorov, D. Yukhin

NEGATIVE EFFECT OF DEMINERALISED WATER ON HUMAN HEALTH AND PROCESS UTILITIES DUE TO BAROMEMBRANE TECHNOLOGY OF SILICON AND BORON REMOVAL

Key words: *water purification; water treatment; natural water; salts; silicon; boron; silicon removal; boron removal; baromembrane method; reverse osmosis; demineralisation; desalination; drinking water; human health; corrosion; aggressiveness; water instability; stabilisation treatment; water mineralisation; Langelier saturation index; model organisms; water quality control.*

Authors' personal details

1. **Alexander Egorov**, external Post-graduate student, head of the group for servicing water supply and sanitation equipment, «Gazprom dobycha shelf Yuzhno-Sakhalinsk», Public Joint Stock Company Gazprom, e-mail: alex.shtorm@mail.ru.

2. **Dmitry Yukhin**, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Heat and Power Engineering and Physics, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, e-mail: amelenteva@mail.ru.

The study deals with the following aspects: it assesses the possible implications of both demineralised and modified (adjusted mineral composition and fortified with salts) water used for drinking purposes on human health and life; it also evaluates adequacy of the minimum and optimal content of essential elements (minerals) in drinking water to meet the technological, sanitary and other standards, and eliminate a bad impact on human health and life; it assesses the negative effect of the demineralised water on process utilities (cold and hot utility and drinking water supply). The paper describes the potential negative effect of the demineralised water on human health and life as well on drinking

water process utilities (pipeline transport). The demineralised drinking water is produced based on the baromembrane technology (high-pressure reverse osmosis) and associated with the technological process of removing silicon and boron from underground natural water. The study reviewed the available literature sources, evaluated results of the chemical and analytical control performed on the water resource before and after the water treatment (pre-and post-treatment), analysed and identified the Langelier saturation index and estimated the need to adapt the «reverse osmosis» method for the existing block and modular plant of natural water treatment in the long run.

© Егоров А.И., Юхин Д.П.

РАЗРАБОТКА ОПЕРАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН КОЗЛЯТНИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ СКАРИФИКАТОРОМ

Ключевые слова: *скарификация; скарификатор семян; всхожесть; вращающийся диск; степень скарификации; степень дробления; микробиологический препарат.*

Введение. Одной из актуальных проблем выращивания кормовых культур является наличие качественных семян. У части кормовых культур, включая козлятник, до 80 % семян имеют твердую, герметичную оболочку, приводящую к долгому сроку прорастания посевов и снижению урожайности [1]. Нарушение у данных семян герметичности оболочки путем накалывания или нацарапывания в процессе подготовки семян к посеву называется скарификацией, а устройства, применяемые для данного процесса, – скарификаторами [2].

К применяемым на практике способам скарификации семян перед посевом относятся: механическая (физическое воздействие); химическая (обработка кислотой); термическая (прогревание и промораживание). В России и за рубежом существуют различные точки зрения на эффективность и преимущества того или иного способа скарификации [3].

На наш взгляд, химическая и термическая скарификация семян при всех своих достоинствах достаточно эффективна в лабораторных методах исследований, а также при обработке мелких партий семян, чаще всего ручным способом [4]. На производстве основным, массовым способом скарификации является механическая, а в случае применения технических устройств – скарификаторов, значительно снижающих трудоемкость процесса, возможно добиться требуемого качества обработки с высоким уровнем всхожести семян [5].

Применяемое в Китайской Народной Республике устройство 9BQS-3,0 с пневматическим скарификационным и посевным комплексом [6] неплохо себя зарекомендовало при одновременных операциях скарифицирования и посева семян кормовых культур. В Соединённых Штатах Америки [7] для скарифицирования семян применялся механический электрический барабанный скарификатор, обеспечивший высокую всхожесть семян. В Российской Федерации промышленностью выпускается ряд скарификаторов: СК-300 (ПАО «Пензмаш»), СКР-300 (ООО «КАМРУД-АГРО»), СКВ-300 (ФГУП «УАПО»), работающих по принципу механической скарификации, модернизируются и проектируются

новые, вводятся параметры для оценки качественных показателей работы скарификатора [8, 9].

По изучении имеющихся источников литературы нами проведены экспериментальные исследования наличествующих в Республике Башкортостан скарификаторов на семенах бобовых культур. Было определено, что имеющиеся конструкции несовершенны и обладают рядом недостатков. Это подтверждается и другими исследователями: недостаточно высокое качество скарификации [10]; повторные удары у части семян по скарифицирующей поверхности и соответственно их повышенная травмируемость [11].

Кроме того, на производстве применяемая технология предпосевной обработки семян козлятника состоит из нескольких, выполняемых часто вручную, отдельных операций: скарификация семян; очистка скарифицированных семян от образовавшейся при обработке пыли и примесей от абразивной поверхности шлифовального круга; обработка очищенных семян на брезенте микробиологическим препаратом «Ризоторфин» [9].

Цели и задачи исследования: предложить операционную технологию и техническое решение, обеспечивающее повышение качества скарификации и последовательно выполняющее три механизированные операции: скарификация, очистка семян и обработка их микробиологическим препаратом.

Условия, материалы и методы исследования. Для исследований предложена конструкция экспериментального скарификатора (рисунок 1), позволяющего механизированным способом выполнять три последовательные операции по предпосевной обработке семян. Каждая операция происходит в своей зоне обработки семян скарификатора.

Первая операция – скарификация – проводится в I зоне. Семена козлятника загружаются в бункер и включается привод. Дозирующим устройством устанавливают подачу семян на

вращающийся диск с лопастями, на котором семена двигаются по траектории, близкой к логарифмической спирали, пока не встретятся с лопастью. Лопасты изменяют направление движения семян, при этом возрастает их скорость. Сходя с диска, семена соприкасаются с абразивной поверхностью шлифовального круга, тем

самым подвергаются скарификации путем нанесения царапин на твердую оболочку и создания возможности проникновения к зародышам влаги и воздуха. Форма лопастей и их меняющийся угол установки позволяет регулировать угол соприкосновения семян с абразивной поверхностью.

а)

б)

Рисунок 1

Экспериментальный скарификатор семян:

а) внешний вид; б) 3D-схема: 1 – электродвигатель 2 – бункер для семян; 3 – верхний диск с лопатками; 4 – абразивная поверхность шлифовального круга; 5 – конусная направляющая поверхность на нижний диск; 6 – нижний диск; 7 – выходное окно; 8 – опора

Вторая операция – очистка скарифицированных семян – проводится во II зоне. Скарифицированные семена после взаимодействия семян с абразивной поверхностью шлифовального круга сходят по конусной направляющей в камеру очистки, где через воздухопроводы образовавшаяся пыль и примеси захватываются воздушным потоком, образованным вентилятором (на рисунке не показано) и уходят за пределы установки.

Третья операция – обработка скарифицированных, очищенных семян микробиологическим препаратом ризоторфином – проводится в III зоне. Микробиологический препарат из бака поступает в распылители, которые образуют аэрозоль. Семена направляются конусной поверхностью на нижний диск, где за счет вращения диска и обработки аэрозолем семена покры-

ваются каплями. После этого обработанные семена поступают в мешки через выходное окно.

Для выбора режима обработки семенного материала на скарификаторе в I зоне необходимо знать влажность. По ГОСТу 52355-2005, семенной материал считается кондиционным, когда влажность семян его не превышает 13–14 %. Однако повышение влажности выше кондиционной может вызвать самосгорание и порчу семян. Поэтому к моменту предпосевной обработки семена должны иметь, как правило, кондиционную влажность. При низкой влажности посевные качества семян не ухудшаются, но при обработке их на скарификаторе появляется много битых и дробленых семян.

Для выбора скоростного режима обработки различных семян используют формулу [2]:

$$v_{\text{окр}} = \frac{2,1\omega}{4,5\sqrt{A}}, \quad (1)$$

где $v_{\text{окр}}$ – окружная скорость ротора, м/сек; ω – влажность семян, %; A – абсолютный вес семян, г.

Во II зоне необходимо определить параметры аэродинамических потоков для подбора вентилятора таким образом, чтобы во время очистки семян от пыли и примесей, образующихся во время скарификации, не происходило их засасывания в пылесборник.

Для этого составлена виртуальная модель, позволяющая обеспечить идентичность результатов моделирования и реального процесса предпосевной обработки, для чего установлены условия подобию взаимодействия воздуха с пылью и примесями (остающимся после скарификации семян), которые по своим размерным характеристикам соответствуют порошковому препарату Полисорб ВП. В связи с этим основным оценочным показателем для проверки идентичности результатов нами выбраны следующие физические свойства пыли и примесей: в большинстве случаев, когда 60...80 % частиц пыли имеют диаметр до 2 мкм, 10...20 % – от 2 до 5 мкм и до 10 % – свыше 10 мкм. Скорость витания их при этом составляет диапазон 0,000018–0,58 м/с.

Для моделирования разработана область расчета модели технологического процесса скарификации семян. Модель спроектирована в программе КОМПАС-3D (рисунок 2), импорти-

рована и реализована в программном комплексе FlowVision. Для описания течения воздуха с частицами порошка в скарификаторе семян использованы системы уравнений двухфазных течений, включающие уравнение Навье – Стокса для описания движения воздушного потока и уравнение движения твердых частиц [12]. Для расчета установлены граничные и начальные условия, создана расчетная сетка.

В III зоне – обработка скарифицированных, очищенных семян микробиологическим препаратом ризоторфином. Нас интересовала полнота покрытия семян, которая характеризуется фактическим содержанием препарата на поверхности семенного материала, выраженным в процентном отношении к заданной норме расхода. Для этого обезжиривалась поверхность нижнего диска, далее покрывалась раствором десятипроцентного технического диметилдихлорсилана $(\text{CH}_3)_2\text{SiCl}_2$ (силикона) в бензоле и высушивалась. Раствор силикона в бензоле позволяет фиксировать капли аэрозоля без их растекания. Затем устанавливалась скорость вращения нижнего диска на 700 об/мин. Время распыла препарата устанавливалось на 10 с, для четкой регистрации следов капель после испарения в препарат добавляли краску фуксин в количестве до 0,1 % к объёму. Снятие размеров капель производили через оптический микроскоп путём автоматической фиксации данных видеокамерой [13].

а)

б)

Рисунок 2

Этапы моделирования в программном комплексе FlowVision
а) проектирование детали в КОМПАС; б) созданная начальная сетка

Для исследования качественных показателей скарификации семян козлятника при средней влажности 11 % определялись параметры: степень скарификации, % и степень дробления семян, % при режимах вращения диска 700–1500 об/мин [9].

Результаты исследования. Расчет по формуле 1 установил, что экспериментальный скарификатор должен иметь диаметр диска, равный

240 мм; минимальное число оборотов диска 650 в минуту; максимальное – 2300 в минуту.

Использование программного комплекса FlowVision позволило провести машинные эксперименты, визуализировать движение воздушных потоков в камере очистки скарификатора (II зона), а также получить результаты расчетов скорости, давления и траекторий движения частиц (пыли и примесей) в любой точке камеры.

Анализ позволил установить, что максимальная скорость воздушного потока отмечена в месте перехода из камеры очистки по воздуховодам к вентилятору и составила около 9 м/с, здесь же отмечено отрицательное давление – 60 Па, то есть имеется вакуум, создаваемый вентилятором, что способствует более качественному всасыванию пыли и примесей. В центральной зоне камеры очистки скорость невысокая и составляет 0,08–0,79 м/с, а давление практически равняется атмосферному. Анализ рисунка 3 показывает, что траектории движения частиц совпадают с векторами скоростей. Основная масса ча-

стиц пыли и примесей со средней скоростью около 0,26–0,54 м/с движется из нижней и средней части камеры очистки к заборным частям воздуховодов вентиляторов. Частицы заполняют весь объем камеры, находятся во взвешенном состоянии.

На рисунке 4 видно, что частицы пыли и примесей со средней скоростью около 6 м/с движутся по воздуховодам вентилятора, то есть происходит их отсасывание и удаление из зоны обработки, а следовательно, создаются благоприятные условия работы во время обработки семян препаратом.

Рисунок 3
Траектории движения частиц

При этом анализ рисунков свидетельствует о том, что семена козлятника размером 2,5–3 мм со скоростью витания 7–9 м/с и капли рабочей жидкости препарата размером 300–400 мкм со скоростью витания 2,7–7,4 м/с не могут увлечься воздушным потоком.

Таким образом, разработанная математическая модель течения двухфазной среды «воздух – частицы» и ее численная реализация в программном комплексе FlowVision подтверждает работоспособность предложенной нами технологической схемы работы скарификатора.

Рисунок 4
Вектора скоростей движения частиц

Полнота покрытия семян после проведенных экспериментов при 700 об/мин составила 86–94 %, что позволяет, на наш взгляд, достаточно качественно обработать семена ризоторфином.

Степень скарификации и степень дробления семян при влажности 11 % и режимах вращения диска 700–1500 об/мин определялись в сравнении с экспериментальными данными предлагаемого нами скарификатора со скарификатором СКВ-300 (ФГУП «Уфимское агрегатное производственное объединение»). Анализ данных по всхожести свидетельствует о том, что качественные показатели работы предлагаемого скарификатора выше, чем у существующего. Рекомендуемыми режимами в данном случае является диапазон 900...1100 оборотов диска, при котором степень скарификации – 87...92 %. С увеличением количества оборотов и соответственно скорости удара семян о абразивную поверхность (степень шероховатости абразивного круга – 40 мкм) степень скарификации увеличивается с 84 % при 700 об/мин до 98 % при 1500 об/мин. Но вместе с этим увеличивается и степень дробления семян, что является неблаго-

приятным фактором при обработке. При рекомендованном выше режиме диапазона оборотов диска – 900...1100, степень дробления семян составит 1,2...2,0 %, что допустимо агротехническими нормами.

Выводы. Предложенная операционная технология и техническое решение, созданный скарификатор обеспечивают повышение качества скарификации при последовательно выполняющихся трех механизированных операций: скарификация, очистка семян и обработка их микробиологическим препаратом ризоторфин. Проведенное моделирование и расчеты позволили обосновать технические параметры и режимы работы устройства.

Проведенные экспериментальные исследования разработанного устройства для скарификации семян козлятника показали качественную предпосевную обработку семян. В сравнении с существующим скарификатором в рекомендуемом диапазоне оборотов диска 900...1100 предлагаемый скарификатор показал снижение степени дробления семян на 0,2...0,4 %, повышение степени скарификации на 2...3 %.

Библиографический список

1. Мокиев, В.Ю. Обоснование конструктивно-технологической схемы и основных параметров вытирающе-скарифицирующего устройства семян трав [Текст]: дис. ... канд. техн. наук / В.Ю. Мокиев. Киров: Зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого, 2017.
2. Ахламов, Ю.Д. Машины для семеноводства трав [Текст] / Ю.Д. Ахламов, И.М. Гринчук, В.К. Журкин. М.: Машиностроение, 1968. 172 с.
3. Янушко, С.В. Приемы повышения посевных качеств семян бобовых трав [Текст] / С.В. Янушко // Мелиорация. 2010. № 1 (63). С. 187–189.
4. Bichoff R.S., de Albuquerque A.N., Mariano D.C., (...), Sodr, D.C., Valente, G.F. Overcoming seed dormancy and evaluation of viability in *Leucaena leucocephala*. *Australian Journal of Crop Science*, 2018, 12 (1), 68–172.
5. De Oliveira J.D., da Silva J.B., Alves C.Z. Treatments to increase, accelerate and synchronize emergence in seedlings of *mucuna-preta*. *Revista Ciencia Agronomica*, 2017, 48 (3), с. 531–539.
6. Luo J., Sun J., Yang L., (...), Li W., Dong Z. Design and experiment of type 9BQS-3.0 pneumatic scarifying and sowing compound operation machine. *Nongye Jixie Xuebao*. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery*, 2013, 44 (SUPPL.1), с. 51–55+66.
7. Lukas S.B., DeFrank J., Baldos O.C. Optimization of *Waltheria indica* seed dormancy relief treatments and seed storage parameters. *HortScience*, 2016, 51 (9), с. 1184–1187.
8. Shevchenko A.P., Bankrutenko A.V., Koval V.S., Begunov M.A., Demchuk E.V. Scarification of Seeds as an Increasing Element of Perennial Legume Grasses Productivity. *Journal of Physics: Conference Series*, 2018, 1059 (1), 012011.
9. Хасанов, Э.Р. Обоснование показателей качества работы скарификатора семян козлятника [Текст] / Э.Р. Хасанов, Д.И. Маскулов, Р.З. Мусин // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2019. № 3 (51). С. 114–120. DOI: 10.31563/1684-7628-2019-51-3-114-120.
10. Вербовский, А.В. Обоснование параметров и режимов работы дискового скарификатора для предпосевной обработки семян многолетних бобовых культур [Текст]: дис. ... канд. техн. наук / А.В. Вербовский. Новосибирск: Сибирский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук, 2009.
11. Лукин, А.Н. Параметры пневматического скарификатора для предпосевной обработки семян многолетних бобовых культур [Текст]: дис. ... канд. техн. наук / А.Н. Лукин.

Новосибирск: Сибирский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук, 2013.

12. Мударисов, С.Г. Моделирование технологического процесса работы сельскохозяйственных машин методами двухфазных течений

[Текст] / С.Г. Мударисов, Р.Ф. Юсупов // Известия Международной академии аграрного образования. 2012. № 14. С. 227–230.

13. Хасанов, Э.Р. Научное обоснование и разработка технологических процессов и технических средств предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур [Текст]: дис. ... докт. техн. наук. / Э.Р. Хасанов. Уфа, 2015.

Сведения об авторах

1. **Хасанов Эдуард Рифович**, доктор технических наук, профессор кафедры сельскохозяйственных и технологических машин, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 228-08-71, e-mail: hasan_ed@mail.ru.

2. **Камалетдинов Рим Рашитович**, доктор технических наук, профессор кафедры сельскохозяйственных и технологических машин, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 228-08-71, e-mail: krr53@mail.ru.

3. **Маскулов Дамир Ильшатович**, аспирант кафедры сельскохозяйственных и технологических машин, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 228-08-71, e-mail: dmaskulov@mail.ru.

4. **Мусин Радик Забирович**, аспирант кафедры сельскохозяйственных и технологических машин, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 228-08-71, e-mail: musin-radik@mail.ru.

Для исследований предложена конструкция экспериментального скарификатора, позволяющего механизированным способом выполнять три последовательные операции по предпосевной обработке семян: скарификация семян; очистка скарифицированных семян от образовавшейся при обработке пыли и примесей от абразивной поверхности шлифовального круга; обработка очищенных семян микробиологическим препаратом «Ризоторфин». Каждая операция происходит в своей зоне обработки семян скарификатора. Форма лопастей и их меняющийся угол установки на вращающемся диске

позволяют регулировать угол соприкосновения семян с абразивной поверхностью и за счет этого повышать качество обработки. Применение разработанного устройства для скарификации семян козлятника обеспечило качественную предпосевную обработку семян. В сравнении с существующим скарификатором в рекомендуемом диапазоне оборотов диска 900...1100 предлагаемый скарификатор показал снижение степени дробления семян на 0,2...0,4 %, повышение степени скарификации на 2...3 % и степени всхожести на 4...5 %.

E. Khasanov, R. Kamaletdinov, D. Maskulov, R. Musin

DEVELOPMENT OF OPERATIONAL TECHNOLOGY FOR PRESEEDING TREATMENT OF SEEDS OF GOATLINE WITH EXPERIMENTAL SCARIFICATOR

Key words: *scarification; seed scarifier; germination; rotating disk; degree of scarification; degree of crushing; microbiological preparation.*

Authors' personal details

1. **Khasanov Eduard**, Doctor of technical sciences, professor of the agricultural and technological machines department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Otyabrya st., 34, e-mail: hasan_ed@mail.ru.

2. **Kamaletdinov Rim**, Doctor of technical sciences, professor of the agricultural and technological machines department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Otyabrya st., 34, e-mail: krr53@mail.ru.

3. **Maskulov Damir**, postgrad of chair of of the agricultural and technological machines, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Otyabrya str., 34, e-mail: dmaskulov@mail.ru.

4. **Musin Radik**, postgrad of chair of of the agricultural and technological machines, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Otyabrya str., 34, e-mail: musin-radik@mail.ru.

For research, the design of an experimental scarifier is proposed, which allows the mechanized method to perform three consecutive operations for pre-sowing seed treatment: seed scarification; cleaning of scarified seeds from dust and impurities formed during processing from the abrasive surface of the grinding wheel; treatment of purified seeds

with the microbiological preparation «Rizotorfin». Each operation takes place in its own seed treatment area of the scarifier. The shape of the blades and their changing installation angle on a rotating disk allow you to adjust the angle of contact of the seeds with the abrasive surface and thereby improve the quality of processing.

© Хасанов Э.Р., Камалетдинов Р.Р., Маскулов Д.И., Мусин Р.З.

Требования к научным статьям и условия публикации

Для публикации в научном периодическом (4 номера в год) издании – журнале «Вестник Башкирского государственного аграрного университета» (далее по тексту: Журнал) принимается ранее не опубликованное автором (авторами) произведение по отраслям наук: **05.00.00 Технические науки, 06.00.00 Сельскохозяйственные науки и Ветеринарные науки по группам специальностей: 05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем, 06.01.00 Агрономия, 06.02.00 Ветеринария и Зоотехния.** Статья должна быть актуальной, содержать постановку научной задачи (проблемы), описание собственных результатов исследования и состоять из следующих блоков: *введение; цель и задачи исследования; условия, материалы и методы исследования; результаты исследования; выводы.*

В редакцию авторы предоставляют:

✓ Материалы публикации в электронной форме в редакторе Word с расширением *.rtf, оригинал статьи, подписанный авторами – почтой.

✓ Отчет о проверке рукописи статьи в программе «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru). **При оригинальности работы менее 75 % она возвращается на доработку.**

✓ Лицензионный договор с автором(ами) о передаче исключительных прав сроком на 5 лет издательству Башкирского ГАУ. Образец договора, размещенный на сайте Журнала www.vestnik.bsau.ru, заполняется, подписывается автором(ми) в 2-х экземплярах и пересылается в сканированной форме по электронной почте в редакцию Журнала со статьей, а оригиналы договора – почтой.

✓ Выписку из протокола заседания кафедры или научного отдела о рекомендации статьи для публикации в Журнале, заверенную подписью и печатью организации

Правила оформления статьи:

1. Объем статьи 8–15 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, размер – 14 кегль, межстрочный интервал – 1,0; абзац – 0,9 см; поля 20 мм со всех сторон.

2. Рисунки, схемы и графики в черно-белом цвете предоставляются в электронном виде, включенными в текст, в стандартных графических форматах с обязательной подрисовочной подписью, и отдельными файлами с расширением *.jpeg, *.tif.

3. Таблицы предоставляются в редакторе Word, шрифт размером – 12 кегль. **Формулы и математические символы** в тексте набираются в стандартном редакторе формул Microsoft Equation; формулы нумеруются, после формулы приводится расшифровка символов, содержащихся в ней, в том порядке, в котором символы расположены в формуле.

4. На первой странице указываются: индекс по универсальной десятичной классификации (УДК) – слева в верхнем углу; на следующей строке – инициалы, фамилия автора (авторов); на следующей строке – название статьи на русском языке заглавными буквами; на следующей строке – ключевые слова или словосочетания (не менее 5) на русском языке (слова отделяются друг от друга точкой с запятой).

5. Далее по порядку следует текст статьи.

6. В конце статьи оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 библиографический список из 15–20 источников, **в т. ч.** не менее 50 % ссылок на публикации из периодических изданий – журналов; не менее 30 % ссылок на публикации из реферативных баз *Web of Science* и (или) *Scopus*; публикации должны быть не старше 3 лет, допускается не более 10 % ссылок старше 10 лет. Ссылки на источники в тексте приводятся в квадратных скобках, например [1]; в библиографическом списке приводятся только те источники, на которые есть ссылка в тексте. **Самоцитирование – не более 20 %.**

7. Сведения об авторе (авторах) на русском языке: фамилия, имя, отчество (полностью), ORCID (при наличии), ученая степень, ученое звание, должность, название организации, служебный адрес, телефон, e-mail.

8. Аннотация на русском языке (200–250 слов). НЕ повторяется название статьи. НЕ разбивается на абзацы. Структура аннотации кратко отражает структуру работы. Вводная часть минимальна. Изложение результатов содержит КОНКРЕТНЫЕ сведения (выводы, рекомендации и т. п.). Нежелательно использовать аббревиатуры и сложные элементы форматирования (например, верхние и нижние индексы). Избегайте использования вводных слов и оборотов! Числительные, если не являются первым словом, передаются цифрами. Все русские аббревиатуры передаются в расшифрованном виде, если у них нет устойчивых аналогов в англ. яз. (допускается: ВТО – WTO, ФАО – FAO и т. п.).

9. Инициалы, фамилии авторов на английском языке. При переводе на английский язык недопустимо использование машинного перевода!

10. Название статьи на английском языке.

11. Ключевые слова на английском языке.

12. Сведения об авторе (авторах) на английском языке.

13. Аннотация на английском языке.

Материалы в электронном виде необходимо направлять по e-mail: vestnik-bsau@mail.ru. Материалы в печатном виде направляются по адресу: 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, каб. 139, редакция Журнала «Вестник Башкирского государственного аграрного университета». Представленные в редакцию рукописи авторам не возвращаются.

Несоответствие представленных материалов по одному из выше перечисленных пунктов может служить основанием для отказа в публикации.

Все рукописи, представляемые авторами для публикации в Журнале, подлежат проверке в системе «Антиплагиат.ВУЗ» для выявления возможных некорректных заимствований с последующим прохождением института рецензирования (экспертной оценки), по результатам чего редакционная коллегия принимает окончательное решение о целесообразности опубликования поданных автором материалов. Информацию о прохождении статьи можно получить по телефону (347) 228-15-11.

Отчет о проверке рукописи статьи в системе «Антиплагиат.ВУЗ» хранится в издательстве в течение срока действия лицензионного договора.

За фактологическую сторону поданных в редакцию материалов юридическую и иную ответственность несут авторы. Редакция оставляет за собой право вносить редакционные изменения и производить сокращение в статье. Корректур статей авторам не предоставляется.

Плата за публикацию статьи в Журнале, в том числе с аспирантов, не взимается.

Подробная информация о журнале и требованиях к статьям размещена на сайте: www.vestnik.bsau.ru.