ВЕСТНИК

БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

3 (55)
2020

16+

ISSN 1684-7628

ОТРАСЛИ НАУК

сельскохозяйственные

технические

ветеринарные

УФА - 2020

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук

СОДЕРЖАНИЕ

	И.И. Габитов С 90-летием, университет!6
Агрономия	DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-8-16 А.В. Барановский, Т.М. Косонова, А.С. Садовой Влияние погодных условий вегетационного периода на продуктивность зернового сорго8
	DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-16-22 А.А. Васильев Эффективность расчетных доз удобрений в зависимости от срока и глубины посадки картофеля16
	DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-23-31 В.Ю. Молодченко, С.Н. Косников Рейтинговая оценка сельскохозяйственных товаропроизводителей центральной зоны Краснодарского края23
Ветеринария и Зоотехния	DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-31-38 В.А. Асафов, В.Д. Харитонов, Н.Л. Танькова, Е.Л. Исакова, П.В. Кузнецов, В.Т. Габриелова Некоторые аспекты использования различных источников соевого белка в рационах кормления телят31
	DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-38-47 И.Р. Долинин, Г.В. Базекин, Е.Н. Сковородин, И.В. Чудов, А.И. Лебедева Морфологическая характеристика печени цыплят-бройлеров при применении Нуклеостима38
	DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-47-56 И.Р. Долинин, Г.В. Базекин, Е.Н. Сковородин, И.В. Чудов, А.И. Лебедева Влияние биологического стимулятора Нуклеостим на центральные органы иммунитета у цыплят-бройлеров47
	DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-56-64 Р.Г. Курманов Комплексный анализ башкирского меда56
	DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-64-68 Н.Р. Мифтахов, Р.М. Ахмадеев, Ш.М. Насыров, И.И. Самерханов Мониторинг эпизоотической ситуации и вакцинопрофилактика бешенства в Республике Татарстан64

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-69-74	
Е.Р. Нуралиев	
Выявление пуллороза эмбрионов птиц путем биологического контроля инкубационного яйца	69
DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-74-80	
О.В. Руденко, М. Алмохаммед	
Сезонные изменения воспроизводительной способности бычков-производителей	74
DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-80-84	
И.И. Слепцов, А.А. Мартынов, Я.С. Васильев	
Показатели крови бычков калмыцкой породы на откорме при включении в их рацион местных природных кормовых добавок в условиях Центральной Якутии	80
DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-84-90	
Ю.М. Смирнова, Г.В. Хабарова	
Показатели производственного использования коров разного генотипа	84
DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-90-94	
Р.А. Улимбашева	
Мясная продуктивность бычков калмыцкой породы при разной продолжительности производственного цикла и уровне концентратов в рационе.....	90
Процессы и машины агроинженерных систем	
DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-95-99	
И.И. Габитов, Ф.Р. Шайхетдинов, А.В. Неговора	
Модернизация эксплуатируемой сельскохозяйственной техники как эффективный фактор повышения уровня технической оснащённости	95
DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-99-107	
Ф.Н. Галлямов, А.В. Шарафутдинов, М.В. Пятаев	
Разработка систем контроля высева семян для зерновых сеялок	99
DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-107-112	
А.И. Некрасов А.А. Некрасов	
Контроль нагрева обмоток электродвигателей	107
DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-112-119	
А.И. Некрасов, А.А. Некрасов	
Оценка технического ущерба от отказов электродвигателей.....	112
DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-119-126	
Д.А. Соловьев, С.М. Бакиров, Г.Н. Камышова	
Разработка электрической схемы логического управления движением секций дождевальной машины, исключающей одновременный запуск электродвигателей	119

РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

Science Index

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА

LIBRARY.RU

AGRIS

Полные тексты статей доступны на сайте электронной научной библиотеки eLIBRARY.RU:
<http://elibrary.ru> и на сайте www.bsau.ru

DOI журнала: 10.31563/1684-7628

DOI выпуска: 10.31563/1684-7628-2020-55-3

Главный редактор: И.И. Габитов, д-р техн. наук, профессор

Заместители главного редактора: Р.Р. Султанова, д-р с.-х. наук, профессор
И.В. Чудов, д-р биол. наук, доцент

Редакционная коллегия: Р.М. Баширов, член-корр. АН РБ, д-р техн. наук, профессор; В.В. Гимранов, д-р вет. наук, профессор; М. Грингс, проф., д-р сельского хозяйства (Германия); Б. Деген, доктор, профессор (Германия); Ф.С. Амиршоев, д-р биол. наук, профессор (Таджикистан); Р.Р. Исмагилов, член-корр. АН РБ, д-р с.-х. наук, профессор; К. Канненберг, д-р экон. наук (Польша); Ж.К. Керималиев, д-р вет. наук (Кыргызстан); С.А. Родин, д-р с.-х. наук, профессор, академик РАН (Москва); С.Г. Мударисов, член-корр. АН РБ, д-р техн. наук, профессор; Х.Х. Тагиров, д-р с.-х. наук, профессор; Н.К. Мазитов, д-р с.-х. наук, профессор, член-корр. РАН (Республика Татарстан); А.А. Стекольников, д-р вет. наук, профессор, академик РАН (Санкт-Петербург); И.О. Чанышев, д-р с.-х. наук; Ю.А. Янбаев, д-р биол. наук, профессор

Адрес учредителя, издателя и редакции:
450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 34
Тел./факс: (347) 228-15-11
E-mail: vestnik-bsau@mail.ru

www.vestnik.bsau.ru

ISSN 1684-7628

Редактор: Н.А. Николаенко
Технический и художественный редактор: **А.Е. Дереева**
Подписано в печать **25.09.2020**. Формат бумаги 60×84/8
Усл.-печ. л. **14,65**. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».
Печать трафаретная. Заказ **383**. Тираж **300** экз.
РИО ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ
450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, каб. 109

© ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 2020

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер ПИ № ФС77-67713 от 10.11.2016

CONTENTS

	I. Gabitov 90th anniversary, the university!.....6
Agronomics	A. Baranovskiy, T. Kosogova, A. Sadovoy Effect of weather conditions during the vegetation period on the productivity of grain sorghum8
	A. Vasilyev Effectiveness of calculated doses of fertilizers related to the time and depth of potato planting..... 16
	V. Molodchenko, S. Kosnikov Rating of agricultural producers in the central zone of Krasnodar territory23
Veterinary and animal science	V. Asafov, V. Kharitonov, N. Tan'kova, Ye. Iskakova, P. Kuznetsov, V. Gabriyelova Some aspects of using different soy proteins in the feeding diets of calves31
	I.R. Dolinin, G.V. Bazekin, E.N. Skovorodin, I.V. Chudov, A.I. Lebedeva Morphological characteristics of the liver of broiler chickens when using Nukleostim38
	I.R. Dolinin, G.V. Bazekin, E.N. Skovorodin, I.V. Chudov, A.I. Lebedeva Influence of biological stimulator Nucleostim on central immunity bodies in broiler chickens47
	R. Kurmanov A comprehensive analysis of the bashkir honey56
	N. Miftakhov, R. Akhmadeev, Sh. Nasyrov, I. Samerkhanov Monitoring of the epizootic situation and rabies vaccination in the Republic of Tatarstan64
	Y. Nuraliyev Identification of bird embryo pallorosis by biological control of incubation egg69
	O. Rudenko, M. Almohammad Seasonal changes in the reproductive capacity of bulls-sires.....74
	I. Sleptsov, A. Martynov, Y. Vasiliev Indicators of blood of gals of kalmyk breed on feeding when included80

	Y. Smirnova, G. Khabarova Production rates of cows of different genotypes	84
	R. Ulimbasheva Meat productivity of kalmyk breed breeds at different duration of the production cycle and level of concentrates in the diet	90
Processes and machinery of agroengineering systems	I. Gabitov, F. Shaihutdinov, A. Negovora Improvements in the in-service agricultural machinery as an effective factor for better equipment	95
	F. Gallyamov, A. Sharafutdinov, M. Pyatayev Development of seeding control systems for grain drills and sowing machines	99
	Al. Nekrasov, An. Nekrasov Electric motor winding heating control	107
	Al. Nekrasov, An. Nekrasov Assessment of technical damage from electric motor failures	112
	D. Soloviev, S. Bakirov, G. Kamyshova Development of an electrical scheme for logical control of the movement of sprinkler machine sections, which excludes simultaneous start of electric motors	119

Editor-in-chief: I. Gabitov, Dr. tech. sci., Professor

Deputy Editor-in-chief: R. Sultanova, Dr. agr. sci.,
I. Chudov, Dr. biol. sci.

Editorial board: R. Bashirov, Corresponding Member AS RB, Dr. tech. sci., Professor; V. Gimranov, Dr. vet. sci., Professor; M. Grings, Prof. Dr. agr. habil. (Germany); B. Degen, Dr., Professor (Germany); F. Amirshoyev, Dr. biol. sci., Professor (Tajikistan); R. Ismagilov, Corresponding Member AS RB, Dr. agr. sci., Professor; K. Kannenberg, Dr. econ. sci. (Poland); Z. Kerimaliev, Dr. vet. sci. (Kyrgyz Republic); S. Rodin, Dr. agr. sci., Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences (Moscow); S. Mudarisov, Corresponding Member AS RB, Dr. tech. sci., Professor; H. Tagirov, Dr. agr. sci., Professor; N. Mazitov, Dr. agr. sci., Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences (Republic of Tatarstan); A. Stekolnikov, Dr. vet. sci., Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences (St. Petersburg); I. Chanyshv, Dr. agr. sci.; Y. Yanbaev, Dr. biol. sci., Professor

Editorial Office Address:
34, 50-letia October St.,
Ufa, 450001
Tel.: (347) 228-15-11
E-mail: vestnik-bsau@mail.ru

Publishing house FSEI HE Bashkir SAU
Printed FSEI HE Bashkir SAU
Editor: **N. Nikolaenko**
Technical editor, corrector, make-up: **A. Dereeva**

ISSN 1684-7628

© FSEI HE Bashkir SAU, 2020

С 90-ЛЕТИЕМ, УНИВЕРСИТЕТ!

В 30-е годы XX в. исторически сложившийся аграрный характер экономики башкирского края настоятельно требовал наличия квалифицированных специалистов, знающих своеобразные географические, почвенные и климатические условия республики, особенности ведения ее сельского хозяйства, в том числе представителей коренных народностей, владеющих языками местного населения. В связи с этим постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от 23 июля 1930 г. № 237 был создан Башкирский сельскохозяйственный институт.

В период коренного переустройства сельского хозяйства страны, массовой коллективизации крестьянских хозяйств, формирования крупных колхозов и совхозов создаваемый «с нуля» отраслевой вуз сельскохозяйственного профиля был призван удовлетворить острую нехватку в специалистах высшей квалификации.

Учебные занятия были начаты 1 октября 1930 г. в трехэтажном здании бывшей духовной семинарии по улице Карла Маркса, 3. Институт тогда состоял из растениеводческого и животноводческого факультетов. В 1930–1931 гг. созданы первые пять кафедр: физики, общей и органической химии, ботаники, зоотехнии, механизации сельского хозяйства. В их составе работали 13 преподавателей, в том числе один профессор, пять доцентов и семь ассистентов.

Современный университет включает в себя восемь факультетов, 27 кафедр, институты дополнительного профессионального образования и инновационного развития, учебную часть, управление информационного обеспечения, управление по воспитательной работе, отдел аспирантуры и докторантуры, центр эстетического воспитания, учебно-научный центр в Уфимском районе, Зауральский учебно-научный центр в Бурзянском районе и другие структурные подразделения. Университет в своем распоряжении имеет семь современных учебно-лабораторных корпусов в г. Уфе. В последние годы созданы и укомплектованы научно-производственная база опытных полей, научные лаборатории и комплексы. Полностью обновлен и реконструирован Дворец молодежи, построены спортивный и физкультурно-оздоровительный комплексы с плавательным бассейном, игровым и тренажерным залами. Задействовано около 200 обновленных специализированных лабораторий, позволяющих наряду с учебным процессом вести научные исследования, ставить эксперименты и закладывать опыты. Университет располагает профилакторием, спортивно-оздоровительным лагерем на берегу р. Белой. Студенты проживают в девяти благоустроенных общежитиях.

Как и в прежние годы, наш вуз ориентирован, прежде всего, на запросы и потребности региона, 70 % студентов – это жители села. За годы своего развития вуз подготовил около 70 тысяч специалистов для агропромышленного комплекса страны и то, что сегодня аграрное производство республики находится в числе ведущих в России, – немалая их заслуга.

Сегодня университет – это мощный научно-образовательный центр, где осуществляется подготовка кадров по множеству востребованных на селе профессий: агронома и ветврача, инженера-механика и землеустроителя, экономиста и энергетика, технолога-пищевика и финансиста, строителя, зооинженера и другим! Мы тесно сотрудничаем с зарубежными университетами, являемся признанной научной площадкой для обсуждения важнейших проблем аграрной науки и производства. По комплексным показателям университет всегда входит в первую десятку лидирующих среди 54 аграрных вузов Российской Федерации.

Фундамент успехов вуза закладывался трудом многих поколений преподавателей, рядовых сотрудников, студентов и выпускников. Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто трудился над созданием и развитием вуза, способствовал формированию сельскохозяйственного института в один из крупнейших аграрных университетов России, в учебный и научный центр аграрного профиля. За годы потрясений, войны, перестройки вуз не утратил созданной образовательной и научной базы. Сохранено и нечто нематериальное – атмосфера, традиции науч-

ных школ, научный потенциал – то, что наши выпускники начинают ценить, оказавшись в профессиональной среде. В большинстве своем – это люди, которые выбрали своим жизненным девизом: «Нам доверено заботиться о Земле!». Университет продолжает бережно сохранять сложившиеся добрые традиции и гордиться преемственностью поколений.

Сегодня ведется целенаправленная совместная работа с Правительством, Министерством сельского хозяйства России и Башкортостана, министерствами и ведомствами, администрациями районов городов, учреждениями АПК. Знаменательным событием поддержки аграрного университета являются решения руководства республики по государственной поддержке выпускников нашего вуза.

Слава и гордость университета – его выпускники, пользующиеся заслуженным авторитетом среди работников всех отраслей народного хозяйства. Они работают на ответственных постах, возглавляют министерства, руководят предприятиями и организациями агропромышленного комплекса, а около 40 выпускников являются главами администраций городов и районов республики. Закрепление теоретических знаний студентов по устройству и эксплуатации высокопроизводительной техники и оборудования различных фирм, содержанию высокопродуктивных пород животных и птиц, технологиям производства оригинальных сортов и гибридов, эффективных удобрений и средств защиты растений и многому другому проводится на таких передовых предприятиях республики, как ГК «Таврос», ГУСП «Башсельхозтехника», ГУСП совхоз «Рощинский» РБ, ГУСП «Совхоз Алексеевский», ГУП ППЗ «Благоварский», ГУСП «МТС Центральная», КФХ «Агли», ООО ПЗ им. Х. Валиева, ГУСП «Тавакан», СПК «Красная Башкирия», ООО СХП «Нерал-Матрикс», ГУСП совхоз «Рощинский», ООО Агрофирма «Байрамгул», ООО АП им. Калинина, СПК колхоз «Герой», СПК «Базы», организации Управления ветеринарии и Россельхознадзора по РБ, государственные муниципальные управления лесного хозяйства, ОАО «Башкирэнерго», Инспекции Гостехнадзора РБ, Россельхозбанк, ОАО «Уфагормолзавод», ОАО «Белебеевский молочный комбинат», хлебокомбинат «Восток», ООО «САВА», ЗАО «Мелеузовский молочно-консервный комбинат», ООО «Мелеузовский мясокомбинат», МУП «Горзеленхоз» г. Уфы, Южно-Уральский ботанический сад-институт УФИЦ РАН, туристическая компания ОАО «Роза ветров», ГУП «Акбузат», ГУП «Башавтотранс», ОАО «ТрансТехСервис», организации Росреестра, ОАО «Гидравлика» и многие другие.

Особое внимание уделяется всестороннему духовно-нравственному воспитанию молодежи. Вуз системно работает над формированием личности студента, знающего свою историю, традиции, родной язык, сильного духом и способного повести за собой коллектив. Сегодня университет находится на лидирующих позициях в республике и в России по различным видам спорта. Всем известны современные достижения студенческих коллективов художественной самодеятельности нашего вуза.

Сейчас, в период модернизации высшего образования в стране, многие задаются вопросом о будущем вуза. История развития цивилизаций знает немало примеров появления и ухода в небытие различных профессий, но профессия земледельца, хлебороба была, есть и будет вечно. На селе всегда нелегко было работать. Но хлеб на все времена был и остается мерилом ценностей. Не зря в народе говорят: никакая глыба золота не заменит крошки хлеба! Поэтому наш аграрный университет, в котором учат молодежь работать на земле, любить и беречь ее, жить и расти вместе с ней, будет всегда.

Уважаемые наши ветераны и работники университета, студенты и выпускники, труженики АПК, сердечно поздравляем вас с 90-летием Башкирского государственного аграрного университета! Желаем всем нам осуществления задуманных планов, удовлетворения от результатов своей работы, веры, здоровья и удачи!

Ректор И.И. Габитов

ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНОВОГО СОРГО

Ключевые слова: зерновое сорго; гибриды; погодные условия; период вегетации; урожайность; структура урожая; коэффициенты корреляции.

Введение. В последние 20–30 лет на планете отмечаются значительные изменения климата в сторону потепления. К 2050 г. прогнозная численность населения на планете ожидается до 9 млрд человек. Сохранение высоких цен на продукты питания приводит к тому, что в настоящее время 2 млрд беднейшего населения планеты тратят от 50 до 70 % своих доходов на еду. В 2020 году число голодающих на планете составит около 860 млн человек [11]. Изменение климата – одна из наиболее серьезных проблем, с которыми столкнется мировое сельское хозяйство в решении главной задачи в обеспечении потребности растущего населения продовольствием [13, 16]. Глобальное повышение температуры окружающей среды приведет к снижению урожайности основных зерновых культур. Для целей продовольственной безопасности необходимо производство продовольственных культур, которые могут противостоять продолжающимся изменениям климата, чтобы заменить или использовать их как альтернативу нынешним основным зерновым культурам, особенно в засушливых и полувасушливых районах планеты [14]. В настоящее время очень актуально дальнейшее повышение объемов производства зерна для обеспечения продовольственной безопасности в глобальном масштабе. По сведениям Росгидромета, климат в России меняется в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете, и тенденции к замедлению потепления нет [7]. За последние 100 лет (1907–2006 гг.), по данным сети Росгидромета, потепление в целом по России составило 1,29 °С при среднем глобальном потеплении 0,74 °С. При этом для Алтайского края рост температуры превысил 3 °С за 100 лет.

Для зерновых культур в целом по России прогнозируется снижение урожайности до 17 % к 2050 г. Согласно оценкам Росгидромета, в 2020 г. ожидается значительное снижение климатообусловленной урожайности зерновых культур на Северном Кавказе, Урале и в Центрально-Черноземном регионе, а ежегодные потери по стране могут составить 10–12 млн т зерна [11].

В значительной мере это касается и востока степной зоны Украины (Донбасс), где закономерно повышается среднегодовая температура воздуха, усиливается влияние неблагоприятных засушливых и суховейных явлений, температурного стресса, недостатка и даже полного отсутствия продуктивной влаги в пахотном и подпахотном слоях почвы, очень длительных бездождевых периодов во время вегетации культурных растений [5, 6]. В связи с этим перед аграриями Луганской области возникла важная проблема по разработке наиболее адаптированных технологий выращивания полевых культур к конкретно складывающимся погодным условиям в период их вегетации. Часто повторяющиеся засушливые годы, резкое снижение урожайности и валовых сборов зерновых культур требуют научно обоснованного подбора культур, стабилизирующих его производство. Нестабильность производства по годам в зависимости от климатического фактора остается на уровне 70 процентов [3].

В этих условиях зерновое сорго (*Sorghum-bicolor* L., Moench.) – тропическая, теплолюбивая культура – гораздо легче переносит воздушную и почвенную засуху, суховеи и высокие температуры, чем другие культурные растения, и является пятой по важности зерновой культурой после пшеницы, риса, кукурузы и ячменя по объемам производства в мире [12]. Общий мировой годовой объем производства сорго составляет около 60 млн тонн с площади выращивания 46 млн га. Наиболее важными производителями являются США, Нигерия, Судан, Мексика, Китай, Индия, Эфиопия, Аргентина, Буркина-Фасо, Бразилия и Австралия. Сорго в засушливых условиях обеспечивает значительно более высокую урожайность в сравнении с общепризнанными яровыми зерновыми культурами – ячменем, овсом, кукурузой, просом [15, 6]. Выращенное зерно сорго имеет универсальное использование на продовольственные, фуражные и технические цели. Зерно сорго – ценный концентрированный корм для всех видов животных, птицы и прудовой рыбы, а по кормовым достоинствам соответствует зерну куку-

рузы [2]. Также сорго является основным продовольственным зерном во многих засушливых, полувасушливых и тропических районах мира, особенно в странах Африки к югу от Сахары [15]. В засушливых степных регионах, в зонах недостаточного увлажнения оно должно стать основной культурой, повышающей продуктивность севооборотов. По данным Малиновского Б.Н. [10], с учетом почвенно-климатических зон, наличия высокоурожайных сортов и гибридов, применения минеральных удобрений и современных технологий на базе высокопроизводительной техники посевы сорго на Северном Кавказе, куда входит и территория Ростовской области, вплотную граничащая с Луганской областью, могут занимать до 10 % пашни. В работе автора говорится, что сорго на зерно в сравнении с кукурузой выгоднее возделывать в районах, где выпадает менее 500 мм осадков в год. В совместных африкано-нидерландских исследованиях [15] подтверждается, что сорго подходит для районов, подверженных засухе, – это жаркие, полувасушливые тропические районы с 400–600 мм осадков в год, слишком сухие для других зерновых культур. Согласно данным Луганского ЦГМ, за последние 12 лет (2008–2019 гг.) среднегодовая сумма осадков составила всего 475 мм, что подтверждает преимущество в выращивании зернового сорго над кукурузой и другими яровыми зерновыми культурами в области.

Цель исследований – в центре Луганской области на базе опытного поля Луганского НАУ изучить продуктивность зернового сорго современных гибридов различных групп спелости в зависимости от погодных условий в период вегетации при выращивании на высоком агротехническом фоне в типичных почвенно-климатических условиях.

Материалы и методы исследований. Исследования в виде полевых опытов проводили на опытном поле Луганского национального аграрного университета в период 2015–2019 годов. Почва опытного участка – чернозем обыкновенный маломощный слабосмытый на лессовидном суглинке с содержанием в пахотном слое 3,3–3,4 % гумуса, а также имеющий среднее содержание подвижного азота и фосфора и высокое – обменного калия. Реакция почвенной среды – нейтральная. Климат области – умеренно-континентальный, с засушливо-суховежными явлениями, с недостаточной среднегодовой суммой атмосферных осадков и резкими колебаниями их количества по годам (согласно среднегодовым показателям по Луганскому ЦГМ [1]: годовая норма осадков – 528 мм, тем-

пературы воздуха –8,8 °С, ГТК Селянинова – 1,0). Выращивали рекомендованные для возделывания в степной зоне гибриды зернового сорго разных групп спелости селекции компании «ADVANTA» (Янки – ультра раннеспелый, Фрискет – раннеспелый, Пума Стар – среднеранний, Бианка – среднеспелый) по общепринятой технологии [4]. Предшественник – озимая пшеница. Фон минерального питания – средний (N₆₀P₄₀). Сев проводили в оптимальные сроки. Норма высева – 250–260 тыс./га всхожих семян. Формировалась оптимальная густота растений в пределах 140–160 тыс./га. Повторность опыта была 4-кратная. Полевой опыт проводился по общепринятой методике полевого эксперимента [8, 9]. В период вегетации проводили 1–2-кратную обработку растений сорго инсектицидами против обыкновенной злаковой тли. Посевы содержали в чистом от сорняков состоянии путем регулярных междурядных рыхлений и ручных прополок.

Погодные условия в годы опыта сильно различались. 2015 г. был засушливым и жарким: сумма осадков за апрель – сентябрь – 273,9 мм, норма 309 мм, средняя температура воздуха – 19,0 °С, ГТК – 0,56, норма 1,0, число дней засухи с относительной влажностью воздуха 30 % и менее достигло 82 при норме 36,6 дней. 2016 г. был благоприятным: за апрель – сентябрь выпало 335,1 мм осадков, средняя температура воздуха была 18,6 °С, число дней засухи 32, ГТК – 1,03. Вегетационный период в 2017 г. был засушливым: сумма осадков – 283,0 мм, средняя температура воздуха – 19,7 °С, число дней засухи достигло 57. ГТК был 0,99. Еще более засушливым был период вегетации в 2018 году: сумма осадков за апрель – сентябрь равна 234,8 мм, средняя температура воздуха – 20,9 °С, число дней засухи – 71, а ГТК равен 0,67. Благоприятным был 2019 год: сумма осадков за апрель – сентябрь – 386,2 мм, средняя температура воздуха – 17,9 °С, число дней засухи – 60, а ГТК – 1,37.

Результаты исследования и их обсуждение. Погодные условия в период вегетации сорго оказывали заметное влияние на его зерновую продуктивность (таблицы 1–3). Уровень урожайности зависел от многих факторов погоды. Но главными были осадки, их количество и время выпадения, температурный режим воздуха и гидротермический коэффициент (ГТК) Селянинова – показатель влагообеспеченности территории. В результате 5-летнего изучения продуктивности зернового сорго различных по скороспелости гибридов было установлено (таблица 1), что наиболее урожайным является среднеранний гибрид Пума Стар, который превзо-

шел урожайность наиболее раннеспелого гибрида Янки на 12,0 ц/га и существенно превысил уровень зерновой продуктивности остальных гибридов. При практически одинаковой густоте стояния растений (130–140 тыс./га) у данного гибрида получены наиболее высокие масса 1000

зерен, масса зерна с метелки при средней высоте стеблестоя растений (95,7 см). Однако наиболее низкая влажность зерна при уборке урожая отмечена у ультрараннеспелого гибрида Янки, что было на 7,2 % меньше, чем у среднеспелого гибрида Бианка.

Таблица 1 Влияние погодных условий на урожайность, структуру урожая и период вегетации гибридов зернового сорго за годы исследований, ц/га

Гибрид	Урожайность за годы исследований, ц/га					Средняя, ц/га	В среднем за 2015–2019 годы исследований				
	2015	2016	2017	2018	2019		влажность зерна, %	высота растений, см	масса зерна с метелки, г	масса 1000 зерен, г	период вегетации, дней
Янки	52,2	57,1	52,8	49,7	65,1	55,4	14,7	78,2	35,5	22,8	96
Фрискет	65,3	72,9	58,3	50,6	70,1	63,4	17,9	96,8	41,4	23,0	98
Пума Стар	63,9	72,7	66,2	56,5	77,6	67,4	20,2	95,7	45,5	24,6	108
Бианка	62,9	62,6	63,7	53,6	70,3	62,6	21,9	93,0	38,3	19,7	112
$\bar{x}$	61,1	66,3	60,2	52,6	70,8	–	–	–	–	–	–
НСР ₀₅ , ц/га	3,8	3,4	4,3	3,3	3,4	–	–	–	–	–	–

В среднем за 2015–2019 гг. очень высокий коэффициент корреляции (0,92) получен между средней урожайностью гибридов и высотой растений. Урожайность зерна в годы исследований имела среднюю (0,52–0,66) и сильную (0,90) прямую корреляционную зависимость с массой 1000 зерен, а также сильную (0,76–0,99) корреляцию с длительностью периода вегетации сорго. Также сильная прямая корреляционная связь ($r = 0,84–0,99$) урожайности сорго была с суммой выпавших осадков за весь вегетационный период (за апрель – сентябрь) и за август ($r = 0,75–0,98$). В то же время зависимость урожайности гибридов сорго от осадков в первой половине вегетации (май – июнь) была средней, отрицательной и незначительной ($r = -0,41 \dots -0,75$), т. к. критерий t_f фактический ($-0,77 \dots -1,98$) был значительно меньше, чем t_f теоретический (3,18) даже на 5 %-ном уровне значимости. Тесная положительная корреляция с урожаем получена по гидротермическому коэффициенту Селянинова (ГТК) за август по ультрараннеспелому гибриду Янки ($r = 0,99$) и среднераннему гибриду Пума Стар (0,87). Таким образом, наиболее сильное влияние на урожайность культуры оказывают осадки во второй половине вегетации, особенно в августе. В различные по погодным условиям годы наименьшая степень варьирования урожайности культуры сорго отмечена по среднеспелому гибриду Бианка ($V = 9,5$ %) и ультрараннеспелому гибриду Янки ($V = 10,9$ %), а наибольшая вариабельность данного показателя получена по раннеспелому гибриду Фрискет ($V = 14,3$ %). У гибрида Пума Стар коэффициент

варьирования урожайности зерна по годам составил 12,1 %. Среднемесячная температура воздуха в вегетационный период не имела достоверной корреляционной зависимости с урожайностью сорго (t_f фактический ($-0,19 \dots -2,05$) < t_f теоретического (3,18)).

За годы проведения полевого опыта растения исследуемых гибридов зернового сорго не полегли. Формирование наиболее высокой урожайности среднераннего гибрида Пума Стар объясняется сравнительно продолжительным периодом вегетации (в среднем 108 дней) в сравнении с раннеспелыми сортообразцами – Янки и Фрискет. Тем не менее данный гибрид успешно вызревал и достигал фазы полной спелости зерна за годы опыта. Растения гибрида Пума Стар в период вегетации, в отличие от других образцов, не повреждались обыкновенной злаковой тлей, формировали наиболее выполненные и озерненные метелки с самой высокой массой 1000 зерен. Анализ среднемесячных показателей метеорологических наблюдений выявил их различную корреляционную связь с урожайностью наиболее продуктивного среднераннего гибрида сорго Пума Стар (таблица 2).

Наибольшее положительное влияние на урожай зерна данного гибрида оказывали осадки в мае ($r = 0,84$) и августе ($r = 0,90$) (рисунок 1) и за период с апреля по сентябрь ($r = 0,99$), относительная влажность воздуха в мае ($r = 0,92$), августе ($r = 0,86$), сентябре ($r = 0,84$) и в целом за период апрель – сентябрь ($r = 0,99$), а также показатель увлажнения территории выращивания сорго (ГТК Селянинова) за август ($r = 0,87$) и особенно за июль – август ($r = 0,90$) (таблица 3).

Таблица 2 Среднемесячные метеорологические показатели и их связь (r) с урожайностью зернового сорго среднераннего гибрида Пума Стар (2015–2019)

Год	Осадки за вегетационный период, мм							Температура воздуха, °C					
	IV	V	VI	VII	VIII	IX	IV–IX	IV	V	VI	VII	VIII	IX
2015	118,3	37,0	51,6	26,0	15,6	25,4	273,9	9,3	15,9	22,0	24,8	22,1	19,6
2016	41,0	80,0	26,0	86,6	43,0	58,4	335,1	12,5	16,0	21,3	23,3	24,2	14,0
2017	62,7	48,9	57,4	86,9	11,9	15,2	283,0	9,2	15,0	19,9	22,4	23,8	17,4
2018	13,9	41,6	85,5	50,8	9,5	33,5	234,8	11,9	18,5	21,6	23,7	22,5	18,0
2019	99,5	74,9	23,4	96,5	73,4	18,5	386,2	10,1	17,6	23,3	21,2	20,3	14,7
норма	30	46	73	70	38	52	309	10,1	15,6	20,0	22,4	20,9	15,0
r	0,43	0,86	–0,97	0,72	0,91	0,05	0,99	–0,06	–0,20	0,41	–0,67	–0,27	–0,79
± S _r	0,52	0,29	0,15	0,40	0,25	0,58	0,10	0,58	0,57	0,53	0,42	0,56	0,36
t ₀₅ φ.	0,83	2,94	–6,44	1,81	3,69	0,09	10,28	–0,10	–0,36	0,78	–1,60	–0,49	–2,21
Годы	Относительная влажность воздуха за вегетационный период, %							Число дней с относительной влажностью воздуха 30 % и менее					
	IV	V	VI	VII	VIII	IX	IV–IX	IV	V	VI	VII	VIII	IX
2015	69	67	66	60	49	55	61	11	9	5	10	25	22
2016	64	73	66	60	57	65	64	6	2	1	10	6	7
2017	68	64	65	63	53	62	62	7	9	4	12	21	11
2018	59	59	53	65	51	56	57	14	12	20	2	22	15
2019	66	72	56	67	68	64	66	14	3	15	12	2	14
норма	64	61	66	65	62	70	65	8,6	11,4	5,8	6,7	8,0	4,7
r	0,41	0,92	0,20	0,14	0,86	0,84	0,99	–0,19	–0,94	–0,31	0,78	–0,88	–0,40
± S _r	0,53	0,22	0,57	0,57	0,30	0,31	0,07	0,57	0,20	0,55	0,36	0,27	0,53
t ₀₅ φ.	0,78	4,12	0,35	0,24	2,89	2,68	13,25	–0,34	–4,67	–0,56	2,15	–3,22	–0,76

Рисунок 1
Влияние осадков в августе на урожайность сорго гибрида Пума Стар

Таблица 3 Влияние условий влагообеспеченности территории (ГТК) на урожайность и массу 1000 зерен у сорго зернового гибрида Пума Стар за годы исследований

Год опыта	ГТК за период вегетации по месяцам и периодам									Масса 1000 зерен, г
	IV	V	VI	VII	VIII	IX	V–VI	VII–VIII	IV–IX	
2015	0,83	0,84	0,78	0,43	0,23	0,53	0,81	0,33	0,61	23,2
2016	1,09	1,68	0,38	1,20	0,56	1,59	1,03	0,88	1,08	26,7
2017	2,19	1,08	1,00	1,21	0,18	0,28	1,04	0,70	0,99	22,9
2018	0,42	0,81	1,20	0,72	0,13	0,72	1,01	0,42	0,67	21,8
2019	4,14	1,48	0,33	1,43	1,29	0,50	0,90	1,36	1,53	28,6
$\bar{x}$	1,73	1,18	0,74	1,00	0,48	0,72	0,96	0,74	0,98	24,6
норма	0,99	0,97	1,21	1,05	0,61	1,16	1,09	0,83	1,00	–
r	0,78	0,88	–0,93	0,77	0,87	0,22	–0,11	0,90	0,90	0,94
$\pm S_r$	0,36	0,28	0,21	0,37	0,28	0,56	0,57	0,25	0,25	0,19
t_{05}	2,17	3,14	–4,53	2,08	3,09	0,38	–0,19	3,57	3,56	4,87

Сильная отрицательная корреляционная зависимость получена между осадками за июнь ($r = -0,97$), числом дней с относительной влажностью воздуха 30 % и менее (дней засухи) в мае ($r = -0,94$), в августе ($r = -0,88$) и урожайностью гибрида Пума Стар. Именно в августе проходили самые ответственные фазы для формирования хорошо выполненного и полновесного зерна сорго: окончание фазы цветения, формирование, налив и молочная спелость зерна. В среднем за 5 лет исследований в период вегета-

ции сорго самым засушливым был август (ГТК = 0,48; относительная влажность воздуха – 56 %; число дней с относительной влажностью воздуха ≤ 30 % составило 15,2). Условия увлажнения в течение этого месяца соответствовали очень засушливой степной зоне (ГТК = 0,7...0,4), а за 2015, 2017 и 2018 годы – зонам полупустыни (ГТК = 0,4...0,2) и пустыни (ГТК < 0,2). Именно за счет этих экстремальных засух заметно снижалась масса 1000 зерен у сорго (рисунк 2).

Рисунок 2
Влияние осадков в августе на массу 1000 зерен сорго гибрида Пума Стар

Рисунок 3
Влияние массы 1000 зерен на урожайность сорго гибрида Пума Стар

Получена сильная корреляционная зависимость между осадками в августе и массой 1000 зерен сорго ($r = 0,98 \pm 0,0034$ при t_{05} факт. = 8,55) и массой 1000 зерен и ГТК за август ($r = 0,94 \pm 0,19$ при t_{05} факт. = 4,87). Это во многом определило и сильную положительную корреляционную связь между урожайностью и массой 1000 зерен сорго ($r = 0,9553 \pm 0,0113$).

Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, что в современных почвенно-климатических и конкретно складывающихся погодных условиях на территории Луганской области можно с успехом выращивать среднеранний гибрид зернового сорго Пума Стар с периодом вегетации от 96 до 119 дней. Практически в любой по влагообеспеченности год посевы зернового сорго данного гибрида обеспечивают стабильно высокие урожаи зерна, весомо превышающие уровень продуктивности других гибридов. Среднеспелый гибрид Бианка с более длительным периодом вегетации существенно уступал по зерновой продуктивности гибриду Пума Стар.

Выводы:

1. В среднем за годы исследований очень высокий коэффициент корреляции ($r = 0,92$) получен между средними показателями урожайности гибридов и высотой растений в фазе полной спелости.
2. Урожайность зерна в годы опыта имела среднюю ($r = 0,52-0,66$) и сильную ($r = 0,90$) пря-

мую корреляционную зависимость с массой 1000 зерен, а также сильную ($r = 0,76-0,99$) корреляцию с длительностью периода вегетации сорго.

3. За 2015–2019 годы, контрастно отличающиеся по погодным условиям вегетационного периода, наиболее высокая корреляционная зависимость получена между урожайностью зерна сорго и такими показателями, как сумма осадков за август ($r = 0,91-0,98$) и ГТК Селянинова за август ($r = 0,87-0,99$) у ультрараннеспелого гибрида Янки и среднераннего гибрида Пума Стар.

4. В среднем за 5 лет наиболее продуктивным был среднеранний гибрид Пума Стар, который превзошел урожайность наиболее раннеспелого гибрида Янки на 12,0 ц/га и существенно превысил уровень зерновой продуктивности остальных гибридов. При практически одинаковой густоте растений (130–140 тыс./га) у данного гибрида получены наиболее высокие масса 1000 зерен (24,6 г), масса зерна с метелки (45,5 г), а средняя высота растений составила 95,7 см.

5. Наибольшее влияние на урожай зерна сорго гибрида Пума Стар оказывали осадки в мае ($r = 0,84$) и августе ($r = 0,91$) и за весь период апрель – сентябрь ($r = 0,99$), относительная влажность воздуха в мае ($r = 0,92$), августе ($r = 0,86$), сентябре ($r = 0,84$) и в целом за период апрель – сентябрь ($r = 0,99$), а также расчетный

показатель оценки условий увлажнения данной территории выращивания сорго (ГТК) за август ($r = 0,87$) и за июль – август ($r = 0,90$).

6. За годы опыта самым засушливым был август (ГТК = 0,48), погодные условия которого соответствовали условиям увлажнения очень засушливой степной природной зоны, а в 2015, 2017, 2018 гг. – зоне полупустыни и пустыни. По наиболее урожайному гибриду Пума Стар выявлена сильная прямая корреляционная зависимость между массой 1000 зерен у сорго и осад-

ками за август ($r = 0,98 \pm 0,0034$ при t_{05} факт. = 8,55) и массой 1000 зерен и ГТК за август ($r = 0,94 \pm 0,19$ при t_{05} факт. = 4,87).

7. Установлена сильная прямая корреляционная связь между урожайностью и массой 1000 зерен по наиболее продуктивному гибриду Пума Стар.

8. Среднемесячная температура воздуха в летний период не имела достоверной корреляционной связи с урожайностью зернового сорго.

Библиографический список

1. Агрокліматичний довідник по Луганській області (1986–2005 рр.) / За ред. Ю.М. Власова. Луганськ: Віртуальна реальність, 2011. 216 с.
2. Алабушев, А.В. Технологические приемы возделывания и использования сорго [Текст] / А.В. Алабушев. Ростов н/Д, 2007. 224 с.
3. Алабушев, А.В. Рекомендации по возделыванию сорго зернового [Текст] / А.В. Алабушев, С.И. Горпиниченко, Г.В. Метлина, В.В. Ковтунов, С.А. Васильченко, О.А. Лушпина, О.Д. Шарова. Ростов н/Д: Книга, 2013. 32 с.
4. Барановский, А.В. Рекомендации по технологии возделывания и использованию сорговых культур [Текст]: научно-практические рекомендации / А.В. Барановский, А.И. Денисенко, Н.И. Дранищев. Луганск, ЛНАУ: Копир-центр Луганск, 2014. 56 с.
5. Барановский, А.В. Влияние применения регуляторов роста на продуктивность зернового сорго [Текст] / А.В. Барановский, Т.М. Косогова, А.Е. Меркулов // Интеграция науки и практики как условие продовольственной безопасности: материалы Международной научно-практической конференции; научный вестник ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет». Луганск: ГОУ ЛНР ЛНАУ, 2019. № 7. Том 1. С. 541–553.
6. Барановский, А.В. Сравнительная продуктивность яровых зерновых культур в засушливых условиях Луганской области [Текст] / А.В. Барановский // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2019. № 1 (81). С. 28–33.
7. Груза, Г.В. Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2014 год [Текст] / Г.В. Груза, М.Ю. Бардин, Э.Я. Ранькова. М.: Госгидромет, 2015. 107 с.
8. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта [Текст] / Б.А. Доспехов. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
9. Моисейченко, В.Ф. Основы научных исследований в агрономии [Текст] / В.Ф. Моисейченко, М.Ф. Трифонова, А.Х. Заверюха, В.Е. Ещенко. М.: Колос, 1996. 336 с.
10. Малиновский, Б.Н. Сорго на Северном Кавказе [Текст] / Б.Н. Малиновский. Ростов н/Д: Ростовский университет, 1992. 208 с.
11. Папцов, А.Г. Глобальная продовольственная безопасность в условиях климатических изменений [Текст]: монография / А.Г. Папцов, Н.А. Шеламова. М.: РАН. 2018. 132 с.
12. Galiba M, Waniska RD, Rooney LW, Miller FR (1988). Food and Agricultural Organization (FAO) (2005). FAOSTAT. [http://faostat.fao.org/faostat/Couscous quality of sorghum with different kernel characteristics](http://faostat.fao.org/faostat/Couscous%20quality%20of%20sorghum%20with%20different%20kernel%20characteristics). J. CerealSci. 7: 183–193.
13. Howden S.M., Soussana J.-F., Tubiello F.N., Chhetri N., Dunlop M., Meinke H. Adapting agriculture to climate change. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2007, 104, 19691–19696.
14. Jin Wang, Sai KranthiVanga, Rachit Saxena, Valérie Orsat and Vijaya Raghavan Effect of Climate Change on the Yield of Cereal Crops: A Review. Climate, 2018, 6, 41. P. 1–19. www.mdpi.com/journal/climate.
15. Mamoudou H. Dicko, Harry Gruppen, Alfred S. Traoré, Alphons G.J. Voragen and Willem J.H. van Berke. 2005. Sorghum grain as human food in Africa: relevance of content of starch and amylase activities. African Journal of Biotechnology Vol. 5 (5), pp. 384–395, 1 March 2006 Available online at <http://www.academicjournals.org/AJB> ISSN 1684–5315 © 2006 Academic Journals.
16. Tripathi A., Tripathi D.K., Chauhan D., Kumar N., Singh G. Paradigms of climate change impacts on some major food sources of the world: A review on current knowledge and future prospects. Agric. Ecosyst. Environ. 2016, 216, 356–373.

1. **Барановский Александр Васильевич**, ORCID: 0000-0003-2098-0889, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, доцент кафедры земледелия и экологии окружающей среды, ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет», 91008, г. Луганск, городок ЛНАУ, 1, ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет», агрономический факультет, каб. А-205, e-mail: Lnau_sorgo2011@mail.ru.

2. **Косогова Татьяна Михайловна**, кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры садово-паркового хозяйства и экологии, ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. Тараса Шевченко», 91011, г. Луганск, ул. Оборонная, 2, ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко», факультет естественных наук, 2 корпус, каб. 166, e-mail: kosogova@list.ru.

3. **Садовой Алексей Сергеевич**, ORCID: 0000-0002-9438-8979, ассистент кафедры селекции и защиты растений, младший научный сотрудник НИЧ, ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет», 91008, г. Луганск, городок ЛНАУ, 1, ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет», агрономический факультет, каб. А-408, e-mail: sadovoialek@yandex.ua.

В настоящее время на планете происходят заметные изменения климата в сторону потепления, что приводит к значительным переменам погодных условий в период вегетации основных полевых культур. Это касается и степных засушливых условий территории Донбасса. Полевой опыт по изучению влияния погодных факторов на продуктивность зернового сорго различных по скороспелости гибридов проводили на черноземе обыкновенном в условиях опытного поля Луганского НАУ в 2015–2019 годы. Наиболее сильная прямая корреляция получена между урожайностью гибридов и суммой выпавших осадков за апрель – сентябрь ($r = 0,84–0,99$) или только с осадками за август ($r = 0,75–0,98$). Средняя и высокая корреляционная связь получена между урожайностью гибридов и гидротермическим коэффициентом (ГТК) за апрель – сентябрь ($r = 0,53–0,89$) и высокая – с ГТК за август ($r = 0,67–0,99$). Среднемесячная темпера-

тура воздуха в летний период не имела достоверной корреляционной зависимости с урожайностью сорго. Урожайность культуры имела среднюю ($r = 0,52–0,66$) и сильную ($r = 0,90$) прямую корреляционную зависимость с массой 1000 зерен, сильную ($r = 0,92$) – с высотой растений и сильную ($r = 0,76–0,99$) – с длительностью периода вегетации сорго. Среди изучаемых гибридов наиболее тесная связь между урожаем сорго и суммой осадков за август ($r = 0,91–0,98$) и ГТК Селянинова за август ($r = 0,87–0,99$) получены у раннеспелого гибрида Янки и среднераннего гибрида Пума Стар. За 2015–2019 годы наиболее высокую и достоверно превышающую остальные гибриды урожайность зерна (56,5–77,6 ц/га) обеспечил гибрид Пума Стар за счет более высокой массы зерна с метелки (42,5–49,8 г) и массы 1000 зерен (21,8–28,2 г). Установлена очень сильная зависимость урожайности гибрида Пума Стар от массы 1000 зерен ($r = 0,96 \pm 0,01$).

A. Baranovskiy, T. Kosogova, A. Sadovoy

EFFECT OF WEATHER CONDITIONS DURING THE VEGETATION PERIOD ON THE PRODUCTIVITY OF GRAIN SORGHUM

Key words: grain sorghum; hybrids; weather conditions; vegetation period; yield; yield formula; correlation coefficients.

Authors' personal details

1. **Alexander Baranovsky**, ORCID: 0000-0003-2098-0889, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Agriculture and Environmental Ecology, Luhansk National Agrarian University, 91008, Luhansk, LNAU campus, 1, Luhansk National Agrarian University, Faculty of Agronomy, office A-205, e-mail: Lnau_sorgo2011@mail.ru.

2. **Tatyana Kosogova**, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Department of Park Gardening and Ecology, Luhansk National University, named after Taras Shevchenko, 91011, Luhansk, ul. Oboronnaya, 2, Luhansk National University named after Taras Shevchenko, Faculty of Natural Sciences, building 2, office 166, e-mail: kosogova@list.ru.

3. **Alexey Sadovoy**, ORCID: 0000-0002-9438-8979, Teaching Assistant of the Department of Plant Breeding and Protection, Junior Researcher of the Research Institute, Luhansk National Agrarian University, 91008, Luhansk, LNAU campus, 1, Luhansk National Agrarian University, Faculty of Agronomy, office A-408, e-mail: sadovoialek@yandex.ua.

Global warming is currently having a measurable effect on Earth, so the process is bringing about significant changes in weather conditions during the vegetation period of the main field crops. This is true for the arid steppe conditions of the Donbass territory. The authors conducted a field experiment to evaluate climatic factors' effect on the productivity of various early maturing grain sorghum hybrids on ordinary chernozem in Luhansk National Agrarian university's experimental field 2015–2019. The study obtained the strongest direct correlation between the yield of hybrids and the amount of precipitation for April – September ($r = 0,84–0,99$) or only correlated with precipitation for August ($r = 0,75–0,98$). A moderate and high correlation was found between the yield of hybrids and the hydrothermal coefficient (HTC) for April – September ($r = 0,53–0,89$) and a high correlation with the HTC for August ($r = 0,67–0,99$). The average monthly air

temperature in summer did not show a significant correlation with the sorghum yield. The crop yield had an average ($r = 0,52–0,66$) and strong ($r = 0,90$) direct correlation with the mass of 1000 grains, a strong correlation ($r = 0,92$) with the height of plants, and a strong correlation ($r = 0,76–0,99$) with the duration of the vegetational season of sorghum. The early-maturing hybrid Yankee and the medium-early maturing hybrid Puma Star showed the closest correlation between the sorghum crop and the amount of precipitation for August ($r = 0,91–0,98$) and the Selyaninov HTC for August ($r = 0,87–0,99$). In 2015–2019, the Puma Star hybrid demonstrated the highest grain yield, significantly higher than other hybrids (56,5–77,6 C/ha), due to the higher grain weight obtained from the panicle (42,5–49,8 g) and the weight of 1000 grains (21,8–28,2 g). The Puma Star hybrid showed an extreme dependence of the yield on the mass of 1000 grains ($r = 0,96 \pm 0,01$).

© Барановский А.В., Косогова Т.М., Садовой А.С.

УДК 635.21:631.5

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-16-22

А.А. Васильев

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСЧЕТНЫХ ДОЗ УДОБРЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА И ГЛУБИНЫ ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ

Ключевые слова: картофель; сорт; уровень питания; срок посадки; глубина посадки; урожайность; крахмал; фотосинтетически активная радиация; коэффициент использования ФАР.

Введение. Продуктивность картофеля обусловлена усвоением фотосинтетически активной солнечной радиации (ФАР) и её использованием на формирование хозяйственно-ценной части урожая. В результате фотосинтеза культурные растения образуют до 95 % своей биомассы [1]. Технология возделывания в этом аспекте является инструментом создания оптимальных условий для роста и развития растений, формирования ассимиляционной поверхности листьев и максимального усвоения ФАР, поступающей за вегетационный период [2–3]. Известно, что высокопродуктивные сорта при благоприятных условиях и высокой агротехнике могут использовать и запасти в урожай 5–6 % ФАР [4, с. 264]. Это подтвердили и наши исследования. В 2004–2006 гг. на окультуренном выщелоченном чер-

ноземе в условиях лесостепной зоны Челябинской области использование ФАР растениями среднераннего сорта картофеля Невский на фоне внесения глауконита (40 т/га) достигало 5,6 %, а у среднеспелого сорта Спиридон – 6,3 %, что обеспечило формирование урожайности клубней 49,3 и 54,2 т/га соответственно [5].

Срок и глубина посадки относятся к важнейшим элементам технологии возделывания картофеля (*Solanum tuberosum* L.), так как непосредственно влияют на начало вегетации, сроки уборки, величину и качество урожая клубней [6–7]. Оптимальный срок посадки устанавливают с учетом физической спелости почвы, сорта, цели использования картофеля и физиологического состояния посадочного материала [8–9]. Глубина посадки связана в основном с ве-

личиной семенных клубней, климатическими особенностями региона и состоянием почвы. Так, в Восточной и Западной Сибири, характеризующихся медленным прогреванием почв, и на Дальнем Востоке в условиях обильного увлажнения вегетационного периода используют мелкую заделку клубней, тогда как в Среднем Поволжье и других регионах с засушливым климатом лучшие результаты обеспечивает глубокая посадка картофеля [10]. Мелкая посадка в оптимально ранние сроки содействует формированию дружных всходов, мощной коревой системы и ассимиляционной поверхности, создает условия для максимального усвоения фотосинтетически активной солнечной радиации (ФАР), влаги и питательных элементов почвы, что позволяет снизить вредоносность болезней и вредителей, а как следствие – положительно отражается на величине и качестве урожая картофеля [11–12].

В научной литературе очень мало сведений о совместном влиянии сроков посадки и глубины заделки семенных клубней на формирование планируемых урожаев. Так, П. А. Чекмарев [13] и А. А. Самаркин [14] в своих исследованиях изучали как сроки, так и глубину посадки картофеля, но делалось это в разных, не связанных друг с другом опытах. Лишь в работе Г. С. Жуковой и Б. А. Писарева [15] сообщается о наличии тесной связи между глубиной и сроком посадки картофеля. Для получения ранней продукции в районах с умеренным и прохладным климатом авторы рекомендуют проводить раннюю посадку с заделкой клубней мельче, чем при обычных сроках посадки. Тогда как в районах с сухим и жарким климатом при поздней посадке картофеля клубни необходимо заделывать глубже, чтобы поместить их во влажный слой почвы. Однако эти заключения не подтверждены экспериментальным материалом.

Цель исследований – изучить влияние сбалансированных норм минеральных удобрений на фотосинтетическую продуктивность, урожайность и качество клубней в лесостепной зоне Челябинской области в зависимости от сроков и глубины посадки картофеля.

Материал и методы исследования. Исследования проведены в период 2014–2017 гг. в Южно-Уральском научно-исследовательском институте садоводства и картофелеводства – филиале ФГБНУ УрФАНЦ УрО РАН. Закладку опытов, анализы и наблюдения проводили в соответствии с общепринятыми методиками [16]. Повторность опыта четырехкратная. Размещение вариантов рендомизированное. Площадь делянки – 27 м². Математическая обра-

ботка данных проводилась методом дисперсионного анализа [17].

Почва участка – чернозем выщелоченный среднесуглинистый с содержанием гумуса (по Тюрину) – $6,13 \pm 0,17$ %, легкогидролизуемого азота (по Тюрину и Кононовой) – $7,13 \pm 1,8$ мг/100 г почвы, подвижного фосфора (по Чирикову) – $10,6 \pm 4,4$ мг/100 г почвы, обменного калия (по Чирикову) – $24,8 \pm 5,4$ мг/100 г почвы, $pH_{\text{сол}} - 5,45 \pm 0,24$.

Сорт картофеля – Кузовок (среднеспелый). Предшественник картофеля – чистый пар. Посадку проводили клубнями первой репродукции массой 50–70 г. Схема посадки 75 × 27 см. Картофель выращивали по общепринятой технологии.

Схема опыта: Фактор А – срок посадки: 1. Первый (12–15 мая); 2. Второй (25–29 мая); 3. Третий – поздний (5–12 июня). Фактор В – глубина посадки: 1. Мелкая (5–6 см); 2. Глубокая (10–12 см). Фактор С – уровень минерального питания: 1. Без удобрений (контроль); 2. Минеральные удобрения в расчете на планируемый урожай 25 т/га (в среднем за 4 года – $N_{71}P_{84}K_{67}$); 3. Минеральные удобрения в расчете на планируемый урожай 40 т/га ($N_{171}P_{227}K_{259}$).

По величине гидротермического коэффициента вегетационный период (май – август) 2014 и 2017 гг. были признаны достаточно влажными (ГТК = 1,34 и 1,44 соответственно), 2015 г. – влажным (1,60), 2016 гг. – недостаточно влажным (0,93).

Результаты исследований. Изучаемые приемы агротехники оказывали существенное влияние на ассимиляционную поверхность листьев картофеля сорта Кузовок. В первой декаде июля растения первого срока посадки имели листовую поверхность в среднем на 25,4 % больше, чем при посадке 25–29 мая, и на 86,9 % больше, чем при поздней посадке. Мелкая заделка семенного материала, ускоряя появление всходов в 2017 г. (на 2–3 дня при первом сроке посадки и на 1–2 дня при втором и третьем), обеспечивала преимущество в дальнейшем развитии картофеля. Так, в первой декаде июля площадь листьев картофеля при посадке глубину 5–6 см в среднем за годы исследований оказалась на 10,2 % больше, чем при посадке на глубину 10–12 см (таблица 1).

Наибольшая листовая поверхность отмечена в фазе цветения культуры. При первом и втором сроках посадки наибольших значений площадь листьев достигала 5 августа в варианте мелкой заделки семенных клубней на фоне внесения удобрений в расчете на урожай 40 т/га – 44,4 и 42,1 тыс. м²/га, тогда как третий срок посадки сдвигал формирование наибольшей ассимиляционной поверхности на 15 мая – 41,3 тыс.

м²/га. Следует отметить, что последний результат получен в варианте глубокой заделки семенного материала.

Сбалансированные дозы минеральных удобрений в расчете на урожай клубней 25 т/га в среднем по опыту увеличивали площадь листьев картофеля сорта Кузовок на 42,0 %, а в расчете на урожай 40 т/га – на 76,5 % по сравнению с контролем.

Суммарный фотосинтетический потенциал (ФП) в значительной степени зависел от приемов агротехники. Наибольшее влияние оказывало применение минеральных удобрений. В расчете на урожай 25 т/га внесение удобрений повышало ФП картофеля в среднем на 41,9 %, а на урожай 40 т/га – на 76,3 % по сравнению с неудобренным контролем (рисунок 1).

При первом сроке посадки этот показатель в среднем был на 8,7 % больше, чем при втором, и на 19,3 % больше, чем при третьем сроке посадки. Мелкая заделка семенного материала способствовала росту ФП картофеля на 4,3 % при первом сроке посадки и на 5,6 % при втором. Влияние глубины посадки на фотосинтетический потенциал картофеля снижалось в варианте позднего срока посадки, где разница между вариантами была недостоверной.

Максимальные значения суммарного ФП зафиксированы при посадке картофеля 12–15 мая

на глубину 5–6 см на повышенном фоне минерального питания – 4,66 млн м²/га-дней, что было в 1,8 раза больше, чем на контроле.

Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) главным образом зависела от срока посадки картофеля. При посадке 12–15 мая этот показатель в среднем составлял 2,7 г/м² в сутки, 25–29 мая и 5–12 июня – 3,0 г/м² в сутки. Глубокая заделка семенного материала повышала этот показатель в среднем на 7,4 % по сравнению с посадкой на глубину 5–6 см.

По мере повышения уровня минерального питания ЧПФ постепенно снижалась: на фоне удобрений в расчете на урожай 25 т/га – в среднем на 3,2 %, на урожай 40 т/га – на 7,2 %.

Коэффициент усвоения фотосинтетически активной радиации в нашем эксперименте определялся в основном уровнем минерального питания (вклад фактора – 81,6 %), в меньшей степени зависел от срока посадки (17,2 %) и не зависел от глубины заделки посадочного материала (0,1 %).

В варианте без применения удобрений коэффициент поглощения ФАР растениями сорта Кузовок не превышал 2,4 % при посадке 12–15 мая с глубокой заделкой клубней. Сдвиг посадки картофеля на третью декаду мая снижал этот показатель до 2,2 %, а на начало июня – до 1,9 % (рисунок 2).

Таблица 1 Листовая поверхность картофеля в зависимости от уровня питания, срока и глубины посадки, тыс. м²/га (среднее за 2014–2017 гг.)

Срок посадки	Глубина посадки	Уровень питания	Площадь листьев, тыс. м ² /га					
			5/VI	15/VI	25/VI	5/VII	15/VII	25/VII
12–15 мая	5–6 см	Контроль	19,6	21,9	24,2	25,6	21,0	18,0
		N ₇₁ P ₈₄ K ₆₇	27,4	31,1	34,8	36,0	31,2	28,1
		N ₁₇₁ P ₂₂₇ K ₂₅₉	33,7	38,5	43,3	44,4	39,5	35,9
	10–12 см	Контроль	18,3	20,8	23,4	24,4	21,4	19,2
		N ₇₁ P ₈₄ K ₆₇	24,5	28,5	32,6	33,2	31,5	28,7
		N ₁₇₁ P ₂₂₇ K ₂₅₉	30,5	35,9	41,3	41,5	39,6	37,2
25–29 мая	5–6 см	Контроль	14,7	18,3	22,0	24,3	23,4	21,0
		N ₇₁ P ₈₄ K ₆₇	20,4	26,0	31,6	34,1	33,3	30,1
		N ₁₇₁ P ₂₂₇ K ₂₅₉	25,1	32,2	39,4	42,1	40,2	37,1
	10–12 см	Контроль	13,5	17,3	21,2	23,1	22,6	21,3
		N ₇₁ P ₈₄ K ₆₇	18,1	23,9	29,6	31,5	32,1	30,3
		N ₁₇₁ P ₂₂₇ K ₂₅₉	22,0	29,3	36,5	38,6	40,2	37,5
5–12 июня	5–6 см	Контроль	10,0	14,0	18,0	22,3	22,1	20,9
		N ₇₁ P ₈₄ K ₆₇	14,4	20,4	26,4	31,9	33,5	30,3
		N ₁₇₁ P ₂₂₇ K ₂₅₉	18,2	25,6	33,1	39,6	40,6	37,8
	10–12 см	Контроль	9,8	14,3	18,8	23,0	23,3	21,9
		N ₇₁ P ₈₄ K ₆₇	13,4	19,9	26,4	31,4	33,0	31,2
		N ₁₇₁ P ₂₂₇ K ₂₅₉	16,6	24,6	32,6	38,5	41,3	38,7

Рисунок 1

Суммарный фотосинтетический потенциал картофеля в зависимости от уровня питания, срока и глубины посадки, млн м²/га-дней (среднее за 2014–2017 гг.)

Рисунок 2

Использование ФАР картофелем в зависимости от уровня питания, срока и глубины посадки, % (среднее за 2014–2017 гг.)

Применение минеральных удобрений в расчете на планируемый урожай 25 т/га повышало усвоение ФАР в среднем в 1,37 раза, а на урожай 40 т/га – в 1,64 раз по отношению к контролю.

Максимальных значений коэффициент усвоения ФАР достигал на фоне внесения удобрений в нормах, рассчитанных на получение программируемого урожая 40 т/га, при проведении посадки картофеля 12–15 и 25–29 мая – 3,6–3,7 %, что позволило получить урожайность клубней в пределах 36,9–39,0 т/га. Поздняя посадка приводила к существенному снижению продуктивности картофеля (в среднем на

21,2 %) и коэффициента усвоения ФАР (на 23,1 %) по сравнению с посадкой во второй декаде мая.

Поздняя посадка картофеля приводила к снижению коэффициента поглощения ФАР на 19,6 % по сравнению с посадкой во второй декаде мая. У раннего сорта Розара наибольшее усвоение ФАР отмечалось в варианте посадки 12–15 мая на глубину 5–6 см – 3,4 %, тогда как у среднеспелого сорта Кузовок при глубокой посадке 25–29 мая – 3,7 %. Поздняя посадка (5–12 июня) снижала этот показатель до 2,5 % у сорта Розара и до 3,0 % у сорта Кузовок (таблица 2).

Таблица 2 Урожайность и качество клубней картофеля в зависимости от уровня питания, срока и глубины посадки (среднее за 2014–2017 гг.)

Срок посадки	Глубина посадки	Уровень питания	Урожайность клубней, т/га	Крахмал		Содержание нитратов, мг/кг
				%	т/га	
12–15 мая	5–6 см	Контроль	23,5	15,97	3,75	45,2
		N ₇₁ P ₈₄ K ₆₇	32,6	16,17	5,26	51,2
		N ₁₇₁ P ₂₂₇ K ₂₅₉	38,3	15,84	6,07	68,2
	10–12 см	Контроль	24,6	16,39	4,04	50,1
		N ₇₁ P ₈₄ K ₆₇	31,3	16,02	5,01	60,9
		N ₁₇₁ P ₂₂₇ K ₂₅₉	38,7	15,70	6,07	66,7
25–29 мая	5–6 см	Контроль	23,0	14,60	3,35	71,4
		N ₇₁ P ₈₄ K ₆₇	31,1	14,60	4,54	82,5
		N ₁₇₁ P ₂₂₇ K ₂₅₉	36,9	14,39	5,31	92,7
	10–12 см	Контроль	22,8	15,07	3,43	78,4
		N ₇₁ P ₈₄ K ₆₇	31,5	14,49	4,57	84,6
		N ₁₇₁ P ₂₂₇ K ₂₅₉	39,0	14,76	5,75	92,9
5–12 июня	5–6 см	Контроль	18,7	14,38	2,69	111,9
		N ₇₁ P ₈₄ K ₆₇	26,6	13,46	3,58	148,7
		N ₁₇₁ P ₂₂₇ K ₂₅₉	31,2	12,88	4,02	174,1
	10–12 см	Контроль	19,8	14,73	2,92	113,7
		N ₇₁ P ₈₄ K ₆₇	27,0	13,79	3,73	130,1
		N ₁₇₁ P ₂₂₇ K ₂₅₉	32,5	13,76	4,47	160,1
HCP ₀₅			1,8	0,72	0,34	14,3
HCP ₀₅ (A, C)			0,8	0,29	0,12	5,9
HCP ₀₅ (B)			0,6	0,24	0,10	4,8

Корреляционный анализ показал, что между урожайностью картофеля сорта Кузовок и коэффициентом использования ФАР существует прямая корреляционная зависимость ($r = 0,995$). В среднем по опыту усвоение 1 % фотосинтетически активной радиации, поступающей за вегетационный период (май – август), обеспечивает формирование урожая клубней 10,5 т/га.

Планируемая урожайность клубней 25 т/га достигалась во всех вариантах опыта. Тогда как урожайность 40 т/га формировалась только при посадке во второй декаде мая на глубину 5–6 см (38,3 т/га) и 10–12 см (38,7 т/га), а также при посадке в третьей декаде мая с глубокой заделкой семенного материала (39,0 т/га).

Применение сбалансированных норм минеральных удобрений, установленных расчетно-балансовым методом на получение планируемого урожая 25 и 40 т/га, не приводило к ухудшению качества клубней в вариантах мелкой посадки картофеля во второй и третьей декадах мая. Тогда как при посадке 12–15 мая на глубину 10–12 см внесение удобрений сопровождалось достоверным снижением крахмалистости клубней на 0,37–0,69 %, а 25–29 мая – на 0,31–0,58 % по сравнению с контролем. При позднем сроке посадки снижение крахмалистости клубней от

удобрений при мелкой заделке семенного материала (0,92–1,52 %) оказалось даже выше, чем при глубокой посадке (0,94–0,97 %).

Наибольший сбор крахмала с единицы площади обеспечивала посадка во второй декаде мая на повышенном фоне питания – 6,07 т/га (как при мелкой, так и при глубокой заделке семенного материала). При втором и третьем сроках посадки наибольшие сборы крахмала с 1 га обеспечивала глубокая посадка картофеля. Однако по сравнению с ранней посадкой этот показатель снижался при посадке 25–29 мая в среднем на 5,6 %, а при посадке 5–12 июня – на 35,8 %.

Выводы. 1. В лесостепной зоне Челябинской области оптимальным сочетанием агроприемов для формирования планируемых урожаев картофеля является посадка 12–15 мая на глубину 5–6 см и 25–29 мая на глубину 10–12 см. Внесение минеральных удобрений в расчете на урожайность 40 т/га при этом обеспечивает наибольший фотосинтетический потенциал (4,66 и 4,47 млн м²/га·дней) и эффективное использование ФАР, поступающей за вегетационный период (3,6 и 3,7 %). Как следствие, формируется высокий урожай (38,3 и 39,0 т/га) и качество клубней картофеля (крахмалистость клуб-

ней – 15,84 и 14,76 %, сбор крахмала с единицы площади – 6,07 и 5,75 т/га соответственно).

2. Планируемая урожайность клубней 25 т/га достигалась сортом Кузовок во всех вариантах опыта. Коэффициент усвоения фотосинтетически активной радиации при этом не превышает 3,2 % при первом сроке посадки, 3,0 % при втором и 2,5 % при третьем. Мелкая посадка 12–15 мая на фоне удобрений в расчете на урожай 25 т/га обеспечивала прибавку уро-

жайности клубней 1,3 т/га и повышение коэффициента усвоения ФАР с 3,0 до 3,2 %.

3. Поздняя посадка (5–12 июня) снижала фотосинтетический потенциал картофеля в среднем на 19,3 %, коэффициент использования ФАР – на 0,5 %, что вызывало снижение урожайности на 5,5 т/га, крахмалистости клубней – на 2,2 %, увеличивало накопление нитратов в 2,45 раза по сравнению с посадкой 12–15 мая.

Библиографический список

1. Шукуров, Р. Показатели фотосинтетической деятельности и продуктивность пшеницы при внесении расчетных норм минеральных удобрений [Текст] / Р. Шукуров // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение биологических и медицинских наук. 2007. № 2. С. 48–54.

2. Мухортова, Т.В. Оценка эффективности клубнеобразования у сортов картофеля в зависимости от скороспелости, тепло- и влагообеспеченности [Текст] / Т.В. Мухортова, В.А. Федорова, Н.В. Тютюма, Е.В. Полухина // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2017. № 3 (47). С. 104–112.

3. Исмагилов, Р.Р. Влияние ростовых веществ на биохимический состав и продуктивность картофеля [Текст] / Р.Р. Исмагилов, В.П. Трапезников // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 2007. № 5. С. 26–28.

4. Чечулин, В.Л. Об энергетической оценке верхней границы коэффициента полезного действия фотосинтеза [Текст] / В.Л. Чечулин // Статьи разных лет. Чечулин В.Л.: сб. науч. тр. Пермь, 2017. С. 126–131.

5. Васильев, А.А. Влияние глауконита на поступление азота, фосфора и калия в растения картофеля [Текст] / А.А. Васильев // Агрохимия. 2014. № 8. С. 40–50.

6. Мингалев, С.К. Реакция различных сортов картофеля на сроки посадки в Свердловской области [Текст] / С.К. Мингалев // Аграрный вестник Урала. 2016. № 2. С. 47–51.

7. Горбунов, А.К. Влияние глубины посадки на урожайность клубней картофеля сорта Тарасов [Текст] / А.К. Горбунов // Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии. 2013. Т. 63. С. 95–100.

8. Логинов, Ю.П. Урожайность раннеспелых сортов картофеля при раннем сроке посадки в северной лесостепи Тюменской области [Текст] / Ю.П. Логинов, А.А. Казак, З.А. Хай-

руллина // Агропродовольственная политика России. 2017. № 4 (64). С. 35–39.

9. Амелюшкина, Т.А. Адаптивность сортов картофеля в условиях серых лесных среднесуглинистых почв калужской области [Текст] / Т.А. Амелюшкина // Аграрная наука. 2019. № 3. С. 72–74.

10. Vasilev A. A., Gorbunov A. K. Problems of Obtaining Planned Potato Harvests in the Southern Urals. J. Russian Agricultural Sciences. 2018. Vol. 44. № 6. Pp. 510–515.

11. Кокров, А.Ю. Продуктивность и качество клубней картофеля в зависимости от фона питания и глубины посадки на орошаемых почвах лесостепи Среднего Поволжья [Текст] / А.Ю. Кокров, В.П. Владимиров // Точки роста эффективности АПК в условиях нестабильного рынка: сб. мат. межд. науч.-практ. конф. Казань, 2018. С. 229–236.

12. Чамышев, А.В. Агроэкологическое обоснование сроков посадки картофеля в Саратовском Правобережье [Текст] / А.В. Чамышев // Аграрный научный журнал. 2016. № 2. С. 30–33.

13. Чекмарев, П.А. Научное обоснование повышения продуктивности картофеля и разработка агротехнических приемов его возделывания в условиях лесостепи Поволжья [Текст]: дис. ... д-ра с.-х. наук / П.А. Чекмарев. Казань, 2006. 426 с.

14. Самаркин, А.А. Научно-практическое обоснование повышения продуктивности картофеля в условиях юго-востока Волго-Вятской зоны [Текст]: автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук / А.А. Самаркин. Чебоксары, 2019. 32 с.

15. Жукова, Г.С. Лучшие сроки и способы посадки картофеля [Текст] / Г. С. Жукова, Б.А. Писарев // Картофель и овощи. 1964. № 4. С. 2–5.

16. Методика исследований по культуре картофеля [Текст]. М.: НИИКХ, 1967. 262 с.

17. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта [Текст] / Б.А. Доспехов. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

Александр Анатольевич Васильев, доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник отдела картофелеводства, Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН, Екатеринбург, Россия, e-mail: kartofel_chel@mail.ru.

Целью данных исследований было изучение влияния сбалансированных норм минеральных удобрений на фотосинтетическую продуктивность, урожайность и качество клубней в лесостепной зоне Челябинской области в зависимости от сроков и глубины посадки картофеля. Постановка полевого опыта и обобщение результатов исследований выполнены в соответствии с классическими методиками. Установлено оптимальное сочетание агроприемов для формирования планируемых урожаев картофеля – посадка в начале первой декады мая на глубину 5–6 см и посадка в третьей декаде мая на глубину 10–12 см. Применение сбалансированных норм минеральных удобрений в расчете на урожай 40 т/га при этом сочетании агроприемов обеспечивает наибольший фотосинтетический потенциал (4,66 и 4,47 млн м²/га · дней), эффективное

использование фотосинтетически активной солнечной радиации, поступающей за вегетационный период (коэффициент использования ФАР – 3,6 и 3,7 %), высокий урожай (38,3 и 39,0 т/га) и качество клубней картофеля (крахмалистость клубней – 15,84 и 14,76 %, сбор крахмала с единицы площади – 6,07 и 5,75 т/га соответственно). Поздняя посадка картофеля (5–12 июня) снижала фотосинтетический потенциал в среднем на 19,3 % и коэффициент использования ФАР – на 0,5 %, что сопровождалось уменьшением как урожайности клубней (на 5,5 т/га), так и качества урожая. Крахмалистость клубней при этом снижалась на 2,2 %, а содержание нитратов в клубнях увеличивалось в 2,45 раза по сравнению с данным показателем, полученным при посадке 12–15 мая.

A. Vasilyev

EFFECTIVENESS OF CALCULATED DOSES OF FERTILIZERS RELATED TO THE TIME AND DEPTH OF POTATO PLANTING

Key words: *potatoes; variety; nutrition level; planting period; planting depth; yield capacity; starch; active photosynthetic radiation; PAR coefficient.*

Authors' personal details

Alexander Vasiliev, Doctor of Agricultural Sciences, scientific secretary, Ural Federal Agricultural Research Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 620142, Russia, Yekaterinburg, Belinsky St., 112 A, e-mail: kartofel_chel@mail.ru.

The study aimed to analyse the effect of balanced mineral fertilizers on photosynthetic productivity, yield capacity, and quality of potato tubers in the forest-steppe zone of Chelyabinsk region related to the planting time and depth. The field experiment was conducted, and findings were interpreted in line with conventional scientific practices. The study established the optimal combination of agricultural practices for the planned potato crops: potatoes should be planted at the beginning of May's first ten-day period at a depth of 5–6 cm. In the last ten-day period of May at a depth of 10–12 cm. Combining the practices mentioned above and the balanced rates of mineral fertilizers per the yield of 40 t/ha produces the most significant photosynthetic poten-

tial (4,66 and 4,47 million m²/ha · days). The practices ensure the effective use of photosynthetic active solar radiation received during the growing period (the PAR coefficient is 3,6 and 3,7 %), high yield (38,3 and 39,0 t/ha), and quality of potato tubers (starch content of 15,84 and 14,76 %, starch collected per unit area of 6,07 and 5,75 t/ha, respectively). Late planting lowered the photosynthetic potential by 19,3 % on average and the PAR coefficient by 0,5 %, resulting in a lower tuber yield (by 5,5 t/ha) and a lower potato quality. The tuber starch content decreased by 2,2 %, and the nitrate content in tubers increased 2,45 fold compared to the potatoes planted on May 12–15.

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Ключевые слова: рейтинг; сельское хозяйство; анализ; посевная площадь; финансовая деятельность; производство; интегральная оценка; линейное преобразование; аддитивный метод.

Введение. Важнейшее место в экономике страны и ведущую роль в жизни общества, несомненно, представляет сельское хозяйство. Специфичность данной отрасли обусловлена производством подавляющей массы продуктов питания, что является основой существования человека, и изготовлением сырья для промышленности, регулированием рабочей силы в секторе экономики. Производство продукции сельского хозяйства, в первую очередь, связано с природными условиями (фактор производства – земля), поэтому ее функцией является охрана и окультуривание окружающей среды, природного ландшафта. Сельское хозяйство в качестве системообразующего блока составляет долю валового внутреннего продукта государства, валовой добавленной стоимости и чистого дохода, служит одним из факторов благосостояния народа, поэтому увеличение объемов создания благ и повышение производительности, как правило, вносят существенный вклад в общее экономическое развитие страны.

Проблема, связанная с развитием сельского хозяйства и сельских районов, – это необходимость увеличения производства для обеспечения достаточного количества продуктов питания для населения вследствие постоянного роста потребностей. Нехватка товаров оказывает влияние на промышленность и, как следствие, на повышение общего уровня цен, что препятствует росту экономики страны, и наоборот, в регионах с перепроизводством – осуществлению контроля за действием сельскохозяйственной политики. Отрасль занимает важное место на рынке труда, поскольку очевидно, что в сельских районах она является одним из основных видов экономической деятельности, что влияет на экономический рост государства в целом. Дополняет такие традиционные функции, опосредованные рынком, косвенный вклад сельского хозяйства в общество: предоставление рабочей силы для урбанизированной рабочей силы, обеспечение сбережений для инвестиций в промышленность, расширение рынков промышленной продукции, предоставление экспортной выручки для оплаты импортных товаров капитала,

производство первичных материалов для агроперерабатывающей промышленности.

Трансформация экономики означает сдвиг страны в относительном вкладе ее технологий и секторов в общий валовой внутренний продукт (ВВП): чтобы процесс перехода от традиционных средств к современным был успешным, сельскохозяйственный сектор должен быть модернизирован. При разработке экономического механизма функционирования и развития сельского хозяйства необходим инструмент для восстановления технического потенциала данной отрасли региона. Он в свою очередь допускает обеспеченность сельскохозяйственных предприятий современной техникой, оборудованием, инвентарем; изучение способов для интенсивного пути экономического роста; внедрение новейших методов производства; разработку, реализацию и контроль мероприятий по привлечению финансовых структур.

Формирование на основе анализа рейтинговой оценки сельскохозяйственных товаропроизводителей центральной зоны Краснодарского края представляет особую важность и является актуальной задачей в настоящее время по причине нахождения региона на высокой позиции по производству и сбору различных культур, наличия развитой сети переработки, хранения продукции и торговли ею. Выращивание на территории Краснодарского края всего спектра культур умеренного пояса и отдельных культур субтропического пояса зависит от благоприятных природных условий. Ведущее место в России по урожайности зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, плодов и ягод, винограда принадлежит Кубани.

Исследование определяет возможные проблемы внутри субъектов в условиях аграрного сектора и, как следствие, допускает пути их решения. В работе представлена рейтинговая оценка сельскохозяйственных товаропроизводителей центральной зоны Краснодарского края. Важнейшим элементом в получении необходимых результатов с помощью анализа является выбор системы показателей и способы их

определения, поиск взаимосвязей между ними, получение комплексного и объективного представления о развитии сельскохозяйственного производства в определенном субъекте. Данным критериям соответствует методика интегральной оценки эффективности. Информация о деятельности внутри муниципальных образований находится в открытом доступе, размещена в сети Интернет на портале Федеральной службы государственной статистики.

Цель исследования – получение рейтинга сельскохозяйственных товаропроизводителей центральной зоны Краснодарского края с помощью проведения интегральной оценки.

Материалы и методы исследования. Объектами исследования выступают сельскохозяйственные товаропроизводители, ведущие деятельность на территории муниципальных образований центральной зоны Краснодарского края: Брюховецкий, Приморско-Ахтарский, Тимашевский, Кореновский, Выселковский, Динской, Тбилисский, Усть-Лабинский, Кавказский, Гулькевичский, Курганинский, Новокубанский районы.

Рейтинговую оценку сельскохозяйственных товаропроизводителей центральной зоны Краснодарского края допустимо обозначить как качественную характеристику и параметр, который можно количественно измерить. Данная оценка обязана проводиться в согласовании с определенными аспектами. Выбор критериев должен отражать экономичность, продуктивность и результативность. Ведущими критериями считаются: доступность информации и знаний, простота расчета и характеристики, которые занижают или завышают объективность. Реализовать эту оценку возможно методом применения синтетического (интегрального) показателя. Необходимо сформировать группу задач и целей для проведения анализа путем объединения некоторого набора параметров и показателей в единую систему, впоследствии данные критерии будут стандартизированы в соответствии с комплексным подходом для вычисления интегрального показателя. Существенным фактором для вывода результатов исследования является построение рейтинга объектов с учетом их влияния на развитие отрасли в том или ином показателе, группе. Процесс можно привести к алгоритму, который представлен на рисунке 1.

При разработке системы параметров и совокупных показателей необходимо определить фокус на тех элементах, которые можно регулировать.

Рисунок 1
Алгоритм рейтинговой оценки сельскохозяйственных товаропроизводителей центральной зоны Краснодарского края

Интегральная оценка базируется на 35 совокупных показателях, объединенных в 5 групп (параметров), которыми являются «Объем производства продукции», «Посевные площади сельскохозяйственных культур», «Наличие сельскохозяйственной техники», «Финансовая деятельность в аграрном секторе», «Валовые сборы сельскохозяйственных культур» (таблица 1). Данная структура, на наш взгляд, позволяет объективно оценить потенциал развития отрасли сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований центральной зоны Краснодарского края. Источником информации послужил портал Федеральной службы государственной статистики.

**Таблица 1 Классификатор параметров и показателей
сельскохозяйственных товаропроизводителей центральной зоны Краснодарского края**

Код	Наименование параметра / показатель
P1	Объем производства продукции
Объем производства продукции сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах)	
X1	Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации)
X2	Хозяйства населения (граждане)
X3	Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Объем производства продукции растениеводства (в фактически действовавших ценах)	
X4	Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации)
X5	Хозяйства населения (граждане)
X6	Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
P2	Посевные площади сельскохозяйственных культур
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации)	
X7	Зерновые и зернобобовые культуры – всего
X8	Зернобобовые культуры – всего
X9	Технические культуры – всего
X10	Бахчевые продовольственные культуры
Хозяйства населения (граждане)	
X11	Зерновые и зернобобовые культуры – всего
X12	Подсолнечник на зерно
X13	Овощи (без высадков)
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели	
X14	Зерновые и зернобобовые культуры – всего
X15	Кормовые культуры – всего
X16	Технические культуры – всего
P3	Наличие сельскохозяйственной техники
X17	Тракторы (без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и др. машины)
X18	Зерноуборочные комбайны
X19	Свеклоуборочные машины (без ботвоуборочных)
X20	Кормоуборочные комбайны
P4	Финансовая деятельность в аграрном секторе
X21	Прибыль (убыток) до налогообложения отчётного года по okved2
X22	Дебиторская задолженность по okved2
X23-	Задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги из общей суммы дебиторской задолженности по okved2
X24-	Задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги из общей суммы кредиторской задолженности по okved2
X25	Прибыль (убыток) до налогообложения прошлого года (по уточненным данным) по okved2
P5	Валовые сборы сельскохозяйственных культур
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации)	
X26	Зерновые и зернобобовые культуры – всего
X27	Зернобобовые культуры – всего
X28	Овощи – всего
X29	Бахчевые продовольственные культуры
Хозяйства населения (граждане)	
X30	Подсолнечник на зерно
X31	Картофель
X32	Плоды и ягоды
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели	
X33	Овес
X34	Горох
X35	Соя

Определение системы показателей и параметров – начальный этап интегральной оценки, далее следует приведение их к сопоставимому виду: осуществление стандартизации, основанной на линейном преобразовании переменных.

Данный вид стандартизации отличается значениями нормированных показателей, распределяющихся в интервале от 0 до 1. Показатель,

имеющий максимальную эффективность, среди остальных будет приниматься в качестве эталонного и равен 1, в обратном случае – 0. Следует отметить, что линейное преобразование используется для показателей различной направленности (положительной и отрицательной), вследствие этого предоставляются формулы 1, 2 для каждого случая.

Стандартизация показателей положительной направленности рассчитывается с помощью данной формулы:

$$x = \frac{x_i - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}, \quad (1)$$

где x – стандартизированный (нормированный) показатель, безразмерная величина; x_i – показатель, который необходимо нормировать; $x_{\min}$ – значение показателя эталонного объекта наименьшего значения.

Для показателей отрицательной направленности необходимо использовать следующую формулу:

$$x = \frac{x_i - x_{\max}}{x_{\min} - x_{\max}}. \quad (2)$$

Исполнение формулы 2 производилось для показателей «Задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги из общей суммы дебиторской задолженности по okved2», «Задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги из общей суммы кредиторской задолженности по okved2» параметра «Финансовая деятельность в аграрном секторе», остальные расчеты стандартизации осуществлялись на основе формулы 1.

Следующий этап вычисления интегральной оценки предполагает применение метода аддитивной свертки. Этот способ реализует принципы справедливой компенсации абсолютных

значений нормированных частных показателей, что представляется в виде взвешенной суммы частных критериев.

$$p_{i,j} = \sum_{i=1}^m a_{ij} \times x_{ij}, \quad (3)$$

где $p_{i,j}$ – показатель группы (параметр); a_{ij} – весовой коэффициент (сумма всех a_{ij} по группе показателей равна 1); x_{ij} – стандартизированный (нормированный) показатель.

Далее проводится дифференцирование сельскохозяйственных товаропроизводителей по муниципальным образованиям центральной зоны Краснодарского края по интегральному показателю, где предполагается упорядочивание объектов оценки по убыванию в связи с выбором метода аддитивной свертки. Полученные результаты позволяют дифференцировать районы по степени эффективности развития в них сельского хозяйства с помощью вычисления количества групп и величины внутригруппового интервала. В работе внутригрупповой интервал составил 2,180, а число групп равно шести. Заключительный этап предполагает ранжирование показателей интегральной оценки сельскохозяйственных товаропроизводителей центральной зоны Краснодарского края [1–9].

Результаты исследования. В таблице 2 приведены преобразованные значения параметров и интегрального показателя.

Таблица 2 Значения параметров и интегрального показателя сельскохозяйственных товаропроизводителей центральной зоны Краснодарского края

Муниципальный район	Объем производства продукции	Посевные площади сельскохозяйственных культур	Наличие сельскохозяйственной техники	Финансовая деятельность в аграрном секторе	Валовые сборы сельскохозяйственных культур	Интегральный показатель
Брюховецкий	2,379	3,704	1,222	2,865	1,795	11,964
Приморско-Ахтарский	1,756	3,325	0,398	1,627	2,679	9,786
Тимашевский	3,794	3,501	0,570	1,475	3,200	12,539
Кореновский	2,027	2,884	1,146	2,233	1,661	9,951
Выселковский	3,033	4,225	2,282	2,607	2,780	14,927
Динской	2,639	3,824	1,092	2,046	4,133	13,734
Тбилисский	1,704	1,805	0,257	2,334	1,583	7,682
Усть-Лабинский	3,741	5,695	2,287	3,761	5,275	20,759
Кавказский	2,368	4,286	0,818	2,156	1,964	11,592
Гулькевичский	2,606	3,181	1,881	2,455	2,777	12,901
Курганинский	4,249	3,998	0,605	1,954	3,417	14,223
Новокубанский	3,067	3,119	4,000	2,684	2,258	15,128

Двенадцатое место в интегральной оценке занимают сельскохозяйственные товаропроизводители Тбилисского района (7,682). Последнюю позицию они принимают и в других параметрах: малые объемы производства продукции,

нехватка площадей для посева сельскохозяйственных культур, как следствие, значение валовых сборов – неудовлетворительное. Слабая финансовая деятельность в связи с высокой задолженностью поставщикам и подрядчикам за то-

вары, работы и услуги из общей суммы кредиторской задолженности по okved2 компенсируется показателями прибыли (убытка) до налогообложения отчётного года по okved2 и дебиторской задолженностью по okved2, тем самым параметр достигает шестого места. Одиннадцатую позицию принимают сельскохозяйственные товаропроизводители Приморско-Ахтарского района как в интегральной оценке (9,786), так и по объему производства сельскохозяйственной продукции, наличию специализированной техники, финансовой деятельности. Большинство совокупных показателей первого параметра имеют последнее место, исключения составляют крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели (третье место по объему сельскохозяйственной продукции, второе – по объему продукции растениеводства), что свидетельствует о развитом частном секторе. Восьмая позиция принадлежит параметру «Посевные площади сельскохозяйственных культур», седьмая – «Валовые сборы сельскохозяйственных культур», что взаимосвязано и объективно.

Десятое место занимают товаропроизводители сельскохозяйственной отрасли Кореновского района, значение интегрального показателя которого составляет 9,951. В связи с небольшим числом посевных площадей, как следствие, приобретают малые значения объемы производства и валовые сборы сельскохозяйственных культур. Для устранения этой проблемы необходимо не только увеличение производства продукции, но и сокращение его потерь на всех стадиях. Производители, определяющие основные работы на территории муниципального района, в целом, обеспечены тракторами, комбайнами и прочей техникой, что определяет шестую позицию в третьем параметре. Дебиторская задолженность среди совокупных показателей принимает десятое место – весьма мало в организации финансовой деятельности. Сам параметр определяется седьмым местом в ранжированной системе.

Интегральный показатель сельскохозяйственных товаропроизводителей Кавказского района, равный 11,592, – на девятом месте. При большом наличии посевных площадей (второе место) имеет малые объемы производства и сборов продукции, причиной этому может служить недостаток сельскохозяйственной техники. Так, насчитывается всего 6 кормоуборочных комбайнов и 279 тракторов. Плохо развита финансовая деятельность – имеются высокие задолженности.

Товаропроизводители сельскохозяйственной отрасли Брюховецкого района занимают восьмое место в рейтинге (11,964), имеют низкие объемы производства среди сельскохозяйственных организаций и граждан при среднем значении земель и технического оборудования. Сбор продукции также небольшой. Однако высокая роль финансовой деятельности (второе место).

Сельскохозяйственные товаропроизводители Тимашевского района находятся на седьмой позиции, где интегральный показатель составляет 12,539. Небольшое количество техники не влияет на темпы посева, производства, сбора различных культур. Параметр «Финансовая деятельность в аграрном секторе» находится на двенадцатой позиции.

Шестое место и значение интегрального показателя 12,901 принадлежат товаропроизводителям сельскохозяйственной отрасли Гулькевичского района. Наблюдается развитый валовый сбор культур, высокая роль деятельности, связанной с финансами (2,455). Сельскохозяйственные организации обеспечиваются специализированной техникой (четвертое место).

Сельскохозяйственные товаропроизводители Динского района занимают пятую позицию (13,734). Характеризуются большим числом посевных земель и сбором культур, но небольшими объемами производства. Финансовые операции развиваются слабо. Показатели «Свеклоуборочные машины (без ботвоуборочных)» и «Кормоуборочные комбайны» имеют низкие частные рейтинги, что и воздействует на общий ранжированный список в параметре «Наличие сельскохозяйственной техники».

Четвертое место принадлежит товаропроизводителям сельскохозяйственной отрасли Курганинского района (14,223). По объему производства продукции имеют первую позицию. Наибольшим совокупным показателем в данном параметре является «хозяйства населения (граждане)» при значении 2352418 тыс. рублей (1,000 – эталонный показатель). Распространены площади для посева (четвертое место), однако наблюдается недостаток уборочных машин для больших территорий. Финансовая деятельность – на десятом месте.

Сельскохозяйственные товаропроизводители в Выселковском районе отличаются большим количеством земель для посева, сбора продукции, числом сельскохозяйственной техники. Они заинтересованы в производственной и финансовой деятельности – это и является следствием третьего места и высокого значения интегрального показателя (14,927).

Вторую позицию определяют товаропроизводители Новокубанского района (15,128). Проведение на предприятиях агропромышленного комплекса мероприятий по эффективному использованию производственного потенциала, финансовых ресурсов с применением новейшей техники (первое место) дает стабильность производства (четвертое место) и получения максимальных результатов.

Первое место занимают товаропроизводители сельскохозяйственной отрасли Усть-Лабинского района, где значение интегрального показателя составляет 20,759. Деятельность на территории муниципального образования характеризуется целесообразностью, здесь рационально используют посевные площади, поэтому товаропроизводители данного субъекта края входят в первую десятку среди других районов по урожайности зерновых и зернобобовых. Имеют отличные показатели производства, сбора культур, задействования в финансовую деятельность.

Хочется отметить, что повышение в сельскохозяйственной отрасли экономической эффективности, стабилизация производства достигаются путем целенаправленной оптимизации отрасли, создании дополнительных мер и индивидуальных мероприятий по улучшению качества параметров и показателей. Так, необходимо осуществлять анализ состояния отрасли, разрабатывать прогнозы ее на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы; содействовать формированию рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; обеспечивать технологическими, информационными разработками; организовывать реализацию комплекса мер по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей; допускать проведение действий для подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, руководителей; привлекать трудовые ресурсы и обеспечивать занятость в производствах; изучать причины недоиспользования

сельских территорий и на этой основе выработать меры по извлечению максимальных экономических ресурсов; производить сравнение фактического (имеющегося) результата с выгодно возможным, впоследствии давать оценку потенциала отдельных сельскохозяйственных товаропроизводителей, ведущих на территории муниципальных образований центральной зоны Краснодарского края отраслевую работу, группировать их в соответствии с уровнем развития производства.

Полученные значения интегрального показателя муниципальных образований центральной зоны Краснодарского края были дифференцированы по уровню их деятельности, это представлено в таблице 3. Таким образом, среди сельскохозяйственных товаропроизводителей, ведущих деятельность на территории муниципальных образований центральной зоны Краснодарского края, можно выделить Усть-Лабинский район с очень высоким уровнем развития, что подтверждается расчетами. Средний уровень достигнут сельскохозяйственными товаропроизводителями Выселковского, Курганинского, Новокубанского районов. Функционирование организаций в Динском, Гулькевичском, Тимашевском районах характеризуется приемлемым уровнем. В предложенной классификации низкий уровень занимают товаропроизводители Брюховецкого, Кореновского, Кавказского районов, а очень низкий – Тбилисского, Приморско-Ахтарского.

Рейтинговые значения в таблице 4 демонстрируют место сельскохозяйственных товаропроизводителей по определенной группе показателей (параметру) в целом. Целесообразность и объективность характеристики определяется в том случае, если показатели образуют взаимосвязанную систему, поскольку ранжирование основано на сборе совокупной информации. Порой основанием для составления рейтинга являются количественные выражения входных данных, а иногда выходных, другими словами, результатов деятельности в сельском хозяйстве.

Таблица 3 Классификация интегрального показателя

Уровень развития сельского хозяйства	Значение интегрального показателя		Наименование муниципального образования
	от	до	
Очень высокий	18,580	20,759	Усть-Лабинский район
Высокий	16,400	18,580	–
Средний	14,221	16,400	Выселковский, Курганинский, Новокубанский районы
Приемлемый	12,041	14,221	Динской, Гулькевичский, Тимашевский районы
Низкий	9,861	12,041	Брюховецкий, Кореновский, Кавказский районы
Очень низкий	7,682	9,861	Тбилисский, Приморско-Ахтарский районы

**Таблица 4 Рейтинговая оценка
сельскохозяйственных товаропроизводителей центральной зоны Краснодарского края**

Муниципальный район	Объем производства продукции	Посевные площади сельскохозяйственных культур	Наличие сельскохозяйственной техники	Финансовая деятельность в аграрном секторе	Валовые сборы сельскохозяйственных культур	Интегральный показатель
Брюховецкий	8	6	5	2	10	8
Приморско-Ахтарский	11	8	11	11	7	11
Тимашевский	2	7	10	12	4	7
Кореновский	10	11	6	7	11	10
Выселковский	5	3	3	4	5	3
Динской	6	5	7	9	2	5
Тбилисский	12	12	12	6	12	12
Усть-Лабинский	3	1	2	1	1	1
Кавказский	9	2	8	8	9	9
Гулькевичский	7	9	4	5	6	6
Курганинский	1	4	9	10	3	4
Новокубанский	4	10	1	3	8	2

Ранжированные списки дают объектам исследования стимулы к повышению результативности, разработке новой стратегии развития или переоценке старой в свете новой среды, помогают определить движущую силу экономических изменений, определяют инновационные планы, которые способствуют не только повышению урожайности, но и направлены на более сложный набор целей, в том числе сохранение природных ресурсов, повышение доходов в сельской местности.

Вывод. Сельское хозяйство играет ключевую роль в жизни общества, поэтому его развитие является обязательным условием экономического благополучия государства. Значительный вклад в процветание страны вносит Краснодарский край, который ориентирован на обеспечение продовольствием населения, постоянно растущей рабочей силой, не связанной с отраслью,

сырьем для промышленного производства. Сельскохозяйственная деятельность напрямую влияет на объем производства в торговле и, в свою очередь, воздействует на доходы людей [10–13].

Улучшение в конкретном регионе определяет стабильность и благосостояние государства, разрешает проблемы макроэкономического уровня. Проведение рейтинговой оценки сельскохозяйственных товаропроизводителей центральной зоны Краснодарского края охватывает практически все стороны рассматриваемой сферы, быстро и объективно дает представление о состоянии отрасли в том или ином районе, определяет слабые и сильные стороны, тем самым выявляет резервы для устойчивого и эффективного развития, допускает динамичность в повышении уровня производственного потенциала, определяет организацию мониторинга деятельности.

Библиографический список

1. Аджиева, К.И. Особенности развития сельского хозяйства в регионе [Текст] / К.И. Аджиева // Вопросы структуризации экономики. 2009. № 3. С. 21–23.
2. Акимов, А.А. Целевые рейтинги развития сельского хозяйства [Текст] / А.А. Акимов // Региональная экономика: теория и практика. 2008. № 13. С. 93–96.
3. Белоцерковский, А.В. К вопросу о рейтингах и рангах [Текст] / А.В. Белоцерковский // Высшее образование в России. 2014. № 1. С. 3–10.
4. Бородин, К.Г. Метод оценки состояния агропродовольственных рынков [Текст] / К.Г. Бородин // Проблемы прогнозирования. 2008. № 2. С. 112–123.
5. Бурда, А.Г. Экономическое и сельскохозяйственное зонирование при моделировании воспроизводства материально-технической базы агропроизводственных систем [Текст] / А.Г. Бурда, В.И. Полусмак, О.В. Кучер // Фундаментальные исследования. 2019. № 2. С. 10–15.
6. Воитлева, З.А. Роль сельского хозяйства в обеспечении продовольственной безопасности России [Текст] / З.А. Воитлева // Journal of new economy. 2011. № 5 (37). С. 177–181.
7. Зенченко, С.В. Система интегральной оценки финансового потенциала региона и методика ее формирования [Текст] / С.В. Зенченко, В.И. Бережной // Региональные проблемы преобразования экономики. 2010. № 2 (15). С. 22–30.

8. Косников, С.Н. Совершенствование методических подходов к оценке уровня экономического развития сельских территорий Краснодарского Края [Электронный ресурс] / С.Н. Косников // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ). Краснодар: КубГАУ, 2014. № 10 (104). Режим доступа: <http://ej.kubagro.ru/2014/10/pdf/07.pdf>.

9. Кучер, О.В. Перспективы внедрения инструментальных средств финансового анализа на предприятиях АПК [Текст] / Кучер О.В. // Информационные технологии в науке нового времени: сборник статей Международной научно-практической конференции. 2016. С. 119–121.

10. Кучер, О.В. Совершенствование методических подходов к рейтинговой оценке финансового состояния организаций АПК [Текст] / Кучер О.В., Косников С.Н. // Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам XI Всероссийской конференции молодых ученых, посвященной 95-летию

Кубанского ГАУ и 80-летию со дня образования Краснодарского края. Ответственный за выпуск А.Г. Кошаев. Краснодар: КубГАУ, 2017. С. 253–254.

11. Лойко, В.И. Подход к оценке интегрального показателя риска интегрированных производственных систем [Электронный ресурс] / В.И. Лойко, Н.В. Ефанова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ). Краснодар: КубГАУ, 2005. № 3 (18). Режим доступа: <http://ej.kubagro.ru/2005/03/18/>.

12. Методы и средства моделирования в экономике. Инструментальные средства математической экономики [Текст]: учеб. пособие / С.Н. Косников. Краснодар: КубГАУ, 2019. 170 с.

13. Саубанов, Р.Х. Роль сельского хозяйства в экономическом развитии регионов России [Текст] / Р.Х. Саубанов // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. 2012. № 15. С. 109–114.

Сведения об авторах

1. **Молодченко Вероника Юрьевна**, студентка 2 курса факультета прикладной информатики, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, e-mail: veron_mol@mail.ru.

2. **Косников Сергей Николаевич**, кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.

Актуальной проблемой становится положение и развитие одного из крупнейших элементов агропромышленного комплекса – сельского хозяйства. В статье проводятся исследование и мониторинг различных характеристик отрасли среди субъектов центральной зоны Краснодарского края. В работе выделяются основные направления и функции сельского хозяйства. Информация о деятельности внутри муниципальных образований находится в открытом доступе – размещается в сети Интернет на портале Федеральной службы государственной статистики. В деятельности определяются возможные пробелы для достижения экономической эффективности, стабилизации производства и потенциала использования сельских территорий. Статья включает описание методик, определение этапов оценки, обоснование выбора параметров и показателей, приведение их в сопоставимый вид путем стандартизации, осуществления способа свертки, поиска рейтинга. Работа предполагает расчет интегральных показателей

методом аддитивной свертки, дифференцирование муниципальных образований и их ранжирование. В результате применения данного подхода выводятся значения показателей и параметров, анализ которых позволяет выявить проблемы деятельности, выработать решения. Система ранжирования служит эффективным инструментом управления и стимулирования объекта центральной зоны края для достижения определенной позиции. Проведённые исследования показывают уровень развития сельского хозяйства в субъекте края, определяют конкретные элементы системы, позволяют выработать план мероприятий и действий для достижения высоких результатов в различных категориях. Таким образом, проведение интегральной оценки, создание на ее основе ранжированного списка дают понимание структуры сельского хозяйства, определяют преимущества в работе и управлении сектором, обнаруживают и допускают устранение недостатков, определяют мероприятия по обновлению сложившихся условий.

RATING OF AGRICULTURAL PRODUCERS IN THE CENTRAL ZONE OF KRASNODAR TERRITORY

Key words: *rating; agriculture; analysis; crop acreage; financial activity; production; integral assessment; linear transformation; additive method.*

Authors' personal details

1. **Veronika Molodchenko**, 2nd-year student of the Faculty of Applied Informatics, Kuban State Agrarian University, named after I.T. Trubilin, 350044, Krasnodar, Kalinin St., 13, e-mail: veron_mol@mail.ru.

2. **Sergey Kosnikov**, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, 350044, Krasnodar, Kalinina St., 13.

Currently, agriculture's status and development as one of the largest sectors of the agro-industrial complex is a relevant issue. The paper reviews the research and monitoring data on various characteristics of the industry among the subjects of the central zone of Krasnodar territory. The paper highlights the main areas and functions of agriculture. Information on the activities within municipalities is publicly available. It is posted on the website of the Federal state statistics service. The paper shows options in the municipalities' activities for economic efficiency, sustainable production, and potential use of rural areas. The paper describes suitable methods, identifies evaluation stages, provides a rationale of parameters and indices. They are reduced to comparable terms by standardization, convolution, rating search. The process involves calculating integral indices by additive convolution, differentiation of mu-

nicipalities, and their ranking. As a result, index and parameter values are derived. Based on the values, the activity problems can be revealed, and solutions to the problems can be elaborated. The ranking system helps manage and stimulate the region's central zone's object to achieve a particular position. The research has determined the level of agricultural development in the region and identified the system's specific elements. Based on the research findings, an implementation plan can be created for achieving high results in various categories. Thus, the integral assessment provides the basis for creating a ranked list. The procedures clarify the structure of agriculture, determine the advantages in working and managing the sector, detect and allow for the elimination of shortcomings, and determine measures to improve the existing conditions.

© Молодченко В.Ю., Косников С.Н.

УДК 637.1

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-31-38

В.А. Асафов, В.Д. Харитонов, Н.Л. Танькова, Е.Л. Исакова, П.В. Кузнецов, В.Т. Габриелова

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ СОЕВОГО БЕЛКА В РАЦИОНАХ КОРМЛЕНИЯ ТЕЛЯТ

Ключевые слова: *заменитель цельного молока; изолят соевого белка; гидролиз белков; соевая мука; факторы кормления; рост телят.*

Введение. От правильного развития молодняка в определенной степени зависит реализация генетического потенциала молочной продуктивности дойного стада, включая продолжительность лактации, а также экономические аспекты производства молока. Для этого телят необходимо скармливать не менее 300–350 литров молока. Для поддержания товарного произ-

водства молока требуется ежегодное пополнение молодняка в молочном стаде – около 40 голов на 100 коров [1]. поголовье коров в России составляет в настоящее время около 8,0 млн голов, а за вычетом поголовья личных подсобных хозяйств – 4,6 млн голов [2]. Для этого поголовья молодняка требуется около 1,3 млн т молока. В то же время использование цельного молока

для выпойки телят снижает товарность молока и увеличивает затраты на содержание стада.

Для повышения товарности и сокращения издержек при выращивании животных используют различные виды заменителей цельного молока (ЗЦМ). Оценочная потребность в ЗЦМ составляет 100–120 тыс. т в пересчете на сухие вещества. В настоящее время известны и используются следующие основные типы ЗЦМ [3]: на обезжиренном молоке и немолочных жирах; на концентрате белков молочной сыворотки и немолочных жирах; на молочной сыворотке, концентратах и изолятах соевого белка и немолочных жирах; на молочной сыворотке, соевой муке и немолочных жирах.

По способу производства различают: продукт, приготовленный в жидком виде и высушенный на распылительной сушилке; регенерированное молоко – продукт, приготовленный сухим смешиванием ингредиентов, включая жир.

Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Более технологично в изготовлении регенерированное молоко. Однако в этом случае имеется проблема внесения жиров. Корм для телят не должен содержать свободных жиров. При их наличии телята плохо усваивают корм и плохо развиваются. Поэтому, как правило, регенерированное молоко имеет невысокий процент жира (12 %). При этом соотношение жир/белок составляет 0,5/1, тогда как в молоке – 1,2/1. Таким образом, телята могут недополучать необходимую для роста энергию или потреблять больше корма для ее восполнения. Производство ЗЦМ в России составляет 10–11 тыс. т, а по импорту поступает около 32 тыс. т [4]. Современное состояние производства ЗЦМ не обеспечивает потребностей животноводства в нем.

С нашей точки зрения, для развития рынка ЗЦМ необходима разработка новых конкурентных методов их получения на основе процессов ферментации и консервирования с различной степенью обезвоживания с целью улучшения качества и снижения сырьевой себестоимости [5, 6]. Перспективным направлением в этой связи является ферментативная обработка растительного сырья и использование многостадийного обезвоживания, в том числе на основе получения продуктов с промежуточной влажностью [6]. Современное производство ЗЦМ базируется в основном на использовании молочной сыворотки, немолочных жиров и белков. Наиболее проблемным компонентом в рецептурах ЗЦМ является источник растительного белка. Как правило, с этой целью применяют различные виды источников белков: соевую муку, концен-

траты и изоляты белков сои. Соевая мука содержит ряд антипитательных веществ, включая лектины, олигосахара и аллергены. Эти компоненты не равноценны по качеству и в ряде случаев требуют специальной обработки для использования в ЗЦМ. К изолятам и концентратам белков сои также применяют специальные требования, в основном в части контроля антигенов [7].

Таким образом, развитие исследований и теоретических обобщений в области новых видов конкурентоспособных кормов для молодняка сельскохозяйственных животных является актуальным, в том числе происходящее путем осуществления выбора и реализации оптимальных для данной технологии способов обезвоживания, ресурсо- и энергосбережения, а также получения продуктов повышенного качества.

Целью исследований, проводимых ФГАНУ «ВНИМИ», является разработка энерго- и ресурсосберегающих технологий ферментированных видов заменителей цельного молока для молодняка с.-х. животных с различной степенью обезвоживания [6]. В данной работе приводятся результаты зоотехнической оценки ЗЦМ на основе различных источников белков.

Одним из перспективных направлений повышения качества ЗЦМ является использование специализированных видов соевого белка, обладающих оптимизированным составом компонентов или подвергнутых определенной биотехнологической трансформации с целью расширения спектра функциональных свойств [7]. В частности, потенциально определенных преимуществ в данной области можно достичь, используя гидролиз белковых компонентов в ЗЦМ. Это связано с тем, что гидролизованые белки позволяют осуществлять изменение его пептидного профиля и на этой основе модификацию свойств в нужном направлении [8, 9]. Кроме того, существенным фактором, определяющим качество белков, предназначенных для кормления молодняка, являются их антигенные свойства, регулирование которых можно осуществлять путем ферментативной обработки [10].

Некоторые аспекты, связанные с выращиванием телят. Важным аспектом, который необходимо учитывать, является решение вопросов оптимизации состава и использования ЗЦМ в структуре питания молодняка сельскохозяйственных животных. На выращивание молодняка приходится 20 % общих затрат, связанных с производством молока. Наиболее эффективным способом снижения этих затрат является сокращение времени выращивания. Естественно, что достижение соответствующей ско-

рости роста зависит от успешного выращивания молодняка. Это позволяет ему набрать нормальную массу и обеспечить первый отел в идеальном возрасте. Оптимальный возраст первого отела – около 24 месяцев. Если отел приходится на возраст в 2,5 и более лет, то это значит, что необходимо содержать больше скота [1].

Другим фактором, который учитывается при выращивании молодняка, является масса животного при первом отеле. Исследования по определению оптимальной массы телок фризской и голштинской пород в различной возрастной категории показали, что для достижения массы 110 кг и 130 кг в первые 4 месяца жизни телята этих пород должны набирать в среднем ежедневно по 0,6 и 0,7 кг соответственно (таблица 1) [11].

Скорость роста телок влияет также на возраст половой зрелости и, соответственно, на массу при первом отеле. Если телята растут очень медленно ($< 0,35$ кг/день), то половая зре-

лость не наступает до 18–20 месяцев [12]. Слишком интенсивная скорость роста телок может быть так же вредной, как и слишком медленная. Установлено, в частности, что интенсивный или «ускоренный» рост, который ведет к ожирению до половой зрелости, снижает процесс развития ткани молочной железы. Критический период развития ткани молочной железы – от трех до десяти месяцев. Имеются данные о том, что ускоренный рост в этот период в дальнейшем снижает выход молока. Коровы при избыточном росте до наступления половой зрелости не дают столько молока во время первой или последующей лактации, как коровы, рост которых находился под контролем (таблица 2) [13].

Таким образом, несмотря на то, что есть много факторов, которые могут повлиять на здоровье, рост телок и их продуктивность, организация правильной программы кормления и важность кормления молоком или ЗЦМ вместе со стартером очевидны [1].

Таблица 1 Рекомендуемая масса молодняка, кг

Возраст животного (мес.)	Стандартная масса для породы	
	фризская	голштинская
0	40	45
4	110	130
10	220	275
12	250	325
15	320	400
22	480	575
24	520	600

Таблица 2 Влияние скорости роста молодняка Голштинской породы до наступления половой зрелости на выработку молока при первой лактации

Показатель	Контролируемая скорость роста	Интенсивная скорость роста
Скорость роста до наступления половой зрелости, кг/день	0,7	1,01
Масса тела (перед отелом), кг	623	613
Выход молока за 305 дней лактации, кг	8305	7800

Материалы, методы и результаты исследований. ФГАНУ «ВНИМИ» совместно с компанией «Дюпон» проводились исследования по изучению скорости роста молочных телят, вскармливаемых заменителями молока с соевым белком из различных источников.

Цель эксперимента – проведение зоотехнической оценки эффективности использования заменителей цельного молока на основе гидролизованного соевого белка при выкармливании телят в возрасте от 4 до 84 дней.

Эксперимент проводился путем набора опытных групп телят, которых выкармливали согласно схемам кормления, представленным в таблицах 3, 4 и 5.

В эксперименте использовались:

1. Заменитель цельного молока на основе гидролизованного изолята соевого белка с массовой долей жира 16 % согласно рецептуре, разработанной ВНИМИ.
2. Промышленный заменитель цельного молока на основе обезжиренного молока с массовой долей жира 16 %.
3. Промышленный заменитель цельного молока на основе соевой муки с массовой долей жира 16 %.

Каждую группу телок в количестве 12 голов отбирали в первый день жизни, при этом исключали заведомо больных телят. Группы рандомизировали по полу, общему состоянию и средней массе телят.

Таблица 3 Схема кормления телят до 3-месячного возраста с применением ЗЦМ на основе гидролизованного соевого белка

Возраст телят, недели / дни	Ежедневное потребление молозива / ЗЦМ	Количество ЗЦМ (г) / воды (л) на одно кормление	Потребление грубых кормов	
			комбикорм / стартер	сено, силос
1–2 день	Молозиво 1,5 л × 4 р/день	–	–	–
3 день	Молозиво 1,5 л × 3 р/день			
4 день	Молоко ¾ + ЗЦМ ¼ 1,5 л × 3 р/день			
5 день	Молоко ½ + ЗЦМ ½ 1,5 л × 3 р/день			
6 день	Молоко ¼ + ЗЦМ ¾ 1,5 л × 3 р/день			
7–10 день	ЗЦМ 2 л × 2 р/день	250 / 1,75	Приучение (~50 г/день)	Сено и силос без ограничений, вода по необходи- мости
11–14 день				
3 нед.	ЗЦМ 3,2 л × 2 р/день	400 / 2,8	До 300 г/день	
4 нед.	ЗЦМ 4 л × 2 р/день	500 / 3,5	До 500 г/день	
5 нед.	ЗЦМ 4 л × 2 р/день	500 / 3,5	До 800 г/день	
6 нед.	ЗЦМ 4 л × 2 р/день	500 / 3,5	До 1200 г/день	
7 нед.	ЗЦМ 3,6 л × 2 р/день	450 / 3,15	До 1400 г/день	
8 нед.	ЗЦМ 3,6 л × 1 р/день	450 / 3,15	До 1700 г/день	
9 нед.	ЗЦМ 2,4 л × 1 р/день	300 / 2,10	Стандартный комбикорм по потребности (2–3 кг/день)	
10–12 нед.	ЗЦМ 1,5 л × 1 р/день по необходимости	188 / 1,3		Неограниченно

Таблица 4 Схема кормления телят до 3-месячного возраста с применением ЗЦМ с обезжиренной соевой мукой

Возраст телят, недели / дни	Ежедневное потребление молозива / ЗЦМ	Количество ЗЦМ (гр) / воды (л) на кормление	Потребление грубых кормов	
			комбикорм «Стартер»	сено (г/день)
1 день	Молозиво 1 л × 4 р/день	–	–	–
2–4 день	Молозиво 1 л × 3 р/день	–		
5–7 день	Молозиво 1 л × 1 р/день, ЗЦМ 1 л × 2 р/день	100 / 0,9		
2 нед.	ЗЦМ 2 л × 2 р/день	200 / 1,8	С 10-ого дня 50 гр	50
3 нед.	ЗЦМ 2 л × 2 р/день	200 / 1,8	100	50
4 нед.	ЗЦМ 2 л × 2 р/день	200 / 1,8	150	50
5 нед.	ЗЦМ 3 л × 2 р/день	300 / 2,7	250	100
6 нед.	ЗЦМ 3 л × 2 р/день	300 / 2,7	400	150
7 нед.	ЗЦМ 2 л × 2 р/день	200 / 1,8	600	200
8 нед.			800	300
9 нед.			1000	400
10 нед.	ЗЦМ 2 л × 2 р/день	200 / 1,8	1500	500

Таблица 5 Схема кормления телят до 3-месячного возраста с применением ЗЦМ на основе обезжиренного молока

Возраст телят, недели / дни	Ежедневное потребление молозива/ ЗЦМ	Количество ЗЦМ (гр.) / воды (л) на кормление	Потребление грубых кормов	
			комбикорм «Стартер»	сена, силоса, воды
1–2 день	Молозиво 1,5 л × 4 раза в день	–	–	–
3 день	Молозиво 1,5 л × 1 р/день, ЗЦМ 1 л × 2 р/день	125 / 0,875		
4–7 день	ЗЦМ 1,5 л × 2 р/день	187 / 1,3		
8–14 день	ЗЦМ 2 л × 2 р/день	250 / 1,75	С 10-ого дня 50 г/день	вода ~ 10 % массы те- ленка в одно кормление, сено и силос без ограниче- ний
3 нед.	ЗЦМ 2,5 л × 2 р/день	312 / 2,2	100 г/день	
4 нед.	ЗЦМ 3 л × 2 р/день	375 / 2,6	250 г/день	
5 нед.	ЗЦМ 3,5 л × 2 р/день	437 / 3,1		
6 нед.	ЗЦМ 3 л × 2 р/день	375 / 2,6	400 г/день	
7 нед.	ЗЦМ 2,5 л × 2 р/день	312 / 2,2	600 г/день	
8 нед.			800 г/день	
9 нед.			1000 г/день	
10 нед.	ЗЦМ 2 л × 2 р/день	250 / 1,75	1500 г/день	
11 нед.	ЗЦМ 1,5 л × 2 р/день	187 / 1,3	1800 г/день	
12 нед.			2000 г/день	

Помимо заменителей цельного молока в эксперименте всем группам телят давали с 10-ти дней вволю воду, сено хорошего качества (и/или подвяленную траву, сухой силос) и комбикорм следующего состава:

Просо	25,0 %
Пшеница	22,6 %
Овес	15,0 %
Кукуруза	15,0 %
Соевый шрот	14,0 %
Подсолнечниковый шрот	5,0 %

Известняк 2,0 %
Трикальцийфосфат 1,4 %
Метаболическая энергия (Мкал/кг с. в.) 2,9
Комбикорм нормировали из расчета 60 кг на теленка до 84 дня жизни. В процессе проведения эксперимента ежедневно регистрировалось общее состояние здоровья, аппетит, ветеринарные процедуры (если производились) для каждого теленка; ежедекадно регистрировались масса и количество съеденных грубых кормов (таблица 6).

Таблица 6 Средняя живая масса молодняка

Вид ЗЦМ	День жизни теленка					
	5	30	60	85	120	150
1. ЗЦМ на основе гидролизованного соевого белка. Масса теленка, кг	44,7	53,5	71,2	91,9	123,6	151,2
Среднесуточный прирост за месяц, г	—	293	590	690	1057	920
Доверительный интервал	2,4	2,7	3,1	4,3	8,1	7,5
2. ЗЦМ на основе сухого обезжиренного молока. Вес теленка, кг	43,9	48,4	63,6	80,0	113,4	136,1
Среднесуточный прирост за месяц, г	—	150	507	547	1113	757
Доверительный интервал	2,6	1,9	2,9	5,7	9,9	10,4
3. ЗЦМ на основе обезжиренной соевой муки. Масса теленка, кг	43,5	41,7	56,3	76,8	107,1	110,1
Среднесуточный прирост за месяц, г	—	—60	486	683	1010	100
Доверительный интервал	2,9	2,7	6,4	7,7	7,6	8,7

Проведена также оценка общего состояния, состояния здоровья в группах:

1. Группа, получавшая ЗЦМ на основе гидролизованного соевого белка: общее состояние телят в группе хорошее, отклонений от физиологической нормы для данного возраста не обнаружено, состояние здоровья хорошее, из группы был выбракован один теленок в возрасте 2,5 месяца с диагнозом бронхопневмония.

2. Группа, получавшая ЗЦМ на основе обезжиренного молока: общее состояние телят в группе хорошее, отклонений от физиологической нормы для данного возраста не обнаружено, состояние здоровья хорошее.

3. Группа, получавшая ЗЦМ на основе соевой муки: общее состояние телят в группе неудовлетворительное, телята отстают в росте, часто болеют. В группе пал один теленок в возрасте 1 месяца — диагноз бронхопневмония, осложненная гастроэнтеритом; три теленка выбракованы в возрасте 1,5 месяцев с диагнозом бронхопневмония и авитаминоз. Результаты, представленные в таблице 6, показывают дан-

ные о росте телят в виде среднесуточного прироста и живой массы через 150 дней.

Показатели роста телят, вскармливаемых заменителями молока на основе гидролизованного соевого белка, были выше, чем при вскармливании другими кормами. Среднесуточный прирост 740 г/день можно считать удовлетворительным для телок в фазе развития до достижения половой зрелости. Заданная масса через 150 дней достигалась при использовании заменителя молока на основе гидролизованного изолята соевого белка. За тот же период рост телят, вскармливаемых заменителем молока, содержащим соевую муку, был очень медленным и недостаточным для достижения заданной массы.

Заключение. При использовании заменителей цельного молока для выпойки телят особое внимание следует обращать на выбор источника белка, который используется в рецептурах. Удовлетворительного роста телят молочных пород можно достичь при употреблении ЗЦМ на основе очищенных и гидролизованных соевых белков.

Библиографический список

1. Kertz A.F., Hill T.M., Quigley J.D., Heinrichs A.J., Linn J.G., Drackley J.K. A 100-Year Review: Calf nutrition and management. J. Dairy Sci. 100:10151–10172. <https://doi.org/10.3168/jds.2017-13062>.

2. Демидова, М. Эксперты сельхозпереписи посчитали, сколько в России коров [Электронный ресурс] // М. Демидова. Режим доступа: <https://yakapitalist.ru/finansy/skolko-v-ros-sii-korov>. Москва, 1 июня 2019 года.

3. Радаева, И.А. Технология молочных консервов и заменителей цельного молока [Текст]: справочник / И.А. Радаева, В.С. Гордезиани, С.П. Шулькина. М.: Агропромиздат, 1986. 351 с.

4. Обзор рынка: заменители цельного молока [Текст] / Г. Локтионова // Ценовик. 2013. № 3.

5. Асафов, В.А. Концентрированные формы заменителя молока на растительной основе для молодняка сельскохозяйственных животных [Текст] / В.А. Асафов, Ю.И. Филатов, Н.Л. Танькова, Е.Л. Исакова, В.В. Мяленко // Научное обеспечение молочной промышленности (ВНИМИ80): сборник научных трудов. М., 2009. С. 18–20.

6. Kharitonov V.D., Burlev M.Ya., Kuznetsov P.V., Mertinc P. Some Reculiazities related to formation of Dried Milk Products properties. J. Food and Raw Materials. 2017. Т. 5. № 2. Р. 161–167.

7. Зобкова, З.С. Продукты на основе соевых компонентов для профилактического и диетического питания [Текст] / З.С. Зобкова, Т.П. Фурсова // Молочная промышленность. 1998. № 5. С. 15–16.

8. Зорин, С.Н. Ферментативные гидролизаты пищевых белков для специализированных

пищевых продуктов диетического (лечебного и профилактического) питания [Текст] // Вопросы питания. 2019. Т. 88, № 3. С. 23–31. doi: 10.24411/0042-8833-2019-10026.

9. Агаркова, Е.Ю. Ферментативная конверсия как способ получения биологически активных пептидов [Текст] / Е.Ю. Агаркова, А.Г. Кручинин // Вестник МГТУ. 2018. Т. 21. № 3 (июль-сентябрь). С. 412–417.

10. Long He, Meng Han, Shiyan Qiao, Pingli He, Defa Li, Na Li, Xi Ma. Soybean Antigen Proteins and their Intestinal Sensitization Activities. Current Protein & Peptide Science, volume 16, Issue 7, 2015, doi: 10.2174/1389203716666150630134602.

11. Drackley J.K. Calf nutrition related to heifer growth and longevity. 2000. P. 153–168.

12. Wattiaux M.A. Babcock Institute for International Dairy Research and Development. University of Wisconsin. Bulletin: Heifer raising weaning to calving 34, growth rate, 2000, pp. 133–136.

13. Lalles J.P., Toullec R., Branco Pardal P. and Sissons J.W. Hydrolyzed soy protein isolate sustains high nutritional performance in veal calves. J. Dairy Sci., 1995, 78, pp. 194–204.

Сведения об авторах

1. **Асафов Владимир Александрович**, кандидат технических наук, зав. сектором технологий функциональных продуктов и кормов, лаборатория ресурсосберегающих процессов и функциональных продуктов, ФГАНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности», 115093, Россия, г. Москва, ул. Люсиновская, 35, корп. 7, e-mail: v_asafov@vnimi.org, ORCID: 0000-0001-8533-8649.

2. **Харитонов Владимир Дмитриевич**, доктор технических наук, главный научный сотрудник, академик РАН, лаборатория ресурсосберегающих процессов и функциональных продуктов, ФГАНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности», 115093, Россия, г. Москва, ул. Люсиновская, 35, корп. 7, e-mail: gnu-vnimi@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-1829-7360.

3. **Танькова Нина Леонидовна**, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, сектор технологий функциональных продуктов и кормов, лаборатория ресурсосберегающих процессов и функциональных продуктов, ФГАНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности», 115093, Россия, г. Москва, ул. Люсиновская, 35, корп. 7, e-mail: n_tankova@vnimi.org.

4. **Кузнецов Павел Владимирович**, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, лаборатория молочных консервов, ФГАНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности», 115093, Россия, г. Москва, ул. Люсиновская, 35, корп. 7, e-mail: p_kuznetsov@vnimi.org.

5. **Исакова Евгения Леонидовна**, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, сектор технологий функциональных продуктов и кормов, лаборатория ресурсосберегающих процессов и функциональных продуктов, ФГАНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности», 115093, Россия, г. Москва, ул. Люсиновская, 35, корп. 7, e-mail: e_isakova@vnimi.org, ORCID: 0000-0002-9090-2678.

6. **Габриелова Валентина Тихоновна**, старший научный сотрудник, лаборатория молочных консервов, ФГАНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности», 115093, Россия, г. Москва, ул. Люсиновская, 35, корп. 7, e-mail: v_gabrielova@vnimi.org.

В данной статье приведены сведения о состоянии производства заменителей цельного молока для выпойки молодняка и дана характеристика способов и сырьевых источников их получения. Обсуждены некоторые аспекты развития технологий, направленные на получение качественных кормов при снижении энергозатрат на их производство. Одним из перспективных направлений повышения качества заменителей цельного молока является использование специализированных видов соевого белка, обладающих оптимизированным составом компонентов или подвергнутых определенной биотехнологической трансформации с целью расширения спектра функциональных свойств. Представлены сведения по влиянию скорости роста молодняка крупного рогатого скота на продуктивность молочного стада. Обозначены факторы, влияющие на развитие телят и продуктивность коров. Среди них – скорость роста телят, возраст

и масса животного при первом отеле. Проведена зоотехническая оценка эффективности использования заменителей цельного молока на основе гидролизованного соевого белка, обезжиренных молока и соевой муки при выкармливании телят в возрасте от 4 до 84 дней. Результаты исследований указывают, что особое внимание следует обращать на выбор источника белка, используемого в заменителях молока. Показатели роста телят, вскармливаемых заменителями молока на основе гидролизованного соевого белка, были выше, чем при вскармливании другими кормами. Заданная масса достигалась при использовании заменителя молока на основе гидролизованного изолята соевого белка. За тот же период рост телят, вскармливаемых заменителем молока, содержащим соевую муку, был очень медленным и недостаточным для достижения заданного веса.

V. Asafov, V. Kharitonov, N. Tan'kova, Ye. Iskakova, P. Kuznetsov, V. Gabriyelova

SOME ASPECTS OF USING DIFFERENT SOY PROTEINS IN THE FEEDING DIETS OF CALVES

Key words: *whole milk substitute; soy protein isolate; hydrolysis of proteins; soy flour; feeding factors; calf growth.*

Authors' personal details

1. **Vladimir Asafov**, Candidate of Technical Sciences, head of the sector of technologies of functional products and feed, laboratory of resource-saving processes and functional products, All-Russian Research Institute of the Dairy Industry, 115093, Russia, Moscow, Lyusinovskaya St., 35, building 7, e-mail: v_asafov@vnimi.org, ORCID: 0000-0001-8533-8649.

2. **Vladimir Kharitonov**, Doctor of Technical Sciences, Chief Researcher, member of the Russian Academy of Sciences, Laboratory of resource-saving processes and functional products, All-Russian Research Institute of the Dairy Industry, 115093, Russia, Moscow, Lyusinovskaya St., 35, building 7, e-mail: gnu-vnimi@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-1829-7360.

3. **Nina Tan'kova**, Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Sector of Technologies for Functional Products and Feed, Laboratory of Resource-Saving Processes and Functional Products, All-Russian Research Institute of the Dairy Industry, 115093, Russia, Moscow, Lyusinovskaya St., 35, building 7, e-mail: n_tankova@vnimi.org.

4. **Pavel Kuznetsov**, Candidate of Technical Sciences, Leading Researcher, Laboratory of Canned Dairy Products, All-Russian Scientific Research Institute of the Dairy Industry, 115093, Russia, Moscow, Lyusinovskaya St., 35, building 7, e-mail: p_kuznetsov@vnimi.org.

5. **Evgeniya Iskakova**, Candidate of Technical Sciences, Leading Researcher, Sector of Technologies for Functional Products and Feed, Laboratory of Resource-Saving Processes and Functional Products, All-Russian Research Institute of the Dairy Industry, 115093, Russia, Moscow, Lyusinovskaya St., 35, building 7, e-mail: e_iskakova@vnimi.org, ORCID: 0000-0002-9090-2678.

6. **Valentina Gabriyelova**, Senior Researcher, Laboratory of Canned Dairy Products, All-Russian Research Institute of the Dairy Industry, 115093, Russia, Moscow, Lyusinovskaya St., 35, building 7, e-mail: v_gabriyelova@vnimi.org.

This article provides the production data of whole milk substitutes for feeding calves and describes the used techniques and raw materials. The study discusses some aspects of technology development to obtain high-quality feed while reducing energy costs. One of the promising directions for improving the quality of whole milk substitutes is soy protein specialized types with an optimized composition of components or subjected to a specific biotechnological transformation to expand the range of functional properties. Information is presented on the effect of the young cattle growth rate on the dairy herd's productivity. The factors influencing the development of calves and the productivity of cows are indicated. Among them are a calf

growth rate, age, and weight of the animal at the first calving. A livestock-related efficiency assessment of the whole milk substitutes based on hydrolyzed soy protein, skim milk, and skimmed soy flour when feeding calves aged 4 to 84 days was carried out. Research results indicate that particular attention should be paid to selecting the protein source used in milk substitutes. Growth rates of calves fed milk substitutes based on hydrolyzed soy protein were higher than when fed other feeds. The target weight was achieved using a milk replacer based on hydrolyzed soy protein isolate. Over the same period, the growth of calves fed a milk replacer containing soy flour was very slow and insufficient to achieve a given weight.

© Асафов В.А., Харитонов В.Д., Танькова Н.Л., Исакова Е.Л., Кузнецов П.В., Габриелова В.Т.

УДК 619:616.1:636.5.084.087.8

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-38-47

И.Р. Долинин, Г.В. Базекин, Е.Н. Сковородин, И.В. Чудов, А.И. Лебедева

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЧЕНИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НУКЛЕОСТИМА

Ключевые слова: *Нуклеостим; биостимулятор; цыплята-бройлеры; печень; гистология; иммуногистохимия; CD 68; PCNA; casp 3.*

Введение. Значительная роль в обеспечении населения высококачественными продуктами питания принадлежит птицеводству. Интерес к этой отрасли постоянен как в крупных специализированных предприятиях, так и в малых фермерских хозяйствах, одновременно расширяется видовая гамма разводимой птицы от страусов до перепелов, хотя промышленное производство мяса и яиц кур более традиционно для сельского хозяйства. Кроме того, для этого налажены технологические мощности, созданы условия содержания и кормления птицы, преимуществом разведения сельскохозяйственной птицы являются также: малый расход кормов, короткий период воспроизводства, пластичность организма кур. Однако одного генетического потенциала организма птиц к производству продукции недостаточно – одним из ключей к экстенсивному наращиванию мощностей птицеводства является поиск возможностей применения биологически активных препаратов, обладающих биоактивными свойствами и оказывающих регулирующее влияние на рост и развитие птицы, интенсивность обменных процессов, способных уси-

ливать функциональную активность органов и систем организма, повышать уровень естественной резистентности организма птиц, в то же время – безопасных для собственного организма, а её продукции – для человека и окружающей среды. На данный момент в различных источниках имеется информация о тканевых препаратах (биостимуляторах) и их благотворном влиянии на организм животных и птиц. Как правило, при их использовании происходит увеличение живой массы, улучшаются биохимические и физические показатели крови и т. д. (даже без изменений условий содержания и кормления) [1, 8, 9].

Цель исследований – изучить влияние биологического стимулятора Нуклеостим на гистологическую и гистохимическую картину печени цыплят-бройлеров 30-дневного возраста.

Материалы и методы. *Экспериментальные животные.* Для проведения исследований было использовано 40 цыплят-бройлеров кросса РОСС 308. Опытные и контрольные группы животных содержались в одинаковых условиях на стандартном пищевом рационе со свободным доступом к воде [2, 3].

Используемые биопрепараты. В работе использован биологический стимулятор Нуклеостим. Данный препарат задавали вместе с кормом согласно инструкции по применению. Оптимальные дозы препарата Нуклеостим – 3 г/кг корма. Исследуемые препараты, смешанные с кормом, задавались через день в течение 10 дней.

Гистологические и иммуногистохимические исследования. Печень фиксировали в 10 %-ном растворе нейтрального формалина, обезвоживали в серии спиртов возрастающей концентрации и заливали в парафин по общепринятой методике [4, 5, 6, 7]. Срезы готовили на микротоме LEICA RM 2145 (Германия), их окрашивали гематоксилином и эозином по Ван Гизону. Парафиновые срезы толщиной 4 мкм окрашивали с помощью иммуногистостейнера Leica Microsystems Bond™ (Германия). В качестве первых антител применяли CD 68, PCNA, casp3, Timp2 в разведении 1:300 (Santa Cruz Biotechnology, США). Для демаскировки использовали непрямую стрептавидин-биотиновую систему детекции Leica BOND (Novocastra™, Германия). Оценку специфичности реакции проводили при окрашивании срезов без первых антител. Исследование и визуализацию препаратов проводили с использованием светового микроскопа Leica DMD 108 (Германия) со специализированным программным обеспечением управления настройками и захвата изображения и микроскопа AxioImager Z1, оснащенного фотонасадкой ProgRes C3 и программой анализа изображений Axiovision (C. Zeiss, Германия). Анализ данных проводили с использованием метода двухфакторного дисперсионного анализа и с помо-

щью непараметрических методов: однофакторного дисперсионного анализа по Краскелу – Уоллису и сравнения некоррелированных данных методом Манна – Уитни в программе Statistica 7,0.

Результаты исследований. Нами установлено, что использование биологического стимулятора Нуклеостим в качестве кормовой добавки способствует благоприятному активному росту и развитию печени у цыплят-бройлеров уже в первый месяц его использования, что привело в дальнейшем к интенсивному росту массы тела птицы. Так, после применения Нуклеостима в дозе 3 г/кг корма у цыплят-бройлеров опытной группы печень была покрыта более утолщенной фиброзной капсулой (рисунок 1). Дольковое строение печени цыплят-бройлеров после применения Нуклеостима по-прежнему не просматривалось (рисунок 2). Портальный тракт был представлен веной с расширенным и свободным просветом, артериолами от одной до двух и желчными протоками (рисунок 3). Возле данных структур выявлялась тонкая фиброзная капсула (рисунок 4). Гепатоциты цыплят-бройлеров опытной группы имели полиморфную форму, цитоплазма окрашивалась слабооксифильно, в ней визуализировались многочисленные мелкодисперсные включения и единичные вакуоли. Ядра гепатоцитов были округло-овальной формы, эухроматин превалировал в центральной части ядер. Там же определялись по одному, реже по два крупных ядрышка, что свидетельствует о высокой синтетической активности печеночных клеток. Гетерохроматин в виде узкой полоски располагался по отношению к кардиолемам маргинально.

Рисунок 1
Глиссонова капсула печени у цыплят-бройлеров опытной группы.
Окраска по Ван Гизону

Рисунок 2
Дольковое строение печени не просматривается у кур опытной группы.
Окраска по Ван Гизону

Рисунок 3
Портальный тракт печени цыплят-бройлеров опытной группы.
Окраска гематоксилином и эозином

Рисунок 4
Разрастание соединительной ткани возле магистральных сосудов печени кур опытной группы.
Окраска по Ван Гизону

Синусоидальные пространства были расширены, признаков застоя крови не обнаруживалось. Пространства Диссе хорошо развиты и четко визуализировались. От гепатоцитов их отделял утонченный слой перисинусоидальных эндотелиоцитов. Они были без патоморфологических изменений. Печеночные пластинки не имели четкой радиальной балочной структуры, образовывали анастомозы друг с другом, что характерно для цыплят-бройлеров данного вида (рисунок 5).

С целью исследования просвета сосудов портального тракта проанализированы диаметры артерий, вен и желчных протоков. Выявлено, что у цыплят-бройлеров в контрольной группе площадь поперечного сечения вен составила 2771,0 (1026–6091) мкм², артерий – 137,5

(21–443) мкм², желчных протоков – 86 (52–263) мкм². В опытной группе площадь поперечного сечения вен составила: медиана 3248,5 (1565–6920) мкм², артерий – 89,0 (22–230) мкм², желчных протоков 232,0 (103–714) мкм² при $p \leq 0,05$ (рисунок 6).

Так, выявлено, что различия значений диаметра артерий между двумя экспериментальными группами, а также в пределах одной экспериментальной группы статистически не значимы между собой. А площадь желчных протоков и вены у цыплят-бройлеров опытной группы была больше практически на 1,2 и 2,7 порядка соответственно по сравнению с контрольной группой. Следовательно, применение Нуклеостима вызывает усиление оттока крови и желчеотделения.

Рисунок 5
Гепатоциты печени цыплят-бройлеров опытной группы.
Окраска гематоксилином и эозином

Рисунок 6
Площадь поперечного сечения вен, артерий, желчных протоков.
Ось x – параметры, ось y – площадь (мкм²) при ув. × 400

При иммуногистохимическом исследовании пролиферативного потенциала печени (*выявление PCNA⁺ клеток в печени*) выявлено, что у цыплят-бройлеров контрольной и опытной групп достаточно интенсивно выявлялись многочисленные гепатоциты, ядра которых были PCNA-позитивны. Однако при морфометрическом исследовании численности окрашенных ядер к данному антигену выяснилось, что в контрольной группе медиана составила 230,5 (201–257) клеток в поле зрения, после применения Нуклеостима количество PCNA⁺ клеток было – медиана 284,5 (266–311) при $p < 0,05$, что в 1,23 раза больше (рисунки 7, 8, 9).

При исследовании CD 68⁺ макрофагов, выявлено, что клетки локализовались в перисину-

соидальных пространствах. Численность клеток в полях зрения составила: в контрольной группе медиана – 5,36 (3–8), в опытной – 2,07 (1–4) ($p < 0,05$). Так в контроле численность CD68 макрофагов была больше в 2,6 раз, чем в опыте (рисунки 10, 11, 12). Повышение количества макрофагов в печени оценивается как провоспалительный фактор, который негативно рассматривается при патоморфологическом исследовании. В то же время активация макрофагов печени необходима для адекватной реакции органа в ответ на экзогенные патологические воздействия: инфекцию, травму. А последующий воспалительный ответ защищает от инфекции и ограничивает клеточное и органное повреждение организма хозяина.

Рисунок 7

Количество PCNA⁺ гепатоцитов в печени цыплят-бройлеров.

Ось x – экспериментальные группы, ось y – количество клеток (штуки) в полях зрения при ув. $\times 400$

Рисунок 8

Печень цыплят-бройлеров контрольной группы. PCNA⁺ гепатоциты.

Иммуногистохимическое окрашивание антителами к ядерному антигену пролиферирующих клеток PCNA.

Непрямая стрептавидин-биотиновая система детекции с докраской гематоксилином

Рисунок 9

Печень цыплят-бройлеров опытной группы, получавших Нуклеостим. PCNA⁺ гепатоциты. Иммуногистохимическое окрашивание антителами к ядерному антигену пролиферирующих клеток PCNA. Непрямая стрептавидин-биотиновая система детекции с докраской гематоксилином

Рисунок 10

Численность CD68⁺ макрофагов в печени цыплят-бройлеров. Ось x – экспериментальные группы, ось y – количество клеток (штуки) в полях зрения при ув. × 400

Рисунок 11

Печень цыплят-бройлеров контрольной группы. CD 68⁺ клетки. Иммуногистохимическое окрашивание антителами к CD 68. Непрямая стрептавидин-биотиновая система детекции с докраской гематоксилином

Рисунок 12

Печень цыплят-бройлеров опытной группы, получавших Нуклеостим.
CD 68⁺ клетки. Иммуногистохимическое окрашивание антителами к CD 68.
Непрямая стрептавидин-биотиновая система детекции с докраской гематоксилином

Рисунок 13

Численность caspasa 3⁺ клеток в печени цыплят-бройлеров.
Ось x – экспериментальные группы, ось y – количество клеток (штуки) в полях зрения при ув. × 400

Рисунок 14

Печень цыплят-бройлеров контрольной группы.
Caspasa 3⁺ клетки (↑). Иммуногистохимическое окрашивание антителами к Caspasa 3.
Непрямая стрептавидин-биотиновая система детекции с докраской гематоксилином

Рисунок 15

Печень цыплят-бройлеров опытной группы, получавших Нуклеостим.
Caspasa 3⁺ клетки (↑). Иммуногистохимическое окрашивание антителами к Caspasa 3.
Непрямая стрептавидин-биотиновая система детекции с докраской гематоксилином

Следовательно, можно предположить, что в печени цыплят-бройлеров контрольной группы латентно протекают воспалительные процессы, в опытной они нивелированы. Каспаза 3 (caspasa 3⁺ клетки) активируется в апоптотической клетке как внешним (лигандами смерти), так и внутренним (митохондриальным).

В данном исследовании в контрольной группе медиана составила 3,36 (2–5) клеток, в опытной группе 1,57 (0–3) ($p < 0,05$), что в 2,14 раз больше, чем в опыте (рисунки 13–15). Следовательно, применение Нуклеостима способствует ингибированию апоптоза.

Выводы. Использование биологического стимулятора Нуклеостим в качестве подкормки у цыплят-бройлеров оптимизирует структуру печени, препятствует развитию в органе нарушений клеточных механизмов метаболизма, ведущих к структурным изменениям. Анализ проведенных исследований показал, что у цыплят-

бройлеров контрольной и опытной групп достаточно интенсивно выявлялись многочисленные гепатоциты, ядра которых были PCNA-позитивны. Применение биостимулятора Нуклеостим при выращивании цыплят-бройлеров не влияет на просвет артерий портального тракта, так как при исследовании было выявлено, что различия значений диаметра артерий между двумя экспериментальными группами, а также в пределах одной экспериментальной группы статистически не значимы между собой. Однако наблюдались различия в площади желчных протоков и вен, что говорит о том, что применение биопрепарата вызывает усиление оттока крови и желчеотделения. Так как в печени контрольной группы цыплят-бройлеров численность CD68⁺ макрофагов была выше, чем в опытной, следовательно, это говорит о том, что в контрольной группе латентно протекают воспалительные процессы.

Библиографический список

1. Бронникова, Г.З. Влияние антиоксидантов на печень птиц мясных пород [Текст] / Г.З. Бронникова, О.В. Дюдьбин, Е.Н. Сковородин // Морфология. 2020. Т. 157. № 2–3. С. 40.
2. Жаров, А.В. Патологическая анатомия животных [Электронный ресурс] / А.В. Жаров. СПб. – М. – Краснодар: Лань, 2013. 620 с. Режим доступа: <http://e.lanbook.com>. ISBN: 978-5-8114-1450-5.
3. Латыпов, Д.Г. Вскрытие и патологоанатомическая диагностика болезней животных [Электронный ресурс] / Д.Г. Латыпов, И.Н. Залялов. СПб. – М. – Краснодар: Лань, 2015. Ре-

жим доступа: <http://e.lanbook.com>. ISBN: 978-5-8114-1976-0.

4. Лилли, Р. Патогистологическая техника и практическая гистология [Текст] / Р. Лилли; пер. с англ.; под ред. и с предисловием чл.-корр. АМН В.В. Португалова. М.: Мир, 1969. 512 с.
5. Меркулов, Г.А. Курс патологистологической техники [Текст] / Г.А. Меркулов. Л.: Медицина, 1969. 423 с.
6. Пирс, Э. Гистохимия [Текст] / Э. Пирс. М., 1962. С. 751–754.
7. Сапожников, А.Г. Гистологическая и микроскопическая техника [Текст] / А.Г. Сапож-

ников, // А.Е. Доросевич. Смоленск. 2000. С. 151–153.

8. Сковородин, Е.Н. Морфологическое обоснование применения антиоксидантов при выращивании птицы [Текст] / Е.Н. Сковородин, Г.В. Базекин, Г.З. Бронникова, О.В. Дюдьбин // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2020. № 1 (53). С. 114–125.

9. Skovorodin E., Bronnikova G., Bazekin G., Dyudbin O., Khokhlov R. Antioxidant influence on poultry liver morphology and hepatocyte ultrastructure. J. Veterinary World. 2019. Т. 12. № 11. P. 1716–1728.

Сведения об авторах

1. **Долнин Ильгиз Раилевич**, ассистент кафедры морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: ilgiz.dolnin@mail.ru.

2. **Базекин Георгий Вячеславович**, кандидат биологических наук, доцент кафедры морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 228-08-57, e-mail: george.bazekin@rambler.ru.

3. **Сковородин Евгений Николаевич**, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 228-28-77, e-mail: skovorodinen@mail.ru.

4. **Чудов Иван Владимирович**, доктор биологических наук, доцент кафедры морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 228-15-11, e-mail: IVChudov@bk.ru.

5. **Лебедева Анна Ивановна**, доктор биологических наук, старший научный сотрудник отдела морфологии ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии» МЗ РФ, e-mail: jeol02@mail.ru.

Значительная роль в обеспечении населения высококачественными продуктами питания принадлежит птицеводству. Биостимуляторы благотворно влияют на организм животных и птиц. Поэтому поиск эффективных биопрепаратов является актуальным. В статье представлены результаты исследований применения биологического стимулятора Нуклеостим при выращивании цыплят-бройлеров кросса РОСС-308. Особое внимание уделяется морфологической

характеристике печени цыплят-бройлеров, а также влиянию на печень биостимулятора Нуклеостим на тканевом и клеточном уровнях. Проведенные гистологические и иммуногистохимические исследования показали, что биологический стимулятор Нуклеостим оптимизирует структуру печени, препятствует развитию в органе нарушений клеточных механизмов метаболизма, ведущих к развитию структурных изменений.

I. Dolinin, G. Bazekin, E. Skovorodin, I. Chudov, A. Lebedeva

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE LIVER OF BROILER CHICKENS WHEN USING NUKLEOSTIM

Key words: *nucleostim; broiler chickens; biological product; agriculture; histology; liver; immunohistochemistry; CD 68; PCNA; casp 3.*

Authors' personal details

1. **Ilgiz Dolinin**, Assistant at the Department of Morphology, Pathology, Pharmacy and Non-communicable Diseases, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, e-mail: ilgiz.dolnin@mail.ru.

2. **Georgy Bazekin**, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Morphology, Pathology, Pharmacy and Non-communicable Diseases, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, phone: +7 (347) 228-08-57, e-mail: george.bazekin@rambler.ru.

3. **Evgeny Skovorodin**, Doctor of Veterinary Science, Professor of the Department of Morphology, Pathology, Pharmacy and Non-communicable Diseases, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, phone: +7 (347) 228-28-77, e-mail: skovorodinen@mail.ru.

4. **Ivan Chudov**, Doctor of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Morphology, Pathology, Pharmacy and Non-communicable Diseases, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, phone: +7 (347) 228-15-11, e-mail: IVChudov@bk.ru.

5. **Anna Lebedeva**, Doctor of Biological Sciences, Senior Researcher of the Department of Morphology of the Federal State Budgetary Institution «All-Russian Center for Eye and Plastic Surgery» of the Ministry of Health of the Russian Federation, e-mail: jeol02@mail.ru.

The poultry industry plays a significant role in providing the population with high-quality food products. According to the literature, biostimulants have a beneficial effect on the body of animals and birds. Therefore, the search for effective biological products is relevant. The article presents the results of studies of the use of a biological stimulator nucleostim when growing broiler chickens of the cross РОСС-308. Particular attention is paid to morpho-

logical characteristics of broiler chicken liver, as well as the effect of the biostimulator nucleostimulator on the liver at the cellular level. Histological and immunohistochemical studies have shown that the biological stimulant nucleostim optimizes the structure of the liver, prevents the development of disorders of cellular metabolic mechanisms in the organ which leads to the development of structural changes.

© Долинин И.Р., Базекин Г.В., Сквородин Е.Н., Чудов И.В., Лебедева А.И.

УДК 619:636.5.084.087.8:616.1

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-47-56

И.Р. Долинин, Г.В. Базекин, Е.Н. Сквородин, И.В. Чудов, А.И. Лебедева

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО СТИМУЛЯТОРА НУКЛЕОСТИМ НА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИММУНИТЕТА У ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

Ключевые слова: биологический стимулятор; птицеводство; Нуклеостим; тимус; иммуногистохимия; CD 68; PCNA; casp 3.

Введение. Птицеводство – одна из важнейших, динамически развивающихся отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающая население полноценными продуктами питания. Для повышения эффективности отрасли необходимо вести поиск новых эффективных биологических веществ. При этом биологически активные вещества должны быть не только высокоэффективными, но и безвредными для животных и человека. К настоящему времени накоплены значительные экспериментальные данные об использовании биологических стимуляторов в птицеводстве и животноводстве. Важным также является изыскание эффективных методов их применения с целью коррекции естественной резистентности и иммунобиологической реактивности птиц. На данный момент в различных источниках имеется информация о тканевых препаратах (биостимуляторах) и их благотворном влиянии на организм животных и птиц. Как правило, при их использовании происходит уве-

личение живой массы, улучшаются биохимические и физические показатели крови и т. д. (даже без изменений условий содержания и кормления) [1, 8, 11].

Цель исследований – изучение влияния биологического стимулятора Нуклеостим на развитие тимуса и его клинко-морфологическую структуру.

Материал и методы. Экспериментальные животные. Для проведения исследований было использовано 100 цыплят-бройлеров кросса РОСС 308. Опытные и контрольная группы животных содержались в одинаковых условиях на специальном, сбалансированном пищевом рационе со свободным доступом к воде.

Используемый биопрепарат. В работе использован биологический стимулятор Нуклеостим. Данный препарат вводили в рацион птиц в нужных концентрациях и задавали вместе с кормом согласно инструкции по применению.

Развитие внутренних органов определяли путем вскрытия с 30 по 38 дни жизни цыплят в условиях кафедры морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ с дальнейшей оценкой массы и размера внутренних органов.

Для измерения размеров, массы и определения топографии внутренних органов использовали анатомо-морфологический метод. Материалом для исследований послужили центральные органы иммунной системы птиц (тимус, селезенка, бурса), сердце и печень. Исследуемые органы взвешивали на аналитических весах. На основании полученных данных вычисляли относительную массу органа [2, 3, 8, 11].

Гистологические исследования. Тимус фиксировали в 10 %-ном растворе нейтрального формалина, обезживали в серии спиртов возрастающей концентрации и заливали в парафин по общепринятой методике. Срезы готовили на микротоме LEICA RM 2145 (Германия), которые окрашивали гематоксилином и эозином по Ван Гизону [4, 5, 6, 7].

Иммуногистохимическое исследование. Парафиновые срезы толщиной 4 мкм окрашивали с помощью иммуногистостейнера Leica Microsystems Bond™ (Германия). В качестве первых антител применяли CD 68, PCNA, casp3, Timp2 в разведении 1:300 (Santa Cruz Biotechnology, США). Для демаскировки использовали непрямую стрептавидин-биотиновую систему детекции Leica BOND (Novocastra™, Германия). Оценку специфичности реакции проводили при окрашивании срезов без первых антител. Исследование и визуализацию препаратов проводили с использованием светового микроскопа Leica DMD 108 (Германия) со специализированным программным обеспечением управления настройками и захвата изображения и микроскопа AxioImager Z1, оснащенного фотонасадкой ProgRes C3 и программой анализа изображений Axiovision (C. Zeiss, Германия) [9, 10].

Анализ данных проводили с использованием метода двухфакторного дисперсионного анализа и применения непараметрических методов – однофакторного дисперсионного анализа по Краскелу – Уоллису и сравнения некоррелированных данных методом Манна – Уитни в программе Statistica 7.0.

Результаты исследований. Влияние Нуклеостима на развитие внутренних органов исследовалось на цыплятах 30–38-дневного возраста. Было сформировано 4 группы по 10 голов. Все опытное поголовье получало стандартный комбикорм. Дополнительно с кормом задавали исследуемый биостимулятор Нуклеостим ежедневно в течение 10 дней. 1 группа – Нуклеостим 10 г/кг корма, 2 группа – Нуклеостим 5 г/кг корма, 3 группа – Нуклеостим 15 г/кг корма, 4 группа – контроль. Влияние биопрепарата оценивалось по состоянию органов пищеварения (печень, железистый желудок) и иммунитета (тимус, бурса). Особое внимание было обращено на центральные органы иммунитета у птиц, т. к. все они интенсивно растут в первые месяцы жизни и максимального развития достигают: тимус к 3,5–4 месяцам, а бурса к 4–4,5 месяцам. Тимус затем постепенно атрофируется по достижении полового созревания. Вскрытие проводилось с 30 по 38 день жизни цыплят в условиях кафедры морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ. Патологических изменений в органах не обнаружено. Оценивались масса и размеры внутренних органов. Данные исследования приведены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что в 3-х опытных группах масса внутренних органов цыплят-бройлеров больше по сравнению с контрольной. Наиболее значительное увеличение органов было отмечено у цыплят, получавших Нуклеостим в дозе (10 г/кг корма). Гистологическое изучение препаратов тимуса цыплят-бройлеров, получавших Нуклеостим, показало, что внешнее строение тимуса в целом не отличалось от контрольной группы. Наблюдалось дольчатое строение органа. Каждая долька характеризовалась наличием коркового слоя и мозгового вещества, которые также четко визуализировались и дифференцировались друг от друга. В паренхиме септы были представлены тонкими прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани, формирующие трабекулы (рисунок 1).

В тимусе цыплят-бройлеров опытной группы возле сосудов выявлялось разрастание волокнистой соединительной ткани, что усиливало гематотимусный барьер (рисунок 2).

Таблица 1 Влияние биостимулятора Нуклеостим на развитие внутренних органов у цыплят бройлеров кросса РОСС308

Исследуемый орган	Масса, г			
	группа			
	контроль	Нуклеостим 10 г/кг корма	Нуклеостим 5 г/кг корма	Нуклеостим 15 г/кг корма
Тимус	0,85 ± 0,07	1,006 ± 0,03	0,84 ± 0,045	0,82 ± 0,02

В мозговом веществе тимуса цыплят-бройлеров в опытной группе выявлялись следующие клетки: тельца Гассала, как дифференцированные, так и молодые; макрофаги, ретикулоэндотелиальные клетки, Т-лимфоциты (рисунок 3).

Толщина фиброзной капсулы, покрывающей орган снаружи составила в контрольной группе – медиана 11,035 (7,3–15,7) мкм; в опытной – 11,2 (9,08–17,6) мкм ($p \geq 0,5$). Следовательно, показатели принципиально не отличались друг от друга (рисунки 4, 5, 6).

При исследовании пролиферирующих клеток (PCNA⁺) в мозговом веществе тимуса выявлено, что в контрольной группе их количество составило: медиана 227 (190–286), а после применения Нуклеостима – медиана 354 (264–398) штук в поле зрения, что в 1,55 раз (или на 56 %) превышало значения контрольной группы (рисунки 7, 8, 9).

Размеры тимусных долек визуально отличались между экспериментальными группами, в опытной группе они были увеличены. Медиана короткого размера контрольной группы составляла 967 (851–1200) мкм, в опытной – 1250 (1150–1321) мкм. Медиана длинного размера в контрольной группе составляла 1519,5 (931–1950) мкм, в опытной – 2565,5 (2100–2984) мкм. ($P < 0,05$). Так, короткий и длинный размер дольки у цыплят-бройлеров после приема Нуклеостима был соответственно в 1,22 и в 1,45 раза больше, чем в контрольной (рисунок 10).

Толщина коркового слоя в контроле составила: медиана 278,2857 (151–444) мкм, в опыте – медиана 380,39286 (243–583) мкм. Толщина мозгового слоя в контроле – медиана 364 (220–620) мкм, в опыте медиана 664 (284–1100) мкм ($P \leq 0,05$). Так, толщина коркового слоя в контроле была в 1,17 раз меньше, чем в опыте, а мозгового в 1,8 раз меньше, чем в опыте (рисунок 11).

Рисунок 1

Тимус цыплят-бройлеров опытной группы. Окраска гематоксилином и эозином

Рисунок 2

Тимус цыплят-бройлеров опытной группы.

Периваскулярное разрастание рыхлой волокнистой соединительной ткани. Окраска по Ван Гизону

Рисунок 3
Мозговое вещество тимуса кур опытной группы.
Окраска гематоксилином и эозином

Рисунок 4
Толщина фиброзной капсулы тимуса.
Ось у – длина (мкм), ось х – экспериментальные группы при ув. $\times 400$

Рисунок 5
Тимус цыплят-бройлеров в контрольной группе.
Соединительнотканная капсула. Окраска по Ван Гизону

Рисунок 6
Тимус кур в опытной группе. Соединительнотканная капсула.
Окраска по Ван Гизону

Рисунок 7
Количество PCNA⁺ клеток в мозговом веществе тимуса кур в полях зрения при ув. $\times 650$.
Ось y – количество клеток в полях зрения (штуки), ось x – экспериментальные группы

Рисунок 8
PCNA⁺ клетки в мозговом веществе контрольной группы.
Иммуногистохимическое окрашивание антителами к ядерному антигену пролиферирующих клеток PCNA.
Непрямая стрептавидин-биотиновая система детекции с докраской гематоксилином

Рисунок 9

PCNA⁺ клетки в мозговом веществе опытной группы.

Иммуногистохимическое окрашивание антителами к ядерному антигену пролиферирующих клеток PCNA.
Непрямая стрептавидин-биотиновая система детекции с докраской гематоксилином

Рисунок 10

Величина тимусной дольки (мкм).

Ось y – мкм, ось x – исследуемые параметры при ув. × 40

Рисунок 11

Толщина коркового и мозгового слоев тимусной дольки.

Ось y – мкм, ось x – исследуемые параметры при ув. × 40

Рисунок 12

Численность CD 68 клеток в ткани тимуса.

Ось у – количество клеток в полях зрения (штуки), ось х – исследуемые параметры при ув. $\times 400$

Рисунок 13

Тимус контрольной группы. CD 68⁺ клетки.

Иммуногистохимическое окрашивание антителами к CD 68.

Непрямая стрептавидин-биотиновая система детекции с докраской гематоксилином

Рисунок 14

CD 68 клетки (↑) в мозговом веществе тимуса опытной группы.

А – CD 68⁺ клетки в кровеносном русле тимуса, В – CD 68⁺ клетки в ткани тимуса.

Иммуногистохимическое окрашивание антителами к CD 68.

Непрямая стрептавидин-биотиновая система детекции с докраской гематоксилином

Следовательно, в опытной группе наблюдалась гипертрофия долек тимуса.

Важнейшим клеточным типом тимуса являются макрофаги, участвующие как в антигенне-зависимой дифференцировке Т-лимфоцитов, так и в селекции плохо обученных клеток. Изменение количества макрофагов может свидетельствовать о функциональной эффективности тимуса. У цыплят-бройлеров опытной группы при иммуногистохимическом исследовании уровня экспрессии маркера макрофагов CD68 в тимусе выявлено увеличение их количества как в ткани, так и кровеносном русле. Среднее число CD68-иммунопозитивных клеток в паренхиме тимуса опытной группы составило – медиана 9,2 (7–12) клеток в поле зрения, а в контрольной – медиана 3 (2–4) клеток ($p < 0,05$), что втрое больше (рисунки 12, 13, 14).

Выводы. В ходе исследований выяснили, что в 3-х опытных группах масса внутренних органов цыплят-бройлеров больше по сравнению с контрольной. Наиболее значительное увеличение органов было отмечено у цыплят, получавших Нуклеостим в дозе 10 г/кг корма. Использование биологического стимулятора Нуклеостим в качестве подкормки у цыплят-бройлеров сохраняет структуру тимуса с четкой визуализацией и дифференцировкой коркового слоя и мозгового вещества, усиливает митотическую активность тимоцитов, улучшает кровоснабжение органа. В результате исследований было установлено, что Нуклеостим оказывает иммуномодулирующее действие, которое выражается в гипертрофии и гиперплазии тимуса, повышении численности макрофагов CD 68, замедлении процессов инволюции тимуса цыплят-бройлеров.

Библиографический список

1. Бронникова, Г.З. Влияние антиоксидантов на печень птиц мясных пород [Текст] / Г.З. Бронникова, О.В. Дюдьбин, Е.Н. Сковородин // Морфология. 2020. Т. 157. № 2–3. С. 40.
2. Жаров, А.В. Патологическая анатомия животных [Электронный ресурс] / А.В. Жаров. СПб. – М. – Краснодар: Лань, 2013. 620 с. Режим доступа: <http://e.lanbook.com>. ISBN: 978-5-8114-1450-5.
3. Латыпов, Д.Г. Вскрытие и патологоанатомическая диагностика болезней животных [Электронный ресурс] / Д.Г. Латыпов, И.Н. Залялов. СПб. – М. – Краснодар: Лань, 2015. Режим доступа: <http://e.lanbook.com>. ISBN: 978-5-8114-1976-0.
4. Лилли, Р. Патогистологическая техника и практическая гистология [Текст] / Р. Лилли; пер. с англ.; под ред. и с предисловием чл.-корр. АМН В.В. Португалова. М.: Мир, 1969. 512 с.
5. Меркулов, Г.А. Курс патогистологической техники [Текст] / Г.А. Меркулов. Л.: Медицина, 1969. 423 с.
6. Пирс, Э. Гистохимия [Текст] / Э. Пирс. М., 1962. С. 751–754.
7. Сапожников, А.Г. Гистологическая и микроскопическая техника [Текст] / А.Г. Сапожников, // А.Е. Доросевич. Смоленск. 2000. С. 151–153.
8. Сковородин, Е.Н. Морфологическое обоснование применения антиоксидантов при выращивании птицы [Текст] / Е.Н. Сковородин, Г.В. Базекин, Г.З. Бронникова, О.В. Дюдьбин // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2020. № 1 (53). С. 114–125.
9. Dabeva M.D., Shafritz D.A. Hepatic Stem Cells and Liver Repopulation, Semin. Liver. Dis., 2003, vol. 23, no. 4, pp. 349–362.
10. McCormick D., Hall P.A. The complexities of proliferating cell nuclear antigen. J. Histopathology. 1992. V. 21. P. 591–543.
11. Skovorodin E., Bronnikova G., Bazekin G., Dyudbin O., Khokhlov R. Antioxidant influence on poultry liver morphology and hepatocyte ultrastructure. J. Veterinary World. 2019. T. 12. № 11. P. 1716–1728.

Сведения об авторах

1. **Долинин Ильгиз Раилевич**, ассистент кафедры морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: ilgiz.dolinin@mail.ru.
2. **Базекин Георгий Вячеславович**, кандидат биологических наук, доцент кафедры морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 228-08-57, e-mail: george.bazekin@rambler.ru.
3. **Сковородин Евгений Николаевич**, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 228-28-77, e-mail: skovorodinen@mail.ru.

4. **Чудов Иван Владимирович**, доктор биологических наук, доцент кафедры морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 228-15-11, e-mail: IVChudov@bk.ru.

5. **Лебедева Анна Ивановна**, доктор биологических наук, старший научный сотрудник отдела морфологии ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии» МЗ РФ, e-mail: jeol02@mail.ru.

Птицеводство – одна из важнейших динамически развивающихся отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающая население полноценными продуктами питания. Для повышения эффективности отрасли необходимо вести поиск новых эффективных биологических веществ. При этом биологически активные вещества должны быть не только высокоэффективными, но и безвредными для животных и человека. К настоящему времени накоплены значительные экспериментальные данные об использовании биологических стимуляторов в птицеводстве и животноводстве. В связи с вышеизложенным целью исследования является изучение влияния биологического стимулятора Нуклеостим на развитие тимуса и его клинкоморфологическую структуру. Для проведения исследований было использовано 100 цыплят-бройлеров кросса РОСС 308. Опытные и контрольная группы животных содержались в оди-

наковых условиях на специальном, сбалансированном пищевом рационе со свободным доступом к воде. В ходе исследований выяснили, что в 3-х опытных группах масса внутренних органов цыплят-бройлеров больше по сравнению с контрольной. Наиболее значительное увеличение органов было отмечено у цыплят, получавших Нуклеостим в дозе 10 г/кг корма. Использование биологического стимулятора Нуклеостим в качестве подкормки у цыплят-бройлеров сохраняет структуру тимуса с четкой визуализацией и дифференцировкой коркового слоя и мозгового вещества, усиливает митотическую активность тимоцитов, улучшает кровоснабжение органа. Нуклеостим оказывает иммуномодулирующее действие, которое выражается в гипертрофии и гиперплазии тимуса, повышении численности макрофагов CD 68, замедлении процессов инволюции тимуса цыплят-бройлеров.

I. Dolinin, G. Bazekin, E. Skovorodin, I. Chudov, A. Lebedeva

INFLUENCE OF BIOLOGICAL STIMULATOR NUCLEOSTIM ON CENTRAL IMMUNITY BODIES IN BROILER CHICKENS

Key words: *biological stimulant; poultry; nucleostim; thymus; immunohistochemistry; CD 68; PCNA; casp 3.*

Authors' personal details

1. **Ilgiz Dolinin**, Assistant at the Department of Morphology, Pathology, Pharmacy and Non-communicable Diseases, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, e-mail: ilgiz.dolinin@mail.ru.

2. **Georgy Bazekin**, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Morphology, Pathology, Pharmacy and Non-communicable Diseases, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, phone: +7 (347) 228-08-57, e-mail: george.bazekin@rambler.ru.

3. **Evgeny Skovorodin**, Doctor of Veterinary Science, Professor of the Department of Morphology, Pathology, Pharmacy and Non-communicable Diseases, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, phone: +7 (347) 228-28-77, e-mail: skovorodinen@mail.ru.

4. **Ivan Chudov**, Doctor of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Morphology, Pathology, Pharmacy and Non-communicable Diseases, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, phone: +7 (347) 228-15-11, e-mail: IVChudov@bk.ru.

5. **Anna Lebedeva**, Doctor of Biological Sciences, Senior Researcher of the Department of Morphology of the Federal State Budgetary Institution «All-Russian Center for Eye and Plastic Surgery» of the Ministry of Health of the Russian Federation, e-mail: jeol02@mail.ru.

Poultry farming is one of the most important dynamically developing branches of the agro-industrial complex, providing the population with full-fledged food products. It is necessary to search for new useful biological substances to increase the efficiency of the industry. At the same time, biologically active substances must be not only highly effective but also harmless to animals and humans. To date, significant experimental data on the use of biological stimulants in poultry and animal husbandry have been accumulated. The research aimed to study the influence of the biological stimulator Nucleostim on the development of the thymus and its clinical and morphological structure. 100 ROSS 308 cross broiler chickens were used for the research. Experimental and control groups of animals were kept in the same conditions on a unique, balanced

diet with free access to water. In the course of the research, it was found that in 3 experimental groups, the mass of internal organs of broiler chickens is greater than in the control group. The most significant increase in organs was observed in chickens receiving Nucleostim at a dose (10 g/kg of feed). The use of the biological stimulator Nucleostim as a top dressing in broiler chickens preserves the structure of the thymus, with clear visualization and differentiation of the cortical layer and brain matter, increases the mitotic activity of thymocytes, improves blood supply to the organ. As a result of research, it was found that Nucleostim has an immunomodulatory effect, which is expressed in hypertrophy and hyperplasia of the thymus, increasing the number of CD 68 macrophages, slowing down the thymus involution processes in broiler chickens.

© Долинин И.Р., Базекин Г.В., Сковородин Е.Н., Чудов И.В., Лебедева А.И.

УДК 638.165.8+581.331.2

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-56-64

Р.Г. Курманов

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ БАШКИРСКОГО МЕДА

Ключевые слова: *качественный палинологический анализ; количественный палинологический анализ; органолептические характеристики; физико-химический анализ; башкирский мед; премиальные сорта меда.*

Введение. Для получения полной информации о ботаническом происхождении меда необходимо проведение комплексных исследований, включающих качественный и количественный палинологический (пыльцевой), физико-химический и органолептический анализы. Полученные данные играют важную роль при характеристике монофлорных видов меда и могут быть использованы при подготовке стандартов на мед. В России подобные исследования никогда ранее не проводились. В Европе благодаря комплексному анализу были охарактеризованы 15 важнейших товарных видов меда [1]. Эти исследования существенно расширили знания о минимальном содержании пыльцы основного медоноса в монофлорном меде и о диапазонах варьирования основных физико-химических показателей, а также позволили описать органолептические характеристики медов с использованием актуальных методик.

Целью данной работы является проведение комплексного анализа ботанического происхождения башкирского меда.

Материалы и методы исследования. Отобрано 30 проб меда, добытых на территории 22 районов Республики Башкортостан. В работе использованы только свежие образцы 2019 г. сбора. Пробы для испытаний были обезличены. Качественный и количественный пыльцевой анализ выполнен к. б. н., с. н. с. Р.Г. Курмановым в лаборатории геологии кайнозоя Института геологии УФИЦ РАН. Органолептический анализ проведен д. б. н., проф. А.Р. Ишбирдиным в Башкирском государственном университете. Физико-химический анализ выполнен в лаборатории Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Башкортостан. В работе использованы обобщенные органолептические [2] и палинологические методики [3]. При интерпретации палинологических данных применялся список российских безнектарных пергаменов [4]. Для анализа медов, не имеющих российских пыльцевых стандартов, руководствовались европейскими характеристиками [5]. Для видов меда с неизвестной представленностью пыльцы учитывалось доминирование пыльце-

вых зерен (> 45 %). Падевые меда выделялись в случаях, когда соотношение количества падевых элементов и пыльцы превышало 3 [6]. В рамках физико-химического анализа исследо-

ваны 7 параметров: диастазное число, рН, свободная кислотность, удельная электрическая проводимость, качественная реакция на содержание НМФ и массовая доля пролина.

Таблица 1 Результаты качественного палинологического анализа

Номер пробы Таксон	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Доля пыльцы медоносных растений, %																														
липа сердцелистная	7	–	22	–	6	–	–	1	4	–	–	1	6	3	9	8	67	36	88	79	53	83	64	58	39	30	77	83	57	22
подсолнечник однолетний	–	1	1	–	–	2	86	87	85	74	58	–	–	–	–	26	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
гречиха посевная	2	–	–	1	–	2	–	1	–	–	–	79	37	5	37	23	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
синяк обыкновенный	1	63	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	57	–	2	13	–	–	2	30	–	–	–	1	47	–	–	6	–
лядвенец	–	–	3	–	86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	13	–	–	–	2	4	6	–	–	–	–	–	22
донник	20	–	–	55	–	–	–	–	–	2	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	4	–	4	1
горчица	6	21	7	6	–	8	–	–	–	–	1	–	–	2	1	2	–	6	–	–	–	1	1	–	49	1	1	1	–	–
рапс	–	–	–	–	–	82	–	1	–	–	–	–	–	–	37	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
сурепка	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	14	5	–	19	2	23	–	–	–	–	–	–	–	–	13	–	–	13	–
бодяк	–	3	26	–	1	2	–	5	1	1	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
чертополох	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	8	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
льнянка обыкновенная	15	–	1	1	–	1	1	1	–	1	–	2	17	2	3	1	2	2	–	1	–	3	4	5	1	–	–	–	–	5
молочай	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–
фацелия пнжмолистная	22	–	–	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ива	13	2	3	11	–	–	1	–	1	–	–	–	2	1	–	6	1	4	–	–	6	2	10	12	–	1	2	2	–	15
остальные медоносы	10	11	34	2	4	2	11	5	8	17	23	8	22	20	3	10	13	14	12	19	8	7	13	17	8	4	16	7	19	33
Доля пыльцы пергааносных растений, %																														
лабазник вязолистный	2	4	30	–	10	1	–	–	5	9	3	1	8	4	5	4	5	9	6	18	11	13	5	26	9	3	18	–	41	13
лабазник обыкновенный	–	–	2	–	7	–	–	–	–	3	–	–	–	3	–	1	4	4	3	–	2	5	1	7	–	4	10	1	11	2
зверобой	–	–	24	–	5	–	8	–	–	–	2	–	–	1	–	–	3	2	–	–	1	18	–	–	–	–	1	2	2	–
земляника	4	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	9	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2
подорожник	1	–	1	1	–	–	1	–	3	1	1	–	1	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	3	–	1	–	1	–	1
остальные пергааносы	2	2	2	2	4	1	5	1	11	7	17	1	3	4	3	9	4	2	1	6	3	2	5	7	1	1	1	7	4	3

Примечание: серым отмечены доли медоносов, достаточные для выделения монофлорного меда.

Результаты исследования. Всего в составе 30 образцов меда обнаружена пыльца 104 таксонов, из которых 73 были отнесены к медоносам, 31 – к пергааносам. Список основных из них приведен в таблице 1. В результате качественного палинологического анализа диагностированы 1 падевый и 29 цветочных образцов меда. Среди

цветочных 27 проб являлись монофлорными, 2 – полифлорными. Из 27 монофлорных образцов 11 отнесены к липовым, 4 – подсолнечниковым, 3 – гречишным, 2 – синяковым, 1 – донниковым, 1 – рапсовым, 1 – бодяковым и 1 – лядвенцовым медам. 3 пробы монофлорного меда могли быть отнесены одновременно к липовому и синяко-

вому, к липовому и горчичному, подсолнечниковому и чертополоховому виду.

Количественный пылевой анализ показал соответствие изучаемых проб меда трем различным классам (таблица 2). Концентрация растительных элементов в образцах варьировала в пределах от 12 000 до 170 500. Во всех изученных пробах были обнаружены как пыльцевые зерна, так и падевые элементы.

Наибольшее количество растительных элементов обнаружено в пробах лядвенцового меда

(№ 5), вида с перепредставленной пылью (90 000–120 000, по [5]), что соответствует классу III. Для бодякового меда (№ 3), вида с недопредставленной пылью (< 20 000, по [5]), относящегося к классу I, число обнаруженных элементов крайне высокое (класс III), что указывает на наличие в образце примесей меда с перепредставленной пылью и свидетельствует о его полифлорности. Аналогично по этому показателю пробу № 11 невозможно отнести к чертополоховому меду (класс I, по [5]).

Таблица 2 Результаты количественного палинологического анализа

№ п/п	Количество пыли и падевых элементов в 10 гр меда, шт.	Класс	Вид меда по данным качественного палинологического анализа
1	39 300	II	падевый
2	20 600	II	синяковый
3	170 500	III	бодяковый
4	92 900	II	донниковый
5	168 600	III	лядвенцовый
6	56 200	II	рапсовый
7	34 300	II	подсолнечниковый
8	71 300	II	подсолнечниковый
9	23 500	II	подсолнечниковый
10	37 800	II	подсолнечниковый
11	53 400	II	подсолнечниковый/чертополоховый
12	26 500	II	гречишный
13	12 000	I	гречишный
14	69 400	II	синяковый
15	18 200	I	гречишный
16	17 200	I	полифлорный
17	24 000	II	липовый
18	15 900	I	липовый
19	74 600	II	липовый
20	66 700	II	липовый
21	41 300	II	липовый
22	64 500	II	липовый
23	17 300	I	липовый
24	16 500	I	липовый
25	43 400	II	липовый/горчичный
26	33 800	II	липовый/синяковый
27	26 200	II	липовый
28	26 700	II	липовый
29	30 900	II	липовый
30	16 900	I	полифлорный

Примечание: класс I – $\leq 20 \times 10^3$ – включает монофлорные меда с недопредставленной пылью,

II – $21 \times 10^3 \leq N \leq 100 \times 10^3$ – включает меда с нормально представленной пылью, большинство полифлорных медов, падевые и смешанные меда,

III – $101 \times 10^3 \leq N \leq 500 \times 10^3$ – включает монофлорные меда с перепредставленной пылью и падевые меда.

В гречишных медах (№№ 13, 15) отмечены самые низкие концентрации растительных элементов среди изученных проб: 12 000 и 18 200 (класс I). Наивысший показатель (26 500, класс II), выделенный в образце № 12, соотносился с максимальным содержанием пыли гречихи в спектре (79 %).

Липовый мед, как и гречишный, относится к видам с недопредставленной пылью. Однако

число проб липового меда, соответствующих классу I (15 900–17 300), оказалось довольно небольшим (№№ 18, 23, 24: Архангельский, Калташинский и Краснокамский районы). Большинство образцов обладали повышенным содержанием пыли и падевых элементов (класс II: 24 000–74 600). Среди них наибольшее количество растительных элементов, представленных преимущественно пылью липы, было обнару-

жено в пробах из горно-лесной зоны (№№ 19, 20, 22: Бурзянский и Иглинский районы). Также данные образцы характеризовались максимальным содержанием пыльцы липы в спектре (79–88 %). Исключение составил образец № 28, обладающий высоким процентом пыльцевых зерен липы (83 %), но низкой концентрацией элементов (26 700). Повышенное содержание пыльцы и пади (33 800–43 400) также отмечено в пробах липового меда с доминированием пыльцевых зерен другого медоноса: синяка обыкновенного и горчицы (№№ 21, 25, 26). В целом для башкирских липовых медов характерна повышенная концентрация растительных элементов, превышающая соответствующие европейские характеристики в 2 раза (3 000–35 200, по [1]). Учитывая данный факт, выделение монофлорных медов с двумя основными медоносами, где второй медонос дает мед с нормально представленной пылью (класс II), как в случае с липовым/синяковым и липовым/горчицным образцами, становится довольно проблематичным.

Отдельно следует отметить пробы липового меда №№ 24 и 29, отличающиеся преобладанием пыльцы лабазников (33 и 52 % соответственно) в общем спектре. Количественный пылевой анализ показал, что доминирование пыльцы пергааносов в составе палиноспектра никоим образом не влияет на содержание пыльцы в образце.

Оставшиеся пробы монофлорных видов меда (синяковый, донниковый, рапсовый и подсолнечниковый), а также образец падевого меда, отнесены к классу II. Все обозначенные виды являются медами с нормально представленной пылью [5]. Согласно европейским комплексным исследованиям [1] у ряда из них отмечены довольно широкие диапазоны варьирования концентрации растительных элементов: 4 200–150 700 – у рапсового меда и 2 300–42 700 – у подсолнечникового. Проанализированный нами образец рапсового меда укладывался в приве-

денные рамки, а среди образцов подсолнечникового меда имелись пробы с повышенным содержанием элементов (до 71 300).

2 полифлорных образца (№№ 16, 30) обладали невысокой концентрацией растительных элементов (класс I), вероятно потому, что имели в основе меда с недопредставленной пылью (гречишный и липовый).

В целом результаты количественного палинологического анализа в подавляющем большинстве случаев подтверждают данные качественного пылевого анализа и играют ключевую роль при диагностике медов с недопредставленной пылью (бодяковый, чертополоховый).

Органолептический анализ позволил выделить липовый (12 проб), подсолнечниковый (3), гречишный (2), синяковый? (1) виды и падевый (1) мед. 4 пробы идентифицированы как осотовый-чертополоховый, гречишный/подсолнечниковый, гречишный/рапсовый и рапсовый/подсолнечниковый. Видовая принадлежность 7 образцов не установлена. Ключевые органолептические критерии из 9 изученных представлены в таблице 3.

Результаты органолептического анализа подтвердили ботаническое происхождение большинства липовых медов, которые отличались светлой интенсивностью цвета, средним-сильным ароматическим, камфорным и слабым-средним животным запахом, а также слабым-средним камфорным ароматом. Исключение составили образцы №№ 28 и 29. В первом случае на органолептику пробы оказало влияние наличие в составе примеси темного меда с недопредставленной пылью (молочай). Минимальная доля пыльцы молочая в монофлорном меде не рассчитана, поэтому диагностика этого вида затруднена. Во второй пробе слабо выраженные характеристики липового меда при довольно высокой доле пыльцы липы в спектре (57 %), вероятно, связаны с условиями откачки и хранения.

Таблица 3 Результаты органолептического анализа

№ п/п	Вид меда по результатам органолептического анализа	Органолептические параметры			Вид меда по данным качественного и количественного пылевого анализа
		интенсивность цвета	интенсивность запаха, запах	аромат	
1	2	3	4	5	6
1	падевый	темный	средний – горячий, карамельный; ароматический, древесный, смоляной	слабо выраженный фруктовый (сухофрукты)	падевый
2	–	светлый	средний; ароматический, пряный, эфирномасличный, травяной	слабо выраженный, травяной, фруктовый	синяковый
3	–	средний	средний; фрукты; ароматический, пряный	слабо выраженный, пряный	полифлорный
4	–	светлый	кислый потный запах, гниющая капуста	слабый – животный, изовалерьяновая кислота, капустный	донниковый

1	2	3	4	5	6
5	липовый	светлый	средний – ароматический, камфорный; слабый – животный; ванильный	выраженный – камфорный	лядвенцовый
6	рапсовый/ подсолнечниковый	светлый	сильный – гниющей капусты	выраженный – гниющей капусты	рапсовый
7	подсолнечниковый	светлый	переработанные фрукты, фруктовая карамель	фруктовый	подсолнечниковый
8	подсолнечниковый?	светлый	слабый запах переработанных фруктов	слабо выраженный, фруктовый	подсолнечниковый
9	осотовый- чертополоховый	светлый	средний – травяной (скошенное душистое сено); горячий, тонкий (пчелиный воск); слабый – ароматический, смоляной	скошенная трава	подсолнечниковый
10	подсолнечниковый	светлый	переработанные фрукты, фруктовая карамель	фруктовый	подсолнечниковый
11	–	светлый	фруктовый, винный	слабый, фруктовый	подсолнечниковый
12	гречишный	темный	сильный – горячие фрукты; слабый – животный	не выражен	гречишный
13	гречишный/ подсолнечниковый	темный	сильный – фруктовый, переработанные фрукты; слабый – животный	слабо выраженный фруктовый	гречишный
14	–	средний	сильный фруктовый	слабо выраженный фруктовый	синяковый
15	гречишный	темный	сильный; животный, химический фенольный	не выражен	гречишный
16	гречишный/ рапсовый	средний	сильный; животный (первая летучая фракция); гниющая капуста	слабый, фруктовый	полифлорный
17	липовый	светлый	средний – ароматический, камфорный; слабый – животный	слабый, камфорный	липовый
18	липовый	светлый	сильный, ароматический, камфорный; средний – животный	слабый, камфорный	липовый
19	липовый	светлый	средний – ароматический; средний – животный	слабый, камфорный	липовый
20	липовый	светлый	средний – ароматический; средний – животный	слабый, камфорный	липовый
21	липовый	светлый	сильный ароматический камфорный, пряный; замещается средней интенсивности животным	слабый, камфорный	липовый
22	липовый	светлый	сильный ароматический камфорный, пряный; замещается средней интенсивности животным	слабый, камфорный	липовый
23	липовый	светлый	сильный ароматический камфорный, пряный; замещается средней интенсивности животным	слабый, камфорный	липовый
24	липовый	светлый	сильный ароматический камфорный, пряный; замещается средней интенсивности животным	средний камфорный	липовый
25	липовый	светлый	средний ароматический камфорный, пряный; замещается средней интенсивности животным	слабый, камфорный	липовый / горчичный
26	липовый	светлый	средний животный, кислый; ароматический, камфорный	средний камфорный	липовый / синяковый
27	липовый	светлый	сильный ароматический камфорный, пряный; замещается слабой интенсивности животным	средний камфорный	липовый
28	синяковый?	светлый-средний	средний; тропические фрукты; ароматический, пряный	слабый фруктовый	липовый
29	–	светлый	средний, животный; слабый фруктовый	слабый, камфорный	липовый
30	–	светлый	средний ароматический; слабый животный	пряные травы	полифлорный

В образцах с двумя доминантными медоносами (№ 25: липа/синяк и № 26: липа/горчица) проявлялась органолептика только липового меда. Интересно, что свойства липового меда были обнаружены и при совсем невысоких кон-

центрациях пыльцы липы в спектре (6 % в пробе № 5, по 22 % в образцах №№ 3 и 30). Это подтверждает данные европейских коллег, согласно которым содержание пыльцевых зерен липы в монофлорных медах может быть крайне низким

(до 1 %) [1]. С другой стороны, примечательно, что происхождения ни одного меда с бобовых (донниковый, № 4, и лядвенцовый виды, № 5) не было подтверждено органолептически, на их характеристики большое влияние оказали примеси медов с яркой органолептикой.

Монофлорность проб подсолнечникового меда была подтверждена органолептически в 3 случаях (№№ 7, 8, 10). Образцы отличались светлой интенсивностью цвета, запахом переработанных фруктов, фруктовой карамели и фруктовым освежающим ароматом. 2 оставшиеся пробы (№№ 9 и 11) не прошли как подсолнечниковые, хотя и имели в своем составе очень высокий процент пыльцевых зерен подсолнечника.

Монофлорные пробы гречишного меда (№№ 12 и 15) характеризовались темной интенсивностью цвета, слабым-сильным животным запахом, не выраженным ароматом и отличались самым высоким процентом пыльцевых зерен гречи. Результаты органолептического анализа других двух проб с высокой долей пыльцы гречи (№№ 13 и 16) не совпали с данными пыльцевого анализа. Данные различия были обусловлены наличием или отсутствием пыльцы рапса и подсолнечника. Аналогичные противоречия были обнаружены в образце рапсового меда (№ 6).

Выделенный по результатам палинологического анализа синяковый мед (№ 2) имел светлую интенсивность цвета, ароматический, пряный, эфирномасличный, травяной запах, слабо выраженный, травяной, фруктовый с охлаждающим ароматом. Схожие свойства, за исключением средней интенсивности цвета, имел образец № 14, также идентифицированный по пыльце как синяковый мед. В целом органолептический анализ подтвердил большую часть из полученных результатов пыльцевого анализа.

Вопросы возникли при диагностике редких видов меда (синяковый), а также при идентификации примесей подсолнечника и рапса.

Согласно результатам физико-химического анализа (таблица 4) пробы липового меда (№№ 17–27), а также полифлорные меда с высокой долей пыльцы липы (№№ 28–30) характеризовались повышенными показателями pH и электропроводности. Аналогичные параметры обнаружены и в образцах с небольшой примесью липы (№№ 3 и 5). В нескольких пробах (№№ 21, 22, 26, 27) отмечена низкая диастаза (7,9–9,3), не характерная для липовых медов согласно ГОСТ Р 31766-2012 «Меды монофлорные. Технические условия» [7].

Падевый мед (№ 1) обладал наивысшей электропроводностью, pH, свободной кислотностью и показателями массовой доли пролина. Образец синякового меда (№ 2) и проба полифлорного меда, в которой доминировала пыльца синяка (№ 14), также отличались высоким содержанием пролина. Полифлорный мед с высоким содержанием пыльцы донника (№ 4) имел довольно высокую диастазу. Проба рапсового/подсолнечникового меда (№ 6) обладала средними физико-химическими показателями.

Половина подсолнечниковых медов (№ 7–9) оказалась гретой, пробы имели сомнительную качественную реакцию на HMF. Данные образцы также обладали самой низкой диастазой. Кроме того, ряд проб (№№ 8, 10, 11) имел повышенную влажность (более 18 %). Таким образом, среди изученных медов с подсолнечника ни один образец не соответствовал ГОСТ Р 31766-2012 «Меды монофлорные. Технические условия» [7]. Вероятно, именно термическая обработка не позволила диагностировать образцы с высокой долей пыльцы подсолнечника с помощью органолептического анализа ранее.

Таблица 4 Результаты физико-химического анализа

№ п/п	Обобщенные результаты по итогам трех анализов	Диастаза, ед. Готе	pH	Свободная кислотность, мэкв/кг	Массовая доля воды, %	Электропроводность, мСм/см	HMF, +/-*	Пролин, мг/кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	падевый	19,1	5,0	35,00	15,4	1,34	–	504
2	синяковый	12,3	3,8	14,35	15,6	0,12	–	452
3	полифлорный	20,9	4,2	17,60	19,6	0,42	–	324
4	полифлорный	24,6	3,8	18,35	17,2	0,18	–	348
5	липовый/лядвенцовый	11,0	5,3	5,45	16,8	0,43	–	260
6	рапсовый/подсолнечниковый	17,9	3,8	16,90	20,0	0,21	–	364
7	подсолнечниковый	2,8	4,0	10,80	17,4	0,24	+	196
8	подсолнечниковый	4,9	4,3	9,25	18,6	0,20	+	260
9	подсолнечниковый/осотовый-чертополоховый	4,9	4,3	11,15	16,4	0,24	+	244
10	подсолнечниковый	11,2	3,8	13,45	19,8	0,16	–	324
11	полифлорный	7,3	3,7	18,05	20,6	0,16	–	268

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	гречишный	18,7	4,3	14,50	16,2	0,16	—	232
13	гречишный/подсолнечниковый	39,8	4,1	21,20	19,0	0,28	—	280
14	полифлорный	21,2	3,8	32,55	18,6	0,29	—	420
15	гречишный	21,5	4,1	18,15	18,2	0,22	—	280
16	полифлорный	22,4	4,0	18,30	17,0	0,22	—	336
17	липовый	13,4	5,3	7,10	15,4	0,45	—	204
18	липовый	11,5	4,7	9,65	17,2	0,39	—	332
19	липовый	12,9	7,3	2,35	20,0	0,37	—	244
20	липовый	12,5	7,2	2,50	20,0	0,42	—	336
21	липовый	9,0	6,2	5,50	15,0	0,38	—	236
22	липовый	7,9	5,3	5,35	16,2	0,34	—	324
23	липовый	16,3	4,2	15,55	18,8	0,31	—	336
24	липовый	14,9	5,1	8,15	16,0	0,25	—	220
25	липовый	12,2	4,9	11,40	16,8	0,43	—	204
26	липовый	9,2	5,1	7,15	14,8	0,30	—	304
27	липовый	9,3	4,7	8,80	16,8	0,38	—	312
28	полифлорный	10,4	6,4	4,85	15,0	0,36	—	316
29	полифлорный	21,6	4,9	7,80	15,6	0,40	—	280
30	полифлорный	19,2	4,2	15,10	14,8	0,24	—	404

Наибольшая диастаза отмечена у гречишных мёдов (№№ 12, 13, 15). При этом даже небольшие примеси гречихи положительно сказывались на данном параметре (№ 14, 16).

Выводы. По итогам комплексных исследований было выделено 8 липовых (№№ 5, 17–20, 23–25), 2 гречишных (№№ 12 и 15), 1 синяковый

(№ 2) и 1 падевый мед (№ 1), а также 9 полифлорных образцов (№№ 3, 4, 6, 13, 14, 16, 28–30). 4 пробы (№№ 21, 22, 26, 27) не прошли как липовый мед только из-за низкой диастазы. Образцы подсолнечникового меда (№№ 7–11) подвергались обработке, что повлияло на их органолептику и физико-химию.

Таблица 5 Рекомендации для премиального сорта башкирского липового меда

Палинологический анализ	качественный	доля пыльцы липы сердцелистной, %	> 70
	количественный	концентрация растительных элементов, шт.	> 60 000
Органолептический анализ	внешний вид	интенсивность цвета оттенок цвета	светлый —
	консистенция	кристаллизация, физические свойства	мелкие кристаллы
		аромат	слабый, камфорный
		сладость	умеренно сладкий
		кислота	—
		послевкусие	легкая горечь, лекарственное
	запах	запах, интенсивность запаха	средний – ароматический; средний – животный

Таблица 6 Рекомендации для премиального сорта башкирского гречишного меда

Палинологический анализ	качественный	доля пыльцы липы сердцелистной, %	> 70
	количественный	концентрация растительных элементов, шт.	> 60 000
Органолептический анализ	внешний вид	интенсивность цвета оттенок цвета	светлый —
	консистенция	кристаллизация, физические свойства	мелкие кристаллы
		аромат	слабый, камфорный
		сладость	умеренно сладкий
		кислота	—
		послевкусие	легкая горечь, лекарственное
	запах	запах, интенсивность запаха	средний – ароматический; средний – животный

Комплексный анализ вскрыл некоторые особенности монофлорных мёдов, которые не охватывают российские стандарты. В частности, было установлено, что минимальные доли

пыльцы липы могут быть существенно ниже регламентированных 30 % и составлять всего 6 %. Для подсолнечниковых мёдов в России введены повышенная диастаза и пониженные pH и влаж-

ность. При использовании европейских показателей [1] одну пробу (№ 10) можно было бы отнести к монофлорному подсолнечниковому меду.

Предварительно можно обозначить следующие характеристики таких медов (таблицы 5, 6) при изначальном соответствии образцов регламентированным ГОСТом физико-химическим параметрам.

Приведенные результаты комплексного анализа играют важную роль при разработке региональных стандартов на премиальные сорта башкирского липового и гречишного меда. Ранее нами было установлено, что на территории Республики Башкортостан в большом количестве добываются меда, характеризующиеся высокими процентами пыльцы липы и гречихи в спектре [4].

Библиографический список

1. Oddo L.P., Piro R., Bruneau E., Guyot-Declerck C., Ivanov T., Piskulova J., Flamini C., Lheritier J., Marlot M.; Russmann H., Von der Ohe W., Von der Ohe K., Gotsiou P., Karabournioti S., Kefalas P., Passaloglou- Katrali M., Thrasyvoulou A., Tsigouri A., Marcazzan G.L., Piana M.L., Piazza M.G., Sabatini A.G., Kerkvliet J., Godinho J., Bentabol A., Ortiz Valbuena A., Bogdanov S., Ruoff K. Main European unifloral honeys: descriptive sheets. J. Apidologie. 35. 2004. P. 38–81.
2. Piana M.L., Persano Oddo L., Bentabol A. Bruneau E., Bogdanov S., Guyot Decklerck C. Sensory analysis applied to honey: state of the art. J. Apidologie. 35. 2004. P. 26–37.
3. Von der Ohe W., Oddo L.P., Piana M.L., Morlot M., Martin P. Harmonized methods of melissopalynology. J. Apidologie, 35, 2004. P. 18–25.
4. Курманов, Р.Г. Географическое и ботаническое происхождение башкирского меда. Атлас пыльцы [Текст] / Р.Г. Курманов. Уфа: Мир печати, 2019. 440 с.
5. D'Albore G.R. Mediterranean Melissopalynology. Università degli Studi di Perugia, 1998.
6. Мед натуральный. Технические условия [Текст]: ГОСТ 19792-2017. М.: Стандартинформ, 2017. 16 с.
7. Меды монофлорные. Технические условия [Текст]: ГОСТ Р 31766-2012. М.: Стандартинформ, 2013. 14 с.

Сведения об авторе

Курманов Равиль Гадельевич, ORCID: 0000-0002-2350-3845, кандидат биологических наук, с. н. с., Институт геологии – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, 450077, г. Уфа, ул. К. Маркса, 16/2, e-mail: ravil_kurmanov@mail.ru.

В статье приведены результаты первого комплексного анализа башкирского меда. С помощью качественного и количественного палинологического (пыльцевого), органолептического и физико-химического анализов охарактеризованы свойства 30 проб меда, отобранных из 22 районов Республики Башкортостан. Согласно результатам качественного пыльцевого анализа большинство образцов отнесено к монофлорным медам, среди них преобладали пробы липового меда. Также часто встречались подсолнечниковый и гречишный виды. Единично отмечены образцы синякового, донникового, рапсового, бодякового, лядвенцового, полифлорного и падевого медов. Количественный палинологический анализ в большинстве случаев подтвердил результаты качественного анализа. Несоответствия были обнаружены лишь при диагностике медов с недопредставленной пыльцой (бодяковый, чертополоховый виды). Кроме того, выделены особенности, присущие ряду проб башкирского липового и гречишного меда, связанные с повышенной концентрацией расти-

тельных элементов в их составе (64 500–74 600 и 26 500 соответственно). По данным органолептического анализа, число монофлорных образцов меда сократилось с 26 до 18. В 8 случаях небольшие примеси медов с характерными свойствами повлияли на качество изучаемых проб. Важно отметить, что органолептика липового меда проявлялась даже при низкой доле пыльцы липы в пыльцевом спектре (6 %). Физико-химический анализ подтвердил ботаническое происхождение липовых, гречишных, синяковых и падевого образцов меда. Отмечено, что довольно часто даже небольшие примеси определенных видов меда (липовый, гречишный) положительно сказывались на физико-химических параметрах образца. В случае с половиной проб подсолнечникового меда установлена их термическая обработка. На основе полученных результатов комплексного анализа возможно выделение характеристик премиальных сортов башкирского липового и гречишного медов, отличающихся повышенной долей пыльцы данных медоносов и высокой концентрацией растительных элементов.

A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE BASHKIR HONEY

Key words: *qualitative palynological analysis; quantitative palynological analysis; organoleptic characteristics; physical and chemical analysis; Bashkir honey; premium varieties of honey.*

Authors' personal details

Ravil Kurmanov, ORCID: 0000-0002-2350-3845, Candidate of Biological Sciences, Institute of Geology – a separate structural division of Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, 450077, Ufa, K. Marx St., 16/2, e-mail: ravil_kurmanov@mail.ru.

The paper contains the results of the first comprehensive analysis of Bashkir honey. Qualitative and quantitative palynological (pollen), organoleptic and physicochemical analyses described properties of 30 honey samples selected from 22 districts of the Republic of Bashkortostan. The qualitative pollen analysis found that most of the samples belonged to monofloral honey. Linden honey prevailed among the samples. Sunflower and buckwheat honey varieties were also common. The analysis found single samples of Viper's Bugloss, Melilot, rapeseed, Cirsium, Bird's foot, polyfloral, and honeydew honey types. The quantitative palynological analysis confirmed the results of qualitative analysis in most cases. Mismatches in honey varieties with underrepresented pollen (Cirsium and Carduus types of honey) were revealed. Also, the analysis found features inherent in several samples of Bashkir linden and buckwheat honey. The features are associated with an increased concentration of plant elements in their composition (64 500–74 600

and 26 500, respectively). The organoleptic analysis reduced the number of monofloral honey samples from 26 to 18. In 8 cases, small admixtures of honey with the characteristic properties affected the samples' quality. Organoleptic characteristics of linden honey were also revealed in honey samples with a low proportion of Linden pollen in the pollen spectrum (6 %). The physical and chemical analysis confirmed the botanical origin of linden, buckwheat, Viper's Bugloss, and honeydew honey samples. The study revealed that quite often, even small admixtures of certain types of honey (linden, buckwheat) had a positive effect on the sample's physical and chemical parameters. Heat treatment was established in half of the sunflower honey samples. The complete analysis results provide the basis for identifying characteristics of premium varieties of Bashkir linden and buckwheat honey. These varieties demonstrate an increased proportion of pollen from the honeybee plants and a high plant element concentration.

© Курманов Р.Г.

УДК 619:616.98:578.824.11

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-64-68

Н.Р. Мифтахов, Р.М. Ахмадеев, Ш.М. Насыров, И.И. Самерханов

МОНИТОРИНГ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Ключевые слова: *бешенство; животные; мониторинг; эпизоотическая ситуация; вакцинопрофилактика.*

Введение. Бешенство является особо опасной острой антропозоонозной вирусной инфекцией, характеризующейся симптомами полиэнцефалита, и представляет постоянную угрозу для человечества. Несмотря на значительные успехи в его изучении, борьба с ним затруднена из-за широкой циркуляции вируса в природе.

Проблема остается актуальной в связи с летальным исходом каждого случая и необходимостью проведения напряженного курса лечебно-профилактических прививок [1, 6, 7, 10, 14].

Резервуаром и главным источником возбудителя бешенства являются дикие хищные животные, собаки и кошки [1, 9]. При эпизоотиях

городского типа основными распространителями болезни служат бродячие и безнадзорные собаки, а при эпизоотиях природного типа – дикие хищники [2, 6, 7, 8]. Вирус передается главным образом со слюной при укусах, а также при оцарапывании или ослонении кожи и видимых слизистых оболочек больными животными. В последнем случае вирус в организм проникает через ссадины и царапины. Наиболее опасны укусы в лицо, шею и кисти рук [5].

Наиболее эффективными средствами контроля бешенства среди домашних и диких животных являются своевременная диагностика и вакцинопрофилактика [3, 4, 13]. Успех противоэпизоотических мероприятий может быть достигнут только при использовании комплекса мер, включающих научно обоснованное планирование вакцинации и мониторинга ее эффективности [7, 11, 12, 15].

Цель и задачи исследований. Целью представленной работы является мониторинг и обобщение данных по заболеваемости животных бешенством на территории Республики Татарстан за последние 10 лет, а также влияние профилактических мероприятий на распространение заболевания.

Условия, материалы и методы исследований. В представленной работе использовали статистические данные по бешенству Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, Россельхознадзора и сведений СМИ. Проведено изучение динамики проявлений эпизоотического процесса по бешенству в Республике Татарстан. Обработку результатов исследований проводили с помощью пакета программ Microsoft Office, Excel.

Результаты исследований. За последние 10 лет бешенство было зарегистрировано во всех 43 муниципальных районах и городах Республики Татарстан. Всего за указанный период заболело 1800 животных. Если рассмотреть по годам, то в 2010 г. бешенством заболело 239 животных, в 2011 – 126, в 2012 – 296, в 2013 – 255, в 2014 – 132 и в 2015 г. – 295. За последние 4 года ситуация по заболеваемости животных бешенством несколько стабилизировалась.

Так, в 2017 г. бешенство выявлено у 20 животных, в 2018 г. – у 24, в 2019 г. – у 24 животных.

В среднем с 2010 по 2015 гг. диагноз был установлен в 245 случаях. С 2016 по 2019 гг. бешенство в среднем регистрировалось в 21 случае. Заболеваемость животных снизилась почти в 12 раз. Удельная заболеваемость в 2019 г. в процентном соотношении составила: у сельскохозяйственных животных – 8, у домашних – 25, у животных дикой фауны – 67 %.

Комплексный подход по борьбе с бешенством в Республике Татарстан (оральная вакцинация диких плотоядных животных, парентеральная вакцинация сельскохозяйственных и домашних животных, регулирование численности лисиц, отлов бродячих собак и кошек) дал положительный эффект по снижению количества выявления бешенства среди животных. За 2017 г. выявлено 18 случаев бешенства в 13 муниципальных районах Республики Татарстан, в том числе по 2 – в Агрызском, Высокогорском, Елабужском, Сабинском и по 1 – в Апастовском, Атнинском, Арском, Балтасинском, Кайбицком, Кукморском, Мамадышском, Тукаевском и Тюлячинском районах. Из 18 заболевших животных лисы составили – 11, кошки – 4, собаки – 2, крупный рогатый скот – 1 гол. В 2018 г. выявлено 24 случая бешенства в 17 муниципальных районах Республики Татарстан, в том числе по 3 – в Пестречинском и Сабинском, по 2 – в Муслумовском, Лениногорском и Тукаевском, по одному случаю – в Алексеевском, Альметьевском, Апастовском, Буинском, Верхне-Услонском, Высокогорском, Заинском, Зеленодольском, Мензелинском, Рыбно-Слободском и Спасском районах. Из 24 заболевших животных лисы составили 13, кошки – 4, собаки – 3, енотовидные собаки – 2, крупный рогатый скот и крысы – по 1 гол. В 2019 г. на территории республики зарегистрировано 24 случая бешенства в 14 муниципальных образованиях, в том числе в Агрызском, Алексеевском, Апастовском, Лаишевском, Лениногорском, Мензелинском, Пестречинском, Тюлячинском районах по 1 случаю, в Муслумовском, Рыбно-Слободском районах и в городе Казани – по 2 случая, в Азнакаевском и в Чистопольском районах – по 3 случая, в Тукаевском районе – 4 случая. На 1 июня 2020 г. зарегистрировано по Республике Татарстан 18 случаев бешенства в 12 муниципальных образованиях.

Анализ представленных данных показал, что в Республике Татарстан наибольший показатель по заболеваемости бешенством выявлен у животных дикой фауны. Он составляет 67 % от общего количества заболевших животных.

В системе противоэпизоотических мероприятий Государственной ветеринарной службой Республики Татарстан проводится профилактическая вакцинация против бешенства сельскохозяйственных, домашних и диких плотоядных животных с применением антирабических вакцин. С начала 2020 г. в республике было запланировано проведение профилактических вакцинаций более 500 тыс. голов сельскохозяйствен-

ных и домашних животных. Вакцинация диких плотоядных животных проводилась путём раскладки оральной вакцины в местах их обитания. Весной текущего года совместно с охотоведами было разложено 900 тыс. доз вакцины «Рабистав», производитель «ФКП «Ставропольская биофабрика».

С целью наибольшего охвата поголовья животных государственная ветеринарная служба Республики Татарстан использует такие мероприятия, как выездные и подворные вакцинации. Статистические данные вакцинации сельскохозяйственных, диких и домашних животных за 2010–2020 годы представлены в таблице.

Таблица 1 Показатели антирабической вакцинации сельскохозяйственных, диких и домашних животных в Республике Татарстан за 2010–2020 гг. (гол.)

Вид животных	Год										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 за 5 мес.
Крупный рогатый скот	233928	232010	283632	277669	381062	621585	506019	802540	786964	759105	214938
Мелкий рогатый скот	4949	2195	3868	5134	2638	64047	59566	70352	113279	125603	31606
Лошади	1049	390	323	2789	4710	7284	4407	9579	21606	19504	5431
Свины	239	294	58902	407	46	0	0	0	0	0	0
Собаки	74672	66601	46594	55774	70509	102613	92920	106933	115421	112425	22408
Кошки	51620	43676	33488	39418	51641	87084	89087	1103425	1153943	106375	24504
Лисицы	0	600100	900000	900100	0	0	900000	1800000	1350000	2470000	900000

Из представленных данных таблицы видно, что ежегодно проводимая плановая вакцинация поголовья восприимчивых животных позволяет формировать среди них значительную иммунную прослойку, препятствующую распространению бешенства. Поголовье животных, подвергнутое вакцинации против бешенства с 2010 по 2014 гг., в среднем составило 886 085 голов, с 2015 по 2019 гг. данный показатель увеличился до 2 550 332 голов, т. е. в 2,9 раза.

Для успешной борьбы с природным бешенством мероприятия по оральной вакцинации диких плотоядных животных необходимо проводить в сочетании с регулированием их численности. Установлена прямая корреляционная связь заболеваемости бешенством животных с плотностью популяции лисиц. В связи с этим считаем целесообразным снижение популяции лисиц до 0,1–0,2 голов на 1 км² в районах, где этот показатель выше.

Широкий охват поголовья животных вакцинопрофилактикой против бешенства при постоянно проводимом контроле её эффективности посредством анализа поедаемости вакцины на наличие тетрациклина в костной ткани (зубов или нижней ветви челюсти), определения уровня вируснейтрализующих антител в сыво-

ротках крови или глазной жидкости животных, исследовании головного мозга на наличие антигена вируса бешенства позволил значительно снизить заболеваемость в Республике Татарстан.

Выводы. В результате ежедневной кропотливой работы ветеринарных специалистов эпизоотическая ситуация по бешенству в Республике Татарстан кардинально изменилась в лучшую сторону с 2016 г. и данная тенденция сохраняется по настоящее время. Полученные положительные результаты можно связать с увеличением охвата поголовья животных, вакцинированных против бешенства. Строгое соблюдение методов контроля эффективности вакцинопрофилактики, а также своевременная диагностика и соблюдение карантинных мероприятий привели к значительному снижению заболеваемости в Республике Татарстан. Однако следует отметить, что в связи с введением режима самоизоляции в РФ и РТ в текущем году работа ветеринарных специалистов по проведению профилактической вакцинации и мероприятий по бешенству была затруднена из-за невозможности обхода личных хозяйств и подворий, поэтому данная работа ветеринарной службой будет активизирована и продолжена с момента снятия всех ограничений, введенных ранее.

Библиографический список

1. Бурдов, Г.Н. Мониторинг бешенства животных на территории Удмуртской Республики [Текст] / Г.Н. Бурдов, Е.И. Марасинская, Н.А. Хисматуллина, С.Г. Явкин // Ветеринарный врач. 2014. № 3. С. 21–25.

2. Гулюкин, М.И. Изучение иммунного статуса организма собак, вакцинированных против бешенства [Текст] / А.М. Гулюкин, Н.А. Хисматуллина, А.З. Гафарова и др. // Ученые записки государственной академии ветеринарной

медицины им. Н.Э. Баумана. 2012. Т. 211. С. 52–56.

3. Дяченко, С.А. Сэндвич-вариант ИФА для выявления вируса бешенства в головном мозге животных и птицы [Текст] / С.А. Дяченко, И.Н. Матвеева, В.М. Попова, Д.П. Кузнецов, А.А. Евглевский // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2015. № 8. С. 201.

4. Ефимова, М.А. Оценка пригодности выделенных антирабических глобулинов для методов лабораторной диагностики: ИФА и МФА [Текст] / М.А. Ефимова, А.Г. Мухамеджанова, А.Н. Чернов, К.С. Хаертынов, Р.М. Ахмадеев, Ш.М. Насыров, И.И. Самерханов, З.З. Алеева, Г.С. Арутюнян, Г.М. Яруллина // Ветеринарный врач. 2018. № 4. С. 3–7.

5. Иванов, А.В. Эпизоотологический и иммунологический надзор за бешенством [Текст] / А.В. Иванов, Н.А. Хисматуллина, А.М. Гулюкин // Ветеринарный врач. 2010. № 4 (17). С. 3–6.

6. Макаров, В.В. Оральная вакцинация лиц против бешенства безальтернативна [Текст] / В.В. Макаров // Вестник РАСХН. 2010. № 2. С. 67–58.

7. Мухин, А.Н. Длительность и напряженность антирабического иммунитета у кошек после вакцинации вакциной «Рабифел» [Текст] / А.Н. Мухин, С.А. Раев, М.А. Лосич, О.Н. Зайкова, О.В. Остапчук, И.В. Непоклонова, О.А. Верховский, Т.И. Алипер // Ветеринария и кормление. 2018. № 6. С. 37–39.

8. Самерханов, И.И. Эпизоотологический мониторинг и контроль эффективности вакцинопрофилактики бешенства диких плотоядных животных в Республики Татарстан [Текст]: дис. ... канд. биол. наук: 06.02.02 / И.И. Самерханов. Уфа, 2018. 128 с.

9. Сокова, Л.С. Проблемы профилактики бешенства безнадзорных собак и кошек [Текст] / Л.С. Сокова, В.Н. Сазонкин, Н.М. Пухова // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. 2015. № 3. С. 33–37.

10. Таршис, М.Г. Болезни животных, опасные для человека [Текст] / М.Г. Таршис, Б.Л. Черкасский. М.: Колос, 1997. 298 с.

11. Чернов, А.Н. Динамика распространения бешенства среди животных на территории Республики Татарстан на фоне Российской Федерации [Текст] / Д.Н. Латфуллин, Р.М. Ахмадеев, Ш.М. Насыров, И.И. Самерханов, Н.Р. Мифтахов // Ветеринария Кубани. 2019. № 2. С. 6–7. DOI 10/33861/2071-8020-2019-2-6-7.

12. Янбарисова, С.Р. Сравнение традиционных и экспресс-методов лабораторной диагностики бешенства [Текст] / С.Р. Янбарисова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2010. № 1 (25). С. 90-91.

13. Astrakhantsev V.A., Chernov A.N., Mukhamedzhanova A.G., Voskresensky S.B., Efimova M.A., Latfullin D.N. Epizootological monitoring and control measures against rabies in Moscow region. J. Pharm. Sci. & Res. Vol. 10 (12), 2018, 3438–3441.

14. Chacko K., Parakadavathu R.T., Al-Maslmani M., Nair A.P., Chekura A.P., Madhavan I. Diagnostic difficulties in human rabies: A case report and review of the literature. Qatar Med. J. 2017; 2016(2):15. DOI: 10.5339/qmj.2016.15.

15. Duong V., Tarantola A., Ong S., Mey C., Choeung R., Ly S., Bourhy H., Dussart P., Buchy P. Laboratory diagnostics in dog-mediated rabies: an overview of performance and a proposed strategy for various settings. Int. J. Infect. Dis. 2016; 46:107–4. DOI: 10.1016/j.ijid.2016.03.016.

Сведения об авторах

1. **Мифтахов Ниаз Рафисович**, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией вирусных антропозоонозов, ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности», тел.: +7 (843) 239-53-20, e-mail: vnivi@mail.ru.

2. **Ахмадеев Рафаил Мазитович**, кандидат ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории вирусных антропозоонозов, ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности», тел.: +7 (843) 239-53-20, e-mail: vnivi@mail.ru.

3. **Насыров Шамиль Минесалихович**, кандидат ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории вирусных антропозоонозов, ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности», тел.: +7 (843) 239-53-20, e-mail: vnivi@mail.ru.

4. **Самерханов Ильнур Иршатович**, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории вирусных антропозоонозов, ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности», тел.: +7 (843) 239-53-20, e-mail: vnivi@mail.ru.

В настоящее время на территории Российской Федерации сохраняется неблагоприятная ситуация по бешенству. Почти во всех регионах

страны периодически отмечается активизация природных очагов бешенства, растет число случаев заболевания среди диких плотоядных

животных, вовлекаются в эпизоотический процесс домашние и сельскохозяйственные животные. Одной из причин неблагополучия по заболеваемости является недостаточный охват антирабической вакцинацией животных и отсутствие контроля её эффективности. Борьба с бешенством предусматривает профилактическую иммунизацию сельскохозяйственных и домашних животных, отлов безнадзорных собак и кошек, оральную вакцинацию диких животных, а также мероприятия по регулированию численности дикой фауны.

В представленной статье описана эпизоотическая ситуация по бешенству в Республике Татарстан с 2010 по 2020 гг. Определена зависимость проявления случаев заболевания от проведения профилактических мероприятий. Полу-

ченные данные свидетельствуют, что эпизоотическая ситуация по бешенству в Республике Татарстан, начиная с 2016 года, кардинально изменилась в лучшую сторону. Это связано, прежде всего, со своевременным проведением карантинных и ветеринарно-профилактических антирабических мероприятий. Заболеваемость сельскохозяйственных животных бешенством сведена к минимуму.

Наряду с этим отмечено, что увеличение охвата поголовья подвергнутых вакцинации сельскохозяйственных, домашних (кошек и собак), а также животных дикой фауны за последние годы в 2,9 раза позволило создать значительную иммунную прослойку, препятствующую распространению болезни, и сократить уровень заболеваемости бешенством в Республике Татарстан.

N. Miftakhov, R. Akhmadeev, Sh. Nasyrov, I. Samerkhanov

MONITORING OF THE EPIZOOTIC SITUATION AND RABIES VACCINATION IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Key words: rabies; animals; monitoring; epizootic situation; vaccination.

Authors' personal details

1. **Niaz Miftakhov**, Candidate of Biological Sciences, head of the Laboratory of Viral Anthroponoses, Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, phone: +7 (843) 239-53-20, e-mail: vnivi@mail.ru.

2. **Rafail Akhmadeev**, Candidate of Veterinary Sciences, Leading Researcher of the Laboratory of Viral Anthroponoses, Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, phone: +7 (843) 239-53-20, e-mail: vnivi@mail.ru.

3. **Shamil Nasyrov**, Candidate of Veterinary Sciences, Leading Researcher of the Laboratory of Viral Anthroponoses, Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, phone: +7 (843) 239-53-20, e-mail: vnivi@mail.ru.

4. **Ilnur Samerkhanov**, Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher of Viral Anthroponoses, Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety, phone: +7 (843) 239-53-20, e-mail: vnivi@mail.ru.

Currently, the rabies situation remains grave in the Russian federation. Almost all country regions face the activation of natural rabies foci. The number of disease cases among wild carnivores is growing, and domestic and farm animals are getting infected. Insufficient anti-rabies vaccination of animals and poor vaccine effectiveness control are the reasons behind the high incidence rate. Rabies control involves preventive immunization of farm and domestic animals, catching stray dogs and cats, oral vaccination of wild animals, and wildlife management measures. The paper describes the epizootic situation of rabies in the Republic of Tatarstan from 2010 to 2020. The

study revealed a correlation between incidence cases with preventive measures. The obtained data indicate that since 2016, rabies' epizootic situation has dramatically changed for the better in the Republic of Tatarstan. The change is due to timely quarantine and veterinary preventive measures. The incidence of rabies among farm animals has been minimized. Also, as the number of vaccinated livestock and domestic (cats and dogs) animals, as well as wild animals, increased 2.9 fold over the past years, the Republic of Tatarstan has managed to reach a significant immunisation level, thus preventing the spread of the disease and reducing the incidence of rabies.

© Мифтахов Н.Р., Ахмадеев Р.М., Насыров Ш.М., Самерханов И.И.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПУЛЛОРОЗА ЭМБРИОНОВ ПТИЦ ПУТЕМ БИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ИНКУБАЦИОННОГО ЯЙЦА

Ключевые слова: сальмонеллез кур; антибиотик; ципровет; энрофлоксацин; макролан; докси форте.

Введение. Как известно, взрослая птица переносит бессимптомно, но переболевшие цыплята являются носителями данной инфекции, т. е. выделителями сальмонеллезной инфекции. Все птицы (цыплята, индюшата, фазанята, цесарята и т. д.) особенно восприимчивы к сальмонеллезу в первые дни жизни. Основным источником возбудителя инфекции служит больная птица, которая вместе с пометом выделяет большое количество возбудителя [1, 2]. Исследованиями установлено, что сальмонелла проникает не только в мышцы и на внутренние органы птиц, но и в яйца, попадая именно в желток [3, 4]. Анализ статистических данных показывает, что домашние птицы, а именно куры, часто болеют сальмонеллезом. Во многих случаях куры были инфицированы *S. enteritidis*, поэтому не проявлялись клинические признаки болезни и падежа птиц [4]. По мнению специалистов ВОЗ, отсутствие симптомов инфекции у сельскохозяйственных животных с выявлением этих бактерионосителей делают их постоянными источниками заражения [5]. В основном дикие птицы способны к распространению инфекции. Так, например инфицированность сальмонеллами зарегистрирована у 140 видов диких птиц. Это говорит о длительном сохранении возбудителя сальмонеллеза в популяции диких птиц и об определенной роли в рассеивании сальмонелл в природе [6, 7]. Большую роль в распространении сальмонелл играют также нарушения ветеринарно-санитарных и гигиенических требований при транспортировке, хранении и реализации продуктов. По этой причине следует обратить внимание на продукцию, полученную от внешне здоровых животных, прошедшую в полном объеме ветеринарно-санитарную экспертизу, а также в процессе транспортировки, переработки, хранения, реализации и конечно же на их потребления [8–11].

Для того чтобы выявить основные факторы инфекционного процесса, необходимо изучить эпизоотическую ситуацию, совершенствовать и разрабатывать лечебные и специфические меры профилактики. В Республике Казахстан частные предприниматели нередко пренебрегают проведением ветеринарных мероприятий и способствуют заносу инфекции для промышленного

птицеводства [12]. В эпоху рыночной экономики, как показывает практика, прежде чем заниматься птицеводством в приусадебных хозяйствах, необходимо провести лечебно-профилактические меры против таких болезней как пуллороз – сальмонеллез кур с целью препятствия заноса бактерий, а также размножения и распространения данной инфекции в промышленном птицеводстве.

Исходя из вышеупомянутого, целью данной работы являлось изучение отклонения от нормы показателей биологического контроля инкубации яиц кросса «Родонит 3» «Хайсекс-Браун» на птицефабрике в Республике Казахстан. В исследования входил анализ правильности проведения методов ветеринарно-санитарных мероприятий на птицефабрике.

Топография проявления нарушений эмбрионального развития в инкубационных яйцах – это наполненность желточного мешка травянисто-зеленого цвета экссудатом инъецированной сетью кровеносных сосудов плотной консистенции. Для анализа результатов эффективности применения методов ветеринарно-санитарных мероприятий и правильности проведенной профилактики при скрытых формах сальмонеллеза кур-несушек родительского стада были применены методы ветеринарно-санитарных мероприятий с использованием традиционных препаратов.

Материалы и методы исследования. В период с 2009 по 2013 гг. нами проведены производственные опыты по изучению отклонения от нормы показателей биологического контроля инкубации яиц кросса «Родонит 3» «Хайсекс-Браун» на птицефабрике Республики Казахстан.

В опытные и контрольные группы подбирали яйца от одного родительского стада при соблюдении равенства массы яиц, сроков снесения и хранения. Возраст родительских стад составлял 230–270 суток. Средняя масса яиц – 54,8–59,5 г, плотность – 1,092–1,095 г/см³, толщина скорлупы – 380–400 мкм, кислотность желтка – 4,2–4,4 мг КОН, содержание каротина в желтке – 15,5–15,7 мкг/г, витамина А – 7,2–8,6 мкг. Срок хранения – 2–5 суток. Инкубацию яиц во всех исследованиях и производственной проверке проводили в инкубаторах универсальных

предварительных (ИУП-Ф-45). В выводных (ИУВ-Ф-15) в первой серии опытов было проинкубировано 1088,59 тыс. штук инкубационных яиц. Во второй серии опытов посажено на выращивание всего 892072 голов птицы [13, 14].

Режимы инкубации, плотность посадки, фронт кормления и поения, параметры микроклимата были аналогичными для всех опытных и контрольных групп. Каждое исследование соответствовало зоогигиеническим и технологическим нормативам (НТП АПК 1,1005,001-01). Кормление птицы осуществляли согласно рекомендациям ВНИТИП (2006). При проведении экспериментов учитывали следующие показатели: температурно-влажный режим при инкубации яиц в камере инкубатора ИУП-Ф-45 и ИУВ-Ф-15 с помощью встроенных в него датчиков влажности и температуры. Результаты инкубации (плодотворность, выводимость яиц и вывод цыплят) приводятся [14]. При этом отходы инкубации мы делили на несколько категорий: как неоплодотворенные яйца, кровяные кольца, замершие, задохлики, слабые цыплята и тому подобное. Прежде чем осуществить биологический контроль инкубации, нам пришлось вскрывать яйца с погибшими зародышами, таким образом установили их возраст.

Исследования проводили в филиале РГП «Республиканской ветеринарной лаборатории» Западно-Казахстанской области, а также в центре санитарно-эпидемиологической экспертизы Западного-Казахстана» (КГСЭН МЗ РК). В научно-исследовательском институте биотехнологии Аграрно-техническом университете им. Жангир-хана Западно-Казахстанской области проведены исследования анализа крови, а также микробиологические исследования смывов.

Одновременно учитывали условия инкубации с учетом эпизоотологических данных, по результатам патологоанатомического вскрытия, результатам лабораторных исследований, комплексно ставили диагноз на пуллороз эмбрионов.

На рисунках 1 и 2 видно, что у погибших эмбрионов содержимое желточного мешка приобретает травянисто-зеленоватый цвет, а кровеносные сосуды инъецированы сетью и обладают плотной консистенцией. Многочисленные мелкие очаги некроза встречаются не только на сердце, но и на селезенке и в почках. Желчный пузырь увеличен и заполнен густой тягучей темно-зеленого цвета желчью, в результате пропитывания ею печень увеличивается в объеме. Также можно увидеть отложение мочекислых солей на теле у эмбрионов (рисунки 1–4).

Рисунки 1–4
Эмбрионы, зараженные пуллорозом

Грязь

Рисунок 5

Диаграмма данных результатов % грязного яйца в разрезе птицефабрик Республики Казахстан с 2007 по 2013 год после проведения комплексной антибиотиковой терапии против сальмонеллезной инфекции

Таблица 1 Показатели биологического контроля инкубации кросса «Родонит 3» и их результаты после применения эффективных методов ветеринарно-санитарных мероприятий на птицефабрике в Республике Казахстан на 2009 г.

Показатель	Контрольный (14 партий) октябрь, ноябрь		Опытный (14 партий) октябрь, ноябрь	
Заложено на инкубацию яиц, шт.	182360	—	182350	—
Выводимость яиц	143440	79,9 ± 0,09	150211	82,1 ± 0,08**
Отходы инкубации (шт.)	28831	20,1 ± 0,09	26887	17,9 ± 0,08**
Вскрытие 10–11 % отхода инкубации яиц (шт.)	3171	—	2957	—
Не оплодотворенные яйца	1620	51,1 ± 0,78	1571	53,1 ± 0,91
Кровяное кольцо	368	11,6 ± 0,56	369	12,5 ± 0,60
Замершие	523	16,5 ± 0,66	506	17,1 ± 0,69
Задохлики	371	11,7 ± 0,57	367	12,4 ± 0,60
Эмбрионы с признаками пуллороза	289	9,1 ± 0,51	144	4,9 ± 0,39*

Таблица 2 Показатели биологического контроля инкубации кросса «Родонит 3» в результате применения эффективных методов ветеринарно-санитарных мероприятий на птицефабрике в Республике Казахстан на 2011 г.

Показатель	Контрольный (14 партий) октябрь, ноябрь		Опытный (14 партий) октябрь, ноябрь	
Заложено на инкубацию яиц, шт.	181800	—	180760	—
Выводимость яиц	143440	80,9 ± 0,09	150211	83,1 ± 0,08*
Отходы инкубации (шт.)	38360	19,1 ± 0,09	30549	16,9 ± 0,08*
Вскрытие 10–11 % отхода инкубации яиц (шт.)	3850	—	3015	—
Не оплодотворенные яйца	1982	51,5 ± 0,75	1619	53,7 ± 0,83
Кровяное кольцо	446	11,6 ± 0,48	377	12,5 ± 0,53
Замершие	674	17,5 ± 0,57	546	18,1 ± 0,63
Задохлики	489	12,7 ± 0,5	404	13,4 ± 0,55
Эмбрионы с признаками пуллороза	259	6,7 ± 0,40	69	2,3 ± 0,27***

Для планирования предварительной схемы ветеринарной профилактики от данного заболевания и для обеспечения надежной защиты птицепоголовья нашей целью являлось исследование показателей биологического контроля инку-

бации яиц кросса «Родонит 3» «Хайсекс-Браун» и анализ результатов применения эффективных методов ветеринарно-санитарных мероприятий на птицефабрике в Республике Казахстан за 2009–2013 гг.

Таблица 3 Показатели биологического контроля инкубации кросса «Хайсекс-Браун» и их результаты после применения эффективных методов ветеринарно-санитарных мероприятий на птицефабрике Республики Казахстан за 2013 год

Показатель	Контрольный (14 партий) октябрь, ноябрь		Опытный (14 партий) октябрь, ноябрь	
Заложено на инкубацию яиц, шт.	180840	–	180480	–
Выводимость яиц	151182	83,6 ± 0,08	153588	85,1 ± 0,08***
Отходы инкубации (шт.)	29658	16,4 ± 0,08	26892	14,9 ± 0,08***
Вскрытие 10–11 % отхода инкубации яиц (шт.)	2995	–	2690	–
Не оплодотворенные яйца	1593	53,2 ± 0,91	1455	54,1 ± 0,96
Кровяное кольцо	353	11,8 ± 0,58	330	12,3 ± 0,63
Замершие	530	17,7 ± 0,69	481	17,9 ± 0,73
Задохлики	386	12,9 ± 0,61	371	13,8 ± 0,66
Эмбрионы с признаками пуллороза	133	4,4 ± 0,37	53	1,9 ± 0,26***

Вывод. При патологоанатомическом вскрытии невыведенных инкубационных яиц кур выявили, что у 15–18 % погибших эмбрионов содержимое желточного мешка травянисто-зеленого цвета и инъецированы они сетью кровеносных сосудов. Желчный пузырь увеличен в несколько раз и заполнен густой тягучей темно-зеленого цвета желчью. На теле эмбрионов и оболочках аллантоиса отложение мочекислых солей. У птиц, погибших от сальмонеллеза, наблюдали крупный неиспользованный желток величиной с орех, катарально-геморрагические воспаления желудочно-кишечного тракта. Слепые отростки кишечника заполнены фибринозной массой, отмечается ампулообразное расширение прямой кишки, заполненное газами и мочекислыми солями.

На основании полученных результатов борьбу с сальмонеллезом птиц целесообразно проводить организованно с включением санитарно-гигиенических и терапевтических мероприятий и последующим серологическим выявлением подозреваемых в заражении и бактерионосительстве птиц. В этих случаях единственным выходом является рациональное использование надежных и безопасных противобактериальных средств и в первую очередь антибиотиков [12, 16]. В зараженных или подозреваемых участках необходимо тщательно проводить дезинфекцию с обеззараживающими растворами данной инфекции, выявлять и лечить бактерионосительных птиц с эффективными действующими препаратами.

Библиографический список

1. Инфекционные болезни животных [Текст]: учебник / Под ред. А.А. Сидорчука. М.: Колос, 2007. С. 482–485.
2. Бакулин, В.А. Болезни птиц [Текст] / В.А. Бакулин. СПб., 2006. С. 285–295.
3. Бессарабов, Б.Ф. Болезни птиц [Текст]: учебное пособие / Б.Ф. Бессарабов, И.И. Мельникова, Н.К. Сушкова, С.Ю. Садчиков; 2-е изд. стер. СПб.: Лань, 2009. С. 220–229.
4. Старосельский, А. Проблемы и пути решения сальмонеллезной инфекции в современном птицеводстве [Текст] / А. Старосельский // Ветеринария. 2010. № 2. С. 13–15.
5. Рахманин, П.П. Эпизоотическое состояние и меры борьбы с сальмонеллезом [Текст] /

- П.П. Рахманин, А.В. Куликовский // Ветеринария. 1989. № 7. С. 40–44.
6. Борьба с сальмонеллезом: роль ветеринарии и пищевой гигиены [Текст] // Доклад Комитета экспертов ВОЗ. Женева: ВОЗ, 1991. 83 с.
7. Попова, П.П. Экология сальмонелл и эпидемиология сальмонеллезов [Текст] / П.П. Попова, М.М. Ременцова, А.А. Ким. Алма-Ата: Наука, 1987. 126 с.
8. Жанузаков, Н.Ж. Эпизоотология, вопросы природной очаговости и профилактики сальмонеллезов [Текст]: методические рекомендации / Н.Ж. Жанузаков, Н.П. Гончаров, П.П. Попова и др. Караганда, 1981. 22 с.

9. Мезенцев, С.В. Обеспечение безопасности продукции птицеводства по сальмонеллезу [Текст] / С.В. Мезенцев // Ветеринария. 2002. № 7. С. 12–14.

10. Куликовский, А.В. Профилактика пищевых токсикоинфекций человека и концепция ХАССП [Текст] / А.В. Куликовский // Ветеринария. 2011. № 1. С. 19–23.

11. Онищенко, И.С. Фенотипические свойства и эпизоотологическая значимость *E. coli* O157:H7 [Текст]: дис. ... канд. вет. наук: 16.00.03 / И.С. Онищенко. Новосибирск, 2008. 128 с.

12. Нуралиев, Е.Р. Пуллороз-сальмонеллез птиц в приусадебных хозяйствах как природный резервуар возбудителя болезни для промышленного птицеводства [Текст] / Е.Р. Нуралиев, И.И. Кочиш // Аграрный научный журнал. 2017. № 11. С. 24–29.

13. Аганичева, А.А. Предынкубационная обработка куриных яиц отечественными стимуляторами [Текст] / А.А. Аганичева, С.А. Алексеева // Нива Поволжья. 2013. № 4 (29). С. 68–72.

14. Нуралиев, Е.Р. Разработка эффективной ветеринарно-санитарной профилактики для промышленной птицефабрики [Текст]: дис. ... канд. биол. наук: 06.02.05 / Е.Р. Нуралиев. М., 2015. 173 с.

15. Брюшной тиф, паратифы А и В, сальмонеллёзы, дизентерия [Текст]: теоретическое занятие специальности 2-79 01 01 «Лечебное дело» / С.А. Татарченко. 2010.

16. Пименов, Н.В. Новые пути решения медико-социальной проблемы сальмонеллеза птиц [Текст] / Н.В. Пименов // Жизнь без опасностей. 2011. № 2. Т. 6. С. 56–60.

Сведения об авторе

Нуралиев Ерис Рахимгалиевич, кандидат биологических наук, главный ветврач Научно-производственного учебного центра, Инновационно-технический университет Республики Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, п. Деркул, ул. Молодежная, 5а, e-mail: Nuraliev-71@mail.ru.

В статье представлены сравнительные производственные опыты по выявлению пуллороз-сальмонеллеза эмбрионов кур яичного кросса «Родонит 3», «Хай секс-Браун» и «Браун Ник». При патологоанатомическом вскрытии невыведенных инкубационных яиц кур выявили, что у 15–18 % погибших эмбрионов содержимое желточного мешка травянисто-зеленого цвета и инъецированы они сетью кровеносных сосудов. Желчный пузырь увеличен в несколько раз и заполнен густой тягучей темно-зеленого цвета желчью. На теле эмбрионов и оболочках аллантаиса отложение мочекислых солей. У птиц, погибших от сальмонеллеза, наблюдали крупный неисполь-

зованный желток величиной с орех, катарально-геморрагические воспаления желудочно-кишечного тракта. Слепые отростки кишечника заполнены фибриновой массой, отмечается ампулообразное расширение прямой кишки, заполненное газами и мочекислыми солями. Борьба с сальмонеллезом птиц должна включать проведение организационных, санитарно-гигиенических и терапевтических мероприятий, серологическое выявление подозреваемых в заражении или бактерионосительстве птиц. В этих случаях единственным выходом является рациональное использование надежных и безопасных противобактериальных средств и в первую очередь антибиотиков.

Y. Nuraliyev

IDENTIFICATION OF BIRD EMBRYO PALLOROSIS BY BIOLOGICAL CONTROL OF INCUBATION EGG

Key words: *salmonellosis of chickens; antibiotic; ciprovet; enrofloxacin; macrolan; doxy forte.*

Authors' personal details

Yeris Nuraliyev, Cand. of Biol. Sci., Chief veteran of the «Scientific and Production Training Center» of the Innovation and Technical University of the Republic of Kazakhstan, West-Kazakhstan region, Uralsk city, settlement, Dercul, Molodezhnaya st., 5a, e-mail: Nuraliev-71@mail.ru.

The article presents comparative production experiments to identify pallorosis-salmonellosis of chicken embryos of the egg cross «Rhodonit 3»,

«High Sex Brown», and «Brown Nick». Autopsy of unhatched incubation eggs of chickens revealed that in 15–18 % of dead embryos, the contents of the yolk

sac were grassy-green in color and injected with a network of blood vessels of dense consistency. The gallbladder is enlarged several times and is filled with thick viscous dark green bile, which permeates the liver from the inside. On the body of the embryos and allantois membranes, the deposition of uric acid salts. In birds that died from salmonellosis, a sizeable unused yolk the size of a nut, catarrhal-hemorrhagic inflammation of the gastrointestinal tract was

observed. The blind processes of the intestine are filled with a fibrinous mass; there is an ampoule-like expansion of the rectum, filled with gases and uric acid salts. It is advisable to combat the salmonellosis of birds: the implementation of organizational, sanitary-hygienic and therapeutic measures, serological identification of birds. In these cases, the only way out is the rational use of reliable and safe antibacterial agents, primarily antibiotics.

© Нуралиев Е.Р.

УДК 636.082.1

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-74-80

О.В. Руденко, М. Алмохаммед

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Ключевые слова: быки-производители; концентрация спермиев; объём эякулята; активность спермиев; месяц года.

Введение. В настоящее время для оценки и прогнозирования фертильности быков (оплодотворяющая способность спермы быков) используются сложные статистические модели, которые учитывают не только селекционные признаки оценки воспроизводства стада (количество осеменений на 1 плодотворное, сервис-период и др.), характеризующиеся невысокой наследуемостью, но и влияние паратипических факторов (эффекты стадо – год – сезон отела, хозяйство и др.) [1]. Паратипическим фактором может выступать возраст производителей: по данным С.Н. Хохрина и Д.В. Давлеткильдиной [2], величина объёма эякулята увеличивается до 6-летнего возраста и только потом наблюдается постепенное уменьшение до 9–10 лет. Исследованиями установлена отрицательная корреляция между возрастом и активностью сперматозоидов [3], а также статистически значимое влияние возраста быков на подвижность сперматозоидов [4]. Актуальными остаются вопросы взаимосвязи эндокринной функции с иммунной системой быков выдающихся селекций, раскрывающие механизмы активизации половой потенции, обеспечивающей продолжительное использование производителей с высоким генетическим потенциалом [5, 6, 7, 8]. Влияют на воспроизводительные функции уровень и полноценность кормления [9–14], режим двигательной активности [15], некогерентный поляризованный свет [16], магнитные бури [17], атмосферное давление [18] и многие другие факторы.

Цель исследований – изучить сезонные изменения качественных показателей спермы быков-производителей.

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на базе ООО «Нижегородское» по племенной работе» в 2018 г. Объект исследования – быки-производители голштинской ($n = 28$), чёрно-пёстрой ($n = 7$), бурой швицкой ($n = 6$) и герефордской ($n = 3$) пород в возрасте от 2 до 6 лет. Данные получены из журналов первичной регистрации качественных показателей спермы быков на племпредприятии. Статистическую обработку данных проводили с использованием программы Microsoft Excel. Влияние месяца года на показатели качества спермы определяли однофакторным дисперсионным анализом.

Результаты исследований. Изменение в течение года погодных условий, таких как продолжительность светового дня, интенсивность солнечной инсоляции, температура и влажность воздуха, атмосферное давление и т. д., влияет на жизненные циклы и общий тонус всего организма. В осенний период мы наблюдаем снижение активности протекания физиологических процессов, весной, наоборот, идёт их активизация. Влияние сезонности на здоровье и продуктивность животных нельзя недооценивать. Сезоны года (зима, весна, лето, осень) оказывают самое непосредственное влияние на функциональные возможности организма крупного рогатого скота, в том числе и на организм быков-

производителей: их здоровье, воспроизводительные способности, физиологическое состояние, качество спермопродукции и морфологические показатели крови [20–23].

Потенция и качество спермы у самцов находятся в большой зависимости от условий содержания породности и возраста производителей, а также от климатических условий. Содержание в неблагоприятных условиях не только задерживает половое развитие молодых производителей, но и временно угнетает половую деятельность у взрослых животных, отчего она становится сезонной, это можно наблюдать в зависимости половой активности самцов от температурного режима: в очень жаркие солнечные дни половая активность резко снижается.

Обнаружена зависимость концентрации спермиев от сезона года. В начале года концентрация сперматозоидов не отличалась высоким уровнем, в среднем по всем быкам она составила в январе $0,592 \pm 0,027$ млрд/мл (рисунок 1). После небольшого спада в феврале мы наблюдаем рост концентрации в весенний период и резкий скачок в июне до $0,886 \pm 0,029$ млрд/мл. Однако

уже в июле концентрация уменьшилась до $0,748 \pm 0,022$ млрд/мл, в последующие месяцы мы также наблюдали постепенное снижение этого показателя. В ноябре концентрация имела минимальное значение в году – $0,550 \pm 0,021$ млрд/мл. Дисперсионный анализ показал статистически значимое влияние месяца года на концентрацию сперматозоидов в эякуляте быков ($F > F_{st}, p < 0,001$), сила влияния составила 28,18 %.

На наш взгляд, такое положение обусловлено природно-климатическими условиями, в частности уровнем солнечной санации. Зимний период в нашей климатической зоне характеризуется малым количеством солнечных дней и низким атмосферным давлением. С приходом весны увеличивается не только количество ясных дней, но и солнечная активность. Это приводит к повышению общего тонуса животных, улучшению всех физиологических процессов в организме и, как следствие, к росту концентрации спермиев. Некоторое снижение данного показателя в июле и августе, возможно, связано с более жаркой погодой в эти месяцы, что отмечают некоторые авторы.

Рисунок 2
Концентрация сперматозоидов в эякуляте, млрд/мл

Приход осени в нашем климате характеризуется резким похолоданием, сокращением солнечной активности и повышению влажности. Совокупность всех этих факторов, возможно, привела к уменьшению концентрации спермиев в этот период. Динамика изменений концентрации сперматозоидов в голштинской породе практически полностью согласуется с общими тенденциями. Влияние месяца года в этой породе также статистически значимо ($F > F_{st}, p < 0,001$), сила влияния составила 29,55 %.

У чёрно-пёстрой и бурой швицкой пород ситуация аналогична общей. Однако в феврале у чёрно-пёстрых и швицких быков огромный провал, концентрация катастрофически мала: $0,418 \pm 0,244$ и $0,422 \pm 0,267$ млрд/мл соответственно. В это время идёт большой брак семени

именно по причине низкой концентрации. В марте ситуация начинает улучшаться, в июне у быков лучшие показатели по концентрации спермиев: чёрно-пёстрые – $0,966 \pm 0,317$ млрд/мл, швицкие – $0,840 \pm 0,165$ млрд/мл. С июля опять наблюдается резкий спад и дальнейшее снижение к зимним месяцам. Влияние месяца года в этих породах статистически значимо ($F > F_{st}, p < 0,05$), сила влияния составила 37,38 % в чёрно-пёстрой породе и 36,52 % в бурой швицкой. Изменение концентрации сперматозоидов в герефордской породе не подвержено сезонным влияниям, высокие значения в апреле и в июне меняются на низкие значения в январе, в марте и в мае. Средний объём эякулята по всем быкам в начале года был достаточно высок: 7,69–8,45 мл. Однако в июне идёт резкое уменьшение

объёма до $5,72 \pm 0,213$ мл, в дальнейшие месяцы мы наблюдали постепенное повышение объёма, в декабре он достиг значения $7,68 \pm 0,237$ мл (рисунок 2). Влияние месяца года на средний объём эякулята быков статистически значимо ($F > F_{st}$, $p < 0,001$), сила влияния составила 19,73 %. Резкое сокращение объёмов эякулятов в июне, возможно, связано с жаркой погодой, которая установилась с середины июня – днём до $27-32^\circ\text{C}$, такой температурный режим не типичен для Нижегородской области. Последующие два месяца также были жаркими, восстановиться от температурного шока животные смогли только к ноябрю.

Аналогичная ситуация наблюдается у голштинской породы: с января по май объём эякулята колеблется с 8,21 до 8,92 мл. В июне происходит резкий спад до 5,82 мл, в дальнейшем объём эякулята постепенно увеличивается, достигая в декабре 7,96 мл. Влияние месяца года на средний объём эякулята голштинских быков

статистически значимо ($F > F_{st}$, $p < 0,001$), сила влияния составила 33,68 %. Чёрно-пёстрые быки практически во все месяцы года имеют небольшой объём эякулята – 5,08–6,27 мл, как и у других пород, в июне наблюдается резкое уменьшение объёма до 4,01 мл. Затем наблюдается постепенный подъём с максимумом в ноябре – $7,35 \pm 1,271$ мл.

Швицкие производители, как и голштинские, в начале года имеют достаточно высокие показатели объёма эякулята: в январе они показывают лучшие результаты среди других пород – $9,64 \pm 0,598$ мл, в июне, как и производители других пород, швицкие быки снизили объём выделяемого эякулята до $6,88 \pm 0,450$ мл. В последующие месяцы мы наблюдаем повышение объёма до $7,98 \pm 0,470$ в декабре. Однако проведённый нами однофакторный дисперсионный анализ не выявил статистически значимого влияния месяца года на данный показатель.

Рисунок 3
Объём эякулята, мл

Не установлено влияние месяца года на объём выделяемого производителями эякулята и у герефордской породы. После января, в котором быки давали эякулят достаточного объёма – 8,50 мл, отмечается резкое уменьшение до 6,42 мл в феврале, последующий подъём в мае до 10,00 мл и опять снижение до 5,86 мл в июне. В дальнейшем также наблюдались резкие повышения и снижения объёма эякулята. Возможно, подобные колебания связаны с индивидуальными особенностями организма, состоянием здоровья производителя и другими факторами, которые достаточно ярко проявляются в малочисленной группе (на племпредприятии три быка породы герефорд).

Активность сперматозоидов – один из важнейших показателей качества спермы. Эякулят достаточного объёма и с высокой концентрацией спермиев, но с низкой их активностью выбраковывают, так как такая сперма не будет

иметь высокой оплодотворяющей способности, а значит, не представляет никакой ценности.

Показатели активности сперматозоидов в сперме производителей племпредприятия в течение года изменяются незначительно. В начале года активность спермиев не велика: $5,98 \pm 0,136$ баллов, в марте наблюдается повышение до $6,33 \pm 0,126$ баллов, а в июле – до $6,47 \pm 0,121$ баллов, этот период отличается максимальной активностью (рисунок 3). После июля наблюдается снижение активности, и в декабре она достигает отметки $5,95 \pm 0,154$ баллов. Повышение активности спермиев в весенние и летние месяцы, на наш взгляд, связано с наступлением тёплой солнечной погоды, которая служит эволюционно сложившимся сигналом подготовки стадных животных к случному сезону. Влияние месяца года не высокое, но статистически значимое ($F > F_{st}$, $p < 0,05$), сила влияния составила 6,36 %.

Рисунок 4
Активность спермиев, баллы

Динамика активности сперматозоидов у голштинских быков в течение года очень похожа с общей по всему племпредприятию, однако несколько выше. Высокие показатели активности были зарегистрированы в апреле ($6,50 \pm 0,134$ баллов) и июле ($6,61 \pm 0,125$ баллов). В зимние месяцы активность спермиев снизилась до $5,99 \pm 0,181$ баллов (декабрь). Однако проведённый нами однофакторный дисперсионный анализ не выявил статистически значимого влияния месяца года на данный показатель.

Чёрно-пёстрые быки отличаются самой низкой активностью спермиев среди изучаемых пород. Максимальная активность у них не превышает 6 баллов – $5,98 \pm 0,348$, этот уровень зафиксирован в марте. Низкую активность спермиев быки имели в феврале ($5,14 \pm 0,428$ баллов) и в августе ($5,21 \pm 0,370$ баллов). Статистически значимого влияния месяца года на данный показатель однофакторный дисперсионный анализ не выявил.

У швицких производителей наблюдалось достаточно сильное колебание активности спермиев в течение года. При неплохих показателях в январе ($6,16 \pm 0,420$ баллов) в феврале активность резко снизилась до $4,92 \pm 0,580$ баллов. В дальнейшем ситуация выровнялась, и в июле активность достигла $6,99 \pm 0,268$ баллов. После июля активность сперматозоидов снова начала

спадать, достигнув в декабре $6,21 \pm 0,553$ баллов. Влияние месяца года статистически значимое ($F > F_{st}$, $p < 0,01$), сила влияния составила 43,13 %.

Активность сперматозоидов у производителей породы герефорд не совпадает с общими тенденциями. Они имеют резкий подъём активности в феврале – марте ($6,83$ – $7,14$ баллов), тогда как у быков других пород было отмечено в это время снижение данного показателя. Низкая активность ($5,48$ – $5,61$ баллов) зафиксирована в летний, наиболее благоприятный период. В осенние месяцы мы снова наблюдали подъём активности до $6,75$ баллов в октябре. В декабре был повторный спад активности до $5,57$ баллов. Статистически значимого влияния месяца года на данный показатель однофакторным дисперсионным анализом не установлено.

Выводы. Результаты проведённого исследования свидетельствуют о статистически значимом влиянии месяца года на основные показатели спермопродукции быков-производителей. Лучшие показатели установлены в летний период, несмотря на снижение объёмов эякулятов у быков всех изучаемых пород, высокая концентрация и активность спермиев позволили снизить брак нативного семени и увеличить количество замороженных сперматозоидов. Низкая активность сперматозоидов установлена в зимний и ранневесенний периоды.

Библиографический список

1. Нарышкина, Е.Н. Фертильность быков-производителей в аспекте генетических и паратипических факторов влияния [Текст] / Е.Н. Нарышкина, А.А. Сермягин, И.Н. Янчуков, Н.А. Зиновьева // Проблемы и перспективы развития современной репродуктивной технологии, криобиологии и их роль в интенсификации животноводства: материалы международной

научно-практической конференции. Дубровицы: ВИЖ им. Л.К. Эрнста, 2017. С. 156–166.

2. Хохрин, С.Н. Влияние возраста на качество спермы быков разных генотипов [Текст] / С.Н. Хохрин, Д.В. Давлеткильдина // Роль молодых ученых в решении актуальных задач АПК: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции молодых

учёных. Санкт-Петербург-Пушкин: Санкт-Петербургский ГАУ, 2017. С. 180–183.

3. Пыжова, Е. Влияние комплекса признаков на качество спермы быков-производителей [Текст] / Е. Пыжова, Ю. Иванов, Г. Ескин // Молочное и мясное скотоводство. 2011. № 1. С. 22–23.

4. Таджиева, А.В. Взаимосвязь качества спермы с возрастом быков [Текст] / А.В. Таджиева, Б.С. Иолчиев, П.М. Кленовицкий, Н.А. Комбарова // Повышение конкурентоспособности животноводства и задачи кадрового обеспечения: материалы XXV Международной научно-практической конференции. Подольск: Российская академия менеджмента в животноводстве, 2019. С. 271–276.

5. Наседкина, Н.В. Качество эякулятов и активность холинэстераз спермы быков [Текст] / Н.В. Наседкина, Д.Д. Остапив, С.И. Кава, О.Я. Дмитрив // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. 2014. Т. 16. № 3–2 (60). С. 219–224.

6. Абилов, А.И. Концентрация эстрадиола в крови быков и его влияние на спермопродукцию и результативность осеменения [Текст] / А.И. Абилов, Г.В. Ескин, Н.А. Комбарова // Сельскохозяйственная биология. 2016. Т. 51. № 6. С. 830–836.

7. Agarwal A., Saleh R.A. Role of oxidants in male infertility rationale, significance, a treatment. Clin. Urol. North. Am. 2002. Vol. 29, № 4. P. 817–827.

8. Aitken R.J., Buckingham D.W., Carreras A., Irvine D.S. Superoxide dismutase in human sperm suspensions: relationship with cellular composition, oxidative stress, and sperm function. Free Radic. Biol. Med. 1996. Vol. 21. P. 495–504

9. Цехмистренко, С.И. Влияние содержания малонового диальдегида и уровня активности ферментов антиоксидантной защиты в эякулятах быков на качество спермы [Текст] / С.И. Цехмистренко, В.А. Коберская // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2013. № 10 (105). С. 5–8.

10. Халтурина, Л.В. Эффективность применения препарата «Баксин-Вет» при нарушениях воспроизводительной способности быков-производителей [Текст] / Л.В. Халтурина // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2015. № 2. С. 261–263.

11. Карпеня, М.М. Влияние различной структуры рациона на качество спермы и естественную резистентность быков-производителей [Текст] / М.М. Карпеня // Селекция на современных популяциях отечественного молочного

скота как основа импортозамещения животноводческой продукции: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Белгород: Константа, 2018. С. 74–80.

12. Глебов, Н.Е. Влияние моркови на спермопродукцию быков-производителей [Текст] / Н.Е. Глебов // Наука сегодня: проблемы и пути решения. Материалы международной научно-практической конференции. Вологда: Маркер, 2019. С. 25–27.

13. Ткачева, Л.В. Воспроизводительная функция быков-производителей при включении в рацион малоалкалоидного люпина [Текст] / Л.В. Ткачева // Актуальные проблемы инновационного развития животноводства: Международная научно-практическая конференция. Брянск: Брянский ГАУ, 2019. С. 172–174.

14. Стекольников, А.А. Влияние препарата органической кислоты на качество спермы быков-производителей [Текст] / А.А. Стекольников, К.В. Племяшов, П.С. Анипченко // Материалы Международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов СПбГАВМ. Санкт-Петербург: СПбГАВМ, 2018. С. 95–97.

15. Коберская, В.А. Влияние L-карнитина в составе рациона быков на липидный состав и качество спермы [Текст] / В.А. Коберская // Биологія тварин. 2015. Т. 17. № 1. С. 62–67.

16. Малявко, И.В. Воздействие двигательной активности на качество спермы ремонтных бычков и воспроизводительную функцию коров [Текст] / И.В. Малявко, Е.А. Кривопушкина, А.А. Менькова // Вестник Брянской ГСХА. 2019. № 3 (73). С. 35–39.

17. Evtukh L., Kalinovskiy G. The effectiveness of irradiation of bull-sire scrotum with incoherent polarized light. J. Біологія тварин. 2015. Т. 17. № 4. С. 61–68.

18. Иолчиев, Б.С. Количественные и качественные показатели спермопродукции у голштинских быков в зависимости от геомагнитной активности [Текст] / Б.С. Иолчиев, П.М. Кленовицкий, А.В. Таджиева, Р.Б. Иолчиев // Сельскохозяйственная биология. 2019. Т. 54. № 6. С. 1196–1205.

19. Абилов, А.И. Качественные и количественные показатели семени у быков-производителей в зависимости от атмосферного давления в день взятия эякулятов [Текст] / А.И. Абилов, Х.А. Амерханов, Ю.А. Корнеев-Жилиев и др. // Сельскохозяйственная биология. 2017. Т. 52. № 2. С. 314–322.

20. Ошкина, Л.Л. Влияние сезона года на морфологические показатели крови быков-про-

изводителей [Текст] / Л.Л. Ошкина, Г.А. Трифонов // Нива Поволжья. 2013. № 2 (27). С. 113–117.

21. Четвертакова, Е.В. Качество спермы быков-производителей разных пород в зависимости от сезона года [Текст] / Е.В. Четвертакова // Вестник Красноярского ГАУ. 2012. № 7 (70). С. 99–103.

22. Сидорова, Н.В. Влияние условий кормления и содержания быков-производителей на

спермопродуктивность и качество спермы [Текст] / Н.В. Сидорова // Вестник Курской ГСХА. 2014. № 5. С. 59–60.

23. Альхименок, Т.Л. Влияние сезона рождения на репродуктивную функцию быков-производителей [Текст] / Т.Л. Альхименок // Молодые ученые – науке и практике АПК: материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых. Витебск: Витебская ГАВМ, 2018. С. 84–86.

Сведения об авторах

1. **Руденко Оксана Васильевна**, ORCID: 0000-0002-8355-1048, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник отдела животноводства, Нижегородский НИИСХ – филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, 607686, Нижегородская область, Кстовский р-н, с. п. Селекционной станции, тел./факс: +7 (83145) 65-377, e-mail: oks-rud76@mail.ru.

2. **Алмохаммед Моханад**, магистрант, ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА» 603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97, e-mail: mhndalmhmd360@gmail.com.

В статье представлены данные по влиянию месяца года на показатели качества спермопродукции быков-производителей. Исследования проведены на быках голштинской, чёрно-пёстрой, бурой швицкой и герефордской пород в возрасте 2–6 лет в ООО «Нижегородское» по племенной работе». В ходе работы установлено статистически значимое влияние месяца года на концентрацию и активность спермиев, а также объём эякулятов. У большинства быков концентрация спермиев в эякуляте в зимний период и в начале весны была снижена, в летние месяцы она повысилась, достигая максимума в июне – $0,886 \pm 0,029$ млрд/мл, сила влияния месяца года на концентрацию спермиев составила 28,18 %. Изменение концентрации сперматозоидов в герефордской породе не подвержено сезонным влияниям. Средний объём эякулята по всем быкам в начале года был достаточно высок: 7,69–

8,45 мл. Однако в июне идёт резкое уменьшение объёма до $5,72 \pm 0,213$ мл, в дальнейшие месяцы мы наблюдали постепенное повышение объёма, сила влияния месяца года на объём эякулята составила 19,73 %. Активность спермиев в начале года не велика: $5,98 \pm 0,136$ баллов, в марте наблюдается повышение до $6,33 \pm 0,126$ баллов, а в июле – до $6,47 \pm 0,121$ баллов, этот период отличается максимальной активностью. После июля наблюдается снижение активности, и в декабре она достигает отметки $5,95 \pm 0,154$ баллов. Сила влияния месяца года на активность спермиев составила 6,36 %. Таким образом, лучшие показатели спермопродукции быков установлены в летний период, несмотря на снижение объёмов эякулятов у быков всех изучаемых пород, высокая концентрация и активность спермиев позволили снизить брак нативного семени и увеличить количество замороженных сперматозоидов.

O. Rudenko, M. Almohammad

SEASONAL CHANGES IN THE REPRODUCTIVE CAPACITY OF BULLS-SIRES

Key words: *bulls-sires; sperm concentration in the ejaculate; semen volume; sperm activity; month of the year.*

Authors' personal details

1. **Oksana Rudenko**, ORCID: 0000-0002-8355-1048, Candidate of agricultural sciences, leading researcher of the livestock department, Nizhny Novgorod Research Agricultural Institute – Branch of the FARC North-East, 607686, Nizhny Novgorod region, Kstovsky district, v. Selektionnaya stantsiya, phone: +7 (83145) 65-377, e-mail: oks-rud76@mail.ru

2. **Mohanad Almohammed**, undergraduate, Nizhny Novgorod State Agricultural Academy, 603107, Nizhny Novgorod, Gagarin avenue, 97, e-mail: mhndalmhmd360@gmail.com.

The article presents data on the influence of the month of the year on the quality indicators of sperm production of bulls. The studies were conducted on Holstein, Black-and-White, Brown Swiss, and Hereford bulls at the age of 2–6 years in LLC «Nizhegorodskoe» on breeding work. The statistically significant influence of the month on sperm concentration, activity, and the volume of the ejaculate was established. In most bulls, the sperm concentration in the ejaculate in the winter and early spring was reduced; in the summer months, it increased, reaching a maximum in June – $0,886 \pm 0,029$ billion/ml. The influence of the month of the year on the sperm concentration was 28,18 %. Changes in the sperm concentration in the Hereford breed are not subject to seasonal influences. The average volume of ejaculate for all bulls at the beginning of the year was relatively high – 7,69–8,45 ml. However, in June,

there was a sharp decrease in volume to $5,72 \pm 0,213$ ml, and in the following months, we saw a gradual increase in volume, the influence of month of the year on the ejaculate volume was 19,73 %. The sperm activity at the beginning of the year was not great – $5,98 \pm 0,136$ points, in March, there was an increase to $6,33 \pm 0,126$ points, and in July to $6,47 \pm 0,121$ points, this period was characterized by maximum activity. After July, there was a decrease in the activity, and in December, it reached the level of $5,95 \pm 0,154$ points. The influence of the month of the year on sperm activity was 6,36 %. Thus, the best indicators of sperm production of bulls were established in the summer period; despite the decrease in the volume of ejaculates in bulls of all studied breeds, the high sperm concentration and activity allowed to reduce the marriage of native seed and increase the number of frozen sperm doses.

© Руденко О.В., Алмохаммед М.

УДК 636.064

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-80-84

И.И. Слепцов, А.А. Мартынов, Я.С. Васильев

ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ БЫЧКОВ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ НА ОТКОРМЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В ИХ РАЦИОН МЕСТНЫХ ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

Ключевые слова: бычки калмыцкой породы; рацион; откорм; природные кормовые добавки; морфологические и биохимические показатели крови.

Введение. В настоящее время отрасль мясного скотоводства в стране активно развивается. Имеется много научных работ в области изучения мясных пород, в том числе исследование мясной продуктивности и выращивания молодняка на мясо [1–11]. Увеличивается поголовье мясного стада в регионах, в том числе в Якутии, на сегодня насчитывается более 1000 голов калмыцкого скота. Молодняк после летнего нагула якутские ученые рекомендуют на осенний откорм. Картина крови животных наглядно показывает происходящие обменные процессы в организме. Изменение состав рациона кормления и технологии содержания скота, безусловно, отражается на показателях крови и ее сыворотке. Выполняя функции снабжения тканей питательными веществами и кислородом, выведения конечных продуктов обмена веществ, сохраняя постоянство водного баланса, терморегуляции и других жизненно важных задач, кровь и кровеносная система играют ключевую роль в нормальном функционировании организма. Многие

исследователи считают, что по показателям гематологических данных можно сделать взаимосвязь с породой и генотипом животного, особенностями рациона кормления и технологии содержания. Состояние здоровья организма животных и продуктивные качества отражаются в картине крови по морфологическим и биохимическим показателям [12, 14, 15]. Способность к адаптации и акклиматизации к специфическим условиям природно-климатических факторов отдельных территорий разведения сельскохозяйственных животных характеризуют по физиологическим, клинко-гематологическим показателям, воспроизводительным качествам коров и интенсивности роста и развития молодняка [13]. В связи с этим изучение особенностей динамики морфологических и биохимических показателей крови и ее сыворотки является важной научно-практической задачей.

Цель исследования – изучение морфо-биохимических показателей крови бычков калмыцкой породы на откорме в осенний период при

включении в рацион местных природных кормовых добавок.

Объект исследований – молодняк (бычки) крупного рогатого скота калмыцкой породы в возрасте 15–16 месяцев.

Материалы и методы исследований. НИР проходила в сентябре-ноябре (в течение 60-ти дней) 2019 года на базе СХПК «Солоосун» (муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус (район)» Республики Саха (Якутия). Хозяйство территориально находится в Заречной части Якутии и занимается разведением мясного скота с 2014 года. Животных завезли из Калмыкии. Подбор и формирование опытной и контрольной групп бычков по 25 голов в каждой по принципу пар-аналогов. Животные клинически здоровые. Рацион и график кормления животных опытной группы на 1 голову: утром 8 часов 8 кг сена, в 12 часов 1,6 кг комбикорма с цеолитом 0,200 кг и солью 0,045 кг, вечером 17 часов 6 кг сенажа. Контрольная группа животных содержалась по такому же графику и рациону, но без включения местных природных кормовых добавок. Проведена сравнительная оценка морфологических и биохимических показателей бычков калмыцкой породы при разных составах рациона кормления. Лабораторные анализы проводились в научной лаборатории ФГБОУ ВО «Арктический ГАТУ» в 2019 г. Исследование крови проводили на гематологическом биохимическом анализаторе.

Статистический анализ проводили по программе «Statistica 10.0».

Результаты исследований. Наши исследования показали, во-первых, что морфологический состав крови у бычков опытной и контрольной группы в начале откормочного периода (таблица 1) и перед забоем (таблица 2) при сравнительном анализе лабораторных данных находится в пределах нормативных показателей клинически здоровых животных. Итак, мы видим, что у бычков опытной группы количество эритроцитов ($6,78 \pm 0,19 \cdot 10^{12}/л$) и лейкоцитов ($8,79 \pm 0,56 \cdot 10^9/л$) было чуть меньше, чем у контрольной группы, – $7,44 \pm 0,20 \cdot 10^{12}/л$ и $11,33 \pm 1,04 \cdot 10^9/л$ соответственно. И наоборот, количество гемоглобина у опытных животных $107,14 \pm 3,72$ г/л, что намного больше, чем у контрольной группы – $97,19 \pm 6,36$ г/л. По остальным морфологическим показателям крови в начале откорма бычков мы не наблюдаем существенных различий. Обобщая сказанное, мы подтверждаем, что бычки калмыцкой породы в летнее пастбищное время находились в одних и тех же условиях вольного содержания, активно использовали подножный корм, богатый питательными веще-

ствами, травостой якутской аласной экосистемы Центральной Якутии.

Во-вторых, следует отметить, что в ходе откормочного периода перед убоем скота морфологический состав крови по показателям имеет незначительные снижения, но в пределах физиологической нормы. Эти изменения мы видим у бычков опытной и контрольной групп и связываем с резким понижением температуры атмосферного воздуха до -15°C в первой декаде ноября 2020 года и переходом на грубый корм. Также не исключено, что применение природных кормовых добавок в виде подкормки цеолита и соли повышает обменные процессы в организме животного. В опытной группе количество эритроцитов в крови увеличено с $6,78 \pm 0,19$ до $7,1 \pm 0,4 \cdot 10^{12}/л$. Обратим внимание, что в зимний сезон количество эритроцитов увеличивается при изменении концентрации гормонов в организме. Мы считаем, что на динамику эритроцитов у животных опытной группы также свое влияние оказали добавление минеральной подкормки в рацион бычков, которая в данном случае выполняла функцию адаптогена.

В ходе научно-производственного опыта мы провели также биохимический анализ сыворотки крови у животных опытной и контрольной групп в начале откорма (таблица 3) и до контрольного забоя бычков (таблица 4).

Заметим, что сравнительный анализ биохимических показателей в сыворотке крови бычков опытной группы подтвердил существенные отличия печёночных ферментов (АЛТ и АСТ) у животных. Уровень АЛТ повышается в крови опытных бычков в динамике с $15,57 \pm 2,32$ до $42,42 \pm 4,59$ ед/л. и АСТ – с $45,93 \pm 2,66$ до $110,42 \pm 10,23$ ед/л. Наблюдаем незначительное повышение данных ферментов от физиологической нормы. При включении в рацион местных природных кормовых добавок увеличивается активность пищеварительного тракта животных. Отметим, что количество печёночных ферментов у бычков контрольной группы остается в пределах нормативных показателей. В то же время в обеих группах в конце откормочного сезона показатели общего белка и мочевины увеличены. Увеличение общего белка и мочевины, мы считаем, происходит за счет лучшего усвоения азота корма в результате повышения активности ферментов в организме под воздействием минеральных веществ, поступающих с кормом. Также незначительно высокий уровень общего белка крови обуславливает высокое содержание мочевины $88,03 \pm 1,11$ г/л и $4,46 \pm 0,35$ ммоль/л соответственно у опытных животных, $90,42 \pm 1,31$ г/л и $7,50 \pm 0,32$ ммоль/л у животных контрольной группы.

Таблица 1 Морфологические показатели крови бычков опытной и контрольной групп при осеннем откорме (начало откорма 04.10.2019 г.)

Показатель	Группа животных		Норма
	опытная	контрольная	
	$M_1 \pm m_1$	$M_2 \pm m_2$	
Эритроциты, $10^{12}/л$	$6,78 \pm 0,19$	$7,44 \pm 0,20$	5,5–8,0
Гемоглобин, г/л	$107,14 \pm 3,72^*$	$97,19 \pm 6,36$	85–135,0
Лейкоциты, $10^9/л$	$8,79 \pm 0,56$	$11,33 \pm 1,04$	4,5–12,0
Гематокрит, ед/л	$39,00 \pm 1,40$	$39,39 \pm 0,95$	28–32
Средний объем эритроцита, фл	$57,55 \pm 1,16$	$53,16 \pm 1,17$	83,0–96,0
Среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг	$15,74 \pm 0,31$	$13,87 \pm 0,29$	30,0–35,0
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците, г/л	$274,64 \pm 3,73$	$261,94 \pm 1,67$	318–342
Ширина распределения эритроцитов, %	$18,29 \pm 1,35$	$17,03 \pm 0,25$	11,9–14,4
Тромбоциты, $10^9/л$	$150,93 \pm 13,82$	$144,69 \pm 9,58$	180–400
Средний объем тромбоцита, фл	$6,83 \pm 0,15$	$6,13 \pm 0,11$	7,0–10,5
Ширина распределения тромбоцитов по объему, %	$15,17 \pm 0,15$	$14,98 \pm 0,09$	11–18
Тромбоцитрит, %	$0,10 \pm 0,01$	$0,08 \pm 0,01$	0,15–0,50

* $P < 0,01$.

Таблица 2 Морфологические показатели крови бычков опытной и контрольной групп при осеннем откорме (перед убоем 11.11.2019 г.)

Показатель	Группа животных		Норма
	опытная	контрольная	
	$M_1 \pm m_1$	$M_2 \pm m_2$	
Эритроциты, $10^{12}/л$	$7,1 \pm 0,4$	$6,5 \pm 0,1$	5,5–8,0
Гемоглобин, г/л	$90,8 \pm 3,3$	$94,4 \pm 1,5$	85–135,0
Лейкоциты, $10^9/л$	$6,4 \pm 0,4$	$8,9 \pm 0,9$	4,5–12,0
Гематокрит, ед/л	$36,5 \pm 1,2$	$38,0 \pm 0,6$	28–32
Средний объем эритроцита, фл	$52,2 \pm 2,0$	$58,3 \pm 1,2$	83,0–96,0
Среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг	$12,9 \pm 0,4$	$14,4 \pm 0,3$	30,0–35,0
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците, г/л	$247,8 \pm 2,1$	$248,1 \pm 1,9$	318–342
Ширина распределения эритроцитов, %	$19,0 \pm 1,1$	$17,9 \pm 0,3$	11,9–14,4
Тромбоциты, $10^9/л$	$133,1 \pm 9,6$	$146,1 \pm 13,8$	180–400
Средний объем тромбоцита, фл	$5,9 \pm 0,1$	$6,2 \pm 0,1$	7,0–10,5
Ширина распределения тромбоцитов по объему, %	$14,9 \pm 0,1$	$15,1 \pm 0,1$	11–18
Тромбоцитрит, %	$0,1 \pm 0,0$	$0,1 \pm 0,0$	0,15–0,50

Таблица 3 Биохимические показатели сыворотки крови бычков опытной и контрольной групп при осеннем откорме (начало откорма 04.10.2019 г.)

Показатель	Группа животных		Норма
	опытная	контрольная	
	$M_1 \pm m_1$	$M_2 \pm m_2$	
АЛТ, ед/л	$15,57 \pm 2,32^*$	$13,2 \pm 2,21$	8–37
АСТ, ед/л	$45,93 \pm 2,66^*$	$87,7 \pm 2,66$	34–106
Общий белок, г/л	$81,89 \pm 4,04$	$72,9 \pm 3,57$	60–80
Мочевина, ммоль/л	$2,54 \pm 0,14$	$2,7 \pm 0,12$	2,8–8,8

* $P < 0,05$; ** $P < 0,001$.

Таблица 4 Биохимические показатели сыворотки крови бычков опытной и контрольной групп при осеннем откорме (перед забоем 11.11.2019 г.)

Показатель	Группа животных		Норма
	опытная	контрольная	
	$M_1 \pm m_1$	$M_2 \pm m_2$	
АЛТ, ед/л	$42,42 \pm 4,59^*$	$35,25 \pm 2,82$	8–37
АСТ, ед/л	$110,42 \pm 10,23^*$	$98,83 \pm 10,73$	34–106
Общий белок, г/л	$88,03 \pm 1,11$	$90,42 \pm 1,31$	60–80
Мочевина, ммоль/л	$4,46 \pm 0,35$	$7,50 \pm 0,32$	2,8–8,8

Вывод. Применение нетрадиционных природных кормовых добавок с включением в рацион откормочных бычков положительно влияет на гематологические и биохимические показатели

ли крови и ее сыворотки и, соответственно, предполагаем, на мясные качества при забое скота, которые мы планируем в дальнейшем изучать.

Сведения об авторах

1. **Слепцов Иван Иванович**, кандидат экономических наук, ректор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Арктический государственный агротехнологический университет», 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ш. Сергеляхское, 3 км, д. 3, тел.: +7 (4112) 507-971, факс: +7 (4112) 358-162, e-mail: saas2005@mail.ru.

2. **Мартынов Андрей Андреевич**, кандидат биологических наук, декан агротехнологического факультета, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Арктический государственный агротехнологический университет», 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ш. Сергеляхское, 3 км, д. 3, тел.: +7 (4112) 507-981, факс: +7 (4112) 358-162, e-mail: andreymartinov@mail.ru.

3. **Васильев Яков Семёнович**, магистр 1 года обучения группы ЗИ-19 (маг) агротехнологического факультета, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Арктический государственный агротехнологический университет», e-mail: yakovvas95@gmail.com.

Получение высоких результатов по производству высококачественной говядины в мясном скотоводстве невозможно без проведения хорошо организованного откорма бычков. В условиях Якутии откорм бычков от 15-месячного возраста можно проводить в осеннее время, после летнего пастбищного нагула. В хозяйственных условиях кормления высокие показатели прироста откормочного молодняка невозможно получить. Поэтому применяется интенсивный откорм с использованием минеральной подкормки скота. В работе представлены материалы исследования морфологического и биохимического состава крови и ее сыворотки у бычков калмыцкой породы, находящихся на научно-производственном откорме. В опытной группе животных в рацион добавляли местные природные кормовые добавки – цеолит и соль, которые выполняли функцию адаптогенов и источников минеральных элементов. В ходе откормочного периода перед убоем скота морфо-

логический состав крови по показателям имеет незначительные снижения, но в пределах физиологической нормы. Эти изменения мы видим у бычков опытной и контрольной групп и связываем с резким понижением температуры атмосферного воздуха до -15°C в первой декаде ноября 2019 года и постоянным переходом на грубый корм. Также не исключено, что использование природных кормовых добавок в виде подкормки цеолита и соли повышает обменные процессы в организме животного. Сравнительный анализ биохимических показателей в сыворотке крови бычков опытной группы подтвердил существенные отличия печёночных ферментов (АЛТ и АСТ) у животных. Применение нетрадиционных природных кормовых добавок с включением в рацион откормочных бычков положительно влияет на гематологические и биохимические показатели крови и ее сыворотки и соответственно на мясные качества.

I. Sleptsov, A. Martynov, Y. Vasiliev

INDICATORS OF BLOOD OF GALDS OF KALMYK BREED ON FEEDING WHEN INCLUDED

Key words: *gobies of the Kalmyk breed; diet; fattening; natural; feed additives; morphological and biochemical parameters of the blood.*

Authors' personal details

1. **Ivan Sleptsov**, Candidate of economic Sciences, rector, Federal state budgetary educational institution of higher education «Arctic state agrotechnological University» 677007, Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, sh. Sergelyakhskoe, 3 km, d. 3, phone: +7 (4112) 507-971, fax: +7 (4112) 358-162, e-mail: saas2005@mail.ru.

2. **Andrey Martynov**, Candidate of Biological Sciences, Dean of the faculty of agrotechnology, Federal state budgetary educational institution of higher education «Arctic state agrotechnological University» 677007, Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, sh. Sergelyakhskoe, 3 km, d. 3, phone: +7 (4112) 507-981, fax: +7 (4112) 358-162, e-mail: andreymartynov@mail.ru.

3. **Yakov Vasiliev**, Master of 1 year of study of the ZI-19 group (MAG) of the Agrotechnological faculty Federal state budgetary educational institution of higher education «Arctic state agrotechnological University», e-mail: yakovvas95@gmail.com.

Obtaining high results in the production of high-quality beef in beef cattle breeding is impossible without well-organized fattening of gobies. In the conditions of Yakutia, fattening of gobies from 15 months of age can be carried out in autumn, after the summer grazing feeding. Under economic conditions of feeding, high growth rates of fattening young animals cannot be obtained. Therefore, intensive fattening with the use of mineral feeding of cattle is used. The paper presents research materials on the morphological and biochemical composition of blood and its serum in calves of the Kalmyk breed, which are on scientific and industrial fattening. In the experimental group of animals, local natural feed additives – zeolite and salt – were added to the diet, which served as adaptogens and sources of mineral elements. During the feeding period before the slaughter, the morphological composition of

blood in terms of indicators has insignificant decreases, but within the physiological norm. We see these changes in the gobies of the experimental control group and associate them with a sharp decrease in atmospheric air temperature to -15°C in the first ten days of November 2019 and a constant transition to roughage. It is also possible that the use of natural feed additives in the form of feeding zeolite and salt increases metabolic processes in the animal's body. A comparative analysis of biochemical parameters in the blood serum of gobies of the experimental group confirmed significant differences in hepatic enzymes (ALT and AST) in animals. The use of non-traditional natural feed additives with the inclusion in the diet of fattening gobies affects the hematological and biochemical parameters of blood and its serum, and, accordingly, meat quality.

© Слепцов И.И., Мартынов А.А., Васильев Я.С.

УДК 636.082.26

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-84-90

Ю.М. Смирнова, Г.В. Хабарова

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРОВ РАЗНОГО ГЕНОТИПА

Ключевые слова: коровы черно-пестрой породы; генотип; молочная продуктивность; продуктивное долголетие; период хозяйственного использования; воспроизводительные качества.

Введение. Рентабельное ведение отрасли молочного животноводства определяется затратами на выращивание молодняка для ремонта стада, труда и материальных средств по уходу за дойным поголовьем, включая всю технологическую линию от кормления коров, обеспечения воспроизводства стада, уровнем продуктивности дойного поголовья. В молочном скотоводстве в высокопродуктивных стадах окупаемость всех учтенных затрат на выращивание ремонтных телок будущим молоком наступает только с третьего отела коров [1]. Поэтому продление сроков производственного использования животных является неотъемлемой задачей эффективного ведения данной отрасли [2]. В послед-

ние десятилетия в связи с переводом молочного скотоводства на промышленную технологию и проведением массового скрещивания многих пород с голштинским скотом наблюдается выведение коров из стада уже после первой лактации из-за низкой продуктивности, ухудшения воспроизводительной способности и ряда других причин [3]. В Российской Федерации, по данным ВНИИплем, на племенных заводах продолжительность продуктивного использования коров в целом по стране составила 2,88 отела [1]. При удое 4000–5000 кг молока затраты на выращивание первотелок окупаются за 2–3 года, а при удое 3000 кг молока – за 4–5 лактаций [4]. По мнению ряда авторов (Стрекозова Н.И., Сив-

кина Н.В. (2014); Лебедев Е.Я. (2012)) экономически целесообразно использовать коров не менее четырех лактаций [5, 6].

Короткий период продуктивной жизни коров и их высокая интенсивность использования требуют ежегодного ввода в основное стадо до 30 и более процентов первотелок, что затруднено недостаточным выходом телят и их плохой сохранностью. И, как следствие, недостаточное поголовье нетелей приводит к снижению эффективности селекционной работы и сокращению поголовья. Следовательно, для сохранения численности животных в стадах сельхозпроизводители прибегают к восполнению маточного поголовья за счет импорта телок или нетелей, что значительно повышает себестоимость молочной продукции, делает ее неконкурентоспособной и ведет к разорению предприятий [7].

Продуктивное долголетие коров относится к наследственным признакам и поэтому его длительность зависит в первую очередь от породы, породности и кровности. В исследованиях Лоретца О.Г. (2014) установлено, что с увеличением доли кровности по голштинской породе у коров черно-пестрой породы снижается продолжительность срока хозяйственного использования [1].

По экспериментальным данным многочисленных исследований, большинство ученых оптимальной считают кровность помесей от 75 до 88 % по голштинской породе [8]. Хотя единого мнения во всем мире о доле кровности по улучшающей породе пока нет. Следовательно, необходимо проводить сравнительный анализ продуктивных качеств помесей с разным генотипом по улучшающей породе в условиях каждого отдельного хозяйства в связи с различиями в условиях содержания и кормления животных [9, 10].

Цель исследования – изучить показатели производственного использования коров разного генотипа.

Задачи исследования: провести анализ продолжительности хозяйственного использования и пожизненной продуктивности коров в зависимости от кровности по улучшающей породе; с учетом кровности определить воспроизводительные качества молочного скота; установить оптимальный генотип с учетом кровности по голштинской породе, обеспечивающий дальнейшее совершенствование продуктивных и воспроизводительных качеств молочного скота.

Материалы и методы исследования. С целью анализа влияния генотипа на период хозяйственного использования, пожизненную молочную продуктивность и воспроизводительные качества коров мы провели исследования на базе ОАО «Заря» Вологодского района. В ходе

исследований была сформирована выборка из 592 выбывших из стада коров черно-пестрой породы в период 2008–2017 гг. и имеющих не менее одной законченной лактации. Анализ долголетия и воспроизводительных качеств коров проводился за семилетний период с даты первого отела. Данный массив животных был разбит на шесть групп коров в зависимости от доли кровности по улучшающей породе, %: 1) чистопородные черно-пестрые; 2) до 25 включительно; 3) 26–49; 4) 50; 5) 51–74; 6) 75 и более. В исследовании показателями продуктивного долголетия были выбраны количество законченных лактаций, период хозяйственного использования в днях, пожизненный надой базисной жирности. Удой на один день жизни и день лактации рассчитывали путем деления надоя за период хозяйственного использования на количество прожитых животными дней и на сумму дойных дней соответственно. Воспроизводительные качества коров оценивали по возрасту первого отела, количеству отелов, среднему расходу семени в дозах на одно плодотворное осеменение, среднему сервис- и межотельному периодам, количеству живых телят, полученных за период использования, коэффициенту воспроизводства. Данные первичного учета подвергались статистической обработке с применением программы Microsoft Excel с последующим установлением достоверности полученных результатов по критерию Стьюдента.

Результаты исследования. В ходе исследований нами было изучено влияние кровности по голштинской породе на продуктивное долголетие коров черно-пестрой породы (таблица 1, рисунок 1).

Анализ пожизненной молочной продуктивности голштинизированных коров черно-пестрой породы в условиях ОАО «Заря» Вологодского района показал, что повышение кровности по улучшающей породе до группы с генотипом 26–49 % положительно сказывается на их продуктивных качествах.

Так, наибольшим периодом хозяйственного использования (3,4 лактации и 1569 дней) характеризовались животные с кровностью по голштинской породе от 26 до 49 %. Данная группа коров достоверно превосходила по изучаемому показателю животных с кровностью 75 % и более на 1,2 лактации и 486 дней соответственно. По удою за период хозяйственного использования разница составила 7592 кг ($P < 0,001$). Кроме этого, у коров с кровностью 26–49 % по улучшающей породе был отмечен самый высокий удой на один день жизни – 10,4 кг ($P < 0,01$). Наибольшим удоем на один день лак-

тации (21,7 кг) отличились полукровные животные, так как имели достаточно высокий удой (21895 кг) при наименьшем количестве дойных дней (998).

Также было установлено достоверное ($P < 0,001$) преимущество в группе коров с кровностью от 51 до 74 % по сравнению с высококровными животными 75 % и более по периоду хозяйственного использования на 343 дня, по количеству законченных лактаций на 0,8 и по удою за период использования базисной жирности на 5252 кг. В свою очередь высококровные животные с генотипом по голштинской породе более 75 % и более характеризовались наимень-

шим периодом хозяйственного использования – 1083 дня и 2,2 законченные лактации, а также показали более низкую пожизненную продуктивность 19512 кг. Неплохим продуктивным долголетием выделялись чистопородные животные, где период хозяйственного использования составил 1392 дня и 3,0 лактации. Удой за период хозяйственного использования у них был равен 22269 кг. У низкокровных животных с генотипом по улучшающей породе 25 % и менее был установлен более короткий период хозяйственного использования и пожизненной продуктивности по сравнению с чистопородными коровами – на 203 дня и 0,4 лактации, а удой – на 2082 кг.

Таблица 1 Влияние кровности по улучшающей породе на показатели долголетия и пожизненного надоя коров

Группа коров по генотипу, %	Кол-во голов	Кол-во законченных лактаций	ПХИ*, дней	Сумма дойных дней	Удой за ПХИ* баз. жирности, кг	Удой на 1 день жизни, кг	Удой на 1 день лакт., кг
1) ч/п черно-пестрые*	94	3,0 $\pm 0,15^{***}$	1392 $\pm 69,5^{***}$	1112 $\pm 51,6^{**}$	22269 ± 1170	9,3 $\pm 0,27$	19,8 $\pm 0,31$
2) до 25	83	2,6 $\pm 0,15^*$	1189 $\pm 66,1$	974 $\pm 51,7$	20187 ± 1253	9,1 $\pm 0,34$	20,3 $\pm 0,46$
3) 26–49	88	3,4 $\pm 0,16^{***}$	1569 $\pm 76,2^{***}$	1256 $\pm 58,3^{***}$	27104 $\pm 1495^{***}$	10,4 $\pm 0,35^{**}$	21,1 $\pm 0,41^*$
4) 50	119	2,6 $\pm 0,12^{**}$	1214 $\pm 52,7$	998 $\pm 39,7$	21895 ± 962	10,1 $\pm 0,26^*$	21,7 $\pm 0,38^{***}$
5) 51–74	123	3,0 $\pm 0,12^{***}$	1426 $\pm 55,4^{***}$	1143 $\pm 42,2^{***}$	24765 $\pm 1107^{***}$	10,3 $\pm 0,27^*$	21,2 $\pm 0,32^{**}$
6) 75 и более	85	2,2 $\pm 0,13$	1083 $\pm 52,2$	894 $\pm 42,9$	19512 ± 1162	9,5 $\pm 0,35$	21,4 $\pm 0,51^*$

* ПХИ – период хозяйственного использования; * ч/п черно-пестрые – чистопородные черно-пестрые;

* $P < 0,05$; ** $P < 0,01$; *** $P < 0,001$.

Рисунок 1
Влияние кровности на продуктивное долголетие коров

Таким образом, при анализе основных селекционных показателей молочной продуктивности более эффективным в данном стаде является генотип коров с кровностью по голштинской породе от 26 до 49 %. Нельзя не отметить животных с кровностью по улучшающей породе 51–74 %, которые, в свою очередь, отличились

достаточно высокими показателями продуктивного долголетия. С увеличением продуктивности животных растет эффективность производства молока. Поэтому сельхозпроизводители нацелены на увеличение молочности коров, но данный фактор отражается на воспроизводительных качествах животных [11]. Следова-

тельно, анализ показателей воспроизводительных качеств коров в зависимости от степени кровности по голштинской породе имеет большое значение (таблица 2). В наших исследованиях более ранний возраст первого отела (27,9 мес.) был выявлен в группе коров с кровностью по улучшающей породе 50 %, 75 % и более.

Увеличение срока использования коров в хозяйстве является важным резервом получения большего количества телят. По мнению отдельных исследователей, корова в племенном хозяйстве, родившая за жизнь менее 4 телят, племенного значения не имеет, так как не может полу-

чить достоверную оценку племенной ценности по потомству [12]. По результатам наших исследований, наибольшее количество отелов и живых телят (4,1) было получено от животных с кровностью 26–49 %. В данной группе животных было установлено достоверное ($P < 0,001$) превосходство с более высококровными коровами (75 % и более) на 1,1 отелов и 1,2 голов живых телят соответственно. Достаточно высокими показателями по количеству отелов (3,8) и живых телят (3,7 гол.) отличались чистопородные животные и с кровностью по улучшающей породе от 51 до 74 % ($P < 0,001$).

Таблица 2 Влияние кровности по улучшающей породе на воспроизводительные качества коров

Группа коров по генотипу, %	Кол-во голов	Возраст 1 отела, мес.	Кол-во отелов	Кол-во живых телят, гол.	Средняя кратн. осем.	Средний СП*, дн.	Средний МОП*, дн.	КВ*
1) ч/п черно-пестрые*	94	29,1 ± 0,30	3,8 ± 0,16***	3,7 ± 0,17***	2,7 ± 0,16	161 ± 8,2*	421 ± 8,4*	1,5 ± 0,07**
2) до 25	83	28,7 ± 0,30	3,5 ± 0,17*	3,3 ± 0,16*	2,5 ± 0,14	154 ± 9,4*	422 ± 9,4*	1,4 ± 0,07*
3) 26–49	88	28,0 ± 0,30**	4,1 ± 0,18***	4,1 ± 0,18***	2,5 ± 0,15	171 ± 12,2	435 ± 9,8	1,6 ± 0,07***
4) 50	119	27,9 ± 0,24**	3,4 ± 0,14*	3,3 ± 0,13*	3,0 ± 0,16	171 ± 8,1	436 ± 7,4	1,4 ± 0,05*
5) 51–74	123	28,3 ± 0,24*	3,8 ± 0,14***	3,8 ± 0,14***	3,0 ± 0,16	181 ± 10,8	447 ± 8,0	1,5 ± 0,05**
6) 75 и более	85	27,9 ± 0,27**	3,0 ± 0,14	2,9 ± 0,15	2,9 ± 0,18	193 ± 13,4	449 ± 8,8	1,2 ± 0,06

* СП – сервис-период; * МОП – межотельный период; КВ – коэффициент воспроизводства;

* $P < 0,05$; ** $P < 0,01$; *** $P < 0,001$.

При анализе кратности осеменения животных в зависимости от генотипа по голштинской породе достоверных различий между группами не было установлено. Наименьшее количество доз на плодотворное осеменение (2,5) выявлено у животных с кровностью до 25 % включительно и от 26 до 49 %. У этих коров изучаемый показатель был лучше животных с кровностью 50 % и более на 0,5 и 0,4 дозы соответственно. Сервис-период оказывает значительное влияние на длительность лактации – его продолжительность зависит от восстановления половой системы животных после отела, от сроков осеменения и оплодотворения коров. Исследованиями установлено, что наименее продолжительный период от отела до плодотворного осеменения был у чистопородных коров и с кровностью до 25 % включительно, где продолжительность сервис-периода составила 161 и 154 дней соответственно. С увеличением кровности по улучшающей породе его продолжительность увеличивалась. Так, в группе животных с кровностью 75 % и более этот показатель был выше на 32 и

39 дней и разница между названными группами достоверна.

В группе животных с кровностью по улучшающей породе 26–49 % продолжительность периода от отела до плодотворного осеменения была ниже, чем у высококровных животных (75 % и более), на 22 дня. Межотельный период у чистопородных черно-пестрых коров и с кровностью до 25 % включительно составлял 421 и 422 дня. В данных группах коров был установлен достоверно ($P < 0,05$) лучший результат по сравнению с животными с генотипом 75 % и более на 28 и 27 дней соответственно. Животные с кровностью по улучшающей породе 26–49 % также имели более короткую продолжительность периода от одного до следующего отела по сравнению с высококровными животными на 14 дней. Важным фактором, отражающим состояние воспроизводства стада, является коэффициент воспроизводства. Этот показатель зависит всего от трех параметров: количества отелов за жизнь, процента телок при рождении и их сохранности [13]. Полученные результаты в ходе

наших исследований свидетельствуют, что во всех группах животных интенсивность процесса замещения выбывших животных нетелями находится на достаточно высоком уровне (от 1,2 до 1,6). Но наибольшее значение данного показателя (1,6) отмечено у коров с кровностью по голштинской породе 26–49 %. Несущественные различия по коэффициенту воспроизводства (0,1) с этой группой животных установлены у чистопородных черно-пестрых коров, а также в группе с кровностью по улучшающей породе 51–74 %. Хуже всех проявили себя высококровные голштинизированные животные, где коэффициент воспроизводства составил 1,2.

Выводы. Несмотря на очевидные преимущества голштинской породы, использование ее для совершенствования стада должно быть лимитировано, поскольку высокоспециализированный голштинский скот отличается зачастую изнеженностью конституции, невысокими адаптационными способностями, требовательностью к уровню кормления, снижением воспроизводительной способности [14, 15]. В резуль-

тате наших исследований по анализу влияния генотипа по голштинской породе на продуктивное долголетие было установлено, что наибольшей продолжительностью хозяйственного использования (3,4 лактации и 1569 дней) и пожизненным надоем базисной жирности (27104 кг) отличались животные с кровностью от 26 до 49 %. Наряду с этим, от животных с данным генотипом было получено наибольшее количество живых телят (4,1 головы) за период хозяйственного использования. Кроме того, проведенные исследования свидетельствовали, что наиболее оптимальными воспроизводительными качествами обладали животные с более низкой кровностью по голштинам [9]. Полученные данные позволяют сделать вывод, что скрещивание черно-пестрых коров с голштинами и получение помесей с кровностью от 26 до 49 % способствуют повышению продолжительности продуктивной жизни коров одновременно с ростом пожизненной продуктивности при сохранении воспроизводительных качеств на достаточно хорошем уровне.

Библиографический список

1. Лоретц, О.Г. Влияние генетических и экологических факторов на продуктивное долголетие [Текст] / О.Г. Лоретц // АВУ. 2014. № 9 (127). С. 34–37 (дата обращения: 30.06.2020).
2. Бежанян, И.В. Продуктивное долголетие коров различных линий в стаде колхоза «Племзавод «Родина» Вологодской области [Текст] / И.В. Бежанян, Г.В. Хабарова // Молочнохозяйственный вестник. 2012. № 1. С. 5–10.
3. Родина, Н.Д. Продолжительность хозяйственного использования черно-пестрых голштинизированных коров [Текст] / Н.Д. Родина, Д.В. Степанов // Вестник ОрелГАУ. 2011. № 6. С. 59–62.
4. Литонина, А.С. Показатели пожизненного использования коров, происходящих от быков разной селекции [Текст] / А.С. Литонина, А.Г. Кудрин // Молочнохозяйственный вестник. 2020. № 1 (37). С. 60–71 (дата обращения: 30.06.2020).
5. Стрекозов, Н.И. Продуктивное долголетие коров при голштинизации черно-пестрого скота [Текст] / Н.И. Стрекозов, Н.В. Сивкин // Генетика и разведение животных. 2014. № 2. С. 11–16.
6. Селекционно-генетическая и экологотехнологическая валентность молочных коров к длительному продуктивному использованию [Текст] / Коллектив авторов; под общ. ред. академика МАНЕБ Е.Я. Лебедько. Брянск: БГСХА, 2012. 276 с.
7. Кононов, В.П. Проблемы совместимости высокой молочной продуктивности, воспроизводительной способности и продуктивной жизни коров в современном животноводстве [Текст] / В.П. Кононов // Farm Animals. 2013. № 1. С. 40–47.
8. Трушников, В.А. Животноводство Алтая [Текст]: монография / В.А. Трушников, Т.В. Лобанова, И.Ю. Попова. Барнаул: АГАУ, 2005. 595 с.
9. Смирнова, Ю.М. Влияние генотипа на долголетие и пожизненную продуктивность коров [Текст] / Ю.М. Смирнова, А.В. Платонов // Агрозоотехника. 2019. Т. 2. № 3. С. 1–8.
10. Решетникова, Н.М. Проблема интенсификации воспроизводства в племенном скотоводстве [Текст] / Н.М. Решетникова // Современные аспекты селекции, биотехнологии, информатизации в племенном животноводстве: сб. науч. ст. М.: ВНИИПлем, 1997. С. 121–130.
11. Кольцов, Д.Н. Современные проблемы воспроизводства крупного рогатого скота Смоленской области [Текст] / Д.Н. Кольцов, А.С. Герасимова, О.В. Татуева, С.И. Кононенко // Сб. науч. тр. СКНИИЖ. 2014. Т. 1. № 3. С. 70–75.
12. Хромова, О.Л. Продолжительность использования коров ярославской породы различ-

ных генотипов [Текст] / О.Л. Хромова, О.Н. Бургомистрова // АгроЗооТехника. 2019. Т. 2. № 1. С. 1–10.

13. Прошина, О.В. Воспроизводство стада – борьба с призраками [Электронный ресурс] / О.В. Прошина, Н.А. Лоскутов. РЦ «ПЛИНОР», 2011. 3 с. Режим доступа: http://kleverkirov.ru/ndex.php/_vosproizvodstvo_stada_-_borba_s_prizrakami_.html. Дата обращения: 03.06.2020.

14. Жукова, С.С. Использование голштинов в совершенствовании черно-пестрой породы [Электронный ресурс] / С.С. Жукова, В.И. Гудыменко // Зоотехния. 2011. № 4. С. 52–55. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-golshtinov-v-sovershenstvovanii-chno-pestroy-porody>. Дата обращения: 27.07.2020.

15. Стрекозов, Н.И. Молочное скотоводство России: настоящее и будущее [Текст] / Н.И. Стрекозов // Зоотехния. 2008. № 1. С. 18–21.

Сведения об авторах

1. **Смирнова Юлия Михайловна**, ORCID: 0000-0002-9155-5110, научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Вологодский научный центр Российской Академии Наук», 160014, г. Вологда, ул. Горького, 56А, Российская Федерация, e-mail: julya_smirnova_35@list.ru.

2. **Хабарова Галина Васильевна**, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 160555, г. Вологда, с. Молочное, ул. Парковая, д. 14, e-mail: galinakhabarova@yandex.ru.

В статье представлено влияние степени голштинизации коров на сроки использования, уровень молочной продуктивности за период хозяйственного использования и воспроизводительные качества. Исследования проводились в условиях ОАО «Заря» Вологодского района. В ходе исследований была сформирована выборка из 592 выбывших из стада коров черно-пестрой породы в период 2008–2017 гг. с первой законченной лактацией. Анализ долголетия и воспроизводительных качеств проводился за семилетний период с даты первого отела. В результате исследований по анализу влияния генотипа по голштинской породе на продуктивное долголетие было установлено, что наибольшей продолжительностью хозяйственного использования (3, 4 лактации и 1 569 дней) и пожизненной продуктивностью базисной жирности (27 104 кг) отличались животные с кровностью от 26 до 49 %.

Наряду с этим от животных с данным генотипом было получено наибольшее количество телят (4,1 головы) за период хозяйственного использования. По воспроизводительным качествам с ростом кровности 50 % и более по улучшающей породе у коров наблюдалось увеличение кратности осеменения, сокращения коэффициента воспроизводства, что характеризует интенсивность процесса замещения выбывших животных нетелями и, как следствие, удлинение сервис- и межотельного периодов. Полученные данные позволяют сделать вывод, что скрещивание черно-пестрых коров с голштинами и получение помесей с кровностью от 26 до 49 % способствуют повышению продолжительности продуктивной жизни коров одновременно с ростом пожизненной продуктивности при сохранении воспроизводительных качеств на достаточно хорошем уровне.

Y. Smirnova, G. Khabarova

PRODUCTION RATES OF COWS OF DIFFERENT GENOTYPES

Key words: *Russian Black Pied cattle; Genotype; Dairy productivity productive longevity Period of economic use; reproducible qualities.*

Authors' personal details

1. **Yulia Smirnova**, ORCID: 0000-0002-9155-5110, Research Associate, Vologda Research Center of the Russian Academy of Sciences, 56A, Gorky, Vologda, 160014, Russian Federation, e-mail: julya_smirnova_35@list.ru.

2. **Galina Khabarova**, Candidate of Sciences (Agricultural), Associate Professor, 14, Parkovaya Street, Molochnoye village, Vologda, 160555, Russian Federation, e-mail: galinakhabarova@yandex.ru.

The article presents the impact of the degree of holsteinization of cows on the terms of use, the level of dairy products during the period of economic use, and reproducing qualities. The research was carried out in the conditions of the Vologda district. The sample included 592 black and mottled cows that dropped out of the herd in 2008–2017, with the first finished lactation. The analysis of longevity and reproducing qualities was carried out over seven years from the date of the first calving. Studies to analyze the effect of the Holstein genotype on productive longevity found that animals with a 26 to 49 % roofing differed in the duration of economic use (3,4 lactation and 1 569 days) and the lifelong productivity of base fat (27 104 kg). The animals with this geno-

type received the largest number of calves (4,1 heads) during the period of economic use. There was an increase in the multiple of insemination, reduction of the reproduction rate on reproducible qualities with an increase in blood 50 % or more. It characterizes the intensity of the process of substitution of endangered animals with non-animals, and as a result, lengthening of service and inter-period periods. The findings suggest that crossing black and mottled cows with holsteins and getting blood mixes from 26 to 49 % contributes to increasing the productive life expectancy of cows while increasing lifelong productivity while maintaining reproducing qualities at a reasonably good level.

© Смирнова Ю.М., Хабарова Г.В.

УДК 636.2:636.082

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-90-94

Р.А. Улимбашева

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ ПРИ РАЗНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА И УРОВНЕ КОНЦЕНТРАТОВ В РАЦИОНЕ

Ключевые слова: бычки; калмыцкая порода; производственный цикл; продолжительность; убойные качества.

Введение. поголовье специализированного мясного скота в нашей стране составляет не более 10 % удельного веса всего крупного рогатого скота и потому считать это направление отдельной отраслью скотоводства можно условно, так как в развитых странах оно достигает 50 % и более. Однако нельзя не отметить, что развитию специализированного мясного скотоводства в России в последние годы уделяется все больше внимания, а существующая государственная поддержка способна обеспечить рост производства мясного сырья в ближайшей перспективе. При этом общеизвестны основные проблемы, с которыми сталкиваются ученые и практики в мясном скотоводстве. К ним можно отнести недостаточный уровень племенной работы с отечественными породами крупного рогатого скота, низкий уровень мясной продуктивности и рентабельности производства [1–3]. Ликвидация дефицита говядины в нашей стране должна идти разными путями, включающими использование современных интенсивных технологий, высокопродуктивных пород отечественного и зарубежного происхождения. К одной из таких пород относится калмыцкая порода крупного

рогатого скота, приспособленная к разным природно-климатическим и кормовым условиям регионов России [4, 5].

Эффективность производства говядины при использовании бычков калмыцкой породы и ее внутривидовых типов подтверждена исследованиями отечественных ученых в Ростовской области [6], Оренбургской области [7, 8], Ставропольском крае [9, 10], Республике Калмыкия [11, 12] и многих других регионах. Рядом авторов [13] в условиях промышленной технологии производства говядины с целью установления потенциала мясной продуктивности симментальского и калмыцкого скота экспериментально проверена возможность и экономическая целесообразность удлинения производственного цикла до 21-месячного возраста. Установлено, что бычков калмыцкой породы эффективнее откармливать до 18-месячного возраста, тогда как симменталов, как более долгорослых, – до 21 месяца. Подобные исследования на бычках абердин-ангусской породы свидетельствуют о большей целесообразности выращивания и откорма молодняка с разделением производственного цикла на три периода в едином производ-

ственном цикле и в зависимости от кормовых возможностей хозяйств с возрастом реализации 14–18 месяцев живой массой 420–440 кг. При использовании такой технологии обеспечивается хорошее использование кормов и получение полномысных туш при высоких технико-экономических показателях производства [14].

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключалась в изучении мясной продуктивности бычков калмыцкой породы при разной продолжительности производственного цикла и уровне концентратов в рационе.

Для достижения указанной цели исследований ставились следующие задачи: изучить убойные качества; установить морфологический состав туш; определить сортовой состав мякоти туш.

Объект, материалы и методы исследований. Объектом исследований являлись бычки калмыцкой породы. Убойные качества подопытных бычков изучались в племенном репродукторе по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы ООО «Дарган», расположенном в Черекском районе (предгорная зона) Кабардино-Балкарской Республики. К возрасту убоя сформировали две группы бычков калмыцкой породы по 3 головы в каждой, выращенных по технологии производства говядины в мясном скотоводстве с разной продолжительностью производственного цикла и уровнем концентратов в рационах. У бычков контрольной группы общая продолжительность производственного цикла составила 18 месяцев (546 суток) с удельным весом концентратов в рационах 40 %, опытной группы – 16 месяцев (482 суток) – 50 %. Подсосный период телят контрольной группы составил 210 суток, опытной – 182 суток, доразрешивание – 186 и 165 суток соответственно, интенсивный заключительный откорм – 150 и 135 суток.

В течение суток кратность кормления подопытных групп бычков составила два раза. Условия ухода и содержания, а также качество кормов на всем протяжении исследований были идентичными для обеих групп бычков. Контрольные убои бычков контрольной группы провели по достижении 18-месячного возраста, опытной – в 16 месяцев. Убои подопытного поголовья осуществляли в ОАО «Нальчикский мясоперерабатывающий комбинат» по методикам ВАСХНИЛ, ВНИИМС. При убое учитывали съёмную и предубойную живую массу, абсолютную массу и относительный выход парной туши, массу и выход внутреннего жира, убойную массу и убойный выход.

Морфологический состав туш изучался после их охлаждения в течение 24 часов в диапа-

зоне температур 0...+4 °С путем обвалки и жиловки туш. Из показателей морфологического состава туш определяли массу мякоти, костей, хрящей и сухожилий. Коэффициент мясности рассчитывали отношением массы мякоти к массе костей. Сортовой состав мякоти туш бычков представлен тремя сортами: высший, первый и второй. Полученный в исследованиях цифровой материал обработан биометрически в соответствии с руководством Н.А. Плохинского [15].

Результаты исследований и их обсуждение. О результатах контрольного убоя бычков, выращенных при разной продолжительности производственных циклов с различиями в уровне концентратов в рационах, можно судить по материалам, представленным в таблице 1. Различия, полученные в предубойной живой массе бычков контрольной и опытной групп, составили 1,9 кг без достоверных межгрупповых отличий. Аналогичная ситуация с различиями в массе парной туши с недостоверным превосходством бычков опытной группы (на 3,4 кг). Более высокой массой внутреннего жира характеризовался молодняк контрольной группы, превосходство которого над сверстниками опытной группы составило 0,9 кг.

Обе группы бычков проявили высокие показатели убойной массы и убойного выхода при несущественных межгрупповых различиях. Однако вследствие меньшей продолжительности производственного цикла выращивания и откорма более предпочтительным оказалось использование технологии производства говядины от бычков опытной группы.

Показатели морфологического состава туш подопытных групп животных отражены в таблице 2.

Полученные результаты свидетельствуют о превосходстве бычков опытной группы над сверстниками контрольной группы по всем изученным показателям морфологического состава туш, за исключением массы костей, хрящей и сухожилий. Различия по массе мякоти в пользу бычков опытной группы составили 5,1 кг. За счет меньшей массы мякоти и большего содержания костей в туше бычков контрольной группы коэффициент мясности у бычков опытной группы оказался на 0,21 ед. больше. Более предпочтительным также оказалось отношение съедобной части к несъедобной в туше бычков опытной группы, превосходство которых над контрольными сверстниками достигло 0,26 ед.

Следовательно, выращивание и откорм бычков калмыцкой породы на рационах с разным удельным весом концентратов и продолжительностью производственного цикла оказали

неравнозначное влияние на морфологический состав туш, что следует учитывать при выборе технологии содержания мясного скота. Результаты анализа сортового состава мякоти туш бычков калмыцкой породы опытной и контрольной групп приведены в таблице 3.

Установлено, что от бычков опытной группы получена более высокая масса мякоти высшего сорта – на 4,9 кг или на 2,2 %, первого сорта – на 6,4 кг или на 1,8 %. В результате этого

выход мякоти второго сорта оказался выше в тушах бычков контрольной группы в среднем на 6,2 кг или на 4 %. Независимо от продолжительности выращивания и откорма, уровня концентратов в рационе у обеих групп бычков превалировал выход мякоти первого сорта – более половины от массы мякоти. Наименьший выход среди всех анализируемых сортов мяса был присутствием мякоти высшего сорта, что согласуется с исследованиями ученых-скотоводов [16, 17].

Таблица 1 Результаты контрольного убоя бычков в зависимости от продолжительности производственного цикла и уровня концентратов в рационе

Показатель		Группа	
		контрольная	опытная
Живая масса, кг:	при снятии с откорма	461,6 ± 4,8	463,0 ± 4,2
	перед убоем	450,5 ± 1,78	452,4 ± 2,41
Масса парной туши:	абсолютная (кг)	255,4 ± 2,14	258,8 ± 4,04
	относительная (%)	56,7	57,2
Масса внутреннего жира:	абсолютная (кг)	14,0 ± 0,44	13,1 ± 0,58
	относительная (%)	3,1	2,9
Убойная масса, кг		269,4 ± 2,58	271,9 ± 4,61
Убойный выход, %		59,8 ± 0,32	60,1 ± 0,73

Таблица 2 Морфологический состав туш бычков в зависимости от продолжительности производственного цикла

Показатель		Группа	
		контрольная	опытная
Масса охлажденной туши (кг)		251,7 ± 3,91	254,2 ± 3,01
Масса мякоти (кг):	абсолютная	194,5 ± 1,66	199,6 ± 2,73
	относительная	77,3	78,5
Масса костей (кг):	абсолютная	48,1 ± 1,02	47,0 ± 0,65
	относительная	19,1	18,5
Масса хрящей и сухожилий (кг):	абсолютная	9,1 ± 2,02	7,6 ± 0,93
	относительная	3,6	3,0
Коэффициент мясности (ед.)		4,04 ± 0,10	4,25 ± 0,11
Отношение съедобной части к несъедобной		3,40	3,66

Таблица 3 Сортовой состав мякоти туш бычков в зависимости от продолжительности производственного цикла

Показатель		Группа	
		контрольная	опытная
Масса мякоти (кг) абсолютная		194,5 ± 1,66	199,6 ± 2,73
Мякоть высшего сорта:	масса (кг)	20,4 ± 1,07	25,3 ± 1,06
	выход (%)	10,5	12,7
Мякоть первого сорта:	масса (кг)	106,0 ± 1,77	112,4 ± 1,31
	выход (%)	54,5	56,3
Мякоть второго сорта:	масса (кг)	68,1 ± 1,34	61,9 ± 0,63
	выход (%)	35,0	31,0

Выводы. Увеличение энергетической ценности рационов бычков путем введения большего количества концентратов – до 50 % – при меньшей продолжительности производственного цикла выращивания и откорма (16 мес) обеспечивает практически такие же показатели мясной продуктивности, как и при длительности цикла 18 мес при уровне концентратов 40 %.

Следовательно, увеличение уровня концентратов в рационе бычков калмыцкой породы на протяжении производственного цикла выращивания и откорма продолжительностью 16 мес является эффективным методом снижения продолжительности технологических периодов и приемом увеличения производства говядины в более короткие сроки.

Библиографический список

1. Кавардаков, В.Я. Методологические аспекты управления инновационно-технологическим развитием животноводства на отраслевом уровне [Текст] / В.Я. Кавардаков, А.Ф. Кайдалов, И.А. Семенов // Вестник Донского государственного аграрного университета. 2017. № 2–1 (24). С. 37–47.
2. Каюмов, Ф.Г. Селекционно-племенная работа с калмыцкой породой скота на современном этапе [Текст] / Ф.Г. Каюмов, А.Ф. Шевхужев, Н.П. Герасимов // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2017. № 3 (48). С. 64–72.
3. Шевхужев, А.Ф. Породный состав и современное состояние производства молока и говядины [Текст] / А.Ф. Шевхужев, М.Б. Улимбашев // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2017. № 1 (46). С. 100–107.
4. Приступа, В.Н. Мясная продуктивность крупного рогатого скота калмыцкой породы различных линий при стойлово-пастбищной системе содержания [Текст] / В.Н. Приступа, О.А. Бабкин, А.Ю. Колосов, А.В. Казьмин // Молочное и мясное скотоводство. 2015. № 1. С. 25–27.
5. Улимбашева, Р.А. Мясная продуктивность молодняка разного направления продуктивности [Текст] / Р.А. Улимбашева // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. 2019. № 1 (41). С. 83–88.
6. Половинко, Л.М. Совершенствование животных калмыцкой породы на основе высокопродуктивных внутрипородных типов [Текст] / Л.М. Половинко, Ф.Г. Каюмов, Е.Д. Куш, Г.П. Легошин, М.Ю. Половинко // Молочное и мясное скотоводство. 2016. № 6. С. 11–14.
7. Черномырдин, В.Н. Калмыцкая порода скота в племенных хозяйствах Оренбургской области [Текст] / В.Н. Черномырдин, Ф.Г. Каюмов // Вестник мясного скотоводства. 2014. № 3 (86). С. 12–16.
8. Каюмов, Ф.Г. Повышение мясной продуктивности и качества мяса скота калмыцкой породы методом вводного скрещивания [Текст] / Ф.Г. Каюмов, А.В. Кудашева, Н.А. Калашников, Т.М. Сидихов // Вестник мясного скотоводства. 2015. № 1 (89). С. 38–44.
9. Калашников, Н.А. Мясная продуктивность бычков калмыцкой породы разных генотипов [Текст] / Н.А. Калашников // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2015. № 2 (52). С. 118–120.
10. Приступа, В.Н. Заводские линии крупного рогатого скота калмыцкой породы [Текст] / В.Н. Приступа, А.И. Клименко, Ю.А. Колосов, А.Ю. Колосов, О.А. Бабкин // Вестник Донского государственного аграрного университета. 2015. № 3. С. 22–30.
11. Амерханов, Х.А. Характеристика генетического материала при выведении высокопродуктивного типа «Вознесенский» калмыцкой породы скота [Текст] / Х.А. Амерханов, Л.М. Половинко, Н.А. Калашников // Вестник мясного скотоводства. 2016. № 4 (96). С. 15–21.
12. Каюмов, Ф.Г. Сравнительная оценка бычков калмыцкой породы новосозданных заводских типов [Текст] / Ф.Г. Каюмов, Е.Д. Куш, Л.М. Половинко, Н.П. Герасимов // Вестник мясного скотоводства. 2017. № 1 (97). С. 21–28.
13. Шахмурзов, М.М. Оценка мясной продуктивности бычков калмыцкой и симментальской пород при разных циклах производства [Текст] / М.М. Шахмурзов, А.Ф. Шевхужев, О.О. Гетоков, И.Я. Шахтамиров // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. 2019. № 3 (43). С. 54–58.
14. Кулинцев, В.В. Продуктивность, качество мышечной и жировой ткани бычков абердин-ангусской породы в зависимости от интенсивности производства говядины [Текст] / В.В. Кулинцев, А.Ф. Шевхужев, В.А. Погодаев // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2019. № 1. С. 79–97.
15. Плохинский, Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников [Текст] / Н.А. Плохинский. М.: Колос, 1969. 256 с.
16. Исаков, Р.С. Мясная продуктивность молодняка черно-пестрой породы и ее помесей с лимузинами [Текст] / Р.С. Исаков, Н.М. Губайдуллин, Х.Х. Тагиров // Молочное и мясное скотоводство. 2014. № 4. С. 8–10.
17. Шевхужев, А.Ф. Формирование мясной продуктивности молодняка черно-пестрого и помесного скота при использовании разных технологий выращивания [Текст] / А.Ф. Шевхужев, Р.А. Улимбашева, М.Б. Улимбашев // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2017. № 3. С. 95–109.

Сведения об авторе

Улимбашева Раина Алексеевна, ORCID: 0000-0003-1755-2672, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник отдела кормления и кормопроизводства, ФГБНУ Северо-Кавказский ФНАЦ, 356241, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Никонова, 49, e-mail: ulimbashева1976@mail.ru.

В статье приводятся результаты контрольного убоя бычков, морфологический и сортовой состав мякоти туш в зависимости от продолжительности производственного цикла и уровня концентратов в рационе. У бычков контрольной группы общая продолжительность производственного цикла составила 18 месяцев (546 суток) с удельным весом концентратов в рационах 40 %, опытной группы – 16 месяцев (482 суток) – 50 %. Подсосный период телят контрольной группы составил 210 суток, опытной – 182 суток, доращивание – 186 и 165 суток соответственно, интенсивный заключительный откорм – 150 и 135 суток. Различия, полученные как по предубойной живой массе, так по массе парной туши, составили 1,9 и 3,4 кг соответственно без достоверной разницы между группами. Установлено превосходство бычков опытной группы над сверстниками контрольной группы по основным изученным показателям морфологиче-

ского состава туш, за исключением массы костей, хрящей и сухожилий. Различия по массе мякоти в пользу бычков опытной группы составили 5,1 кг, коэффициенту мясности – 0,21 ед., отношению съедобной части к несъедобной в туше – 0,26 ед. При прочих равных условиях от бычков опытной группы получена более высокая масса мякоти высшего сорта на 4,9 кг или на 2,2 %, первого сорта – на 6,4 кг или на 1,8 %. В результате этого выход мякоти второго сорта оказался выше в тушах бычков контрольной группы в среднем на 6,2 кг или на 4 %. Таким образом, обе группы бычков проявили высокие показатели убойной массы и убойного выхода при несущественных межгрупповых различиях. Однако вследствие меньшей продолжительности производственного цикла выращивания и откорма более предпочтительным оказалось использование технологии производства говядины от бычков опытной группы.

R. Ulimbasheva

MEAT PRODUCTIVITY OF KALMYK BREED BREEDS AT DIFFERENT DURATION OF THE PRODUCTION CYCLE AND LEVEL OF CONCENTRATES IN THE DIET

Key words: gobies; Kalmyk breed; the production cycle; duration; destructive qualities.

Authors' personal details

Radina Ulimbasheva, ORCID: 0000-0003-1755-2672, Candidate of Agricultural Science, research associate of the Department of feeding and feed production North-Caucasian Federal Scientific Agrarian Center, Stavropol ter., Mikhailovsk, Nikonov street, 49, 356241, e-mail: ulimbashева1976@mail.ru.

The article presents the results of bulls control slaughter, morphological and varietal composition of the pulp of carcasses, depending on the duration of the production cycle and the level of concentrates in the diet. In the gobies of the control group, the total duration of the production cycle was 18 months (546 days), with a specific gravity of concentrates in the rations of 40 % in the experimental group – 16 months (482 days) – 50 %. The suckling period of calves in the control group was 210 days, in the experimental group – 182 days, rearing – 186 and 165 days, respectively, intensive final fattening – 150 and 135 days. The differences obtained both in the pre-slaughter live weight and in the weight of the paired carcass were 1,9 and 3,4 kg, respectively, without a significant difference between the groups. The superiority of bulls of the experimental group over the control group was established according to the leading studied indicators of the morphological

composition of carcasses, except the mass of bones, cartilage, and tendons. Differences in the mass of the pulp in favor of the calves of the experimental group were 5,1 kg, the coefficient of meat content was 0,21 units, the ratio of the edible part to the inedible part in the carcass was 0,26 units. All other things being equal, from the bulls of the experimental group, a higher mass of pulp of the highest grade was obtained by 4,9 kg or 2,2 %, of the first grade – by 6,4 kg or 1,8 %. The yield of second-grade pulp was higher in the carcasses of gobies of the control group by an average of 6,2 kg or 4 %. Thus, both groups of bulls showed high slaughter weight and slaughter yield, with insignificant inter-group differences. However, due to the shorter duration of the production cycle of growing and fattening, it turned out to be preferable to use beef production technology from bull calves of the experimental group.

© Улимбашева Р.А.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ

Ключевые слова: *техническая оснащенность; сельскохозяйственная техника; государственная поддержка; энергообеспеченность; капитально-восстановительный ремонт модернизация техники.*

Введение. В последние годы удалось стабилизировать резкое сокращение численного состава основных видов сельскохозяйственных машин, комбайнов и тракторов. В Республике Башкортостан существенно снизилось количество машин, выработавших нормативный срок эксплуатации и средний их возраст, также наблюдается уменьшение нагрузки на технику при выполнении основных видов механизированных сельскохозяйственных работ. С 2010 по 2020 гг. средний возраст тракторов уменьшился с 17,9 до 15,8, зерноуборочных комбайнов – с 14,8 до 11,8, кормоуборочных комбайнов – с 11,4 до 9,6 лет. За последние 10 лет парк техники значительно превысил нормативный срок эксплуатации. В то же время, несмотря на существенную государственную поддержку, техническая обеспеченность основными видами техники в отдельных районах и сельхозпредприятиях остается недостаточной. С 1990 г. уровень энергообеспеченности снизился с 278 до 177 л. с. на 100 га посевной площади. Между тем, согласно комплексной задаче Минсельхоза республики, в ближайшие годы необходимо довести энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций до 230...250 л. с. на 100 га посевной площади [1, 2, 4, 6, 10].

В целях повышения технической оснащенности АПК в различных регионах Российской Федерации предпринимаются меры государственной поддержки. Только в Республике Башкортостан применяется новое и эффективное направление – организация капитально-восстановительного ремонта и модернизация находящейся в эксплуатации техники на базе специализированных ремонтных предприятий региона [3, 4, 6, 8]. Объясняется это тем, что ремонту и восстановлению подлежит порядка 50 % изношенных деталей узлов и агрегатов сельскохозяйственной техники, при этом затраты на изготовление новых запасных частей составляют в среднем не более 35 % от стоимости оригинальных деталей, затраты на ремонт и восстановление изношенных деталей составляют не более

25 % стоимости новых [5, 7, 9]. Все это обеспечивает рентабельную работу ремонтно-обслуживающих организаций.

Цель и задачи исследований – оценка эффективности субсидирования затрат сельхозтоваропроизводителей на проведение капитально-восстановительного ремонта и модернизации техники.

Методы и результаты исследований. Головной организацией по техническому сервису и ремонтному обслуживанию предприятий и организаций АПК в Республике Башкортостан является ГУСП «Башсельхозтехника». В настоящее время направления деятельности предприятия многоплановы и разносторонни (рисунок 1):

- торговля автотракторной, сельскохозяйственной техникой, оборудованием, запасными частями;
- финансовая аренда (лизинг) сельскохозяйственной техники и животных;
- предпродажная подготовка, сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание реализуемой техники;
- ремонт всех видов сельскохозяйственной техники и оборудования;
- производственная сборка отдельных видов сельхозтехники;
- хранение различных товарно-материальных ценностей;
- уборка урожая зерновых культур и подсолнечника.

Анализ показателей работы предприятия подтверждает существенное увеличение объемов ремонта с 52,0 млн. руб. в 2017 г. до 80,5 млн руб. в 2019 г. Резкое увеличение объемов наблюдается в направлении сборки тракторов и сельхозоборудования с 27 млн руб. в 2017 г. до 118 млн руб. в 2019 г. При этом объемы работ по другим направлениям практически остались на прежнем уровне.

За период с 2017 по 2020 гг. ГУСП «Башсельхозтехника» демонстрирует позитивную динамику развития (таблица 1).

Рисунок 1
Направления деятельности ГУСП «Башсельхозтехника»

Таблица 1 Сведения о работе группы компаний ГУСП «Башсельхозтехника» РБ за 2017–2019 годы и плановый 2020 год

№ п/п	Показатель	ед. изм.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	План на 2020 г.
1	Всего выручка, в том числе:	тыс. руб.	679 221	803 580	859 764	1 020 000
1.1	Реализация товаров (сельхозмашины, запчасти и пр.)	тыс. руб.	512 353	598 520	606 262	730 990
1.2	Реализация услуг, из них:	тыс. руб.	166 868	205 060	253 502	289 010
	– сборка тракторов и сельхозоборудования	тыс. руб.	26 950	78 638	117 892	123 000
	– ремонт сельхозтехники (Чишминский филиал)	тыс. руб.	52 733	69 423	80 460	110 000
	– услуги мехотряда	тыс. руб.	20 680	16 889	18 500	18 000
	– услуги лизинга	тыс. руб.	35 926	11 170	3 817	5 000
	– хранение ТМЦ	тыс. руб.	18 566	25 790	25 855	23 000
	– прочие услуги	тыс. руб.	12 013	3 150	6 978	10 010
2	Численность персонала	тыс. руб.	273	233	206	213
3	Среднемесячная зарплата	тыс. руб.	25 386	25 340	28 565	28 060

В процессе модернизации производится замена базовых узлов и агрегатов на более совершенные и экономичные. В частности, при сборке тракторов или капитальном ремонте в предприятии Башсельхозтехника опционально устанавливается курсоуказатель с подруливающим устройством конструкции Башкирского ГАУ (рисунок 2).

Проведение капитально-восстановительного ремонта и модернизации находящейся в эксплуатации техники субсидируется в рамках республиканской программы путем покрытия затрат сельхозтоваропроизводителей до 60 %. При этом модернизация и ремонт должны производиться на базе специализированных ремонтных предприятий республики. В целом в ремонтных предприятиях республики по итогам

2019 г. объем работ по ремонту техники, узлов и агрегатов составил более 1,0 млрд руб., что превышает объемы ремонтных работ за прошлые годы (2018 год – 890 млн руб.). Объем работы по ремонту техники в ремонтных предприятиях с 2010 по 2020 г. увеличился в 7 раз. Все это позволило полностью загрузить ремонтные предприятия и обеспечить рентабельность их работы. Ремонтно-техническим предприятиям в рамках реализации программ республиканского субсидирования за 2018 г. на проведение капитально-восстановительного ремонта и модернизацию техники выплачено 120 млн руб. субсидий, а в 2019 г. – 250 млн руб.

Таким образом, во многом организация капитально-восстановительного ремонта и модернизация находящейся в эксплуатации техники

на базе специализированных ремонтных предприятий республики позволили значительно повысить коэффициент готовности тракторов и

комбайнов при увеличении их нормативного срока эксплуатации.

Рисунок 2

Тракторы в сборочном цехе ГУСП «Башсельхозтехника» (а), конструкции подруливающих устройств с редукторным и электромагнитным приводами (б)

Выводы. Выделение субсидий из регионального бюджета на организацию капитально-восстановительного ремонта и модернизацию находящейся в эксплуатации техники на базе специализированных ремонтных предприятий является эффективным фактором повышения уровня технической оснащенности машинно-тракторного парка предприятий АПК. Реализация программы субсидирования затрат сельхозтоваропроизводителей на проведение капитально-восстановитель-

ного ремонта и модернизации техники позволила существенно повысить коэффициент готовности тракторов и комбайнов при увеличении их нормативного срока эксплуатации. Одновременно повысилась загрузка ремонтно-технических предприятий на местах и возросли объемы ремонтных работ в 7 раз, снизились средний возраст тракторов и комбайнов за последние 10 лет (с 2010 по 2020 г.) на 18 %, состав техники выше нормативного срока эксплуатации – на 34 %.

Библиографический список

1. Кулистикова, Т. Мощность сельхозтехники в стране за пять лет уменьшилась на 12 % [Электронный ресурс] / Т. Кулистикова // Агроинвестор. 17 апреля 2018 г. Режим доступа: <https://www.agroinvestor.ru/tech/news/29700-moshchnost-selkhoztekhniki-v-strane-umenshilas-na-12>.
2. Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 07.07.2017 № 1455. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219731.
3. О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования [Текст]: постановление Правительства Республики Башкортостан от 20 июня 2018 года № 275.
4. Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования [Текст]: приказ Министерства сельского

хозяйства Республики Башкортостан от 22 июня 2018 года № 129.

5. Бутов, А.М. Рынок сельскохозяйственных машин [Электронный ресурс] / А.М. Бутов. М.: Высшая школа экономики, 2019. 87 с. Режим доступа: [https://dcenter.hse.ru/data/2019/12/18/1523096077/Рынок %20сельскохозяйственных %20машин-2019.pdf](https://dcenter.hse.ru/data/2019/12/18/1523096077/Рынок%20сельскохозяйственных%20машин-2019.pdf).

6. Габитов, И.И. Региональные меры государственной поддержки повышения уровня технической оснащенности предприятий агропромышленного комплекса [Текст] / И.И. Габитов, С.Г. Мударисов, П.А. Иофинов // Технический сервис машин. 2020. № 2 (139). С. 83–96.

7. Ежевский, А.А. Техническая и технологическая обеспеченность сельскохозяйственного производства России на 2013–2020 годы [Текст] / А.А. Ежевский // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2014. № 1.

8. Лачуга, Ю.Ф. О вопросах технической оснащенности аграрного производства в Российской Федерации и Республике Башкортостан в современных условиях [Текст] / Ю.Ф. Лачуга, И.И. Габитов // Вестник Башкирского государ-

ственного аграрного университета. 2013. № 3 (27). С. 96–100.

9. Фисинин, В.И. Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 года [Текст] / В.И. Фисинин, Ю.Ф. Лачуга, А.А. Жученко, А.Л. Иванов, И.Г. Ушачев, А.А. Ежевский, Н.В. Краснощеков, В.И. Черноиванов, А.Ю. Измайлов, Д.С. Стребков, В.Д. Попов, Э.И. Липкович, Н.В. Войтович, В.И. Кирюшин, А.А. Артюшин, И.В. Горбачев, В.Ф. Федоренко, М. А. Та-

ранов, В.М. Кряжков, В.П. Елизаров, Л.С. Ор-сик, А.А. Рахманов, П.А. Чекмарев, В.А. Шапочкин, Н.Т. Сорокин. М.: Росинформагротех, 2009. 80 с.

10. Gabitov I.I., Mudarisov S.G., Gafurov I.D., Ableeva A.M., Negovora A.V., Davletshin M.M., Rakhimov Z.S., Khamaletdinov R.R., Martynov V.M., Yukhin G.P. Evaluation of the efficiency of mechanized technological processes of agricultural production. Journal of Engineering and Applied Sciences. 2018. Т. 13. № S10. P. 8338–8345.

Сведения об авторах

1. **Габитов Илдар Исмаилович**, доктор технических наук, профессор кафедры автомобилей и машинно-тракторных комплексов, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 228-91-77, e-mail: rektor_bgau@mail.ru.

2. **Шайхетдинов Фларис Рифкатович**, генеральный директор ГУСП «Башсельхозтехника», тел.: +7 (347) 293-63-47, e-mail: bshte@bshte.ru.

3. **Неговора Андрей Владимирович**, доктор технических наук, профессор кафедры автомобилей и машинно-тракторных комплексов, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: +7 (347) 228-32-13, e-mail: negovora@bsau.ru.

Техническая оснащенность сельскохозяйственного производства в России характеризуется низким уровнем энергообеспеченности. В регионах страны, где удалось стабилизировать резкое снижение технической оснащенности, наблюдается уменьшение количества машин, выработавших нормативный срок эксплуатации и средний их возраст. В Республике Башкортостан ведущим учреждением по организации капитально-восстановительного ремонта и модер-

низации находящейся в эксплуатации техники машинно-тракторного парка предприятий АПК является ГУСП «Башсельхозтехника». Показано, что реализация программы субсидирования затрат сельхозтоваропроизводителей на проведение капитально-восстановительного ремонта и модернизации техники позволила существенно повысить коэффициент готовности тракторов и комбайнов при увеличении их нормативного срока эксплуатации.

I. Gabitov, F. Shaihutdinov, A. Negovora

IMPROVEMENTS IN THE IN-SERVICE AGRICULTURAL MACHINERY AS AN EFFECTIVE FACTOR FOR BETTER EQUIPMENT

Key words: *equipment; agricultural machinery; state support; energy supply; major overhaul; improved machinery.*

Authors' personal details

1. **Ildar Gabitov**, Doctor of Technical Sciences, Professor at the Department of Automobiles and Tractors, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», phone: +7 (347) 228-91-77, e-mail: rektor_bgau@mail.ru.

2. **Flaris Shaikhetdinov**, General Director of State Unitary Agricultural Enterprise «Bashselkhoz-tekhnika», phone: +7 (347) 293-63-47, e-mail: bshte@bshte.ru.

3. **Andrey Negovora**, Doctor of Technical Sciences, Professor at the Department of Automobiles and Tractors, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», phone: +7 (347) 228-32-13, e-mail: negovora@bsau.ru.

Farming equipment in Russia suffers from low energy supply. Some regions of the country man-

aged to stop a sharp decline in the equipment level. These regions have fewer machines that have com-

pleted their expected service life and average age. In the Republic of Bashkortostan, the state agricultural enterprise «Bashselkhoztekhnika» is the leading company involved in major overhauls and improvements for agricultural businesses' in-service machinery. The paper highlights that the pro-

grammes of subsidizing agricultural producers' costs for capital overhauls and improvements in farm machinery have significantly increased the availability factor of tractors and combine harvesters and enhanced their expected service life.

© Габитов И.И., Шайхетдинов Ф.Р., Неговора А.В.

УДК 631.331

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-99-107

Ф.Н. Галлямов, А.В. Шарафутдинов, М.В. Пятаев

РАЗРАБОТКА СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ВЫСЕВА СЕМЯН ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ СЕЯЛОК

Ключевые слова: *посевные комплексы; распределение семян; система контроля высева; качество посева; индуктивный датчик.*

Введение. Производство зерна является основной отраслью агропромышленного производства, предназначенной обеспечить население продуктами питания, животноводство – кормами, промышленность – сырьём. В технологии производства зерна особое место занимает посев, выполняемый в зависимости от региональных условий различными сеялками, которые должно объединять единое требование – энерго- и ресурсосбережение, сопровождаемое качеством посева.

Соблюдение заданных параметров качества в процессе посева ввиду воздействия ряда факторов, таких как неровность поля, изменяющаяся по длине гона, влажность и твердость почвы, колебания температуры атмосферного воздуха, присутствие растительных остатков и инородных предметов и т. д., порождает определенные трудности в работе механизатора и требует от него постоянного внимания. По мере совершенствования сеялок за счет увеличения их ширины захвата и рабочих скоростей движения эти обстоятельства усугубляются настолько, что контроль трактористом хода технологического процесса становится не только неэффективным, но и практически неосуществимым.

Поэтому в последние годы наряду с созданием новых зерновых сеялок активно ведутся исследования и разработки системы контроля высева семян с бесконтактными датчиками, которые позволят сократить затраты труда и повысить качество посева. Применение средств контроля высева в составе посевного агрегата позволяет учесть многообразие физических характеристик семян и адаптировать рабочие органы посевной машины на оптимальное выполнение

технологических операций, оперативно обнаруживать различные нарушения технологического процесса высева.

В работах ведущих ученых Лурье А.Б., Ксеновича И.П., Еникеева В.Г., Бородина И.Ф., Бузенкова Г.М., Иофинова С.А., Хорошенкова В.К., Щеповалова В.Д., Викторова А.И., Черникова В.Г., Тамирова М.А. и других, посвященных исследованиям технологических процессов высева и созданию средств контроля функционирования мобильных агрегатов, изучены основные факторы, влияющие на количественные и качественные показатели технологических процессов, реализуемых ими в реальных условиях работы, которые можно распространить и на посевные агрегаты.

На сегодняшний день создан ряд конструкций таких систем с датчиками фотоэлектрического типа [13]. Они состоят из блока информации и соединительных проводов, фотоприемника и усилителя сигнала, источника света. В качестве фотоприемника, как правило, используются фоторезисторы, фотодиоды, фотосопротивления и другие фотоэлементы. Питание системы осуществляется от сети постоянного тока трактора через стабилизатор. Фотоприемники и источники света находятся внутри сошника или семяпровода, так чтобы луч света находился на пути потока семян, т. е. с противоположных сторон сошника или семяпровода. В местах установки фотоприемников и источников света сошники (семяпроводы) имеют сужение в виде воронки, образованное их стенками, что обеспечивает необходимое направление потока семян.

Принцип работы системы с фотоэлектрическими датчиками высева семян состоит в следу-

ющем. Высеваемые семена при движении в сошнике (семяпроводе) пересекают луч света, изменяя при этом интенсивность освещения фотоприемника. В результате этого в последнем возникают импульсы, которые затем усиливаются электронным усилителем, поступают на блок обработки информации и выдаются в удобном для наблюдения виде (мигание лампочки, звуковой сигнал).

На ряде систем зарубежных фирм устанавливаются для контроля нормы высева счетчики, которые подсчитывают число семян, высеянных за единицу пройденного пути либо за единицу времени. В случае, когда действительная норма высева семян становится меньше заданной (т. е. когда фактическое число усиленных импульсов меньше заданных на генераторе), замыкается цепь соответствующей контрольной лампочки и звуковой сигнализации. На действительный расход семян, превышающий заранее установленный, прибор не реагирует.

Фотоэлектрический метод контроля высева на описанном принципе широко используется в Венгрии, Болгарии и в США фирмами «Дики-Джон» и «Пази бразерс инкорпорейшнл» в ряде выпускаемых ими систем типа «DjO», предназначенных для контроля за работой высевających аппаратов 4, 6 и 8-рядных сеялок [13].

В системе «DjO» чувствительный элемент (датчик) представляет собой осветитель (миниатюрная электролампочка) и два фотоприемника, расположенные в утолщениях специального пластмассового цилиндра, установленного в разрыве семяпровода. Чувствительность датчиков позволяет регистрировать не только кукурузные зерна, но и мелкие семена таких культур, как рис, свекла, редис, капуста, сорго, просо и т. д. Датчики подключаются к пульту, установленному в кабине трактора. Сигнальные лампы, расположенные на пульте, соединены электрическими цепями с определенными датчиками и зажигаются (вспыхивают) при каждом пролете семян через датчики. По ритму их мигания можно следить за работой высевających аппаратов.

Достоинства систем контроля высева системы «DjO» – высокие чувствительность и надежность работы, быстродействие, многоканальность. К недостаткам следует отнести одновременное постоянное мигание шести или восьми сигнальных лампочек, что утомляюще действует на тракториста, а также необходимость для проверки исправности системы присоединять к пульту дополнительное устройство и производить переключение нескольких штепсельных разъемов, что в полевых условиях крайне нежелательно [13].

Системы контроля высева ВЕМ-6 и ВЕМ-8, разработанные в ВНР, используются в 6- и 8-рядных кукурузных сеялках. По рекламным сведениям, их можно приспособить для контроля работы сеялок при высеве других сельскохозяйственных культур: сахарной свеклы, сои и т. д.

Эти системы автоматически контролируют непрерывность процесса высева. При прекращении подачи семян вследствие отсутствия их в бункере или забивания сошников, семяпроводов и других нарушений технологического процесса прибор подает одновременно звуковой и световой сигналы.

В системе ВЕМ, как и «DjO», для контроля нормы высева семян имеются счетчики, с помощью которых производится подсчет семян, высеваемых в течение 15 с или любого требуемого времени, а также сигнализация короткого замыкания цепей питания лампочек. Электрическая часть выполнена на интегральных схемах, что значительно повышает надежность системы в целом.

К системам такого же типа относится ультразвуковой счетчик (сигнализатор), осуществляющий подсчет семян, высеваемых в рядок за определенное время [13].

Принцип действия сигнализатора состоит в следующем. При пересечении семенем пространства между пьезоэлементами звуковая связь нарушается, и на коллекторе составного транзистора образуется импульс положительной полярности, который усиливается транзистором VT5. Импульсы с установленной частотой следования поступают с выхода генератора на второй вход сравнивающего устройства. Если действительная интенсивность (норма) высева семян в каком-либо рядке становится меньше заданной, на пульте контроля включаются соответствующие световой и звуковой сигналы.

Описанный принцип работы системы контроля нормы высева семян использован в посевных мониторах фирм «Агар Инструменте (УК) Лтд» (Англия) и «Хассель» (ФРГ), предназначенных для оборудования преимущественно сеялок точного высева.

Из приведенных материалов следует, что системы контроля высева, наряду с преимуществами (высокая чувствительность, малая инерционность, быстродействие, отсутствие влияния на траекторию движения семян), имеют ряд недостатков. К ним можно отнести низкую помехозащитность от запыления источника света и фотоприемника, недостаточную механическую прочность элементов системы, а также различие конструкции датчиков для регистрации мелких и крупных семян, т. е. отсутствие универсальности.

Для устранения вышеперечисленных недостатков систем контроля высева необходимо вести работы в направлении расширения функциональных возможностей электронных систем, связанных с применением бортовых микроконтроллерных устройств, использовании удобного человеко-машинного интерфейса, включая алфавитно-цифровые и графические дисплеи, а также защищенности датчиков от запыления и вибрации. Большинство существующих методов контроля дают результаты, по которым можно оценить качество высева семян лишь косвенно или в недостаточной мере. Более точные и полные способы определения качества, такие как раскапывание контрольных отрезков с построением гистограммы распределения, чрезвычайно трудоемки и не дают 100 % гарантию точности контроля. Поэтому разработка недорогих и эффективных средств контроля является актуальной задачей.

Цель исследования – повышение эффективности работы высевающих систем зерновых сеялок.

Условия, материалы и методы исследований. Для создания программной части системы контроля использована среда визуального моделирования Rastin Rose, в основе которой лежит диаграмма прецедентов или UseCase-диаграмма. Она определяет весь алгоритм действий системы.

Система собрана на программируемом микроконтроллере Arduino Mega на базе процессора ATmega328P с инфракрасными датчиками пролета семян с длиной волны от 760 до 1100 нм и углом направленности луча до 60 градусов. Для генерирования программного кода применен унифицированный язык моделирования UML (Unified Modeling Language). Для программирования последующих операций использовался программируемый контроллер Arduino Mega на базе процессора ATmega328P, с 16КБ flash-память, eeprom-память 0.5КБ, с 14 цифровыми входами/выходами.

Созданная таким образом система сбора и отображения данных является универсальной для различных систем сельскохозяйственных агрегатов (для всех типов сельскохозяйственных операций). Адаптированное приложение разработано под Android и дает возможность вывода результатов на экран телефона и планшетного компьютера.

Для проверки работоспособности в полевых условиях разработана система контроля высева семян, включающая в себя количество сошников до 45 штук (для зерновой сеялки); контролер оборотов высевающего аппарата; датчики пролета

семян инфракрасного типа. Для проверки параметров работы системы была собрана лабораторная установка, представленная на рисунке 1.

Рисунок 1
Лабораторная установка

Система состоит из датчика контроля вращения валов индуктивного типа, датчика наличия семян в бункере емкостного типа, GPS-датчика, определяющего скорость и пройденный путь (с точностью 1–2 м). Задача системы состоит в отслеживании забивания сошников; наличия семян и/или удобрений в бункере сеялки; вращения валов дозатора; скорости движения сеялки (посевного комплекса); засеянной площади; целостности цепи подключения датчиков пролета семян ДПП; напряжении в сети питания и надежности контакта присоединения системы к цепи питания.

Для полевых испытаний был изготовлен датчик пролета семян, представленный на рисунке 2. В программе Компас была изготовлена 3D-модель корпуса датчика. После уточнения параметров деталь была изготовлена на 3D-принтере.

Датчик пролета семян представляет собой пластиковую трубу с корпусом для датчика, внутри трубы друг напротив друга расположены источник и приемник сигнала. Семена, пролетая между чувствительными элементами, приводят к изменению емкости и соответственно получению сигнала о пролете семян. Были выбраны чувствительные элементы оптического типа (инфракрасного).

Рисунок 2

Датчик пролета семян в сборе: а – 3D-модель корпуса; б – крепление датчика на патрубки; в – расположение источника и приемника сигнала

Датчик высева семян располагается в средней части семяпровода. Обнаружение семян проходит при длине волн от 760 до 1100 нм и угле направленности 60 градусов. Для определения необходимого количества датчиков надо провести теоретические исследования.

Результаты и обсуждение. В результате анализа существующих систем определена теоретическая вероятность индикации потока семян датчиками высева при известной вероятности регистрации семян датчиком и известной интенсивности потока λ . Эта вероятность описывается формулой Пуассона:

$$P_k(t) = \frac{(p\lambda t)^k}{k!} e^{-p\lambda t}, \quad (1)$$

где k – количество семян, пролетевших в зоне датчика. Интервалы между сигналами датчика распределены по показательному закону с параметром $p\lambda$.

Для вычисления вероятности p регистрации семян датчиками высева использовано условие равномерности распределения семян по поперечному сечению семяпровода и понятие геометрической вероятности. Искомая вероятность равна:

$$p = \frac{2l_{\text{сем}}}{1,7\pi R}, \quad (2)$$

где $l_{\text{сем}}$ – длина периметра семени, R – радиус сечения семяпровода. Вероятность индикации потока семян датчиками высева зависит от интенсивности семенного потока λ , геометрических размеров семян и семяпровода. На основе теоретических исследований получена формула оценки качества контроля нормы высева. Относительная среднеквадратичная погрешность нормы высева для катушечных аппаратов равна:

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{10^4}{kH} \left[\frac{\pi}{2} c^2 (n - k) + \frac{n}{l_p(1-\eta)} \right]}. \quad (3)$$

Эта погрешность зависит от нормы высева H , числа k -контролируемых высевающих аппаратов и отрезка пути l_p , на котором производятся измерения, числа высеваемых каналов n , задан-

ного отклонения от нормы высева c . Задавшись допустимой погрешностью $\varepsilon \leq \varepsilon_1$, из формулы (3) можно определить выражение $1p$.

$$1p \geq n / \{ (1-\eta) [\varepsilon^2 kH / 10^4 - \frac{\pi}{2} c^2 (n - k)] \}. \quad (4)$$

Анализ этого выражения показывает, что существует определенное критическое значение числа датчиков высева k , устанавливаемых на сеялке, опускаясь ниже которого, нельзя обеспечить требуемую точность измерений нормы высева [12].

В соответствии с вышеизложенными зависимостями определим, что для полевых экспериментов на каждый семяпровод зерновой сеялки СЗС-2,1 будет установлен датчик высева семян, соединенный с остальными кабелем для передачи информации о процессе высева от датчиков на монитор. Кабельная разводка при этом объединяется в одном разъеме с трехпиновым брызгозащищенным контактом. Для проведения исследований в полевых условиях на сеялку СЗС-2,1 установлен 19-пиновый разъем (9 подсоединяются к датчикам на семяпроводах, 1 – к датчику пути и 1 – резервный). Для облегчения монтажа применена технология изготовления печатных плат.

Для передачи данных о состоянии семяпроводов зерновой сеялки используется интерфейс RS 485. Его преимущество заключается в возможности объединения несколько устройств. Также дополнительно установлен резистор R_5 на 120 Ом. Его функция заключается в смещении сигнала для защиты приемников от ложных срабатываний.

Данные о параметрах работы системы выводятся на планшет, установленный в кабине трактора. Положение трактора определяется при помощи антенны ГЛОНАСС/GPS самого планшета. Пролет семян регистрируется при помощи датчиков высева семян. Через адаптер токовой петли информация с дискретных датчиков по интерфейсу RS 485 поступает в Bluetooth-устройство и

на планшет. Вращение вала высевающего аппарата, а также скорость движения трактора в случае выхода из строя GPS контролируются датчиком пути/вращения, который предназначен для определения частоты вращения высевающего аппарата при пробуксовке, заклинивании и об-

рыве цепи. При возникновении перечисленных неисправностей подается сигнал в виде моргающего света и звукового сигнала. Датчик устанавливается на колесе сеялки или на валу, соединенном с высевающим диском. Экран планшета при работе представлен на рисунке 3.

Рисунок 3
Экран планшета при работе

В процессе работы система выводит на экран планшета следующую информацию:

- об отсутствии вращения вала высевного агрегата;
- о снижении уровня посевного материала и/или удобрений в бункерах сеялки;
- о номере опрашиваемого датчика пролета семян;
- о номере неисправного датчика пролета семян;
- о номере «забившегося» сошника;
- об относительном потоке семян/удобрений в каждом семяпроводе;
- количество отработанных мото-часов в режиме «высев».

При нарушении технологического процесса высева (остановка высевающего аппарата, прекращение подачи им семян, забивание семяпровода или сошника) в каком-либо семяпроводе соответствующая лампочка на пульте перестает мигать и включается звуковой сигнал, оповещающий тракториста о неисправности.

Приборы питаются от аккумуляторной батареи трактора (12 В) и потребляют ток не более 2А. Разработанная программа обработки информации от датчиков реализована в среде C+. На нее получено свидетельство о регистрации полезной модели.

Разработанное устройство опробовано при посеве посевным агрегатом из 5 сеялок СЗС-2,1

в условиях предприятия ООО ПЗ Валиева Республики Башкортостан (рисунок 4).

Испытания проведены в соответствии с ГОСТом [9] и частными методиками [10]. В 2019 году посеяно более 500 га озимой пшеницы сорта Башкирская 10 и Волжская К. Скорость работы посевного комплекса изменялась от 8 до 12 км/ч. Система сработала более 100 раз по различным причинам (рисунок 5).

Также наблюдалась тенденция забивания в зависимости от скорости движения сеялки (рисунок 6). При оснащении данной системой зерновых сеялок отпала необходимость остановки и профилактической очистки семяпроводов в конце каждого гона. Это привело к снижению временных затрат на 3–5 минут на каждом гоне, что в среднем дало экономию времени и соответственно повышение производительности агрегата на 22 %.

При проведении посева без визуализации результатов работы другого агрегата той же марки и при таких же условиях пустые просевы составили примерно 8 % засеваемых площадей. В период испытаний с использованием системы контроля высева семян выявлены три производственных отказа второй группы сложности (нарушение целостности датчика, обрыв провода).

Результаты работы сеялок с системой контроля и без них представлены в таблице 1.

Кабель

а

Датчик

б

Рисунок 4

Система контроля высева семян: а – кабельная разводка, б – датчик пролета семян

Рисунок 5

Основные причины забивания семяпровода

Рисунок 6

Основные причины забивания семяпроводов в зависимости от скорости движения сеялки

Таблица 1 Сравнение посевных агрегатов

Показатель	Ед. изм.	Без СКВ	С системой контроля
Стоимость СКВ	руб.	–	28,1
Урожайность	т/га	3,1	3,5
Цена реализации	руб./т	8000	
Работа за сезон	час	150	
Дополнительная продукция за сезон	руб.	–	198000

При ориентировочной стоимости разработанной системы не более 28,1 тыс. рублей си-

стема окупится за один – два дня. Система может устанавливаться на любой посевной ком-

плекс или сеялку и позволяет проводить посевную кампанию со 100 % плотностью высева.

На базе студенческого конструкторского бюро и опытно-конструкторского участка инженерингового центра Башкирского ГАУ продолжается разработка вышеприведенных систем с дальнейшим уклоном на автоматизацию управления работы машин. Электронный блок управления применим и при дифференцированном внесении удобрений. В настоящее время получены заявки и готовятся к монтажу 6 комплектов оборудования в хозяйства Илишевского и Дюртюлинского районов Республики Башкортостан, системы проходят тестирование на виброустойчивость, а также на устойчивость к температурным и гидрохимическим воздействиям.

Выводы. В результате исследований проведен анализ существующих систем контроля вы-

сева, определены их достоинства и недостатки. Проведен анализ перспективных решений систем контроля высева, благодаря которому можно увеличить производительность труда и сократить процесс высева.

Разработанная система контроля предназначена для установки на зерновых сеялках с общим количеством сошников до 45 штук и диаметром семяпроводов от 28 до 31 мм.

При установке предлагаемой системы экономическая выгода за счет равномерности высева и экономии времени составит до 198 тыс. руб. с одной зерновой сеялки. Период окупаемости составит 1–2 рабочих дня.

Общее количество зерновых сеялок в Республике Башкортостан, на которых необходимо установить данную систему, составляет более 1000 единиц.

Библиографический список

1. Астахов, В.С. Принципиально новые распределители семян [Текст] / В.С. Астахов, А.С. Сентюров // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 1994. № 10.
2. Астахов, В.С. Анализ пневматических централизованных высевающих систем [Текст] / В.С. Астахов // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 1997. № 10.
3. Вожик, Ю.Г. Влияние формы выпускного патрубка пневматического аппарата на качество рассева сыпучих минеральных удобрений [Текст] / Ю.Г. Вожик // Механизация и электрификация сельского хозяйства. Киев: Урожай, 1970. Вып. 4.
4. Навигационные технологии в сельском хозяйстве. Координатное земледелие [Текст] / В.И. Балабанов, С.В. Железова, Е.В. Березовский, А.И. Беленков, В.В. Егоров. М.: РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 2013. 148 с.
5. Вуколов, Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTIKA и EXCEL [Текст]: учебное пособие / Э.А. Вуколов. 2-е изд., испр. и доп. М.: ФОРУМ, 2008. 464 с.
6. Мударисов, С.Г. Обоснование конструктивно-технологических параметров горизонтального распределителя пневматической сеялки [Текст] / С.Г. Мударисов, А.В. Шарафутдинов // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2019. № 1 (49). С. 133–139.
7. Обоснование параметров пневматической системы транспортирования семян и удобрений почвообрабатывающего посевного агрегата [Текст] / З.С. Рахимов, Н.Т. Хлызов, И.Р. Рахимов, Д.В. Сидорченко, А.Н. Галимов // АПК России. 2017. Т. 24. № 1. С. 91–104.
8. Пятаев, М.В. К вопросу о моделировании процесса распределения семян распределителем пневматической зерновой сеялки [Текст] / М.В. Пятаев, А.П. Зырянов, Н.А. Кузнецов // Вестник КрасГАУ. 2014. № 9. С. 177–182.
9. Пятаев, М.В. Результаты теоретического исследования процесса распределения посевного материала вертикальным распределителем при работе агрегата на склонах [Текст] / М.В. Пятаев // АПК России. 2017. Т. 24. № 2. С. 431–436.
10. Мазитов, Н.К. Полевая всхожесть семян и зимостойкость растений при различных способах предпосевной обработки почвы и сева [Текст] / Н.К. Мазитов, Р.Л. Сахапов, О.Л. Шайтанов, Н.Э. Гарипов, Р.С. Багманов, Л.З. Шарифиев // Достижения науки и техники АПК. 2009. № 3. С. 23–24.
11. Mazitov N.K., Lobachevsky Ya.P., Dmitriev S.Yu., Sakhapov R.L., Sharafiev L.Z., Rakhimov I.R. Upgraded technology and equipment for soil processing and sowing in extreme conditions. J. Russian Agricultural Sciences. 2015. Т. 41. Р. 79.
12. Молофеев, В.Ю. Повышение эффективности функционирования высевающих систем зерновых сеялок посредством создания устройств контроля качества их работы [Текст]: автореф. дис. ... канд. техн. н. / В.Ю. Молофеев. Санкт-Петербург – Пушкин, 2004. 16 с.
13. Чичкин, В.П. Овощные сеялки и комбинированные агрегаты. Теория, конструкция, расчет [Текст] / В.П. Чичкин. Кишинев: Штиинца, 1984. 392 с.

1. **Галлямов Фаил Наилович**, кандидат технических наук, доцент кафедры строительных, дорожных, коммунальных и сельскохозяйственных машин, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: galfail@mail.ru.

2. **Шарафутдинов Азат Вилевич**, кандидат технических наук, доцент кафедры строительных, дорожных, коммунальных и сельскохозяйственных машин, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: meh-fak@yandex.ru.

3. **Пятаев Максим Вячеславович**, кандидат технических наук, доцент кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка, Южно-Уральский государственный аграрный университет, 457100, Челябинская область, город Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, 13, e-mail: 555maxim@mail.ru.

Исследования направлены на разработку системы контроля высева семян для зерновых сеялок. В исследовании выполнен анализ имеющихся технических средств и обоснованы конструктивно-технологические параметры системы контроля высева, изготовлена производственная установка и проведены полевые испытания.

Для реализации программной части системы контроля была использована среда визуального моделирования Ratal Rose. Это позволило разработать алгоритм сбора и отображения данных, на основе которого было разработано программное обеспечение.

Для создания 3D-модели датчика и уточнения его параметров использовалась программа

Компас, на основе которой корпус датчика был изготовлен на 3D-принтере.

Полевые опыты проводились при сравнении 2 одинаковых сеялок с идентичными условиями. Экономия времени и повышения производительности на агрегате, где использовалась система контроля, составило 22 %.

Полученные результаты позволили разработать программное обеспечение для системы и определить оптимальные конструктивно-технологические параметры датчика контроля высева семян зерновой сеялки с целью снижения забивания семяпроводов и повышения качества распределения семян.

F. Gallyamov, A. Sharafutdinov, M. Pyataev

DEVELOPMENT OF SEEDING CONTROL SYSTEMS FOR GRAIN DRILLS AND SOWING MACHINES

Key words: *sowing machines; seed distribution; seeding control system; seeding quality; inductive sensor.*

Authors' personal details

1. **Fail Gallyamov**, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Construction, Road, Communal and Agricultural Machines, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, e-mail: galfail@mail.ru.

2. **Azat Sharafutdinov**, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Construction, Road, Communal and Agricultural Machines, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, e-mail: meh-fak@yandex.ru.

3. **Maxim Pyataev**, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Operation of Machine and Tractor Park, South Ural State Agrarian University, 457100, Chelyabinsk region, Troitsk, Y.A. Gagarin St., 13, e-mail: 555maxim@mail.ru.

The paper discusses technical aspects involved in developing seeding control systems for grain seeders and sowing machines. Construction and technological parameters of seeding control systems are based on the analysis of the available machinery. As a result an operation-performing unit was con-

structed and tested in field trials. The RatalRose visual simulation environment was used to design the software of the seeding control system. The environment allowed for interpreting the volume concentration of particles. A procedure for collecting and presenting data was developed. COMPAS com-

puter program was used to create a 3D design of the sensor and measure its parameters, then the sensor case was made using a 3D printer.

Field trials involved comparing 2 identical drills under identical conditions. The drill equipped with the seeding control system had better indices of time saving and efficiency (by 22 %). The study results

allowed us to develop the software for the seeding control system and determine the optimal design and process parameters of the seeding control sensor for a pneumatic drill in order to reduce clogging in the seed pipes and improve the quality of seed distribution.

© Галлямов Ф.Н., Шарафутдинов А.В., Пятаев М.В.

УДК 631.171:621.311

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-107-112

А.И. Некрасов, А.А. Некрасов

КОНТРОЛЬ НАГРЕВА ОБМОТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Ключевые слова: *электродвигатель; контроль нагрева; обмотка статора; гнездо рым-болта; защитное устройство.*

Введение. За прошедшее время изменились организационная форма, структура и экономическая основа сельскохозяйственного производства, оснащение электрифицированной техникой и оборудованием сельхозпредприятий, фермерских и крестьянских хозяйств, появились новые серии электродвигателей и виды электрооборудования, требующие инновационных подходов и методов обслуживания с контролем технического состояния ресурсообразующих элементов и узлов [1]. В сельскохозяйственном производстве асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором (ЭД) являются основным видом привода стационарного технологического оборудования и машин. Более половины от общего числа ЭД работают в неблагоприятных условиях, поэтому свыше 80 % их отказов приходится на пробой изоляции и сгорание обмотки статора. Отказы электродвигателей приводят к нарушениям технологических процессов и простою технологического оборудования, что сопровождается снижением качества, недопроизводством или значительными потерями сельскохозяйственной продукции и значительными экономическими ущербами [2]. Для повышения эксплуатационной надежности сельских электроустановок необходим комплексный подход к решению общей задачи совершенствования системы технического обслуживания и ремонта электрооборудования сельхозпредприятий, обеспечивающей снижение эксплуатационных затрат и увеличение выпуска сельхозпродукции.

Цель и задачи исследования – повышение эксплуатационной надежности сельских элект-

роустановок и эффективности использования электрооборудования сельхозпредприятий за счет совершенствования системы технического обслуживания и применения инновационного метода контроля теплового состояния обмотки статора электродвигателей, установление количественной связи между фактической температурой нагрева обмотки и температурой нагрева корпуса электродвигателя в непосредственной близости от обмотки.

Условия, материалы и методы. Основной характеристикой изоляции является электрическая прочность, зависящая от ряда других качеств, снижение уровня которых приводит к ее уменьшению. Изоляция должна сохранять высокую теплопроводность для работы при возникновении и повышенных местных нагревов, сопровождающихся ускоренным ее разрушением. Необратимые отрицательные изменения структуры и химического состава изоляции, происходящие под воздействием неблагоприятных эксплуатационных факторов, называют старением, а процесс ухудшения свойств изоляции в результате старения называют износом. Одним из основных факторов, определяющих срок службы изоляции ЭД, является тепловое старение [3, 4].

Различают понятия теплоустойчивости и нагревостойкости. Теплоустойчивостью называют способность электроизоляционного материала сохранять свои свойства на определенном уровне при относительно кратковременном повышении до определенного уровня нагрева. Материал не должен при этом разрушаться и расслаиваться, изменять свой химический состав, не должно возникать значительных пластичес-

ких деформаций, вытекания или разрушения связующих компонентов. Нагревостойкость характеризует способность материала без существенного ухудшения характеристик выдерживать воздействие предельно допустимой для данного типа изоляции температуры в течение срока службы ЭД и при обусловленных величинах других эксплуатационных воздействий. Для практических целей нагревостойкость служит более важной характеристикой изоляции, поэтому именно она положена в основу классификации электроизоляционных материалов. К важному фактору износа и старения изоляции относятся термомеханические нагрузки, возникающие в результате сменяющихся нагревов и охлаждений обмоток, что весьма распространено в сельскохозяйственном производстве. В обмотках позволяют механические напряжения, обусловленные периодическими изменениями температуры из-за переменной загрузки рабочих машин (от холостого хода до перегрузки). Определенную роль в процессе разрушения изоляции играют термомеханические явления, связанные с различием коэффициентов теплового расширения изоляции и проводниковых материалов. Они приводят к образованию в изоляции трещин, разбуханию, расслоению и взаимному смещению отдельных ее слоев. Термомеханические процессы активизируются при работе ЭД в форсированных режимах и при частых переходных процессах (например, повторно-кратковременных режимах работы, реверсах), сопровождающихся тепловыми ударами [5, 6].

Результаты исследования. При работе электрифицированной техники довольно часто наблюдается перегрузка ЭД, обрыв фазы из-за повышенной вибрации, ухудшение охлаждения вследствие загрязнения или заваливания обрабатываемым материалом, заклинивания ротора. Основным показателем приближающейся аварии служит чрезмерное повышение температуры обмотки и соответственно корпуса ЭД. Современные ЭД изготавливаются в целях экономии активных материалов (в первую очередь меди), с высоким заполнением паза проводниками, что снижает устойчивость обмотки к перегреву и повышает требования к защите от вызывающих его режимов.

Недостатком типовых защит является несоответствие превышений номинального тока в обмотках статора ЭД температуре их нагрева. Например, перегрев обмоток часто происходит от ухудшения обдувания корпуса при сильном загрязнении и перекрытии вентиляционных каналов, повреждений вентилятора, завале ЭД технологическим материалом (кормом, соломой,

травой, навозом и др.). В этом случае даже при номинальном значении тока ЭД температура нагрева обмоток может превысить допустимые значения, а исправная защита не сработает. Для повышения надежности защиты выпускают ЭД со встроенными в лобовую часть обмотки термодатчиками (позисторами), которые подают сигнал на отключение ЭД при чрезмерном повышении температуры [6]. Но температура срабатывания позисторов в значительной мере зависит от точности соблюдения инструкции по их установке. Кроме того, требуется прокладка дополнительных проводов для их связи с исполнительным блоком и магнитным пускателем. Это усложняет конструкцию, увеличивает стоимость и трудозатраты, снижает надежность защиты. К тому же замена вышедших из строя термодатчиков в условиях эксплуатации невозможна. Ремонт отказавших ЭД, особенно большой мощности, весьма затруднителен ввиду отсутствия в сельской местности требуемым образом оснащенных ремонтных предприятий и низкой квалификации их персонала. Стоимость капитального ремонта ЭД приближается к цене нового электродвигателя, а качество ремонта соответствует восстановлению ресурса на 60–70 % [3].

В существующих условиях целесообразны разработка и внедрение в практику простых, дешевых и доступных сельским электрикам методов и технических средств, позволяющих контролировать состояние электродвигателей в процессе их эксплуатации. Одним из таких методов является контроль степени нагрева обмоток ЭД посредством измерения температуры его корпуса. Например, состояние подшипниковых узлов оценивают измерением их температуры (максимальная рабочая температура не должна превышать температуры окружающего воздуха более чем на 45–50 °С, при этом абсолютное ее значение – не более 80 °С).

Температуру электродвигателей можно измерять тепловизорами TESTO 875-2, Guide BritIR B0, термометрами СП-2К, термопреобразователями сопротивления ТСМ, ТСР, ТДВ, термопарами типа ТХА, ТХК, ТПП, ДТПЛ015 00 60, J (Fe-CuNi), с диапазоном измерения температур до +250–500 °С, или другими средствами отечественного и зарубежного производства.

Для дистанционного контроля температуры наружного нагрева и выявления неисправностей в работе электродвигателей удобными в применении являются тепловизоры с диапазоном измеряемых температур до +500 °С, которые позволяют осуществлять обследование, не прерывая рабочий процесс, при доступной стоимости

и высоком уровне безопасности персонала. Повысить эффективность и сократить затраты времени на проверки позволят тепловизоры для электрооборудования с заданной функцией температурной сигнализации. Использование термометров в данном случае не обеспечивает нужной точности измерения температуры обмоток статора электродвигателей из-за влияния обтекающего корпус электродвигателя потока воздуха, изменяющего результаты измерения.

Для повышения точности и безопасности измерения предложен метод эксплуатационного контроля температуры обмотки статора проведением замеров температуры в полости гнезда для рым-болта в корпусе электродвигателя. Эта зона выбрана, во-первых, из удобства доступа на большинстве рабочих машин; во-вторых, вывернув временно рым-болт, можно наиболее достоверно измерить температуру стали (поскольку в глубине гнезда рым-болта отсутствует движение воздуха); в-третьих, появляется возможность использования датчиков или сигнальных устройств, выполненных с возможностью ввертывания их в гнездо рым-болта.

Для применения данного метода на практике необходимо определить количественную связь между фактическими температурами нагрева лобовых частей обмотки и корпуса электродвигателя в гнезде рым-болта. С данной целью были проведены исследования ряда электродвигателей серий 4А и АИР различной мощности и частоты вращения [6]. В результате анализа выявлена возможность объединения ЭД разных типов в две группы, для каждой из которых определено значение коэффициента K_T , равного отношению фактической температуры лобовых частей обмотки к фактической температуре внутренней поверхности гнезда рым-болта.

Установлено, что для электродвигателей с частотой вращения 1000 и 750 с^{-1} целесообразно использовать коэффициент $K_T = 1,4$, а для электродвигателей с частотой вращения 3000 и 1500 с^{-1} – коэффициент $K_T = 1,7$, $K_T = K_{\text{обм}} / K_{\text{корп}} = 1,4-1,7$. Путем измерения температуры корпуса ЭД в гнезде рым-болта и умножением полученного результата на соответствующее значение K_T получают величину фактического нагрева обмотки в наиболее нагреваемой части. Итоговый результат сравнивают с предельно допустимой температурой нагрева изоляции соответствующего класса и делают выводы о степени нагрева ЭД. По стандарту Международной электротехнической комиссии, максимальная длительно допустимая температура нагрева изоляции классов В и F составляет 130 и 155 $^{\circ}\text{C}$ [7]. Обмотка ЭД серий 4А и АИР, у которых высота

оси вращения равна 50...132 мм, имеет класс нагревостойкости В или F, а при высоте 160...200 мм – F. В электродвигателях сельскохозяйственного и специального назначения изоляцию класса F зачастую стараются использовать по требованию В, тем самым создавая тепловой запас.

Исходя из полученных данных, составлены технические требования на устройство эксплуатационного контроля нагрева и защиты электродвигателей. Эти устройства могут состоять из двух блоков (универсального съемного исполнительного органа и датчика температуры), помещаемых в нижнюю часть полого стального болта нужного диаметра, либо представлять собой единый съемный прибор. Вворачиваемое основание должно иметь номер резьбы (по ГОСТ 7751-73) М8 для ЭД, у которых высота оси вращения равна 90, 100 и 112 мм, М10 – для 160 мм и М20 – для 180, 200 и 225 мм. С увеличением мощности защищаемого ЭД возрастает диаметр гнезда его рым-болта и соответственно диаметр вворачиваемой части устройства, что улучшает теплообмен и условия для более точного измерения температуры.

Устройство может быть изготовлено с электропитанием от клеммной коробки ЭД, от малогабаритного аккумулятора либо от специального блока питания, использующего электромагнитное поле самого защищаемого ЭД. Устройство срабатывает с подачей светового, звукового сигнала либо сигнала на отключение ЭД от электрической сети, а также контролирует температуру непрерывно или путем периодического ее измерения. На рисунке представлена общая схема устройства контроля нагрева и защиты электродвигателя [8, 9].

Рисунок 1
Схема устройства контроля нагрева и защиты электродвигателя

Устройство содержит полый металлический болт 1 с головкой под гаечный ключ, вворачиваемый в гнездо рым-болта электродвигателя 3, соединенного валом с рабочей машиной. Внутри нижней части полого металлического болта 1 установлен термодатчик 2, соединенный с усилителем 4, имеющим автономный источник блока питания 5. К выходу усилителя 4 подключен вход сигнального блока 6, имеющего датчик 7. К выходу сигнального блока 6 подключен индикатор-светодиод 8, звуковой генератор-зуммер 9 и отключающее устройство 10, соединенное с магнитным пускателем 11, который управляет работой электродвигателя 3. Датчиком 7 задают порог срабатывания сигнального блока 6, учитывающий значение предельно допустимой температуры перегрева обмотки защищаемого электродвигателя для данного класса изоляции, создают необходимый температурный запас. При помощи сигнального блока, светодиода, зуммера подают световой и звуковой сигналы, свидетельствующие о возникновении аварийной ситуации по причине нагрева обмоток выше допустимого значения и необходимости принятия срочных мер по ликвидации аварийной ситуации с отключением электродвигателя от сети. Термодатчик 2, установленный в торце полого болта 1, плотно прилегает к сердечнику электродвигателя, в пазах которого расположена обмотка статора, и контролирует их температуру. Для улучшения теплопроводности в местах контакта соединяемые части покрывают теплопроводящей пастой.

Измерение и контроль температуры статора электродвигателя осуществляется в зоне гнезда рым-болта, где нет обдувающего движения потока воздуха, воздействующего на показания термодатчика. Гнездо рым-болта – это предусмотренное технологией и временно не используемое в процессе работы электродвигателя наиболее близкое место доступа к обмотке, удобное для установки датчиков и других устройств, изготовленных с возможностью ввертывания.

Все элементы электрической схемы устройства смонтированы на печатной плате и вместе с малогабаритным аккумулятором, светодиодом, зуммером и отключающим устройством помещены в теплоустойчивый, герметичный пластиковый корпус, прочно соединенный с металлической вворачиваемой частью, выполненной в виде полого болта с гайкой под ключ, и представляет собой один съемный узел эксплуатационного контроля нагрева и защиты электродвигателя, который удобно применять для визуального и звукового контроля обслуживающим

персоналом степени нагрева электродвигателей, а также может быть эффективным его использование с действием на отключение. Разработан экспериментальный образец устройства с питанием от клеммной коробки электродвигателя. Диапазон контролируемых температур 20...200 °С [6].

В сельскохозяйственном производстве разработанное устройство следует применять для эксплуатационного контроля нагрева и защиты электродвигателей мощностью 11 кВт и более, задействованных в технологических процессах, не допускающих внезапных перерывов, связанных с потерей продукции и большими материальными ущербами. Постоянно обновляемая информация о температурном состоянии обмоток статора электродвигателей позволяет персоналу своевременно принимать необходимые меры по устранению аварийных ситуаций в системе электроприводов технологического оборудования.

Выводы. Разработан новый метод эксплуатационного контроля нагрева и защиты обмоток статора электродвигателей, основанный на измерении и контроле температуры корпуса электродвигателя в зоне гнезда рым-болта. Установлена количественная связь между фактической температурой нагрева обмотки $T_{обм}$ и температурой нагрева корпуса $T_{корп}$ электродвигателя в непосредственной близости от обмотки, где нет обдувающего движения потока воздуха, воздействующего на показания термодатчика. Установлена зависимость соотношения температур обмотки статора электродвигателя и его корпуса и определено значение коэффициента $K_T = K_{обм} / K_{корп} = 1,4–1,7$. Измеренное значение температуры корпуса электродвигателя $T_{корп}$ умножают на соответствующее значение K_T и получают фактическое значение температуры нагрева обмотки $K_{обм}$. Вворачиваемое в гнездо рым-болта устройство удобно применять для визуального и звукового контроля степени нагрева электродвигателя или с действием на отключение его от сети.

В сельскохозяйственном производстве метод и устройство наиболее целесообразно применять для контроля и защиты относительно мощных электродвигателей, задействованных в технологических процессах, не допускающих внезапных перерывов и связанных с потерей продукции и большими материальными ущербами. Постоянно имеющаяся информация о температурном состоянии обмоток статора электродвигателей позволяет персоналу своевременно принимать необходимые меры по устранению аварийных ситуаций и предотвращению преждевременного выхода электродвигателей из строя.

Библиографический список

1. Энергетическая стратегия сельского хозяйства России на период до 2020 года [Текст]. М.: ГНУ ВИЭСХ, 2009. 64 с.
2. Система планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных предприятий [Текст]. М.: Агропромиздат, 1987. 187 с.
3. Сырых, Н.Н. Теоретические основы эксплуатации электрооборудования [Текст] / Н.Н. Сырых, Н.Е. Кабин. М.: Агробизнесцентр, 2007. 514 с.
4. Гольдберг, О.Д. Испытания электрических машин [Текст] / О.Д. Гольдберг. М.: Высшая школа, 2000. 255 с.
5. Мусин, А.М. Аварийные режимы асинхронных электродвигателей и способы их защиты [Текст] / А.М. Мусин. М.: Колос, 1979. 112 с.
6. Борисов, Ю.С. Эксплуатационный контроль нагрева обмотки электродвигателя. Энергетика, электрификация и автоматизация технологических процессов защищенного грунта [Текст] / Ю.С. Борисов // Сб. научн. тр. ВИЭСХ. 1992. Т. 79.
7. Стандарт МЭК 34-11, ч. 2. Правила защиты вращающихся электрических машин [Текст]. М.: Изд-во стандартов, 1982.
8. Патент РФ № 2 409 884. Способ эксплуатационного контроля нагрева и защиты электродвигателей [Текст] / А.И. Некрасов, А.А. Некрасов, Ю.С. Борисов и др. БИ № 2, 2011.
9. Патент РФ на полезную модель № 90942. Устройство эксплуатационного контроля нагрева и защиты электродвигателей [Текст] / А.И. Некрасов, А.А. Некрасов, Ю.С. Борисов, Н.Н. Сырых. Оpubл. в БИ № 2, 2010.

Сведения об авторах

1. **Некрасов Алексей Иосифович**, ORCID: 0000-0001-6141-984X, доктор технических наук, главный научный сотрудник лаборатории электроснабжения и теплообеспечения, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение федеральный научный агроинженерный центр «Всероссийский институт механизации» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), 109428, Россия, г. Москва, 1-й Вешняковский проезд, 2, e-mail: nalios@mail.ru.
2. **Некрасов Антон Алексеевич**, ORCID: 0000-0001-5816-8939, кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории электроснабжения и теплообеспечения, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральное научное агроинженерное учреждение «Всероссийский институт механизации» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), 109428, Россия, г. Москва, 1-й Вешняковский проезд, 2, e-mail: nalios@mail.ru.

Надежность работы асинхронных электродвигателей зависит от состояния изоляции их обмоток, которое обусловлено степенью нагрева в процессе эксплуатации. Аварийные режимы работы электродвигателей сопровождаются превышением допустимой температуры нагрева обмоток. Типовые защиты по ряду причин во многих случаях не защищают обмотки от таких режимов, поэтому до 80 % отказов электродвигателей в сельском хозяйстве приходится на перегорание обмоток статора. Для совершенствования защиты обмоток от аварийных режимов разработан метод эксплуатационного контроля нагрева и защиты электродвигателей, основанный на измерении и контроле температуры корпуса электродвигателя в зоне гнезда рым-болта. Установлена количественная связь между фактической температурой нагрева обмотки $T_{обм}$ и температурой нагрева корпуса $T_{корп}$ электродвигателя в непосредственной близости от обмотки. В гнезде рым-болта отсутствует обдувающее движение потока воздуха, воздействующего на показания термодатчика. Установлена зависимость соотношения температур и

определено значение коэффициента $K_T = K_{обм} / K_{корп} = 1,4...1,7$. Измеренное значение температуры корпуса электродвигателя $T_{корп}$ умножают на соответствующее значение K_T и получают фактическое значение температуры нагрева лобовых частей обмотки $K_{обм}$. Вворачиваемое в гнездо рым-болта устройство удобно применять для визуального и звукового контроля обслуживающим персоналом степени нагрева электродвигателей. Может быть также эффективным использование устройства с его действием на отключение. Постоянно обновляющаяся информация о температурном состоянии обмоток статора электродвигателей позволяет персоналу своевременно принимать необходимые меры по устранению аварийных ситуаций и предотвращению преждевременного выхода электродвигателя из строя. В сельскохозяйственном производстве устройство наиболее целесообразно применять для контроля относительно мощных электродвигателей, задействованных в технологических процессах, не допускающих внезапных перерывов и связанных с потерей продукции и большими материальными ущербами.

ELECTRIC MOTOR WINDING HEATING CONTROL

Key words: *electric motor; heating control; stator winding; eyebolt socket; protective device.*

Authors' personal details

1. **Aleksey Nekrasov**, ORCID: 0000-0001-6141-984X, Doctor of Technical Sciences, chief researcher of the laboratory of power supply and heat supply, Federal scientific engineering center «All-Russian Institute of mechanization», 109428, 1st Veshnyakovsky proezd, 2, Moscow, Russia, e-mail: nalios@mail.ru.

2. **Anton Nekrasov**, ORCID: 0000-0001-5816-8939, Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher of the laboratory of power supply and heat supply, Federal scientific engineering center «All-Russian Institute of mechanization», 109428, 1st Veshnyakovsky proezd, 2, Moscow, Russia, e-mail: nalios@mail.ru.

The asynchronous motors reliability depends on the insulation state of their windings, which is due to the degree of heating during operation. The emergency operation of electric motors is accompanied by exceeding the permissible temperature of heating the windings. Specific protections, for several reasons, in many cases, do not protect the windings from such modes. Therefore up to 80 % of motor failures in agriculture are due to burnout of the stator windings. The method for operational monitoring of heating and motor protection based on measuring and monitoring the temperature of the motor housing in the area of the eyebolt socket has been developed to improve the protection of the windings from emergency conditions. A quantitative relationship has been established between the actual heating temperature of the T_{wind} winding and the heating temperature of the motor housing T_{corp} near the winding. There is no airflow in the eyebolt socket that affects the readings of the temperature sensor. The dependence of the temperature ratio is estab-

lished, and the coefficient $C_t = C_{wind} / C_{corp} = 1,4 \dots 1,7$ is determined. The measured value of the temperature of the motor housing T_{corp} is multiplied by the corresponding value of the C_t , and the actual values of the heating temperature of the frontal parts of the coil C_{wind} are obtained. The device, screwed into the eyebolt socket, is conveniently used for visual and sound control by maintenance personnel of the degree of heating of electric motors. Using the device with its shutdown effect may also be useful. Always available information about the temperature state of the stator windings of electric motors allows personnel to take timely necessary measures to eliminate emergencies and prevent premature motor failure. In agricultural production, the device is most suitable for monitoring relatively powerful electric motors involved in technological processes that do not allow sudden interruptions and are associated with loss of products and extensive material damage.

© Некрасов А.И., Некрасов А.А.

УДК 631.171:621.311

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-112-119

А.И. Некрасов, А.А. Некрасов

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ОТКАЗОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Ключевые слова: *техническое обслуживание электрооборудования; отказы электродвигателей; технический ущерб; показатели эффективности; оборудование животноводческих ферм.*

Введение. Совершенствование системы эксплуатации электрооборудования позволит увеличить срок службы электрооборудования, сократить материальные затраты на приобретение нового и ремонт отказавшего электрооборудования,

а также снизить возникающие технологические ущербы сельскохозяйственных предприятий. Отказ электродвигателя вызывает экономический ущерб, состоящий из технологической и технической составляющих, возникших

от недовыпуска животноводческой продукции и от замены электродвигателя. За прошедшее время изменились организационная форма, структура и экономическая основа сельскохозяйственного производства, оснащение электрифицированной техникой и оборудованием сельхозпредприятий, фермерских и крестьянских хозяйств, выпуском новых видов электрооборудования, в том числе электродвигателей и магнитных пускателей. Издана новая Система машин и технологий для комплексной механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства на период до 2020 года (в России). Оценка ущербов от отказов электрооборудования в животноводстве основывается на ранее проводимых работах по определению ущербов, наносимых сельскохозяйственному производству при отключении электроэнергии и при отказах электрооборудования [1–3].

Методическая основа исследования. При оценке ущербов необходим комплексный подход к решению общей задачи повышения эксплуатационной надежности сельских электроустановок на основе использования информации по ущербам от отказов электроприводов технологического оборудования. Для применения в работе электротехнических служб сельхозпредприятий необходим удобный для расчета способ оценки ущербов без использования малозначащих составляющих, содержащий современный справочный материал по электрооборудованию и сельхозпродукции, удобный в пользовании специалистами сельхозпредприятий. При отказе электродвигателя останавливается механизм или машина, на которой установлен данный двигатель, при этом возникающий ущерб в большей степени зависит от времени простоя рабочей машины. Большинство электродвигателей при выходе из строя не восстанавливают на месте, а отправляют на капитальный ремонт на специализированное предприятие, а на рабочую машину устанавливают резервный электродвигатель. При этом отказавший двигатель отправляют в ремонт не сразу, а при накоплении в хозяйстве до 10–15 штук для отправки на ремонтное предприятие, находящееся на значительном расстоянии от сельхозпроизводителя. На большинстве ремонтных предприятий обычно имеются обменные фонды, сокращающие время нахождения двигателей в ремонте. Ремонтное предприятие принимает неисправные двигатели и выдает отремонтированные в том же количестве, из числа которых в хозяйстве создают резервный фонд [4–7].

Ущерб от замены аварийно отказавшего электродвигателя состоит из затрат на демонтаж-монтаж и цены нового электродвигателя или стоимости его капитального ремонта. Также размер ущерба связан с мощностью, размерами и массой, конструкцией и способом установки на разных машинах, с различными условиями эксплуатации, включая удобство демонтажа-монтажа. Поэтому однозначная оценка объема и условий работы электромонтеров с электродвигателем конкретного типа или мощности для расчетов на один аварийно отказавший электродвигатель невозможна. Также предполагается, что при современных условиях эксплуатации электродвигателей приблизительная средняя величина технической составляющей ущерба, обусловленной преждевременным ремонтом или списанием двигателя, может находиться в пределах половины его цены. Более точный технический ущерб от отказа электродвигателя может рассчитываться по-разному, в зависимости от этого заменяют отказавший на электродвигатель на новый или капитально отремонтированный с использованием исправных элементов, или электродвигатель подвергается ремонту на месте установки либо в электроцехе сельхозпредприятия. При этом учитывается остаточная стоимость электродвигателя и все другие расходы и отчисления, что значительно усложняет расчеты. Имеющаяся информация по номенклатуре поставляемых сельскому хозяйству электродвигателей показывает, что заводы-изготовители поставляют в основном двигатели общепромышленного исполнения, которые используются в условиях, на которые они не рассчитаны. При низком качестве капитального ремонта срок службы отремонтированных двигателей не превышает 1–1,5 лет [2].

В таблицах 1–4 представлена необходимая для расчета технической составляющей ущерба исходная информация по стоимости, массе, капитальному ремонту различных типов единых серий асинхронных двигателей (в России), наиболее применяемых в сельскохозяйственном производстве [5, 6].

Полученная информация по электродвигателям предназначена для использования при проведении экономической оценки ущербов от отказов электрооборудования, планировании мероприятий по техническому обслуживанию и повышению эксплуатационной надежности электрооборудования для обеспечения высокоэффективной работы оборудования животноводческих ферм.

Таблица 1 Стоимость электродвигателей серии 5А при мощности, кВт

Частота вращения, мин ⁻¹	Стоимость электродвигателей, руб., при мощности в кВт									
	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55
3000	–	–	18070	27054	28594	32349	38799	59210	66912	80996
1500	–	16045	19330	25802	29075	33408	43517	61135	69511	75673
1000	17920	19611	25706	29075	36874	54492	62965	76828	97307	106089
750	21951	26091	30423	38799	60269	65371	83856	101090	115291	132926

Таблица 2 Масса электродвигателей 5А при мощности, кВт

Частота вращения, мин ⁻¹	Масса электродвигателей, кг, при мощности, кВт									
	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55
3000	–	–	70	106	112	140	155	235	255	340
1500	–	64	76	111	120	145	165	245	270	345
1000	63	74	108	129	160	245	280	330	430	450
750	74	108	124	160	240	260	340	430	460	705

Таблица 3 Средняя стоимость электродвигателей АИР

Частота вращения, об/мин	Стоимость электродвигателей, руб., при мощности, кВт											
	0,25	0,55	1,1	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5	11	18,5	22	30
3000	2020	2508	3416	4666	5844	7174	8279	10484	15153	23593	31081	36038
1500	2395	3198	4126	5647	7217	8074	10861	13682	16464	25613	31674	38617
1000	2818	3542	4602	7102	10142	11028	14317	15670	23224	33950	41945	48045
750	3670	5493	6850	10371	11433	15009	15998	23200	26039	43626	46525	60500

Таблица 4 Масса электродвигателей АИР

Частота вращения, мин ⁻¹	Масса электродвигателей, кг, при мощности, кВт											
	0,25	0,55	1,1	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5	11	18,5	22	30
3000	3,8	6,1	9,2	15	30	26	32	48	78	130	150	170
1500	4,2	8,1	9,4	18,1	35	29	45	70	84	140	160	180
1000	5,6	9,9	16	27	43	48	69	82	125	160	195	255
750	–	15,9	22	43	48	68	82	125	150	210	225	360

Результаты и обсуждение. На основании многолетних исследований, проводимых лабораторией эксплуатации электрооборудования в сельском хозяйстве ВИЭСХ, установлено, что технический ущерб от отказа электродвигателя зависит от многих факторов, и точное его определение весьма затруднительно для практических расчетов в условиях сельхозпредприятий. Технический ущерб U_T , связанный с заменой отказавшего электродвигателя, состоит из затрат на демонтаж-монтаж и цены K_o нового или K_p капитально отремонтированного электродвигателя с учетом выработанного ресурса. В общем виде техническая составляющая ущерба от преждевременного выхода из строя электродвигателя, не отработавшего свой нормативный срок, можно определить по выражению [2]:

$$U_T = C_m + K_H \left(1 - \frac{t_{\phi}}{T_{cl}}\right) - C_{cl}, \quad (1)$$

где C_m – затраты, связанные с заменой отказавшего электродвигателя новым (монтаж, демонтаж); K_H – стоимость отказавшего электродвига-

теля; C_{cl} – ликвидная (металлолом) стоимость отказавшего электродвигателя; T_{cl} – нормативный срок службы электродвигателя; t_{ϕ} – фактический срок службы электродвигателя.

По фактическим срокам службы в расчетах следует использовать информацию, которая получена от сельхозпредприятий, эксплуатирующих электрооборудование в соответствии с требованиями системы ППРЭСХ. Нормативный срок службы для электродвигателей, работающих в тяжелых условиях животноводства, – 7 лет, ликвидная стоимость лома электродвигателей – 20 руб./кг (0,35 \$), а затраты на монтаж – 10 % стоимости нового электродвигателя. Результаты расчета по выражению (1) величины технического ущерба при отказе электродвигателей, работающих в условиях животноводческих помещений, представлены в таблице 5. Зависимость величины технического ущерба от срока службы при отказе электродвигателей в животноводстве для 1 – 0,55 кВт; 2 – 3,0 кВт; 3 – 5,5 кВт представлены на рисунке 1.

Таблица 5 Результаты расчета величины технического ущерба при отказе электродвигателей в животноводстве, руб.

Электродвигатель	Технический ущерб при сроке службы t_f , лет						
	1	2	3	4	5	6	7
АИР 0,55 кВт	2899	2442	1985	1528	1074	615	–
АИР 3,0 кВт	6208	5177	4146	3115	2084	1053	–
АИР 5,5 кВт	9495	7944	6392	4840	3289	1737	–

Рисунок 1
Зависимость величины технического ущерба от срока службы при отказе электродвигателей: 1 – 0,55 кВт; 2 – 3,0 кВт; 3 – 5,5 кВт

При использовании электродвигателей в сельскохозяйственном производстве средний срок службы до первого капитального ремонта составляет в животноводстве 3–3,5 года, в растениеводстве – 4 года, на подсобных предприятиях – 5 лет [8–10]. Продолжительность ремонтного цикла между последующими капитальными ремонтами электродвигателей в среднем составляет: для животноводства 1,5 года, для растениеводства 2 года, для подсобных предприятий 2,5 года. Практика показывает, что электродвигатели должны ремонтироваться за весь срок службы не более одного раза. Уровень эксплуатации и качество ремонта необходимо повысить так, чтобы каждый двигатель служил до первого капитального ремонта не менее 5–6 лет, а после капитального ремонта – не менее 3–4 лет. Электродвигатели подлежат списанию по завершении нормативного срока службы, определяемого нормами амортизационных отчислений, по которым можно оценить число фактических капитальных ремонтов и средний технический ущерб. Для снижения величины материальных ущербов сельхозпредприятий от отказов путем снижения аварийности электродвигателей необходимо своевременное проведение упреждающих мероприятий по их техническому

обслуживанию и ремонту с выполнением диагностических проверок технического состояния электродвигателей, обеспечение необходимого резерва запасных элементов и материалов для ремонтно-эксплуатационных нужд, применение соответствующих средств защиты электродвигателей от аварийных режимов, повышение оперативности и технической оснащенности электроремонтных бригад для выявления и устранения отказов.

На основании ранее выполненных исследований и расчетов следует, что более точное вычисление технической составляющей ущерба требует сбора достаточно большого объема информации, которую можно получить только в условиях практической эксплуатации электрооборудования сельхозпредприятия, имеющего укомплектованную энергетическую службу, выполняющую график проведения профилактических работ и аккуратно ведущую учетную эксплуатационную документацию. Необходимо также знать срок службы резервного электродвигателя с момента его выпуска заводом-изготовителем до момента установки на данной рабочей машине, срок службы отказавшего электродвигателя с момента выпуска заводом-изготовителем до отказа на данной рабочей машине,

а также их нормативный срок службы. В процессе эксплуатации электродвигателя проводят ежегодные амортизационные отчисления от его первоначальной стоимости, которые со временем можно использовать для ремонта или замены новым изделием. Если отказавший электродвигатель не отработал нормативный срок до капитального ремонта или списания, предприятие при его ремонте или замене понесет убытки, входящие в состав технического ущерба $У_T$. Для удобства практической оценки технического ущерба целесообразным является использование обобщающего коэффициента ущерба k_y , зависящего от фактического срока службы электродвигателя. При отказе электродвигателя со списанием и заменой на аналогичный возникающий ущерб $У_T$ определяется по выражению [5]:

$$У_T = K_m \cdot k_y(t_f), \quad (2)$$

где K_m – стоимость нового электродвигателя с монтажом, руб.; k_y – коэффициент ущерба, о. е.; t_f – фактическое время службы электродвигателя, лет.

Зависимость коэффициента ущерба от фактического срока службы электродвигателя в жи-

вотноводстве представлена на рисунке 2. Величина технического ущерба $У_T$ при выходе из строя электродвигателей, установленных на технологическом оборудовании животноводческих ферм, в зависимости от срока службы при нормативном сроке 7 лет [1] определяется умножением коэффициента ущерба на стоимость электродвигателя с монтажом. Как следует из рисунка 2, при среднем сроке службы электродвигателя в животноводстве 3–3,5 года коэффициент ущерба равен 0,5–0,6 о. е. Результаты расчета средней величины технического ущерба $У_T$ при $K_y = 0,6$ от отказа электродвигателей АИР в зависимости от мощности, рассчитанного по выражению (2), представлены в таблице 6.

Предлагаемый метод определения технического ущерба позволяет при необходимости оперативно оценивать экономический ущерб из-за преждевременных замен и капитальных ремонтов электродвигателей и другого электрооборудования, а также применим для оценочных расчетов при решении общих хозяйственных задач или при отсутствии конкретной исходной информации по отказам электродвигателей.

Рисунок 2

Зависимость коэффициента ущерба от фактического срока службы электродвигателя в животноводстве

Таблица 6 Результаты расчета технического ущерба от отказа электродвигателя АИР в животноводстве при $K_y = 0,6$

Мощность ЭД Р, кВт	1,1	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5
K_0 – стоимость ЭД	4126	5647	7218	8074	10861	13862
C_m – стоимость монтажа	413	565	722	807	1086	1386
$K_m = K_0 + C_m$	4539	6207	7940	8881	11947	15248
$У_T$ – величина ущерба	2723	3724	4764	5328	7162	9149

Выводы. Выполнена оценка технических составляющих ущербов от отказов электродвигателей технологического оборудования животноводческих ферм. Установлено, что величина

технического ущерба от отказа электродвигателя зависит от многих факторов, учет которых усложняет расчеты, а результаты малозначительны для практического применения в усло-

виях сельхозпредприятий. Основными составляющими технического ущерба являются фактический срок службы и неиспользованная стоимость электродвигателя. Для практического использования в производственных условиях животноводческих ферм средняя расчетная величина технического ущерба при аварийном отказе одного электродвигателя определяется с использованием усредненного коэффициента технического ущерба от стоимости нового электродвигателя с монтажом. Выполнены расчеты и построены зависимости величины технического ущерба от срока службы при отказе электродви-

гателей различной мощности, используемых в животноводстве.

Результаты выполненной работы позволяют определять технический ущерб, связанный с отказами электродвигателей, определить степень экономической ответственности задействованного электрооборудования, уточнить и скорректировать периодичности проведения профилактических работ и ремонтов, выявить возможности совершенствования и повышения эффективности работы энергетической службы сельхозпредприятия.

Библиографический список

1. Система планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных предприятий [Текст]. М.: Агропромиздат, 1987. 187 с.
2. Сырых, Н.Н. Теоретические основы эксплуатации электрооборудования [Текст] / Н.Н. Сырых, Н.Е. Кабин. М.: Агробизнесцентр, 2007. 514 с.
3. Strebkov D.S., Nekrasov A.I., Nekrasov A.A. Maintenance of power equipment system based on the methods of diagnosis and control of technical condition. Handbook of Research on Renewable Energy and Electric Resources for Sustainable Rural Development. January, 2018. Chapter 18. Pages: 535. pp. 421–448. DOI: 10.4018/978-1-5225-3867-7.
4. Nekrasov A.I., Nekrasov A.A. Method for definition of the required spare components set to maintain electric equipment for rural applications. International Russian Automation Conference (RusAutoCon). 2018. IEEE Xplore Digital library. P. 3.
5. Борисов, Ю.С. Методические рекомендации по прогнозированию и контролю технического состояния электродвигателей в сельскохозяйственном производстве [Текст] / Ю.С. Борисов, А.И. Некрасов, А.А. Некрасов. М.: ГНУ ВИЭСХ, 2011. 108 с.
6. Стоимость электродвигателей [Электронный ресурс]: заголовок с экрана. Режим доступа: <http://electronpro.ru/price>. Дата обращения: 24.02.2019.
7. Ерошенко, Г.П. Адаптация эксплуатации электрооборудования к особенностям сельскохозяйственного производства [Текст] / Г.П. Ерошенко, С.М. Бакиров. Саратов: Наука, 2011. 132 с.
8. Борисов, Ю.С. Фактические сроки службы электродвигателей в сельскохозяйственном производстве [Текст] / Ю.С. Борисов // Научно-тех-
- нический бюллетень по электрификации сельского хозяйства. Вып. 1(64). М.: ВИЭСХ, 1989.
9. Некрасов, А.И. Оценка остаточного ресурса электрооборудования по физическим характеристикам [Текст] / А.И. Некрасов, А.А. Некрасов. Вестник аграрной науки Дона. 2018. Т. 1. № 41. С. 5–11.
10. Некрасов, А.И. Совершенствование системы технического сервиса электрооборудования сельхозпроизводителей [Текст] / А.И. Некрасов, Н.Н. Сырых, А.А. Некрасов. Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 9 (51). Часть 2. С. 73–75.
11. Пахомов, А.И. Техничко-экономическая эффективность диагностического обслуживания электродвигателей в сельском хозяйстве [Текст] / А.И. Пахомов // Техника в сельском хозяйстве. 2012. № 5. С. 34–36.
12. Пахомов, А.И. Анализ методов диагностики изоляции асинхронных двигателей [Текст] / А.И. Пахомов // Техника в сельском хозяйстве. 2012. № 5. С. 15–17.
13. Пахомов, А.И. Эксплуатационная надежность асинхронных двигателей [Текст] / А.И. Пахомов, И.А. Переверзев, А.Ф. Кроневальд // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2008. № 3. С. 24–25.
14. Трушкин, В.А. Совершенствование методики оценки технологического ущерба от отказа электрооборудования в растениеводческих и тепличных комплексах [Текст] / В.А. Трушкин, А.В. Гузачев // Техника в сельском хозяйстве. 2012. № 1. С. 30–35.
15. Трушкин, В.А. Анализ перспективных стратегий ТО и Р электрооборудования сельскохозяйственного производства [Текст] / В.А. Трушкин, А.В. Гузачев // Актуальные проблемы энергетики АПК: материалы 7 международной научно-практической конференции; под общ. ред. В.А. Трушкина. 2016. С. 224–229.

16. Левин, М.А. Анализ состояния технической эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий саратовской области [Текст] / М.А. Левин, Г.П. Ерошенко, В.А. Трушкин, А.С. Гузачев // Аграрный научный журнал. 2017. № 12. С. 70–72.

17. Пястолов, А.А. Эксплуатация и ремонт электроустановок [Текст] / А.А. Пястолов и др. М.: Колос, 1984. 271 с.

Сведения об авторах

1. **Некрасов Алексей Иосифович**, ORCID: 0000-0001-6141-984X, доктор технических наук, главный научный сотрудник лаборатории электроснабжения и теплообеспечения, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр «Всероссийский институт механизации» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), 109428, г. Москва, 1-й Вешняковский проезд, 2, e-mail: nalios@mail.ru.

2. **Некрасов Антон Алексеевич**, ORCID: 0000-0001-5816-8939, кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории электроснабжения и теплообеспечения, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр «Всероссийский институт механизации» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), 109428, г. Москва, 1-й Вешняковский проезд, 2, e-mail: nalios@mail.ru.

Аварийный отказ электродвигателя вызывает экономический ущерб, состоящий из технологической и технической составляющих, возникших от недовыпуска животноводческой продукции и от замены электродвигателя. Выполнена оценка технической составляющей экономического ущерба от отказов электродвигателей различной мощности, установленных для привода технологического оборудования в животноводстве. По результатам расчетов получены зависимости величины технического ущерба от стоимости и срока службы отказавшего электродвигателя. Отказы электродвигателей оборудования животноводческих ферм приводят к простоям технологических процессов и материальным ущербам. Размер ущербов возрастает в сельхозпредприятиях с большой удаленностью и разбросанностью молочных и откормочных

ферм, что затрудняет своевременное устранение электромонтерами отказов электродвигателей и увеличивает продолжительность простоев. Определены основные факторы, влияющие на показатели эффективности использования электродвигателей в сельскохозяйственном производстве, обеспечивающие снижение интенсивности отказов и сокращение времени их устранения. Результаты выполненной работы позволяют определять техническую составляющую экономического ущерба, связанную с отказами электродвигателей, определить степень экономической ответственности задействованного электрооборудования, уточнить и скорректировать сроки проведения профилактических работ и ремонтов, выявить резервы улучшения эффективности работы энергетической службы сельхозпредприятия.

A. Nekrasov, A. Nekrasov

ASSESSMENT OF TECHNICAL DAMAGE FROM ELECTRIC MOTOR FAILURES

Key words: *maintenance of electrical equipment; motor failures; technical damage; performance indicators; equipment for livestock farms.*

Authors' personal details

1. **Aleksey Nekrasov**, ORCID: 0000-0001-6141-984X, Doctor of Technical Sciences, chief researcher of the laboratory power supply and heat supply, Federal scientific engineering center «All-Russian Institute of mechanization», 109428, 1st Veshnyakovsky proezd, 2, Moscow, Russia, e-mail: nalios@mail.ru.

2. **Anton Nekrasov**, ORCID: 0000-0001-5816-8939, Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher of the laboratory power supply and heat supply, Federal scientific engineering center «All-Russian Institute of mechanization», 109428, 1st Veshnyakovsky proezd, 2, Moscow, Russia, e-mail: nalios@mail.ru.

The emergency failure of the electric motor causes economic damage, consisting of the technological and technical components that arose from the shortage of livestock products and the replacement of the electric motor. The technical component of the economic damage from failures of electric motors of various capacities installed for the drive of technological equipment in animal husbandry has been evaluated. Based on the calculation results, the dependencies of the amount of technical damage on the cost and service life of a failed motor are obtained. Failures of electric motors of livestock farm equipment lead to technological downtime and material damage. The amount of damage is more significant in agricultural enterprises, with a large remoteness and dispersal of dairy and fattening farms,

which complicates the timely repair of electric motor failures by electricians and increases the duration of downtime. The main factors that influence the performance indicators of electric motors in agricultural production, which reduce the failure rate and reduce the time to resolve them, are identified. The results of the work performed allow us to determine the technical component of the economic damage associated with the failure of electric motors. It also makes it possible to determine the degree of economic responsibility of the electrical equipment involved, clarify and adjust the timing of preventive maintenance and repairs, and identify the reserves for improving the efficiency of the energy service of the agricultural enterprise.

© Некрасов А.И., Некрасов А.А.

УДК 631.21

DOI: 10.31563/1684-7628-2020-55-3-119-126

Д.А. Соловьев, С.М. Бакиров, Г.Н. Камышова

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ СЕКЦИЙ ДОЖДЕВАЛЬНОЙ МАШИНЫ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЙ ОДНОВРЕМЕННЫЙ ЗАПУСК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Ключевые слова: *электропривод; схема управления; дождевальная машина; энергозатраты; мощность электродвигателя.*

Введение. Движение электрифицированной дождевальной машины (ДМ) выполняется дискретно по секциям, согласно [1–4]. При включении электропривода опорной тележки крайней (последней) секции движение других опорных тележек секций подстраивается так, что при перемещении последующей опорной тележки секции от нормали более чем на угол φ° при длине трубопровода секции l автоматически включается питание электропривода опорной тележки предыдущей секции (рисунок 1).

Имеется также прибор синхронизации движения в линию (ПСЛ) [5], принцип работы которого состоит в контроле угла φ° и включении/отключении питания электропривода. Такое дискретное управление приводит к случаям одновременного запуска нескольких электроприводов опорных тележек (до 3–10 секций) [6]. Тогда график нагрузочной характеристики источника в некотором промежутке времени имеет вид, представленный на рисунке 2. Для автономных источников питания, таких как переносной генератор с двигателем внутреннего сгорания на дизельном или бензиновом топ-

ливе, данный режим приводит к тому, что требуется выполнение условия по выбору мощности источника:

$$P_{I\max}(t_i) > P_{H\max}(t_i), \quad (1)$$

где $P_{I\max}(t_i)$ и $P_{H\max}(t_i)$ – максимальные мощности соответственно источника электроэнергии и нагрузки в момент времени t_i , кВт.

Выполнение условия (1) приводит к тому, что при выборе источника энергии требуется складывать большую мощность, чтобы удовлетворять нагрузке в каждый момент ее действия, то есть с запасом. Вместе с этим сложение нагрузок секций приводит к совокупному показателю затрат энергии. Тогда, например, для переносного генератора обеспечение работы дождевальной машины (ДМ) сопровождается значительными потерями.

Перерасход горючего топлива очевиден, так как для требования нагрузки в конкретный момент времени, например, 1 кВт*ч электроэнергии, дизельный или любой другой (на горючем топливе) переносной генератор мощностью 10 кВт будет сжигать топливо, обеспечивая около 10 % мощности. В этом случае загрузка

генератора составляет 0,1 или 10 % [7], а потери энергии в данный момент достигают 70 %. Исследования показывают [8, 9], что с такой ситуацией перерасхода топлива сталкиваются все сельскохозяйственные производители, имеющие дождевальные машины с переносными генераторами.

Возникшую проблему возможно решить путем применения переносных генераторов меньшей мощности. Однако для дождевальных машин, состоящих из 8–12 секций, одновременный

запуск всех электроприводов может привести не только к аварийной остановке, но даже к отказу генератора. Поэтому в данной работе ставится цель оценить вероятность одновременного запуска всех электроприводов дождевальной машины, разработать способ и электрическую схему, исключающую одновременный запуск электроприводов опорных тележек дождевальных машин, а также оценить снижение энергетических затрат на перемещение дождевальной машины.

Рисунок 1

Дискретное движение секций ДМ (v_1 , v_2 – линейные скорости перемещения соответственно предыдущей и последующей опорных тележек секции): а) перемещение последующей секции; б) перемещение предыдущей секции

Рисунок 2

Нагрузочная характеристика источника электрической энергии

Результаты исследования. Мощность источника питания (для переносного генератора) оценивается суммой мощностей каждого потребителя и коэффициентом одновременности k_o , который определяется по вероятности одновременного запуска электроприводов

$$P_{H \max}(t) > k_o(B_1(t)) \sum_{i=1}^j P_i, \quad (2)$$

где $B_1(t)$ – вероятность одновременного включения всех секций; P_i – электрическая нагрузка i -ой секции (мощность электродвигателя и устройств автоматики в составе электропривода опорной тележки i -ой секции), начиная с крайней, кВт; j – количество секций дождевальной машины.

Вероятность одновременного включения в работу всех электроприводов будет зависеть от срабатываний автоматики, которая ориентируется на перемещение секций (рисунок 3). Тогда одновременный запуск можно определить в соответствии с геометрией перемещения дождевальной машины как единого целого. То есть определить вероятность таких событий, когда две, три и т. д. секции, перемещаясь, образуют идеальный прямолинейный луч. Согласно [10, 11], вероятность одновременного включения в работу всех электроприводов можно определить по длине трубопровода секции и длине окружности пройденного тележкой пути (рисунок 4).

Согласно геометрическим параметрам движения [12] и теории математической статистики

[13], вероятность можно определить по выражениям

$$\left. \begin{aligned} B_j(t)P_j &= 1, \\ B_{j-1}(t)(P_{j-1}; P_j) &= \frac{j-1}{j}, \\ B_1(t)(\sum_{n=1}^j P_j) &= \frac{1}{j}. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

С учетом вероятности появления события – ДМ в виде прямой линии (нормали) и скоростных характеристик опорных тележек, вероятность одновременной работы всех электроприводов легко определить. Результаты расчета вероятности сведем в таблицу 1.

На основе данных таблицы с вероятностью 0,1 существует возможность запуска всех электроприводов одновременно. Поэтому при выборе источника питания, например, переносного генератора, требуется учитывать данные вероятности.

Рисунок 3

Общий вид дискретного перемещения секций дождевальной машины:

а) вид перемещения секций с отставанием; б) вид перемещения секций как идеальный прямолинейный луч

Рисунок 4

Сравнение длин пройденного пути опорных тележек дождевальной машины, состоящей из 5 секций

Таблица 1 Результаты расчета вероятности одновременного запуска электроприводов при количестве секций $j = 10$

	Двух	Трех	Четырех	Пяти	Шести	Семи	Восьми	Девяти	Десяти
$B_i(t)$	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1

Исключение одновременного запуска электроприводов позволит снизить потери энергии с 70 % до 10 %. Этого можно добиться путем использования логической схемы поочередного включения электроприводов. Тогда общее количество энергии с логической схемой

$$W_{\text{лог}} = W - W_{\text{СП}}, \quad (4)$$

где $W_{\text{СП}}$ – совокупные потери энергии при одновременном включении электроприводов, кВт*ч.

Также использование логической схемы позволит снизить негативное влияние наложенных друг на друга пусков ЭД на источник с переносным генератором и исключить перерасход топлива при стабилизации работы двигателя внутреннего сгорания с генератором [14].

Разработаем и проанализируем работу электрической схемы, исключающей одновременный запуск электроприводов. В логической схеме, представленной на рисунке 5, дополнительный контакт будет исключать одновременный пуск электродвигателей, что приведет к увеличению продолжительности выполнения полива, так как логическая остановка крайней тележки уже не будет контролироваться реле-датчиком повторного включения ПВ %.

Временную диаграмму логической схемы построим на графике $U(t)$ (рисунок 6).

Минимальная продолжительность выполнения полива $T_{\text{ДМ min}}$ без логической схемы определяется по промежутку времени работы электропривода опорной тележки крайней j -ой секции t_p

$$T_{DM \min} = t_{pj}. \quad (5)$$

С логической схемой управления продолжительность работы ДМ будет ориентирована на продолжительность работы каждого электропривода в отдельности, как на рисунке 6:

$$T_{DM \min}^{лог} = t_j + t_{j-1} + \dots + t_1 = \frac{j(t_j + t_1)}{2}. \quad (6)$$

Если скорость перемещения опорных тележек одинакова, согласно [15], то продолжительность оборота крайней секции относительно первой составит

$$t_{pj} = j t_1. \quad (7)$$

Тогда доля увеличения продолжительности работы ДМ с логической схемой управления с количеством секций, равной j , составит

$$\tau' = \frac{T_{DM \min}^{лог}}{T_{DM \min}} = \frac{j(j t_1 + t_1)}{2} = \frac{j+1}{2}. \quad (8)$$

Из выражения (8) для ДМ, состоящей из 10 секций, продолжительность работы с логической схемой управления увеличится в 5,5 раз.

Применение логической схемы управления, исключающей одновременную работу электроприводов, позволит получить мощность источника, равную мощности электродвигателя одного электропривода:

$$P_{II}^{лог} = P_j. \quad (9)$$

На основе этих данных определим возможный диапазон снижения энергозатрат для пере-

носного генератора с логической схемой управления.

Примем, что переносной генератор без логической схемы управления имеет мощность $P_{IIГ}$, который при ПВ 100 % обеспечивает энергией дождевальную машину за один полив в течение промежутка времени t_{pj} :

$$W_{Г} = P_{IIГ} t_{pj}. \quad (10)$$

Для ДМ с логической схемой управления движением требуется генератор, мощность которого определяется соотношением:

$$P_{IIГ}^{лог} = \frac{P_{IIГ}}{j}. \quad (11)$$

Тогда количество энергии ДМ с логической схемой

$$\begin{aligned} W_{Г}^{лог} &= \frac{P_{IIГ}}{j} \frac{j t_{p1} (j+1)}{2} = \\ &= \frac{P_{IIГ} t_{p1} (j+1)}{2}. \end{aligned} \quad (12)$$

С учетом (12) доля снижения энергии при использовании логической схемы управления составит:

$$\begin{aligned} \Delta W_{лог} &= \frac{W_{Г} - W_{Г}^{лог}}{W_{Г}} = \\ &= 1 - \frac{P_{IIГ} t_{p1} (j+1)}{2 j P_{IIГ} t_{p1}} = 1 - \frac{j+1}{2j}. \end{aligned} \quad (13)$$

Рисунок 5

Логическая схема управления движением опорных тележек секций ДМ ($S1 \dots S_{j-1}$ – переключатели (концевые выключатели); $KM1 \dots KM_j$ – катушки и контакты $KM1.1-1.3 \dots KM_{j-1}.1-j.3$ магнитных пускателей электродвигателей $M1 \dots M_j$)

Таким образом, использование логической схемы управления для источника в виде переносного генератора приводит к экономии

25,21...48,85 % энергии на перемещение дождевальной машины.

Рисунок 6
Временная диаграмма логической части схемы управления движением секций ДМ

Рисунок 7
Зависимость снижения энергозатрат от числа опорных тележек (секций) ДМ с использованием логической схемы управления

Выводы. На основе выполненных исследований установлена вероятность 0,1 (10 %) одновременного запуска электроприводов дождевальной машины в укрупненном виде без учета задержки времени срабатывания контактов концевых выключателей и магнитных пускателей электродвигателя. Также предложена упрощенная электрическая схема, исключающая одновременный запуск электроприводов, применение которой позволит экономить до 48,85 % энергии источника в виде переносного генера-

тора на жидком топливе. Однако продолжительность работы дождевальной машины в целом увеличивается в 1,5–6,5 раз, что ограничивает диапазон поливной нормы дождевальной машины, например, вместо 60–650 м³/га диапазон с логической схемой управления составит 360–650 м³/га. Данное ограничение не является определяющим, так как решение о выборе поливной нормы машины принимается на основании природно-климатических зон и вида выращиваемой культуры.

Библиографический список

1. Журавлева, Л.А. Совершенствование технологических приемов полива дождевальными машинами кругового действия «Каскад» [Текст] / Л.А. Журавлева, В.А. Соловьев // Мелиорация. 2019. № 1 (87). С. 78–82.
2. Инструкция по эксплуатации [Текст]. Bauer – Centerstar 9000 133 EL, 168 EL, 168 E, 203 EL, 203 E. Фойтсберг, 2003. С. 103.
3. Каталог ирригационной продукции Zimmatic by Lindsay [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: www.lindsay.com. Дата обращения: 23.11.2019.

4. Каталог продукции Valley [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.valmont.com/irrigation. Дата обращения: 16.11.2019.

5. Каталог. Отличительные особенности ирригационных машин Reinke [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.reinke.com. Дата обращения: 8.11.2019.

6. Устройство автоматизированного управления многоопорной дождевальной машиной фронтального действия для точного полива [Текст]: пат. № 2522526 С1 Российская Федерация, МПК А01G 25/16, А01G 25/09, G01N 25/56, G01S 19/05 / В.Н. Карпов, В.А. Смелик, З.Ш. Юлдашев, Р.З. Юлдашев; заявители и патентообладатели ФГБОУ ВПО «СПбГАУ» и Карпов Валерий Николаевич. № 2012153613/13 заявл. 11.12.2012; опубл. 20.07.2014. Бюл. № 20. 20 с.

7. Прищеп, Л.Г. Учебник сельского электрика [Текст] / Л.Г. Прищеп. 3-е изд. доп. и перераб. М.: Агропромиздат, 1986. 509 с.

8. Романенко, В.А. Сельскохозяйственные машины (устройства, работа и основные регулировки) [Текст]: учеб. пособие / В.А. Романенко, Е.И. Трубилин, И.Б. Фурсов, С.К. Папуша, А.А. Романенко, А.С. Брусенцов, В.В. Кравченко, В.А. Миронов, В.И. Коновалов, С.В. Белоусов. Краснодар: КубГАУ, 2014. 232 с.

9. Рыжко, Н.Ф. Регулирование расхода воды дождевальных машин для снижения потребления электроэнергии на полив [Текст] / Н.Ф. Рыжко, Н.В. Рыжко, С.Н. Рыжко, Е.С. Смирнов, Е.А. Шишенин // Инновации природообустройства и защиты окружающей среды. Материалы I Национальной научно-

практической конференции с международным участием. 2019. С. 105–109.

10. Eroshenko G.P., Solovyev D.A., Glukharev V.A., Bakirov S.M., Startsev S.V. Modes and Parameters of Circular Action Sprinkler electric drives. J. of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. 2018. Т. 10. № 10. Special Issue. P. 2123–2128.

11. Абдразаков, Ф.К. Рациональное снижение металлоемкости при конструировании широкозахватных дождевальных машин [Текст] / Ф.К. Абдразаков, Л.А. Журавлева, В.А. Соловьев // Аграрный научный журнал. 2018. № 5. С. 37–42.

12. Рекомендации по научно обоснованным технологиям орошения сельскохозяйственных культур кукурузы на зерно, картофеля, лука и моркови современными стационарными широкозахватными круговыми и фронтальными дождевальными машинами Reinke и Valley в условиях центральной орошаемой зоны Ростовской области [Текст] / Под ред. Н.А. Иванова; Новочерк. гос. мелиор. акад. Новочеркасск, 2013. 30 с.

13. Рывкин, А.А. Справочник по математике [Текст]: справочное пособие для учащихся сред. спец. учеб. заведений и поступающих в вузы / А.А. Рывкин, А.З. Рывкин, Л.С. Хренов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1987. 480 с.

14. Справочник по электрическим машинам [Текст] / Под общ. ред. И.П. Копылова, Б.К. Клокова. В 2 т. Т. 1. М.: Энергоатомиздат, 1988. 456 с.

15. Eroshenko G.P., Esin A.I., Solovyev D.A., Serebrennikov F.V., Bakirov S.M. Optimal power supply synthesis for circular action sprinkler. J. of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. 2018. Т. 10. № 10. Special Issue. P. 2129–2134.

Сведения об авторах

1. **Соловьев Дмитрий Александрович**, доктор технических наук, доцент, врио ректора, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова», РФ, Саратовская область, г. Саратов, Театральная пл., 1, e-mail: solovevda@bk.ru.

2. **Бакиров Сергей Мударисович**, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры инженерной физики, электрооборудования и электротехнологии, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова», РФ, Саратовская область, г. Саратов, Театральная пл., 1, e-mail: s.m.bakirov@mail.ru.

3. **Камышова Галина Николаевна**, кандидат физико-математических наук, доцент, заведующая кафедрой математики, механики и инженерной графики, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова», РФ, Саратовская область, г. Саратов, Театральная пл., 1, e-mail: gkamichova@mail.ru.

Работа посвящена снижению затрат энергии на полив дождевальными машинами кругового действия. Известно, что часто используемым источником энергии для электрифицированных

дождевальных машин является переносной генератор с двигателем внутреннего сгорания на жидком топливе. При выборе параметров генератора учитывают запас мощности для таких

режимов, когда запускаются одновременно все электроприводы опорных тележек секций дождевальной машины. Вероятность запуска двух, трех и т. д. электроприводов определяется по длине секции и длине окружности, пройденной опорной тележкой. Так как длины всех секций одинаковы, то вероятность одновременного запуска, например, 10 секций составит 0,1 (10 %). Как видно этот режим не продолжительный, и, обеспечивая запас мощности, потери энергии при недогрузке генератора могут достигать 70 %. Избежать значительных потерь энергии возможно путем изменения режима управления дождевальной машины, а именно, разработкой логической электрической схемы включения электроприводов. В предложенной схеме переключатели $S1...Sj-1$ (концевые выключатели) поочередно включают отдельные электроприводы в соответствии с действием приборов син-

хронизации движения в линию. Для наглядности приводится временная диаграмма работы логической электрической схемы. При действии предложенной схемы мощность переносного генератора можно выбрать по мощности одного электродвигателя, работающего в составе электропривода опорной тележки. Вместе с этим увеличивается продолжительность работы всей дождевальной машины на величину, зависящую от количества секций, из-за поочередного включения электроприводов. Например, для машины, состоящей из 10 секций, продолжительность работы машины при повторности включения крайнего электропривода ПВ100 % увеличится в 5,5 раз. Таким образом, применение логической схемы позволяет экономить до 48,85 % энергии, но ограничивает диапазон поливной нормы дождевальной машины.

D. Soloviev, S. Bakirov, G. Kamyshova

DEVELOPMENT OF AN ELECTRICAL SCHEME FOR LOGICAL CONTROL OF THE MOVEMENT OF SPRINKLER MACHINE SECTIONS, WHICH EXCLUDES SIMULTANEOUS START OF ELECTRIC MOTORS

Key words: *electric drive; control scheme; sprinkler machine; energy costs; electric motor power.*

Authors' personal details

1. **Dmitry Solovyev**, Doctor of Technical Sciences, Docent, acting rector Saratov State Agrarian University named after N. I. Vavilov, Russian Federation, Saratov region, 1, Teatralnaya Square, Saratov, 410012, e-mail: solovevda@bk.ru.

2. **Sergey Bakirov**, Candidate of Technical Sciences, Docent, Associate Professor at the Department of «Engineering physics, electrical equipment and electrical technologies», Saratov State Agrarian University named after N. I. Vavilov, Russian Federation, Saratov region, 1, Teatralnaya Square, Saratov, 410012, e-mail: s.m.bakirov@mail.ru.

3. **Galina Kamyshova**, Candidate of Physic-mathematical Sciences, Docent, Head of the Department of «Mathematics, mechanics and engineering graphics», Saratov State Agrarian University named after N. I. Vavilov, Russian Federation, Saratov region, 1, Teatralnaya Square, Saratov, 410012, e-mail: gkamichova@mail.ru.

The work is devoted to reducing energy costs for irrigation by circular action sprinkler machines. It is known that a frequently used source of energy for electrified sprinkler machines is a portable generator with an internal combustion engine on liquid fuel. When selecting the generator parameters, the power reserve for such modes is taken into account when all the electric drives of the support carts of the sections of the sprinkler machine are started simultaneously. The probability of launching two, three, etc. electric drives is determined by the length of the sprinkler machine section and the length of the circle passed by the support truck. Since the lengths of all sections are the same, the probability

of starting simultaneously, for example, ten sections will be 0,1 (10 %).

As you can see, this mode is not long-lasting and, providing a reserve of power, energy losses when the generator is underloaded can reach 70 %. It is possible to avoid significant energy losses by changing the control mode of the sprinkler machine, namely, by developing a logical, electrical scheme for switching on electric drives. In the proposed scheme, switches $S1...Sj-1$ (limit switches) alternately turn on individual electric drives by the action of the devices for synchronizing movement in a line. For clarity, a temporary diagram of the logical, electrical scheme is provided. With the pro-

posed scheme, the power of a portable generator can be selected by the power of one electric motor operating as part of the electric drive of the support truck. The operation duration of the sprinkler machine increases by an amount depending on the number of sections. For example, for a sprinkler ma-

chine consisting of 10 sections, the duration of operation time of the sprinkler machine when reclosing of the last electric drive PV100 % will increase 5,5 times. Thus, the logic scheme saves up to 48,85 % of energy but limits the range of irrigation rates of the sprinkler machine.

© Соловьев Д.А., Бакиров С.М., Камышова Г.Н.