Археологические вести

— 30 —

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE FOR THE HISTORY OF MATERIAL CULTURE

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Archaeological news

30
(2020)

Saint-Petersburg
2020

Археологические вести

30
(2020)

Санкт-Петербург
2020

Издание основано в 1992 году

Редакционная коллегия:

Н. В. Хвощинская (главный редактор), О. И. Богуславский, В. С. Бочкарёв, С. А. Васильев, М. Ю. Вахтина, Ю. А. Виноградов, член-корреспондент РАН П. Г. Гайдуков, Т. С. Дорофеева (отв. секретарь), М. Т. Кашуба, А. В. Курбатов, В. А. Лапшин, академик РАН Н. А. Макаров, академик РАН В. И. Молодин, Н. И. Платонова, Н. Ю. Смирнов, Л. Г. Шаяхметова

Археологические вести, Ин-т истории материальной культуры РАН. — **Вып. 30** / [Гл. ред. Н. В. Хвощинская]. — СПб., 2020. — 368 с.: ил.

В очередной номер журнала «Археологические вести» включены статьи, посвященные новейшим исследованиям в области археологии и истории. В разделе «Новые открытия и исследования» рассматриваются отдельные категории археологических древностей от каменного века до средневековья. В ряде работ обсуждаются вопросы хронологии археологических памятников разных эпох, в частности, чустской культуры в Ферганской долине, тагарской в Минусинской котловине, уточняется датировка основного культурного горизонта поселения раннежелезного века Марьянское 1, находящегося в Краснодарском крае, и время сокрытия двух гнёздовских кладов рубежа IX–X вв. Кроме того, две статьи посвящены изучению первоначальных укреплений Старой Ладogi и результатам исследования палеопочв, подстилающих культурный слой этого памятника.

В специальном разделе «Актуальные проблемы археологии» представлены результаты изучения поселения Балка Лисовицкого эпохи бронзы на Таманском полуострове, обосновывается место происхождения и распространения больших прямоугольных пряжек из сибирского гагата в эпоху хунну, а также обсуждается вопрос об особенностях древнерусских фортификационных сооружений. Отдельный раздел посвящен истории науке, также в журнале приводится информация о международных конференциях. Среди авторов журнала ученые из различных научных центров России.

The current issue of “Archaeological news” includes articles devoted to the most recent researches in the sphere of archaeology and history. The section “New discoveries and studies” considers particular categories of archaeological antiquities dated from the Stone Age to the Middle Ages. A series of articles discuss questions of chronology of archaeological sites of different epochs, in particular, of the Chust culture in the Fergana Valley and the Tagar culture in the Minusinsk Kettle; a more precise dating is proposed for the main cultural horizon of the Early Iron Age site of Maryanskoye 1 in Krasnodar Kray and the date of burying of two Gnezdovo hoards at the turn between the 9th and 10th century. In addition, two articles are dedicated to studies of the original fortifications of Staraya Ladoga and the results of investigations of palaeosoils underlying the cultural layer of this site.

The special section “Topical problems of archaeology” presents the results of the investigation of the settlement-site of “Lisovitsky Balka” of the Bronze Age on the Taman Peninsula; the provenience and distribution of large rectangular buckles from Siberian jet of the Xiongnu period are grounded, and the problem on the features of Old-Russian fortifications is discussed. A separate section is dedicated to the history of science. This yearbook also presents information on international conferences. Among the authors of the volume there are researchers from different scientific centres of Russia.

ISSN 1817-6976

Первая страница обложки — пластина-пряжка, Салхит, Монголия (Treasures..., 2011. P. 135, fig. 172)

First page of cover — plate-buckle, Salkhit, Mongolia (Treasures..., 2011. P. 135, fig. 172)

Четвертая страница обложки — пряжка, могильник Культобе в Южном Казахстане (Подушкин, 2012. Рис. 1, 5)

Fourth page of cover — buckle, cemetery of Kultobe in Southern Kazakhstan (Подушкин, 2012. Рис. 1, 5)

© Институт истории материальной культуры РАН, 2020

© Коллектив авторов, 2020

© Российская академия наук, продолжающееся издание
«Археологические вести», 1992 (год основания), 2020

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Технология первичной обработки камня комплекса слоя 5 эоплейстоценовой стоянки Байраки в Приднестровье¹

Н. К. Анисюткин²

Аннотация. Статья посвящена технологическому анализу комплекса раннего палеолита Приднестровья — слоя 5 стоянки Байраки, который датируется эоплейстоценом (эпизод харамильо, 1 млн лет). В коллекции (888 экз.) представлены все категории каменных изделий, включая нуклеусы, отщепы и чешуйки, галечные формы и орудия на отщепах. Каменная индустрия основана на крупных галечных формах из песчаника и многочисленных мелких изделиях из кремня. Сопоставление индустрии слоя 5 с комплексами олдована указывает на их заметное сходство при сравнении разновременных индустрий единого технокомплекса Mode 1.

Annotation. The paper deals with technological analysis of the complex of the Early Palaeolithic of Transnistria from layer 5 at the site of Bayraki dating from the Eioleptocene (Jaramillo event, 1 mil. BP). Among the collection (888 items), all the categories of lithics are represented including nuclei, flakes and chips, while the pebble forms are tools on flakes. The stone industry is based on large pebble forms from sandstone and abundant small flint artefacts. Comparison of the industry from layer 5 with Oldowan complexes demonstrates their marked similarity. These nonsimultaneous industries can be attributed to a single technocomplex of Mode 1.

Ключевые слова: Восточная Европа, Приднестровье, Байраки, олдован, микроиндустрия.

Keywords: Eastern Europe, Transnistria, Bayraki, Oldowan, micro-industry.

DOI: 10.31600/1817-6976-2020-30-11-28

Введение

Открытие в начале XXI в. палеолитических местонахождений в отложениях эоплейстоценового³ возраста, расположенных на юго-западе Восточно-Европейской равнины, стало закономерным итогом многолетних археологических работ по изучению регионального раннего палеолита. Важно подчеркнуть, что определенный задел был сделан еще в середине 1980-х гг. Тогда в Приднестровье (Молдавия) на VII надпойменной

террасе Днестра удалось обнаружить два местонахождения раннего палеолита, где архаичные каменные изделия были связаны с вскрытыми на склонах древними лессово-почвенными отложениями (Анисюткин, 1987; 1994). Так, на местонахождении Погреба в ископаемой почве впервые удалось обнаружить совместно с каменными орудиями два зуба трогонтериевого слона (*Mammuthus trogontherii* Pohl.), являющегося типичным представителем тираспольского фаунистического комплекса (Анисюткин, 2010).

Поиск древнейшего раннего палеолита на VII надпойменной террасе стимулировали находки отдельных окатанных отщепов в нижней части склона местонахождения Большой Фонтан, где отчетливо прослеживались отложения пойменного и руслового аллювия данной террасы. К этому времени было установлено, что аллювий рассматриваемой террасы надежно датируется эоплейстоценовым временем (Антропоген и палеолит..., 1986; Адаменко и др., 1996).

¹ Исследование проведено в рамках выполнения программ ФНИ РАН по теме государственной работы № 0184-2019-0001 «Древнейшие обитатели России и сопредельных стран: пути и время расселения, эволюция культуры и общества, адаптация к природной среде».

² Отдел палеолита, ИИМК РАН; Дворцовая наб., д. 18, Санкт-Петербург, 191186, Россия.

³ Понятие «эоплейстоцен», применяемое геологами нашей страны, эквивалентно понятию «ранний плейстоцен» по международной шкале.

Рис. 1. А — расположение стоянки Байраки на юге Восточно-Европейской равнины; Б — памятники раннего палеолита в пределах Молдовы и Нижнего Приднестровья; В — памятники раннего палеолита в окрестностях города Дубоссары: 1 — Байраки, 2 — Большой Фонтан, 3 — Крещесты

Fig. 1. A — location of the site of Bayraki in the south of the East-European Plain; B — lower Palaeolithic sites within the boundaries of Moldova and Lower Dniester region; B — Early Palaeolithic sites around the city of Dubossary: 1 — Bayraki, 2 — Bolshoy Fontan, 3 — Crecești

Однако начать исследования удалось лишь спустя более двух десятков лет. Прекращение работ было связано с развалом Советского Союза и наступившим затем периодом нестабильности в Республике Молдова. Исследования смогли возобновиться в 2010 г. и ознаменовались открытием ожидаемого объекта, который был выявлен в 1,5 км севернее местонахождения Большой Фонтан (прежде Дубоссары 1) в балке Байраки. В данном случае на VII надпойменной террасе левобережья Днестра был обнаружен самый ранний палеолитический памятник Восточно-Европейской равнины возрастом около 1 млн лет (рис. 1). Несколько позднее синхронный объект Крещесты удалось открыть в 3 км северо-западнее балки Байраки (Анисюткин и др., 2012; 2013).

Первые памятники эоплейстоценового возраста были выявлены в пределах юга России — в Дагестане и на Тамани — в начале XXI в. (Амирханов, 2007, 2016; Анойкин, 2008; Щелинский,

Кулаков, 2007). Гораздо раньше артефакты этого времени были известны за Карпатскими горами, уже в пределах Центральной Европы. Там они обнаружены в нижних слоях местонахождения раннего палеолита Королево 1 с датой для культурно-хронологического комплекса VII, равной 850 тыс. лет (Гладилин, Ситливый, 1990; Кулаковская, 2003; Степанчук, 2006). Эоплейстоценовая каменная индустрия открыта и исследуется также на Балканах в нижних слоях пещеры Козарника (Иванова, 2009).

Важно напомнить, что Приднестровье относится к числу тех регионов бывшего Советского Союза, где четвертичные отложения были наиболее полно и детально изучены. Эти масштабные работы всегда были нацелены на комплексное исследование плейстоценовых отложений, связанных с хорошо выраженной «лестницей» речных террас Днестра. Так, в районе г. Тирасполь удалось установить, что аллювий VII надпойменной

террасы имеет эоплейстоценовый возраст, соответствуя палеомагнитной эпохе матуяма. Здесь отложения руслового аллювия датированы эпизодом харамильо (около 1 млн лет). Дополнительным подтверждением явились две термolumинесцентные даты — 0,94 и 1,1 млн лет (Антропоген и палеолит..., 1986. С. 56). Подобная датировка, как полагал в начале работ А. Л. Чепалыга, ожидалась и для аллювиальных слоев стоянки Байраки, расположенной на этой же террасе у г. Дубоссары. Исследования, проведенные учеными из Института географии РАН и Института геологии РАН в 2010–2014 гг., подтвердили ожидания — аллювиальные отложения нижних слоев стоянки были эоплейстоценовыми, а слои 5 и 6 однозначно соответствовали палеомагнитному эпизоду харамильо. Не противоречила этой дате и находка в слое 3 обломка нижней челюсти зюссенборнской лошади (*Equus (Alohippus) aff. sussenbornensis* W.), которая считается характерной для таманского фаунистического комплекса (Четвертичная система..., 1982. С. 272).

В отличие от местонахождений Дагестана и Тамани, артефакты комплекса Байраки оказались более молодыми. К тому же, согласно предварительным данным, каменная индустрия стоянки Байраки существовала в иных экологических условиях (Чепалыга и др., 2011).

Изучение индустрий, сопоставляемых по совокупности технических и морфологических признаков с олдованом (Mode 1), позволило получить интересную информацию о специфике региональных комплексов этого времени. Основные системы анализа, как известно, были разработаны на африканских материалах, но был учтен и собственный опыт. В этом случае полезно принять во внимание опыт исследования олдованского комплекса, проведенного Х. А. Амирхановым на юге Йемена еще в 80-х гг. прошлого века (Амирханов, 1991).

В данной ситуации публикации российских ученых представляют особый интерес, позволяя несколько по-иному оценить полученные данные, обратив внимание на своеобразие изучаемых комплексов (Амирханов, 1991; 2017; Шелинский, 2014; Проблемы палеолита Дагестана, 2012; Анисюткин, 2017).

В предлагаемой здесь статье анализируется технология комплекса древнейшего раннего палеолита юго-запада Восточно-Европейской равнины, представленного коллекцией слоя 5 стоянки

Байраки с многочисленными артефактами, достаточными для полноценного научного анализа (Анисюткин и др., 2015).

Используемые источники

Стоянка Байраки была открыта в 2010 г. и изучалась российско-молдавской археологической экспедицией, включая ученых из ИИМК РАН, Института культурного наследия Академии наук Молдовы, а также геологов и палеогеографов из Института географии РАН и Института геологии РАН, в 2011–2014 гг. Междисциплинарные исследования на стоянке организовал и курировал профессор А. Л. Чепалыга (Институт географии РАН). Благодаря грантам этого ученого экспедиция смогла продолжить работы также в 2013 и 2014 гг.

Археологические и редкие палеонтологические находки связаны с древними отложениями балки Байраки, расположенной в северной (верхней) части ныне не действующего гравийного карьера на окраине молдавского г. Дубоссары. Координаты местонахождения: N 47°16'27" и E 29°11'10" (Анисюткин и др., 2012; 2013; 2015).

Геоморфология и стратиграфия

Относительно короткая балка Байраки, расположенная на северо-восточной окраине г. Дубоссары, прорезает древнюю VII (Кицканскую) надпойменную террасу левобережного Днестра. В верхней части она представлена пологой ложбиной, частично заполненной голоценовым гумусированным делювием. Склоны балки имеют разное геологическое строение. Правый борт сложен более молодым двух- или трехслойным делювием, который соответствует эрозии среднечетвертичного времени. Изучаемый ключевой участок с более древними отложениями, вскрытый в раскопе и серии разрезов, расположен на левом склоне западной экспозиции балки, на месте бывшего гравийного карьера.

Для получения ясного представления о стратиграфии стоянки кроме закладки основного раскопа были проведены дополнительные работы. В сезоны 2011 и 2012 гг. сплошной зачисткой протяженностью более 70 м вправо от раскопа был вскрыт левый борт балки в ее верхней прибрежной части, где мощность четвертичных отложений заметно увеличивается. Разрезы вскрыли элементы разновозрастного погребенного рельефа. В заполнениях палеоврезов (на склонах и днищах) обнаружены новые стратиграфические слои.

Общая площадь раскопа составила около 30 кв. м. Характер сохранности отложений и их последовательность на участке раскопа имели свои особенности. Все три ископаемые почвы лежали на склоне одна на другой почти без перебива, создавая сложности при их разделении. Эту проблему позволили решить расчистки, где удалось обнаружить слои и горизонты, отсутствующие или слабовыраженные в пределах раскопа. Мощность общего разреза раскопа — более 9 м, где на долю субэзальных отложений приходится более 3 м. В целом отложения можно подразделить на три толщи.

Верхняя толща представлена голоценовой почвой без археологических находок мощностью около 1,5 м.

Толща отложений четвертичного возраста начинается с лессовидного суглинка желто-коричневого цвета мощностью 0,2–0,4 м. Ниже лежат три слоя ископаемых почв, включая верхнюю почву коричневого цвета, мощность которой не превышает 0,6 м, и лежащую ниже среднюю красноцветную почву, состоящую из двух горизонтов и имеющую мощность 0,4 м.

Самой нижней является гидроморфная ископаемая почва типа глеезема, выделенная почвоведом С. А. Сычевой. Эта почва мощностью более 0,6 м, сформирована на поверхности пойменного аллювия. Она относится к эоплейстоценовому времени. Почва разбита вертикальными трещинами, идущими из средней почвы и заполненными красноцветным суглинком, имеющим слоистую структуру.

В разрезе расчистки ниже по склону удалось выделить два лессовидных горизонта, связанных с палеоврезами, разделяющих эти ископаемые почвы. Палеомагнитный анализ образца суглинка, перекрывающего нижнюю гидроморфную почву, показал обратную намагниченность.

Пойменная фация аллювия, перекрытая нижней гидроморфной почвой, характеризуется чередованием белесовато-голубой супеси с ржавыми прослоями опесчаненных глин. В нижней части этих отложений выявлен бедный археологический слой 4. Мощность пойменных отложений различна и варьирует от 4,2 до 4,8 м.

Старичный аллювий характеризуется отложениями чередующихся прослоев серого алевроита и оранжево-бурых глеевых слойков, окрашенных в процессе ожелезнения, которым сопутствуют карбонатные стяжения. Общая горизонтальная

слоистость данных отложений нарушается на отдельных участках проседанием грунта. Толщина алевроитовых прослоев достигает 10 см, глеевых слойков — около 3 см. Границы слоя четкие, общая его мощность — около 70 см. Ниже по склону эти отложения резко падают вниз, срезая песчано-гравийные отложения руслового аллювия с артефактами.

Лежащий ниже русловой аллювий достигает в раскопе мощности свыше 3 м. Он подразделен на три литологических слоя.

Верхний литологический слой 9 представлен отложениями светло-коричневого цвета, состоящими из крупнозернистого песка с тонкими линзами очень мелкого гравия. Это отложения пляжного типа. Здесь выявлены многочисленные каменные артефакты, включая крупные галечные формы и мелкие орудия из кремня. Среди них имеются окатанные изделия. Ниже прослеживаются песчанистые отложения темного окраса из-за марганцевых включений на коричневом мелко-галечном субстрате. По-прежнему много артефактов из кремня, реже песчаника, по-разному окатанных, приуроченных к линзам неплотной породы. Среди нескольких небольших обломков неопределимых костей найден фрагмент пяточной кости мелкого *Cervidae*. Основанием слоя является прослой светло-серого песка с включениями мелкой гальки, к северному краю разреза близкого к выклиниванию, с единичными слабо окатанными кремневыми находками. Этот литологический слой 9 имеет мощность около 1 м (550–640 см).

Слой 10 состоит из нескольких горизонтов. Найденные здесь артефакты были отнесены к археологическому слою 5. В слое увеличивается количество гравийно-галечного материала. Нижний горизонт перенасыщен разноразмерной галькой, но крупных галек нет. Здесь встречаются многочисленные, нередко окатанные артефакты и мелкие обломки неопределимых костей. Этот слой имеет мощность около 1,5 м (640–780 см).

Слой 11. Галечник, местами сцементированный, — конгломерат. Ниже, в гравийно-галечном слое, встречаются единичные интенсивно окатанные кремневые изделия. Это переотложенный археологический слой 6. Глубина залегания — 780–800 см.

Всего на раскопе обнаружено 6 слоев с находками каменных артефактов раннего палеолита. Они заметно деформированы эрозионными

процессами и не являются подлинными культурными слоями, а могут рассматриваться как горизонты распространения археологических находок разной сохранности.

Лучшую сохранность имеют немногочисленные кремневые изделия из слоя 2 и, возможно, слоя 4. Сильно разрушенными и даже переотложенными следует считать слои 1 и 6 (рис. 2).

Не исключено, что между красноцветной и лежащей ниже гидроморфной почвами с археологическими слоями 2 и 3 был еще один разрушенный древней эрозией археологический слой. На это указывает находка чопперовидного скребла из делювиального суглинка. Образец этого суглинка, отобранный для палеомагнитного анализа, показал обратную намагниченность, свидетельствуя о начале палеомагнитной эпохи матуяма. В этом случае перед нами самая поздняя в разрезе находка каменного артефакта эоплейстоценового возраста.

Анализируемая коллекция каменных изделий слоя 5 происходит из нескольких горизонтов находок разной сохранности, указывающих на существование ряда сезонных стоянок на береговой линии реки или лимана. Люди селились здесь неоднократно, скорее всего, на обширной песчаной косе или острове. При подъеме уровня воды места стоянок затапливались, но не подвергались интенсивным размывам. На это указывает наличие в слое обильных чешуек и мелких отщепов кремня размерами менее 15 мм. Как свидетельствует практика, подобные предметы обычно не сохраняются в слоях, разрушенных водными потоками. В этом плане показательным, что в нижних горизонтах литологического слоя 10, где увеличивается количество гравийно-галечного материала, чешуйки и очень мелкие изделия единичны. Нет чешуек и в переотложенном слое 6. Наиболее насыщенные мелким материалом, включая чешуйки, были именно верхние горизонты, представляя пляжные отложения верхней части литологического слоя 9. Здесь, на участке около 5 кв. м, найдено отчетливое скопление многочисленных кремневых изделий, включая большинство нуклеусов и чешуек, малочисленных на прочей части раскопа.

В качестве примера укажу, что среди находок самого нижнего слоя мустьерской стоянки Кетросы, связанного с отложениями пойменного аллювия, полностью отсутствуют кремневые чешуйки и мелкие отщепы. Зато они обильны в субэриальных отложениях лежащего выше основного

культурного слоя 2 хорошей сохранности (Анисюткин, 2013).

Каменная индустрия археологического слоя 5. Коллекция всех горизонтов слоя 5 рассматривается как единый комплекс. В пределах слоя каменные изделия, включая нуклеусы и орудия, практически неразличимы. Это же можно отметить и по поводу сохранности поверхности артефактов: в одном и том же горизонте имелись как окатанные, так и неокатанные предметы.

Сырье. По составу каменного сырья коллекция артефактов из слоя 5 весьма разнородна, что указывает на использование нескольких месторождений источников сырья. Крупные рубящие орудия изготовлены преимущественно из галек твердого косоуцкого песчаника. Единственное галечное орудие сделано из менее прочного девонского песчаника. Подавляющее большинство мелких изделий и нуклеусов изготовлены из черного желвачного, а также серого и темно-серого кремня. Малочисленны изделия из яшмо-кварцита, кварца и роговика.

Черный (сеноманский) желвачный кремнь обнаружен в известняках сарматского возраста, выходы которых расположены ниже по долине балки Байраки на небольшом удалении от стоянки. Кроме того, эта разновидность кремня известна из руслового аллювия более древних террас, насыщенного мелкими окатанными желвачками и галечками.

Также местное происхождение имеет серый (туронский) кремнь. Менее окатанными и более износостойчивыми являлись изделия из темно-серого мелового кремня, близкого по тональности к черному, но имеющего светло-серые вкрапления. Именно из такого сырья изготовлены наиболее хорошо сохранившиеся орудия. Для этого сырья свойственна высокая пластичность, обеспечивающая качественный раковистый излом. Вместе с тем раскалывание этого кремня было затруднено из-за обилия каверн и значительной распространенности меловой корки.

Преобладал черный кремнь (52 %), серый кремнь был менее многочисленен (44 %). Важно обратить внимание на то, что применяемое кремневое сырье было весьма низкого качества. Так, два желвака серого кремня размерами около 10 см, найденных в отвалах карьера, имели трещиноватую структуру. С них, как показали эксперименты, не удалось снять отщепов размерами крупнее 3 см.

Рис. 2. Геохронологическая позиция стоянки Байраки в биостратиграфической и магнитостратиграфических шкалах: а-в — намагниченность (а — нормальная, б — обратная, в — аномальная)

Fig. 2. Geochronological position of the site of Bayraki in the biostratigraphic and magnetostratigraphic scales: а-в — magnetization (а — normal, б — inverse, в — abnormal)

Сохранность поверхностей артефактов слоя 5 различна. Преобладают окатанные предметы, но степень оглаженности поверхностей разная. Среди сильно окатанных изделий нет предметов со следами соударений. Окатанность связана с особенностями расположения того или иного участка стоянки. Важно, если иметь в виду современные реалии, что люди обитали здесь, скорее всего, в конце лета — начале осени в периоды низкого стояния уровня воды. Во время паводков места стоянок оставались. Артефакты оказывались затопленными на небольшой глубине и перемещались вместе с частицами песка. Изделия, попавшие на участки с более заметным течением, окатывались наиболее интенсивно. Напротив, предметы с участка со слабым течением или быстро погребенные оставались слабо окатанными или неокатанными.

Анализ коллекции

Всего в комплексе имеется 888 артефактов, большая часть которых была найдена на участке в 5 кв. м, где было выявлено около 700 экз. Представлены все категории изделий, включая орудия, нуклеусы, отщепы, осколки и многочисленные чешуйки. Отбойники из галек песчаника и кварцита найдены в количестве четырех предметов. Одна из песчаниковых галек использовалась в качестве ретушера.

Приведу в табл. 1 данные о коллекции слоя 5, где представлены все категории находок, включая нуклеусы, орудия и продукты раскалывания.

Таблица 1. Общие данные о количестве изделий слоя 5
Table 1. General data on the number of artefacts in layer 5

Находки	Количество, экз.
Нуклеусы	40
Отщепы и чешуйки	651
Орудия на отщепах и осколках	140
Галечные орудия	53
Отбойники (ретушеры)	4
Итого	888

Сколы. Отщепы и чешуйки являются наиболее многочисленной категорией находок. К чешуйкам условно отнесены изделия размерами менее 12 мм. Единичными образцами представлены мелкие пластинки и резцовые сколы, которые можно рассматривать как результат применения техники дробления (рис. 5, 11, 13).

Для общего представления о сколах используется серия из 200 хорошо морфологически выраженных предметов, включая вещи со вторичной обработкой (рис. 3, 4, 5). Длина изделий определялась по оси скалывания. Средняя длина отщепов достигает лишь 32,3 мм. Наиболее крупный из них, изготовленный из гальки яшмо-кварцита, имеет длину 64 мм, а самый мелкий отщеп с ретушью — 13 мм.

Таблица 2. Размеры отщепов слоя 5
Table 2. Dimensions of flakes from layer 5

Размеры отщепов, мм	Количество, экз.	Доля, %
Очень мелкие, 12–20	40	20
Мелкие, 21–50	148	74
Средние, > 50	12	6
Итого	200	100

Как следует из табл. 2, господствуют изделия мелких размеров. Преобладают отщепы длиной 21–49 мм, среди которых обильны предметы с общим индексом массивности более 30. Стандартных форм нет. Много укороченных реберчатых отщепов. Несмотря на разнообразие форм, в коллекции имеются выразительные пластинчатые отщепы (рис. 3, 6; 4, 4, 10; 5, 7, 10) и даже подобие неретушированного «леваллуазского» острия на мелком и тонком треугольном отщепе с удаленной ударной площадкой (рис. 5, 9).

Ограничение дорсальных поверхностей отщепов было разным (табл. 3). По характеру огранки спинки выделены четыре группы изделий. К первой отнесены первичные отщепы с корочным покрытием, ко второй — отщепы с единичными снятиями, к третьей группе — предметы, где негативов снятий выявлено не более трех, и к четвертой — отщепы, на спинках которых есть негативы от более чем трех снятий.

Таблица 3. Количество негативов сколов на спинках кремневых отщепов
Table 3. Number of negatives of blows on the backs of flint flakes

Наличие сколов, шт.	Количество, экз.	Доля, %
Нет (первичные)	18	10
Единичные	44	24,5
2–3	98	54,4
> 3	20	11,1
Итого	180	100

Отщепы с немногочисленными негативами сколов преобладают. Это можно объяснить как характером сырья, представленного в основном кремневыми желваками и гальками небольших размеров, так и примитивностью техники первичного раскалывания камня.

Среди отщепов с сохранившимися ударными площадками заметна общая для индустрий типа Mode 1 тенденция преобладания естественных площадок. Обратимся к табл. 4.

Таблица 4. Типы ударных площадок отщепов
Table 4. Types of striking platforms of the flakes

Тип площадок	Количество, экз.	Доля, %
Естественные	102	51,0
Гладкие	41	20,5
Двугранные	6	3,0
Фасетированные	4	2,0
Неопределимые	47	23,5
Итого	200	100

Среди определимых ударных площадок преобладают естественные, то есть сохраняющие корку, реже представлены гладкие площадки, единичны двугранные и грубо фасетированные площадки. Последние виды площадок трудноопределимы и не являются полным аналогом фасетированных площадок. Они случайны и не указывают на намеренную подправку. К неопределимым ударным площадкам отнесены точечные и линейные, но преобладают площадки, разбитые при раскалывании. Выявлены как скошенные, так и прямые площадки.

Ударные бугорки слабо выступают или не выступают. Найдены отщепы с неконическими основаниями (рис. 4, 6, 7). Выпуклые ударные бугорки характерны для очень мелких отщепов или чешуек.

Так, заметная часть отщепов длиной свыше 40 мм была превращена в орудия (рис. 3, 6, 13). К примеру, самый крупный отщеп из яшмо-кварцита применялся как нож с угловой режущей кромкой и подправкой полукрутой ретушью поперечного края (обушка), в котором можно заметить аналог атипичным орудиям клювовидной формы типа Bill-hook, но без выемки (рис. 3, 13). На относительно крупном отщепе удлинённой формы (длиной 47 мм) было изготовлено комбинированное орудие, сочетающее типичное боковое скребло и выразительное клювовидное острие типа Bill-hook (рис. 5, 15).

Нуклеусы

Общее число предметов сложно определить точно по причине невыразительности морфологии, что характерно для индустрий этого времени. В целом выделено 40 достаточно четко выраженных нуклеусов (рис. 6; 7). По площади раскопа они распределены весьма неравномерно. Значительная их масса сосредоточена лишь в восточной части раскопа на площади около 5 кв. м, где найдено 25 нуклеусов. Преобладают остаточные формы мелких размеров длиной 3–5 см. Это указывает на то, что сырье приносилось на стоянку со стороны. На месте стоянки сырьевого материала нет. В отложениях слоя 5 отсутствуют галька и обломки кремня, пригодные для раскалывания. Мелкие галечки песчаника и яшмы диаметром не более 2–3 см, постоянно встречаемые в слое, были малочисленны.

Нуклеусы подразделены на одноплощадочные — 5 экз., двуплощадочные — 3 экз., радиальные — 4 экз., многоплощадочные (многогранные) — 6 экз., но преобладают атипичные — 22 экз. Найдено несколько предметов с плоскостным расщеплением. Среди них особо выразительным является одноплощадочный, который можно сопоставить даже с нуклеусами среднего палеолита (рис. 6, 11). Характерно почти полное отсутствие стандартных форм с подготовленными для раскалывания площадками. Нуклеусы по причине примитивности техники раскалывания слабо сработаны, а полезная масса их не была использована в полной мере.

На нуклеусах в качестве ударных площадок чаще всего использовались естественные поверхности. Дополнительная подготовка площадок и плоскостей скалывания отсутствовала. В качестве нуклеусов применялись и чоперы. В свою очередь многие из ядрищ переоформлялись в орудия. Чаще всего это были нуклевидные скребки (рис. 7). Преимущественно использовались многоплощадочные ядрища шаровидной формы (рис. 7, 8). Скребковый рабочий край оформлялся отвесной ретушью на том или ином участке с острой кромкой. Иногда рабочий край выделялся подправкой с вентральной плоскости (рис. 6, 7).

Подобное явление можно считать весьма характерным для индустрий Mode 1. Похожие скребковидные формы прослеживаются не только в палеолите Африки (Harris, Isaac, 1976; Schick, Toth, 2006), но и, к примеру, в комплексах стоянок Тамани, где они описаны как

Рис. 3. Стоянка Байраки. Слой 5. Кремневые орудия: 1, 4, 5, 8-10, 12 — отщепы; 2, 3, 7, 11 — отщепы с ретушью; 6 — пластинка с крутой ретушью поперечного конца; 13 — нож с угловой режущей кромкой и поперечной ретушью дистального конца

Fig. 3. Site of Bayraki. Layer 5. Tools: 1, 4, 5, 8-10, 12 — flakes; 2, 3, 7, 11 — flakes with retouch; 6 — blade with abrupt retouch of the transversal end; 13 — knife with an angle cutting edge and transversal retouch of the distal end

Рис. 4. Стоянка Байраки. Слой 5. Кремневые орудия: 1, 3 — отщепы с точечными площадками;

2, 9, 11 — отщепы с ретушью и следами утилизации; 4 — пластинка с мелкой ретушью;

5, 12, 14, 15 — реберчатые отщепы; 6–8, 13 — отщепы; 10 — пластинчатый отщеп

Fig. 4. Site of Bayraki. Layer 5. Tools: 1, 3 — flakes with point striking platforms; 2, 9, 11 — flakes with retouch and traces of use; 4 — blade with fine retouch; 5, 12, 14, 15 — ridge flakes; 6–8, 13 — flakes; 10 — blade-like flake

Рис. 5. Стоянка Байраки. Слой 5. Кремневые отщепы и орудия из них: 1, 11 — клювовидные орудия типа Bill-hook на обломках отщепов; 2 — зубчатое орудие; 3, 5, 8 — скребла; 4 — отщеп; 7, 10 — пластинчатые отщепы; 6 — скребок на отщепе; 9 — треугольное острие на тонком отщепе; 12 — отщеп с ретушью; 13 — обломок с резцовым сколом; 14 — острие на отщепе; 15 — комбинированное орудие (скребло и форма типа Bill-hook)

Fig. 5. Site of Bayraki. Layer 5. Flint flakes and tools on them: 1, 11 — becs of the Bill-hook type on fragments of flakes; 2 — denticulate tool; 3, 5, 8 — end scrapers; 4 — flake; 7, 10 — blade-like flakes; 6 — end scrape on flake; 9 — triangular point on thin flake; 12 — flake with retouch; 13 — piece with a burin blow; 14 — point on flake; 15 — combined tool (end scraper and a form of the Bill-hook type)

Рис. 6. Стоянка Байраки. Слой 5. Кремневые нуклеусы и нуклеидные орудия: 1, 2, 4, 11 — одноплощадочные; 3, 9 — двуплощадочные; 5 — многоплощадочный; 6, 10 — радиальные; 7, 8 — нуклеидные орудия (7 — вентральная подправка создает скребковидный рабочий край)

Fig. 6. Site of Bayraki. Layer 5. Flint nuclei and core-shaped tools: 1, 2, 4, 11 — single-platform; 3, 9 — double-platform; 5 — multi-platform; 6, 10 — radial; 7, 8 — core-shaped tools (7 — ventral resharping produces a scraper-like working edge)

Рис. 7. Стоянка Байраки. Слой 5. Кремневые нуклеусы и нуклеидные формы: 1, 4, 6 — нуклеусы (1 — многоплощадочный шаровидной формы; 4, 6 — одноплощадочные); 2, 3, 5, 7, 8 — скребки нуклеидные (7 — на многоплощадочном ядрище)

Fig. 7. Site of Bayraki. Layer 5. Flint nuclei and core-shaped tools: 1, 4, 6 — cores (1 — multi-platform of globular shape; 4, 6 — single-platform); 2, 3, 5, 7, 8 — core-shaped end-scrapers (7 — on a multi-platform core)

чопперовидные скребла и нуклеидные скребки (Шелинский, 2014).

В целом анализ ядрищ и отщепов указывает на неразвитость техники первичного раскалывания камня. Об этом свидетельствует полное отсутствие предварительной подготовки как поверхностей скалывания, так и ударных площадок,

а также массивность и многообразие форм отщепов. Обилие мелких орудий, вероятно, можно считать вынужденной мерой, зависимой, прежде всего, от особенностей сырья, из которого изготовление отщепов более крупных размеров весьма затруднительно. Впрочем, этот вывод требует дополнительной проверки.

Сопоставление с комплексами олдована

По всем показателям комплекс слоя 5 соответствует примитивным и неразвитым каменным индустриям, которые сопоставимы с олдованскими. Для получения отщепов широко применялись различные приемы скалывания, включая биполярную технику и дробление. Раскалывание шло под острым углом между рабочей площадкой и плоскостью скалывания. Для изготовления орудий нередко использовались угловатые обломки с острыми краями, полученные техникой дробления. Среди отщепов нет стандартных форм. Основная часть отщепов имеет мелкие размеры, укороченные пропорции и значительную массивность.

По размерам отщепов комплекс слоя 5 входит в круг каменных индустрий технокомплекса типа Mode 1 с преобладанием мелких изделий. Для примера использованы опубликованные комплексы олдована Африки и Юго-Западной Европы (Испания), включая такие как Гона, Эйн Ханеш, Кооби Фора, Барранка Леон, Фуэнте Нуэва, где средняя длина отщепов находится в пределах 32–38 мм. В их число входит и комплекс слоя 5 со средним показателем длины отщепов, равным 32,3 мм.

Для олдована характерно обилие артефактов, сохраняющих на своих поверхностях значительные участки корочного покрытия, что свидетельствует о неразвитости технологии. Для подтверждения этого сопоставим данные слоя 5 с комплексами подлинного олдована, используя методику, разработанную американским исследователем Н. Тотом. Данная методика основана на анализе коллекции известной стоянки Кооби Фора (Isaac, 1983). По материалам из слоя FxJj 50 удалось выявить технологическую цепочку получения отщепов при раскалывании галечного материала. Предложенный пример недостаточно учитывает многообразие сырья и способов его раскалывания. Так, представлен лишь один из возможных вариантов частично двусторонней оббивки галек. Тем не менее этот пример показался мне интересным и используется в исследовании. По наличию корочного покрытия отщепы подразделены на семь условных типов (рис. 8).

Тип I: отщепы (первичные), целиком покрытые коркой.

Тип II: отщепы с покрытой коркой площадкой и частичной коркой на дорсальной поверхности.

Тип III: отщепы без корки на дорсальной поверхности, но с корочной площадкой.

Тип IV: отщепы первичные, но с выделенной сколом гладкой площадкой.

Тип V: отщепы с частичной коркой лишь на дорсальной поверхности и гладкой площадкой.

Тип VI: отщепы без корки.

К типу VII отнесены предметы с неясными признаками, которые в данном исследовании не рассматриваются.

Для сопоставления, напомним еще раз, используются материалы олдована разного возраста, начиная с древнейшей африканской стоянки Гона возрастом 2,6 млн лет и комплекса Кооби Фора (слой FxJj 50) — 1,6 млн лет. В качестве примера приводятся коллекции стоянок Барранка Леон (БЛ) и нижнего горизонта слоя 3 Фуэнте Нуэва (ФНЗ) из Южной Испании, которые по возрасту (1,2 млн лет) близки Байракам.

Важно отметить, что на памятниках использовалось разное каменное сырье: в Африке это преимущественно изверженные породы, а в Европе — кремль, кварцит и известняк (Semaw, 2006; Isaac, 1983; Fajardo, 2009).

Для контраста даны материалы двух более поздних комплексов раннего палеолита Приднестровья. В одном случае это коллекция стратифицированного материала из местонахождения Ярово, определенная как тейяк. Комплекс датируется концом раннего — началом среднего палеолита. Второй, более ранний, комплекс, связанный с отложениями миндельского или даже кромерского времени, представлен коллекцией местонахождения Большой Фонтан. Использованный здесь кремль отличался хорошим качеством. Тем не менее среди отщепов и орудий из них преобладали изделия мелких размеров, подавляющая часть которых не превышала 50 мм (Анисюткин, 2001; 2010). Обратимся к табл. 5.

Из анализа табл. 5 следует, что в комплексе слоя 5 стоянки Байраки многочисленны изделия со значительным корочным покрытием. Среди них преобладают отщепы I–III типов (66,7 %). Несколько меньше изделий с частичным корочным покрытием или без него (типы V и VI; 28,6 %). Можно обратить внимание на малое количество отщепов типа IV.

Среди стоянок африканского олдована также преобладают первые три типа отщепов. Особенно это показательно для древнейшего комплекса Гона, где сколов с сохранившейся галечной коркой особенно много. Для комплекса Кооби Фора эта группа отщепов (типы I–III) лишь

Рис. 8. Схема последовательной обработки гальки, основанная на реальных материалах стоянки Кооби Фора. Представлены этапы раскалывания и образование «типов» отщепов (Toth, 1982; Isaak, 1983). Т — тип

Fig. 8. Scheme of the consecutive working of a pebble studied on the basis of real materials from site of Koobi Fora. Phases of knapping and formation of “types” of flakes (Toth, 1982; Isaak, 1983). T — type

Таблица 5. Сопоставление комплекса отщепов слоя 5 стоянки Байраки с индустриями олдована и раннего палеолита

Table 5. Comparison of flakes from layer 5 at the site of Bayraki with Oldowan and Early Palaeolithic industries

Комплекс	Доля типа, %					
	Тип I	Тип II	Тип III	Тип IV	Тип V	Тип VI
Байраки	14,0	28,7	24,0	4,7	14,6	14,0
Гона	2,0	29,0	45,0	2,0	10,0	12,0
Кооби Фора	7,6	23,0	13,4	7,1	28,4	20,5
Барранка Леон	7,8	3,2	13,8	5,05	18,8	49,7
Фуэнте Нуэва 3	14,7	8,2	8,8	0,98	21,5	44,1
Ярово	0,0	0,7	0,7	2,1	50,5	46,0
Большой Фонтан	3,1	5,0	6,2	5	48,4	32,3

незначительно превосходит вторую. На рассматриваемых стоянках преобладало сырье из эффузивных пород. Причем, нужно подчеркнуть существенную разницу в возрасте. Сходную с Кооби Фора картину дает североафриканский вариант олдована из Эйн Ханеш (Алжир), где основой сырья был кремьен. Здесь разница между группами также небольшая (Sahnouhi, 2006).

Для каменных индустрий с юга Испании характерна несколько иная картина. Так в комплексе ФНЗ отчетливо преобладает группа отщепов типа V и VI (более 65 %). Группа же отщепов типа I–III составляет почти 32 %. Похожую тенденцию можно заметить в комплексе БЛ, где группа типа I–III достигает почти 25 %, а V и VI — 68,5 %. В данном случае некоторое различие можно объяснить влиянием более качественного сырья, использованного в комплексе БЛ, где абсолютно

преобладает кремьен. В комплексе же ФНЗ кремьен и известняк использовались в равном количестве (Fajardo, 2009).

Резкий контраст с показателями каменных индустрий олдована дают комплексы приднепровского раннего палеолита. Здесь группа изделий с корочным покрытием слабо представлена в тейяке, но более заметна в раннем палеолите. В коллекции Ярово она составляет всего 1,4 %, а в Большом Фонтане — 14,3 %. Напротив, группа отщепов типов V и VI достигает в Ярово наибольшего значения — 96,5 %. Также много этих отщепов и в коллекции БФ (более 80 %). В комплексе Ярово мало естественных (галечных) ударных площадок, но относительно много в Большом Фонтане, где их количество достигает четверти всех отщепов с определяемыми площадками.

В данном случае перед нами две разные технологические системы. В олдоване она еще не

выработана и почти целиком зависит от качества сырья. В раннем же палеолите мы имеем дело с клетонской технологией, которую можно назвать первой стандартизированной технологией палеолита. Здесь уже имеет место более совершенная и относительно более экономная система использования полезных качеств каменного сырья, позволяющая получать больше нужных сколов с одного ядрища. Особенно показательна тейякская индустрия Ярово, где также господствует технология клетона, но уже присутствуют нуклеусы с подготовленными ударными площадками. К тому же, если иметь в виду ранний палеолит, часто приносимое на стоянку сырье было уже опробовано или даже подготовлено для расщепления.

По совокупности показателей, выявленных на основе методики Н. Тота, показавшей свою продуктивность, комплекс отщепов стоянки Байраки имеет более заметное сходство с представленными комплексами африканского олдована, несколько отличаясь от более близкого ему по возрасту испанского. Частично это можно объяснить весьма плохим качеством сырьевого материала в Байраках. В коллекции испанского олдована кремнь, известняк и кварцит имели более хорошее качество. Сырье отличалось более крупными размерами. Из одного нуклеуса было получено большее число отщепов, что естественно отражалось на показателях, увеличивая количество изделий без корки или с незначительным корочным покрытием. Особенно много здесь отщепов без галечной корки.

Из анализа публикаций олдованских комплексов Тамани и Дагестана мы получаем сходную картину. Так, В. Е. Щелинский отмечает обилие на стоянке Родники первичных и полупервичных отщепов. В коллекции преобладают отщепы с естественными площадками. Исследователь обращает особое внимание на явную архаичность технологии. Отмеченные особенности, связанные с наличием в коллекции значительного количества отщепов крупнее 50 мм, можно объяснить спецификой исходного сырья, в качестве которого использовался твердый окварцованный доломит, имевший форму плитчатых отдельных и их обломков разных размеров, включая весьма крупные (Щелинский, 2014). По совокупности технологических признаков комплексы таманского олдована имеют существенное сходство (Щелинский, 2013). В комплексах дагестанского олдована основой применяемого сырья были кремнь и известняк. Здесь выделены два

варианта — «мелкоорудийная индустрия раннего палеолита» и типичный олдован. Для первого варианта использовался мелкогабаритный кремнь более низкого качества, а для второго (комплексы Айникаб и Мухкай) — более качественный кремнь и известняк (Анойкин, 2017; Амирханов, 2016).

Заключение

Анализ техники первичного раскалывания камня индустрии слоя 5 стоянки Байраки указывает на сходство комплекса с индустриями типа Mode 1 или олдованом. Почти все технологические показатели оказались сопоставимыми. Их вариативность можно объяснить особенностью применяемого сырья. Тем не менее примитивная техника первичного раскалывания камня давала себя знать при весьма разном сырьевом материале, включая сырье более высокого качества. Так, в коллекции каменной индустрии стоянки Кермек на Тамани, где крупные формы могли быть зависимы от использования качественного крупногабаритного сырья, все же обильны отщепы небольших размеров, не превышающие 50 мм (Щелинский, 2013). В коллекциях рассматриваемых памятников, включая Байраки, преобладают примитивные и слабо сработанные нуклеусы, а также мелкие отщепы, отличающиеся массивностью и многообразием форм. Господствуют отщепы и нуклеусы со значительным корочным покрытием. Отметим сочетание крупных галечных форм и мелких орудий на отщепах.

Наши материалы, соответствующие концу отмеченной эпохи, не имеют принципиальных отличий от более ранних комплексов. В плане технологии все индустрии не проявляют элементов развития. Изменения можно проследить лишь в наборах каменных орудий, прежде всего сделанных на отщепах. Среди них впервые прослеживаются серии стандартных форм (Анисюткин, 2017; 2020). Появление таких форм можно рассматривать как пример адаптации древнейших «колонистов» Северного Кавказа к суровым природным условиям обитания на новой для них территории Юго-Запада Восточно-Европейской равнины.

В дальнейшем, если иметь в виду общую тенденцию развития, наиболее заметные изменения в технологии древнейшего раннего палеолита связаны с появлением серий крупных отщепов, которые стали заготовками новых форм орудий ашельского типа, соответствуя развитым индустриям типа Mode 2.

- Адаменко и др., 1996 — Адаменко О. М., Гольберт А. В., Осюк В. А., Матвишина Ж. Н., Медяник С. И., Моток В. Е., Сиренко Н. А., Чернюк А. В. Экосистемы Нижнего и Среднего Днестра. Киев: Феникс, 1996. 200 с.
- Амирханов, 1991 — Амирханов Х. А. Палеолит юга Аравии. М.: Наука, 1991. 344 с.
- Амирханов, 2007 — Амирханов Х. А. Исследование памятников олдована на Северо-Восточном Кавказе. Предварительные результаты. М.: Таус, 2007. 52 с.
- Амирханов, 2016 — Амирханов Х. А. Северный Кавказ: начало преистории. Махачкала: МавраевЪ, 2016. 344 с.
- Анисюткин, 1987 — Анисюткин Н. К. Новое местонахождение раннего палеолита у с. Погребы на Нижнем Днестре // Молдавское Поднестровье в первобытную эпоху. Кишинев: Штиинца, 1987. С 4–15.
- Анисюткин, 1994 — Анисюткин Н. К. Древнейшие местонахождения раннего палеолита на юго-западе Русской равнины // АВ. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994. № 3. С. 6–16.
- Анисюткин, 2001 — Анисюткин Н. К. Мустьерская эпоха на юго-западе Русской равнины. СПб.: Европейский Дом, 2001. 310 с.
- Анисюткин, 2010 — Анисюткин Н. К. Новые данные изучения раннепалеолитических местонахождений на верхних террасах нижнего течения Днестра // Древнейшие обитатели Кавказа и расселение предков человека в Евразии. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2010 (Тр. ИИМК РАН; Т. XXXV). С. 172–187.
- Анисюткин, 2013 — Анисюткин Н. К. Мустьерская стоянка Кетросы в контексте среднего палеолита Восточной Европы. СПб.: Нестор-История, 2013 (Тр. Костенковско-Борщевской археологической экспедиции ИИМК РАН; Вып. 7). 172 с.
- Анисюткин, 2017 — Анисюткин Н. К. К вопросу о стандартизации каменных орудий в индустриях эоплейстоценового возраста на юго-западе Восточной Европы // Вестник Московского университета. М.: МГУ, 2017 (Серия XXIII: Антропология, № 1). С. 133–140.
- Анисюткин, 2020 — Анисюткин Н. К. К вопросу об эволюции эоплейстоценовых каменных орудий на территории Восточно-Европейской равнины // АВ. СПб.: ИИМК РАН, 2020. Вып. 27. С. 24–37.
- Анисюткин и др., 2012 — Анисюткин Н. К., Чепалыга А. Л., Коваленко С. И., Очередной А. К. Раскопки стоянки раннего палеолита Байраки в 2011 году // Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск, 2012. № 4 (52). С. 19–27.
- Анисюткин и др., 2013 — Анисюткин Н. К., Степанчук В. Н., Чепалыга А. Л. Крецешты, новое местонахождение раннего палеолита с галечной индустрией на Днестре: Каменные изделия, геологические условия, возраст // Древнейший Кавказ: перекресток Европы и Азии / Ред. С. А. Васильев. СПб.: ИИМК РАН, 2013. С. 89–103.
- Анисюткин и др., 2015 — Анисюткин Н. К., Чепалыга А. Л., Коваленко С. И. Предварительные итоги пятилетних исследований (2010–2014 гг.) древнейшей на территории Восточно-Европейской равнины многослойной стоянки раннего палеолита Байраки (Приднестровье) // АВ. СПб.: Дмитрий Буланин, 2015. Вып. 21 (2015). С. 11–30.
- Анойкин, 2008 — Анойкин А. А. Ранний палеолит предгорной зоны каспийского побережья Дагестана (по материалам долины реки Рубас) // Ранний палеолит Евразии; новые открытия: Материалы междунар. конф. (Краснодар–Темрюк, 1–5 сентября 2008 г.). Ростов н/Д.: ЮНЦ РАН, 2008. С. 33–35.
- Анойкин, 2017 — Анойкин А. А. Палеолит Приморского Дагестана: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. 07.00.06 / Институт археологии и этнографии СО РАН. Новосибирск, 2017. 31 с.
- Антропоген и палеолит..., 1986 — Антропоген и палеолит Молдавского Приднестровья. Путеводитель экскурсий VI Всесоюзного совещания по изучению четвертичного периода (Кишинев, 1986). Кишинев: Штиинца, 1986. С. 76–78.
- Гладилин, Ситливый, 1990 — Гладилин В. Н., Ситливый В. И. Ашель Центральной Европы. Киев: Наукова думка, 1990. 268 с.
- Иванова, 2009 — Иванова С. Раннепалеолитни ансамбли от пещерата Козарника // *Saxa loquuntur*: в чест на 65-годишнината на Николай Сираков. София, 2009. С. 29–57.
- Кулаковская, 2003 — Кулаковская Л. В. Новые аспекты исследования Королево // Археологический альманах. Донецк, 2003. № 13. С. 158–169.
- Проблемы палеолита Дагестана, 2012 — Проблемы палеолита Дагестана / Отв. ред. М. В. Шуньков. Новосибирск: ИАЭ СО РАН, 2012. 292 с.
- Степанчук, 2006 — Степанчук В. Н. Нижний и средний палеолит Украины. Черновцы: Зелена Буковина, 2006. 463 с.
- Чепалыга и др., 2011 — Чепалыга А. Л., Анисюткин Н. К., Садчикова Т. А. Древнейшая в Восточной Европе палеолитическая стоянка Байраки на

- Днестре: возраст, палеоландшафты, археология // БКИЧП. М., Наука. 2012. № 71. С. 123–140.
- Четвертичная система..., 1982 — Четвертичная система. Стратиграфия СССР. М.: Недра, 1982. Полутом 1. 337 с.
- Щелинский, 2013 — Щелинский В. Е. Кермек — стоянка начальной поры раннего палеолита в Южном Приазовье // Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии Евразии. К 70-летию академика А. П. Деревянко. Новосибирск: ИАЭ СО РАН, 2013. С. 153–171.
- Щелинский, 2014 — Щелинский В. Е. Эоплейстоценовая раннепалеолитическая стоянка Родники 1 в Западном Предкавказье. СПб.: Периферия, 2014. 168 с.
- Щелинский, Кулаков, 2007 — Щелинский В. Е., Кулаков С. А. Богатыри (Синяя балка) — раннепалеолитическая стоянка эоплейстоценового возраста на Таманском полуострове // РА. 2007. № 3. С. 7–18.
- Fajardo, 2009 — Fajardo B. The oldest occupation of Europe: evidence from Southern Spain // The cutting edge: new approaches to the archaeology of human origin / Eds. K. Schick, N. Toth. 2009 (Stone Age Institute Publication Series; No. 3). P. 115–136.
- Harris, Isaac, 1976 — Harris J. W. K., Isaac G. The Karari industry: Early Pleistocene archaeological evidence from the terrain east of Lake Turkana, Kenya // Nature. 1976. Vol. 262. P. 102–107.
- Isaac, 1983 — Isaac G. Early stages in the evolution of human behaviour: the adaptive significance of stone tools // Zesde Kroon-Voodracht Gehouden Voor de Stichting Nederlands Museum voor Antropologie en Praehistoir. Amsterdam, 1983. P. 5–32.
- Sahnouhi, 2006 — Sahnouhi M. The North African Early Stone Age sites at Ain Hanech // The Oldowan: case studies into the Earliest Stone Age / Eds. N. Toth, K. Schick. Gasport Stone Age Inst. 2009. No. 1. P. 77–112.
- Semaw, 2006 — Semaw S. The oldest stone artifacts from Gona (2,5–2,6 Ma), Afar, Ethiopia: implications for understanding the earliest stages of stone knapping // The Oldowan: case studies into the Earliest Stone Age / Eds. N. Toth, K. Schick. Gasport Stone Age Inst. 2009. No. 1. P. 43–76.
- Schick, Toth, 2006 — Schick K., Toth N. An overview of the Oldowan industrial complex: the sites and the nature of their evidence // The Oldowan: case studies into the Earliest Stone Age / Eds. N. Toth, K. Schick. Gasport Stone Age Inst. 2009. No. 1. P. 3–42.

Technology of primary knapping in the complex of layer 5 at the Eioleptocene site of Bayraki in the Dniester region

N. K. Anisutkin

The paper is devoted to analysis of the technology of the assemblage of lithics of the earliest Palaeolithic of Mode 1 type provenient from layer 5 of the site of Bayraki. The site was discovered in Transnistria (Moldova) in 2010 and was investigated in 2011–2014 when interdisciplinary studies were here conducted. The latter were carried out by archaeologists from Russia and Moldova, as well as by geologists, palaeogeographers and geophysicists from institutes of geology and geography of the Russian Academy of Sciences. Six Early Palaeolithic layers have been distinguished including layers 3, 4, 5 and 6 dated to the end of the palaeomagnetic Matuyama epoch. The lower layers (5 and 6) were formed during the palaeomagnetic Jaramillo event (ca 1 mil. BP). In layer 5, 888 lithics from flint and solid sandstone have been found including 40 cores, 651 flakes, 140 tools on flakes, 53 pebble choppers and 4 pebble hammerstones. Flint scales and small flakes are predominating in the collection. Totally, the complex under consideration corresponds to industries of Mode 1 type. Comparison of the collection from layer 5 with complexes of different times of the Oldowan of Africa, Spain and southern Russia (Dagestan and Taman) has demonstrated their marked similarity although no indication of an evolution has been noted.