Археологические вести

— 30 —

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE FOR THE HISTORY OF MATERIAL CULTURE

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Archaeological news

30
(2020)

Saint-Petersburg
2020

Археологические вести

30
(2020)

Санкт-Петербург
2020

Издание основано в 1992 году

Редакционная коллегия:

Н. В. Хвощинская (главный редактор), О. И. Богуславский, В. С. Бочкарёв, С. А. Васильев, М. Ю. Вахтина, Ю. А. Виноградов, член-корреспондент РАН П. Г. Гайдуков, Т. С. Дорофеева (отв. секретарь), М. Т. Кашуба, А. В. Курбатов, В. А. Лапшин, академик РАН Н. А. Макаров, академик РАН В. И. Молодин, Н. И. Платонова, Н. Ю. Смирнов, Л. Г. Шаяхметова

Археологические вести, Ин-т истории материальной культуры РАН. — **Вып. 30** / [Гл. ред. Н. В. Хвощинская]. — СПб., 2020. — 368 с.: ил.

В очередной номер журнала «Археологические вести» включены статьи, посвященные новейшим исследованиям в области археологии и истории. В разделе «Новые открытия и исследования» рассматриваются отдельные категории археологических древностей от каменного века до средневековья. В ряде работ обсуждаются вопросы хронологии археологических памятников разных эпох, в частности, чустской культуры в Ферганской долине, тагарской в Минусинской котловине, уточняется датировка основного культурного горизонта поселения раннежелезного века Марьянское 1, находящегося в Краснодарском крае, и время сокрытия двух гнёздовских кладов рубежа IX–X вв. Кроме того, две статьи посвящены изучению первоначальных укреплений Старой Ладogi и результатам исследования палеопочв, подстилающих культурный слой этого памятника.

В специальном разделе «Актуальные проблемы археологии» представлены результаты изучения поселения Балка Лисовицкого эпохи бронзы на Таманском полуострове, обосновывается место происхождения и распространения больших прямоугольных пряжек из сибирского гагата в эпоху хунну, а также обсуждается вопрос об особенностях древнерусских фортификационных сооружений. Отдельный раздел посвящен истории науке, также в журнале приводится информация о международных конференциях. Среди авторов журнала ученые из различных научных центров России.

The current issue of “Archaeological news” includes articles devoted to the most recent researches in the sphere of archaeology and history. The section “New discoveries and studies” considers particular categories of archaeological antiquities dated from the Stone Age to the Middle Ages. A series of articles discuss questions of chronology of archaeological sites of different epochs, in particular, of the Chust culture in the Fergana Valley and the Tagar culture in the Minusinsk Kettle; a more precise dating is proposed for the main cultural horizon of the Early Iron Age site of Maryanskoye 1 in Krasnodar Kray and the date of burying of two Gnezdovo hoards at the turn between the 9th and 10th century. In addition, two articles are dedicated to studies of the original fortifications of Staraya Ladoga and the results of investigations of palaeosoils underlying the cultural layer of this site.

The special section “Topical problems of archaeology” presents the results of the investigation of the settlement-site of “Lisovitsky Balka” of the Bronze Age on the Taman Peninsula; the provenience and distribution of large rectangular buckles from Siberian jet of the Xiongnu period are grounded, and the problem on the features of Old-Russian fortifications is discussed. A separate section is dedicated to the history of science. This yearbook also presents information on international conferences. Among the authors of the volume there are researchers from different scientific centres of Russia.

ISSN 1817-6976

Первая страница обложки — пластина-пряжка, Салхит, Монголия (Treasures..., 2011. P. 135, fig. 172)

First page of cover — plate-buckle, Salkhit, Mongolia (Treasures..., 2011. P. 135, fig. 172)

Четвертая страница обложки — пряжка, могильник Культобе в Южном Казахстане (Подушкин, 2012. Рис. 1, 5)

Fourth page of cover — buckle, cemetery of Kultobe in Southern Kazakhstan (Подушкин, 2012. Рис. 1, 5)

© Институт истории материальной культуры РАН, 2020

© Коллектив авторов, 2020

© Российская академия наук, продолжающееся издание
«Археологические вести», 1992 (год основания), 2020

Старая Ладога, СЭМ-исследования растительных остатков из палеопочв, разделенных отложениями Ладожской трансгрессии. Новые материалы и старые проблемы¹

Н. И. Платонова, Г. М. Левковская, Д. А. Брицкий, Л. А. Карцева, В. А. Лапшин, Н. В. Григорьева, П. А. Миляев, Д. В. Збукова²

Аннотация. В статье представлены результаты СЭМ-исследований палинокомплексов палеопочв, залегающих в основании Староладожского разреза. Получены доказательства пойменно-наводкового генезиса палеопочвы, непосредственно подстилающей культурный слой Земляного городища. Традиционными корреляциями выявлен палинологический маркер, позволивший обосновать синхронность окончания Ладожской трансгрессии (в южном Приладожье) и регрессии вод в северо-западном Приильменье.

Annotation. This paper presents the results of SEM-examination of palynological complexes of two paleosols at the base of the Staraya Ladoga section. There was obtained evidence of the floodplain genesis of the paleosol directly underlying the cultural layer of Zemlyanoye hillfort. A new palynological marker has been identified here which enables us to ground the synchronous character of the end of the Ladoga Transgression (in the southern Ladoga region) and the regression of Lake Ilmen (in the northwestern region).

Ключевые слова: Старая Ладога, Ладожская трансгрессия, раннее средневековье, СЭМ-микрофотографии, палеопочвы, палинокомплекс, пойма, диатомеи, стоматоцисты, палеоботанический стресс, корреляции.

Keywords: Staraya Ladoga, Ladoga transgression, early Middle Ages, SEM micrographs, palaeosoils, palynological complex, flood plain, diatoms, stomatocysts, palaeobotanic stress, correlations.

DOI: 10.31600/1817-6976-2020-30-163-185

Введение

Статья представляет собой первую попытку исследования растительных остатков Старой Ладоги с помощью сканирующего электронного микроскопа (далее — СЭМ).

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-09-40111 «Социокультурные трансформации в Восточной Европе и формирование Руси: новые материалы, интерпретации, обобщения».

² Платонова Н. И.; Левковская Г. М.; Лапшин В. А.; Григорьева Н. В.; Миляев П. А. — ИИМК РАН; Дворцовая наб., д. 18, Санкт-Петербург, 191186, Россия. Брицкий Д. А.; Карцева Л. А. — Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН; ул. Профессора Попова, д. 2, Санкт-Петербург, 197376, Россия. Збукова Д. В. — Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского; Средний пр. ВО, д. 74, Санкт-Петербург, 199106, Россия.

Использование СЭМ для изучения палинологопалеоботанических комплексов каменного века (Левковская, 2017а; Левковская и др., 2014; 2018) продемонстрировало, что эта методика существенно дополняет информацию о палеогеографических условиях древности. Благодаря сильным увеличениям СЭМ (до ≈ 25 000 вместо максимального увеличения светового микроскопа до × 900), в мацератах палинокомплексов удается обнаружить как палинологические, так и палеоботанические находки — микроостатки древесин, листьев, фитоциты, диатомовые и другие водоросли, эпидермисы и т. д.

Настоящая работа носит рекогносцировочный характер, так как построена на ограниченной по объему выборке материала. Тем не менее ее можно считать пионерной, ибо к материалам эпохи средневековья данная методика ранее не прилагалась.

Материалом для экспериментальных СЭМ-исследований послужили три пробы, отобранные из разрезов двух палеопочв (одна — верхней, две — нижней), перекрытых, в свою очередь, толщей культурных отложений Староладожского поселения.

Задачи исследования

В задачи работы входило: 1) продемонстрировать на материалах Старой Ладogi перспективность использования СЭМ как нового способа получения и хранения палинологической и палеоботанической информации; 2) на основе полученных данных выяснить оптимальное направление дальнейших исследований палеогеографического контекста памятников Староладожского комплекса.

В ходе анализа мацератных осадков, полученных на основе трех образцов, было изготовлено 72 СЭМ-микрографии (далее — СМГ), задокументировавших информацию о выявленных растительных остатках. Параллельно мацераты верхней почвы подверглись анализу на световом микроскопе. Полученные данные позволили детализировать представления о палеогеографических условиях формирования староладожских отложений, а также рассмотреть в ином ключе проблему древнего земледелия на Северо-Западе Восточной Европы.

Методика

Традиционно СЭМ используется палинологами и палеоботаниками для изучения отдельных находок и таксонов³. Новацией примененной нами методики, определившей разнообразие растительных остатков, исследованных с помощью СЭМ, стало прикрепление к СЭМ-столикам не препаратов пыльцы конкретных таксонов, а мацератов из пробирок с целыми комплексами разнообразных растительных микроостатков. Зачастую эти мельчайшие фрагменты остаются невидимыми не только в ходе флотации грунтов в поле, но и при исследовании на световом микроскопе. Помимо отдельных объектов на СМГ фиксировались общие виды фрагментов мацератных комплексов, показывающие встречаемость и количественные соотношения микроостатков между собой.

³ В этой связи отметим факт использования сканирующей электронной микроскопии для диагностики пыльцы отдельных таксонов в ходе исследования проблем раннего сельскохозяйственного освоения Приильменья (Еремеев и др., 2007. С. 245).

Взятие проб, а также детальное описание разрезов и мест отбора образцов было осуществлено А. Л. Александровским (см. приложение I). Превращение проб в пробирочные мацераты с палинокомплексами выполнено Д. В. Збуковой по методике ВСЕГЕИ, применяемой для рыхлых отложений плейстоцена и голоцена. Для полного освобождения от минеральных частиц осадки в пробирках обрабатывались с фтористо-водородной кислотой (которая обычно не используется в российских четвертичных палинологических лабораториях ввиду ее токсичности). Ацетолизная обработка мацератов (для увеличения объема органических остатков) была выполнена в палинологической лаборатории БИН РАН с использованием ледяной уксусной кислоты.

При подготовке мацератов к СЭМ-исследованиям на поверхность двустороннего скотча, приклеенного к СЭМ-столикам, наносилась тонким слоем жидкость из пробирок. В соответствии с методикой БИН РАН столики с палинокомплексами напылялись в вакуумной установке смесью золота с палладием. Исследование выполнялось на сканирующем микроскопе Jeol JSM 6390LA Центра коллективных исследований БИН РАН. В ходе исследования изучаемые формы фотографировались в разных проекциях с различными увеличениями. В связи с многообразием таксонов растений, микроостатки которых встречаются в мацератах, и отсутствием атласов для определения многих таксонов по их мельчайшим остаткам в процессе исследования на СЭМ каждая форма обсуждалась палинологами Д. А. Брицким и Г. М. Левковской совместно с главным специалистом по электронной микроскопии БИН РАН Л. А. Карцевой. Параллельное исследование мацератов из пробы П1 на световом микроскопе (МБИ-3) произведено Г. М. Левковской.

В дальнейшем материалы, задокументированные на СМГ, были дополнительно изучены целым рядом специалистов. Определение стоматоцист золотистых водорослей произведено С. Н. Шадриной (приложение II), диатомовых водорослей — Н. Б. Балашовой и Г. А. Киселевым (приложение III), древесных микроостатков — Е. С. Чавчавадзе (приложение IV). В ходе работы по определению находок наряду с литературными источниками использовались базы данных, размещенные в интернете (Информационная система идентификации; Банк...; Human Impacts Pollen Database; PalDat; Palynological Laboratory Database).

Электронная обработка результатов СЭМ-исследований, оформление таблиц с изображением остатков растений и определение пыльцевых зерен осуществлены Д. А. Брицким и Г. М. Левковской; статистический анализ палинокомплекса и обобщение полученных результатов — Г. М. Левковской. Интерпретация естественнонаучных данных в археологическом контексте произведена коллективом исследователей ИИМК РАН под руководством Н. И. Платоновой.

Стратиграфия и топография проб

Первая из трех проб, отобранных в 2019 г., была взята из разреза шурфа на Ладожском открытом поселении (Варяжская ул., профиль 2, раскопки В. А. Лапшина 2019 г.) (рис. I.2, 1). Образец отобран из нижней погребенной почвы (AU) (здесь и далее обозначения почвенных горизонтов по А. Л. Александровскому, см. приложение I).

Еще две пробы взяты на Земляном городище из северной стенки раскопа № 6 (раскопки В. А. Лапшина 2019 г.), прирезанного с востока к участку, исследованному раскопами № 3–5 (1999–2013 гг., раскопки А. Н. Кирпичникова)⁴. В разрезе наблюдается резкое падение слоев к востоку (к р. Волхов), вызванное их проседанием в штольни, прорытые со стороны берега ниже уровня археологического материка⁵. Стратиграфическая колонка сохранила свою целостность только в северо-западном углу раскопа. На этом участке обе почвы и разделяющий их горизонт осадков Ладожской трансгрессии залегают горизонтально (рис. 1, 1)⁶. Пробы отобраны из разреза по линии «У», на границе кв. У/XVI–XVII, 1) из пахотного горизонта (PU) верхней почвы; 2) из нижней почвы (AY) (рис. 1, 1, 2; приложение I, рис. I.2, 2).

Верхнюю почву перекрывал сверху горизонт бурого гумуса, смешанного, в большей или меньшей

степени, с навозом и щепой. В нижней части бурого гумуса прослежен слой горения мощностью 0,02–0,10 м (гумусированная прослойка черного цвета с большим количеством мелких угольков и разрозненных обугленных веточек) (рис. 1, 1, 2).

Полученные результаты

Пополнение Банка новым видом источников

Для почвы 1 было изготовлено 49 СМГ общего вида исследованных мацератных комплексов и отдельных палинологических/палеоботанических объектов. Для почвы 2 получено 23 СМГ. Материалы размещены в созданном Г. М. Левковской электронном Банке палеоботанических и палинологических данных из археологических памятников территории бывшего СССР (Банк...), в котором ранее аккумулировалась информация по различным эпохам каменного века. Тем самым положено начало созданию банка СЭМ-изображений растительных остатков из неолитических и раннесредневековых памятников лесной зоны Восточной Европы. Параллельно коллекция СМГ добавлена на сетевой накопитель (NAS) QNAP TS-231, подключенный к внутренней сети ИИМК РАН, на котором формируется единая база данных по Староладожскому археологическому комплексу.

Серия СЭМ-микрографий остатков растений различных таксонов и общего вида исследованных мацератных комплексов является для Банка новым источником информации. Его важность для будущих разработок подчеркивается тем, что к рассмотрению этих материалов можно возвращаться повторно, в контексте новых открытий⁷.

Нижняя почва в контексте СЭМ-анализа

Нижняя почва на ряде участков Староладожского поселения вмещает культурные остатки эпохи неолита с гребенчато-ямочной керамикой,

⁴ Локализацию раскопа № 6 см.: Кирпичников, 2018. Рис. В.7, 8–9.

⁵ С проблемой провалов культурного слоя в штольни, вырытые с целью добычи белого кембрийского песка Староладожская экспедиция сталкивалась с первого года раскопок (Гроздилов, 1938. Л. 206–3). О характере таких штолен см.: Сабанеев, 1886. С. 1–6.

⁶ Высотные отметки верха нижней почвы в месте отбора образцов — 11,79 м БС и 5,63 м от современного уровня Волхова. Верхняя почва залегала на высоте 12,01 м БС и 5,85 м от современного уровня Волхова.

⁷ К примеру в монографии, посвященной палеогеографии Лубанской низины (Восточная Латвия) в среднем голоцене, была опубликована СЭМ-микрография с подписью «фрагмент культурного слоя» (Левковская, 1987. С. 71). Год спустя в печати появилось описание морфологии современной пыльцы различных видов льна (Григорьева, 1988), и выяснилось, что на этой микрографии отражены детали скульптуры пыльцевого зерна льна долгунца. Поскольку земледелие в Лубанской низине достоверно зафиксировано начиная с неолита, это позволило предположить, что ее население уже в ту эпоху культивировало лен (Лозе, 1988; Левковская и др., 2019).

Рис. 1. Стратиграфия раскопа № 6 Староладожского Земляного городища (раскопки В. А. Лапшина 2019 г.) и место отбора образцов на СЭМ-анализ: 1 — разрез северной стенки раскопа № 6 (2019 г.) (чертеж подготовлен Н. В. Григорьевой) (условные обозначения: а — сухой черный гумус (позднесредневековый культурный слой); б — бурый гумус; в — влажный черный гумус (верхняя часть раннесредневекового культурного слоя); г — навоз; д — угли; е — слой подсыпки; ж — зола; з — синяя глина; и — коричневая глина; к — щепа; л — темно-серый суглинок (погребенная почва); м — серо-бурый опесчаненный суглинок со щебнем и галькой (материк); н — серо-белесая гумусированная глина (отложения Ладожской трансгрессии), о — место отбора образца); 2 — нижняя часть культурного слоя Земляного городища (I — погребенная почва 1; II — отложения Ладожской трансгрессии; III — погребенная почва 2)

Fig. 1. Stratigraphy of excavation no. 6 of Zemlyanoye Gorodishche in Staraya Ladoga (excavated by V. A. Lapshin in 2019) and the spot of sampling for SEM analysis: 1 — section of the northern edge of excavation no. 6 (2019) (drawing by N. V. Grigor'yeva) (keys: а — dry black humus (late mediaeval cultural layer); б — brown humus; в — wet black humus (upper section of the early mediaeval cultural layer); г — dung; д — pieces of charcoal; е — addition layer; ж — ashes; з — blue clay; и — brown clay; к — wood chips; л — dark grey loam (buried soil); м — grey-brown sandy loam with debris and pebbles (virgin layer); н — grey-whitish humic clay (deposits of the Ladoga transgression); о — place of selection); 2 — lower section of the cultural layer of Zemlyanoye Gorodishche (I — buried soil 1; II — deposits of Ladoga transgression; III — buried soil 2)

отложившиеся $\approx 5100\text{--}4600$ ВР и «запечатанные» сверху отложениями Ладожской трансгрессии (Тимофеев, Стеценко, 1997. С. 331–334; Лапшин, 2018. С. 143–144; Мурашкин, 2018. С. 181–187).

Комплекс растительных остатков нижней почвы, зафиксированный на СМГ (рис. 2, Б; приложение III, рис. III.2; приложение IV, рис. IV.1, 5), характеризуется очень малым количеством пыльцы при наличии значительного числа остатков флоры водоемов — стоматоцист золотистых водорослей (ранее не фиксировавшихся в разрезе Старой Ладogi), створок и обломков диатомовых водорослей, в сочетании с другими микроостатками, пока неопределимыми.

В приложении II приведены определения стоматоцист золотистых водорослей из почвы 2, выполненные С. Н. Шадринной. В определителях они имеют следующие номера⁸: № 302, Gilbert et al. (приложение II, рис. II.1, 2); № 3, van de Vijver, Beyens (приложение II, рис. II.1, 3); № 165, Kamenik, Schmidt (приложение II, рис. II.1, 5). Выявлено также две неидентифицированные стоматоцисты (приложение II, рис. II.1, 4, 6).

В приложении III приведены определения диатомовых водорослей, сделанные Н. Б. Балашовой

⁸ Здесь и далее используются стандартизированные системы описания стоматоцист и диатомовых водорослей. Пояснения см.: Приложения II–III.

Рис. 2. Земляное городище Старой Ладоги. СЭМ-микрографии палинологического-палеоботанического комплексов — индикаторов водного, пойменного и антропогенного генезиса отложений для образца из кровли верхней почвы (А, В, Г) и для нижней почвы (Б). I — СЭМ-микрографии общих видов комплексов: А, Б — отложения водоема с цистами водорослей, диатомовыми водорослями (см. приложение III) и микроостатками растений; В — отложения начального этапа заселения поймы угнетенной наземной растительностью с господством пыльцы плохо сохранившейся (из-за чередования водных и наземных условий) и недоразвитой или уродливой (из-за переувлажнения грунтов щелочными водами); Г — этап сильного антропогенного воздействия с резким доминированием микроостатков древесин, не имеющих диагностических признаков, и единичными находками пыльцы; II — СЭМ-микрографии части определенных таксонов: 1, 2 — цисты водорослей; 3 — микроостаток древесины двудольного растения; 4–9 — пыльцевые зерна с различными патологиями, описанными на рис. 3: 4, 7 — полиады мелких невызревших зерен, 5 — уродливое зерно орешника (*Corylus* sp.) (?) без скульптуры, 6, 8 — уродливая пыльца пионерного растения берегов водоемов и сорняка подорожника ланцетолистного (*Plantago lanceolata* L.), 9 — уродливая пыльца пихты (*Abies* sp.) (?)

Fig. 2. Zemlyanoye Gorodishche of Staraya Ladoga. SEM micrographs of the palyno-palaeobotanical complexes — indicators of aquatic, initial floodplain and anthropogenic soil genesis, obtained from a sample of the buried soil 1 top (A, B, Г) and from the lower soil (Б). I — SEM micrographs of the complexes general view: А, Б — aquatic sediments with algal cysts, diatoms (see Att. III) and plant micro-remains; В — sediments of the initial floodplain colonization by terrestrial plants dominated by poorly preserved (due to the alteration of subaerial and aquatic environments) or underdeveloped and deformed (due to soil waterlogging with alkaline waters) pollen; Г — stage of the intense anthropogenic impact and domination of micro-remains of woody species with no diagnostic characters and single pollen; II — SEM micrographs of some identified taxa: 1, 2 — algal cysts, 3 — dicotyledon wood micro-remain; 4–9 — pollen grains with different abnormalities (as described in fig. 3): 4, 7 — polyades of undersized immature pollen, 5 — immature pollen of hazel (*Corylus* sp.) (?) with no sculpture, 6, 8 — deformed pollen of ribwort plantain (*Plantago lanceolata* L.) — pioneer riparian and weed species, 9 — deformed pollen of fir (*Abies* sp.) (?)

и Г. А. Киселевым. По большей части это пресноводные планктонные формы: 1) *Stephanodiscus neoastrea* Håkansson & Hickel (приложение III, рис. III.1, 2); 2) *Aulacoseira islandica* (O. Müller) Simonsen (приложение III, рис. III.1, 3); 3) *Cyclotella dubius* (Hustedt) Round (приложение III, рис. III.1, 4–5). Четвертый вид, встреченный в почве 2, — *Pinnularia* sp. (приложение III, рис. III.2) — представляет донные сообщества.

Наряду с остатками водной растительности, на СМГ из почвы 2 задокументирована пыльца широколиственных древесных пород. Удалось определить пыльцевое зерно липы (рис. 3, 5) и микроостаток древесины нехвойного древесного растения⁹ (рис. 2, Б, деталь 3).

Нижняя почва сформировалась на опесчаненных гумусированных суглинках. Однако на СМГ общего состава комплекса (рис. 2, Б) не зафиксировано следов почвообразования, таких как остатки ходов червей, следы кротовин, микромицелия и других типов скоплений карбонатов. В целом приведенные данные свидетельствуют, скорее, о пойменном характере накопления гумусированного слоя. Культурные остатки эпохи неолита, местами вмещенные в данный горизонт, этому не противоречат. Они не представляли долговременных поселений и могут интерпретироваться как сезонные стоянки рыбаков. Разумеется, при оценке материалов почвы 2 необходимо делать поправку на то, что в период Ладожской трансгрессии она подвергалась затоплению и частичному размыву.

**Кровля верхней почвы по данным
СЭМ-анализа и традиционных исследований
Новые данные о палеорастительности
и палеоклимате в период формирования
верхов почвы 1**

СЭМ-исследования кровли почвы 1 выявили в ней микроостатки водной растительности, хотя не столь разнообразные и обильные, как в почве 2.

С. Н. Шадринной определена стоматоциста золотистой водоросли, обитающая при температурах

воды 0–25 °С на регулярно затопляемых местообитаниях или в небольших водоемах при pH воды 4,5–9,1 (№ 15 по атласу стоматоцист, Duff, Smol emend. Zeeb, Smol) (приложение II, рис. II.1, 1).

Н. Б. Балашовой и Г. А. Киселевым установлено присутствие в верхней почве двух видов диатомовых водорослей (*Aulacoseira islandica* (O. Müller) и *A. granulata* (Ehrenberg) Simonsen) (см. приложение III, рис. III.1, 1, 6). Скорее всего, их видовое многообразие этим не исчерпывается. Большая часть микроостатков водорослей, зафиксированных на СМГ, не поддается видовому определению, так как представляет собой обломки.

Среди древесных остатков, задокументированных на СМГ и описанных Е. С. Чавчавадзе в Приложении IV, удалось выявить и определить микроостатки пихты сибирской (*Abies sibirica* Ledeb.), липы мелколистной (*Tilia cordata* Mill.) (приложение IV, рис. IV.1, 1, 3), вересковых (сем. *Ericaceae* — черника, брусника, голубика) (рис. IV.1, 2) и розоцветных (сем. *Rosaceae* — малина или рябина) (рис. IV.1, 4).

Помимо того, на СМГ определены пыльцевые зерна: пихты (рис. 3, 1), дикорастущего злака (рис. 3, 3), сорного растения — подорожника (рис. 3, 7–8), а также розоцветных (рис. 3, 2, 4), вместе со скоплением невызревшей пыльцы карликовых размеров, похожей на пыльцу ольхи (определена условно из-за недоразвития).

Параллельно, в ходе просмотра 30 стекол на световом микроскопе, было определено более 200 пыльцевых зерен из верхней почвы. В общем составе комплекса присутствует значительное количество пыльцы древесных пород (50 %) и травяно-кустарничковых растений (40 %). Среди древесных господствует пыльца ольхи (*Alnus* sp.) (52 %), представленная преимущественно мелкими недоразвитыми пыльцевыми зернами; часть их находится в составе нераспавшихся полиад. Много пыльцы березы (*Betula* sp.) (20 %). Не найдена пока пыльца хвойных древесных пород, за исключением задокументированного на СМГ пыльцевого зерна пихты, чье присутствие подтверждается и находкой микроостатка древесины (рис. IV.1, 1). Присутствует пыльца широколиственных древесных пород — вяза (*Ulmus* sp.), орешника (?) (*Corylus* sp.) и липы (*Tilia* sp.). Суммарное содержание широколиственных весьма значительно (24 %). Среди них господствует вяз. Найдена пыльца ивы (*Salix* sp.), характерная для растительности пойм.

⁹ По определению Е. С. Чавчавадзе, на СМГ 462 выявлен микроостаток древесины, в котором видны фрагмент восьмислойного луча, возможно, контактного; клетки разного размера; сосудисто-лучевая полость. Поры в крупных клетках расположены супротивно, а в мелких — диффузно и супротивно. Это микроостаток древесины не хвойного, а цветкового двудольного растения.

В составе травяно-кустарничковых растений содоминируют пыльца лебедовых (*Chenopodiaceae*) (48 %), большая часть которой также недоразвита, и мезофильного разнотравья — гвоздичных (*Caryophyllaceae*), бобовых (*Fabaceae*), зонтичных (*Umbelliferae*). Встречена пыльца подорожника (*Plantago* sp.) и кипрейных (*Chamaenerium*) (иванчай), а также единичные пыльцевые зерна осок (*Cyperaceae*) и водного растения уруть (*Myriophyllum* sp.). Помимо пыльцы найдены споры зеленых (*Bryales*) и сфагновых (*Sphagnum*) мхов, многоножковых папоротников (*Polypodiaceae*) и гроздовника (*Botrychium*).

В ходе исследования на световом микроскопе выявлено также одно крупное пыльцевое зерно *Cerealia*, полностью отвечающее критериям определения пыльцы культурных злаков, разработанным палинологами (*Firbas*, 1937; *Troels-Smith*, 1955; *Beug*, 1961; *Leroi-Gourhan*, 1969; *Andersen*, 1979; *Фёдорова*, 1959; *Гуман*, 1978; *Тарасевич*, 1983). Указанные критерии были обобщены Г. М. Левковской (*Левковская*, 1987. С. 74, табл. 5).

Найденное пыльцевое зерно имеет большой размер (более 45 мкм), что типично для пыльцы культурных злаков. Пора с широкого конца не смещена, заметно выступает над поверхностью зерна и имеет значительный размер околопорового кольца. Зерно идентифицируется как пыльца пшеницы (*Triticum* sp.). К сожалению, она не попала в число форм, задокументированных на СМГ. Данная находка является уникальной для почвы 1, где до сих пор совсем не обнаруживалось пыльцы культурных злаков. В силу своей единичности она не может использоваться для ответственных заключений. Впрочем, стоит иметь в виду, что на расстоянии всего нескольких шагов от современных полей содержание пыльцы культурных злаков и сорных растений не превышает 1–3 % (*Vuorela*, 1973). Исключение составляют только посевы ржи (*Königsson*, *Possnert*, 1997. Р. 80–81).

Нельзя исключать, что пыльца культурного злака попала в почву 1 из кровли близко расположенных сапропелей — в ходе процесса почвообразования и периодических паводков, размывавших пойму. Именно с уровнем кровли сапропелей в Ладоге связан вполне реальный эпизод «земледельческой активности». Пыльца *Cerealia* (ячменя и ржи) была найдена палинологом Э. А. Плешивцевой в разрезах двух скважин, пробуренных на Земляном городище (*Шитов и др.*, 2004. С. 10–13). Находки приурочены к верхним 10–15 см

отложений Ладожской трансгрессии. Возможно, население эпохи раннего металла, освоившее береговую зону в I тыс. до н. э., практиковало простейший вариант земледелия на свежей пойме, когда едва вышедшие из-под воды участки влажных сапропелей были еще свободны от сорняков и не требовали трудоемкой обработки. В ходе последующего зарастания и заболачивания пойм посевы прекращались.

В общем составе палинокомплекса верхней почвы содоминирует пыльца древесно-кустарниковых и травяно-кустарничковых растений. Среди первых господствует ольха, среди вторых — лебедовые. Следовательно, в период формирования верхов почвы 1 территория вокруг Земляного городища не была полностью облесена. Основные площади занимали, по-видимому, пойменные ольховые леса с широколиственными, ольховые топи и рудеральные группировки, образованные лебедовыми.

Доминирование лебедовых зафиксировано и в карпологической флоре, происходящей из контактной зоны почвы 1 и нижнего горизонта культурного слоя. Мари белой найдено 1366 плодов (*Чухина и др.*, 2014. С. 449; 2015. С. 226). Обилие пыльцы лебедовых в комплексе почвы 1 могло иметь разные причины, как, например: 1) пионерное заселение вышедших из-под воды палеопойм, до распространения на них лугов и древесной растительности (особенно типичное для этапов с сухим климатом — холодным или теплым); 2) интенсивное уничтожение людьми коренной растительности и замещение ее рудеральными группировками; 3) близость посевов, иногда окаймленных лебедовыми. Для окончательного решения этого вопроса необходимо проведение площадных полевых исследований с одновременным отбором палинологических и карпологических проб.

Доминирование ольхи, временами при почти полном отсутствии пыльцы хвойных деревьев, явилось для нас полной неожиданностью. Его можно было бы отнести за счет недостаточно представительной выборки материала, если бы идентичная или очень схожая картина с максимумами пыльцы ольхи не прослеживалась на низких геоморфологических уровнях (высокие поймы, низинные болота) еще на ряде опорных разрезов Северо-Запада (*Malachovskij et al.*, 1996. Р. 117; *Delusin*, 1991. Р. 38, fig. 15; и др.). Наибольший интерес для нас представляют разрезы

высокой поймы р. Назия в юго-западном Приладожье (Семёнова и др., 2009) и низинного болота Радбелик в северо-западном Приильменье (Königsson, Possnert, 1997; Königsson et al., 1997), а также разрезы берега р. Нева — Невский лесопарк и Невский пятачок (Малаховский и др., 1993).

В разрезе Радбелик (рис. 4, А) доминирование ольхи начинается сразу после смены озерного осадконакопления на болотное — когда глинистый ил перекрывается низинным торфом и исчезают находки водорослей, ранее весьма многочисленные. Для этого переломного периода там получена ^{14}C дата 2300 ± 75 BP ($449-227$ cal. BC) (Ua-3793) (Königsson et al., 1997. P. 372). Видимо, данный уровень соответствовал общему спаду воды в регионе после прорыва Невы. С ним можно синхронизировать и формирование вреза двухметровой высокой поймы в 10,5-метровую террасу р. Назия (рис. 4, В, Г).

Для последующего этапа с ольховым максимумом в Радбелике имеются три даты в интервале от 2155 ± 80 BP ($337-158$ cal. BC) (Ua-3792) до 1515 ± 70 BP ($453-598$ cal. AD) (Ua-10506). Резкое падение количества пыльцы ольхи с 40 до 10 % и начало господства пыльцы недревесной растительности начинаются после 1515 ± 70 BP (Там же).

Диаграмма Земляного городища (рис. 4, Б), с близким процентным содержанием пыльцы древесных пород (с господством ольхи) и недревесных растений (рудерального сорняка мари белой),

соответствует, по-видимому, времени перехода от этапа господства ольхи к этапу доминирования лугов и рудеральных группировок в растительном покрове. Это могло быть вызвано новым понижением уровня воды в гидрологической сети района, в результате чего произошел врез поймы в высокую пойму.

Современным аналогом палинокомплексу почвы 1 является растительность притеррасной части пойм рек лесной зоны Восточной Европы и, в частности, современных пойменных лесов в низовьях Волхова (Сорокина, 2008. С. 42–55). Притеррасная пойма, по Н. В. Павлову, избыточно увлажнена, служит средоточием мелких озерков, изобилует болотными образованиями, а на осоковых трясинах встречаются заросли ольхи черной (*Alnus incana*) или белой (*A. glutinosa*) (Павлов, 1948. С. 96–97). Для верхнего горизонта почвы 1 Земляного городища такая реконструкция подтверждается результатами СЭМ-исследований: в пробе, взятой из этого горизонта, обнаружены диатомовые водоросли и стоматоцисты золотистых водорослей. По соседству, на более дренированных территориях, существовали ольховые леса с примесью широколиственных пород.

На высоких террасах господствовала хвойная растительность (данные по городищу Любша и Ивановскому торфянику) (Петров и др., 2018. С. 417, рис. 3; 2019). Именно растительность высоких террас с господством хвойных, продуцирующих огромное количество пыльцы, отражена на

Рис. 3. Земляное городище Старой Ладogi. СЭМ-микрофотографии пыльцевых зерен, разрушенных чередованием субаэриальных и субаэриальных условий, с морфологическими патологиями (уродство, недоразвитие) из-за переувлажнения почв щелочными водами. Верхняя (1–4, 6–8) и нижняя (5) погребенные почвы: 1 — пихта (*Abies sp.*), зерно с мешками разного размера и формы ($\times 1200$), рядом — скопление недоразвитой пыльцы; 2, 4 — розоцветные (*Rosaceae*): 2 — скульптура нормально развита, 4 — скульптура сглажена ($\times 6000$; $\times 2500$), 3 — дикорастущий злак (*Poaceae*) вместе с двумя полиадами невызревшей мелкой пыльцы, в одной из них представлена карликовая пыльца ольхи (*Alnus sp.*) (?) ($\times 2200$); 5 — пыльцевое зерно липы (*Tilia sp.*) с не полностью вызревшей, сглаженной скульптурой, вместе с чистой и диатомовой водорослью ($\times 2200$); 6 — неопределенное пыльцевое зерно с порами разной формы и величины ($\times 2000$); 7–8 — подорожник ланцетолистный (*Plantago lanceolata L.*) с ненормально развитыми апертурами разного размера и формы ($\times 600$; $\times 220$)

Fig. 3. Zemlyanoye Gorodishche of Staraya Ladoga. SEM-microphotographs of pollen grains, destroyed due to the alternation of subaerial and aquatic conditions, and with morphological abnormalities (deformity, immaturity) caused by soil waterlogging with alkaline waters. Upper (1–4, 6–8) and lower (5) buried soils: 1 — fir (*Abies sp.*), grain with saccus of different size and form ($\times 1200$), nearby — polyads of underdeveloped pollen; 2, 4 — pollen grains of rose family (*Rosaceae*): 2 — normally developed sculpture, 4 — smoothed sculpture ($\times 6000$; $\times 2500$), 3 — wild grasses (*Poaceae*) with two polyads of undersized immature pollen, in one, dwarf pollen of alder (*Alnus sp.*) (?) is discernible ($\times 2200$); 5 — pollen grain of linden (*Tilia sp.*) with smoothed underdeveloped sculpture neighbouring a cyst and a diatom ($\times 2200$); 6 — unidentified pollen grain with pores of different size and form ($\times 2000$); 7–8 — ribwort plantain (*Plantago lanceolata L.*) with abnormally developed apertures of different size and form ($\times 600$; $\times 220$)

Рис. 4. Спорово-пыльцевые диаграммы отложений высоких пойм озер Ладожского и Ильмень с максимумами пыльцы ольхи (*Alnus sp.*) (≈ 2400 – 1400 л. н.) (А, Б, В) и высокой террасы р. Назиы периода Ладожской трансгрессии без максимума пыльцы ольхи (Г): А — низинное болото Радбелик (Приильменье), с ^{14}C датировками (Königsson, Possnert, 1997. С. 79–81); Б — Земляное городище Старой Ладоги, кровля погребенной почвы (П1), вмещающей раннесредневековые культурные остатки и уголь с ^{14}C датировками ≈ 1500 – 1300 л. н.; В — Назиа 2, разрез 2-метровой высокой поймы, врезанной в отложения 10,5-метровой террасы (Юго-Западное Приладожье) (Семёнова и др., 2009. С. 548); Г — Назиа 1, разрез 10,5-метровой террасы с осадками Ладожской трансгрессии, перекрывающими торфяник с остатками деревьев и ^{14}C датировками (Там же). Условные обозначения: I (1–3) — общие для всех диаграмм: 1 — уровень корреляции трех диаграмм (А, Б, В): конец максимума пыльцы ольхи и начало возрастания количества пыльцы травяно-кустарничковых растений (начало замещения пойменных лесов с примесью широколиственных пород и притеррасных ольховых топей пойменными лугами); 2 — показатель степени облесенности территории: процент пыльцы древесных пород и кустарников (AP); 3 — показатель степени распространения безлесных группировок в регионе: сумма пыльцы травяно-кустарничковых растений (NAP); II (4–17) — для диаграмм А и Б: 4 — процент пыльцы каждого таксона и его содержание, увеличенное в 10 раз; 5 — находки пыльцы в количестве 1 % и менее; 6–8 — дифференциация AP (Königsson, Possnert, 1997): 6 — сумма пыльцы термофильных широколиственных древесных пород (QM), 7 — сумма пыльцы кустарников (Shrubs), 8 — сумма пыльцы прочих древесных пород (Trees except QM); 9–12 — различные группы травяно-кустарничковых растений, выделенные на опубликованной диаграмме разреза Радбелик (Königsson, Possnert, 1997. С. 79–81): 9 (Gr 1) — группа 3A:b — сумма пыльцы наиболее ксерофильных растений: можжевельника (*Juniperus sp.*), подорожника ланцетолистного (*Plantago lanceolata L.*), горца птичьего (*Polygonum aviculare*), тополя (*Populus*) и др., из которых в почве 1 Старой Ладоги определены подорожник и тополь, 10 (Gr 2) — группа 3C: сумма пыльцы злаков (*Poaceae*) размером более 40 мк, относимых к группе культурных злаков (*Cerealia*), и пыльца отдельных культурных растений — овса (*Avena sativa*), хмеля (*Humulus*), гречихи (*Fagopyrum-type*), ячменя (*Hordeum-type*), ржи (*Secale*), пшеницы (*Triticum*), из которых в почве 1 Старой Ладоги определено пыльцевое зерно пшеницы, 11 (Gr 3) — группа 3A:a — умеренно ксерофильные растения, из которых в почве 1 Старой Ладоги, Назиы 1 и Назиы 2 определена пыльца лебедовых (*Chenopodiaceae*), 12 (Gr 4) — группа 4A: водоросли (*Algae*), из которых в почве 1 Старой Ладоги задокументированы (с помощью СЭМ) находки диатомовых и цист золотистых водорослей; 13–17 — литология: 13 — низинный торф, 14 — глинистый ил, 15 — опесчаненный глинистый ил, 16 — Старая Ладога, верх верхней погребенной почвы, подстилающей раннесредневековый культурный слой, 17 — палинологический / литологический рубеж, соответствующий концу озерной трансгрессии в низинном торфянике Радбелик (≈ 2400 л. н.) и началу максимума пыльцы ольхи на диаграммах А, Б, В; III (18–30) — для диаграмм В и Г: 18 — процент пыльцы каждого таксона и его содержание, увеличенное в 10 раз; 19 — недифференцированная сумма пыльцы древесных пород (AP) (включая термофильные древесные породы (QM), кустарники (Shrubs) и прочие древесные); 20 — границы палинозон; 21 — границы палиноподзон; 22–30 — литология: 22 — пески мелкозернистые монолитные, 23 — торф с древесными остатками, 24 — торф с прослойками песка, 25 — песок с линзами торфа, 26 — пески тонкозернистые, 27 — песок гумусированный с корнями растений, 28 — мелко- и среднезернистый песок, 29 — суглинки, 30 — современная почва. *Примечание:* на диаграммах А, Б, В и Г показана лишь часть определенных авторами таксонов

Fig. 4. Pollen diagrams of deposits from high floodlands of the Ladoga and Ilmen lakes with alder pollen (*Alnus sp.*) maximum in the span of ≈ 2400 – 1400 BP (A, B, B) and the high terrace of Naziya river formed during Ladoga transgression, without the maximum of alder pollen (Г): А — lowland Radbelik fen (Lake Ilmen region) with ^{14}C dates (Königsson, Possnert, 1997. С. 79–81); Б — Zemlyanoye Gorodishche in Staraya Ladoga, the top of the buried soil (П1) containing early mediaeval cultural remains and charcoal with ^{14}C dates of ≈ 1500 – 1300 BP; В — Naziya 2, section of 2-metre high flood plain cut into deposits of 10.5-metre terrace (south-west Ladoga region) (Семёнова и др., 2009. P. 548); Г — Naziya 1, section of 10.5-metre terrace with deposits of the Ladoga transgression roofing a peatbog with remains of trees ^{14}C dated (*Ibid.*). Legend keys: I (1–3) — common for all the diagrams: 1 — level correlated in three diagrams (A, B, B): end of the alder pollen maximum and beginning of the increase of the quantity of the pollen of herbs (beginning of the replacement of flood plain forests with admixture of the broadleaf species and alder fens by floodplain meadows); 2 — palynological indicator of the afforestation of the area: pollen percentage of trees and shrubs (AP); 3 — palynological indicator of the treeless societies distribution: sum of the grass pollen and spores (NAP); II (4–17) — in diagrams A and B: 4 — pollen percentage of each taxon and its ten times magnification; 5 — finds of pollen in quantity of 1% or less; 6–8 — differentiation of AP (Königsson, Possnert, 1997): 6 — sum of the pollen of thermophilic broadleaf species (QM), 7 — sum of the pollen of shrubs, 8 — sum of the pollen of other tree species (Trees except QM); 9–12 — different groups of the herb and shrub species identified in the published non-adapted diagram of the Radbelik section (Königsson, Possnert, 1997. P. 79–81): 9 (Gr 1) — group 3A:b — sum of the pollen of the most xerophilous plants: juniper (*Juniperus sp.*),

ribwort plantain (*Plantago lanceolata* L.), birdweed (*Polygonum aviculare*), poplar (*Populus*), etc., of which, in soil 1 of Staraya Ladoga, only plantain and poplar has been identified; 10 (Gr 2) — group 3C: sum of the pollen of grasses (*Poaceae*) with the size exceeding 40 µm attributed as the group of cultivated cereals (*Cerealina*) and pollen of particular cultivated plants — oats (*Avena sativa*), hop (*Humulus*), buckwheat (*Fagopyrum-type*), barley (*Hordeum-type*), rye (*Secale*), and wheat (*Triticum*), of which only pollen grain of wheat has been identified in soil 1 of Staraya Ladoga, 11 (Gr 3) — group 3A:a: moderately xerophilous plants, pollen of the goosefoot family (*Chenopodiaceae*) has been identified in soil 1 of Staraya Ladoga, Naziya 1 and Naziya 2, 12 (Gr 3) — group 4A: algae (*Algae*), of which SEM analysis has recorded finds of diatoms and chrysophycean cysts in soil 1 of Staraya Ladoga; 13–17 — lithology: 13 — fen, 14 — clayey silt, 15 — sandy clayey silt, 16 — Staraya Ladoga, top of the buried soil underlying the early mediaeval cultural layer, 17 — palynological/lithological boundary corresponding to the end of the lake transgression at the lowland Radbelik peatbog (≈2400 BP) and the beginning of the alder maximum in the diagrams A, Б, В; III — in diagrams Б and Г: 18 — pollen percentage of each taxon and its ten times magnification; 19 — non-differentiated sum of the arboreal pollen (AP) (including thermophilous broadleaf species (QM), shrubs and other woody species); 20 — boundaries of the pollen zones; 21 — boundaries of the pollen subzones; 22–30 — lithology: 22 — monolithic fine-grained sands, 23 — peat with wood remains, 24 — peat with intercalations of sand, 25 — sand with lenses of peat, 26 — fine-grain sands, 27 — humic sand with plant roots, 28 — fine- and medium-grain sand, 29 — loams, 30 — modern soil. Note: Adapted diagrams A, Б, В and Г include only some of the identified taxa

диаграммах донных отложений Ладожского озера (Левковская, 1967; Савельева и др., 2017. С. 300, рис. 1; Sapelko et al., 2019. Р. 72).

Рассмотрение вопроса, почему максимум пыльцы ольхи не был выявлен в Старой Ладоге раньше, не вмещается в рамки данной статьи и требует отдельного анализа. Забегая вперед, можно сказать: в подавляющем большинстве случаев это связано с неполнотой геологической летописи разрезов, а также с тем, что пробы из отложений высокой поймы, по разным причинам, остались непроанализированными (Шитов и др., 2004. С. 10, рис. 2; 2005. С. 10–11, рис. 2; 2007. С. 48, рис. 1; 2008. С. 5–9, рис. 1, 2; Александровский и др., 2010. С. 49–51, 58–59, рис. 4). Авторы планируют вернуться к этому сюжету в следующей работе.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что климат периода формирования почвы 1 был теплее современного (южно-таежного). Об этом свидетельствуют максимумы пыльцы термофильных широколиственных пород (вяза, липы, дуба и орешника), совпадающие с максимумами ольхи на трех коррелируемых диаграммах (рис. 4, А–В). Суммарное содержание пыльцы широколиственных в кровле почвы 1 (24 %) значительно выше, чем в пробах с поверхности современных пойм (6–9 %) (Шитов и др., 2008. С. 12; Delusin, 1991. Р. 19, табл. 2).

Климат рассматриваемого этапа был более континентальный, чем современный, о чем свидетельствуют находки пыльцевого зерна и микроостатка древесины пихты сибирской (рис. 3, 1; рис. IV.1, 1). Ареал пихты в настоящее время приурочен к более восточным и северо-восточным

районам с континентальным климатом (приложение IV, рис. IV.2, 1). Это предполагает более высокие летние температуры, более суровые зимы и меньшее количество осадков.

О высоких летних температурах свидетельствуют и данные карплогического анализа, выявившего в древнейшем культурном слое Ладоги многочисленные находки семян проса (*Panicum miliaceum*). В этой связи М. Аалто и Х. Хейнайоки предположили, вслед за В. А. Петровым, что просо культивировалось на месте (Петров, 1945; Аалто, Хейнайоки, 1997. С. 37). На это последовали возражения со стороны М. В. Шитова и сотворов, отметивших, что просо — культура, не типичная для южно-таежной зоны, что оно вызревает южнее 56° с. ш. и возделывается на каштановых и черноземных почвах степной зоны (Шитов и др., 2004. С. 13).

Анализ образцов из раскопа А. Н. Кирпичникова 2010 г. подтвердил правоту традиционной точки зрения. В отмытках обнаружались «...цветковые чешуи, в которые были заключены зерновки проса. Наличие цветковых чешуй свидетельствует о том, что просо выращивалось непосредственно в окрестностях Ладоги, а не было привезено из другой местности, так как предметом торговли... должно было выступать уже обмолоченное зерно» (Чухина и др., 2014. С. 245). Так что термофильный злак, действительно, произрастал в Поволжье. Но скорее всего его культивирование связано не с периодом формирования почвы 1, а с малым климатическим оптимумом раннего средневековья, начало которого приходится на VIII в. (Арсланов и др., 2020. С. 13).

*Геоботанический стресс**в период формирования кровли почвы 1*

Подавляющее большинство пыльцевых зерен из почвы 1, зафиксированных на СМГ, представлено недозревшими, уродливыми или карликовыми формами. Так, на рис. 3 из восьми представленных форм нормально развитым является лишь пыльцевое зерно розоцветного (рис. 3, 2). Пыльцевое зерно пихты (рис. 3, 1) уродливо, имеет мешки разной формы и размера, нет четкого деления щита и гребня. Зерно дикорастущего злака (рис. 3, 3) почти лишено скульптуры, а рядом с ним на СМГ видны две нераспавшиеся из-за невызревания полиады карликовых неопределимых зерен. У пыльцевого зерна розоцветного струйчатой скульптурой (рис. 3, 4) недоразвиты апертуры (поры). У неопределимой формы на рис. 3, 6 все поры имеют неодинаковые размеры. Два пыльцевых зерна подорожника (рис. 3, 7–8) имеют разное количество пор, причем различна и их форма, и ширина оконтуривающих их ободков.

Особенно плохо развита пыльца, представленная на рис. 2, В, Г, где доминируют контуры пыльцевых зерен с нечеткой скульптурой. У формы на рис. 2, В, деталь 5, напоминающей уродливое пыльцевое зерно орешника или березы, не развит протопласт (то есть оно стерильно). Исследования на световом микроскопе показали, что количественно в комплексе доминирует пыльца ольхи и лебедовых, в основном недоразвитая, в том числе в виде скоплений в нераспавшихся полиадах (которые палинологи не всегда включают в подсчет).

Все палиноморфологи знают, что в каждом пыльнике растений, даже существующих в оптимальных условиях, можно встретить морфологически атипичные формы. Это наглядно иллюстрируют, например, публикации А. Е. Пожидаева (Pozhidaev, 1998). Поэтому имеющиеся в литературе попытки использовать единичные находки атипичных пыльцевых зерен в пыльниках растений для индикации состояний природной среды (Дзюба, 2006) вряд ли можно признать корректными.

На основе представительных статистических данных о связи морфологической вариабельности пыльцы в отложениях разного возраста с различными экологическими факторами было установлено, что палиноиндикаторами природной среды являются палинотератные комплексы отложений, в которых наблюдаются различ-

ные процентные соотношения пыльцевых зерен: 1) нормально развитых; 2) карликовых; 3) уродливых; 4) невызревших форм (Levkovskaya, 1999; Левковская, 2017а; 2017б; Левковская, Боголюбова, 2011; Левковская и др., 2014). Спорово-пыльцевые диаграммы, отражающие эти соотношения, позволяют дифференцировать начальные и конечные этапы межледниковий и межстадиалов и их климатические оптимумы, а также геоботанические катастрофы и стрессы (Левковская и др., 2005. С. 126, рис. 1).

В условиях резкого дефицита температур — в ледниковых отложениях (Ананова, 1966), в тундрах (Левковская, 1973; Васильчук, 2005) или в горах, на верхних пределах цветковых растений (Levkovskaya et al., 2012), формируется комплекс с господством невызревших, карликовых форм с утонченной скульптурой.

При резком дефиците влаги — данные по поверхностным пробам из Южной Аравии (Левковская, 2017б) и некоторым горизонтам отложений из Костёнок (Левковская, 2017б; Levkovskaya et al., 2015) — доминантами являются невызревшие, но объемные формы. В комплексах проб солончаков господствуют формы, покрытые коллоидом, похожие на минералы, но с просвечивающими изнутри зернами пыльцы.

Уродливая пыльца в природных комплексах не является главным патологическим признаком. В современных пробах единичные уродливые формы чаще встречаются в краевых частях ареалов, особенно там, где сильны процессы гибридизации (древовидных и карликовых берез и т. д.). Находка уродливой пыльцы пихты в почве 1 (рис. 2, Г, деталь 9), возможно, свидетельствует о проходившей тут границе ареала этого растения.

Доминирование уродливых форм с самыми разнообразными отклонениями любого признака от палиноморфологических норм, или стерильных форм с отсутствием протопласта, типично для проб в условиях высокого радиоактивного заражения почв (Чернобыль) (Левковская и др., 2011; Levkovskaya, 2012).

Формы из почвы 1 Старой Ладogi, задокументированные на СМГ, являются индикаторами палинотератного комплекса особого типа. Здесь мы наблюдаем не единичные, а массовые проявления патологического развития пыльцы: у самых различных таксонов преобладают не мелкие, но уродливые или недозрелые пыльцевые зерна, либо

встречаются полиады с еще карликовой пылью. Скорее всего, это результат воздействия химически активных вод на пыльцевые зерна в процессе их формирования.

В данном случае наиболее вероятно, что причиной геоботанического стресса являлось *формирование комплекса в условиях избыточно увлажненных почв с щелочной реакцией среды* (рН более 7). О последнем свидетельствуют находки диатомовых водорослей и пыльцевого зерна урути, живущей в водах, богатых кальцием (Белавская, 1981. С. 230). В этой связи можно отметить, что, к примеру, пыльцевые зерна карликовой березы в Ленинградской области деформированы в 80 % случаев, и связано это именно с эдафическими условиями (переувлажнением почв на болотах, где произрастает данный вид) (Куприянова, Алешина, 1978. С. 64).

Геоботанический стресс, наблюдаемый для растительного комплекса почвы 1, также был обусловлен эдафическим фактором — сильной заболоченностью и щелочной реакцией водной среды. Приведенные СЭМ-данные о стрессовом состоянии репродуктивной сферы многих растений снижают до минимума возможность занятий земледелием на данном участке в период формирования гумусированного горизонта почвы 1.

Проблема генезиса почвы 1

Результаты СЭМ-исследований приносят качественно новую информацию в дискуссию о генезисе почвы 1, подстилающей раннесредневековый культурный слой. Эту почву на Земляном городище первым выделил В. И. Равдоникас. В его стратиграфической схеме она значится, как «Горизонт Ж» — «погребенная луговая заболоченная почва с включениями вивианита» (Равдоникас, 1950. С. 8). Сейчас почва 1 на территории Земляного городища трактуется разными авторами как:

— палеопочва сложного лесолугового генезиса, сформировавшаяся на гумусированных озерных отложениях конца Ладожской трансгрессии (Александровский и др., 2009. С. 685; 2010. С. 45–48; 2018. С. 100–103). В верхней части ее дифференцируется наиболее интенсивно окрашенный пахотный горизонт PU мощностью около 12 см (см. приложение I);

— погребенная гидроморфная палеопочва, нижняя часть которой представляет собой автохтонную ненарушенную дерново-глебовую почву. Верхняя часть — турбированная почва, результат механического перемешивания автохтонной

почвы и начавшего накапливаться раннесредневекового культурного слоя. Описания указанного горизонта («верхней части почвы», по М. В. Шитову, и «пахотного слоя», по А. Л. Александровскому) практически совпадают между собой, за исключением характеристики нижнего контакта — ровного, по А. Л. Александровскому (Александровский и др., 2010. С. 57), и неровного, по М. В. Шитову (Шитов и др., 2007. С. 50). Земледелие на этой почве М. В. Шитов считает невозможным;

— отложения, образовавшиеся на территории выгона или стойловых площадок скота (чем и объясняется большое количество фосфора в составе почвы). Территория Земляного городища не могла использоваться по-другому в силу повышенной гидроморфности (Сперанская и др., 2017. С. 984–985)¹⁰.

Проведенные СЭМ-исследования позволяют высказать новую точку зрения на проблему: *гумусированный горизонт (верхняя часть профиля) почвы 1 сформировался в условиях переувлажненной поймы*.

Аргументами в пользу данной гипотезы служат задокументированные на СМГ изображения общего вида мацератных комплексов. В ходе анализа СМГ, изготовленных по материалам одной и той же пробы из почвы 1, выявилось три совершенно разных типа сочетаний находок пыли и микроостатков растений, которым соответствовали различные экологические условия.

Тип 1 представляет собой сочетание цист водорослей, обломков диатомей и ряда неопределимых микроостатков (рис. 2, А). Остатки водной растительности доминируют. Экологическая обстановка типа 1 реконструируется как водоем с многочисленными остатками водорослей.

Тип 2 отражает господство неопределимой (из-за плохой сохранности или недоразвития) пыли (рис. 2, В). Видны контуры недоразвитой пыли, похожей на пыльцу березы или орешника (рис. 2, В, деталь б), вяза (?) и др. Экологическая обстановка типа 2 — субаэральные условия. Об этом свидетельствуют находки пыли подорожника ланцетолистного и отсутствие диатомей. Возможно, здесь отражен начальный этап существования вышедшей из-под воды влажной поймы, когда все растения на ней продуцировали огромное количество невызревшей и уродливой пыли.

¹⁰ Данная точка зрения систематически не изложена и в указанной публикации лишь упомянута.

Тип 3 фиксирует резкое доминирование в комплексе древесных микроостатков, часто не имеющих диагностирующих признаков (рис. 2, Г). Присутствует пыльца подорожника (рис. 2, Г, деталь 8) и древесные микроостатки, часть которых поддается определению (приложение IV, рис. IV.1, 1–4). Экологическая обстановка типа 3 отражает этап интенсивного уничтожения людьми древесной растительности, на СМГ видны сотни древесных микроостатков. Это согласуется с картиной обилия древесной щепы и навоза, визуальное зафиксированной в процессе раскопок нижних горизонтов культурного слоя практически по всей территории Земляного городища (Петров, 1945. С. 47, рис. 24).

Смещение в единой пробе разноэкологических и, возможно, разновозрастных микрофрагментов требует объяснений. Разумеется, тут могло сыграть роль механическое перемешивание, в ходе древней пахоты или иной деятельности людей. Однако стоит иметь в виду, что отбор пробы произведен из слоя с визуальное ненарушенной структурой, без следов перемешивания. Кроме того, следов механических повреждений пыльцы на СМГ не обнаружено.

Самым вероятным фактором, определившим совместное залегание микрофрагментов различных растительных комплексов, является пойменно-паводковый генезис осадков, обусловивший быстрые и частые смены условий обводнения/необводнения и супермикролинзовидную слоистость. Соответственно в пробе наблюдается чередование отложений, сформированных в аэральные/субаэральные условия, повышенной/пониженной увлажненности. Последнее объясняет и сравнительно слабую насыщенность комплекса пыльцой. Быстрая смена субаквальных/субаэральные условий является наиболее вероятной причиной разрушения пыльцы и плодов в отложениях (Петров, 1945; Березина, Тюремнов, 1973. С. 5–8).

Заключение

Все проблемы, затронутые в настоящей статье, являются дискуссионными. В литературе не существует однозначных ответов на вопросы о хронологии Ладожской трансгрессии, генезисе ладожских палеопочв, развитии земледелия в Поволжье. Излагая свою точку зрения, авторы надеются на серьезную и плодотворную дискуссию по всем указанным проблемам.

В процессе наших исследований выявлены два ценных источника информации о палеогео-

графических событиях в Поволжье. Первым из них является новый палинологический маркер, позволяющий коррелировать удаленные разрезы, расположенные на низких геоморфологических уровнях. Это максимум пыльцы ольхи, начало которого приходится на ≈ 2400 ^{14}C ВР, а окончание — на ≈ 1500 – 1400 ^{14}C ВР.

Корреляции удаленных разрезов на основе этого маркера позволяют обосновать синхронность окончания Ладожской трансгрессии в южном Приладжье (данные по разрезам Назия 2, Невский лесопарк и Невский пятачок) и резкого спада воды в северо-западном Приильменье (данные по разрезу Радбелик). На низких геоморфологических уровнях это событие датируется ≈ 2400 ^{14}C ВР. На высоких уровнях спад воды, конечно, произошел раньше.

Верхний горизонт почвы 1 на Земляном городище, с датировками ≈ 1400 – 1300 ^{14}C ВР, коррелируется с этапом, когда господство ольхи уже заканчивалось, а на диаграммах резко увеличился процент пыльцы недревесных растений. Последнее свидетельствует о начале распространения лугов на месте ольховых топей.

Второй новый источник информации получен нами в ходе СЭМ-исследований благодаря новому подходу к подготовке СЭМ-столиков, апробированному ранее на материалах шести памятников палеолита. В настоящее время он впервые применен к исследованиям отложений неолита — раннего средневековья. В результате удалось получить не только коллекцию СЭМ-микрографий различных таксонов (диатомовых водорослей, цист золотистых водорослей, микроостатков древесин, пыльцевых зерен с разными типами морфологических патологий), но и микрографии общих видов фрагментов палинокомплексов.

Анализ этих данных показал, что кровля почвы 1, подстилавшей раннесредневековый культурный слой Земляного городища, целиком состоит из микрофрагментов отложений, сформировавшихся в различных экологических условиях — субаквальных и субаэральные (что типично для пойм). На пойменный генезис указывают находки диатомей и стоматоцист золотистых водорослей, а также данные о преобладании атипичной и невызревшей пыльцы большинства таксонов из-за переувлажнения грунтов щелочными водами. Таким образом, эдафические условия,

существовавшие в период формирования кровли почвы 1 (то есть ранее 1400 ВР), были неблагоприятны для репродуктивной сферы большинства растений. Причиной служила переувлажненность отложений, вызванная, возможно, очередной осцилляцией Ладоги, наступившей уже в период регрессии.

На этой основе нами сформулирована гипотеза о пойменно-паводковом генезисе отложений указанной гидроморфной почвы. Отметим, что пойменный характер отложений подразумевает и неполноту заключенной в них информации по причине неизбежных, регулярных размывов.

В последнее время перед исследователями остро встал вопрос: почему в кровле почвы 1 на Земляном городище, идентифицированной как пахотный горизонт (Александровский и др., 2010. С. 49, 58–59), не обнаруживаются ни пыльца, ни фитоциты культурных растений, хотя встречены их плоды (Чухина и др., 2015; Сперанская и др., 2017)? Не менее актуален и другой вопрос: была ли Старая Ладога исключительно портовым, торговым центром, получавшим продовольствие извне, или ее жители обеспечивали себя сами, в том числе и продуктами земледелия?

На первый вопрос в настоящее время можно дать взвешенный ответ. Вплоть до середины I тыс. н. э. территория Земляного городища представляла собой переувлажненную пойму, подсыхшую лишь в третьей четверти I тыс. н. э. в связи с изменениями климата, обусловившими резкое понижение уровня воды в гидрологической сети Северо-Запада (ср.: Фурасев, 2002. С. 71). После осушения площадки, в период ее расчистки под хозяйственные нужды, она, конечно, должна была подвергнуться пожару, корчевке и — вполне возможно — распашке. До сих пор решающим аргументом в пользу признания данного участка старопахотным служили нечеткие следы борозд, зафиксированные на поверхности сизовато-серых сапропелей, подстилающих темный почвенный горизонт (см.: приложение I, рис. I.3). Однако практически полное отсутствие в «пахотном слое» пыльцы и фитоцитов культурных злаков все же заставляет нас считать эту распашку недолговременным эпизодом (ср.: Чухина и др., 2015. С. 228). Вопрос о возможной связи обнаруженных слабых свидетельств земледельческой активности не с серединой I тыс. н. э., а с эпохой раннего металла можно пока оставить открытым.

Второй вопрос также требует дополнительного исследования. Отсутствие посевов на территории самого Земляного городища вовсе не означает их отсутствия в Ладожской округе. Культивирование злаков началось в регионе как минимум с эпохи раннего металла и вряд ли прекратилось в средневековье. Но в разные периоды оно практиковалось на разных типах почв и различных высотных отметках, в силу изменений экологической обстановки. Вероятно, площадка Земляного городища была наиболее пригодной для пойменного земледелия именно в эпоху раннего металла, когда этот участок только-только вышел из-под воды и еще не превратился в болото, поросшее ольхой.

В эпоху раннего средневековья наиболее пригодными для земледелия в округе Ладоги являлись территории флювиогляциальных гряд, сложенных песчанистыми суглинками. Такие участки имеются на правом берегу Волхова, в районе устья р. Любша и д. Чернавино, а также на левом берегу, в районе урочища Победище (Шитов и др., 2007. С. 37). Отметим, что на Любшанском городище, на высоко расположенной плакорной почве песчаного состава, обнаружены вполне исчерпывающие признаки земледельческой активности, включая пыльцу культурных злаков, фитоциты, следы пожаров (подсеки) и четкие борозды древней пахоты на материке (Петров и др. 2018; Миляев, 2018. С. 220–221, рис. 5.9). Поиск в Ладожской округе свидетельств пойменного земледелия второй половины I тыс. н. э. также представляется перспективным.

Раннесредневековый культурный слой на Земляном городище начал откладываться именно в тот период, когда в его ближайшей округе произошло сокращение площадей ольховых лесов с широколиственными породами и ольховых топей. Заросли кустарника стали сменяться безлесными группировками, удобными для земледелия. Это было следствием понижения воды в гидрологической сети, отмечавшегося во многих районах Северо-Запада в третьей четверти I тыс. н. э. В Старой Ладоге к этому времени относится формирование Чернавинской террасы с содоминированием пыльцы древесных и травяно-кустарничковых растений и датировкой ≈1300 ВР в основании разреза (Шитов и др., 2005. С. 7–10). Появление участков свежей поймы должно было стимулировать развитие пойменного земледелия, являвшегося куда менее трудоемким, чем подсечно-огневое.

В начальные фазы регрессий водоемов для посевов на свежей пойме практически не требовалось проведения сложных работ по рыхлению почвы (особенно на опесчаненных грунтах), а также по внесению удобрений, поливу и прополке. Об этом убедительно свидетельствует обобщение материалов по трем фазам неолитического земледелия Восточной Прибалтики (Левковская, 1987; Лозе, 1988; Левковская, Тимофеев, 2004; Левковская и др., 2019; Gross, 1939; Jakubowska, 1997; Rimantienė, 1999; Loze, 2000; Kriiska, 2003; Levkovskaya, 2011). Но именно легкость обработки земли на влажной пойме, еще свободной от растительности, служит причиной того, что выделить достоверные признаки пойменного земледелия всегда стоит большого труда. Отсутствуют

максимумы пыльцы сорных растений на спорово-пыльцевых диаграммах; отсутствуют зачастую и наконечники орудий для рыхления/вспашки почвы в орудийном наборе. Поэтому наличие даже единичных находок пыльцы культурных злаков (в том числе на Земляном городище) является важным показателем, как минимум, требующим внимания и дальнейшего исследования.

Благодарности

Авторы выражают искреннюю признательность канд. геол.-минерал. наук Михаилу Вячеславовичу Шитову, д-ру геол.-минерал. наук, профессору Андрею Алексеевичу Никонову, канд. геол.-минерал. наук Эльзе Сергеевне Плешивцевой за ценные советы и предоставленные научные материалы.

Аалто, Хейнайоки, 1997 — Аалто М., Хейнайоки Х. Растительность и окружающая среда Старой Ладogi в эпоху викингов // Древности Поволжья / Ред. А. Н. Кирпичников, Е. Н. Носов. СПб.: ИИМК РАН, 1997. С. 37–38.

Александровский, 2012 — Александровский А. Л. Радиоуглеродный возраст пахотного горизонта под культурным слоем Земляного городища Старой Ладogi // Ладoga и Ладожская земля в эпоху Средневековья / Отв. ред. А. Н. Кирпичников. СПб.: Нестор-История, 2012. Вып. 3. С. 59–61.

Александровский, Александровская, 2018 — Александровский А. Л., Александровская Е. И. Результаты исследований культурного слоя и почв на Варяжской улице в Старой Ладoge // Новое в археологии Старой Ладogi, материалы и исследования / Отв. ред. Н. И. Платонова, В. А. Лапшин. СПб.: Невская Книжная Типография, 2018 (Тр. ИИМК РАН; Т. LIII). С. 168–180.

Александровский, Долгих, 2012 — Александровский А. Л., Долгих А. В. Почвенно-географические исследования в Старой Ладoge в 2010 г. // Староладожский сборник. СПб.: Нестор-История, 2012. Вып. 9. С. 69–78.

Александровский и др., 2009 — Александровский А. Л., Арсланов Х. А., Давыдова Н. Н., Долуханов П. М., Зайцева Г. И., Кирпичников А. Н., Кузнецов Д. Д., Лавенто М., Лудикова А. В., Носов Е. Н., Савельева Л. А., Сапелко Т. В., Субетто Д. А. Новые данные относительно трансгрессии Ладожского озера, образования реки Невы и земледельческого освоения Северо-Запада России // Доклады РАН. М., 2009. Т. 424, № 5. С. 682–687.

Александровский и др., 2010 — Александровский А. Л., Кренке Н. А., Нефедов В. С. Исследования почв и

отложений под культурным слоем Земляного городища Старой Ладogi // Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран 1 / Отв. ред. Е. Н. Носов, С. В. Белецкий. СПб.: Ломоносовъ, 2010. С. 43–61.

Александровский и др., 2018 — Александровский А. Л., Лапшин В. А., Григорьева Н. В., Александровская Е. И., Скрипкин В. В. Почвообразование на территории Старой Ладogi в неолите и раннем средневековье // Записки ИИМК. СПб.: ИИМК РАН, 2018. № 18. С. 99–104.

Ананова, 1966 — Ананова Е. Н. О недоразвитой пыльце в плейстоценовых отложениях // БКИЧП. 1966. № 32. С. 18–22.

Арсланов и др., 2020 — Арсланов Х. А., Новенко Е. Ю., Сапелко Т. В., Дергачев В. А., Носевич Е. С., Максимов Ф. Е., Петров А. Ю., Григорьев В. А., Денисенков В. П., Левченко С. Б. Короткопериодные изменения климата на Северо-Западе России за последние 2300 лет и их корреляция с изменениями солнечной активности // Радиоуглерод в археологии и палеоэкологии: прошлое, настоящее, будущее / Ред. Н. Д. Бурова, А. А. Выборнов, М. А. Кулькова. СПб.; Самара: Порто-Принт, 2020. С. 12–14.

Атлас древесины..., 1992 — Атлас древесины и волокон для бумаги / Отв. ред. Е. С. Чавчавадзе. М.: Ключ, 1992. 336 с.

Банк... — Банк палеоботанических и палинологических данных из археологических памятников территории бывшего СССР [The Bank of Paleobotanical and Palynological Findings from Archaeological Sites of the Former USSR Territory (BARPP)]. [Электронный ресурс.] Режим доступа: www.gml.spb.ru (дата обращения: 30.09.2020).

- Баранова и др., 2006 — Баранова С. С., Медведева Л. А., Анисимова О. В. Биоразнообразие водорослей — индикаторов окружающей среды. Тель-Авив: PiliesStudio, 2006. 498 с.
- Белавская, 1981 — Белавская А. П. Семейство слано-ягодниковые (Halogagaceae) // Жизнь растений. Энциклопедия. В 6 т. Т. 5 (2): Цветковые растения / Ред. А. Л. Тахтаджян. М.: Просвещение, 1981. С. 230.
- Бенькова, Швейнгрубер, 2004 — Бенькова В. Е., Швейнгрубер Ф. Х. Анатомия древесины растений России (атлас для идентификации древесины деревьев, кустарников, кустарничков, полукустарников и деревянистых лиан России / Benkova V. E., Schweighruber F. H. Anatomy of Russian wood (an atlas for the identification of trees, shrubs, dwarf shrubs and woody lianas from Russia. Birmensdorf, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research. Bern; Stuttgart; Wien; Haupt, 2004. 456 p.
- Березина, Тюремнов, 1973 — Березина Н. А., Тюремнов С. Н. Сохранность и разрушение пыльцы — важный фактор формирования спорово-пыльцевого спектра // Методические вопросы палинологии: Тр. III междунар. палинолог. конф. / Отв. ред. А. М. Медведева. М.: Наука, 1973. С. 5–8.
- Васильчук, 2005 — Васильчук А. К. Особенности формирования палиноспектров в криолитозоне России. М.: Изд-во МГУ, 2005. 245 с.
- Верзилин, Клейменова, 2010 — Верзилин Н. Н., Клейменова Г. И. Проблема существования реки Нева в голоцене // Вестник СПбГУ. Серия 7. Вып. 4. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2010. С. 74–82.
- Вихров, 1959 — Вихров В. Е. Диагностические признаки древесины главнейших сельскохозяйственных и лесопромышленных пород СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1959. 132 с.
- Гаммерман и др., 1946 — Гаммерман А. Ф., Никитин А. А., Николаева Т. Л. Определитель древесины по микроскопическим признакам (с атласом микрофотографий). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946. 143 с.
- Григорьева, 1988 — Григорьева В. В. Морфология пыльцевых зерен рода *Linum* (Linaceae) флоры СССР // Ботанический журнал. Л.: Наука, Лен. отд., 1988. Т. 73, № 10. С. 1409–1417.
- Гроздилов, 1938 — Гроздилов Г. П. Черновой отчет о раскопках в Старой Ладогe в 1938 г. // НА ИИМК РАН. РО. Ф. 35. Оп. 1. 1938. № 199.
- Гуман, 1978 — Гуман М. А. Антропогенные изменения растительности юга Псковской области в голоцене по палинологическим данным // Ботанический журнал. Л.: Наука, Лен. отд., 1978. Т. 63, № 10. С. 1415–1430.
- Дзюба, 2006 — Дзюба О. Ф. Палиноиндикация качества окружающей среды. СПб.: Недра, 2006. 198 с.
- Диатомовый анализ..., 1949 — Диатомовый анализ. Кн. 2. Определитель ископаемых и современных диатомовых водорослей. Порядки Centrales и Mediales. М.: Гос. изд-во геолог. лит-ры, 1949. 283 с.
- Диатомовые водоросли СССР..., 1974 — Диатомовые водоросли СССР. Ископаемые и современные. Т. 1. Л.: Наука, 1974. 403 с.
- Еремеев и др., 2007 — Еремеев И. И., Дзюба О. Ф., Лисицына О. В. Древнее расселение и земледелие на восточном берегу оз. Ильмень по данным археологии и палеогеографии // Записки ИИМК. 2007. № 2. С. 215–256.
- Информационная система идентификации... — Информационная система идентификации растительных объектов на основе карпологических, палинологических и анатомических данных. Образцы пыльцы, спор. [Электронный ресурс.] Режим доступа: <http://botany-collection.bio.msu.ru/pollen-speciment/index> (дата обращения: 31.05.2020).
- Качалов, 1970 — Качалов А. А. Деревья и кустарники. М.: Лесная промышленность, 1970. 408 с.
- Квасов, 1975 — Квасов Д. Д. Позднечетвертичная история крупных озер и внутренних морей Восточной Европы. Л.: Наука, 1975. 278 с.
- Кирпичников, 2018 — Кирпичников А. Н. Историко-культурное исследование Старой Ладоги // Новое в археологии Старой Ладоги, материалы и исследования / Отв. ред. Н. И. Платонова, В. А. Лапшин. СПб.: Невская Книжная Типография, 2018 (Тр. ИИМК РАН; Т. LIII). С. 7–20.
- Куприянова, Алешина, 1978 — Куприянова Л. А., Алешина Л. А. Пыльца двудольных растений флоры Европейской части СССР. Т. 2. Л.: Наука, 1978. 184 с.
- Лапшин, 2018 — Лапшин В. А. Посад Старой Ладоги, новые исследования // Новое в археологии Старой Ладоги, материалы и исследования... СПб.: Невская Книжная Типография, 2018 (Тр. ИИМК РАН; Т. LIII). С. 135–206.
- Левковская, 1967 — Левковская Г. М. О распределении пыльцы и спор в поверхностном слое донных отложений Ладожского озера // История озер Северо-Запада. Л.: Всесоюзное геогр. общ-во, 1967. С. 140–145.
- Левковская, 1973 — Левковская Г. М. Зональные особенности современной растительности рецентных спорово-пыльцевых спектров Западной Сибири // Методические вопросы палинологии... М.: Наука, 1973. С. 116–120.
- Левковская, 1987 — Левковская Г. М. Природа и человек в среднем голоцене Лубанской низины. Рига: Зинатне, 1987. 93 с.

- Левковская, 2017а — Левковская Г. М. Методические аспекты использования палинологии для климатостратиграфии (особенности российской и зарубежных палинологических школ) // Актуальные проблемы современной палинологии: Материалы XIV палинол. конф., посв. памяти В. П. Гричука (Москва, 5–8 июня 2017) / Ред. Н. С. Болиховская, Т. С. Ключевиткина. М.: Географ. фак. МГУ, 2017. С. 158–162.
- Левковская, 2017б — Левковская Г. М. Зональные и локальные особенности палинокомплексов современных отложений из Южной Аравии // Актуальные проблемы современной палинологии: Материалы XIV палинол. конф. ... М.: Географ. фак. МГУ, 2017. С. 154–157.
- Левковская, Боголюбова, 2011 — Левковская Г. М., Боголюбова А. Н. Качество пыльцы и особенности палинокомплексов некоторых природных экстремумов плейстоцена и их сравнение с палинокомплексами отложений с высоким радиоактивным заражением из района Чернобыльской техногенной катастрофы // Проблемы современной палинологии: Материалы XIII Российской палинол. конф. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2011. С. 278–285.
- Левковская, Тимофеев, 2004 — Левковская Г. М., Тимофеев В. И. К хронологии и экологии начала земледелия Восточной Прибалтики (о признаках неолитического земледелия в районе Цедмарских торфяниковых стоянок в Калининградской области) // Проблемы хронологии и этнокультурных взаимодействий в неолите Евразии / Ред. В. И. Тимофеев, Г. И. Зайцева. СПб.: ИИМК РАН, 2004. С. 88–106.
- Левковская и др., 2005 — Левковская Г. М., Хоффкер Дж. Ф., Аникович М. В., Форман С. Л., Холлидэй В. Т., Поспелова Г. А., Попов В. В., Карцева Л. А., Стёганицева В. Я., Санько А. Ф. Климатостратиграфия древнейших палеолитических слоев стоянки Костёнки 12 (Волковская) // Проблемы ранней поры верхнего палеолита Костёнковско-Борщёвского района и сопредельных территорий. СПб.: Копи-Р, 2005. С. 93–130.
- Левковская и др., 2011 — Левковская Г. М., Мацко В. П., Сквернюк И. И., Орехова М. Г., Карцева Л. А. Качество пыльцы и особенности палинокомплексов поверхностных почвенных проб из района Чернобыля (данные по отложениям с высоким радиоактивным заражением) // Проблемы современной палинологии: Материалы XIII Российской палинол. конф. Т. 2. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2011. С. 271–277.
- Левковская и др., 2014 — Левковская Г. М., Карцева Л. А., Четверов В. А., Газизова Д. Г. СЭМ-микрографии пыльцы — новые источники палинологической, палеоботанической, палеогеографической и археологической информации // Методы палинологических исследований: Тез. докл. палинологической школы-конф. с междунар. участием. М.: Изд-во МГУ, 2014. С. 41.
- Левковская и др., 2018 — Левковская Г. М., Карцева Л. А., Чавчавадзе Е. С., Любин В. П., Беляева Е. В., Лисицын С. Н., Дудин А. Е., Артюшенко А. А., Боголюбова А. Н. О получении информации об объектах собирательства каменного века с помощью СЭМ (данные по стоянкам Баракаевская, Монашеская, Костенки 1/1, Борщево 5, Атапуэрка) // Стратегии жизнеобеспечения в каменном веке, прямые и косвенные свидетельства рыболовства и собирательства: Материалы МНК, посв. 50-летию В. М. Лозовского. СПб.: ИИМК РАН, 2018. С. 252–253.
- Левковская и др., 2019 — Левковская Г. М., Зайцева Г. И., Боголюбова А. Н. О трех фазах неолитического земледелия Восточной Прибалтики (по археологическим, радиоуглеродным и палинологическим данным) // Эволюция неолитических культур Восточной Европы / Ред. А. А. Выборнов, Е. В. Долбунова, Е. М. Колпаков, Е. С. Ткач. СПб.: Портпринт, 2019. С. 52–56.
- Лозе, 1988 — Лозе И. А. Поселения каменного века Лубанской низины. Мезолит, ранний и средний неолит. Рига: Зинатне, 1988. 211 с.
- Малаховский и др., 1993 — Малаховский Д. Б., Арсланов Х. А., Гей Н. А., Козырева М. Г., Джиноридзе Р. Н. Новые данные по голоценовой истории Ладожского озера // Эволюция природных обстановок и современное состояние геосистемы / Отв. ред. Н. Н. Давыдова, Б. И. Кошечкин. РАН, Русское географическое общество. СПб.: б/и, 1993. С. 61–73.
- Миляев, 2018 — Миляев П. А. Городище Любша: планиграфия и стратиграфия // Новое в археологии Старой Ладogi, материалы и исследования... СПб.: Невская Книжная Типография, 2018 (Тр. ИИМК РАН; Т. LIII). С. 207–232.
- Мурашкин, 2018 — Мурашкин А. И. Инвентарь неолитического слоя Старой Ладogi (Варяжская улица) // Новое в археологии Старой Ладogi, материалы и исследования... СПб.: Невская Книжная Типография, 2018 (Тр. ИИМК РАН; Т. LIII). С. 181–195.
- Никонов, 2017 — Никонов А. А. Воздействие голоценовых пертурбаций Онежско-Ладожской гидрологической системы на древнее население прибрежных пространств // Самарский научный вестник. Самара: Самарский гос. соц.-пед. ун-т, 2017. Т. 6, № 3 (20). С. 171–177.
- Павлов, 1948 — Павлов Н. В. Ботаническая география СССР. Алма-Ата: Изд-во АН Каз. ССР; М.: Искра революции, 1948. 704 с.

- Петров, 1945 — Петров В. А. Растительные остатки из культурного слоя Старой Ладogi // КСИА. 1945. Вып. XI. С. 42–51.
- Петров и др., 2018 — Петров Д. В., Савельева Л. А., Шитов М. В. Находки фитолитов культурных злаков и других палиноморф в погребенной почве Любшанского городища (Старая Ладога) // Тр. XVII Всерос. микропалеонтологического совещания «Современная микропалеонтология — проблемы и перспективы» (Казань, 24–29 сентября 2018 г.) / Отв. ред. М. С. Афанасьева, А. С. Алексеев. М.: ПИН РАН, 2018. С. 414–418.
- Петров и др., 2019 — Петров Д. В., Савельева Л. А., Шитов М. В., Петров А. Ю. Реконструкция растительности южного Приладожья в голоцене по данным спорово-пыльцевого анализа разреза Ивановский Остров // Динамика экосистем в голоцене (к 100-летию Л. Г. Динесмана): Материалы V Всероссийск. научн. конф. с междунар. участием / Отв. ред. А. Б. Савинецкий. М.: Медиа-ПРЕСС, 2019. С. 255–257.
- Равдоникас, 1950 — Равдоникас В. И. Старая Ладога (из итогов археологических исследований 1938–1947 гг.) Ч. II // СА. 1950. XII. С. 7–40.
- Сабанеев, 1886 — Сабанеев Д. А. Заметка о древней Климентовской церкви близ Старой Ладogi // Записки Императорского Русского археологического общества. Новая серия. Т. 1. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1886. С. 1–6.
- Савельева и др., 2017 — Савельева Л. А., Андреев А. А., Громиз Р., Лузикова А. В., Субетто Д. А., Фёдоров Г. М., Меллес М. Биостратиграфия позднеледниковых и голоценовых осадков Ладожского озера // Актуальные проблемы современной палинологии: Материалы XIV палинол. конф., посв. памяти В. П. Гричука. Москва (5–8 июня 2017) / Ред. Н. С. Болиховская, Т. С. Ключевиткина. М.: Географ. фак-т МГУ, 2017. С. 299–303.
- Сафронова, 2018 — Сафронова Т. В. Золотистые водоросли (*Chrysophyceae*, *Syniophyceae*) особо охраняемых природных территорий Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга: Рукопись дис. ... канд. биол. наук. 03.02.01. Ботан. ин-т им. В. Л. Комарова РАН. СПб., 2019. 205 с.
- Семёнова и др., 2009 — Семёнова Л. Р., Савельева Л. А., Никонов А. А. Новые данные по палеогеографии среднего и позднего голоцена юго-западного Приладожья // VI Всерос. совещание по изучению четвертичного периода. Новосибирск: ИНГТ СО РАН, ИГМ СО РАН, 2009. С. 545–548.
- Соколов и др., 1977 — Соколов С. Я., Связева О. А., Кубли В. А. Ареалы деревьев и кустарников СССР. Л.: Наука, Лен. отд., 1977. Т. I. 164 с.
- Соколов и др., 1986 — Соколов С. Я., Связева О. А., Кубли В. А. Ареалы деревьев и кустарников СССР. Л.: Наука, Лен. отд., 1986. Т. III. 181 с.
- Сорокина, 2008 — Сорокина И. А. Флора долины реки Волхов и прилегающих территорий в границах Нижне-Волховского ботанико-географического района. Часть 1: Физико-географические условия. Список видов флоры // Вестник СПбГУ. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. Серия 3. Вып. 3. С. 42–55.
- Сперанская и др., 2017 — Сперанская Н. Ю., Чухина И. Г., Григорьева Н. В., Соломонова М. Ю. Итоги изучения фитолитов погребенной почвы Земляного городища Старой Ладogi // V (XXI) Всероссийский археологический съезд: Сб. науч. тр. / Отв. ред. А. П. Деревянко, А. А. Тишкин. Барнаул: АлтГУ, 2017. С. 984–985.
- Субетто, 2009 — Субетто Д. А. Донные отложения озер, палеолимнологические реконструкции. СПб.: Изд-во РГПУ, 2009. 342 с.
- Тарасевич, 1983 — Тарасевич В. Ф. Сем. *Рoaceae* Barnh. — злаки, мятликовые // Бобров А. Е., Куприянова Л. А., Литвинцева М. В., Тарасевич В. Ф. Споры папоротникообразных и пыльцы голосеменных и однодольных растений флоры европейской части СССР. Л.: Наука, 1983. С. 158–177.
- Тимофеев, Стеценко, 1997 — Тимофеев В. И., Стеценко Н. К. Староладожская неолитическая стоянка // Памятники старины. Концепции. Открытия. Версии / Ред. А. Н. Кирпичников. СПб.; Псков: ИИМК РАН, 1997. Т. 2. С. 331–334.
- Фёдорова, 1959 — Фёдорова Р. В. Некоторые особенности морфологии пыльцы культурных злаков // Тр. Института географии АН СССР. Материалы по геоморфологии и палеогеографии. Работы по спорово-пыльцевому анализу. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1959. Вып. 77. С. 166–186.
- Фурасьев, 2002 — Фурасьев А. Г. Климат Северо-Запада России в период славянской колонизации VIII–X веков // Старая Ладога и проблемы археологии Северной Руси / Отв. ред. А. Н. Кирпичников. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2002. С. 70–73.
- Чавчавадзе, 1979 — Чавчавадзе Е. С. Древесина хвойных. Л.: Наука, 1979. 192 с.
- Чавчавадзе, Сизоненко, 2002 — Чавчавадзе Е. С., Сизоненко О. Ю. Структурные особенности древесины кустарников и кустарничков арктической флоры России. СПб.: Росток, 2002. 271 с.
- Человек и природная среда..., 2005 — Человек и природная среда в истории России. Часть I: Результаты междисциплинарных исследований и учебных практик Санкт-Петербургского государственного университета в Старой Ладogi и южном Приладожье. СПб., 2005. 140 с.

- Чухина и др., 2014 — Чухина И. Г., Радыш Д. А., Григорьева Н. В. Предварительные результаты изучения растительных макроостатков по материалам раскопок 2010 года в Старой Ладоге // Ладoga в контексте истории и археологии северной Евразии / Ред. В. Т. Мусбахова. СПб.: Нестор-История, 2014. С. 244–251.
- Чухина и др., 2015 — Чухина И. Г., Радыш Д. А., Григорьева Н. В. Опыт сопоставления результатов карпологических исследований Земляного городища Старой Ладogi и городища Камно // АИППЗ. 2015. Вып. 30 / Отв. ред. Н. В. Лопатин. М.; Псков; СПб.: Нестор-История, 2015. С. 221–230.
- Шитов и др., 2004 — Шитов М. В., Бискэ Ю. С., Носов Е. Н., Плешиивцева Э. С. Природная среда и человек нижнего Поволжья на финальной стадии Ладожской трансгрессии // Вестник СПбГУ. СПб., 2004. Серия 7. № 3. С. 3–15.
- Шитов и др., 2005 — Шитов М. В., Бискэ Ю. С., Плешиивцева Э. С., Мараков А. Я. Позднеголоценовые изменения уровня Волхова в районе Старой Ладogi // Вестник СПбГУ. СПб., 2005. Серия 7. № 3. С. 3–16.
- Шитов и др., 2007 — Шитов М. В., Константинова Т. А., Лоскутов И. Г., Плешиивцева Э. С., Сумарева И. В., Чухина И. Г., Щеглова О. А. Городская среда, землепользование и сельское хозяйство в средневековой Ладoge и ее округе (по палинологическим и карпологическим данным). Часть II: Середина I тыс. от Р. Х. — середина IX в. // Вестник СПбГУ. СПб., 2007. Серия 7. № 4. С. 3–16.
- Шитов и др., 2008 — Шитов М. В., Плешиивцева Э. С., Потапович А. А. История хозяйственного освоения Нижнего Поволжья, начальный период // Вестник СПбГУ. СПб., 2008. Серия 7. № 1. С. 3–14.
- Яценко-Хмелевский, 1954 — Яценко-Хмелевский А. А. Древесины Кавказа. Т. I. Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1954. 674 с.
- Andersen, 1979 — Andersen S. Th. Identification of wild grass and cereal pollen // Danmarks Geol Undersøgelser Årbog, 1978. København, 1979. P. 69–92.
- Beug, 1961 — Beug H.-J. Leitfaden der Pollenbestimmung für Mitteleuropa und angrenzende Gebiete. Lieferung 1. Jena: Gustav Fischer Verlag, 1961. 63 S.
- Cabala, 2003 — Cabala J. New and rare morphotypes of chrysophycean stomatocysts from Poland // Nova Hedwigia. 2003. Vol. 7, no.1–2. P. 99–107.
- Carney et al., 1992 — Carney H. J., Whiting M. C., Duff K. E., Whitehead D. R. Chrysophycean cysts in Sierra Nevada (California) lake sediments, paleoecological potential // Journal of Paleolimnology. 1992. Vol. 7. P. 73–94.
- Delusin, 1991 — Delusin I. The Holocene Pollen Stratigraphy of Lake Ladoga and Vegetational History of its surroundings (Annales Academiae Scientiarum Fennicae, 153). 1991. 66 p.
- Duff et al., 1995 — Duff K. E., Zeeb B. A., Smo J. P. Atlas of Chrysophycean Cysts. 1995. 189 p.
- Firbas, 1937 — Firbas F. Der pollenanalytische Nachweis des Getreidebaues // Ztschr. Botanik. 1937. Bd. 31. S. 447–478.
- Greguss, 1959 — Greguss P. Holzanatomie der europäischen Laubhölzer und Sträucher. Akademiai Kiadó, Budapest, 1959. 330 p.
- Gross, 1939 — Gross H. Moorgeologische Untersuchung der Vorgeschichtlichen Dörfer im Zedmar-Bruch // Prussia. 1939. Bd. 33. P. 100–168.
- Human Impacts Pollen Database — Human Impacts Pollen Database, a pollen identification key. [Электронный ресурс.] Режим доступа: <https://keyserver.lucidcentral.org/key-server/data/0f030b07-0200-4b0f-8509-0a0808060703/media/Html/index.html> (дата обращения: 26.05.2020).
- Jakubowska, 1997 — Jakubowska I. Early Antropogenic Activities in Eastern Latvian Lowlands — New Pollen Analyses from Zvidze, Lake Lubana region // ISKOS. No. 11. Helsinki, 1997. P. 152–158.
- Kamenik et al., 2005 — Kamenik C., Agusti-Panareda A., Appleby P. G., Dearing J. A., Shilland E. M., Sporka F., Stefkova E., Thompson R. Paleolimnological evidence for atmospheric pollution, climate and catchment-related changes in alpine chrysophyte stomatocyst assemblages (Tatra, Slovakia) // Nova Hedwigia. Beiheft, 2005. Vol. 128. P. 275–293.
- Königsson, Possnert, 1997 — Königsson L.-K., Possnert G. Pollen Analysis Covering the past 4000 Radiocarbon Years of Culture Landscape of the Novgorod Area, Russia // Environment and Vikings / Eds. U. Miller, H. Clarke. Birka studies 4. 1997. Vol. 52. P. 73–89.
- Königsson et al., 1997 — Königsson L.-K., Possnert G., Hammar Th. Economical and Cultural Change in the Landscape Development at Novgorod, Russia // Tor. Uppsala, 1997. P. 353–387.
- Krammer, 2000 — Krammer K. Diatoms of Europe. Diatoms of the European inland waters and comparable habitats. Vol. 1: The genus Pinnularia Ruggell: A. R. G. Gantner Verlag. K.G., 2000. 703 p.
- Krammer, Lange-Bertalot, 1986 — Krammer K., Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae 1. Teil, Naviculaceae // Süßwasserflora von Mitteleuropa. Bd. 2/1. Jena: Gustav Fischer Verlag, 1986. 876 S.
- Krammer, Lange-Bertalot, 1991 — Krammer K., Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae 3. Teil, Centrales, Fragilariaceae, Eunotiaceae. Stuttgart; Jena: Gustav Fischer Verlag, 1991 (Süßwasserflora von Mitteleuropa; Bd. 2/3). 576 S.

- Kriiska*, 2003 — *Kriiska A.* From hunter-fisher-gatherer to farmer — Changes in the Neolithic economy and settlement on Estonian territory // *Archaeologia Lithuania*. 2003. No. 4. P. 11–26.
- Kristiansen, Preisig*, 2007 — *Kristiansen J., Preisig H. R.* Chrysophyte and haptophyte algae. Part 2: Synurophyceae / Eds. B. Büdel et al. Heidelberg: Spektrum Akademie Verlag, 2007 (Süßwasserflora von Mitteleuropa). 252 p.
- Leroi-Gourhan*, 1969 — *Leroi-Gourhan A.* Pollen grains of *Gramineae* and *Cerealia* from Shanidar and Zawi Chemi // The domestication and exploitation of plants and animals / Eds. Peter J. Ucko, G. W. Dimbleby. London, 1969. P. 143–148.
- Levkovskaya*, 1999 — *Levkovskaya G.* Palynoteralical Complexes as Indicators of the Ecological Stress, Past and Present // Proceedings of the 5th European Palaeobotanical and Palynological Conference (Kraków, June 26–30, 1998) // *Acta Palaeobotanica*. Suppl. 2. 1999. No. 2. P. 643–648.
- Levkovskaya*, 2011 — *Levkovskaya G.* The Flood Terrace Model of the Neolithic Phase of the Agriculture of Two East Baltic Lowlands EAA (Oslo, Norway, 14–18 September, 2011). Oslo: State University, 2011. P. 15–16.
- Levkovskaya*, 2012 — *Levkovskaya G. M.* Pollen indication of the natural and Chernobyl type geobotanical catastrophes // Japanese Journal of Palynology. Abstracts. 13th International Palynological Congress. 9th International Organization of Palaeobotany Conference. Tokyo, 2012. No. 58. P. 126–127.
- Levkovskaya et al.*, 2012 — *Levkovskaya G., Lyubin V., Belyaeva E.* Late Caucasian Neanderthals of Barakavskaya Cave, Chronology, Palaeoecology and Palaeoeconomy (Chapter 16) // *Caves in Context. The Cultural Significance of Caves and Rockshelters in Europe* / Eds. K. A. Bergsvik, R. Skeates. Oxford: Oxbow Books, 2012. P. 225–253.
- Levkovskaya et al.*, 2015 — *Levkovskaya G., Shumilovskikh L., Anikovich M., Platonova N., Hoffecker J. F., Lisitsyn S., Pospelova G., Kuzmina I., Sanko A.* Supra-regional correlations of the most ancient paleosols and Paleolithic layers of Kostenki-Borschevo region (Russian Plain) // *Quaternary International*. Vol. 365 (16 April, 2015). P. 114–134.
- Loze*, 2000 — *Loze I.* Stone age settlements in the Lake Lubāns wetland in Latvia, and subsistence strategies of the population // *Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis A.* 2000. Vol. 54, iss. 3/4. P. 109–122.
- Malachovskij et al.*, 1996 — *Malachovskij D. B., Delusin I. V., Gej N. A., Dginoridze R. N.* Evidence from Neva valley, Russia, of the Holocene history of Lake Ladoga // *Fennia*. 1996. Vol. 174, no. 1. P. 113–123.
- Nygaard*, 1956 — *Nygaard G.* Ancient and recent flora of diatoms and Chrysophyceae in Lake Gribbs // *Folia limnologica scandinavica*. 1956. Vol. 8. P. 32–262.
- PalDat... — PalDat, Palynological Database, an online publication on recent pollen [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.paldat.org> (дата обращения: 31.05.2020).
- Palynological Laboratory Database... — Palynological Laboratory Database. Komarov Botanical Institute of Russian Academy of Science. [Электронный ресурс.] Режим доступа: <http://pollendatabase.ru> (дата обращения: 26.05.2020).
- Pang*, 2017 — *Pang W.* Chrysophycean stomatocysts from the Da Hinggan Mountains. 2017. 249 p.
- Pozhidaev*, 1998 — *Pozhidaev A. E.* Hypothetical way of pollen aperture patterning. 1. Formation of 3-colpate patterns and endoaperture geometry // Review of Palaeobotany and Palynology. 1998. 104. P. 67–83.
- Rimantienė*, 1999 — *Rimantienė R.* Traces of Agricultural Activity in the Stone Age Settlements of Lithuania // *Environmental and Cultural History of the Eastern Baltic Region* / Ed. U. Miller. Strasbourg: Council of Europe; Rixensart: PACT, 57, 1999. P. 275–290.
- Saarnisto, Grönlung*, 1996 — *Saarnisto M., Grönlung T.* Shoreline displacement of Lake Ladoga — new data from Kilpolansaari // *Hydrobiologia*. 1996. 322. P. 205–215.
- Sapelko et al.*, 2019 — *Sapelko T., Pozdnyakov Sh., Kuznetsov D., Ludikova A., Zazovskaya E.* Holocene sedimentation in the central part of Lake Ladoga // *Quaternary International*. 2019. Vol. 524. P. 67–75.
- Troels-Smith*, 1955 — *Troels-Smith J.* Karakterisering af løse jordarter (Characterisation of Unconsolidated Sediments) // *Danmarks Geologiske Undersøgelse*. 1955. No. 3. P. 39–73.
- Vijver, Beyens*, 1997 — *Vijver B., Beyens, L.* The Subfossil Chrysophyte Cyst Flora of Some Peat Samples from Kerguelen Islands // *Archiv für Protistenkunde, Protozoen, Algen, Pilze*. 1997. Vol. 148. P. 491–503.
- Vuorela*, 1973 — *Vuorela I.* Relative pollen rain around cultivated fields // *Acta Botanica Fennica*. 1973. Vol. 102. P. 1–27.
- Wilkinson et al.*, 2001 — *Wilkinson A., Zeeb B. A., Smol J. P.* Atlas of Chrysophycean Cysts. Vol. II. 2001. 169 p.

**Staraya Ladoga, SEM investigations of plant remains
from palaeosols separated by deposits of the Ladoga transgression.
New materials and old problems**

N. I. Platonova, G. M. Levkovskaya, D. A. Britskiy, L. A. Kartseva, V. A. Lapshin,
N. V. Grigor'yeva, P. A. Milyaev, D. V. Zbukova

Reconnaissance investigations of macerated palynocomplexes using scanning electronic microscopy (SEM) have resulted in compilation of a bank of SEM micrographs of plant remains from two palaeosols underlying the cultural deposits of the Staraya Ladoga section and separated by clays of the Ladoga transgression. The lower soil (2) is synchronous to the Neolithic Age ($\approx 5100\text{--}4600$ BP). The upper palaeosol (1) was formed during the Palaeometal and Early Iron Ages up to the beginning of the Early Middle Ages (≈ 1400 BP). The collected SEM pollen data provide argumentation for the floodplain genesis of the investigated hydromorphic depositions. The edaphic conditions found during the period of formation of the upper horizon of palaeosol 1 underlying the cultural deposits of Staraya Ladoga were unfavourable for the reproductive sphere of the most of the plants and for agriculture. It is indicated by the predominance of morphologically atypical and immature pollen of the majority of taxa. This phenomenon was produced by the waterlogging of the soils by alkaline waters as revealed by numerous finds of diatoms and chrysophycean stomatocysts of algae. SEM micrographs obtained for one sample from the upper horizon of soil 1 indicate that it is constituted completely by microfragments of the deposits formed under alternating exposed and inundated environments (as is typical of floodplains). The gained correlations of spore-pollen diagrams have allowed the authors to distinguish a new palynological *Alnus* marker (maximum quantity of alder) with its beginning dated to the end of the lake transgression (ca 2400 BP). This marker is present in diagrams of the sections of the lowest geomorphological levels including the lowland Radbelik bog (Lake Ilmen), the two-metre high floodplain of Naziya 2 (South-West of the Ladoga region) and Nevsky Lesopark and Nevsky Pyatachok (Neva river) indicating the synchrony of the Lakes Ladoga and Ilmen regressions. The deposits of top of the upper palaeosol of Zemlyanoye Gorodishche with considerable contents of alder and non-arboreal pollen probably are synchronous to the beginning of the transition from the domination of alder swamps and alder forests with an admixture of broadleaf species to the flood terrace meadows (ca 1500–1400 BP).