Археологические вести

— 30 —

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE FOR THE HISTORY OF MATERIAL CULTURE

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Archaeological news

30
(2020)

Saint-Petersburg
2020

Археологические вести

30
(2020)

Санкт-Петербург
2020

Издание основано в 1992 году

Редакционная коллегия:

Н. В. Хвощинская (главный редактор), О. И. Богуславский, В. С. Бочкарёв, С. А. Васильев, М. Ю. Вахтина, Ю. А. Виноградов, член-корреспондент РАН П. Г. Гайдуков, Т. С. Дорофеева (отв. секретарь), М. Т. Кашуба, А. В. Курбатов, В. А. Лапшин, академик РАН Н. А. Макаров, академик РАН В. И. Молодин, Н. И. Платонова, Н. Ю. Смирнов, Л. Г. Шаяхметова

Археологические вести, Ин-т истории материальной культуры РАН. — **Вып. 30** / [Гл. ред. Н. В. Хвощинская]. — СПб., 2020. — 368 с.: ил.

В очередной номер журнала «Археологические вести» включены статьи, посвященные новейшим исследованиям в области археологии и истории. В разделе «Новые открытия и исследования» рассматриваются отдельные категории археологических древностей от каменного века до средневековья. В ряде работ обсуждаются вопросы хронологии археологических памятников разных эпох, в частности, чустской культуры в Ферганской долине, тагарской в Минусинской котловине, уточняется датировка основного культурного горизонта поселения раннежелезного века Марьянское 1, находящегося в Краснодарском крае, и время сокрытия двух гнёздовских кладов рубежа IX–X вв. Кроме того, две статьи посвящены изучению первоначальных укреплений Старой Ладogi и результатам исследования палеопочв, подстилающих культурный слой этого памятника.

В специальном разделе «Актуальные проблемы археологии» представлены результаты изучения поселения Балка Лисовицкого эпохи бронзы на Таманском полуострове, обосновывается место происхождения и распространения больших прямоугольных пряжек из сибирского гагата в эпоху хунну, а также обсуждается вопрос об особенностях древнерусских фортификационных сооружений. Отдельный раздел посвящен истории науке, также в журнале приводится информация о международных конференциях. Среди авторов журнала ученые из различных научных центров России.

The current issue of “Archaeological news” includes articles devoted to the most recent researches in the sphere of archaeology and history. The section “New discoveries and studies” considers particular categories of archaeological antiquities dated from the Stone Age to the Middle Ages. A series of articles discuss questions of chronology of archaeological sites of different epochs, in particular, of the Chust culture in the Fergana Valley and the Tagar culture in the Minusinsk Kettle; a more precise dating is proposed for the main cultural horizon of the Early Iron Age site of Maryanskoye 1 in Krasnodar Kray and the date of burying of two Gnezdovo hoards at the turn between the 9th and 10th century. In addition, two articles are dedicated to studies of the original fortifications of Staraya Ladoga and the results of investigations of palaeosoils underlying the cultural layer of this site.

The special section “Topical problems of archaeology” presents the results of the investigation of the settlement-site of “Lisovitsky Balka” of the Bronze Age on the Taman Peninsula; the provenience and distribution of large rectangular buckles from Siberian jet of the Xiongnu period are grounded, and the problem on the features of Old-Russian fortifications is discussed. A separate section is dedicated to the history of science. This yearbook also presents information on international conferences. Among the authors of the volume there are researchers from different scientific centres of Russia.

ISSN 1817-6976

Первая страница обложки — пластина-пряжка, Салхит, Монголия (Treasures..., 2011. P. 135, fig. 172)

First page of cover — plate-buckle, Salkhit, Mongolia (Treasures..., 2011. P. 135, fig. 172)

Четвертая страница обложки — пряжка, могильник Культобе в Южном Казахстане (Подушкин, 2012. Рис. 1, 5)

Fourth page of cover — buckle, cemetery of Kultobe in Southern Kazakhstan (Подушкин, 2012. Рис. 1, 5)

© Институт истории материальной культуры РАН, 2020

© Коллектив авторов, 2020

© Российская академия наук, продолжающееся издание
«Археологические вести», 1992 (год основания), 2020

Методы стабильных изотопов в исследованиях археологических объектов (применяемые методы и последние результаты)¹

Г. И. Зайцева, Н. Д. Бурова, С. А. Ришко, А. А. Семенцов, О. В. Лохова²

Аннотация. В статье показывается возможность изотопных методов и перспектива их применения при анализе археологического материала. Данная информация позволит археологам скорректировать направления исследований и выработать оптимальный методологический подход в решении конкретных задач.

Annotation. This paper demonstrates the possibilities of isotope methods and the prospects of their application for analyses of archaeological materials. This information may be helpful for archaeologists in order to correct the direction of their investigations and to develop the optimal methodological approach to solution of particular problems.

Ключевые слова: стабильные изотопы, ¹³C, ¹⁵N, Sr, углерод, азот, стронций, изотопный анализ.

Keywords: stable isotopes, ¹³C, ¹⁵N, carbon, nitrogen, strontium, isotopic analysis.

DOI: 10.31600/1817-6976-2020-30-200-206

Введение

Изучение археологических объектов с использованием различных изотопов началось с конца 1950-х гг., когда для хронологических исследований стали использоваться радиоактивные изотопы. Среди них первое место, несомненно, принадлежит до сих пор радиоуглероду.

Основы применения радиоуглерода широко известны (Арсланов, 1987). Радиоуглеродным анализом археологических объектов лаборатория ИИМК РАН занимается с 1950-х гг. Получен огромный материал, создана база данных радиоуглеродных дат различных археологических культур и памятников, отраженная в статьях и монографиях (Тимофеев и др., 2004; Радиоуглерод..., 2007).

¹ Статья подготовлена в рамках выполнения программ ФНИ РАН по теме государственной работы № 0184-2019-0009 «Исследование археологического материала Центральной России, Сибири, Северного Кавказа и Крыма эпохи бронзы, железа и средневековья естественнонаучными методами: радиоуглеродное датирование, масс-спектрометрия, спектральный анализ химического состава артефактов, остеология».

² Лаборатория археологической технологии, ИИМК РАН; Дворцовая наб., д. 18, Санкт-Петербург, 191186, Россия.

В настоящее время многие ключевые проблемы археологии, связанные с происхождением человека, взаимодействием культур, с направлениями миграции и путями торговли, с разработкой источников сырья, развитием технологических приемов в обработке металлов, и другие трудно решить только одними методами археологии.

Прогресс в области инструментальной техники, связанный с появлением приборов последнего поколения, позволяет не только осуществлять элементный анализ образцов, но и определять с высокой точностью различные изотопы, часто являющиеся определенными маркерами, характеризующими некоторые составляющие природной среды, структуры питания человека и другие важные аспекты среды обитания древних людей. К нынешнему времени накоплен большой экспериментальный опыт, который требует анализа и осмысления. В данной статье мы попытаемся суммировать и проанализировать данные, разбросанные по различным отечественным и зарубежным публикациям.

Основы методик

Применение стабильных изотопов в археологии началось примерно на 20 лет позднее радиоуглеродного анализа, то есть с конца 1970-х гг.

Рис. 1. Схема поступления углерода в организм человека

Fig. 1. Scheme of the accumulation of carbon by human organism

Изотопы условно можно подразделить на легкие, атомной массой до 20 атомных единиц, и тяжелые, свыше 90.

Н. Ван дер Мерве и Д. Фогель на основе определения стабильных изотопов $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в коллагене костей животных и человека смогли впервые доказать выращивание кукурузы уже в доисторический период в Северной Америке (Vogel, van der Merwe, 1978). Можно сказать, что с этого времени ведется отсчет применения этих изотопов для целей археологии. Сейчас исследования с помощью стабильных изотопов получили новый импульс, и сфера их применения постоянно расширяется. Химическим путем разделить изотопы, отличающиеся на единицу массы, практически невозможно.

Для этих целей используют масс-спектрометры. Масс-спектрометр — это вакуумный прибор, использующий физические законы движения заряженных частиц в магнитных и электрических полях и необходимый для получения масс-спектра. Современные масс-спектрометры дают возможность измерять ИС (изотопный состав) с точностью, достигающей 10^{-7} .

Из множества стабильных изотопов, существующих в природе, в археологических исследованиях пока что нашли применение такие легкие изотопы, как ^{13}C , ^{15}N , кислород (^{18}O), стронций, свинец и некоторые другие.

Легкие изотопы (^{13}C , ^{15}N)

Рассмотрим поступление в живой организм легких изотопов углерода и азота. В растения углерод поступает в результате процессов фотосинтеза. Растения при фотосинтезе избирательно поглощают легкий изотоп углерода (van der Merwe, 1982). Содержание в атмосфере углерода с массой 12 и 13 составляет соответственно 98,916 % и 1,084 %.

Соотношение изотопов углерода $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ в растениях зависит от того, как идет усвоение углекислого газа при фотосинтезе. Существуют три механизма фотосинтеза. Наиболее распространенный механизм усвоения углерода носит название цикла Кельвина и обозначается C_3 . Подавляющее большинство деревьев, кустарников и трав усваивают углекислый газ из атмосферы именно по этому принципу. Другой механизм (C_4) называется циклом Хетча-Слека. Типичные представители для него — сахарный тростник и кукуруза. Некоторые растения, произрастающие в жарком и сухом климате, используют механизм САМ. Характерные представители в этом случае — кактусы и ананасы (рис. 1).

Через пищу углерод поступает в организм человека и фиксируется в костной ткани. Кости животных и человека являются своеобразным архивом для исследований, дающим возможность

Рис. 2. Весовое содержание основных элементов и изотопов

Fig. 2. Weight contents of the main elements and isotopes

узнать как источники питания, так и определенные условия окружающей среды.

Кость состоит из органической части (коллаген) и неорганической, карбонатной, части. Коллаген имеет тот изотопный состав, который наблюдался в природе в момент его формирования. Значительную роль при фракционировании играет температура. Таким образом, по соотношению изотопов $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ можно судить как о диете, так и о температурном режиме в контексте холоднее–теплее (*Krueger, Reesman, 1982*).

Азот, как и углерод, — необходимый для жизнедеятельности элемент. В белке животных и человека содержится 16–17 % азота.

Азот входит в состав ДНК и многих органических соединений, белков. Содержится в мышечной (7,2 %), костной (4,3 %) тканях, крови человека (в человеческом организме массой 50 кг в среднем содержится 1,3 кг азота, а соответственно — массой 70 кг — 1,8 кг)(рис. 2).

В организмах плотоядных животных белок образуется за счет потребляемых белковых веществ, имеющих в организмах травоядных животных и в растениях.

Растения синтезируют белок, усваивая содержащиеся в почве азотистые вещества, главным образом неорганические. Значительные количества азота поступают в почву благодаря азотфиксирующим микроорганизмам, способным переводить свободный азот воздуха в соединения азота.

Структура питания отражается в коллагене костной ткани. В археологических памятниках сохраняется именно костный материал, другие ткани сохраняются очень редко. Коллаген состоит из неорганической части (примерно на одну четверть) и органических компонентов. Неорганическая часть представлена в основном апатитами, то есть кальциевыми солями фосфорной кислоты. Приблизительно 95 % органического вещества костного материала приходится на коллаген. Именно костный коллаген и является материалом для изотопных исследований.

Выделение коллагена в лаборатории отработано и широко используется (Арсланов, 1987). Главная задача химической обработки — удаление посторонних примесей, апатитов и остатков гуминовых кислот, попавших в костный материал за время его залегания в почве. Выделение его из костного материала заключается в последовательной обработке материала растворами кислоты и щелочи с последующей промывкой.

Коллаген костей травоядных, а через них и хищных животных, наследует исходный изотопный состав растительности. Эта закономерность справедлива и для человека, если он использует для питания «ландшафтную» пищу.

У приморских жителей значения изотопного состава углерода коллагена отражают соотношение между потребляемыми морскими и континентальными продуктами.

Изотопный состав азота также может помочь различить морской, пресноводный и континентальный источники белков. В белках большинства морских и пресноводных рыб повышено содержание тяжелого изотопа ^{15}N , а при движении по пищевой цепочке его доля еще более возрастает. Правда, толкование результатов изотопного анализа осложняется влиянием климатических условий. В жарких, засушливых регионах содержание тяжелого изотопа азота в костях

животных выше, чем в областях с умеренным климатом. Проще говоря, доля ^{15}N увеличивается по мере уменьшения количества атмосферных осадков.

Кроме того, можно получить данные о составе диеты древнего населения, о некоторых параметрах окружающей среды, например температуре, и т. д.

Легкие изотопы ^{13}C и ^{15}N в исследованиях структуры питания жителей и животных древнего Ярославля. Последние годы лаборатория занимается исследованиями на основе стабильных изотопов. В основном материалы поступают из ИА РАН. Интересные данные по структуре питания получены из коллективных захоронений Ярославля.

В выборке представлены более 170 образцов костей людей (женщин, мужчин и детей) и около 50 образцов костей различных животных (домашних — коров, лошадей, свиней, собак; диких — бобра) из пяти коллективных захоронений Ярославля, для которых получены данные $\delta^{13}\text{C}$ и $\delta^{15}\text{N}$ (Яворская и др., 2015; Энговатова и др., 2015).

Значения $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ для всей исследованной выборки оказались в пределах $-20 \pm 0,3$ ‰, что соответствует смешанному рациону питания, характерному для умеренного пояса.

Значения $^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$ в костях людей позволяют судить об обогащении рациона питания белками, а среди них — о преобладании мяса наземных или водных животных различных трофических уровней. Результаты изотопного анализа дали возможность оценить наличие различий в структуре питания мужчин и женщин. Как выяснилось, средний рацион обоих полов сходен, что свидетельствует об отсутствии гендерных различий в традициях питания ярославцев.

Величина $\delta^{15}\text{N}$ для костной ткани детей возраста грудного вскармливания (в среднем до 2 лет) помогает представить уровень значений изотопных показателей для индивидов с преимущественно белковой пищей. Значение показателя для детей в возрасте до 2–3 лет составляет около $+12,7$ ‰, что несколько выше, чем для взрослого населения. Однако различия находятся в пределах единого трофического уровня, что позволяет предполагать достаточно высокую удельную долю белковой пищи в рационе средневековых жителей города.

Следует отметить, что индивидуальная изменчивость по содержанию тяжелого изотопа

азота более высока, чем по изотопу углерода. Значение $\delta^{15}\text{N}$ составляет $11,7 \pm 0,6$ ‰, что указывает на то, что основой белкового питания было мясо наземных млекопитающих.

Редкие индивиды со значениями $\delta^{15}\text{N}$, превышающими 13 ‰, вероятно, регулярно употребляли в пищу речную или озерную рыбу. Определены некоторые различия в изотопном составе детей разного возраста.

Тяжелые изотопы

Изотопы стронция. Отличительной биогеохимической чертой стронция является его фиксация в костной ткани во время роста скелета и в дальнейшем. При смене места обитания, в котором изотопный состав стронция может быть отличен, не происходит изотопного обмена по стронцию, если костная ткань уже не растет. Исключительно важным и полезным для изотопных исследований оказался памятник Колихо на Северо-Западном Кавказе.

Летом 2008 г. в окрестностях поселка Агуй-Шапсуг (Туапсинский район Краснодарского края) в долине реки Агой, на берегу ее левого притока, речки Колихо, впервые в истории кавказской археологии был открыт и исследован дольмен, в котором находились останки более 60 погребенных. Исключительную ценность дольмену придают уникальные климатические обстоятельства в эпоху бронзы, ставшие причиной мощного оползня, перекрывшего в это время мегалитический склеп трехметровым слоем глины, песка и гальки. Благодаря этому обстоятельству содержимое погребальной камеры дольмена практически не понесло утрат, связанных обычно с повторными захоронениями или ограблениями в более поздние исторические эпохи.

Для локализации районов происхождения людей, погребенных в дольмене Колихо, были определены региональные фоновые показатели изотопов стронция по биологическим образцам. Образцы происходят из окрестностей дольменных групп, расположенных в долинах рек со сбросом в Чёрное море на участке протяженностью около 100 км между Туапсе и Геленджиком. Образцами служили панцири виноградных улиток *helix pomatia*, для которых характерны короткий период роста панциря и ограниченная территория миграции.

Природный стронций (Strontium) Sr состоит из четырех стабильных изотопов ^{88}Sr (82,56 %),

^{86}Sr (9,86 %), ^{87}Sr (7,02 %) и ^{84}Sr (0,56 %). Распространенность изотопов стронция связана с образованием ^{87}Sr за счет распада природного ^{87}Rb . По этой причине точный изотопный состав стронция в породе или минерале, которые содержат рубидий, зависит от возраста и отношения Rb/Sr в данной породе или минерале.

Анализ изотопного состава стронция в образцах осуществлялся следующим образом. Сначала навески проб массой около 200 мг истирались в агатовой ступке до получения мелкодисперсной субстанции. Затем производилось удаление возможных вторичных загрязнений путем промывания проб в течение 1 ч в 1N растворе HCl . После этого с применением центрифугирования из раствора выделялись чистые субстанции образцов, которые в дальнейшем подвергались разложению в смеси азотной и плавиковой кислот. Степень разложения контролировалась с помощью центрифугирования. По достижении полного разложения образцов из них производилось выделение рубидия и стронция для изотопного анализа путем катионообменной хроматографии на смоле марки AG50W-X8. Изотопный анализ Sr производился на мультиколлекторном масс-спектрометре TRITON в статическом режиме. Коррекция на изотопное фракционирование стронция производилась при помощи нормализации измеренных значений по отношению $^{88}\text{Sr}/^{86}\text{Sr} = 8,37521$. Нормализованные отношения приводились к значению $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr} = 0,71025$ в международном изотопном стандарте NBS-987.

Сравнительный анализ значения отношения $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ в костях погребенных с микрорегиональными природными фоновыми показателями (геологические и биологические образцы) показал, что около половины (47 %) погребенных (из числа проанализированных) по крайней мере в последний, 7–10-летний, период жизни были частью постоянного населения долины Агоя или соседних долин, расположенных в 50–60 км от Колихо (Ришко и др., 2019; Trifonov et al., 2012; Trifonov et al., 2014).

Почти половина (53 %) погребенных (из числа проанализированных) со значением отношения $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr} > 0,708$ как минимум последнее десятилетие своей жизни провели за пределами Агойской долины, на территории пока неустановленной области. Высокие показатели отношений изотопов стронция косвенно указывают на область к юго-востоку от Сочи, в зоне расположения более радиогенных геологических

структур, характерных для горной системы Западного Кавказа.

Различия в содержании изотопов стронция этой группы могут указывать как на прижизненный переезд из района в район, так и на посмертное перемещение останков умерших на чужбине в семейный склеп.

Соотношение изотопов стронция может идентифицировать районы проживания древнего населения, поскольку это соотношение определяется двумя факторами: начальным соотношением Rb/Sr в породах и их геологическим возрастом, соответственно почвы и вода в разных регионах должны быть различны по изотопному составу стронция, а последний, в свою очередь, фиксируется в костной ткани живых организмов.

Таким образом, изотопный состав стронция может служить индикатором места рождения и достижения зрелости и индикатором миграции племени, если в костях скелетов разных людей соответственно разного возраста наблюдаются отличия в изотопном составе.

Особенно четко факт миграции может быть установлен сравнением изотопного состава стронция в костях людей со стронцием в костях домашних животных с относительно малым сроком жизни и короткими дистанциями выпаса, например коровы, овцы, свиньи.

Если исследования легких стабильных изотопов (углерода и азота) для целей археологии широко представлены в научной литературе последних десятилетий, то изотопы стронция еще только начали применяться, что объясняется аппаратными трудностями. Для легких изотопов можно использовать электронные масс-спектрометры, например DeltaX, DeltaV и другие подобные приборы, а для стронция необходим более дорогой термоионизационный масс-спектрометр Thermo-FinniganTRITON, который есть пока у ограниченного круга исследовательских лабораторий.

Изотопы свинца. Разработана методика локального изотопного анализа свинца (изотопы ^{206}Pb , ^{207}Pb и ^{208}Pb) методом LA-ICPMS в материале изделий из бронзы и золота.

Для анализа крупных изделий при помощи специального инструмента выполнялся отбор микрофрагментов (до 1 мм). Далее серия этих отобранных проб по особой технологии распределялась на поверхность шайбы из эпоксидной смолы, которая после застывания полировалась до получения максимально ровного среза фрагментов.

Эта шайба помещалась в абляционную ячейку системы лазерного пробоотбора измерительного комплекса. Мелкие изделия (до дюйма длиной) могут быть поставлены в абляционную ячейку целиком.

Выбор точки анализа и позиционирование пробы выполнялись при помощи программного обеспечения системы лазерной абляции, с визуально увеличенным отображением поверхности шайбы на экране компьютера. Диаметр пучка лазера составлял от 10 до 250 мкм, частота следования импульсов — от 2 до 20 Гц. Эти параметры выбирались в зависимости от концентрации свинца в пробах. Глубина образующегося при анализе кратера — до 200 мкм.

При взаимодействии импульсного лазерного излучения и поверхности образца образуются микрочастицы пробы. Во время анализа ячейка продувается потоком аргона, и частицы пробы транспортируются в ионный источник масс-спектрометра. Масс-спектрометрический анализ

выполнялся в многоколлекторном режиме, с одновременным измерением всех изотопов свинца. В результате изотопного анализа изотопов свинца в различных изделиях из памятников скифского времени Тувы и Минусинской котловины наметились определенные различия содержания этих изотопов, которые позволяют говорить о рудных провинциях и центрах металлообработки.

Одни из таких центров тяготеет к горной системе Западного Саяна, другие — к северной части Кузнецкого Алатау.

Заключение

Главная задача настоящей публикации — показать возможности изотопных методов и перспективу их использования при анализе археологического материала. Данная информация позволит археологам скорректировать направления исследований и выработать оптимальный методологический подход в решении конкретных задач.

Арсланов, 1987 — Арсланов Х. А. Радиоуглерод. Геохимия и геохронология. Л.: Изд-во ЛГУ, 1987. 300 с.

Радиоуглерод..., 2007 — Радиоуглерод в археологических и палеоэкологических исследованиях. СПб.: ИИМК РАН, 2007. 410 с.

Тимофеев и др., 2004 — Тимофеев В. И., Зайцева Г. И., Долуханов П. М., Шукуров А. М. Радиоуглеродная хронология неолита Северной Евразии. СПб.: Теза, 2004. 157 с.

Ришко и др., 2019 — Ришко С. А., Трифонов В. А., Лохов К. И. Возможности и ограничения интерпретации соотношения изотопного состава стронция в зубах и костных тканях погребенных из dolmen Колихо (Северо-Западный Кавказ) с природными фоновыми показателями // Материалы Всерос. науч. конф. (с международным участием) «Геохронология четвертичного периода: инструментальные методы датирования новейших отложений», посв. 90-летию со дня рождения Л. Д. Сулержицкого (Москва, 24–26 апреля 2019). М.: Ин-т географии РАН, 2019. С. 71.

Энговатова и др., 2015 — Энговатова А. В., Добровольская М. В., Зайцева Г. И., Антипина Е. Е., Клещенко Е. А., Медникова М. Б., Тарасова А. А., Яворская Л. В. Естественнонаучные методы реконструкции системы питания и социальной стратификации населения средневекового европейского города // Естественнонаучные методы исследований и парадигма современной археологии: Сб. докл. Всерос. науч. конф. / Науч. ред. М. В. Добровольская, Е. Н. Черных. М.: Языки славянской культуры, 2015. С. 117–125.

Яворская и др., 2015 — Яворская Л. В., Антипина Е. Е., Энговатова А. В., Зайцева Г. И. Стабильные изотопы углерода и азота в коллагене животных из трех городов Европейской России. Первые результаты и интерпретация // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Волгоград, 2015 (Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения). С. 56–62.

Krueger, Reesman, 1982 — Krueger H. W., Reesman R. H. Carbon isotope analyses in food technology // Mass spectrometry review. 1982. № 1. P. 205–236.

Trifonov et al., 2012 — Trifonov V. A., Zaitseva G. I., van der Plicht J., Burova N. D., Bogomolov E. S., Sementsov A. A., Lokhova O. V. The dolmen «Kolikho», Western Caucasus: isotopic investigation of funeral practice and human mobility // Radiocarbon. Vol. 54, no. 3–4. P. 761–769.

Trifonov et al., 2014 — Trifonov V. A., Zaytseva G. I., van der Plicht J., Kraineva A. A., Sementsov A. A., Kazarnitsky A., Burova N. D., Rishko S. A. Shepsi, the oldest dolmen with the port-hole slab in the Western Caucasus // Radiocarbon. 2014. Vol. 56 (2). P. 743–752.

van der Merwe, 1982 — van der Merwe N. J. Carbon Isotopes, Photosynthesis, and Archaeology: Different pathways of photosynthesis cause characteristic changes in carbon isotope ratios that make possible the study of prehistoric human diets // American Scientist. 1982. Vol. 70 (6). P. 596–606.

Vogel, van der Merwe, 1977 — Vogel J. C., van der Merwe N. J. Isotopic evidence for early maize cultivation in New York State // Amer. Antig. 1977. 42. P. 238–242.

Methods of stable isotopes in investigations of archaeological objects (application and last results)

G. I. Zaytseva, N. D. Burova, S. A. Rishko, A. A. Sementsov, O. V. Lokhova

This paper demonstrates the possibilities of isotopic methods and the prospects of their application to analysis of archaeological materials. Among the numerous stable isotopes found in nature, so far only such light isotopes as ^{13}C , ^{15}N , oxygen (^{18}O), strontium, lead and some other have found their use. By means of exploration of the composition of light isotopes obtained from the collagen of bones it is possible to gain information on the diet of ancient man and animals. A similar investigation was conducted by the authors at the example of the mediaeval cemetery at the city of Yaroslavl. In turn, the isotopic composition of strontium can serve as an indication of the place of birth and puberty, as well as a mark of the migration of the tribe. In this paper this is demonstrated at the example of burials at the dolmen of "Kolikho" near the settlement of Aguy-Shapsug (Tuapse district of Krasnodar Kray) in the River Agoy valley.

Besides, at present, a method of local isotopic analysis of lead is devised (isotopes ^{206}Pb , ^{207}Pb and ^{208}Pb) using the LA-ICPMS method to materials of artefacts from bronze and gold. Analysis of lead isotopes in different objects from sites of Tuva and Minusinsk depression has shown certain differences of the contents of these isotopes which suggest ore provinces and centres of metalworking.