IV Congresso Internacional das **Licenciaturas** COINTER - PDVL 2017

PRODUÇÃO DE MUDAS DE DUAS CULTIVARES DE TOMATE (*Lycopersicon Esculentum* MILL.) EM FUNÇÃO DE DIFERENTES SUBSTRATOS

Apresentação: Pôster

Talytha Ravenna de Melo Souza¹; Keila Mourão Lima²; Lorena kamila de Melo Souza³, José Brandão de Menezes Júnior⁴

Introdução

O tomate (*Lycopersicon esculentum* Mill.) é pertencente à família das solanáceas, originário da zona andina na América do Sul. Tornou-se um dos frutos mais consumidos e importantes do mundo. Em 2001, a produção mundial de tomate, alcançou um nível de aproximadamente de 105 milhões de toneladas de frutos produzidos. A cultura apresenta um ciclo curto e com altos rendimentos. A cultura do tomate é uma das mais comuns do mundo, contendo uma importante fonte de vitaminas e sendo importante economicamente para produção de pequenos agricultores e agricultores de escala média. (NAIKA et al, 2006).

Para a produção de boas mudas se faz necessário a aquisição de mudas de qualidade (Martinez; Barbosa, 1999). Em razão da importância de mudas de tomate de qualidade utilizando traços culturais da região para expandir a oferta de hortaliças de qualidade no município de Codó-MA e região, buscou-se nesse trabalho, avaliar métodos de produção de mudas de tomate, visando suprir carência de informações, nesta etapa de condução da lavoura, para produtores do Município de Codó-MA e região.

---

¹ Bacharelado em Agronomia, Instituto Federal do Maranhão – IFMA/Campus Codó, E-mail: taly_raven@hotmail.com

² Bacharelado em Agronomia, Instituto Federal do Maranhão – IFMA/Campus Codó, E-mail: keillareggae@hotmail.com

³ Tecnologia em Alimentos, Instituto Federal do Maranhão – IFMA/Campus Codó, E-mail: lorennakamila@hotmail.com

⁴ Mestrado em Ciências Agrárias, Instituto Federal do Maranhão – IFMA/Campus Codó, E-mail: juniorbrandao_30@hotmail.com

Fundamentação Teórica

A cultivar *Lycopersicon esculentum* é bastante produzida em todo o mundo, apresentando boa aceitação pelos consumidores e havendo milhares de cultivares que variam na forma, tamanho, cor e sabor. Os frutos são bastante ricos em minerais, vitaminas, fibras, aminoácidos, além de uma grande quantidade de fósforo, ferro e vitamina B, a vitamina A também é bastante encontrada, porém em maiores teores nos frutos de coloração amarela. Dentre várias outras importâncias nutricionais, destacam-se as variedades com a coloração vermelha, possuindo boa quantidade de licopeno, um antioxidante que ajuda na prevenção de cânceres (NAIKA et al., 2006).

A produção de mudas de hortaliças sob cultivo protegido tem apresentado um crescimento considerável, em decorrência das vantagens em relação ao sistema tradicional, geralmente conduzido em sementeira a céu aberto, como por exemplo, maior precocidade, menor possibilidade de contaminação fitopatogênica, maior relação percentual entre sementes plantadas e mudas obtidas, melhor aproveitamento da área destinada à produção de mudas, maior facilidade na execução de tratos culturais e menor estresse por ocasião do transplântio (BEZERRA, 2003).

Na cadeia produtiva de hortaliças de boa qualidade, a fase de produção de mudas é uma das etapas mais importantes para o desenvolvimento da cultura, pois influencia diretamente no desempenho produtivo da planta adulta, tanto do ponto nutritivo como em produção (SILVA JR. et al, 1995).

Metodologia

O experimento foi conduzido no campo experimental do Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Maranhão - FMA Campus Codó-MA. A semeadura foi realizada em meios alternativos, com copos descartáveis com 180 ml de profundidade, utilizando sementes de tomate das cultivares Sam Marzano e Santa Clara i-530, foram semeadas três sementes por recipiente, a uma profundidade de 1 cm, que em seguida foram cobertas por uma fina camada do substrato. O desbaste foi realizado após germinação, com 15 dias após semeadura, após plantio, os recipientes foram colocados em ambiente protegido (casa de vegetação) com telado de 50% de sombreamento. Durante a condução do experimento foram realizadas duas irrigações diárias (manhã e final da tarde).

Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados com seis tratamentos e dez repetições.

Os tratamentos constaram das cultivares San Marzano e Santa Clara i-530 juntamente com os diferentes substratos: terra preta (AP), composto orgânico (CO) e paul de palmeira (PP).

Aos 30 dias após a semeadura foram coletadas as mudas, aleatoriamente, cinco plântulas de cada parcela e levadas a laboratório, onde foram lavadas em água corrente para a eliminação do substrato. Os parâmetros avaliados foram: porcentagem de emergência (%E), índice de velocidade de emergência (IVE), massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca da raiz (MSR). A porcentagem de germinação foi calculada de acordo com metodologia descrita por Labouriau e Valadares (1976).

Os dados coletados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey com 95% de confiança, utilizando-se o software XLstat.

Resultados e Discursões

De acordo com o parâmetro porcentagem de germinação, foi constatado diferenças significativas entre os tratamentos analisados. Porém, os tratamentos em sua grande maioria conseguiram obter bons desempenhos, como visto na Tabela 1. Principalmente os que obtiveram como substrato paul de palmeira e compostagem. Contudo, os tratamentos consistidos de terra preta e a variedade Santa Clara i-530 contiveram a menor média, com 76% de plântulas germinadas, sendo consideradas baixas comparadas as demais médias.

Tabela 1: Resultados das análises das duas cultivares de Tomate com diferentes substratos.

Parâmetros	Avaliações			
	%G	IVE	MSF	MSR
San Marzano e terra preta	92 ^{ab}	1,4 ^{bc}	0,03 ^c	0,02 ^c
San Marzano e compostagem	90 ^{ab}	1,6 ^{ab}	0,17 ^b	0,07 ^a
San Marzano e paul de palmeira	100 ^a	1,8 ^a	0,12 ^b	0,04 ^b
Santa clara i-530 e compostagem	88 ^{ab}	1,6 ^a	0,25 ^a	0,09 ^a
Santa clara i-530 e paul de palmeira	96 ^a	1,9 ^{ab}	0,14 ^b	0,04 ^b
Santa clara i-530 e terra preta	76 ^b	1,2 ^c	0,05 ^c	0,01 ^c

*Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Para o parâmetro Índice de Velocidade de Emergência – IVE, constatou-se que houve diferença significativa entre os tratamentos analisados. Desta forma os tratamentos que obtiveram os melhores desempenhos estatísticos foram os tratamentos formados do substrato paul de palmeira com a variedade Santa Clara i-530, paul de palmeira com a variedade San Marzano, compostagem

com a variedade San Marzano e a compostagem com a variedade Santa Clara i-530. Os mesmos apresentaram médias superiores a 1,5. Como visto na Tabela 1.

Verificou-se que para a variável peso da matéria seca da parte aérea (MSPA) o tratamento consistido do substrato composto orgânico com a variedade Santa clara i-530 proporcionou o melhor resultado estatístico comparado aos demais tratamentos. Apresentando média igual a 0,25g, sendo considerado o melhor tratamento para o parâmetro analisado. Como visto na tabela 1.

Para a variável peso da matéria seca da raiz (MSR), os tratamentos que utilizaram o composto orgânico proporcionaram os melhores resultados. Aquele que utilizou-se da cultivar Santa Clara i-530 com a compostagem obteve média de 0,09g e o tratamento com compostagem e a variedade San Marzano apresentou média de 0,07g, não diferindo os dois tratamentos estatisticamente, conforme constata-se na Tabela 1. Os demais tratamentos obtiveram médias inferiores a 0,05g, sendo considerados de baixo desempenho e não indicado para uma boa produção de mudas de tomateiro.

Segundo De Medeiros et al (2013), o melhor substrato encontrado foi o de compostagem para a produção de mudas de tomate para o quesito matéria seca da raiz, apresentando resultados superiores quando comparados aos demais substratos, resultado semelhante ao desta pesquisa.

Conclusão

De acordo com os parâmetros analisados foi possível observar o bom desempenho dos tratamentos que obtiveram como substrato o composto orgânico com as cultivares San Marzano e a Santa Clara i-530. Portanto, os mesmos são mais indicados para a produção de mudas de tomates nas condições de campo analisadas.

Referências Bibliográficas

BEZERRA, Fred Carvalho. **Produção de mudas de hortaliças em ambiente protegido**. Embrapa Agroindústria Tropical, 2003.

DE MEDEIROS, Damiana Cleuma et al. **Qualidade de mudas de tomate em função do substrato e irrigação com efluente de piscicultura**. REVISTA BRASILEIRA DE AGROECOLOGIA, v. 8, n. 2, 2013.

LABOURIAU, L. G. VALADARES, M. B. **On the germination of seeds of Calotropis procera**. Anais da Academia Brasileira de Ciências, São Paulo, n.48, p.174-186. 1976.

MARTINEZ, H. E. P.; BARBOSA, J. G. **Substratos para hidroponia**. In: **CULTIVO PROTEGIDO DE HORTALIÇAS EM SOLO E HIDROPONIA**. Informe Agropecuário, v. 20, n. 200/201, p. 81-89, 1999.

NAIKA, Shankara et al. **A Cultura do tomate**. Wageningen: Fundação Agromisa e CTA, p. 104, 2006.

SILVA JÚNIOR, A.A.; MACEDO, S.G.; STUKER, H. **Utilização de esterco de peru na produção de mudas de tomateiro**. Florianópolis: EPAGRI, 1995. 28p. (Boletim Técnico, 5).