II Congresso Internacional das **Ciências Agrárias** COINTER - PDVAgro 2017

Rendimentos de carcaça de ovinos confinados alimentados com fontes proteicas alternativas

Apresentação: Pôster

Joederson Luiz Santos Dantas¹; Marcone Geraldo Costa²; Gelson dos Santos Difante³;
Antonio Leandro Chaves Gurgel¹; Joelma Silva Souza⁴

Introdução

A produção de ovinos tem mostrado um panorama diferente nos dias atuais, mesmo que timidamente, encontra-se carne de ovinos em gôndolas de supermercado, além de pratos contendo ingredientes ovinos em restaurantes e churrascarias. Esse cenário exige um sistema de produção que otimize o manejo alimentar dos animais disponibilizando nutrientes em quantidades e qualidade, diminuindo a idade ao abate e aumentando o ganho de peso, podendo assim manter a regularização da oferta de produtos no mercado.

Os sistemas de criação em confinamento permitem terminar ovinos mais precoces e com excelente qualidade de carcaça. Porém, sabe-se que esse sistema utiliza em sua grande maioria grãos, que muitas vezes pode ser inviável financeiramente para o produtor, dependendo da região em que ele se encontra. Desta forma torna-se necessária a busca por alternativas alimentares na tentativa de diminuir custo, sem prejudicar a qualidade da carcaça, aumentando assim, a rentabilidade do sistema. A utilização de forrageiras adaptadas à região Nordeste, como palma forrageira e o feno de capim-massai, bem como, o uso de fontes proteicas alternativas que não concorram diretamente com a alimentação humana, e que possam apresentar uma boa relação custo/benefício, pode ser uma alternativa para produção de ovinos de corte. Contudo, são escassas as informações acerca da associação da palma e do feno de capim-massai com farelo do subproduto do coco, da torta de babaçu que podem ser usadas como fontes proteicas, além da torta de algodão usadas na alimentação de

---

¹ Mestrando no Programa de Pós-graduação em Produção Animal, UAECA – UFRN, Macaíba, RN, joedersondantas@outlook.com

² Professor do Programa de Pós-Graduação em Produção Animal, UAECA – UFRN, Macaíba, RN, gdifante@hotmail.com

³ Professor do Programa de Pós-Graduação em Produção Animal, UAECA – UFRN, Macaíba, RN, marconegc@ufrnet.br

⁴ Mestrando no Programa de Pós-graduação em Produção Animal, UAECA – UFRN, Macaíba, RN, antonioleandro09@gmail.com

³ Doutoranda no programa de pós-graduação em zootecnia, UFMG, Belo horizonte, MG, joedersondantas@outlook.com

ovinos, sobretudo referente aos seus efeitos sobre os atributos da carcaça. Assim sendo, objetivou-se avaliar o rendimento de carcaça de ovinos de corte confinados e alimentados com palma forrageira, feno de capim-massai associados com fontes proteicas.

Fundamentação Teórica

O confinamento torna-se estratégia necessária para melhorar os índices produtivos da ovinocultura e assegurar a obtenção de produtos com garantia de qualidade e sanidade (CAÇÃO et al., 2014). Com fornecimento de dietas balanceadas é possível conseguir maior ganho de peso, menor período no confinamento, redução da idade ao abate, refletindo em oferta de carne de melhor qualidade. Associada a esta técnica de terminação o uso de coprodutos tem sido avaliados como alternativa aos alimentos convencionais, como o farelo de soja, por seu alto custo, torna pouco rentáveis os programas de terminação dos animais confinados.

Metodologia

O experimento foi conduzido na área experimental do Grupo de Estudos em Forragicultura, da UFRN, Campus de Macaíba. Foram utilizados 32 ovinos SPRD (Sem Padrão Racial Definido), com peso vivo médio inicial de $22,34 \pm 2,05$ kg e idade média de quatro meses, confinados e distribuídos em delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos e oito repetições. Os tratamentos constituíram da associação da Palma forrageira (*Opuntia Ficus-indica*) e feno de capim-massai (*Panicum maximum*) com quatro fontes proteicas: Farelo de Soja, Torta de Babaçu, Farelo de Coco e Torta de Algodão. As dietas foram ajustadas para serem isonitrogenadas (média de 12% PB) utilizando-se a ureia para ajuste do teor de proteína, sendo formuladas para atender as exigências nutricionais dos animais, para ganho médio diário de 150g segundo recomendações do NRC (2007). As dietas foram fornecidas duas vezes ao dia na forma de mistura completa, com monitoramento diário do consumo alimentar e ajuste para manter as sobras em torno de 10% do total ofertado. Os animais foram abatidos com peso médio de 35,0 kg, para avaliação dos rendimentos de carcaça.

Após o período de jejum, os animais foram pesados para obtenção do peso vivo ao abate (PVA). Os abates ocorreram de forma humanitária, onde foram insensibilizados por concussão cerebral, seguido de sangria por secção da artéria carótida e veia jugular. Após a esfolagem, procedeu-se à evisceração, e os não componentes foram pesados individualmente: trato gastrointestinal (TGI- cheio e vazio) e por diferença, foi calculado o conteúdo do TGI. Foi registrado o peso da carcaça quente (PCQ) para estimar o rendimento de carcaça quente ($RCQ = PCQ/PVA \times 100$). O peso do corpo vazio (PCVZ) foi determinado através da diferença entre o peso de abate e o peso do conteúdo do trato

gastrointestinal ($PCVZ = PVA - CTGI$). Calcularam-se também as perdas de peso durante o jejum ($PJ = PC \text{ antes do jejum} - PVA/PC \text{ antes do jejum} \times 100$). As carcaças foram transferidas para câmara de resfriamento onde permaneceram durante 24 horas a uma temperatura de $\pm 4^{\circ}\text{C}$. Posteriormente, as mesmas foram novamente pesadas registrando-se o peso da carcaça fria (PCF) utilizado para estimar o rendimento da carcaça fria ($RCF = PCF/PVA \times 100$). O percentual de perda de peso pelo resfriamento foi obtido pela fórmula: $PR = ((PCQ - PCF)/PCQ) \times 100$ e rendimento verdadeiro ou biológico ($RV = PCQ/PCV \times 100$). Os dados foram submetidos à análise de variância e o efeito das diferentes fontes proteicas comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Resultados e Discussões

Os valores obtidos referentes aos pesos, rendimentos de carcaça e perdas por resfriamento são apresentados na Tabela 1. Nota-se que somente houve diferença ($P < 0,05$) para as variáveis conteúdo do trato gastrointestinal (CTGI) e perda ao jejum (PJ). Em relação ao CTGI, a diferença pode ter sido ocasionada pelos diferentes teores de FDN encontrados nas fontes proteicas. Os animais que receberam na dieta farelo de coco apresentaram as maiores perdas em comparação aos demais. Esse resultado pode estar relacionado ao jejum prolongado no qual os animais foram submetidos, permitindo possivelmente tempo adequados para maior degradação da digesta ruminal. Não foi observado efeito ($P > 0,05$) da associação da palma forrageira e feno de capim-massai com as fontes proteicas sobre o peso vivo ao abate, peso de carcaça quente, peso de carcaça fria, peso do corpo vazio, rendimento de carcaça quente, rendimento de carcaça fria, perdas ao resfriamento e rendimento biológico. Esses resultados podem ser atribuídos ao critério de peso estabelecido para o abate, de aproximadamente 35 kg de peso vivo. A similaridade encontrada para essas variáveis pode ser reforçada pela lei da harmonia anatômica (Boccard & Dumont, 1960) a qual relata que, em carcaças com peso e quantidade de gorduras similares, quase todas as regiões corporais se encontram em proporções semelhantes, qualquer que seja a conformação considerada do animal.

A semelhança dos pesos vivos de abate resultou em conformidade nos pesos de carcaça quente e peso de carcaça fria entre os tratamentos. Observou-se que a média de peso de abate dos animais foi de 33,69 kg. Esse valor, embora um pouco superior aos 30 a 32 kg definidos como padrão de acabamento de borregos Santa Inês terminados em confinamento (Vieira et al., 2010), é compatível para animais sem padrão racial definido (SRD). O peso da carcaça é influenciado pela velocidade de crescimento, pela idade ao abate, pelo plano nutricional, entre outros, e constitui importante fator na estimativa de seu rendimento. Vale ressaltar que a valorização da carcaça ovina depende da relação

entre peso corporal e idade, onde se buscam maiores pesos a menores idades.

Tabela 1. Médias de rendimento de carcaça de ovinos alimentados com palma forrageira e feno de Capim-massai associados com diferentes fontes proteicas

Variável	Tratamentos				CV (%)
	Soja	Babaçu	Coco	Algodão	
Peso ao abate (kg)	34,73a	32,62a	32,97a	34,42a	7,52
Conteúdo do TGI (kg)	5,22a	5,80ab	6,30b	5,39ab	13,95
Perda ao jejum (Kg)	4,38b	7,40ab	9,84a	5,04b	51,82
Peso de carcaça quente (kg)	17,72a	16,28a	16,57a	17,48a	8,55
Peso de carcaça fria (kg)	16,53a	15,51a	16,05a	16,1a	9,32
Peso corpo vazio (kg)	29,51a	26,82a	26,67a	29,03a	7,73
Rendimento carcaça quente (%)	51,1a	49,9a	50,26a	50,81a	4,86
Rendimento carcaça fria (%)	47,75a	47,53a	48,67a	46,83a	7,20
Perdas por resfriamento (%)	6,59a	4,85a	3,16a	7,92a	64,42
Rendimento biológico (%)	60,22a	60,72a	62,14a	60,22a	5,12

TGI – trato gastrointestinal; Médias seguidas de letras diferentes nas linhas diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

As médias de peso de carcaça quente e carcaça fria encontrados no presente estudo (17,01 e 16,05kg, respectivamente) atendem aos valores mínimos indicados por Silva Sobrinho (2001) para caracterização de carcaças de boa qualidade, com peso de carcaça quente igual ou maior que 14,4 kg e peso de carcaça fria maior ou igual a 13,8kg. Para os parâmetros rendimento de carcaça quente, rendimento de carcaça fria e rendimento biológico, foram observadas médias semelhantes às obtidas por Santos et al. (2011) que verificaram os seguintes valores 49,57; 48,19 e 57,58% respectivamente. Os rendimentos observados estão dentro da variação (40 a 50%) descrita por Silva Sobrinho (2001) para ovinos de raça especializada para produção de carne.

Conclusões

A associação da Palma forrageira e o feno de Capim-massai com as fontes proteicas (torta de babaçu, farelo de coco e torta de algodão) não alteram as características de carcaça, os pesos e rendimentos dos cortes comerciais, podendo ser utilizado como fonte de proteína alternativa ao farelo de soja em dietas para acabamento de ovinos de corte em confinamento.

Referências

BOCCARD, R.; DUMONT, B.L. Étude de la production de la viande chez les ovins. II. Variation de importance relative des différentes régions corporelles de l'agneau de boucherie. *Annales de Zootechnie*, v.9, n.4, p.355-365, 1960.

CAÇÃO, M. M. F.; SANTOS, G. B.; CAVALETTI, M., et al. Resíduo de limpeza de soja em substituição ao farelo de soja na dieta de cordeiro em terminação. **B. Indústr. Anim.**, Nova Odessa. v.71, n.2, p.106-113, 2014.

SANTOS, J. R. S. et al. Carcass characteristics and body components of Santa Inês lambs in feedlot fed on different levels of forage cactus meal. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 40, n. 10, p. 2273-2279, 2011.

SILVA SOBRINHO, A. G. da. Aspectos quantitativos e qualitativos da produção de carne ovina. In: *A PRODUÇÃO animal na visão dos brasileiros*. Piracicaba: Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, p. 425-446, 2001.

VIEIRA, M. M. M.; CÂNDIDO, M. J. D.; BOMFIM, M. A. D.; et al. Características da carcaça e dos componentes não-carcaça em ovinos alimentados com rações à base de farelo de mamona. **Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal**, v.11, n.1, p 140-149 jan/mar, 2010.

.