The background of the cover is a collage of various agricultural products. At the top, there's a loaf of bread covered in sesame seeds, a stalk of wheat, and some green vegetables. In the middle, there's a corn cob. At the bottom, there's a basket of green beans, a bunch of carrots, and a cow's head. The title is overlaid on a semi-transparent white box in the upper middle section.

Ciência, Tecnologia e Inovação: do campo à mesa

AYRTON MATHEUS DA SILVA NASCIMENTO (org.)
IRIS BARBOSA DE SOUZA (org.)
REGIANE RIBEIRO DOS SANTOS (org.)

VOL. 1

**Editora
IIDV**

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Ciências, tecnologia e inovação [livro eletrônico]
: do campo à mesa / organização Ayrton Matheus
da Silva Nascimento , Iris Barbosa de Souza ,
Regiane Ribeiro dos Santos. -- 1. ed. --
Recife, PE : Instituto Internacional
Despertando Vocações, 2020.
PDF

ISBN 978-65-88970-02-7

1. Agricultura 2. Agroindústria 3. Ciências 4.
Engenharia de produção 5. Inovação tecnológica 6.
Tecnologia I. Nascimento, Ayrton Matheus da Silva.
II. Souza, Iris Barbosa de. III. Santos, Regiane
Ribeiro dos.

20-49998

CDD-637.181

Índices para catálogo sistemático:

1. Agricultura: Engenharia de produção: Tecnologia agrícola 637.181

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: DO CAMPO À MESA

1ª Edição

Volume 1

Recife – PE - Brasil

INSTITUTO INTERNACIONAL DESPERTANDO VOCAÇÕES

2020

PREFÁCIO

O Congresso Internacional da Agroindústria - CIAGRO 2020, é um evento internacional, concebido no âmbito das atividades desenvolvidas no Programa Internacional Despertando Vocações para as Ciências Agrárias (PDVAgro) e realizado pelo Instituto Internacional Despertando Vocações (IIDV).

O CIAGRO 2020 proporcionou a interação entre os participantes e a reflexão e discussão do papel da inovação da ciência e tecnologia, pautada em pesquisas científicas, em todos os segmentos da cadeia produtiva do alimento, envolvendo a alimentação do campo à mesa.

Este e-book volume 1 com 53 capítulos traz uma variedade de artigos alinhados com a área das Ciências Agrárias ao tratar de temas que abordam alimentos funcionais, análises sensorial, físico-química e microbiológica de alimentos, biotecnologia, controle de qualidade e segurança dos alimentos.

Por fim, os conteúdos e resultados das pesquisas divulgados contribuem no aumento da disponibilidade de conhecimentos úteis, enriquecendo a formação e atualizando estudantes e profissionais que atuam nos diferentes setores da agroindústria, instigando-os na constante busca de novas tecnologias para a área.

Dr^a. Regiane Ribeiro dos Santos (**Presidência do CIAGRO 2020**)
I Congresso Internacional da Agroindústria – CIAGRO

CONSELHO EDITORIAL

PRESIDÊNCIA

Dr.^a **Kilma da Silva Lima Viana** – Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) | Instituto Internacional Despertando Vocações (IIDV)

CONSELHEIROS

Dr. **Airton José Vinholi Júnior** – Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS)

Dr. **Alexander Patrick Chaves de Sena** – Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

Dr.^a **Ana Patrícia Siqueira Tavares Falcão** – Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

Dr. **Arquimedes José de Araújo Paschoal** – Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

Dr. **Dewson Rocha Pereira** – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Dr. **Edísio Raimundo Silva** – Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

Dr.^a **Francisca da Rocha Barros Batista** – Instituto Federal do Piauí (IFPI)

Dr.^a **Iraneide Pereira da Silva** – Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

Dr. **Jaime Patrício Leiva Nuñez** – Universidad de Playa Ancha (UPLA)

Dr. **Jeymesson Raphael Cardoso Vieira** – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Dr. **José Ângelo Peixoto da Costa** – Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

Dr. **José Ayron Lira dos Anjos** – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Dr. **Jose Cuauhtemoc Ibarra Gamez** – Instituto Tecnológico de Sonora, Ciudad Obregón (ITSON)

Dr.^a **Lastenia Ugalde Meza** – Universidad de Playa Ancha (UPLA)

Dr.^a **Renata Cristine de Sá Pedrosa Dantas** – Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

Dr. **Roberto Gómez Fernández** – Ministério da Educação de Luxemburgo

Dr.^a **Suzana Pedroza da Silva** – Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

Dr.^a **Maria Trinidad Pacherez Velasco** – Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN)

Dr. **Thales Ramon de Queiroz Bezerra** – Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

Dr.^a **Viviane da Silva Medeiros** – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Coordenação Executiva

MSc. **Erick Viana da Silva** – Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) | Instituto Internacional Despertando Vocações (IIDV)

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Esp. **Ayrton Matheus da Silva Nascimento** – Instituto Internacional Despertando Vocações (IIDV)

Esp. **Douglas Salgado da Silva** – Instituto Internacional Despertando Vocações (IIDV)

SETOR COMERCIAL/MARKETING

Cynthia Alice Canuto de Oliveira – Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

Heloisa de Barros Dantas – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Kaline Soares da Silva – Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

Larissa Amanda Pereira da Silva – Instituto Internacional Despertando Vocações (IIDV)

Mariana Almeida Ferreira Lima – Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

Misael Tomaz de Araújo – Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

COORDENAÇÃO TÉCNICA EDITORIAL

Vinícius de Barros Monteiro – Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

ASSISTENTES EDITORIAIS

Anderson Soares da Silva – Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

Carlos Augusto Brandão – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Cecília Lima Siqueira – Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

Danielly Francielly dos Santos Silva – Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

Jussara Ricardo da Silva Rodrigues – Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

Karoliny Paula da Silva – Centro Universitário Guararapes (UNIFG)

Palloma Joyce de Aguiar Silva – Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

Sumário

Parte 1: Alimentos Funcionais

Capítulo 1.	Alimentos Funcionais Probióticos: Um Novo Estilo de Vida	1
Capítulo 2.	Camu-camu (<i>Myrciaria dubia</i> (H.B.K.) mc vaugh): padrão de identidade e qualidade, compostos fenólicos, capacidade redutora e antioxidante da polpa	16
Capítulo 3.	Chemical composition of maize landraces and their importance to human health	30
Capítulo 4.	Elaboração de brigadeiro funcional de batata-doce, colágeno, aveia em pó e quinoa	45

Parte 2: Análises sensorial, físico-química e microbiológica de alimentos

Capítulo 5.	Avaliação da capacidade antioxidante e antimicrobiana de extratos de folhas de moringa	59
Capítulo 6.	Avaliação do perfil microbiológico e identificação de matéria estranha em polpas de frutas congeladas comercializadas no município de Quixeramobim – CE	73
Capítulo 7.	Bacteria from bovine mastitis: survey and literature review	90
Capítulo 8.	Bactérias da mastite subclínica bovina: suscetibilidade a antibióticos	108
Capítulo 9.	Bebida fermentada a base de extrato hidrossolúvel de aveia em infusão de maçã com canela	122
Capítulo 10.	Características tecnológicas e sensoriais de hambúrgueres elaborados com farinha de aveia como substituto parcial de gordura	136
Capítulo 11.	Desenvolvimento e caracterização microbiológica de ricota condimentada com orégano elaborada com leite de cabra	153
Capítulo 12.	Determinação de parâmetros da composição nutricional de farinha de feijão (<i>Phaseolus vulgaris</i>) biofortificada e a influência do tratamento térmico	168
Capítulo 13.	Influência da época de colheita nas características físico-químicas de azedinha e peixinho	184
Capítulo 14.	Non-commercially explored <i>Campomanesia</i> spp. native fruits as potential source of antimicrobial compounds	197
Capítulo 15.	Perfil de investigação da composição mineral e centesimal de amostras de alimentos de cultivo convencional e agroecológico	211
Capítulo 16.	Qualidade agroindustrial de cana-de-açúcar em função da aplicação de escória siderúrgica e gesso	227
Capítulo 17.	Simultaneous determination of aliphatic organic acids and amino acids in floral honey: analytical validation in capillary electrophoresis	241

Parte 3: Biotecnologia

Capítulo 18.	Aplicação de lacases em síntese orgânica para obtenção de bioativos com atividade antioxidante: uma revisão	256
Capítulo 19.	Bioinseticidas obtidos por <i>Bacillus thuringiensis</i> microencapsulados: uma revisão	274
Capítulo 20.	Biorremediação de solos e águas contaminados com hidrocarbonetos: revisão de literatura	293
Capítulo 21.	Carotenoides e suas bioatividades: uma mini-revisão focada nas fontes aquáticas	309
Capítulo 22.	Colágeno, gelatina e suas aplicações na indústria alimentícia: uma visão geral focando na matéria-prima da piscicultura	324
Capítulo 23.	Efeitos do uso do campo magnético na atividade enzimática <i>in vitro</i> : revisão integrativa	339
Capítulo 24.	Etanol 1,5G: uma discussão sobre a integração entre o etanol de primeira e segunda geração	356
Capítulo 25.	Hidrolizados de colágeno, seus produtos e suas bioatividades: uma mini-revisão	375
Capítulo 26.	Mini-revisão focada nas aplicações biotecnológicas da quitosana: embalagens, alimentos & bebidas	390
Capítulo 27.	Otimização do meio de cultura para a produção de um complexo enzimático a partir de casca de <i>Mangifera indica</i> L. (manga) por fermentação sólida	411
Capítulo 28.	Potencial farmacológico da goma do cajueiro (<i>Anacardium occidentale</i> L.): um biopolímero do nordeste brasileiro	428
Capítulo 29.	Pré-tratamento biológico e sacarificação da biomassa de <i>Furcraea foetida</i> como potencial para produção de bioetanol de segunda geração	446
Capítulo 30.	Resíduos agrícolas como fontes de prebióticos para aplicação biotecnológica: uma breve revisão	466
Capítulo 31.	Resíduos agroindustriais: uma alternativa promissora e sustentável na produção de enzimas por microrganismos	482

Parte 4: Controle de qualidade e Segurança dos alimentos

Capítulo 32.	Aplicação do programa 5S em laboratório de controle de qualidade de um laticínio	499
Capítulo 33.	Autenticidade de méis: uma breve revisão sobre fingerprints e marcadores químicos	514
Capítulo 34.	Avaliação da qualidade de leite comercializado informalmente no brejo paraibano	529
Capítulo 35.	Avaliação de mercado e das boas práticas de manipulação de hortofrutícolas entregues a domicílio em Campos dos Goytacazes/RJ	542

Capítulo 36.	Avaliação de temperatura de balcões térmicos usados para servir alimentos em restaurantes self service	561
Capítulo 37.	Avaliação do desempenho do gestor nas competências gerenciais em uma unidade de alimentação e nutrição	575
Capítulo 38.	Avaliação do leite cru refrigerado de uma agroindústria de laticínios da serra gaúcha-RS	587
Capítulo 39.	Avaliação qualitativa dos cardápios de alimentação hospitalar da serra da Ibiapaba – CE	606
Capítulo 40.	Boas práticas na fabricação de bombons artesanais e pontos críticos de controle	620
Capítulo 41.	Diferenciais entre indicação geográfica e rastreabilidade e seu impacto na cadeia produtiva de pescado	634
Capítulo 44.	Escaneamento por bioimpedância elétrica em leite: explorando a técnica	653
Capítulo 43.	Estratégias para o armazenamento e manutenção de qualidade da noz-pecã após a colheita	674
Capítulo 44.	Efeito da alimentação orgânica na qualidade de presunto cru	694
Capítulo 45.	food defense: gerenciamento de riscos e aplicação de ferramenta carver + shock em frigorífico	709
Capítulo 46.	Os açougues e seus desafios: condições higiênico-sanitárias vs qualidade microbiológica da carne	725
Capítulo 47.	Padrão de identidade e qualidade do mel de <i>Apis mellifera</i> : uma breve revisão	741
Capítulo 48.	Prevalência de <i>Listeria</i> spp. e <i>Listeria monocytogenes</i> em queijo artesanal do meio-oeste catarinense	759
Capítulo 49.	Qualidade microbiológica do leite: <i>Jatropha dioica</i> contra bactérias de mastite bovina	774
Capítulo 50.	Qualidade de méis comercializados em feiras livres no município de Barreiras-BA	789
Capítulo 51.	Resíduos de alimentos como fonte de compostos antimicrobianos – uma revisão e discussão do potencial	807
Capítulo 52.	Risco sanitário na comercialização de carne: condições estruturais do mercado Francisco Bolonha, Belém (PA)	822
Capítulo 53.	Treinamento de boas práticas de manipulação de alimentos para comércio ambulante de Garanhuns-PE	836

CAPÍTULO 01: ALIMENTOS FUNCIONAIS PROBIÓTICOS, UM NOVO ESTILO DE VIDA

CHAPTER 01: PROBIOTIC FUNCTIONAL FOOD, A NEW LIFESTYLE

Williames Fabio de Souza Bezerra Filho¹; Larissa Nunes Torres²; Maria Clara Leal Bezerra Barros³; Sonara de França Sousa⁴

Resumo

O presente trabalho teve como objetivo traçar o perfil dos consumidores de probióticos por meio de um questionário *online* composto por 21 perguntas relacionadas ao perfil socioeconômico, de saúde e de consumo, compartilhado via link. De acordo com os resultados obtidos, a maioria são mulheres, autodeclaradas brancas, residentes na região Nordeste, com idade entre 20 a 35 anos, renda mensal de até dois salários mínimos, praticam atividade física com pouca frequência e apresentam algum tipo de doença crônica, com destaque para a hipertensão, obesidade e diabetes. 42,20% afirmaram saber o significado do termo “alimento funcional”, 45,10% afirmaram saber as características de um alimento probiótico e 58,40% afirmaram estar preocupados com a saúde ao adquiri-los, sendo os probióticos mais consumidos os queijos, iogurtes, leite fermentado e coalhada. A frequência de consumo foi de 3 a 4 vezes por semana e 36,60% afirmaram apresentar melhorias no funcionamento do intestino. Sobre a comercialização, 58,26% da aquisição dos alimentos probióticos é em supermercados, 69,10% estão dispostos a pagar mais por um alimento saudável e 87,30% afirmaram que os fabricantes deveriam informar sobre os benefícios e possíveis malefícios do produto nos rótulos, uma vez que a embalagem é um fator decisivo na escolha do produto.

Palavras-Chaves: consumidor, funcionamento do organismo, perfil, produtos lácteos, saúde.

Abstract

This work aimed to outline the profile of probiotic consumers through an online questionnaire composed of 21 questions related to the socioeconomic, health and consumption profile, shared via link. According to the results obtained, the majority are women, self-declared white, residing in the Northeast, aged between 20 and 35 years, monthly income of up to two minimum wages, practice physical activity infrequently and have some type of chronic disease, with emphasis on hypertension, obesity and diabetes. 42.20% said they knew the meaning of the term "functional food", 45.10% said they knew the characteristics of a probiotic food and 58.40% said they were concerned with health when purchasing them, with the most consumed probiotics being cheeses, yogurts, fermented milk and curds. The frequency of consumption was 3 to 4 times a week and 36.60% said they had improvements in bowel function. Regarding commercialization, 58.26% of probiotic food purchases are from supermarkets, 69.10% are willing to pay more for healthy food and 87.30% stated that manufacturers should inform about the benefits and possible harms of the product in labels, since the packaging is a decisive factor in the choice of the product.

¹ Engenharia de Alimentos, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, williamesfabio_2001@outlook.com

² Engenharia de Alimentos, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, larissan.torres159@gmail.com

³ Engenharia de Alimentos, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, mclaraleal.engalimentos@gmail.com

⁴ Doutora em Engenharia de Processos, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, sonara_franca@yahoo.com.br

Keywords: consumer, body functioning, profile, dairy products, health.

Introdução

O termo alimento funcional surgiu no Japão por volta de 1980, quando o governo japonês iniciou um programa de redução de custos de seguro saúde e medicamentos, em especial voltada à população que estava se tornando mais velha e procurou incentivar qualquer metodologia que pudesse melhorar a perspectiva da saúde em longo prazo (IKEDA et al, 2010). Esse termo é dado a alimentos que além das suas funções básicas nutricionais, apresentam também benefícios fisiológicos ou que reduzem riscos de doenças crônicas (STRINGHETA et al, 2007).

Segundo a Resolução nº 19, de 30 de abril de 1999, sobre a alegação de propriedade funcional dos alimentos, é aquela relativa ao papel metabólico ou fisiológico que o nutriente ou não nutriente tem no crescimento, desenvolvimento, manutenção e outras funções normais do organismo humano (BRASIL, 1999). Entre os compostos funcionais mais investigados pela ciência, temos os probióticos, que segundo a RDC nº 241, de 26 de julho de 2018, é definido como microrganismos vivos que, quando administrado em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do indivíduo (BRASIL, 2018).

Esses microrganismos podem ser encontrados em alimentos, bebidas ou em suplementos alimentares, fazendo parte da composição de iogurtes, sucos e bebidas lácteas fermentadas, contribuindo para um mercado significativo. Nos iogurtes e bebidas lácteas, encontramos com mais frequência as bactérias anaeróbicas, *Bifidobacteria* e *Lactobacilli*, sendo o iogurte o mais consumido popularmente para obtenção desse microrganismos (SHAIKH, 2018).

Dentre os benefícios trazidos ao homem em função do consumo de alimentos contendo probióticos, estão a síntese de vitaminas e proteínas pré-digeridas, a inibição de patógenos, a reconstituição da microbiota intestinal após o uso de antibióticos, o aumento da imunidade, a redução da atividade ulcerativa, o controle da colite e o possível efeito hipocolesterolêmico, sendo sua presença muito importante nos alimentos (SAAD, 2006; GOLDIN; GORBACH, 2008).

Poucas pesquisas sobre o comportamento dos consumidores de alimentos probióticos são encontradas na literatura, diante da importância dos fatores relacionados ao conhecimento, aceitação e compra destes produtos, o presente trabalho teve como objetivo traçar o perfil dos consumidores de alimentos probióticos por meio de um questionário *online* compartilhado via *link* em redes sociais.

Material e Métodos

A metodologia abordada foi através da utilização de um questionário *online* elaborado na plataforma Google® *Forms*, compartilhado nas redes sociais via *link* e atingiu um grupo de 457 pessoas. O questionário continha 20 perguntas de múltipla escolha e 1 aberta, onde foi realizado um teste de triangulação para se obter as respostas mais comentadas pelos participantes.

Para caracterizar os participantes, foram incluídas questões sobre gênero, raça/etnia, lugar do país onde mora, faixa etária e renda familiar, além de informações relacionadas a saúde dos participantes, quanto a de prática de atividades físicas e doenças crônicas. Quanto ao conhecimento e uso de probióticos foram abordadas perguntas tais como: a frequência do consumo de probióticos, a preocupação com o consumo de alimentos mais saudáveis, locais que costumam encontrar os produtos, porque os consome, quais os mais consumidos. Além de perguntar se conhecem o que é um produto funcional e um produto probiótico, e ainda se percebe melhora ao utilizar esses alimentos. Os dados obtidos foram dispostos em forma de gráficos de barras utilizando o *software* Excel.

Resultados e Discussão

De acordo com o perfil socioeconômico dos participantes (Figuras 1, 2, 3, 4 e 5), são em sua maioria mulheres, autodeclaradas brancas, residentes na região Nordeste, com idade entre 20 a 35 anos e renda mensal de até dois salários mínimos. BAYER (2012) ao fazer um levantamento do perfil de consumidores de alimentos funcionais no município de Ponta Grossa – PR, verificou que dos 200 consumidores participantes, 65% eram do sexo feminino de faixa etária predominante entre 26 a 35 anos (36,5%), já CRUZ (2016), avaliando o perfil de 124 consumidores de alimentos funcionais, constatou que 58,9% eram mulheres, de faixa etária entre 25 a 30 anos (29%) e apresentavam ensino médio completo ou superior incompleto (68%).

A predominância das mulheres nesse cenário também foi reportado por LEITE (2011) afirmando que os consumidores do sexo feminino são considerados o principal público-alvo de alimentos funcionais, pois demonstram uma postura reflexiva sobre o impacto do consumo de alimentos na sua saúde.

Figura 1: Gênero dos participantes que responderam o questionário.

Fonte: Própria (2020)

Figura 2: Raça dos participantes do questionário.

Fonte: Própria (2020)

Figura 3: Região do país onde moram os participantes do questionário.

Fonte: Própria (2020)

Figura 4: Idade dos participantes do questionário.

Fonte: Própria (2020)

Figura 5: Renda mensal dos participantes do questionário.

Fonte: Própria (2020)

Quando perguntados sobre a prática de exercícios físicos (Figura 6), 37% dos entrevistados responderam fazer com pouca frequência. Quando questionados sobre a presença de doenças crônicas (Figura 7), 80,10% afirmaram ter, com destaque para a hipertensão (28%) obesidade (10%) e diabetes (7%), respectivamente (Figura 8). As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), tais como a obesidade, a hipertensão arterial, o diabetes, as neoplasias, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, a osteoporose e as doenças cardiovasculares, podem ter como causa os fatores ambientais, incluindo os hábitos não saudáveis, como a dieta inadequada e o sedentarismo, o que, por sua vez, torna-se uma ameaça à saúde e ao desenvolvimento humano global (Schmidt et al., 2011; Lima, 2012).

Figura 6: Frequência da prática de exercícios dos participantes.

Fonte: Própria (2020)

Figura 7: Disponibilidade de doenças crônicas dos participantes do questionário.

Fonte: Própria (2020)

Figura 8. Doenças crônicas apresentadas

Fonte: Própria (2020)

Quando perguntados sobre o conhecimento do que é um alimento funcional, 42,20% dos entrevistados responderam saber o que se trata (Figura 9). Os alimentos funcionais caracterizam-se por oferecer vários benefícios à saúde, além do valor nutritivo inerente à sua composição química, podendo desempenhar um papel potencialmente benéfico na redução do risco de doenças crônicas degenerativas (BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE, 2020).

Figura 9: Conhecimento dos participantes sobre o que é um alimento funcional.

Fonte: Própria (2020)

Na classe dos alimentos funcionais, encontram-se os probióticos, 45,10% dos respondentes afirmaram saber as características desse tipo de produto (Figura 10) e 58,40% afirmaram estar preocupados com a saúde ao adquirir-los (Figura 11).

Quando perguntados sobre o tipo de probiótico mais consumidos (Figura 12), observou-se que os produtos lácteos fermentados apresentaram destaque, a saber, os queijos (35,57%), iogurtes (31,88%), leite fermentado (13,58%) e coalhada (8,21%). Os derivados lácteos fermentados apresentam propriedades terapêuticas por incluírem em sua composição bactérias como *Lactobacillus* e *Bifidobacterium* que possuem características probióticas, e essas apresentam efeitos bioquímicos sobre os nutrientes do leite e efeitos fisiológicos sobre o consumidor (FARIA et al., 2006; GALLINA et al., 2012; LEUCAS, 2012).

Também foi observado que alguns respondentes mencionaram consumir alimentos que não são considerados probióticos, embora também apresente propriedades funcionais, tais como a chia e a linhaça, estes grãos são classificados como prebióticos, ou seja, são alimentos não digeríveis pelo hospedeiro (fibras) e que tem a propriedade de serem fermentados de maneira seletiva no cólon, favorecendo o seu bem-estar (FERREIRA; SILVA, 2010).

Figura 10: Conhecimento dos participantes sobre o que é um alimento probiótico.

Fonte: Própria (2020)

Figura 11: Preocupação dos participantes em comprar alimentos mais saudáveis.

Fonte: Própria (2020)

Figura 12: Quais os produtos mais consumidos?

Fonte: Própria (2020)

A Figura 13 refere-se ao motivo dos participantes em consumirem os probióticos mencionados na figura anterior. Percebe-se que o “sabor” foi mencionado em 89 das respostas registradas, referindo-se à aceitação dos probióticos por parte deste atributo, seguidos pelas palavras “saúde e saudáveis” e “bom funcionamento do intestino”.

A figura 14 refere-se a intenção na hora da compra do alimento probiótico, 60,20% responderam ser o sabor e 26,50% responderam por ser um alimento saudável, correlacionado com as respostas da Figura 13.

Figura 13: Principais motivos descritos pelos participantes ao consumirem um alimento probiótico.

Fonte: Própria (2020)

Figura 14: O que é levando em conta na hora da compra de um alimento probiótico

Fonte: Própria (2020)

Quando perguntados sobre a frequência em que consomem probióticos (Figura 15), 37,90% responderam ser de 3 a 4 vezes por semana. Sobre a ação dos lactobacillus vivos para regularizar o intestino (Figura 16), 44,50% responderam não fazer uso. Foi perguntado aos participantes que fazem o uso de probióticos para regular o intestino, se eles notaram as melhorias ao consumirem o produto (Figura 17), 36,60% afirmaram que sim, corroborando com BAYER (2012) ao mencionar que os principais benefícios apontados pelos consumidores de

alimentos probióticos é a melhora da função intestinal (34,4%) e o fortalecimento do sistema imunológico (29,1%).

Figura 15: Frequência do consumo de probióticos, pelos participantes do questionário.

Fonte: Própria (2020)

Figura 16: Uso de lactobacilos vivos para regularizar o intestino, pelos participantes do questionário.

Fonte: Própria (2020)

Figura 17: Participantes que notam melhorias ao utilizar probióticos para regular o intestino.

Fonte: Própria (2020)

Sobre a comercialização dos alimentos probióticos, 58,26% afirmaram adquiri-los em supermercados (Figura 18); 69,10% responderam que pagariam a mais por um alimento saudável (Figura 19); e 68,50% afirmaram faltar incentivo dos mercados em fornecer alimentos mais saudáveis aos consumidores (Figura 20). GALLOTTI (2012) afirma que os consumidores se preocupam com os custos dos produtos funcionais quando eles são para consumo familiar e que estão dispostos a pagar preços mais altos pelos mesmos, pois, ao adquiri-los não estão levando para casa apenas o produto em si, mas sim, levando saúde e qualidade de vida por meio de todos os benefícios inseridos na composição do alimento.

Quando questionados sobre a rotulagem dos probióticos (Figura 21) 87,30% afirmaram que os fabricantes deveriam informar mais sobre os benefícios e possíveis malefícios do produto corroborando com LEITE (2011) ao mencionar que os consumidores utilizam os rótulos para obter informações referentes aos benefícios e características dos alimentos funcionais mais do que outros veículos como os *sites* na internet ou propagandas na televisão.

Figura 18: Onde os participantes do questionário costumam encontrar alimentos probióticos.

Fonte: Própria (2020)

Figura 19: Participantes que estariam dispostos a pagar mais por alimentos mais saudáveis.

Fonte: Própria (2020)

Figura 20: Falta incentivo dos mercados para comprar alimentos mais saudáveis?

Fonte: Própria (2020)

Figura 21: Importância de ter um rótulo mais claro, de acordo com os participantes do questionário.

Fonte: Própria (2020)

Conclusões

De acordo com o perfil dos participantes, são em sua maioria mulheres, autodeclaradas brancas, residentes na região Nordeste, com idade entre 20 a 35 anos, renda mensal de até dois salários mínimos, praticam atividade física com pouca frequência e apresentam algum tipo de doença crônica, com destaque para a hipertensão, obesidade e diabetes.

Sobre o conhecimento de alimentos funcionais, 42,20% dos entrevistados afirmaram saber o significado do termo, 45,10% afirmaram saber as características de um alimento probiótico e 58,40% afirmaram estar preocupados com a saúde ao adquirir-los, sendo os probióticos mais consumidos os queijos, iogurtes, leite fermentado e coalhada.

O sabor é o principal atributo relacionado à aceitação dos probióticos, seguido pelas características de serem considerados alimentos saudáveis. A frequência de consumo foi de 3 a 4 vezes por semana e 36,60% afirmaram que apresentam melhorias no funcionamento do intestino.

Sobre a comercialização, 58,26% da aquisição dos alimentos probióticos é em supermercados, 69,10% dos participantes estão dispostos a pagar mais por um alimento saudável e 87,30% afirmaram que os fabricantes deveriam informar mais sobre os benefícios e possíveis malefícios do produto nos rótulos, uma vez que a embalagem é um fator decisivo na escolha do produto.

Referências

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. Resolução nº 19, de 30 de abril de 1999. Aprova o Regulamento Técnico de Procedimentos Para Registro de Alimento com Alegação de Propriedades Funcionais e ou de Saúde em sua Rotulagem. Diário Oficial da União, Brasília, 03 mai. 1999. Disponível em :http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RES_18_1999_COMP.pdf/dd30fd35-e7ea-4f8d-be72-ae2e439191b. Acessado em: 28 de julho de 2020.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. Resolução nº 241 de 26 de julho de 2018. Dispõe sobre os requisitos para comprovação da segurança e dos benefícios à saúde dos probióticos para uso em alimentos. **Diário Oficial da União**, Brasília, 27 de julho de 2018. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/34379910/do1-2018-07-27-resolucao-da-diretoria-colegiada-ndc-n-241-de-26-de-julho-de-2018-34379900 . Acessado em: 28 de julho de 2020.

BAYER, K. H. **Levantamento do nível de conhecimento dos consumidores sobre os alimentos funcionais no município de Ponta Grossa (PR)**. Orientador: Ms. Eliana Queiroz Bortolozo, 2012, 60f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Alimentos) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2012.

BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE. Alimentos funcionais. Disponível em: <https://bvsmis.saude.gov.br/dicas-em-saude/420-alimento-funcionais>. Acessado em: 27 de julho de 2020.

CRUZ, G. F. R. **O comportamento do consumidor de alimentos funcionais**. Orientadora: Dra. Marlette Cassia Oliveira Ferreira. 2016. 88f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Processos Gerenciais) - Instituto Federal de São Paulo, Caraguatatuba, 2016.

FARIA, C. P. et al. Parâmetros de produção de leite de búfala fermentado por *Lactobacillus casei*. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 41, n. 3, p. 511-516, 2006.

FERREIRA, C. L. L. F.; SILVA, A. C. Probióticos e Prebióticos na Saúde da Criança. In: ROSA, C. O. B.; COSTA, N. M. B. **Alimentos Funcionais- Componentes Bioativos e Efeitos Fisiológicos**. Rio de Janeiro: Editora Rubio, 2010, P.97-108.

GALLINA, D. A. et al. Caracterização de bebida obtida a partir de leite fermentado simbiótico adicionado de polpa de goiaba e avaliação de viabilidade das bifidobactérias. **Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes**, Juiz de Fora, v. 67, n. 386, p. 45-54, 2012.

GALLOTI, M. E. R. **Motivação e valores associados ao consumo de alimentos funcionais e nutricosméticos: um estudo exploratório com mulheres no Rio de Janeiro**. Orientadora: Letícia Moreira Casotti. 2012, 316f. Dissertação de mestrado (Administração)- Instituto COPPEAD de Administração, UFRJ, Rio de Janeiro, 2012.

GOLDIN, B. R.; GORBACH, S. L. Clinical Indications for probiotics: an overview. **Clinical Infectious Diseases**, Chicago, v. 46, n.1, p. 96-100, 2008.

IKEDA, A. A.; MORAES, A.; MESQUITA, G. Considerações Sobre Tendências e Oportunidades dos Alimentos Funcionais. **Revista P&D em Engenharia de Produção**, Itajubá, v.8, n.2, p. 40-56, 2010.

LEITE, R.C. **O Comportamento do Consumidor de Nível Superior de Produtos Lácteos Funcionais**. Orientador: Dr. Jean Philippe Palma Revillion, 2011, 90f, Dissertação (Mestrado em Agronegócios) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011.

LEUCAS, H. L. B. **Efeitos benéficos de micro-organismos envolvidos na produção de leite fermentado**. Orientador: Flaviano dos Santos Martins, 2012, 51f. Monografia de Especialização (Pós-Graduação em Microbiologia aplicada às Ciências ambientais e industriais) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.

LIMA, D. F. R. **Influência dos hábitos alimentares e prática de atividade física no controle do peso corporal e valores sanguíneos para glicose, triglicerídeos e colesterol**. Orientadora: Eliana Aparecida Fagundes Queiroz Bortolozzo, 2012, 47f. Trabalho de conclusão de curso (Tecnologia em Alimentos) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2012.

ROSA, C. O. B.; COSTA, N. M. B. (Ed). **Alimentos Funcionais Componentes Bioativos e Efeitos Fisiológicos**. Rio de Janeiro: Editora Rubio, 2010, 536p.

SAAD, S. M. I. Probióticos e prebióticos: o estado da arte. **Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas**, São Paulo, v. 42, n. 1, p. 1-16, 2006.

SHAIKH, A. **Demanda por probióticos cresce significativamente**. Disponível em: < <https://www.milkpoint.com.br/artigos/espaco-aberto/demanda-por-probioticos-cresce-significativamente-207775> />. Acesso em 22 de julho de 2020.

SCHMIDT, M. I; DUNCAN, B. B; AZEVEDO E SILVA, G; MENEZES, A. M, MONTEIRO, C. A; BARRETO, S. M, et al. Chronic noncommunicable diseases in Brazil: burden and current challenges. **Lancet**. 2011; 377(9781):1949-61. DOI:10.1016/S0140-6736(11)60135-9.

STRINGHETA, et al. Políticas de saúde e alegações de propriedades funcionais e de saúde para alimentos no Brasil. **Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas**, São Paulo, v.43, n.2, p. 181-194, 2007. DOI: 10.1590/S1516-93322007000200004.

**CAPÍTULO 02: CAMU-CAMU (*MYRCIARIA DUBIA* (H.B.K.) MC VAUGH):
PADRÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE, COMPOSTOS FENÓLICOS,
CAPACIDADE REDUTORA E ANTIOXIDANTE DA POLPA**

**CHAPTER 02: CAMU-CAMU (*MYRCIARIA DUBIA* (H.B.K.) MC VAUGH):
IDENTITY AND QUALITY, PHENOLIC COMPOUNDS, REDUCING AND
ANTIOXIDANT CAPACITY OF PULP**

Carolina Kato Prado¹; Jéssica Barrionuevo Ressutte²; Natália Vicente Rezende Mudenu³; Tiago Bervelieri
Madeira⁴; Wilma Aparecida Spinosa⁵

Resumo

O camu-camu é conhecido pelo seu alto teor de vitamina C e compostos bioativos, porém, o consumo desse fruto é limitado devido ao seu sabor ácido e adstringente. Estudos que possam caracterizar o camu-camu são relevantes, pois podem fornecer informações úteis para um melhor aproveitamento tecnológico desse fruto pela indústria. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a polpa do camu-camu quanto ao seu padrão de identidade e qualidade. Para isso foram realizadas análises físico-químicas, ensaios de capacidade antioxidante e redutora e compostos fenólicos. O camu-camu apresentou umidade de 92,77 g/100g, vitamina C de 2,24 g/100g e capacidade redutora de 2,60 g EAG/100g. O pH foi de 2,93 e o teor de açúcares totais de 8,00 g/100g. Os compostos fenólicos presentes no camu-camu foram ácido nicotínico, ácido gálico, ácido protocatecuico, teobromina, epigallocatequina, ácido hidroxibenzóico, catequina, ácido clorogênico, cafeína, epicatequina, ácido p-cumárico, ácido sinápico, quercetina, rutina, miricetina e kaempferol. A capacidade antioxidante para os métodos avaliados por DPPH, ABTS e FRAP foram de 57,30 µmol trolox/g, 167,36 µmol trolox/g e 1133,03 µmol Fe²SO₄/g, respectivamente. A partir dos resultados obtidos pode-se inferir que o camu-camu tem potencial para uso na indústria de alimentos como importante fonte de compostos bioativos.

Palavras-Chaves: Polpa de camu-camu, compostos bioativos, antioxidantes, ácido ascórbico, polifenóis.

Abstract

Camu-camu is known for its high content of vitamin C and bioactive compounds, however, the consumption of this fruit is limited due to its acidic and astringent flavor. Studies that can characterize camu-camu are relevant, because they can provide useful information for a better technological use of this fruit by the industry. In this context, the objective of this work was to characterize the camu-camu pulp in terms of its identity and quality standard. For this, physicochemical analyzes, tests of antioxidant and reducing capacity and phenolic compounds were carried out. The camu-camu showed 92.77 g/100g moisture, 2.24 g/100g vitamin C and 2.60 g EAG/100g reducing capacity. The pH was 2.93 and the total sugar content was 8.00 g/100g. The phenolic compounds present in camu-camu were nicotinic acid, gallic acid, protocatechuic acid, theobromine, epigallocatechin, hydroxybenzoic acid, catechin, chlorogenic acid, caffeine, epicatechin, p-cumaric acid, synapic acid, quercetin, rutin, myricetin

¹ Doutora em Ciência de Alimentos, Universidade Estadual de Londrina, carolkprado@gmail.com

² Doutoranda em Ciência de Alimentos, Universidade Estadual de Londrina, jessicaressutte@gmail.com

³ Doutora em Ciência de Alimentos, Universidade Estadual de Londrina, natvr9@hotmail.com

⁴ Doutor em Química, Universidade Estadual de Londrina, madeiratb@gmail.com

⁵ Doutora em Ciência de Alimentos, Universidade Estadual de Londrina, wilma.spinosa@uel.br

and kaempferol. The antioxidant capacity for the methods evaluated by DPPH, ABTS and FRAP were 57.30 $\mu\text{mol trolox/g}$, 167.36 $\mu\text{mol trolox/g}$ and 1133.03 $\mu\text{mol Fe}^2\text{SO}_4/\text{g}$, respectively. From the results obtained, it can be inferred that the camu-camu has potential for use in the food industry as an important source of bioactive compounds.

Keywords: Camu-camu pulp, bioactive compounds, antioxidants, ascorbic acid, polyphenols.

Introdução

O camu-camu (*Myrciaria dubia* (H. B. K.) McVaugh), também chamado de caçari ou araçá-d'água, é um fruto esférico, com superfície lisa e coloração vermelho-escuro, conhecido por possuir elevada umidade e acidez. A planta de cam-camu é pertencente à família *Myrtaceae*, sendo encontrada dispersa em quase toda a Amazônia, nas margens dos rios e lagos. O camucamuzeiro leva de 3 ou 4 anos para começar a produzir frutos, após seu plantio definitivo. A frutificação dessa planta ocorre entre os meses de novembro e março (INPA, 2018; RIBEIRO; MOTA; CORRÊA, 2002). Atualmente o Peru é o país líder de produção e comercialização, porém, países vizinhos como a Colômbia, Brasil e Venezuela têm expandido o cultivo do camu-camu (KANESHIMA et al., 2017).

No Brasil, o camu-camu é encontrado desde o litoral Atlântico no estado do Pará até a região Amazônia do Tocantins, sendo cultivado principalmente nos estados do Maranhão, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins (EMBRAPA, 2012, SOUZA-FILHO et al., 2002). Esse fruto tem sido estudado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), desde 1980 e pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) desde 2007.

Devido à elevada acidez da polpa, o camu-camu é mais utilizado no preparo de sucos, concentrado para preparo de outros produtos alimentícios, e para preparo de cápsulas de vitamina C (AZEVEDO et al., 2015). Entretanto um dos fatores que contribuem para a restrição do seu consumo são o sabor muito ácido da polpa e o amargor da casca, levando à necessidade de pesquisas para seu melhor aproveitamento. Uma das alternativas para a utilização deste fruto é na forma de polpa congelada (MAEDA et al., 2006). A polpa congelada apresenta vantagens como poder ser transportada para outros locais e poder ser utilizada como ingrediente para a produção de outros alimentos, contribuindo dessa forma, com a conservação do fruto, além de aumentar a renda dos produtores e flexibilizar a sua aplicação para produção de alimentos (CONCEIÇÃO et al., 2020).

As propriedades do camu-camu despertam interesses econômicos e científicos das indústrias farmacêuticas, apresentando um grande potencial econômico capaz de colocá-lo no mesmo nível de importância de outras frutas tradicionais da região amazônica, como o açaí e cupuaçu (NASCIMENTO et al., 2013) e por isso o camu-camu tem sido exportado para Japão

e Estados Unidos em grande escala (AGUIAR; SOUZA, 2015).

A *Myrciaria dubia* é conhecida pelo seu alto teor de ácido ascórbico, que comparado ao da acerola é aproximadamente 20 vezes maior (VIDIGAL et al., 2011). Os frutos de camu-camu também apresentam vários tipos de aminoácidos e quantidades consideráveis de minerais (AGUIAR; SOUZA, 2018; CUNHA-SANTOS et al., 2019; FUJITA et al., 2017). Ademais, o camu-camu apresenta altos teores de compostos fenólicos, com efeitos neuroprotetores (AZEVEDO et al., 2015), hepatoprotetores (AKACHI et al., 2010), antimutagênicos (AZEVEDO et al., 2019), hipoglicemiantes (BALISTEIRO et al., 2017) e anti-inflamatórios (INOUE et al., 2008).

Tanto a vitamina C quanto os compostos fenólicos são classificados como antioxidantes não-enzimáticos, sendo eles naturais. O ácido ascórbico é um sequestrador de radicais livres solúvel em água, que doa um elétron para o radical lipídico e se torna radical ascorbato, impedindo a reação em cadeia da peroxidação lipídica (NIMSE; PAL, 2015). Os compostos fenólicos por sua vez podem atuar impedindo a oxidação de diversas formas: pela ligação a metais, pelo sequestro de espécies reativas de oxigênio (ERO), pela produção de óxido nítrico e modulação de enzimas envolvidas na produção de ERO (BARADARAN; NASRI; RAFIEIAN-KOPAEI, 2014).

O estresse oxidativo está relacionado a uma série de doenças e também ao processo de envelhecimento, sendo resultado de um desequilíbrio entre a produção de ERO e as defesas antioxidantes do organismo (KALLAUR; OLIVEIRA; REICHE, 2014). As frutas e vegetais possuem grande variedade de antioxidantes que protegem as células dos danos oxidativos e consequentemente diminuem o risco de doenças crônicas, já que atuam impedindo ou retardando a oxidação de substâncias (URQUIZA-MARTÍNEZ; NAVARRO, 2016). Por isso, há uma grande procura por produtos naturais que possam ter uma potencial contribuição no tratamento de doenças (LANGLEY et al., 2015).

Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi caracterizar o camu-camu em relação às suas composições físico-química e de compostos fenólicos e avaliar sua capacidade antioxidante e redutora visando seu potencial econômico e aplicação na indústria de alimentos.

Material e Métodos

Material

A polpa congelada de camu-camu foi doada pela empresa PolpaSul. Os frutos com grau de maturação maduro, de coloração vermelha, adquiridos pela empresa foram provenientes de árvores cultivadas a beira do rio Madeira na região Amazônica. Após o despolpe, o produto,

isento de qualquer aditivo, foi envasado em embalagens plásticas individuais com capacidade para 100 gramas e congelado para posteriores análises físico-químicas, de capacidades redutora e antioxidante.

Análises físico-químicas

Foram realizadas análises de pH, sólidos solúveis, acidez titulável, gorduras totais, proteínas totais, açúcares totais, umidade e ácido ascórbico.

O pH (pHmetro PG2000, Gehaka®, Brasil), acidez total em ácido cítrico, sólidos solúveis em °Brix (Refratômetro – RM40, Mettler Toledo®, USA) e vitamina C foram obtidos de acordo com metodologia da IAL (2008), em que a acidez total foi expressa em g/100g e a vitamina C em mg/100g. Para as análises de umidade, proteínas totais, gorduras totais e açúcares totais foram utilizadas metodologias de acordo com a AOAC (2012) e os resultados foram expressos em g/100g.

Determinação de compostos fenólicos, análises de capacidade redutora e capacidade antioxidante

Para essas análises foi feito um extrato a partir da polpa congelada de camu-camu. O extrato foi obtido de acordo com metodologia de Rufino et al. (2011), utilizando-se de duas extrações de 5 g de amostra, a primeira com uma mistura de água e metanol e a segunda com acetona e água.

Capacidade Redutora

A determinação da capacidade redutora foi realizada pelo método de Folin-Ciocalteu Singleton e Rossi (1965), modificado por Reynertson et al. (2008). A curva padrão de solução de ácido gálico foi obtida em duplicata com concentrações de 50, 100, 150, 180, 200 e 250 µg/mL e a absorbância foi lida a 765 nm.

Capacidade Antioxidante

As análises para determinação de capacidade antioxidante foram realizadas utilizando três métodos: DPPH (2,2-difenil-1-Picrilhidrazil), ABTS (ácido 2,2'-azinobis (3-eilbenzotiazolínico-6-sulfônico)) e FRAP (Poder antioxidante de redução do íon Ferro), de acordo com Rufino et al. (2010).

DPPH

Nessa análise 3,9 mL de solução DPPH a 0,06 mmol/L foram adicionados a 100 µl de extrato de camu-camu. A absorbância foi lida a 515 nm a intervalos de 1 minuto nos primeiros 10 minutos e em intervalos de 5 minutos até a estabilização. A curva padrão de solução de Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromano-2-carboxílico) foi obtida a partir de uma solução-mãe a 250 µg/mL diluída nas concentrações de 25, 50, 100, 150 e 200 µg/mL.

ABTS

A determinação de capacidade antioxidante pelo método ABTS foi feita adicionando-se 30 µL do extrato de camu-camu diluído a 5000 µg/mL a 3 mL de solução de trabalho ABTS, que 6 minutos após agitação, a absorbância foi medida a 734 nm. A curva padrão foi obtida por meio de diluições a 0,3, 0,5, 0,7, 1,0, 1,5, 1,8 e 2,0 mM a partir de uma solução estoque de Trolox a 8 mM.

FRAP

Para essa determinação 0,9 mL do reagente FRAP a 37 °C foram misturados a 30 µL de amostra e 90 µL de água destilada, sendo lida a absorbância a 595 nm, após 30 minutos a temperatura de 37°C. A curva padrão foi feita utilizando as concentrações de 50, 100, 200, 300, 400, 500 e 600 µg/mL.

Quantificação de compostos fenólicos por Cromatografia líquida de ultra eficiência acoplado a detector de massas (UPLC-MS/M)

Para essa análise, 1 mL do extrato de camu-camu foi seco em fluxo de nitrogênio e ressuspenso em 1 mL de Metanol. Para determinação de compostos fenólicos, utilizou-se um cromatógrafo líquido (UPLC – Ultra Performance Liquid Chromatography) (Acquity UPLC, Waters, MA, EUA) acoplado a um detector de massas (Acquity Tandem Quadrupolo, Waters, MA, EUA) no modo ionização positivo, com temperatura do gás de dessolvatação (Nitrogênio) de 500 °C a uma vazão de 900 L/ h, gás do cone mantido à mesma temperatura na vazão de 20 L/h. A temperatura de fonte de ionização foi de 120 °C. As voltagens do cone amostral e do extrator foram otimizadas para cada composto e a voltagem do capilar foi de 3,5 KV. Para a separação dos compostos fenólicos foi utilizada uma coluna Waters BEH C8 com dimensões de 2,1 x 50 mm e partícula de 1,7 µm. As condições cromatográficas foram: fase móvel A composta por água e 0,1% de ácido fórmico e fase móvel B composta por metanol e 0,1% de ácido fórmico. De 0 a 0,4 minutos o gradiente de fase móvel utilizado foi de 95% (A) e 5% (B), posteriormente a fase (B) teve sua proporção aumentada linearmente até 95% no tempo de 15,40

minutos e mantida na mesma proporção até 18,40 minutos. No tempo de 18,41 minutos, retornaram-se as proporções das fases às condições iniciais até 20 minutos. O volume de injeção da amostra foi de 10 μ L e a amostra foi diluída 10 vezes (1:10) em água antes de sua injeção.

Resultados e Discussão

Análises físico-químicas

Os resultados de caracterização físico-química da polpa de camu-camu são apresentados na Tabela 1. O camu-camu apresentou-se com teor de umidade alto, corroborando resultados encontrados por Aguiar e Souza (2015) e Fujita et al. (2013), $94,1 \pm 0,1$ g/ 100 g de fruto e $92,9 \pm 0,1$ g/ 100 g de camu-camu, respectivamente, conferindo uma característica suculenta a esse fruto.

Tabela 1. Caracterização físico-química da polpa congelada de camu-camu.

Característica	Média $\pm$ Desvio padrão
Umidade (g/100g)	$92,77 \pm 0,15$
Gorduras totais (g/100g)	$0,14 \pm 0,01$
Proteínas totais (g/100g)	$0,35 \pm 0,07$
Açúcares totais (g/100g)	$8,00 \pm 0,28$
Acidez total (g/100g)	$1,93 \pm 0,01$
pH	$2,93 \pm 0,01$
Sólidos Solúveis ($^{\circ}$ Brix)	$6,2 \pm 0,00$
Ácido ascórbico (mg/100g)	$2241 \pm 2,62$

O camu-camu apresentou baixo pH, que, segundo Nascimento et al. (2013), é explicado pelo teor de ácido ascórbico. Esse fato combinado com o baixo conteúdo de açúcares também comprova a sua baixa aceitação, mesmo pela população da região amazônica, e a sua pouca exploração comercial devido ao sabor extremamente ácido (MAEDA et al., 2006).

Rufino et al. (2010) ao avaliarem diversas frutas tropicais do Brasil verificaram que o camu-camu apresentou o maior nível de vitamina C ($1882 \pm 43,2$ mg/100 g de fruta fresca), sendo superior ao da acerola ($1357 \pm 9,5$ mg/100 g de fruta fresca). Neste trabalho o conteúdo de vitamina C foi superior ao encontrado por Baldeón et al. (2015) ($1092,85 \pm 47,68$ mg/100 g de fruta fresca), porém próximo ao encontrado por Aguiar e Souza (2015) ($2031 \pm 0,04$ mg/100 g de fruta fresca) e Rufino et al. (2010).

Em um trabalho Grigio et al. (2016), em que foram avaliados o estágio de maturação e o tempo de estocagem da fruta, todos os estágios de maturação (imaturo, semi-maduro e maduro) e no tempo inicial assim como nos demais tempos de estocagem apresentaram teores de ácido ascórbico superiores ao deste trabalho, atingindo o nível de 6112 mg/100 g de fruta fresca, que os autores atribuíram ao fato de a polpa e a casca terem sido processadas juntas, verificando que a casca do camu-camu contribui com seu alto conteúdo de ácido ascórbico e é um subproduto que poderia ser utilizado pela indústria alimentícia para obtenção de vitamina C tanto para fortificar alimentos, quanto como conservante.

Determinação e quantificação de compostos fenólicos, análises de capacidade redutora e capacidade antioxidante

Os compostos fenólicos identificados por UPLC-MS/MS são apresentados na Tabela 2. Os fenólicos principais encontrados foram o ácido gálico, a epigallocatequina, o ácido clorogênico, a quercetina, a rutina, a miricetina e o kaempferol.

Tabela 2. Compostos fenólicos identificados e quantificados na polpa congelada de camu-camu por UPLC-MS/MS.

Compostos	Concentração (mg/100 g fruta)
Miricetina	2,110
Ácido Gálico	1,000
Catequina	0,550
Quercetina	0,444
Ácido Clorogênico	0,282
Rutina	0,258
Epigallocatequina	0,234

Kaempferol	0,182
Cafeína	0,086
Ácido Hidroxibenzóico	0,076
Ácido Protocatecuíco	0,072
Ácido Nicotínico	0,062
Ácido p-Cumárico	0,054
Teobromina	0,022
Epicatequina	0,018
Ácido Sinápico	0,004

Balisteiro et al. (2017) ao analisarem sucos de 6 frutas nativas do Brasil, dentre elas o camu-camu, verificaram que os compostos fenólicos encontrados por cromatografia líquida de alta eficiência acoplado a um detector de arranjo de diodos (HPLC/DAD) foram ácido sirínico, quercetina, ácido elágico livre, ácido elágico total e derivados de miricetina, não sendo identificados catequina, epicatequina e derivados do kaempferol encontrados neste trabalho. Os derivados de quercetina e de miricetina, os únicos compostos semelhantes com este trabalho, apresentaram valores de 0,46 e 0,61 mg/100 mL de suco, respectivamente, ou seja, a concentração de quercetina apresentou-se semelhante enquanto os níveis de miricetina foram inferiores aos deste estudo.

Fracassetti et al. (2013) ao analisar a polpa, semente e casca do fruto fresco de camu-camu, assim como a polpa em pó e farinha por cromatografia líquida de alta eficiência acoplado a um detector de arranjo de fotodiodos (HPLC/PDA) encontraram compostos derivados de quercetina, de miricetina, de ácido elágico, de ácido gálico, antocianinas, elagitaninos e proantocianinas. Entretanto, na polpa fresca apenas derivados de miricetina (1,79 mg/100 g de polpa fresca), de quercetina (0,14 mg/100 g de polpa), do ácido elágico (0,06 mg/100 g de polpa), antocianinas (0,32 mg/100 g de polpa) e elagitaninos (6,67 mg/100 g de polpa) foram encontrados, sendo os níveis de derivados de miricetina e de quercetina inferiores aos níveis de quercetina e miricetina deste estudo.

Essas diferenças nos níveis e tipos de compostos fenólicos podem ser devido ao estágio de maturação, região de cultivo e também a apresentação da fruta, pois a polpa congelada apresentou maior conteúdo desses compostos do que o camu-camu fresco em um estudo que

realizou a composição química da polpa congelada e seus efeitos no perfil lipídico, glicemia, capacidade antioxidante, peroxidação lipídica, e atividade antioxidante de enzima no plasma de roedores com diabetes do tipo 1, sendo possível observar melhora na hiperlipidemia e peroxidação lipídica desses ratos (GONÇALVES et al., 2014).

A capacidade redutora apresentada na Tabela 3 foi superior aos valores encontrados por Chirinos et al. (2010), 1120 ± 47 , 1420 ± 193 e 1320 ± 102 mg EAG em 100 gramas de fruta fresca para os estágios de maturação: totalmente verde, verde-avermelhado e vermelho, respectivamente. Porém, a fruta estudada era proveniente do Peru, enquanto a utilizada nesse estudo foi cultivada no Amazonas. Esses autores concluíram que o camu-camu apresentou alta capacidade redutora ao compará-lo com cerejas, ameixas, morangos, mirtilo, entre outras frutas do tipo berries.

Tabela 3. Capacidade redutora e capacidade antioxidante da polpa congelada de camu-camu.

Parâmetro	Média $\pm$ Desvio padrão
Capacidade redutora (mg EAG/100g)	$2606,27 \pm 147,71$
DPPH ($\mu\text{mol trolox/g}$)	$57,30 \pm 4,19$
ABTS ($\mu\text{mol trolox/g}$)	$167,36 \pm 8,42$
FRAP ($\mu\text{mol Fe}_2\text{SO}_4/\text{g}$)	$1133,03 \pm 151,44$

Neves et al. (2017) encontraram valores de capacidade redutora e ácido ascórbico de 12420,12 mg GAE/100 g de fruta fresca e 3474,09 mg/100 mL de polpa, respectivamente, para frutos no início da maturação, sendo o melhor tempo de colheita para obtenção de maior quantidade desses compostos, pois com o amadurecimento a concentração deles diminuiu devido a reações catabólicas desse processo. Mesmo a colheita sendo feita no início da maturação, após 5 dias de estocagem a frio foram observadas perdas de 75,23 e 98,36% para composto fenólicos e vitamina C, respectivamente (NEVES et al., 2017). A importância de se definir quando as perdas desses compostos ocorrem é devido a suas capacidades antioxidantes (CARVALHO-SILVA et al., 2014).

É possível observar na análise de DPPH deste trabalho que o camu-camu apresentou capacidade antioxidante inferior aos encontrados por Chirino et al. (2010) para três estágios de

maturação analisados pelos autores (153 ± 8 , 185 ± 11 e 167 ± 11 $\mu\text{mol trolox/g}$ para os estágios verde, verde-avermelhado e vermelho, respectivamente), o que assim como a capacidade redutora, pode ser devido a origem da fruta, uma vez que as frutas utilizadas neste estudo possuíam grau de maturação vermelho, ou seja, maduro.

A capacidade antioxidante obtida pelo método do ABTS foi superior a encontrada por Rufino et al. (2010) no camu-camu fresco ($153 \pm 2,6$ $\mu\text{mol Trolox/g}$ fruta fresca), que concluíram que, dentre as 18 frutas brasileiras analisadas, o camu-camu foi a que apresentou maior capacidade antioxidante, considerando tanto em matéria seca quanto fresca.

Azevedo et al. (2018) verificaram uma alta capacidade antioxidante, determinada por DPPH e ABTS, de frutos de camu-camu cultivados em ambientes seco ($1520,45 \pm 112,79$ e $1418,25 \pm 17,65$ μmol de equivalente de Trolox/g de camu-camu no estágio maduro para DPPH e ABTS, respectivamente) e inundado ($1124,37 \pm 29,12$ e $1209,08 \pm 65,66$ μmol de equivalente de Trolox/g de camu-camu no estágio maduro para DPPH e ABTS, respectivamente), sendo maior naqueles cultivados em ambiente seco e no estágio maduro, que concluíram que, mesmo não sendo cultivado em regiões nativas, esse fruto preserva sua capacidade antioxidante, a qual também pode estar mais relacionada aos conteúdos de antocianinas e polifenóis totais, presentes em maior quantidade nos frutos maduros.

O valor encontrado pelo método de FRAP assemelha-se ao apresentado por Chagas et al. (2015) para o camu-camu nos estágios de maturação “imaturo” e “semi-maturo” ($1287,56$ e $1355,56$ $\mu\text{mol Fe}_2\text{SO}_4/\text{g}$, respectivamente), porém com valor inferior ao estágio “maturo” ($1994,93$ $\mu\text{mol Fe}_2\text{SO}_4/\text{g}$). Desta forma, verifica-se que o estágio de maturação influencia nos compostos presentes no camu-camu, que conferem a capacidade antioxidante dele. Ainda no referido trabalho os frutos foram provenientes de plantas nativas das margens do Lago da Morena no Estado de Roraima, diferentemente dos deste estudo que foram colhidos de plantas nativas das margens do Rio Madeira no Amazonas.

Uma alternativa para o sabor amargo e ácido do camu-camu é a produção de extrato em pó a fim de que o camu-camu possa ser utilizado como ingrediente pela indústria alimentícia com o papel de aumentar o conteúdo de antioxidantes de outros alimentos tanto visando a obtenção de um produto funcional quanto o utilizando como conservante. Entretanto, Azevêdo et al. (2014) observaram que o calor utilizado para secar os resíduos de camu-camu diminuiu consideravelmente o conteúdo de vitamina C e a sua capacidade redutora e, consequentemente, reduziu a capacidade antioxidante por meio do método de DPPH, tendo as perdas de capacidade redutora atingido 50,7 e 63,9% e do ácido ascórbico 98,21 e 98,89% para temperaturas de 40 e 80°C, respectivamente.

Quando o processo de secagem utilizado foi a liofilização, as perdas foram de 42,21% e 97,42% para capacidade redutora e ácido ascórbico, respectivamente. Logo, a polpa fresca congelada, como a utilizada neste estudo, conserva os compostos bioativos presentes no camu-camu, por se tratar de um produto menos processado e armazenado em baixas temperaturas, sendo mais interessante para sua exploração considerando os benefícios para a saúde.

Conclusões

O camu-camu possui significantes teores de compostos bioativos e capacidade antioxidante, sendo uma fruta que poderia ser mais explorada no Brasil, porém há necessidade de se encontrar formas de consumi-la, o que aumentaria seu valor no mercado nacional e constituiria uma fonte de renda para produtores, podendo ser cultivada em locais diferentes da Amazônia, mas com o apelo de um produto brasileiro com propriedades funcionais.

Referências

AGUIAR J. P. L.; SOUZA F. C. A. Antioxidants chemical composition and minerals in freeze-dried camu-camu (*Myrciaria dubia* (H. B. K.) Mc Vaugh) pulp. **Food and Nutrition Sciences**, n. 6, p. 869-674, 2015.

AGUIAR, J. P. L.; SOUZA, F. DAS C. DO A. Antioxidant capacidant and bioactive compounds and health benefits of camu-camu puree (*myrciaria dubia* (h.b.k) mc vaugh). **International Journal of Development Research**, v. 8, n. 6, p. 20742–20745, 2018.

AKACHI, T.; SHIINA, Y.; KAWAGUCHI, T.; KAWAGISHI, H.; MORITA, T.; SUGIYAMA, K. 1-Methylmalate from camu-camu (*myrciaria dubia*) suppressed D-galactosamine-induced liver injury in rats. **Bioscience, Biotechnology and Biochemistry**, v. 74, n. 3, p. 573–578, 2010.

AOAC. Association of official analytical chemists. **Official methods of analysis of the AOAC International**. 19 ed. Arlington, 2012.

AZEVEDO, J. C. S.; BORGES, K. C.; GENOVESE, M. I.; CORREIA, R. T. P.; VATTEM, D. A. Neuroprotective effects of dried camu-camu (*Myrciaria dubia* HBK McVaugh) residue in *C. elegans*. **Food Research International**, v. 73, p. 135–141, 2015.

AZEVEDO, L.; DE ARAUJO RIBEIRO, P. F.; DE CARVALHO OLIVEIRA, J. A.; CORREIA, M. G.; RAMOS, F. M.; DE OLIVEIRA, E. B.; BARROS, F.; STRINGHETA, P. C. Camu-camu (*Myrciaria dubia*) from commercial cultivation has higher levels of bioactive compounds than native cultivation (Amazon Forest) and presents antimutagenic effects in vivo. **Journal of the Science of Food and Agriculture**, v. 99, n. 2, p. 624–631, 2019.

BALDEÓN, E. O.; ALCÁÑIZ, M.; MASOT, R.; FUENTES, E. M.; BARAT, J. M.; GRAU, R. Voltammetry pulse array developed to determine the antioxidant activity of camu-camu

(*Myrciaria dubia* (H.B.K.) McVaug) and tumbo (*Passiflora mollissima* (Kunth) L.H. Bailey) juices employing voltammetric electronic tongues. **Food Control**, v. 54, p. 181–187, 2015.

BALISTEIRO, D. M.; ARAUJO, R. L. De; GIACAGLIA, L. R.; GENOVESE, M. I. Effect of clarified Brazilian native fruit juices on postprandial glycemia in healthy subjects. **Food Research International**, v. 100, p. 196–203, 2017.

BARADARAN, A.; NASRI, H.; RAFIEIAN-KOPAEI, M. Oxidative stress and hypertension: Possibility of hypertension therapy with antioxidants. **Journal of Research in Medical Sciences**, v. 19, p. 358–367, 2014.

CARVALHO-SILVA, L. B.; DIONÍSIO, A. P.; PEREIRA, A. C. S.; WURLITZER, N. J.; BRITO, E. S. De; BATAGLION, G. A.; BRASIL, I. M.; EBERLIN, M. N.; LIU, R. H. Antiproliferative, antimutagenic and antioxidant activities of a Brazilian tropical fruit juice. **LWT - Food Science and Technology**, v. 59, n. 2P2, p. 1319–1324, 2014.

CHAGAS E. A.; GRIGIO M. L.; DURIGAN M. F. B.; FUJITA E.; VIEITES R. L. Caracterização centesimal e compostos bioativos de frutos do camu-camu em diferentes estádios de maturação. In: 1º Congresso Brasileiro de Processamento Mínimo e Pós-colheita de Frutas, Flores e Hortaliças, 2015, Aracaju – SE. **Anais do Congresso Brasileiro de Processamento Mínimo e Pós-colheita de Frutas, Flores e Hortaliças**, 2015.

CHIRINOS, R.; GALARZA, J.; BETALLELUZ-PALLARDEL, I.; PEDRESCHI, R.; CAMPOS, D. Antioxidant compounds and antioxidant capacity of Peruvian camu camu (*Myrciaria dubia* (H.B.K.) McVaugh) fruit at different maturity stages. **Food Chemistry**, v. 120, n. 4, p. 1019–1024, 2010.

CONCEIÇÃO, N. *et al.* By-products of camu-camu [*Myrciaria dubia* (Kunth) McVaugh] as promising sources of bioactive high added-value food ingredients: Functionalization of yogurts. **Molecules**, v. 25, n. 1, p. 1–17, 2020.

CUNHA-SANTOS, E. C. E. *et al.* Vitamin C in camu-camu [*Myrciaria dubia* (H.B.K.) McVaugh]: evaluation of extraction and analytical methods. **Food Research International**, v. 115, p. 160–166, 2019.

DE AZEVEDO, J. C. S.; FUJITA, A.; DE OLIVEIRA, E. L.; GENOVESE, M. I.; CORREIA, R. T. P. Dried camu-camu (*Myrciaria dubia* H.B.K. McVaugh) industrial residue: A bioactive-rich Amazonian powder with functional attributes. **Food Research International**, v. 62, p. 934–940, 2014.

EMBRAPA. **A cultura do camu-camu. Embrapa Amazônia Oriental**. Brasília: Embrapa, 2012. 81 p.

FRACASSETTI, D.; COSTA, C.; MOULAY, L.; TOMÁS-BARBERÁN, F. A. Ellagic acid derivatives, ellagitannins, proanthocyanidins and other phenolics, vitamin C and antioxidant capacity of two powder products from camu-camu fruit (*Myrciaria dubia*). **Food Chemistry**, v. 139, p. 578–588, 2013.

FUJITA, A. *et al.* Improving anti-hyperglycemic and anti-hypertensive properties of camu-camu (*Myrciaria dubia* Mc. Vaugh) using lactic acid bacterial fermentation. **Process**

Biochemistry, v. 59, p. 133–140, 2017.

FUJITA, A.; BORGES, K.; CORREIA, R.; FRANCO, B. D. G. de M.; GENOVESE, M. I. Impact of spouted bed drying on bioactive compounds, antimicrobial and antioxidant activities of commercial frozen pulp of camu-camu (*Myrciaria dubia* Mc. Vaugh). **Food Research International**, v. 54, p. 495–500, 2013.

GONÇALVES, A. E. D. S. S.; LELLIS-SANTOS, C.; CURI, R.; LAJOLO, F. M.; GENOVESE, M. I. Frozen pulp extracts of camu-camu (*Myrciaria dubia* McVaugh) attenuate the hyperlipidemia and lipid peroxidation of Type 1 diabetic rats. **Food Research International**, v. 64, p. 1–8, 2014.

GRIGIO, M. L.; CHAGAS, E. A.; BERLINGIERI DURIGAN, M. F.; DE ANDRADE SOUSA, A.; MOTA FILHO, A. B.; CHAGAS, P. C. Determination of harvest time and quality of native camu-camu fruits (*Myrciaria dubia* (Kunth) Mc Vaugh) during storage. **Fruits**, v. 71, n. 6, p. 373–378, 2016.

INOUE, T.; KOMODA, H.; UCHIDA, T.; NODE, K. Tropical fruit camu-camu (*Myrciaria dubia*) has anti-oxidative and anti-inflammatory properties. **Journal of Cardiology**, v. 52, p. 127–132, 2008.

INSTITUTO ADOLFO LUTZ (IAL). **Métodos físico-químicos para análise de alimentos**. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA). **Cultivo do camu-camu**. Disponível em: www.inpa.gov.br/cpca/areas/camu-camu.html. Acesso em: 31 julho 2020.

KALLAUR A. P.; OLIVEIRA S. R.; REICHE E. M. V. **The role of genetic polymorphisms in oxidative stress**. In.: DICH J.; BREGANÓ J. W.; SIMÃO A. N. C.; CECCHINI R. (Ed.). New York: CRC Press, 2014, p. 7-44.

KANESHIMA, T. *et al.* Antimicrobial constituents of peel and seeds of camu-camu (*Myrciaria dubia*). **Bioscience, Biotechnology and Biochemistry**, v. 81, n. 8, p. 1461–1465, 2017.

LANGLEY, P. C.; PERGOLIZZI, J. V.; TAYLOR, R.; RIDGWAY, C. Antioxidant and associated capacities of camu camu (*Myrciaria dubia*): A systematic review. **Journal of Alternative and Complementary Medicine**, v. 21, n. 1, p. 8–14, 2015.

MAEDA, R. N.; PANTOJA, L.; YUYAMA, L. K. O.; CHAAR, J. M. Determinação da formulação e caracterização do néctar de camu-camu (*Myrciaria dubia* McVaugh). **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, v. 26, n. 1, p. 70–74, 2006.

NASCIMENTO, O. V.; BOLETI, A. P. A.; YUYAMA, L. K. O.; LIMA, E. S. Effects of diet supplementation with Camu-camu (*Myrciaria dubia* HBK McVaugh) fruit in a rat model of diet-induced obesity. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v. 85, n. 1, p. 355–363, 2013.

NEVES, L. C.; DE CAMPOS, A. J.; CISNEROS-ZEVALLOS, L.; COLOMBO, R. C.;

ROBERTO, S. R. Postharvest behavior of camu-camu fruits based on harvesting time and nutraceutical properties. **Scientia Horticulturae**, v. 217, p. 276–284, 2017.

NIMSE, S. B.; PAL, D. Free radicals, natural antioxidants, and their reaction mechanisms. **RSC Advances**, v. 5, n. 35, p. 27986–28006, 2015.

REYNERTSON, K. A.; YANG, H.; JIANG, B.; BASILE, M. J.; KENNELLY, E. J. Quantitative analysis of antiradical phenolic constituents from fourteen edible Myrtaceae fruits. **Food Chemistry**, v. 109, n. 4, p. 883–890, 2008.

RIBEIRO S. I.; MOTA M. G. C.; CORRÊA M. L. P. **Recomendações para o cultivo do camucamuzeiro no Estado do Pará**. Belém: Embrapa, 2002.

RUFINO, M. do S. M.; ALVES, R. E.; DE BRITO, E. S.; PÉREZ-JIMÉNEZ, J.; SAURA-CALIXTO, F.; MANCINI-FILHO, J. Bioactive compounds and antioxidant capacities of 18 non-traditional tropical fruits from Brazil. **Food Chemistry**, v. 121, n. 4, p. 996–1002, 2010.

RUFINO, M. S. M.; ALVES, R. E.; FERNANDES, F. A. N.; BRITO, E. S. Free radical scavenging behavior of ten exotic tropical fruits extracts. **Food Research International**, v. 44, n. 7, p. 2072–2075, 2011.

SINGLETON V. L.; ROSSI J. A. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. **American Journal of Enology and Viticulture**, v. 16, n. 3, p. 144–158, 1965.

SOUZA FILHO, M. *et al.* Physico-chemical and Sensory Characterization of Nectars from Native Fruits from the North and Northeast of Brazil: Exploratory study. **Brazilian Journal of Food Technology**, v. 5, p. 139–143, 2002.

VIDIGAL, M. C. T. R.; MINIM, V. P. R.; CARVALHO, N. B.; MILAGRES, M. P.; GONÇALVES, A. C. A. Effect of a health claim on consumer acceptance of exotic Brazilian fruit juices: Açaí (*Euterpe oleracea* Mart.), Camu-camu (*Myrciaria dubia*), Cajá (*Spondias lutea* L.) and Umbu (*Spondias tuberosa* Arruda). **Food Research International**, v. 44, n. 7, p. 1988–1996, 2011.

CHAPTER 03: CHEMICAL COMPOSITION OF MAIZE LANDRACES AND THEIR IMPORTANCE TO HUMAN HEALTH

Francisco Wilson Reichert Júnior ¹; Carlos Rafael Silva de Oliveira ²; Afonso Henrique da Silva Júnior ³; Jéssica Mulinari ⁴.

Abstract

Maize is one of the most cultivated cereals in the world, corresponding to up to 20% of the total calories consumed by humans. This species has great genetic diversity for plant, ear, and grain characteristics. Besides being a source of protein and carbohydrates, maize may be a source of other important compounds for human health, such as carotenoids with provitamin A activity. Thus, this review aims to present the importance of landrace varieties as a source of important chemical components for human health. Around 500,000 children worldwide suffer from health problems related to lack of vitamin A. A possible solution to increase the levels of provitamin A in the diet is the biofortification of maize. Landraces varieties of maize can be a tool for the biofortification of maize since they present great genetic variability for several characteristics, among them, higher levels of carotenoids predecessors of provitamin A than commercial varieties. Furthermore, landraces varieties can be an alternative for cultivation in needy communities, since they need less technological input for their cultivation. Thus, studies that seek to study the potential of landraces varieties for the biofortification of maize are essential.

Keywords: Maize landraces, Nutrition, Human health, Genetic resources.

Introduction

Maize is the species with the highest genetic diversity among cultivated crops, with a large number of varieties being identified. Besides, it has a great edaphoclimatic adaptation and can be grown at different altitudes and latitudes. Maize still presents great variability for quantitative and qualitative characteristics, such as reaction to diseases, productivity, the biochemical composition of grains, plant and cycle architecture (PATERNIANI et al., 2000; TEIXEIRA, 2008). This great adaptability allowed the species to spread throughout the national territory, being present in practically all the states of Brazil.

The genetic material available, also known as germplasm, is composed of a set of different types of maize such as sweet, common, or popcorn. Among each type of maize, there are landraces materials (local), improved populations, and exotic materials (NASS et al., 1993; ARAÚJO AND NASS, 2002). There are several terms for landraces, eg. local, traditional, ancient varieties, etc. Harlan (1975) described landrace varieties as populations made up of a mixture of genotypes in which all are reasonably well adapted to the region in which they evolved but present small differences in adaptations to particular conditions within the environment, such as reactions to diseases, pests, competition, abiotic stresses, and nutritional composition (ZEVEN, 1998). In maize, landraces varieties can vary widely in shape and color of grains, ranging from white to almost black.

ARAÚJO AND NASS, 2002). There are several terms for landraces, eg. local, traditional, ancient varieties, etc. Harlan (1975) described landrace varieties as populations made up of a mixture of genotypes in which all are reasonably well adapted to the region in which they evolved but present small differences in adaptations to particular conditions within the environment, such as reactions to diseases, pests, competition, abiotic stresses, and nutritional composition (ZEVEN, 1998). In maize, landraces varieties can vary widely in shape and color of grains, ranging from white to almost black.

Conserving genetic variability is important for maize, since the production of ancient and landrace cultivars, which is a way of preserving these materials, has been disappearing. This maintenance has been threatened by pressure on producers to adopt improved cultivars. Furthermore, the rural exodus threatens both agriculture and landraces materials themselves (CANCI et al., 2004). The substitution of landrace cultivars for commercial ones brought advantages to the producer, such as greater productivity and homogeneity, however, it brought some problems, among them the higher production costs and the reduction of nutritional quality.

Although much of the maize grain is composed of starch and proteins, there are several other substances, such as anthocyanins and carotenoids, normally related to pigmentation and found with greater abundance in landrace varieties. These compounds have received attention due to their human health benefits. Carotenoids are tetraterpenes, mainly responsible for the yellow and orange colorations of various vegetables. Carotenoids are known to benefit the activity of vitamin A. Anthocyanins are pigments responsible for the purple, blue and red stains in vegetables. Among the biological functions of anthocyanins, can be mentioned the anti-inflammatory, anticancer, and antioxidant activities, among others (CEVALLOS-CASALS, et al., 2004; HULSHOF et al., 2007; KUHNEN et al., 2011).

Landraces varieties are not only important for breeding but also have a great socioeconomic role. They are grown in practically the entire national territory, mainly in regions of the predominance of family farming or indigenous and quilombolas since they need less technological inputs, making the cultivation less costly (BARROS et al., 2010; SANDRI and TOFANELLI, 2008).

In this sense, the conservation of maize diversity is important not only for the species itself but also for the human being, since the diversity of landrace varieties contributes to a diversity of compounds important for human health. Thus, in this review, works that show the importance of Landrace varieties of maize to the human diet will be presented, as well as the compounds found in these varieties and their benefits for human nutrition and health.

Maize landraces

Maize is probably the cultivated species with the greatest genetic diversity (Figure 1). There are more than 300 known breeds and, within these, thousands of varieties. It is grown practically all over the globe, presenting materials adapted to the most diverse climates and regions: from altitudes of 2,500 m to sea level and latitudes varying from the extreme north to the extreme south. It is possible to observe this genetic variability for plant, ear and grain characteristics, size, cycle, the chemical composition of the grains, endosperm, and protein quality (PATERNIANI et al., 2000).

Landrace varieties are defined as varieties coming from species that occur *in situ*, composed of a group of plants within a taxon at the lowest known level, with genetic diversity developed or adapted by the indigenous population, traditional community or traditional farmers, including natural selection combined with human selection in the local environment, which is substantially different from commercial cultivars (BRAZIL, 2015). There are several cultures that present landrace varieties maintained by farmers, such as beans, rice, wheat, maize, among others.

These varieties are important for the breeding of crops, as they have a high potential for adaptation to specific environmental conditions. In general, landrace varieties are less productive than commercial cultivars. However, these materials have great genetic variability and constitute a source of genes that can be exploited in the search for resistance to biotic and abiotic factors, as well as a source of important health compounds (PATERNIANI et al., 2000; ARAÚJO and NASS, 2002; HWANG et al., 2016).

Figure 1. Diversity of Mexican landraces maize varieties.

Source: O'Leary, M. CIMMYT (2016).

The maize kernel is composed of three major parts: the pericarp is the outer layer of the kernel, protects the pericarp against moisture, and the attack of insects and microorganisms, one of the parts of the pericarp is the aleurone layer. The endosperm represents about 80% of the kernel's dry matter, it is the source of starch (energy) and protein for the germ when the seed is germinating. The germ is the only living part of the kernel, which contains the genetic information, vitamins, enzymes, and minerals for the kernel to develop into a maize plant (POMERANZ, 1982).

There are different forms and compositions of the maize grain endosperm that classify them into different types (Figure 2). According to Brown and Darrah (1985), among the main are:

- a) Dent maize: It is characterized by the presence of endosperm with hard starch on the sides and back of the grains, while from the center to the crown it is composed of soft or floury starch, which after drying produces a distinct indentation, in the form of a tooth. It is mainly used for animal feed, however, it is the raw material for many industrialized products and staple foods. Although more than 90% of its production is destined for animal feed, this type of Maize enters several specialized products through the milling industry. It can reach the market at a high price for certain products due to its whiter starch.
- b) Flint maize: This type of maize has a thick and hard endosperm with vitreous starch and a small portion of soft starch in the center. The grains are generally round and smooth. They present better development in temperate regions and are mostly grown in South America (such as Argentina) and southern Europe, where they are used for typical dishes.
- c) Popcorn: It is probably the oldest type of maize. It is characterized by an extremely hard endosperm, with only a small portion of soft starch in the center. It is practically a flint maize with small grains. The beans can be pointed or round. It is characterized by the expansion of the endosperm when heated, breaking the pericarp, and exposing the starch. It is mainly used for human consumption as a snack.
- d) Sweet maize: It is characterized by a maize that has mutant recessive genes that alter the synthesis of starch in the endosperm, accumulating sugars. When dry, it presents a wrinkled appearance. Among the main mutant genes related to these characteristics are sugary (*su*), shrunken -2 (*sh2*), and Brittle (*bt*). It is mainly used in the production of canned foods and the sale as fresh maize.

- e) Flour maize: It presents endosperm with almost entirely soft starch. When dry it shrinks completely evenly and does not form the indentation. When dry, they are easy to mill, however, it molds easily when maturing in more humid regions. Its cultivation is more common in the Andean regions of South America.

Figure 2. Endosperm distribution and major parts in five types of maize kernels

Source: Adapted from Dickerson, (2003).

All of these types of maize have landrace varieties being grown in different places on the planet, including Brazil. In 2013, after conducting a diversity census in the Far West region of Santa Catarina, 1513 local maize populations were found, 1078 of popcorn maize, 337 of dent maize, 61 of sweet maize, and 37 of farinaceous maize. Among the main uses described by farmers, features of agronomic and culinary interest were highlighted, where producers described the preference for landrace maize in the production of typical dishes and family food (COSTA et al. 2016).

These landrace varieties have been widely cultivated independently across the country and have socioeconomic importance for family farming systems (CARVALHO et al., 2004). Thus, the conservation of landrace varieties of maize is associated with the way of cultivation of several families of small farmers in Brazil.

Grain composition and health benefits

The average bromatological and micronutrient composition of the sweet, popcorn and dent grains of commercial cultivars is shown in Table 1. As the composition of the farinaceous and flint grains are similar to those of the dent grains, they were not included in the table.

Table 1. Average bromatological and micronutrient composition of popcorn, sweet and dent maize (quantity in 100 g).

Maize type	Protein	Lipid	Fiber	Carbohydrates	Sugars
Dent	10.35 g	5.20 g	7.0 g	75.90 g	0 g
Popcorn (popped)	12.90 g	4.50 g	14.5 g	77.50 g	0.90 g
Sweet	3.15 g	1.00 g	2.0 g	15.80 g	6.30 g
Maize type	P	K	Mg	Fe	Zn
Dent	300.0 mg	325.0 mg	108.0 mg	5.0 mg	4.5 mg
Popcorn (popped)	300.0 mg	250.0 mg	80.0 mg	2.5 mg	0.10 mg
Sweet	275.0 mg	270.0 mg	37.0 mg	0.50 mg	0.45 mg

Source: USDA (2020); FAO (2020).

In a 100 g portion, dent maize has 7.3 g of fiber, sorghum 6.7 g, wheat 13.1 g, popcorn 14.4 g, and oat 10.1 g. Regarding protein, maize has 10.34 g, sorghum 10.62 g, wheat 9.61 g, and popped popcorn 12.89 g. As for iron, maize has 2.71 mg, sorghum 3.36 mg, wheat 3.71 mg, roasted meat 0.56 mg, egg 1.56 mg, and popped popcorn 3.19 mg (USDA, 2020). The main differences in the composition of the grains are related to differences in the shape of the grain and the composition of the endosperm. In the case of popcorn, in a 100 g portion, it has more protein than the main cereals, more iron than eggs and meat and more fiber than oat. Showing the nutritional validity of this snack.

The protein contents and other components of the grain may vary depending on the genotype and the environment. Uarrota et al. (2013), working with eight landrace varieties of maize, found protein levels ranging from 7.04 to 11.59 g per 100 g of grains, while lipids ranged from 3.01 to 5.53 g. These values are relevant when compared to studies using commercial hybrids that found values of protein that ranged from 5.7 to 8.9 g (ERICKSSON et al., 2001; SCHULZ and BARANSKA, 2007).

Maize is the raw material for food, feed, and many industrialized products, ranging from textile products to the pharmaceutical industry. Maize represents about 15% of total proteins and 20% of all calories in human food (FAO, 1992), in addition to being a source of carotenoids (VALLABHANENI et al., 2010; KUHNEN, et al., 2011; MESSIAS et al., 2014). However, the main effort currently concerning the importance of maize in the human diet is in the biofortification of this crop, mainly in aspects related to vitamin A and micronutrients such as zinc and iron (BOUIS AND SALTZMAN, 2017).

Concerning the micronutrients, biofortification efforts have been carried out to increase

the levels of minerals in the grains. Zinc, for example, has a fundamental role in antioxidant and DNA repair functions, and its deficiency can increase the risk of cancer (MAFRA, 2005; MESSIAS et al., 2013). Maize has an average zinc content of $20 \mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$, approximately 40% of the daily requirement for children and lactating mothers (CAKMAK, 2008), requiring the consumption of approximately 350g of maize per day to achieve that 40%. Bänzinger and Long (2000) showed the potential of landrace varieties to increase the levels of minerals in maize. When evaluating 1,814 varieties of maize, they found zinc values reaching $57.6 \mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$. The potential of a large part of the maize germplasm is still unknown, making its characterization essential to find characteristics of interest.

Concerning pigments, landrace maize may be an important alternative in the search for genotypes with higher levels of carotenoids. These compounds are the main source of yellow-orange pigments in plants and are classified into xanthophylls (lutein, β -cryptoxanthin, and zeaxanthin), derivatives of oxygenated hydrocarbons and carotenes (β -carotene and α -carotene). Some of these substances, such as lutein and zeaxanthin, have antioxidant properties and about 50 carotenoids have provitamin A activity. Provitamin A is linked to several essential functions in the body, such as reproductive functions, vision, growth, and immunity, besides presenting anti-cancer effects, preventing macular degeneration and reducing the risk of diabetes (JASWIR et al., 2011; RODRIGUES-AMAYA, 1997; KOUSHAN et al., 2013; KUHNEN et al., 2011; HWANG et al., 2016).

Although these compounds are present in fruits and vegetables, their presence in grains, such as maize, is of major relevance and should be emphasized due to the importance of this cereal in the human diet worldwide, especially in regions with lower human development indexes, such as some regions of Brazil, Africa and Asia (ZUMA et al., 2018). Besides, there is evidence that indicates that the human consumption of plant metabolites such as carotenoids is below ideal, mainly in poor regions. Another problem is the focus of breeding programs that emphasize, for the most part, productivity as opposed to grain quality, while, due to its importance in the diet, grain quality should be among the priorities. Since maize has good levels of secondary compounds and there is the possibility of increasing its micronutrient levels to combat the deficiency of these nutrients, maize has gained great interest in biofortification programs (ZHU et al., 2008; MESSIAS et al., 2014).

The vast majority of commercial maize varieties grown in the world have values of provitamin A pigments, such as carotenoids, of around $2 \text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ (HARJES et al., 2008). Based on this and the increased demand for more nutritious and functional foods, landrace varieties can be a source of genes for increasing the levels of carotenoids due to their genetic variability

for several characteristics (MESSIAS et al., 2014). Table 2 shows studies evaluating landrace varieties and lines of maize regarding their carotenoid content.

Table 2. Content of some of the carotenoids found in studies with landrace varieties and lines of maize.

Authors	No. of varieties	Range (mg·kg ⁻¹)		
		Zeaxanthin	Lutein	β-Cryptoxanthin
(KUHNEN et al., 2011)	26 landraces	0.07 - 10.7	0.03 - 3.69	0.01 - 0.10
(HWANG et al., 2016)	2 landraces (different locations)	0.05 - 14.90	0.12 - 24.99	0.08 - 8.83
(MENKIR et al., 2017)	477 lines in 2014 and 496 in 2016	0.0 - 42.8	0.0 - 52.9	0.1 - 9.6
(PILLAY et al., 2011)	F2 of different colors	0.09 - 11.8	1.1 - 19.1	0.01 - 5.4
(SWARNO et al., 2014)	127 inbred lines	2.77 - 14.88	0.01 - 7.22	1.65 - 9.71

The range between varieties it is mainly related to genetic and environmental factors. The same variety can present different values in contents of chemical components due to the change of environment. In the research by Sweley et al. (2012) when studying the effect of hybridity and the environment on biochemical and physical characteristics of popcorn, found that both influenced significantly, having the environment more prominently influenced the mineral composition of grains of popcorn. Changes in the mineral composition of the grains are largely related to the type of soil and availability of nutrients. Thus, studies that evaluate genetics and in which environments each variety best expresses its components are essential for cultivation and use indications (FAO, 1992).

Since maize is one of the most cultivated species in the world, it can be an alternative in places where the consumption of fruits and vegetables is not enough to supply the need for provitamin A compounds. Vitamin A deficiency (VAD) is considered a serious problem in more than 60 countries, mainly in Africa and Asia. The World Health Organization reported that about 250 million preschool children are affected by VAD worldwide. Among the main problems related to hypovitaminosis A is the degeneration of the optic system, leading about half a million children to blindness in pre-school age (WHO, 200?). The great genetic variability of maize for the levels of carotenoids, as shown in Table 2, can be one of the tools to find genes

that can be used in breeding programs to increase the levels of provitamin A in cereals (HARJES et al., 2008; WURTZEL et al., 2012).

Since carotenoids are closely related to grain color, it is necessary to understand how it works and how this characteristic is regulated. The yellow color and its variations are related to the carotenoid metabolic pathway, while the red and purple colors are related to the anthocyanin biosynthesis. The white color is produced by the lack of pigments from any of the previous paths. The production of these colors requires numerous genes, from structural to regulatory genes. Only the genes related to carotenoids can express the coloring on the endosperm, while anthocyanins are related to pigmentation of the pericarp, more specifically the aleurone. These interactions can be seen in pigment extraction studies. For example, when working with landraces of maize in southern Brazil, Kuhn et al. (2011) identified that the varieties in which the carotenoids were responsible for the coloring (such as Língua de Papagaio and Palha Roxa) have low amounts of anthocyanins, having pigmented endosperm and colorless pericarp, while varieties with less pigmentation in the endosperm (such as Roxo 29 and Roxo 41) have greater amounts of anthocyanins, having colorless endosperm and pigmented pericarp. The main genes related to the final color of the grain and their combinations are shown in Table 3 (FORD, 2000).

Table 3. Summary of genes related to maize grain color.

Gene Type	Symbol	Gene Name	Symbol	Phenotype	Metabolic Pathway
Color Gene	<i>Pr</i>	Red	<i>Pr1</i>	Purple aleurone	Anthocyanin
		Aleurone1			
	<i>pr</i>		<i>pr1</i>	Red aleurone	
Color Gene	<i>R</i>	Colored1	<i>R1(R-r)</i>	Colored aleurone	Anthocyanin
	<i>r</i>		<i>R1 (r-r)</i>	Colorless aleurone	
Color Gene	<i>C^l</i>	Colored	<i>C1-I</i>	Colorless aleurone	Anthocyanin
		Aleurone1			
	<i>C</i>		<i>C1</i>	Colored aleurone	
	<i>c</i>		<i>c1</i>	Colorless aleurone	
Color Gene	<i>Y</i>	White1	<i>Y1</i>	Yellow endosperm	Carotenoid
	<i>y</i>		<i>y1</i>	White endosperm	

Source: Ford (2000).

While the final color of the grains is related to four major genes, carotenoid biosynthesis consists of several steps governed by several genes. For the biofortification of maize, it is

necessary to understand the biochemical synthesis and identify the main genes involved in the biosynthesis of provitamin A (MAQBOOL et al., 2018). Typically, characteristics like these are governed by more than one gene, being considered quantitative characteristics, which are more complex to work in breeding programs. However, identifying this quantitative effect is essential to find out which genes are linked to this trait and which is the best breeding method to adopt.

Thus, the search for potential genes involved in the production of provitamin A is essential (MAQBOOL et al., 2018). A summary of the carotenoid biosynthesis is shown in Figure 3. Carotenoid biosynthesis is composed of several key points that are governed by different enzymes/genes, among them: phytoene synthase 1 (*PSY*), phytoene desaturase (*PDS*), ζ -carotene desaturase (*ZDS*), lycopene β -cyclase (*LCYB*), lycopene ϵ -cyclase (*LCYE*) and β -carotene hydroxylase 1 (*CRTRB1*). In addition to identifying the genes, understanding the production efficiency of provitamin A is also important, since different genes can have different production efficiencies.

Figure 3. Summary of carotenoid synthesis. Enzymatic reactions are represented by arrows. Dotted lines indicate that there are steps not shown.

Source: MESSIAS et al. (2014).

Messias et al. (2014), studying landrace varieties of maize, observed that the levels of carotenoids ranged from 10.03 to 61.50 $\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$, with the highest levels in yellow-orange varieties. Furthermore, they identified that the expression of PSY1 (phytoene synthase) showed a positive correlation with the total content of carotenoids, and they also identified two varieties with potential for biofortification of maize to provitamin A. Harjes et al. (2008) found a positive correlation between the gene LCYE and the levels of β -carotene and β -cryptoxanthin in maize. Yan et al. (2010) observed a correlation between the CRTRB1 gene and the increase in β -carotene and its subsequent conversion to β -cryptoxanthin and zeaxanthins. Studies like these show the importance of genetic variability in the search for genes of interest for the improvement and biofortification of the species.

Final Consideration

Since maize is a crop of world importance in human nutrition, the conservation of the genetic diversity of this species is essential for its adaptation to climate changes, food supply and food security. In the case of maize biofortification, especially for provitamin A, landrace varieties are an important source of genes. Also, this varieties are important source of food and economic income for many small farmers, being used for food and feed in their farms. Thus, the conservation of these materials is fundamental for the maintenance of the genetic diversity of the species and also for breeding in search of characteristics of interest to the human being.

References

ARAÚJO, P. M.; NASS, L. L. Caracterização e avaliação de milho crioulo. **Scientia Agrícola**, v. 59, p. 589-593, 2002.

BÄNZINGER, M.; LONG, J. The potential for increasing the iron and zinc density of maize through plant-breeding. **Food and Nutrition Bulletin**. v.21, p.397-400, 2000.

BARROS, L. B.; MOREIRA, R. M. P.; FERREIRA, J. M. Phenotypic, additive genetic and environment correlations of maize landraces populations in family farm systems. **Scientia Agrícola**. v. 67, p. 685-691, 2010.

BOUIS, H. E.; SALTZMAN, A. Improving nutrition through biofortification: A review of evidence from HarvestPlus, 2003 through 2016. **Global Food Security**. v. 12, p.49-58, 2017.

BRAZIL. Lei Nº 13.123, de 20 de maio 2015. Regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3o e 4o do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto no 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga

a Medida Provisória no 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras **providências**. Brasília, DF, 2015.

BROWN, W. L.; DARRAH, L. L. Origin, Adaptation, and Types of Corn. **National Corn Handbook**. 1985, 6p.

CAKMAK, I. Enrichment of cereal grains with zinc: Agronomic or genetic biofortification? **Plant Soil**. v.302, p.1–17, 2008.

CANCI, A.; GUADAGNIN, C. A.; GUADAGNIN, C. M. I. **A diversidade das espécies crioulas em Anchieta – SC: Diagnóstico, resultado de pesquisa e outros apontamentos para a conservação da agrobiodiversidade**. São Miguel do Oeste: Mclee, 2004, 112p.

CARVALHO, V. P.; RUAS, C. F.; FERREIRA, J. M.; MOREIRA, R. M. P.; RUAS, P. M. Genetic diversity among maize (*Zea mays* L.) landraces assessed by RAPD markers. **Genetics and Molecular Biology**. v.27, p.228-236, 2004.

CEVALLOS-CASALS, B. A.; CISNEROS-ZEVALLOS, L. Stability of anthocyaninbased aqueous extracts of Andean purple corn and red-fleshed sweet potato compared to synthetic and natural colorants. **Food Chemistry**. v.89, p.69–77, 2004.

COSTA, F. M.; SILVA, N. C. D. A.; OGLIARI, J. B. Maize diversity in southern Brazil: indication of a microcenter of *Zea mays* L. **Genetic Resources and Crop Evolution**, v. 64, p. 681-700, 2016.

DICKERSON, G. W. Specialty Corns. **New Mexico State University**. 2003. Available in: https://aces.nmsu.edu/pubs/_h/H232.pdf. Access in July, 2020.

ERIKSSON, L.; JOHANSSON, E.; KETTANEH-WOLD, N.; WOLD, S. **Multi-and megavariate data analysis. Principles and applications** (2nd ed.). Umea, Sweden: Umetrics Academy. 2001.

FAO – **Food and Agriculture Organization** – Maize in human nutrition. 1992. Available in: < <http://www.fao.org/3/T0395E/T0395E03.htm> > Access in: June 2020.

FORD, R. Inheritance of Kernel Color in Corn: Explanations & Investigations. **The American Biology Teacher**. v.62, p.181-188, 2000.

HARJES, C.E.; ROCHEFORD, T. R.; BAI, L.; BRUTNELL, T. P.; VALLABHANENI, R.; WILLIAMS, M.; WURTZEL, E. T.; KANDIANIS, C. B.; SOWINSKI, S.G.; STAPLETON, A. E.; YAN, J.; BUCKLER, E. S. Natural genetic variation in lycopene epsilon cyclase tapped for maize biofortification. **Science**. v.319, p.330–333, 2008.

HARLAN, J.R. Our vanishing genetic resources. **Science**, v. 188: 618–621, 1975.
HULSHOF, P. J. M.; KOSMEIJER-SCHUIL, T.; WEST, C. E.; HOLLMAN, P. C. H. Quick screening of maize kernels for provitamin A content. **Journal of Food Composition and Analysis**. v.20, p.655–661, 2007.

HWANG, T.; NDOLO, V. U.; KATUNDU, M.; NYIRENDA, B.; BEZNER-KERR, R.; ARNTFIELD, S.; BETA, T. Provitamin A potential of landrace orange maize variety (*Zea*

mays L.) grown in different geographical locations of central Malawi. **Food Chemistry**. v.196, p.1315-1324, 2016.

JASWIR, I.; NOVIENDRI, D.; HASRINI, R. F.; OCTAVIANTI, F. Carotenoids: Sources, medicinal properties and their application in food and nutraceutical industry. **Journal of Medicinal Plants Research**. v.5, p.7119–7131, 2011.

KOUSHAN, K.; RUSOVICI, R.; LI, W.; FERGUSON, L. R.; CHALAM, K. V. The role of lutein in eye-related disease. **Nutrients**. v.5, p.1823–1839, 2013.

KUHNEN, S.; LEMOS, P. M. M.; CAMPESTRINI, L.H.; OGLIARI, J. B.; DIAS, P. F.; MARASCHIN, M. Carotenoid and anthocyanin contents of Brazilian maize landraces. **Journal of the Science of Food and Agriculture**, v. 91, p. 1548-1553, 2011.

MAFRA, A. G. F. D. Zinc and cancer: a review. **Revista saúde**. v.1, p.144-156, 2005
MAQBOOL, M. A.; ASLAM, M.; BESHIR, A.; KHAN, M. S. Breeding for provitamin A biofortification of maize (*Zea mays* L.). **Plant Breeding**. v. 137, p.451-469, 2018.

MENKIR, A.; DIXON, B. M.; MENGESHA, W.; ROCHEFORD, T.; ALAMU, E. O. Accruing genetic gain in pro-vitamin A enrichment from harnessing diverse maize germplasm. **Euphytica**. v.213, p. 1-12, 2017.

MESSIAS, R. S.; GALLI, V.; SILVA, S. D. A.; ROMBALDI, C. V. Carotenoid Biosynthetic and Catabolic Pathways: Gene Expression and Carotenoid Content in Grains of Maize Landraces. **Nutrients**. v.6, p. 546-563, 2014.

MESSIAS, R. S.; GALLI, V.; SILVA, S. D. dos A.; SCHIRMER, M. A.; ROMBALDI, C. V. Micronutrient and functional compounds biofortification of maize grains. **Food Science and Nutrition**. v.1, p1-60, 2013.

NASS, L.L.; PELLICANO, I.J.; VALOIS, A.C.C. Utilization of genetic resources for maize and soybean breeding in Brazil. **Brazilian Journal of Genetics**, v.16, p.983-988, 1993.

O'LEARY, M. Maize: From Mexico to the world. CIMMYT – **International Maize and Wheat improvement center**. 2016 Available in < <https://www.cimmyt.org/blogs/maize-from-mexico-to-the-world/>> Access in: June 2020.

PATERNIANI, E.; NASS, E.; SANTOS, M. X. O valor dos recursos genéticos de milho para o Brasil – uma abordagem histórica da utilização do germoplasma. In: UDRY, C. V.; DUARTE, W. (Org.) **Uma história brasileira do milho – o valor dos recursos genéticos**. Brasília: Paralelo 15, 2000. p. 11- 42.

PILLAY, K.; SIWELA, M.; DERERA, J.; VELDMAN, F. J. Provitamin A carotenoids in biofortified maize and their retention during processing and preparation of South African maize foods. **Journal Food Science Technology**. p.1-11, 2011.

POMERANZ, Y. Grain Structure and End-Use Properties. **Food Structure**. v.1, p.107-124, 1982.

RODRIGUEZ-AMAYA, D. B. **Carotenoids and food preparation: the retention of**

provitamin A carotenoids in prepared, processed and stored foods. Office of Health and Nutrition, U.S. Agency for International Development. Washington, DC, 1997.

SANDRI, C. A.; TOFANELLI, M. B. D. Milho Crioulo: Uma Alternativa para Rentabilidade no Campo. **Pesquisa Agropecuária Tropical**. v. 38, p. 59-61, 2008.

SCHULZ, H.; BARANSKA, M. Identification and quantification of valuable plant substances by IR and Raman spectroscopy. **Vibrational Spectroscopy**. v.43, p.13-25, 2007.

SWARNO, W. B.; PIXLEY, K. V.; ROJAS, N. P.; KAEPLER, S. M.; BABU, R. Formation of Heterotic Groups and Understanding Genetic Effects in a Provitamin A Biofortified Maize Breeding Program. **Crop Science**. v.54, p.14-24, 2014.

SWELEY, J. C.; ROSE, D. J.; JACKSON, D. S. Hybrid and environment effects on popcorn kernel physiochemical properties and their relationship to microwave popping performance. **Journal of Cereal Science**. v. 55, p. 188-194, 2012.

TEIXEIRA, F. F.; Milho Cultivado no Brasil e banco de germoplasma – uma forma de classificação da variabilidade genética, **EMBRAPA**, Comunicado Técnico, 2008, 11p.

UARROTA, V. G.; AMANTE, E. R.; DEMIATE, I. M.; VIEIRA, F.; DELGADILLO, I.; MARASCHIN, M. Physicochemical, thermal, and pasting properties of flours and starches of eight Brazilian maize landraces (*Zea mays* L.). **Food Hydrocolloids**. v.30, p.614-624, 2013.

USDA – U.S. Department of Agriculture. FoodData Central. Available in: <https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/396830/nutrients>. Access in: June 2020.

VALLABHANENI, R.; BRADBURY, L.M.; WURTZEL, E.T. The carotenoid dioxygenase gene family in maize, sorghum, and rice. **Arch. Biochem. Biophys.** v. 504, p.104–111, 2010.

WHO – World Health Organization – Micronutrients deficiencies. 200? Available in: <<https://www.who.int/nutrition/topics/vad/en/>> Access in: June 2020.

WURTZEL, E. T.; CUTTRIS, A.; VALLABHANENI, R. Maize provitamin A carotenoids, current resources, and future metabolic engineering challenges. **Frontiers in Plant Science**. v.3, p.1-12, 2012.

YAN, J. B.; KANDIANIS, C. B.; HARJES, C. E.; BAI, L.; KIM, E. H.; YANG, X. H.; SKINNER, D. J.; FU, Z. Y.; MITCHELL, S.; LI, Q.; FERNANDEZ, M. G. S.; ZAHARIEVA, M.; BABU, R.; FU, Y.; PALACIOS, N.; LI, J. S.; DELLAPENNA, D.; BRUTNELL, T.; BUCKLER, E. S.; WARBURTON, M. L.; ROCHEFORD, T. Rare genetic variation at *Zea mays* crtRB1 increases betacarotene in maize grain. **Nat. Genet.** 42, 322–327. 2010.

ZEVEN, A. C. Landraces: A review of definitions and classifications. **Euphytica**. v. 104, p. 127-139, 1998.

ZHU, C.; NAQVI, S.; BREITENBACH, J.; SANDMANN, G.; CHRISTOU, P.; CAPELL, T. Combinatorial genetic transformation generates a library of metabolic phenotypes for the carotenoid pathway in maize. **Proc. Natl. Acad. Sci.** v.105, p.18232–18237, 2008.

ZUMA, M. K.; KOLANISI, U.; MODI, A. T. The Potential of Integrating Provitamin A-Biofortified Maize in Smallholder Farming Systems to Reduce Malnourishment in South Africa. **Environmental Research and Public Health**. v.15, p.1-12, 2018.

CAPÍTULO 04: ELABORAÇÃO DE BRIGADEIRO FUNCIONAL DE BATATA-DOCE, COLÁGENO, AVEIA EM PÓ E QUINOA

CHAPTER 04: ELABORATION OF FUNCTIONAL BRIGADEIRO OF SWEET POTATO, COLLAGEN, OAT IN POWDER AND QUINOA.

Flávia Pederiva Ferreira¹; Sumária Sousa e Silva²; Raquel Aparecida Loss³; Giorgio Ferreira Guedes⁴; Sumaya Ferreira Guedes⁵

Resumo

O doce brigadeiro é um produto de origem brasileira, muito apreciado independente de idade. Diante disso, foi desenvolvida a formulação de brigadeiro à base de batata-doce, com adições de colágeno, quinoa e aveia em pó, um produto inovador e funcional, de alto valor energético, pensando em uma dieta mais saudável, utilizando dois tipos diferentes de leite condensado (zero açúcar e de soja). Os brigadeiros foram formulados em triplicatas e submetidos a análise físico-química. Os brigadeiros que continham leite condensado zero açúcar apresentaram maiores teores de umidade, acidez, cinzas, proteínas em comparação com a formulação dos brigadeiros com leite condensado de origem vegetal. Apesar da diferença, formular o brigadeiro sem leite animal torna-se uma alternativa as pessoas que apresentam intolerância ou alergia a lactose. Portanto, os brigadeiros podem ser considerados como alimentos funcionais por conter em suas formulações, acréscimos de aveia, colágeno e quinoa, apresentando altos teores de proteínas, baixo teor de açúcares e propriedades funcionais associadas aos ingredientes utilizados nas formulações.

Palavras-Chaves: Batata-doce, alimentos funcionais, análises físico-químicas.

Abstract

The sweet brigadeiro is a product of Brazilian origin, much appreciated regardless of age. In view of this, the sweet potato brigadier formulation was developed, with additions of collagen, quinoa and powdered oats, an innovative and functional product, with high energy value, thinking about a healthier diet, using two different types of condensed milk (zero sugar and soy). The brigadeiros were formulated in triplicates and subjected to physical-chemical analysis. The brigadeiros that contained zero sugar condensed milk had higher contents of moisture, acidity, ash, proteins in comparison with the formulation of the brigadeiros with condensed milk of vegetable origin. Despite the difference, formulating brigadeiro without animal milk becomes an alternative for people who have lactose intolerance or allergy. Therefore, brigadeiros can be considered as functional foods because they contain in their formulations, additions of oats, collagen and quinoa, presenting high levels of proteins, low sugar content and functional properties associated with the ingredients used in the formulations.

Keywords: Sweet potato, functional foods, physicochemical analysis.

¹ Engenheira de Alimentos, Unemat, eng.flaviapederiva@gmail.com

² Química, Unemat, sumariasousa@gmail.com

³ Engenheira de Alimentos, Unemat, raquelloss@unemat.br

⁴ Zootecnista, Prefeitura de Rondonópolis, giorgozoo@hotmail.com

⁵ Doutora, Unemat, sumayaguedes@unemat.br

Introdução

O desenvolvimento de produtos com características funcionais são alternativas para os consumidores que procuram por alimentação e vida mais saudável. Essa procura está relacionada principalmente pela comprovação científica das relações existentes entre dieta e saúde, que visam proporcionar saúde e bem-estar (VIEIRA, PIERRE, 2018).

A definição de alimentos funcionais originou-se no Japão em 1980, devido ao desenvolvimento de alimentos que viessem a reduzir custos com a saúde pública devido à expectativa de vida no país ser alta. Os alimentos processados devem ter aparência semelhante aos alimentos convencionais, para serem utilizados como parte de uma dieta normal e precisam apresentar benefícios fisiológicos, reduzindo o risco de doenças crônicas e conservando as qualidades básicas nutricionais de cada alimento (SILVA et al., 2016).

Os alimentos funcionais são aqueles que possuem em suas composições, substâncias nutrientes ou não nutrientes, que promovem o melhoramento da saúde e bem-estar, além de prevenir o aparecimento de doenças degenerativas permitindo uma melhor qualidade de vida. (GUIMARÃES, OLIVEIRA, 2014). Alimentos funcionais também são aqueles que contêm nutrientes que fornecem energia, por exemplo, a batata-doce, um tubérculo rico em hidratos de carbono (MANIGLIA et al., 2015).

A batata-doce por nome científico *Ipomoea batatas*, é um tubérculo que se destaca pela facilidade de cultivo, baixa exigência no manejo, boa capacidade de produção em solos fracos, baixa incidência a pragas e baixo custo de produção. É uma planta pertencente à família das convolvuláceas, embora perene, é cultivada anualmente e apresenta característica de armazenar reservas nutritivas em suas raízes. Pode ser utilizada na alimentação humana, animal e como matéria-prima em indústrias alimentícias, papel, tecidos cosméticos e álcool carburante (CARMONA et al., 2015).

A batata-doce é cultivada em 111 países, aproximadamente 90 % da produção mundial são obtidos da Ásia, 5 % na África e 5 % no restante do mundo. A china é o maior produtor, com cerca de 100 milhões de toneladas por ano (MAINO et al., 2019).

A batata-doce é um dos tubérculos mais energéticos que existe na alimentação humana, devido à alta porcentagem de hidratos de carbono, ou seja, açúcares. Com isso é considerada um alimento de extrema importância para pessoas que desenvolvem diariamente esforços musculares prolongados. O hidrato de carbono ou açúcares é um dos componentes principais da alimentação utilizada pelo músculo durante esforços físicos. Quando um indivíduo ingere essa substância, ela se armazena nos depósitos musculares, que durante a atividade física é queimada, fornecendo energia necessária para os músculos (SÁNCHEZ et al. 2019).

De acordo com Barros et al, (2017), uma alimentação equilibrada até pode vir a suprir as necessidades energéticas, vitamínicas e hídricas em pessoas comuns, mas em pessoas que praticam atividades físicas regularmente a necessidade aumenta. Com isso, já que a atividade física é definida por diferenciadas intensidades, duração e frequência diária e semanal, deve-se considerar que para cada tipo de exercício físico, existem necessidades nutricionais e indicação para uso de suplementação específico.

Dessa forma, a substituição e/ou adição de ingredientes nos doces tradicionais tem se tornado alvo das indústrias alimentícias, que buscam o aprimoramento de seus produtos com a necessidade advinda do consumidor (CLAUDY et al. 2014). Entre os ingredientes do brigadeiro que podem ser substituídos, destaca-se, por exemplo, o leite condensado sem adição de açúcar, diminuindo o valor calórico, o leite condensado de soja, que não contém proteína animal, indicado para pessoas que possuem intolerância ou alergia a proteína do leite e o granulado de chocolate que pode ser substituído por grãos como o de quinoa que apresentam elevado teor de proteína (GRAF et al. 2015). A adição de aveia para aumentar o teor de fibras em conjunto com leguminosas como a batata-doce que podem ser acrescentadas, modificando as características nutricionais do produto e adequando-o como um alimento funcional (ALMEIDA et al. 2007).

Diante disso, foi desenvolvida a formulação de brigadeiro à base de batata-doce, com adições de colágeno, quinoa e aveia em pó, um produto inovador e funcional, de alto valor energético, pensando em uma dieta mais saudável, utilizando dois tipos diferentes de leite condensado.

Materiais e Métodos

Preparo das formulações

Todos os ingredientes foram adquiridos no comércio local do município de Barra do Bugres - MT. As batatas-doces logo após a aquisição foram higienizadas com sabão comercial em água corrente e imersas em hipoclorito de sódio a 10% (v/v) por 15 minutos. Posteriormente, foram cozidas em fogo brando por 20 minutos e triturada ainda quente (sem casca) com auxílio de liquidificador doméstico (TRON, Brasil) previamente sanitizado com álcool etílico 70 % (v/v).

Foram realizadas duas formulações de brigadeiros, apenas alterando o tipo de leite condensado. Em uma formulação foi adicionado leite condensado zero açúcar e na outra leite condensado de soja. As formulações utilizadas estão descritas na Tabela 1.

Tabela 1: Formulação dos brigadeiros.

Ingrediente	Formulação 1	Formulação 2
Leite condensado 0% açúcar (g)	100	----
Leite condensado de soja (g)	----	100
Margarina (g)	20	20
Aveia em pó (g)	50	50
Batata-doce sem casca (g)	200	200
Quinoa (g)	12,5	12,5
Colágeno (g)	15	15

Fonte: Própria (2020).

Em uma panela de aço inoxidável foi adicionado o leite condensado (soja ou zero açúcar), margarina, batata-doce e aveia em pó, na sua respectiva formulação apresentada na Tabela 1, homogeneizando e cozido em fogo brando até que a mistura desgrudasse do fundo da panela.

Após resfriar por aproximadamente 20 minutos, foram adicionados o colágeno e enrolados com formato redondo típico de brigadeiro e polvilhado em grãos de quinoa na superfície (Figura 1).

Figura 1. Brigadeiros de batata-doce com casca. A-Leite condensado de soja; B- Leite condensado zero açúcar.

Fonte: Própria (2020).

As formulações foram produzidas em triplicatas, submetidas para análises físico-químicas.

Análises físico-químicas

As análises físico-químicas de umidade, acidez, lipídios e resíduo mineral fixo (cinzas) foram realizadas de acordo com os métodos descritos por Lutz (2008). Os açúcares totais foram determinados de acordo com o método DNS (MALDONADE et al. 2013), as análises de fibras pelo método de Silva e Queiroz (2006) e as proteínas seguiram a metodologia de Detmann et

al. (2012). Todas as análises foram realizadas em triplicata para melhor confiabilidade dos resultados. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de comparação entre médias, teste de Tukey, com significância de 5 %. O tratamento dos dados foi feito por meio do *software Statistic* versão 7.0.

Resultados e Discussão

Foram avaliados sete parâmetros físico-químicos, como acidez total titulável, umidade, cinzas, proteínas, açúcares totais, fibras e lipídios. Os resultados obtidos se encontram compilados na Tabela 2 onde serão utilizados para comparar com as formulações de diferentes brigadeiros encontrados por outros autores, onde o brigadeiro de batata-doce “A” é a formulação com leite condensado zero açúcar e o que acompanha a letra “B”, o leite condensado de soja.

Tabela 2: Comparação dos valores físico-químicos obtidos das formulações de brigadeiros de batata-doce “A” e “B” outros tipos de brigadeiro encontrados na literatura.

Parâmetros F.Q.	Leite condensado zero açúcar	Leite condensado de soja	Tradicional ¹	Banana com aveia ¹	Cenoura ²
Acidez (%)	7,07±0,37 ^a	5,27±0,34 ^b	n.d.	n.d.	5,24
Umidade (%)	48,79±1,02 ^a	45,10±0,39 ^b	14,29	38,84	47,94
Cinzas	1,87±0,02 ^a	0,89±0,02 ^b	1,04	1,93	1,33
Proteínas (%)	20,08±2,09 ^a	15,33±0,89 ^b	7,34	2,87	6,88
Açúcares totais (%)	3,48±0,31 ^a	4,01±0,24 ^b	n.d.	n.d.	18,85
Fibra bruta (%)	0,88±0,09 ^a	0,88±0,09 ^a	0,33	3,12	3,03
Lipídios (%)	0,21 ^a	0,26 ^a	11,61	3,12	23,17

n.d. não determinado.

Fonte: Própria (2020). ¹CLAUDY et al. (2014); ²PEREIRA et al. (2012)
Valores com letras distintas, diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

A amostra de brigadeiro formulado com o leite condensado zero açúcar apresentou valor de acidez total titulável maior do que a com leite condensado de soja (Figura 2). Essa diferença pode ser explicada pelos componentes de composição de cada leite condensado. Segundo Embrapa (2015), as substâncias responsáveis pela acidez são os fosfatos, citratos, a caseína, albumina e o gás carbônico dissolvido no leite, caso a acidez se apresente mais elevada, indica que há maior teor de proteínas e minerais presentes, do que aqueles que se apresentam com

acidez mais baixas, como é o caso do leite condensado de soja.

Figura 2. Acidez total titulável. A- Leite condensado zero açúcar; B- Leite condensado de soja.

Fonte: Própria (2020).

Os valores de acidez determinados dos brigadeiros formulados são inferiores a acidez das raízes de batata-doce encontrados por Sánchez (2019) de 10,40 %, e próximo aos valores de Fontes et al. (2012) e Leonel e Cereda (2002) que foram 7,93 % e 7,93 %, respectivamente.

O valor reduzido da acidez dos brigadeiros contendo o leite condensando de soja pode ser explicado, através de sua formulação que é utilizado o regulador de acidez bicarbonato de sódio durante o preparo do extrato hidrossolúvel de soja e, conseqüentemente, altera os valores de acidez dos doces e produtos elaborados a base de soja (OLVEBRA, 2015).

Os valores de acidez das amostras do brigadeiro de batata-doce que continham o leite condensado zero açúcar se apresentaram próximas ao encontrado por Pereira et al. (2012) que em sua pesquisa formulou o brigadeiro de cenoura com o leite condensado tradicional e encontrou uma acidez de 5,74%. Dessa forma, este é mais um indicativo que a substituição do leite por extrato hidrossolúvel de soja (EHS) na fabricação do leite condensando influência na acidez dos produtos elaborados. De acordo com a tabela 2 as formulações A e B diferiram entre si pelo teste de Tukey a 5 % de significância.

A umidade encontrada para o brigadeiro formulado com leite condensado zero açúcar foi levemente superior a formulação com leite condensado de soja (Figura 3).

Figura 3. Umidade. A- Leite condensado zero açúcar; B- Leite condensado de soja.

Fonte: Própria (2020).

Leonel e Cereda (2002), em suas pesquisas encontraram uma umidade de 67,73 % para a batata-doce, já Roesler et al. (2008) encontrou 76,37 %. O decorrente decréscimo de umidade da batata-doce *in natura* em comparação com a formulação dos brigadeiros pode ser explicado pela adição de aveia nas formulações. De acordo com a tabela 2 as formulações A e B diferiram entre si pelo teste de Tukey a 5 % de significância.

O teor de cinzas nos brigadeiros variou conforme o tipo de leite condensado utilizado, sendo os teores maiores na formulação do leite condensado zero açúcar, fabricado com leite animal, em comparação com o de soja, fabricado com extrato hidrossolúvel vegetal (Figura 4). Segundo Silva e Queiroz (2006), os alimentos de origem animal, possuem maior valor em cinzas do que os vegetais. Isso explica a diferença entre o teor de minerais totais nas formulações, pois, as amostras com leite condensado zero açúcar é proveniente de fonte animal, no qual é rico em cálcio e fósforo (VALSECHI, 2001)

Figura 4. Teor de cinzas totais. A- Leite condensado zero açúcar; B- Leite condensado de soja.

Fonte: Própria (2020).

Leonel e Cereda (2012) analisaram a batata-doce e obtiveram um teor de minerais totais de 1,32 %. Andrade e Martins (2002), em suas pesquisas encontraram 2,08 % de cinzas, e Fontes et al. (2012) obteve um valor de 3,48 %. De acordo com Glóra (2009), o grau de maturação das batatas-doces em diferentes épocas de colheita, pode variar a composição delas. Portanto, a adição de batata-doce não influenciou nos resultados, visto que as batatas-doces para a formulação dos brigadeiros foram adquiridas de uma única localidade, e foram homogeneizadas durante a produção, dessa forma, a diferença de minerais totais nas formulações, se explica pelos diferentes leites condensados. De acordo com a tabela 2 as formulações A e B diferiram entre si pelo teste de Tukey a 5 % de significância.

Os teores de proteína para as formulações foram de $20,08 \pm 2,09$ % para formulação com leite condensado zero açúcar e $15,33 \pm 0,89$ % para formulação com leite condensado de soja (Figura 5). A diferença pode ser explicada pelo de leite condensado de diferentes fontes uma animal (com leite de vaca) e outra vegetal (extrato hidrossolúvel de soja).

Figura 5. Teor de proteínas. A- Leite condensado zero açúcar; B- Leite condensado de soja.

Fonte: Própria (2020).

Outro fator que pode ter contribuído para o aumento do teor de proteínas para as formulações dos brigadeiros em relação à batata-doce é a adição do colágeno em pó, uma proteína fibrosa, encontrada em todo o reino animal (SILVA e PENNA, 2013) que apresenta alto teor de proteína (Basso, et al 2013). A adição do grão quinoa também favorece o acréscimo no teor das proteínas, pois, segundo Spehar, (2006), a quinoa apresenta quantidade de proteína próxima a proteína do leite, no caso a caseína.

Claudy, et al. (2014), encontraram 2,87% de proteínas para o brigadeiro adicionado de aveia e banana e 7,34% quando analisaram o brigadeiro tradicional. Já Pereira, et al. (2012)

quando analisou o brigadeiro de cenoura encontrou um teor de proteínas de 6,88%. Os brigadeiros elaborados a partir de batata-doce com adições de quinoa e colágeno obtiveram valores de proteínas mais elevados do que os encontrados nas literaturas para outras formulações.

Portanto, os brigadeiros formulados a base de batata-doce se apresentaram com boa quantidade de proteína, podendo ser ingerido por pessoas que são praticantes de atividades físicas, pois as proteínas fortalecem os músculos, aumentam a resistência a doenças, previne anemia, aumenta a imunidade, melhora a saúde da pele, dos cabelos e das unhas (ALVARENGA, 2007). De acordo com a tabela 2 as formulações A e B diferiram entre si pelo teste de Tukey a 5 % de significância.

A amostra que se apresentou com maior teor de glicídios totais foi a que continha o leite condensado de soja, como mostra a Figura 6, devido a sua formulação, que não dispensa o açúcar durante a industrialização, diferente do leite condensado zero açúcar, em que o próprio nome já diz, não há adição de açúcares.

Figura 6. Açúcares totais. A- Leite condensado zero açúcar; B- Leite condensado de soja.

Fonte: Própria (2020).

Como a batata-doce é rica em carboidratos, alguns pesquisadores como Fontes et al. (2012) ao analisarem somente a mesma, encontraram 9,44 % para açúcares totais, já Glória (2009) obteve resultados de 6 % ao caracterizar raízes de batata-doce em diferentes meses de colheita.

Pereira et al. (2012), formulou o brigadeiro de cenoura, e obteve teor de açúcares totais de 18,85%. Os brigadeiros elaborados a partir de batata-doce apresentaram resultados inferiores aos encontrados pela literatura, possivelmente pelo fato de não terem sido realizados análises

de carboidratos complexos, tais como amido. De acordo com a tabela 2 as formulações A e B diferiram entre si pelo teste de Tukey a 5 % de significância.

Os resultados de fibra bruta estão descritos na Figura 7. A adição da aveia, que é um ingrediente considerado com elevado teor de fibras não influenciou no acréscimo de fibras aos produtos. Roriz (2012), em suas pesquisas sobre aproveitamento de resíduos de tubérculos para formulação de novos produtos, afirma que a adição de casca em seus produtos formulados a partir de resíduos se apresentaram com melhores teores de nutrientes e fibras, o que pode ter contribuído para os baixos resultados, uma vez que no preparo as cascas foram retiradas.

Figura 7. Fibra bruta. A- Leite condensado zero açúcar; B- Leite condensado de soja.

Fonte: Própria (2020).

Na determinação de fibra bruta, é utilizado ácidos e bases para isolá-la, na extração por ácidos, são removidos os açúcares, pectina e hemicelulose nos alimentos, já na básica são removidas as proteínas, pectinas e hemiceluloses remanescentes e parte da lignina. A fibra bruta consiste na retirada da maior parte de celulose com pequenas quantidades de lignina e hemicelulose, fato que não ocorre na determinação do teor de alimentar, método mais suave de análise (NEUMANN, 2002). Devido à falta de reagentes e dificuldades em laboratórios que realizem análise de fibra alimentar, foi realizada análise de fibra bruta, o que pode ter contribuído para resultados inferiores ao esperado. De acordo com a tabela 2 as formulações A e B não diferiram entre si pelo teste de Tukey a 5 % de significância.

Os valores de lipídios nas amostras dos brigadeiros variam de 0,21% a 0,26 %, os resultados encontrados para as formulações ficaram próximos um do outro, pode-se então concluir que os diferentes ingredientes não influenciaram no teor de lipídios dos doces elaborados (Figura 8).

Figura 8. Lipídios totais. A- Leite condensado zero açúcar; B- Leite condensado de soja.

Fonte: Própria (2020).

Claudy et al. (2014), encontrou 3,12 % de lipídios quando analisou o brigadeiro adicionado de aveia e banana, e 11,61 % para o brigadeiro tradicional, e Pereira et al. (2012), obteve um teor de lipídios de 23,17 % para o brigadeiro de cenoura. Portanto, os brigadeiros elaborados a partir de batata-doce se apresentaram com resultados inferiores aos encontrados pela literatura. De acordo com a tabela 2 as formulações A e B não diferiram entre si pelo teste de Tukey a 5 % de significância.

Conclusões

De acordo com os resultados obtidos, as maiores variações entre os resultados foram devido a diferença de leite condensado utilizado. Os brigadeiros que continham leite condensado zero açúcar, origem animal, em suas formulações apresentaram maiores teores de umidade, acidez, cinzas, proteínas em comparação com a formulação dos brigadeiros com leite condensado de origem vegetal. A diferença é associada a composição do leite e do extrato hidrossolúvel de soja utilizados na fabricação dos leites condensados, pois o leite animal (de vaca) apresenta maiores valores de minerais e proteínas.

Os açúcares totais se apresentaram baixos teores nas formulações contendo o leite condensado zero de açúcar, quando comparados as formulações contendo o leite condensado de soja, devido a adição de açúcares no leite condensado de soja.

Portanto, o brigadeiro de batata-doce é uma ótima opção para pessoas que possuem intolerância a lactose, quando formulados com o leite condensado de soja, e apresenta baixa quantidade de lipídios, que é um dos elementos evitados por pessoas que buscam uma alimentação equilibrada, e possui valor de proteína considerável. Os brigadeiros podem ser

considerados como alimentos funcionais por conter em suas formulações, acréscimos de aveia, colágeno e quinoa, apresentando altos teores de proteínas, baixo teor de açúcares e propriedades funcionais associadas ao uso de extrato hidrossolúvel vegetal.

Referências

- ALMEIDA, R. L. J. SANTOS, N. C. PEREIRA, T. S. SILVA, V. M. A. CAVALCANTE, J. A. PINHEIRO, W. S. RIBEIRO, V. H. A. SANTOS, I. A. BARROS, E. R. MUNIZ, C. E. S. **Composição centesimal e comportamento reológico do extrato de aveia (*Avena sativa*)**. Research, Society and Development, v. 9, n. 3, ISSN 2525-3409, 2020.
- ALVARENGA, G. **A importância dos nutrientes para uma vida saudável**. Disponível em <http://www.foreverliving.com.br/arqs/downloads/detalhe_1224594990_flp_cartilha_nutricao_20071214_web.pdf> Acesso em 14 de junho de 2015.
- ANDRADE, R. L. P. MARTINS, J. F. P. **INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE FÉCULA DE BATATA-DOCE (*Ipomoea batatas* L.) SOBRE A VISCOSIDADE DO PERMEADO DE SORO DE QUEIJO**. Ciênc. Tecnol. Alimen, Campinas, 22(3): 249-253, set-dez. 2002.
- BARROS, A. J. S. PINHEIRO, M. T. C. RODRIGUES, V. D. **CONHECIMENTOS ACERCA DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E CONSUMO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES POR PRATICANTES DE ATIVIDADES FÍSICA EM ACADEMIAS**. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, São Paulo. V. 11, n. 63. P.301-311. Maio/Jun. 2017. ISSN 1981-9927.
- BASSO, T. R., URNAU, R. M., BRANDALIZE, C. SIMÕES, M. R. **Extração e caracterização de colágeno obtido de peles do processamento de tilápia. III Encontro Paranaense de Engenharia e Ciência**. Toledo-Pr, 2013.
- CARMONA, P. AO. PEIXOTO, J. R. AMARO, G. B. MENDONÇA, M. A. **Divergência genética entre acessos de batata-doce utilizando descritores morfoagronômicos das raízes**. Horticultura Brasileira 33: 241-250. Abr. – jun. 2015.
- CLAUDY, L. SERBAI, D. SANTOS, E. F. MANHANI, M. R. SILVA, E. C. NOVELLO, D. **BRIGADEIRO ADICIONADO DE AVEIA E BANANA: CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL ENTRE CRIANÇAS**. Evidência, Joaçaba v. 14 n. 1, p. 35-46, jan/jun. 2014.
- DETMANN, E., SOUZA, M. A., FILHO, S. C. V., QUEIROZ, A. C., BERCHIELLI, T. T., SALIBA, E. O. S., CABRAL, L. S., PINA, D. S., LADEIRA, M. M., AZEVEDO, J. A. G. **Métodos para Análise de Alimentos. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Ciência Animal**. Visconde do Rio Branco, MG: Suprema, 2012.
- EMBRAPA, Disponível em: <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia8/AG01/arvore/AG01_194_21720039246.html> acesso em 12 de junho de 2015.
- FONTES, L. C. B. SIVI, T. C. RAMOS, K. K. QUEIROZ, F. P. C. **Efeito das condições operacionais no processo de desidratação osmótica de batata-doce**. **Revista Brasileira de**

Produtos Agroindustriais, Campina Grande, v.14, n.1, p.1-13, 2012.

GLÓRIA, Z. M. D. Caracterização físico-química e sensorial da batata-doce de Aljezur. Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior Agrária, Beja, 2009.

GRAF, B. L. SILVA, P. R. ROJO, L. E. HERRERA, J. D. BALDEÓN, M. E. RASKIN, I. **Innovation in Health Value and Functional Food Development of Quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd)**. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. Vol. 14, 2015.

GUIMARÃES, L. M. OLIVEIRA, D. S. **INFLUÊNCIA DE UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA LONGEVIDADE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS**. Interciência & Sociedade (ISSN: 2238-1295) – Vol. 3, N. 2, 2014.

LEONEL, M.; CEREDA, M. P. **Caracterização físico-química de algumas tuberosas amiláceas**. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, 22(1): 65-69, jan.-abr. 2002.

LUTZ, I. A. **Métodos físico-químicos para análise de alimentos**. 4. ed. 1. ed. digital. São Paulo, 2008.

MAINO, S. C. JÚNIOR, E. S. POZZO, D. M. D. SANTOS, R. F. SIQUEIRA, J. A. C. **BATATA-DOCE (*IPOMOEA BATATAS*) DENTRO DO CONTEXTO DE CULTURAS ENERGÉTICAS, UMA REVISÃO**. Revista Brasileira de Energias Renováveis, v.8, n.4, p.629-638, 2019.

MALDONADE, I. R., CARVALHO, P. G. B., FERREIRA, N.A. **Protocolo para determinação de açúcares totais em hortaliças pelo método de DNS**. Comunicado Técnico 85. ISSN 1414.9850, março, 2013.

MANIGLIA, F. P. PAGNANI, A. C. C. NASCIMENTO, G. G. Desenvolvimento de dieta enteral artesanal com propriedades funcionais. Rev. Bras. Nutr.Clin. 2015; 30 (1): 66-70.

NEUMANN, M. Avaliação, composição, digestibilidade e aspectos metabólicos da fibra. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002.

OLVEBRA <http://www.olvebra.com.br/loja/Secoes/Produtos.asp?proId=64> acesso em 11 de maio de 2015.

Pereira TS, Leite DDF, Vieira NF, Silva FS, Santos AF. Avaliação da qualidade físico-químicas e sensorial de brigadeiro de cenoura. In: Encontro Nacional de Educação, Ciência e Tecnologia/UEBP, 2012. Campina Grande. Anais... Campina Grande: EUPB, 2012.

ROESLER PVSO; GOMES SD; MORO E; KUMMER ACB; CEREDA MP. 2008. Produção e qualidade de raiz tuberosa de cultivares de batata-doce no Oeste do Paraná. Acta Scientiarum 30: 117-122.

RORIZ, R. F. C. Aproveitamento dos resíduos alimentícios obtidos das centrais de abastecimento do Estado de Goiás S/A para alimentação humana. Universidade Federal de Goiás, Escola de Agronomia de Engenharia de Alimentos, Programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Goiânia, 2012.

SÁNCHEZ, C. SANTOS, M. INIAV, P. V. Batata-doce branca, roxa ou alaranjada? Avaliação qualitativa e nutricional. Dossier Técnico. Instituto Nacional de Investigação

Agrária e Veterinária, I.P. Maio de 2019.

SILVA, A. C. C. SILVA, N. A. PEREIRA, M. C. S. VASSIMON, H. S. **Alimentos Contendo Ingredientes Funcionais em sua Formulação: Revisão de Artigos Publicados em Revistas Brasileiras.** Revista Conexão Ciência. Vol. 11, Nº 2, 2016.

SILVA, D. J., QUEIROZ, A. C. *Análise de Alimentos, Métodos Químicos e Biológicos.* 3ª reimpressão. Viçosa- MG 2006.

SILVA, I. P. Estudo de encapsulamento de substancias para produção de alimentos funcionais.

SILVA, T. F., PENNA, A. L. B. Colágeno: **Características químicas e propriedades funcionais.** *Rev Inst Adolfo Lutz.* São Paulo, 2012; 71(3): 530-9.

SPEHAR, C. R. **Adaptação da Quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.) Para incrementar a diversidade agrícola e alimentar no Brasil.** *Cadernos de Ciência & Tecnologia, Brasília,* v. 23, n. 1, p. 41-62, jan./abr. 2006.

VALSECHI, O. A. O leite e seus derivados. Tecnologia de produtos agrícolas e origem animal. Universidade Federal de São Carlos, centro de ciências agrárias, Departamento de tecnologia agroindustrial e socioeconômica rural. Araras-SP, 2001.

VIEIRA, L. G. PIERRE, F. C. **CONSIDERAÇÕES SOBRE TENDÊNCIAS E OPORTUNIDADES DOS ALIMENTOS FUNCIONAIS.** 7ª Jornada Científica e Tecnológica da Fatec de Botucatu. 29 de Outubro a 01 de Novembro de 2018, Botucatu – São Paulo, Brasil.

CAPÍTULO 05: AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ANTIOXIDANTE E ANTIMICROBIANA DE EXTRATOS DE FOLHAS DE MORINGA

CHAPTER 05: EVALUATION OF ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL CAPACITY OF MORINGA LEAF EXTRACTS

Marina Silva¹; Mabel Câmara Araújo²; Luciano Tormen³; Cátia Tavares dos Passos Francisco⁴; Eduarda Molardi Bairy⁵

Resumo

Moringa oleifera é uma planta originária da Índia conhecida por propriedades funcionais e medicinais. A utilização de solventes variados para obtenção de extratos, por extrair compostos distintos, pode resultar em comportamentos antioxidante e antimicrobiano diferentes. O objetivo do presente estudo foi avaliar capacidade antioxidante e antimicrobiana de extratos de folhas de *M. oleifera*, obtidos por decocção em água, extração hidroalcolica e em extrator Soxhlet com etanol. Os extratos foram avaliados quanto ao teor de compostos fenólicos pelo método de *Folin-Ciocalteu*, capacidade de sequestro do radical DPPH e pela capacidade de redução do íon férrico, bem como, atividade antimicrobiana por difusão em ágar testando bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Os rendimentos em massa dos extratos variaram entre 14,0 para extração hidroalcolica a 43,9% para decocção. A concentração de compostos fenólicos resultou de 26,6 a 36,5 mg ÁG g⁻¹. A capacidade de sequestro do radical DPPH variou de 29,9 a 64,9 mg Trolox g⁻¹. Com relação a capacidade de redução do íon férrico, foram obtidos resultados entre 67,7 e 138,5 mg Trolox g⁻¹. Os extratos não apresentaram ação antimicrobiana. A extração por decocção apresentou melhor rendimento e capacidade antioxidante. Assim, a capacidade antioxidante dos extratos está diretamente ligada às condições de extrações submetidas.

Palavras-Chaves: Moringa, folhas, extração, compostos fenólicos totais, antioxidante.

Abstract

Moringa oleifera is a plant originally from India, known for its functional and medicinal properties. The application of different solvents to obtain extracts can cause different antioxidant and antimicrobial effects due to the ability to extract different compounds. The objective of the present study was to evaluate the antioxidant and antimicrobial capacity of *M. oleifera* leaf extracts, obtained by water decoction, hydroalcoholic extraction and Soxhlet extractor with ethanol. The extracts were calculated according to the content of total phenolic compounds by the *Folin-Ciocalteu* method, the DPPH sequestration capacity and ferric ion reducing capacity, and antimicrobial activity by diffusion in agar, testing Gram-positive and Gram-negative bacteriae. The weight yield of the extracts varied between 14.0 for hydroalcoholic extraction to 43.9% for decoction. The concentration of total phenolic compounds resulted in 26.6 to 36.5 mg of AG g⁻¹. The DPPH sequestration capacity ranged from 29.9 to 64.9 mg of Trolox g⁻¹. Regarding the ferric reducing capacity, results were between 67.7 and 138.5 mg of Trolox g⁻¹. The extracts did not have antimicrobial action. Decoction extraction had better yield and antioxidant capacity. Thus, the antioxidant capacity of the extracts is directly linked to the extraction conditions.

¹ Engenharia de Alimentos, Universidade Federal da Fronteira Sul, marina15.06@hotmail.com

² Engenharia de Alimentos, Universidade Federal da Fronteira Sul, mabel.caraujo@gmail.com

³ Engenharia de Alimentos, Universidade Federal da Fronteira Sul, luciano.tormen@uffs.edu.br

⁴ Engenharia de Alimentos, Universidade Federal da Fronteira Sul, catia.passos@uffs.edu.br

⁵ Doutora, Universidade Federal da Fronteira Sul, eduarda.bairy@uffs.edu.br

Keywords: Moringa, leaves, extraction, total phenolic compounds, antioxidant.

Introdução

Moringa oleifera é a planta representante da família Moringaceae, originária da Índia com 14 espécies nativas, distribuída em países de clima tropical e introduzida no Brasil na década de 60 (BARRETO et al., 2009; MORTON, 1991). Suas folhas, flores, vagens, raízes e sementes são utilizadas para diversos fins, como coagulante natural para purificação da água (KALOGO et al., 2000), obtenção de biodiesel (RASHID et al., 2008), obtenção de extratos (RODRÍGUEZ et al., 2016; ZHAO et al., 2013), na medicina tradicional (ANWAR et al., 2007) e devido a presença de fitoquímicos e sua composição nutricional (AMAGLO et al., 2010; SAINI et al., 2016) tem enriquecido formulações alimentares (OYEYINKA et al., 2019; SAUCEDO et al., 2018).

As diferentes partes de *M. oleifera* apresentam rica composição de compostos bioativos (BARRETO et al., 2009; STOHS et al., 2015), sendo as folhas responsáveis por níveis consideráveis de compostos fenólicos, ácido ascórbicos, flavonoides, carotenoides, aminoácidos, esteróis e óleos essenciais (BARRETO et al., 2009; MOYO et al., 2011; NOUMAN et al., 2016; ÖZCAN, 2020). No entanto, a presença desses compostos pode variar dependendo do estágio de maturação da *M. oleifera* (SREELATHA et al., 2009), tipos de cultivares (NOUMAN et al., 2016), assim como métodos e condições de extrações (HAMANY et al., 2018; RODRÍGUEZ et al., 2015).

Durante o processo de obtenção dos extratos, há fatores que influenciam o extrato final, como tipo de solvente, método de extração utilizado, tempo, temperatura e pressão (AZMIR et al., 2013), o que pode levar a variações no rendimento e na composição (CELEP et al., 2019; DE SOUZA et al., 2018). A escolha de qual solvente orgânico utilizar durante o processo para obtenção de extratos a partir de matérias primas vegetais, devido a polaridade e a afinidade entre o solvente a matriz vegetal, é um dos principais fatores que influenciam na eficiência da extração (AZMIR et al., 2013), sendo necessário considerar também o custo, transferência de massa, toxicidade e disponibilidade para execução.

Métodos convencionais de extração, como o uso de equipamento Soxhlet com solventes orgânicos, são classificados em desvantagens, uma vez que podem causar danos ao meio ambiente, utilizam grande volume de solvente, alto custo, longo tempo de extração, baixa seletividade (HERRERO et al., 2015; OUÉDRAOGO et al., 2018), e também por degradarem compostos termolábeis de interesse presentes na matriz vegetal (DE SOUZA et al., 2018; GARCIA et al., 2010). Por outro lado, extrações utilizando condições sustentáveis são

consideradas benéficas (BOEING et al., 2014; CELEP et al., 2019; ROCCHETTI et al., 2020), uma vez que apresentam capacidade de extrair ampla gama de compostos bioativos, extratos seguros para aplicações alimentares e farmacêuticas, baixo custo e não causam danos ao meio ambiente (AZMIR et al., 2013; MARTINS et al., 2015).

Autores anteriores com estudos de folhas de *M. oleifera*, relataram diferentes formas para obtenção de extratos, como métodos de extração por infusão hidrometanólica 70% (NOUMAN et al., 2016), maceração, decocção, extração assistida por ultrassom e microondas com o uso de água (CASTRO et al., 2017) e maceração e extração assistida por ultrassom com o uso de metanol, etanol e acetona como solvente (RODRÍGUEZ et al., 2015). Os trabalhos de Zhao et al. (2013) e Rodríguez et al. (2016) avaliaram as condições de extração de folhas de *M. oleifera*, composição dos extratos, a presença de compostos fenólicos totais, atividade antioxidante, e, relataram que há variações na composição final e quantidade de compostos bioativos presentes nos extratos, dependendo do método e do solvente de extração utilizado. Outro estudo sobre extração de compostos fitoquímicos de partes aéreas de *M. oleifera* por tecnologias não convencionais, Hamany et al. (2018) relataram que extrações utilizando solventes sustentáveis e condições de pressão e temperatura, são eficientes para extrair ampla gama de compostos, sendo estes, responsáveis pelas características bioativa da planta (ANWAR et al., 2007; FAROOQ et al., 2020; HAMANY et al., 2018; SAUCEDO et al., 2018).

Desta forma, o objetivo principal do presente estudo foi obter extratos de folhas de *M. oleifera* utilizando extração convencional por Soxhlet com etanol, extração hidroalcóolica e por decocção com água. Os extratos obtidos foram avaliados quanto ao rendimento em peso, quantificação de compostos fenólicos totais (CFT), capacidade de sequestro do radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH), redução de íon férrico 2,4,6-tri(2-piridil)-s-triazina (TPTZ) e, atividade antimicrobiana para bactérias Gram-positivas e Gram-negativas.

Material e Métodos

Material vegetal

As partes aéreas da *Moringa oleifera* foram obtidas na região oeste do Paraná, Brasil, por doação. As folhas (Figura 1) foram lavadas com água corrente, sanitizadas com solução de hipoclorito (100 ppm) e secas em estufa com circulação de ar forçado a 323,15 K até massa constante. Após as folhas foram trituradas em processador de alimentos doméstico durante 30 minutos, seladas à vácuo e armazenadas até sua utilização configurando um lote único.

Figura 1. Folhas de *Moringa oleifera*.

Fonte: Própria (2020).

Extração em Soxhlet

A extração em extrator Soxhlet utilizou o solvente orgânico etanol 99%. O processo de extração foi conduzido segundo o método oficial da AOAC 1999 com modificações. A extração ocorreu com a massa de 5 g de amostra para 150 mL de solvente em ebulição por 6 horas. No final, o solvente foi removido utilizando evaporador rotativo sob pressão reduzida (Quimis, São Paulo, Brasil) a 333,15 K até massa constante. O extrato foi armazenado na ausência de luz até seu uso.

Extração por decocção

A extração por decocção utilizou água como solvente e foi conduzida de acordo como descrito anteriormente por Martins et al. (2015) com modificações. Em um sistema de bancada foi utilizando água destilada na proporção de 10:1 (água:amostra) em massa. A mistura foi mantida sob temperatura de ebulição por 5 minutos e deixada em repouso por mais 5 minutos antes de ser filtrada sob pressão reduzida. A água foi removida por evaporador rotativo sob pressão reduzida a 333,15 K até massa constante e o extrato armazenado na ausência de luz até seu uso.

Extração hidroalcóolica

A extração hidroalcóolica foi conduzida segundo metodologia descrita anteriormente (DE OLIVEIRA et al., 2015) com modificações. A mistura etanol/água na proporção 70:30 em volume, sob temperatura ambiente em bancada utilizando a proporção de 10:1 (solvente:amostra) em massa, foi mantida sob homogeneização por 1 h e em seguida filtrada por pressão reduzida. Sobre o resíduo resultante foi realizado o processo de extração descrito por mais duas vezes. O solvente dos extratos combinados foi removido por evaporador rotativo sob pressão reduzida a 333,15 K até massa constante, e armazenado na ausência de luz até seu

uso.

Compostos fenólicos totais

A quantificação de compostos fenólicos totais foi determinada pelo método de *Folin-Ciocalteu* descrita por Minussi et al. (2003) com modificações e realizada em triplicata. A dissolução dos extratos ocorreu com 10 mg de amostra em 10 mL de etanol 99%, homogeneizados em agitador magnéticos com ausência de luz. Após a dissolução em tubo cônico foram adicionados 0,2 mL de extrato, 2,0 mL do reagente *Folin-Ciocalteu* 10% (v/v), 1,0 mL de carbonato de sódio 7,5% (m/v) e 6,8 mL de água destilada. A mistura foi homogeneizada com ausência de luz e mantida em repouso por 2 horas. A determinação de absorbância foi realizada em espectrofotômetro UV-visível (Evolution 201, Thermo Scientific) no comprimento de onda de 765 nm. A curva padrão foi realizada utilizando ácido gálico. Os resultados foram expressos em miligrama equivalente de ácido gálico por grama de extrato (mg ÁG g⁻¹).

Eliminação do radical DPPH

A atividade antioxidante por método de eliminação, foi determinada pela capacidade de sequestro do radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) presente nos extratos. A determinação foi realizada em triplicata, segundo a metodologia de Rufino et al. (2007) com modificações. A dissolução dos extratos ocorreu a partir de 20 mg de amostra e 5 mL de acetona 99,5%. A solução de DPPH foi preparada na concentração de 60 µM. Para determinar a absorbância foi utilizado espectrofotômetro UV-visível (Evolution 201, Thermo Scientific) e realizada a leitura em 515 nm. A curva padrão foi realizada utilizando o reagente (±)-6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromano-2-carboxílico(Trolox), e os resultados expressos em miligrama equivalente de Trolox por grama de extrato (mg Trolox g⁻¹).

Redução do íon férrico

A atividade antioxidante também foi determinada através da capacidade de redução do íon férrico 2,4,6-tri(2-piridil)-s-triazina (TPTZ), descrito por Rufino et al. (2006) com modificações. A dissolução do extrato ocorreu com 20 mg de amostra e 10 mL de acetona 99,5%. Aliquotas de 100 µL de extrato foram transferidas para tubo cônico com 0,2 mL de água destilada, 2,7 mL de solução FRAP e incubadas a 308,15 K por 30 min. A curva padrão foi preparada com Trolox, e a leitura da absorbância determinada em espectrofotômetro UV-visível (Evolution 201, Thermo Scientific) no comprimento de onda de 595 nm. O potencial antioxidante foi expresso em miligrama equivalente de Trolox por grama de extrato (mg Trolox g⁻¹).

Atividade antimicrobiana

As atividades antimicrobianas dos extratos de folhas de *M. oleifera* foram realizadas pelo método de difusão em ágar segundo a metodologia de Czaikoski et al. (2015). Foram testadas três bactérias Gram-negativas: *Salmonella typhimurium*, *Escherichia coli* e *Pseudomonas aeruginosa*; e duas Gram-positivas: *Staphylococcus aureus* e *Listeria monocytogenes*. O resultado foi expresso pela medição do diâmetro do halo.

Análise estatística

Os resultados foram avaliados por análise de variância (ANOVA), no qual determina a diferença com 95 % de significância. O Teste de Tukey foi utilizado para comparar médias ($p < 0,05$) quando houve diferença significativa entre compostos fenólicos totais e a atividade antioxidante pelo método de sequestro do radical DPPH e redução de íon férrico (FRAP).

Resultados e Discussão

Rendimento

A Tabela 1 apresenta os resultados de rendimento dos extratos de folhas de *M. oleifera* obtidos pelos três métodos de extrações aplicados. O método por decocção em água apresentou maior rendimento (44,0%), seguido pelo método por Soxhlet com etanol (25,2%) e hidroalcólico (14,0%). Esse resultado mostra que a temperatura aliada a polaridade intermediária da água foram mais efetivas no processo de extração, o que pode ser explicado devido ao possível rompimento de membranas celulares do vegetal de forma mais facilitada pelo calor, levando a maior interação com os constituintes das folhas de *M. oleifera* na decocção.

Os rendimentos de extrações no presente estudo apresentaram comportamentos similares à de trabalhos anteriores de extratos com matérias-primas vegetais. Em estudo de extração das partes aéreas de tomilho (*T. vulgaris*), o rendimento também foi maior para extratos obtidos por decocção (11,0%) do que hidroalcólico (7,0%) (MARTINS et al., 2015). Para extratos de folhas de *M. oleifera* os rendimentos para extratos obtidos por decocção em água (59,2 %) foram superiores a extração convencional utilizando equipamento Soxhlet com etanol 70% (35,9%) (VONGSAK et al., 2013), confirmando a influência de escolha do solvente, devido a polaridade intermediária da água.

Tabela 1. Rendimento de extrato seco de folhas de *M. oleifera* em porcentagem

Extração	Condições de extração	Rendimento em porcentagem (m/m)
1	Soxhlet (solvente etanol)	25,2
2	Decocção (solvente água)	44,0
3	Extração hidroalcóolica	14,0

Fonte: Própria (2020).

A Tabela 2 apresenta os resultados de compostos fenólicos totais, capacidade de sequestro do radical DPPH e redução de íon férrico (FRAP) nos extratos de folhas de *M. oleifera*.

Tabela 2. Compostos fenólicos totais e capacidade de sequestro do radical DPPH e de redução do íon férrico (FRAP) dos extratos de folhas de *M. oleifera*

Extração	Condições de extração	Compostos fenólicos totais (mg ÁG g ⁻¹)	Capacidade de sequestro do radical DPPH (mg Trolox g ⁻¹)	Capacidade de redução do íon férrico (mg Trolox g ⁻¹)
1	Soxhlet (solvente etanol)	26,6 ± 2,8 ^b	29,9 ± 4,2 ^a	67,7 ± 1,05 ^a
2	Decocção (solvente água)	35,5 ± 0,8 ^a	64,9 ± 6,2 ^c	109,4 ± 0,6 ^b
3	Extração hidroalcóolica	36,5 ± 0,4 ^a	41,3 ± 1,7 ^b	138,5 ± 2,2 ^c

Resultado expresso como média ± desvio padrão. ^{a-b} Letras iguais na mesma linha não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey (p < 0,05).

Fonte: Própria (2020).

Para quantificação de compostos fenólicos totais, os extratos que apresentaram melhores resultados foram obtidos por extração hidroalcóolica (36,5 mg ÁG g⁻¹) e decocção em água (35,5 mg ÁG g⁻¹), com valores próximos e sem diferença estatísticas entre si (p < 0,05). O método de decocção com água apresentou a maior porcentagem de rendimento em massa. Estes dois métodos de extração ainda, apresentaram valores superiores a quantificação obtida por extração convencional utilizando equipamento Soxhlet com etanol (26,6 mg ÁG g⁻¹). Esse resultado mostra que os fenóis presentes em folha de *M. oleifera* são preferencialmente extraídos com solvente mais polares devido a maior afinidade, como no uso da extração com apenas água ou mistura de água+etanol. O uso de água e/ou etanol na extração de compostos fenólicos, é responsável por extrair antocianinas, taninos, polifenóis, flavonoides, terpenos e alcaloides com maior facilidade (AZMIR et al., 2013), confirmando assim a influência da polaridade na recuperação dos compostos bioativos presentes em matérias primas vegetais.

Trabalho anterior de extratos de folhas de *M. oleifera* de Rodríguez et al. (2015), relataram a variação da quantificação de compostos fenólicos totais de acordo com o tipo de solvente escolhido, os resultados apresentaram que os extratos obtidos por maceração e extração assistida por ultrassom utilizando como solvente uma mistura de água+etanol (50%), obtiveram melhores resultados (27 a 47 mg ÁG g folha⁻¹) quando comparados com extratos que utilizaram apenas o solvente orgânico etanol 99% (3,8 a 8,6 mg ÁG g folha⁻¹). Em outra pesquisa de extração de folhas de moringa (PRABAKARAN et al., 2018), os resultados variaram de 89 a 200 mg ÁG g⁻¹ para extratos obtidos com o uso de metanol, etanol, acetato de etila, água e acetona, sendo o extrato gerado a partir do uso de acetato de etila, responsável pela maior quantificação de compostos fenólicos totais. Este resultado confirma o fator polaridade do solvente durante a extração na recuperação dos compostos fenólicos, uma vez que a metodologia de extração foi a mesma ocorrendo variação apenas entre os cinco solventes utilizados de polaridades distintas.

Mecanismos distintos são utilizados para definir potencial antioxidante. O método de eliminação foi utilizado pela capacidade de sequestro do radical orgânico DPPH e os resultados foram apresentados na Tabela 2. O extrato de folhas de *M. oleifera* com maior capacidade de eliminação do radical, foi obtido pela condição de extração por decocção em água (64,9 mg Trolox g⁻¹), sendo essa também responsável pelo maior rendimento (44%).

O extrato obtido por extração hidroalcóolica (41,3 mg Trolox g⁻¹) também apresentou resultado superior ao extrato obtido em extrator Soxhlet com etanol (29,9 mg Trolox g⁻¹), havendo ainda diferença estatística ($p < 0,05$) entre os extratos. Esse resultado pode ser justificado devido o método de extração utilizando equipamento Soxhlet com etanol, ocorrer durante um período maior e em alta temperatura, levando assim a uma possível degradação dos compostos termolábeis.

Pesquisa recente de extratos de folhas de *M. oleifera* obtidos por extração assistida por homogeneizador, com o uso de três solventes diferentes sendo metanol (100%), metanol+água (50/50 v) e acetato de etila (100%) (ROCCHETTI et al., 2020), resultaram em valores próximos aos encontrados no presente estudo, a capacidade de eliminação do radical DPPH variou de 23,54 a 49,55 mg Trolox g⁻¹, sendo o maior resultado apresentado pelo extrato obtido com mistura de água+metanol. Estudos anteriores de extratos de folhas de *M. oleifera* também apresentaram resultados consideráveis pelo método de sequestro do radical DPPH (FAROOQ et al., 2020; PRABAKARAN et al., 2018; STOHS et al., 2015).

O poder de redução do metal também foi utilizado para definir o potencial antioxidante, sendo realizado o método de redução do íon férrico (FRAP). Como mostra a Tabela 2, os

extratos obtidos por extração hidroalcolica (138,5 mg Trolox g⁻¹) e decocção em água (109,4 mg Trolox g⁻¹), apresentaram maior poder de redução quando comparados com o método de extração tradicional em extrator Soxhlet com etanol (67,7 mg Trolox g⁻¹). Essas variações podem ser justificadas devido a composição de cada extrato, uma vez que cada solvente é capaz de extrair classes diferentes de compostos, os quais apresentam comportamentos diferentes (GARCIA et al., 2010; RODRÍGUEZ et al., 2015; SAUCEDO et al., 2018). O mesmo comportamento foi verificado por (VONGSAK et al., 2013) em estudo de extratos de folhas de *M. oleifera* obtidos com o uso de água, etanol 70% e etanol 50% como solvente, sendo a maior resposta para redução do íon férrico correspondente ao extrato obtido por maceração com etanol 70%. Em outro estudo com extratos de folhas de *M. oleifera*, (ROCCHETTI et al., 2020) obtiveram respostas de redução do íon férrico variando de 13,77 a 58,26 mg Trolox g⁻¹, sendo esses valores inferiores aos obtidos no presente trabalho.

Compostos fenólicos totais, sequestro do radical DPPH e a redução de íons férrico, estão correlacionados com a capacidade oxidante presente nos extratos de folhas de *M. oleifera*. A Figura 2 mostra os efeitos das condições de extração causadas na quantificação de compostos fenólicos totais e potencial antioxidante.

Figura 2. Compostos fenólicos totais (CFT), sequestro do radical DPPH e redução de íon férrico (FRAP) obtidos em extratos de folhas de *M. oleifera* por extração em Soxhlet com etanol (1), decocção com água (2) e extração hidroalcolica (3). Números de extrações correspondem as condições descritas na Tabela 2.

Fonte: Própria (2020).

A influência da forma como o extrato é obtido resulta diretamente na composição individual de cada amostra. Como mostra a Figura 1, é possível verificar os extratos obtidos por decocção em água e extração hidroalcolica, por apresentarem maior concentração de

compostos fenólicos totais (CFT), também são responsáveis pela maior capacidade de sequestro do radical DPPH e da redução de íon férrico (FRAP). Essa relação indica que o potencial antioxidante presente nos extratos se deve a elevada concentração de fenóis, que foi mais bem recuperada nos extratos obtidos com o uso de água e mistura de água+etanol como solventes. Extratos de bardana (*Arctium lappa*) obtidos por extração supercrítica com o uso de CO₂ e por Soxhlet com etanol também tiveram essa correlação em que os extratos com maior concentração de compostos fenólicos totais, tiveram maior atividade antioxidante (DE SOUZA et al., 2018).

Com relação avaliação da atividade antimicrobiana, os três extratos de folhas de *M. oleifera* foram testados a fim de verificar a inibição do crescimento bacteriano, para as bactérias Gram positivas e Gram negativas, e os resultados estão detalhados na Tabela 3.

Tabela 3. Avaliação da atividade antimicrobiana de extratos de folha de *M. oleifera* obtidos por diferentes métodos de extração.

Bactérias testadas	Extração em Soxhlet (solvente etanol)	Extração por decocção (solvente água)	Extração hidroalcolica
<i>Salmonella typhimurium</i>			
<i>Escherichia coli</i>			
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Não apresentou inibição	Não apresentou inibição	Não apresentou inibição
<i>Staphylococcus aureus</i>			
<i>Listeria monocytogenes</i>			

Fonte: Própria (2020).

Como mostra os resultados da Tabela 3, os três extratos não apresentaram zona de inibição para as bactérias testadas na metodologia empregada. Este fato é justificado não apenas pela diferença entre os métodos e solventes utilizados durante a extração para obtenção dos extratos, como também, devido a metodologia empregada de difusão em ágar para as bactérias investigadas. O modo de ação típico esperado dos compostos bioativos, é que ocorra a alteração de permeabilidade e integridade das células bacterianas, por se tratar da complexidade da parede celular, alguns grupos possui uma membrana externa, resultando na característica hidrofílica capaz de limitar a difusão de compostos hidrofóbicos por meio de sua cobertura de lipopolissacarídeos (CZAIKOSKI et al., 2015; DE SOUZA et al., 2018).

Revisões anteriores apresentaram resultados positivos para ação dos extratos de folhas de *M. oleifera* obtidos por métodos e solventes diferentes, em bactérias Gram positivas e Gram negativas (SAINI et al., 2016; SAUCEDO et al., 2018). Estudo recente de extrato aquoso e extrato etanólico de folhas de *M. oleifera* (FAROOQ et al, 2020) relataram a capacidade de inibição de ambos os extratos para as bactérias *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*,

Staphylococcus aureus e *Bacillus subtilis*. Em outro estudo recente (ROCCHETTI et al., 2020), três extratos de folhas de *M. oleifera* obtidos com uso de solvente metanol (100%), metanol+água (50/50 v) e acetato de etila (100%) apresentaram zona de inibição para as bactérias Gram-positivas *Bacillus cereus* e *Listeria innocua*, porém não tiveram inibição para bactérias Gram-negativas *Salmonella Enteritidis* e *Salmonella Typhimurium*.

Conclusões

A partir dos resultados apresentados no presente trabalho, é possível verificar que a metodologia empregada influencia diretamente no rendimento e nas propriedades do extrato, isto porque ocorre variação da polaridade do solvente utilizado, condições de temperatura e tempo de extração empregado, resultando na composição final distinta. Extrato obtido por decocção utilizando apenas água, apresentou melhor rendimento e melhor potencial antioxidante, através da capacidade de sequestro do radical DPPH e de redução do íon férrico. Este tipo de extração está à frente de metodologias convencionais, uma vez que não utiliza solvente orgânico, não gera resíduos, possui baixo tempo de extração, baixo custo e a aplicação do extrato pode ocorrer de forma limpa e segura, sendo o seu uso favorável dentro da indústria de alimentos. Para atividade antimicrobiana, ambos os extratos não inibiram a zona de crescimento das bactérias testadas. Desta forma, é possível considerar extratos de folhas de *M. oleifera* como uma matriz vegetal de interesse maior para estudos futuros e a possíveis aplicações dentro da indústria de alimentos.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (nº404326/2016-1) pelo apoio financeiro concedido e bolsa de iniciação científica .

Referências

- AMAGLO, N. K.; BENNETT, R. N.; LO CURTO, R. B.; ROSA, E. A.S.; LO TURCO, V.; GIUFFRIDA, A.; LO CURTO, A.; CREA, F.; TIMPO, G. M. Profiling selected phytochemicals and nutrients in different tissues of the multipurpose tree *Moringa oleifera* L., grown in Ghana. **Food Chemistry**, v. 122, n. 4, p. 1047–1054, 2010.
- ANWAR, F.; LATIF, S.; ASHRAF, M.; GILANI, A. H. *Moringa oleifera*: A food plant with multiple medicinal uses. **Phytotherapy Research**, v. 21, n. 1, p. 17–25, 2007.
- AOAC. Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemists International, **Arlington**, 1999.

AZMIR, J. et al. Techniques for extraction of bioactive compounds from plant materials: A review. **Journal of Food Engineering**, v. 117, n. 4, p. 426–436, 2013.

BARRETO, M. B.; FREITAS, J. V. B.; SILVEIRA, E. R.; BEZERRA, A. M. E.; NUNES, E. P.; GRAMOSA, N. V. Constituintes químicos voláteis e não-voláteis de *Moringa oleifera* Lam., *Moringaceae*. **Revista Brasileira de Farmacognosia**, v. 19, n. 4, p. 893–897, 2009.

BOEING, J. S. et al. Evaluation of solvent effect on the extraction of phenolic compounds and antioxidant capacities from the berries: Application of principal component analysis. **Chemistry Central Journal**, v. 8, n. 1, p. 1–9, 2014.

CASTRO-LÓPEZ, C. et al. Impact of extraction techniques on antioxidant capacities and phytochemical composition of polyphenol-rich extracts. **Food Chemistry**, v. 237, p. 1139–1148, 2017.

CELEP, E. et al. Influence of extraction method on enzyme inhibition, phenolic profile and antioxidant capacity of *Sideritis trojana* Bornm. **South African Journal of Botany**, v. 121, p. 360–365, 2019.

CZAIKOSKI, K.; MESOMO, M. C.; KRÜGER, R. L.; QUEIROGA, C. L.; CORAZZA, M. L. Extraction of *Campomanesia xanthocarpa* fruit using supercritical CO₂ and bioactivity assessments. **Journal of Supercritical Fluids**, v. 98, p. 79–85, 2015.

DE OLIVEIRA FERNANDES, T. et al. *Campomanesia adamantium* (Myrtaceae) fruits protect HEPG2 cells against carbon tetrachloride-induced toxicity. **Toxicology Reports**, v. 2, p. 184–193, 2015.

DE SOUZA, A. R. C. et al. Extraction of *Arctium Lappa* leaves using supercritical CO₂ + ethanol: Kinetics, chemical composition, and bioactivity assessments. **Journal of Supercritical Fluids**, v. 140, p. 137–146, 2018.

FAROOQ, B.; KOUL, B. Comparative analysis of the antioxidant, antibacterial and plant growth promoting potential of five Indian varieties of *Moringa oleifera* L. **South African Journal of Botany**, v. 129, p. 47–55, 2020.

GARCIA-SALAS, P. MORALES-SOTO, A.; SEGURA-CARRETERO, A.; FERNÁNDEZ-GUTIÉRREZ, A.; Phenolic compound extraction systems for fruit and vegetable samples. **Molecules**, v. 15, n. 12, p. 8813–8826, 2010.

HAMANY DJANDE, C. Y.; PIATER, L. A.; STEENKAMP, P. A.; MADALA, N. E.; DUBERY, I. A. Differential extraction of phytochemicals from the multipurpose tree, *Moringa oleifera*, using green extraction solvents. **South African Journal of Botany**, v. 115, p. 81–89, 2018.

HERRERO, M.; IBÁÑEZ, E. Green processes and sustainability: An overview on the extraction of high added-value products from seaweeds and microalgae. **Journal of Supercritical Fluids**, v. 96, p. 211–216, 2015.

KALOGO, Y.; ROSILLON, F.; HAMMES, F.; VERSTRAETE, W. Effect of a water extract

of *Moringa oleifera* seeds on the hydrolytic microbial species diversity of a UASB reactor treating domestic wastewater. **Letters in Applied Microbiology**, v. 31, n. 3, p. 259–264, 2000.

MARTINS, N.; BARROS, L.; SANTOS-BUELGA, C.; SILVA, S.; HENRIQUES, M.; FERREIRA, I. C.F.R. Decoction, infusion and hydroalcoholic extract of cultivated thyme: Antioxidant and antibacterial activities, and phenolic characterisation. **Food Chemistry**, v. 167, p. 131–137, 2015.

MINUSSI, R. C.; ROSSI, M.; BOLOGNA, L.; CORDI, L.; ROTILIO, D.; PASTORE, G. M.; DURÁN, N. Phenolic compounds and total antioxidant potential of commercial wines. **Food Chemistry**, v. 82, n. 3, p. 409–416, 2003.

MORTON, J. F. The horseradish tree, *Moringa pterygosperma* (*Moringaceae*) -A boon to arid lands? **The New York Botanical Garden**, v. 45, n. 1929, p. 318–333, 1991.

MOYO, B. et al. Nutritional characterization of *Moringa* (*Moringa oleifera* Lam.) leaves. **African Journal of Biotechnology**, v. 10, n. 60, p. 12925–12933, 2011.

NOUMAN, W.; ANWAR, F.; GULL, T.; NEWTON, A.; ROSA, E.; DOMÍNGUEZ-PERLES, R. Profiling of polyphenolics, nutrients and antioxidant potential of germplasm's leaves from seven cultivars of *Moringa oleifera* Lam. **Industrial Crops and Products**, v. 83, p. 166–176, 2016.

OUÉDRAOGO, J. C. W. et al. Enhanced extraction of flavonoids from *Odontonema strictum* leaves with antioxidant activity using supercritical carbon dioxide fluid combined with ethanol. **Journal of Supercritical Fluids**, v. 131, p. 66–71, 2018.

OYEYINKA, A. T.; OYEYINKA, S. A. *Moringa oleifera* as a food fortificant: Recent trends and prospects. **Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences**, v. 17, n. 2, p. 127–136, 2016.

ÖZCAN, M. M. *Moringa* spp: Composition and bioactive properties. **South African Journal of Botany**, v. 19, p.25-31, 2020.

PRABAKARAN, M. et al. Polyphenol composition and antimicrobial activity of various solvent extracts from different plant parts of *Moringa oleifera*. **Food Bioscience**, v. 26, p. 23–29, 2018.

RASHID, U.; ANWAR, F.; MOSER, B.R.; KNOTHE, G.; *Moringa oleifera* oil: A possible source of biodiesel. **Bioresource Technology**, v. 99, n. 17, p. 8175–8179, 2008.

ROCCHETTI, G. et al. Phenolic profiling and in vitro bioactivity of *Moringa oleifera* leaves as affected by different extraction solvents. **Food Research International**, v. 127, p. 108712, 2020.

RODRÍGUEZ-PÉREZ, C.; QUIRANTES-PINÉ, R.; FERNÁNDEZ-GUTIÉRREZ, A.; SEGURA-CARRETERO, A. Optimization of extraction method to obtain a phenolic compounds-rich extract from *Moringa oleifera* Lam leaves. **Industrial Crops and Products**, v. 66, p. 246–254, 2015.

- RODRÍGUEZ-PÉREZ, C.; MENDIOLA, J.A.; QUIRANTES-PINÉ, R.; IBÁÑEZ, E.; SEGURA-CARRETERO, A. Green downstream processing using supercritical carbon dioxide, CO₂-expanded ethanol and pressurized hot water extractions for recovering bioactive compounds from *Moringa oleifera* leaves. **The Journal of Supercritical Fluids**, v. 116, p. 90–100, 2016.
- RUFINO, M. DO S. M.; ALVES, R. E.; BRITO, E. S.; MORAIS, S. M.; SAMPAIO, C. G.; PEREZ-JIMÉNEZ, J. **Metodologia Científica: Determinação da Atividade Antioxidante Total em Frutas pelo Método de Redução do Ferro (FRAP)**. Embrapa, v. 1, p. 1-4, 2006.
- RUFINO, M. DO S. M.; ALVES, R. E.; BRITO, E. S.; MORAIS, S. M.; SAMPAIO, C. G.; PEREZ-JIMÉNEZ, J.; Saura-Calixto, F. D. **Metodologia Científica: Determinação da atividade antioxidante total em frutas pela captura do radical livre DPPH**. Embrapa, p 1-4, 2007.
- SAINI, R. K.; SIVANESAN, I.; KEUM, Y.S. Phytochemicals of *Moringa oleifera*: a review of their nutritional, therapeutic and industrial significance. **3 Biotech**, v. 6, n. 2, p. 203, 2016.
- SAUCEDO-POMPA, S.; TORRES-CASTILLO, J. A.; CASTRO-LÓPEZ, C.; ROJAS, R.; SÁNCHEZ-ALEJO, E. J.; NGANGYO-HEYA, M.; MARTÍNEZ-ÁVILA, G. C.G. Moringa plants: Bioactive compounds and promising applications in food products. **Food Research International**, v. 111, p. 438–450, 2018.
- SREELATHA, S.; PADMA, P. R. Antioxidant activity and total phenolic content of *Moringa oleifera* leaves in two stages of maturity. **Plant Foods for Human Nutrition**, v. 64, n. 4, p. 303–311, 2009.
- STOHS, S. J.; HARTMAN, M. J. Review of the Safety and Efficacy of *Moringa oleifera*. **Phytotherapy Research**, v. 29, n. 6, p. 796–804, 2015.
- VONGSAK, B. et al. Maximizing total phenolics, total flavonoids contents and antioxidant activity of *Moringa oleifera* leaf extract by the appropriate extraction method. **Industrial Crops and Products**, v. 44, p. 566–571, 2013.
- ZHAO, S.; ZHANG, D. Supercritical fluid extraction and characterisation of *Moringa oleifera* leaves oil. **Separation and Purification Technology**, v. 118, p. 497–502, 2013.

CAPÍTULO 06: AVALIAÇÃO DO PERFIL MICROBIOLÓGICO E IDENTIFICAÇÃO DE MATÉRIA ESTRANHA EM POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS COMERCIALIZADAS NO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM – CE

CHAPTER 06: EVALUATION OF THE MICROBIOLOGICAL PROFILE AND IDENTIFICATION OF STRANGE MATTER IN FROZEN FRUIT PULPS COMMERCIALIZED IN QUIXERAMOBIM – CE

Raimunda Valdenice da Silva Freitas¹; Samara Paiva Mendes²; Francilda Rodrigues Guimarães³; Sarah Marques da Silva de Oliveira Mendes⁴; Eliaquim Mendes Ferreira⁵

Resumo

O consumo de frutas processadas e seus derivados têm apresentado aumento expressivo e significativo por serem alimentos de alto valor nutritivo que compõem uma dieta saudável e equilibrada, tornando-se de grande importância avaliar a qualidade microbiológica destes produtos que deve atender as exigências do consumidor e da legislação vigente. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o perfil microbiológico e identificar matéria estranha em polpas de frutas congeladas comercializadas no município de Quixeramobim - CE. As amostras foram adquiridas no comércio local do município citado, sendo avaliadas duas marcas comerciais (marca A e marca B) e cinco sabores (acerola, cajá, caju, goiaba e maracujá), sendo realizadas análises microbiológicas para coliformes totais e termotolerantes; contagem de bolores e leveduras; Pesquisa de *Salmonella* sp. e identificação de matéria estranha. As amostras apresentaram resultados satisfatórios para Pesquisa de *Salmonella* sp. No entanto, foi detectada a presença de *E. coli* nas polpas de caju e goiaba da marca B. Além disso, foi possível identificar sujidades e matéria estranha às polpas de frutas analisadas, dentre elas: parte de isentos e fragmentos de vidro, com exceção da polpa de goiaba que não apresentou sujidades visíveis, mas possivelmente a presença de larvas vermiformes.

Palavras-Chaves: legislação, micro-organismos, sujidades.

Abstract

The consumption of processed fruits and their derivatives has shown an expressive and significant increase because they are foods of high nutritional value that make up a healthy and balanced diet, making it of great importance to evaluate the microbiological quality of these products that must meet the demands of the consumer and the current legislation. Thus, this work aimed to evaluate the microbiological profile and to identify foreign matter in frozen fruit pulps sold in the city of Quixeramobim - CE. The samples were acquired in the local commerce of the mentioned city, being evaluated two commercial brands (brand A and brand B) and five flavors (acerola, cajá, cashew, guava and passion fruit), being carried out microbiological analyzes for total and thermotolerant coliforms; molds and yeasts; Research of *Salmonella* sp. and identification of foreign matter. The samples showed satisfactory results for *Salmonella* sp. However, the presence of *E. coli* in the B brand and cashew pulps was detected. In addition, it was possible to identify dirt and foreign matter to the fruit pulps analyzed, among them: part of exempt and glass fragments, except of the guava pulp that did not show visible dirt, but possibly

¹ Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal da Paraíba, valdenice2006@yahoo.com.br

² Tecnóloga em Alimentos, Faculdade de Tecnologia Centec - Sertão Central, samarapaiva.4502@gmail.com

³ Tecnóloga em Alimentos, Faculdade de Tecnologia Centec - Sertão Central, cildinha05@yahoo.com.br

⁴ Tecnóloga em Alimentos, Faculdade de Tecnologia Centec - Sertão Central, sarahmarques.016@gmail.com

⁵ Tecnólogo em Alimentos, Faculdade de Tecnologia Centec - Sertão Central, eliaquimmendes@gmail.com

the presence of worm larvae.

Keywords: legislation, micro-organisms, dirt.

Introdução

O Brasil é considerado o 3º maior produtor de frutas no mundo, colocação esta proveniente da grande diversidade de culturas em todo o território do país e em variados climas, sendo considerado um fator de grande importância econômica (SEBRAE, 2015).

As frutas são importantes alimentos na nutrição humana devido principalmente seus constituintes, tais como: água, açúcares, fibras, vitaminas e sais minerais. Com isso, o consumo de frutas processadas e seus derivados apresentam aumento significativo que se deve em parte, a busca por uma alimentação saudável e também pelo desenvolvimento da Tecnologia de Alimentos que proporcionou a possibilidade do processamento de frutas e armazenamento em embalagens adequadas, como é o caso das embalagens plásticas que podem ser levadas ao congelamento (CASTRO et al., 2015; SATIM; SANTOS, 2009).

Porém, características intrínsecas do produto, como a elevada atividade de água pode contribuir com a alta perecibilidade desse, reduzindo o tempo de comercialização, podendo ocasionar problemas de armazenamento e conseqüentemente, possíveis perdas na produção. Assim, as polpas de frutas congeladas são consideradas alternativas de aproveitamento das frutas, podendo ser elaboradas nas épocas de safra, permitindo a disponibilidade desses produtos nos períodos de entressafra, evitando possíveis problemas associados à sazonalidade (PARIZ, 2011; CASTRO et al., 2015).

Em virtude do crescimento elevado no consumo de polpas de frutas processadas e com a necessidade de obedecer aos padrões microbiológicos para alimentos, a RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001 estabelece padrões microbiológicos para polpa de fruta com valor máximo de 10^2 NMP/g para coliformes a 45°C (termotolerantes) e ausência de *Salmonella* spp. em 25g para que este alimento apresente condições adequadas ao consumo humano garantindo assim, a saúde dos consumidores (BRASIL, 2001).

As etapas do processamento até o produto acabado devem passar por constante controle de qualidade que compreende um sistema de padronização, melhoramento e manutenção dos processos a partir de análises microbiológica, físico-química e sensorial (MUNIZ et al., 2006).

Para que o produto seja considerado apto ao consumo, as polpas devem ser preparadas com frutas sãs, limpas, isentas de sujidades, parasitas e detritos de animais ou vegetais. Não conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal, observada também a presença ou ausência de sujidades, parasitas e larvas

(OLIVEIRA et al., 2012).

A contaminação dos alimentos pode está relacionada também à presença de um grupo de micro-organismos indicadores, os quais são pertencentes à microbiota entérica de animais de sangue quente como também ao ser humano, podendo promover dados sobre episódios de contaminação de origem fecal, possibilitando a suspeita da presença de micro-organismos deteriorantes ao alimento ou até mesmo patogênicos, além de ser um importante indicativo de ausência de condições higiênica sanitária de qualidade no processamento de alimentos (DANTAS et al., 2012).

Com isso, as Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA's) são causadas pela ingestão de alimentos contendo algum tipo de contaminante causador de grave problema de saúde publica. Dentre eles podem-se destacar os principais micro-organismos, tais como: *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Staphylococcus aureus*, *Clostridium botulinum*, *Clostridium perfringes*, *Vibrio* sp., *Campylobacter* spp., *Listeria monocytogenes*, *Shigella*, *Bacillus cereus* e *Yersinia*. Assim, a manifestação de uma DTA pode ocorrer na forma de infecção, intoxicação e/ou toxinfecção, apresentando como sintomas mais comuns diarreias, vômitos, náuseas e dores abdominais (MENDONÇA et al., 2020; FLORES; MELO, 2015).

Com a crescente variedade de produtos derivados de frutas que estão sendo desenvolvidos e ofertados no mercado, torna-se necessário para o setor de polpas de frutas, a adequação de padrões de qualidade e segurança a níveis exigidos pelos consumidores e pela legislação, ambos cada vez mais exigentes, já que a preocupação com a qualidade desde a obtenção da matéria-prima até o produto final é considerado sinônimo de saúde.

Desse modo, torna-se de grande importância a avaliação da qualidade de polpas de frutas congeladas através do perfil microbiológico e identificação de matéria estranha, já que suas características devem se encontrar mais próximas da fruta *in natura*, atribuindo assim, uma maior confiabilidade quanto à qualidade, ausência de material indesejável e indicação de presença das boas práticas sanitárias na cadeia produtiva. Uma vez que polpas produzidas em ambientes de processamento insalubre podem ocasionar uma série de riscos à saúde do consumidor como doenças gastrointestinais e contaminação por micro-organismos patogênicos.

Diante do exposto, esta pesquisa teve como objetivo avaliar o perfil microbiológico e identificar possíveis matérias estranha em polpas de frutas congeladas comercializadas no município de Quixeramobim – CE.

Material e Métodos

Obtenção das amostras

As amostras analisadas foram obtidas do comércio local no município de Quixeramobim – CE, sendo realizadas observações para averiguar se a embalagem original do produto apresentava algum tipo de rompimento antes da aquisição das polpas.

Após aquisição, as amostras foram armazenadas em condições adequadas de refrigeração em caixa isotérmica e transportadas para o Laboratório de Microbiologia da Faculdade de Tecnologia Centec - Sertão Central para realização das análises.

Para o desenvolvimento da pesquisa foram avaliadas polpas de frutas congeladas de duas marcas comerciais, as quais foram codificadas como marca A e marca B, sendo avaliados cinco sabores diferentes (cajá, caju, maracujá, acerola e goiaba).

As amostras foram submetidas aos procedimentos de análises microbiológicas e identificação de matéria estranha, conforme descritos a seguir.

Análises microbiológicas

Para realização das análises microbiológicas as amostras de polpas de frutas congeladas foram previamente descongeladas, homogeneizadas, deixadas à temperatura ambiente e abertas assepticamente em câmara de fluxo laminar com auxílio de tesoura flambada e homogeneizadas em recipientes esterilizados.

As análises microbiológicas realizadas foram as seguintes: Técnica do Número Mais Provável (NMP.g⁻¹) para coliformes totais e termotolerantes (ou coliformes a 45°C); Contagem Padrão em Placas para bolores e leveduras e Pesquisa de *Salmonella* sp.

Para cada amostra, fracionou-se uma alíquota de 10 mL, sendo transferida e homogeneizada em frascos contendo 90 mL de solução salina estéril, de acordo com o método do Número Mais Provável (NMP) utilizado para contagem de coliformes totais e termotolerantes (SILVA et al., 2010).

No teste presuntivo as amostras foram diluídas em três concentrações 10⁻¹, 10⁻² e 10⁻³. Na primeira concentração inoculou-se 10 mL e nas concentrações 10⁻² e 10⁻³, apenas 1 mL; em seguida foram inoculadas (1 mL) numa série de três tubos de Caldo lactosado (CL) para cada diluição. As amostras foram incubadas em estufa a 35°C/48 horas.

Consideraram-se positivos (suspeitos) os tubos que apresentaram formação de gás no interior do tubo de Duhran identificado pela presença de bolhas. No teste confirmativo uma alçada de cada tubo suspeito foi transferida para tubos de ensaio dotados de um tubo de Duhran invertido, contendo Brilliant Green Bile Broth (BVB) meio seletivo que contém lactose. A

produção de gás nos tubos de BVB é indicativa de características relevantes para confirmação da presença de coliformes totais. Posteriormente, realizou-se o mesmo procedimento descrito anteriormente e transferiu-se com o auxílio de uma alça uma bolha dos tubos de BVB com presença de coliformes totais para tubos contendo o meio caldo seletivo EC Broth (EC); em seguida os tubos foram submetidos à incubação em banho-maria a 45°C por 24 horas. Os resultados foram procedidos e analisados de acordo com o Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos (SILVA et al., 2010).

Para a Técnica do Número Mais Provável realizou-se procedimento de análise conforme apresentado na figura 1.

Figura 1. Esquema geral para Técnica do Número Mais Provável (NMP.g⁻¹) em polpas de frutas congeladas comercializadas em Quixeramobim - CE.

Fonte: Pariz (2011) com adaptações realizadas pelos autores.

*SS: solução salina; CL: caldo lactosado; BVB: meio seletivo Brilliant Green Bile Broth; EC: caldo seletivo EC Broth.

Para contagem de bolores e leveduras, utilizou-se o método de plaqueamento direto conforme apresentado na figura 2.

Figura 2. Esquema do plaqueamento direto em polpas de frutas congeladas comercializadas em Quixeramobim – CE

Fonte: Pariz (2011) com adaptações realizadas pelos autores.

*SS: solução salina; PDA: meio de cultura Ágar Batata Dextrose.

O método citado foi realizado através da inoculação de 0,1 mL (3 gotas) das amostras diluídas em diferentes concentrações (10^{-1} , 10^{-2} e 10^{-3}) sob a superfície do meio (Ágar Batata Dextrose) e posteriormente incubou-se as placas em estufa incubadora D.B.O. a temperatura de 22/25°C por um período de 5 dias.

Posteriormente, realizou-se a enumeração dos fungos filamentosos e leveduras utilizando-se o método de contagem direta em placas e os resultados foram expressos pelo número de unidades formadoras de colônia por grama de material (UFC. g⁻¹) (SILVA et al., 2010).

Para Pesquisa de *Salmonella* sp. a técnica tradicional de determinação deste micro-organismo em alimentos detecta a presença ou ausência em 25 g de cada amostra avaliada. Na

etapa de pré-enriquecimento transferiu-se 25 g de cada amostra para frasco contendo 225 mL de Lactose Broth (CL), em seguida agitou-se para a obtenção de uma solução homogênea e incubou-se a 35°C por 24 horas.

Posteriormente, transferiu-se 1,0 mL do caldo de pré-enriquecimento e adicionou-se em tubo de ensaio contendo 10 mL de Caldo Rappaport-Vassiliadis (RV), incubou-se a 35°C por 24 horas. Após período de incubação em estufa de cultura bacteriológica para ambos os meios, transferiu-se uma bolha de cada meio com o auxílio de uma alça para três meios seletivos de *Salmonella*: Brilliant Green Ágar (BG), Salmonella-Shigella Ágar (SS) e Hektoen Enteric Ágar (HE), considerada etapa do plaqueamento seletivo (SILVA et al., 2007).

Identificação de matéria estranha

A presença de impurezas/matéria estranha nas amostras de polpas congeladas foi determinada pela centrifugação de 20 g da amostra a 3000 rpm durante 15 minutos para formação de um precipitado.

Posteriormente, foi descartado o material sobrenadante e retirada amostragem do precipitado formado. Em seguida, as amostras foram submetidas à secagem em estufa a 35°C e o material foi observado em estereoscópio e microscópio, conforme metodologia descrita por Freitas (2013).

Delineamento Experimental

O delineamento experimental utilizado foi o D.I.C. (Delineamento Inteiramente Casualizado) em esquema fatorial de 2 x 5, onde o primeiro fator consistiu nas diferentes marcas avaliadas (A, B) e o segundo fator, nos sabores avaliados (cajá, caju, maracujá, acerola e goiaba).

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizadas 5 repetições para cada sabor avaliado, totalizando 25 amostras para cada marca e 50 amostras avaliadas em todo o experimento. As médias obtidas foram comparadas conforme fatores avaliados.

Resultados e Discussão

Análises microbiológicas

Observou-se que as amostras avaliadas apresentaram resultados em conformidade e não conformidades com os padrões estabelecidos pela legislação em vigor de acordo com os resultados apresentados na tabela 1 para coliformes totais e termotolerantes (coliformes a 45°C).

Tabela 1. Resultados médios do Número Mais Provável (NMP.g⁻¹) de coliformes totais e termotolerantes em polpas de frutas congeladas comercializadas no município de Quixeramobim - CE.

Sabores	Marcas	Coliformes	Coliformes
Avaliados	comerciais	Totais (NMP.g ⁻¹)	Termotolerantes (NMP.g ⁻¹)
Acerola	A	< 3	< 3
	B	< 3	< 3
Cajá	A	< 3	< 3
	B	< 3	< 3
Caju	A	9,2 x 10 ^{1*}	9,2 x 10 ^{1*}
	B	2,3 x 10 ^{1*}	9*
Goiaba	A	< 3	< 3
	B	4 x 10 ^{1*}	1,8 x 10 ^{1*}
Maracujá	A	< 3	< 3
	B	< 3	< 3

Fonte: Elaborada pelos autores.

*Amostras de polpas de frutas congeladas que não estão em conformidade com os padrões estabelecidos pela RDC nº12 de 02 de Janeiro de 2001 (BRASIL, 2001).

A RDC nº12 de 02 de Janeiro de 2001 estabelece os padrões microbiológicos para alimentos. Assim para polpas de frutas concentradas ou não, com ou sem tratamento térmico, refrigeradas ou congeladas a RDC preconiza um valor máximo de 10² NMP.g⁻¹ para coliformes termotolerantes (BRASIL, 2001). Já a Instrução Normativa nº01 de 07 de janeiro de 2000 por meio de atualização e prevalência da Instrução Normativa nº49 de 26 de setembro de 2018 fixa os padrões de identidade e qualidade para polpa de fruta, estabelece um limite máximo de 1/g para coliformes termotolerantes (BRASIL, 2000; BRASIL, 2018).

A legislação não apresenta parâmetro estabelecido para coliformes totais, no entanto, na presente pesquisa realizou-se análise desse micro-organismo devido o mesmo ser um importante indicativo da qualidade das condições higiênico-sanitária de processamento.

Conforme os resultados obtidos na pesquisa verificou-se que apenas as polpas de goiaba (marca “B”) e as polpas de caju (marca “A” e “B”) apresentaram contagens de coliformes totais/termotolerantes acima de < 3 NMP/g. Também foi detectada a contaminação das polpas pela bactéria *Escherichia coli*, nas polpas de caju (A e B) e goiaba da marca B.

A *Escherichia coli*, é uma bactéria com características importantes por fazer parte do grupo de micro-organismos gram-negativos, não esporogênica, anaeróbia facultativa, com ambiente natural no intestino de humanos e de animais, sendo responsável por causar enfermidades ao homem, podendo provocar graves doenças transmitidas por alimentos. Além

disso, destaca-se que o período de incubação pode variar de 3 a 8 dias, estando associada principalmente a alguns alimentos, como: carne bovina, crua ou mal passada, como também leite cru (FRANCO; LANDGRAFF, 2008; GERMANO; GERMANO, 2015).

Farias, Oliveira e Costa (2012) citam que a contaminação de polpas de frutas congeladas por coliformes totais e termotolerantes está provavelmente associada à manipulação inadequada da matéria-prima durante o processamento ou à contaminação dos equipamentos que entram em contato com o alimento.

Souza, Souza e Mendes (2019) avaliando o perfil microbiológico de polpas de frutas congeladas comercializadas em feiras públicas da cidade de Macapá (Amapá), verificaram que todas as amostras analisadas (manga, abacaxi e maracujá) apresentaram crescimento de coliformes termotolerantes. Entretanto, polpa de maracujá manteve-se dentro dos parâmetros exigidos pela legislação vigente, além disso, os autores afirmam que o crescimento de coliformes termotolerantes indica possíveis falhas durante o processamento ou acondicionamento, podendo ocasionar danos à saúde do consumidor.

Resultados referentes à contagem de coliformes a 45°C são utilizados para avaliar as condições higiênicas da cadeia produtiva, desde a produção até o processamento e etapa de estocagem, tornando-se necessário seguir as diretrizes de boas práticas de fabricação e comercialização dos produtos. Assim, a presença de coliformes termotolerantes sugere contaminação por *Escherichia coli* que apresenta habitat no intestino humano e de outros animais endotérmicos (SOUZA; CARNEIRO; GONSALVES, 2011).

Faria et al. (2016) avaliando a qualidade microbiológica de polpas de frutas congeladas comercializadas na cidade de Cuiabá – MT, verificaram que em todas as amostras de polpas congeladas analisadas (abacaxi, acerola, caju, goiaba e maracujá), os resultados apresentaram conformidade com os padrões de qualidade microbiológica estabelecidos pela legislação. Sendo que nenhuma das amostras excedeu ao máximo permitido para análise de coliformes, com resultados variando entre < 3 a 43 NMP.mL^{-1} , tanto para coliformes totais quanto para coliformes termotolerantes.

Muniz, Reis e Vieira (2017) avaliando polpas de frutas comercializadas no Sudoeste da Bahia constataram que para coliformes totais e *Escherichia coli*, as amostras avaliadas (acerola, cajá e goiaba) apresentaram resultados em conformidade com a legislação vigente.

Para contagem de bolores e leveduras verificou-se que os sabores caju (marca “A”), acerola e maracujá (marca “B”), apresentaram não conformidade com padrão estabelecido pela legislação em vigor (tabela 2).

Tabela 2. Resultados médios para contagem de bolores e leveduras em polpas de frutas congeladas comercializadas no município de Quixeramobim - CE.

Sabores Avaliados	Marcas comerciais	Bolores e Leveduras (UFC.g ⁻¹)
Acerola	A	1,5 x 10 ³
	B	1,4 x 10 ^{4*}
Cajá	A	6,3 x 10 ¹
	B	1,1 x 10 ²
Caju	A	1,2 x 10 ^{4*}
	B	1,2 x 10 ³
Goiaba	A	1,1 x 10 ³
	B	4,1 x 10 ³
Maracujá	A	1,3 X 10 ³
	B	8,6 x 10 ^{3*}

Fonte: Elaborada pelos autores.

*Amostras de polpas de frutas congeladas que não estão em conformidade com os padrões estabelecidos pela Instrução Normativa nº 49 de 26 de setembro de 2018 (BRASIL, 2018).

A Instrução Normativa nº 01 de 07 de setembro de 2000 e Instrução Normativa nº49 de 26 de setembro de 2018, fixam os padrões de identidade e qualidade para polpa de fruta e com relação à contagem de bolores e leveduras estabelece como limite máximo 5x10³ UFC/g para polpa *in natura*, congelada ou não; e 2x10³ UFC/g para polpa que sofreu tratamento térmico ou foi conservada quimicamente (BRASIL, 2000; BRASIL, 2018).

As elevadas contagens de bolores e leveduras, associadas com a presença de bactérias do grupo coliformes, reforçam a hipótese de processamento inadequado ou recontaminação pós-processo, explicado por qualidade insatisfatória da matéria-prima, equipamentos sujos, manipulação e sanitização inadequadas (SANTOS; COELHO; CARREIRO, 2008).

Santos e Nascimento (2014) avaliando a qualidade microbiológica de polpas de frutas comercializadas em feiras de São Luís - MA, verificaram altas contagem de bolores e leveduras, acima do padrão estabelecido pela legislação vigente e ressaltam que a presença de bolores/leveduras nos alimentos pode representar perigo à saúde dos consumidores em razão da produção de micotoxinas por estes micro-organismos, sendo, necessário monitoramento das condições microbiológicas.

Lanz, Nachtigal e Severo (2019) avaliando parâmetros de qualidade de polpas de acerola congeladas, também observaram que as amostras em análise apresentaram resultados referentes à contagem de bolores e leveduras divergentes aos parâmetros requeridos pela

legislação com resultados variando entre $2,26 \times 10^3$ a $1,27 \times 10^4$ UFC/g.

Contudo isso, os resultados para contagem de bolores e leveduras encontrados na presente pesquisa indicam que polpas de acerola (marca B), caju (marca A) e maracujá (marca B) apresentaram-se fora dos padrões exigidos pela legislação, embora esperado que para alimentos congelados a contagem de bolores e leveduras seja baixa devida o emprego de temperatura adequada na conservação das polpas. Assim, a figura 3 apresenta resultados referentes à identificação de bolores e leveduras nas amostras em não conformidade com a legislação vigente, conforme citado anteriormente.

Figura 3. Contagem Padrão em Placas de Bolores e Leveduras (UFC.g⁻¹) em polpas de acerola (marca B), caju (marca A) e maracujá (marca B).

Fonte: Elaborado pelos autores.

Um fator de grande importância para a obtenção de polpas de frutas de qualidade é a aplicação de algum tratamento térmico, como a pasteurização, inibindo ou eliminando o crescimento de micro-organismos causadores de possíveis contaminações. Entretanto, infelizmente este processo é negligenciado por pequenas agroindústrias (LANZ; NACHTIGAL; SEVERO, 2019).

Souza et al. (2020) avaliando polpas congeladas de acerola e maracujá de diferentes marcas comerciais (A, B, C) obtiveram resultados para contagem de bolores e leveduras variando de $1,0 \times 10^2$ a $4,0 \times 10^1$ UFC/g para polpa de acerola e $1,1 \times 10^2$ a $6,0 \times 10^1$ UFC/g para polpa de maracujá. Resultados esses inferiores aos valores encontrados na presente pesquisa.

As frutas são ricas em vitaminas e compostos orgânicos que favorecem o crescimento das bactérias, leveduras e bolores. A ampla variedade de pH para crescimento dos bolores e leveduras faz com que estes micro-organismos se tornem agentes de deterioração das frutas (JAY, 2005).

Para pesquisa de *Salmonella* sp., verificou-se que todas as amostras estão em conformidade com a legislação vigente com ausência em 25g da amostra (Tabela 03).

Tabela 3. Resultados médios para Pesquisa de *Salmonella* sp. em polpas de frutas congeladas.

Sabores Avaliados	Marcas comerciais	Pesquisa de <i>Salmonella</i> sp.
Acerola	A	Ausente
	B	Ausente
Cajá	A	Ausente
	B	Ausente
Caju	A	Ausente
	B	Ausente
Goiaba	A	Ausente
	B	Ausente
Maracujá	A	Ausente
	B	Ausente

Fonte: Elaborada pelos autores.

A Instrução Normativa n.º 49, de 26 de setembro de 2018 – Ministério da Agricultura e do Abastecimento; Resolução RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001 preconiza que o padrão permitido para *Samonella* sp. seja ausência em 25g, visto que esse micro-organismo é classificado como bactéria patogênica. Desse modo, as amostras analisadas apresentaram-se em conformidade com o que preconiza a legislação vigente (BRASIL, 2001; BRASIL, 2018).

Souza et al. (2016) realizando avaliação microbiológica em polpa de acerola, abacaxi, cajá, goiaba, graviola, mamão, manga e maracujá, identificaram *Salmonella* spp. em 5% das amostras e por ser um micro-organismo patogênico deve estar ausente nas amostras por representar um potencial risco a saúde dos consumidores.

A *Salmonella* é uma bactéria gram-negativa, anaeróbia facultativa causadora de infecções de grande impacto das Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA's) no mundo. Essa bactéria tem como habitat primário o trato gastrointestinal do homem e as doenças provocadas por essa bactéria têm como principais alimentos envolvidos produtos lácteos, ovos, carnes, entre outros (GABARON; OTUTUMI; PIAU JÚNIOR, 2015; MENDONÇA et al., 2020). A ausência deste micro-organismo pode ser indicativa de que, possivelmente, as amostras foram processadas em condições satisfatórias desde o processamento até o consumidor final (SOUZA; SOUZA; MENDES, 2019).

Identificação de matéria estranha

De acordo com os resultados obtidos foi possível detectar matérias estranhas nas polpas de frutas congeladas (tabela 4).

Tabela 4. Resultados da análise microscópica de polpas de frutas congeladas comercializadas no município de Quixeramobim - CE.

Sabores Avaliados	Marcas comerciais	Presença de Sujidades	Partes de insetos	Larvas vermiformes
Acerola	A	Presente	Presente	Ausente
	B	Presente	Presente	Ausente
Cajá	A	Presente	Ausente	Ausente
	B	Presente	Ausente	Ausente
Caju	A	Presente	Ausente	Ausente
	B	Presente	Ausente	Ausente
Goiaba	A	Ausente	Ausente	Presente
	B	Ausente	Ausente	Presente
Maracujá	A	Presente	Ausente	Ausente
	B	Presente	Ausente	Ausente

Fonte: Elaborado pelos autores.

Verificou-se que das matérias estranhas identificadas destacou-se a presença de sujidades, como fragmentos de vidro e partes de insetos.

Conforme a Instrução Normativa nº1 de 07 de janeiro de 2000, que estabelece o padrão de Identidade e Qualidade (PIQs) para polpas de frutas, no que se refere à microscopia não permite a presença de terra, sujidade, parasitas, fragmentos de insetos ou pedaços das partes não comestíveis da fruta e da planta (BRASIL, 2000).

Santos (2015) avaliando a qualidade microscópica e microbiológica de polpa de acerola antes e depois da intervenção para treinamento de manipuladores verificou que em 100% das amostras analisadas foi encontrado algum tipo de matéria estranha, sendo que antes da intervenção foi encontrado um número maior de sujidades (27) que as obtidas depois da intervenção (16). Sendo assim, consideradas impróprias para o consumo por apresentar matérias estranhas prejudiciais à saúde humana, como pelos e fragmentos de insetos, demonstrando o efeito da ausência das Boas Práticas de Fabricação.

Observou-se presença de partes de insetos em polpa congelada de acerola das marcas A e B e sujidades, identificadas e associadas a fragmentos de vidro em polpa congelada de cajá da marca A, conforme apresentada na figura 4.

Figura 4. Imagens microscópicas da identificação de matérias estranhas em polpas congeladas de acerola e cajá.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Perreira et al. (2006) avaliando a qualidade de polpas comercializadas em Viçosa-MG, detectaram a presença de matérias estranhas em polpas caju, goiaba e graviola, sendo encontrados insetos, fragmentos de inseto/larvas e tecido vegetal. Fregonesi et al. (2010) caracterizando polpas de frutas comercializadas em Ribeirão Preto - SP, verificaram que do total de amostras analisadas 53,33% estavam em desacordo quanto aos parâmetros microscópicos.

De acordo com Santos (2015) a maior conscientização dos responsáveis pelas linhas de produção nas indústrias de processamentos de polpas de frutas e o treinamento dos manipuladores podem melhorar as condições higiênico-sanitárias dos produtos.

Nas análises microscópicas realizadas com polpa de cajá, observou-se que essas apresentaram presença de fragmentos de vidro, provavelmente devido à quebra de algum material próximo à área de processamento, ocasionando assim modificações na qualidade da polpa de fruta processada, já que a legislação especifica ausência de fragmentos ou qualquer sujidade.

Além disso, observou-se a presença de larvas vermiformes em amostras de polpa de goiaba da marca “A”; sendo identificadas pelo seu formato e movimentos rápidos durante a análise, podendo sua presença estar associada ao desenvolvimento a partir de ovos presentes na goiaba que foi submetida ao processamento.

Conclusões

As amostras de polpas de frutas analisadas apresentaram resultados satisfatórios quanto a ausência *Salmonella* sp.

Na análise de coliformes totais/termotolerantes foram evidenciadas resultados em conformidade e não conformidade com o estabelecido pela legislação vigente. Além disso, foi

detectada a presença de *E. coli* nas polpas de caju e goiaba da marca A e B.

Para a contagem de bolores e leveduras os sabores caju (marca “A”), acerola e maracujá (marca “B”) apresentaram não conformidade com a legislação.

Foi possível realizar a detecção de matéria estranha e sujidades nas polpas de frutas, tais como: fragmentos de vidro e parte de insetos, com exceção da amostra de polpa de goiaba que não foi identificado nenhum tipo de sujidades citadas, mas possivelmente a presença de larvas vermiformes nas mesmas.

Referências

BRASIL. Agência Nacional De Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 12, de 02/01/2001. **Regulamento Técnico sobre Padrões Microbiológicos para Alimentos**. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 10 jan. 2001, Seção I, p. 45-53.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Abastecimento. **Regulamento Técnico Geral para Fixação dos Padrões de Identidade e Qualidade para Polpa de Frutas**. Instrução Normativa nº1 de 07/01/2000. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, nº 6, 10/01/2000.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Padrões de Identidade e Qualidade de Suco e Polpa de Fruta**. Instrução Normativa nº49 de 26 de setembro de 2018. Diário Oficial da União, Brasília, ed. 187, seção 1, pág. 4, 27/09/2018.

CASTRO, T. M. N.; ZAMBONI, P. V.; DOVADONI, S.; CUNHA NETO, A.; RODRIGUES, L. J. Parâmetros de qualidade de polpas de frutas congeladas. **Revista do Instituto Adolfo Lutz**, v. 74, n. 4, p. 426-436, 2015.

DANTAS, R.; ROCHA, A. P. T.; ARAÚJO, A. S.; RODRIGUES, M. A. S.; MARANHÃO, T. K. L. Qualidade Microbiológica de polpa de frutas comercializadas na cidade de Campina Grande, PB. **Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais**, v.14, n.2, p.125-130, 2012.

FARIA, R. A. P.; BRASIL, A. S.; ROSA, O. O.; SIQUEIRA, N. M. F. P. Avaliação da qualidade microbiológica de polpas de frutas congeladas comercializadas na cidade de Cuiabá – MT. **Higiene Alimentar**, v. 30, n. 256/257, 2016.

FARIAS, M.; OLIVEIRA, B. D.; COSTA, F. E. de. C. Determinação da qualidade microbiológica de polpas de açaí congeladas comercializadas na cidade de Pouso Alegre - MG. **Alimentos e Nutrição**, Araraquara, v.23, n.2, p.243-249, 2012.

FLORES, A. M. P. C. MELO, C. B. Principais bactérias causadoras de doenças de origem alimentar. **Revista Brasileira de Medicina Veterinária**, v. 37, p. 65-72, 2015.

FRANCO, B. D. G.; LANDGRAF, M. **Microbiologia dos alimentos**. São Paulo: Atheneu, 2008.

FREGONESI, B. M.; YOKOSAWA, C. E.; OKADA, I. A.; MASSAFERA, G.; BRAGA COSTA, T. M.; PRADO, S. P. T. Polpa de açaí congelada: características nutricionais, físico-

químicas, microscópicas e avaliação da rotulagem. **Revista Instituto Adolfo Lutz**. São Paulo, v.69, n.3, p. 387-395, 2010.

FREITAS, R. V. S. **Avaliação da qualidade de polpas de frutas congeladas comercializadas no município de Limoeiro do Norte – CE**. 77 f. 2013. Monografia (Especialização em Segurança Alimentar) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará *Campus* Limoeiro do Norte – CE, 2013.

GABARON, D. de A.; OTUTUMI, L. K.; PIAU JÚNIOR, R. Surtos de salmonelose notificados no período de janeiro de 2009 a julho de 2014 no estado do Paraná, Brasil. **Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da UNIPAR**, v. 18, n. 1, p. 33-37, 2015.

GERMANO, P. M. L.; GERMANO, M. I. S. **Higiene e vigilância epidemiológica de alimentos**. Barueri: Manole, 2015.

JAY, J. M. Microbiologia de Alimentos. 6. ed., Porto Alegre: Artmed, 2005.

LANZ, C.; NACHTIGA, L.; SEVERO, J. Parâmetros de qualidade de polpas de uva e acerola congeladas. **Revista de Ciência e Inovação do IF Farroupilha**, v. 04, n. 01, p. 94-105, 2019.

MENDONÇA, L. P.; COSTA, M. G. A.; MACEDO, R. C. B. S.; SALES JÚNIOR, R. A.; SANTANA, F. E. O.; SILVA, L. R. C. Doenças emergentes de origem alimentar: uma revisão integrativa. **Revista Brasileira de Educação e Saúde**, v. 10, n. 3, p. 1-6, 2020.

MUNIZ, M. B.; QUEIROZ, A. J. DE M.; FIGUEIREDO, R. M. F. DE.; DUARTE, M. E. M. Caracterização Termofísica de Polpas de Bacuri. **Revista Ciência e Tecnologia de Alimentos**, Campinas, v. 26, n. 2, p.360-368, 2006.

MUNIZ, C. M.; REIS, R. B. S.; VIEIRA, V. F. Coliformes totais e *Escherichia coli* em polpas de frutas comercializadas no Sudoeste da Bahia. **In on Line Revista Multidisciplinar e de Psicologia**, v. 11, n. 35, p. 180-187, 2017.

OLIVEIRA, E. S.; BARBOSA, J. B.; TALMA, S. V.; PEREIRA, S. M. F. Qualidade de polpas de frutas congeladas comercializadas em Campos dos Goytacazes – RJ. **Vértices**, v.14, n.1, p.73-80, 2012.

PARIZ, K. L. **Avaliação da qualidade microbiológica de polpas de frutas**. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, 2011.

PERREIRA, J. M. de A. T. K.; OLIVEIRA, K. A. de M.; SOARES, N. de. F. F.; GONÇALVES, M. P. J. C.; PINTO, C. L. O.; FONTES, E. A. F. Avaliação da qualidade físico-química, microbiológica e microscópica de polpas de frutas congeladas comercializadas na cidade de Viçosa-MG. **Alimentos e Nutrição**, Araraquara, v.17, n.4, p.437-442, 2006.

SATIM, M.; SANTOS, R. A. M. Estudo das características nutricionais das polpas de mangas (*Mangifera indica* L.) variedade Tommy Atkins. **VI EPCC**. Encontro Internacional de Produção Científica Cesumar, 2009.

SANTOS, C. A. A.; COELHO, A. F. S.; CARREIRO, S. C. Avaliação microbiológica de

polpas de frutas congeladas. **Revista Ciência e Tecnologia de Alimentos**, Campinas, v.28, n.4, p. 913-915, 2008.

SANTOS, L.C.M. **Avaliação da qualidade microscópica e microbiológica de polpa de acerola antes e depois de intervenção para treinamento dos manipuladores**. 36f. 2015. (Trabalho de Conclusão de Curso – Engenharia de Alimentos) - Sete Lagoas: Universidade Federal de São João Del Rei; 2015.

SANTOS, W. C.; NASCIMENTO, A. R. Caracterização microbiológica de polpas de quatro frutas regionais comercializadas em feiras de São Luís/MA. **Caderno de Pesquisa**, v. 21, n. especial, p. 01 – 07, 2014.

SEBRAE. Agronegócio Fruticultura. **Boletim de Inteligência**, 2015. Disponível: <[http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/64ab878c176e5103877bfd3f92a2a68f/\\$File/5791.pdf](http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/64ab878c176e5103877bfd3f92a2a68f/$File/5791.pdf)>. Acesso em: 11/07/2019.

SILVA, N.; JUNQUEIRA, V. C. A.; SILVEIRA, N. F. A.; TANIWAKI, M. H.; SANTOS, R. F. S.; GOMES, R. A. R. **Manual de métodos de análise microbiológicas de alimentos – 4. Ed.** - São Paulo: Livraria Varela, 2010. 552p.

SOUZA, A. C. F.; SOUZA, J. F.; MENDES, I. G. Avaliação microbiológica de polpas congeladas de frutas comercializadas em feiras públicas da cidade de Macapá, Amapá. **Research, Society and Development**, v. 09, n. 02, p. 01-10, 2019.

SOUZA, G. C.; CARNEIRO, J. G.; GONSALVES, H. R. de. O. Qualidade microbiológica de polpas de frutas congeladas produzidas no município de Russas – CE. **Revista Agropecuária Científica no Semi-árido**, v. 7, n. 3, p. 01-05, 2011.

SOUZA, J. C. C. O.; MACEDO, R. O.; LEANDRO, L. M. G.; ALMEIDA, B. J.; FONSECA, F. L. A. Avaliação Microbiológica de polpas de frutas comercializadas na cidade de Juazeiro do Norte – CE. **Higiene Alimentar**, v. 30, n. 254/255, 2016.

SOUZA, Y. A.; BORGES, M. A.; VIANA, A. F. S.; DIAS, A. L.; SOUSA, J. J. V.; SILVA, B. A.; SILVA, S. K. R.; AGUIAR, F. S. Avaliação físico-química e microbiológica de polpas de frutas congeladas comercializadas em Santarém – PA. **Brazilian Journal of Food Technology**, v. 23, n. 1, p. 1-10, 2020.

CHAPTER 07: BACTERIA FROM BOVINE MASTITIS: SURVEY AND LITERATURE REVIEW

Patrícia Jacob dos Santos¹; Silvia Leal Ladeira²; Helenice de Lima Gonzalez³; Giniani Carla Dors⁴; Patrícia da Silva Nascente⁵

Abstract

Subclinical bovine mastitis is the most prevalent and responsible for the loss of 70% in production, reducing milk secretion by 45%. Clinical mastitis shows clinical signs, in addition to reducing production. The objective of this work was to study bovine mastitis in the literature and conduct research on bacteria in cases of mastitis in four dairy farms in the region of Pelotas - RS - Brazil. In addition to bibliographic research, pathogenic aerobic bacteria were isolated and identified in 94 milk samples with clinical mastitis (n = 12) or subclinical (n = 82) with positive CMT (+ + +). The samples collected and previously identified in test tubes were cultured in blood agar and oven 36°C/24 h, and reading the results performed within 24h to 36°C aerobically. Bacterial growth was observed in 62 (65.9%) samples: 12 (19.4%) clinical mastitis and in 50 (80.6%) subclinical mastitis. After identified biochemical characterization: Coagulase negative *Staphylococcus* sp. (n = 29), *Staphylococcus* sp. Coagulase positive (n = 6), *Corynebacterium* spp. (n = 16), *Streptococcus* spp. (n = 7), *Streptococcus uberis* (n = 4). The knowledge and identification of the etiological agent is important for the correct treatment and implementation of mastitis control and prevention methods and for herd monitoring.

Keywords: Mastitis, Card Mastitis Test, CMT, Somatic Cells Count, SCC.

Introduction

Milk is considered a complete food with high nutritional value, composed mainly of water (87.3%), proteins (3.3 to 3.5%), lipids (3.5 to 3.8%), mineral salts (0.7%), vitamins and lactose (4.9%) (SGARBIERI, 2005). Being rich in proteins, vitamins, fats, carbohydrates and minerals is an important source of nutrients for humans and several bioactive compounds that are highly significant for several biochemical and physiological functions (MARTINS; ANDRADE, 2011; ORTEGA-ANAYA; JIMÉNEZ-FLORES, 2018; KHAN et al., 2019). And so, it can be better used by the body, it should be of excellent quality, thus ensuring efficiency (MENDONÇA et al., 1999). Milk and derivatives are excellent means for the development of desirable microorganisms, and other pathogenic and deteriorating microorganisms, as well as the milk microbiota has a direct influence on the health of bovine mammary glands, thus requiring care with their production: milking, processing and storage (GUIMARÃES; LANGONI, 2009; PANG et al., 2018). The microorganisms originate from the milk of infected udder, and the

¹ Programa de Pós Graduação em Bioquímica e Bioprospecção, UFPEL, patisfarma@gmail.com

² Faculdade de Veterinária, UFPEL, helenicegonzalez@hotmail.com

³ Faculdade de Veterinária, UFPEL, s.ladeira@hotmail.com

⁴ Faculdade de Agronomia, UFPEL, dorsgi@yahoo.com.br

⁵ Doutora, Instituto de BiologiaUFPEL, pattsn@gmail.com

surface thereof or a variety of other sources environment (GODKIN; LESLIE, 1993; METZGER et al., 2018).

Mastitis is characterized by an inflammation of the mammary gland related to physical, chemical, thermal, or microbial, and 90% of mastitis are caused by bacteria (RAMALHO et al., 2012). This disorder can be classified as a form of presentation as clinical or subclinical (PHILPOT; NICKERSON, 1991). The clinical presentation is characterized by visible signs, while the subclinical form displays a degree of difficulty to identify because there is no clinical changes in the mammary gland that can be observed macroscopically (MIRA et al., 2013). A diagnosis of clinical mastitis is based on clinical observations with identification of the infectious agent. The subclinical form is usually the most prevalent accounting for approximately 70% of production losses may reduce the secretion of milk by 45% (FONSECA; SANTOS, 2000). In this case it is necessary to use other methods of diagnosis, somatic cell count (SCC) and somatic cell score (California Mastitis Test - CMT) are common diagnostic tests for the detection of subclinical mastitis (HARMON, 1994; MACHADO et al., 2000; DELLA LIBERA et al., 2011; ADKINS; MIDDLETON, 2018). In Brazil it can be said that subclinical mastitis is present in all dairy herds (MACHADO et al., 2000).

The pathogens involved in the etiology of bovine mastitis can be classified into "major" and "minor". The first category includes agents that cause higher SCC, significant changes in milk composition and, consequently, a great economic impact, the main ones being: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, Coliforms, *Streptococcus* spp., *Enterococcus* spp., *Pseudomonas* spp., *Actinomyces pyogenes* and *Serratia* spp. Negative Coagulase (NC) *Staphylococcus* and *Corynebacterium bovis* pathogens are considered "minor" and promote moderate inflammation with lower SCC (HARMON 1994). Considering the source of infection, the agents of mastitis are classified, infectious (primary mastitis), such as: *Streptococcus agalactiae*, *Staphylococcus aureus*, *Mycoplasma* spp., *Corynebacterium bovis*, NC *Staphylococcus*, or environmental (secondary mastitis) such as *Escherichia coli*, Coliforms, *Streptococcus uberis*, *Enterococcus* spp., *Streptococcus equinus* (formerly *S. bovis*) and other environment *Streptococcus* spp. (COSTA et al. 1998, MENDONÇA et al. 1999; HEIKKILÄ et al., 2018).

The increase in somatic cells is the main feature used for the diagnosis of subclinical mastitis, other factors may however result in this change. There are several tests that assess Somatic Cell Count (SCC) of milk from these tests highlight the CMT,

WMT (Wisconsin Mastitis Test) and Electronic Somatic Cell Count (SCC) (RUPP et al., 2000). The cultivation of milk samples from individual mammary quarters is used to identify an etiologic agent, especially in cases of positive CMT (BRAMLEY et al., 1996; SEARS et al., 1993). In times of automatization of dairy cow husbandry, objective tools for mastitis diagnostic are demand and moderns studies about diagnose show the true positives quarters on CATH ELISA or handheld dynamometer and an infrared thermometer to diagnose and score clinical and subclinical mastitis (MAHMMOD et al., 2013; WOLLOWSKI et al., 2019; PUGGIONI et al., 2020) but he results obtained in the investigation of the causal agents of mastitis are fundamental to the understanding of the specific problems of the herds, to guide rational measures to control mastitis and suggest changes regarding the management adopted, including performing susceptibility testing to indicate best medication for treatment (RADOSTITIS et al., 1994; BRAMLEY et al., 1996). The use of diagnostic tests indirectly leads to a reduction in mastitis cases, providing thus a higher quality milk product (MIRA et al., 2013).

The objective of this work was to study clinical and subclinical bovine mastitis in the literature and conduct research on bacteria frequency in cases of mastitis in four dairy farms in the region of Pelotas - RS - Brazil.

Materials e Methods

Dairy Farm

Four Jersey and Dutch dairy farms in Pelotas - RS were studied during the six-month period (January to June) to verify cases of clinical and subclinical mastitis (CMT + ++). The four farms milking was performed twice a day, with a mean interval of 12 h. During visits was evaluate all lactating cows and the four mammary quarters.

The clinical mastitis was diagnosed by testing “Dark Background Test” with five first jets of milk and observation lumps. Subclinical mastitis was tested with California Mastitis Test (CMT). The test CMT is determined according to the degree of gelation or viscosity of the mixture of equal parts milk and reagent (2 mL) in the appropriate tray. The results may be negative or positive scores, the latter being classified in three levels (+, + +, + + +). In this case were selected for the analysis process microbiological those with scores + + +, as well as cases of clinical mastitis with the presence of clinical signs.

Milk Sampling

After pre-dipping, “Dark Background Test” and CMT, from the mammary quarter

positive to clinical or subclinical mastitis, 10 mL of milk was collected in sterile tubes. Before was made disinfection of teat orifice with cotton soaked in alcohol 70°GL, identified for each mammary quarter and shipped immediately after collection, to the Regional Laboratory Diagnostics - Faculty of Veterinary (UFPEL) under refrigeration in insulated containers with ice.

Microbiology

In the laboratory, samples were plated on blood agar (8% defibrinated sheep blood), the reading of the plates held at 18 to 24 h in an oven maintained at a temperature of 36°C in aerobic atmosphere. The samples which were subjected to bacterial growth making smear stained by Gram and subsequently to the appropriate biochemical tests such as catalase, coagulase, and assimilation of carbohydrates for their identification.

All samples were biochemically characterized in the Bacteriology Sector of the Regional Diagnostic Laboratory of the Faculty of Veterinary Medicine. The methodology used to follow the Cowan and Steel bacterial identification manual (STEEL et al. 1993). The samples were subjected to the Catalase test to differentiate *Staphylococcus* spp. (positive catalase) from *Streptococcus* spp. and *Enterococcus* spp. (both negative catalase). Catalase positive samples were submitted to MR-VP (Methyl Red, Voges-Proskauer), Coagulase test and biochemical analyses against Ribose, Nitrate, Galactose, Maltose, Mannitol and Trealose, in addition to polymyxin resistance.

CAMP test was performed for catalase negative samples and Esculin, Inulin, Mannitol, Salicin, Sorbitol and Trealose tests. These samples were placed in BHI broth (Brain Heart Infusion), manufactured by Laboratórios Conda S.A. + 6.5% NaCl to differentiate *Streptococcus* spp. (no growth) from *Enterococcus* spp. (there is growth). After carrying out the tests, the samples were placed in the oven at 37 °C and after 24 h the reading was done.

The study was conducted with frequency analysis of cases of clinical and subclinical mastitis and frequency of microorganisms observed. The total number of mammary quarters analysed was calculated the percentage of clinical mastitis, subclinical (CMT + + +), non-infectious and infectious and the data were analysed descriptively.

Results e Discussion

In the four dairy farms studied, 94 (quarter mammary) cases of mastitis were observed, 82 (87.2%) cases of subclinical mastitis (CMT + + +) and 12 (12.8%) cases of

clinical mastitis. The bacterial isolation was observed in 62/94 (65.9%) samples: 12 (19.4%) originated from clinical mastitis and in 50 (80.6%) from subclinical mastitis. Considering only subclinical mastitis (n = 82) bacterial isolation was 50, representing 60.8% (Table 1).

Table 1 – Distribution of clinical and subclinical mastitis frequency in four dairy farms in the city of Pelotas - RS

Mastitis	N	%
Clinical	82	87.2%
Subclinical	12	12.8
TOTAL	94	100

Zeryehun and Abera (2017) concluded that prevalence of mastitis particularly the subclinical mastitis was major problem of dairy cows when observed prevalence of clinical and subclinical mastitis and quarter level prevalence for clinical and subclinical mastitis were 12.5% and 51.8% at cow level. Clinically, 101 (6.6%) quarters which belong to 75 (19.5%) animals were found to be with blind teat.

Philpot and Nickerson (1991) indicate that 90% of mastitis are caused by bacteria. In addition to these pathogens, fungi, yeasts, algae, and viruses may also be involved in the etiology of the disease, but the occurrence is low. According to Ribeiro et al. (2003) infectious subclinical mastitis is one that presents positive test result for CMT, or other tests indicative and confirmed by microbial growth. This test was chosen because it is one of the most popular and practical tests for the diagnosis of subclinical mastitis, which analyzes separately the mammary glands of lactating cows (PHILPOT, 1994; DELLA LIBERA et al., 2011; PADUCH et al. 2013; GODDEN et al., 2017).

For some years, the frequency of clinical and subclinical mastitis in dairy cattle has been studied worldwide. It seeks to understand which microorganisms involved in each one to better understanding the origin and prevention of this disease. In relation to subclinical mastitis, like the results observed in this study, other authors did not have 100% of bacterial isolation in CMT positive milk samples. Costa et al. (1986) reported bacterial growth at 88.8% between 2533 CMT positive milk samples, originating from 32 dairy properties, eighteen municipalities of the state of São Paulo- Brazil.

Results higher than those cited in this paper in relation to subclinical mastitis.

Filippsen et al. (1999) showed that of 1.319 mammary quarters with CMT positive, 670 (50.0%) presented in isolation microbiological, and Brito et al. (1999) analyzed samples 6315, found that in 57.6% of bacteria were isolated. Beloti et al. (1997) working with 295 milk samples from subclinical mastitis, bacterial growth obtained in 223 (75.6%) samples. These results are lower than those obtained in the present study. At the same time Costa et al. (1995) reported 46.5% positive mammary quarters the CMT showed bacterial isolation.

The different studies show frequency of mastitis in dairy farm, isolation frequency in subclinical and clinical mastitis and which microorganisms involved (KAKI et al., 2019; AMBROGGIO et al., 2018). Etiological agents may vary from place to place, depending on the weather; animal and livestock species and include a wide variety of gram-positive and gram-negative bacteria; fungal (DEB et al. 2013). Sargeant et al. (1998) describe the frequency of occurrence of clinical mastitis in dairy herds in Ontario. In 65 dairy farms involved in a 2-year observational study with 2840 cows and heifers, 19.8% of cows experienced one or more cases of clinical mastitis during lactation. Environmental, contagious, and minor pathogens were all associated with cases of clinical mastitis.

A study conducted by Ribeiro et al. (2001a) observed that the total of 9.079 with a positive reaction to CMT, 4.952 (54.5%) showed microbial growth. Ribeiro et al. (2001b) showed that of 9.150 samples with positive CMT, 4.988 (54.5%) had bacterial isolation. In another study Ribeiro et al. (2001c) found that of 1.554 samples positive to the CMT, 596 (38.4%) presented microbial isolation. Confirming that not all milk samples positive present CMT bacterial growth. The same author notes that the greater the intensity of the reaction to CMT greater the number of samples positive microbiologically. This justifies the high percentage of this work insulations in cases of CMT positive, since it was only evaluated score + + +. To Brito et al. (1999), the number of bacterial isolates increased with the intensity of the reaction to CMT. Regarding 32 (34.1%) samples with CMT + + + found in this study, which showed no bacterial isolation, can be explained by some physiological interferences. There are several factors that can influence the variation of SCC being cited: the order of birth, lactation, month and season (SCHEPERS et al., 1997; LAEVENs et al., 1997; SOUZA et al., 2005; CUNHA et al., 2008). For this reason, the CMT test should be performed as presumptive test for mastitis, just as it is necessary to repeat the microbiological examination in these cases. The inflammation may also be present without an infectious process in the gland,

due to traumatic injuries, assaults by chemical agents, among other factors. The microbial agent may further have already been eliminated by the natural way of self-healing processes, resulting in a negative culture (RIBEIRO et al., 2003; BRITO et al., 1999; SKRZYPEK et al., 2004; GOMES et al., 2011).

Costa et al. (2001), in their study, 8.116 samples were collected from the mammary glands negative CMT, and 45.1% were isolated microorganisms contagious. Moreover, the test samples positive CMT not always show microbial growth. According to the author, it is suspected that the agent is not removed continuously false negative result may occur. According to Sears et al. (1993) and Brito et al. (1999), samples of milk should be confirmed microbiologically negative only after two or three analyzes.

Freitas et al. (2005) analyzed 984 quarters breast. Of these, 10 (1.0%) had clinical mastitis and 562 (57.1%) subclinical mastitis. Correlating the CMT test with microbiological examination, it was found that 562 of subclinical mastitis, only 356 (63.3%) were positive for microbiological examination. The positive results in CMT, but negative in microbiological examination may indicate an inflammatory etiology of nonbacterial, because according to Costa et al. (1996), the CMT is a helper method in good correlation with the microbiological examination, however, the inflammatory process may not be of infectious origin.

The results reported for the identification of subclinical mastitis by CMT suggest greater caution in the use of this test as an indicator of intramammary infection by the finding of large numbers of milk samples without microbial growth, since it is probably a non-infectious subclinical mastitis. And we still need to work proactively in mastitis control, it is a disease management and to make a proper prevention, it is necessary to consider the entire property management, mainly including hygienic measures (CARVALHO et al., 2002, SILVA et al., 1998). These results are worrying, since according to Prado et al. (1997) the subclinical form is responsible for the largest losses in the production and composition of milk.

The quality of raw milk is influenced by multiple factors, among which are zootechnical factors associated with management, health of the mammary gland, feeding, genetic potential of the herds and factors related to the obtaining and storage of the milk-milk milk (GUERREIRO et al., 2005). One of the causes that exert extremely harmful influence on the composition and characteristics of milk is a mastitis (Müller, Ernst 2002).

In cases of clinical mastitis in 100% of cases was bacterial isolation, indicating that there is always the microbial involvement when the clinical signs are apparent. After

the biochemical characterization identified: Negative Coagulase *Staphylococcus* spp. (n=29), Positive Coagulase *Staphylococcus* spp. (n=6), *Corynebacterium* spp. (n=16), *Streptococcus* spp. (n=7), *Streptococcus uberis* (n=4) (Table 1). The identification of the etiologic agent is important for the implementation of methods of prevention and control and monitoring of the herd. The importance of diagnosing subclinical mastitis and apparently healthy, the use of CMT, is to discover which animals can be transmitters of infection by line or by hand milking the milker (BRAMLEY et al., 1996; HARMON 1994). These animals besides being sources of contamination, contribute by low milk quality and lower total volume produced, which reflects in economic losses to property (MOEINI et al., 2002). However, despite the bacteriological diagnosis to be crucial, it is expensive and time consuming, not being applicable to herds with large numbers of animals. Several simplifications have been studied in order to eliminate these difficulties, the use of special culture media and creating schemes presumptive identification (RIBEIRO et al., 2003; FIGUEIREDO, 1995).

Table 2 – Microorganisms isolated from milk of cows with mastitis in Pelotas - Rio Grande do Sul

Microrganisms	N	%
Coagulase negative <i>Staphylococcus</i> spp.	29	46,8
Coagulase positive <i>Staphylococcus</i> spp.	6	9,7
<i>Corynebacterium</i> spp.	16	25,8
<i>Streptococcus</i> spp.	7	11,3
<i>Streptococcus uberis</i>	4	6,4
TOTAL	62	100

The species isolated in this study belonged to the classification of major pathogens (53.2%) and minor (46.8%), environmental (11.3%) and infectious (88.7%) and primary (27.4%) and secondary (72.6%). The most common microorganisms in cases of bovine mastitis are *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus* spp., *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Corynebacterium* spp., *Escherichia coli*, *Nocardia* spp. *Prototheca* and *zopfii* (BRABES et al., 1999; BIRHANU et al., 2017; SULEIMAN et al., 2018; ROCHA et al., 2019; BIANCHI et al., 2019; NAUSHAD et al., 2019).

Among the contagious pathogens, *Staphylococcus aureus* is the most frequent and prevalent in cases of bovine mastitis. It causes clinical and subclinical intramammary infection with serious economic loss and herd management problems in dairy cows

(ZSCHÖCK et al., 2000; Kerro Dego et al., 2002). According Gentilini et al. (2002) currently CN *Staphylococcus* have received greater importance as causative agents of intramammary infections in dairy cattle worldwide (KROL et al., 2016; RASPANTI et al., 2016; HOEKSTRA et al., 2018; [MAHMMOD](#) et al., 2018; RONCO et al., 2018; MACFADYEN et al., 2019). The *S. aureus* is known worldwide as a causative agent of various purulent diseases in both humans and animals (BEAN; GRIFFIN, 1990) is also one of the most important causes of food poisoning (PENNA et al., 1998) due to production of various enterotoxins (OMOE et al., 2002). Thus, the milk and dairy products are important vehicles of *S. aureus* and are commonly involved in outbreaks of food poisoning (BERGDOLL, 1989).

Although most articles reviewing belong to Brazilian studies in other countries, such as Sweden, the isolated species are the same: The most common isolates of 590 bacteriological diagnoses were *Staphylococcus aureus* (19%) and NC *Staphylococcus* sp. (NCS 16%) followed by *S. dysgalactiae* (9%), *S. uberis* (8%), *Escherichia coli* (2.9%), and *Streptococcus* spp. (1.9%) (PERSSON et al., 2012). The distribution of the most commonly isolated bacteria considering only bacteriological positive samples were: *S. aureus* (31%), NC *Staphylococcus* spp. (27%), *S. dysgalactiae* (15%), *S. uberis* (14%), *E. coli* (4.8%), and *Streptococcus* spp. (3.1%).

The correct identification of *S. aureus* from bovine mastitis is important both from the epidemiological point of view as the prevention of infections, including immunoprophylaxis (BRITO et al., 2002; SOUZA et al., 2019). In Pernambuco, Pinheiro de Sá et al. (2000) found that the most common microorganisms in cases of bovine mastitis were *Staphylococcus* spp. (32.6%) and *Corynebacterium* spp. (13.2%), but among *Staphylococcus* isolated, the species *S. aureus* was the most prevalent (66.4%).

In 2001, a nationwide survey was conducted in Finland to estimate prevalence of bovine mastitis, distribution of mastitis pathogens. The results were compared with those of a previous survey done in 1995. The prevalence of mastitis continued to decrease from 38% in 1995 to 31% in 2001. This mainly resulted from increased prevalence of *Corynebacterium bovis*. NC *Staphylococcus* spp. remained the most common bacterial group, comprising almost one-half of the pathogens isolated, whereas the relative number of *Staphylococcus aureus* isolations decreased from the time of the previous study. Compared with the other Nordic countries, penicillin resistance among the *Staphylococcus* spp. was still at a relatively high level in Finland (52.1 and 32.0% for *Staphylococcus aureus* and CN *Staphylococcus*, respectively) (PIKALA et al., 2001).

Mastitis causing CN *Staphylococcus* and *Staphylococcus aureus* are compared to Taponen; Pyörälä (2008). *Staphylococcus* spp. are the bacteria most commonly isolated from bovine mastitis, and CNS are now predominant over *S. aureus* in most countries. CNS include various species, but only a few prevail in bovine mastitis. *S. aureus* can cause clinical mastitis, but often causes subclinical mastitis, which remains persistent and increases milk somatic cell count. CNS, traditionally regarded as minor pathogens, seem to lack the ability to cause severe mastitis. CNS can, however, persist in the mammary gland and moderately increase milk somatic cell count.

Freitas et al. (2005) noted that the most prevalent agents in bovine mastitis in Pernambuco (Brazil) were 36% NC *Staphylococcus* spp., *Corynebacterium* spp. 34.8% and *S. aureus* 13.6%.

Besides the problems with the infected animals, the study of microorganisms in milk also reveals knowledge about its index of microbial contamination that can be used in the prosecution of its intrinsic quality and sanitary conditions of its production and herd health. Considering the potential to multiply the bacteria in the milk can cause chemical changes such as degradation of fats, proteins or carbohydrates, which may render the product unfit for consumption and industrialization (COUSIN, 1982).

It has questioned the interpretation of the CMT as diagnosing subclinical mastitis, being a subjective test with false-positive or false-negative (MARTIN et al., 1994; CASURA et al., 1995). However, even with some positive results in CMT, but that does not indicate an infectious process, the articles reviewed indicate that this test should be routinely performed for measures in the handling of animals and milking line are adopted to ensure maximum production and quality of milk (BARBOSA et al., 2002; OLIVEIRA et al., 2011).

Conclusion

Based on the research about clinical and subclinical mastitis, microorganisms more frequent and prevalent in mastitis cases, and similarity between positive CMT and isolations of bacterial, these results were able to visualize, in the region of Pelotas - RS, a frequency of clinical and subclinical mastitis in four dairy properties in the period of six months similar results also observed in the country and in the world. It was also possible to know the microorganisms involved in these two cases and confirm what has been happening in research from other locations. Besides, the results reinforce the importance of prevention and control of this disease.

References

- ADKINS, P.R.F.; MIDDLETON, J.R. Methods for Diagnosing Mastitis. **Vet. Clin. North Am. Food Anim. Pract.**, v. 34(3), p. 479-491, 2018.
- AMBROGGIO, M. B.; PERRIG, M. S.; CAMUSSONE, C.; et al. Survey of potential factors involved in the low frequency of CP5 and CP8 expression in *Staphylococcus aureus* isolates from mastitis of dairy cattle from Argentina, Chile, and Uruguay. **J. Appl. Genet.**, v. 59(3), p.357-363, 2018.
- BARBOSA, C. P.; BENEDETTI, E.; RIBEIRO, S. C.A.; GUIMARÃES, E. C. Relação entre contagem de células somáticas (CCS) e os resultados do “California Mastitis Test” (CMT) no diagnóstico de mastite bovina. **Bioscience Journal**, v. 18(1), p. 93-102, 2002.
- BEAN, N. H.; GRIFFIN, P. M. Foodborne disease outbreaks in the United States, 1973-1987: pathogens, vehicles, and trends. **Journal of Food Protection**, v. 53(9), p. 804-817, 1990.
- BELOTI, V., MÜLLER, E. E.; FREITAS, J. C.; METTIFOGO, E. Estudo da mastite subclínica em rebanhos leiteiros no norte do Paraná. **Seminário Ciências Agrárias**, v. 18(1), p. 45-53, 1997.
- BERGDOLL, M. S. *Staphylococcus aureus*. In: Doyle MP (Ed.). Foodborne bacterial pathogens. New York, Marcell Dekker, 1989, p. 463-523.
- BIANCHI, R.M.; SCHWERTZ, C.I.; de CECCO, B.S. et al. Pathological and microbiological characterization of mastitis in dairy cows. **Trop Anim Health Prod.** v. 51(7), p.2057-2066, 2019.
- BIRHANU, M.; LETA, S.; MAMO, G.; TESFAYE, S. Prevalence of bovine subclinical mastitis and isolation of its major causes in Bishoftu Town, Ethiopia. **BMC Res Notes**, v. 10(1), p.767, 2017.
- BRABES, K. C. S.; CARVALHO, E. P.; DIONÍSIO, F. L.; PEREIRA, M. L.; GARINO, F.; COSTA, E. O. Participação de espécies coagulase positivas e negativas produtoras de enterotoxinas do gênero *Staphylococcus* na etiologia de casos de mastite bovina em propriedades de produção leiteira dos Estados de São Paulo e Minas Gerais. **Revista Napgama**, v. 2(3), p. 4-11, 1999.
- BRAMLEY, A. J.; CULLOR, J. S.; ERSKINE, R. J.; FOX, L. K.; HARMON, R. J.; HOGAN, J. S.; NICKERSON, S. C.; OLIVER, S. P.; SMITH, K. L.; SORDILLO, L. M. **Current of Bovine Mastitis**. 4th ed. Madison: National Mastitis Council. 1996, p. 64.
- BRITO, M. A. V. P.; BRITO, J. R. F.; PORTUGAL, J. A. B. Identificação de contaminantes bacterianos no leite cru de tanques de refrigeração. **Rev. Inst. Lat. Când. Tostes**, v. 57, p. 47-52, 2002.

BRITO, M. A. V. P.; BRITO, J. R. F.; RIBEIRO, M. T.; VEIGA, V. M. O. Padrão de infecção intramamária em rebanhos leiteiros: exame de todos os quartos mamários das vacas em lactação. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 51(2), p. 33-35, 1999.

CARVALHO, L. A.; NOVAES, L. P.; MARTINS, C. E.; ZOCCAL, R.; MOREIRA, P.; RIBEIRO, A. C. C. L.; LIMA, V. M. B. 2002. **Embrapa Gado de Leite Sistema de Produção 2** In: http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Leite/LeiteCerrado/manejo/ma_mite.html Accessed in 2 September 2007.

CASURA, C.; SCHUKKEN, Y.H.; RÜSCH, P. Quality assessment of California mastitis test as a diagnostic tool in quarter somatic cell count estimation, **Proc. IDF Int. Mastitis Seminar**, v. 3, p. 57-58, 1995.

COSTA, E. O. Importância da mastite na produção leiteira do Brasil. **Revista de Educação Continuada do CRMV-S**, v. 1, p. 3-9, 1998.

COSTA, E. O.; CARCIOFI, A. C.; MELVILLE, P. A.; PRADA, M. S.; SCHALCH, U. Estudo etiológico da mastite clínica bovina. **Revista Brasileira de Medicina Veterinária**, v.17, p. 156-159, 1995.

COSTA, E. O.; COUTINHO, S. D.; TEIXEIRA, C. M. Etiologia bacteriana da mastite bovina no estado de São Paulo, Brasil. **Revista Microbiológica**, v. 17(2), p. 107-112, 1986.

COSTA, E. O.; MELVILLE, P. A.; RIBEIRO, A. R.; WATANABE, E. T.; CARCIOFI, A. C.; PORADA, M. S. Desinfecção mamária pós-ordenha: avaliação de sua eficiência no controle de mastite bovina. In: **Anais Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária** 24. Goiânia, GO. 1996.

COSTA, E. O.; RIBEIRO, A. R.; GARINO, Jr. F.; SILVA, J. A. B.; WATANABE, E. T.; DELIBRE, E.; LEÃO, E. F. Portador: um importante elo na epidemiologia de mastite infecciosa bovina. In: **Anais Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária** 28 2001, Salvador, 2001.

COUSIN, M. A. Presence, and activity psychotropic microorganisms in milk and dairy products. **Journal of Food Protection**, v. 45, p. 172, 1982.

CUNHA, R. P. L.; MOLINA, L. R.; CARVALHO, A. V.; FACURY FILHO, E. J.; FERREIRA, P. M.; GENTILINI, M. B. Mastite subclínica e relação da contagem de células somáticas com número e lactações, produção e composição química do leite em vacas da raça Holandesa. **Arq Bras Med Vet Zootec**, v. 60, p.19-24, 2008.

DEB, R.; KUMAR, A.; CHAKRABORTY, S.; et al. Trends in diagnosis and control of bovine mastitis: a review. **Pak. J. Biol. Sci.**, v. 16(23), p. 1653-1661, 2013.

DELLA LIBERA, A. M. M. P.; SOUZA, F. N.; BLAGITZ, M. G.; BATISTA, C. F. Avaliação de indicadores inflamatórios no diagnóstico da mastite bovina. **Arquivos do**

Instituto Biológico, v. 78(2), p. 297-300, 2011.

DETILLEUX, J. Tolerance to bovine clinical mastitis: Total, direct, and indirect milk losses. **Journal of Dairy Science** v.101(4), p.3334-3343, 2018.

FIGUEIREDO, J. B. Mastite bovina: visão panorâmica de uma doença complexa In: **Anais** Congresso Brasileiro de Reprodução Animal 11 Belo Horizonte. Anais...:176, 1995.

FILIPPSEN, L. F. Prevalência da mastite bovina causada por *Prototheca zopfii* em rebanhos leiteiros, na região Norte do Paraná. **Ciência Rural**, v. 29(1), p. 87-89, 1999.

FONSECA, L. F. L.; SANTOS, M. V. **Qualidade do Leite e Controle de Mastite**. São Paulo: Lemos Editorial, 2000. 175p.

FREITAS, M. F. L.; PINHEIRO JÚNIOR, J. W.; STAMFORD, T. L. M.; RABELO, S. S. A.; SILVA, D. R.; SILVEIRA, V. M.; SANTOS, F. G. B.; SENA, M. J.; MOTA, R. A. Perfil de sensibilidade antimicrobiana in vitro de *Staphylococcus* coagulase positivos isolados de leite de vacas com mastite no agreste do estado de Pernambuco. **Arq. Inst. Biol.**, v. 72(2), p. 171-177, 2005.

GENTILINI, E.; DENAMIEL, G.; BETANCOR, A. Antimicrobial susceptibility of Coagulase-Negative Staphylococci isolated from bovine mastitis in Argentina. **Journal of Dairy Science**, v. 85, p.1913-1917, 2002.

GODDEN, S.M.; ROYSTER, E.; TIMMERMAN, J.; RAPNICKI, P.; GREEN, H. Evaluation of an automated milk leukocyte differential test and the California Mastitis Test for detecting intramammary infection in early- and late-lactation quarters and cows. **Journal of Dairy Science** v.100(8), p.6527-6544, 2017.

GODKIN, M. A.; LESLIE, K. E. Culture of bulk tank milk as a mastitis screening test: a brief review. **Canadian Veterinary Journal**, v. 34, p. 601-605, 1993.

GOMES, V.; MADUREIRA, K. M.; DELLA LIBERA, A. M. M. P.; BLAGITZ, M. G.; ALVES, M.; BAPTISTELLA, F.; BENESI, F. J. Dinâmica da celularidade do colostro de vacas da raça Holandesa no pós-parto imediato. **Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.**, v. 63(5), p. 1047-1053, 2011.

GUERREIRO, P. K.; MACHADO, M. R. F.; BRAGA, G. C.; GASPARINO, E.; FRANZENER, A. S. M. Milk microbiological quality according to prophylactic techniques in production management. **Agrotech. Sci.**, v. 29, p. 216-222, 2005.

GUIMARÃES, F. F.; LANGONI, H. Leite: Alimento imprescindível, mas com riscos para saúde pública. **Vet. e Zootec.**, v. 16(1), p. 38-51, 2009.

HARMON, R. J. Physiology of mastitis and factors affecting somatic cell counts. **J. Dairy Research**, v. 77, p. 2103-2112, 1994.

HARMON, R. J. Somatic cell counts: a primer. In: Annual Meeting National Mastitis Council 40. Reno. **Anais...** Madison: National Mastitis Council: 3-9, 2001.

HEIKKILÄ, A.M.; LISKI, E.; PYÖRÄLÄ, S.; TAPONEN, S. Pathogen-specific production losses in bovine mastitis. **Journal Dairy Science** v. 101(10), p. 9493-9504, 2018.

HERINGSTAD, B.; KLEMETSDAL, G.; RUANE, J. Clinical Mastitis in Norwegian Cattle: Frequency, Variance Components, and Genetic Correlation with Protein Yield. **Journal Dairy Science** v. 82, p. 1325–1330, 1999.

HOEKSTRA, J.; RUTTEN, V.; SOMMELING, L. et al. High Production of LukMF' in *Staphylococcus aureus* Field Strains Is Associated with Clinical Bovine Mastitis. **Toxins (Basel)**. v.10(5), p.200, 2018.

JAN, M.; SARGEANT, H.; MORGAN, S.; KEN, E.; LESLIE, M. J.; IRELAND, A. B. Clinical mastitis in dairy cattle in Ontario: Frequency of occurrence and bacteriological isolates. **Can. Vet. J.**, v. 39, p. 33-38, 1998.

KAKI, A. A.; DJEBALA, S.; LATIF, M. B.; MOULA, N. Evaluation of the Prevalence of Subclinical Mastitis in Dairy Cattle in the Soummam Valley (Bejaia, Algeria). **Bulletin UASVM Veterinary Medicine**, v. 76(2), 2019.

KERRO DEGO, O.; VAN DIJK, J.E.; NEDERBRAGT, H. Factors involved in the early pathogenesis of bovine *Staphylococcus aureus* mastitis with emphasis on bacterial adhesion and invasion. A review. **Vet Q.** v.24(4), p.181-198, 2002.

KHAN I.T.; NADEEM, M.; IMRAN, M.; ULLAH, R.; AJMAL, M.; JASPAL, M.H. Antioxidant properties of Milk and dairy products: a comprehensive review of the current knowledge. **Lipids Health Dis.** V.18(1), p.41, 2019.

LAEVENS, H.; DELUYKER, H.; SCHUKKEN, Y. H.; De MEULEMEESTER, L.; VANDERMEERSCH, R.; DE MUËLENAERE, E.; DE KRUIF, A. Influence of parity and stage of lactation on the somatic cell count in bacteriologically negative dairy cows. **Journal Dairy Science**, v. 80, p. 3219-3226, 1997.

MACFADYEN, A.C.; LEROY, S.; HARRISON, E.M.; PARKHILL, J.; HOLMES, M.A.; PATERSON, G.K. *Staphylococcus pseudoxylus* sp. nov., isolated from bovine mastitis. **Int J Syst Evol Microbiol.** v,69(8), p,2208-2213, 2019.

MACHADO, P. F.; PEREIRA, A. R.; SILVA, L. F. P. Células somáticas no leite em rebanhos brasileiros. **Scientia Agricola**, v. 57(2), p. 359- 361, 2000.

MAHMMOD YS, TOFT N, KATHOLM J, GRØNBÆK C, KLAAS IC. Bayesian estimation of test characteristics of real-time PCR, bacteriological culture and California mastitis test for diagnosis of intramammary infections with *Staphylococcus aureus* in dairy cattle at routine milk recordings. **Prev Vet Med.** v.112(3-4), p.309-317, 2013.

MARTIN, S. W.; MEEK, A. H.; WILLEBERG, P. Measurement of disease frequency and production, In: Martin S. W., Meek A. H. & Willeberg P. (ed.) Veterinary Epidemiology. **Principles and Methods**. Iowa State University Press, Ames. 1994. p. 48-76.

MARTINS, P. F.; ANDRADE, H. V. Identificação de Resíduos de Antibióticos na Recepção de Leite Cru Pré-Beneficiado Como Implantação do Plano APPCC em Laticínios. **FAZU em Revista**, v. 8, p. 108-114, 2011.

MENDONÇA, C. L.; FIORAVANT, M. C. S.; SILVA, J. A. Etiologia da mastite bovina. **Veterinária Notícias**, v. 5(1), p.107-118, 1999.

METZGER, S.A.; HERNANDEZ, L.L.; SUEN, G.; RUEGG, P.L. Understanding the Milk Microbiota. **Vet Clin North Am Food Anim Pract.** v. 34(3), p.427-438, 2018.

MIRA, S. C.; DELLA LIBERA, A. M. P.; SOUZA, N. F.; LIMA, S. M.; BLAGITZ, G. M. Celularidade do leite no diagnóstico de infecções intramamárias em bovinos. **Rev. Cienc. Agrar.** v. 56(1), p.7-11, 2013.

MOEINI, M. M.; SANJABI, M. R.; AHADI, A. H. High bacteria count in milk and it's economic loss. In: World Buiatrics Congress 22. Hannover. **Anais...** 9-10, 2002.

NAUSHAD, S.; KANEVETS, U.; NOBREGA, D. et al. *Staphylococcus debuckii* sp. nov., a coagulase-negative species from bovine milk. **Int J Syst Evol Microbiol.** v. 69(8), p. 2239-2249, 2019.

OLIVEIRA, C. M. C.; SOUSA, M. G. S.; SILVA, N. S.; MENDONÇA, C. L.; SILVEIRA, J. A. S.; OAIGEN, R. P.; ANDRADE, S. J. T.; BARBOSA, J. D. Prevalência e etiologia da mastite bovina na bacia leiteira de Rondon do Pará, estado do Pará. **Pesq. Vet. Bras.**, v. 31(2), p.104-110, 2011.

OMOE, K.; ISHIKAWA, M.; SHIMODA, Y.; HU, D.; UEDA, S.; SHINAGAWA, K. Detection of seg, she, and sei genes in *Staphylococcus aureus* isolates and determination of the enterotoxin productivities of *Staphylococcus aureus* isolates harborin seg, seh, or sei genes. **J. Clin. Microbiol.**, v. 40 (3), p. 857-862, 2002.

ORTEGA-ANAYA, J.; JIMÉNEZ-FLORES, R. Symposium review: The relevance of bovine milk phospholipids in human nutrition-Evidence of the effect on infant gut and brain development. **J Dairy Sci.** v.102(3), p.2738-2748, 2019.

PADUCH, J.H.; HEROLD, M.; KRÖMKER, V. Diagnostische Eigenschaften eines neuen California-Mastitis-Tests [Diagnostic characteristics of a new California Mastitis Test]. **Tierarztl Prax Ausg G Grosstiere Nutztiere.** v.41(2), n.81-87, 2013.

PANG, M.; XIE, X.; BAO, H. et al. Insights Into the Bovine Milk Microbiota in Dairy Farms With Different Incidence Rates of Subclinical Mastitis. **Front Microbiol.** v.9, p.2379, 2018.

PENNA, T. C. V.; COLOMBO, A. J.; ABE L. E. M.; ACHOSHVILI, S. A. M. Parâmetros de resistência térmica de cepas de *Staphylococcus aureus* enterotoxigênicos no leite. **Rev. Farm. Bioq.** v. 24, p. 113-117. 1998.

PERSSON, Y.; NYMAN, A. K.; GRÖNLUND-ANDERSSON, U. Etiology and antimicrobial susceptibility of udder pathogens from cases of subclinical mastitis in

dairy cows in Sweden. **PLoS One**. v. 7(10), 2012.

PHILPOT, W. N. **Dairy herd management practices for improving milk quality and controlling mastitis**. In: Dairy Research Report. Louisiana State University, 1994. p.13-25.

PHILPOT, W. N.; NICKERSON, S. C. **Mastitis: Counter Attack**. A strategy to combat mastitis. Illinois: Badson Brothers Co., 1991. p.150.

PIKALA, M.; HAVERI, S.; PYÖRÄLÄ, V.; MYLLYS, T.; HONKANEN-BUZALSKI. Bovine mastitis in Finland 2001 prevalence, distribution of bacteria, and antimicrobial resistance. **Vet. Microbiol.**, v. 16 (1-2), p. 29-36. 2009.

PINHEIRO DE SÁ, M. E.; MOTA, R. A.; SOUZA, M. I.; OLIVEIRA, A. A. F. Etiologia da mastite subclínica em bovinos leiteiros do agreste meridional do Estado de Pernambuco. **Rev. Bras. Ciênc. Veter.**, v. 7(2), p. 100-1003, 2000.

PRADO, E.; CRUZ, F. E. R.; VIANA, F. C. Problemas sanitários do rebanho de leite: percepção dos criadores. **Arq. Bras. Med. Vet. Zoot.**, v. 49(1), p. 19-29. 1997.

PUGGIONI, G.M.G.; TEDDE, V.; UZZAU, S. et al. Evaluation of a bovine cathelicidin ELISA for detecting mastitis in the dairy buffalo: Comparison with milk somatic cell count and bacteriological culture. **Res Vet Sci**. v.128, p.129-134, 2020.

RADOSTITIS, O. M.; LESLIE, K. E.; FETROW, J. **Mastitis control in dairy herds**. In: Radostitis OM, LESLIE KE, FETROW J. Herd health food animal production medicine. Philadelphia: WB Saunders. 1994. p. 229-276.

RAMALHO, C. A.; SOARES, K. D. A.; SILVA, D. F.; BARROS, M. R. C.; JUNIOR, J. W. P.; OLIVEIRA, J. M.; MOTA, R. A.; MEDEIROS, E. S. Eficácia in vitro de desinfetantes comerciais utilizados no pré e pós-dipping frente a *Staphylococcus* spp. isolados em rebanhos leiteiros. **Pesq. Vet. Bras.**, v. 32(12), p.1285- 1288, 2012.

RIBEIRO, M. E. R.; STUMPF, Jr. W.; GOMES, J. F., et al. Mastite causada por *Staphylococcus* coagulase negativa em um rebanho Jersey na região de clima temperado In: Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária 28. Salvador. SBMV **Anais...**: 162. 2001c.

RIBEIRO, M. E. R.; STUMPF, Jr. W.; GOMES, J. F., et al. Ocorrência de *Streptococcus* sp. em Unidades de Produção Leiteiras monitoradas na região sul do Rio Grande do Sul. In: Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária 28. Salvador. SBMV **Anais...**: 162. 2001b.

RIBEIRO, M. E. R.; STUMPF, Jr. W.; GOMES, J. F., et al.. Relação de CMT positivo e crescimento microbiológico no diagnóstico da mastite bovina na região sul do Rio Grande do Sul. In: Congresso Brasileiro de Zootecnia 21. Congresso Internacional de Zootecnia 3. Goiânia. SBZ. **Anais...**: 98, 2001^a.

RIBEIRO, M. E.; PETRINI, L. A.; AITA, M. F.; BALBINOTTI, M.; STUMPF, Jr. W.; GOMES, J. F.; SCHRAMM, R. C.; MARTINS, P. R.; BARBOSA, R. S. Relação entre mastite clínica, subclínica infecciosa e não infecciosa em unidades de produção leiteiras

na região sul do Rio Grande do Sul. **Rev. Bras. Agroec.** v. 9(3), p. 287-290, 2003.

ROCHA, L.S.; SILVA, D.M.; SILVA, M.P. et al. Comparative genomics of *Staphylococcus aureus* associated with subclinical and clinical bovine mastitis. **PLoS One.** v.14(8):e0220804. 2019.

RONCO, T.; KLAAS, I.C.; STEGGER, M. et al. Genomic investigation of *Staphylococcus aureus* isolates from bulk tank milk and dairy cows with clinical mastitis. **Vet Microbiol.** v.215, p.35-42, 2018.

RUPP, R.; BEAUDEAU, F.; BOICHARD, D. Relationship between milk somatic-cell counts in the first lactation and clinical mastitis occurrence in the second lactation of French Holstein cows. **Prev. Vet. Med.**, v. 46, p.99-111, 2000.

SCHEPERS, A. J.; LAM, T. J. G. M.; SCHUKKEN, Y. H.; WILMINK, J. B. M.; HANEKAMP, W. J. A. Estimation of variance components for somatic cell counts to determine thresholds for uninfected quarters. **J. Dairy Sci.**, v. 80, p. 1833-1840, 1997.

SEARS, P. M.; GONZALÈZ, R. N.; WILSON, D. J.; HAN, H. R. Procedures for mastitis diagnosis and control. Veterinary Clinics of North America: **Food Animal Practice**, v. 9(3), p. 445-468, 1993.

SILVA, N.; LOBATO, F. C. F.; COSTA, G. M. **Mastitis aguda espontânea por Klebsiella en bovinos Holstein.** In: Panamerican Congress on Mastitis Control and Milk Quality, Mérida, México. 1998. p. 144-147.

SKRZYPEK, R.; WÓJTOWSKI, J.; FAHR, R. D. Factors affecting somatic cell count in cow bulk tank milk – A case study from Poland. **Journal of Veterinary Medicine Series A** v. 51(1), p. 127-131, 2004.

SOUZA, G. N.; BRITO, J. R. F.; MOREIRA, E. C.; BRITO, M. A. V. P.; SILVA, M. V. G. B. Fatores de risco para alta contagem de células somáticas do leite do tanque em rebanhos leiteiros da Zona da Mata de Minas Gerais, Brasil. **Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.**, v. 57(2), p.251-260, 2005.

SOUZA, G. N.; MOREIRA, E. C.; BRITO, J. R. F.; BRITO, M. A. V. P.; SILVA, M. V. G. B. Variação da contagem de células somáticas em vacas leiteiras de acordo com patógenos da mastite. **Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.**, v. 61(5), p. 1015-1020, 2009.

SOUZA, G.Á.A.D.; DE ALMEIDA, A.C.; XAVIER, M.A.S. et al. Characterization and molecular epidemiology of *Staphylococcus aureus* strains resistant to beta-lactams isolated from the milk of cows diagnosed with subclinical mastitis. **Vet World.** v,12(12), p.1931-1939, 2019.

STEEL, Kenneth John; BARROW, G. I.; FELTHAM, R. K. A. **Cowan and Steel's manual for the identification of medical bacteria.** Cambridge university press, 1993.

SULEIMAN, T.S.; KARIMURIBO, E.D.; MDEGELA, R.H. Prevalence of bovine subclinical mastitis and antibiotic susceptibility patterns of major mastitis pathogens isolated in Unguja island of Zanzibar, Tanzania. **Trop Anim Health Prod.** v.50(2), p.259-266, 2018.

TAPONEN, S.; PYÖRÄLÄ, S. Coagulase Negative Staphylococci as cause of bovine mastitis- not so different from *Staphylococcus aureus*. **Acta Vet. Scand.**, v. 8, p.53-36, 2011.

WOLLOWSKI, L.; BERTULAT, S.; KOSSATZ, A.; HEUWIESER W. Short communication: Diagnosis and classification of clinical and subclinical mastitis utilizing a dynamometer and a handheld infrared thermometer. **Journal Dairy Science**. v. 102(7), p. 6532-6539, 2019.

ZERYEHUN, T., ABERA, G. Prevalence and Bacterial Isolates of Mastitis in Dairy Farms in Selected Districts of Eastern Harrarghe Zone, Eastern Ethiopia. **J Vet Med**. v. 2017, p. 6498618, 2017.

ZSCHÖCK, M.; BOTZLER, D.; BLÖCHER, S.; SOMMERHÄUSEN, J.; HAMANN, H. P. Detection of genes for enterotoxins (ent) and toxic shock syndrome toxin-1 (tst) in mammary isolates of *Staphylococcus aureus* by polymerase-chain-reaction. **Int. Dairy J.**, v. 10, p. 569-574, 2000.

CAPÍTULO 08: BACTÉRIAS DA MASTITE SUBCLÍNICA BOVINA: SUSCETIBILIDADE A ANTIBIÓTICOS

CHAPTER 08: BACTERIA OF SUBCLINICAL MASTITIS: SUSCEPTIBILITY TO ANTIBIOTICS

Pedro Rassier dos Santos¹; Helenice de Lima Gonzalez²; Silvia Regina Leal Ladeira³ Ginini Carla Dors⁴; Patrícia da Silva Nascente⁵

Resumo

O leite é um alimento de alto valor nutritivo e sua produção está presente no mundo todo, graças ao retorno rápido que ele possibilita ao produtor. Para que o leite e seus derivados não percam a qualidade, são necessários cuidados durante todo o processo. Salienta-se que o uso de antibióticos é comum nas propriedades para tratar a principal doença que acomete os bovinos leiteiros: a mastite. Com isso, o objetivo deste estudo foi testar a suscetibilidade de bactérias isoladas em casos de mastite subclínica frente a três antibióticos de uso na medicina veterinária. As bactérias foram isoladas de amostras de leite colhidas em diferentes propriedades rurais do município de Pelotas – RS e estocadas em laboratório. O antibiograma foi realizado com três antibióticos: Amoxicilina + ácido Clavulânico, Gentamicina e Tetraciclina. As bactérias estudadas foram *Staphylococcus* spp. (coagulase negativa), *Staphylococcus* spp. (coagulase positiva), *Corynebacterium* spp. e *Streptococcus* spp. A maior resistência foi observada à Gentamicina (37,1%), seguido pela tetraciclina (22,2%) e amoxicilina + ácido clavulânico (18,5%). Esses resultados salientam para a identificação do agente causador de mastite e avaliação da eficácia dos antibióticos em cada propriedade, pois o uso indiscriminado de antibióticos vem aumentando a resistência dos microrganismos.

Palavras-Chaves: bovinos, CMT, produção leiteira, qualidade do leite, resistência.

Abstract

Milk is a high nutritional value food and has a worldwide production thanks to the rapid return it provides to producers. In order to milk and its derivatives not lose quality, some procedures are necessary, ranging from production to storage. It should be noted that the use of antibiotics is common in properties to treat the main disease that affects dairy cattle: mastitis. The aim of this study was to test the susceptibility of bacteria isolated in cases of subclinical mastitis against three antibiotics used in veterinary medicine. The bacteria were isolated from milk samples collected in different rural properties in the municipality of Pelotas - RS and stored in the laboratory. The antibiogram was performed with three antibiotics: Amoxicillin + Clavulanic acid, Gentamicin and Tetracycline. The bacteria studied were *Staphylococcus* spp. (coagulase negative), *Staphylococcus* spp. (positive coagulase), *Corynebacterium* spp. and *Streptococcus* spp. The highest resistance was observed to Gentamicin (37.1%), followed by tetracycline (22.2%) and amoxicillin + clavulanic acid (18.5%). The results emphasize for the identification of the causative agent of mastitis and evaluation of the efficacy of antibiotics in each property, because the indiscriminate use of antibiotics has been increasing the resistance of microorganisms.

¹ Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pelotas, rassier1907@gmail.com

² Medicina Veterinária, Universidade Federal de Pelotas, helenicegonzalez@hotmail.com

³ Medicina Veterinária, Universidade Federal de Pelotas, silvia.s.ladeira@gmail.com

⁴ Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial, Universidade Federal de Pelotas, dorsgi@yahoo.com.br

⁵ Prof^a. Dr^a. em Medicina Veterinária, Universidade Federal de Pelotas, pattsn@gmail.com

Keywords: cattle, CMT, dairy production, milk quality, resistance.

Introdução

Cerca de 150 milhões de lares em todo mundo estão envolvidos na produção leiteira, impulsionados principalmente pelo retorno rápido que a atividade traz ao produtor (FAO, 2016). O leite é considerado um dos mais nobres alimentos devido a sua composição; rico em proteína, gordura, carboidratos, sais minerais e vitaminas, além de fornecer elementos anticarcinogênicos presente na gordura, como o ácido linoléico conjugado, esfingomielina, ácido butírico, beta-caroteno e vitaminas A e D (BITENCOURT et al., 2000; BRITO; BRITO, 2004). No Brasil, a produção leiteira está entre as atividades mais importantes dentro do setor agropecuário, responsável por grande relevância social e econômica (LUCCA & AREND, 2020). Entretanto, o leite tem apresentado alguns problemas na sua qualidade, como a alta contagem de microrganismos encontrados no mesmo (NOEL et al., 2016; CARVALHO et al., 2018; TAPONEN et al., 2019).

Devido a seu alto teor nutritivo, qualquer descuido durante o processo de ordenha pode acarretar na presença de bactérias e conseqüentemente queda na qualidade do leite e de seus derivados (CERVA, 2013). Sabe-se que a carga microbiana inicial influencia na qualidade do leite, e quanto maior o número de contaminantes e a temperatura de estocagem, menor será o tempo de conservação do produto (SILVEIRA et al., 1998). A regularização das condições sanitárias para a industrialização do leite e seus derivados e os padrões físico-químicos e microbiológicos para que estes produtos possam ser liberados para o comércio varejista são estabelecidos pelas Instruções Normativas 76 e 77 (BRASIL, 2018a; BRASIL 2018b).

Do ponto de vista sanitário e comercial, a bovinocultura leiteira encontra sérios entraves principalmente pela alta prevalência de mastite, doença que prevalece dentro dos rebanhos bovinos destinados a produção leiteira, impactando negativamente na economia (LANGONI et al., 2011; ACOSTA et al., 2016). Os principais agentes relacionados a mastite são as bactérias gram-positivas, incluindo *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, e *Mycoplasma bovis* (SHAHEEN; TANTARY; NABI 2016), e seu aparecimento está relacionado, principalmente ao manejo inadequado de ordenha, já que os microrganismos relacionados as inflamações são geralmente originados da cama, fezes, urina, equipamento de ordenha e água (CUNHA et al., 2016).

A mastite subclínica possui incidência muito maior em um rebanho leiteiro comparada a mastite clínica, podendo apresentar prevalência de 20% em rebanhos de alta produção a 50% em rebanhos de baixa produção (SHAHEEN et al., 2016; HOSSAIN et al., 2017). Neste caso

não há sinais visíveis na forma subclínica, esta pode passar despercebida em muitos casos e o método mais utilizado para sua detecção é a Contagem de Células Somáticas (CCS) pelo California Mastitis Test (CMT), por se tratar de um teste de baixo custo e fácil aplicação em rebanhos leiteiros (ROSSI et al., 2018).

O uso de antibióticos ainda é o procedimento mais utilizado dentro das salas de ordenha para o tratamento da mastite bovina, com o intuito de aumentar a produção e reduzir as fontes de infecção (SHAHEEN et al., 2016). Entretanto, a utilização indevida e indiscriminada destes fármacos sem avaliar sua eficácia pode contribuir para o aumento na resistência antimicrobiana dentro dos sistemas de produção (WHO, 2015). Além disso, eventualmente, resíduos de antimicrobianos utilizados na terapia da doença podem ser encontrados no leite (CADES et al., 2017). O antibiograma é um teste que oferece como resultado padrões de resistência ou sensibilidade de uma bactéria específica a vários antimicrobianos e a realização do antibiograma sempre indica os melhores antibióticos para o controle de determinada doença/infecção, visto que existem antibióticos específicos para o controle das diferentes bactérias (KONEMAN et al., 2012)

Neste contexto, considerando a importância da mastite para a qualidade do leite e consequente produção leiteira em nosso país e no mundo, o objetivo deste estudo foi testar a suscetibilidade de bactérias isoladas em casos de mastite subclínica frente a três antibióticos comumente utilizados para o tratamento de mastite bovina na medicina veterinária.

Material e Métodos

Foram selecionadas bactérias isoladas de amostras de leite colhidas em diferentes propriedades rurais do município de Pelotas - RS, a partir de tetos de animais que apresentaram mastite subclínica com resultados positivos (++ e +++) no teste de CMT (*California Mastitis Test*) (SCHALM, 1957). A coleta do leite com mastite foi realizada obtendo uma amostra de leite, cerca de 10mL em tubos estéreis de teste individuais, sendo previamente realizada a identificação dos tubos e a desinfecção do orifício do teto com algodão embebido em álcool 70°GL e retirado os primeiros jatos. Os tubos foram acondicionados em caixas isotérmicas com gelo e remetidas sob refrigeração. As amostras de leite foram semeadas em Ágar Sangue, incubadas por 24 horas à temperatura de 36°C e identificadas no Laboratório Regional de Diagnóstico da Faculdade de Medicina Veterinária- UFPel e estocadas no Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal (LIPOA) da mesma Universidade. A metodologia utilizada seguindo o manual de identificação bacteriana de Cowan e Steel (STEEL et al. 1993).

Após a realização da técnica de coloração de Gram, todas as amostras foram submetidas

ao teste de Catalase para diferenciar *Staphylococcus* spp. (catalase positiva) de *Streptococcus* spp. (catalase negativa). As amostras positivas para catalase foram submetidas a MR-VP (vermelho de metila, Voges-Proskauer), teste de coagulase e análises bioquímicas utilizando ribose, nitrato, galactose, maltose, manitol e Trealose, além de resistência à polimixina. CAMP foi realizado para amostras negativas de catalase e testes de esculina, inulina, manitol, salicina, sorbitol e trealose. Após a realização dos testes, as amostras foram colocadas na estufa a 37°C e após 24 horas a leitura foi realizada.

Foram selecionados os microrganismos de maior frequência em mastite: nove *Staphylococcus* spp. coagulase negativa, seis *Staphylococcus* spp. coagulase positiva, sete *Corynebacterium* spp., quatro *Streptococcus* spp. não-hemolítico e um *Streptococcus* beta-hemolítico.

O antibiograma foi realizado pelo método de difusão em ágar Muller-Hillton, através da disposição de discos comerciais impregnados com os antibióticos: Amoxicilina + ácido Clavulânico, Gentamicina e Tetraciclina, em placas com o meio de cultivo, onde previamente foi semeado o agente bacteriano a ser testado (KIRBY & BAUER, 1956).

Após a realização do procedimento as placas foram incubadas a 36°C por 24 horas. A leitura do antibiograma foi realizada através da medida dos halos formados ao redor dos discos com antibióticos (TRABULSI & ALTERTHUM, 2004). O resultado foi expresso como: resistente (R), intermediário (I) ou sensível (S) aos antibióticos, interpretados de acordo com o CLSI (2012).

Resultados e Discussão

Foram selecionados *Staphylococcus* spp. coagulase negativa, *Staphylococcus* spp. coagulase positiva, *Corynebacterium* spp. e *Streptococcus* spp. e sua escolha foi baseada na frequência em que eles são descritos como principais agentes causadores de mastite subclínica (RIBEIRO et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2011; KREWER et al., 2013; ACOSTA et al., 2016; SHAHEEN; TANTARY; NABI 2016; ZIMERMANN et al., 2017).

Quando se fala de mastite, *S. aureus* é o principal agente etiológico, sendo isolado em diferentes países no mundo, incluindo o Brasil (FREITAS et al., 2018; HOQUE et al., 2018; GEMECHU; YUNUS; SOMA & BEYENE, 2019; MESQUITA et al., 2020). Este microrganismo se adapta facilmente a condições hostis, o que facilita sua colonização, dispersão e causar doenças. Além disso, apresentam diversos fatores de virulência, como proteína A, enzima e toxinas que contribuem para o estabelecimento da infecção (CEPEDA et al., 2005). No rebanho leiteiro, sua infecção caracteriza-se geralmente na forma subclínica,

resultando em vacas contaminadas, aumento de células somáticas e difícil erradicação (BRITO & BRITO, 1998).

Ainda que existam algumas características de virulência que contribuem para a persistência do *S. aureus* no tecido mamário, o uso inadequado de antibióticos propicia o aparecimento de cepas multirresistentes, comprometendo a eficiência do tratamento da mastite bovina causada por estes e outros microrganismos (CUNHA et al., 2006). No nosso estudo, não foi observada a presença de cepas multirresistentes.

Corynebacterium spp. está entre os principais agentes de mastite e embora possa ser encontrado em mastite clínica, normalmente está relacionado a infecções subclínicas (BRADLEY; GREEN, 2005; OLIVEIRA et al., 2011). São considerados patógenos contagiosos, responsáveis por elevar a contagem de células somáticas (NATIONAL MASTITIS COUNCIL, 2004).

Streptococcus uberis e *S. dysgalactiae* estão entre as principais espécies dentro do gênero *Streptococcus*, relacionadas a mastite subclínica (BI et al., 2016; WALD et al., 2020). *S. uberis* é um patógeno importante na indústria de laticínios (DIESER et al., 2017), visto que é um microrganismo comensal e assintomático, isolado de diversas partes do corpo de bovinos, como pele, intestino, amígdalas e trato genital (WARD et al., 2009). *Streptococcus dysgalactiae* também está entre os mais comuns microrganismos relacionados a mastites ambientais e embora sejam isolados a partir de tonsilas, boca e vagina de vacas, podem persistir nas glândulas mamárias e ser transmitidos de uma vaca para outra (QUINN et al., 2005).

A descrição da sensibilidade, resistência ou sensibilidade intermediária dos isolados frente à amoxicilina com ácido clavulânico 10mcg (A), a gentamicina 10mcg (B) e a tetraciclina 30mcg (C) estão descritos na tabela 1.

Tabela 1. Descrição da suscetibilidade dos isolados bacterianos obtidos de mastite bovina frente a três antibióticos: amoxicilina + ácido clavulânico 10mcg (A), gentamicina 10mcg (B) e tetraciclina 30mcg (C)

Isolados bacterianos	A	B	C
<i>Staphylococcus</i> spp. (coagulase negativa) (2)	S	S	S
<i>Staphylococcus</i> spp. (coagulase positiva) (2),	S	S	S
<i>Corynebacterium</i> sp. (2)	S	S	S
<i>Staphylococcus</i> sp. (coagulase positiva) (1)	S	S	I
<i>Staphylococcus</i> spp. (coagulase negativa) (2)	S	S	I
<i>Streptococcus</i> sp. (não hemolítico) (1)	S	S	I
<i>Staphylococcus</i> sp. (coagulase negativa) (1)	S	I	S

<i>Corynebacterium</i> sp. (1)	S	R	S
<i>Staphylococcus</i> spp. (coagulase positiva) (2)	S	R	S
<i>Streptococcus</i> sp. (não hemolítico) (1)	S	R	S
<i>Staphylococcus</i> sp. (coagulase negativa) (1)	S	R	I
<i>Streptococcus</i> beta-hemolítico (1)	S	R	I
<i>Streptococcus</i> sp. (não hemolítico) (1)	S	R	I
<i>Staphylococcus</i> sp. (coagulase negativa) (1)	S	R	R
<i>Staphylococcus</i> sp. (coagulase positiva) (1)	S	R	R
<i>Staphylococcus</i> sp. (coagulase negativa) (1)	R	S	S
<i>Staphylococcus</i> sp. (coagulase negativa) (1)	R	S	R
<i>Corynebacterium</i> sp. (4)	R	S	R
<i>Streptococcus</i> sp. (não hemolítico) (1)	R	S	R

*S – sensível; I - sensibilidade intermediária; R - resistente.

Fonte: Própria (2020)

Após avaliar a suscetibilidade das 27 bactérias frente aos três antibióticos, observou-se que a gentamicina (B) foi o antibiótico ao qual o maior número de isolados apresentaram resistência (37,1%), resultado oposto ao observado por diversos trabalhos (CUNHA et al., 2006; DA SILVA et al., 2019; KUROSAWA et al., 2020). Cunha et al. (2006) avaliaram os perfis de sensibilidade, *in vitro*, de *Staphylococcus* sp., *Corynebacterium* sp., *Streptococcus* sp., *E. coli*, *Bacillus* sp., *Micrococcus* sp., *Enterococcus* sp. e *Klebsiella* sp. isoladas de mastite bubalina, e observaram que a gentamicina foi o antibiótico que demonstrou o maior percentual de eficácia com 97,98% de inibição das amostras estudadas. Kurosawa et al. (2020) também obtiveram resultados que diferiram do nosso estudo após testarem a suscetibilidade de 29 amostras de *Staphylococcus* spp. oriundos de leite e observarem que apenas uma amostra se mostrou resistente (3,24%) à gentamicina. No trabalho realizado por Da Silva et al. (2019) foi observada 100% de eficácia da gentamicina frente aos isolados de leite cru.

A resistência a tetraciclina (C) foi observada em 22,2% das bactérias testadas no nosso estudo. KUROSAWA et al. (2020) obtiveram resultados melhores do que o nosso, onde das 29 amostras de *Staphylococcus* spp. testadas, 24 foram sensíveis (82,76%), um intermediário (3,45%) e quatro resistentes (13,90%). Da Silva et al. (2019) observaram 100% de eficácia quando testaram a tetraciclina. Diferentemente, em estudo realizado por Cunha et al. (2006), a tetraciclina foi a droga que apresentou a menor eficácia *in vitro*, com 41,42% dos microrganismos resistentes a este fármaco. De acordo com Zimmermann & Araújo (2017), alguns microrganismos apresentam uma proteína (Tet) que lhes confere resistência à tetraciclina

através do transporte do antibiótico para fora da célula bacteriana.

No nosso estudo, o antibiótico que apresentou maior eficácia foi a amoxicilina + ácido clavulânico (A), com 81,5% das amostras apresentando sensibilidade e 18,5% das amostras apresentando resistência. Estes resultados concordaram com Trinidad et al. (1990) que estudando a susceptibilidade antimicrobiana de *Staphylococcus aureus* (n=48), *Staphylococcus chromogenes* (n=167), *Staphylococcus hyicus* (n=71) e outros *Staphylococcus* sp. (n=17) isolados de mastite em novilhas e primíparas, testando a amoxicilina + ácido clavulânico obtiveram sensibilidade em 90,5%, 100%, 100% e 100% das amostras, respectivamente. Resultado diferente foi encontrado por Da Silva et al. (2019), quando 33,33% das bactérias patogênicas isoladas de leite apresentaram resistência

As espécies resistentes a amoxicilina + ácido clavulânico foram dois *Staphylococcus* spp. coagulase negativa e três *Corynebacterium* spp. Frente a gentamicina, a resistência foi observada em dois *Staphylococcus* spp. coagulase negativa, três *Staphylococcus* spp. coagulase positiva, um *Corynebacterium* sp., três *Streptococcus* spp. não hemolíticos e um *Streptococcus* sp. beta hemolítico. Amoxicilina + ácido clavulânico foi o antibiótico ao qual a maior variabilidade de gêneros das bactérias identificadas neste estudo apresentou resistência. As espécies resistentes a tetraciclina foram três *Staphylococcus* spp. coagulase negativa, quatro *Corynebacterium* spp. e um *Streptococcus* sp. não hemolítico. Vale salientar que nenhum dos antibióticos testados apresentou 100% de eficácia.

Dentre as sete amostras de *Corynebacterium* spp. do nosso estudo, três (42,85%) apresentaram resistência a amoxacilina + ácido clavulânico, uma (14,28%) a gentamicina e três (42,85%) a tetraciclina. Entre os cinco *Streptococcus* spp. (incluindo um hemolítico) houve resistência de quatro amostras (80%) apenas frente a gentamicina. Dentro dos *Staphylococcus* spp. apenas três (20%) apresentaram resistência somente a gentamicina. Os outros, quando apresentaram resistência, esta estava presente a mais de um antibiótico. Vários autores concordam que existe uma significativa diferença entre o perfil de sensibilidade a antimicrobianos entre *Staphylococcus* sp. e *Streptococcus* sp. (ANDRADE et al., 2000; CUNHA et al., 2006; POUTREL et al., 2018).

De modo geral, a resistência antimicrobiana está entre as dez principais ameaças a saúde global (OMS, 2019) e atualmente grande importância tem sido dada à multirresistência antibiótica das bactérias, por sua correlação com a presença de microrganismos virulentos, como os *S. aureus* meticilina-resistentes (MRSA) (BULLÉ, et al., 2016; SISTI, 2017; SILVA et al., 2018). *S. aureus* é a espécie mais frequentemente associada a casos e surtos de intoxicação alimentar, visto que algumas cepas são capazes de produzir várias enterotoxinas

(EE) (OMOE et al., 2005).

O estabelecimento de alternativas para tratamento de mastites de origem infecciosa em vacas leiteiras é de grande importância e testes de suscetibilidade antimicrobiana como o realizado nesse trabalho auxiliam nisso (LANGONI et al., 2006). Vários métodos de tipagem bacteriana são utilizados para comparar cepas e identificar mecanismos de transmissão e fontes de contaminação, e dentro desses métodos o antibiograma tem sido usado por ser de fácil execução, acessível, permitir controle de qualidade rigoroso e de baixo custo, além de permitir o conhecimento acerca da resistência microbiana das bactérias testadas (RIBEIRO et al., 2008).

Uma alternativa para minimizar os riscos de contaminação por estes microrganismos dentro da bovinocultura leiteira é a aplicação de Boas Práticas de Produção (BPP) nas diferentes etapas do processo (VALLIN et al., 2009). Paschoal (2014) salienta que os equipamentos que auxiliam na ordenha podem contribuir com cerca de 10% da carga microbiana do leite em condições experimentais, podendo este valor aumentar caso a estrutura ou a limpeza dos equipamentos não estejam satisfatórias. Com relação aos equipamentos dentro da sala de ordenha, Gleeson et al. (2009) destacam as teteiras da ordenhadeira mecânica como a maior causa de contaminação entre as vacas, entretanto, o adequado manejo pré-ordenha pode reduzir a contaminação dos tetos não só por bactérias ambientais como também por bactérias provenientes de outros animais.

Além disso, as técnicas de *pré* e *pós-dipping* auxiliam na forma de preparar o teto para a ordenha. O *pré-dipping* significa a imersão dos tetos das vacas em uma solução desinfetante momentos antes da ordenha, responsável por queda de até 50% na taxa de novas infecções da glândula mamária e consequentemente, diminuição do número de bactérias que entram em contato com o leite e passam pelas tubulações (FONSECA & SANTOS, 2001; BLOWEY; EDMONDSON, 2010). Entretanto, a desinfecção ao final da ordenha (*pós-dipping*) é considerada a prática isolada mais importante de controle de novas infecções intramamárias, onde os melhores resultados estão relacionados ao uso de iodo, 0,7% a 1,0%; clorexidina, 0,5% a 1,0% e cloro, 0,3% a 0,5% (FONSECA & SANTOS, 2001).

Embora o controle de mastite tenha como principal fundamento a realização de medidas higiênico sanitárias, o uso de antibióticos tem um papel importante no combate de patógenos, principalmente os relacionados a mastite contagiosa, possibilitando a eliminação das infecções intramamárias e reduzindo as fontes de infecção (ERSKINE et al., 1993). Entretanto, seu uso deve ser com cautela, pois quando de forma descontrolada, o uso de antibióticos em animais para alimentação seleciona bactérias resistentes que podem chegar até os seres humanos pelo contato com os animais, contato direto e indireto com resíduos e/ou consumo de alimentos

(GRACE, 2015; O'NEILL, 2015). Bactérias resistentes a agentes antimicrobianos, mesmo que não patogênicas, podem interferir de forma negativa para as futuras opções de tratamento (OVERDEVEST et al., 2011).

As drogas aqui testadas já foram amplamente empregadas no passado e o uso incorreto associado à seleção natural dos microrganismos provavelmente resultou no fenômeno de resistência. Embora a resistência a antimicrobianos possa ocorrer naturalmente por meio de mutações espontâneas, o uso intensivo de antimicrobianos em humanos e animais acaba acelerando o processo (WHO, 2015). Entre os mecanismos de resistência estão a produção de enzimas que destroem ou inativam as drogas, redução da permeabilidade celular, criação de rotas secundárias alternativas que substituem as inibidas pela droga, eliminação do antibiótico ou alteração do sítio-alvo da droga (QUINN et al., 2005).

Deve-se salientar que a escolha aleatória de medicamentos para tratamento de mastite nas propriedades leiteiras, não implicará obrigatoriamente no sucesso do tratamento, especialmente naquelas propriedades onde seu uso é frequente e inadequado (NADER et al., 2007). Além do mais, testes como o realizado nesse estudo auxiliam na preservação das bases antimicrobianas para que futuramente possam ser utilizadas com eficácia no controle de doenças/infecções, evitando a formação de resistência pelas bactérias e também promove um registro histórico de quais bactérias são resistentes em uma determinada propriedade aos variados antibióticos disponíveis, possibilitando assim, melhores medidas de controle.

Conclusões

Em decorrência da diversidade de agentes etiológicos envolvidos em mastites, a utilização de exames microbiológicos e posteriormente testes de sensibilidade antimicrobiana *in vitro* são medidas indicadas antes da eleição do tratamento, pois esta diversidade microbiológica pode ter diferentes respostas frente ao medicamento a ser utilizado, como vem se observando no decorrer dos anos. Além disso, o uso indiscriminado dos produtos para essa enfermidade vem aumentando a resistência desses agentes patógenos frente aos antibióticos de uso rotineiro.

Referências

ACOSTA, A. C. et al. Mastites em ruminantes no Brasil. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 36, n. 7, p. 565-573, 2016.

ANDRADE, M. A. et al. Sensibilidade *in vitro* de *Staphylococcus aureus* isolados de amostras de leite de vacas com mastite subclínica. 2000.

BI, Yanliang et al. Prevalence of bovine mastitis pathogens in bulk tank milk in China. **PLoS One**, v. 11, n. 5, p. e0155621, 2016.

BITENCOURT, D. et al. **Sistemas de pecuária de leite: uma visão na região de clima temperado**. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2000.

BLOWEY, R. W.; EDMONDSON, P. **Mastitis control in dairy herds**. Cabi, 2010.

BRADLEY, A.; GREEN, M. Use and interpretation of somatic cell count data in dairy cows. **In practice**, v. 27, n. 6, p. 310-315, 2005.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Instrução Normativa nº 76 de novembro de 2018. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, nov. 2018a. Disponível em <https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/52750137/do1-2018-11-30-instrucao-normativa-n-76-de-26-de-novembro-de-2018-52749894IN%2076> Acesso em 07 ago. 2020.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa n. 77, de 26 de novembro de 2018. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 30 nov. 2018b. Disponível em <https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/52750141/do1-2018-11-30-instrucao-normativa-n-77-de-26-de-novembro-de-2018-52749887> Acesso em 07 ago. 2020.

BRITO, J. R. F.; BRITO, M. A. V. P. Qualidade do leite brasileiro e os desafios para atendimento das exigências internacionais. **ZOCAL, et al. Leite: uma cadeia produtiva em transformação. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite**, p. 235-243, 2004.

BRITO, J. R. F.; BRITO, M. A. V. P. Programas de controle das mastites causadas por microrganismos contagiosos e do ambiente. **Embrapa Gado de Leite-Documentos (INFOTECA-E)**, 1998.

BULLÉ, D. J. et al. Prevalência de *Staphylococcus aureus* metilicina resistentes em profissionais de saúde. **Revista de Enfermagem da UFSM**, v. 6, n. 2, p. 198-205, 2016.

CADES, M. et al. Perfil de resistência antimicrobiana de mastite bovina em propriedade leiteira no município de Monte Negro/RO. **Revista Brasileira de Ciências da Amazônia/Brazilian Journal of Science of the Amazon**, v. 6, n. 1, p. 15-20, 2017.

CARVALHO, A. S. S. et al. Susceptibilidade de *Staphylococcus aureus* isolados de leite cru a antibióticos comerciais. **Ciência Animal Brasileira**, v. 19, 2018.

CEPEDA, J. A. et al. Isolation of patients in single rooms or cohorts to reduce spread of MRSA in intensive-care units: prospective two centre study. **The Lancet**, v. 365, n. 9456, p. 295-304, 2005.

CERVA, C. Manual de boas práticas na produção de leite em propriedades de agricultura familiar do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: FEPAGRO, 2013.

CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute). Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria that Grow Aerobically. 2012.

DA CUNHA, A. F. et al. Prevalência, etiologia e fatores de risco de mastite clínica em rebanhos leiteiros de Viçosa-MG. **Acta Veterinaria Brasilica**, v. 10, n. 1, p. 48-54, 2016.

CUNHA, A. P. et al. Perfil de sensibilidade antimicrobiana de agentes contagiosos e ambientais isolados de mastite clínica e subclínica de búfalas. **Arquivos do Instituto Biológico**, v. 73, n. 1, p. 17-21, 2006.

DA SILVA, R. T. et al. Perfil de sensibilidade a antimicrobianos de bactérias patogênicas humanas isoladas de leite cru. **Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes**, v. 74, n. 3, p. 185-194, 2019.

DIESER, S. A. et al. *Streptococcus uberis*: In vitro biofilm production in response to carbohydrates and skim milk. **Revista Argentina de Microbiología**, v. 49, n. 4, p. 305-310, 2017.

ERSKINE, R. J. et al. Advances in the therapy for mastitis. **Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice**, v. 9, n. 3, p. 499-517, 1993.

FONSECA, L. F. L.; SANTOS, M. V. Qualidade do leite e controle de mastite. 2001.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO). Dairy Production and Products – Milk Production. Disponível em <<http://www.fao.org/dairy-production-products/en/#.V3AZwbgrLIV>> Acesso em 14 jun. 2020.

FREITAS, C. H. et al. Identification and antimicrobial susceptibility profile of bacteria causing bovine mastitis from dairy farms in Pelotas, Rio Grande do Sul. **Brazilian Journal of Biology**, v. 78, n. 4, p. 661-666, 2018.

GEMECHU, T. et al. Bovine mastitis: Prevalence, Isolation and identification of major bacterial pathogens in selected areas of Bench Maji Zone, Southwest Ethiopia. **Journal of Veterinary Medicine and Animal Health**, v. 11, n. 2, p. 30-36, 2019.

GLEESON, D. et al. Effect of pre-milking teat preparation procedures on the microbial count on teats prior to cluster application. **Irish Veterinary Journal**, v. 62, n. 7, p. 1-7, 2009.

GRACE, D. Review of evidence on antimicrobial resistance and animal agriculture in developing countries. 2015.

HOQUE, M. N. et al. Molecular characterization of *Staphylococcus aureus* strains in bovine mastitis milk in Bangladesh. **International Journal of Veterinary Science and Medicine**, v. 6, n. 1, p. 53-60, 2018.

HOSSAIN, M. K. et al. Bovine mastitis and its therapeutic strategy doing antibiotic sensitivity test. **Austin J Vet Sci Anim Husb**, v. 4, n. 1, p. 1030, 2017.

KIRBY, W. M. et al. Clinical usefulness of a single disc method for antibiotic sensitivity testing. **Antibiotics annual**, 1956.

KONEMAN, E. et al. **Diagnóstico microbiológico: textos e atlas coloridos**. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2012.

KREWER, C. C. et al. Etiology, antimicrobial susceptibility profile of *Staphylococcus* spp. and risk factors associated with bovine mastitis in the states of Bahia and Pernambuco. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 33, n. 5, p. 601-606, 2013.

KUROSAWA, L. S. et al. Perfil de susceptibilidade antimicrobiana de *Staphylococcus* spp. associados a mastite bovina. **PUBVET**, v. 14, p. 138, 2020.

LANGONI, H.; DOMINGUES, P. F.; BALDINI, S. Mastite caprina: seus agentes e sensibilidade frente a antimicrobianos. **Revista Brasileira de Ciência Veterinária**, v. 13, n. 1, 2006.

LANGONI, H. et al. Aspectos microbiológicos e de qualidade do leite bovino. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 31, n. 12, p. 1059-1065, 2011.

LUCCA, E. J.; AREND, S. C. A pecuária leiteira e o desenvolvimento da Região Noroeste do Rio Grande do Sul. **Revista Brasileira de Desenvolvimento Regional**, v. 7, n. 3, p. 107-142, 2020.

MESQUITA, A. A. et al. prevalência e resistência a antibióticos de *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus agalactiae* em propriedades de agricultura familiar em rebanhos leiteiros de minas gerais, brasil. 2020.

NADER FILHO, A. et al. Sensibilidade antimicrobiana dos *Staphylococcus aureus* isolados no leite de vacas com mastite. **Arquivos do Instituto Biológico, São Paulo**, v. 74, n. 1, p. 1-4, 2007.

National Mastitis Council. Microbiological Procedures for the Diagnosis of Bovine Udder Infection and Determination of Milk Quality. Verona, USA. 47p. 2004.

DA COSTA NOEL, C. et al. Perfil de suscetibilidade antimicrobiana e produção de “slime” de isolados de *Staphylococcus* spp. provenientes de casos de mastite bovina na região sul-fluminense. **Revista de Saúde**, v. 7, n. 1, p. 22-26, 2016.

O’NEILL J. Antimicrobials in agriculture and the environment: reducing unnecessary use and waste. London, UK: **Review on Antimicrobial Resistance**, 2015.

OLIVEIRA, C. M. C. et al. Prevalência e etiologia da mastite bovina na bacia leiteira de Rondon do Pará, estado do Pará. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 31, n. 2, p. 104-110, 2011.

OMOE, K. et al. Comprehensive analysis of classical and newly described staphylococcal superantigenic toxin genes in *Staphylococcus aureus* isolates. **FEMS microbiology letters**, v. 246, n. 2, p. 191-198, 2005.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Thirteenth general programme of work 2019–2023. Disponível em <<https://www.who.int/about/what-we-do/thirteenth-general-programme-of-work-2019---2023>>. Acesso em 04 jun. 2020.

OVERDEVEST, I. et al. Extended-spectrum β -lactamase genes of *Escherichia coli* in chicken meat and humans, The Netherlands. **Emerging infectious diseases**, v. 17, n. 7, p. 1216, 2011.

PASCHOAL, J. J. Qualidade do Leite. In: SILVA, J. C. P. M. et al. (Ed.). **Manejo e Administração na Bovinocultura Leiteira**. Viçosa, p. 181-198. 2014.

POUTREL, B. et al. Prevalence of mastitis pathogens in France: Antimicrobial susceptibility of *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus uberis* and *Escherichia coli*. **J Vet Sci Technol**, v. 9, n. 522, p. 2, 2018.

QUINN, P. J. et al. **Microbiologia veterinária e doenças infecciosas**. Artmed Editora, 2005.

RIBEIRO, M. G. Princípios terapêuticos na mastite em animais de produção e de companhia. **Manual de Terapêutica Veterinária**. 3ª ed. Roca, São Paulo, p. 759-771, 2008.

ROSSI, R. S. et al. Diagnostic accuracy of Somaticell, California Mastitis Test, and microbiological examination of composite milk to detect *Streptococcus agalactiae* intramammary infections. **Journal of dairy science**, v. 101, n. 11, p. 10220-10229, 2018..

SCHALM, O. W. Experiments and observations leading to development of the California Mastitis Test. **J. Am. Vet. Med. Assoc.**, v. 130, p. 199-204, 1957.

SHAHEEN, M.; TANTARY, H. A.; NABI, S. U. A treatise on bovine mastitis: disease and disease economics, etiological basis, risk factors, impact on human health, therapeutic management, prevention and control strategy. **Advances in Dairy Research**, p. 1-10, 2016.

SILVA, J. G.; ALCÂNTARA, A. M.; MOTA, R. A. Mastite bovina causada por *Staphylococcus* spp. resistentes à meticilina: revisão de literatura. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 38, n. 2, p. 223-228, 2018.

SILVEIRA, I. A. da; CARVALHO, E. P. de; TEIXEIRA, D. Influência de microrganismos psicrotóxicos sobre a qualidade do leite refrigerado: uma revisão. **Hig. aliment**, p. 21-7, 1998.

SISTI, E. A relevância do *staphylococcus aureus* resistente à meticilina (MRSA) nas infecções hospitalares. **REVISTA INTERDISCIPLINAR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO-RevInt**, v. 4, n. 1, 2017.

STEEL, K. J., BARROW, G.I., FELTHAM, R.K.A. **Cowan and Steel's manual for the identification of medical bacteria**. Cambridge university press. 1993.

TAPONEN, S. et al. Bovine milk microbiome: a more complex issue than expected. **Veterinary research**, v. 50, n. 1, p. 44, 2019.

TRABULSI, L. R.; ALTERTHUM, F. **Microbiologia**. 4ed. São Paulo: Atheneu, 2004.

TRINIDAD, P.; NICKERSON, S. C.; ALLEY, T. K. Prevalence of intramammary infection and teat canal colonization in unbred and primigravid dairy heifers. **Journal of Dairy Science**, v. 73, n. 1, p. 107-114, 1990.

VALLIN, V. M. et al. Melhoria da qualidade do leite a partir da implantação de boas práticas de higiene na ordenha em 19 municípios da região central do Paraná. **Semina: Ciências Agrárias**, v. 30, n. 1, p. 181-188, 2009.

WALD, R. et al. Comparison of the population structure of *Streptococcus uberis* mastitis isolates from Austrian small-scale dairy farms and a Slovakian large-scale farm. **Journal of Dairy Science**, v. 103, n. 2, p. 1820-1830, 2020.

WARD, P. N. et al. Evidence for niche adaptation in the genome of the bovine pathogen *Streptococcus uberis*. **BMC genomics**, v. 10, n. 1, p. 1-17, 2009.

WHO 2015. World Health Organization. Antibiotic resistance. Disponível em <<https://www.who.int/>> . Acesso 2 jun. 2020.

ZAATOUT, N.; AYACHI, A.; KECHA, M. Epidemiological investigation of subclinical bovine mastitis in Algeria and molecular characterization of biofilm-forming *Staphylococcus aureus*. **Tropical Animal Health and Production**, v. 52, n. 1, p. 283-292, 2020.

ZIMERMANN, K. F.; ARAUJO, M. E. M. Mastite bovina: agentes etiológicos e susceptibilidade a antimicrobianos. **Campo Digital**, v. 12, n. 1, 2017.

CAPÍTULO 09: BEBIDA FERMENTADA A BASE DE EXTRATO HIDROSSOLÚVEL DE AVEIA EM INFUSÃO DE MAÇÃ COM CANELA

CHAPTER 09: FERMENTED DRINK BASED ON WATER-SOLUBLE OAT EXTRACT IN INFUSION OF APPLE WITH CINNAMON

Shirley Santos Monteiro¹; Shênia Santos Monteiro²; Andréa Trigueiro Lima³ Thaisa Abrantes Souza
Gusmão⁴

Resumo

O mercado de bebidas lácteas seja popular e amplamente aceito pelos consumidores, a demanda por bebidas não lácteas tem crescido exponencialmente em função das desvantagens das bebidas lácteas. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos das concentrações de goma xantana e sacarose na textura e parâmetros sensoriais da bebida fermentada a base do extrato hidrossolúvel de aveia em infusão de maçã com canela. Foi avaliado a concentração de goma xantana (0,1, 0,3 e 0,5%) e sacarose (5,0, 7,0 e 9,0 %) no pH e acidez das bebidas fermentadas, usando as cepas *Streptococcus thermophilus* e *Lactobacillus bulgaricus*. As avaliações os efeitos das formulações foram realizados por planejamento fatorial completo 2², três repetições no ponto central nos parâmetros de textura. Os diferentes perfis de textura das bebidas foram analisados através da sensorial. Observou-se o aumento da consistência e do índice de viscosidade das bebidas com o aumento da concentração de goma xantana. A análise sensorial indica que as concentrações de 0,3% de goma xantana e 7,0% de sacarose foram as indicadas para elaboração de uma bebida fermentada a base do extrato hidrossolúvel de aveia em infusão de maçã com canela.

Palavras-Chaves: Goma xantana, *Lactobacillus bulgaricus*, Sacarose, *Streptococcus thermophilus*.

Abstract

The dairy beverage market is popular and widely accepted by consumers, the demand for non-dairy drinks has grown exponentially due to the disadvantages of dairy drinks. Therefore, the objective of this work was to evaluate the effects of xanthan gum and sucrose configurations on the texture and sensory parameters of the fermented drink based on water-soluble extract of oats infused with apple and cinnamon. The concentration of xanthan gum (0.1, 0.3 and 0.5%) and sucrose (5.0, 7.0 and 9.0%) without pH and acidity of fermented drinks was evaluated, using *Streptococcus thermophilus* as strains and *Lactobacillus bulgaricus*. The effects of the effects of the formulations were carried out by the complete 2² factorial design, three repetitions at the central point in the texture parameters. The different texture profiles of the drinks were visible from the sensory. Observe the increase in the consistency and the viscosity index of the drinks with the increase in the concentration of xanthan gum. A sensory analysis indicates that the restrictions of 0.3% of xantama gum and 7.0% of sucrose were indicated for the preparation of a fermented drink based on water-soluble extract of oats in apple and cinnamon infusion.

¹ Doutoranda em Engenharia Agrícola, UFCG, shirley_pinto_monteiro@hotmail.com

² Mestranda em Engenharia Agrícola, UFCG, shenia-monteiro@hotmail.com

³ Graduada em Engenharia de Alimentos, UFCG, andrea_trigueiro@hotmail.com

⁴ Doutora em Engenharia de Processos, UFCG, ta_brantes@hotmail.com

Keywords: Xanthan gum, *Lactobacillus bulgaricus*, Sucrose, *Streptococcus thermophilus*.

Introdução

Um novo campo de pesquisa vem abrindo o espaço para estudos fundamentais que tratam de características funcionais em alimentos capazes de promover benefícios a saúde. Embora os iogurtes e os leites fermentados sejam os mais populares, a demanda dos consumidores por bebidas não lácteas, com alta aceitação e funcionalidade, está aumentando. As desvantagens dos leites fermentados são principalmente a tendência contínua do vegetarianismo, a crescente prevalência de intolerância à lactose e o nível de colesterol dos produtos lácteos (CODA et al., 2012; GOBBETTI et al., 2010; PRADO et al., 2008).

Nos últimos anos tem sido cada vez mais frequente a ocorrência de pessoas com algum tipo de restrição alimentar. Fato que faz com que a indústria de alimentos esteja cada vez mais em busca de desenvolvimento, buscando se adaptar a uma nova realidade exigida pelo mercado (BELTRAN, 2017).

A preparação de bebidas vegetais fermentadas tem um grande potencial na elaboração de um novo produto funcional (SHORI, 2016). Frutas, hortaliças e cereais podem ser utilizadas como substratos para substituição da fonte láctea, porém estudos devem ser feitos para determinação de espécies apropriadas, viabilidade celular e a sobrevivência dos micro-organismos ao longo da estocagem, bem como a aceitabilidade sensorial do consumidor (SHORI, 2016). Estes produtos vegetais probióticos representam um grande potencial de crescimento para a indústria de alimentos podendo ser assim, explorados por meio do melhoramento dos novos ingredientes, processos e produtos (DEZIDERIO, 2019).

Neste sentido, para Yépez et al. (2019), as bebidas funcionais à base de cereais representam possibilidades sustentáveis em termos sociais. Obviamente, que para explorar o potencial de extratos vegetais na produção de bebidas fermentadas, é necessário investigar sua composição físico-química e suas características sensoriais e microbiológicas (KIZZIE-HAYFORD et al., 2016).

As bebidas à base de cereais têm um enorme potencial para atender a essa expectativa e atuar como veículos em potencial para compostos funcionais como antioxidantes, fibras alimentares, minerais, prebióticos e vitaminas (KREISZ et al., 2008). As bebidas fermentadas com aveia são chamadas de funcionais por causa do efeito

simbiótico de culturas iniciadoras de probióticos e a fibra prebiótica β -glucana (ANGELOV et al., 2018). O mercado de alimentos e bebidas funcionais evoluiu consideravelmente, à medida que as pessoas se tornam mais e mais preocupados com sua qualidade de saúde e estilo de vida (SALMERÓN et al., 2015; SHAH et al., 2016). O grão de aveia tem um alto potencial funcional devido à sua composição. Aveia é conhecida ser uma excelente fonte de fibra alimentar, antioxidantes e uma fração proteica bem equilibrada (ANGELOV et al., 2018; SHAH et al., 2016).

A aveia destaca-se entre os cereais por fornecer aporte energético e nutricional equilibrado, conter em sua composição química aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas e sais minerais indispensáveis ao organismo humano e, principalmente, pela composição de fibras alimentares (WEBER et al., 2002).

Agregando ainda mais propriedades funcionais a uma bebida fermentada a base de aveia, a incorporação de infusões a exemplo de canela, uma especiaria amplamente usada que é frequentemente adicionado a diversos produtos com leite, permite a elaboração de um produto com um diferencial inovador que atenda uma vastas variedades de público, com restrições alimentares aos derivados de leite. Uma vez, que a canela contém compostos funcionais usados para superar problemas digestivos, diabetes, inflamação e atividade microbiana (MUHAMMAD; DEWETTINCK, 2017). Assim como, a maçã que contém em sua composição compostos bioativos com propriedades funcionais que podem provocar efeitos benéficos a saúde do consumidor.

Uma variedade de tecnologias (por exemplo, cozimento, brotação e moagem) é rotineiramente usada para processar cereais, mas a fermentação continua sendo uma das melhores opções para melhorar as propriedades nutricionais e sensoriais e o prazo de validade (MATTILA-SANDHOLM, 1998). Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos da concentração de goma xantana e sacarose na textura e parâmetros sensoriais da bebida fermentada a base do extrato hidrossolúvel de aveia em infusão de maçã com canela.

Material e Métodos

O experimento foi conduzido no Laboratório de Engenharia de Alimentos da Unidade Acadêmica de Engenharia de Alimentos do Centro de Tecnologia e Recursos Naturais (CTRN), campus Campina Grande-PB, pertencente à Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). A matéria-prima utilizada foi adquirida no comércio da cidade de Campina Grande-PB.

A infusão foi preparada utilizando saches de maçã com canela na concentração de 1% da mistura de maçã e canela, permanecendo em infusão durante 10 minutos na temperatura de 80 °C, em seguida foi arrefecido a temperatura de 42 °C.

Para obtenção do extrato hidrossolúvel de aveia, os flocos de aveia foram hidratados durante 20 minutos e posteriormente triturados com a infusão de maçã com canela na proporção 1:6 flocos/infusão, em liquidificador convencional e filtrado.

Para o processo fermentativo foi utilizado cepas desidratadas de *Streptococcus thermophilus* e *Lactobacillus bulgaricus*. Foram inoculados 100 mg.L⁻¹ de bactérias lácticas em base seca ativa em relação ao volume total do extrato. A fermentação procedeu-se na temperatura de 42 °C até pH 4,5.

A adição da goma xantana nas concentrações de 0,1, 0,3 e 0,5% e sacarose de 5, 7 e 9%, foi realizada de acordo com as concentrações determinadas pelo planejamento fatorial completo 2², com três pontos centrais (Tabela 1). Após o termino da fermentação, todas as amostras foram acondicionadas em potes hermeticamente fechados e mantido a temperatura de refrigeração, de 8 ± 2 °C.

Tabela 1. Matriz do planejamento fatorial completo 2².

Experimentos	Goma xantana (%)	Sacarose (%)
1	0,1	5,0
2	0,5	5,0
3	0,1	9,0
4	0,5	9,0
5	0,3	7,0
6	0,3	7,0
7	0,3	7,0

Fonte: Própria (2020).

As bebidas foram submetidas as análises de pH e acidez total titulável. As medidas do pH foram determinadas utilizando potenciômetro modelo 0400 (Quimis, São Paulo, Brasil), previamente calibrado, a leitura foi feita diretamente no produto, em triplicata. Para acidez, foram homogeneizados 5 gramas de cada amostra com 50 mL de água destilada, em seguida, a suspensão foi titulada com solução de NaOH 0,1 N até pH 8,5.

O perfil de textura foi determinado através do texturômetro universal modelo TA-XT plus - Textura Analyzer do fabricante Stable Micro Systems equipado com o software

ExponentStable Micro Systems, com utilização do probe A/BE e disco de 35 mm. As análises foram realizadas em triplicata, com altura da amostra de 3,5 cm.

O teste sensorial realizado contou com participação de 50 julgadores não treinados, constituído por discentes, docentes e funcionários da UFCG. Presença de alergias ou intolerâncias alimentares, resfriados e outras alterações de saúde com comprometimento de paladar foram adotados como critérios de exclusão para os participantes. Os julgadores estavam cientes dos objetivos da pesquisa, segundo o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).

As bebidas foram submetidas a um teste de aceitação, utilizando uma escala hedônica verbal de 9 pontos, com escores variando de 9 (gostei extremamente) até 1 (desgostei extremamente). Os parâmetros avaliados pela escala hedônica foram aparência, aroma, sabor, doçura e textura. Foi avaliado também a intenção de compra, onde os julgadores assinalaram na escala estruturada verbal de cinco pontos (5 - Certamente compraria a 1 - Certamente não compraria). As amostras foram servidas à temperatura de aproximadamente 8 °C em porções de aproximadamente 25 g apresentadas em copos codificados com números de três dígitos, de forma balanceada e em blocos completos. Um copo com água filtrada à temperatura ambiente foi fornecido para enxague da boca entre as avaliações, o teste foi aplicado em cabines individuais sob luz branca.

Os resultados do planejamento fatorial completo 2^2 com três repetições no ponto central foram comparados por meio de análise de variância seguida da metodologia da superfície de resposta, e as diferenças foram consideradas significativas para valores de $p \leq 0,05$ utilizando o software Statistica 7.0. As respostas sensoriais foram avaliadas utilizando o software Assistat 7.7 (SILVA; AZEVEDO, 2016), aplicando o teste de Tukey ($p < 0,01$).

Resultados e Discussão

O planejamento experimental 2^2 completo, com 3 pontos centrais, foi usado para avaliar os efeitos das variáveis independentes nas respostas: pH, acidez titulável, firmeza, consistência, coesividade e índice de viscosidade.

A concentração de goma xantana e sacarose na formação da bebida fermentada não influenciaram significativamente nos parâmetros de respostas: pH, acidez titulável, firmeza e coesividade. Porém, foi observado uma tendência de aumento da firmeza com o aumento da concentração de goma xantana (Figura 1). Segundo Amatayakul et al.

(2006), quanto maior a quantidade de sólidos totais, maior a firmeza do produto, isto é, maior o índice de consistência. O aumento da firmeza das amostras pode estar relacionado à produção de polissacarídeo viscoso (SABOKBAR; MOOSAVI-NASAB; KHODAIYAN, 2015; RANDAZZO et al., 2016).

Figura 1. Influência da concentração de goma xantana da firmeza das bebidas fermentadas.

Fonte: Própria (2020).

Quanto a consistência e o índice de viscosidade, foi observado um efeito estatisticamente significativo para a variável concentração de goma xantana (Figura 2). O aumento da concentração de goma xantana resultou no aumento da consistência e do índice de viscosidade das bebidas obtidas, mostrando que em concentrações maiores a goma xantana é um aditivo útil para obtenção de uma bebida mais viscosa e mais consistente. Brandão et al. (2008) observou aumentou exponencialmente com o aumento da concentração de xantana na viscosidade de caldo de cana.

A viscosidade tem ligação direta com o teor de sólidos totais do produto, havendo aumento na viscosidade com o incremento da concentração de sólidos solúveis (GOMES; PENNA, 2009).

Figura 2. Efeito das variáveis independentes nas respostas: a) consistência, b) índice de viscosidade.

Fonte: Própria (2020).

Tabela 2. Análise de variância (ANOVA).

Fonte de variação	SQ	GL	QM	F calculado	F tabelado
Consistência					
Regressão	9,7688	1	9,7688	18,77	10,01
Resíduos	2,6016	5	0,5203		
Falta de ajuste	2,5373	3	0,8458	26,29	19,16
Erro puro	0,0644	2	0,0322		
Total	12,3704	6			
R ²	0,7897				
Índice de viscosidade					
Regressão	0,1062	1	0,1062	16,47	10,01
Resíduos	0,0322	5	0,0064		
Falta de ajuste	0,0321	3	0,0107	137,01	19,16
Erro puro	0,0002	2	0,0001		
Total	0,1384	6			
R ²	0,7671				

Fonte: Própria (2020).

A análise de regressão foi realizada para os parâmetros consistência e índice de viscosidade, obtendo os modelos lineares com coeficiente de determinação de 0,7897 e 0,7671, respectivamente. Os modelos obtidos, dados conforme as Equações (1) e (2), foram submetidos a análise de variância (ANOVA) (Tabela 2) e foi observado que o valor de F calculado foi maior que o valor de F tabelado, no entanto as razões entre os valores dos F foram inferiores a dois. Modelos com a razão dos valores de F superior a dois são considerados significativos e maiores que quatro são considerados preditivos.

$$\text{Consistência} = 1,357 + 7,814 \times \text{GX} \quad (1)$$

$$\text{Índice de viscosidade} = -0,102 + 0,815 \times \text{GX} \quad (2)$$

Em que: GX é a concentração de goma xantana (%).

Apesar dos modelos obtidos terem apresentado coeficientes de determinação baixos e a razão dos valores de F inferior a dois, os efeitos da concentração da goma xantana na formulação das bebidas foi significativo para a consistência e para o índice de viscosidade. Os efeitos significativos foram utilizados para determinar os perfis dos valores previstos e a desejabilidade para os valores ótimos (Figura 3).

Figura 3. Perfil de valores previstos e desejabilidade em análise das variáveis dependentes: consistência e índice de viscosidade. Os valores destacados em negrito correspondem as concentrações ótimas de goma xantana e sacarose para obtenção de uma bebida fermentada com maior consistência e viscosidade.

Fonte: Própria (2020).

Analisando a Figura 3, observa-se que os valores mais altos para os parâmetros de textura (consistência e índice de viscosidade) foram obtidos quando utilizado na formulação das bebidas 0,5% de goma xantana aliado a 9,0% de sacarose. A bebida formulada nessas condições desejáveis foi submetida a análise sensorial (experimento 4) junto as bebidas fermentadas obtidas nos experimentos 1 (0,1% de goma xantana mais 5,0% de sacarose) e 5 (0,3% de goma xantana mais 7,0% de sacarose) para análise da influência da consistência e índice de viscosidade no perfil sensorial das bebidas.

A análise sensorial é utilizada para evocar, medir, analisar e interpretar reações às características de alimentos e outros materiais da forma como são percebidos pelos sentidos da visão, olfato, gosto, tato e audição. Uma vez que a qualidade de um alimento implica, entre outras coisas, a satisfação do consumidor, é necessário que se tenha em mente que o próprio consumidor é quem deve ditar esta qualidade. Portanto cabe ao consumidor determinar os parâmetros de qualidade do produto. Neste ponto a análise sensorial se mostra extremamente importante (LUCIA; MININ; CARNEIRO, 2010)

Os escores sensoriais médios da avaliação organoléptica para as diferentes amostras de bebidas de iogurte são mostrados na Tabela 3. As pontuações sensoriais foram atribuídas utilizando uma escala hedônica de 9 pontos, onde o valor de 1 (desgostei muitíssimo) consiste em uma avaliação bastante antipática e o valor 9 (gostei muitíssimo) representa uma boa aceitação dos parâmetros sensoriais avaliados. Nas formulações da bebida fermentada analisadas sensorialmente, observou-se pontuações entre 5,06 (experimento 1, parâmetro doçura) a 7,10 (experimento 5, parâmetro aparência). Analisando a Tabela 3, em todos os parâmetros avaliados, observou-se que as bebidas fermentadas produzidas a base de extrato hidrossolúvel de aveia em infusão de maçã e canela teve uma aceitação média variando entre os escores equivalente a indiferente a gostei ligeiramente. É essencial que a bebida láctea tenha propriedades sensoriais adequadas para garantir que sejam aceitas pelos consumidores (MOLERO; BRIÑEZ, 2018).

Tabela 3. Médias de aceitação¹ da bebida fermentada a base de extrato hidrossolúvel de aveia em infusão de maçã e canela resultante de três tratamentos com diferentes proporções de estabilizantes/espessante e sacarose.

Ensaio	Parâmetros sensoriais				
	Aparência	Aroma	Sabor	Doçura	Textura
1	6,46 ± 1,83b	6,48 ± 1,64a	5,22 ± 1,83b	5,06 ± 1,75b	5,48 ± 1,95b

4	6,96 ± 1,52ab	6,62 ± 1,66a	6,46 ± 1,69a	7,00 ± 1,28a	5,94 ± 1,94b
5	7,10 ± 1,28a	6,74 ± 1,63a	6,80 ± 1,23a	6,86 ± 1,51a	6,98 ± 1,72 ^a

Médias na mesma coluna e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de Turkey ($p < 0,01$), $n = 50$ julgadores. ¹Escala hedônica estruturada de nove pontos (1 = desgostei muitíssimo; 9 = gostei muitíssimo). Os valores correspondem à com estimativa do desvio padrão.

Fonte: Própria (2020).

A análise estatística revelou que houve diferença estatística ($p < 0,01$) entre as bebidas dos experimentos 1 e 5, para todos os parâmetros analisados, exceto o aroma, que não apresentou diferença estatística entre as diferentes formulações. As formulações dos experimentos 4 e 5 diferiram com significância estatística para o parâmetro textura, sendo observado uma pontuação mais alta neste parâmetro na bebida do experimento 5. Esses resultados indicam que a bebida com maior consistência e maior índice de viscosidade (experimento 4) obteve uma aceitação menor quanto a bebida obtida usando em sua formulação 0,3% de goma xantana e 7,0% de sacarose (experimento 5).

Na Figura 4, são apresentados o perfil dos escores médios para cada formulação da bebida fermentada. Ao analisar a Figura 4, observa-se que a bebida obtida do experimento 5 apresentou a maior aceitação pelos julgadores, obtendo resultado bastante semelhantes para a bebida obtida no experimento 4, exceto para o parâmetro de textura das bebidas.

Figura 4. Perfil sensorial da bebida fermentada a base do extrato hidrossolúvel de aveia em infusão de maçã e canela resultante de três tratamentos com diferentes proporções de estabilizantes/espessante e sacarose.

Fonte: Própria (2020).

A aparência representa uma das primeiras características que irá refletir imediatamente ao julgamento e opinião do consumidor sobre um produto (KOMEROSKI, 2016). A avaliação sensorial indicou que o produto foi bem aceito pelos consumidores. Dessa forma, pode ser uma alternativa à inclusão de bebida fermentada a base do extrato hidrossolúvel de aveia em infusão de maçã e canela na alimentação, além de atender às necessidades de indivíduos com deficiência de lactase e vegetarianas.

Foi avaliado a intenção de compra das bebidas fermentadas a base de extrato hidrossolúvel de aveia em infusão de maçã com canela obtidas nos experimentos 1, 4 e 5, e os resultados estão resumidos na Tabela 4. Observou-se que a bebida do experimento 1 obteve a menor pontuação, de acordo com a escala estruturada de intenção de compra, onde o valor de 5 é atribuída ao resultado positivo de que certamente compraria o produto, a o valor de 1, onde indica que certamente não compraria o produto avaliado. As bebidas dos experimentos 4 e 5 não apresentaram diferença estatística ($p > 0,01$), porém é observado uma tendência de preferência para a bebida obtida no experimento 5, utilizando 0,3% de goma xantana e 7,0% de sacarose em sua formulação.

Tabela 4. Médias de intenção de compra da bebida fermentada a base de extrato hidrossolúvel de aveia em infusão de maçã e canela resultante de três tratamentos com diferentes proporções de estabilizantes/espessante e sacarose.

Ensaio	Intenção de Compra
1	2,18 ± 1,14 b
4	3,26 ± 1,29 a
5	3,74 ± 1,04 a

Médias na mesma coluna e com letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de Turkey ($p < 0,01$), $n = 50$ julgadores. Escala estruturada verbal de cinco pontos (5- Certamente compraria a 1 - Certamente não compraria). Os valores correspondem à com estimativa do desvio padrão.

Fonte: Própria (2020).

Os resultados da análise sensorial revelam que as bebidas à base de extrato hidrossolúvel de aveia em infusão de maçã com canela apresentaram uma aceitação variando do neutra ao gostei ligeiramente. Silva et al. (2013) observaram os mesmos resultados para bebida láctea fermentada elaborada a partir do amido da amêndoa da manga *Tommy Atkins* mostrou-se viável para comercialização, por apresentar boas características sensoriais. Além disso, foi observado que a concentração do agente estabilizante/espessante (goma xantana) nas formulações das bebidas tem uma influência significativa na aceitação do produto. Já quanto a concentração de sacarose, o parâmetro

doçura avaliado na análise sensorial revela que a concentração de 5% não foi bem aceita, enquanto, as concentrações de 7 e 9% não diferiram na percepção sensorial dos julgadores.

De acordo com Mohr (2019), a demanda de mercado por alimentos que apresentem características sensoriais agradáveis ao público e que detenham componentes que tragam benefícios a saúde do consumidor, tem aumentado gradativamente nos últimos anos, por produtos que não contenham lactose e ingredientes de origem animal, está em expansão, tornando atraente a opção de alimento que contemple estas características.

Conclusões

A concentração da goma xantana tem um papel importante na textura das bebidas, onde foi observado que concentrações superiores a 0,3% não foi bem aceita pelos consumidores. A concentração de sacarose não apresentou efeito significativo na textura. No entanto, as concentrações de 7 e 9% receberam pontuações maiores, não diferindo entre si.

Referências

- AMATAYAKUL, T.; SHERKAT, F.; SHAH, N. P. Physical characteristics of set yoghurt made with altered casein to whey protein ratios and EPS-producing starter cultures at 9 and 14% total solids. **Food hydrocolloid**, v. 20, n. 2-3, p. 314-324, 2006.
- ANGELOV, A.; YANEVA-MARINOVA, T.; GOTCHEVA, V. Oats as a matrix of choice for developing fermented functional beverages. **Journal of Food Science and Technology**, v. 55, n. 7, p. 2351-2360, 2018. <https://doi.org/10.1007/s13197-018-3186-y>
- CODA, R.; LANERA, A.; TRANI, A.; GOBBETTI, M.; CAGNO, R. Yogurt-like beverages made of a mixture of cereals, soy and grape must: Microbiology, texture, nutritional and sensory properties. **International Journal of Food Microbiology**, v. 155, n. 3, p. 120-127, 2012. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2012.01.016>
- BELTRAN, L. B. **Desenvolvimento e caracterização de sorvete vegano de chocolate**. Orientador: Maria Josiane Sereia. 2018, f. 51. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Tecnologia em Alimentos). Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Campo de Mourão-PR, 2018.
- BRANDÃO, L. V.; NERY, T. B. R.; MACHADO, B. A. S.; ESPERIDIÃO, M. C. A.; DRUZIAN, J. I. Production of xanthan gum obtained from sugarcane. **Food Science**

and Technology, v. 28, p. 217-222, 2008.

DEZIDERIO, M. A. **Desenvolvimento de bebida fermentada funcional de origem vegetal**. Orientador: Rodrigo Rodrigues Petrus. 2019, f. 91. Universidade de São Paulo Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Alimentos), Pirassununga-SP, 2019.

GOBBETTI, M.; CAGNO, R.; ANGELIS, M.; CAGNO, R. DI; ANGELIS, M. Functional microorganisms for functional food quality. **Food Science and Nutrition**, v. 50, n. 8, p. 716-727, 2010. <https://doi.org/10.1080/10408398.2010.499770>

KOMEROSKI, M. R. **A relevância dos componentes sensoriais nas escolhas alimentares**. Orientadora: Viviani Ruffo de Oliveira. 2016, f. 41. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Nutrição). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016.

KREISZ, S.; ARENDT, E. K.; HÜBNER, F.; ZARNKOV, M. Cereal-based gluten-free functional drinks. **Gluten-Free Cereal Products and Beverages**, p. 373-392, 2008. <https://doi.org/10.1016/B978-012373739-7.50018-6>

KIZZIE-HAYFORD, N; JAROS, D; ZAHN, S; ROHM, H. Effects of protein enrichment on the microbiological, physicochemical and sensory properties of fermented tiger nut milk. **Food Science and Technology**, v. 74, p. 319-324, 2016.

LUCIA, S. M. D.; MININ, V. P. R.; CARNEIRO, J. D. S. **Análise sensorial de alimentos**. In: MININ, V. P. R. 2 ed. Viçosa: Editora UFV, p. 13-15, 2010.

MATTILA-SANDHOLM, T. VTT on lactic acid bacteria. Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus Symposium, v. 156, p. 1-10, 1998.

MOLERO, M. S.; BRÍÑEZ, W. J. Probiotics Consumption Increment through the Use of Whey-Based Fermented Beverages. **Chemistry**, p. 115-132, 2018. <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.72362>

MOHR, F. B. M. **Fermentados tipo iogurte sabor pitanga: alimento funcional e aceitação sensorial**. Orientador: Américo Wagner Júnior. 2019, f. 109. Tese (Doutorado em Agronomia), Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco-PR, 2019.

MUHAMMAD, D. R. A.; DEWETTINCK, K. Cinnamon and its derivatives as potential ingredient in functional food - A review. **International Journal of Food Properties**, v. 20, p. 1-27, 2017. <https://doi.org/10.1080/10942912.2017.1369102>

PRADO, F. C.; PARADA, J. L.; PANDEY, A.; SOCCOL, C. R. Trends in non-dairy probiotic beverages. **Food Research International**, v. 41, n. 2, p. 111-123, 2008. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2007.10.010>

RANDAZZO, W.; CORONA, O.; GUARCELLO, R.; FRANCESCA, N.; GERMANÀ, M. A.; ERTEN, H.; MOSCHETTI, G.; SETTANNI, L. Desenvolvimento de novas bebidas não lácteas de sucos de frutas do Mediterrâneo fermentadas com micro-

organismos de kefir de água. **Microbiol de alimentos**, v. 54, p. 40-51, 2016. [https://doi: 10.1016/j.fm.2015.10.018](https://doi.org/10.1016/j.fm.2015.10.018).

SABOKBAR, N.; MOOSAVI-NASAB, M.; KHODAIYAN, F. Preparação e caracterização de uma nova bebida à base de suco de maçã e soro de leite fermentada usando grãos de kefir. **Food Science and Biotechnol**, v. 24, p. 2095-2104, 2015. [https://doi: 10.1007/s10068-015-0278-6](https://doi.org/10.1007/s10068-015-0278-6).

SALMERÓN, I.; THOMAS, K.; PANDIELLA, S. S. Effect of potentially probiotic lactic acid bacteria on the physicochemical composition and acceptance of fermented cereal beverages. **Journal of Functional Foods**, v. 15, p. 106-115, 2015. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2015.03.012>

SILVA, G. A. S.; CAVALCANTI, M. T.; ALMEIDA, M. C. B. M.; ARAÚJO, A. S.; CHINELATE, G. C. B.; FLORENTINO, E. R. Utilização do amido da amêndoa da manga *Tommy Atkins* como espessante em bebida láctea. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 17, n. 12, p. 1326-1332, 2013.

SILVA, F. A. S.; AZEVEDO, C. A. V. The Assistat Software Version 7.7 and its use in the analysis of experimental data. **African Journal of Agricultural Research**, v. 11, n. 39, p. 3733-3740, 2016. <https://doi.org/10.5897/AJAR2016.11522>

SHAH, A.; MASOODI, F. A.; GANI, A.; ASHWAR, B. A. Newly released oat varieties of himalayan region -Techno-functional, rheological, and nutraceutical properties of flour. **Food Science and Technology**, v. 70, p. 111-118, 2016. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2016.02.033>

SHORI, A. B. Influence of food matrix on the viability of probiotic bacteria: A review based on dairy and non-dairy beverages. **Food Bioscience**, v. 13, p. 1-8, 2016.

YÉPEZ, A.; RUSSO, P.; SPANO, G.; KHOMENKO, I.; BIASIOLI, F.; CAPOZZI, V, AZNAR, R. In situ riboflavin fortification of different kefir-like cereal-based beverages using selected Andean LAB strains. **Food Microbiology**, v. 77, p. 61-68, 2019.

WEBER, F. H.; GUTKOSKI, L. C.; ELIAS, M. C. Caracterização química de cariopses de aveia (*Avena sativa* L.) da cultivar UPF 18. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, v. 22, n. 1, p. 39-44, 2002. <https://doi.org/10.1590/s0101-20612002000100007>

CAPÍTULO 10: CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS E SENSORIAIS DE HAMBÚRGUERES ELABORADOS COM FARINHA DE AVEIA COMO SUBSTITUTO PARCIAL DE GORDURA

CHAPTER 10: TECHNOLOGICAL AND SENSORY CHARACTERISTICS OF HAMBURGERS PREPARED WITH OAT FLOUR AS PARTIAL FAT SUBSTITUTE

Magda Maria Oliveira Inô¹; Adriana Mendes Oliveira²; Vanessa Regina Kunz³; Luiz Fernando Souza Almeida⁴; Ítalo Abreu Lima⁵

Resumo

Os consumidores, em busca de alimentação saudável, exigem do mercado produtos com melhor qualidade e oferta regular. Devido a essa necessidade, buscou-se elaborar um produto cárneo acrescido de fibras, realizar a análise sensorial, microbiológica e físico-químicas. Foram elaboradas 4 formulações de hambúrgueres bovinos (T1: 0,0% farinha de aveia e 17,4% de gordura); (T2: 4,4% farinha de aveia e 13,0% gordura); (T3: 8,7% farinha de aveia e 8,7% gordura) e T4 (13,0% farinha de aveia e 4,4% gordura). A adição de farinha de aveia não influenciou os teores de umidade dos produtos elaborados ($P > 0,05$), que ficou entre 59 e 61,87%. Para os demais parâmetros houve efeito significativo entre os tratamentos ($P < 0,05$). Em relação aos lipídeos, todos os tratamentos atenderam a Legislação Brasileira. Os valores de pH e atividade de água aumentaram à medida que reduziu a gordura. Na análise sensorial não foi detectado diferença significativa ($p > 0,05$) entre os tratamentos para os atributos sabor e aroma. A substituição do toucinho pela farinha de aveia não só resultou em um produto de menor valor calórico, mas também melhorou características tecnológicas de rendimento, encolhimento e perda de peso, além de uma boa aceitação sensorial.

Palavras-Chaves: Produto reestruturado, Fibra, Alimento Funcional.

Abstract

Consumers, in search of healthy food, demand from the market products with better quality and regular supply. Due to this need, we sought to develop a meat product with added fibers, to carry out sensory, microbiological and physical-chemical analysis. 4 formulations of beef hamburgers were prepared (T1: 0.0% oatmeal and 17.4% fat); (T2: 4.4% oatmeal and 13.0% fat); (T3: 8.7% oatmeal and 8.7% fat) and T4 (13.0% oatmeal and 4.4% fat). The addition of oatmeal did not influence the moisture content of the elaborated products ($P > 0.05$), which was between 59 and 61.87%. For the other parameters, there was a significant effect between treatments ($P < 0.05$). Regarding lipids, all treatments complied with Brazilian legislation. The pH and water activity values increased as fat decreased. In the sensory analysis, no significant difference ($p > 0.05$) was detected between treatments for the flavor and aroma attributes. The replacement of bacon by oatmeal not only resulted in a product with lower caloric value, but also improved technological characteristics of yield, shrinkage and weight loss, in addition to good sensory acceptance.

¹ Engenharia de Alimentos, IFBA/Campus Barreiras, m.oliveira.ino@gmail.com

² Engenharia de Alimentos, IFBA/Campus Barreiras, adrianamendes_oliveira@hotmail.com

³ Engenharia de Alimentos, IFBA/Campus Barreiras, va-nessak@hotmail.com

⁴ Engenharia de Alimentos, IFBA/Campus Barreiras, luizfernando@ifba.edu.br

⁵ Doutorado, IFBA/Campus Barreiras, italoabreu@ifba.edu.br

Keywords: Restructured product, Oats, Functional food, Fiber.

Introdução

A Legislação (BRASIL, 2000) define como hambúrguer “produto cárneo industrializado, obtido de carne moída dos animais de açougue, adicionado ou não de tecido adiposo e ingredientes, moldado e submetido a processo tecnológico adequado”. Trata-se de produto cru, semifrito, cozido, frito, congelado ou resfriado’, conforme a sua classificação.

O hambúrguer tem como ingrediente obrigatório carne de diferentes espécies de animais de açougue e como ingredientes opcionais gordura (animal ou vegetal), água, sal, proteínas (animal e/ou vegetal), leite em pó, açúcares, malto-dextrina, aditivos intencionais, condimentos, aromas e especiarias, vegetais, queijos e outros recheios. Apresenta como parâmetros físico-químicos de acordo com o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade, os teores de lipídios no máximo 23,0 %, proteína mínimo de 15,0 %, carboidratos totais máximo de 3,0 % e o teor de cálcio (máximo em base seca) 0,1 % no hambúrguer cru e 0,45 % no hambúrguer cozido (BRASIL, 2000).

Atualmente, é cada vez mais evidente a busca por produtos de preparo rápido, em virtude do ritmo urbano, dado pelo tempo produtivo do processo de produção, que acaba invadindo a vida social e impondo aos cidadãos, principalmente das grandes cidades, alguns comportamentos de consumo, dados pela escassez do tempo (TREVISAN et al., 2016; JUNIOR, 2017; PAULA, et al., 2019).

Entre os produtos cárneos mais apreciados mundialmente temos o hambúrguer, que devido a facilidade de preparo, se tornou um produto consumido por todas as classes sociais. Esse produto é fabricado a partir da carne moída, com adição ou não de gordura e condimentos, sendo posteriormente moldado. Quando adicionado de substâncias prebióticas como as fibras, desempenham funções benéficas ao organismo além de nutrir, sacia a fome rapidamente, o que combina com o atual modo de vida dos habitantes dos centros urbanos (OLIVEIRA et al., 2014; SILVA et al., 2018).

A adição de fibras alimentares na alimentação humana, especialmente em produtos cárneos proporciona um melhor rendimento no cozimento, aumenta a capacidade de retenção de água, reduz o custo da formulação e agrega características funcionais ao alimento (PAULA, et al., 2019).

Segundo Colmenero (2001), produtos cárneos convencionais do tipo fast food possuem alto conteúdo de gordura, variando entre 20 e 30 %. Vários experimentos sobre

o uso de substitutos de gorduras em produtos cárneos, especialmente em hambúrguer, vêm sendo desenvolvidos, uma vez que, embora consumido por todas as classes populares em virtude da praticidade que representa e por possuir nutrientes que alimentam e saciam a fome rapidamente (JUNIOR, 2017; BIS, 2016; GONÇÁLVES, et al., 2016; CARVALHO, 2015; VALENTE, et al., 2014; DA SILVA et al., 2014), o consumo demasiado desse tipo de produto pode ser prejudicial à saúde humana, causando obesidade e doenças, como hipertensão, diabetes mellitus e dislipidemias.

A adição de gordura na formulação de produtos cárneos é utilizada para se obter suculência e maciez. Embora a gordura seja necessária para várias funções do organismo humano, e ser utilizada nas formulações de produtos cárneos para garantir textura macia e sabor, quantidades elevadas podem trazer riscos à saúde e aumentar o risco de doenças (JUNIOR, 2017; GONÇÁLVES, et al., 2016).

Dos produtos cárneos industrializados, nos quais tem sido estudada a influência da adição de fibras na diminuição do teor de gordura dos mesmos, o hambúrguer tem recebido merecida atenção. Dentre as fibras recentemente utilizadas como ingredientes em alimentos cárneos industrializados, as adições de carragena, fibra solúvel de aveia (β -glucana), farelo de aveia, fécula de mandioca, fibra de soja, fibra de ervilha, goma, farelo de linhaça, farinha de gergelim, farinha de quinoa, farinha da casca de abacaxi, fibra de aveia e semente de chia (ANDERSON e BERRY, 2001; SEABRA et al., 2002; QUEIROZ et al., 2005; MARQUES, 2007; PIÑERO et al., 2008; MONEGO, 2009; CIRIANO et al., 2013; Melo et al., 2013; MACHADO, 2014; LÓPEZ-VARGAS et al., 2014; TREVISAN et al., 2016; JUNIOR, 2017; PAULA, et al., 2019) foram ressaltadas como alternativas para um produto mais saudável.

Outro tipo de fibra utilizado como substituto de gordura é a de aveia. Muitas das características da fibra de aveia, como a alta capacidade de absorção de água, inclusive durante o cozimento, por dar a sensação bucal similar a gordura, pela ausência de sabor de cereais e porque contribui com fibra dietética nos produtos, poderiam potencialmente beneficiar produtos como hambúrguer (TREVISAN et al., 2016).

Produtos de aveia também têm uma imagem positiva com o consumidor, porque alguns benefícios a saúde estão relacionados ao consumo de produtos de aveia, como o uso de fibra alimentar da aveia e a diminuição do colesterol sérico (CARBONELL et al., 2005).

Diante disto, a redução do teor de gordura e a adição de ingredientes funcionais em produtos cárneos reestruturados como hambúrgueres apresentam-se como tendências

no desenvolvimento de produtos na indústria de carnes (JUNIOR, 2017). No entanto, no Brasil, ainda não existem opções comerciais de produtos cárneos reestruturados com adição de fibras vegetais para consumo em geral, podendo tornar os resultados deste estudo um referencial de interesse para as indústrias frigoríficas.

Sendo assim, esse trabalho teve como objetivo desenvolver e caracterizar através de análises físico-química e sensorial, hambúrgueres de carne bovina com adição de farinha de aveia, em substituição parcial da gordura suína.

Material e Métodos

O presente estudo foi realizado nos Laboratórios de Tecnologia de Carnes e Derivados; de Análise de Alimentos e de Microbiologia de Alimentos do Instituto Federal da Bahia (IFBA), *Campus* Barreiras. Foram utilizadas carne de dianteiro bovino (acém) e gordura suína (toucinho), obtidas de estabelecimentos comerciais na cidade de Barreiras – BA. Em seguida foram transportadas ao Laboratório de Carnes e Derivados do IFBA, *Campus* Barreiras onde foram mantidos congelados até sua utilização. A farinha de aveia e a proteína texturizada de soja também foram adquiridas em estabelecimentos comercial de Barreiras-BA.

O processamento dos produtos foi baseado conforme descrito por Terra (1998), sendo, no entanto, realizado algumas adaptações. As peças cárneas foram limpas, o que constitui na separação de pedaços cárneos sem tamanho determinado, com consequente remoção do excesso de gorduras, nervos, aponeuroses e hematomas presentes. Em seguida, moídas em disco de 8 mm e o toucinho moído em disco de 5 mm.

A mistura dos hambúrgueres foi realizada manualmente em caixas plásticas, adicionando-se as quantidades definidas de carne moída, gordura, PTS (proteína de soja) previamente hidratada, água gelada, condimento global para hambúrguer (empresa Ibrac) e farinha de aveia, lentamente, até a formação de uma mistura homogênea. Foram obtidas quatro formulações, conforme observada na Tabela 01.

Tabela 01. Formulação básica para elaboração de Hambúrgueres.

Matéria-prima (Massa)	Formulações (%)			
	T1	T2	T3	T4
Acém bovino	65	65	65	65
Gordura suína	17,4	13	8,7	4,4
Farinha de aveia	0	4,4	8,7	13
Água gelada	4,4	4,4	4,4	4,4
Proteína texturizada de soja (PTS)	4,4	4,4	4,4	4,4

Água para hidratar a PTS	8,8	8,8	8,8	8,8
Total	100	100	100	100

Ingredientes (em relação à massa total)

Condimento global (Mix) para Hambúrguer	4	4	4	4
---	---	---	---	---

Fonte: Própria (2020).

Após a homogeneização dos ingredientes de cada formulação, os hambúrgueres foram prensados e moldados com hamburgueira manual de 11 cm de diâmetro, obtendo-se hambúrgueres com peso líquido de 80 g cada, embalados em sacos de polietileno e congelados em freezer a -18 °C até o momento das análises.

Foi avaliada a perda de peso no forno micro-ondas (PPMO) dos hambúrgueres, em triplicata, durante o aquecimento por dois minutos (tempo necessário para que as amostras congeladas atingissem temperatura de 75 °C no seu centro geométrico), conforme TREVISAN et al., 2016.

O rendimento foi calculado em triplicata, de acordo com a Equação 1, e a porcentagem de encolhimento dos hambúrgueres em triplicata, com base na variação do diâmetro do produto cru e cozido, de acordo conforme a Equação 2 (MARQUES, 2007):

$$\text{Equação 01: \% rendimento} = \frac{\text{Peso da amostra cozida} \times 100}{\text{Peso da amostra crua}}$$

$$\text{Equação 02: \% encolhimento} = \frac{(\text{Diâmetro da amostra crua} - \text{Diâmetro da amostra cozida}) \times 100}{\text{Diâmetro da amostra crua}}$$

A umidade foi determinada por secagem em estufa a 105 °C e o extrato etéreo, pelo método de Soxhlet, segundo metodologias oficiais da Associação Oficial de Análises Químicas (AOAC, 2002). Essas análises foram feitas em triplicata.

A atividade de água (aw) dos produtos acabados foi determinada por meio de um aparelho Aqualab digital modelo série 3TE da Decagon Devices, EUA (DECAGON DEVICES Inc, 2003). O pH foi medido por potenciometria (Peagâmetro Orion, modelo 710 A) de acordo com o método (TERRA; BRUM, 1988). Todas as determinações foram feitas em triplicata.

A avaliação microbiológica dos produtos prontos para o consumo foi realizada após estocagem sob congelamento. Foram feitas análises microbiológicas de contagens de coliformes a 45°C segundo a metodologia de Silva, Junqueira e Silveira (2001).

As análises microbiológicas de *coliformes* a 45°C foram realizadas pela técnica

do Número Mais Provável (NMP), utilizando-se caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) para o teste presuntivo e Caldo Verde Brilhante (CVB) para confirmar coliformes a 30°C e caldo EC para confirmar a fermentação a 45°C. O resultado foi expresso em NMP por grama.

A análise sensorial foi realizada após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do IFBA, sob o protocolo CAAE 06758817.6.0000.5031, conforme Resolução no 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, tendo os participantes assinado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Para a aferição da análise sensorial foi aplicado um teste de perfil de consumo e um teste de aceitação com atributos cor, sabor, textura, aroma e aparência, em uma escala hedônica de 9 pontos, cujos extremos ancoram nos termos “1 - desgostei muitíssimo” e “9 - gostei muitíssimo”, de acordo com a Figura 01. As amostras foram analisadas por uma equipe de 30 provadores não treinados, compostos por alunos e funcionários do IFBA, *campus* Barreiras. Cada julgador recebeu uma amostra de cada tratamento (aproximadamente 20 g), totalizando 4 amostras de hambúrguer.

Figura 01. Ficha de avaliação sensorial e perfil de consumo de hambúrguer.

TESTE DE ACEITAÇÃO - HAMBÚRGUER BOVINO					PERFIL DE CONSUMO DE HAMBÚRGUER COM FARINHA DE AVEIA	
Por favor, avalie as amostras codificadas e use a escala abaixo para indicar o quanto você gostou ou desgostou das mesmas.					1. Sexo: () M () F	
9- Gostei muitíssimo					2. Faixa Etária:	
8- Gostei muito					() 15 a 20 anos () 21 a 30 anos () 31 a 40 anos () acima de 40 anos	
7- Gostei moderadamente					3. Você consome Hambúrguer?	
6- Gostei ligeiramente					() sim (responda as questões 4) () Não (Responda a questão 5)	
5- Não gostei / nem desgostei					4. Qual a frequência com que você consome Hambúrguer?	
4- Desgostei ligeiramente					() mais de 5 vezes por mês () 3 vezes por mês () 1 vez por mês	
3- Desgostei moderadamente					5. Caso não consuma Hambúrguer, quais os motivos?	
2- Desgostei muito					() Não gosto () Não tenho hábito () É muito caro	
1- Desgostei muitíssimo					() Não tem disponibilidade no mercado	
					() Por outros motivos (especificar): _____	
					6. Você tem conhecimento sobre Alimentos Funcionais?	
					() sim Não()	
					7. Você consome produtos (alimentos) funcionais?	
					() sim Não() (Responda a questão 8)	
					8. Caso não consuma produtos (alimentos) funcionais, quais os motivos?	
					() Não gosto () Não tenho hábito () É muito caro	
					() Não tem disponibilidade no mercado	
					() Por outros motivos (especificar): _____	
					9. Você compraria esses produtos (Hambúrguer com adição de farinha de Aveia)?	
					() sim Não()	
Observações:						

Fonte: Própria (2020).

Os hambúrgueres foram submetidos à cocção em grelha elétrica. A cada 1 minuto, foram virados, até apresentar aspecto de grelhado. O tempo de grelha foi em média de 9 minutos, até temperatura interna de 71°C por 15 segundos (ARISSETO e POLLONIO, 2005). As amostras foram envolvidas em papel alumínio e mantidas em estufa, numa

temperatura de 60°C, até o momento de servir aos julgadores (15 min) para avaliação sensorial.

Resultados e Discussão

Os resultados dos parâmetros de umidade, lipídios, pH e atividade de água (A_w) dos hambúrgueres elaborados com farinha de aveia em substituição parcial da gordura estão representados na Tabela 02.

De acordo com os dados apresentados na Tabela 02, percebe-se que adição de farinha de aveia não influenciou os teores de umidade dos produtos elaborados, visto que não houve diferença significativa ($P > 0,05$) entre os tratamentos.

Tabela 02. Média ($\pm$ desvio padrão) dos parâmetros físico-químicos dos hambúrgueres.

Tratamentos	Parâmetros Físico-químicos			
	Umidade (%)	Gordura (%)	pH	Atividade de Água (A_w)
T1	59,27 $\pm$ 1,23 ^a	23,0 $\pm$ 0,69 ^a	5,86 $\pm$ 1,36 ^a	0,959 $\pm$ 0,01 ^a
T2	60,3 $\pm$ 1,01 ^a	18,4 $\pm$ 0,74 ^b	5,86 $\pm$ 1,33 ^a	0,968 $\pm$ 0,00 ^b
T3	61,87 $\pm$ 1,40 ^a	16 $\pm$ 0,81 ^c	5,91 $\pm$ 1,37 ^b	0,975 $\pm$ 0,01 ^c
T4	59,0 $\pm$ 0,39 ^a	12 $\pm$ 0,67 ^d	5,9 $\pm$ 1,37 ^b	0,974 $\pm$ 0,01 ^c

T1(0,0% farinha de aveia, 17,4% de gordura suína); T2 (4,4% farinha de aveia, 13,0% gordura suína); T3(8,7% farinha de aveia, 8,7% gordura suína) e T4 (13,0% farinha de aveia, 4,4% gordura suína). Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem ($p < 0,05$) entre si pelo teste F.

Fonte: Própria (2020).

Este resultado pode indicar que a emulsão cárnea formada foi estabilizada pela ação eficiente das proteínas miofibrilares, mantendo o teor de água na matriz, o que pode implicar na suculência do hambúrguer. A umidade se constitui em um parâmetro importante para a suculência e palatabilidade de produtos cárneos (BORBA et al., 2013).

No presente trabalho, a média dos tratamentos para umidade foi de 60,11%, bem próximo ao encontrado por Trevisan et al., (2016), que avaliaram a adição de fibra de aveia (3 e 6%) sobre as propriedades físico-químicas de hambúrgueres. Este comportamento não foi percebido por MARQUES (2007), o qual estudou formulações de hambúrgueres adicionados de diferentes concentrações de farinha de aveia e cuja umidade diminuiu com o aumento da concentração de farinha.

Em relação à quantidade de lipídeos, a adição de farinha de aveia teve efeito significativo ($P < 0,05$). Todos os tratamentos estavam de acordo com valores estabelecidos pela Legislação Brasileira (BRASIL, 2000), que determina teores máximos de 23% de gordura em hambúrgueres. A gordura é um ingrediente importante aplicado nas formulações de produtos alimentícios, pois contribui para melhor palatabilidade,

maciez e suculência (JIMÉNEZ-COLMENERO, 2007).

Os hambúrgueres adicionados de farinha de aveia nas proporções de: 8,7% (Tratamento 3) e 13% (Tratamento 4), apresentaram uma redução importante do teor de lipídeos, da ordem de 30% e 47% respectivamente, quando comparado ao tratamento controle (Tratamento 1). Por ter alcançado uma redução maior que 25% de gordura, os tratamentos (T3 e T4) podem ser considerados *light*, pela legislação (BRASIL, 2003). Portanto, isto significa que a adição de farinha de aveia melhora a qualidade nutricional quanto ao requisito de alimento saudável, diminuindo o teor de gordura do produto, cumprindo, assim, o objetivo do estudo.

Esses resultados corroboram com os encontrados por Almeida, 2011, que ao adicionar fibra vegetal de aveia em hambúrgueres de carne caprina, encontrou uma redução de quatro vezes o valor de lipídeo do tratamento com maior adição de farinha de aveia (2%).

Para os valores de pH também houve diferença significativa ($P < 0,05$). O valor do pH aumentou ligeiramente nos tratamentos 3 e 4, onde foram adicionados maior percentual de farinha de aveia. Esta variação não afetou negativamente os hambúrgueres visto que permaneceram dentro da faixa de pH para carne vermelha que é de 6,2 a 5,4 (FORSYTHE, 2002).

De acordo com Fernandes e Pizato (2019), o aumento da concentração adição de farinha de sorgo em hambúrguer, fez com que aumentassem os valores de pH. Já Trevisan et al., (2016) adicionando 3 e 6% de fibra de aveia em hambúrgueres bovino, observaram valor mais baixo de pH, quando a concentração da fibra era maior.

Sabe-se que o abaixamento do pH pode afetar a capacidade emulsificante das proteínas miofibrilares. Além do efeito tecnológico, o pH também influencia o desenvolvimento microbiano e reações químicas e físicas que acarretam a deterioração do produto. Por isso, o manuseio em boas condições sanitárias, a estocagem à baixa temperatura e o sistema de embalagem são elementos chaves na manutenção do pH e consequentemente no aumento da vida de prateleira do produto (JIMÉNEZ-COLMENERO, 2007; FORSYTHE, 2002).

Ao avaliar os resultados da Tabela 02, pode-se observar que à medida que aumentou-se a concentrações de farinha de aveia e reduziu-se a concentração de gordura utilizada, a atividade de água dos hambúrgueres aumentou ($p < 0,05$). Isso ocorreu possivelmente pelo fato de a farinha de aveia apresentar alta higroscopicidade, enquanto a gordura é hidrofóbica.

Substituindo o toucinho em hambúrgueres de frango, com adição de semente de chia (0, 2, 4 e 8%) Paula et al., (2019) não perceberam diferença significativa entre os tratamentos para os valores de atividade de água (Aw). O mesmo não foi observado por Boechat et. al., (2016), que substituíram toucinho suíno de hambúrgueres bovinos por biomassa e farinha de banana, obtendo valores de Aw variando de 0,948 a 0,953.

Enquanto MELO et al., (2013) ao desenvolverem hambúrgueres de carne bovina com substituição da gordura animal por farinha desengordurada de gergelim, observaram redução nos valores de atividade de água à medida que aumentava a proporção de farinha.

Conforme pode ser observado na Tabela 03, os maiores rendimentos foram obtidos pelos Tratamentos (T2, T3 e T4), indicando que a adição da farinha de aveia em substituição à gordura, nos níveis utilizados no presente trabalho, pode contribuir com aumento da massa do hambúrguer devido a presença das fibras e amido na farinha que proporcionam volume à massa e textura ao produto. O rendimento de hambúrguer é de grande valia, pois, repercute na quantidade do produto após a cocção.

Dentre as vantagens da utilização de fibra de aveia em produtos cárneos como substituto de gordura, destaca-se sua alta capacidade de retenção de água que auxilia no aumento do rendimento do produto final (TALUKDER, 2015). O aumento na porcentagem de fibra de aveia solúvel (β -Glucana), adicionada em um produto cárneo cozido com redução de gordura, aumentou significativamente o rendimento (PIÑERO et al., 2008; ÁLVAREZ; BARBUT, 2013).

Tabela 03. Média ($\pm$ desvio padrão) dos parâmetros físicos dos hambúrgueres.

Caracterização do Cozimento	Tratamentos %			
	T1	T2	T3	T4
Rendimento de Cocção	70,61 $\pm$ 1,81 ^a	80,51 $\pm$ 0,37 ^b	86,36 $\pm$ 1,29 ^c	88,33 $\pm$ 1,11 ^d
Perda de Peso por Cocção	26,3 $\pm$ 1,41 ^a	18,39 $\pm$ 1,03 ^b	12,63 $\pm$ 1,25 ^c	10,8 $\pm$ 0,78 ^d
Porcentagem de Encolhimento	20,32 $\pm$ 1,64 ^a	14,16 $\pm$ 0,83 ^b	5,3 $\pm$ 1,88 ^c	2,27 $\pm$ 0,72 ^d

T1(0,0% farinha de aveia, 17,4% de gordura suína); T2 (4,4% farinha de aveia, 13,0% gordura suína); T3(8,7% farinha de aveia, 8,7% gordura suína) e T4 (13,0% farinha de aveia, 4,4% gordura suína). * (RC) Rendimento de Cocção; (PPC) Perda de Peso por Cocção e (PE) Porcentagem de Encolhimento. Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem ($p < 0,05$) entre si pelo teste F.

Fonte: Própria (2020).

De acordo com Oliveira et al., (2014), foi observado que quanto maior a quantidade de farinha de linhaça dourada adicionada, maior foi o rendimento, bem como a retenção de água após processo de cocção, contribuindo ainda para o menor encolhimento dos hambúrgueres desenvolvidos.

Machado (2014) ao desenvolver e avaliar a qualidade nutricional de um produto cárneo tipo hambúrguer com substituição parcial da gordura suína por farinha de quinoa, relatou valores de rendimento entre 70 e 84,93%.

Estudos realizados por Almeida (2011), em hambúrguer caprino adicionado de 4 % farinha aveia demonstraram resultados similares ao presente trabalho, sendo que o rendimento dos hambúrgueres aumentou à medida que elevou-se a concentração da farinha de aveia. Costa (2004) também verificou que a utilização de uma mistura de farelo e fibra de aveia proporcionou ao hambúrguer rendimento superior (15,0%) ao do controle após o cozimento.

Em relação a Perda de Peso por Cocção, os valores estão diretamente relacionados com o Rendimento de Cocção, uma vez que quanto menor a perda de peso maior o rendimento de cocção, conforme pode ser observado na tabela 03. O tratamento T4 apresentou a menor perda de peso, mostrando que a adição de 13% de farinha de aveia colaborou com esta propriedade no reaquecimento.

Alguns autores afirmam que as vantagens na utilização de fibra ou farelo de aveia incluem sua superior capacidade de reter umidade e evitar que o produto resseque durante o cozimento, além da capacidade de reter o aroma da carne (MEINHOLD, 1991; PSZCZOLA, 1991). A perda de peso em produtos cárneos pode ser associada à mudança de fase que ocorre quando o produto é submetido ao aquecimento, na qual a gordura passa do estado sólido para líquido como consequência da aplicação de calor.

O efeito contrário se observa no parâmetro encolhimento, sendo que os tratamentos com maior porcentagem de farinha de aveia apresentaram um encolhimento menor ($p < 0,05$) quando comparado ao tratamento controle (T1), no qual não houve adição da farinha.

No que se diz respeito à porcentagem de encolhimento, sabe-se que este é causado pela desnaturação de proteínas durante o processo de cozimento e parcialmente pela evaporação e fusão das gorduras da carne (ULU, 2006). O desempenho de cozimento também possui influência da estrutura da matriz formada no produto reestruturado. Sítios que favoreçam a saída de água ou a desnaturação de proteínas impactarão em menores percentuais de encolhimento (HUBER, 2012). Esta pode ser uma das causas da variabilidade dos resultados destes parâmetros, apresentada neste e nos trabalhos citados.

Em estudo com hambúrguer de carne bovina, Bis (2016) relata que o maior encolhimento foi observado para o tratamento com redução de gordura e sem adição de fibra de aveia, enquanto o tratamento com menor encolhimento foi com adição de 6% de

fibra de aveia.

Os resultados obtidos nas análises microbiológicas dos hambúrgueres crus de carne bovina se mostraram dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente e são apresentados na tabela 04.

Tabela 04. Resultados microbiológicos dos hambúrgueres de carne bovina com 3 dias de estocagem sob congelamento.

Tratamentos	Análise microbiológica de <i>Coliformes</i> a 45°C	
	Resultado	Limite* (Padrão Microbiológico)
T1	< 1100 NMP/g	5,0x10 ³ NMP/g
T2	< 1100 NMP/g	5,0x10 ³ NMP/g
T3	< 1100 NMP/g	5,0x10 ³ NMP/g
T4	< 1100 NMP/g	5,0x10 ³ NMP/g

T1(0,0% farinha de aveia, 17,4% de gordura suína); T2 (4,4% farinha de aveia, 13,0% gordura suína); T3(8,7% farinha de aveia, 8,7% gordura suína) e T4 (13,0% farinha de aveia, 4,4% gordura suína). *Brasil, 2001.

Fonte: Própria (2020).

Conforme observado na tabela acima, todas as amostras estão bem abaixo do máximo preconizado pela legislação vigente para *Coliformes* a 45°C/g e revelam condições sanitárias satisfatórias do produto para consumo humano, podendo ser empregado na análise sensorial, de acordo com a Resolução RDC n. 12 da Agência Nacional da Vigilância Sanitária (BRASIL, 2001).

Os coliformes totais são encontrados em fezes, mas também em outros ambientes como vegetais e o solo, persistindo por tempo superior ao de bactérias patogênicas de origem intestinal, a presença desse grupo de microrganismos em alimentos não indicam, necessariamente, que a contaminação seja de origem fecal recente (FRANCO; LANDGRAF, 1996).

A Tabela 05 apresenta as médias dos valores atribuídos pelos consumidores aos tratamentos de hambúrguer bovino com adição de farinha de aveia. À medida que foi reduzido o teor de gordura e adicionado à farinha de aveia observou-se uma queda nos valores das médias obtidas das análises de cor, sabor, textura, aroma e aparência. Em geral todas as formulações foram bem aceitas pelos consumidores.

Tabela 05. Média ($\pm$ desvio padrão) dos atributos sensoriais dos hambúrgueres.

Tratamentos	Atributos Sensoriais				
	Cor	Sabor	Textura	Aroma	Aparência
T1	8,33 $\pm$ 0,80 ^a	8,03 $\pm$ 1,03 ^a	7,83 $\pm$ 0,94 ^a	7,73 $\pm$ 1,38 ^a	8,10 $\pm$ 0,80 ^a
T2	7,36 $\pm$ 1,32 ^b	8,00 $\pm$ 1,31 ^a	7,76 $\pm$ 1,27 ^a	7,66 $\pm$ 1,32 ^a	8,06 $\pm$ 0,90 ^{ab}

T3	7,06±1,61 ^b	7,30±1,51 ^a	6,83±2,62 ^{ab}	7,46±1,61 ^a	7,26±1,48 ^{bc}
T4	7,06±1,61 ^b	7,13±1,69 ^a	6,70±1,95 ^b	7,33±1,56 ^a	7,16±1,53 ^c

T1(0,0% farinha de aveia, 17,4% de gordura suína); T2 (4,4% farinha de aveia, 13,0% gordura suína); T3(8,7% farinha de aveia, 8,7% gordura suína) e T4 (13,0% farinha de aveia, 4,4% gordura suína). Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem ($p<0,05$) entre si pelo teste F.

Fonte: Própria (2020).

Observa-se que para o atributo sabor e aroma, todas as formulações foram consideradas iguais ($p>0,05$), possuindo média de pontos de 7,6, e 7,5 respectivamente, o que equivale a gostei moderadamente a gostei muito na escola hedônica de 9 pontos.

Em relação a cor, houve diferença significativa ($p<0,05$) entre o tratamento 1 (sem adição de farinha de aveia) e os demais tratamentos com adição de farinha (T2, T3 e T4). A amostra com maior média para a cor foi o tratamento controle T1 8,33 (gostei moderadamente) sem adição da farinha de aveia. A presença da fibra insolúvel, alterou a coloração dos demais tratamentos, que obtiveram média de 7 (gostei moderadamente).

Para o atributo textura também houve interação significativa ($p<0,05$) entre as amostras, que apresentaram média na escala de 7 (gostei moderadamente) e 6 (gostei ligeiramente). A menor nota pode ser atribuída ao fato de que à medida em que se acrescenta fibra e reduz gordura, o produto tende a reduzir a sua maciez.

De modo geral, as amostras de todos os tratamentos, foram avaliadas pelos consumidores com médias entre 6 “gostei ligeiramente” e 8 “gostei muito”, o que indica aceitabilidade satisfatória (DUTCOSKY, 2011).

Grande parte dos estudos realizados com substitutos de gordura em produtos cárneos também vem obtendo boa aceitação sensorial quando submetidos à avaliação com provadores (LAMAS, 2016). Teixeira et al. (2008) verificaram que em hambúrgueres de carne bovina com diferentes níveis de farinha de aveia (0; 2 e 4%), a preferência pela amostra com 2% de farinha de aveia foi indicada por em 35% dos provadores.

Em relação ao teste de perfil de consumo de hambúrguer (93,0%) dos provadores responderam que consomem esse produto. A maioria dos indivíduos que participaram da análise sensorial se encontrava na faixa etária entre 15 e 20 anos (63,33%) e pertenciam ao sexo feminino (70%). A frequência de consumo de hambúrguer foi de (36,67%) uma vez por mês, enquanto que (30%) consomem mais de 5 vezes ao mês.

Sobre alimentos funcionais, (76,67%) disseram que tem conhecimento ou que já ouviram falar sobre esse assunto e (66,67%) informaram que consomem algum tipo de alimento funcional. Quando questionados sobre a intenção de compra de hambúrguer

adicionado de farinha de aveia, todos os provadores foram unânimes e afirmaram que comprariam hambúrguer enriquecido com fibra.

Conclusões

A substituição do toucinho pela farinha de aveia não só resultou em um produto de menor valor calórico, mas também melhorou características tecnológicas de rendimento, encolhimento e perda de peso, além de uma boa aceitação sensorial.

Sendo assim a adição de farinha de aveia ao hambúrguer pode ser considerada uma alternativa tecnológica para produção de um produto cárneo que agregue tanto a praticidade, sabor e ao mesmo tempo a qualidade nutricional, com potencial para ser estudado, melhorado e comercializado.

Referências

ALMEIDA, R. S. **Processamento de hambúrguer de carne caprina adicionados com diferentes níveis de farinha de aveia**. 2011. 73p. Ilustrado. Dissertação (Programa de Pós-Graduação) -Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 2011.

ÁLVAREZ, D.; BARBUT, S. Effect of inulin, β -glucan and their mixtures on emulsion stability, color and textural parameters of cooked meat batters. **Meat Science**, Barking, v. 94, n. 3, p. 320-327, 2013.

ANDERSON, E. T.; BERRY, B. W. Effects of inner pea fiber on fat retention and cooking yield in high ground beef. **Food Research International**, v. 1, n. 1, p. 1-7, 2001.

AOAC. Association of Official Analytical Chemists. Official methods of analysis of AOAC International. 17th ed. Gaithersburg, 2000. v. 2.

ARISSETO, A. P.; POLLONIO, M. A. R. Avaliação da estabilidade oxidativa do hambúrguer tipo calabresa, formulado com reduzidos teores de nitrito e diferentes percentagens de gordura, durante armazenamento congelado. **Revista Higiene Alimentar**, v. 19, n. 136, 72-80, 2005.

BIS, C. V. **Efeito das fibras alimentares como substitutos de gordura em hambúrguer de carne bovina e paio**. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Ciência de Alimentos). Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, São José do Rio Preto, SP. 2016.

BOECHAT, P.G.R.; VIDIGAL, J.D.; CRISTÓFORI, J.C.R.A.; REBELLO, L.P.G.; SILVA, C.O.; SILVA, A. B. Aproveitamento integral de biomassa e farinha de banana verde na produção de hambúrguer bovino. In: XXV Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos, 2016, . Anais eletrônicos... Gramado, RS, 2016.

BORBA, C.M., OLIVEIRA, V. R., MONTENEGRO, K. R., HERTZ, P. F., VENZKE, J. G. Avaliação físico química de hambúrguer de carne bovina e de frango submetidos a diferentes processamento térmicos. **Brazilian Journal of Food Nutrition**, 24(1), 21-27. 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA. Resolução RDC nº 359, de 23 de dezembro de 2003. **Aprova Regulamento Técnico de Porções de Alimentos Embalados para Fins de Rotulagem Nutricional**. Diário Oficial da União, Brasília, 2003.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA. Resolução RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001. **Aprova o Regulamento Técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos**. Diário Oficial da União; Poder Executivo, 10 jan., 2001.

BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Secretaria de Defesa Agropecuária/Órgão: DIPOA - Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. **Regulamento técnico de identidade e qualidade de hambúrguer, anexo IV**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 de agosto de 2000.

CARVALHO, L. T. **Parâmetros tecnológicos, aceitação sensorial e sensação de saciedade após consumo de hambúrguer bovino com adição de fibra de trigo e teor de gordura reduzido**. Dissertação (Mestrado em Ciências). Universidade de São Paulo, Pirassununga, SP. 2015.

CARBONELL, L. A. et al. Functional and sensory effects of fibre-rich ingredients on breakfast fresh sausages manufacture. **Food Science and Technology International**. v. 11(2), 2005, p. 89-97.

CIRIANO, M. G. I.; BERASATEGI, I.; NAVARRO-BLASCO, I.; ASTIASARAN, I.; ANSORENA, D. Reduction of sodium and increment of calcium and omega-3polyunsaturated fatty acids in dry fermented sausages: effects on the mineral content, lipid profile and sensory quality. **Journal of the Science of Food and Agriculture**, v. 93, n. 4, p. 876-881, 2013.

COLMENERO, F.J. CARBALLO, J. COFRADES, S. Healthier meat and meat products: their role as functional foods. **Meat Science**, v. 59, ed. 1. P. 5-13, set 2001.

COSTA, L.O. Processamento e Diminuição do Reprocesso do Hambúrguer Bovino (HBV). 2004. 127f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Alimentos) - Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2004.

DA SILVA, NRF; FERNANDES, EL; SILVEIRA, TC; ESCUDINI, SV; VIDIGAL, JG; KAWASE, KYF; BORGES, JTS.. Aceitação de hambúrguer formulado com substituição de gordura animal por farinha de semente de chia. **Hortic. bras**, v. 31, n. 2. (Suplemento-CD Rom), julho 2014.

DUTCOSKY, S. D. **Análise sensorial de alimentos**. 3.ed. Curitiba: Champagnat, 2011. p. 423.

FERNANDES, A.B.C., PIZATO, S. Elaboração de hambúrguer de carne bovina com adição de farinha de sorgo (*Sorghum Vulgare*). **PubSaúde**, 2, 2019.

FORSYTHE, S.J. **Microbiologia de segurança alimentar**. Tradução de: Maria Carolina Minardi Guimarães e Cristina Leonhardt. Porto Alegre: Artmed, 2002, p. 1-42.

GONÇÁLVES, M. S.; SILVA, B.M. T.; PALHARES, P. C.; NEVES, M. P.; SILVA, V. R.; RAMOS, E. M. Elaboração e análise físico-químicas de hambúrguer adicionado de chia e transglutaminase. XXV Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos. 24 a 27 de outubro de 2016 – FAURGS – Gramado / RS.

HUBER, E. **Desenvolvimento de produtos cárneos reestruturados de frango (hambúrguer e empanado) com adição de fibras vegetais como substitutos totais de gordura**. Tese (Doutorado em Engenharia de Alimentos). Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2012.

JIMÉNEZ-COLMENERO, F. Healthier lipid formulation approaches in meat based functional foods. Technological options for replacement of meat fats by non-meat fats. **Trends Food Science Technology**, v.18, n.11, p.567-578, 2007.

JUNIOR, Walter José dos Reis. **Utilização de farinha da casca do abacaxi (*Ananas comosus* (L.) Merr.) para desenvolvimento de hambúrguer bovino com teor reduzido de gordura**. 2017. 67p Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos). Instituto de Tecnologia, Departamento de Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2017.

LAMAS, Karoliny de Oliveira, Mestrado Profissional, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, março de 2016. **Utilização de farinha de chia (*Salvia hispanica* L.) como substituta parcial de gordura na elaboração de hambúrguer de frango**. Rio Pomba-MG, 78f., 2016.

LÓPEZ-VARGAS, J. H. et al. **Quality characteristics of pork burger added with albedo-fiber powder obtained from yellow passion fruit (*Passiflora edulis* var. *flavicarpa*) co-products**. *Meat Science*, v. 97, n. 2, p. 270–276, jun. 2014.

MACHADO, E. A. **Avaliação da Qualidade Nutricional de Hamburgueres Suplementados com farinha de quinoa**: 2014. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação do curso superior em tecnologia em Alimentos) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Francisco Beltrão, 2014.

MARQUES, J. M. **Elaboração de um Produto de Carne Bovina “Tipo Hambúrguer” Adicionado de Farinha de Aveia**. 2007. 71f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2007.

MEINHOLD, N. M. Processed meats with 38-75% less fat. *Food Processing*, v.52, n.1, p. 105-106, 1991.

MELO, L.S.M.; CLERICI, M.T.P.S. Desenvolvimento e avaliação tecnológica, sensorial e físicoquímica de produto cárneo, tipo hambúrguer, com substituição de gordura por farinha desengordurada de gergelim. **Alim Nutr. = Braz J Food Nutr.**,

Out-Dez; 24(4): 361-368. 2013.

MONEGO, Magda Aita. **Goma da linhaça (*linum usitatissimum* L.) para uso como hidrocolóide na indústria alimentícia.** 2009. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria – RS. 2009.

OLIVEIRA, D. F. et al. Farinha de linhaça dourada como substituto de gordura animal em hambúrguer de carne bovina com redução de sódio. **Brazilian Journal of Food Technology Campinas**, v. 17, n. 4, p. 273-282, out./dez. 2014.

PAULA, M. M. D.O. et al. Technological and sensory characteristics of hamburgers added with chia seed as fat replacer. **Ciência Rural**, v. 49, n. 8, 2019.

PIÑERO, M. P.; PARRA, K.; HUERTA-LEIDENZ, N.; ARENAS DE MORENO, L.; FERRER, M.; ARAUJO, S.; BARBOZA, Y. Effect of oat's soluble fibre (beta-glucan) as a fat replacer on physical, chemical, microbiological and sensory properties of low-fat beef patties. **Meat Science**, Barking, v. 80, n. 3, p. 675-680, 2008.

PSZCZOLA, D. E. Oat-bran based ingredient blend replaces fat in ground beef and pork sausage. **Food Technology**, v. 45, n.60, p. 60-66, 1991.

QUEIROZ, Y. U. et al. Desenvolvimento e avaliação das propriedades físico-químicas de hambúrgueres com reduzidos teores de gordura e de colesterol. **Revista Nacional da Carne**. ed. 338. Abril, 2005.

SEABRA, L. M. J. et al. Fécula de mandioca e farinha de aveia como substitutos de gordura na formulação de hambúrguer de carne ovina. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, Campinas, v. 22, n.3, set./dez. 2002.

SILVA, Carlos Eduardo da.; et al. Influência de diferentes métodos de cocção sobre os macro e micronutrientes de hambúrguer bovino com linhaça. **Rev. Nutr. clín. diet. hosp.** 38(3):111-119.2018.

SILVA, N.; JUNQUEIRA, V. C. A.; SILVEIRA, N. F. A. **Manual de métodos de análise microbiológica de alimentos.** 2. ed. São Paulo: Varela, 2001. 317 p.

TALUKDER, S. Effect of dietary fiber on properties and acceptance of meat products: a review. **Critical Reviews in Food Science and Nutrition**, Cleveland, v. 55, n. 7, p. 1005-1011, 2015.

TEIXEIRA, T. R. M.; PERIN, C. P.; FREITAS, M. S.; JARDIM, F. B. B. Avaliação sensorial e do rendimento de hambúrgueres bovinos enriquecidos com aveia. In: **Jornada Científica das Faculdades Associadas de Uberaba**. Uberaba, p.13-17, 2008.

TERRA, N. N. **Apontamentos de tecnologia de carnes.** São Leopoldo: UNISINOS, 1998. 216 p.

TERRA, N. N.; BRUM, M. A. R. **Carne e seus derivados: técnicas de controle de qualidade.** São Paulo: Nobel, 1988. 119 p.

TREVISAN, Y. C., et al. Efeito da adição de fibra de aveia sobre as propriedades físico-químicas de hambúrguer cozido e congelado com redução de gordura e sal. **Brazilian Journal of Food Technology**, v.19, e2015079, 2016.

ULU, H. Effects of carrageenan and guar on the coking and textural properties of low fat meatballs. **Food Chemistry**, v.95, n.4, p.600-605, 2006.

VALENTE, T. P.; DE MESQUITA, M. O.; MANFIO, M. Produto cárneo acrescido de fibra com baixo teor de sódio. **Disciplinarum Scientia**. Série: Ciências da Saúde, Santa Maria, v. 15, n. 1, p. 91-100, 2014.

CAPÍTULO 11: DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE RICOTA CONDIMENTADA COM ORÉGANO ELABORADA COM LEITE DE CABRA

CHAPTER 11: DEVELOPMENT AND MICROBIOLOGICAL AND PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERIZATION OF RICOTA SPICED WITH ORGAN

Antonio Alef Pereira de Oliveira¹; Layane Rosa da Silva²; Aliou Toro Lafia³; José Douglas Bernardino Domingos⁴; Fabiana Augusta Santiago Beltrão⁵

Resumo

A ricota é um produto de origem italiana fabricada por meio de precipitação ácida para separação das proteínas do soro do leite. A ricota pode ser consumida ao natural, com ou sem sal, e saboreada com mel, açúcar ou frutas, ou ainda condimentada com alho, salsa, orégano e outros. Objetivou-se com este trabalho processar e avaliar ricota adicionada de diferentes concentrações de alho e orégano e avaliar sua estabilidade microbiológica. Foram elaboradas quatro formulações: ricota tradicional (T1); ricota condimentada com orégano (T2); ricota condimentada com alho (T3) e ricota condimentada com alho e orégano (T4), as quais foram submetidas à análise microbiológica após 10 dias de armazenamento refrigerado (5 ± 2 °C). Os resultados das análises microbiológicas indicaram que todas as amostras se encontravam dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente para queijos de alta umidade.

Palavras-Chaves: Ricota, bromatologia, condimentos.

Abstract

Ricotta is a product of Italian origin manufactured using acid precipitation to separate whey proteins. The ricotta can be eaten in its natural state, with or without salt, and savored with honey, sugar or fruit, or seasoned with garlic, parsley, oregano and others. The objective of this work was to process and evaluate ricotta added with different concentrations of garlic and oregano and to evaluate its microbiological stability. Four formulations were prepared: traditional ricotta (T1); ricotta seasoned with oregano (T2); ricotta seasoned with garlic (T3) and ricotta seasoned with garlic and oregano (T4), which were submitted to microbiological analysis after 10 days of cold storage (5 ± 2 °C).

Keywords: Ricotta, bromatology, condiments.

Introdução

A partir do soro do leite pode ser elaborado o queijo ricota, um produto de origem italiana, e considerado um dos queijos mais magros, devido ao teor reduzido de lipídeos e de calorias em sua composição (SPANU et al., 2018). A ricota fresca é definida como

¹ Bacharelado em Agroindústria, Universidade Federal da Paraíba/UFPB, aleffjoe@gmail.com

² Bacharelado em Agroindústria, Universidade Federal da Paraíba/UFPB, layanerossa@gmail.com

³ Mestrando em Tecnologia Agroalimentar, Universidade Federal da Paraíba/UFPB, zime1990@gmail.com

⁴ Bacharelado Nutrição e Dietética, Universidade Federal de Campina Grande/UFCG, douglas94nc@gmail.com

⁵ Doutora em Biotecnologia, Universidade Federal da Paraíba/UFPB, fabs.15@hotmail.com

o queijo obtido pela precipitação ácida a quente de proteínas do soro de leite, com adição de leite, até vinte por cento do seu volume, devendo apresentar consistência mole e coloração branca ou creme, formato cilíndrico e peso variando entre 300 g e 1 kg (BRASIL, 2017).

O elevado consumo de ricota se deve pelo seu alto valor proteico, baixo teor de sódio e gorduras. Por estas razões é amplamente utilizada pelos consumidores adeptos de uma dieta saudável (ROSAS et al., 2016; VALADÃO, 2015). A ricota ainda apresenta um sabor acentuado e ligeiramente agradável, que pode ser consumido ao natural, com ou sem sal, condimentada ou defumada (BRASIL, 2017). O uso de condimentos e especiarias em alimentos tem crescido largamente, pois além de conferirem sabor, auxiliam na digestão, aprimoram as características sensoriais do alimento e possuem propriedades terapêuticas (SEDLMAIER et al., 2017).

O orégano é uma planta aromática e medicinal *Origanum vulgare* pertence à família Lamiaceae. Esta erva aromática é vulgarmente chamada de orégão vulgar ou manjerona selvagem e são utilizadas várias partes da sua estrutura física para diversos fins, pois os seus metabolitos secundários conferem-lhe algumas propriedades tanto condimentares como medicinais, é considerada uma planta tônica e tem uma grande diversidade de propriedades medicinais, sendo as propriedades digestivas e expetorantes as que mais se enfatizam (Norman, 2004).

O alho (*Allium sativum* L.) é uma hortalíça rica em amido e substâncias aromáticas de alto valor condimentar e possui ação fitoterápica com diversas propriedades farmacológicas. Uma das espécies cultivadas mais antigas começou a ser plantado há mais de 5.000 anos pelos hindus, árabes e egípcios. Nesse contexto, se torna relevante o uso de novos ingredientes naturais em formulações de ricota como o alho e o orégano. Ainda, verifica-se a importância de prolongar a vida útil e agregar um novo sabor característico ao produto, configurando-se como uma nova e viável opção de consumo (Norman, 2004).

Mesmo dotado de excelentes características nutricionais, o leite de cabra não é visto como um bom atraente pelos consumidores, por isso é de suma importância que sua divulgação e marketing possibilitem mostrar sua qualidade, devendo ser feito junto às associações e/ou cooperativas de produtores, para que possa discutir e propor políticas de fomento a esta atividade por meio de uma produção sustentável. Bem como a realização de mais pesquisas que visem disponibilizar aos produtores informações com fácil entendimento e aplicabilidade, mediante o tipo sistema de produção adotado (Cavalcanti,

2014).

Diante do que foi abordado em termos de pesquisa e em face de desenvolvimento socioeconômico de regiões que atuam com a caprinocultura leiteira, o leite de cabra ainda é um produto pouco estudado no tange o seguimento e aplicação ao mercado, fazendo com que a ricota se torne apenas um derivado opcional para aplicação de beneficiamento do leite, dessa forma, para o aproveitamento do soro de queijos (Cutrim. 2017).

Nesse contexto, busca-se através do desenvolvimento e caracterização de ricota de leite de cabra, com adição de orégano, agregando valor nutricional, tornando uma nova opção de derivado lácteo, gerando o estímulo a produção de produtos lácteos com o leite de cabra principalmente para pequenos produtores, com pensamento sustentável, evitando desperdício do leite e estimulando a produção e conseqüentemente a renda, o que configura a principal motivação para a elaboração deste trabalho.

Material e Métodos

As análises microbiológicas foram realizadas segundo as recomendações metodológicas sendo pesquisados os seguintes microrganismos: coliformes a 35°C; *Estafilococcus coagulase positiva*; bolores e *Salmonella*. As ricotas foram elaboradas no laboratório de laticínios da Universidade Federal da Paraíba, seguindo rigorosamente todas as boas práticas de manipulação e de fabricação de alimentos. Os ingredientes foram adquiridos da feira local da cidade de Bananeiras-PB, com exceção do leite de cabra que foi do laboratório de ovinos e caprinos da Universidade Federal da Paraíba.

Para elaboração foram utilizados os seguintes ingredientes soro do leite, orégano, alho e vinagre. Foram elaboradas quatro formulações de ricota, tradicional (T1); ricota condimentada com orégano (T2); ricota condimentada com alho (T3) e ricota condimentada com alho e orégano (T4).

O processamento da ricota aconteceu da seguinte forma como mostra o fluxograma abaixo.

Inicialmente o soro do leite de cabra foi colocado em um recipiente levado ao fogo e agitado de forma lenta e constante até atingir 65 °C, sempre controlando a temperatura com termômetro. Depois foi feito a adição do leite e os condimentos assim que atingiu a temperatura de 65 °C, adicionando lentamente de 5 a 8% de leite desnatado, levando-se em consideração o volume inicial do soro, ou seja, 5 a 8 litros de leite para cada 100 litros de soro. Após a adição do leite e os condimentos, continua-se a agitação até atingir 85 °C. Nesse momento é preciso ir adicionado o vinagre branco lentamente na proporção de 0,1 com relação ao volume do leite e de soro, ou seja, 100 ml de vinagre branco para cada 100 litros da mistura soro/leite, mexendo a mistura por 3 minutos para melhor incorporação. Após a incorporação do vinagre, é possível observar observa-se a formação de flocos na superfície da mistura, nesse momento deve-se interromper a agitação, e controlar a temperatura até atingir 95 °C. Em seguida, foi retirada a fonte de calor e deixada a mistura em repouso por 30 minutos para que acontecesse o resfriamento. Depois desse descanso é possível observa na superfície da mistura a formação de uma massa branca flutuante, resultando na Ricota. Essa massa flutuante foi retirada cuidadosamente, com o auxílio de uma peneira, evitando que se quebre os flocos. Em seguida colocadas e formas para assim a massa ficar em repouso e acontecer a dessoragem. Após ficar em temperatura ambiente, as ricotas ainda nas formas foram levadas para resfriamento a temperatura de 6 a 10 °C por um período de 24 horas.

A utilização do leite desnatado deve-se principalmente ao fato da Ricota ser um queijo para pessoas em dieta de restrição alimentar ou que necessitem de alimentos de fácil digestibilidade. Após 30 minutos de repouso, foi retirada com cuidado a massa floculada, com auxílio de uma peneira, evitando-se quebrar os flocos. A adição de orégano e alho foi de 10g para formulação de ricota condimentada com orégano (T2); ricota condimentada com alho (T3) e ricota condimentada com alho e orégano (T4). A ricota de (T1) não foi adicionado nenhum tipo de condimento, permanecendo no modo tradicional.

Para as análises microbiológicas foram seguidas de acordo com a RDC nº12 de 2 de janeiro de 2001, que estabelece os limites microbiológicos para queijos com alto teor de água, temperados, condimentados ou adicionados de ervas ou outros ingredientes é de Coliformes a 45 °C/g 10^2 , *Staphylococcus* coagulase positiva/g 10^3 e *Salmonella* sp/ 25g Ausência.

Para a determinação de *Estafilococos* coagulase positiva, foi transferido com o auxílio de uma pipeta 1 ml do diluente para as placas de petri, sendo em seguidas incubadas em estufa a 35°C por 24 horas, após este período foi verificado se houve presença ou ausência para este microrganismo. A partir das diluições sucessivas 10^{-1} , 10^{-2} e 10^{-3} transfere 1ml da amostra para a placa de petri e depois transferidos o meio Aga Batata Dextrose (BDA) aguarda-se a solidificação do meio e incuba a 25°C de 3 a 5 dias.

Para a determinação de *salmonella* inicialmente foi realizado um plaqueamento seletivo diferencial, para isso foi homogeneizado o tubo de enriquecimento e retirado com uma alça de platina uma alçada do Caldo Tretationato e feita a estria em placas de Agar Entérico de Hectoem e Agar Xilose Lisina descarboxilado como também em Agar verde brilhante Agar *Salmonella* diferencial ou Agar *Salmonella Shigela*, após estes procedimentos as placas foram invertidas e incubadas a 35°C por 24 horas, logo após este período foi verificado se houve o desenvolvimento de colônias típicas de *Salmonella*. Para a confirmação das colônias típicas de *Salmonella*, com o auxílio de uma agulha de inoculação foi removido uma porção da massa das células, do centro da colônia típica e semeado nos tubos contendo Agar Lisina ferro e Agar Tríplice açúcar. Logo os tubos foram incubados a 35°C por 24 horas. Para o teste Bioquímico foi transferido com o auxílio de uma agulha através de uma picada a cultura de colônia típica de TSI para o meio e incubado a 35°C por 24 horas, após este período foi verificado se houve presença ou ausência de salmonela no produto.

Resultados e Discussão

A Tabela 1 mostra os resultados de coliformes totais e termotolerantes (NMP/g), e enterobactérias (UFC/g) das ricotas tradicional e condimentadas com orégano e alho nos tempos de 1, 7 e 21 dias de armazenamento refrigerado.

Tabela 1 - Resultados de coliformes totais e termotolerantes (NMP/g), e enterobactérias (UFC/g) das ricotas tradicional e condimentadas com orégano e alho

Determinações	Tempo de armazenamento	RT	RO	RA	ROA
Coliformes totais – 35 °C (NMP/g)	1 dia	3,6	9,2	23	23
	7 dias	<3,0	3,6	23	<3,0
	21 dias	240	<1.100	<3,0	290
Coliformes termotolerantes – 45 °C (NMP/g)	1 dia	<3,0	<3,0	23	<3,0
	7 dias	<3,0	3,6	23	<3,0
	21 dias	3,6	<3,0	<3,0	<3,0
Enterobactérias (UFC/g)	1 dia	<10 ²	<10 ²	<10 ²	<10 ²
	7 dias	<10 ²	<10 ²	3 x 10 ²	10 ³
	21 dias	7,7 x 10 ⁴	2,3 x 10 ⁵	3,1 x 10 ⁶	1,4 x 10 ⁶

Legenda: RT – ricota tradicional; RO – ricota condimentada com orégano; RG – ricota condimentada com alho; ROA – ricota condimentada com orégano e alho .

Os resultados de coliformes totais das ricotas tradicional e condimentadas, nos tempos 1 e 7 dias de armazenamento refrigerado, variaram de <3,0 a 23 NMP/g. Aos 21 dias, os resultados de coliformes totais da ricota condimentada com açafrão-da-terra (RT), da ricota condimentada com açafrão-da-terra e gengibre (RAO) e da ricota tradicional (RT) foram <1.100, 290 e 240 NMP/g, respectivamente. Já a ricota condimentada com gengibre (RA) apresentou menor contaminação (<3,0 NMP/g).

A legislação brasileira não determina limites de tolerância para este grupo de micro-organismos em ricota (BRASIL, 2001). Entretanto, por ser um alimento de vida de prateleira limitada e por apresentar elevada umidade e disponibilidade de nutrientes a ricota é considerada um alimento susceptível ao crescimento de bactérias deteriorantes e patogênicas. A presença de coliformes totais nas ricotas, mesmo que em baixas contagens, pode indicar falhas higiênicas ocorridas durante a manipulação do produto ou pós processamento do mesmo, ou até mesmo a má qualidade das matérias-primas utilizadas (VALIATTI et al., 2017).

No estudo de Sales et al. (2016), que avaliou 10 amostras de ricotas frescal

adquiridas em supermercados do município de Curitiba – PR, foi verificada a presença de coliformes totais em 80% das amostras analisadas, com valores variando de 2 a 999 UFC/25 g. Os autores concluíram que estes resultados indicaram falhas higiênicas durante a produção e manipulação do produto.

Preis et al. (2015) verificaram que ricotas adicionadas de condimento composto por amido de milho, glutamato monossódico, sal, manjerição em flocos, sementes moídas de funcho, orégano desidratado pó/moído, pimenta preta moída, pimenta branca moída, cebola desidratada em pó, louro em pó, coentro moído/pó, açúcar, vegetais desidratados e corante natural de cúrcuma, apresentaram contagem inferior a 3 NMP/g de coliformes totais, enquanto a ricota padrão (sem especiarias) apresentou contagem de 23 NMP/g. Os resultados encontrados pelos autores demonstraram a eficácia do condimento composto na inibição do crescimento de coliformes totais em ricotas.

Dessa forma, considerando o potencial antimicrobiano do orégano e do alho já relatado na literatura, pode-se atribuir a este condimento, na concentração testada neste estudo, um efeito inibidor do crescimento de coliformes totais nas ricotas ao longo dos 21 dias de armazenamento refrigerado (CUTRIM, 2017; SANTOS, 2015).

Os resultados de coliformes termotolerantes das ricotas tradicional e condimentadas, nos tempos 1, 7 e 21 dias de armazenamento refrigerado, variaram de <3,0 a 23 NMP/g. Desta forma, todas as amostras, em todos os tempos avaliados, encontravam-se de acordo com a legislação vigente, a qual determina $5,0 \times 10^2$ NMP/g de coliformes a 45 °C como sendo o limite tolerável em queijos de muito alta umidade (BRASIL, 2001). Os resultados encontrados se assemelham aos obtidos por Andrade et al. (2014) que, ao avaliar ricota natural e ricota condimentada com alho, salsa, manjerição e ervas-finas, detectaram valores inferiores a 3,0 NMP/g em todas as amostras de ricota, nos tempos zero e 7 dias de armazenamento refrigerado a 10 °C.

No primeiro tempo de análise das ricotas não foi observada a presença de enterobactérias em níveis detectáveis ($<10^2$ UFC/g). No entanto, após 7 dias de armazenamento, as ricotas condimentadas com orégano (RA) e orégano e alho (RAO) apresentaram contagens de 3×10^2 e 10^3 UFC/g, respectivamente. Após 21 dias, todas as amostras apresentaram resultados elevados de enterobactérias, variando de $7,7 \times 10^4$ a $3,1 \times 10^6$ UFC/g. Os resultados encontrados neste estudo indicam que o orégano e o alho, nas concentrações utilizadas, não apresentaram efeito inibidor sobre esse grupo microbiano ao longo do período de armazenamento.

Embora a legislação brasileira não disponha de padrões para este grupo de micro-organismos a sua avaliação é importante, pois muitas enterobactérias são utilizadas como indicadores biológicos de contaminação em água, alimentos e instrumentos. Este grupo inclui bactérias dos gêneros *Escherichia*, *Shigella*, *Salmonella*, *Enterobacter*, *Klebsiella*, *Serratia*, *Proteus* e outros. Alguns destes micro-organismos podem causar doenças, incluindo gastroenterites e infecções do trato urinário, como também podem produzir toxinas que causam intoxicações (NOGUEIRA et al., 2013; FREITAS et al., 2015).

No presente trabalho não foi observada a presença de estafilococos coagulase positiva nas ricotas tradicional e condimentadas em nenhum dos tempos avaliados ($<10^2$ UFC/g). Portanto, todas as amostras encontravam-se de acordo com a legislação, a qual determina que para queijos de alta umidade elaborados por coagulação enzimática sem a ação de bactérias lácticas o limite tolerável de estafilococos coagulase positiva é $5,0 \times 10^2$ UFC/g (BRASIL, 2001).

Em contrapartida, no estudo de Carrijo et al. (2011) foi detectada a presença de *Staphylococcus* spp. em todas as amostras de ricotas frescas comercializadas no município de Niterói, Rio de Janeiro, e estafilococos coagulase positiva em 50% delas, classificando-as como impróprias para o consumo humano. A identificação de micro-organismos do gênero *Staphylococcus* em leite e derivados é relevante pois este micro-organismos produz uma toxina termorresistente, ou seja, que resiste ao tratamento térmico ao qual o leite é submetido. Esta toxina pode causar surtos de intoxicação estafilocócica (CAVALCANTI, 2014; CERESER et al., 2011).

No que diz respeito à *Salmonella* sp., todas as amostras analisadas, em todos os tempos de armazenamento refrigerado, exibiram ausência em 25 g, apresentando-se em conformidade com a legislação vigente (BRASIL, 2001).

Conclusões

As ricotas condimentadas demonstraram estabilidade microbiológica de acordo com os parâmetros estabelecidos pela legislação, estando aptas para o consumo. Diante do exposto, conclui-se que a utilização de condimentos combinados em ricotas é uma alternativa viável e promissora, uma vez que minimiza as alterações negativas nas características sensoriais da ricota ao mesmo tempo em agrega valor ao produto.

Referências

- ANDRADE, S. FLORESTA, P. M. M.; MARTINS, A. D. O.; MARTINS, M. P.; MARTINS, J. M. Avaliação das características físico-químicas, microbiológicas e sensoriais de ricotas em pasta condimentadas. **VÉRTICES**, Campos dos Goytacazes/RJ, v.16, n.1, p. 87-99, jan/abr. 2014.
- ARRAIS, B. C. D. **Desenvolvimento de ricota funcional**: avaliação das características físico-químicas e microbiológicas do produto. 2015. 57f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia do Leite) - Universidade Norte do Paraná- UNOPAR, Londrina, 16. Marc, 2015.
- ASQUI, M. G. P. **Diseño del proceso de elaboración de queso ricotta a partir del suero láctico de la quesera “El Sinche”**. 2017. 86f. Monografia (Graduação em Engenharia Química) - Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba – Ecuador, 2017.
- AZEVEDO, L. M.; FILHO, F. C. C.; LIMA, M. T.; SILVA, A. A.; et al. Vida de prateleira de ricota temperada. **Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal**, Piauí, v. 10, n. 1, p. 1-8, jan-marc, 2016.
- BALD, J. A.; VINCENZI, A.; GENNARI, A.; LEHN, D. N.; SOUZA, C. F. V. Características físico-químicas de soros de queijo e ricota produzidos no Vale do Taquari, RS. **Revista Jovens Pesquisadores**, Santa Cruz do Sul, v. 4, n. 3, p. 90- 99, 2014.
- BARBOSA, E. D. **Secagem do extrato aquoso de gengibre (Zingiber officinale Roscoe) pelo método de camada de espuma**. 2016. 39f. Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2016.
- BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, Resolução - CNNPA nº 12, de 1978. Aprova as normas técnicas especiais, do Estado de São Paulo, revistas pela CNNPA, relativas a alimentos e bebidas, para efeito em todo território brasileiro, **Diário oficial da União**, 24 Jul. 1978.
- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 12, de 02/01/2001. Regulamento técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 2001.
- BRASIL, Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017, Regulamentada Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, que dispõem sobre o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 3 out. 2017.
- BRASIL, Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. Portaria Nº 146, de 7 de Março de 1996. Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 11 Mar. 1996.
- BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa

nº 62, de 26 de agosto de 2003. Métodos Analíticos Oficiais para Análises Microbiológicas para o Controle de Produtos de Origem Animal e Água. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 18 Set, Seção 1, 2003.

BRASIL. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 276, de 22 de Setembro de 2005. Regulamento técnico para especiarias, temperos e molhos. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 23 set. 2005.

CAJAS, A. X. T. **Desarrollo de un condimento a base de vegetales deshidratados y especias bajo en sodio, utilizando cloruro de potasio como sustituto de sal**. 2018. 88f. Monografia (Graduação em Química dos Alimentos) – Faculdade de Ciências Químicas, Quito, Fev, 2018.

CARRIJO, K. F.; PRAXEDES, C. I. N. S.; NOBRE, F. S. D.; DUARTE, M. T.; et al. Condimentos e especiarias empregados no processamento de alimentos: considerações a respeito de seu controle físico-químico. **PUBVET**, Londrina, v. 6, n. 26, Ed. 2013, p. 1-27, Art. 1417-1422, 2012.

CERESER, N. D.; JÚNIOR, O. D. R.; MARCHI, P. G. F.; SOUZA, V.; et al. Avaliação da qualidade microbiológica da ricota comercializada em supermercados do estado de São Paulo. **Embrapa Caprinos e Ovinos-Artigo em periódico indexado (ALICE)**, 2011.

CAVALCANTI, F. B. **Avaliação microbiológica do queijo "tipo ricota" comercializados em supermercados de Campina Grande-PB**. 2015. 29p. Monografia (Graduação em Química Industrial) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande – PB, 2014.

CUNHA, E. O. **Análise comparativa da qualidade nutricional de ricotas tradicional, light e orgânica vendidas em João Pessoa**. 2014. 35f. Monografia. (Graduação em Nutrição) – Departamento de Nutrição da Universidade Federal da Paraíba– UFPB, João Pessoa, 2014.

CUTRIM, E. S. M. **A avaliação antimicrobiana e antioxidante dos óleos essenciais de *Zingiber officinale* Roscoe (gengibre) e *Rosmarinus officinalis* L. (alecrim) frente às bactérias patogênicas**. 2017. 69f. Monografia (Graduação em Química Industrial) – Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2017.

DABAGUE, I. C. M.; DESCHAMPS, C.; MACHADO, M. P.; CÔCCO, L. C. Rendimento do óleo essencial de *Zingiber officinale* em resposta a diferentes processamentos e tempos de extração. **Revista Acadêmica Ciência Agrár. Ambient.**, Curitiba, v. 11, Supl. 2, p. S163-S168, 2013.

DAMER, J. R. S.; MORRESCO, T. R.; WESCHENFELDER, S. Qualidade microbiológica de queijo ricota comercializado na região Noroeste do Rio Grande do Sul. **Revista Brasileira de Ciência Veterinária**, Rio Grande do Sul, Brasil, v. 22, n. 3-4, p. 216-219, jul/dez. 2015-2016.

DETONI, E.; GONÇALVES, L.A. **Desenvolvimento de creme de ricota**

condimentado com tomate seco e manjeriço. 2011. 40f. Monografia (Graduação em Tecnologia em Alimentos) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão – PR, 2011.

DORNELLAS, F. C. **Atividade antifúngica de *Cúrcuma longa* L.(Zingiberaceae) contra fungos deteriorantes de pães.** 2016. 33f. Monografia (Graduação em Tecnologia de Alimentos) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFP, Campo Mourão, 2016.

DUARTE, A. F. S.; MARTINS, A. L. C.; MIGUEL, M. D.; MIGUEL, O. G. O uso de plantas medicinais durante a gravidez e amamentação. **Visão Acadêmica**, Curitiba, v.18, n.4, p.126-139, out/dez, 2017.

FREITAS, M. P. Avaliação microbiológica de queijos artesanais produzidos na cidade de Taió, Santa Catarina. **Revista Interdisciplinar Saúde Meio Ambient.** v. 4, n. 2, p. 103-114, jul./dez. 2015.

HORBAN, M. A.; SILVA, A. A.; MAYDL, M. P.; CASTELLA, R.; LUNELLI, C. E.Produção de Poli (Ácido láctico) a partir do soro de leite. **The Journal of Engineering and Exact Sciences – JCEC.** Vol. 03 N. 08, 2017.

FERNANDES, M. S. ***Enterococcus* spp. e *Bacillus cereus* isolados do processamento de ricota:** patogenicidade, formação de biofilmes multiespécie e detecção de autoindutores. 2014. 221f. Tese (Tecnologia de Alimentos) - Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas, Campinas – SP, 2014.

FERREIRA, L. R. **Bebida isotônica formulada a base de permeado obtido da ultrafiltração do soro de leite adicionado de carotenóides em pó de pequi (*caryocar brasiliense* Camb.)** 2017. 86f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais – Brasil, 2017.

GUATEMIM, E. L. X.; SILVEIRA, S. M.; MILLEZI, A. F.; FERENZ, M.; et al.Evaluation of the microbiological quality of ricotta cheese commercialized in Santa Catarina, Brazil, **Food Science and Technology**, Campinas, v. 36, n°4, p. 612-615, Oct.-Dec. 2016.

GUO, J.; WU, H.; DU, L.; ZHANG, W.; YANG, and. J. Comparative Antioxidant Properties of Some Gingerols and Shogaols, and the Relationship of Their Contents with the Antioxidant Potencies of Fresh and Dried Ginger (*Zingiber officinale* Roscoe). **J. Agr. Sci. Tech**, China, Vol. 16: p.1063-1072, 2014.

GRASSO, E. C.; AOYAMA, E. M.; FURLAN, M. R. Ação Antiinflamatória de *Curcuma longa* L. (zingiberaceae). **Revista Eletrônica Thesis**, São Paulo, ano XIV, n.28, p.117-129, 2º semestre, 2017.

HAFEMANN, S. P. G.; AVANÇO, G. B.; SCAPIM, M. R. S.; ANTIGO, J. L.; et al.Ricota com Adição de Óleo Essencial de Orégano (*Origanum vulgare* Linneus): Avaliação Físico-Química, Sensorial e Microbiológica. **Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais**, Campina Grande, v.17, n.3, p.317-323, 2015.

HANNA, A. C. S. **Aproveitamento de soro de queijo para a produção de pasta de ricota sabor tucumã (*astrocaryum aculeatum meyer*)**. 2015. 46f. Dissertação (Ciência dos Alimentos) Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2015.

HENING, B.; PIOLA, R. L. **Desenvolvimento de ricota saborizada adicionada de oligofructose**. 2013. 47f. Monografia (Graduação em Tecnologia em Alimentos) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná – FTFP, Francisco Beltrão, 2013.

JAHN, R. C.; GARCIA, M. V.; COPETTI, M. V. Deterioração fúngica em indústria de queijo tipo tropical. **Brazilian Journal of Food Research**, Campo Mourão, v. 8, n. 1, p. 16-25, jan./mar. 2017.

LIMA, A.; SILVA, L. S.; CAVALCANTI, N. A. A.; CAMPOS, T. F. G. M. Gengibre (*zingiber officinale roscoe*), propriedades bioativas e seu possível efeito no diabetes tipo 2: estudo de revisão. **Revista Saúde em Foco**, Teresina, v. 1, n. 2, p. 15-25, ago/dez. 2014.

LIMA, B. B.; LEAL, M. C. **Parâmetros indicadores de qualidade de queijos artesanais comercializados em Castro-PR**. 2017. 30f. Monografia (Graduação em Tecnologia em Alimentos) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFP, Ponta Grossa, 2017.

MACHADO, N. A. F. **Desenvolvimento e análise sensorial de bolo enriquecido com soro de leite e microencapsulado de própolis vermelha**. 2017. 62f. Dissertação (Mestrado em Nutrição) – Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2017.

MAGENIS, R. B. **Avaliação das propriedades físico-químicas, reológicas e do perfil eletroforético por SDS-PAGE de queijo minas frescal**. 2015. 116f. Tese (Doutorado em Ciência dos Alimentos) - Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Florianópolis, 2015.

MANCINI, S.; SECCI, G.; PREZIUSO, G.; PARISI, G.; PACI, GISELLA. Ginger (*Zingiber officinale Roscoe*) powder as dietary supplementation in rabbit: life performances, carcass characteristics and meat quality. **Italian Journal of Animal Science**, p. 1-6, jan. 2018.

MARCHI, J. P.; et al. *Curcuma Longa L.*, o Açafrão Da Terra, e seus benefícios medicinais. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, Umuarama, v. 20, n. 3, p. 189-194, set./dez. 2016.

MARIOT, A.; GIBIKOSKI, C. Z.; VIEIRA, R. M.; VILARINS, V. **Produção de ácido láctico a partir de soro de leite**. 2017. 293f. Projeto de pesquisa (Graduação em Engenharia Química) – Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, Tubarão - SC, 2017.

MARMITT, D. J.; REMPEL, C.; GOETTERT, M. I.; SILVA, A.D. Análise da produção científica do *Curcuma longa L.* (açafrão) em três bases de dados após a criação da RENISUS. **Revista Pan-Amazônica de Saúde**, Lagedo – Rio Grande do Sul, Brasil, v. 7, n. 1, p. 71-77, 2016.

MARQUES, L. F.; COSTA, T. L., MOURA, R. L., MARIA, A.; COSTA, N. M., CHAVES, C. G.; FREITAS, R. M. Adição de orégano na produção de ricota: um teste de aceitação. **Anais: JORNADA NACIONAL DA AGROINDÚSTRIA**, Bananeiras: UFPB, 2008.

MEDEIROS, R. O. N. B. **Estudo da aplicação na área da saúde do gengibre, sua caracterização química**. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas)- Instituto Superior de Ciências da Saúde - Egas Moniz, Nov. 2017.

MEIRA, Q. G. S. **Produção e caracterização de Ricota Caprina adicionada de bactérias Probióticas**. 2015.140f. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos), Universidade Federal da Paraíba – UFPB, João Pessoa, 2015.

MENDES, F. S.; SOUZA, C. F. V. Qualidade microbiológica de soro de queijo e soro de ricota de laticínios do vale do Taquari, Rio Grande do Sul. **Revista Brasileira de Tecnologia Agroindustrial**, Ponta Grossa, v. 11, n. 2, p. 2437-2450, jul/dez. 2017.

NASCIMENTO, J. C. S.; LIMA, M. S.; ALBUQUERQUE, G. S.; CHINELATE, G. C.B.; SILVA, J. J. C. Avaliação da ação de diferentes antimicrobianos naturais contra microrganismos patogênicos. **Revista Brasileira de Agrotecnologia**, Pernambuco, v. 7, n. 2, p.203-208, 2017.

NOGUEIRA, A. M. S.; STELLA FLÁVIA RENZETI MARIOTTI, S. F. R.; BUENO, S.M. Análise da qualidade microbiológica De queijo ralado comercializados em São José do Rio Preto – SP. **Revista Científica UNILAGO**, p. 129-135, 2013.

Norman, J. 2004. Ervas aromáticas e especiarias, **Editora Civilização, Porto**.

OLIVEIRA, J. **Uso de critérios para avaliação da qualidade microbiológica de um laticínio**. 2016. 53f. Monografia (Bacharel em Engenharia de Alimentos), Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, Laranjeiras do Sul, 2016.

OLIVEIRA, J. O.; VILELA, L. T. O .; SILVA, L. H. O.; NASCIMENTO, T. S.; et al. Análise microbiológica de especiarias desidratadas comercializadas em feiras livres de Cuiabá, Mato Grosso. **Journal Health Npeps**, Cuiabá – Mato Grosso, Brasil, v. 2, n. 2, p. 365-379, 2017.

OLIVEIRA, M. B. **Avaliação de queijos ricota comercializados em Goiânia-GO e queijos processados com diferentes concentrações de leite e adicionados de proteínas de soja e cálcio**. 2012. 109f. Dissertação (Mestrado) - Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás - UFG, Goiânia, 2012.

PREIS, C.; C.; CHAGAS, T. E. R.; RIGO, E. Avaliação da ação antimicrobiana de óleo essencial de orégano (*origanum vulgare*) em ricotas adicionadas de especiarias. **Revista do Congresso Sul Brasileiro de Engenharia de Alimentos**. v. 1. n. 1, p. 1-8, 2015.

ALES, W. B.; CAVEIÃO, C.; VALENTIM, D.; CASTRO, L. Análise microbiológica em ricotas frescal no município de Curitiba – PR. **Revista de Biotecnologia & Ciência**. Vol.5, Nº1, p.16-24, 2016.

SANTOS, P. D. F. **Avaliação da atividade antimicrobiana de microcristais de curcumina**. 2015. 36f. Monografia (Bacharel em Engenharia dos Alimentos) – Departamento de Alimentos– DALIM – da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, Paraná, 2015.

SANTOS, R. R.; SOUZA, A. L. R.; TROMBETE, F. M.; MELO, N. R. Proteína do soro de leite: Aproveitamento e aplicações na produção de embalagem biodegradável. **Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável**, Pombal – PB, Vol. 10. nº 5, p. 51 - 58, Dez., 2015.

SANTOS, S.; et al. Características tecnológicas, de qualidade e potencialidades da cadeia produtiva de queijo colonial na região Sul do Brasil: uma revisão. **FTT Journal of Engineering and Business**, São Bernardo do Capo – SP, v. 1, n. 2, p. 50-64, fev/jun, 2017.

SATTIN, E.; ANDREANI, N. A.; CARRARO, L.; FASOLATO, L.; et al. Microbial dynamics during shelf-life of industrial Ricotta cheese and identification of a *Bacillus* strain as a cause of a pink discolouration. **Food Microbiology**, vol. 57, p. 8-15, dez. 2016.

SEDLMAIER, A. W.; SANTOS, A. C.; PERES, A. P. Avaliação sensorial de carne moída acrescida de condimentos naturais com baixo teor de sódio. **Cadernos da Escola de Saúde – Faculdades Integradas do Brasil**, Curitiba, v. 1, n. 11, p. 90-102. 2017.

SHIBATA, L. W. **Análise físico-química, microbiológica e sensorial do queijo de coalho condimentado produzido a partir do leite de cabra congelado**. 2018. 32f. Monografia (Graduação em Zootecnia) – Centro de Ciências Agrárias. Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Areia – PB, 2018.

SILVA, E. A.; SANTOS, E. A. L.; AQUINO, A. B.; ARAUJO, J. M.; et al. Processamento de ricota natural e condimentada: avaliação microbiológica e sensorial. **Revista GEINTEC - Gestão, Inovação e Tecnologias**, São Cristovão/SE, v. 4, n. 2, p. 788-795, 2014.

SPANU, C.; PIRAS, F.; MOCCI, A. M.; NIEDDU, G.; SANTIS, E. P. L.; SCARANO, C. Use of *Carnobacterium* spp protective culture in MAP packed Ricotta fresca cheese to control *Pseudomonas* spp. **Food Microbiology**, 74, p.50-56, 28 fev. 2018.

SOUSA, J. P. B.; et al. Açafrão em pó (*Curcuma longa* L.) em dietas de frangos de corte. In: **Colloquium Agrariae**.v. 13, n.2, Mai-Ago. 2017, p.97-108, 2017.

SOUZA, M. Y. M. **Análise de creme de Ricota**: Caracterização físico-química e classificação quanto ao teor de gordura no extrato seco. 2014. 29f. 21. Ed. Monografia (Graduação em Química Industrial) – Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências e Tecnologia, Campina Grande – PB, 2014.

TAVARES, F. O.; PIERETTI, G. G.; ANTIGO, J. L.; POZZA, M. S. S.; SCAPIM, M. R. S.; et al. Cobertura comestível adicionada de óleos essenciais de orégano e alecrim para uso em ricota. **Rev. Inst. Laticínios Cândido Tostes**, Juiz de Fora, v. 69, n. 4, p.

249-257, jul./ago., 2014.

TOZETTO, L. M. **Produção e caracterização de cerveja artesanal adicionada de gengibre (*Zingiber officinale*)**. 2017. 80f. 30 cm. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFP, Ponta Grossa, 2017.

CAPÍTULO 13: DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DE FARINHA DE FEIJÃO (*Phaseolus vulgaris*) BIOFORTIFICADA E A INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO TÉRMICO

CHAPTER 13: DETERMINATION OF NUTRITIONAL COMPOSITION PARAMETERS OF BIOFORTIFIED BEAN (*Phaseolus vulgaris*) FLOUR AND THE INFLUENCE OF HEAT TREATMENT

Natália Hortência Costa Souza¹; Aryane Stéffani Araújo Custódio²; Gabriel Silvério Filbido³; Fabricio Barros Brum⁴; Camila Gabriel Kato Schwartz⁵

Resumo

A desnutrição é um dos grandes problemas do Brasil, uma das estratégias para o combate à desnutrição é o consumo de alimentos ricos em vitamínicos e minerais. O feijão (*Phaseolus vulgaris*) é um dos alimentos mais consumidos no país e o desenvolvimento de um novo produto como a farinha de feijão fortificada é uma estratégia simples, eficaz e de baixo custo que pode vir a suprir as deficiências nutricionais de ferro da população brasileira. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi realizar a determinação de parâmetros da composição nutricional como os teores de umidade, cinzas, lipídeos, proteínas, Fe total, Fe (II) e Fe (III) de farinha de feijão biofortificada *in natura* e submetida à tratamento térmico à 50°C. O processo de secagem influenciou na umidade, no teor de Fe total e Fe (II) contudo, não diferiu o teor de cinzas, lipídeos, proteínas e no teor de Fe (III). Constatamos que a composição nutricional da farinha de feijão (*Phaseolus vulgaris*) biofortificada foi afetada positivamente pelo tratamento térmico à 50°C com aumento do teor de Fe total e Fe (II) tornando o produto com valor nutricional mais elevado mostrando ser um processo promissor para diminuir a incidência de desnutrição no Brasil.

Palavras-Chaves: Feijão, *Phaseolus vulgaris*, biofortificação, anemia, desnutrição.

Abstract

Malnutrition is one of the major problems in Brazil and one of the strategies to combat malnutrition is the consumption of foods rich in vitamins and minerals. Beans (*Phaseolus vulgaris*) is one of the most consumed foods in the country and the development of a new product such as fortified bean flour is a simple, effective and low-cost strategy that can supply the iron deficiencies of the Brazilian population. Thus, the objective of this work was to determine the parameters of the nutritional composition, such as moisture, ash, lipids, proteins, total Fe, Fe (II) and Fe (III) levels of fresh biofortified bean flour and submitted to heat treatment at 50°C. The drying process influenced the humidity, the total Fe and Fe (II) content, however, the ash, lipid, protein content and Fe (III) content did not differ. Thus, the nutritional composition of biofortified bean flour (*Phaseolus vulgaris*) was positively affected by heat treatment at 50°C with an increase in the total Fe content and Fe (II) making the product with a

¹Discente em Engenharia de Alimentos, Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, nataliahcsouza@hotmail.com

²Discente em Engenharia de Alimentos, Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, aryanesac06@outlook.com

³Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Docente na Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, gabrielfilbido@hotmail.com

⁴Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Docente na Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, fabricao_b_brum@yahoo.com.br

⁵Doutora em Ciência de Alimentos, Docente na Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, camilagkato@hotmail.com

higher nutritional value demonstrating to be a promising process to decrease the malnutrition incidence in Brazil.

Keywords: Beans, *Phaseolus vulgaris*, biofortification, anemia, malnutrition.

Introdução

Países em desenvolvimento apresentam consideráveis índices de desnutrição, sendo que o fornecimento de alimentos com teores apreciáveis de macro e micronutrientes seria uma das principais estratégias para o enfrentamento deste problema (PLANTIER, 2010; UNICEF, 2019).

A anemia ferropriva é uma doença causada pela carência nutricional de ferro, micronutriente essencial para a manutenção de diversos processos fisiológicos vitais, considerada um dos maiores problemas enfrentados pela saúde pública brasileira. Assim, a fortificação alimentar tem sido uma das opções para complementar e elevar os níveis de micronutrientes na alimentação, podendo-se obter alimentos com maiores teores de ferro (QUEIRÓZ e TORRES, 2000; LÍBERA et al., 2008; FILBIDO, 2020).

O feijão (*Phaseolus vulgaris*) é considerado boa fonte de proteínas, carboidratos, fibras, vitaminas e, minerais tais como ferro (Fe) , cálcio (Ca), magnésio (Mg) , fósforo (P) e zinco (Zn) (SILVA, ROGGA e CANNIATTI, 2009; VELLOZO e FISBERG, 2010). É consumido geralmente, na forma de grão cozido, uma vez que há poucas opções de produtos derivados do feijão no mercado brasileiro. Dessa forma, torna-se interessante o desenvolvimento de novos alimentos à base de feijão, sobretudo, aqueles enriquecidos com ferro. A farinha de feijão biofortificada se apresenta como um dos produtos com maior potencial de aplicação podendo ser utilizada como ingrediente principal para a elaboração de diversos produtos alimentícios nutricionalmente diferenciados, que além de suprir a carência nutricional atenderia a demanda de mercado.

Este produto se constitui em uma estratégia simples, eficaz e de baixo custo, capaz de satisfazer as necessidades nutricionais de micronutrientes como o ferro na alimentação da população brasileira (SILVA, ROGGA e CANNIATTI, 2009; VELLOZO e FISBERG, 2010; CONAB, 2019).

A biofortificação consiste em uma técnica que possibilita o aumento do valor nutricional dos alimentos através do incremento do conteúdo de micronutrientes, como vitaminas e minerais específicos. Pode ser realizada através da engenharia genética ou do melhoramento convencional de plantas, modificando-se a composição dos alimentos sem que haja qualquer

alteração das características sensoriais ou da aparência dos mesmos. Podendo ser consumidos em suas formas originais ou como ingredientes para a elaboração de outros alimentos (ZANCUL, 2004).

Desta forma, a utilização da farinha de feijão biofortificada em alimentos poderá enriquecê-los e proporcionar uma maior qualidade nutricional para os consumidores. Porém, os efeitos da temperatura ou mesmo de processos de secagem poderão conduzir à redução das disponibilidades das proteínas, aumento da dureza, como também, no tempo de cocção em grão. A qualidade nutricional dos mesmos se mostra melhor, quando não são mantidos sob temperaturas mais elevadas, principalmente quanto aos teores de proteínas e minerais (BRAGANTINI, 1996; AVILA et al., 2015).

O armazenamento em ambientes não controlados de temperatura e umidade é um fator que pode prejudicar a qualidade final destes produtos, aumentando a deterioração e a perda quantitativa pelo ataque microbiano, de pragas e pelo próprio metabolismo dos grãos. Os grãos com maiores teores de água possuem maior taxa respiratória e com isso maior degradação de suas reservas (BRAGANTINI, 1996; OLIVEIRA, 2008; OLIVEIRA et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2013; AVILA et al., 2015; MOTA, 2016).

Desse modo, uma temperatura elevada pode acarretar perdas da qualidade do produto, devido à redução dos níveis de proteínas, provavelmente causada pela desaminação, reações de hidrólise, descarboxilação e complexação com outros componentes presentes no meio (BRAGANTINI, 2005; FARONI et al., 2005; OLIVEIRA, 2008; CHIDANANDA et al., 2014; AVILA et al., 2015; MOTA, 2016).

Além das implicações mencionadas, poderá ocorrer também, degradação lipídica através de processos oxidativos. Uma vez que a porosidade destes materiais, favorece a deposição de oxigênio no meio. Por outro lado, a intensificação dos processos respiratórios endógenos destas matrizes vegetais pode acelerar reações deteriorativas diversas, as quais podem ser intensificadas por teores de umidade inadequados (acima de 13%), bem como por ambientes com temperaturas elevadas, usualmente acima de 20 °C (BRAGANTINI, 2005; FARONI et al., 2005; OLIVEIRA, 2008; CHIDANANDA et al., 2014; AVILA et al., 2015; MOTA, 2016).

Considerando estes aspectos há a premente necessidade de se estender a vida útil dos produtos (vida de prateleira) e, evitar perdas nutricionais através da redução das alterações bioquímicas no pós-colheita de grãos, ou no pós-processamento de seus derivados. Assim, a temperatura pode ser considerada como o fator físico de maior importância na conservação uma

vez que, a maioria das reações químicas são aceleradas com o aumento da temperatura (SIQUEIRA et al., 2013; NJORGE et al., 2014; CHIGWEDERE et al., 2018).

Pautados no exposto e, considerando que até o momento, não se verifica na literatura dados sobre efeitos das condições de armazenamento da farinha de feijão biofortificada, o presente trabalho teve como objetivo realizar a determinação de parâmetros da composição nutricional de farinha de feijão (*Phaseolus vulgaris*) biofortificada *in natura* e submetida à tratamento térmico à 50°C. Foram avaliados os teores de umidade, cinzas, lipídeos, proteínas, Fe total, Fe (II) e Fe (III).

Material e Métodos

Utilizou-se o feijão (*Phaseolus vulgaris*) classificado como cultivar BRS Campeiro de grão preto biofortificado com ferro da safra de 2018/2019 fornecido pelo campo experimental da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER) de Tangará da Serra - MT.

Para a obtenção da farinha de feijão, fez-se a limpeza e seleção dos mesmos, com a remoção de corpos estranhos, grãos quebrados, chochos, ardidos ou com outros defeitos. O quarteamento foi realizado a fim de se separar uma quantidade representativa de grãos para a realização dos procedimentos experimentais subsequentes. Os grãos selecionados foram totalmente triturados em moinho de facas, até a obtenção de uma fração fina e homogênea. A farinha obtida foi armazenada em embalagens de polietileno, fechadas e mantidas em ambiente fresco, seco, ao abrigo da luz e livre do acesso de insetos e roedores até a realização dos procedimentos experimentais.

O tratamento térmico da farinha de feijão biofortificada foi realizado em estufa com circulação de ar à temperatura de 50°C durante 24 horas.

As análises de umidade foram realizadas pelo método de secagem em estufa a 105°C, até peso constante conforme a metodologia do Manual e Normas Analíticas do Instituto Adolf Lutz (IAL, 2005).

As cinzas foram determinadas a partir das amostras presentes nos cadinhos provenientes da análise de umidade, foram incinerados em forno mufla a 550°C até que ficassem brancas ou ligeiramente acinzentadas. As amostras foram resfriadas e pesadas (IAL, 2005).

O processo de determinação do conteúdo de lipídeos foi realizado por extração à quente, utilizando-se como solvente éter de petróleo em equipamento de Soxhlet. As amostras previamente dessecadas à 105°C foram acondicionadas em cartuchos de papel filtro e

introduzidas no extrator. O processo foi conduzido por um período de seis horas após, o sistema foi desligado e o excesso de solvente recuperado. O balão coletor, com o extrato etéreo, seguiu para estufa a 105°C, onde permaneceu por 3 horas. A seguir foi resfriado à temperatura ambiente e pesado, sendo o teor de lipídeos determinados gravimetricamente conforme normas do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2005).

Para determinação de proteínas utilizou-se o método de Kjeldahl, adicionou-se 15 mL de ácido sulfúrico concentrado e 1 g de mistura catalítica (sulfato de cobre e sulfato de potássio) à 0,2g de amostra em tubo de digestão de micro-Kjeldahl. A seguir, a mistura foi digerida em bloco digestor à temperatura de 400 °C até que a solução ficasse translúcida. A solução foi destilada à quente com arraste de vapor em meio fortemente alcalino de hidróxido de sódio a 40% para que o sulfato de amônio libere amônia. O nitrogênio volátil resultante foi capturado em solução de ácido bórico. Posteriormente, o borato de amônio resultante foi titulado com solução padronizada de ácido clorídrico 0,02 mol/L (DETMANN et al., 2012).

Para quantificação de Fe (II) e Fe total foi utilizado o método colorimétrico da orto-fenantrolina, proposto por Mendham et. al (2000). As análises foram realizadas em triplicata, as amostras contendo 2g foram aquecidas em forno mufla por 550°C até a digestão completa da matéria orgânica. Os resíduos oriundos da calcinação foram digeridos em água destilada, ácido clorídrico (HCl) concentrado, ácido nítrico (HNO³) concentrado, foram tampados com vidro relógio para então, serem submetidos ao aquecimento em banho de areia por 30 minutos. Após a digestão, foi realizada a determinação de ferro utilizando solução de Fe (II), solução de fenantrolina e solução tampão de acetato de sódio. Para determinação de Fe total nas amostras calcinadas e digeridas foram utilizadas solução de ferro, solução de fenantrolina, cloridrato de hidroxilamina e solução tampão de acetato de sódio. Posteriormente, as leituras foram realizadas em espectrofotômetro a 515 nm.

Utilizou-se o procedimento para determinação de Fe (III) proposto por Mendham et al. (2000), consistindo em um método colorimétrico de tiocianato de potássio (SCN⁻). As amostras foram digeridas como na metodologia de Fe (II) e Fe total, sendo preparadas solução tampão de sulfato férrico amoniacal FeNH₄(SO₄)₂ 1,792x10⁻³ mol/L, solução de ácido nítrico (HNO³) 4,0 mol/L, solução de tiocianato de potássio (SCN⁻) 2,0 mol/L e água destilada. O ânion tiocianato (SCN⁻) atua como agente complexante por meio de espectrofotometria UV-Visível, sendo a determinação realizada em comprimentos de onda de 450 nm.

Todos os parâmetros avaliados foram submetidos à análise de variância pelo teste t de Student, a um nível de significância igual ou inferior a 5% realizada no programa GraphPad

Prism 8.

Resultados e Discussão

Os resultados da determinação dos parâmetros da composição nutricional de farinha de feijão biofortificada *in natura* e submetida à tratamento térmico à 50°C, referentes aos conteúdos de umidade, cinzas, lipídeos, proteínas são apresentados na Figura 1 e o teor de Fe total, Fe (II) e Fe (III) estão presentes na Figura 2.

Figura 1. Teores de umidade, cinzas, lipídeos e proteínas (%) presentes nas farinhas de feijão biofortificadas *in natura* e submetida à tratamento térmico à 50°C.

Fonte: Própria (2020).

* As médias diferem significativamente entre si pelo teste t de Student a 5% de significância.

** Resultados expressos em matéria seca.

O teor de umidade é apresentado na Figura 1, no qual percebe-se que as médias das amostras diferiram significativamente entre si. Os valores de umidade foram de 14,07% e 10,65% para as amostras tratada à 50°C e *in natura*, respectivamente.

A amostra submetida ao tratamento térmico à 50°C mostrou-se com umidade mais elevada. Tais características podem ser atribuídas às possíveis alterações estruturais na farinha em função da aplicação de calor, causando assim, uma maior porosidade do material. O principal efeito da secagem nos grãos é a perda de água e com isso têm-se alterações nas características físicas dos mesmos, gerando a presença de espaços vazios no seu interior e aumento de sua porosidade (ARAÚJO et al., 2014). Assim, levanta a hipótese de que o maior

teor de umidade para a farinha tratada à 50°C seja decorrente de uma possível formação de poros e espaços vazios na massa de farinha, os quais associados à umidades atmosféricas mais elevadas, podem resultar em uma maior absorção de umidade do meio para o interior do material analisado culminando assim, em um maior teor de água quando comparado a farinha *in natura*.

Esse comportamento anômalo corrobora para o fato de que a exposição destes produtos à temperaturas mais elevadas podem ocasionar a perda de qualidade dos mesmos, uma vez que, conforme observado, elevou-se a umidade daquele material submetido à temperatura de 50°C. Um fator determinante para a qualidade do produto é o armazenamento em condições adequadas, ou seja, é necessário o controle da temperatura e umidade pois, sem o controle desses parâmetros o produto fica mais susceptível à deterioração devido ao ataque de pragas, ataque microbiano, e também devido as alterações metabólicas do produto (BRAGANTINI, 1996; OLIVEIRA et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2013).

Concomitantemente, em se tratando de grãos, observa-se que maiores teores de água têm-se maiores taxas respiratórias e conseqüentemente, maiores degradações das reservas energéticas dos mesmos, potencializando os processos deteriorativos dos grãos. Essa situação é agravada em temperaturas superiores a 20 °C e quando se tem teores de água acima de 11-13% (BRAGANTINI, 1996; BRAGANTINI, 2005; FARONI et al., 2005; OLIVEIRA, 2008; OLIVEIRA et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2013).

Sabe-se que entre a colheita e o consumo, muitas vezes os grãos são armazenados sob condições ambientes. Considerando que o Brasil é um país tropical, no qual as temperaturas e umidade relativa do meio são muitas vezes elevadas e impróprias para o armazenamento, essas condições acabam intensificando a perda da qualidade dos grãos, tornando-os mais endurecidos o que aumenta o tempo de cocção, além de mudanças indesejáveis no sabor e textura (CHIARADIA e GOMES, 1997; GOMES e SILVA, 2003; SILVEIRA 2011).

Níveis de umidades em desacordo com as recomendações técnicas resultam em grandes perdas na estabilidade química e microbiológica, alterando assim, a qualidade geral dos alimentos (CHIARADIA e GOMES, 1997). Adicionalmente, farinhas que apresentam médias de umidade superiores a 15% estão mais susceptíveis ao desenvolvimento de microrganismos, como leveduras e fungos, isto pode acarretar a diminuição de sua vida útil (CHIARADIA e GOMES, 1997; GOMES e SILVA, 2003; SILVEIRA 2011).

Segundo Brasil (2005), o valor máximo permitido para teor de umidade de farinhas é de 15%, sendo assim, ambas as farinhas de feijão biofortificadas avaliadas no presente trabalho

enquadram-se neste requisito estando dentro dos padrões exigidos pela legislação brasileira.

As cinzas referem-se ao resíduo mineral fixo formado por resíduos inorgânicos remanescentes após a completa combustão da matriz orgânica de uma amostra de alimento refletindo assim, o conteúdo total de minerais do alimento (BRIGIDE, 2002; SILVA e QUEIROZ, 2006).

O processamento térmico aplicado no presente trabalho, praticamente não alterou o conteúdo de cinzas das amostras (Figura 1), pois não houve diferença significativa entre os conteúdos dessa fração. A farinha de feijão submetida ao tratamento térmico apresentou 2,43% de cinzas e a *in natura*, 2,42%.

Conforme a literatura, as maiores perdas no conteúdo de minerais ocorrem durante a cocção, podendo atingir até 3% (BRIGIDE, 2002; SILVA e QUEIROZ, 2006).

Ramírez-Cárdenas, Leonel e Costa (2008), ao avaliarem os teores de cinzas em cinco cultivares de feijão, obtiveram resultados variando de 3,36 a 4,22%, valores mais elevados que os encontrados no presente estudo. Da mesma forma, Gomes et al. (2006), avaliando a composição centesimal de farinha de feijão cru, encontraram 3,23% de cinzas.

De modo geral, comparando-se com os dados disponíveis na literatura, pode-se afirmar que a biofortificação não elevou consideravelmente o conteúdo de minerais totais na farinha de feijão biofortificada avaliada no presente trabalho, tendo em vista seus conteúdos de cinzas (minerais totais).

Em relação aos teores de lipídeos (Figura 1), não se observou diferença significativa entre os tratamentos avaliados. A farinha de feijão biofortificada *in natura* apresentou 1,07% de lipídeos e a tratada à 50°C, 1,34%.

Tais valores confirmam resultados de outros estudos, Ramírez-Cárdenas, Leonel e Costa (2008), verificaram que grãos de feijão biofortificado apresentaram concentrações de lipídeos de 1,42 a 1,94 %. O mesmo foi observado por Lovato et al., (2018) que apresentou valores de 1,15 a 1,78% de lipídeos para variedades de grãos de feijão biofortificado. Mesquita et al., (2007) em seus estudos constatou um teor mínimo de 0,53% e máximo de 2,55% de lipídeos presente nos grãos crus de feijão biofortificado.

Os lipídeos são macronutrientes indispensáveis ao organismo e possuem uma elevada concentração energética. São insolúveis em água e solúveis em solventes apolares e, uma vez que suas alterações podem provocar perdas da qualidade do produto, seu controle e estabilidade são de suma importância, tanto econômica quanto tecnológica (MOTTA, 2005; SILVA e QUEIROZ, 2006; GOMES e OLIVEIRA, 2011; PITA, 2012).

Os feijões contêm uma pequena quantidade de lipídeos, com grande variabilidade na composição dos ácidos graxos, predominando as formas insaturadas, que representam cerca de 65 a 87% do total dos lipídeos do mesmo. Os mais encontrados são o ácido oléico (7 a 10%), o linoléico (21 a 28%) e o α -linolênico (37 a 54%) (MAHADEVAPPA e RAINA, 1978; ANDERSON; SMITH e WASHNOCK, 1999; YAMAGUISHI, 2008). Os ácidos graxos saturados também estão presentes e correspondem de 10 a 15% dos lipídeos totais (MAHADEVAPPA e RAINA, 1978; ANDERSON; SMITH e WASHNOCK, 1999; YAMAGUISHI, 2008).

O conteúdo de proteínas (Figura 1) da farinha de feijão biofortificada *in natura* apresentou 26,78% de proteínas e a tratada à 50°C, 26,70%. Nota-se que os valores não divergiram entre si significativamente.

Conforme trabalhos prévios, os valores proteicos variam entre 17,72 e 31,59%, reforçam os resultados obtidos no presente trabalho (PIRES et al., 2005; BRIGIDE et al., 2002; MARQUEZI et al., 2016). Por sua vez, Donadel e Prudêncio Ferreira (1999) citaram teores de proteína bruta de 22,73% na farinha de feijão. Enquanto que, Lovato et al. (2018), apresentou concentrações proteicas que variaram de 18,29% a 22,47%. Um alto teor proteico é bom índice e deve ser levado em consideração para o uso de farinha de feijão em alimentos formulados.

As proteínas são compostos orgânicos que se formam através de uma ou mais cadeias de aminoácidos e estão presentes em vários alimentos, assumindo diversas funções no organismo que vão desde a formação do músculo, defesa do organismo até a transformação de energia (FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2012).

A quantificação do teor de ferro em alimentos é importante devido a necessidade da estimativa de seu conteúdo para fins nutricionais (BRIGIDE, 2002).

De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) (2016), os valores de minerais para feijões crus, do grupo comercial preto, são de 5,0 mg.100g⁻¹ para Fe total. Estes valores são considerados baixos, quando comparados aos valores encontrados neste estudo (Figura 2), evidenciando-se assim, a efetividade da biofortificação do feijão e sua importância.

Os teores de Fe total, Fe (II) e Fe (III) das farinhas de feijão biofortificadas são apresentados na Figura 2.

Figura 2. Teores de Fe total, Fe (II) e Fe (III) (mg/100g) nas farinhas de feijão biofortificadas *in natura* e submetida à tratamento térmico à 50°C.

Fonte: Própria (2020).

* As médias diferem significativamente entre si pelo teste t de Student a 5% de significância.

** Resultados expressos em matéria seca.

O teor de Fe total diferiu significativamente entre as amostras. A farinha de feijão submetida à tratamento térmico à 50°C, apresentou teor de Fe total de 16,65% e a *in natura*, 14,40%.

Sob estes aspectos, o tratamento térmico ao qual a farinha de feijão biofortificada foi submetida neste trabalho mostrou resultado benéfico ao elevar o conteúdo de Fe total.

Pode-se considerar que o tratamento térmico aplicado conduziu a uma maior liberação de ferro por parte dos complexos e quelatos fítics, derivados do ácido fítico (fitatos férricos), sob os quais este mineral se encontra em parte indisponível, tanto para a sua determinação através de métodos analíticos quanto para a disponibilidade biológica no trato digestivo humano (COZZOLINO, 2012; THEODOROPOULOS et al., 2018).

Os resultados indicaram maiores teores de Fe total que os referenciados na literatura. Gomes et al. (2006), avaliando a composição mineral em farinha de feijão cru, encontraram 8,99 mg/100g de Fe total. O feijão preto quando cru apresenta em sua composição Fe total de 6,5 mg/100g (NEPA, 2011).

Além do Fe total, torna-se interessante a identificação e quantificação das diferentes espécies ou fases do ferro presentes em um alimento, a fim de se buscar encontrar não apenas o teor total deste mineral, mas também, quantificar a sua espécie menos e mais bioacessível, Fe

(III) e Fe (II) respectivamente. A forma química é o principal fator relacionado à biodisponibilidade do ferro uma vez que, o teor total de ferro não é suficiente para avaliar a biodisponibilidade do mesmo (KHOUZAM, SZPUNAR e LOBINSKI, 2012; REIS e GONÇALVES, 2015).

Para os resultados de Fe (II), apresentados na Figura 2, as amostras também diferiram significativamente entre si, onde a *in natura* apresentou 13,62 mg/100g de Fe (II) e a tratada à 50°C, 15,90 mg/100g.

Percebe-se que o mesmo comportamento apresentado pelo Fe total, também foi verificado para o Fe II, o qual apresentou incremento de seu teor em função do tratamento térmico aplicado.

O ferro sob a forma química de Fe (II) compõe-se na espécie mais bioacessível, já o Fe (III), por sua vez, é o menos bioacessível. A quantificação das duas espécies químicas de ferro é extremamente importante, pois o organismo humano absorve menos Fe (III), uma vez que esta substância necessita ser reduzida a Fe (II) através de complexos enzimáticos específicos para somente então ser absorvida no trato intestinal (COZZOLINO, 2012).

A farinha de feijão biofortificada *in natura* mostrou 0,75 mg/100g de Fe (III) e a tratada a 50°C apresentou 0,78 mg/100g de Fe (III). Os valores encontrados não diferiram significativamente entre si. Indicando que o conteúdo desta fração não foi alterado pelo tratamento térmico aplicado.

Tais valores são considerados baixos, entretanto, desejáveis sob o ponto de vista nutricional, uma vez que essa é a espécie de ferro de menor interesse para estar presente em alimentos, devido sua reduzida biodisponibilidade. O elevado valor de Fe (III) por vezes verificado em alguns alimentos pode estar relacionado com a adição do fumarato ferroso, agente fortificante pouco solúvel em água (WHO, 2006; COZZOLINO, 2012).

Conclusão

A composição nutricional da farinha de feijão (*Phaseolus vulgaris*) biofortificada foi afetada positivamente pelo tratamento térmico à 50°C com aumento do teor de Fe total e Fe (II) tornando o produto com valor nutricional mais elevado demonstrando assim, ser um processo promissor para diminuir a incidência de desnutrição no Brasil.

Agradecimentos

Agradecemos ao Welinton Procópio e ao campo experimental da Empresa Mato-

Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER) de Tangará da Serra- MT pelo fornecimento do grão preto biofortificado com ferro da safra 2018/2019.

Referências

ANDERSON, J. W.; SMITH, B. M.; WASHNOCK, C. S. Cardiovascular and renal benefits of dry bean and soybean intake. **American Journal of Clinical Nutrition**, New York, v. 70 (suppl), p. 464S-474S, 1999.

ARAÚJO, W. D.; GONELI, A. L. D.; SOUZA, M. A.; GONÇALVES, A. A.; VILHASANTI, H. C. B., Propriedades físicas dos grãos de amendoim durante a secagem. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v.18, n.3, p.279–286, 2014.

AVILA, B. P., SANTOS, M. S.; NICOLETTI, A.; ALVEZ, G. D.; ELIAS, M. C.; MONKS, J.; GULARTE, M. A. Impact of Different Salts in Soaking Water on the Cooking Time, Texture and Physical Parameters of Cowpeas. **Plant Foods for Human Nutrition**, v. 70(4), p.463-469, 2015.

BRAGANTINI, C. Produção de sementes. In: ARAUJO, R. S.; RAVA, C. A.; STONE, L. F.; ZIMMERMANN, M. J. de O. (Coord.). **Cultura do feijoeiro comum no Brasil**. POTAFOS, 1996. p. 639-667.

BRAGANTINI, C. **Alguns aspectos do armazenamento de sementes e grãos de feijão** - Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2005. 28 p.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 263 de 22 de setembro de 2005. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/e-legis/>>. Acesso em: 08 de Ago.de 2020.

BRIGIDE, Priscila. **Disponibilidade de ferro em grãos de feijão comum (*Phaseolus vulgaris* L.) irradiados**. Orientadora: Solange Guidolin Canniatti-Brazaca 2002. 58 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, 2002.

CHIARADIA, A. C. N.; GOMES, J. C. **Feijão: química nutrição e tecnologia**. Viçosa: Fundação Arthur Bernardes, 1997, 180p.

CHIDANANDA, K. P.; CHELLADURAI, V.; JAYAS, D. S.; ALAGUSUNDARAMB, K.; WHITE, N. D. G.; FIELDS, P. G. Respiration of pulses stored under different storage conditions. **Journal of Stored Products Research**, v. 59, p. 42–47, 2014.

CHIGWEDERE, C. M.; OLAOYE, T. F.; KYOMUGASHO, C.; KERMANI, Z. J.; PALLARES, A. P.; LOEY, A. M. V.; GRAUWET, T.; HENDRICKX, M. E. Mechanistic insight into softening of Canadian wonder common beans (*Phaseolus vulgaris*) during cooking. **Food Research International**, v.106, p. 522-531, 2018.

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento. **Indicadores Agropecuários**. Balança

Comercial do Agronegócio. Balança Importação. Brasília, Ano XXVIII, n.3, p. 01-96, Março 2019. Disponível em: <www.conab.gov.br>. Acesso em: 30/10/2019.

COZZOLINO, S. M. F. **Biodisponibilidade de nutrientes**, 4 ed., Campinas, Brasil: Manole, 2012.

DETMANN, E.; SOUZA, M.A.; VALADARES FILHO, S.C.; QUEIROZ, A.C.; BERCHIELLI, T.T.; SALIBA, E.O.S.; CABRAL, L.S.; PINA, D.S.; LADEIRA, M.M.; AZEVEDO, J.A.G. **Métodos para análise de alimentos - INCT - Ciência Animal**. Visconde do Rio Branco: Suprema, 214p, 2012.

DONADEL, M. E.; PRUDENCIO-FERREIRA, S. H. Propriedades funcionais de concentrado proteico de feijão envelhecido. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, v. 19, n. 3, p. 380-386, 1999.

FARONI, L. A.; CORDEIRO, I. C.; ALENCAR, E. R.; ROZADO, A. F.; ALVES, W. M.; Influência do conteúdo de umidade de colheita e temperatura de secagem na qualidade do feijão. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**. v.10, n.1, p.148–154, 2006.

FILBIDO, Gabriel Silvério. **Especiação química de ferro e bioacessibilidade in vitro de minerais em alimentos infantis fortificados**. Dissertação (Mestrado). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Cuiabá Bela Vista. 2020. 94p.

FOOD INGREDIENTS BRASIL. Dossiê: proteínas. **Revista Food Ingredients Brasil**, n. 22. 2012. p. 58-90.

GOMES, J. C.; SILVA, C. O. Elaboração de análises físico-químicas de farinha de feijão. **Rev. Ceres**. v.50, n.292, p.687-697, 2003.

GOMES, J. C; SILVA, C. O. COSTA, N. M. B. PIZORI, M. R. Desenvolvimento e Caracterização de Farinhas de Feijão. **Rev. Ceres**. v.53, n.309, p.548-558, 2006.

GOMES, J. C; OLIVEIRA, G. F. **Análises físico-químicas de alimentos**. Minas Gerais: Universidade Federal de Viçosa, 2011.

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. **Métodos físico-químicos para análise de alimentos**. Edição IV, Brasília: Instituto Adolf Lutz, 2005.

KHOUZAM, R. B., SZPUNAR J., LOBINSKI, R. Trace element speciation in food: State of the art of analytical techniques and methods. **Pure and Applied Chemistry**, v. 84, p.169-179, 2012.

LÍBERA, B. D.; SOUZA, G. G. de; PADILHA, P. C.; LEITE, P. M.; SAUNDERS, C.; ACCIOLY, E. Estratégias de combate às micro deficiências no grupo materno-infantil. **Revista Brasileira de Nutrição Clínica**, v. 23, n.3, p. 190-198, 2008.

LOVATO, F.; KOWALESKI, J.; SILVA, S. Z.; HELDT, L. F. S. Proximate composition and mineral content of different cultivars of biofortified beans (*Phaseolus vulgaris* L.). **Braz. J. Food Technol.** v. 21, e 2017068, 2018.

MAHADEVAPPA, V. G., RAINA, P. L. Nature of some Indian legume lipids. **J. Agric. Food Chem.**, v.26, p.124,1978.

MARQUEZI, M.; GERVIN, V. M.; WATANABE, L. B.; BASSINELLO, P. Z.; AMANTE, E. R. Physical and chemical properties of starch and flour from different common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) cultivars. **Brazilian Journal of Food Technology**, v. 19, 2016.

MENDHAM, J., DENNEY, R. C.;BARNES, J. D., TOMAS, M. J. K. **Volgel's Quantitative Chemical Analysis**. (6th ed.) Prentice Hall, 2000.

MESQUITA, F. R.; CORRÊA A. D.; ABREU C. M. P.; LIMA R. A. Z.; ABREU A. F. B. Linhagens de Feijão (*Phaseolus Vulgaris* L.): Composição química e digestibilidade proteica. **Ciênc. Agrotec.**, v. 31, n. 4, p.1114-1121, 2007.

MOTA, D. H. **Propriedades físicas durante a secagem e qualidade tecnológica em cultivares de feijão carioca em diferentes condições de armazenamento**. Brasília: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de Brasília, 2016, 163 f.

MOTTA, V. T. Bioquímica Básica: Carboidratos. In: Autolab Análises Clínicas, 2005.

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO (NEPA). TACO: Tabela brasileira de composição de alimentos. Campinas: NEPA-UNICAMP, 2011. p.161.

NJOROGE, D. M., KINYANJUI, P. K., MAKOKHA, A. O., CHRISTIAENS, S., SHPIGELMAN, A., SILA, D. N.; HENDRICKX, M. E. Extraction and characterization of pectic polysaccharides from easy- and hard-to-cook common beans (*Phaseolus vulgaris* L.). **Food Research International**, v. 64, p. 314–322, 2014.

OLIVEIRA, M. **Temperatura de secagem e condições de armazenamento sobre propriedades da soja para consumo e produção de biodiesel**. 2008. 140f. Dissertação (Mestrado). Ciência e Tecnologia Agroindustrial. Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2008. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas – RS.

OLIVEIRA, V. R.; RIBEIRO, N. D.; JOST, E.; COLPO, E.; POERSCH, N. L.; Perfil sensorial de cultivares de feijão sob diferentes tempos de cozimento. **Revista Brazilian Journal Food Nutrition**, v.24, n.2, p.145-152. 2013.

OLIVEIRA, V. R.; RIBEIRO, N. D.; MAZIERO, S. M.; FILHO, A. C.; JOST, E. Qualidade para o cozimento e composição nutricional de genótipos de feijão com e sem armazenamento sob refrigeração. **Ciência Rural**, v.41, n.5, p.746-752, 2011.

PIRES, C. V.; OLIVEIRA, M. A. G.; CRUZ, G. A. D. R.; MENDES, F. Q.; REZENDE, S. T.; MOREIRA, M. A. Physicochemical composition of different cultivars of beans (*Phaseolus vulgaris* L.). *Alimentação e Nutrição*, v. 16, p. 157-162, 2005.

PITA, J. S. L. **Caracterização físico-química e nutricional da polpa e farinha da casca de maracujazeiros do mato e amarelo**. 2012. 77p. Dissertação (Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Itapetinga, 2012.

PLANTIER, S. B. **Avaliação do teor de ferro em farinhas enriquecidas**. Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA - Assis, p. 16, 2010.

QUEIROZ, S. S.; TORRES, M. A. de A. Anemia ferropriva na infância. **Jornal de Pediatria**, v.76, n.3, p. 298-304, 2000.

RAMÍREZ-CÁRDENASI, L.; LEONEL, A. J.; COSTA, N. M. B. Efeito do processamento doméstico sobre o teor de nutrientes e de fatores antinutricionais de diferentes cultivares de feijão comum. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, v. 28, n. 1, p. 200-213, 2008.

REIS, L. S. GONÇALVES E. C. B. A., Chemical speciation: an instrument for evaluation of mineral bioavailability, **Ciência Rural**, v.45, p.1126-1132, 2015.

SILVA, A. G.; ROCHA, L. C.; CANNIATTI, B. S. G. Physico-chemical characterization, protein digestibility and antioxidant activity of comum bean (*Phaseolus vulgaris* L.) **Alimentos e Nutrição**, v. 20, n. 4, p. 591-598, 2009.

SILVA, D. J; QUEIROZ, A. C. **Análise de Alimentos: Métodos Químicos e Biológicos**. Minas Gerais: Universidade Federal de Viçosa, 2006.

SIQUEIRA, R. J. de. A.; LACERDA FILHO, A. F. de; VOLK, M. B. da S. Avaliação da Qualidade do Feijão Armazenado em Ambiente Refrigerado. **Alimentos e Nutrição**, Viçosa – MG, vol. 20, n. 4, p. 649–655, 2013.

THEODOROPOULOS, V. C. T. TURATTI, M. A. GREINER R. MACEDO, G. A. PALLONE, J. A. L. Effect of enzymatic treatment on phytate content and mineral bioaccessibility in soy drink. **Food Research International**, v.108, p.68-73, 2018.

UNICEF. Situação mundial da infância. **Crianças, alimentação e nutrição**. Outubro, 2019. p. 1-8. Disponível em: https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/unicef_sowc/sowc2019_informacoes_america_latina_caribe.pdf. Acesso em: 14 agosto 2020.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE. Food. Disponível em: <https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list>. Acesso em: 14 ago. 2020.

VELLOZO, Eliana P.; FISBERG, Mauro. A contribuição dos alimentos fortificados na prevenção da anemia ferropriva. **Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia**, v.32, n.2, p. 140-147, 2010.

World Health Organization (WHO), Guidelines on food fortification with micronutrients, **Geneva: World Health Organization**, 2006.

YAMAGUISHI, C. T. Processo biotecnológico para a produção de feijão desidratado com baixo teor de oligossacarídeos da família rafinose. 2008. 148 f. Dissertação (Mestrado em Processos Biotecnológicos) – Setor de Tecnologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2008.

ZANCUL, Mariana de Senzi. Fortificação de alimentos com ferro e vitamina A. **Medicina, Ribeirão Preto**, v.37, jan.-jun., p. 45-50, 2004.

CAPÍTULO 13: INFLUÊNCIA DA ÉPOCA DE COLHEITA NAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICAS DE AZEDINHA E PEIXINHO

CHAPTER 13: INFLUENCE OF HARVESTING SEASON ON PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF SORREL AND LAMB'S EARS

Antonio Henrique de Souza¹; Andreia Aparecida dos Anjos Chagas²; Ernani Clarete da Silva³; Marinalva Woods Pedrosa⁴; Lanamar de Almeida Carlos⁵

Resumo

As hortaliças não convencionais, são reconhecidas apenas regionalmente como alimento e/ou como plantas medicinais. A época de colheita pode estar relacionada com o metabolismo dessas plantas. Objetivou-se avaliar a influência da época de colheita sobre as características físico-químicas das hortaliças peixinho e azedinha colhidas no outono e no inverno. Foram avaliados os parâmetros: cor, sólidos solúveis totais, sólidos totais, pH, acidez titulável. Foram encontradas diferenças significativas para luminosidade apenas nas folhas de peixinho, sendo maior no outono ($56,27 \pm 1,27$). Ambas hortaliças apresentaram maiores valores de croma no inverno ($17,51 \pm 1,68$ e $11,72 \pm 1,73$, respectivamente). Ambas hortaliças apresentaram diferenças nos parâmetros de sólidos solúveis totais, apontando maiores médias no inverno ($3,67 \pm 0,39$ e $6,75 \pm 0,78$ °Brix para azedinha e peixinho, respectivamente). O mesmo comportamento foi observado para os valores de sólidos totais, tendo maiores médias no inverno ($9,81 \pm 0,78$ e $18,87 \pm 1,10\%$ para azedinha e peixinho, respectivamente). O pH variou apenas nas folhas de peixinho, sendo maior no outono ($6,49 \pm 0,10$) e a acidez total titulável apresentou diferença significativa para as duas espécies. A partir dos resultados encontrados, a estação não é o único fator que pode alterar os parâmetros avaliados.

Palavras-Chaves: Hortaliças não convencionais, Estações do ano, PANC, *Stachys byzantina*, *Rumex acetosa*.

Abstract

Non-conventional vegetables are recognized only regionally as food and/or medicinal plants. The harvest season may be related to the metabolism of these plants. The objective was to evaluate the influence of the harvesting season on the physicochemical characteristics of the goldfish and sorrel vegetables harvested in autumn and winter. The parameters were evaluated: color, total soluble solids, total solids, pH, titratable acidity. Significant differences in luminosity were found only in goldfish leaves, being greater in autumn (56.27 ± 1.27). Both vegetables showed higher chroma values in winter (17.51 ± 1.68 and 11.72 ± 1.73 , respectively). Both vegetables showed differences in the parameters of total soluble solids, indicating higher averages in winter (3.67 ± 0.39 and 6.75 ± 0.78 ° Brix for sorrel and goldfish, respectively). The same behavior was observed for the values of total solids, with higher averages in winter (9.81 ± 0.78 and $18.87 \pm 1.10\%$ for sorrel and goldfish, respectively). The

¹ Engenheiro Agrônomo – Universidade Federal de São João del-Rei/*Campus* Sete Lagoas (UFSJ/CSL), antoniohsouza@ufv.br

² Mestranda do PPGCA – Universidade Federal de São João del-Rei/*Campus* Sete Lagoas (UFSJ/CSL), andreiachagas.ufsj@gmail.com

³ Docente – Universidade Federal de São João del-Rei/*Campus* Sete Lagoas (UFSJ/CSL), clarete@ufsj.edu.br

⁴ Pesquisadora – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG, marinalva@epamig.br

⁵ Docente – Universidade Federal de São João del-Rei/*Campus* Sete Lagoas (UFSJ/CSL), lanamar@ufsj.edu.br

pH varied only in the goldfish leaves, being higher in the autumn (6.49 ± 0.10) and the total titratable acidity showed a significant difference for both species. From the results found, the station is not the only factor that can change the evaluated parameters.

Keywords: Unconventional vegetables, Seasons, PANC, *Stachys byzantina*, *Rumex acetosa*.

Introdução

As hortaliças não convencionais são espécies consumidas em determinadas regiões principalmente por pequenos agricultores ou por determinados grupos familiares que mantêm a tradição de consumi-las. Muitas vezes negligenciadas, estas hortaliças podem se tornar uma importante fonte nutricional, além de ser fonte de renda (VIANA *et al.*, 2015; SILVA *et al.*, 2018). Com os modelos de produção atual visando à monocultura e outras práticas que prejudicam a biodiversidade, o mercado destas hortaliças vem ganhando seu espaço e se mostrando cada vez mais necessário (VENDRUSCOLO *et al.*, 2015).

Em regiões onde tradicionalmente estas hortaliças são encontradas e consumidas, a utilização destas plantas não se detém apenas ao consumo *in natura* ou com mínimo preparo, podendo ser introduzidas no preparo de carnes, macarrão, bebidas e pães (MARTINEVSKI *et al.*, 2013; KINUPP & LORENZI, 2014; LISE, 2018, ZEM *et al.*, 2018).

Atualmente o estudo destas hortaliças vem crescendo e ganhando maior espaço na comunidade científica através de pesquisas realizadas principalmente por empresas como EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), EPAMIG (Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais) e também por autores referência na área (Kinupp & Lorenzi, 2014), o que auxilia na disseminação da sua utilização. Algumas destas hortaliças são a azedinha (*Rumex acetosa* L.), bertalha (*Anredera cordifolia*), araruta (*Maranta arundinacea*), capuchinha (*Tropaeolum majus* L.), peixinho (*Stachys byzantina* C. Koch.), beldroega (*Portulaca oleracea*), taioba (*Xanthosoma sagittifolium*) e ora-pro-nóbis (*Pereskia aculeata* Mill.) (BRASIL, 2010).

Muitas vezes chamadas de plantas daninhas ou plantas invasoras, as plantas alimentícias não convencionais (PANC) acabam recebendo esta denominação devido ao fato de se tornarem competidoras das plantas de interesse comercial (OSIPE *et al.*, 2013). Segundo Carvalho (2011), tais plantas sofrem pressão seletiva ao longo dos anos, fazendo com que se desenvolva assim, sistemas de resistência que garantem sua sobrevivência. Estes mecanismos provocam respostas da planta, que muda a forma de interação com o meio à sua volta garantindo assim, o seu sucesso em ambientes onde outras plantas possivelmente não sobreviveriam (PITELLI & PAVANI, 2005).

Tais hortícolas não apresentam produção em escala comercial, como é o caso de hortaliças como alface, rúcula, couve e repolho, porém apresentam em sua constituição compostos benéficos para a saúde humana como vitamina C, D e A (UUSIKU *et al.*, 2010; VIANA *et al.* 2015), minerais (FASUYI, 2007; KINUPP & BARROS, 2008), enzimas, carotenoides (VIANA *et al.* 2015) e compostos fenólicos (AGUILERA *et al.*, 2016), além de fibras e proteínas (BARBALHO *et al.*, 2016; FERREIRA *et al.*, 2010; SCHMEDA-HIRSCHMANN *et al.*, 2005). Tais alimentos apresentam antioxidantes naturais em sua composição, os quais detêm capacidade de neutralizar radicais livres, atuando também em vias metabólicas estimulando o sistema imune, reduzindo a pressão sanguínea e também exercendo papel importante na atividade de enzimas e sinalizadores celulares que retardam o aparecimento de doenças como câncer (SHAHIDI, 2007; GANDINI *et al.*, 2000).

A azedinha possui este nome devido ao sabor característico de suas folhas. É uma planta com alta rusticidade e muito apreciada pelos consumidores, apresentando bom potencial de marketing e pode contribuir para enriquecer a dieta humana, pois apresenta quantidades relevantes de macro e micronutrientes em sua constituição, além de proteínas, fibras e altas concentrações de ferro (SILVA *et al.*, 2013), além de compostos antioxidantes naturais (AMARAL & ALMEIDA-CARLOS, 2016), como compostos fenólicos e carotenoides (VIANA *et al.*, 2015). As mais de 200 espécies pertencentes ao gênero *Rumex* contêm na sua composição, antraquinonas, sais ácido oxálico, livre ou sob a forma de oxalato de cálcio ou de potássio (VIANA *et al.*, 2015), vitamina C, β -caroteno e polifenóis (TORRES *et al.*, 2019).

O gênero *Stachys*, pertencente à família Lamiaceae, inclui cerca de 300 espécies. Seu nome se originou da palavra “Chistets”, que significa “limpador de feridas” ou “curandeiro” devido às propriedades antimicrobianas de plantas pertencentes a este gênero, que são utilizadas no tratamento de doenças infecciosas como diarreia, febre e resfriados (SANTOS *et al.*, 2013; NOROUZI-ARASI *et al.*, 2006; KARTSEV *et al.*, 1994). O peixinho da horta, como é mais conhecida a espécie *Stachys byzantina*, é uma herbácea perene, atingindo cerca de 20 cm de altura e formando touceiras com dezenas de propágulos e é cultivada utilizando medidas pré-estabelecidas para culturas convencionais, como níveis de fertilizantes indicados para alface (BRASIL, 2013). Popularmente é conhecida como lambarizinho, língua de vaca, orelha de lebre e peixe de pobre. As folhas podem ser colhidas a partir de 60-70 dias após o plantio, à medida que elas atingem um bom tamanho, superior a 8 cm, podendo atingir até 15 cm. Esta planta raramente floresce em condições climáticas brasileiras, sendo propagada vegetativamente (KINUPP & LORENZI, 2014; BRASIL, 2010).

O metabolismo da planta pode ser afetado por diversos fatores, como por exemplo, o

tipo de solo no qual a cultura está introduzida, o clima e sazonalidade da região, a intensidade de luz solar, desenvolvimento da planta, radiação UV, pluviometria, temperatura, disponibilidade de nutrientes e água para as plantas e segundo Gobbo-Neto & Lopes (2007), principalmente a época em que a planta é colhida já que os constituintes das mesmas podem variar quantitativamente e qualitativamente.

A época de colheita está relacionada com a potencial conservação de um fruto (RITA, 2017), pois possui influência direta em seu metabolismo (CHITARRA & CHITARRA, 2005), o que foi observado também para hortaliças, quando a época de colheita das mesmas teve efeito, além disso, sobre sua composição bioativa (TEIXEIRA, 2018)

A globalização da alimentação proporciona a verticalização das escolhas, em que os mesmos pratos são consumidos cotidianamente, ocasionando perdas da diversidade dos alimentos locais e regionais em função de alimentos que possuem uma cadeia comercial estabelecida (SILVEIRA *et al.*, 2016). Dessa forma, é importante buscar informações que contribuam para o resgate destas hortaliças, seja como alimento ou em sua aplicação medicinal e a caracterização físico-química em diferentes épocas de colheita, tornam este trabalho relevante.

Este estudo teve como objetivo avaliar a influência da época de colheita nos atributos físico-químicos das hortaliças não convencionais azedinha e peixinho.

Material e Métodos

Coleta do material vegetal

Para o experimento, foram utilizadas folhas de azedinha (*Rumex acetosa* L.) e peixinho (*Stachys byzantina* C. Koch.) colhidas no Banco de Hortaliças Não Convencionais (Figura 1) da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) – Fazenda Santa Rita, situada em Prudente de Moraes (19°45'41.35" S 44°15'73.7" O).

Figura 1. Hortaliças não convencionais: (A) azedinha (*Rumex acetosa* L.) e (B) peixinho (*Stachys byzantina* C. Koch.). Banco de Hortaliças Não Convencionais, Unidade Regional Epamig Centro Oeste.

Fonte: Arquivo pessoal (2018).

O cultivo das hortaliças foi realizado sem o uso de agroquímicos e os tratamentos culturais foram realizados de acordo com o desenvolvimento das plantas. As folhas de cada uma das hortaliças foram colhidas ao acaso.

As folhas das hortaliças foram coletadas em duas estações, no dia 25 de abril de 2018 (outono) e no dia 06 de agosto de 2018 (inverno), sempre no período da manhã. Após, foram transportadas sob refrigeração para o Laboratório de Conservação de Alimentos da Universidade Federal de São João del-Rei, *Campus Sete Lagoas* em Sete Lagoas/MG, onde foi conduzido o experimento. As folhas foram acondicionadas separadamente em sacos de polietileno e armazenadas em freezer a -20°C até o momento das análises, exceto a análise de cor, que foi feita imediatamente.

Avaliação Das Características Físico-Químicas

Cor Instrumental

A análise da cor foi realizada com o auxílio de um colorímetro Konica Minolta CR410 e utilizou-se a classificação proposta pela CIE (Commission Internationale de l'Eclairage), a CIE L^*C^*h em que: L^* = Luminosidade, C^* = Croma e h = ângulo Hue, após a calibração do equipamento utilizando a placa branca CRA43. A leitura foi feita em três pontos distintos na superfície de cada folha, de maneira a obter-se um valor médio, seguindo o mesmo protocolo utilizado por Torres *et al.*, (2019) para folhas de azedinha.

Sólidos Solúveis Totais

Os teores de sólidos solúveis totais foram determinados conforme metodologia descrita pela AOAC (2012). As amostras foram trituradas utilizando-se gral e pistilo, filtradas para remoção total dos sólidos e colocadas sobre prisma de um refratômetro digital Reichert, R2 Mini com compensação interna de temperatura. Os resultados foram expressos em °Brix.

Sólidos Totais

Cerca de 2 g das amostras homogeneizadas foram submetidas à temperatura de 105° C em estufa de esterilização e secagem (FANEM 515) por 48 horas. A porcentagem de sólidos totais foi obtida pela diferença entre as massas inicial e final (após a estufa) das amostras, conforme protocolo da AOAC (2012).

Potencial Hidrogeniônico (pH)

O valor de pH foi determinado por potenciometria com o auxílio de um pHmetro digital Tekna T-1000, através da imersão direta do eletrodo na amostra imediatamente após a homogeneização de 1 grama do material vegetal com 50 mL de água destilada (AOAC, 2012).

Acidez Total Titulável (ATT)

Para determinação da acidez total titulável usou-se uma solução de NaOH 0,1 N como padrão e fenolftaleína como indicador, com assistência de pHmetro. Os resultados foram expressos em gramas de ácido cítrico por 100 gramas de amostra fresca (AOAC, 2012). A acidez total titulável foi calculada:

$$ATT \left(\frac{g \text{ ácido cítrico}}{100 g \text{ amostra fresca}} \right) = \frac{V \cdot N \cdot F \cdot Eq}{10 \cdot M} \quad \text{Equação 1}$$

Sendo:

V = Volume gasto da solução de NaOH

N = Normalidade da solução de NaOH

F = Fator de correção obtido da padronização do NaOH

$Eq.$ = Equivalente ácido cítrico

M = Massa da amostra

Análise de Dados

Para a análise estatística foi realizado o delineamento inteiramente casualizado (DIC), sendo a estação o tratamento, com 5 repetições. As avaliações foram realizadas em triplica. A verificação dos pressupostos de normalidade e homogeneidade das variâncias foi feita pelos testes de Shapiro-Wilk e Levene. Os dados provenientes de todas as análises foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de Tukey com 5% de

probabilidade, utilizando o software SISVAR 5.6 (FERREIRA, 2014).

Resultados e Discussão

Os dados gerados pela experimentação apresentaram homogeneidade e normalidade indicando que os erros seguiram, respectivamente, uma distribuição normal e variância constante segundo testes de Shapiro-Wilk e Levene. Assim, não houve necessidade de transformação dos dados.

Observaram-se diferenças significativas ($p < 0,05$) para os parâmetros de croma, sólidos solúveis totais, sólidos totais e acidez total titulável para as folhas de azedinha coletadas no outono e no inverno. Já para os parâmetros de luminosidade, ângulo Hue e pH foram similares de uma estação para outra.

Todas as características físico-químicas das folhas de peixinho exceto parâmetro °Hue apresentaram diferenças significativas ($p < 0,05$) entre as épocas de colheita.

Parâmetros Colorimétricos

A luminosidade (L^*) indica a tonalidade das folhas e varia de 0 (negro) a 100 (branco), sendo que, quanto mais próximo de 100, mais clara a folha da hortaliça, ou seja, maior a capacidade de refletância de luz pela mesma (TORRES *et al.*, 2019). Apenas o peixinho apresentou luminosidade diferente entre as estações, sendo maior no outono ($56,27 \pm 1,27\%$), como observado na Tabela 1.

Correia *et al.* (2017), trabalhando com o armazenamento de hortaliças não convencionais, observaram um valor de luminosidade para almeirão-de-árvore (coletados no mesmo local de procedência das hortaliças avaliadas neste estudo), que também é uma hortaliça não convencional folhosa, minimamente processado (47,71%), menor do que valor médio relatado neste trabalho para azedinha ($52,08 \pm 1,62\%$) no outono.

Tabela 1. Valores médios dos parâmetros de L , C^* e °Hue das folhas de Azedinha e Peixinho colhidas nas estações Outono e Inverno.

Estações	Plantas	
	Azedinha	Peixinho
	L^* (%)	
Outono	$52,08 \pm 1,62^a$	$56,27 \pm 1,27^a$
Inverno	$53,07 \pm 1,28^a$	$53,63 \pm 1,82^b$
Média	52,58	54,95
	C^*	
Outono	$15,21 \pm 1,04^b$	$10,25 \pm 1,24^b$
Inverno	$17,51 \pm 1,68^a$	$11,72 \pm 1,73^a$
Média	16,36	10,99
	Hue (°)	
Outono	$108,57 \pm 1,29^a$	$108,31 \pm 1,86^a$
Inverno	$109,62 \pm 0,88^a$	$109,49 \pm 2,85^a$

Média	109,1	108,9
--------------	-------	-------

Médias seguidas de mesma letra minúscula nas colunas (envolvendo cada parâmetro distintamente), não diferem significativamente entre si, ao nível de significância 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

O croma (C*) indica a saturação da cor, sendo que quanto mais próximo de 0 as cores são neutras e próximo de 60 as cores são vívidas, ressaltando a maior intensidade e pureza na cor das folhas da hortaliça (GOYENECHE *et al.*, 2014). As folhas de azedinha e peixinho apresentaram maior valor no inverno ($17,51 \pm 1,68$ e $11,72 \pm 1,73$, respectivamente) ressaltando cores mais vívidas, o que pode influenciar na decisão de compra pelo consumidor.

Os valores dos ângulos Hue, que indicam a cor real, apresentaram-se entre $108,31 \pm 1,86^\circ$ a $109,62 \pm 0,88^\circ$ correspondente ao segundo quadrante que vai do amarelo ao verde (TORRES *et al.*, 2019). Este parâmetro pode ser relacionado à presença de clorofila nas folhas, sendo que, quanto mais verde, maior a quantidade deste pigmento (FONTANA, 2016). Observa-se que ambas as hortaliças coletadas nas diferentes estações não apresentaram diferenças para ângulo Hue ($p < 0,05$).

Ao analisar as características físico-químicas e a produção de fitoquímicos em PANC nas quatro estações do ano, Teixeira (2018) relatou valores médios para ângulo Hue de 119,86 para folhas peixinho, apresentando folhas mais verdes do que as folhas trabalhadas neste estudo. A clorofila é o pigmento responsável pela coloração verde nas folhas das hortaliças. Durante a estação do inverno, este pigmento pode formar complexos, causando mudança na coloração destas (GILMORE & BALL, 2000). Tal evento pode estar relacionado com as variações de cor nas folhas das hortaliças.

Sólidos Solúveis Totais (SST), Sólidos Totais (ST), Potencial Hidrogeniônico (pH) e Acidez Total Titulável (ATT).

Os valores médios dos parâmetros de sólidos solúveis totais, sólidos totais, pH e acidez total titulável das folhas de azedinha e peixinho nas estações outono e inverno podem ser observados na Tabela 2.

Tabela 2. Valores médios dos parâmetros de sólidos solúveis totais (SST), sólidos totais (ST), pH e acidez total titulável (ATT) das folhas de Azedinha e Peixinho nas estações Outono e Inverno.

Estações	Plantas	
	Azedinha	Peixinho
	SST (°Brix)	
Outono	$3,24 \pm 0,34^b$	$4,71 \pm 0,27^b$
Inverno	$3,67 \pm 0,39^a$	$6,75 \pm 0,78^a$
Média	3,46	5,73
	ST (%)	
Outono	$8,53 \pm 0,48^b$	$8,75 \pm 0,81^b$
Inverno	$9,81 \pm 0,78^a$	$18,87 \pm 1,10^a$
Média	9,17	13,81

	pH	
Outono	$3,53 \pm 0,074^a$	$6,49 \pm 0,10^a$
Inverno	$3,53 \pm 0,053^a$	$6,29 \pm 0,09^b$
Média	3,53	6,39
	ATT (g ác. cítrico 100 g ⁻¹ de amostra fresca)	
Outono	$1,53 \pm 0,018^a$	$0,11 \pm 0,014^b$
Inverno	$1,10 \pm 0,041^b$	$0,34 \pm 0,037^a$
Média	1,32	0,23

Médias seguidas de mesma letra minúscula nas colunas (envolvendo cada parâmetro distintamente), não diferem significativamente entre si, ao nível de significância 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Os valores de sólidos solúveis totais representam os ácidos, os sais, as vitaminas, os aminoácidos, algumas pectinas e os açúcares presentes nos vegetais (LIMA *et al.*, 2001), já os sólidos totais representam a matéria seca que compõe os mesmos e, segundo Chitarra & Chitarra (2005), podem variar de 5% à 20% para folhas de hortaliças.

O valor médio de sólidos solúveis totais apresentados neste trabalho na estação do Outono para as folhas de peixinho ($4,71 \pm 0,27$ °Brix), foi menor do que o valor médio relatado por Teixeira (2018), sendo $8,42$ °Brix para a mesma hortaliça, na mesma estação, coletadas no ano anterior (2017). Também, os valores de sólidos totais relatados por Teixeira (2018) para as folhas da mesma hortaliça coletadas no inverno de 2017 (18,90%) foram próximos ao relatado neste trabalho para as folhas coletadas na mesma estação ($18,87 \pm 1,10\%$) no ano de 2018. De uma maneira geral, as variações das características podem estar relacionadas com as características edafoclimáticas as quais as plantas estão submetidas, uma vez que estas condições podem afetar diretamente o seu metabolismo (MOYER *et al.*, 2002).

As folhas de peixinho coletadas no outono apresentaram valor de pH significativamente superior ($6,49 \pm 0,10$) aos das folhas coletadas no inverno ($6,29 \pm 0,09$). O pH das folhas de azedinha não foram influenciadas pela época de colheita.

Torres *et al.* (2019), ao caracterizar o perfil fitoquímico e características físico-químicas das folhas de azedinha em função da adubação orgânica e densidade de plantio, relataram pH de 3,11, sendo menor que o valor médio para as duas estações relatado neste trabalho (3,53). Makarov *et al.* (2014) relataram valor de pH 3,7 para esta hortaliça, maior do que o valor relatado neste trabalho.

Os valores de acidez total titulável nas folhas das duas hortaliças apresentaram diferenças relacionadas à época de colheita, sendo que nas folhas de azedinha a maior acidez foi detectada no outono ($1,53 \pm 0,018$ gramas de ácido cítrico 100 g⁻¹ de amostra fresca) e nas folhas de peixinho, no inverno ($0,34 \pm 0,037$ gramas de ácido cítrico 100 g⁻¹ de amostra fresca). A acidez total titulável encontrada para as folhas de azedinha foi maior quando comparada às

folhas de peixinho, corroborando os resultados relatados por Viana *et al.* (2015) e Silva *et al.* (2013). Estes valores de acidez justificam o baixo valor de pH encontrado para a azedinha em relação ao peixinho. A presença de ácidos orgânicos como os ácidos cítrico, málico, oxálico e tartárico dentre outros está relacionada à acidez dos vegetais (CHITARRA & CHITARRA, 2005; SANTOS *et al.*, 2016).

Conclusões

Para as folhas de azedinha, os parâmetros físico-químicos de coroma, sólidos solúveis totais e sólidos totais foram maiores durante o inverno e acidez total titulável maior no outono. Para as folhas de peixinho, os parâmetros físico-químicos de luminosidade e pH foram maiores durante o outono e coroma, sólidos solúveis totais, sólidos totais e acidez total titulável foram maiores no inverno. A partir dos resultados encontrados, a estação não é o único fator que pode alterar os parâmetros avaliados.

Referências

- AGUILERA, Y.; MARTIN-CABREJAS, M. A.; DE MEJIA, E. Phenolic compounds in fruits and beverages consumed as part of the mediterranean diet: Their role in prevention of chronic diseases. **Phytochemistry Reviews**, 15(3), 405-423, 2016.
- AMARAL, T. F.; ALMEIDA-CARLOS, L. Valor nutricional e potencial antioxidante de hortaliças não convencionais folhosas. **Informe Agropecuário**, Belo Horizonte, v. 37, n. 295, p. 95-103, 2016.
- AOAC – ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTRY. **Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemistry**. Gaithersburg, Maryland, 3000 p., 2012.
- BARBALHO, S. M.; GUIGUER, E. L.; MARINELLI, P. S.; SANTOS BUENO, P. C.; PESPININI-SALZEDAS, L. M.; SANTOS, M. C. B.; OSHIWA, M.; MENDES, C. G.; MENEZES, M. L.; NICOLAU, C. C. T.; OTOBONI, A. M.; ALVARES, G. R. *Pereskia aculeata* Miller Flour: metabolic effects and composition. **Journal of Medicinal Food**, New York, 19(9), 890-894, 2016.
- BRASIL. **Manual de hortaliças não-convencionais**. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo. Brasília: Mapa/ACS, 92 p., 2010.
- BRASIL. **Manual de hortaliças não-convencionais**. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo. Brasília: Mapa/ACS, 99 p., 2013.
- CARVALHO, L. B. **Estudos ecológicos de plantas daninhas em agroecossistemas**. 1 ed. Jaboticabal, SP, Edição do autor, 2011. v. 1.

CHITARRA, M. I. F.; CHITARRA, A. B. **Pós-colheita de frutos e hortaliças: fisiologia e manuseio**. Lavras: ESAL/FAEPE, 2005.

CORREIA, V. T da V.; SOUZA, N. C. R. de; TEIXEIRA, B. A.; CARLOS, L. A.; SILVA, E. C. Caracterização físico-química de almeirão-de-árvore (*Cichorium intybus* L.) minimamente processado. In: CONGRESSO NACIONAL DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO; CONGRESSO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, 3; 6. Ouro Preto, MG. **Anais**. Ouro Preto, 2017.

FASUYI, A. O. Bio-nutritional evaluations of three tropical leaf vegetables (*Telfairia occidentalis*, *Amaranthus cruentus* and *Talinum triangulare*) as sole dietary protein sources in rat assay. **Food Chemistry**, v. 103, n. 3, p. 757-765, 2007.

FERREIRA, D. F. Sisvar: a Guide for its Bootstrap procedures in multiple comparisons. **Ciência e agrotecnologia**, vol.38, n.2, p. 109-112, 2014.

FERREIRA, R. M. A.; FERNANDES, P. L. O.; FONTES, L. O.; RODRIGUES, A. P. M. S.; SILVA, L. T. Antioxidantes e sua importância na alimentação. **Revista Verde**, Mossoró, v. 5, n. 5, p. 26-30, dez., 2010.

FONTANA, L. **Avaliação física, físico-química e sensorial de cultivares alface produzidas em diferentes sistemas de cultivo**. Orientador: Marta Regina Verruma-Bernardi. 2016. 64 f. Dissertação (Mestrado em Agroecologia e Desenvolvimento Rural) – Universidade Federal de São Carlos, Araras, São Paulo, 2016.

GANDINI, S.; MERZENICH, H.; ROBERTSON, C.; BOYLE, P. Meta-analysis of studies on breast cancer risk and diet: the role of fruit and vegetable consumption and the intake of associated micronutrients. **European Journal of Cancer**, Kidlington, v.36, n. 5, p.636-646, 2000.

GILMORE, A. M.; BALL, M. C. Protection and storage of chlorophyll in overwintering evergreens. **Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America**, vol. 97, n. 20, 4 p., 2000.

GOBBO-NETO, L.; LOPES, N. P. Plantas medicinais: fatores de influência no conteúdo de metabólitos secundários. **Quim. Nova**, Vol. 30, No. 2, 374-381, 2007.

GOYENECHE, R.; AGÜERO, M. V.; ROURA, S.; SCALA, K. D. Application of citric acid and mild heat shock to minimally processed sliced radish: Color evaluation. **Postharvest Biology and Technology**, v. 93, p. 106-113, 2014.

KARTSEV, V.; STEPANICHENKO, N.; AUELBKOV, S. Chemical composition and pharmacological properties of plants of the genus *Stachys*. **Chem Natural Compound**. 30(6), 645-54, 1994.

KINUPP, V. F.; BARROS, I. B. I. Teores de proteína e minerais de espécies nativas, potenciais hortaliças e frutas. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, Campinas, v.28, n.4, p. 846-857, 2008.

KINUPP, V. F.; LORENZI, H. **Plantas alimentícias não convencionais (PANC) no Brasil:**

guia de identificação, aspectos nutricionais e receitas ilustradas. Nova Odessa: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 768p. 2014.

LIMA, K. S. C.; GROSSI, J. L.; LIMA, A. L. S.; ALVES, P. F. M. P.; CONEGLIAN, R. C. C.; GODOY, R. L. O.; SABAA-SRUR, A. U. O. Efeito da irradiação ionizante γ na qualidade pós-colheita de cenouras (*Daucus carota* L.) cv. Nantes. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, v. 21, n. 2, p. 202-208, 2001.

LISE, C. C. **Potencial emulsificante de ora-pro-nóbis (*Pereskia aculeata* Miller) em derivado cárneo tipo mortadela.** Orientador: Marina Leite Mitterer-Daltoé. 2018. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2018.

MAKAROV, V. V.; MAKAROVA, S. S.; LOVE, A. J.; SINITSYNA, O. V.; DUDNIK, A. O.; YAMINSKY, I. V.; TALIANSKY, M. E.; KALININA, N. O. Biosynthesis of stable iron oxide nanoparticles in aqueous extracts of *Hordeum vulgare* and *Rumex acetosa* plants. **Langmuir**, 30(20), 5982-5988, 2014.

MARTINEVSKI, C. S.; OLIVEIRA, V. D.; RIOS, A. D. O.; FLORES, S. H.; VENZKE, J. G. Utilização de bertalha (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis) e ora-pro-nobis (*Pereskia aculeata* Mill.) na elaboração de pães. **Alimentos e Nutrição Araraquara**, v. 24, n. 3, p. 272, 2013.

MOYER, R. A.; HUMMER, K. E.; FINN, C. E.; FREI, B.; WROLSTAD, R. E. Anthocyanins, phenolics, and antioxidant capacity in diverse small fruits: *Vaccinium*, *Rubus*, and *Ribes*. **Journal of Agriculture and Food Chemistry**, Washington, v. 50, p. 519-525, 2002.

NOROUZI-ARASI, H.; YAVARI, I.; KIA-ROSTAMI, V.; JABBARI, R.; GHASVARI-JAHROMI, M. Volatile constituents of *Stachys inflata* Benth. from Iran. **Flavour Fragr. J.**, 21(2), 262-4, 2006.

OSIPE, R.; ADEGAS, F. S.; OSIPE, J. B. Plantas daninhas na agricultura: o caso da buva. In: CONSTANTIN, J. *et al.* **Buva: fundamentos e recomendações para manejo.** 2 ed. Curitiba, Omnipax. p. 1-4. 2013.

PITELLI, R. A.; PAVANI, M. C. M. P. D. Feralidade e transgênese. In: BORÉM, A. **Biotecnologia e meio ambiente.** Viçosa, MG, Universidade Federal de Viçosa. p. 363-384. 2005.

RITA, I. A. O. **Influência da época de colheita e estado fenológico na composição fenólica e propriedades bioativas de infusões de tomilho-limão, hortelã-vulgar, limonete e erva-príncipe.** Tese de Doutorado. Orientador: Isabel C.F.R. Ferreira, Lillian Barros, 89 p., 2017.

SANTOS, C. C. D. M. P.; SALVADORI, M.S.; MOTA, V.G.; COSTA, L.M.; DE ALMEIDA, A.A.C.; DE OLIVEIRA, G.A.L. Antinociceptive and antioxidant activities of phytol in vivo and in vitro models. **Neurosci J.**, 1-9, 2013.

SANTOS, Ê. R. M.; OLIVEIRA, H. N. M.; OLIVEIRA, E. J.; AZEVEDO, S. H. G.; JESUS, A. A.; MEDEIROS, A. M. DARIVA, C.; SOUSA, E. M. B. D. Supercritical fluid extraction of *Rumex acetosa* L. roots: Yield, composition, kinetics, bioactive evaluation and comparison with

conventional techniques. **The Journal Of Supercritical Fluids**, Natal, v. 9, n. 1, p.1-9, 2016.

SCHMEDA-HIRSCHMANN, G.; FERESIN, G.; TAPIA, A.; HILGERT, N.; THEODULOZ, C. Proximate composition and free radical scavenging activity of edible fruits from the Argentina Yungas. **Journal of the Science of Food and Agriculture**, v. 85, n. 8, p. 1357-1364, 2005.

SHAHIDI, F. **Natural antioxidants**. Chemistry, effects and applications. Champaing: AOCS Press, 414 p., 2007.

SILVA E. C.; CARLOS L. A.; ARAÚJO A. P.; FERRAZ L. C. L.; PEDROSA M. W.; SILVA L. S. Characterization of two types of azedinha in the region of Sete Lagoas, Brazil. **Horticultura Brasileira** v.31, p. 328-331, 2013.

SILVA, I. A.; CAMPELO, L. H. B. P.; PASDILHA, M. R. F.; SHINOHARA, N. K. S. Mecanismos de resistência das plantas alimentícias não convencionais (PANC) e benefícios para a saúde humana. **Anais da Academia Pernambucana de Ciências Agrônômicas**, v.15, p.77-91, 2018.

SILVEIRA, G. S. R.; BORTOLINI, L. O. F.; PEDROSA, M. W. Resgate de hortaliças não convencionais em Minas Gerais. **Informe Agropecuário**, Belo Horizonte, v. 37, n. 295, p.12-20, 2016.

TEIXEIRA, B. A. **Bioprodução de fitoquímicos em plantas alimentícias não convencionais (PANC) nas quatro estações do ano**. Orientador: Lanamar de Almeida Carlos. 2018. 51 f. Dissertação (Mestre em Ciências Agrárias) – Universidade Federal de São João del-Rei, Sete Lagoas, MG, 2018.

TORRES, M. P.; DE ALMEIDA CARLOS, L.; PEDROSA, M. W.; SILVA, A. P. C. M.; DA SILVA, E. C.; FERRAZ, L. D. C. L. Profile of phytochemistry and antioxidant activity of sorrel in function of organic fertilization and density of plantio. **Bioscience Journal**, Uberlândia, v. 35, n. 3, p. 775-783, 2019.

UUSIKU, N.P.; OELOFSE, A.; DUODU, K.G.; BESTER, M.J.; FABER, M. Nutritional value of leafy vegetables of Sub-saharan Africa and their potential contribution to human health: A review. **Journal of Food Composition and Analysis**. v.23, p. 499-509, 2010.

VENDRUSCOLO, R.; TOMÉ DA CRUZ, F.; SCHNEIDER, S. (Re) valorização de los alimentos de la agricultura familiar: límites y particularidades de las estrategias agroalimentarias em el Estado de Rio Grande do Sul, Brasil. **Agroalimentaria**, v.22, p.149-169, 2015.

VIANA, M. M. S.; ALMEIDA-CARLOS, L.; SILVA, E. C.; PEREIRA, S. M. F.; OLIVEIRA, D. B.; ASSIS, M. L. V. Composição fitoquímica e potencial antioxidante de hortaliças não convencionais. **Horticultura Brasileira**, v. 33, p. 504-509, 2015.

ZEM, L. M.; HELM, C. V.; ZUFFELLATO-RIBAS, K. C.; KOEHLER, H. S. A nutritional analysis of juices of ora-pro-nobis's leaves and stalks. **Revista Eletrônica Científica da UERGS**, v. 4, n. 3, p. 512-524, 2018.

CHAPTER 14: NON-COMMERCIALLY EXPLORED *Campomanesia* spp. NATIVE FRUITS AS POTENTIAL SOURCE OF ANTIMICROBIAL COMPOUNDS

Silvani Verruck¹; Anildo Cunha Junior²; Nei Fronza³; Jean Carlos Budke⁴; Sheila Mello da Silveira⁵

Abstract

Campomanesia eugenioides, *Campomanesia xanthocarpa* (Berg) and *Campomanesia xanthocarpa* var. *littoralis* comprises non-commercially explored native fruits from Brazil. Considering the scarcity of studies on the native fruits characterization from *Campomanesia* spp., the aim of the present study was to determine the antibacterial effects of *C. xanthocarpa* (Berg), *C. eugenioides* and *C. xanthocarpa* var. *littoralis* against 15 strains of food-borne pathogens. The antibacterial tests demonstrated a high antibacterial activity for some of the Gram-positive bacteria tested, i.e., *Bacillus cereus*, *Bacillus subtilis*, *Listeria monocytogenes*, and *Staphylococcus aureus*. It is noteworthy that *C. xanthocarpa* var. *littoralis* fruit extract was the better against a more substantial number of bacteria. Finally, it was possible to report that phenolic and flavonoids compounds present in *C. eugenioides*, *C. xanthocarpa* and *C. xanthocarpa* var. *littoralis* could be strongly associated with the antibacterial activity observed.

Keywords: *Campomanesia eugenioides*, *Campomanesia xanthocarpa* var. *littoralis*, *Campomanesia xanthocarpa*, native fruit, antibacterial properties, bioactive compounds.

Introduction

Territorial extension, geographical position, soil and climatic conditions are conditions that makes Brazil as one of the world's largest fruit producers (BARROS et al., 2017). However, large production of few fruit species are taking over more area, and consequently, the population loses the chance to know native species and varying their diet. In this sense, several native species are not economically explored yet. These native species could offer rich and nutritious alternatives, that could be more widely used for *in natura* consumption or in the production of sweets, jams, juices and ice-creams (PEREIRA et al., 2013). Thus, several still little known species of fruit have been evaluated more recently as an alternative to traditional species (BRANDAO; ANJOS; BELL, 2017; PAZ et al., 2015).

The fruits belonging to the genus *Campomanesia* sp. Comprises several species that could be more explored (DONADO-PESTANA et al., 2018). The fruits are round and green in color when young and yellow and sweet when mature (VALLILO et al., 2008), and globose and smooth, measuring about 5.5 to 7 mm in diameter (LIMA et al., 2011). Some species such as *C. xanthocarpa* var. *littoralis* (D. Legrand) shows some different characteristic such as the green color attributed to the fruit when mature and their size (15 to 40 mm) (BIAVATTI et al.,

¹ Dr^a, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina, silvani.verruck@ufsc.br

² MSc, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, EMBRAPA Suínos e Aves, anildo.cujinha@embrapa.br

³ Dr, Engenharia de Alimentos, Instituto Federal Catarinense, nei.fronza@ifc.edu.br

⁴ Dr, Biologia, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, jean@uricer.edu.br

⁵ Dr^a, Engenharia de Alimentos, Instituto Federal Catarinense, sheila.silveira@ifc.edu.br

2004). *Campomanesia xanthocarpa* (Berg) is one of the most popularly known and widespread species among the genus (BARBIERI et al., 2017). On the other hand, *C. eugenoides* is commonly confused with *C. xanthocarpa* because they have similar characteristics, but *C. eugenoides* is not so well known and studied. *Campomanesia* species are traditionally used in as traditional medicine for the treatment of intestinal disorders (MOURA-COSTA et al., 2012).

Currently, consumers have appreciated the availability of more natural and healthier foods, which may also bring some health benefit. In addition, with the development of bacteria resistant to many antibiotics, there is a growing interest in the study of antimicrobial substances from natural products. These factors have collaborated to increase interest in the search for natural products that have biological activities such as antimicrobial activity (SILVEIRA et al., 2014).

In the light of these observations, Cardoso et al. (2010) in their study with fruits of *C. pubescens* and *C. adamantium* found representative values of minimum inhibitory concentration for Gram-positive, Gram-negative bacteria, and also yeasts. This ability can be related with the presence of bioactive compounds in the fruits, such as phenolic compounds with proven antibacterial activities (CUSHNIE; LAMB, 2011; DRAGIŠIĆ MAKSIMOVIĆ et al., 2013). These compounds could be related with DNA molecule damage and with interferences on the reconstitution of damaged cell membranes (DRÖGE, 2002). Thus, considering the scarcity of studies on the native fruits characterization from *Campomanesia* spp., the aim of the present study was to determine the antibacterial effects of *C. xanthocarpa* (Berg), *C. eugenoides* and *C. xanthocarpa* var. *littoralis* against 15 strains of food-borne pathogens.

Material and Methods

Location description and collection of samples

Ripened *C. eugenoides* (*Campomanesia eugenoides*), *C. xanthocarpa* (*Campomanesia xanthocarpa* (Berg)) and *C. xanthocarpa* var. *littoralis* (*Campomanesia xanthocarpa* var. *littoralis* (D. Landrum)) fruits were collected in the West region of Santa Catarina State, Brazil, at latitude 27°14'2"S and longitude 52°1'40"W of Greenwich. The vouchers specimens were deposited at the Herbário do Vale do Taquari (HVAT, Lageado, Rio Grande do Sul, Brazil) and at the Herbário Padre Balduino Rambo (HPBR, Erechim, Rio Grande do Sul, Brazil) as presented in Table 1. All the samples were collected when fully mature and were preselected considering the absence of visible injury, infections and color uniformity. Moreover, the fruits

were freeze-dried with all the edible parts (skin, pulp, and seeds) and processed in a knife mill (Tecator, Knifetec 1095 model). The powders obtained were vacuum sealed in plastic bags and stored at a temperature of -18 ± 0.2 °C until analyzed.

Table 1. *Campomanesia eugenioides*, *Campomanesia xanthocarpa* (Berg) and *Campomanesia xanthocarpa* var. *littoralis* (D. Landrum) studied in the present work.

Registry number	Popular name	Scientific name	Collection location
HVAT 2612	Guabiroba	<i>Campomanesia eugenioides</i>	Concórdia, SC, 27°18'46" South, 51°59'16" West, Brazil
HPBR 11579	Guabiroba do mato	<i>Campomanesia xanthocarpa</i> (Berg)	Concórdia, SC, 27°12'01" South, 52°01'58" West, Brazil.
HPBR 11580	Guabiroba verde	<i>Campomanesia xanthocarpa</i> var. <i>littoralis</i> (D. Landrum)	Concórdia, SC, 27° 14' 3" South, 52° 1' 43" West, Brazil.

Source: Herbário do Museu de Ciências Naturais da UNIVATES (HVAT, Lajeado, RS) and Herbário Padre Balduino Rambo da URI (HPBR, Erechim, RS).

Freeze dry

Initially, the whole fruits (about two kilos) were washed with distilled water and crushed in a mini-processor to obtain a homogeneous mass (pulp). The pulp was distributed in aluminum trays and frozen in a freezer at -18 °C for 24 hours. Then, the samples were dehydrated in a lyophilizer (Liobrás LP810, SP, Brazil). The humidity was determined by gravimetry. The dry samples were processed in a knife mill (Tecator, model Knifetec 1095, Germany), vacuum packed and stored at -18 °C until the extract preparation.

Extract preparation

The extract of each fruit species was prepared prepared with freeze-dried fruit and ethanol: water 80:20 (v/v) in a mass/solvent ratio of 1:5 to obtain the hydroalcoholic extract by exhaustive maceration with solvent exchange at 24, 48, 72 and 192 hours. The extraction was carried out under agitation in an orbital plate (Etica, 109-2-E model, São Paulo, Brazil) at room temperature without incidence of light. The extract was filtered and rota-evaporated (40 ± 1 °C) until dryness and dissolved in 100 mL of dimethyl sulfoxide (DMSO). All the extracts were stored in the dark at 4 ± 1 °C until analyzed.

Evaluation of the antibacterial activity

Microorganisms. Antibacterial activity was evaluated for the following strains: *Bacillus cereus* ATCC 11778, *Bacillus subtilis* ATCC 6633, *Enterobacter aerogenes* ATCC 13048, *Escherichia coli* ATCC 25922, *Listeria monocytogenes* ATCC 19117, *Listeria monocytogenes* serotype 2 ATCC 19112, *Proteus vulgaris* ATCC 13315, *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853, *Salmonella* Enteritidis ATCC 13076, *Salmonella* Typhimurium ATCC 14028, *Shigella sonnei* ATCC 25931, *Staphylococcus aureus* ATCC 29213, *Staphylococcus aureus* ATCC 6538, *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 and *Yersinia enterocolitica* ATCC 9610.

Microorganism suspension standardization. Bacterial cultures were grown on 5% sheep red blood agar. Following the initial incubation, 3-5 isolated colonies were suspended in 10 ml of tryptose soy broth (TSB) and incubated at 35 ± 2 °C for 2 to 6 hours, to obtain an actively growing culture. This inoculum was diluted in 0.9% saline solution to a concentration of approximately 10^8 CFU mL⁻¹ comparable spectrophotometrically to 0.5 McFarland standard at 625nm. For the agar disc diffusion assay and the minimum inhibitory concentration determination, bacterial solutions of 10^7 CFU mL⁻¹ were employed.

Agar disc diffusion method. The agar disc diffusion method was employed for the screening of antibacterial activities of the extracts of the fruit according to the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2019b). The test was performed in sterile Petri dishes (90 mm diameter) containing Mueller-Hinton agar medium (Difco, Sparks, USA). Briefly, the tested microorganism suspension was spread with a sterile swab on the MH agar. The extracts (100 mg mL^{-1}) absorbed on sterile paper discs ($25 \mu\text{L}$ per disc of 9 mm diameter and 250 g m^{-2}) were placed on the surface of the media previously inoculated and then incubated at 35 ± 2 °C for 24 h. After the zone diameter of the inhibition was measured and expressed in mm. Commercial discs of ampicillin (10 mg per disc) and chloramphenicol (30 mg per disc) were used as positive controls and disks containing DMSO ($25 \mu\text{L}$) as a negative control. All tests were performed in triplicate. The inhibition was classified as strongly inhibitory, moderately inhibitory or not inhibitory according to Carović-Stanko et al. (2010). Minimum inhibitory concentrations were recorded for the extracts that showed positive antibacterial activity.

Minimum inhibitory concentration (MIC): broth microdilution. MICs were determined according to the method proposed by CLSI (CLSI, 2019a), with some modifications. In the microplate, serial dilutions of the extracts were made directly to the wells in the first row until the eighth row with sterile DMSO, resulting in concentrations that varied from 100 mg mL^{-1} to 0.75 mg mL^{-1} . Ninety microliters of MHB, $10 \mu\text{L}$ of the diluted tested solution and $10 \mu\text{L}$ of the previously standardized microorganism suspension were added to

each well, and the plate was incubated at 35 ± 2 °C for 24 h. It was assured the sterility control (MHB added of DMSO and without inoculum) and growth control (MHB added of DMSO and inoculum). Microbial growth was detected and confirmed with the addition of 20 µL of an aqueous solution of triphenyltetrazolium chloride (TTC, 0.5%, w/v), with one hour of additional incubation. All analyses were carried out in triplicate and expressed in mg mL⁻¹.

Minimum bactericidal concentration (MBC): To determine the MBCs the method proposed by Celiktas et al. (CELIKTAS et al., 2007) was used, with some modifications. For this, 10 µL of the suspension in which was not microbial growth on the MIC assay were plated on TSA. The plates were incubated at 35 ± 2 °C for 24 h. The lowest concentration of the extract at which no growth of microorganisms was observed was considered the MBC. All tests were performed in triplicate and expressed in mg mL⁻¹.

Statistical analysis

The significance of the differences between the means of the samples was determined by analysis of variance (ANOVA) followed by Tukey's test (5 % significance). All statistical analyses were performed using the software STATISTICA version 13.3 (StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA).

Results and Discussion

The antibacterial activities of *C. eugenoides*, *C. xanthocarpa* (Berg), and *C. xanthocarpa* var. *littoralis* fruits extracts were evaluated against seven Gram-positive and eight Gram-negative bacterial strains. Considering a future use of the extracts of the fruit as a possible food additive, these microorganisms were chosen because they are considered some of the most common food-borne pathogens. Thus, the results of the agar diffusion assay, presented in Table 2, showed that the three extracts had no antibacterial activity against the eight species of Gram-negative bacteria tested. In accordance with Malanovic and Lohner (2016), Gram-negative bacteria present in their cell wall a lipopolysaccharide membrane that can interfere with some of these antibacterial substances blocking its activity.

Remarkably, all Gram-positive bacteria tested in the present study were susceptible to the three fruit extracts (Table 2). According to the classification of Carović-Stanko et al. (2010), the antibacterial activity can be classified in the following three categories: > 15 mm zone of inhibition was strongly inhibitory; 10-15 mm zone of inhibition was moderately inhibitory, and <10 mm was not inhibitory. Taking this into account, *C. eugenoides* showed strong inhibitory effect against *Listeria monocytogenes* serotype 2 (Figure 1) and *Staphylococcus aureus* ATCC

6538 (Figure 2). Also, *C. xanthocarpa* (Berg) showed strong inhibitory effect against *S. aureus* ATCC 29213 (Figure 2), while *C. xanthocarpa* var. *littoralis* showed strong inhibitory effect against *Bacillus subtilis* (Figure 3), *L. monocytogenes* serotype 2 (Figure 1), *S. aureus* ATCC 6538 and *S. aureus* ATCC 25923 (Figure 2). The fruits extract moderately inhibited all other Gram-positive bacteria. Thus, *C. xanthocarpa* var. *littoralis* fruit extract demonstrated high inhibitory activity against a more substantial number of Gram-positive bacteria.

Listeria monocytogenes species is known to be potentially pathogenic to humans and animals, causing gastrointestinal disorders, septicemia, abortion and, in more serious cases, death. They grow in a very wide temperature range (from 1 to 45° C), which makes their control difficult (RYSER; DONNELLY, 2001). The growth of *S. aureus* in food also poses a great risk to human health because several strains of this species produce enterotoxins. Contaminations by *S. aureus* are among the main causes of foodborne diseases in the world (LANCETTE; BENNET, 2001). According to Ahmad, Mehmood and Mohammad (1998), fruits are popularly used as natural antimicrobials for the treatment of bacteriosis in Ayurvedic medicine. These authors reported zones of inhibition greater than 20 mm for Indian gooseberry, Haritaki and Bibhitaka, against *S. aureus*, *B. subtilis*, *E. coli*, *P. aeruginosa*, *S. Typhimurium* and *P. vulgaris*.

C. eugenoides and *C. xanthocarpa* var. *littoralis* showed moderate activity against *Bacillus cereus*, and these results did not differ significantly ($p < 0.05$) from the zone of inhibition presented by the antibiotic ampicillin (14.7 mm) used as a positive control. Al-Zoreky (2009) reported antimicrobial activity of a methanolic extract of pomegranate peel against *L. monocytogenes*, *S. aureus*, *B. subtilis*, *E. coli*, *P. aeruginosa*, *K. pneumoniae* and *Y. enterocolitica*, with inhibition halos ranging from 16 to 20 mm. Compatible values with those observed in the present work for the tested Gram-positive species. Among the Myrtaceae family, Boulekbache-Makhlouf, Slimani and Madani (2013) reported the antimicrobial activity of Tasmanian eucalyptus fruits against *S. aureus* (14.67 mm) and *B. subtilis* (11.5 mm) and Medina et al. (2011) reported the antimicrobial activity of the aqueous extract of yellow araçá and red araçá against *S. Enteritidis* (15.3 and 17 mm, respectively). The antimicrobial activity of Tasmanian eucalyptus fruits is equivalent to those reported for the *Campomanesia* species studied in the present work.

Table 2. Average diameter of inhibition zone $\pm$ standard deviation (mm) of *Campomanesia eugenioides*, *Campomanesia xanthocarpa* (Berg) and *Campomanesia xanthocarpa* var. *littoralis* (D. Landrum) fruit extracts, positive and negative controls[†].

	<i>C. eugenioides</i>	<i>C. xanthocarpa</i> (Berg)	<i>C. xanthocarpa</i> var. <i>littoralis</i>	Amp	Chlo	DMSO
Gram (+)						
<i>Bacillus cereus</i> ATCC 11778	14.0 $\pm$ 0.0 ^c	13.0 $\pm$ 0.0 ^d	15.0 $\pm$ 0.0 ^b	14.7 $\pm$ 0.6 ^{bc}	30.0 $\pm$ 0.0 ^a	-
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	14.0 $\pm$ 0.0 ^c	13.7 $\pm$ 0.6 ^c	16.0 $\pm$ 0.0 ^b	30.0 $\pm$ 0.0 ^a	31.0 $\pm$ 1.1 ^a	-
<i>Listeria monocytogenes</i> ATCC 19117	12.3 $\pm$ 0.6 ^c	12.0 $\pm$ 0.0 ^c	12.7 $\pm$ 0.5 ^c	31.7 $\pm$ 0.6 ^a	28.0 $\pm$ 1.1 ^b	-
<i>Listeria monocytogenes</i> ser 2 ATCC 19112	15.3 $\pm$ 0.6 ^c	14.3 $\pm$ 0.6 ^c	15.7 $\pm$ 0.5 ^c	39.3 $\pm$ 0.6 ^a	27.0 $\pm$ 0.6 ^b	-
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 29213	14.0 $\pm$ 0.0 ^e	18.3 $\pm$ 0.6 ^c	15.0 $\pm$ 0.0 ^d	22.7 $\pm$ 0.6 ^b	25.0 $\pm$ 0.0 ^a	-
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	19.3 $\pm$ 0.6 ^c	13.3 $\pm$ 0.6 ^e	16.0 $\pm$ 0.0 ^d	42.7 $\pm$ 0.6 ^a	29.0 $\pm$ 0.6 ^b	-
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	15.0 $\pm$ 0.0 ^d	13.5 $\pm$ 0.5 ^e	16.8 $\pm$ 0.2 ^c	32.7 $\pm$ 0.6 ^a	29.0 $\pm$ 1.0 ^b	-
Gram (-)						
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	-	-	-	-	27.0 $\pm$ 1.0	-
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	-	-	-	20.0 $\pm$ 0.0 ^b	29.0 $\pm$ 1.0 ^a	-
<i>Proteus vulgaris</i> ATCC 13315	-	-	-	30.7 $\pm$ 0.6 ^a	27.0 $\pm$ 1.1 ^b	-
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	-	-	-	-	-	-
<i>Salmonella</i> Enteritidis ATCC 13076	-	-	-	25.7 $\pm$ 0.6 ^b	29.0 $\pm$ 0.5 ^a	-
<i>Salmonella</i> Typhimurium ATCC 14028	-	-	-	26.0 $\pm$ 0.0 ^b	27.0 $\pm$ 0.6 ^a	-
<i>Shigella sonnei</i> ATCC 25931	-	-	-	23.0 $\pm$ 0.0 ^b	29.0 $\pm$ 1.0 ^a	-
<i>Yersinia enterocolitica</i> ATCC 9610	-	-	-	24.0 $\pm$ 0.0 ^b	33.0 $\pm$ 0.6 ^a	-

[†] Results presented as mean $\pm$ SD, n=3. The same letters in the same line indicate no significant difference ($P < 0.05$). (-) – Without inhibition zone. Amp – ampicillin; Chlo – chloramphenicol; DMSO – dimethyl sulfoxide. **Source:** The authors (2020).

Figure 1. Inhibition zone of *C. eugenioides*, *C. xanthocarpa* (Berg), and *C. xanthocarpa* var. *littoralis* fruit extracts against *Listeria monocytogenes* ATCC 19117 and *Listeria monocytogenes* ser 2 ATCC 19112. The white disk represents the negative control with DMSO.

Source: The authors (2020).

Figure 2. Inhibition zone of *C. eugenioides*, *C. xanthocarpa* (Berg), and *C. xanthocarpa* var. *littoralis* fruit extracts against *Staphylococcus aureus* ATCC 29213, *Staphylococcus aureus* ATCC 6538 and *Staphylococcus aureus* ATCC 25923. The white disk represents the negative control with DMSO.

Source: The authors (2020).

Figure 3. Inhibition zone of *C. eugenoides*, *C. xanthocarpa* (Berg), and *C. xanthocarpa* var. *littoralis* fruit extracts against *Bacillus cereus* and *Bacillus subtilis*. The white disk represents the negative control with DMSO.

Source: The authors (2020).

Minimum inhibitory concentrations (MIC) and minimum bactericidal concentrations (MBC) were determined for the bacteria species that showed susceptibility in the disk diffusion method, and these results are shown in Table 3. In general, all fruit extracts showed good antibacterial activity against all species of bacteria tested, with emphasis on the MBC of *C. eugenoides* against *Bacillus cereus* and *B. subtilis*; *C. xanthocarpa* (Berg) against *S. aureus* ATCC 29213; and *C. xanthocarpa* var. *littoralis* against *B. subtilis* and *L. monocytogenes* serotype 2. Figure 4 shows the microdilution plate for the MIC test of *C. xanthocarpa* against *S. aureus* ATCC 29213 and *S. aureus* ATCC 6538.

Table 3. Minimum inhibitory concentrations (MIC) and minimum bactericidal concentrations (MBC) (mg mL⁻¹) of *Campomanesia eugenoides*, *Campomanesia xanthocarpa* (Berg) and *Campomanesia xanthocarpa* var. *littoralis* (D. Landrum) fruit extracts ^a.

	<i>C. eugenoides</i>		<i>C. xanthocarpa</i> (Berg)		<i>C. xanthocarpa</i> var. <i>littoralis</i>	
	MIC	MBC	MIC	MBC	MIC	MBC
<i>Bacillus cereus</i>	0.62	0.62	0.62	10.00	0.31	1.25
<i>Bacillus subtilis</i>	0.62	0.62	0.62	10.00	0.31	0.62
<i>Listeria monocytogenes</i>	1.25	2.50	0.62	1.25	0.62	1.25
<i>Listeria monocytogenes</i> sor 2	1.25	2.50	0.62	1.25	0.62	0.62
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 29213	1.25	1.25	0.62	0.62	0.31	1.25
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	1.25	1.25	0.62	1.25	0.31	1.25
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	1.25	1.25	0.62	2.50	0.31	1.25

^a Results presented as modal value, n=3. Source: The authors (2020).

Figure 4. Result of the minimum inhibitory concentration (MIC) of the extract of *C. xanthocarpa* in DMSO against *Staphylococcus aureus* ATCC 29213 and *Staphylococcus aureus* ATCC 6538.

Source: The authors (2020).

For hexanic extracts of the fruits of *C. pubescens* and *C. adamantium*, Cardoso et al. (2010) reported minimal inhibitory concentrations in the range of 5 to 20 $\mu\text{g mL}^{-1}$ for four species of bacteria (*S. aureus*, *P. aeruginosa*, *E. coli* and *Salmonella* Setúbal) and two yeasts (*Saccharomyces cerevisiae* and *Candida albicans*). The authors observed lower MIC values for the bacterium *S. aureus* (15 $\mu\text{g mL}^{-1}$) compared to the results described in the present study. They also present, for *P. aeruginosa*, MIC of 15 $\mu\text{g mL}^{-1}$ and for *E. coli* MIC of 20 $\mu\text{g mL}^{-1}$, bacteria that were not susceptible to the extracts of the fruits of this study by the agar diffusion technique. Therefore, it is evident that the genus *Campomanesia* presents antimicrobial properties against potentially pathogenic bacteria to humans.

Cavanagh, Hipwell and Wilkinson (2003) observed strong antimicrobial activity of raspberry, cranberry, blackberry and currant against *E. faecalis*, *E. coli*, *P. aeruginosa*, *S. Enteritidis*, *S. Typhimurium*, *S. sonnei* and *S. aureus*. It can be seen, therefore, that fruits of different species (including those of the genus *Campomanesia*) have antimicrobial capacity and could be used as adjuvants in treatments of bacteriosis caused by the consumption of contaminated food.

Regarding other fruits of the Myrtaceae family, studies on Serrana guava are reported. Basile et al (1997) presented MIC for *S. aureus* ($8 \mu\text{g mL}^{-1}$), *P. aeruginosa* ($1 \mu\text{g mL}^{-1}$), *E. coli* ($1 \mu\text{g mL}^{-1}$) while in relation to MBC the maximum concentration of the extract used was not effective ($1000 \mu\text{g mL}^{-1}$). Vuotto et al. (2000) observed for *S. aureus* MIC of 64 mg L^{-1} and MBC not detected, for *E. coli* MIC of 4 mg L^{-1} and MBC of 32 mg L^{-1} , for *P. vulgaris* MIC of 8 mg L^{-1} and MBC of 64 mg L^{-1} , for *P. aeruginosa* MIC of 1 mg L^{-1} and MBC of 8 mg L^{-1} and for *E. aerogenes* MIC of 2 mg L^{-1} and MBC of 16 mg L^{-1} . In the light of these observations, according to Cardoso et al. (2010), the extraction protocol could be improved using other extraction solvents to obtain better results against Gram-negative bacteria.

The antimicrobial activity shown by fruits is mainly due to the presence of secondary metabolites in its composition, such as phenolic compounds, among them the flavonoids that have antimicrobial activity reported in the literature (HARBORNE; WILLIAMS, 2000; CUSHNIE; LAMB, 2005; 2011). Finally, the results obtained in our study, lead us to believe that the phenolic and flavonoids compounds from *C. eugenioides*, *C. xanthocarpa* (Berg) and *C. xanthocarpa* var. *littoralis* are primarily responsible by the antibacterial activity observed. The data reported depicting the potential use of these three *Campomanesia* species as antibacterial agents, and the role they may play in their future application fields aiming to generate a functional food.

Final Considerations

This study will provide important scientific data supporting the application of valuable fruits from three edible *Campomanesia* species for producing bioactive ingredients and natural preservatives for food products. *C. eugenioides*, *C. xanthocarpa* (Berg), and *C. xanthocarpa* var. *littoralis* showed distinct antimicrobial characteristics. All the three extracts had no antibacterial activity against the eight species of Gram-negative bacteria tested. Nevertheless, all Gram-positive bacteria tested were susceptible to the three fruit extracts, where *C. xanthocarpa* var. *littoralis* fruit extract demonstrated high inhibitory activity against a more substantial number of Gram-positive bacteria. We concluded that the phenolic and flavonoids compounds of *C. eugenioides*, *C. xanthocarpa* (Berg) and *C. xanthocarpa* var. *littoralis* are primarily responsible by the antibacterial activity detected. Thus, our results contribute to the discovery of the potential application of these native *Campomanesia* Brazilian fruits, as a natural product with antibacterial properties.

Conflicts of interest statement

Authors declare no conflicts of interest in this manuscript.

Acknowledgments

The authors acknowledge financial support from FAPESC (08/2009, process FCTP 3302/091). The authors also gratefully thank to A. Dalla Rosa and J. Oliveira for providing the samples, and to Dr. A. Jasper (UNIVATES, RS, Brazil) for the botanical identification of the samples.

Author's contributions

All authors contributed extensively to the work presented in this manuscript. S.V. and S.M.S.: Designed and performed research, wrote and revised the manuscript. A.C.J.: Contributed to the development of experimental part and reviewed the manuscript. N.F.: Helped in design research and discussion. J.C.B.: performed the species identification. All authors read and approved the final manuscript.

References

AHMAD, I., MEHMOOD, Z., MOHAMMAD, F. Screening of some Indian medicinal plants for their antimicrobial properties. **Journal of Ethnopharmacology**, v. 62, p. 183–193, 1998.

AL-ZOREKY, N.S. Antimicrobial activity of pomegranate (*Punica granatum* L.) fruit peels. **International Journal of Food Microbiology**, v. 134, p. 244–248, 2009.

BARBIERI, S. F. et al. Extraction, purification and structural characterization of a galactoglucomannan from the gabioba fruit (*Campomanesia xanthocarpa* Berg), Myrtaceae family. **Carbohydrate Polymers**, v. 174, p. 887–895, 15 out. 2017.

BARROS, R. G. C. et al. Evaluation of bioactive compounds potential and antioxidant activity in some Brazilian exotic fruit residues. **Food Research International**, v. 102, p. 84–92, 1 dez. 2017.

BASILE, A. et al. Antibacterial activity in *Actinidia chinensis*, *Feijoa sellowiana* and *Aberia caffra*. **Internactional Journal of Antimicrobial Agents**, v. 8, p. 199–203, 1997.

BIAVATTI, M. . et al. Preliminary studies on *Campomanesia xanthocarpa* (Berg.) and *Cuphea carthagenensis* (Jacq.) J.F. Macbr. aqueous extract: weight control and biochemical parameters. **Journal of Ethnopharmacology**, v. 93, n. 2–3, p. 385–389, ago. 2004.

BOULEKBACHE-MAKHLOUF, L., SLIMANI, S., MADANI, K. TOTAL phenolic content, antioxidant and antibacterial activities of fruits of *Eucalyptus globulus* cultivated in Algeria.

Industrial Crops and Products, v. 41, p. 85– 89, 2013.

BRANDAO, M. P.; ANJOS, V. de C. dos; BELL, M. J. V. Time resolved fluorescence of cow and goat milk powder. **Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy**, v. 171, p. 193–199, 2017.

CARDOSO, C. A. L. et al. Antimicrobial Activity of the Extracts and Fractions of Hexanic Fruits of Campomanesia Species (Myrtaceae). **Journal of Medicinal Food**, v. 13, n. 5, p. 1273–1276, 2010.

CAROVIĆ-STANKO, K. et al. Composition and antibacterial activities of essential oils of seven Ocimum taxa. **Food Chemistry**, v. 119, n. 1, p. 196–201, 2010.

CAVANAGH, H. M. A.; HIPWELL, M.; WILKINSON, J. M. Antibacterial activity of berry fruits used for culinary purposes. **Journal of Medicinal Food**. V. 6, n. 1, 2003.

CELIK TAS, O. Y. et al. Antimicrobial activities of methanol extracts and essential oils of Rosmarinus officinalis, depending on location and seasonal variations. **Food Chemistry**, v. 100, n. 2, p. 553–559, 2007.

CLSI. **Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically; approved standard**. 8. ed. Pennsylvania, USA: CLSI document M7-A6, 2019a.

CLSI. **Performance standards for antimicrobial disk susceptibility tests: approved standard**. 8. ed. Pennsylvania, USA: CLSI document M2-A8, 2019b.

CUSHNIE, T. P. T.; LAMB, A. J. Antimicrobial activity of flavonoids. **International Journal of Antimicrobial Agents**, v. 26, p. 343–356, 2005.

CUSHNIE, T. P. T.; LAMB, A. J. Recent advances in understanding the antibacterial properties of flavonoids. **International Journal of Antimicrobial Agents**, v. 38, n. 2, p. 99–107, ago. 2011.

CUSHNIE, T. P. T.; LAMB, A. J. Recent advances in understanding the antibacterial properties of flavonoids. **International Journal of Antimicrobial Agents**, v. 38, p. 99– 107, 2011.

DONADO-PESTANA, C. M. et al. Polyphenols from Brazilian native Myrtaceae fruits and their potential health benefits against obesity and its associated complications. **Current Opinion in Food Science**, v. 19, p. 42–49, 1 fev. 2018.

DRAGIŠIĆ MAKSIMOVIĆ, J. J. et al. Profiling antioxidant activity of two primocane fruiting red raspberry cultivars (Autumn bliss and Polka). **Journal of Food Composition and Analysis**, v. 31, n. 2, p. 173–179, 1 set. 2013.

DRÖGE, W. Free Radicals in the Physiological Control of Cell Function. **Physiological Reviews**, v. 82, n. 1, p. 47–95, jan. 2002.

HARBORNE, J. B.; WILLIAMS, C. A. Advances in flavonoid research since 1992. **Phytochemistry**, v. 55, p. 481-504, 2000.

- LANCETTE, G. A., BENNET, R. W. *Staphylococcus aureus* and staphylococcal enterotoxins. In: DOWNES, F. P.; ITO, K. **Compendium of methods for the microbiological examination of foods**. 4 ed. Washington: APHA, cap. 36, p. 343-363, 2001.
- LIMA, D. F. et al. O gênero *Campomanesia* (Myrtaceae) no estado do Paraná, Brasil. **Rodriguésia**, v. 62, n. 3, p. 683–693, set. 2011.
- MALANOVIC, N.; LOHNER, K. Antimicrobial Peptides Targeting Gram-Positive Bacteria. **Pharmaceuticals (Basel, Switzerland)**, v. 9, n. 3, 20 set. 2016.
- MEDINA, A. L. et al. Araçá (*Psidium cattleianum* Sabine) fruit extracts with antioxidant and antimicrobial activities and antiproliferative effect on human cancer cells. **Food Chemistry**, v. 128, p. 916–922, 2011.
- MOURA-COSTA, G. F. et al. Antimicrobial activity of plants used as medicinals on an indigenous reserve in Rio das Cobras, Parana, Brazil. **Journal of Ethnopharmacology**, v. 143, n. 2, p. 631–638, 2012.
- PAZ, M. et al. Brazilian fruit pulps as functional foods and additives: Evaluation of bioactive compounds. **Food Chemistry**, v. 172, p. 462–468, 1 abr. 2015.
- PEREIRA, M. C. et al. Characterization, bioactive compounds and antioxidant potential of three Brazilian fruits. **Journal of Food Composition and Analysis**, v. 29, n. 1, p. 19–24, 1 fev. 2013.
- RYSER, E. T.; DONNELLY, C. W. *Listeria*. In: DOWNES, F. P.; ITO, K. **Compendium of methods for the microbiological examination of foods**. 4 ed. Washington: APHA, cap. 36, p. 343-363, 2001.
- SILVEIRA, S. M. et al. Chemical composition and antibacterial activity of *Laurus nobilis* essential oil towards foodborne pathogens and its application in fresh Tuscan sausage stored at 7 °C. **LWT - Food Science and Technology**, v. 59, n. 1, p. 86–93, nov. 2014.
- VALLILO, M. I. et al. Composição química dos frutos de *Campomanesia xanthocarpa* Berg-Myrtaceae. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, v. 28, p. 231–237, 2008.
- VUOTTO, M.L. et al. Antimicrobial and antioxidant activities of *Feijoa sellowiana* fruit. **International Journal of Antimicrobial Agents**, v.13, p.197-201, 2000.

CAPÍTULO 15: PERFIL DE INVESTIGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO MINERAL E CENTESIMAL DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS DE CULTIVO CONVENCIONAL E AGROECOLÓGICO

CHAPTER 15: INVESTIGATION PROFILE OF THE MINERAL AND CENTESIMAL COMPOSITION OF CONVENTIONAL AND AGROECOLOGICAL AGRICULTURAL SAMPLES

Edna Santana de Sena¹; Liz Oliveira dos Santos²

Resumo

A avaliação da composição centesimal e mineral de amostras de alimentos são os métodos mais atualizados na modernidade para a extração e quantificação dos componentes orgânicos e minerais de um determinado alimento, com vistas a saber o seu valor nutricional e, conseqüentemente, a determinação da segurança alimentar para o consumidor. Diante disso, buscamos com o presente trabalho avaliar o perfil dos trabalhos publicados na base de dados do Google Scholar, envolvendo avaliação da composição centesimal e mineral em alimentos de origem animal, vegetal ou industrial, nos estados físicos comercializados no país (sólido e líquido) entre os anos de 2000 a 2020 no Brasil. Para isto, buscamos descrever e caracterizar a agricultura convencional e a agroecologia, com vistas a entender as fontes de alimentos mais presentes na sociedade. Por fim, buscamos descrever os achados sob um olhar matemático com a linearização dos dados com a utilização da técnica dos mínimos quadrados.

Palavras-Chaves: Bromatologia; Centesimal; Mineral; Alimentos; Agricultura.

Abstract

The evaluation of the centesimal and mineral composition of food samples are the most updated methods in modern times for the extraction and quantification of the organic and mineral components of a given food, with a view to knowing its nutritional value and, consequently, the determination of food security. for the consumer. Therefore, we seek with the present work to evaluate the profile of the works published in the Google Scholar database, involving evaluation of the centesimal and mineral composition in foods of animal, vegetable or industrial origin, in the physical states marketed in the country (solid and liquid) between the years 2000 to 2020 in Brazil. For this, we seek to describe and characterize conventional agriculture and agroecology, with a view to understanding the food sources most present in society. Finally, we seek to describe the findings from a mathematical perspective with the linearization of the data using the least squares technique.

Keywords: Bromatology; Centesimal; Mineral; Foods; Agriculture.

Introdução

Nos últimos anos, grandes mudanças ocorreram nos hábitos alimentares da população, principalmente em relação à substituição de alimentos caseiros e naturais por alimentos industrializados, sendo estes responsáveis por 85% do consumo total de alimentos em 2007 (IBGE, 2008). E, de certo, a indústria vem participando desse novo direcionamento alimentar,

¹ Tecnologia em Alimentos, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, edna_sena95@yahoo.com

² Doutora, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, liz@ufrb.edu.br

dado que a mesma congrega dezenas de milhares de estabelecimentos de micro e pequeno porte, distribuídos regionalmente, com grande contribuição na geração de empregos e tributos, além de ter forte potencial para o empreendedorismo como instrumento de inclusão social (MADI et al., 2015).

Além disso, é importante mostrar que a indústria de alimentos e bebidas é vital para o abastecimento da população nos centros urbanos, considerando-se toda a logística de armazenamento, distribuição e comercialização nos estabelecimentos atacadistas e varejistas (MADI et al., 2015). No entanto, a Revolução Industrial criou, entre outras coisas, a possibilidade de se comer mais e melhor trazendo novas formas de se produzir, transportar, cozinhar e comer. A partir daí, a indústria alimentícia possibilitou uma ampla produtividade (PELLERANO, 2014).

Diante disso, com o surgimento de um cenário que possibilita o desenvolvimento e comercialização de novos produtos, bem como o desenvolvimento de um pensamento ecológico com o passar dos tempos, há uma constante busca pelo desenvolvimento de técnicas que possibilitem uma análise para saber não apenas a composição alimentar, mas também a garantir a segurança do alimento. Com isso, como atualmente a análise mineral e a centesimal vem sendo empregada para saber da composição dos alimentos, principalmente industrializados, buscamos com o presente trabalho estudar o perfil da análise centesimal e mineral em alimentos de origem animal, vegetal ou industrial, nos estados físicos comercializados no país (sólido e líquido) entre os anos de 2000 e 2020 no Brasil.

Agricultura convencional

O início da agricultura está ligado a uma série de transformações no ato de produzir (ASSIS & ROMEIRO, 2002). Nos últimos anos tem sido desenvolvida e incentivada uma agricultura baseada na conhecida “Revolução Verde”, concretizada pelas práticas da mecanização, irrigação e fertilidade do solo, bem como o uso de agroquímicos no combate de pragas e doenças, intensificando assim a produção de alimentos (NEVES et al., 2004). Ela passou por várias revoluções agrícolas, que visavam diminuir as restrições do meio ambiente e necessidade de trabalho (ASSIS & ROMEIRO, 2002).

Isso porque, como a agricultura moderna, a partir dos anos 50, priorizou um modelo tecnológico com base no uso intensivo da mecanização, adubos minerais de alta solubilidade e agrotóxicos (KAMIYAMA et al., 2011) houve a necessidade de um olhar moderno, mecanizado, utilizando técnicas sofisticadas, com uso de fertilizantes, sistemas de irrigação,

correção dos solos para o plantio, uso de produtos químicos para corrigir as suas características, uso de estufas e seleção de sementes (FREITAS et al., 2014). Porém, este modelo teve início no século passado, quando a revolução industrial introduziu o uso de máquinas e equipamentos agrícolas (RICCI, ARAÚJO & CASTRO, 2002).

Ela foi fortemente incentivada no Brasil na década de 70, e originou-se dos pacotes tecnológicos daquele governo, sendo sinônimo decrescimento econômico (CONTERATO & FILLIPE, 2009). O modelo de agricultura praticado no período era direcionado aos grandes produtores e contribuiu tanto para o aumento da produção no meio rural como para a liberação de mão de obra e o crescimento das indústrias (MARIANI et al., 2015). Além disso, na atualidade, o sistema convencional é um dos sistemas de produção agrícola no país, cujo processo de produção está baseado no emprego de adubos químicos e agrotóxicos.

O sistema agroalimentar moderno baseou-se nos avanços tecnológicos e nas descobertas científicas da agricultura e da pecuária (como o uso de fertilizantes sintéticos, agrotóxicos e drogas veterinárias; o melhoramento genético, o confinamento animal; a mecanização); na grande escala de produção (local e global); na industrialização; na oferta de alimentos desconectada da sazonalidade; na distribuição e comercialização em grandes redes varejistas; na escolha disponível a todos que podem arcar com os preços dos alimentos; nas desigualdades nutricionais entre e dentro das sociedades; e nas repercussões socioambientais vinculadas ao modelo produtivo (BEARDSWORTH & KEIL, 1997).

Os termos agricultura convencional, tradicional, moderna, contemporânea, química, industrial e outros, são utilizados para definir o modelo de agricultura predominante em todo o mundo (RICCI, ARAÚJO & CASTRO, 2002). Ele pode ser definido como um estilo de produção em larga escala, com apoio de recursos tecnológicos que permitam ampla produção e vasta contenção de praga, além de incentivos a modificações genéticas. Todavia, o sistema convencional de agricultura convencional é considerado altamente dependente de insumos externos, como fertilizantes químicos e agrotóxicos (ADL et al., 2011). Diante disso, é considerada uma das principais poluidoras dos recursos hídricos, sendo a salinidade e a contaminação por nitrato os principais indicadores de poluição (DIAZ & ROSENBERG, 2008). Segundo Ricci, Araújo & Castro (2002),

Nesse contexto monofatorial, os diferentes aspectos da produção são vistos de forma isolada; por exemplo, o surgimento de uma determinada praga é sanado pelo seu extermínio via tratamento com agrotóxicos. O melhoramento genético é sempre orientado para potencializar elevadas produtividades, incluindo a incorporação de resistência a pragas e doenças específicas, por meio de cruzamentos direcionados. Técnicos e pesquisadores tendem à superespecialização, fazendo com que a agricultura convencional fundamente-se, cada vez mais, em tecnologias de produto (agrotóxicos e fertilizantes minerais de alta concentração e solubilidade, maquinaria e sementes híbridas)” [sic] (RICCI, ARAÚJO & CASTRO, 2002).

De acordo com Darolt et al. (2003), a técnica da agricultura convencional consiste na preparação do solo com aração, gradagem e abertura de sulco, seguida de processo de fertilização com uso de adubos químicos altamente solúveis, como ureia, super simples, cloreto de potássio, NPK e outros. Isso porque, segundo o autor, a utilização desses fertilizantes é uma forma de reposição de nutrientes essenciais ao desenvolvimento do que se deseja plantar, dado que a natureza levaria muito tempo para recuperá-los, dificultando assim o processo de cultivo em larga escala.

Não obstante os autores ainda mencionam que a fertilização e preparação do solo não são o bastante para um cultivo em larga escala, devido ao surgimento de pragas e doenças que podem prejudicar a lavoura. Em decorrência do fato, usam-se inseticidas, fungicidas e nematicidas na intenção de eliminar parasitas e manter a produção longe de pragas, além de conter invasores com uso de herbicidas. Todavia, para um cultivo em grandes dimensões utilizam-se espécie do tipo lisa e uma monocultura, como supramencionado, para facilitar a colheita haja vista a necessidade de apenas uma única técnica para colher.

Uma das vantagens é a produção em massa de apenas uma espécie, que facilita o cuidado durante as épocas, mas também é um tipo de agricultura que produz em grande quantidade e preços menores, se comparado com produtos cultivados por meio de outras técnicas agrícolas, como a agricultura orgânica (DAROLT et al., 2003). Além disso, para esse tipo de agricultura não há necessidade de certificações, porém existe a indispensabilidade de disponibilidade de vasta área de terra para o plantio.

Com base no contexto de que a agricultura convencional sempre se apresentou como uma ameaça à biodiversidade, e até mesmo ao futuro da produção agrícola (FREITAS et al, 2014). O uso intensivo dos recursos naturais tem promovido mudanças drásticas no comportamento dos atributos físicos do solo (FREITAS et al., 2014). E segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2012), o uso intensivo de agrotóxicos pode causar a degradação dos recursos naturais como, solo, água, flora e fauna, em alguns casos de forma irreversível, portanto insustentável, levando a desequilíbrios biológicos e ecológicos.

Atualmente, o Brasil é um dos maiores compradores de agrotóxicos do mundo, entretanto as intoxicações provocadas por estas substâncias têm aumentado tanto entre os trabalhadores rurais, por ficarem expostos diretamente a estes produtos, como entre pessoas que se contaminam por meio da ingestão de alimentos contaminados (PIGNATI, 2011). No entanto, segundo a ANVISA (2012),:

o sistema de produção convencional não consegue estabelecer a sustentabilidade do ponto vista social, ecológico e econômico. No ponto de vista social, a população tem

consumido alimentos com a dosagem de agrotóxicos acima do limite máximo autorizado e, além disso, com ingredientes ativos não autorizados, segundo as amostras analisadas por cultura nos anos de 2011 e 2012.

Infelizmente, a modernização no meio rural não se ajustou às condições da agricultura familiar, reduziu a necessidade da força de trabalho e, conseqüentemente, excluiu o agricultor familiar do processo produtivo, tornando-se incremento de desigualdades sociais e pobreza nos meios urbano e rural (AZEVEDO et al., 2011). Além disso, agricultura convencional destruiu a fertilidade do solo, tornou a lavoura quimicamente dependente. E em decorrência desses eventos é necessário um longo tempo de transição para o solo poder se recuperar de forma natural. No entanto, isso é algo que não está dentro das possibilidades do camponês, principalmente a camada mais pobre, porque a parcela de terra de que dispõe precisa ser completamente utilizada. Não há possibilidade de deixar a terra em pousio para recuperar-se (STOTZ, 2012).

Agroecologia

A Agroecologia surgiu, precisamente, de uma interação entre os produtores (que se rebelam frente à deterioração da natureza e da sociedade, que é provocada pelo modelo produtivo hegemônico) e os pesquisadores e professores mais comprometidos com a busca de estratégias sustentáveis de produção (SEVILLA, 2001). Ela é uma ciência desenvolvida a partir da década de 1970, como consequência de uma busca de suporte teórico para as diferentes correntes de agricultura alternativa que já vinham se desenvolvendo desde a década de 1920 (ASSIS et al., 2002).

De acordo com os autores, ela é uma resposta aos críticos destes movimentos por uma nova agricultura integrada ao meio ambiente, que os definiam como uma tentativa retrógrada de volta ao passado na agricultura. E possui como variantes a agricultura ecológica, a agricultura alternativa e a agricultura sustentável, entre outras, e vem sendo desenvolvida e aprimorada desde o surgimento dos demais sistemas agrícolas do século passado (NODARI et al., 2015).

Porém, com um olhar mais cultural, alguns consideram que agroecologia é terra, instrumento e alma da produção, onde se plantam novas sementes do saber e do conhecimento, onde enraíza o saber no ser e na terra; é onde se amalgamam saberes e conhecimentos, descrita ainda como ciências, tecnologias e práticas, artes e ofícios no forjamento de um novo paradigma produtivo (LEFF, 2002). Assim, podemos considerar ela como o paradigma emergente,

substituto da agricultura industrial ou convencional, exatamente por incorporar elementos de síntese, unificadores, integradores (NODARI et al., 2015).

Diante disso, pode-se afirmar que a agroecologia é a fusão entre a "Empiria camponesa" e a "Teoria Agroecológica" que estabelece um desenvolvimento alternativo, notadamente um Desenvolvimento Rural Sustentável (SEVILLA, 2001). Isso em decorrência dela ser um corpo de conhecimentos científicos e populares resultante do esforço de pesquisadores e de agricultores que se recusaram a admitir a modernização industrial da agricultura como a única forma de manejar os recursos naturais em um mundo submetido à globalização do capital (MOREIRA et al., 2004).

E ao contrário do que muitos proferem, segundo Paduá (2001), a agroecologia é muito mais do que uma forma de gestão de recursos naturais, configurando-se como um novo modo de vida rural, capaz de conjugar valores, qualidade de vida, trabalho, renda, democracia, emancipação política, em um mesmo processo. É um dos sistemas agrícolas mais sustentáveis sob todos os aspectos e propõe-se a resgatar a dignidade humana dos agricultores que ao longo da história domesticaram plantas e animais e mantiveram grande parte da diversidade genética utilizada pela espécie humana (NODARI et al., 2015).

Logo, podemos dizer que é uma modalidade de cultivo com vistas a respeitar o limite de desgaste dos meios naturais, usufruindo delas sem causar malefício passível de necessidade de recursos artificiais para correção do solo ou mesmo do ambiente natural. Isso porque,

os métodos da Agroecologia mostraram o potencial de suas estratégias para desenvolver uma agricultura sustentável e altamente produtiva, baseada na capacidade fotossintetizadora dos recursos vegetais, na conservação dos solos, no manejo de processos ecológicos, nos cultivos múltiplos e em sua associação com espécies silvestres, no "metabolismo" entre processo de produção primária, transformação tecnológica e reciclagem ecológica de resíduos industriais (TOLEDO, 1989).

Esse modo de pensar o plantio, permite observar a realidade atual em que a agricultura convencional se insere. Demonstrando que a globalização, hoje, oferece comida de todos os países em todas as partes do mundo, junto com o Mc Donald's e a Coca-Cola, que homogeneízam o gosto dos cidadãos deste planeta (LEFF, 2002), criando uma cultura artificial com produtos prejudiciais à saúde humana e, consequentemente, cultivando de forma irracional e desenfreada, desencadeando um processo caótico na natureza e na própria sociedade, que busca meios artificiais para conter problemas decorrentes do uso excessivo de um bem natural.

Análise centesimal e mineral de alimentos

Quando se fala em análise, seja de qualquer tipo, subentende-se que haverá sempre

avaliações de cunho quantitativo que concomitantemente se seguirá para uma análise qualitativa. Diante disso, vale mencionar que na análise química qualitativa, é verificada a presença ou não de substâncias de interesse, sem importar ao analista a massa ou concentração dele na amostra. Todavia, de acordo com o autor, na análise química quantitativa, é verificado o teor (massa/concentração) do componente que está sendo determinado; assim, uma análise química quantitativa sempre terá como resultado um valor numérico seguido de uma unidade de volume, de massa ou de concentração, enquanto que na avaliação qualitativa haverá apenas a positividade ou não de substância de interesse na amostra (SKOOG, 2006).

Esses tipos de avaliações são de grande valia, principalmente no setor alimentício, porque, de acordo com Brinques (2015), alimentos são formados por um conjunto de diferentes constituintes, que podem ser classificados em substâncias nutrientes ou não nutrientes, que são de interesse social, principalmente por ter estrita relação com a saúde da população e de cada indivíduo que o consome. Até porque, os alimentos funcionais possuem propriedades nutricionais básicas, consumidos em dietas convencionais, demonstram capacidade de regular funções corporais de forma a auxiliar na prevenção de doenças (SOUZA et al., 2003).

Para a população em geral, é de extrema importância o conhecimento da composição que cada alimento, tanto em termos nutricionais, quanto microbiológicos. Dessa forma, as orientações nutricionais se tornam mais palpáveis, além da possibilidade de promover a segurança alimentar e nutricional (NICHELLE, 2018). Diante disso, a Bromatologia busca estudar os componentes químicos, estruturalmente definidos, que compõem os alimentos, com foco nos componentes presentes em grande quantidade (componentes centesimais), cuja concentração seja maior que 1%, por exemplo, água, proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais (VASCONCELOS, 2016).

Em alguns casos mais específicos, faz-se necessária a determinação de componentes individuais nos alimentos como alguns metais (principalmente metais tóxicos como chumbo e mercúrio), açúcares (como a lactose), aminoácidos específicos (fenilalanina e lisina), aflatoxinas entre outros (BOLZAN, 2013). Isso porque, a composição centesimal dos alimentos consiste em reconhecer a disponibilidade dos alimentos e, dessa forma, conhecer as características físico-químicas deles e seus nutrientes (NICHELLE, 2018). Não obstante, de acordo com a referida autora, também demonstra a proporção dos nutrientes em um alimento, sendo cada nutriente expresso na sua proporção em relação a 100 g do produto.

Nichelle (2018), compreende os objetivos da composição centesimal, reconhecer a disponibilidade dos alimentos e as suas características físico-químicas, bem como a composição dos nutrientes e a importância da variedade e da diversidade de alimentos na dieta humana. No

entanto, seu princípio é fornecer valor nutritivo e calórico dos alimentos, haja vista que de posse das análises é possível detectar se o alimento compreende os padrões previstos na legislação. Isso porque, em todo o mundo existem uma gama de alimentos que, nativos ou não, possuem grande importância socioeconômica e enorme potencial de exploração comercial (ROCHA et al., 2012), visto que o Brasil e outros países são detentores de uma vasta biodiversidade e grande extensão territorial (NICHELLE, 2018), destaca-se a importância da realização destas análises.

Consoante, as análises são necessárias para elaboração de programas de nutrição, saúde e educação, e a composição presente em cada alimento permite traçar estratégias nutricionais, principalmente, para contornar problemas decorrentes do excesso ou falta de determinadas substâncias orgânicas e inorgânicas no corpo humano, e até mesmo animal. Exemplo disso, de acordo com Bolzan (2013), é a análise centesimal dos açúcares em geral que estão diretamente atrelados ao desenvolvimento do diabetes, e a importância da análise é para auxiliar nas dietas. No entanto, estudos centesimais de metais pesados tem sua relevância por serem extremamente tóxicos, devendo ser evitados, e por permitir a detecção de existência de contaminação, seja por qualquer fator.

Existem diversos tipos de análises de interesse, seja de açúcares, lipídios, metais pesados, lactose, fenilalanina, lisina e várias outras (BOLZAN, 2013) que permitem o fornecimento de subsídios para o diagnóstico do estado de saúde e nutrição de uma população por meio da avaliação do consumo alimentar (NICHELLE, 2018), bem como para seu tratamento e prevenção de agravos, e é com base nesse teor de nutrientes que se dá a avaliação da dieta, permitindo decidir sobre sua adequação ou inadequação. Porém, no plano individual, o acompanhamento do padrão alimentar é um importante subsídio para o estabelecimento da situação de risco nutricional, determinado, de um lado, por carências específicas e, de outro, por práticas alimentares inadequadas (CECCHI, 2015).

Por outro lado, quando se pretende desenvolver um novo produto alimentício e lançá-lo no mercado, é fundamental submetê-lo a análises de composição centesimal (ROCHA et al., 2012). Com base nas análises de composição centesimal dos alimentos é que são elaboradas as tabelas de composição de alimentos, as quais são vastamente utilizadas em avaliações do consumo de alimentos de indivíduos (NICHELLE, 2018), e que possuem como referências as tabelas de composição de alimentos: a) Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) — 2011; b) Tabela Sonia Tucunduva Philippi — 2013; c) Tabela Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — 2008-2009; d) Tabela de composição química de alimentos (Guilherme Franco).

Por convenção, segundo Nichelle (2018) os grupos homogêneos de substâncias que

constituem os alimentos são: a) Umidade ou voláteis a 105°C; b) Cinzas ou resíduo mineral fixo (RMF); c) Lipídeo, gorduras ou extrato etéreo; d) Proteína bruta ou extrato nitrogenado; e) Carboidratos, glicídios, açúcares ou sacarídeos; e f) Fibras ou substâncias insolúveis. Contudo, vale mencionar que informações sobre a composição centesimal de alguns fitoterápicos são escassas e, muitas vezes, eles são utilizados pela população de modo empírico, sem nenhuma identificação dos constituintes que possam estar envolvidos na eficácia terapêutica (ROCHA et al., 2012).

Entretanto, a composição centesimal não busca analisar apenas as substâncias orgânicas existentes nos alimentos. Elas também podem analisar as características minerais presentes neles, que se referem as substâncias inorgânicas existentes em todos os alimentos, em menor quantidade, mas que exercem a função de constituintes no nosso organismo e são indispensáveis ao processo vital, devendo estar presentes nos alimentos em proporções adequadas. Isso porque, segundo o autor, eles são responsáveis pelo equilíbrio osmótico dos líquidos do organismo e agem na manutenção do equilíbrio acidobásico por assumirem a função do ácido ou das bases, dependendo do alimento, além de serem os responsáveis por dar rigidez aos ossos e dentes (VASCONCELOS, 2016).

Material e Métodos

O presente trabalho buscou realizar uma revisão de literatura acerca da realização de análise centesimal e mineral em alimentos brasileiros, publicados no Google Scholar, entre os anos de 2000 e 2020, com a utilização dos descritores: “alimentos e bromatologia”, “alimentos e centesimal”, “composição mineral de alimentos” e “Brasil”. Obtendo como resultado 1980 trabalhos relacionados. Porém, para utilização neste estudo, foi realizada uma busca de forma aleatória, sendo selecionado 120 artigos científicos publicados em anais brasileiros no período supramencionado, o que equivale a 6,25%.

Com os achados selecionados extraíram-se as informações como: ano de publicação, caracterização do estado físico do alimento estudado pelo texto (se sólido ou se líquido) e origem do alimento (se de origem animal, vegetal ou se ele é industrializado). E, entendendo por alimento industrializado todo aquele que tenha passado por algum processo de transformação que retirou as características básicas e, assim, transformando-o num produto comercial.

As informações obtidas foram dispostas em forma de rol, com caracterização dos dados por ano. Para, a partir de então, serem construídos gráficos que possam promover percepção da

tendência desse tipo de análise. Não obstante, com os dados dispostos em gráficos e tabelas, buscou-se utilizar a técnica dos mínimos quadrados na tentativa de obter uma equação linear que proporcionasse um entendimento matemático mais apurado sobre o comportamento deste tipo de análise na atualidade brasileira

Resultados e Discussão

Dos 120 artigos encontrados no Google Scholar, 89,17% (107/120) se referiram a estudos relacionados a alimentos do tipo sólido, enquanto 10,83% (13/120) se referem a alimentos líquidos. No entanto, desses artigos 27 se relacionavam a alimentos de origem animal, 45 a alimentos de origem vegetal e 50 relativos a alimentos do tipo industrializado, correspondendo ao percentual de 22,5%, 37,5% e 41,67% respectivamente. Contudo, 2 (1,67%) deles apresentaram estudos simultâneos de alimentos com características distintas ou mesmo de origens distintas.

Os estudos sobre alimentos industrializados obtiveram maior preferências entre os autores consultados, ficando, assim, em primeiro lugar no interesse dos atuais pesquisadores. Ficando os alimentos vegetais em segundo lugar de interesse e os de origem animal em último lugar. Todavia, cabe salientar que como o estudo observou uma amostra de 6,06% (120 artigos) dentre todos artigos os disponibilizados no site de busca, deve-se entender que pode haver oscilações no entendimento do tipo de alimento possui maior interesse de estudo de análise centesimal e mineral, fazendo com que os alimentos vegetais e animais possam ganhar maior destaque frente aos alimentos industrializados.

Porém, frente aos dados analisados, pode-se notar que há uma tendência de crescimento do interesse pelos produtos industrializados em comparação com os outros, mas não significam que não haja estudos sobre alimentos de origem animal ou vegetal no decorrer dos anos. Isso porque, de acordo com os dados, existe um crescimento ano a ano de estudos relativos a alimentos industrializados, mesmo que estes ainda possuam oscilações de dados. Porém, o número de estudos da amostra apresentou um pico de 9,1% (11 estudos) de interesse no ano de 2017.

Com a linearização dos dados, pudemos obter a equação linear para alimentos de origem animal $y = 0,0727x - 144,9$ (com medida de ajuste $R^2 = 0,144$); equação linear para alimentos de origem industrial $y = 0,3078x - 616,28$ (com medida de ajuste $R^2 = 0,4708$); e equação linear para alimentos de origem vegetal $y = 0,0273x - 52,675$ (com medida de ajuste $R^2 = 0,0109$), sendo o R^2 uma medida de ajuste relativa a regressão linear (linearização) generalizada feita com os dados extraídos dos artigos.

Observando os coeficientes angulares das equações lineares obtidas (0,0273 para origem vegetal; 0,0727 para origem animal; e 0,3078 para origem industrial), pode-se notar que eles representam a rapidez média de crescimento do interesse por esses tipos de produtos no decorrer dos tempos (TIPLER, 2011). E, por mais que haja oscilações, existe indícios de uma tendência de crescimento como demonstrado pelas equações citadas e descritas nas Figuras 2, 4 e 5. Não obstante, pode-se observar que o interesse prevalece pelos industrializados, que apresenta uma velocidade 4,2 vezes maior que o interesse por produtos de origem animal e 11,2 vezes maior que produtos de origem vegetal.

Ao avaliar a realidade brasileira atual e os artigos selecionados para extração de dados para o presente estudo de revisão em amostra, tem-se o desenvolvimento de novos produtos apresentados ao mercado provenientes de utilização da matéria orgânica geralmente descartada no consumo de alimentos vegetais, o que eram considerados agroresíduos, como a casca de banana, talos e outros componentes vegetais de variados tipos de alimentos do gênero; bem como novas tendências de desenvolvimentos de produtos com vistas a suplementar dietas nutritivas para indivíduos acometidos por alguma doença e até mesmo saudáveis, como farinha de abóbora, farinha de banana, farinha de linhaça e dentre outros.

Além disso, é possível notar que os avanços na agricultura promoveram o desenvolvimento de diversos tipos de alimentos não cultiváveis em determinadas localidades, o que proporcionou uma melhora na disponibilidade de alimentos em determinadas regiões. Porém, não apenas isso se vê uma tentativa de valorização de produtos ou mesmo subprodutos provenientes de recursos vegetais, como produção de geleias a partir da goiaba, da banana ou mesmo de maçã, além de farinhas e outros recursos alimentares disponibilizados para alimentação de diversos tipos de animais.

Não obstante, em virtude da disponibilização de novos produtos no mercado, existe a necessidade, de acordo com as normas brasileiras (mencionadas em seção anterior), de estudo sobre a composição nutricional desses alimentos para determinar a segurança de seu consumo. Entretanto, esses novos produtos demonstram uma corrida por alimentos nutritivos, provenientes de baixa manipulação industrial, que sirvam como solução para a contenção do desenvolvimento de doenças crônicas na população, principalmente por excesso de açúcar e sal em alimentos industrializados. Mas que, sem esquecer, os estudos de composição centesimal e mineral de alimentos servem como propósito não apenas para determinação da segurança alimentar, mas para informar à população que o consome sobre sua composição.

Figura 1. Disposição dos dados segundo a origem alimentar.

Fonte: Própria (2020).

Figura 2. Linearização dos dados relativos à origem alimentar proveniente de animal.

Animal

Fonte: Própria (2020).

Figura 3. Disposição dos dados segundo estado físico do alimento.

Industrializado

Fonte: Própria (2020).

Figura 4. Linearização dos dados relativos à origem alimentar proveniente de industrializados.

Fonte: Própria (2020).

Figura 5. Linearização dos dados relativos à origem alimentar proveniente de vegetal.

Fonte: Própria (2020).

Diante disso, pode-se dizer que entre os anos de 2010 a 2020, o crescimento dos produtos advindos de alimentos típicos e exóticos (o que confere uma ideia de exclusividade a depender do tipo de acesso que se tem a esse novo tipo de alimento disponibilizado no mercado, promovendo até mesmo a ideia de status) vem crescendo e são objetos de estudos pelos diversos pesquisadores na área de alimentos. Porém, conforme a Figura 3, pode-se observar que o estudo sobre alimentos em estado sólido é superior aos estudos de alimentos líquidos.

Esse fato pode evidenciar que a produção de alimentos em estado sólido é o mais preferido para ser consumido por toda a sociedade ou, ainda, que os alimentos em estado líquido são de menor interesse para estes tipos de estudos, seja por existirem em menor quantidade quando comparado aos alimentos sólidos, seja por baixo interesse industrial para desenvolvimento de novos alimentos nesse estado físico. Todavia, como pode-se notar pela linearização dos dados o crescimento de estudos relacionados a alimentos em estado sólido vem crescendo com uma rapidez de 8,7 vezes se comparado com os alimentos em estado líquido.

A equação linear $y = 0,3623x - 723,2$ representa o crescimento de estudos em torno dos alimentos sólidos, de todos os tipos de origem, e que possui uma variação estatística para o modelo apresentado de $R^2 = 0,496$; enquanto a equação linear $y = 0,0416x - 82,913$ descreve o

comportamento de estudos relacionados a alimentos líquidos, também provenientes de qualquer tipo de origem, e possuindo uma oscilação estatística para o modelo apresentado em torno de $R^2 = 0,1027$. Infelizmente, com os dados, nota-se que os alimentos em estado líquido são de menor interesse, porém são os de maior propensão e facilidade para ocorrência de fraudes e adulterações. Ou, ainda, os alimentos líquidos são menos lançados no mercado em comparação com sólidos.

Conclusões

Ante o exposto, pode-se dizer que nos últimos anos, entre 2000 e 2020, o crescimento dos produtos advindos de alimentos típicos e exóticos vem crescendo – o que conferem uma ideia de exclusividade a depender do tipo de acesso que se tem a esse novo tipo de alimento disponibilizado no mercado (promovendo até mesmo a ideia de status) - e são objetos de estudos pelos diversos pesquisados na área de alimentos para produzir dados que informem as composições nutricionais, a comprovação da segurança alimentar, do alimento.

Ainda, que os produtos industrializados, mesmo que minimamente, vem crescendo no Brasil e vem ganhando cada vez mais atenção no meio científico porque estão também ganhando os olhares da população. Além do mais, é notado há ainda uma quantidade de trabalhos envolvendo avaliação da composição centesimal e mineral de matrizes alimentares com cultivo de origem orgânica é pequeno, podendo ser considerada uma área promissora para o desenvolvendo de novas pesquisas.

Referências

ADL, S.; IRON, D.; KOLOKOLNIKOV, T. A threshold area ratio of organic to conventional agriculture causes recurrent pathogen outbreaks in organic agriculture. **Science of the Total Environment**, Amsterdam, v.409, p.2192–2197, 2011.

ASSIS, R.L.; ROMEIRO, A.R. Agroecologia e agricultura orgânica: controvérsias e tendências. **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, Curitiba, n.6, p.67-80, 2002.

ASSIS, R. L.; ROMEIRO, A. R. Agroecologia e agricultura orgânica: controvérsias e tendências. **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, n. 6, p. 67-80, jul./dez. 2002. Editora UFPR.

AZEVEDO, Elaine de; PELICIONI, M. C. F. Promoção da Saúde, Sustentabilidade e Agroecologia: uma discussão intersectorial1 Health Promotion, Sustainability and Agroecology: an intersectoral discussion. **Saúde Soc.** São Paulo, v.20, n.3, p.715-729, 2011

BEARDSWORTH, A.; KEIL, T. **Sociology on the menu**. London: Routledge, 1997.

BOLZAN, Rodrigo Cordeiro. **Bromatologia**. – Frederico Westphalen: Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, 2013.

CONTERATO, M. A. e FILIPI, E. E. **Teorias do Desenvolvimento**. SEAD. Editora UFRGS. 2009.

CECCHI, H. M. **Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos**. 2. ed. Campinas: Unicamp, 2015.

DAROLT, Moacir; RODRIGUES, Anibal; NAZARENO, Nilceu; BRISOLLA, Airton; RUPPEL, Osvaldo. **Análise comparativa entre o sistema orgânico e convencional de batata comum**. Disponível em: <
https://www.researchgate.net/profile/Nilceu_Nazareno/publication/266461261_ANALISE_COMPARATIVA_ENTRE_O_SISTEMA_ORGANICO_E_CONVENCIONAL_DE_BATATA_COMUM/links/55d1ecbb08ae95c3504d626c/ANALISE-COMPARATIVA-ENTRE-O-SISTEMA-ORGANICO-E-CONVENCIONAL-DE-BATATA-COMUM.pdf>. Acesso em: 24 de Julho de 2020.

DIAZ, R.J.; ROSENBERG, R. Spreading dead zones and consequences for marine ecosystems. **Science, Nova York**, v.321, p.926-929, 2008.

FREITAS, Janierk Pereira de; MEDEIROS, Monalisa Cristina Silva; SILVA, José Adailton Lima; Freitas, Francisco Eduardo de; NETO, Manoel Ferreira da Silva. **Agroecologia como alternativa para mudanças de um estilo de agricultura convencional para uma agricultura de base familiar: o caso do assentamento Santo Antônio no município de cajazeiras-pb**. CAMPO-TERRITÓRIO: revista de geografia agrária, v. 9, n. 17, p. 436-468, abr., 2014.

KAMIYAMA, A.; MARIA, I.C.; SOUZA, D.C.C.; SILVEIRA, A.P.D. Percepção ambiental dos produtores e qualidade do solo em propriedades orgânicas e convencionais. **Bragantia, Campinas**, v.70, n.1, p.176-184, 2011.

LEFF, Enrique. Agroecologia e saber ambiental. **Agroecol.e Desenv. Rur. Sustent.**, Porto Alegre, v.3, n.1, jan./mar.2002.

MARIANI, C. M.; HENKES, J. A. Agricultura orgânica x agricultura convencional soluções para minimizar o uso de insumos industrializados. **R. gest. sust. ambient.**, Florianópolis, v. 3, n. 2, p. 315-338, out. 2014/mar. 2015.

MOREIRA, R. M.; CARMO, M. S. Agroecologia na construção do desenvolvimento rural sustentável. **Agric. São Paulo**, São Paulo, v. 51, n. 2, p. 37-56, jul./dez. 2004.

NEVES, M. C. P. et al. **Agricultura Orgânica: uma estratégia para o desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis**. Rio de Janeiro: EDUR, 2004.

NICHELE, Priscila Gharib. **Bromatologia**. – Porto Alegre: SAGAH, 2018.

NODARI, R. O.; GUERRA, M. P. **A agroecologia: estratégias de pesquisa e valores**. Estudos avançados 29 (83), 2015.

PADUA, J. A. (Org.) **Seminário preparatório ao Encontro Nacional de Agroecologia**. Rio de Janeiro, 27 e 28 de julho de 2001. Rio de Janeiro, agosto de 2001.

PIGNATI, W. **Não existe uso seguro de agrotóxicos**. Disponível em: <<http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/44972-nao-existe-uso-seguro-de-agrotoxicos-entrevista-especial-com-wanderlei-pignati>>. Acesso em: 27 de junho de 2020.

RICCI, Marta dos Santos Freire; ARAÚJO, Maria do Carmo Fernandes; CASTRO, Cristina Maria de. **Cultivo orgânico do café: recomendações técnicas** - Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2002.

ROCHA, Denise Alvarenga; ABREU, Celeste Maria Patto De; SOUSA, Raimundo Vicente De; CORRÊA, Angelita Duarte. Método de obtenção e análise da composição centesimal do polvilho da fruta-de-lobo. **Rev. Bras. Frutic.**, Jaboticabal - SP, v. 34, n. 1, p. 248-254, março 2012.

SEAB/DERAL. **Preços Médios Mensais Recebidos pelos Produtores**. Disponível em: <<http://www.pr.gov.br/seab/deral>>. Acesso em: 23 de Julho de 2020.

SEVILLA, E. Agroecología y desarrollo rural sustentable: una propuesta desde Latinoamérica (mimeo). In: SARANDON, Santiago (Ed.) **Agroecología: el camino para una agricultura sustentable**. Rosario, 2000.

STOTZ, E. N. Os limites da agricultura convencional e as razões de sua persistência: estudo do caso de Sumidouro, RJ. **Rev. bras. Saúde ocup.**, São Paulo, 37 (125): 114-126, 2012.

TOLEDO, V.M. et al. **La producción rural en México: alternativas ecológicas**. México: Fundación Universo Veintiuno, 1989.

VASCONCELOS, V. G. **Bromatologia**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

CAPÍTULO 16: QUALIDADE AGROINDUSTRIAL DE CANA-DE-AÇÚCAR EM FUNÇÃO DA APLICAÇÃO DE ESCÓRIA SIDERÚRGICA E GESSO

CHAPTER 16: AGROINDUSTRIAL QUALITY OF SUGARCANE AS FUNCTION OF STEEL SLAG AND GYPSUM APPLICATIONS

Paulo Ricardo Aprício Clemente¹; Laurício Endres²; José Miguel da Silva Neto³; Vinicius Santos Gomes da Silva⁴

Resumo

O gesso mineral e a escória de siderúrgica podem atenuar os efeitos da acidez do solo em profundidade, favorecendo o desenvolvimento das raízes da cana-de-açúcar, resultando em incrementos no crescimento e produtividade do canavial, e possivelmente na qualidade agroindustrial da lavoura. Ante ao exposto, avaliou-se neste estudo, a associação de corretivos de acidez do solo na qualidade agroindustrial da RB92579 no ciclo de cana-planta. O experimento foi conduzido em condições de campo, utilizando-se delineamento em blocos ao acaso, no esquema fatorial 4 x 4, com quatro repetições. Os tratamentos consistiram da combinação de quatro doses de escória de siderurgia (0, 4, 8 e 16 t ha⁻¹) e quatro doses de gesso (0, 3, 6 e 12 t ha⁻¹). Por ocasião de maturação da cana foi avaliada a qualidade agroindustrial da cana por meio da determinação do teor de fibras, sacarose aparente (Pol), sólidos solúveis (Brix), pureza e PCC (Pol da cana corrigida). A aplicação isolada ou em conjunto de escória de siderúrgica e gesso mineral não influenciou a qualidade agroindustrial da RB92579, que por sua vez, apresentou em média 12; 14; 84, 30 e 15,11% de Fibras, Pol, pureza, Brix e PCC, respectivamente.

Palavras-Chaves: correção do solo, sacarose aparente, *Saccharum officinarum*, sólidos solúveis.

Abstract

Mineral gypsum and steel slag can attenuate the effects of soil acidity in depth, favoring the development of the root system of sugar cane, resulting in increases in the growth and productivity of the cane field, and possibly in the agro-industrial quality of the crop. In view of the above, the association of soil acidity correctives in the agro-industrial quality of RB92579 in the cane-plant cycle was evaluated in the present study. The experiment was carried out under field conditions, using a randomized block design, in a 4 x 4 factorial scheme, with four replications. The treatments consisted of the combination of four doses of steel slag (0, 4, 8 and 16 t ha⁻¹) and four doses of plaster (0, 3, 6 and 12 t ha⁻¹). At the time of cane maturation, the agroindustrial quality of the cane was evaluated by determining the fiber content, apparent sucrose (Pol), soluble solids (Brix), purity and PCC (corrected cane pol). The isolated or combined application of steel slag and mineral plaster did not influence the agroindustrial quality of RB92579 in the cane-plant cycle. On average, it presented 12; 14; 84, 30 and 15.11% Fibers, Pol, purity, Brix and PCC, respectively.

Keywords: soil correction, saccharose apparent, *Saccharum officinarum*, soluble solids.

¹ Doutor em Produção Vegetal. Professor do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas, pauloclemente_645@hotmail.com

² Doutor em Ciências Biológicas. Professor do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas, lauricioendres@hotmail.com

³ Discente de Agronomia, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, josemiguelifpe@gmail.com

⁴ Doutor em Ciência do Solo, Universidade Federal Rural de Pernambuco, vinicius.agro2008.1@gmail.com

Introdução

A cana-de-açúcar é uma das mais importantes culturas energéticas do mundo, tendo o melhor rendimento energético líquido entre elas (WACLAWOVSKY et al., 2010). Nos últimos anos, está ganhando interesse global como matéria-prima para produção de biocombustíveis devido ao seu equilíbrio de energia ser potencialmente positivo (SMEETS et al., 2009; LOSORDO et al., 2016). Globalmente, o Brasil destaca-se como o principal produtor, cujo sistema produtivo é um dos mais competitivos do mundo, devido principalmente ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia nacionais para a produção de cana, extração e industrialização do caldo, uso dos resíduos sucroalcooleiros na adubação dos canaviais e geração de energia elétrica (OLIVEIRA et al., 2015; SANTOS et al., 2016; SILVA et al., 2017)

Apesar do cenário promissor, atualmente a canavicultura, especialmente no Nordeste do Brasil, enfrenta séria crise agrícola e industrial, marcada por baixo rendimento dos canaviais. O estado de Alagoas, por exemplo, que é o maior produtor da região, tem uma produtividade média de colmos inferior a 60 t ha^{-1} (CONAB, 2020), bem abaixo do potencial biológico da cultura (LANDELL; BRESSIANI, 2008).

As reduzidas produtividades no Nordeste, estão relacionadas principalmente a distribuição sazonal irregular das chuvas (ABREU et al., 2013; SILVA et al., 2013a; SILVA et al., 2013b) e acidez acentuada nos solos (CLEMENTE et al., 2017). Nos Tabuleiros costeiros ocorre deficiência hídrica na primavera-verão (SOUZA et al., 2004), isso resulta em falta de água em grande parte do período de crescimento da planta. Outro fato que contribui para o baixo rendimento, são os efeitos de acidez do solo ligados à presença de Al^{+3} em concentrações tóxicas, além dos baixos teores de cátions de caráter básico, como Ca^{+2} , Mg^{+2} e K^{+} principalmente nas camadas subsuperficiais do solo (CLEMENTE et al., 2018).

Os corretivos de acidez como calcários, escória de siderurgia e gesso, são alternativas que minimizam essas limitações na cana-de-açúcar. O uso de calcário neutraliza a acidez na camada superficial do solo além de fornecer nutrientes essenciais como o Ca e Mg. A escória de siderurgia apresenta resultados iguais e até superiores ao uso de calcários, além de apresentar uma solubilidade mais alta e ser fonte de silício (PRADO et al., 2001; PRADO et al., 2003; BRASSIOLI et al., 2009). Em estudo econômico entre a escória de siderurgia e calcário na cana-de-açúcar durante cinco ciclos, Prado e Fernandes (2010) concluíram que a escória proporciona maior retorno econômico e aumenta para mais um ciclo o canavial tratado com esse corretivo.

Outro insumo agrícola utilizado para mitigar o efeito do estresse hídrico é o gesso. O gesso melhora a distribuição das raízes em profundidade e propicia às plantas o aproveitamento

de maior volume de água e nutrientes, principalmente em épocas de estiagem (CLEMENTE et al. 2017). Estudos indicam que o gesso tem proporcionado o aprofundamento das raízes, resultando em maior crescimento e produtividade da cana-de-açúcar (FREIRE et al. 2007; ROCHA et al., 2008), com possíveis efeitos positivos na qualidade agroindustrial da lavoura.

Diante do exposto, objetivou-se neste estudo avaliar a qualidade agroindustrial da cana-de-açúcar, variedade RB92579, em função da aplicação de escória siderúrgica e gesso.

Material e Métodos

Localização e caracterização da área experimental

O experimento foi conduzido em campo, localizado no município de São Luiz do Quitunde (9°22'S e 35°32'W), Zona da Mata de Alagoas, Brasil (Figura 1), cujo clima conforme a classificação de Koppen, se caracteriza como tropical chuvoso, com verões secos. A precipitação média anual local é de 2.220 mm, porém durante o ensaio, a precipitação acumulada foi 1.700 mm e a temperatura média 27,5°C.

Figura 1. Localização da área experimental

Fonte: Própria (2020).

O solo da área experimental foi classificado como Neossolo Flúvico (EMBRAPA, 2013). Antes da instalação do estudo foi realizada a amostragem de solo nas camadas de 0 a 20 cm, 20 a 40 cm e 40 a 60 cm para a caracterização química (Tabela 1). Todas as análises foram realizadas conforme metodologias descritas pela Silva (2009).

Tabela 1 - Caracterização química do solo da área em que foi instalado o experimento.

Característica		Profundidade (cm)		
		0-20	20-40	40-60
pH	CaCl ₂	5,20	4,8	4
M.O.	g dm ⁻³	20,0	13	11
P _{resina}	mg dm ⁻³	12,0	8	1
Al ³⁺	mmolc dm ⁻³	1,00	2	10
H+Al	mmolc dm ⁻³	25,0	31	35
K	mmolc dm ⁻³	1,70	1,4	0,9
Ca	mmolc dm ⁻³	19,0	18	6
Mg	mmolc dm ⁻³	9,0	6	2
SB	%	29,0	26	9
CTC	%	54,0	57	64
Bo	mg dm ⁻³	0,42	0,59	0,62
Cu	mg dm ⁻³	1,4	0,9	0,2
Fe	mg dm ⁻³	48	45	46
Mn	mg dm ⁻³	0,4	0,3	0,2
Zn	mg dm ⁻³	0,4	0,2	0,1

Fonte: Própria (2020).

Desenho experimental e implantação do ensaio

O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições, sob esquema fatorial 4 x 4, constituído pela combinação de quatro doses de escória de siderurgia (0, 4, 8 e 16 t ha⁻¹) e quatro doses de gesso (0, 3, 6 e 12 t ha⁻¹) (Quadro 1). As parcelas foram constituídas de cinco sulcos de 10 metros de comprimento, espaçados de 1 m, sendo a área útil representada pelos três sulcos centrais com 8 m de comprimento (descartou-se 1m de cada extremidade), totalizando 24 m².

O solo foi preparado usando uma grade pesada para destruir os resíduos da cultura, seguido de nivelamento e abertura dos sulcos. As doses de escória siderúrgica foram uniformemente aplicadas no fundo do sulco, a uma profundidade de aproximadamente 20 cm, ao longo de um comprimento de 10 m. O gesso, por sua vez, foi aplicado em cobertura na área total, quando os sulcos já se encontravam fechados. Optou-se pela variedade RB92579 utilizando uma densidade de plantio de 15 rebolos m⁻¹, a escolha deste genótipo deveu-se a sua elevada adaptabilidade, produtividade e representatividade que possui no Brasil (SILVA et al. 2017).

Todas as parcelas receberam 700 kg ha⁻¹ da fórmula 14-00-18 (sulfato de amônio - 20% de N e cloreto de potássio - 58% de K₂O). O controle manual de plantas daninhas foi realizado apenas até 30 dias após o surgimento da brotação. A irrigação (30 mm) foi realizada aos 2 e 20

dias após o início do experimento.

A fonte de escória de siderurgia adotada foi a do Agro Silício, derivado da produção de aço inox. Esse produto é utilizado como padrão na maioria das pesquisas relacionadas ao Silício no Brasil devido ao seu alto grau de pureza e solubilidade (KORNDÖRFER et al. 2002).

O silício utilizado no experimento foi classificado como dolomítico e as porcentagens passantes nas peneiras ABNT 10, ABNT 20 e ABNT 50 foram 100, 99,9 e 71,4 respectivamente. A caracterização físico-química da escória de siderurgia é apresentada na Tabela 2.

Quadro 1. Tratamentos utilizados no experimento

Sigla	Dose de gesso ($t\ ha^{-1}$)	Dose de escória de siderurgia ($t\ ha^{-1}$)
Testemunha	0	0
G (3)	3	0
G (6)	6	0
G (12)	12	0
E (4)	0	4
E (4) + G (3)	3	4
E (4) + G (6)	6	4
E (4) + G (12)	12	4
E (8)	0	8
E (8) + G (3)	3	8
E (8) + G (6)	6	8
E (8) + G (12)	12	8
E (16)	0	16
E (16) + G (3)	3	16
E (16) + G (6)	6	16
E (16) + G (12)	12	16

Fonte: Própria (2020).

O gesso utilizado no experimento foi de origem mineral proveniente de jazidas de gipsita ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) do polo gesseiro do Araripe em Pernambuco. A caracterização do gesso, apresentou 45,86% de CaO , 20,30% de S e 19,18% de umidade em sua composição de acordo com a metodologia descrita por Korndörfer et al. (2004).

Avaliação da qualidade agroindustrial

Por ocasião da maturação da cana, 14 meses após o plantio, foram amostradas aleatoriamente a parte aérea de 8 plantas na área útil de cada parcela, as canas foram despontadas e despalhadas, e encaminhadas para o laboratório Agroindustrial da Usina Santo

Antônio em São Luís do Quitunde/AL. As amostras foram passadas em forrageira, e na sequência foram coletadas subamostras para determinação dos atributos tecnológicos da cana-de-açúcar, de acordo com a metodologia de Fernandes (2011). As subamostras foram submetidas à prensa hidráulica automática, sob pressão de 250 kg cm^{-2} , durante 1 min, em seguida o caldo foi coletado. No caldo, foram quantificados os sólidos solúveis totais (°Brix) com refratômetro digital, e a percentagem de sacarose aparente (Pol) que foi obtida por meio de sacarímetro. A pureza foi determinada pela quantidade de sacarose contida nos sólidos solúveis. Foram determinados ainda percentagem de fibra e a percentagem de sacarose no colmo (PCC), de acordo com as equações descritas em Fernandes (2011).

Tabela 2. Caracterização química e física da escória siderúrgica. PN: poder de neutralização; RE: reatividade; PRNT: poder relativo de neutralização total.

Si Total	Si Solúvel	CaO	CaCO ₃	MgO	MgCO ₃	PN	RE	PRNT
%								
13,81	7,82	39,8	70,8	9,7	20,4	87,5	88,5	77,4

PN: Poder de Neutralização; RE: Reatividade; PRNT: Poder Relativo de Neutralização Total.

Fonte: Própria (2020).

Análise de dados

Os resultados de sólidos solúveis totais, sacarose aparente no caldo, pureza do caldo, percentagem de fibra, e de sacarose aparente no colmo (PCC) foram submetidas a análise de variância a 5% de probabilidade pelo teste F, utilizando o programa SISVAR (FERREIRA et al., 2011).

Resultados e Discussão

Não houve diferença estatística significativa pelo teste F ($P > 0,05$) para os atributos tecnológicos (Brix, Pol, Pureza, Fibra e PCC) da RB92579 em função dos tratamentos (Tabela 3). A falta de resposta da cana-de-açúcar à aplicação de corretivos no solo para tais características tecnológicas foi também observada por Prado (2001), Lima et al. (2010) e Carvalho et al. (2013).

Tendo em vista que a escória de siderurgia e o gesso, consistem em materiais corretivos que podem apresentar efeito residual prolongado, é possível que nas rebrotas, as parcelas que tiveram a correção do solo evidenciem diferenças significativas quando comparadas as parcelas que não receberam a aplicação de gesso e escória. Prado et al. (2003) verificaram que a escória de siderurgia promoveu efeito residual benéfico, após 48 meses da aplicação, na correção da acidez do solo e na elevação do valor da saturação por bases, o que resultou em aumentos na produção da soqueira da cana-de-açúcar.

Tabela 3. Análise de variância dos atributos de qualidade agroindustrial da RB92579 em função da escória de siderurgia e do gesso.

	Brix	Pol	Pureza	Fibra	PCC
Escória de siderurgia (A)	ns	ns	Ns	ns	ns
Gesso (B)	ns	ns	Ns	ns	ns
Interação (A x B)	ns	ns	Ns	ns	ns
Média (%)	21,04	18,21	86,39	13,10	15,11
CV (%)	4,98	6,33	4,92	3,32	6,32

Fonte: Própria (2020).

O percentual de sólidos solúveis no caldo da RB92579 oscilou de 19,63% (8 t ha⁻¹ de escória de siderurgia) a 21,68% (parcelas que receberam aplicação de 3 t ha⁻¹ de gesso), contudo essa diferença não foi significativa ($P>0,05$) e as plantas em média apresentaram 21,04 % de sólidos solúveis no caldo (Figura 2). Silva et al. (2017) avaliaram a qualidade tecnológica de quatro variedades de cana (RB92579, RB867515, SP813250 e VAT90212) cultivadas em um Latossolo Amarelo e obtiveram valores 14% inferiores aos observados no presente estudo. Resultados semelhantes ao presente trabalho foram observados por Oliveira et al. (2011), que obtiveram para 11 variedades cultivadas em um Argissolo Amarelo um teor médio de Brix de aproximadamente 21% e por Silva et al. (2014) em estudo conduzido com a RB92579 na Zona da Mata de Pernambuco que verificaram 20,23% para o ciclo de cana-planta e 21,20% na primeira rebrota. Conforme Fernandes (2011) o Brix é um atributo largamente utilizado no setor sucroenergético, expressa o percentual em peso dos sólidos solúveis contidos no caldo da cana-de-açúcar e constitui de 18-25% do total do caldo.

A semelhança dos sólidos solúveis, o percentual de sacarose aparente no caldo da RB92579 apresentou uma tendência de valores mais elevados (19,03%) quando foi aplicado gesso na dose de 3 t ha⁻¹ (Figura 3). Em média foi observado um percentual de 18,21%. Pancelli et al. (2015) verificaram um teor médio de sacarose aparente de 20%, portanto superior aos verificados neste estudo. Oliveira et al. (2017) constataram no caldo da RB92579, no ciclo de cana-planta, um conteúdo de sacarose aparente no caldo da ordem de 18%, semelhante ao obtido na presente pesquisa. Clemente et al. (2018) em ensaio conduzido em São Luís do Quitunde/AL, constataram que a RB92579 evidenciou maior percentual de sacarose aparente do caldo (19,75%), quando comparado com as variedades RB991536 (18,85%) e RB011941 (17,80%). Calheiros et al. (2012) em trabalho conduzido em um Latossolo Amarelo, no município de Rio Largo, AL, verificaram que a RB92579 possui aproximadamente 16% a mais de sacarose aparente que a RB867515.

Figura 2. Percentual de sólidos solúveis no caldo da RB92579 em função de doses de escória de siderurgia e gesso

Fonte: Própria (2020).

Figura 3. Percentual de sacarose aparente no caldo da RB92579 em função de doses de escória de siderurgia e gesso

Fonte: Própria (2020).

De acordo com Fernandes (2011), a Pol constitui a percentagem aparente de sacarose contida no caldo da cana, sendo determinada por métodos sacarimétricos ou polarimétricos, é um atributo que indica o grau de maturação da cana, de modo que quanto maior o seu percentual mais avançado é o estágio de maturação. Quando a cana-de-açúcar está imatura apresenta

quantidades elevadas de açúcares redutores e compostos precursores de cor que afetam negativamente a sacarose aparente. É uma importante variável da qualidade agroindustrial do canavial, que é influenciada principalmente pelos genótipos cultivados, partes da planta e épocas de colheita (PEREIRA et al., 2017).

Com relação a pureza do caldo da cana-de-açúcar a amplitude de variação foi de 81,12% a 89,01% (Figura 4), que por sua vez, não foi suficiente para ser verificado diferença estatística significativa. O teor médio verificado foi 86,39%. Clemente et al. (2018) em estudo conduzido na Usina Santo Antônio, na Zona da Mata de Alagoas, verificaram que os genótipos RB92579, RB991536 e RB011941 não diferem quanto a pureza do caldo, apresentando em média 88% no ciclo de cana-planta. Albuquerque et al. (2016) em experimento instalado em Penedo/AL avaliaram a qualidade tecnológica da RB92579 submetida a diferentes fontes e formas de aplicação de fósforo e obtiveram em média 89% de pureza aparente. Oliveira et al. (2017) constataram que no ciclo de cana planta, não houve diferença estatística entre as variedades RB98710, RB92579 e a RB921552, que apresentaram um valor médio de 87,15%, no ciclo de cana-planta a RB92579 foi a variedade que apresentou maior pureza com 88,75%, sendo 1,6% maior que a média das demais variedades.

Oliveira et al. (2012) menciona que a pureza do caldo está diretamente relacionada com a qualidade da matéria prima, e sofre influência das impurezas minerais e vegetais que são adicionadas à cana no momento da colheita. É um atributo que representa a quantidade de sacarose contida nos sólidos solúveis. Sendo um importante indicador da maturidade da cana-de-açúcar; quanto mais madura, maior o acúmulo de sacarose e consequentemente maior a pureza (LAVANHOLI et al., 2008). Conforme as normas estabelecidas pelo Consecana (2006) as usinas só podem recusar o recebimento de cana com menos de 75% de pureza. Oliveira et al. (2012) citam que no Estado de São Paulo, tem-se, como referência, pureza mínima de 80% em início de safra e 85% no transcorrer da safra para que seja recomendada a industrialização da cana.

Com relação a fibra (Figura 5), constatou-se valores que variaram de 12,83% (no tratamento 8 t ha⁻¹ de escória mais 6 t ha⁻¹ de gesso) a 13,67% (tratamento com 8 t ha⁻¹ de escória mais 12 t ha⁻¹ de gesso), mas sem diferenças significativas. Em média a RB92579 apresentou um percentual de fibras de 13,10% (Tabela 3). Simões et al. (2015), em estudo de avaliação da resposta de variáveis fisiológicas e tecnológicas da RB92579 sob diferentes sistemas de manejo de irrigação em três ciclos, obtiveram para fibra valores médios de 13,8; 14,9; e 16,6% para cana-planta, primeira e segunda, rebrota, respectivamente, para estes mesmos ciclos Silva et al. (2017) encontraram 12,96; 13,73 e 14,62%.

Figura 4. Percentual de pureza no caldo da RB92579 em função de doses de escória de siderurgia e gesso.

Fonte: Própria (2020).

A fibra corresponde um atributo de grande importância para o setor sucroenergético. Sob o aspecto agrícola, os genótipos que evidenciam maior quantidade de fibras são mais resistentes à entrada de pragas no colmo, e frequentemente são mais resistentes ao tombamento, mesmo quando submetidas a queima antes da colheita. Além disso, reflete na eficiência da extração da moenda, ou seja, quanto mais elevado o percentual de fibra da cana, menos eficiente será extração. Por outro lado, é importante destacar que genótipos com reduzidos percentuais de fibra são mais sujeitos a danos mecânicos provocados no corte e transporte, o que contribui para a contaminação e as perdas industriais (LAVANHOLI et al., 2008; PRADO et al., 2017).

O percentual de sacarose aparente na cana (PCC) oscilou de 14,16% (quando aplicado 8 t ha⁻¹ de escória de siderúrgica) a 15,78% (aplicação de 3 t ha⁻¹ de gesso mineral) (Figura 6). Em média a RB92579 apresentou 15,10% de PCC. Costa et al. (2011) constataram para esse mesmo genótipo 14,30%, semelhante aos valores médios (14,35%) observados por Albuquerque et al. (2016).

Figura 5. Percentual de fibra da RB92579 em função de doses de escória de siderurgia e gesso.

Fonte: Própria (2020).

Figura 6. Percentual de sacarose na cana da RB92579 em função de doses de escória de siderurgia e gesso.

Fonte: Própria (2020).

Conclusões

A aplicação isolada ou em conjunto de escória de siderurgia e gesso mineral não influenciou a qualidade agroindustrial da RB92579 no ciclo de cana-planta.

Referências

ABREU, M. L. et al. Crescimento e produtividade de cana-de-açúcar em função da disponibilidade hídrica dos Tabuleiros Costeiros de Alagoas. **Bragantia**, v. 72, n. 3, p. 262-

270, 2013.

ALBUQUERQUE, A. P. C. et al. Seleção de cultivares de cana-de-açúcar para a Zona da Mata Norte de Pernambuco II: Meio de safra. **Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável**, v. 11, n. 1, p. 10, 2016.

ALBUQUERQUE, A. W. et al. Growth and yield of sugarcane as a function of phosphorus doses and forms of application. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**. v.20, n.1, p. 29-35, 2016.

AZEVEDO, D. M. P. et al. In: AZEVEDO, D. M. P.; LIMA, E. F. (Ed.). **O agronegócio da mamona no Brasil**. Campina Grande: Embrapa Algodão; Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2001. p. 121-160.

BRASSIOLI, F. B. et al. Avaliação agrônômica da escória de siderurgia na cana-de-açúcar durante cinco ciclos de produção. **Bragantia**, v. 68, p.381-387, 2009.

CALHEIROS, A. S. et al. Production of biomass, from sugar and protein in function of sugarcane varieties and phosphorous fertilization. **Semina Ciências Agrárias**, v. 33, n. 2, p. 809-818, 2012.

CARVALHO, J. M. et al. Unburned ratoon sugarcane yield according to gypsum and vinasse doses. **Pesquisa Agropecuária Tropical**, v. 43, n. 1, p. 1-9, 2013.

CLEMENTE, P. R. A.; SILVA, V. S. G.; FERREIRA, V. M.; VIEIRA, J.; SILVA, G. V. S. B.; ENDRES, L. Nutritional status and technological quality of sugarcane due to increasing gypsum doses. **Australian Journal of Crop Science**, Canberra, v.12, n.9, p.1504-1511, 2018.

CLEMENTE, P. R.; BEZERRA, B. K. L.; SILVA, V. S. G.; SANTOS, J. C. M.; ENDRES, L. Root growth and yield of sugarcane as a function of increasing gypsum doses. **Pesquisa Agropecuária Tropical**, Goiânia, v. 47, n. 1, p. 110-117, 2017.

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (Conab). **Acompanhamento da safra brasileira: cana-de-açúcar**. Primeiro levantamento. 2020. Disponível em: <http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_04_20_14_04_31_boletim_cana_portugues_-_lo_lev_-_17-18.pdf>. Acesso em: 20 de Maio, 2017.

CONSECANA. **Manual de Instruções**. 5º ed. Piracicaba, Consecana, 2006. 112p.

EMBRAPA. **Sistema brasileiro de classificação de solos**. 3.ed. Brasília: Embrapa, 2013. 353p.

FERNANDES, A. C. **Cálculos na agroindústria da cana-de-açúcar**. 3.ed. Piracicaba: STAB, 2011. 416p.

FERREIRA, D. F. Sisvar: a computer statistical analysis system. **Ciência e Agrotecnologia**. v.35, n.6, p. 1039-1042, 2011.

FREIRE, F. J. et al. Gesso mineral do Araripe e suas implicações na produtividade agrícola da cana-de-açúcar no estado de Pernambuco, Brasil. **Anais da Academia Pernambucana de**

Ciência Agrônômica, v. 4, p. 199-213, 2014.

KORNDÖRFER, G. H. et al. Papel do silício na produção de cana-de-açúcar. **Revista STAB**, v. 21, n. 1, p. 6-9, 2002.

LANDELL, M. G. A.; BRESSIANI, J. A. **Melhoramento genético e manejo varietal**. In: DINARDO-MIRANDA, L.L.; VASCONCELOS, A.C.M.; LANDELL, M.G.A. (Org.). Cana-de-Açúcar. 1 ed. Campinas: Instituto Agrônômico de Campinas, 2008. p. 101-156.

LAVANHOLI, M. G. D. P. **Qualidade da cana-de-açúcar como matéria prima para a produção de açúcar e álcool**. In: DINARDO-MIRANDA, L.L.; VASCONCELOS, A.C.M.; LANDELL, M.G.A. (Org.). Cana-de-Açúcar. 1 ed. Campinas: Instituto Agrônômico de Campinas, 2008 p.697-722.

LIMA, F. H. S. L et al. Produtividade de cana-de-açúcar com a utilização de doses e fontes de gesso em um latossolo no estado de Pernambuco. **Nucleus**, v.7, n.1, p. 1-8, 2010.

LOSORDO, Z. et al. Cost competitive second-generation ethanol production from hemicellulose in a Brazilian sugarcane biorefinery. **Biofuels, Bioproducts and Biorefining**, v.10, n.5, p. 589-602, 2016.

OLIVEIRA, D. C. et al. Stalk productivity and quality of three sugarcane varieties at the beginning, in the middle, and at the end of the harvest. **African Journal of Agricultural Research**. v. 12, n.4, p. 260-269, 2017.

OLIVEIRA, E. C. A. et al. Productivity, water use efficiency, and technological quality of sugarcane subjected to different water regimes. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v.46, n.6, 617-625, 2011.

OLIVEIRA, F. M. et al. Avaliação tecnológica de variedades de cana-de-açúcar influenciadas por diferentes adubações e supressões de irrigação. **Revista Ceres**, v. 59, n. 6, p. 832-840, 2012.

OLIVEIRA, M. W. et al. Produção e qualidade de três variedades de cana-de-açúcar cultivadas no Nordeste de Minas Gerais. **Ciência Agrícola**, v. 12, p. 17, 2015.

PANCELLI, M. A et al. Growth, yield and nutrition of sugarcane ratoon as affected by potassium in a mechanized harvesting system. **Australian Journal of Crop Science**. v. 9, n.10, p. 915-924, 2015.

PEREIRA, L. F.M. et al. Sugars levels of four sugarcane genotypes in different stem portions during the maturation phase. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v. 89, n. 2, p. 1231-1242, 2017.

PRADO, E. A. F. et al. Características tecnológicas da cana-de-açúcar sob aplicação de doses de vinhaça em Latossolo Vermelho distroférrico. **Revista de Ciências Agroveterinárias**, v. 16, n. 4, p. 386-395, 2017.

PRADO, R. M. et al. Efeito residual da escória de siderurgia como corretivo de acidez do solo na soqueira de cana-de-açúcar. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 27, n. 2, p. 287-

296, 2003.

PRADO, R. M. Qualidades tecnológicas da cana-planta e da cana-soca em função da aplicação da escória de siderurgia e do calcário. **Scientia Agrária**, v. 2, n. 1, p. 61-66, 2001.

PRADO, R. M.; FERNANDES, F. M. Aspecto econômico do uso da escória de siderurgia na cana-de-açúcar durante cinco ciclos de produção. **Terra Latinoamericana**, v. 28, n. 3, p. 273-279, 2010.

ROCHA, A. T. et al. Emprego do gesso do Araripe na melhoria do ambiente radicular da cana-de-açúcar. **Revista Brasileira de Ciências Agrárias**, v. 3, n. 4, p. 307-312, 2008.

SANTOS, L. A. et al. Potencial energético da biomassa de cana-de-açúcar em uma usina sucroenergética. **Revista da Universidade Vale do Rio Verde**, v. 14, p. 1101-1108, 2016.

SILVA, F. C. **Manual de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes**. 2.ed. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica; Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2009. 627p.

SILVA, V. P. R. et al. Risco climático da cana-de-açúcar cultivada na região Nordeste do Brasil. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 17, n. 2, p. 180-189, 2013a.

SILVA, V. P. R. et al. Crop coefficient, water requirements, yield and water use efficiency of sugarcane growth in Brazil. **Agricultural Water Management**, v. 128, p. 102-109, 2013a.

SILVA, V. S. G. et al. Agroindustrial quality in first and second ratoon crops of sugarcane varieties. **Australian Journal of Crop Science**, v. 11, p. 1216-1220, 2017.

SILVA, W. P. et al. Produtividade e qualidade tecnológica da cana-de-açúcar sob diferentes fontes de adubação. **Revista Brasileira de Agricultura Irrigada**, v. 8, n. 6, p. 476-487, 2014.

SIMÕES, W. L. et al. Respostas de variáveis fisiológicas e tecnológicas da cana-de-açúcar a diferentes sistemas de irrigação. **Revista Ciência Agronômica**, v. 46, n. 1, p. 11-20, 2015.

SMEETS, E. M. W.; BOUWMANW, L. F.; STEHFEST, E. VAN VUUREN, D. P; POSTHUMA, A. Contribution of N₂O to the greenhouse gas balance of first generation biofuels. **Global Change Biology**, v. 15, p.1-23, 2009.

SOUZA, J. L. et al. Análise da precipitação pluvial e temperatura do ar na região do tabuleiro costeiro de Maceió, AL, período de 1972-2001. **Revista Brasileira de Agrometeorologia**, Santa Maria, v. 12, n. 1, p. 131-141, 2004.

TEIXEIRA, C. et al. Crescimento e produtividade de quatro variedades de cana-de-açúcar no quarto ciclo de cultivo. **Revista Caatinga**, v. 24, n. 3, p. 56-63, 2011.

WACLAWOVSKY, A. J. et al. Sugarcane for bioenergy production: an assessment of yield and regulation of sucrose content. **Plant Biotechnology Journal**. v. 8, n.3, p. 263-276, 2010.

CHAPTER 17: SIMULTANEOUS DETERMINATION OF ALIPHATIC ORGANIC ACIDS AND AMINO ACIDS IN FLORAL HONEY: ANALYTICAL VALIDATION IN CAPILLARY ELECTROPHORESIS

Greici Bergamo¹; Siluana Katia Tischer Seraglio²; Clara Mariana Gonçalves Lima³; Roseane Fett⁴; Ana Carolina Oliveira Costa⁵

Abstract

Few studies investigated low molecular mass aliphatic organic acids (AOA) and amino acids in honey mainly due to their low concentrations in this product. However, these compounds influence the physical, chemical, sensorial, and biological characteristics of honey and their investigation by validated methods are important to guarantee the veracity of these data. Thus, this study aimed to validate a simultaneous method for determination of 13 AOA and two amino acids in floral honey using a capillary electrophoresis system equipped with diode array detector. The proposed method was validated based on Eurachem and Ministry of Agriculture, Livestock, and Food Supply Guidelines, which showed good results for the evaluated validation parameters: system suitability, limits of detection and quantification, linearity, matrix effect, precision, and accuracy. Also, the Peakmaster[®] software was used to select an appropriate internal standard. The validated method was then employed to determine AOA and amino acids in multifloral honeys, in which citric, glycolic, gluconic, and glutamic acids were quantified in all samples. Therefore, the proposed method can be used in the determination of AOA and amino acids in floral honeys with precision and accuracy ensured.

Keywords: Analytical validation, Capillary electrophoresis, Peakmaster[®], Blossom honey.

INTRODUCTION

Honey is a product produced by bees, mainly by the genus *Apis mellifera*, from the nectar of flowers (floral honey); or from secretions of living parts of plants or excretions of plant-sucking insects (honeydew honey) (EUROPEAN COMMISSION, 2002).

Widely consumed due to its sweet taste and its beneficial health properties (BOBIS et al., 2020; DA SILVA et al., 2016; LUKASIEWICZ; KOWALSKI; MAKAREWICZ, 2015; SERAGLIO et al., 2019; TERZO; MULÈ; AMATO, 2020), many researches have been dedicated to investigate the physicochemical properties and composition of honey, such as carbohydrate contents, free acidity, minerals, proteins, phenolic compounds, low molecular mass aliphatic organic acids (AOA), and amino acids (AZEVEDO et al., 2017a, 2017b; BERGAMO et al., 2018, 2019; BOBIS et al., 2020; KAYGUSUZ et al., 2016; KOWALSKI et al., 2017; SERAGLIO et al., 2016).

However, there are still few studies that investigated AOA and amino acids in honey, and they indicate low concentrations of these constituents, generally around 1% each. Although the small concentrations, these compounds influence the physical, chemical, sensorial, and biological characteristics of honey (DA SILVA et al., 2016; DEL CAMPO et al., 2016; KOWALSKI et al.,

¹ Doutora, Ciências dos Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina, greici.bergamo@hotmail.com

² Pós-doutoranda (CNPq Scholarship - Brazil (160175/2019-4)), Ciências dos Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina, siluanaseraglio@hotmail.com

³ Doutoranda, Ciências dos Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina, claramarianalima@gmail.com

⁴ Professora, Doutora em Química Orgânica, Universidade Federal de Santa Catarina, roseane.fett@ufsc.br

⁵ Professora, Doutora em Química Analítica, Universidade Federal de Santa Catarina, ana.costa@ufsc.br

2017; TEZCAN et al., 2011). Thus, the investigation of these compounds in this food is relevant and the use of a validated method guarantees the veracity of these data.

Several techniques coupled with different detectors can be used to evaluate AOA and amino acids in honey, and, among them, high performance liquid chromatography is applied more frequently (HAROUN et al., 2012; KEKE; CINKMANIS, 2019; KOWALSKI et al., 2017). Still, other studies have used gas chromatography coupled with mass spectrometry (AZEVEDO et al., 2017b; SANZ et al., 2005) and capillary electrophoresis coupled with *diode array detector* (BRUGNEROTTO et al., 2019; MATO et al., 2006b; TEZCAN et al., 2011).

The use of methods based on capillary electrophoresis can be advantageous because it is a versatile analytical technique, capable of detecting compounds with low molar absorption capacity, such as AOA and amino acids, in addition to enabling short-term analysis and simple sample preparation (BRUGNEROTTO et al., 2019; KALJURAND; KOEL, 2011; MATO et al., 2006a). Although this technique shows promising results, the determination of AOA and amino acids by capillary electrophoresis in honeys is very scarce, with few studies exploring this technique (BRUGNEROTTO et al., 2019; MATO et al., 2006b; NAVARRETE et al., 2005; TEZCAN et al., 2011).

Thus, the present study aimed to validate a method for simultaneous determination of AOA and amino acids in floral honey *using a capillary electrophoresis system equipped with diode array detector*.

MATERIAL AND METHODS

Reagents

Ultrapure water (Millipore Corporation, Milli-Q Simplicity® UV system, Saverne, France) was used for all analyses. Cetyl trimethylammonium bromide (CTAB), 3,5-dinitrobenzoic acid, β -alanine, trifluoroacetic acid (IS – internal standard), and analytical standards of AOA and amino acids (maleic, malonic, tartaric, formic, citric, malic, glycolic, lactic, succinic, acetic, propionic, gluconic, glutaric, aspartic, and glutamic acids) were obtained from Sigma-Aldrich (St. Louis, USA), while sodium hydroxide (NaOH) was acquired from Vetec (Duque de Caxias, Brazil).

Instrumentation

Simultaneous determination of AOA and amino acids was performed in a capillary electrophoresis system equipped with diode array detector (Agilent Technologies, 7100, Germany) according to Azevedo et al. (2014), with modifications.

Electrophoretic separation was conducted in an uncoated fused-silica capillary (Polymicro Technologies, Phoenix, USA) of 64.5 cm effective length (73 cm total length) and 75 μm inner diameter at 25 °C. Background electrolyte (BGE) was composed of 21 mmol L⁻¹ β -alanine, 10 mmol

L⁻¹ 3,5-dihydroxybenzoic acid, and 1,5 mmol L⁻¹ CTAB, at pH 3.6. At the beginning of each day, capillary was flushed for 10 min with 1 mol L⁻¹ NaOH, followed by water (10 min) and BGE (15 min), while at the end of each working day, it was rinsed with 1 mol L⁻¹ NaOH followed by water, both for 10 min. Hydrodynamic pressure (+50 mbar for 3 s) was used for the introduction of standards and samples into the capillary by its end furthest from the detector. Separation voltage of -30 kV was applied, and between runs, capillary was flushed by 1 min with BGE. The analytes detection was performed by indirect mode (set at 254 nm, with a reference at 360 nm for peak inversion). Data acquisition and treatment were performed using HP ChemStation software (rev. A.06.01).

Samples

Five multifloral honeys were harvested by local beekeepers in Urubici, Santa Catarina state, Brazil, in 2016. Honeycombs were manually drained in the laboratory and the honey stored at -20 ± 2 °C until analyses.

Before injection into capillary electrophoresis system, the thawed samples (1.0 ± 0.01 g) were diluted with water in a 5 mL volumetric flask. This mixture was centrifugated by 14.000 rpm for 10 min (MiniSpin® Plus, Eppendorf AG, Suffolk, USA) and the supernatant diluted in the proportion 9:1 (v/v; supernatant:IS at the concentration of 570 mg L⁻¹). Further dilutions were performed when necessary and the results were expressed in mg 100 g⁻¹.

Analytical validation

The proposed method was validated based on Eurachem and Ministry of Agriculture, Livestock, and Food Supply Guidelines (BRASIL, 2011; MAGNUSSON; ÖRNEMARK, 2014) and included the determination of the system suitability, limits of detection and quantification, linearity, matrix effect, precision, and accuracy.

System suitability

System suitability was evaluated by 10 consecutives injections of the intermediate concentration of the standard calibration curve. Results were presented as %RSD (relative standard deviation) for corrected peak area and corrected migration time.

Limits of detection and quantification

Limit of detection (LOD) was considered as the lowest concentration that was possible to detect the analytes (signal/noise ratio ≥ 3), while the limit of quantification (LOQ) was established as the lowest concentration that was possible to quantify the analytes with acceptable precision (signal/noise ratio ≥ 10). Both limits were determined in standard solution, since no matrix effect was found, by six independent replicates in the established concentrations. Results were expressed as mg L⁻¹.

Linearity and matrix effect

Two calibration curves, constructed at five concentration levels and in three independent replicates, were prepared to assess the linearity and matrix effect: (a) standard calibration curve in water; and (b) matrix-matched calibration curve applying the method of standard addition, which consist in the fortification of a sample with standard solution.

For both curves, the linear regression model was chosen because it represented the relationship between the analyte concentration and the instrumental signal obtained. Then, ordinary least squares method (OLSM) was used to calculate the intercept and slope, but it assumes some assumptions. Violations of OLSM residuals in relation to their normality, homoscedasticity, and independency were investigated by Shapiro–Wilk test (SHAPIRO; WILK, 1965), Levene test (LEVENE, 1960), and Durbin-Watson test (DURBIN; WATSON, 1950), respectively. Also, *F*-tests were employed to assess the fitting of the model by its regression and lack of fit significances (SNEDECOR; COCHRAN, 1989).

The matrix effect was evaluated by *t*-test comparing the slope of the standard calibration curve and matrix-matched calibration curve, both calculated by OLSM (ARMITAGE; BERRY; MATTHEWS, 2002).

Precision

For repeatability (intra-day precision), three independent replicates of all concentration levels of the standard calibration curve were prepared by the same analyst and injected on the same day. For partial reproducibility (inter-day precision), this same procedure was performed over three different days by different analysts (*n*=9). Results were presented in terms of %RSD for corrected peak area.

Accuracy

Apparent accuracy was evaluated by the injection of six independent replicates of a fortified sample at three concentration levels of the calibration curve (low, medium, and high). The % recovery was calculated as shown in Equation 1, and the concentrations used in the formula were estimated using the standard calibration curve.

$$\% \text{ recovery} = \left(\frac{\text{concentration in the fortified sample} - \text{concentration in the non fortified sample}}{\text{concentration added}} \right) \times 100$$

Equation 1

Data analysis

Differences were considered statistically significant at the 5% level (*p* < 0.05) and data processing was performed using the software's Statistica® (version 13.0) and Past® (version 4.02).

RESULTS AND DISCUSSION

Considering the impact of AOA and amino acids on the honey composition (DE-MELO et

al., 2018; DEL CAMPO et al., 2016; KOWALSKI et al., 2017), their investigation is relevant and the use of a validated method ensures the trueness of these data.

In this sense, according to the intrinsic characteristics of honey, it was necessary to make changes in the method, which was originally developed and validated for the evaluation of AOA in sugarcane spirits. Thus, considering reports in the literature for floral honey (BRUGNEROTTO et al., 2019; DEL CAMPO et al., 2016; KEKE; CINKMANIS, 2019; KOWALSKI et al., 2017; SUN et al., 2017), new AOA (gluconic, glutaric, and propionic acids) and two amino acids (aspartic and glutamic acids) were also investigated by this method. This change resulted in the search for a new IS, a function previously designated by aspartic acid and now by trifluoroacetic acid. This IS was selected using the Peakmaster® software, in which was possible to simulate an electropherogram with the presence of many compounds (data not shown).

Another important change made in the method was the inversion of the electroosmotic flow inside the capillary through the use of CTAB, an electroosmotic flow inverter, in the BGE solution instead the capillary modification by applying a semi-permanent coating of 2-hydroxypropyltrimethyl-ammonium chloride chitosan, as originally proposed. This procedure facilitated and reduced the time of pre-analysis operations.

Method validation

Suitability tests are important to ensure that instrumental system that will be used is providing reproducible data. In this study, it was evaluated by consecutive injections of the same concentration of standard mixture. As shown in Table 1, low %RSD values were found, ranging from 0.6 to 1.3% for the corrected peak area and from 0.1 to 0.3% for corrected migration time. These results indicate that the validation procedure can continue since the instrumental system is suitable.

Table 1. System suitability, limit of quantification (LOQ), limit of detection (LOD), and the concentration range for low molecular mass aliphatic organic acids (AOA) and amino acids.

Compound	System suitability		LOQ (mg L ⁻¹)	LOD (mg L ⁻¹)	Concentration range (mg L ⁻¹)
	Corrected peak area (%RSD)	Corrected migration time (%RSD)			
AOA					
Maleic acid	0.8	0.1	7.0 ± 0.3	1.7 ± 0.1	7.0 – 55.7
Malonic acid	1.1	0.1	6.2 ± 0.2	1.6 ± 0.1	6.2 – 49.9
Tartaric acid	0.9	0.3	9.0 ± 0.4	2.2 ± 0.1	9.0 – 72.0
Formic acid	1.3	0.1	2.8 ± 0.1	0.7 ± 0.0	2.8 – 22.1
Citric acid	1.0	0.2	11.5 ± 0.6	2.9 ± 0.2	11.5 – 92.2
Malic acid	0.6	0.3	8.0 ± 0.4	2.0 ± 0.1	8.0 – 64.4
Glycolic acid	0.9	0.2	4.6 ± 0.2	1.1 ± 0.0	4.6 – 36.5
Lactic acid	1.2	0.1	5.4 ± 0.3	1.3 ± 0.0	5.4 – 43.2
Gluconic acid	0.7	0.1	13.1 ± 0.6	3.3 ± 0.2	13.1 – 104.7

Succinic acid	1.1	0.3	7.1 ± 0.3	1.8 ± 0.1	7.1 – 56.7
Glutaric acid	0.9	0.2	7.9 ± 0.4	2.0 ± 0.1	7.9 – 63.4
Acetic acid	0.8	0.3	3.6 ± 0.2	0.9 ± 0.0	3.6 – 28.8
Propionic acid	0.7	0.2	4.4 ± 0.2	1.1 ± 0.0	4.4 – 35.6
<i>Amino acids</i>					
Aspartic acid	0.8	0.1	8.0 ± 0.4	2.0 ± 0.1	8.0 – 63.9
Glutamic acid	1.0	0.2	8.8 ± 0.4	2.2 ± 0.1	8.8 – 70.6

%RSD – relative standard deviation. Results expressed as mean $\pm$ standard deviation for LOQ, LOD, and concentration range.

Source:. Authors (2020), except the data of concentration range and limits of detection and quantification which were adapted from Seraglio (2020).

In Table 1 were also presented LOQ, LOD, and the concentration range proposed for each compound. For LOQ and LOD, the %RSD values were lower than 7.0%, results considered satisfactory for indirect methods in capillary electrophoresis system (AZEVEDO et al., 2014). Also, these results can be considered adequate for the determination of the investigated compounds in floral honey, since many of these compounds were quantified in the analyzed samples.

Due to the low concentration of many of the investigated compounds and to ensure the maximum dilution of the samples, to decrease the matrix effect, it is important that the calibration curve starts at low concentrations. In this sense, for each compound, the concentration determined as LOQ was established as the first concentration level of the calibration curve.

The concentration range proposed in this study was investigated in relation to its linearity in both calibration curves (standard and matrix-matched). Firstly, the OLSM assumptions were investigated and all them were confirmed. No significant evidence of non-normality (p values > 0.05), autocorrelation (p values > 0.05), and heteroscedasticity (p values > 0.05) of the residuals were found. In Table 2, these data are shown for the standard calibration curve.

Table 2. Residuals normality, homoscedasticity, and independency of standard calibration curve and matrix effect for low molecular mass aliphatic organic acids (AOA) and amino acids.

Effect for low molecular mass aliphatic organic acids (AOA) and amino acids.				
Compound	Standard calibration curve			Matrix effect (<i>p</i> value by <i>t</i> -test)
	Normality (<i>p</i> value by Shapiro-Wilk test)	Homoscedasticity (<i>p</i> value by Levene test)	Independency (<i>p</i> value by Durbin-Watson test)	
AOA				
Maleic acid	0.184	0.153	0.105	0.559
Malonic acid	0.326	0.734	0.374	0.180
Tartaric acid	0.095	0.634	0.194	0.068
Formic acid	0.491	0.648	0.083	0.524
Citric acid	0.301	0.199	0.235	0.198
Malic acid	0.073	0.535	0.074	0.963
Glycolic acid	0.396	0.178	0.092	0.291
Lactic acid	0.832	0.741	0.156	0.499

Gluconic acid	0.387	0.601	0.235	0.078
Succinic acid	0.062	0.783	0.082	0.097
Glutaric acid	0.073	0.563	0.174	0.078
Acetic acid	0.892	0.489	0.293	0.485
Propionic acid	0.204	0.273	0.093	0.931
<i>Amino acids</i>				
Aspartic acid	0.167	0.452	0.074	0.503
Glutamic acid	0.674	0.633	0.198	0.663

Differences were considered statistically significant at $p < 0.05$.

Source: Authors (2020).

The goodness of the linear regression was also confirmed of both curves. The high significance of the regression (p values < 0.05) and no evidence of lack of fit (p values > 0.05) indicate the linearity in the concentration range studied. In Table 3, these data are shown for the standard calibration curve.

Therefore, the OLSM can be considerate adequate to predict the concentration of AOA and amino acids in floral honey respecting the concentration range studied.

Table 3. ANOVA statistics for linear regression model of standard calibration curve for low molecular mass aliphatic organic acids (AOA) and amino acids.

Compound	Regression			Lack of fit (<i>p</i> value by <i>F</i> -test)
	Equation	Coefficient of determination	<i>p</i> value by <i>F</i> -test	

AOA

Maleic acid	$y = 1.678x - 0.010$	0.987	<0.001	0.805
Malonic acid	$y = 1.723x - 0.007$	0.998	<0.001	0.939
Tartaric acid	$y = 3.089x - 0.018$	0.999	<0.001	0.404
Formic acid	$y = 1.727x - 0.001$	0.988	<0.001	0.589
Citric acid	$y = 2.645x - 0.093$	0.991	<0.001	0.237
Malic acid	$y = 3.032x - 0.029$	0.994	<0.001	0.851
Glycolic acid	$y = 3.069x - 0.018$	0.988	<0.001	0.755
Lactic acid	$y = 2.282x - 0.010$	0.990	<0.001	0.598
Gluconic acid	$y = 3.252x - 0.014$	0.995	<0.001	0.901
Succinic acid	$y = 3.621x - 0.006$	0.999	<0.001	0.759
Glutaric acid	$y = 4.035x + 0.002$	0.991	<0.001	0.919
Acetic acid	$y = 3.056x + 0.028$	0.987	<0.001	0.059
Propionic acid	$y = 3.334x - 0.020$	0.992	<0.001	0.928

<i>Amino acids</i>				
Aspartic acid	$y = 3.454x + 0.002$	0.995	<0.001	0.467
Glutamic acid	$y = 4.561x - 0.108$	0.994	<0.001	0.889

Differences were considered statistically significant at $p < 0.05$.

Source: Authors (2020).

Once the linearity of both curves was confirmed, matrix effect was investigated. As shown in Table 2, no evidence of matrix effect (p values > 0.05) was detected in the proposed concentration range. This data suggests that both curves gave the same response. Thus, the standard calibration curve was chosen for the quantification and subsequent validation steps of AOA and amino acids in floral honey.

Considering the data shown in Table 4, it was possible to observe acceptable repeatability and partial reproducibility of the method, which %RSD values lower than 5.3%, and satisfactory recovery, ranging from 94.2 ± 3.1 to $107.3 \pm 2.1\%$. These data are important since they reinforce the reliability of the method in relation to the quantification of AOA and amino acids in floral honey.

Table 4. Precision and accuracy of low molecular mass aliphatic organic acids (AOA) and amino acids in the standard calibration curve.

Compound	Precision (corrected peak area; %RSD)		Accuracy (% recovery)		
	Intra-day	Inter-day	Low level	Medium level	High level
<i>AOA</i>					
Maleic acid	0.5 – 4.6	1.6 – 4.9	102.3 ± 3.1	102.0 ± 4.5	102.7 ± 4.6
Malonic acid	0.7 – 4.2	2.1 – 5.3	105.4 ± 4.1	104.3 ± 5.0	104.5 ± 2.5
Tartaric acid	0.9 – 3.6	1.3 – 4.2	106.5 ± 2.4	104.2 ± 4.2	103.4 ± 5.3
Formic acid	1.1 – 4.2	2.1 – 4.4	102.0 ± 4.5	99.7 ± 3.4	106.3 ± 3.2
Citric acid	0.8 – 2.7	1.4 – 3.9	106.2 ± 2.1	102.1 ± 3.2	105.6 ± 4.2
Malic acid	1.0 – 3.7	1.9 – 4.8	102.6 ± 5.1	101.8 ± 4.1	103.7 ± 2.9
Glycolic acid	0.3 – 3.1	0.9 – 4.0	104.1 ± 5.2	105.1 ± 4.6	101.8 ± 4.0
Lactic acid	1.1 – 4.4	1.7 – 5.2	106.5 ± 3.4	104.3 ± 5.2	101.9 ± 4.9
Gluconic acid	1.2 – 4.2	2.3 – 5.1	96.6 ± 4.1	97.3 ± 4.2	96.4 ± 2.3
Succinic acid	1.1 – 3.6	1.6 – 4.5	103.4 ± 3.1	97.7 ± 2.3	97.5 ± 1.9
Glutaric acid	1.4 – 3.7	1.7 – 5.0	96.3 ± 2.1	103.4 ± 5.4	102.0 ± 2.5
Acetic acid	0.6 – 3.9	1.2 – 4.7	103.2 ± 5.1	103.1 ± 2.3	99.6 ± 3.5
Propionic acid	1.4 – 4.7	2.1 – 5.3	100.5 ± 4.5	107.3 ± 2.1	101.8 ± 1.0
<i>Amino acids</i>					
Aspartic acid	0.4 – 4.1	1.9 – 5.0	95.3 ± 4.4	95.6 ± 3.9	94.2 ± 3.1
Glutamic acid	0.9 – 3.6	1.5 – 4.2	104.2 ± 3.2	106.3 ± 4.7	105.5 ± 3.4

%RSD – relative standard deviation. Results expressed as mean $\pm$ standard deviation for accuracy.

Source: Authors (2020).

Method application

Once the method was validated, it was applied to the analysis of AOA and amino acids in multifloral honeys from Santa Catarina state, Brazil. Figure 1 shows the electropherogram of AOA and amino acids in the H1 multifloral honey and the concentration of AOA and amino acids determined in all floral honeys was presented in Table 5.

Figure 1. Electropherogram of low molecular mass aliphatic organic acids and amino acids in the H1 multifloral honey diluted in the proportion 1:9 (w/v; honey:water). IS – internal standard (trifluoroacetic acid), 1 – formic acid, 2 – citric acid, 3 – malic acid, 4 – glycolic acid, 5 – lactic acid, 6 – gluconic acid, 7 – glutamic acid, 3 – unknown peak, EOF – electroosmotic flow.

Source: Authors (2020).

Table 5. Concentration (mg 100 g⁻¹) of low molecular mass aliphatic organic acids (AOA) and amino acids in multifloral honeys.

Compound	Honey sample				
	H1	H2	H3	H4	H5
<i>AOA</i>					
Maleic acid	<LOD	<LOD	<LOD	<LOD	<LOD
Malonic acid	<LOD	<LOD	<LOD	<LOD	<LOD
Tartaric acid	<LOD	<LOD	<LOD	<LOD	<LOD
Formic acid	18.4 ± 0.5	8.4 ± 0.2	6.0 ± 0.1	4.3 ± 0.0	<LOD
Citric acid	7.8 ± 0.2	9.7 ± 0.3	12.7 ± 0.3	22.7 ± 0.6	9.8 ± 0.1
Malic acid	35.3 ± 0.8	6.8 ± 0.1	3.9 ± 0.1	4.1 ± 0.1	<LOD
Glycolic acid	5.6 ± 0.1	5.0 ± 0.1	6.1 ± 0.1	6.6 ± 0.1	5.6 ± 0.1
Lactic acid	8.6 ± 0.2	<LOD	20.4 ± 0.2	<LOD	<LOD
Gluconic acid	674.5 ± 18.5	889.7 ± 23.6	1287.9 ± 27.5	453.7 ± 10.7	953.8 ± 9.6
Succinic acid	<LOD	6.3 ± 0.2	<LOD	<LOD	6.5 ± 0.1
Glutaric acid	<LOD	<LOD	<LOD	<LOD	<LOD
Acetic acid	<LOD	5.9 ± 0.1	4.5 ± 0.1	<LOD	<LOD
Propionic acid	<LOD	<LOD	<LOD	<LOD	<LOD
<i>Amino acids</i>					
Aspartic acid	<LOD	<LOD	<LOD	<LOD	<LOD
Glutamic acid	12.4 ± 0.3	8.4 ± 0.3	5.6 ± 0.1	15.6 ± 0.4	7.6 ± 0.1

Results expressed as mean ± standard deviation. LOD – limit of detection.

Source: Authors (2020).

As shown in Table 5, eight AOA and one amino acid were determined in the samples, being citric, glycolic, gluconic, and glutamic acids quantified in all of them, while five AOA (maleic, malonic, tartaric, glutaric, and propionic acids) and the amino acid aspartic acid were below their limit of detection in all analyzed samples. The differences observed in the profile and amount of AOA and amino acids in the samples are possibly associated with the different botanical sources present in these honeys, since they are multifloral. Also, these honeys are from the same geographical location, which considerably reduces the influence of the site on the profile and amount of these compounds.

Gluconic acid is the main AOA found in honeys. It is formed especially by the action of the enzyme D-glucose oxidase, originated from the bee, on the glucose from the nectar (MATO et al., 2003; RUIZ-ARGÜESO; RODRIGUEZ-NAVARRO, 1973). Indeed, this AOA presented the highest concentrations in the samples evaluated and they were in agreement with those reported by other floral honeys, such as acacia, anzer flowers, rhododendron, chestnut, rosemary, thyme, heather, lavender, and multifloral, ranging from 132 to 1378 mg 100 g⁻¹ (NOZAL et al., 2003; TEZCAN et al., 2011).

Others AOA found in the investigated honeys, such as formic, citric, succinic, and malic acids, were also reported for floral honeys from different botanical and geographical origins, and their concentrations are in many cases in agreement with these found in the present study (DEL CAMPO et al., 2016; HAROUN et al., 2012; MATYSIAK; BALCERZAK; MICHALSKI, 2018; OHMENHAEUSER et al., 2013; TEZCAN et al., 2011). Despite below the limit of detection in the honeys evaluated in the present study, maleic, malonic, tartaric, glutaric, propionic, and aspartic acids were reported in other honeys, such as sunflower, multifloral, chestnut, eucalyptus, citrus, heather, lavender, and thyme (BRUGNEROTTO et al., 2019; HAROUN et al., 2012; KIVRAK, 2015; NOZAL et al., 2003; OHMENHAEUSER et al., 2013). Therefore, AOA and amino acids can contribute in the discrimination of honeys, with high potential in the differentiation of floral and honeydew honeys (AZEVEDO et al., 2017b; HAROUN et al., 2012; SHAMSUDIN et al., 2019), but more studies still need to be conducted to ensure reliable data regarding the botanical and geographical discrimination of honeys.

It is also important to highlight the low concentration or absence of acetic acid in the samples, since this AOA is associated with fermentation process in honeys (CHIRIFE; ZAMORA; MOTTO, 2006). Therefore, the data found are strongly indicators that the evaluated honeys were fresh, especially considering that these honeys were transported, drained, and frozen immediately after harvesting the honeycomb and were handled and stored properly.

Glutamic acid is one of the main amino acids found in honeys and in floral honeys this amino acid come mainly from the pollen (BOBIS et al., 2020; CARRATÙ et al., 2011). Its

concentration in the multifloral honeys evaluated in this study was in agreement with those found in the literature for other floral honeys such as sunflower, citrus, thyme, heather, lavender, vitex, jujube, and acacia, ranging from not detected to 20.5 mg 100 g⁻¹ (KIVRAK, 2015; QAMER et al., 2007; SUN et al., 2017).

CONCLUSIONS

In this study, a simultaneous method for determination of 13 AOA and two amino acids in floral honey using a capillary electrophoresis system equipped with diode array detector was validated. The proposed method showed satisfactory results for the evaluated validation parameters, ensuring the reliability in the quantification of these compounds in floral honey. Among the AOA and amino acids investigated in multifloral honeys by the validated method, eight AOA and one amino acid were determined in the samples, being citric, glycolic, gluconic, and glutamic acids quantified in all of them. Therefore, this method is suitable for use in the determination of AOA and amino acids in floral honeys.

ACKNOWLEDGMENTS

This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001. The authors also wish to thank the Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

REFERENCES

- ARMITAGE, P.; BERRY, G.; MATTHEWS, J. N. S. **Statistical methods in medical research**. 4 ed. ed. Oxford, UK: Blackwell Science Ltd, 2002.
- AZEVEDO, M. S. et al. Screening and determination of aliphatic organic acids in commercial Brazilian sugarcane spirits employing a new method involving capillary electrophoresis and a semi-permanent adsorbed polymer coating. **Food Research International**, v. 60, p. 123–130, jun. 2014.
- AZEVEDO, M. S. et al. Proteome comparison for discrimination between honeydew and floral honeys from botanical specie *Mimosa scabrella* Benthham by principal componet analysis. **Journal of The Science of Food and Agriculture**, v. 97, n. 13, p. 4515–4519, 2017a.
- AZEVEDO, M. S. et al. Free amino acid determination by GC-MS combined with a chemometric approach for geographical classification of bracinga honeydew honey (*Mimosa scabrella* Benthham). **Food Control**, v. 78, p. 383–392, ago. 2017b.
- BERGAMO, G. et al. Mineral profile as a potential parameter for verifying the authenticity of bracinga honeydew honeys. **LWT**, v. 97, p. 390–395, nov. 2018.
- BERGAMO, G. et al. Physicochemical characteristics of bracinga honeydew honey and blossom honey produced in the state of Santa Catarina: An approach to honey differentiation.

Food Research International, v. 116, p. 745–754, fev. 2019.

BOBIS, O. et al. Eucalyptus honey: Quality parameters, chemical composition and health-promoting properties. **Food Chemistry**, v. 325, n. April, p. 126870, 2020.

BRASIL. Inmetro. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Orientação sobre validação de métodos analíticos. Documento de caráter orientativo. DOQ-CGCRE-008. Revisão 04. 2011.

BRUGNEROTTO, P. et al. A capillary electrophoresis method to determine aliphatic organic acids in bracatinga honeydew honey and floral honey. **Journal of Food Composition and Analysis**, v. 82, p. 103243, set. 2019.

CARRATÙ, B. et al. Free amino acids, oxalate and sulphate for honey characterization. **Journal of ApiProduct and ApiMedical Science**, v. 3, n. 2, p. 81–88, 1 abr. 2011.

CHIRIFE, J.; ZAMORA, M. C.; MOTTO, A. The correlation between water activity and % moisture in honey: fundamental aspects and application to Argentine honeys. **Journal of Food Engineering**, v. 72, n. 3, p. 287–292, fev. 2006.

DA SILVA, P. M. et al. Honey: Chemical composition, stability and authenticity. **Food Chemistry**, v. 196, n. April, p. 309–323, abr. 2016.

DE-MELO, A. A. M. et al. Composition and properties of *Apis mellifera* honey: A review. **Journal of Apicultural Research**, v. 57, n. 1, p. 5–37, 23 jan. 2018.

DEL CAMPO, G. et al. Quantitative determination of carboxylic acids, amino acids, carbohydrates, ethanol and hydroxymethylfurfural in honey by ¹H NMR. **Food Chemistry**, v. 196, p. 1031–1039, abr. 2016.

DURBIN, J.; WATSON, G. S. Testing for serial correlation in least squares regression II. **Biometrika**, v. 38, p. 159–178, 1950.

EUROPEAN COMMISSION. European Commission Council Directive 2001/110/EC of 20 December 2001 relating to honey. **Official Journal of the European Communities**, p. 10–47, 2002.

HAROUN, M. I. et al. **Organic acid profiles and contents of Turkish honeydew and floral honeys**. In: International Conference on Environment, Agriculture and Food Sciences (ICEAFS'2012). Phuket, Thailand. August 11-12, 2012., 2012.

KALJURAND, M.; KOEL, M. Recent Advancements on Greening Analytical Separation. **Critical Reviews in Analytical Chemistry**, v. 41, n. 1, p. 2–20, jan. 2011.

KAYGUSUZ, H. et al. Characterization of Anatolian honeys based on minerals, bioactive components and principal component analysis. **LWT - Food Science and Technology**, v. 68, p. 273–279, maio 2016.

KEKE, A.; CINKMANIS, I. Determination of organic acids in honey samples from Latvian market by high-performance liquid chromatography. **Research for Rural Development**, v. 1, p. 229–233, 2019.

KIVRAK, İ. Free amino acid profiles of 17 Turkish unifloral honeys. **Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies**, v. 38, n. 8, p. 855–862, 9 maio 2015.

KOWALSKI, S. et al. Free amino acids profile of Polish and Slovak honeys based on LC–MS/MS method without the prior derivatisation. **Journal of Food Science and Technology**, v. 54, n. 11, p. 3716–3723, 2017.

LEVENE, H. Robust test for equality of variances. In: [s.l.] Palo Alto, USA: Stanford University Press, 1960. p. 278–292.

LUKASIEWICZ, M.; KOWALSKI, S.; MAKAREWICZ, M. Antimicrobial and antioxidant activity of selected Polish honeys. **LWT - Food Science and Technology**, v. 64, n. 2, p. 547–553, dez. 2015.

MAGNUSSON, B.; ÖRNEMARK, U. **Eurachem guide: the fitness for purpose of analytical methods – a laboratory guide to method validation and related topics**. 2 ed. ed. Torino, Italy: Eurachem, 2014.

MATO, I. et al. Significance of nonaromatic organic acids in honey. **Journal of Food Protection**, v. 66, n. 12, p. 2371–2376, 2003.

MATO, I. et al. Analytical Methods for the Determination of Organic Acids in Honey. **Critical Reviews in Analytical Chemistry**, v. 36, n. 1, p. 3–11, 12 jan. 2006a.

MATO, I. et al. Rapid determination of nonaromatic organic acids in honey by capillary zone electrophoresis with direct ultraviolet detection. **Journal of Agricultural and Food Chemistry**, v. 54, n. 5, p. 1541–1550, mar. 2006b.

MATYSIAK, I.; BALCERZAK, M.; MICHALSKI, R. Ion chromatography with conductometric detection for quantitation of formic acid in Polish bee honey. **Journal of Food Composition and Analysis**, v. 73, n. September 2017, p. 55–59, 2018.

NAVARRETE, M. et al. Direct determination of aliphatic acids in honey by coelectroosmotic capillary zone electrophoresis. Direct determination of aliphatic acids in honey by coelectroosmotic capillary zone electrophoresis. **Journal of Apicultural**, v. 44, n. 2, p. 65–70, 2005.

NOZAL, M. J. et al. HPLC determination of low molecular weight organic acids in honey with series-coupled ion-exclusion columns. **Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies**, v. 26, n. 8, p. 1231–1253, abr. 2003.

OHMENHAEUSER, M. et al. Qualitative and quantitative control of honeys using NMR spectroscopy and chemometrics. **ISRN Analytical Chemistry**, v. 2013, p. 1–9, 2013.

QAMER, S. et al. Free amino acids content of Pakistani unifloral honey produced by *Apis mellifera*. **Pakistan Journal of Zoology**, v. 39, n. 2, p. 99–102, 2007.

RUIZ-ARGÜESO, T.; RODRIGUEZ-NAVARRO, A. Gluconic acid-producing bacteria from honey bees and ripening honey. **Journal of General Microbiology**, v. 76, p. 211–216, 1973.

SANZ, M. L. et al. A contribution to the differentiation between nectar honey and honeydew honey. **Food Chemistry**, v. 91, n. 2, p. 313–317, jun. 2005.

SERAGLIO, S. K. T. et al. Development and validation of a LC-ESI-MS/MS method for the determination of phenolic compounds in honeydew honeys with the diluted-and-shoot approach. **Food Research International**, v. 87, p. 60–67, set. 2016.

SERAGLIO, S. K. T. et al. An overview of physicochemical characteristics and health-promoting properties of honeydew honey. **Food Research International**, v. 119, p. 44–66, maio 2019.

SERAGLIO, S. K. T. **Mel de melato de bracatinga (Mimosa scabrella Bentham): bioacessibilidade e estabilidade química e bioativa**. Universidade Federal de Santa Catarina, 2020.

SHAMSUDIN, S. et al. A comparative characterization of physicochemical and antioxidants properties of processed *Heterotrigona itama* honey from different origins and classification by chemometrics analysis. **Molecules**, v. 24, n. 21, p. 1–20, 2019.

SHAPIRO, S. S.; WILK, M. B. An analysis of variance test for normality (complete samples). **Biometrika**, v. 52, n. 3/4, p. 591–611, 1965.

SNEDECOR, G. W.; COCHRAN, W. G. **Statistical methods**. 8. ed. ed. Iowa: State University Press, 1989.

SUN, Z. et al. Identification of botanical origin of Chinese unifloral honeys by free amino acid profiles and chemometric methods. **Journal of Pharmaceutical Analysis**, v. 7, n. 5, p. 317–323, 2017.

TERZO, S.; MULÈ, F.; AMATO, A. Honey and obesity-related dysfunctions: a summary on health benefits. **The Journal of Nutritional Biochemistry**, v. 82, p. 108401, ago. 2020.

TEZCAN, F. et al. Evaluation of organic acid, saccharide composition and antioxidant properties of some authentic Turkish honeys. **Journal of Food and Nutrition Research**, v. 50, n. 1, p. 33–40, 2011.

CAPÍTULO 18: APLICAÇÃO DE LACASES EM SÍNTESE ORGÂNICA PARA OBTENÇÃO DE BIOATIVOS COM ATIVIDADE ANTIOXIDANTE: UMA REVISÃO

CHAPTER 18: APPLICATION OF LACCASES IN ORGANIC SYNTHESIS AND OBTAINMENT OF BIOACTIVES WITH ANTIOXIDANT ACTIVITY: A REVIEW

Camila Gabriel Kato-Schwartz¹; Emanueli Backes²; Rosane Marina Peralta³; Gisella Maria Zanin⁴

Resumo

As lacases (EC 1.10.3.2) são enzimas capazes de catalisar a oxidação de diferentes fenóis produzindo radicais fenoxi concomitantemente reduzindo o oxigênio molecular à água. Devido aos benefícios dos processos oxidativos com lacase, estas enzimas têm sido utilizadas nas indústrias de alimentos, têxtil, papel e celulose e são utilizadas também em biossensores e em processos de biorremediação. O aumento da demanda por compostos antioxidantes altamente ativos e estáveis para aplicação na indústria de alimentos tem impulsionado a investigação de novos métodos para síntese de antioxidantes. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi revisar aspectos relacionados à aplicação das lacases em reações de síntese orgânica via oligomerização/polimerização de diferentes fenólicos visando a obtenção de novos bioativos antioxidantes. As características e fontes das lacases utilizadas bem como a estrutura e propriedades dos novos compostos fenólicos sintetizados foram discutidos em detalhes. Foi dada uma atenção especial aos métodos de avaliação da atividade antioxidante e os benefícios da utilização das enzimas imobilizadas nos bioprocessos.

Palavras-Chave: Lacase, Basidiomiceto, Síntese orgânica, Antioxidantes.

Abstract

Laccases (EC 1.10.3.2) are enzymes capable of catalyzing the oxidation of various phenols by producing phenoxy radicals with concomitant reduction of molecular oxygen to water. Due to the benefits of oxidative processes with laccase, these enzymes have been used in the food, textile, paper and cellulose industries and are also used in biosensors and in bioremediation processes. The increase in the necessity for antioxidant compounds with improved properties for application in the food industry has driven the investigation of promising methods such as the application of laccase for the synthesis of antioxidants. Within this context, the objective of the present work is to review aspects related to the application of laccases in reactions of organic synthesis via oligomerization/polymerization of phenolics, aiming at obtaining new antioxidant bioactives. The characteristics and sources of the laccases as well as the structure and properties of the phenolic compounds are discussed in detail. Special attention was paid to methods of assessing antioxidant activity and the benefits of using immobilized enzymes in bioprocesses.

Keywords: Laccase, Basidiomycetes, Organic synthesis, Antioxidants.

¹Programa de Pós-graduação em Engenharia Química, Universidade Estadual de Maringá, camilagkato@hotmail.com

²Programa de Pós-graduação em Ciência de Alimentos, Universidade Estadual de Maringá, emanuelibackes@outlook.com

³Programa de Pós-graduação em Ciência de Alimentos, Universidade Estadual de Maringá, rmperalta@uem.br

⁴Programa de Pós-graduação em Engenharia Química, Universidade Estadual de Maringá, giselladeq@gmail.com

1. Introdução

Compostos fenólicos ou polifenólicos vegetais são um amplo grupo de metabólitos que se originam do metabolismo secundário das plantas. Eles contêm um ou mais grupos hidroxila ligados a um anel de benzeno e têm um papel importante na defesa contra patógenos de plantas e agentes estressores abióticos (DAGLIA, 2012). Os compostos fenólicos estão se tornando cada vez mais objeto de intensa pesquisa devido às suas propriedades bioativas, incluindo as atividades antioxidante, antidiabética, anti-inflamatória, antialérgica e antiplaquetária. Os compostos fenólicos atuam na prevenção da oxidação lipídica em alimentos e na prevenção de doenças como câncer e aterosclerose que são induzidas por radicais livres (XIAO et al., 2016; XIAO, 2017; SINGH, et al., 2018).

Os compostos fenólicos naturais com atividade antioxidante estão presentes em baixas concentrações em relação a um substrato oxidável e recebem atenção pela capacidade de retardar ou inibir a oxidação desse substrato (ADELAKUN et al., 2012b). Muitos dos compostos fenólicos naturais são sensíveis à temperatura, pH e à luz devido à presença de duplas ligações alternadas (NEMADZIVA et. al., 2018). Consequentemente, os mais diversos tipos de vegetais, comestíveis e não comestíveis tem sido utilizado como matrizes na pesquisa de novos compostos fenólicos mais ativos e mais estáveis. Além desta busca pela descoberta de novos fenólicos naturais, uma segunda abordagem tem sido empregada na obtenção destes fenólicos mais ativos e mais estáveis: modificações estruturais em fenólicos já conhecidos.

A síntese orgânica utilizando um composto fenólico ou uma mistura de compostos fenólicos com o objetivo de obtenção de novos compostos com propriedades funcionais mais elevadas que os fenólicos parentais, ganha um componente ambiental importante quando realizada utilizando-se como catalisador do processo uma enzima. O apelo ambiental é o grande impulsionador desta abordagem, pois possibilita a modificação dos substratos sem o uso de substâncias químicas e em condições brandas, com baixo impacto ambiental. Os radicais formados pela ação dos biocatalisadores resultam, geralmente, na formação de novas moléculas com propriedades biológicas de interesse (ADELAKUN et al., 2012b; MUNIZ-MOURO et al., 2017).

As lacases (EC 1.10.3.2) são cobre-oxidases que oxidam substratos fenólicos formando radicais fenoxil. As lacases são encontradas em fungos, bactérias, plantas e insetos (NARAYANAN et al., 2015; DEVASIA e NAIR 2016; REZAEI et al., 2017). Lacases livres e imobilizadas vem sendo aplicadas em diversas áreas incluindo degradação de poluentes, cosmética, bioenergética e síntese orgânica (NEMADZIVA et al., 2018; MUÑIZ-MOURO et al. 2018; REANO et al., 2016; NAGHDI et al., 2019; DARONCH et al., 2020).

O objetivo deste trabalho foi revisar aspectos relacionados à aplicação das lacases em reações de síntese orgânica via oligomerização/polimerização de diferentes fenólicos visando a obtenção de novos bioativos antioxidantes. As características e fontes das lacases utilizadas bem como a estrutura e propriedades dos novos compostos fenólicos sintetizados foram discutidos em detalhes. Foi dada uma atenção especial aos métodos de avaliação da atividade antioxidante e os benefícios da utilização das enzimas imobilizadas nos bioprocessos.

2. Metodologia empregada

Para a seleção dos artigos científicos, utilizou-se as seguintes bases de dados: Scopus e Web of Science considerando os artigos publicados nos últimos 10 anos (2011-2020) e utilizando como termos de buscas os termos “lacase” e “síntese” e “antioxidante” (em inglês *laccase*, *synthesis* e *antioxidant*, respectivamente). Foram encontrados 7524 artigos na busca com a palavra *laccase* e 52 artigos quando a busca foi realizada com as os três termos (*laccase synthesis* e *antioxidant*) na base Scopus e 7821 artigos (*laccase*) e 59 artigos (*laccase, synthesis e antioxidant*). Foram considerados para esta revisão, somente os artigos que possibilitaram aos autores alcançar os objetivos pré-estabelecidos.

3. Desenvolvimento

3.1. Lacase: características e fontes

As lacases são enzimas amplamente distribuídas entre os seres vivos, sendo encontradas em plantas, vegetais e insetos. São encontradas em múltiplas formas e isso explica as diversas funções desta enzima. Nas plantas, as lacases atuam na polimerização da lignina e na síntese de poliflavonóides. Já nos insetos, a lacase tem como função principal a esclerotização da cutícula vegetal. Quando proveniente de bactérias, lacases são relacionadas aos processos de síntese de pigmentos marrons nos esporos e proteção contra a luz UV. Também possuem importantes funções na homeostase do íon cobre e na morfogênese (CHAUHAN; GORADIA; SAXENA, 2017; SHARMA et al., 2018; JANUSZ et al., 2020).

O primeiro relato da ocorrência de lacase foi feito em 1883 através de um estudo da secreção leitosa, urushi, árvore chinesa/japonesa *Rhus vernicifera* (GAVNHOLT; LARSEN, 2002; JANUSZ et al., 2020). Lacases tem sido isoladas de plantas como feijão, pinho, mung e ameixa e também da família botânica de Anacardiaceae, contudo, ainda é escasso o uso de lacases vegetais em aplicações industriais (WANG et al., 2015; JANUSZ et al., 2020). Lacases são também encontradas em vários gêneros de insetos, como *Calliphora*, *Diploptera*, *Bombyx*, *Drosophila*, *Lucilia*, *Menduca*, *Musca*, *Phormia*, *Rhodnius*, *Oryctes*, *Papilio* e *Sarcophaga*

(CHAUHAN; GORADIA; SAXENA, 2017; JANUSZ et al., 2020), mas assim como as lacases vegetais, não são, até o presente momento utilizadas em bioprocessos.

A primeira lacase isolada a partir de uma bactéria (*Azospirillum lipoferum*) ocorreu somente em 1993 a partir da rizosfera de arroz e desde então, elas foram identificadas em outras bactérias Gram-positivas como *Staphylococcus*, *Streptomyces*, *Geobacillus*, *Rhodococcus*, *Bacillus*, *Azospirillum*, *Aquisalibacillus* e *Lysinibacillus* (DHIMAN; SHIRKOT 2015; NARAYANAN et al. 2015; REZAEI et al., 2017). Algumas bactérias Gram-negativas também apresentam a capacidade de secretar a lacase, como é o caso das *Pseudomonas*, *Enterobacter*, *Proteobacterium*, *Delfia* and *Alteromonas* (DHIMAN; SHIRKOT 2015; DEVASIA; NAIR 2016; CHAUHAN; GORADIA; SAXENA, 2017). As lacases de bactérias são consideradas mais estáveis a elevadas temperaturas e pH quando comparadas as fúngicas e possuem um peso molecular que varia de 20 a 80 kDa (CHAUHAN; GORADIA; SAXENA, 2017).

As lacases mais estudadas são as encontradas nos fungos basidiomicetos causadores da decomposição branca da madeira, tais como *Pleurotus ostreatus*, *Trametes versicolor*, *Oudemansiella canarii*, *Pycnoporus cinnabarinus*, *Pycnoporus sanguineus* etc., além de diversos ascomicetos e alguns deuteromicetos, como *Trichoderma* sp. (RIVERA-HOYOS et al., 2013; CHAUHAN; GORADIA; SAXENA, 2017; BRUGNARI et al., 2018; JANUSZ et al., 2020).

As lacases fúngicas desempenham papel importante na pigmentação e resistência dos esporos e estão associadas à renovação do húmus, aos processos de desintoxicação, formação de corpos e principalmente biodegradação da lignina (ZHANG et al., 2015; CHAUHAN; GORADIA; SAXENA, 2017; SHARMA et al., 2018; JANUSZ et al., 2020). Percebe-se que a função da lacase é sintética em quase todos os organismos, com exceção dos fungos, onde além da função de síntese de pigmentos, por exemplo, também estão associadas à processos de degradação, como a degradação da lignina. Ela também foi a primeira enzima que se mostrou capaz de polimerizar monômeros de lignina *in vitro* (GAVNHOLT; LARSEN, 2002).

Como já abordado, as lacases são capazes de catalisar reações de oxidação monoeletrônica de diversos substratos tais como anilinas, fenóis, aminas aromáticas, aminofenóis, metoxifenóis, polifenóis, poliaminas e derivados de lignina. Concomitantemente ocorre a produção de água sendo o único subproduto da oxidação monoeletrônica de substratos que utiliza o oxigênio molecular (Figura 1) (JEON et al., 2010; BRUGNARI et al., 2018; WELLINGTON; GOVINDJEE; STEENKAMP, 2018).

Figura 1. Oxidação direta da lacase na transformação do substrato fenólico catecol em *o*-benzoquinino.

Fonte: Modificado de Polak e Jarosz-Wilkolazca (2012).

Devido a sua atividade oxidativa de largo espectro, as lacases são amplamente utilizadas em diversas aplicações industriais, incluindo modificação de polímeros, branqueamento têxtil, processamento de alimentos, síntese orgânica, indústria cosmética e transformação e biorremediação de uma infinidade de compostos xenobióticos incluindo hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, pesticidas, corantes sintéticos e produtos farmacêuticos como diclofenaco (Figura 2). Devido a extensa aplicação e utilização dessas enzimas, elas podem ser consideradas um dos biocatalisadores mais importantes e com aplicações industriais divergentes como o potencial de polimerizar e despolimerizar (BILAL et al., 2019; TAHERAN et al., 2017; BARRIOS-ESTRADA et al., 2018). Este aspecto foi comprovado pelo elevado número de artigos encontrados na pesquisa que abordou o período de 2011-2020 realizada nas bases Scopus (7524 artigos) e Web of Science (7821) utilizado nesta revisão.

Figura 2. Principais áreas de aplicação de lacases.

Fonte: Próprio autor (2020).

3.2. Compostos fenólicos: estrutura e propriedades

Os compostos fenólicos, muitos deles metabólitos secundários, constituem uma classe extremamente importante de moléculas. Esses compostos ocorrem naturalmente em frutas e vegetais e estão relacionados à efeitos benéficos à saúde com propriedades antidiabética, anti-inflamatória, antialérgicos, antiplaquetários e antitumorais (XIAO et al., 2016; XIAO, 2017;

SINGH, et al., 2018). Também exercem função como eliminadores de radicais livres, inibidores da oxidação de lipoproteínas e agente quelantes de metais (MAMEDE; PASTORE, 2004; PREHN; GONZALO-RUIZ; CORTINA-PUIG, 2012).

A presença de compostos fenólicos em alimentos influencia a qualidade dos vegetais como aroma, sabor, cor e atributos sensoriais como vinhos, café, sucos e chás (AGRAWAL; CHATURVEDI; VERMA, 2018; LETTERA et al., 2016; PEZZELLA et al., 2015). Estes compostos são amplamente utilizados como aditivos em uma variedade de processos industriais, como na indústria de papel, na fabricação de plásticos, corantes ou drogas (PREHN; GONZALO-RUIZ; CORTINA-PUIG, 2012).

Com base em elementos estruturais que ligam anéis benzeno e números de grupos hidroxila ligados, podem ser classificados em fenóis simples ou polifenóis (SINGH, et al. 2018). Por sua vez, os polifenóis (fitoquímicos poli-hidroxilados) que possuem estruturas comuns podem ser divididos em duas categorias, flavonóides (polifenóis) e polifenóis não flavonóides (fenóis simples ou ácidos) (PREHN; GONZALO-RUIZ; CORTINA-PUIG, 2012; SINGH, et al., 2018).

A estrutura química dos flavonóides favorece sua ação antioxidante pois possuem dois ou mais anéis aromáticos, cada um contendo um ou mais grupos hidroxila fenólicos e são conectados através de uma ponte de carbono fornecendo assim, compostos com alta atividade antioxidante. Esses compostos são sensíveis à oxidação enzimática e não enzimática e a atividade antioxidante é sensível à luz devido as suas duplas ligações alternadas (MAMEDE; PASTORE, 2004; HELENO et al., 2015; XIAO et al., 2016; XIAO, 2017; SINGH, et al., 2018).

Os polifenóis não flavonóides conhecidos como ácidos fenólicos podem ser divididos em dois grupos principais, ácidos hidroxibenzóicos que são derivados do ácido benzóico e ácidos hidroxicinâmicos, derivados de ácidos cinâmico. Quimicamente, esses compostos possuem ao menos um anel aromático e pelo menos um hidrogênio é substituído por um grupo hidroxila e ambos os grupos possuem propriedades antioxidantes (HELENO et al., 2015).

Os derivados de ácidos hidroxicinâmicos possuem um anel aromático com uma cadeia carbônica, formado por 3 carbonos ligados ao anel. Dentro desse grupo estão presentes os ácidos p-cumárico, caféico, ferúlico e sinápticos sendo encontrados na natureza (DEGÁSPARI; WASZCZYNSKYJ, 2004).

Os ácidos hidroxibenzóicos possuem grupo carboxílico ligado ao anel aromático e, dentro desse grupo, estão presentes os ácidos gálico, elágico, vanílico, siríngico, entre outros. A atividade antioxidante desses compostos está relacionada aos seus ésteres, contudo, também

é determinada pelo número de hidroxilas presente na molécula e a posição (DEGÁSPARI; WASZCZYNSKYJ, 2004; MAMEDE; PASTORE, 2004).

Os ácidos sináptico, ferúlico e *p*-cumárico são antioxidantes mais ativos do que os derivados do ácido benzóico, tais como ácido procatecuíco, siríngico e vanílico. Isso se deve à dupla ligação presente na molécula dos derivados do ácido cinâmico ($-\text{HC}=\text{CHCOOH}$), que participa da estabilização do radical por ressonância de deslocamento do elétron desemparelhado, enquanto que os derivados do ácido benzóico não apresentam essa característica (DEGÁSPARI; WASZCZYNSKYJ, 2004).

O ácido ferúlico contém uma hidroxila na posição orto com o grupo metoxila sendo doador de elétrons, um fator responsável por aumentar a estabilidade do radical fenoxil e também do aumento da eficiência antioxidante do ácido ferúlico. Contudo, ácidos que contenham uma segunda hidroxila na posição orto ou para tem-se aumento da atividade antioxidante, como acontece com o ácido caféico. Isso explica a maior atividade antioxidante presente no ácido caféico quando comparado ao ácido ferúlico (DEGÁSPARI; WASZCZYNSKYJ, 2004). Entretanto, a atividade antioxidante do ácido caféico é próxima a do ácido *m*-cinâmico, mesmo possuindo um grupo de hidroxila a mais (MAMEDE; PASTORE, 2004).

O ácido *p*-cumárico possui o grupo hidroxila na posição para o que lhe proporciona maior atividade antioxidante em relação ao ácido hidrocínâmico (MAMEDE; PASTORE, 2004). Os ácidos ferúlico, *p*-cumárico e sináptico possuem elevada propriedade antioxidante quando comparados aos derivados do ácido benzóico como os ácidos vanílico e siríngico devido à dupla ligação presente na molécula dos derivados do ácido cinâmico ($-\text{HC}=\text{CHCOOH}$). O ácido cinâmico está relacionado a estabilização do radical devido a ressonância de deslocamento do elétron desemparelhado. Já os derivados do ácido benzóico não possuem essa característica (DEGÁSPARI; WASZCZYNSKYJ, 2004).

Existem compostos fenólicos que não se apresentam na forma livre no tecido vegetais, como é o caso dos taninos que estão presentes na forma de polímeros. Os taninos possuem alto peso molecular e podem ser classificados em relação ao seu tipo estrutural em: taninos hidrolisáveis e condensados. Os taninos hidrolisáveis possuem um núcleo central de álcool poliédrico ou glicose, esterificado com ácido elágico ou gálico, e são hidrolisáveis com ácidos, bases ou enzimas. Já os taninos condensados são polímeros de catequina ou leucoantocianidina e não são hidrolisáveis por com ácidos (SOARES, 2002; KATO et al., 2017).

Os benefícios biológicos proporcionados pelos compostos fenólicos estão diretamente relacionados com a atividade antioxidante que cada fenol exerce sobre determinado meio. A

ação antioxidante do composto fenólico depende de sua estrutura química, podendo ser estipulado pela ação da molécula como agente redutor (potencial de quelação de metais, reatividade com outros antioxidantes e velocidade de inativação do radical livre) (XIAO et al., 2016; XIAO, 2017; SINGH, et al., 2018).

3.3. Método de avaliação da atividade antioxidante

A capacidade antioxidante pode ser determinadas por diversos métodos e expressa por meio de diversos parâmetro como através da capacidade de redução de metal (FRAP – *ferric reducing antioxidant power*, CUPRAC - *cupric ion reducing antioxidant capacity*), remoção de um radical peroxil (TRAP – *total reactive antioxidant potential*, ORAC – *oxygen radical absorbance capacity*), atividade sequestrante do DPPH (2,2-difenil-1-picrylhydrazil), atividade sequestrante do ABTS (2,20-azino-bis (ácido 3-ethylbenzthiazoline-6-sulfônico) e através da quantificação de produtos formados durante a peroxidação de lipídeos lipídeos (TBARS, oxidação do LDL (lipoproteínas de baixa densidade) e co-oxidação do β -caroteno) (SUCUPIRA et al., 2012; ALVES et al., 2010). Para a determinação da capacidade antioxidante in vivo, os métodos mais utilizados são o DPPH, ORAC, ABTS e FRAP.

A atividade antioxidante de compostos fenólicos como os flavonóides pode ser determinada através da reatividade como agente doador de H e elétrons, reatividade diante a outros antioxidantes, estabilidade do radical flavanoil formado, quanto a capacidade de quelar metais de transição e através da solubilidade e interação com membranas.

O método do radical DPPH se baseia no sequestro de radicais livres, no caso o DPPH, no qual possui um elétron desemparelhado por toda a molécula conferindo uma coloração violeta. Dessa forma, esse método se baseia na capacidade antioxidante de uma determinada molécula em sequestrar o radical livre DPPH. Quando isso ocorre, tem-se a mudança na coloração de violeta para amarelo pálido (SUCUPIRA et al., 2012; ALVES et al., 2010; ZIYATDINOVA; SNEGUREVA; BUDNIKOV, 2017).

O método ORAC se baseia na propriedade fluorescente das proteínas B-ficoeritrina (B-PE) e R-ficoeritrina (R-PE) no qual tem-se um decréscimo da fluorescência dessas proteínas, devido a perda de sua conformidade ao sofrer danos oxidativo (SUCUPIRA et al., 2012; ALVES et al., 2010).

O método do ABTS está relacionado à habilidade dos antioxidantes em sequestrar o cátion $ABTS^{\bullet+}$. Esta captura resulta em um decréscimo na absorbância, sendo lida a partir da mistura do radical com o antioxidante em diferentes tempos (SUCUPIRA et al., 2012).

No método FRAP, complexo férrico-tripiridiltiazina (FeIII-TPZ) é reduzido ao complexo ferroso (FeII-TPZ) quando as condições do meio reacional são ácidas e na presença de um antioxidante. O complexo formado devido a esta reação indica uma coloração azul intensa e com absorção máxima de 593 nm (BENZIE; STRAIN, 1996).

Como há uma gama enorme de tipos de radicais livres, não há ainda um único método capaz de avaliar a atividade antioxidante de forma precisa e quantitativa. Por conta disso, vários métodos devem ser utilizados na avaliação dos diversos fenólicos sejam eles naturais ou obtidos através de síntese orgânica.

3.4. Modificação de compostos fenólicos por reações de síntese orgânica e avaliação da atividade antioxidante

Embora o uso de compostos fenólicos tenha sido impulsionado pelo apelo nutracêutico de suas multifacetadas atividades biológicas, fatores como baixa solubilidade em meio aquoso e suscetibilidade ao calor, luz e oxigênio podem limitar suas aplicações (NEMADZIVA et al., 2018). Ademais, a atividade antioxidante destes compostos é, em geral, inferior à de compostos antioxidantes sintéticos (ADELAKUN et al., 2012a).

Compostos fenólicos monoméricos simples podem apresentar meia-vida curta no organismo, além de serem metabolizados em estruturas menos ativas (NEMADZIVA et al., 2018). Consequentemente, cresce o interesse em abordagens biocatalíticas, como a síntese “verde”, que permitam a oligomerização de polifenóis e formação de oligômeros com propriedades bioativas intensificadas. Reações de polimerização enzimática são capazes de resultar em polifenóis com densidade eletrônica superior à unidade monomérica, maior solubilidade, termoestabilidade e propriedades antioxidantes (MUNIZ-MOURO et al., 2017; MUÑIZ-MOURO et al., 2018). Diversos flavonoides de alto peso molecular exibem propriedades fisiológicas aprimoradas, como atividade antioxidante e anticarcinogênica, e um tempo de circulação relativamente mais longo *in vivo* (KURISAWA et al., 2003).

O interesse especial em lacases como catalisador dos processos de biotransformação provém da enzima utilizar oxigênio molecular como acceptor final de elétrons, diferentemente de peroxidases, por exemplo, que requerem peróxido de hidrogênio (MUÑIZ-MOURO et al. 2018). Para além, lacase são especialmente capazes de oxidar diversos compostos aromáticos, produzindo radicais intermediários altamente reativos que se ligam através de reações de dimerização e trimerização, por exemplo (MOGHARABI; FARAMARZI, 2014). O interesse na síntese orgânica de dímeros e trímeros de compostos fenólicos através de reações

enzimáticas cresce dado o valor terapêutico associado a estes produtos de acoplamento (ADELAKUN et al., 2012a).

Em estudo conduzido por Adelakun et al. (2012a), dois produtos diméricos (β -5 e β - β) foram obtidos da reação de modificação do ácido ferúlico catalisada por lacase de *Trametes pubescens*. O dímero β -5 apresentou atividade antioxidante amplificada comparativamente ao substrato ácido ferúlico, medida pelos métodos DPPH e ABTS. Este comportamento está relacionado, muito provavelmente, ao aumento de grupos doadores de elétrons e à formação do grupo ácido carboxílico com uma ligação dupla C–C insaturada adjacente, que fornece locais de ataque adicionais para os radicais (Figura 3).

Figura 3. Via da reação proposta para a síntese do dímero β -5 de ácido ferúlico catalisada por lacase.

Fonte: Modificado de Adelakun et al. (2012a).

A oxidação do grupamento *p*-hidroxila do composto fenólico pela ação da lacase produz um radical que marca o início da reação. A estabilização por ressonância pode levar o elétron não emparelhado à ocupar diferentes posições na molécula radicalizada. Se o acoplamento deste elétron na posição β se der com outro na posição C5 do próximo radical, haverá a formação de um dímero através da ligação β -5. Da mesma forma o acoplamento covalente entre elétrons desemparelhados ambos na posição β resulta na formação de um dímero β - β . Este comportamento é corriqueiramente observado em reações de dimerização, embora na natureza sejam as ligações β -O-4 as predominantemente formadas na síntese de polímeros (ADELAKUN et al., 2012a; NEMADZIVA et al., 2018).

De forma análoga, o dímero β - β do ácido caféico foi sintetizado utilizando uma lacase de *Streptomyces coelicolor* A3(2) (Figura 4). O produto de síntese demonstrou aumento de 1,5 vezes na capacidade de sequestro do radical livre DPPH e atividade antioxidante equivalente ao Trolox aumentada em 1,8 vezes, comparativamente ao ácido cafeico. As propriedades de solubilidade aquosa e estabilidade à pH ácido foram melhoradas (NEMADZIVA et al., 2018).

Figura 4. Via de reação proposta para a síntese de phellinsin A catalisada por lacase.

Fonte: Modificado de Nemadziva et al. (2018).

Dado o grande interesse nas propriedades dos compostos de síntese, condições operacionais otimizadas são fundamentais para configurar um processo eficiente e econômico. A polimerização do monômero de rutina foi previamente elucidada por Kurisawa et al. (2003). O polímero demonstrou atividade de eliminação de superóxido e inibição na oxidação de lipoproteína de baixa densidade humana (LDL) ampliadas. Entretanto, estudos adicionais conduzidos por Muñiz-Mouro et al. (2018) demonstraram que o oligômero de rutina provenientes de reação com lacase com baixa atividade enzimática inicial obteve melhores características nutracêuticas. O aumento da atividade enzimática também influenciou negativamente a estabilidade térmica do produto. Doses mais elevadas de enzimas promoveram a formação de múltiplas ligações intermoleculares entre as unidades de rutina, o que reduziu o conteúdo de fenólicos na molécula, com consequente queda na atividade antioxidante (HEIM; TAGLIAFERRO; BOBILYA, 2002).

A oxidação do composto fenólico 2,6 dimetoxifenol por lacase de *Trametes pubescens* gerou, como produto principal, um dímero simétrico do substrato obtida de uma ligação C–C (3,3',5,5'-tetrametoxi-bifenil-4,4'-diol) (ADELAKUN et al. 2012b). De acordo com os ensaios DPPH e FRAP, o dímero demonstrou atividade antioxidante aproximadamente duas vezes maior do que o substrato fenólico. Os resultados sustentam a potencialidade da aplicação da lacase na síntese de compostos nutracêuticos com interesse comercial.

Reano et al. (2016) demonstraram o uso de lacase comercial oriunda de *Trametes versicolor* na síntese de compostos para utilização como polímeros de embalagens de alimentos. A reação procedeu com a oligomerização de bisfenóis à base de ácido diidroferúlico renováveis para síntese de novos oligômeros com elevadas atividades antioxidantes. Esses oligômeros fenólicos alifáticos - aromáticos, com porções do tipo bisgúaiacol, exibiram alta estabilidade térmica, bem como potente atividade antioxidante demonstrada pelo método DPPH.

Apesar dos diversos estudos evidenciando a ação eficiente da lacase em processos de síntese de compostos com valor agregado, estes são conduzidos em escala laboratorial. A falta de estabilidade operacional por períodos prolongados e a dificuldade de recuperação e reuso

das enzimas quando na forma livre, fazem sua aplicação em escala industrial ser limitada. Dessa forma, a imobilização enzimática vem sendo empregada como alternativa eficaz para transpor tais empecilhos e produzir biocatalisadores industriais robustos (VELASCO-LOZANO et al., 2015).

3.5. Imobilização de lacase: alternativa para melhorar o desempenho reacional das lacases

A imobilização enzimática consiste na restrição da mobilidade celular através de interações químicas ou físicas à uma fase (matriz ou suporte) diferente daquele para substratos e produtos (BOUABIDI; EL-NAAS; ZHANG, 2019). Enquanto as interações físicas se baseiam na adsorção ou aprisionamento da porção enzimática, as interações químicas se estabelecem por ligações covalentes à um suporte ou ligações cruzadas (reticulação) (Figura 5) (DARONCH et al., 2020).

Quando imobilizada, a lacase apresenta aumento da estabilidade, com proteção da estrutura da enzima às condições adversas, maior durabilidade e possibilidade de reuso acrescido. Tais fatores se traduzem em redução dos custos operacionais e aumento na eficiência do sistema biocatalítico (VELASCO-LOZANO et al., 2015; NAGHDI et al., 2019; DARONCH et al., 2020).

Figura 5. Esquema ilustrativo da imobilização enzimática por adsorção em suporte (a), encapsulamento (b), ligação covalente ao suporte (c) e ligação cruzada (d).

Fonte: Próprio autor (2020).

Vários métodos já foram reportados para imobilização eficaz de lacase, nomeadamente imobilização em polímeros, imobilização com quitosana (NAGHDI et al., 2019) e suporte de agarose anionicamente ativado (BRUGNARI et al., 2018). Portadores multifários também têm sido estudados para a imobilização da lacase (ZHOU et al., 2013; LIU et al., 2012), entre outros.

Lacases imobilizadas já provvaram ser uma poderosa ferramenta para produção de biossensores industriais (CABALLERO et al., 2018; MOHTAR et al., 2019), degradação de

poluentes ambientais (RATANAPONGLEKA; PUNBUT, 2017; VIDAL-LIMON et al., 2018), deslignificação de biomassa lignocelulósica (AMIN et al., 2018; ASGHER et al., 2018) e melhoramento de características sensoriais e tecnológicas de alimentos e bebidas (HOU et al., 2016; LETTERA et al., 2016). Entretanto, enquanto a pesquisa e aplicação de lacase livre na síntese de novos compostos orgânicos com propriedades bioativas é já realidade, há uma escassez bibliográfica em estudos que elucidem seu comportamento quando na forma imobilizada. Os resultados promissores da aplicação deste biocatalisador nos mais distintos segmentos industriais, aliado aos avanços de técnicas de imobilização enzimática, demanda que esta lacuna científica seja melhor explorada e elucidada.

4. Considerações Finais

A versatilidade bioquímica da lacase se deve à sua capacidade de oxidação de uma ampla gama de substratos. O interesse nestas enzimas como biocatalisadores em reações de oligomerização e polimerização de monômeros fenólicos é crescente devido à possibilidade de melhoria das atividades biológicas dos compostos formados em relação aos compostos de origem. Os produtos reacionais sintetizados são úteis para aplicações em indústrias de alimentos, farmacêutica e cosmética dada a notável atividade antioxidante dos mesmos. Ademais, esta é uma abordagem ambientalmente correta que se enquadra no conceito de “química verde”.

5. Agradecimentos

Os autores Camila Gabriel Kato Schwartz (Bolsa PDJ-Proc. 151189/2019-6), Emanuelli Backes (bolsa-doutorado) e Rosane Marina Peralta (Proc. 304406/2019-8 e Proc. 404898/2016-5) agradecem o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

6. Referências

- ADELAkun, O.E.; KUDANGA, T.; PARKER, A.; GREEN, I.R.; ROES-HILL, M.L.; BURTON, S.G. Laccase catalyzed dimerization of ferulic acid amplifies antioxidant activity, **Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic**, v. 74, p. 29–35, 2012a.
- ADELAkun, O.E.; KUDANGA, T.; GREEN, I.R.; ROES-HILL, M.L.; BURTON, S.G. Enzymatic modification of 2,6-dimethoxyphenol for the synthesis of dimers with high antioxidant capacity. **Process Biochemistry**, v. 47, p. 1926–1932, 2012b.

AGRAWAL, K.; CHATURVEDI, V.; VERMA, P. Fungal laccase discovered but yet undiscovered. **Bioresources and Bioprocessing**, v. 5(4), p. 1–12, 2018.

ALVES, C.Q.; DAVID, J.M.; DAVID, J.P.; BAHIA, M.V.; AGUIAR, R.M. Métodos para determinação de atividade antioxidante in vitro em substrato orgânicos. **Química Nova**, v.33 (10), p. 2202–2210, 2010.

AMIN, R.; KHORSHIDI, A.; SHOJAEI, A.F.; REZAEI, S.; FARAMARZI, M.A. Immobilization of laccase on modified Fe₃O₄@SiO₂@Kit-6 magnetite nanoparticles for enhanced delignification of olive pomace bio-waste. **International Journal of Biological Macromolecules**, v. 114, p. 106–113, 2018.

ASGHER, M.; WAHAB, A.; BILAL, M.; IQBAL, H.M.N. Delignification of lignocellulose biomasses by alginate–chitosan immobilized laccase produced from *Trametes versicolor* IBL-04. **Waste Biomass Valor**, v. 9, p. 2071–2079, 2018.

BARRIOS-ESTRADA, C., ROSTRO-ALANIS, M. DE J., MUÑOZ-GUTTIÉRREZ, B.D., IQBAL, H.M.N., KANNAN, S., PARRA-SALDÍVAR, R. Emergent contaminants: endocrine disruptors and their laccase-assisted degradation – a review. **Science of The Total Environment**, v. 612, p. 1516–1531, 2018.

BENZIE, I.F.F.; STRAIN, J.J. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of antioxidant power: the frap assay. **Analytical Biochemistry**, v. 239, p. 70–76, 1996.

BILAL, M.; RASHEEDB, T.; NABEELB, F.; IQBALC, H.M.N.; ZHAO, Y. Hazardous contaminants in the environment and their laccase-assisted degradation – A review. **Journal of Environmental Management**, v. 234, p. 253–264, 2019.

BOUABIDI, Z.B.; EL-NAAS, M.H.; ZHANG, Z. Immobilization of microbial cells for the biotreatment of wastewater: A review. **Environmental Chemistry Letters**, v. 17, p. 241–257, 2019.

BRUGNARI, T.; PEREIRA, M.G.; BUBNA, G.A.; FREITAS, E.N.; CONTATO, A.G.; CORRÊA, R.C.G.; CASTOLDI, R.; SOUZA, C.G.M.; POLIZELI, M.L.T.M.; BRACHT, A.; PERALTA, R.M. A highly reusable MANAE-agarose-immobilized *Pleurotus ostreatus* laccase for degradation of bisphenol A. **Science of the Total Environment**, v. 634, p. 1346–1351, 2018.

CABALLERO, S.J.; GUERRERO, M.A.; VARGAS, L.Y.; ORTIZ, C.C.; CASTILLO, J.J.; GUTIÉRREZ, J.A.; BLANCO, S. Electroanalytical determination of catechol by a biosensor based on laccase from *Aspergillus oryzae* immobilized on gold screen-printed electrodes. **Journal of Physics: Conference Series**, v. 1119(1), 012009d, 2018.

CHAUHAN, P.S.; BINDI GORADIA, B.; SAXENA, A. Bacterial laccase: recent update on production, properties and industrial applications. **3 Biotech**, v. 7, p. 323–343, 2017.

DAGLIA, M. Polyphenols as antimicrobial agents. **Current Opinion in Biotechnology**. V. 23, p. 174–181, 2012

DARONCH, N.A.; KELBERT, M.; PEREIRA, C.S.; ARAÚJO, P.H.H.; OLIVEIRA, D. Elucidating the choice for a precise matrix for laccase immobilization: A review. *Chemical Engineering Journal*, v. 397, 125506, 2020.

DEGÁSPARI, C.H.; WASZCZYNSKYJ, N. Propriedades antioxidantes de compostos fenólicos. *Visão Acadêmica*, v. 5(1), p. 33–40, 2004.

DEVASIA, S.; NAIR, J.A. Screening of potent laccase producing organisms based on the oxidation pattern of different phenolic substrates. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, v. 5, p. 127–137, 2016.

DHIMAN, K.; SHIRKOT, P. Bioprospecting and molecular characterization of laccase producing bacteria from paper mills of Himachal Pradesh. *Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section B: Biological Sciences*, v. 85, p. 1095–1103, 2015.

GAVNHOLT, B.; LARSEN, K. Molecular biology of plant laccases in relation to lignin formation. *Physiologia Plantarum*, v.116. p. 273–280, 2002.

HEIM, K.E.; TAGLIAFERRO, A.R.; BOBILYA, D.J. Flavonoid antioxidants: Chemistry, metabolism and structure-activity relationships. *Journal of Nutritional Biochemistry*, v. 13, p. 572–584, 2002.

HELENO, S.A.; MARTINS, A.; QUEIROZ, M.P.R.P.; FERREIRA, I.C.F.R. Bioactivity of phenolic acids: metabolites versus parent compound: A review. *Food Chemistry*, v. 173, p. 501–513, 2015.

HOU, J-J.; YANG, X-Q.; FU, S-R.; WANG, M-P.; XIAO, F. Preparation of double-network tofu with mechanical and sensory toughness. *International Journal of Food Science Technology*, v. 51, p. 962–969, 2016.

JANUSZ, G.; PAWLIK, A.; SWIDERSKA-BUREK, U.; POLAK, J.; SULEJ, J.; JAROSZ-WILKOŁAZKA, A.; PASZCZYNSKI, A. Laccase properties, physiological functions, and evolution. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 21(966), p. 1–25, 2020.

JEON, J-R.; KIM, E-J.; MURUGESAN, K.; PARK, H-K.; KIM, Y-M.; KWON, J-H.; KIM, W-G.; LEE, J-Y.; CHANG, Y-S. Laccase-catalysed polymeric dye synthesis from plant-derived phenols for potential application in hair dyeing: Enzymatic colourations driven by homo- or hetero-polymer synthesis. *Microbial Biotechnology*, v. 3, p. 324–335, 2010.

KATO, C.G.; GONÇALVES, G.A.; PERALTA, R.A.; SEIXAS, F.A.V.; DE SÁ-NAKANISHI, A.B.; BRACHT, L. COMAR, J.F.; BRACHT, A.; PERALTA, R.M. Inhibition of-amylases by condensed and hydrolysable tannins: focus on kinetics and hypoglycemic actions. *Enzyme Research*, v. 2017, p. 1–17, 2017.

KURISAWA, M.; CHUNG, J.E.; UYAMA, H.; KOBAYASHI, S. Enzymatic synthesis and antioxidant properties of poly(rutin). *Biomacromolecules*, v. 4, p. 1394–1399, 2003.

LETTERA, V.; PEZZELLA, C.; CICATIELLO, P.; PISCITELLI, A.; GIACOBELLI, V. G.; GALANO, E.; AMORESANO, A.; SANNIA, G. Efficient immobilization of a fungal laccase and its exploitation in fruit juice clarification. *Food Chemistry*, v. 196, p. 1272–1278, 2016.

LIU, Y.Y.; ZENG, Z.T.; ZENG, G.M.; TANG, L.; PANG, Y.; LI, Z.; LIU, C.; LEI, X.X.; WU, M.S.; REN, P.Y.; LIU, Z.F.; CHEN, M.; XIE, G.X. Immobilization of laccase on magnetic bimodal mesoporous carbon and the application in the removal of phenolic compounds. **Bioresource Technology**, v. 115, p. 21–26, 2012.

MAMEDE, M.E.O.; PASTORE, G.M. Compostos fenólicos do vinho: estrutura e ação antioxidante. **Boletim CEPPA**, v. 22(2), p. 233–252, 2004.

MOGHARABI, M.; FARAMARZI, M.A. Laccase and Laccase-Mediated Systems in the Synthesis of Organic Compounds. **Advanced Synthesis & Catalysis**, v. 356, p. 897–927, 2014.

MOHTAR, L.G.; ARANDA, P.; MESSINA, G.A.; NAZARENO, M.A.; PEREIRA, S.V.; JULIO RABA, J.; BERTOLINO, F.A. Amperometric biosensor based on laccase immobilized onto a nanostructured screen-printed electrode for determination of polyphenols in propolis. **Microchemical Journal**, v. 144, p. 13–18, 2019.

MUNIZ-MOURO, A.; OLIVEIRA, I.M.; GULLÓN, B.; LÚ-CHAU, T.A.; MOREIRA, M.T.; LEMA, J.M.; EIBES, G. Comprehensive investigation of the enzymatic oligomerization of esculin by laccase in ethanol : water mixtures. **RSC Advances**, v. 7, p. 38424–34833, 2017.

MUÑIZ-MOURO, A.; GULLÓN, B.; LÚ-CHAU, T.; MOREIRA, M.; LEMA, J.; EIBES, G. Laccase Activity as an Essential Factor in the Oligomerization of Rutin. **Catalysis**, v. 8(321), p. 1–15, 2018.

NAGHDI, M.; TAHERAN, M.; BRAR, S.K.; KERMANSHAHI-POUR, A.; VERMA, M.; SURAMPALLI, R.Y. Fabrication of nanobiocatalyst using encapsulated laccase onto chitosan-nanobiochar composite. *International Journal of Biological Macromolecules*, v. 1, p. 530–536, 2019.

NARAYANAN, M.P.; MURUGAN, S.; EVA, A.S.; DEVINA, S.U.; KALIDASS, S. Application of immobilized laccase from *Bacillus subtilis* MTCC 2414 on decolourization of synthetic dyes. **Research Journal of Microbiology**, v. 10, p. 421–432, 2015.

NEMADZIVA, B.; ROES-H, M. L.; KOORBANALLY, N.; KUDANGA, T. Small laccase-catalyzed synthesis of a caffeic acid dimer with high antioxidant capacity. **Process Biochemistry**, v. 69, p. 99–105, 2018.

PEZZELLA, C.; GUARINO, L.; PISCITELLI, A. How to enjoy laccases. **Cellular and Molecular Life Sciences**, v. 72, p. 923–940, 2015.

POLAK, J.; JAROSZ-WILKOLAZKA, A. Fungal laccases as green catalysts for dye synthesis. **Process Biochemistry**, v. 47, p. 1295–1307, 2012.

PREHN, R.; GONZALO-RUIZ, J.; CORTINA-PUIG, M. Electrochemical detection of polyphenolic compounds in foods and beverages. **Current Analytical Chemistry**, v. 8(4), p. 472–484, 2012.

RATANAPONGLEKA, K.; PUNBUT, S. Removal of acetaminophen in water by laccase immobilized in barium alginate. **Environmental Technology**, v. 39(3), p. 336–345, 2017.

REANO, A. F.; PION, F.; DOMENEK, S.; DUCROT, P.-R.; ALLAIS, F. Chemo-enzymatic preparation and characterization of renewable oligomers with bisguaiacol moieties: promising sustainable antiradical/antioxidant additives. **Green Chemistry**, v. 18(11), p. 3334-3345, 2016.

REZAEI, S.; SHAHVERDI, A.R.; FARAMARZI, M.A. Isolation, one-step affinity purification, and characterization of a polyextremotolerant laccase from the halophilic bacterium *Aquisalibacillus elongatus* and its application in the delignification of sugar beet pulp. **Bioresource Technology**, v. 230, p. 67–75, 2017.

RIVERA-HOYOS, C.M.; MORALES-ÁLVAREZ, E.D.; POUTOU-PIÑALES, R.A.; PEDROSA-RODRIGUEZ, A.M.; RODRIGUEZ-VÁSQUEZ, R.; DELGADO-BOCADA, J.M. Fungal laccases. **Fungal Biology Reviews**, v. 27, p. 67–82, 2013.

SHARMA, A.; JAIN, K.K.; JAIN, A.; KIDWAI, M.; KUHAD, R.C. Bifunctional in vivo role of laccase exploited in multiple biotechnological applications. **Applied Microbiology and Biotechnology**, v. 102, p. 10327–10343, 2018.

SINGH, B.; SINGH, J.; KAUR, A.; SINGH, N. Phenolic compounds as beneficial phytochemicals in pomegranate (*Punica granatum* L.) peel: A review. **Food Chemistry**, v. 261, p. 75–86, 2018.

SOARES, S.E. Ácidos fenólicos como antioxidantes. **Revista de Nutrição**, v. 15(1), p. 71–81, 2002.

SUCUPIRA, N.R.; SILVA, A.B.; PEREIRA, G.; COSTA, J.N. Métodos para determinação da atividade antioxidante de frutos. **Ciências Biológicas e da Saúde**, v. 14 (4), p. 263–269, 2012.

TAHERAN, M.; NAGHDI, M.; BRAR, S.K.; KNYSTAUTAS, E.J.; VERMA, M.; SURAMPALLI, R.Y. Degradation of chlortetracycline using immobilized laccase on polyacrylonitrile-biochar composite nanofibrous membrane. **Science of The Total Environment**, v. 605-606, p. 315–321, 2017.

VIDAL-LIMON, A.; SUÁREZ, P.C.G.; ARELLANO-GARCÍA, A.; CONTRERAS, O.E.; AGUILA, S.A. Enhanced Degradation of Pesticide Dichlorophen by Laccase Immobilized on Nanoporous Materials: A Cytotoxic and Molecular Simulation Investigation. **Bioconjugate Chemistry**, v. 29, p. 1073–1080, 2018.

VELASCO-LOZANO, S.; LÓPEZ-GALLEGU, F.; MATEOS-DÍAZ, J.C.; FAVELATORRES, E. Cross-linked enzyme aggregates (CLEA) in enzyme improvement – A review. **Biocatalysis**, v. 1, p. 166–177, 2015.

XIAO, J. Dietary flavonoid aglycones and their glycosides: Which show better biological significance? **Critical Reviews in Food Science and Nutrition**, v. 57(9), p. 1874–1905, 2017.

XIAO, J.; CAPANOGLU, E.; JASSBI, A.R.; MIRON, A. Advance on the flavonoid C-glycosides and health benefits. **Critical Reviews in Food Science and Nutrition**, v. 56, p. 29–45, 2016.

WANG, J.; FENG, J.; JIA, W.; CHANG, S.; LI, S.; LI, Y. Lignin engineering through laccase modification: A promising field for energy plant improvement. **Biotechnol. Biofuels**, v. 8(145), p. 1–11, 2015.

WELLINGTON, K.W.; GOVINDJEE, V.P.; STEENKAMP, P. A laccase- catalysed synthesis of triaminated cyclohexa-2,4-dienones from catechol. **Journal of Catalysis**, v. 368, p. 306–314, 2018.

ZHANG, J.; CHEN, H.; CHEN, M.; REN, A.; HUANG, J.; WANG, H.; ZHAO, M.; FENG, Z. Cloning and functional analysis of a laccase gene during fruiting body formation in *Hypsizygus marmoreus*. **Microbiological Research**, v. 179, p. 54–63, 2015.

ZHOU, Z.; HARTMANN, M. Progress in enzyme immobilization in ordered mesoporous materials and related applications. **Chemical Society Reviews**, v. 42(9), p. 3894–3912, 2013.

ZIYATDINOVA, G.; SNEGUREVA, Y.; BUDNIKOV, H. Novel approach for the voltammetric evaluation of antioxidant activity using DPPH – modified electrode. **Electrochimica Acta**, v. 247, p. 97–106, 2017.

CAPÍTULO 19: BIOINSETICIDAS OBTIDOS POR *Bacillus thuringiensis* MICROENCAPSULADOS: UMA REVISÃO

CHAPTER 19: BIOINSECTICIDES OBTAINED BY MICROENCAPSULATED *Bacillus thuringiensis*: A REVIEW

Maria Clara do Nascimento¹; Marcia Nieves Carneiro da Cunha²; Juanize Matias da Silva Batista³
Thiago Pajeú Nascimento⁴; Ana Lúcia Figueiredo Porto⁵

Resumo

Os insetos compõem o maior grupo do Reino Animal e são extremamente importantes para o equilíbrio ecológico da natureza, muitos são até explorados comercialmente pelos humanos devido à geração de vários produtos, como por exemplo o mel. Apesar de tal positividade, alguns insetos são considerados “vilões” por causarem danos à agricultura e por propagarem diversas doenças. Com isso é vasto o número de pesquisas a fim de produzir inseticidas bastante eficientes, menos danosos ao meio ambiente e a saúde humana, e que tenham um baixo custo de produção. A fonte que mais apresenta essas vantagens é a microbiana, na qual se destaca a bactéria *Bacillus thuringiensis* (Bt) devido às inúmeras pesquisas e produtos já realizados com sucesso. Outro fator que atende a tais necessidades é a técnica de microencapsulação, que visa melhorar pontos como o efeito, proteção e manipulação dos inseticidas. Por isso, o objetivo desse trabalho é descrever os três pontos supracitados (inseticidas, Bt e microencapsulação) e discutir pesquisas referentes a agentes inseticidas produzidos por Bt e que sejam microencapsulados. Os trabalhos aqui apresentados demonstram que a Bt é ótima produtora de compostos secundários com ação inseticida e que a microencapsulação de fato potencializa os efeitos dos produtos.

Palavras-Chave: Biotecnologia, Microrganismos, Insetos, Revestimento de ingredientes ativos.

Abstract

Insects make up the largest group in the Animal Kingdom and are extremely important for the ecological balance of nature, many are even commercially exploited by humans due to the generation of various products, such as honey. Despite such positivity, some insects are considered "villains" for causing damage to agriculture and for spreading various diseases. With this, the number of researches is vast in order to produce very efficient insecticides, less harmful to the environment and human health, and that have a low production cost. The source that most presents these advantages is the microbial, in which the bacterium *Bacillus thuringiensis* (Bt) stands out due to the numerous researches and products already carried out with success. Another factor that meets these needs is the microencapsulation technique, which aims to improve points such as the effect, protection and manipulation of

¹ Graduanda em Bacharelado em Ciências Biológicas, Universidade Federal Rural de Pernambuco, mclaranaascimento@hotmail.com

² Pós Doutoranda, Universidade Federal Rural de Pernambuco, marcianieves@yahoo.com.br

³ Pós Doutoranda, Universidade Federal Rural de Pernambuco, juanizematias@yahoo.com.br

⁴ Pós Doutorando, Universidade Federal Rural de Pernambuco, thiago_pajeu@hotmail.com

⁵ Professora Titular, Universidade Federal Rural de Pernambuco, analuporto@yahoo.com.br

insecticides. Therefore, the objective of this work is to describe the three points mentioned above (insecticides, Bt and microencapsulation) and discuss research related to insecticidal agents produced by Bt and that are microencapsulated. The works presented here demonstrate that Bt is an excellent producer of secondary compounds with insecticidal action and that microencapsulation actually enhances the effects of the products.

Keywords: Biotechnology, Microorganisms, Insects, Coating of active ingredients.

1. Introdução

A Classe Insecta é a mais numerosa e diversificada do Filo Arthropoda, os insetos são invertebrados que tiveram um enorme sucesso evolutivo devido algumas adaptações como os apêndices articulados e a capacidade de voo (BUZZI, 2013). São animais que estão presentes em todos os ambientes e possuem grande importância ecológica e econômica por realizar importantes funções como, manter o equilíbrio de cadeias alimentares, polinização e produção de produtos comercializados pelo homem como a seda e o mel (PASUPULETI; ARIGELA, 2020; RADER et al., 2016). Os insetos também são utilizados em processos criminais quando se aplica a entomologia forense, onde a partir da espécie de inseto e o estágio do seu desenvolvimento sobre um determinado cadáver pode determinar o tempo de morte do indivíduo (BRUNDAGE; BYRD, 2016). Alguns insetos são danosos à saúde humana por serem vetores ou causadores das arboviroses, como a dengue por exemplo, outros insetos são considerados pragas agrícolas quando nocivos a plantas e produtos vegetais. Tais problemáticas levam a buscas por produtos que sejam utilizados contra os insetos, ou seja, levam aos inseticidas (CAMARA, 2016; SAWICKA; EGBUNA, 2020).

Os produtos utilizados no controle ou extermínio total dos insetos podem ser produzidos a partir de compostos orgânicos ou inorgânicos que sejam de origem sintética ou natural. Bactérias, vírus, fungos e nematoides são fontes naturais de compostos tóxicos aos insetos que geram produtos vantajosos em comparação com os sintéticos devido a diversas vantagens como a baixa taxa de toxicidade a saúde humana, ao meio ambiente e espécies não alvo, e o baixo custo de produção, por exemplo (NETO et al., 2017). O gênero *Bacillus* envolve bactérias gram-positivas produtoras de endósporos que podem ser encontradas em variados substratos e que são muito utilizadas na produção de pesticidas. A espécie *Bacillus thuringiensis* (Bt) é produtora de δ -endotoxinas, proteínas com morfologia de cristais conhecidas como proteína Cry, composto que possui atividade entomopatogênica contra diversos insetos, sendo esse grupo um dos principais presentes o mercado de bioinseticidas (GALZER; FILHO, 2016).

Ultimamente os artefatos utilizados no controle de insetos estão sendo submetidos à técnica de microencapsulação, procedimento no qual uma camada extra pode ser utilizada afim de melhorar vários aspectos desde a produção até a utilização do inseticida, como potencializar o efeito do produto, assegurar boas condições de armazenamento, garantir que o inseticida seja liberado apenas no local exato e pelo tempo desejado, assim diminuindo o tempo de exposição e eventual toxicidade as pessoas que o manipulam e ao meio ambiente, e visando vários outros proveitos (YUSOP et al., 2017).

Contudo, o objetivo dessa revisão narrativa é descrever os principais tópicos que envolvem os bioinseticidas microencapsulados oriundos da bactéria *Bacillus thuringiensis*, e dissertar algumas pesquisas realizadas nos últimos 5 anos que envolvem esse tema.

2. Desenvolvimento

2.1 Inseticidas

Devido aos problemas causados por alguns insetos como a proliferação de doenças tal como a dengue, malária, doença de Chagas e leishmaniose, e os inúmeros danos a plantações, como por exemplo a interferência no crescimento das plantas, desvalorização de frutos, morte ou até mesmo a aniquilação total de colheitas, é incessante a busca por produtos que atuem no controle ou erradicação total desses insetos (CHAO et al., 2020; SAEED et al., 2020; SENAPATI et al., 2019; ZHANG et al., 2020). Todo composto capaz de atingir o ovo, a larva ou o inseto já adulto é denominado inseticida, esses são frequentemente utilizados por várias esferas, desde indústrias a uso doméstico (WOJCIECHOWSKA et al., 2016; ZHANG et al., 2020).

A penetração dos inseticidas no corpo do inseto consiste em como ou por onde ele atinge o inseto, assim eles podem ser classificados em: inseticidas de ingestão quando penetram no organismo alvo via oral e são absorvidos pelo intestino; inseticidas de contato são os que entram em contato com o tegumento; os inseticidas de fumigação invadem o organismo através das vias respiratórias; ao agir através da ação translaminar o modo de ação do inseticida é definido como de profundidade; há ainda aqueles que translocam pelo sistema vascular das plantas até atingirem o inseto, os inseticidas sistêmicos (ATHANASSIOU; ARTHUR, 2018).

Os inseticidas podem ser realocados em vários grupos de acordo com o seu sítio de ação, eles podem atuar sobre o sistemas nervoso e muscular, intestino, sistema respiratório, crescimento e desenvolvimento ou podem até ter local de ação inespecífico/desconhecido.

Na Tabela 1 estão as classificações de alguns grupos de inseticidas de acordo com sua fisiologia alvo (SPARKS et al., 2020).

Tabela 1. Grupos de inseticidas de acordo com seu sítio de ação.

Fisiologia Alvo	Grupo
Músculo e Nervo	Inibidores de Acetilcolinesterase
	Antagonistas dos canais de cloro regulados por GABA
	Moduladores dos canais de sódio
	Bloqueadores dos receptores nicotínicos de acetilcolina
Respiração	Inibidores da ATP sintase mitocondrial
	Desacopladores da fosforilação oxidativa via interrupção do gradiente de prótons
Intestino Médio	Inibidores de transporte de elétrons, complexo mitocondrial I, II, III e IV
	Disruptores microbianos do intestino dos insetos
Crescimento e Desenvolvimento	Disruptores virais da membrana peritrófica do intestino médio
	Simuladores do hormônio juvenil
	Inibidores de crescimento de ácaros
	Inibidores da biosíntese de quitina, tipos 0 e 1
	Agonistas do receptor de ecdisona

Fonte: Adaptado de Sparks et al. (2020).

Estudos toxicológicos agudos levam a classificação toxicológica dos inseticidas que serve para distinguir os inseticidas mais perigosos dos menos danosos à saúde humana. A Organização Mundial da Saúde (OMS) (2020) classifica a toxicidade do inseticida com base na dose letal média aguda ingerida via oral e dérmica de 50 mg/kg (DL₅₀) em estudos realizados com ratos, assim os inseticidas e vários outros produtos químicos são divididos em cinco classes:

- Os produtos inseridos na Classe Ia são categorizados como extremamente perigoso quando a DL₅₀ atinge valores < 5 mg/kg via oral e < 50 mg/kg via dérmica;
- Quando a DL₅₀ fica entre 5-50 mg/kg quando ingerido via oral e entre 50-200 mg/kg por via dérmica o produto é considerado altamente perigoso e denominados como Classe Ib;
- Aqueles moderadamente perigosos estão na Classe II que inclui os que atingem DL₅₀ de 50 a 2000 mg/kg para ambas as vias;
- A Classe III reúne a categoria dos ligeiramente perigosos, que são os de DL₅₀

oral/dérmica < 2000 mg/kg;

- Aqueles que não são provável que apresentem risco agudo ($DL50 \geq 5000$ mg/kg) estão dentro da Classe U.

A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 294, de 29 de julho de 2019 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define a classificação dos agrotóxicos, afins e preservativos de madeira no Brasil. A mesma assim como a classificação da OMS é baseada na toxicidade aguda da dose letal média, porém, além das vias oral e dérmica insere a via inalatória que compreende aos gases, vapores, produtos sólidos e líquidos (PSeL). Além disso, a ANVISA determina que os agrotóxicos tenham cores pré-definidas em sua rotulagem de acordo com sua posição na classe toxicológica como pode ser visto na Tabela 2. A classe 1 engloba os agrotóxicos extremamente tóxicos, na classe 2 encontram-se os altamente tóxicos, aqueles considerados moderadamente tóxicos estão na classe 3, os poucos tóxicos estão na classe 4 e os que são improváveis de causar danos agudos estão na classe 5 (BRASIL, 2019).

Tabela 2. Classes Toxicológicas de acordo com a RDC nº 294, de 29 de julho de 2019.

Via					Categoria	Cor do Rótulo
Oral (mg/kg)	Dérmica (mg/kg)	Gases (ppm/V)	Inalatória Vapores (mg/L)	PSeL (mg/L)		
≤ 5	≤ 50	≤ 100	$\leq 0,5$	$\leq 0,005$	1	Vermelho
>5 - 50	>50 - 200	>100-500	>0,5 - $\leq 2,0$	>0,05 - 0,5	2	Vermelho
>50 - 300	>299-1000	>500-2500	>2,0- ≤ 10	>0,5-1,0	3	Amarelo
>300-2000	>1000-2000	>2500-20000	>10- ≤ 20	>1,0-5,0	4	Azul
>2000-5000	>2000-5000	>20000	>20	>5,0	5	Azul
>5000	>5000	-	-	-	Não classificado	Verde

Fonte: Adaptado da ANVISA (2019) , apenas para fins ilustrativos.

De acordo com sua fonte, os produtos utilizados no controle ou extermínio de insetos podem ser classificados como inseticidas químicos ou naturais. Os químicos são aqueles que

sua elaboração é realizada em laboratório utilizando materiais sintéticos e os inorgânicos (GUPTA et al., 2019). Os inseticidas de fontes naturais, ou seja, de origem biológica são os que possuem compostos extraídos de algum vegetal, animal ou microrganismo (PAULRAJ et al., 2016). Existe também a organização desses produtos em gerações. A primeira geração de inseticidas compreende aos inorgânicos como o enxofre e o arsênico, alguns orgânicos de origem vegetal como a nicotina e os organominerais (ATHANASSIOU; ARTHUR, 2018). O início da fabricação de inseticidas sintéticos entre o final do século XIX e início do século XX marcou a segunda geração desses produtos, sendo todos eles de largo espectro, ou seja, não atingia apenas o seu organismo alvo. Os produtos químicos ou naturais que afetam especificamente o crescimento e desenvolvimento dos insetos foram classificados como inseticidas de terceira geração (SOUSA et al., 2020).

Dependendo sua composição química os inseticidas podem ser divididos em dois grupos, os orgânicos, aqueles que possuem carbono em sua estrutura, e os inorgânicos, aqueles que não possuem carbono (ASHITHA; MATHEW, 2020). Os compostos inorgânicos eram os mais usados antigamente, porém devido a sua alta toxicidade aos grupos diferentes dos insetos, inclusive os humanos, eles foram caindo em desuso. Neste grupo encontram-se o chumbo, sulfatos, carbonatos, arsênico, alumínio, boro, cobre e vários outros compostos. O enxofre e o fosfina são os inseticidas inorgânicos mais utilizados ultimamente sendo eles utilizados contra ácaros e formigas, respectivamente (DAVIS, 2017; SARWAR, 2016). Os inseticidas sintéticos e naturais estão dentro do grande grupo de inseticidas orgânicos. Dentre os sintéticos estão: os organoclorados que possuem C, Cl e H em sua estrutura, muito persistentes no ambiente e nocivos ao homem causando diversas patologias, o dicloro difenil tricloroetano (DDT) (Figura 1) é um exemplo desse tipo de inseticida (JAYARAJ et al., 2016; PARADA et al., 2016); os organofosforados (Figura 2) incluem o ácido fosfórico e seus derivados com espectro de ação variável (OCK et al., 2020); na classe dos carbamatos (Figura 3) estão os inibidores da acetilcolinesterase elaborados a partir de alcaloides (JANKOWSKA, 2019); piretroides são os análogos sintéticos das piretrinas naturais, sua estrutura química é caracterizada pela presença de um anel com três carbonos, grupo carboxílico e um grupo vinil, a deltametrina (Figura 4) é um inseticida piretroide muito vendido no Brasil (ENSLEY, 2018); os compostos derivados e melhorados da nicotina formal a classe dos neonicotinóides, o primeiro a ser comercializado em meados anos 90 foi o imidaclopride (Figura 5) (MATSUDA et al., 2020); amitraz, fenilpirazóis (Figura 6) são outras classes químicas dos inseticidas (GUPTA; ANADÓN, 2018; KITA et al., 2017).

Figura 1. Estrutura do DDT.

Fonte: Adaptado de Sousa (2020).

Figura 2. Estrutura do organofosforado.

Fonte: Adaptado de Sousa (2020).

Figura 3. Estrutura do carbamato.

Fonte: Adaptado de Sousa (2020).

Figura 4. Estrutura do deltametrina.

Fonte: Adaptado de Sousa (2020).

Figura 5. Estrutura do imidaclopride.

Fonte: Adaptado de Sousa (2020).

Figura 6. Estrutura do fipronil

Fonte: Adaptado de Gupta e Anadón (2018).

Quando extraídos de animais, microrganismos, minerais ou plantas os inseticidas são ditos como naturais. Esse tipo de inseticida é mais interessante por causar menos danos à saúde humana e ao ambiente, e por serem biodegradáveis. Algumas plantas são produtoras de compostos secundários tóxicos aos insetos, como por exemplo a *Tanacetum cinerariifolium* na qual a partir de suas flores secas é extraído o piretro, composto que atinge o sistema nervoso dos insetos levando-os a morte. A azadiractina é um bioativo que pode ser obtido das sementes de *Azadirachta indica*, conhecida como Nim, e são utilizados na produção de inseticidas naturais. Vários óleos essenciais de outras plantas também são utilizados no controle biológico de insetos (IKBAL; PAVELA, 2019; ISMAN, 2020). Os estudos envolvendo microrganismos entomopatogênicos estimularam os pesquisadores a desenvolver produtos que agissem no controle de insetos, os metabólicos produzidos por esses indivíduos são altamente tóxicos para os insetos e inofensivos a saúde de outros animais e a natureza. Um dos motivos também do sucesso dos inseticidas microbianos é a sua facilidade de fabricação e alta produtividade por baixo custo, já que os bioprocessos envolvidos são bastantes simples e baratos. Metapremium, BoveMax EC®, CartuchoVIT e

Bt-horus são alguns inseticidas microbianos já presentes no comércio (NAWAZ et al., 2016). Alguns dos microrganismos utilizados na produção de bioinseticidas são: *Hirsutella* sp., *Phytophthora* sp., *Colletotrichum* sp., *Trichoderma* sp., *Metarhizium* sp., *Beauveria* sp., *Sporothrix* sp., *Aschersonia* sp., *Aspergillus* sp., *Entomophthora* sp., *Penicillium* sp., *Nosema* sp., Baculoviridae, *Bacillus* sp. e *Pseudomonas* sp.

2.2 *Bacillus thuringiensis*

Um dos principais microrganismos utilizados como agente bioinseticida é a bactéria do solo *Bacillus thuringiensis* (Bt). Essas bactérias são bioinseticidas seguros, biodegradáveis e de alto potencial, com elevada taxa de letalidade contra os insetos agrícolas (DEVI et al., 2019). Seu potencial entomopatogênico se deve a capacidade de sintetizar vários cristais proteicos durante a esporulação conhecidos como delta-endotoxinas. As delta-endotoxinas de *B. thuringiensis* são produzidas em diversas morfologias cristalinas como bipiramidais, cuboidais, esféricos e romboidais, onde cada tipo de cristal possui atividade inseticida apenas para uma ordem de inseto, e isso faz com que bioinseticidas formulados a base de Bt sejam ecologicamente seguros por não atingirem populações de insetos benéficos, outros invertebrados e vertebrados (FREIRE DA SILVA et al., 2020). Após a ingestão, estas toxinas são ativadas pela ação das enzimas digestivas que atuam em pH alcalino, ligam-se a receptores específicos nas células epiteliais do intestino médio e induzem poros na membrana que conduzem, habitualmente, a septicemia e morte de insetos (HERRERO et al., 2016).

2.3 Microencapsulação

Entretanto, a maioria dos entomopatógenos possuem algumas limitações quanto a sua utilização no campo, pois são suscetíveis à rápida degradação ambiental devido à radiação UV, calor, dessecação, pH do substrato e competição microbiana. Para garantir a eficácia, manipulação proveitosa, melhores condições de armazenamento, segurança e fácil aplicação os inseticidas precisam sofrer alteração de sua forma bruta para a utilizável, esse processo é denominado formulação. A formulação é composta pelo ingrediente ativo (substância que realmente controla a praga) e ingredientes inertes como surfactantes, um veículo e outros ingredientes como os corantes. Os ingredientes inertes são aditivos que visam a melhoria da manipulação do produto, aumenta sua toxicidade, proteção contra fatores ambientais, etc. Os tipos de formulações mais utilizadas são: pó seco, solúvel ou molhável; soluções concentradas; emulsões e concentrados emulsionável; suspensões concentradas; aerossol;

gases; granulados; pasta; adesivos e microencapsulado (WATANABE et al., 2016).

A microencapsulação é uma técnica em que micropartículas são envolvidas por uma camada a fim de protegê-las ou melhorar seu desempenho. Esse método visa proteger o material encapsulado de vários fatores como pH, temperatura e reações químicas indesejadas com outras materiais e também melhora a estabilidade e a viabilidade do produto. Micropartículas são partículas esféricas sólidas, líquidas ou gasosas que possuem de 1 a 1000µm. Em relação a sua estrutura as micropartículas podem ser classificadas em um tipo matricial em que a substância pode estar na superfície ou no interior denominado microesferas, e em microcápsulas onde a substância encontra-se no núcleo e envolvida por uma camada construída durante o processo de microencapsulação, esses dois tipos de micropartículas podem ser observados na Figura 7 (SUGANYA; ANURADHA, 2017).

Figura 7. Representação de uma microesfera (A) e Representação de uma micropartícula (B).

Fonte: Adaptado de Suave et al. (2006).

Os compostos utilizados no envolvimento das micropartículas são definidos agentes encapsulantes. Eles podem ser obtidos de fontes naturais, sintéticas ou semissintéticas. Cera, sacarose e gelatina são alguns dos tipos naturais. Os sintéticos envolvem polímeros e os semissintéticos acetato de celulose, nitrato de celulose e outros. O sucesso dos compostos bioativos encapsulados depende do tipo de substância que será utilizada na sua microencapsulação, o que é definido por suas características químicas e físicas, seu método de microencapsulamento e seu tipo de aplicação. A viscosidade, a capacidade de absorver água, capacidade de proteção, fácil manuseio durante o processo, boas condições de liberação da micropartícula e baixo custo são alguns pontos que devem ser estudados durante a escolha da substância que será utilizada na encapsulação (BHATIA, 2020; SONAWANE, 2020).

A maneira como ocorre a liberação do bioativo presente no núcleo da microcápsula é ponto crucial no sucesso da ação da micropartícula em seu uso final. Geralmente a escolha

da técnica da encapsulação foca o controle da excreção da substância envolvida tendo a finalidade de definir o modo de como ela será liberada, os locais onde o bioativo precisa ser preservado ou liberado para começar agir, o tempo em que ele levará para começar a ser liberado e a duração da mesma (CASTRO et al., 2017). A eliminação do núcleo pode ocorrer de maneira mecânica quando algo entra em atrito com o microencapsulado e rompe o revestimento da partícula, por dissolução do encapsulado em solvente de interesse, dependendo da temperatura que muda o estado da matéria ou por meio de alterações químicas. O material utilizado na envoltura da micropartícula e o modo de liberação definido para tal irão definir a velocidade e a quantidade do produto liberado, o que também depende de qual será o uso da substância (CANDIAGO et al., 2018).

As metodologias de microencapsulação irão depender das propriedades do bioativo, principalmente as química e física, devido as interações da micropartícula com o material escolhido para o envelopamento e o seu tamanho. O número de técnicas já reconhecidas por patente é numeroso e vem crescendo cada vez mais, todos os métodos existentes podem ser em três grandes grupos: químico, físico e físico-químico. Alguns dos métodos físicos são: a liofilização, processo onde um material líquido congelado é desidratado por sublimação (PISANO et al., 2019); o *spray chilling*, método de congelamento por atomização (YIN; CADWALLADER, 2018); e o leito fluidizado, técnica na qual um sólido com menos que 100µm é transformado líquido por algum gás ou líquido quente e seco (ESTEVINHO; ROCHA, 2018). Entre os métodos químicos podem ser encontrados a polimerização interfacial, nessa técnica se usa uma emulsão água/óleo para polimerizar os monômeros líquidos ou sólidos de 1-500µm (KAMBLE et al., 2018); e a inclusão molecular em que normalmente líquidos são encapsulados por β -ciclodextrina (OZKAN et al., 2018). Entre os métodos físico-químicos mais utilizados estão: a coacervação, onde micropartículas menores que 500 µm são separadas devido a formação de três fases imisturáveis seguida da deposição e endurecimento do material encapsulante sobre a micropartícula, quando se utiliza só um polímero a coacervação é denominada simples, caso sejam utilizados mais de um passa a ser chamada de coacervação complexa e a emulsificação variando a utilização de água e óleo seguida de evaporação do solvente utilizado; além delas existem outras técnicas como a pulverização em agente formador de reticulação e envolvimento lipossômico (GUMFEKAR, 2020; TIMILSENA et al., 2019).

A aplicação da microencapsulação abrange diversas áreas como o ramo farmacêutico, onde o método é utilizado para melhorar o sabor, liberação, odor e redução de

irritações dos medicamentos. Paracetamol, Diclofenaco e Ácido acetilsalicílico são alguns medicamentos que obtiveram sucesso ao fazer uso da microencapsulação (AKEL et al., 2017; ANEES et al., 2018; SAKPAKDEEJAROEN et al., 2020); na área alimentícia o uso da técnica beneficia a proteção do produto a condições externas que possa diminuir suas qualidades como o gosto e aroma, como também aumenta o tempo de armazenamento. No ramo alimentício muito usada em óleo de peixe, corantes, acidulantes e em enzimas como as de *Lactobacillus sp* (BAKRY et al., 2016; MU et al., 2018). Além disso, a microencapsulação é utilizada em cosméticos e produtos agrícolas (NANDY et al., 2020; ZHANG et al., 2019).

O uso da técnica de microencapsulação em pesticidas alveja alcançar a proteção do produto contra fatores ambientais externo como a chuva e o sol, influenciam a biodisponibilidade e na seletividade da espécie alvo (RAJAN et al., 2020). Uma das maiores vantagens da microencapsulação dos pesticidas é a segurança que repassa para quem trabalha aplicando os mesmos e ao meio ambiente devido ao fato de controlar o tempo de exposição. Múltiplos pesticidas já foram encapsulados como o herbicida trifluralina, óleos de *Citrus sp.*, decadienoato e os oriundos de *Bacillus thuringiensis* (CHI et al., 2020; DE ARAÚJO et al., 2020).

2.4 Discussão

Após pesquisas sobre bioinseticidas produzidos pelo gênero *Bacillus* foi verificado que, Khorramvatan et al. (2017) microencapsulou *B. thuringiensis* subsp. *kurstaki* KD-2 (Bt-KD2) utilizando como agente encapsulante alginato de sódio através de gelificação por emulsão água/óleo. O processo seguiu um planejamento que variava a concentração cloreto de cálcio (0,1 e 0,3 M), alginato de sódio (2 e 3% p/p) e a velocidade de agitação nas variáveis respostas: viabilidade dos esporos, mortalidade e diâmetro. Os autores observaram a morfologia das microcápsulas por microscopia óptica e o efeito da radiação ultravioleta (UVB) sobre elas. O inseticida microencapsulado foi exposto a ínstares larvais de *Ephesia kuehniella* Zeller e a partir disso a mortalidade foi estudada durante 7 dias. O ensaio que apresentou a maior viabilidade dos esporos (79%) foi o com concentração 2,2% (p/p) de alginato de sódio; 0,26M de CaCl_2 e velocidade de agitação de 1898rpm. O produto atingiu cerca de 93% de mortalidade sobre *Ephesia kuehniella*. E diâmetro de até 23 μ . Após estudos estatísticos foi visto que, a combinação entre o alginato e CaCl_2 influenciaram no aumento do diâmetro da micropartícula. A concentração do polímero teve forte influência

sobre a viabilidade dos esporos. As melhores condições para o microencapsulamento foram alginato de sódio 2,15%, CaCl₂ 0,24 M e velocidade 1606 rpm. A viabilidade, mortalidade e diâmetro dos esporos foram de 68%, 85% e 9µ respectivamente. Sob UVB a viabilidade dos esporos caiu para 40% e a mortalidade para 50%. Os autores constataram que tal procedimento é viável na microencapsulação de Bt-KD2.

He e colaboradores (2017) realizaram a microencapsulação de proteínas de cristais (Cry1Ac) produzidas por *Bacillus thuringiensis* HD73 (Bt-HD73). Os agentes encapsulantes utilizados foram quitosana e alginato, em cada microcápsula foram construídas 10 camadas a partir de um ciclo de deposição de quitosana-alginato. Foi testada a toxina normal sem ter passado pelo processo de microencapsulação e a que foi encapsulada. Os autores detalharam morfológicamente as microcápsulas, a liberação da toxina dependendo do pH e sua resistência sob estresses ambientais como, altas temperaturas, dessecação e raios ultravioleta. O produto foi testado contra a mariposa *Ostrinia furnacalis*. A microscopia realizada para observação do tamanho revelou que a microcápsula tinha cerca de 0,6x1,2µm. Foi detectado que a maior liberação das proteínas foi ocorreu quando o produto estava em pH $\geq 9,0$. Quando expostas a temperatura ambiente por mais de 10 dias, as proteínas perderam suas propriedades físico- químicas, porém sob temperatura de 50°C essas propriedades foram mantidas. A eficácia da proteção da microencapsulação também foi comprovada quando o produto foi submetido a dessecação. A exposição a UVB após o estado de extrema secura por mais de 3 – 6 horas diminuiu tal proteção. A mortalidade das larvas de *O. furnacalis* variou de 70 a 50% em condições normais, após o produto ter passado por estresse ambiental houve uma queda na mortalidade das larvas. A toxicidade dos inseticidas não microencapsulados e microencapsulados foram equivalentes.

As proteínas produzidas por *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* HD-1 (Bt-HD1) foi objeto de estudo da pesquisa de Cortés et al. (2017). Os autores realizaram microencapsulação pelo método de emulsão por inversão utilizando água e óleo de milho. O produto foi exposto a larvas de *Spodoptera frugiperda* para ser ingerido via oral. Foram realizadas análises de dois ensaios diferentes, um observou a influência da baixa concentração das proteínas produzidas por Bt-HD1 e no outro o efeito do diâmetro da microcápsula. Após sete dias do início do experimento foi verificada a quantidade de indivíduos mortos e o peso dos sobreviventes. Com os resultados foi observado que a diminuição do diâmetro da microcápsula aumentou a mortalidade da espécie-alvo, microcápsulas de 3,1µm aumentaram mais de 105%, as de 3,2 µm fizeram a mortalidade

variar entre 93 – 74%, já as com 9,5 μm atingiram cerca de 80% da população de larvas. Com apenas 40ng/cm² de concentração das proteínas produzidas por *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* HD-1 a mortalidade chegou em 70%. Quando expostas a concentração de 10ng/cm² as larvas aumentaram de tamanho, o mesmo também ocorreu quando foram disponibilizadas microcápsulas com altas concentrações de proteínas. As microcápsulas preservaram suas características mesmo após serem expostas a raios ultravioleta.

Eski et al. (2019) em seu trabalho isolou uma cepa de *B. thuringiensis* S13 (Bt-Se13) e a inoculou em biorreator com fermentação em estado líquido contendo farinha de soja, glicose e outros ingredientes durante 72h a 30°C. O extrato junto foi lavado para retirada de enzimas e toxinas indesejáveis e seguiu para microencapsulação utilizando o método de *spray drying* ($\pm 4^\circ\text{C}$) seguindo um planejamento de 2³ variando o tipo de agente encapsulante (amido, soja modificados, maltodextrina DE10 e goma-arábica), a temperatura de entrada (120, 140, 160 e 180°C) e temperatura de saída (60, 70, 80 e 90°C) com uma matriz de 16 ensaios. Para verificar as características do microencapsulado feito em ótimas condições foram verificados a morfologia, o tamanho da micropartícula, a determinação de molhagem do pó, a suspensabilidade, o teor de umidade e a entomopatogenicidade de Bt-Se13 microencapsulado, não microencapsulado e de um produto comercial frente a larvas de *Spodoptera exigua* em condições de laboratório e plantio em vaso. A mortalidade foi estudada ao decorrer de 10 dias. Após análises estatísticas os autores verificaram que, sobre a microencapsulação com produzida com Maltodextrin DE10, temperatura de entrada de 180°C e temperatura de saída de 90°C o tipo de agente encapsulante foi o que mais influenciou; a temperatura de entrada foi a que mais influenciou no encapsulamento contendo goma-arábica, 160°C de entrada e 80°C de saída; já o microencapsulamento feito a temperatura de 140°C na entrada e 70°C e na saída amido modificado sofreu influência da temperatura de saída. O estudo de caracterização da micropartícula revelou que medição da micropartícula foi de 13,462 μm , o tempo de molhagem 25,22 segundos, a suspensabilidade 77,66%, e o teor de umidade 7,29%. Todos os compostos testados contra *S. exigua* demonstraram 100% de mortalidade quando aplicados na concentração de 10⁹ ml⁻¹. Nos ensaios feito em laboratório, a toxicidade aguda do Bt-Se13 microencapsulado sob a espécie alvo foi 1.6×10⁴ UFC ml⁻¹, a toxicidade causada pelo Bt- Se13 que não passou pelo processo de microencapsulação foi 1.0×10⁵ ml⁻¹ e o produto comercial causou 4.6×10⁴ ml⁻¹. No plantio em vaso 93% das larvas foram mortas por Bt-Se13 microencapsulado e 90% pelo produto do já disponível no comercio.

3. Considerações Finais

Contudo, é notável a elevada eficácia dos compostos secundários produzidos por *Bacillus thuringiensis* frente ao combate aos insetos, e que, o microencapsulamento desses bioativos potencializa a sua ação. Isso demonstra a importância da elaboração de revisões como essa acerca do assunto, para que se torne interessante e numerosa a continuação e realização de novas pesquisas para o desenvolvimento de bioinseticidas microencapsulados contendo o Bt como ingrediente ativo.

4. Referências

AKEL, H.; MADANI, F.; IBRAHIM, W. Preparation of Paracetamol Microcapsules by Complex Coacervation and Studying the effect of some Factors Influencing Microencapsulation Yield and Efficacy. **Research Journal of Pharmacy and Technology**, v. 10, n. 10, p. 3271-3275, 2017.

ANEES, M. et al. Formulation and In-Vitro Evaluation of Polymers Blend Based Diclofenac Sodium Microparticles for Sustained Release Drug Delivery. **RADS Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences**, v. 6, n. 3, p. 171-177, 2018.

ASHITHA, A. MATHEW, J. Characteristics and Types of Slow/Controlled Release of Pesticides. In: RAKHIMOL, K. R. **Controlled Release of Pesticides for Sustainable Agriculture**. 1. ed. Switzerland: Springer, 2020. Cap. 6, p. 141-153.

ATHANASSIOU, C. G.; ARTHUR, F. H. Bacterial Insecticides and Inert Materials. In: ATHANASSIOU, C. G.; ARTHUR, F. H. **Recent Advances in Stored Product Protection**. 1. ed. Berlin: Springer-Verlag, 2018. cap. 5, p. 83-98.

BAKRY, Amr M. et al. Microencapsulation of oils: A comprehensive review of benefits, techniques, and applications. **Comprehensive reviews in food science and food safety**, v. 15, n. 1, p. 143-182, 2016.

BHATIA, M. A review on application of encapsulation in agricultural processes. In: SONAWANE, H. S.; BHANVASE, B. A; SIVAKUMAR, S. **Encapsulation of Active Molecules and Their Delivery System**. India: Elsevier, 2020. cap. 8, p. 131-140.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Guia N ° 12/2019 – Versão 2**: Guia para elaboração de rótulo e bula de agrotóxicos, afins e preservativos de madeira. Brasília, 2019.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC N° 302, de 23 de Agosto de 2019. Diário Oficial da União. Brasília, 28 ago. 2019. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2858730/REP_RDC_296_2019.pdf/0a4d947a-1509-40dc-beac-d233e08b4149. Acesso em 08 jun. 2020.

BRUNDAGE, A.; BYRD, J. H. Forensic entomology in animal cruelty cases. **Veterinary**

pathology, v. 53, n. 5, p. 898-909, 2016.

CANDIAGO, N. T.; ANSILIERO, R.; GELINSKI, J. L. N. Revisão sobre métodos de microencapsulação. **Anuário Pesquisa e Extensão Unoesc Videira**, v. 3, p. e17281-e17281, 2018.

CAMARA, T. N. L. Arboviroses emergentes e novos desafios para a saúde pública no Brasil. **Revista de Saúde Pública**, v. 50, p. 36, 2016.

CHAO, C.; LEONE, J. L.; VIGLIANO, C. A. Chagas disease: Historic perspective. **Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease**, v. 1866, n. 5, p. 165689, 2020.

CHI, Y. et al. Microencapsulation of *Bacillus megaterium* NCT-2 and its effect on remediation of secondary salinization soil. **Journal of Microencapsulation**, v. 37, n. 2, p. 134-143, 2020.

CORTÉS, J. B. et al. Reducing the microcapsule diameter by micro-emulsion to improve the insecticidal activity of *Bacillus thuringiensis* encapsulated formulations. **Biocontrol Science and Technology**, v. 27, n. 1, p. 42-57, 2017.

DAVIS, F. R. Inseticidas, agricultura e antropoceno. **Ambiente Global**, v. 10, n. 1, p. 114-136, 2017.

DE ARAÚJO, J. S. F. et al. Microencapsulation of sweet orange essential oil (*Citrus aurantium* var. *dulcis*) by liophylization using maltodextrin and maltodextrin/gelatin mixtures: Preparation, characterization, antimicrobial and antioxidant activities. **International journal of biological macromolecules**, v. 143, p. 991-999, 2020.

DEVI, P. S. V.; DURAIMURUGAN, P.; CHANDRIKA, K. S. V. P. *Bacillus thuringiensis*-based nanopesticides for crop protection. In: **Nano-biopesticides today and future perspectives**. Academic Press, 2019. p. 249-260.

ENSLEY, S. M. Pyrethrins and Pyrethroids. In: GUPTA, R. C. **Veterinary Toxicology: Basic and Clinical Principles**. 3. ed. United States: Academic Press, 2018. cap. 39, p. 515-520.

ESKI, A.; DEMIRBAĞ, Z.; DEMIR, İ. Microencapsulation of an indigenous isolate of *Bacillus thuringiensis* by spray drying. **Journal of microencapsulation**, v. 36, n. 1, p. 1-9, 2019.

ESTEVINHO, B. N.; ROCHA, F. Application of Biopolymers in Microencapsulation Processes. In: GRUMEZESCU, A. M.; HOLBAN, A. M. **Biopolymers for Food Design**. ed. 20. Cambridge: Academic Press, 2018. cap. 7, p. 191-222.

FREIRE DA SILVA, T. A., et al. Optimization of a culture medium based on forage palm for δ -endotoxin production, **Biocatalysis and Agricultural Biotechnology**, Volume 27, August 2020, 101664.

GALZER, E. C. W.; FILHO, W. S. A. Utilização do *Bacillus thuringiensis* no controle biológico de pragas. **Revista Interdisciplinar de Ciência Aplicada**, v. 1, n. 1, p. 13-16, 2016.

GUMFEKAR, S. P. Physicochemical characterization techniques in the encapsulation of active molecules. In: SONAWANE, H. S.; BHANVASE, B. A; SIVAKUMAR, S. **Encapsulation of Active Molecules and Their Delivery System**. India: Elsevier, 2020. cap. 2, p. 9-22.

GUPTA, C. R.; ANADÓN, A. Fipronil. In: GUPTA, R. C. **Veterinary Toxicology: Basic and Clinical Principles**. 3. ed. United States: Academic Press, 2018. cap. 39, p. 533 - 538.

GUPTA, R. C. Insecticides. In: GUPTA, R. C. **Biomarkers in Toxicology**. 2. ed. London: Academic Press, 2019. cap. 26, p. 455-475.

HE, X. et al. Biopolymer microencapsulations of *Bacillus thuringiensis* crystal preparations for increased stability and resistance to environmental stress. **Applied microbiology and biotechnology**, v. 101, n. 7, p. 2779-2789, 2017.

HERRERO, S. et al. Susceptibility, mechanisms of response and resistance to *Bacillus thuringiensis* toxins in *Spodoptera* spp. **Current Opinion in Insect Science**, v. 15, p. 89–96, 2016.

IKBAL, C.; PAVELA, R. Essential oils as active ingredients of botanical insecticides against aphids. **Journal of Pest Science**, p. 1-16, 2019.

ISMAN, Murray B. Botanical insecticides in the twenty-first century—fulfilling their promise?. **Annual Review of Entomology**, v. 65, p. 233-249, 2020.

JANKOWSKA, M. et al. The unusual action of essential oil component, menthol, in potentiating the effect of the carbamate insecticide, bendiocarb. **Pesticide biochemistry and physiology**, v. 158, p. 101-111, 2019.

JAYARAJ, R.; MEGHA, P.; SREEDEV, P. Pesticidas organoclorados, seus efeitos tóxicos nos organismos vivos e seu destino no meio ambiente. **Toxicologia Interdisciplinar**, v. 9, n. 3-4, p. 90-100, 2016.

KAMBLE, V.; SAWANT, M.; MAHANWAR, P. Microencapsulation of cypermethrin via interfacial polymerization for controlled release application. **Materials Today: Proceedings**, v. 5, n. 10, p. 22621-22629, 2018.

KHORRAMVATAN, S. et al. Optimising microencapsulated formulation stability of *Bacillus thuringiensis* subsp. kurstaki (Bt-KD2) against ultraviolet condition using response surface methodology. **Archives of Phytopathology and Plant Protection**, v. 50, n. 5-6, p. 275-285, 2017.

KITA, T. et al. Amitraz and its metabolite differentially activate α - and β -adrenergic-like octopamine receptors. **Pest management science**, v. 73, n. 5, p. 984-990, 2017.

MATSUDA, K.; IHARA, M.; SATTELLE, D. B. Neonicotinoid insecticides: molecular targets, resistance, and toxicity. **Annual Review of Pharmacology and Toxicology**, v. 60, p. 241-255, 2020.

MU, R. J. et al. Microencapsulation of *Lactobacillus acidophilus* with konjac glucomannan hydrogel. **Food Hydrocolloids**, v. 76, p. 42-48, 2018.

NANDY, A. et al. Microencapsulation of retinyl palmitate by melt dispersion for cosmetic application. **Journal of Microencapsulation**, v. 37, n. 3, p. 205-219, 2020.

NAWAZ, M.; MABUBU, J. I.; HUA, H. Situação atual e avanço dos biopesticidas: pesticidas microbianos e botânicos. **J Entomol Zool Stud**, v. 4, n. 2, pág. 241-246, 2016.

NETO, G. J. C. et al. Bioprospecção de produtos naturais inseticidas. In: **Anais do Congresso Brasileiro de Fitossanidade**. 2017.

OCK, J.; KIM, J; CHOI, Y. Organophosphate insecticide exposure and telomere length in US adults. **Science of The Total Environment**, v. 709, p. 135990, 2020.

OZKAN, G. et al. A review of microencapsulation methods for food antioxidants: Principles, advantages, drawbacks and applications. **Food chemistry**, v. 272, p. 494-506, 2019.

PARADA J. R. H. et al. Organochlorine insecticides DDT and chlordane in relation to survival following breast cancer. **International Journal of Cancer**, v. 138, n. 3, p. 565-575, 2016.

PASUPULETI, V. R.; ARIGELA, C. S. Polyphenols and Flavonoids from Honey: A Special Focus on Diabetes. In: KUMAR, D.; SHAHID, M. **Natural Materials and Products from Insects: Chemistry and Applications**. Switzerland: Springer, 2020. cap. 1, p. 1-20.

PAULRAJ, M. G. Natural Insecticides from Actinomycetes and Other Microbes for Vector Mosquito Control. In: VEER, V. & GOPALAKRISHNAN, R. **Herbal Insecticides, Repellents and Biomedicines: Effectiveness and Commercialization**. Índia: Springer, 2016. Cap. 5, p. 85-99.

PISANO, R. et al. Achieving continuous manufacturing in lyophilization: Technologies and approaches. **European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics**, v. 142, p. 265-279, 2019.

RADER, R. et al. Non-bee insects are important contributors to global crop pollination. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 113, n. 1, p. 146-151, 2016.

RAJAN, M. et al. Controlled Release Pesticides as a Route to Sustainable Crop Production. In: RAKHIMOL, K. R. *et al.* **Controlled Release of Pesticides for Sustainable Agriculture**. Switzerland: Springer, 2020. p. 111-125.

SAEED, F. et al. Transgenic technologies for efficient insect pest management in crop plants. In: USHA, K.; MALIK, Z. A.; KAMALUDDIN. **Transgenic Technology Based Value Addition in Plant Biotechnology**, p. 123, 2020. 1 ed. Academic Press: EUA, 2020. Cap 6, p. 123-156.

SAKPAKDEEJAROEN, I. et al. Development of transferrin-bearing vesicles encapsulating aspirin for cancer therapy. **Journal of liposome research**, v. 30, n. 2, p. 174-181, 2020.

SARWAR, M. Inseticidas inorgânicos usados em cenários paisagísticos e pragas de insetos. **Chemistry Research Journal**, v. 1, n. 1, p. 50-57, 2016.

SAWICKA, B.; EGBUNA, C. Pests of Agricultural Crops and Control Measures. In: **Natural Remedies for Pest, Disease and Weed Control**. Academic Press, 2020. p. 1-16.

SENAPATI, A. et al. Impact of adult mosquito control on dengue prevalence in a multi-patch setting: A case study in Kolkata (2014–2015). **Journal of theoretical biology**, v. 478, p. 139- 152, 2019.

SONAWANE, S. H. et al. Current overview of encapsulation. In: SONAWANE, H. S.; BHANVASE, B. A; SIVAKUMAR, S. **Encapsulation of Active Molecules and Their Delivery System**. India: Elsevier, 2020. cap. 1, p. 1-8.

SOUSA, S. Chemistry and Toxicology Behind Insecticides and Herbicides. In: RAKHIMOL, K. R. **Controlled Release of Pesticides for Sustainable Agriculture**. 1. ed. Switzerland: Springer, 2020. Cap. 3, p. 59-109.

SPARKS, T. C. et al. Insecticides, biologics and nematicides: Updates to IRAC's mode of action classification-a tool for resistance management. **Pesticide Biochemistry and Physiology**, p. 104587, 2020.

SUAVE, J. et al. Microencapsulação: Inovação em diferentes áreas. **Revista Saúde e Ambiente/Health and Environment Journal**, v. 7, n. 2, p. 12-20, 2006.

SUBBANNA, A. R. N. S. et al. Bio-efficacy of chitinolytic *Bacillus thuringiensis* isolates native to northwestern Indian Himalayas and their synergistic toxicity with selected insecticides. **Pesticide biochemistry and physiology**, v. 158, p. 166-174, 2019.

SUGANYA, V.; ANURADHA, V. Microencapsulation and nanoencapsulation: a review. **International Journal of Pharmaceutical and Clinical Research**, v. 9, n. 3, p. 233-239, 2017.

SUGANYA, V.; ANURADHA, V. Microencapsulation and nanoencapsulation: a review. **International Journal of Pharmaceutical and Clinical Research**, v. 9, n. 3, p. 233-239, 2017.

TIMILSENA, Y. P. et al. Complex coacervation: Principles, mechanisms and applications in microencapsulation. **International journal of biological macromolecules**, v. 121, p. 1276-1286, 2019.

WATANABE, E. et al. Organic solvent-saving sample preparation for systematic residue analysis of neonicotinoid insecticides in agricultural products using liquid chromatography–diode array detection. **Food analytical methods**, v. 9, n. 1, p. 245-254, 2016.

WOJCIECHOWSKA, M.; STEPNOWSKI, P.; GOŁĘBIOWSKI, M. The use of insecticides to control insect pests. **Invertebrate Survival Journal**, v. 13, n. 1, p. 210-220, 2016.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification 2019. Geneva: World Health Organization, 2020.

YIN, Y.; CADWALLADER, K. R. Spray-chilling encapsulation of 2-acetyl-1-pyrroline zinc chloride complex using hydrophobic materials: Feasibility and characterization of microcapsules. **Food chemistry**, v. 265, p. 173-181, 2018.

YUSOP, F. H. M.; ABD M. S. F.; HAMZAH, F. Preservation of bioactive compound via microencapsulation. **Chemical Engineering Research Bulletin**, p. 50-56, 2017.

ZHANG, C. et al. Survey of Asymptomatic Malaria and Mosquito Vectors in Muang Khua District of Phongsaly Province, China-Laos Border. **International Journal of Infectious Diseases**, 2020.

ZHANG, M. et al. One-step microencapsulation and spraying of pesticide formulations for improved adhesion and sustained release. **Journal of microencapsulation**, v. 36, n. 7, p. 649- 658, 2019.

CAPÍTULO 20: BIORREMEDIAÇÃO DE SOLOS E ÁGUAS CONTAMINADOS COM HIDROCARBONETOS: REVISÃO DE LITERATURA

CHAPTER 20: BIORREMEDIATION OF SOILS AND WATERS CONTAMINATED WITH HYDROCARBONS: AN REVIEW

Laís Mendes Moura da Silva¹; Cristina Giatti Marques de Souza²; Rosane Marina Peralta³ Rafael Castoldi⁴

Resumo

Os acidentes ambientais tem sido uma preocupação em todo o mundo, principalmente àqueles de difícil reversão. O derrame de petróleo em solos e lixiviado nas águas, por exemplo, vem intrigando pesquisadores na sociedade atual. Seus derivados são compostos de hidrocarbonetos chamados de BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno). Este grupo contém moléculas altamente tóxicas e de difícil biodegradação. Para isso faz-se necessário estudos que possibilitam a remediação desses compostos de modo que diminua a contaminação e os seus efeitos adversos a população e ao meio ambiente. A biorremediação é uma das saídas para a eliminação desse grupo de moléculas, nesse processo utilizam-se de microrganismo capazes de degradar essa matéria, como fungos e bactérias. O presente trabalho discute os processos de degradação do BTEX abordando os microrganismos com capacidade degradativa desses compostos.

Palavras-Chave: Petróleo, Hidrocarbonetos, Biorremediação.

Abstract

Environmental accidents have been a concern worldwide, especially those that are difficult to reverse. The oil spill in soils and leachate in the waters, for example, has intrigued researchers in today's society. Its derivatives are composed of hydrocarbons called BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene and xylene). This group contains highly toxic molecules that are difficult to biodegrade. For that, it is necessary studies that enable the remediation of these compounds in a way that reduces the contamination and its adverse effects on the population and the environment. Bioremediation is one of the ways to eliminate this group of molecules, in this process they use microorganisms capable of degrading this matter, such as fungi and bacteria. The present work discusses the degradation processes of BTEX addressing microorganisms with degradative capacity of these compounds.

Keywords: Oil, Hydrocarbons, Bioremediation.

¹ Biotecnologia, Universidade Estadual de Maringá, laismendes76@gmail.com

² Professora Doutora no Departamento de Bioquímica da Universidade Estadual de Maringá, cgmsouza@uem.br

³ Professora Doutora no Departamento de Bioquímica da Universidade Estadual de Maringá, rmperalta@ue.br

⁴ Professor Doutor no Departamento de Bioquímica da Universidade Estadual de Maringá, rcastoldi@uem.br

1. Introdução

O solo é a camada superficial da crosta terrestre, o que leva a exposição a vários tipos de danos, muitas vezes são causados pela ação do homem, é a camada que mais sofre impactos com danos diretos e indiretos. Toda forma de liberação de matérias nocivas ao solo prejudicam a vida biológica naquele meio. Entre as formas de maior contaminação está o derramamento de compostos químicos como o petróleo e seus derivados (HEIDERSCHIEDT et al., 2016).

A água é o mais importante recurso natural para sobrevivência na Terra, no organismo ela representa cerca de 70% da massa corporal, atua como um importante transportador de substâncias de manutenção do corpo. No ambiente é muito utilizada para o uso doméstico, industrial, agrícola, navegação, entre outros. A navegação pelos rios e mares são frequentes, nas embarcações contém desde pessoas, alimentos e combustíveis como o petróleo. Dessa forma, há uma necessidade de se tomar um cuidado especial com esse recurso (OLIVEIRA et al., 2018).

O petróleo é um importante elemento utilizado como combustível em transportes e geração de energia, é uma substância natural que se encontra em estado líquido. É um composto altamente tóxico, se apresenta com uma densidade menor do que da água e é um elemento formado por grupos hidrocarbonetos alifáticos, acíclicos e aromáticos (MORAES, 2014). No Brasil, tem-se alguns acidentes de derrames de gasolina em centros de distribuição. Um desses acidentes foi em janeiro de 2012, um derramamento no mar ocasionado devido à uma operação de transbordo de uma monoboia da Transpetro, atingiu a praia em Tramandaí, RS. O acidente derramou cerca de 1,2 milhões de litros de óleo no mar (LEAL et al, 2016).

Os compostos derivados do petróleo possuem grande importância ambiental, eles são chamados de BTEX de cadeias aromáticas, grupo composto pelo benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos, são moléculas com alta toxicidade, pois eles possuem um potencial mutagênico, teratogênico e carcinogênico (LEAL et al, 2016). O benzeno, por exemplo, é considerado uma substância cancerígena e hemotóxica, essa classificação é decorrente de sua metabolização. A hematotoxicidade é caracterizada principalmente pela diminuição das células sanguíneas, resultando em quedas no número dos elementos do sangue, esse evento é um possível indicador de leucemia mieloide aguda precoce. Além disso, este composto causa também alterações de cromossomos que são consideradas a explicação mais plausível para sua carcinogenicidade (COSTA; GOLDBAUM, 2016).

Os BTEX são moléculas lipossolúveis o que possibilita o aumento da continuidade desses compostos no meio ambiente, sendo assim, dificulta a biodegradação natural (LEAL et al, 2016). Nos rios e mares o derramamento destes compostos diminui o nível de atividade fotossintéticas dos fitoplâncton e de algas e seu efeito impermeabilizante possibilitam que aves, mamíferos e animais marinhos perdem a flutuabilidade e o isolamento térmico levando a morte (MOREIRA, 2016). No solo, são esses compostos se ligam a moléculas presentes nesse meio, onde permanecem por milhares de anos, alterando a biota do solo, causando infertilidade entre outros problemas, implicando diretamente na produção agrícola afetando toda a população em geral por meio da cadeia alimentar (JASMINE; MUKHERJI, 2019).

A presença desses elementos tóxicos leva a diversos problemas ambientais que influenciam direta e indiretamente os seres humanos, além de uma influência ainda maior a outras formas de vida do ecossistema, desta forma, faz-se necessário estudos a fim de remediar esses poluentes (HEIDERSCHEIDT, et al., 2016).

Os processos de remediação como os físico-químicos, são altamente caros, além de estar propício a acumular outras substâncias que fazem parte dele, que também podem ser prejudiciais à saúde. Sendo assim, a remediação utilizando microrganismos seria vantajoso no ponto de vista econômico, além de evitar outras contaminações como no processo físico-químico (SILVA, 2018).

A biorremediação é uma dessas formas de remediação que se utiliza organismos, como plantas, fungos, microrganismos, que em sua composição possuem enzimas que são capazes de eliminar a contaminação em solos e águas. A velocidade com que essas moléculas degradam o poluente é discrepante, isso porque, cada substância tem uma resistência, por conta de sua estrutura e concentrações diferentes no ambiente (HEIDERSCHEIDT, et al., 2016).

Nos últimos anos tem-se observados o uso de bactérias degradadoras de hidrocarbonetos, pela sua eficiência e seu baixo custo. As bactérias têm a propriedade de transformar resíduos tóxicos a não-tóxicos, sendo assim, há a redução significativa dos efeitos nocivos à saúde e meio ambiente. Esse tipo de processo é executado *in situ*, ou seja, o tratamento percorre sem que haja um transtorno aos ecossistemas (GHOREISHI et al., 2017).

As bactérias que vivem em locais contaminados e a caracterização das mesmas podem auxiliar na biorremediação. Os microrganismos como *Pseudomonas spp.*, *Bacillus spp.*, *Micrococcus spp.*, *Rhodococcus spp.*, *Enterobacter spp.*, *Mycobactena spp.*, *Modococci spp.* e

Acinetobacter spp podem degradar compostos do petróleo, porém em taxas diferentes, sendo importante avaliá-los quanto a capacidade de degradação, para obter um bom resultado (GHOREISHI et al., 2017).

Os fungos também são biodegradadores e fazem parte da natureza, em águas, solos e ar, contribuem para a decomposição da matéria orgânica. O uso de fungos filamentosos e seus metabólitos têm se mostrado de grande potencial na degradação de compostos tóxicos por terem alto potencial degradativo, algumas espécies que assimilam os hidrocarbonetos são do gênero *Aspergillus* e *Penicillium*, sendo uma característica individual das espécies (SOUSA et al., 2016).

Portanto, este trabalho avalia alguns tipos de biorremediação, comparando os tratamentos com diferentes microrganismos visando a degradação do grupo de hidrocarbonetos BTEX.

2. Desenvolvimento

Na revisão de literatura, visando aprofundar o conhecimento sobre este assunto, foram abordadas questões como, o grupo de hidrocarbonetos de cadeia aromática, suas classificações, os riscos que esses compostos possuem e os diferentes processos de biorremediação desses compostos em águas e solos.

2.1 Discussão

2.1.1 Hidrocarbonetos de cadeia monoaromática

Hidrocarbonetos de cadeia benzênica são os que apresentam maior toxicidade aos seres vivos, associados a efeitos crônicos e cancerígenos, pois possuem uma degradação lenta, permanecendo por muito tempo em contato com as células do organismo. Essas moléculas tóxicas originam-se da combustão incompleta da matéria orgânica e são altamente perigosos, pois no ambiente se dispersam de forma que as moléculas se tornem mais complexas (LEITE, et. al. 2017). A dispersão desses compostos no ambiente é facilitada pelo transporte de solo e águas em decorrência da solubilidade e volatilidade devido às pequenas cadeias carbônicas compostas de 6 a 8 carbonos (NESPECA, 2018).

Outra propriedade a ser considerada é a solubilidade, capacidade de um determinado constituinte em ser dissolvido em água. A potência de ser dissolvido acontece pela presença de etanol na composição das gasolinas automotivas intensificando a solubilidade, mobilidade e

persistência dos compostos BTEX na matriz contaminada. A temperatura é a propriedade físico-química que garante a redução da densidade do contaminante, desta forma, a mobilidade dos compostos tendem a aumentar na elevação de temperatura e assim há a redução das características (CAVALLARI, 2017).

As propriedades físicas desses compostos interferem no impacto do ambiente e a alta toxicidade quando solúvel em água ou na presença de outros compostos, estão demandando uma atenção na remediação ambiental, principalmente o processo de biomonitoramento. Esses compostos possuem características relativamente importantes a considerar para que se realize esse tipo de procedimento. Listadas na Tabela 1 (OSÓRIO, 2018).

Tabela 1- Propriedades físico química dos BTEX.

Composto	Peso molecular (g.mol ⁻¹)	Solubilidade (mg.L ⁻¹) ^{25*}	Constante Dielétrica ²⁰	Densidade (g.cm ⁻³) ²⁵	Log K _{ow}	Ponto de Ebulição (°C)	Ponto de Fusão (°C)
Benzeno	78,112	1790	2,28	0,8765	+2,13	80,08	5,53
Tolueno	92,139	526	2,38	0,8623	+2,69	110,60	-95,00
Etilbenzeno	106,165	169	2,41	0,8626	+2,76	136,20	-94,95
o-Xileno	106,165	178	2,30	0,8755	+3,00	144,40	-25,16
m-Xileno	106,165	161	2,30	0,8598	+3,00	139,10	-47,85
p-Xileno	106,165	162	2,30	0,8565	+3,00	138,30	13,30

*Solubilidade em água a 25° C

2.1.2 Benzeno

O benzeno é um hidrocarboneto aromático classificado como poluente onipresente do ar, pois está associado a uma combustão juntamente com a gasolina que é liberado principalmente de veículos. A exposição em humanos ao benzeno induz estresse oxidativo em células do corpo, que resulta em quebras na fita do DNA, gerando mutações genéticas cromossômicas, aberrações e micronúcleos. Essas transformações são de grande importância e relevância, sendo que, são as principais causas do surgimento do câncer ao sofrerem esses eventos (LOOMIS, et al. 2017). Na Figura 1 pode-se observar a sua forma estrutural (BEZERRA, 2017).

O benzeno é uma molécula de alto risco para com sua toxicidade, ele está presente principalmente em postos de abastecimento como um importante produto químico orgânico juntamente com a gasolina. A exposição dessa molécula em altas doses e a curto prazo pode

desenvolver anestesia do sistema nervoso central e falência de órgãos, enquanto as exposições a longo prazo em baixas doses causam diminuição na contagem de células sanguíneas periféricas, envenenamento crônico por benzeno e até neoplasias hematológicas como SMD e leucemia, além de mutações cromossômicas (GUO et al., 2019).

Figura 1. Estrutura molecular do benzeno.

Fonte: Bezerra (2017).

2.1.3 Tolueno

O tolueno é um solvente orgânico volátil, altamente inflamável e também pode ser identificado pelo ar. É uma molécula pouco solúvel em água (quando comparado com o benzeno), porém com a presença de um composto orgânico sua solubilidade aumenta. É um composto tóxico devido a capacidade de promover morte celular e ter um efeito neurotóxico em humanos e animais (SOARES, et al., 2016). Na Figura 2 pode-se observar a sua forma estrutural (BEZERRA, 2017).

Figura 2. Estrutura molecular do tolueno.

Fonte: Bezerra (2017).

2.1.4 Xileno

O termo xileno refere-se ao grupo de três isômeros orto-xileno, meta-xileno e para-xileno que se diferem em função da organização dos grupos metila. É um líquido incolor, inflamável, praticamente insolúvel em água. Os xilenos são encontrados principalmente no petróleo utilizados em fragrâncias sintéticas e na fabricação de tintas, vernizes e borracha. São também lançados na

atmosfera por meio de emissões fugitivas de fontes industriais, emissão veicular, volatilização de solventes e incêndios florestais. A exposição a esse composto de misturas de xileno resulta em alguns sintomas como irritação dos olhos, nariz e garganta e efeitos neurológicos. O contato dessa molécula vias aéreas, pode afetar o sistema nervoso central e dependendo das concentrações provoca fortes dores de cabeça, vertigens, fadiga e tremores. A USEPA classifica os xilenos no Grupo D, como não carcinogênico para humanos (CETESB, 2016). Na Figura 3 observa-se a forma molecular dos 3 isômeros (SILVA et al., 2019).

Figura 3. Isômeros orto-xileno, meta-xileno e para-xileno.

Fonte: Silva et al. (2019).

2.1.5 Etil-Benzeno

O etilbenzeno é utilizado como um aditivo na gasolina e pode estar presente em produtos como tintas, pesticidas e plásticos. Como os outros BTEX é altamente volátil e como o tolueno, o contato crônico com esse composto resulta em sintomas similares apresentados acima. É também muito utilizado na produção do estireno a partir da desidrogenação do etilbenzeno (OLIVEIRA, 2017).

Segundo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, o etilbenzeno foi classificado como um possível cancerígeno com base em estudos de animais de laboratório pela IARC, realizados em 2009. Na Figura 4 observa-se a forma molecular do etilbenzeno (OLIVEIRA, 2017).

Figura 4. Estrutura molecular do etilbenzeno.

Fonte: Oliveira (2017).

2.1.6 Biorremediação

Alguns estudos mostram a importância dos microrganismos em benefício da humanidade, esses testes começaram desde 1856 com Louis Pasteur. Na época o francês não imaginava o grande potencial que os microrganismos tinham em remediar áreas contaminadas. Mediante a descoberta foram surgindo diversas alternativas para tentar minimizar problemas de contaminação ambiental, uma dessas técnicas é de biorremediação.

A biorremediação é um processo que utiliza principalmente microrganismos, plantas, enzimas microbianas ou vegetais para desintoxicar e degradar contaminantes no solo e em outros ambientes, com a finalidade de restaurar a saúde do ecossistema (GOUMA et al., 2014). Há interesse no efeito de fatores ambientais sobre a capacidade de biorremediação de compostos xenobióticos que estendem a meia-vida em ecossistemas terrestres e aquáticos. Esse processo é caracterizado pela inserção desses organismos ou enzimas a fim de reduzir o efeito de um composto tóxico, transformando em compostos inofensivos ao meio ambiente (ORYAN, et al., 2018).

2.1.7 Remediação por método físico-químico

Os métodos físicos químicos para a remediação dos solos e águas contaminados pelos BTEX, são amplamente utilizados. Segundo Zhou (2019) os processos de oxidação têm ganhado uma grande importância para essa utilização devido a eficiência da remoção de solos e águas contaminados. Os oxidantes químicos tem o poder de converterem poluentes orgânicos em inofensivos ou menos prejudiciais, alguns utilizados são peróxido de hidrogênio, persulfato, permanganato, ozônio e o processo de Fenton.

No entanto, a utilização desses métodos químicos, podem alterar a geoquímica do solo devido a sua instabilidade, esses compostos reagem com microrganismos presentes no meio, afetando a vida biológica nesse ambiente e produzindo outros tipos de substâncias que não são favoráveis ao ambiente.

2.1.8 Biorremediação utilizando bactérias

Entre os materiais biológicos usadas, as células bacterianas são preferidas como biomaterial adequado para a biorremediação devido à sua habilidade de estar presente em toda a parte em forma de colônias, capacidade de crescer sob controle condições e taxas mais rápidas de remediação da poluição devido à seu metabolismo (PRABHAKARAN et al., 2019).

Os microrganismos podem utilizar os compostos petroquímicos como única fonte de carbono e energia esse efeito pode resultar a mudanças mensuráveis na composição do combustível. Esse processo é classificado como relativamente barato, e quando comparado a outros tipos de remediação é o mais seguro (WANG et al., 2019).

A biorremediação *in situ* é a mais empregada no mundo. Contudo, os microrganismos devem estar ativos para desempenharem a sua tarefa de biodegradação. Como na Figura 5 a seguir (ANDRADE et al., 2016).

Figura 5. Esquema de simplificado da ação de microrganismos em processos de biorremediação.

Fonte: Andrade et al. (2016).

No trabalho de Mazzeo (2016) realizado *ex situ*, foram selecionadas cinco espécies de bactérias que possuem um grande potencial de biodegradação de BTEX. O ensaio realizado pelos pesquisadores é conhecido como DBO, nesse processo ocorre a oxidação da matéria orgânica com o consumo de Oxigênio e liberação de gases como gás carbônico. Neste trabalho após seleção de bactérias foi adicionado diferentes concentrações dos cinco tipos de BTEX, em culturas de bactérias pré-selecionadas separadamente em vidros âmbar onde foram mantidos por 20 dias sob agitação.

Nessas condições os microrganismos possuíam como única fonte de carbono os hidrocarbonetos. Os resultados apresentados foram obtidos através dos valores de consumo de oxigênio, logo, podemos inferir que os microrganismos consumiram a presente matéria orgânica (BTEX).

Diversos microrganismos foram encontrados usando MacConkey e ágar CLED, como *Acinetobacter lwoffii*, *P. putida* e bacilos Gram negativos não fermentativos. No ágar-sangue e ágar-chocolate, outras duas espécies de bactérias foram identificadas *Moraxella sp* e *Brevundimonas diminuta*. Os resultados na identificação de microrganismos biodegradáveis por BTEX são mostrados na Tabela 2.

Tabela 2. Crescimento bacteriano na ausência e presença de quatro concentrações de BTEX em Meio Bushnell – Haas

Strain	Glucose 0.1% (µL)	BTEX (µL/3 mL)			
	12	5	10	15	20
<i>Acinetobacter lwoffii</i>	++	–	–	–	–
BGN	+	–	–	–	–
<i>Pseudomonas putida</i>	+++	++	+	+	+
<i>Moraxella sp</i>	++	–	–	–	–
<i>Brevundimonas diminuta</i>	+++	–	–	–	–
<i>A. lwoffii</i> , BGN, <i>P. putida</i> , <i>Moraxella sp</i> , <i>B. diminuta</i>	+++	++	+	+	+
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	+++	++	++	+	+

(+): turbidez positiva, baixo crescimento.

(++): turbidez positiva, crescimento moderado.

(+++): turbidez positiva, crescimento intenso.

(-): turbidez negativa, sem crescimento.

A bactéria *P. putida* causou turbidez em meio de glicose (controle) e em todos os meios com BTEX. A bactéria *A. lwoffii*, *Moraxella sp*, *B. diminuta* e NFGNB causaram turbidez no meio contendo apenas glicose, e não cresceram na presença de BTEX, independentemente na concentração testada. A espécie *P. aeruginosa* ATCC 27853, usado como controle, causou turbidez em todos os tubos, seja na presença ou ausência de BTEX. Os tubos contendo as cinco linhagens de bactérias de o efluente da refinaria de petróleo também causou turbidez. A replicação em placas obtidas desses tubos com positivo turbidez, ou seja, com as espécies *P. putida*, consórcio das cinco bactérias e *P. aeruginosa*, revelou que *P. putida* estava presente na replicação de ambos *P. putida* e tubos bacterianos de consórcio. Portanto, *P. putida* provou ser a única bactéria isolada de o efluente bruto da refinaria capaz de crescer na presença da BTEX.

A bactéria *P. aeruginosa* é uma gram negativa em forma de bastonete, é uma boa representante dentro de grupos de microrganismos aeróbicos com habilidade de biodegradação aromática. Em estudos apresentados, o uso da bactéria tem-se mostrado bastante eficiente (Kurzbaum, 2017)

2.1.9 Biorremediação utilizando fungos

Os fungos estão em grande quantidade distribuídos na natureza, encontrados na água, no solo, sobre os animais e vegetais vivos, entre outros. A utilização de fungos filamentosos e seus metabólitos nos processos de biorremediação vem crescendo, em virtude do alto potencial degradativo, bioassortivo e dos mecanismos de resistência em condições ambientais adversas. As principais espécies de fungos que assimilam hidrocarbonetos são do gênero *Aspergillus* e *Penicillium*, sendo uma característica individual da espécie (SOUZA, 2016).

A vantagem em se utilizar fungos se relaciona com a tolerância a maiores concentrações de produtos tóxicos, à capacidade de crescerem sob condições ambientais de estresse como em meios com baixos valores de pH, e ainda, por suportarem meios pobres em nutrientes. Os fungos apresentam uma maior capacidade de sobrevivência em meios com baixa atividade de água em relação às bactérias e leveduras (RODRIGUES, 2017).

No trabalho de Rodrigues (2017) a amostra utilizada foi uma água contaminada com gasolina e fungo selecionado por meio de cultivo em Ágar Sabouraud Dextrose, acrescido de 0,03 g.L⁻¹ do antibiótico estreptomicina, visando eliminar a proliferação de bactérias, foi o *Aspergillus niger* AN400. O experimento foi realizado em reator contínuo onde ocorreu duas etapas de alimentação. Na primeira etapa com adição de 0,5 g.L⁻¹ de glicose no afluente e na segunda etapa sem adição de glicose no afluente. A Etapa I foi dividida em duas fases distintas, segundo a não adição (Fase 1) e adição de nutrientes (Fase 2) no afluente, sendo a Fase 1 correspondente às coletas de 1 a 5 e a Fase 2 às coletas de 6 a 10. Na Etapa II foi mantida a adição de nutrientes. Nas Figuras 6 e 7, são apresentadas as concentrações de benzeno, tolueno, etilbenzeno, m e p-xileno e o-xileno do afluente e efluente ao reator de leito fixo e fluxo contínuo com fungos nas Etapas I e II, respectivamente.

Na Etapa I, foram alcançados os percentuais de remoção de 96% na Fase 1 e 97% na Fase 2 para benzeno; 95% e 93% para tolueno, respectivamente; 65% e 79% para etilbenzeno; 89% e 86% para m e p-xileno e 87% e 88% para o-xileno. Ao se comparar as duas fases, evidenciou-se que a adição de nutrientes não resultou, estatisticamente, em uma diferença significativa nas eficiências de remoção dos poluentes (Figura 6).

Na Etapa II, as remoções médias foram de 88% para benzeno, 90% para tolueno, 90% para etilbenzeno, e de 91% para m, p e o-xileno. Observou-se a Etapa I com a II, não houve diferença

nas eficiências de remoção para tolueno, m e p-xileno e o-xileno. Entretanto, as eficiências de remoção de benzeno e etilbenzeno apresentaram diferença significativa ($p < 0,05$), por meio de cálculos estáticos. Isso mostrou que houve diminuição da eficiência de remoção de benzeno de 96% (Etapa I) para 88% (Etapa II) e aumento da eficiência de remoção de etilbenzeno de 72% (Etapa I) para 90% (Etapa II). A presença de glicose favoreceu a melhores percentuais de remoção de benzeno na Etapa I (Figura 7).

Figura 6 - Concentração de benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno no afluente e efluente ao reator de leito fixo e fluxo contínuo ao longo das coletas da Etapa I.

Estudos demonstram que a utilização de fonte de carbono mais facilmente assimiláveis é benéfica na biodegradação de alguns compostos recalcitrantes, pois favorece o aumento de biomassa e ganho de energia resultando em melhores remoções desses compostos. Na Etapa II, o aumento da eficiência observado foi atribuído à retirada da glicose do meio. Dessa forma, a presença da glicose teria contribuído para que os microrganismos a consumissem preferencialmente em relação ao etilbenzeno (RODRIGUES, K., 2017).

Figura 7. Concentração de benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno no afluente e efluente ao reator de leito fixo e fluxo contínuo ao longo das coletas da Etapa II.

3. Considerações Finais

A degradação de hidrocarbonetos utilizando técnicas de biorremediação pode ser uma saída importante para diminuição desses compostos altamente tóxicos para o meio ambiente. Nota-se que a utilização dos microrganismos é pouco invasiva ao meio ambiente e não há uma síntese de metabólitos secundários, ou compostos que podem afetar a biota da amostra a ser tratada.

Observa-se também que a utilização dos microrganismos, bactérias ou fungos, depende do composto que precisa ser degradado e o ambiente a ser remediado, o uso dos dois grupos de microrganismos é eficaz na degradação dos BTEX.

Os métodos físico-químicos, por sua vez, são efetivos em processos de remediação, no entanto podem alterar importantes condições do ambiente que está sendo remediado, principalmente a biota local, outro ponto negativo do uso desses métodos é o uso de agentes químicos tóxicos que podem causar contaminações secundárias.

4. Referências

ANDRADE, J. A., AUGUSTO, F., JARDIM, I. C., Biorremediação de solos contaminados por petróleo e seus derivados. **Ecl. química**, Volume 35, nº 3, 2016.

BEZERRA, J. K. A., Remoção de benzeno e tolueno em solução aquosa por adsorção utilizando carvão ativado produzido a partir do lodo doméstico. **Universidade federal do Rio Grande do Norte**, 2017.

CAVALLARI, F., Caracterização geofísica de contaminação por hidrocarbonetos em acidente ferroviário. **Universidade Estadual paulista “Júlio de Mesquita Filho”**. 2017.

CETESB, Avaliação de Benzeno; Tolueno; o-Xileno; m, p-Xileno e Etilbenzeno na Atmosfera da Estação de Monitoramento de Pinheiros - Município de São Paulo – SP 2013 - 2014. **Companhia ambiental do estado de São Paulo, diretoria de engenharia e qualidade ambiental**, 2016.

COSTA, D. F.; GOLDBAUM, M., Contaminação química, precarização, adoecimento e morte no trabalho: benzeno no Brasil. **Departamento de Medicina Preventiva, Faculdade de Medicina, USP. Ciência e saúde coletiva**, 2017.

GOUMA, S., FRAGOEIRO, S., BASTOS, A.C., MAGAN, N. **Bacterial and Fungal Bioremediation Strategies**, pp. 301 – 323, 2014.

GUO, X.; ZHONG, W.; CHEN, Y.; ZHANG, W.; REN, J.; GAO, A.; Benzene metabolites trigger pyroptosis and contribute to haematotoxicity via TET2 directly regulating the Aim2/Casp1 pathway. **EBioMedicine**, P.578-589 (2019).

GHOREISHI, G. et al. Bioremediation capability and characterization of bacteria isolated from petroleum contaminated soils in Iran. **Sustainable Environment Research**, 2017.

HEIDERSCHIEDT, D. et al. Conceitos aplicados à poluição do solo decorrente do derrame de petróleo e seus derivados. **Revista Maiêutica Indaial**, v. 4, n. 1, p. 7-14, 2016.

JASMINE, J., MUKHERJI, S., Impact of bioremediation strategies on slurry phase treatment of aged oily sludge from a refinery. **Journal of Environmental Management**, Volume 246, 15 September 2019, Pages 625-635.

KURZBAUM, E., RAIZNER, Y., COHEN, O., SUCKEVERIRENE, R. Y., Kulikov, A., HAKIMI, B., MENASHE, O. Encapsulated *Pseudomonas putida* for phenol biodegradation: Use of a structural membrane for construction of a well-organized confined particle. **Science of The Total Environment**, 2017 121, 37–45.

LEAL, A. J. et al. Changes in the microbial community during bioremediation of gasoline-contaminated soil. **Brazilian journal of Microbiology**, p. 343, 2016.

LEITE, M. S.; MESQUITA, M. V., Processos de remediação para hidrocarbonetos e etanol resultantes da contaminação dos postos de combustíveis. **Revista de engenharia e tecnologia aplicada UNG**, v.1, n 1, 2017.

LOOMIS, D., GUYTON, K. Z., GHISSASSI, F., GROSSE, Y., BOUVARD, V., TALLAA, L. B., GUHA, N., VILAHUR, N., MATTOCK, H., STRAIF, K., Agência Internacional de Pesquisa em Grupo de Trabalho sobre Monografia do Câncer Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, Lyon, França. v18, 2017.

MAZZEO, D. E. C., LEVY, C. E., DE ANGELYS, D. de F., MARIN-MORALES, M. A.. BTEX biodegradation by bacteria from effluents of petroleum refinery. **Science of The Total Environment**, 2016, 408(20), 4334–4340.

MORAES, B. P., Petróleo. **CPRM Serviço geológico do Brasil**, 2014 Disponível em: <<http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Canal-Escola/Petroleo-1256.html>>. Acesso em 12 de maio de 2019.

MOREIRA, P. A. R., Derrames de hidrocarbonetos no mar: uma avaliação das questões operacionais. **Faculdade de engenharia universidade do porto**, 2016. Disponível em: <<https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/82721/2/118504.pdf>>. Acesso em: 24 de julho de 2019.

NESPECA, M. G., Aplicação de espectroscopia no infravermelho próximo e análise multivariada para identificação e quantificação de hidrocarbonetos totais do petróleo em solo. **Universidade Estadual Paulista**, 2018.

OLIVEIRA, G., MARCATO, F. S., SCAZUFCA P., PIRES, R. C., Perdas de água 2018 (SNIS 2016): Desafios para a disponibilidade hídrica e avanço da eficiência do saneamento básico. **GO associados, saneamento Brasil**, Maio 2018.

OLIVEIRA, L.; Avaliação da capacidade de biodegradação de benzeno, tolueno, etilbenzeno e isômeros de xilenos por bactéria de área contaminada. **Universidade de São paulo- instituto de ciência biomédica**, 2017.

ORYAN, A., JALILI, M., KAMALI, A., NIKAHVAL, B., The concurrent use of probiotic microorganism and collagen hydrogel/scaffold enhances burn wound healing: An *in vivo* evaluation. **Burns**, Volume 44, November 2018, Pages 1775-1786.

OSORIO, D. S. G., Estudo comparativo de sílicas mesoporosas organofuncionalização magnéticas como adsorventes de benzeno, etilbenzeno, tolueno, xileno (BTEX). **Universidade de São Paulo**, 2018.

PRABHAKARAN, D. C., BENITEZ, V. B., SIVRY, Y., GELABERT, A., RIOTTE, J., SUBRAMANIAN, S., Mechanistic studies on the bioremediation of Cr(VI) using *Sphingopyxis* macrogoltabida SUK2c, a Cr(VI) tolerant bacterial isolate. **Biochemical Engineering Journal**, 2019.

RODRIGUES, K., OLIVEIRA, P. C., MOREIRA, I. C., FIRMINO, S. F., WANDERLEY, C. R., ARAÚJO, R., MARINHO, G., Remoção de BTEX por fungos em reator aeróbio de escoamento contínuo. **Eng Sanit Ambient**, v.22, n.4, jul/ago 2017, p.809-820.

SILVA, I. S.; LIMA, S. G.; Abordagem física de compostos orgânicos. **Atena editora**, v. 1,p. 3, 2019.

SILVA, W. M., Utilização de microrganismos na biorremediação de solo contaminado por derivados de petróleo. **Universidade Estadual paulista “Júlio de Mesquita Filho”**, 2018.

SOARES, M. V.; ÁVILA, D.S., Exposição ao tolueno altera desenvolvimento, comportamento e induz aumento de eventos apoptóticos em *caenorhabditis elegans*. **Universidade federal do Pampa**, 2016.

SOUSA, K. C. et al. Biorremediação de solos contaminado por hidrocarbonetos utilizando fungos. **Revista da Universidade Vale do Rio Verde, Três Corações**, v. 14, n. 2, p. 43-52, ago./dez. 2016.

WANG, X., XUE, L., CHANG, S., HE, X., FAZ, T., WU, J., NIU, J., EMANEGHEMI, B., Bioremediation and metabolism of clothianidin by mixed bacterial consortia enriched from contaminated soils in Chinese greenhouse. **Process Biochemistry**, Volume 78, March 2019, Pages 114-122.

ZHOU, Z., LIUA, X., SUNA, K., LINA, C., MAA, J., HEA, M., OUYANG, W., Persulfate-based advanced oxidation processes (AOPs) for organic contaminated soil remediation: A review. **Chemical Engineering Journal**, 2019.

CAPÍTULO 21: CAROTENOIDES E SUAS BIOATIVIDADES: UMA MINI-REVISÃO FOCADA NAS FONTES AQUÁTICAS

CHAPTER 21: CAROTENOIDS AND THEIR BIOACTIVITIES: A MINI-REVIEW FOCUSED ON AQUATIC SOURCES

Nilson Fernando Barbosa da Silva¹; Julyanne Victória dos Santos Ferreira²; Beatriz de Aquino Marques da Costa³, Ana Lúcia Figueiredo Porto⁴ e Vagne de Melo Oliveira⁵

Resumo

Os carotenoides são pigmentos tetraterpenoides orgânicos e nutricionalmente benéficos para a saúde, podendo ser obtidos de uma variedade de fontes, como organismos aquáticos, como crustáceos, microalgas, peixes; além de plantas, frutos, fungos, leveduras e bactérias, entre outros. Os organismos marinhos são excelentes fornecedores desses pigmentos, principalmente provenientes de microalgas e camarão. Levando em consideração sua importância biológica, este trabalho objetivou revisar as principais bioatividades e fontes aquáticas de carotenoides. A revisão bibliográfica elucidou as principais bioatividades desses pigmentos lipídicos, agindo como antioxidante, antiinflamatório, antitumoral, anti-obesidade, anti-diabetes, além de outras bioatividades. Os carotenoides podem ser naturais ou sintéticos. Com base no tipo, o mercado de carotenoides é segmentado em astaxantina, betacaroteno, luteína, licopeno, cantaxantina e zeaxantina, além dos outros tipos (capsantina, urucum, alfa-caroteno e apocarotenal). O principal carotenoide extraído de organismos aquáticos é a astaxantina. As principais formulações são em suspensão de óleo, pó, beadlet e emulsão. As principais aplicações são voltadas para a indústria de alimentos e bebidas, suplementos alimentares, cosméticos e farmacêuticos. O mercado comercial de carotenoides tem necessidade de fontes alternativas e nesse aspecto, organismos aquáticos parece ser uma excelente e viável opção.

Palavras-Chave: Aquicultura, Bioativos, Produtos naturais, Pigmentos.

Abstract

Carotenoids are organic and nutritionally beneficial tetraterpenoid pigments and can be obtained from a variety of sources, such as aquatic organisms, such as crustaceans, microalgae, fish; in addition to plants, fruits, fungi, yeasts and bacteria, among others. Marine organisms are excellent suppliers of these pigments, mainly from microalgae and shrimp. Taking into account its biological importance, this study aimed to review the main bioactivities and aquatic sources of carotenoids. The literature review elucidated the main bioactivities of these lipid pigments, acting as antioxidants, anti-inflammatory, anti-tumor, anti-obesity, anti-diabetes, in addition to other bioactivities. Carotenoids can be natural or synthetic. Based on the type, the carotenoids market is segmented into astaxanthin, beta carotene, lutein, lycopene, canthaxanthin and zeaxanthin, in addition to the other types (capsanthin, annatto, alpha-carotene and apocarotenal). The main carotenoid extracted from aquatic organisms is astaxanthin. The main formulations are in oil suspension, powder, beadlet and emulsion. The main applications are aimed at food and beverages, food supplements,

¹Graduando em Engenharia de Pesca, Universidade Federal Rural de Pernambuco, nilsons.fernando@gmail.com

²Graduanda em Ciências Biológicas, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Julyanne.marculino@gmail.com

³Mestranda em Biotecnologia Animal, Universidade Federal Rural de Pernambuco, deaquinobeatriz@gmail.com

⁴Professora Titular, Universidade Federal Rural de Pernambuco, analuporto@yahoo.com.br

⁵Doutor, Universidade Federal Rural de Pernambuco, vagne_melo@hotmail.com

cosmetics and pharmaceutical industries. The commercial carotenoid market is in need of alternative sources and in this respect, aquatic organisms seem to be an excellent and viable option.

Keywords: Aquaculture, Bioactive, Natural products, Pigments.

1. Introdução

Os carotenoides são pigmentos tetraterpenoides orgânicos nutricionalmente benéficos para a saúde (BOGACZ-RADOMSKA; HARASYM; PIWOWAR, 2020), sendo encontrado principalmente em flores e frutos, apresentando diversos papéis na fotobiologia, fotoquímica e medicina. As características dos carotenoides, como a reatividade com o oxigênio, os tornam essenciais nas recomendações alimentares e farmacêuticas (RIVERA-MADRI et al., 2020). Os carotenoides exercem um papel basal na manutenção do organismo e na prevenção de algumas doenças crônicas devido às suas notáveis propriedades físico-químicas, estruturais e biológicas, envolvendo seu papel antioxidante, antiinflamatório e até no combate a obesidade (GOPAL; MARADGI; PONESAKKI, 2020). Com suas bioatividades realçadas no segmento nutracêutico e farmacêutico, pesquisas científicas demonstraram que o consumo de dieta rica em carotenóides está aliado à redução da deficiência de vitamina A (carotenoide pró-vitamina A), tratamento de doenças crônicas, como diabetes mellitus, doenças cardíacas, oculares e degenerativas ocasionadas pela idade, prevenindo o envelhecimento (RIVERA-MADRI et al., 2020; SHILPA et al., 2020).

Os carotenoides podem ser obtidos de fontes animais, com destaque para organismos aquáticos (SACHINDRA; MAHENDRAKAR, 2005); vegetais, especialmente, dos frutos (RIVERA-MADRI et al., 2020); e microbianas, como fungos (LAGASHETTI et al., 2019; KALRA; CONLAN; GOEL, 2020; VENIL et al., 2020), por exemplo. A principal fonte de carotenoides na pele humana é a dieta, principalmente frutas, vegetais e produtos marinhos, mas também podem se originar de suplementação e aplicação tópica. Na pele os carotenoides se acumulam, principalmente, na epiderme e atuam como uma barreira protetora contra várias influências ambientais. Ou seja, a pele está exposta a vários fatores ambientais, incluindo radiação ultravioleta que causa estresse oxidativo, levando a seu envelhecimento prematuro, além de outros efeitos prejudiciais, como queimaduras, danos na estrutura do DNA e, consequentemente, câncer de pele (BALIĆ; MOKOS, 2019).

Os carotenoides produzidos por síntese química dominam o mercado global, mas sua obtenção a partir de fontes naturais parece promissora, especialmente a partir de subprodutos agro-alimentares, como os produtos da aquicultura. Essa alternativa pode ser útil para valorizar os recursos renováveis de baixo custo, reduzir resíduos agro-industriais, aumentar os

impactos econômicos e contribuir com a redução dos despejos ambientais (DEL MAR CONTRERAS-GÁMEZ; GÓMEZ-CARAVACA, 2020). Nesse contexto, este trabalho teve por objetivo realizar uma mini-revisão sobre as bioatividades dos carotenoides, focando nas fontes provenientes da aquicultura, a partir de uma visão sustentável e ecologicamente correta de utilização desses pigmentos.

2. Desenvolvimento

Para o desenvolvimento desta revisão, foram realizadas pesquisas a partir de plataformas eletrônicas científicas, a saber: Science Direct (<http://www.sciencedirect.com/>), Scielo- ScientificElectronic Library (www.scielo.org) e Springer (<https://www.springer.com>), utilizando como palavras-chave: carotenoides, carotenoides pescado, pigmentos pescado, carotenoide agroindustrial. Realizou-se a leitura dos títulos e resumos para seleção dos artigos, livros, capítulos de livro, notas científicas, entre outros, excluindo os que não estavam dentro do escopo da proposta ou mesmo que não detinham informações relevantes para nossa investigação. Foram incluídas publicações em inglês e português que atenderam aos critérios de busca. Para a discussão dos conteúdos investigados foram abordados os seguintes temas: estrutura química, funções biológicas, síntese, carotenoides em organismos aquáticos e mercado comercial de pigmentos.

2.1 Características químicas dos carotenoides

Os carotenoides são moléculas lipídicas que possuem cadeia ramificada e insaturada, com ligações duplas ressonantes que migram entre os átomos de carbono (CARDOSO, 1997). Estruturalmente, podem ser divididos em dois grupos: os carotenos, compostos apenas de carbonos e átomos de hidrogênio; e as xantofilas, que também contêm oxigênio. Os humanos obtêm carotenoides de suas dietas e os acumulam em quantidades relativamente grandes nos tecidos e no plasma, desempenhando uma variedade de funções biológicas (AMENGUAL, 2019).

As ligações duplas presentes nas cadeias dos carotenoides podem ocorrer tanto na forma *cis* quanto na *trans*, sendo os carotenoides que apresentam estereoisomeria *trans* mais estáveis. Os carotenoides são compostos tetraterpenoides, ou seja, possuem 40 carbonos em sua estrutura, estes subdivididos em 8 grupos de isoprenos (C_5H_8) unidos em uma única e longa cadeia. Além da presença de compostos isoprenoides, alguns grupos também apresentam anéis cetônicos, tal qual a β -ionona (NELSON; COX, 2014). Esses anéis, quando

presentes, ligam-se aos isoprenos em suas extremidades e forma o retinol, molécula amplamente conhecida como a vitamina A.

A formação de retinol garante ao carotenoide o caráter de precursor dessa vitamina, assim denominando os que apresentam esse anel cetônico de provitamina A (AMBRÓSIO; CAMPOS; FARO, 2006). Os carotenoides que apresentam um anel em sua estrutura são os carotenoides monocíclicos, enquanto os que não apresentam e os que apresentam dois anéis em sua estrutura são denominados de acíclicos e bicíclicos, respectivamente (VALDUGA et al., 2009). Esse grupo apresenta ainda outra distinção quanto a sua cadeia carbônica, grupos que em suas cadeias constam apenas interações entre carbono e hidrogênio são considerados hidrocarbonetos ou carotenos, quanto os que apresentam oxigênio em sua estrutura, tanto como hidroxilas ou como éteres, são as xantofilas ou oxicarotenoides (CARDOSO, 1997; BÁEZ, 2007).

A presença de hetero-átomos garante as xantofilas um grau de polaridade maior que quanto os carotenos, tornando as xantofilas compostos mais aptos a sofrer reações de quebra. Moléculas carotenoides possuem muitos elétrons com capacidade de absorver determinados comprimentos de ondas (entre 400-500nm) nas suas camadas periféricas. Esses elétrons quando chegam a um grau de excitação muito alto refratam os demais comprimentos de ondas não absorvidos e isso resulta na coloração característica que observamos em vegetais, algas, aves, peixes e camarões que apresentam o carotenoide em sua estrutura (WEAVER et al., 2020).

2.2 Bioatividades dos carotenoides

Os carotenoides possuem inúmeras funções biológicas (Figura 1), sendo responsáveis pela captação dos comprimentos de ondas que não podem ser absorvidos pela clorofila presentes em plantas, algas e bactérias (BARTLEY; SCOLNIK, 1995). Por conta dessa propriedade e de refratar certos comprimentos de ondas, resultando em uma coloração natural, os carotenoides têm sido largamente utilizados como corantes naturais em vários setores da indústria, substituindo os corantes sintéticos que são danosos ao ambiente (MORTENSEN, 2006; BÁEZ, 2007). Outra grande propriedade dos carotenoides devido a sua estrutura é a de interagir e eliminar radicais livres presentes no organismo (FOO et al., 2017).

Estudos recentes visaram aplicar a fucoxantina extraída de microalgas (FOO et al., 2017) e astaxantina obtida a partir de peixes e camarões (SOWMYA et al., 2017; LIRA et al., 2017; MAOKA et al., 2017) em fármacos que combatem o estresse oxidativo causado pelo excesso dos radicais livres (BAE, 2020). Dentre as bioatividades da fucoxantina estão sua

ação antioxidante, antiinflamatória, anticâncer, anti-obesidade, antidiabética, anti-angiogênica e antimalárica e seus efeitos protetores no fígado, vasos sanguíneos do cérebro, ossos, pele e olhos. As bioatividades da fucoxantina já foram estudadas em uma variedade de microalgas, como *Alaria crassifolia*, *Cladosiphon okamuranus*, *Cystoseira hakodatensis*, *Eisenia bicyclis*, *Fucus serratus*, *Fucus vesiculosus*, *Myagropsis myagroides*, *Padina tetrastomatica*, *Petalonia binghamiae*, *Sargassum fulvellum*, *Hijikia fusiformis*, *Ishige okamurae*, *Kjellmaniella crassifolia*, *Laminaria japonica*, *Laminaria ochotensis*, *Sargassum heterophyllum*, *Sargassum heterophyllum*, *Sargassum horneri*, *Sargassum siliquastrum* e *Undaria pinnatifida*, e as diatomáceas *Chaetoseros* sp., *Cylindrotheca closterium*, *Odontella aurita* e *Phaeodactylum tricornutum* (PENG et al., 2011).

Figura 1. Bioatividades dos carotenoides.

Fonte: Adaptação do levantamento bibliográfico (2020).

Entre a variedade de carotenoides marinhos, a fucoxantina de algas marrons e astaxantina de algas exibem efeitos *in vitro* e *in vivo* e em tratamentos clínicos de doenças (CHUYEN; EUN, 2015). A astaxantina e o β -carotenono também possuem grande atuação na prevenção de doenças cardiovasculares. Eles agem combatendo lesões causadas por radicais lipídicos nas paredes dos vasos sanguíneos (RIQUE et al., 2002). O retinol, éster mais conhecido como vitamina A e que pode ser extraído a partir do β -caroteno e de outros grupos de carotenoides pro-vitaminícos, é umas das vitaminas mais importantes no processo de desenvolvimento do sistema epitelial, imunológico e visual (AMBRÓSIO et al., 2006).

Os carotenoides, particularmente β -caroteno, licopeno, luteína e astaxantina, têm efeitos fotoprotetores, não apenas por meio de propriedades de absorção de luz direta, mas também por meio de seus efeitos antioxidantes devido à eliminação de espécies reativas de oxigênio, bem como pela regulação da expressão gênica induzida pela luz ultravioleta, modulação da sinalização dependente do estresse e/ou supressão das respostas celulares e teciduais, como inflamação. Dietas ricas em carotenoides demonstraram seus efeitos fotoprotetores na pele (principalmente por diminuir a sensibilidade ao eritema induzido por UVR) e seus efeitos benéficos na prevenção e melhoria do envelhecimento da pele (elasticidade e hidratação da pele melhorada, textura da pele, rugas e manchas senis). Além disso, os carotenoides podem ser úteis na prevenção e tratamento de algumas fotodermatoses, incluindo protoporfiria eritropoiética (PPE), porfiria cutânea tardia (PCT) e erupção polimorfa à luz (PMLE) (BALIĆ; MOKOS, 2019).

2.3 Carotenoides em organismos aquáticos e suas aplicações

As principais fontes de carotenoides de organismos marinhos são: a) Algas Marinhas e Ervas Marinhas; b) Procariontes (bactérias e arqueias), cianobactérias, fungos e protistas; e c) Animais marinhos (GALASSO; CORINALDESI; SANSONE, 2017).

Os carotenoides não podem ser produzidos por consumidores secundários. Apesar disso, algumas espécies apresentam este pigmento como um fenótipo, a partir da coloração de camarões (LIRA et al., 2017), lagostas (WALD; BURG, 1957) e alguns moluscos (SUHNEL et al., 2009), além de esponjas, águas-vivas, entre outros. Essa expressão fenotípica acontece devido ao hábito alimentar dessas espécies. Organismos bentônicos, demersais, recifais e/ou que simplesmente se alimentem de algas, bactérias e perifíton presentes no sedimento podem sintetizar os carotenoides produzidos por essas espécies (MESQUITA; TEIXEIRA; SERVULO, 2017).

Os pigmentos mais abundantes em organismos aquáticos são astaxantina, β -caroteno, luteína e zeaxantina, além de outros em menor proporção. Algumas espécies do gênero *Salmonidae* (CRAIK; HARVEY, 1987). Organismos aquáticos de um modo geral utilizam as cores geradas pelos carotenoides para camuflagem ou para atrair um parceiro durante o período reprodutivo.

A astaxantina (3,3'-dihidroxi- β , β' -caroteno-4,4'-diona) é um carotenoide xantofila, contido em *Haematococcuspluvialis*, *Chlorella zofingiensis*, *Chlorococcum* e *Phaffiarhodozyma* (AMBATI et al., 2014), de alto valor agregado e com uma ampla gama de aplicações nas indústrias de alimentos, rações, nutracêutica e farmacêutica, vem recebendo grande atenção da ciência e do público nos últimos anos (LIU et al., 2014). As principais aplicações comerciais da astaxantina estão descritas no Quadro 1. Estudos têm mostrado que a astaxantina tem importantes efeitos preventivos e terapêuticos na fibrose hepática, fígado gorduroso não alcoólico, câncer de fígado, lesão hepática induzida por drogas e isquemia; e seu mecanismo está relacionado a atividades antioxidantes e antiinflamatórias e à regulação de múltiplas vias de sinalização (LI; GUO; WU, 2020).

As microalgas são uma fonte rica de compostos bioativos (LAFARGA; CLEMENTE; GARCIA-VAQUERO, 2020), incluindo uma diversidade de pigmentos, para os quais esses microrganismos fotossintéticos representam um recurso biológico quase exclusivo. Os carotenoides amarelos, laranja e vermelhos têm um uso industrial em produtos alimentícios e cosméticos como suplementos vitamínicos e produtos alimentares saudáveis e como aditivos para rações para aves, gado, peixes e crustáceos (DEL CAMPO; GARCÍA-GONZÁLEZ; GUERRERO, 2007), compreendendo uma alternativa viável e sustentável às moléculas que são sintetizadas de modo químico que atualmente dominam o mercado global (LAFARGA; CLEMENTE; GARCIA-VAQUERO, 2020).

As microalgas verdes *Haematococcuspluvialis* e *Chlorella zofingiensis* representam os mais promissores produtores de astaxantina. Embora *Haematococcuspluvialis* possua o maior teor de astaxantina intracelular, tem deficiências intrínsecas, como taxa de crescimento lenta, baixo rendimento de biomassa e alta necessidade de luz. Em contrapartida, *Chlorella zofingiensis* cresce rápido fototroficamente, heterotroficamente e mixotroficamente, e é de fácil cultivo, podendo atingir altas densidades celulares. Estas características biotecnológicas fornecem *Chlorella zofingiensis* com alto potencial para ser um organismo melhor do que *Haematococcus pluvialis* para a produção em massa de astaxantina (LIU et al., 2014).

Del Campo et al. (2004) cultivaram fotoautotroficamente *Chlorella zofingiensis* cepa CCAP 211/14 e observaram uma quantidade significativa de carotenoides (astaxantina e

luteína), de crescente demanda para uso como aditivos alimentares em piscicultura e avicultura, como corantes em alimentos e em produtos de saúde. Ainda, os produtos de astaxantina são usados para aplicações comerciais nas formas farmacêuticas, tais como: comprimidos, cápsulas, xaropes, óleos, géis moles, cremes, biomassa e pós granulados (AMBATI et al., 2014).

Quadro 1. Bioatividades da astaxantina.

Fonte de astaxantina	Aplicações	Referência
Comercial	Ativação da autofagia e inibição da apoptose em célula gástrica infectada por <i>Helicobacter pylori</i>	Lee; Lim; Kim (2020)
Comercial	Inibição da disfunção mitocondrial e a expressão de interleucina-8 em células epiteliais gástricas infectadas por <i>Helicobacter pylori</i>	Kim; Lim; Kim (2018)
Comercial	Combate a doença do fígado gordo	Liu et al. (2018)
Comercial	Prevenção e reversão da resistência a insulina	Ni et al. (2015)
Não informado	Proteção do músculo liso vascular	Chen et al. (2020)
Microalga (<i>Haematococcus pluvialis</i>)	Agente neuroprotetor contra a isquemia do nervo óptico	Lin et al. (2020)
Microalga (<i>Haematococcus pluvialis</i>)	Homeostase mitocondrial do cálcio	Sztretye et al. (2020)
Comercial	Prevenção da osteoartrite	Sun et al. (2019)
Comercial	Antioxidante e anti-envelhecimento	Eren et al. (2019)
Comercial	Proliferação e migração de células cancerosas da mama <i>in vitro</i>	McCall et al. (2018)
Microalga (<i>Haematococcus pluvialis</i>)	Pigmentação do leite	Mezquita et al. (2015)
Subprodutos de camarão	Nefropatia diabética	Sila et al. (2015)
Microalga (<i>Haematococcus pluvialis</i>)	Tratamento da dermatite de contato	Kim et al. (2015)
Comercial	Regulação dos canais de cálcio	Altunrende et al. (2018)
Comercial	Supressão de enfisema pulmonar	Kubo et al. (2019)
Comercial	Proteção contra danos à retina	Otsuka et al. (2016)
Microalga (<i>Haematococcus pluvialis</i>)	Cosmético	Tominaga et al. (2012)
Comercial	Prevenção de lesão pulmonar	Cai et al. (2019)

Fonte: Adaptado da Pesquisa Bibliográfica (2020).

Os resíduos de camarão na forma de carapaça de cabeça e corpo compreendem 45-60% de todo o camarão. O desperdício de camarão é uma das importantes fontes naturais de carotenóide. A recuperação desses componentes valiosos a partir dos resíduos não apenas melhoraria a economia dos processadores de camarão, mas também minimizaria o potencial

de poluição dos resíduos de camarão. O desperdício de camarão pode ser a matéria-prima mais barata para a recuperação de carotenóides e, posteriormente, pode ser uma alternativa melhor ao carotenóide sintético (SACHINDRA; MAHENDRAKAR, 2005).

O hepatopâncreas é o principal órgão de armazenamento de lipídios do caranguejo, e o sabor característico do caranguejo vem principalmente dele. Astaxantina já foi extraída do hepatopâncreas de caranguejo *Eriocheir sinensis* (WANG et al., 2019). Uma carotenoproteína laranja contendo astaxantina como grupo protético foi extraída e purificada da carapaça do caranguejo *Macropipus puber*. A extração foi possível por meio do Triton X-100, originando uma carotenoproteína de laranja (GÓMEZ; GÁRATE; MILICUA, 1984).

2.4 Mercado de carotenoides

Segundo relatório da Market Research Reports (2020), o mercado de carotenoides está projetado para crescer de USD 1,5 bilhões em 2019 para 2,0 bilhões em 2026. Isso é atribuído ao uso crescente de carotenoides naturais como corantes e alimentos e às inovações nas tecnologias de extração. Embora os carotenoides sintéticos respondam por uma grande participação no mercado, os consumidores preferem optar por produtos com rótulos naturais e limpos, o que deve impulsionar o crescimento do mercado de carotenoides de origem natural na região. A Figura 2 descreve as principais empresas que operam no mercado de carotenoides, bem como as principais aplicações e formas de produtos.

Figura 2. Bioatividades dos carotenoides.

Fonte: Adaptação de Market Research Reports (2020).

3. Considerações Finais

Os carotenoides são pigmentos naturais ou sintéticos utilizados principalmente em formulações para indústria de alimentos e bebidas, suplementos alimentícios, cosméticos e farmacêutico devido suas inúmeras bioatividades, tais como atividade antioxidante, antiinflamatório e antitumoral, além de outros. Também podem ser obtidas a partir de uma variedade de fontes, recebendo hoje grande atenção do mercado industrial as provenientes de organismos aquáticos, como microalgas e camarões. O principal carotenoide extraído de organismos aquáticos é a astaxantina. O mercado comercial de carotenoides tem necessidade de fontes alternativas e nesse aspecto, organismos aquáticos parece ser uma excelente e viável opção.

4. Referências

- AMBATI, R.R.; PHANG, S.M.; RAVI, S.; ASWATHANARAYANA, R.G. Astaxanthin: sources, extraction, stability, biological activities and its commercial applications--a review. **Marine drugs**, v.12, n.1, p.128–152, 2014. <https://doi.org/10.3390/md12010128>
- AMBRÓSIO C.L.B.; CAMPOS F.A.C.S.; FARO Z.P. Carotenóides como alternativa contra a hipovitaminose A. **Revista de Nutrição**, v.19, n.2, p.233-243, 2006.
- AMENGUAL, J. Bioactive Properties of Carotenoids in Human Health. **Nutrients**, v.11, n.10, artigo 2388, 2019. <https://doi.org/10.3390/nu11102388>
- ALTUNRENDE, M.E.; GEZEN-AK, D.; ATASOY, İ.L.; CANDAS, E.; DURSUN, E. The Role of Astaxanthin on Transcriptional Regulation of NMDA Receptors Voltage Sensitive Calcium Channels and Calcium Binding Proteins in Primary Cortical Neurons. **Noropsikiyatri arsivi**, v.55, n.4, p.295–300, 2018. <https://doi.org/10.29399/npa.23259>
- BALIĆ, A.; MOKOS, M. Do We Utilize Our Knowledge of the Skin Protective Effects of Carotenoids Enough?. **Antioxidants (Basel, Switzerland)**, v.8, n.8, artigo 259, 2019. <https://doi.org/10.3390/antiox8080259>
- BAE, M.; KIM, M.-B.; PARK, Y.-K.; LEE, J.-Y. Health benefits of fucoxanthin in the prevention of chronic diseases. **Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids**, in press, artigo158618, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2020.158618>
- BÁEZ, J.E. Generadores de Colores Naturales: Carotenos y Xantofilas. **Enlace Químico**, v.1, n.7, p.234-239, 2007.
- BARTLEY, G.E.; SCOLNIK, P.A. Plant Carotenoids: pigments for photoprotection, visual attraction and human health. **The Plant Cell**, v.7, p.1027-1038, 1995.

BOGACZ-RADOMSKA, L.; HARASYM, J.; PIWOWAR, A. Commercialization aspects of carotenoids. **Carotenoids: Properties, Processing and Applications**, p.327–357, 2020 doi:10.1016/b978-0-12-817067-0.00010-5

CAI, X.; CHEN, Y.; XIE, X.; YAO, D.; DING, C.; CHEN, M. Astaxanthin prevents against lipopolysaccharide-induced acute lung injury and sepsis via inhibiting activation of MAPK/NF- κ B. **American journal of translational research**, v.11, n.3, p.1884–1894, 2019.

CARDOSO, S.L. Fotofísica de carotenóides e o papel antioxidante do beta-caroteno. **Química Nova**, v.20, p.535-40, 1997.

CHEN, Y.; LI, S.; GUO, Y.; YU, H.; BAO, Y.; XIN, X.; YANG, H.; NI, X.; WU, N.; JIA, D. Astaxanthin Attenuates Hypertensive Vascular Remodeling by Protecting Vascular Smooth Muscle Cells from Oxidative Stress-Induced Mitochondrial Dysfunction. **Oxidative medicine and cellular longevity**, v.2020, artigo 4629189, 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/4629189>

CHUYEN, H.V.; EUN, J.-B. Marine carotenoids: Bioactivities and potential benefits to human health. **Critical Reviews in Food Science and Nutrition**, v.57, n.12, p.2600–2610, 2015. doi:10.1080/10408398.2015.1063477

CRAIK, J.C.A.; HARVEY, S.M. A biochemical method for distinguishing between wild and farmed salmonid fishes by their carotenoid pigmentation. **Journal of the Forensic Science Society**, v.27, n.1, p.47-55, 1987.

DEL CAMPO, J.A.; RODRÍGUEZ, H.; MORENO, J.; VARGAS, M.A.; RIVAS, J.; GUERRERO, M.G. Accumulation of astaxanthin and lutein in *Chlorella zofingiensis* (Chlorophyta). **Applied Microbiology and Biotechnology**, v.64, n.6, p.848–854, 2004. <https://doi.org/10.1007/s00253-003-1510-5>

DEL CAMPO, J.A.; GARCÍA-GONZÁLEZ, M.; GUERRERO, M.G. Outdoor cultivation of microalgae for carotenoid production: current state and perspectives. **Applied Microbiology and Biotechnology**, v.74, n.6, p.1163–1174, 2007. <https://doi.org/10.1007/s00253-007-0844-9>

DEL MAR CONTRERAS-GÁMEZ, M.; GÓMEZ-CARAVACA, A.M. Underutilized sources of carotenoids. **Carotenoids: Properties, Processing and Applications**, p.107–147. doi:10.1016/b978-0-12-817067-0.00004-x

EREN, B.; TUNCAY TANRIVERDI, S.; AYDIN KÖSE, F.; ÖZER, Ö. Antioxidant properties evaluation of topical astaxanthin formulations as anti-aging products. **Journal of cosmetic dermatology**, v.18, n.1, p.242–250, 2019. <https://doi.org/10.1111/jocd.12665>

FOO, S.C. et al. Antioxidant capacities of fucoxanthin-producing algae as influenced by their carotenoid and phenolic contents. **Journal of Biotechnology**, v.241, p.175-183, 2017.

GALASSO, C.; CORINALDESI, C.; SANSONE, C. Carotenoids from Marine Organisms: Biological Functions and Industrial Applications. **Antioxidants (Basel, Switzerland)**, v.6, n.4, artigo 96, 2017. <https://doi.org/10.3390/antiox6040096>

GÓMEZ, R.; GÁRATE, A.M.; MILICUA, J.C. Characterization of a carotenoprotein from the carapace of the crab *Macropipus puber*. **Revista espanola de fisiologia**, v.40, n.3, p.319–323, 1984.

GOPAL, S.S.; MARADGI, T.; PONESAKKI, G. Antiobese properties of carotenoids: An overview of underlying molecular mechanisms. **Carotenoids: Properties, Processing and Applications**, p.75–105, 2020. doi:10.1016/b978-0-12-817067-0.00003-8

KALRA, R.; CONLAN, X.A.; GOEL, M. Fungi as a Potential Source of Pigments: Harnessing Filamentous Fungi. **Frontiers in chemistry**, v.8, artigo 369, 2020. <https://doi.org/10.3389/fchem.2020.00369>

KIM, H.; AHN, Y.T.; LEE, G.S.; CHO, S.I.; KIM, J.M.; LEE, C.; LIM, B.K.; JU, S.A.; AN, W.G. Effects of astaxanthin on dinitrofluorobenzene-induced contact dermatitis in mice. **Molecular medicine reports**, v.12, n.3, p.3632–3638, 2015. <https://doi.org/10.3892/mmr.2015.3892>

KIM, S.H.; LIM, J.W.; KIM, H. Astaxanthin Inhibits Mitochondrial Dysfunction and Interleukin-8 Expression in Helicobacter pylori-Infected Gastric Epithelial Cells. **Nutrients**, v.10, n.9, artigo 1320, 2018. <https://doi.org/10.3390/nu10091320>

KUBO, H.; ASAI, K.; KOJIMA, K.; SUGITANI, A.; KYOMOTO, Y.; OKAMOTO, A.; YAMADA, K.; IJIRI, N.; WATANABE, T.; HIRATA, K.; KAWAGUCHI, T. Astaxanthin Suppresses Cigarette Smoke-Induced Emphysema through Nrf2 Activation in Mice. **Marine drugs**, v.17, n.12, artigo 673, 2019. <https://doi.org/10.3390/md17120673>

LAFARGA, T.; CLEMENTE, I.; GARCIA-VAQUERO, M. Carotenoids from microalgae. **Carotenoids: Properties, Processing and Applications**, p.149–187, 2020. doi:10.1016/b978-0-12-817067-0.00005-1

LAGASHETTI, A.C.; DUFOSSÉ, L.; SINGH, S.K.; SINGH, P.N. Fungal Pigments and Their Prospects in Different Industries. **Microorganisms**, v.7, n.12, artigo 604, 2019. <https://doi.org/10.3390/microorganisms7120604>

LEE, H.; LIM, J.W.; KIM, H. Effect of Astaxanthin on Activation of Autophagy and Inhibition of Apoptosis in Helicobacter pylori-Infected Gastric Epithelial Cell Line AGS. **Nutrients**, v.12, n.6, p.1750, 2020. <https://doi.org/10.3390/nu12061750>

LI, J.; GUO, C.; WU, J. Astaxanthin in liver health and disease: A potential therapeutic agent. **Drug design, development and therapy**, v.14, p.2275–2285, 2020. <https://doi.org/10.2147/DDDT.S230749>

LIN, W.N.; KAPUPARA, K.; WEN, Y.T.; CHEN, Y.H.; PAN, I.H.; TSAI, R.K. *Haematococcus pluvialis*-derived astaxanthin is a potential neuroprotective agent against optic nerve ischemia. **Marine drugs**, v.18, n.2, artigo 85, 2020. <https://doi.org/10.3390/md18020085>

LIRA, G.M.; LOPEZ, A.M.Q.; FIRMINO, G.O.; SANTOS, S.D.; BEZERRA, R.S. Total carotenoids and antioxidant activity of fillets and shells (in natura or cooked) of “Vila Franca”

shrimp (*Litopenaeus Schmitti*) in different intervals of storage under freezing. **Ciência e Agrotecnologia**, v.41, n.1, p.94-103, 2017.

LIU, J.; SUN, Z.; GERKEN, H.; LIU, Z.; JIANG, Y.; CHEN, F. *Chlorella zofingiensis* as an alternative microalgal producer of astaxanthin: biology and industrial potential. **Marine drugs**, v.12, n.6, p.3487–3515, 2014. <https://doi.org/10.3390/md12063487>

LIU, H.; LIU, M.; FU, X.; ZHANG, Z.; ZHU, L.; ZHENG, X.; LIU, J. Astaxanthin Prevents Alcoholic Fatty Liver Disease by Modulating Mouse Gut Microbiota. **Nutrients**, v.10, n.9, artigo 1298, 2018. <https://doi.org/10.3390/nu10091298>

LU, W.; MAIDANNYK, V.A.; LIM, A.S.L. Carotenoids degradation and precautions during processing. **Carotenoids: Properties, Processing and Applications**, p.223–258, 2020. doi:10.1016/b978-0-12-817067-0.00007-5

MAOKA, T.; SATO, W.; NAGAI, H.; TAKAHASHI, T. Carotenoids os red, brown and Black specimens of *Plectropomus leopardus*, the coral trout (Suziara in japanese). **Journal of Oleo science**, v.66, n.6, p.579-584, 2017.

MARKET RESEARCH REPORTS. Carotenoids Market. Disponível em <<https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/carotenoid-market-158421566.html>>. Acesso 09/08/2020.

MCCALL, B.; MCPARTLAND, C.K.; MOORE, R.; FRANK-KAMENETSKII, A.; BOOTH, B.W. Effects of Astaxanthin on the Proliferation and Migration of Breast Cancer Cells *In Vitro*. **Antioxidants**, v.7, n.10, artigo 135, 2018. <https://doi.org/10.3390/antiox7100135>

MESQUITA, S.S.; TEXEIRA, C.M.L.L.; SERVULO, E.F.C. Carotenoides: Propriedade, Aplicações e Mercado. **Revista virtual de química**, v.9, n.2, p.672-688, 2017.

MEZQUITA, P.C.; HUERTA, B.E.; RAMÍREZ, J.C.; HINOJOSA, C.P. Milks pigmentation with astaxanthin and determination of colour stability during short period cold storage. **Journal of Food Science and Technology**, v.52, n.3, p.1634–1641, 2015. <https://doi.org/10.1007/s13197-013-1179-4>

MORTENSEN, A. Carotenoids and other pigments as natural colorants. **Pure and Applied Chimestry**, v.78, n.8, p.1477-1491, 2006.

NI, Y.; NAGASHIMADA, M.; ZHUGE, F.; ZHAN, L.; NAGATA, N.; TSUTSUI, A.; NAKANUMA, Y.; KANEKO, S.; OTA, T. Astaxanthin prevents and reverses diet-induced insulin resistance and steatohepatitis in mice: A comparison with vitamin E. **Scientific reports**, v.5, artigo 17192, 2015. <https://doi.org/10.1038/srep17192>

OTSUKA, T.; SHIMAZAWA, M.; INOUE, Y.; NAKANO, Y.; OJINO, K.; IZAWA, H.; TSURUMA, K.; ISHIBASHI, T.; HARA, H. Astaxanthin Protects Against Retinal Damage: Evidence from In Vivo and In Vitro Retinal Ischemia and Reperfusion Models. **Current eye research**, v.41, n.11, p.1465–1472, 2016. <https://doi.org/10.3109/02713683.2015.1127392>

PENG, J.; YUAN, J.P.; WU, C.F.; WANG, J.H. Fucoxanthin, a marine carotenoid present in brown seaweeds and diatoms: metabolism and bioactivities relevant to human health. **Marine drugs**, v.9, n.10, p.1806–1828, 2011. <https://doi.org/10.3390/md9101806>

RIQUE, A.B.R.; SOARES, E.A.; MEIRELLES, C.M. Nutrição e exercício na prevenção e controle das doenças cardiovasculares. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v.8 n.6, p.244-254, 2002.

RIVERA-MADRID, R.; CARBALLO-UICAB, V.M.; CÁRDENAS-CONEJO, Y.; AGUILAR-ESPINOSA, M.; SIVA, R. Overview of carotenoids and beneficial effects on human health. **Carotenoids: Properties, Processing and Applications**, p.1–40, 2020. doi:10.1016/b978-0-12-817067-0.00001-4

SACHINDRA, N.M.; MAHENDRAKAR, N. S. Process optimization for extraction of carotenoids from shrimp waste with vegetable oils. **Bioresource Technology**, v.96, n.10, p.1195–1200, 2005. doi:10.1016/j.biortech.2004.09.018

SHILPA, S.; SHWETHA, H.J.; RAJU, M.; LAKSHMINARAYANA, R. Factors affecting bioaccessibility and bio-efficacy of carotenoids. **Carotenoids: Properties, Processing and Applications**, p.41–73, 2020. doi:10.1016/b978-0-12-817067-0.00002-6

SILA, A.; GHLISSI, Z.; KAMOUN, Z.; MAKNI, M.; NASRI, M.; BOUGATEF, A.; SAHNOUN, Z. Astaxanthin from shrimp by-products ameliorates nephropathy in diabetic rats. **European journal of nutrition**, v.54, n.2, p.301–307, 2015. <https://doi.org/10.1007/s00394-014-0711-2>

SOWMYA, P.R.; ARATHI, B. P., VIJAY, K., BASKARAN, V., & LAKSHMINARAYANA, R. Astaxanthin from shrimp efficiently modulates oxidative stress and allied cell death progression in MCF-7 cells treated synergistically with β -carotene and lutein from greens. **Food and Chemical Technology**, v.106, p.58-69, 2017. <https://doi.org/10.1016/j.fct.2017.05.024>

SUN, K.; LUO, J.; JING, X.; GUO, J.; YAO, X.; HAO, X.; YE, Y.; LIANG, S.; LIN, J.; WANG, G.; GUO, F. Astaxanthin protects against osteoarthritis via Nrf2: a guardian of cartilage homeostasis. **Aging**, v.11, n.22, p.10513–10531, 2019. <https://doi.org/10.18632/aging.102474>

SUHNEL, S.; LAGREZE, F.; FERREIRA, J.F.; CAMPESTRINI, L.H.; MARASCHIN, M. Carotenoid extraction from the gonad of the scallop *Nodipecten nodosus* (Linnaeus, 1758) (Bivalvia: Pectinidae). **Brazilian Journal of Biology**, v.69, n.1, p.209-215, 2009.

SZTRETYYE, M.; SINGLÁR, Z.; SZABÓ, L.; ANGYAL, Á.; BALOGH, N.; VAKILZADEH, F.; SZENTESI, P.; DIENES, B.; CSERNOCH, L. Improved Tetanic Force and Mitochondrial Calcium Homeostasis by Astaxanthin Treatment in Mouse Skeletal Muscle. **Antioxidants (Basel, Switzerland)**, v.9, n.2, artigo 98, 2020. <https://doi.org/10.3390/antiox9020098>

TOMINAGA, K.; HONGO, N.; KARATO, M.; YAMASHITA, E. Cosmetic benefits of astaxanthin on humans subjects. **Acta biochimica Polonica**, v.59, n.1, p.43–47, 2012.

VALDUGA, E. et al. Produção de Carotenóides: Microorganismos como Fonte de Pigmentos Naturais. **Química nova**, v.32, n.9, p.2429-2436, 2009. <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422009000900036>

VENIL, C.K.; VELMURUGAN, P.; DUFOSSÉ, L.; DEVI, P.R.; RAVI, A.V. Fungal Pigments: Potential Coloring Compounds for Wide Ranging Applications in Textile Dyeing. **Journal of fungi**, v.6, n.2, artigo 68, 2020. <https://doi.org/10.3390/jof6020068>

WALD, G.; BURG, S.T. The vitamin A of the Lobster. **The Journal of General Physiology**, v.40, n.4, p.609–625, 1957.

WANG, F.; LIN, W.; LV, S.; JIANG, S.; LIN, L.; LU, J. Comparison of Lipids Extracted by Different Methods from Chinese Mitten Crab (*Eriocheir sinensis*) Hepatopancreas. **Journal of food science**, v.84, n.12, p.3594–3600, 2019. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.14946>

CAPÍTULO 22: COLÁGENO, GELATINA E SUAS APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA: UMA VISÃO GERAL FOCANDO NA MATÉRIA-PRIMA DA PISCICULTURA

CHAPTER 22: COLLAGEN, GELATIN AND ITS APPLICATIONS IN THE FOOD INDUSTRY: AN OVERVIEW FOCUSING ON THE RAW MATERIAL OF FISH FARMING

Jessica Costa da Silva¹; Beatriz de Aquino Marques da Costa²; Luiz Henrique Svintistkas Lino³; Vagne de Melo Oliveira⁴; Ana Lúcia Figueiredo Porto⁵

Resumo

A piscicultura tem sido um dos setores mais desenvolvidos da aquicultura, todavia, a alta demanda de produção de peixes tem gerado grande quantidade de resíduos (pele, ossos, escamas), os quais agregam valor comercial e pode ser reaproveitado para extração de biomoléculas, entre elas, o colágeno, proteína bastante abundante em mamíferos e que a partir da sua hidrólise parcial é possível obter outro biopolímero, a gelatina. Esta revisão de literatura objetivou investigar o reaproveitamento de resíduos de peixe para produção de gelatina e suas aplicações na indústria de alimentos. Para tanto, foram acessadas diferentes plataformas utilizando palavras-chaves em inglês e português, priorizando publicações de 2016 a 2020. A pele de peixe tem sido utilizada para a produção de gelatina, a qual apresenta estrutura sólida, gelificante e intumesciente, características de interesse dos segmentos farmacêuticos, cosméticos e nutraceuticas, entre outros. Além disso, possui grande vantagem comparada a de mamíferos, que podem oferecer riscos à saúde pela transmissão de doenças, além das restrições religiosas quanto a sua utilização. Conclui-se que os subprodutos de peixe têm se mostrado bastante proveitosos na produção de gelatina, assim como, sua aplicação na indústria de alimentos por ser uma fonte segura e não transmitir doenças.

Palavras-Chave: Alimentos, Aquicultura, Biopolímero, Produto.

Abstract

Fish farming has been one of the most developed sectors of aquaculture, however, the high demand for fish production has generated a large amount of waste (skin, bones, scales), which add commercial value and can be reused for the extraction of biomolecules, among them, collagen, a protein abundant in mammals and that from its partial hydrolysis it is possible to obtain another biopolymer, gelatin. This literature review aimed to investigate the reuse of fish waste for gelatin production and its applications in the food industry. To this end, different platforms were accessed using keywords in English and Portuguese, prioritizing publications from 2016 to 2020. Fish skin has been used for the production of gelatin, which has a solid, gelling and intumescent structure, characteristics of interest to pharmaceutical, cosmetic and nutraceutical segments, among others. In addition, it has a great advantage compared to mammals, which can offer health risks due to the transmission of diseases, in addition to religious restrictions regarding their use. It is concluded that fish by-products have

¹Doutoranda em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco, jess.cost15@gmail.com

²Mestranda em Biociência Animal, Universidade Federal Rural de Pernambuco, deaquinobeatriz@gmail.com

³Mestrando em Biologia Aplicada a Saúde, luiz.svintiskas@hotmail.com

⁴Doutor, Universidade Federal Rural de Pernambuco, vagne_melo@hotmail.com

⁵Professora Titular, Universidade Federal Rural de Pernambuco, vagne_melo@hotmail.com

been shown to be quite useful in the production of gelatin, as well as its application in the food industry as it is a safe source and does not transmit diseases.

Keywords: Food, Aquaculture, Biopolymer, Product.

1. Introdução

O colágeno e a gelatina de peixes são de interesse crescente. A estrutura do colágeno foi estudada usando várias tecnologias modernas e pode ser observada uma variação de acordo com as fontes e as estações do ano, o que pode afetar suas aplicações e condições ideais de extração. Numerosos estudos investigaram as bioatividades e os efeitos biológicos do colágeno, gelatina e seus peptídeos de hidrólise, usando modelos de ensaio *in vitro* e *in vivo*. Além do valor nutricional estabelecido como fonte de proteína, colágeno e produtos derivados de colágeno podem exercer várias atividades biológicas em potencial nas células da matriz extracelular através dos peptídeos derivados de alimentos correspondentes após a ingestão, e isso pode justificar suas aplicações em suplementos alimentares e preparações farmacêuticas. Além disso, um número crescente de novas aplicações foi encontrado para colágeno e gelatina (LIU et al., 2015).

A gelatina é um ingrediente multifuncional usado em alimentos, produtos farmacêuticos, cosméticos e filmes fotográficos como agente gelificante, estabilizador, espessante, emulsificante e formador de filme. Como um hidrocolóide termorreversível com um intervalo mais estreito entre as temperaturas de fusão e gelificação, ambas abaixo da temperatura do corpo humano, a gelatina oferece vantagens exclusivas sobre os agentes gelificantes à base de carboidratos (BORAN; REGENSTEIN, 2010).

A gelatina proveniente de peixes tem se destacado por trazer benefícios extraordinários para pessoas com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e osteoporose (LV et al., 2019), além de poder substituir a gelatina de mamíferos (MIRZAPOUR-KOUHDASHT et al., 2020).

Dentre as espécies de peixes com potencial para fornecer colágeno para produção de gelatina, a tilápia-do-Nilo (*Oreochromis niloticus*) merece especial atenção devida ser a espécie que lidera a produção na piscicultura nacional e, conseqüentemente, liberando grande volume de pele para reutilização, extração e produção de gelatina.

Assim, dentro desse contexto, esta revisão objetivou investigar o reaproveitamento de resíduos de peixes para a produção de gelatina, priorizando sua aplicação na indústria de alimentos e bebidas.

2. Desenvolvimento

Para esta mini-revisão bibliográfica, foram realizadas buscas em base de dados científicos, priorizando publicações entre 2016 e 2020, tais como: ScienceDirect (<http://www.sciencedirect.com/>), PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>), Scielo (<http://www.scielo.com/>) e Google acadêmico (<https://scholar.google.com.br/>), utilizando as palavras-chaves: colágeno, gelatina de peixe, benefícios da gelatina de peixe, propriedades reológicas da gelatina de peixe. Não houve nenhuma restrição quanto ao tipo e artigo (pesquisa, revisão, nota científica, dissertação e/ou teses de doutoramento). O conteúdo foi identificado, selecionado e organizado para formulação dos conceitos, de acordo com a conveniência dos autores.

2.1 Piscicultura, colágeno e gelatina

O crescimento da indústria da Pesca e Aquicultura tem sido bastante promissor para a economia mundial. De acordo com os dados fornecidos pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), em 2018 o total da produção mundial da pesca capturada foi a mais alta registrada, atingindo 96,4 milhões de toneladas, um aumento significativo de 5,4% em relação à média dos anos anteriores (FAO, 2018).

No Brasil, o crescimento da piscicultura tem se destacado para atender a demanda de alimentos por ser uma fonte rica em proteínas, aminoácidos e ômega-3 (OLIVEIRA et al., 2017a), auxiliando na alimentação balanceada e saudável, para manter o bom funcionamento celular e de todos os órgãos presentes no corpo (STOHS; KITCHENS, 2019).

Devido ao alto consumo desse tipo de produto, os pescadores artesanais e a indústria pesqueira têm gerado muitos resíduos durante as etapas de processamento/beneficiamento, pois aproximadamente 70% do peso dos peixes são constituídos por resíduos, tais como: ossos, pele, escamas, barbatanas, nadadeiras e vísceras internas, como fígado, estômago e intestino, os quais quase sempre são descartados inadequadamente no ambiente de coleta ou lixeiras, tornando-o bastante danoso ao meio ambiente (OLIVEIRA et al., 2017b).

De potencial ilimitado, os subprodutos descartados do beneficiando de peixes são fontes de biomoléculas proteicas de grande interesse comercial, como o colágeno (SUN et al., 2017). O colágeno é uma proteína fibrosa e insolúvel, sendo a principal estrutura dos tecidos conjuntivos, estando presente em tendões, pele, ligamentos, ossos, entre outros (ALVES et al., 2017; RIAZ et al., 2018).

O colágeno tem sido utilizado em inúmeras aplicações visando melhorias a saúde humana e animal, através do seu uso em processos de cicatrização, tratamento de ferimentos e queimaduras (LIMA-JÚNIOR et al., 2017; ARUMUGAM et al., 2018). Ainda, tem sido empregado na indústria alimentícia, principalmente, para a produção de gelatina (PANG et al., 2017), na indústria de couro para confecção de bolsas e sapatos, e no segmento cosmético para proteção da pele e antienvelhecimento (ALVES et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2017b). Até o momento, já foram descritos na literatura 29 subtipos diferentes de moléculas de colágeno, sendo mais abundante o colágeno Tipo I (OLIVEIRA et al., 2017a), que além dos peixes, pode ser extraído de vários organismos de vida marinha como: lula, polvo, esponjas do mar, camarão (TAYEL et al., 2018), entre outros.

A partir da hidrólise do colágeno pela collagenase, uma metaloproteínase que cliva a tripla hélice dessa proteína, são produzidos fragmentos peptídicos menores, em tamanho e massa molecular, os chamados “peptídeos” (OLIVEIRA et al., 2017B). Esses peptídeos têm sido amplamente empregados em suplementos alimentares pela sua potencialidade nutracêutica, biomédica e farmacêutica, principalmente, visando a prevenção e tratamento de doenças ósseas, como osteoporose e osteoartrite (PORFIRIO et al., FANARO, 2016; KWATRA, 2020), implantes regenerativos de córnea (JANGAMREDDY et al., 2018) e até na regeneração da pele (ZHANG et al., 2020). Através do colágeno, podem ser produzidos vários tipos de gelatina com multifuncionalidades de interesse dentro do segmento alimentício e de bebidas (LIN et al., 2017; RENUKA et al., 2019).

As principais fontes de gelatina são mamíferos e peixes (Figura 1). A gelatina comercial é produzida a partir de pele de suínos e do couro e ossos de bovinos (LIU et al., 2019). Recentemente, algumas matérias-primas alternativas chamaram a atenção de pesquisadores e da indústria, não apenas porque superaram as preocupações religiosas compartilhadas por judeus e muçulmanos, mas também porque fornecem, em alguns casos, vantagens tecnológicas sobre as gelatinas de mamíferos (BORAN; REGENSTEIN, 2010).

As peles de peixes de várias espécies de peixes estão entre as outras fontes que foram amplamente estudadas como fontes para a produção de gelatina, com potencial significativo para a produção de gelatina de alta qualidade com diferentes temperaturas de fusão e gelificação em uma faixa muito mais ampla do que as gelatinas de mamíferos, mas ainda assim têm uma força e viscosidade de gel suficientemente alta (BORAN; REGENSTEIN, 2010).

Para ser consumida, a gelatina passa por processos de purificação para melhor uso industrial, principalmente na área de alimentos. No entanto, a aceitabilidade dos produtos de

gelatina depende muito das fontes animais da gelatina. As gelatinas extraídas de fontes suínas e bovinas têm características atraentes, mas aceitação limitada devido a proibições religiosas e possíveis ameaças zoonóticas, enquanto a gelatina de peixe é bem-vinda em todas as religiões e culturas (ALI et al., 2018).

Figura 1. Principais fontes de colágeno e gelatina de origem comercial.

Fonte: Imagens de SMART – Servier Medical Art (2020) e Freepik (2020)

2.2 Obtenção de proteínas colagenosas

Para que haja a produção de gelatina é preciso, primeiramente, extrair o colágeno. Para obtenção das proteínas colagenosas, a pele de peixe é submetida a várias etapas de tratamento seguindo protocolos rigorosos (Figura 2) durante a realização de análises físico-químicas para a confirmação do colágeno extraído.

Figura 2. Processo de extração do colágeno.

Fonte: Oliveira et al.(2017a). Imagem cedida gentilmente pelos autores.

2.3 Produção e composição de gelatinas

A gelatina é conhecida como um pó, apresentando estrutura firme, sólida, gelificante, e intumescente (MIRZAPOUR-KOUHDASHT et al., 2020), que ao entrar contato com a água dissolve facilmente, principalmente após a desnaturação por calor (ABDELHEDI et al., 2017). A composição dos aminoácidos da gelatina vai variar de acordo com a fonte extraída, isso envolve as espécies, as formas de pré-tratamento e, principalmente, os tipos extração (BENJAKUL; KITTIPHATTANABAWON, 2018).

A gelatina é obtida através da hidrólise do colágeno, podendo ser extraída por vários métodos, entre eles estão os dois tipos de processo mais realizados para a sua produção. A gelatina tipo A (ponto isoelétrico: 6-9) é extraída por processos ácidos a partir de, por exemplo, matéria-prima de peixes e suínos, pelo fato destas não possuírem grandes quantidades de ligações químicas, o que torna o processo mais rápido por não exigir pré-tratamento intensivo e longo; A gelatina tipo B (ponto isoelétrico 5), é extraído através de processos alcalinos, utilizando, por exemplo, matéria-prima proveniente de bovinos (ossos, pele e tendão). Nesse processo o pré-tratamento é intenso devido à grande quantidade de ligações químicas (SILVA, 2016). A qualidade da gelatina é determinada industrialmente pela resistência do gel, viscosidade, temperaturas de fusão ou gelificação, conteúdo de água e segurança microbiológica. Para os fabricantes de gelatina, o rendimento de uma determinada matéria-prima também é importante (BORAN; REGENSTEIN, 2010). Algumas das propriedades desejáveis para uma boa gelatina comercial estão ilustradas na Figura 3.

Figura 3. Propriedades desejadas numa gelatina comercial

Fonte: Rousselot® (2020). Montagem realizada através do software Diagram.

2.4 Produção e caracterização da gelatina de peixe

O processo para extração de gelatina exige várias etapas: pré-tratamento da matéria-prima, extração, purificação, concentração, secagem, moagem, peneiramento e mistura. Após esse processo a gelatina pode ser submetida a diversos tipos de caracterização quanto ao teor de proteínas, determinação da umidade, teor de conteúdo mineral (cinzas), pH e acidez titulável (SILVA et al., 2018).

A qualidade da gelatina está associada às suas propriedades reológicas (Tabela 1), ou seja, verificando a sua elasticidade, viscosidade, ponto de fusão e força (HUANG et al., 2017), sendo a viscosidade e a força do gel algumas das propriedades reológicas mais importantes para a comercialização da gelatina (LIN et al., 2017), tendo em vista que essa caracterização física varia em cada fonte de matéria-prima.

Tabela 1. Estudos sobre as propriedades reológicas com diferentes tipos de aplicações na gelatina de peixe.

Nome científico	Estudo	Autor/ano
<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	Efeito de Fosforilação e gelificação	Zhang et al. (2017)
<i>Ctenopharyngodon idellus</i>	Modelo para cremes de café	Huang et al. (2020)
<i>Hamiramphus far</i>	Potencial de revestimento	Abdelhedi et al. (2017)
<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	Enzima modificada através gelatina de peixe	Huang et al. (2017)
Produto comercial (tilápia)	Efeito da K-carragena da estrutura da gelatina	Sow et al. (2017)
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Efeito dos solutos de Confeitaria	Kamer et al. (2019)
Produto comercial (tilápia)	Efeito da propriedade antioxidante do gel de gelatina	Sinthusamran et al. (2018)

Fonte: Acervo pessoal

Estudos realizados por Huang et al. (2018) apresentaram várias técnicas reológicas associadas a textura e microestrutura para melhor compreensão do efeito de fosforilação nas propriedades de gelificação e emulsificação da gelatina de peixes, sendo também analisadas as propriedades cinéticas, viscosidade aparente, varredura de temperatura e frequência, análise do perfil de textura, aspecto microscópico, atividades emulsificantes e a força atômica microscópica.

A gelatina pode ser extraída tanto de peixes de água fria, quanto em peixes de água morna (SULTANA et al., 2018), sendo assim, os subprodutos de peixes provenientes de água morna não tem apresentado resultados muito satisfatórios quanto às suas propriedades reológicas, diferentemente, dos subprodutos dos peixes de água fria, que têm passado por diferentes modificações em seus protocolos com o intuito de aumentar o desenvolvimento de suas aplicações na indústria (CHUNG, 2020). No entanto, vê-se que a avaliação da textura e

as propriedades reológicas tem sido importante, sobretudo, para a indústria de alimentos, um exemplo, confeitaria (ALTAN KANER et al., 2018).

2.5 Vantagens da produção de gelatina de peixe

O uso da gelatina de peixe tem sido vantajosa para aplicação industrial por apresentar características semelhantes à gelatina de mamíferos, muito devido à ausência de restrições sanitárias e socioculturais (ABDELHEDI et al., 2017; SULTANA et al., 2017).

Na questão sanitária, existem preocupações a respeito das gelatinas provenientes de fontes bovinas e suínas devido a possível transmissão de enfermidades (LAURINDO et al., 2017), como a Encefalopatia Espongiforme Bovina (PANG et al., 2017; SILA et al., 2017; MIRZAPOUR-KOUHDASHT et al., 2020), uma doença degenerativa crônica que afeta os Sistema Nervoso Central (SNC) (LAURINDO et al., 2017).

Estudos realizados por Pang et al. (2017) relataram que a diferença entre as gelatinas é a menor quantidade de prolina (Pro) na gelatina proveniente de mamíferos, enquanto na gelatina de peixe é menor a quantidade de hidroxiprolina (Hyp). Ainda, os autores reforçam que a gelatina bovina pode ser substituída pela gelatina de tilápia em iogurte com baixo teor de gordura, tendo em vista que ambas apresentam características semelhantes. Além disso, o hidrolisado da gelatina de peixe desempenha amplas funções biológicas, como antidiabética, anti-hipertensiva, crioprotetora, antitumoral, antioxidante (KARAYANNAKIDIS & ZOTOS, 2016; LV et al., 2019).

Já foi reportado com sucesso o uso da gelatina de peixes dulcícolas com potencial para uso industrial, além da tilápia, a gelatina produzida da carpa (*Cyprinus carpio*) a apresentou bom potencial antioxidante (TKACZEWSKA; BUKOWSKI; MAK, 2018). Todavia, a aplicação da gelatina proveniente de peixes no mercado comercial ainda é baixa, quando comparada a gelatina de mamíferos (LIN et al., 2017).

2.6 Produção de gelatina com pele de peixe

A pele de peixe tem sido um dos principais resíduos utilizados na indústria do processamento de pescado e frutos do mar (ABDLHEDI et al., 2017; SULTANA et al., 2018). Embora alguns estudos registrem a produção de gelatina proveniente de outros tipos de resíduos, por exemplo, a escama de carpa-comum, *Cyprinus carpio* (HUANG et al., 2018), a gelatina proveniente da pele tem apresentado maior rendimento e consequentemente, é a mais aplicada para a elaboração de produtos na indústria. Através da Tabela 2 é possível identificar

que a variedade de espécies aquáticas já registradas na literatura utilizadas para a extração de colágeno e produção de gelatina para fins biotecnológicos.

Tabela 2. Espécies de peixes fontes de gelatinas extraídas de subprodutos de pele.

Nome científico	Autor
<i>Oreochromis niloticus</i>	Zhang et al. (2016)
<i>Ictalurus punctatus</i>	Zhang et al. (2016)
<i>Liza aurata</i>	Bkhairia et al. (2016)
<i>Anguilla anguilla</i>	Sila et al. (2017)
<i>Hemiramphus far</i>	Abdelhedi et al.(2017)
<i>Ctenopharyngodon idellus</i>	Cai et al. (2017)
<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	Huang et al. (2017)
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Cheunget al. (2017)
<i>Probarbus jullieni</i>	Ali et al. (2018)
<i>Cyprinus carpio</i>	Santos et al. (2018)
<i>Brycon amazonicus</i>	Silva et al. (2018)
<i>Colossoma macroponum</i>	Silva et al. (2018)
<i>Katsuwonus pelamis</i>	AksunTümerkan et al. (2019)
<i>Aluterus monoceros</i>	Renukaetal. (2019)
<i>Epinephelus diacanthus</i>	Renuka et al. (2019)
<i>Salmo salar</i>	Pełczyńska et al. (2019)
<i>Oreochromis aureus</i>	Sow et al. (2019)
<i>Pollachius virens</i>	Casanova et al. (2020)
<i>Oreochromis mossambicus</i>	Tan et al. (2020)

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

2.7 Gelatina de peixe na produção de alimentos

Na indústria de alimentos, a gelatina tem sido amplamente utilizada na preparação de molhos, assados, sobremesas, geleias, doces, carnes e produtos com baixo teor de gordura (GHORANI et al., 2020). Com essa grande variedade de produtos, a indústria tem buscado diferentes fontes de matéria-prima, com o intuito de expandir a sua aplicação e fornecer produtos de excelente qualidade para a sociedade.

A gelatina de peixe tem apresentado resultados bastante satisfatórios em suas aplicações, e por isso se tornou um dos biopolímeros mais utilizados na produção de filmes e embalagens biodegradáveis (SYAHIDA et al., 2020), podendo ser usada como espuma emulsificante intumescente devido a sua propriedade tensoativa (HUANG et al., 2017), agente microencapsulante devido as suas propriedades reológicas (RENUKA et al., 2019), material para produção de cápsulas (LIU et al., 2018), emulsificantes para a produção de óleo em água, por apresentar excelente biocompatibilidade e biodegradabilidade (ZHANG et al., 2020).

Dentre as comprovações do uso da gelatina de fontes aquáticas, tem sido relatado que emulsões de peixes estabilizadas com gelatina podem ser bastante inovadoras em bebidas e alimentos (ZHANG et al., 2020), além apresentar potencial na indústria de confeitaria para a produção de gomosos, exemplo, balas, conhecido, popularmente como confeitos (ALTAN KAMER et al., 2018). Com o avanço da tecnologia, a gelatina de peixe tem ganhado força em suas aplicações fazendo com que sejam valorizadas tanto quanto a gelatina de mamíferos, tornando-se também uma excelente alternativa para substituição da gelatina bovina devido as suas propriedades funcionais (HUANG et al., 2020).

3. Considerações finais

A gelatina de peixe tem se tornado cada vez mais valorizada, principalmente por sua fonte de matéria-prima (resíduos, rejeitos e/ou subprodutos) não possuírem necessidade de grandes investimentos. Além disso, tem sido uma alternativa bastante promissora por não oferecer nenhum risco à saúde humana, podendo ser uma substituta da gelatina de mamíferos e diminuir a quantidade de resíduos sólidos que são descartados inadequadamente no meio ambiente, contribuindo ainda para o aumento da renda e margem de lucro.

4. Referências

ABDELHEDI, O.; NASRI, R.; MORA, L.; TOLDRÁ, F.; NASRI, M.; JRIDI, M. Collagenous proteins from black-barred halfbeak skin as a source of gelatin and bioactive peptides. **Food Hydrocolloids**, v.70, p.123–133, 2017.

ABDELHEDI, O.; JRIDI, M.; NASRI, R.; MORA, L.; TOLDRÁ, F.; NASRI, M.. Rheological and structural properties of *Hemiramphus far* skin gelatin: Potential use as an active fish coating agent. **Food Hydrocolloids**, v. 87, p. 331–34, 2019.

AKSUN TÜMERKAN, E.T.; CANSU, Ü.; BORAN, G.; REGENSTEIN, J.M.; ÖZOĞUL, F. Physiochemical and functional properties of gelatin obtained from tuna, frog and chicken skins. **Food Chemistry**, v. 287, p. 273-279, 2019.

ALI, A.M.M.; KISHIMURA, H.; BENJAKUL, S. Physicochemical and molecular properties of gelatin from skin of golden carp (*Probarbus jullieni*) as influenced by acid pretreatment and prior-ultrasonication. **Food Hydrocolloids**, v. 82, 9. 164–172, 2018.

ALI, E.; SULTANA, S.; HAMID, S.; HOSSAIN, M.; YEHYA, W.A.; KADER, A.; BHARGAVA, S.K. Gelatin controversies in food, pharmaceuticals, and personal care products: Authentication methods, current status, and future challenges. **Critical reviews in food science and nutrition**, v.58, n.9, p.1495–1511, 2018.

ALTAN KAMER, D.D.; PALABIYIK, I.; ISIK, N.O.; AKYUZ, F.; DEMERCI, A.S.; GUMUS, T. Effect of confectionery solutes on the rheological properties of the fish (*Oncorhynchus mykiss*) gelatin. **LWT**, v. 101, p. 499-505, 2018.

ARFAT, Y.A.; AHMED, J.; HIREMATH, N.; AURAS, R.; JOSEPH, A. Thermo-mechanical, rheological, structural and antimicrobial properties of bionanocomposite films based on fish skin gelatin and silver-copper nanoparticles. **Food Hydrocolloids**, v. 62, p. 191–202, 2017.

ARUMUGAM, G.K.S.; SHARMA, D.; BALAKRISHNAN, R.M.; ETTIYAPPAN, J.B.P. Extraction, optimization and characterization of collagen from sole fish skin. **Sustainable Chemistry and Pharmacy**, v.9, p.19–26, 2018.

BANDEIRA, S.F. Extração e caracterização da gelatina obtida de cabeça de carpa (*Aristichthys mobilis*). Orientador: Luiz Antonio de Almeida Pinto, 2009. F. Dissertação de mestrado (Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos) - Escola de Química e Alimentos, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, Brasil, 2009.

BENJAKUL, S.; KITTIPHATTANABAWON, P. Gelatin. **Module in Food Science**, 2018. Disponível em: doi:10.1016/b978-0-08-100596-5.21588-6

BKHAIRIA, I.; MHAMDI, S.; JRIDI, M.; NASRI, M. New acidic proteases from *Liza aurata* viscera: Characterization and application in gelatin production. **International Journal of Biological Macromolecules**, v.92, p.533-542, 2016.

BORAN, G.; REGENSTEIN, J.M. Fish gelatin. **Advances in food and nutrition research**, v.60, p.119–143, 2010.

CASANOVA, F.; MOHAMMADIFAR, M.A.; JAHROMI, M.; PETERSEN, H.O.; EYBYE, K.L.; KOBELGAARD, S.; JESSEN, F. Physico-chemical, structural and techno-functional properties of gelatin from saithe (*Pollachius virens*) skin. **International Journal of Biological Macromolecules**, v.156, p.918-927, 2020.

CAI, L.; FENG, J.; REGENSTEIN, J.; LV, Y.; LI, J. Confectionery gels: Effects of low calorie sweeteners on the rheological properties and microstructure of fish gelatin. **Food Hydrocolloids**, p.67, v.157–165, 2017.

CHUNG, D. Fish gelatin. **Biopolymer-Based Formulations**, p.67–85, 2020.

CHEUNG, I.W.Y.; LI-CHAN, E.C.Y. Enzymatic production of protein hydrolysates from steelhead (*Oncorhynchus mykiss*) skin gelatin as inhibitors of dipeptidyl-peptidase IV and angiotensin-I converting enzyme. **Journal of Functional Foods**, v.28, p.254–264, 2017.

FAO. 2020. **The State of World Fisheries and Aquaculture 2020**. Sustainability in action. Rome.

FAUZI, M.B.; LOKANATHAN, Y.; AMINUDDIN, B.S.; RUSZYMAH, B.H.I.; CHOWDHURY, R.S. Ovine tendon collagen: Extraction, characterisation and fabrication of thinfilms for tissue engineering applications. **Materials Science and Engineering**, v.68, p.163–171, 2016.

GHORANI, B.; EMADZADEH, B.; REZAEINIA, H.; RUSSELL, S.J. Improvements in gelatin cold water solubility after electrospinning and associated physicochemical, functional and rheological properties. **Food Hydrocolloids**, v.104, p.105740, 2020.

HUANG, T.; TU, Z.; SHANGGUAN, X.; WANG, H.; SHA, X.; BANSAL, N. Rheological behavior, emulsifying properties and structural characterization of phosphorylated fish gelatin. **Food Chemistry**, v. 246, p. 428-436, 2018.

HUANG, T.; TU, Z.-C.; WANG, H.; SHANGGUAN, X.; ZHANG, L.; ZHANG, N.-H., BANSAL. Pectin and enzyme complex modified fish scales gelatin: Rheological behavior, gel properties and nanostructures. **Carbohydrate polymers**, v.156, n.535, p.294-302, 2017.

JANGAMREDDY, J.R.; HAAGDORENS, M.K.C.; MIRAZUL ISLAM, M.; LEWIS, P.; SAMANTA, A.; FAGERHOLM, P.; LISZKA, A.; LJUNGEN, M.K; BUZNYK, O.; ALARCON, E.I.; ZACARIA N.; MEEK, K.M.; GRIFFITH, M. Short peptide analogs as alternatives to collagen in pro-regenerative corneal implants. **Acta Biomaterialia**, v.69, p.120–130, 2018.

KARAYANNAKIDIS, P.D.; ZOTOS, A. Fish processing by-products as a potential source of gelatin: a review. **Journal of Aquatic Food Product Technology**, v.25, p.65-92, 2016.

KWATRA, B. Collagen supplementation: therapy for the prevention and treatment of osteoporosis and osteoarthritis: a review. **World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences**, v.9, n.5, p.589-604, 2020.

LAURINDO, E.E.; BARROS, I.R. F. Encefalopatia espongiforme bovina atípica: uma revisão. **Arquivo do Instituto Biológico**, v.84, p.1-10, 2017.

LIMA-JUNIOR, E.M.; PICOLO, N.S.; MIRANDA, M.J.B.; RIBEIRO, W.L.C.; ALVES, A.P.N.N.; FERREIRA, G.E.; PARENTE, E.A.; MORAES-FILHO, M.O. Uso da pele de tilápia (*Oreochromis niloticus*), como curativo biológico oclusivo, no tratamento de queimaduras. **Revista Brasileira de Queimaduras**, n.16, v. 1, p.10-17, 2017.

LIU, D.; NIKOO, M.; BORAN, G.; ZHOU, P.; REGENSTEIN, J.M. Collagen and gelatin. **Annual review of food science and technology**, v.6, p.527–557, 2015.

LIU, J.; YONG, H.; LIU, Y.; QIN, Y.; KAN, J.; LIU, J. Preparation and characterization of active and intelligent films based on fish gelatin and haskap berries (*Lonicera caerulea L.*) extract. **Food Packaging and Shelf Life**, v.22, artigo 100417, 2019.

LIU, Y.; LI, B.; ZHANG, K.; LI, J.; HOU, H. Novel hard capsule prepared by tilapia (*Oreochromis niloticus*) scale gelatin and konjac glucomannan: characterization, and *in vitro* dissolution. **Carbohydrate Polymers**, v.206, p.254-261, 2018.

LIN-CHEN, L.V.; HUANG, Q.-Y.; DING, W.; XIAO, X.-H.; ZHANG, H.-Y.; XIONG, L.-X. Fish gelatin: The novel potential applications. **Journal of Functional Foods**, v.63, p.1-14, 2019.

LIN, L.; REGENSTEIN, J.M.; LV, S.; LU, J.; JIANG, S. An overview of gelatin derived from aquatic animals: Properties and modification. **Trends in Food Science & Technology**, v.68, p.102–112, 2017.

MIRZAPOUR-KOUHDASHT, A.; MOOSAVI-NASAB, M.; KRISHNASWAMY, K.; KHALESI, M. Optimization of gelatin production from Barred mackerel by-products: Characterization and hydrolysis using native and commercial proteases. **Food Hydrocolloids**, v.108, p.1-14, 2020.

MIRZAPOUR KOUHDASHT, A.; MOOSAVI-NASAB, M.; AMINLARI, M. Gelatin production using fish wastes by extracted alkaline protease from *Bacillus licheniformis*. **Journal of food Science and Tecnology**, v.1, p.1-6, 2018.

OLIVEIRA, V.M.; CUNHA, M.N.C.; NASCIMENTO, T.P.; ASSIS, C.R.D.; BEZERRA, R.S.; PORTO, A.L.F. Colágeno: características gerais e produção de peptídeos bioativos - uma revisão com ênfase nos subprodutos do pescado. **Actapesca**, v.2, p.70-82, 2017a.

OLIVEIRA, V.M.; CARNEIRO CUNHA, M.N.; ASSIS, C.R.D.; NASCIMENTO, T.P.; HERCULANO, P. N.; CAVALCANTI, M.T.H.; PORTO, A. L. Colagenases de pescado e suas aplicações industriais. **Pubvet**, v.11, n.3, p. 243-255, 2017b.

PANG, Z.; DEETH, H.; YANG, H.; PRAKASH, S.; BANSAL, N. Evaluation of tilapia skin gelatin as a mammalian gelatin replacer in acid Milk gels and low-fat stirred yogurt. **Journal of Dairy Science**, v.100, n.5, p.3436–3447, 2017.

PEPCZYŃSKA, M.; DÍAZ-CALDERÓN, P.; QUERO, F.; MATIACEVICH, S.; CHAR, C.; ENRIONE, J. Interaction and fragility study in salmon gelatin-oligosaccharide composite films at low moisture conditions. **Food Hydrocolloids**, v.97, p.105-207, 2019.

PORFIRIO, E.; FANARO, G.B. Collagen supplementation as a complementary therapy for the prevention and treatment of osteoporosis and osteoarthritis: a systematic review. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 19, n. 1, p. 153-164, 2016.

RENUKA, V.; RAO RAVISHANKAR, C.N.; ZYNUDHEEN, A.A.; BINDU, J.; JOSEPH, T.C. Characterization of gelatin obtained from unicorn leather jacket (*Aluterus monocerus*) and reef cod (*Epinephelus diacanthus*) skins. **LWT- Food Science and Technology**, Disponível em: 108586.doi:10.1016/j.lwt.2019.108586

SANTOS, J.P.; ESQUERDO, V.M.; MOURA, C.M.; PINTO, L.A. A. Crosslinking agents effect on gelatins from carp and tilapia skins and in their biopolymeric films. **Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects**, n.539, p.184–191, 2018.

SILA, A.; MARTINEZ-ALVAREZ, O.; KRICHEN, F.; GÓMEZ-GUILLÉN, M.C.; BOUGATEF, A. Gelatin prepared from European eel (*Anguilla anguilla*) skin: Physicochemical, textural, viscoelastic and surface properties. **Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects**, v.529, p.643–650, 2019.

SILVA, G.C.O.; SILVA, S.S.; CARVALHO, J.W.P.; GUEDES, F.S.; LOSS, R.A. Obtenção e Caracterização físico-química e microbiológica da gelatina de resíduos de matrinxã (*Brycon amazonicus*) e tambaqui (*Colossoma macropomum*). **Acta of fisheries and aquatic Resources**, v.6, n.1, p.74-84, 2018.

SILVA, E.V.C. **Otimização das condições de extração da gelatina de pele de peixes amazônicos por diferentes métodos**. 2016. 20f. Tese de doutorado (Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém-Pará, 2016.

SINTHUSAMRAN, S.; BENJAKUL, S.; SWEDLUND, P.J.; HEMAR, Y. Physical and rheological properties of fish gelatin gel as influenced by κ -carrageenan. **Food Bioscience**, v.20, p.88–95, 2017.

SINTHUSAMRAN, S.; BENJAKUL, S. Physical, rheological and antioxidant properties of gelatin gel as affected by their incorporation of β -glucan. **Food Hydrocolloids**, v.79, p.409–415, 2018.

STOHS, S.J.; KITCHENS, E.K. Nutritional Supplementation in Health and Sports Performance. **Nutrition and Enhanced Sports Performance**, p.3–9, 2019.

SOW, L.C.; NICOLE CHONG, J.M.; LIAO, Q.X.; YANG, H. Effects of κ -carrageenan on the structure and rheological properties of fish gelatin. **Journal of Food Engineering**, v.239, p.92–103, 2019.

SOW, L.C.; YU TOH, N.Z.; WONG, C.W.; YANG, H. Combination of sodium alginate with tilapia fish gelatin for improved texture properties and nanostructure modification. **Food Hydrocolloids**, v.94, p.459-467, 2019.

SUI CHIN, S.; HAN LYN, F.; NUR HANANI, Z.A. Effect of Aloe vera (*Aloe barbadensis* Miller) gel on the physical and functional properties of fish gelatin films as active packaging. **Food Packaging and Shelf Life**, v.12, p.128–134, 2017.

SULTANA, S.; ALI, M.E.; AHAMAD, M.N.U. Gelatine, collagen, and single cell proteins as a natural and newly emerging food ingredients. **Preparation and Processing of Religious and Cultural Foods**, n.1, p.215–239, 2018.

SUN, L.; LI, B.; SONG, W.; SI, L.; HOU, H. Characterization of Pacific cod (*Gadus macrocephalus*) skin collagen and fabrication of collagen sponge as a good biocompatible biomedical material. **Process Biochemistry**, v.63, p.229–235, 2019.

TAN, C.-C.; KARIM, A.A.; UTHUMPORN, U.; GHAZALI, Farid C. Effect extraction temperature on the emulsifying properties of gelatin from Black tilapia (*Oreochromis mossambicus*) skin. **Food Hydrocolloids**, v.108, Artigo 106024, 2020.

TAYEL, A.A.; GHANEM, R.A.; MOUSSA, S.H.; FAHMI, M.; TARJAM, H.M.; ISMAIL, N. Skin protectant textiles loaded with fish collagen, chitosan and oakgalls extract composite. **International Journal of Biological Macromolecules**, v.117, p.25–29, 2018.

TKACZEWSKA, J.; BUKOWSKI, M.; MAK, P. Identification of Antioxidant Peptides in Enzymatic Hydrolysates of Carp (*Cyprinus Carpio*) Skin Gelatin. **Molecules**, v.24, n.97, p.1-15, 2019.

ZHANG, Q.; WANG, Q.; LV, S.; LU, J.; JIANG, S.; REGENSTEIN, J.M.; LIN, L. Comparison of collagen and gelatin extracted from the skins of *Nile tilapia* (*Oreochromis niloticus*) and channel catfish (*Ictalurus punctatus*). **Food Bioscience**, v.13, p.41–48, 2016.

ZHANG, T.; TU, Z.; ZOU, Z.; SHANGGUAN, X.; WANG, H.; BANSAL, N. Glycosylated fish gelatin emulsion: Rheological, tribological properties and its application as model coffee creamers. **Food Hydrocolloids**, v.102, 2020.

ZHANG, Z.; ZHU, H.; ZHENG, Y.; ZHANG, L.; WANG, X.; LUO, Z.; TANG, J.; LIN, L.; DU, Z.; DONG, C. The effects and mechanism of collagen peptide and elastin peptide on skin aging induced by D-galactose combined with ultraviolet radiation. **Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology**, v.210, p.1-8, 2020.

ZHANG, T.; DING, M.; TAO, L.; LIU, L.; TAO, N.; WANG, X.; ZHONG, J. Octenyl succinic anhydride modification of bovine bone and fish skin gelatins and their application for fish oil-loaded emulsions. **Food Hydrocolloids**, v.108, p.1-10, 2020.

ZHANG, T.; SUN, R.; DING, M.; LI, L.; TAO, N.; WANG, X.; ZHONG, J. Commercial cold-water fish skin gelatin and bovine bone gelatin: structural, functional, and emulsion stability differences. **LWT- Food Science and Technology**, v.125, 2020.

YOON, H.J.; SHIN, S.R.; CHA, J.M.; LEE, S.-H.; KIM, J.-H.; DO, J.T.; BAE, H. Cold Water Fish Gelatin Methacryloyl Hydrogel for Tissue Engineering Application. **PLoS ONE**, v.11 n. 10, Artigo e0163902, 2016.

CAPÍTULO 23: EFEITOS DO USO DO CAMPO MAGNÉTICO NA ATIVIDADE ENZIMÁTICA *IN VITRO*: REVISÃO INTEGRATIVA

CHAPTER 23: EFFECTS OF THE USE OF THE MAGNETIC FIELD IN ENZYMATIC ACTIVITY *IN VITRO*: INTEGRATIVE REVIEW

Emeson Farias Araujo Santos¹; Rodrigo Lira de Oliveira²; Tatiana Souza Porto³; Camila Souza Porto⁴

Resumo

Entre diversos tipos de biomoléculas, as enzimas possuem uma sensibilidade magnética ao ponto de modificar sua estrutura tridimensional. Essa modificação contribui no processo do encaixe-induzido da enzima ao substrato, e dependendo do tipo da classe enzimática e da intensidade do fluxo magnético pode haver uma diminuição ou aumento na atividade catalítica. Devido a isso, esse trabalho teve por objetivo sintetizar os trabalhos já publicados por meio de uma busca sistemática da literatura a fim de compreender quais enzimas já foram expostas ao tratamento do fluxo magnético para avaliar o efeito na atividade catalítica. Trata-se de uma revisão integrativa. A busca foi realizada nas bases eletrônicas de dados Medline, Web of Science e Google scholar. Os critérios de elegibilidade foram artigos originais *in vitro* que utilizaram o campo magnético na atividade enzimática, publicada entre os anos de 2015 a 2020. Os artigos foram avaliados de acordo com os princípios de Bardín com análise do documento. Dos 69 artigos rastreados, participaram da revisão integrativa 08 artigos. Foi verificado artigos com resultados negativos e positivos. No entanto, a maioria teve efeito positivo, com aumento na atividade enzimática. Conclui-se que o campo magnético é uma alternativa para potencializar a atividade da enzima. Implicando em melhorar as condições reacionais na obtenção da enzima mais competitiva no setor industrial.

Palavras-Chave: Fluxo magnético, Catálise enzimática, Magnetismo.

Abstract

Among several types of biomolecules, enzymes have a magnetic sensitivity to the point of modifying their three-dimensional structure. This modification contributes to the enzyme-induced fitting process to the substrate, and depending on the type of enzyme class and the intensity of the magnetic flux, there may be a decrease or increase in catalytic activity. Because of this, this work aimed to synthesize the works already published through a systematic search of the literature in order to understand which enzymes have already been exposed to the treatment of magnetic flux to evaluate the effect on catalytic activity. This is an integrative review. The search was performed in the electronic databases Medline, Web of Science and Google scholar. The eligibility criteria were original *in vitro* articles that used the magnetic field for enzyme activity, published between the years 2015 to 2020. The articles were evaluated according to the Bardín principles with analysis of the document. Of the 69 articles screened, 08 articles participated in the integrative review. Articles with negative and positive results were verified. However, most had a positive effect, with an increase in enzyme activity. It is concluded that the magnetic field is an alternative to enhance the activity of the enzyme. Implying in improving the reaction conditions in obtaining the most competitive enzyme in the industrial sector.

¹Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Alagoas, emeson.araujo.santos@gmail.com

²Doutor em Biotecnologia Industrial, Universidade Federal Rural de Pernambuco, rodrigoliral@outlook.com

³Doutora em Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica, Universidade Federal Rural de Pernambuco, mailto:portots@yahoo.com.br

⁴Doutora em Biotecnologia Industrial, Universidade Federal de Alagoas, camila.porto@penedo.ufal.br

Keywords: Magnetic flux, Enzymatic catalysis, Magnetism.

1. Introdução

Para a produção de alimentos capazes de suprir as necessidades humanas, a agroindústria encontra-se no desafio de aplicação de novas técnicas com maior eficácia e menor impacto no meio ambiente (DAMKE, 2019; CRUZ et al., 2020; LAVERDE; HURTADO; RODAS, 2020). No Brasil, a agroindústria é uma das atividades que tem forte impacto no produto interno bruto (PIB), contribuindo positivamente para o crescimento social e econômico do país (FURTUOSO; BARROS; GUILHOTO, 2019). Isso porque o setor agroindustrial é responsável pela geração de empregos (renda financeira) e geração de produtos alimentícios para importação e exportação (DENGGO; GAZOLLA; PERONDI, 2019; DANKE, 2019).

Dentre vários setores da agroindústria há um crescimento da utilização de produtos oriundos da biotecnologia, a qual ganha destaque as enzimas comerciais (MAGALHÃES et al., 2019; RIBEIRO, 2019). As enzimas são catalizadores biológicos responsáveis por acelerar as reações químicas (NELSON; COX, 2018). No entanto, um dos grandes desafios dos pesquisadores é na produção de enzimas altamente seletiva, eficaz e consequentemente competitiva no mercado industrial (QUEIROZ; SOUSA, 2020).

Existe na literatura a reportagem de alguns fatores que afetam a atividade enzimática, tais como pH, temperatura e a duração da atividade enzimática com o substrato (NELSON; COX, 2018). Atualmente existem estudos que comprovam o fluxo magnético como fator que altera a atividade enzimática, tanto de forma negativa quanto de forma positiva (LIU; GUO; LIU, 2015; ALEXANDER et al., 2015). No entanto, ainda falta compreender de que forma afeta a enzima e quais enzimas são afetadas, uma vez que o campo magnético pode ou não alterar a atividade das mesmas, além de reconhecer quais enzimas é afetado negativamente ou positivamente. Entender estas lacunas pode resultar na elaboração de protocolo metodológico mais eficaz na produção de enzimas mais competitiva no mercado industrial.

É constatada uma modificação na atividade enzimática, alterando a catálise da enzima, por meio da sensibilização magnética que a biomolécula sofre devido ao fluxo magnético (FRAGA, 2018). Devido a isso, pesquisadores tem investigado a partir de testes experimentais *in vitro* o efeito do campo magnético na atividade enzimática, no entanto é uma área não consolidada, os quais ainda procuram compreender os mecanismos biofísicos para explicar os resultados encontrados. Além de buscar compreender o porquê de haver divergências nos resultados, tanto na diminuição quanto no aumento da atividade catalítica.

Por esta perspectiva de alteração na catálise enzimática por meio da sensibilização ao fluxo magnético, torna-se fundamental reconhecer quais as enzimas que tem potencial para aumentar sua atividade e quais são as que têm potencial para diminuir a atividade. De acordo com Fraga (2018) e Sales (2018), o campo magnético pode alterar o sítio ativo da enzima, alterar os resíduos de aminoácidos presentes na superfície da enzima ou modificar sua estrutura tridimensional, e essas mudanças vai depender de qual enzima está sendo exposta ao campo magnético.

Todo campo magnético externo pode provocar um campo magnético interno em qualquer matéria, provocando uma mudança na rotação dos spins dos átomos constituintes do corpo (matéria) afetado pelo campo magnético externo. No entanto, quando o campo magnético externo é retirado, o campo magnético interno é desfeito (BAUER; WESTFALL; DIAS, 2012). Estudos recentes apontam que a enzima é sensível ao campo magnético externo, modificando sua estrutura tridimensional, através da mudança das ligações peptídicas, e atividade catalítica. Porém, pouco se sabe o nível de sensibilidade de cada enzima e até que ponto determinada enzima pode permanecer com sua atividade catalítica após a exposição do campo magnético, cuja retirada do campo magnético externo desfaz o campo magnético interno na enzima, voltando a sua estrutura e atividade natural.

Dessa forma, a revisão integrativa é uma ferramenta importante que, diferente da revisão narrativa, explora áreas de estudos mais gerais, localizando pontos focais por meio de uma visão mais geral do campo estudo. Demonstrando, por meio de uma busca sistemática da literatura disponível nas bases de dados, os trabalhos recentes, os países com maior interesse na área, quais são os principais grupos de estudos e pesquisadores da área, além de integrar e sintetizar os resultados principais dos trabalhos originais.

Nessa situação, para compreender quais enzimas foram afetadas pelo campo magnético, bem como quais sustentações metodológicas e justificativas foram abordadas nos estudos experimentais, foi conduzida uma revisão integrativa sistematicamente para reunir as evidências disponíveis sobre o uso do campo magnético na atividade enzimática em testes laboratoriais *in vitro*.

2 Desenvolvimento

O presente trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica baseada nos princípios norteadores de Mendes, Silveira e Galvão (2008) por meio de uma revisão integrativa, sendo-os: Identificação da problemática, com uma busca sistemática da literatura compreendendo as lacunas do tema e o propósito da pesquisa de revisão; uma busca da literatura sistematizando

etapas para seleção dos estudos, com padronização de palavras-chave, as bases de dados que foram usadas para selecionar os artigos primários e os critérios de inclusão e exclusão dos trabalhos encontrados nas bases de dados; avaliação dos trabalhos selecionados para verificar se realmente eram legíveis para coleta de dados; e por fim, análise dos dados.

A utilização do campo magnético como ferramenta metodológica para alterar a atividade enzimática *in vitro* é um campo de estudo recente, com poucos estudos realizados, no qual poucas enzimas foram expostas ao campo magnético. Consequentemente, ainda não existe um padrão metodológico para avaliar os efeitos do fluxo magnético, nem uma discussão teórica forte que justifique tais efeitos, o que ocasionar em cada grupo de pesquisar formular sua própria metodologia, o que dificulta a realização de meta-análise nas revisões sistemáticas. Devido a isto, esta pesquisa foi de natureza quanti-qualitativa, uma vez esta pesquisa teve como objetivos específicos realizar um levantamento sistemático dos trabalhos referentes aos resultados do efeito do campo magnético em atividades enzimáticas *in vitro*, bem como analisar o discurso das teorias fundamentadas nas justificativas e metodologias utilizadas nestes trabalhos.

2.1. Identificação do problema

Para nortear a realização da pesquisa de revisão formulou-se a seguinte questão: Quais os efeitos do uso do campo magnético em atividades enzimáticas em testes laboratoriais *in vitro*? A busca dos estudos ocorreu entre o período de dezembro de 2019 a junho de 2020. Para os critérios de inclusão foram padronizados a seleção de estudos publicados nos últimos seis anos, em específico os trabalhos publicados entre os anos de 2015 a 2020, nos idiomas inglês, espanhol e português, que apresentaram em sua discussão o efeito do campo magnético em atividades enzimáticas *in vitro*. Foram excluídos artigos de revisão, pesquisa laboratorial *in vivo*, duplicatas e estudos publicados em anos anteriores a 2015.

2.2. Busca da literatura

Foi realizada a busca eletrônica dos trabalhos indexados nas bases de dados gerais: Medline (via Pubmed) e Web of Science. Para a busca da literatura cinzenta foram utilizados: Google scholar. A realização da busca ocorreu por meio de dois pesquisadores de forma independente, com auxílio de um terceiro pesquisador quando houve discordância entre os dois pesquisadores. As palavras-chave utilizadas foram padronizadas por meio descritores, pesquisada em português e inglês: “Campo magnético” e “atividade enzimática” ("Magnetic field" and "enzymatic activity") ("Campo magnético" y "actividad enzimática"); “Campo

magnético e aumento na atividade enzimática” (“Magnetic field” and “increased enzyme activity”) (“Campo magnético y mayor actividad enzimática”); “Campo magnético” e “diminuição na atividade enzimática” (“Magnetic field” and “decrease in enzyme activity”) (“Campo magnético” y “disminución de la actividad enzimática”); “Exposição do campo magnético” e “atividade enzimática” (“Magnetic field exposure” and “enzyme activity”) (“Exposición al campo magnético” y “actividad enzimática”); “Exposição do Campo magnético” e “modificação tridimensional da enzima” (“Magnetic field exposure” and “three-dimensional modification of the enzyme”) (“Exposición al campo magnético” y “modificación tridimensional de la enzima”); “Exposição do campo magnético” e “inativação do sítio ativo enzimático” (“Magnetic field exposure” and “inactivation of the enzymatic active site”) (“Exposición al campo magnético ”e“ inactivación del sitio activo enzimático ”); e “Exposição do campo magnético” e “estrutura tridimensional da enzima” (“Exposure of the magnetic field” and “three-dimensional structure of the enzyme”) (“Exposición al campo magnético” y “estructura tridimensional de la enzima”).

A seleção dos estudos ocorreu em duas etapas. Primeiro uma avaliação do título e resumo, de forma independente pelos dois pesquisadores, com auxílio da plataforma digital *Rayyan QCRI*. Após a seleção dos estudos incluídos por meio do título e resumo houve uma leitura integral dos textos utilizando o diagrama PRISMA (Figura 1).

2.3. Coleta e análise dos dados

Os dados foram extraídos conforme consta no protocolo dos estudos primários selecionados: autor, ano, país, pico (População, intervenção, comparador e desfecho) e resultado. Para a análise qualitativa dos estudos foram adotados os princípios metodológicos de Bardin (2008), com a análise do conteúdo (Figura 2).

A primeira fase consistiu em organizar os conteúdos de acordo com as informações que se pretendia analisar, como exemplo a busca sistemática dos artigos primários que discutiam o uso do campo magnético em atividade enzimática *in vitro*. A segunda etapa foi codificar as informações por meio de registro de unidade (procedimentos metodológicos para o uso do campo magnético, intensidade do fluxo magnético utilizado, autores, ano de publicação, país onde a pesquisa foi realizada, tipo de enzima utilizada, resultado da pesquisa, fundamentação e justificativa teórica da pesquisa) e registro de conceito (introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão). E por fim, a terceira etapa foi uma abordagem de sintetizar as informações categoricamente de acordo com as unidades de

registro, apresentado os dados por autor, ano de publicação, país, enzima, metodologia utilizada, resultado e justificativa.

Figura 1. Fluxograma para realização da revisão sistemática integrativa PRISMA.

Fonte: Crochane (2015)

Figura 2. Etapas para análise do conteúdo de acordo com os princípios norteadores de Bardin (2014).

Fonte: Bardin (2014)

3. Discussão

Diversos grupos de pesquisas têm investido na análise do efeito do campo magnético em sistemas biológicos, utilizando testes *in vitro* e *in vivo*, como exemplo: a importância do campo para crescimento microbiano, explicado pela mudança no metabolismo dos microrganismos; nanopartículas magnéticas como suporte para imobilização de enzimas e análise do fluxo magnético na catálise enzimática (LIU; GUO; LIU, 2015; ALEXANDER et al., 2015; BORK, et al., 2015; SALES, et al. 2018; FRAGA, 2018). Após a busca sistemática da literatura disponível sobre os estudos primários laboratoriais *in vitro* com o uso do campo magnético na atividade enzimática foram rastreados 68 artigos nos quais foram incluídos 08 trabalhos para compor a revisão integrativa (Figura 3).

Figura 3. Fluxo da busca de evidência científica sobre o uso do campo magnético em atividades enzimáticas em estudos laboratoriais *in vitro*.

Foi observado que 66% dos trabalhos rastreados apesar de está relacionado à exposição ao campo magnético o objetivo das pesquisas não eram avaliar a influência do campo magnético da atividade enzimática, o que foi motivo de exclusão da revisão. Além dos trabalhos que utilizaram como ferramenta metodológica o eletromagnetismo. Diante disso apenas nove estudos foram incluídos (Tabela 1).

Tabela 1. Apresentação dos artigos científicos selecionados para compor a revisão integrativa por título e ano de publicação.

Título	Ano
Enhancing the resolution of (R,S)-2-octanol catalyzed by magnetic crosslinked lipase aggregates using an alternating magnetic field	2015
Enzyme-functionalized gold-coated magnetite nanoparticles as novel hybrid nanomaterials: Synthesis, purification and control of enzyme function by low-frequency magnetic field	2015
A further investigation of the effects of extremely low frequency magnetic fields on alkaline phosphatase and acetylcholinesterase	2016
Characterization of the performance and catalytic activity of lysozyme from chicken egg submitted to permanent magnetic field	2017
Static magnetic field effects on proteases with fibrinolytic activity produced by <i>Mucor Subtilissimus</i>	2017
Rotating magnetic field as tool for enhancing enzymes properties - laccase case study	2018
Effect of high pressure and magnetic field treatments on stability of <i>Candida antarctica</i> lipase B (CALB) and lysozyme from chicken egg	2018
Effect of magnetic field on the Eversa® Transform 2.0 enzyme: Enzymatic activity and structural conformation	2019

Fonte: Autor (2020).

Considerando a proporção de trabalhos rastreados com os termos de busca padronizados há poucos trabalhos publicados com a temática de avaliação do campo magnético na atividade enzimática. O que demonstra a importância da realização de mais pesquisas na área, para expor um maior número de enzimas ao fluxo magnético e verificar os efeitos.

De acordo com os estudos rastreados desta revisão integrativa é necessário destacar que a maioria dos resultados evidenciou uma melhora na atividade enzimática devido à exposição do fluxo magnético. Dos 08 artigos incluídos neste estudo integrativo da literatura, publicado entre os anos de 2015 a 2020, apenas um artigo relatou que não houve diferença

significativa na atividade enzimática com o uso do campo magnético, e outro estudo que notabilizou uma diminuição na atividade enzimática com a presença do campo magnético (Quadro 1).

3.1 Países com grupos de pesquisas que estudam campo magnético na atividade enzimática.

Foram identificados quatro países (Rússia, China e Brasil) que havia grupos de pesquisa, desenvolvido e publicado os trabalhos avaliando o campo magnético na atividade enzimática. Entre esses países, dos 08 artigos identificados 04 foram pesquisas feitas no Brasil. Com relação aos anos de publicação houve dois trabalhos publicados em 2015, um em 2016, dois em 2017, dois em 2018 e um em 2019; o que obteve maior frequência o ano de 2017.

3.2 Procedimentos metodológicos para avaliar o campo magnético na atividade enzimática

Os estudos rastreados e elegíveis para avaliação da revisão integrativa demonstraram diferença quanto aos parâmetros metodológicos para avaliar o efeito de campo magnético. A diferença encontra-se tanto no designer experimental quanto na intensidade e frequência do fluxo magnético.

No tratamento da lipase comercial Eversa® Transform 2.0 para o execução experimental foi utilizado um ímã permanente de neodímio borro-ferro com intensidade do fluxo magnético de 0,7 e 1,34 T. Neste trabalho foi utilizado o sistema de recirculação para analisar o efeito do campo ao tempo de exposição, com duração de 1, 2 e 4 horas. Com intuito de comprovar o efeito do campo na estrutura tridimensional da enzima este estudo procurou determinar a estrutura da enzima, a fim de verificar mudanças na estrutura secundária da proteína (FRAGA, et al., 2019).

Diferente da metodologia de Fraga (2019), o estudo de lipases sobre a exposição do campo magnético verificou e comparou tanto a intensidade bem como a frequência do fluxo magnético na atividade enzimática, adotando o uso do campo magnético alternado (PRANDO, et al., 2018). Para esse estudo só foi incluído análises estatística para corroborar com a justificativa de mudança na atividade enzimática.

Quadro 1. Síntese categórica das principais características dos artigos incluídos neste estudo de revisão integrativa, 2020.

Autor (es)	Ano	País	Enzima	Objetivo	Metodologia	Principais resultados	Conclusão
Silkstone e Wilson	2016		Fosfatase alcalina ; Acetilcolinesterase	Os efeitos dos campos magnéticos nas reações enzimáticas	Utilização campos magnéticos, de 100 μ T a 10 mT e em uma variedade de frequências de campo.	Não foi encontrado alteração na atividade enzimática em nenhuma frequência do campo magnético.	Os autores observaram resultados diferentes de trabalhos já publicados. Na conclusão os autores afirmaram que o trabalho anterior afirmando sobre a influência do campo magnético foi superestimado pelos pesquisadores.
Liu, Guo e Liu	2015	China	Lipases	Catalisar a resolução de (R, S) -2-octanol sob um campo magnético alternado	Utilizar o campo magnético alternado para aprimorar atividade da lipase.	O campo magnético resultou em aumento aparente de atividade enzimática	A frequência tem mais influência do que a intensidade na alteração catalítica da enzima.
Wasak et al.,	2019		Lacase	o efeito da exposição do campo magnético rotativo (RMF) sobre o fungo e atividade enzimática e propriedades catalíticas da lacase	Utilização do campo magnético rotativo com a frequência variou de 10 a 50 Hz. Este trabalho não avaliou a intensidade do campo magnético.	Os resultados obtidos no estudo revelaram que a RMF pode alterar positivamente a atividade de lacase	A aplicação do campo magnético rotativo abre uma nova maneira de controlar e direcionar o bioprocessamento baseado em enzimas.
Prando et al.,	2017	Brasil	Lisozima	Avaliar os efeitos de um campo magnético permanente e as condições operacionais atividade catalítica, estrutura enzimática secundária e terciária, e tamanho de partícula da lisozima da clara do ovo.	Aplicação do campo magnético com densidade de 0,71 T e 1,34 T.	A densidade de fluxo magnético e pH apresentaram efeitos positivos significativos ($p < 0,1$) na atividade enzimática.	Alteração no sítio ativo da enzima.
Prando et al.,	2018	Brasil	Lipase de <i>Candida antarctica</i> e Lisozima do ovo da galinha	Tratar enzimas com alta pressão ou campo magnético e avaliar seu armazenamento e estabilidade após o tratamento.	Testes com campo magnético estático gerando um campo magnético de fluxo de 0,7 T e 1,34 T.	A aplicação de um campo magnético de 1,34 T aumentou a atividade da lisozima em cerca de 55%, enquanto um tratamento com 0,7 T aumentou 80% da atividade da lipase de <i>C. antarctica</i> .	

Autor (es)	Ano	País	Enzima	Objetivo	Metodologia	Principais resultados	Conclusão
Fraga et al.,	2018	Brasil	Eversa® Transform 2.0	Investigar a estrutura tridimensional da enzima, bem como a atividade sob exposição do campo magnético.	Investir por técnicas espectroscópicas e de espectrometria de massa após exposição em densidade de fluxo magnético atual (0,7 e 1,34 T) no modo de recirculação (1, 2 e 4 h).	Notou-se mudança na conformação estrutural da enzima com exposição do campo magnético, além de melhorado sua atividade.	A aplicação de campos magnéticos como pré-tratamento enzimático mostrou-se uma técnica promissora e uma alternativa viável para aumentar a atividade enzimática, uma vez que é uma opção de baixo custo, ecológica e de fácil processo de regeneração.
Albuquerque et al.,	2017	Brasil	Proteases fibrinolíticas	Efeitos do campo magnético estático em proteases fibrinolíticas.	Foram utilizados para realizar ensaios em campos ligeiramente heterogêneos: um SMF vertical variado (para testes em microtubos, de 0,100 a 0,170T) e um SMF horizontal variado (para testes em placas de Petri, 0,01 a 0,122T), gerado por dois ímãs permanentes (liga NdFeB)	Os resultados mostraram diferenças significativas ($p < 0,05$) nos ensaios de fibrinólise estática após 24 horas de exposição.	Esses resultados sugerem uma resposta demônios de fibrina para o SMF como uma possível causa dos efeitos observados
Majougaa et al.,	2015	Rússia	Quimotripsina	Nanopartículas de magnetita revestidas a ouro com funcionalidade enzimática como novonanomateriais híbridos: síntese, purificação e controle de enzimas função por campo magnético de baixa frequência	A amplitude do campo magnético pode variar na faixa de mT a 250 mT. Os experimentos foram realizados na frequência de 50 Hz e intensidade do campo magnético variou de 15 a 220 kA / m.	O efeito do campo magnético CA de baixa frequência na atividade catalítica do quimotripsina imobilizada foi positiva.	A atividade enzimática diminui com a exposição dos NPs ao campo magnético

Estes exemplos de metodologias demonstra a ausência de uma padronização de protocolo, uma vez que cada grupo de pesquisa elabora seu próprio procedimento experimental. Por outro lado, essa variação de procedimento metodológico reforça a riqueza de propostas de protocolos que podem ser usado para verificar efeito do campo magnético na atividade enzimática.

3.3 Tipos de enzimas submetidas ao tratamento sobre o efeito do campo magnético na atividade enzimática

Notou-se a exposição de 11 enzimas ao campo magnético, sendo-as: Fosfatase alcalina; acetilcolinesterase; lipases reticuladas; lacase; lisozima; lipase de *C. antarctica*; lisozima do ovo da galinha; lipase comercial Eversa® Transform 2.0; proteases fibrinolíticas; α -amilase; e quimiotripsina.

Tabela 2. Enzimas expostas ao fluxo magnético versus efeito na atividade enzimática.

Enzimas	Desfecho
Fosfatase alcalina	Não houve diferença na atividade enzimática com o campo magnético, independente da intensidade e frequência.
Acetilcolinesterase	Não houve diferença na atividade enzimática com o campo magnético, independente da intensidade e frequência.
Lipases reticuladas	Houve aumento significativo na atividade enzimática, porém foi notado que a frequência tem potencial maior que a intensidade de alterar a atividade enzimática.
Lisozima	Efeito positivo na atividade enzimática.
Lacase	Houve alteração positiva na atividade da enzima.
Lipase de <i>C. antarctica</i>	Efeito positivo na atividade enzimática (aumento de 80%).
Lisozima do ovo da galinha	Efeito positivo na atividade (aumento de 55%)
Lipase comercial Eversa® Transform 2.0	Efeito positivo na atividade da enzima.
Proteases fibrinolíticas	Efeito positivo na atividade enzimática.
Quimiotripsina	Efeito negativo na atividade enzimática, notando que quanto maior a exposição da enzima com o campo magnético, menor era atividade.

Fonte: Autor (2020).

Foi possível destacar que a partir dos resultados destes trabalhos rastreados a frequência tem potencial maior que a intensidade de acarretar mudança na atividade enzimática. Além de que dos nove trabalhos apenas um pode verificar tanto a mudança na

atividade, bem como a alteração tridimensional da enzima, corroborando com a fundamentação teórica de que o campo magnético pode modificar a orientação dos spins nos átomos das moléculas dos aminoácidos, o que altera os tipos de ligações peptídicas, modificando a estrutura da enzima.

3.4 Fundamentação teórica sobre o efeito do campo magnético na atividade enzimática

Quanto ao referencial teórico, os autores tiveram a mesma linha de pensamento para justificar o efeito do campo magnético na atividade enzimática. Todos os autores classificaram as enzimas como moléculas diamagnéticas, uma forma de atração e repulsão da macromolécula (FLORÊNCIO; MONSANTO; MERGULHÃO, 2017). E que o fluxo magnético externo pode acarretar momentos dipolo magnéticos interno na enzima, modificando integralmente ou parcialmente a estrutura da enzima, o que inclui o sítio ativo e os resíduos de aminoácidos presentes nas extremidades da molécula.

Esse argumento é compreendido pelo fato que toda matéria é susceptível a momento dipolo magnético (BAUER; WESTFALL; DIAS, 2012). No entanto esses momentos são pontuais, ocorrendo apenas quando há um estímulo externo, no caso um campo magnético externo. Com isso, sabe-se que quando a enzima é retirada da exposição do fluxo magnético, sua atividade e estrutura voltam ao normal. Porém há poucos trabalhos relatando até quanto tempo a enzima consegue permanecer com a atividade alterada após a exposição.

Nesta revisão pode-se notar que os autores justificam a mudança na atividade devido à alteração na conformação tridimensional devido à mudança nas ligações peptídicas, no entanto apenas um artigo incluiu em sua metodologia um procedimento que verifica se houve mudanças na conformação. Isso demonstra as limitações dos demais trabalhos em comprovar a mudança na estrutura da enzima.

Essa modificação na estrutura tridimensional da enzima é decorrente de um efeito em cascata, no qual o campo magnético externo induz um campo magnético interno, modificando as orientações espaciais dos spins dos átomos constituintes do biocatalizador. A mudança de orientação desses spins modifica as ligações entre os átomos, modificando a estrutura secundária da molécula, o que irá modificar a estrutura tridimensional. No entanto, é importante ressaltar que o nível dessas modificações dependerá do quão sensível é a enzima ao campo magnético. Logo, esse processo de mudança poderá influenciar na catálise, e dependendo da mudança poderá ser positivamente ou negativamente.

3.5 Influência do campo magnético na teoria chave-fechadura versus encaixe-induzido

A teoria chave-fechadura conceituava a enzima como uma macromolécula muito específica, com o sítio ativo inflexível (NELSON; COX, 2018). No entanto, ao decorrer dos anos, pesquisadores descobriram que apesar da enzima ser considerada específica para cada tipo de substrato, o seu sítio ativo ou os resíduos de aminoácidos eram flexíveis (ALMEIDA; KIILL, 2019). Ou seja, no momento da catálise enzimática, o sítio ativo ou os resíduos de aminoácidos presentes nas periferias externa da estrutura enzimática atua de forma flexível por meio de uma indução até se encaixar com o determinado substrato.

A influência do campo magnético no processo do encaixe-induzido pode ser observada na alteração do sítio ativo ou a orientação espacial dos resíduos de aminoácido, presente na superfície da estrutura enzimática, quando ligada ao substrato. Isso pode ser exemplificado nos estudos da exposição do campo magnético na lacase. Ao analisar o efeito da frequência magnética na cinética enzimática da lacase, Wasak et al. (2019) observaram que o K_m aumentou e 0,021 mmol para 0,056 mmol com a frequência de 30 Hz. Porém, com a exposição de outras frequências não notaram mudança na cinética.

Em teoria, trata-se de que um campo magnético externo induz um campo magnético interno na enzima provocando uma alteração na conformação tridimensional devido às ligações peptídicas. Na prática, a exposição do fluxo magnético na enzima altera a estrutura.

No entanto, dependendo do tipo de enzima a alteração pode ser um efeito positivo favorecendo um melhor encaixe ao substrato ou um efeito negativo com uma estrutura que dificulte o encaixe. Exemplo disso é o estudo de quimiotripsina que com a exposição ao campo magnético houve uma diminuição em sua atividade catalítica, que provavelmente foi devido uma alteração em sua estrutura no qual dificultou o encaixe ao substrato (ALEXANDER et al., 2015).

Por fim, é importante compreender que a mudança na estrutura da enzima vai depender do quão sensível é essa macromolécula. Pois, há enzimas que podem ter um nível muito baixo de sensibilização ao ponto de não haver efeito do fluxo magnético em sua estrutura e atividade catalítica. Isso é exemplificado pelo estudo com as enzimas fosfatase alcalina e acetilcolinesterase ao tratamento do campo magnético em diferentes níveis de intensidade ao fluxo magnético, no qual não houve mudança estatisticamente significativa na atividade catalítica das duas enzimas (SILKSTONE; WILSON, 2016).

4. Considerações Finais

Durante os últimos seis anos, entre 2015 a 2020, houve a publicação de nove artigos que avaliaram o efeito do campo magnético na atividade catalítica da enzima. Entre esses estudos, a maioria resultou em um efeito positivo, com aumento na atividade enzimática. É uma área de pesquisa recente no qual não existe um padrão de protocolo para os experimentos, o que resulta em cada grupo de pesquisa elaborar seu próprio protocolo. Além disso, notaram-se algumas limitações nos artigos, exemplo disso foi à falta de mais análises que provassem a mudança na estrutura enzimática.

Esta revisão permitiu compreender que o campo magnético é uma ferramenta metodológica com potencial para melhorar a catálise enzimática, dependendo do quão sensível é a enzima ao fluxo magnético. A partir disso surge a demanda de investimento em pesquisas que possam avaliar o efeito do campo magnético em mais enzimas. Por fim, a aplicação do campo magnético é uma boa alternativa para gerar e potencializar um biocatalizador com mais competitividade no mercado industrial.

5. Referências

ALBUQUERQUE, W.; NASCIMENTO, T.; BRANDÃO- COSTA, R.; FERNANDES, T.; PORTO, A. Static magnetic field effects on proteases with fibrinolytic activity produced by *Mucor subtilissimus*. **Bioelectromagnetics**, 38(2), 109-120, 2017.

BARDIN, L. Análise de conteúdo. **Lisboa** (Portugal): Edições 70, 2008.

BAUER, W.; WESTFALL, G. D.; DIAS, H. Física para Universitários-Eletricidade e Magnetismo. **AMGH Editora**, 2012.

BORK, J.; HENRIQUES, R.; WEINSBERGER, G.; FURIGO JR, A. Síntese e imobilização da lipase de *Rhizomucor miehei* em nanopartículas magnéticas modificadas com moléculas de lauril sulfato. In: **Anais** do XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química. São Paulo: Editora Edgard Blücher. 2015.

CRUZ, F. T. Agricultura familiar, processamento de alimentos e avanços e retrocessos na regulamentação de alimentos tradicionais e artesanais. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, 58.2, 2020.

DAMKE, L. I.; GOMES, C. M.; GODOY, T. P.; ROSA, L. A. B.; PATIAS, T. Z. Políticas públicas para agroindústrias familiares e o desenvolvimento regional. **Estudos Sociedade e Agricultura**, 27 Edição 2, p. 418-439, 2019.

DENGO, M. B.; GAZOLLA, M.; PERONDI, M. A. Novidades territorializadas das agroindústrias familiares do Sudoeste do Paraná. **Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional**, 2019.

FLORENCIO, O.; MONSANTO, S. A.; MERGULHÃO, S. **Fundamentos de Física 2**. 2017. FRAGA, F. C. **Influência de campo magnético na conformação estrutural e atividade enzimática de hidrolases**. / Fernanda Cristina Fraga; orientadora, Débora de Oliveira, coorientadora, Alexsandra Valério, coorientador, Marco Di Luccio, 2018. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Florianópolis, 2018.

FRAGA, Fernanda Cristina, et al. Effect of magnetic field on the Eversa® Transform 2.0 enzyme: Enzymatic activity and structural conformation. **International journal of biological macromolecules**, 122: 653-658, 2019.

FURTUOSO, M. C. O.; BARROS, G. S. A. C.; GUILHOTO, J. J. M. O produto interno bruto do complexo agroindustrial brasileiro. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, 36.3: 9-32, 2019.

HAGHI, M., et al. Efeito do campo magnético de baixa densidade gerado por Helmholtz Coil na atividade da α -amilase e sensibilidade antibiótica de *B. cereus*. **International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology**, 4, 7, 2017.

LIU, Y.; GUO, C.; LIU, Chun-Zhao. Enhancing the resolution of (R, S)-2-octanol catalyzed by magnetic cross-linked lipase aggregates using an alternating magnetic field. **Chemical Engineering Journal**, 280: 36-40, 2015.

LIU, Y.; GUO, C.; LIU, Chun-Zhao. Enhancing the resolution of (R, S)-2-octanol catalyzed by magnetic cross-linked lipase aggregates using an alternating magnetic field. **Chemical Engineering Journal**, 280: 36-40. 2015.

MAGALHÃES, N.; CAVALCANTE, A. V.; ANDRADE, L. S.; WANDERLEY, C. R. P.; MARINHO, G.; PESSOA, K. A. R. Produção de ácido cítrico por *Aspergillus niger* AN 400 a partir de resíduo agroindustrial. **Engenharia Sanitaria e Ambiental**, 24.1: 101-107, 2019.

MAJOUGA, A.; SOKOLSKY-PAPKOV, M.; KUZNETSOV, A.; LEBEDEV, D.; EFREMOVA, M.; BELOGLAZKINA, E.; KLYACHKO, N. Enzyme-functionalized gold-coated magnetite nanoparticles as novel hybrid nanomaterials: synthesis, purification and control of enzyme function by low-frequency magnetic field. **Colloids and Surfaces B: Biointerfaces**, 125: 104-109, 2015.

MAJOUGA, A.; SOKOLSKY-PAPKOV, M.; KUZNETSOV, A.; LEBEDEV, D.; EFREMOVA, M.; BELOGLAZKINA, E.; KLYACHKO, N. Enzyme-functionalized gold-coated magnetite nanoparticles as novel hybrid nanomaterials: synthesis, purification and control of enzyme function by low-frequency magnetic field. **Colloids and Surfaces B: Biointerfaces**, 125, 104-109, 2015.

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. de C. P.; GALVAO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & contexto enfermagem**, Florianópolis, v. 17, n. 4, dez. 2008.

NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de Bioquímica de Lehninger-7. **Artmed Editora**, 2018.

PRANDO, L. T.; MELCHIORI, M. S.; TORRES, T. M. S.; OLIVEIRA, V. A.; VENERAL, J. G.; CASTIANI, M. A.; LUCCIO, M. Effect of high pressure and magnetic field treatments on stability of *Candida antarctica* lipase B (CALB) and lysozyme from chicken egg. **Catalysis Communications**, 116: 43-47, 2018.

PRANDO, LT.; LIMA, PR.; REZZADORI, K.; OLIVEIRA, JVD.; LUCCIO, M. Caracterização do desempenho e da atividade catalítica da lisozima de ovo de galinha submetido a campo magnético permanente. **Industrial & Engineering Chemistry Research**, 56 (32), 9065-9071. 2017.

QUEIROZ, C.; SOUSA, A. C. B. Produção de enzimas hidrolíticas por fungos filamentosos em diferentes substratos sólidos. **Brazilian Journal of Development**, 6.7: 51849-51860, 2020.

RIBEIRO, R. P. **Enzimas lignocelulolíticas da microbiota ruminal de ovinos Morada Nova e seu potencial na sacarificação do bagaço de cana-de-açúcar**. Embrapa Caprinos e Ovinos-Tese/dissertação (ALICE), 2019.

SALES, F. H. S.; LOPES, J. T.; COSTA, I. S.; SANTOS, D. G.; PADILHA, L. L. A Influência do Campo Magnético na Germinação e no Crescimento de Vegetais. **Revista Pindorama**, 1.01: 15-15, 2018.

SILKSTONE, G.; WILSON, M. T. Uma investigação adicional dos efeitos de campos magnéticos de frequência extremamente baixa na fosfatase alcalina e acetilcolinesterase. **Plos one**, 11.3: e0148369, 2016.

CAPÍTULO 24: ETANOL 1,5G: UMA DISCUSSÃO SOBRE A INTEGRAÇÃO ENTRE O ETANOL DE PRIMEIRA E SEGUNDA GERAÇÃO

CHAPTER 24: 1.5G ETHANOL: A DISCUSSION ABOUT THE COMBINATION BETWEEN FIRST AND SECOND GENERATION ETHANOL

Vanessa Paola Miranda Zart¹; Cristina Giatti Marques de Souza²; Rosane Marina Peralta³, Rafael Castoldi⁴

Resumo

A produção de etanol a partir de fontes renováveis tem sido uma alternativa promissora na busca pela redução da taxa de emissão de dióxido de carbono para a atmosfera. Uma das principais fontes de obtenção de matéria prima para a produção do bioetanol é a cana-de-açúcar, predominantemente produzida no Brasil. A fim de otimizar a produção, tem sido proposta uma integração dos processos de produção do etanol de primeira e segunda gerações. O trabalho objetiva discutir os principais problemas relacionados a produção de etanol da segunda geração e apresentar as vantagens da integração dos processos. A pesquisa se dá por meio de uma revisão integrativa da literatura em conjunto com testes experimentais envolvendo o pré-tratamento biológico e produção de enzimas celulolíticas, evidenciando a eficácia do processo de produção 1,5G em melhorar o rendimento de etanol frente aos métodos autônomos de produção, conferindo assim uma maior viabilidade econômica mediante o compartilhamento de estruturas.

Palavras-Chave: Etanol, Bioetanol, 1,5G, Integração, Sacarificação, Cana-de-açúcar.

Abstract

The ethanol production from renewable sources has been a promising alternative in order to reduce the rate of carbon dioxide emissions into the atmosphere. One of the main sources of raw material for the bioethanol production is sugarcane, predominantly produced in Brazil. In order to optimize the production, an integration of the first and the second generation ethanol production processes has been proposed. The work aims to discuss the main problems related to second generation ethanol production and present the advantages of the integration of both processes. The research takes place through an integrative review of the literature, together with experimental tests involving biological pre-treatment and production of cellulolytic enzymes, showing the effectiveness of the 1.5G production process in improving ethanol yield, compared to autonomous methods of production and thus providing greater economic viability through the sharing of structures.

Keywords: Ethanol, Bioethanol, 1.5G, Integration, Sacarification, Sugarcane.

¹ Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá (UEM), vanessa.zart@gmail.com

² Profa. Dra., Universidade Estadual de Maringá (UEM), cgmsouza@uem.br

³ Profa. Dra., Universidade Estadual de Maringá (UEM), rmperalta@uem.br

⁴ Prof. Dr., Universidade Estadual de Maringá (UEM), rcastoldi@uem.br

Introdução

Mudanças climáticas têm sido observadas com maior destaque nas últimas décadas, sendo, portanto, um alvo relevante de discussões políticas e científicas. O aquecimento global destaca-se em meio à tais mudanças, estando intimamente ligado ao aumento da emissão de dióxido de carbono (CO₂), considerado o principal gás responsável pelo denominado “efeito estufa” (GHG, do inglês *greenhouse gas*) (ANDERSON et al., 2016). A oxidação do carbono que ocorre durante a combustão de combustíveis fósseis tem sido uma das fontes predominantes de CO₂ atmosférico (24%), inferior apenas ao setor de eletricidade e geração de calor (Figura 1). Isso implica na ligação direta do setor de transportes aos impactos ambientais, uma vez que os combustíveis fósseis dominam mais da metade do mercado energético do setor (ADITIYA et al., 2016). Esses combustíveis ainda servem como o principal recurso global de energia e representam mais de 88% do consumo de energia primária, apesar de não serem provenientes de fontes renováveis e passíveis de esgotamento em um futuro próximo, de acordo com especialistas (LI, P. et al., 2019).

Figura 1. Gráfico de setores, indicando a porcentagem da emissão de CO₂ proveniente da combustão de combustíveis fósseis por setor, no ano de 2015. *Em “outros” estão inclusos a agricultura/silvicultura, pesca, indústrias de energia que não sejam eletricidade e geração de calor, e outras emissões não especificadas em outros lugares.

Fonte: Adaptado de International Energy Agency (2017).

Fontes de energia mais sustentáveis têm sido objetos fundamentais em pesquisas que objetivam a redução dos impactos ambientais causados pelos gases do efeito estufa. O bioetanol, produzido a partir de fontes renováveis, se apresenta como uma alternativa promissora para os combustíveis fósseis, podendo ser substituto total ou parcial da gasolina. No

Brasil, a quantidade de álcool anidro presente na gasolina gira em torno de 23%, segundo disposto pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). No ano de 2019, o Brasil se mantém como o segundo país que mais produz etanol de maneira sustentável e eficiente, atrás apenas dos Estados Unidos. Juntos, os Estados Unidos e o Brasil produzem 84% do etanol mundial, segundo o Departamento de Energia dos EUA (U.S. Department of Energy).

O etanol de primeira geração pode ser derivado do amido ou de outros açúcares por meio de um processo de fermentação. Uma das principais fontes de obtenção do açúcar proveniente de plantas utilizadas é a cana-de-açúcar, predominantemente produzida no Brasil. Esta cultura requer baixos recursos hídricos e terrestres por unidade de produção de energia biocombustível, além de emitir baixas quantidades de gases do efeito estufa (JIAO, J. et al., 2018). De acordo com Aditiya et al. (2016), uma das características mais favoráveis à utilização dessas culturas como matéria prima para a produção do etanol consiste no alto rendimento e em baixos custos de conversão, sendo os principais limitantes desse padrão de produção a sazonalidade do cultivo e seu conflito com a produção de finalidade alimentar.

Nesse contexto foi proposta uma segunda geração de bioetanol, tendo como foco a utilização de derivados de resíduos agrícolas e florestais como matérias-primas. Segundo Jambo et al. (2016), essa nova concepção minimiza o problema anteriormente citado, denominado “*food versus fuel*” (traduzindo do inglês para o português, “alimentos versus combustíveis”). Para a produção do bioetanol de segunda geração (2G), o açúcar é obtido através da conversão de materiais lignocelulósicos e amiláceos presentes nesses derivados. Tais açúcares podem ser posteriormente processados, obtendo como produto final o bioetanol anidro (ADITIYA et al., 2016). Por ser produzido a partir da biomassa, a segunda geração de etanol embasa uma fonte mais sustentável de energia, apresentando menores impactos ambientais em termos de emissões de CO₂, se comparados aos combustíveis fósseis (HAJI ESMAEILI, S. A. et al., 2020). Existem, no entanto, dificuldades para a produção do bioetanol de segunda geração em larga escala, uma vez que o processo exige uma tecnologia mais cara e mais avançada. Além disso, apresenta altos custos de conversão e baixos rendimentos, o que é justificado pela presença da lignina presente em sua composição.

Dentro desse quadro, cientistas sugeriram a utilização de organismos marinhos, como as algas, na produção do bioetanol, surgindo assim a sua terceira geração. Algas são consideradas matérias-primas que apresentam um grande potencial de conversão da biomassa em energia. Contudo, a produção do bioetanol de terceira geração é dependente de diversos fatores como tecnologias avançadas e é dependente do ambiente marinho, dificultando sua viabilidade (JAMBO et al., 2016).

Como alternativa aos problemas enfrentados pelas três gerações de bioetanol, foi proposta a integração dos processos de produção das duas primeiras gerações. O problema do baixo rendimento obtido pela produção de etanol lignocelulósico (2G), devido às baixas concentrações de açúcar após a hidrólise, é sanado facilmente pela primeira geração, a qual apresenta altas taxas de conversão.

Métodos de pré-tratamento utilizados na produção do etanol 2G geram uma grande variedade de compostos secundários, os quais atuam como inibidores para enzimas e outros microorganismos em etapas subsequentes. Com a integração dos processos, são necessárias concentrações mais baixas da matéria-prima lignocelulósica, levando a menores concentrações de inibidores formados durante o pré-tratamento, descartando a necessidade de desintoxicação (LENNARTSSON et al. 2014; BHATIA, S. K. et al. 2020).

Desta forma o presente estudo tem por objetivo discutir os atuais métodos de produção do bioetanol, com foco na integração entre os processos de primeira e segunda gerações e discutir os principais problemas na busca pela sua produção em larga escala. O trabalho também visa avaliar de que forma a produção de etanol da geração 1,5G pode ser considerada viável em território brasileiro, frente a produção do etanol de primeira e segunda geração.

Desenvolvimento

A produção do bioetanol e fontes de biomassa

O composto orgânico de fórmula molecular C_2H_6O é designado como etanol, álcool ou álcool etílico. A produção de etanol a partir de biomassa e fontes renováveis dá origem ao chamado bioetanol, pertencente à classe de biocombustíveis, dividindo espaço com o biodiesel, biobutanol, biogás, óleos vegetais e biodrogênio. As principais matérias-primas são baseadas em produtos orgânicos com elevadas quantidades de carboidratos, usualmente açúcares de seis carbonos, passíveis de serem fermentados à etanol por enzimas fúngicas (NIGAM; SINGH, 2011).

Macromoléculas não podem ser diretamente convertidas a etanol por processos fermentativos convencionais, devendo primeiramente ser clivadas a moléculas mais simples, originando, por exemplo, a glicose. O amido, que consiste em um polímero formado por uma longa cadeia de glicose, apresenta-se como uma excelente matéria-prima na produção do bioetanol. Nos Estados Unidos (EUA) é amplamente utilizado o amido proveniente do milho, dada sua facilidade em ser degradado à glicose. No entanto, outras fontes de carboidratos são comumente utilizadas na produção do bioetanol, como por exemplo a cana-de-açúcar, a raiz de beterraba, frutas e suco de palmeira como fontes de açúcares; grãos como trigo, arroz, sorgo

doce, milho e plantas de raiz como batata e mandioca como fontes de amido e também resíduos de madeira, cedro, pinho, resíduos agrícolas e fibras como fontes de celulose (ZABED et al., 2017).

A cana-de-açúcar é uma gramínea perene alta de cultura semi-perene e integrante da família *Poaceae* e do gênero *Saccharum*. A cana-de-açúcar é uma planta tropical, com múltiplos caules de aproximadamente 3 a 4 metros de altura e cinco centímetros de diâmetro. O caule constitui uma porção aproximada de 75% da planta quando madura, constituindo-se em 11–16% de fibra, 12–16% de açúcares solúveis, 2–3% de não açúcares e 63–73% de água. O cultivo da cana-de-açúcar é sensível ao clima, tipo de solo, irrigação, fertilizantes, insetos, controle de doenças, variedade da cana e época de colheita. É comumente cultivada em países tropicais e subtropicais e, portanto, muito bem adaptada ao clima brasileiro (MANOCHIO et al., 2017; CARVALHO et al., in press). Os principais constituintes do bagaço de cana são a celulose, hemicelulose e lignina. Um cálculo da composição realizado por Dias et al. (2012), com base em dados da literatura de aproximadamente 50 amostras, está representado graficamente na Figura 2, indicando a porcentagem de cada constituinte. Carvalho et al. (in press), aponta os valores de aproximadamente 41,3% para celulose, 24,9% para hemicelulose e 20,2% para lignina. Extrativos e cinzas equivalem ambos a aproximadamente 4,9%.

Figura 2. Composição do bagaço de cana-de-açúcar.

Fonte: Adaptado de Dias et al. (2012).

Primeira geração do bioetanol

A primeira geração de biocombustíveis líquidos é obtida a partir de açúcares, grãos ou sementes através de processos simples, até a formação do produto final. O processo

convencional segue normalmente as etapas de recepção e limpeza da cana-de-açúcar, extração de açúcares, tratamento e concentração de suco, fermentação, destilação e desidratação. Após a recepção na fábrica, a cana deve ser limpa para remover parte da sujeira transportada pelo campo. A limpeza da cana-de-açúcar geralmente é feita com água de lavagem, que é reciclada para o processo de limpeza após a remoção de sujeira e outras impurezas. No processo de fermentação ocorre a conversão da glicose em etanol por leveduras e é interrompida ao atingir a concentração aproximada de 10% (v/v) de etanol, dado que concentração relativamente alta de etanol no meio de fermentação é desejável, contanto que não provoque inibição à levedura (VOHRA et al., 2014). A fermentação pode se dar de forma aeróbica ou anaeróbica, dependendo da disponibilidade e necessidade de oxigênio durante o processo.

As últimas etapas são a destilação e a desidratação, que resultam em uma solução azeotrópica de etanol a 95% (v/v), podendo ser filtrada ou destilada até alcançar a concentração desejada de etanol hidratado ou anidro (VOHRA et al., 2014). O produto pode ser então misturado a combustíveis fósseis ou ser usado diretamente como combustível.

O bagaço, resíduo lignocelulósico do processamento de cana-de-açúcar, é queimado em caldeiras para gerar calor e eletricidade para a própria usina (cogeração) e caso haja excedente, pode ser exportado para o sistema elétrico nacional. Além de responder pela geração de energia, o bagaço da cana-de-açúcar também atrai atenção para sua utilização na produção do etanol de segunda geração. A simplificação do processo de produção do etanol de primeira geração (1G) está representada na Figura 3.

Figura 3. Fluxograma de blocos da simplificação do processo de produção do etanol de primeira geração, a partir do bagaço de cana.

Fonte: Adaptado de (DIAS et al., 2013b).

Segunda geração do bioetanol

No início dos anos 1970, quando a produção de etanol alavancou no Brasil, o bagaço era considerado estritamente um resíduo, o qual era eliminado por meio de caldeiras de baixa eficiência. Entretanto, com o passar do tempo, passou a ser reconhecido como uma matéria-prima promissora na produção de etanol celulósico ou de segunda geração (2G), reduzindo os impactos ao meio ambiente.

A biomassa lignocelulósica atua como matéria-prima na produção do bioetanol 2G, sendo composta principalmente de celulose, hemicelulose e lignina (SINDHU et al., 2016). Porém, esse complexo forma uma barreira física, conferindo resistência, rigidez e impermeabilidade, dificultando o acesso de microrganismos. Para o uso da biomassa lignocelulósica na produção de etanol, quatro etapas são essenciais, sendo elas o pré-tratamento, hidrólise enzimática, fermentação dos polímeros de açúcares em etanol e destilação (RASTOGI; SHRIVASTAVA, 2017). O pré-tratamento tem papel fundamental na conversão da matéria-prima ao etanol, promovendo a despolimerização da lignocelulose. A estrutura cristalina da celulose é um dos principais fatores que dificultam a hidrólise e, portanto, o processo tem a finalidade de reduzir o seu grau de cristalinidade, favorecendo a forma amorfa, a qual é mais adequada ao ataque enzimático.

Em suma, os principais objetivos do processo de pré-tratamento são a redução de tamanho físico do material, a exposição dos componentes (hemicelulose, celulose e lignina) antes da hidrólise para melhorar a produção açúcares redutores, a viabilização do acesso às enzimas para a hidrólise dos carboidratos em soluções fermentáveis e a redução do grau de cristalinidade da matriz de celulose.

Composição da biomassa e enzimas

Os materiais lignocelulósicos são os principais componentes da biomassa e representam o recurso de energia renovável mais abundante disponível na terra (LORENCI WOICIECHOWSKI, A. et al. 2020), podendo amenizar o conflito entre o uso de alimentos e energia. Resíduos agrícolas contêm uma grande fração de substâncias lignocelulósicas e a abundância relativa desses três componentes difere para cada tipo de biomassa (PAUDEL et al., 2017).

Dentre essas porções, a lignina torna-se um dos maiores entraves. Para degradar essa estrutura são utilizadas enzimas, como a lignina peroxidase (LiP), a manganês peroxidase (MnP) e a lacase, enzimas oxidativas provenientes dos fungos da podridão branca (WAN; LI, 2012), responsáveis pela deslignificação (redução do teor de lignina) e desintoxicação (remoção

de compostos químicos da hidrólise de açúcar) da biomassa lignocelulósica. (RASTOGI; SHRIVASTAVA, 2017).

As enzimas atuam de forma a fornecer fontes de carbono mais facilmente digeríveis para o crescimento e metabolismo dos fungos. A hidrólise enzimática é o passo crítico para a produção de bioetanol, onde os carboidratos complexos são convertidos em monômeros simples (GUPTA; VERMA, 2015). Como as enzimas microbianas são eficientes na degradação de compostos lignocelulósicos, sabe-se que o pré-tratamento biológico é adequado para biomassa contendo lignoceluloses, embora a sua taxa de reação enzimática seja lenta e os custos mais elevados se comparado a outros métodos (PAUDEL et al., 2017). As estruturas referentes às unidades estruturais da celulose e lignina estão representadas na Figura 4.

Figura 4. Representação esquemática de (a) estrutura da celulose e (b) estrutura da lignina.

Fonte: Extraído de Watkins et al. (2014).

Um procedimento adequado para a degradação desses componentes é de fundamental importância para o desenvolvimento de novas tecnologias, visando principalmente a otimização

do processo de produção do etanol de segunda geração, o qual pode se dar de forma mais eficiente pela integração com o processo de produção de etanol de primeira geração, resultando na promissora geração 1,5.

Eficiência do pré-tratamento biológico frente a outros métodos

A eficiência de remoção de lignina depende do tipo de pré-tratamento empregado e das condições ideais mantidas durante o pré-tratamento. Os processos de pré-tratamento podem ser físicos, químicos, biológicos ou podem ser uma combinação desses métodos (NIJU, S.; SWATHIKA, M., 2019). Os pré-tratamentos físicos se baseiam no aumento da área superficial e no volume de poros acessíveis, diminuindo o grau de polimerização da celulose e sua cristalinidade, promovendo a hidrólise das hemiceluloses e despolimerização parcial da lignina (ZABED et al., 2016). Pré-tratamentos químicos e físico-químicos, tais como explosão a vapor, utilização de ácidos e bases, oxidação, radiação ionizante e utilização de amônia e solventes orgânicos também causam a desestabilização da parede celular, a solubilização da lignina e outras respostas necessárias antes da hidrólise enzimática (WANDERLEY et al., 2013; RABEMANOLONTSOA; SAKA, 2016; DA SILVA et al., 2016).

O pré-tratamento biológico baseia-se na capacidade de determinados organismos em degradar a lignina para obter acesso a celulose e hemicelulose. Os microrganismos mais utilizados são os fungos das podridões branca, parda e mole, além de algumas bactérias ruminantes, sendo que os da podridão branca são considerados mais eficientes para este fim (WAN; LI, 2012), uma vez que consomem menos energia e causam menos danos ao meio ambiente. Diversos fatores influenciam na degradação biológica da lignocelulose, como tensão fúngica, condições de cultura, secreção enzimática e mecanismos oxidativos (SALVACHÚA et al., 2011).

Vários estudos revelaram que o pré-tratamento biológico, especialmente utilizando fungos da podridão branca, é capaz de melhorar a eficiência da hidrólise com menor gasto de energia, de modo que a conversão da fração de carboidratos para açúcares monoméricos possa ser alcançada mais rapidamente e com maiores rendimentos (SINDHU; BINOD; PANDEY, 2016). Um dos maiores benefícios do pré-tratamento biológico é que o subproduto resultante deste método não inibe a hidrólise subsequente, bem como a fermentação, uma vez que é realizado em condições moderadas. É um processo que dispensa a reciclagem química e não libera nenhum composto perigoso ou tóxico para o meio ambiente (UMMALYMA, S. B. et al., 2019).

Segundo SINDHU et al. (2016), rendimentos de até 82% no processo de sacarificação foram obtidos após pré-tratamentos biológicos, utilizando o fungo da podridão branca, *Irpex lacteus* sobre talos de milho. Apesar do alto rendimento, estes resultados foram obtidos no vigésimo oitavo dia de pré-tratamento, apontando uma das principais limitações do método biológico, isto é, o tempo.

O pré-tratamento biológico apresenta várias vantagens sobre outros métodos de pré-tratamento, sendo a principal desvantagem dessa estratégia o processo lento, bem como o fato de que os açúcares podem ser usados pelos microrganismos para seu crescimento. No entanto, enefícios ao meio ambiente devem ser destacados, para que novas pesquisas possibilitem a viabilidade de tal método de pré-tratamento, através da otimização do processo e redução do o tempo, crucial para seu uso tecnológico.

Breve abordagem ao cenário brasileiro de produção de etanol e principais limitações

Os combustíveis de primeira geração são produzidos atualmente em larga escala em diversos países. O maior questionamento envolvendo esse tipo de produção está relacionado ao conflito com a oferta de alimentos. O baixo aproveitamento da biomassa total das plantas reduz a eficiência do uso da terra e essa concorrência com a produção de alimentos implica num alto custo de produção. Esses custos podem variar de acordo com a matéria-prima utilizada, processo de conversão, escala de produção e região. O cultivo acessível da cana-de-açúcar no Brasil torna a produção do bioetanol uma opção viável. Pelo fato de a planta ser produzida em volumes substanciais, o etanol à base de cana-de-açúcar está se tornando uma alternativa cada vez mais econômica aos combustíveis fósseis. Isso incentiva a busca por novas tecnologias de obtenção de melhores rendimentos em seu processo de fabricação.

Segundo aponta a revista Novacana, no ano de 2007 o Brasil contava com 370 unidades de processamento da cana-de-açúcar, das quais 355 se voltavam à produção de etanol. O rendimento médio de usinas mistas se encontra em torno de 71 kg açúcar e 42 litros de etanol por tonelada de cana processada. A distribuição das usinas sucroalcooleiras em território brasileiro no ano de 2015, de acordo com seu tipo, pode ser observada na Figura 5.

Figura 5. Produção de etanol por tipo, por Unidade da Federação em território brasileiro no ano de 2015.

Fonte: Extraído de IBGE (2017).

Atuais limitações na produção de bioetanol de segunda geração

Os principais fatores que limitam a comercialização e produção em larga escala do etanol de segunda geração são o custo, bem como a baixa eficiência hidrolítica das enzimas no processo de sacarificação, bem como o tempo demandado em caso de pré-tratamento biológico. O dispêndio mais influente na produção de etanol 2G é baseada na aquisição de enzimas, seguido preço de venda da eletricidade produzida e em menor escala, o custo de transporte de folhas e outros materiais remanescentes da colheita da cana-de-açúcar (MACRELLI et al., 2014).

Portanto, os esforços atuais visam essencialmente potencializar a eficiência de produção, principalmente através da combinação de tecnologias e intensificação do aproveitamento de resíduos remanescentes, para que assim o processo possa ser economicamente viável e ambientalmente sustentável (ZABED et al., 2016).

Geração 1,5 de etanol

O desenvolvimento de projetos e pesquisas relacionadas ao etanol de segunda geração tem apresentado declínio devido aos problemas apresentados e ao limitado avanço nas usinas

em funcionamento. Em contraposição, uma produção mais competitiva do etanol 2G pode ser alcançada mediante a integração das tecnologias 1G e 2G em uma usina, compartilhando fluxos de energia e materiais em unidades de operação, além de permitir o aproveitamento mais eficiente das fontes alternativas para produção de combustível.

O rendimento de etanol da cana-de-açúcar pode ser aumentado se o bagaço, já presente no local como resíduo de processo de produção do etanol de primeira geração, for tratado para produzir etanol 2G, ao invés de seguir para a queima na produção de eletricidade, embora a rentabilidade seja fortemente dependente do preço de etanol. A utilização de todo o material na produção de subprodutos pode apresentar um impacto considerável sobre a viabilidade econômica da integração (MACRELLI et al., 2012).

Ou seja, a execução integrada dos processos de produção requer menores investimentos se comparada a uma usina autônoma, uma vez que algumas operações (como por exemplo a concentração, fermentação, destilação, armazenamento e cogeração) podem ser compartilhadas entre as duas plantas. Por já estarem disponíveis na própria usina ou próximo a ela, os resíduos da produção de etanol 1G são mais facilmente aproveitados para a produção de bioetanol 1,5G.

É importante notar que o uso da biomassa lignocelulósica para produzir o etanol 1,5G pode impedir a competição futura pelo uso da terra entre a produção de etanol e a produção de alimentos, possibilitando uma ampliação no rendimento de etanol sem interferir na área de produção alimentícia (CARPIO; SIMONE DE SOUZA, 2017).

Além disso, os problemas relacionados à formação de inibidores de fermentação durante o pré-tratamento terão efeitos inferiores nos rendimentos, uma vez que o hidrolisado será fermentado e acrescido ao caldo de cana-de-açúcar, diluindo esses inibidores. A possível recuperação do solvente na deslignificação alcalina pode, conjuntamente, apresentar inúmeros benefícios num aspecto ambiental (DIAS et al., 2012a).

Integração dos processos de produção

As principais etapas do processo na produção de etanol 1G são a moagem da cana de açúcar e a fermentação dos açúcares disponíveis. A produção de etanol 2G é, no entanto, mais complexa, devido a necessidade de um pré-tratamento a fim de decompor a matriz estrutural e clivar os açúcares poliméricos a monômeros fermentáveis, antes da conversão microbiana ao etanol. Os principais desafios neste processo são maximizar a conversão de lignocelulose e minimizar a perda de açúcares, o que é difícil usando condições operacionais amenas.

A integração é possível em várias etapas do processo, desde o pré-tratamento, até os processos posteriores, como por exemplo, nas etapas de destilação ou evaporação. Assim,

diferentes configurações de processos são possíveis. Dois principais métodos de integração são a integração no estágio de fermentação ou no estágio de cultivo de fungos. Em ambos os casos, a primeira geração praticamente não sofre alterações, sendo um pouco mais evidente na primeira opção, pois os inibidores do processo da segunda geração não podem ser inseridos nos fermentadores (LENNARTSSON et al., 2014).

Um dos principais coprodutos da produção de etanol a partir da cana-de-açúcar e do bagaço é a eletricidade. Ao projetar uma usina integrada, uma das duas principais configurações pode ser escolhida: a produção de biogás ou a produção de DDGS (Grãos secos destilados com solúveis ou *Dried Distillers Grains with Solubles*, em inglês), derivados do milho, para a utilização na nutrição de monogástricos. Representações esquemáticas de ambos os processos de produção podem ser observadas nas Figura 6 (a) e (b). A escolha depende principalmente do mercado de DDGS e biogás no local da usina. No entanto, segundo aponta Dias et al. (2012), a produção de biogás manifesta uma menor notoriedade enquanto não oferecer qualidade de combustível para veículos, dada a baixa aplicação. A grande produção de DDGS e a fermentação combinada de pentoses e hexoses tem sido mais promissoras, se comparadas à produção de biogás. Além disso, caso a legislação impeça a produção de DDGS que incluem leveduras geneticamente modificadas, será necessária uma etapa de separação antes da fermentação de pentoses e hexoses no processo 1G, para separar os sólidos da fração líquida, a fim que estes sólidos possam ser utilizados para a produção de DDGS sem serem misturados com a levedura (JOELSSON et al., 2016).

Figura 6. Fluxograma de blocos da integração entre os processos de produção da primeira e segunda geração de etanol a partir do bagaço de cana. (a) representa a produção de DDGS e (b) a produção de biogás.

Fonte: Adaptado de (DIAS et al., 2013b) e (DIAS et al., 2013c).

Em se tratando do processo de produção que visa a obtenção de DDGS, a escolha de produtos químicos para o pré-tratamento também se torna crucial. No entanto, o enxofre possui limitações em relação à alimentação animal, podendo demandar a ausência do ácido sulfúrico no pré-tratamento das lignoceluloses. A hidrólise é comumente realizada com a utilização de enzimas, podendo ocorrer em compartimentos separados ou juntos à fermentação, sem apresentar significativa influência na qualidade de DDGS. Após a hidrólise, as hexoses liberadas serão convertidas em etanol e CO₂ pelo microrganismo fermentador, como de costume.

Segundo estudos guiados por Dias et al. (2013), pôde-se verificar que a fermentação das pentoses leva a uma maior produção de etanol, mas a quantidade de material lignocelulósico hidrolisado é menor do que nas configurações onde as pentoses são biodigeridas, infelizmente com maior demanda de energia das etapas de concentração e destilação, devido ao aumento na produção de etanol. Contudo, como a concentração elevada de etanol no meio de fermentação é desejável, para atingir um menor consumo de energia na etapa de purificação, a concentração de açúcares no líquido hidrolisado desempenha um papel importante no dado processo.

Recuperar parte dos resíduos do campo pode aumentar a quantidade de material lignocelulósico excedente disponível para hidrólise, uma vez que estes podem ser queimados para fornecer energia para suprir as necessidades do processo industrial (DIAS et al., 2012b). A redução do consumo de vapor e a maximização da qualidade do material lignocelulósico excedente é fundamental para aumentar o rendimento de usinas que visam a utilização do bagaço e dos resíduos resultantes na produção de etanol 2G. Além disso, pentoses podem também ser fermentadas até etanol, aumentando a produção de etanol do processo. No entanto,

esta prática implica também em um aumento no consumo de energia (DIAS et al., 2012a). Na integração, a biomassa fúngica também pode ser utilizada para outros fins. Algumas cepas produzem lipídeos que podem ser extraídos da biomassa e vendidos como, por exemplo, suplementos dietéticos (BELLOU et al., 2012).

O uso dessa tecnologia tem chamado a atenção para o futuro desenvolvimento de biocombustíveis, principalmente no Brasil, pela otimização da estrutura de centenas de usinas de primeira geração, no país onde a produção de bioetanol em larga escala já é realidade.

Próximos desafios na produção do etanol

Um dos maiores desafios do processo de produção de etanol lignocelulósico está na obtenção de concentrações suficientemente altas de açúcar após a hidrólise. De um modo geral, o presente problema pode ser resolvido mediante a integração entre os processos de produção de etanol 1G e 2G, uma vez que concentrações suficientemente altas são facilmente alcançadas na primeira geração. Assim, são necessárias concentrações mais baixas da matéria-prima lignocelulósica, levando a uma diminuição na concentração de inibidores formados durante o pré-tratamento, resolvendo conseqüentemente a necessidade de desintoxicação.

Segundo aponta Lennartson et al. (2014), o problema relacionado à utilização de pentoses pode ser resolvido através da utilização de cepas geneticamente modificadas de *S. cerevisiae*. Entretanto, a opinião pública negativa pode se tornar um problema. Outros microrganismos capazes de fermentar pentoses em etanol também poderiam ser empregados, mas geralmente são bastante sensíveis a inibidores (inclusive ao etanol). As pentoses também poderiam ser aplicadas na produção de compostos diferentes do etanol em etapas posteriores do processo. Porém, a dedicação e adequação do processo para tal aproveitamento não seria economicamente ideal, devido às baixas concentrações produzidas.

A incrustação, em particular, e a viscosidade do líquido também podem ser grandes obstáculos no processo. Ao reduzir a quantidade total de sólidos suspensos e compostos orgânicos no líquido, a gravidade desses obstáculos pode ser reduzida. Isso poderia permitir que mais água fosse removida nos evaporadores e menos nos secadores. Poderia também permitir que mais da vinhaça fina fosse enviada de volta ao processo, o que diminuiria diretamente a carga nos evaporadores e nos secadores (LENNARTSSON et al., 2014).

De um modo geral, a produção integrada de etanol de primeira e segunda gerações apresenta várias vantagens sobre as usinas independentes de produção de etanol, sem, no entanto, abnegar inúmeros aspectos a serem melhorados para que a nova geração de combustíveis renováveis possa ser realidade no Brasil.

Considerações Finais

O desenvolvimento sustentável fornece uma base para a diminuição dos efeitos que levam a mudanças climáticas e o emprego da bioenergia tende a impactar positivamente na mitigação desses efeitos. Em se tratando da produção de bioetanol a partir da cana-de-açúcar, principal fonte de açúcar para fermentação em território brasileiro, foram avaliados os atuais métodos de produção, além da realização de um pré-tratamento biológico para a sacarificação do bagaço de cana.

A comparação dos atuais métodos de produção do bioetanol permitiu constatar uma maior viabilidade econômica na integração dos processos de produção 1G e 2G em virtude do compartilhamento estrutural e de equipamentos, podendo se dar em diferentes etapas do processo, amplificando sua versatilidade e aplicação. A indesejável geração de subprodutos devido à degradação da lignocelulose pode ser amenizada ao diluir o hidrolisado ao caldo de cana e os resíduos da colheita podem ser recuperados e aproveitados, evidenciando os aspectos positivos da integração.

Com um pré-tratamento biológico adequado e eficiente aliado à integração dos processos de produção, o rendimento de etanol pode ser potencializado, trazendo inúmeros benefícios econômicos e ao meio ambiente. Com base nos resultados, pode-se enfatizar a importância da avaliação do processo de produção de bioetanol para uma compreensão mais clara, orientando à novas pesquisas capazes de preencher as lacunas e expandir os benefícios da integração do etanol de primeira e segunda geração.

Referências

- ADITIYA, H. B. et al. Second generation bioethanol production: A critical review. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 66, p. 631–653, 2016.
- ADSUL, M. G. et al. Polysaccharides from bagasse : applications in cellulase and xylanase production. v. 57, p. 67–72, 2004.
- ANDERSON, T. R.; HAWKINS, E.; JONES, P. D. CO₂, the greenhouse effect and global warming: from the pioneering work of Arrhenius and Callendar to today's Earth System Models. **Endeavour**, v. 40, n. 3, p. 178–187, 2016.
- BELLOU, S. et al. Lipids Containing Polyunsaturated Fatty Acids Synthesized by Zygomycetes Grown on Glycerol. p. 146–158, 2012.
- BHATIA, S. K. et al. Recent developments in pretreatment technologies on lignocellulosic biomass: Effect of key parameters, technological improvements, and challenges. *Bioresource Technology*, v. 300, n. January, p. 122724, 2020.
- CARPIO, L. G. T.; SIMONE DE SOUZA, F. Optimal allocation of sugarcane bagasse for

producing bioelectricity and second generation ethanol in Brazil: Scenarios of cost reductions. **Renewable Energy**, v. 111, p. 771–780, 2017.

CARVALHO, D. J. et al. (in press). Assessment of the self-sustained energy generation of an integrated first and second generation ethanol production from sugarcane through the characterization of the hydrolysis process residues. **Energy Conversion and Management**, v. 203, n. November, p. 112267, 2020. (Prevision screen – November/2020)

DA SILVA, A. R. G.; TORRES ORTEGA, C. E.; RONG, B. G. Techno-economic analysis of different pretreatment processes for lignocellulosic-based bioethanol production. **Bioresource Technology**, v. 218, p. 561–570, 2016.

DANTAS, G. A.; LEGEY, L. F. L.; MAZZONE, A. Energy from sugarcane bagasse in Brazil: An assessment of the productivity and cost of different technological routes. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 21, p. 356–364, 2013.

DEMIRBAS, A. Biofuels securing the planet's future energy needs. **Energy Conversion and Management**, v. 50, n. 9, p. 2239–2249, 2009.

DIAS, M. O. S. et al. Improving second generation ethanol production through optimization of first generation production process from sugarcane. **Energy**, v. 43, n. 1, p. 246–252, 2012a.

DIAS, M. O. S. et al. Integrated versus stand-alone second generation ethanol production from sugarcane bagasse and trash. **Bioresource Technology**, v. 103, n. 1, p. 152–161, 2012b.

DIAS, M. O. S. et al. Evaluation of process configurations for second generation integrated with first generation bioethanol production from sugarcane. **Fuel Processing Technology**, v. 109, p. 84–89, 2013a.

DIAS, M. O. S. et al. Biorefineries for the production of first and second generation ethanol and electricity from sugarcane. **Applied Energy**, v. 109, p. 72–78, 2013b.

DIAS, M. O. S. et al. Cogeneration in integrated first and second generation ethanol from sugarcane. **Chemical Engineering Research and Design**, v. 91, n. 8, p. 1411–1417, 2013c.

GUPTA et al. Evaluation of pretreatment methods in improving the enzymatic saccharification of cellulosic materials. **Carbohydrate Polymers**, New Delhi, v. 84, n. 3, p. 1103–1109, 17 mar. 2011.

GUPTA, A.; VERMA, J. P. Sustainable bio-ethanol production from agro-residues: A review. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 41, p. 550–567, 2015.

HAJI ESMAEILI, S. A. et al. First-generation vs. second-generation: A market incentives analysis for bioethanol supply chains with carbon policies. **Applied Energy**, v. 277, n. July, p. 115606, 2020.

IBGE. Dinâmica Territorial da Produção Agropecuária, 2017. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/apps/dinamica_agropecuaria/>. Acesso em 2 de set. de 2020

JAMBO, S. A. et al. A review on third generation bioethanol feedstock. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 65, p. 756–769, 2016.

JEYA, M. et al. Bioresource Technology Enhanced saccharification of alkali-treated rice straw by cellulase from *Trametes hirsuta* and statistical optimization of hydrolysis conditions by RSM. **Bioresource Technology**, v. 100, n. 21, p. 5155–5161, 2009.

JIAO, J.; LI, J.; BAI, Y. Ethanol as a vehicle fuel in China: A review from the perspectives of raw material resource, vehicle, and infrastructure. *Journal of Cleaner Production*, v. 180, p. 832–845, 2018.

JOELSSON, E. et al. Techno-economic evaluation of integrated first- and second-generation ethanol production from grain and straw. **Biotechnology for Biofuels**, v. 9, n. 1, p. 1–16, 2016.

KAPARAJU, P. et al. Bioresource Technology Bioethanol, biohydrogen and biogas production from wheat straw in a biorefinery concept. **Bioresource Technology**, v. 100, n. 9, p. 2562–2568, 2009.

LENNARTSSON, P. R.; ERLANDSSON, P.; TAHERZADEH, M. J. Integration of the first and second generation bioethanol processes and the importance of by-products. **Bioresource Technology**, v. 165, n. C, p. 3–8, 2014.

LI, P.; SAKURAGI, K.; MAKINO, H. Extraction techniques in sustainable biofuel production: A concise review. **Fuel Processing Technology**, v. 193, n. May, p. 295–303, 2019.

LORENCI WOICIECHOWSKI, A. et al. Lignocellulosic biomass: acid and alkaline pretreatments and their effects on biomass recalcitrance – conventional processing and recent advances. **Bioresource technology**, v. 304, n. January, p. 122848, 2020.

MACRELLI, S.; GALBE, M.; WALLBERG, O. Effects of production and market factors on ethanol profitability for an integrated first and second generation ethanol plant using the whole sugarcane as feedstock. **Biotechnology for Biofuels**, v. 7, n. 1, p. 1–16, 2014.

MACRELLI, S.; MOGENSEN, J.; ZACCHI, G. Techno economic evaluation of 2nd generation bioethanol production from sugar cane bagasse and leaves integrated with the sugar based ethanol process. **Biotechnology for Biofuels**, v. 5, p. 22, 2012.

MANOCHIO, C. et al. Ethanol from biomass: A comparative overview. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 80, n. February, p. 743–755, 2017.

MILLER, G. A. I. L. Use of Dinitrosalicylic Acid Reagent for Detection of Reducing Sugars. **Analytical Chemistry - ANAL CHEM**, v. 31, 1959.

NAIK, S. N. et al. Production of first and second generation biofuels: A comprehensive review. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 14, n. 2, p. 578–597, 2010.

NIJU, S.; SWATHIKA, M. Delignification of sugarcane bagasse using pretreatment strategies for bioethanol production. **Biocatalysis and Agricultural Biotechnology**, v. 20, n. May, p. 101263, 2019.

NIGAM, P. S.; SINGH, A. Production of liquid biofuels from renewable resources. **Progress in Energy and Combustion Science**, v. 37, n. 1, p. 52–68, 2011.

PAUDEL, S. R. et al. Pretreatment of agricultural biomass for anaerobic digestion: Current

state and challenges. **Bioresource Technology**, v. 245, n. August, p. 1194–1205, 2017.

RABELO, S. C. et al. Production of bioethanol, methane and heat from sugarcane bagasse in a biorefinery concept. **Bioresource Technology**, v. 102, n. 17, p. 7887–7895, 2011.

RABEMANOLONTSOA, H.; SAKA, S. Various pretreatments of lignocellulosics. **Bioresource Technology**, v. 199, p. 83–91, 2016.

RAMESH, T. et al. A genetic model of amyotrophic lateral sclerosis in zebrafish displays phenotypic hallmarks of motoneuron disease. v. 662, p. 652–662, 2010.

RASTOGI, M.; SHRIVASTAVA, S. Recent advances in second generation bioethanol production: An insight to pretreatment, saccharification and fermentation processes. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 80, n. May, p. 330–340, 2017.

SALVACHÚA, D. et al. Fungal pretreatment: An alternative in second-generation ethanol from wheat straw. **Bioresource Technology**, v. 102, n. 16, p. 7500–7506, 2011.

SINDHU, R.; BINOD, P.; PANDEY, A. Biological pretreatment of lignocellulosic biomass - An overview. **Bioresource Technology**, v. 199, p. 76–82, 2016.

UMMALYMA, S. B. et al. **Biological pretreatment of lignocellulosic biomass-current trends and future perspectives**. [s.l.] Elsevier Inc., 2019.

VAN VLEET, Jh; JEFFRIES, Tw. Yeast metabolic engineering for hemicellulosic ethanol production. **Current Opinion In Biotechnology**, Madison, v. 20, n. 3, p. 300-306, jul. 2009.

VOHRA, M. et al. Bioethanol production: Feedstock and current technologies. **Journal of Environmental Chemical Engineering**, v. 2, n. 1, p. 573–584, 2014.

WAN, C.; LI, Y. Fungal pretreatment of lignocellulosic biomass. **Biotechnology Advances**, v. 30, n. 6, p. 1447–1457, 2012.

WANDERLEY, M. C. DE A. et al. Increase in ethanol production from sugarcane bagasse based on combined pretreatments and fed-batch enzymatic hydrolysis. **Bioresource Technology**, v. 128, p. 448–453, 2013.

WATKINS, D. et al. Extraction and characterization of lignin from different biomass resources. **Integrative Medicine Research**, v. 4, n. 1, p. 26–32, 2014.

ZABED, H. et al. Fuel ethanol production from lignocellulosic biomass: An overview on feedstocks and technological approaches. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 66, p. 751–774, 2016.

ZABED, H. et al. Bioethanol production from renewable sources: Current perspectives and technological progress. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 71, n. October 2015, p. 475–501, 2017.

CAPÍTULO 25: HIDROLIZADOS DE COLÁGENO, SEUS PRODUTOS E SUAS BIOATIVIDADES: UMA MINI-REVISÃO

CHAPTER 25: COLLAGEN HYDROLYSATES, ITS PRODUCTS AND THEIR BIOACTIVITIES: A MINI-REVIEW

Beatriz de Aquino Marques da Costa¹; Ana Lúcia Figueiredo Porto²; Vagne de Melo Oliveira³; Tatiana Souza Porto⁴

Resumo

O colágeno é um dos mais importantes biopolímeros no mercado global de proteínas. O colágeno de origem aquática, ou seus derivados, é empregado por diversos segmentos industriais, com benefícios a saúde humana. Assim, este trabalho objetivou revisar o tópico de hidrolizados a base de colágeno, focando nos derivados e nas bioatividades nutracêuticas de subprodutos aquáticos. Devido às restrições sanitárias e socioculturais das fontes tradicionais (bovinos e suínos, principalmente, além de aves), as de origens aquáticas (peixes teleósteos, peixes cartilagosos e invertebrados marinhos) se tornam uma alternativa viável. O processo de extração do colágeno compreende o uso de soluções salinas, ácidas e/ou enzimáticas. Com a hidrólise parcial do colágeno é possível obter a gelatina (16-150 kDa), a partir de técnicas que associam soluções ácidas e/ou alcalinas à exposição a elevadas temperaturas e atividade enzimática. Biotecnologicamente, a gelatina é empregada como emulsificante, gelificante e espumante, além de usos clínicos e farmacêuticos. Os peptídeos são fragmentos de baixo peso molecular (3-6 kDa) gerados pela hidrólise total do colágeno por um processo que envolve a desnaturação química do colágeno e o emprego de collagenases e proteases collagenolíticas. Peptídeos de colágeno apresentam diversas bioatividades e são utilizados em formulações na indústria biomédica, farmacêutica e nutracêutica.

Palavras-Chave: Hidrólise, Gelatina, Peptídeos Bioativos.

Abstract

Collagen is one of the most important biopolymers in the global protein market. The aquatic collagen, or its derivatives, is used by several industrial segments, with benefits to human health. Thus, this work aimed to review the topic of collagen -based hydrolysates, focusing on derivatives and nutraceutical bioactivities of aquatic by-products. Due to the sanitary and sociocultural restrictions of traditional sources (cattle and pigs, mainly, in addition to birds), those of aquatic origins (teleost fish, cartilaginous fish and marine invertebrates) become a viable alternative. The collagen extraction process includes the use of saline, acidic and / or enzymatic solutions. With partial hydrolysis of collagen, it is possible to obtain gelatin (16-150 kDa), using techniques that combine acidic and / or alkaline solutions to exposure to high temperatures and enzymatic activity. Biotechnologically, gelatin is used as an emulsifier, gelling and foaming agent, in addition to clinical and pharmaceutical uses. Peptides are low molecular weight fragments (3-6 kDa) generated by the total hydrolysis of collagen by a process that involves chemical denaturation of collagen and the use of collagenases and collagenolytic proteases. Collagen peptides have several bioactivities and are used in formulations in the biomedical, pharmaceutical and nutraceutical industry.

Keywords: Hydrolysis, Gelatin, Bioactive Peptides.

¹Mestranda em Biociência Animal, Universidade Federal Rural de Pernambuco, deaquinobeatriz@gmail.com

²Profª Titular, Universidade Federal Rural de Pernambuco, analuporto@yahoo.com.br

³Pós-doutorando, Universidade Federal Rural de Pernambuco, vagne_melo@hotmail.com

⁴Profª Associada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, portots@yahoo.com.br

Introdução

Polímeros são macromoléculas formadas por arranjos de monômeros covalentemente ligados (polimerização). Esses compostos são encontrados na forma natural (produzida por seres vivos, os chamados biopolímeros) e na forma sintética. Cada tipo de polímero possui características diferenciadas, principalmente, os provenientes de organismos vivos, uma vez que a forma de extração pode alterar a estrutura polimérica (OLATUNJI, 2020).

Entre os exemplos de biopolímeros, estão às proteínas (arranjos de aminoácidos, em diferentes níveis de organização, forma e função), além de polissacarídeos e ácidos nucleicos (XU *et al.*, 2020). Biopolímeros aquáticos é um termo designado para polímeros extraídos de organismos aquáticos (dulcícolas e/ou marinhos). Já entre os biopolímeros aquáticos, estão agrupados a quitina (Mohan et al., 2019), celulose (Chen et al., 2016), alginato (Huang et al., 2019), carragena (Zhang et al., 2019), colágeno (Carvalho et al., 2020), além de outros.

O colágeno é uma proteína fibrosa amplamente utilizada no mercado global de produtos proteicos. Eles são aplicáveis na produção de materiais cirúrgicos, na engenharia de tecidos e até mesmo na engenharia civil. Do ambiente aquático, é possível extrair colágeno de peixes teleósteos (marinhos e/ou dulcícolas), peixes cartilaginosos e de invertebrados marinhos (esponjas, anêmonas-do-mar, pepinos-do-mar, principalmente) (FELICIAN *et al.*, 2019). A principal fonte de colágeno desse tipo de ambiente é a partir de resíduos da piscicultura, como através do reuso de ossos, pele, escamas, bexiga natatória e nadadeiras (OLIVEIRA *et al.*, 2017).

De acordo com a Grand ViewSearch (2020), até 2027 o mercado global do colágeno tem a tendência de alcançar a faixa dos \$ 7,5 bilhões, devido ao aumento na demanda por essas moléculas em procedimentos médicos e/ou cosméticos. A publicação destaca ainda a vantagem do colágeno de origem aquática sobre outras fontes, como a bovina e suína, por conta de sua alta taxa de absorção pelo organismo e biodisponibilidade.

O colágeno de origem aquática e seus produtos derivados (gelatina, peptídeos) podem ser empregados nos segmentos biofarmacêutico, cosmético e nutracêutico (Grand ViewSearch, 2020), com numerosos benefícios à saúde humana e animal, como propriedades antihipertensivas (inibidora de ECA), antioxidantes, cicatrizante, antienvelhecimento, entre outras (CHEN et al., 2019; HONG *et al.*, 2019; KUMAR *et al.*, 2019). Assim, este trabalho objetivou realizar uma mini-revisão sobre o hidrolisado a base de colágeno, focando em suas fontes aquáticas e suas principais bioatividades.

Desenvolvimento

Para o desenvolvimento desta mini-revisão, foram realizadas buscas a partir de bancos de dados científicos eletrônicos, como ScienceDirect (<https://www.sciencedirect.com/>), Elsevier (<https://www.elsevier.com/>), Scopus (<https://www.scopus.com/>), PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>), Wiley Online Library (<https://onlinelibrary.wiley.com/>) e o Google Scholar (<https://scholar.google.com.br/>), utilizando como palavras-chave: colágeno, fontes de colágeno, colágeno aquático, colágeno propriedades, colágeno extração, colágeno hidrólise, gelatina, gelatina aplicações, gelatina propriedades, colágenos peptídeos, peptídeos bioativos de colágeno, peptídeos de colágeno aplicações, assim como seus correspondentes em língua inglesa. Realizou-se a leitura dos títulos e resumos para seleção dos artigos, livros, capítulos de livro, notas científicas, entre outros, excluindo os que não estavam dentro da proposta ou mesmo que não continham informações relevantes para nossa investigação. Foram incluídas publicações em inglês e português que atenderam aos critérios de busca. Dessa forma, na presente revisão será abordada uma visão geral sobre o colágeno e seus derivados, assim como sua obtenção, importância e aplicação.

Colágeno: visão geral

O colágeno é considerado um dos biopolímeros mais abundantes nos seres vivos, constituindo aproximadamente entre 25-35% do total do conteúdo proteico do organismo de vertebrados, sendo encontrado principalmente na pele e cartilagens. Em animais, o colágeno compõe ossos, tendões, pele, cartilagens, vasos sanguíneos e matriz extracelular, onde desempenha um papel estrutural de sustentação tecidual e proteção mecânica, assim como algumas funções mais sofisticadas, como armazenamento e liberação de fatores de crescimento. Até o presente momento, estão identificados 29 subtipos distintos da família das moléculas colagenosas, designados de I até XXIX, baseado na estrutura, função, propriedades e distribuição no corpo. Dentre estes, o COL-I é o mais abundante (90% do total de colágeno corporal), seguido de outros comumente encontrados como os tipos COL-II, COL-III e COLIV (OLATUNJI, 2020; LIM *et al.*, 2019).

Os integrantes da família das moléculas colagenosas apresentam estruturas moleculares característica de tripla hélice (Figura 1), composta por três cadeias α polipeptídicas que se posicionam em torno de um eixo central. Essa conformação se dá pela repetição de domínios glicina (GLY) – “X” – “Y”, onde “X” e “Y” são prolina e hidroxiprolina (ADAMIAK; SIONKOWSKA, 2020). O alto conteúdo de glicina confere a essas moléculas sua rigidez e estabilidade características, devido às pontes de hidrogênio que esse aminoácido é capaz de

produzir entre os grupamentos amina ($-N - H_2$) e o grupo carbonila ($-CO-$) de cadeias adjacentes (LEÓN-LÓPEZ *et al.*, 2019).

Figura 1. Estrutura do colágeno nativo. Arranjo em forma de tripla hélice.

Fonte: SMART – Servier Medical Art (2020).

As fontes de colágeno mais comumente utilizadas são mamíferos (bovinos e suínos), de onde são aproveitados ossos, pele e tendões, que apresentam boa biocompatibilidade e estão amplamente disponíveis para exploração. No entanto, o uso de tais fontes encontra limitações, como a ascensão da preocupação com zoonoses que atingem especificamente esses animais (encefalopatia espongiforme bovina, encefalomielite e febre aftosa, por exemplo), a ocorrência de processos alérgicos e a restrição que algumas comunidades religiosas possuem acerca do consumo de produtos derivados de fontes suínas e bovinas (YORGANCIOGLU *et al.*, 2020).

Desta forma, fontes de colágeno de origem aquática são estudadas como uma forma de substituir fontes animais terrestres. Organismos aquáticos como vertebrados marinhos (mamíferos, peixes teleósteos e cartilagosos), esponjas, estrelas-do-mar, anêmonas-do-mar, águas-vivas e alguns crustáceos podem ser utilizados como alternativa dessa matéria-prima (Figura 2). A utilização desses seres representa vantagens quando comparada ao uso de mamíferos terrestres como: o processo de extração facilitado; o risco de transmissão das patologias que atingem especificamente os mamíferos é erradicado; essas fontes estão disponíveis em abundância (LIM *et al.*, 2019).

Figura 2. Fontes de Colágeno. Setas em vermelho indicam as fontes que apresentam desvantagens e em verde as fontes vantajosas.

Fonte: Própria com imagens de SMART – Servier Medical Art (2020).

O processo de obtenção do colágeno passa por procedimentos de preparação (prétratamento), extração e recuperação e pode variar de acordo com a fonte, já que há variações no conteúdo, assim como ocorrem variações de acordo com a parte do animal utilizada (OLATUNJI, 2020). Inicialmente, é feita a limpeza e separação das amostras, seguido de um tratamento químico para desproteinização, desmineralização e desengorduramento (AHMED et al., 2020).

O processo de hidrólise pode ser desempenhado com a utilização de metodologias que envolvem o emprego de soluções ácidas (GIRALDO-RIOS; RIOSZAPATA-MONTOYA, 2020), alcalinas, exposição a temperaturas elevadas (LIU et al., 2015) e atividade enzimática (IDEIA et al., 2019), como descrito com mais detalhes para a obtenção de gelatina e peptídeos nos tópicos a seguir.

No método ácido-solúvel (ASC), geralmente são utilizadas solução ácidas para clivar ligações não-covalentes a fim de tornar o colágeno mais solúvel e remover moléculas não-colagenosas sem danos a sua estrutura. Os ácidos mais comuns utilizados nas soluções são o ácido acético, ácido láctico, ácido cítrico e ácido clorídrico (HCL) (LIM et al., 2019).

O tratamento enzimático é uma alternativa, porém, é usualmente realizada em associação ao tratamento químico. Nessa metodologia (método pepsina-solúvel (PSC), enzimas proteolíticas, frequentemente a pepsina, são utilizadas para aumentar a solubilidade das moléculas colagenosas através da quebra de algumas ligações peptídicas de forma específica, o que

também contribui para uma menor geração de resíduos e aumento do rendimento ao final do processo da extração (IDEIA *et al.*, 2019; BLANCO *et al.*, 2017).

Colágeno hidrolisado e produtos derivados

A hidrólise de uma molécula com alta massa molecular como o colágeno, leva a geração de fragmentos de menor peso molecular, conhecidos como peptídeos. Esses produtos gerados apresentam propriedades e utilidades variáveis, diferentes daquelas observadas nas moléculas nativas, assim, ao longo dos anos foram investigados hidrolisados de diferentes fontes como leveduras (MARSON *et al.*, 2020), leite (AL-SHAMSI *et al.*, 2018), resíduos lignocelulósicos (LI; QIWAN, 2020), carne suína (LI *et al.*, 2020), carne de aves (WANG & SHAHIDI, 2018) e resíduos pesqueiros (DE *et al.*, 2020; KRASNOVA; SEMENOV; ZARUBIN, 2020), sendo os últimos fontes promissoras de colágeno.

A hidrólise do colágeno desintegra suas pontes de hidrogênio, o que resulta na conversão de sua estrutura nativa (tripla-hélice) em estruturas espirais “aleatórias”. Esse produto pode ser fracionado ainda mais para obtenção de uma variedade de subunidades menores (Figura 3), com propriedades modificadas (menor viscosidade, baixo Ponto Isoelétrico, aumento da biodisponibilidade) (LEÓN-LÓPEZ *et al.*, 2019; CHEN *et al.*, 2014).

Figura 3. Esquema simplificado da degradação do colágeno (etapas de degradação e hidrólise).

Fonte: Própria com imagens de SMART – Servier Medical Art (2020).

A hidrólise do colágeno (uma proteína fibrosa) é mais difícil de ser realizada quando comparada a proteínas globulares, o que leva a uma baixa taxa de hidrólise. Essa característica torna o colágeno vantajoso para aplicações comerciais (ARAUJO *et al.*, 2020). Os principais

produtos dessa hidrólise são: a gelatina e os peptídeos com funções biológicas diversificadas de acordo com a fonte de colágeno (HALIM *et al.*, 2016).

Gelatina

A gelatina é um produto derivado da sua hidrólise parcial do colágeno (16-150 kDa). Dessa forma, por se tratar de um extrato natural, é de interesse dos ramos biomédico e nutracêuticos, como na formulação de biofilmes, medicamentos cicatrizantes e na produção de peptídeos, respectivamente (CAO *et al.*, 2020; MICHELINI *et al.*, 2020).

Apesar de ser um produto derivado, a gelatina não possui as mesmas propriedades do colágeno nativo, comumente são encontrados em sua composição outras proteínas, gorduras, sais e umidade. No entanto, vale destacar que, assim, como outros derivados de colágeno, as propriedades da gelatina são altamente influenciadas pelo material-fonte, assim como das técnicas de extração utilizadas para sua obtenção (KARAYANNAKIDIS; ZOTOS, 2014). Durante o processo de extração da gelatina, o material-fonte é submetido a prétratamento com soluções ácidas ou alcalinas a fim de aumentar a eficiência na extração (Figura 4). Durante o processo ácido, é gerada a gelatina tipo A (ponto isoelétrico (pI) 6-9), com a utilização de solução ácida (solução de ácido acético) (GIRALDO-RIOS; RIOSZAPATAMONTOYA, 2020); a técnica alcalina compreende a extração em meio alcalino (solução de NaOH) (LIU *et al.*, 2015), gerando a gelatina tipo B (pI em pH 5). Após o tratamento com a solução adequada, a amostra passa então por extração sob temperaturas elevadas (faixa de 70°C-90°C) (AL-HASSAN, 2020; ABEDINIA, 2017).

Figura 4. Tratamento do material-fonte rico em colágeno para a produção da gelatina.

Fonte: Própria com imagens de SMART – Servier Medical Art (2020).

A hidrólise química (meio ácido ou alcalino) pode ainda ser seguida pela adição de enzimas ao processo. Nessa etapa, proteases collagenolíticas são empregadas para clivar ainda mais a estrutura do colágeno previamente desarranjada pelas técnicas anteriores. Assim, como também visto nos protocolos de extração do colágeno, a amostra passa ainda por centrifugação, precipitação e diálise para obtenção do produto purificado (IDEIA et al., 2019).

A gelatina possui algumas características, como propriedade emulsificante, capacidade espumante, capacidade de retenção de água e ligação de gorduras e força de gel que devem ser consideradas quanto a sua aplicação, como demonstrado no Quadro 1.

Quadro1. Características da gelatina com influência direta sobre sua aplicabilidade.

Características	Informações adicionais
Força de gel	Influencia a capacidade de gelificação; varia entre 100-300 Bloom.
Propriedade emulsificante	Influenciada pela solubilização da proteína; comparável a emulsificantes comerciais.
Capacidade espumante	A densidade e estabilidade da espuma formada aumentam proporcionalmente a concentração de proteínas.
Capacidade de retenção de água e ligação com gorduras	Diretamente relacionada a textura da gelatina através de interações com água, óleos e outros constituintes da gelatina.

Fonte: CAO et al. (2020); BALTI et al. (2011).

A gelatina encontra aplicabilidade na indústria alimentícia, na forma de gelificantes, emulsificantes e agentes espumantes, melhorando a elasticidade e viscosidade dos produtos; pode ser empregada também em outros segmentos, como na produção de filmes comestíveis e no processo de encapsulamento, técnica de interesse para produção de biomateriais e produtos biofarmacêuticos. Além disso, é de grande interesse na utilização para obtenção de peptídeos com funções biológicas variáveis de acordo com a fonte da matéria-prima (NURILMALA et al., 2020; KARAYANNAKIDIS; ZOTOS, 2014).

Peptídeos Bioativos

Peptídeos são fragmentos de baixa massa molecular obtidos a partir da clivagem de uma proteína, e são dotados de características não observadas na molécula nativa, como maior biodisponibilidade e absorção pelo organismo, o que propicia suas variadas atividades biológicas (ZAMORANO-APODACA et al., 2020; CHUN et al., 2017).

Os peptídeos são fisiologicamente importantes para o organismo, desempenhando funções fisiológicas importantes, como: Insulina (hormônio liberado pelo pâncreas, responsável pela redução da glicemia sanguínea) (QASEM et al., 2019); Ocitocina (neurotransmissor secretado pela hipófise, essencial durante o parto e lactação) (SUZUKI, 2018); Peptídeo Natriurético Atrial (produzido pelo tecido cardíaco, atuando na manutenção da homeostase do tecido cardiovascular) (MAISEL et al., 2018); e Gastrina (associada ao estímulo da liberação do ácido gástrico pelo estômago e ao comportamento alimentar) (BOHLER et al., 2019).

Para a produção de peptídeos de uma molécula colagenosa nativa é necessária a prévia desnaturação de sua estrutura, que não é facilmente degradada por qualquer enzima. Por isso, para a sua produção se faz necessário o tratamento químico prévio do colágeno nativo ou a utilização da gelatina como matéria-prima. A partir do colágeno desnaturado são empregadas collagenases (metaloproteinases), enzimas capazes de clivar a tripla hélice do colágeno de forma específica (OLIVEIRA et al., 2017). Assim, as cadeias polipeptídicas geradas se tornam susceptíveis a ação de outras enzimas, as proteases com propriedades colagenolíticas, como papaína, tripsina e quimiotripsina, que, por sua vez, auxiliam na clivagem das estruturas em fragmentos ainda menores (Figura 5) (OLATUNJI, 2020).

Figura 5. Degradação do colágeno nativo e digestão enzimática que resulta na formação de peptídeos

Fonte: Própria com imagens de SMART – Servier Medical Art (2020).

Os peptídeos gerados têm massa molecular que pode variar entre 3-6 kDa, dependendo das proteases colagenolíticas empregada no processo, visto que as ligações-alvo de diferentes enzimas variam e, conseqüentemente, a sua massa molecular. Há uma grande variedade de propriedades alcançáveis a partir da hidrólise do colágeno, como diferentes solubilidades, ações no organismo e condições ótimas de atividade (LEÓN-LÓPEZ et al., 2019).

Os peptídeos de colágeno são conhecidos por suas variadas funções biológicas, como com potencial antioxidante (WU et al., 2018), anti-hipertensivo (inibidor de enzima conversora de angiotensina (ECA)) (FU et al., 2016), antitumoral (KISLING; LUST; KATWA, 2019), cicatrizante (YAMANAKA; OKADA; SANADA, 2017), antienvhecimento (ZHANG et al., 2020); formação e manutenção óssea (ZHU et al., 2020), podendo ser empregados pelas indústrias farmacêuticas e cosméticas como na produção de hidratantes e medicamentos cicatrizantes, assim como na indústria alimentícia na produção de alimentos e bebidas funcionais, suplementos alimentares, fortificantes, entre outros, beneficiando a saúde tanto humana quanto animal (Figura 6) (LI et al., 2020; FELICIAN et al., 2019; KUMAR et al., 2019).

Figura 6. Aplicações dos peptídeos bioativos de colágeno nas diversas indústrias.

Fonte: LI et al. (2020); FELICIAN et al. (2019); KUMAR et al. (2019).

Considerações finais

O colágeno tem sido considerado um dos biopolímeros mais valiosos comercialmente, muito devido a sua biocompatibilidade com o tecido humano. Os produtos derivados de sua hidrólise têm despertado atenção do mercado industrial por suas múltiplas e valiosas oportunidades de aplicação, servindo de matéria-prima biomédica, farmacêutica, nutracêutica e cosmética. Dos produtos em ascensão, a gelatina tem dominado o mercado e fontes alternativas que permitam o barateamento do processo são altamente desejáveis. Igualmente importante, os peptídeos gerados durante a produção da gelatina têm sido objeto de investigações devido suas bioatividades (antioxidantes, antimicrobianos, anti-hipertensiva, antitrombótico, antitumoral, cardioprotetor, antienvhecimento, entre outros). Colágeno, gelatina e peptídeos podem ser produtos derivados da mesma fonte e suas características

físicoquímicas e estruturais vão se alterar de acordo com o tipo de produto desejado pela indústria. Nesta revisão, demos atenção às fontes aquáticas devidas suas propriedades similares ao colágeno de mamíferos, tornando-se uma alternativa viável e ecologicamente correta de fornecimento de colágeno, gelatina e/ou de peptídeos para o mercado global de proteínas.

Referências

- ABEDINIA, A. et al. Extraction and characterization of gelatin from the feet of Pekin duck (*Anas platyrhynchos domestica*) as affected by acid, alkaline, and enzyme pretreatment. **International Journal of Biological Macromolecules**, v. 98, p. 586-594, 2017.
- ADAMIAK, K.; SIONKOWSKA, A. Current methods of collagen cross-linking: Review. **International Journal of Biological Macromolecules**, v. 161, p. 550-560, 2020.
- AL-HASSAN, A. Gelatin from camel skins: Extraction and characterizations. **Food Hydrocolloids**, v. 101, n. 105457, 2020.
- AL-SHAMSI, K. et al. Camel milk protein hydrolysates with improved technofunctional properties and enhanced antioxidant potential in in vitro and in food model systems. **Journal of Dairy Science**, v. 101, n. 1, p. 47-60, 2018.
- AHMED, M. et al. Extraction and characterization of gelatin from camel skin (potential halal gelatin) and production of gelatin nanoparticles. **Saudi Journal of Biological Sciences**, v. 27, n. 6, p. 1596-1601, 2020.
- ARAUJO, J. et al. Enzymatic Hydrolysis of Fish Waste as an Alternative to Produce High Value-Added Products. **Waste and Biomass Valorization**, 2020. Disponível em: <<https://link.springer.com/article/10.1007/s12649-020-01029-x#article-info>>. Acesso em: 16 jun. 2020.
- BALTI, R. et al. Extraction and functional properties of gelatin from the skin of cuttlefish (*Sepia officinalis*) using smooth hound crude acid protease-aided process. **Food Hydrocolloids**, v. 25, n. 5, p. 943-950, 2011.
- BLANCO, M. et al. Hydrolysates of Fish Skin Collagen: An Opportunity for Valorizing Fish Industry Byproducts. **Marine Drugs**, v. 15, n. 5, Artigo 131, 2017.
- BOHLER, M. et al. Gastrin releasing peptide-induced satiety is associated with hypothalamic and brainstem changes in chicks. **Neuroscience Letters**, v. 713, Artigo 134529, 2019.
- CAO, S. et al. Structure and physical properties of gelatin from bovine bone collagen influenced by acid pretreatment and pepsin. **Food and Bioproducts Processing**, v. 121, p. 213-223, 2020.
- CARVALHO, D. et al. Marine collagen-chitosan-fucoidan cryogels as cell-laden biocomposites envisaging tissue engineering. **Biomedical Materials**, 2020. Disponível em: <<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-605X/ab9f04>>. Acesso em: 30 jul. 2020.

Collagen Market Size Worth \$7.5 Billion By 2027 | CAGR 6.4%. Disponível em: <<https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-collagen-market>>. Acesso em: 16 jun. 2020.

CHEN, L. et al. Effects of pressure on gelatinization of collagen and properties of extracted gelatins. **Food Hydrocolloids**, v. 36, p. 316-322, 2014.

CHEN, Y. et al. Physicochemical, antioxidant properties of giant croaker (*Nibea japonica*) swim bladders collagen and wound healing evaluation. **International Journal of Biological Macromolecules**, v. 138, p. 483-491, 2019.

CHEN, Y. et al. Production of new cellulose nanomaterial from red algae marine biomass *Gelidium elegans*. **Carbohydrate Polymers**, v. 151, p. 1210-1219, 2016.

CHUN, J.; MIN, S.; JO, Y. Production of low molecular collagen peptides-loaded liposomes using different charged lipids. **Chemistry and Physics of Lipids**, v. 209, p. 1-8, 2017.

DE, D. et al. Effect of fish waste hydrolysate on growth, survival, health of *Penaeus vannamei* and plankton diversity in culture systems. **Aquaculture**, v. 524, Artigo 735240, 2020.

FELICIAN, F. et al. The wound healing potential of collagen peptides derived from the jellyfish *Rhopilema esculentum*. **Chinese Journal of Traumatology**, v. 22, n. 1, p. 12-20, 2019.

FU, Y. et al. Angiotensin I-converting enzyme-inhibitory peptides from bovine collagen: insights into inhibitory mechanism and transepithelial transport. *Food Research International*, v. 89, p. 373-381, 2016.

GEORGE, A. et al. A comprehensive review on chemical properties and applications of biopolymers and their composites. **International Journal of Biological Macromolecules**, v. 154, p. 329-338, 2020.

GIRALDO-RIOS, D.; RIOS, L.; ZAPATA-MONTOYA, J. Kinetic modeling of the alkaline deproteinization of Nile-tilapia skin for the production of collagen. *Heliyon*, v. 6, n. 5, Artigo 03854, 2020.

HALIM, N.; YUSOF, H.; SARBON, N. Functional and bioactive properties of fish protein hydrolysates and peptides: A comprehensive review. *Trends in Food Science & Technology*, v. 51, p. 24-33, 2016.

HONG, H. et al. Preparation of low-molecular-weight, collagen hydrolysates (peptides): Current progress, challenges, and future perspectives. **Food Chemistry**, v. 301, Artigo 125222, 2019.

HUANG, G. et al. Characterization of a bifunctional alginate lyase as a new member of the polysaccharide lyase family 17 from a marine strain BP-2. **Biotechnology Letters**, v. 41, n. 10, p. 1187-1200, 2019.

IDEIA, P. et al. Fish Processing Industry Residues: A Review of Valuable Products Extraction and Characterization Methods. **Waste and Biomass Valorization**, v. 11, n. 7, p. 3223-3246, 2019.

KARAYANNAKIDIS, P.; ZOTOS, A. Fish Processing By-Products as a Potential Source of Gelatin: A Review. **Journal of Aquatic Food Product Technology**, v. 25, n. 1, p. 65-92, 2014.

KISLING, A.; LUST, R.; KATWA, L. What is the role of peptide fragments of collagen I and IV in health and disease?. **Life Sciences**, v. 228, p. 30-34, 2019.

KRASNOVA, I.; SEMENOV, G.; ZARUBIN, N. Modern technologies for using fish wastes in the production of collagen hydrolysates and functional beverages. **IOP Conference Series: Earth and Environmental Science**, v. 421, Artigo 062030, 2020.

KUMAR, A. et al. Marine collagen peptide as a fortificant for biscuit: Effects on biscuit attributes. **LWT- Food Science and Technology**, v. 109, p. 450-456, 2019.

LEÓN-LÓPEZ, A. et al. Hydrolyzed Collagen—Sources and Applications. **Molecules**, v. 24, n. 22, p. 4031, 2019.

LI, P. et al. Extraction and characterization of collagen from sea cucumber (*Holothuriacinerascens*) and its potential application in moisturizing cosmetics. **Aquaculture**, v. 515, p. 734590, 2020.

LI, Q. et al. Plastein from hydrolysates of porcine hemoglobin and meat using Alcalase and papain. **Food Chemistry**, v. 320, p. 126-654, 2020.

LI, Y.; QI, B.; WAN, Y. Separation of monosaccharides from pretreatment inhibitors by nanofiltration in lignocellulosic hydrolysate: Fouling mitigation by activated carbon adsorption. **Biomass and Bioenergy**, v. 136, Artigo 105527, 2020.

LIM, Y. et al. Marine Collagen as A Promising Biomaterial for Biomedical Applications. **Marine Drugs**, v. 17, n. 8, p. 467, 2019.

LIU, D. et al. Effects of alkaline pretreatments and acid extraction conditions on the acidsoluble collagen from grass carp (*Ctenopharyngodon idella*) skin. **Food Chemistry**, v. 172, p. 836-843, 2015.

MAISEL, A.; DURAN, J.; WETTERSTEN, N. Natriuretic Peptides in Heart Failure. **Heart Failure Clinics**, v. 14, n. 1, p. 13-25, 2018.

MARSON, G. et al. Proteolytic enzymes positively modulated the physicochemical and antioxidant properties of spent yeast protein hydrolysates. **Process Biochemistry**, v. 91, p. 3445, 2020.

MICHELINI, L. et al. Characterization of gelatin hydrogels derived from different animal sources. **Materials Letters**, v. 272, Artigo 127865, 2020.

MOHAN, K. et al. Extraction and characterization of chitin from sea snail *Conus inscriptus* (Reeve, 1843). **International Journal of Biological Macromolecules**, v. 126, p. 555-560, 2019.

NURILMALA, M. et al. Characterization and Antioxidant Activity of Collagen, Gelatin, and the Derived Peptides from Yellowfin Tuna (*Thunnus albacares*) Skin. **Marine Drugs**, v. 18, n. 2, p. 98, 2020.

OLATUNJI, O. Aquatic Biopolymers: Understanding their Industrial Significance and Environmental Implications. 1. ed. [s.l.] Springer International Publishing, 2020.

OLIVEIRA, V. et al. Colágeno: características gerais e produção de peptídeos bioativos - uma revisão com ênfase nos subprodutos do pescado. **Acta off Fisheries and Aquatic Resources**, v. 5, n. 2, p. 56-68, 2017.

QASEM, R. et al. Identification of recombinant human insulin and biosynthetic insulin analogues by multiplexed targeted unlabeled mass spectrometry of proteotypic tryptic peptides. **Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis**, v. 172, p. 357-363, 2019.

SADASIVUNI, K. et al. Recent advances in mechanical properties of biopolymer composites: a review. **Polymer Composites**, v. 41, n. 1, p. 32-59, 2019.

SUZUKI, Y. Development of a fluorescent peptide for the highly sensitive and selective detection of oxytocin. **Sensors and Actuators B: Chemical**, v. 254, p. 321-328, 2018.

WANG, D.; SHAHIDI, F. Protein hydrolysate from turkey meat and optimization of its antioxidant potential by response surface methodology. **Poultry Science**, v. 97, n. 5, p. 1824-1831, 2018.

WU, R. et al. Antioxidant and anti-freezing peptides from salmon collagen hydrolysate prepared by bacterial extracellular protease. **Food Chemistry**, v. 248, p. 346-352, 2018.

XU, E. et al. Advances in conversion of natural biopolymers: A reactive extrusion (REX)-enzyme-combined strategy for starch/protein-based food processing. **Trends in Food Science & Technology**, v. 99, p. 167-180, 2020.

YAMANAKA, H.; OKADA, S.; SANADA, H. A multicenter, randomized, controlled study of the use of nutritional supplements containing collagen peptides to facilitate the healing of pressure ulcers. **Journal of Nutrition & Intermediary Metabolism**, v. 8, p. 51-59, 2017.

YORGANCIOGLU, A.; BAŞARAN, B.; SANCAKLI, A. Value Addition to Leather Industry Wastes and By-Products: Hydrolyzed Collagen and Collagen Peptides. Textile Industry and Waste, 2020. Disponível em: <<https://www.intechopen.com/online-first/value-addition-to-leather-industry-wastes-and-by-products-hydrolyzed-collagen-and-collagen-peptides>>. Acesso em: 25 jun. 2020.

ZAMORANO-APODACA, J. et al. Biological and functional properties of peptide fractions obtained from collagen hydrolysate derived from mixed by-products of different fish species. **Food Chemistry**, v. 331, Artigo 127350, 2020.

ZHANG, Y. et al. Biomaterials Based on Marine Resources for 3D Bioprinting Applications. **Marine Drugs**, v. 17, n. 10, p. 555, 2019.

ZHANG, Z. et al. The effects and mechanism of collagen peptide and elastin peptide on skin aging induced by D-galactose combined with ultraviolet radiation. **Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology**, v. 210, Artigo 111964, 2020.

COSTA, B. A. M. et al.

ZHU, L. et al. Porcine bone collagen peptides promote osteoblast proliferation and differentiation by activating the PI3K/Akt signaling pathway. **Journal of Functional Foods**, v. 64, p. 103697, 2020.

CAPÍTULO 26: MINI-REVISÃO FOCADA NAS APLICAÇÕES BIOTECNOLÓGICAS DA QUITOSANA: EMBALAGENS, ALIMENTOS & BEBIDAS

CHAPTER 26: MINI-REVIEW FOCUSED ON THE BIOTECHNOLOGICAL APPLICATIONS OF CHITOSAN: PACKAGING, FOOD & BEVERAGE

Vagne de Melo Oliveira¹; Márcia Nieves Carneiro da Cunha²; Juanize Matias da Silva Batista³,
Beatriz de Aquino Marques da Costa⁴ e Ana Lúcia Figueiredo Porto⁵

Resumo

A quitosana é um polissacarídeo obtido da quitina e que tem sido utilizado em processos ambientais, agrícolas, terapêuticos e industriais. Dentre estes, a indústria alimentícia parece ser a que melhor explora essa matéria-prima, visando à fabricação de embalagens, preparação de alimentos, ou mesmo como aditivos em bebidas. Assim, este trabalho objetivou revisar brevemente sobre as aplicações biotecnológicas da quitosana na indústria alimentícia. Para tanto, foram utilizadas buscas em bases científicas para a realização do levantamento bibliográfico (ScienceDirect, Elsevier, Scopus, Springer, TandFonline, PubMed, Wiley Online Library e Google Scholar). Foi identificado grande volume de publicações, sinalizando a importância do tema para a área industrial, sendo diagnosticadas a partir das publicações disponíveis que o uso da quitosana está diretamente relacionado às suas propriedades (biodegradabilidade, biocompatibilidade, atoxicidade) e que deficiências ocasionais podem ser supridas associando este polímero a outros compostos naturais. O volume científico trata de aplicações em processos de águas residuais, clarificação e aditivos de bebidas, aumento do tempo de prateleira dos alimentos, proteção contra microrganismos deteriorantes e formação de filmes biodegradáveis para revestimento de frutas e vegetais. Por fim, as fontes aquáticas têm recebido especial atenção pela sua abundância e facilidade de extração, além de apresentar funções biológicas que são desejadas pela indústria nutracêutica.

Palavras-Chave: alimentos, bebidas, embalagens, nutracêuticos.

Abstract

Chitosan is a polysaccharide obtained from chitin and it has been used in environmental, agricultural, therapeutic, and industrial processes. Among these, the food industry seems to be the one that exploits this raw material the best, aiming at package manufacturing, food preparation, or even as beverage additives. Thus, this work aimed to briefly review the biotechnological applications of chitosan in the food industry. For that, searches in scientific bases were used to carry out the bibliographic survey (ScienceDirect, Elsevier, Scopus, Springer, TandFonline, PubMed, Wiley Online Library and Google Scholar). A large volume of publications was identified, signaling the importance of the topic for the industrial area, from the available publications, it was detected that the use of chitosan is directly related to its properties (biodegradability, biocompatibility, atoxicity) and that occasional deficiencies can be addressed by associating this polymer to other natural compounds. The scientific volume deals with applications in waste water processes, clarification and beverage additives, increased shelf life of food, protection against deteriorating microorganisms and formation of

¹Doutor, Universidade Federal Rural de Pernambuco, vagne_melo@hotmail.com

²Doutora, Universidade Federal Rural de Pernambuco, marcianieves@yahoo.com.br

³Doutora, Universidade Federal Rural de Pernambuco, juanizematias@yahoo.com.br

⁴Mestranda em Biociência Animal, Universidade Federal Rural de Pernambuco, deaquinobeatriz@gmail.com

⁵Professora Titular, Universidade Federal Rural de Pernambuco, analuporto@yahoo.com.br

biodegradable films for coating fruits and vegetables. Finally, aquatic sources have received special attention for their abundance and ease of extraction, in addition to presenting biological functions that are desired by the nutraceutical industry.

Keywords: food, beverages, packaging, nutraceuticals.

Introdução

Polímeros são compostos formados por monômeros unidos, covalentemente, numa reação de polimerização (OLATUNJI, 2020). Os biopolímeros são polímeros produzidos por organismos vivos, enquanto que biopolímero aquático é um termo que faz referência aos polímeros provenientes de ambiente dulcícola e/ou marinho (OLIVEIRA et al., 2021). Biopolímeros aquáticos são de extremo interesse industrial e médico devido as suas propriedades bioativas e de capacidade para formação de biomateriais, destacando-se o colágeno, alginato, pectina, celulose, agarose, ágar, carragenina, gelatina, dextrana, xantana, quitina, além de outros polímeros, que têm recebido especial atenção nos últimos anos devido à sua abundância, biodisponibilidade, alta versatilidade, baixa toxicidade, boa biocompatibilidade, biodegradabilidade, flexibilidade, entre outros, oferecendo aplicações multifuncionais para no âmbito industrial (EL KNIDRI et al., 2018; HU et al., 2018; MARTÃO; MIHAI; VODNAR, 2019; SHARIATINIA et al., 2019; OLIVEIRA et al., 2021).

A crescente atenção para a utilização, ou mesmo reutilização, dos biopolímeros aquáticos está ligada principalmente as questões ambientais, uma vez que muitos desses polímeros são descartados (AHMED et al., 2018). A quitina é um dos biopolímeros mais abundantes na natureza (EL KNIDRI et al., 2018), podendo ser obtido a partir de insetos, fungos (MUANPRASAT; CHATSUDTHIPONG, 2017; VERLEE; MINCKE; STEVENS, 2017), moluscos e exoesqueletos de crustáceos, sendo esta o principal recurso para obtenção desse polímero, principalmente através da carapaça dos crustáceos (MANIGANDAN et al., 2018). Esse biopolímero pode ser extraído de organismos aquáticos por método químico e biológico. O primeiro é o mais utilizado devido à rapidez do processo de extração, porém é oneroso e considerado ambientalmente prejudicial, enquanto o segundo método é o menos utilizado, mas tem se destacado pelo alto rendimento obtido nas extrações, principalmente quando a fonte é aquática, como camarões (PRIYADARSHI; RHIM, 2020).

A quitina extraída pelo método químico ou biológico é convertida em quitosana, um derivado polissacarídeo policatiônico natural (PAUL; KOLESINSKA; SUJKA, 2019), considerado um copolímero linear de 2-acetamido-2-desoxi-D-glicopiranosose e 2-amino-2-desoxi-D-glicopiranosose ligada a β -(1 $\rightarrow$ 4) (AHMED et al., 2018; SHARIATINIA, 2019), através do processo bioquímico de desacetilação, envolvendo a remoção de grupos acetil

(COCH₃) da estrutura da quitina. Esta N-desacetilação nunca é completa e, portanto, são obtidos quitosana com diferentes graus de desacetilação. A desacetilação da quitina pode ser realizada através de dois métodos: alcalino e enzimático (PRIYADARSHI; RHIM, 2020), consumindo tempo, energia e reagentes (EL KNIDRI et al., 2018). O grupo amina primário da quitosana é responsável por suas propriedades, como a natureza catiônica, entrega controlada de medicamentos e compostos ativos, muco-adesão, antimicrobiana, antioxidante, antifúngica, aprimoramento da permeação, entre outros (ELSABEE; ABDOL, 2013; ALI; AHMED, 2018; PRIYADARSHI; RHIM, 2020). Além disso, a quitosana possui vários grupos funcionais OH e NH₂ que permitem sua ligação às proteínas e íons metálicos (SHARIATINIA, 2019).

Biopolímeros de quitosana têm sido amplamente utilizados em ambientes alimentícios, biomédicos, cosméticos, farmacêuticos e nutracêuticos devido à sua origem natural e inúmeras propriedades funcionais (PATRULEA et al., 2015; MUXIKA et al., 2017; AHSAN et al., 2018; EL KNIDRI et al., 2018; BARANWAL et al., 2018; KRAVANJA et al., 2019; MU et al., 2019; SHARIATINIA et al., 2019; WANG et al., 2020). Dentro dos diferentes segmentos comerciais, a indústria de alimentos tem cada vez mais incentivado prospecções para uso de biopolímeros de quitosana na preparação de microesferas visando o encapsulamento de bioativos para fins nutracêuticos (AKBARI-ALAVIJEH; SHADDEL, R.; JAFARI, 2020), ou mesmo atuar como agente estabilizante e espessante, e até para servir de matéria-prima para confecção de embalagens para proteção e prolongamento da vida útil de prateleira de frutas e vegetais, algumas das quais até podendo ser comestíveis (MARTÃO; MIHAI; VODNAR, 2019). Diante deste cenário, este trabalho objetivou realizar uma breve revisão sobre as principais aplicações biotecnológicas dos biopolímeros de quitosana na indústria alimentícia, focando, primordialmente, nos segmentos de consumo alimentícios, bebidas e de embalagens.

Desenvolvimento

Esta mini-revisão foi desenvolvida a partir de levantamento bibliográfico, fazendo uso de plataformas eletrônicas científicas, como: ScienceDirect (<https://www.sciencedirect.com/>), Elsevier (<https://www.elsevier.com/>), Tandfonline (<https://www.tandfonline.com/>), Scopus (<https://www.scopus.com/>), Google Scholar (<https://scholar.google.com.br/>), Springer (<https://www.springer.com/>), PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>) e Wiley Online Library (<https://onlinelibrary.wiley.com/>), utilizando como descritores as palavras-chave: quitosana, quitosana em alimentos, quitosana em bebidas, quitosana em embalagens,

quitosana e aplicações. Realizou-se a leitura dos títulos e resumos para seleção dos artigos, livros, capítulos de livro, notas científicas, entre outros, excluindo os que não estavam dentro do escopo da proposta ou mesmo que não detinham informações relevantes para nossa investigação. Foram incluídas publicações em inglês e português que atenderam aos critérios de busca.

Visão geral

A indústria de Aquicultura é um dos ramos comerciais que estão em evidência pelo crescimento e participação na economia global. Como um subproduto principal da indústria de pescado e frutos do mar, uma grande quantidade de resíduos de carapaças de crustáceos é gerada a cada ano, atrelada a esse crescimento, com potencial para ser usada para produzir quitina de valor agregado e esta ser convertida em quitosana através da desacetilação. Sendo extraído de um resíduo orgânico usando muitos métodos de eficiência energética, a obtenção da quitosana se torna menos onerosa quando comparada a obtenção de polímeros sintéticos (PRIYADARSHI; RHIM, 2020). Moléculas de quitosana apresentam uma ampla gama de propriedades úteis, incluindo atividades antimicrobianas e antiinflamatórias. A produção química de oligômeros de quitosana parcialmente acetilados é prejudicial ao meio ambiente e é difícil controlar o grau de polimerização e acetilação. Esses problemas podem ser resolvidos com o uso de enzimas específicas (quitinases, quitosanases, quitina desacetilases) que auxiliam na produção de quitosana da melhor forma (KIDIBULE et al., 2018; SCHMITZ et al., 2019). Assim, as propriedades físico-químicas e bioativas da quitosana fazem dessa matéria-prima uma opção viável e promissora para uso em preparações alimentícias, produção de bebidas e fabricação de embalagens (PRIYADARSHI; RHIM, 2020).

Aplicações biotecnológicas da quitosana

As aplicações biotecnológicas da quitosana se estendem por inúmeras áreas, tais como ambiental, industrial, agrícola e médica (CHEBA, 2020). Biopolímeros de quitosana, seja nativo ou modificado, são adequados para uso na indústria alimentícia devida suas excelentes propriedades (biodegradabilidade, biocompatibilidade, atoxicidade) (CHEUNG et al., 2015; DRAGOSTIN et al., 2016; FONSECA-SANTOS; CHORILLI, 2017; XU et al., 2018; ZHAO et al., 2018; MATICA et al., 2019; PAUL; KOLESINSKA; SUJKA, 2019), para serem aplicado em processos de purificação de água, clarificação e desacidificação de sucos, extensão de vida útil de alimentos, retardo da deterioração microbiana, melhoria da qualidade de alimentos, aditivos alimentícios e para formação de filmes para embalagens biodegradáveis (CHEBA, 2020).

A quitosana pode ser fornecida pelo mercado comercial na forma de fibras, filmes, géis, esponjas e/ou nanopartículas (DUTTA; TRIPATHI; DUTTA, 2012; ROZMANET al., 2019; OTTONELLI et al., 2020; SATO et al., 2020), podendo ser utilizada para o tratamento de água residual (SARODE et al., 2019), fabricação de papel (SONG et al., 2018), agricultura (KASHYAP; XIANG; HEIDEN, 2015), na promoção do desempenho reprodutivo de peixes cultiváveis (BHAT et al., 2018), na área de engenharia óssea (GAIHRE; LECKA-CZERNIK; JAYASURIYA, 2018), odontológica (AGUILAR et al., 2019), na entrega de genes (CAO et al., 2019), tratamento de fibrose hepática (WANG et al. 2018), biomédica, apresentando ação antiplaquetária, anticoagulante (SONIN et al., 2020), antiinflamatória, anti-hipertensiva (MUANPRASAT; CHATSUDTHIPONG, 2017), antifúngica (LIU et al., 2018), neuroprotetora (CHEN; LI; BORGENS, 2018), promotora da regeneração de tecidos epiteliais (DRAGOSTIN et al., 2016; IACOB et al., 2018), nanofibras para entrega de insulina (LANCINA; SHANKAR; YANG, 2017), empregada na terapia de medicamentos para tratamento do câncer (YOUNES et al., 2012; BABU; RAMESH, 2017; DRAGOSTIN et al., 2020), adjuvante para entrega de vacinas (ELIEH-ALI-KOMI; HAMBLIN, 2016; MALIK et al., 2018), integrante de formulações cosméticas e de usos têxteis, químicos, fotográficos, cromatográficos, eletrônicos, na fabricação de papeis e, especialmente, nos segmentos relacionados a indústria de consumo de alimentos, bebidas (ROCHA; COIMBRA; NUNES, 2017) e, principalmente, na fabricação de embalagens para produtos de origem animal e de origem vegetal, como de frutas e leguminosas (PRIYADARSHI; RHIM, 2020).

A quitosana tem sido relatada como excelente componente bioativo para fins nutracêuticos, como descrito por Wang et al. (2019) ao investigarem o potencial termogênico da quitosana e de oligossacarídeo de quitosana no tratamento da obesidade em ratos. Segundo os autores, ambos os polissacarídeos contribuíram para redução do ganho de peso em ratos obesos induzidos por dieta rica em gordura, sem afetar a ingestão de alimentos, e inibiram efetivamente a hipertrofia e hiperplasia do tecido adiposo, além de aumentarem a expressão de genes e proteínas de escurecimento (UCP1, PGC1 α , PRMD16, e ATF2) no tecido adiposo branco e no marrom. Também, hidrogéis à base de quitosana têm sido amplamente estudados devido à sua preparação simples, boa biocompatibilidade e reparabilidade em condições fisiológicas para administração (XU et al., 2019). Fan et al. (2020) desenvolveram hidrogéis preparados a partir de colágeno reticulado de pele de tilápia (*Oreochromis niloticus*) e quitosana para entrega de nanocorpos. Os resultados indicaram a viabilidade da quitosana na entrega de medicamentos, potencializando sua utilização para usos na terapia do câncer.

A quitosana apresenta boa atividade antimicrobiana frente uma grande variedade de microrganismos patogênicos e deteriorantes, principalmente, de alimentos, incluindo fungos e bactérias Gram+ e Gram- (DUTTA; TRIPATHI; DUTTA, 2012). Samayanpaulraj et al. (2020) investigaram o potencial antibacteriano da quitosana de camarão (*Penaeus indicus*) frente a isolados de *Aeromonas hydrophila* virulenta Ah17 e observaram que ela foi capaz de controlar o crescimento dessa cepa. Nanopartículas de quitosana também já foram reportadas com ação antimicrobiana frente a uma gama de bactérias, fungos, leveduras e algas, através de estudos *in vivo* quanto *in vitro*, sendo utilizado como revestimento antimicrobiano, em processos cicatriciais (feridas, queimaduras), na prevenção de doenças infecciosas e na inibição de agentes deteriorantes de alimentos, especialmente, frutas (ROZMANET al., 2019).

Daetz et al. (2016) e Oliveira et al. (2020) utilizaram micropartículas de quitosana para tratar metrite em vacas leiteiras em período de lactação. As nanofibras à base de quitosana têm uma proporção de área de superfície: volume maior do que os materiais a granel em escala macro. Além disso, nanofibras à base de quitosana podem levar a porosidade e propriedades mecânicas aumentadas, melhorando, assim, as funcionalidades da superfície e, consequentemente, a gama de aplicações. No entanto, a diversidade de fontes de matéria-prima e o tipo de processo utilizado para extração da quitina e produção da quitosana podem fornecer características e propriedades físico-químicas distintas (FARIAS; SANT'ANNA CADAVAL JUNIOR; ALMEIDA PINTO, 2019). Também, ressalta-se que, o exame de toxicidade desses biopolímeros e de seus derivados é um procedimento essencial para avaliar a possibilidade de usar essas concentrações como ingrediente alimentar (DARWESH et al., 2018).

Aplicação biotecnológica: filmes/embalagens/revestimentos

O processo de embalagem de alimentos deve ser feito de forma criteriosa quando se trata da preservação de alimentos frescos ou processados. Ele desempenha um papel importante em fazer com que o alimento, que é preparado em um local, esteja disponível para os consumidores em algum outro lugar após dias, semanas ou mesmo meses após a colheita ou fabricação inicial (PRIYADARSHI; RHIM, 2020). Nesse sentido, compósitos à base de quitosana são opções viáveis para a fabricação de embalagens, principalmente, destinadas a indústria alimentícia, podendo ser utilizados como filmes e/ou revestimentos comestíveis (SOUZA et al., 2020). Levando em consideração a abundância dos biopolímeros aquáticos em fornecer quitina, os materiais derivados têm sido amplamente aplicados em vários campos ligados ao ambiente alimentar, muito devido suas propriedades biológicas, como capacidade

antioxidante e sua disposição para a formação de filmes (WANG; QIAN; DING, 2018; HAMIL et al., 2020).

Em embalagens destinadas a utilização em alimentos, os efeitos antimicrobianos se somam às propriedades de barreira dos materiais, para aumentar a vida útil e a qualidade dos produtos. A quitosana é um polissacarídeo bioativo natural com atividade antimicrobiana intrínseca e, devido às suas propriedades físico-químicas excepcionais transmitidas pela estrutura do polissacarídeo, foi reconhecida como uma alternativa natural aos polímeros antimicrobianos sintetizados quimicamente. Este, associado à crescente preferência por materiais biofuncionais de recursos renováveis, resultou em um interesse significativo sobre o potencial de aproveitamento de quitosana em materiais de embalagem (VAN DEN BROEK et al., 2015).

Para aplicações em embalagens de alimentos, a quitosana pode ser usada na forma de filmes de embalagem ou revestimentos diretamente no material alimentar (PRIYADARSHI; RHIM, 2020). Hamil et al. (2020) utilizaram as estruturas espinhosas de ouriço-do-mar (*Paracentrotus lividus*), que geralmente são encontradas em toneladas de mortos à beira-mar, associada com gel de quitosana para produção de filmes biodegradáveis e observaram uma melhora da hidrofobicidade dos filmes, além do que, a presença da quitosana foi capaz de aumentar a estabilidade antioxidante e térmica dos filmes, tornando-se uma alternativa para produção de filmes hidrofóbicos e de alta estabilidade térmica.

As fracas propriedades mecânicas, permeabilidade a gases e vapor d'água limitam o uso da quitosana (ELSABEE; ABDOL, 2013) e isso tem proporcionado uma quantidade significativa de investigações usando a quitosana de modo associativo a outros polímeros, como alginato, celulose e colágeno, por exemplo. Para melhorar os atributos biológicos e fisiológicos, principalmente mecânicos, térmicos e de barreira, dos filmes à base de quitosana, uma vasta mistura de extratos de plantas e polímeros de suporte foi misturada em filmes de quitosana (MUJTABA et al., 2019), obtendo-se excelentes resultados.

Andrade et al. (2019) investigaram o efeito da incorporação de nanocelulose obtida de diferentes fibras (espiga de milho, casca de milho, casca de coco e farelo de trigo) aos filmes de quitosana/glicerol e observaram que a fonte das nanofibras foi determinante na definição das propriedades dos filmes de quitosana/glicerol formados, apresentando-se promissor para o desenvolvimento de novos filmes biodegradáveis para revestimento. Pereda et al. (2014) prepararam filmes polieletrólitos concebidos como embalagens potencialmente comestíveis para alimentos preparados por moldagem de emulsões formadoras de filmes à base de quitosana, glicerol e azeite, contendo nanocristais de celulose dispersos. Segundo dados da

pesquisa, o uso combinado de nanopartículas de celulose e azeite de oliva provou ser um método eficiente para reduzir a permeabilidade elevada ao vapor de água dos filmes de quitosana plastificados, melhorando ainda seu comportamento à tração. Os testes mecânicos revelaram que todos os filmes analisados apresentaram dois relaxamentos principais atribuídos às fases ricas em glicerol e quitosana, respectivamente.

Ren et al. (2017) examinaram a influência da concentração do polímero de quitosana nas propriedades mecânicas e de barreira de filmes de amido de milho/quitosana. A pesquisa comprovou que a incorporação de quitosana resultou no aumento da solubilidade do filme, em diferenças totais de cor, na resistência à tração e na diminuição na permeabilidade ao vapor de água. Segundo os autores, os resultados são indicativos da real possibilidade de produção de filmes biodegradáveis para serem utilizadas em alimentos e medicamentos a partir da quitosana associada a compostos vegetais.

Suseno et al. (2014) investigaram o aumento da vida útil da banana *Cavendish* usando o revestimento comestível de quitosana. Os autores reportaram que a banana revestida pelo filme demonstrou atrasos no processo de amadurecimento em comparação com a banana não revestida, além das constatações da redução na perda de peso, bem como na perda de vitamina C em comparação com a banana não revestida. A perda de peso e a de vitamina C diminuiu com o aumento da concentração de quitosana e o grau de desacetilação dela.

Kritchenkov et al. (2020) evidenciaram que o componente triazol betaína quitosana altamente antibacteriano pode ser incorporado na matriz de sódio de succinil quitosana por simples mistura para produzir filmes compactos e uniformes. Nesta pesquisa, as aplicações de teste das películas de mistura como revestimentos de alimentos para bananas reduziram sua perda de peso, perda de vitamina C e taxa de respiração, e isso resultou no aumento da vida útil das bananas revestidas pelos filmes, sinalizando ser promissor para uso alimentício. Crizel et al. (2018) ponderaram o efeito da adição de diferentes concentrações de farinha e micropartículas de bagaço de azeitona em filmes à base de quitosana. Os autores verificaram que os filmes a base de quitosana com adição de 10% de micropartículas de bagaço de azeitona eram mais homogêneos e compactos, além de maior resistência mecânica, sem apresentar alterações na permeabilidade e solubilidade ao vapor d'água. Além disso, a adição de micropartículas melhorou as propriedades ópticas e aumentou a ação antioxidante contra a oxidação das nozes durante o período de 31 dias.

Nanoemulsões de quitosana como revestimentos comestíveis para proteção de frutas e alimentos vegetais tem sido bastante investigados nos últimos anos (CHAUDHARY et al., 2020), visando melhorar as funcionalidades desses filmes comestíveis ativos e preservar esses

alimentos por um período de tempo maior (NAIR et al., 2020). Alimentos frescos, tais como os hortifrutigranjeiros e carnes, são produtos de fácil deteriorização devido à sua composição biológica. Guo; Yadav; Jin (2017) analisaram o uso de revestimentos para fins comestíveis antimicrobianos e filmes de microemulsões para reduzir as populações de patógenos de origem alimentar. Os autores empregaram a goma de fibra de milho como um emulsificante com quitosana, obtendo êxito na redução de bactérias Gram- e Gram+, podendo ser utilizado de modo eficaz para a redução da carga patogênica em alimentos, como carnes prontas para consumo e de morangos, por exemplo. Chien; Sheu; Yang (2007) prepararam fatias de manga com soluções aquosas de 0%, 0,5%, 1% e 2% de quitosana e observaram que a aplicação de um revestimento de quitosana foi capaz de prolongar os atributos de qualidade e estender a vida útil dessa fruta. Assim, a quitosana tem sido utilizada como revestimento comestível em uma variedade de alimentos de origem animal e vegetal, tais como os descritos para peitos de frango, ovos, filetes frescos de peixes, frutos de goiaba (*Psidium guajava* L.), peras e brócolis recém-cortados (SOUZA et al., 2020), entre outros.

Aplicação biotecnológica: alimentos & bebidas

A qualidade biológica do alimento pode ser intensificada e/ou melhorada a partir da utilização de quitosana. Sentença corroborada por Huang et al. (2017), quando analisaram o efeito do tratamento com quitosana enriquecida com ácido salicílico no aumento da qualidade físico-química do kiwi chinês (*Actinidia chinensis* Planch). Segundo os autores, o tratamento com o polímero manteve a textura e a cor, sendo capaz de inibir a perda de umidade e a mudança de acidez, além de contribuir para atrasar a decomposição da vitamina C (teor máximo de 97,93 mg/kg) e dos sólidos solúveis, tornando-se uma alternativa favorável para melhorar a qualidade dessa fruta.

A quitosana é uma prodigiosa opção na preservação e prolongamento da vida útil de produtos aquáticos, como peixes e frutos do mar, devido sua ação antimicrobiana contra patógenos deteriorantes de origem alimentar, além do que, a ação antioxidante da quitosana protege os produtos alimentícios contra oxidação lipídica (INANLI et al., 2020), principalmente os alimentos produzidos pela indústria de aquicultura. Rhoades; Roller (2000) investigaram a atividade antimicrobiana de quitosanas degradadas e nativas hidrolisadas por degradação oxidativa-redutiva e lisozima contra microrganismos deteriorantes em alimentos e bebidas, a fim de avaliar seu potencial como produto conservante de alimentos e puderam constatar sua eficiência em alimentos de baixo pH, quando aplicada sozinha ou em combinação com outros sistemas conservantes. Também, foi ressaltado pelos autores que os

constituintes da matriz alimentar têm papel crucial na eficácia antimicrobiana da quitosana.

Darwesh et al. (2018) produziram nanoquitosana a partir de resíduos de camarão e de biomassa produzida por fungos (*Rhizopus stolonifer*). Os autores testaram nove grupos de ratos tratados com quitosana ou nanoquitosana de ambas as fontes a 100 e 200 mg.kg⁻¹. Os autores constataram que a adição de quitosana na dieta de todos os grupos não demonstrou alterações significativas nos parâmetros bioquímicos sanguíneos e de estresse oxidativo, quando da comparação ao grupo controle, dados apoiados pela histopatologia do fígado, rim e estômago. Os autores também observaram a ausência de sinais inflamatórios, fibroses ou cirrose nessas no fígado, rim e estômago. Além disso, tanto a quitosana quanto a nanoquitosana de camarão e a fúngica apresentaram alta capacidade antimicrobiana, além da vantagem de produtos considerados atóxicos, podendo ser utilizados como ingredientes na preparação de alimentos.

Ausar et al. (2001) analisaram a hidrólise de um agregado de leite induzido por quitosana, usando enzimas gástricas (pepsina) e intestinais (tripsina e lipase pancreática). Segundo os autores, foi observada inibição progressiva da lipase pancreática em proporção ao aumento da massa molecular da quitosana empregada para induzir a formação do agregado. Ainda, a presença de quitosana afetou a velocidade inicial da reação e reduziu sua extensão. Os resultados sugerem que um agregado de leite induzido por quitosana é bem digerido por proteases gástricas e intestinais, facilitando seu uso oral como componente nutracêutico.

Bough; Landes (1976) demonstraram através de seus estudos que a quitosana, produzida a partir da quitina extraída de resíduos de camarões e caranguejos, era capaz de coagular sólidos suspensos no soro de queijo com a mesma eficácia ou mais do que dez polímeros sintéticos comerciais; enquanto que Oh et al. (2001) averiguaram as atividades antimicrobianas das quitosanas contra quatro espécies de microrganismos deteriorantes de alimentos (*Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus fructivorans*, *Serratia liquefaciens* e *Zygosaccharomyces bailii*) em meio líquido e maionese. Os autores relataram que o efeito biocida inicial das quitosanas e que as contagens de células viáveis foram expressivamente reduzidas, indicando a viabilidade de uso desse polímero na indústria alimentícia. Savant; Torres (2000) produziram complexos com quitosana e avaliaram quanto ao seu potencial coagulante para o tratamento de soro de queijo Cheddar. O estudo demonstrou com sucesso a eficácia dos complexos com quitosana na floculação de resíduos sólidos suspensos em soro de queijo com mais de 70% de recuperação de proteína.

Aditivos em alimentos e bebidas devem resistir às condições fisiológicas corporais. Para exercer efeitos benéficos sobre os probióticos, eles devem ser capazes de tolerar as condições do trato gastrointestinal sob as condições ácidas do ambiente estomacal e da bile no

intestino delgado. O microencapsulamento tem recebido especial atenção, uma vez que pode proteger organismos probióticos contra um ambiente desfavorável e permitir sua liberação em um estado viável e metabolicamente ativo no intestino (CHEN et al., 2015). Shu et al. (2017) microencapsularam *Lactobacillus acidophilus* em complexo polieletrólito formado por géis de xantana-quitosana e xantana-quitosana-xantana no iogurte, obtendo uma boa sobrevivência da bactéria durante o período de armazenamento (21 dias). Utilizando a mesma bactéria e o mesmo complexo, Shu et al. (2018) avaliaram os efeitos da microencapsulação nas mudanças na sobrevivência e no comportamento de liberação do *Lactobacillus acidophilus* durante a exposição ao fluido gástrico e intestinal simulados. Os autores observaram que a bactéria encapsulada foi capaz de apresentar alta resistência aos fluidos testados do que amostras não encapsulada. Além disso, a viabilidade de células livres e imobilizadas do *Lactobacillus acidophilus* incorporada em bebidas lácteas foi avaliada por um período de 21 dias e que a contagem de bactérias viáveis também foi considerada alta.

Pourjafar et al. (2020) aplicaram a quitosana para revestir probióticos de *Lactobacilos* encapsulados num tipo de bebida iraniana (*Doogh*) e avaliaram a capacidade de sobrevivência das bactérias e as características do produto final durante o período de 42 dias, tendo sido observado um aumento da capacidade de sobrevivência desses probióticos (*Lactobacillus acidophilus* e *Lactobacillus rhamnosus*) na *Doogh*, como também no lúmen gastrointestinal. Singh et al. (2020) trataram videiras com quitosana (0,01% em ácido acético 0,01%), enquanto as videiras controle foram pulverizadas apenas com ácido acético 0,01%. Segundo os autores, várias antocianinas monoméricas aumentaram significativamente nas peles dos frutos após o tratamento com quitosana. Esses dados foram corroborados por Silva et al. (2020) quando observaram maior atividade antioxidante e antibacteriana em videiras tratadas com quitosana. Taillandier et al. (2015) investigaram os mecanismos de ação de uma preparação específica de quitosana de origem fúngica sobre *Brettanomyces bruxellensis*, uma levedura responsável pela produção de compostos aromáticos indesejáveis (fenóis voláteis) em bebidas, alterando a qualidade do vinho. O efeito de inativação foi confirmado pelos autores, além da observação da formação de agregados celulares.

Roller; Covill (1999) investigaram as propriedades antifúngicas da quitosana em meios de laboratório e suco de maçã contra 15 leveduras e bolores associados à deterioração de alimentos, a fim de avaliar o potencial do uso da quitosana como conservante natural. Das cepas de fungos filamentosos testados, a quitosana reduziu com a menor concentração utilizada a taxa de crescimento de *Mucor racemosus*. O efeito inicial da quitosana no suco de maçã foi biocida. Também avaliando a deteriorização do suco de maçã, Kiskó; Sharp; Roller

(2015) averiguaram o uso da quitosana para reduzir a ação microbiana sobre esse produto. Os autores isolaram e identificaram microrganismos presentes nos sucos tratados ou não com quitosana. Foi reportado que a quitosana foi capaz de inativar as leveduras de deterioração, mas aumentou a sobrevivência de *Escherichia coli* O157:H7. A quitosana (0,05-0,1%) foi capaz de atrasar a deterioração do suco de maçã por leveduras (*Kloeckera apiculata* e *Metschnikowia pulcherrima*) e crescimento lento de *Saccharomyces cerevisiae* e *Pichia* spp.

Em sistemas vegetais, a quitosana tem sido utilizada para a síntese de nanopartículas visando o sistema de entrega para fertilizantes, herbicidas, pesticidas e micronutrientes para a promoção do crescimento da cultura por meio de uma nutrição equilibrada e sustentada. Além disso, as nanopartículas de quitosana oferecem material genético para a transformação de plantas com segurança (MALERBA; CERANA, 2016), sem afetar os micróbios benéficos do solo. Ainda, é útil para reduzir as perdas de fertilizantes devido à sua capacidade de revestimento que é importante para manter a poluição ambiental sob controle (SHARIF et al., 2018).

O tratamento com quitosana estimula a taxa fotossintética, o fechamento estomático, aumenta as enzimas antioxidantes através das vias de sinalização do óxido nítrico e do peróxido de hidrogênio e induz a produção de ácidos orgânicos, açúcares, aminoácidos e outros metabólitos que são necessárias para os ajustes osmóticos, sinalizações de estresse e metabolismo energético. É utilizada como ferramenta para fitorremediação e biorremediação de solos. Além disso, é empregado como composto antitranspirante por via foliar em muitas plantas, reduzindo o uso de água e garantindo proteção contra outros efeitos negativos (HIDANGMAYUM et al., 2019). Com base nessas propriedades, há um grande interesse no uso de biopolímeros de quitosana em sistemas agrícolas (SHARIF et al., 2018). Savard et al. (2002) avaliaram as propriedades antimicrobianas de polímeros com diferentes massas moleculares de quitosana-lactato contra duas leveduras isoladas de vegetais fermentados e contra três bactérias ácido lácticas de um iniciador misto para chucrute. Os autores puderam constatar que o polímero quitosana-lactato reduziu o crescimento de todos os microrganismos em meio sólido e meio líquido.

Rahman et al. (2018) investigaram os efeitos da aplicação de quitosana sobre o crescimento, produção de frutos e atividades antioxidantes de morangos. Segundo os autores, a aplicação da quitosana contribuiu para o crescimento da planta e a produção de frutos (até 42% mais) em comparação com o controle não tratado. Os frutos das plantas pulverizadas com quitosana também apresentaram teores expressivamente maiores (até 2,6 vezes) de compostos carotenóides, antocianinas, flavonóides e fenólicos em comparação com o controle

não tratado. As atividades antioxidantes totais em frutos de plantas tratadas com quitosana também foram maiores (até 2 vezes) quando confrontadas com o grupo sem tratamento. Esses dados vão de encontro com os descritos por He et al. (2018) quando trataram morangos com oligossacarídeos de quitosana e puderam observar uma melhora da qualidade e da capacidade oxidante dessa fruta. Assim, de acordo com o descrito na literatura científica, a quitosana tem se tornando uma excelente opção para uso em vegetais voltados para a produção de alimentos.

Considerações Finais

Esta mini-revisão se propôs a elencar as principais aplicações biotecnológicas da quitosana, um copolímero obtido a partir da quitina e amplamente empregado nos diferentes segmentos industriais; tendo este trabalho focado na inserção desse polímero na fabricação de produtos de revestimento/filmes para embalagens, na aplicação em alimentos de origem animal e de frutas e vegetais, além de bebidas, muitas com funções nutracêuticas. O volume de publicações a respeito do tema é grande e ainda tendência é de crescimento devido às inúmeras possibilidades de associação dos polímeros de quitosana com outros polímeros, principalmente de origem aquática, uma prática que vem sendo utilizada com sucesso pelos profissionais de biotecnologia para suprir aspectos deficientes da quitosana. Ainda, visando redução de custos operacionais, as fontes aquáticas marinhas têm recebido atenção por apresentar funções biológicas que são altamente desejáveis pela indústria nutracêutica. Assim, são incentivadas novas investigações que possam atrelar esse biopolímero a novos compostos visando à produção de embalagens, alimentos e/ou bebidas suplementadas com quitosana.

Referências

- ANDRADE, M.R. et al. Effect of Cellulose Nanocrystals from Different Lignocellulosic Residues to Chitosan/Glycerol Films. **Polymers**, v.11, n.4, 658, 2019. <https://doi.org/10.3390/polym11040658>
- AGUILAR, A. et al. Application of Chitosan in Bone and Dental Engineering. **Molecules (Basel, Switzerland)**, v.24, n.16, 3009, 2019. <https://doi.org/10.3390/molecules24163009>
- AHMED, S.; ANNU; ALI, A.; SHEIKH, J. A review on chitosan centred scaffolds and their applications in tissue engineering. **International Journal of Biological Macromolecules**, v.116, p.849–862, 2018.
- AKBARI-ALAVIJEH, S.; SHADDEL, R.; JAFARI, S.M. Encapsulation of food bioactives and nutraceuticals by various chitosan-based nanocarriers. **Food Hydrocolloids**, v.105, 105774, 2020. doi:10.1016/j.foodhyd.2020.105774

ALI, A.; AHMED, S. A review on chitosan and its nanocomposites in drug delivery. **International Journal of Biological Macromolecules**, v.109, p.273–286, 2018.

AHSAN, S.M. et al. Chitosan as biomaterial in drug delivery and tissue engineering. **International Journal of Biological Macromolecules**, v.110, p.97–109, 2018.

AUSAR, S.F. et al. Hydrolysis of a chitosan-induced milk aggregate by pepsin, trypsin and pancreatic lipase. **Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry**, v.65, n.11, p.2412–2418, 2001. <https://doi.org/10.1271/bbb.65.2412>

BABU, A.; RAMESH, R. Multifaceted Applications of Chitosan in Cancer Drug Delivery and Therapy. **Marine drugs**, v.15, n.4, 96, 2017. <https://doi.org/10.3390/md15040096>

BHAT, I.A. et al. Fabrication and characterization of chitosan conjugated eurycomanone nanoparticles: *In vivo* evaluation of the biodistribution and toxicity in fish. **International Journal of Biological Macromolecules**, v.112, p.1093–1103, 2018.

BARANWAL, A. et al. Quitosana: Um material de bio-fabricação indiscutível para aplicações em engenharia de tecidos e bio-deteção. **International Journal of Biological Macromolecules**, v.110, p.110–123, 2018.

BOUGH, W.A.; LANDES, D.R. Recovery and nutritional evaluation of proteinaceous solids separated from whey by coagulation with chitosan. **Journal of Dairy Science**, v.59, n.11, p.1874–1880, 1976. [https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302\(76\)84456-6](https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(76)84456-6)

CAO, Y. et al. Recent Advances in Chitosan-Based Carriers for Gene Delivery. **Marine drugs**, v.17, n.6, 381, 2019. <https://doi.org/10.3390/md17060381>

CHAUDHARY, S. et al. Chitosan nanoemulsions as advanced edible coatings for fruits and vegetables: Composition, fabrication and developments in last decade. **International Journal of Biological Macromolecules**, v.152, p.154–170, 2020. doi:10.1016/j.ijbiomac.2020.02.276

CHEBA, B.A. Chitosan: Properties, Modifications and Food Nanobiotechnology. **Procedia Manufacturing**, v.46, p.652–658, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.03.093>

CHEN, H. et al. Effect of complexation conditions on microcapsulation of *Lactobacillus acidophilus* in xanthan-chitosan polyelectrolyte complex gels. *Acta scientiarum polonorum. Technologia Alimentaria*, v.14, n.3, p.207–213, 2015. <https://doi.org/10.17306/J.AFS.2015.3.22>

CHEN, B.; LI, J.; BORGES, R.B. Neuroprotection by chitosan nanoparticles in oxidative stress-mediated injury. **BMC research notes**, v.11, n.1, 49, 2018. <https://doi.org/10.1186/s13104-018-3162-7>

CHEUNG, R.C. et al. Chitosan: An Update on Potential Biomedical and Pharmaceutical Applications. **Marine Drugs**, v.13, n.8, p.5156–5186, 2015.

CHIEN, P.-J.; SHEU, F.; YANG, F.-H. Effects of edible chitosan coating on quality and shelf life of sliced mango fruit. **Journal of Food Engineering**, v.78, n.1, p.225–229, 2007. doi:10.1016/j.jfoodeng.2005.09.022

CRIZEL, T.M. et al. Active food packaging prepared with chitosan and olive pomace. **Food Hydrocolloids**, v.74, p.139–150, 2018.
doi:10.1016/j.foodhyd.2017.08.007

DARWESH, O.M. et al. Bio-evaluation of crustacean and fungal nano-chitosan for applying as food ingredient. **Toxicology reports**, v.5, p.348–356, 2018.
<https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2018.03.002>

DAETZ, R. et al. Clinical response after chitosan microparticle administration and preliminary assessment of efficacy in preventing metritis in lactating dairy cows. **Journal of Dairy Science**, v.99, n.11, p.8946–8955, 2016. <https://doi.org/10.3168/jds.2016-11400>

DRAGOSTIN, O.M. et al. New antimicrobial chitosan derivatives for wound dressing applications. **Carbohydrate polymers**, v.141, p.28–40, 2016.

DRAGOSTIN, O.M. et al. Designing of Chitosan Derivatives Nanoparticles with Antiangiogenic Effect for Cancer Therapy. **Nanomaterials**, v.10, n.4, 698, 2020.

DUTTA, J.; TRIPATHI, S.; DUTTA, P.K. Progress in antimicrobial activities of chitin, chitosan and its oligosaccharides: a systematic study needs for food applications. **Food science and technology international = Ciencia y tecnologia de los alimentos internacional**, v.18, n.1, p.3–34, 2012. <https://doi.org/10.1177/1082013211399195>

ELSABEE, M.Z.; ABDOU, E.S. Chitosan based edible films and coatings: A review. **Materials Science and Engineering: C**, v.33, n.4, p.1819–1841, 2013.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.msec.2013.01.010>

EL KNIDRI, H. et al. Extraction, chemical modification and characterization of chitin and chitosan: A review. **International Journal of Biological Macromolecules**, v.109, p.273–286, 2018.

ELIEH-ALI-KOMI, D.; HAMBLIN, M.R. Chitin and Chitosan: Production and Application of Versatile Biomedical Nanomaterials. **International Journal of Biological Macromolecules**, v.4, n.3, p.411–427, 2016.

FAN, X. et al. Development of tilapia collagen and chitosan composite hydrogels for nanobody delivery. **Colloids and Surfaces B: Biointerfaces**, v.195, 111261, 2020.
doi:10.1016/j.colsurfb.2020.111261

FARIAS, B.S. et al. Chitosan-functionalized nanofibers: A comprehensive review on challenges and prospects for food applications. **International Journal of Biological Macromolecules**, v.123, p.210–220, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.11.042>

FONSECA-SANTOS, B.; CHORILLI, M. An overview of carboxymethyl derivatives of chitosan: Their use as biomaterials and drug delivery systems. **Materials Science Engineering. C, Materials for biological applications**, v.77, p.1349–1362, 2017.

GAIHRE, B.; LECKA-CZERNIK, B.; JAYASURIYA, A.C. Injectable nanosilica-chitosan microparticles for bone regeneration applications. **Journal of Biomaterials Applications**, v.32, n.6, p.813–825, 2018. <https://doi.org/10.1177/0885328217741523>

GUO, M.; YADAV, M.P.; JIN, T.Z. Antimicrobial edible coatings and films from micro-emulsions and their food applications. **International Journal of Food Microbiology**, v.263, p.9–16, 2017. doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2017.10.002

HAMIL, S. et al. Use of sea urchin spines with chitosan gel for biodegradable film production. **International Journal of Biological Macromolecules**, v.152, p.102-108, 2020. doi:10.1016/j.ijbiomac.2020.02.263

HE, Y. et al. Pre-Harvest Treatment of Chitosan Oligosaccharides Improved Strawberry Fruit Quality. **International Journal of Molecular Sciences**, v.19, n.8, 2194, 2018. <https://doi.org/10.3390/ijms19082194>

HIDANGMAYUM, A. et al. Application of chitosan on plant responses with special reference to abiotic stress. **Physiology and molecular biology of plants: an international journal of functional plant biology**, v.25, n.2, p.313–326, 2019. <https://doi.org/10.1007/s12298-018-0633-1>

HU, Z. et al. Chitosan-Based Composite Materials for Prospective Hemostatic Applications. **Marine Drugs**, v.16, n.8, 273, 2018.

HUANG, Z. et al. Physicochemical properties enhancement of Chinese kiwi fruit (*Actinidia chinensis* Planch) via chitosan coating enriched with salicylic acid treatment. **Journal of Food Measurement and Characterization**, v.11, n.1, p.184-191, 2017. <https://doi.org/10.1007/s11694-016-9385-1>

IACOB, A.T. et al. Preparation, Characterization and Wound Healing Effects of New Membranes Based on Chitosan, Hyaluronic Acid and Arginine Derivatives. **Polymers**, v.10, n.6, 607, 2018.

INANLI, A.G. et al. The impact of chitosan on seafood quality and human health: A review. **Trends in Food Science & Technology**, v.97, p.404-416, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.01.029>

KASHYAP, P.L.; XIANG, X.; HEIDEN, P. Chitosan nanoparticle based delivery systems for sustainable agriculture. **International Journal of Biological Macromolecules**, v.77, p.36–51, 2015. doi:10.1016/j.ijbiomac.2015.02.039

KRAVANJA, G. et al. Chitosan-based (Nano)materials for Novel Biomedical Applications. **Molecules**, v.24, n.10, 1960, 2019.

KIDIBULE, P.E. et al. Use of chitin and chitosan to produce new chitooligosaccharides by chitinase Chit42: enzymatic activity and structural basis of protein specificity. **Microbial Cell Factories**, v.17, n.1, 47, 2018. <https://doi.org/10.1186/s12934-018-0895-x>

KISKÓ, G.; SHARP, R.; ROLLER, S. Chitosan inactivates spoilage yeasts but enhances survival of *Escherichia coli* O157:H7 in apple juice. **Journal of Applied Microbiology**, v.98, n.4, p.872–880, 2005. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2004.02527.x>

KRITCHENKOV, A.S. et al. Active antibacterial food coatings based on blends of succinyl chitosan and triazole betaine chitosan derivatives. **Food Packaging and Shelf Life**, v.25, 100534, 2020. doi:10.1016/j.fpsl.2020.100534

LANCINA, M.G.; SHANKAR, R.K.; YANG, H. Chitosan nanofibers for transbuccal insulin delivery. **Journal of biomedical materials research. Part A**, v.105, n.5, p.1252–1259, 2017. <https://doi.org/10.1002/jbm.a.35984>

LIU, W. et al. Synthesis, characterization and antifungal efficacy of chitosan derivatives with triple quaternary ammonium groups. **International Journal of Biological Macromolecules**, v.114, p.942–949, 2018.

MALERBA, M.; CERANA, R. Chitosan Effects on Plant Systems. *International Journal of Molecular Sciences*, v.17, n.7, 996, 2016. <https://doi.org/10.3390/ijms17070996>

MALIK, A. et al. Novel application of trimethyl chitosan as an adjuvant in vaccine delivery. **International Journal of Nanomedicine**, v.13, p.7959–7970, 2018. <https://doi.org/10.2147/IJN.S165876>

MANIGANDAN, V. et al. Chitosan Applications in Food Industry. In: **Biopolymers for Food Design**, p.469–491, 2018. doi:10.1016/b978-0-12-811449-0.00015-3

MARTĂU, G.A.; MIHAI, M.; VODNAR, D.C. The Use of Chitosan, Alginate, and Pectin in the Biomedical and Food Sector-Biocompatibility, Bioadhesiveness, and Biodegradability. **Polymers**, v.11, n.11, 1837, 2019. <https://doi.org/10.3390/polym11111837>

MATICA, M.A. et al. Chitosan as a Wound Dressing Starting Material: Antimicrobial Properties and Mode of Action. **International Journal of Molecular Sciences**, v.20, n.23, 5889, 2019.

MU, M.; LI, X.; TONG, A.; GUO, G. Multi-functional chitosan-based smart hydrogels mediated biomedical application. **Expert Opinion on Drug Delivery**, v.16, n.3, p.239–250, 2019.

MUANPRASAT, C.; CHATSUDTHIPONG, V. Chitosan oligosaccharide: Biological activities and potential therapeutic applications. **Pharmacology & Therapeutics**, v.170, p.80–97, 2017.

MUJTABA, M. et al. Current advancements in chitosan-based film production for food technology; A review. **International Journal of Biological Macromolecules**, v.121, p.889–904, 2018. doi:10.1016/j.ijbiomac.2018.10.109

MUXIKA, A. et al. Chitosan as a bioactive polymer: Processing, properties and applications. **International Journal of Biological Macromolecules**, v.105, p.1358–1368, 2017.

NAIR, M.S. et al. Enhancing the functionality of chitosan- and alginate-based active edible coatings/films for the preservation of fruits and vegetables: A review. **International Journal of Biological Macromolecules**, v.164, p.304-320, 2020. doi:10.1016/j.ijbiomac.2020.07.083

OH, H.I. et al. Antimicrobial characteristics of chitosans against food spoilage microorganisms in liquid media and mayonnaise. **Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry**, v.65, n.11, p.2378–2383, 2001. <https://doi.org/10.1271/bbb.65.2378>

Olatunji, O. **Aquatic Biopolymers Understanding their Industrial Significance and Environmental Implications**, 1st ed., Springer International Publishing, 2020. doi:10.1007/978-3-030-34709-3_16.

OLIVEIRA, E.B. et al. Using chitosan microparticles to treat metritis in lactating dairy cows. **Journal of Dairy Science**, v.103, n.8, p.7377–7391, 2020. <https://doi.org/10.3168/jds.2019-18028>

OLIVEIRA, V.M. et al. Physical, biochemical, densitometric and spectroscopic techniques for characterization collagen from alternative sources: a review based on the sustainable valorization of aquatic by-products. **Journal of Molecular Structure**, v.1224, 129023, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.129023>

OTTONELLI, M. et al. Chitosan-Stabilized Noble Metal Nanoparticles: Study of their Shape Evolution and Post-Functionalization Properties. **Nanomaterials**, v.10, n.2, 224, 2020.

PAUL, P.; KOLESINSKA, B.; SUJKA, W. Chitosan and Its Derivatives - Biomaterials with Diverse Biological Activity for Manifold Applications. **Mini-Reviews in Medicinal Chemistry**, v.19, n.9, p.737-750, 2019.

PATRULEA, V. et al. Chitosan as a starting material for wound healing applications. **European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics**, v.97, p.417–426, 2015.

PEREDA, M. et al. Polyelectrolyte films based on chitosan/olive oil and reinforced with cellulose nanocrystals. **Carbohydrate polymers**, v.101, p.1018–1026, 2014. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.10.046>

POURJAFAR, H. et al. Viability of microencapsulated and non-microencapsulated Lactobacilli in a commercial beverage. **Biotechnology Reports**, v.25, e00432, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.btre.2020.e00432>

PRIYADARSHI, R.; RHIM, J.-W. Chitosan-based biodegradable functional films for food packaging applications. **Innovative Food Science & Emerging Technologies**, v.62, 102346, 2020. doi:10.1016/j.ifset.2020.102346

RAHMAN, M. et al. Chitosan biopolymer promotes yield and stimulates accumulation of antioxidants in strawberry fruit. **PloS one**, v.13, n.9, e0203769, 2018. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203769>

REN, L. et al. Influence of chitosan concentration on mechanical and barrier properties of corn starch/chitosan films. **International Journal of Biological Macromolecules**, v.105, p.1636–1643, 2017.

<https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.02.008>

RHOADES; ROLLER, S. Antimicrobial actions of degraded and native chitosan against spoilage organisms in laboratory media and foods. **Applied and Environmental Microbiology**, v.66, n.1, p.80–86, 2000. <https://doi.org/10.1128/aem.66.1.80-86.2000>

ROCHA, M.A.M.; COIMBRA, M.A.; NUNES, C. Applications of chitosan and their derivatives in beverages: a critical review. **Current Opinion in Food Science**, v.15, p.61–69, 2017. doi:10.1016/j.cofs.2017.06.008

ROLLER, S.; COVILL, N. The antifungal properties of chitosan in laboratory media and apple juice. **International Journal of Food Microbiology**, v.47, n.1-2, p.67–77, 1999. [https://doi.org/10.1016/s0168-1605\(99\)00006-9](https://doi.org/10.1016/s0168-1605(99)00006-9)

ROZMAN, N. et al. Potential Antimicrobial Applications of Chitosan Nanoparticles (ChNP). **Journal of Microbiology and Biotechnology**, v.29, n.7, p.1009–1013, 2019. <https://doi.org/10.4014/jmb.1904.04065>

SAMAYANPAULRAJ, V. et al. Identification and characterization of virulent *Aeromonas hydrophila* Ah17 from infected *Channa striata* in river Cauvery and *in vitro* evaluation of shrimp chitosan. **Food Science & Nutrition**, v.8, n.2, p.1272–1283, 2020. <https://doi.org/10.1002/fsn3.1416>

SATO, T. et al. Chitosan-Based Coacervate Polymers for Propolis Encapsulation: Release and Cytotoxicity Studies. **International Journal of Molecular Sciences**, v.21, n.12, p.4561, 2020.

SARODE, S. et al. Overview of wastewater treatment methods with special focus on biopolymer chitin-chitosan. **International Journal of Biological Macromolecules**, v.121, p.1086–1100, 2019. doi:10.1016/j.ijbiomac.2018.10.089

SAVANT, V.D.; TORRES, J.A. Chitosan-based coagulating agents for treatment of cheddar cheese whey. **Biotechnology Progress**, v.16, n.6, p.1091–1097, 2000.

SAVARD, T.; et al. Antimicrobial action of hydrolyzed chitosan against spoilage yeasts and lactic acid bacteria of fermented vegetables. **Journal of Food Protection**, v.65, n.5, p.828–833, 2002.

SCHMITZ, C. et al. Conversion of Chitin to Defined Chitosan Oligomers: Current Status and Future Prospects. **Marine drugs**, v.17, n.8, 452, 2019. <https://doi.org/10.3390/md17080452>

SHARIF, R. et al. The Multifunctional Role of Chitosan in Horticultural Crops; A Review. **Molecules (Basel, Switzerland)**, v.23, n.4, 872, 2018.

SHU, G. et al. Microencapsulation of *Lactobacillus Acidophilus* by Xanthan-Chitosan and Its Stability in Yoghurt. **Polymers**, v.9, n.12, 733, 2017. <https://doi.org/10.3390/polym9120733>

SHU, G. et al. Effect of Xanthan⁻ Chitosan Microencapsulation on the Survival of *Lactobacillus acidophilus* in Simulated Gastrointestinal Fluid and Dairy Beverage. **Polymers**, v.10, n.6, 588, 2018. <https://doi.org/10.3390/polym10060588>

SHARIATINIA, Z. Pharmaceutical applications of chitosan. **Advances in Colloid and Interface Science**, v.263, p.131-194, 2018.

SHARIATINIA Z. Pharmaceutical applications of chitosan. **Advances in colloid and interface science**, v.263, p.131–194, 2019.

SINGH, R.K. et al. Chitosan Application in Vineyards (*Vitis vinifera* L. cv. Tinto Cão) Induces Accumulation of Anthocyanins and Other Phenolics in Berries, Mediated by Modifications in the Transcription of Secondary Metabolism Genes. **International Journal of Molecular Sciences**, v.21, n.1, 306, 2020. <https://doi.org/10.3390/ijms21010306>

SONIN, D. et al. Biological Safety and Biodistribution of Chitosan Nanoparticles. **Nanomaterials**, v.10, n.4, 810, 2020.

SONG, Z.; LI, G.; GUAN, F.; LIU, W. Application of Chitin/Chitosan and Their Derivatives in the Papermaking Industry. **Polymers**, v.10, n.4, 389, 2018. <https://doi.org/10.3390/polym10040389>

SOUZA, V. et al. Chitosan Composites in Packaging Industry-Current Trends and Future Challenges. **Polymers**, v.12, n.2, 417, 2020. <https://doi.org/10.3390/polym12020417>

SILVA, V. et al. Comparative Insight upon Chitosan Solution and Chitosan Nanoparticles Application on the Phenolic Content, Antioxidant and Antimicrobial Activities of Individual Grape Components of Sousão Variety. **Antioxidants**, v.9, n.2, 178, 2020. <https://doi.org/10.3390/antiox9020178>

SUSENO, N. et al. Improving Shelf-life of Cavendish Banana Using Chitosan Edible Coating. **Procedia Chemistry**, v.9, p.113–120, 2014. doi:10.1016/j.proche.2014.05.014

TAILLANDIER, P. et al. Effect of a fungal chitosan preparation on *Brettanomyces bruxellensis*, a wine contaminant. **Journal of Applied Microbiology**, v.118, n.1, p.123–131, 2015. <https://doi.org/10.1111/jam.12682>

VAN DEN BROEK, L.A. et al. Chitosan films and blends for packaging material. **Carbohydrate polymers**, v.116, p.237–242, 2015. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.07.039>

VERLEE, A.; MINCKE, S.; STEVENS, C.V. Recent developments in antibacterial and antifungal chitosan and its derivatives. **Carbohydrate Polymers**, v.164, p.268–283, 2017. doi:10.1016/j.carbpol.2017.02.001

WANG, H.; QIAN, J.; DING, F. Emerging Chitosan-Based Films for Food Packaging Applications. **Journal of agricultural and food chemistry**, v.66, n.2, p.395–413, 2018. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.7b04528>

WANG, J. et al. Beneficial Metabolic Effects of Chitosan and Chitosan Oligosaccharide on Epididymal WAT Browning and Thermogenesis in Obese Rats. **Molecules (Basel, Switzerland)**, v.24, n.24, 4455, 2019. <https://doi.org/10.3390/molecules24244455>

WANG, W. et al. Chitosan Derivatives and Their Application in Biomedicine. **International Journal of Molecular Sciences**, v.21, n.2, 487, 2020.

WANG, Z.F. et al. Therapeutic effect of chitosan on CCl₄- induced hepatic fibrosis in rats. **Molecular medicine reports**, v.18, n.3, p.3211–3218, 2018. <https://doi.org/10.3892/mmr.2018.9343>

XU, Y. et al. Injectable and Self-Healing Chitosan Hydrogel Based on Imine Bonds: Design and Therapeutic Applications. **Journal Molecular Sciences**, v.19, n.8, 2198, 2018. <https://doi.org/10.3390/ijms19082198>

YOUNES, I.; et al. Chitin and chitosan preparation from shrimp shells using optimized enzymatic deproteinization. **Process Biochemistry**, v.47, n.12, p.2032–2039, 2012.

ZARGAR, V.; ASGHARI, M.; DASHTI, A. A Review on Chitin and Chitosan Polymers: Structure, Chemistry, Solubility, Derivatives, and Applications. **ChemBioEng Reviews**, v.2, n.3, p.204–226, 2015. doi:10.1002/cben.201400025

ZHAO, D. et al. Biomedical Applications of Chitosan and Its Derivative Nanoparticles. **Polymers**, v.10, n.4, 462, 2018.

CAPÍTULO 27: OTIMIZAÇÃO DO MEIO DE CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE UM COMPLEXO ENZIMÁTICO A PARTIR DE CASCA DE *Mangifera indica* L. (MANGA) POR FERMENTAÇÃO SÓLIDA

CHAPTER 27: OPTIMIZATION OF THE CULTURE MEDIA FOR THE PRODUCTION OF ENZYMATIC COMPLEX FROM THE SHELL OF *Mangifera indica* L. (MANGA) UNDER SOLID FERMENTATION

Sergio Luis Yupanqui Mendoza¹; Ángel Pablo Castro Alvarado²; Gracinda Marina Castelo da Silva³

Resumo

Os componentes do meio de cultura para a produção de um extrato enzimático, a partir da fermentação em substrato sólido de cascas de manga por *Aspergillus niger* ATCC 9642, foram otimizados utilizando um Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR). Os resultados obtidos com a metodologia Plackett-Burman, indicaram que das cinco variáveis estudadas, apenas três (peptona, extrato de levedura e pectina cítrica) foram consideradas significativas ($p < 0,05$) para a produção enzimática. A otimização das três variáveis foi realizada através do método DCCR, cobrindo um total de 18 unidades experimentais, incluindo quatro pontos centrais. A atividade enzimática máxima apresentada para a celulase total foi de 0,819 U/g, de 26,97 U/g para a endoglucanase (CMCase) e de 129,86 U/g para a pectinase, valores experimentais obtidos quando se utilizou um meio sólido otimizado composto por: casca de manga suplementado com peptona 5,5 g/L, extrato de levedura 6,84 g/L e pectina cítrica 6,94 g/L. Os testes de validação dos modelos polinomiais apresentaram um relacionamento adequado entre os valores previstos e experimentais, para as atividades enzimáticas FPase, CMCase e pectinase.

Palavras-Chaves: Extrato enzimático, fermentação em substrato sólido, cascas de manga, otimização.

Abstract

The components of the culture medium for the production of enzymatic extract, from fermentation in solid substrate of mango peels by *Aspergillus niger* ATCC 9642, were optimized using a Central Rotational Compound Design (DCCR). The results obtained with the Plackett-Burman methodology, indicated that of the five variables studied, only three (peptone, yeast extract and citrus pectin) were considered significant ($p < 0,05$) for enzyme production. The optimization of the three variables was performed using the DCCR, covering a total of 18 experimental units, including four central points. The maximum enzymatic activity presented for total cellulase was 0,819 U/g, for endoglucanase (CMCase) of 26,97 U/g and pectinase activity of 129,86 U/g, experimental values that were obtained when using a solid medium optimized composed of mango peel supplemented with 5,5 g/L peptone, 6,84 g/L yeast extract and 6,94 g/L citrus pectin. The validation tests of the polynomial models showed an adequate relationship between the predicted and experimental values, for the enzymatic activities FPase, CMCase and pectinase.

Keywords: Enzymatic extract, solid-state fermentation, mango peels, optimization.

¹ Programa de Pós-graduação em Processos Químicos e Biotecnológicos (PPGQB), Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Brasil, sergioluis@alunos.utfpr.edu.br

² Programa de Graduación en Biotecnología, Universidad Nacional del Santa, Perú, acalcastro@gmail.com

³ Doutora em Engenharia Química, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Brasil, gmarina@utfpr.edu.br

Introdução

O aumento da demanda por produtos agroindustriais aumenta exponencialmente conforme o crescimento da população. Satisfazer a demanda leva a uma maior produção de produtos alimentícios, resultando em um alto nível de resíduos. O acúmulo desses resíduos não apenas representa um problema ambiental, mas também resulta em perda de material potencialmente valioso devido à variabilidade de sua composição estrutural, destacando seu alto valor nutricional (MUÑOZ; PANTOJA; CUATIN, 2014). Tendo em conta a necessidade de administrar a enorme quantidade de resíduos agroindustriais produzidos e agregando a ele seu baixo custo, alta disponibilidade e alto valor nutricional, aumentou-se o interesse em seu uso em processos biotecnológicos (MOJUMDAR; DEKA, 2019).

A biotecnologia aplicada ao uso de material agroindustrial tem sido responsável por reescrever o que é geralmente conhecido por "desperdício", para matérias-primas, formando e desenvolvendo outros produtos (SADH; DUHAN; DUHAN, 2018). Dessa forma, a disponibilidade desses nutrientes em matérias-primas agroindustriais oferece ambientes adequados para o crescimento de microrganismos.

A manga é uma das principais frutas produzidas no Brasil e detém o título da fruta com maior valor nas exportações brasileiras (ANUÁRIO BRASILEIRO DE HORTI&FRUTI, 2019). O resíduo da industrialização da manga é constituído principalmente por casca e semente, representando entre 40% a 60% da fruta (MUÑOZ; PANTOJA; CUATIN, 2014). Sua importante fonte de carboidratos, proteínas, pectinas, fibras e componentes minerais levou esses resíduos a serem candidatos a substratos para a produção de enzimas hidrolíticas por fermentação sólida (Vários).

O grupo de enzimas celulase e pectinases está dentro do grupo enzimático mais amplamente utilizado comercialmente. Ambos os complexos podem ser sintetizados extracelularmente via fermentação por uma ampla variedade de fungos filamentosos, entre os quais as cepas de *Aspergillus niger* apresentaram rendimentos mais elevados (MRUDULA; MURUGAMMAL, 2011).

Em suma, é importante estabelecer condições de fermentação que maximizem a produção enzimática, para isso, vários meios de cultura são utilizados para suprir as necessidades nutricionais dos microrganismos. Por sua vez, o complexo enzimático produzido deve apresentar um equilíbrio adequado de atividade entre as diferentes enzimas celulolíticas que agem sinergicamente em conjunto com as enzimas pectinolíticas. Assim, o presente trabalho tem como objetivo otimizar o meio de cultura para a produção de um complexo enzimático por *Aspergillus niger* ATCC 9642 em meio de fermentação sólido, utilizando casca de manga como principal fonte de carbono e energia.

Material e Métodos

Microrganismo

O microrganismo utilizado para a fermentação foi uma linhagem de *Aspergillus niger* ATCC 9642, pertencente à coleção do Laboratório de Biotecnologia Marinha do “*Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada*” (CICESE), Baja California, México. Os esporos de manutenção do fungo filamentoso foram preservados em tubos com tampa de rosca, em solução estéril e armazenados a -4 °C. A ativação dos esporos foi realizada utilizando a metodologia proposta por Rodríguez-Zúñiga *et al.*, (2011), com algumas modificações em duas etapas de transferência. Inicialmente, os esporos foram transferidos para um meio básico formulado por Couri e Farias (1995), com a seguinte composição (g/L): Pectina cítrica (10,0), NaNO₃ (3,0), KH₂PO₄ (1,0), MgSO₄.7H₂O (0,5), KCl (0,5), FeSO₄.7H₂O (0,01), ágar-ágar (20,0), pH do meio ajustado em 4,2 e incubado por 5 dias a 30 °C. Os conídios crescidos foram suspensos em 10 mL de solução estéril de Tween 80 estéril a 0,1% (p/v).

A segunda etapa de transferência consistiu em inocular 1 mL de conídios suspensos em solução estéril em um Erlenmeyer de 250 mL contendo 5 g de casca de manga estéril e prétratada, ajustando a umidade com água destilada a 70%, com pH de 4,5 a 32 °C por 5 dias, período em que a formação micelial fúngica foi verificada. Para obter a solução de inoculação, 100 mL de solução de surfactante estéril Tween 80 a 0,1% (p/v) foram adicionados ao frasco Erlenmeyer contendo os esporos crescentes na casca de manga. A suspensão de esporos foi separada das partículas de casca de manga por filtração com gaze. A concentração final de inóculo para todas as fermentações realizadas foi de 10⁷ esporos por grama de substrato sólido, sendo determinada por meio de uma câmara de Neubauer.

Substrato e condições de pré-tratamento

Os resíduos de casca de manga da variedade Kent foram gentilmente doados pela empresa “*Inversiones Frigoríficas PRC S.A.*” localizado na cidade de Santa, Áncash, Peru.

Com o objetivo de aumentar a biodisponibilidade de estruturas celulósicas das cascas de manga nas fermentações sólidas, foi realizado um tratamento térmico com água fervente. Primordialmente, as cascas de manga foram cortadas em tamanho uniforme de aproximadamente 10 cm e, em seguida, tratadas com água destilada em ebulição, seguindo o método descrito por Mostafa *et al.*, (2013). Para aumentar a área de ação enzimática, as fibras de casca de manga tratadas foram esmagadas em um moinho de facas e peneiradas, até atingir um tamanho de partícula de 0,5 mm. As porcentagens de massa seca de lignina, celulose, hemicelulose e pectina foram estimadas antes e após o tratamento.

Condições de fermentação e extração enzimática

Os meios de fermentação sólidos para a produção de enzimas foram preparados seguindo a metodologia proposta por Rodríguez-Zúñiga *et al.*, (2011), apresentando algumas modificações. Foram utilizados frascos Erlenmeyer de 250 mL aos quais foram adicionados 5 g de casca de manga pré-tratada. O meio basal descrito por Mandels e Weber (1969), foi utilizado para todas as fermentações sólidas, variando apenas as concentrações de peptona, uréia, extrato de levedura (NH₄)₂SO₄ e pectina cítrica para indução de atividade enzimática, a formulação dos meios foi realizado seguindo o delineamento experimental Plackett-Burman. As condições fermentativas foram realizadas com temperatura de 32 °C, pH em 4,5, ajustando a porcentagem de umidade para 70% com água destilada suplementada com nutrientes (concentrações de acordo com o delineamento experimental). Os frascos Erlenmeyer foram finalmente esterilizados a 121 °C, 1 atm por 30 min.

A extração enzimática foi realizada seguindo a metodologia proposta por Mrudula e Murugammal (2011). O extrato enzimático foi extraído do meio sólido misturando homogeneamente todo o meio de fermentação com água destilada (1:10 p/v) e agitada em um agitador rotativo (120 rpm) a 30 °C com um tempo de contato de 1 hora. Utilizou-se um tecido gaze umedecido para filtrar os extratos para depois ser centrifugados a 6000 rpm por 15 min, o sobrenadante claro foi usado como fonte de enzima extracelular.

Determinação da atividade enzimática

A atividade da endoglucanase ou carboximetilcelulase (CMCase) foi determinada medindo espectrofotometricamente os açúcares redutores produzidos a partir de 2% (p/v) de carboximetilcelulose, enquanto a atividade celulase total-teste de papel de filtro (FPase) foi determinada pela estimativa dos açúcares redutores liberados durante a degradação do papel de filtro Whatman N° 1 (1,0 × 6,0 cm) (WOOD; BHAT, 1988). O método do ácido dinitrosalicílico (DNS) foi utilizado para quantificação da atividade enzimática. Os ensaios de reação foram realizados incorporando 0,5 mL de tampão de citrato de sódio 50 mM (pH 4,8), extrato enzimático de 0,5 mL e 0,5 mL de carboximetilcelulose (2% em volume) em um tubo de ensaio. A reação de controle negativo não continha CMC e o branco continha 0,5 mL de DNS e 0,5 mL de tampão de citrato de sódio. Para a atividade FPase, 1 mL de tampão de citrato de sódio 50 mM (pH 4,8), 0,5 mL de extrato enzimático e uma tira de papel de filtro foram adicionados a um tubo. O controle negativo continha 1,5 mL de tampão e uma tira de papel de filtro e o branco continha 0,5 mL de tampão e 0,5 mL de DNS. O tempo de reação foi de 10 min para CMCase e FPase, que então foram incubadas a 50 °C. As amostras foram diluídas com a adição de 10 mL de água destilada para medições de absorbância a 540 nm. Uma unidade de atividade

da CMCase ou FPase (U) é definida como 1 µmol de açúcar redutor liberado por minuto de reação. Entretanto, a medição da atividade da pectinase foi realizada utilizando pectina cítrica (pectina 0,5% em tampão citrato de sódio 0,05 M, pH 4,8), nas mesmas condições supracitadas. Uma unidade de atividade enzimática pectinase foi definida como a quantidade de enzima que libera 1 µmol de açúcares redutores (como ácido galacturônico) por minuto de reação.

Delineamento Experimental

Metodologia Plackett-Burman

A triagem dos componentes do meio de fermentação e seus efeitos sobre a atividade enzimática foram determinados por meio do delineamento experimental Plackett-Burman, utilizando o software Statistica versão 10.0 (StatSoft Inc. 2010, EUA). O delineamento experimental consiste no uso de dois níveis, que localizam variáveis significativas ao rastrear as variáveis "n" nos experimentos "n + 1" (KARLAPUDI et al., 2018).

Testou-se cinco fatores (listados na Tabela 1), obtendo-se um conjunto de oito experimentos (Tabela 2). Cabe mencionar que todos os experimentos foram realizados em triplicata. O efeito principal foi calculado basicamente como uma diferença entre as medições médias de cada variável realizada em um nível alto (+1) e baixo (-1), selecionando as variáveis em um modelo de primeira ordem, como mostra a equação 1.

$$Y = \beta_0 + \sum \beta_i x_i \quad (1)$$

onde Y foi a resposta (atividade enzimática), β_0 foi o intercepto do modelo, β_i é o coeficiente de regressão e x_i é a variável independente.

A análise estatística do modelo foi realizada para o cálculo da análise de variância (ANOVA), considerando que os fatores com nível de significância de 5% ($p < 0,05$) tiveram efeito significativo no meio de fermentação para produção de enzimas.

Tabela 1. Valores e níveis das variáveis do planejamento Plackett-Burman

Delineamento Variáveis	Concentração (g/L)	-1	+1
experimental			
	Peptona (X ₁)	0,75	6,00
	Extrato de levedura (X ₂)	0,25	6,00
	Ureia (X ₃)	0,3	3,00
Plackett-Burman			
	(NH ₄) ₂ SO ₄ (X ₄)	1,4	3,00
	Pectina cítrica (X ₅)	1,00	5,00

Fonte: Própria (2020).

Delineamento Composto Central Rotacional

Após a seleção das variáveis, o DCCR foi utilizado para otimizar a atividade enzimática do extrato produzido. Foi realizado um planejamento fatorial 2³, incluindo seis pontos axiais, oito pontos fatoriais e quatro pontos centrais, obtendo um número total de 18 unidades experimentais. Após a medição das respostas, cada uma foi ajustada a um modelo polinomial independente de segunda ordem, que foi usado para representar graficamente as superfícies de resposta, como mostra a equação 2.

$$Y = \beta_0 + \sum \beta_i x_i + \sum \beta_{ij} x_i x_j + \sum \beta_{ii} x_i^2 \quad (2)$$

onde Y é o valor de resposta previsto (atividade enzimática otimizada), β_0 é o coeficiente de termo constante, β_i é o coeficiente de efeito linear, β_{ii} é o coeficiente de efeito quadrático, β_{ij} é o coeficiente de interação dos efeitos, x_i e x_j são os níveis codificado das variáveis X_i e X_j . A relação entre x_i e o valor verdadeiro da variável independente X_i é a seguinte:

$$x_i = \frac{X_i - X_0}{\Delta X_i} \quad (3)$$

onde X_0 é o valor real da variável independente no ponto central do teste e ΔX_i é a mudança de etapa da variável independente.

A Tabela 2 representa os níveis das variáveis independentes utilizadas na experimentação. As variáveis dependentes (respostas) foram as atividades enzimáticas de celulase (CMCase e FPase) e pectinase, expressas em unidades enzimáticas por grama de substrato sólido utilizado (U/g).

Tabela 2. Valores e níveis das variáveis do Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR)

Delineamento experimental	Variáveis	Concentração (g/L)				
		-1,682	-1	0	+1	+1,682
DCCR	Peptona (X ₁)	2,136	3,50	5,50	7,50	8,864
	Extrato de levedura (X ₂)	0,995	3,00	6,00	9,00	11,045
	Pectina cítrica (X ₃)	4,136	5,5	7,5	9,5	10,864

Fonte: Própria (2020).

Resultados e Discussão

Seleção das variáveis significativas

A Tabela 3 representa a matriz experimental para o planejamento Plackett-Burman para a seleção de variáveis significativas no processo de fermentação sólida. Foi realizado um total de oito ensaios, utilizando um total de cinco variáveis independentes, representadas em valores reais e valores codificados. Foi possível observar um máximo de atividade enzimática para FPase (0,367 U/g), CMCase (11,758 U/g) e Pectinase (84 U/g), empregando um meio sólido suplementado com nutrientes, de acordo com a seguinte composição: peptona 6,00 g/L, extrato de levedura 6,00 g/L, ureia 3,00 g/L, (NH₄)₂SO₄ 3,00 g/L e pectina cítrica em 5,00 g/L.

De acordo com a análise de variância ANOVA (dados não mostrados) e o gráfico de Pareto para a atividade celulase total (FPase), conforme representado na Figura 1.A, todas as variáveis estudadas apresentaram efeitos positivos. No entanto, apenas o extrato de levedura e peptona foram significativas ($p < 0,05$).

Da mesma forma, para a análise da atividade da Carboximetilcelulase (CMCase), como mostra o gráfico de Pareto na Figura 1.B, três variáveis foram significativas, dentre elas o extrato de levedura, pectina cítrica e peptona ($p < 0,05$), todas apresentando efeitos positivos para a fermentação.

Finalmente, a atividade enzimática pectinase apresentou duas variáveis significativas (Figura 1.C), pectina cítrica e extrato de levedura, ambas variáveis com efeitos positivos. Dessa forma, três nutrientes foram selecionados como variáveis independentes (peptona, extrato de levedura e pectina cítrica), para fins de otimização, utilizando as variáveis significativas no meio de fermentação para complementar os requisitos nutricionais das três atividades enzimáticas.

Tabela 3. Delineamento experimental Plackett-Burman com as cinco variáveis em estudo e as atividades enzimáticas para FPase, CMCase e Pectinase.

Ensaio	Peptona		Extrato de levedura		Ureia		(NH ₄) ₂ SO ₄		Pectina cítrica		FPase	CMCase	Pectinase
	X ₁ (g/L)	x ₁	X ₂ (g/L)	x ₂	X ₃ (g/L)	x ₃	X ₄ (g/L)	x ₄	X ₅ (g/L)	x ₅	U/g	U/g	U/g
1	0,75	-1	0,25	-1	0,3	-1	3,0	1	5,0	1	0,021	3,996	55,320
2	6,0	1	0,25	-1	0,3	-1	1,4	-1	1,0	-1	0,112	4,097	35,190
3	0,75	-1	6,0	1	0,3	-1	1,4	-1	5,0	1	0,198	9,129	70,346
4	6,0	1	6,0	1	0,3	-1	3,0	1	1,0	-1	0,324	8,836	49,080
5	0,75	-1	0,25	-1	3,0	1	3,0	1	1,0	-1	0,098	1,931	15,759
6	6,0	1	0,25	-1	3,0	1	1,4	-1	5,0	1	0,175	7,418	65,070
7	0,75	-1	6,0	1	3,0	1	1,4	-1	1,0	-1	0,216	5,719	42,129
8	6,0	1	6,0	1	3,0	1	3,0	1	5,0	1	0,367	11,758	84,635

Fonte: Própria (2020).

Figura 1. Gráficos de Pareto das variáveis significativas do meio de cultura da fermentação sólida. (A) Atividade celulase total (FPase), (B) Atividade endoglucanase (CMCase) e (C)

Fonte: Própria (2020).

Otimização do meio de cultura

Foi realizado um DCCR, a fim de otimizar os componentes do meio fermentativo sólido e determinar seu efeito na atividade enzimática celulase (CMCase e FPase) e pectinase do extrato produzido por *Aspergillus niger* ATTC 9642.

Os experimentos realizados foram planejados com o objetivo de obter modelos quadráticos capazes de descrever o comportamento da enzima produzida no meio sólido de fermentação sob diferentes concentrações de nutrientes.

Nesse contexto, a matriz do DCCR 2³ (valores reais e codificados das concentrações de peptona, extrato de levedura e pectina cítrica) e os resultados das atividades enzimáticas da enzima Carboximetilcelulase (CMCase), atividade celulase pape filtro (FPase) e Pectinase obtidas a partir da fermentação em estado sólido de *Aspergillus niger* ATCC 9642, são apresentadas na Tabela 4.

Tabela 4. Matriz DCCR com os três componentes do meio de cultura para otimização

Ensaio	Peptona		Extrato de levedura		Pectina cítrica		FPase	CMCase	Pectinase
	X ₁ (g/L)	x ₁	X ₂ (g/L)	x ₂	X ₃ (g/L)	x ₃	U/g	U/g	U/g
1	3.5	-1	3,0	-1	5,5	-1	0.457	17.685	79.145
2	3.5	-1	3,0	-1	9,5	1	0.351	11.171	45.089
3	3.5	-1	9,0	1	5,5	-1	0.653	21.092	123.109
4	3.5	-1	9,0	1	9,5	1	0.487	19.057	80.990
5	7.5	1	3,0	-1	5,5	-1	0.591	18.321	105.214
6	7.5	1	3,0	-1	9,5	1	0.501	14.450	73.891
7	7.5	1	9,0	1	5,5	-1	0.621	20.478	88.053
8	7.5	1	9,0	1	9,5	1	0.559	17.994	65.879
9	2.136	-1.682	6,0	0	7,5	0	0.457	14.256	87.210
10	8.864	1.682	6,0	0	7,5	0	0.521	16.767	111.073
11	5.5	0	0,955	-1.682	7,5	0	0.411	14.012	55.391
12	5.5	0	11,045	1.682	7,5	0	0.522	17.980	76.904
13	5.5	0	6,0	0	4,136	-1.682	0.759	23.890	95.008
14	5.5	0	6,0	0	10,864	1.682	0.587	15.761	80.095
15	5.5	0	6,0	0	7,5	0	0.795	25.017	119.908
16	5.5	0	6,0	0	7,5	0	0.808	25.129	120.108
17	5.5	0	6,0	0	7,5	0	0.801	25.008	120.479
18	5.5	0	6,0	0	7,5	0	0.805	24.908	121.660

Fonte: Própria (2020).

Foi possível determinar uma atividade enzimática máxima para carboximetilcelulase (CMCase), atividade de celulase total-ensaio com papel filtro (FPase) e pectinase de 0,808 U/g, 25,129 U/g, 123,109 U/g, respectivamente.

Os modelos polinomiais de segunda ordem expressos pelas equações 4,5 e 6, em que as variáveis (x_1 , x_2 e x_3) assumiram seus valores codificados, representam a atividade enzimática FPase, CMCase e pectinase, respectivamente, dependendo da concentração de peptona (x_1), extrato de levedura (x_2) e pectina cítrica (x_3) no meio de fermentação sólido.

$$FPase (U/g) = 0,802 + 0,031x_1 - 0,11x_1^2 + 0,044x_2 - 0,118x_2^2 - 0,052x_3 - 0,045x_3^2 - 0,03x_1x_2 + 0,015x_1x_3 - 0,004x_2x_3 \quad (4)$$

$$CMCase (U/g) = 24,972 + 0,473x_1 - 3,165x_1^2 + 1,733x_2 - 2,994x_2^2 - 2,09x_3 - 1,64x_3^2 - 0,69x_1x_2 + 0,27x_1x_3 + 0,73x_2x_3 \quad (5)$$

$$Pectinase (U/g) = 120,51 + 3,28x_1 - 7,44x_1^2 + 6,65x_2 - 19,10x_2^2 - 11,33x_3 - 11,53x_3^2 - 13,13x_1x_2 + 2,83x_1x_3 + 0,13x_2x_3 \quad (6)$$

A análise de variância ANOVA foi realizada para validar estatisticamente os modelos polinomiais. A ANOVA para o modelo de segunda ordem referente à resposta da atividade da FPase (dados não apresentados), indicou que todos os efeitos lineares e quadráticos foram significativos, assim como a interação entre a concentração de peptona e o extrato de levedura ($p < 0,05$). As interações entre a concentração de peptona-pectina e extrato de levedura-pectina não apresentaram significância estatística. Da mesma forma, a análise de variância mostrou um R^2 de 0,989, ou seja, aproximadamente 98,9% da variação observada na atividade FPase, pode ser explicada pelo modelo ajustado expresso na Equação 4. Portanto, a validade do modelo pode ser afirmada para explicar o comportamento da variável dependente. Por sua vez, também foi determinado o R^2 ajustado, cujo valor garante ou não um ajuste satisfatório do modelo polinomial de segunda ordem aos dados avaliados na experimentação. O R^2 ajustado para a atividade FPase foi 0,977, valor numericamente semelhante ao R^2 do modelo.

A ANOVA para o modelo de segunda ordem referente à resposta da atividade da carboximetilcelulose (CMCase) indicou que os efeitos lineares e quadráticos da concentração do extrato de levedura e pectina, bem como o efeito quadrático da concentração de peptona, foram significativos ($p < 0,05$). O efeito das interações entre as variáveis (peptona-extrato de levedura, peptona-pectina cítrica e extrato de levedura-pectina cítrica), bem como o efeito linear da peptona não foram significativos. O R^2 do modelo foi de 0,973, ou seja, aproximadamente 97,3% da variação observada na atividade de carboximetilcelulase (CMCase), pode ser explicada pelo modelo ajustado expresso na Equação 5. Portanto, a validade do modelo pode

ser usada para explicar o comportamento da variável dependente. O R^2 ajustado para a atividade CMCase foi 0,944, numericamente similar ao R^2 do modelo.

A análise ANOVA do último caso, correspondente à atividade da pectinase, mostrou que os efeitos linear e quadrático da concentração de extrato de levedura e pectina cítrica foram significativos, assim como o efeito quadrático da concentração de peptona e a interação entre a concentração do extrato de levedura e peptona ($p < 0,05$). O R^2 neste caso foi de 0,936 e o R^2 ajustado de 0,864; sendo capaz de afirmar a validade do modelo para explicar o comportamento da atividade da pectinase.

O valor estatístico resultante da otimização do meio de cultura para a concentração de peptona foi de 5,5 g/L, extrato de levedura com 6,84 g/L e concentração de pectina cítrica em 6,93 g/L. Os valores previstos foram o resultado da análise estatística para um perfil de desejabilidade ideal das atividades enzimáticas em estudo; os valores das atividades enzimáticas previstas foram para atividade celulase total (FPase) de 0,808 U/g, atividade de endoglucanase ou carboximetilcelulase de 25.129 U/g e atividade de pectinase de 123,11 U/g.

A otimização do meio de cultura mostrou que uma concentração moderada de fontes de nitrogênio (extrato de levedura e peptona) tem um efeito positivo na atividade celulase. Os efeitos quadráticos significativos das concentrações do meio para peptona, extrato de levedura e pectina cítrica mostraram uma região ótima para as três atividades enzimáticas em estudo (curvatura nas superfícies de resposta). O aumento da concentração de extrato de levedura em todas as fermentações significou uma diminuição da atividade enzimática, Infanzón-Rodríguez *et al.*, (2020) afirmaram que um aumento excessivo na concentração de extrato de levedura, embora favorecesse o crescimento de fungos, diminui a atividade celulase.

Da mesma forma, o valor estatístico previsto na experimentação para o extrato de levedura (6,84 g/L) coincide com os resultados obtidos por Shahriarinnour *et al.*, (2011), nos quais determinou maior atividade enzimática da FPase e da CMCase empregando um meio sólido suplementado com 6 g/L de extrato de levedura.

O efeito da concentração de peptona foi semelhante ao efeito obtido com a suplementação do extrato de levedura, apresentando algumas modificações. O efeito quadrático da concentração de peptona no meio de fermentação sólido foi significativo para todas as atividades enzimáticas, ao contrário de seu efeito linear, o qual apenas teve um efeito significativo no cálculo da atividade celulase total (FPase). Pode-se afirmar que a concentração adequada de peptona em um meio de fermentação não deve estar fora da faixa de otimização estabelecida (5,5 g/L na experimentação). A peptona é considerada uma excelente fonte de nitrogênio para a produção de celulases, como o extrato de levedura, sendo considerada por

alguns autores a principal fonte de nitrogênio na produção de enzimas celulases (GAUTAM *et al.*, 2011; SHOUKRY; HASSAN; EL-SHALL, 2019).

A concentração de pectina no meio de cultura teve um efeito significativo na análise da atividade da celulase e pectinase. A enzima pectinase pode quebrar polímeros heterogêneos de hemicelulose que se interconectam com as microfibrilas de celulose (GUPTA *et al.*, 2016). Portanto, isso explica o fato do trabalho sinérgico das enzimas celulases e pectinases no extrato enzimático produzido; para o benefício da hidrólise da celulose.

Assim, uma clara redução na atividade enzimática pectinase também foi evidenciada quando se utilizou meios de cultura com baixas concentrações de pectina, bem como uma clara melhoria na atividade enzimática ao trabalhar em altas concentrações das mesmas, isso pode explicar o caráter induzível das enzimas pectinases em diferentes concentrações de pectina (AHMED *et al.*, 2016). Todavia, embora baixas concentrações de pectina produzam baixa atividade pectinase, na experimentação foi possível obter o contrário, dito de outro modo, utilizando o valor estatístico da concentração de pectina (6,94 g/L) que se relaciona à porcentagem de pectina no meio de cultura sólido, valor moderadamente baixo; é possível obter como resultado uma alta atividade enzimática pectinase estimada em 123,11 U/g (valor estatístico previsto de acordo com o DCCR).

A atividade de pectinase apresentada, embora tenha um perfil induzido pela concentração de pectina, a contribuição da composição estrutural das cascas de manga foi uma vantagem considerável sobre a atividade enzimática. As cascas de manga são compostas por carotenoides, fibra dietética, polifenóis e pectina, sendo esta última considerada um dos principais constituintes estruturais da parede celular (15% do peso seco da casca) e, por sua vez, reconhecida por diferentes autores por sua alta qualidade (BERARDINI *et al.*, 2005).

A Figura 2 mostra os gráficos da superfície de resposta e os gráficos de contorno para a interação entre a concentração do extrato de levedura e peptona em resposta à atividade enzimática FPase, CMCase e pectinase. Os gráficos são representações das equações polinomiais de segundo grau mostradas nas equações 4,5 e 6. Pode-se observar que, todos os gráficos da superfície de resposta e os gráficos de contorno têm uma região com presença de curvatura ou superfície quadrática, que, como já foi definido, é a região onde apresenta uma maximização da resposta estudada. As demais interações resultantes do delineamento experimental não foram apresentadas neste estudo, porém apresentaram superfícies semelhantes.

Figura 2. Gráficos de superfície de resposta e gráficos de contorno para a interação entre a concentração de peptona e o extrato de levedura em resposta à atividade enzimática. (A) Atividade celulase total (FPase), (B) atividade de endoglucanase (CMCase) e (C) atividade pectinase de *Aspergillus niger* ATCC 9642.

Fonte: Própria (2020).

Validação dos modelos

Para confirmar a validade dos modelos, foi utilizado o meio sólido composto por casca de manga como principal fonte de carbono, suplementado com as concentrações otimizadas descritas anteriormente (5,5 g/L de peptona; 6,84 g/L de extrato de levedura e 6,94 g/L de pectina cítrica). As condições de temperatura, pH, tempo de fermentação e porcentagem de umidade foram ajustadas conforme mencionado no delineamento experimental. Todas as experiências foram realizadas em triplicata.

Os valores experimentais foram 0,819 U/g para a atividade celulase total (FPase), 26,972 U/g para a atividade endoglucanase ou carboximetilcelulase (CMCase) e 129,86 U/g para a atividade da pectinase. Foi possível demonstrar uma diferença positiva entre o valor previsto e o experimental de 1,3%, 7,33% e 5,48%, para as atividades enzimáticas FPase, CMCase e pectinase, respectivamente, verificando a validade do modelo otimizado.

Os resultados obtidos correspondentes à atividade da enzima celulase são ligeiramente superiores aos resultados encontrados por Rodríguez-Zúñiga *et al.*, (2011), os quais relataram atividade da enzima FPase e CMCase de 0,41 U/g e 21,0 U/g, respectivamente; por outro lado, os resultados da atividade da pectinase foram inferiores aos relatados por Kumar; Sharma; Sarkar, (2011), os quais detalham atividade pectinase de 179,83 U/g, 26% a mais do que o relatado neste estudo.

Conclusões

Com base nos resultados, o uso de cascas de manga suplementadas com fontes de nitrogênio e pectina como indutor enzimático foi satisfatório para a produção de enzimas celulase e pectinase. Da mesma forma, o uso do planejamento experimental Plackett-Burman, bem como o Delineamento composto central rotacional (DCCR), foram ferramentas eficientes para otimizar as condições do meio de cultura sólido. A atividade enzimática máxima correspondente à celulase total, endoglucanase e pectinase foi de 0,819 U/g, 26,972 U/g e 129,86 U/g respectivamente, alcançada com um meio sólido composto por cascas de manga suplementadas com 5,5 g/L de peptona; 6,84 g/L de extrato de levedura e 6,94 g/L de pectina cítrica. A conformação estrutural das cascas de manga, por sua vez, facilitou a indução de pectinases excretadas no meio de fermentação, e também favoreceu o trabalho sinérgico enzimático entre celulasas e pectinases. Dessa forma, verifica-se a viabilidade de resíduos agroindustriais, como cascas de manga, para a produção de extratos enzimáticos.

Referências

- AHMED, I. et al. Bioprocessing of citrus waste peel for induced pectinase production by *Aspergillus niger*; its purification and characterization. **Journal of Radiation Research and Applied Sciences**, Special issue on: “Current Research and Future Trends in Biotechnology for a Healthy and Green Word”. v. 9, n. 2, p. 148–154, 1 abr. 2016.
- ANUÁRIO BRASILEIRO DE HORTI&FRUTI 2019. **Santa Cruz do Sul: Editora Gazeta Santa Cruz**, p. 98, 2019.
- BERARDINI, N. et al. Utilization of mango peels as a source of pectin and polyphenolics. **Innovative Food Science & Emerging Technologies**, v. 6, n. 4, p. 442–452, dez. 2005.
- COURI, S.; FARIAS, A. X. Genetic manipulation of *Aspergillus niger* for increased synthesis of pectinolytic enzymes. **Revista de microbiologia**, v. 26, n. 4, p. 314–317, 1995.
- GAUTAM, S. P. et al. Optimization for the Production of Cellulase Enzyme from Municipal Solid Waste Residue by Two Novel Cellulolytic Fungi. **Biotechnology Research International**, v. 2011, 23 jan. 2011.
- GUPTA, V. K. et al. Fungal Enzymes for Bio-Products from Sustainable and Waste Biomass. **Trends in Biochemical Sciences**, v. 41, n. 7, p. 633–645, 1 jul. 2016.
- INFANZÓN-RODRÍGUEZ, M. I. et al. Optimization of Cellulase Production by *Aspergillus niger* ITV 02 from Sweet Sorghum Bagasse in Submerged Culture Using a Box–Behnken Design. **Sugar Tech**, v. 22, n. 2, p. 266–273, abr. 2020.
- KARLAPUDI, A. P. et al. Plackett-Burman design for screening of process components and their effects on production of lactase by newly isolated *Bacillus* sp. VUVD101 strain from Dairy effluent. **Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences**, v. 7, n. 4, p. 543–546, 1 dez. 2018.
- KUMAR, S.; SHARMA, H. K.; SARKAR, B. C. Effect of substrate and fermentation conditions on pectinase and cellulase production by *Aspergillus niger* NCIM 548 in submerged (SmF) and solid state fermentation (SSF). **Food Science and Biotechnology**, v. 20, n. 5, p. 1289, 31 out. 2011.
- MOJUMDAR, A.; DEKA, J. Recycling agro-industrial waste to produce amylase and characterizing amylase–gold nanoparticle composite. **International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture**, v. 8, n. 1, p. 263–269, 1 dez. 2019.
- MOSTAFA, F.; AHMED, S.; HELMY, W. ORIGINAL ARTICLES Enzymatic Saccharification of Pretreated Lemon Peels for Fermentable Sugar Production. **Journal of Applied Sciences Research**, v. 9, p. 2301–2310, 1 jan. 2013.
- MRUDULA, S.; MURUGAMMAL, R. Production of cellulase by *Aspergillus niger* under submerged and solid state fermentation using coir waste as a substrate. **Brazilian Journal of Microbiology**, v. 42, n. 3, p. 1119–1127, set. 2011.

MUÑOZ, D.; PANTOJA, A. J.; CUATIN, M. F. Aprovechamiento de Residuos Agroindustriales como Biocombustible y Biorefinería. v. 12, n. 2, p. 10, 2014.

RODRÍGUEZ-ZÚÑIGA, U. F. et al. Produção de celulases por *Aspergillus niger* por fermentação em estado sólido. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 46, n. 8, p. 912–919, ago. 2011.

SADH, P. K.; DUHAN, S.; DUHAN, J. S. Agro-industrial wastes and their utilization using solid state fermentation: a review. **Bioresources and Bioprocessing**, v. 5, n. 1, p. 1, 2 jan. 2018.

SHAHRIARINOUR, M. et al. Effect of medium composition and cultural condition on cellulase production by *Aspergillus terreus*. **African Journal of Biotechnology**, v. 10, p. 7459–7467, 1 jul. 2011.

SHOUKRY, A.; HASSAN, F.; EL-SHALL, H. Optimization of Cellulase Enzyme Production from *Pleurotus* under Submerged Fermentation. 6 abr. 2019.

WOOD, T. M.; BHAT, K. M. Methods for measuring cellulase activities. In: **Methods in Enzymology**. Biomass Part A: Cellulose and Hemicellulose. [s.l.] Academic Press, 1988. v. 160p. 87–112.

CAPÍTULO 28: POTENCIAL FARMACOLÓGICO DA GOMA DO CAJUEIRO (*Anacardium occidentale* L.): UM BIOPOLÍMERO DO NORDESTE BRASILEIRO

CHAPTER 28: PHARMACOLOGICAL POTENTIAL OF CASHEW GUM (*Anacardium occidentale* L.): A BIOPOLYMER FROM THE NORTHEAST BRAZIL

Márcia Nieves Carneiro da Cunha¹; Maria Clara do Nascimento², Carla Lêdo Moraes³, Juanize Matias da Silva Batista⁴, Vagne de Melo Oliveira⁵, Ana Lúcia Figueiredo Porto⁶

Resumo

A goma de cajueiro (*Anacardium occidentale* L.) (GC) é composta principalmente por uma estrutura heteropolissacarídica altamente ramificada, constituída por galactose em sua cadeia principal com ligações (1 → 3) e cadeias laterais com ligações (1 → 6). A GC vem sendo utilizada em importantes processos biotecnológicos. Desta forma, a presente revisão objetiva realizar uma breve prospecção sobre a GC, suas propriedades biológicas e possíveis aplicações biotecnológicas. Para tal, foi realizado um levantamento dos artigos publicados sobre o tema disponíveis nas bases de dados Science direct, Scopus e Web of Science. Estudos demonstram o grande potencial de GC para aplicações farmacológicas e aplicação em processor de liberação controlada de drogas.

Palavras-Chave: Polissacarídeos, exsudatos vegetais, Gomas vegetais

Abstract

Cashew gum (*Anacardium occidentale* L.) (CG) is mainly composed of a highly branched heteropolysaccharide structure, consisting of galactose in its main chain with bonds (1 → 3) and side chains with bonds (1 → 6). A CG has been used in important biotechnological processes. Thus, this review aims to provide a brief prospection about CG, its biological properties, and possible biotechnological applications. To this end, a survey of articles published on ready to use the topic in the databases Science direct, Scopus and Web of Science was carried out. Recent studies available in the literature suggest an enormous potential and wide applicability of this polymer and pharmacological and application in a controlled drug release process.

Keywords: Polysaccharides, vegetable exudates, vegetable gums

¹ Doutora em Biotecnologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, marcianieves@yahoo.com.br

² Bacharelado em Ciências Biológicas, Universidade Federal Rural de Pernambuco, mclaranaascimento@hotmail.com

³ Pós-Graduação em Biociência Animal, Universidade Federal Rural de Pernambuco, carlaledo@yahoo.com.br

⁴ Doutora em Biociência Animal, Universidade Federal Rural de Pernambuco, juanizematias@yahoo.com.br

⁵ Doutor em Ciências Biológicas, Universidade Federal Rural de Pernambuco, vagne_melo@hotmail.com ⁶ Doutora em Engenharia Química, Professora Titular da Universidade Federal Rural de Pernambuco, analuporto@yahoo.com.br

Introdução

O cajueiro (*Anacardium occidentale* L.) é uma planta nativa do nordeste brasileiro com considerável capacidade adaptativa a solos de baixa fertilidade, a temperaturas elevadas e ao estresse hídrico (SERRANO e PESSOA, 2016). A produção do caju no Brasil está concentrada na região Nordeste, e possui elevada importância socioeconômica para a Região, principalmente para o semiárido, por gerar postos de trabalho e renda na época mais seca do ano (BRAINER e VIDAL, 2018) e por ser um fruto fornecedor de matéria-prima para a fabricação de vários subprodutos (ALENCAR et al., 2018).

No Nordeste brasileiro, dada a importância econômica desta cultura, no ano de 2019 a área cultivada da planta foi de 434.614 hectare com uma produtividade para castanha de caju de 319 kg/hectare (CONAB, 2020). A goma do cajueiro (GC) é um coproduto do agronegócio do caju com grande potencial para aplicação em diferentes áreas industriais (PORTO et al., 2017). Nesse contexto, indubitavelmente, o desenvolvimento de novos bioprodutos a base de polissacarídeos do cajueiro é uma alternativa para agregar valor à cajucultura, além de, possibilitar a obtenção de um produto à base de matéria prima regional com baixo custo/benefício (SILVA et al., 2013).

Polissacarídeos obtidos a partir de várias fontes naturais têm sido amplamente utilizados na indústria, principalmente nas áreas alimentícia, farmacêutica e cosmética, além de movimentarem inúmeros trabalhos de pesquisa (Lima, Maia e Lima, 2013). Estudos sobre a GC despertam cada vez mais interesse da comunidade científica, visto que, este polissacarídeo possui características reológicas que favorecem sua aplicação biotecnológica. Desta forma, esta revisão teve por objetivo realizar uma breve prospecção sobre a GC, seu aspecto estrutural, obtenção e purificação, suas propriedades farmacológicas e aplicações biotecnológicas.

Desenvolvimento

Cultura do Cajueiro (*Anacardium occidentale* L.) – Aspectos Econômicos

O cajueiro (*Anacardium occidentale* L.) é uma planta nativa do Nordeste brasileiro, que apresenta uma grande capacidade adaptativa a solos de baixa fertilidade, a temperaturas elevadas e ao estresse hídrico (EMBRAPA, 2016). Características que favoreceram a difusão do cultivo desta planta em toda Região Nordeste, tornando-o uma importante fonte de renda para essa região. Para a comercialização o principal produto do cajueiro é a amêndoa da castanha-de-caju, localizada no interior da castanha.

Segundo dados da CONAB (Companhia de Nacional de Abastecimento) dentre os Estados do Nordeste produtores de castanha-de-caju *in natura*, o Estado do Ceará destaca-se como o maior produtor, com uma produção de aproximadamente 87 mil toneladas em 2019, representando 62,4 % do total de produção Nacional estimada em 139.3 mil toneladas. O Ceará é seguido pelos Estados do Piauí e do Rio Grande Norte com produções aproximadas de 21,6 e 16,8 mil toneladas em 2019, respectivamente.

Em um quadro de produção mundial da castanha, o Brasil está entre os dez maiores produtores, estando atrás de países como: Vietnã, Índia e Costa do Marfim (FAO, 2017). No ano de 2016 o Brasil situou-se como quinto maior exportador de castanha de caju sem casca, com uma participação de 3,1% do total global exportado naquele ano, o principal país importador deste produto são os Estados Unidos, seguido da Holanda e Alemanha (CONAB, 2019).

Como dito anteriormente a amêndoa da castanha-do-caju é principal produto comercial extraído do cajueiro, entretanto, praticamente todas as partes da planta podem ser aproveitadas, da castanha também pode ser extraída a película que reveste a amêndoa, rica em taninos utilizados na indústria química de tintas e vernizes. Já o pedúnculo do caju (pseudofruto) é processado por indústrias para a obtenção do suco ou da polpa congelada, a ser utilizada na fabricação de sucos, cajuínas e outras bebidas, na fabricação de doces e na alimentação animal, além disso, o caju inteiro (pedúnculo com castanha) é comercializado *in natura* em feiras e supermercados. Outras partes dessa planta também são utilizadas, as cascas das árvores e as folhas, são fontes de tanino e goma de interesse biotecnológico.

A Goma do Cajueiro (GC)

De acordo com Licá et al. (2018) as gomas são polímeros naturais, formados por unidades de monossacarídeos em arranjos lineares ou ramificados, pertencentes à classe dos carboidratos. São substâncias translúcidas, inodoras, insípidas, não tóxicas, hidrofílicas, amorfas, com propriedades coloidais, com funções espessantes (ligação com moléculas de água), gelificantes (construção de rede, envolvendo zonas de ligação), emulsificantes, estabilizantes e aglutinantes. Apresentam também, capacidade de controle de cristalização, inibição de sinerese, encapsulação e formação de filmes. As gomas exsudadas são produzidas pelas células epiteliais de plantas quando o córtex é agredido por injúrias físicas ou ataque microbiano. A produção do exsudado gomoso é um mecanismo de defesa destas plantas que crescem em áreas semiáridas (ANDRADE et al., 2013). Vários vegetais possuem a capacidade de produzir gomas, dentre os quais merece destaque o cajueiro (*Anacardium occidentale* L.).

A goma de cajueiro (GC) é um heteropolissacarídeo aniônico complexo altamente ramificado obtido a partir do exsudado da casca ou do caule da árvore, é composto principalmente de β - D- galactose (72%), seguida de α - D- glicose

(14%), arabinose (4,6%), ramnose (3,2%) e ácido glicurônico (4,6%) e sua cadeia principal contém unidades de galactose unidas por elos do tipo β (1 $\rightarrow$ 3) e na cadeia lateral β (1 $\rightarrow$ 6) (QUELEMES et al., 2017), como pode ser observado na Figura 1. Segundo Paula et al. (2011) as concentrações dos constituintes da goma podem variar de acordo com a época do ano, além de fatores sazonais que a planta esteja sujeita no momento da extração do exsudato.

Este polissacarídeo possui algumas características atraentes para uso biotecnológico por ser não tóxico, hidrofílico, biocompatível e biodegradável, possuindo propriedades semelhantes à goma arábica em relação ao peso molecular, teor de ácido urônico e mesmo tipo de unidades monossacarídicas (PAULA et al., 2011).

Figura 1. Estrutura da goma de cajueiro (*Anacardium occidentale*, L.)

Fonte: Adaptado de Lima, Maia e Lima, 2013.

Na área de alimentos, a goma de cajueiro, especificamente, apresenta potencial de aplicação como aditivo alimentar na forma de espessante para sucos e refrescos, emulsificante para molhos e saladas e material de parede para microcápsulas (FURTADO et al., 2013). A GC também possui a capacidade de ser usada como aglutinante para comprimidos, hidrogéis

superabsorventes, agentes gelificantes, como intensificadores de viscosidade, como surfactantes, revestimento agente para microencapsulação, e para liberação controlada de drogas, além disso, a GC apresenta diferentes propriedades farmacológicas, tais como: atividade antitumoral, antioxidante, anti-inflamatória e cicatrizante, antibacteriana e antifúngica. Como a goma do cajueiro possui estrutura muito semelhante à da goma arábica. Pressupõe-se, portanto, que essa goma tenha potencialmente as mesmas aplicações da goma arábica (ARAÚJO et al., 2018). Além da semelhança estrutural (ramificações) e química (açúcares componentes) com a goma arábica, a GC tem um importante diferencial: sua alta disponibilidade na região Nordeste do território brasileiro, podendo gerar lucros no período da entressafra do caju (ANDRADE et al., 2013).

Extração e purificação da Goma do Cajueiro

A forma mais utilizada para extração da goma bruta exsudada do cajueiro é através do método físico onde é realizada uma incisão no tronco da planta e um exsudato que varia de amarelo pálido a marrom avermelhado é então coletado, e seco por exposição ao sol até perder a aderência e tornar-se duro e quebradiço, visando facilitar a manipulação e etapas posteriores de purificação. A outra forma de extração da goma é quimicamente pela ação de derivados do ácido benzoico (NAYAK et al., 2019).

Após a extração, a purificação da goma bruta é uma importante etapa realizada visando remover as impurezas da amostra, visto que, estas podem afetar as propriedades do polímero. As etapas de purificação da GC foram descritas inicialmente por Costa, Paula e Rodrigues em 1996, entretanto, o processo de purificação descrito por esses autores sofreu algumas modificações ao longo dos anos, como exemplo a secagem do material utilizando liofilização e o emprego de técnicas de cromatografia para confirmar a pureza da goma obtida após as etapas de purificação, contudo, as etapas mais importantes do processo continuam inalteradas (Figura 2). Para purificação, inicialmente a goma bruta é triturada e dissolvida em água destilada na proporção de 4g de goma bruta para cada 100 mL de água destilada (GC extrato bruto) após completa dissolução essa solução apresentará pH ácido, o qual é corrigido pela adição de uma solução concentrada de cloreto de sódio para ocorrer a substituição de cátions por sódio. O ajuste de pH é um dos fatores mais críticos do processo. Valores de pH menores do que 6.0 diminuem a solubilidade da GC, pois nestas condições existe maior probabilidade de formação de pontes de hidrogênio entre as moléculas com a consequente agregação das partículas. Se o pH é elevado acima de 7,0, a solução e a goma obtida tornam-se escuras, provavelmente devido a solubilização de impurezas pouco solúveis em meio ácido. O GC extrato bruto é então filtrado, o sobrenadante é descartado, e o filtrado é precipitado com solventes voláteis, como acetona e

etanol. O excesso de cloreto de sódio é removido através de lavagens sucessivas com água destilada, acetona e etanol e novamente sujeito a filtração e processos de precipitação. Para garantir a formação de sal de sódio da goma de caju, o pó obtido é ressuspensionado em água destilada e passar por coluna cromatográfica, posteriormente o material é liofilizado, o pó seco é chamado de goma de caju purificada e será armazenada a baixas temperaturas. A figura 2 apresenta um esquema simplificado da purificação da GC.

Figura 2. Esquema simplificado com principais etapas de purificação da goma do cajueiro (*Anacardium occidentale* L.)

Fonte: Adaptado de Ribeiro et al., 2016

Principais propriedades farmacológicas da Goma do Cajueiro

A utilização da goma do cajueiro como medicamento natural é realizada há décadas com base no conhecimento popular em várias regiões do Nordeste brasileiro, onde é utilizada comumente pela população, como anti-inflamatório, agente cicatrizante de feridas, antidiarreico, gastroprotetor, dentre outros usos. O uso popular da goma vem estimulando pesquisas científicas com objetivo de confirmar tais propriedades atribuídas ao exsudato de cajueiro.

Formulações biotecnológicas para Sistema de liberação de fármacos utilizando goma de cajueiro

Os sistemas de liberação controlada possuem dois objetivos principais: manter constante a concentração sanguínea de uma determinada droga, assegurando uma maior

biodisponibilidade, e reduzir os efeitos colaterais, realçando, assim, a adesão do paciente ao tratamento com um menor número de dosagens requeridas (HENRIQUE, FALCARE E LOPES, 2006). Já foram descritos na literatura diferentes sistemas, tais como: lipossomas, as bombas osmóticas, os revestimentos entéricos, os sistemas transdérmicos, os pró-fármacos, e os sistemas matriciais poliméricos, nos quais proporcionam uma liberação com um tempo maior do fármaco no organismo especialmente no tecido ou órgão-alvo quando comparado com o convencional, tornando-se alvo de grande interesse das indústrias farmacêuticas (DE OLIVEIRA ALENCAR et al., 2018).

De acordo com Bizerra e Silva (2016) os sistemas poliméricos para liberação controlada representam alternativa para incorporação de substâncias ativas e apresentam vantagens como: (1) maior controle da liberação do princípio ativo; (2) redução de doses tóxicas e subterapêuticas; (3) monitoramento dos níveis de fármaco no sítio de aplicação; (4) obtenção de altas concentrações de fármaco no local a ser tratado, quando comparadas com os níveis plasmáticos após administração oral; e (5) direcionamento do princípio ativo a alvos específicos. Diminuindo o intervalo de dosagem e reduzindo efeitos colaterais indesejados uma vez que utiliza uma menor quantidade do princípio ativo, resultando em menor custo.

Substâncias naturais, como gomas de polissacarídeos, dentre essas a goma do cajueiro (GC), oferecem uma vantagem única no desenvolvimento e formulação de sistemas de entrega de medicamentos e são preferidos sobre os sintéticos (OLOGUNAGBA et al., 2017; NAYAK et al., 2019). Pesquisas recentes utilizando GC em sistemas de liberação de fármacos estão disponíveis na literatura, testando este biopolímero como excipiente na formulação de comprimidos, hidrogéis, biofilmes e ainda na produção de partículas poliméricas para a encapsulação de drogas.

Discussão

Para realizar uma breve prospecção a respeito das propriedades farmacológicas da goma do cajueiro (GC) e sobre sua aplicação no desenvolvimento de processos de entrega controlada de fármacos, foi realizada uma pesquisa em diferentes bases de periódicos (Tabela 1). O levantamento da literatura disponível sobre o tema foi realizado em julho de 2020, só foram considerados os artigos de pesquisa que utilizaram a unicamente a GC purificada ou a GC purificada em combinação com outros polissacarídeos naturais ou sintéticos, artigos científicos que avaliaram a atividade de outras partes da planta *Anacardium occidentale* L. (folha, casca, fruto) foram descartados, nenhuma restrição foi utilizada referente ao ano das publicações,

apenas artigos de pesquisa foram selecionados, revisões de literatura ou outros documentos não foram considerados para a pesquisa.

Tabela 1. Base de Dados consultadas e termos de busca utilizados na revisão.

Base de dados	Endereço eletrônico
Science Direct	https://www.sciencedirect.com/
Scopus	https://www.scopus.com/
Web of Science	https://www.webofknowledge.com/
Google Scholar	https://scholar.google.com/
Termos de busca	
("Cashew gum" OR "Anacardium occidentale") AND <i>antitumor</i>	
("Cashew gum" OR "Anacardium occidentale") AND <i>antiproliferative</i>	
("Cashew gum" OR "Anacardium occidentale") AND (<i>Antimicrobial</i> OR <i>Antibacterial</i> OR <i>Antifungal</i>)	
("Cashew gum" OR "Anacardium occidentale") AND <i>Gastroprotective</i>	
("Cashew gum" OR "Anacardium occidentale") AND <i>antidiarrheal</i>	
("Cashew gum" OR "Anacardium occidentale") AND " <i>Drug delivery</i> "	

Fonte: Autor (2020)

Principais propriedades farmacológicas da Goma do Cajueiro

Atividade Antitumoral

A combinação da goma de cajueiro com outros oligossacarídeos e proteínas, exibiu atividade inibitória média de 88% $p < 0,005$ contra um tumor sólido de sarcoma 180 implantado em camundongos (Mothé et al., 2008). O potencial antitumoral da goma de cajueiro (GC) *in vitro* e *in vivo* foi determinado por Barros et al. (2020), em seus estudos os citados autores avaliaram o nível de citotoxicidade da GC e o efeito antitumoral através do modelo de melanoma B16-F10. A inibição do tumor foi calculada com base no peso do tumor. Como resultado, o GC não demonstrou citotoxicidade *in vitro*, porém mostrou uma inibição tumoral significativa *in vivo*, com cerca de 36,9 a 43% de redução na massa tumoral, sem toxicidade para os órgãos.

O impacto do CG na morfologia e viabilidade celular com linhas celulares tumorais e não tumorais foi recentemente avaliado Ribeiro et al. (2020) utilizando microscopia de força atômica (MFA) e brometo de 3-(4,5-dimetil-2-tiazol)-2,5-difenil-2-H-tetrazólio (MTT),

respectivamente. A atividade antiproliferativa foi confirmada para as linhas de células cancerígenas HCT116 (carcinoma colorretal), B16F10 (melanoma) e HL60 (leucemia promielocítica). Uma mudança na morfologia celular foi observada como uma rugosidade superficial aumentada para HL60. Nos resultados obtidos pelos autores não foi possível observar nenhum grau de citotoxicidade para linhas não-tumorais pela GC, a GC demonstrou seletividade para células tumorais, sendo assim, pode-se considerar que a GC apresenta grande potencial antitumoral e é um biomaterial promissor para estudos futuros, desta forma, torna-se evidente a necessidade do estímulo por novas pesquisas neste campo de aplicação.

Atividade Antimicrobiana

Alguns autores relataram o potencial antibacteriano e antifúngico da goma de caju frente a diferentes espécies de micro-organismos. Torquato et al. (2004) testaram a atividade da goma de caju bruta e purificada frente a bactérias, leveduras e fungos. Esses autores observaram um aumento da atividade antimicrobiana na goma purificada em comparação com a goma bruta.

Estudos semelhantes foram realizados por Campos et al. (2012) visando analisar o mecanismo de ação antimicrobiana da goma de caju (bruta e purificada) por imagem de microscopia de força atômica (AFM), avaliaram o crescimento de oito diferentes espécies de bactérias na presença da goma. Os resultados indicaram fortes propriedades antimicrobianas da goma de caju puro contra todos os microrganismos testados, exceto *Candida albicans* e *Lactobacillus acidophilus*. Por outro lado, a goma de caju bruta apresentou apenas atividade antimicrobiana contra bactérias Gram-positivas (MRSA, MSSA, *Listeria innocua* e *Enterococcus faecium*). As imagens de microscopia de Força atômica mostraram que a goma de caju purificada conduz ao colapso celular bacteriano indicando que a purificação da goma de caju afeta seu espectro antimicrobiano.

Mudanças na estruturais através da introdução de novos grupos funcionais, para adicionar caráter catiônico a GC, foram realizadas por Quelemes et al. (2017), que observaram forte atividade antimicrobiana contra cepas de *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina. Os resultados descritos indicam que a goma de cajueiro purificada e estruturalmente modificada apresenta forte atividade antimicrobiana, entretanto, os relatos encontrados na literatura da ação isolada da goma (sem interação com outras substâncias) são antigos, e sugerem a necessidade de novos estudos.

Propriedades gastroprotetoras e antidiarreica da goma de cajueiro

A goma de cajueiro (GC) é utilizada tradicionalmente no Nordeste brasileiro no tratamento de várias enfermidades, a exemplo de distúrbios do trato gastrointestinal, levando ao interesse da comunidade científica em investigar tais propriedades. Araújo et al. (2015) quando avaliaram a atividade da GC da contra diarreia aguda através do modelo de diarreia induzida por óleo de mamona e PGE₂ em roedores, e o seu efeito contra diarreia secretora usando um modelo de secreção de fluidos em alças fechadas intestinais tratadas com toxina do cólera em camundongos vivos. Observaram uma excelente atividade antidiarreica da GC, visto que, nas concentrações avaliadas da goma a gravidade da diarreia aguda em ratos reduziu significativamente, além disto, a GC diminuiu o volume do óleo de mamona e PGE₂ e a secreção de fluido intestinal induzida. Além disso, na diarreia secretora, o GC inibiu significativamente a secreção de fluidos intestinais. Os autores puderam concluir em seu estudo que a GC possui atividade antidiarreica nos modelos de diarreia aguda, inflamatória e secretora, o que poderia justificar seu uso tradicional no tratamento da diarreia no Nordeste do Brasil.

Um estudo realizado por Carvalho et al. (2015) teve como objetivo avaliar as propriedades gastroprotetoras da GC a partir de lesões estomacais induzidas por naproxeno (NAP) em Ratos Wistar machos e tratados com diferentes concentrações de GC (1, 3, 10 e 30 mg/kg). O intestino delgado medial foi utilizado para avaliação das lesões macroscópicas e amostras do estômago e do intestino foram utilizadas para avaliação histológica em ensaios de glutathione (GSH), malonyldialde-hyde (MDA) e mieloperoxidase (MPO). Ratos adicionais foram utilizados para medir a secreção e muco gástrico. O pré-tratamento com a GC reduziu o dano macroscópico e microscópico induzido pelo NAP. A GC atenuou significativamente as alterações induzidas pela NAP nos níveis de MPO, GSH e MDA. Além disso, os autores observaram que os níveis de muco aderente retornaram aos valores normais após o tratamento com CG.

Resultados que corroboram com os apresentados por Nicolau et al., (2019) quando avaliaram a atividade da CG na mucosa esofágica humana (células provenientes de biópsias esofágicas humanas com refluxo não-erosivo) e de camundongos com Doença do refluxo gastroesofágico não-erosiva (DRGE) experimentalmente induzido. A GC aderiu à mucosa esofágica humana por até 1 h. Nos estudos com animais, a GC melhorou os parâmetros da função barreira (TER e permeabilidade da mucosa) na mucosa do esôfago distal, e reduziu características inflamatórias do dano esofágico, conferindo proteção tópica da mucosa esofágica. Esses resultados confirmam o efeito protetor da GC contra os danos gastrointestinais por meio de mecanismos que envolvem a inibição da inflamação e o aumento da quantidade de muco aderente na mucosa.

Tabela 2. Principais aplicações farmacológicas da goma do cajueiro (*Anacardium occidentale* L.) (GC).

Aplicações da goma do cajueiro	Métodos	Resultados	Autor e Ano
Potencial antitumoral	Injetados 200mg/kg por 7 dias	Atividade inibitória média de 88% contra um tumor sólido de sarcoma 180 implantado em camundongos	Mothé et al., 2008
	Modelo de melanoma B16-F10	Inibição tumoral significativa <i>in vivo</i> , com cerca de 36,9 a 43% de redução na massa tumoral, sem toxicidade para os órgãos	Barros et al., 2020
	MFA e MTT	Atividade antiproliferativa confirmada para as linhas de células cancerígenas HCT116 (carcinoma colorretal), B16F10 (melanoma) e HL60 (leucemia promielocítica).	Ribeiro et al. 2020
Potencial Antibacteriana e Antifúngica	Atividade antimicrobiana (NCCLS)	Aumento da atividade na goma purificada em comparação com a goma bruta	Torquato et al. 2004
	Atividade antibacteriana Microscopia de força atômica (AFM)	A goma de caju pura apresentou fortes atividade antimicrobianas contra os microrganismos testados	Campos et al., 2012
	Modificação estrutural (quaternização) da goma e teste frente a <i>Staphylococcus aureus</i> resistente à metilina	Forte atividade antimicrobiana	Quelemes et al., 2017
Atividade gastroprotetoras e antidiarreica	Diarreia induzida por óleo de mamona e PGE ₂ em roedores	A gravidade da diarreia em ratos reduziu significativamente e diminuição da secreção de fluidos intestinais	Araújo et al., 2015
	Tratamento de lesões estomacais induzidas por naproxeno (NAP) em Ratos Wistar machos	O pré-tratamento com a GC reduziu o dano macroscópico e microscópico induzido pelo NAP	Carvalho et al., 2015
	Avaliaram a atividade da CG na mucosa esofágica	A GC reduziu características inflamatórias do dano esofágico, conferindo proteção tópica da mucosa esofágica	Nicolau et al., 2019

Fonte: Autor (2020)

Principais formulações biotecnológicas para Sistema de liberação de fármacos utilizando goma de cajueiro

O sistema de liberação controlada de medicamentos é uma abordagem farmacológica moderna que tem como objetivo melhorar a eficácia do medicamento, aumentando a sua biodisponibilidade e diminuindo a toxicidade e possíveis efeitos colaterais para pacientes em tratamento (CRUZ et al., 2019; RICHTER et al., 2020). A micro e nanoencapsulação de moléculas bioativas em matrizes poliméricas naturais também tem despertado crescente interesse nas últimas décadas.

O estudo de novos polímeros naturais como agentes encapsulantes para microencapsulação é uma necessidade para atender exigências do mercado mundial e garante a disponibilidade de materiais alternativos àqueles já utilizados, preferencialmente de baixo custo, baixa toxicidade, ampla disponibilidade e biodegradabilidade. Estudos com a goma de cajueiro em associação com outros polímeros para obtenção de novos copolímeros têm sido amplamente realizados visando possíveis aplicações destes na indústria farmacêutica. Copolímeros de GC e L-lactídeo foram sintetizados para encapsular a anfotericina B (AMB), um antibiótico usado no tratamento de doenças fúngicas e leishmania com efeitos colaterais para pacientes em tratamento. Pode-se inferir que os copolímeros sintetizados apresentaram potencial como sistemas de nanocarreadores para AMB (RICHTER et al., 2020). Em outro estudo a GC enxertada com Nisopropilacrilamida (NIPA) foi utilizada para o encapsulamento da epirrubicina demonstrando bom potencial para uso de sistema de entrega deste medicamento (ABREU et al., 2016). Outro copolímero criado a partir da associação da GC com a goma de chicha (*Sterculia striata*) foi desenvolvido e testado como biomaterial para aplicação na indústria farmacêutica, apresentando características desejáveis e compatíveis com os materiais utilizados usualmente, ambos os polímeros naturais demonstraram ser excipientes promissores para uso como comprimidos e hidrogéis (DOS SANTOS FERREIRA et al., 2019). Da mesma forma, o potencial da associação da GC com a goma xantana como excipiente para comprimidos de ibuprofeno foi verificado através das formulações de comprimidos de matriz de ibuprofeno (~200 mg de ibuprofeno) contendo misturas variadas de GC e goma xantana preparadas por compressão direta. Todos os comprimidos testados demonstraram o mecanismo de transporte e a liberação de ibuprofeno envolveu difusão e erosão das matrizes de goma hidratada. Os estudos demonstraram o uso potencial da mistura desses polímeros como veículos para a entrega controlada de medicamentos (Fosu et al., 2016).

Hasnain et al., (2019) investigaram a utilidade da GC como excipiente farmacêutico em pastas dentárias contendo aceclofenaco para o tratamento da dor no tratamento da periodontite.

Utilizando o CG com carbonato de cálcio (agente abrasivo), glicerina (umectante e co-solvente), parabeno metílico (conservante), lauril sulfato de sódio (surfactante) e cânfora (agente aromatizante) e 1% p/p de CA. As pastas dentárias formuladas demonstraram liberação sustentada de aceclofenaco por 6 horas, *in vitro* também revelando boa adesão à membrana mucosa oral. Essas pastas dentárias AC a 1% p / p podem ser usadas no tratamento eficaz da inflamação e dor dentárias através da administração local de AC durante um período prolongado no tratamento da periodontite.

Comprimidos de liberação controlada formulados com GC, GC reticulada e celulose microcristalina (MCC) foram preparados por compressão direta. Estudos *in vivo* para a formulação comercializada e otimizada mostraram que não houve diferença significativa entre os dois, confirmando o perfil de liberação sustentada. O estudo de estabilidade para formulação otimizada mostrou ainda melhores resultados. Pode-se concluir que gomas naturais e seus derivados podem ser efetivamente utilizados para a preparação de comprimidos de liberação sustentada (BHOSALE et al., 2015). Biofilmes de GC/PVA foram capazes de aprisionar inibidores de tripsina com atividade antimicrobiana obtidos de *Platypodium elegans* (PeIT) e *Inga laurina* (ILIT). No entanto, a atividade inibitória do PeIT imobilizado foi duas vezes maior que a observada para o ILIT. Além disso, os inibidores liberados mostraram alta estabilidade após 24 h de armazenamento, confirmando que os filmes GC/PVA são materiais versáteis e eficientes para serem utilizados como suporte à imobilização de biomoléculas (CRUZ et al., 2019).

Estudos estão sendo realizados com objetivo de identificar como ocorre a interação entre o polímero e a droga, como o estudo realizado por Cordeiro et al. (2017) para avaliar a interação entre o biopolímero, composto da associação GC com a quitosana, e o medicamento pilocarpina foi realizado por visando identificar como ocorre a liberação controlada da droga, de acordo com esses autores a GC interagiu com a pilocarpina, tendo um efeito térmico protetor sobre a droga.

Além do uso de polissacarídeos do cajueiro em associação com outros polímeros vegetais ou sintéticos, na literatura disponível nos bancos de dados utilizados nesta pesquisa foi possível identificar que mudanças estruturais na goma também são alvo de pesquisa, pois estas conferem diferença nas propriedades químicas e físicas da GC, como exemplo modificando sua solubilidade em água, dentre outras. Estudos realizados a partir da acetilação da goma, testou a capacidade desta na produção de nanopartículas e mostrou grande potencial como veículo em sistemas controlados de liberação de drogas, principalmente quando testado no nanoencapsulamento do alcalóide natural epiisopiloturina. As nanopartículas sintetizadas

mostram grande potencial para o uso na liberação da epiisopiloturina. (DO AMARAL RODRIGUES et al., 2019). Da mesma forma, estudos foram realizados por Silva et al. (2019) também utilizando a GC acetilada como plataforma em sistemas de entrega de medicamentos tendo a insulina como droga modelo. No citado estudo as nanopartículas foram desenvolvidas através da técnica de complexação polieletrólítica e o resultado mostrou uma eficiência do encapsulamento da insulina de 52,5% e a estabilização eletrostática foi sugerida pelo potencial zeta de + 30,6 mV. A liberação sustentada de insulina foi observada por até 24 h. Sugerindo que GC acetilado apresentou potencial como veículo para liberação sustentada de insulina por via oral. A indometacina, um conhecido agente anti-inflamatório, também foi nanoencapsulada utilizando GC acetilada como material de parede e liberação controlada da droga foi observada por até 72 h (Pitombeira et al., 2015).

Biofilmes de GC/PVA foram capazes de aprisionar inibidores de tripsina com atividade antimicrobiana obtidos de *Platypodium elegans* (PeIT) e *Inga laurina* (ILIT). No entanto, a atividade inibitória do PeIT imobilizado foi duas vezes maior que a observada para o ILIT. Além disso, os inibidores liberados mostraram alta estabilidade após 24 h de armazenamento, confirmando que os filmes GC/PVA são materiais versáteis e eficientes para serem utilizados como suporte à imobilização de biomoléculas (CRUZ et al., 2019).

Considerações Finais

Muito se tem pesquisado em relação à produtos medicinais naturais e seu uso terapêutico. De acordo com os resultados obtidos na revisão de literatura a respeito das propriedades farmacológicas da goma do cajueiro (GC) e sua aplicação no desenvolvimento de novos bioprocessos para liberação controlada de fármacos foi possível inferir que os polissacarídeos exsudados do cajueiro possuem uma ampla atividade farmacológica, neste estudo foram descritos trabalhos que evidenciaram em seus resultados a potencialidade da CG para uso antitumoral e antiproliferativo, antimicrobiano, frente a fungos, bactérias e leveduras, gastroprotetor e antidiarreico.

No que se refere a aplicação da GC em processos biotecnológicos de liberação controlada de fármacos, estudos recentes relatam o uso da GC em combinação com outros polissacarídeos e CG estruturalmente modificada, como material para excipiente de fármacos, através de formulações de comprimidos, biofilmes, hidrogéis e micro e nanoencapsulamento de drogas, tais pesquisas apresentam resultados que demonstram o grande potencial deste biopolímero para aplicações biotecnológicas indicando o uso de gomas naturais como uma alternativa eficaz aos polímeros sintéticos.

Entretanto, na presente pesquisa foi possível verificar um escasso número de publicações principalmente no que se refere ao potencial farmacológico da GC e de maneira geral, mostra a importância do incentivo ao desenvolvimento de novas pesquisas sobre as propriedades e tecnológicas da GC, um polissacarídeo de baixo custo de obtenção e amplamente encontrado no Nordeste brasileiro.

Referências

- ABREU, F. O., OLIVEIRA, E. F., PAULA, H. C., & DE PAULA, R. C. Chitosan/cashew gum nanogels for essential oil encapsulation. **Carbohydrate polymers**, 89(4), 1277-1282, 2012.
- ALENCAR, N. S., GONÇALVES, J. F., OLIVEIRA, E. A F., LUCENA, T. C., SOUSA, R. M. Produção da Castanha de Caju nas microrregiões do Ceará no período de 1993 a 2016. **RECoDAF – Revista Eletrônica Competências Digitais para Agricultura Familiar** v. 4, n. 1. ISSN: 2448-0452, 2018.
- ANDERSON, D.M.W.; BELL, P. C. Structural analysis of the gum polysaccharide from *anacardium occidentale*. **Analytica Chimica Acta**, v79, p 185-197, 1975.
- ANDRADE, K., DE CARVALHO, C. W., & TAKEITI, C. Y. Goma de cajueiro (*Anacardium occidentale*): avaliação das modificações químicas e físicas por extrusão termoplástica. **Polímeros**, 23(5), 667-671, 2013.
- ARAÚJO, T. S., COSTA, D. S., SOUSA, N. A., SOUZA, L. K., DE ARAÚJO, S., OLIVEIRA, A. P., ... & MEDEIROS, J. V. R. Antidiarrheal activity of cashew GUM, a complex heteropolysaccharide extracted from exudate of *Anacardium occidentale* L. in rodents. **Journal of ethnopharmacology**, 174, 299-307, 2015
- BARROS, A.B., MOURA, A.F., SILVA, D.A., OLIVEIRA, T.M., BARRETO, F.S., RIBEIRO, W.L.C., ALVES, A.P.N.N., ARAÚJO, A.J., MORAES FILHO, M.O., ILESG, B., MEDEIROS, J.V.R., MARINHO-FILHO, J.D.B. Evaluation of antitumor potential of cashew gum extracted from *Anacardium occidentale* Linn. **International Journal of Biological Macromolecules** Volume 154, 1 July 2020, Pages 319-328

- BHOSALE, R. R., OSMANI, R. A. M., & MOIN, A. Natural gums and mucilages: a review on multifaceted excipients in pharmaceutical science and research. *International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research*, 15(4), 2014.
- BIZERRA, A., SILVA, V. Sistemas de liberação controlada: Mecanismos e aplicações. *Revista Saúde e Meio Ambiente*, v. 3, n. 2, p. 1-12, 2016.
- BRAINER, M. S. DE C. P.; VIDAL, M. DE F. V. Cajucultura nordestina em recuperação. *Caderno setorial ETENE*, v. 54, n. Ano 3, 2018
- CAMPOS, D. A., RIBEIRO, A. C., COSTA, E. M., FERNANDES, J. C., TAVARIA, F. K., ARARUNA, F. B., ... & PINTADO, M. M. (2012). Study of antimicrobial activity and atomic force microscopy imaging of the action mechanism of cashew tree gum. *Carbohydrate polymers*, 90(1), 270-274
- CARVALHO, N. S., SILVA, M. M., SILVA, R. O., NICOLAU, L. A., SOUSA, F. B. M., DAMASCENO, S. R., ... & MEDEIROS, J. V. R. (2015). Gastroprotective properties of cashew gum, a complex heteropolysaccharide of *Anacardium occidentale*, in naproxen- induced gastrointestinal damage in rats. *Drug Development Research*, 76(3), 143-151.
- CARVALHO, N. S., SILVA, M. M., SILVA, R. O., NICOLAU, L. A., SOUSA, F. B. M., DAMASCENO, S. R., ... & MEDEIROS, J. V. R. (2015). Gastroprotective properties of cashew gum, a complex heteropolysaccharide of *Anacardium occidentale*, in naproxen- induced gastrointestinal damage in rats. *Drug Development Research*, 76(3), 143-151, 2015.
- CONAB, Histórico Mensal Castanha-de-caju, Maio de 2020, acesso em 29 de julho de 2020 (<https://www.conab.gov.br/info-agro/analises-do-mercado-agropecuario-eextrativista/analises-do-mercado/historico-mensal-de-castanha-de-caju>).
- CORDEIRO, M. S. F., DA SILVA, C. M. B., VIEIRA, A. C. Q. D. M., NADVORNY, D., DE SÁ, L. L. F., DE SOUZA, F. R. L., ... & RIBEIRO, A. J. Biopolymers and pilocarpine interaction study for use in drug delivery systems (DDS). *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, 127(2), 1777-1785, 2017.
- COSTA, S., RODRIGUES, J., & DE PAULA, R. (1996). Monitorização do Processo de Purificação de Gomas Naturais: Goma do Cajueiro. *Polímeros: Ciência e Tecnologia*, 6, 49–55.
- CRUZ, M. V., JACOBOWSKI, A. C., MACEDO, M. L., BATISTA, K. A., & FERNANDES, K. F. Immobilization of antimicrobial trypsin inhibitors onto cashew gum polysaccharide/PVA films. *International journal of biological macromolecules*, 127, 433-439, 2019.
- DE OLIVEIRA ALENCAR, G., BEZERRA, C. A., SCHERF, J. R., DA SILVA, J. F., BARRETO, M. D. F. R., ALVES, M. P., & DE CARVALHO MENDES, R. Liberação prolongada de fármacos e suas aplicações farmacológicas: revisão sistemática. *Revista ECIência*, v 6, 2018.
- DO AMARAL RODRIGUES, J., DE ARAÚJO, A. R., PITOMBEIRA, N. A., PLÁCIDO, A., DE ALMEIDA, M. P., VERAS, L. M. C., ... & FEITOSA, J. P. A. Acetylated cashew gumbased nanoparticles for the incorporation of alkaloid epiisopiloturine. *International journal of biological macromolecules*, 128, 965-972, 2019.

DOS SANTOS FERREIRA, S. R., MESQUITA, M. V. N., DE SÁ, L. L. F., NOGUEIRA, N. C., DOS SANTOS RIZZO, M., SILVA-FILHO, E. C., ... & RIBEIRO, A. B. Sustainable natural gums for industrial application: Physiochemical and texturometric evaluation. **Journal of Drug Delivery Science and Technology**, 54, 101306, 2019.

FOSU, M. A., OFORI-KWAKYE, K., KUNTWORBE, N., & BONSU, M. A. Investigation of blends of cashew and xanthan gums as a potential carrier for colonic delivery of Ibuprofen. **International Journal of PharmTech Research**, 9(7), 369-380, 2016.

HASNAIN, M. S., RISHISHWAR, P., RISHISHWAR, S., ALI, S., & NAYAK, A. K. Extraction and characterization of cashew tree (*Anacardium occidentale*) gum; use in aceclofenac dental pastes. **International journal of biological macromolecules**, 116, 1074-1081, 2018.

HENRIQUE, J. S.; FALCARE, R. S.; LOPES, P. S. Sistemas de liberação controlada. **Pharmacia Brasileira**, v. 56, p. 22, 2006.

LICÁ, I. C. L., DOS SANTOS SOARES, A. M., DE MESQUITA, L. S. S., & MALIK, S. Biological properties and pharmacological potential of plant exudates. **Food Research International**, 105, 1039-1053, 2018.

LIMA, R. E. M., MAIA, L. K. R., & LIMA, J. S. Produção de Goma a Partir do Cajueiro. **Enciclopédia Biosfera**, 9(17), 2093-2106, 2013.

MOTHÉ, C.G., DE SOUZA, I.A., CALAZANS, G.M.T. Antitumor activity of cashew gum from *Anacardium Occidentale* L., **Agro Food Industry Hi-Tech** 19 (6), pp. 50-52, 2008.

NAYAK, A. K., ANSARI, M. T., SAMI, F., BERA, H., & HASNAIN, M. S. (2019). Cashew gum in drug delivery applications. In *Natural Polysaccharides in Drug Delivery and Biomedical Applications* (pp. 263-283). Academic Press.

NICOLAU, L. A., BATISTA-LIMA, F. J., SANTANA, A. P., SALES, T. M., CARMONETO, J. P., FREITAS, G. B., ... & WOODLAND, P. J. Cashew gum, a biopolymer, topically protects oesophageal mucosa in non-erosive reflux disease: A promising translational study. **Carbohydrate polymers**, 226, 115205, 2019.

OLOGUNAGBA, M. O., JAIN, S., THANKI, K., SURESH, S., FURTADO, S., AZUBUIKE, C. P., & SILVA, B. O. (2017). Extraction and Characterization of the Gum Exudate of *Anacardium occidentale* for its potential as an Excipient in Drug Delivery Systems. **Trop J Nat Prod Res**, 1(2):76-83, 2017.

PAULA, H. C.; SOMBRA, F. M.; DE FREITAS CAVALCANTE, R.; ABREU, F. O.; DEPAULA, R. C. Preparation and characterization of chitosan/cashew gum beads loaded with *Lippia sidoides* essential oil. **Materials Science and Engineering C**, v. 31, n. 2, p. 173-178, 2011.

PITOMBEIRA, N. A., NETO, J. G. V., SILVA, D. A., FEITOSA, J. P., PAULA, H. C., & DE PAULA, R. C. Self-assembled nanoparticles of acetylated cashew gum: Characterization and evaluation as potential drug carrier. **Carbohydrate Polymers**, 117, 610-615, 2015.

PORTO, B. C.; FURTADO, R. F.; CRISTIANINI, M. Caracterização de emulsão de goma de cajueiro modificada quimicamente para o microencapsulamento de D-limoneno. Embrapa Agroindústria Tropical-Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E), 2017.

QUELEMES, P. V., DE ARAÚJO, A. R., PLÁCIDO, A., DELERUE-MATOS, C., MACIEL, J. S., BESSA, L. J., ... & DA SILVA, D. A. Quaternized cashew gum: An anti-staphylococcal and biocompatible cationic polymer for biotechnological applications. *Carbohydrate polymers*, 157, 567-575, 2017.

RIBEIRO, F. D. O. S., DE FRANÇA DOURADO, F., SILVA, M. F. S., BRITO, L. M., PESSOA, C., DE LIMA, L. R. M., ... & DA SILVA, D. A. (2020). Anti-proliferative profile of Anacardium occidentale polysaccharide and characterization by AFM. *International Journal of Biological Macromolecules*. Volume 156, 1 August 2020, Pages 981-987

RICHTER, A.R., CARNEIRO, M.J., DE SOUSA, N.A., (...), GOYCOOLEA, F.M., DE PAULA, R.C.M. Self-assembling cashew gum-graft-poly lactide copolymer nanoparticles as a potential amphotericin B delivery matrix. *International Journal of Biological Macromolecules*, 152, pp. 492-502, 2020.

SERRANO, L. A. L.; PESSOA, P. F. A. P. Aspectos econômicos da cultura do cajueiro. Embrapa agroindústria tropical: Fortaleza-Ceará, 2016.

SILVA, E. D. L. V., DE JESUS OLIVEIRA, A. C., PATRIOTA, Y. B. G., RIBEIRO, A. J., VEIGA, F., HALLWASS, F., ... & SOARES-SOBRINHO, J. L. Solvent-free synthesis of acetylated cashew gum for oral delivery system of insulin. *Carbohydrate polymers*, 207, 601608, 2019.

SILVA, R. A. O., MARQUES, L. G. A., DE FREITAS, R. M., DOS SANTOS, M. D. S. F., AVALCANTI DA SILVA FILHO, E., DO Ó PESSOA, C., & SANTOS, M. R. D. M. C. Prospecção tecnológica: aplicação da goma do cajueiro (Anacardium occidentale) em nanotecnologia. *Revista GEINTEC-Gestão, Inovação e Tecnologias*, 3(4), 055-069, 2013.

TORQUATO, D. S., FERREIRA, M. L., SÁ, G. C., BRITO, E. S., PINTO, G. A. S., & AZEVEDO, E. H. F. Evaluation of antimicrobial activity of cashew tree gum. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*, 20(5), 505-507, 2004.

CAPÍTULO 29: PRÉ-TRATAMENTO BIOLÓGICO E SACARIFICAÇÃO DA BIOMASSA DE *FURCRAEA FOETIDA* COMO POTENCIAL PARA PRODUÇÃO DE BIOETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO

CHAPTER 29: BIOLOGICAL PRE-TREATMENT AND SACARIFICATION OF *FURCRAEA FOETIDA* BIOMASS AS A POTENCIAL FOR SECOND GENERATION BIOETHANOL PRODUCTION

Giovanni Tombolato Gaeta¹; Critina Giatti Marques de Souza², Rosane Marina Peralta³, Rafael Castoldi⁴

Resumo

A produção de bioetanol vem se mostrando uma tendência mundial frente aos combustíveis fósseis. O processo de pré-tratamento com microrganismos da biomassa lignocelulósica aumenta a digestibilidade do material e possibilitar o processo de recuperação dos polissacarídeos. Dentre as biomassas vegetais, a *Furcraea Foetida*, uma Agavácea, muito utilizada na obtenção de fibras naturais, tem potencial desconhecido para obtenção de açúcares fermentescíveis. Visando facilitar a sacarificação enzimática dos polissacarídeos e a produção de enzimas por estirpes de fungos do gênero *Ganoderma*, *Pleurotus* e *Fusarium*, foram realizadas a quantificação e caracterização de enzimas degradadoras de celulose e hemicelulose. A atividade de enzimas ligninolíticas por basidiomicetos, apresentou valores 20% maiores para o cultivo de *Pleurotus*, enquanto que a atividade de lacase no mesmo período, apresentou diferenças de 129% em cultivos de *P. ostreatus*. Cultivos de basidiomicetos apresentaram uma degradação entre 94% e 88% dos compostos fenólicos. O processo de sacarificação pelo pool enzimático Cellic-CTec2 gerou valores de $81,61 \pm 8,43$ $\mu\text{mol/mL}$ de açúcares redutores em meios pré-tratados por basidiomicetos, uma melhora de 66,3%. Sacarificações realizadas sobre amostras pré-tratadas com *Fusarium lateritium* var. *Majus*, apresentaram uma menor liberação de açúcares redutores, entre $28,27 \pm 3,61$ $\mu\text{mol/mL}$ com aumento de 30,82%.

Palavras-Chaves: Pré-tratamento; Bioetanol; Sacarificação; *Furcraea foetida*.

Abstract

The production of bioethano has shown to be a worldwide trend in relation to fossil fuels. The pretreatment process of lignocellulosic biomass with microorganisms increases the digestibility of the material and enables the process of polysaccharide recovery. Among the plants biomass, *Furcraea Foetida*, an agavácea, widely used to obtaining natural fibers, has unknown potential for obtaining fermentable sugars. In order to facilitate the enzymatic saccharification of the polysaccharides and the production of enzymes by strains of fungi from the genus *Ganoderma*, *Pleurotus* and *Fusarium*, the quantification and characterization of cellulose and hemicellulose degrading enzymes were carried out. The activity of ligninolytic enzymes by basidiomycetes, showed 20% higher values for the cultivation of *Pleurotus*, while the lacase activity in the same period, showed differences of 129% in cultures of *P. ostreatus*. Basidiomycete cultures showed a degradation between 94% and 88% of the phenolic compounds.

¹ Graduado em Bioquímica pela Universidade Estadual de Maringá – giovannitgaeta@gmail.com

² Professora Doutora no Departamento de Bioquímica da Universidade Estadual de Maringá – cgmsouza@uem.br

³ Professora Doutora no Departamento de Bioquímica da Universidade Estadual de Maringá – rmperalta@uem.br

⁴ Professor Doutor no Departamento de Bioquímica da Universidade Estadual de Maringá – rcastoldi@uem.br

The saccharification process by the Cellic-CTec2 enzymatic pool generated values of $81.61 \pm 8.43 \mu\text{mol} / \text{mL}$ of reducing sugars in pre-treated media with basidiomycetes, an improvement of 66.3%. Saccharifications performed on samples pretreated with *Fusarium lateritium* var. *Majus*, showed a lower release of reducing sugars, between $28.27 \pm 3.61 \mu\text{mol/mL}$ with an increase of 30.82%.

Keywords: Pre-Treatment, Bioethanol, Saccharification, *Furcraea Foetida*

Introdução

A produção de biocombustíveis

O termo biomassa pode ser definido como qualquer matéria orgânica produzida a partir da fotossíntese ou até mesmo qualquer material derivado dos seres vivos. A biomassa vegetal, principalmente, tem um potencial biotecnológico na produção de açúcares fermentáveis, que podem ser utilizados para produção de combustíveis. Nos últimos anos, a utilização de biocombustíveis visando à substituição parcial ou total de combustíveis fósseis, vem sendo o foco das discussões sobre a utilização de biomassa (DE PAULA, 2009).

A biomassa celulósica tem o potencial de contribuir para atender a demanda por combustível líquido, mas os requisitos de uso de terra e processos ineficientes representam obstáculos para o uso em larga escala de tecnologias de biomassa em biocombustíveis (RUBIN, 2008).

A biomassa vegetal é a mais abundante no mundo o que leva o polissacarídeo celulose a ser, dentre os materiais naturais, o biopolímero com maior potencial biotecnológico (LAUREANO-PEREZ et al., 2005). A abundância da celulose tem estimulado o uso dos processos de fermentações celulolíticas pelo homem (ZHU et al., 2009), inclusive para produção de etanol.

Diferentes tipos de biomassas vegetais são estudadas como potencial fonte de polissacarídeos e seu uso na produção de etanol. As principais fontes e de baixo custo são as biomassas remanescentes da agricultura, como o, sabugo de milho, casca de arroz, bagaço da cana, entre outras, são muitas vezes utilizados com baixo valor agregado.

Contudo, um dos principais problemas com a produção de bioetanol é a disponibilidade de matérias-primas, questão variante segundo a distribuição geográfica e periodização de cultivos. O preço das matérias primas é também altamente volátil o que pode afetar bastante os custos de produção deste biocombustível, uma vez que as matérias primas normalmente representam mais do que um terço dos custos de produção.

Além das biomassas derivadas da agricultura tradicional, são buscadas outras fontes vegetais para a demanda de carboidratos. Vegetais lignocelulósicos produzidos com único fim aos biocombustíveis. Como no caso do uso do sorgo como fonte de celulose e

hemicelulose para produção de bioetanol (DAMAY et al., 2018), e até mesmo *Phalaris aquatica* L. uma planta herbácea nativa da região do mediterrâneo (CHRYSIKOU et al., 2018), são estudados como biomassa para produção de etanol.

Um vegetal com potencial para uso como fonte de carboidratos é a *Furcraea foetida*, possui uma estrutura holocelulósica de aproximadamente 75% (PIRES, 2009), planta com uso ornamental, produção do sisal, entre outras, ainda não foi estudado visando a obtenção de açúcares fermentescíveis via sacarificação de polissacarídeos.

Furcraea foetida

A *Furcraea foetida*, *Agave foetida*, ou *Furcraea gigantea* tem sua distribuição original desde o sudeste da América Central até o norte da América do Sul, sendo nativa da região nordeste brasileira (ZAYAS, 1989). Apresenta características como reprodução por brotamento (HUECK, 1953; MOTOOKA et al., 2003), longos períodos de floração e frutificação, pioneirismo, adaptação a áreas degradadas, eficiência no sucesso reprodutivo, além disso, compete com outras plantas por nutrientes e espaço físico (MOTOOKA et al., 2003).

A *F. foetida* apresenta uma conformação estrutural em roseta foliar cujo comprimento pode alcançar de 2,5 a 4,0 m de diâmetro, com folhas pontiagudas, fibrosas, suculentas, dispostas em volta de uma base curta, as folhas podem conter espinhos espaçados em suas margens (MOTOOKA, 2003; PIRANI, CORDEIRO, 2002; YOKOSUKA 2009). Durante o período de reprodução essa planta desenvolve uma inflorescência de 6 a 8 m de altura no centro da roseta com o formato de uma espiga ramificada (YOKOSUKA 2009). A utilização da espécie *F. foetida* foi comum na região de Praia Mole, Ilha de Santa Catarina, até meados de 1940 e 1950 para a confecção de artefatos do cotidiano da população da época, notando-se que a utilização mais encontrada está relacionada à ornamentação e a construção de cercas vivas (SARMENTO, 2013).

A *F. foetida* apresenta um potencial ainda desconhecido para a produção de bioetanol, porém como toda biomassa vegetal tem uma estrutura lignocelulósica complexa, necessitando de pré-tratamento para desconstrução dessa estrutura e posterior sacarificação das porções celulósicas e hemicelulósicas.

Esses pré-tratamentos são importantes pois a hidrólise da celulose ou hemicelulose por celulasas e hemicelulasas resulta na produção final de monossacarídeos. Essas enzimas, porém, por serem proteínas, não conseguem penetrar com facilidade na estrutura lignocelulósica, tendo barreiras como a lignina e até mesmo a estrutura cristalina dos polissacarídeos.

Pré-tratamentos

A utilização da biomassa como uma fonte de carboidratos para produtos químicos e combustíveis tem sido severamente dificultada pela baixa eficiência da população microbiana celulolítica. Além disso, a menos que um excesso muito grande de enzimas seja usado, a digestibilidade enzimática da celulose na biomassa nativa é baixa (< 20% de rendimento), devido à característica estrutural do material lignocelulósico. Em vista disso, biomassas em geral requerem um pré-tratamento para aumentar a digestibilidade e tornar a celulose e até mesmo a hemicelulose mais acessível às enzimas que convertam os carboidratos em açúcares fermentescíveis (FALKOSKI et al., 2013).

Um pré-tratamento eficaz é caracterizado por diversos critérios, tais como evitar a necessidade de reduzir o tamanho das partículas da biomassa e limitar a formação dos produtos da degradação que inibem o crescimento dos microrganismos fermentativos.

A resistência da biomassa lignocelulósica a hidrólise é causada em grande parte pela sua cristalinidade, pela área de superfície acessível, proteção pela lignina, caráter heterogêneo das partículas da biomassa, e o fato da celulose estar revestida pela hemicelulose (VASQUEZ et al., 2007; ARANTES e SADDLER, 2010).

Avaliando-se o potencial de fungos para estes processos, eles são capazes de se desenvolver em meios com altas quantidades de substâncias químicas recalcitrantes, portanto com grande capacidade de degradação da estrutura lignocelulósica, principalmente aos fungos do gênero *Trichoderma* e *Fusarium*, que têm apresentado resultados promissores (WANG 2012).

Sacarificação

O processo de sacarificação consiste no uso de enzimas hidrolíticas que atuam em polissacarídeos (celulose e hemiceluloses) obtendo assim os seus monômeros constituintes na forma de açúcares fermentáveis, passíveis de serem utilizados na produção de biocombustíveis. A conversão da celulose em monômeros de glicose é feita empregando-se enzimas celulolíticas tais como as celobiohidrolases (CBHs), também chamadas de exo-1,4- β -glucanases, as endo-1,4- β -glucanases (EGs) e as β -glicosidases (BGs). Estas atuam em diferentes sítios da cadeia celulósica de forma sinérgica: as CBHs atuam clivando ligações glicosídicas nas extremidades da cadeia, obtendo-se como produto as unidades de celobiose; as EGs clivam regiões amorfas internas da cadeia celulósica e as BGs clivam a celobiose (VALADARES 2013).

As celulasas podem ser produzidas por diversos fungos e bactérias. O fungo *Trichoderma reesei* é o microrganismo mais utilizado industrialmente para a produção de celulasas, entretanto, como desvantagem, a sua produção de β -glicosidase é relativamente pequena. Assim, a aplicação de extrato enzimático proveniente de *T. reesei* para a degradação da celulose gera altas concentrações de oligômeros. Outro fungo com potencial produção de celulasas é o *Fusarium*, com diversas citações na literatura (MEDVE, 1998; PANAGIOTOU 2004).

Hemiceluloses e Hemicelulasas

As hemiceluloses são polímeros complexos, ramificados, compostos de monossacarídeos e derivados, dentre os quais podemos citar a glicose, xilose, manose, arabinose, ácido 4-O-metilglucurônico e ácido 4-O-metilgalacturônico. Além de seus constituintes, as hemiceluloses diferem da celulose por possuírem um menor grau de polimerização e com presença de ramificações na cadeia principal. Esta cadeia principal é formada por monômeros de pentoses ou hexoses unidos, em geral, por ligações glicosídicas β -(1-4) com pontos de ramificações unidos à cadeia principal por ligações glicosídicas β -(1-2), β (1-3) e/ou β -(1-6) (SHALLOM; SHOHAM, 2003). As hemiceluloses são classificadas de acordo com sua composição, como β -mananas, galacto-glicomananas, arabinanas, arabinogalactanas.

Dentre as hemiceluloses, as mais abundante são as xilanas. Em comum, as xilanas são compostas por uma cadeia principal de resíduos de xilose unidos por ligações glicosídicas β -(1-4) nas plantas terrestres, no entanto, cadeias com ligações glicosídicas β -(1-3) unindo os resíduos de xilose foram caracterizadas em algas, como também foi encontrado cadeias com os dois tipos de ligações em *Palmeria palmata* (SUBRAMANIYAN; PREMA, 2002).

A degradação da hemicelulose impõe vários desafios aos mais diversos tipos de microrganismos. O polímero é de alto peso molecular, insolúvel ou associado com celulose e lignina. A hemicelulose também é altamente variável na sua estrutura, portanto, diversas enzimas são necessárias para sua completa hidrólise. A degradação da xilana, por exemplo, necessita da ação sinérgica de diversas enzimas. Endo- β -1,4-xilanase (EC 3.2.1.8), exo- β xilosidase (EC 3.2.1.37), α -L-arabinofuranosidase (EC 3.2.1.55), α -glucuronidase (EC 3.2.1), acetil xilano esterase (EC 3.1.1.6), (ácido ferúlico e ácido p-cumárico) esterase (EC 3.2.1). Além desta gama de enzimas envolvidas na degradação da xilana, se olharmos apenas para as endo- β -1,4-xilanases, por exemplo, veremos como a complexidade das hemiceluloses acarretaram numa gama de endo- β -1,4-xilanases diferentes (FAIK, 2010)

Enzimas fúngicas

Em geral, os fungos que decompõem substâncias celulósicas são encontrados no solo, colonizando vegetais, suas raízes e resíduos, com importante função de reciclagem de nutrientes. A atividade fúngica depende do conteúdo de matéria orgânica no solo, a qual determina sobremaneira a ocorrência e a distribuição desses organismos (RUEGGER, TAUKTORNISIELO, 2004).

Os fungos, em função de suas características de reprodução e crescimento, adaptam-se a diversos substratos, entre os quais efluentes de indústrias processadoras de alimentos, resíduos agrícolas e agroindustriais (TAVARES et al., 1998). Assim, são capazes de degradar a celulose e hemicelulose e utilizá-las como fonte de carbono e energia; inclusive os fungos filamentosos, considerados uma classe de microrganismos de grande significado comercial e amplamente distribuídos na natureza, encontrados em solos, em vegetais e animais, podendo ter hábitos saprófitos ou parasitas (GRIMM et al., 2005).

As enzimas celulolíticas fúngicas têm sido estudadas devido ao seu potencial biotecnológico (NG, 2004). Entre os produtores de celulasas e hemicelulasas estão os gêneros: *Aspergillus*, *Penicillium* e *Trichoderma* (LYND et al., 2002). Os fungos do gênero *Trichoderma* são considerados grandes secretores de celulasas e hemicelulasas, sendo geneticamente os mais estudados. Os fungos produzem um grupo complexo de celulasas capazes de clivar as ligações β -(1 $\rightarrow$ 4)-glicosídicas presentes na celulose e derivados de celulose (ORTEGA et al., 2001).

O Gênero *Fusarium* grupo é um grande táxon polifilético de fungos do Filo Ascomycota, encontrado no solo e capaz de crescer em uma ampla gama de substratos, em associação, muitas vezes patogênicas, com plantas. São isolados em diversas condições climáticas, sendo predominantes em ambientes temperados e tropicais (TEETOR-BARSCH; ROBERTS, 1983; COLEMAN et al., 2011; SUMMERELL e LESLIE, 2011).

Esse gênero tem em seu histórico ataques a diversas culturas de grande relevância econômica, como tomate, banana, pimenta, berinjela, feijão, girassol, trigo, milho. Muitas cepas do gênero *Fusarium* vem sido referenciadas como grandes produtoras enzimáticas de celulasas e hemicelulasas, sendo capaz de se desenvolver em ambientes com alta presença de substâncias recalcitrantes (PERALDI et al., 2011, FORTUNATO et al., 2012).

Estudos têm mostrado que, além das celulasas, a presença de enzimas acessórias é muito importante para a formulação de um bom coquetel enzimático. Associações de celulasas e hemicelulasas contribuem para uma hidrólise mais eficiente da biomassa, e uma maior produção de monossacarídeos. O uso de xilanases em sinergismo com celulasas, tem

apresentado bons resultados, reduzindo a adição de celulasas e levando à liberação quase total da glicose da biomassa (HU et al. 2011).

A eficiência da sacarificação enzimática também pode ser influenciada pela inibição das endoglicanases e exoglicanases pelos produtos finais de hidrólise, a celobiose e glicose (DUFF; MURRAY, 1996). Este fato, entretanto, pode ser amenizado pela suplementação de β glicosidase ao coquetel enzimático ou então promovendo as etapas de sacarificação e fermentação simultaneamente (OLOFSSON et al., 2008).

Desta forma, a busca por diferentes tipos de biomassas com potencial biotecnológico na produção de combustíveis, além de estudar formas de pré-tratamentos eficientes e ambientalmente seguras e a produção de enzimas capazes de hidrolisar os carboidratos da biomassa na sacarificação, são pontos chaves na produção do etanol celulósico de forma viável economicamente.

Material e Métodos

Pré-tratamento biológico com fungos

As folhas usadas da *Furcraea foetida* foram picadas e secas em estufa de circulação forçada a 50°C. As amostras foram então trituradas em moinho de pás adquirindo uma composição fina ideal para o cultivo. As biomassas foram então pré-tratadas com fungos da podridão branca *Pleurotus ostreatus* e *Ganoderma lucidum*, isoladamente. O cultivo utilizando o *Fusarium lateritium* var. *majus* foi utilizado como forma de pré-tratamento e aproveitar o seu potencial como produtor de enzimas para uso na sacarificação. Os fungos *P. ostreatus* e *G. lucidum* foram inoculados para fermentação em estado sólido a partir de discos miceliais com 10 mm de diâmetro, com 10% do peso nas diferentes fibras. As cepas de *F. Lateritium* foram inoculadas a partir de suspensões de esporos 10^6 . As amostras foram mantidas estáticas, no escuro a 37° C, em frascos erlenmeyer de 0,125 L com 10 g de fibra, suplementado com meio de Vogel (VOGEL, 1956), glicose 0,5% e extrato de levedura 0,2%, com umidade final variando de 65 a 82%, sendo extraídas após o pré-tratamento após adição de 0,025 L de água destilada. Filtrou-se os materiais insolúveis de cada um dos frascos sendo a biomassa restante seca à 50° C em estufa de circulação forçada até peso constante. Os materiais solúveis foram utilizados para outras análises. Em relação aos tempos de cultivo, foram realizados testes com diferentes dias de pré-tratamento, variando de 15 e 45 dias, observando o crescimento do fungo sobre a fibra e a degradação da lignina, além do rendimento de açúcares redutores.

Determinação das atividades enzimáticas

Os materiais solúveis foram utilizados para determinação das atividades das principais enzimas ligninolíticas e celulolíticas.

Lacase

A atividade da lacase foi determinada para os cultivos de *Pleurotus ostreatus* e *Ganoderma lucidum*, sendo realizada à 40°C usando ABTS como substrato. A mistura de reação foi preparada com 200 µl de ABTS (10mM), 100 µl do filtrado em 1,7 ml de tampão acetato de sódio 50mM (pH 4,0). O aumento da absorbância foi monitorado a 420 nm (SHIN; LEE, 2000).

Manganês peroxidase

As atividades de Manganês Peroxidase foram determinadas para as cepas de *Pleurotus ostreatus* e *Ganoderma lucidum*. A mistura de reação continha 0,2 mL de MnSO₄ 10mM, 0,2 mL de H₂O₂ 0,5 mM e 0,2 mL do extrato enzimático em tampão malonato 50mM, pH 4,5. Os íons mangânicos gerados pela ação da enzima formam um complexo com o malonato que absorve em 270 nm (WARIISHI et al., 1992)

Beta-glicosidase

A atividade de β-glicosidases foram determinadas para os cultivos de *Pleurotus ostreatus* e *Ganoderma lucidum* utilizando-se os substratos sintéticos o-nitrofenil-beta-glicopiranosídeo, incubando-se este substrato em tampão citrato 50 mM, pH 5,4 com o filtrado a 50° C durante 10 min. A reação foi parada com adição de tetraborato de sódio, em seguida medido espectrofotometricamente a 410 nm (LENARTOVICZ et al., 2003).

Amilase, xilanase e celulase

A Atividade dessas enzimas foram determinadas para todos os cultivos fúngicos, utilizando-se os substratos amido, xilano e carboximetilcelulose, respectivamente pelo surgimento de açúcares redutores utilizando o método do ácido 3,5 dinitrosalicílico (DNS) (MILLER, 1959).

Determinações de fenólicos

Os fenólicos totais presentes nos materiais foram avaliados pelo método de Singleton et al. (1999) para todos os cultivos, utilizando vanilina como padrão. As fibras pré-tratadas com os fungos, e os resíduos lignocelulósicos controles sem pré-tratamento, foram submetidas a sacarificação. A sacarificação foi realizada utilizando dois pools enzimáticos comerciais contendo enzimas celulolíticas (Cellic-CTec2) e hemicelulolíticas (Cellic-HTec2), fornecidos pela empresa Novozymes. Além disso, foi utilizado o pool enzimático produzido a partir do

crescimento do *F. Lateritium* sobre as fibras de *F. Foetida*, na forma de extrato bruto com alta presença de xilanases.

Sacarificação

As sacarificações foram realizadas com 0,5 g de *F. foetida* pré-tratadas e sem pré-tratamentos, em tampão citrato de sódio 50 mM (pH 5,0), a 37° C, com volume final de 10 mL, agitação de 150 rpm por 72 horas, utilizou-se de 1 mL do pool enzimático comercial e 9 mL do pool enzimático do *F. Lateritium*. O processo de sacarificação utilizando o pool HTec2 e o pool FLM foi realizado em fibras de *Furcraea foetida* pré-tratadas ou não pelo cultivo de *Fusarium lateritium* var. *Majus*. A sacarificação com o pool CTec2 foi realizado nas fibras de *F. foetida* não tratadas e pré-tratadas com a cepa de *Pleurotus ostreatus*. Após 72 horas de sacarificação foram realizadas as análises de açúcares redutores presentes, para avaliar o rendimento dos cultivos. Os açúcares redutores liberados na sacarificação foram quantificados pelo método do DNS (MILLER, 1959).

Análise estatística dos dados experimentais

Os experimentos foram realizados pelo menos em triplicata. Os resultados serão expressos como a média, $\pm$ erro padrão da média. A análise da significância da diferença entre duas médias será feita através do teste *t* de Student.

Resultados e Discussão

Crescimento dos microrganismos e dosagens enzimáticas

A biomassa de *F. Foetida* tem sua utilização pautada principalmente na ornamentação, cercas vivas e até para produção de fibras de Sisal, porém a utilizada da holocelulose como potencial para produção de combustíveis ainda não foi explorada. Como toda fibra lignocelulósica há a necessidade de um pré-tratamento que facilite o acesso para as enzimas celulolíticas e hemicelulolíticas à fibra, assim foi realizado pré-tratamentos biológicos utilizando fungos, além disso avaliou-se a produção de enzimas como potencial para sacarificação enzimática da fibra pré-tratada.

Os fungos basidiomicetos *Ganoderma lucidum* e *Pleurotus ostreatus*, além do ascomiceto *Fusarium Lateritium* var. *majus* foram cultivados sobre as folhas de *Furcraea Foetida*. Após o período de cultivo de 45 dias para os basidiomicetos e 15 dias para o ascomiceto, foram interrompidos para análises enzimáticas e uso da biomassa para sacarificação.

Os tempos de 15 dias para o *F. Lateritium* foram suficientes para o crescimento completo na fibra, porém para os basidiomicetos *P. ostreatus* e *G. lucidum*, o crescimento foi mais lento, necessitando de um período de pré-tratamento maior (45 dias).

Figura 1. Atividade das enzimas Xilanase e Celulase nos cultivos do *G. Lucidum*, *P. Ostreatus* e *Fusarium Lateritium* var. *Majus* extraídos dos respectivos cultivos sobre a *Furcraea foetida*. Cultivos realizados pelo menos em triplicata. Letras iguais indicam resultados estatisticamente iguais para cada pool enzimático utilizado, segundo teste ANOVA ($P < 0.05$).

Fonte: Autor (2020)

Ao analisar a produção de xilanase e celulase nos três tipos de cultivo, observou-se uma maior produção dessas enzimas pelo *F. Lateritium* (Figura 1). Uma maior produção de enzimas celulolíticas e hemicelulolíticas nos ascomicetos é esperado em comparação com os basidiomicetos. A produção dessas enzimas está relacionada a grande proporção de celulose e hemicelulose presente na *F. Foetida*. A *Furcraea Foetida* apresenta proporções de aproximadamente 75% de holocelulose, com 22% de hemicelulose e 52% de celulose, e ainda 8% de lignina (PIRES, 2009).

Os fungos do gênero ascomiceto como o *F. Lateritium* e microbiotas parecidas como o *Trichoderma reesei* são organismos conhecidos por melhor atuarem em sistemas celulósicos e hemicelulósicos, pela sua produção razoável de celulasas e hemicelulasas (ELISASHVILI, 1993). A produção destas enzimas pelos ascomicetos já foi contrastada frente a fungos da ordem dos basidiomicetos, onde o padrão de produção dessas enzimas em cultivos feitos na cana de açúcar, em períodos de tempo semelhantes, se mostrou superior (MAMEDE, et al., 2008).

A produção aumentada de xilanase e celulase pelo *F. Lateritium* na biomassa de *F. Foetida* após 15 dias de cultivo, mostra que o pool enzimático produzido tem potencial para uso na sacarificação, discutido posteriormente no tópico 5.3. Sacarificação enzimática.

Tabela 1. Atividade das enzimas β -Xilosidase, β -Glicosidase, Manganês Peroxidase e Lacase nos cultivos de *G. Lucidum* e *P. Ostreatus* extraídos dos respectivos cultivos sobre a *Furcraea foetida*. Cultivos ao menos em triplicata. Letras iguais indicam resultados estatisticamente iguais para cada pool enzimático utilizado, segundo teste t.

Enzimas (U/L)	<i>Ganoderma lucidum</i>	<i>Pleurotus ostreatus</i>
β -xilosidase	119,15 $\pm$ 9,67 ^a	129,25 $\pm$ 24,59 ^a
β -glicosidase	135,18 $\pm$ 11,57 ^b	114,84 $\pm$ 9,60 ^c
Manganês Peroxidase	180,61 $\pm$ 25,86 ^d	174,55 $\pm$ 13,13 ^d
Lacase	159,94 $\pm$ 16,54 ^e	366,77 $\pm$ 30,15 ^f

Fonte: Autor (2020)

Análises das enzimas β -xilosidase, β -glicosidase, Mn Peroxidase e Lacase foram realizadas para os cultivos do *P. ostreatus* e *G. lucidum* na *F. Foetida* após 45 dias (Tabela 1). As enzimas β -xilosidase, β -glicosidase e Mn Peroxidase apresentaram suas produções constantes comparando *G. lucidum* com *P. ostreatus*. Enzimas peroxidases parecem apresentar uma expressão menor nestes tipos de cultivos (MAMEDE, et al., 2008).

Uma diferença encontrada foi em relação a β -glicosidase, com maior produção pelo fungo *G. lucidum*, com um aumento de cerca de 20%. Os valores de enzimas encontrados são considerados baixos, mostrando que esses fungos não são grandes produtores dessas enzimas.

Por outro lado, dosagens enzimáticas da enzima Lacase apresentaram diferenças entre os cultivos de *P. ostreatus* e *G. lucidum*, sendo a atividade apresentado pelo extrato enzimático resultante do tratamento com *P. ostreatus* cerca de 2,29 vezes maior que o tratamento com *G. lucidum*. (Tabela 1).

Os mecanismos para a degradação de lignina são variados entre os fungos, gerando diversos possíveis mecanismos para a degradação desses compostos (HATAKKA, 1994). O fungo *P. ostreatus* é conhecido por degradar lignina, sendo elevada a atividade de Lacases expressas por tais fungos em longos períodos de crescimento em meios de cultivo sólidos, é uma espécie que apresenta um mecanismo adaptativo para a degradação da lignina em diferentes condições.

Expressão de fenólicos totais nas biomassas pré-tratadas

A dosagem de fenólicos totais revelou uma queda considerável com relação a biomassa íntegra da *Furcraea Foetida* utilizada no cultivo, sendo a cepa de *P. ostreatus* a mais eficiente nesse quesito, apresentando uma redução de 93,51% dos compostos fenólicos presentes no meio, seguida pelo *G. lucidum* com uma redução de 88,46%, e pelo *F. Lateritium* de 80,19% (Figura 2). Estes resultados mostram a eficiência do pré-tratamento na redução e possível degradação de tais compostos fenólicos como relatado por Rouches et al. (2015).

Figura 2. Comparação da concentração de compostos fenólicos totais solúveis, extraídos dos extratos de *Furcraea foetida* íntegra e pré-tratada com os diferentes fungos. Letras iguais indicam resultados estatisticamente iguais para cada pool enzimático utilizado, segundo teste ANOVA ($P < 0.05$).

Fonte: Autor (2020)

As folhas de *F. Foetida* possuem alta expressão de fenólicos totais solúveis (MATHEW, ARORA, 2012). E esta alta quantidade de fenólicos encontradas na *Furcraea foetida* está relacionado ao seu sistema de defesa, bem conhecido por essas espécies de plantas, no qual é confirmado pela dificuldade de qualquer crescimento fúngico sobre as mesmas em ambiente natural (MATHEW, ARORA, 2012). Em nossos cultivos as reduções foram consideráveis, demonstrando que os fungos estudados foram capazes de se adaptar e crescer em um meio rico em fenólicos.

A maior degradação de fenólicos ocorreu no cultivo do *Pleurotus ostreatus*, o mesmo cultivo no qual apresentou a maior produção de Lacase, podendo esta enzima estar relacionada a forte diminuição dos compostos fenólicos, utilizado como um recurso adaptativo para permitir o crescimento do fungo, pois a enzima Lacase é uma polifenol oxidase, pertencente à classe de enzimas oxidoreductase (MAYER, STAPLES, 2002).

Sacarificação enzimática

A sacarificação enzimática é parte importante para a produção de açúcares, pois a celulose e a hemicelulose precisam ser degradadas em açúcares fermentáveis. Na sacarificação utilizam-se principalmente de celulasas, β -glicosidases, xilanases, β -xilosidases entre outras.

Para avaliar o pré-tratamento biológico com uso de fungos foi realizada a sacarificação utilizando o pool enzimático da Cellic-CTec2 e Cellic-HTec2, com presenças predominantes de enzimas celulolíticas e hemicelulolíticas, respectivamente. Além disso, foi utilizado o pool

enzimático produzido pelo fungo *F. lateritium* var. *majus* sobre as folhas da *Furcraea foetida*, esse pool enzimático foi utilizado em extrato bruto com predominância de xilanase.

Figura 3. Açúcares redutores liberados após 72 horas de sacarificação com o pool enzimático CTec2. Biomassa de *Furcraea foetida* controle sem pré-tratamento (FF controle CTec2) e a *Furcraea foetida* pré-tratada com *Pleurotus ostreatus* durante 45 dias (FF pré-tratada PO CTec2). Letras iguais indicam resultados estatisticamente iguais para cada pool enzimático utilizado, segundo teste t ($P < 0.05$).

Fonte: Autor (2020)

A avaliação do pré-tratamento utilizando o *Pleurotus ostreatus* por 45 dias sobre a *F. Foetida* foi utilizado o pool enzimático da CTec2 (Figura 3). A sacarificação com a *F. Foetida* controle apresentou $49,08 \pm 8,62$ μmol/mL de açúcares redutores, em contraste a *F. Foetida* pré-tratada que apresentou liberação de $81,61 \pm 8,43$ μmol/mL. Portanto, o pré-tratamento biológico com *P. ostreatus* proporcionou uma melhora de 66,3% em relação ao controle, demonstrando ser uma forma de pré-tratamento eficiente.

Ao compararmos com sacarificações feitas em *Lantana Camara*, uma espécie invasora da região dos trópicos americanos da família das verbenáceas, a mesma foi submetida a um prétratamento ácido para deslignificação e posterior sacarificação enzimática, e se obteve um aumento no rendimento da sacarificação de aproximadamente 77,7% (RAMESH et al 2010). Outros processos apresentaram melhoras de 67,6%, 80,0% e 70,0% para pré-tratamentos com clorito no bagaço de cana (ADSUL et al., 2005), *P. Juliflora* (JEYA et al., 2009), e tratamento alcalino para palha de arroz (GUPTA et al., 2009), respectivamente. Isso demonstra que um pré-tratamento biológico de longo prazo, possibilitando a degradação de diversos componentes da parede celular da planta, apresenta uma melhora no processo de sacarificação comparável a métodos ácidos ou alcalinos de pré-tratamento. O tempo de cultivo estendido,

pode consistir de uma boa estratégia para a degradação desses compostos frente a tratamentos químicos gerais, gerando biomassas mais propícias para o posterior tratamento enzimático.

Além da utilização da porção celulósica das biomassas para produção de combustíveis, como o etanol de segunda geração, a porção hemicelulósica também pode ser explorada, principalmente na utilização das pentoses. Atualmente, se trata de um grande desafio o uso da hemicelulose para o processo fermentativo, devido a boa parte dos pré-tratamentos existentes constituírem de sua remoção, porém o uso de microrganismos produtores de tais enzimas capazes de hidrolisar as variadas estruturas que a hemicelulose pode assumir, demonstra uma alternativa sustentável para o mesmo (GÍRIO et al. 2010). O uso desse tipo de pré-tratamento ainda abre a opção da engenharia genética, para a produção e expressão de enzimas responsáveis pela lise destas estruturas e pelas vias de fermentação dos açúcares gerados, em especial as pentoses como a xilose (VLEET et al 2009)

Na análise do pré-tratamento realizado pelo fungo *F. lateritium*, com um cultivo de apenas 15 dias, não observou-se melhora estatística na liberação de açúcares em relação ao controle sem pré-tratamento, tanto nas análises do pool enzimático HTec2 quanto do pool FLM.

Figura 4. Açúcares redutores liberados após 72 horas de sacarificação utilizando os pools enzimáticos HTec2 e Pool FLM. Biomassa de *Furcraea foetida* controle sem pré-tratamento com o pool HTec2 (FF controle HTec2); biomassa de *Furcraea foetida* pré-tratada com *Fusarium lateritium* var. *majus* durante 15 dias com o pool HTec2 (FF pré-tratada FLM HTec2); biomassa de *Furcraea foetida* controle sem pré-tratamento com o pool FLM (FF controle Pool FLM); e biomassa de *Furcraea foetida* pré-tratada com *Fusarium lateritium* var. *majus* durante 15 dias com o pool FLM (FF pré-tratada FLM Pool FLM).

Letras iguais indicam resultados estatisticamente iguais para cada pool enzimático utilizado, segundo teste t ($P < 0.05$).

O pool enzimático HTec2 apresenta uma quantidade considerável de hemicelulases, assim observa-se que a liberação de $44,49 \pm 4,26 \mu\text{mol/mL}$ e $51,84 \pm 3,92 \mu\text{mol/mL}$ no

controle sem pré-tratamento da *F. foetida* e no pré-tratado pelo *F. lateritium*, respectivamente, refere-se basicamente a açúcares da porção da hemicelulose da *F. Foetida*.

Ao testar o pool enzimático, retirado do extrato bruto do pré-tratamento de *F. lateritium* na *F. Foetida* observou-se uma menor eficiência do que o pool enzimático da HTec2, resultado este explicado pois o pool enzimático da Novozymes apresenta um concentrado de altas taxas de hemicelulases e em proporções maiores do que os utilizados no pool enzimático do *F. lateritium*.

A liberação de açúcares apresentou valores de $28,27 \pm 3,61 \mu\text{mol/mL}$ e $21,61 \pm 1,81 \mu\text{mol/mL}$, na *F. Foetida* pré-tratada com *F. lateritium* e na *F. Foetida* controle, respectivamente. Apesar de não haver mudança estatística entre os valores, é uma forma de tratamento no qual aproveitou-se o mesmo extrato bruto do pré-tratamento biológico para uso na sacarificação, caminho promissor quando se espera maior eficiência dos processos industriais.

A baixa liberação de açúcares redutores pela *F. Foetida* mesmo com baixa presença de lignina, leva a possibilidade que o maior entrave na utilização da *F. Foetida* como potencial para produção de etanol celulósico é a complexidade da estrutura da holocelulose, e nossa forma de pré-tratamento biológico mostrou-se parcialmente satisfatório. A celulose, principalmente, é uma estrutura de difícil degradação pois possui uma complexidade estrutural, além das cristalizações que os polímeros que compõem a mesma podem apresentar. Outro ponto é a grande variação em termos de composição, requerendo o uso de uma diversidade de enzimas endo e exoglucanases da quais os microrganismos utilizados nesses tipos de cultivos podem ser deficitários ou terem baixa expressão (SANTOS et al, 2012).

Conclusões

A *Furcraea foetida* tem potencial para produção de etanol, por ser uma biomassa com alta proporção de polissacarídeos. O pré-tratamento biológico da biomassa lignocelulósica utilizando-se de fungos mostrou-se competitivo frente a outros métodos de deslignificação, mesmo com a alta presença de fenólicos. Os rendimentos com a sacarificação enzimática foram superiores comparando as biomassas pré-tratadas e controles sem pré-tratamento com uso do pool enzimático da CTec2. No entanto ao utilizar o pool enzimático da HTec2 e do extrato bruto do *F. lateritium* var. *majus* não houve diferença na liberação de açúcares antes e após os pré-tratamentos. Porém, o pool enzimático do pré-tratamento da *F. Foetida* com *F. lateritium* var. *majus* chegou a valores de quase 50% da liberação de açúcares redutores do pool enzimático comercial da HTec2. Além disso, o fungo *Fusarium lateritium* var. *majus*

mostrou ser um bom produtor de xilanases, com possibilidade do uso das mesmas para sacarificação da porção hemicelulósica da biomassa da *F. foetida*.

Referências

ADSUL M. G.; GHULE J. E.; SHAIKH H. **Enzymatic hydrolysis of delignified bagasse polysaccharides**. Carbohydr. Polym. 62, 6–10. 2005.

ARANTES, V.; SADDLER, J. N. Access to cellulose limits the efficiency of enzymatic hydrolysis: the role of amorphogenesis. **Biotechnology for biofuels**, v. 3, p. 4, 2010.

CHRYSIKOU L. P.; BEZERGIANNI S.; KIPARISSIDES C. **Environmental analysis of a lignocellulosic-based biorefinery producing bioethanol and high-added value chemicals**. Centre for Research & Technology Hellas, Greece 2018.

COLEMAN J. J.; MUHAMMED M. **Fusarium pathogenesis investigated using Galleria mellonella as a heterologous host**. Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Division of Infectious Diseases, USA. 2011.

DAMAY J.; BOBOESCU I. J.; DURET X. **A novel hybrid first and second generation hemicellulosic bioethanol production process through steam treatment of dried sorghum biomass**. Bioresource Technology. V. 263, p. 103-111. 2018.

DE PAULA, M. P. **Hidrólise ácida de polpa de sisal: características do processo heterogêneo e estudo das reações correlatas**. Dissertação (Mestrado em Ciências - FísicoQuímica) - Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. 2009.

ELISASHVILI, V.L.; Biosynthesis and properties of celulasas and xylanases of higher Basidiomycetes. **Applied Biochemistry and Microbiology**, New York, v. 29, p. 257-266, 1993.

FAIK, A. Xylan biosynthesis: news from the grass. **Plant physiology**, v. 153, n. 2, p. 396–402, 2010.

FALKOSKI, D. L. et al. Chrysoporthe cubensis: A new source of cellulases and hemicellulases to application in biomass saccharification processes. **Bioresource Technology**, v. 130, p. 296–305, 2013.

FORTUNATO A. A.; RODRIGUES F. A. **Physiological and biochemical aspects of the resistance of banana plants to Fusarium wilt potentiated by silicon**. Phytopathology 102:957-966. 2012.

GÍRIO F.M. ; FONSECA C.; DUARTE L.C.; **Hemicelluloses for fuel ethanol: A review**. Laboratório Nacional de Energia e Geologia, Lisboa, Portugal 2010.

GRIMM. L, H., KELLY, S., KRULL, R, HEMPEL, D. C. Morphology and production of filamentous fungi. **Applied Microbiology Biotechnonology**, v. 69, p. 375-384, 2005.

GUPTA R.; SHARMA K. K.; KUHAD R. C. Separate hydrolysis and fermentation (SHF) of *Prosopis juliflora*, woody substrate for the production of cellulosic ethanol by *Saccharomyces cerevisiae* and *Pichia stipitis* NCIM 3498. **Bioresour. Technol.** 100, 1214–1220. 2009.

HATAKKA, A. **Lignin-modifying enzymes from selected white-rot fungi: production and role in lignin degradation.** FEMS Microbiology Reviews 13:125-135 (1994).

HU, J.; ARANTES, V.; SADDLER, J. N. The enhancement of enzymatic hydrolysis of lignocellulosic substrates by the addition of accessory enzymes such as xylanase: is it an additive or synergistic effect? **Biotechnology for Biofuels**, v. 4, n. 1, p. 36, 2011.

HUECK, K. **Problemas e importância prática da fitossociologia no Estado de São Paulo.** Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo: Instituto de Botânica. Série Contribuições para a pesquisa fitossociológica paulista, São Paulo, V.1, 1953.

JEYA M.; ZHANG Y.-W.; KIM I.-W. Enhanced saccharification of alkali-treated rice straw by cellulase from *Trametes hirsuta* and statistical optimization of hydrolysis conditions by RSM. **Bioresour. Technol.** 100, 5155– 5161. 2009.

LAUREANO-PEREZ, L. et al. Understanding factors that limit enzymatic hydrolysis of biomass. **Applied Biochemistry and ...**, v. 124, n. 1-3, p. 1081–1099, 2005.

LENARTOVICZ, V., SOUZA, C.G.M., MOREIRA, F.G., PERALTA, R.M. Temperature and carbon source affect the production and secretion of a thermostable β -xylosidase by *Aspergillus fumigatus*. **Process Biochemistry**, 38, 1775–1780, 2003.

LYND L.R.; WEIMER P.J.; VAN W.H. **Microbial cellulose utilization: Fundamentals and biotechnology.** Micro. & Mol.Bio.Rev., 66: 506-577. 2002.

MAMEDE J. M., et al., **Análise enzimática de fungos lignocelulolíticos cultivados em vinhaça e bagaço de cana de açúcar.** Dissertação (Dissertação em Agronomia) Universidade de São Paulo, Piracicaba. p. 56-60. 2008.

MATHEW J., ARORA K. M., MAZUMDAR A. **Evaluation of phytochemical composition and antioxidant activity of aqueous extract of *Barleria mysorensis* and *Furcraea foetida* leaves.** Molecular and Microbiology Research Laboratory, Environmental Biotechnology Division, School of Bio Sciences and Technology, VIT University, Vellore, Tamil Nadu - 632 014, India 2012.

MAYER, A.M., STAPLES, R.C. **Laccase: new functions for an old enzyme.** Phytochemistry 60:551-565 (2002).

MEDVE, J., KARLSSON, J., LEE, D., TJERNELD, F., **Hydrolysis of Microcrystalline Cellulose by Cellobiohydrolase I and Endoglucanase II from *Trichoderma reesei*: Adsorption, Sugar Production Pattern, and Synergism of the Enzymes.** Forest Products Biotechnology, Faculty of Forestry, University of British Columbia, Vancouver, Canada, 1998.

MOTOOKA, P. *et al.* **Weeds of Hawai'i's Pastures and Natural Areas: An Identification and Management Guide.** College of Tropical Agriculture and Human Resources, University of Hawai'i, Mānoa, 2003.

OLOFSSON, K.; BERTILSSON, M.; LIDÉN, G. A short review on SSF - an interesting process option for ethanol production from lignocellulosic feedstocks. **Biotechnology for biofuels**, v. 1, n. 1, p. 7, 2008.

ORTEGA, N., BUSTO, M.D., PEREZ-MATEOS. **Kinetics of cellulose saccharification by *Trichoderma reesei* cellulases**. International Biodeterioration & Biodegradation, v. 47, p. 714, 2001.

PANAGIOTOU, G., CHRISTAKOPOULOS, P., OLSSON, L. **Simultaneous saccharification and fermentation of cellulose by *Fusarium oxysporum* F3—growth characteristics and metabolite**. Center for Microbial Biotechnology, Biocentrum-DTU, Building 223, Technical University of Denmark, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark, 2004.

PERALDI, A., BECCARI, G., STEED, A., NICHOLSON, P. Brachypodium distachyon: a new pathosystem to study Fusarium head blight and other Fusarium diseases of wheat. **BMC Plant Biology**. v.11. p.100. 2011.

PIRANI, J.R.; CORDEIRO, I. Agavaceae, p.7-8. In: Wanderley M.G.L.; Shepherd, G.J. & Giulietti, A.M.(Coord.). **Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo**. FAPESP: HUCITEC, São Paulo. V.2, 2002.

PIRES, J.S.C.; **Fibras naturais: Características químicas e potenciais aplicações**. Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, Instituto de Biociências, Botucatu, São Paulo. P. 39-46, 2009.

RAMESH C. K.; GUPTA R.; KHASA Y. P. Bioethanol production from Lantana camara (red sage): Pretreatment, saccharification and fermentation. **Bioresource Technology** 101 p. 8348– 8354 2010.

ROUCHES E.; HERPOEL-GIMBERT I.; STEYER J.P. Improvement of anaerobic degradation by white-rot fungi pretreatment of lignocellulosic biomass: A review. **Renewable and Sustainable Energy Reviews** 59 179–198, 2016.

RUBIN, E. M. Genomics of cellulosic biofuels. **Nature**, vol. 454, no. 7206, pp. 841–845, 2008.

RUEGGER, M. J. S. e TAUKE-TORNISIELO, S. M. **Atividade da celulase de fungos isolados do solo da Estação Ecológica de Juréia-Itatins, São Paulo, Brasil**. Revista Brasileira Botânica, v.27, p. 205-211, 2004.

SANTO F. A.; COLODETTE J. L.; FERNANDES S. A. Potential of Sugarcane Straw for Ethanol Production. **Química Nova**, Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil. Vol. 35, No. 5, p. 1004-1010. 2012

SARMENTO, A. S. M.; BARBOSA, C.; CASTELLANI, T. T.; HANAZAKI, N. **Interferência Humana no Estabelecimento e Distribuição de *Furcraea foetida* (L.) Haw (Agavaceae) na Praia Mole, Ilha de Santa Catarina, Brasil: Uma Interface entre Etnobotânica e Espécies Exóticas Invasoras**. Biodiversidade Brasileira, 3(2): 175-191, 2013.

SHALLOM, D.; SHOHAM, Y. Microbial hemicellulases. **Current Opinion in Microbiology**, v. 6, n. 3, p. 219–228, 2003.

SHIN, K.S., LEE, Y.J. Purification and characterization of new member of the laccase family from the White – rot basidiomycete *Coriolus hirsutus*. **Archives Biochemistry and Biophysics**. 384, 109-115, 2000.

SUBRAMANIYAN, S.; PREMA, P. Biotechnology of microbial xylanases: enzymology, molecular biology, and application. **Critical reviews in biotechnology**, v. 22, n. 1, p. 33–64, 2002.

SUMMERELL B.A.; LESLIE J.F., Liew, E.C.Y. et al. **Fungal Diversity** (2011) 46: 1. <https://doi.org/10.1007/s13225-010-0075-8>

TAVARES, V. B., SIVIERI, K., CERON, C. R., DA SILVA, R., TRABUCO, E. Utilização de resíduo líquido de indústria de processamento de suco de laranja como meio de cultura de *Penicillium citrinum*: depuração biológica do resíduo e produção de enzima. **Química Nova**, v. 21, p.722-725, 1998.

TEETOR G.H.; Roberts D.W. 1983. Entomogenous Fusarium species. **Mycopatologia** 84, 316.

VALADARES F. L. **Produção e uso de enzimas derivadas do fungo *Pleurotus Ostreatus* na hidrólise de bagaço de cana pré-tratado por processo quimiotérmico**. Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo. Setembro de 2013.

VASQUEZ, M. P. et al. Enzymatic Hydrolysis Optimization to Ethanol Production by Simultaneous Saccharification and Fermentation. **Applied Biochemistry and Biotechnology**, v. 136-140, n. 2, p. 141–153, 2007.

VLEET J.H.; JEFFRIES T.W. **Yeast metabolic engineering for hemicellulosic ethanol production**. Department of Bacteriology, University of Wisconsin-Madison, Madison, WI 53706, United States, 2009.

VOGEL, H.J. A convenient growth medium for Neurospora (Medium N). **Microbial Genet. Bull.** 13, 42-43, 1956.

WANG Z., XIN H., GENG A. Cellulase production and oil palm empty fruit bunch saccharification by a new isolate of *Trichoderma koningii* D-64. **Process Biochemistry**, vol. 47, pg. 1564-1571, 2012.

WARIISHI, H., VALLI, K., GOLD, M.H. Manganese (II) oxidation by manganese peroxidase from the basidiomycete *Phanerochaete chrysosporium*. **Journal of Biological Chemistry**. 267, 23688–23695, 1992.

YOKOSUKA A., SANO T., HASHIMOTO K. **Steroidal Glycosides from *Furcraea foetida* and Their Cytotoxic Activity**. Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences School of Pharmacy Tokyo, Japan 2009.

ZAYAS, A. A. Distribución geográfica y posible origen de las Agavaceae. **Universidad de La Habana, Revista del Jardín Botánico Nacional**, 10(1): 25-36, 1989.

ZHU, J.Y., PAN, X.J., WANG, G.S., GLEISNER, R. **Sulfite pretreatment for robust enzymatic saccharification of spruce and red pine**. *Bioresource Technology* 100, 2411–2418, 2009.

CAPÍTULO 30: RESÍDUOS AGRÍCOLAS COMO FONTES DE PREBIÓTICOS PARA APLICAÇÃO BIOTECNOLÓGICA: UMA BREVE REVISÃO

CHAPTER 30: AGRICULTURAL WASTE AS PREBIOTIC SOURCES FOR BIOTECHNOLOGICAL APPLICATION: A BRIEF REVIEW

Nairane da Silva Rosa-Leão¹; Quésia Jemima da Silva²; Beatriz de Aquino Marques da Costa³, Vagne de Melo Oliveira⁴ e Ana Lúcia Figueiredo Porto⁵

Resumo

Resíduos agrícolas são considerados algumas das principais matérias-primas possíveis para obtenção de produtos biológicos, possibilitando agregar valor à biomassa residual que normalmente é descartada. Fazem parte desses resíduos: cascas de frutas, polpas de legumes, folhagens, entre outros; que ao serem utilizados no processamento de diversos segmentos industriais, podem ser fontes valiosas de carboidratos fermentáveis como de prebióticos, utilizados com mais frequência na indústria de alimentos. Essa pesquisa visa descrever a importância da utilização dos produtos residuais agrícolas, com destaque para o principal componente nutritivo, os carboidratos com função prebiótica, bem como, suas possíveis aplicações em diversos processamentos para obtenção de novos produtos biotecnológicos. Os prebióticos são compostos por oligossacarídeos como os gentioliogossacarídeos, xiloliogossacarídeos, isomaltoliogossacarídeo, frutoliogossacarídeos e a lactulose, sendo definidos como carboidratos fermentáveis, que ao serem utilizados pela indústria de alimentos, atuam com a capacidade simbiótica de servirem como substrato na fermentação por ação de micro-organismos, que não apresentam toxicidade à saúde humana. Após o desenvolvimento desta pesquisa foi possível observar a importância dos carboidratos fermentáveis no processamento de diferentes produtos com destaque para aqueles oriundos de resíduos agroindustriais.

Palavras-Chave: biomassa, biotecnologia, prebióticos, resíduos.

Abstract

Agricultural residues are considered some of the main possible raw materials for obtaining biological products, making it possible to add value to the residual biomass that is normally discarded. These residues include: fruit peels, vegetable pulps, foliage, among others; that when used in the processing of several industrial segments, they can be valuable sources of fermentable carbohydrates such as prebiotics, used more frequently in the food industry. This research aims to describe the importance of using agricultural waste products, with emphasis on the main nutritional component, carbohydrates with prebiotic function, as well as their

¹Doutoranda em Biotecnologia-Renorbio, Universidade Federal Rural de Pernambuco, nairane.rs@gmail.com

²Doutorado em Biociência animal, Universidade Federal Rural de Pernambuco, quesiajemima0@gmail.com.br

³Mestranda em Biociência Animal, Universidade Federal Rural de Pernambuco, deaquinobeatriz@gmail.com

⁴Doutor, Universidade Federal Rural de Pernambuco, vagne_melo@hotmail.com

⁵Professora Titular, Universidade Federal Rural de Pernambuco, analuporto@yahoo.com.br

possible applications in various processes to obtain new biotechnological products. Prebiotics are composed of oligosaccharides such as gentiooligosaccharides, xylooligosaccharides, isomaltoligosaccharides, fructooligosaccharides and lactulose, being defined as fermentable carbohydrates, which when used by the food industry, act with the symbiotic ability to serve as a substrate in the fermentation by microorganisms that are not toxic to human health. After the development of this research, it was possible to observe the importance of fermentable carbohydrates in the processing of different products, especially those from agro-industrial residues.

Keywords: biomass, biotechnology, prebiotics, waste.

1. Introdução

Os resíduos agrícolas são considerados algumas das principais matérias-primas possíveis para obtenção de produtos biológicos (GHOSH et al., 2016), possibilitando agregar valor a biomassa residual que normalmente é descartada (XU et al., 2019). Fazem parte desses resíduos: cascas de frutas, polpas de legumes (GOMES et al., 2016), folhagens, como as das palmeiras, folhas de ervas para preparação de chás, como a camomila, farelo de copra, palhas de arroz (CHIMTONG et al., 2016), e aveia (ROMANÍ et al., 2016) que ao serem utilizados no processamento de diversos segmentos industriais podem ser fontes valiosas de carboidratos fermentáveis, tais como de prebióticos (ROMANÍ et al., 2016), utilizados com mais frequência na indústria de alimentos (GUIDO et al., 2016; ASHWINI et al., 2019).

De acordo com Khangwal et al. (2019), os prebióticos são carboidratos não digeríveis pelo ser humano e, mesmo que não sejam digeridos com facilidade, eles têm uma importante função como a de fibra alimentar (THOMAS et al., 2016); sendo encontrados em vegetais ao serem adicionados no processo ou produzidos a partir da hidrólise enzimática da biomassa lignocelulósica pela indústria alimentícia (GUIDO et al., 2016; KHANGWAL et al., 2019).

Entre os prebióticos estão os oligossacarídeos que são obtidos a partir de diferentes resíduos agrícolas (CHIMTONG et al., 2016), como xilooligossacarídeos (ROMANÍ et al., 2016), ligninas (KHANGWAL et al. 2019), oligossacarídeos de pectina da casca de citros (ZHANG et al., 2018), galacto-oligossacarídeos (WANG et al., 2020), que não são digeríveis pelo organismo humano, porém fornecem substratos que impulsionam o desenvolvimento de microrganismos principalmente no trato gastrointestinal, beneficiando o organismo que os abrigam (HAMASALIM et al., 2016; KERRY et al., 2018), sendo realizado o aproveitamento desses carboidratos, por organismos vivos conhecidos como probióticos (MANO et al., 2018). Prebióticos podem ser utilizados em aditivos e suplemento alimentares (HAMSALIM et al., 2016; TUFARELLI et al., 2016), como na fortificação de sucos de frutas e na fermentação de bebidas não lácteas sendo observada, como uma alternativa para aumentar a ingestão de

nutrientes bioativos (GOMES et al., 2020), além de sorvetes, ressaltando o sabor (KHANGWAL et al., 2019).

Considerando a busca para suprir as necessidades em reaproveitar os descartes agrícolas, com a necessidade de agregar valor a biomassa, utilizar a biotecnologia e inovação no desenvolvimento de prebióticos se tornou uma alternativa promissora em vários aspectos da saúde humana (FARIAS et al., 2019). Desta forma, o objetivo desta revisão foi descrever a importância da utilização dos produtos residuais agrícolas, com destaque para o principal componente nutritivo, os carboidratos com funções prebióticas, bem como, suas possíveis aplicações em diversos tipos de processamentos alimentícios para obtenção de novos produtos biotecnológicos.

2. Desenvolvimento

Para o desenvolvimento desta revisão, foram realizadas pesquisas durante o período de abril de 2020 a julho de 2020, a partir das seguintes plataformas eletrônicas: Science Direct (<http://www.sciencedirect.com/>), Scielo- ScientificElectronic Library (www.scielo.org) e Springer (<https://www.springer.com>), utilizando como palavras-chave: biotecnologia e prebióticos, prebióticos dietéticos, resíduos agrícolas, resíduo agroindustrial e resíduo do processamento. Realizou-se a leitura dos títulos e resumos para seleção dos artigos, excluindo os que não estavam dentro do escopo da proposta ou que não detinham informações relevantes para nossa investigação. Foram incluídas publicações em inglês e português que atenderam aos critérios de busca. Foram priorizados artigos com data de publicação entre 2015 e 2020, totalizando 115 publicações, garantindo assim um levantamento bibliográfico atualizado. Para a discussão dos conteúdos investigados, foram abordados os seguintes temas: resíduos agrícolas, prebióticos e suas aplicações biotecnológicas.

2.1. Resíduos agrícolas

A agroindústria envolve o conjunto de atividades relacionadas à transformação de matérias-primas, entre elas, as provenientes da agricultura. O processo de transformação dos produtos alimentícios *in natura* gera grandes quantidades de resíduos, que se somam a falta de incentivo de políticas públicas, logística e infraestrutura adequada aos pequenos produtores para o escoamento destes, ganhando a cada dia maior importância dentro das empresas (NONES et al. 2016; ORELLANA et al., 2020).

O descarte inadequado realizado ao ar livre é uma problemática da agroindústria brasileira, que gera potenciais riscos de contaminação dos solos e águas (FAO, 2019; ONG BANCO DE ALIMENTOS, 2019). E a dificuldade de administrar os aterros, que em algumas situações, são os destinos desses resíduos, que em geral não atendem aos padrões ambientais de qualidade, durabilidade limitada, ausência de controle do volume, além de demandarem elevados custos para sua manutenção (MUNHOZ et al., 2019).

A reutilização desses resíduos é a opção mais vantajosa sob o ponto de vista econômico, ambiental, e, muitas vezes, social que representa o descarte inadequado dos resíduos, surgindo um novo olhar através reutilização (VIANA; CRUZ, 2016). Tendo em vista que o reaproveitamento direcionado ao enriquecimento nutricional da alimentação, esses resíduos têm chamado muita atenção por seu efeito direto na saúde pública (MARTINS et al., 2020).

Dentre os maiores volumes de resíduos agrícolas, destacam-se a borra de café (TIAN et al., 2017), as cascas de sementes, as sobras de cortes dos produtos minimamente processados, como melão e melancia; bem como os demais oriundos de fontes variadas (MARTINS et al., 2020), podendo ser utilizados de forma sustentável, contribuindo para agregar valor de consumo, minimizando o desperdício da indústria alimentícia e agrícola, diminuindo, assim, os custos operacionais e sanitários (COSTA FILHO et al., 2017; XU et al., 2019).

2.2. Prebióticos

Os prebióticos são elementos, substrato ou ingredientes alimentares, a base de carboidratos não-digeríveis ou estruturas quimicamente estáveis que oferecem uma fonte energética com papel de modular a microbiota intestinal (GARCIA et al., 2016; KHANGWAL et al., 2019), recebendo atenção das indústrias farmacêuticas e alimentícias por seus efeitos benéficos na saúde (GIBSON et al., 2017; FARIAS et al., 2019), como no fortalecimento do sistema imunológico (HAMASALIM et al., 2016 ; KERRY et al., 2018), apresentando elementos utilizados para manter e recuperar a estabilidade de organismos patógenos atuantes em doenças (QUIGLEY et al., 2020), como por exemplo, extratos de folhas de chá impedindo o desenvolvimento de doenças contribuindo para o desenvolvimento e multiplicação de bactérias benéficas (CHIMTONG et al., 2016).

Os prebióticos atuam em distúrbios cardiovasculares, doença de Crohn, esteatose hepática, auxiliando na redução de sintomas referente à má alimentação ou a doença desenvolvida (MENEES et al., 2018; KHANGWAL et al., 2019), na incorporação de cálcio e magnésio, elevando a densidade óssea, minimizando os risco de câncer (ASHWINI et al.,

2019), alergias alimentares (LI et al., 2020), contribuindo para o bem-estar quando acrescentada na ingestão cotidiana, além de serem elementos considerados não calóricos (VENTURA, 2017), demonstrando inúmeras vantagens para o organismo.

Uma característica importante dos prebióticos é a sua capacidade de interagir com os probióticos formando um produto simbiótico com ação importante no intestino delgado e grosso. Na indústria de alimentos essa interação substrato-nutriente é extremamente explorada na produção de bebidas fermentadas por microrganismos (MANO et al., 2018). Os microrganismos classificados como probióticos não apresentam toxicidade à saúde humana (YAHFOUFET al., 2018). Baseado em indícios, o trato gastrointestinal humano abriga aproximadamente 10¹⁴ células bacterianas de diferentes gêneros e espécies (SHA et al., 2020), sendo assim, oferecendo vantagens ao estimular o crescimento e atividade desses microrganismos (HAMSALIM et al., 2016).

Os prebióticos são compostos por oligossacarídeos como os gentioliogossacarídeos, xiloliogossacarídeos, isomaltoliogossacarídeo, frutoliogossacarídeos e a lactulose (MADJD et al., 2016), porém a partir da nova definição, outros carboidratos não-digeríveis passam a integrar o grupo de fibras dietéticas (ALVES et al., 2017), como os frutanos (oligofrutose e inulina) que são fibras solúveis e fermentáveis, não digeridas por enzimas hidrolíticas e pela α -amilase na parte superior do trato gastrointestinal (CASTRO et al., 2016). Esses compostos são utilizados como prebióticos, por influenciar os processos bioquímicos e fisiológicos do organismo, além de agregar características tecnológicas aos alimentos mediante o processamento (OLIVEIRA et al., 2016; ORTEGA et al., 2016).

2.3. Aplicação Biotecnológica dos prebióticos

Visando o aumento e melhoria da qualidade de vida, o consumo de alimentos tem sido realizado de forma cada vez mais racional, com a ingestão de alimentos funcionais como os prebióticos (SANTOS et al., 2018; SINGH et al., 2017). A indústria de processamento de alimentos tem adicionado esses compostos em seus produtos visando, também, desenvolver características sensoriais importantes como cor, aroma, textura e sabor; e características tecnológicas, tendo em vista suas propriedades emulsionantes, estabilizadores, agentes de gelificação, edulcorantes (LI et al., 2019), entre outras.

Essas características são obtidas a partir de dois métodos, pela adição oligossacarídeo prebiótico à matriz alimentar, ou pela síntese de carboidrato prebiótico diretamente no produto, por via enzimática (RASTALL; GIBSON, 2015). De acordo com Mano et al. (2018), estudos biotecnológicos estão atuando em possibilidades inovadoras para obtenção de prebióticos a

partir de fontes de carboidratos, como os oligossacarídeos, através de processos de hidrólise enzimática ou hidrólise ácida de xilanas, encontrada em biomassa lignocelulósica da agroindústria, para aplicação na indústria alimentícia (CHIMTONG et al., 2016; GUIDO et al., 2016). O desenvolvimento de novas técnicas de encapsulamento de prebióticos tem auxiliado muito contra efeitos agressivos ao prebiótico, oferecendo-lhe proteção do meio onde pode se encontrar (CUI et al., 2018; KHANGWAL et al., 2019).

Nissen et al. (2020) desenvolveram uma bebida à base de cânhamo, fermentada com *Lactobacillus fermentum*, *Lactobacillus fermentum plantarum* e *Bifidobacterium bifidum*, que demonstrou ser uma fonte importante de nutrientes, rica em antioxidantes e moléculas bioativas, como os ácidos graxos poli-insaturados. O processo de fermentação pode representar uma estratégia eficaz para aumentar compostos bioativos, como terpenos e acetato, propionato e butirato, provenientes de sementes, como as de cânhamo (GOMES et al., 2020). Os mesmos resultados foram observados por Bessa e Silva (2019) na elaboração e caracterização, físico-química e sensorial, de iogurtes de tamarindo enriquecidos com prebióticos (inulina e fruto-oligossacarídeo), e Gomes et al. (2020) ao adicionar pequi (*Caryocar brasiliense*) a uma bebida láctea a base de kefir relataram aumento na qualidade tecnológica e nutricional, como adição de compostos antioxidantes, como os carotenóides e aumento da acidez.

De acordo com Feitosa et al. (2019), os fruto-oligossacarídeos também podem ser empregados no processamento substituindo o açúcar, como em sobremesas aeradas de morango, obtendo-se resultados de dulçor muito próximo ao açúcar convencional utilizado pela indústria. Os frutanos podem ser incorporados a alimentos devido às suas propriedades emulsionante e estabilizadora em formulações de massa de pão substituindo açúcar e gordura, apontando a viabilidade e segurança da utilização destes na elaboração de alimentos funcionais (FIGUEIROA; ARRIAGA 2017), demonstrando a tendência que a incorporação desses prebióticos em produtos nutricionais traz benefícios à saúde humana.

Entre os resíduos agrícolas com propriedades prebióticas encontradas, está o grão do café, moído ou simplesmente sua borra (TIAN et al., 2017), assim como, casca de maçã, farelo de polpa seca do coco, palha de arroz, que ao passar pelo processamento de hidrólise, ocorreu a extração riquíssima em oligossacarídeos utilizado para fins prebiótica e segundo Chimtong et al. (2016), após o processo, houve diferentes concentrações de oligossacarídeos, destacando-se as folhas de chá com maior número de carboidratos, atuando também como antibacteriano em amostras com *Escherichia coli*. Demonstrando sua alta eficácia como prebiótico e com um bônus em sua atividade, como agente antibacteriano. Conforme pode ser visualizado na tabela

1, em que exemplificando a potencialidade de utilização da biomassa residual em futuros processos biotecnológicos.

Tabela 1. Relação de subprodutos agrícolas e seus respectivos autores

Tipos de resíduos	Referências
Casca de Limão e Polpa de beterraba	Gomes et al. (2016)
Casca de Citrus	Zhang et al. (2018)
Cascas: palmeira, maçã, folhas de chá usadas e café gasto	Chimtung et al. (2016)
grãos, farelo de copra e a palha de arroz	
Palha de aveia	Romaní et al. (2016)
Palha de milho e sabugo de milho	Orellana et al. (2020)
Casca de trigo	Jagtap et al. (2017)
Derivados do leite	Markowiak et al. (2017)
Casca de farelo de arroz, casco de soga	Guido et al. (2016)
engajo de uva	
Melaço, soro de leite, talos de algodão, espigas de milho, trigo, palha, madeira de álamo, bagaço de cana e farinha de copra	Mano et al. (2018)
Palha de trigo, celulose e lignina	Xu et al. (2019)
Grãos de café torrado, café moído e borra do café	Tian et al. (2017)

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

A aplicação em nutracêuticos conhecidos como suplementos alimentares também foi evidenciada ao serem extraídos de resíduos agrícolas, como casca de trigo, através do processamento de hidrólise, para obtenção de xilooligossacarídeos e investigação de sua potencialidade antioxidante (JAGTAP et al., 2017), corroborando com a premissa de uso no segmento alimentício. O processo de auto-hidrólise é conhecido como um pré-tratamento que utiliza água sob temperaturas e pressões elevadas favorece a separação inicial do resíduo, conferindo-lhe maior valor agregado da palha de aveia com obtenção de carboidratos como oligossacarídeos e com palha de trigo, celulose e lignina a obtenção de xilooligossacarídeos (ROMANI et al., 2016; CARVALHO 2018; XU et al., 2019), como demonstrado na tabela 2.

Segundo Al-Khalaifa et al. (2019), os probióticos também enriquecem a alimentação animal, respaldados por estudos que indicam que o uso de prebióticos na complementação nutricional de frangos não ocasionam danos ou efeitos colaterais, contribuindo para sua produção. Em organismos humanos, Duarte et al. (2017) relataram que o enriquecimento com pó de caju favorece o desenvolvimento de cepas de micro-organismos como os *lactobacillus*, considerados probióticos, na indústria alimentícia, conferindo benefícios no crescimento bacteriano.

Tabela 2. Relação dos tipos de biomassa residual e prebióticos de fonte agrícola

Resíduo	Prebiótico	Referências
Casca de palmeira de açúcar, casca de maçã de pinho, folhas de chá usadas e café gasto Os grãos, o farelo de copra e a palha de arroz	Oligossacarídeos	Chim Tong et al. (2016)
Borra de Café, grão café moído	Oligossacarídeo	Duarte et al. (2017)
Casca de farelo de arroz, casco de soga engaçado de uva	Oligossacarídeos galactooligossacarídeo, frutooligossacarídeo xilooligossacarídeos	Guido et al. (2016)
Casca de Limão e Polpa de beterraba	oligossacarídeos pécicos Oligogalacturonídeos	Gomes et al. (2016)
Melaço, soro de leite, talos de algodão, espigas de milho, trigo palha, madeira de álamo, bagaço de cana e farinha de copra	Oligossacarídeos: frutooligossacarídeo, galactooligossacarídeo, síntese de xilooligossacarídeo e de mananoligossacarídeo	Mano et al. (2018)
Palha de aveia	Xilooligossacarídeos oligossacarídeos e lignina	Romaní et al. (2016)
aspargos, beterraba, alho, chicória, cebola, alcachofra, trigo, mel, frutas, vegetais, leite, sementes de legumes, lentilhas, ervilhas, feijões, grão de bico, malva e mostarda	Galacto-oligossacarídeos inulina, frutooligossacarídeos, oligossacarídeos	Wang et al. (2019) Wang et al. (2020)
Palha de trigo, celulose e lignina	xilooligossacarídeos	Xu et al. (2019)
Casca de Citrus	Oligossacarídeos de pectina	Zhang et al. (2018)

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

A suplementação com prebióticos objetiva, principalmente, desenvolver características organolépticas e sensoriais nos alimentos e aumentando o valor nutricional destes, realizada em meios contendo microrganismos tem sido de grande importância econômica na produção de alimentos simbióticos (Tabela 3). Segundo Wang et al. (2020) entre os prebióticos com ação simbiótica para o desenvolvimento de microrganismos estão inulina, frutooligossacarídeos e oligossacarídeos, que atuam como substratos para fermentação, conciliando alimentação e saúde, incentivando a indústria alimentícia à inovação no mercado para aplicações futuras

(FEITOSA et al., 2019). Karimi et al. (2015) demonstraram que a inulina tem um efeito protetor em diferentes cepas de probióticos, aumentando sua sobrevivência e atividade durante o armazenamento. Além de ser resistente à hidrólise, tanto no estômago quanto no intestino delgado, exercendo efeito bifidogênico ligando a uma variedade de propriedades fisiológicas benéficas. É adicionado principalmente a produtos lácteos com baixo teor de gordura, incluindo leite fermentado, iogurte, sobremesa, queijo e sorvete, pois também substitui a gordura (VILLALVA et al., 2017).

Tabela 3. Carboidratos prebióticos com ação simbiótica para o desenvolvimento de probióticos.

Prebiótico	Probiótico	Efeito simbiótico	Referências
Inulina	<i>Bifidobacterium lactis</i>	Redução da gordura em sorvete de pêssego	Villalva et al. (2017)
β -glucano	<i>Lactobacillus</i> e <i>Bifidobacterium spp.</i>	Redução da gordura em iogurte	Ibrahim; Seleneva (2019)
Inulina	<i>Lactobacillus acidophilus</i> LA-5 e <i>Bifidobacterium lactis</i> BB-12	Leite fermentado com baixo teor de gordura	Pereira et al. (2020)
Inulina	<i>Lactobacillus rhamnosus</i> SP1	Bebida fermentada a base de água de coco	Segura-Badilla et al. (2020)
β -glucano	<i>Streptococcus thermophilus</i> , <i>Lactobacillus bulgaricus</i> e <i>Lactobacillus acidophilus</i>	Iogurte fermentado de leite de búfala	Sinamo; Hasan; Hasanah (2019)
Inulina	<i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Streptococcus termofílico</i> e <i>Acidophilus bacillus</i>	Bebida fermentada a base de leite de aveia	Sukhova et al. (2020)

Fonte: Dados da pesquisa 2020.

Em preparos de bebidas à base de vegetais, além da soja e arroz, o cânhamo vem sendo empregado como um substituto inovador ao leite de origem animal (NISSEN et al., 2020). Na tabela 4 é possível observar as principais aplicações biotecnológicas entre outras diferentes fontes prebióticas.

Tabela 4. Aplicações biotecnológicas de prebióticos.

Prebiótico	Aplicação tecnológica	Referências
Frutooligossacarídeo (FOOS)	Fermentação de embutidos	Bis-Souza et al. (2020) Bis-Souza; Penna; Barretto (2020) Feitosa et al. (2019) Figueiroa; Arriaga (2017) Tewari et al. (2018)

Xilana (xilooligossacarídeo)	Clarificação de sucos	Rosmine et al. (2017); Shahrestani et al. (2016)
Inulina	Iogurte tipo grego Bebidas à base de soro de leite	Guimarães et al. (2018) Costa et al. (2019) Munhoz et al. (2019) Tewari et al. (2018)
Quitooligossacarídeos (COS)	Fermentação de bebida	Gallina et al. (2019)
Galactooligossacarídeo	Redução de lactose em bebidas lácteas	Bosso et al. (2019) Tewari et al. (2018)

Fonte: Dados da pesquisa 2020.

Buscando ser mais atrativo ao consumidor, a indústria de laticínios vem adicionando polpa ou pedaços de frutas em iogurtes e compostos com função de prebiótico. Munhoz et al. (2019) ao adicionar fibras e polpa de açaí (*Euterpe oleracea*) a bebida fermentada, relataram uma melhor aceitação sensorial e nutricional, tendo em vista o teor de antocianinas, composto antioxidante de cor avermelhadas e de sólidos solúveis totais presentes na fruta, importantes para saúde humana. No entanto, os prebióticos também são empregados, na produção de diversas bebidas, como os chás. Segundo Tewari et al. (2018) relatam a eficiência na melhoria da qualidade nutricional e sensorial de chá verde, gelado, pronto para ingestão (RTD) adicionado dos galactooligossacarídeo (GOS), frutooligossacarídeo (FOS) e inulina e ingredientes simbióticos (GOS, FOS, inulina e *Lactobacillus acidophilus*).

3. Considerações Finais

Apesar dos problemas ambientais atribuídos aos resíduos agroindustriais, esses têm demonstrado ser uma excelente fonte de nutrientes para ser utilizado como substrato em processos fermentativos, o que os tornam atrativos, principalmente, para a indústria de processamento de alimentos e bebidas, por serem ricos em carboidratos fermentáveis com atividade prebiótica. Os prebióticos quando adicionados nos alimentos podem auxiliar nas suas características organolépticas e contribuir para o desenvolvimento de micro-organismo probióticos benéficos ao organismo humano. Com isso os prebióticos tornam-se uma alternativa viável para a produção de compostos funcionais, agregando valor econômico a esses produtos.

4. Referências

- AL-KHALAIFA, H.; AL-NASSER, A.; AL-SURAYEE, T.; AL-KANDARI, S.; AL-ENZI, N.; AL-SHARRAH, T.; RAGHEB, G.; AL-QALAF, S.; MOHAMMED, A. Effect of dietary probiotics and prebiotics on the performance of broiler chickens. **Poultry science**, v. 98, n. 10, 2019.
- ALVES, A.P.C.; MARQUES, T.R.; CARVALHO, T.C.L.; PINHEIRO, A.C.M.; RAMOS, E.M.; CORRÊA, A.D. Elaboration and acceptability of restructured hams added with jaboticaba skin. **Food Science Technology**, v. 37, n. 2, 2017.
- ARRUDA, H.S.; PEREIRA, G.A.; PASTORE, G.M. Oligosaccharide profile in Brazilian Cerrado fruit araticum (*Annona crassiflora* Mart.). Lebensmittel-Wissenschaft und –Technologie. **Food Science and Technology**, n. 76, 2017.
- BIS-SOUZA, C.V.; PATEIRO, M.; DOMÍNGUEZ, R.; PENNA, A.L.B.; LORENZO, J. M.; BARRETTO, A.C.S. Impacto fructooligosaccharides and probiotics trains on the quality parameters of low-fat Spanish Salchichón. **Meat Science**, n.159, 2020.
- BIS-SOUZA, C.V.; PENNA, A.L.B.; BARRETTO, A.C.S. Applicability of potentially probiotic *Lactobacillus casei* in low-fat Italian type salami with added fructooligosaccharides: in vitro screening and technological evaluation. **Meat Science**, n.168, 2020.
- BONGAERTS, G.P.A.; SEVERIJNEN, R.S.V.M. A reassessment of the PROPATRIA study and its implications for probiotic therapy. **Nature biotechnology**, v. 34, n. 1, 2016.
- CASTRO, N.L.M.; AMBROSIO, G.P.; VIERA, L.C.; VELEZ, A.E.; BRAVO, V.B. Diseño de una bebida potencialmente funcional de tomate (*Lycopersicum esculentum*) con tumeric (*Curcuma longa* Linn). **Cumbres**, v. 2, n. 2, 2016.
- CHIMTONG, S.; SAENPHOOM, P.; KARAGEAT, N.; SUTTAY, S. Oligosaccharide production from agricultural residues by non starch polysaccharide degrading enzyme and their prebiotic properties. **Agriculture and Agricultural Science Procedia**, v. 11, p. 131-136, 2016.
- COSTA, M.F.; PIMENTEL, T.C.; GUIMARÃES, J.T.; BALTHAZAR, C.F.; ROCHA, R.S.; CAVALCANTI, E.A.; ESMERINO, M.Q.; FREITAS, R.S.L.; RAICES, M.C.; SILVA, A.C.; CRUZ, I. Impacto prebiotics on their geological characteristic and volatile compounds of Greek yogurt. **LWT**, n.105, 2019.
- COSTA FILHO, D. V. et al. Aproveitamento de resíduos agroindustriais na elaboração de subprodutos. In: **II Congresso Internacional das Ciências Agrárias–COINTER–PDVAgro**. 2017.
- CUI, Yuanjing et al. Photonic functional metal–organic frameworks. **Chemical Society Reviews**, v. 47, n. 15, p. 5740-5785, 2018.
- FAO, Fisheries Department, Rome, Italy (2018)

FARIAS, D.P.; ARAÚJO, F.F.; NERI-NUMA, I.A.; PASTORE, G.M. Prebiotics: trends in food, health and technological applications. **Trends in food science & technology**, v. 93, 2019.

FEITOSA, B.F.; FONTES, C.P.M.L.; OLIVEIRA, E.N.A.; MACHADO, A.L.; NETO, J.O.O.; FEITOSA, J.V.F. Prebiotics fructooligosaccharides as a substitute for commercial sugar in aerated strawberry desserts with a non-dairy matrix. **Revista Verde**, v.14, n.4, 2019.

FIGUEROA ARRIAGA, I. C. Obtención de un producto de panificación enriquecido con fructanos de *Agave angustifolia* Haw y su evaluación en ratones en crecimiento. 2017. 96 f. Tesis (Maestría em Ciencias em Desarrollo de Productos Bióticos) Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, Instituto Politécnico Nacional, Morelos, 2017.

GALLINA, D.A.; PACHECO, M.T.B.; BARBOSA P.P.M.; AMORIM, M.M.F.; COBAS, A.C. Efeito de quitos-oligosacarídeos modificados nas características físico-químicas e microbiológicas em uma bebida probiótica fermentada. **Revista do Instituto Laticínios Cândido Tostes**, v. 74, n. 4, 2019.

GARCIA MARÍÑO, A.; NÚÑEZ VELÁZQUEZ, M.; BARRETO PENÍE, J. Microbiota, probióticos, prebióticos y simbióticos. **Acta Médica de Cuba**, v. 17, n. 1, 2016.

GHOSH, S.; CHOWDHURY, R.; BHATTACHARYA, P. Sustainability of cereal straws for the fermentative production of second generation biofuels: a review of the efficiency and economic of biochemical pretreatment processes. **Applied Energy**, v. 198, 2017.

GIBSON, Glenn R. et al. Expert consensus document: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus state mentions the definition and scope of prebiotics. **Nature reviews Gastroenterology & hepatology**, v. 14, n. 8, p. 491, 2017.

GOMES, F.O.; SILVA, M.C.M.; SOUZA, P.B.; FREITAS, T.K.T.; SILVA, D.J.S. Physical and chemical evaluation of a pequi taste kefir drink. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 3, 2020.

GRANATO, D.; BARBA, F.J.; KOVA, D.B.; LORENZO, J.M.; CRUZ, A.G.; PUTNIK, P. Functional Foods: Product Development, Technological Trends, Efficacy Testing, and Safety. **Annual Review of Food Science and Technology**, v.20, 2019.

GUIDO, E.S.; KALIL, S.J.; DA SILVEIRA, J.T. Produção de xilo-oligosacarídeos por hidrólise enzimática de xilana de madeira de faia. **Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão**, v. 7, n. 4, 2016.

GUIMARÃES, J.T.; SILVA, E.K.; COSTA, A.L.R.; CUNHA, R.L.; FRITAS, M.Q.; MEIRELES, M.A.A.; CRUZ, A.G. Manufacturing a prebiotic whey beverage exploring the influence of degree of inulin polymerization. **Food Hydrocolloids**, v.77, 2018.

GUERIN, J.; PETIT, J.; BURGAIN, J.; BORGES, F.; BHANDARI, B.; PERROUD, C.; DESOBRYA, S.; GIANI, J.C. *Lactobacillus rhamnosus* GG encapsulation by spray drying: milk proteins clotting control to produce innovative matrices. **Journal Food Engineering**, n. 193, 2017.

HAMASALIM, H.J. Synbiotic como aditivos alimentares relacionados à saúde e desempenho animal. **Avanços em Microbiologia**, v.6, n.4, 2016.

HOSEINIFAR, S.H.; AHMADI, A.; RAEISI, M.; HOSEINI, S.H.; KKHALLILI, M.; BEHNAMPOUR, N. Comparative study on immuno modulatory and grow then hancing effects of three prebiotics (galactooligosaccharide, fructooligosaccharide and inulin) in common carp (*Cyprinus carpio*). **Fish Shell fish Immunol**, n.58, 2016.

HOSSAIN, M.I.; SADEKUZZAMAN, M.; HA, S.D. Probiotics as potential alternative biocontrol agents in the agriculture and food industries: A review. **Food Research International**, v.100, 2017.

IBRAHIM, M.N.G.; SELEZNEVA, I.S. The symbiotic effect of β -glucan-enriching bio-low fat yogurt. **Научный журнал НИУ ИТМО**, n.4, 2019.

JAGTAP, Sandeep; RAHIMIFARD, Shahin. Unlock ing the potential of the Internet of Things to improve resource efficiency in food supply chains. In: International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, **Food & Environment. Springer, Cham, 2017. p. 287-301.**

KERRY, R.G.; PATRAB, J.K.; YOOHEON, S.G.; HAN-SEUNG, P.; DAS, S. Benefaction of probiotics for human health: A review. **Journal of food and drug analysis**, v. 26, n. 3, 2018.

KARIMI, R.; AZIZI, M.H.; GHASEMLOU, M.; Vaziri, M. Application of inulin in cheese as prebiotic, fat replacer and texturizer: a review. **Carbo hydrate Polymers**, v.119, 2015.

KHANGWAL, I.; SHUKLA, P. Potential prebiotics and their transmission mechanisms: Recent approaches. **journal of food and drug analysis**, v. 27, n. 3, p. 649-656, 2019.

KOBYLIAK N, C.C.; CAMMAROTA, G.; HALEY, A.P.; STYRIAK, I.; GASPAR, L.; et al. Probiotics in prevention and treatment of obesity: a critical view. **Nutr Metab**, v. 13, 2016.

LI, N.; WANG, Z. QU, T.; KRAFT, J.; OH, J.; PIJKEREN, J.P.; HUBER, G.W.; PAN, X. High yield synthesis of glucooligosaccharides (GLOS) as potential prebiotics from glucose: Via non enzymatic glycosylation. **Green Chemistry**, v. 21, n. 10, p. 2686-2698, 2019.

MANO, Mario Cezar Rodrigues et al. Oligosaccharide biotechnology: an approach of prebiotic revolution on the industry. **Applied microbiology and biotechnology**, v. 102, n. 1, p. 17-37, 2018.

MADJD, A., TAYLOR, M.A., MOUSAVI, N.; DELAVARI, A.; MALEKZADEH, R.; MACDONALD, I.A.; FARSHCHI, H.R. Comparison of the effect of daily consumption of probiotic compared with low-fat conventional you gurton weightloss in heal thy obese women following na energy-restricted diet: a randomized controlled trial. **The American Journal of Clinical Nutrition**, v.103, n.2, 2016.

MARKOWIAK, Paulina; ŚLIŻEWSKA, Katarzyna. Effects of probiotics, prebiotics, and synbiotics on human health. **Nutrients**, v. 9, n. 9, p. 1021, 2017.

MARTINS, L.H.S.; KONAGANO, E.M.H.; SOUZA, R.L.L.S.; LOPES, A.S. Physico-chemical analysis of different agro-industrial residues for its use in their industry. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 2, 2020.

MENEES, S.; CHEY, W. The gut microbiome and irritable bowel syndrome. **F1000 Research**, v. 7, 2018.

MUNHOZ, C.L.; HIRATA, V.G.; FRIA, S.B.; FERREIRA, T.H.B. Elaboração de iogurtes de açaí (*Euterpe oleracea*) com adição de prebióticos. **Global Science Technology**, v.12, n.3, 2019.

NUNES, P.B.B.; ANDRADE, S.A.C.; SILVA, T.M.S.; SILVA, G.R.; MACHADO, E.C.L. Prebiotics in UHT milk: advances in enzymatic conversion of lactose to galacto-oligosaccharides. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 5, 2020.

NISSSEN, L.; CARLO, E.; GIANOTTI, A. Prebiotic potential of hemp blended drinks fermented by probiotics. **Food Research International**, n. 131, 2020.

NONES, D.L.; BRAND, M.A.; AMPESSAN, C.G.M.; FRIDERICH, G. Quantification of agricultural and forestry waste biomass to production of pellets for power generation. **Revista de Ciências Agroveterinárias**, v.16, n.2, 2017

ORELLANA, B.B.M.A.; VALE, A.T.; ORELLANA, J.B.P.; CHAVES, B.S.A.; MOREIRA, A.C.O. Caracterização de resíduos agroindustriais da região do distrito federal para fins energéticos. **Energia na agricultura**, v. 35, n. 1, p. 46-61, 2020.

OLIVEIRA, C.F.D.; PINTO, E.G.; TOMÉ, A.C.; QUINTANA, R.C.; DIAS, B.F. Desenvolvimento e caracterização de geleia de laranja enriquecida com aveia. **Revista de Agricultura Neotropical**, v. 3, n. 3, 2016.

ORTEGA, M.; BARBOZA, Y.; PIÑERO, M.P.; PARRA, K. Formulación y evaluación de una galleta elaborada con avena, linaza y pseudofruto del cauji como alternativa de un alimento funcional. **Multiciencias**, v. 16, n. 1, 2016.

PEREIRA, J.A.; PINTO, S.S.; DIAS, C.O.; VIEIRA, M.P.T.; RIBEIRO, D.H.B.; AMBONI, R. D.M.C.; FRITZEN-FREIRE, C.B. Potentially symbiotic fermented milk: A preliminary approach using lactose free milk. **Food Science and Technology**, <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2019.108847>, 2020.

RASTALL, R.A.; GIBSON, G.R. Recent developments in prebiotics to selectively impact beneficial microbes and promote intestinal health. **Current Opinion in Biotechnology**, v. 32, p. 42-46, 2015.

ROMANÍ, A.; TOMAZ, P.D.; GARROTE, G.; TEIXEIRA, J.; DOMINGUES, L. Combined alkali and hydro thermal pre treatments for oat straw valorization within a biorefinery concept. **Bioresour. Technology**, v. 220, 2016.

ROSMINE, E.; SAINJAN, N.C.; SILVESTER, R.; ALIKKUNJU, A.; VARGHESE, S.A. Statistical optimisation of xylanase production by estuarine *Streptomyces* sp. and its application

in clarification of fruit juice. **Journal of Genetic Engineering and Biotechnology**, v. 15, n. 2, p. 393-401, 2017.

SHAHRESTANI, H.; TAHERE-KAFRANI, A.; SOOZANIPOUR, A.; TAVAKOLI, O. Enzymatic clarification of fruit juices using xylanase immobilized on 1, 3, 5-triazine-functionalized silica-encapsulated magnetic nanoparticles. **Biochemical engineering journal**, v. 109, p. 51-58, 2016.

SEGURA-BADILLA, O.; LAZCANO-HERNÁNDEZ, M.; KAMMAR-GARCÍA, A.; VERA-LÓPEZ, O.; AGUILAR-ALONSO, P.; RAMÍREZ-CALIXTO, J.; NAVARRO-CRUZ, A.R. Use of coconutwater (*Cocos nucifera* L) for the development of a symbiotic functional drink. **Heliyon**, v.6, 2020.

SINAMO, K.N.; HASAN, F.; HASANAH, U. Effect of concentration starter and fermentation time on the quality of yoghurt drink from buffalo milk. **Journal of Physics: Conference**, n.1542, 2020.

SANTOS, R.O.; SILVA, M.V.F.; NASCIMENTO, K.O.; BATISTA, A.L.D.; MORAES, J.; ANDRADE, M.M.; ANDRADE, L.G.Z.S.; KHOSRAVI-DARANI, K.; FREITAS, M.Q.; RAICES, R.S.L.; SILVA, M.C.; JUNIOR, J.L.B.; BARBOSA, M.I.M.J.; CRUZ, B.A.G. Prebiotic flours in dairy food processing: Technological and sensory implications. **International Journal of Dairy Technology**, v. 71, 2018.

SINGH, S.P.; JADAUN, J.S.; NARNOLIYA, L.K.; PANDEY, A. Pandey Prebiotic Oligosaccharides: Special Focus on Fructooligosaccharides, Its Biosynthesis and Bioactivity. **Applied Biochemistry and Biotechnology**, v. 183, n. 2, 2017.

SUKHOVA, I.V.; ROMANOVA, T.N.; KOROSTELEVA, L.A.; BAIMISHEV, R.H.; DOLGOSHEVA, E.V. The effect of hydrated oatmeal on quality of the symbiotic fermented milk product. **BIO Web of Conferences**, n.17, 2020.

THAVARAJAH, D.; THAVARAJAH, P.; ABARE, A.; BASNAGALA, S.; LACHER, C.; COMBS JR, P.S.G.F. Mineral micronutrient and prebiotic carbohydrate profiles of USA-grownkale (*brassicaoleracea* L. var. *acephala*). **Journal of Food Composition and Analysis**, v. 52, p. 9-15, 2016.

THOMAS, L.V. Probiotics-the journey continues. **International Journal of Dairy Technology**, v.69, 2016.

TEWARI, S.; DUBEY, K.K.; REKHA, S. Evaluation and application of prebiotic and probiotic ingredients for development of ready to drink tea beverage. **Journal of food science and technology**, v. 55, n. 4, p. 1525-1534, 2018.

TIAN, T.; LIU, Y.; YAN, H.; YOU, Q.; YI, X.; DU, Z.; XU, W.; SU, Z.. Analysis tool kit for the agricultural community. **Nucleic acids research**, v.45, n.W1, p. W122-W129, 2017.

TUFARELLI, V.; LAUDADIO, V. An overview on the functional food concept: perspectives and applied researches in probiotics, prebiotics and synbiotics. **Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences**, n. 4, 2016.

VENTURA, E. **Consumption of probiotic compared with low-fat conventional yougurt on weight loss in.** Disponível em:<<http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/blog/casal-fit-no-g1-zona-da-mata/post/alimentos-prebioticos.html>> Acesso em: 21 de jul 2020

VILLALVA, F.J.; BRUNERI, A.P.C.; VINDEROLA, G.; OLIVEIRA, E.G.; PAZ, N. F.; RAMÓN, A.N. Formulation of a peach ice cream as potential symbiotic food. **Food Science and Technology**, v. 37, n. 3,2017.

VIANA, L.G.; CRUZ, P.S. Reaproveitamento de resíduos agroindustriais. In: **IV Congresso Baiana de Engenharia Sanitária e Ambiental**, 2016.

WANG, S.; XIAO, Y.; TIAN, F.; ZHAO, J.; ZHANG, H.; ZHAI, Q.; CHEN, W. Rational use of prebiotics for gut microbiota alterations: Specific bacterial phylotypes and related mechanisms. **Journal of Functional Foods**, v. 66, p. 103838, 2020.

WANG, Y.; GUO, Q.; DOUGLAS, G.; H., LAPOINTE, G. Oligosaccharides: Structure, function and application. **Encyclopedia of Food Chemistry**, 2019.

XIA, Y.; WANG, M.; GAO, F.; LU, M.; CHEN, G. Effects of dietary probiotic supplementation on the growth, gut health and disease resistance of juvenile Nile tilapia (*oreochromisniloticus*). **Animal Nutrition**, v. 6, n. 1, 2020.

XU, J.; LIU, B.; WU, L.; HU, J.; HOU, H.; YANG, J. A waste-minimized biorefinery scenario for the hierarchical conversion of agricultural straw into prebiotic xylooligosaccharides, fermentable sugars and lithium-sulfur batteries. **Industrial Crops and Products**, v. 129, 2019.

YAHFOUFI, N.; MALLET, J.F.; GRAHAM, E.; MATAR, C. Role of probiotics and prebiotics in immunomodulation. **Curr Opin Food Sci**, v.20, 2018.

CAPÍTULO 31: RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS: UMA ALTERNATIVA PROMISSORA E SUSTENTÁVEL NA PRODUÇÃO DE ENZIMAS POR MICRORGANISMOS

CHAPTER 31: AGRO-INDUSTRIAL WASTE: A PROMISING AND SUSTAINABLE ALTERNATIVE IN THE PRODUCTION OF ENZYMES BY MICROORGANISMS

Viviane do Nascimento e Silva Alencar¹; Juanize Matias da Silva Batista²; Thiago Pajeú Nascimento³
Marcia Nieves Carneiro da Cunha⁴; Ana Cristina Lima Leite⁵

Resumo

Nos últimos anos, devido à maior preocupação da ciência e da sociedade pelo meio ambiente, houve um crescimento no número de pesquisas que visam a utilização dos resíduos agroindustriais como uma maneira de aproveitamento para a geração de produtos com alto valor agregado. Existem diferentes tipos de resíduos gerados pelas indústrias, como por exemplo, indústrias de curtume, sucroalcooleiras, abatedouros, criações de animais, alimentícia, celulose e papel. Os microrganismos podem ser utilizados na bioreciclagem desses resíduos ou na produção de vários produtos de alto valor agregado, incluindo biomoléculas industrialmente importantes. O baixo custo deste tipo de matéria-prima permite o desenvolvimento de processos economicamente competitivos e ecológicos. Uma das maneiras de utilização dos resíduos agroindustriais é através do processo de fermentação em estado sólido, pois a natureza físico-química desses substratos facilita a colonização por microrganismos. Há um grande avanço em pesquisas nesse campo, especialmente devido a solução de problemas ambientais e tentativas de redução de custos dos bioprocessos. O objetivo desse trabalho foi realizar uma breve revisão sobre a utilização de resíduos agroindustriais para a obtenção de produtos biotecnológicos de alto valor agregado e sua contribuição para sustentabilidade do planeta.

Palavras-Chave: resíduos agroindustriais; compostos bioativos; fermentação em estado sólido; microrganismos.

Abstract

In recent years, due to the greater concern of science and society for the environment, there has been an increase in the number of studies aimed at the use of agro-industrial waste as a way of using it to generate products with high added value. There are different types of waste generated by industries, such as tanneries, sugar and alcohol, slaughterhouses, raise animal, food, cellulose and paper. Microorganisms can be used in the bio-recycling of these residues or in the production of various products with high added value, including industrially important biomolecules. The low cost of this type of raw material allows the development of economically competitive and ecological processes. One of the ways of using agro-industrial residues is through the solid state fermentation process, since the physical-chemical nature of these substrates facilitates colonization by microorganisms. There is a great advance in research in

¹ Pós-graduação em Inovação Terapêutica, Universidade Federal de Pernambuco, viviane.antosilva@gmail.com

² Pós-doutorado, Universidade Federal Rural de Pernambuco, juanizematias@yahoo.com.br

³ Pós-doutorado, Universidade Federal Rural de Pernambuco, thiago_pajeu@hotmail.com

⁴ Pós-doutorado, Universidade Federal Rural de Pernambuco, marcianieves@yahoo.com.br

⁵ Professor Departamento de Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de Pernambuco, acilb2003@yahoo.com.br

this field, especially due to the solution of environmental problems and attempts to reduce the costs of bioprocesses. The objective of this work was to carry out a brief review on the use of agro-industrial residues to obtain biotechnological products with high added value and their contribution to the sustainability of the planet.

Keywords: agro-industry waste; bioactive compounds; solid-state fermentation; microorganisms.

1. Introdução

O agronegócio é um setor produtivo promissor e deve apresentar expansão de 3% em 2020 no Brasil (MAPA, 2018). Nas contas da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) será 9,8% maior em 2020 em relação a 2019. O crescimento acentuado do agronegócio brasileiro o coloca em posição de destaque no processo de desenvolvimento do país.

A produção agropecuária de destaque do Brasil, também influencia na grande produção de resíduos. A Organização das Nações Unidas Para a Alimentação e a Agricultura (FAO), estima que a produção mundial de resíduos agroindustriais atinja 1,3 bilhão de toneladas por ano, sendo que, 1/3 dos alimentos potencialmente destinados ao consumo humano são desperdiçados, seja como resíduos, oriundos do processamento, ou como perca na cadeia produtiva (FAO, 2013).

Com isso, quantidades significativas de resíduos agroindustriais são descartadas pelas indústrias; no entanto, o aproveitamento desses resíduos se traduz em uma forma de minimizar os impactos ambientais causados pelo descarte incorreto destes no ambiente. Além disso, eles representam matérias-primas interessantes para a produção de produtos com possível valor agregado. Uma maneira para o aproveitamento desses resíduos é o bioprocessamento para a produção de produtos como biocombustíveis (etanol, butanol e hidrogênio), produtos químicos valiosos, como: ácidos orgânicos (ácido butírico, ácido succínico, ácido itacônico, ácido lático, ácido fumárico e ácido málico), triacilgliceróis, polihidroxialcanoatos, e também enzimas e outras biomoléculas (MARZO et al., 2019).

Diversas agroindústrias têm realizado o aproveitamento dos resíduos na produção de subprodutos, como na indústria de produção de queijos, utilizando o resíduo do soro lácteo na produção de bebidas fermentadas, onde também, os setores de produção animal, já utilizam o soro na incrementação de ração; indústrias sucroalcooleiras utilizam o bagaço oriundo da produção de etanol, para fornecimento de energia nos fornos industriais das usinas (COSTA FILHO et al., 2017).

Essa valorização dos resíduos agroindustriais como suportes nutricionais para a produção de bioprodutos oferece uma alternativa de diversificação de produtos para agricultores e para a agroindústria (SCHALCHLI et al., 2016), além de atender a preocupação com a limitação de recursos fósseis, problemas ambientais e sustentabilidade, juntamente com a preferência do consumidor por produtos naturais, biodegradáveis e ambientalmente amigáveis (DIAZ; BLANDINO; CARO, 2018).

Essa preocupação global em relação à geração de resíduos, que são categorizados em industrial, agrícola, sanitário e sólidos urbanos (DIAZ; BLANDINO; CARO, 2018), impulsiona a chamada biotecnologia sustentável que estimula o desperdício zero (NNOLIM; OKOH; NWODO, 2020), uma intervenção que não apenas ajuda a combater a poluição ambiental, permitindo a restauração completa do solo orgânico e contribuindo positivamente para os esforços de minimização do aquecimento global (NAIDU; SIDDIQUI; IDRIS, 2020), mas também contribui significativamente para a economia, pois, estrategicamente, incita a utilização desses resíduos para produção de itens de alto valor (PRAKASH et al., 2018).

A maioria dos resíduos agrícolas é de natureza lignocelulósica, sendo uma grande fração composta de carboidratos, por isso os resíduos agroindustriais são altamente nutritivos por natureza, eles facilitam o crescimento microbiano e uma forma de utiliza-los é com o emprego de microrganismos e/ou de produtos microbianos com propriedades que possam ser usados na bioreciclagem e também para a produção de vários tipos de produtos de valor agregado, incluindo biomoléculas industrialmente importantes (NNOLIM; OKOH; NWODO, 2020).

As biomoléculas, produtos do metabolismo microbiano, são de alta relevância na economia verde devido a sua alta especificidade pelos substratos, maior eficiência catalítica, boa relação custo-benefício e serem eco-amigáveis (NNOLIM; OKOH; NWODO, 2020).

Resíduos agroindustriais, como bagaço de cana, espiga de milho e farelo de arroz, têm sido amplamente investigados para serem aproveitados como matéria-prima para diferentes estratégias de fermentação com vistas à produção de biomoléculas (RAVINDRAN et al., 2018).

Esses resíduos podem ser usados na fermentação em estado sólido (SSF) devido à sua fácil disponibilidade, alta biodegradabilidade e rica fonte de nutrientes como carbono, reduzindo assim a custos de produção e o impacto ambiental de sua disposição (NAIDU; SIDDIQUI; IDRIS, 2020; SADH; DUHAN; DUHAN, 2018).

Devido ao exposto, é de suma importância que se estude meios de utilizar esses recursos agroindustriais de forma eficiente. O objetivo desse trabalho foi fazer uma breve revisão sobre a utilização de resíduos agroindustriais para a obtenção de produtos

biotecnológicos de alto valor agregado por microrganismos e sua contribuição para sustentabilidade do planeta.

2. Desenvolvimento

2.1 Resíduos agroindustriais

Os resíduos agroindustriais são gerados no processamento de alimentos, fibras, couro, madeira, produção de açúcar, álcool, etc., sendo sua produção, geralmente, sazonal, condicionada pela maturidade da cultura ou oferta da matéria-prima. As águas residuárias podem ser o resultado da lavagem do produto, escaldamento, cozimento, pasteurização, resfriamento e lavagem do equipamento de processamento e das instalações. Os resíduos sólidos são constituídos pelas sobras de processo, descartes e lixo proveniente de embalagens, lodo de sistemas de tratamento de águas residuais, além de lixo gerado no refeitório, pátio e escritório da agroindústria (COSTA FILHO et al., 2017).

Os resíduos podem ser classificados em orgânicos e inorgânicos. Os resíduos orgânicos são aqueles gerados nos setores de agricultura e pecuária como os rejeitos das culturas (café, cacau, banana, soja, milho, etc.), dejetos gerados nas criações animais e os efluentes e resíduos produzidos nas agroindústrias, como abatedouros, laticínios e graxarias. Os resíduos sólidos inorgânicos abrangem as embalagens produzidas nos segmentos de agrotóxicos, fertilizantes e insumos farmacêuticos veterinários, além dos resíduos sólidos domésticos da área rural (RODRIGUES et al., 2013).

Temos ainda os resíduos agroindustriais classificados como biomassa lignocelulósica, onde a lignocelulose é o principal componente da biomassa vegetal, composta principalmente por celulose, hemicelulose e lignina. A celulose é um polímero de homopolissacarídeos composto por D-glicose ligada por ligações β -1,4-glicosídica, organizadas nas plantas em microfibrilas cristalinas. É protegida por uma região amorfa de hemiceluloses e lignina, responsável pela estrutura recalcitrante das células vegetais. No que se refere à hemicelulose, é um heteropolímero ramificado de 93 monômeros de açúcares, como xilose, arabinose, manose, glicose e galactose (CHANDEL; SINGH, 2011; DIAZ; BLANDINO; CARO, 2018). Para usar essa biomassa como matéria-prima em processos fermentativos, a estrutura da lignocelulose deve ser previamente desconstruída por uma etapa adequada de pré-tratamento e posteriormente, hidrolisada para produzir açúcares fermentáveis, incluindo glicose, xilose, arabinose, ácido galacturônico, etc. (KUMAR; SINGH; KORSTAD, 2017; MARZO et al., 2019).

Logo, tem-se que uma grande gama de subprodutos são gerados durante o processamento industrial dos resíduos agroindustriais. Em geral, não há nenhuma aplicação direta desses resíduos, como: caule, folhas, sementes, polpa de frutas, legumes e cereais. No entanto, esses resíduos são ricos em açúcares, fibras, proteínas e minerais que são essenciais para síntese de produtos bioativos por microrganismos (PANESAR et al., 2016). A Figura 1 traz diversos exemplos desse potencial.

Figura 1 - Potencial de valorização de resíduos agroindustriais.

Fonte: COSTA FILHO et al., 2017.

2.2 Pré-tratamento de resíduos agroindustriais

O uso de resíduos agroindustriais renováveis e ambientalmente sustentáveis como matéria-prima para a produção de produtos de base biológica ganhou interesse recentemente. Para esse fim, a aplicação de um pré-tratamento adequado para melhorar a digestibilidade da biomassa e a otimização da hidrólise da biomassa para a produção de açúcares fermentáveis é crucial. A combinação de pré-tratamentos juntamente com o emprego de microrganismos tolerantes aos inibidores gerados durante o processo ou capazes de fermentar açúcares de pentose em hidrolisados mostraram ser abordagens interessantes (DIAZ; BLANDINO; CARO, 2018).

Atualmente, as técnicas de pré-tratamento disponíveis incluem explosão a vapor, moagem, explosão por congelamento, tratamentos químicos com ácidos, bases, solventes orgânicos ou outros produtos químicos e tratamento com fungos (DIAZ; BLANDINO; CARO, 2018).

Os processos de pré-tratamento podem ser físicos, químicos, biológicos ou uma combinação desses métodos. Os pré-tratamentos físicos geralmente consistem em reduzir o tamanho da biomassa ou a deformação da estrutura da biomassa, enquanto os pré-tratamentos químicos removem as barreiras químicas das enzimas. No que diz respeito aos pré-tratamentos

biológicos, eles utilizam microrganismos para alcançar qualquer um dos resultados anteriores (DIAZ; BLANDINO; CARO, 2018).

Quanto a etapa de otimização por hidrólise, os resíduos agroindustriais podem ser hidrolizados para produzir açúcares fermentáveis, o que pode ser realizado por meio de produtos químicos, como ácidos (ácido sulfúrico, ácido clorídrico, etc.), líquidos iônicos ou enzimas (celulases, hemicelulases, pectinases, etc.). Cada método tem várias vantagens e desvantagens. Quanto ao primeiro, o tempo de retenção pode ser mais curto e os custos mais baixos, embora também apresente algumas desvantagens, incluindo a geração de compostos inibidores para a etapa subsequente de fermentação, necessidade de altas temperaturas e problemas de corrosão nos reatores. No caso da hidrólise enzimática, apesar do maior tempo de retenção e o alto custo das enzimas, pode-se operar em temperaturas mais baixas e faixas de pH mais baixas, evitando problemas de corrosão (KUMAR; SINGH; KORSTAD, 2017).

Embora os processos enzimáticos sejam preferidos aos químicos, o custo das enzimas é um fator limitante. Considera-se que cerca de 30 a 40% do custo em produção de enzimas é devido ao substrato da fermentação, o que poderia ser reduzido usando-se substratos de baixo custo, como os resíduos agroindustriais (MARZO et al., 2019).

2.3 Fermentação em estado sólido (FES)

A ampla diversidade de matérias primas encontradas nos resíduos agroindustriais, eles serem de fácil acesso e baixo custo, fazem desses resíduos ótimos candidatos para serem reaproveitados para a produção de um produto comercial. Nessa produção pode-se utilizar três métodos fermentativos: Fermentação Submersa, Fermentação em Superfície e Fermentação em Estado Sólido, sendo que cada um deles possui características peculiares no processo (BOSSA et al., 2019). No entanto, a fermentação em estado sólido (FES) possui grande potencial em comparação com os outros tipos de fermentação para a utilização dos resíduos agroindustriais na produção de biomoléculas, principalmente devido à natureza físico-química de muitos substratos lignocelulósicos que se prestam, naturalmente, para a fase sólida do cultivo (RAVINDRAN et al., 2018).

A FES é um bioprocesso no qual os microrganismos se desenvolvem em um ambiente sem água livre ou com um conteúdo muito baixo de água livre; é um tipo de fermentação heterogênea trifásica (sólido-líquido-gás), em que os microrganismos crescem na superfície de substrato sólido poroso com umidade suficiente para manter o crescimento e metabolismo microbiano. As partículas sólidas representam a fase principal e o processo é realizado na ausência ou quase ausência de água visível entre as partículas (DIAZ et al., 2016). Na maioria dos casos, os fungos filamentosos são escolhidos para processos de FES devido à sua exclusiva

capacidade de colonizar os espaços interparticulares de matrizes sólidas e conseguir secretar várias enzimas para hidrolisar o substrato (**Figura 2**).

Figura 2. Esquema do crescimento fúngico na superfície de substratos sólidos.

Fonte: HÖLKER; LENZ, 2005.

Considerando que o Brasil é um grande produtor agrícola e que há grande geração de resíduos, a FES se apresenta como uma alternativa bastante viável para o aproveitamento desses resíduos, gerando substâncias de interesse econômico, como enzimas, ácidos orgânicos, aromas e pigmentos, por exemplo. Sendo uma tecnologia que provou ser muito eficiente em termos de produtividade, baixo consumo de energia e resolução dos problemas de descarte. Portanto, essa tecnologia fornece uma alternativa de abordagem bastante econômica para exploração dos resíduos (BOSSA et al., 2019; MARZO et al., 2019).

Os resíduos agroindustriais são substratos interessantes para processos FES também por serem ricos em açúcares complexos, como celulose, hemicelulose e pectina, que podem ser convertidos em açúcares simples e assimilados pelos fungos, visto que o tipo de bioproduto formado vai depender muito das composição do substrato utilizado (MARZO et al., 2019).

2.4 Composição do meio de cultura

Está bem documentado que diferentes microorganismos diferem em sua eficiência na produção de biomoléculas, dependendo principalmente de sua capacidade de fermentação e de suas características nutricionais, fisiológicas e genéticas (DURAIKANNU; CHANDRASEKARAN, 2018). O desempenho do processo fermentativo é afetado por fatores químicos como pH, fatores físicos como a temperatura, agitação e aeração e também pelos componentes do meio de cultivo, sendo os constituintes nutricionais dos resíduos agroindustriais de suma importância nesse processo (BOSSA et al., 2019).

A composição do meio de fermentação, a concentração dos constituintes, o rendimento e a produtividade volumétrica desempenham papéis importantes na produção de metabólitos primários e secundários pelos microorganismos, influenciando na taxa de produção das biomoléculas. Atingir o objetivo industrial básico de produzir biomoléculas usando um microorganismo é possível quando a escolha desse microorganismo for baseada em sua capacidade de crescimento e no seu potencial de produção das moléculas de interesse, sendo que o parâmetro de constituição do meio de cultura desempenham um papel crucial nesse processo (DURAIKANNU; CHANDRASEKARAN, 2018). A Tabela 1 demonstra a composição de diversos tipos de resíduos agroindustriais.

Tabela 1 - Composição química (%) de resíduos importantes da agroindústria.

Resíduo agroindustrial	Carboidratos	Fibras brutas	Pectinas	Gorduras	Proteínas	Ligninas
Bagaço da cana-de-açúcar	66,48 ± 2,68	-	-	-	2,3	17,79 ± 0,62
Farelo de arroz	14,1 ± 1,1	26,9	-	30,4 ± 0,9	38,2 ± 2,3	25,63
Farelo de trigo	56,8	33,4-63,0	-	3,5-3,9	13,2-18,4	5,6
Borra de café	55,53 ± 0,85	60,46 ± 2,2	-	2,29 ± 0,30	17,44 ± 0,10	23,90 ± 0,30
Casca de mandioca	75,5 ± 1,2	11,2 ± 0,6	-	3,1 ± 0,1	1,7 ± 0,1	1,92 ± 0,07
Resíduo de maçã	48,0-62,0	-	-	-	3,9-5,7	23,5
Resíduo de azeitona	34,8 ± 0,9	-	-	16,65 ± 0,09	4 ± 1,0	43,2 ± 0,5
Casca de banana	79,0 ± 0,5	9,3 ± 0,1	-	3,0 ± 0,2	0,6 ± 0,1	6,4-9,6
Casca de laranja	30	-	14,4	-	7,9	1,0

Fonte: RAVINDRAN et al., 2018.

2.5 Microrganismos utilizados nos processos fermentativos

No processo de fermentação, os microrganismos realizam uma série de reações catalisadas por enzimas para obtenção de energia através da degradação de moléculas complexas de açúcares em moléculas orgânicas mais simples como o ácido pirúvico, com produção de ATP (MOREIRA, 2015).

Neste processo para obtenção de energia, os microrganismos sintetizam metabólitos secundários, que são compostos extracelulares secretados no meio de cultura durante o crescimento e diferenciação de um organismo vivo, muitos desses metabólitos têm sido isolados e caracterizados, principalmente para fins industriais (SPECIAN et al., 2014).

Grande parte dos avanços nessa área são derivados das descobertas recentes nas áreas de genética, fisiologia e metabolismo de microrganismos. A diversidade genética e metabólica dos microrganismos tem sido explorada há muitos anos visando a obtenção de produtos biotecnológicos, tais como a produção de antibióticos (estreptomicina, penicilina, etc.), de alimentos (cogumelos), processamento de alimentos (queijo, iogurte, vinagre, etc.), bebidas alcoólicas (vinho, cerveja, etc.), ácidos orgânicos (cítrico e fumárico), álcoois (etanol), alimentos fermentados (molho de soja), tratamento e/ou remediação de resíduos (esgotos domésticos, lixo), e na agricultura, na fertilização de solos (fixação biológica de nitrogênio) e controle biológico de pragas e doenças (controle da lagarta da soja, da cigarrinha da cana de açúcar, de fitopatógenos como *Rhizoctonia* e outros) (FALEIRO, 2011). Exemplos de microrganismos utilizados em processos fermentativos para produção de bioprodutos são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Microrganismos utilizados em processos fermentativos para produção de bioprodutos.

Microrganismos	Bioprodutos
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Fermentação alcóolica em processos industriais
<i>Lactobacillus fermentum</i> ; <i>S. cerevisiae</i> ; <i>S. uvarum</i> ; <i>Acetobacter aceti</i> ; <i>Acetobacter orleanensis</i> ;	Fermentação alcóolica na fabricação de vinho e vinagre
<i>S. cerevisiae</i> ; <i>S. uvarum</i>	Produção de glicerol
<i>Lactobacillus casei</i> ; <i>L. acidophilus</i> ; <i>L. plantarum</i> . <i>L. fermentum</i>	Produção de iogurtes
<i>Dunaliella bardawil</i>	Síntese de β -caroteno
<i>Aspergillus spp.</i>	α -amilase, como detergente
<i>Bacillus subtilis</i>	β -amilase, na produção de cerveja
<i>Trichoderma viride</i>	Celulose
<i>S. cerevisiae</i>	Invertase
<i>S. fragilis</i>	Lactase
<i>Aspergillus niger</i>	Lipase, como detergente, na curtição de couro e produção de queijo

<i>A. niger</i>	Oxidases, no branqueamento de papel e tecido
<i>A. niger</i>	Pectinases, em suco de frutas
<i>A. oryzae</i>	Proteases, como amaciante de carne, no auxílio digestivo e curtimento de couro
<i>Mucor sp.</i> ; <i>Escherichia coli</i>	Renina, na produção de queijo
<i>Streptococcus</i> β -hemolítico do grupo C	Estreptoquinase, utilizado na lise de coágulos
<i>Bacillus thuringiense</i>	Biofertilizantes
<i>Aspergillus fumigatus</i> ; <i>Rhizopus stolonifer</i> ; <i>Rhodococcus sp.</i> ; <i>Nocardia sp.</i> ; <i>Bacillus sp.</i> ; <i>Pseudomonas sp.</i>	Degradação de moléculas químicas contidas em defensivos agrícolas

Fonte: dos SANTOS et. al., 2018; PAMPHILE et. al., 2017; LIANG et. al., 2016; MARULANDA; GRANADOS; GARCÍA-ZAPATEIRO, 2016; MARTINEZ et. al., 2014; SAMUEL; LINA; IFEANYI, 2016; SANTOS et. al., 2009.

A chamada biologia sintética é aplicável em muitas áreas, transformando os microrganismos em fábricas para produzir moléculas de interesse. O seu potencial é imenso e as possibilidades de inovações são quase ilimitadas. Usando a biologia sintética, é possível transformar bactérias em veículos de produção de biomoléculas, projetar biomoléculas de acordo com alguma característica específica e controlar a produção de biomoléculas. Por exemplo, pode-se explorar bactérias como fábricas bioquímicas criando novas enzimas para produzir produtos químicos desejados; genomas bacterianos podem ser editados para tornar a célula bacteriana compatível com uma dada estratégia (FLORES BUESO; LEHOURITIS; TANGNEY, 2018).

Diversas espécies de microrganismos têm sido utilizadas na FES a partir de resíduos agroindustriais. Entretanto, os fungos possuem propriedades fisiológicas, bioquímicas e enzimáticas favoráveis à utilização na FES para produzir biomoléculas (BOSSA et al., 2019). Os fungos filamentosos são conhecidos por biossintetizar uma quantidade fantástica de metabólitos secundários, chegando a uma produção de até 73% superior a de outras classes de microrganismos (SPECIAN et al., 2014). Dentre os fungos que são preferencialmente utilizados para produção de produtos biotecnológicos, destacam-se algumas espécies dos gêneros *Aspergillus* e *Penicillium* (BOSSA et al., 2019).

Em segundo lugar, destacam-se as leveduras, que também são capazes de serem cultivadas em um ambiente de baixa atividade de água. Existe também o destaque de algumas espécies de bactérias (por exemplo, *Bacillus subtilis*, *Bacillus thuringiensis* e *Lactobacillus* sp.) e bactérias filamentosas (*Streptomyces* sp.) (SOCCOL et al., 2017).

2.6 Enzimas

Ao selecionar o microrganismo correto, é possível obter, por fermentação dos açúcares contidos nos resíduos agroindustriais, uma ampla gama de metabólitos que têm aplicações úteis (DIAZ; BLANDINO; CARO, 2018).

Dentre esses metabólicos estão as enzimas, que são biomoléculas conhecidas como catalisadores biológicos que encontram aplicações em diversas indústrias, variando desde indústrias de panificação e fabricação de cerveja, celulose para produção de papel, e indústria de detergente. Devido ao seu alto grau de especificidade de substrato e parâmetros operacionais rigorosos e robustos, o uso de enzimas é preferido à catálise química em muitas situações (RAVINDRAN et al., 2018).

Dentre as enzimas úteis em processos industriais, as celulasas estão entre as principais enzimas extracelulares secretadas por diferentes tipos de fungos. As lipases e proteases fúngicas também têm grande importância na degradação microbiana de resíduos agroindustriais. As lipases (EC 3.1.1.3) catalisam a hidrólise de triacilgliceróis, principais constituintes de gorduras e óleos, amplamente encontrados em resíduos de origem vegetal. Os resultados dessa hidrólise são ácidos graxos livres, glicerol e acilgliceróis parciais, que são recursos energéticos facilmente utilizáveis pelos microrganismos (TAKÓ et al., 2015). As proteases microbianas pertencem ao grupo das hidrolases e são enzimas predominantemente multifuncionais que catalisam a lise de uma matriz de polímeros proteicos em constituinte peptídico e aminoácidos. A contribuição global de proteases para enzimas industriais é de aproximadamente 60%, dos quais as fontes primárias são bactérias do gênero *Bacillus* (NNOLIM; OKOH; NWODO, 2020).

As queratinases microbianas (EC 3.4.21 / 24 / 99.11), que também são membros das enzimas proteolíticas, é um grupo predominantemente associado a hidrólise de queratina (NNOLIM; OKOH; NWODO, 2020).

Com o advento da tecnologia de DNA recombinante, houve a possibilidade de clonar microrganismos e produzir em massa enzimas de qualquer origem para atender à demanda de várias indústrias. A melhoria das cepas por mutação é uma tecnologia amplamente empregada na indústria para aumentar o rendimento na produção de enzimas (RAVINDRAN; JAISWAL, 2016).

Espera-se que o mercado global de enzimas para uso industrial aumente a um crescimento anual de 4,7% entre 2016 e 2021 (passando de aproximadamente 5 Bilhões de dólares americanos em 2016 para 6,3 Bilhões de dólares americanos em 2021). Entretanto, apesar da demanda crescente, as enzimas são reagentes relativamente caros, e isso aumenta o custo operacional dos processos que as utilizam. Uma análise crítica do processo de produção

de enzimas revela que quase 50% do custo de produção está associado ao investimento de capital, enquanto o custo das matérias-primas representa quase um terço desses custos, a substituição ou complementação de matérias-primas por fontes oriundas de resíduos agroindustriais pode resultar em uma redução significativa desses custos (RAVINDRAN et al., 2018).

2.7 Discussão

Nos últimos anos, tem havido um interesse crescente em pesquisas na reutilização de resíduos e subprodutos agroalimentares. Os resíduos das indústrias agrícola e de alimentos são produzidos em grandes quantidades e seu descarte pressupõe um importante problema. Além disso, dado que este tipo de matéria-prima não serve mais para fins alimentares e devido também ao seu baixo custo, existe um potencial enorme de sua utilização em processos economicamente competitivos e também ecológicos (BELLASIO et al., 2015; MARZO et al., 2019).

Nesse sentido, a Lei nº 12.305/2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que obriga os municípios a criarem planos de gerenciamento desses resíduos em suas regiões, sendo que a prioridade é a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição ambientalmente adequada dos rejeitos. Assim sendo, a reutilização desses resíduos para a produção de bioprodutos é de grande valia (RODRIGUES et al., 2013).

Na literatura encontramos diversos casos de aproveitamento dos resíduos agroindustriais para a produção de biomoléculas. Essas biomoléculas podem ser comercializadas como produtos finais, serem utilizadas para a produção de outros produtos de valor agregado ou serem utilizadas no processo de descarte ecológico dos resíduos produzidos pelas indústrias.

Cunha *et al.*, 2016 avaliou a produção de enzimas amilolíticas, celulolíticas e proteolíticas pela linhagem *Penicillium* spp. LEMI A8221 cultivada por fermentação em estado sólido utilizando resíduos da colheita de soja (grãos pequenos e quebrados, vagens, hastes e folhas). A composição química geral dos resíduos da colheita de soja (50% de celulose, 25% de hemicelulose e 25% de lignina), fazem desse tipo de resíduo um excelente substrato para o crescimento e desenvolvimento de microrganismos para promover a bioconversão da celulose e da lignina em produtos de interesse econômico. O *Penicillium* spp. LEMI A8221 foi considerado um agente biológico promissor para a aplicação industrial, especialmente para

produção de protease, uma vez que o fungo apresentou eficiência satisfatória na conversão do substrato nos produtos de interesse.

Naidu; Siddiqui & Idris, 2020, em sua pesquisa no país da Malásia, utilizaram fungos Himenomicetos, *Pycnoporus sanguineus* e *Trametes lactinea*, por fermentação em estado sólido para a biodegradação dos resíduos ligno-hemicelulolíticos produzidos a partir das indústrias de óleo de palma, sendo que o descarte dos resíduos gerados com a utilização dos dendezeiros é um grande desafio para esse ramo industrial, pois gera-se 80 milhões de toneladas de resíduos verdes / biomassa lignocelulósica, esses resíduos incluem: troncos de dendezeiros, folhas de dendezeiros, cacho de frutos vazios de óleo de palma, fibras prensadas de óleo de palma, e efluentes da moagem dos frutos.

Já Takó *et al*, 2015 produziu celulases, lipases e proteases a partir dos fungos Zigomicetos, *Mucor corticolus*, *Rhizomucor miehei*, *Gilbertella persicaria* e *Rhizopus niveus* usando resíduos agroindustriais como substratos para posterior produção de bioetanol. Vários Zigomicetos são conhecidos como fontes valiosas de substâncias extracelulares e hidrolases, algumas das quais podem ser empregadas em processos industriais. Utilizou-se a fermentação em estado sólido com resíduos de milho não tratados (caule e folha) e também com resíduos de milho e farelo de trigo. Os pesquisadores concluíram que os resíduos de caule e folhas de milho eram potencialmente aplicáveis como uma fonte com propriedades de forte indução na produção de celulase e lipase pelos fungos. As celulases produzidas eram então utilizadas para a conversão de biomassas de origem celulósica em etanol, sendo que para esse processo é necessário a hidrólise enzimática da biomassa em glicose fermentável. Essa degradação é realizada pelas celulases, que são misturas complexas de enzimas com diferentes especificidades para hidrolisar as ligações p-1,4-glicosídicas da celulose. A adição do coquetel de celulase aos resíduos celulósicos agilizou o processo de sacarificação e, portanto, a produção do bioetanol de forma eficaz e ecológica.

Nascimento *et al.*, 2014 estudou uma seleção de 14 amostras de *Aspergillus* sp. isoladas do solo da Caatinga de Pernambuco, Brasil, para produção de tanase em meios alternativos contendo resíduos agroindustriais oriundos da indústria de sucos e bebidas (cascas de café, tangerina e uva). A tanase (EC 3.1.1.20) é uma esterase e depsidase formada predominantemente por ácido gálico, que possui inúmeras aplicações biotecnológicas. A enzima tanase faz parte de um dos maiores grupos de enzimas industriais descritas na literatura, pois hidrolisa ésteres e apresenta ligações laterais de taninos hidrolisáveis, produzindo, assim, glicose e ácido gálico. A tanase é uma enzima extracelular, produzida na presença de ácido tânico por fungos filamentosos, bactérias e leveduras. O gênero *Aspergillus* se destaca como

um excelente produtor de tanase. Neste caso foi utilizada a fermentação submersa. O meio que continha resíduo de café apresentou maior produção de tanase, quando comparado ao meio controle e aos demais meios contendo os outros resíduos agroindustriais (laranja e uva). Verificou-se a habilidade do *Aspergillus* sp, de amostra isolada do solo da Caatinga, em hidrolisar os taninos presentes nos resíduos testados, transformando-os na enzima tanase.

Um outro estudo, proposto por Nnolim; Okoh & Nwodo, 2020 avaliou os potenciais de produção de enzimas queratinolíticas de alguns isolados bacterianos autóctones no solo do município de Raymond Mhlaba, na África do Sul. Muitos setores agroindustriais acumulam biomassa de resíduos queratinosos que podem ser aproveitados para a produção de itens alto valor. Amostras de solo foram coletadas de lixões, de onde foram isoladas bactérias produtoras de queratinase. A atividade da queratinase foi avaliada em relação à formação de tiol e percentual de degradação de penas. A espécie *Bacillus* sp. isolada desses solos apresentou o melhor potencial queratinolítico, com maior atividade extracelular de queratinase e de degradação de penas, se revelando em um grande potencial para uso biotecnológico.

O estudo de Prakash *et al.* 2018 investigou a viabilidade de produção de bioetanol a partir de cascas de banana usando enzimas termo alcalina estáveis. Essas enzimas foram produzidas a partir de resíduos agroindustriais. Os pesquisadores isolaram o *Geobacillus stearothermophilus* HPA19 para produzir um coquetel de enzimas xilano-pectino-celulolítica termo-alcalina, usando outro tipo de resíduo, o farelo de trigo. O aproveitamento das cascas de banana para a produção de bioetanol é muito útil, uma vez que esses resíduos são geralmente jogados pelos cultivadores em cursos d'água ou em aterros sanitários locais, havendo um efeito prejudicial no meio ambiente.

3. Considerações Finais

As pesquisas no campo da utilização de resíduos agroindustriais são essenciais, não só pela problemática ambiental, mas também pela preferência do mercado por produtos naturais, biodegradáveis e ambientalmente amigáveis. A acessibilidade a fontes alternativas e economicamente viáveis de substratos para a produção fermentativa de produtos de alto valor agregado, como as biomoléculas é fundamental para o desenvolvimento da biotecnologia sustentável.

4. Referências

- BELLASIO, M. et al. Organic acids from lignocellulose: *Candida lignohabitans* as a new microbial cell factory. **Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology**, v. 42, n. 5, p. 681–691, 2015.
- BOSSA, L. F. et al. Resíduos agroindustriais para produção de produtos biotecnológicos. In: **Agroecologia : caminho de preservação do meio ambiente**. [s.l: s.n.]. p. 9–25, 2019.
- CHANDEL, A. K.; SINGH, O. V. Weedy lignocellulosic feedstock and microbial metabolic engineering: Advancing the generation of “Biofuel”. **Applied Microbiology and Biotechnology**, v. 89, n. 5, p. 1289–1303, 2011.
- COSTA FILHO, D. V. et al. Aproveitamento de resíduos agroindustriais na elaboração de subprodutos. In: **II Congresso Internacional das Ciências Agrárias COINTER-PDVAgro 2017**. ISSN: 2526-7701.Oral. João Pessoa: Pernambuco, 2017, p. 1–8, 2017.
- CUNHA, J. R. B. et al. Cultivo de *Penicillium* spp. em resíduos da colheita de soja para produção de celulase, protease e amilase. **Rev. Ceres Viçosa**, v. 63, n. 5, p. 597–504, 2016.
- DIAZ, A. B. et al. Modelling of different enzyme productions by solid-state fermentation on several agro-industrial residues. **Applied Microbiology and Biotechnology**, v. 100, n. 22, p. 9555–9566, 2016.
- DIAZ, A. B.; BLANDINO, A.; CARO, I. Value added products from fermentation of sugars derived from agro-food residues. **Trends in Food Science and Technology**, v. 71, p. 52–64, 2018.
- dos SANTOS, P. S. et. al. Fermentação em estado sólido em resíduos agroindustriais para a produção de enzimas: uma revisão sistemática. **The Journal of Engineering and Exact Sciences**, v. 4, n. 2, 2018.
- DURAIKANNU, D.; CHANDRASEKARAN, S. D. Optimization and modeling studies on the production of a new fibrinolytic protease using *Streptomyces radiopugnans*_VITSD8. **Frontiers in Biology**, v. 13, n. 1, p. 70–77, 2018.
- FALEIRO, A. Biotecnologia: uma visão geral. In: Biotecnologia: estado da arte e aplicações na agropecuária. [s.l: s.n.], 2011.
- FAO. Desperdício de alimentos tem consequências no clima, na água, na terra e na biodiversidade. Disponível em: <http://www.fao.org.br/dacatb.asp>. Acesso em: 20 de Julho de 2020.
- FLORES BUESO, Y.; LEHOURITIS, P.; TANGNEY, M. In situ biomolecule production by bacteria; a synthetic biology approach to medicine. **Journal of Controlled Release**, v. 275, p. 217–228, 2018.
- HÖLKER, U.; LENZ, J. Solid-state fermentation: are there any biotechnological advantages? **Current Opinion in Microbiology**, v. 8, n. 3, p. 301–306, 2005.
- KUMAR, D.; SINGH, B.; KORSTAD, J. Utilization of lignocellulosic biomass by oleaginous yeast and bacteria for production of biodiesel and renewable diesel. **Renewable and**

Sustainable Energy Reviews, v. 73, n. October 2015, p. 654–671, 2017.

LIANG, M-H et. al.. Inhibiting Lycopene Cyclases to Accumulate Lycopene in High β -Carotene-Accumulating *Dunaliella bardawil*. **Food Bioprocess Technol.** v. 9, n. 6, p. 1002–1009, 2016.

MAPA. Projeções do Agronegócio: Brasil 2017/18 a 2027/28 projeções de longo prazo: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Política Agrícola. – Brasília: MAPA/ACE. [s.l: s.n.].

MARTINEZ, M. E. M. et. al. Estudo da fermentação submersa não aerada por *Saccharomyces cerevisiae* para determinação dos parâmetros de consumo de glicose e produção de glicerol e etanol. **Eclética Química**. v. 39, p. 91–106, 2014.

MARULANDA, M.; GRANADOS, C.; GARCÍA-ZAPATEIRO, L. A. Análisis sensorial y estimación fisicoquímica de vida útil de una bebida tipo yogur a base de lactosuero dulce fermentada con *Streptococcus Salivarius ssp. Thermophilus* y *Lactobacillus Casei ssp. Casei*. **Producción + Limpia**. v.11, n.1, p. 94–102, 2016.

MARZO, C. et al. Valorization of agro-industrial wastes to produce hydrolytic enzymes by fungal solid-state fermentation. **Waste Management and Research**, v. 37, n. 2, p. 149–156, 2019.

MOREIRA, C. Fermentação, **Rev. Ciência Elem.**, v. 3 n. 2 p. 106, 2015.

NAIDU, Y.; SIDDIQUI, Y.; IDRIS, A. S. Comprehensive studies on optimization of ligno-hemicellulolytic enzymes by indigenous white rot hymenomycetes under solid-state cultivation using agro-industrial wastes. **Journal of Environmental Management**, v. 259, p. 110056, 2020.

NNOLIM, N. E.; OKOH, A. I.; NWODO, U. U. Proteolytic bacteria isolated from agro-waste dumpsites produced keratinolytic enzymes. **Biotechnology Reports**, v. 27, p. e00483, 2020.

NASCIMENTO, K. B. DE M. et al. Utilização de resíduos agroindustriais para produção de tanase por *Aspergillus sp.* isolado do solo da caatinga de Pernambuco, Brasil. **E-Xacta**, v. 1, n. 1, p. 95–103, 2014.

PAMPHILE et. al. Aplicações biotecnológicas de metabólitos secundários extraídos de fungos endofíticos: o caso do *Colletotrichum sp.* **Revista Uningá**, v. 53, n. 1, p. 113–119, 2017.

PANESAR, P.S., KAUR, R., SINGLA, G., SANGWAN, R.S. Bio-processing of agro-industrial wastes for production of food-grade enzymes: progress and prospects. **Appl Food Biotechnol**, v. 3, n. 4, p. 208–227, 2016.

PRAKASH, H. et al. Development of eco-friendly process for the production of bioethanol from banana peel using inhouse developed cocktail of thermo-alkali-stable depolymerizing enzymes. **Bioprocess and Biosystems Engineering**, v. 41, n. 7, p. 1003–1016, 2018.

RAVINDRAN, R. et al. A review on bioconversion of agro-industrial wastes to industrially important enzymes. **Bioengineering**, v. 5, n. 4, p. 1–20, 2018.

RAVINDRAN, R.; JAISWAL, A. K. Microbial enzyme production using lignocellulosic food

industry wastes as feedstock: A review. **Bioengineering**, v. 3, n. 4, 2016.

RODRIGUES, L. S. et al. Gerenciamento de resíduos sólidos agrossilvipastoris e agroindustriais. **Cadernos Técnicos de Veterinária e Zootecnia (Cadernos Técnicos da Escola de Veterinária da UFMG)**, n. 68, 2013.

SADH, P. K.; DUHAN, S.; DUHAN, J. S. Agro-industrial wastes and their utilization using solid state fermentation: a review. **Bioresources and Bioprocessing**, v. 5, n. 1, p. 1–15, 2018.

SAMUEL, O.; LINA, J. ; IFEANYI, O. Production of vinegar from oil-palm wine using *Acetobacter aceti* isolated from rotten banana fruits. **Universal Journal of Biomedical Engineering**, v. 4, n. 1, p. 1–5, 2016.

SANTOS, R. N.; ALVES, A. O.; SILVEIRA, B. Microrganismos de uso biotecnológico. **JEPEX**, 2009.

SCHALCHLI, H. et al. Production of ligninolytic enzymes and some diffusible antifungal compounds by white-rot fungi using potato solid wastes as the sole nutrient source. **International Journal of Laboratory Hematology**, v. 38, n. 1, p. 42–49, 2016.

SOCCOL, C. R.; COSTA, E. S. F.; LETTI, L. A. J.; KARP, S. G.; WOICIECHOWSKI, A. L.; SOUZA-VANDENBERGHE, L. P. Recent developments and innovations in solid state fermentation. **Biotechnology Research and Innovation**, v. 1, p. 52–71, 2017.

SPECIAN, V. et al. Secondary metabolites produced by endophytic fungi of pharmaceutical interest. **UNOPAR Cient Ciênc Biol Saúde**, v. 16, n. 345, p. 345–351, 2014.

TAKÓ, M. et al. Enhanced production of industrial enzymes in *Mucoromycotina* fungi during solid-state fermentation of agricultural wastes/by-products. **Acta Biologica Hungarica**, v. 66, n. 3, p. 348–360, 2015.

CAPÍTULO 32: APLICAÇÃO DO PROGRAMA 5S EM LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE UM LATICÍNIO

CHAPTER 32: APPLICATION OF THE 5S PROGRAM IN A DAIRY QUALITY CONTROL LABORATORY

Rubia Viana Batista¹; Larissa Schlichting. da Silva²; Eduarda Molardi Bainy³

Resumo

O objetivo deste trabalho foi implementar o programa 5S em um laboratório de controle de qualidade (CQ) de um laticínio com Serviço de Inspeção Federal (SIF) em Laranjeiras do Sul, Paraná. Inicialmente o programa foi apresentado aos colaboradores do laboratório e definido a composição da equipe e sua integração. Através do trabalho realizado no laboratório foi possível elaborar cronograma e planos de ação para cada senso, junto a responsável pelo CQ do estabelecimento. No fim de cada senso foram realizadas duas auditorias internas para os três primeiros sentidos e uma para o quarto e quinto sentidos. Foi observada a satisfação pelos resultados obtidos, mudança no comportamento e o sentimento de responsabilidade, equipe e propriedade sobre os sentidos. Dentre os benefícios relatados estão a melhoria no ambiente de trabalho, mais limpo e organizado; ambiente mais seguro, evitando-se acidentes; facilidade em encontrar os materiais resultando em aumento da produtividade e redução de desperdícios. No fim do programa foi realizada uma auditoria externa, contemplando todos os sentidos, que apresentou resultados satisfatórios na sua implementação. Porém, para continuidade e fortalecimento do programa, é necessário o monitoramento dele, bem como o incentivo e reconhecimento aos colaboradores, que é base da pirâmide da Qualidade Total.

Palavras-Chave: gestão da qualidade, cinco sentidos, segurança de alimentos.

Abstract

The objective of this work was to implement the 5S program in a quality control laboratory (QC) of a dairy with the Federal Inspection Service (SIF) in Laranjeiras do Sul, Paraná. Initially, the program was presented to the laboratory collaborators and the composition of the team and its integration was defined. Through the work carried out in the laboratory, it was possible to develop a schedule and action plans for each area, together with the person responsible for the establishment's QC. At the end of each sense, two internal audits were carried out for the first three senses and one for the fourth and fifth senses. Satisfaction with the results obtained, changes in behavior and the feeling of responsibility, team and ownership over the senses were observed. Among the reported benefits are the improvement in the work environment, cleaner and more organized; safer environment, avoiding accidents; ease in finding the materials resulting in increased productivity and reduced waste. At the end of the program, an external audit was carried out, covering all the senses, which presented satisfactory results in its implementation. However, to continue and strengthen the program, it is necessary to monitor it, as well as to encourage and recognize employees, basis of the Total Quality pyramid.

Keywords: quality management, five senses, food safety.

¹ Engenharia de Alimentos, Universidade Federal da Fronteira Sul, rubiavianabatista@gmail.com

² Engenharia de Alimentos, Universidade Federal da Fronteira Sul, larischs@hotmail.com

³ Doutora em Engenharia de Alimentos, Universidade Federal da Fronteira Sul, eduarda.bainy@uffs.edu.br

Introdução

Depois da II Guerra Mundial com o Japão destruído, algumas estratégias foram empregadas para reconstruir o país e alavancar as indústrias. A partir daí a gestão da qualidade passou a ser conhecida e utilizada por grandes marcas ao redor do mundo, na busca pela Qualidade Total com ações comportamentais trabalhadas no 5S (Neto et al., 2017). A adoção de programas da qualidade é fundamental para estruturar a gestão organizacional, estabelecer prioridades, organizar, padronizar e realizar melhorias no processo e produtos. Dentre os programas utilizados para obtenção destes resultados está o Programa 5S (Paula et al., 2017).

O programa 5S é conhecido pela simplicidade de seus princípios e por ter como objetivo a promoção da qualidade no ambiente organizacional, renovar os conceitos de organização e produtividade, gerando novos padrões de comportamento. Ele baseia-se em cinco sentidos, sendo estes *Seiri* (Utilização), *Seiton* (Organização), *Seiso* (Limpeza), *Seiketsu* (Padronização/ Saúde e Bem-estar) e *Shitsuke* (Autodisciplina). Seus resultados são expressivos e verificáveis em curto espaço de tempo e por isso é considerada essencial para ser aplicada junto à programas básicos da qualidade, como as BPF (Andrade, 2015; Souza et al., 2018; Neto et al., 2017). O primeiro senso consiste em eliminar o que é desnecessário no ambiente, o segundo em ordenar local correto aos materiais, o terceiro em realizar limpeza a fundo criando guias para este procedimento, o quarto é responsável por padronizar as boas práticas implementadas pelos três primeiros sentidos, enquanto que o último senso consiste no cumprimento e comprometimento das pessoas em todas as etapas (Gobis e Campanatti, 2012; Almeida e Barbosa, 2017; Turbano et al., 2016).

O 1º Senso de Utilização é fundamentado em tomar conhecimento e classificar os materiais necessários e desnecessários do local, eliminando do laboratório o que não é frequentemente utilizado pela equipe. O 2º Senso de Organização é fundamentado no objetivo de definir local para cada material, de modo que este seja encontrado facilmente. Já o 3º Senso de Limpeza é baseado na manutenção de um ambiente limpo e organizado, promovendo um ambiente em boas condições sanitárias, seguro e agradável para a equipe de trabalho (Turbano et al., 2016; Costa e Souza, 2017).

O 4º Senso de Padronização, também como conhecido como o Senso da Saúde e Bem-estar, é fundamentado em padronizar as boas práticas implementadas pelos três primeiros sentidos, a fim de manter o que já foi conquistado. As ações buscam um ambiente que garanta a saúde física e mental do funcionário, além de padronizar as atividades realizadas por eles (Costa e Souza, 2017). Já o 5º Senso de Autodisciplina é baseado no cumprimento e comprometimento das pessoas com as etapas já realizadas. A equipe deve compreender e seguir as regras e padrões

criados, sejam eles escritas ou não, além de garantir que pessoas que passem em seu local de trabalho respeitem elas também. Quando o senso de autodisciplina está consolidado, o programa 5S está consolidado (Habu et al., 1992).

O objetivo do presente trabalho foi implantar o programa 5S em um laboratório de controle de qualidade de um laticínio sob inspeção do serviço federal (SIF) localizado em Laranjeiras do Sul/PR, bem como, avaliar e quantificar cada senso na forma de auditoria interna e externa.

Material e Métodos

A metodologia para implantação do programa 5S foi de caráter exploratório e descritivo. O trabalho foi realizado de setembro a novembro de 2018 em um laticínio com Serviço de Inspeção Federal (SIF) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) localizado em Laranjeiras do Sul. Definiu-se a área piloto como o Laboratório de Controle de Qualidade, por ser um local pequeno, com atividades importantes para a indústria e com necessidade de melhorias.

O trabalho se iniciou com a fundamentação teórica dos sentidos por parte do responsável pela implantação deste, seguida da integração com a equipe do laboratório e através da realização do trabalho diário junto a equipe durante aproximadamente um mês. Neste período foi possível conhecer a realidade do trabalho, situação do local, verificar necessidades e particularidades do ambiente, identificando assim, pontos importantes para elaboração dos planos de ação de cada senso.

O cronograma das atividades para a implementação do Programa 5S foi elaborado com a responsável pelo setor do CQ e apresentado na versão final preenchido na Figura 1. O 1ºS teve duração de três semanas para implementação, sendo que na última semana foi realizada uma auditoria interna, *feedback* com discussão das não conformidades com equipe e nova oportunidade de adequação dos pontos de melhoria antes da realização da segunda auditoria interna. O 2º e 3º Sentidos tiveram duração de duas semanas cada para implementação, sendo que na segunda semana foi realizada o mesmo procedimento (1ª auditoria interna, *feedback*, tempo para adequação e 2ª auditoria interna) como descrito anteriormente para o 1ºS. O 4ºS teve duração de duas semanas para implementação e o 5º Senso teve duração de uma semana para implementação. Foi realizada apenas auditoria interna para estes dois Sentidos, uma vez que não apresentaram grande número de não conformidades. Assim, os sentidos tiveram duração de 10 semanas para implementação.

Após definição do cronograma e elaboração de planos de ação para cada senso, foi exposta a proposta de implantação do programa 5S, o conceito desta ferramenta, abordagem de

cada senso, os objetivos, ações e benefícios almejados através desta implantação para os colaboradores do Laboratório de CQ.

A equipe 5S foi definida, sendo eles, os três analistas do laboratório, a responsável pela implantação do programa e a responsável pelo CQ. Foram realizados registros fotográficos da situação atual do laboratório, para posteriormente fazer comparação entre antes e depois das atividades propostas pelos planos de ação.

Figura 1. Cronograma do plano de ação das atividades do programa 5S.

Fonte: Própria (2018).

A cada início de senso, realizava-se uma reunião com a equipe sobre o senso, a proposta dele e as atividades relacionadas no plano de ação elaborado. As ações compreendidas nos planos foram realizadas pela equipe do laboratório e pela responsável pela implantação do programa, sendo adequada conforme fluxo de trabalho do laboratório. Em cada plano de ação foram apresentadas as ações a serem realizadas pela equipe do 5S, os integrantes da equipe, e espaços destinados ao registro de conclusão da atividade.

As auditorias internas foram realizadas no fim da implementação de cada senso pela responsável do programa e pela responsável pelo CQ da empresa. As fichas de avaliação para as auditorias internas foram elaboradas baseadas nos planos de ação de cada senso, levando em consideração particularidades do ambiente de trabalho em questão, sendo estabelecidas notas para cada item, sendo 1 para ruim, 2 para regular, 3 para bom, 4 para ótimo e NA para não aplicável. A nota de corte 3 foi estabelecida para aprovação para seguir para próximo senso.

Quando necessário, foi orientado que o auditor anotasse observações para que estas fossem discutidas com a equipe 5S e implementadas antes de seguir para o próximo senso.

No fim do cronograma das atividades foi realizado uma auditoria interna pela responsável pelo programa e pela responsável pelo CQ. Na quarta semana de novembro de 2018 foi realizada uma auditoria externa no Laboratório de CQ, por uma Engenheira de Alimentos com experiência no Programa 5S e externa ao laticínio. Essa auditoria final contemplou todos os 5 sentidos. Nesta auditoria obteve-se uma nota média para cada senso, sendo possível comparar com as notas anteriores. O objetivo da auditoria final externa foi possuir um parâmetro geral dos sentidos realizados e obter uma visão externa com ideias para melhoria contínua do 5S.

Resultados e Discussão

1º Senso - Utilização

Na primeira etapa do programa 5S, iniciando pelo senso de utilização, foi realizada reunião com a equipe do laboratório para explicar o propósito do senso e de suas ações. As atividades do plano de ação para o senso de utilização foram realizadas exclusivamente pela equipe de analistas do laboratório. Nesta etapa foi retirado materiais identificados como desnecessários ou que não pertenciam àquele ambiente de trabalho, materiais quebrados e em excesso, reagentes vencidos, que acabam ocupando espaço e além de não ser utilizado. A equipe ficou responsável em determinar o estoque suficiente dentro do senso de utilização e que deveriam estar no laboratório em quantidade suficiente para o trabalho de no mínimo uma semana.

Realizadas as ações propostas pelo plano de ação, fez-se a primeira auditoria interna com a responsável pela implantação do programa e a responsável pelo setor da qualidade do estabelecimento. Foram realizadas duas auditorias internas em momentos distintos apresentadas na Figura 2.

Figura 2. Primeira e segunda auditoria interna do 1º senso - Utilização.

Fonte: Própria (2018).

As médias das notas obtidas para o senso de utilização na primeira auditoria foram respectivamente 2,8, ficando entre regular e bom, e 1,6 ficando entre ruim a regular. As notas não demonstraram um bom desempenho do senso de utilização, o que já era o esperado uma vez que se trata de um programa novo e equipe estava se habituando ao objetivo, criação de novos hábitos e proposta dele.

As auditorias foram realizadas em turnos diferentes pelo responsável do programa e responsável do CQ. Observou-se que após a auditoria da manhã feita pela responsável pelo CQ, a equipe atendesse as não conformidades imediatamente. Com isso, alguns itens não foram identificados na auditoria do período da tarde pela responsável pelo 5S. Consequentemente, as notas finais da responsável pelo 5S foram superiores às notas da responsável pelo CQ.

As não conformidades observadas nas auditorias sobre este senso foram a presença de itens pessoais no laboratório, presença de galões que são utilizados pelo setor de fabricação, excesso de rascunhos pelas bancadas, presença de alguns materiais em desuso sobre bancadas e geladeira. Como as notas das auditorias foram menores do que 3, foi passado a equipe as não conformidades encontradas, solicitando que estas fossem atendidas e com isso todos os itens propostos no plano de ação foram concluídos para realizar uma segunda auditoria.

É possível observar na segunda auditoria que as notas referentes às ações do 1º senso melhoraram consideravelmente, ficando agora entre bom e ótimo. Isso demonstra que com o decorrer do tempo e com adaptação aos novos hábitos implementados na rotina de laboratório, a equipe amadureceu as ideias propostas e passou a mudar seu comportamento alinhando este ao senso de utilização do programa.

2º Senso - Organização

As atividades propostas no plano de ação do 2º senso foram realizadas na grande maioria pela responsável pela implantação do programa, devido a equipe não dispor de tempo para realizar ações como etiquetar e demarcar as áreas, por exemplo, e por isso foram os responsáveis secundários pelas atividades. Foi realizada demarcação com fita vermelha de todos os equipamentos, reagentes categorizando pelo tipo de análise, além da área do escritório destinada para organização dos registros.

Também foi providenciado um organizador de documentos, etiquetas para identificação de cada área, reagente e material e pastas para não amassar os documentos. Na bancada de análises foi removido papel perflex e substituído por papel contact branco, forrado com plástico transparente, que permitiu facilitar a limpeza da bancada, promovendo assim ambiente mais agradável.

Os reagentes foram organizados em fileiras, dispostos de maneira ordenada por tipo de análise, e apenas em quantidade suficiente para aproximadamente uma semana, evitando acúmulo de estoque exagerado. As demais áreas também foram demarcadas e identificadas, tais como os locais de armazenamento dos materiais de limpeza e materiais de análise, assim como as áreas de análises das coletas individuais dos produtores, espaço para preenchimento de planilhas e as prateleiras da geladeira.

Foi realizada conscientização da equipe para manutenção da ordem e organização do laboratório. Assim como conscientização dos colaboradores de outros setores que eventualmente utilizam o laboratório. Além disso, todas as tomadas do laboratório foram identificadas quanto à sua voltagem. No fim das atividades propostas pelo senso de organização, realizou-se auditoria interna, sendo que as notas médias da primeira e segunda auditorias estão demonstradas no Figura 3.

Figura 3. Primeira e segunda auditoria interna do 2º senso - Organização.

Fonte: Própria (2018).

Nesta auditoria foi observado alguns locais não estavam identificados, além da desordem de algumas prateleiras e a presença de itens pessoais no laboratório. As notas nesta auditoria ficaram entre regular e bom, sendo estas satisfatórias (acima de 3). Comparando com as notas da primeira auditoria do 1º senso, houve uma evolução da implementação do programa 5S na área piloto. Foram discutidas com a equipe as não conformidades, a fim de conscientizá-los sobre a importância em manter a ordem e respeitá-la, bem como exigir o mesmo dos colegas de outros setores. Na segunda auditoria inteira, as notas foram 3,5 (Figura 2), entre bom e ótimo na escala de pontuação, resultado que demonstra evolução da equipe quando comparada à primeira auditoria do senso.

No início do programa identificaram a dificuldade de comunicação entre os colaboradores e com isso, foi solicitado um quadro de lousa, para que ali fosse anotados recados pertinentes ao programa e às atividades do laboratório. Esta estratégia de comunicação foi assertiva, promoveu interesse pelos recados anotados e facilitou a comunicação, uma vez que eles liam quando pudessem, assim suas atividades também não eram prejudicadas.

3º Senso - Limpeza

Para o senso de limpeza, inicialmente foi explicado à equipe para que estabelecessem um dia da semana para limpeza, onde seria realizada uma limpeza mais fina em prateleiras e bancadas, sendo determinado pela equipe o domingo. As demais atividades rotineiras de lavagem de vidrarias, caixas, baldes, bancadas, troca de lixo e descarte do resíduo orgânico seria diariamente, ao fim do expediente ou sempre que necessário.

Para padronizar essas atividades, foi elaborado um guia rápido com os itens que necessitavam de limpeza, a frequência e o procedimento desta. A finalidade do guia foi reforçar estes pontos para equipe, mas também como maneira de orientar outras pessoas que venham realizar a tarefa no laboratório, como em casos de admissão de novo analista.

Avisos também foram fixados em locais estratégicos e de fácil visualização a fim de orientar e reforçar as ações para a própria equipe, mas também para colaboradores de outros setores que tem acesso ao laboratório. Foi orientado também que a equipe criasse o hábito de manter o ambiente limpo e organizado, evitando assim que no final do expediente precisassem de mais tempo para isto.

As atividades propostas no plano de ação do senso de limpeza foram responsabilidade, em sua grande maioria, pela equipe do laboratório e a responsável pela implantação do programa. À medida que se verificavam não conformidades, até mesmo relacionada aos 1º e 2º sentidos, a equipe foi orientada para tomar as devidas providências. A primeira e segunda auditoria interna para o senso de limpeza tem suas notas apresentadas na Figura 4.

Figura 4. Primeira e segunda auditoria interna do 3º senso - Limpeza.

Fonte: Própria (2018).

As notas ficaram em torno de 3 que representa bom. Não conformidades foram feitas quanto ao descumprimento da frequência de limpeza dos itens solicitados, não havia disponibilidade de material de limpeza para realizar a tarefa e não havia manutenção do ambiente limpo e em ordem. Estas não conformidades foram discutidas com a equipe e orientadas sobre a importância e benefícios obtidos com o cumprimento das atividades presente no plano de ação.

A segunda auditoria interna do senso (Figura 3) apresentou as mesmas notas obtidas após algum tempo trabalhado este senso com a equipe, permanecendo como bom. Durante toda a implementação do programa o senso de limpeza foi que mais apresentou não conformidades e descumprimento ao combinado, sendo que entre a principal justificativa para tal estava a falta de tempo devido elevado fluxo de carregamentos no laticínio.

Novamente foi observado itens sujos pelas bancadas, frequência da troca algodão do suporte das pipetas não atendido, presença de sujidades do dia anterior, lixeiras abertas, entre outras não conformidade. Este fato demonstra que este senso deve ser trabalhado com a equipe com mais atenção.

4º Senso – Padronização/Saúde e Bem-estar

As ações propostas no plano de ação do senso de padronização eram basicamente elaboração de procedimentos e guias rápidos para as atividades realizadas no laboratório, como organização de amostras na geladeira, procedimentos curtos para uso dos equipamentos e para preenchimento de planilhas. Além de orientação aos colaboradores quanto às Boas Práticas de Laboratório a fim de evitar-se acidentes no local. A intenção destas ações foi promover através do estabelecimento de padrões, um ambiente agradável e seguro para o colaborador, livre de estresses causados por pela falta de comunicação ou desencontro dela.

Um dos padrões estabelecidos foi a organização das amostras na geladeira, as quais devem ser dispostas de baixo para cima, sabendo desta forma que as primeiras a serem colocadas, seriam as primeiras a serem analisadas. Caso um novo analista comece a trabalhar no laboratório, saberá como dispor amostras na geladeira devido identificação com o padrão estabelecido. O guia rápido da limpeza fixado em local estratégico e de fácil visualização, com os itens, frequência e procedimento determinados junto com a equipe do laboratório, bem como a identificação para organização padrão das amostras de leite dentro da geladeira.

Para o senso de padronização e autodisciplina foi realizada apenas uma auditoria interna, uma vez que não foi um senso que apresentou grande número de não conformidade. As notas das auditorias estão apresentadas na Figura 5.

Figura 5. Auditoria interna do 4º senso - Padronização.

Fonte: Própria (2018).

Ambas as notas foram 3,6, ficando entre bom e ótimo. Este resultado foi satisfatório, considerando a importância deste senso para validação do restante. A não conformidade observada no 4º senso foi que alguns guias de trabalho não estavam sendo cumpridos pela equipe, o que foi orientado para que passassem a cumpri-los.

Foi observado que os três primeiros sentidos foram os mais densos e que exigiram mais tempo para serem trabalhados e estabelecimento de novos hábitos que levam no mínimo 3 semanas para serem criados pelas pessoas. Porém, os dois últimos sentidos, de padronização e autodisciplina são os mais complexos de serem consolidados, levando em consideração que exige a real mudança organizacional e no comportamento da equipe, além da manutenção do interesse, motivação pelo programa e autodisciplina de cada colaborador.

5º Senso - Autodisciplina

O último senso é o mais desafiador para ser validado. Foi trabalhado com a equipe por meio de reuniões, aplicação de ‘testes orais’ utilizando pontuação, a fim de incentivar o colaborador a se apropriar do conceito do programa e dos cinco sentidos.

Nos testes foram questionados os conceitos básicos de cada senso, os benefícios percebidos no ambiente de trabalho com a implementação de cada um, principais dificuldades encontradas e o que poderia ser feito a respeito. Assim foi possível obter informações sobre as percepções e feedback de cada colaborador. Também foi instigado a equipe sobre qual seria o próximo passo com o fim do cronograma de implementação do 5S.

Os principais benefícios citados pelos colaboradores com a implementação do Programa 5S foram: 1) Melhora no ambiente de trabalho, mais limpo e organizado; 2) Ambiente mais seguro, de maneira que se previne acidentes de trabalho; 3) Evita-se desperdícios, com menor estocagem de material no laboratório e utilização dos materiais mais antigos antes; 4) Redução de tempo e maior produtividade na execução das análises, pela facilidade em encontrar os materiais que foram organizados no 1ºS.

A motivação e a responsabilidade sobre o programa foram observadas pela equipe que se tornou proativa e autônoma para manutenção dos primeiros sensores, como por exemplo substituição das etiquetas do laboratório, adotando um padrão para tamanho e letra de impressão, e identificaram vários outros itens que não haviam sido previamente identificados.

Foi possível observar também que na equipe do laboratório, um colaborador se destacou quanto à motivação com o programa. Foi nítido a influência deste com o restante da equipe, além de motivar os colaboradores externos que tem acesso ao laboratório e até mesmo a responsável pelo controle de qualidade do estabelecimento, que demonstraram mudança no comportamento conforme a implementação do 5S.

A auditoria do 5º senso foi realizada pela responsável pelo 5S e pela responsável pelo controle de qualidade do estabelecimento. As notas estão demonstradas na Figura 6.

Figura 6. Auditoria interna do 5º senso - Autodisciplina.

Fonte: Própria (2018).

Ambas as notas da auditoria foram 3,6, estando entre bom e ótimo. A nota de corte estabelecida no início do programa era 3, logo o resultado foi considerado satisfatório pois demonstrou comprometimento, apropriação, e conhecimento da equipe com relação ao programa 5S.

Com o 5S é possível tornar o local de trabalho um ambiente seguro, agradável e motivador para os funcionários, além de modificar a relação destes com o seu trabalho, contribuindo assim para o aumento do moral, promovendo sentimento de propriedade e orgulho (Almeida e Barbosa, 2017). A ferramenta contribuiu para importantes pilares da Qualidade Total, como a produtividade, custos, segurança, entrega e moral.

Auditoria Externa

Como proposto no cronograma de implantação do programa 5S, na última semana de novembro de 2018 após 10 semanas de implementação do 5S, realizou-se a auditoria final externa por uma Engenheira de Alimentos com experiência na área, acompanhada pela responsável pelo programa e pela responsável pelo CQ do estabelecimento. As notas da auditoria externa para cada senso estão apresentadas Figura 7, onde é possível notar que todas as notas ficaram na faixa de 3 e 4, que representa bom e ótimo, representando resultado positivo quanto ao trabalho realizado pela equipe no laboratório.

Figura 7. Notas da auditoria final externa.

Fonte: Própria (2018).

Dentre as não conformidades levantadas, pode citar a falta de identificação de alguns itens, ajuste de etiquetas de equipamentos e uso de pallets para os baldes em contato com o chão. Foi sugerido também elaboração de procedimento para os crioscópios do laboratório, elaboração de registro de limpeza diário, registro das reuniões relacionadas ao programa, bem como uma ficha para treinamento de novos analistas do laboratório. A responsável pelo CQ e a equipe do 5S relatou que o programa promoveu a melhoria considerável do ambiente de trabalho, satisfação da equipe com o trabalho, diminuição de stress decorrente da desorganização, maior segurança no trabalho e produtividade.

Conclusões

A implantação do programa 5S inicialmente apresentou certas dificuldades relacionadas à interação e interesse da equipe do laboratório com o programa e ações propostas. Com o decorrer da implementação do 5S foram empregados outros recursos e meio de comunicação para que a equipe compreendesse a importância e se apropriasse das atividades. Diversos momentos demonstraram que a estratégia utilizada estava funcionando e a equipe se sentia responsável pelo programa. Foi possível observar os novos hábitos adotados pela equipe, diminuição de reclamações do setor, satisfação da equipe, diminuição de stress, maior segurança no trabalho e produtividade.

Com o término do programa foi possível observar a mudança que o programa promoveu no laboratório de controle de qualidade do estabelecimento, perceptível na responsabilidade da equipe com o programa, orientação a outros colaboradores quanto ao respeito pela ordem e organização do local, realizada pela própria equipe do laboratório. Foi possível observar o desenvolvimento de importantes pilares da Qualidade Total, como a produtividade, custos, segurança, entrega e moral. No entanto, para a continuação do programa e sobrevivência dele se faz necessário o monitoramento dele para manter o Programa 5S vivo, como também incentivo e reconhecimento por parte dos superiores, fortalecendo assim a base da pirâmide, que é o moral dos funcionários.

Referências

ALMEIDA, F. N. C. **Implantação da metodologia 5S nos laboratórios de pesquisa de uma universidade pública**. Orientador: Danilo Hisano Barbosa. 2017. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção), Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2017.

ANDRADE, R. L. **Análise do ambiente organizacional para implantação do sistema 5S no almoxarifado de uma empresa maranhense**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração), Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2015.

CAMPOS, V. F. **TQC: Controle de Qualidade Total (no estilo japonês)**. Belo Horizonte, MG: Fundação Christiano Ottoni, 2014.

COSTA, B. W. C. e SOUZA, F. A. Análise do programa 5S e das aplicações da ferramenta da qualidade por alunos de engenharia. **Anais do IX Simpósio de Engenharia de Produção de Sergipe**, 2017.

GOBIS, M. A. e CAMPANATTI, R. Os benefícios da aplicação de ferramentas de gestão de qualidade dentro das indústrias do setor alimentício. **Revista Hórus**, v. 7, n. 1, p. 26-40, 2012.

HABU, N.; KOIZUMI, Y.; OHMORI, Y. **Implementação do 5S na prática**. Editora Icea, Campinas/SP, 1992.

NETO, O. P. C.; PINHEIRO, L. G. P. e OLIVEIRA, A. S. Análise de feitos da implantação do programa 5S em distintos segmentos. **Produção em Foco**, v. 7, n. 2, p. 290-307, 2017.

PAULA, L. N.; ALVES, A. R. e NANTES, E. A. S. A importância do controle de qualidade em indústria do segmento alimentício. **Conhecimento online**, v. 2, 2017.

SOUZA, B. C.; PINTO, G. A.; PAULA, P. P.; LOBO, R. J. e SOUZA, F. V. P. Implantação do programa 5S através da metodologia DMAIC. **Brazilian Journal of Development**, v. 4, n. 5, p. 2163-217, 2018.

TURBANO, V. S.; ANDRADE, C. T. A. A.; BEZERRA, F. M. e SALES, J. P. **Aplicação do programa 5S em uma empresa de artefatos de couro da região metropolitana do Cariri**. XXXVI Encontro Nacional de Engenharia de Produção, João Pessoa/PB, 2016.

CAPÍTULO 33: AUTENTICIDADE DE MÉIS: UMA BREVE REVISÃO SOBRE *FINGERPRINTS* E MARCADORES QUÍMICOS

CHAPTER 33: AUTHENTICITY OF HONEYS: A BRIEF REVIEW ON *FINGERPRINTS* AND CHEMICAL MARKERS

Silvana Katia Tischer Seraglio¹; Greici Bergamo²; Luciano Valdemiro Gonzaga³; Roseane Fett⁴; Ana Carolina Oliveira Costa⁵

Resumo

A adulteração do mel representa uma ameaça à segurança alimentar desse produto, tornando-se uma questão ainda mais crítica quando se trata de méis com alta demanda e valor de mercado agregado. Nesse sentido, a busca por ferramentas que possam auxiliar na identificação de fraudes tanto por meio da adição de compostos ao mel como por meio da mistura de diferentes méis vem sendo alvo de pesquisas ao longo das últimas décadas. Portanto, esta revisão teve como objetivo abordar principalmente o uso do “*fingerprint*” cromatográfico/espectrométrico e da análise alvo (marcadores químicos) como ferramentas na avaliação da autenticidade de méis. Com base nas informações apresentadas, foi possível verificar o potencial dessas abordagens na detecção de fraudes em méis e a importância da contínua investigação dessas e de outras ferramentas para a avaliação da autenticidade de méis.

Palavras-Chave: Análise alvo, Impressão cromatográfica/espectrométrica, Mel, Metabolômica.

Abstract

The adulteration of honey represents a threat to the food security of this product, making it an even more critical issue when it comes to honey with high demand. In this sense, the search for tools that can assist in the identification of frauds both by adding compounds to honey and by mixing different honeys has been the subject of researches over the past few decades. In this sense, this review aimed to address mainly the use of the chromatographic/spectrometric fingerprint and the target analysis (chemical markers) as tools in assessing the authenticity of honey. Based on the information presented, it was possible to verify the potential of these approaches in detecting fraud in honeys and the importance of the continuous investigation of these and other tools for the evaluation of the authenticity of honeys.

Keywords: Target analysis, Chromatographic/spectrometric printing, Honey, Metabolomics.

Pós-doutoranda (CNPq Scholarship - Brazil (160175/2019-4)), Ciências dos Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina, siluanaseraglio@hotmail.com

² Doutora, Ciências dos Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina, greici.bergamo@hotmail.com

³ Técnico de laboratório, Universidade Federal de Santa Catarina, lvgonzaga@hotmail.com

² Professora, Doutora em Química Orgânica, Universidade Federal de Santa Catarina, roseane.fett@ufsc.br

² Professora, Doutora em Química Analítica, Universidade Federal de Santa Catarina, ana.costa@ufsc.br

1 Introdução

De acordo com organizações regulamentadoras, o mel é definido como sendo um produto elaborado pelas abelhas do gênero *Apis mellifera* a partir do néctar de flores (mel floral) ou de secreções adocicadas de partes vivas de plantas e/ou de excreções de insetos sugadores de plantas (mel de melato) (BRASIL, 2000; CODEX ALIMENTARIUS, 2001; EUROPEAN COMMISSION, 2002; MERCOSUL, 1999).

Esse alimento é utilizado milenarmente como adoçante e com fins medicinais (KATEEL et al., 2018; KHALIL et al., 2015). O mel é composto majoritariamente de açúcares, majoritariamente frutose e glicose, constituindo aproximadamente de 60 a 80% da sua composição. A água consiste no segundo principal constituinte presente em méis, correspondendo por volta de 15 a 20%. Além desses macronutrientes, centenas de outros micronutrientes são encontrados nos méis, incluindo ácidos orgânicos, minerais, compostos voláteis, vitaminas, carotenoides, compostos fenólicos, produtos de degradação de açúcares, enzimas, aminoácidos, proteínas, peptídeos, compostos aromáticos, dentre outros (BERGAMO et al., 2018, 2019; CAN et al., 2015; ESCUREDO et al., 2013; FECHNER et al., 2016). Devido à composição, o mel também está associado a efeitos promotores da saúde, que incluem principalmente atividade antioxidante, antimicrobiana e anti-inflamatória (CAN et al., 2015; GHRAHMH; KHAN; ALSHEHRI, 2018; SERAGLIO et al., 2019).

Portanto, sendo um alimento amplamente conhecido e presente na mesa de consumidores do mundo inteiro, o mel torna-se alvo de ações fraudulentas. A adulteração intencional do mel representa um potencial risco à saúde do consumidor além de ser uma prática criminosa, a qual se torna ainda mais crítica quando se trata de méis com características específicas. Essa ação pode ocorrer por meio da adição intencional de xaropes de açúcar, água, dextrinas e outros constituintes ao mel, bem como pela mistura de méis de baixa qualidade ou de baixo valor comercial a méis de alto valor a fim de aumentar o rendimento e lucro (BERGAMO et al., 2019; CAMINA; PELLERANO; MARCHEVSKY, 2012; WU et al., 2017). Além disso, a mistura de diferentes méis também pode ocorrer naturalmente pela ação das próprias abelhas, de acordo com a disponibilidade de recursos melíferos e de pólen. Esse é o caso da mistura de mel de melato de bracatinga com mel floral durante os períodos inicial e final de safra, no qual existe a disponibilidade de néctar e de exsudato concomitantemente (BERGAMO et al., 2018; MARENDIA et al., 2011). Nesse contexto, a busca por ferramentas que possam auxiliar na identificação de fraudes em méis tem sido alvo de pesquisas nas últimas décadas, empregando-se essencialmente técnicas analíticas associadas a tratamentos estatísticos

(PITA-CALVO; VÁZQUEZ, 2018; SERAGLIO et al., 2019). Nesse cenário, a busca por perfis cromatográficos e espectrométricos, gerando padrões conhecidos como “*fingerprint*” (ou impressão digital), além disso a investigação de marcadores químicos de autenticidade também tem se destacado.

Nesse sentido, essa breve revisão teve como objetivo abordar principalmente o uso do *fingerprint* cromatográfico/espectrométrico e da análise alvo (por meio de marcadores químicos) como ferramentas de avaliação da autenticidade de méis.

2 Metabolômica

A metabolômica consiste em uma ciência interdisciplinar relacionada à caracterização de metabólitos de baixa massa molar (<1500 Da) de determinada matriz empregando tecnologias analíticas sofisticadas e métodos estatísticos (CUADROS-RODRÍGUEZ et al., 2016; IBÁÑEZ et al., 2013; PUTRI et al., 2013).

A “metabolômica de alimentos” (do inglês, *food metabolomics*) ou “foodômica” (do inglês, *foodomics*) (CIFUENTES, 2009; CUADROS-RODRÍGUEZ et al., 2016; IBÁÑEZ et al., 2013; KIM et al., 2016) é o segmento da metabolômica relacionada aos alimentos. Esta extensão surgiu principalmente visando atender as demandas relacionadas a garantia da segurança alimentar, a qualidade e a rastreabilidade de alimentos empregando métodos analíticos eficientes e de baixo custo (CASTRO-PUYANA; HERRERO, 2013). Nesse contexto, essa ciência apresenta grande potencial nas temáticas de autenticação de alimentos e identificação de fraudes (JUMHAWAN et al., 2015; KUSÍ; VAN RUTH, 2015; MIAO et al., 2015; SON et al., 2008).

A qualidade dos alimentos, que envolve a sua composição, aroma, sabor, entre outros atributos, é extremamente importante para a sua aceitação por parte do consumidor. Além disso, essas características também podem estar relacionadas à agregação de valor a um produto, tornando esses alimentos susceptíveis a fraudes. No caso do mel, a origem botânica é um fator extremamente determinante para a sua aceitação pelo consumidor, fato que afeta diretamente o valor do produto e por isso estimula a ocorrência cada vez mais rotineira de fraudes envolvendo misturas de diferentes tipos de méis, incluindo mel artificial, bem como a adição de outras substâncias a esses produtos (BERGAMO et al., 2018; JANDRIĆ et al., 2015; WANG et al., 2015; WU et al., 2017).

Por envolver a investigação de uma vasta diversidade de compostos químicos presentes em matrizes alimentares, a análise metabolômica de alimentos se torna complexa. A fim de facilitar esse estudo, algumas estratégias foram criadas, tais como:

- Análise alvo: identificação e/ou quantificação de analitos de interesse, sendo também referenciados como marcadores químicos, de identificação ou de autenticidade (CASTRO-VÁZQUEZ et al., 2014; GAŠIĆ et al., 2015);

- Perfil metabólico: caracterização de um grupo de metabólitos com relação entre si ou provindos de uma via metabólica específica (CASTRO-PUYANA; HERRERO, 2013);

- Impressão digital (*fingerprint*): comparação de padrões de metabólitos entre amostras, como cromatogramas/espectros, sem necessitar obrigatoriamente da identificação e/ou quantificação desses metabólitos. Dependendo da origem desses compostos, este pode ser referenciado ainda como impressão metabólica, cromatográfica ou espectrométrica (CASTRO-PUYANA; HERRERO, 2013; CUADROS-RODRÍGUEZ et al., 2016; GARCÍA-CAÑAS et al., 2010; IBÁÑEZ et al., 2013; PIZARRO et al., 2013; SÂRBU et al., 2012; SOUTO et al., 2010; URBANO et al., 2006).

2.1 *Fingerprint* cromatográfico/espectrométrico

A impressão digital associada à análise estatística multivariada pode indicar diferenças expressivas entre amostras o que permite que padrões específicos sejam determinados para certos grupos de alimentos. Nesse sentido, a busca por *fingerprints* oriundos do uso das técnicas de cromatografia e espectrometria têm se destacado na área de alimentos, inclusive em méis (CASTRO-PUYANA; HERRERO, 2013).

Dentre os métodos que podem ser empregados na determinação de *fingerprints* cromatográficos/espectrométricos em alimentos, podem ser destacadas as técnicas vibracionais espectroscópicas, como a espectroscopia de ressonância magnética nuclear (CUBERO-LEON; PEÑALVER; MAQUET, 2014); e as técnicas de separação cromatográfica e eletroforética, como a cromatografia a gás (ALIFERIS et al., 2010; JUMHAWAN et al., 2015; MIAO et al., 2015), cromatografia líquida de alta eficiência (KUŚ; VAN RUTH, 2015), eletroforese capilar (HAN et al., 2012) e espectrofotometria ultravioleta/visível (BERGAMO et al., 2020; PIZARRO et al., 2013; SÂRBU et al., 2012; SOUTO et al., 2010; URBANO et al., 2006).

Associada aos métodos de detecção das impressões digitais, a análise estatística multivariada é massivamente empregada para o tratamento dos dados. Dentre as principais ferramentas estatísticas utilizadas, podem ser destacadas a análise de *cluster* (SÂRBU et al.,

2012), análise de componentes principais (CASTRO-PUYANA; HERRERO, 2013; CHEN et al., 2008; KUŠ; VAN RUTH, 2015; WORLEY; POWERS, 2013), análise discriminante de projeções ortogonais para estruturas latentes, análise hierárquica de projeções ortogonais para estruturas latentes (ALIFERIS et al., 2010; JANDRIĆ et al., 2015; JUMHAWAN et al., 2015), análise de algoritmos baseados na regra do vizinho mais próximo (KUŠ; VAN RUTH, 2015), análise discriminante linear (PIZARRO et al., 2013; SÂRBU et al., 2012; SOUTO et al., 2010), entre outros. Dentre as ferramentas citadas, a análise de componentes principais destaca-se pelo seu amplo uso, possivelmente por tratar-se de uma análise que permite uma inspeção visual da similaridade ou discrepância entre as amostras, tornando a interpretação dos dados mais fácil (MIAO et al., 2015).

A seguir serão apresentados alguns estudos de sucesso voltados à aplicação do *fingerprint* cromatográfico/espectrométrico na autenticidade de méis.

A diferenciação de 62 amostras de méis florais Poloneses de seis origens distintas (*Brassica napus* L. var *oleifera* Metzger, *Fagopyrum esculentum* Moench, *Calluna vulgaris* (L.) casco, *Centaurea cyanus* L., *Robinia pseudoacacia* L. e *Tilia* spp) foi realizada no estudo de Kuš e Van Ruth (2015) a partir do uso da técnica de cromatografia líquida de alta eficiência acoplada ao detector de arranjo de diodos (HPLC-DAD, do inglês *high performance liquid chromatography-diode array detector*) associada ao uso da análise de componentes principais e de algoritmos baseados na regra do vizinho mais próximo. Com base nos resultados obtidos, os autores puderam concluir que o uso da impressão cromatográfica provinda da HPLC-DAD juntamente com a análise quimiométrica dos dados fornecem um padrão universal e podem ser empregados na classificação de méis florais.

Em outro estudo, a impressão cromatográfica de 77 amostras de méis florais gregos de sete origens diferentes (*Castanea sativa*, *Gossypium hirsutum*, *Abies* spp., *Erica manipuliflora*, *Pinus* spp., *Corydthymus capitatus* e *Citrus* spp.) foi investigada a partir do uso da cromatografia a gás associada à espectrometria de massas. Por meio do uso da microextração em fase sólida no modo “*headspace*”, compostos voláteis foram extraídos e em seguida submetidos a análise cromatográfica. Diferentes ferramentas estatísticas foram utilizadas no tratamento dos dados, a saber: análise de componentes principais, análise discriminante de projeções ortogonais para estruturas latentes, análise hierárquica de projeções ortogonais para estruturas latentes e modelagem independente e flexível por analogia de classe. Os autores verificaram que a combinação das impressões cromatográficas associada à análise hierárquica de projeções ortogonais para estruturas latentes resultou na separação correta de 98% dos méis

investigados, demonstrando o potencial do uso dessa abordagem na discriminação e classificação de méis de acordo com a sua origem botânica (ALIFERIS et al., 2010).

O potencial da impressão espectrométrica na discriminação do mel de melato de bracinga de méis florais de diferentes origens botânicas oriundos do Brasil foi investigado por Bergamo et al. (2020). Por meio da avaliação do perfil espectrofotométrico visível (380 a 800 nm) de ambos os méis associado a análise de componentes principais, foi possível verificar a existência de um perfil específico para o mel de melato de bracinga, independente do ano de coleta, o qual permitiu a sua satisfatória diferenciação de méis florais da mesma região geográfica e, possivelmente de outros méis de melato de diferentes origens botânicas e geográficas. Segundo os autores, a impressão espectrométrica construída a partir das amostras contribuiu para a avaliação da autenticidade do mel de melato de bracinga.

2.2 Marcadores de autenticidade: análise alvo

Ao contrário da impressão digital no qual não é necessária a identificação e quantificação dos metabolitos, na análise alvo essas práticas são necessárias e utilizadas para a verificação da autenticidade e diferenciação de méis, tanto por meio da sua origem botânica como geográfica (CASTRO-VÁZQUEZ et al., 2014; GAŠIĆ et al., 2015), uma vez que a composição do mel é influenciada por diversos fatores como espécie da planta, condições ambientais e climáticos, processamento e estocagem, dentre outros (PISANI; PROTANO; RICCOBONO, 2008; PYRZYNSKA; BIESAGA, 2009). Ainda, o conhecimento prévio dos analitos possivelmente presentes na amostra alvo é importante para que seja então escolhido o método mais adequado para sua detecção.

A seguir serão reportados alguns dos principais grupos de compostos presentes nos méis e alvos comuns da busca por marcadores químicos de autenticidade.

2.2.1 Açúcares

Além da presença majoritária dos monossacarídeos frutose e glicose (entre 60 e 80% da composição do mel), normalmente são também encontrados, em menores concentrações, especialmente di e trissacarídeos como sacarose, maltose, isomaltose e rafinose (KAMAL; KLEIN, 2011; NAYIK; DAR; NANDA, 2015; PASCUAL-MATÉ et al., 2018), os quais vêm sendo investigados principalmente como marcadores de origem botânica e também de diferenciação entre méis de melato e méis florais (BERGAMO et al., 2019; CAN et al., 2015; DE LA FUENTE et al., 2011; ESCUREDO et al., 2013; KAŠKONIENĖ; VENSKUTONIS; ČEKSTERYTĖ, 2010; MANZANARES et al., 2011; OUCHEMOUKH et al., 2010).

Em 77 méis da Espanha (53 méis florais e 24 méis de melato), os açúcares frutose, glicose, sacarose, maltose, isomaltose, trealose, turanose e melezitose foram avaliados utilizando HPLC acoplado ao detector de índice de refração diferencial por Manzanares et al. (2011). Os autores observaram que as concentrações de trealose e isomaltose eram maiores em méis de melato quando comparados aos méis florais, enquanto para a glicose, sacarose, turanose e melezitose as concentrações encontradas foram menores. Segundo os autores, o perfil de açúcares aliado à análise estatística multivariada pode contribuir na discriminação de méis florais e méis de melato.

A contribuição do perfil e concentração de açúcares na discriminação entre méis de melato e méis florais também foi investigada por Bergamo et al. (2019a) utilizando eletroforese capilar acoplada a detector de arranjo de diodos. Maiores concentrações de maltose e menores concentrações de glicose e sacarose foram encontradas em méis de melato de bracinga, os quais contribuíram fortemente para a discriminação entre os dois tipos de méis (melato e floral) utilizando a análise de componentes principais.

Em outro estudo, 108 méis uniflorais e multiflorais espanhóis foram investigados por De La Fuente et al. (2011) quanto ao seu perfil e concentração de açúcares por cromatografia a gás acoplada a espectrometria de massas. As maiores concentrações foram encontradas para a frutose seguida da glicose. Dissacarídeos, como turanose, maltulose, isomaltose, maltose, kojibiose e trealulose, e outros oligossacarídeos, como erlose, rafinose, 1-kestose e melezitose, também foram encontrados, porém em menores concentrações e com ampla variabilidade dentro da mesma origem botânica. Entretanto, alguns açúcares foram identificados como possíveis indicadores da origem botânica do mel, como a teanderose e panose em méis de alecrim; a 6-kestose para méis de *Rosaceae*; a sacarose para méis de citrus; e rafinose e 1-kestose para méis de urze. Sendo assim, esses açúcares podem contribuir na classificação dos méis citados acima.

Além da variabilidade no perfil e concentrações de açúcares a partir da origem botânica e geográfica, outros fatores como a ação de enzimas e reações durante o armazenamento e processamento resultam em uma variabilidade adicional da composição de açúcares em méis (DE LA FUENTE et al., 2011). Dessa forma, a exploração da composição de carboidratos como marcadores de diferenciação de origem botânica e geográfica, bem como de adulterações, apresenta potencial, mas ainda requer estudos complementares.

2.2.2 Minerais

Os minerais compõem pequena quantidade da composição dos méis (normalmente até 1%), sendo encontrados em maiores concentrações em méis escuros, como méis de melato ou méis florais de tonalidade escura como de eucalipto (BOBIS et al., 2020; GONZÁLEZ-MIRET et al., 2005; SERAGLIO et al., 2019; VANHANEN; EMMERTZ; SAVAGE, 2011).

É reconhecido que o perfil e concentração desses compostos em méis está diretamente relacionado à quantidade e tipos desses elementos absorvidos pelas plantas por meio do solo e água (GONZÁLEZ-MIRET et al., 2005). Dessa forma, esses elementos também trazem consigo informações quanto à contribuição do próprio ambiente (GAŠIĆ et al., 2015; TUZEN et al., 2007). Considerando essas características, os minerais presentes no mel são um reflexo da característica da região onde o mel foi elaborado, apresentando enorme potencial para ser explorado como marcador de origem geográfica e diferenciação entre méis de melato e méis florais.

No estudo conduzido por Madejczyk e Baralkiewicz (2008), a composição de minerais de amostras de mel monofloral de colza e de mel de melato oriundos de diferentes regiões da Polônia foram investigados. Os elementos potássio, magnésio, cálcio, ferro, zinco, cobre, alumínio, boro, manganês, níquel e cromo foram quantificados, sendo as maiores concentrações de sódio, magnésio e zinco encontradas nos méis de melato e de cálcio e manganês nos méis monoflorais de colza. Por meio do uso da análise de agrupamento hierárquico, foi possível a diferenciação entre os dois tipos de méis (melato e colza) e os distinguir geograficamente.

Em outro estudo, com base nos minerais potássio, cálcio, sódio, magnésio e manganês, Bergamo et al. (2018) propuseram um modelo de classificação para a diferenciação entre méis de melato de bracinga puros de méis florais e méis de melato de bracinga adulterados com 5, 15 e 25% de méis florais. O modelo de classificação proposto apresentou resultados promissores, podendo contribuir na verificação da autenticidade e detecção de fraudes relacionado ao mel de melato de bracinga.

2.2.3 Compostos voláteis

As características especialmente sensoriais, como aroma e sabor, de cada tipo de mel são influenciados em grande parte pela composição e concentração da sua fração volátil (ESCRICHE et al., 2009; SORIA; MARTÍNEZ-CASTRO; SANZ, 2007, 2008). Esses compostos são constituintes minoritários do mel provenientes de diversas fontes como do néctar, pólen e/ou melato (ALISSANDRAKIS et al., 2003; CASTRO-VÁZQUEZ et al., 2009);

produzidos pela abelha; do processo de maturação do mel; da manipulação e condições pós-colheita (ROWLAND et al., 1995). Nesse último caso, a presença de compostos derivados de furano, como furfural e 5-hidroximetilfurfural, podem ser detectados quando o mel foi submetido a aquecimento e/ou estocagem prolongada, ocasionando o decréscimo da sua qualidade e indicando assim possível deterioração do produto (CASTRO-VÁZQUEZ; DÍAZ-MAROTO; PÉREZ-COELLO, 2006). Além disso, os compostos voláteis apresentam grande potencial na busca por marcadores de autenticidade.

Por meio da investigação da composição volátil de 16 méis de melato e 29 méis florais da Espanha, Soria et al. (2004) observaram que 70% das amostras foram corretamente diferenciadas principalmente com base nos compostos borneol-álcool terpenóide (maior concentração no mel de melato) e 1-(2-furanil)-etanona (característico dos méis florais).

Em outros estudos com méis espanhóis, três compostos (*erythro*-2,3-butanediol, *treo*-2,3-butanediol, 1-hidroxi-2-propanona e 3-hidroxi-2-butanona) foram sugeridos como indicadores de méis de melato, uma vez que só foram encontrados nesse tipo de mel (ESCRICHE et al., 2009; SORIA et al., 2005). Ainda, o *trans*-carvalho lactona foi proposto como indicador de origem botânica de mel de melato de carvalho (CASTRO-VÁZQUEZ; DÍAZ-MAROTO; PÉREZ-COELLO, 2006).

Elevada abundância dos ácidos benzoico, fenilacético, 2-hidroxibenzoico e 4-hidroxifenilacético aliada a baixa abundância do 4-hidroxifeniletanol e dos ácidos 4-hidroxibenzoico e 4-metoxibenzoico foram sugeridos como possíveis marcadores químicos do mel de melato de *Salix* spp. (JERKOVIĆ et al., 2010).

Em outro estudo, 55 compostos voláteis foram identificados em méis de *Pinus* spp. de diferentes regiões da Grécia, sendo estes pertencentes as classes de ésteres, álcoois, ácidos carboxílicos, aldeídos, cetonas, hidrocarbonetos e outros (KARABAGIAS et al., 2014). Segundo os autores, a utilização dos compostos voláteis contribui com maior precisão para a discriminação geográfica desses méis, do que quando empregados parâmetros como físico-químicos.

Portanto, considerando a diversidade de compostos presentes na fração volátil de méis, esse grupo de compostos apresentam elevado potencial para ser explorado na busca de marcadores químicos de autenticidade de méis e indicação de fraudes.

3 Considerações finais

Nessa breve revisão, principalmente o uso do *fingerprint* cromatográfico/espectrométrico e da análise alvo (marcadores químicos) foram abordados como ferramentas na avaliação da autenticidade de méis. Com base nas informações levantadas foi possível verificar que a análise alvo, por meio da busca de marcadores químicos específicos, vem sendo mais explorada do que o *fingerprint* cromatográfico/espectrométrico. Minerais, açúcares e compostos voláteis podem ser citados como os principais grupos de compostos com potencial para identificação de marcadores químicos. Entretanto, outras classes de compostos presentes em méis, como aminoácidos e proteínas, também podem ser exploradas na busca de marcadores químicos, bem como a contínua investigação de possíveis *fingerprints* apresenta promissor potencial. Sendo assim, nessa revisão foi possível entender a importância da continuidade da investigação dessas e outras ferramentas para a avaliação da autenticidade de méis, visto o promissor potencial apresentado por essas ferramentas na detecção de fraudes e garantia da autenticidade de méis.

4 Agradecimentos

Os autores gostariam de agradecer o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES; código de financiamento 001) pelas bolsas de estudo e suporte financeiro.

5 Referências

- ALIFERIS, K. A. et al. Botanical discrimination and classification of honey samples applying gas chromatography/mass spectrometry fingerprinting of headspace volatile compounds. **Food Chemistry**, v. 121, p. 856–862, 2010.
- ALISSANDRAKIS, E. et al. Ultrasound-assisted extraction of volatile compounds from citrus flowers and citrus honey. **Food Chemistry**, v. 82, p. 575–582, 2003.
- BERGAMO, G. et al. Mineral profile as a potential parameter for verifying the authenticity of bracatinga honeydew honeys. **LWT - Food Science and Technology**, v. 97, p. 390–395, 2018.
- BERGAMO, G. et al. Physicochemical characteristics of bracatinga honeydew honey and blossom honey produced in the state of Santa Catarina: an approach to honey differentiation. **Food Research International**, v. 116, p. 745–754, 2019.
- BERGAMO, G. et al. Use of visible spectrophotometric fingerprint and chemometric approaches for the differentiation of *Mimosa scabrella* Benth honeydew honey. **Journal of Food Science and Technology**, *in press*, 2020.

BOBIS, O. et al. Eucalyptus honey: quality parameters, chemical composition and health-promoting properties. **Food Chemistry**, v. 325, p. 126870, 2020.

BRASIL. MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 11, de 20 de outubro de 2000. Aprova Regulamento técnico de Identidade e Qualidade do Mel. p. 1–4, 2000.

CAMINA, J. M.; PELLERANO, R. G.; MARCHEVSKY, E. J. Geographical and botanical classification of honeys and apicultural products by chemometric methods. a review. **Current Analytical Chemistry**, v. 8, p. 408–425, 2012.

CAN, Z. et al. An investigation of Turkish honeys: their physico-chemical properties, antioxidant capacities and phenolic profiles. **Food Chemistry**, v. 180, p. 133–141, 2015.

CASTRO-PUYANA, M.; HERRERO, M. Metabolomics approaches based on mass spectrometry for food safety, quality and traceability. **TrAC Trends in Analytical Chemistry**, v. 52, p. 74–87, 2013.

CASTRO-VÁZQUEZ, L. et al. Differentiation of monofloral citrus, rosemary, eucalyptus, lavender, thyme and heather honeys based on volatile composition and sensory descriptive analysis. **Food Chemistry**, v. 112, p. 1022–1030, 2009.

CASTRO-VÁZQUEZ, L. et al. Floral origin markers for authenticating Lavandin honey (*Lavandula angustifolia* x *latifolia*). Discrimination from Lavender honey (*Lavandula latifolia*). **Food Control**, v. 37, p. 362–370, 2014.

CASTRO-VÁZQUEZ, L.; DÍAZ-MAROTO, M. C.; PÉREZ-COELLO, M. S. Volatile composition and contribution to the aroma of Spanish honeydew honeys. Identification of a new chemical marker. **Journal of Agricultural and Food Chemistry**, v. 54, p. 4809–4813, 2006.

CHEN, Y. et al. Quality control and original discrimination of *Ganoderma lucidum* based on high-performance liquid chromatographic fingerprints and combined chemometrics methods. **Analytica Chimica Acta**, v. 623, p. 146–156, 2008.

CIFUENTES, A. Food analysis and foodomics. **Journal of Chromatography A**, v. 1216, p. 7109, 2009.

CODEX ALIMENTARIUS. Revised codex standard for honey, standards and standard methods. **Codex Alimentarius Commission FAO/OMS**, v. 11, p. 1–7, 2001.

CUADROS-RODRÍGUEZ, L. et al. Chromatographic fingerprinting: an innovative approach for food “identification” and food authentication – a tutorial. **Analytica Chimica Acta**, v. 909, p. 9–23, 2016.

CUBERO-LEON, E.; PEÑALVER, R.; MAQUET, A. Review on metabolomics for food authentication. **Food Research International**, v. 60, p. 95–107, 2014.

DE LA FUENTE, E. et al. Carbohydrate composition of Spanish unifloral honeys. **Food Chemistry**, v. 129, p. 1483–1489, 2011.

ESCRICHE, I. et al. Influence of simulated industrial thermal treatments on the volatile fractions of different varieties of honey. **Food Chemistry**, v. 112, p. 329–338, 2009.

ESCUREDO, O. et al. Nutritional value and antioxidant activity of honeys produced in a European Atlantic area. **Food Chemistry**, v. 138, p. 851–856, 2013.

EUROPEAN COMMISSION. European Commission Council Directive 2001/110/EC of 20 December 2001 relating to honey. **Official Journal of the European Communities**, p. 10–47, 2002.

FECHNER, D. C. et al. Multivariate classification of honeys from Corrientes (Argentina) according to geographical origin based on physicochemical properties. **Food Bioscience**, v. 15, p. 49–54, 2016.

GARCÍA-CAÑAS, V. et al. Advances in nutrigenomics research: novel and future analytical approaches to investigate the biological activity of natural compounds and food functions. **Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis**, v. 51, p. 290–304, 2010.

GAŠIĆ, U. M. et al. Chemical markers for the authentication of unifloral *Salvia officinalis* L. honey. **Journal of Food Composition and Analysis**, v. 44, p. 128–138, 2015.

GHRAMH, H. A.; KHAN, K. A.; ALSHEHRI, A. M. A. Antibacterial potential of some Saudi honeys from Asir region against selected pathogenic bacteria. **Saudi Journal of Biological Sciences**, v. 26, p. 1278–1284, 2018.

GONZÁLEZ-MIRET, M. L. et al. Multivariate correlation between color and mineral composition of honeys and by their botanical origin. **Journal of Agricultural and Food Chemistry**, v. 53, p. 2574–2580, 2005.

HAN, L. et al. Simultaneous chromatographic fingerprinting and quantitative analysis of flavonoids in pollen *Typhae* by high-performance capillary electrophoresis. **Acta Pharmaceutica Sinica B**, v. 2, p. 602–609, 2012.

IBÁÑEZ, C. et al. Metabolomics, peptidomics and proteomics applications of capillary electrophoresis-mass spectrometry in foodomics: a review. **Analytica Chimica Acta**, v. 802, p. 1–13, 2013.

JANDRIĆ, Z. et al. Discrimination of honey of different floral origins by a combination of various chemical parameters. **Food Chemistry**, v. 189, p. 52–59, 2015.

JERKOVIĆ, I. et al. Molecular diversity of volatile compounds in rare willow (*Salix* spp.) honeydew honey: identification of chemical biomarkers. **Molecular Diversity**, v. 14, p. 237–248, 2010.

JUMHAWAN, U. et al. Application of gas chromatography/flame ionization detector-based metabolite fingerprinting for authentication of Asian palm civet coffee (*Kopi Luwak*). **Journal of Bioscience and Bioengineering**, v. 120, p. 555–561, 2015.

KAMAL, M. A.; KLEIN, P. Determination of sugars in honey by liquid chromatography. **Saudi journal of biological sciences**, v. 18, p. 17–21, 2011.

KARABAGIAS, I. K. et al. Characterisation and classification of Greek pine honeys according to their geographical origin based on volatiles, physicochemical parameters and chemometrics. **Food Chemistry**, v. 146, p. 548–557, 2014.

KAŠKONIENĖ, V.; VENSKUTONIS, P. R.; ČEKŠTERYTĖ, V. Carbohydrate composition and electrical conductivity of different origin honeys from Lithuania. **LWT - Food Science and Technology**, v. 43, p. 801–807, 2010.

KATEEL, R. et al. Antibacterial action of tropical honey on various bacteria obtained from diabetic foot ulcer. **Complementary Therapies in Clinical Practice**, v. 30, p. 29–32, fev. 2018.

KHALIL, M. I. et al. Cardioprotective effects of Tualang Honey: amelioration of cholesterol and cardiac enzymes levels. **BioMed Research International**, v. 2015, p. 286051, 2015.

KIM, S. et al. Food metabolomics: from farm to human. **Current Opinion in Biotechnology**, v. 37, p. 16–23, 2016.

KUŚ, P. M.; VAN RUTH, S. Discrimination of Polish unifloral honeys using overall PTR-MS and HPLC fingerprints combined with chemometrics. **LWT - Food Science and Technology**, v. 62, p. 69–75, 2015.

MADEJCZYK, M.; BARALKIEWICZ, D. Characterization of Polish rape and honeydew honey according to their mineral contents using ICP-MS and F-AAS/AES. **Analytica Chimica Acta**, v. 617, p. 11–17, 2008.

MANZANARES, A. B. et al. Differentiation of blossom and honeydew honeys using multivariate analysis on the physicochemical parameters and sugar composition. **Food Chemistry**, v. 126, p. 664–672, 2011.

MARENDIA, T. A. et al. Desenvolvimento de um sistema para classificação do mel em floral e melato por parâmetros físico químicos combinados com redes neurais artificiais. **Evidência**, v. 11, p. 61–74, 2011.

MERCOSUL. Regulamento Técnico MERCOSUL “Identidade e Qualidade do Mel”. MERCOSUL/GMC/RES. N° 89/99. p. 1–6, 1999.

MIAO, Q. et al. GC-FID coupled with chemometrics for quantitative and chemical fingerprinting analysis of *Alpinia oxyphylla* oil. **Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis**, v. 102, p. 436–442, 2015.

NAYIK, G. A.; DAR, B. N.; NANDA, V. Physico-chemical, rheological and sugar profile of different unifloral honeys from Kashmir valley of India. **Arabian Journal of Chemistry**, v. 12, p. 3151–3162, 2015.

OUCHEMOUKH, S. et al. HPLC sugar profiles of Algerian honeys. **Food Chemistry**, v. 121, p. 561–568, 2010.

PASCUAL-MATÉ, A. et al. Sugar composition and sugar-related parameters of honeys from the northern Iberian Plateau. **Journal of Food Composition and Analysis**, v. 74, p. 34–43, 2018.

PISANI, A.; PROTANO, G.; RICCOBONO, F. Minor and trace elements in different honey types produced in Siena County (Italy). **Food Chemistry**, v. 107, p. 1553–1560, 2008.

PITA-CALVO, C.; VÁZQUEZ, M. Honeydew Honeys: A Review on the characterization and authentication of botanical and geographical origins. **Journal of Agricultural and Food Chemistry**, v. 66, p. 2523–2537, 2018.

PIZARRO, C. et al. Classification of Spanish extra virgin olive oils by data fusion of visible spectroscopic fingerprints and chemical descriptors. **Food Chemistry**, v. 138, p. 915–922, 2013.

PUTRI, S. P. et al. Current metabolomics: technological advances. **Journal of Bioscience and Bioengineering**, v. 116, p. 9–16, 2013.

PYRZYNSKA, K.; BIESAGA, M. Analysis of phenolic acids and flavonoids in honey. **TrAC Trends in Analytical Chemistry**, v. 28, p. 893–902, 2009.

ROWLAND, C. Y. et al. Comparison of organic extractives found in leatherwood (*Eucryphia lucida*) honey and leatherwood Flowers and leaves. **Journal of Agricultural and Food Chemistry**, v. 43, p. 753–763, 1995.

SÂRBU, C. et al. Classification and fingerprinting of kiwi and pomelo fruits by multivariate analysis of chromatographic and spectroscopic data. **Food Chemistry**, v. 130, p. 994–1002, 2012.

SERAGLIO, S. K. T. et al. An overview of physicochemical characteristics and health-promoting properties of honeydew honey. **Food Research International**, v. 119, p. 44–66, 2019.

SON, H. S. et al. ¹H nuclear magnetic resonance-based metabolomic characterization of wines by grape varieties and production areas. **Journal of Agricultural and Food Chemistry**, v. 56, p. 8007–8016, 2008.

SORIA, A. C. et al. Characterization of artisanal honeys from Madrid (Central Spain) on the basis of their melissopalynological, physicochemical and volatile composition data. **Food Chemistry**, v. 85, p. 121–130, 2004.

SORIA, A. C. et al. Estimation of the honeydew ratio in honey samples from their physicochemical data and from their volatile composition obtained by SPME and GC-MS. **Journal of the Science of Food and Agriculture**, v. 85, p. 817–824, 2005.

SORIA, A. C.; MARTÍNEZ-CASTRO, I.; SANZ, J. Estimation of recovery by multistep purge-and-trap gas chromatographic-mass spectrometric analysis of honey volatiles. **Journal of chromatography. A**, v. 1157, p. 430–436, 2007.

SORIA, A. C.; MARTÍNEZ-CASTRO, I.; SANZ, J. Some aspects of dynamic headspace analysis of volatile components in honey. **Food Research International**, v. 41, p. 838–848, 2008.

SOUTO, U. T. C. P. et al. UV-Vis spectrometric classification of coffees by SPA-LDA. **Food Chemistry**, v. 119, p. 368–371, 2010.

TUZEN, M. et al. Trace element levels in honeys from different regions of Turkey. **Food Chemistry**, v. 103, p. 325–330, 2007.

URBANO, M. et al. Ultraviolet–visible spectroscopy and pattern recognition methods for differentiation and classification of wines. **Food Chemistry**, v. 97, p. 166–175, 2006.

VANHANEN, L. P.; EMMERTZ, A.; SAVAGE, G. P. Mineral analysis of mono-floral New Zealand honey. **Food Chemistry**, v. 128, p. 236–240, 2011.

WANG, S. et al. Detection of honey adulteration with starch syrup by high performance liquid chromatography. **Food Chemistry**, v. 172, p. 669–674, 2015.

WORLEY, B.; POWERS, R. Multivariate analysis in metabolomics. **Current Metabolomics**, v. 1, p. 92–107, 2013.

WU, L. et al. Recent advancements in detecting sugar-based adulterants in honey – a challenge. **TrAC Trends in Analytical Chemistry**, v. 86, p. 25–38, 2017.

CAPÍTULO 34: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE LEITE COMERCIALIZADO INFORMALMENTE NO BREJO PARAIBANO

CHAPTER 34: EVALUATION OF THE QUALITY OF MILK COMMERCIALIZED INFORMALMENTE IN THE PARAIBANO BREJO

Laíza Soliely Costa Gonçalves¹; Kimberly Cristina da Costa Pereira²; Aliou Toro Lafia³ Luiza Soliana Costa Gonçalves⁴; Fabiana Augusta Santiago Beltrão⁵

Resumo

A comercialização informal de leite *in natura* ainda é uma prática comum, apesar de ser proibida por lei, ainda é vista nas cidades do interior. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica e físico-química de leite cru comercializado informalmente nas cidades de Solânea PB e Bananeiras PB no Brejo Paraibano. Foram realizadas análises microbiológicas e físico-químicas de amostras coletadas em dez comércios dos municípios de Solânea e Bananeiras, conforme legislação. O experimento foi conduzido no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos Laticínios (PDLAT), no Laboratório de Microbiologia de Alimentos (LMA) e no Laboratório de Análise Físico-química de Alimentos (LAFQ), do CCHSA, Campus III – Bananeiras, da UFPB, durante 4 semanas. Resultando onde todas as amostras apresentaram-se fora dos padrões em relação à pelo menos um parâmetro de análises microbiológicas e físico-químicas, respectivamente. Concluiu-se que o leite comercializado cru nas cidades de Solânea e Bananeiras não atende aos requisitos microbiológicos e físico-químicos preconizados pela legislação vigente, apresentando diferenças que confirmam que o leite comercializado pode ser prejudicial à saúde e pode conter adulteração.

Palavras-Chave: Controle de qualidade; leite bovino; condições higiênico-sanitárias; qualidade do leite.

Abstract

The informal marketing of fresh milk is still a common practice, despite being prohibited by law, it is still seen in inland cities. The objective of this work was to evaluate the microbiological and physical-chemical quality of raw milk sold informally in the cities of Solânea PB and Bananeiras PB in Brejo Paraibano. Microbiological and physical-chemical analyzes were carried out on samples collected in ten stores in the municipalities of Solânea and Bananeiras, according to legislation. The experiment was conducted at the Laboratory of Research and Development of Dairy Products (PDLAT), at the Laboratory of Food Microbiology (LMA) and at the Laboratory of Physical-Chemical Analysis of Food (LAFQ), at CCHSA, Campus III - Bananeiras, at UFPB for 4 weeks. Resulting where all samples were found out of the standards in relation to at least one parameter of microbiological and physical-chemical analyzes, respectively. It was concluded that raw milk sold in the cities of Solânea and Bananeiras does not meet the microbiological and physico-chemical requirements recommended by current legislation, with differences that confirm that commercialized milk can be harmful to health and may contain adulteration.

Keywords: Quality control; bovine milk; hygienic-sanitary conditions; milk quality.

¹ Técnico em Agroindústria, Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, Bacharel em Agroindústria Universidade Federal da Paraíba, laizasolielyc@gmail.com

² Bel. em Agroindústria, Universidade Federal da Paraíba, kimberly_crys@hotmail.com

³ Mestrando em Tecnologia de Alimentos, PPGTA, Universidade Federal da Paraíba, zime1990@gmail.com

⁴ Bel. Química Industrial, Universidade Estadual da Paraíba, solianaa_luiza@gmail.com

⁵ Docente, Universidade Federal da Paraíba, fasb.15@hotmail.com

Introdução

O leite bovino é um produto agropecuário de grande importância econômica para geração de emprego e renda no mundo, desempenhando o papel de alimento humano (FERREIRA et al., 2017). Segundo a Instrução Normativa nº 62, de 29 de dezembro de 2011, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o leite é definido como o produto obtido da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas (BRASIL, 2011). Sendo denominado como leite cru refrigerado, o leite produzido em propriedades rurais, refrigerado e destinado aos estabelecimentos de leite e derivados sob serviço de inspeção oficial (BRASIL, 2018). O leite cru e *in natura*, é o leite que não sofreu o processamento térmico adequado, ou seja, é susceptível a presença de patógenos, não existindo a garantia de qualidade e segurança para o consumo (VIDAL; NETTO, 2018).

O leite é um alimento completo rico em macronutrientes e micronutrientes, tornando um alimento nutritivo e fundamental para a alimentação de indivíduos de todas as faixas de idades, desde da inclusão em dietas para crianças como para idosos. Devido a sua composição rica em nutrientes e compostos, é um produto propício para uma grande diversidade, crescimento e desenvolvimento de micro-organismos tanto benéficos como patogênicos. O que por sua vez pode acarretar na probabilidade de desenvolver algum tipo de contaminação, e por esse motivo a higiene e obtenção de leite com qualidade é indispensável, assegurando a sua inocuidade junto ao consumidor. A qualidade do leite está relacionada a preocupação de técnicos e autoridades ligadas à área de saúde, principalmente, pelo risco de propagação de micro-organismos patogênicos relacionados com doenças de origem alimentar (VIEIRA et al, 2001; TIMM et al., 2003; TRONCO, 2003).

Uma forma de garantir o controle de qualidade do leite é através da utilização dos processos térmicos, como a refrigeração, pasteurização e a Ultra Pasteurização (UHT), a fim de inibir o crescimento desordenado de bactérias. Apesar que em algumas circunstâncias, enzimas possuem maior resistência a esses tipos de processos térmicos, prejudicando a qualidade do leite e seus derivados, como por exemplo, as bactérias psicrotróficas e sua atividade proteolítica (TRONCO, 2003; ORDÓÑES, 2005).

O consumo do leite *in natura*, ou seja, sem a aplicação de qualquer processo térmico, é habitual no interior da Paraíba assim como no Nordeste, devido a hábitos culturais, regionais e sociais, utilizando da justificativa de que o leite obtido diretamente do produtor é mais saudável que o industrializado, além da forma de aquisição ser de baixo custo comparado a venda de leite formal, vale salientar que a comercialização informal de leite no Brasil é proibida desde 1952 (MOLINA et al, 2015; MOTTA et al, 2015).

Visto que a fiscalização para esse produto de forma informal é incipiente, ou seja, não há garantia de que os padrões microbiológicos e físico-químicos exigidos pela Instrução Normativa nº 76 e 77 de 26 de dezembro 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sejam executados pelos produtores e comerciantes informais. A não inspeção do leite favorece a adulteração por parte dos

produtores, os quais utilizam dessa prática repentinamente, por exemplo, através da fraude com a retirada da gordura, a adição de água, a adição de neutralizantes e conservantes, práticas essas comuns para aumentar o rendimento do volume do leite e/ou mascarar problemas como deterioração causados pelas inadequadas ou inexistentes de boas práticas de fabricação e refrigeração, já que esse produto não é submetido e nem assegurado a qualquer exigência de controle de qualidade por legislação (MENDES et al., 2010; MONTANHINI; HEIN, 2013; TRINDADE et al, 2018; BRASIL, 2018).

O leite se obtido e manipulado em condições inadequadas e comercializado informalmente se torna uma preocupação para a saúde pública, pois gera um risco potencial para consumidor que consome na forma *in natura* ou na forma de seus derivados, podendo causar em doenças prejudiciais à saúde (LYE et al., 2013). A comercialização do leite cru em forma informal nos últimos anos vem chamando a atenção das autoridades, visto que sua produção e venda não sofrem inspeção, aumentando cada vez mais sua produção (EMBRAPA, 2012; MOLINA; CENTENARO; FURLAN, 2015).

De acordo com o Artigo 476 do RIISPOA, Brasil (1981) e a Instrução normativa nº 76, Brasil (2018), é considerado normal o leite cru refrigerado que apresenta as seguintes características centesimal (100g): teor de gordura mínima de 3%, acidez titulável entre 0,14 e 0,18°D, densidade a 15°C entre 1,028 e 1,034, lactose no mínimo de 4,3%, extrato seco total mínimo de 11,4% e extrato seco desengordurado mínimo de 8,4% (BRASIL, 1981; BRASIL, 2018).

O leite é um ótimo meio de cultura para a propagação de micro-organismos. A preocupação com a conservação de sua qualidade deve começar mesmo antes da ordenha, com os cuidados sanitários do rebanho e os cuidados higiênicos dispensados ao local e equipamentos de ordenha. Deve ser lembrado, inclusive o papel de maior influência praticado pelas pessoas envolvidas na atividade, sem contatar na forma que o leite é repassado para os consumidos, tais como embalagens e a adequação do armazenamento. Por isso, o cuidado da qualidade higiênica do leite e uso das normas exigidas por leite. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar os parâmetros microbiológicos e físico-químicos de leite cru *in natura* comercializados de forma informal nas cidades de Solânea PB e Bananeiras PB.

Material e Métodos

O experimento foi realizado no período de novembro à dezembro de 2019, no Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, campus III, Bananeiras – PB. Nos laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos Laticínios (PDLAT), no Laboratório de Microbiologia de Alimentos (LMA) e no Laboratório de Análise Físico-química de Alimentos (LAFQ).

Amostragem

A matéria-prima utilizada para a realização desse estudo foi o leite *in natura* comercializado informalmente em pontos de vendas localizadas em duas cidades do brejo paraibano. Foram coletadas 10 amostras de leite *in natura* durante 4 semanas, sendo 5 amostras na cidade de Solânea PB e 5 amostras

na cidade de Bananeiras PB. Após a coleta, as amostras foram acondicionadas em caixas de isopor com gelo e encaminhadas ao Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos Laticínios (PDLAT), prosseguindo para os demais laboratórios, para análise imediata dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos.

Avaliação Microbiológica

As análises microbiológicas foram realizadas no Laboratório de Microbiologia de Alimentos (LMA), as amostras foram analisadas seguindo os métodos descritas no manual da *American Public Health Association* (APHA, 2001) e obedecendo aos padrões exigidos pela Instrução Normativa nº 62 de 29 de dezembro de 2011, pelas Instruções Normativas nº 76 e nº 77, de 26 de dezembro de 2018, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA (BRASIL, 2011; BRASIL, 2018), para os parâmetros de Coliformes à 35 °C NMP/ml e a 45°C NMP/ml e Bactérias Mesófilas UFC/ml.

Análises Físico-Químicas

As análises físico-químicas foram realizadas no Laboratório de Análise Físico-química de Alimentos (LAFQ), as amostras foram analisadas em triplicatas obedecendo aos padrões exigidos pela legislação da Instrução Normativa nº 62, de 29 de dezembro de 2011, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA, seguindo a metodologia do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008), os parâmetros físico-químicos avaliados foram: Temperatura, teor de gordura, sólidos não gordurosos, densidade, índice do ponto crioscópico, proteína, lactose, sais minerais, acidez Dornic e pH, conforme as recomendações.

Análise dos resultados

Os dados referentes aos resultados das amostras foram analisados comparando-se as médias entre as diferentes amostras pelo Teste de médias (teste de Tukey, $p < 0,05$). As análises foram realizadas utilizando o software Statistica 7.0 (Statsoft Inc., Tulsa, OK, EUA).

Resultados e Discussão

Análise Microbiológica

Os resultados para os parâmetros microbiológicos estão representados na Tabela 1 e 2, conforme as exigências dos padrões da Instrução Normativa nº 62, de 29 de dezembro de 2011 e nº 76 e nº 77, de 26 de dezembro de 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2011; BRASIL, 2018).

Tabela 1 - Valores médios das análises microbiológicas de amostras do município de Solânea PB

PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS	1	2	3	4	5	PADRÃO (BRASIL, 2011)
Coliformes a 35°C NMP/ml	4,6x10 ^{2b}	7,5x10 ^{2a}	1,0x10 ^{2c}	4,6x10 ^{2b}	4,6x10 ^{2b}	1x10 ³
Coliformes a 45°C NMP/ml	4,6x10 ^{2c}	7,4x10 ^{3ab}	3,6x10 ^{2d}	9,3x10 ^{2a}	3,6x10 ^{2d}	1x10 ²
Bactérias Mesófilas UFC/ml	1,0x10 ^{4d}	3,0x10 ^{2c}	19,9x10 ^{2a}	6,2x10 ^{2b}	6,6x10 ^{2b}	8x10 ⁴

*letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey a nível de 5%; NMP: Número mais provável; UFC: Unidade Formadora de Colônias;

Tabela 2 - Valores médios das análises microbiológicas de amostras do município de Bananeiras PB

PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS	6	7	8	9	10	PADRÃO (BRASIL, 2011)
Coliformes a 35°C NMP/ml	1,1x10 ^{3a}	1,1x10 ^{3a}	1,1x10 ^{3a}	1,1x10 ^{3a}	1,1x10 ^{3a}	1x10 ³
Coliformes a 45°C NMP/ml	1,1x10 ^{2b}	2,0x10 ^{2a}	1,0x10 ^{2bc}	1,1x10 ^{2cd}	1,1x10 ²	1x10 ²
Bactérias Mesófilas UFC/ml	19,6x10 ^{3a}	14,6x10 ^{3b}	2,0x10 ^{3c}	19,3x10 ^{3ab}	1,0x10 ²	8x10 ⁴

*letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey a nível de 5%; NMP: Número mais provável; UFC: Unidade Formadora de Colônias;

De acordo com os resultados obtidos na tabela 1 e 2 pode-se observar que as amostras da cidade de Solânea PB, apresentaram contagens de coliformes a 35 °C e a 45°C acima de 10³ e 10², valor preconizada pela legislação da IN nº 62, de 29 de dezembro de 2011 e encontrado no estudo de Farias, Croisfelt e Baffi (2014), ao comparar com o estudo de Souza, Nogueira e Nunes (2011), que obteve contaminação nas suas amostra, por possuir dados semelhantes, resultando em contaminação por coliformes em todas as amostras da tabela 1. Já para os mesmos parâmetros na tabela 2, pode observar que as amostras estavam em menor nível de contaminação, sendo tolerado 10³ e 10².

Os resultados acima de 1x10³ e 1x10² indicam controle inadequado quando a qualidade microbiológica, sendo as causas mais frequentes aquelas provenientes do leite cru, local de venda e/ou falta de manipulação com cuidados de higiene.

Na análise da presença de bactérias mesófilos aeróbios puderam-se observar que as amostras de número 3, 6, 7 e 9 estavam muito acima do padrão máximo exigido, ou seja, na cidade de Solânea PB apenas uma amostra estava fora do padrão, já na cidade de Bananeiras PB três amostradas estavam fora do padrão. A presença dessas bactérias é utilizada como indicador das condições sanitária do leite. Recomendando o uso e aplicação de processamento térmico e aplicação das boas práticas de fabricação.

Com base na Instrução Normativa nº 77, de 26 de dezembro de 2018, recomendasse que o leite seja armazenado na propriedade rural em tanques de refrigeração em temperatura máxima de 4°C e chegando ao local de processamento em temperatura máxima de 7°C (BRASIL, 2018). Durante a coleta, as amostras estavam sendo comercializadas em temperatura ambiente, essa comercialização informal em temperatura inadequada aumenta a susceptibilidade de deterioração, diminuindo a qualidade do leite com o passar do tempo. Com falta de refrigeração há uma predominância de micro-organismos mesófilos.

O número dessas bactérias presentes no leite cru está relacionado às condições higiênicas na produção e ao tempo e temperatura em que o leite é armazenado. Sendo fundamental a contagem desse tipo de micro-organismo para identificar sua qualidade através da atividade metabólica desses microrganismos resultando em alterações bioquímicas nos constituintes do leite que diminuem a vida útil (MARIOTO et al, 2020).

O controle microbiológico do leite é de suma importância para a saúde humana, a propagação de bactérias no leite o torna impróprio para consumo, devido a alterações causada pela presença desse micro-organismo em sua composição química. Esta contaminação por microrganismos tem sido constante, trazendo problemas e perdas econômicas em produtos que não há um controle e aplicação de práticas higiênicas (PADILHA et al., 2001; ATANAGILDO, 2019).

Análise Físico-química

Os resultados para os parâmetros físico-químicos estão representados por valores médios nas Tabelas 3 e 4, conforme as exigências dos padrões da Instrução Normativa nº 62, de 29 de dezembro de 2011, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2011).

Tabela 3 - Valores médios das análises físico-químicas de amostras do município de Solânea PB

AMOSTRAS	1	2	3	4	5	Média	Padrão Oficial*
Temperatura (°C)	15,2 ⁰ C	24 ⁰ C	25,5 ⁰ C	24,6 ⁰ C	18 ⁰ C	21,5⁰C	7-9°C
Gordura (%)	3,55	3,32	2,49	3,77	3,75	3,38%	Mín. 3,0%
Sólidos não gordurosos (%)	8,35	8,81	8,45	8,06	8,22	8,38%	Mín. 8,4%
Densidade (g/mL)	1,031	1,029	1,029	1,028	1,027	1,029	1,028-1,034 g/ml
Ponto crioscópico (°H)	0,531	0,534	0,514	0,502	0,563	0,53⁰H	- 0,530 a 0,550 ⁰ H
Proteína (%)	3,12	3,11	2,97	2,98	3,82	3,20%	Mín. 2,9%
Lactose (%)	4,84	4,66	4,42	4,32	4,32	4,51%	Mín. 4,3%
Sais minerais (%)	0,70	0,70	0,66	0,66	0,70	0,68	---
Acidez (°D)	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19⁰D	0,14 a 0,18 °D
pH	7,0	7,11	6,38	6,71	6,54	6,75	---

Fonte: própria (2020).

De acordo com a legislação em vigor, as amostras analisadas (Tabelas 3 e 4) quanto ao teor de gordura (%), Sólidos não gordurosos (%) , Densidade (g/mL), Ponto crioscópico (°H), Proteína (%), Lactose (%), Sais minerais (%), Acidez (°D) e pH, respectivamente, não atenderam aos padrões físico-químicos, segundo a Instrução Normativa nº 62, 76 e 77 (BRASIL, 2011; BRASIL, 2018).

Tabela 4 - Valores médios das análises físico-químicas de amostras do município de Bananeiras

AMOSTRAS	6	7	8	9	10	Média	Padrão Oficial*
Temperatura (°C)	15,2 ⁰ C	17,7 ⁰ C	17,9 ⁰ C	20,5 ⁰ C	18 ⁰ C	17,9⁰C	7-9°C
Gordura (%)	2,9	3,37	2,49	3,71	3,76	3,25%	Mín. 3,0%
Sólidos não gordurosos (%)	8,38	8,81	8,41	8,06	7,87	8,31%	Mín. 8,4%
Densidade (g/mL)	1,032	1,029	1,029	1,028	1,028	1,029	1,028-1,034 g/ml

Ponto crioscópico (°H)	-0,557	-0,533	-0,504	-0,502	-0,491	-0,517°H	-0,530 a -0,550°H
Proteína (%)	3,25	3,10	2,97	2,98	2,89	3,04%	Mín. 2,9%
Lactose (%)	4,82	4,60	4,42	4,34	4,27	4,49%	Mín. 4,3%
Sais minerais (%)	0,73	0,70	0,66	0,66	0,66	0,68%	---
Acidez (°D)	0,18	19	19	19	19	0,19°D	0,14 a 0,18 °D
pH	6,39	6,25	6,33	6,29	6,48	6,35	---

Fonte: própria (2020).

Para as análises físico-químicas do leite coletado nos municípios de Solânea PB e Bananeiras PB, foram obtidos os seguintes resultados: a temperatura encontrada foi entre 15°C a 25°C entre todas as amostras, com médias de 21,5°C para as 5 amostras da cidade de Solânea PB e 17,9°C para as 5 amostras na cidade de Bananeiras PB. Em quer a amostra número 3 coletada em Solânea diferiu significativamente a nível de 5% das demais, ou seja, foi a maior temperatura encontrada dentre as amostras. A Instrução Normativa nº 77, de 26 de dezembro de 2018, Brasil (2018), recomenda que o leite chegue ao laticínio, ou local de processamento, à temperatura de no limite mínimo de 7,0°C e no máximo 9,0°C. Ao relacionar essa informação com os dados coletados todas as amostras, no momento da coleta, estavam sendo comercializadas sem refrigeração adequada ou nenhuma, consequentemente, as temperaturas encontradas aproximam-se da temperatura ambiente, ou seja, todas as amostras estavam fora do padrão exigido. Ao comparar com estudo de Atanagildo (2019), os resultados variaram de 2,8 (mínima) a 22,8°C (máxima), com média de temperatura de 9,53°C em 7 amostras, com resultado de média abaixo do encontrado nesse estudo.

Para a análise de gordura os resultados variaram em médias de 3,38% a 3,25%, o que segundo a Instrução Normativa nº 76, de 26 de dezembro de 2018, Brasil (2018), o teor de gordura varia de acordo com a classificação do leite em integral, semidesnatado e desnatado, sendo respectivamente os padrões preconizados de no mínimo 3,0% de gordura em leite cru refrigerado (BRASIL, 2011; BRASIL, 2018). Porém o teor de gordura analisado nas amostras 3, 6 e 8 estão em desacordo com a legislação, esses resultados demonstraram que o valor encontrado de gordura pode ser relacionado à padronização do leite, e o baixo teor de gordura pode determinar a fraude com adição de água, que consequentemente, resulta na diminuição do extrato seco desengordurado. Vale ressaltar, que para os produtores de leite que não são fiscalizados pelos órgãos competentes, não há controle da padronização do teor de gordura do leite para 3,0%.

Para análise de teor de sólidos não gordurosos ou extrato seco desengordurado, os resultados foram de valores médios de 8,38% e 8,31%, apenas as amostras 2,3,7 e 8, estão dentro do padrão exigido, que é no mínimo 8,4%. Porém ao comparar com o resultado encontrado por Amaral e Santos (2011), com média de 7,5% em 3 amostras, que estavam em total desacordo com a legislação, os resultados desse estudo estavam acima da média encontrada em ambos locais.

Para a análise de densidade relativa, conforme o art. 5º da Instrução Normativa nº 76, de 26 de novembro de 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os resultados encontrados foram de médias iguais para ambos os locais, de 1,029 g/ml. Portanto, a média está dentro do valor

permitido pela legislação. A densidade do leite deve apresentar-se entre 1,028 g/ml e 1,034 g/ml à 15°C, segundo recomendação da legislação vigente (BRASIL, 2018). Valores abaixo dessa faixa podem indicar adulteração, por adição de água, e para valores acima do preconizado, adulteração por adição de outras substâncias ou desnate do leite (POLEGATO; RUDGE, 2003; ALVES; ANTES, 2014).

Para análise de Ponto crioscópico ou índice crioscópico que é a medida do ponto de congelamento do leite ou da depressão do ponto de congelamento do leite em relação ao da água, os resultados variaram em médias de -0,517 e -0,530 °H, sendo aceitável pela legislação o ponto crioscópico do leite entre -0,530 °H e -0,550 °H (BRASIL, 2018). Havendo diferença significativa a nível de 5% entre as amostras 5, 2 e 1 das demais, em Solânea PB e diferença entre as amostras 6 e 7 em Bananeiras PB, em que ambas estavam dentro do valor mínimo exigido. Segundo Castanheira (2010), resultados acima de -0,530 °H significam acréscimo de água e resultados abaixo de -0,550 °H, indicam possíveis problemas pelo congelamento do leite no tanque de expansão, além de adulteração do leite por reconstituintes. Esse tipo de adulteração em amostras de leite comercializadas informalmente foi evidenciado no estudo de Polegato e Rudge (2003), Silveira e Bertagnolli (2014), também encontraram valores inadequados para o ponto crioscópico de amostras de leite cru analisadas. Com esses resultados se mostra claramente o descuido e imprudência por parte de muitos produtores de leite que fornecem leite nesse tipo de comercialização pela região, pois além de não ter um fornecedor que garanta a qualidade da matéria-prima, a fraude é evidente e não existe um controle de qualidade (BRASIL, 2018).

Para a análise de teor de proteína os resultados variaram com médias de 3,20% em Solânea PB e 3,04% em Bananeiras PB, resultando em todas as amostras em confronto com a legislação estando dentro do padrão mínimo exigido, que é 2,9% de proteína para leite cru refrigerado (BRASIL, 2018). No estudo de Bylund (2003), o teor variou entre 3,0% e 3,8%, sendo semelhante aos valores médios encontrados nesse estudo.

Para análise de lactose os resultados variaram em médias de 4,51% e 4,49%. De acordo com o Artigo 476 do RIISPOA (BRASIL, 1997), considera-se normal o leite que apresenta no mínimo 4,3% de lactose. Sendo assim, o teor de lactose das amostras de leite analisadas pode ser considerado normal, porém, apenas o teor da amostra de número 10 estava abaixo do valor mínimo exigido, com teor de 4,27%.

Para análise de sais minerais os resultados variaram em médias de 0,68% a 0,71%. Não é estabelecido teor de sais minerais em leite, mas é possível observar que não houve grande variação entre as amostras. Amaral e Santos (2011) encontraram em amostras de leite cru comercializado na cidade de Solânea-PB, valores para minerais variando entre 0,57 e 0,64, ou seja, foram encontrados valores abaixo do desse estudo.

Para análise de acidez °Dornic, os resultados da maioria das amostras permaneceram em 19°D (0,16g de ácido láctico/100g de produto) para acidez Dornic, onde apenas a amostra 6, da cidade de Bananeiras PB, está dentro dos padrões, que estabelece o limite máximo de 18°D, sendo que foram encontrados valores de até 19°D em outras amostras. Esses resultados indicam que provavelmente não

houve uma refrigeração imediata logo após a ordenha, ou ainda, devido à falta de higiene durante a obtenção higiênica, conforme é exigido pela Instrução Normativa nº 77, e a alta acidez pode ocorrer da acidificação da lactose, proveniente da multiplicação de micro-organismos deterioradores ou patogênicos (BRASIL, 2018).

No estudo de Silveira e Bertagnolli (2014) identificaram que em torno de 80% das amostras analisadas de leite cru comercializadas informalmente em Santa Maria - RS, apresentaram acidez superior a 0,18g de ácido láctico/100 mL. O alto grau de acidez no leite é o resultado da fermentação da lactose provocada pela ação de enzimas e multiplicação de bactérias lácticas, assim também com ocasionar a coagulação da caseína e assim, limitando o seu uso (BJORKROTH; KOORT, 2011). Segundo Mareze et. al (2015) e Atanagildo (2019), o bicarbonato de sódio, é o componente mais utilizado como redutor de acidez em leite, porém conforme a legislação Brasil (2018), não é permitida a adição de conservantes, substâncias capazes de corrigir o pH ou aditivos no leite cru.

Para análise de pH os resultados variaram em médias de 6,75 e 6,35, não possuindo tanta variação nas amostras da cidade de Bananeiras PB, diferente do da cidade de Solânea PB, em que as amostras 1 e 2 diferiram significativamente entre as demais a nível de 5%. A água apresenta pH próximo da neutralidade e quando adicionada ao leite aumenta significativamente o seu pH. Entretanto a legislação não preconiza valores de pH, sendo que valores com muito diferencial entre si resultam da fraude com água ou há relação entre o pH do leite com a saúde da glândula mamária, onde animais com a mastite, apresentam um leite com pH levemente alcalino (7,3 a 7,5), podendo então ser usado como parâmetro indicativo de sanidade, pois o pH do leite cru varia entre 6,6-6,8 a temperatura de 20°C (RODAS et al., 2014; ATANAGILDO, 2019).

Importante frisar que essas amostras são destinadas ao comércio informal de Solânea e Bananeiras e, entre tanto, os seus fornecedores ou produtores devem produzir um alimento seguro e com qualidade, não somente pelo valor nutricional, como também no aspecto de higiene. Estes fatores são de grande importância, pois o público consumidor deste alimento é bastante susceptível a enfermidades transmitidas por alimentos.

As pequenas variações nos componentes do leite podem ser explicadas pela ordem genética, fisiológica, ambiental e ainda pode ser devido ao desnate e fraudes para aumentar o rendimento (MENDES et al., 2010). De acordo com as análises físico-químicas e microbiológicas realizadas, constatou-se a necessidade de refrigeração e cuidados com a obtenção e transporte do leite informal, que resulta em acidificação do produto e contagens acima do permitido pela legislação vigente. Considerando a comercialização informal e inadequada do leite, os resultados evidenciam a precariedade do produto, pois do total de amostras analisadas, todas apresentaram-se fora dos padrões quanto às análises microbiológicas e físico-químicas, respectivamente, entre as características físico-químicas avaliadas.

Conclusões

De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, concluiu-se que o leite cru comercializado de forma informalizada nas cidades de Solânea PB e Bananeiras PB no período desse estudo onde todas as amostras apresentaram-se fora dos padrões em relação à pelo menos um parâmetro de análises microbiológicas e físico-químicas, respectivamente permitido por legislação, ou seja, não atende a todos os requisitos microbiológicos e físico-químicos, apresentando diferenças quanto sua composição físico-química e qualidade microbiológica.

Vale ressaltar que mediante os resultados encontrados o leite comercializado nesses locais está fora do padrão de consumo, além de apresentarem características para adulteração da composição, podendo causar riscos à saúde do consumidor, evidenciando o perigo de consumo do leite informal. Sendo necessário a aplicação de fiscalização pelos órgãos competentes afim de inibir a venda desse e envolver instituições capazes de conscientizar esses tipos de produtores e fornecedores, com aplicação de ferramentas para capacitação dos mesmos e com isso melhorar o desempenho e a obtenção de leite de qualidade pelo produtor junto ao consumidor e aos órgãos de fiscalização.

Referências

- FARIAS, C. P.; CROISFELT, F. M.; BAFFI, M. A. Microbiological quality of *in natura* raw milk, raw chilled and pasteurized milk sold in the region of Uberlândia, MG. **Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável**, Pombal - Pb, v. 9, n. 4, p. 250-254, out-dez, 2014.
- AMARAL, C. R. S.; SANTOS, E. P. Leite cru comercializada na cidade de Solânea, PB: caracterização físico-química e microbiológica. **Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais**, 13 (1), 7–13. 2011.<https://doi.org/10.15871/1517-8595/rbpa.v13n1p7-13>.
- APHA, *American Public Health Association*. **Compendium of Methods for the Microbiological Examination of foods**. 3a ed. Washington: APHA; 1992.
- BJÖRKROTH, J.; KOORT, J. Taxonomy and biodiversity. In: **Encyclopedia of Dairy Sciences**. Elsevier Scientific Publ. Co, 2011. p. 45-48.
- BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA Instrução Normativa nº 51, de 18 de setembro de 2002. Aprova os Regulamentos Técnicos de Produção, Identidade e Qualidade do Leite tipo A, do Leite tipo B, do Leite tipo C, do Leite Pasteurizado e do Leite Cru Refrigerado e o Regulamento Técnico da Coleta de Leite Cru Refrigerado e seu Transporte a Granel. **Diário Oficial da União**, Brasília, p.13, 21 set. 2002. Seção 1.
- BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Instrução Normativa nº 77, de 26 de novembro de 2018. Critérios e procedimentos para a produção, acondicionamento, conservação,

transporte, seleção e recepção do leite cru em estabelecimentos registrados no serviço de inspeção oficial. **Diário Oficial da União**, Brasília, p. 10, 26 nov. 2018. Edição 230, Seção 1.

BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Instrução Normativa nº 76, de 26 de novembro de 2018. Regulamentos Técnicos que fixam a identidade e as características de qualidade que devem apresentar o leite cru refrigerado, o leite pasteurizado e o leite pasteurizado tipo A. **Diário Oficial da União**, Brasília, p. 9, 30 nov. 2018. Edição: 230. Seção: 1.

BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução – MAPA. Normativa nº 62, de 29 de dezembro de 2011. Aprova o Regulamento Técnico de Produção, Identidade e Qualidade do Leite tipo A, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite Cru Refrigerado, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite Pasteurizado e o Regulamento Técnico da Coleta de Leite Cru Refrigerado e seu Transporte a Granel, em conformidade com os Anexos desta Instrução Normativa. **Diário Oficial da União**, Brasília, 31 dez. de 2011. Seção 1, p. 6.

BRASIL, Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório Nacional de Referência Animal. Regulamento Industrial de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal: artigo 476. Brasília: **Ministério da Agricultura**, 1981.

BYLUND, G. **Dairy processing handbook**. Tetra Pak Processing Systems AB, 2003.

DIAS, J. A.; ANTES, F. G. **Qualidade físico-química, higiênico-sanitária e composicional do leite cru: indicadores e aplicações práticas da Instrução Normativa 62**. Documentos 158. Porto Velho, RO: Embrapa Rondônia, ISSN 0103-9865, out., 2014.

EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Gado de Leite. **Produção, industrialização e comercialização**. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite. 2012.

FERREIRA, A. G. G.; LYRA, D. G.; SILVA, J. C. S.; SOARES, F. M. F.; ARAÚJO, C. A. Perfil dos consumidores de leite bovino *in natura* no município de Santana do Ipanema – Alagoas. **Nutri-time Revista Eletrônica**, on-line, Viçosa, v.14, n.4, p.6056-6065, jul./ago, 2017. ISSN: 1983-9006.

IAL, Instituto Adolfo Lutz. Métodos físico-químicos para análise de alimentos. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. 1020p.

LYE, Y. L.; AFSAH-HEJRI, L.; CHANG, W. S.; LOO, Y. Y.; PUSPANADAN, S.; KUAN, C. H.; GOH, S. G.; SHAHRIL, N.; RUKAYADI, Y.; KHATIB, A.; JOHN, Y.H.T.; NISHIBUCHI, M.; NAKAGUCHI, Y.; SON, R. Risk of Escherichia coli O157:H7 transmission linked to the consumption of raw milk. **International Food Research Journal**, Serdang, v. 20, n. 2, p. 1001-1005, 2013.

MAREZE, J.; MARIOTO, L.R.M.; GONZAGA, N.; DANIEL, G. C.; TAMANINI, R.; BELOTI, V. Detecção de adulterações do leite pasteurizado por meio de provas oficiais. **Semina: Ciênc. Biol. Saúde**, v. 36, n. 1 supl, 2015.

MENDES, C. G.; SAKAMOTO, S. M.; SILVA, J. B. A.; JÁCOME, C. G. M.; LEITE, A. I. Análises físico-químicas e pesquisa de fraude no leite informal comercializado no município de Mossoró, RN. **Revista Ciência Animal Brasileira**, Goiânia, v. 11, n. 2, p. 349-356, abr./jun. 2010.

MOLINA, C. H. A.; CENTENARO, G. S.; FURLAN, V. J. M. Qualidade do leite cru comercializado informalmente no município de Itaqui-RS. **Vigilância Sanitária debate**. 2015;3(4):106-113.

MONTANHINI, T. M. M.; HEIN, K. Qualidade do leite cru comercializado informalmente no município de Piraí do Sul, estado do Paraná, Brasil. **Revista Instituto Laticínios Cândido Tostes**, Juiz de Fora, v. 68, n. 393, p. 10-14, jul/ago., 2013.

MOTTA, R.G.; SILVA, A.V.; GIUFFRIDA, R.; SIQUEIRA, A.K.; PAES, A.C.; MOTTA, I.G.; LISTONI, F.J.P.; RIBEIRO M.G. Indicadores de qualidade e composição de leite informal comercializado na região Sudeste do Estado de São Paulo. **Pesquisa Veterinária Brasileira**. 35(5):417-423. 2015.

ORDÓÑEZ, Juan A. et al. **Tecnologia de Alimentos: Alimentos de Origem Animal**. Porto Alegre: Artmed, 2005. v. 2.

POLEGATO, E. P. S.; RUDGE, A. C. Estudo das características físico-químicas e microbiológicas dos leites produzidos por mini-usinas da região de Marília – São Paulo. **Revista Higiene Alimentar**, v. 17, n. 110, p. 56-63, 2003. Disponível em: <<http://www.bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?>>. Acesso em: 07 mar. 2020.

RODAS, M.A.B.; SATO, J.H.S.; TAKARHASHI, A.A.; TEMERLOGLOU, D.P.; SEPAROVIC, L.; NARDINI, G. S. **Leite Pasteurizado e ultra alta temperatura (UAT): Avaliação do índice crisoscópio e valor de Ph- Bol.** Inst Adolfo Lutz. P. 57-59, 2014.

SILVEIRA, M. L. R.; BERTAGNOLLI, S. M. M. Avaliação da qualidade do leite cru comercializado informalmente em feiras livres no município de Santa Maria-RS. **Revista Vigilância Sanitária em Debate: Sociedade, Ciência & Tecnologia (Visa em Debate)**, vol.2, n.2, p.75-80. 2014.

SOUZA, F.M.; NOGUEIRA, M. S.; NUNES, F. C. Qualidade microbiológica do leite cru comercializado informalmente na cidade de Areia-PB. **Revista Agropecuária Técnica**. Areia PB, v. 32, n. 1, p 168–171, 2011

TANAGILDO, L. F. **Qualidade do leite comercializado em feiras livres no município de Vilhena-RO**. 2019. 25 f. TCC (Graduação) - Curso de Zootecnia, Faculdade da Amazônia, Vilhena RO, 2019.

TRINDADE, L. C. A.; MARTINS, M. L.; MARTINS, J. M.; MARTINS, A. D. O. Qualidade de leite cru comercializado informalmente no município de RIO POMBA, MG. **Revista Higiene Alimentar**, vol.32, nº 284/285, set-out. p. 72-76. 2018.

VIDAL, A. M. C.; NETTO, A. S. **Obtenção e processamento do leite e derivados**. Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, USP, Pirassununga-SP, 2018. 220 p.

VIEIRA, M.C.M.; ANDRÉ M.C.D.P.B.; SERAFINE, A.B.; LIMA, S.V.; SILVA, E.V. Avaliação microbiológica do leite pasteurizado tipo C comercializado no estado de Goiás no período de janeiro a junho de 2000. **Revista Higiene Alimentar**, n.82. p.72, 2001.

CAPÍTULO 35: AVALIAÇÃO DE MERCADO E DAS BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE HORTOFRUTÍCOLAS ENTREGUES A DOMICÍLIO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

CHAPTER 35: MARKET EVALUATION AND GOOD HANDLING PRACTICES OF HORTIFRÚTIS DELIVERY IN CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Lara Poses Mussi¹; Rosana Maria dos Santos Nani de Miranda²; Jaomara Nascimento da Silva³; Rafael dos Santos Costa⁴

Resumo

O crescimento progressivo de entregas a domicílio (*delivery*) de hortofrutícolas requer cuidados higiênico-sanitários adequados em toda cadeia produtiva. Logo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o nicho de mercado de *delivery* de hortifrúti em Campos dos Goytacazes/RJ focando na qualidade e segurança dos alimentos. Em 2019, o *delivery* foi avaliado por uma entrevista estruturada com responsáveis dos 10 hortifrúti, com aplicação do *checklist* de boas práticas, além de avaliar o perfil e a satisfação dos consumidores finais pelo questionário on-line. Os resultados demonstraram que as boas práticas dos hortifrúti foram satisfatórias nos itens manipuladores, armazenamento e transporte do alimento, entretanto, demais itens precisariam fazer a correção das inadequações. Todos os hortifrúti utilizam redes sociais para *marketing*; 10% dos hortifrúti produzem e 90% compram de fornecedores. O perfil do consumidor pré-pandemia no serviço *delivery* varia de 19-81 anos, sendo 54% na faixa dos 31-50 anos; 38% possuindo renda acima de 4 salários mínimos; 76% tem ensino superior e 43% compram semanalmente. Portanto, o *delivery* dos hortifrúti no município possibilitou agregar valor aos produtos agrícolas, sendo um diferencial nesse segmento de mercado, e melhorar a distribuição de renda. Ademais, a pesquisa demonstrou satisfação dos consumidores pela qualidade do atendimento, comodidade e praticidade.

Palavras-Chave: boas práticas, *delivery*, gestão, manipulação, perfil do consumidor.

Abstract

The progressive growth of delivery of fruit and vegetables requires adequate hygienic-sanitary care throughout the production chain. Therefore, the objective of this work was to evaluate the delivery market niche of Hortifrutis in Campos dos Goytacazes/RJ focusing on food quality and safety. In 2019, the delivery was evaluated by a structured interview with the responsible 10 Hortifrutis, with application of the checklist of good practices, in addition to evaluate the profile and satisfaction of final consumers through the online questionnaire. The results demonstrated that the good practices of Hortifrutis were satisfactory in handling items, storage and transportation of food, however, other items would need to correct inadequacies. All the Hortifrutis uses social networks for marketing; 10% of the Hortifrutis produce and 90% buy from suppliers. The pre-pandemic consumer profile in the delivery service it varies from 19-81

¹ Dra. em Produção Vegetal, UENF, e Técnica em Agronegócios, SENAR, lara_pmw@hotmail.com

² Graduanda em Agronomia, UENF, e Técnica em Agronegócios, SENAR, ronani.uenf@gmail.com

³ Dra. em Produção Vegetal, UENF, jaomarasilva@gmail.com

⁴ MSc. em Ciência Animal, SIE-RJ, rafaelroyal@yahoo.com.br

years, with 54% in the range of 31-50 years; 38% having an income above 4 minimum wages; 76% have higher education and 43% buy weekly. Therefore, delivery of Hortifrutis in the municipality made it possible aggregate value to agricultural products, being a differential in this market segment, and improve income distribution. Furthermore, the survey demonstrated consumer satisfaction with the quality of service, convenience and practicality.

Keywords: good practices, delivery, management, handling, consumer profile.

Introdução

O nicho de mercado de entregas a domicílio (tele-entrega ou *delivery*) vem sendo uma estratégia de comercialização das frutas e hortaliças em alguns hortifrúteis no município de Campos dos Goytacazes - RJ. Em tempos de globalização, a expansão da utilização das tecnologias inovadoras, como a internet, possibilita o acesso às diversas redes sociais por meio do uso de aplicativos em smartphones (exemplo do *WhatsApp*), promovendo aos empreendimentos adequações necessárias para atender as novas tendências deste mercado dinâmico e competitivo do agronegócio.

Deste modo, o serviço de entregas a domicílio dos hortifrúteis demonstra que os empresários estão atentos às mudanças desse mercado e às demandas da sociedade. Uma característica empreendedora, na qual transforma em realidade uma oportunidade de que frutas e hortaliças possam chegar até o consumidor final sem que o mesmo saia de suas residências (SOUZA; HOLANDA, 2019; LIMA, 2018; MAGALHÃES, 2018; CASTRO, 2016; SEBRAE, 2014).

No entanto, frutas e hortaliças são produtos perecíveis e necessitam de cuidados e tecnologias adequadas na cadeia de comercialização para que sejam entregues ao consumidor com suas características preservadas, a fim de garantir qualidade e segurança alimentar (CHITARRA; CHITARRA, 2005). Dessa forma, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), responsável pela fiscalização e regulamentação de todos os aspectos sanitários do país, estabelece as Boas Práticas para Serviços de Alimentação por meio da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) N° 216/2004, na qual define que os estabelecimentos devem se adequar para proporcionar essa segurança aos consumidores (BRASIL, 2004).

Segundo a ANVISA, a manipulação de alimentos envolve todas as operações com a matéria-prima, desde a sua obtenção (colheita) até a entrega (preparação, embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e exposição à venda). As pessoas que entram em contato direto ou indireto com o alimento em todas essas operações são reconhecidas como manipuladores (BRASIL, 2004). Sendo assim, a qualidade das frutas, legumes e verduras é

iniciada no campo pelos produtores com as boas práticas agrícolas, mas tem de ser mantida ao longo da cadeia de abastecimento e distribuição, ou seja, é necessário implementar as boas práticas em todas as etapas da produção dos alimentos: antes, dentro e fora da porteira. A adoção de soluções eficientes ao longo da cadeia produtiva viabiliza a chegada do alimento produzido até o consumidor final, com a diminuição de perdas e desperdícios, sendo uma das formas de garantir segurança alimentar e nutricional (SEBRAE, 2016; FAO, 2011).

Atualmente, a esfera global passa por processos transformatórios no atendimento aos clientes, devido à pandemia que se instaurou de forma gradativa. Antes dessa situação mundial, os consumidores já buscavam novas formas de compra por alimentos com qualidade nutritiva, boa aparência e seguros, além da busca por empresas que adotassem práticas sustentáveis e que fariam a comercialização por *delivery*. Portanto, o objetivo neste trabalho foi avaliar o nicho do mercado de entregas a domicílio para frutas e hortaliças dos hortifrúteis, focando na qualidade e segurança dos alimentos, em Campos dos Goytacazes, município do interior do Estado do Rio de Janeiro.

Material e Métodos

O trabalho foi realizado no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de outubro a novembro de 2019, pré-pandemia do coronavírus SARS-CoV-2, em 10 hortifrúteis diferentes que realizam o serviço de entregas a domicílio (*delivery*). O trabalho foi fundamentado nas três seguintes avaliações:

- Avaliação da entrega a domicílio (*delivery*) nos hortifrúteis

A primeira avaliação foi relacionada às vantagens e desvantagens do nicho de mercado de entregas a domicílio, por meio de pesquisa de campo exploratória e descritiva nos estabelecimentos de hortifrúteis e entrevista estruturada. As entrevistas foram realizadas com os responsáveis pelo empreendimento, setor de hortofrutícolas e entregas (Quadro 1).

Quadro 1. Perguntas da entrevista estruturada com os responsáveis nos hortifrúteis.

1- São produtores?	() Sim	() Não
2- Quem são os fornecedores das frutas?		
3- Quem são os fornecedores das hortaliças?		
4- Vende produtos minimamente processados?	() Sim	() Não
Se sim, quem prepara os minimamente processados?		
5- Quantos funcionários tem o estabelecimento? E suas funções?		

6- Quais as condições higiênico-sanitárias da loja física? Aplicação de alguns itens do <i>checklist</i> da RDC 216/2004 (Anvisa).
7- Como é o armazenamento/estoque dos produtos?
8- São todos os produtos que são entregues a domicílio? Quais são?
9- Quais os critérios que utilizam para a escolha dos produtos entregues a domicílio?
10- Como é a embalagem dos produtos entregues a domicílio?
11- Como são transportados os produtos do serviço de entrega a domicílio?
12- Quais estratégias de <i>marketing</i> (divulgação) que utilizam?
13- Quais técnicas de gestão utilizam para administrar o empreendimento?
14- Quais são os custos operacionais da loja física?
15- Quais são os custos da entrega a domicílio?
16- Realizam algum tipo de controle de receitas e despesas?
17- E as vendas a domicílio apresentaram algum incremento na renda mensal?

Fonte: Própria (2020).

Ao todo foram 10 hortifrúteis de Campos dos Goytacazes, distribuídos pelos seguintes bairros do município: Parque (Pq.) Aldeia (Guarus), Pecuária, Pq. Leopoldina, Pq. Califórnia, Pq. Aurora, IPS, Centro, Pq. Santo Amaro, Turf Club, Pq. Imperial e Penha. O processo de seleção desses hortifrúteis foi por meio das redes sociais (Instagram e Facebook) que utilizam como principal meio de divulgação do serviço de entrega no município.

O intuito da entrevista estruturada foi caracterizar esses estabelecimentos quanto aos fornecedores de frutas e hortaliças, o número de funcionários, as condições higiênico-sanitárias (da loja física, do armazenamento e do transporte), os critérios para a escolha dos produtos, avaliar as estratégias de *marketing* e de gestão empregadas para administração do empreendimento.

- Avaliação das condições higiênico-sanitárias nos hortifrúteis

A segunda avaliação foi das condições higiênico-sanitárias das lojas físicas dos hortifrúteis que foram avaliadas de acordo com as boas práticas de manipulação, realizadas no setor de hortofrutícolas com aplicação de alguns itens do *checklist* fundamentado na RDC Nº 216/2004 (ANVISA), apresentado abaixo no Quadro 2.

Quadro 2. Itens do *checklist*, baseado na RDC Nº 216/2004 (ANVISA), aplicado nos hortifrúteis de Campos dos Goytacazes/RJ. Perguntas cuja resposta é “SIM”, marcou-se quando o estabelecimento atende ao item, “NÃO”, quando o estabelecimento não atende ao item e “NA”

(não se aplica), quando o estabelecimento não possui este setor ou esta operação.

I. EXPOSIÇÃO AO CONSUMO E ORGANIZAÇÃO	SIM	NÃO	NA
1) Higiene: As áreas de exposição do alimento (gôndolas e balcões refrigerados) são mantidas organizadas e em adequadas condições higiênico-sanitárias (limpas e livres de contaminação)?			
2) Os equipamentos necessários à exposição ou distribuição dos alimentos minimamente processados, sob temperaturas controladas, são devidamente dimensionados e estão em adequado estado de higiene, conservação e funcionamento?			
3) PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair): as mercadorias mais antigas estão sobre as novas?			
4) Os códigos de rastreabilidade estão funcionando?			
II. MATÉRIAS-PRIMAS, INGREDIENTES E EMBALAGENS	SIM	NÃO	NA
1) Integridade das embalagens primárias: ausência de rasgos, furos, bem como aquelas que apresentem sujidades que possam alterar a qualidade e integridade do produto?			
2) A temperatura das matérias-primas e ingredientes que necessitem de condições especiais de conservação está adequada?			
3) Estão adequadamente acondicionados e identificados com o prazo de validade?			
4) Para os alimentos dispensados da obrigatoriedade da indicação do prazo de validade, é observada a ordem de entrada dos mesmos?			
5) Os produtos com prazos de validade vencidos são retirados diariamente da área de venda, descartados ou separados e identificados para troca?			
6) Os alimentos consumidos crus são submetidos a algum processo de higienização, a fim de reduzir a contaminação superficial?			
7) Os produtos minimamente processados têm as seguintes informações: identificação do produto, nome da marca, quantidade, ingredientes, preço, data de fabricação e data ou prazo de validade?			
III. QUALIDADE DOS PRODUTOS	SIM	NÃO	NA
1) Defeito leve			
2) Defeito grave			
3) Estágio de maturação			
4) Podridão			
IV. MANIPULADORES	SIM	NÃO	NA
1) Verifica-se que os manipuladores adotam procedimentos que minimizem o risco de contaminação dos alimentos preparados por meio da antissepsia das mãos e pelo uso de utensílios ou luvas descartáveis?			

2) Os manipuladores possuem higiene pessoal, apresentando-se com uniformes compatíveis à atividade, conservados e limpos?			
3) Os manipuladores usam cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou outro acessório apropriado para esse fim, não sendo permitido o uso de barba nem adornos?			
V. ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SIM	NÃO	NA
1) É utilizada somente água potável para higienização das FVL?			
2) Quando utilizada solução alternativa ao abastecimento de água pública, a potabilidade é atestada semestralmente mediante laudos laboratoriais?			
3) O reservatório de água é edificado e ou revestido de materiais que não comprometam a qualidade da água?			
4) O reservatório de água é higienizado em um intervalo máximo de seis meses?			
5) São mantidos registros da operação de higienização do reservatório de água?			
VI. INSTALAÇÕES FÍSICAS	SIM	NÃO	NA
1) As áreas internas e externas do estabelecimento estão livres de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente?			
2) As instalações são mantidas íntegras, conservadas, livres de rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, infiltrações, bolores, descascamentos?			
3) As instalações físicas como piso, parede e teto possuem revestimento liso, impermeável e lavável?			
4) As instalações são abastecidas com água tratada e dispõem de conexões com rede de esgoto público ou fossa séptica?			
5) As portas da área de preparação e armazenamento de alimentos são dotadas de fechamento automático?			
6) As aberturas externas das áreas de armazenamento e preparação de alimentos, inclusive o sistema de exaustão, são providas de telas milimetradas para impedir o acesso de vetores e pragas?			
7) As telas são removíveis para facilitar a limpeza periódica?			
8) Os ralos são sifonados e as grelhas possuem dispositivo que permitam seu fechamento?			
VII. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DOS ALIMENTOS	SIM	NÃO	NA
1) As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens são armazenados respeitando-se o espaçamento mínimo necessário para garantir adequada ventilação e limpeza e, quando for o caso, desinfecção do local?			
2) Os paletes, estrados e prateleiras são de material liso, resistente, impermeável e lavável?			
3) Os alimentos preparados aguardando o transporte estão organizados, identificados e protegidos contra contaminantes?			

4) O armazenamento e o transporte do alimento preparado, da distribuição até a entrega ao consumo, ocorrem em condições de tempo e temperatura que não comprometam sua qualidade higiênico-sanitária?			
5) Os meios de transporte do alimento preparado são higienizados, sendo adotadas medidas a fim de garantir a ausência de vetores e pragas?			
6) Os veículos são dotados de cobertura para proteção da carga, não transportando outras cargas que comprometam a qualidade higiênico-sanitária do alimento preparado?			

Fonte: Adaptado de Brasil (2004).

- Avaliação do perfil e da satisfação dos consumidores finais

A terceira avaliação do trabalho foi baseada nos perfis e na satisfação dos consumidores finais dos hortifrúteis, com a finalidade de verificar os seguintes parâmetros: idade, renda, escolaridade, frequência de compra de entrega a domicílio, avaliação do atendimento e da qualidade dos produtos alimentícios comercializados, se retornaria ao estabelecimento para novas compras e a fazer uso do serviço de *delivery*. Essa pesquisa de satisfação foi realizada de forma indireta, voluntária e aberta para os clientes dos hortifrúteis, por meio de questionários, divulgados pelos canais de comunicação e-mail e *WhatsApp*, a fim de garantir um público-alvo de 50 consumidores. Foi utilizada a plataforma do *Google Forms* para a elaboração do questionário (Quadro 3) e suas ferramentas para formulação dos gráficos com auxílio do Excel, a partir dos dados obtidos pelas respostas dos consumidores, e assim foram analisadas e discutidas.

Quadro 3. Questionário aplicado em Campos dos Goytacazes/RJ para avaliar o perfil e a satisfação dos consumidores finais do serviço de *delivery* dos hortifrúteis.

Questionário do perfil e da satisfação dos consumidores-clientes
Esse questionário faz parte de uma pesquisa para avaliar o perfil dos consumidores e a satisfação do serviço de entrega a domicílio de frutas, legumes e verduras em Campos dos Goytacazes - RJ com o intuito da melhoria desse serviço e da qualidade dos produtos comercializados. Desde já agradeço a colaboração!
*Obrigatório
1. Idade? * _____
2. Renda? * (Marcar apenas uma).
☐ Até 1 salário mínimo.
☐ 1 a 2 salários mínimos.

☐ 3 a 4 salários mínimos.

☐ Acima de 4 salários mínimos.

3. Escolaridade? * (Marcar apenas uma).

☐ Ensino fundamental.

☐ Ensino Médio.

☐ Ensino Técnico.

☐ Ensino Superior.

☐ Sem escolaridade.

4. Qual é a frequência que você realiza a compra com entrega a domicílio? *
(Marcar apenas uma).

☐ É a primeira vez que compro.

☐ Uma vez na semana.

☐ Mais de uma vez na semana.

☐ Mais de duas vezes no mês.

☐ Outro: _____

5. Como foi o atendimento por telefone ou por WhatsApp ou pela rede social? *
(Marcar apenas uma).

☐ Ótimo.

☐ Bom.

☐ Regular.

☐ Ruim.

☐ Outro: _____

6. Qual foi a qualidade dos produtos alimentícios que chegaram na sua casa? *

(Marcar apenas uma).

- ☐ Ótima.
- ☐ Boa.
- ☐ Regular.
- ☐ Ruim.
- ☐ Outro: _____

7. Quais aspectos influenciaram na avaliação da qualidade dos produtos? *

(Pode selecionar mais de uma opção. Marque todas que se aplicam).

- ☐ Aparência.
- ☐ Limpeza.
- ☐ Armazenamento.
- ☐ Embalagem.
- ☐ Outro: _____

8. O que te agradou no serviço de entrega a domicílio? *

(Pode selecionar mais de uma opção. Marque todas que se aplicam.)

- ☐ Produtos de qualidade.
- ☐ Bom atendimento.
- ☐ Preço.
- ☐ Comodidade.
- ☐ Praticidade.
- ☐ Economia de tempo.
- ☐ Outro: _____

9. Você também realiza compras dos produtos alimentícios na loja física? *

(Marcar apenas uma.)

- ☐ Sim.
- ☐ Sim. Prefiro comprar os produtos na loja física.
- ☐ Não. Compro só pelo serviço de entrega a domicílio.
- ☐ Outro: _____

10. Você recomendaria o serviço de entrega a domicílio de frutas, legumes e verduras? * (Marcar apenas uma).

- ☐ Sim.
- ☐ Não.
- ☐ Talvez.

11. Alguma observação ou sugestão a ser feita? *

Fonte: Própria (2020).

Resultados e Discussão

- Avaliação da entrega a domicílio (*delivery*) nos hortifrútiis

As redes sociais (*Instagram* e *Facebook*) e o *WhatsApp* são os principais meios de divulgação e *marketing* que os hortifrútiis utilizam para expor seus produtos e receber os pedidos do serviço de entrega em Campos dos Goytacazes/RJ. Além de contar com a colaboração de influenciadores, clientes e parceiros na divulgação. Um desses hortifrútiis utiliza um aplicativo gratuito para smartphones e um site exclusivo para atender aos pedidos do serviço de entregas a domicílio.

De todos os hortifrútiis visitados, que realizam o serviço de entrega a domicílio, apenas um estabelecimento produz as hortaliças que comercializa. No qual o trabalho é realizado em uma escola estadual de Campos dos Goytacazes, ou seja, é um trabalho educativo, pedagógico e motivador para os alunos. Os envolvidos no trabalho são os próprios professores, da área técnica agropecuária, alunos, do ensino médio e do técnico em agropecuária, e a vice-diretora

da escola, que é a responsável pela entrega dos produtos. A formulação do preço das hortaliças é feita de acordo com uma avaliação da cotação da semana do Ceasa/RJ das matérias-primas, além de avaliar o preço no mercado local e acrescenta em 30% de valor agregado. Não há um retorno financeiro diretamente para os colaboradores. O dinheiro arrecadado é para financiar as produções, os custos operacionais (compra dos insumos, combustível, embalagens) e alguns momentos de lazer com os alunos (lanches).

Os demais hortifrúteis compram as frutas e hortaliças de fornecedores. Os fornecedores das frutas são de pequenos produtores de Campos dos Goytacazes, São Francisco de Itabapoana, Rio de Janeiro e de Vitória (ES). Os fornecedores de hortaliças são de pequenos produtores de Campos dos Goytacazes, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, Rio de Janeiro, da região serrana (Nova Friburgo e Teresópolis) e de Vitória (ES). Os produtos chegam 3 vezes por semana ou todo dia, dependendo da sua origem.

Nem todos os hortifrúteis visitados apresentaram setor de armazenamento das frutas e hortaliças. Estas chegam dos fornecedores e já vão direto para a exposição à venda. Apenas 3 hortifrúteis apresentaram câmaras frias, com temperaturas controladas, para armazenamento dos produtos. Um hortifrúti que só faz a entrega a domicílio, ao receber os produtos já separa os pedidos para ser entregue posteriormente. A escola utiliza uma sala como o local de recepção para dispor as hortaliças coletadas. Durante a colheita das hortaliças, eles tentam ao máximo não deixar resíduos de terra. As hortaliças ficam nessa sala até o momento de entrega. Os tomates são embalados em bandejas de isopor cobertos com filme PVC. Os pedidos são separados e as hortaliças são acondicionadas em cestas de papelão limpas e reaproveitadas (caixas de achocolatado que a escola recebe). Vale lembrar que este tipo de embalagem reaproveitada (papelão) tem que ser higienizada corretamente antes de acondicionar as frutas e hortaliças para evitar o risco de contaminação cruzada. Todos os outros hortifrúteis utilizam sacolas ou caixas plásticas ao entregar os produtos a domicílio.

O excedente da produção de tomate e dos temperos verdes da escola é empregado na produção de molho de tomate, que também é comercializado. Outros excedentes das demais hortaliças são distribuídos para o consumo na residência dos seus alunos ou são utilizadas na compostagem para adubação das hortas na escola. Os tomates e os temperos verdes selecionados na quitanda e são separados para serem processados, a fim de obter o molho. Se eles realizam a produção de molho de tomate no mesmo dia da coleta, eles direcionam os produtos para o laboratório de processamento da escola para realizar as etapas de sanitização, preparação e acondicionamento do molho. Entretanto, caso eles não realizem a produção no dia da colheita, as hortaliças são armazenadas sob refrigeração. Essas formas de diversificar a

produção e seus produtos tem o intuito de minimizar as perdas e desperdícios dos alimentos, além de aumentar as alternativas de comercialização e renda (SEBRAE, 2016; FAO, 2011).

Os hortifrúteis comercializam os produtos minimamente processados. Porém, apenas a escola, entre os estabelecimentos avaliados, que é responsável pela produção e comercialização desses produtos, como quiabo, milho, couve, coco, alho descascado e tomate. Os pequenos estabelecimentos (7 unidades), que correspondem 70% dos hortifrúteis avaliados, apenas fazem uma limpeza superficial, cortam pela metade e embalam com filme de PVC, tais como abóbora, melancia, melão e mamão. Os estabelecimentos maiores (3 unidades), que representam 30% dos hortifrúteis avaliados, apresentaram uma cozinha e fazem limpeza, sanitização e acondicionamento.

Todos os produtos dos hortifrúteis são comercializados nos serviços de entregas a domicílio. O critério que os hortifrúteis utilizam para escolha dos produtos é a melhor qualidade do produto e varia de acordo com a demanda do consumidor final. Vale lembrar que 2 estabelecimentos realizam a entrega a domicílio em dias específicos, posterior a data de chegada dos produtos dos fornecedores, para garantir a qualidade (estado de frescor) dos mesmos. Os demais hortifrúteis atendem no horário comercial, respeitando o horário de almoço. Outro critério que utilizaram para o serviço de entregas a domicílio é a taxa mínima de compras para realizar a entrega ou taxa fixa de entrega (1 hortifrúti).

Uma vez que muitos dos hortifrúteis são localizados em bairros, a bicicleta é o meio de transporte utilizado em quase todos os estabelecimentos, devido ao menor custo operacional. Já quando a entrega é para outro bairro mais distante, pode ser utilizado uma moto ou um carro ou uma Kombi, como já mencionado. Um estabelecimento só realiza entregas, já que não tem loja física, e só utiliza o carro, a fim de manter a qualidade dos produtos e atender a sua clientela.

Quanto à gestão do empreendimento, todos os hortifrúteis relataram que fazem o controle de receitas e despesas pelo fluxo de caixa diariamente, semanalmente e mensalmente. Focam no controle de perdas e tentam ao máximo reduzi-las. Os estabelecimentos maiores, 30% dos hortifrúteis avaliados, realizam treinamentos da equipe e avaliação de produtividade, o que motiva os colaboradores. Quase todos os hortifrúteis, com exceção da escola e do estabelecimento que só faz a entrega, relataram que os custos operacionais da loja física inviabilizam a manutenção desta estrutura, por exemplo, as contas de aluguel, água, luz, folha de pagamento dos funcionários, impostos e fornecedores.

Os custos da escola são água, luz, insumos, instrumentos e equipamentos para colheita e processamento. Enquanto, os custos operacionais da entrega a domicílio dos hortifrúteis são: manutenção do veículo, combustível e funcionário. No caso do hortifrúti que só realiza as

entregas a domicílio, além dos custos operacionais da entrega, tem o custo do aluguel da banca que é utilizada como suporte quando chegam os produtos dos fornecedores.

Por fim, 7 estabelecimentos dos hortifrúteis visitados (70%) relataram que a entrega a domicílio proporcionou um incremento na renda mensal, sendo que um destes informou que tal serviço foi tão aceito pela sociedade que abriram mão das vendas presenciais na banca e só atendem pelo serviço de *delivery*. Os outros 3 estabelecimentos (30%) alegaram que o serviço agrega valor, porém, atendem algumas vezes por cordialidade e fidelidade aos clientes antigos, mas para eles o lucro é pequeno e, em alguns casos, não é viável.

- Avaliação das condições higiênico-sanitárias nos hortifrúteis

Em relação às condições higiênico-sanitárias analisadas pelas boas práticas de manipulação das frutas e hortaliças, segue abaixo a Tabela 1 que apresenta os resultados do *checklist* com os itens avaliados nos 10 hortifrúteis.

Tabela 1. Itens do *checklist* da RDC 216 avaliados nos 10 hortifrúteis

CHECKLIST RDC 216 DE 2004 (ANVISA)	SIM (%)	NÃO (%)	NA* (%)
I. Exposição ao consumo e organização	53,5	17,5	30,0
II. Matérias-primas, ingredientes e embalagens	59,0	35,0	6,0
III. Qualidade dos produtos	72,5	27,5	0,0
IV. Manipuladores	80,0	20,0	0,0
V. Abastecimento de água	56,0	0,0	44,0
VI. Instalações físicas	47,0	26,0	26,0
VII. Armazenamento e transporte do Alimento	82,0	5,0	13,0

*NA (não se aplica). **Fonte:** Própria (2020).

Dentre os itens avaliados no *checklist* (Tabela 1), observa-se que as instalações físicas apresentaram a menor porcentagem de estabelecimentos que atenderam a este item (47%), principalmente, devido à presença de objetos em desuso e estranhos ao ambiente, limpeza, conservação e revestimentos não laváveis no local. Entretanto, os estabelecimentos atenderam os seguintes itens: 72,5% da qualidade dos produtos, 80% dos manipuladores e 82% no armazenamento e transporte do alimento, o que demonstra uma maior conscientização dos hortifrúteis nesses quesitos para garantir a qualidade dos produtos ofertados.

Quanto aos itens de exposição ao consumo e organização (30%) e abastecimento de água (44%) dos estabelecimentos de hortifrúteis não possuem esse setor (Tabela 1), por se tratar de apenas entrega a domicílio e não ter uma loja física. Os 17,5% dos estabelecimentos não

atenderam ao item de exposição ao consumo e organização devido à grande quantidade de produtos expostos de forma desorganizada, às condições de limpeza e ao material das gôndolas inadequadas (sujas e de madeira ou material enferrujado), além de produtos sem os códigos de rastreabilidade.

Dos hortifrúteis avaliados, 35% não atenderam ao item de matérias-primas, ingredientes e embalagens pelo fato de alguns produtos, tais como processados minimamente, estarem fora da temperatura adequada para sua conservação, além de terem sido embalados sem a devida identificação adequada de acordo com a legislação (identificação do produto, nome da marca, quantidade, ingredientes, preço, data de fabricação e data ou prazo de validade).

- Avaliação do perfil e da satisfação dos consumidores finais

De acordo com os resultados do questionário, o perfil dos consumidores do serviço de entrega a domicílio dos hortifrúteis em Campos dos Goytacazes varia de 19 a 81 anos, sendo o maior percentual de consumidores na faixa dos 31 a 50 anos (54%), apenas 14% na faixa de 51 a 81 anos, e o restante abaixo de 30 anos (32%). Assim, o público de meia idade está em busca de uma qualidade de vida melhor, no qual representa o grupo de maior consumo de alimentos saudáveis. A Figura 1 apresenta a renda (A) e a escolaridade (B) dos consumidores que utilizam esse serviço dos hortifrúteis. Observa-se que a maioria dos consumidores possuem renda acima de 4 salários mínimos (38%), de 1 a 2 salários (32%) e tem ensino superior (76%), apesar de ser um serviço acessível a todos. O nível de escolaridade superior e a renda maior da população representam maior consumo de frutas e hortaliças (GAMA, 2017; IBGE, 2008).

Figura 1. Renda (A) e escolaridade (B) dos consumidores que utilizam o serviço de entrega a domicílio dos hortifrúteis em Campos dos Goytacazes - RJ.

B

Fonte: Própria (2020).

Os resultados mostraram que os consumidores estão satisfeitos com a qualidade no atendimento ao cliente oferecida por todos os meios utilizados pelos hortifrúti (telefone, site e rede social), sendo classificados como ótimo (46%) e bom (37%). No entanto, 17% dos consumidores classificaram como regular e as observações que eles citaram foram a demora em responder no *WhatsApp*. Provavelmente, por conta de falhas no sinal de internet ou indisponibilidade de pronto atendimento por parte dos colaboradores. Quando entravam em contato por via telefônica com o hortifrúti, eram informados que não poderiam receber o pedido, pois estavam em atendimento a outros clientes. Além disso, alguns consumidores alegaram que poderia ter um aviso prévio sobre a indisponibilidade de certos produtos, pois, do contrário, eles só sabem que não existe o produto disponível quando as compras são entregues.

Dessa forma, a sugestão dos consumidores seria disponibilização de uma lista com todos os produtos ofertados e seus respectivos preços, permitindo uma decisão de compra adequada às necessidades dos clientes ou o envio de fotos dos produtos aos clientes antes da entrega a domicílio. Como também não enviar áudios, pois muitos consumidores não conseguem escutar no mesmo tempo e demoram responder prontamente a solicitação, o que dificulta a finalização do pedido das compras.

Os resultados da frequência dos consumidores, que realizam a compra pelo serviço de entrega a domicílios nos hortifrúti (Figura 2), mostraram que eles estão sempre adquirindo os produtos por esse serviço, o que evidencia a fidelidade desses clientes. Já que: 43% compram semanalmente, 30% mais de duas vezes no mês, 20% compraram pela primeira vez e 5% realizam a compra mais de uma vez na semana. A frequência de compras de hortifrúti está relacionada ao consumo de alimentos mais saudáveis (HORTIFRUTI BRASIL, 2019; GAMA, 2017).

Figura 2. Frequência dos consumidores na compra de entrega a domicílio nos hortifrúteis em Campos dos Goytacazes - RJ.

Fonte: Própria (2020).

A qualidade dos produtos entregues a domicílio vem sendo satisfatória pela maioria dos consumidores, em vista de que classificaram a qualidade como boa (50%) e ótima (41%). Entretanto, apenas 9% dos consumidores classificaram a qualidade dos produtos entregues como regular, possivelmente pelos aspectos avaliados (embalagem, armazenamento, limpeza e aparência). Os quais foram todos selecionados pelos consumidores (Figura 3). Sendo, a aparência o aspecto de maior relevância na avaliação das frutas e hortaliças pelos 84% dos consumidores, seguido pelo aspecto da limpeza (66%). Alguns consumidores alegaram que chegaram a receber produtos com qualidade diferente do que solicitaram e gostariam de saber a origem do produto, o que pode ser evidenciado pela falta da rastreabilidade verificada em alguns produtos dos hortifrúteis.

Figura 3. Aspectos da qualidade dos hortifrúteis entregues a domicílio em Campos dos Goytacazes - RJ que influenciaram na avaliação dos consumidores.

Fonte: Própria (2020).

Em relação ao serviço de entrega a domicílio dos hortifrúteis realizado em Campos dos Goytacazes, antes do aparecimento da COVID-19, 22% dos consumidores questionados só utilizam o serviço de entrega, 44% dos consumidores também compram na loja física e 34% utilizam o serviço de entrega, mas preferem comprar os produtos na loja física. Logo é um serviço que agrega valor aos produtos ofertados nos hortifrúteis, sendo um diferencial para o estabelecimento e atraindo, cada vez mais, os consumidores em virtude da qualidade dos produtos e do bom atendimento. Além disso, os consumidores citaram que a comodidade e a praticidade são os fatores que mais agradaram a eles no serviço de entrega a domicílio, principalmente, aqueles que não têm tempo para ir à loja física do hortifrúti e realizar as compras (Figura 4).

Figura 4. Fatores que mais agradaram os consumidores ao utilizar o serviço de entrega a domicílio nos hortifrúteis em Campos dos Goytacazes - RJ.

Fonte: Própria (2020).

Por fim, os consumidores ao serem questionados se recomendariam o serviço de entrega a domicílio dos hortifrúteis, 80% dos consumidores responderam que sim, 18% talvez e apenas 2% dos consumidores não recomendaram o serviço. Possivelmente, esses consumidores que responderam talvez e não na recomendação, tiveram alguma dificuldade durante a prestação desse serviço. Algumas observações que eles citaram no questionário foram a falta do comprometimento quanto ao tempo de entrega, indisponibilidade de transporte e a quantidade dos produtos, além da sugestão de criar um tipo de pacote fechado com quantidades variadas e pequenas dos produtos ofertados.

É válido ressaltar, que no quadro atual do município com a pandemia ainda existente, há necessidade da realização novamente da pesquisa do perfil e da satisfação dos consumidores pela mesma equipe que realizou esse presente estudo, para fins de constatação do balanço de novas práticas de cuidados com os alimentos com o serviço de *delivery*.

Conclusões

O estudo demonstrou que o serviço de entregas a domicílio para frutas e hortaliças dos hortifrúteis, pré-pandemia da COVID-19, em Campos dos Goytacazes, apresentou vantagens em agregar valor aos produtos agrícolas, por ser um diferencial nesse segmento de mercado em crescente expansão, e melhorar a distribuição de renda. Além disso, os consumidores ficaram satisfeitos com o serviço *delivery* realizado no município, em virtude da qualidade do atendimento e dos produtos ofertados por proporcionar, principalmente, comodidade e praticidade. Uma vez que tecnologias são utilizadas para maximizar os resultados do agronegócio, desde que seja adotado o gerenciamento eficiente dos recursos.

De acordo com a avaliação do *checklist*, as boas práticas de manipulação dos hortifrúteis foram satisfatórias em relação aos itens dos manipuladores, armazenamento e transporte do alimento. Porém, os demais itens precisariam corrigir as inadequações com a implementação do manual de boas práticas para garantir a qualidade e a segurança dos alimentos, conforme as exigências legais vigentes. Mesmo que seja de forma gradativa até tornar os procedimentos operacionais padrões uma rotina.

Sendo assim, esse serviço pode ser considerado uma oportunidade de negócio para produtores rurais locais comercializarem seus produtos do campo diretamente para a mesa do consumidor final, devido à redução dos custos com os intermediários, proprietários das lojas físicas. Uma sugestão seria oferecer um plano básico mensal com entregas semanais de *kits* padronizados de hortifrúteis, entretanto, também poderiam ser oferecidos *kits* personalizados com preços diferenciados de acordo com a demanda de cada cliente.

Referências

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n. 216 de 15 de setembro de 2004**. Aprova o regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 2004. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_216_2004_COMP.pdf/66f5716e-596c-4b9d-b759-72ce49e34da0>. Acesso em: 2 nov. 2019.

CASTRO, MARINELLA. **Empreendedores investem no delivery da feira para a mesa do consumidor**. 2016. Disponível em: <<https://www.em.com.br>>. Acesso em: 4 nov. 2019.

CHITARRA, M. I. F.; CHITARRA, A. B. **Pós-colheita de frutos e hortaliças: fisiologia e manuseio**. 2. ed. Lavras: Universidade Federal de Lavras, 2005. 785 p.

FAO. **Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention**. Rome. 2011. Disponível em: <<http://www.fao.org/3/a-i2697e.pdf>> Acesso em: 4 nov. 2019.

GAMA, MARA. **Só 40% dos brasileiros consomem frutas e hortaliças todo dia**. 2017. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1927705-so-40-dos-brasileiros-consoem-frutas-e-hortalicas-todo-dia.shtml>>. Acesso em: 1 dez. 2019.

HORTIFRUTI BRASIL. **O consumo de frutas não é mais o mesmo!** 2019. Disponível em: <<https://www.hfbrasil.org.br/br/revista/acessar/completo/edicao-de-marco-quais-tendencias-devem-nortear-o-consumo-de-frutas.aspx>>. Acesso em: 1 dez. 2019.

IBGE. **Pesquisa de Orçamento das Famílias**. 2008. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pof/tabelas>>. Acesso em: 1 dez. 2019.

LIMA, FABIANA DA SILVA. **Venda direta como forma de posicionamento estratégico na distribuição de alimentos da produção rural**. 2018. 116 f. Dissertação (Mestrado em Agronegócio e Desenvolvimento) - Faculdade de Ciências e Engenharia, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Tupã, 2018.

MAGALHÃES, CASA. **Supermercado online: saiba porque apostar nesta tendência!** Disponível em: <<https://www.casamagalhaes.com.br/blog/supermercado-e-varejo/supermercado-online-saiba-porque-apostar/>>. Acesso em: 4 nov. 2018.

SEBRAE. **Serviços Delivery**. 2014. Disponível em: <http://www.sebraemercados.com.br/wp-content/uploads/2015/10/2014_07_02_BO_Junho_Servicos_Delivery_validacao.pdf>. Acesso em 4 nov. 2019.

SEBRAE. **Fatores-chave de sucesso para a horticultura**. Boletim Tendências e Oportunidades. 2016.

SOUZA, ARNON SILLAS NOVAIS; HOLANDA, FRANCISCO SANDRO RODRIGUES. Inovação e modelagem de hortifrúti em Aracajú/SE. **Revista Ingi**, v. 3, n. 4, p. 503-515, 2019.

CAPÍTULO 36: AVALIAÇÃO DE TEMPERATURA DE BALCÕES TÉRMICOS USADOS PARA SERVIR ALIMENTOS EM RESTAURANTES *SELF SERVICE*

CHAPTER 36: TEMPERATURE ASSESSMENT OF THERMAL BALCONIES USED TO SERVE FOODS IN SELF SERVICE RESTAURANTS

Guilherme Crema D'Ávila¹; Emanueli Marchesan Maran²; Clara Mariana Gonçalves Lima³; Silvani Verruck⁴; Mauren Miyaji⁵

Resumo

A qualidade das refeições em restaurantes deve seguir técnicas de controle higiênico sanitárias, com monitoramento de tempo e temperatura de exposição em balcões de *self service*, segundo a RDC nº 216, de setembro de 2004, impedindo assim surtos de doenças transmitidas por alimentos (DTA's). Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar as condições de temperatura dos balcões térmicos de restaurantes *self service* que servem mais de 100 refeições por dia no município de Itapetinga, Bahia. Foram selecionados onze restaurantes com alvará sanitário registrado na Vigilância Sanitária Municipal de Itapetinga, Bahia (VISAN), verificando a temperatura dos balcões térmicos de seis alimentos quentes e seis alimentos frios de cada restaurante. Além disso, foi realizada uma entrevista com a coordenadora da VISAN a fim de conhecer as ações do órgão relacionadas aos serviços de alimentação. Desta forma, pode-se constatar que a situação de Itapetinga é preocupante, uma vez que apenas 10% dos restaurantes atendem as especificações de armazenamento de alimentos quentes e nenhum atendeu as especificações para alimentos frios. Conclui-se então, que há falta de orientação e fiscalização afim de garantir um maior controle da segurança dos alimentos oferecidos pelos serviços de alimentação.

Palavras-Chave: serviços de alimentação, segurança dos alimentos, vigilância sanitária.

Abstract

The quality of meals in restaurants must follow hygienic-sanitary control techniques, such as monitoring of time and temperature of exposure in self-service balconies according to RDC No. 216 of September 2004, thus, preventing outbreaks of foodborne diseases (DTA's). Therefore, the objective of this work was to evaluate the temperature conditions of the thermal balconies of self-service restaurants that serve more than 100 meals a day in the municipality of Itapetinga, Bahia. Eleven restaurants with sanitary license registered by the Municipal Sanitary Surveillance of Itapetinga, Bahia (VISAN) were selected. There were checked the temperature of the thermal balconies of six hot foods and six cold foods of each restaurant. In addition, an interview was conducted with the VISAN coordinator in order to learn about the agency's actions related to the food services. Thus, it can be seen that the situation in Itapetinga is worrying, since just 10% of the restaurants meet the specifications for storage of hot foods and none meet the specifications for cold foods exposure to consumers. It is concluded, then, that there is a lack of guidance and supervision in order to guarantee a greater control of the safety of the food offered by the food services.

Keywords: food service, food safety, sanitary surveillance.

¹ Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, guicrema17@gmail.com

² Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina, emanuelimaran@gmail.com

³ Doutorado em Ciência de Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina, claramarianalima@gmail.com

⁴ Profa. Dra., Universidade Federal de Santa Catarina, silvani.verruck@ufsc.br

⁵ Profa. MSc., Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, maumiyaji@yahoo.com.br

Introdução

Para a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos - ABIA, serviços de alimentação são atividades de preparo de alimentos que ocorrem fora do domicílio, que podem ser consumidas em qualquer lugar. O setor de serviços de alimentação é bastante amplo, abrange vários canais de distribuição, divididos em dois grupos: serviço público ou institucional, que envolve os canais ligados ao governo, e serviço privado (ABIA, 2018). De acordo com a ANVISA, a definição de serviços de alimentação aplica-se a estabelecimentos que realizam manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao consumo, tais como, cantinas, bufês, confeitarias, cozinhas industriais, cozinhas institucionais, lanchonetes, restaurantes, dentre outros (BRASIL, 2004).

O setor de *food service*, termo utilizado para refeições preparadas fora do lar (LEAL, 2010), vem apresentando um cenário positivo com um crescimento de 246,2% nos últimos 10 anos, e as vendas da indústria para esse mercado têm crescido, em média, 13,2% ao ano (ABIA, 2018). Trata-se de um mercado que, no Brasil, é extremamente pulverizado, com 1,3 milhões de pontos de vendas em todo o país. A maioria é formada por pequenos operadores de *food service*, sendo a capacitação técnica o ponto fundamental para um desenvolvimento sustentável nos próximos anos. O crescimento deste setor é extremamente positivo para a economia brasileira, porque gera aumento no número de empregos, maiores investimentos e renda para toda a cadeia produtiva (ABIA, 2018).

O restaurante *self service* oferece suas refeições e sobremesas em balcões de distribuição de alimento que podem ser “por quilo” onde o cliente pesa sua porção após se servir e paga valor proporcional ao peso ou com valor fixo e consome-se à vontade. O serviço é considerado prático pelo consumidor pois é uma forma rápida de almoçar e dispor de uma variedade maior de alimentos do que se fosse preparar os alimentos em casa (LEAL, 2010). Estima-se que no Brasil a cada cinco refeições uma é feita fora de casa, tendo como principais fatores que contribuíram para esse fato, o aumento da taxa de urbanização e o aumento da renda da população (AKUTSU, 2005).

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas – ABERC, o mercado de refeições coletivas forneceu 13 milhões de refeições por dia, movimentou cerca de 19,3 bilhões de reais por ano. Além disso, ofereceu 230 mil empregos diretos, e representou para os governos uma receita de 2,6 bilhões de reais anuais entre impostos e contribuições em 2018 (ABERC, 2019).

Os restaurantes *self service* por quilo, são os mais populares no Brasil. Entretanto, esse

tipo de serviço ocupa o segundo lugar no ranking de estabelecimentos com maior ocorrência de doenças transmitidas por alimentos (DTA's). Um dos fatores críticos da segurança dos alimentos que pode estar presente nas refeições servidas nesses restaurantes é a contaminação por microrganismos durante o processamento ou a exposição dos alimentos em temperaturas inadequadas por muitas horas, dando origem, então, à ocorrência das DTA's (RICARDO et al., 2012; PENEDO et al., 2015)

As DTA's manifestam-se de diversas formas, desde sintomas leves até situações mais graves que necessitam auxílio médico, podendo, até mesmo, levar à óbito. Os alimentos podem sofrer contaminação durante todas as etapas de produção e distribuição, pela ação de microrganismos patogênicos ou de suas toxinas (MARINHO, 2015; BORGES et al., 2016). A temperatura é um dos principais fatores que influencia no crescimento dos microrganismos em alimentos. O processo de cocção e resfriamento de um alimento deve ser realizado de forma a minimizar o risco da multiplicação microbiana e suas consequências ao consumidor. Deve-se sempre associar a temperatura ao tempo de exposição para avaliar o grau de risco. O binômio tempo-temperatura é um dos principais indicadores para o controle da quantidade de microrganismos nos alimentos, a fim de deixá-los aptos para o consumo. Logo, deve ser monitorado constantemente (BORGES et al., 2016).

Nesse contexto, a qualidade higiênico-sanitária dos estabelecimentos de serviço de alimentação tem sido amplamente estudada. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é necessária atenção para estabelecer um maior nível de segurança dos alimentos distribuídos para a população brasileira. Este órgão realiza um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: o controle de bens de consumo e prestação de serviço que direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas de processo, da produção ao consumo (BRASIL, 2002a).

De acordo com o Regimento Interno da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Portaria nº354 de 11 de agosto de 2006, dentre as suas responsabilidades fiscalizadoras e disciplinadoras estão: o estabelecimento de normas, intervenção na administração de entidades, cancelamento da autorização de funcionamento e autorização especial de funcionamento de empresas em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde, coordenação e execução do controle da qualidade de bens e produtos, autuação e aplicação das penalidades previstas em lei (BRASIL, 2006).

Sua atuação engloba as seguintes áreas: agrotóxicos e toxicologia; alimentos;

cosméticos; derivados do tabaco; farmacovigilância; inspeção; medicamentos; monitoração de propaganda; portos, aeroportos e fronteiras; produtos para a saúde; rede brasileira de laboratórios analíticos de saúde; regulação de mercado; relações internacionais; saneantes; sangue, tecidos e órgãos; serviços de saúde e tecnovigilância (BRASIL, 2006).

Na prática, a vigilância sanitária estabelece as bases técnicas para a implementação de programas de saúde e segurança alimentar, além de coletar e analisar informações, garantindo, assim, um aprimoramento constante na identificação e na solução de problemas em um determinado local (BRASIL, 2002a). Em razão de sua complexidade, para que se alcance a segurança alimentar, a questão deve ser analisada ao longo de toda a cadeia produtiva do alimento, ou seja, a fiscalização da qualidade dos alimentos deve ser feita não só no produto final, mas em todas as etapas da produção, desde o abate ou a colheita, passando pelo transporte, armazenamento e processamento, até a distribuição final ao consumidor (BRASIL, 2006).

Em virtude da exigência do mercado consumidor e, principalmente, pela segurança dos seus produtos, os serviços de alimentação passaram a implementar as boas práticas na produção dos seus alimentos (SILVA, 2009). Em razão disso, foi publicada a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) N°216 de 15 de setembro de 2004, que dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. Esta resolução é aplicável aos serviços de alimentação que realizam algumas das seguintes atividades: manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao consumo. Estes podem ser subdivididos em três categorias: alimentos cozidos, mantidos quentes e expostos ao consumo; alimentos cozidos, mantidos refrigerados, congelados ou à temperatura ambiente, que necessitam ou não de aquecimento antes do consumo; e alimentos crus, mantidos refrigerados ou à temperatura ambiente, expostos ao consumo (BRASIL, 2004).

Dentre as ações que devem ser realizadas pelo serviço de alimentação de acordo com a RDC N°2016/04, podem-se destacar a manipulação do alimento e exposição do consumo de alimento preparado. Na manipulação do alimento, durante a preparação, deve-se minimizar o risco de contaminação cruzada, evitar o contato direto ou indireto entre alimentos crus, semi-preparados e prontos para o consumo. Além disso, os ingredientes devem estar em condições higiênico-sanitárias adequadas e em conformidade com a legislação específica, onde os ingredientes perecíveis devem ser expostos à temperatura ambiente somente pelo tempo mínimo necessário para a preparação do alimento, a fim de não comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento preparado (BRASIL, 2004).

Após serem submetidos à cocção, os alimentos preparados devem ser mantidos em

condições de tempo e de temperatura que não favoreçam a multiplicação microbiana. Para conservação a quente, os alimentos devem ser submetidos à temperatura superior a 60°C por, no máximo, seis horas. E na conservação sob refrigeração ou congelamento, os alimentos devem ser previamente submetidos ao processo de resfriamento, o qual deve ser realizado de forma a minimizar o risco de contaminação cruzada e a permanência do mesmo em temperaturas que favoreçam a multiplicação microbiana. A temperatura do alimento preparado deve ser reduzida de 60°C a 10°C em até duas horas. Em seguida, o mesmo deve ser conservado sob refrigeração a temperaturas inferiores a 5°C, ou congelado à temperatura igual ou inferior a -18°C (BRASIL, 2004).

Quando aplicável, os alimentos a serem consumidos crus devem ser submetidos a processo de higienização a fim de reduzir a contaminação superficial. Os produtos utilizados na higienização dos alimentos devem estar regularizados no órgão competente do Ministério da Saúde e serem aplicados de forma a evitar a presença de resíduos no alimento preparado. O prazo máximo de consumo do alimento preparado e conservado sob refrigeração a temperatura de 4°C (quatro graus Celsius), ou inferior, deve ser de 5 (cinco) dias. Quando forem utilizadas temperaturas superiores a 4°C (quatro graus Celsius) e inferiores a 5°C (cinco graus Celsius), o prazo máximo de consumo deve ser reduzido, de forma a garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado (BRASIL, 2004).

Já na exposição ao consumo do alimento preparado, os equipamentos necessários à exposição ou distribuição de alimentos preparados sob temperaturas controladas, devem ser devidamente dimensionados, dispor de barreiras de proteção que previnam a contaminação do mesmo em decorrência da proximidade ou da ação do consumidor e de outras fontes. A temperatura desses equipamentos deve ser regularmente monitorada (BRASIL, 2004). A área do serviço de alimentação onde se realiza a atividade de recebimento de dinheiro, cartões e outros meios utilizados para o pagamento de despesas, deve ser reservada. Os funcionários responsáveis por essa atividade não devem manipular alimentos preparados, embalados ou não (BRASIL, 2004).

Um documento que auxilia os estabelecimentos a organizar e garantir o controle e a qualidade do alimento preparado é o Manual de Boas Práticas que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo os requisitos higiênico-sanitários dos edifícios; a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios; o controle da água de abastecimento; o controle integrado de vetores e pragas urbanas; a capacitação profissional; o controle da higiene e saúde dos manipuladores; o manejo de resíduos e o controle e garantia de qualidade do alimento preparado. Esse documento, juntamente com os

Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs), que descrevem detalhadamente como executar as tarefas no estabelecimento, devem estar disponíveis para a consulta de todos os funcionários (BRASIL, 2002b).

Assim, em função da importância da manutenção dos parâmetros imprescindíveis para a qualidade dos alimentos servidos em restaurantes, esse trabalho visa avaliar as condições higiênico-sanitários dos balcões térmicos no município de Itapetinga, Bahia.

Material e Métodos

Local de realização do estudo

Para a realização do trabalho foram escolhidos restaurantes *self service* com alvará sanitário registrado na Vigilância Sanitária Municipal – VISAM que servem em média 100 refeições por dia localizados no município de Itapetinga localizado no centro-sul da Bahia conforme a Figura 1. As amostras foram coletadas no período de 18 de março a 10 de abril de 2019. De acordo com a VISAM, existem 15 restaurantes que se enquadram nessa classificação. Destes 15, foram realizadas visitas a 11 estabelecimentos dentro do período do estudo, todas em conjunto com a equipe da VISAM.

Figura 1. Localização do município de Itapetinga no estado da Bahia

Fonte: IBGE, 2010.

Verificação da temperatura dos balcões térmicos

Para verificação da temperatura dos balcões dos onze restaurantes, foi utilizado um termômetro digital infravermelho para alimentos, Minipa MT- 350. Foram aferidas as

temperaturas de seis alimentos servidos quentes e seis saladas que são servidas frias. Desses valores, foram tiradas médias aritméticas simples tanto da parte quente quanto da parte fria de cada balcão avaliado. Os resultados são apresentados mediante análise descritiva.

Baseada na verificação, foram listados os pontos críticos das áreas analisadas para a elaboração de um relatório contendo sugestões de melhorias que a empresa possa instituir, caso seja de seu interesse, com base na RDC nº 216/2004.

Entrevista com a coordenadora responsável pela vigilância sanitária do município de Itapetinga

Foi realizada uma entrevista com a coordenadora responsável pela Sanitária do Município de Itapetinga (VISAM) para conhecer as principais ações do órgão relacionadas aos serviços de alimentação no município. Para a entrevista foi utilizado um questionário estruturado contendo questões discursivas de livre preenchimento conforme abaixo.

Nome:

Cargo:

- 1) Número de restaurantes que servem mais de 100 refeições/dia (com alvará):
- 2) Estimativa de restaurantes que servem mais de 100 refeições/dia (sem alvará):
- 3) Frequência de inspeções nos restaurantes:
- 4) O que é avaliado nas inspeções:
- 5) Que tipos de não conformidades são mais encontradas?
- 6) Quais as ações tomadas pela VISAM no caso das não conformidades?
- 7) Nos últimos 5 anos houve registros de intoxicação/infecção alimentar em Itapetinga?
- 8) O que foi feito em relação a esse assunto?
- 9) Na sua opinião, quais os principais desafios e problemas encontrados pela VISAM em relação aos restaurantes?

Resultados e Discussão

Verificação da temperatura dos balcões térmicos

Para fins de confidencialidade, não serão divulgados os nomes dos restaurantes, estes foram aleatoriamente nomeados de acordo com as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K. Os resultados das médias das 6 temperaturas quentes e 6 temperaturas frias mensuradas são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Médias das temperaturas dos balcões térmicos dos restaurantes avaliados.

Restaurante	Temperatura quente (°C)	Temperatura fria (°C)
A	42,00	28,50
B	50,50	28,25
C	59,25	31,00
D	46,00	26,75
E	53,75	25,25
F	55,25	29,50
G	47,67	14,83
H	48,75	19,28
I	37,95	24,80
J	45,50	30,00
K	61,25	30,50

Durante a avaliação, pode-se constatar que nenhum dos estabelecimentos avaliados tinham o próprio termômetro para mensurar as temperaturas dos balcões, portanto, não era possível saber se as temperaturas estavam de acordo com os parâmetros estabelecidos pela RDC nº 216/2004.

A resolução em questão estabelece que alimentos cozidos mantidos quentes devem permanecer a, no mínimo, 60°C por até 6 horas para que a multiplicação microbiana seja reduzida (BRASIL, 2004). Apenas o restaurante K se encontrava dentro do padrão para alimentos servidos quentes, sendo que o restaurante I apresentou a temperatura próxima a 38°C, que seria a temperatura ambiente nos dias considerados mais quentes em Itapetinga.

Em estudo realizado por Lima et al. (2017) analisando a aferição térmica em alimentos que compõem refeições porcionadas no Mercado Municipal de Salinas, também encontrou inadequações nas temperaturas dos alimentos quentes com 75% das temperaturas inadequadas, o que demonstra que os estabelecimentos devem ter o processo de apresentação das refeições revisto e monitorado a fim de garantir a segurança dos alimentos.

Para alimentos frios, a temperatura deve ser reduzida para 10°C antes que seja servido, e essa deve ser mantida durante todo o tempo de exposição ao consumidor por, no máximo, 4 horas (BRASIL, 2004). Nenhum dos restaurantes apresentou temperaturas adequadas, sendo as aferidas, muito maiores do que o esperado. Alguns dos estabelecimentos visitados não serviam as saladas em um balcão separado e frio, e sim, em parte da estrutura do próprio balcão quente que não apresentava nenhuma forma de regulação de temperatura, já outros, mantinham as saladas no balcão frio com o sistema de regulação de temperatura desligado. Estes estabelecimentos, contribuem para que as temperaturas dos alimentos estejam fora do padrão estipulado, o que coloca as preparações em risco, pois favorece o desenvolvimento de microrganismos patogênicos, que levam ao surgimento de surtos de DTA's (SILVA et al., 2016).

Outros estudos semelhantes, realizado por Silva et al. (2016) e Oliveira et al. (2012), também apresentaram resultados parecidos para a cidade de Itapaci- GO e Belo Horizonte – MG, respectivamente, onde os restaurantes não estavam dentro dos parâmetros para a temperatura de exposição dos alimentos, e que apresentam como principal fator a ausência de balcões de exposição adequados, além de cubas com excesso de alimentos, elevado tempo de exposição, armazenamento inadequado, entre outros.

Borges et al. (2016) avaliaram a temperatura dos alimentos servidos pelo Restaurante Universitário da Universidade Federal do Tocantins, campus de Palmas e verificaram que 100% das amostras quentes foram consideradas adequadas de acordo com a legislação vigente. Em relação às preparações frias, apenas 26,66% estavam de acordo com a legislação. Já Correa et al. (2017), avaliaram, dentre outros fatores, a temperatura dos balcões térmicos de um restaurante universitário no oeste do Paraná. Eles encontraram 60% de adequação nos alimentos quentes e 100% de adequação nos alimentos frios.

Ainda é possível, de acordo com a ABERC (2013), aceitar alimentos acondicionados em temperaturas entre 10°C e 21°C por, no máximo, duas horas. Após esse período torna-se necessário descartar os alimentos. Mesmo adotando essa faixa de temperatura, apenas dois restaurantes estariam dentro das especificações de temperatura, sendo eles os restaurantes G e H, contudo, estes não obedecem ao critério de tempo de armazenamento. Os alimentos ficam mais de 2 horas expostos no balcão refrigerado. Acima da temperatura de 21°C, os alimentos refrigerados já devem automaticamente ser descartados.

Os principais microrganismos indicadores de qualidade são os aeróbios mesófilos e os coliformes, que se multiplicam numa faixa de temperatura ótima de 20°C e 35°C. Sua presença em altas contagens é oriunda de más condições higiênicas na manipulação e nesse caso conservação e exposição insatisfatórios. Já a detecção de elevado número de bactérias do grupo dos coliformes termotolerantes em alimentos é interpretada como indicativo da presença de patógenos intestinais, visto que a população deste grupo é constituída de alta proporção de *Escherichia coli* (PARDI, 1993; JAY, 2005).

A maioria dos microrganismos patogênicos encontrados em alimentos são mesófilos (SEGECE, 2012; JAY, 2005), e assim, observando as temperaturas encontradas para os balcões de alimentos, podemos dizer que em todos os restaurantes as temperaturas estavam favorecendo o crescimento desta classe de microrganismos. Para melhor conhecimento dos microrganismos que podem estar presentes nos balcões de *self service* e os perigos que estes alimentos podem trazer ao consumidor, é recomendado um estudo microbiológico dos principais microrganismos patogênicos.

Além disso, vemos a necessidade de serem realizados treinamentos constantes para os manipuladores e gestores, visto que a temperatura é um dos fatores extrínsecos mais importantes no combate e inibição do crescimento microbiano (JAY, 2005; FRANCO; LANDGRAF, 1996). Com base nos resultados encontrados pode-se dizer que a situação em Itapetinga é extremamente preocupante, pois apenas um único restaurante (10%) atende à especificação de armazenamento de alimentos quentes e nenhum atende à temperatura para alimentos frios dentre aqueles que são fiscalizados pela Vigilância Sanitária e possuem alvará sanitário.

Depois da verificação foram listados para o responsável pelo restaurante os principais pontos referentes aos padrões exigidos pela ANVISA e então elaboradas sugestões para que os estabelecimentos os adotassem a fim de evitar as discordâncias de temperatura com a legislação (BRASIL, 2004). Para todos os estabelecimentos foi recomendado a aquisição de um termômetro para aferição diária da temperatura dos alimentos quentes e frios, para que assim fizessem o controle (BRASIL, 2004).

Para os alimentos que seriam servidos quentes, foi recomendado que eles fossem colocados nos balcões logo depois de preparados enquanto ainda estivessem bem quentes, e que a temperatura do balcão fosse mantida em 100°C no regulador, para garantir que a transferência de calor ocorresse uniformemente em todos os alimentos que fossem servidos. Tendo em vista que as saladas cozidas e cruas eram servidas logo depois do preparado, foi sugerido que esses pratos fossem os primeiros a serem preparados na manhã e que fossem armazenados na geladeira específica para esse alimento até o momento de servir, para que a temperatura fosse diminuída para, no mínimo, 10°C, além de recomendar que o estabelecimento que não usava o balcão frio passasse a usá-lo.

Entrevista com a coordenadora responsável pela Vigilância Sanitária do Município de Itapetinga

De acordo com a coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal de Itapetinga, a inspeção nos restaurantes ocorre duas vezes ao ano. Nessas inspeções são avaliados os seguintes pontos: documentação atualizada (alvará de funcionamento da prefeitura, alvará sanitário do ano anterior); certificado de dedetização; atestado de saúde dos manipuladores; limpeza da caixa d'água; estrutura física compatível e adequada; e condições higiênico-sanitárias do estabelecimento.

Nos restaurantes estudados, todos os pontos avaliados foram encontrados com irregularidades, além do armazenamento inadequado dos alimentos, falta de equipamentos e

utensílios adequados de manipulação, vestimenta inadequada dos manipuladores e ausência de separação entre a área suja e a área limpa.

Especificamente a respeito da temperatura dos balcões, não é realizada a aferição da mesma durante as inspeções, fato que corrobora com a despreocupação dos estabelecimentos em relação ao controle da temperatura dos alimentos. De acordo com o tipo de irregularidade podem-se aplicar duas medidas: apenas uma notificação se a não conformidade for leve e a interdição para os casos mais graves.

Apesar das irregularidades encontradas nas temperaturas dos balcões térmicos nos restaurantes, a coordenadora informou que nos últimos 5 anos não houve registro de intoxicações/infecções alimentares no município de Itapetinga, mas sabe-se que eventualmente algumas pessoas passam mal após consumir alimentos nesses estabelecimentos. O que ocorre é que frequentemente as pessoas deixam de registrar ou desconhecem o fato de que a Vigilância Sanitária monitora esses casos. Apesar da subnotificação dos casos no Brasil e no mundo, em 2010 ocorreram 600 milhões casos e cerca de 420 mil mortes de doenças transmitidas por alimentos no mundo (OMS, 2015). Fato relevante que mostra a importância de ser realizadas as boas práticas e o controle da qualidade dos alimentos dentro dos estabelecimentos manipuladores de alimentos.

Dentre os principais desafios a serem vencidos, na opinião da coordenadora em relação aos restaurantes, encontramos a resistência por parte dos proprietários em aceitar as recomendações da Vigilância Sanitária, pois a maioria ainda não compreende que são medidas que devem ser tomadas a fim de garantir a qualidade dos alimentos oferecidos, a integridade e saúde dos consumidores. Para eles as notificações são vistas como punições e medidas exageradas, vendo a Vigilância Sanitária como vilã ao invés de ser considerada uma aliada, que auxilia aos estabelecimentos a atingir o nível desejado no que se refere à segurança dos alimentos, finaliza a coordenadora.

Conclusões

Ao avaliar os resultados obtidos dos restaurantes verificados, ficou clara a falta de preocupação dos restaurantes com o monitoramento de um parâmetro tão importante como a temperatura para a manutenção da qualidade do produto oferecido. Aliado a isso, há falta de informação e as dificuldades enfrentadas pelo órgão fiscalizador de manter esse setor em total adequação, pois nenhum dos estabelecimentos visitados, tinha conhecimento acerca das temperaturas exigidas pela regulamentação dos serviços de alimentação.

Referências

AKUTSU, R. C. Adequação das Boas Práticas de Fabricação em Serviço de Alimentação. *Revista de Nutrição*, Campinas, 2005; 18(3); 419-427.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS - ABERC. Mercado Real de Refeições. Disponível em: <<http://www.aberc.com.br/mercadoreal.asp?IDMenu=21>>. Acesso em: 09 outubro 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS - ABERC. Manual ABERC de práticas de elaboração e serviço de refeições para coletividades. São Paulo; ABERC; 2013. 10 ed. 197 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS - ABERC. 2019. Disponível em: <<http://www.aberc.com.br/mercadoreal.asp?IDMenu=21>>. Acesso em: 08 mar. 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS – ABIA. Congresso Internacional de Food Service chega à sua 11ª edição. 2018. Disponível em: <https://www.abia.org.br/vsn/tmp_2.aspx?id=382>. Acesso em: 10 mar. 2019.

BORGES, N. R.; MOURA, B. A.; VIEIRA, C. F. S.; SANTOS, D. D. M.; ALMEIDA, L. J.; ZUNIGA, A. D. G. Avaliação do binômio tempo-temperatura das refeições de um restaurante na cidade de Palmas– Tocantins. *Revista Desafios*, Palmas. v. 03, n. 02, p. 90-98. 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Cartilha de Vigilância Sanitária. Brasília, 2002a, 2ª ed., 55 p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 275, DE 21 DE OUTUBRO DE 2002. Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos. **Diário Oficial da União**: Brasília, 2002b.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução de Diretoria Colegiada nº 216, de 15 de setembro de 2004. Regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. Disponível em: <<http://portal.anvisa.gov.br>>. Acesso em 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portaria nº354, de 11 de agosto de 2006. Aprova e promulga o Regimento Interno da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e dá outras providências. Disponível em: <<http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/388704/1%2B-%2BPortaria%2Bn%25C2%25BA%2B354%2B-%2Bprt%2B%2B422.pdf/ea2ca50d-b5f4-4c99-b910-c1f5a82d96f3>>. Acesso em 01 mar 2019.

CORREA, V. G.; QUEIROZ, F.; BONIN, E.; FATEL, E. C. S.; GUEDES, G. B. Monitoramento do binômio tempo e Temperatura nos processos de produção de alimentos em um restaurante universitário. *Brazilian Journal of Food Research*, Campo Mourão, v. 8, n. 2, p. 46-56, abr./jun. 2017.

FRANCO, Bernadette Dora Gombossy de Melo; LANDGRAF, Mariza. Microbiologia dos alimentos. São Paulo (SP): Atheneu, 1996. 182p.

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010. Disponível em: < <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/itapetinga/pesquisa/23/25207?tipo=cartograma>>. Acesso em: 30 de jul de 2020.

JAY, James M. (James Monroe). Microbiologia de alimentos. 6. ed. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2005. 711p. ISBN 9788536305073.

LEAL, D. Crescimento da alimentação fora do domicílio. Segurança Alimentar e Nutricional, Campinas, 2010.

LIMA, C. M. G.; SANTOS, K. A.; CARDOSO, R. M. D.; DUARTE, F. C.; ROCHA, R. A.; OLIVEIRA, A. R. G.. **Aferição térmica em alimentos que compõem refeições porcionadas.** The Journal of Engineering and Exact Sciences. Disponível em: 10.18540/jcecvl3iss6pp0792-0795. Vol. 03 N. 06. p. 0792-0795. 2017.

MARINHO, G. A.; OLIVEIRA, G. S.; LIMA, J. L.; LOPES, W. M. A.; NUNES. G. A.; NUNES, M. G. A. Perfil epidemiológico das Doenças Transmitidas por Alimentos e seus fatores causais na região da Zona da Mata Sul de Pernambuco. UNOPAR Cient Ciênc Biol Saúde, 17(4): 238-43, 2015.

OLIVEIRA, L. C. de; FLORES, R. R.; AMORIM, M. M. A.; FERREIRA, C. C.; AMARAL, D. A.. **Avaliação das temperaturas das preparações dos restaurantes self service do hipocentro de Belo Horizonte/ MG.** HU Revista, Juiz de Fora, v. 38, n. 3 e 4, p. 167-173, jul./dez. 2012. Disponível em: <<https://periodicos.ufjf.br/index.php/hurevista/article/view/2018/740>>. Acesso em: 30 jul. 2020.

OMS, Organização Mundial da Saúde. **Food-Borne Disease Burden Epidemiology Reference Group.** [S. l.: s. n.]. E-book, 2015.

PARDI, M.C.; SANTOS, I.F.; SOUZA, E.R.; PARDI, H.S. Ciência, higiene e tecnologia da carne: tecnologia da carne e subprodutos, processamento tecnológico. Goiânia :UFG, 1993. 1110p.

PENEDO, A., JESUS, R., SILVA, S., MONTEIRO, M., RIBERIO, R. Avaliação das temperaturas dos alimentos durante o preparo e distribuição em restaurantes comerciais de Belo Horizonte - MG. Demetra: Alimentação, Nutrição & Saúde, Belo Horizonte, 2015; 10(2); 429-440.

RICARDO, F. O., MORAIS, M. P., CARVALHO, A. C. M. S. Controle de tempo e temperatura na produção de refeições de restaurantes comerciais na cidade de Goiânia - GO. Demetra: Nutrição & Saúde. 2012; 7(2):85-96.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. Escola Estadual de Educação Profissional- EEEP. **Microbiologia de Alimentos.** Fortaleza, Ceará, 2012. p. 27. Disponível em:

<https://www.seduc.ce.gov.br/wpcontent/uploads/sites/37/2011/10/nutricao_e_dietetica_micrобиologia_de_alimentos.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2020.

SILVA, C.C. Cantina escolar. In.: BOCCALETTO, E.M.A.; MENDES, R.T. (org.) Alimentação, atividade física e qualidade de vida dos escolares do município de Vinhedo/SP. Campinas-SP: IPES Editorial, 2009.

SILVA, G. A.; SILVA, L. A. da; ALVES, C. C. M.; COSTA, T. A. da. **Temperaturas de expositores de alimentos e qualidade higiênico-sanitária em restaurante self-service, na cidade de Itapaci- GO.** REFACER v. 5, n. 2, 2016.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ITAPETINGA - VISA ITAPETINGA. 2011. Como posso utilizar a Vigilância Sanitária Municipal? Disponível em: <<http://vigilanciasanitariaitapetingaba.blogspot.com/2011/>>. Acesso em: 02 jun. 2019.

CAPÍTULO 37: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO GESTOR NAS COMPETÊNCIAS GERENCIAIS EM UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CHAPTER 37: EVALUATION OF THE MANAGER'S PERFORMANCE IN THE MANAGEMENT SKILLS IN A FOOD AND NUTRITION UNIT

Maria Rosa Figueiredo Nascimento ¹; Alexandra Marins Hatschek ²; Beatriz de Lopes ³; Katia Cansanção Correa de Oliveira ⁴; Vânia Madeira Policarpo ⁵

Resumo

A presença de um gestor é fundamental para garantir a qualidade do serviço em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN). Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi caracterizar um gestor de UAN, bem como, suas atividades dentro desse serviço, e também identificar percepções a respeito das competências gerenciais requeridas pela empresa e as efetivas em seu trabalho enquanto gestor. Trata-se de um estudo de campo, descritiva, realizado em uma Unidade de Alimentação e Nutrição de escola municipal entre março a junho de 2018. As informações de interesse, foram obtidas por meio de observações e perguntas abertas conduzidas por uma aluna de pós-graduação. A escola atende 711 pessoas entre alunos do primeiro e segundo seguimento do ensino fundamental e funcionários. Inicialmente, na ausência de um gestor foi observado que os colaboradores executavam as suas atribuições de forma irregular não seguiam nenhuma sequência, conseqüentemente o serviço tornava se desorganizado e cansativo. Após a chegada de uma gestora na UAN, houve capacitação dos funcionários, implementação de procedimentos operacionais padronizados (pops) e de fichas técnicas de preparos, além de melhora na comunicação entre a equipe, refletindo na qualidade do serviço. Podemos concluir que, a presença do gestor nessa UAN foi fundamental para instituir e padronizar técnica que visam obter qualidade ponto de vista higiênico-sanitário, desde o início da produção até o produto final, assim como para melhorar a interação entre a equipe.

Palavras-Chave: Gestão, Unidade de alimentação e nutrição, Motivação, Conscientização.

Abstract

The presence of a manager is essential to guarantee the quality of service in a Food and Nutrition Unit (UAN). In this sense, the objective of the present study was to characterize a UAN manager, as well as his activities within that service, and also to identify perceptions regarding the managerial competencies required by the company and the effective ones in his work as a manager. This is a descriptive field study carried out in a Food and Nutrition Unit of a municipal school between March and June 2018. The information of interest was obtained through observations and open questions conducted by a graduate student. The school serves 711 people, including students in the first and second segments of elementary school and employees. Initially, in the absence of a manager, it was observed that employees performed their assignments irregularly and did not follow any sequence, consequently the service became disorganized and tiring. After the arrival of a manager at the UAN, there was training for employees, implementation of standardized operational procedures (pops) and technical preparation sheets, as well as improved communication between the team, reflecting

¹ Doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos, PPGCTA/UFRRJ, mariarosa@ufrj.br

² Discente do curso de pós-graduação lato sensu núcleo de pós-graduação e extensão – Faveni

³ Mestranda em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela (PPGCTA / UFRRJ)

⁴ Doutoranda em Ciências Nutricionais, Instituto de Nutrição Josué de Castro UFRJ, kcansancao@gmail.com

⁵ Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, PPGCTA / UFRRJ, madeira@ufrj.br

on the quality of the service. We can conclude that the presence of the manager in this UAN was fundamental to institute and standardize techniques that aim to obtain quality from a hygienic-sanitary point of view, from the beginning of production to the final product, as well as to improve the interaction between the team.

Keywords: Management, Food and nutrition unit, Motivation, Awareness.

Introdução

Atualmente encontramos muitos casos de produção onde a rentabilidade dos funcionários está em nível decrescente por consequência da falta de motivação ou da falta de sincronia no meio de trabalho (OLIVEIRA, FERREIRA, TEIXEIRA, 2020; JUSTEN, CHILANTI, 2018). É importante citar que, o setor de serviço de alimentação não se faz de forma individual, pelo contrário, existe no contexto um setor de redes humanas, que desencadeiam as atividades dos funcionários na maioria do tempo, de forma que equipe e gerência se inter-relacionam, favorecendo a produtividade dos setores de serviço, ou seja, a motivação de funcionários numa Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) atua como um fator de melhoria no desempenho dos profissionais (SANTOS, BUCCIOLI, 2019; AVELATO, ARAUJO, 2009; BITENCOURT, 2005; TEIXEIRA, 2010).

Para se obter qualidade, a UAN deve contar com um quadro de pessoal adequado tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo, desenvolvendo ações proativas, antecipando-se nas suas ações, prevenindo desvios comportamentais e de desempenho profissional que possam prejudicar a qualidade dos serviços e produtos (AMARAL, CARNEVALE, 2008). As UANs são formadas por um conjunto de áreas e serviços responsáveis pela produção de refeições balanceadas dentro dos padrões dietéticos e higiênicos, visando atender as necessidades nutricionais de seus comensais, adequadas aos recursos financeiros da unidade (DE BRITO, TORRES, 2015; ABREU et al., 2013).

Com o forte crescimento do setor de serviços, a grande concorrência, a presença de doenças transmitidas por alimentos e processos devido à baixa qualidade de produtos, a qualidade de produtos e serviços passou a ser um dos objetivos a serem alcançados pelas UANs, a fim de promover a saúde de seus usuários e garantir o seu lugar no mercado de alimentação (ALVAREZ, 2019; SLACK, 2018; TEIXEIRA et al., 2010). Desse modo, o êxito no funcionamento de uma UAN, depende da definição clara de seus objetivos, de sua estrutura administrativa, de suas instalações físicas e recursos humanos e, sobretudo da normatização de todas as operações desenvolvidas, que devem ser baseadas nos elementos do processo administrativo básico (TEIXEIRA et al., 2010).

Segundo Abreu (2013), o sucesso de uma organização é baseado nos processos pelo qual a mesma opera, podendo ser o processo administrativo o responsável. Este processo,

pode ser definido como as várias funções do administrador de UAN como um todo. O planejamento, organização, direção e controle, constituem as funções administrativas. Quando visualizadas na sua abordagem total para o alcance de objetivos, tais como, a qualidade de um serviço, forma o processo administrativo. A qualidade pode ser conceituada como uma sistematização da produção de produtos e serviços com o intuito de assegurar um resultado econômico das operações, e que atendam plenamente a satisfação do consumidor, o conceito de qualidade é uma ideia antiga, porém sua gestão para obtenção é recente (ABREU et al., 2013; COLARES, FREITAS, 2005). Bravo (2010) descreve que, a gestão de qualidade facilita o processo de mudanças organizacionais envolvendo pessoas e criando processos que facilitem o alcance da mudança esperada.

O engenheiro francês Henry Fayol, é considerado um dos fundadores da administração moderna. Fayol dedicou sua vida ao estudo dessa área, e desenvolveu a teoria da gestão ou processo administrativo, onde segundo ele, “administração é baseada em quatro princípios (planejamento, organização, direção e controle), de acordo com o autor, previsão seguido de métodos adequados de gerência torna os resultados satisfatórios inevitáveis, afirma ainda que esses princípios são universais e podem ser aplicados a qualquer organização” (FAYOL, 1994).

Em se tratando de cargos gerenciais, estes exercem um papel de responsabilidade quanto ao sucesso organizacional, uma vez que são os articuladores das pessoas e resultados, atuando como canal de comunicação mediante a coordenação das atividades de suas unidades com as demais unidades de uma organização (SARTOR, ALVES, 2019; FREITAS, ODELIUS, 2018). Uma das áreas onde a atuação do nutricionista brasileiro tem sido frequentemente requerida é a de produção de refeições para atendimento ao trabalhador da indústria, do comércio e do setor de serviços (CFN, 2015; BOOG et al., 1988).

“Se tratando de uma cozinha, trabalha-se com pessoas e para pessoas. É importante observar suas expectativas, entender suas motivações e necessidades, e fazer com que seus anseios se transformem em uma experiência positiva” (MAXIMIANO, 2011).

“A cordialidade, o respeito, o profissionalismo e a eficiência são fatores fundamentais na relação entre gestores e equipe” (FONSECA, 2018).

Os três grandes pilares do serviço de alimentação são: em primeiro lugar o ambiente não só em relação aos aspectos decorativos, mas o ambiente gerado por todo o conjunto humano e físico; em segundo lugar o serviço deve ser adequado ao conceito do restaurante e sua proposta de atendimento ao nicho específico de mercado; e por último, o cardápio que precisa estar em

perfeita sintonia com todos os elementos componentes desse conceito e em sincronia com os anseios e expectativas do público-alvo (MANZALLI, 2010; ABREU et al., 2013).

Desse modo, para garantir a qualidade do serviço em uma UAN, é fundamental a presença de um gestor visando planejar, organizar, e administrar corretamente toda operação, alcançando menor desperdício de tempo e recursos, aproveitando melhor a mão de obra, reduzindo custos e evitando problemas que ponham em risco a saúde do trabalhador e de seus comensais (NOBREGA et al., 2012; SILVA, BRASIL, 2012). Sendo assim, pesquisas que retratam a importância do gestor dentro de UAN para garantir o controle higiênico-sanitário, do início até o final da produção são fundamentais.

O objetivo do presente estudo foi caracterizar um gestor de UAN, bem como, suas atividades dentro desse serviço, e também identificar percepções a respeito das competências gerenciais requeridas pela empresa e as efetivas em seu trabalho enquanto gestor.

Material e Métodos

Trata-se de um estudo qualitativo, de metodologia exploratória, que utilizou observações e perguntas abertas, direcionadas à funcionários de uma UAN de uma escola municipal, localizada em Seropédica, Rio de Janeiro. Essa escola, conta com a parceria da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), o que a diferencia das demais do mesmo município.

Para obter as informações pertinentes ao estudo, foram realizadas visitas, observações e anotações, visando caracterizar o funcionamento da escola, o número total de funcionários e de alunos, levantamento de mudanças na cozinha, desempenho das atividades desenvolvidas na cozinha pelos funcionários antes e após a presença de um gestor nessa UAN.

As visitas ocorreram entre os meses de março a junho de 2018 nos horários de 07:00 às 14:00 horas. Adicionalmente, foram realizadas entrevistas abertas, ou seja, os participantes foram orientados a falar livremente a respeito da temática proposta, possibilitando ao pesquisador um amplo discurso acerca do tema (BONI, QUARESMA, 2005). Tanto as visitas quanto as entrevistas foram conduzidas pela pós-graduanda. Cabe ressaltar que, as observações realizadas contribuiriam para complementar as informações obtidas, por meio da percepção de aspectos comportamentais (MINAYO, 2010).

Resultados e Discussão

Quanto a caracterização da escola, foi constatado que é uma escola municipal, mas tem parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sendo administrada por uma diretora da universidade e uma subdiretora da prefeitura. Observou-se que a gestão é democrática, partindo da premissa de que todos são importantes, por isso devem ser ouvidos e respeitados. É um modelo de trabalho mais colaborativo, que depende do empenho conjunto para alcançar ótimos resultados. Nesse caso, o mais comum é ouvir frases do tipo “não se gerencia pessoas, se gerencia com pessoas”. É um tipo mais equilibrado no qual todos colaboram para chegar a um denominador comum. O difícil é achar o ponto de equilíbrio ideal para o empreendimento.

A escola atende ao primeiro e segundo seguimento do ensino fundamental, sendo 350 do primeiro e 240 do segundo seguimento, 53 professores, 48 funcionários sendo que, 8 pertence a universidade e 21 a prefeitura Municipal de Seropédica, também conta com a ajuda dos terceirizados, sendo 15 pagos pela universidade e 4 pela prefeitura, totalizando 691 pessoas. Adicionalmente, há colaboração de 20 estagiários distribuídos em todos os setores da escola (**Tabela 1**).

Tabela 1. Caracterização da escola.

Função	Número de pessoas
Alunos do 1º segmento	350
Alunos do 2º segmento	240
Professores	53
Outras funções	48
Estagiários	20
Total	711

Observou se que a cozinha tem dois funcionários da universidade, 01 cozinheiro e 01 técnico, além de 08 merendeiras do quadro da prefeitura. A cozinha funciona em horário integral (das 07:00 às 17:00 horas), servindo desjejum, almoço e lanche, o que destaca essa escola das demais do mesmo município, pois é a única que atende horário integral. Durante a permanência do estágio foi visto que não havia nenhum profissional que gerenciasse, comandasse e fiscalizasse as atividades desenvolvidas na cozinha, na qual foi observado que, os colaboradores executavam as suas atribuições de forma irregular não seguiam nenhuma sequência, conseqüentemente o serviço tornava se desorganizado e cansativo. Para Teixeira et al. (2010), o êxito no funcionamento de uma unidade de alimentação e nutrição, depende da definição clara de seus objetivos, de sua estrutura administrativa, de suas instalações físicas e recursos humanos e, sobretudo da normatização de todas as operações desenvolvidas, que

devem ser baseadas nos elementos do processo administrativo básico, preconizado por Fayol.

Quanto a execução do cardápio, os mesmo já elaborados pela prefeitura, observou-se que os colaboradores executavam de qualquer maneira, não aplicando as técnicas de pré-preparo, preparo e cocção, as Boas Práticas de Fabricação (BPFs) de acordo com a RDC 216 de 2004, não eram aplicadas tão pouco os procedimentos operacionais padronizados (POPs) (BRASIL, 2004). Segundo Paladini (2012), as estratégias de produção da qualidade iniciam-se, sem dúvida, pela introdução de processos de gestão de qualidade, a ideia de tais estratégias é relativamente simples. Trata-se de um processo que visa induzir as pessoas a produzir qualidade em suas atividades desde o início. Para Mezomo (2014), os nutricionistas administradores do serviço de nutrição devem estabelecer sistemas de gestão com uma estruturação própria, de acordo com os objetivos preestabelecidos, a fim de alcançar tais objetivos e minimizar possíveis problemas.

Quanto ao comprimento do horário de entrada e saída dos colaboradores foi visto que eles faltavam com frequência, chegavam atrasados e às vezes saíam mais cedo, com essa falta de compromisso com o serviço muitas vezes as refeições saíam mais tarde, atrasando todo serviço. Todos os dias ocorriam algum incidente na cozinha, prejudicando todo o andamento da mesma. De acordo com Abreu (2013), é fundamental que todos os funcionários entendam a importância de cada atividade desenvolvida dentro de uma UAN, e suas atribuições específicas assim como seus horários, a fim de garantir uma rotina saudável e adequada tanto para o bom funcionamento do serviço, quanto para a qualidade de saúde de cada funcionário.

Desse modo, a diretora solicitou ao reitor da universidade parceira, um profissional técnico para administrar a UAN. Com a vinda do gestor, houve mudanças drásticas na cozinha, uma gestora que realmente soube administrar, mas também foi um líder. Seu primeiro contato foi uma conversa informal colocando tudo o que ela pretendia fazer ali junto aos colaboradores. Percebeu-se, mudanças na cozinha quanto a instalação de equipamentos em desuso existentes que se encontravam num depósito, com a implantação desse equipamento facilitou os serviços, e foi claramente percebido que os colaboradores desenvolviam suas atividades com prazer, e também o bom relacionamento com a gestora, e a cada dia que passava sentia um grande progresso na cozinha.

Durante o período de férias escolares, foram ministrados cursos de capacitação para os manipuladores como, técnicas de preparo dos alimentos, boas práticas de higiene e de procedimentos operacionais padronizados com o objetivo de melhorar a qualificação dos profissionais promovendo melhora no funcionamento da cozinha. Após a capacitação, foram feitos os POPs e cartazes que foram colocados na cozinha. Como exemplo, os POPs da

higienização das mãos, da lavagem e desinfecção dos legumes, e cartazes com informações dos horários de almoço dos funcionários da cozinha, técnicas de preparo com as fichas técnicas, introdução de algumas preparações com verduras, hortaliças e frutas no cardápio. Os POPs são ferramenta fundamentais para auxiliar a obtenção de níveis de segurança alimentar previstos na legislação (MOREIRA, DAL FABBRO, 2018; ROSA, GUELBERT, 2105).

Quanto as preparações os colaboradores receberam instruções de como lidar com as fichas técnicas, observando que as preparações passaram a ter gosto, com uma ótima aparência e textura, e diminuição de desperdícios, e melhor aceitabilidade. Adicionalmente, a higienização da cozinha feita diariamente, apresentou melhora, sendo observado que todo final de semana e feito uma limpeza geral. Além disso, o uso de uniforme passou a ser obrigatório. A utilização de ferramentas como as fichas técnicas, treinamentos e diálogo, são fundamentais para garantir a qualidade do serviço, a importância de cada etapa e das obrigatoriedades dentro de uma UAN precisam ser claras de forma que o colaborador possa compreender o porquê de tal recomendação (CASTRO et al., 2013).

Também foi observado que, no planejamento dos cardápios, a carne passou a ser retirada um dia antes, sendo levada a um refrigerador para que no dia seguinte seja limpa e cortada, sendo colocada para refrigerar até o dia seguinte para ser preparada e distribuída na refeição. Também foi observado que diminuiu o desperdício de alimentos, os cardápios atendiam a todos os requisitos, onde é servido uma proteína prato principal uma guarnição, saladas cruas e cozidas, o complemento arroz e feijão e uma fruta. Isto acontece devido a universidade contribuir com gêneros alimentícios para merenda escolar, como também adquire itens (frutas e legumes) da agricultura familiar recurso do FNDE/ PNAE (AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR).

A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas. A aquisição dos produtos da Agricultura Familiar poderá ser realizada por meio da Chamada Pública, dispensando-se, nesse caso, o procedimento licitatório (BRASIL, 2009).

Adicionalmente, foi observado uma atitude por parte da gestora, na qual as crianças recebiam instruções sobre a importância do consumo de frutas e hortaliças diariamente. A

partir dessa ação, houve melhor aceitabilidade desses alimentos pelas crianças. De acordo com Paiva et al. (2012), a presença de um gestor na UAN de uma escola é fundamental para garantir a oferta de uma alimentação equilibrada e variada, além de contribuir para práticas educativas que visam aumentar o consumo de todos os grupos de alimentos oferecidos, em especial frutas, legumes e verduras.

Com relação aos adolescentes da turma do 9º ano, foi criado um horário para ministrar atividades teóricas e práticas sobre segurança alimentar e alimentação saudável, incluindo preparo de receitas. Em si tratando de um público onde as escolhas alimentares são baseadas em doces, frituras, refrigerantes entre outros alimentos ricos em açúcares e gorduras que estão associados ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (MARRÓN-PONCE et al., 2019; LOUZADA et al., 2015), essa abordagem dentro da escola, fortalece o vínculo entre a escola e a comunidade.

Um fato que se destacou, foi a comunicação entre a gestora e os colaboradores, por exemplo, sempre que ia acontecer uma preparação nova, uma mudança na cozinha, a gestora comunicava se sempre com os colaboradores, isso só contribuiu para os colaboradores adquirirem mais confiança. Diante do exposto foi observado que os colaboradores passaram a ter mais compromisso com suas atividades, respeito uns com os outros, todas as vezes que um colaborador fosse faltar era levado ao conhecimento da gestora. Adicionalmente, foi observada melhor interação entre a equipe, criando um ambiente de trabalho satisfatório entre eles e a gestora.

Segundo Marchiori (2017), “a comunicação serve como “... uma ponte de significados que cria compreensão mútua e confiança, já que a compreensão leva a aceitação ou não da mensagem, e uma ação para quem recebe a mensagem”.

Para Furnham (2001), “as pesquisas mostram que a escolha de canal de comunicação pode afetar em muito o nível de clareza ou ambiguidade da mensagem que está sendo transmitida. O canal oral (conversas pelo telefone ou reuniões pessoais, por exemplo) são preferíveis ao canal por escrito, com anotações e memorandos, quando as mensagens forem ambíguas (e exigirem bastante assistência para serem interpretadas) ao passo que o canal por escrito é preferível quando a mensagem é clara”.

Conclusões

Podemos concluir que, a presença do gestor nessa UAN foi fundamental para instituir e padronizar técnica que visam obter qualidade ponto de vista higiênico-sanitário, desde o início da produção até o produto final, assim como para melhorar a interação entre a equipe.

Referências

ABREU, E. S.; SPINELLI, M. G. N.; PINTO, A. M. S. (Ed. 5). **Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição: Um modo de fazer**. São Paulo: Metha, 2013.

ALVAREZ, M. E. B. **Gestão de qualidade, produção e operações**. São Paulo: Atlas, (Ed. 3), 2019.

AMARAL, L. B.; CARNEVALE, R. M. S. **Redução do desperdício de alimentos na produção de refeições hospitalares**. Trabalho de Conclusão de Curso de especialização em Gestão Pública. Faculdade IBGEN - Instituto Brasileiro de Gestão De negócios, Porto Alegre, RS, 2008.

AVELATO, H.; ARAÚJO, E. M. G. **Gestão, organização e condições de trabalho**. V Congresso Nacional de Excelência em Gestão. Gestão do Conhecimento para a Sustentabilidade. 2009.

BITENCOURT, C. C. **Gestão de Competências e Aprendizagem nas Organizações**. São Leopoldo: UNISINOS, 2005.

BONI, V.; QUARESMA, S. J. Aprendendo a entrevistar: como fazer entrevistas em ciências sociais. **Revista Eletrônica dos Pós-Graduandos em Sociologia Política da UFSC**, v. 2, p. 68-80, 2005.

BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução RDC no 216, de 15 de setembro de 2004. **Aprova o regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação**. Disponível em: <<http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/388704/RESOLU%25C3%2587%25C3%2583ORDC%2BN%2B216%2BDE%2B15%2BDE%2BSETEMBRO%2BDE%2B2004.pdf/23701496-925d-4d4d-99aa-9d479b316c4b>>. Acesso em: 05 de Jan. de 2018.

BRASIL. Resolução/CD/FNDE n. 38, de 16 de julho de 2009. **Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. 2009**. Disponível em: <<https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3341->

[resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-38-de-16-de-julho-de-2009](#)>. Acesso em: 05 de Jan. de 2018.

BRAVO, I. **Gestão da qualidade em tempos de mudança**. São Paulo: Alínea, (Ed. 3), 2010.

BOOG, M. C. F.; RODRIGUES, K. R. M.; SILVA, S. M. F. Situação profissional dos nutricionistas egressos da PUCCAMP 1. Áreas de atuação, estabilidade, abandono da profissão, desemprego. **REVISTA DE NUTRIÇÃO DA PUCCAMP**, V. 1, P. 139-152, 1988.

CASTRO, R. S. D.; VIEITES, R. L. **Boas práticas de fabricação (BPF), análise de tomate e água em restaurantes da cidade de Botucatu - SP**. Tese. Universidade Estadual Paulista. Júlio de Mesquita Filho. São Paulo: Botucatu, 2013.

CFN. CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS. Resolução Nº 380, de 9 de Dezembro de 2005. **Dispõe sobre a definição das áreas de atuação do nutricionista e suas atribuições, estabelece parâmetros numéricos de referência, por área de atuação**. Brasília, DF. Disponível Em: <[HTTP://WWW.CFN.ORG.BR/INICIAL/RESOLUCAO_380.PDF](http://www.cfn.org.br/inicial/resolucao_380.pdf) >. ACESSO EM 05 JAN. DE 2018.

COLARES, L. G. T.; FREITAS, C. M. **Processo de trabalho, saúde e qualidade de vida no trabalho em uma unidade de alimentação e nutrição: Uma abordagem qualitativa**. Tese. Escola Nacional De Saúde Pública, Rio De Janeiro, RJ, 2005.

DE BRITO, K. M. F.; TORRES, C. C. Riscos à saúde dos trabalhadores em unidade de alimentação e nutrição de um hospital universitário. Dissertação. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, RN, 2015.

FAYOL, H. Administração industrial e geral. São Paulo: ATLAS, 1994, P. 138.

FONSECA, M. T. **Tecnologias gerenciais de restaurantes**. São Paulo: SENAC, (ED. 7). 2018.

FREITAS, P. F. P.; ODELIUS, C. C. Competências gerenciais: uma análise de classificações em estudos empíricos. **Cad. EBAPE.BR**, v. 16, 2018.

FURNHAM, A. **Linguagem corporal no trabalho**. (Tradução de Márcia da Cruz Nóboa Leme). São Paulo: Nobel, 2001.

JUSTEN, M. K.; CHILANTI, G. **Absenteísmo em uma unidade de alimentação e nutrição de grande porte em Caxias do Sul-RS**. (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação, de Bacharelado em Nutrição). Universidade de Caxias do Sul, Canela, RS, 2017.

LOUZADA, M. L. C.; et al. Consumption of ultra-processed foods and obesity in Brazilian adolescents and adults. **Prev Med**. v.81, p. 9-15, 2015.

MANZALLI, P. V. **Manual para serviços de alimentação**. São Paulo, Metha, (Ed. 2), 2010.

MARCHIORI, M. **Cultura e comunicação organizacional**. São Caetano do Sul: Difusão, (Ed. 2), 2017.

MAXIMIANO, A. C. A **Introdução à Administração**. São Paulo: Atlas, (Ed. 8), 2011.

MARRÓN-PONCE, J. A., et al. Associations between Consumption of Ultra-Processed Foods and Intake of Nutrients Related to Chronic Non-Communicable Diseases in Mexico. **J Acad Nutr Diet**. v.119, p. 1852-1865, 2019.

MEZOMO, I. B. **Os Serviços de Alimentação: Planejamento e Administração**. São Paulo: Manole, (Ed. 6), 2014.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. São Paulo: Hucitec Abrasco, (Ed. 14), 2014. p. 393.

MOREIRA, T. R. B. M.; DAL FABBRO, A. L. **Condições sanitárias e documentação de serviços de alimentação de creches públicas e privadas**. (Dissertação). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP. 2018.

NOBREGA, A. B. N.; et al. **Competências gerenciais do nutricionista gestor de unidades de alimentação terceirizada**. RapUnP. 2012.

OLIVEIRA, S. P. F.; FERREIRA, A. M. M.; TEIXEIRA, G. M. Qualidade de vida no trabalho de manipuladores de um serviço de nutrição hospitalar em Maceió - AL. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v.50, p. e3498, 2020.

PAIVA, P. Y. U.; et al. A importância do nutricionista na qualidade de refeições escolares: estudo comparativo de cardápios de escolas particulares de ensino infantil no município de São Paulo. **Revista UNIVAP, São José dos Campos-SP**, v. 18, dez.2012.

PALADINI, Edison Pacheco. **Gestão da qualidade: teoria e prática**. São Paulo: Atlas, (Ed. 3), 2012.

ROSA, P. T.; GUELBERT, T. F. **Implantação do manual de boas práticas de manipulação em cozinha pedagógica de uma instituição de ensino na cidade de Campo Mourão – PR**. (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação, do Curso Superior de Tecnologia de Alimentos), Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Campo Mourão, PR, 2015.

SANTOS, M.; BUCCIOLI, P. T. **Motivação e liderança em Unidades de Alimentação e Nutrição**. Revista Ciências Nutricionais Online, v.3, p.39-45, 2019.

SARTOR, J.; ALVES, M. K. Percepção do perfil de liderança do nutricionista gestor em unidades de alimentação e nutrição. **Revista Saúde e Desenvolvimento Humano**. v. 7, 2019.

SILVA, S. M. R; BRASIL, D. S. B. **Importância da utilização das ferramentas de gestão da qualidade para a produção de alimentos seguros – análise de uma unidade de alimentação e nutrição (UAN) na cidade de Belém – PA**. (Dissertação), Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias Departamento de Economia e Gestão, Lisboa, 2012.

SLACK, N. **Administração da produção**. São Paulo: Atlas, (Ed. 8), 2018.

TEIXEIRA, S. et al. **Administração aplicada a Unidades de Alimentação e Nutrição**. São Paulo: Atheneu, (Ed. 1), 2010.

CAPÍTULO 38: AVALIAÇÃO DO LEITE CRU REFRIGERADO DE UMA AGROINDÚSTRIA DE LATICÍNIOS DA SERRA GAÚCHA-RS

CHAPTER 38: EVALUATION OF CHILLED RAW MILK FROM A SERRA GAÚCHA DAIRY INDUSTRY

Jeferson Aloisio Ströher¹; Sabrina Caxambu¹; Joseane Vogel²; Luís Carlos Oliveira dos Santos Jr³

Resumo

O leite cru refrigerado precisa ser obtido de maneira higiênica, seguindo protocolos rigorosos para que não haja a possibilidade de alterações em sua composição. Portanto este trabalho teve como objetivo avaliar parâmetros estabelecidos pela Instrução Normativa (IN) nº 76/18 e 77/18 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), num grupo de 30 produtores de uma Agroindústria da Serra Gaúcha-RS. Foram analisados os parâmetros físico-químicos de gordura, proteína total, lactose anidra, sólidos não gordurosos e sólidos totais, e os parâmetros microbiológicos de Contagem Padrão em Placas (CPP) e Concentração de Células Somáticas (CCS), além de análise de resíduos de produtos de uso veterinário e contaminantes. Os valores encontrados para os parâmetros de CPP em sua maioria estão em acordo com o que preconiza a legislação, porém a CCS parece ser o problema maior dos produtores da região devido aos elevados índices apresentados em 50% dos produtores avaliados. Também há resultados em desacordo para as análises de proteína, lactose anidra, sólidos não gordurosos. Quanto à detecção de resíduos de antibiótico, nenhum produtor teve resultado positivo, e na detecção de fraudes, 3 produtores apresentaram resultados positivos para o teste de cloretos coincidindo com as maiores taxas de CCS no leite cru refrigerado.

Palavras-Chave: Qualidade do leite, Instrução normativa 76, Instrução normativa 77, Detecção de fraudes, Resíduos de antibióticos

Abstract

The chilled raw milk must be obtained in a hygienic way, following strict protocols so that there is no possibility of changes in its composition. Therefore, this work aimed to evaluate parameters established by Normative Instruction (IN) 76/18 and 77/18 of the Ministry of Agriculture, Livestock and Supply (MAPA), in a group of 30 producers of an Agroindustry in the Serra Gaúcha - RS. The physical-chemical parameters of fat, total protein, anhydrous lactose, non-fat solids and total solids were analyzed, as well as the microbiological parameters of Standard Plate Count (CPP) and Somatic Cell Concentration (CCS), in addition to the analysis of residues from veterinary products and contaminants. The values found for the CPP parameters are mostly in accordance with the legislation, but the CCS seems to be the biggest problem for the region's producers due to the high rates presented in 50% of the evaluated producers. There are also results in disagreement for the analysis of protein, anhydrous lactose, non-fat solids. Regarding the detection of antibiotic residues, no producer tested positive, and in the detection of frauds, 3 producers tested positive for chloride, coinciding with the highest rates of CCS in chilled raw milk.

Keywords: Milk quality, Normative instruction 76, Normative instruction 77, Fraud detection, Antibiotic residues.

¹ Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, jeferson.stroher@hotmail.com, sabrinacaxambu11@gmail.com

² Graduação em Medicina Veterinária, Universidade de Caxias do Sul, jvogel@ucs.br

³ Doutorado em Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina, luisc.oliveirajr@gmail.com

Introdução

O leite cru refrigerado é composto por uma combinação de água com diversos elementos sólidos que representam de 12 a 13% do total do produto. Estes elementos são constituídos por lipídios (3,5% a 5,3%), carboidratos (4,7% a 5,2%), proteínas (3% a 4%), sais minerais e vitaminas (1%), sendo que a forma como estão distribuídos e suas interações são determinantes para a estrutura, propriedades funcionais e aptidão do leite para processamento (BRITO et al., 2009).

A matéria prima quando obtida na ordenha, seja de forma manual ou mecânica, deve seguir protocolos rigorosos de higiene para que evite a possibilidade de alteração na sua composição e em sua qualidade. A falta de higiene na ordenha acarreta aumento de bactérias contaminantes e patogênicas que podem comprometer a qualidade do leite e seus derivados (TRONCO, 2008). Entre os micro-organismos existentes no leite proveniente da ordenha, se destacam os psicrotróficos, mesófilos e termófilos (SAEKI et al., 2010).

Para que haja uma contenção e um controle mais apurado da contaminação no leite cru refrigerado proveniente da ordenha, o advento dos órgãos de fiscalização tem respaldo importante. No Brasil, O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) tem a propriedade para publicar decretos reguladores como a Instrução Normativa (IN) nº 76 (BRASIL, 2018), que apresenta o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) do leite cru refrigerado, alterando itens como a temperatura de recebimento de leite na plataforma que foi reduzida para 7°C (anteriormente se admitia até 10 °C), e os padrões microbiológicos como a Contagem Padrão em Placas (CPP) (< 300.000 UFC/mL) e a Concentração de Células Somáticas (CCS) (< 500.000 CS/mL). Esta legislação também relata que o leite cru refrigerado não deve apresentar substâncias estranhas à sua composição, tais como agentes inibidores do crescimento microbiano. No momento em que for disponibilizado aos consumidores, o leite cru refrigerado não deve conter nenhum contaminante em níveis que coloquem em risco sua saúde (FAO, 2009). O RTIQ da IN 76 também determina os parâmetros físico-químicos que o leite cru refrigerado deve apresentar (BRASIL, 2018). As análises dos parâmetros físico-químicos no leite cru refrigerado são de grande importância pois podem indicar presença de substâncias químicas indevidas que geram alterações na composição do produto final, e assim, podem ser constatadas fraudes ou adulterações, que provocam prejuízos econômicos à indústria e danos à saúde do consumidor. A detecção da ocorrência de leites fraudados é importante para assegurar a qualidade do produto a ser consumido e garantir boas condições de rendimento no processamento de derivados (ROBIM et al., 2012).

Existe ainda o artigo 248 do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária dos

[588]

Produtos de Origem Animal (RIISPOA) (MAPA, 2017), que considera que o leite deve ter características sensoriais normais, físico-químicas pré-estabelecidas e não deve possuir substâncias estranhas à sua composição. A mesma legislação descreve que os estabelecimentos só podem vender e distribuir produtos que não tenham sido alterados ou fraudados, e complementa que constitui infração alterar ou fraudar qualquer matéria prima, ingrediente ou produto de origem animal, podendo ser considerado impróprio para o consumo humano.

Já a IN nº 77 (MAPA, 2018) dispõe que os estabelecimentos devem realizar o controle diário do leite cru refrigerado de cada compartimento do tanque do caminhão, contemplando as análises de pesquisas de neutralizantes de acidez, pesquisas de reconstituintes de densidade ou do índice crioscópico, entre outras análises de composição do leite. Esta mesma instrução normativa relata que o conjunto dos métodos empregados para a realização das análises deve ser capaz de detectar diferentes tipos de neutralizantes de acidez, reconstituintes de densidade, substâncias conservadoras e contaminantes.

Uma preocupação especial na IN nº 77 em relação aos resíduos de medicamentos veterinários (RMV) é a crescente disseminação da resistência a antimicrobianos (RAM) em espécies bacterianas que causam doença em humanos, além do desequilíbrio da flora intestinal humana, sendo consequente do uso indiscriminado destes medicamentos em animais de produção e isso tem levado certos países a adotarem medidas de controle rigorosas nesta área, inclusive o Brasil. Esta mesma IN ainda cita que, para a detecção de resíduos de produtos de uso veterinário, a análise deve ser realizada em todos os tanques de cada veículo transportador e que em cada recebimento de leite, deve-se realizar análise de no mínimo dois grupos de antimicrobianos além da análise de leite para todos os grupos de antimicrobianos para os quais existam especificações de triagem analíticas disponíveis.

Portanto, o leite cru refrigerado, estocado nos tanques de refrigeração individuais ou comunitários deve ser coletado para análise em laboratório da Rede Brasileira de Qualidade do Leite (RBQL), com frequência mínima de uma amostra mensal, para avaliação de resíduos de produtos de uso veterinário. Também está descrito na IN nº 77, as análises do leite que a granja leiteira deve realizar antes de cada beneficiamento e a análise para detecção de resíduos de produtos de uso veterinário que deve ser realizada sempre que houver reintrodução no beneficiamento do leite de vacas que finalizaram o período de carência do tratamento com antimicrobianos.

Considerando as atualizações da legislação brasileira (IN nº 76 e IN nº 77) em relação a produção de leite cru refrigerado e a dificuldade observada pelos produtores na adequação

aos novos parâmetros legais, o presente estudo tem o objetivo de avaliar o enquadramento de 30 produtores de leite da Serra Gaúcha no Rio Grande do Sul frente aos parâmetros de identidade e qualidade atualizados pelo MAPA.

Materiais e Métodos

Foram selecionados 30 produtores vinculados a uma agroindústria de 7 municípios da Serra Gaúcha-RS, onde cada produtor forneceu 3 litros de leite (contendo 1L cada) de diferentes pontos do tanque de expansão para a realização das análises de bancada (detecção de resíduos de antibióticos e a detecção de fraudes) mais 4 amostras de leite (contendo 45 mL) cada para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas em laboratório (RBQL). As amostras foram devidamente codificadas a fim de manter a integridade dos produtores.

A análises de resíduos de antibióticos foram realizadas utilizando os testes da marca Bioeasy®, sendo eles o Kit 4IN1 BTSQ (famílias de antibióticos analisadas: Tetraciclina, Sulfonamidas, Fluoroquinolonas e Beta-lactâmicos); Kit 2IN1 BTCef (famílias de antibióticos analisadas: Beta-lactâmicos, Cefalexina e Tetraciclina); 4 em 1- BTSQ (famílias de antibióticos analisadas: Beta-lactâmicos, Tetraciclina, Sulfonamidas e Quinolonas) e o Kit 3IN1 (Quinolonas, Lincomicina e Tilosona). A legislação brasileira (BRASIL, 2018) explana que na recepção do leite cru refrigerado deve-se realizar no de no mínimo dois grupos de antimicrobianos. Para a detecção de fraudes no leite cru refrigerado foram realizados os testes de: presença de cloretos, substâncias redutoras voláteis (álcool etílico), amido, determinação de peróxido de hidrogênio e formaldeído conforme o Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal (BRASIL, 2018). As análises de neutralizantes de acidez metodologia A e B, cloro e hipocloritos e para a detecção de sacarose foram realizados conforme preconizado pelo MAPA (BRASIL, 2006).

As análises físico-químicas e microbiológicas foram realizadas em laboratório externo credenciado pelo MAPA (Unianálises, Lajeado-RS) E foram realizadas as seguintes análises: CPP, CCS, gordura, lactose anidra, sólidos não gordurosos e sólidos totais de acordo com metodologia oficial conforme a IN 77 (BRASIL, 2018).

Todas as análises de bancada foram realizadas em triplicata (detecção de fraudes e resíduos de antibióticos) e as análises em RBQL (CPP, CCS, gordura, lactose anidra, sólidos não gordurosos e sólidos totais) em duplicata foram e calculadas a sua média $\pm$ desvio padrão.

Resultados e Discussão

A qualidade do leite cru refrigerado pode ser avaliada em relação a sua composição

[590]

nutricional, sanitária e higiênica no processo de ordenha sendo que todos os produtores avaliados no estudo possuem ordenha mecanizada e tanques de resfriamento do tipo expansão, contribuindo para um leite de melhor qualidade. A determinação das contagens de micro-organismos no leite é de grande importância para avaliar a higiene da ordenha, a saúde dos animais e as condições de estocagem e transporte do leite cru. Além disto, o leite com elevada contagem bacteriana representa risco para a saúde do consumidor, pelo potencial de veicular micro-organismos patogênicos e toxinas microbianas (GERMANO E GERMANO, 2001). Em relação a infecções intramamárias, a contagem de células somáticas (CCS) é utilizada em âmbito mundial para identificar vacas com mastite (COSTA et al., 2017).

Os pontos mostrados para as análises de CPP e CCS (Figura 1) mostram que a grande parte das amostras de CCS estavam acima do limite máximo do que preconiza a legislação brasileira (BRASIL, 2018), enquanto, os dados de CPP poucos estiveram acima da legislação (BRASIL, 2018). Dos 30 produtores analisados, 15 (50%) apresentaram contagens de CCS acima do permitido pela legislação (BRASIL, 2018). As contagens mais elevadas de CCS foram $1.236 \times 10^3 \pm 3$ e $1.217 \times 10^3 \pm 2$ CS/mL, respectivamente e as menores $27 \times 10^3 \pm 1$ e $28 \times 10^3 \pm 1$ CS/mL, respectivamente.

Figura 1. Contagem de micro-organismos pelos métodos CPP e CCS em leite cru refrigerado considerando os seus limites máximos representados pelas barras em 300×10^3 UFC/mL (CPP) e 500×10^3 CS/mL (CCS) conforme a IN 76 (BRASIL, 2018).

Fonte: Própria (2020).

A CCS é o mecanismo pelo qual se avalia a incidência e prevalência de mastite nos rebanhos leiteiros. O controle da mastite bovina é uma ação multifatorial, que se faz necessário para gerar resultados eficientes, além do incentivo financeiro, de mecanismos que modifiquem

a atitude e o comportamento das pessoas relacionadas ao manejo preventivo. Esses mecanismos podem ser trabalhados através de programas de treinamentos, oficinas, campanhas de comunicação em massa e reforçar a pressão social, melhorando a percepção do produtor frente a importância da mastite (CASSOLI, 2012; ESGUERRA, 2014).

As amostras com elevadas CCS podem ter sido afetadas pela mastite, visto que é um dos principais desafios encontrados nos rebanhos leiteiros no mundo, por acarretar perdas econômicas aos produtores relacionadas aos tratamentos, redução da produção e qualidade do leite, além do possível descarte de animais. No Canadá, somente no ano de 2013, 20% das vacas foram abatidas involuntariamente, devido a problemas com mastite clínica ou por alta CCS (MARTIN et al., 2018). No Brasil, cerca de 49% dos rebanhos monitorados em 2012 apresentaram CCS acima de 400.000 CS/mL em tanques de resfriamento de leite, indicando uma alta prevalência de mastite segundo o reportado por Cassoli (2012).

Coentrão et al. (2008), ao avaliarem a CCS de amostras individuais de leite cru de 2.657 vacas, em 24 rebanhos no estado de Minas Gerais, descrevem valores médios de CCS de $608 \times 10^3 \pm 967 \times 10^3$ CS/mL. Martins et al. (2015) analisaram 5.758 amostras de leite de vacas individuais de 7 propriedades do Estado de Goiás e a CCS média dos rebanhos com mastite subclínica foi de aproximadamente 743×10^3 CS/mL. Vallin et al. (2009) encontraram média de CCS de $6,08 \times 10^5$ CS/mL em leite cru obtido a partir de ordenha manual em 19 municípios da região central do Paraná. Lima et al. (2006), por sua vez, encontraram média de $4,02 \times 10^5$ CS/mL na região Agreste de Pernambuco. Todos estes autores obtiveram médias de CCS semelhantes aos mais altos índices apresentados neste trabalho, podendo indicar que a mastite subclínica está presente em boa parte dos rebanhos dos produtores da Serra Gaúcha.

Dos 30 produtores analisados, 4 (13,3%) apresentaram Contagem padrão em placas (CPP), acima da legislação brasileira (BRASIL, 2018), que é ≤ 300.000 UFC/mL. Os maiores resultados foram 421×10^3 e 427×10^3 UFC/mL respectivamente, enquanto os menores resultados foram > 8 UFC/mL. A CPP elevada indica uma alta contaminação de micro-organismos presentes no leite como reportado por Fagan et al. (2008) que relata ainda que a CPP elevada é indicativa da carência de higiene de ordenha, dos equipamentos e utensílios. Oliveira et al. (2010) encontraram para CPP a média de $3,7 \times 10^3$ UFC/mL nas 11.523 amostras de leite cru estudadas por eles no município de Vassouras, Rio de Janeiro, bem abaixo do que estipula a legislação e condizente com a maioria dos produtores avaliados neste trabalho. Porém, Vallin et al. (2009) encontraram média de CPP de $1,6 \times 10^6$ UFC/mL em leite cru obtido em ordenha manual e $4,2 \times 10^6$ UFC/mL em leite obtido em ordenha mecânica. Lima et al. (2006)

encontraram média de CPP de $3,2 \times 10^8$ UFC/mL em sistemas de ordenha manual no agreste de Pernambuco. Eckstein et al. (2010) comparou as contagens de CPP nos diferentes tipos de refrigeração, constatando que as menores contagens foram encontradas em tanques de expansão ($2,33 \times 10^5$ UFC/mL), seguidos por tanques de imersão ($1,19 \times 10^6$ UFC/mL) e freezers ($1,26 \times 10^6$ UFC/mL). Segundo a IN 76 (MAPA, 2018), as indústrias de laticínios somente podem adquirir leite cru refrigerado de produtores que possuírem tanques de expansão, não sendo mais permitidos os tanques de imersão e freezer pois são de difícil higienização. Estas avarias nos resultados podem ser explicadas por uma inexistência ou ineficácia das Boas Práticas Agropecuárias entre os produtores (BRASIL, 2017).

A análise dos demais parâmetros preconizados da legislação estão representados nas Figuras 2 e 3, onde pode-se observar a conformidade quanto ao teor de gordura em todas as amostras, uma vez que a legislação brasileira determina que o teor deva ser $\geq 3,0$ g/100 g (MAPA, 2018). O teor de gordura estando em conformidade com a legislação é positivo para a agroindústria pois a empresa pode produzir natas, cremes de leite e derivados lácteos com maior rendimento e qualidade. Já para a análises de proteína, duas amostras apresentaram $2,88 \pm 0,1$ g/100 g de conteúdo proteico, estando em desacordo com o padrão mínimo da legislação brasileira que é $\geq 2,9$ g/100 g (BRASIL, 2018) e com resultados semelhantes à Teixeira et al. (2003) que verificaram teores de proteína abaixo da legislação em 3,14% em amostras de leite de vacas da raça Holandesa. O teor de proteína no leite pode variar devido à raça do animal e a época do ano (DÜRR, 2004).

Lima et al. (2006) encontraram média de 3,54% de gordura nas 31 amostras estudadas do Agreste de Pernambuco, semelhante à Pereira et al. (1999) que encontraram média de gordura de 3,64% nas 6.112 amostras de leite cru analisadas, que também relataram média de 3,32% de proteína. Zanela et al. (2006) avaliando a qualidade do leite em sistemas de produção na região Sul do país verificaram média de proteína de 3,42 g/100g, semelhante a maior parte dos produtores selecionados por este trabalho. Com relação ao percentual de lactose, Lima et al. (2006) encontrou média de 4,47% nas 31 amostras de leite cru refrigerado estudadas no Agreste de Pernambuco.

Quanto ao teor de lactose anidra, 3 amostras estiveram abaixo do limite mínimo ($\geq 4,3$ g/100 g) estipulado pela legislação brasileira (BRASIL, 2018), tendo seu resultado em (4,08, 4,27 e 4,28 g/100 g, respectivamente). As concentrações de lactose no leite dependem, principalmente, da glicose que é produzida no fígado a partir do ácido propiônico produzido no rúmen, ácido este produzido em maior proporção quando quantidades adequadas de

concentrado são fornecidas aos animais (PEREIRA, 2000). O padrão de lactose abaixo da legislação brasileira (BRASIL, 2018), pode estar relacionada à regulação da pressão osmótica na glândula mamária, de forma que a maior produção de lactose determina maior produção de leite (PERES, 2001). Campos et al. (2006) verificaram que, assim como o teor de gordura do leite diminui quando a produção do leite aumenta, o mesmo comportamento acontece com a lactose embora a lactose é o componente menos afetado com a oscilação do volume de leite. A diminuição da lactose em três amostras analisadas no presente trabalho em níveis abaixo do padrão da legislação (BRASIL, 2018), sugerem adição de água, uma vez que este é o componente mais estável do leite (SANTOS; FONSECA, 2007).

Eifert et al. (2006) relataram que a lactose é o principal e o mais importante componente osmótico do leite, por estar diretamente ligado a secreção de água e ao volume de leite produzido, além de ser um componente dependente de glicose para a sua síntese. No entanto, quando há menor proporção de lactose no leite, sugere-se que provavelmente o animal esteja com deficiência de glicose, logo se observa a tendência a menor produção de leite.

Bueno et al. (2005) observaram uma redução do teor de lactose à medida que a CCS aumentou, o mesmo foi constatado neste estudo, sendo que os produtores que tiveram o teor de lactose abaixo da legislação, também apresentaram a análise de CCS acima do padrão legal (BRASIL, 2018). Auldist (1995) também verificou redução na concentração de lactose, relacionada ao aumento da CCS. O autor atribui a redução da porcentagem de lactose a menor síntese deste componente do leite em glândulas mamárias infectadas e da perda de lactose da glândula para a corrente sanguínea, associado ao aumento da permeabilidade da membrana que separa o leite do sangue, o que provoca a excreção da mesma na urina (PEREIRA, 2000).

Quatro amostras de leite não atenderam os padrões da legislação para ESD (g/100 g), mas todas as amostras atenderam a legislação para EST (g/100 g) no leite cru refrigerado, considerando os seus limites máximos (BRASIL, 2018) em ($\geq 8,40$ e $\geq 11,40$ g/100 g, respectivamente). A variação de sólidos totais está diretamente ligada à variação da gordura (PERES, 2001). Reis et al. (2007), analisando amostras de leite cru obtidas a partir de ordenha manual e mecânica, verificou os teores médios de ESD de 8,59 g/100g e 8,25 g/100g, respectivamente, mostrando que a ordenha manual é melhor para este parâmetro. Valores superiores aos observados neste trabalho foram observados por Silva (2003), com resultados médios de 8,71% (manual) e 8,48% (mecânica), evidenciando uma maior concentração desse componente quando a ordenha era realizada manualmente, o que está de acordo com os resultados apresentados neste trabalho.

Figura 2. Teor de gordura (g/100g), proteína (g/100g) e lactose anidra (g/100g) nas amostras considerando os seus limites mínimos representados pelas barras em (3,0 g/100g, 2,9 g/100g e 4,3 g/100g, respectivamente) de acordo com o RTIQ para leite cru refrigerado (BRASIL, 2018).

Fonte: Própria (2020).

Figura 3. Teor de sólidos totais (EST) (g/100g) e sólidos não gordurosos (ESD) (g/100g) nas amostras considerando os seus limites mínimos representados pelas barras em (8,40 g/100g e 11,40 g/100g, respectivamente) de acordo com o RTIQ para leite cru refrigerado (BRASIL, 2018).

Fonte: Própria (2020).

Quanto às análises de fraudes, a presença de cloretos foi detectada em três amostras. Este teste também é utilizado para detectar adição de água ao leite. O resultado deste trabalho pode ter relação com as taxas mais elevadas de CCS do experimento que consequentemente, resultam em alto teor de cloretos levando a um resultado falso-positivo para fraudes. A alta taxa de CCS é uma das formas utilizadas para detectar a mastite subclínica, uma vez que, o leite de

um animal que apresenta esta patologia pode sofrer uma série de alterações na sua composição físico-química, incluindo o aumento dos teores de cloro e sódio que estão presentes na circulação sanguínea do animal, e chegam ao leite através dos capilares sanguíneos. (FORNASARI; MONTANHINI, 2015).

Não foram encontradas a presença de formaldeído, neutralizantes de acidez, sacarose, álcool etílico, peróxido de hidrogênio e cloro e hipocloritos nas 30 amostras analisadas do experimento.

Fimino et al. (2010) analisaram 60 amostras de leite cru refrigerado e detectaram a presença de formol em 13% das amostras. Fimino et al. (2010) em estudo com leite cru dos tanques de expansão, verificaram presença de formol e de nitrato em 13,0 % e 40,0 % das amostras, respectivamente.

A análise de neutralizantes de acidez é realizada devido a adição de substâncias alcalinas no leite, já que estas substâncias têm por finalidade neutralizar a acidez do leite e mascarar uma possível qualidade microbiológica insatisfatória (AMORIM, 2017). A adição fraudulenta de neutralizantes como o bicarbonato de sódio ou o hidróxido de sódio visa ocultar a elevação da acidez do leite a níveis acima dos permitidos pela legislação (TRONCO, 2008).

A análise de sacarose verifica a presença de açúcar no leite. É uma fraude muito comum, pois a presença das substâncias sólidas adicionadas aumenta a densidade do leite aguado (FERRÃO et al., 2007).

A adição de cloro e hipoclorito ao leite pode ser considerada uma fraude comum, já que devido ao seu baixo custo e amplo espectro de ação são frequentemente empregados na higienização de equipamentos de ordenha e laticínios (CORDS et al., 2001; TRONCO, 2008). Robim (2011) e Tamanini (2012) também encontraram resultados negativos para o teste de cloro e hipocloritos. Sua adição intencional ao leite pode representar risco à saúde do consumidor (EPA, 2000).

Firmino et al. (2010) verificando o uso de reconstituintes da densidade, não observaram presença de amido, entretanto, foram observados resultados positivos para análise de sacarose em 6,0 % das amostras, e em 36,0 % das amostras para análise de cloretos.

Nenhuma amostra de leite cru refrigerado avaliada apresentou resultado de antibióticos positivo constando assim, um rigoroso controle destes produtos na localidade estudada. Na indústria de laticínios a presença de resíduos de antimicrobianos no leite pode gerar efeitos microbiológicos indesejáveis, como a inibição da microbiota (interferência das características sensoriais e tecnológicas dos produtos lácteos industrializados), causando perdas econômicas

(BRITO et al., 2000). A pesquisa de Neta et al. (2016) que constataram ausência de resíduos da classe beta-lactâmicos e tetraciclina em todas as amostras, está em acordo com o presente trabalho, visto que não houve detecção de resíduos de antibióticos nas amostras.

Alguns autores encontraram pequenas, mas significativas quantias de antibióticos no leite cru refrigerado, como Almeida et al. (2003) que verificou 1,89% amostras positivas de antibióticos, semelhante ao encontrado por Ribeiro et al. (2009), que observou 2,7% de amostras positivas. Já Silva et al. (2012) verificou quantias de antibióticos em apenas em 1,10% nas amostras analisadas.

Diversos trabalhos da literatura relataram altos resíduos de antibióticos em leite cru refrigerado, como Nero et al. (2007) que avaliaram 210 amostras de propriedades rurais de quatro estados (MG, RS, PR e SP), utilizando o Charm-test e constataram 11,5% das amostras positivas. Em experimento de Nascimento et al. (2011), 50% das amostras tiveram resultados positivos, sendo 34,8% para a família de antibióticos Beta-lactâmicos.

Elevados índices de resíduos de antibióticos também foram relatados por Rosa e Queiroz (2007) que observaram 15% de amostras positivas para resíduos de antibióticos da família dos beta- lactâmicos. Macedo et al. (2009) analisando 103 propriedades leiteiras, detectaram um total de 11 amostras positivas (10,68%) no leite cru refrigerado. Raia Jr. (2001), analisando 60 amostras de leite cru refrigerado em tanques de resfriamento detectou 9 (15%) amostras positivas. Aguiar et al. (2016) ao analisarem amostras de leite provenientes de 15 tanques de refrigeração utilizando o teste eclipse 50®, constataram que 26,7% das amostras foram positivas na detecção de resíduos de antibióticos. Albuquerque et al. (1996) observaram 69,7% das amostras contendo substâncias antimicrobianas em leite cru refrigerado.

Conclusões

Dos 30 produtores analisados, 10 (33,3%) estiveram em conformidade com todas as análises realizadas neste experimento e atenderam à legislação brasileira (BRASIL, 2018). Quanto a análise de CCS, 15 (50%) produtores não atenderam o que preconiza a legislação (BRASIL, 2018), provavelmente pela alta incidência de mastite no rebanho leiteiro. Para a análise de CPP somente 4 (13,3%) produtores não atenderam a legislação brasileira (BRASIL, 2018). Quanto as demais análises: proteína 2 (6,6%), sólidos não gordurosos 5 (16,6%), e lactose anidra 3 (10%) não atenderam o que preconiza o RTIQ do leite cru refrigerado (BRASIL, 2018).

Nas amostras onde houveram, resultados positivos para o teste de cloretos, também

tiveram os maiores resultados para a análise de CCS. E não houve a presença de resíduos de antibióticos nas amostras estudadas.

Os produtores e as indústrias receptoras precisam buscar conhecimento, aprimorar o manejo sanitário do rebanho e de ordenha, para melhorar a produtividade, a saúde animal e evitar descarte de leite, visando produzir com mais segurança e qualidade para o consumo e processo. Nas propriedades avaliadas neste trabalho, poucas adequações se mostram necessárias para estar em conformidade com os itens atualizados da legislação brasileira para leite cru refrigerado.

Referências

AGUIAR, G. S. et al. **Avaliação da presença de antibiótico em leite cru refrigerado**. Revista UNIVAP, São José dos Campos-SPBrasil, ISSN 2237-1753. v. 22, n. 40, Edição Especial 2016. Disponível em: <https://revista.univap.br/index.php/revistaunivap/article/view/952>. Acesso em: 25 jul. 2020.

ALBUQUERQUE, L.M.B.; MELO, V.M.M.; MARTINS, S.C.S. **Investigações sobre a presença de resíduos de antibióticos em leite comercializado em Fortaleza-CE-Brasil**. Higiene Alimentar, São Paulo, v.10, n.41, p.29-32, 1996.

ALMEIDA, L.P. et al. **Resíduos de Antibiótico em Leite de Propriedades Rurais da Região de Uberlândia-MG**. Biosci. J., Uberlândia, v.19, n. 3, pág. 83-87. 03 maio 2006. Disponível em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/view/6472>. Acesso em: 25 jul. 2020.

ALVAREZ, Juan Camilo Esguerra. **O homem como fator de risco da mastite**. 2014. 63 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Agrônoma, Universidade de São Paulo, [S.l.], 2014. Disponível em: <https://teses.usp.br/>. Acesso em: 25 jul. 2020.

AMORIM, A.L.B.C. **Avaliação da presença de substâncias químicas em leites cru e beneficiado produzidos e comercializados no Distrito Federal e Entorno**. Brasília: Faculdade de Agronomia e Veterinária, Universidade de Brasília, 2017, 49p. Dissertação de Mestrado. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/23637>. Acesso em: 25 jul. 2020.

AULDIST, M. J. **Changes in the compositional of Milk from healthy and mastitic dairy cows during the lactation cycle.** Australian Journal of Experimental Agriculture, Melbourne, v. 35, n. 4, p. 427-436, 1995.

BIOEASY®. Bioeasy Milk Antibiotic Rapid test kits. Disponível em:

http://en.bioeasy.com/?page_id=1148. Acesso em: 25 jul. 2020.

BRASIL. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. (2018) **Instrução Normativa nº 77.** Brasília, DF: MAPA. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/> . Acesso em 27 jun. 2018.

BRASIL. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. (2018) **Instrução Normativa nº 76.** Brasília, DF: MAPA. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/>. Acesso em 27 jun. 2018.

BRASIL. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. (2018) **Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal.** Brasília, DF: MAPA. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/>. Acesso em 27 jun. 2018.

BRASIL. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. **Instrução Normativa nº 68 de 12 de dezembro de 2006.** Brasília, DF: MAPA, 2006. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/>. Acesso em: 25 mai. 2018.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017.** Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/>. Acesso em 27 jun. 2018.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 13, de 29 de maio de 2014. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, 13 mai. 2014. Seção 1, p. 55. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/> . Acesso em 27 jun. 2018.

BRITO, M. A. V. P. *Resíduos de antimicrobianos no leite.* Juiz de Fora: Embrapa Gado de

Leite, 2005. 28 p. Disponível em: <https://www.embrapa.br/>. Acesso em: 27 jul. 2020.

BRITO, M. A. V. P.; ARCURI, E. F.; BRITO, J. R. F. Testando a qualidade do leite. In: MINAS LEITE, 2, 2000, Juiz de Fora. **Anais...** Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2000. p. 83-94. Disponível em: <http://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/>. Acesso em: 27 jul. 2020.

Brito, M. A. V. P.; BRITO, J. R. F. **Qualidade do leite**. 2009. Disponível em: http://www.fernandomadalena.com/site_arquivos/903.pdf. Acesso em: 28 jul. 2020.

BUENO, V. F. F et al. **Contagem celular somática: relação com a composição centesimal do leite e período do ano no Estado de Goiás**. Ciência Rural, Santa Maria, v. 35, n. 4, p. 848-854, 2005.

CASSOLI, L.D.; Uma pergunta Simples: A qualidade do leite tem melhorado nos últimos anos? **Milkpoint**. 2012. Disponível em: <https://www.milkpoint.com.br/noticias-e-mercado/giro-noticias/uma-pergunta-simples-a-qualidade-do-leite-tem-melhorado-nos-ultimos-anos-79994n.aspx?r=669428400#>. Acesso em: 25 jul 2020.

COENTRÃO, C.M. et al. Fatores de risco para mastite subclínica em vacas leiteiras. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, [S.l.], v. 60, n. 2, p. 283-288, abr. 2008. <http://dx.doi.org/10.1590/s0102-09352008000200001>. Disponível em: <https://www.scielo.br/>. Acesso em: 20 jul. 2020.

COSTA, H. N. et al. Estimativa das perdas de produção leiteira em vacas mestiças Holandês x Zebu com mastite subclínica baseada em duas metodologias de análise. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, [S.l.], v. 69, n. 3, p. 579-586, jun. 2017. <http://dx.doi.org/10.1590/1678-4162-9019>. Disponível em: www.scielo.br/. Acesso em: 20 jul. 2020.

DÜRR, J. W. **Programa nacional de melhoria da qualidade do leite: uma oportunidade única**. In: Dürr J. W., Carvalho M. P., Santos M. V. (Eds.) O compromisso com a qualidade do leite no Brasil. Passo Fundo: Editora Universidade de Passo Fundo, p. 38-55, 2004.

ECKSTEIN, I. I. et al. Contagem Bacteriana Total e Contagem de Células Somáticas do leite cru em diferentes tipos e tempos de resfriamento. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE QUALIDADE DO LEITE. 4. 2010. Florianópolis. **Anais...** Florianópolis: CAV, 2010.

EIFERT, E. C. et. al. **Consumo, produção e composição do leite de vacas alimentadas com óleo de soja e diferentes fontes de carboidratos na dieta.** Revista Brasileira Zootecnia, v. 35, n. 1, p. 211-218, 2006.

FERRÃO, M. F. et al. LS-SVM: uma nova ferramenta quimiométrica para regressão multivariada. Comparação de modelos de regressão ls-svm e pls na quantificação de adulterantes em leite em pó empregando nir. **Química Nova**, [S.l.], v. 30, n. 4, p. 852-859, ago. 2007. <http://dx.doi.org/10.1590/s0100-40422007000400018>. Disponível em: www.scielo.br/. Acesso em: 25 jul. 2020.

FIRMINO, F. C. et al. DETECÇÃO DE FRAUDES EM LEITE CRU DOS TANQUES DE EXPANSÃO DA REGIÃO DE RIO POMBA, MINAS GERAIS. **Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes**, [S.l.], v. 376, n. 65, p. 5-11, set. 2010. Disponível em: www.revistadoilct.com.br. Acesso em: 25 jul. 2020.

FORNASARI, M. T. C.; MONTANHINI, M. T. M. **Avaliação da Eficiência da Prova Qualitativa de Cloretos para Investigação de Adulteração do Leite.** Rebrapa: Brazilian Journal of Food Research. [S.l.], p. 75-79. 26 maio 2015. Disponível em: <https://portalpubvet.com.br/>. Acesso em: 25 jul. 2020.

FORNASARI, M. T. C.; MONTANHINI, M. T. M. Avaliação da Eficiência da Prova Qualitativa de Cloretos para Investigação de Adulteração do Leite. **Rebrapa: Brazilian Journal of Food Research**. [S.l.], p. 75-79. 26 maio 2015. Disponível em: <https://portalpubvet.com.br/>. Acesso em: 25 jul. 2020.

GERMANO, P. M. L.; GERMANO, M. I. S. **Higiene e vigilância sanitária de alimentos: qualidades das matérias-primas, doenças transmitidas por alimentos, treinamento de recursos humanos.** Embrapa. São Paulo, 3 ed. p. 1-986, 2008.

JUNIOR, R. B. R. **Influência da mastite na ocorrência de resíduos de antimicrobianos no leite**. 2001. 106 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Farmácia, Universidade de São Paulo, [S.l.], 2001. Disponível em: <https://teses.usp.br/>. Acesso em: 25 jul. 2020.

LIMA, M. C. G. et al. Contagem de células somáticas e análises físico-químicas e microbiológicas do leite cru tipo C produzido na região Agreste do estado de Pernambuco. **Arquivo Instituto Biológico**, São Paulo, v. 73, n. 1, p. 89-95, mar. 2006. Disponível em: www.biologico.agricultura.sp.gov.br. Acesso em: 25 jul. 2020.

MACEDO, L.; FREITAS, J. Ocorrência de resíduos de antimicrobianos em leite. **Revista de Ciências Agrárias - Amazonian Journal of Agricultural and Environmental Sciences**, América do Norte, 52, mar. 2009. Disponível em: <http://www.ajaes.ufra.edu.br/>. Acesso em: 20 Jul. 2020.

MARTIN, P. et al. Symposium review: novel strategies to genetically improve mastitis resistance in dairy cattle. **Journal Of Dairy Science**, [S.l.], v. 101, n. 3, p. 2724-2736, mar. 2018. <http://dx.doi.org/10.3168/jds.2017-13554>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29331471/>. Acesso em: 20 jul. 2020.

MARTINS, J. D. *et al.* Subclinical mastitis in dairy cattle rural properties Goiás. **Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal**, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 206-214, 2015. <http://dx.doi.org/10.5935/1981-2965.20150019>. Disponível em: <https://repositorio.bc.ufg.br/xmlui/handle/ri/12439>. Acesso em: 25 jul. 2020.

NASCIMENTO, G. G. F.; MAESTRO, V.; CAMPOS, M. S. P. Ocorrência de resíduos de antibióticos no leite comercializado em Piracicaba, SP. **Revista de Nutrição**, [S.l.], v. 14, n. 2, p. 119-124, Ago. 2001. <http://dx.doi.org/10.1590/s141552732001000200005>. Disponível em: <https://www.scielo.br/>. Acesso em: 25 jul. 2020.

NERO, L. A. *et al.* Resíduos de antibióticos em leite cru de quatro regiões leiteiras no Brasil. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, [S.l.], v. 27, n. 2, p. 391-393, jun. 2007. <http://dx.doi.org/10.1590/s0101-20612007000200031>. Disponível em: <https://www.scielo.br/>. Acesso em: 25 jul. 2020.

NETA, F. C. C. N. et al. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE LEITE CRU ARMAZENADO EM TANQUES DE REFRIGERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ALEGRE, ESPÍRITO SANTO. **Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável**, [S.l.], v. 6, n. 3, p. 21-27, 30 set. 2016. <http://dx.doi.org/10.21206/rbas.v6i3.333>. Disponível em: <https://periodicos.ufv.br/>. Acesso em: 25 jul. 2020.

OLIVEIRA, R. R. et al. Determinação do caseinomacropeptídeo em leite UAT por espectroscopia no infravermelho próximo e regressão por mínimos quadrados parciais. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, [S.l.], v. 70, n. 3, p. 946- 956, jun. 2018. <http://dx.doi.org/10.1590/1678-4162-9778>. Disponível em: <https://www.scielo.br/>. Acesso em: 20 jul. 2020.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA. **PADRÃO GERAL CODEX PARA A ROTULAGEM DE ALIMENTOS PRÉ-EMBALADOS: CODEX GENERAL STANDARD FOR THE LABELLING OF PREPACKAGED FOODS**. Roma: Fao, Viale Delle Terme di Caracalla, 1991. Disponível em: www.codexalimentarius.net. Acesso em: 20 jul. 2020.

PEREIRA, A. R. et al. Efeito do nível de células somáticas sobre os constituintes do leite I-gordura e proteína. **Brazilian Journal Of Veterinary Research And Animal Science**, [S.l.], v. 36, n. 3, p. 121-124, jan. 1999. <http://dx.doi.org/10.1590/s1413-95961999000300003>. Disponível em: <https://www.scielo.br/>. Acesso em: 20 jul. 2020.

PEREIRA, J. C. **Vacas leiteiras: aspectos práticos da alimentação**. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2000. 198 p. PERES, 2001).

REIS, G. L. et al. **Procedimentos de coleta de leite cru individual e sua relação com a composição físico-química e a contagem de células somáticas**. *Ciência Rural*, Santa Maria, v. 37, n. 4, p. 1134-1138, 2007.

RIBEIRO, M. G. et al. Microrganismos patogênicos, celularidade e resíduos de antimicrobianos no leite bovino produzido no sistema orgânico. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, [S.l.], v. 29,

n. 1, p. 52-58, jan. 2009. [Http://dx.doi.org/10.1590/s0100-736x2009000100008](http://dx.doi.org/10.1590/s0100-736x2009000100008). Disponível em: <https://www.scielo.br/>. Acesso em: 25 jul. 2020.

ROBIM, M. S. et al. Research fraud in UHT whole milk marketed in the state of Rio de Janeiro and comparison between the methods of physicochemical officers and the method of ultrasound. **Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes**, [S.l.], v. 67, n. 389, p. 43-50, 2012. <http://dx.doi.org/10.5935/2238-6416.20120077>. Disponível em: <https://www.revistadoilct.com.br>. Acesso em: 20 jul. 2020.

ROSA, L. S. et al. Avaliação da qualidade do leite cru e resfriado mediante a aplicação de princípios do APPCC. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, [S.l.], v. 27, n. 2, p. 422-430, jun. 2007. <http://dx.doi.org/10.1590/s0101-20612007000200036>. Disponível em: <https://www.scielo.br/>. Acesso em: 25 jul. 2020.

SAEKI, Erika K.; MATSUMOTO, Leopoldo S. CONTAGEM DE MESÓFILOS E PSICOTRÓFICOS EM AMOSTRAS DE LEITE PASTEURIZADO E UHT. **Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes**, [S.l.], v. 65, n. 377, p. 29-35, nov. 2010. Disponível em: <https://www.revistadoilct.com.br/>. Acesso em: 25 jul. 2020.

SANTOS, M. V.; LARANJA-DA-FONSECA, L. F. **Estratégias para controle de mastite e melhoria da qualidade do leite**. [S.l.]: Manole, 2007. 314 p.

SILVA, F.R. et al. Resíduos de Antibióticos em Leite Cru Refrigerado. In: **I Congresso de Pesquisa e Pós-Graduação do Campus Rio Verde do IFGoiano**. 06 e 07 de novembro de 2012.

SILVA, L. C. C. et al. Heat stability of casein and ethanol stability at 68, 72, 75 e 78%, in bovine milk. **Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes**, [S.l.], v. 67, n. 384, p. 55-60, 2012. <http://dx.doi.org/10.5935/2238-6416.20120008>. Disponível em: <https://www.revistadoilct.com.br/>. Acesso em: 20 jul. 2020.

SILVA, R. C. S. N. et al. Number of judges necessary for descriptive sensory tests. **Food Quality And Preference**, [S.l.], v. 31, p. 22-27, jan. 2014.

[Http://dx.doi.org/10.1016/j.foodqual.2013.07.010](http://dx.doi.org/10.1016/j.foodqual.2013.07.010). Disponível em:
<https://www.sciencedirect.com/>. Acesso em: 20 jul. 2020.

TEIXEIRA, N. M.; FREITAS, A. F.; BARRA, R. B. **Influência de fatores de meio ambiente na variação mensal da composição e contagem de células somáticas do leite em rebanhos no Estado de Minas Gerais**. Revista Arquivo Brasileiro Medicina Veterinária Zootecnia, Belo Horizonte, v. 55, n. 4, p. 491-499, 2003.Campos et al., (2006).

TRONCO, V. M. **Manual para Inspeção da Qualidade do Leite**. 3. ed. Santa Maria: Editora UFSM, 2008; 206p.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. **Chlorine**. [S.l.], 2000. Disponível em: <https://19january2017snapshot.epa.gov/sites/production/files/2016-09/documents/chlorine.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2020.

VALLIN, V. M. et al; Melhoria da qualidade do leite a partir da implantação de boas práticas de higiene na ordenha em 19 municípios da região central do Paraná. **Semina: Ciências Agrárias**, Londrina, v. 30, n. 1, p. 181-188, jan. 2009. Disponível em: <https://www.bvs-vet.org.br/>. Acesso em: 25 jul. 2020.

VIRGINIA TECH. **PUBLICATION 404-400**: Cleaning and Sanitizing Milking Equipment. [S.l.]: Dairy Science, 2009. Disponível em: <https://www.pubs.ext.vt.edu/404/404-400/404-400.html>. Acesso em: 20 jul. 2020.

ZANELA, M. B. **Qualidade do leite em sistemas de produção na região Sul do Rio Grande do Sul**. Revista Pesquisa Agropecuária Brasileira, Santa Maria, v. 41, n. 1, p. 153-159, 2006.

CAPÍTULO 39: AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS CARDÁPIOS DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR DA SERRA DA IBIAPABA – CE

CHAPTER 39: QUALITATIVE EVALUATION OF HOSPITAL FOOD MENU IN SERRA DA IBIAPABA – CE

Afonso Marques da Cunha Filho¹; Patrícia Mesquita²; Valeria Cristina³; Beatriz Brandão⁴.

Resumo

O planejamento do cardápio é de extrema importância em qualquer estabelecimento, pois é através dele que podemos garantir que o cliente irá receber uma alimentação devidamente equilibrada e de qualidade. No caso das unidades hospitalares, é ainda mais importante este planejamento das refeições, de forma a garantir uma alimentação equilibrada nutricionalmente, buscando uma alimentação saudável que ajude na manutenção ou recuperação da saúde do paciente. Este estudo tem como objetivo, portanto, avaliar a qualidade dos cardápios executados de algumas unidades hospitalares das cidades da serra da Ibiapaba, estado do Ceará. A pesquisa utilizou para a análise o método de Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC), elaborado por Proença e Vieros (2003). Foi percebido que as refeições oferecidas pelas unidades avaliadas tiveram uma baixa oferta de verduras, legumes e frutas e que algumas UAN's ainda ofertaram alimentos fontes de enxofre e apresentavam repetições de técnicas culinárias em relação as refeições ofertadas, necessitando, assim, de um maior planejamento nesses quesitos.

Palavras-Chave: Análise Qualitativa, Planejamento de Cardápio, Gastronomia.

Abstract

The planning of meals is of great importance in any establishment, for through it we can ensure towards the client will receive a quality feeding and balanced properly. In case of the hospital units, it is even more important the planning of meals, in order to ensure a nutritionally and balanced diet seeking a healthy feeding that helps with the patient's health maintenance, or your recovery. This study aims to evaluate the quality of the menus from some hospital units of Serra da Ibiapaba, State of Ceará. The research used for analysis the Qualitative Evaluation of the Menu Components - QEMC (in Portuguese: "Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio" (AQPC), elaborated by "Proença e Vieros" (2003). Was observed that the meals offered by units have a few supply of vegetables and fruits, and in some UAN's still offered food sources of sulfur, and presented repetitions of techniques cooking in relation to meals offered, requiring a better planning in these questions.

Keywords: Qualitative Analysis, Menu Planning, Gastronomy.

¹ Agroindústria, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, afonso.filho70@hotmail.com

² Mestre (a), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, patricia.campos@ifce.edu.br

³ Mestre (a), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, valeria.nogueira@ifce.edu.br

⁴ Doutor (a), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, beatriz.brandao@ifce.edu.br

Introdução

A serra da Ibiapaba está localizada na região Nordeste, no estado do Ceará, composta por oito cidades, quais sejam: Carnaubal, Croatá, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, São Benedito, Tianguá, Ubajara e Viçosa do Ceará. O trabalho foi realizado em seis hospitais localizados em seis cidades da região que aceitaram participar da pesquisa, totalizando 184 cardápios analisados.

As Unidades de Alimentação e Nutrição – UAN tem como papel principal proporcionar para os seus comensais uma alimentação equilibrada nutricionalmente, que apresente uma sanidade adequada, previstas por lei, necessária para manter ou recuperar a saúde dos seus consumidores (VEIROS; PROENÇA, 2003).

Dentro das UAN, cabe a um nutricionista a função de planejar a composição do cardápio. Caso o cardápio seja elaborado por outro profissional, antes de ser executado, deve obrigatoriamente passar por aprovação de um nutricionista, pois este profissional é quem vai garantir que o cardápio esteja balanceado para que os comensais tenham uma refeição devidamente equilibrada (SILVA; MARTINEZ, 2008).

O planejamento do cardápio é muito importante, pois é durante a sua elaboração que se decide a finalidade a que se propõe, assim como qual grupo vai atender: se será para indivíduos saudáveis, que tem como objetivo uma alimentação para manter ou melhorar sua saúde e bem-estar ou, ainda, para indivíduos enfermos, grupo com necessidades especiais.

Dentro do universo da saúde, o cardápio e seu dimensionamento pode depender da patologia e das necessidades de uma dieta específica, restrições a determinados alimentos (diabéticos, hipertensos, celíacos etc.). Dentro dessa dimensão, tem-se que considerar o grupo dos intolerantes ou os alérgicos. E também temos o grupo dos vegetarianos que não consome nenhum tipo de carne e o dos veganos que tem uma dieta bem restrita, pois não consome alimentos fontes de proteínas animal (VIEIRA et al., 2015).

O ideal é que o cardápio hospitalar deve respeitar os hábitos alimentares dos pacientes e suas características sociais, religiosas e culturais, sempre levando em conta o hábito alimentar anterior a internação, com o intuito de evitar rejeição e assim evitar problemas de desnutrição e desperdício de alimentos. O cardápio deve ser bem dinâmico e diferenciado buscando a máxima aceitação dos pacientes (ROBERTO, 2013).

Estudo publicado em 2007 avaliou um grupo específico de pacientes cuja doença impacta negativamente o estado nutricional. Os autores observaram recusa alimentar das grandes refeições (almoço e jantar) com preferências por lanches e concluíram o trabalho destacando a importância da aplicação das técnicas de gastronomia e do

desenvolvimento de cardápio especializado com o objetivo de melhorar a ingestão alimentar e, por consequência, o estado nutricional dos pacientes em questão (LINS, 2013, p. 12).

O maior investimento na gestão hospitalar deve ser na qualificação dos funcionários da cozinha, pois boa estrutura não será suficiente se o colaborador não segue todos os princípios da gastronomia, aliados às exigências higiênico-sanitárias. O treinamento deve ser desde a preparação de cortes dos alimentos até a finalização, pois o aspecto visual é muito importante (LINS, 2013).

Segundo Mirshawka (1994), a palavra hospital deriva do latim *hospitalis*, adjetivo derivado de *hospes* (hóspede, estrangeiro, viajante), que também pode ser entendido como “aquele que dá agasalho ou hospeda”. faz uma comparação entre o hospital e hotel, pois ambos possuem um início comum, já que a noção de hospitalidade oferecida por esses locais deu origem à palavra acolhimento. Podemos dizer que hospital e hotel são similares, pois ambos têm o objetivo de hospedar, sendo o hospital destinado a tratar enfermidades e a recuperar a saúde do seu cliente. Já o hotel, por sua vez, oferece um ambiente para descanso mental, físico e até de distração.

No que diz respeito à alimentação, ambos dão ênfases bem diferentes. No hotel, o serviço de alimentação busca compor pratos bem elaborados, bastante valorizados devido a suas montagens, tendo uma equipe de cozinha com grande conhecimento técnico e normalmente com um chef renomado. A principal preocupação da Unidade Produtora de Refeição - UPR do hotel é fornecer uma refeição saborosa que agrade o paladar de seus clientes e claro fornecer uma alimentação segura para manter a saúde de seu comensal.

O Serviço de Nutrição e Dietética - SND inserido no hospital tem como principal objetivo a nutrição do enfermo, atendendo aos aspectos nutricionais e sensoriais (BRITO; BEZERRA, 2013) Dessa forma, a alimentação pode ajudar na promoção e recuperação da saúde com grande importância na melhoria do quadro clínico dos pacientes (BORGES et al., 2006).

Todos sabemos que o ambiente hospitalar ainda continua sendo visto como um lugar com péssima comida e, juntamente com o mal-estar causado pelas enfermidades, esse fato pode diminuir a aceitação das dietas pelos pacientes (SOUSA; GLÓRIA; CARDOSO, 2011). É importante que o nutricionista e a equipe do SND planejem as dietas pensando não somente no fator nutricional, mas também no sensorial para que estimule o paciente a ter uma boa aceitação do cardápio planejado (BRITO; BEZERRA, 2013).

Nos hospitais, diferentemente do hotel, a alimentação é menos elaborada, normalmente sem vida e sem sabor, fazendo com que seja um dos fatores com que o paciente não se alimente

de forma correta ou pelo menos de forma não prazerosa, pois a comida não se torna atrativa. Nos hospitais, a preocupação é garantir uma alimentação microbiologicamente segura e nutricionalmente adequada (PEDROSA, 2007), coerente com o fato de que o ambiente hospitalar normalmente não é um lugar tão aconchegante. Entre um dos poucos serviços que possuem a possibilidade de tornar o tempo de internação mais acolhedor para o enfermo e seus familiares é através da alimentação, que precisa ser capaz não somente de suprir as necessidades básicas para a manutenção e recuperação do paciente (GUIMARÃES, 2007).

O SND é de grande importância, pois se torna responsável pelo acolhimento dos pacientes e familiares (GUIMARÃES, 2007), precisando estar disponível em qualquer momento que seja solicitado, seja por meio do serviço de quarto ou através de lanchonete/restaurante devendo estar à disposição de quem precisar (BOEGER, 2005). O SND deve oferecer cardápios variados para atender também aos públicos que possuem alguma restrição alimentar, não afetando a qualidade nutricional (PEDROSA, 2007).

A enfermeira Nightingale foi uma das primeiras profissionais de enfermagem a falar em seus estudos sobre indicadores de alimentação hospitalar, considerando errados os horários da alimentação e relatos de fome durante o período de internação de pacientes. Sabemos que a alimentação pode trazer várias sensações. Nesse sentido, a gastronomia hospitalar que tem como objetivo unir a dietética prescrita com alimentações saborosas, saudáveis e auxiliar na recuperação do estado nutricional do paciente. Através de suas intervenções técnicas pode proporcionar sensações agradáveis, conforto ou apenas prazer, que podem ajudar a diminuir o sofrimento do paciente hospitalizado (DICKINSON *et al.*, 2005).

A Serra da Ibiapaba localizada no estado do Ceará a 304km da capital Fortaleza sendo reconhecida regionalmente por possuir uma grande variedade de belezas naturais, como cachoeiras e o parque nacional, localizado na cidade de Ubajara, reconhecida também em função do clima frio e a prática de esportes radicais, possui alguns artefatos históricos, tais como engenhos antigos. Os hospitais da serra são de pequeno porte, atendendo aos serviços mais básicos da população, os pacientes com casos mais graves, são transferidos para a cidade de Sobral ou para a capital Fortaleza.

De acordo com os estudos de Souza (2011) as refeições que foram servidas com o foco nos detalhes, tais como a temperatura, a aparência e a cordialidade no serviço oferecido, tendem a aumentar a ingestão pelos enfermos internados reduzindo o desperdício de alimento e a desnutrição. Assim, é de grande importância associar o tratamento assistencial do paciente em uma dieta individualizada por meio de técnicas culinárias, a fim de transformar o ato de se

alimentar prazeroso, sendo este o maior desafio da gastronomia hospitalar. Este trabalho irá estudar o cenário da alimentação dos hospitais das cidades da Serra da Ibiapaba, com ênfase na análise qualitativa das preparações servidas.

Material e Métodos

O estudo foi realizado em hospitais municipais da Serra da Ibiapaba, nas cidades de Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, São Benedito, Ubajara e Viçosa do Ceará, onde foi analisado no hospital municipal de cada cidade. Foi realizado durante o período do mês de agosto a setembro, através de visitas nos hospitais, com base em ofícios da instituição, solicitando o cardápio de cada unidade aos seus gestores. Cada cidade foi identificada por letras, para manter o anonimato dos hospitais.

A amostra foi composta pela descrição do cardápio do almoço. O cardápio foi coletado durante os meses de agosto e setembro e analisado utilizando a ferramenta de Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC), que aponta itens como: monotonia de cores, técnicas culinárias, montagem dos pratos, presença de alimentos com alto teor de enxofre, presença de doces e frituras na mesma refeição.

Este método AQPC tem a finalidade de avaliar a qualidade geral das refeições seguindo os critérios abaixo (VEIROS; PROENÇA, 2003):

- Presença de fritura: Quantas vezes é servido a opção de frituras ou se servido em dias próximos;
- Cores das preparações: Verifica se o cardápio oferece duas ou mais preparações com a mesma cor;
- Presença de enxofre: Verificar se os cardápios oferecem três ou mais alimentos ricos em enxofre, exceto o feijão que não foi considerado por fazer parte dos hábitos alimentares da região consumir feijão todos os dias;
- Folhas na salada: Se o cardápio oferta ou não algum tipo de salada folhosa;
- Frutas na sobremesa: Verifica se o cardápio oferta fruta na alimentação como sobremesa em razão da oferta de fibras, vitaminas e minerais, recomendadas diariamente;
- Doces na sobremesa: Se o Cardápio oferece doces na sobremesa;
- Oferta de fritura e doces no mesmo dia: Verifica se o cardápio oferece doce nas sobremesas no mesmo dia que oferece fritura;
- Conserva na salada;

- Presença de carne gordurosa, esses dois itens apesar de fazerem parte do método AQPC, não foram analisados devido não se encaixarem nos cardápios analisados.

O jogo de cores no prato é de grande importância, pois o fator estético visual são, normalmente, o primeiro atrativo. Foi verificada se existia a monotonia de cores, onde se observaram repetições de cores no prato e/ou também repetições nas técnicas culinárias (frituras, cozidos, grelhados) em dias consecutivos.

Sobre os alimentos ricos em enxofre, não indicados para fins terapêuticos, foram considerados os seguintes alimentos: abacate, acelga, aipo, alho, amendoim, batata-doce, brócolis, castanha, cebola, couve-de-bruxelas, couve-flor, ervilha, gengibre, goiaba, jaca, lentilha, maçã, melancia, melão, milho, mostarda, nabo, nozes, ovo, rabanete, repolho e uva. Foi observado, assim, se os cardápios ofereciam três ou mais alimentos dos que foram citados acima.

Para cada item analisado do método AQPC, foi verificada a quantidade de cardápios adequados e inadequados da região, com apresentação em porcentagem. A adequação seguiu a recomendação de Ginani (2011). Foram consideradas “muito satisfatórias” aquelas que obtiveram adequação acima de 85%; “satisfatórias” de 60 a 84,9%; “insatisfatórias” de 50 a 59,9% e “muito insatisfatórias” de 0 a 49,9%.

Os dados analisados foram realizados por meio de percentuais e a tabulação foi feita pelo programa Microsoft Excel 2016.

Resultados e Discussão

A avaliação da qualidade dos cardápios das UAN, feita através do método AQPC, permitiu que se identificassem características importantes sobre a qualidade nutricional das refeições oferecidas nas unidades hospitalares da serra. Dos itens analisados em ambos cardápios (Pacientes e Funcionários), o que mais está em adequação é o das sobremesas (doces), tendo em vista que nenhuma das unidades oferece doce para os pacientes e funcionários. Dentre os cardápios analisados, foi possível perceber que nenhum oferecia mais de uma escolha de opção de carne ou acompanhamentos. Somente em alguns casos isolados a refeição é preparada de forma diferenciada, diferenciando a dieta de pacientes e funcionários (Tabela 1 e 2; Gráficos 1 e 2)

O cardápio das cidades A e E é o mesmo para pacientes, acompanhantes e funcionários.

O primeiro item avaliado foi a presença de frutas na refeição, sendo que apenas três cidades ofertam frutas em ambos os cardápios paciente e funcionários. Os cardápios das cidades A e B ofertam uma porção durante três dias da semana, sendo servido suco de fruta nos outros

dias. A cidade A só oferece abacaxi e é acompanhando uma salada cozida ou crua. Já a cidade D oferece diariamente uma porção de fruta. As mais críticas, são as cidades C, E e F que não ofertam nenhuma porção nos cardápios.

Tabela 1. Percentual de porções servidas nos cardápios oferecidos para os pacientes das unidades hospitalares, no mês de agosto/setembro, da Serra da Ibiapaba, 2018.

Itens analisados do cardápio	Cidades						Região	%
	A	B	C	D	E	F		
Fruta	12	12	0	28*	0	0	52	28,3
Folhosos	0	0	0	0	0	0	0	0
Cores iguais	8	0	0	0**	20	0	28	10,9
Ricos em enxofre	8	8	0	0	0	20	36	19,6
Doce	0	0	0	0	0	0	0	0
Fritura	4	0	0	0	0	0	4	0
Fritura + Doce	0	0	0	0	0	0	0	0
Técnicas de Preparo	20	12	31	31	8	20	122	66,3
Total de cardápios	31	31	31	31	30	30	184	100

Fonte: Elaborada pelo autor. (2018)

Tabela 2: Percentual de porções servidas nos cardápios oferecidos para os funcionários das unidades hospitalares, no mês de agosto/setembro, da Serra da Ibiapaba, 2018.

Itens analisados do cardápio	Cidades						Região	%
	A	B	C	D	E	F		
Fruta	12	20	0	31	0	0	63	34,2
Folhosos	0	24	0	16	0	0	40	21,7
Cores iguais	8	0	0	1	20	0	29	11,4
Ricos em enxofre	8	12	4	12	0	20	56	30,4
Doce	0	0	0	0	0	0	0	0
Fritura	4	4	4	4	0	4	20	10,86
Fritura + Doce	0	0	0	0	0	0	0	0
Técnicas de Preparo	20	0	20	3	8	4	55	29,89
Total de cardápios	31	31	31	31	30	30	184	100

28* O cardápio oferta frutas diariamente. Porém, está descrito nele que a fruta pode ser substituída por suco, dependendo da disponibilidade.

Fonte: Elaborada pelo autor. (2018)

O item de monotonia de cores apresentou dificuldade ao ser analisado, pois alguns cardápios não detalhavam os ingredientes usados. Diante da análise realizada, verificou-se que a cidade E apresentou mais monotonia de cores. A monotonia de técnicas culinárias também foi observada em todas as unidades. As cidades C e D apresentaram mais repetições com opções cozidas diariamente, destacando que a cidade C ofereceu frango com legumes, picadinho de carne com legumes ou carne moída com legumes. Enquanto a cidade D ofereceu apenas carne moída com legumes.

Fazendo uma comparação nos cardápios dos funcionários e pacientes, podemos perceber que o cardápio dos funcionários tem mais alimentos ricos em enxofre. No cardápio dos pacientes das cidades A, B e F apresentaram alimentos flatulentos na composição do prato. Analisando o cardápio dos funcionários, apenas a cidade E não apresentou a presença de

alimento rico em enxofre. A cidade D ofertava batata doce como purê ou era cozida no feijão e a cidade B oferecia salada de repolho. Nas outras cidades, o alimento causador de flatulências foi a cebola, sendo ofertada em farofa acebolada ou nos bifes acebolados. Vale ressaltar que não foi informado no cardápio o uso de cebola como tempero das preparações. Mas sabe-se que culturalmente é bastante comum usar cebola e alho como temperos básicos para quase todas as preparações.

Gráfico 1. Percentual de porções servidas nos cardápios oferecidos para os pacientes das unidades hospitalares, no mês de agosto/setembro, da Serra da Ibiapaba, 2018.

Fonte: Elaborada pelo autor. (2018)

Gráfico 2. Percentual de porções servidas nos cardápios oferecidos para os funcionários das unidades hospitalares, no mês de agosto/setembro, da Serra da Ibiapaba, 2018.

Fonte: Elaborada pelo autor. (2018)

Na cidade D, os folhosos foram padrão para todos os dias do cardápio. Porém, apresentou como desvantagem a oferta diária de salada crua, que pode causar uma monotonia alimentar e também aumentar a formação de gases fermentadores, dependendo dos ingredientes das saladas.

Nos cardápios da cidade D, o critério mais alarmante foi a monotonia das preparações dos pacientes, considerando que a preparação é padrão para todos os dias. Ou seja, diariamente são servidos: Arroz, Feijão, Macarrão e Carne Moída com Legumes. Mas vale ressaltar que todas as unidades são de pequeno porte. Logo, o fluxo de pacientes internados é curto, permanecendo no hospital por 48h, aproximadamente.

As técnicas de preparação da cidade D demonstraram poucas repetições, sendo o assado a técnica que mais se repetia. Destaca-se que o cardápio apresentava sucos diferenciados, com adição de pepino, couve e o hospital participa do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que recebe alimentos de agricultura familiar. Então, não tem ingredientes fixos, pois o cardápio é elaborado de acordo com a entrega do PAA.

De acordo com o método AQPC, também são analisados itens como conservas, carnes gordurosas e duas ou mais frituras no mesmo dia. Porém, os cardápios elaborados não eram muito explicativos. E, como foram analisados apenas o almoço, com apenas uma opção de carne, não foi possível analisar o item de duas ou mais frituras servidas no mesmo dia.

De acordo com o método aplicado, foi possível verificar que algumas unidades de alimentação não atendem aos itens avaliados pelo método AQPC, o que compromete o consumo variado de nutrientes.

O consumo de Frutas, Legumes e Verduras (FLV) são fontes de fibras dietéticas, que são substâncias não digeríveis pelo nosso organismo. As fibras fazem um papel de reguladoras, onde trabalham para a funcionalidade correta do intestino, além de ajudar na redução dos níveis de colesterol (FERRARI; TORRES, 2002).

A pirâmide alimentar brasileira determina que deve ser consumido no mínimo três porções de frutas por dia com o objetivo de reduzir as doenças cardiovasculares e até mesmo alguns tipos de câncer (BRASIL, 2014). Nenhuma UAN oferece folhosos na alimentação dos pacientes e pesquisas mostram que os compostos presentes em frutas, legumes e verduras apresentam substâncias químicas com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, de grande importância para a prevenção de doenças (BRASIL, 2014).

A monotonia de cores foi um dos itens que foi considerado satisfatório. No entanto, não foi possível analisar com maior precisão, tendo em vista que o cardápio foi analisado somente formalmente. O jogo de cores na montagem do prato é muito importante, pois uma montagem com cores iguais não despertam interesse do comensal e isso pode trazer várias consequências, como o aumento do desperdício da refeição e aumento do tempo de internamento hospitalar, diante do baixo consumo de nutrientes (PEREZ et al. 2002; VEIROS; PROENÇA, 2003; SOUSA et al., 2005).

De acordo com o Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional Hospitalar - IBRANUTRI (que tem como objetivo de investigar a desnutrição hospitalar no Sistema Único de Saúde - SUS, realizado em 12 estados brasileiros, totalizando 25 hospitais e 4 mil pacientes), foi possível observar uma média de 48,1% de desnutrição hospitalar, sendo 12,6% desnutridos graves e 35,5% moderados. Também foi possível observar que a região mais crítica foi a Norte/Nordeste, ficando com 36,1% nutridos, 43,8% desnutridos moderados e 20,1% desnutridos graves (WAITZBERG et al., 2001).

Ao analisar os cardápios, foi possível perceber que apenas um oferecia pratos regionais, conhecido como Maria Isabel. Corbeau (1998) cita em um de seus trabalhos que o setor da alimentação hospitalar tem por dever conhecer os hábitos culturais do local e dos pacientes, pois a alimentação é mais do que o ato de nutrir. Ou seja, é fonte de prazer, faz parte da manutenção da vida e auxilia na reconstrução da saúde.

Durante o preparo das refeições é importante que os sabores devam estar em equilíbrio sendo eles os ácidos, salgado, apimentado, amargo, doce, picante, suave, azedo, sempre tomando cuidado para que não se repitam. Diversificar os métodos de alguns componentes do prato deixam a refeição variada em sua aparência e no sabor (TEICHMAN, 2000).

Segundo Bezerra (2003), em seu trabalho em uma unidade hospitalar com o objetivo de verificar o que fazer para melhorar a refeição, verificou-se que as principais sugestões são: acrescentar mais tempero; variar mais a carne e o cardápio; aumentar a quantidade de frutas; melhorar a decoração dos pratos e melhorar a apresentação das refeições.

Nos gráficos 3 e 4 que mostram os níveis de adequação dos cardápios, foi possível verificar um baixo consumo de frituras nos cardápios dos pacientes e funcionários, apresentando 97,8% e 89,1%, respectivamente. Com isso os cardápios ficaram no grupo dos muito satisfatórios. Segundo Souza (2017), em uma pesquisa utilizando o método (AQPC) para cardápios de UANs institucionais, do tipo hospitalar, restaurante universitário e empresas que forneciam refeição aos seus colaboradores. Apresentou os níveis de fritura parecido com o encontrado no atual trabalho, ficando também no grupo dos muito satisfatórios, com 87,18% de adequação.

Infelizmente, não foi possível analisar alguns itens e um deles foi as carnes gordurosas, pois nenhum dos seis cardápios analisados especificou o tipo de carne servida. O consumo de carnes gordurosas não é benéfico para os comensais, pois pode elevar os níveis de colesterol e triglicerídeos, entre outras disfunções nos organismos (GIONGO; CABRAL, 2012).

Gráfico 3. Percentual de adequação e inadequação dos cardápios dos pacientes, segundo os critérios da Avaliação da Qualidade das Preparações dos Cardápios da Serra da Ibiapaba, 2018.

Fonte: Elaborada pelo autor (2018)

Gráfico 4. Percentual de adequação e inadequação dos cardápios dos funcionários, segundo os critérios da Avaliação da Qualidade das Preparações dos Cardápios da Serra da Ibiapaba, 2018.

Fonte: Elaborada pelo autor. (2018)

Conclusões

Conclui-se que as refeições oferecidas tiveram uma baixa oferta de FLV, principalmente de folhosos. Os cardápios dos pacientes apresentaram poucas opções de alimentos fontes de enxofre em comparação com a dos funcionários, o que vem ajudando para reduzir o desenvolvimento de gases formadores em pacientes internados no hospital.

O item de maior adequação foi a oferta de doces, tanto no cardápio de pacientes como no de funcionários, que apresentaram 0% de oferta.

A gastronomia hospitalar surgiu para intervir na alimentação hospitalar e transformar uma refeição pobre em temperos e condimentos. Ainda é muito complicado trabalhar com o realce do sabor nessas unidades, pois a gastronomia hospitalar encontra muitos desafios, diante de várias restrições de ingredientes básicos utilizados para conferir mais sabor as refeições. Sem contar, ainda, o fato de que também exige muita criatividade.

Outro desafio é a inclusão de pratos regionais, pois isso implica em uma maior aceitação do cardápio, considerando os hábitos culturais juntamente com o uso das técnicas dietéticas adequadas.

Referências

BEZERRA, A. C. **Gastronomia na prescrição de dietas hospitalares e as influências geradas pela indústria hoteleira**. 2003. 47p. Monografia (especialização) Universidade de Brasília. Centro de Excelência em Turismo. Brasília, 2003.

BOEGER, M. A. **Gestão em hotelaria hospitalar**. São Paulo: Atlas, 2005.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Guia alimentar para a população brasileira: promovendo a alimentação saudável**. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

BRITO, L. F.; BEZERRA, V. M. Avaliação qualitativa das preparações do cardápio de uma unidade de Vitória da Conquista. **Alimentos e Nutrição Araraquara**, Bahia, v. 24, n. 2, p. 158, 2013.

CORBEAU, J. P. S'alimenter à l'hôpital: les dimensions caches de la commensalité. In: **Assistance Publique:Hôpitaux Paris, L'appétit vient en mangeant! Histoire de l'alimentation à l'hôpital**. XV – XX siècle. Paris: Edoine Editeurs e Musée de l' Assistance Publique, 1998. p. 101-14.

DICKINSON, A.; WELCH, C.; AGER, L.; COSTAR, A. Hospital Mealtimes: action research for change? **Proceedings of the Nutrition Society**, v. 64, n. 3, p. 269-275, 2005.

FERRARI, C. K. B.; TORRES, E. A. F. S. Alimentos funcionais: quando a boa nutrição melhora a nossa saúde. **Revista Portuguesa de Saúde Pública**, Lisboa, v. 20, n. 2, 2002, p.31-34

GINANI, V. C. **Avaliação da qualidade nutricional, sensorial e cultural de cardápios populares**. 2011, 131 f., tese (Pós-graduação em Nutrição Humana) - Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade de Brasília, Brasília, 2011

GIONGO, V.; CABRAL, L. Avaliação do Risco Potencial de Doenças Coronarianas em Dietas com Alto Consumo de Carnes Vermelhas. Estudo Investigativo sobre Indicadores de Câncer Colorretal. **Revista Eletrônica Novo Enfoque**, 2012, 15(Edição Especial): 20-24.

GUIMARÃES, N.V. **Hotelaria hospitalar: uma visão interdisciplinar**. São Paulo: Atheneu, 2007.

LINS, Magnoni. Gastronomia hospitalar: conceitos e verdades. In: ROBERTO, T. S. Gastronomia hospitalar no conceito do comfort food. São Paulo: Livraria brasileiro, 2013. p.34-35.

MIRSHAWKA, V. **Hospital: fui bem atendido, a vez do Brasil**. São Paulo: Makron Books, 1994.

PEDROSA, C. G. **Cuidado alimentar e nutricional ao paciente hospitalizado: elementos para a construção de um modelo fundamentado na humanização**. 2007, 133 f. Dissertação(Mestrado). Florianópolis: UFSC, 2007.

PEREZ, J.I.U.; PICÓN, C.M.J.; BENAVENT, E.G.; A. ALVAREZ, E.M. Detección precoz y control de la desnutrición hospitalaria. **Nutr Hosp** 2002; v. 17, n. 3, p. 139-146.

PROENÇA, R.P.C.; SOUSA, A.A.; VEIROS, M.B.; HERING, B. **Qualidade nutricional e sensorial na produção de refeições**. Florianópolis: UFSC, 2005. 221 p.

ROBERTO, T. S. Gastronomia hospitalar no conceito do comfort food. São Paulo: Livraria brasileiro, 2013. 5p.

SILVA, S. M. C. S.; MARTINEZ, S. **Cardápio: guia prático para elaboração**. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 279p.

SOUSA, A. A.; GLORIA, M.S.; CARDOSO, T. S. Aceitação de dietas em ambiente hospitalar. **Revista de Nutrição**, v. 24, n. 2, 2011, p.287-294.

SOUZA Y. D. C. **Análise da qualidade de cardápios de unidades de alimentação e nutrição de Goiânia – GO. 2017**. Monografia (Graduação em Nutrição) Faculdade de Nutrição(fanut), Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017.

SOUZA, M.D.; MIYOKO, N. **A Gastronomia Hospitalar Auxiliando na Redução dos Índices de Desnutrição entre pacientes Hospitalizados**. O Mundo da Saúde, 35(2), pp. 208-214, são Paulo, 2011.

TEICHMAN, I. M. **Cardápios - técnicas e criatividade**. Caxias do Sul: EDUCS, 2000. (Hotelaria).

VEIROS, M.B.; PROENÇA, R.P.C. Avaliação qualitativa das preparações do cardápio de uma unidade de alimentação de nutrição – método AQPC. **Nutrição em Pauta**, São Paulo, v.12, n. 62, set./out. 2003, p. 36-42.

VIEIRA, M. N. C. M.; JAPUR C. C. **Gestão da qualidade na produção de refeições**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.

WAITZBERG, D.L.; WALESKA, T.; CAIAFFA, M.D. CORREIA, I.T.D. Hospital malnutrition: the Brazilian National Survey (IBRANUTRI): A study of 4000 patients. **Nutrition**, v. 17, n.7/8, 2001, p. 553-580.

CAPÍTULO 40: BOAS PRÁTICAS NA FABRICAÇÃO DE BOMBONS ARTESANAIS E PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE

CHAPTER 40: GOOD PRACTICES IN THE MANUFACTURE OF HANDMADE CHOCOLATE AND CRITICAL CONTROL POINTS

Ângela Christina Conte Theodoro¹; Ana Lúcia Lima²; Juliana Rodrigues Donadon³ Danielle Bogo⁴; Raquel Pires Campos⁵

Resumo

O chocolate apresenta grande consumo e na forma de bombons tem importante aceitação pelo consumidor e influência em sua apresentação. O objetivo do trabalho foi avaliar os possíveis perigos na fabricação de bombons artesanais e identificar os pontos críticos de controle para segurança e qualidade durante a fabricação, visando oferecer um produto com qualidade e segurança para o consumidor. Foi realizada uma observação *in loco* da produção de bombons caseiros no município de Campo Grande – MS, caracterizando um estudo de caso. O estabelecimento de produção artesanal de bombons apresentou 54,79 % dos itens em conformidades na lista de verificação das Boas Práticas de Fabricação. Foram identificados os seguintes Pontos Críticos de Controle: desenformação, embalagem, refrigeração, armazenamento e transporte. Portanto, é necessária a padronização do processo de fabricação artesanal e um adequado controle higiênico-sanitário tanto do local de produção, quanto dos manipuladores e a forma que os bombons serão comercializados.

Palavras-Chave: chocolate, qualidade, segurança.

Abstract

Chocolate is widely consumed and in the form of handmade chocolates it has important acceptance by the consumer and influences its presentation. The objective of the work was to evaluate the possible dangers in the manufacture of handmade chocolates and to identify the critical points of control for safety and quality during manufacture, aiming to offer a product with quality and safety to the consumer. An on-site observation of the production of homemade chocolates was carried out in the municipality of Campo Grande – MS, featuring a case study. The establishment of production of chocolates handmade presented 54.79 % of the items in conformity in the checklist of Good Manufacturing Practices. The following Critical Control Points were identified: removal from the mold, packaging, refrigeration, storage and transportation. Therefore, it is necessary to standardize the artisanal manufacturing process and adequate hygienic-sanitary control both at the place of production and at the handlers and the way that the chocolates will be marketed.

Keywords: chocolate, quality, safety.

¹ Tecnóloga em Alimentos, UFMS, angelachristiina@gmail.com

² Tecnóloga em Alimentos, UFMS, analulima2010@hotmail.com

³ Doutora de Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste, UFMS, daniellebogo@gmail.com

⁴ Doutora em Agronomia, UFMS, julianadonadon@yahoo.com.br

⁵ Doutora em Agronomia, UFMS, raquel.campos@ufms.br

Introdução

O bombom é originário da Espanha e logo se difundiu pela Europa, com diversas simbologias, sendo consumido principalmente como um alimento divino (BATISTA, 2008). Cristóvão Colombo foi quem trouxe as sementes de cacau para Europa (DIOGO et al., 2015) e durante muitos anos o chocolate foi consumido como alimento quente, somente após a revolução industrial passou a ser popular e consumido em forma de tabletes, ganhando assim, consumo nas diferentes classes sociais (BATISTA, 2008).

O chocolate é definido como uma mistura de derivados de cacau (*Theobroma cacao* L.), massa, pasta ou licor de cacau, cacau em pó e/ou manteiga de cacau, de forma e consistência variada, com adição de outros ingredientes, contendo no mínimo 25 % (g. 100 g⁻¹) de sólidos totais de cacau, podendo conter recheio e/ou cobertura (BRASIL, 2005; LUBAS et al., 2016).

O bombom de chocolate é um produto constituído de chocolate ou por um núcleo formado de recheios diversos como pedaços de frutas *in natura* ou secas, oleaginosas, leite, licores, cremes, entre outros, recobertos por uma camada de chocolate ou glacê (DIOGO et al., 2015).

O processo de fabricação de bombons artesanais é feito a partir do chocolate industrial, que é obtido da mistura de cacau, açúcar e leite em pó, denominada massa de chocolate. É elaborado com diversas variações dependendo do tipo de bombom que se quer produzir. Os produtos elaborados em casa, sem equipamentos próprios tendem a ter maior chance de contaminação, pois são produzidos das mais diversas formas e lugares, podendo haver ineficiência dos procedimentos de higiene pessoal e de sanitização das superfícies de manipulação, bem como dos vasilhames a serem utilizados (BATISTA, 2008).

Para estes alimentos destinados ao consumo humano, torna-se necessária a fiscalização de órgãos competentes, padronização do procedimentos de higiene operacional e implementação de Boas Práticas de Fabricação (BRASIL, 2013). Com a crescente preocupação referente a qualidade e segurança dos produtos comercializados e consumidos, tem-se incentivado o desenvolvimento e a criação de regulamentações e ferramentas como forma de garantir ao consumidor de produtos artesanais, a mesma qualidade dos produtos produzidos de forma industrial (TEJEDA, 2012).

Para tanto, foi implantada a RDC n° 49 de 31 de outubro de 2013 que apresenta diretrizes de proteção da produção de alimentos em pequena escala que convergem com ações da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) que visam a valorização das culturas alimentares e o estímulo a circuitos regionais de produção, distribuição e consumo de alimentos (CINTRÃO, 2017).

O uso de ferramentas como as Boas Práticas de Manipulação (BPM) e Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) tornam os produtos aptos ao consumo humano e satisfação dos clientes com normas e procedimentos para atingir um determinado padrão de qualidade de um produto ou de um serviço na área de alimentos (ROSA, 2015).

É necessário a avaliação das Boas Práticas de Fabricação nas entidades que produzem alimentos, tensionando assim a melhoria das condições de higiene e saúde que abrangem a fabricação dos produtos, de modo que se obtenha um diagnóstico da situação, propondo ajustes e/ou aperfeiçoamento (DE OLIVEIRA et al., 2020).

A fabricação dos bombons caseiros tem um caráter puramente artesanal, podendo originar um produto sem garantia de segurança microbiológica, com consequências danosas aos consumidores. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2011), as BPF constituem um conjunto de princípios e regras para o correto manuseio do alimento abrangendo desde as matérias-primas até o produto final.

A implantação do sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) na fabricação de bombom artesanal atenderá as exigências dos consumidores, cada vez mais preocupados em saber como foram produzidos seus alimentos. O sistema APPCC é uma das ferramentas de qualidade, prevista em legislação, com a finalidade de prevenir e garantir a inocuidade e segurança dos alimentos por meio do controle de perigos. A implementação dessa ferramenta deve ser elaborada com base nas características do estabelecimento. Associado aos programas de BPF e aos POPs, são ferramentas essenciais para a gestão da qualidade nos locais produtores de alimentos (SALGADO et al., 2020).

O sistema é baseado em etapas inerentes ao processamento industrial dos alimentos, desde a obtenção da matéria-prima até o consumo e fundamenta-se em identificar os perigos potenciais à saúde do consumidor e medidas de controle de condições que possam gerar riscos. Os perigos analisados podem ser físicos, químicos e/ou biológicos (RIBEIRO-FURTINI; ABREU, 2006). Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar os pré-requisitos de Boas Práticas de Fabricação do bombom artesanal e identificar os Pontos Críticos de Controle para segurança e qualidade durante a fabricação.

Material e Métodos

Foi utilizada uma abordagem qualitativa na modalidade de estudo de caso (GIL, 2008). Um diagnóstico do local e do processo de produção de bombons foi realizado com base na estrita observação *in loco* da produção artesanal numa residência na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, entre os meses de março a junho de 2017. De maneira mais detalhada

foram avaliados os seguintes itens: edificação e instalações, equipamentos, móveis e utensílios, manipuladores, produção e transporte do alimento e documentação. O instrumento utilizado foi o *checklist* contido na RDC n. 275 de 21 de outubro de 2002, como método de identificar a aplicação dos pré-requisitos: Boas Práticas de Fabricação e Procedimento Padrão de Higiene Operacional. A porcentagem em conformidade foi classificada de acordo com a legislação: GRUPO 1 – 76 a 100 % de atendimento aos itens; GRUPO 2 - 51 a 75 % de atendimento aos itens; GRUPO 3 - 0 a 50 % de atendimento aos itens (BRASIL, 2002).

Acompanhou-se a rotina de produção, armazenamento e expedição sem intervenção. Um diagrama de blocos foi elaborado com todas as etapas de produção. Os Pontos Críticos de Controle foram apontados por meio da observação do processamento dos bombons e uso de árvore decisória conforme a ocorrência dos perigos físicos, químicos e microbiológicos.

Resultados e Discussão

Processo de produção e avaliação higiênico-sanitária

O processo de produção é manual e artesanal, e os utensílios e equipamentos são de uso comum com os demais moradores da residência. A formulação básica do bombom elaborado tem como insumos o chocolate em barra, leite condensado, creme de leite e coco ralado. Os resultados da avaliação das condições higiênico-sanitárias da produção de bombons artesanais alertam para a necessidade de implementação das Boas Práticas de Fabricação, pois foram observadas falhas nos requisitos analisados (Tabela 1).

Classificação segundo as BPF

Quanto as conformidades nos itens da lista de verificação das Boas Práticas de Fabricação em estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos, pelo valor médio das conformidades de 54,79 % este estabelecimento pertence ao GRUPO 2 - 51 a 75 % de atendimento dos itens avaliados (BRASIL, 2002).

Conformidades das condições de edificação e instalações

Quanto ao quesito edificação e instalações obteve-se média de 67,67 % de conformidade, onde foi observado que o acesso ao local de preparo é de uso comum a outros usos, as janelas e portas não tem proteção contra insetos e animais domésticos, assim como a falta de proteção adequada nas luminárias.

As paredes eram todas revestidas de material impermeável e de fácil limpeza, assim como o piso que estava em boas condições de conservação e era de cor clara. Embora estes aspectos não representem riscos imediatos à qualidade dos produtos elaborados, podem levar a um conjunto de comportamentos que causam problemas de qualidade. Entre os graves

problemas notados pode-se destacar: a falta de lavatórios específicos para a higienização das mãos e descarte de resíduos inadequados.

Tabela 1. Avaliação da conformidade dos itens verificados no *checklist* das Boas Práticas de Fabricação na produção de bombons artesanais em Campo Grande – MS.

Itens de Verificação	Conformidade (%)
1. Edificação e instalações	67,67
1.1 Área externa	50
1.2 Acesso	0
1.3 Área interna	100
1.4 Piso	100
1.5 Tetos	100
1.6 Paredes e divisórias	66,6
1.7 Porta	66,6
1.8 Janelas e outras aberturas	66,6
1.9 Escadas, elevadores de serviço, estruturas auxiliares	NA
1.10 Instalações sanitárias e vestiários para os manipuladores	19,9
1.11 Instalações sanitárias para os visitantes e outros	100
1.12 Lavatórios na área de produção	100
1.13 Iluminação e instalações elétricas	66,6
1.14 Ventilação e climatização	50
1.15 Higienização das instalações	44,4
1.16 Controle integrado de vetores e pragas urbanas	66,6
1.17 Abastecimento de água	38,46
1.18 Manejo dos resíduos	100
1.19 Esgoto sanitário	100
1.20 Leiaute	50
2 Equipamentos, móveis e utensílios	76,35
2.1 Equipamentos	50
2.2 Móveis (mesas, bancadas, vitrines, estantes)	100
2.3 Utensílios	100
2.4 Higienização dos equipamentos e maquinários, móveis e utensílios	55,5
3 Manipuladores	41,65
3.1 Vestuários	33,3
3.2 Hábitos higiênicos	66,6
3.3 Estado de saúde	0
3.4 Programa de controle de saúde	0
3.5 Equipamentos de proteção individual	0
3.6 Programa de capacitação dos manipuladores e supervisão	0
4 Produção e transporte do alimento	26,24
4.1 Matéria-prima, ingredientes e embalagens	9
4.2 Fluxo de produção	0
4.3 Rotulagem e armazenamento do produto final	22,22
4.4 Controle de qualidade do produto final	0
4.5 Transporte do produto final	0
5 Documentação	0
5.1 Manual de Boas Práticas de Fabricação	0
5.2 Procedimentos Operacionais Padronizados	0
Média geral de conformidades	54,79

Fonte: Adaptado da RDC nº 275 (2002).

Conformidade das condições dos equipamentos, móveis e utensílios

Referente aos equipamentos, obteve-se média de 50 % de conformidade. Móveis como mesas, bancadas, vitrines e estantes e os utensílios estavam 100 % em conformidade segundo a RDC 275 (BRASIL, 2002). Porém, no quesito higienização desses itens, o índice de conformidade reduziu para 55,5 %.

Conformidade das condições dos manipuladores

Referente aos manipuladores, observou-se ausência de calçados e vestimentas adequados para a produção de alimentos, ausência de registros do estado de saúde dos funcionários e hábitos higiênicos incorretos devido à falta de local adequado para lavagem das mãos. A higienização correta e frequentemente das mãos e a higiene pessoal são hábitos essenciais para a manutenção da qualidade dos alimentos (LOVATTI, 2004). Notou-se também que não há programa de controle de saúde dos manipuladores, falta do equipamento de proteção individual e um programa de capacitação dos manipuladores e supervisão.

Conformidades das condições da produção e transporte

Em relação à produção e transporte do alimento obteve-se 26,24 % de conformidade (Tabela 1). A prática de armazenamento foi uma das principais falhas das produções analisadas, uma vez que pode ser determinante para a qualidade do produto final pois, no local os produtos eram armazenados em mesmo refrigerador de uso comum com os demais moradores da residência. Sousa et al. (2010), também citaram o armazenamento como uma das principais falhas observadas durante a produção de bombons de chocolate com recheio de frutas.

Conformidades da documentação

Constatou-se que o estabelecimento não possuía Manual de Boas Práticas (BPF), nem os Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) e nem conhecimento a respeito do assunto, o que resultou em 100 % de inconformidade para o item documentação (Tabela 1). O resultado encontrado é similar ao de Sousa et al. (2010), que também constataram que os fabricantes de bombom com recheio de frutas não possuíam o Manual de Boas Práticas de Fabricação e nem os Procedimentos Operacionais Padronizados.

Estes têm importância fundamental em locais produtores de alimentos, pois descrevem as operações realizadas, como requisitos sanitários, manutenção e higienização das instalações, equipamentos e utensílios, o controle da água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, controle da higiene e saúde dos manipuladores, tendo em vista a garantia da qualidade do produto final (SILVA JUNIOR, 2002). Os PPHO são considerados críticos na cadeia produtiva de alimentos. Para tal, recomenda-se a adoção de programas de monitoramento, registros, ações de correção e a aplicação constante do *checklist* (RIBEIRO-

FURTINI; ABREU, 2006) a fim de evitar possíveis problemas.

A falta de conscientização sobre as Boas Práticas de Fabricação, a falta de controle da temperatura do ambiente de armazenamento do chocolate e formulação das trufas com alto teor de umidade foram as principais causas de contaminação por mofo em trufas de chocolate constatados numa fábrica na região metropolitana do Recife (CORREA; DE OLIVEIRA, 2017).

Desta forma a implementação das BPFs e POP's favorecem um melhor desempenho na produção de alimentos, garantindo segurança e qualidade dos produtos (BRASIL, 1997) e são considerados pré-requisitos do APPCC (BRASIL, 1998).

Processo produtivo e PCC

O processo produtivo e pontos críticos de controle foram descritos em diagrama de blocos (Figura 1). No processo de produção, foram introduzidos pontos de controle às etapas de armazenamento, transporte, resfriamento, desenformar e embalar. Estes pontos passaram a ser controlados, pois sabe-se que o chocolate não pode ser manuseado em ambiente com temperatura elevadas ou muito baixas como também, deve ser manuseado em ambiente com umidade relativa controlada.

O espaço disponível para produção, armazenamento de matérias-primas, insumos e produtos é limitado e de uso comum com outras atividades do manipulador, onde a produção é realizada em uma cozinha doméstica de uso comum entre os moradores da residência, sendo inviável um fluxo de produção ordenado. A falta de qualificação e treinamento para a produção de bombons pode ocasionar produtos sem garantia de segurança microbiológica, com sérias consequências ao produto final e também ao consumidor (BATISTA, 2008).

A Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle tem grande importância na indústria de alimentos pois, possibilita a garantia de produtos sem quaisquer contaminantes. A análise é realizada durante a fabricação, permitindo o controle da transformação da matéria-prima em produto final. Esse controle rigoroso proporciona maior qualidade e segurança, redução de perdas e retrabalho no processo produtivo (QUINTINO; RODOLPHO, 2018).

No processamento do bombom as etapas que requerem atenção são: resfriamento, desenformação, embalagem, armazenamento e transporte, conforme os Quadros 1, 2, 3, respectivamente.

Figura 1. Diagrama de blocos da produção de bombons artesanais em Campo Grande – MS.

Fonte: Própria (2020).

Resfriamento

Quadro 1. Pontos Críticos de Controle para etapa de resfriamento da produção de bombons artesanais em Campo Grande – MS.

Perigo para qualidade e segurança	Físico: temperatura inadequada ^a Biológicos: microrganismos patogênicos ^a
Medidas preventivas	Equipamento para uso exclusivo para armazenar o produto ^b Controle de tempo e temperatura de refrigeração com uso de medidores de temperatura ^b Resfriamento rápido ^b
Risco	Alto ^a
Severidade	Alto ^a
Limite crítico	Estocagem $\leq 7^{\circ}\text{C}$ ^b
Monitoramento	O quê? Temperatura adequada e tempo de resfriamento ^a Como? Medição e registro de tempo e temperatura de resfriamento ^a Quando? Controle diário de estoque e registrador contínuo de temperatura ^a Quem? Funcionário responsável pelo processamento do bombom ^a
Ação corretiva	Controle de tempo e temperatura de resfriamento ($4^{\circ}\text{C} - 5^{\circ}\text{C}$) ^a
Verificação	Calibração dos instrumentos de medição de temperatura. Supervisão ^a
Registro	Registrar planilhas de controle de temperatura de resfriamento com assinatura do responsável e data de recebimento ^a

Fonte: Própria (2020) ^a e adaptado de SEBRAE (2000) ^b.

Para a fabricação dos bombons o resfriamento ocorre no momento da formação de “casquinha” de chocolate nos moldes preenchidos de chocolate derretido, em várias etapas para haver engrossamento deste revestimento. Em escala industrial, as formas de bombom passam pelo túnel de resfriamento para endurecer e atingir as condições ideais para o desenforme (PINTO; THEODORO, 2017).

Desenforme e embalagem

Quadro 2. Pontos Críticos de Controle para etapa de desenforme e embalagem da produção de bombons artesanais em Campo Grande – MS.

Perigo para qualidade e segurança	Recontaminação e/ou multiplicação de microrganismos patogênicos ^a
Medidas preventivas	Uso de EPI adequado na etapa de retirada do bombom dos moldes ^a Armazenamento adequado das embalagens ^a Higiene adequada do manipulador ^b Controle de temperatura do ambiente ^b
Risco	Baixo ^a
Severidade	Alto ^a
Limite crítico	Coliformes a 45 °C: 10 UFC/cm ² plástico ^d <i>Salmonella</i> sp: ausência em 25g de amostra ^d Temperatura ambiente ≤ 15 °C ^b
Monitoramento	O quê? Controle de temperatura ambiente ^a Como? Observação visual do laudo e instrumento de controle (termômetro) ^a Quando? Durante a retirada do molde e embalagem ^a Quem? Funcionário responsável pelo processo ^a
Ação corretiva	Ajustar condições de trabalho ^a
Verificação	Supervisão ^a
Registro	Registrar os laudos recebidos e as análises de verificação com assinatura do responsável e data de recebimento ^a

Fonte: Própria (2020) ^a, adaptado de SEBRAE (2000) ^b, adaptado de BRASIL (2002) ^c e RDC nº 12 (BRASIL, 2001) ^d.

As etapas de desenforme e embalagem são Pontos Críticos de Controle, pois o desenforme e acondicionamento são as últimas etapas do processo de fabricação do bombom, por isso não deve haver contaminação. É importante que o recebimento e estocagem da embalagem seja em local adequado até ser levada a linha de produção do bombom.

Armazenamento e transporte

Quadro 3. Pontos Críticos de Controle para etapa de armazenamento e transporte na produção de bombons artesanais em Campo Grande – MS.

Perigo para qualidade e segurança	<p>Biológico: multiplicação de microrganismos patogênicos ^a</p> <p>Físicos: insetos, poeira, materiais estranhos ^a</p>
Medidas preventivas	<p>Controle de tempo/temperatura para evitar proliferação de microrganismos que aumente o risco ^b</p> <p>Condições de armazenamento adequadas (condições higiênicas) ^b</p> <p>Limpeza e sanitização dos equipamentos e ambiente (evitar recontaminação pós processo térmico) ^b</p> <p>Sistemas adequados de limpeza e sanitização após processamento ^b</p> <p>Uso de telas protetoras nas janelas e portas ^b</p> <p>Retirada de materiais estranhos da área de armazenamento e/ou transporte ^b</p>
Risco	Médio ^a
Severidade	Alto ^a
Limite crítico	<p>Coliformes a 45 °C: 10 UFC/g de amostra ^d</p> <p><i>Staphylococcus aureus</i> (Estaf. coag. Positiva): 5x10² UFC/g de amostra ^b</p> <p><i>Salmonella</i> sp: ausência em 25g de amostra ^d</p>
Monitoramento	<p>O quê? Condições de armazenamento e transporte ^a</p> <p>Como? Limpeza e sanitização ^a</p> <p>Quando? A cada lote recebido ^a</p> <p>Quem? Funcionário responsável pelo recebimento do lote de chocolate ^a</p>
Ação corretiva	Não aceitar o lote fora do limite crítico de segurança ^a
Verificação	Verificar a veracidade dos laudos, realizando testes microbiológicos semanais ^a
Registro	Registrar os laudos recebidos e as análises de verificação com assinatura do responsável e data de recebimento ^a

Fonte: Própria (2020) ^a, adaptado de SEBRAE (2000) ^b, adaptado de BRASIL (2002) ^c e RDC nº 12 (BRASIL, 2001) ^d.

Essa etapa é um ponto crítico de controle, pois não há nenhuma etapa posterior que elimine os perigos, caso estejam presentes, assim o armazenamento do bombom elaborado deve ser monitorado. A cada compra de lote de chocolate para cobertura, deverá ser exigido da empresa fornecedora laudos garantindo a segurança microbiológica. É importante que o produto final fique armazenado em local adequado até ser levado para o transporte, e controle de temperatura, preferencialmente com transporte refrigerado.

As condições de embalagem e armazenamento são importantes na manutenção das

características organolépticas, sobretudo aromas e aparência. Quando o chocolate é exposto a altas temperaturas durante o armazenamento pode haver alteração em sua aparência, cor e brilho (DIOGO et al., 2015)

Quanto aos riscos microbiológicos, pode-se relacionar a presença de *Salmonella*, à sanidade do produto, enquanto coliformes totais são utilizados como indicadores de higiene durante a produção, transporte e armazenamento dos produtos (TEJEDA et al., 2012). A fim de garantir a qualidade na produção e comercialização destes bombons, além da saúde do consumidor, é necessária a padronização do processo de fabricação caseira e um adequado controle higiênico-sanitário tanto do local de produção, quanto dos manipuladores e onde os bombons serão comercializados.

O controle do processo de fabricação de produtos alimentícios influencia diretamente em sua qualidade final. Para se obter excelência, todo o processo deve ser analisado, controlado e monitorado para que os requisitos desejados e especificações técnicas sejam atendidos (QUINTINO; RODOLPHO, 2018).

Conclusões

A qualidade e segurança na produção dos bombons artesanais se iniciam com as Boas Práticas de Fabricação que necessitam dos Procedimentos Operacionais Padrão para contribuir na manutenção das condições higiênico-sanitárias adequadas à produção de alimentos, o que aumentaria a porcentagem de conformidade.

Os Pontos Críticos de Controle detectados na observação *in loco* para a segurança dos consumidores de bombom artesanal foram a embalagem, o armazenamento e o transporte. Devido à falta de tratamento térmico do chocolate utilizado, a etapa de resfriamento é considerada um ponto crítico de controle para qualidade, assim como a embalagem, por ser a última etapa do processo.

É necessária a padronização do processo de fabricação caseira e um adequado controle higiênico-sanitário do local de produção, dos manipuladores e dos pontos de comercialização dos bombons, garantindo a qualidade e segurança do produto, tanto para o consumidor quanto para o produtor. Mesmo apresentando baixo risco sanitário, a produção de bombons artesanais deve seguir as recomendações especificadas na legislação.

Referências

BATISTA, A. P. S. A. **Chocolate**: sua história e principais características. Orientadora:

Fabiana Lopes Nalon. 2008. 56 f. Dissertação (Curso de Especialização em Gastronomia e Saúde) – Centro de Excelência em Turismo, Universidade de Brasília, Brasília, 2008.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Portaria nº 46, de 10 de fevereiro de 1998. Manual genérico para APPCC em indústrias de produtos de origem animal. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 1998. Disponível em: <https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-ma-46-de-10-02-1998,687.html>. Acesso em: 29 de jul. de 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 49, de 31 de outubro de 2013. Dispõe sobre a regularização para o exercício de atividade de interesse sanitário do microempreendedor individual, do empreendimento familiar rural e do empreendimento econômico solidário e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2013. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0049_31_10_2013.html. Acesso em: 24 de jul. de 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 264, de 22 de setembro de 2005. Aprova o “Regulamento Técnico para Chocolate e Produtos de Cacau”. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2005. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_264_2005_.pdf/081370e3-e45d-454f-840a-a728ef62e3e5. Acesso em: 24 de jul. de 2020.

BRASIL. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria SVS/MS nº 326, de 30 de julho de 1997. Regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 1997. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/388704/Portaria%2BSVS-MS%2BN.%2B326%2Bde%2B30%2Bde%2BJulho%2Bde%2B1997.pdf/87a1ab03-0650-4e67-9f31-59d8be3de167>. Acesso em: 29 de jul. de 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002. Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2002. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_275_2002_COM P.pdf/fce9dac0-ae57-4de2-8cf9-e286a383f254. Acesso em: 24 de jul. de 2020.

CINTRÃO, R. P. Segurança alimentar, riscos, escalas de produção - desafios para a regulação sanitária. **Vigilância Sanitária em Debate: Sociedade, Ciência & Tecnologia**, v. 5, p. 3-13, 2017.

CORREA, P. F.; DE OLIVEIRA, L. B.; Aplicação das ferramentas da qualidade na solução de problemas de contaminação em uma fábrica de chocolate. **Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada**, v. 2, p. 86-101, 2017.

DE OLIVEIRA, A. M. C.; SOUSA, P. V.; ALVES, A. A. S.; MEDEIROS, S. R. A.; MENDONÇA, M. J. N. Adequação de serviços de alimentação às boas práticas de fabricação. **Conexões-Ciência e Tecnologia**, v. 14, p. 30-36, 2020.

DIOGO, F. M. J. **Desenvolvimento de um Bombom de Chocolate com recheio de queijo**

fundido e compota de fruta. Orientadores: Rui Alves e Carla Barbosa, 2015. 131 f. Dissertação (Mestrado em Empreendedorismo e Inovação na Indústria Alimentar) –Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Instituto Politécnico de Viana Castelo, Viana do Castelo, Portugal, 2015.

FIGUEIREDO, V. F.; COSTA NETO, P. L. O. Implantação do HACCP na indústria de alimentos. **Gestão & Produção**, v. 8, p. 100-11, 2001.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

SEBRAE. **Guia para elaboração do plano APPCC: geral**. 2. ed. Brasília, SENAI/DN, 2000. 301 p.

LOVATTI, R. C. C. Gestão da qualidade em alimentos: uma abordagem prática. **Higiene Alimentar**, v. 18, p. 26-31, 2004.

LUBAS, C. C. S.; CÂNDIDO, C. J.; SOUZA, S. V. S.; GUIMARÃES, R. C. A. Qualidade nutricional de barras de chocolate adicionadas de castanhas de baru. **Multítemas**, v. 21, p. 181-192, 2016.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE - OPAS. **A atenção à saúde coordenada pela APS: construindo as redes de atenção no SUS - Contribuições para o debate**. Brasília: OPAS, 2011.

PINTO, C. de S. **Elaboração e implementação do sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle em linha de chocolate ao leite**. Orientadora: Heloísa Theodoro, 2017. 63 f. Trabalho de conclusão de curso (Nutrição) – Campus da Região das Hortências, Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 2017.

QUINTINO, S. da S.; RODOLPHO, D.; Um estudo sobre a importância do APPCC – Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle – na indústria de alimentos. **Revista Interface Tecnológica**. v. 15, p. 196-207, 2018.

RIBEIRO-FURTINI, L. L.; ABREU, L. R. Utilização de APPCC na indústria de alimentos. **Ciência e Agrotecnologia**, v. 30, p. 358-363, 2006.

ROSA, P. T. **Implantação do Manual de Boas Práticas de Manipulação em cozinha pedagógica de uma instituição de ensino na cidade de Campo Mourão – PR**. Orientadora: Tanatiana Ferreira Guelbert, 2015. 176 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia de Alimentos) - Departamento Acadêmico de Alimentos, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2015.

SALGADO, T. M. V.; ALCÂNTARA, L. O.; CARVALHO, M. S. M. APPCC: uma ferramenta da gestão da segurança de alimentos. **Alimentos: Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente**, v. 1, p. 90-107, 2020.

SILVA JUNIOR, E. A. **Manual de controle higiênico-sanitário em alimentos**. 5. ed. São Paulo: Varela, 2002. 350 p.

SOUSA, C. L.; LOURENÇO, L. F. H.; FRANCÊS, J. M. de O.; SOARES, Y. P. P.;

ARAÚJO, E. A. F.; PENA, R. da S. Avaliação microbiológica, físico-química e das condições de fabricação de bombom de chocolate com recheio de frutas. **Alimentos e Nutrição**, v. 21, p. 305-310, 2010.

TEJADA, T. S.; DIAS, P. A.; CONCEIÇÃO, R. C. S. TIMM, C. D. Micro-organismos patogênicos e deteriorantes em chocolate artesanal ao leite. **Revista do Instituto Adolfo Lutz (impresso)**, v. 71, p. 178-81. 2012.

CAPÍTULO 41: DIFERENCIAIS ENTRE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA E RASTREABILIDADE E SEU IMPACTO NA CADEIA PRODUTIVA DE PESCADO

CHAPTER 41: DIFFERENTIALS BETWEEN GEOGRAPHICAL INDICATION AND TRACEABILITY AND ITS IMPACT ON THE FISH PRODUCTION CHAIN

Kátia Alessandra Mendes da Silva¹; Gesilene Mendonça de Oliveira²

Resumo

A cadeia produtiva de alimentos e bebidas seguirá em transição pós pandemia, ocasionada por diferentes *drivers* no que diz respeito a gestão e aprimoramento de seus processos produtivos tais como o aumento da concorrência global, alterações nos regulamentos, pressões das barreiras técnicas, maior atenção ao bioterrorismo, mudança do comportamento, maior eficiência produtiva e redução dos custos, entre outros. Para mitigar a assimetria de informação o objetivo desse artigo foi esclarecer as diferenças entre indicação geográfica e rastreabilidade, bem como demonstrar seu impacto positivo na cadeia produtiva do pescado por meio de uma revisão de literatura tendo como materiais legislações e produções acadêmicas. O Brasil tem um cenário promissor para o desenvolvimento da cadeia produtiva do pescado, no entanto, para o desenvolvimento e o aumento do consumo de pescado, sendo imperativo a elucidação do entrave estacionado no quesito qualidade que envolve diversas variáveis como frescor, higiene, preço, origem, certificação, formas de manejo, sustentabilidade. Concluiu-se que, apesar de, o conceito de Indicação Geográfica e Rastreabilidade serem diferentes, podem se complementar e que a utilização de ambas na cadeia produtiva de pescado, em especial junto ao pescador, colaboram para agregar valor, reduzir a assimetria de informação e restabelecer a confiança dos consumidores desde que aplicadas adequadamente, além de se constituírem em desenvolvimento, inovação e empreendedorismo.

Palavras-Chave: Atividade pesqueira, Promoção da qualidade, Segurança alimentar, Controle do processo, Selo Arte

Abstract

The food and beverage production chain will continue in post-pandemic transition, caused by different drivers with regard to the management and improvement of their production processes such as increased global competition, changes in regulations, pressures on technical barriers, greater attention to bioterrorism, behavior change, greater productive efficiency and cost reduction, among others. To mitigate information asymmetry, the objective of this article was to clarify the differences between geographical indication and traceability, as well as to demonstrate its positive impact on the fish production chain through a literature review using legislation and academic production as material. Brazil has a promising scenario for the development of the fish production chain, however, for the development and increase of fish consumption, it is imperative to elucidate the obstacle based on quality that involves several variables such as freshness, hygiene, price, origin, certification, management methods, sustainability. It was concluded that, although the concept of Geographical Indication and

¹ Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, kanutmendes@gmail.com

² Professora Doutora, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, gesilene@gmail.com

Traceability are different, they can complement each other and that the use of both in the fish production chain, especially with fishermen, collaborate to add value, reduce information asymmetry and reestablish consumer confidence as long as it is properly applied, in addition to constituting development, innovation and entrepreneurship.

Keywords: Fishing activity, Quality promotion; Food security; Process control, Art Stamp

Introdução

O ano de 2020 iniciou-se com uma pandemia causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 que provoca a doença *COVID-19* sigla em inglês para “coronavirus disease 2019”, onde 19 se refere ao ano da primeira notificação da doença, em Wuhan na China (SAID; SILVA, 2020). Configura-se um estado de calamidade pública, onde pouco se conhece a respeito desse microrganismo, e que as únicas certezas que se tem a respeito sobre a prevenção do contágio são afastamento social, a manutenção correta da higienização das mãos e superfícies, correto acondicionamento dos alimentos, e que com elas a mudança no comportamento da população, em especial na aquisição dos alimentos de origem animal, visto que, sua real origem anda permanece duvidosa.

Aliado a esse episódio, a cadeia produtiva de alimentos e bebidas seguirá em transição, ocasionada por diferentes *drivers* no que diz respeito a gestão e aprimoramento de seus processos produtivos tais como o aumento da concorrência global, alterações nos regulamentos, pressões das barreiras técnicas, maior atenção ao bioterrorismo, maior eficiência produtiva e redução dos custos, adoção de novas tecnologias de informação, adequação do capital humano, liderança mais atuante junto aos clientes internos e externos, em especial no Brasil (REGO, MADI, 2012).

Outros fatores relevantes dizem respeito à diversidade dessa cadeia, são a inovação, conformidade de produtos, excelência de serviços, sustentabilidade, mobilidade, maior diversidade de formas, tamanhos, e benefícios à saúde que também corroboram com a adoção de inúmeras ferramentas para atestar a qualidade, idoneidade e confiabilidade de um produto frente ao consumidor e que corroboram com as tendências em alimentação, com destaque para a confiabilidade e qualidade (FIESP, ITAL, 2012).

Para atingir e garantir que seus produtos possuem tais fatores, gestores utilizam-se de ferramentas diversas como os vários sistemas de gestão, certificações e selos que determinam sua origem, rastreabilidade, recall etc. (FALGUERA, V., ALIGUER, N., FALGUERA, M., 2012; GRACIA, AZUCENA DE-MAGISTRIS, 2016).

No que se refere ao pescado, que de acordo com a legislação brasileira, engloba peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, répteis, os equinodermos e outros animais aquáticos destinados

ao consumo humano (BRASIL, 2017), o uso dessas ferramentas é *sine-qua-non* considerando que pesquisas apontam maior disposição para pagar mais por um alimento ou produto alimentício que traga consigo um valor agregado, além de representar qualidade e segurança (YANGUI et al. 2014). No entanto, essas ferramentas vêm sendo utilizadas de maneiras muitas vezes equivocadas, e até falsificadas, ocasionando uma assimetria de informação para o consumidor. Basicamente assimetria de informação ocorre quando uma das partes envolvidas na cadeia produtiva restringe algumas informações referentes àquele produto e ou serviço.

Carvalho e Barcellos (2013) afirmam que a assimetria de informação na cadeia produtiva de alimentos se apresenta em ambos os lados: produtor e consumidor, onde o primeiro não sabe dos anseios e o segundo pouco ou nada sabe sobre os processos que perpassam o produto até a sua aquisição. Considerando o momento de pandemia, a informação é um artefato basilar para estabelecer a relação de confiança entre as partes.

Para mitigar a assimetria de informação o objetivo desse artigo foi esclarecer as diferenças entre indicação geográfica e rastreabilidade, assim como demonstrar seu impacto positivo na cadeia produtiva do pescado.

Desenvolvimento

Pescado

Definido como organismo aquático de origem animal, com origem em águas continental, marinha ou estuarina, sejam estas de cultivo ou extrativa, desde que sejam destinados ao consumo humano (BRASIL, 2017). Mundialmente é o alimento mais consumido e negociado no mundo, cuja aquisição se dá por meio da pesca extrativa, que encontra-se em declínio acentuado devido à exploração de seus recursos, e ou pela aquicultura, que encontra-se em plena ascensão, mas, que por sua vez, deve melhorar a qualidade técnica-gerencial em toda a sua cadeia produtiva. A comercialização de pescado é especialmente importante para os países em desenvolvimento, representando em alguns casos metade do valor total das mercadorias comercializadas.

A *Food and Agriculture Organization* (FAO) e a Organização das Nações Unidas (ONU) apontam o pescado oriundo da pesca extrativa ou da aquicultura como o alimento principal para garantir a segurança alimentar e a nutricional, assim como o uso de recursos naturais, de modo assegurar o desenvolvimento sustentável em termos econômicos, sociais e ambientais. A FAO ainda destaca que a atividade pesqueira será uma das principais atividades responsáveis pela segurança alimentar do planeta, com previsões de produção de proteína de origem animal para a próxima década maior do que o setor de animais de abate (carnes bovinas,

suínas e aves). Alimento este necessário para atender a previsão de demanda por proteína de origem animal de alto valor biológico para fornecer a mais de 9,6 bilhões de indivíduos em 2050 (FAO, 2014; ONU, 2015; FAO, 2018).

Apesar de ainda existirem muitos países que não informam as suas estatísticas pesqueiras para a FAO, a mesma contabilizou uma produção da pesca marinha no ano de 2018 de 84,4 milhões de toneladas em todo mundo (FAO, 2020). No Brasil, no ano de 2011, a produção nacional total foi de 1. 431,9 toneladas e em relação a pesca extrativa marinha um quantitativo de 553. 670,0 toneladas. A atividade pesqueira no Brasil tem relevante importância socioeconômica, gera um Produto Interno Bruto (PIB) nacional de 5,0 bilhões de reais, mobiliza 800 mil profissionais e proporciona 3,5 milhões de empregos diretos e indiretos (BRASIL, 2014).

O Brasil tem um cenário promissor para o desenvolvimento da cadeia produtiva do pescado. No entanto, para o desenvolvimento e o aumento do consumo desse alimento, em especial no Brasil, é indispensável que seja elucidado o entrave estacionado no quesito qualidade que envolve diversas variáveis como frescor, higiene, preço, origem, certificação, formas de manejo, sustentabilidade etc. (INMETRO, 2011; SILVA, 2012; CALLEJA, 2015).

Outros entendimentos sobre as variáveis de qualidade, como a falta de informações e padrões na cadeia produtiva do pescado, inibem a identificação da origem e o percurso dos produtos oriundos do setor pesqueiro, o que compromete a segurança do produto e do consumidor, gera a desconfiança de todos os envolvidos nessa cadeia, além de ocasionar as chamadas barreiras técnicas que dificultam ou impedem a exportação do pescado, principalmente dos países em desenvolvimento (JOVENTINO e JOHNSON, 2013; HILBORN et al, 2015). Nesse sentido, o setor deve, portanto, buscar a sua adequação frente às demandas de seus *stakeholders*, sem que haja a utilização e entendimento equivocados dos termos utilizados.

Apesar da aquicultura ser apontada como principal provedora de alimento para as próximas três décadas devido a estagnação da pesca extrativa, o progressivo aumento nos últimos 50 anos na produção pesqueira total mundial (pesca extrativa e aquicultura), principalmente nas últimas duas décadas, demonstrou o potencial que esta atividade demonstra para garantir a segurança alimentar do mundo, sob o ponto de vista da disponibilidade de alimentos, assim como a população mundial tem para consumir alimentos nutritivos e diversificados, aumentando o consumo *per capita* ano, que a nível de mundo representou no ano de 2018 20,5 kg / hab. / ano (FAO, 2020).

Em âmbito nacional, a pesca extrativa marinha é a principal responsável pela produção de pescado, sendo a pesca artesanal a principal provedora de alimentos, empregos e receitas nas regiões Nordeste e Norte do País, onde se encontra a maior população pesqueira e a mais pobre. Nas regiões Sudeste e Sul, apesar da pesca industrial ocorrer com mais frequência e representar 55 % do volume de pescado desembarcado, a pesca artesanal também é responsável pelo fornecimento de alimentos e é meio de subsistência para milhões de pessoas. Esta responde por 45 % do volume da produção total de pescado desembarcado no país (BRASIL, 2011), destacando-se então, o seu importante papel, em um contexto global, tanto para a segurança alimentar, como para o desenvolvimento econômico local, tendo em vista a oportunidade que representa para a erradicação da pobreza.

O segmento artesanal, a pesca de pequena escala (PPE), vem recebendo um olhar mais criterioso e cuidadoso por parte da FAO. De acordo com a Agenda 2030 da FAO, no seu Objetivo 14.b, visa proporcionar o acesso dos pescadores artesanais aos recursos marinhos e mercados, e ressalta a importância da tecnificação para a manutenção da qualidade nutritiva e sanitária. E, no Brasil, a pesca artesanal é praticada milenarmente tendo sua origem descrita com índios, e continua sendo exercida, apesar de todo o avanço tecnológico do século XXI, de modo rústico, simplicidade, em geral autônomo ou no âmbito familiar com diversidades e complexidades em função dos aspectos sociais, ambientais, políticos, econômicos, culturais, entre outros, e cujo saber é passado de geração em geração pela oralidade e pelo fazer (ONU, 2015; FAO, 2016, 2018; SILVA, 2014).

Neste contexto, a atividade pesqueira do setor artesanal visa contribuir para melhorar o desenvolvimento equitativo e socioeconômico das condições das comunidades de pesca artesanal ao lado da gestão sustentável e responsável das suas pescas, por meio das ações dos diversos setores da sociedade civil e pública, uma vez que a pesca artesanal contribui substancialmente para a garantia da segurança alimentar e nutricional produzindo em torno de 45 % da produção do total da pesca (BRASIL, 2008; FAO, 2014).

Indicação Geográfica (IG)

Indicação geográfica (IG) é uma ferramenta coletiva de valorização de produtos tradicionais vinculados a determinados territórios, que apresentam uma qualidade única em função de recursos naturais como solo, vegetação, clima e saber fazer (know-how ou savoir-faire), que e vem se desenvolvendo naturalmente no decorrer da história, e se aplica a diversos produtos, alimentícios ou não, cuja as funções principais são (i) agregar valor ao produto e (ii) proteger a região produtora, devendo ainda promover os produtos e sua herança histórico-

cultural, que é intransferível (BRASIL, 2008; SEBRAE; INPI, 2011; VALENTE, 2012). A IG equivale-se de formas de proteção especial para produtos (como a marca e a patente - ligadas à propriedade intelectual) e asseguradas legalmente por diversas convenções internacionais (INPI, 2011).

Foi na França que surgiu o primeiro apelo de origem *châteauneuf-du-pape* no século XVII, quando em 1935 aprovou-se o sistema de *Apellation d'Origine Contrôlée* (AOC), e criou-se o Instituto Nacional das Apelações de Origem (INAO), uma entidade estatal subordinada aos Ministérios da Economia e Agricultura, sendo, portanto, a primeira a ter um documento jurídico, destinado ao queijo Roquefort. Isso lhe confere um progresso transcendente nos quesitos jurídicos e técnicos, em função do reconhecimento de seus territórios (VALENTE, 2012).

Controversamente, Bruch (2009) afirma que a primeira IG foi de fato reconhecida dentro do contexto jurídico, se deu no ano de 1756, em Portugal por meio da Cia. Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. Independente de onde tenha sido o marco legal da IG, o fato é que, a França detém essa modalidade, possuindo aproximadamente 455 registros com Apelo de Origem Controlada (AOC) entre bebidas alcoólicas, produtos agroalimentares e laticínios (INAO, 2011). A IG pode ser dividida em Indicação de Procedência (IP) e Denominação de Origem (DO) (SEBRAE; INPI, 2011).

Indicação de Procedência (IP)

A IP valoriza a tradição produtiva e o reconhecimento público de que, o produto de uma determinada região possui uma qualidade diferenciada. Caracteriza-se por ser área conhecida pela produção, extração ou fabricação de determinado produto. Ela protege a relação entre o produto e sua reputação, em razão de sua origem geográfica específica (SEBRAE; INPI, 2011).

Denominação de Origem (DO)

A DO é a espécie onde as características daquele território agregam um diferencial ao produto. Define que uma determinada área tenha um produto cujas qualidades sofram influência exclusiva ou essencial por causa das características daquele lugar, incluindo fatores naturais e humanos. Ou seja, as peculiaridades daquela região devem afetar o resultado final do produto, de forma identificável e mensurável (SEBRAE; INPI, 2011).

Valente (2012) ressalta que embora as definições tenham o mesmo objetivo, a DO deve ter influência das características geográficas, humanas, meteorológicas, imperativas na caracterização e diferenciação do produto ou serviço. Características essas irrelevantes na IP.

Embora a concessão da IP apresente-se mais acessível é necessário consultar as referências disponíveis para que se comprove a tradição do local, e para DO deve haver realizações de estudos, testes e análises, cuja proteção dar-se-á por meio da representação gráfica ou figurativa (INPI, 2011).

No Brasil, a IG é regulamentada pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, da Presidência da República, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. A mesma lei determina que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) estabelecerá as condições de registro das IGs, o que promulgou a Resolução nº75, de 28 de novembro de 2000, sendo revogada em de 25 de agosto, de 2013 pela Instrução Normativa (IN) nº 25, de 08 de agosto de 2013, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) (BRASIL, 2013). Ainda de acordo com as disposições desta Instrução Normativa aplicam-se, ainda, à representação gráfica ou figurativa da IG, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território de cujo nome seja indicação geográfica (BRASIL, 2013).

O INPI criou em 2010 a Coordenação de Fomento e Registro de IG o que reduziu o tempo de concessão de registros passando de 2,5 anos para 1,2 ano (A LAVOURA, 2013). A indicação geográfica é um processo burocratizado, que no Brasil deve passar pelas seguintes fases: (i) pedido, exame formal, (ii) publicação do pedido, (iii) análise do mérito, (iv) publicação da concessão e (v) emissão do certificado (FERNANDES, 2014).

Embora esse movimento ainda seja muito recente no Brasil, de acordo com o catálogo das Indicações Geográficas Brasileiras (IGB), desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), em parceria com INPI, até o ano de 2020 haviam sido registradas quatorze 79 IGs. Destas vinte e duas são DO (13 nacionais e 09 internacionais) e 57 IP (todas nacionais), e com 151 pedidos em andamento, informações atualizadas até julho de 2020, (INPI, 2020; COSTA, 2014; BRASIL, 2016).

A IG pode ser requerida por produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local, que legitimados ao uso exclusivo do nome geográfico, serão representados por associações, pessoas jurídicas e institutos, ou ainda que sendo único produtor ou prestador de serviços, pessoa jurídica ou física, o registro sairá em nome próprio, apresentada por meio de selos de indicando IP ou DO (BRASIL, 2013, FERNANDES, 2014; NUNES, 2014). No entanto, Nunes (2014), ressalta que são necessários solucionar obstáculos, tais como a organizar e capacitar os produtores, identificar as peculiaridades do produto ou serviço, e executar a correta vigilância do uso.

Por fim a IG pode constituir-se em uma estratégia para desenvolver a transferência de tecnologia social, agregar valor e inovar o pescado brasileiro, em especial aos pescadores artesanais, em decorrência das características que lhes são peculiares.

Rastreabilidade

A temática tornou-se pujante a partir de diversos incidentes relacionados à segurança dos alimentos e dos consumidores, a saber: (i) contaminações com salmonela em ovos nos anos 80, a crise da “vaca louca” em 1996 e *Escherichia coli* em 1997 (Inglaterra); (ii) contaminação de hambúrgueres de uma rede de *fast-food* com *E. coli*, o que ocasionou a enfermidade de mais de 300 pessoas com o falecimento de 3 crianças e 1 adulto, (iii) a contaminação de carne com listeria, em 1998/99, causando a morte de 11 indivíduos (Estados Unidos); (iv) queijo e diversos lanches prontos provocaram contaminações por salmonela em 580 pessoas (Canadá), etc. sendo a crise da Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE), usualmente conhecida como a doença da vaca louca e a gripe aviária, as mais conhecidas e alarmantes na atualidade (GALVÃO, 2011; GALVÃO e OETTERER, 2014; MATEUS e RUSSO-ALMEIGA, 2015).

Em síntese, a rastreabilidade em alimentos é a habilidade de identificar a origem e percorrer o trajeto de um gênero alimentício e tudo o que nele for adicionado, por meio do acesso a informações e registros ao longo de todas as etapas de produção, transformação e distribuição , possibilitando o seu recolhimento em qualquer ponto caso necessário (ISO, 2011; EC, 2012; MATEUS, RUSSO-ALMEIGA, 2015).

Apesar de sua proeminência, a rastreabilidade aplicada isoladamente, não se constitui como requisito de qualidade (SILVA, 2012; SILVA et al., 2014), mas tem como papel o estabelecimento de padrões, a avaliação da conformidade, a correção dos problemas e suas causas, a definição de melhorias e medidas preventivas, permite a identificação de produtos similares sem que se agreguem, permite o recall dos produtos pontualmente, bem como elevar a confiança e aceite do produto frente ao consumidor, sendo portanto complementar a à gestão da qualidade e segurança do alimento (MOURA e GONÇALVES, 2012; GALVÃO, OETTERER e MACIEL, 2014).

A rastreabilidade pode ser interna (que envolve a identificação de insumos, do produto em processo e do produto acabado, e responsabilidades departamentais), e externa (envolve os fluxos de comunicação de possíveis não conformidades), e com diferentes maneiras de se registrar e transmitir as informações a serem rastreadas, tais como manual, código de barras, radio frequência e *QR CODE*, *Compact Disc* (CD) (MOURA e GONÇALVES, 2012) e através de ferramentas biotecnológicas (análise de elementos traços, DNA, etc.) que permitem a

autenticação ou certificação de origem de produtos alimentares, em especial no pescado (CARLSON et al., 2013; LEAL et al, 2015).

O contingente de indústrias de pescado que possuíam o sistema de rastreabilidade implantado e implementado na Europa e nas Américas até 2011 flutuava em torno de 50-60%, e o percentual restante, sequer possui a origem do seu pescado. Esses dados no Brasil não são consistentes, devido à falta de organização e coesão da cadeia produtiva (MOURA e GONÇALVES, 2012).

A União Europeia (EU) tornou-se a detentora primária da ação de rastreabilidade, quando estabeleceu no ano de 2002 o regulamento nº104/2000 que instituiu normas de comercialização de pescado, que devem ser rotulados com clareza de informações quanto à denominação comercial, métodos e áreas de produção e captura do pescado (BIONDI, 2011).

No Brasil foi lançado no ano de 2011, pela incubadora AquaBio Aquicultura (RN), o Sistema Brasileiro de Rastreabilidade de Pescado (Sibrap), cem por cento virtual, disponível na Associação dos Aquicultores do Apodi (Aquapo), empresa vinculada à incubadora de Agronegócio de Mossoró (IAGRAM), com o apoio da Universidade Federal Rural do Semiárido, no Rio Grande do Norte, na criação de tilápias (LOPES, 2011). Nesse sistema o pescado cultivado recebe um lacre, uma etiqueta impermeável e autocolante contendo as informações necessárias para o rastreamento do produto, apto a rastrear três espécies de aquicultura: moluscos (ostras e mexilhões) e crustáceos (camarões e lagostas) e piscicultura de águas continentais ou marinhas (LOPES, 2011; SEBRAE, 2011).

Galvão, Oetterer e Maciel (2014) destacam três questões relevante que devem ser ponderadas pela indústria de pescado dentro da rastreabilidade: a) quais informações devem ser coletadas, mantidas e compartilhadas? b) como devem ser armazenadas para atender as demandas de clientes e autoridades, com a devida prontidão? e c) como coletar e armazenar de maneira economicamente viável?

Neste contexto, as informações podem ser originárias dos diários de bordo das embarcações onde constam área de pesca, hora de captura, dia e hora de desembarque, método de processamento a bordo, espécie capturada, tamanho, peso e temperatura do pescado etc. (GALVÃO, 2008). Os registros relativos a rastreabilidade devem incluir, no mínimo: (i) razão social, CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico, se houver, das empresas imediatamente anterior e posterior na cadeia produtiva; (ii) descrição dos produtos recebidos e distribuídos, incluindo denominação de venda, marca, lote, prazo de validade e número de regularização junto ao órgão competente, quando aplicável; (iii) data de recebimento ou distribuição; (iv)

número da nota fiscal, e (v) quantidade de produtos recebida ou distribuída (SUCASSAS, 2011; BRASIL, 2015).

Embora não exista uma legislação específica no Brasil sobre a rastreabilidade, legislações a exemplo da Portaria nº 326, de 04 de setembro de 1997 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), estabelece no item 7.7 a documentação e registros de alimentos e produtos, que configuram requisitos básicos para implantação da rastreabilidade, além de, a mesma essencial frente a demanda do mercado internacional e nacional (SILVA, 2012; SILVA et al., 2014).

Internacionalmente tem-se a *International Standardization Organization* (ISO) 22005:2007, norma que informa os princípios e especifica os requisitos básicos para a concepção e implementação de um sistema de rastreabilidade alimentar humana e animal, que podem ser utilizados por uma organização que opera em qualquer passo na cadeia alimentar humana e animal, e flexível o suficiente para permitir que as organizações de alimentação e organizações de alimentos para atingir os objetivos identificados (ISO, 2005).

Outra norma é a ISO 12877:2011, que trata da rastreabilidade dos produtos de piscicultura - especificação da informação a ser registrada na cadeia de distribuição desse pescado, que fornece uma base genérica para a rastreabilidade, onde a chave para o funcionamento está na identificação de cada unidade comercializado, seja de matérias-primas ou produtos acabados, com uma identificação única (ISO, 2011).

Rijswijk et al., (2012) ao inquerirem consumidores europeus, tiveram como resultados, que estes associam a rastreabilidade à saúde, segurança, qualidade e controle, dos quais o último foi associado a conceitos de confiança e segurança, além do anseio por informações mais claras e detalhadas sobre o pescado. Isso demonstra que a rastreabilidade pode sim contribuir para estabelecer a confiança do consumidor em relação a esse alimento (FRANCO, 2014).

No entanto, para atingir a rastreabilidade do pescado com eficiência e eficácia, é imperativo que haja maior integração entre o pescador/aquicultor aos demais elos, em especial junto à indústria. Adicionalmente, a rastreabilidade permite a retirada do alimento ou produto, como a orientação adequada ao público sem que haja maiores danos ao comércio, momento denominado recall.

Recall

Aprovada no Brasil em 2015 a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 25/2015, que dispõe sobre o recolhimento de alimentos e sua comunicação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e aos consumidores, destinada a todos os estabelecimentos que

realizam atividades de produção, industrialização, armazenamento, fracionamento, transporte, distribuição, importação e ou comercialização de alimentos, inclusive *in natura*, bebidas, águas envasadas, suas matérias-primas, ingredientes, aditivos alimentares, coadjuvantes de tecnologia e embalagens e outros materiais em contato com alimentos (BRASIL 2015).

Ainda de acordo com a referida resolução, toda empresa interessada deve dispor de Plano de Recolhimento, documentado na forma de Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) que dentre outras diretrizes, devem ser aprovados, datados e assinados pelo responsável técnico, pelo responsável designado para o procedimento de recolhimento ou pelo responsável legal, firmando o compromisso de implementação, monitoramento, avaliação, registro e manutenção dos mesmos (BRASIL, 2015).

Um estudo realizou *recalls* simulados com o intuito de avaliar a aplicabilidade e efetividade de um sistema de rastreabilidade em cinco continentes (Dinamarca, Islândia, Finlândia, Noruega e Ilhas de Faroe), onde os resultados revelaram pouca interação na cadeia, embora todas as informações estivessem disponíveis. E concluíram que a cadeia do pescado dessas localidades, ainda não estavam prontas para um *recall*, evidenciando um sistema de rastreabilidade ainda insipiente (RANDRUP, et al. 2008). Nesse sentido fica claro que o *recall* não se configura como um elemento de qualidade, segurança ou que agregue valor ao alimento ou produto, visto que essa ação é parte final, integrante da rastreabilidade.

Além da IG e da rastreabilidade é relevante chamar a atenção para a obtenção do selo ARTE, a Portaria Nº 22, de 4 de março de 2020 que foi submetida à consulta pública da Instrução Normativa que visa estabelecer, em todo território nacional, o Regulamento Técnico de Boas Práticas Agropecuárias e de Fabricação aos aquicultores, pescadores e produtores de produtos alimentícios derivados do pescado e classificados como artesanais, que entre os requisitos estão a capacitação e higiene dos manipuladores, manipulação segura do pescado, condições adequadas das embarcações (BRASIL, 2020).

Discussão

A partir de todo o contexto apresentado fica clara a necessidade da cadeia produtiva de pescado se adequar, buscando romper, especialmente, as barreiras de capital humano, entendendo e reforçando que a Pandemia da COVID-19 já vem contribuindo para a mudança de comportamentos relacionados aos procedimentos de higiene e em toda cadeia produtiva.

Aqui foram apresentadas duas ferramentas que servem de direcionamentos para implementação de novos procedimentos que visam a melhoria desse setor, frente a sua real importância enquanto uma cadeia de produção que promove a geração de emprego e renda,

promoção da segurança alimentar e nutricional, promover a atividade de modo sustentável, que corroboram também com os objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) da Organização as Nações Unidas (ONU) (ONU, 2015).

A rastreabilidade é influenciada segundo os regulamentos legais e técnicos, características do alimento ou produto, expectativas do consumidor e objetivos a serem alcançados. Para distinguir entre as diferentes categorias de informações, todos os elementos de informação são classificados como "deve", "deveria" ou "pode" (ISO, 2011). As suas diferentes formas de se registrar e transmitir as informações, cada qual com suas vantagens e desvantagens são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. Benefícios e inconveniências dos vários sistemas de registros para a rastreabilidade.

Tipo de sistema	Benefícios	Inconveniências
Manual	Baixo custo	Suscetível a maiores erros e falsificações
		Perda de informações
	Custo moderado	
Código de barras	Aceitação mundial	Leitor
	Expressiva capacidade de informações	Contato visual
	Sem contato visual	
	Redução de mão-de-obra	Oneroso
Rádio frequência (RFIG)	Possível adicionar ou regravar informações na memória,	Sujeito a rádio interferências
	Leitura múltipla de etiquetas	Etiquetas interferem na reciclagem
		Oneroso
Rádio frequência Ativa	Maior alcance de leitura (1.000-1.100 metros)	Duração de bateria
	Baixo custo	
Rádio frequência Passiva	Opera em frequências baixa, alta e ultra-alta	Poucos metros de alcance
Rádio frequência semi-passiva	Baixo custo quando equiparada à passiva	Duração de bateria
		Limitação da distancia

Fonte: Moura e Gonçalves, 2012.

Galvão (2011) realizou uma pesquisa com o intuito especificar parâmetros intrínsecos à pesca extrativa do *Cod fish* islandês e associá-los a matéria-prima utilizando o sistema de rastreabilidade com ferramenta de estudo, e subsequentemente, viabilizar o conhecimento e técnicas agregados, ao setor pesqueiro brasileiro, e dentre as suas conclusões está a necessidade de se padronizar em todas as embarcações pesqueiras informações contidas no mapa de bordo, já mencionadas anteriormente, como forma de iniciar uma rastreabilidade e essa auxiliar na adoção de medidas de qualidade, visto que a rastreabilidade e a qualidade têm forte relação.

Uma operação da Polícia Federal com o apoio técnico do MAPA, no Estado de Santa Catarina, denominada Operação Poseidon, que visando coibir a prática de crimes ambientais contra as relações de consumo e falsificação documental, relacionados à industrialização de peixes capturados ilegalmente (espécies em extinção), assim como, a troca de espécies na rotulagem do produto, prendeu em flagrante quatro pessoas de uma empresa investigada, devido a apresentação de documentos falsos de rastreabilidade quando da diligência de busca e apreensão (PF, 2014). Essa ação corrobora com a necessidade de conscientizar toda a cadeia de pescado, na tomada de decisão para a mudança de comportamento frente à qualidade e rastreabilidade no setor, seguida da credibilidade nos mercados nacional e internacional.

Estudos indicaram que os consumidores dos Estados Unidos, Europa (Finlândia e Itália) valorizam tanto o método de produção quanto a origem do produto/alimento (POUTA et al., 2010; WOLF et al., 2011). Em outros estudos, os autores evidenciaram que a origem do produto é mais relevante que o método de produção, ou que ainda terá sua importância de acordo com os atributos avaliados e as características dos consumidores envolvidos (POUTA et al., 2010; GALAN, GARCIA, BARREIRO-HURLE, 2013). Claret et al. (2012) identificaram que os fatores relevantes para os consumidores ao adquirir o pescado foram: o país de origem, o método de captura no mar e o grau de frescor do peixe. Por outro lado, Vanhonacker et al. (2011) afirmaram que para alguns consumidores de pescado oriundo da aquicultura, não dão importância a origem, sendo o aspecto visual o fator determinante para a decisão de compra.

Considerando a pesca artesanal, a IG é uma estratégia de negócio, que apesar de todo o processo burocrático, pode ser cogitada para um futuro próximo, como uma política pública que favoreça a permanência do pescador em sua localidade, ampliar a renda, assim como ofertar pescado e seus derivados diferenciados para o consumidor interno e externo, uma vez que estes terão maior valor agregado. Além disso promove e ou fortalece a organização dos pescadores artesanais, compartilham e difundem o conhecimento adquirido ao longo dos anos.

O consumidor interno e ou externo de pescado, após a Pandemia da COVID-19 irá continuar na busca de fornecedores que garantem efetivamente a segurança e qualidade do pescado. No que tange a pesca artesanal, a mesma, tem suas valorizações intrínsecas (tradição, saber, cultura, manejo, etc.) que agregam naturalmente valor para sua comercialização, sendo urgente porém, a adequação dos procedimentos de controle, sanidade e higiene da atividade em toda a cadeia cujo selo ARTE, será sem dúvida um aliado e uma oportunidade para realização desses ajustes primordiais e com isso ampliar a sua competitividade, visto que, esse gargalo que afeta toda cadeia produtiva do pescado, extrativo ou cultivado, não será mais suportado.

Considerações Finais

A indicação geográfica e a rastreabilidade diferem entre si tanto conceitualmente quanto na sua aplicação prática. No entanto, a rastreabilidade traz consigo a indicação geográfica, visto que, esta é uma das primeiras informações a ser coletada e assume um importante papel nas decisões de compra do pescado. A indicação geográfica, apesar de seu aspecto burocrático, contribui substancialmente para a implantação e implementação da rastreabilidade e por conseguinte na mudança do comportamento dos atores envolvidos em toda cadeia produtiva do pescado.

E foi possível apontar que o *recall* também não deve ser utilizado de modo unitário ou como atributo de qualidade, pois o mesmo é parte integrante e final do sistema de rastreabilidade, e configura-se apenas no recolhimento de um alimento ou produto, que não atende aos padrões pré-definidos de um sistema de controle ou de produção.

Conclui-se então que a utilização indicação geográfica e ou rastreabilidade na cadeia produtiva de pescado, em especial junto ao pescador, colaboram para agregar valor, reduzir a assimetria de informação e restabelecer a confiança dos consumidores desde que aplicadas adequadamente, além de se constituírem em desenvolvimento, inovação e empreendedorismo.

Referências

A LAVOURA. Indicação geográfica. **Revista A Lavoura**. v. 694, n.27. p.26-32. 2013.

BIONDI, G. F. **Panorama da rastreabilidade do pescado**. Disponível em: <ftp://ftp.sp.gov.br/ftpcesca/IIsimcope/palestra_germano_biondi.pdf>. Acesso em: 30 de Julho de 2020.

BORGHETTI, J. R. Estimativa da pesca e aquicultura de água doce e marinha. Brasília, Instituto de Pesca/APTA/SAA. **Série Relatório Técnico**, 3: p. 8-14. 2000.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. (MDIC). Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). **Instrução Normativa** (IN) nº25, 21 de agosto de 2013. Estabelece as condições para o Registro das Indicações Geográficas. Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). 2013.

BRASIL **Resolução da Diretoria Colegiada** - RDC nº 24, de 08 de junho de 2015. Dispõe sobre o recolhimento de alimentos e sua comunicação à Anvisa e aos consumidores. Diário Oficial da União nº 107, Brasília-DF, Brasil 09 de junho de 2015.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). **Guia para a solicitação de registro de indicação geográfica para produtos agropecuários**. 2008. http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Desenvolvimento_Sustentavel/Produ%C3%A7%C3%A3o%20Integrada/Guia_indicacao_geografica.pdf. Acesso em 11 maio 2016.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Decreto nº 9.013** de 29 de março de 2017. Regulamenta a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e a Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, que dispõem sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. 2017.

BRASIL. Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação. **Portaria nº 22**, DE 25 de Junho de 2020. Regulamento Técnico de Boas Práticas Agropecuárias e de Fabricação aos aquicultores, pescadores e produtores de produtos alimentícios derivados do pescado e classificados como artesanais. Diário Oficial da União (DOU). ISSN 1677-7042. Seção1. 6 de março de 2020.

BRUCH, K. L. Tradição e cultura preservadas: Indicações Geográficas são meio para assegurar reconhecimento aos diferenciais de uma região produtora. **Jornal Bon Vivant**, Flores da Cunha: Século Novo, p. 12, jan/fev. 2009.

CALLEJA, D. L. Pescadores artesanais de Macaé: perfil socioeconômico e subsídios para a certificação da pesca. 153f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais e Conservação) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campus Macaé- RJ. 2015.

CARSON, H. S. et al. Temporal, spatial, and interspecific variation in geochemical signatures within gish otoliths, bivalve larval shells, and crustacean larvae. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 473, 133–148. 2013.

CARVALHO, D. M; BARCELOS, J. O. J. Market orientation for milk farmers: how to deal with information asymmetry. **Organizações Rurais & Agroindustriais**, Lavras, v. 15, n. 2, p. 153-166, 2013.

CLARET, A., GUERRERO, L., AGUIRRE, E., RINCÓN, L., HERNÁNDEZ, M. D., MARTÍNEZ, I., PELETEIRO, J. B., GRAU, A., RODRÍGUEZ, C. Consumer preferences for sea fish using conjoint analysis: Exploratory study of the importance of country of origin, obtaining method, storage conditions and purchasing price, **Food Quality and Preference** (26), 259–266. 2012.

COSTA, E. R. C. AS Indicações geográficas (igs) como elementos fortalecedores para a atividade turística. **Turismo: Estudos & Práticas (RTEP/UERN)**, Mossoró/RN, vol. 3, n. 1, jan./jun. 2014.

EC. European Commission. **Food traceability**. Tracing food through the production and distribution chain to identify and address risks and protect public health. June 2007. Disponível

em: http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/traceability/factsheet_trace_2007_en.pdf. Acesso em: 17 maio 2012.

FALGUERA, V., ALIGUER, N., FALGUERA, M. "An integrated approach to current trends in food consumption: Moving toward functional and organic products?" **Food Control** 26(2): 274-281. 2012.

FAO. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. **The State of World Fisheries and Aquaculture**. Roma: FAO, 2014. Disponível em: < <http://www.fao.org/3/d1eaa9a1-5a714e42-86c0-f2111f07de16/i3720e.pdf>> Acesso em: 22 mai. 2014.

FAO. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. **The State of World Fisheries and Aquaculture**. Contributing to Food Security and Nutrition for all. Rome: 2016. 204p.

FAO. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. **The State of World Fisheries and Aquaculture**. Sustainability in action. Rome: 2020. 224p.

FERNANDES, L. R. **O registro de IG no Brasil**. Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Diretoria de contratos, Indicações Geográficas e Registros (DCIG). 2014. Disponível em: < http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/acs/registro-de-IG-11092014.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2016.

FIESP/ ITAL. Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Instituto de Tecnologia de Alimentos. **Brasil Trend Foods 2020**. p.176. 2010.

FRANCO, F. E. Origem e rastreabilidade da carne e do peixe na perspectiva do consumidor: um estudo exploratório. 99f. Dissertação (Mestrado em Ciência do Consumo Alimentar). Universidade Aberta. Porto-Lisboa. 2014.

GALAN, B. L.; GARCIA, A. BARREIRO-HURLE, J. What comes first, origin or production method? An investigation into the relative importance of different attributes in the demand for eggs. **Spanish Journal of Agricultural Research** v.11, n.2, p.305-315. 2013.

GALVÃO, J. A.; OETTERER, M. MACIEL, E. S. **Rastreabilidade na cadeia produtiva de pescado**. In: GALVÃO, J. A.; OETTERER, M. Qualidade no processamento de pescado. Rio de Janeiro: Elsevier. 2014. 237p.

GALVÃO, J. A. **Rastreabilidade da cadeia produtiva do pescado**: avaliação dos parâmetros ambientais e sua influência na qualidade da matéria-prima destinada à indústria. 2011. 203 f. Tese (Doutorado em Ciências). Universidade de São Paulo. Centro de Energia Nuclear. Piracicaba-SP. 2011.

GRACIA, A. AND T. DE-MAGISTRIS. "Consumer preferences for food labeling: What ranks first?" **Food Control**, v.61. p.39-46. 2016.

HILBORN, R.; FULTON, E. A.; GREEN, B. S.; HARTMANN, K., TRACEY, S. R.; WATSON, R. A. When is a fishery sustainable? **Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences**, v.72. p. 1–9. 2015.

INMETRO. Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade. Portal do consumidor. **O Inmetro e você**. Disponível em: <<http://portaldoconsumidor.wordpress.com/o-inmetro-e-voce/>>. Acesso em: 20/11/2011.

INPI. Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Pedido de indicação geográfica concedidos e em andamento. Disponível em: < <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/pedidos-de-indicacao-geografica-no-brasil>>. Acesso em: 25 jul. 2020.

ISO. International Standartization Organization 22005:2007.**Erro! Fonte de referência não encontrada..** 2005. 11p.

ISO. International Standartization Organization. 12877:2011. **Traceability of finfish products-** Specification on the information to be recorded in farmed finfish distribution chains. 2011. 42p.

ISO. International Standartization Organization. 12877:2011. **Traceability of finfish products-** Specification on the information to be recorded in farmed finfish distribution chains. 2011. 42p.

JOVENTINO, F. K. P.; JOHNSON, R.M. F. **Os conflitos envolvendo a pesca artesanal na Baía de Ilha Grande – Rio de Janeiro**. In: XI Reunião Científica do Instituto de Pesca, 2013, São Paulo. p. 54-56. 2013.

JULIÃO, A. M. 2010. **Modelo para implantação de sistema de gestão integrado (ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000) em entreposto de pescado**. Seropédica, RJ. Tese (Doutorado em Ciências e Tecnologia dos Alimentos) - UniversIGade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ.

LEAL, M. C.; PIMENTEL, T.; RICARDO, F; ROSA, R. CALDAO, R.Seafood traceability:current needs, available tools, and biotechnological challenges for Origin certification. **Trends in Biotechnology**. v.33, n.6, p.331-336. 2015.

LOPES, J. F. **Rastreabilidade em pescado:** inovação no Semiárido. Software armazena informações sobre o cultivo e captura. Portal dia de Campo: Informação que produz. Postada em 21/10/2011. Disponível em: <<http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?IG=25387&secao=Colunas%20Assinadas>>. Acesso em 17 jun. 2012.

MATEUS, J. C.; RUSSO-ALMEIDA, P. A. Traceability of 9 Portuguese cattle breeds with PDO products in the market using microsatellites. **Food Control**, n. 47, p. 487-492. 2015.

MOURA, R. S. T. GONÇALVES, A. G. Rastreabilidade como complemento no gerenciamento da qualidade do pescado. **Rev. Panorama da Aquicultura**, p. 94-108. 2012.

NUNES, M. H. O. As políticas federais de incentivo à difusão das indicações geográficas e preservação do patrimônio cultural: teoria e prática. **III Workshop Catarinense de Indicação Geográfica. II Encontro Internacional Interdisciplinar em Patrimônio Cultural**. Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Joenville, SC. 2014.

ONU. Organização das Nações Unidas. **Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development**. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. 35p. Disponível em: < <https://www.unfpa.org/resources/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development> >. Acesso em: 30 ago. 2020.

PF. Polícia Federal. Agência de Notícias da Polícia Federal. **Operação Poseidon combate fraudes em comercialização de pescados em SC**. 2014. Disponível em: < <http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2014/04/operacao-poseidon-combate-fraudes-em-comercializacao-de-pescados-em-sc> >. Acesso em: 04 set. 2020.

POUTA, E et. al. Consumer choice of broiler meat: the effects of country of origin and production methods. **Food Qual Prefer**, v.21, p.539-546. 2010.

RANDRUP, M.; STOROY, J.; LIEVONEN, S.; MARGEIRSSON, S.; ARNASON, S.V.; OLAVSSTOVU, D.; MØLLER, S.F.; REDERIKSEN, M. T. Simulated recalls of fish products in five Nordic countries. **Food Control**, v.19, p.1064–1069.2008.

REGO, R. A.; MADI, L. F. C. **Fatores que influenciam o mercado de bens de consumo**. In: BRASIL pack trends 2020. Campinas: ITAL. cap. 2, p. 41-65. 2012.

RIJSWIJK, W., FREWER, L. J. Consumer needs and requirements for food and ingredient traceability information., **International Journal of Consumer Studies**, v.36, p.282– 290. 2012.

SAID, A. M; SILVA, J. C. A espacialidade da covid-19 e o pandemônio em meio a pandemia nas comunidades tradicionais da Caxaíba – Paraty. **Rev. Tamoios**, São Gonçalo (RJ), ano 16, n. 1, Especial COVID-19. p. 206-231, maio 2020.

SEBRAE - Sistema Brasileiro de Apoio à Pequenas e Micro Empresas -. **Empresa incubada cria programa de rastreamento de tilápias**. Disponível em: < <http://www.empreendedor.com.br/noticias/empresa-incubada-cria-programa-de-rastreamento-de-til%C3%A1pias> >. Acesso em: 04 dez. 2011.

SEBRAE. Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas. **Indicação Geográfica das vieiras da baía de Ilha Grande, Angra dos Reis-RJ**. Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (SEBRAE). Aquicultura e pesca RJ de Janeiro. 2015. Disponível em:<<http://aquicultura-rj-sebrae.com.br/indicacao-geografica-das-vieiras-da-baia-de-ilha-grande/>>. Acesso em: 16 mar. 2016.

SILVA, A. P. **Pesca artesanal brasileira**. Aspectos conceituais, históricos, institucionais e prospectivos. Embrapa Pesca e Aquicultura, 2014. 32p.

SILVA, K. A. M. **Aplicação da análise de riscos como ferramenta para a garantia do alimento seguro e da sustentabilidade**: estudo de caso na tilapicultura. 114f. Dissertação

(Mestrado em Ciências e Tecnologia dos Alimentos) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ. 2012.

SILVA, N. R. **Caracterização das relações socioeconômicas da cadeia produtiva da pesca em Macaé – RJ**: Transformações e impactos associados à economia do petróleo. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campos dos Goytacazes, RJ. 2013.

SILVA, K. A. M.; SILVA, M. R.; OLIVEIRA, G. M.; COSTA, S. R. R.; WEYANDT, A. J. Rastreabilidade na cadeia de pescado: uma ferramenta para a segurança do alimentos. **Rev.Hig. Alim.** Vol.28, nº234-235. 48-52p. 2014.

SUCASAS, L. F. A. **Avaliação de resíduo do processamento de pescado e desenvolvimento de co-produtos visando o incremento da sustentabilidade da cadeia produtiva**. São Paulo. 166f. Tese (Doutor em Ciências). Universidade de São Paulo. Centro de Energia Nuclear. 2011.

THOMPSON, M.; SYLVIA, G.; MORISSEY, M.T. Seafood Traceability in the United States: current trends, system design, and potential applications. **Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety**, v.1, p.1-7, 2005.

UMBERGER, W. J.; FEUZ, D. M.; CALKINS, C. R.; SITZ, B. M. Country-of-Origin Labeling of Beef Products: U.S. Consumers' Perceptions. **Journal of Food Distribution Research** v.34, n. 3. 2003.

VALENTE, M. E. R.; PEREZ, R.; R. A.; CHAVES, J.B.P. Indicação geográfica de alimentos e bebidas no Brasil e na União Europeia. **Cienc. Rural**, Santa Maria, v. 42, n. 3, p. 551-558. 2012.

VANHONACKER, F., ALTINTZOGLU, T., LUTEN, J., & VERBEKE, W. Does fish origin matter to European consumers? Insights from a consumer survey in Belgium, Norway and Spain. **British Food Journal**, v.113, n. 4, p.535-549. 2011.

WOLF, C. A, TONSOR, G. T, OLYNK, N. J. Understanding US consumer demand for mild production attributes. **J Agr Resour Econ** v.36, n.2, p.326-342. 2011.

YANGUI, A., M. COSTA-FONT and J. M. Gil. "Revealing additional preference heterogeneity with an extended random parameter logit model: The case of extra virgin olive oil." **Spanish Journal of Agricultural Research** v.12, n., p. 553-567. 2014.

CAPÍTULO 42: ESCANEAMENTO POR BIOIMPEDÂNCIA ELÉTRICA EM LEITE: EXPLORANDO A TÉCNICA

CHAPTER 42: ELECTRIC MILK BIOIMPEDANCE SCANNING: EXPLORING THE TECHNIQUE

Ana Maria Geller¹; Luciano Carvalho Ayres²; Claudia Wollmann Carvalho³; Renato Hartwig Neuenfeld⁴; Wemerson de Castro Oliveira⁵

Resumo

O leite é um produto alimentício de alto valor nutritivo e muito versátil na agroindústria de alimentos. Sua cadeia produtiva movimenta valores significativos, sendo necessário constante controle de qualidade para coibir falsificações e fraudes. Neste sentido, pesquisadores têm se dedicado a desenvolver métodos para análise do leite, bem como para identificar as diversas adulterações deste produto. A proposta deste artigo foi analisar sistematicamente publicações em revistas científicas, nas quais a bioimpedância foi utilizada como técnica para analisar o leite, selecionadas das principais plataformas de busca nos últimos 5 anos. A bioimpedância tem sido utilizada para detectar e monitorar muitos parâmetros e processos biológicos, com a vantagem de ser uma técnica relativamente barata e não invasiva. Em se tratando do leite, os trabalhos analisados, indicaram que a técnica tem se mostrado uma ferramenta promissora para a detecção e quantificação de diversos parâmetros físicos, químicos e biológicos, utilizados na determinação da qualidade do leite bovino, tanto para controle como monitoramento de eventuais alterações na sua composição. Contudo, por ser uma técnica nova no setor, sua utilização para a análise de rotina ainda implica na necessidade de maior pesquisa.

Palavras-Chave: Leite bovino, Impedância, Análise sistemática.

Abstract

Milk is a food product of high nutritional value and very versatile in the food industry. Its production chain moves values, requiring constant quality control for counterfeiting and fraud to prevent. In this sense, researchers have been dedicated to developing methods for analyzing milk, as well as to identify the various adulterations of this product. The proposed article was systematically analyzed publications of these scientific journals, in which a bioimpedance was used as a technique to analyze milk, selected from the main search platforms in the last 5 years. Bioimpedance has been used to detect and monitor many biological parameters and processes, with the advantage of being a relatively inexpensive and non-invasive technique. In the case of milk, the forced labor indicated that the technique has been specified as a promising tool for the detection and quantification of several physical, chemical and biological factors used in determining the quality of bovine milk, both for control and monitoring of strength. changes in

¹ Doutora em Química Analítica Ambiental, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul), anageller@ifsul.edu.br

² Mestre em Engenharia Elétrica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul), lucianoayres@ifsul.edu.br

³ Doutora em Química, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul), claudiacarvalho@ifsul.edu.br

⁴ Mestre em Engenharia Elétrica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul), renatoneuenfeld@ifsul.edu.br

⁵ Doutor em Microbiologia Agrícola, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul), wemersonoliveira@ifsul.edu.br

its composition. However, as it is a new technique in the sector, its use for routine analysis still implies the need for further research.

Keywords: Bovine milk, Impedance, Systematic analysis.

1. Introdução

Leite, é uma combinação de elementos sólidos, como lipídios (gordura), carboidratos, proteínas, sais minerais e vitaminas em 87% de água (BRITO et al., 2020). Ele é um dos produtos mais versáteis da agroindústria de alimentos, podendo ser consumido na sua forma original ou ser transformado em derivados (RENTERO, 2018).

Atualmente, no Brasil, estima-se que a captação total de leite comercializado no ano de 2019, foi de 24,97 bilhões de litros, existindo 1.171.190 fazendas leiteiras. A região Sudeste possui o maior volume de produção, já a região Centro-Oeste apresentou o maior incremento em relação a 2018 (17,33%), seguida da Região Sul (13,48%) (MILKPOINT, 2020). A cadeia produtiva do leite está presente em todo o Brasil, gerando um faturamento, em 2017, de R\$ 70,2 bilhões para a indústria de laticínios no país, crescimento de 4% em relação a 2016 (RENTERO, 2018). Entre os produtos de maior consumo, está o leite longa vida ou UHT (*Ultra High Temperature*) ou, traduzindo, leite UAT (ultra alta temperatura). Tal fato, segundo a Associação Brasileira do Leite Longa Vida - ABVL, se deve pela preferência no consumo por cerca de 80% da população, decorrente de sua praticidade de armazenamento sem a necessidade de refrigeração e estendido tempo de prateleira (BERTOLINI; ROSSI, 2017; OLIVEIRA et al., 2019).

Para garantir a qualidade do leite e seus derivados e ainda coibir fraudes, o governo brasileiro, elabora e atualiza as diretrizes de controle. Atualmente, a instrução normativa nº 30/2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, oficializa o Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal (BRASIL, 2018). O manual de 140 páginas, descreve com precisão como cada análise deve ser realizada, fazendo distinção entre análises físico-químicas e microbiológicas. O capítulo 2 é destinado a descrição referente ao leite e produtos lácteos. As análises recomendadas são baseadas no preparo de diferentes soluções, empregando titulações, reações e outras técnicas trabalhosas que demandam tempo e experiência do analista (BRASIL, 2017). Nesse sentido, a procura por novas técnicas de análise para a indústria alimentícia, particularmente, para a promoção da qualidade do leite, tem sido uma constante e entre elas, neste artigo abordaremos, com especial atenção, a impedância.

A impedância é um termo comum no campo da eletricidade e denota a razão entre a tensão e a corrente elétrica estabelecida em um componente ou sistema. O conceito de

bioimpedância trata das propriedades elétricas de um tecido biológico, como condutividade, permissividade, resistência, capacitância e indutância (PLIQUETT, 2010). Os tecidos biológicos são formados por células de características semelhantes envoltas por um líquido eletrolítico. Tais células são combinações de moléculas organizadas e compostas por diversos componentes químicos, tanto inorgânicos como água e sais, como os orgânicos: ácidos, carboidratos e proteínas (QUILLFELDT, 2005; PEREIRA, 2009). Entre esses tecidos, pode haver a circulação de corrente elétrica, através de íons de compostos dissociados no meio aquoso existente, tanto dentro como fora da célula, uma vez que nos tecidos biológicos não há disponibilidade de elétrons livres como ocorre nas bandas de valência dos metais condutores (QUILLFELDT, 2005). Assim, a bioimpedância elétrica pode ser definida como o grau de impedimento a passagem da corrente elétrica em um meio biológico, cuja medição é realizada através de eletrodos metálicos. O modelo elétrico de um meio biológico pode ser representado por um elemento resistivo, que depende majoritariamente da composição química do meio extracelular, e de um elemento capacitivo decorrente das membranas celulares e do conteúdo intracelular.

Neste contexto, a associação destes elementos forma a chamada bioimpedância que varia com a frequência (f), em hertz (Hz), da fonte de excitação aplicada e com o tipo de tecido (PEREIRA, 2009). A influência da frequência de excitação no comportamento da corrente elétrica nos tecidos biológicos é ilustrada na Figura 1 (a), ou seja, para frequências inferiores a 100 kHz, a corrente predominante circula no espaço extracelular e para frequências maiores a corrente atravessa a membrana celular e percorre o espaço intracelular (GRIMNES; MARTINSEN, 2000). Assim, um tecido biológico pode ser modelado por um circuito elétrico equivalente conforme ilustrado na Figura 1 (b), onde o espaço extracelular pode ser representado por um resistor (R_e) em paralelo com um circuito-série composto pelo capacitor (C_m) e o resistor (R_i), referentes à membrana celular e ao meio intracelular, respectivamente (HOLDER, 2004; TAKA, 2008).

Como uma forma de excitação dos tecidos biológicos e medição destas propriedades elétricas, é necessária a construção de um conjunto de eletrodos dispostos e conectados a um circuito eletrônico, responsável pela injeção de corrente elétrica e medição de tensão, denominado canal de medição (MORO; PORTO, 2015; PEREIRA, 2009). Os valores de impedância do tecido biológico, compreendidos entre os eletrodos de medição, são geralmente representados por um número complexo Z , dado em ohms (Ω), composto por uma parte real, $\text{Re}\{Z\}$, e outra imaginária, $\text{Im}\{Z\}$. A parte real corresponde à componente resistiva R da impedância Z , enquanto a imaginária sua reatância capacitiva, X_C . Neste caso, os números complexos em sua forma polar representam a relação de amplitude (magnitude ou módulo de

Z , simbolizado por $|Z|$, em ohms) e atraso entre os sinais alternados de tensão e corrente elétrica (fase de Z , simbolizado por um ângulo θ , em graus). Usualmente, os dados de bioimpedância medidos são plotados em um plano de impedância complexo como o da figura 2, de acordo com o modelo de Cole-Cole (GRIMNES; MARTINSEN, 2000). Conforme a frequência $\omega = 2\pi f$, em rad/s, do sinal de excitação aumenta, o ângulo de fase θ eleva-se gradualmente, à medida que a corrente passa a fluir pela resistência intracelular. Para altas frequências, a reatância capacitiva da membrana celular torna-se desprezível e a corrente flui completamente através do ambiente intracelular e extracelular. Assim, a impedância equivalente total torna-se, mais uma vez, puramente resistiva. Em situações práticas, o gráfico de Cole-Cole observado é um semicírculo, como o da Figura 2.

Figura 1. (a) Comportamento da corrente elétrica em tecidos biológicos em função da frequência. (b) Circuito elétrico equivalente de uma célula.

Fonte: (a) Adaptado de Porto et al., 2020; (b) Adaptado de Holder, 2004.

Figura 2. Gráfico de Cole-Cole para bioimpedância.

Fonte. Adaptado de Grimnes; Martinsen, 2000.

Sendo assim, geralmente, o canal de medição de bioimpedância é composto de um gerador de onda senoidal, um condicionador de sinal para ajustar o nível de tensão de saída do bloco gerador, uma fonte de corrente controlada por tensão, um bloco para leitura das tensões, um bloco demodulador fase-quadratura, que tem a finalidade de fornecer o valor real e imaginário da impedância elétrica, e por fim, um filtro passa-baixa. Um diagrama simplificado do canal de medição pode ser visto na Figura 3.

Figura 3. Diagrama simplificado de um canal de medição de bioimpedância.

Fonte. Adaptado de Porto, 2009.

A maioria das fontes de corrente utilizadas em medidas de bioimpedância é chamada de conversor tensão/corrente, pois a corrente na saída é proporcional à tensão da entrada. Idealmente, uma fonte de corrente I_s deve possuir impedância de saída Z_o infinita, assim a corrente I_L fornecida para a carga é constante (Figura 4a). Porém, as fontes de corrente reais possuem uma impedância de saída finita e podem ser representadas por um resistor R_o em paralelo com um capacitor C_o , conforme indicado na figura 4b. A existência desta impedância de saída causa erros sistemáticos nas medidas de bioimpedância e, portanto, deve ser caracterizada previamente. Cabe ressaltar, ainda, que existem variações no projeto de canais de medição, quanto ao tipo de fonte de excitação, quantidade e construção dos eletrodos e topologias dos circuitos eletrônicos envolvidos no canal de medição.

A técnica da impedância, por ser não invasiva, relativamente barata e por possibilitar a detecção e o monitoramento de vários parâmetros e processos biológicos já é bem utilizada na área da medicina (TAKA, 2008; YÚFERA; CAÑETE; DAZA, 2011; SANCHEZ et al., 2011). Em alimentos, há trabalhos que remontam a década de 90 (NEAVES; WADDELL; PRENTICE, 1988; DEAK; BEUCHAT, 1993; RUSSELL; FLETCHER; COX, 1994), porém, recentemente sua utilização foi retomada, principalmente para a análise de vegetais e frutas (BAKR et al., 2016; FREEBORN et al., 2017; EL KHALED et al., 2017; AL ALI et al., 2018). Ainda é importante destacar que aspectos particulares da técnica implicam numa nomenclatura

diferenciada. Quando há variação de frequência os termos mais empregados são Espectroscopia de Impedância Elétrica (*Electrical Impedance Spectroscopy* - EIS) ou Espectroscopia de bioimpedância (*Bioimpedance Spectroscopy* ou *Bioelectrical Impedance Spectroscopy* - BIS). O EIS é bem usual, mesmo nos trabalhos de bioimpedância. Já quando a frequência de medida é fixa, a técnica é conhecida por Análise de Bioimpedância Elétrica (*Bioelectrical Impedance Analysis* - BIA). Contudo, este artigo de revisão estará focado em apresentar a utilização da metodologia de espectroscopia de bioimpedância em leite bovino elucidando suas potencialidades de análise, já que este alimento é muito consumido e, portanto, deve oferecer boa qualidade, bem como envolve uma cadeia produtiva extensa e mundialmente estruturada, com representação de norte ao sul do Brasil e que, infelizmente, costuma ser objeto de fraudes.

Figura 4. Modelo de uma fonte de corrente (a) ideal, (b) real.

Fonte: Adaptado de Holder, 2004.

2. Desenvolvimento

A presente revisão sistemática considerou artigos elegíveis de estudos originais realizados com a temática “Utilização da metodologia de escaneamento por bioimpedância elétrica em leite bovino”, publicados em inglês, espanhol ou português nos últimos cinco anos (2015-2020). Considerando os critérios de elegibilidade desta proposta, os artigos não originais como revisões, editoriais, cartas, comentários e capítulos de livros não foram considerados. As fontes de informações consideradas foram retiradas das bases de dados eletrônicas incluídas na *Google Scholar*, *LILACS*, *PubMed*, *Science Direct*, *Scielo* e *Tripdatabase*, a partir dos termos: “*impedance*”, “*bioimpedance*”, “*milk*” e “*microbiology*” cruzados um com o outro. A fase inicial de seleção dos artigos foi através da análise dos títulos, seguida do resumo e por último a leitura integral, sendo esta avaliação independente perpassando por um total de 25 artigos

originais sobre a temática, sendo 7 excluídos por não apresentarem dados originais, ou seja, foram artigos de revisão, ou ainda apresentaram dados de outros tipos de leite animal (égua e cabra).

As pesquisas com a aplicação da metodologia de impedância elétrica têm crescido substancialmente nos últimos anos, principalmente voltadas para a área de análises de alimentos. Na plataforma *PubMed* o primeiro relato de citação sobre a impedância (*impedance*) foi em 1919 e, posteriormente, em 1977 surge a citação do termo bioimpedância (*bioimpedance*), sendo este último relacionado às propriedades elétricas de um tecido biológico (QUILLFELDT, 2005; PEREIRA, 2009). A utilização da técnica na área da saúde e de alimentos não é recente, citações datadas de 1947 foram identificadas em relação a impedância na medicina (*impedance + medicine*) e em alimentos (*impedance + food*) e 1967 na área de nutrição (*impedance + nutrition*) (*PubMed*). Atualmente, são encontradas 354.278 e 5.183 citações sobre o termo impedância e bioimpedância, respectivamente, na *Science Direct*.

No Quadro 1, apresenta-se o número de citações, dos últimos cinco anos, considerando os termos de busca e suas combinações, utilizados nesta revisão, nas diferentes plataformas. O conjunto dos termos *impedance+milk* foi o que apresentou maior número de citações em todas as plataformas. Observou-se que, substituindo o termo *impedance* por *bioimpedance*, nas combinações de palavras, o número de citações foi drasticamente reduzido. Considerando as plataformas que publicam somente artigos científicos, a *Science Direct* foi a que apresentou maior número de citações.

Observa-se um crescente aumento de citações ao longo dos anos, em publicações que relacionam a técnica de impedância/bioimpedância em análises físico-químicas e microbiológicas de leite, principalmente bovino (Quadro 1). Considerando os termos utilizados nas buscas realizadas e as duas plataformas mais acionadas para pesquisas de artigos originais, *Science Direct* e *PubMed*, é possível observar um aumento de citações de 2,0 e 1,3 vezes comparando o ano de 2020 com o de 2015, respectivamente. Deve-se ressaltar que no ano de 2020 o número de citações consideradas é somente referente ao primeiro semestre.

Ao final da busca, considerando os últimos 5 anos, foram analisados 18 artigos, dentre estes 9 (nove) publicado entre 2016 (n=5) e 2017 (n=4). Outra observação interessante, diz respeito ao tipo de revista onde os artigos foram publicados, 50% dos trabalhos foram abordados em revistas específicas da área de engenharia elétrica, enquanto que os outros trabalhos foram publicados em revistas com ênfase em alimentos, microbiologia, ciência animal e química. Tal fato, pode estar associado a necessidade de conhecimento e aprimoramento do

equipamento/técnica para a determinação da impedância, e por outro lado, revela a versatilidade da técnica em termos de aplicações.

Quadro 1. Número de citações entre os anos de 2015-2020 nos bancos de dados de diferentes plataformas.

Termos	Plataformas pesquisadas						
	Google Scholar	Science direct	PubMed	Scielo	TripDatabase	LILACS	Total
Impedance+milk	15000	2557	99	1	135	0	17792
Impedance+milk+microbiology	2730	335	12	0	15	0	3092
Bioimpedance+milk	1390	93	22	1	19	0	1525
Bioimpedance+milk+microbiology	150	6	0	0	0	0	156
Total	19270	2991	133	2	169	0	
Média	4817,5	747,75	33,25	0,5	42,25	0	
Termos	Science Direct						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Média
Impedance+milk	255	332	410	474	565	521	2557
Impedance+milk+microbiology	34	44	61	61	62	73	335
Bioimpedance+milk	16	10	15	13	22	17	93
Bioimpedance+milk+microbiology	0	1	1	1	1	2	6
Total	305	387	487	549	650	613	
Média	76,25	96,75	121,75	137,25	162,5	153,25	
Termos	PubMed						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Média
Impedance+milk	17	17	25	22	23	20	124
Impedance+milk+microbiology	1	2	2	3	4	0	12
Bioimpedance+milk	2	3	4	7	6	5	27
Bioimpedance+milk+microbiology	0	0	0	0	0	0	0
Total	20	22	31	32	33	25	
Média	5	5,5	7,75	8	8,25	6,25	

Fonte: Própria.

3. Discussão

O leite pode ser comercializado na forma cru ou “in natura”, ou após sofrer processo térmico de pasteurização ou UHT, segundo as normativas contidas nas portarias n° 146/1996 e n° 370/1997 do MAPA (BRASIL, 1996; BRASIL, 1997). Contudo, é a relação constante entre seus componentes a base para os testes que objetivam apontar a ocorrência de problemas que alteram a composição do leite (BRITO et al., 2020). Na análise realizada, sete artigos apresentaram dados de impedância determinados em leite cru, seis utilizaram o leite tipo UHT e em seis trabalhos o tipo de leite não foi informado, o que dificulta a comparação entre

trabalhos. É comum que as pesquisas apresentem dados de mais de um tipo de leite, diferenciado, principalmente, por tipo de processamento ou ainda teor de gordura. Ainda, a análise das publicações permite dizer que em dois artigos o objetivo era, através da impedância, avaliar a qualidade por características físico-químicas, oito tinham como foco combater adulteração e oito com avaliação química e biológica (Quadro 2).

Ao avaliar as metodologias utilizadas nos diferentes trabalhos, percebeu-se uma grande variação de temperatura de análise, sendo a maior temperatura 47°C (BANCALARI et al., 2016) em ensaios com verificação de atividade metabólica bacteriana, e a menor sendo 5°C (aproximadamente a temperatura utilizada na armazenagem e transporte) nos ensaios de análise de bioimpedância elétrica realizado por Schumacher e colaboradores (2019).

Apesar de quatro trabalhos citarem dados de condutividade (URIA et al., 2016; TRIPATHY et al., 2017; SCHUMACHER et al., 2019; SUDE & GHODINDE, 2019), em nenhum deles foi mencionado o equipamento utilizado, para Sude & Ghodinde (2019), a condutividade do leite puro foi de 4,65mS, já do leite adulterado com ureia o valor passou para 4,58mS e com amido para 4,734mS.

Percebe-se a busca pela otimização das pesquisas com impedância em análise de leite, pelo fato de oito trabalhos estarem usando equipamentos comerciais (LIU et al., 2015; LI et al., 2016; BANCALARI et al., 2016; TRIPATHY et al., 2017; DAS et al., 2018; SCHUMACHER et al., 2019; NASCIMENTO et al., 2020; SOARES et al., 2020), enquanto que quatro apresentaram resultados de equipamentos de desenvolvimento próprio ou com adaptações. Ainda, cinco grupos não informam precisamente sobre a origem do equipamento utilizado. Os dados de frequência citados, apresentam variação entre 0,1Hz até 10MHz. No entanto, há divergências de melhor valor, 30kHz ou 100kHz, para respectivamente, Durante e colaboradores (2016) e Tripathy e colaboradores (2017). Para o grupo de Tripathy, o valor de impedância para o leite puro ficou entre 620 e 650Ω.

Quadro 2. Metodologias utilizadas nos diferentes trabalhos

Citação	Revista	Objetivo	Análise	Frequência
CHAKRAVBORTY e BISWAS, 2018	IEEE Sensors Journal	Identificar o limite mínimo detectável para cinco adulterantes comuns no leite	Adulteração: detergente, (NH ₄) ₂ SO ₄ ; NaOH; NaHCO ₃ e NaCl	5,6kHz – 500Hz
DAS et al., 2018	IEEE Sensors Journal	Detectar e quantificar de sabão, como adulterante, em leite, empregando espectroscopia de impedância elétrica, variando os parâmetros de impedância, capacitância, condutância e corrente.	Adulteração: Sabão (concentrações - 0,1; 0,3; 0,5; 0,7 e 0,9 %)	100Hz – 1MHz
DURANTE et al., 2016	IEEE Sensors Journal	Apresenta uma metodologia desenvolvida para a detecção de adulteração de leite bovino por aplicação elétrica com medições de impedância.	Adulteração: H ₂ O ₂ ; NaOH e formol (concentração – 1; 5 e 10%)	10kHz - 10MHz (melhor resultado em 30kHz)
FARAHI et al., 2015	Food Control	Determinar paraquat no eletrodo de prata usando espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS).	Contaminação química: herbicida Paraquat	100MHz – 10KHz
GUPTA et al., 2017	IEEE Sensors Journal	Desenvolver um novo sensor de microeletrodo portátil baseado em espectroscopia de impedância para a detecção de adulteração no leite.	Adulteração: detergente (concentrações – 2; 4; 6; 8 e 10%)	faixa 0,05-5,0kHz (melhor resultado em 4,75kHz)
HUI e YING, 2017	ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers)	Avaliar um método de análise quantitativa rápida para detecção de ofloxacina em leite cru usando reconhecimento específico de molécula e uma técnica de espectro de impedância eletroquímica (EIS)	Contaminação química: antibiótico ofloxacina	1kHz
ISTAMBOULIÉ, G. et al, 2016	Talanta	Desenvolver um sensor impedimétrico baseado na imobilização covalente de aptâmeros em eletrodos impressos em tela descartáveis após ativação do sal de diazônio	Composto biológico: aflatoxina M1	10kHz - 1Hz
LOPES et al., 2017	Food Anal. Methods	Usar espectroscopia de impedância elétrica (EIS) e cálculo fracionário para caracterizar leite ultra pasteurizado	Físico-química: comparação entre tipos de leite	5Hz - 1MHz
SOARES et al., 2020	Food Chemistry	Comparar resultados de processos analíticos químicos padrão e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) na caracterização de diferentes bebidas	Comparação: café moído; café solúvel; substitutos do café; cevada; leite de vaca; bebidas vegetais; chá; infusões de plantas e misturas de plantas	0,1Hz - 10kHz
SUDE e GHODINDE, 2019	International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI 2019)	Realizar medidas de impedância elétrica em tempo real de amostras de leite adulterados	Adulteração: água; ureia e amido	10kHz a 10MHz (melhor resultado em 90 kHz)
BANCALARI, E. et al., 2016	Frontiers in Microbiology	Encontrar uma maneira objetiva de interpretar a significância metabólica das curvas de impedância e propô-la como uma abordagem válida para avaliar o desempenho acidificante potencial de bactérias ácido-láticas iniciadoras a serem empregadas na transformação do leite	Microbiológico: <i>Lactobacillus helveticus</i> ; <i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>Bulgaricus</i> ; <i>Lactococcus lactis</i> ; <i>Streptococcus thermophilus</i>	

Citação	Revista	Objetivo	Análise	Frequência
TRIPATHY et al., 2017	Food Chemistry	Propor uma nova abordagem de detecção da qualidade do leite com base na utilização de propriedades biofísicas inerentes como "marcadores" de adulteração	Adulteração: Água; hidróxido de sódio; carbonato de sódio; formalina; alantoína; sulfato de amônio; ácido benzoico; ácido cianúrico.	1Hz - 1MHz. (melhor resultado em 100kHz)
SCHUMACHER et al., 2019	South African Journal of Animal Science	Utilizar a análise de bioimpedância elétrica (BIA) como método alternativo de avaliação da qualidade do leite cru bovino	Físico-química; contagem bacteriana e de células somáticas	50kHz
LIU et al., 2015	Electrochimica Acta	Desenvolver um método simples <i>in situ</i> para determinar a concentração bacteriana no leite com um sensor de microeletrodo interdigitado.	Microbiológico: <i>Escherichia coli</i>	1Hz - 1MHz
URIA et al., 2016	Electrochimica Acta	Determinação rápida de células bacterianas viáveis em amostras de leite usando sensor impedimétrico	Microbiológico: <i>Escherichia coli</i>	100Hz – 1MHz (posteriormente fixou em 10kHz)
DAS et al., 2015	ISA Transactions	Desenvolver um sistema de instrumentação completo para detectar diferentes tipos de adulteração no leite.	Adulteração: água da torneira (concentrações - 10; 20 e 40%); ureia (concentrações -0,6; 0,8; 1,0 e 1,2 mg/mL)	7kHz
LI et al., 2016	Sensors and Actuators A: Physical	Apresentar um novo método de inspeção que usa a indutância de bobina dupla para avaliar a qualidade do leite cru.	Qualidade: contagem de células somáticas	9MHz
NASCIMENTO et al., 2020	QUARKS: Brazilian Electronic Journal of Physics, Chemistry and Material Science	Apresentar modelos matemáticos obtidos a partir de medidas elétricas para controle da qualidade do leite e detecção de adulterações	Adulteração: etanol (concentrações – 0; 5; 10; 15; 20; 25 e 30%), cloreto de sódio (concentrações – 0 a 0,15%) e bicarbonato de sódio (concentrações – 0 a 0,3%)	100Hz

3.1 Bioimpedância na análise físico-química e biológica do leite

As características físico-químicas do leite podem ser alteradas devido às condições genéticas, nutricionais e ambientais das vacas, e de forma fraudulenta nos processos de obtenção, armazenamento, transporte e beneficiamento do leite (BERTOLINI; ROSSI, 2017), principalmente relacionadas à adição ou remoção de substâncias químicas próprias ou estranhas à sua composição (ABRANTES et al., 2014).

Lopes e colaboradores (2017) analisaram leite UHT integral, semi e desnatado e, ainda, leite cru semi e desnatado com redução e/ou fortificação dos teores de gordura, para simular amostras de leite usando especificações da espectroscopia por impedância elétrica, variando a frequência entre 5Hz e 1MHz, e o cálculo fracionário para caracterizar leite ultra pasteurizado. Os valores encontrados foram comparáveis aos determinados através dos métodos químicos padrão, revelando forte correlação entre as técnicas. Os resultados mostram que a espectroscopia de impedância elétrica e cálculo fracionário são capazes de modelar leite com um conjunto reduzido de parâmetros.

Chakraborty e Biswas (2018) variaram o percentual de gordura, entre 1,5 a 20% com creme de leite em amostras de leite UHT integral, semi e desnatado que foram analisadas, através de um sensor de impedância, resultando em diversas medidas do ângulo da fase da impedância, sensíveis a concentração iônica do meio, pela presença de íons como Na^+ , K^+ e Cl^- e outros minerais presentes no leite.

Na avaliação da qualidade do leite bovino cru, os teores de proteína e gordura são os responsáveis por aumentar o valor agregado (RENTERO, 2018). Sob esta perspectiva a análise por bioimpedância elétrica foi utilizada para avaliar não somente a gordura, mas também através dos critérios: contagem de células somáticas (CCS), contagem bacteriana total (CBT), proteína, lactose, sólidos totais (ST) e sólidos não gordurosos (SNG), com resultados que demonstraram potencial para estimar a composição do leite, mas necessitando aumentar a precisão da técnica (SCHUMACHER et al., 2019).

É interessante ressaltar que foi possível determinar a qualidade de leite cru, através do controle de CCS, desta vez utilizando um *chip* de bobina dupla medindo a variação de fase para a indutância magnética, cujo equipamento apresenta um tamanho reduzido, baixo custo e com resposta rápida, ou seja, características desejáveis para análises de inspeção de rotina. Pela correlação proposta, os deslocamentos de fase medidos foram de 65° a 86° , correspondendo a uma variação de CCS de 2 a 500kcel/mL (LI et al., 2016).

Cabe destacar, que apesar dos artigos ressaltarem seus objetivos em análises físico-químicas de caracterização, é pelo controle destes parâmetros que as fraudes são descobertas e,

por consequência, a técnica é recomendável para a confirmação de adulterações.

3.2. Bioimpedância na avaliação de adulteração do leite

Os adulterantes mais comuns no leite são: água, soro, leite desnatado, colostro, substâncias amiláceas, goma, sacarose, sal e outros leites (ABRANTES et al., 2014). Visando coibir fraudes e manter a qualidade do leite e seus derivados no Brasil, a instrução normativa nº 30/2018, do MAPA, oficializa o Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal (BRASIL, 2018). Detectar as fraudes mais comuns, implica na utilização de técnicas sofisticadas como: espectroscopia, eletroforese em gel, espectroscopia de absorção e cromatografia líquida (ABRANTES et al., 2014; FAGNANI, 2016; DAS et al., 2018), e por isto, a comunidade científica busca novas alternativas, preferencialmente mais rápidas e baratas para tal finalidade, como a bioimpedância.

Medições de impedância, para caracterizar adulteração de leite cru e UHT, com diferentes proporções de água potável, água deionizada, peróxido de hidrogênio (H_2O_2), hidróxido de sódio (NaOH) e formaldeído (CH_2O) foram realizadas por Durante e colaboradores (2016). As amostras foram analisadas eletricamente aplicando as medições de espectroscopia de impedância elétrica em um sistema microcontrolado, permitindo um monitoramento em tempo real. Uma classificação dos resultados foi proposta usando um algoritmo de k-vizinhos mais próximos que permitiu qualificar quantitativamente as amostras em termos de pureza e adulteração.

Também Chakraborty e Biswas (2018) variaram o percentual de gordura, entre 1,5 a 20% com creme de leite em amostras de leite UHT integral, semi e desnatado, e assim, testaram os adulterantes (NaOH, $NaHCO_3$, $(NH_4)_2SO_4$ e NaCl) através de um sensor de impedância, sensível a concentração iônica do meio de medição, dando diferentes ângulo de fase da impedância. Conforme a concentração iônica da solução, a difusão destes íons se altera, refletindo na variação do valor de medida da impedância. O sensor de bioimpedância, obteve um baixo limite de detecção para os adulterantes testados: 1g/L para $(NH_4)_2SO_4$ e NaCl e 2g/L para NaOH e $NaHCO_3$.

É considerado fraude intencional a adição de substâncias alcalinas, como o sabão, no leite, com o intuito de aumentar a conservação ou diminuir a acidez, como também amido ou ureia para aumentar a densidade, fazendo a reconstituição da mesma, em caso de adição de água (ABRANTES et al., 2014). Existem muitas formas de se adulterar o leite, por isto, Tripathy e colaboradores (2017) propuseram em seu trabalho, a adoção de marcadores combinados, ou seja, de um laboratório multiplexado em plataforma de *chip* para avaliar os seguintes

adulterantes em leite: água da torneira, NaOH, NaCO₃, (NH₄)₂SO₄, formol, ureia, ácido benzóico e ácido cianúrico. A adulteração com multicomponentes é uma prática comum sendo monitorada por estes autores a partir das mudanças na condutividade elétrica e no pH do leite, sendo que a padronização do leite puro foi feita com a espectroscopia de impedância com eletrodo de trabalho de carbono vítreo e contador de platina/eletrodo de referência, a um potencial de 0,3V e na faixa de frequência de 1Hz – 1MHz. Como resultado, verificaram que a combinação de dois dados é eficiente para detectar a adulteração do leite, por exemplo, impedância e pH, para casos de fraudes com adição de ácido salicílico (4mg/mL) e posterior calibração de pH com a adição de NaOH. Apesar dos valores de pH estarem conforme o padrão recomendado, a amostra foi identificada como "adulterada" monitorando as mudanças na impedância elétrica.

Também neste sentido, foi verificado a adulteração de leite com amido e detergente, através de um micro sensor baseado na espectroscopia de impedância. Os resultados indicaram variação no valor de impedância para diferentes concentrações de amido e detergente nas amostras, variando a faixa de frequência de 0,05 – 5,0kHz. A impedância da amostra de leite de referência em frequência 4,75kHz foi considerada $8,01 \times 10^2 \Omega$, já a amostra de leite adulterada com 10% (p/v) de detergente teve um valor 56% do valor original, enquanto a impedância de amostra de leite adulterada com 10% (p/v) de amido apresentou um valor 160% maior do valor de referência (GUPTA et al., 2017).

O trabalho desenvolvido por Das e colaboradores (2018), através da detecção *on-chip* empregando a espectroscopia de impedância, determinou a adulteração de leite bovino com 0,1%; 0,3%; 0,5%; 0,7% e 0,9% (m/m) de sabão, avaliando a variação dos parâmetros elétricos: impedância, capacitância, condutância e corrente. Os autores observaram que a capacitância, a condutância e a corrente aumentam, ao passo que a impedância diminui com o aumento do teor de sabão no leite, sendo que o coeficiente de sensibilidade foi explicado em termos dos valores de condutância medidos.

Sude e Ghondinde (2019) através de um circuito em série, medindo os valores de impedância conseguiram classificar quantitativamente o leite adulterado com água, ureia e amido. Os autores perceberam que este tipo de adulteração altera principalmente a parte resistiva da impedância elétrica. A frequência de 90kHz se mostrou a melhor opção para examinar a adulteração do leite, pois o sensor funciona como um elemento de fase constante. Observaram também, que conforme a concentração de adulteração do leite aumenta, o valor da tensão diminui, assim como a condutividade e o valor de pH.

3.3. Bioimpedância na avaliação microbiológica

A impedância na microbiologia, principalmente em análise de alimentos, já tem sido pesquisada desde os anos 70. Além da aplicação da bioimpedância, que é comumente utilizado para análise do controle e quantificação microbiana, pesquisas também têm sido realizadas com o intuito de avaliação da atividade metabólica bacteriana (BANCALARI et al., 2016). Liu e colaboradores (2015) utilizaram um sensor de impedância com microeletrodos interdigitados para determinar a contaminação bacteriana *in situ*, ou seja, em fazendas, laticínios e plantas de processamento como uma ferramenta de controle de qualidade. Os pesquisadores testaram uma variação de frequência entre 1Hz a 1MHz, no entanto, concluíram que o crescimento bacteriano causa mudança mensurável entre as frequências de 1Hz – 10kHz (baixa frequência). Diante disso, determinaram o tempo de detecção (necessário para atingir uma mudança de impedância de 10%) em 10Hz, conseguindo detectar a presença de *Escherichia coli* no leite na concentração de 7 células/mL. O sistema testado mostrou ser eficiente e com alta sensibilidade para detectar uma variação de células entre $7,2 \times 10^0$ a $7,2 \times 10^8$ células/mL. Vale ainda destacar, que a detecção bacteriana foi possível sem a necessidade de fazer enriquecimento do leite para o crescimento da *E. coli*.

No ano seguinte, Uria e colaboradores (2016) também publicaram resultados relacionando o crescimento de *E. coli* com as alterações de impedância associadas à acidificação do meio de cultivo, mas na frequência de 10kHz. Diferentemente do estudo de Liu e colaboradores (2015), os autores tiveram que enriquecer a amostra de leite. O sistema apresentou menor sensibilidade de detecção comparado ao trabalho anterior, conseguindo detectar uma concentração de *E. coli* em uma faixa de 10^2 a 10^6 UFC/mL em 6 horas de incubação (margem de erro de 5-12%). Uma das conclusões dos autores foi que as alterações dependem do número de microrganismos na amostra, uma vez que para detectar as mudanças elétricas é necessário a mudança de pH devido ao metabolismo bacteriano.

Em um estudo utilizando um sistema comercial de análise microbiológica BacTrac 4300 R, sob influência de quatro diferentes temperaturas, mostrou a capacidade de avaliar a cinética de crescimento utilizando curvas de impedância. Foram utilizados no estudo supracitado quatro espécies de bactérias lácticas, *Lactobacillus helveticus*, *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus*, *Lactococcus lactis* e *Streptococcus thermophilus* totalizando 80 isolados, diluídas de 10 a 100.000 vezes (BANCALARI et al., 2016). Os autores também propuseram uma possibilidade, através da utilização da impedância, de avaliar o potencial de acidificação de bactérias lácticas *starter*, utilizadas na transformação do leite, indicando novos potenciais de

aplicação da técnica na produção de leite fermentado e queijo, principalmente queijos cozidos e semi-cozidos.

3.4. Bioimpedância na avaliação de contaminação de resíduos químicos e compostos biológicos

A técnica de impedância também tem sido aplicada na detecção de contaminação de resíduos químicos e compostos biológicos como toxinas produzidas por microrganismos. Farahi e colaboradores (2015) detectaram o herbicida Paraquat em amostra de leite utilizando impedância eletroquímica. Os autores conseguiram uma resposta da metodologia na faixa de detecção entre $1,0 \times 10^{-14}$ a $8,0 \times 10^{-4}$ mol/L, com uma repetibilidade de 1,03% considerando $n=8$. De forma conclusiva, o método pode ser amplamente aplicado, desde que em condições de trabalho otimizadas, para determinar ultra traços do herbicida Paraquat, na ordem de $7,37 \times 10^{-16}$ mol/L, com boa sensibilidade.

Um ano após o sucesso da pesquisa na detecção do herbicida Paraquat, um outro grupo de pesquisadores projetaram um *aptasensor* e conseguiram detectar a presença de aflatoxina M1 (AFM1) em leite através da espectroscopia de impedância eletroquímica. Para a detecção foi necessário um tratamento preliminar das amostras de leite usando uma extração simples (líquido-líquido), seguida de uma filtração através de membrana de PTFE de 0,2mm (ISTAMBOULIÉ et al., 2016). Concluiu-se que o sistema desenvolvido foi capaz de detectar AFM1 entre 20 e 1000ng/kg que são compatíveis com os níveis de contaminação natural.

Outro composto que também foi alvo de pesquisa com aplicação da técnica de impedância foi a ofloxacina (HUI e YING, 2017). Neste estudo, os autores objetivaram investigar um método de análise quantitativa rápida da concentração de ofloxacina em leite cru, em uma frequência de 1kHz, e criaram um modelo com base nos autovalores da relação sinal-ruído máximos da técnica de impedância eletroquímica. Hui e Ying (2017) concluíram que o método apresentou alta acurácia, repetibilidade e recuperação (recuperação das amostras variou de 88,2% a 94%), equivalente a precisão de uma análise de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Comparativamente, o maior erro da técnica de impedância eletroquímica com HPLC foi de 1,22% e da técnica isolada de 0,67%.

4. Considerações Finais

O levantamento e a análise sistemática dos trabalhos com a temática bioimpedância em leite, não pretendeu esgotar o assunto, ou fazer uma revisão da técnica em sua totalidade, mas adveio de uma proposta de evidenciar a versatilidade de aplicação da técnica. Nos últimos 5

anos, foi possível perceber o desenvolvimento da bioimpedância como alternativa, em diversas áreas da ciência dos alimentos. Para o leite, especialmente, tem se mostrado promissora para em análises físico-químicas, monitoramento de diversos agentes adulterantes e ainda, no controle microbiológico. Contudo, a utilização da bioimpedância, como técnica para análise de rotina na indústria leiteira, apesar da rapidez e custo baixo, ainda carece de consolidação, que com certeza virá através do desenvolvimento de maiores pesquisas.

5. Referências

ABRANTES, M. R., CAMPÊLO C. S.; SILVA J. B. A., 2014. Fraude em leite: Métodos de detecção e implicações para o consumidor. **Revista Instituto Adolfo Lutz**, v 73(3). p 244-251, 2014.

AL-ALI, A. A.; ELWAKIL, A.S.; MAUNDY, B.J. **Bio-impedance Measurements with Phase Extraction using the Kramers-Kronig transform: Application to Strawberry Aging**. In: IEEE 61st International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS), 2018, Windsor, 468 p.

BAKR, A. A.; RADWAN, A. G.; MADIAN, A. H.; ELWAKIL, A. S. **Aging effect on apples bio-impedance using AD5933**. In: 3rd IEEE Int. Conf. on Advances in Computational Tools for Engineering Applications (ACTEA), 2016, Beirute, 161 p.

BANCALARI, E.; BERNINI, V.; BOTTARI, B.; NEVIANI, E.; GATTI, M., 2016. Application of Impedance Microbiology for Evaluating Potential Acidifying Performances of Starter Lactic Acid Bacteria to Employ in Milk Transformation. **Frontiers in Microbiology**, v 7 (1628) p. 1-11, 2016.

BERTOLINI, A. B.; ROSSI, G. A. M., 2017. Análises físico-químicas e detecção de fraudes em leite tratado termicamente por Ultra Alta Temperatura (UAT) comercializado na Região Centro-Oeste do Estado de São Paulo, Brasil. **Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal**, v 11(4). p. 374 – 381, 2017.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Portaria nº 146, de 07 de março de 1996. Aprova os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade dos Produtos Lácteos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 3977, de 11 mar. 1996. Disponível em: <http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=1218>. Acesso em: 29 jul. 2020.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Portaria nº 370, de 04 de setembro de 1997. Aprova a Inclusão do Citrato de Sódio no Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade do Leite U.H.T (U.A.T). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 19700, de 08 set. 1997. Disponível em: <http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=1252>. Acesso em: 29 jul. 2020.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Manual de métodos oficiais para análise de alimentos de origem animal / Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa Agropecuária. – Brasília : MAPA, 2017. 140 p. ISBN 978-85-7991-111-8. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/laboratorios/legislacoes-e-metodos/poa/Manualdemtodosoficiaisparaanlisedealimentosdeorigemanimal1ed.rev_.pdf. Acesso em: 28 jul. 2020.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 30, de 26 de junho de 2018. Oficializa o Manual de Métodos Oficiais para Análise de Alimentos de Origem Animal. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 134, p. 9, 13 jul. 2018. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/29896222/do1-2018-07-13-instrucao-normativa-n-30-de-26-de-junho-de-2018-29896212. Acesso em: 28 jul. 2020.

BRITO, M. A.; BRITO, J. R.; ARCURI, E.; LANGE, C.; SILVA, M.; SOUZA, G.. Composição. In: Agência de Informação Embrapa: Agronegócio do Leite. Disponível em: https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia8/AG01/arvore/AG01_128_21720039243.html. Acesso em: 28 jul. 2020.

CHAKRABORTY, M.; BISWAS, K., 2018. Limit of detection for five common adulterants in milk: A study with different fat percent. **IEEE Sensors Journal**, v 18(6). p. 2395 - 2403, 2018.

DAS, S.; SIVARAMAKRISHNA, M.; BISWAS, K.; GOSWAMI, B., 2015. A low cost instrumentation system to analyze different types of milk adulteration. **ISA transactions**, v 56. p. 268-275, 2015.

DAS, C.; CHAKRABORTY, S.; KARMAKAR, A.; CHATTOPADHYAY, S. **On-chip Detection and Quantification of Soap as an Adulterant in Milk Employing Electrical Impedance Spectroscopy**. In: International Symposium on Devices, Circuits and Systems (ISDCS), Howrah, 2018, 1-4 p. DOI: <http://dx.doi.org/10.1109/ISDCS.2018.8379634>.

DEAK, T.; BEUCHAT, L. R., 1993. Comparison of conductimetric and traditional plating techniques for detecting yeasts in fruit juices. **Journal of applied bacteriology**, v 75(6). p. 546–550, 1993.

DURANTE, G.; BECARI, W.; LIMA, F. A. S.; PERES, E. M., 2016. Electrical Impedance Sensor for Real-Time Detection of Bovine Milk Adulteration. **IEEE Sensors Journal**, v 16(4). p.861-865, 2016.

EL KHALED, D.; CASTELLANO, N.N.; GAZQUEZ, J.A.; GARCIA SALVADOR, R.M.; MANZANO_AGUGLIARO, F., 2017. Cleaner quality control system using bioimpedance methods: a review for fruits and vegetables. **Journal of Cleaner Production**, v 140. p. 1749-1762, 2017.

FARAH, A.; EL GAINI, L.; ACHAK, M.; EL YAMANI, S.; EL MHAMMEDI, M. A.; BAKASSE, M., 2015. Interaction study of paraquat and silver electrode using electrochemical impedance spectroscopy: Application in milk and tomato samples. **Food Control**, v 47. p. 679-685, 2015.

FARGNANI, R. **As principais fraudes em leite**. Publicado em 13/06/2016. Disponível em: <https://www.milkpoint.com.br/colunas/rafael-fagnani/principais-fraudes-em-leite-100551n.aspx>. Acesso em: 29 jul. 2020.

FREEBORN, T. J.; ELWAKIL, A. S. & MAUNDY, B., 2017. Variability of Cole-model bioimpedance parameters using magnitude-only measurements of apples from a two-electrode configuration, **International Journal of Food Properties**, 20:sup1, S507-S519, 2017.

GUPTA, R.; WADHWA, S.; MATHUR, A.; DUBEY, K. A., 2017 Designing of a Microelectrode Sensor based Label Free Milk Adulteration Testing System (MATS). **IEEE Sensors Journal**, v 17(18). p. 6050-6055, 2017.

GRIMNES, S.; MARTINSEN, O. G. **Bioimpedance and bioelectricity basics**. London: UKAcademic press, 2000.

QUILLFELDT, J. A. Origem dos Potenciais Elétricos das Células Nervosas. [S.l.]: Departamento de Biofísica - UFRGS, 2005. Disponível em: http://www.ufrgs.br/biofisica/Bio10004/JAQuillfeldt_OrigPotsEletrCelNervs_poligrafo2005.pdf. Acesso em: 25 ago. 2018.

HUI, G.; YING, Y., 2017. Quantitative rapid analysis method for ofloxacin in raw milk based on molecule-specific recognition and electrochemical impedance spectrum. **Transactions of the ASABE**, v60(5). p. 1439-1443, 2017.

HOLDER, D. **Electrical Impedance Tomography: Methods, history and applications**. London: Institute of Physics Publishing, 2004.

ISTAMBOULIÉ, G.; PANIEL, N.; ZARA, L.; GRANADOS, L. R.; BARTHELMEBS, L.; NOGUER, T., 2016. Development of an impedimetric aptasensor for the determination of aflatoxin M1 in milk. **Talanta**, v146. p. 464-469, 2016.

LI, W.; LIAO, S.; TSOU, C., 2016. A novel sensing chip with dual-coil inductance for determining raw milk quality. **Sensors and Actuators A**, v241. p. 96-103, 2016.

LIU, J.; SETTU, K.; TSAI, J.; CHEN, C., 2015. Impedance sensor for rapid enumeration of E. coli in milk samples. **Electrochimica Acta**, v 182. p. 89-95, 2015.

LOPES, A.M.; MACHADO, J.A.T.; RAMALHO, E.; SILVA, V., 2017. Milk Characterization Using Electrical Impedance Spectroscopy and Fractional Models. **Food Analytical Methods**, v 11(3). p. 901-912, 2017.

MILKPOINT. Levantamento TOP 100 2020: os 100 maiores produtores de leite do Brasil. 2020. Disponível em: <https://www.milkpoint.com.br/top100-2020-lp/>. Acesso em: 28 julho 2020.

MORO, L. C.; PORTO, R. W. Single frequency electrical impedance tomography system with offline reconstruction algorithm. In: IEEE 6th Latin American Symposium on Circuits & Systems (LASCAS), 2015, Montevideu. p. 1-4, 2015.

NASCIMENTO, W L.; ANJOS, L.; BELL, V.; JOSÉ, M., 2020 Mathematical models for correlating electrical parameters and milk adulterants. **QUARKS: Brazilian Electronic Journal of Physics, Chemistry and Materials Science**, v 2(1). p. 27-33, 2020.

NEAVES, P.; WADDELL, M. J.; PRENTICE, G. A., 1988. A medium for the detection of Lancefield Group D cocci in skimmed milk powder by measurement of conductivity changes. **Journal of Applied Bacteriology**, v 65(6). p. 437–448, 1988.

OLIVEIRA, K. B.; KOBORI, C. N.; UBALDO, J. C. S. R., 2019. Avaliação da qualidade físico-química, rotulagem e ocorrência de adulterações em amostras de leite UHT. **Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes**, v 74(3). p. 195-206, 2019.

PORTO, R. W. **Projeto e avaliação de um canal de medição de bioimpedâncias**. Orientador: Adalberto Schuck Jr. 2009. 124 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.

PORTO, R. W.; AYRES, L. C.; NEUENFELD, R. H.; CARVALHO, C. W.; GELLER, A. M.; OLIVEIRA, W. C. Electrical Bioimpedance Scanning in Bacterial Diagnosis and Mastitis Detection. In: **IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC)**, 2020, Dubrovnik, 1-6 p. DOI: <http://dx.doi.org/10.1109/I2MTC43012.2020.9129159>.

PEREIRA, R. M. **Desenvolvimento de um sistema de espectroscopia de impedância elétrica multicanal**. Orientador: Pedro Bertemes Filho. 2009. 116 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Elétrica) Universidade do Estado de Santa Catarina, Joinville 2009.

PLIQUETT, U., 2010 Bioimpedance: a review for food processing. **Food Engineering Reviews**, v 2(2). p. 74-94, 2010.

RENTERO, N. Anuário Leite 2018: Indicadores, tendências e oportunidades para quem vive no setor leiteiro. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1094149/anuario-leite-2018-indicadores-tendencias-e-oportunidades-para-quem-vive-no-setor-leiteiro>. Acesso em: 28 julho 2020.

RUSSELL, S. M.; FLETCHER, D. L.; COX, N. A., 1994. The effect of incubation temperature on recovery of mesophilic bacteria from broiler chicken carcasses subjected to temperature abuse. **Poultry science**, v 73(). p. 1144–1148, 1994.

SANCHEZ, B.; VANDERSTEEN, G.; BRAGOS, R.; SCHOUKENS, J., 2011. Optimal multisine excitation design for broadband electrical impedance spectroscopy. **Measurement Science and Technology**, v 22(11). p. 115601, 2011.

SCHUMACHER, L.L.; VIÉGAS, J.; NAETZOLD, S.; TONIN, T. J.; ROCHA, L.; CAUDURO, L.; MORO, A.B.; ROBALO, S. S., 2019. Use of electrical bioimpedance analysis to evaluate the quality of bovine raw milk. **South African Journal of Animal Science**, v 49(3). p. 727-734, 2019.

SUDE, M.; GHODINDE, K. Electrical impedance Sensor for Real-Time Detection of Urea and Starch in Milk. In: **Proceedings of the Third International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI 2019)**, IEEE 2019, ISBN: 978-1-5386-9439-8, 2019.

TAKA, E. N. **Transvarredura por Bioimpedância: uma ferramenta para detecção precoce de câncer de mama em mulheres jovens**. Orientadores: Márcio Nogueira de Souza Alexandre Visintainer Pino. 2008. 131 f. Dissertação. (Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

TRIPATHY, S.; GHOLE, A.; KHANDAVALLI, D.; VANJARI, S.; SINGH, S., 2016. A comprehensive approach for milk adulteration detection using inherent bio-physical properties as 'Universal Markers': Towards a miniaturized adulteration detection platform. **Food Chemistry**. v 217. p. 756-765, 2016.

URIA, N.; MORAL-VICO, J.; ABRAMOVA, N.; BRATOV, A.; MUÑOZ, F. X., 2016. Fast determination of viable bacterial cells in milk samples using impedimetric sensor and a novel calibration method. **Electrochimica Acta**, v 198. p. 249-258, 2016.

YÚFERA, A.; CAÑETE, D.; DAZA, P. A microelectrode-cell sensor model for real time monitoring. In.: **SENSORDEVICES 2011**: The Second International Conference on Sensor Device Technologies and Applications, v 1. p. 143 - 146, 2011.

CAPÍTULO 43: ESTRATÉGIAS PARA O ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO DE QUALIDADE DA NOZ-PECÃ APÓS A COLHEITA

CHAPTER 43: STRATEGIES FOR STORAGE AND MAINTENANCE OF PECAN NUTS QUALITY AFTER HARVEST

Stephanie Reis Ribeiro¹; Vanderlei Both ²; Roger Wagner ³

Resumo

A noz-pecã é um fruto seco rico em compostos nutritivos, considerado um alimento promotor de saúde. No entanto, a manutenção da qualidade da noz-pecã no período pós-colheita torna-se um desafio, devido ao seu alto teor lipídico, constituído majoritariamente de ácidos graxos insaturados suscetíveis à oxidação. Nesse processo pode ocorrer escurecimento das nozes, perda da crocância, formação de odores rançosos, bem como a redução das propriedades nutricionais, comprometendo a integridade e, conseqüentemente, perdas na comercialização. Além disso, o beneficiamento ineficiente também impacta no desenvolvimento de microrganismos, especialmente os fungos, que além de acelerar as reações de degradação podem produzir micotoxinas, as quais são nocivas à saúde do consumidor. Apesar de sua importância nutricional e econômica, há poucas informações sobre condições ideais de armazenamento e vida-de-prateleira das nozes-pecã. Em geral, temperaturas abaixo de 10 °C, teor de umidade em torno de 4%, umidade relativa de 40-60%, concentração de oxigênio menor que 3kPa de O₂ são recomendadas para o armazenamento de nozes. Esta revisão foi realizada para congrega diferentes técnicas e parâmetros de armazenamento (temperatura, tempo, umidade, etc.), bem como os tipos de embalagens na estocagem, visando a manutenção da qualidade das nozes-pecã. Dessa forma, o conhecimento sobre as condições recomendadas para o armazenamento e beneficiamento da noz-pecã favorece a conservação dos atributos nutricionais e sensoriais.

Palavras-Chave: *Carya illinoensis*, armazenamento, conservação, qualidade.

Abstract

Pecan is a dry fruit rich in nutritious compounds, considered a health-promoting food. However, maintaining pecan quality in the post-harvest period becomes a challenge, due to its high lipid content, mostly composed of unsaturated fatty acids susceptible to oxidation. In this process, darkening of the nuts, loss of crispness, formation of rancid odors may occur, as well as the reduction of nutritional properties, compromising integrity and, consequently, losses in commercialization. In addition, inefficient processing also impacts the development of microorganisms, especially fungi, which in addition to accelerating degradation reactions can produce mycotoxins, which are harmful to consumer health. Despite its nutritional and economic importance, there is little information on ideal storage conditions and shelf-life for pecans. In general, temperatures below 10 °C, moisture content around 4%, relative humidity 40-60%, oxygen concentration less than 3kPa of O₂ are recommended for the storage of nuts. This review was carried out to gather different techniques and storage parameters (temperature, time, humidity, etc.), as well as the types of packaging in storage, with a view to maintaining the quality of pecans. Thus, knowledge about the recommended conditions for the storage and

¹Doutoranda, Ciência e Tecnologia dos Alimentos, Universidade Federal de Santa Maria, stephanieribeiro18@hotmail.com

² Professor, Doutor, Agronomia, Universidade Federal de Santa Maria, vanderleiboth@yahoo.com.br

³Professor, Doutor, Ciência e Tecnologia dos Alimentos, Universidade Federal de Santa Maria, rogerwag@gmail.com

processing of pecans favors the conservation of nutritional and sensory attributes.

Keywords: *Carya illinoensis*, storage, conservation, quality.

Introdução

O incentivo ao consumo da noz-pecã [*Carya illinoensis* (Wangenh.) K. Koch] alia o sabor característico e muito apreciado pelo consumidor, as diferentes formas de apresentação (*in natura*, cozidas, caramelizada, salgadas, em pasta, óleo, etc.) (KING et al., 2008) e os benefícios à saúde (SALVADOR et al. 2016). Dessa forma, a noz-pecã é considerada um alimento de alto valor agregado e detém um mercado promissor para os investidores (Fronza et al., 2015). A noz-pecã é produzida em maior escala nos EUA (ERTEN, 2016), com cerca de 55% da produção mundial (FRONZA et al. 2018), (aproximadamente 127.000 ton). O Brasil apresenta atualmente uma produção próxima de 3.500 t em 2019, colocando o país entre os quatro maiores produtores do mundo, atrás apenas dos EUA, México e África do Sul (ABNC, 2019). A produção nacional de pecãs está concentrada na Região Sul, sendo estado do Rio Grande do Sul o responsável por aproximadamente 50% da produção nacional (LESINA, 2020; SILVA, 2017). Nesta região percebe-se um incremento significativo na implantação de novas áreas de nogueira pecã. Como a cultura demora cerca de seis anos para iniciar a produção de frutos, a expectativa é que haja um grande aumento da produção nos próximos anos.

A noz-pecã é classificada como um fruto seco altamente lipídico (cerca de 50% a 70%) (SALVADOR et al., 2016; VENKATACHALAM, 2006), mas também é uma excelente fonte de outros nutrientes, como proteínas e fibras (10 e 14%, respectivamente) (RIBEIRO et al., 2020). Contudo, o elevado teor de lipídeos, apresenta predominantemente os ácidos graxos insaturados (AGI), como os ácidos graxos oleico, linoleico e linolênico (SALVADOR et al., 2016; ZHAO, 2011). Esses ácidos graxos, embora possuam efeitos benéficos reconhecidos à saúde humana (KING et al., 2008; TORABIAN et al., 2009), tornam a noz suscetível à deterioração por hidrólise e subsequente oxidação (MASKAN; KARATAS, 1998). As reações de deterioração lipídica estão entre os principais fatores que depreciam as nozes, formando compostos que atribuem descritores sensoriais relacionados ao ranço (*off-flavors*), promovendo também o escurecimento da mesma (RIBEIRO, et al., 2020; IVANOVA-PETROPULOS, et al., 2015). Nesse sentido, ainda não há legislação que ampare os atributos de qualidade da noz-pecã, mas leva-se em consideração os parâmetros químicos para óleo de oliva bruto, utilizado pela ANVISA (BRASIL, 2005).

O aumento significativo da área cultivada de nogueira-pecã demanda estudos que busquem auxiliar os produtores no processamento pós-colheita, pré-armazenamento e

armazenamento (MOKOCHINSKI, 2015). São escassos os estudos sobre armazenamento da noz-pecã. Em estudo recente foi observado boa manutenção da qualidade, após 12 meses, com a armazenagem de nozes em uma condição de umidade relativa do ambiente menor do que 60%, temperaturas inferiores a 10 °C e disponibilidade de O₂ abaixo de 3 kPa (RIBEIRO et al., 2020) (Tabela 1). No entanto, muitos produtores ainda realizam o armazenamento em silos ou *containers*, em que as nozes estão submetidas a temperatura e umidade relativa ambiente após a devida secagem, sujeitas às alterações fisiológicas com perdas na qualidade (MA et al., 2013; MA et al., 2010) e suscetíveis ao crescimento fúngico. Os limites aceitáveis para os parâmetros de qualidade no prazo de validade das nozes tem base nos grãos quando percebidos como não comestíveis (escuras e com sabor rançoso) (PANKAEW et al., 2016).

Várias técnicas já foram aplicadas no armazenamento de nozes e grãos armazenados para retardar sua deterioração, como o uso de substâncias químicas por fumigação (BOUKAEW et al., 2017), tratamento com plasma atmosférico frio (SOHBATZADEH et al., 2016), irradiação (ALGABR et al., 2013) e dióxido de cloro (LEE et al., 2013). Porém, ainda são incipientes os trabalhos voltados a estudar as condições de armazenamento de pecãs (RIBEIRO et al., 2020). Dessa forma, existe uma lacuna a ser explorada visando amenizar as reações de oxidação e crescimento fúngico ao longo do período pós-colheita da noz-pecã. Sendo assim, a presente revisão visa abordar diferentes métodos e condições de armazenamento, incluindo o emprego de câmaras com atmosfera controlada, bem como fornecer informações sobre os efeitos do armazenamento na qualidade das nozes-pecã.

Cultivo e consumo da noz-pecã

Nativa do sudeste dos Estados Unidos e México (SANTERRE, 1994), o cultivo da noqueira-pecã se estendeu a vários outros países no início do século XX (China, Austrália, África do Sul, Israel, Argentina e Brasil), os quais respondem pelo restante da produção comercial (FRONZA, et al. 2018). No Brasil são cultivados principalmente os seguintes tipos de nozes: castanha-do-Brasil, castanha-de-caju, macadâmia e pecã. Dentre elas, a noz-pecã tem sua maior produção no estado do Rio Grande do Sul, com cerca de 50% (LESINA, 2020). A pecanicultura nesse estado tem proporcionado uma importante fonte de renda tanto para pequenas como em grandes propriedades (FRONZA et al., 2015).

A noz-pecã apresenta versatilidade em suas apresentações, podendo ser consumidas *in natura* ou cozidas, caramelizada, salgadas, granuladas, em pasta e, também na forma de óleo culinário, que pode ser obtido por prensagem mecânica, sendo considerado uma especiaria muito apreciada na Europa (SALVADOR, 2014; King et al., 2008). Além de tudo, o óleo

também é um componente de cosméticos, loções, sabões, perfumes e óleos para massagem (SAHENA, 2009; VILLARREAL-LOZOYA, 2007). Entretanto, é uma das nozes mais saborosas para ser consumida *in natura*.

Composição química e parâmetros de qualidade

Classificados como fruto seco (MURDOCK, 2002), as nozes-pecã são fontes de lipídeos ricos em AGI (em torno de 90%) (SALVADOR et al., 2016). Os principais ácidos graxos encontrados são o oleico (C18:1 n9), linoleico (C18:2 n6) e linolênico (C18:3 n3), nas concentrações aproximadas de 63%, 18% e 3%, respectivamente (SALVADOR et al., 2016; ZHAO, 2011). Além dos lipídeos, são importantes fontes de outros macronutrientes, podendo apresentar na sua composição química cerca de 9,9 g de proteínas; 7,8 g de carboidratos; 3,7 g de umidade; 1,4 g de cinzas (minerais totais) a cada 100 g de noz (ORO et al., 2008; Venkatachalam, 2006). Os elementos cálcio, fósforo e ferro, além das vitaminas B2 e A foram reportadas por Rainey e De Nyquist (1997). Adicionalmente, apresenta expressivas concentrações de fitoesteróis totais em sua composição (1000 a 2900 mg kg⁻¹), bem como tocoferóis (α , γ e δ), podendo chegar a 370 mg kg⁻¹ (THOMPSON; KADER, 2012; WCRF, 2007).

Alguns atributos de qualidade, como cor, aroma, crocância, ausência de contaminação devem ser observados para o consumo da noz-pecã, seja ela *in natura* ou qualquer forma de processamento, (WOODROOF, 1967). Na comercialização, há classificações de acordo com a massa da amêndoa, o tamanho e as características da casca, que são utilizadas para definição de preços no mercado (CARGNELUTTI FILHO et al., 2014). A qualidade das amêndoas é obtida pelo manejo adequado realizado no campo durante a estação de cultivo. Essa qualidade deve ser mantida após a colheita pela estocagem em condições adequadas de armazenamento. Dessa forma, a vida-de-prateleira das nozes é afetada por diferentes fatores inerentes ao cultivar, manejo no campo, condições edafoclimáticas, bem como de técnicas de colheita, secagem, armazenamento e processamento, quando for o caso.

As nozes tendem a desenvolver rancidez rapidamente se armazenadas em condições inadequadas. Sendo assim, o índice de acidez e o índice de peróxidos estão entre os principais parâmetros químicos avaliados para qualidade de nozes (RIBEIRO et al., 2020; WALTON et al., 2017; GECGEL et al., 2011) (Tabela 1). O índice de acidez (expressa a porcentagem de ácidos graxos livres) esta relacionada com o desenvolvimento de reações hidrolíticas no óleo e comumente expressos os ácidos graxos livres da noz em miligrama equivalentes de ácido oleico por grama de óleo (ROSSELL, 1986). Através da RDC N° 270 (2005) a ANVISA determina

como parâmetro de qualidade para óleos brutos uma acidez máxima de 1,0 mg de ácido oleico g^{-1} de óleo, enquanto que determina para óleos refinados o máximo de 0,3 mg ácido oleico g^{-1} de óleo (BRASIL, 2005). A medida do índice de peróxidos é utilizada como um indicador dos estágios iniciais de oxidação lipídica. Na RDC N° 270 (2005) é estipulado os valores de peróxidos em óleos vegetais de no máximo 15 meq de $\text{O}_2 \text{ kg}^{-1}$ de óleo, e para refinados de no máximo 5 meq de $\text{O}_2 \text{ kg}^{-1}$ de óleo.

Manutenção da qualidade no armazenamento de nozes

A exposição das nozes a níveis elevados de oxigênio, temperatura, umidade e entre outros fatores como a presença de casca, película protetora e eventuais quebras podem influenciar na velocidade das reações oxidativas (RIBEIRO et al., 2020) e crescimento microbiano (GUADAGNI et al., 1978). Logo, para reduzir o desenvolvimento de características indesejáveis (escurecimento, rancidez, etc.), diferentes técnicas e materiais de embalagem, (GARCÍA-PASCUAL et al., 2003) tem sido pesquisadas e/ou utilizadas para aumentar a vida-de-prateleira das nozes (Tabela 1).

Secagem

As nozes-pecã normalmente são colhidas pela ocasião da abertura do epicarpo (shuck). Pode ser realizada com equipamentos mecanizados que provocam vibrações nas árvores para a queda das nozes (shaker), ou manualmente logo após a queda. É importante a coleta imediata para evitar contaminações pelo solo. Neste momento, as nozes apresentam elevado teor de umidade, o que acelera as reações hidrolíticas e oxidativas (GAMA et al., 2018), crescimento de fungos, aumento da germinação e, conseqüentemente, redução no prazo de validade. Portanto, essa umidade excessiva precisa ser removida o mais rápido possível. Para uma secagem eficiente é indispensável o conhecimento sobre as características das nozes, de forma a otimizar nas operações de secagem a temperatura e o tempo, bem como o desenho ideal dos secadores (PANKAEW et al., 2016), podendo ser natural, em fornos ou microondas (SILVA et al., 2016).

O teor de umidade está correlacionado com a atividade da água (a_w). Esta é uma medida que se refere à água livre, que pode influenciar na velocidade das reações físicas, químicas, enzimáticas (MANEFA et al., 2017) e metabólicas (SABLANI et al., 2007), estando diretamente relacionada ao tempo de vida-de-prateleira. Além disso, elevados valores de a_w favorecem o desenvolvimento de bolores entre outros microorganismos durante o armazenamento nas nozes (SILVA et al., 2016; VENKATACHALAM; SATHE, 2006). Em geral pecãs apresentam valores de a_w entre 0,6 a 0,8 (VENKATACHALAM, 2006). Entretanto,

quando se considera o tempo de armazenamento em temperatura ambiente ($\sim 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$), as pecãs com a_w de $\sim 0,75$ desenvolvem bolores após 16 semanas, enquanto que as armazenadas com a_w de 0,9 desenvolvem bolores em apenas 4 semanas de armazenamento (VENKATACHALAM; SATHE, 2006).

Em relação aos aspectos sensoriais, a secagem ineficiente ou não realizada, causa diversos fenômenos indesejáveis (desenvolvimento fúngico, deterioração por reações hidrolíticas) e, conseqüentemente, prejuízos na comercialização. A noz macadâmia em casca, com alto teor de umidade, desenvolve coloração marrom nas amêndoas, reduzindo a sua vida útil (PHATANAYINDEE et al., 2012; WALTON et al., 2013). Portanto, essa classe de alimentos requer uma secagem o mais rápido possível para minimizar as perdas de qualidade (PANKAEW et al. 2016). Pistaches com 4% de umidade apresentaram maior luminosidade (coloração mais clara), firmeza, e doçura do que pistaches com 11% de umidade, as quais apresentam valores quatro vezes maiores nos parâmetros de rancidez e amargor. Ademais, as pistaches mais secas (4%) mantiveram sua qualidade preservada por 12 meses, quando armazenadas a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ (KADER et al., 1982). Dessa forma, a partir de uma secagem bem sucedida as nozes tendem a manter os aspectos de qualidade e estender sua vida útil. Além desse ponto, existem outros fatores positivos com a aplicação do processo de secagem nas nozes, como a facilitação do descascamento e redução de amêndoas de castanhas de caju quebradas, devido ao teor de umidade mais baixo (OGUNSINA; BAMGBOYE, 2012).

Temperatura de armazenamento

A temperatura é um fator que influencia diretamente nas reações químicas, enzimáticas e crescimento microbiano, bem como pode modificar a composição química, através da alteração do teor de água (RIBEIRO et al., 2020; ARENA et al., 2013; LEUFVEN et al., 2010). O armazenamento de nozes em temperaturas baixas (0 a $7\text{ }^{\circ}\text{C}$) prolonga a vida-de-prateleira das nozes (CHRISTOPOULOS; TSANTILI, 2015), retardando a evolução dos principais indicadores de perda de qualidade, como aumento de índice de acidez e peróxidos (RIBEIRO et al., 2020). Estes autores realizaram um experimento em que armazenaram por 12 meses nozes-pecã com casca, da cultivar Barton, em diferentes temperaturas ($1,5$, 10 e $20\text{ }^{\circ}\text{C}$). Os resultados encontrados indicam que as temperaturas mais baixas apresentaram maior luminosidade (L^*), coloração amarelo/dourada (b^*) e menor índice de acidez, enquanto as nozes estocadas a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ apresentaram maiores índices de peróxidos e coloração avermelhada (a^*). Da mesma forma, amêndoas (*Prunus dulcis*, cultivar Mamaei) inteiras armazenadas a $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ apresentaram índice de peróxidos e trienos conjugados menores em relação às armazenadas

a 23 °C. Adicionalmente, as amêndoas estocadas a 4 °C apresentaram maiores escores sensoriais para os atributos cor e odor ao final de 10 meses.

A redução da temperatura tem se mostrado um fator efetivo no retardo da ação de lipoxigenases (GAMA et al., 2018) e oxidação dos lipídeos, que desencadeiam a produção de hidroperóxidos (GAMLI; HAYOĞLU, 2007; LEUFVEN et al., 2010) e aumento dos ácidos graxos livres (WALTON et al., 2017). Em decorrência dessas reações de deterioração dos ácidos graxos observa-se a formação de compostos voláteis relacionados ao aroma e sabor de ranço (aldeídos, cetonas, álcoois) (RIBEIRO et al., 2020; MEXIS; KONTOMINAS, 2009b), em especial o aldeído hexanal (JENSEN et al., 2001, 2003; MEXIS; KONTOMINAS, 2009a).

Controle de luminosidade

As reações catalisadas pela luz podem prejudicar a qualidade e a estabilidade de alimentos com alto teor de óleos e gorduras (SATTAR, 1989), podendo ser pela oxidação lipídica ou de degradação das vitaminas presentes (MIN; BOFF, 2002). Nozes armazenadas em condições com maior luminosidade têm valores mais altos de peróxido, concentração de hexanal, sabor rançoso e amargo, bem como alterações na cor, em comparação com nozes armazenadas no escuro (MEXIS et al., 2009), devido oxidação de pigmentos e ácidos graxos (RAEI et al., 2009). Em óleos extraídos de nozes a taxa de peroxidação é profundamente diminuída pelo armazenamento em vidro âmbar ou eliminação completa da luz (SATTAR, 1989). O óleo de noz chilena (Walnut) apresentou valores de peróxidos de 1,57 quando exposto à luz, 0,15 no escuro, 1,20 em recipiente transparente e 0,19 meq de O₂ kg⁻¹ de óleo quando em vidro âmbar (SATTAR, 1989). Na avaliação de óleo de amêndoas, armazenados em temperatura ambiente durante o período de 2 meses, os valores de ácidos graxos livres obtidos, quando expostos a luz e no escuro, respectivamente, foram de 0,59% e 0,49%, da mesma forma, os valores médios de peróxido foram 25.67 e 19.15 meq de O₂ kg⁻¹ de óleo (ATSU-BARKU et al., 2012). Portanto, o controle da luminosidade no armazenamento de nozes, também nos óleos extraídos, é importante para minimizar as reações induzidas pela luz.

Radiação

As radiações ultravioleta, raios gama, feixe de elétrons e microondas são comumente utilizadas em estudos da manutenção de qualidade de nozes (SILVA et al., 2016; KARAGÖZ et al., 2014; BARREIRA et al., 2012; DE MELLO, SCUSSEL, 2009). O uso de radiações é uma alternativa para substituir tratamentos tradicionais como a fumigação, as quais podem contaminar nozes e o ambiente com os resíduos químicos (KUME et al., 2009). No entanto, a aplicação das doses de irradiação devem ser otimizadas, visando a máxima eficiência na

redução microbiana, eliminando os riscos biológicos, com a mínima modificação química e sensorial das nozes (MA et al., 2013; BARREIRA et al., 2012). A irradiação por micro-ondas pode ser utilizada tanto na secagem, como para o controle de fungos deterioradores e produtores de micotoxinas (SILVA et al., 2016; FANG et al., 2011; LUTER et al., 1982). Na secagem de castanhas do Pará, o uso do micro-ondas apresentou desempenho adequado, diminuindo em até 43,5% no teor de umidade e, consequentemente na redução da a_w (SILVA et al., 2016). Em outro estudo, mostrou a diminuição da contagem de *Aspergillus parasiticus* (FANG et al., 2011).

O uso de diferentes níveis de radiação gama (1, 3, 5, and 7 kGy) em avelã, walnut, amêndoa doce e pistache não alteraram significativamente o teor de óleo das nozes, no entanto, o teor de ácidos graxos livres e índice de peróxidos aumentaram proporcionalmente à dose. Além disso, a concentração de ácidos graxos saturados totais aumentou enquanto os ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados totais diminuíram com doses maiores de radiação (GECGEL et al., 2011). Em pecãs inoculadas com *Escherichia coli* e *Salmonella* Typhimurium, nas ranhuras dorsais ou na superfície plana, e irradiadas à temperatura ambiente usando um acelerador de feixe eletrônico de 1,35 MeV a 0,2, 0,4, 0,6 e 0,8 kGy em embalagem a vácuo, embalagem a ar, 100% de embalagem de nitrogênio e 100% de embalagem de oxigênio, não houve diferenças ($p > 0,05$) nos valores de D10 (dose necessária para a descontaminação) entre os microrganismos nas diferentes atmosferas. Em contrapartida, a irradiação sob atmosfera de nitrogênio mostrou-se como alternativa promissora, pois retarda o aparecimento de ranço, quando comparada à irradiação sob condições atmosféricas ou 100% de oxigênio.

Embalagens

As embalagens são essenciais para contenção e apresentação dos alimentos, além de contribuir para minimizar reações que afetam a sua integridade. A qualidade e a vida útil dos alimentos são influenciadas pelas propriedades de barreira da embalagem contra umidade, oxigênio e a interação de constituintes do alimento com o material (ORO, 2007). Diversos materiais podem ser utilizados, como o plásticos e alumínio, tanto com ou sem selamento a vácuo (RAISI, et al., 2015; MEXIS et al., 2009) (Tabela 1). Ribeiro et al., (1993) estudaram a estabilidade de castanhas-do-pará descascadas em bandejas de polipropileno (PP) cobertas com filmes de cloreto de polivinila (PVC), quando estocadas à temperatura ambiente por 12 meses. Nesse trabalho os autores reportaram que após 2 meses de estocagem as castanhas foram consideradas inadequadas para consumo, pelo fato das castanhas estarem em pedaços, o que acelerou as reações de degradação, devido a passagem gradual de oxigênio pela embalagem

durante armazenamento. Ou seja, era necessário que a embalagem proporcionasse uma barreira maior à passagem de O₂ para melhor manutenção da qualidade.

Em um estudo com nozes-pecã armazenadas a temperatura ambiente por 150 dias em filme de náilon-polietileno sob vácuo ou em recipientes plásticos de polipropileno, os resultados indicaram que o teor de umidade não sofreu mudanças significativas (ORO, 2007). Entretanto, foi observado escurecimento da superfície das nozes e aumento significativo nos valores de acidez e peróxidos do óleo extraído ao final do armazenamento ($p > 0,05$) nas nozes armazenadas em recipientes plásticos. A qualidade das nozes do ponto de vista microbiológica foi considerado adequado, com ausência de *Salmonella sp.* Na análise sensorial não foi percebida redução da aceitabilidade, sendo viável o armazenamento nessas embalagens por 120 dias, não observando diferenças entre as nozes estocadas nos dois tipos de embalagens (ORO, 2007).

Selamento a vácuo

A aplicação de vácuo na embalagem é uma tecnologia eficaz no armazenamento e comercialização dos produtos (NOSEDA et al., 2012), pois retirando o oxigênio do *headspace* da embalagem retarda as reações de oxidação e crescimento de microrganismos aeróbios (FLOROS; MATSOS, 2005). Este método não pode ser aplicado a alimentos sensíveis como batata frita e algumas frutas, entretanto tem sido recomendado para nozes, as quais são robustas o suficiente para suportar a compressão. O uso do vácuo também exige embalagens apropriadas, que resultem em baixa troca gasosa. Isso evita que as nozes alterem o peso e a descoloração. Além disso, devem apresentar alta resistência mecânica (manuseio e transporte), soldabilidade, boa maquinabilidade e custo compatível com a aplicação (HEROBETTA, 2007). Adicionalmente, o emprego do vácuo apresenta ainda como vantagem a redução de tamanho das embalagens dos produtos, o que favorece o transporte (HEROBETTA, 2007).

O armazenamento de amêndoas doces em embalagem a vácuo retardou o aumento do índice de peróxidos por 7 meses (RAISI, et al., 2015). Ozturk et al., (2016) observaram maior eficiência frente as deteriorações oxidativas quando comparado às demais embalagens com atmosfera modificada em pistache armazenados sob vácuo no período de 30 dias. Por outro lado, Maskan e Karatas (1998) verificaram que tratamento com uso de alto CO₂ (98%) em pistaches foi mais eficaz que a embalagem a vácuo em relação à oxidação lipídica.

Embalagem com atmosfera modificada

A demanda o ano todo por produtos em sua apresentação natural e fresca, sem adição de substâncias químicas cresceu consideravelmente. Assim, embalagens com atmosfera modificada (AM) ganharam significativo espaço na indústria alimentícia (FLOROS; MATSOS,

2005). As modificações das atmosferas das embalagens envolvem normalmente a redução das pressões parciais de oxigênio (pO_2) e aumento das pressões parciais de dióxido de carbono (pCO_2) e nitrogênio (pN_2), sendo controladas apenas no momento de fechar a embalagem. Essas modificações visam estender a vida-de-prateleira dos produtos significativamente, pela manutenção de suas características (FLOROS; MATSOS, 2005). Alguns estudos mostram que a embalagem com AM pode estender em até 10 vezes a vida-de-prateleira de um alimento. Nozes, amêndoas, avelãs e castanhas são exemplos típicos desses alimentos que podem ser beneficiados positivamente com essa técnica (KILCAST; SUBRAMANIAM, 2000), devido ao seu alto teor lipídico, como mencionado anteriormente.

Pistache armazenado em embalagens com ar (pO_2 de 20 kPa), vácuo e AM (98% de CO_2), em temperatura ambiente apresentaram diferenças significativas nos valores de peróxidos e aumento da acidez somente a partir do terceiro mês de armazenamento. A atmosfera modificada com 98% de CO_2 demonstrou valores menores nos parâmetros de oxidação, podendo ser atribuído à solubilidade do gás na porção líquida e lipídica do pistache, agindo como uma barreira na interface óleo/água diminuindo a ação do oxigênio (MASKAN; KARATAS, 1998). Além disso, essa tecnologia promove a redução da taxa de respiração e o crescimento microbiológico, bem como as alterações enzimáticas, conforme Mazza e Jayas (2001). Entretanto, essa técnica pode apresentar resultados variáveis quanto à qualidade, pois como mencionado anteriormente, o controle dos gases ocorre apenas na instalação da atmosfera. Durante o período de armazenamento, a taxa respiratória do produto, a temperatura de armazenamento, a permeabilidade e seletividade do filme aos gases, o período de armazenamento, entre outro, irão influenciar na efetividade da técnica sobre a manutenção da qualidade.

Atmosfera Controlada

O armazenamento em atmosfera controlada (AC) visa prolongar a vida útil de diversas frutas, no entanto é pouco explorada em *nuts* (RIBEIRO et al., 2020). Na tabela 1. Essa técnica tem por principal função reduzir a respiração, produção de etileno e reações bioquímicas associadas às alterações fisiológicas (BRACKMANN et al., 2001). No armazenamento em AC os produtos são colocados em um ambiente hermético, onde a pO_2 é reduzida e o pCO_2 pode ser adicionado/aumentado em relação à condição ambiente. Essa técnica se diferencia da AM pelo fato de ter ajustadas as tensões dos gases com certa frequência, conforme a necessidade do fruto em questão. Além disso, a AC normalmente é associada com o emprego de baixas temperaturas e controle da umidade relativa do ar, potencializando sua eficiência na

preservação dos alimentos. A tolerância do fruto para a AC depende de vários fatores, incluindo a cultivar, maturidade, pressões parciais dos gases (pO_2 , pCO_2 e pN_2) utilizadas na atmosfera e o período de aplicação (BULENS et al., 2012; BAI, et al., 2005).

Tabela 1. Valores encontrados para índice de acidez e peróxidos em nozes de diferentes espécies após armazenamento por longo período em diferentes condições ou tratamento com irradiação

<i>Nut</i>	Método	Tempo	Temperatura	Índice de Acidez	Índice de Peróxidos	Referências
Amêndoa doce	Embalagem de PET/LDPE	12 meses	Ambiente (~25 °C)	-	$>10 \pm 0,01$	(MEXIS et al., 2009)
	AM - CO ₂ (95%)	10 meses	4 °C	-	$0,75 \pm 0,04$	(RAISI et al., 2015)
	AM - CO ₂ (95%)	10 meses	Ambiente (~25 °C)	-	$1,11 \pm 0,07$	(RAISI et al., 2015)
Avelã	AM - N ₂ (99%)	12 meses	4 °C	$0,13 \pm 0,01$	$0,06 \pm 0,03$	(GHIRARDELLO et al., 2013)
	Embalagem plástica	12 meses	4 °C	$0,27 \pm 0,01$	$0,09 \pm 0,02$	(GHIRARDELLO et al., 2013)
Canarium	Vácuo	11 meses	Ambiente (22 a 30 °C)	$0,31 \pm 0,01$	$0,61 \pm 0,02$	(WALTON et al., 2017)
Macadâmia	Embalagem plástica	16 meses	Ambiente (20 °C)	-	$3,00 \pm 0,3$	(HIMSTEDT, 2002)
Pecã	AC - 3 kPa de O ₂	12 meses	1 °C	$0,41 \pm 0,07$	$1,74 \pm 0,24$	(RIBEIRO et al., 2020)
	AC - 3 kPa de O ₂	12 meses	10 °C	$0,48 \pm 0,01$	$1,60 \pm 0,01$	(RIBEIRO et al., 2020)
	AC - 3 kPa de O ₂	12 meses	20 °C	$0,62 \pm 0,03$	$1,55 \pm 0,37$	(RIBEIRO et al., 2020)
Pistache	7 kGy	-	-	-	$4,00 \pm 0,05$	(MEXIS; KONTOMINAS, 2009)
	1 kGy	-	-	$0,18 \pm 0,01$	$1,01 \pm 0,02$	(GECGEL et al., 2011)
	7 kGy	-	-	$0,23 \pm 0,05$	$1,80 \pm 0,01$	(GECGEL et al., 2011)
Walnut	1 kGy	-	-	$0,22 \pm 0,01$	$1,20 \pm 0,5$	(GECGEL et al., 2011)
	7 kGy	-	-	$0,26 \pm 0,01$	$1,80 \pm 0,2$	(GECGEL et al., 2011)

“ - ” = não analisado

As concentrações dos gases da AC necessitam ser ajustados visando manter por maior tempo possível os atributos iniciais dos produtos. Dependendo do produto armazenado, valores elevados de pCO_2 podem causar distúrbios fisiológicos, depreciando a qualidade final. Por outro lado, o O_2 deve ser mantido em uma pressão mais próxima possível da condição ótima. Concentrações acima da ótima podem não apresentar o efeito desejado, enquanto que aquelas excessivamente baixas podem induzir ao metabolismo fermentativo (THEWES et al., 2015). Ademais, juntamente com temperaturas baixas, as atividades como reações bioquímicas, respiração e oxidação são reduzidas (RIBEIRO et al., 2020; MESSINA, 2015). Outro benefício da AC é ser uma alternativa contra ataques de insetos, onde fumigantes químicos não são permitidos (SEM et al., 2010).

Pecãs armazenadas em casca a 1, 10 e 20 °C e em AC de 1 kPa, 3 kPa de O_2 e atmosfera de ambiente (20 kPa de O_2) por até 12 meses apresentaram pouca diferença nas condições com AC de menor temperatura e pressão de oxigênio, para parâmetros de oxidação avaliados (cor, acidez, peróxidos). Por outro lado, ocorreu um aumento significativo na maior condição de pO_2 (ambiente) e temperatura de 20 °C (RIBEIRO, et al., 2020). No trabalho de Guadagni (1978) com amêndoas doces armazenadas em casca em AC, o armazenamento foi eficaz contra deteriorações e formação de sabores rançosos pelo período de 12 meses mantidos em temperatura ambiente (18 °C - 27 °C). Em AC, as câmaras de armazenamento são fechadas por longos períodos e o desenvolvimento microbiano anormal não pode ser detectado visualmente e, quando observadas, muitas vezes o estágio avançado das modificações do metabolismo do fruto não permite intervenções (LÓPEZ et al., 2015). Dessa forma, a recomendação é que seja feita uma amostragem periódica para a avaliação dos produtos que estão armazenados nas câmaras, especialmente em produtos em que não existem muitos estudos realizados ainda, a exemplo da noz-pecã.

Considerações Finais

Esta revisão foi realizada visando estudar os diferentes tipos de técnicas e embalagens que podem ser utilizadas para manter a qualidade no armazenamento de nozes, amêndoas e castanhas, com atenção especial para a noz-pecã. Com a quebra da casca ou descascamento total, as amêndoas das nozes ficam expostas diretamente ao ar, facilitando as degradações oxidativas e contaminações microbianas. Sendo assim, a determinação das condições ideais e a seleção adequada dos métodos de armazenamento, bem como as embalagens tornam-se necessárias para evitar a absorção de umidade, retardar o crescimento microbiano, evitar a

formação de peróxidos, hidrólise e oxidação lipídica, escurecimento, entre outros, que influenciam na qualidade e segurança geral da *nut* armazenada.

Apesar de não haver muita pesquisa com o armazenamento da noz-pecã, alguns aspectos foram reportados em relação à temperatura e pressões parciais de gases no armazenamento. Certamente ainda existem muitas lacunas no conhecimento que necessitam ser preenchidas com relação à manutenção da qualidade pós-colheita desta cultura. Estes estudos podem ser conduzidos a partir dos resultados obtidos em outras *nuts*, por isso a importância de abordar também estes aspectos nesta revisão. Com a tendência de aumento na produção nacional de pecã, em função do aumento significativo da área de plantio da cultura, aliado à colheita concentrada em um curto período do ano (abril e maio), certamente o tema armazenamento será uma grande demanda do setor, em busca da manutenção da qualidade. Isso justifica a sequência dos trabalhos visando ofertar noz-pecã de qualidade aos consumidores durante o ano todo.

Referências

AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução da diretoria colegiada- **Resolução-RDC Nº 270, de 22 de Setembro de 2005**. Disponível em:< http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2005/rdc0270_22_09_2005.html> Acessado em: 08 jul. 2020.

ALGABR, H. M.; ZHENG, T.; YU, X. 2013. Inactivation of *Aspergillus flavus* in drinking water after treatment with UV irradiation followed by chlorination. **Science of the Total Environment**, v. 525:9, p. 463 – 464. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.06.065>

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NOZES, CASTANHAS E FRUTAS SECAS, ABNC. **Brasil atinge a marca de 4º maior produtor mundial de noz – pecã**. Disponível em: <http://www.abncnuts.org.br/> Acesso em 24 de junho de 2020

ATSU BARKU, V. Y.; NYARKO, H. D.; DORDUNU, P. 2012, Studies on the physicochemical characteristics, microbial load and storage stability of oil from indian almond nut (*Terminalia catappa* L.), **Food Science and Quality Management**, v. 8:1, p. 9-17, 2012. <https://doi.org/10.12691/ajfst-3-4-1>

BAI, J.; BALDWIN, E. A.; GOODNER, K. L.; MATTHEIS, J. P.; BRECHT, J. K. 2005 Response of four apple cultivars to 1-methylcyclopropene treatment and controlled atmosphere storage, **Horticultural Science**, v. 40, p. 1534–1538, 2005. <https://doi.org/10.21273/HORTSCI.40.5.1534>

BARREIRA, J. C. M.; ANTONIO, A. L.; GÜNAYDI, T.; ALKAN, H.; BENTO, A.; BOTELHO, L, M.; FERREIRA, I. C. F. R. 2012, Chemometric characterization of gamma irradiated chestnuts from Turkey. **Radiation Physics and Chemistry**, v. 81:9, p. 1520–1524. <https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2012.01.005>

BOUKAEW, S.; PRASERTSAN, P.; SATTAYASAMITSATHIT, S.; 2017. Evaluation of antifungal activity of essential oils against aflatoxigenic *Aspergillus flavus* and their

allelopathic activity from fumigation to protect maize seeds during storage. **Industrial Crops and Products**, v. 97, p. 558-566. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2017.01.005>

BRACKMANN, A.; MELLO, A. M.; FREITAS, S. T.; VIZZOTO, M.; STEFFENS, C. A. 2001 Armazenamento de maçãs 'Royal Gala' sob diferentes temperaturas e pressões parciais de oxigênio e gás carbônico. **Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal**, v. 23:3, p. 532-536, 2001. <https://doi.org/10.1590/S0100-29452001000300016>

BULENS, I.; VAN DE POEL, B.; HERTOOG, M.L.A.T.M.; DE PROFT, M.P.; GEERAERD, A.H.; NICOLAI, B.M.; 2012 Influence of harvest time and 1-MCP application on postharvest ripening and ethylene biosynthesis of 'Jonagold' apple, **Postharvest Biology Technology**, v.72, p. 11–19, 2012. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2012.05.002>

CARGNELUTTI-FILHO, A.; POLETO, T.; MUNIZ, M. F. B.; BAGGIOTTO, C.; POLETO, I. 2014 Dimensionamento amostral para avaliação da massa e diâmetro de frutos de noqueira-pecã, **Ciência Rural**, ISSN 0103-8478, 2014. <http://dx.doi.org/10.1590/0103-8478cr20140964>

DE MELLO, F. R.; SCUSSEL, V. M. 2009 Development of physical and optical methods for in-shell Brazil nuts sorting and aflatoxin reduction, **Journal of Agricultural Science**, v. 1, 3-14, 2009. <https://doi.org/10.5539/jas.v1n2p3>

ERTEN, E.S.; **Characterization of aroma components of raw and roasted almonds and the effect of the oxidative state of the nut on roasted flavor formation**, Thesis (Doctorate in Philosophy of Food Science and Human Nutrition), University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois, 2016.

FANG, Y.; HU, J.; XIONG, S.; ZHAO, S. 2011 Effect of low-dose microwave radiation on *Aspergillus parasiticus* **Food Control**, v. 22, p. 1078-1084, 2011. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2011.01.004>

FLORES, J. D.; MATSOS, K. L. 2005 **Innovations in food packaging**. Elsevier, Academic Press, Cap. 10, p. 159-171, 2005

FRONZA, D.; HAMANN, J. J.; **Técnicas para o cultivo da noqueira-pecã**. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Politécnico, Núcleo de Fruticultura Irrigada, 2016.

FRONZA, D.; HAMANN, J. J.; BOTH, V.; ANESE, R. O.; MEYER, E. A. 2018 **Pecan cultivation: general aspects**. **Ciência Rural**, v. 48:2, 2018. <https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20170179>

FRONZA, D.; POLETO, T.; HAMANN, J. J.; **O cultivo da noqueira-pecã**. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Politécnico, Núcleo de Fruticultura Irrigada, 2015.

GAMA, T.; WALLACE, H. M.; TRUEMAN, S. J.; HOSSEINI-BAI, S. 2018. Quality and shelf life of tree nuts: A review. **Scientia Horticulturae**, v. 242, p. 116–126. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.07.036>

GARCÍA-PASCUAL, P.; MATEOS, M.; CARBONELL, V.; SALAZAR, D. M. 2003 Influence of storage conditions on the quality of shelled and roasted almonds. **Biosystems Engineering**, v. 84:2, p. 201–209, 2003. [https://doi.org/10.1016/S1537-5110\(02\)00262-3](https://doi.org/10.1016/S1537-5110(02)00262-3)

GECGEL, U.; GUMUS, T.; TASAN, M.; DAGLIOGLU, O.; ARICI, M. 2011. Determination of fatty acid composition of γ -irradiated hazelnuts, walnuts, almonds, and pistachios. **Radiation Physics and Chemistry**, v. 80:4, p. 578–581, 2011. <https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2010.12.004>

GHIRARDELLO, D.; CONTESSA, C.; VALENTINI, N.; ZEPPA, G.; ROLLE, L.; GERBI, V., BOTTA, R. 2013 Effect of storage conditions on chemical and physical characteristics of hazelnut (*Corylus avellana* L.). **Postharvest Biology and Technology**, v. 81, p. 37–43, 2013. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2013.02.014>

GUADAGNI, D. G.; SODERSTROM, E. L.; STOREY, C. L. 1978, Effects of controlled atmosphere on flavor stability of almonds. **Journal of Food Science**, v. 43:4, p. 1077-1080, 1978. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.1978.tb15237.x>

HEROBETTA, D. 2006 **Aumente o tempo de prateleira de seus produtos com embalagens a vácuo**. Revista Frigorífico, 2006. Edição 130. Disponível em: http://www.revistafrigorifico.com.br/revista/edicao_130_vacuio.htm. Acesso em: 10 jun. 2020.

IVANOVA-PETROPULOS, V.; MITREV, S.; STAFILOV, T.; MARKOVA, N.; LEITNER, E., LANKMAYR, E.; SIEGMUND, B. 2015 Characterisation of traditional Macedonian edible oils by their fatty acid composition and their volatile compounds. **Food Research International**, v. 77:3, p. 506-514, 2015. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2015.08.014>

KAYA, A.; TEKIN, A. R.; ONER, M. D. 1993 Oxidative stability of sunflower and olive oils: comparison between a modified active oxygen method and long term storage. **Lebensmittel Wissenchat Technologie**, v. 26:5, p. 464–468, 1993. <https://doi.org/10.1006/fstl.1993.1091>

KARAGÖZ, I.; MOREIRA, R. G.; CASTELL-PEREZ, M. E. 2014 Radiation D10 values for Salmonella Typhimurium LT2 and an Escherichia coli cocktail in pecan nuts (Kanza cultivar) exposed to different atmospheres, **Food Control**, v. 39, pp. 146 - 153 2014. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2013.10.041>

KILCAST, D.; SUBRAMANIAM, P. 2000 **The stability and shelf-life of food**. Cap 7. Woodhead Publishing Limited. Elsevier, Cambridge, London, 2000, ISBN 978-0-08-100435-7, <https://doi.org/10.1016/C2015-0-06842-3>

KING, J. C.; BLUMBERG, J.; INGWERSEN, L.; JENAB, M.; TUCKER, K. L. 2008 Tree nuts and peanuts as components of a healthy diet. **The Journal of Nutrition**, v. 138, p. 1736 – 1740, 2008. <https://doi.org/10.1093/jn/138.9.1736S>

KUME, T.; FURUTA, M.; TODORIKI, S.; UENOYAMA, N.; KOBAYASHI, Y. 2009. Status of food irradiation in the world. **Radiation Physics and Chemistry**. v. 78, p. 222–226, 2009. <https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2012.01.005>

LEE, H.; RYU, J.; KIM, H. 2020. Antimicrobial activity of gaseous chlorine dioxide against *Aspergillus flavus* on green coffee beans, v. 86, 103308, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.fm.2019.103308>

LESINA, E. Cultivo da noz-pecã se expande e ganha espaço no Rio Grande do Sul. Jornal do comércio - Agronegócios. Edição impressa de 10/02/2020. Disponível em: https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/economia/2020/02/724121-cultivo-da-noz-peca-se-expande-eganha-espaco-no-rio-grande-do-sul.html (2020) Acesso em: 21 mar. 2020.

LÓPEZ, L.; ECHEVERRIA, G.; USALL, J.; TEIXIDÓ, N. 2015 The detection of fungal diseases in the 'Golden Smoothee' apple and 'Blanquilla' pear based on the volatile profile. **Postharvest Biology and Technology**, v. 99, p. 120-130, 2015. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2014.08.005>

LUTER, L.; WYZLOUZIL, W.; KASHYAP, S. C. 1982 The destruction of aflatoxins in peanuts by microwave roasting, **Canadian Institute of Food Science and Technology Journal**, v. 15, p. 234-238, 1982. [https://doi.org/10.1016/S0315-5463\(82\)72545-3](https://doi.org/10.1016/S0315-5463(82)72545-3)

MA, Y.; LU, X.; LIU, X.; MA, H.; 2013 Effect of ⁶⁰Coγ-irradiation doses on nutrients and sensory quality of fresh walnuts during storage, **Postharvest Biology and Technology**, v. 84, 36–42, 2013. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2013.04.001>

MA, Y.; WANG, G. L.; LIU, X.; LI, Y. C. 2010 Germination and sprouting physiology of fresh walnut irradiated by ⁶⁰Coγ-irradiation. **Acta Bot. Boreali-Occident.** v. 30:10, p. 2034–2039, 2010. <https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2013.04.001>

MASKAN, M.; KARATAS, S. 1998 Fatty acid oxidation of pistachio nuts stored under various atmospheric conditions and different temperatures. **Journal of Science and Food Agriculture**, v. 77, p. 334-340, 1998. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0010\(199807\)77:3<334::AID-JSFA42>3.0.CO;2-A](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0010(199807)77:3<334::AID-JSFA42>3.0.CO;2-A)

MAZZA, G.; JAYAS, D. S. 2001 **Controlled and Modified Atmosphere Storage**. In: ESKIN, N. A. M.; ROBINSON, D. S. (Eds.) Food Shelf Life Stability - Chemical, Biochemical and Microbiological Changes. CRC Press LLC, Boca Raton, 2001.

MESSINA, C. M.; BONO, G.; RENDA, G.; BARBERA, L. L.; SANTULLI, A. 2015 Effect of natural antioxidants and modified atmosphere packaging in preventing lipid oxidation and increasing the shelf-life of common dolphinfish (*Coryphaena hippurus*) fillets, **LWT - Food Science and Technology**, v. 62:1, p. 271–277, 2015. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2015.01.029>

MEXIS, S. F.; BADEKA, A. V.; KONTOMINAS, M. G. 2009. Quality evaluation of raw ground almond kernels (*Prunus dulcis*): Effect of active and modified atmosphere packaging, container oxygen barrier and storage conditions. **Innovative Food Science & Emerging Technologies**, v. 10:4, 580–589, 2009 <https://doi.org/10.1016/j.ifset.2009.05.002>

MEXIS, S. F.; KONTOMINAS, M. G. 2009a Effect of γ-irradiation on the physicochemical and sensory properties of cashew nuts (*Anacardium occidentale* L.). **LWT - Food Science and Technology** v. 42:9, p. 1501-1507, 2009a. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2009.03.023>

MEXIS, S. F.; KONTOMINAS, M. G. 2009b Effect of gamma irradiation on the physicochemical and sensory properties of raw shelled peanuts (*Arachis hypogaea* L.) and pistachio nuts (*Pistacia vera* L.), **Journal of the science of Food and Agriculture**, v. 89:5, p. 867-875, 2009b. <https://doi.org/10.1002/jsfa.3526>

MIN, D. B.; BOFF, J. M. 2002. Chemistry and reaction of singlet oxygen in foods **Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety**, v. 1, p. 58-72, 2002 <https://doi.org/10.1111/j.1541-4337.2002.tb00007.x>

MOKOCHINSKI, F. M. **Estimativa de produção, caracterização física e perfil químico de amêndoas de nogueira-pecã**; Dissertação (Mestrado em Agronomia), Universidade Estadual do Centro-Oeste, UECO, Guarapuava – Paraná, p. 17, 2015.

MURDOCK, D. H. **Encyclopedia of foods: a guide to healthy nutrition**. San Diego: Academic Press, p. 529, 2002.

NOSEDA, B.; ISLAM, M.T.; ERIKSSON, M.; HEYNDRICKX, M.; DE REU, K.; VAN LANGENHOVE, H.; DEVLIEGHERE, F.; 2012 Microbiological spoilage of vacuum and modified atmosphere packaged Vietnamese *Pangasius hypophthalmus* fillets. **Food Microbiology**, v. 30, p. 408-419, 2012. <https://doi.org/10.1016/j.fm.2011.12.025>

OGUNSINA B. S.; BAMGBOYE A. I. 2012 Effect of Moisture Content, Nut Size and Hot-Oil Roasting Time on the Whole Kernel “Out-Turn” of Cashew Nuts (*Anacardium occidentale*) During Shelling. **Nigerian Food Journal**, v. 30:2, p. 57-65, 2012. [https://doi.org/10.1016/S0189-7241\(15\)30036-9](https://doi.org/10.1016/S0189-7241(15)30036-9)

ORO, T.; OGLIARI, P. J.; AMBONI, R. D. M. C.; BARRERA-ARELLANO, D.; BLOCK, J. M. 2008 Evaluación de la calidad durante el almacenamiento de nueces Pecán [*Carya illinoensis* (Wangenh.) C. Koch] acondicionadas en diferentes envases. **Grasas y Aceites**, v. 59:2, p. 132-138, 2008. <https://doi.org/10.3989/gya.2008.v59.i2.501>

ORO, T.; **Composição nutricional, compostos bioativos e vida útil de noz e óleo extravirgem de noz-pecã [*Carya illinoensis* (Wangenh.) C. Koch] 2007**. 105 p. Dissertação (Mestrado em Ciência dos Alimentos) – Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.

OZTURK, I.; SAGDIC, O.; YALCIN, H.; CAPAR, T. D.; ASYALI, M. H. 2016. The effects of packaging type on the quality characteristics of fresh raw pistachios (*Pistacia vera* L.) during the storage. **LWT - Food Science and Technology**, 65, 457–463. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2015.08.046>

PANKAEW, P.; JANJAI, S.; NILNONT, W.; PHUSAMPAO, C.; BALA, B.K. 2016. Moisture desorption isotherm, diffusivity and finite element simulation of drying of macadamia nut (*Macadamia integrifolia*). **Food and Bioproducts Processing**, v. 100, p. 16-24, 2016.

RAEI, M.; MORTAZAVI, A.; POURAZARANG, H. 2009 Effects of Packaging Materials, Modified Atmospheric Conditions, and Storage Temperature on Physicochemical Properties of Roasted Pistachio Nut. **Food Analytical Methods**, v. 3:2, p. 129–132, 2009. <https://doi.org/10.1007/s12161-009-9076-1>

RAINEY, C.; NYQUIST, L.; Nuts: nutrition and health benefits of daily use. **Nutrition Today**, v. 32:4, p. 157-163, 1997. Disponível em: https://journals.lww.com/nutritiontodayonline/Abstract/1997/07000/Nuts_Nutrition_and_Health_Benefits_of_Daily_Use.6.aspx Acesso em: 05 jul 2020

RAISI, M.; GHORBANI, M.; MAHOONAK, A. S.; KASHANINEJAD, M.; HOSSEINI, H. 2015 Effect of storage atmosphere and temperature on the oxidative stability of almond kernels

during long term storage, **Journal of Stored Products Research**, v. 62, p. 16-21, 2015. <https://doi.org/10.1016/j.jspr.2015.03.004>

RIBEIRO, M. A. A.; REGITANO-D'ARCE, M. A. B.; LIMA, U. A.; NOGUEIRA, M. C. S. 1993 Storage of canned shelled Brazil nuts: effects on the quality. **Acta Alimentaria**, v. 22:4, p. 295-303, 1993.

RIBEIRO, S. R.; RIBEIRO, Q. M.; KLEIN, B.; SANTOS, I. D.; FORGIARINI, S.; HAMANN, J. J.; CICHOSKI, A. J.; FRONZA, D.; BRACKMANN, A.; BOTH, V.; WAGNER, R. 2020 Effect of low oxygen on quality attributes of 'Barton' pecan nuts after long-term storage at different temperatures, **Scientia Horticulturae**, v. 263, 109098, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.109098>

SAHENA, F.; ZAIDUL, I. S. M.; JINAP, S.; KARIM, A. A.; ABBAS, K. A.; NORULAINI, N. A. N.; OMAR A. K. M. 2009 Application of supercritical CO₂ in lipid extraction – A review. **Journal of Food Engineering**, v. 95: 2, p. 240-253, 2009. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2009.06.026>

SALVADOR, A. A. **Atividade antioxidante e perfil de ácidos graxos de extratos da torta de noz pecã [*Carya illinoensis* (Wangenh) K. Koch] obtidos por extração supercrítica**, Dissertação (Mestrado em Engenharia de Alimentos), Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina 2014.

SALVADOR, A. A.; PODESTÁ, R.; BLOCK, J. M.; FERREIRA, S. R. S. 2016 Increasing the value of pecan nut [*Carya illinoensis* (Wangenh) C. Koch] cake by means of oil extraction and antioxidant activity evaluation. **Journal of Supercritical Fluids**, v. 116, p. 215–222, 2016. <https://doi.org/10.1016/j.supflu.2016.05.046>

SANTERRE, C. R. **Pecan Technology**. New York: Chapman & Hall: 161 p. 1994.

SATTAR, A.; JAN, M.; AHMAD, A.; HUSSAIN, A.; KHAN, I. 1989 Light induced oxidation of nut oils (Short communication). **Food Nahrung** v. 33:2, p. 213-215, 1989. <https://doi.org/10.1002/food.19890330226>

SEM, F.; MEYVACI, K. B.; TURANLIB, F.; AKSOY, U.; 2010 Effects of short-term controlled atmosphere treatment at elevated temperature on dried fig fruit, **Journal of Stored Products Research**; v. 46, p. 28–33, 2010. <https://doi.org/10.1016/j.jspr.2009.07.005>

SILVA, A. C.; SARTURI, H. J.; DALL'OGGIO, E. L.; SOARES, M. A.; SOUSA, P. T.; VASCONCELOS, L. G.; KUHNEN, C. A. 2016. Microwave drying and disinfestation of Brazil nut seeds. **Food Control**, v. 70, p. 119-129, 2016. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2016.04.049>

SILVA, C. 2017 Produtores comemoram boa safra de noz-pecã - **Jornal do Comércio**, Porto Alegre, 08 mai. 2017. Disponível em http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2017/04/economia/559613-produtores-comemoram-boasafra-de-noz-pecã.html Acesso em:15 mar. 2020

SOHBATZADEH, F.; MIRZANEJHAD, S.; SHOKRI, H.; NIKPOUR, M. 2016. Inactivation of *Aspergillus flavus* spores in a sealed package by cold plasma streamers. **Journal of Theoretical and Applied Physics**, v. 10, p. 99-106. <https://doi.org/10.1007/s40094-016-0206-z>

THEWES, F. R.; BOTH, V.; BRACKMANN, A.; WEBER, A.; ANESE, R. O. 2015. Dynamic controlled atmosphere and ultralow oxygen storage on “Gala” mutants quality maintenance. **Food Chemistry**, v. 188, p. 62–70, 2015. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.04.128>

THOMPSON, J. F.; KADER, A. A. 2012 Harvesting, transporting, processing and grading, Chapter 17, in: Ferguson, L.; 2012 Pistachio production manual. Oakland, University of California, **Agriculture and Natural Resources**, 2012.

TORABIAN, S.; HADDAD, E.; RAJARAM, S.; BANTA, J.; SABATÉ, J. 2009. Acute effect of nut consumption on plasma total polyphenols, antioxidant capacity and lipid peroxidation. **Journal of Human Nutrition and Dietetics**. v. 22, p. 64–71, 2009. <https://doi.org/10.1111/j.1365-277X.2008.00923.x>

VENKATACHALAM, M.; SATHE, S. K. 2006. Chemical composition of selected edible nut seeds. **Journal of Agricultural and Food Chemistry**, v. 54:13, p. 4705-4714 2006. <https://doi.org/10.1021/jf0606959>

VILLARREAL-LOZOYA, J. E.; LOMBARDINI, L.; CISNEROS-ZEVALLOS, L. 2007 Phytochemical constituents and antioxidant capacity of different pecan [*Carya illinoensis* (Wangenh.) K. Koch] cultivars; **Food Chemistry**, v. 102, p. 1241–1249, 2007. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2006.07.024>

WALTON, D. A.; RANDALL, B. W.; POIENOU, M.; NEVENIMO, T.; MOXON, J.; WALLACE, H. M. 2017. Shelf Life of Tropical Canarium Nut Stored under Ambient Conditions. **Horticulturae** v. 3:1, 24, 2017. <https://doi.org/10.3390/horticulturae3010024>

WOODROOF, J. G.; **Pecan history and distribution**. In: Tree Nuts: Production, Processing, Products, v. 2, p. 1-38, Westport, Conn: AVI, 1967.

WORLD CANCER RESEARCH FUND (WCRF). Food, nutrition, physical activity, and prevention of cancer: a global perspective. Washington (DC): AICR; 2007. Disponível em: <http://www.wcrf.org/int/research-we-fund/continuous-update-project-cup> , Acessado em 21 de maio de 2020.

ZHAO, X.; LIU, A.; ZHANG, W.; LV, S.; REN, K. 2011 The effect of pecan oil on hippocampal cells apoptosis in ovariectomized rats; **Procedia Engineering**, v. 18 p. 375–380, 2011 <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.11.060>

CAPÍTULO 44: EFEITO DA ALIMENTAÇÃO ORGÂNICA NA QUALIDADE DE PRESUNTO CRU

CHAPTER 44: EFFECT OF ORGANIC FOOD ON THE QUALITY OF RAW HAM

John Nonvignon Bossis Honfoga¹; Mariana de Oliveira Silva²; Juliana Lopes de Lima³; Marta Suely Madruga⁴; Taliana Kênia Alencar Bezerra⁵

Resumo

Produtos cárneos processados de alta qualidade, especialmente o presunto cru, tem origem na Europa onde são mais consumidos. Entretanto, o mercado brasileiro está adotando esse produto devido as suas características sensoriais muito apreciáveis. Objetivou-se com a pesquisa verificar a influência da alimentação orgânica na qualidade do presunto cru elaborado no Brasil. O presunto foi elaborado na Fazenda Yaguara Ecológico a partir de suínos de raça híbrida. Após 50 dias do nascimento, os animais passaram pelo desmame e foram alimentados através do sistema orgânico contendo frutas e hortaliças, durante 10 meses. Os suínos foram abatidos e os presuntos processados e maturados. O presunto foi avaliado frente às análises físicas e químicas e avaliação da oxidação lipídica e proteica. Diante dos resultados, verificou-se que os parâmetros atividade de água, teor de proteína e de lipídeos corroboraram com a legislação brasileira e os demais parâmetros físicos e químicos se apresentaram satisfatórios indicando a qualidade do produto. Em relação à avaliação oxidativa, os resultados apresentaram valores de uma oxidação mínima, onde é desejável e necessária para obtenção de atributos sensoriais peculiares ligados à qualidade do produto. Os resultados indicam que a alimentação e a genética dos animais interferiram diretamente na qualidade do presunto cru.

Palavras-Chave: Alimentação orgânica, Suíno híbrido, Qualidade da carne, Presunto cru.

Abstract

High-quality processed meat products, especially raw ham, originate in Europe where they are most consumed. However, the Brazilian market is adopting this product due to its very appreciable sensory characteristics. The objective of the research was to verify the influence of organic food on the quality of raw ham made in Brazil. The ham was made at Fazenda Yaguara Ecológico using hybrid pigs. After 50 days of birth, the animals passed through weaning and were fed through the organic system containing fruits and vegetables, for 10 months. The pigs were slaughtered and the hams processed and matured. The ham was evaluated against physical and chemical analysis and evaluation of lipid and protein oxidation. In view of the results, it was found that the parameters of water activity, protein and lipid content corroborated with Brazilian legislation and the other physical and chemical parameters were satisfactory indicating the quality of the product. Regarding the oxidative evaluation, the results showed values of minimal oxidation, where it is desirable and necessary to obtain peculiar sensory attributes linked to the quality of the product. The results indicate that the feeding and the genetics of the animals directly interfered in the quality of the raw ham

Keywords: Organic food, Hybrid pig, Meat quality, Raw ham.

¹Engenharia de Alimentos, Universidade Federal da Paraíba, jnbossis91@hotmail.com

²Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal da Paraíba, marianaoliveira.ufpb@gmail.com

³Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal da Paraíba, julianalopesdelimabp@gmail.com

⁴Doutora, Universidade Federal da Paraíba, msmadruga@uol.com.br

⁵Doutora, Universidade Federal da Paraíba, taliana.kenia@hotmail.com

Introdução

Na suinocultura a alimentação assume o principal custo para os produtores, representando cerca de 60-70% do custo total de produção. A alimentação promove não só o crescimento como o desenvolvimento do animal, com reflexo inclusive no potencial genético de futuras crias das gestantes (FERREIRA, 2017). Neste sentido, o produtor tem buscado alternativas para minimizar os custos com alimentação sem prejudicar o potencial de produção dos animais e ainda manter-se competitivo no mercado com produtos de qualidade (SIMAS, 2018).

A qualidade da carne de suínos pode sofrer consideráveis influências de acordo com o tipo de alimento fornecido ao animal (MELO et al., 2014). Portanto, conhecendo as características da qualidade da carne pode-se garantir que estas proporcionem a obtenção de produtos com melhor característica tecnológica, físico-química e sensorial. Desta forma, atingirá um significativo valor para o mercado, satisfazendo os desejos de compra de consumidores (ROSA et al., 2008).

Dentre os sistemas de alimentação têm-se o sistema de produção não convencional baseado na alimentação orgânica. Segundo Tonet et al. (2016), esse sistema apresenta-se viável financeiramente e em relação às características nutricionais e sensoriais. Em soma, a utilização da alimentação orgânica em suínos apresenta aos consumidores um produto com alternativa mais natural, devido a redução de aditivos químicos em produtos derivados. A grande variedade de alimentos alternativos orgânicos que influenciam no desempenho dos animais e consequentemente na carne obtida e em produto derivados é constituída por resíduos de frutas e hortaliças (TONET et al., 2016).

Diversos estudos vêm sendo realizados, mostrando que a incorporação de vegetais, como frutas e hortaliças, na dieta dos animais apresentou características antioxidantes oriunda da presença de compostos fenólicos dos vegetais. Produtos como bagaço de uva, guaraná em pó, mistura de óleos vegetais, castanha, têm sido comumente ofertados na alimentação de suínos criados em sistema orgânico (ALMEIDA, 2017; SIMAS, 2018; PEIRETTI et al., 2015; BONNEAU; LEBRET, 2010).

Diante deste cenário, a utilização de produtos de origem vegetal, como fonte de compostos fenólicos, nas dietas de animais, apresenta grandes potencialidades para a produção de carnes, devido ao aumento do teor de antioxidantes no músculo e consequentemente estabilidade da oxidação e assim proporcionam características sensoriais e nutricionais desejáveis (TONET et al. 2016).

Dentre os principais parâmetros avaliados que influenciam diretamente na qualidade da

carne, destacam-se os processos de oxidação lipídica e proteica. Durante os processos oxidativos ocorre o desenvolvimento de sabores e odores desagradáveis, decorrente da formação de radicais e outros compostos oxidados, como óxidos de colesterol. Por outro lado, a oxidação pode acarretar resultados positivos, como a formação de compostos aromáticos característicos em produtos curados (LORIDO et al., 2015; LORIDO et al., 2019).

Contudo, a alimentação dos suínos é um fator interferente na qualidade da carne e consequentemente na qualidade do produto cárneo a ser desenvolvido, como por exemplo, o presunto cru. O presunto cru é considerado um produto diferenciado pelas suas características de produção e aspectos sensoriais. Durante seu processo de maturação desenvolve aroma e sabor próprio, que o torna muito apreciado (CANDEK-POTOMAR; KRLEP, 2012). De acordo com o regulamento técnico de identidade e qualidade de presunto (BRASIL, 2000), entende-se por presunto cru produto obtido do pernil ou corte de pernil de suínos, maturado e dessecado, adicionado de condimentos, podendo ou não ser curado e defumado onde, a presença de mofos é consequência natural do seu processo tecnológico e de fabricação.

Os presuntos crus são distinguidos pela origem de produção e qualidade da matéria-prima (HERSLETH et al., 2011). A combinação genética suína formada pelas raças Large White e Landrace, além de animais da raça Duroc, é recomendada para produção de presunto cru por apresentarem um adequado grau de gordura intramuscular e possuir uma baixa frequência do gene Halotano (relacionado à incidência de carne PSE – pálida, flácida e exsudativa) (COSTA, 2005). Por esse motivo, empresas brasileiras já desenvolvem linhagens híbridas de suínos para a produção de presuntos crus, no entanto o animal da mistura de raças Landrace x Large White x Duroc x Pietrain também precisa ser estudado para desenvolvimento de produtos como o presunto cru.

Diante do exposto, objetivou-se com a pesquisa verificar a influência da alimentação orgânica em suínos com mistura de raças Landrace x Large White x Duroc x Pietrain e posteriormente elaboração e avaliação de presunto cru

Material e Métodos

Matéria-prima

Os animais utilizados na pesquisa foram provenientes da mistura de raças Landrace, Large White, Duroc e Pietrain. Os suínos passaram por um processo de desmame após 50 dias de vida e em seguida foram alimentados através do sistema orgânico contendo ração e frutas e hortaliças como: cana de açúcar, capim, jaca, siriguela, banana verduras e manga, durante 10 meses de vida. Logo após, os mesmos foram abatidos seguindo

todas as exigências estabelecidas pela portaria nº 711, de 1º de Novembro de 1995 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA, que dispõe sobre as normas técnicas de instalações e equipamentos para abate e industrialização de suínos (BRASIL, 1995). Após a insensibilização os animais passaram pela etapa de sangria, escaldagem, depilação, evisceração e em seguida, o corte da carcaça.

O presunto foi elaborado na Fazenda Yaguara Ecológica, localizada na cidade de Taquaritinga do Norte, Pernambuco (Latitude: -7.88809, 36° 5' 33" Oeste). Após o abate as carcaças foram refrigeradas durante 24 horas e, logo após, realizado o processo de corte para separação dos pernis. O pernil passou por um processo de salga (1,1 dia/kg) e posteriormente maturação em câmara com sistema de controle de temperatura e umidade. O período de maturação foi encerrado após a perda de 30% do peso inicial do pernil, conforme o fluxograma apresentado na figura 1. As amostras do presunto foram acondicionadas em embalagens térmicas e conduzidas ao Laboratório de Análises Químicas de Alimentos– LAQA, localizado na Universidade Federal da Paraíba, Campus I, João Pessoa – PB, para a realização das análises.

Figura 1. Fluxograma de processamento do presunto cru

Fonte: Própria (2019).

Metodologia

Análises Físicas

O presunto cru foi avaliado quanto ao pH, atividade de água (Aa), capacidade de retenção de água (CRA), cor (L*, a*, b*) e Força de cisalhamento (FC). O pH foi determinado

segundo a metodologia, em triplicata, descrita pela AOAC (2000), procedimento nº 981.12, em pHmetro (INOLAB, Estados Unidos). A atividade de água foi realizada segundo os procedimentos analíticos da AOAC (2000), utilizando-se um aparelho AQUALAB CX2 (Decagon Devices, USA). A Capacidade de Retenção de Água (CRA) foi realizada de acordo com Wang (2019). Para avaliação da cor foram determinados os parâmetros a^* , b^* e L^* , (CIELAB, 2004) com um colorímetro Konica Minolta (Modelo CR-400, Osaka, Japão).

Análises Químicas

As análises químicas foram realizadas em quadruplicata para os parâmetros umidade, proteínas e cinzas de acordo com a metodologia proposta pela AOAC (2000) e lipídeos foram dosados de acordo com Folch, Lees e Stanley (1957).

Análises de oxidação lipídica

A avaliação do processo de oxidação lipídica foi realizada nos presuntos crus, através dos métodos: índice de peróxido, dienos conjugado, índice de para-anisidina e substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS).

Índice de peróxido

O índice de peróxido foi determinado de acordo com método descrito por Carvalho et al. (2002). A gordura foi previamente extraída pelo método de Folch, Lees e Stanley (1957) e em seguida, adicionada de ácido acético e iodeto de potássio. A mistura ficou em repouso por 1 minuto em local escuro, após este tempo, foi adicionado água destilada e solução de amido.

Dienos conjugados

O extrato lipídico do presunto cru foi dissolvido em iso-octano e a absorbância verificada a 234 nm em espectrofotômetro UV-VIS (Quimis, Q798U, São Paulo, Brasil). Foi determinado o aumento na absorbância para cada 50 mg de lipídeo (IUPAC, 1992). Os resultados foram expressos através da Equação 1:

$$\% \text{ Dienos} = \frac{A}{C \cdot d} \quad \text{Equação (1)}$$

Onde: A é a absorbância a 234 nm; C é a concentração de lipídio na solução iso-octano (g 100 ml⁻¹) e d é o comprimento da célula (cm).

Índice de Para-Anisidina (p-anisidina)

O índice de p-anisidina (Av) foi determinado conforme método determinado pela IUPAC (1987). As amostras lipídicas foram dissolvidas em hexano e a absorbância foi verificada a 350 nm através de espectrofotômetro UV-VIS (Quimis, Q798U, São Paulo, Brasil). Em seguida, 1mL de p-anisidina foi adicionada a 5mL da mistura e mantido em local escuro durante 10 minutos antes de uma nova leitura da absorbância a 350 nm. O resultado foi calculado como mostra a Equação 2.

$$IpA = 25 * \left(\frac{(1,2 * A2) - A1}{m} \right) \quad \text{Equação (2)}$$

Onde: A1 é absorbância da amostra antes da adição da solução de p-Anisidina, A2 é a absorbância da amostra após a adição da solução de p-Anisidina e m é a massa lipídica utilizada na análise

Determinação do número de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS)

A determinação do valor de TBARS foi realizada conforme método descrito por Rosmini et al. (1996), onde 5g da amostra foi misturada a 5 mL de ácido tricloroacético (TCA) 10% e 2,5 mL de água destilada. Os tubos foram agitados durante 5 minutos e centrifugados por 5 minutos a 3500 rpm. O sobrenadante foi filtrado e homogeneizado com 5 mL de ácido tiobarbitúrico (TBA) 0,02 M. A mistura foi aquecida em banho-maria a 100 °C durante 30 min. Em seguida, os tubos foram resfriados e a absorbância da mistura foi lida a 532 nm contra um branco contendo 5 mL de TCA 10%, 2,5 mL de água destilada e 5 mL de TBA 0,02 M. Uma curva padrão de 1,1,3,3-tetrametoxipropano (TMP) foi utilizada para quantificação do número de TBARS.

Análises de oxidação proteica

Quantificação dos compostos carbonílicos

As carbonilas totais foram determinadas por meio do método dinitrofenilhidrazina (DNPH) descrito por Oliver (1987). Aliquota de 1,0 g de amostra foi homogeneizado com 10,0 mL de tampão Na₃PO₄ (fosfato de sódio) 20 mol/L e NaCl (cloreto de sódio) 0,6 mol/L, pH 6,5 (1:10). A partir deste homogeneizado, duas alíquotas de 150 µL de cada amostra foram colocadas em tubos Eppendorf de 2 mL correspondentes: uma foi tratada para a quantificação de proteínas e a outra para a quantificação de carbonilas. As proteínas foram então precipitadas pela adição de 1 mL de ácido tricloroacético a 10% (TCA) frio, seguido de centrifugação a 4 °C durante 5 minutos a 5000 rpm e os sobrenadantes foram rejeitados. Para a determinação dos compostos carbonilas, adicionou-se 1 mL da solução de HCl 2 mol/L com 0,2% de DNPH aos

sedimentos. Para a determinação de proteínas, adicionou-se 1 mL de HCl 2 mol/L às pastilhas. Após incubação à temperatura ambiente por 1 h, as proteínas foram novamente precipitadas com 1 mL de TCA a 10% frio, seguido de centrifugação a 4 ° C durante 10 minutos a 10000 rpm e lavadas duas vezes com 1 mL de etanol/acetato de etila (1:1 v / v) e evaporado o resíduo de solvente com gás nitrogênio a baixa pressão, sendo os sedimentos dissolvidos em 1,5 mL de tampão Na₃PO₄ 20 mmol/L, pH 6,5, adicionado com hidrocloreto de guanidina 6 mol/L. A leitura foi realizada em espectrofotômetro (Q798U, Quimis, São Paulo, Brasil) com comprimento de onda de 370 nm para compostos carbonílicos e 270 nm para concentração de proteína.

Oxidação da mioglobina

O conteúdo de metamioglobina foi calculado seguindo a metodologia descrita por Fernandez-Lopes et al. (2003) onde, 5 g de carne foi homogeneizada com 50 mL de tampão de fosfato 0,04 M (pH 6,8) a 4 °C. O extrato foi centrifugado durante 30 min a velocidade de 15 000 rpm. Em seguida, o sobrenadante foi filtrado através de papel Whatman (Nº 1) e a absorbância foi lida a 525, 572 e 730 nm. A porcentagem de metamioglobina foi determinada utilizando a fórmula de Krzywicki (1979), como mostra a Equação (3):

$$\text{MetMb (\%)} = 1.395 - ((A_{572} - A_{730}) / (A_{525} - A_{730})) \times 100 \quad \text{Equação (3)}$$

Análise Estatística

Os resultados obtidos foram expressos através da média, desvio padrão e coeficiente de variação.

Resultados e Discussão

Avaliação física do presunto cru

Os resultados das análises físicas realizadas no presunto cru avaliado neste estudo estão apresentados na Tabela 1. O valor do pH encontrado neste estudo foi 5,65, valor este relativamente menor ao encontrado por Fuente et al. (2014), ao trabalhar com presunto cru da raça ibérica (6,09). Yim et al. (2019) ao realizar um estudo com o presunto curado seco de uma raça mista Landrace x Yorkshire x Duroc também obteve valores de pH aproximadamente 6,0. Dessa forma, observe-se que o pH obtido no presente estudo é um pouco baixo. A medida de pH é fundamental para avaliação da carne, porque irá influenciar a capacidade de retenção de água, a cor, textura, conservação da carne, entre outras características (BARBOSA, 2017).

Tabela 1. Avaliação física de presunto cru

Parâmetros	Presunto	CV%	Fuente et al. (2014)
pH	5,65±0,03	0,53	6,09
CRA	9,42±0,93	9,87	-
Aa	0,85±0,01	1,18	0,88
L*	38,44±0,36	0,94	39,53
a*	9,07±0,54	5,95	18,35
b*	2,32±0,25	10,77	5,94

CRA: Capacidade de retenção de água; Aa: Atividade de água; L*: parâmetro de cor (luminosidade); a*: parâmetro de cor (verde ao vermelho); b*: parâmetro de cor (azul ao amarelo).

Fonte: Próprio (2020)

Com relação à capacidade de retenção de água, foi obtido um valor de 9,42. Segundo Barbosa (2017), a capacidade de retenção de água é um parâmetro importante que está ligado diretamente ao valor nutritivo da carne e sensorial, porque as perdas de água (exudado) do produto englobam nutrientes como proteínas solúveis, vitaminas e mineiras; e a perda da água implica em um produto mais seco e com menor maciez (HUFF-LONERGAN; LONERGAN, S., 2005). No tocante, a atividade de água, o valor obtido está em conformidade com o estabelecido pela legislação (BRASIL, 2000). O mesmo resultado corrobora com o obtido por Fuente et al. (2014), de 0,88, ao estudar presunto cru ibérico.

Avaliando a coloração do produto, observa-se que para o parâmetro luminosidade (L*), o presunto cru apresentou um valor de 38,44. A luminosidade tem a variação de 0 a 100 indicando modificações do escuro ao claro. No caso do presunto esse valor apresentou tendência ao escuro devido ao presunto ser um produto curado e consequentemente apresentar característica da coloração escura.

Por outro lado, a cromaticidade a* que indica a coloração verde (-a) a vermelha (+a) apresentou um valor de 9,07 indicando uma tendência de coloração vermelha característica de presunto cru curado. E para a cromaticidade b* que indica a coloração azul (-b) a amarela (+b), percebeu-se uma tendência de cor amarela com um valor de 2,32, devido a presença da gordura no produto.

Comparando os parâmetros de cor dessa amostra com o estudo de Fuente et al. (2014) em que foi avaliado o presunto cru alimentado com uma dieta orgânica vegetal, pode-se observar que o valor da luminosidade, de 39,53, se assemelha ao deste estudo. Entretanto, os parâmetros a* e b* apresentaram valores mais altos aos encontrados neste estudo, o que poderia

ser influenciado por diversos fatores, como a alimentação do animal, raça e quantidade reduzida de aditivos químicos, como sal de cura. Segundo Barbosa (2017), o poder da cor é fundamental na avaliação do alimento por parte do consumidor, que observa a aparência da coloração, seu contraste e a diferença de cor do produto cárneo.

Avaliação química

A composição química do presunto cru está apresentada na Tabela 2. Os resultados obtidos em relação à proteína e lipídeos encontram-se em conformidade com os estabelecidos na legislação (BRASIL, 2000) que exige um valor mínimo de 27% para proteína e um valor máximo de 20% para gordura. O valor da proteína obtido, 28,79%, corrobora com o encontrado por Lorigo et al. (2019) ao estudar o presunto cru do tipo ibérico alimentado por grama e belotas. Já o teor de gordura obtido neste estudo foi superior ao encontrado por Lorigo et al. (2019) (8,99%), Fuente et al. (2014) (6,05%) e Yim et al. (2019) (7,03%), em presuntos. Essa diferença nos resultados pode ser associada a vários fatores, principalmente pela alimentação e genética dos suínos.

Tabela 2. Composição química de presunto cru

Parâmetros	Presunto	CV	Lorigo et al. (2019)	Lorigo et al. (2015)
Proteínas	28,79±0,08	0,28	30,93	39,26
Lipídeos	16,42±0,72	4,38	8,99	10,62
Umidade	32,41±0,98	3,02	39,11	40,84
Cinzas	3,58±0,32	8,94	-	-

Fonte: Própria (2020).

Ao observar o teor de umidade, o valor encontrado foi de 32,41%, valor inferior obtido por Lorigo et al. (2019) (39,11%) e Lorigo et al. (2015) (40,84%) ao estudarem presuntos cru. No que diz respeito ao teor de cinzas, o valor obtido foi de 3,58%, valor próximo ao encontrado por Silva et al. (2019) ao estudar o presunto cru de porco preto da Caatinga criado com alimentação orgânica enriquecido com bagaço de uva (4,05%). Os mesmos autores alegam que esse valor encontrado pode estar associado à alimentação recebida pelos animais.

Avaliação de oxidação lipídica e proteica

Os resultados das análises de oxidação lipídica e proteica se encontram na Tabela 3 e 4, respectivamente. Avaliando o valor do TBA (0,78 mg MDA/kg) pode-se observar que o mesmo

apresentou-se superior ao encontrado por Fuente et al. (2014), de 0,34 mg MDA/kg em presunto cru ibérico. Rodrigues (2019) encontrou um valor de 0,85 mg MDA/kg para TBA ao estudar o presunto curado de suíno bísaro alimentado com cereais, e Teixeira et al. (2018) obteve valor semelhante, 0,93 mg MDA/kg, também estudando presunto alimentado com cereais. Entretanto, o valor encontrado nesta pesquisa abrange o limiar de segurança para o consumo, descrito por Rodrigues (2019) (1,59 mg MDA/kg).

Tabela 3. Avaliação de oxidação lipídica de presunto cru.

Análise	Presunto	CV	Fuente et al. (2014)
TBA	0,78±0,11	14,10	0,34
Índice de Peróxido	15,72±3,58	22,77	
Dienos conjugados	33,50±0,19	0,56	
p-anisidina	1,86±0,70	37,63	

Fonte: Própria (2020).

Tabela 4. Avaliação de oxidação proteica de presunto cru.

Análise	Presunto	CV%	Fuente et al. (2014)
Compostos carbonílicos	0,33±0,07	21,21	6,84
Metamioglobina	72,32± 1,79	2,47	-

Fonte: própria (2020).

O índice de peróxido e o valor de dienos conjugados são avaliados para a determinação dos compostos primários da oxidação. Onde o índice de peróxido é usado para medir a fase inicial da oxidação ou o nível da mesma. Na oxidação, há liberação de peróxidos e as alterações iniciais não são percebidas sensorialmente (MATHIAS et al., 2010).

O índice de peróxido obtido neste estudo foi 15,72 mg/kg e segundo a legislação brasileira, o limite máximo permitido de índice de peróxido em uma amostra é de 10 mg de peróxido O₂/kg de produto.

Porém, de acordo com Mathias et al. (2010), as gorduras para serem consideradas estáveis precisam ter 0 (zero) mEquivalente de peróxido inicial / kg de gordura e apresentar valor menor do que 20 mEq/kg de gordura em 20 horas de teste. A oxidação lipídica nos presuntos pode contribuir para a qualidade sensorial, sempre que não ultrapasse uma intensidade que traga características negativas ao presunto, como por exemplo, odores e sabores a ranço (BARBOSA, 2017).

Avaliando o teor de dienos conjugados (33,50%) observa-se que o mesmo apresentou valor satisfatório, pois segundo Marmesat (2009), o teor de dienos conjugados ideal é abaixo

da média de 50% e assim pode dizer que a amostra não apresenta um maior grau de instauração de ácidos graxos, no entanto um índice de oxidação razoável sofrido.

No tocante ao teor de p-anidissina, o valor obtido foi 1,86, valor este considerado baixo e assim satisfatório. Segundo Gispert (2014), a determinação do teor de p-anidissina serve para verificar se há produtos secundários da oxidação lipídica, entretanto, a análise não distingue entre produtos voláteis e não voláteis, embora seja mais sensível aos aldeídos voláteis não saturados do que aos saturados.

A oxidação proteica do presunto cru foi avaliada analisando a formação dos compostos carbonílicos e a oxidação da mioglobina. Analisando a quantidade de compostos carbonílicos encontrada no presunto, 0,33 nM de carbonil/mg de proteína, observa-se que o valor foi considerado baixo ao comparar ao detectado por Fuente et al. (2014) (6,84 nM de carbonil/mg de proteína) em presunto cru ibérico. Diante deste resultado associa-se o retardo da formação de compostos carbonílicos à ingestão orgânica (rica em compostos antioxidante) dos suínos. Segundo Estévez (2011), a presença dos compostos carbonílicos é o reflexo do dano oxidativo aos aminoácidos alcalinos.

No que compete à oxidação da mioglobina, o valor da metamioglobina encontrado foi de 72,44%. De acordo com Costa (2005), a formação da metamioglobina (coloração marrom) resulta da oxidação do íon ferroso (Fe^{+2}) para a forma férrica (Fe^{+3}), em baixas concentrações de oxigênio, incapaz de se ligar ao oxigênio. Souza et al (2013), observou uma porcentagem de 72,05% de metamioglobina em charque armazenado por 60 dias, mostrando a oxidação da mioglobina devido ao efeito da salga. Uma pequena quantidade de oxidação é necessária para obter o aroma característico em carnes curadas, embora um excesso de oxidação possa levar a alterações no sabor, ranço e coloração (BARBOSA, 2017). Os resultados mostram que a alimentação recebida pelo suíno e sua genética influenciaram na composição química e física do produto assim como na sua qualidade sensorial.

Conclusões

Os resultados deste estudo apontam que a base alimentar usada na criação dos suínos e a sua genética têm uma influência perceptível na qualidade do produto final. Assim, o presunto cru obtido do suíno de uma mistura de raças Landrace x Large White x Duroc x Pietrain, tendo sua dieta baseada em uma alimentação orgânica vegetal, apresenta-se como um produto com suas qualidades físico-químicas e sensoriais dentro dos padrões da legislação brasileira e apto para ser comercializado

Referências

ALMEIDA, B.C. da S. **Utilização do bagaço de uva em rações para suínos em terminação**. 95f. 2017. Tese. Programa de doutorado integrado em zootecnia. Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife.

AOAC- Association of Official Analytical Chemists. **Official methods of analysis** the of AOAC International. 17th ed. Washington, USA, 2000.

BARBOSA, N. A. D. **Caracterização físico-química de Presuntos de porcos da raça Bísara com diferentes tempos de cura**. Dissertação de mestrado. Escola Superior de Agrária. Instituto Politécnico de Bragança. Bragança, 2017.

BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Secretaria de Defesa Agropecuária/Órgão: DIPOA - Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Instrução Normativa Nº 22, de 31 de julho de 2000. **Regulamento técnico de identidade e qualidade de presunto cru**, anexo IV. Diário Oficial da União, Brasília, DF, seção 1, página 15, 3 de agosto de 2000.

BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. **Normas técnicas de instalações e equipamentos para abate e industrialização de suínos**. Portaria Nº 711, de 01/11/1995. Brasília: Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 1995.

BONNEAU, M.; LEBRET, B. Production systems and influence on eating quality of pork. **Meat Science**, v. 84, p. 293-300, 2010.

CANDEK-POTOKAR, M.; SKRLEP, M. Factors in pig production that impact the quality of dry-cured ham: A review. **Animal**, v. 6, n.2, p. 327-338, 2012.

COSTA, M. R. **Processamento acelerado de presunto cru com uso de transglutaminase em carne desossada: perfis sensorial, colorimétrico e de textura em comparação com produtos tradicionais**. Dissertação de mestrado. Faculdade de Engenharia de Alimentos. Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2005

COSTA, M. R. et al. Perfil sensorial e aceitação de presuntos crus produzidos por métodos

tradicionais e acelerado. **Ciênc. Tecnol. Aliment.** vol.27 no.1 Campinas Jan./Mar. 2007.

ESTÉVEZ, M. Protein carbonyls in meat systems: a review. **Meat Science**, 89, 259–279, 2011.

FERREIRA, P. **Avaliação do crescimento e da qualidade da carcaça e da carne de suínos Landrace x Large White submetidos a acabamento intensivo até elevado peso ao abate.** Dissertação de mestrado. Departamento de Produção e Tecnologia Alimentar. Escola Superior Agrária de Santarém. Instituto Politécnico de Santarém. Santarém, 2017

FOLCH, J.; LEES, M.; STANLEY, S. G. H. A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. **Journal of Biological Chemistry**, v.226, n.1, p.497-509, 1957

FUENTES, V.; VENTANAS, S.; VENTANAS, J.; ESTÉVEZ, M. The genetic background affects composition, oxidative stability and quality traits of Iberian drycured hams: Purebred Iberian versus reciprocal Iberian x Duroc crossbred pigs. **Meat Science**, v.96, p. 737-743, 2014.

GISPERT, G. A. **Estudi de l'activitat antioxidant de residus d'alvocat i borratja.** Dissertação de mestrado. Escola Tècnica Superiro d'Enginyeria Industrial de Barcelona. Barcelona, 2014.

HERSLETH M.; LENGARD, V.; WERBEKE, W.; GUERRERO, L.; NAES, T. Consumers' acceptance of innovations in dry-cured ham: impact of reduced salt content, prolonged aging time and new origin. **Food Quality and Preference**, v. 22, p. 31–41, 2011.

HUFF-LONERGAN, E., LONERGAN, S. Mechanisms of water-holding capacity of meat: The role of postmortem biochemical and structural changes. **Meat Science**. 71: 194-204, 2005.

LORIDO, L.; PIZARRO, E.; ESTÉVEZ, M.; VENTANAS, S. Emotional responses to the consumption of dry-cured hams by Spanish consumers: A temporal approach. **Meat Science**, v. 149, p. 126-133, 2019.

LORIDO, L.; ESTÉVEZ, M. VENTANAS, J.; VENTANAS, S. Salt and intramuscular fat modulate dynamic perception of flavour and texture in dry-cured hams. **Meat Science**, v. 107,

p. 39-48, 2015.

MARMESAT, S.; MORALES, A.; VELASCO, J.; RUIZ-MÉNDEZ, M. V.; DOBARGANES, M. C. Relationship between changes in peroxide value and conjugated dienes during oxidation of sunflower oils with different degree of unsaturation. **GRASAS Y ACEITES**, 60 (2), 155-160, ABRIL-JUNIO 2009.

MELO, D. S. et al. Qualidade da carne de suínos com uso de glicerina na alimentação. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, Belo Horizonte, v. 66, n. 2, p. 583-592, jan./fev. 2014.

OLIVER, C. N.; AHN, B. W.; MOERMAN, E. J.; GOLDSTEIN, S.; STADTMAN, E. R. Age-related changes in oxidized proteins. **Journal of Biological Chemistry**. v. 262, n. 12, p. 5488-5491, 1987

PEIRETTI, P.G.; GAI, F.; BRUGIAPAGLIA, A.; MUSSA, P.P.; MEINERI, G. Fresh meat quality of pigs fed diets with different fatty acid profiles and supplemented with red wine solids. **Food Science and Technology**, v. 35, p. 633-642, 2015.

RODRIGUES, R. I. A. **Estudo de indicadores de qualidade da carne e do presunto de porco bísaro**. Dissertação de mestrado em zootecnia. Instituto Politecnica de viana do Castelo. Viana, Dezembro de 2019

ROSA, A. F.; et al. Qualidade da carne de suínos de três linhagens genéticas comerciais em diferentes pesos de abate. **Ciência Rural**, Santa Maria, v.38, n.5, p.1394-1401, 2008.

TONET, R. M.; SILVA, a. a.; PONTARA, L. P. Alimentos alternativos para aves e suínos em sistemas de produção com base agro ecológica. **PUBVET**, Maringá, v.10, n.8, p.628-635, Ago., 2016

SILVA, M. O.; HONFOGA, J. N. B.; LIMA, J. L.; DALMAS, P. S.; MADRUGA, M. S.; BEZERRA, T. K. A. Efeito do bagaço de uva (*Vitis vinifera* L.) associada à alimentação orgânica na qualidade de presunto cru do porco preto da caatinga. In: **V Encontro Nacional da Agroindústria, 2019**, Bananeiras. Anais do V Enag, 2019.

SIMAS, F. J. R.; **Avaliação do guaraná (*Paullinia Cupana* var. *sorbilis*) em pó como aditivo na dieta de suínos em terminação.** Dissertação de mestrado. Programa de pós-graduação em ciência animal. Faculdade de ciências agrárias. Universidade Federal do Amazonas. Manaus, Maio 2018.

Souza, M. A. A.; et al. Lipid and Protein Oxidation in Charqui Meat and Jerked Beef. **Brazilian. Archives Biology and Technology.** v.56 n.1: pp. 107-112, Jan/Feb 2013.

TEIXEIRA, A., PEREIRA, E., BARBOSA, N., RODRIGUES, S. Efeito do tempo de cura nas características físico-químicas de presunto Bísaro. **Revista Portuguesa de Zootecnia.** Ano III, nº 1. ISSN: 0872-7098, 2018

WANG, C.; WANG, H.; LI, X.; ZHANG, C. Effects of oxygen concentration in modified atmosphere packaging on water holding capacity of pork steaks. **Meat Science**, v. 148, p. 189-197, 2019.

CAPÍTULO 45: FOOD DEFENSE: GERENCIAMENTO DE RISCOS E APLICAÇÃO DE FERRAMENTA CARVER + *SHOCK* EM FRIGORÍFICO

CHAPTER 45: FOOD DEFENSE: RISK MANAGEMENT AND CARVER + *SHOCK* TOOL APPLICATION IN SLAUGHTERHOUSE

Danielle Resende Aguiar¹; Marta Mitsui Kushida²; Leandro Carlos Paiva³

Resumo

A ferramenta CARVER + *Shock* é um *software* criado pelo governo norte-americano e direcionado para prever as possíveis vias de contaminação intencional de uma empresa de alimentos, propondo soluções a essas vulnerabilidades. Como objetivo para esse trabalho aplicou-se a ferramenta em um frigorífico com a finalidade de elencar os pontos críticos e vulneráveis da empresa e propor suas possíveis soluções. A metodologia proposta foi adaptada diretamente do *software*: através de questionários propostos na execução do programa são apresentadas questões sobre as linhas de produção, as estruturas prediais, os acessos às dependências e às informações da empresa e o controle de acessos dos colaboradores aos diversos setores da empresa. Ao final é apresentado um relatório com os principais pontos vulneráveis da empresa. Os resultados apresentados pelo *software* conseguiram determinar as áreas vulneráveis de contaminação intencional nas dependências do frigorífico. Além disso, o sistema conseguiu analisar locais da empresa onde geralmente não são pensadas ações de controle e definiu algumas medidas importantes para a mitigação das contaminações intencionais. Ao final concluiu-se que o sistema CARVER + *Shock* é uma ferramenta útil para pequenas e médias empresas do setor alimentar, apesar de ser trabalhoso e exigir um conhecimento avançado da língua inglesa.

Palavras-chave: Segurança dos alimentos, *Food Defense*, CARVER+*Shock*, frigorífico.

Abstract

The CARVER + Shock tool is a software created by the US government and aimed at predicting possible ways of intentional contamination by a food company, proposing solutions to these vulnerabilities. As a goal for this work, the tool was applied in a slaughterhouse with the purpose of listing the critical and vulnerable points of the company and proposing its possible solutions. The proposed methodology was adapted directly from the software: through questionnaires proposed in the execution of the program, questions are presented about the production lines, building structures, access to the company's premises and information and the control of access by employees to the various sectors of the company. At the end, a report is presented with the main vulnerable points. The results presented by the software were able to determine the vulnerable areas of intentional contamination on the premises of the slaughterhouse. In addition, the system was able to analyze company locations where control actions are not usually thought of and defined some important measures to mitigate intentional contamination. In the end, it was concluded that the CARVER + Shock system is a useful tool

¹ Mestre em Ciências e Tecnologia de Alimentos, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, *campus* Machado, danielle.resende@hotmail.com.br.

² Doutora, Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo - FZEA/USP, martakushida@usp.br.

³ Doutor, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, *campus* Machado, leandro.paiva@ifsuldeminas.edu.br.

for small and medium sized companies in the food sector, despite being laborious and requiring an advanced knowledge of the English language.

Keywords: Food Safety, Food Defense, CARVER + Shock, slaughterhouse.

Introdução

Nas últimas décadas, a globalização, somada a exigência dos mercados, vem impor às empresas a adoção de sistemas mais consistentes e eficazes para satisfazer as necessidades atuais, no que concerne à segurança e qualidade alimentar. As crescentes preocupações das empresas, governos e consumidores sobre a contaminação intencional e fraude alimentar conduziram a emergência de novos conceitos e metodologias como o da defesa alimentar, cujo escopo visa essencialmente a proteção da indústria, produtos e instalações, da contaminação intencional, adulteração e terrorismo alimentar (SEVERINO, 2016).

Esta iniciativa exige o esforço corporativo e governamental para combater os acontecimentos de adulterações, os quais devem estar cientes das ameaças terroristas a que o país pode estar sujeito e do impacto que poderá ter sobre a cadeia alimentar. Para ir ao encontro a estes esforços, as empresas do setor alimentar devem dispor de meios e procedimentos para prevenir e antecipar situações de contaminação intencional ou adulteração. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o combate ao terrorismo alimentar é conseguido utilizando-se de medidas articuladas de prevenção, detecção, preparação, resposta e comunicação entre os países, instituições e pessoas. Para que tais medidas sejam concretizadas com sucesso é crucial que os países tenham previamente implantados programas de segurança e defesa alimentar consistentes e eficazes (WHO, 2002).

Nesse sentido, o *food defense* (em tradução livre, defesa alimentar) é um conceito que tem surgido com objetivo de desenvolver uma abordagem de programas visando proteger, prevenir e mensurar o impacto sobre a população e a indústria produtora de alimentos passíveis de um ataque de contaminação intencional. A segurança dos alimentos (*food safety*) encontra-se associada à garantia do fornecimento de produtos seguros ao longo de toda a cadeia alimentar, garantindo que um alimento não causará prejuízos à saúde do consumidor por contaminações biológicas, químicas ou físicas, quando é preparado e/ou no momento que é ingerido, segundo a utilização prevista (BETANCOURT, 2017). A segurança alimentar (*food security*) na perspectiva de garantia da disponibilidade dos alimentos como meio de garantir a subsistência das populações, é definida segundo a *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO) como a garantia para todos os seres humanos do acesso físico e econômico, estabilidade dos alimentos e utilização de alimentos seguros e saudáveis, sendo

assim, uma questão de envolvimento governamental, através de políticas públicas (FAO, 1996).

Ao trazer a temática à nossa realidade, o Brasil apresenta uma agricultura muito desenvolvida devido às suas dimensões continentais e a quantidade de alimento exportado a todos os países do mundo. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), criado há mais de 150 anos, é responsável pela garantia da segurança alimentar e Segurança dos Alimentos, juntamente com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), esta representante do Brasil no CAC – *Codex Alimentarius Commission*, este último criado pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação). Em 1963, o CAC lançou o *Codex Alimentarius*, um manual de procedimentos que visa à inocuidade dos alimentos. A partir disto, foram exigidas das empresas que processam, embalem e distribuem alimentos o cumprimento de requisitos mínimos de qualidade. Nesse momento, qualidade em alimento é obrigatório a toda a indústria alimentícia, independente do poder aquisitivo ou nível de exigência do consumidor (BETANCOURT, 2017).

Com o mercado mundial de exportação e importação cada vez desenvolvido, em 1993, o sistema Análises de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) foi incorporado ao *Codex Alimentarius* e exigido a todos os países membros do CAC. Este sistema visa prevenir as contaminações intencionais ou não intencionais dentro da linha de processamento, com o objetivo de analisar os perigos e os pontos críticos de controle. Em 1998, o MAPA adotou o APPCC como ferramenta que aprimora o sistema de inspeção dentro das indústrias de processamento de alimento no Brasil. Este é o primeiro sistema de qualidade que muda o conceito de controle de qualidade para garantia de qualidade. Atualmente é o principal método em operação em nosso país que garante a qualidade na produção de alimentos (GERMANO; GERMANO, 2015).

A partir de 2001, principalmente, após os eventos terroristas de 11 de setembro, houve uma maior preocupação com o tratamento da contaminação intencional como possibilidade de prejuízo à garantia de qualidade. Com os atentados, nos Estados Unidos, a *U.S. Food and Drug Administration* (FDA) passou a intensificar os trabalhos na modernização do sistema de qualidade, com o objetivo de extrapolar o APPCC para além da linha de produção de alimentos, analisando todos os pontos vulneráveis da empresa. A partir dessas observações iniciou-se uma discussão sobre um alimento defendido ou protegido de ameaças sob a expressão *Food Defense* (FDA, 2014).

Baseando-se nesses fatos, estabeleceu-se uma política para identificar infraestruturas críticas, incluindo sistemas de produção de alimentos e agricultura, com intuito de protegê-los

de ataques terroristas. A criticidade foi definida como o impacto negativo que um ataque ou falha de uma dada infraestrutura teria na nação se ela fosse comprometida ou destruída (SAATHOFF, 2011).

De acordo com Manning & Soon (2016), o conceito de *food defense* pode ser descrito como o processo que garante a segurança dos alimentos, bebidas e das suas cadeias de abastecimento de todas as formas de adulteração intencional. De um modo geral, estes atos são motivados por fins econômicos ou com o objetivo de causar danos à saúde pública.

Um plano de defesa alimentar (*food defense*) é basicamente um sistema que visa proteger os produtos alimentares de adulteração intencional. O desenvolvimento de um plano garante um ambiente de trabalho seguro para os funcionários, fornece um produto seguro, protege o negócio da empresa e aumenta o grau de preparação e a capacidade de resposta perante uma situação crítica (SEVERINO, 2016).

Existem diversos sistemas de defesa alimentar cujo escopo visa a prevenção da contaminação intencional de produtos, no qual indivíduos, motivados ideologicamente ou não, estão propensos a contaminar produtos com recurso a determinados agentes, com a finalidade de causar prejuízos diretos às organizações ou à população em geral. Os sistemas de defesa alimentar garantem ainda a proteção contra outras formas de agressão à empresa, como danos à propriedade, à marca ou aos funcionários da organização (HUFF, 2014).

Atualmente não existe nenhuma estrutura específica definida para um plano de defesa alimentar, este deve ser desenvolvido considerando vários fatores, que podem incluir o ambiente e envolvente da unidade, a respectiva construção e segurança (interna, externa, pessoal) e a acessibilidade às instalações. O desenvolvimento de um plano de defesa alimentar exige uma análise prévia pela organização da necessidade de implementação do mesmo, avaliação dos recursos disponíveis e assegurar o envolvimento de uma equipa nesta área (CTCPA, 2012).

Com base nos sistemas existentes para a defesa alimentar, a empresa pode desenvolver um plano baseado nas ferramentas auxiliares. Estes sistemas permitem a implementação e integração nos planos de segurança dos alimentos, aspectos que cobrem a avaliação de ameaças, de vulnerabilidades ou de riscos com vista à prevenção de contaminação intencional, adulteração e fraude alimentar (aspectos cobertos pela defesa alimentar).

Para auxiliar a indústria de alimentos norte-americana na produção de seus planos de defesa alimentar, a FDA, em trabalho conjunto com o *United States Department of Agriculture* (USDA), desenvolveu uma ferramenta tecnológica para evitar contaminações deliberadas,

denominado CARVER + *Shock*. O CARVER é um acrônimo que relaciona seis atributos usados para avaliar a atratividade de um alvo para o ataque, dos quais nomeiam-se (FDA, 2014):

- Criticidade: impacto na saúde pública e economia resultante de um ataque. A introdução de agentes de ameaça nos alimentos pode causar impactos significativos na saúde pública ou economia;
- Acessibilidade: capacidade de acesso físico e saída do invasor. Uma organização é acessível quando um invasor pode alcançar a área ou etapa do processo e realizar o ataque sem ser identificado. Esta medida é independente da probabilidade de sucesso da introdução de agentes de ameaça;
- Recuperabilidade: capacidade de recuperação do sistema após um ataque. Este critério é medido com base no tempo que o sistema específico leva a recuperar a produtividade, considerando a diminuição do volume de vendas, associado à baixa procura do produto;
- Vulnerabilidade: facilidade de realizar ataque. Medida da facilidade com que os agentes de ameaça podem ser introduzidos em quantidades suficientes para atingir o propósito do invasor. A vulnerabilidade é determinada tanto pelas características do alvo e como as do meio ambiente circundante;
- Efetividade: quantidade de perdas diretas na produção resultante do ataque. Este critério mede a perda de produtividade do sistema danificado por um ataque num único setor da instalação. Portanto, para o mesmo produto, o efeito é inversamente relacionado com o número total de instalações;
- Reconhecimento: facilidade de identificação de alvo. Medida de reconhecimento de um invasor, sem confundir com outros alvos ou componentes.

O critério *Shock* constitui o sétimo atributo considerado na metodologia CARVER. É a medida combinada dos impactos econômicos, de saúde e psicológicos resultantes de um ataque bem-sucedido. O impacto psicológico será aumentado se houver um grande número de mortes ou caso o alvo tenha um significado simbólico, histórico, cultural, religioso ou outro. As repercussões na economia são caracterizadas pela diminuição da atividade econômica nacional, o aumento do desemprego nas indústrias em causa, entre outros fatores inerentes (FDA, 2014).

O *software* avalia as vulnerabilidades dentro de um sistema ou uma edificação. Facilita ao usuário pensar como o invasor, identificando os alvos mais atraentes ou mais propensos para um ataque, o que permite concentrar os recursos e planos de proteção nestes pontos. O CARVER + *Shock* produz uma série de questionários criados para avaliar os possíveis pontos de vulnerabilidade das empresas e sugerir possíveis mudanças de comportamento por parte dos

gestores. O CARVER + *Shock* também é responsável por criar um plano de recuperabilidade da empresa, caso aconteça uma ameaça. Esta é uma ferramenta não utilizada em solo brasileiro no que tange a indústria de alimentos.

Sendo assim, o principal objeto deste artigo, como divulgação dos resultados de dissertação de mestrado, foi trazer o conhecimento e uma análise dessa ferramenta e aplicá-la em uma empresa do setor alimentício, buscando analisar as vulnerabilidades da empresa como um todo. A empresa escolhida foi um frigorífico de abate de suínos que atua no Estado de São Paulo. O trabalho teve como hipótese o fato que esse *software* poderia ser utilizado em adição ao trabalho já desenvolvido pela equipe de implantação do sistema APPCC. Como a ferramenta prevê ao usuário uma visão como um terrorista ao aplicar uma contaminação intencional, o *software* poderia atuar em locais onde o sistema APPCC não teria o foco, prevendo as vulnerabilidades da empresa. A partir dos resultados apresentados pelo CARVER + *Shock* é possível, então, conseguir desenhar e implementar planos de defesa alimentar para a empresa. Estes planos poderiam minimizar o risco de contaminação intencional e obter uma resposta rápida em caso de uma emergência que seja consequência de uma contaminação.

Materiais e métodos

Descrição da empresa analisada

A empresa, objeto do estudo, doravante denominada empresa X, é uma empresa de capital nacional, localizada no Estado de São Paulo e atua no ramo de abate de suínos desde 1978. A empresa possui um frigorífico de porte médio, contando com 217 colaboradores, sendo que 80 trabalham diretamente com a linha de abate de suínos e uma desossa, gerando uma produção de 800 toneladas por mês de produtos cárneos, fazendo parte deste portfólio, cortes cárneos como: carne resfriada com osso (meia carcaça suína), sendo este o principal produto que é revendido para a maior parte dos açougues de supermercado de grandes redes e para açougues convencionais; carne congelada sem osso; carne congelada com osso e miúdos de suínos resfriados e congelados. O frigorífico tem autorização, expedida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para o abate de 1000 animais por dia, e entrepostagem de 400 quartos de carcaça de bovinos. Além disso, a empresa possui o APPCC implantado e está em fase de implantação de ISO 9001. Neste momento, um novo setor está em fase final de implantação (setor de fabricação de embutidos), que pretende processar até 5 toneladas diárias, aumentando, assim, sua cadeia de atuação dentro do setor de carnes, fechando, praticamente, toda a cadeia de produção.

Um dos motivos pelo qual visualizou-se a necessidade de estudar a ferramenta CARVER + *Shock* e implantá-la na empresa em questão deveu-se ao incidente de uma contaminação intencional por creolina praticada por um funcionário insatisfeito com sua chefia. Na ocasião, o funcionário responsável pela desinfecção das pocilgas de recebimento de suínos teve acesso a uma quantidade maior de creolina do que a descrita nos Procedimentos Operacionais Padronizados (POP's), no próprio almoxarifado de produtos químicos. O funcionário, descontente com a atuação de seu superior imediato, cumpriu todo o procedimento de desinfecção das pocilgas, sendo o mesmo verificado pelos colaboradores responsáveis pela garantia da qualidade. Logo depois da desinfecção, com a creolina restante (cerca de 5 litros), o funcionário, próximo do término de seu turno de trabalho, se dirigiu até o reservatório de água potável do estabelecimento e depositou a creolina diretamente no reservatório. O ato foi cometido numa segunda-feira. No outro dia, durante a vistoria pré-operacional realizada pelo setor de garantia de qualidade, foi constatada a contaminação do reservatório de água, observada nas análises de água, no qual constatou-se alterações de pH, odor e turbidez. Constatadas as alterações, o abate foi suspenso pela equipe da garantia da qualidade e pela equipe da Inspeção Federal do MAPA. O fiscal local acionou a fiscalização regional que aplicou um primeiro auto de infração (multa) por falta de água potável para o abate. Um segundo auto de infração foi aplicado à empresa, por conta de presença de cresóis em níveis não aceitáveis no reservatório de água; essa amostra foi colhida no dia seguinte e enviada ao LANAGRO (Laboratório Nacional Agropecuário) vinculado ao MAPA.

Os prejuízos com a interdição do abate foram: 2 mil carcaças que deixaram de ser vendidas, totalizando 160 toneladas de carne que deixaram de ser produzidas; gastos extras com alimentação, água e limpeza; gastos extras com a dispensa e pagamento de funcionários pelos 4 dias de interdição; pagamento das multas acarretadas pelos autos de infração; o histórico negativo por água contaminada no processo adquirida pelo estabelecimento dentro do Ministério da Agricultura. O caso não foi noticiado pelos meios de comunicação, sendo assim o estabelecimento não sofreu deterioração de sua imagem junto ao consumidor final, mas o cliente intermediário não foi atendido prontamente com a mercadoria.

Percebeu-se, assim, a necessidade de procurar ferramentas que pudessem cobrir toda a empresa, para além do APPCC, que já era aplicado, mas visava apenas as linhas de produção e anexos, mas não a empresa como um todo. A empresa necessitava de um sistema que sistematizasse a autorização e os níveis de acesso de cada colaborador em setores mais vulneráveis a ataques. Pensando dessa forma, a pesquisa foi proposta com a implantação do

sistema CARVER + *Shock* nos setores da empresa considerados vulneráveis e sua avaliação quanto à sugestão de mitigação dessas vulnerabilidades e acessibilidade a esses setores.

Descrição do *software* CARVER + *Shock*

O *software* CARVER + *Shock* foi desenvolvido, inicialmente, para analisar e mitigar as vulnerabilidades apresentadas nas instalações do exército dos Estados Unidos. Após os incidentes terroristas de setembro de 2001, a agência americana de vigilância sanitária (FDA), juntamente com o setor de agricultura (USDA) adaptaram o *software* para as necessidades das empresas produtoras de alimentos dos Estados Unidos (FDA, 2015).

O *software* possui dois segmentos principais: um primeiro direcionado aos produtores agrícolas, no qual, um questionário, bem como os resultados, são voltados às vulnerabilidades concernentes à produção agrícola e aos agentes que possam perpetrar algum ato terrorista nas instalações. Um segundo segmento é direcionado às empresas de processamento de alimentos; as entradas de dados são direcionadas para as estruturas e os fluxogramas de produção na qual as empresas são especializadas. Tanto as perguntas, quanto as sugestões apresentadas, tem o objetivo de mitigar as vulnerabilidades do setor produtivo, bem como do entorno da empresa.

O *software* contém três seções principais: fluxograma, entrevista e pontuação. Inicialmente, a primeira página do programa sugere que o usuário insira os dados, elaborando uma representação gráfica do processo de produção em forma de fluxograma. Esta seção possui a alternativa de agregar ícones que representam as operações realizadas, os processos de produção, os ingredientes e materiais empregados para que se possa realizar toda a produção da empresa analisada (FDA, 2014). O fluxograma deve ser elaborado contemplando todas as etapas do processo de produção: desde a recepção da matéria prima, acondicionamento, processo produtivo, descarte de subprodutos, armazenamento e transporte de produtos acabados, bem como o transporte dos subprodutos e dos rejeitos produzidos no processo de fabricação do produto. A Figura 1 mostra o fluxograma da empresa X analisada. Nele pode-se perceber como o processo produtivo do abate de suínos foi montado, mostrando ao leitor todas as etapas do processo.

Logo após a construção do fluxograma de processos o *software* gera um questionário contendo várias perguntas. As perguntas são específicas para cada ícone criado anteriormente no fluxograma. Elas são baseadas em pontos que podem ser suscetíveis ao acesso por funcionários, visitantes, funcionários terceirizados, motoristas, funcionários de empresas de suporte e manutenção, além de vendedores externos.

Um modelo pode ser descrito na Figura 2 abaixo, no qual pode-se observar, no canto esquerdo, cada setor criado pelo fluxograma. Se o usuário clicar em cada setor, será colocado à disposição uma série de perguntas concernentes àquele setor. Além disso, serão providenciadas perguntas que envolvam a segurança da empresa como um todo, bem como o tratamento dado a visitantes e membros externos à empresa. Na parte inferior estão todas as perguntas que precisam ser respondidas.

Figura 1. Apresentação do fluxograma desenvolvido no programa CARVER + Shock.

Fonte: CARVER+Shock Industry

Figura 2. Questionário gerado a partir do fluxograma para o item Facility.

Fonte: CARVER + Shock Industry.

Após todas as perguntas propostas serem respondidas – no caso da pesquisa foram quase 950 perguntas – cada item foi qualificado e avaliado com base nos sete atributos (descritos anteriormente) que compõem o sistema CARVER + *Shock*, apresentando uma pontuação geral do sistema. Os atributos foram avaliados numa escala de 1 a 10, no qual quanto mais elevada foi a pontuação, maior a vulnerabilidade, e portanto, são considerados pontos mais suscetíveis a algum ataque (FDA, 2014).

Para avaliar os resultados o *software* utilizou dois gráficos em forma de barras em uma escala de 0 a 20, cada um com uma cor e um grupo de atributos específicos. A barra de cor azul é denominada “importância” e representa os atributos de criticidade e recuperabilidade. A barra de cor vermelha é chamada de “facilidade de um ataque” e representa os atributos de acessibilidade e a vulnerabilidade. Para cada ícone proposto no fluxograma é apresentado o conjunto de barras que representam os atributos para cada ícone (BETANCOURT, 2017).

Além disso, no canto direito, o usuário pode perceber que para cada atributo foram oferecidas sugestões para mitigar as vulnerabilidades. Essas sugestões foram propostas pelo próprio *software* que analisou o grau de relevância das questões respondidas pelo usuário no momento da entrevista. Estes dados permitiram identificar a posição dos itens dentro dos quadros de resultados estabelecidos anteriormente pela agência de vigilância sanitária americana (FDA, 2015b). O conjunto de atributos pode ser analisado na Figura 3:

Figura 3. Quadro de atributos das vulnerabilidades apresentadas pelo sistema.

[718]

Resultados e discussão

Análise sobre o *software*

Como já dito anteriormente, o *software* CARVER + Shock foi desenvolvido para atender as necessidades das empresas norte-americanas no desenvolvimento de planos de controle para a defesa alimentar. O objetivo, ao usá-lo como metodologia de pesquisa, foi testá-lo como ferramenta, adaptando a realidade do *software* ao cotidiano de uma empresa brasileira de produção de alimentos.

O primeiro dos obstáculos foi, efetivamente, o uso do idioma. Todo o *software* é apresentado na língua inglesa. Diante disso, o primeiro grande desafio foi montar o fluxograma e entender quais os atributos já relacionados dentro do *software* poderiam ser adaptáveis à realidade das empresas brasileiras, que são distintas das norte-americanas. Trata-se de abrir todas as opções de fluxogramas de cadeias de produção já existentes dentro do *software* e buscar uma que melhor adaptasse à cadeia de produção já estabelecida pela empresa X, objeto desta pesquisa. A cadeia de produção que melhor se adaptava ao contexto da empresa X foi a *slaughterhouse* (ou abatedouro, em livre tradução). Nesta opção, o fluxograma continha etapas de abate de aves, de bovinos, peixes e suínos. As particularidades de cada fluxo, se não observadas ou não entendidas, podem levar a uma resultado não aplicável.

Outro fato, relacionado ao uso da língua inglesa, é a implantação em empresas brasileiras, sobretudo as de pequeno porte. É notório a dificuldade e o acesso da população brasileira ao ensino de uma língua estrangeira. Para empresas de pequeno porte este pode ser um limitador para a implantação. E a não implantação em pequenas empresas é um agravante, pois parte da matéria prima da maioria da cadeia de produção de alimentos brasileira, advém destes fornecedores.

Em um segundo momento, talvez o mais trabalhoso, foi a tradução de todas as perguntas propostas pelo *software*. Foram mais de 950 perguntas (repetitivas e quando se aplica a uma entrevista, o *software* fica cansativo) que davam conta de todos os processos apresentados na montagem do fluxograma dentro do *software*. Esses processos puderam ser melhor visualizados na Figura 1, apresentada anteriormente. Mais uma vez, a barreira da língua inglesa se apresenta como o grande entrave para o perfeito entendimento das perguntas. O tempo gasto na tradução, reflexão e resposta às perguntas propostas é grande e dispendioso. Além disso, no que tange as perguntas, elas não são tratadas em profundidade

dentro de cada setor; são perguntas generalizadas que abordam todos os setores em conjunto.

Há um banco de dados contendo os fluxos de produção dos principais ramos da indústria de alimentos (laticínios, frigoríficos etc). Dentro destes fluxos de produção, no *software*, as áreas são separadas em internas e externas. Diante disso, percebeu-se que poderia-se aplicar a língua portuguesa para nomear cada etapa do fluxograma, dentro dessa separação. Isto pode facilitar a visualização das áreas estudadas.

Depois do fluxograma realizado as perguntas são mostradas, baseando-se nas premissas de avaliação do CARVER + *Shock*, sendo levado a avaliar sobre cada etapa na linha de abate ou setor/sala destinada a etapa do processo. Dado o número enorme de perguntas postuladas, evidentemente, as respostas e propostas apresentadas pelo *software* ao analisar os dados coletados também são enormes. Todos os resultados são apresentados ou em forma de *score*, contendo uma pontuação que varia de acordo com os atributos da metodologia CARVER, ou em forma de respostas curtas. Além disso, são apresentadas algumas sugestões, também baseado na mesma metodologia. Para um primeiro contato com o *food defense*, em uma primeira avaliação da empresa, a sistemática da lógica de “invasor”, dado pelo programa, tanto no momento das perguntas, como nas propostas e no *score* apresentado ao fim da análise é interessante e um ponto positivo para o *software*.

Como visto na figura 3, os dados são apresentados de maneira bastante dinâmica pelo programa através de gráficos e sugestões específicas para cada atributo selecionado. Este é outro ponto positivo para o *software*: ele é didático e as informações e sugestões são claras e levam ao usuário uma navegação direta sobre as decisões que ele precisa tomar para mitigar cada um dos problemas apresentados pelo *software*.

Ainda na Figura 3, pode-se perceber uma aba superior onde mostra os principais tipos de contaminação que o programa propõe que poderiam ser perpetradas por um agente malicioso. O usuário pode navegar por essa aba e perceber todas as sugestões para cada tipo de contaminação diferente. Evidentemente, a navegação se torna mais complexa quanto mais informações o usuário deseja coletar. Por outro lado, há muitas sugestões e análises que se repetem nas diferentes abas do *software*.

Conclusão

O conceito de defesa alimentar vem assumindo um papel cada vez mais importante nos programas tradicionais de segurança dos alimentos. Os ataques ocorridos a nível mundial têm conduzido a novas exigências de comercialização e uma conscientização da necessidade de

programar tecnologias para elaborar um plano de defesa alimentar contra tais ameaças, passíveis de ocorrer em qualquer ponto da cadeia alimentar. Cabe salientar que, existe apenas um trabalho anterior a este no Brasil. Trata-se da aplicação e avaliação do CARVER + *Shock* em dois laticínios sendo um de pequeno porte e outro de médio porte (BETANCOURT, 2017). O sistema CARVER + *Shock* apresentou-se como uma ferramenta útil para pequenas e médias empresas, já que o *software* foi testado em um frigorífico de médio porte, com os resultados aqui publicados, e, também, com os resultados obtidos pela aplicação da ferramenta em laticínios de pequeno e médio porte obtendo resultados satisfatórios segundo BETANCOURT (2017). O fator mais preponderante que possa inviabilizar a implantação do *software* ainda é o uso da língua inglesa e a interpretação das informações contidas nos resultados.

No que tange a empresa analisada, o *software* conseguiu determinar as áreas vulneráveis de contaminação intencional nas dependências do frigorífico. O sistema conseguiu analisar locais da empresa onde geralmente não são pensadas ações de controle e definiu algumas medidas importantes para a mitigação das contaminações intencionais.

A partir dos resultados obtidos pelo CARVER + *Shock*, ressalta-se que os dados coletados foram analisados e compilados. O desenvolvimento e conceito de *food defense* foi apresentado à equipe da garantia da qualidade, juntamente à diretoria da empresa. Foi apresentada a necessidade do desenvolvimento de um plano de defesa alimentar que seja complementar aos outros planos já implantados. Sendo assim, houve uma movimentação positiva no sentido de criar uma atmosfera segura que contemplasse tanto a produção quanto as áreas adjacentes ao frigorífico, visto que, a empresa já tinha o histórico de contaminação intencional perpetrada por funcionários.

No entanto, ainda é necessário efetuar uma avaliação de vulnerabilidade detalhada considerando vários fatores que permitam uma análise sobre o impacto econômico, psicológico e na saúde da população e dos clientes consumidores dos produtos comercializados pela empresa, depois de uma contaminação intencional.

Ao final deste estudo conclui-se que o sistema CARVER + *Shock* é uma ferramenta útil para pequenas e médias empresas do setor alimentar, apesar de ser trabalhoso e exigir do usuário um conhecimento avançado da língua inglesa, dado o número alto de perguntas a serem respondidas. Às empresas que adotarem esse sistema, cabem a elas construir um plano de resposta rápido caso uma contaminação ocorra, envolvendo sistemas de *recall*, criação de uma equipe de segurança e na divulgação efetiva de notícia, evitando a

deterioração da imagem da empresa junto ao mercado consumidor.

Sendo assim, em países como o Brasil, onde a indústria agroalimentar constitui uma parte vital para a economia do país, gerando divisas quando os produtos são exportados, ou para o consumo interno, a questão da defesa alimentar assume uma extrema importância econômica; portanto é importante garantir que os produtos sejam de uma fonte confiável e cumpram com os novos requisitos normativos produzidos em outros países. É necessário estruturar planos de defesa alimentar nas empresas produtoras de alimentos em nosso país. Esses planos implantados poderão, se implantados, monitorados e verificados, baseado em ciência e tecnologia, e fundamentado nas recomendações feitas por sistemas complementares, como o CARVER + *Shock*, melhorar a segurança física, pessoal, operacional e assim minimizar o acesso do agressor aos processos produtivos das empresas.

Referências

BETANCOURT, Sarah Romero. **Defesa alimentar (food defense):** avaliação e aplicação da ferramenta CARVER + *Shock* na indústria do leite no Brasil. Dissertação de mestrado. Universidade de São Paulo, 2017.

BOSONA, T; GEBRESENBET, G. Food traceability as an integral part of logistics management in food and agricultural supply chain. **Food Control**, vol. 33, nº 1, pp. 32-48, 2013.

BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

Decreto

nº 9.013, de 29 de março de 2017. Dispõe sobre o regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, que disciplina a fiscalização e a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, instituídas pela Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e pela Lei nº 7.889, de novembro de 1989. Diário Oficial da União, 29 de março de 2017.

BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

Circular nº 175, de 16 de maio de 2005. Dispõe sobre os procedimentos de verificação dos programas de autocontrole (versão preliminar). Diário Oficial da União, 16 de maio de 2005.

BRITISH STANDARDS INSTITUTION (BSI). **PAS 96:** Guide to protecting and defending food and drink from deliberate attack. Londres: BSI, 2014.

BRUEMMER, Barbara. Food biosecurity. **Journal of American Dietetic Association**, v. 106, nº 06, June 2003, pp. 687-691.

CENTRE TECHNIQUE AGRALIMENTAIRE (CTCPA). **La food defense:** protection de la chaîne alimentaire contre les risques d'actions malveillantes, criminelles ou terroristes. Paris, France, 02 juillet 2012. Disponível em: <https://www.ctcpa.org/food-defense-securite-alimentaire-ctcpa>. Acesso em: 13 de junho de 2018.

DIAS, Juliane; UBARANA, Fernando. Food defence: proteção contra a contaminação intencional. **Revista Controle de Contaminação**. n. 147, p. 33-36, julho de 2011.

FAO. **World Food Summit**. (1996). Disponível em: http://www.fao.org/wfs/index_en.htm. Acesso em: 13 de junho de 2018.

FREDRICKSON, N. R. Food security: food defense and biosecurity. In: ALFEN, N. K. V. (Ed.). **Encyclopedia of agriculture and food systems**. Oxford: Academic Press, 2014. P. 311- 323.

GERMANO, Pedro M.L; GERMANO, Maria Izabel S. **Higiene e vigilância sanitária de alimentos**. 3ª ed. Barueri, SP: Ed. Manole, 2008.

GLOBAL FOOD SAFETY INITIATIVE FOUNDATION & THE CONSUMER GOODS FORUM (GFSI & CGF). **GFSI Position on Mitigating the Public Health Risk of Food Fraud**. France: GFSI, 2014.

HAVAS, Karyn; SALMAN, Mo. Food security: its components and challenges. **Nutrition and Public Health Journal**, vol. 4, nº 1, 2011.

HUFF, Andrew G. **Enhancing food defense: risk managers' perceptions, critically assessments, and a novel method for objectively determining food systems' criticality**. Doctor degree: University of Minnesota, USA. March, 2014.

KEREMIDIS, et. ali. Historical perspective on agoterrorism: lessons learned from 1945 to 2012. **Biosecurity and bioterrorism: biodefense strategy, practice, and Science**, vol. 11, suplement 1, 2013.

MANNING, L.; SOON, J. M. Food Safety, Food Fraud, and *Food defense*: A Fast Evolving Literature. **Journal of Food Science**, nº 81, pp. 823-834, 2016.

NGANJE, Willian, et. ali. Food safety and defense risks in U.S. - Mexico produce trade. **Choices Magazine**. 2nd quarter 2009, Number 24 (2), 2009.

PRAIA, Elisabete F. S. S. **Avaliação da implementação de requisitos de food defense em unidades alimentares**. Dissertação de mestrado. Universidade de Lisboa, 2017.

SAATHOFF, Scott M. **Food defense planning and implementation in a food ingredients manufacturing facility**. Master degree, Kansas State University, USA, 2011.

SEVERINO, Paula Rita de Sousa. **Food defense e sua relação com as normas IFS V6, BRC V7 e FSSC 22000**. Dissertação de mestrado. Universidade de Lisboa, 2016.

SPINK, J., MOYER, D.C. Defining the public health threat of food fraud. **Journal of Food Science**. Nº 76, 2011, pp. 157-163.

SPINK, J., MOYER, D.C. Understanding and combating food fraud. **Food Technology Magazine**, vol. 67, nº 1, 2013, pp. 30-35.

UNITED STATES DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES & UNITED STATES FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (HHS & FDA). **Food Safety and Security: Operational Risk Management Systems Approach**. Washington, Estados Unidos:

FDA, 2001.

UNITED STATES DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES & UNITED STATES FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (HHS & FDA). CARVER + *Shock* Primer. Na overview of the Carver Plus *Shock* method for food sector vulnerability assessments. Washington: Estados Unidos: FDA, 2014.

Disponível em:

<https://www.fda.gov/food/fooddefense/fooddefenseprograms/ucm376791.htm>. Acesso em: 15 de junho de 2018.

UNITED STATES DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES & UNITED STATES FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (HHS & FDA). **Food defense awareness**. Washington, Estados Unidos: FDA, 2015a. Disponível em:

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdtraining/course_01/module_01/lesson_03/FD01_01_03_060.cfm. Acesso em: 13 de junho de 2018.

UNITED STATES DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES & UNITED STATES FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (HHS & FDA). **Training course for food security**. Washington, Estados Unidos: FDA, 2015b. Disponível em:

<http://www.fda.gov/downloads/Training/ForStateLocalTribalRegulators/UCM218900.pdf>.

UNITED STATES DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES & UNITED STATES FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (HHS & FDA). **FSMA final rule for mitigation strategies to protect food against intentional adulteration**. Washington, Estados Unidos: FD, 2016.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Terrorist threats to food**: guidance for establishing and strengthening prevention and response systems. World Health Organization. Geneva, Switzerland, 2002.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Food defense**. World Health Organization. Geneva, Switzerland, 2002. Disponível em:

<http://www.who.int/trade/glossary/story028/en/>. Acesso em: 18 de junho de 2018.

YADAV, V.; SHARMA, A. Free *software* for food industries to ensure food safety: CARVER

+ *Shock*. **Comprehensive reviews for food Science and food safety**, vol. 10, 2016, pp. 109- 117.

CAPÍTULO 46: OS AÇOUGUES E SEUS DESAFIOS: CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS vs QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA CARNE

CHAPTER 46: BUTCHERS AND THEIR CHALLENGES: HYGIENIC AND SANITARY CONDITIONS vs MICROBIOLOGICAL MEAT QUALITY

Erica Loreнна Batista da Silva¹; Teresa Emanuelle Pinheiro Gurgel²; Carolina de Gouveia Mendes da Escossia Pinheiro³; Joice Teixeira Souza⁴; Kewen Santiago da Silva Luz⁵

Resumo

A carne é um excelente meio de desenvolvimento de microrganismos, podendo ser responsável pela transmissão de bactérias patogênicas ao homem. A contaminação ocorre principalmente pela negligência do manipulador e irregularidades do espaço de trabalho. Diante desta problemática, objetivou-se verificar as condições sanitárias dos açougues da cidade de Mossoró-RN. Foram coletadas 18 amostras, sendo nove de carne bovina e nove de frango, *in natura*, com propósito de pesquisar bactérias do gênero *Salmonella* e a determinação do Número Mais Provável (NMP) de bactérias coliformes. Para avaliar as condições sanitárias dos estabelecimentos, aplicou-se um *checklists*. O resultado apresentou presença de coliformes a 35 °C (>1100 NMP/g) e a 45 °C. 44,4% (4 amostras), estavam dentro dos padrões sanitários exigidos pela legislação, variando entre 240 a 460 NMP/g, Nas amostras de frango, apenas 55,6% (5 amostras) apresentaram-se dentro das normas, variando em < 3 a 290 NMP/g. Todas as amostras analisadas apresentaram ausência de *Salmonella* spp. Através dos *checklists* aplicados foi possível identificar que apenas dois estabelecimentos privados atingiram 70% de conformidade. Os dados obtidos neste trabalho corroboram com a premissa de que a implantação das boas práticas de manipulação acompanhadas das boas práticas de higiene resultam na maior qualidade e segurança do alimento.

Palavras-chave: Carne bovina, frango, *Salmonella*, coliformes, *checklist*.

Abstract

Meat is an excellent medium for microbe development and may be responsible for foodborne diseases. The meat contamination occurs mainly due to the negligence of the handler. The work aimed to verify the sanitary conditions of butchers in Mossoró city, Brazil. For this work eighteen samples were collected. Nine fresh beef samples and nine fresh chicken samples acquired Mossoró city, Brazil with the purpose of researching bacteria of the genus *Salmonella* and the determination of the Most Probable Number (NMP) of coliform bacteria. Checklists were also carried out to assess the hygienic and sanitary conditions of each location. In all samples the presence of coliforms at 35 °C was detected (> 1100 MPN/g). For the analysis of coliforms at 45 °C of beef, just 44.4% (4 samples) agreed with the Brazilian sanitary standards (samples values between 240 and 460 MPN/g). Regarding chicken meat samples, only 55.6% (5 samples) agreed with the standards (< 3 to 290 MPN/g). All samples analyzed did not show the presence of *Salmonella* ssp. The applied checklists showed only two private businesses reached 70% of Brazilian legislation compliance. This work shows the

¹ Mestranda em Ciência Animal, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, ericaloreнна03@hotmail.com ;

² II Unidade Regional de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, SESAP/IIURSAP/SUVISA, Mossoró, teresaemanuelle@gmail.com

³ Doutora, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, carolmendesvet@hotmail.com ;

⁴ Mestranda em Ciência Animal, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, joice.ts@outlook.com ;

⁵ Mestrando em Ciência Animal, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, kewenluz@gmail.com .

implementation of good handling and good hygiene practices results in higher quality and safety of food for consumers.

Keywords: Beef, chicken, *Salmonella*, coliforms, checklist.

Introdução

Carnes são as massas musculares e os demais tecidos que as acompanham, incluída ou não a base óssea correspondente, procedentes das diferentes espécies animais, julgadas aptas para o consumo pela inspeção veterinária oficial (BRASIL, 2017).

Pela sua variedade de nutrientes, a carne se torna um meio de cultura de fácil multiplicação de bactérias patogênicas e deteriorantes de produtos, sendo fontes de toxinfecções alimentares. Outro fatores importantes que podem oferecer risco de contaminação é o transporte, processo de refrigeração inadequada, exposição ao ar, ambientes e outros (LAMAS, 2020). Assis (2014), cita em seus estudos que os agentes de origem biológica são os maiores responsáveis pelas doenças transmitidas por alimentos.

As DTAs são um problema de saúde pública, além de causar doenças nos seres humanos também são responsáveis por causar perdas econômicas em todo o mundo (OLIVEIRA et al 2010). Tharuk et al (2010), relata que a segurança alimentar é importante para a manutenção da saúde pública, apesar da legislação esta cada vez mais rigorosa em vários países, os casos de DTA ou surtos continuam a ser comuns.

A importância do cuidado com o manipulador, destacando-se que o mesmo deve ser afastado em caso de lesões ou de problemas de saúde que comprometam a qualidade do alimento, tais como: a observação diária do asseio pessoal (mãos sempre higienizadas), se os uniformes são compatíveis à atividade e ainda se estão conservados e limpos. Para garantir esse cuidado os manipuladores devem ser supervisionados e capacitados periodicamente de acordo com a Resolução RDC 216/2004 (BRASIL, 2004).

Segundo RIISPOA – Regulamento e inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, (BRASIL, 2017) no art. 53 os responsáveis pelos estabelecimentos deverão assegurar que todas as etapas de fabricação dos produtos de origem animal sejam realizadas de forma higiênica, a fim de se obter produtos que atendam aos padrões de qualidade, que não apresentem risco à saúde, à segurança e ao interesse do consumidor.

A legislação brasileira, através da Instrução Normativa nº 60 de 23 de dezembro de 2019 (BRASIL, 2019), define como parâmetro de qualidade microbiológica da carne *in natura* a ausência de *Salmonella* spp. em 25 gramas de amostra. Esta é considerada um dos principais agentes patogênicos de origem alimentar no mundo. A RDC de nº 12 de 02 de

janeiro de 2001 (BRASIL, 2001), vigente até 23 de dezembro de 2020, estabelece como padrão para coliformes termotolerantes o valor de 10^4 NMP/g, para carnes resfriadas ou congeladas, *in natura*, de aves.

Estudos mostram que os açougues e/ou estabelecimentos que comercializam carnes no Brasil não atendem aos requisitos mínimos exigidos pela vigilância sanitária municipal. Tais como: estrutura física, manipulação correta e disposição dos resíduos sólidos. Isso tem aumentado o número de pessoas com DTA.

Um trabalho realizado por Lamas (2020), destaca que dentre os resultados de não conformidades encontrados nos estabelecimentos que comercializam carne moída e quibe em Presidente Prudente- SP, estão em 90% o uso incorreto de uniformes e alguns EPIs, 100% de funcionários utilizando barbas e/ou bigodes, adornos como anéis, pulseiras, colares e ate relógios e 90% de utensílios sujos ou em péssimo estado de conservação.

Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi verificar a relação das condições higiênico-sanitárias dos açougues com a presença de coliformes totais, coliformes termotolerantes e *Salmonella* ssp. em carnes bovinas e aves, comercializadas no município de Mossoró-RN.

Materiais e Métodos

A presente pesquisa é de natureza qualitativa, quantitativa, transversal e observacional em que aplicou-se um *checklist* e realizou-se análise microbiológica de carnes bovinas e frango para levantamento de dados sobre as condições higiênico-sanitárias de açougues (supermercados, mercadinhos e mercado público), localizados no município de Mossoró-RN, durante o mês de outubro de 2019. Os estabelecimentos 1,2,3,4 e 5, foram representados pelos açougues privados e 6,7,8 e 9 pelos públicos.

Foram obtidas duas amostras (carne de frango e carne bovina) por açougue, totalizando 18 amostras avaliadas. Os cortes escolhidos foram o chã de dentro (parte traseira do animal) na carne bovina e o peito de frango. Estas foram coletadas pela manhã e transportadas em caixa isotérmica, acondicionadas em embalagem do comércio até o Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal – LIPOA, da Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, Mossoró – RN, onde o experimento foi conduzido.

Análise Microbiológica

Para as análises microbiológicas, seguiu-se os procedimentos descritos na instrução normativa nº 62 de 2003 (BRASIL, 2003) para a diluição foram retiradas 25 gramas representativos da amostra original e feitas as diluições em 225 mL de solução salina

peptonada 0,1%, homogeneizadas por aproximadamente 2 minutos em *stomacher*. Após, foram realizadas diluições sucessivas. Na pesquisa de coliformes a 36 °C, as diluições foram inoculadas em série de 3 tubos (10^{-1} , 10^{-2} , e 10^{-3}) em caldo verde brilhante bile lactose, incubados a 35 °C por 48 h em banho-maria. A presença de coliformes a 35 °C foi confirmada pela formação de gás (mínimo 1/10 do volume total do tubo de Durham) ou efervescência quando agitado gentilmente, e o valor foi dado por número mais provável (NNP/g). Para coliformes a 45 °C, inoculou-se as amostras positivas em tubos contendo caldo *Escherichia Coli/EC*, incubados a 45 °C às 48 h. Confirmados através da presença de gases nos tubos. Para determinar os resultados de número mais provável NNP, utilizou-se a tabela de referência presente na instrução normativa.

Para *Salmonella* spp., alíquotas de 25g das amostras foram adicionadas a 225 mL de água peptonada e incubadas a 36 °C. Após 16 a 20 h, alíquotas de 1 mL destas diluições foram transferidas para dois diferentes caldos de enriquecimento Selenite Cistine e Tetrationato, e 0,1 mL para caldo Rappaport incubados por 24 h à 41 °C. Após a incubação, as colônias foram estriadas em placas de petri com ágar *Salmonella – Shigella* (SS) e ágar Rambach, incubadas invertidas à 36 °C por 24 h. As colônias típicas obtidas nas placas foram testadas nos meios ágar Lisina Ferro e ágar Tríplice Açúcar Ferro. Em seguida, as amostras positivas foram submetidas à incubação em ágar Ureia. O resultado é interpretado de acordo com a coloração do tubo: se inalterada (amarelo) suspeita-se de *Salmonella*; caso o tubo com ágar mude para a cor rosa, descarta-se a presença de *Salmonella*. O resultado foi expresso em presença ou ausência de *Salmonella* spp. em 25g de cada amostra.

Aplicação de *checklist*

O *checklist* aplicado foi adaptado com base no roteiro para inspeção em açougues, utilizado pelo departamento de vigilância sanitária da Prefeitura Municipal de Marabá/Pará, este portanto adaptado da RDC 216/04 (BRASIL, 2004), ficando restrito a 50 perguntas que foram respondidas por método observacional. A análise crítica do *checklist* ocorreu com base nessa mesma resolução.

As perguntas foram separadas em 5 diferentes categorias, são elas:

- 1- Situação e Condições de Edificação (24 perguntas);
- 2- Equipamentos/Instrumentos e utensílios (12 perguntas);
- 3- Aparência dos funcionários da área de produção/manipulação/venda (5 perguntas);
- 4- Matéria-prima/insumos/produtos finais (4 perguntas);
- 5- Fluxo de produção/manipulação/controle de qualidade (5 perguntas).

As opções de respostas para o preenchimento do *checklist* eram “SIM”, quando o estabelecimento atendia ao item observado, “NÃO”, quando o mesmo apresentava não conformidade. A aplicação do *checklist* foi realizada durante a aquisição das amostras.

Os resultados foram tabulados e calculados em percentagem, através de média aritmética, segundo as conformidades e não conformidades do estabelecimento. Cada resposta equivalia a um ponto. Os resultados obtidos eram tabulados nas planilhas do aplicativo Microsoft Excel® (MICROSOFT, 2010) e a partir destes, elaboradas as tabelas e os gráficos. Os parâmetros de qualidade e adequação sanitária foram aqueles que apresentaram resultados a partir de 70% de conformidade. Esse dado foi definido pelos autores da pesquisa.

Resultados e Discussão

A contaminação da carne pode acontecer em várias etapas, que compreende desde o ambiente de criação do animal, alimentação, abate, como também no processamento. Muitos são os pontos ao longo da cadeia, favoráveis para que essa contaminação aconteça. (ALMEIDA., et al 2017)

Análises microbiológicas

Os resultados das análises microbiológicas para coliformes realizadas nas nove amostras de carne bovina e frango, coletadas em açougues na cidade de Mossoró-RN, podem ser observados na Tabela 1.

Entre as nove amostras de carne bovina avaliadas, 100% apresentaram resultados positivos (acima de $1,10^3$ NMP/g) para o teste de coliformes a 35 °C e 44,4% (4 amostras) apresentaram-se dentro dos padrões da RDC 12/2001 (BRASIL, 2001) para teste de coliformes 45 °C. Esta legislação determina que o limite não ultrapasse 10^4 NMP. A legislação que entrará em vigor, IN 60/ 2019 (BRASIL, 2019), não determina valores de coliformes totais e termotolerantes em carne bovina “*in natura*”. Para os demais resultados representados na tabela 1 como $>10^3$ NMP/g, não se pode determinar se estão dentro dos parâmetros, pois são necessárias mais diluições para se chegar ao número concreto. Os valores encontrados nas amostras insatisfatórias concordam com outros estudos, como é o caso de Silvestre et al. (2014) que em sua pesquisa, detectaram 100% de coliformes termotolerantes em carnes bovinas *in natura*, coletadas em açougues e supermercados, no município de Alexandria-RN. Lamas (2020) investigou a presença de coliformes termotolerantes em amostras de carne moída e quibe cru comercializados em Presidente Prudente – SP, os resultados obtidos demostram 6 amostras com valores abaixo do limite e 18

amostras com a presença de coliformes termotolerantes com valores acima do que preconiza a legislação, em uma delas o resultado foi superior a 100 NMP/g.

A presença de coliformes nos alimentos está relacionado a diversos fatores, tais como, local de armazenamento, transporte, equipamentos moedores, manipuladores, ambiente, recipientes e utensílios inadequados segundo a legislação (BRASIL, 2004).

Tabela 1. Enumeração de Coliformes a 35 °C e coliformes a 45 °C, encontrados nas amostras de carne bovina e frango coletadas no município de Mossoró/RN no ano de 2019.

Amostras de carne bovina	coliformes a 35 °C	coliformes a 45 °C
1	>1,10 ³ NMP/g	240NMP/g
2	>1,10 ³ NMP/g	290 NMP/g
3	>1,10 ³ NMP/g	460 NMP/g
4	>1,10 ³ NMP/g	290 NMP/g
5	>1,10 ³ NMP/g	>1,10 ³ NMP/g
6	>1,10 ³ NMP/g	>1,10 ³ NMP/g
7	>1,10 ³ NMP/g	>1,10 ³ NMP/g
8	>1,10 ³ NMP/g	>1,10 ³ NMP/g
9	>1,10 ³ NMP/g	>1,10 ³ NMP/g
Amostras de frango		
1	240 NMP/g	15 NMP/g
2	210 NMP/g	75MP/g
3	>1,10 ³ NMP/g	290 NMP/g
4	240 NMP/g	>1,10 ³ NMP/g
5	Ausente	< 0,3 NMP/g
6	>1,10 ³ NMP/g	>1,10 ³ NMP/g
7	>1,10 ³ NMP/g	>1,10 ³ NMP/g
8	>1,10 ³ NMP/g	>1,10 ³ NMP/g
9	>1,10 ³ NMP/g	1100 NMP/g

Fonte: Própria (2019)

As amostras de carnes de frango apresentaram resultados satisfatórios em 55,6% (5 amostras), de acordo com a Resolução nº 12/2001 da Agência Nacional da Vigilância Sanitária (BRASIL, 2001) que estabelece como padrão de coliformes a 45 °C a tolerância de 10⁴ para carnes resfriadas ou congeladas, "*in natura*", de aves (carcaças inteiras, fracionadas ou cortes). Na IN nº60/2019, não há padrão de coliforme a 35 °C para carne de aves. Um

estudo realizado por Tominaga (2019), em vinte amostras de carne de frango comercializados no Japão, apresentou resultados de contaminação microbiológica por coliformes variando entre 6,8 e 6,9 $\log_{10}$ UFC/g.

Os resultados confirmaram ausência de *Salmonella* spp., em todas as amostras de carnes e frangos. As legislações brasileiras, através da resolução RDC de nº 12 de 02 de janeiro de 2001 como também a mais recente, a IN nº 60/2019, definem como parâmetro de qualidade microbiológica da carne *in natura*, a ausência de *Salmonella* spp. em 25 gramas de amostra. (BRASIL, 2019), estando neste caso em conformidade sanitária sob esse aspecto. Os resultados também estão de acordo com estudos realizados por Muchinski e Degenhardt (2016), que coletaram amostras de carne de frango temperada em sete estabelecimentos de médio e grande porte no Município de Xanxerê, SC, apresentaram todas as amostras negativas para *Salmonella* spp.

Zaboli et al., (2019) cita em sua literatura que a carne de ave é a principal fonte proteica para a população humana na maioria das áreas do mundo. Vale ressaltar que há algumas restrições quanto ao seu preparo e manuseio, uma vez que uma má utilização do produto pode resultar em toxinfecções alimentares (HESSEL et al., 2019).

Nesta parte da pesquisa, nota-se que em 3 açougues (1 ao 3), os resultados microbiológicos foram satisfatórios para coliformes a 45 °C variando entre 15 e 460 NMP/g. O açougue 4 apresentou resultado insatisfatório apenas para coliformes a 45 °C ($> 1,10^3$ NMP/g) na amostra de frango. O açougue 5 apresentou na carne bovina valores acima de $1,10^3$ NMP/g, ausência de coliformes nas amostras de frango a 35°C e valores de $< 0,3$ NMP/g a coliformes a 45°C. Os açougues de 5 a 9 apresentaram-se insatisfatórios em resultados de coliformes a 35° e 45 °C na carne bovina (acima de $1,10^3$ NMP/g) e nas amostras de 6 a 9 de frango.

Checklist

Abaixo estão relacionados os resultados da aplicação do *checklist*, para a verificação das condições de higiene e estrutural, em nove açougues, localizados em supermercado, mercadinhos e mercado público no Município de Mossoró/RN:

Figura 1. Situação e condição da edificação dos açougues comercializadores de carne bovina e frango, no mês de outubro de 2019, no município de Mossoró/RN.

Fonte: Própria (2019)

Sobre a situação e condições de edificação (Figura 1) - Os açougues avaliados apresentavam estrutura física irregular, principalmente os 6, 7, 8 e 9 (localizados no mercado público) em que os boxes estavam em áreas com focos de insalubridade, era perceptível a presença de objetos em desuso na área externa a manipulação, o que aumenta a probabilidade de contaminação, pois pode atrair pragas. As áreas internas e externas do estabelecimento devem estar livres de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente, não sendo permitida a presença de animais (BRASIL, 2004). O piso, teto e paredes se encontravam no momento da observação em estado precário de conservação, o que dificulta a limpeza.

Dois açougues (1 e 2), possuíam banheiros exclusivos para funcionários separados por sexo e em bom estado de conservação. Nos banheiros de uso geral não tinham sabonete nem papel toalha. As instalações sanitárias devem possuir lavatórios e estar supridas de produtos destinados à higiene pessoal tais como papel higiênico, sabonete líquido inodoro antisséptico ou sabonete líquido inodoro e produto antisséptico e toalhas de papel não reciclado ou outro sistema higiênico e seguro para secagem das mãos. Os coletores dos resíduos devem ser dotados de tampa e acionados sem contato manual (BRASIL, 2004).

De acordo com Abreu e Spinelli (2009), o ambiente deve ter iluminação uniforme, sem ofuscamento, sem contrastes excessivos, sombras e cantos escuros. Segundo a RDC 216/04, as lâmpadas e luminárias devem permitir limpeza, estarem protegidas contra explosões e quedas acidentais e estas devem estar em bom estado de conservação. Dos nove estabelecimentos visitados apenas um encontrava-se em conformidade com as exigências acima mencionadas.

Segundo Farias et al. (2020) os riscos existentes de contaminação de alimentos nos estabelecimentos podem estar relacionadas a falta de informação e educação dos responsáveis pela organização, gerenciamento e operacionalização das atividades. Não somente a falta de recursos financeiros

Figura 2. Equipamentos/instrumentos e utensílios de açougues comercializadores de carne bovina e frango, no mês de outubro de 2019, no município de Mossoró/RN.

Fonte: Própria (2019)

Sobre os equipamentos, instrumentos e utensílios, observados nos locais de comercialização de carne (Figura 2) apenas dois estabelecimentos privados (1 e 2) apresentaram-se em conformidade. Os demais apresentaram-se abaixo das conformidades exigidas pela legislação. As principais deficiências estavam relacionadas a falta de equipamentos suficientes para realização do trabalho e pelo estado precário de conservação e higienização. Segundo a RDC 216/04 os equipamentos, móveis e utensílios devem ser devidamente higienizados por um funcionário devidamente capacitado. Sendo estas registradas e realizadas em frequência adequada, onde devem ser tomadas precauções para impedir a contaminação dos alimentos por produtos saneantes, pela suspensão de partículas e pela formação de aerossóis (BRASIL, 2004).

Figura 3. Aparência dos colaboradores da área de produção/manipulação/venda de açougues comercializadores de carne bovina e frango, no mês de outubro de 2019, no município de Mossoró/RN.

Fonte: Própria (2019)

Com relação a aparência dos funcionários da área de produção/manipulação/venda (Figura 3), Os estabelecimentos privados (1,2,3,4 e 5) apresentaram pessoal na área de manipulação devidamente fardados, dotados de equipamentos de proteção individual (EPI), com boa apresentação e hábitos higiênicos adequados, enquanto nos estabelecimentos públicos (6,7,8 e 9) pode-se constatar falta de roupas adequadas ao serviço, muitas vezes o vendedor manipulava a carne e o dinheiro sem higiene correta das mãos, além do uso de adornos (BRASIL, 2004). Um dado preocupante é a ausência do uso de uniformes e EPI's, visto que praticas como esta, estar relacionada a doenças transmitidas por alimentos (LIMA, 2006).

O Ministério do Trabalho, por meio da Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), obriga a empresa a fornecer aos empregados, gratuitamente, Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) em estado adequado ao risco e em perfeito estado de conservação (BRASIL, 2010).

As práticas inadequadas de higiene e processamento realizado por manipuladores de alimentos podem provocar a contaminação dos alimentos. A maioria dos manipuladores carece de informações relativas aos cuidados higiênico-sanitários, que devem ser adotados durante a produção dos alimentos.

Figura 4. Matéria-prima/ insumos/ produtos finais de açougues comercializadores de carne bovina e frango, no mês de outubro de 2019, no município de Mossoró/RN.

Fonte: Própria (2019)

Nos itens sobre matéria-prima/ insumos/ produtos finais (Figura 4), as matérias-primas dos açougues 1, 2, 3, 4 e 5, localizados em supermercados e mercadinhos continham procedência controlada, eram inspecionadas pelos órgãos competentes e armazenadas em condições controladas de temperatura. Os açougues 3 e 5 estavam em condições de não conformidade elevada assim como nos açougues 6, 7, 8 e 9, localizados no mercado, nestes as carnes estavam expostas à venda a temperatura ambiente colocando em risco a saúde do consumidor. As matérias-primas e os ingredientes caracterizados como produtos perecíveis devem ser expostos à temperatura ambiente somente pelo tempo mínimo necessário para a preparação do alimento, a fim de não comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento preparado (BRASIL, 2004).

As principais fontes e rotas de contaminação da carne descritas por Jay (2005) são: “I- a faca de sangria má esterilizada; II- a própria pele do animal; III- o trato gastrointestinal que possui uma enorme e variada flora microbiana e, se perfurado, pode contaminar toda a carcaça; IV- A mão dos manipuladores; V- os recipientes de guarda da carne que não sendo esterilizados carregam microrganismos contaminantes; VI- o ambiente de manuseio e armazenamento; e os nódulos linfáticos que, assim como o trato gastrointestinal, pode ser perfurado e contaminar a carne ao seu redor”.

O cuidado para se evitar contaminação nas etapas posteriores, como: transportes, inadequação dos processos de refrigeração, congelamento e descongelamento, exposição ao ar e ao ambiente, embalagem e armazenamento são importantes para garantir a qualidade do alimento (MERCIER et al., 2017; HENNEKINN, 2018).

Figura 5. Fluxo de produção/ manipulação/ controle de qualidade de açougues comercializadores de carne bovina e frango, no mês de outubro de 2019, no município de Mossoró/RN.

Fonte: Própria (2019)

Ao avaliar o fluxo de produção, manipulação e controle de qualidade dos estabelecimentos comercializadores de carne (Figura 5), verificou-se que apenas os açougues 1, 2, 3, 4 e 5, armazenavam as carnes separadas por espécies, evitando a contaminação cruzada. Nos outros pode-se perceber que as carnes eram armazenadas sem distinção de espécie e sem identificação de prazo de validade. As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens devem ser armazenados em local limpo e organizado, de forma a garantir proteção contra contaminantes. Devem estar adequadamente acondicionados e identificados, sendo que sua utilização deve respeitar o prazo de validade. Para os alimentos dispensados da obrigatoriedade da indicação do prazo de validade, deve ser observada a ordem de entrada dos mesmos. (BRASIL, 2004)

O açougue 5 não fazia retirada frequente dos resíduos e rejeitos após a manipulação, assim como nos açougues 7, 8 e 9, onde as sobras dos cortes eram descartadas no final do expediente. Os resíduos devem ser frequentemente coletados e estocados em local fechado e isolado da área de preparação e armazenamento dos alimentos, de forma a evitar focos de contaminação e atração de vetores e pragas urbanas (BRASIL, 2004)

Para Assis (2014), pensar em boas praticas consiste em estabelecer um sistema básico de requisitos sanitários, incluindo infraestrutura, fluxo de operação, higiene geral, saúde e higiene dos manipuladores, qualidade da água, controle de pragas, entre outros.

Gráfico 6. Avaliação geral das conformidades de açougues comercializadores de carne bovina e frango, no mês de outubro de 2019, no município de Mossoró/RN.

Fonte: Própria (2019)

De acordo com os dados obtidos sobre a avaliação geral das conformidades (Figura 6), constatou-se que as condições higiênico-sanitárias dos açougues ainda são precárias, o que influencia diretamente na qualidade microbiológica das carnes. Na avaliação geral, somente os açougues 1 e 2 (70% e 72%), localizados em dois grandes supermercados do município, conseguiram atingir valores igual ou superior a 70%. No entanto, a menor adequação foi referente ao açougue 5 (28%) localizado em um mercadinho. O que influenciou na resposta dos ensaios microbiológicos, com resultados satisfatórios para o açougue 1, 2, 3, 4 e 5 para coliformes a 45 °C. Vale ressaltar que os açougues de 6, 7, 8 e 9 apresentaram-se insatisfatórios para coliformes a 35° e 45 °C na carne bovina e nas amostras de 6 a 9 de frango.

No caso do estabelecimento 3, apesar da avaliação global desfavorável (40%), os resultados microbiológicos estavam todos dentro dos padrões sanitários, que neste caso, deve-se repetir o experimento e averiguar com mais detalhes toda a logística e processos de manipulação dos alimentos. Os estabelecimentos 6, 7, 8 e 9 (mercado público) foram os mais precários, apresentando em sua maioria 40% de conformidade, principalmente devido a comercialização acontecer em boxes, sem condições estruturais adequadas, os produtos coletados estavam expostos nas bancadas sem refrigeração e manipulação inapropriada.

No geral, pode-se perceber que grande parte dos açougues estão fora dos padrões higiênicos-sanitários exigidos pela legislação, os proprietários deixam a desejar nas instalações e edificações, usam matérias e utensílios em péssimos estados de conservação, não possuem higiene adequada de mãos e materiais o que foi refletido nos resultados microbiológicos insatisfatórios dos alimentos analisados, principalmente da carne bovina. Pode-se observar ainda, que alguns dos açougues da iniciativa privada (do 1 ao 5), foram

melhor classificados, provavelmente por estes terem a maior consciência quanto a importância do alvará sanitário ou, pela obrigação de ter o documento público, para participar de licitações ou ainda para poder comercializar certos tipos de produtos.

Portanto, nem sempre as deficiências se prendem à falta de recursos financeiros; partes importantes dessas deficiências estão vinculadas à falta de informação dos responsáveis pela organização, gerenciamento e operacionalização das atividades, como também a ausência de um olhar mais assertivo e criterioso dos órgãos fiscalizadores (vigilância sanitária, instituto de defesa ao meio ambiente, ministério da agricultura), e a realização de um trabalho multidisciplinar, a fim de averiguar toda a rede produtora de carne, para realizar um sistema integrado de rastreamento e controle desses alimentos; pois, a contaminação nem sempre ocorre na ponta da cadeia produtiva.

Assim como o investimento em capacitação e supervisão continuada da mão-de-obra envolvida na manipulação dessas carnes seria uma alternativa a ser realizada como forma de garantir condições higiênico-sanitárias adequadas e a qualidade do produto comercializado, contribuindo para a promoção da saúde pública.

Conclusão

Conclui-se que a maioria dos açougues apresentaram condições higiênico-sanitárias insatisfatórias o que influenciou nos resultados das análises microbiológicas. Apenas dois açougues (1 e 2) atingiram 70% ou mais de conformidade, como propôs o estudo. Estes açougues foram os que apresentaram os melhores resultados microbiológicos, fazendo-nos entender que as condições de edificação, os equipamentos moveis e utensílios, o manipulador, a área de produção, a matéria-prima, entre outros, influenciam diretamente na qualidade da carne bovina e de frango. O cuidado com estes itens citados evita a contaminação por coliformes e *Salmonella*.

Referências

ABREU, E. S.; SPINELLI, M. G. N. **Logística e Suprimentos**. In: PINTO, A. M. S.; ABREU, E. S.; SPINELLI, M. G. N. **Gestão de unidades de alimentação e nutrição: um modo de fazer**. São Paulo: MethaLtda, 2009. cap.9, p.119-141.

ALMEIDA, L; et al. Frequência de contaminação microbiológica em Frigorífico. R. bras. Tecnol. Agroindustr., Ponta Grossa, v. 11, n. 1, p. 2314-2331, jan./jun.2017

ASSIS, de Luana. Principais Microorganismos envolvidos em DVA. Alimentos Seguros: Ferramenta para gestão e controle da produção e distribuição. **Senac Nacional**, Rio de Janeiro, v.2, n. 2, 2014

BRASIL, Anvisa. Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Diário Oficial da União, Poder Executivo, 16 set. 2004. Disponível em: <<http://legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=12546>>. Acesso em: 16 dezembro de 2019

BRASIL, Anvisa. RDC, nº. 12 de 2 de janeiro de 2001 – Regulamento técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos. Diário Oficial da União de 10/01/2001

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Instrução Normativa nº 62 de 26 de agosto de 2003, Oficializar os Métodos Analíticos Oficiais para Análises Microbiológicas para Controle de Produtos de Origem Animal e Água. Diário Oficial da União de 18/09/2003

BRASIL. Anvisa. Instrução Normativa nº 60 de 23 de dezembro de 2019, Estabelece listas de padrões microbiológicos para alimentos. Diário Oficial da União de 26/12/2019

BRASIL. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017. Regulamenta a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, que disciplina a fiscalização e a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, Brasília, DF, 2017

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora no 6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI. Brasília: ministério do trabalho e Emprego, 2010.

FARIAS, A.S.; AKUTSU, R.C.C.A.; BOTELHO, R.B.A.; COELHO ARAÚJO, W.M.; SILVA, I.C.; SÁVIO, K.E.; ZANDONADI, R.P. Food Safety Conditions in Home-Kitchens: A Cross-Sectional Study in the Federal District/Brazil. **Int. J. Environ. Res. Public Health** **2020**, *17*, 4897.

HENNEKINNE, J.A. Staphylococcus aureus as a Leading Cause of Foodborne Outbreaks Worldwide. In: FETSCH, Alexandra (Org.). Staphylococcus aureus. [s.l.]: Academic Press, 2018, p. 129–146.

HESEL, C. T.; ELIAS, S. O.; PESSOA, J. P. Food safety behavior and handling practices during purchase, preparation, storage and consumption of chicken meat and eggs. **Food Research International**, v. 125, p. 108631, 2019.

JAY, J. et al. Microbiologia de Alimentos. 6. ed. Porto Alegre: **Artmed**, 2005

LAMAS, I.B; et al. Avaliação microbiológica de carne moída e quibe cru comercializada em uma cidade do Oeste Paulista. **Colloquium vitae**. jan- abr; 12(1): 86-92 2020

LIMA, C. R, Quem está na minha cozinha? São Paulo: Livraria Varela, 2006.

MERCIER, S.; VILLENEUVE, S.; MONDOR, M. Time–Temperature Management Along the Food Cold Chain: A Review of Recent Developments. **Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety**, v. 16, n. 4, p. 647–667, 2017.

MUCHINSKI, M., DEGENHARDT, R. Qualidade microbiológica de carne de frango temperada comercializada em açougues. *Jornada Integrada Em Biologia*, 91. 2016

OLIVEIRA, A. B. A., Paula, C. M. D., Capalonga, R., Cardoso, M. R. I. & Tondo, E. C. 2010. Doenças transmitidas por alimentos, principais agentes etiológicos e aspectos gerais: uma revisão. *HCPA*, 30, 279-285.

SILVESTRE, M.K.; ABRANTES, M.R.; PAIVA, W.S.; SOUZA, Ê.S.; SILVA, J.B. A. Avaliação da qualidade da carne bovina in natura comercializada no município de Alexandria-RN. *Acta Veterinária Brasília*, v. 7, n. 4, p. 327-331, 2014.

THARUK, M., Olafsson, S., Lee, J. S., Hurburg, C. R. 2010. Data mining for recognizing patterns in foodborne disease outbreaks. *Journal of Food Engineering*, 97, 213-227.

TOMINAGA, T. Rapid detection of coliform bacteria using a lateral flow test strip assay. ***Journal of Microbiological Methods***, v. 160, p. 29–35, 2019.

ZABOLI, G.; HUANG, X.; FENG, X. How can heat stress affect chicken meat quality? – a review. ***Poultry Science***, v. 98, n. 3, p. 1551–1556, 2019.

CAPÍTULO 47: PADRÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DO MEL DE *APIS MELLIFERA*: UMA BREVE REVISÃO

CHAPTER 47: IDENTITY AND QUALITY STANDARD OF *APIS MELLIFERA* HONEY: A BRIEF REVIEW

Clara Mariana Gonçalves Lima¹; Siluana Katia Tischer Seraglio²; Greici Bergamo³; Roseane Fett⁴; Ana Carolina Oliveira Costa⁵

Resumo

Os parâmetros físico-químicos definidos no Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) dos méis de abelhas *Apis mellifera* buscam garantir a qualidade e segurança de méis para consumo humano. Portanto, considerando a importância do PIQ dos méis de abelhas *Apis mellifera*, a proposta dessa breve revisão foi apresentar e discutir os parâmetros físico-químicos necessários para a comercialização segura desse alimento. Sendo assim, foram reportadas informações relacionadas à umidade, açúcares, acidez livre, 5-hidroximetilfurfural, atividade diastásica, cinzas, minerais, condutividade elétrica e sólidos insolúveis. A partir dessas informações, a importância de cada um desses parâmetros na inibição de ações fraudulentas, de processamento mal conduzido, entre outros foram demonstradas. Portanto, essa revisão demonstra a importância desses parâmetros mínimos como forma de assegurar a identidade e qualidade do mel, bem como da necessidade de constante fiscalização a fim de evitar riscos à saúde dos consumidores devido ao consumo de um mel não adequado.

Palavras-Chave: Composição, Mel de melato, Mel floral, Parâmetros físico-químicos.

Abstract

The physicochemical parameters defined in the Identity and Quality Standard (IQS) of *Apis mellifera* bee honeys aim to guarantee the quality and safety of honeys for human consumption. Therefore, considering the importance of IQS of honeys from *Apis mellifera* bees, the purpose of this brief review was to present and discuss the physicochemical parameters necessary for the safe marketing of that food. In this sense, information related to moisture, sugars, free acidity, 5-hydroxymethylfurfural, diastatic activity, ashes, minerals, electrical conductivity, and insoluble solids were reported. Based on this information, the importance of each of these parameters in inhibiting fraudulent actions, poorly conducted processing, among others, has been demonstrated. Thus, this review demonstrates the importance of these minimum parameters as a way of ensuring the identity and quality of honey, as well as the need for constant inspection in order to avoid risks to consumers' health due to the consumption of an unsuitable honey.

Keywords: Composition, Honeydew honey, Blossom honey, Physicochemical parameters.

¹ Doutoranda, Ciências dos Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina, claramarianalima@gmail.com

² Pós-doutoranda (CNPq Scholarship - Brazil (160175/2019-4)), Ciências dos Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina, siluanaseraglio@hotmail.com

³ Doutora, Ciências dos Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina, greici.bergamo@hotmail.com

⁴ Professora, Doutora em Química Orgânica, Universidade Federal de Santa Catarina, roseane.fett@ufsc.br

⁵ Professora, Doutora em Química Analítica, Universidade Federal de Santa Catarina, ana.costa@ufsc.br

Introdução

O Brasil possui um notável potencial apícola (CALDAS et al., 2019) devido à diversificada flora melitófila, condições edafoclimáticas favoráveis e ampla extensão territorial (MARQUES et al., 2011).

O mel é um alimento de sabor doce composto por macro e micro nutrientes que conferem propriedades nutricionais e medicinais ao produto (KATEEL et al., 2018; KHALIL et al., 2015), produzido principalmente por abelhas da espécie *Apis mellifera*. De acordo com sua origem podem ser classificados como floral, quando obtidos a partir do néctar das flores; ou melato, quando obtidos por meio de secreções de plantas ou de excreções de insetos sugadores de plantas (BRASIL, 2000; CODEX ALIMENTARIUS, 2001; EUROPEAN COMMISSION, 2002). Méis de origem floral ainda podem ser classificados como uni/monofloral ou multi/polifloral, de acordo com a origem botânica do néctar utilizado pelas abelhas na produção do mel (BRASIL, 2000; MERCOSUL, 1999).

Como forma de avaliar a qualidade dos méis produzidos e comercializados, alguns parâmetros foram elencados por órgãos regulamentadores e fiscalizadores como forma de avaliar a qualidade do produto (BRASIL, 2000; CODEX ALIMENTARIUS, 2001; EUROPEAN COMMISSION, 2002). Os principais critérios de interesse são a avaliação da maturidade do mel, determinado pelo teor de umidade, açúcares não redutores e redutores; pureza, determinada basicamente pelos teores de sólidos insolúveis, cinzas e condutividade elétrica; e o estado de deterioração determinado pelos parâmetros de acidez livre, diastase e 5-hidroximetilfurfural (5-HMF). De acordo com Carvalho et al. (2020), vários estudos demonstraram que uma elevada porcentagem de amostras de mel de diferentes regiões do Brasil não está adequada às normas vigentes que os adequam ao consumo.

Cabe ressaltar que devido à diversidade na composição química dos diferentes tipos de méis, os limites mínimo e máximo de cada parâmetro estipulados pelos principais órgãos regulamentadores podem variar de acordo com determinados fatores, como a origem botânica e o local de produção, por exemplo. Méis de origem floral e de melato, possuem limites diferentes para o teor de cinzas, por exemplo. Méis produzidos em países tropicais cuja temperatura ambiente é maior em relação a países de regiões subtropicais, maiores valores para 5-HMF são admitidos por algumas legislações. Outras exceções também são atribuídas para méis que reconhecidamente possuem atividade enzimática baixa onde menores valores de atividade diastásica são aceitos (BRASIL, 2000; CODEX ALIMENTARIUS, 2001; EUROPEAN COMMISSION, 2002).

Considerando a importância do Padrão de Identidade e Qualidade do mel para a comercialização desse produto, a proposta dessa breve revisão é apresentar e discutir os parâmetros físico-químicos necessários para garantir a qualidade e segurança alimentar dos méis de *Apis mellifera*.

Desenvolvimento

Definição, tipos e descrição breve da composição do mel de *Apis mellifera*

O mel é definido como um produto elaborado por abelhas melíferas (*Apis mellifera*). Este pode ser produzido a partir do néctar de flores, sendo este designado como mel floral, ou principalmente de secreções adocicadas de partes vivas de plantas e/ou excreções de insetos sugadores de plantas, sendo essas secreções/excreções chamadas também de melato, originando assim o mel de melato. Após recolhidas, estas substâncias são transformadas e combinadas com substâncias próprias das abelhas, que armazenam este produto nos favos da colmeia para maturação, originando ao final desse processo o mel propriamente dito (BRASIL, 2000; CODEX ALIMENTARIUS, 2001; EUROPEAN COMMISSION, 2002; MERCOSUL, 1999).

Devido à diversidade de fontes botânicas disponíveis, os méis florais podem ser classificados como unifloral ou monofloral quando provenientes majoritariamente de flores de uma mesma família, gênero ou espécie; ou multifloral ou polifloral quando obtidos a partir de diferentes origens botânicas (BRASIL, 2000; MERCOSUL, 1999). Em relação ao mel de melato, a mistura deste mel com mel floral pode ocorrer naturalmente nas próprias colmeias quando existe disponibilidade de néctar e de melato, combinação que ocorre especialmente nos períodos de início do verão e final do inverno no Brasil (BERGAMO et al., 2018; MARENDIA et al., 2011). Esta mistura de méis também é considerada como mel de melato por organizações regulamentadoras como Mercosul e Legislação Brasileira, desde que os Parâmetros de Identidade e Qualidade relacionados ao mel de melato sejam atendidos (BRASIL, 2000; MERCOSUL, 1999).

Ainda, segundo a Legislação Brasileira e do Mercosul, o mel pode ser classificado conforme o procedimento de obtenção do mel do favo em: mel escorrido, obtido pelo escorrimento do mel dos favos desoperculados; mel prensado, obtido por meio da prensagem dos favos; e mel centrifugado, obtido pela centrifugação dos favos desoperculados. Além disso, o mel pode ser classificado segundo a sua apresentação e/ou processamento em mel, sendo este em estado líquido, cristalizado ou semi cristalizado; em mel em favo, quando o mel é comercializado nos favos operculados; em mel com pedaços de favos, quando o mel contém um ou mais pedaços de favos; em mel cristalizado, quando este, devido a processos naturais,

encontrasse no estado sólido; em mel cremoso, quando este apresenta uma estrutura cristalina e fina podendo ter sido submetido a um processo físico; e em mel filtrado, quando o processo de filtração é empregado mas sem acarretar em prejuízos nutricionais ao produto (BRASIL, 2000; MERCOSUL, 1999).

Porém, independentemente do tipo de mel e suas classificações, este é considerado uma matriz complexa constituído por diversas classes de compostos. Alguns destes são oriundos das abelhas (como aminoácidos e enzimas), outros do néctar, melato ou pólen (como minerais, compostos voláteis e compostos fenólicos), bem como podem ser produzidos durante a maturação e estocagem do mel (como ácidos orgânicos, compostos voláteis e compostos de degradação) (ANKLAM, 1998; DA SILVA et al., 2016; KAROUI et al., 2007).

Os monossacarídeos frutose e glicose são os açúcares predominantes, sendo os compostos majoritários e encontrados em concentrações de até 80% em peso úmido do mel. Na sequência, a água é o segundo principal constituinte do mel, encontrado normalmente entre 15 a 20% em peso úmido. Ainda, diversos compostos minoritários são encontrados como enzimas, carotenoides, ácidos orgânicos, aminoácidos, minerais, componentes aromáticos, vitaminas, lipídios, polifenóis, entre outros, sendo estes constituintes responsáveis por inúmeras características sensoriais, físico-químicas e biológicas atribuídas ao mel (BERGAMO et al., 2018, 2019a, 2019b; CAN et al., 2015; ESCUREDO et al., 2013; FECHNER et al., 2016).

Parâmetros de identidade e qualidade do mel de *Apis mellifera*

A fim de garantir a identidade e requisitos mínimos de qualidade e segurança do mel para consumo humano, diferentes organizações regulamentadoras ao redor do mundo tem estabelecido normas que ambos os tipos de méis (floral e melato) devem cumprir para serem considerados aptos para consumo e comercialização.

As características sensoriais de méis, como cor, sabor, aroma e consistência, são previstas por organizações regulamentadoras. Em relação à cor dos méis, estes podem variar de quase incolor a pardo-escuro, enquanto o sabor e aroma devem ser característicos da origem do mel (tipo e origem botânica) e a sua consistência dependerá do estado físico do produto. Nota-se, assim, que essas características são extremamente diversificadas e dependentes fortemente do tipo do mel e das suas origens botânicas (BRASIL, 2000; CODEX ALIMENTARIUS, 2001; EUROPEAN COMMISSION, 2002; MERCOSUL, 1999), o que impossibilita uma definição mais restrita desses requisitos. Entretanto, essas características detêm grande poder sobre a aceitação de um tipo de mel pelo consumidor (AL et al., 2009; BERGAMO et al., 2019b). Por exemplo, espera-se que méis de melato sejam escuros, pela elevada concentração de minerais,

e não cristalizados, devido ao menor teor de glicose (SERAGLIO et al., 2019). Já em relação aos méis florais, espera-se que méis de eucalipto e de trigo sarraceno sejam escuros, enquanto que méis de tília e de canola sejam claros, características também relacionadas às concentrações dos minerais presentes nesses produtos (BOBIS et al., 2020; KUŠ et al., 2014).

No entanto, os méis florais e de melato distinguem-se entre si especialmente em relação a algumas características físico-químicas (BERGAMO et al., 2019a, 2019b; CAN et al., 2015; PITA-CALVO; VÁZQUEZ, 2017). Dessa forma, são previstos limites distintos para cada uma dessas classes de méis em relação aos parâmetros de açúcares redutores, sacarose, minerais e condutividade elétrica, como apresentado na Tabela 1 (BRASIL, 2000; CODEX ALIMENTARIUS, 2001; EUROPEAN COMMISSION, 2002; MERCOSUL, 1999).

Tabela 1. Requisitos físico-químicos de identidade e qualidade para méis florais e de melato.

Parâmetro	Legislação Brasileira e Mercosul		Codex Alimentarius e Comissão Europeia	
	Tipo do mel	Valor estabelecido	Tipo do mel	Valor estabelecido
Soma de frutose e glicose (g 100 g ⁻¹)	-	-	Floral	Mínimo 60
			Melato e misturas com florais	Mínimo 45
Açúcares redutores (g 100 g ⁻¹)	Floral	Mínimo 65	-	-
	Melato	Mínimo 60		
Umidade (g 100 g ⁻¹)	Floral/melato	Máximo 20	Méis no geral	Máximo 20
Sacarose (g 100 g ⁻¹)	Floral	Máximo 6	Méis no geral	Máximo 5
	Melato	Máximo 15		
Sólidos insolúveis em água (g 100 g ⁻¹)	Floral/melato	Máximo 0,1*	Méis no geral não prensados	Máximo 0,1
Minerais (Cinzas - g 100 g ⁻¹)	Floral	Máximo 0,6	-	-
	Melato	Máximo 1,2		
Condutividade elétrica (mS cm ⁻¹)	-	-	Méis no geral	Máximo 0,8
			Melato e outros méis específicos	Mínimo 0,8
Acidez livre (mEq kg ⁻¹)	Floral/melato	Máximo 50	Méis no geral	Máximo 50
Atividade diastásica	Floral/melato	Mínimo 8** (unidades Göthe)	Méis no geral	Mínimo 8 (unidades Shade)
			Méis naturalmente com baixo teor enzimático	Mínimo 3*** (unidades Shade)
5-Hidroximetil-furfural (mg kg ⁻¹)	Floral/melato	Máximo 60	Méis no geral	Máximo 40
			Méis de origem tropical	Máximo 80

Legenda: * Exceto no mel prensado, com tolerância de até 0,5 g 100 g⁻¹, unicamente em produtos para venda direta ao público; ** Méis com baixo teor enzimático devem apresentar valor de no mínimo 3 unidades Göthe, sempre que o teor de 5-hidroximetilfurfural não exceder 15 mg kg⁻¹; *** Sempre que o teor de 5-hidroximetilfurfural não exceder 15 mg kg⁻¹; mEq – mili equivalentes; mS – mili Siemens.

Fonte: Adaptado de Brasil (2000), Mercosul (1999), Codex Alimentarius (2001) e European Commission (2002).

De acordo com a Tabela 1, nota-se que os parâmetros exigidos são semelhantes entre diferentes organizações regulamentadoras, sendo que a principal diferença é encontrada em relação à determinação de cinzas pela Legislação Brasileira e Mercosul e da condutividade elétrica por outras organizações regulamentadoras internacionais. Além disso, os limites estabelecidos para cada parâmetro também são muito similares, senão iguais, entre as diferentes organizações regulamentadoras. Esses parâmetros trazem importantes informações referentes ao grau de maturidade, de deterioração e de pureza do mel (BRASIL, 2000).

Além das delimitações sensoriais e físico-químicas, outras especificações também são descritas, como: o mel não pode apresentar indícios de fermentação; ter sido adicionado de açúcares, aditivos ou quaisquer substâncias que venham a modificar a sua composição original; conter contaminantes como metais pesados, pesticidas ou outros que sejam proibidos ou estejam acima dos limites previstos em regulamentações específicas; conter substâncias estranhas; ser acondicionado em embalagem não própria para alimentos (BRASIL, 2000; CODEX ALIMENTARIUS, 2001; EUROPEAN COMMISSION, 2002; MERCOSUL, 1999). Caso haja aquecimento brando do mel, este não deve comprometer a sua composição e qualidade, assim como tratamentos químicos e bioquímicos não devem ser utilizados (CODEX ALIMENTARIUS, 2001).

Portanto, especialmente por meio das características físico-químicas, objetiva-se garantir a identidade do mel e a sua qualidade e segurança, inibindo ou minimizando a prática de ações de adulteração da autenticidade do mel (BERGAMO et al., 2019a; CAMINA; PELLERANO; MARCHEVSKY, 2012). As adulterações no mel normalmente ocorrem pela adição de água, amidos e glicoses a fim de promover o aumento do rendimento do produto (EVANGELISTA-RODRIGUES et al., 2005). Em âmbito nacional, a Vigilância Sanitária e o Ministério da Agricultura vêm buscando minimizar as fraudes por meio de coletas de amostras em feiras livres, supermercados e comércios de ruas para a realização de testes que identifiquem a autenticidade do alimento (AGUIAR, 2018). Vale salientar que adulterações causam impacto nos ganhos econômicos dos apicultores (SOBRINO-GREGORIO et al., 2018) bem como de todo o ecossistema (ADENEKAN et al., 2015).

Acrescenta-se que, para a detecção de adulterantes no mel normalmente são empregadas, em conjunto com as análises físico-químicas previstas em legislações, técnicas analíticas mais avançadas como: espectroscopia no infravermelho; espectroscopia Raman; espectroscopia de fluorescência; espectroscopia de ressonância magnética nuclear; cromatografia de troca aniônica de alto desempenho acoplado a detector amperométrico

pulsado; cromatografia a gás acoplada a espectrometria de massas; entre outras (HE et al., 2020; ZÁBRODSKÁ; VORLOVÁ, 2014).

Maturidade

Umidade

A água é o segundo maior constituinte presente nos méis, sendo o seu teor dependente da origem botânica e geográfica, condições edafoclimáticas, época de colheita, grau de maturidade alcançado na colmeia, condições de armazenamento, entre outros (CHIRIFE; ZAMORA; MOTTO, 2006; FECHNER et al., 2016; FLORES; ESCUREDO; SEIJO, 2015). Por esses motivos, a umidade do mel varia consideravelmente, podendo inclusive chegar a teores acima de 20% (FINOLA; LASAGNO; MARIOLI, 2007; SAXENA; GAUTAM; SHARMA, 2010). De acordo com Marchini, Moreti e Otsuk (2005), uma das principais causas da alta umidade do mel é a colheita precoce de favos imaturos ou condições inadequadas de armazenamento. Por essas razões, esse parâmetro é considerado um indicativo da maturidade de méis.

A água afeta várias características do mel, como viscosidade, cristalização, cor, sabor, solubilidade e conservação (ESCUREDO et al., 2014; FECHNER et al., 2016; LAUX; CAMARA; ROSENKRANTZ, 2011). Dentre essas, a cristalização pode ser destacada, uma vez que tem importante impacto na aceitação de um mel pelo consumidor e sobre a conservação do produto. A cristalização é um fenômeno relacionado com a razão frutose/glicose e também com a razão glicose/umidade. Valores inferiores a 1,7 para a razão entre glicose/umidade indicam uma cristalização lenta ou nula, enquanto valores cima de 2 são considerados indicativos de uma cristalização completa e rápida (DOBRE et al., 2012).

A cristalização do mel, especificadamente da glicose, conduz à redução do teor de sólidos solúveis na fase aquosa, promovendo o aumento da atividade de água daquela fração (TOSI et al., 2008; VENIR; SPAZIANI; MALTINI, 2010). Como consequência dessa condição, a ocorrência de fermentação do mel ao longo da sua estocagem é favorecida (NAYIK; DAR; NANDA, 2015). Isso ocorre basicamente pela ação de microrganismos osmotolerantes sobre os açúcares redutores do mel gerando a formação de ácido acético e água (CHIRIFE; ZAMORA; MOTTO, 2006). Entretanto, valores de atividade de água entorno de 0,5 a 0,7 são encontrados em méis (NAYIK; DAR; NANDA, 2015; SAXENA; GAUTAM; SHARMA, 2010), os quais são considerados satisfatórios para a inibição do crescimento desses microrganismos (CHIRIFE; ZAMORA; MOTTO, 2006).

Açúcares

A concentração e, principalmente, o perfil de açúcares de um mel depende fortemente de vários fatores como condições climáticas, origem botânica e geográfica, ação de enzimas, processamento e estocagem, os quais podem auxiliar na discriminação de diferentes méis, incluindo méis de melato e floral (BERGAMO et al., 2019a; DE LA FUENTE et al., 2011; DOBRE et al., 2012).

Os monossacarídeos frutose e glicose (açúcares redutores) são os principais constituintes dos méis, sendo a frutose encontrada geralmente em concentrações levemente superiores a glicose (DOBRE et al., 2012; FINOLA; LASAGNO; MARIOLI, 2007; TORNUK et al., 2013). A soma desses dois açúcares são responsáveis por normalmente 65 a 80% da constituição do mel (DOBRE et al., 2012; PASCUAL-MATÉ et al., 2018; TORNUK et al., 2013). Porém, menores teores de açúcares redutores (a partir de 45%) também podem ser encontrados em méis, especialmente em méis de melato (CAN et al., 2015; SAXENA; GAUTAM; SHARMA, 2010). Ainda, outros oligossacarídeos, especialmente di e trissacarídeos, são encontrados em méis, porém em concentrações individuais inferiores aos açúcares majoritários (DE LA FUENTE et al., 2011; PASCUAL-MATÉ et al., 2018).

A composição de açúcares do mel afeta diretamente as suas características de higroscopicidade, viscosidade e cristalização, por exemplo (FECHNER et al., 2016; NAYIK; DAR; NANDA, 2015). A cristalização do mel, apesar de ser um processo natural, é comumente considerado um defeito pelos consumidores (ESCUREDO et al., 2014). Nesse processo, é observada a separação de fases o qual ocorre basicamente devido à baixa solubilidade da glicose (VENIR; SPAZIANI; MALTINI, 2010). Valores abaixo de 1,0 para a razão frutose/glicose são comumente indicativos de uma cristalização rápida, enquanto que valores normalmente acima de 1,3 para a razão frutose/glicose são interpretados como sugestivos de uma cristalização lenta ou inexistente (DOBRE et al., 2012). Considerando que méis de melato comumente apresentam teores de glicose mais baixos quando comparados à méis florais, a ausência ou lenta cristalização desse tipo de mel é uma característica reconhecida dessa classe (SERAGLIO et al., 2019).

Os açúcares redutores e a sacarose (oligossacarídeo não redutor correspondendo normalmente de 2 a 3% dos carboidratos presentes no mel) também são considerados indicadores da maturidade dos méis, pois a sacarose provinda do néctar ou do melato é convertida especialmente na frutose e glicose por enzimas oriundas das abelhas, como a α - e β -glicosidase (DE LA FUENTE et al., 2011; MATEO; BOSCH-REIG, 1997). Dessa forma, altos teores de sacarose e baixos teores de açúcares redutores são um indicativo de colheita precoce

do mel, resultando na não conversão total ou quase total da sacarose, ou de um mel originário de alimentação artificial prolongada das colmeias com xaropes de açúcares (ESCUREDO et al., 2013; SAXENA; GAUTAM; SHARMA, 2010; TORNUK et al., 2013). Essa problemática tem levado vários pesquisadores em todo o mundo a buscarem novas estratégias analíticas para enfrentar o desafio de detectar adulterantes no mel, especialmente aqueles à base de açúcar, os quais não são facilmente detectados (WU et al., 2017).

Deterioração

Acidez livre

A acidez livre presente no mel é proveniente dos ácidos orgânicos, oriundos da fonte de néctar e/ou secreções e excreções sacarínicas que serão utilizadas na produção de mel pelas abelhas (BERGAMO et al., 2019a; BRUGNEROTTO et al., 2019). Quando o processo de fermentação é iniciado, os açúcares presentes no mel são transformados em ácidos orgânicos por meio de leveduras, e, como consequência, ocorre um aumento na acidez (CAVIA et al., 2007; CHIRIFE; ZAMORA; MOTTO, 2006; FINOLA; LASAGNO; MARIOLI, 2007; TORNUK et al., 2013). Dessa forma, a acidez é um parâmetro relacionado à deterioração (BRASIL, 2000) e ao frescor do mel (KARABAGIAS et al., 2017) e valor máximo de 50 mEq kg⁻¹ são determinados por legislações.

Cabe ressaltar que estudos recentes vem demonstrando que alguns méis de melato possuem naturalmente uma acidez mais elevada, superior a 50 mEq kg⁻¹, mesmo sendo frescos (BERGAMO et al., 2019a; TERRAB; DIEZ; HEREDIA, 2003). Esses estudos demonstraram que a acidez encontrada nesses méis é proveniente da alta quantidade de ácidos orgânicos presentes nessa classe específica de mel, não tendo aparentemente uma relação direta com vias fermentativas de deterioração.

5-Hidroximetilfurfural

O 5-HMF é um produto intermediário do escurecimento não enzimático formando a partir da redução de açúcares através da reação de Maillard, reações de desidratação de hexoses catalisadas em meio ácido ou por reações de caramelização (FECHNER et al., 2016; MOREIRA et al., 2010; SHAPLA et al., 2018).

Esse composto é formado gradualmente durante o aquecimento ou armazenamento do mel. No entanto, vários fatores afetam a sua ocorrência como o perfil de açúcares, pH, acidez, atividade de água, umidade, além da estocagem prolongada e aquecimento (ANKLAM, 1998; FALLICO; ARENA; ZAPPALA, 2008; FECHNER et al., 2016; TORNUK et al., 2013; YÜCEL; SULTANOGLU, 2013). Portanto, o 5-HMF é considerado um parâmetro indicador

do frescor do mel e dos procedimentos de manipulação destes (ESCUREDO; SEIJO; FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, 2011; FECHNER et al., 2016). Além disso, esse composto é considerado tóxico em determinadas concentrações (DA SILVA et al., 2016), o que reforça a importância dos limites máximos estipulados para o 5-HMF em méis, o qual varia de 40 a 80 mg kg⁻¹, dependendo da organização regulamentadora (BRASIL, 2000; CODEX ALIMENTARIUS, 2001; EUROPEAN COMMISSION, 2002; MERCOSUL, 1999). Grigoryan (2015) descreveu o 5-HMF como sendo cancerígeno e citotóxico, o qual o constitui como um dos parâmetros mais críticos da qualidade do mel a ser avaliado.

Atividade diastásica

A diastase é um conjunto de enzimas (α - e β -amilase) secretadas pelas abelhas as quais promovem a hidrólise do amido em monômeros menores. Apesar do néctar e melato não possuírem quantidade relevante de amido, essas enzimas parecem contribuir na digestão do pólen pelas abelhas (DE-MELO et al., 2018; FLANJAK et al., 2016).

A atividade enzimática no mel é variável e depende de vários fatores como a quantidade de saliva contendo enzimas adicionadas ao mel pelas abelhas, a quantidade de néctar ou melato processado, as condições fisiológicas das abelhas e da colmeia, além do aquecimento e estocagem prolongada, fatores estes que decrescem a atividade diastásica dos méis (ÁVILA et al., 2018; DE-MELO et al., 2018; FLANJAK et al., 2016; JUAN-BORRÁS et al., 2014). Assim, esse parâmetro é considerado um dos indicadores do frescor do mel, uma vez que espera-se que méis frescos e não aquecidos tenham a presença dessas enzimas ativas, apesar de alguns méis serem reconhecidos por alguns órgãos regulamentadores como méis com teor naturalmente baixo dessas enzimas, sendo assim aplicado a estes méis o limite mínimo de 3 unidades de diastase desde que o teor de 5-HMF seja de até 15 mg kg⁻¹. Para os demais méis, estes devem apresentar atividade de no mínimo 8 unidades de diastase (BRASIL, 2000; CODEX ALIMENTARIUS, 2001; EUROPEAN COMMISSION, 2002; MERCOSUL, 1999).

A determinação da atividade diastásica do mel é realizada por meio de análise quantitativa, em que uma unidade diastásica corresponde a atividade enzimática de 1 g de mel, o qual pode hidrolisar 0,01 g de amido em 1 h a 40 °C, sendo os resultados expressos em unidades de diastase, Schade ou Göthe (SAKAČ; SAK-BOSNAR, 2012).

Pureza

Cinzas, minerais e condutividade elétrica

O teor de cinzas é representado por todo o resíduo inorgânico remanescente da queima de matéria orgânica sendo, portanto, um indicador do conteúdo mineral do mel (SAXENA; GAUTAM; SHARMA, 2010). É considerado um parâmetro de pureza por alguns órgãos regulamentadores (BRASIL, 2000) porque se algumas etapas do beneficiamento do mel forem mal conduzidas, material inorgânico (como sujidades) poderá ser agregado ao produto, aumentando os níveis desse parâmetro (SANTOS; OLIVEIRA, 2013). Ainda, alguns autores relacionam o teor de cinzas com a poluição ambiental (ANKLAM, 1998), evidenciando ainda mais a sua relação com a pureza do produto.

O teor de cinzas pode estar relacionado com a possível origem botânica do mel (SAXENA; GAUTAM; SHARMA, 2010), bem como na diferenciação de méis florais e de melato, uma vez que menores valores são normalmente encontrados em méis florais (FINOLA; LASAGNO; MARIOLI, 2007). Baseado nessas evidências, a Legislação Brasileira preconiza teores máximos diferenciados de cinzas para méis florais e de melato (0,6 e 1,2 g 100 g⁻¹; respectivamente). Valores acima do preconizado podem indicar excesso de sujidades ou poluição ambiental.

Internacionalmente, para fins de avaliação do padrão de identidade e qualidade do mel, o teor de cinzas foi substituído pela condutividade elétrica, uma vez que esse parâmetro é influenciado pela quantidade de minerais, acidez, presença de íons, ácidos orgânicos e proteínas no mel (ALQARNI et al., 2014; CAN et al., 2015; FECHNER et al., 2016; SAXENA; GAUTAM; SHARMA, 2010; YÜCEL; SULTANOGLU, 2013). Assim, da mesma forma que o conteúdo de cinzas, legislações também estipulam limites diferentes para méis florais e de melato (máximo de 0,8 mS cm⁻¹ e mínimo de 0,8 mS cm⁻¹; respectivamente) (CODEX ALIMENTARIUS, 2001; EUROPEAN COMMISSION, 2002).

Sólidos insolúveis

Os sólidos insolúveis são avaliados como parâmetro de identidade e qualidade do mel pois estão relacionados a resíduos como cera, patas e asas das abelhas e outras sujidades provenientes do campo (MENDES et al., 2009) ou do processamento inadequado (SANTOS; OLIVEIRA, 2013; SILVA et al., 2009). Por estarem relacionados diretamente com resíduos, os principais órgãos regulamentadores determinam limites de máximos para esse parâmetro (0,1 g 100 g⁻¹ para méis florais e de melato) (BRASIL, 2000; CODEX ALIMENTARIUS, 2001; EUROPEAN COMMISSION, 2002; MERCOSUL, 1999). Segundo Schlabit, Silva e Souza

(2010), os apicultores poderiam remover tais resíduos utilizando uma peneira de malha com orifícios menores que a utilizada comumente.

Considerações finais

Nessa revisão bibliográfica foram apresentados e discutidos os parâmetros físico-químicos mínimos necessários para garantir a qualidade e segurança alimentar de méis florais e de melato de abelhas *Apis mellifera*. Com base nas informações levantadas foi possível entender a importância de cada parâmetro exigido por organizações regulamentadoras na limitação da ocorrência de fraudes, de processos mal conduzidos, entre outros. Assim, foi possível identificar que, dentre os parâmetros previstos em legislações, o perfil e concentração de açúcares são os principais indicadores de adulterações de méis por xaropes, por exemplo. Entretanto, todos os demais parâmetros exigidos contribuem com informações relevantes quanto a qualidade e segurança desse produto. Sabe-se que essas análises apresentam limitações quanto ao grau de detecção de alterações, entretanto estas representam uma importante barreira no controle da qualidade de méis. Portanto, considerando que a prática de adulterações em méis é recorrente, torna-se extremamente importante conhecer os parâmetros mínimos envolvidos na garantia da identidade e qualidade do mel, bem como que a fiscalização por parte das autoridades competentes seja realizada de forma constante a fim de banir tais ocorrências.

Agradecimentos

Os autores gostariam de agradecer o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES; código de financiamento 001) pelas bolsas de estudo e suporte financeiro.

Referências

ADENEKAN, M. O. et al. Physicochemical and vitamin constituents of honey samples obtained from different agro-ecological Zones of Nigeria. **Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies**, v. 1, n. 1, p. 36–41, 2015.

AGUIAR, A. C. S. **Panorama e perspectivas da cadeia produtiva do mel no Brasil**. [s.l.] Universidade Federal de Uberlândia, Patos de Minas, 2018.

AL, M. L. et al. Physico-chemical and bioactive properties of different floral origin honeys from Romania. **Food Chemistry**, v. 112, n. 4, p. 863–867, 15 fev. 2009.

ALQARNI, A. S. et al. Mineral content and physical properties of local and imported honeys in Saudi Arabia. **Journal of Saudi Chemical Society**, v. 18, n. 5, p. 618–625, 2014.

ANKLAM, E. A review of the analytical methods to determine the geographical and botanical

origin of honey. **Food Chemistry**, v. 63, n. 4, p. 549–562, dez. 1998.

ÁVILA, S. et al. Stingless bee honey: Quality parameters, bioactive compounds, health-promotion properties and modification detection strategies. **Trends in Food Science & Technology**, v. 81, n. March, p. 37–50, nov. 2018.

BERGAMO, G. et al. Mineral profile as a potential parameter for verifying the authenticity of bracatinga honeydew honeys. **LWT**, v. 97, p. 390–395, nov. 2018.

BERGAMO, G. et al. Physicochemical characteristics of bracatinga honeydew honey and blossom honey produced in the state of Santa Catarina: An approach to honey differentiation. **Food Research International**, v. 116, p. 745–754, fev. 2019a.

BERGAMO, G. et al. Differentiation of honeydew honeys and blossom honeys: a new model based on colour parameters. **Journal of Food Science and Technology**, v. 56, n. 5, p. 2771–2777, 10 maio 2019b.

BOBIS, O. et al. Eucalyptus honey: Quality parameters, chemical composition and health-promoting properties. **Food Chemistry**, v. 325, n. April, p. 126870, 2020.

BRASIL. Mapa. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 11, de 20 de outubro de 2000. Aprova Regulamento técnico de Identidade e Qualidade do Mel. p. 1–4, 2000.

BRUGNEROTTO, P. et al. A capillary electrophoresis method to determine aliphatic organic acids in bracatinga honeydew honey and floral honey. **Journal of Food Composition and Analysis**, v. 82, p. 103243, set. 2019.

CALDAS, F. et al. COMPOSIÇÃO QUÍMICA, ATIVIDADE ANTIRADICALAR E ANTIMICROBIANA DO PÓLEN APÍCOLA DE FABACEAE. **Química Nova**, v. 42, n. 1, p. 49–56, 2019.

CAMINA, J. M.; PELLERANO, R. G.; MARCHEVSKY, E. J. Geographical and botanical classification of honeys and apicultural products by chemometric methods. A review. **Current Analytical Chemistry**, v. 8, n. 3, p. 408–425, 1 maio 2012.

CAN, Z. et al. An investigation of Turkish honeys: their physico-chemical properties, antioxidant capacities and phenolic profiles. **Food Chemistry**, v. 180, p. 133–141, ago. 2015.

CARVALHO, R. D. A. et al. Assessment of adulteration and mycoflora identification of honey samples marketed in the metropolitan region of Belo Horizonte, Brazil. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 7, p. 440974246, 21 maio 2020.

CAVIA, M. M. et al. Evolution of acidity of honeys from continental climates: influence of induced granulation. **Food Chemistry**, v. 100, n. 4, p. 1728–1733, jan. 2007.

CHIRIFE, J.; ZAMORA, M. C.; MOTTO, A. The correlation between water activity and % moisture in honey: fundamental aspects and application to Argentine honeys. **Journal of Food Engineering**, v. 72, n. 3, p. 287–292, fev. 2006.

CODEX ALIMENTARIUS. Revised Codex Standard for Honey, Standards and Standard Methods. **Codex Alimentarius Commission FAO/OMS**, v. 11, n. 1987, p. 1–7, 2001.

DA SILVA, P. M. et al. Honey: Chemical composition, stability and authenticity. **Food Chemistry**, v. 196, n. April, p. 309–323, abr. 2016.

DE-MELO, A. A. M. et al. Composition and properties of *Apis mellifera* honey: A review. **Journal of Apicultural Research**, v. 57, n. 1, p. 5–37, 23 jan. 2018.

DE LA FUENTE, E. et al. Carbohydrate composition of Spanish unifloral honeys. **Food Chemistry**, v. 129, n. 4, p. 1483–1489, dez. 2011.

DOBRE, I. et al. Rheological behavior of different honey types from Romania. **Food Research International**, v. 49, n. 1, p. 126–132, nov. 2012.

ESCUREDO, O. et al. Nutritional value and antioxidant activity of honeys produced in a European Atlantic area. **Food Chemistry**, v. 138, n. 2–3, p. 851–856, jun. 2013.

ESCUREDO, O. et al. Contribution of botanical origin and sugar composition of honeys on the crystallization phenomenon. **Food Chemistry**, v. 149, p. 84–90, abr. 2014.

ESCUREDO, O.; SEJO, M. C.; FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, M. Descriptive analysis of *Rubus* honey from the north-west of Spain. **International Journal of Food Science & Technology**, v. 46, n. 11, p. 2329–2336, nov. 2011.

EUROPEAN COMMISSION. European Commission Council Directive 2001/110/EC of 20 December 2001 relating to honey. **Official Journal of the European Communities**, p. 10–47, 2002.

EVANGELISTA-RODRIGUES, A. et al. Análise físico-química dos méis das abelhas *Apis mellifera* e *Melipona scutellaris* produzidos em regiões distintas no Estado da Paraíba. **Ciência Rural**, v. 35, n. 5, p. 1166–1171, out. 2005.

FALLICO, B.; ARENA, E.; ZAPPALA, M. Degradation of 5-hydroxymethylfurfural in honey. **Journal of Food Science**, v. 73, n. 9, p. C625–C631, nov. 2008.

FECHNER, D. C. et al. Multivariate classification of honeys from Corrientes (Argentina) according to geographical origin based on physicochemical properties. **Food Bioscience**, v. 15, p. 49–54, set. 2016.

FINOLA, M. S.; LASAGNO, M. C.; MARIOLI, J. M. Microbiological and chemical characterization of honeys from central Argentina. **Food Chemistry**, v. 100, n. 4, p. 1649–1653, jan. 2007.

FLANJAK, I. et al. Croatian produced unifloral honeys characterised according to the protein and proline content and enzyme activities. **Journal of Apicultural Science**, v. 60, n. 1, p. 39–48, 2016.

FLORES, M. S. R.; ESCUREDO, O.; SEJO, M. C. Assessment of physicochemical and antioxidant characteristics of *Quercus pyrenaica* honeydew honeys. **Food Chemistry**, v. 166, p. 101–106, 2015.

GRIGORYAN, K. Safety of honey. In: **Regulating Safety of Traditional and Ethnic Foods**. 1st ed. ed. Cambridge, USA: Academic Press, 2015. p. 217–246.

HE, Y. et al. Detection of adulteration in food based on nondestructive analysis techniques: a review. **Critical Reviews in Food Science and Nutrition**, v. 0, n. 0, p. 1–21, 16 jun. 2020.

JUAN-BORRÁS, M. et al. Effect of country origin on physicochemical, sugar and volatile composition of acacia, sunflower and tilia honeys. **Food Research International**, v. 60, p. 86–94, jun. 2014.

KARABAGIAS, I. K. et al. Characterization and geographical discrimination of commercial *Citrus* spp. honeys produced in different Mediterranean countries based on minerals, volatile compounds and physicochemical parameters, using chemometrics. **Food Chemistry**, v. 217, p. 445–455, fev. 2017.

KAROUI, R. et al. The use of front face fluorescence spectroscopy to classify the botanical origin of honey samples produced in Switzerland. **Food Chemistry**, v. 101, n. 1, p. 314–323, jan. 2007.

KATEEL, R. et al. Antibacterial action of Tropical honey on various bacteria obtained from diabetic foot ulcer. **Complementary Therapies in Clinical Practice**, v. 30, p. 29–32, fev. 2018.

KHALIL, M. I. et al. Cardioprotective effects of Tualang Honey: amelioration of cholesterol and cardiac enzymes levels. **BioMed Research International**, v. 2015, p. 286051, maio 2015.

KUŚ, P. M. et al. Antioxidant activity, color characteristics, total phenol content and general HPLC fingerprints of six Polish unifloral honey types. **LWT - Food Science and Technology**, v. 55, n. 1, p. 124–130, 2014.

LAUX, D.; CAMARA, V. C.; ROSENKRANTZ, E. α -Relaxation in honey study versus moisture content: high frequency ultrasonic investigation around room temperature. **Journal of Food Engineering**, v. 103, n. 2, p. 165–169, mar. 2011.

MARCHINI, L. C.; MORETI, A. C. DE C. C.; OTSUK, I. P. Análise de agrupamento, com base na composição físico-química, de amostras de méis produzidos por *Apis mellifera* L. no Estado de São Paulo. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, v. 25, n. 1, p. 8–17, mar. 2005.

MARENDIA, T. A. et al. Desenvolvimento de um sistema para classificação do mel em floral e melato por parâmetros físico químicos combinados com redes neurais artificiais. **Evidência**, v. 11, n. 1, p. 61–74, 2011.

MARQUES, L. J. P. et al. Levantamento da flora apícola em Santa Luzia do Paruá, Sudoeste da Amazônia, Maranhão. **Acta Botanica Brasilica**, v. 25, n. 1, p. 141–149, mar. 2011.

MATEO, R.; BOSCH-REIG, F. Sugar profiles of Spanish unifloral honeys. **Food Chemistry**, v. 60, n. 1, p. 33–41, set. 1997.

MENDES, C. D. G. et al. As análises de mel: revisão. **Revista Caatinga**, v. 22, n. 2, p. 7–14, 2009.

MERCOSUL. Regulamento Técnico MERCOSUL “Identidade e Qualidade do Mel”. MERCOSUL/GMC/RES. N° 89/99. p. 1–6, 1999.

MOREIRA, R. F. A. et al. Chemical changes in the volatile fractions of Brazilian honeys during

storage under tropical conditions. **Food Chemistry**, v. 121, n. 3, p. 697–704, ago. 2010.

NAYIK, G. A.; DAR, B. N.; NANDA, V. Physico-chemical, rheological and sugar profile of different unifloral honeys from Kashmir valley of India. **Arabian Journal of Chemistry**, ago. 2015.

PASCUAL-MATÉ, A. et al. Sugar composition and sugar-related parameters of honeys from the northern Iberian Plateau. **Journal of Food Composition and Analysis**, v. 74, p. 34–43, 2018.

PITA-CALVO, C.; VÁZQUEZ, M. Differences between honeydew and blossom honeys: a review. **Trends in Food Science & Technology**, v. 59, p. 79–87, jan. 2017.

SAKAČ, N.; SAK-BOSNAR, M. A rapid method for the determination of honey diastase activity. **Talanta**, v. 93, p. 135–138, maio 2012.

SANTOS, D. C.; OLIVEIRA, E. N. A. Características físico-químicas e microbiológicas de méis de *Apis mellifera* L. provenientes de diferentes entrepostos. **Comunicata Scientiae**, v. 4, n. 1, p. 67–74, 2013.

SAXENA, S.; GAUTAM, S.; SHARMA, A. Physical, biochemical and antioxidant properties of some Indian honeys. **Food Chemistry**, v. 118, n. 2, p. 391–397, jan. 2010.

SCHLABITZ, C.; DA SILVA, S. A. F.; DE SOUZA, C. F. V. Avaliação de paraâmetros físico-químicos microbiológicos em mel. **Revista Brasileira de Tecnologia Agroindustrial**, v. 4, n. 1, p. 80–90, 9 jul. 2010.

SERAGLIO, S. K. T. et al. An overview of physicochemical characteristics and health-promoting properties of honeydew honey. **Food Research International**, v. 119, p. 44–66, maio 2019.

SHAPLA, U. M. et al. 5-Hydroxymethylfurfural (HMF) levels in honey and other food products: effects on bees and human health. **Chemistry Central Journal**, v. 12, n. 1, p. 1–18, 2018.

SILVA, K. D. F. N. L. et al. Características físico-químicas de mel produzido em Limoeiro do Norte durante o armazenamento. **Revista Caatinga**, v. 22, n. 4, p. 246–254, 2009.

SOBRINO-GREGORIO, L. et al. Monitoring honey adulteration with sugar syrups using an automatic pulse voltammetric electronic tongue. **Food Control**, v. 91, p. 254–260, set. 2018.

TERRAB, A.; DIEZ, M. J.; HEREDIA, F. J. Palynological, physico-chemical and colour characterization of Moroccan honeys: I. River red gum (*Eucalyptus camaldulensis* Dehnh) honey. **International Journal of Food Science and Technology**, v. 38, n. 4, p. 379–386, abr. 2003.

TORNUK, F. et al. Quality characterization of artisanal and retail Turkish blossom honeys: determination of physicochemical, microbiological, bioactive properties and aroma profile. **Industrial Crops and Products**, v. 46, p. 124–131, abr. 2013.

TOSI, E. et al. Honey diastase activity modified by heating. **Food Chemistry**, v. 106, n. 3, p. 883–887, fev. 2008.

VENIR, E.; SPAZIANI, M.; MALTINI, E. Crystallization in “Tarassaco” Italian honey studied by DSC. **Food Chemistry**, v. 122, n. 2, p. 410–415, set. 2010.

WU, L. et al. Recent advancements in detecting sugar-based adulterants in honey – A challenge. **TrAC Trends in Analytical Chemistry**, v. 86, p. 25–38, jan. 2017.

YÜCEL, Y.; SULTANOGLU, P. Characterization of honeys from Hatay Region by their physicochemical properties combined with chemometrics. **Food Bioscience**, v. 1, p. 16–25, mar. 2013.

ZÁBRODSKÁ, B.; VORLOVÁ, L. Adulteration of honey and available methods for detection – a review. **Acta Veterinaria Brno**, v. 83, n. 10, p. S85–S102, 2014.

CAPITULO 48: PREVALÊNCIA DE *Listeria* spp. E *Listeria monocytogenes* EM QUEIJO ARTESANAL DO MEIO-OESTE CATARINENSE

CHAPTER 48: PREVALENCE OF *Listeria* spp. AND *Listeria monocytogenes* IN ARTISANAL CHEESE FROM SANTA CATARINA MIDWEST

Bruna Marchesan Maran¹; Thalia Indara Balsan²; Nei Fronza³; Silvani Verruck⁴; Sheila Mello da Silveira⁵

Resumo

A ocorrência de doenças veiculadas por alimentos é cada vez mais frequente, atingindo um número crescente de indivíduos. Os surtos ocasionados por *Listeria monocytogenes* têm sido associados a uma ampla gama de produtos alimentícios incluindo derivados lácteos. Muitas especialidades regionais de queijo são fabricadas a partir de leite cru nas propriedades rurais, empregando barreiras tecnológicas numa base empírica, podendo representar risco à segurança do consumidor se patógenos estiverem presentes. O objetivo deste trabalho foi determinar a prevalência de *Listeria* spp. e *L. monocytogenes* isoladas de amostras de queijo artesanal coletados no município de Seara, Estado de Santa Catarina, Brasil. Foram analisadas 8 amostras de queijo artesanal, sendo realizadas as etapas de enriquecimento primário e secundário, seguidas do plaqueamento em meios de cultura seletivos. As colônias suspeitas de *Listeria* spp. ou *L. monocytogenes* foram testadas quanto às características fenotípicas de crescimento em Agar Listeria segundo Ottaviani e Agosti, hemólise, utilização de carboidratos, reação da catalase, coloração de Gram, teste VM-VP, redução de nitrito e motilidade. Nenhuma amostra apresentou presença do patógeno *L. monocytogenes*, mas houve presença do gênero *Listeria* spp. em quatro amostras de queijo artesanal, fazendo-se necessário o contínuo monitoramento do rebanho e da qualidade microbiológica do alimento.

Palavras-Chave: queijo artesanal, leite cru, listeriose.

Abstract

The occurrence of foodborne diseases is more and more frequent, affecting an increasing number of individuals. Outbreaks caused by *Listeria monocytogenes* have been associated with a wide range of food products including dairy products. Many regional cheese specialties are made from raw milk on rural properties, employing technological barriers on an empirical basis, which can pose a threat to consumer safety when transmitting pathogens. Therefore, the objective of this study was to determine the prevalence of *Listeria* spp. and *L. monocytogenes* isolated from artisanal cheese samples collected in the municipality of Seara, State of Santa Catarina, Brazil. Eight artisanal cheese samples were analyzed, with the primary and secondary enrichment stages being performed, followed by plating in selective culture media. The suspected colonies of *Listeria* spp. or *L. monocytogenes* were tested for phenotypic growth characteristics on Agar Listeria according to Ottaviani and Agosti, haemolysis, use of carbohydrates, catalase reaction, Gram coloring, VM-VP test, nitrite reduction, and motility. No sample had the presence of the pathogen *L. monocytogenes*, but there was the presence of the genus *Listeria* spp. in four samples of artisanal cheese, making it necessary to monitor the herd and the microbiological quality of the food continuously.

¹ Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina, bruna.maran@gmail.com

² Engenharia de Alimentos, Instituto Federal Catarinense - Campus Concórdia, thalia.balsan@gmail.com

³ Prof. Dr., Instituto Federal Catarinense - Campus Concórdia, nei.fronza@ifc.edu.br

⁴ Profa. Dra., Universidade Federal de Santa Catarina, silvani.verruck@ufsc.br

⁵ Profa. Dra., Instituto Federal Catarinense - Campus Concórdia, sheila.silveira@ifc.edu.br

Keywords: artisanal cheese, raw milk, listeriosis.

Introdução

Doenças veiculadas por alimentos (DVA's) são doenças ocasionadas pela ingestão de alimentos contaminados por bactérias, vírus, parasitas infecciosos, fungos, entre outros (HOFFMANN; SCALLAN, 2017). Dentre os microrganismos considerados patógenos de origem alimentar, podemos citar: *Salmonella* spp., *Campylobacter* spp., *Escherichia coli*, *Listeria monocytogenes*, *Yersinia enterocolitica*, *Staphylococcus* spp., *Clostridium perfringens*, entre outros, os quais são responsáveis por parte das morbidades e mortalidades, resultando em danos significativos ao desenvolvimento socioeconômico em todo o mundo (OMS, 2015; WIWANITKIT, 2018).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2010 ocorreram 600 milhões de casos e cerca de 420 mil mortes causadas por doenças veiculadas por alimentos no mundo, tomando como base 31 agentes de risco de contaminação (OMS, 2015). Já nos Estados Unidos, conforme relatório realizado em dez Estados do País pela *The Foodborne Diseases Active Surveillance Network*, no ano de 2019 ocorreram 25.866 infecções e 122 mortes provenientes de doenças veiculadas por alimentos. Destes casos, os ocasionados por contaminação por *Listeria monocytogenes* foram 134 infecções, com índice de hospitalizações de 98% e taxa de letalidade de 16%, podendo ser considerada um constante problema de saúde pública devido principalmente a sua alta mortalidade (CDC, 2020).

Listeria spp. são bactérias Gram-positivas em forma de bastonete curto ou cocobacilo, não esporuladas e que podem ser aeróbicas ou anaeróbicas facultativas. Dentre as 10 espécies do gênero *Listeria*, pode-se destacar a *L. monocytogenes* como espécie patogênica para os seres humanos (THAKUR; ASRANI; PATIAL, 2018). Essas são anaeróbias facultativas, fermentadoras de glicose sem produção de gás e têm crescimento ideal a 37°C, mas são capazes de crescer em uma ampla faixa de temperatura entre 0 e 45°C. Possui resistência ao cloreto de sódio e cresce em pH entre 4,6 a 9,2 (REES; DOYLE; TAYLOR, 2017). Outras características que podem diferenciá-la de outros microrganismos estão apresentadas na Tabela 1, as quais fazem parte dos testes bioquímicos realizados para identificação de *L. monocytogenes* (RYSER; DONNELLY, 2015).

Tabela 1. Características de *Listeria monocytogenes*

Característica	Resultado
Motilidade guarda-chuva	+
Produção de catalase	+
β -Hemolise	+
L- Ramnose	+
D-Xilose	-
Oxidase	-

Fonte: Adaptado de Ryser, Donnelly (2015).

A espécie *Listeria monocytogenes* é causadora de dois tipos de listeriose em seres humanos, a do tipo invasiva e a não invasiva. A listeriose não invasiva ou gastrointestinal não é diagnosticada com frequência e ocorre geralmente em adultos saudáveis, provocando febre e diarreia. Já a listeriose invasiva ocorre geralmente em pessoas mais suscetíveis como neonatos, gestantes, indivíduos com 65 anos ou mais e indivíduos imunocomprometidos, atuando em cada grupo de pessoas de maneira distinta (DESAI; TRIMBLE, 2019).

O patógeno causador de listeriose pode ser isolado de fontes ambientais como solo e água, trato gastrointestinal de bovinos, coelhos, peixes, aves, humanos e outros, além de diversos alimentos tais como leite cru, carne crua, queijos moles, peixes, aves, frutos do mar, frutas, vegetais e outros produtos minimamente processados ou prontos para o consumo. Essa contaminação em alimentos pode ser resultado de possíveis más condições de manuseio e processamento do alimento, uma vez que o patógeno pode resistir a temperaturas de congelamento e falhas na pasteurização (THAKUR; ASRANI; PATIAL, 2018).

Como a *L. monocytogenes* está presente no solo, pastagens e água, as fazendas de gado leiteiro tornam-se um ambiente natural para esta bactéria que, por consequência, pode estar presente no trato gastrointestinal dos animais. Dessa forma, para evitar a contaminação cruzada entre o ambiente do rebanho e a sala de ordenha para o leite cru, é necessária a implantação de medidas para impedir a colonização do ambiente de obtenção e processamento de leites e derivados e impedir a contaminação pós-processamento de produtos lácteos (FOX; JIANG; GOBIUS, 2018).

Em alguns países da América Latina há muitos queijos produzidos de maneira artesanal que são geralmente fabricados em instalações pequenas próximas da fazenda e que, muitas vezes, carecem de medidas de higienizações eficazes e do controle microbiológico do leite utilizado na produção de derivados (BARRÍA *et al.*, 2020). Devido a esses e outros fatores, muitos queijos de curta maturação de origem latino-americana estão associados a surtos de origem alimentar (GÉRARD *et al.*, 2020). No Brasil, não há relatos de surtos de listeriose

humana provocados por alimentos, no entanto os casos ocorridos no país ainda são subdiagnosticados e subnotificados (BARANCELLI *et al.*, 2014).

O setor de laticínios tem grande importância econômica no Brasil, sendo que em 2014 foram produzidos 1.032.000 toneladas de queijo baseada principalmente em pequenas e médias indústrias (CRUZ *et al.*, 2016; OXARAN *et al.*, 2017). Porém, o processo de produção de queijo é bastante diversificado e, além da produção industrial, há também a produção de forma artesanal que, por sua vez, pode apresentar-se como a principal fonte de renda de pequenos produtores rurais (CORREIA; ASSIS, 2017).

Os queijos artesanais brasileiros são aqueles elaborados por métodos tradicionais que possuem vinculação e valorização territorial, regional ou cultural e que respeitam os protocolos de elaboração estabelecidos para cada variedade (BRASIL, 2019). Existem muitas variedades de queijos tradicionais de cada região tais como o queijo Marajó produzido na ilha do Marajó no norte do País, os queijos requeijão e manteiga do nordeste, Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Serro e Triângulo Mineiro tradicionais do Estado de Minas Gerais e queijo Serrano e colonial característicos do Sul do Brasil (KAMIMURA *et al.*, 2019).

No Estado de Santa Catarina, a produção de queijo artesanal, conforme o censo agrícola brasileiro de 2017, foi estimada em 8.210 toneladas por ano (CARVALHO *et al.*, 2019). E, em 2019, o Decreto nº362 regulamentou a Lei nº 17486 de 2018 que dispõe sobre a produção e comercialização de queijos artesanais de leite cru no Estado (SANTA CATARINA, 2018, 2019). O leite cru para elaboração do queijo deve ser recém-ordenhado da própria fazenda ou de outras propriedades próximas, desde que atendam todas as normas técnicas sanitárias, para depois ser beneficiado por meio de métodos tradicionais que mantenham as características históricas-culturais e regionais, utilizando mão de obra predominantemente familiar e respeitando as boas práticas de fabricação com a garantia da segurança alimentar (SANTA CATARINA, 2019). Todavia, os queijos produzidos a partir de leite cru podem apresentar maiores ocorrências de contaminação por *Listeria*, principalmente em produtos com umidade de alta a média, tornando-se um desafio para a segurança de alimentos (SANTOS, 2016). Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi determinar a prevalência de *Listeria* spp. e *Listeria monocytogenes* isoladas de amostras de queijo artesanal coletadas no município de Seara, Santa Catarina.

Material e Métodos

Área de Estudo

As propriedades rurais que participaram do projeto pertencem ao município de Seara pertencente a região do meio oeste de Santa Catarina (Figura 1) e foram definidas em conjunto com a EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) e Crediseara. Para este estudo, foram utilizadas 8 amostras de queijos artesanais. As amostras de queijo artesanal foram coletadas assepticamente em frascos e embalagens estéreis, acondicionadas em caixas isotérmicas e transportadas ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos pela EPAGRI para a realização das análises microbiológicas.

Figura 1. Localização do município de Seara no Estado de Santa Catarina, Brasil.

Fonte: IBGE (2019).

Análise Microbiológica

Pré-enriquecimento das amostras

O pré-enriquecimento da amostra foi realizado utilizando-se caldo UVM de enriquecimento para *Listeria*, incubado a 30 °C por 24 horas. Para o enriquecimento seletivo, a partir do meio de pré-enriquecimento, foi inoculado o caldo Fraser, suplementando-o conforme a indicação do fabricante e também incubado a 30 °C por 24 a 48 horas (BRASIL, 2003).

Identificação

A partir do enriquecimento secundário com o caldo Fraser, inoculou-se, com o auxílio da alça de platina, a superfície dos meios sólidos ágar ALOA sem suplemento, ágar Oxford (AO) e ágar Palcam (AP). Então incubou-se as placas de Petri invertidas a 37°C por 24 e 48 horas. Repetiu-se o procedimento acima do primeiro meio sólido para o segundo meio de

enriquecimento sólido, ALOA, incubando-o as placas invertidas a 37°C por 24h $\pm$ 2h. Para o ágar ALOA, considerou-se como presuntivo positivo para *Listeria monocytogenes* as colônias verde-azuladas cercadas por um halo opaco e *Listeria* spp. positivo as colônias verde-azuladas com ou sem halo opaco (ISO, 2017).

Seleção de colônias para confirmação

Selecionou-se colônias de cada placa presumida como *Listeria monocytogenes* ou *Listeria* spp. estriando-as em placas de ágar nutriente pré-secas permitindo o desenvolvimento de colônias isoladas. Incubou-se as placas a 36°C $\pm$ 1°C por 24h e então realizou-se os testes de confirmação para *Listeria* spp. e *Listeria monocytogenes*. Caso a primeira colônia fosse negativa, utilizou-se até 5 colônias de cada placa de meio seletivo para análise (ISO, 2017).

Teste de hemólise em ágar sangue

Selecionou-se com o auxílio de alça de platina colônias com características morfológicas e fisiológicas indicativas de *Listeria* spp. e também amostra controle de *L. monocytogenes* e inoculou-as em placas com meio ágar-sangue sólido. Incubou-se as placas a 37°C por 24h e logo após examinou-se as cepas de teste e amostras controles de *L. monocytogenes* (ISO, 2017).

Utilização de carboidratos

Para a preparação do caldo de L-Ramnose e D-Xilose preparou-se anteriormente a base e a solução do carboidrato. A base é composta por 10g de digesto enzimático de tecidos animais, 1g de extrato de carne, 5g de cloreto de sódio, 0,02g de púrpura de bromocresol 1000mL de água. Dissolveu-se os componentes em água e corrigiu-se o pH para 6,8 $\pm$ 0,2 a 25°C. Então esterilizou-se em autoclave por 15min a 121°C. Para cada uma das soluções de carboidratos, D-Xilose e L-Ramnose, utilizou-se 100mL de água e 5g de carboidrato, passando-os pela esterilização por filtração em membrana de 0,45 μ m. Então, preparou-se assepticamente os tubos de ensaio com 1mL de solução do carboidrato e 9mL de base (ISO, 2017).

Selecionou-se colônias típicas de *Listeria* spp. a partir do ágar nutriente e inoculou-as em cada um dos caldos, incubando a 37°C por 5 dias. Realizou-se o mesmo procedimento para a amostra controle positiva de *L. monocytogenes*. Para a reação positiva observou-se a formação de ácido indicado pela coloração amarela para ambos os carboidratos (ISO, 2017).

Reação de catalase

Suspendeu-se uma colônia isolada no ágar nutriente em uma gota de solução de peróxido de hidrogênio 3% em uma lâmina. Observou-se a formação ou não formação imediata de bolhas de gás. O aparecimento de bolhas de gás indica uma reação catalase positiva (ISO, 2017).

Coloração de Gram

A técnica de coloração de Gram foi realizada de acordo com a ISO 721. Selecionou-se as colônias obtidas no ágar nutriente e inoculou-se as mesmas em tubos com meio líquido nutritivo não seletivo. Incubou-se a 25°C de 8 a 24h até que o meio ficasse turvo. Com o auxílio de alça de platina previamente esterilizada, obteve-se uma porção do caldo turvo e depositou-se sob uma lâmina limpa. Então, realizou-se, com o auxílio de outra lâmina a 45° sob a primeira, a técnica de esfregaço passando posteriormente pela fixação em chama. Cobriu-se o esfregaço com solução cristal violeta deixando-se agir por 1 min. Passado o tempo, enxaguou-se suavemente a lâmina inclinada com água destilada por alguns segundos. Cobriu-se a lâmina com a solução de iodo e deixou-se agir por 1min para lavar novamente a lâmina inclinada com água destilada por alguns segundos. Despejou-se então suavemente e continuamente uma película de etanol 95% na lâmina inclinada durante 30s. Enxaguou-se suavemente a lâmina inclinada com água para eliminar o etanol, cobriu-se a lâmina com safranina por 40s e enxaguou-se suavemente a lâmina inclinada com água deixando a lâmina secar (ISO, 2019).

Analizou-se a lâmina sob a objetiva de imersão de alta potência de um microscópio onde as células bacterianas que aparecem azul ou violeta são denominadas de Gram-positivas e aquelas que são coradas de rosa escuro a vermelho são denominadas de Gram-negativas (ISO, 2019).

Teste de Vermelho de Metila e Vogues Proskauer (VM-VP)

Usando a alça de platina, inoculou-se o tubo contendo 5mL do meio VMVP previamente estéril e incubou-se a 37°C por 48h. Após a incubação, pipetou-se 1mL do tubo incubado para outro tubo onde adicionou-se 0,6mL de solução de α -naftol a 5% e 0,2mL de solução de hidróxido de potássio a 40%. Agitou-se bem e inclinou-se o tubo deixando agir por 15min a 1h examinando a coloração. Se a coloração do tubo ficasse vermelha forte indicaria que a reação era positiva. *Listeria* spp. é positiva para VP. Caso a coloração permanecesse da cor do reagente (amarelo ou esverdeado) o teste era negativo. Reincubou-se a cultura remanescente no caldo VM-VP por mais 24h e realizou-se o teste VM. Adicionou-se a 2,5mL da cultura cinco gotas

de vermelho de metila e observou-se imediatamente a coloração do meio, que se ficasse vermelha indicaria teste positivo, e se amarela, teste negativo (BRASIL, 2003).

Redução do nitrato

Inoculou-se 5mL de caldo previamente preparado e estéril com uma alçada da cultura a ser analisada e incubou-se a 35°C por 24h. Logo após a incubação, adicionou-se 0,25mL de reagente A (solução 0,8% de ácido sulfúrico) e 0,25mL de reagente B para cada cultura. Em no máximo 10 minutos, observou-se a presença de coloração rósea avermelhada como teste positivo, indicando que o nitrato foi reduzido a nitrito. Diante de resultado negativo, adicionou-se uma pitada de pó de zinco e deixou-se agir por 10 minutos. Então, observou-se se a cor permaneceu inalterada (teste positivo), ou se adquiriu coloração rósea avermelhada, indicando teste negativo para redução de nitrato (BRASIL, 2003).

Motilidade

Com o auxílio de uma agulha de inoculação previamente estéril, selecionou-se uma colônia típica de *Listeria* spp. da placa contendo ágar nutriente e inoculou-a no tubo contendo ágar motilidade previamente preparado e esterilizado. Incubou-se o tubo a 25°C por 48h. Após a inoculação, examinou-se o crescimento em torno do local onde foi inoculada a cultura suspeita e observou-se se ocorreu padrão típico de crescimento semelhante ao de guarda-chuva. Caso o crescimento não fosse suficiente, incubava-se por mais 5 dias, observando novamente após este tempo (ISO, 2017).

Resultados e Discussão

Dentre as oito amostras de queijo artesanal analisadas, apenas quatro apresentaram colônias típicas de *Listeria* spp. e/ou *Listeria monocytogenes* no ágar ALOA, Palcam ou Oxford. Desta forma, as colônias bacterianas suspeitas foram testadas quanto às características fenotípicas de crescimento em ágar ALOA, ágar sangue, utilização de carboidratos, reação da catalase, coloração de Gram, teste VM-VP, redução de nitrito e motilidade com resultados apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Análise das características fenotípicas das colônias suspeitas de *Listeria* spp. e *L. monocytogenes* em queijo artesanal.

Amostra	Ágar de isolamento	ALOA		Hemólise	Xilose	Ramnose	Catalase	Gram	VM	VP	Nitrato	Motilidade
		24h	48h									
CP		+ <i>L. monocytogenes</i>		+	-	+	+	Cocobacilo G+	+	+	-	-
A1	Palcam	+ L. spp.	+ L. spp.	Fraca	+	+	+	Cocobacilo G+	+	-	-	-
A4	Palcam	-	+ L. spp.	-	+	+	+	Cocobacilo G+	+	+	-	-
	ALOA*	-	-	-			+	Cocobacilo G+	-	-	-	-
A5	ALOA*	-	+ L. spp.	-	-	-	+	Cocobacilo G+	-	-	-	-
	Oxford	-	+ L. spp.	-	+	-	+	Cocobacilo G+	-	-	-	-
	Palcam	+ L. spp.	+ L. spp.	Fraca	+	+	+	Cocobacilo G+	+	+	-	-
A7	ALOA*	-	+ L. spp.	-	+	-	+	Cocobacilo G+	-	-	-	-
	Oxford	-	+ L. spp.	-	-	-	+	Cocobacilo G+	-	-	-	-
	Palcam	-	+ L. spp.	-	-	-	+	Cocobacilo G+	-	-	-	-

CP: controle positivo. +L. spp.: positivo para *Listeria* spp.. A1, A4, A5, A7: amostras de queijo colonial. *Ágar base para ALOA sem suplemento.

Para o meio cromogênico, seletivo e diferencial ALOA, foram identificadas no tempo de 24h apenas o crescimento de colônias típicas de *Listeria* spp. em duas amostras (A1 e A5, ambas incubadas inicialmente no meio Palcam). Em 48h apenas a amostra A4 incubada inicialmente com ALOA não apresentou colônias típicas de *Listeria* spp., resultando em presuntivo negativo. Todas as demais amostras de queijo apresentaram-se com colônias típicas de *Listeria* spp. com coloração verde-azulada sem a presença de halo opaco, sendo o controle positivo o único que apresentou a presença de halo opaco circundando as colônias verde-azuladas em 24 e 48h resultando em presuntivo positivo para *L. monocytogenes*. Essa diferenciação e detecção de *Listeria* spp. ocorre pela ação da enzima β -D-glicosidase que atua na clivagem dos conjugados X- β -D-glucosídeo, deixando as colônias com coloração verde-azulada. Porém, *L. monocytogenes* diferencia-se das demais através da atividade de lecitinase pela ação da fosfatidil inositol fosfolipase C (PIPLC). Desta forma, *L. monocytogenes*, além de formar colônias verde-azuladas, hidrolisa o substrato do meio produzindo um halo opaco que circunda as colônias (ISO, 2017). No entanto, mesmo não apresentando colônias características de *L. monocytogenes*, todos os demais testes obrigatórios para *L. monocytogenes* foram realizados a fim de conhecer a ecologia bacteriana presente.

O teste de hemólise em ágar sangue é positivo para *L. monocytogenes* quando as colônias são estreitas, claras e apresentam zonas leves de hemólise (ISO, 2017) como encontrado no controle positivo (CP). Duas amostras de queijo apresentaram hemólise fraca (A1 e A5 com Ágar Palcam). A presença de hemólise é o principal fator de virulência de *L. monocytogenes*, porém *L. seeligeri* e *L. ivanovii* também apresentam atividade hemolítica (RYSER; DONNELLY, 2015) e, desta forma, as amostras que apresentaram hemólise fraca podem ser quaisquer destas espécies. As demais amostras não apresentaram atividade hemolítica, o que indica que essas possivelmente não são colônias de *L. monocytogenes*, mas sim de outras espécies do gênero *Listeria* spp.

O consumo de carboidratos como xilose e ramnose produzindo ácidos modifica o pH do meio e ocorre mudança na coloração do mesmo. O uso ou não desses carboidratos depende da espécie de *Listeria* spp. que está sendo analisada. *Listeria monocytogenes*, por exemplo, é positiva para consumo de L-Ramnose e negativa para D-Xilose (ISO, 2017) e, portanto, analisando os resultados encontrados nenhuma das amostras apresentou teste positivo para *L. monocytogenes*. As colônias isoladas a partir do ágar Palcam das amostras de queijo A1, A4 e A5 apresentaram consumo de xilose e ramnose positivos. De acordo com a ISO 11290 (2017) dentre as espécies do gênero *Listeria* spp., *L. fleischmanii*, *L. rocourtiae* e *L. weihenstephanensis* são capazes de fermentar L-ramnose e D-xilose produzindo ácido e a

espécie *L. welshimeri* é capaz de consumir D-xilose e possui característica de reação variável para o consumo de L-ramnose com produção de ácido. Com isso, as amostras positivas para ambos os carboidratos podem ser quaisquer das espécies citadas acima. Enquanto isso, as colônias isoladas a partir do ágar ALOA e Oxford da amostra A5 apresentaram consumo somente de xilose, característica apresentada pelas espécies *L. ivanovii*, *L. seeligeri* e variável para *L. welshimeri* (ISO, 2017). Já as demais amostras não apresentaram consumo de nenhum dos dois carboidratos, característica identificada como *L. marthii* e variável para *L. innocua* e *L. grayi* (ISO, 2017). Desta forma, as amostras apresentaram-se positivas para *Listeria* spp. mas negativas para *L. monocytogenes*.

A reação da catalase ocorre quando, ao adicionar-se peróxido de hidrogênio (H₂O₂) sobre uma colônia de bactéria, a enzima catalase atua degradando o peróxido de hidrogênio em H₂O e $\frac{1}{2}$ O₂, liberando bolhas de oxigênio (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). O teste de reação da catalase resultou para todas as amostras como catalase positiva, característica de *Listeria* spp. uma vez que estas possuem a enzima catalase (ISO, 2017).

Outra característica que todas as colônias presuntivas de *Listeria* spp. apresentaram foi a forma de cocobacilo Gram-positivo, confirmando a característica da possível presença de *Listeria* spp. nas amostras. Já no teste VM-VP as colônias das amostras A4 e A5 isoladas de ágar Palcam, juntamente com o controle apresentaram resultado positivo tanto para VM quanto para VP, característica apresentada por *Listeria* spp. dentre as quais podemos citar *L. seeligeri*, *L. welshimeri*, *L. grayi* e com característica variável para consumo de glicose mas VP positivo temos *L. monocytogenes*, *L. innocua*, *L. ivanovii* e *L. marthii* que também podem ser uma das espécies detectadas nessa amostras dependendo da combinação dos resultados das demais análises (NÚÑEZ-MONTERO *et al.*, 2018). Porém a amostra A1 apresentou VM positivo e VP negativo, característica que possivelmente possa inferir na presença de *Listeria* spp. uma vez que algumas espécies isoladas recentemente apresentaram resultado VP negativo como *L. rocourtiae*, *L. weihenstephanensis* e *L. fleischmanii* (ISO, 2017; NÚÑEZ-MONTERO *et al.*, 2018). As demais amostras apresentaram-se VM e VP negativos, característica não encontrada nos estudos analisados como característica de *Listeria* spp..

Por sua vez, o teste de redução de nitrato apresenta modificação da coloração do meio para rosa, quando as bactérias não realizam a reação de redução de nitrato à nitrito. Caso as bactérias realizassem essa reação a coloração do meio não sofreria modificação quando adicionado pó de zinco (BRASIL, 2003). As amostras de queijo artesanal apresentaram resultado negativo para todas as colônias isoladas, característica apresentada para as espécies *L. monocytogenes*, *L. innocua*, *L. seeligeri*, *L. ivanovii* e *L. marthii*, podendo ser variável para diferentes cepas de *L. grayi*. Desta forma, as colônias isoladas podem ser quaisquer das espécies

citadas acima, mas não apresentam característica de *L. rocourtiae*, *L. weihenstephanensis* e *L. fleischmanii* uma vez que essas apresentam característica de redução de nitrato positivo (NÚÑEZ-MONTERO *et al.*, 2018).

E por fim, todas as amostras apresentaram teste de motilidade negativo. *Listeria* spp. apresentam característica de crescimento tipo guarda-chuva, no entanto, algumas espécies de *Listeria* isoladas recentemente não apresentam motilidade quando realizada análise no ágar motilidade (ISO, 2017). Sendo assim, mesmo não apresentando crescimento tipo guarda-chuva, as colônias isoladas das amostras de queijo tipo artesanal podem ser do gênero *Listeria* spp.. Isto porque ao analisarmos todos os testes em conjunto encontramos características que confirmam o gênero *Listeria* spp. como os aspectos microscópicos, a reação positiva para catalase, e adicionalmente VP e motilidade positiva ou negativa (ISO, 2017).

A fim de indicarmos a possível espécie de *Listeria* spp. presente em cada amostra de queijo, foram comparados os resultados da Tabela 2 com os descritos no anexo D da ISO 11290-1 de 2017 dos principais testes para identificação de *Listeria* spp.. As possíveis espécies presentes no queijo artesanal podem ser observadas na Tabela 3.

Tabela 3. Possíveis espécies de *Listeria* para cada colônia suspeita isolada de queijo artesanal, com base nas características apresentadas na ISO 11290-1 (2017).

Amostra	Ágar de isolamento	Possível espécie de <i>Listeria</i> spp.
A1	Palcam	Nenhuma espécie característica
A4	Palcam	<i>L. welshimeri</i> , <i>L. fleischmanii</i> , <i>L. rocourtiae</i> ou <i>L. weihenstephanensis</i>
A5	ALOA*	Nenhuma espécie característica
	ALOA*	<i>L. marthii</i> , <i>L. grayi</i> ou <i>L. innocua</i>
	Oxford	<i>L. ivanovii</i> , <i>L. welshimeri</i> ou <i>L. seeligeri</i>
A7	Palcam	Nenhuma espécie característica
	ALOA*	<i>L. ivanovii</i> , <i>L. welshimeri</i> ou <i>L. seeligeri</i>
	Oxford	<i>L. marthii</i> , <i>L. grayi</i> ou <i>L. innocua</i>
	Palcam	<i>L. marthii</i> , <i>L. grayi</i> ou <i>L. innocua</i>

A1, A4, A5, A7: amostras de queijo colonial. *Ágar base para ALOA sem suplemento.

Desta forma, podemos constatar que as quatro amostras de queijo que apresentaram resultados presuntivos para *Listeria* spp. foram confirmadas, apresentando possibilidades de serem diferentes espécies do gênero *Listeria* spp., com exceção da presença de *Listeria monocytogenes*, a qual não apresentou confirmação. Estudos realizados por Barancelli *et al.* (2014) e Oxaran *et al.* (2017), nos estados de São Paulo e Goiás, demonstram a baixa incidência de *L. monocytogenes* em indústrias e produtos lácteos incluindo o leite cru utilizado como matéria prima. A presença de *Listeria* spp. pode estar relacionada não só às condições higiênico-sanitárias do local de produção, mas também à matéria prima utilizada para a produção do alimento (HAMIDIYAN *et al.*, 2018; REES; DOYLE; TAYLOR, 2017), isso

porque a alimentação do gado leiteiro como o consumo de silagens e a contaminação durante a ordenha têm sido consideradas a maior fonte de *Listeria* spp. no leite cru.

Conclusões

Como não houve presença de *L. monocytogenes* em nenhuma das amostras avaliadas, conclui-se que as amostras de queijo artesanal de leite cru analisadas neste estudo não representam risco para a saúde do consumidor, no que concerne à *Listeria monocytogenes*, importante patógeno alimentar. Porém, devido à presença do gênero *Listeria* spp., faz-se importante o constante acompanhamento do rebanho e da produção de queijo artesanal.

Agradecimentos

Agradecemos à Andréia Tecchio, pela disponibilização de recursos do projeto R4D para a aquisição de materiais de laboratório e pela coleta de amostras junto aos produtores. Agradecemos também à Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) pela coleta de amostras e o transporte até o IFC Campus Concórdia e à Cooperativa de Crédito Rural Seara (CrediSeara) pela viabilização da aquisição de materiais de laboratório para a realização das análises.

Referências

BARANCELLI, Giovana V. *et al.* Pulsed-Field Gel Electrophoresis characterization of *Listeria monocytogenes* isolates from cheese manufacturing plants in São Paulo, Brazil. **International Journal of Food Microbiology**, [S. l.], v. 173, p. 21–29, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2013.12.018>

BARRÍA, Carla *et al.* Tracing *Listeria monocytogenes* contamination in artisanal cheese to the processing environments in cheese producers in southern Chile. **Food Microbiology**, [S. l.], v. 90, p. 103499, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.fm.2020.103499>

BRASIL. LEI 13.860, DE 18 DE JULHO DE 2019. Dispõe sobre a elaboração e a comercialização de queijos artesanais e dá outras providências. Brasil: **Diário Oficial da União**, Brasília, 2019.p. 1.

BRASIL. Instrução Normativa n. 62, de 26 de agosto de 2003. Métodos Analíticos Oficiais para Análises Microbiológicas para Controle de Produtos de Origem Animal e Água. **Diário Oficial da União**. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Brasília, DF, 18 set. 2003, Seção 1, p. 14.

CARVALHO, Michelle de Medeiros *et al.* Traditional Colonial-type cheese from the south of Brazil: A case to support the new Brazilian laws for artisanal cheese production from raw milk. **Journal of Dairy Science**, [S. l.], v. 102, n. 11, p. 9711–9720, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.3168/jds.2019-16373>

CORREIA, Vinícius Tadeu da Veiga; ASSIS, Isabella Cristina Lopes de. Queijos artesanais : revisão de literatura. **Revista eletrônica Nutri Time**, [S. l.], v. 14, p. 8001–8008, 2017.

DESAI, Rahat Wadhwa; TRIMBLE, Lisa M. *Listeria monocytogenes*. In: LUI, Dongyou (org.). **Handbook of Foodborne Diseases**. [S. l.]: CRC Press, 2019. p. 195–206. *E-book*.

FOX, Edward M.; JIANG, Yujun; GOBIUS, Kari S. Key pathogenic bacteria associated with dairy foods: On-farm ecology and products associated with foodborne pathogen transmission. **International Dairy Journal**, [S. l.], v. 84, p. 28–35, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2018.03.013>

GÉRARD, Amaury *et al.* Determination of the growth potential of *Listeria monocytogenes* in various types of Belgian artisanal cheeses by challenge tests. **Food Microbiology**, [S. l.], v. 92, p. 103582, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.fm.2020.103582>

HAMIDIYAN, Negar *et al.* **The prevalence of *Listeria* spp. food contamination in Iran: A systematic review and meta-analysis**. [S. l.]: Elsevier Ltd, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2018.02.038>

HOFFMANN, S.; SCALLAN, E. Epidemiology, Cost, and Risk Analysis of Foodborne Disease. In: DODD, Christine E. R. *et al.* (org.). **Foodborne Diseases**. 3. ed. [S. l.]: Elsevier, 2017. p. 31–63. *E-book*. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-385007-2.00002-4>

KAMIMURA, Bruna Akie *et al.* Large-scale mapping of microbial diversity in artisanal Brazilian cheeses. **Food Microbiology**, [S. l.], v. 80, p. 40–49, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.fm.2018.12.014>

NÚÑEZ-MONTERO, Kattia *et al.* *Listeria costaricensis* sp. nov. **International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology**, [S. l.], v. 68, n. 3, p. 844–850, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1099/ijsem.0.002596>

OMS, Organização Mundial da Saúde. **Food-Borne Disease Burden Epidemiology Reference Group**. [S. l.: s. n.]. *E-book*.

OXARAN, Virginie *et al.* *Listeria monocytogenes* incidence changes and diversity in some Brazilian dairy industries and retail products. **Food Microbiology**, [S. l.], v. 68, p. 16–23, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.fm.2017.06.012>

REES, C. E. D.; DOYLE, L.; TAYLOR, C. M. *Listeria monocytogenes*. In: DODD, Christine E. R. *et al.* (org.). **Foodborne Diseases: Third Edition**. 3. ed. [S. l.]: Elsevier Inc., 2017. p. 253–276. *E-book*. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-385007-2.00012-7>

RYSER, Elliot T.; DONNELLY, Catherine W. *Listeria*. In: **Compendium of Methods of the Microbiological Examination of Foods**. [S. l.]: Washington D.C, 2015. p. 425–443. *E-book*.

SANTA CATARINA, Governo do Estado. Lei nº 17486 de 16 de Janeiro de 2018. Dispõe sobre a produção e comercialização de queijos artesanais de leite cru e adota outras providências. Brasil: **Diário Oficial do Estado**, 2018.

SANTA CATARINA, Governo do Estado. **Decreto nº 362 de 21 de novembro de 2019. Regulamenta a Lei nº 17.486, de 2018, que dispõe sobre a produção e comercialização de queijos artesanais de leite cru e adota outras providências**. Brasil: Diário Oficial do Estado, 2019.

SANTOS, Anderson Joaquim Pereira dos. **Efeitos do período de maturação de queijos sobre a microbiota deteriorante e listeria monocytogenes**. 2016. - Universidade de Brasília, [s. l.], 2016.

THAKUR, Meenakshi; ASRANI, Rajesh Kumar; PATIAL, Vikram. Listeria monocytogenes: A Food-Borne Pathogen. *In*: HOLBAN, Alina Maria; GRUMEZESCU, Alexandru Mihai (org.). **Foodborne Diseases**. [S. l.]: Elsevier Inc., 2018. v. 15p. 157–192. *E-book*. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811444-5.00006-3>

TORTORA, Gerard J. ..; FUNKE, Berdell R. ..; CASE, Christie L. Crescimento Microbiano. *In*: TORTORA, Gerard J. ..; FUNKE, Berdell R. ..; CASE, Christie L. (org.). **Microbiologia**. 10. ed. [S. l.]: Artmed, 2012. p. 156–183. *E-book*.

WIWANITKIT, Viroj. Important Emerging and Reemerging Tropical : Food-Borne Diseases. *In*: HOLBAN, Alina Maria; GRUMEZESCU, Alexandru Mihai (org.). **Handbook of Food Bioengineering: FoodBorne Diseases**. [S. l.]: Academic Press, 2018. p. 33–55. *E-book*.

CAPÍTULO 49: QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DO LEITE: *JATROPHA DIOICA* CONTRA BACTERIAS DE MASTITE BOVINA

CHAPTER 49: MICROBIOLOGICAL QUALITY OF MILK: *JATROPHA DIOICA* AGAINST BOVINE MASTITIS BACTERIA

Patrícia da Silva Nascente ¹; Carolina Labrecht Gonçalves ²; Giniani Carla Dors ³; Jesús Jaime Hernandez Escareño ⁴; Rafael Guerra Lund ⁵

Resumo

O leite é um produto altamente perecível e suas características físico-químicas e biológicas se alteram facilmente com a ação de microrganismos. Casos de mastite e má higienização no processo de ordenha possibilitam o aparecimento desses agentes. Como alternativa profilática e terapêutica, as plantas medicinais ganham espaço na medicina veterinária como opção aos tratamentos e prevenções usuais. O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial antibacteriano do extrato alcoólico de *Jatropha dioica* frente a bactérias isoladas de leite de vacas com mastite. Com esse propósito, a suscetibilidade de *Staphylococcus* spp. e *Streptococcus* spp. frente a *J. dioica* foi verificada através da técnica de Microdiluição em Caldo. Observou-se inibição do crescimento dos isolados nas CIM de 28,12 µg.mL⁻¹ a 112,5 µg.mL⁻¹. Estes resultados sugerem potencial antimicrobiano do extrato alcoólico de *J. dioica*, caracterizando-a como promissora no tratamento e prevenção da mastite bovina e contaminação do leite.

Palavras-Chave: Atividade antimicrobiana, Plantas medicinais, Leite bovino, *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.

Abstract

Milk is highly perishable product, and its physicochemical and biological characteristics can change easily with the action of microorganisms. As a prophylactic and therapeutic alternative, medicinal plants are gaining ground in veterinary medicine as an option to the usual prevention and treatments. This study aimed to evaluate the antimicrobial activity of the alcoholic extract of *Jatropha dioica* against bacteria isolated from cow's milk. The susceptibility of the organisms, *Staphylococcus* spp. and *Streptococcus* spp. was verified by the Broth Microdilution technique. There was inhibition of growth compared to all isolates, with a MIC varied from 28,12 µg.mL⁻¹ to 112,5 µg.mL⁻¹. These results suggest an antimicrobial potential of the alcoholic extract *J. dioica*, characterizing it as a promising in the treatment and prevention of bovine mastitis and milk contamination.

Keywords: Antimicrobial activity, Medicinal plants, Bovine milk, *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.

¹Doutora, Universidade Federal de Pelotas, pattsn@gmail.com

²Doutora, Universidade Federal de Pelotas, carolina_lamg@yahoo.com.br

³Doutora, Universidade Federal de Pelotas, dorsgi@yahoo.com.br

⁴Doutor, Universidade Autonoma de Nuevo Leon – Mexico, jjescareno@hotmail.com

⁵Doutor, Universidade Federal de Pelotas, rafael.lund@gmail.com

Introdução

O leite é um dos alimentos mais nobres por ter sua composição rica em proteína, gordura, carboidratos, sais minerais e vitaminas, tendo seu consumo difundido em todo o mundo. Segundo o Art. 475 do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) o 'leite é produto oriundo de ordenha completa e ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas (BRASIL, 1997).

Os parâmetros para avaliação da qualidade do leite são a composição (teores de proteína, gordura, lactose, sais minerais e vitaminas), as características físico-químicas (sabor, odor, cor, acidez, pH, densidade, ponto de congelamento, ponto de ebulição, calor específico, tensão superficial, viscosidade e condutividade elétrica) e a higiene. Esse alimento de grande importância nutricional tem capacidade de promover multiplicação de micro-organismos e se faz necessário e imprescindível o controle e cuidado com a higiene e qualidade do produto, desde a sua produção, transporte e beneficiamento, buscando evitar danos à saúde humana, perdas nos laticínios e inocuidade do produto (GUERREIRO et al., 2005).

A mastite bovina é uma dispendiosa e multifatorial enfermidade que acomete os rebanhos leiteiros em todo o mundo, influenciando diretamente na qualidade e na produção do leite, além de promover a ocorrência de perda por descartes de animais e gastos com o tratamento curativo (HAGNESTAM-NIELSEN et al., 2009; LOPES et al., 2012; LANGONI, 2013; DEMEU et al., 2015).

Com uma conhecida pluralidade etiológica (LANGONI, 2013), a mastite apresenta os gêneros *Staphylococcus* spp. e *Streptococcus* spp. dentre os principais agentes envolvidos com a enfermidade de origem bacteriana (ACOSTA et al., 2016; FREITAS et al., 2018), caracterizando-a como um risco iminente à saúde pública ao se considerar o potencial patogênico destes micro-organismos.

Staphylococcus aureus (coagulase positiva) causa mastite clínica e subclínica em bovinos leiteiros e é um potencial problema de saúde para os seres humanos (EL ASHKER et al., 2015; FREITAS et al., 2018). Ele tem sido relatado como um dos agentes causadores mais relevantes dessa enfermidade por muitos pesquisadores (OLIVEIRA et al., 2010; LOZANO et al., 2016; EL-ASHKER et al., 2020), demonstrando a dificuldade no seu controle. A pele do úbere e tetos são os sítios onde se observa esse agente e o que facilita as infecções (ZANETTE et al., 2010).

Entretanto, *Staphylococcus* spp. coagulase-negativo também é conhecido como patógeno comum envolvido na mastite bovina, porém são primordialmente derivados do ambiente e geralmente são associados a uma infecção moderada (BOGNI et al., 2011).

Streptococcus uberis também é agente causador de mastite em rebanhos leiteiros. É responsável por casos clínicos e subclínicos (HOGAN et al., 1989). Dentro do gênero *Streptococcus*, *Streptococcus uberis* é um patógeno importante na indústria de laticínios (ZADOKS, et al., 2003), visto que é um dos principais agentes causadores da mastite no mundo, incluindo o Brasil (COSTA, et al., 1998). *S. uberis*, assim como *Escherichia coli*, são considerados patógenos ambientais (RADOSTITS et al., 1994). *Streptococcus dysgalactiae* também está entre os mais comuns micro-organismos relacionados a mastites ambientais, que tem como principal reservatório o ambiente onde a vaca vive, não limitando-se apenas a locais onde é realizada a ordenha (SMITH & HOGAN, 1993; OLIVER, 1988; TODHUNTER et al., 1995).

Nos exemplos citados deve-se dar ênfase especial ao caráter zoonótico dos micro-organismos e também a resistência adquirida frequentemente com o tratamento antimicrobiano convencional inadequado, o qual proporciona uma seleção de micro-organismos multirresistentes (FREITAS et al., 2018; EL-ASHKERA et al., 2020; ANTOK et al., 2020) causando também problema em saúde pública (KORB et al., 2011; VASCONCELLOS & ITO, 2011). Segundo Brito et al. (2001), diversos estudos que tratam da suscetibilidade a antimicrobianos de patógenos da mastite bovina no Brasil, apontam para um aumento crescente no padrão de resistência. Embora ela possa ocorrer naturalmente por meio de mutações espontâneas, o uso intensivo de antimicrobianos em humanos e animais acelera o processo (WHO, 2015) e apesar da pressão para reduzir o uso de antimicrobianos em animais produtores de alimentos, os antimicrobianos ainda são importantes para a saúde animal e uma ferramenta ainda usada no controle de mastite (MIDDLETON et al., 2014).

Por outro lado, além do uso de produtos no tratamento da mastite, a desinfecção de tetos antes e após a ordenha é uma prática incorporada na rotina desses animais, como preventivos na contaminação do leite e do úbere (SCHUCH et al., 2008). O uso dos desinfetantes na higienização das salas de ordenha também é de grande importância na fazenda, contribuindo para a produção de alimentos lácteos de qualidade e para a obtenção de um rebanho sadio (FONSECA; SANTOS, 2000).

O termo *pré-dipping* consiste na antissepsia dos tetos antes da ordenha que visa reduzir o número de bactérias neste local que possam contaminar o leite e *pós-dipping* é o termo utilizado para a remoção após a ordenha da película de leite que permanece no teto após a retirada do conjunto de ordenha e auxilia na prevenção de infecções neste canal (SANTOS; FONSECA, 2007). Além disso, as bactérias presente no animal e no canal do teto interferem na qualidade do leite. CBT (Contagem Bacteriana Total) é uma análise indicativa das condições

de higiene, antes, durante e após a ordenha (PEIXOTO et al., 2016), a presença de bactérias no leite vai interferir no rendimento, sabor, odor e vida de prateleira, portanto, é de fundamental importância a refrigeração do leite logo após a ordenha e a agilidade no transporte após a coleta até a indústria de laticínios (SILVA et al., 2012). Dependendo do produto utilizado no pré e pós *dipping*, pode haver a presença de resíduos químicos no leite e assim como a resistência dos micro-organismos aos antibióticos, a resistência frente aos desinfetantes também são relatadas na literatura.

Neste contexto, mais recentemente outras alternativas de prevenção e tratamento (TITZE; KRÖMKER, 2020; VISSIO et al., 2020; CASTELLANI et al., 2019; CHOTIGAPA et al., 2019), como o uso de plantas medicinais, visam contribuir com a necessidade de se desenvolver novos métodos a serem aplicados na medicina veterinária na tentativa de reduzir o impacto e o uso de medicamentos sintéticos, a fim de manter a integridade do animal e do consumidor (GALDINO; DOMINGUES; LAPENNA, 2012).

Pouco descrita na literatura quanto às suas propriedades terapêuticas, *Jatropha dioica* é uma espécie vegetal originária do semiárido mexicano, conhecida na medicina popular mexicana como “Sangre de drago” e utilizada frente a infecções de pele e tecido subcutâneo, além de problemas odontológicos e renais (MANZANERO-MEDINA et al., 2009). Deste modo, o objetivo deste estudo foi avaliar o potencial antibacteriano do extrato alcoólico das raízes da planta *Jatropha dioica*, frente a bactérias isoladas de leite com diagnóstico de mastite.

Material e Métodos

J. dioica

Exemplares da planta *J. dioica* foram coletados em uma região montanhosa da cidade de Monterrey – Estado de Nuevo Leon, México. As plantas foram coletadas em sua totalidade, enroladas em papéis e embaladas em papelão. Uma amostra foi depositada e identificada por um botânico do Herbário da Universidade Federal de Pelotas (Pelotas RS Brasil). A planta foi limpa, separada de acordo com suas respectivas partes vegetais e secos à temperatura ambiente por sete dias.

Foram suspensos 18 g de raízes frescas de *J. dioica* em 200 mL de etanol 70% e a mistura foi deixada em repouso por 24 h, sendo utilizado o sobrenadante para o teste de suscetibilidade antimicrobiana na concentração de 0,09 g.mL⁻¹.

Isolados bacterianos

Para a análise da suscetibilidade bacteriana frente ao extrato foram utilizados oito isolados bacterianos oriundos de diferentes casos de mastite bovina: *Staphylococcus coagulase negativa* (n=3), *Staphylococcus intermedius* (n=2), *Streptococcus uberis* (n=1), *Streptococcus dysgalactiae* (n=1) e *Streptococcus agalactiae* (n=1). Todos os isolados estavam estocados no Laboratório de Micologia e Bioprospecção do Departamento de Microbiologia e Parasitologia do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPeI).

Microdiluição em Caldo

O teste foi realizado por meio da técnica de Microdiluição em Caldo padronizada pelo documento M07-A9 do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2006) adaptada a um fitoterápico. O extrato foi diluído em Muller Hinton para obter dez concentrações sucessivas (1:2) de 450 $\mu\text{g.mL}^{-1}$ a 0,87 $\mu\text{g.mL}^{-1}$.

Os inóculos foram preparados individualmente através da produção de uma suspensão na escala 0,5 de MacFarland, alcançando uma concentração final de 10^6 UFC mL^{-1} e novamente diluídos em meio de cultivo Muller Hinton. Como controle positivo, foi adicionada apenas a suspensão bacteriana de cada espécie e o meio de cultivo Muller Hinton, sendo considerado controle negativo o meio de cultivo e as diluições do extrato etanólico.

As microplacas foram incubadas a 36°C e a leitura da Concentração Inibitória Mínima (CIM) foi realizada após 24h, quando foi comparado o crescimento de cada isolado em relação aos respectivos controles. A CIM foi considerada como a média da menor concentração capaz de inibir totalmente o crescimento bacteriano visualizado em cada duplicata.

Citotoxicidade

O meio de cultura de células utilizado foi Dulbecco (DMEM), suplementado com 10% de soro fetal bovino (FBS), 2% de glutamina, penicilina (100 U mL^{-1}) e estreptomicina (100 mg mL^{-1}). Os fibroblastos de camundongo da linha celular imortalizada 3T3 / NIH foram mantidos como cultura de estoque em DMEM e incubados a 37 °C em uma atmosfera umidificada de 5% de CO_2 no ar, até subconfluência. O ensaio de brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio (MTT) avaliou a função metabólica celular de acordo com a atividade desidrogenase mitocondrial (BEAN et al., 1995). A viabilidade celular foi analisada pelo software de análise estatística SigmaPlot 12 (Systat Software Inc., San Jose CA EUA).

Resultados e Discussão

As CIMs observadas frente aos oito isolados estudados variaram entre 28,12 $\mu\text{g.mL}^{-1}$ a 112,5 $\mu\text{g.mL}^{-1}$. Na Tabela 1 podem-se observar os resultados de acordo com cada isolado bacteriano.

Tabela 1. Concentração Inibitória Mínima (CIM) do extrato alcoólico de *Jatropha dioica* observada frente a diferentes bactérias isoladas de mastite bovina.

Isolado Clínico bacteriano	CIM ($\mu\text{g.mL}^{-1}$)
<i>Staphylococcus intermedius</i>	56,25
<i>Staphylococcus intermedius</i>	56,25
<i>Staphylococcus coagulase negativa</i>	56,25
<i>Staphylococcus coagulase negativa</i>	28,12
<i>Staphylococcus coagulase negativa</i>	28,12
<i>Streptococcus uberis</i>	112,5
<i>Streptococcus dysgalactiae</i>	56,25
<i>Streptococcus agalactiae</i>	56,25

Fonte: Própria (2020).

O extrato alcoólico de *J. dioica* demonstrou atividade antibacteriana *in vitro* frente aos isolados, obtendo-se os menores valores de CIM frente a *Staphylococcus coagulase negativa*, grupo considerado emergente, com crescente envolvimento em casos de mastite (PYÖRÄLÄ; TAPONEN, 2009) e descritos por Timmis e Schultz (1987) como agentes que podem apresentar infecções de longa duração e baixa taxa de cura espontânea. Mais recentemente, em episódio de mastites, *Staphylococcus* spp. são relatados como relevantes devido a sua alta frequência e multirresistencia com capacidade de produção de toxinas. Nesse caso, com a produção de toxina envolve-se em casos de surtos alimentares relacionadas a diferentes espécies dentro do gênero (MARIANO et al., 2007; MEHMETI et al., 2016; ACOSTA et al., 2016).

O *S. uberis* foi considerado o agente menos sensível ao extrato testado, o que pode estar associado a antibioticoterapia inadequada direcionada ao animal da amostra de origem para controlar a enfermidade. De acordo com Bramley e Dodd (1984) esta espécie é considerada como sendo uma das causas mais comuns de novas infecções em vacas secas, sendo de difícil controle na rotina de higienização. No cenário mundial, a frequência desta espécie tende a ser baixa e variável (GIANNECHINI et al., 2002; CALDERON; BI et al., 2016), entretanto, sua importância nos rebanhos pode estar subestimada, uma vez que, se observa na literatura que o diagnóstico etiológico da mastite bovina ocasionada por *Streptococcus* spp., em geral, limita-

se a identificação do gênero, não sendo feita a diferenciação dentre as espécies (SANTOS et al., 2007).

O uso das plantas com finalidade terapêutica no Brasil vem aumentando há alguns anos (NASCIMENTO et al, 2000; DIOGE et al., 2015). Os efeitos de óleos ou dos extratos de plantas sobre as bactérias têm sido estudados por muitos pesquisadores no mundo todo. Entretanto, há necessidade de maior conhecimento e de uso moderado para evitar problemas quanto ao uso prolongado e indiscriminado destes produtos (ALMAGBOUL et al, 1985; DAHANUKAR; KULKARNI; REGE, 2000; IKRAM; INAMUL, 1984; IZZO et al, 1995).

Outros estudos vem sendo desenvolvidos com plantas nativas do Brasil frente a bactérias causadoras de mastite, entre eles, foi estudado óleo de semente de girassol e Castanha do Brasil, também obtendo bons resultados (FREITAS et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2010; BEZERRA et al., 2009; DANTAS et al., 2009; SCHUCH et al., 2008). Esses estudos não tem apenas direcionamento a planta ao tratamento da mastite, mas na eliminação precoce dessas bactérias relacionadas a essa enfermidade quando encontradas no ambiente ou na pele do animal. O uso de produtos naturais no *pré-dipping* têm por objetivo reduzir a carga microbiana presente na pele dos tetos e a obtenção de um produto sem agentes contaminantes.

Quanto a espécie *J. dioica*, não foram encontrados estudos relacionados ao uso no tratamento e prevenção de mastite, entretanto, estudos conduzidos por Silva-Belmares et al. (2014), a partir de diferentes extratos orgânicos de suas raízes, demonstraram atividade frente as bacterias *Bacillus cereus*, *Escherichia coli*, *Salmonella typhi*, *Staphylococcus aureus*, *Enterobacter aerogenes*, *Enterobacter cloacae*, *Salmonella typhimurium* e aos fungos *Cryptococcus neoformans*, *Candida albicans*, *Candida não albicans* e *Sporothrix schenckii* de interesse medico veterinario. Nessa pesquisa, a atividade do extrato hexano de *J. dioica* pode ser atribuída em parte à presença de β -sitosterol, o principal composto identificado por bioautografia.

Oliveira et al. (2013), verificaram a atividade anti-*Candida* do seu extrato, aquoso e etanólico, obtendo inibição da levedura na concentração de $28,1 \mu\text{g.mL}^{-1}$, resultados que sustentam os obtidos no presente estudo. Não-*C. albicans*, o MIC e o MFC foram de $28,12 \mu\text{g.mL}^{-1}$, mas para *Candida famata* e *Candida glabrata* esses valores aumentam para $56,25 \mu\text{g.mL}^{-1}$.

Vargas-Segura et al. (2019) verificaram a atividade bactericida contra *S. mutans* cariogênica ATCC 25175, bem como para a caracterização fitoquímica dessa planta entre outras 14 estudadas e concluindo que extratos selecionados são bons candidatos a serem utilizados no controle de bactérias cariogênicas. Silva-Mares et al. (2013) estudaram a planta mexicana

contra o HSV-1 e HSV-2 e segundo descrevem que o extrato de *J. dioica* não mostrou citotoxicidade nas concentrações utilizadas.

A utilização de extratos vegetais com ação antimicrobiana foi demonstrada com eficiência em testes *in vitro* e *in vivo* na anti-sepsia de tetos antes e após a ordenha, embasando estudos que visam a promoção à integridade do animal e da qualidade do leite a partir de antimicrobianos alternativos (SCHUCH et al., 2008; AVANCINI; WIEST, 2008; FACCIN et al., 2016). Devido as suas características na medicina popular mexicana, *Jatropha* spp. está sendo alvo de estudos por pesquisadores brasileiros devido seu potencial medicinal, o qual pode ser atribuído por seus componentes químicos, com destaque aos alcalóides, triterpenos e esteróides (MARTÍNEZ et al., 2014). No Brasil, observa-se grande variedade de estudos que avaliam diferentes características e comportamentos deste gênero, entre outros, no bioma da Caatinga, semiárido brasileiro (NEVES et al., 2010; NEVES et al., 2011; CHAVES et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2010).

Vários artigos já foram publicados para relatar o uso medicinal não antimicrobiano de *J. dioica* (MARTÍNEZ et al., 2014). CREFAL (1988) cita o uso da planta em doenças como: hemorroidas, úlcera, gastrite, asma, queda de cabelo, manchas em pele, acne, sangramento de gengivas e dor de dente, entre outros. Pérez-Escandón et al. (2003) menciona o uso medicinal e comestível de *J. dioica*. Para o teste de citotoxicidade em relação aos extratos radiculares de *J. dioica*, a CIM de 28,1 $\mu\text{g.mL}^{-1}$ foi a menos citotóxica. Araujo-Espino et al. (2017) observou, em estudo *in vivo*, que *J. dioica* não exerce efeito genotóxico nem citotóxico no sangue periférico quando administrado em altas doses de camundongos.

Outras espécies do gênero *Jatropha* são estudadas quanto as suas propriedades terapêuticas, dentre elas, *J. multifida*, *J. gossypifolia*, *J. isabellei*, às quais estão associadas com a atividades antibacteriana, larvicida, antioxidante, antinociceptiva e anti-inflamatória (RAMPADARATH; PUCHOOA; RANGHOO-SANMUKHIYA, 2014; OKOH et al., 2016; SILVA et al., 2013).

A relevância das pesquisas com produtos naturais e os resultados obtidos com *J. dioica*, justificam novas análises microbiológicas do extrato, incluindo estudos *in vivo*, para seu desenvolvimento como antimicrobiano alternativo.

Conclusões

Foi observado inibição do crescimento dos isolados de *Staphylococcus* spp. e *Streptococcus* spp. nas CIM de 28,12 $\mu\text{g.mL}^{-1}$ a 112,5 $\mu\text{g.mL}^{-1}$, respectivamente. Estes resultados sugerem que o extrato alcoólico da *Jatropha dioica* tem potencial antibacteriano

frente a bactérias causadoras de mastite e assim pode-se considerar a planta *J. dioica* como promissora para o uso na produção de leite, seja no uso para tratamento e prevenção da mastite bovina como na contaminação do leite utilizado para o consumo humano.

Referências

ACOSTA, A. C.; SILVA, L. B. G.; MEDEIROS, E. S.; PINHEIRO-JÚNIOR, J. W.; MOTA, R. A. Mastites em ruminantes no Brasil. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 36, n. 7, p. 565-573, 2016.

ARAUJO-ESPINO, D. I.; ZAMORA-PEREZ, A. L.; ZÚÑIGA-GONZÁLEZ, G. M.; et al. Genotoxic and cytotoxic evaluation of *Jatropha dioica* Sessé ex Cerv. by the micronucleus test in mouse peripheral blood. **Regulatory Toxicology and Pharmacology**: RTP, v. 86, p. 260-264, 2017.

ANTOK, F. I.; MAYRHOFFER, R.; MARBACH, H.; MASENGESHO, J. C.; KEINPRECHT, H.; NYIRIMBUGA, V.; FISCHER, O.; LEPUSCHITZ, S.; RUPPITSCH, W.; EHLING-SCHULZ, M.; FEßLER, A. T.; SCHWARZ, S.; MONECKE, S.; EHRLICH, R.; GRUNERT, T.; SPERGSE, J.; LONCARIC, I. Characterization of Antibiotic and Biocide Resistance Genes and Virulence Factors of Staphylococcus Species Associated with Bovine Mastitis in Rwanda. **Antibiotics**, v.9, n.1, p.1-17, 2020

ALMAGBOUL, A. Z.; BASHIR, A. K.; FAROUK, A.; SALIH A. K. M. Antimicrobial activity of certain Sudanese plants used in folkloric medicine. Screening for antibacterial activity. **Fitoterapia**, v. 56, p. 331-337, 1985.

AVANCINI, C.; WIEST, J. M.; DALL'AGNOL, R.; HAAS, J. S.; VON POSER, G. L. Antimicrobial activity of plants used in the prevention and control of bovine mastitis in Southern Brazil. **Latin American Journal of Pharmacy**, v. 27, n. 6, p. 894-9, 2008.

BI, H.; DUARTE, C. M.; BRITO, M.; VILAS-BOAS, V.; CARDOSO, S.; FREITAS, P. Performance enhanced UV/vis spectroscopic microfluidic sensor for ascorbic acid quantification in human blood. **Biosensors and Bioelectronics**, v. 85, p. 568-572, 2016.

BOGNI, C. E outros. Waragainstmastitis: Current concept son controlling bovine mastitis pathogens. In Science against Microbial Pathogens: Communicafing. **Current Research and Technological Advances**, Ed. World Scientific: Singapore, p. 483–494, 2011.

BEZERRA D. A. C., PEREIRA A. V., LÔBO K. M. S., RODRIGUES O. G., ATHAYDE A. C. R., MOTA R A. et al . Atividade biológica da jurema-preta (*Mimosa tenuiflora* (Wild) Poir.) sobre *Staphylococcus aureus* isolado de casos de mastite bovina. **Revista Brasileira farmacognosia**, v.19, n. 4 p.814-817, 2009.

BRAMLEY, A. J.; DODD, F. H. Reviews of the progress of dairy science: mastitis control–progress and prospects. **Journal of Dairy Research**, v. 51, n. 3, p. 481-512, 1984.

BRASIL, Ministério da Agricultura. Departamento Nacional de Inspeção de Produtos de Origem Animal. **Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem**

Animal – RIISPOA. Aprovado pelo decreto n 30691 de 29 de março de 1952. Alterado pelo Decreto 2244 de 04 de junho de 1997. Brasília – DF. 1997.

BRITO, M.A.V.P.; BRITO, J.R.F.; SILVA, M.A.S.; CARMO, R.A. Concentração mínima inibitória de dez antimicrobianos para amostras de *S. aureus* isoladas de infecção intramamária bovina. **Arquivos Brasileiros de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v.53, n.5, p.10-17, 2001.

CALDERÓN, A.; RODRÍGUEZ, V. C. Prevalencia de mastitis bovina y su etiología infecciosa en sistemas especializados en producción de leche en el altiplano cundiboyacense (Colombia). **Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias**, v. 21, n. 4, p. 582-589, 2008.

CASTELANI, J. R. P.; ARCARO, J. E. P.; BRAGA, A. S.; BOSSO, Q.; MOURA, F.; ESPOSITO, I. P.; SAUTER, M.; CORTEZ, N.; LINCOPAN, N. *Short communication: Activity of nisin, lipid bilayer fragments and cationic nisin-lipid nanoparticles against multidrug-resistant Staphylococcus spp. isolated from bovine mastitis* **Journal of Dairy Science**, v. 102, n. 1, p.678-683, 2019.

CHAVES, L.H.G.; MESQUITA, E.F.; ARAUJO, D.L.; FRANÇA, C.P. Crescimento, distribuição e acúmulo de cobre e zinco em plantas de pinhão-mansão. **Revista Ciência Agronômica**, v. 41, n. 2, p. 167-176, 2010.

CHOTIGAPA, R.; LAMPANG, K. N.; PIKULKAEW, S.; OKONOGI, S.; SILMAN, P.; MEKTRIRAT, R. Antiseptic effect of natural teat dip containing lactic acid against mastitis-causing *Escherichia coli* **Veterinary World** v.12, p. 398-401, 2019.

CLSI. 23 M2a9. **Clinical and Laboratory Standards Institute**. <http://www.microbiolab-bg.com/CLSI.pdf>, 2006.

COSTA, E.O.; RIBEIRO, A.R.; WATANABE, E.T.; MELVILLE, P.A. Infectious bovine mastitis caused by environmental organisms. **Zentralbl Veterinarmed** v.45, p. 65–71, 1998.

CREFAL. **Manual de Homeopatía**. Cuaderno de trabajo No. 9. Proyecto Especial OEA-92, Meseta purépecha, coedición Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos SARH - Organización de los Estados Americanos OEA – CREFAL, Ciudad de México, México. 1988.

DAHANUKAR, S. A.; KULKARNI, R. A.; REGE, N. N. Pharmacology of medicinal plants and natural products. **The Indian Journal of Pharmacology**, v. 32, p. 81–118, 2000.

DANTAS, S. A. F.; SENA, L. V. T.; MELO, D. J. A.; DUARTE, F. T.; HOLOS, A. S. C.; et al. Avaliação de plantas medicinais no combate a mastite bovina. **Holos**, v. 4, 2009.

DEMEU, F. A.; LOPES, M. A.; ROCHA, C. M. B. M.; COSTA, G. M.; SANTOS, G.; NETO, A. F. Influência da escala de produção no impacto econômico da mastite em rebanhos bovinos leiteiros. **Revista Ceres**, v. 62, n. 2, p. 167-174, 2015.

MARMITT, D.; REMPEL, C.; GOETTERT, M; SILVA, A. Plantas com potencial antibacteriano da relação nacional de plantas medicinais de interesse no sistema único de saúde: revisão sistemática. **Revista de Saúde Pública de Santa Catarina**, v. 8, n. 2, p. 135-152, 2015

MARICATO, E.; SANTOS, P.; BRITO, M. A. V. P.; LANGE, C.; BRITO, J. R. F.; CERQUEIRA, M. M. O. P. *Streptococcus* e gêneros relacionados como agentes etiológicos de mastite bovina. **Acta Scientiae Veterinariae**, v. 35, n. 1, p. 17-27, 2007.

EL-ASHKER, M.; GWIDA, M.; TOMASO, H.; MONECKE, S.; EHRICHT, R.; EL-GOHARY, F.; HOTZEL, H.; *Staphylococci* in cattle and buffalos with mastitis in Dakahlia Governorate, Egypt. **Journal Dairy Science**, v. 98, p. 7450–7459, 2015.

EL-ASHKER, M.; GWIDAB, M.; MONECKE, S.; EL-GOHARY, F.; EHRICHT, D.H., R.; ELSAYED, M.; AKINDUTIF, P.; EL-FATEHB, M.; MAURISCHAT, S. Antimicrobial resistance pattern and virulence profile of *S. aureus* isolated from household cattle and buffalo with mastitis in Egypt. **Veterinary Microbiology**, v. 240, 2020.

FACCIN, A.; SCHUCH, L.F.D.; SCHIAVON, D.B.A.; GONÇALVES, C.L.; MOTA, F. LESSA, L.F. Utilização do extrato hidroalcoólico de *Schinus terebinthifolius* Raddi na antisepsia do teto pré e pós ordenha em bovinos de leite. **Ciência Animal Brasileira**, v. 17, n. 1, p. 90-97, 2016.

FONSECA, L.F.L.; SANTOS, M.V. **Qualidade do leite e controle de mastite**. São Paulo : Lemos Editorial, 2000. 175p.

FREITAS, C.H.; GONCALVES, C.L.; MENDES, J.F.; OTERO, D.M., PEREIRA, D.M.; GONZALEZ, H.L. NASCENTE, P.S. Antimicrobial activity of fixed oil found in Brazil nuts and sunflower seeds against microorganisms isolated from bovine subclinical mastitis. **African Journal of Microbiology Research**. v.10, n.23, p.861-865.

FREITAS, C. H.; MENDES, J. F.; VILLARREAL, P. V.; SANTOS, P. R.; GONÇALVES, C. L.; . GONZALES, H.; NASCENTE, P. S. Identification and antimicrobial susceptibility profile of bacteria causing bovine mastitis from dairy farms in Pelotas, Rio Grande do Sul. **Brazilian Journal of Biology**, v. 78, n. 4, p. 661-666, 2018 .

GALDINO, M. C.; DOMINGUES, P. F.; FERREIRA, B. L. S. A produção de leite orgânico e aspectos de segurança alimentar. **Veterinária e Zootecnia**, p. 490-501, 2012.

GIANNECHINI, R.; CONCHA, C.; RIVERO, R.; DELUCCI, I.; LOPES, J.M. Occurrence of clinical and sub-clinical mastitis in dairy herds in the West Littoral Region in Uruguay. **Acta Veterinaria Scandinavica**, v. 43, n. 4, p. 1-10, 2002.

GUERREIRO, P.K.; MACHADO, M.R.; BRAGA, G.C.; GASPARINO, E.; FRANZENER, A.S.M. Qualidade microbiológica de leite em função de técnicas profiláticas no manejo de produção. **Ciência e Agrotecnologia**. v. 29, n. 1, p. 216 – 222, 2005.

HOGAN, J. S.; SMITH, K. L.; HOBLET, D. H.; TODHUNTER, D. A.; SCHOENBERGER, P. S.; HUESTON, W. D.; PRITCHARD, D. E.; BOWMAN, G. L.; HEIDER, L. E.; BROCKETT, B. L.; CONRAD, H. R. Bacterial counts in bedding materials used on nine commercial dairies. **Journal Dairy Science** v. 72, p. 250–258. 1989b.

IKRAM, M.; INAMUL, H. Screening of medicinal plants for antimicrobial activities. **Fitoterapia**, v. 55, p. 62-64, 1984.

IZZO, A. A.; BISCARDI, C. D.; FUSCO, G.; MASCOLO, D.; BORRELI, R.; CAPASSO, N.; FASULO, F.; AUTORE, F. Biological screening of Italian medicinal plants for antibacterial activity. **Phytother Research** v. 9, p. 281-286, 1995.

KORB, A.; BRAMBILLA, D. K.; TEIXEIRA, D. C.; RODRIGUES, R. M. Riscos para a saúde humana do uso de antibióticos na cadeia produtiva leiteira. **Revista de Saúde Pública de Santa Catarina**, v. 4, n. 1, p. 21-36, 2011.

LANGONI, H. Qualidade do leite: utopia sem um programa sério de monitoramento da ocorrência de mastite bovina. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 33, n. 5, p. 620-626, 2013.

LOPES, M. A.; DEMEU, F. A.; DA ROCHA, C. M. B. M.; DA COSTA, G. M.; FRANCO NETO, A.; DOS SANTOS, G. Avaliação do impacto econômico da mastite em rebanhos bovinos leiteiros. **Arquivos do Instituto Biológico**, v. 79, n. 4, p. 477-483, 2012.

LOZANO, C.; GHARSA, H.; BEN SLAMA, K.; ZARAZAGA, M.; TORRES, C.; *Staphylococcus aureus* in animals and food: methicillin resistance, prevalence, and population structure. A review in the African continent. **Microorganisms**, v. 4, p. 12, 2016.

MANZANERO-MEDINA, G. I.; FLORES-MARTÍNEZ, A.; SANDOVALZAPOTITLA, E.; BYE-BOETTLER, R. Etnobotánica de siete raíces medicinales en el Mercado de Sonora de la ciudad de México. **Polibotánica**, n. 27, p. 191-228, 2009.

MARIANO, F. A., FOLLY, M.M., TEIXEIRA, G.N., CARMO, L.S.; VIEIRA-DA-MOTTA, O. Produção de enterotoxinas por *Staphylococcus* isolados de leite de cabras do estado do Rio de Janeiro. **Revista Brasileira de Ciência Veterinária**, v. 14, n. 2, 2007.

MARTÍNEZ, N.; ALMAGUER, G.; VÁZQUEZ-ALVARADO, P.; FIGUEROA, A.; ZÚÑIGA, C.; HERNÁNDEZ-CERUELOS, A. Análisis fitoquímico de *Jatropha dioica* y determinación de su efecto antioxidante y quimioprotector sobre el potencial genotóxico de ciclofosfamida, daunorrubicina y metilmetanosulfonato evaluado mediante el ensayo cometa. **Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas**, v. 13, n. 5, p. 437-457, 2014.

MEHMETI, I.; BEHLULI, B.; MESTANI, M.; ADEMI, A.; NES, I. F.; DIEP, D. B. Antimicrobial resistance levels amongst staphylococci isolated from clinical cases of bovine mastitis in Kosovo. **Journal Infect Dev Ctries**, v. 10, n.10, p. 1081-1087, 2016.

MIDDLETON, J. R.; SAEMAN, A.; FOX, L. K.; LOMBARD, J.; HOGAN, J. S.; SMITH, K. L. The National Mastitis Council: a global organization for mastitis control and milk quality, 50 years and beyond. **J. Mammary Gland Biology Neoplasia**, v.19, p.241–251, 2014.

NEVES, E. L.; FUNCH, L. S.; VIANA, B. F. Comportamento fenológico de três espécies de *Jatropha* (Euphorbiaceae) da Caatinga, semi-árido do Brasil. **Brazilian Journal of Botany**, v. 33, n. 1, p. 155-166, 2010.

NEVES, E. L. das; MACHADO, I. C.; VIANA, B. F. Sistemas de polinização e de reprodução de três espécies de *Jatropha* (Euphorbiaceae) na Caatinga, semi-árido do Brasil. **Brazilian Journal of Botany**, v. 34, n. 4, p. 553-563, 2011.

NASCIMENTO, G.G.F.; LOCATELLI, J.; FREITAS, P.C.; SILVA, G.L. Antibacterial activity of plant extracts and phytochemicals on antibiotic resistant bacteria **Brazilian Journal of Microbiology**, v.31, p.247-256, 2000.

NEVES, E. L. das; FUNCH, L. S.; VIANA, B. F. Comportamento fenológico de três espécies de *Jatropha* (Euphorbiaceae) da Caatinga, semi-árido do Brasil. **Brazilian Journal of Botany**, v. 33, n. 1, p. 155-166, 2010.

NEVES, E. L. das; MACHADO, I. C.; VIANA, B. F. Sistemas de polinização e de reprodução de três espécies de *Jatropha* (Euphorbiaceae) na Caatinga, semi-árido do Brasil. **Brazilian Journal of Botany**, v. 34, n. 4, p. 553-563, 2011.

OKOH, S.O., IWERIEBOR, B.C., OKOH, O.O., NWODO, U.U., OKOH, A.I. Antibacterial and Antioxidant Properties of the Leaves and Stem Essential Oils of *Jatropha gossypifolia* L. **Biomed Research International** v.2016, p.1-9, 2016.

OLIVEIRA S. G. D.; NASCENTE P. S.; ESCAREÑO J. J. H.; CARVALHO R. V.; PIVA E.; LUND, R. G. Evaluation of anti-Candida activity and cytotoxicity of *Jatropha dioica* Cerv. extracts. **African Journal of Microbiology Research**, v. 7, n. 30, p. 3903-3907, 2013.

OLIVEIRA F.C.S., BARROS R.F.M., MOITA NETO J.M.. Plantas medicinais utilizadas em comunidades rurais de Oeiras, semiárido piauiense. **Revista Brasileira Plantas Medicinai**s, v.12, n.3, p.282-301, 2010.

OLIVER, S.P. Frequency of isolation of environmental mastitis-causing pathogens and incidence of new intramammary infection during the nonlactating period. **American Journal Veterinary Research**. v.49, p.1789-1793, 1988.

PEREZ-ESCANDON, B.E., VILLAVICENCIO-NIETO, M.A., RAMIREZ-AGUIRRE, A. **Lista de las plantas útiles del estado de Hidalgo** Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Centro de Investigaciones Biológicas 133 p., 2003.

PEIXOTO, A.L.P.; SILVA, M.A.; MORAIS, L.A.M.; SILVA F.R.; CARMO R.M.; LAGE, M.E. Influência do tipo de ordenha e do armazenamento do leite sobre a composição química, contagem de células somáticas e contagem bacteriana total. **Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes**, v. 71, n. 1, p. 10-18, 2016.

PYÖRÄLÄ, S.; TAPONEN, S. Coagulase-negative staphylococci—Emerging mastitis pathogens. **Veterinary microbiology**, v. 134, n. 1-2, p. 3-8, 2009.

RADOSTITS, O. M.; Leslie, K. E.; Fetrow, J. **HerdHealth: Food Animal Production Medicine**. 2nd ed. W.B. Saunders Company, Philadelphia, PA. 1994.

RAMPADARATH, S.; PUCHOOA, D.; RANGHOO-SANMUKHIYA, V. M. A comparison of polyphenolic content, antioxidant activity and insecticidal properties of *Jatropha* species and wild *Ricinus communis* L. found in Mauritius. **Asian Pacific journal of tropical medicine**, v. 7, p. S384-S390, 2014.

SANTOS M. V.; FONSECA L. F. L. **Estratégias para Controle de Mastite e Melhoria da Qualidade do Leite**. Editora Manole, Barueri. 314p. 2007.

SANTOS, E.M.P.; BRITO, M.A.V.P.; LANGE, C.; BRITO, J.R.F.; CERQUEIRA, M.M.O.P. *Streptococcus* e gêneros relacionados como agentes etiológicos de mastite bovina **Acta Scientiae Veterinariae**. v.35, n.1, p.17-27, 2007.

SCHUCH, L. F. D.; WIEST, J. M.; COIMBRA, H. S.; PRESTES, L. S.; De TONI, L.; LEMOS, J. S. Cinética da atividade antibacteriana in vitro de extratos naturais frente a microrganismos relacionados à mastite bovina. **Ciência Animal Brasileira**, v. 9, n. 1, p. 161-169, 2008.

SILVA, N. M. A.; BASTOS, L.P.F.; OLIVEIRA, D.L.S.; OLIVEIRA, M.C.P.P.; FONSECA, L.M. Influence of somatic cell count and total bacterial counts of raw milk in cheese yield using small-scale methodology. **Arquivos Brasileiros de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 64, n. 5, p. 1367- 1372, 2012.

SILVA, C. R.; FRÖHLICH, J. K.; OLIVEIRA, S. M.; CABREIRA, T. N.; ROSSATO, M. F.; TREVISAN, G.; FROEDER, A. L.; BOCHI, G. V.; MORESCO, R. N.; ATHAYDE, M. L. The antinociceptive and anti-inflammatory effects of the crude extract of *Jatropha isabellei* in a rat gout model. **Journal Ethnopharmacology** v. 145, p. 205–213, 2013.

SILVA-BELMARES, Y.; RIVAS-MORALES, C.; VIVEROS-VALDEZ, E.; de la CRUZ-GALICIA, M. G.; CARRANZA-ROSALES, P. Antimicrobial and cytotoxic activities from *Jatropha dioica* roots. **Pakistan Journal Biology Science**, v. 17, n.5, p. 748-750, 2014.

SILVA-MARES, D.; TORRES-LÓPEZ, E.; RIVAS-ESTILLA, A. M.; CORDERO-PÉREZ, P.; WAKSMAN-MINSKY, N.; RIVAS-GALINDO, V. M. Plants from northeast Mexico with anti-HSV activity. **Natural Products Communications**, v. 8, n.3, p. 297-298, 2013.

SMITH, K.L.; HOGAN, J.S. Environmental mastitis. **Veterinary Clinical North American Food Animal Practice** v.9, p.489–98, 1993.

TIMMIS, L.L.; SCHULTZ, L.H. Dynamics and significance of coagulase-negative *staphylococcal* intramammary infections. **Journal Dairy Science** v.70, p.2648 -2657, 1987.

TITZE, I.; KRÖMKER, V. Antimicrobial Activity of a Phage Mixture and a Lactic Acid Bacterium against *Staphylococcus aureus* from Bovine Mastitis. **Veterinary Science** v. 7, p. 31, 2020.

VARGAS-SEGURA, A. I.; SILVA-BELMARES, S. Y.; SEGURA-CENICEROS, E. P.; ASCACIO-VALDÉS, J. A.; MÉNDEZ-GONZÁLEZ, L.; ILYINA, A. Screening and characterization of medicinal plants extracts with bactericidal activity against *Streptococcus mutans* **Natural Prod. Research** v.8, p. 1-5.

VASCONCELLOS, S. A.; ITO, F. H. Principais zoonoses transmitidas pelo leite. Atualização. **Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP**, v. 9, n. 1, p. 32-37, 2011.

VISSIO, C.; MELLA, A.; AMESTICA, L.; PO M. Noninferiority study evaluating the efficacy of a teat disinfectant containing copper and zinc for prevention of naturally occurring intramammary infections in an automatic milking system. **Journal Dairy Science** v. 103, p. 1776–1784, 2020.

ZADOKS, R. N. GILLESPIE, B., BARKEMA, H., SAMPIMON, O., OLIVER, S., & SCHUKKEN, Y. Clinical, epidemiological and molecular characteristics of *Streptococcus uberis* infections in dairy herds. **Epidemiology & Infection**, v. 130, n. 2, p. 335-349, 2003.

ZANETTE, E.; SCAPIN, D.; ROSSI, E.M. Suscetibilidade antimicrobiana de *Staphylococcus aureus* isolados de amostras de leite de bovinos com suspeita de mastite. **UNOESC & Ciência ACBS**, v. 1, n. 1, p. 65-70, 2010

WHO – Word Health Statistics, 2015.

CAPÍTULO 50: QUALIDADE DE MÉIS COMERCIALIZADOS EM FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA.

CHAPTER 50: QUALITY OF HONEY COMMERCIALIZED IN FREE FAIRS IN THE MUNICIPALITY OF BARREIRAS-BA.

Luana Regina Pereira Alves ¹; Camila Filgueira de Souza ²; Ana Célia Barreto de Araújo Santana³, Fabrício Luiz Tulini ⁴; Ítalo Abreu Lima⁵

Resumo

O consumo de mel tem aumentado significativamente nos últimos anos em todo o mundo, nesse sentido objetivou-se avaliar a qualidade físico-química de méis, comercializados nas três feiras livres de Barreiras-BA. Foram coletadas cinco amostras em barracas/boxes diferentes, denominadas de M1, M2, M3, M4 e M5. Analisou-se umidade, pH, cinzas, atividade de água, acidez titulável, viscosidade e reação de lugol. Houve efeito significativo ($P < 0,05$) para o pH, os valores variaram entre 3,37 e 4,09. Houve efeito significativo ($P < 0,05$) entre as amostras para acidez e umidade, estando em conformidade com a Legislação. Para atividade de água não houve diferença significativa ($P > 0,05$). As cinzas variaram de 0,015 a 0,198%, obedecendo a legislação brasileira que preconiza um valor máximo de 0,6%. Para a análise de viscosidade, houve diferença significativa entre as amostras ($P < 0,05$), sendo que os valores encontrados no decorrer do estudo variaram entre 540 a 4980 cP. As amostras M3, M4 e M5 apresentaram resultado positivo para o teste de lugol. É importante ressaltar que, por se tratar de méis adquiridos em feiras livres, não inspecionados pelos órgãos competentes, os consumidores estão sujeitos a aquisição de produtos fraudados que podem oferecer riscos à saúde.

Palavras-Chave: Mel, Adulteração, Fiscalização.

Abstract

Honey consumption has increased significantly in recent years worldwide. In this sense, the objective was to evaluate the physicochemical quality of honeys, sold in the three open markets in Barreiras-BA. Five samples were collected in different tents / boxes, named M1, M2, M3, M4 and M5. Moisture, pH, ash, water activity, titratable acidity, viscosity and lugol reaction were analyzed. There was a significant effect ($P < 0.05$) for the pH, the values varied between 3.37 and 4.09. There was a significant effect ($P < 0.05$) between the samples for acidity and humidity, being in compliance with the legislation. There was no significant difference for water activity ($P > 0.05$). The ashes varied from 0.015 to 0.198%, obeying the Brazilian legislation that recommends the maximum value of 0.6%. For the analysis of viscosity, there was a significant difference between the samples ($P < 0.05$), and the values found during the study ranged from 540 to 4980 cP. Samples M3, M4 and M5 showed a positive result for the lugol test. It is important to note that, as they are honeys purchased at street markets, not inspected by competent bodies, consumers are subject to the purchase of fraudulent products that may represent health risks.

¹ Engenharia de Alimentos, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, *Campus* Barreiras, luanareginaalves@gmail.com

² Engenharia de Alimentos, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, *Campus* Barreiras, souza.cf94@gmail.com

³ Engenharia de Alimentos, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, *Campus* Lauro de Freitas, anabarreto@ifba.edu.br

⁴ Farmácia, Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB, *Campus* Barreiras, fabricao.tulini@ufob.edu.br

⁵ Doutorado, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, *Campus* Barreiras, italoabreu@ifba.edu.br

Keywords: Honey, Tampering, Inspection.

Introdução

A Legislação Brasileira define o mel como “produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas, a partir do néctar das flores ou das secreções procedentes de partes vivas das plantas ou de excreções de insetos sugadores de plantas que ficam sobre partes vivas de plantas, que as abelhas recolhem, transformam, combinam com substâncias específicas próprias, armazenam e deixam maturar nos favos da colmeia” (Brasil, 2000).

A produção de mel é um mercado promissor, o que coloca alguns países no topo dentro desse mercado. A China encabeça a produção de mel natural no mundo, o mel desse País é um dos mais baratos no mercado mundial, o baixo custo de produção faz da China um dos mais competitivos, se não o mais competitivo do mundo no mercado de mel. Em 2017, a China foi responsável por 29,2% de todo o mel produzido no mundo, sendo também o maior exportador mundial e o principal fornecedor para a União Europeia (FAO, 2019).

O segundo maior produtor mundial de mel é a Turquia com 6,2% da produção, porém, este País não possui uma participação expressiva no mercado mundial do produto (FAO, 2019). A Argentina ocupa o terceiro lugar, na qual no ano de 2016 respondeu por 12% do volume total de mel comercializado no mundo, ocupando a posição de segundo maior exportador global de mel em termos de volume e o terceiro em termos de valor.

O Brasil, apesar do vasto potencial para a produção apícola e de ser reconhecidamente um dos países exportadores de mel de alta qualidade, ocupou em 2017 a décima primeira posição na produção mundial de mel e responde por menos de 4,0% das exportações globais do produto. Em 2017, foram produzidas 41,6 mil toneladas de mel no Brasil, dos quais 16,5 mil toneladas no Sul do País (IBGE, 2019).

Como discorre alguns autores, há determinados fatores que podem influenciar na composição do mel, como o tipo de vegetação da região, espécie floral, condições climáticas e raça da abelha (FUJII; RODRIGUES; FERREIRA, 2009; OLIVEIRA; SANTOS, 2011). Dessa forma, o mel é considerado um produto natural, sendo composto por açúcares (monossacarídeo frutose e glicose), ácidos orgânicos, hidrocarboneto aminoácidos, vitaminas do complexo B, vitaminas C, D e E, antioxidantes, água e substâncias que lhe conferem aroma e sabor (BARTH et al., 2005; CODEX STANDARD FOR HONEY, 2010).

Segundo Marchini (2001), o Brasil tem um grande potencial apícola, por sua extensão territorial e pela variabilidade climática existente, possibilitando assim produzir mel o ano todo, o que o diferencia dos demais países que, normalmente, colhem mel uma vez por ano podendo proporcionar milhares de toneladas do saboroso mel, de primeira qualidade, aceito pelo mercado mais exigente do mundo. Os estados da Bahia e Pernambuco ocupam respectivamente o terceiro e quarto lugar, totalizando 29,54% da produção de mel do estado, o Piauí está como o pioneiro do grupo (IBGE, 2011).

Por outro lado, o consumo per capita de mel no Brasil situa-se entre os menores do mundo, em 2017 o consumo de mel no Brasil foi de 0,07kg/pessoa/ano enquanto em países como a Alemanha é superior a 1 kg/pessoa/ano e nos Estados Unidos, que é o principal destino do mel brasileiro, gira em torno de 0,6 kg/pessoa/ano. (VIDAL, 2019)

De acordo com VIDAL (2019), grande parte da população brasileira percebe o mel como um medicamento, sendo um dos principais fatores que explicam o baixo consumo deste produto no país. Assim, o mercado internacional coloca-se como uma alternativa para o produtor brasileiro comercializar a produção. Entretanto, é necessário buscar estratégias para melhor explorar o mercado interno, estudos apontam que o consumidor brasileiro de mel possui poder aquisitivo mais elevado, sendo, portanto, exigente quanto a padrões de higiene, valores nutricionais e praticidade.

O mel é um alimento apreciado por seu sabor característico e pelo seu considerável valor nutritivo, no qual sua oferta é bem menor que a procura, o seu preço é relativamente alto, o que incentiva por muitas vezes a sua adulteração, a qual é geralmente feita através de adição de açúcares comerciais, derivados de cana-de-açúcar e milho (MARQUELE-OLIVEIRA, 2017). Sistemáticamente, apicultores e consumidores têm demonstrado grande preocupação com a qualidade e com constantes adulterações de amostras de méis (ALVES *et al*, 2005).

Os métodos de análises para os parâmetros de qualidade do mel são correspondentes às características físico-químicas e sensoriais aplicadas ao produto com objetivo de identificar as possibilidades de fraudes e falhas no processo de armazenagem ou decorrentes da extração do produto (REZENDE, 2017).

Os requisitos para a qualidade do mel foram estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na instrução normativa nº11, de 20 de outubro de 2000, descrito pelo RTIQ - Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do mel. A instrução do determinado regulamento limita a utilização de açúcares e outras substâncias que possam descaracterizar a composição natural e original do produto. As características sensoriais do mel pode apresentar coloração variável, desde quase incolor à coloração pardo-

escura, e o sabor e aroma devem ser característicos de acordo com sua origem, podendo apresentar variação em sua consistência.

No Brasil, as análises físico-químicas indicadas pela legislação para o controle de qualidade do mel puro são: umidade, acidez, cinzas, açúcares redutores e não-redutores, açúcares totais, pH, cor, sólidos insolúveis em água, atividade diastásica e hidróximetilfurfural (HMF) (BRASIL, 2000).

Em virtude da busca pelo consumo de produtos naturais, o consumo de mel tem aumentado significativamente nos últimos anos em todo o mundo (BERTOLDI, 2008). Esta procura tem impulsionado melhorias na qualidade do mel produzido, visando à segurança alimentar através de um produto natural, livre de contaminantes e microrganismos e, assim, a aceitação do mesmo no mercado internacional.

Contudo, o aumento do mercado consumidor de mel está esbarrando no problema de adulteração do produto. O mel é um produto natural de fornecimento limitado e frequentemente, de alto preço, tem sido alvo de adulterações, causando extrema desconfiança nos consumidores tradicionais, sendo a principal barreira para a ampliação de seu consumo (AZAREDO et al., 1999). A obtenção de parâmetros físico-químicos de méis é importante para sua caracterização como também é primordial para garantir a qualidade desse produto no mercado.

O mel é um produto com elevado valor nutritivo e propriedades terapêuticas. Entretanto, pode apresentar diferentes defeitos decorrentes do mal processamento ou fraudes, necessitando de rigoroso controle de qualidade e fiscalização em toda cadeia produtiva (SALAZAR et al., 2017).

Alguns estudos tem analisado a qualidade do mel comercializado em feiras livres em diversas cidades do Brasil (De Assis Carvalho et al., 2020; Ribeiro, 2019; Santos et al., 2018; Borges et al., 2017; Barbosa et al., 2007; Chaves et al., 2015; Barbosa et al., 2014; Finco et al., 2010; Moreti et al., 2009; Coringa et al., 2009 e Welke et al., 2008). Entretanto ainda são escassos na literatura análise de qualidade de mel em Barreiras.

Dessa forma, esse trabalho teve como objetivo analisar alguns parâmetros físico-químicos de qualidade, de amostras de méis comercializados em feiras livres, na cidade de Barreiras-BA.

Material e Métodos

As amostras de méis foram obtidas aleatoriamente nas três feiras livres (denominadas: F1, F2 e F3) presentes na cidade de Barreiras-Ba, no período de setembro a novembro de 2018. Foram coletadas cinco amostras em barracas/boxes diferentes, denominadas de M1, M2, M3,

M4 e M5. As amostras M1 e M2 foram obtidas na feira F1, as amostras M3 e M4 na feira F2 e a amostra M5 na feira F5. As amostras coletadas para este estudo estavam prontas para a comercialização, em potes de plástico transparentes individualizados e de tamanhos variados (200g a 500g).

Durante a coleta das amostras, foram observadas: tipos das embalagens, bem como a presença e informações dos rótulos.

Após a coleta, as mesmas foram encaminhadas ao laboratório de Análise de Alimentos do IFBA– Campus Barreiras e mantidas em ambiente limpo e fresco até o momento das análises.

Para avaliação dos parâmetros físico-químicos dos méis, foram realizadas as análises de: umidade, pH, cinzas, viscosidade, acidez titulável e reação de lugol.

A determinação da umidade foi através do método de perda por dessecação (umidade) – Secagem direta em estufa a 105°C. E, a amostra é colocada em estufa a 105°C. No qual é aquecida e resfriada até peso constante, conforme metodologia indicada pelo Instituto Adolfo Lutz (2008).

O teor de cinzas foi realizado através da incineração das amostras dos méis em mufla aquecida a 600°C. Metodologia indicada pelo Instituto Adolfo Lutz (2008).

A determinação da atividade de água (A_w) das amostras foi realizada no aparelho Aqualab® CX2 (Decagon Devices Inc., Pullman, EUA), que utiliza a determinação do ponto de orvalho, seguindo as orientações do fabricante.

Para determinação do pH pesou-se 10 g da amostra de mel em um béquer que foi diluído com auxílio de 100 mL de água. O pH, foi determinado com o aparelho previamente calibrado, operando-o de acordo com as instruções do manual do fabricante conforme metodologia descrita por Adolfo Lutz 2008.

Para a determinação da viscosidade das amostras foi utilizado um viscosímetro da marca Brookfield, modelo RVT. Foram realizadas leituras de torque nas velocidades de rotação de 50 rpm, na temperatura de 25°C. Salienta-se que para algumas amostras, foi necessário realizar a descristalização do mel. As amostras cristalizadas foram colocadas em banho-maria, em temperatura próxima a 40°C. Após o resfriamento, fez-se a determinação da viscosidade (SILVA et al 2010).

Para análise de acidez, utilizou-se o método baseado na titulação potenciométrica de uma solução de 10 gramas de mel diluída em 75 mL de água destilada com solução de hidróxido de sódio a 0,1 m e fenolftaleína a 1% (AOAC 2016).

Quanto à reação de Lugol, a metodologia foi conduzida de com as normas do Instituto

Adolfo Lutz (2008). O teste indica a presença de amido e dextrinas ou açúcares comerciais. Foi pesado 10,0 g de cada amostra em beakers de 50 mL e em seguida adicionados 10 mL de água agitando-se. Foi pipetado 1 mL de solução de lugol em cada amostra. O teste é considerado negativo quando a coloração final das amostras se mostrar próxima a do mel, indicando a ausência de amido e dextrina. As amostras que adquirirem cor vermelho-violeta a azul são dadas como positivas quanto à presença de amido e dextrina.

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC), com 3 repetições. Os dados obtidos foram submetidos à Análise de Variância (ANOVA), com o objetivo de avaliar se houve existência de efeitos significativos em relação aos diferentes tratamentos. Quando houve diferença significativa ($p > 0,05$) foi aplicado o Teste Tukey.

Resultados e Discussão

Em feiras livres na cidade de Barreiras-BA os méis são comercializados envasados em embalagens plásticas com diferentes volumes (garrafa PET) reaproveitadas de outros alimentos. Todas as embalagens dos méis analisados, nenhuma apresentou identificação de rotulagem com informações sobre origem, registro, peso, validade e outras informações que são obrigatórias em alimentos embalados na ausência do consumidor (BRASIL, 2002).

A embalagem e o rótulo representam um fator de confiabilidade e seguridade para o consumidor. Estratégias mercadológicas, quanto à publicidade e logística, são ferramentas necessárias também ao produto artesanal, visando promoção e qualidade do mesmo (SEBRAE, 2011).

Foram também observadas condições inadequadas de armazenamento do mel, pois além da utilização de embalagens não recomendadas havia incidência de luz solar direta nos recipientes que estavam dispostos em bancadas. As amostras dos produtos não apresentaram nenhuma substância visível estranha.

De acordo com o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade do Mel, o mel pode apresentar-se a granel ou fracionado, devendo ser acondicionado em embalagem apta para alimento, adequada às condições previstas de armazenamento e que confira proteção adequada contra contaminação. Além disso, não deve conter substâncias estranhas, de qualquer natureza, tais como insetos, larvas, grãos de areia e outros (BRASIL, 2000).

Nas tabelas 01 e 02 são encontrados os resultados das análises físico-químicas dos méis analisados.

Conforme os dados apresentados, dispostos na Tabela 01, houve efeito significativo (P

< 0,05) para o pH, os valores variaram entre 3,37 e 4,09. Na legislação brasileira não há indicação dos valores de pH, porém essa medida é considerada importante pois pode ser indicativo de fraudes ou contaminação microbiana.

Tabela 1: Parâmetros físico-químicos de amostras de méis de comercializadas em feiras livres, na cidade Barreiras-Ba.

Parâmetros Físico-químicos	Amostras de Mel				
	M1	M2	M3	M4	M5
pH	3,37 ^a	3,78 ^b	3,49 ^c	3,85 ^d	4,09 ^e
Acidez (meq.Kg-1)	34,5 ^a	8,9 ^b	13,27 ^c	15, 25 ^d	18,9 ^e
Atividade de Água	0,562 ^a	0,594 ^b	0,545 ^c	0,603 ^d	0,604 ^d
Umidade (%)	14,85 ^a	6,68 ^b	17,65 ^c	18,8 ^d	15,98 ^e
Cinzas (%)	0,04 ^a	0,01 ^b	0,02 ^c	0,02 ^c	0,19 ^d

M1, M2, M3, M4 e M5 (Amostras de méis artesanais obtidos em feiras livres na cidade de Barreiras – BA).

Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem ($p < 0,05$) entre si pelo teste F.

Fonte: Própria (2020).

De acordo com Silva e Bandeira (2012), o pH é um parâmetro importante na avaliação da qualidade do mel, pois pode influenciar na velocidade de formação de outros compostos, como na produção de hidroximetilfurfural. Os valores médios de pH obtidos nas amostras coletadas em feiras livres na cidade de Barreiras – BA foi 3,71. Este valores corroboram com os obtidos por De Assis Carvalho et al., (2020), Barbosa et al. (2016), Finco et al. (2010), Moreti et al. (2009) e Welke et al. (2008).

O pH do mel é influenciado pela origem botânica, sendo geralmente inferior a 4,0 para mel de origem floral e superior a 4,5 para os méis de melato (mel obtido somente pela secreção de partes vivas das plantas ou de excreções de insetos sugadores de partes vivas da planta). Pode ainda ser influenciado pela concentração de diversos ácidos, cálcio, sódio, potássio e outros constituintes das cinzas (Azeredo, 2003).

Borges et al. (2017), analisando a qualidade de méis comercializados em feiras livres de Salvador e Petrolina, encontraram valores de pH variando de 3,6 a 4,1 para amostras de Petrolina e de 3,2 a 4,0 para as amostras de Salvador. Silva (2005) analisando 58 amostras de méis de abelha, encontrou valores próximos ao desse estudo, para análise de pH valores entre 3,39 e 3,87.

O pH e a acidez são considerados importantes fatores antimicrobianos, promovendo maior estabilidade ao produto quanto o desenvolvimento de microrganismos (Gois et al., 2013).

Os valores da acidez para as amostras analisadas variaram entre 8,9 e 34,50 meq.kg-1, com média de $18,16 \pm 10,15$ meq.kg-1, estando em conformidade com a Legislação, que estipula valores de acidez de até 50 mEq.kg-1 (BRASIL 2000).

De Assis Carvalho et al., (2020), constataram a irregularidade em três amostras de mel

não inspecionadas na região metropolitana de Belo Horizonte. Já Borges et al. (2017), constataram a irregularidade em duas amostras coletadas na cidade de Salvador-BA, nas quais apresentaram valores acima de 50 mEq.kg-1, e para as amostras coletadas em Petrolina-PE os valores da acidez variaram entre 14,1 e 45,5 mEq.kg-1, que se aproximam dos resultados do presente estudo.

Chaves et al. (2015), ao analisarem 20 amostras em Teresina -PI, encontraram média para acidez total de 42 mEq/kg, com 25% de amostras em desacordo com a legislação.

Conforme evidencia Ribeiro & Ramirez (2018), vários ácidos orgânicos estão presentes no mel, como o glicônico, succínico, málico, acético, cítrico, fórmico, láctico, fólico e ácido butírico. Esses ácidos estão presentes em diferentes quantidades e conferem a característica de produtos com pH acidificado. A acidez ocasionada pela presença desses ácidos orgânicos é a responsável pela estabilidade do mel frente a ação de microrganismos, sendo por esse motivo que essa análise se torna essencial para a qualidade do mel de abelha.

Em relação à atividade de água (A_w), não houve diferença significativa ($P > 0,05$) entre as amostras M4 e M5, que apresentaram valores na faixa de 0,60. As demais amostras de mel, tiveram valores abaixo de 0,60.

De Assis Carvalho et al., (2020), obtiveram valores entre 0,519 a 0,647 para atividade água de amostras de mel não inspecionadas na região metropolitana de Belo Horizonte.

A atividade de água no mel é de 0,5 a 0,6 (Iurlina & Fritz, 2005) e a variabilidade deste elemento interfere na viscosidade do produto (Olaitan et al., 2007). Os méis com uma $A_w \leq 0,60$ são biologicamente estáveis.

Apesar da Legislação não estabelecer valores, este parâmetro pode ser complementar para determinação da vida de prateleira do mel, uma vez que a maioria das bactérias deteriorantes não se multiplica em A_w inferior a 0,91, e especialmente as bactérias patogênicas em alimentos, como o *Staphylococcus aureus* que tolera A_w de 0,86 para sua multiplicação, ao passo que *Clostridium botulinum* não cresce abaixo de 0,94 (JAY, 2005; Kacaniová et al., 2007; Franco, 2008).

Para a análise de umidade, houve efeito significativo ($P < 0,05$) entre as amostras. Os teores de umidade encontrados nesse trabalho variaram entre 6,68 a 18,8%, conforme pode ser observado na tabela 01 e estão de acordo com a legislação brasileira, que determina um valor máximo de 20% (BRASIL, 2000). Os resultados dessa pesquisa corroboram com os encontrados por Arruda et al. (2004) e Moreti et al. (2009) que obtiveram variações entre 14,97 a 17,23% e 15,0 a 20,3% de umidade, respectivamente, em méis coletados no estado do Ceará.

Ao avaliarem seis amostras de méis, Barbosa et al (2014) constataram valores que

variaram entre 12% a 17% de umidade. Em contrapartida, Santos et al (2018) encontraram valores acima do indicado, entre as três amostras avaliadas, todas apresentaram valores entre 24% a 33. O mesmo ocorreu no trabalho de Alves et al (2005), na qual no total de vinte amostras analisadas, a média para a umidade nas amostras foi de 28%, sendo consideradas amostras com alta probabilidade de deterioração.

O teor de umidade é um parâmetro importante para a qualidade do mel, já que está diretamente ligados à fermentação do produto e dessa forma, altos teores de umidade favorecem uma fermentação mais rápida, inibindo a qualidade do mel e diminuindo o seu tempo de prateleira (White Júnior, 1978 apud Marchini; Sodré & Moreti, 2003).

Na composição do mel a água compõe o segundo componente em quantidade, em geral variando de 15 a 21%, dependendo do clima, origem floral e colheita antes da completa desidratação. O conteúdo de água no mel é, sem dúvida, uma das características mais significante, podendo também influenciar na sua viscosidade, peso específico, maturidade, cristalização, sabor, palatabilidade e conservação (Seemann & Neira, 1988 apud Marchini et al., 2004) e, segundo (Frías, 2008) o mel maduro tem menos de 18% de água.

A quantificação de cinzas no mel é importante para detecção de algumas irregularidades, podendo indicar a falta de higiene, a não decantação, falha na filtração ou obtenção do mel por meio da prensagem dos favos (Finco et al., 2010).

Os teores de cinzas variaram de 0,015 a 0,198%, estando de acordo com a legislação brasileira que preconiza um valor máximo de 0,6% (BRASIL, 2000). Estes resultados corroboram com os obtidos por Barbosa et al. (2016) que obtiveram valor médio 0,22% de cinzas em amostras de méis em feiras livres na cidade de Sete lagoas – MG e com Finco et al. (2010) que encontraram um valor médio de 0,14% para amostras de méis (n=24) obtidas na região Sul de Tocantins

Segundo Viuda-Martos et al. (2010), a variação do valor de cinzas é influenciada pela de diferenças no solo, condições atmosféricas e tipo e fisiologia de cada planta, em virtude disso, o baixo conteúdo de cinzas em algumas amostras, pode ser característico de méis florais, e a ampla faixa de valores para cinzas pode indicar ainda não uniformidade nas técnicas de manejo e/ou colheita por parte dos produtores (Finola et al., 2007).

Para as análises de reação de lugol e viscosidade, os resultados estão expressos na tabela 02.

Para a análise de viscosidade, houve diferença significativa entre as amostras ($P < 0,05$), sendo que os valores encontrados no decorrer do estudo variaram entre 540 a 4980 cP. A legislação brasileira não estabelece valores de viscosidade para identificar a qualidade do mel,

entretanto esse valor é de extrema importância, pois pode ser correlacionada com o parâmetro de umidade, apontando para uma possível adição de água no produto, o que pode ser um indicativo de fraude.

Tabela 2: Parâmetros físico-químicos de amostras de méis de comercializadas em feiras livres, na cidade Barreiras-BA.

Amostras de Mel	Parâmetros Físico-químicos	
	Viscosidade (mPa.s)	Reação de Lugol
M1	4520 ^a cP	+
M2	1644 ^b cP	+
M3	4980 ^c cP	+
M4	540 ^d cP	-
M5	1596 ^e cP	-

* Ausência (-) Presença (+). M1, M2, M3, M4 e M5 (Amostras de méis artesanais obtidos em feiras livres na cidade de Barreiras – BA). Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem ($p < 0,05$) entre si pelo teste F.

Fonte: Própria (2020).

A viscosidade e as outras propriedades físico-químicas do mel dependem de muitos fatores, incluindo o tipo de abelha, a composição e a temperatura, sendo que um dos fatores de maior importância para a viscosidade é o conteúdo de água. Segundo Abu- Jdayil et al. (2002), esta viscosidade decresce com o aumento do conteúdo de água, sendo assim, méis muito viscosos possuem um menor conteúdo de água e méis mais fluidos possuem um maior teor de água. Excesso de água em méis pode ser indicativo de fraudes com adição de constituintes sólidos com açúcar comercial e a água é utilizada para obter uma melhor homogeneização do conteúdo.

Estudando um total de 58 amostras de méis do estado do Piauí e do Ceará, Silva (2005), encontrou valores variando de 536 a 2080 cP, com o valor médio de 1130 cP para o estado do Ceará e 960 a 3436 cP, com o valor médio de 1720 cP para o estado do Piauí. Após a adição da solução de Lugol, as amostras M4 e M5 não apresentaram alteração de cor, já as demais amostras apresentaram coloração azul intensa, conforme ilustrado na Figura 01.

Figura 1: Reação de Lugol em amostras de méis de comercializadas em feiras livres, na cidade Barreiras-BA.

Fonte: Própria (2019)

A reação de Lugol deve apresentar resultado negativo (-), sem alteração de cor. Quando ocorrer alteração de coloração, resultado considerado positivo (+) é caracterizado um produto fraudado ou que não é mel (SCHLABITZ, SILVA e SOUZA, 2010). Quando amido ou dextrinas são adicionados

ao mel com fins fraudulentos, a reação de Lugol identifica a fraude apresentando um composto de coloração que pode variar do vermelho violeta ao azul (CORINGA et al, 2009).

As amostras avaliadas foram coletadas em feiras livres da cidade, onde a fiscalização é falha nesses locais, o que possibilita o comerciante lesar o consumidor, adicionando amido para aumentar viscosidade e densidade do produto, adicionados a xaropes ou caldas de caramelo. Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Santos et al. (2011), que no total de 5 amostras, duas apresentaram característica de mel adulterado.

É importante considerar que a avaliação da qualidade de mel é realizada através da análise de um conjunto de parâmetros, portanto, não se pode afirmar se o mel é puro, se foi convenientemente manipulado ou armazenado através da análise individual de cada parâmetro, o produto final depende das condições em que foi processado.

Em estudo com 60 amostras de mel produzido na região de São Fidelis/RJ, não foi encontrada nenhuma reprovação na Reação de Lugol (AZEREDO, AZEREDO e DAMASCENO, 1999). Coringa et al., (2009), avaliando 6 amostras provenientes do estado do Mato Grosso, registraram a ocorrência de uma reprovação nessa análise. A intensidade da cor apresentada pelo composto após a adição da solução Lugol varia de acordo com a quantidade e a qualidade da glicose comercial presente no mel (GARCIACRUZ et al, 1999).

Conclusões

De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, conclui-se que as amostras coletadas em feiras livres do município de Barreiras - BA apresentam inconformidades em relação a rotulagem e tipos de embalagens utilizadas para armazenamento.

Para o teste de lugol, os resultados das amostras M1, M2 e M3 não foram satisfatórios, indicando que essas podem ter sofrido algum tipo de fraude, algo que é comum no Brasil principalmente se tratando de méis artesanais comercializados em feiras livres sem qualquer tipo de fiscalização. Em relação aos demais parâmetros físico-químicos de qualidade, as amostras foram satisfatórias se enquadrando nos limites estabelecidos pela legislação brasileira vigente que tratam de méis de abelhas para consumo.

É importante ressaltar que, por se tratar de méis adquiridos em feiras livres e não inspecionados pelos órgãos competentes, os consumidores estão sujeitos a aquisição de produtos fraudados que podem oferecer riscos à saúde.

Referências

ABU-JDAYIL, B.; GHZAWI, A. A. M.; AL-Malah, K. I. M. et al. Heat effect on rheology of light and dark-colored honey. **Journal of Food Engineering**, v.51, p.33-38. 2002.

ALVES, R.M.; CARVALHO, C.A.L.; SOUZA, B.A.; SODRÉ, G.S.; MARCHINI, L.C.

Características físico-químicas de amostras de mel de melipona mandacaia smith (hymenoptera: apidae). **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, Campinas, 25(4): 644-650, out.-dez. 2005.

ALVES, R. M. O.; Carvalho, C. A. L.; Souza, B. A.; Sodré, G. S.; Marchini, L. C. Physico-chemical characteristics of samples of honey melipona mandacaia smith (hymenoptera: apidae). **Food Science and Technology**, v. 25, n.4, p. 644-650, 2005.

AOAC. Association of Official Analytical Chemists. Official methods of analysis of AOAC International. 17th ed. Gaithersburg, 2000. v. 2.

ARRUDA, C.M.F. **Características físico-químicas de amostras de méis de Apis mellifera. 1758 (Hymenoptera:Apidae) de diferentes estados do Nordeste Brasileiro.** 2002. 125f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"-Universidade de São Paulo. 2012.

AZEREDO, L. C. et al. Protein contents and physicochemical properties in honey samples of Apis mellifera of different floral origins. **Food Chemistry**, v. 80, n. 2, p. 249-254, 2003.

AZEREDO, Maria Aparecida Alves; AZEREDO, Laerte da Cunha; DAMASCENO, Joelma Gonçalves. **Características físico-químicas dos méis do município de São Fidelis-RJ.** 1999.

BARBOSA, S.; RIBEIRO, J. L.; UBALDO, J. C. S. R. Características físico-químicas de méis comercializados na cidade de Sete Lagoas-MG. In: **CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS**, 25., 2016, Gramado. Anais... Gramado: SBCTA Regional, 2016., 2016.

BARTH, M. O. et al. Determinação de parâmetros físico-químicos e da origem botânica de méis indicados monoflorais do sudeste do Brasil. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, v. 25, n. 2, p. 229-233, 2005.

BERTOLDI, C. R. C. **Meliponicultura, uma alternativa sustentável.** Embrapa. Agosto de 2008.

BORGES et al. Determinação da qualidade de mel comercializadas em feiras livres de Salvador e Petrolina. **Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais**, Campina Grande, .19, n.3, p.231-240, 2017.

BRASIL, Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002. **Aprovar o Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados.** Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 23 set. 2002.

BRASIL. Ministério da Agricultura. Instrução normativa nº 11, de 20 de outubro de 2000. **Estabelece o regulamento técnico de identidade e qualidade do mel.** Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 23 out. 2000.

BULIGON C, PEGORARO N, BERSCH P, SALAZAR RFS, SALAZAR LN. Avaliação de fraudes em méis consumidos na Região Noroeste do Rio Grande do Sul. **Disciplinarum Scientia**. Série Ciências da Saúde. 2016; 16(2): 213-220.

CAMARGO, J. M. F.; PEDRO, S. R. M. Meliponini Lepeletier, 1836. In: MOURE, J. S.; RBAN, D.; MELO, G. A. R. (Orgs.). **Catalogue of bees (Hymenoptera, Apoidea) in the Neotropical Region**. Curitiba: Sociedade Brasileira de Entomologia, 2007. p. 272- 578.

CANO, C.B.; FELSNER, M.L.; MATOS, J.R. et al. Comparison of methods for determining moisture content of citrus and eucalyptus Brazilian honeys by refractometry . **Journal of food composition and a analysis**, v.14, p. 101-109, 2001.

CHAVES WA et al. 2015. **Qualidade de Mel Comercializado em Feiras Livres do Município de Teresina, Piauí**. In: XXV Congresso Brasileiro de Zootecnia. Resumos... Fortaleza: ZOOTEC.

CORINGA, Elaine de A. Oliveira et al. **Qualidade físico-química de amostras de méis produzidos no Estado do Mato Grosso – APL Apicultura**. Cuiabá, 2009.

DE ASSIS CARVALHO, Raíssa et al. Assessment of adulteration and mycoflora identification of honey samples marketed in the metropolitan region of Belo Horizonte, Brazil. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 7, p. 440974246, 2020.

FINCO ABADIO FDB et al. 2010. **Propriedades físicas e químicas do mel de Apis mellifera L**. Food Science and Technology 30: 706-712

FINOLA, M. S. et al. **Microbiological and chemical characterization of honeys from central Argentina**. Food Chemistry, n. 100, p. 1649-1653, 2007.

FRANCO, B. D. G. M.; LANDGRAF, M. **Microbiologia dos alimentos**. São Paulo: Atheneu, 2008.

FRÍAS, I.; HARDISSON, A. **Estudio de los parámetros analíticos de interés en la miel. II: Azúcares, cenizas y contenido mineral y color**. Alimentaria, v.28, n235, p. 41-43, 1992.

FUJII, I.A.; RODRIGUES, P.R.M.; FERREIRA, M. do N. et al. **Caracterização físico química do mel de guaranazeiro (Paullinia cupana var. sorbilis) em Alta Floresta, Mato Grosso**. Rev. Bras. Saúde Prod. Anim., v.10, p.645-653, 2009.

GARCIA-CRUZ, Crispin Humberto et al. **Determinação da qualidade do mel**. Revista Alimentação e Nutrição, São Paulo, n. 10, p. 23-35, 1999.

GOIS, G. C.; DE LIMA, C. A. B.; DA SILVA, L. T. & RODRIGUES, A. E. Composição do mel de Apis Mellifera: Requisitos de Qualidade. **Acta Veterinária Brasília**, 7 (2), 137-147 2013.

HUIDOBRO, J.F.; SIMAL, J. **Determination of sugars in honey**. Anales de Bromatologia, v.36,n.2p247-264, 1984.

IAL. 2008. Instituto Adolfo Lutz. **Métodos físico-químicos para análise de alimentos**. 4.ed. São Paulo: IAL. 1020p.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Pesquisa pecuária municipal**. IBGE (2017). Disponível em: < <https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/74>>. Acesso em: 22 de julho de 2020,

IURLINA, M.O.; FRITZ, R. Characterization of microorganisms in Argentinean honeys from different sources. **International Journal of Food Microbiology**, n.105, p. 297 – 304, 2005

JAY, J. M. **Microbiologia de alimentos**. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. JEFFREY, A. E.; ECHAZARRETA, C. M. Medical uses of honeys. **Revista Biomédica**, v. 7, n. 1, p. 43-49, 1996.

KAHRAMAN, T.; BUYUKUNAL, S. K.; VURAL, A.; ALTUNATMAZ, S. S. Physico-chemical properties in honey from different regions of Turkey. **Food Chemistry**, v. 123, p. 41– 44, 2010.

KACANIOVÁ, M.; SUDZINA, M.; SUDZINOVÁ, J. FIKSELOVÁ, M.; CUBON, J.; HASCIK, P. Microbiological and physico-chemical quality of honey collected from different slovak habitats. **Slovak Journal of Animal Science**, v. 40, p. 38-43, 2007.

KOBLITZ MGB. 2008. **Bioquímica de alimentos: Teoria e Aplicações Práticas**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 256p.

MARCHINI, L.C.; SODRÉ, G.S.; RODRIGUES, S.R. **Características físico-químicas de amostras de méis de *Apis Mellifera* (Hymenoptera: Apidae) provenientes do Mato Grosso do Sul**. In: SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIAS DE ALIMENTOS, 4., 2001, Campinas. Resumos... Campinas : R. Vieira Gráfica, 2001b.p.160.

MARQUELE-OLIVEIRA, Franciane et al. Fundamentos da análise do mel brasileiro: uma visão geral. **Honey Analysis**. InTech , p. 139-170, 2017.

MENDES, C.G.; SILVA, J.B.A.; MESQUITA, L.X.; Maracajá, P.B.2009. As análises e mel: Revisão. **Revista Verde**, 22, 7–14.

MORETI A.C. de C.C., SODRÉ G. da S., MARCHINI L.C. & Otsuk I.P. 2009. Características físico-químicas de amostras de méis de *Apis mellifera* L. do Estado do Ceará, Brasil. **Ciência Agrotecnologia**., 33(1): 191-199.

NAILA, Aishath et al. Classical and novel approaches to the analysis of honey and detection of adulterants. **Food Control**, [s.l.], v. 90, p.152-165, ago. 2018.

OLAITAN, P. B.; ADELEKE, O. E.; OLA, I. O. Honey: a reservoir for microorganisms and an inhibitory agent for microbes. **African Health Sciences**, Ajol, v. 7, p. 159-165, 2007.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA - FAO. Faostat. 2019. Disponível em: . Acesso em: 22 de Julho de 2020.

PEREIRA, J.A. **AValiação da Qualidade de Méis (*Apis mellifera*) de Floradas do Cerrado da Região Sobradinho. UBERLÂNDIA – MG**, 2017.

PEREIRA, L.V; SANTOS, H.J; CONCEIÇÃO, G.M.; SILVA, M.C. **Análise físico- química de mel com própolis comercializados no município de Caxias, Maranhão, Brasil**. ISSN 1983-4209. Volume 10, Número 01. Maranhão, 2014.

RODRIGUES, A.E; SILVA, E.M.S; BESERRA, E.M.F; RODRIGUES, M.L. Análise físico-química dos méis das abelhas *Apis mellifera* e *Melipona scutellaris* produzidos em duas regiões no Estado da Paraíba. **Ciência Rural**, v.35 n. 5, set-out, 2005.

RODRÍGUEZ, G.O.; FERRER, B.S., FERRER, A et al. Characterization of honey produced in Venezuela. **Food Chemistry**, v. 84, 499-502, 2004.

RIBEIRO, R.; RAMIREZ, K, S. Avaliação da qualidade físico-química e microbiológica de mel comercializado. **Revista de Ciências Agroveterinárias**. Santa Catarina, 2018.

RIBEIRO, Ana Carolina. **Qualidade físico-química do mel comercializados em feiras livres na região metropolitana de Belo Horizonte – MG**. 2019. 27f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia de Alimentos). Universidade Federal de São João del-Rei, Sete Lagoas, MG.

SALAZAR, Ludmila Noskoski et al. Caracterização físico-química de mel de diferentes regiões do Estado do Rio Grande do Sul rotulados com diferentes selos de serviços de fiscalização. **Ciência e Natura**, v. 39, n. 3, pág. 656-665, 2017.

SANTOS, B, A; MOURA, C.L; CAMARA, L.B. DETERMINAÇÃO DA AUTENTICIDADE DOS MÉIS VENDIDOS NAS FEIRAS LIVRES E COMÉRCIOS POPULARES. **Brazilian Educational Technology: research and learning**, 2011.

SANTOS, P.Y.; OLIVEIRA, S.S.; ALMEIDA, M.; OTANI, F.S. Análise de atividade de água e umidade na qualidade do mel produzido em comunidades da reserva extrativista tapajós - Arapiuns, Santarém, Pará. **Agroecossistemas**, v. 10, n. 2, p. 1 – 10, 2018.

SILVA, L. R.; VIDEIRA, R.; MONTEIRO, A. P.; VALENTÃO, P.; ANDRADE, P. B. Honey from Luso region (Portugal): **Physicochemical characteristics and mineral contents**. *Microchemical Journal*, v. 93, p. 73–77, 2009.

SILVA, G. **Características Físico-Químicas, Microbiológicas e Polínicas de amostras de méis de *Apis mellifera* L.,1758 (HYMENOPTERA: APIDAE) dos Estados do Ceará e Piauí**. Piracicaba, 2005.

SILVEIRA, I.R., BANDEIRA, M.L.S.F. Caracterização dos méis de *abelha Apis mellifera* produzidos no extremo Sul da Bahia. **Revista Eletrônica Multidisciplinar Pindorama do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA**, n.02, ano 3, jun, 2012.

SILVA, K.F., SANTOS, D.C., SILVA, C.T., QUEIROZ, A.J., LIMA, A.O. **RHEOLOGICAL BEHAVIOR OF *Apis mellifera* HONEY OF THE MUNICIPALITY OF TABULEIRO DO NORTE-CE**. Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR Campus Ponta Grossa - Paraná – Brasil. *Revista Brasileira de Tecnologia Agroindustrial* ISSN: 1981-3686/ v. 04, n. 01: p. 52-57 , 2010.

Serrano, R.B; Villanueva, M.T.O.; Marquina, A.D. 1994. Lamiel. **Edulcorante natural por xcelência I. Origen, clasificación y propiedades**. *Alimentaria*, 1, 25-28.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE. **EMBALAGEM QUE FAZ A DIFERENÇA**. 2011. Disponível em: <https://respostas.sebrae.com.br/embalagem-que-faz-a-diferenca/>, acessado em: 25 de Julho de 2020.

SODRÉ, G.S.; MARCHINI, L.C.; MORETI, A.C.C.C.; OTSUK, I.P.; CARVALHO, C.A.L.2003. **Análises multivariadas com base nas características físico-químicas de amostras de méis de Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae) da região litoral norte no estado da Bahia**. Archivos Latinoamericano Produção Animal, 1,129-137.

SCHLABITZ, Cláudia; SILVA, Sabrina Aparecida Ferreira da; SOUZA, Cláucia Fernanda Volken de. Avaliação de parâmetros físico-químicos e microbiológicos em mel. **Revista Brasileira de Tecnologia Agroindustrial**, v. 04, n. 01, p. 80–90, Lajeado, 2010.

Viuda-Martos, M.; Ruiz-Navajas, Y.; ZaldivarCruz, J.M.; Kuri, V.; Fernández-López, J.; Carbonell-Barrachina, Á.A.; Pérez, Álvarez, J.Á. Aroma profile and physico-chemical properties of artisanal Honey from Tabasco, Mexico. **Food Science and Technology**, v.25, p. 1111-1118, 2010.

VIDAL, M.F. **EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE MEL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO BNB**. Caderno Setorial ETENE., ano 4; nº 62. 2019.

SE, Kuan Wei et al. Detection techniques for adulterants in honey: Challenges and recent trends. **Journal Of Food Composition And Analysis**, [s.l.], v. 80, p.16-32, jul. 2019.

WELKE JE et al. 2008. Caracterização físico-química de méis de Apis mellifera L. da região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. **Ciência Rural** 38: 1737-1741.

WHITE JÚNIOR, J.W. **Methods for determining carbohydrates, hydroxymethylfurfural and proline in honey**; Collaborative study.Journal of the Association of the Official Analytical Chemistry, v.62, n.3, p.515-526. 1979.

CAPÍTULO 51: RESÍDUOS DE ALIMENTOS COMO FONTE DE COMPOSTOS ANTIMICROBIANOS – UMA REVISÃO E DISCUSSÃO DO POTENCIAL

CHAPTER 51: FOOD RESIDUES AS SOURCE OF ANTIMICROBIAL COMPOUNDS – A REVIEW AND DISCUSSION OF POTENTIALS

Nataís Fleck¹; Wemerson Castro de Oliveira²; Hans Fröder³; Voltaire Sant'Anna⁴

Resumo

A busca por substâncias que possam ser utilizadas como conservadores alimentares, naturais, não-tóxicas e que não interfiram nas características organolépticas dos produtos são uma preocupação e um desafio para a indústria de alimentos. O objetivo deste estudo foi analisar referências bibliográficas sobre a utilização de resíduos da indústria como fonte de compostos antimicrobianos, seu modo de ação, as possíveis aplicações e limitações para aplicações em alimentos. Observou-se que em vários trabalhos empregando extratos vegetais, destacam os polifenóis e óleos essenciais como alternativas viáveis para a conservação e aumento da vida de prateleira. Estes estudos têm recebido ênfase para a melhoria da qualidade na indústria de alimentos principalmente por terem ação antimicrobiana, uma vez que interagem com a membrana celular. Constata-se que as pesquisas provenientes de compostos de origem natural, que possam substituir os aditivos sintéticos, necessitam considerar processos de degradação (oxigênio, luz, enzimas) ao longo do período de armazenamento, aspectos toxicológicos e equipamentos para escalar o processo. O desenvolvimento de soluções sustentáveis para a gestão de resíduos alimentares ainda permanece sendo um dos principais desafios da sociedade.

Palavras-Chave: Rejeitos agroindustriais, Atividade antimicrobiana, Bioconservantes, Polifenóis, Óleos essenciais.

Abstract

The search for substances that can be used as food preservatives, natural, non-toxic and that do not interfere with the organoleptic characteristics of products is a concern and a challenge for the food industry. The aim of this study was to analyze bibliographic references on the use of industry residues as a source of antimicrobial compounds, their mode of action, possible applications and limitations for applications in food. It was observed that in several studies using plant extracts, polyphenols and essential oils are highlighted as viable alternatives for the conservation and increase of shelf life. These studies have received emphasis on improving quality in the food industry, mainly because they have antimicrobial action, since they interact with the cell membrane. It appears that research from compounds of natural origin, which can replace synthetic additives, needs to consider degradation processes (oxygen, light, enzymes) throughout the storage period, toxicological aspects and equipment to scale the process. The development of sustainable solutions for the management of food waste still remains one of the main challenges facing society.

Keywords: Agro-industrial waste, Antimicrobial activity, Biopreservatives, Polyphenols, essential oils.

¹Mestranda Profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), natais-fleck@uergs.edu.br

²Doutor em Microbiologia Agrícola, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul), wemersonoliveira@ifsul.edu.br

³Doutor em Ciência dos Alimentos, Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES), hfroder@hotmail.com

⁴Doutor em Engenharia Química, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), voltaire-santanna@uergs.edu.br

1. Introdução

A pesquisa por conservantes naturais para aplicação em alimentos tem sido impulsionada pela demanda do consumidor por produtos sem ou com redução de compostos químicos, mas que se mantenham seguros, que tenham alta qualidade e uma longa vida útil. Além disso, o surgimento e proliferação de microrganismos patógenos tem se mostrado um sério problema de saúde pública no mundo e, assim, esforços em várias áreas das ciências da vida e da saúde têm sido realizados para estudar e controlar esse problema (KHORSHIDIAN et al., 2018). Neste contexto, a busca por substâncias que possam ser utilizadas como conservadores alimentares, não-tóxicas e que não interfiram nas características organolépticas (LUCERA et al., 2012) dos produtos finais são preocupação constante e um dos desafios atuais mais importantes na indústria de alimentos (KHORSHIDIAN et al., 2018). Diante de toda essa demanda e aliado também a uma visão sustentável, surgem as pesquisas com os resíduos orgânicos sólidos.

Resíduos orgânicos sólidos da indústria de alimentos têm sido estudados como fonte natural de polifenóis, carotenóides, fibras, compostos com capacidade antimicrobiana, antioxidante, anti-hipertensiva, anticâncer e pigmentos. Além disso, apresentam potencial claro a ser processado pelas indústrias de alimentos e acostumado à dieta humana (ZHU et al., 2015; DALLA COSTA et al., 2016; NAGY et al., 2017). Considerando essas importantes propriedades, extratos vegetais já vêm sendo estudados como agentes antimicrobianos. Matrizes alimentares com concentrações altas de polifenóis e compostos derivados atuam como inibidores bacterianos e fúngicos, fungos filamentosos e leveduras, importantes para a cadeia agroindustrial (CAXAMBÚ et al., 2016; SANT'ANNA et al., 2017; TROJAIKE et al., 2018; GIRARDI et al., 2019)

Novos estudos vêm sendo publicados na literatura científica sobre o assunto e é importante que se mantenha a análise dos dados gerados sobre as diferentes matrizes propostas, modos de ação e suas aplicações. Ainda, a discussão de barreiras para a real aplicação desses compostos na indústria de alimentos também deve ser foco de observação para que haja avanços em pesquisa aplicada na área. Assim, o objetivo do presente trabalho é analisar dados de artigos científicos atuais sobre a utilização de resíduos da indústria de alimentos como fonte de compostos antimicrobianos, seu modo de ação, as possíveis aplicações em alimentos e discutir limitações em potenciais para o emprego real em aplicações de alimentos. Para tanto, artigos científicos, teses, dissertações e documentos técnicos, a partir de busca em plataformas com uma ampla base de dados e de palavras-chaves, foram analisadas criteriosamente e discutidas no âmbito proposto.

2. Desenvolvimento

Resíduos e subprodutos da cadeia produtiva de alimentos são fontes disponíveis e baratas de compostos com importantes atividades para aplicações em alimentos. Atualmente, em sua grande maioria são descartados ou conduzidos à compostagem, ignorando-se o grande potencial que apresentam de gerarem produtos de alto valor agregado e que podem se inserir no contexto de economia circular, uma das grandes tendências mundiais para o setor alimentício. Dentre as estratégias de extração de compostos de alto valor agregado, estão aqueles com potencial de serem utilizados como bioconservantes. A Figura 1 indica a tendência de pesquisas sobre o tema atualmente. Apesar dos resultados não mostrarem apenas trabalhos que lidam diretamente com a temática, mas também documentos com essas palavras-chave no texto, é clara a curva em ascensão na busca por compostos antimicrobianos a partir de subprodutos ou descartes de alimentos nos último cinco anos.

Figura 1. Número de citações em procura abrangente no *Google Scholar* (azul, no eixo principal) e *Science Direct* (vermelho, no eixo secundário) por *food by-products antimicrobial*.

O Quadro 1 relaciona alguns estudos que utilizaram matrizes alimentares a partir do processamento de alimentos como fonte de compostos naturais para a inibição de microrganismos.

Como observado no Quadro 1, são várias as matrizes que têm sido estudadas como fonte de compostos naturais com potencial antimicrobiano. Friedman, Henika e Levin (2013) observaram propriedades inibitórias de bagaço de azeitona usando um ensaio quantitativo de atividade bactericida contra patógenos de origem alimentar como *E. coli*, *L. monocytogenes*, *S. enterica* e *S. aureus*. Já Zambrano (2019), concluiu que os extratos de resíduos de uva, maçã e pitaia podem ser bons candidatos ao desenvolvimento de conservantes naturais, por ter observado em seu estudo a inibição de biofilmes de *P. aeruginosa*, *P. putida* e *S. aureus*.

Quadro 1. Resumo da utilização de extratos de resíduos de alimentos com atividade antimicrobiana

Resíduo	Extração	Compostos identificados/sugeridos	Microrganismo testado*	Referência
Bagaço de cana-de-açúcar	Aquosa a quente (10kg/m ³)	Polifenóis totais, flavonóides, compostos com atividade sequestrante de radicais ABTS e DPPH	<i>Staphylococcus aureus</i> (-), <i>Listeria monocytogenes</i> (-), <i>Escherichia coli</i> (-), <i>Salmonella</i> Enteritidis (-)	Girardi et al., (2019)
Casca de limão, laranja e cidra	Aquosa a quente (micro-ondas)	n.i.	<i>E. coli</i> (-), <i>Pseudomonas fluorescens</i> (-), <i>Pseudomonas putida</i> (-), <i>Staphylococcus epidermidis</i> (-)	Caputo et al. (2018)
Casca de pinhão (<i>Araucaria angustifolia</i>)	Aquosa a quente (10kg/m ³)	n.i.	<i>S.aureus</i> (+), <i>Bacillus cereus</i> (+), <i>L.monocytogenes</i> (+), <i>Listeria innocua</i> (+), <i>Aeromonas hydrophila</i> (+), <i>E.coli</i> (-), <i>S. Enteritidis</i> (-), <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (-), <i>Corynebacterium fimi</i> (-), fungos fitopatogênicos (-)	Trojaie et al. (2018)
Acerola verde (<i>Malpighia marajinata</i>)	Aquosa (ultrassom)	Polifenóis, vitamina C e atividade antioxidante	Fungos filamentosos (-), <i>Candida albicans</i> (+), <i>S. aureus</i> (+)	Rocha (2019)
Borra de café	Aquosa (10kg/m ³)	Polifenóis totais, compostos com atividade sequestrante de radicais ABTS e DPPH e poder quelante de ferro	<i>S.aureus</i> (-), <i>B.cereus</i> (-), <i>L.monocytogenes</i> (-), <i>L.innocua</i> (-), <i>Aeromonas hydrophila</i> (-), <i>E.coli</i> (-), <i>S. Enteritidis</i> (-), <i>P. aeruginosa</i> (-), <i>C. fimi</i> (-), fungos fitopatogênicos (-)	Sant'Anna et al. (2017)
Jabuticaba (<i>Myrciaria cauliflora</i>)	Aquosa e microencapsulado	Compostos fenólicos (antocianinas)	<i>S. aureus</i> (+), <i>E. coli</i> (+), <i>S. Enteritidis</i> (+)	Baldin (2016)
Casca, polpa e biomassa do noni <i>in natura</i>	Éter e álcool etílico	n.i.	<i>S. aureus</i> (+), <i>L. monocytogenes</i> (+), <i>E. coli</i> (+), <i>Salmonella</i> Choleraesuis (+)	Farias et al. (2018)
Casca de noz-pecã	Aquosa (10kg/m ³)	n.i.	<i>S.aureus</i> (+), <i>B.cereus</i> (+), <i>L.monocytogenes</i> (+), <i>L.innocua</i> (+), <i>Aeromonas hydrophila</i> (+), <i>E.coli</i> (-), <i>S. Enteritidis</i> (+), <i>P. aeruginosa</i> (+), <i>C. fimi</i> (-), fungos fitopatogênicos (-)	Caxambú et al. (2016)
Casca de mirtilo (<i>Vaccinium myrtillus</i>)	Aquosa, acetona, metanol e etanol (40%, 50%, 60%, 70% e 80%)	Antocianinas	<i>S.aureus</i> (+), <i>B.cereus</i> (+), <i>B.subtilis</i> (+), <i>Enterococcus faecalis</i> (+), <i>P.aeruginosa</i> (+), <i>E. coli</i> (+), <i>Serratia marcescens</i> , <i>S. Enteritidis</i> (+)	Santos e Santana (2016)

Resíduo	Extração	Compostos identificados/sugeridos	Microrganismo testado*	Referência
Polpa do jatobá (<i>Hymenaea courbaril</i>), polpa, casca e semente do tamarindo (<i>Tamarindus indica</i> L.), folha de bananeira (<i>Musa</i> spp.), folha de jabuticabeira (<i>Plinia cauliflora</i>), folha de Ora-pro-nóbis (<i>Pereskia aculeata</i>), estigmas de milho (<i>Zea mays</i>), pó torrado de café (<i>Coffea arabica</i>)	Metanol	Compostos fenólicos	<i>B.cereus</i> (+), <i>S.aureus</i> (+), <i>E.coli</i> (+), <i>P.aeruginosa</i> (+), <i>S.Typhimurium</i> (+), <i>S. Enteritidis</i> (+), <i>Shigella sonnei</i> (+)	Alvarenga (2018)
Bolo de azeitona e água residual da azeitona	Etanol teor de fenol do resíduo sólido $8,90 \pm 0,728$ g / L e do resíduo líquido $0,95 \pm 0,017$ mg / g)	Polifenóis	<i>S. aureus</i> (+), <i>Streptococcus faecalis</i> (-), <i>E. coli</i> (-)	Leouifoudi et al. (2015)
Óleo essencial de orégano e extrato de resíduo de abóbora	Etanol	n.i.	Coliforms (+), Mesófilos (+), <i>Salmonella</i> (+) <i>E. coli</i> (+), <i>S. aureus</i> (+), <i>L. monocytogenes</i> (+)	Caetano et al. (2017)
Casca de limão, tangerina e laranja	Aquosa (ultra alta pressão)	Polifenóis totais, compostos com atividade sequestrante de radicais ABTS e DPPH	<i>E. faecalis</i> (+), <i>B.subtilis</i> (+), <i>S. aureus</i> (+), <i>Clostridium sporogenes</i> (+), <i>Klebsiella</i> (-), <i>S. Typhimurium</i> (+), <i>Acinetobacter lwoffii</i> (+), <i>A. junii</i> (+), linhagens de <i>L.monocytogenes</i> (-)	Casquete et al. (2015)

* (-) sem inibição; (+) inibição; n.i. não identificada

Extrato da casca de noz-pecã também apresentou atividade antibacteriana, na concentração de 10 kg/m³, contra *A. hydrophila*, *S. aureus*, *B. cereus*, *L. monocytogenes*, *L. innocua*, *S. Enteritidis* e *P. aeruginosa*. No entanto, o extrato aquoso não apresentou capacidade de inibir o crescimento de *Corynebacterium spp.*, *Clostridium perfringens* e *Escherichia coli*. Além disso, os autores verificaram que o extrato, quando foi aplicado em folhas de alface, se mostrou eficaz na redução da contagem de bactérias mesófilas e psicotróficas ao longo de 5 dias de armazenamento do produto em temperatura de refrigeração, indicando grande potencial para ser utilizado como antimicrobiano natural para aplicações em alimentos (CAXAMBÚ et al., 2016). Trojaíke e colaboradores (2018) observaram que extrato aquoso de casca de pinhão na concentração de 10 kg/m³ apresentou a capacidade de inibir o crescimento de *S.aureus*, *B.cereus*, *L.monocytogenes*, *L.innocua* e *A. hydrophila*, apesar de não conseguir a mesma eficácia contra *C. fimi*, *E.coli*, *P. aeruginosa* e *S. Enteritidis*. Contudo, os autores observaram que a combinação do extrato do resíduo com tratamentos térmicos em condições de pasteurização é possível reduzir a resistência térmica de *L.monocytogenes*, potencialmente permitindo a redução das condições de tempo-temperatura para a conservação térmica de alimentos. Girardi e colaboradores (2019) não observaram atividade antimicrobiana de bagaço de cana-de-açúcar na concentração de 10 kg/m³ contra *L.monocytogenes*, *L.innocua*, *S.aureus*, *E.coli* e *S. enterica* Enteritidis.

É de conhecimento da comunidade científica que as matrizes alimentares com concentrações altas de polifenóis e compostos derivados atuam na inibição bacteriana como em *E. coli*, *L. monocytogenes*, *B. cereus*, *S. aureus*, *Salmonella* spp., além de fungos filamentosos e leveduras importantes para a cadeia agroindustrial (CAXAMBÚ et al., 2016; SANT'ANNA et al., 2017; TROJAIKE et al., 2018; GIRARDI et al., 2019). Sagdic e colaboradores (2011), utilizando extrato fenólico de uvas da variedade Gamay em testes *in vitro*, observaram grande inibição de *Z. rouxii* e *Z. bailii*, importantes fungos fitopatogênicos. Os mesmos autores demonstrou inibição do crescimento de *Enterobacteriaceae*, *S. aureus*, *Salmonella*, leveduras e bolores na carne bovina rissóis durante 48 h de armazenamento a 4 °C, do extrato etanólico de bagaço de uva a 10%, indicando que o bagaço pode ser uma boa opção para estender o prazo de validade de produtos alimentícios. Dependendo dos métodos de extração ou variedades de uva, extratos de bagaço de uva têm atividade antioxidante ou pró-oxidante (NASSIRI-ASL & HOSSEINZADEH, 2016).

Kołodziejczyk e colaboradores (2013) relataram a capacidade antioxidante e atividade antimicrobiana do extrato de bagaço de cereja azeda industrial, que possuem como componente majoritário os flavonóis, contra *Salmonella*, *E. coli* O157:H7 e *Listeria* spp. O crescimento de

Salmonella e *E. coli* O157:H7 foi reduzido em concentrações superiores a 2500 µg / mL e inibido em *Listeria* spp. Resultados similares foram encontrados por Sant'Anna e colaboradores (2017) ao avaliar extratos aquosos de borra de café. Quando testado diretamente nos alimentos, resultados positivos de inibição microbiana foram identificados estando a mesma relacionada aos polifenóis.

Esses trabalhos creditam a capacidade de inibir o crescimento de importantes microrganismos importantes para a cadeia produtiva de alimentos à presença de fenólicos e óleos essenciais. Deve-se destacar, que os compostos fenólicos e os óleos essenciais possuem atividade antibacteriana, antioxidante e antifúngica contra uma ampla gama de microrganismos através de vários mecanismos (SAGDIC et al., 2011; KHORSHIDIAN et al., 2018). Os mecanismos de ação antibacteriana dos compostos fenólicos ainda não foram totalmente esclarecidos, mas esses compostos são conhecidos por envolver muitos locais de ação no nível celular. Segundo Bouarad-Chibane e colaboradores (2019), muitas referências explicam que essa atividade está relacionada pela modificação da permeabilidade das membranas celulares, mudanças em várias funções intracelulares induzidas pela ligação de hidrogênio dos compostos fenólicos às enzimas ou pela modificação da rigidez da parede celular com perdas de integridade devido a diferentes interações com a membrana celular.

Vários são os motivos que podem justificar a ausência de atividade inibitória dos extratos obtidos de resíduos alimentares, sendo esta relacionada a baixa concentração de compostos nos extratos ou ineficiência do modo de extração e até mesmo de separação fenólicos específicos (CAXAMBU et al., 2016). Além disso, alguns fungos como *Aspergillus niger* e *Penicillium* sp. podem crescer na presença de taninos, utilizando esses compostos como fonte de carbono ou devido à produção de enzimas hidrolisantes de polifenóis (SCALBERT, 1991; SERRANO et al., 2009).

A atividade antimicrobiana de frutas que contém antocianinas provavelmente é causada por múltiplos mecanismos e sinergismos, pois contêm vários compostos, incluindo ácidos orgânicos fracos, ácidos fenólicos e suas misturas em diferentes formas químicas (CISOWSKA et al., 2011; VERRUCK et al., 2018). Atividade antimicrobiana do ácido p-cumárico contra *E. coli*, *S. typhimurium* e *S. dysenteriae* foi relatada por Lou e colaboradores (2012), pois observaram que este composto altera a permeabilidade da membrana celular e tem a capacidade de se ligar ao DNA inibindo a função celular. Ácidos gálico e ferúlico atuam, diferentemente do ácido p-cumárico, desestabilizando a membrana citoplasmática das células de bactérias patogênicas como *E. coli*, *L. monocytogenes*, *P. aeruginosa* e *S. aureus* (BORGES et al., 2013).

Os ácidos fenólicos mudaram os componentes polares, apolares e aceitadores de elétrons das células bacterianas. A capacidade de aceitador de elétrons, após exposição a ácido gálico e ácido ferúlico, aumentou para as bactérias Gram-positivas e diminuiu para as Gram-negativas. Isso revela que os ácidos são produtos eletrofílicos e parecem interagir significativamente com os componentes da superfície bacteriana (BORGES et al., 2013). Isso pode se comprovar no estudo de Molva (2015), que analisou a atividade antibacteriana do extrato de semente de uva em células vegetativas e endósporos de *Alicyclobacillus acidoterrestris* DSM 3922 em suco de maçã. Em análise de microscopia eletrônica de varredura foi visualizado, pela autora, danos à estrutura e aos componentes celulares da bactéria no seu estado vegetativo. No entanto, a atividade antibacteriana contra os endósporos dependia do meio de esporulação.

No estudo realizado por Nohynek e colaboradores (2006) foi proposto que compostos fenólicos têm sua atividade antimicrobiana em bactérias Gram-negativas pelo poder quelante de cátions divalentes de suas membranas externas. Em bactérias Gram-positivas, acredita-se que taninos podem reagir e inibir a biossíntese com componentes da parede celular (JONES et al., 1996). Taninos com potencial ação bacteriana, fúngica e viricida foram isolados de plantas e/ou componentes da planta que contêm atividades antimicrobianas, e que estão comercialmente disponíveis para os consumidores (KHAMENEH et al., 2019). No mesmo contexto, Widsten e colaboradores (2014) identificaram extratos à base de plantas que suprimiu efetivamente as principais bactérias de deterioração de peixes e carne de cordeiro resfriados e relacionou tal capacidade a compostos com alta atividade antioxidante como taninos.

Em relação aos óleos essenciais, a literatura indica basicamente o uso de cascas de frutas cítricas como fonte de compostos antimicrobianos a partir de resíduos agroindustriais. Caputo e colaboradores (2018), ao avaliar extratos aquosos assistidos por micro-ondas de casca de limão, laranja e cidra, observaram que as infusões foram capazes de inibir o crescimento da fase lag de crescimento de linhagens de *E. coli*, *P. fluorescens*, *P. putida*, *S. epidermidis*, apesar de não mostrarem atividade bactericida contra as bactérias estudadas. Além disso, os autores observaram que esses extratos foram capazes de reduzir a capacidade de formação de biofilme por parte desses microrganismos em testes *in vitro*. Essas atividades foram relacionadas pelos autores devido à presença de óleos essenciais e polifenóis extraídos dos resíduos.

Extratos de óleos essenciais alcoólicos da casca crua de bergamota-ponkan, pomelo e limão-bergamota não foram seletivos quanto ao tipo de parede celular bacteriana, apresentando atividade antimicrobiana contra *E. coli*, *S. aureus*, *P. aeruginosa* e *E. faecalis* (GERHARDT et al., 2013). Cabe destacar ainda, que as cascas frescas são fontes mais promissoras que os

resíduos secos para obtenção de compostos com tal atividade. Casquete e colaboradores (2015), ao analisarem a atividade antimicrobiana de extratos obtidos de tangerina, limão e laranja por ultra alta pressão, mostraram que as infusões, com concentrações de ao menos 1 mg/mL apresentaram a habilidade de inibir o crescimento de bactérias Gram-positivas e negativas (*E. faecalis*, *B. subtilis*, *S. aureus*, *C. sporogenes*, *Klebsiella*, *S. Typhimurium*, *A. lwoffii*, *A. junii*). Extrato de casca de limão e tangerina não apresentaram capacidade antimicrobiana contra linhagens de *L.monocytogenes* e *E.coli* e contra linhagens de *L.monocytogenes*, *A. baumannii* e *Pseudomonas* spp., respectivamente. Compostos da casca de laranja doce não foram eficazes contra a linhagem de *L. monocytogenes* 3391 e *Klebsiella* spp.

Os mecanismos de ação dos óleos essenciais ainda não foram completamente estabelecidos. No entanto, estudos indicaram que compostos de diferentes grupos químicos presentes nesses produtos naturais são capazes de atuarem em mais de um alvo na célula, como na permeabilização ou ruptura da membrana citoplasmática, permitindo a passagem de compostos não específicos ou liberação do conteúdo citoplasmático (ZHANG et al., 2016). Para Negro e colaboradores (2016), a maior fração de compostos voláteis de óleos essenciais de citrus é constituída por monoterpenos e sesquiterpenos, bem como seus derivados oxigenados. Ainda, há a presença nessas frutas de aldeídos (cital), álcoois e ésteres, compostos não voláteis, que podem agir como composto inibidor de bactérias (NEGRO et al., 2016).

Também, em frutas cítricas deve-se considerar a presença de limoneno, um hidrocarboneto cíclico hidrofóbico, como outros terpenos e terpenóides, cuja atividade antibacteriana é creditada principalmente à sua interação com as membranas celulares (BAKKALI et al., 2008). O limoneno se acumula na membrana citoplasmática, por causa do alto valor do coeficiente de partição nessa estrutura biológica, e altera a lipoestrutura e a fluidez dessa estrutura, que se torna mais permeável. Consequentemente, o material celular pode ser perdido, os lipídios e as proteínas podem sofrer alternâncias celulares (NEGRO et al., 2016). Dannenberg e colaboradores (2019) analisaram óleo essencial de pimenta rosa (*Schinus terebinthifolius* Raddi), que possui como componente majoritário β -mirceno (41%), e observaram alterações na permeabilidade e integridade da membrana celular de todas as bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, indicando que o dano à parede celular é um dos seus mecanismos de ação. Ainda, há de se considerar na extração de compostos de resíduos de alimentos a presença de ácidos orgânicos que podem apresentar atividade antimicrobiana ou agir em sinergismo com os compostos estudados e creditados até o presente momento (KIM e RHEE, 2015). Mais estudos são necessários para elucidar de forma completa os modos de ação de agentes antimicrobianos de resíduos agroindustriais.

Apesar do real potencial de utilização desses extratos como bioconservantes em alimentos, eles ainda apresentam algumas limitações tecnológicas a serem avaliadas e estudadas em sistemas alimentares reais. Antocianinas são um dos polifenóis com tal capacidade. Contudo, elas podem ser degradadas por enzimas naturalmente presentes em alimentos como a polifenoloxidase (RUENROENGKLIN et al., 2009), o que pode ser um grande limitante para alimentos que necessitam armazenamento a longo prazo. Ainda, sobre o mesmo composto, são susceptíveis a variações de pH, culminando em sua degradação, alteração molecular e redução de atividades biológicas (CISOWSKA et al., 2011).

Em relação aos óleos essenciais devemos considerar que podem ser oxidados e sofrer modificações que alterem sua atividade ao longo do armazenamento. Um bioconservante natural para ter sua produção e utilização em larga escala deve apresentar amplo espectro de ação, mas também deve apresentar estabilidade e flexibilidade de utilização. Extratos com base em antocianinas, por exemplo, teriam limitação de aplicação em alimentos levemente ácidos devido à redução de sua estabilidade (LACOMBE et al., 2010).

Um outro ponto de grande importância e que deve ser considerado é a necessidade de se explorar mais aspectos de risco para utilização desses extratos em alimentos. Moncalvo e colaboradores (2016) analisaram o conteúdo de contaminantes químicos: ocratoxina A, aminas biogênicas, pesticidas e metais em extratos de cascas de uvas de diferentes vinícolas localizadas no norte da Itália. Ocratoxina foi detectada em baixas concentrações nos pós das cascas e nos extratos de algumas variedades, por exemplo. Além das questões extrínsecas relacionadas às uvas, ainda devem ser considerados os aspectos toxicológicos relacionados à ingestão excessiva de polifenóis da fruta. A ingestão excessiva de certos flavonóides alcançada através da suplementação de extratos vegetais pode ter efeitos potencialmente tóxicos no organismo (BOUŠOVA e SKALOVA, 2012).

Soma-se a esses fatores, a falta de protocolos e equipamentos industriais testados e concisos para processamento de subprodutos, e isso pode ser uma barreira adicional à sua adoção, questão recorrente em inovações e desenvolvimento de produtos. Além dos custos operacionais, a implementação de uma unidade de processamento de subprodutos alimentícios deve abordar questões legais e sanitárias. Por exemplo, não há legislação ou regulamento técnico de identidade e qualidade para esses produtos que norteiam questões de implantação de uma planta de processamento ou de análises de padrões microbiológicos e físico-químicos. Vários outros pontos podem ser levantados como o custo benefício da extração e processamento desses compostos, o uso verdadeiramente sustentável desses subprodutos, uma vez que, o

processo de extração pode gerar maior quantidade ou até mesmo resíduos com maior potencial de agressão ambiental, dentre outros.

3. Conclusões

Estima-se que a quantidade de resíduos com potencial aproveitamento após o processamento é de milhões de toneladas a cada ano. Dentre os vários fatores, destacam-se o desperdício excessivo, problemas na conservação e falhas na cadeia produtiva levando a perdas e prejuízos financeiros, principalmente de frutas e hortaliças.

De maior importância é o potencial de subprodutos devido ao conteúdo de biocomponentes, que podem ser usados para a produção de alimentos inovadores, fazendo uso de compostos naturais. Os extratos vegetais, principalmente os obtidos de resíduos alimentares, têm grande potencial de serem utilizados como bioconservantes na indústria de alimentos, sendo necessário estudos tecnológicos para a sua aplicação em grande escala.

Devido ao alto teor de componentes bioativos, os subprodutos (casca, polpa, sementes) constituem uma matéria-prima natural valiosa para aplicação em alimentos, como polifenóis, óleos aromáticos, dentre outros. As substâncias extraídas podem ser utilizadas na produção de alimentos como ingredientes funcionais e nutracêuticos, tanto na alimentação humana quanto animal promovendo saúde, ou nas indústrias cosmética e farmacêutica.

A tecnologia moderna de processamento sustentável de alimentos deve ter em mente a necessidade de reduzir o desperdício e usar os subprodutos de forma eficaz. O impacto dessas ações é importante para a economia alimentar atual, bem como para o futuro estado do meio ambiente. Ainda assim, poucos resíduos do processamento de frutas e vegetais são utilizados de forma adequada na indústria de alimentos como novos atrativos através do enriquecimento de ingredientes naturais, na área farmacêutica e na produção de biocombustíveis, merecendo cada vez mais pesquisas e estudos pela comunidade científica e pelas indústrias.

4. Referências

ALVARENGA, G. F. **Avaliação do potencial antimicrobiano e antioxidante de espécies vegetais para aplicação como aditivo em filmes/revestimentos para alimentos**. Orientadora: Pinto, Nísia Andrade Villela Dessimoni. 2018. 131 p. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2018.

BAKKALI, F.; AVERBECK, S.; IDAOMAR, M. Biological effects of essential oil: a review. **Food and Chemical Toxicology**, v.46, n.2, p.446-75, 2008.

BALDIN, J. C. **Avaliação do potencial antimicrobiano e antioxidante do extrato de jabuticaba (*Myrciaria cauliflora*) microencapsulado adicionado em linguiça frescal e mortadela.** Orientador: Trindade, Marco Antonio. 2016. 100f. Dissertação de Doutorado (Programa de Pós-Graduação em Ciências) Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2016.

BOUŠOVÁ, I.; SKÁLOVÁ, L. Inhibition and induction of glutathione S-transferases by flavonoids: possible pharmacological and toxicological consequences. **Drug Metabolism Reviews**, v.44, n.4, p.267–286, 2012.

BOUARAB-CHIBANE, L.; FORQUET, V.; LANTÉRI, P.; CLÉMENT, Y.; LÉONARD-AKKARI, L.; OULAHAL, N.; DEGRAEVE, P.; BORDES, C. Antibacterial properties of polyphenols: characterization and QSAR (Quantitative structure–activity relationship) models. **Frontiers in Microbiology**, v.10, p.829, 2019.

BORGES, A.; FERREIRA, C.; SAAVEDRA, M.J.; SIMÕES, M. Antibacterial activity and mode of action of ferulic and gallic acids against pathogenic bacteria. **Microbial Drug Resistance**, v.19, n.4, p.256-265, 2013.

CAETANO, K.S. **Utilização de amido, óleo de orégano e extrato de resíduo de abóbora para o desenvolvimento de filmes biodegradáveis ativos.** Orientadora: Cladera-Oliveira, Flôrencia. 2016. 122f. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos), Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016.

CAPUTO, L.; QUINTIERI, L.; CAVALLUZZI, M.M.; LENTINI, G.; HABTEMARIAM, S. Antimicrobial and antibiofilm activities of citrus water-extracts obtained by microwave-assisted and conventional methods. **Biomedicines**, v.6, n.2, 9.70-84, 2018.

CASQUETE, R.; CASTRO, S.M.; MARTÍN, A.; RUIZ-MOYANO, S.; SARAIVA, J.A.; CÓRDOBA, M.G.; TEIXEIRA, P. Evaluation of the effect of high pressure on total polyphenolic content, antioxidant and antimicrobial activity of citrus peels. **Innovative Food Science and Emerging Technologies**, v.31, p.37-44, 2015.

CAXAMBÚ, S.; BIONDO, E.; KOLCHINSKI, E.M.; LAPPE, R.; BRANDELLI, A.; SANT'ANNA, V. Evaluation of the antimicrobial activity of pecan nut [*Carya illinoensis* (Wangenh) C. Koch] shell aqueous extract on minimally processed lettuce leaves. **Food Science and Technology (Campinas)**, v.36, p.42-45, 2016.

CISOWSKA, A.; WOJNICZ, D.; HENDRICH, A. Anthocyanins as antimicrobial agents of natural plant origin. **Natural Product Communication**, v.6, n.1, p.149-156, 2011.

DALLA COSTA, A.P.; THYS, R.C.S.; RIOS, A.O.; FLORES, S.H. Carrot flour from minimally processed residue as substitute of b-carotene commercial in dry pasta prepared with common wheat (*Triticum aestivum*). **Journal of Food Quality**, v.39, p.590-598, 2016.

DANNENBERG, GUILHERME DA SILVA; FUNCK, GRACIELE DAIANA; SILVA, WLADIMIR PADILHA; FIORENTINI, ÂNGELA MARIA; Essential oil from pink pepper (*Schinus terebinthifolius* Raddi): Chemical composition, antibacterial activity and mechanism of action, **Food Control**, v. 95, p. 115-120, 2019.

DIAO, WEN-RUI; HU, QING-PING; ZHANG, HONG; XU, JIAN-GUO; Chemical composition, antibacterial activity and mechanism of action of essential oil from seeds of fennel (*Foeniculum vulgare* Mill.). **Food Control**. v. 35, p.109-116, 2014.

FARIAS, L. L.; LOSS, R. A.; SOUSA, S.; PUTON, B. M. S.; PAROUL, N.; CANSIAN, R. L.; GUEDES S. F. Potencial antimicrobiano e avaliação físico-química da casca, polpa e biomassa do noni (*Morinda citrifolia* Linn). **Global Science and Technology**, v.11, n.2, p.247-255, 2018.

FRIEDMAN, MENDEL; HENIKA, PHILIP R.; LEVIN, CAROL E.; Bactericidal Activities of Health- Promoting, Food- Derived Powders Against the Foodborne Pathogens *Escherichia coli*, *Listeria monocytogenes*, *Salmonella enterica*, and *Staphylococcus aureus*. **Journal of Food Science**. v.78 p. 270-275 2013.

GERHARDT, C.; WIEST, J.M.; GIROLOMETTO, G.; SILVA, M.A.S.; WESCHENFELDER, S. Aproveitamento da casca de citros na perspectiva de alimentos: prospecção da atividade antibacteriana. **Brazilian Journal of Food Technology**, v.31, p.215-2018, 2013.

JONES, R.N. The emergent needs for basic research, education, and surveillance of antimicrobial resistance. **Diagnostic Microbiology and Infectious Diseases**, v.25, p.153-161, 1996.

KHAMENEH, Bahman et al. Review on plant antimicrobials: A mechanistic viewpoint. **Antimicrobial Resistance & Infection Control**, v.8, n.1, p.118, 2019.

KHORSHIDIAN, N.; YOUSEFI, M.; KHANNIRI, E.; MORTAZAVIAN, A. M.; Potential application of essential oils as antimicrobial preservatives in cheese. **Innovative Food Science and Emerging Technologies**, v.45, p. 62-72, 2018.

KIM, S.A.; RHEE, M.S. Synergistic antimicrobial activity of caprylic acid in combination with citric acid against both *Escherichia coli* O157:H7 and indigenous microflora in carrot juice. **Food Microbiology**, v. 49, p.166-172, 2015.

KOŁODZIEJCZYK, K.; SÓJKA, M.; ABADIAS, M.; VIÑAS, I.; GUYOT, S.; BARON, A. Polyphenol composition, antioxidant capacity, and antimicrobial activity of the extracts obtained from industrial sour cherry pomace. **Industrial Crops and Products**. v.51, p. 279–288, 2013.

LACOMBE, A.; WU, V.C.H.; TYLER, S.; EDWARDS, K. Antimicrobial action of the American cranberry constituents: phenolics, anthocyanins, and organic acids, against *Escherichia coli* O157:H7. **International Journal of Food Microbiology**, v.139, p.102-107, 2010.

LEOUIFOUDI, I.; HARNAFI, H.; ZYAD, A. Olive mill waste extracts: polyphenols content, antioxidant, and antimicrobial activities. **Advances in Pharmacological Sciences**, v.2015, p.714138, 2015.

LUCERA, A., COSTA, C., CONTE, A., Del Nobile, M. A. Food applications of natural 1309 antimicrobial compounds. **Frontiers in microbiology**, v.3, 287, 2012.

MARCIAL, GUILLERMO E., GEREZA, CARLA L., KAIRUZA, MARTHA NUÑEZ, ARAOZB, VICTORIA COLL, SCHUFFB, CAROLA, VALDEZA, GRACIELA FONT, Influence of oregano essential oil on traditional Argentinean cheese elaboration: Effect on lactic starter cultures. **Revista Argentina de Microbiologia**, v.48, p. 229-235, 2016.

MOLVA, CELENK; BAYSAL, AYSE HANDAN. Antimicrobial activity of grape seed extract on *Alicyclobacillus acidoterrestris* DSM 3922 vegetative cells and spores in apple juice. **Food Science and Technology**. v.60, n.1, p. 238-245, 2015.

MONCALVO, A.; MARINONI, L.; DORDONI, R.; DUSERM GARRIDO, G.; LAVELLI, V.; SPIGNO, G. Waste grape skins: evaluation of safety aspects for the production of functional powders and extracts for the food sector. **Food Additives & Contaminants: Part A**, v.33, n.7, p.1116–1126, 2016.

NAGY, M.; SEMENIUC, C.A.; SOCACI, S.A.; POP, C.R.; ROTAR, A.M.; SALAGEAN, C.D.; TOFANA, M. Utilization of brewer's spent grain and mushrooms in fortification of smoked sausages. **Food Science and Technology Campinas**, v.37, n.2, p.315-320, 2017.

NASSIRI-ASL, M.; HOSSEINZADEH, H. Review of the Pharmacological Effects of *Vitis vinifera* (Grape) and its Bioactive Constituents: An Update. **Phytotherapy Research**, v.30, n.9, p.1392–1403, 2016.

NEGRO, V.; MANCINI, G.; RUGGERI, B.; FINO, D. Citrus waste as feedstock for bio-based products recovery: Review on limonene case study and energy valorization. **Bioresource Technology**, v.214, p.806-816, 2016.

NOHYNEK, L.J.; ALAKOMI, H.L.; KÄHKÖNEN, M.P.; HEINONE, M.; HELANDER, I.M.; OKSMAN-CALDENTY; PUUPPONEN-PIMIÄ, R. Berry phenolics: antimicrobial properties and mechanisms of action against severe human pathogens. **Nutrition and Cancer**, v.54, p.18–32, 2006.

PANTELIĆ, MM, DABIĆ ZAGORAC, D. Č., DAVIDOVIĆ, SM, TODIĆ, SR, BEŠLIĆ, ZS, GAŠIĆ, UM, TEŠIĆ, Ž. LJ. & NATIĆ, MM. Identification and quantification of phenolic compounds in bark, pulp and berry seeds in 13 vine varieties grown in Serbia. **Food Chemistry**, v.211, p.243-252. 2016.

ROCHA, A. J. A. C. **Avaliação do Potencial Antimicrobiano do Extrato da Acerola**. Orientador: Poletto, Patrícia. 2019. 54f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Alimentos) – Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2019.

RUENROENGKLIN, N.; SUN, J.; SHI, J.; XUE, S.J.; JIANG, Y. Role of endogenous and exogenous phenolics in litchi anthocyanin degradation caused by polyphenol oxidase. **Food Chemistry**, v.115, p.1253-1256, 2009.

SCALBERT, A. Antimicrobial Properties of Tannins. **Phytochemistry**, v.30, n.12, p.3875-3883, 1991.

SAGDIC, O.;OZTURK, I.;OZKAN, G.;YETIM, H.;EKICI, L.; YILMAZ, M. T. RP-HPLC-DAD analysis of phenolic compounds in pomace extracts from five grape cultivars: evaluation

of their antioxidant, antiradical and antifungal activities in orange and apple juices. **Food Chemistry**, v.126, n.4, p.1749-1758, 2011.

SANT'ANNA, V.; BIONDO, E.; KOLCHINSKI, E.M; SILVA, L.F.S.; CORRÊA, A.P.F.; BACH, E.; BRANDELLI, A. Total Polyphenols, Antioxidant, Antimicrobial and Allelopathic Activities of Spend Coffee Ground Aqueous Extract. **Waste and Biomass Valorization**, v.8, p.439–442, 2017.

SANTOS, T.R.J.; DE AQUINO SANTANA, L.C.L. Potencial antimicrobiano de diferentes extratos da casca de mirtilo (*Vaccinium myrtillus*). **Anais do 7th International Symposium on Technological Innovation–ISTI 2016**. 2016.

SERRANO, J.; PUUPONEN-PIMIA, R.; DAUER, A.; AURA, A.M.; SAURACALIXTO, F. Tannins: current knowledge of food sources, intake, bioavailability and biological effects. **Molecular Nutrition and Food Research**, v.53, p.310–329, 2009.

TROJAIKE, G.H.; BIONDO, E.; LAPPE, R.P.; BRANDELLI, A.; SANT'ANNA, V. Antimicrobial Activity of *Araucaria angustifolia* Seed (*Pinhão*) Coat Extract and its Synergism with Thermal Treatment to Inactivate *Listeria monocytogenes*. **Food and Bioprocess Technology**, v.12, p.193–197, 2019.

VERRUCK, S.; PRUDENCIO, E.S.; DA SILVEIRA, S.M. Compostos bioativos com capacidade antioxidante e antimicrobiana em frutas. **Revista do Congresso Sul Brasileiro de Engenharia de Alimentos**. 2018.

WIDSTEN, P.; CRUZ, C.D.; FLETCHER, G.C.; PAJAK, M.A.; MCGHIE, T.K. Tannins and Extracts of Fruit Byproducts: Antibacterial Activity against Foodborne Bacteria and Antioxidant Capacity. **Journal of Agricultural and Food Chemistry**, v.62, p.11146–11156, 2014.

ZAMBRANO, CAROLINA; KEREKES, BEÁTA; KOTOGÁN; ALEXANDRA; PAPP, TAMÁS; VÁGVOLGYI, CSABA; KRISCH, JUDIT; TAKÓ, MIKLÓS. Antimicrobial activity of grape, apple and pitahaya residue extracts after carbohydrase treatment against food-related bacteria. **LWT-Food Science and Technology**, v. 100, p. 416-425, 2019.

ZHANG, Y. et al. Antibacterial activity and mechanism of cinnamon essential oil against *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus*. **Food Control**, v.59, p.282-289, 2016.

ZHU, F.; DU, B.; ZHENG, L.; LI, J. Advance on the bioactivity and potential applications of dietary fibre from grape pomace. **Food Chemistry**, v.186, p.207-212, 2015.

CAPÍTULO 52: RISCO SANITÁRIO NA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNE: CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO MERCADO FRANCISCO BOLONHA, BELÉM (PA)¹

CHAPTER 52: HEALTH RISK IN THE MEAT MARKETING: STRUCTURAL CONDITIONS OF THE FRANCISCO BOLONHA MARKET, BELÉM (PA)

Matheus Yuri de Oliveira Rosa²; Vitória Nazaré Costa Seixas³

Resumo

Esta pesquisa objetivou avaliar as condições estruturais e higiênico-sanitárias do Mercado de Carne Francisco Bolonha, no Complexo do Ver-o-Peso, Belém (PA), a fim de verificar se o local apresenta requisitos adequados para a comercialização de alimentos, conforme a exigência dos instrumentos normativos em vigência no Brasil. Para tanto, foi realizada pesquisa de campo mediante a utilização de diferentes instrumentos coleta dos dados, a saber: observações sistemáticas, registros fotográficos, entrevista e aplicação de uma lista de verificação (*check-list*) com a Administração do mercado. Este último instrumento foi estruturado em 30 quesitos organizados em 4 itens, baseados na Portaria 386/1997, na RDC 275/2002, na RDC 216/2004 e na Portaria 2619/2011. Os resultados, embora demonstrem que o Mercado apresenta “Boa” avaliação, evidenciam desconformidades em relação à água, aos balcões, às vedações de portas etc. Tais inadequações para o comércio e para a manipulação de alimentos contribuem para conformar um espaço propício à contaminação e à disseminação de Doenças Veiculadas por Alimentos (DVAs).

Palavras-Chave: Condições higiênico-sanitárias, Mercado Público, Ver-o-Peso.

Abstract

This research aimed to assess the structural, sanitary and hygienic conditions of the Francisco Bolonha Meat Market, at the *Ver-o-Peso* complex, in Belém (in the state of Pará/Brazil). It was made in order to verify whether the site presents adequate condition for food marketing, as per requirement of Brazil's legal instruments. For this purpose, a field research was made using diverse data collection instruments, such as: systematic observations, photographic records, interviews, and a check-list application for the Market Management to respond. The latter instrument was instructed in 30 requirements organized in 4 items, based on the Ordinance 386/1997, the Collegiate Directorate Resolution (RDC) 275/2002, the RDC 216/2004, and the Ordinance 2619/2011. Although the results show that the Market has “Good” evaluation, they also evince noncompliance in relation to the water, the counters, the door sealings, etc. Such inadequacies to the market and handling of food contribute to set a space which is conducive to contamination and dissemination of Foodborne Diseases (DVAs).

Keywords: Sanitary and Hygienic conditions, Public Market, Ver-o-Peso.

¹Artigo referente aos dados parciais do Projeto de Pesquisa “Análise do risco sanitário de carne bovina comercializada no Mercado Francisco Bolonha, Belém (PA)”, com financiamento do CNPq.

² Acadêmico de Tecnologia de Alimentos, Universidade do Estado do Pará (UEPA), matheusyurid@gmail.com;

³Doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos, docente da Universidade do Estado do Pará (UEPA), vitoria.seixas@uepa.br.

Introdução

No Brasil, diversos estudos (MATOS et al., 2015; COSTA et al., 2017; ROSA et al., 2019) têm apontado que, entre os locais de comercialização de carne bovina, as feiras livres e os mercados populares compreendem os ambientes mais propício à contaminação. A carne bovina, pois, é um alimento deveras perecível e suscetível à veiculação de doenças em face de suas características nutricionais, uma vez que é rica em nutrientes necessários para o crescimento de bactérias, leveduras e bolores. Afinal, cortada e/ou moída, a carne bovina vendida nesses espaços é caracterizada como uma das principais geradoras e potencializadoras de infecções em humanos, dado o seu consumo acentuado, as condições de manipulação por parte dos vendedores e as precárias infraestruturas dos locais de armazenamento e de comercialização (REIS, 2019).

Diante disso, segundo Rosa et al. (2019), os consumidores têm se mostrado preocupados com a qualidade da carne consumida, se tornando mais informados e exigentes, logo, primando por produtos de maior qualidade, isto é, alimentos livres de agentes que atentem contra a saúde humana. Por assim ser, a carne bovina demanda cuidados especiais durante o processo produtivo de forma a garantir a sua qualidade e a saúde do consumidor (OLIVEIRA et al., 2017). A final, conquanto seja oriunda de animais sadios, a qualidade da carne não depende apenas da microbiota natural, de contaminantes patogênicos ou deterioradores, mas também da higiene no processo produtivo e beneficiador (REIS, 2019). Nesse cenário, as condições estruturais e higiênico-sanitárias dos locais de comercialização, como feiras e mercados populares, têm uma relevância significativa para a manutenção da qualidade da carne (RODRIGUES et al., 2017).

Nesse contexto, no Brasil, foram criados instrumentos normativos para controlar e assegurar a comercialização de alimentos em condições adequadas. Entre tais normas, pode-se destacar a RDC 275/2002 - que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e apresenta a lista de verificação das boas práticas (BRASIL, 2002) - e a RDC 216/2004 - que estabelece procedimentos de Boas Práticas para serviços de alimentação objetivando garantir as condições higiênico-sanitárias dos alimentos (BRASIL, 2004). Destarte, as boas práticas de fabricação, manipulação e comercialização de alimentos são indispensáveis para a ineficiência dos processos de toda a cadeia de produção, visto que contribuem para a segurança, o controle de qualidade e a soberania alimentar (ROSA et al., 2019).

De posse destas compreensões, este trabalho emerge com o objetivo de avaliar as

condições estruturais e higiênico-sanitárias do Mercado de Carne Francisco Bolonha, Belém (PA), a fim de verificar se o espaço está adequado para atuar na comercialização de alimentos, devido à sua importância sociocultural para a cidade. Cumpre destacar que o Bolonha foi eleito como lócus de estudo por figurar como o principal e mais popular espaço de comercialização de carne, pois está situado no Complexo do Ver-o-Peso.

Material e Métodos

Área de estudo

O Mercado de Carne Francisco Bolonha, que faz parte do Complexo do Ver-o-Peso, está localizado na Avenida Castilho França (a frente), entre as Travessas Oriental do Mercado e Ocidental do Mercado, e de fundos para a Rua 15 de Novembro, Bairro do Comércio. Atualmente, no térreo do mercado estão as lojas de acesso livre e independente das ruas que circundam o mercado e no interior os boxes individuais (Figura 1), que estão subdivididos em setores: venda de carne, refeições e artesanato, contando com a administração do local e uma escada helicoidal com acesso a um mirante (SILVA, 2018). No mais, é relevante ressaltar a importância do Bolonha como um importante polo de escoamento de produtos regionais, juntamente com o potencial produtivo das ilhas ao entorno da cidade e dos demais municípios (SILVA; CASTRO, 2013).

Figura 1. Planta do Mercado Francisco Bolonha

Fonte: Adaptado de Silva (2018).

Coleta de dados

A pesquisa de campo, ocorrida entre os dias 15 e 16 de janeiro de 2020, utilizou

diferentes instrumentos para a coleta de dados, a saber: observação não participante, registro fotográfico, entrevista com a administração do mercado e aplicação de uma lista de verificação (*check-list*) relacionada às condições estruturais e higiênico-sanitárias, especificamente, do Mercado de carne Francisco Bolonha, no Complexo do Ver-o-Peso, Belém (PA).

O instrumento de coleta de dados contou com 30 quesitos distribuídos em 4 itens, que são: em 1) Água; 2) Controle integrado de pragas; 3) Sanitários e vestiários e; 4) Instalações e edificações do mercado. Sendo importante destacar que o *check-list* foi baseado nos seguintes instrumentos normativos: o Regulamento da inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, Portaria Nº 368/1997 (BRASIL, 1997); o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos, Resolução-RDC Nº 275/2002 (BRASIL, 2002); o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, Resolução-RDC nº 216/2004 (BRASIL, 2004); e o Roteiro de inspeção de açougues e peixarias, anexo da Portaria nº 2619/2011, da Prefeitura Municipal de São Paulo (SÃO PAULO, 2011). Não obstante, convém mencionar que a lista de verificação (*check-list*) considerou as condições culturais e de viabilidade econômica comuns às feiras e aos mercados públicos populares, mas sem deixar de exigir condições básicas de higiene e sanidade.

Diante disso, foram avaliados os requisitos que são exigidos pelas legislações citadas acima. As alternativas para assinalar o *check list* foram: 1) Sim (10 pts.) – quando o quesito não atendia ao item observado; 2) Parcialmente (5 pts.) – quando o quesito existia mas não atendia a conformidade; 3) Não (0 pts.) – quando o quesito não atendia ao item observado; 4) Não se aplica – quando o quesito não foi considerado pertinente ao local pesquisado e; 5) Não observado – quando o quesito não foi encontrado no local pesquisado. Para determinar o percentual de adequação dos pontos de venda do mercado às disposições legais, foi empregada a fórmula de conformidade baseada na RDC 275/2002 da Vigilância Sanitária (BRASIL, 2002), qual seja:

$$\text{Conformidade (\%)} = \text{Índice real} \times 100 / \text{Total de requisitos observados}$$

Após cálculos dos percentuais, a classificação da conformidade dos locais de venda foi realizada com base também nas instruções das Boas Práticas de Fabricação (BPF), da RDC 275/2002 (BRASIL, 2002), que englobam os requisitos mínimos pela legislação quanto à manipulação e à comercialização de alimentos, como mostra a Tabela 1. Assim sendo, foram considerados como “Ruim” os valores iguais e/ou abaixo de cinquenta por cento ($\leq 50\%$), foram

classificados como “Bom” os valores que variaram de cinquenta e um a setenta e quatro por cento (51% a 74%) e, por fim, considerou-se como “Excelente” os valores que variaram de setenta e cinco a cem por cento (75% a 100%).

Tabela 1. Classificação do nível de conformidade dos pontos de venda

Classificação	Conformidade (%)	Situação
Grupo 1	De 75% a 100%	Excelente (E)
Grupo 2	De 51% a 74%	Bom (B)
Grupo 3	≤ 50%	Ruim (R)

Fonte: Adaptado da RDC 275/2002 (BRASIL, 2002).

Resultados e Discussão

Condições estruturais e higiênico-sanitárias do Mercado Francisco Bolonha

A partir da obtenção dos dados, pôde-se observar que há um equilíbrio em relação as conformidades e as desconformidades, tendo em vista que a avaliação geral das condições estruturais e higiênico-sanitárias do Mercado Francisco Bolonha resultou em 58,33% (Bom), do nível de conformidade com a legislação, conforme a Tabela 2. Apesar de ser um resultado incomum nos estudos que analisam mercados públicos e feiras populares pelo Brasil (SANTOS et al. 2016; RODRIGUES et al. 2017; COSTA et al. 2017; ROSA et al. 2019; REIS, 2019), estes dados são reflexo das recentes e recorrentes ações públicas no local, tendo em vista que, além de ser o principal e um dos mais antigo mercados de Belém, compõe o conjunto arquitetônico patrimonial do Complexo do Ver-o-Peso, tombado pelo IPHAN. Logo, por fazer parte do Cartão Postal Turístico da cidade, há um investimento maior por parte do Poder Público, diferente da situação destoante visualizada em outros mercados do município, como Rosa et al. (2019) constataram no Mercado do Distrito de Icoaraci, Belém (PA).

Tabela 2. Avaliação das condições estruturais e higiênico-sanitárias do Mercado Francisco Bolonha, Belém (PA)

Aspectos avaliados	Classificação do nível de conformidade			Avaliação
	≤ 50%	51 a 74%	75 a 100%	
I – Água	28,58%			Ruim
II – Controle integrado de pragas	50%			Ruim
III – Sanitários e vestiários		70%		Bom
IV – Instalações e edificações			75%	Excelente
Avaliação Geral		58,33%		Bom

Fonte: Própria (2020).

Acerca do item “1 – Água”, a avaliação alcançou 20 dos 70 pontos possíveis, o que corresponde a apenas 28,58% de conformidade (Tabela 3), sendo considerado pelos parâmetros de classificação da RDC 275/2002 (BRASIL, 2002) como “Ruim”. Embora disponha de água oriunda do abastecimento público e os reservatórios com boas condições de uso (dotados de tampa, livre de vazamentos, livre de infiltrações e descascamentos), o mercado não apresentava no momento da pesquisa nenhum dos demais quesitos, quais sejam: apropriada frequência de higienização do reservatório de água, existência de registros e/ou comprovantes de higienização do reservatório, laudos laboratoriais acerca da potabilidade da água, além do controle de potabilidade realizado por técnicos especializados.

Tabela 3. Aspectos avaliados referente ao abastecimento de água do mercado

I – ÁGUA		Pontuação	Resultado
1) A água utilizada é de abastecimento público;		10	Conforme
2) O mercado possui reservatório próprio (água: poço; mina; caminhão pipa);		0	Não Conforme
3) Reservatório de água dotados de tampa, satisfatória condição de uso, livre de vazamentos, infiltrações e descascamentos;		10	Conforme
4) Apropriada frequência de higienização do reservatório de água;		0	Não Conforme
5) Existência de registros da higienização do reservatório e/ou comprovante de execução do serviço em caso de terceirizadas;		0	Não Conforme
6) Potabilidade da água a partir de laudos laboratoriais;		0	Não Conforme
7) Controle de potabilidade realizado por técnico comprovadamente capacitado.		0	Não Conforme
Resultado Ideal: 70 pontos 100%	Resultado Real:	20 28,58%	Ruim

Fonte: Própria (2020).

Tal resultado mostra-se em desacordo com a legislação, pois, para a RDC 275/2002, a água utilizada para a manipulação dos alimentos deve ser potável e os reservatórios devem estar em ótimas condições de conservação (BRASIL, 2002). De forma similar à realidade encontrada no Mercado de Carnes do Ver-o-Peso, Rodrigues et al. (2017), no Município de Bom Jesus (PI), identificaram que a água que abastecia os estabelecimentos comercializadores de carne era de origem pública, porém nenhum dos reservatórios apresentava cuidados higiênicos e todos se encontravam em péssimas condições. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2018, foram notificados 503 surtos de doenças veiculadas por alimentos, em que 29,9% incriminou a água como um dos alimentos de maior suspeita (BRASIL, 2018).

Ao avaliar o item “2 – Controle integrado de pragas”, obteve-se o resultado de 50% (25 pontos), sendo considerado “Ruim” (Tabela 4). Apesar de o mercado apresentar ralos fechados, não estavam em boas condições de conservação e havia acúmulo de lixo, o qual provocava a

sua obstrução e prejudicava a sua eficiência (Figura 2). Conforme a administração do espaço, constantemente se faz uso de produtos químicos para inibir e/ou acabar com as pragas – inclusive essa prática de dedetização conta com comprovantes de execução disponibilizados pela empresa responsável pelo serviço. Todavia, evidenciou-se que as portas e as janelas não são ajustadas às patentes e não dispõem de proteção inferior. Ademais, não são adotadas outras medidas preventivas/corretivas além da dedetização para de inibir, de não abrigar e/ou proliferar pragas.

Tabela 4. Aspectos avaliados referente ao controle integrado de pragas do mercado

II – CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS		Pontuação	Resultado
8) Os ralos e grelhas são sifonados e fechados;		5	Parcialmente
9) As portas são ajustadas aos batentes, apresentam proteção na parte inferior contra entrada de insetos e roedores e possuem mola;		0	Não Conforme
10) Adota-se medidas preventivas/corretivas para não atrair, abrigar e/ou proliferar pragas;		0	Não Conforme
11) Faz uso de produtos químicos para a inibir e/ou acabar com as pragas;		10	Conforme
12) Em caso de adoção do controle químico, existência de comprovante de execução de expedido por empresa especializada;		10	Conforme
Resultado Ideal: 50 pontos 100%	Resultado Real:	25 50%	Ruim

Fonte: Própria (2020).

Figura 2. Ralos do mercado

Fonte: Própria (2020).

Segundo a RDC 275/2002, o controle integrado de vetores e pragas urbanas

[...] devem contemplar as medidas preventivas e corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou a proliferação de vetores e pragas urbanas. No caso da adoção de controle químico, o estabelecimento deve apresentar comprovante de execução de serviço fornecido pela empresa especializada contratada, contendo as informações estabelecidas em legislação sanitária específica (BRASIL, 2002, p. 7).

Nada distante, no Mercado Municipal de Icoaraci, Distrito de Belém, de acordo com a pesquisa de Rosa et al. (2019), sendo semelhante em virtude dos mercados estarem localizados na mesma cidade, enfrenta uma realidade ainda mais grave, devido ao fato do espaço estrutural se apresentar desconforme em todos os itens correspondentes à controle de pragas. Segundo os autores mencionados, o mercado não possuía controle de pragas e as caixas de gordura eram mantidas sem qualquer cobertura de proteção, propiciando a entrada de insetos e pragas que poderiam contaminar os alimentos comercializados.

Os locais em que há a presença de comerciantes e consumidores devem dispor de banheiros e/ou vestiários com o objetivo de confortar o público quando necessário para fins de necessidades pessoais, mas para isso, deve-se apresentar em bom estado estrutural e de conservação. Sendo assim, o quesito “3 – Sanitários e vestiários” ao ser avaliado, apresentou 70% de conformidade (Tabela 5), sendo considerado como “Bom”, tendo em vista que apresentou conformidade nos seguintes quesitos: existiam banheiros para uso dos feirantes e frequentadores do mercado; os sanitários possuíam tampa; os banheiros contavam com pias para a higienização das mãos e havia uma frequente coleta de lixo.

Ademais, entre as conformidades parciais estão a distância dos banheiros em relação à área de produção e de manipulação de alimentos do mercado, o bom estado de uso (com as paredes e pisos apresentando bom estado de conservação), a iluminação e a disposição de produtos de higienização (sabão líquido e toalhas descartáveis). Diante disso, nas observações constatou-se que o mercado atende às recomendações da RDC 275/2002 do Ministério da Saúde, a qual exige que os estabelecimentos contenham banheiros e/ou vestiários adequados e em bom estado de conservação, a fim de garantir um bom uso do local e garantir higienização adequada (BRASIL, 2002). Entretanto, em trabalho semelhante, Santos et al. (2016) declararam em sua pesquisa referente a um mercado de peixes localizado na Zona Leste de Teresina (PI), que mesmo com o distanciamento dos banheiros das áreas de manipulação e armazenamento, a estrutura dos banheiros encontravam-se em condições desapropriadas de uso, tendo em vista que “[...] não dispõem de mictórios, nem torneiras e portas com acionamento e fechamento automático, respectivamente. Não possuem ducha em número suficiente, estão com iluminação, ventilação e estado de conservação inadequados”.

Tabela 5. Aspectos avaliados referente ao item sanitários e vestiários do mercado

III – SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS		Pontuação	Resultado
13) Apresenta banheiros para uso dos feirantes e frequentadores		10	Conforme
14) Se existente, apresenta-se longe das áreas de produção e/ou manipulação de alimentos presentes no Mercado		5	Parcialmente
15) Pisos e paredes adequados apresentando satisfatório estado de conservação.		5	Parcialmente
16) O compartimento encontra-se em bom estado de uso		5	Parcialmente
17) Os vasos sanitários possuem assento com tampa		10	Conforme
18) Iluminação e ventilação adequadas		5	Parcialmente
19) Dispõe de lixeiras com pedais para o descarte dos papéis servidos		5	Parcialmente
20) Possui pia para a higienização das mãos		10	Conforme
21) Dispõe de produtos de higiene e assepsia (sabão líquido, álcool, toalhas descartáveis)		5	Parcialmente
22) Coleta frequente de lixo		10	Conforme
Resultado Ideal: 100 pontos 100%	Resultado Real:	70 70%	Bom

Fonte: Própria (2020).

Podendo ser considerado um dos mais importantes quando se trata do Mercado Bolonha, o item “4 – Instalações e edificações”, após a análise dos dados, apresentou 75% de conformidades, sendo considerado “Excelente”. Como mostra a Tabela 6, em que cinco dos oito itens avaliados conseguiram a nota máxima (10 pts.), sendo estes: o mercado possuía acesso livre, independente e sem comunicação com residências; o local possuía ventilação suficiente para proporcionar conforto térmico, tendo em vista que o mercado é um local aberto (Figura 3). Além disto, o piso apresentava caimento direto para os ralos (observado anteriormente na Figura 2), o sistema de esgoto juntamente com as caixas de esgoto estava livre de vazamentos, odores e apresentavam-se vedadas e em bom estado de conservação, estando também fora da área de manipulação dos alimentos (Figura 4).

Conforme a RDC 216/2004, as instalações devem ser projetadas com o objetivo de facilitar os processos de limpeza, desinfecção e as operações de manutenção. No mais, a resolução exige que “O acesso às instalações deve ser controlado e independente, não comum a outros usos” (BRASIL, 2004, s. p.). Ao analisarem as condições estruturais do Mercado Público do Município de Parnaíba (PI), Costa et al. (2017) declaram em seu estudo que o espaço estava sujo, com rejeitos espalhados, lixo exposto, esgoto aberto e exalando odor desagradável

– situação bastante comum em diversos mercados e feiras populares pelo Brasil.

Tabela 6. Aspectos avaliados referente às instalações e edificações do mercado

IV – INSTALAÇÕES E EDIFICAÇÕES DO MERCADO		Pontuação	Resultado
23) O Mercado tem acesso livre, independente e sem comunicação direta com residências		10	Conforme
24) O local possui ventilação suficiente para proporcionar conforto térmico		10	Conforme
25) Estão livres de sucata, lixo e animais		5	Parcialmente
26) O piso apresenta caimento direto para os ralos		10	Conforme
27) As instalações elétricas apresentam-se em bom estado de conservação		5	Parcialmente
28) O sistema de esgoto está livre de vazamentos e odores		10	Conforme
29) A caixa de esgoto está presente fora da área das manipulações, e está vedada		10	Conforme
30) O mercado possui local próprio e adequado para o armazenamento externo do lixo, protegido de chuva, sol, acesso de animais domésticos e roedores e livre de odores		0	Não Conforme
Resultado Ideal: 80 pontos 100%	Resultado Real:	60 75%	Excelente

Fonte: Própria (2020).

Figura 3. Corredor principal do mercado

Fonte: Própria (2020).

Figura 4. Caixas de gordura e esgoto

Fonte: Própria (2020).

No entanto, apesar de esse item ter alcançado um excelente resultado, ainda houveram conformidades parciais, ao observar que: o mercado não estava livre de sucata, lixo e animais. Em relação às instalações elétricas, quando observado no mercado em geral, a fiação não está aparente, no entanto, é importante destacar que os espaços destinados a venda de carne bovina, é aparente a exposição de fiação improvisada, indo de encontro ao que determina a RDC 216/2004 (BRASIL, 2004), quando menciona que as instalações elétricas devem estar embutidas e protegidas. Segundo alguns feirantes e a Administração do Mercado, como a energia não é forte o suficiente para alimentar a dos pontos de venda, os balcões suspensos implantados na reforma do mercado em 2007 nunca funcionaram e atualmente servem apenas de depósito para mantimentos, conforme a Figura 5. À vista disso, os feirantes utilizam pedaços de ferro enferrujado para fazer a exposição dos alimentos aos consumidores.

Consoante dispõe a RDC 216/2004 (BRASIL, 2004), os balcões devem utilizados apenas como local de armazenamento de utensílios, assim como precisam ser mantidos em bom estado de conservação e devem passar por periódicas operações de limpeza e desinfecção. Esse cenário se aproxima da pesquisa realizada por Costa et al. (2013), que evidenciaram péssimas condições higiênico-sanitárias e estruturais da edificação de minimercados de Recife (PE), bem como equipamentos, móveis e utensílios se mostravam insatisfatórios, uma vez que não atendiam aos critérios exigidos pela legislação aplicável.

Figura 5. Balcão frigorífico que não funciona, presença de sucata e fiação exposta nos pontos de venda de carne bovina do Mercado Bolonha

Fonte: Própria (2020).

Conclusões

No transcorrer desta investigação acerca das condições higiênico-sanitárias do Mercado Francisco Bolonha, a partir dos quesitos avaliados, pôde-se evidenciar que as condições estruturais do mercado, acrescidas do mau cuidado por parte das autoridades responsáveis e dos comerciantes, conformam um espaço com muitas inadequações para o comércio e para a manipulação de alimentos, uma vez que as condições atuais do mercado podem propiciar a contaminação e a disseminação de DVAs. Destarte, é essencial ofertar cursos de capacitação sobre Boas Práticas de Manipulação, a fim de que os comerciantes possam melhorar as condições de trabalho e, consequentemente, ofertar alimentos com melhor qualidade.

Referências

BRASIL. Resolução nº 216, de 15 de setembro de 2004. Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para serviços de Alimentação. Diário Oficial da União – DOU da República Federativa do Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília, DF, 15 set. 2004. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/388704/RESOLU%25C3%2587%25C3%2583O-RDC%2BN%2B216%2BDE%2B15%2BDE%2BSETEMBRO%2BDE%2B2004.pdf/23701496-925d-4d4d-99aa-9d479b316c4b>. Acesso em: 08 abr. 2019.

BRASIL. Resolução nº 275, de 21 de outubro de 2002. Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos. Diário Oficial da União – DOU da República Federativa do Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília, DF, 21 out. 2002. Disponível em:

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_275_2002_COMP.pdf/fce9dac0-ae57-4de2-8cf9-e286a383f254. Acesso em: 07 abr. 2019.

BRASIL. **Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977** [Lei de infrações à legislação sanitária]. Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências. Diário Oficial da União – DOU da República Federativa do Brasil. Presidência da República. Brasília, DF, 20 ago. 1977 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6437.htm. Acesso em: 08 abr. 2019.

BRASIL. **Surtos de doenças transmitidas por alimentos no Brasil**: informe 2018. Brasília (DF): Ministério da Saúde, 2018.

RODRIGUES, A. A. et al. Aspectos higiênico-sanitários de estabelecimentos comercializadores de carnes no município de Bom Jesus-PI. **Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal**, v. 11, n. 1, p. 94-103, 2017.

COSTA, J. et al. Condições higiênico-sanitárias e físico-estruturais da área de manipulação de carne *in natura* em minimercados de Recife (PE), Brasil. **Arquivos do Instituto Biológico**, São Paulo, v. 80, n. 3, p. 352-358, 2013.

COSTA, M. C. et al. Condições higiênico-sanitárias da carne bovina comercializada em um mercado público do Piauí. **Segurança Alimentar e Nutricional**, Campinas, v. 24, n. 1, p. 1-8, 2017.

SILVA, L. H. R. **Mercado Bolonha**: patrimônio arquitetônico e *lôcus* de práticas culturais comerciais em Belém do Pará. 2018. 118 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2018.

MATOS, J. C. et al. Condições higiênico-sanitárias de feiras livres: uma revisão integrativa. **Revista Eletrônica Gestão & Saúde**, Brasília, v. 6, n. 3, p. 2884-2893, 2015.

OLIVEIRA, F. et al. Cadeia produtiva da carne bovina no Brasil. **Revista Interação Interdisciplinar**, Mineiros, v. 1, n. 1, p. 229-244, 2017.

REIS, R. M. **Qualidade de carne bovina moída *in natura* comercializada em Manaus, AM**. 2019. 60 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2019.

ROSA, M. Y. O. et al. O risco sanitário na comercialização de alimentos em um mercado público da Amazônia: um estudo de caso em Belém (PA). **Scientia Plena**, Aracaju, v. 15, n. 10, p. 1-7, 2019.

SANTOS, E. H. B. et al. Avaliação das Condições Higiênico-Sanitárias no Comércio de Pescados em um Mercado do Peixe. **Journal of Health Sciences**, Londrina, v. 18, n. 3, p. 151-158, 2016.

SÃO PAULO (Município). **Portaria nº 2619, de 6 de dezembro de 2011**, Dispõe sobre o Regulamento de Boas Práticas e de Controle de condições sanitárias e técnicas das atividades relacionadas à importação, exportação, extração, produção, manipulação, beneficiamento, acondicionamento, transporte, armazenamento, distribuição, embalagem, reembalagem,

fracionamento, comercialização e uso de alimentos, águas minerais e de fontes, bebidas, aditivos e embalagens para alimentos. Secretaria Municipal de Saúde. São Paulo, SP, 6 dez. 2011. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/portaria_2619_1323696514.pdf. Acesso em: 07 abr. 2019.

SILVA, I. S.; CASTRO, E. M. R. Interações rural-urbano: a sociobiodiversidade e o trabalho em portos, feiras e mercados de Belém, Pará. **Novos Cadernos NAEA**, Belém, v. 16, n. 1, p. 109-126, 2013.

CAPÍTULO 53: TREINAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMÉRCIO AMBULANTE DE GARANHUNS-PE

CHAPTER 53: TRAINING GOOD PRACTICES IN FOOD HANDLING FOR AMBULANT TRADE IN GARANHUNS-PE

Mirelly Costa da Silva¹; Gerla Castello Branco Chinelate²

Resumo

A aplicação de Boas Práticas de Manipulação e Procedimento Operacionais Padronizados em todos os serviços de alimentação, é de grande importância, tendo em vista que a falta de higiene e conscientização dos manipuladores de alimentos é uma das principais fontes de contaminação. O presente trabalho apresenta as atividades desenvolvidas em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal do município de Garanhuns/PE. Desta forma o objetivo geral desse trabalho foi avaliar as condições higiênicas destes estabelecimentos, baseada em legislações sanitárias vigentes. Foram realizados o acompanhamento, orientações e treinamentos com os vendedores ambulantes e estabelecimentos durante as festividades oficiais do calendário da cidade com o intuito de reduzir ao máximo os riscos contaminação, utilizando ferramentas de qualidade, para trabalhar a respeito da necessidade e importância da higiene e segurança alimentar no preparo de refeições, aplicando as Boas Práticas de Manipulação de Alimentos (BPMA) e dos Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) fundamentadas pela Resolução RDC nº216/04 ANVISA. Nos resultados e observações feitas validou-se que a falta de boas práticas por parte de alguns manipuladores compromete a segurança alimentar da população.

Palavras-Chave: Segurança dos alimentos, Saúde dos consumidores, Comércio ambulante.

Abstract

It is of great importance to apply Good Standard Handling Practices and Operating Procedures in all food services, considering that the hygiene and awareness of food handlers is one of the main sources of contamination. The present work presents the activities developed in partnership with the Municipal Health Surveillance of the municipality of Garanhuns / PE. Thus, the general objective of this work was to evaluate the hygienic conditions of these establishments, based on current sanitary legislation. Follow-up, guidance and training were carried out with street vendors and establishments during the official festivities of the city calendar in order to reduce the contamination risks as much as possible, using quality tools, to work on the need and importance of hygiene and safety food in the preparation of meals, applying Good Food Handling Practices (BPMA) and Standard Operating Procedures (POPs) based on Resolution RDC nº216 / 04 ANVISA. In the results and observations made, it was validated that the lack of good practices on the part of some handlers compromises the food security of the population.

Keywords: Food safety, Consumer health, Street commerce.

¹Engenharia de Alimentos, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, eng.mirellycosta@gmail.com

² Doutora em Biotecnologia, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, gerla.chinelate@ufape.edu.br

Introdução

A comercialização de alimentos por ambulantes pode causar um grande risco para a saúde dos consumidores, se os alimentos não forem ofertados a população de maneira correta, seja pela falta de estrutura física adequada ou manipuladores de alimentos que não são capacitados, o que torna a segurança alimentar um grande desafio, já que esse tipo de comércio ambulante pode se instalar em vias públicas, parques, festividades e outros, fazendo assim que seja mais difícil o controle de qualidade e segurança dos alimentos. A falta de conhecimento, informação e investimento nesses pequenos estabelecimentos de alimentação reproduzem uma baixa qualidade dos alimentos e produtos comercializados.

Em estabelecimentos comerciais de alimentos, é de grande prioridade que qualidade seja garantida, posto que a cada dia que se passa só aumenta o hábito de realizar refeições fora de casa. Segundo dados do IBGE, o brasileiro gasta cerca de 25% de sua renda com alimentação fora do lar. A Associação de Bares e Restaurantes (ABRASEL) estima que o setor represente, hoje, 2,7% do PIB brasileiro. Já a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA) destaca que o setor tem crescido a uma média anual de 14,2%. (SEBRAE, 2019). Esses serviços apresentam grandes vantagens para o consumidor, como uma grande variedade de opções, uma rapidez de atendimento e custos acessíveis. No entanto, existem alguns elementos preocupam os órgãos responsáveis pela fiscalização da área de alimentação, tais como a insegurança dos alimentos, pelo maior tempo de exposição em temperaturas inadequadas. Além de mostrar a legislação, os programas de Boas Práticas devem sensibilizar o profissional para a adoção de boas práticas operacionais na manipulação, preparo e comércio de alimentos mais seguros (SOUZA et al., 2015). Além disso, alimentação fora do lar se tornou uma alternativa viável economicamente, por todas suas facilidades e por ser também uma forma de sustento para as famílias, a alimentação na “rua” pode ser considerada uma manifestação cultural local, que vai além da função nutricional, oferecendo muitas vezes uma experiência gastronômica aos consumidores (PERTILE, 2013).

Por esse motivo é fundamental a implantação de Boas Práticas de Manipulação (BPM) e de ser necessário uma rigorosa fiscalização, para que sejam evitadas as Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA's) que são originadas do consumo de alimentos e bebidas contaminadas, que podem comprometer a saúde dos consumidores, levando assim um risco para a população.

O Manual de Boas Práticas (BPM) é um documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento incluindo, no mínimo, os requisitos sanitários dos edifícios; a manutenção e a higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios; o controle da higiene e saúde dos manipuladores; o controle e garantia de qualidade do produto final. Além

disso, objetiva descrever os procedimentos adotados para atender os requisitos às Boas Práticas, incluindo desde aspectos de higiene pessoal, projetos e instalações, limpeza e sanitização de equipamentos e utensílios, até controles aplicados aos processos para assegurar a produção de alimentos seguros (ANVISA, 2006). Doenças transmitidas por alimentos (DTA) são aquelas causadas pela ingestão de alimentos e/ou água contaminados. Existem mais de 250 tipos de DTA no mundo, sendo que a maioria delas são infecções causadas por bactérias e suas toxinas, vírus e outros parasitas.

Material e Métodos

O trabalho foi desenvolvido no município de Garanhuns- PE, de início, foram realizadas reuniões na VISA, para discussão a respeito das atividades a serem realizadas em dois grandes eventos no município: Festival Viva Dominginhos e Festival de Inverno de Garanhuns, com a definição dos procedimentos a serem seguidos. Todos os comerciantes cadastrados para trabalharem nos eventos passaram por análises documentais, tais como certificados de funcionamento e demais documentos para que fosse liberado o funcionamento e a comercialização, como o diagnóstico geral do setor de produção de alimentos dos estabelecimentos envolvidos no projeto segundo a RDC N°216 de 15 de setembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para os Serviços de Alimentação. Os requisitos avaliados serão relativos a Higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios; Controle da potabilidade da água; Higiene e saúde dos manipuladores; Manejo dos resíduos; Manutenção preventiva e calibração de equipamentos; Controle integrado de vetores e pragas urbanas; Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens e Programa de recolhimento de alimentos.

Durante os encontros foram realizados treinamentos através do curso de capacitação para os ambulantes devidamente cadastrados, em parceria com o SEBRAE de Garanhuns. Onde também foram realizadas reuniões e feitos acompanhamentos nos pontos de comércio ambulante de alimentos e bebidas, juntamente com os agentes e fiscais da Vigilância Sanitária (ANVISA) do município, para que fosse feito um diagnóstico das condições higiênico-sanitárias dos mesmos, e análise de verificação de aplicação das Boas Práticas de Manipulação (BPM) e Boas Práticas de Fabricação (BPF) que são baseadas nas Resoluções RDC n°. 216/2004, e na RDC n°. 275/2002.

Resultados e Discussão

O treinamento dos manipuladores de alimentos envolve atividades com o objetivo de

capacitar para o preparo de alimentos, por meio de mecanismos que possibilitem a transmissão dos conceitos importantes sobre as técnicas operacionais e de informações sobre o controle higiênico sanitário.

A capacitação dos ambulantes foi ministrada através de reuniões e palestras, onde foi trabalhado a respeito de como os manipuladores de alimentos deveriam se portar e sobre os procedimentos de higiene e limpeza dos equipamentos e alimentos, contaminação alimentar, uso correto dos uniformes, higienização das mãos, e todos os cuidados necessários para foi distribuído um material de auxílio, que continham todas as instruções e orientações a respeito de como garantir uma qualidade e segurança alimentar e também uma Cartilha de Boas Práticas de Manipulação elaborada pela aluna de extensão como parte do projeto.

Durante os dias e as noites dos festivais foram feitos acompanhamento em todas as barracquinhas dos ambulantes que estavam presentes, aos cadastrados foi feita a verificação se estavam dentro das normas estabelecidas pela RDC (Figura 1). Os comerciantes que não estavam dentro do padrão estabelecido sofreram apreensão de seus alimentos e novamente orientados a respeito das normas.

Durante o acompanhamento foram verificadas as condições higiênico-sanitárias dos pontos de comércio, formas de armazenamento, distribuição e exposição dos alimentos comercializados, e também análise de validade e condições físicas dos mesmos, foi observado também o comportamento dos ambulantes desde a abordagem inicial, durante a observação de alguns problemas encontrados: nas instalações; bancadas e utensílios; exposição, manipulação, armazenamento dos alimentos até a etapa final de orientação e conscientização quanto aos princípios de manipulação e segurança alimentar a ser tomados, da parte de alguns manipuladores houve uma certa resistência a aplicação dos métodos de Boas Práticas, mais ao longo da orientação e explicação dos riscos, foi visto que a conscientização a respeito da segurança alimentar. A respeito das problemas encontrados em utensílios e até mesmo em produtos fora da data de validade e/ou impróprios para consumo, os mesmos foram recolhidos e foi feita uma advertência e orientação ao ambulante responsável, foi encontrado em uma das barracas queijo, refrigerantes e ervilhas vencidos, colheres de pau, e com refeições sendo servidas sem a devida refrigeração, o que facilita a contaminação dos alimentos, levando riscos à saúde dos consumidores.

Figura 1. Visitas aos ambulantes juntamente com a equipe da Vigilância Sanitária Municipal.

A cartilha distribuída foi elaborada a partir de ferramentas de qualidade, de acordo com a legislação vigente, utilizando as metodologias de Boas Práticas de Manipulação e dos Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs), e também seguindo a Resolução RDC nº216/04 ANVISA. A cartilha completa pode ser verificada no Apêndice.

É necessário ressaltar que esses treinamentos devem ser atualizados, sempre que for necessário. Pode ser feito de duas formas: expositiva e prática, aumentando a motivação e a capacidade de resolução e prevenção dos problemas diários da empresa por meio de reflexões sobre situações já vivenciadas. A qualidade dos alimentos é um sistema preventivo, com disposição de controles e condições de trabalho que antecipem os problemas, seguido de

programas, ferramentas, procedimentos e normas. As ações para garantir a qualidade exigem o comprometimento de toda a equipe envolvida direta e indiretamente no processo produtivo (SENAI, 2003). Mesmo com a capacitação e orientação prévia feita nas reuniões, a ausência de alguns ambulantes gera dificuldades no ato de manter a segurança da população, e isso merece preocupação, sendo necessária uma educação sanitária mais precisa e que seja feito um trabalho maior e constante com esses ambulantes, no mais amplo sentido, que deverá alcançar não somente a capacitação mais reduzir os hábitos e costumes tradicionais que, por si só, criam um risco à saúde. Por esse motivo devem haver programas de capacitação e reciclagem de aperfeiçoamento constante para os ambulantes, a fim de assegurar que as normas e os princípios higiênico-sanitários sejam respeitados. É de grande importância também que os órgãos responsáveis fiscalizem constantemente os ambulantes, somente assim será possível certificar o controle da saúde do consumidor.

Conclusões

A realização de ações educativas direcionadas aos ambulantes e além de campanhas educativas constantes onde deve ser trabalhado a respeito das Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, os conscientizando a respeito dos riscos que eles podem estar levando a população e a eles mesmo se não seguirem com as normas estabelecidas. É necessário persistência e dedicação por parte dos órgãos públicos, nesses trabalhos e além de apoio e interesse dos ambulantes e uma maior exigência dos consumidores, já que durante o trabalho foi observado grande resistência da parte de alguns ambulantes.

Referências

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Cartilha sobre boas práticas para serviços de alimentação: RDC nº 216/2004**. Brasília, 2004.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC n. 216, de 15 de setembro de 2004. **Dispõe sobre regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação**. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 16 set. 2004. p. 1-10.

BRASIL. Ministério da saúde. **Doenças transmitidas por alimentos: causas, sintomas, tratamento e prevenção**. Disponível em: < <http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/doencas-transmitidas-por-alimentos>>. Acesso: em: 26 de out. 2019.

SACCOL, A.L.F. et al. **Lista de avaliação de boas práticas para serviços de alimentação: RDC 216/2004, ANVISA**. São Paulo: Varela, 2006. 47p.

SANTOS, Ruama Araújo. **SEBRAE. Mercado de alimentação fora do lar**, 2019. Disponível

em: < <https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ac/artigos/alimentacao-fora-do-lar,19cfb3656dc20610VgnVCM1000004c00210aRCRD> >. Acesso: em 26 de out. 2019.

SENAI. **Trabalhando com segurança na produção de alimentos**. Rio de Janeiro, SENAI/DN. 32p (Série Qualidade e Segurança Alimentar) Projeto APPCC. Convênio CNI/SENAI/SEBRAE. (2003).

SILVA JR. E. A. **Manual de Controle Higiênico Sanitário em Alimentos**. 4ª Edição. São Paulo. Editora Varela, 2001.

SIQUEIRA, **Treinamento sobre higiene e controle de qualidade para manipuladores de alimentos de uma unidade de alimentação e nutrição**. Revista Higiene Alimentar, São Paulo, v. 22, n.166/167, dez.2005. p. 32 – 37.

SOUZA, G. C. et al. **Comida de rua: avaliação das condições higiênico-sanitárias de manipuladores de alimentos**. Ciência & Saúde Coletiva, v. 20, n. 8, p. 2329-2338, 2015.

VEIGA, C.F. et al. **Estudo das condições sanitárias dos estabelecimentos comerciais de manipulação de alimentos no município de Maringá, PR**. Hig. Aliment., São Paulo, v. 20, n. 138, p. 28-36, 2006.

Segundo pesquisa, 34% dos brasileiros gastam com alimentação fora do lar. Exame.abril.com.br. 28 abril de 2017. Disponível em: <<https://exame.abril.com.br/negocios/dino/segundo-pesquisa-34-dos-brasileiros-gastam-com-alimentacao-fora-do-lar-shtml/>> Acesso em: 26 de out. 2019.

APÊNDICE: CARTILHA DE BOAS PRÁTICAS DE FABICAÇÃO

CARTILHA DE BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	3
O QUE SÃO BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO?	4
O QUE É O MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO (BPM)?	4
O QUE É PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO (POP)?	4
QUEM É O MANIPUADOR?	5
- ONZE REGRAS ESSENCIAIS PARA O MANIPUADOR	5
DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (DTA)	5
TIPOS DE CONTAMINAÇÃO E RISCOS	6
COMO CONTROLAS OS RISCOS? IMPLANTANDO AS BPM!!!	7
- LAVAGEM CORRETA DAS MÃOS:	8
- COMO DEVE SER O LOCAL DE TRABALHO:	9
- CUIDADOS QUE DEVEM SER TOMADOS COM OS INGREDIENTES NO PREPARO DE ALIMENTOS:	10
A COMIDA ESTÁ PRONTA, VAMOS SERVI-LA DE MANEIRA CORRETA?	11
E O LIXO? O QUE FAZER	12
REFERÊNCIAS	12

APRESENTAÇÃO

*É necessário estabelecer procedimentos de Boas Práticas para serviços de alimentação a fim de assegurar condições higiênico-sanitárias do alimento preparado e saúde aos consumidores, deve existir a aplicação das **Boas Práticas de Manipulação** nos serviços de alimentação que exercem as seguintes atividades: como a manipulação, no preparo, armazenamento, distribuição, exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao consumo, tais como cantinas, bufês, confeitarias, cozinhas industriais, cozinhas institucionais, lanchonetes, padarias, pastelarias, e restaurantes seguindo as normas estabelecidas pela RDC N° 216 ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária.*

O QUE SÃO BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO?

São práticas de higiene que devem ser obedecidas pelos manipuladores de alimentos, desde a escolha e compra dos produtos a serem utilizados no preparo do alimentos até a venda para o consumidor. O objetivo das Boas práticas de manipulação é evitar a ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados, o que leva risco à saúde do consumidor e do manipulador.

IMAGEM: GOOGLE

O QUE É O MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO (BPM) ?

IMAGEM:GOOGLE

O manual de Boas Práticas é um documento que descreve o trabalho executado no estabelecimento e a forma correta de fazê-lo. Nele, pode-se ter informações gerais sobre como é feita a limpeza, o controle de pragas, da água utilizada, os procedimentos de higiene e controle de saúde dos funcionários, o treinamento de funcionários, o que fazer com o lixo e como garantir a produção de alimentos seguros e saudáveis.

O QUE É PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO (POP)?

O Procedimento Operacional Padronizado (POP) é um documento que descreve passo-a-passo como executar as tarefas no estabelecimento. É como uma receita de bolo, que deve ser seguida rigorosamente, para que tudo vá bem. O POP destaca as etapas da tarefa, os responsáveis por fazê-la, os materiais necessários e a frequência em que deve ser feita. Como os POP são documentos aprovados pelo estabelecimento, por meio do responsável, é dever de cada manipulador segui-los.

QUEM É O MANIPUADOR?

IMAGEM: SESC

Todas as pessoas que trabalham com alimentação são consideradas “manipuladores de alimentos”, ou seja, quem produz, coleta, transporta, recebe, prepara e distribui o alimento, é dever do mesmo fazer a segurança do alimento para evitar as Doenças Transmitidas por Alimento (DTA)

ONZE REGRAS ESSENCIAIS PARA O MANIPUADOR

ENQUANTO ESTIVER MANIPULANDO ALIMENTOS NÃO SE DEVE:

- 1- COÇAR.
- 2- FALAR, TOSSIR OU ESPIRRAR SOBRE OS ALIMENTOS
- 3- COLOCAR O DEDO NO NARIZ, NA ORELHA OU NA BOCA
- 4- ASSOAR O NARIZ.
- 5- CUSPIR NO CHÃO DO LOCAL DE TRABALHO.
- 6- MASCAR CHICLETES, PALITOS OU OUTRAS COISAS PARECIDAS
- 7- PENTEAR NEM PASSAR AS MÃOS NO CABELO
- 8- FUMAR NOS AMBIENTES DE PREPARO, MANIPULAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS.
- 9- PROVAR ALIMENTOS COM AS MÃOS OU PROVAR COM TALHERES E COLOCÁ-LOS DE NOVO NA PANELA SEM ANTES HIGIENIZÁ-LOS
- 10- MEXER EM DINHEIRO
- 11- USAR UTENSÍLIOS NÃO HIGIENIZADOS PARA MEXER OU SERVIR ALIMENTOS

IMAGEM : GOOGLE

DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (DTA)

São doenças provocadas pelo consumo de alimentos que ocorrem quando microrganismos prejudiciais à saúde, parasitas ou substâncias tóxicas estão presentes no alimento. Os sintomas mais comuns de DTA são vômitos e diarreias, podendo também apresentar dores abdominais, dor de cabeça, febre, alteração da visão, olhos inchados, dentre outros. Para adultos saudáveis, a maioria das DTA dura poucos dias e não deixa sequelas; já para as crianças, as grávidas, os idosos e as pessoas doentes, as consequências podem ser mais graves, podendo inclusive levar à morte.

IMAGEM: GOOGLE

TIPOS DE CONTAMINAÇÃO E RISCOS

A contaminação pode ocorrer de três maneiras, através da contaminação por parasitas, microrganismos e contaminação física.

- *Contaminação por parasitas:*

Os parasitas como: ameba, giárdia e vermes podem estar presentes no solo, na água e no intestino dos homens e dos animais, podendo então contaminar os alimentos e causar doenças. Na contaminação por parasitas, deixar lixo exposto, ambiente sujos e desorganizados são os lugares mais oportunos para vetores de contaminação, como: ratos, baratas e outros insetos.

- *Contaminação por Microrganismos:*

Se não forem tomados alguns cuidados, os micróbios que contaminam o alimento podem se multiplicar rapidamente e causar doenças; Na contaminação por Microrganismos, não podem ser vistos a olho nu, e são umas dos maiores contaminadores de alimentos, apresentam diversas formas como: bactérias, fungos e vírus, nem sempre alteram o odor e sabor dos alimentos agindo silenciosamente. Deve se manter as mãos sempre limpas, ao chegar no trabalho, quando espirrar, tossir ou assoar o nariz, depois de recolher o lixo, pegar em dinheiro, ou usar o banheiro. Os micróbios multiplicam-se nos alimentos quando encontram condições ideais de nutrientes, umidade e temperatura.

- *Contaminação Física:*

Qualquer corpo estranho encontrado no alimento, como pequenos pedaços de vidro ou madeira, insetos, metais ou cabelo; Na contaminação física, pode estar no estouro de uma lâmpada, na utilização de colher de pau, por essa maneira se deve fazer a manutenção dos equipamentos, para evitar que alguma parte solte, manter tudo sempre organizado e limpo; fazer sempre a barba e o bigode e manter as unhas curtas sem esmalte e base.

OS RISCOS ESTÃO EM TODA PARTE!!!

IMAGEM:SESC

COMO CONTROLAS OS RISCOS? IMPLANTANDO AS BPM!!!

As Boas Práticas são regras que, quando praticadas, ajudam a evitar ou reduzir os perigos.

As Boas Práticas envolvem:

- *adequação e manutenção das instalações;*
- *prevenção da contaminação por utensílios, equipamentos e ambientes;*
- *prevenção da contaminação por colaboradores;*
- *prevenção da contaminação pelo ar ambiente (ar condicionado, condensação etc.);*
- *prevenção da contaminação por produtos químicos;*
- *controle de pragas;*
- *garantia da qualidade da água (ex: limpeza da caixa d'água);*
- *cuidado com o lixo.*

IMAGEM: GOOGLE

- **LAVAGEM CORRETA DAS MÃOS:**

Para lavagem correta das mãos siga os seguintes passos:

- 1. Utilize a água corrente para molhar as mãos;*
- 2. Esfregue a palma e o dorso das mãos com sabonete, inclusive*
- 3.as unhas e os espaços entre os dedos, por aproximadamente 15 segundos;*
- 3. Enxágue bem com água corrente retirando todo o sabonete;*
- 4. Seque-as com papel toalha ou outro sistema de secagem eficiente;*
- 5. Esfregue as mãos com um pouco de produto anti-séptico;*

IMAGEM: GOOGLE

- **COMO DEVE SER O LOCAL DE TRABALHO:**

O ambiente de trabalho deve ser mantido sempre limpo e organizado, livre de bagunça, o chão da cozinha sempre limpo e varrido antes da produção, e nunca durante a produção dos alimentos, para evitar a poeira que pode se acumular sobre os alimentos, móveis e utensílios devem ser guardados em lugares limpos e secos, protegidos da poeira, moscas e outros insetos; equipamentos devem estar com manutenção em dia, em bom estado de conservação e limpos, durante a limpeza os mesmo devem ser desmontados e higienizados parte por parte.

SIM

IMAGEM: ANVISA

NÃO

IMAGEM: ANVISA

IMAGEM: SESC

- ***CUIDADOS QUE DEVEM SER TOMADOS COM OS INGREDIENTES NO PREPARO DE ALIMENTOS:***

IMAGEM:GOOGLE.

PARA COMEÇAR...

Lave bem as mãos antes de usar a cozinha;

NA PIA...

Esponjas podem ter restos de comida, que favorecem o surgimento de bactérias

Não use a mesma água com sabão para lavar a louça várias vezes.

Não se deve utilizar utensílios de madeira na cozinha, pois a madeira é bastante absorvente e de difícil higienização, levando ao acúmulo de bactérias que pode vir a contaminar os alimentos que estão sendo preparados, os utensílios a serem utilizados devem ser feitos de alumínio ou vidro.

Não reutilize o mesmo utensílio para manipular alimentos diferentes, não deixe que alimentos crus se misturem aos prontos para consumo, não manipule alimentos já higienizados.

IMAGEM:SESC

Produtos que exigem mais cuidado

- Geladeira
- Liquidificador
- Batedeira
- Espremedor
- Processador
- Mixer

Eletrodomésticos "quentes", como fogão, sanduicheira, torradeira, forno elétrico e micro-ondas, também precisam ser limpos após o uso

IMAGEM: GOOGLE

Não use ou compre produtos com embalagens amassadas, estufadas, enferrujadas, abertas ou com algum tipo de defeito. Deve-se limpar as embalagens antes de abri-las, os ingredientes que não forem totalmente usados devem ser armazenados em recipientes limpos e identificados com nome, data da abertura da embalagem e o prazo de validade.

A COMIDA ESTÁ PRONTA, VAMOS SERVI-LA DE MANEIRA CORRETA?

Os equipamentos (estufas, balcões, buffets, geladeiras, freezers, etc.) devem estar conservados, limpos e funcionando bem. A temperatura das estufas, bufês e geladeiras devem estar reguladas de forma que os alimentos quentes permaneçam acima de 60°C e os alimentos frios permaneçam abaixo de 5°C. Procure diminuir ao máximo o tempo entre o preparo e a distribuição dos alimentos. Os balcões e bufês devem ser protegidos para que os clientes não contaminem os alimentos enquanto se servem. Os funcionários responsáveis por servir o alimento devem estar sempre com as mãos lavadas. Os funcionários que manipulam o alimento (mesmo com guardanapos, pegadores e talheres) não podem pegar em dinheiro. Os funcionários responsáveis por servir o alimento devem estar sempre com as mãos lavadas. Os funcionários que manipulam o alimento (mesmo com guardanapos, pegadores e talheres) não podem pegar em dinheiro.

E O LIXO? O QUE FAZER.

IMAGEM: SESC

A cozinha deve ter lixeiras de fácil limpeza, com tampa e pedal. Retire sempre o lixo para fora da área de preparo de alimentos em sacos bem fechados. Após o manuseio do lixo, deve se lavar as mãos.

O lixo pode atrair insetos e outros animais para a área de preparo dos alimentos, o que é um meio ideal para a multiplicação de microrganismos patogênicos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Cartilha sobre boas práticas para serviços de alimentação: RDC nº 216/2004. Brasília, 2004.

SIQUEIRA, Treinamento sobre higiene e controle de qualidade para manipuladores de alimentos de uma unidade de alimentação e nutrição. Revista Higiene Alimentar, São Paulo, v. 22, n.166/167, dez.2005. p. 32 – 37.