**РІЗНОМАНІТНІСТЬ ГЕНОТИПІВ АМПЕЛОГРАФІЧНОГО РЕПОЗИТОРІЮ
ННЦ «ІВІВ ІМ. В. Є. ТАІРОВА» ТА ЇХ ПОТЕНЦІАЛ У СЕЛЕКЦІЇ**

**І. А. Ковальова, В. В. Скрипник, В. В. Власов, Н. А. Мулюкіна, Л. В. Герус,
М. Г. Федоренко, О. В. Салій**

*Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова» НААН,
вул. 40-річчя Перемоги, 27, смт Таїрове, м. Одеса, 65496, Україна*

Створено ознакову колекцію сортів-донорів цінних господарських ознак, зокрема безнасінності. Аналіз частини реєстрових сортів за шкалою стійкості проти грибних хвороб довів існування тенденції до підвищення адаптивності у сортів нового покоління.

За ступенем розвитку рудиментів насіння проведено оцінку 36 сортів винограду з 12 країн світу, виділено кишиниші першої категорії, які в подальшому можуть бути використані як батьківські компоненти у схрещуваннях.

Було складено ароматичні профілі вин з ягід нових технічних сортів та форм винограду, підтверджено їх безперечні смакові якості. Перспективні столові сорти були виділені за такими показниками, як величина грона та ягоди, товарність грон на куці.

Використання методів SSR-аналізу дозволило підтвердити походження досліджуваних сортів, що особливо актуально для зразків, одержаних за допомогою суміші пилку.

Ключові слова: *SSR-аналіз, генотип, стійкість, безнасінність, сорт, органолептичний профіль, товарність, великоплідність, великоягідність.*

Загальна площа виноградників в Україні становить майже 40 000 га. Історія українського виноградарства бере свій початок з часу заснування давньогрецьких колоній на території північно-чорноморського регіону (700–600 рр. до н. е.).

До першого офіційного Державного реєстру рослин України (1936 р.) було занесено 30 інтродукованих та лише один місцевий сорт. Станом на серпень 2019 р. в ньому було 57 % сортів української селекції, з них 55 % – селекції ННЦ «ІВІВ ім. В. Є. Таїрова». Селекційні завдання, згідно з якими створювались ці сорти, були пов'язані з особливостями клімату Північного Причорномор'я (континентальний і сухий, взимку температура знижується до -26–28 °C) та грибними хворобами, що спричиняють епі-

фітотії двічі чи більше на 10 років. Нові сорти винограду переважно створені на основі 3–4 різних родів *Vitis*, вони є нащадками у 5–6 покоління від перших схрещувань, проведених у рамках селекційних програм «Веселка» для столового винограду та «Стійкість + якість». Більшість нових сортів потребують лише 5 (7 – в умовах епіфітотії) обприскувань фунгіцидами замість 8 (10 – під час епіфітотії) загальноприйнятих для сортів *Vitis vinifera*, тому вони придатні для адаптивного, а в перспективі і для органічного виноградарства [1, 2].

Вимоги сучасного ринку виноградарської продукції, а саме затребуваність кишинишів сортів, формують нові селекційні завдання. На сьогодні в ампелографічній колекції ННЦ «ІВІВ ім. В. Є. Таїрова» для виз-

Інформація про авторів:

Ковальова Ірина Анатоліївна, канд. с.-г. наук, директор, email: ikovalova@ukr.net,
<https://orcid.org/0000-0002-1117-9750>

Скрипник Вячеслав Вікторович, аспірант відділу селекції, генетики та ампелографії,
e-mail: slaviik27@ukr.net, <https://orcid.org/0000-0002-5917-596X>

Власов Вячеслав Всеволодович, старший науковий співробітник, академік, доктор с.-г. наук, радник дирекції, e-mail: vvv_tair@ukr.net, <https://orcid.org/0000-0002-7390-7047>

Мулюкіна Ніна Анатоліївна, старший науковий співробітник, доктор с.-г. наук, заступник директора з наукової роботи, e-mail: tairmna2005@ukr.net, <https://orcid.org/0000-0002-5935-6015>

Герус Людмила Василівна, канд. с.-г. наук, в. о. завідуючого відділом селекції, генетики та сортовищення, e-mail: lg0377_77@ukr.net, <https://orcid.org/0000-0001-8154-4795>

Федоренко Марина Григорівна, науковий співробітник відділу селекції, генетики та ампелографії, e-mail: marinatairovo@ukr.net, <https://orcid.org/0000-0001-8477-8490>

Салій Олена Василівна, науковий співробітник відділу селекції, генетики та ампелографії, e-mail: helena_saliy@ukr.net, <https://orcid.org/0000-0002-3658-8315>

начення сортів-донорів за ознакою «безнасінність» досліджено 36 сортів різного генетичного та географічного походження. Кращі з них вже використовуються у подальшому селекційному процесі.

Мета дослідження полягала в аналізі частини реєстрових сортів за шкалою стійкості проти грибних хвороб, оцінці групи кишмишних сортів за ознакою безнасінності, оцінці нових технічних сортів за ароматичними якостями і столових – за показниками крупноплідності й товарності, а також у проведенні SSR-аналізу для ДНК-паспортизації сортів і підтвердження їх походження.

Матеріали та методи дослідження. Виноградні насадження містилися на експериментальних ділянках ННЦ «ІВІВ ім. В. Є. Таїрова» (Таїрово, Одеса, Україна). Дослідження проводили впродовж 2016–2019 рр. Стійкість в польових умовах визначали у період інтенсивного росту кущів і в період досягання урожаю (травень - вересень) на природному інфекційному фоні за 9-бальною шкалою ОІВ і методом М. Г. Банковської (2007 р.) [3]. Для визначення категорії безнасінності спиралися на методику

К. В. Смирнова (1962 р.) [4, 5].

ДНК одержували із замороженого листового матеріалу (-20 °С) за допомогою набору для виділення рослинної ДНК (QIAGEN). SSR-аналіз був проведений за дев'ятьма мікросателітними локусами (VVS2, ZAG62, ZAG79, VVMD5, VVMD7, VVMD25, VVMD27, VVMD28, VVMD32) на 80 інтродукованих та власної селекції сортах, з них 54 столових і технічних сортів і 19 кишмишних сортів, відібраних на колекційних та селекційних ділянках ННЦ «ІВІВ ім. В. Є. Таїрова» [6–9].

Для з'ясування винних смакових якостей (сортів Загрей, Одеський жемчуг, Ярило) спиралися на органолептичний аналіз та метод профілювання вин.

Результати дослідження. З метою поповнення бази даних сортів-донорів та джерел цінних ознак, зокрема донорів безнасінності, був проведений аналіз з встановлення частки насіння у ягодах 36 кишмишних сортів з колекції ННЦ «ІВІВ ім. В. Є. Таїрова», виділених серед більш ніж 700 сортотразків за ознакою «безнасінність». Всі вони різнилися за генетичним та географічним походженням (рис. 1).

Рис. 1. Походження групи безнасінних сортотразків.

Найбільшу частку становили сорти американського та вітчизняного походження. Для визначення категорії безнасінності досліджували масову частку насіння у складі ягоди (рис. 2).

Щодо групи безнасінних сортотразків, маса 100 ягід коливалась у межах від 70 г

(Кишмиш зимостійкий) до 500 г (Rusalka 3) (табл. 1). Насіння у сортів даної групи рудиментарне, хоча й різнилось за кількістю та масою. Так, у 100 ягодах містилось від 13 до 445 насінин масою від 0,7 до 5 г. Менше 100 насінин у 100 ягодах виявлено у сортів Rusalka (74 шт.), Centennial Seedless (70 шт.),

Рис. 2. Розподіл сортів за категорією безнасінності.

1. Характеристика різних сортів винограду, зважаючи на категорію безнасінності

Сорт	Маса 100 ягід, г	Кількість насінин, шт.	Маса насіння у 100 ягодах, г	Маса насіння у ягоді, мг	Категорія безнасінності
Rusensko bez seme	240	170	2,2	22	IV
Rusalka	140	74	0,2	2	I
Rusalka 3	500	212	2,7	27	IV
Кишмиш рожевий	130	102	0,2	2	I
Attika seedless	410	260	3	30	IV
Кишмиш лучистый	410	220	3	30	IV
Кишмиш зимостойкий	70	274	1,5	15	IV
Русбол	170	294	4,1	41	IV
Эльф	150	270	2,5	25	IV
Princess	390	137	0,4	4	I
Centennial Seedless	260	70	0,1	1	I
Hrushaki	130	51	0,07	0,7	I
Perlett	160	157	0,2	2	I
Sultanina	110	135	0,2	2	I
Romulus	160	128	1	10	II
Flame seedless	220	198	1	10	II
Interlaken seedless	130	49	0,06	0,6	I
Jupiter	340	224	3	30	IV
Einset seedless	200	244	1,5	15	IV
Glenora	190	120	0,5	5	I
Himrod	170	51	0,08	0,8	I
Lakemont	200	48	0,1	1	I
Marquis	240	164	0,2	2	I
Mars	230	160	1	10	II
Prima seedless	180	102	0,15	1,5	I
Venus	220	200	2	20	IV
Кишмиш Ваткана	200	274	1,8	18	IV
Кишмиш ВИРа	300	309	2,5	25	IV
Сирануш	280	348	2,8	28	IV
Кишмиш узун башлы	220	251	3	30	IV
Надранний безнасінний Магарача	120	246	2	20	IV
Кишмиш ОСХИ	170	253	1,2	12	III
Кишмиш таїровський	160	128	1	10	II
Мечта	200	209	3	30	IV
Ялтинський безнасінний	220	445	9,4	94	IV
Beogradzka beszemena	330	100	0,5	5	I

Hrushaki (51 шт.), Interlaken seedless (49 шт.) та Lakemont (48 шт.).

Безперечно, кращим є сорт Sultanina. Саме його нащадки, навіть, якщо це 5–6 покоління, належать до першої категорії безнасіності – в ягоді або повністю відсутнє насіння, або є 1–2 м'яких дрібних рудиментарних насінин. До числа потомків Sultanina, крім вищеперелічених, належать сорти Princess, Perlett, Himrod, Marquis та Beogradska bese-mena. Вони хоч і мають більше 100

насінин у 100 ягодах, однак насіння дрібне, трав'янисте і при поїданні ягід його присутність не проявляється. Ці зразки будуть згодом використовуватись і вже залучені у селекційний процесі для одержання сортів різної категорії безнасіності.

Різноманітність видового складу генотипу різних сортів винограду пояснює розбіжності за рівнем стійкості проти основних грибних захворювань (табл. 2).

На рисунку 3 схематично зображено

2. Рівень стійкості проти основних грибних захворювань сортів, занесених до Реєстру сортів та рослин України з 1936 по 2019 рр.

Сорт	Рік занесення до Реєстру	Мільдю	Оїдум	Гнилі ягід	Сорт	Рік занесення до Реєстру	Мільдю	Оїдум	Гнилі ягід
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аліготе	1936	l	l	l	Леся	1985	l	l	m
Каберне Совіньон	1936	l	l	l	Одеський сувенір	1985	m	l	m
Карабурну	1936	l	l	l	Укр 85	1985	l	l	m
Мускат білий	1936	l	l	l	Янтар ОСГІ	1985	m	m	m
Мускат гамбурзький	1936	l	l	l	Асма	1986	m	m	m
Мускат рожевий	1936	l	l	l	Мускат янтарний	1986	l	l	m
Рислінг	1936	m	l	l	Южанка ОСГІ	1986	m	m	m
Сенсо	1936	l	l	l	Молдова	1987	h	h	h
Шасла	1936	l	m	l	Мускат жемчужний	1988	m	m	l
Королева виноградників	1944	l	l	l	Антей Магарацький	1988	h	h	h
Мускат Оттонель	1944	l	m	l	Золотистий устойчивий	1990	m	l	l
Жемчуг Саба	1944	m	l	m	Кишмиш ОСГІ	1990	l	l	l
Чауш білий	1944	l	l	l	Ланка	1990	m	m	m
Агадаї	1958	l	m	m	Новоукраїнський ранній	1990	l	l	l
Алеатіко	1958	l	l	l	Особий	1991	l	l	l
Альбіньо кримський	1958	m	m	l	Восторг	1992	h	m	h
Вердельо	1958	m	l	m	Сурученський білий	1992	h	h	h
Гарс Левелю	1958	m	l	m	Мускат одеський	1993	h	h	h
Екім кара (Кефесія)	1958	m	m	h	Первенец Магарача	1994	h	m	h
Іршаї Олівер	1958	m	m	h	Аврора Магарача	1995	h	h	h
Клерет білий	1958	m	m	l	Кефесія	1995	m	m	h
Кокур білий	1958	l	l	m	Капсельський білий	1995	l	l	l
Матраса	1958	l	l	l	Крона	1995	l	l	l
Матяш Янош	1958	l	m	l	Сари Пандас	1995	l	l	l
Морастель	1958	l	m	m	Аркадія	1995	m	l	m
Мускат олександрійський	1958	l	l	l	Мурведр	2001	l	l	l
Мускат чорний	1958	m	m	m	Семільон	2001	l	l	l
Мюллер Тургау	1958	l	l	l	Кок пандас	2002	l	l	l
Мюскадель	1958	m	l	l	Оригінал	2002	m	m	h
Німранг	1958	l	m	l	Піно білий	2002	l	l	l
Ркацителі	1958	m	l	h	Солдайя	2002	l	l	l
Сапераві	1958	l	l	l	Цитринний Магарача	2002	h	h	h
Серсіаль	1958	l	l	l	Данко	2003	h	h	h
Совіньон білий	1958	m	l	l	Ассоль	2005	h	h	h
Тайфі рожевий	1958	m	m	l	Бордо	2006	l	l	l
Трамінер рожевий	1958	m	m	m	Буковинка	2006	h	h	h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фетяска біла	1958	m	m	l	Гурзуфський рожевий	2006	h	h	h
Фурмінт	1958	l	l	l	Загрей	2006	h	h	h
Хіндогни	1958	l	m	l	Загадка	2006	m	m	m
Шабаш	1958	l	m	m	Інтервітис Магарача	2006	m	m	m
Шардоне	1958	l	l	l	Кобзар	2006	m	m	m
Піно сірий	1959	l	l	l	Любительський	2006	h	h	h
Піно чорний	1959	m	m	m	Лівадійський чорний	2006	h	h	h
Рислінг італійський	1959	m		l	Мускат Лівадія	2006	h	h	h
Ташли	1959	m	m		Мускат Голодриги	2006	h	h	h
Альфонс Лавалле	1960	l	l	l	Олег	2006	h	h	h
Італія	1969	m	l	m	Рісус	2006	h	m	m
Кардинал	1969	l	l	l	Рубін Голодриги	2006	h	h	h
Красуня Цегледа	1969	m	m	h	Роднічок	2006	m	h	m
Лімбергер	1969	l	l	m	Смена	2006	m	h	h
Марсельський чорний ранній	1969	l	l	l	Тавквери Магарача	2006	h	h	h
Мускат пейцький	1969	m	m	l	Анателікон	2007	m	m	m
Ранній Магарача	1969	l	m	h	Альмінський	2007	h	h	h
Рубіновий Магарача	1969	m	h	m	Геркулес	2007	l	m	m
Совіньон зелений	1969	m	l	l	Етюд	2007	h	h	h
40 років Жовтня	1969	l	l	l	Кишмиш таїровський	2007	l	m	m
Сухолиманський білий	1969	l	l	l	Огоньок таїровський	2007	m	m	l
Тельті Курук	1969	m	l	l	Рислінг Магарача	2007	h	h	h
Дністровський рожевий	1972	h	m	h	Спартанець Магарача	2007	h	h	h
Одеський чорний	1972	m	m	m	Таір	2007	h	h	h
Одеський ранній	1973	l	l	l	Ялтинський безнасіний	2007	h	h	h
Лісова троянда	1975	m	m	h	Гранатовий Магарача	2008	h	h	h
Мускат таїровський	1976	l	l	l	Гвіане	2008	l	l	l
Тавріда	1977	m	m	m	Красень	2008	h	h	h
Восток	1978	m	m	m	Памяті Голодриги	2008	h	h	h
Сапераві северний	1978	h	m	h	Флора	2008	h	h	h
Камрают	1979	m	m	m	Ароматний	2009	h	h	h
Гузаль Кара	1980	m	m	m	Комета	2009	m	h	h
Мадлен мускатний	1980	m	l	m	Лівія	2010	m	m	m
Фіолетовий ранній	1980	m	l	m	Південнобережний	2010	h	h	h
Чауш мускатний	1980	m	m	m	Памяті Дженєєва	2011	m	m	m
Голубок	1981	m	m	m	Сіра	2011	m	m	m
Киргизький ранній	1981	m	m	m	Ланжерон	2015	h	h	h
Мускат узбекистанський	1981	h	h	h	Одісей	2015	h	h	h
Первомайський	1981	m	m	m	Іскорка	2015	m	m	m
Ранній ВІРУ	1981	m	m	m	Персей	2019	h	m	h
Степняк	1982	h	m	m	Ярило	2019	h	h	h
Київський золотистий	1983	m	m	m	Одеський жемчуг	2019	h	h	m
Мерло	1983	m	l	m	Заграва	2019	h	m	h
Мечта	1983	m	m	l	Кардишах	2019	m	m	h
Шасла северна	1984	m	m	l					

l – низький рівень стійкості, *m* – середній рівень стійкості, *h* – високий рівень стійкості.

аналіз рівня стійкості проти основних грибних захворювань сортів, районуваних з 1936 по 2019 рр., коли вони були занесені до Реєстру сортів новітнього покоління, створених на основі складних міжвидових гібридів. У Реєстрі добре простежується тенденція до збільшення кількості стійких сортів порівняно з останніми десятиріччями минулого століття, особливо з даними 1936–1979 рр.,

коли Реєстр на 90–75 % складався з інтродукованих сортів *Vitis vinifera*.

Саме генотипи нового покоління, що поєднують у своєму геномі декілька видів *Vitis vinifera*, відзначаються одночасно високою адаптивністю і стабільно високими показниками якості продукції. Кращі з них взяті за батьківські компоненти для використання в подальшому селекційному процесі і

Рис. 3. Рівень стійкості проти основних грибних захворювань сортів, занесених до Реєстру сортів та рослин України з 1936 по 2019 рр.

для поповнення та збагачення регіональних сортиментів, можливо вони стануть основою для адаптивного виноградарства України, а в перспективі – предками генотипів, рівень адаптивності яких уможливить говорити про біологічне, тобто без використання хімічних препаратів, виноградарство.

Новітні сорти винограду повинні мати не лише високі адаптивні показники, але й відмінні якісні характеристики (рис. 4). Споживачі та виробники виноградарської продукції надають перевагу сортам, з ягід яких вдається одержати вино з особливими смаковими якостями і відмінним ароматом, або, які вирізняються незвичною формою ягоди чи її забарвленням – для столової групи.

2

1

3

Рис. 4. Ароматичні профілі вин з ягід сортів Ароматний (1), Загрей (2) та Мускат одеський (3).

Простий смак та аромат ягід сорту Загрей у вині перетворюється на складну фруктову-квіткову композицію зі смаком меду та барбарису. Простий, з присмаком яблука, смак ягід форми Чарівний у вині набуває смаку черешні та чорносливу з ніжним ароматом фіалки. Цитринно-манговий смак, що добре відчутний у ягодах сорту Ярило, проявляється і в кінцевому продукті – вині та доповнюється добре вираженим ароматом персика. Легкі смакові карамельні відтінки ягід сорту Ароматний переходять у виражений смак ананаса і полуниці, який гармонічно доповнюється пікантним гіркуватим

смаком та ароматом здобної випічки. У вині сорту Одеський жемчуг, на відміну від свіжої ягоди, немає мускатного аромату. Він перетворюється на чудовий аромат чайної троянди, доповнюється смаком свіжої малини та відчутним ароматом барбарису (рис. 5). В ягодах нових технічних генотипів 6–7 покоління поєднується аромат чорниці, свіжого абрикосу, сушеного персика, кураги та ін. Комплексне дослідження дає можливість виділити найбільш перспективні з них і підтвердити стабільність рівня прояву ознак продуктивності та якості продукції.

Для столового сорту дуже важливим

Рис. 5. Схематичне зображення компонентів в ароматі перспективних технічних сортів винограду.

показником є величина грона та ягоди. На рисунку 5 відображено рівень прояву показників «середня маса грона» та «середня маса ягоди» за 2016–2019 рр. Сорти та форми показали середню масу грона від 405 до 592 г

та середню масу ягоди від 4,5 до 8,2 г. Уваги заслуговує форма Калісто з середньою масою грона 592 г та масою ягоди 6,9 г (рис. 6).

Не менш важливим показником для столового сорту є товарність грон на куші. У

Рис. 6. Рівень прояву показників «середня маса грона» та «середня маса ягоди» перспективних столових сортів та форм (середнє за 2016–2019 рр.).

середньому за чотири роки дослідження з різними умовами вегетаційного періоду товарність становила від 65,5 (Фонтан) до 84,5 % (Калісто) (рис. 7).

Рис. 7. Товарність грон (середнє за 2016–2019 рр.).

SSR-аналіз 80 сортів винограду був виконаний за високополіморфними локусами VVS2, VVMD5, VVMD7, VVMD25, VVMD27, VVMD28, VVMD32, ZAG62. В таблиці 3 частково представлені дані мікросателітного аналізу, проведеного з метою паспортизації кишмишних сортів для подальшої реєстрації у Національному банку генетичних ресурсів України.

Походження 74 сортів з 80 було підтверджено генотипами двох батьківських форм [6]. Для шести зразків, одержаних при запиленні материнських рослин пилковою сумішшю, були визначені батьківські сорти (для зразка Український 85 – сорт Іршаї Олівер, для таких сортів, як Шкода та Опало-

вий – сорт Мускат жемчужний; Ланжерон – сорт Кобзар; Голубок – сорт 40 років Жовтня; Іскорка – сорт Мускат одеський) [6].

Основні показники генетичного різноманіття сортів винограду, виявлені на основі алельних профілів інтродукованих сортів і сортів селекції ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» (незважаючи на наявність декількох груп близькоспоріднених зразків), свідчать про значну генетичну неоднорідність та відсутність впливу інбридингу на генетичну структуру досліджуваних сортів [7]. Це разом з високою стійкістю до біотичних і абіотичних факторів робить зазначені генотипи потенційними донорами господарсько-цінних ознак для нових селекційних програм.

3. Результати ПЛР-аналізу групи кишмишних сортів винограду

№	Сорт	ZAG62	ZAG79	VVMD 5	P3	VVS2	VVM 32
1	Jupiter	200	262	260	203	-	-
2	Prima seedless	194	266	-	-	133 100	287 264
3	Marquis	200	264	245	203	113	288
4	Glenora	200 190	281	-	203	129 103	261
5	Attika seedless	200 190	291	246	176	128 108	283
6	Кишмиш лучистый	190	288	243	188	128 116	284 260
9	Mars	196	272	251	195		280
10	Эльф	196 180	278	-	-	124	280
11	Сверхранний безсемян- ний Магараца	194	278	-	-	135	280
12	Lakemont	200 190	272	-	-	143 115	240
13	Himrod	200 190	272	-	198	143 119	235
14	Юпитер 2	196	270	-	198	-	244
15	Кишмиш Таировский	200 190	292	286 241	198 188	-	260
16	Русенко безсемянный	194 190	281	-	188	127	260
17	Эйсент сидлесс	190	287	240	199	-	-
18	Venus	194	294	240		-	-
19	Кишмиш зимостойкий	190	279	285 241	198 185	-	-

Висновки. На підставі аналізу групи кишмишних сортів за часткою насіння в ягоді вдалося виділити зразки першої категорії, які в подальшому можуть бути використані як батьківські компоненти у схрещуваннях. Аналіз частини реєстрових сортів за шкалою стійкості проти грибних захворювань довів існування тенденції до підвищення адаптивності сортів нового покоління. Ароматичні профілі вин з ягід нових технічних сортів та форм винограду підтверджують особливі

смакові та ароматичні властивості сортової сировини. Перспективні столові сорти виділені за показниками величина грона і ягоди, товарність грона. Використання методів SSR-аналізу уможливило підтвердити походження досліджуваних сортів, що особливо актуально для зразків, одержаних за рахунок суміші пилку. Одержані результати свідчать про генетичну неоднорідність досліджуваної частини колекції та перспективу її використання у подальшому селекційному процесі.

Використана література

1. Ковалева І. А., Герус Л. В. Селекція винограда в мировом контексте: проблеми и тренды / Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей: тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю Нац. генбанку рослин України (Київ, 4–7 лип. 2016 р.), Київ, 2016. 187–188 с.
2. Результати ступенчатої селекції на генетическую обусловленность высокого уровня проявления хозяйственно-ценных признаков сортов винограда селекции ННЦ "ИВиВ им. В. Е. Таирова" / Герус Л. В. и др. *Виноградарство і виноробство*. 2015. Вип. 52. С. 42–53.
3. Банковська М. Г. Оцінка стійкості генотипів винограду проти грибних хвороб. *Виноградарство і виноробство*: міжвід. тем. наук. зб. Одеса: ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова». 2007. Вип. 45 (1). С. 20–25.
4. Бессемянные сорта и гибридные формы винограда / К. В. Смирнов и др. Новочеркасск - Запорожье, 2002. 54 с.
5. Селекция винограда на бессемянность / Смирнов К. В. и др. *Виноградарство и лекарственные растения*: тр. ТСХА. Москва: МСХА, 1996. Вып. 267. С. 16–18.
6. Карастан О. М., Мулюкіна Н. А., Плачинда Г. В., Папіна О. С. Молекулярно-генетичний аналіз батьківських та прабатьківських форм для верифікації походження зразків винограду *V. vinifera* L. *Наук. вісн. Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Л. Українки*. 2017. Вип. 13 (362). С. 15–20.
7. Карастан О., Мулюкіна Н., Папіна О. Плачинда Г. Оцінка генетичного різноманіття винограду (*Vitis vinifera* L.) з використанням мікросателітних маркерів. *Вісн. Львівського ун-ту*. 2018. Вип. 77. С. 53–61. (Серія «Біологія»).

References

1. Kovalova, I. A., Gerus, L. V. (2016). Grape breeding in a global context: problems and trends. *Genetychna sortove riznomanittia roslin dlia pokrashchennia yakosti zhyttia liudei: tezy dopovidei Mizhn. nauk.-prakt. konf., prysviach. 25 richchiu Natsionalnoho* henbanku roslin Ukrainy. [Genetic and variety diversity of plants for improving human life quality: Int. Sci. Conf. dedicated to 25-th anniversary of The National Center for Plant Genetic Resources of Ukraine in Kharkiv: Abstracts of Papers]. Kiev: N. p.

- 187–188. [in Russian]
2. Gerus, L. V., Kovalova, I. A., Salii, E. V. et al. (2015). Results of stage breeding for genetically related high level of manifestation of valuable traits in grape varieties bred in the Institute of Viticulture and Winemaking named after V. E. Tairov. *Vinogradarstvo i vinorobstvo* [Viticulture and wine-making an interagency thematic], 52, 54–60. [in Russian]
 3. Bankovska, M. G. (2007). Evaluation of resistance to fungal diseases in grape varieties. *Vynohradarstvo i vinorobstvo* [Viticulture and winemaking: an interagency thematic], 45 (1), 20–25. [in Ukrainian]
 4. Smirnov, K. V., Kostrikin, I. A., Maistrenko, L. A. et al. (2002). *Besemyannye sorta i gibridnye formy vinograda* [Seedless grape varieties and hybrid forms]. Novocherkassk - Zaporozhe: N. p. 54 p. [in Russian]
 5. Smirnov, K. V., Kostrikin, I. A., Maistrenko L. A. et al. (1996). Breeding for seedlessness in table grape varieties. *Vinogradarstvo i lekarstvennye rasteniya* [Viticulture and medicinal plants]. Moscow: MSHA, 267, 16–18. [in Russian]
 6. Karastan, O. M., Muljukina, N. A., Plachinda, G. V. et al. (2017). Molecular and genetic analysis of parental and great-parental selections for grapevine samples origin verification. *Naukovij visnik Shidnoevropejskogo universitetu imeni Lesi Ukrainki* [Science Herald of East European Lesja Ukrainka University], 13 (362), 15–20 [in Ukrainian].
 7. Karastan, O. M., Muljukina, N. A., Plachinda, G. V. et al. (2018). Grapevine (*Vitis vinifera* L.) genetic diversity evaluation by the microsatellite markers. *Visnik Lvivskogo universitetu. Serija biologichna* [Lviv University Herald. Biological series], 77, 53–61. [in Ukrainian]

УДК 634.836.5(477):581.167

Ковалева И. А., Скрипник В. В., Власов В. В., Мулюкина Н. А., Герус Л. В., Федоренко М. Г., Саллий Е. В. Разнообразие генотипов ампелографического репозитория ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова» и их потенциал в селекции. Зерновые культуры. 2020. Т. 4. № 1. С. 28–37.

Национальный научный центр «Институт виноградарства и виноделия им. В. Е. Таирова» НААН, ул. 40-летия Победы, 27, пгм. Таирова, г. Одесса, 65496, Украина

Создана признаковая коллекция сортов-доноров ценных хозяйственных признаков, в частности бессемянности. Анализ части реестровых сортов по шкале устойчивости к грибным болезням подтвердил наличие тенденции к росту адаптивности сортов нового поколения.

По степени развития рудиментов семян осуществлена оценка 36 сортов винограда из 12 стран мира, выделены кишмиши первой категории, которые в дальнейшем могут быть использованы как родительские компоненты в скрещиваниях.

Составлены ароматические профили вин из новых технических сортов и форм винограда, подтверждена эксклюзивность их вкусового ароматического комплекса. Перспективные столовые сорта выделены по таким показателям, как величина грозди и ягоды, а также товарность гроздей на кусте.

Использование методов SSR-анализа позволило подтвердить происхождение исследуемых сортов, что особенно актуально для образцов, полученных с помощью смеси пыльцы.

Ключевые слова: SSR-анализ, генотип, устойчивость, бессемянность, сорт, органолептический профиль, товарность, крупноплодность, крупноягодность.

UDK 634.836.5(477):581.167

Kovalova I. A., Skrypnyk V. V., Vlasov V. V., Muliukina N. A., Gerus L. V., Fedorenko M. G., Salii O. V. Genotypes diversity in the ampelographic repository of NSC “Tairov Research Institute of Viticulture and Wine-Making” (Ukraine) and its potential in breeding process. Grain Crops. 2020. 4 (1). 28–37.

National Scientific Center «Tairov Research Institute of Viticulture and Wine-Making» NAAS, 27, 40 let Pobeda Str., Tairovo, Odessa, 65496, Ukraine

Traits collection of donor varieties (valuable economic traits donors), in particular seedlessness trait, has been created. An analysis some of the registered varieties on the resistance scale to fungal diseases showed a tendency to increasing the adaptability of new generation varieties.

According to the degree of seed rudiments development, an assessment of 36 grape varieties originated from 12 countries was made, the first category seedlessness varieties were identified, which in the future can be used as parent components in crosses.

Screening data analysis of the registered grape varieties resistance to fungal diseases was presented, and the tendency to increase of resistant varieties number in State Register of plant varieties for dissemination in Ukraine compared to the last decades of the last century. Genotypes with high productivity and ecological plasticity were presented, which are suitable for the formation of a new adaptive variety structure that provides stable yield annually, combined with exclusive taste and aroma of wine made from new wine varieties and high-quality table grape along with a considerable decrease of a number of pesticide treatments. This fact along with high resistance to biotic and abiotic factors makes such genotypes potential donors of valuable traits for new breeding programs.

Aromatic profiles of wines from new wine varieties and selections grades and forms of grapes were compiled, the exclusivity of their taste and aroma complex was confirmed. Promising table varieties were distinguished by the traits of the bunch and berry size and the marketability of the bunches.

By the SSR analysis the origin of varieties was confirmed, which is especially important for varieties obtained using a pollen mixture.

Key words: SSR-analysis, genotype, resistance seedlessness, variety, organoleptic profile, marketability, large berry and bunch size.