КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ СТАНОВЯТСЯ ТЕСНЫМИ

Рассказывает профессор химического факультета Университета Цукубы (Япония)
Владимир Ярославович Ли.

Любой учебник органической химии основывается на тетраэдрической модели атома углерода, заложенной Бутлеровым и Кекуле и окончательно сформулированной Вант-Гоффом и Ле-Белем. В соответствии с ней молекула метана CH_4 представляет собой правильный тетраэдр, в вершинах которого – атомы водорода, а в центре – углерод, с углом между связями углерод–водород $109,5^\circ$. Другой непреложной истиной считается правило Хюккеля: ароматической является плоская моноциклическая сопряженная система, содержащая $(4n + 2)$ π -электронов. Всегда ли применимы эти каноны? Ряд современных работ говорит, что нет. В частности, группе профессора университета г. Цукуба (Япония) Владимира Ярославовича Ли удалось синтезировать и изучить системы, которым тесно в рамках общепринятых представлений органической химии.

Владимир Ярославович, не так много наших соотечественников работают в Японии. Какие перипетии научной карьеры привели вас на этот остров?

Для моего поколения, выпускников советской вузовской системы, вообще характерен поиск места приложения своих способностей не только в России, но и за рубежом. Где только мы не работали! Я окончил физико-математическую школу при Новосибирском государственном университете и затем учился в Дальневосточном государственном университете во Владивостоке. Сейчас он называется Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и находится на острове Русский, в прошлом году я читал там лекции как приглашенный профессор. После университета я поступил в аспирантуру в Институте органической химии (ИОХ

АН) в Москве, где работал в лаборатории Олега Матвеевича Нефедова. Лаборатория была очень большая, около 50 человек, в основном она занималась химией карбенов и малых циклов. В рамках этой лаборатории в составе небольшой группы мы исследовали соединения тяжелых элементов 14-й группы (которая в России традиционно называется 4-й группой) – кремния, германия, олова и свинца, т.е. элементов тяжелее углерода. В основном я занимался органической химией германия и олова. И до сих пор занимаюсь этими же элементами, правда, расширив круг своих интересов влево и вправо по Периодической таблице. После защиты диссертации я работал по распределению в Научно-исследовательском институте органических полупродуктов и красителей (НИОПИК) в Долгопрудном, но через четыре года вернулся в лабораторию

Нефедова, где работал в группе Михаила Петровича Егорова, нынешнего директора Института органической химии.

В 1995 году я оказался в постдокторантуре в Корейском институте науки и технологии (Korea Institute of Science and Technology) в Сеуле. Одна из причин моего пребывания там была чисто этнической – мне всегда хотелось побывать в Корее. В 1996 году я получил приглашение из Университета Поля Сабатье (Université Paul Sabatier) в Тулузе. Проработал там год в лаборатории профессора Сатже, место было замечательное, но в 1998 году профессор Секигучи из Университета города Цукуба (University of Tsukuba) в Японии пригласил меня на должность приглашенного исследователя. Причем мы не были знакомы, никогда не встречались, он знал меня только по публикациям. Это было очень интересно, и я поехал, будучи в полной уверенности, что через год вернусь – многие говорили, что в Японии трудно долго жить. Прошел год, и Секигучи предложил мне задержаться еще на пару лет. Я подумал: ну, еще два года – и вернусь обратно. Однако прошло вот уже 20 лет, и я до сих пор работаю в университете города Цукуба, на химфаке, и по-прежнему занимаюсь тяжелыми элементами главных подгрупп. Поскольку это университет, у меня есть учебная нагрузка, читаю курсы по общей и органической химии для бакалавров и магистров. Но самое главное – веду научную работу со своими студентами. И это, конечно, самое интересное.

Каковы направления ваших научных работ?

Мои научные интересы лежат в областях фундаментальной химии. В основном, как я уже сказал, мы занимаемся тяжелыми элементами главных подгрупп (13–16-й групп). На их основе синтезируем элементоорганические соединения, изучаем их структуру и природу связей. Причем мы работаем с низкокоординированными элементами. Что это такое? Например, элементы 14-й группы имеют четыре валентных электрона на внешних орбиталях и во многих соединениях выступают как четырехвалентные, это их традиционная координация. Однако за счет способности и склонности кремния (в отличие от углерода) к образованию 3-центровых 4-электронных связей, координационное число кремния может быть увеличено до 5 и даже до 6. Это область гиперкоординированных органических соединений кремния, изучением которой в России очень успешно занимаются профессора Юрий Иванович Бауков и Вадим Витальевич Негребский из 2-го Медицинского института в Москве.

Напротив, наша область – это органические соединения с низковалентными элементами, в которых

координационное число меньше, чем число валентных электронов. Например, такие соединения аналогов углерода – кремния и германия, координационное число которых равно двум, трем и даже – одному. Такие соединения координационно ненасыщенные и поэтому очень реакционноспособные. Работать с ними достаточно трудно – они очень чувствительны к кислороду и влаге воздуха, для их выделения

Я поехал в Японию в полной уверенности, что через год вернусь

и характеристики нужна техническая сноровка. Но самое важное – структуру и природу связей в таких соединениях нельзя объяснить теориями Бутлерова и Кекуле – классические представления о строении органических молекул тесны для них. Поэтому приходится привлекать новые концепции, основанные на неклассических теориях химической связи.

Яркий пример – пирамиданы¹: соединения со структурой квадратной пирамиды, в вершине которой четырехкоординированный аналог углеродного атома. Природа связей между вершиной и основанием в таких соединениях противоречит классическим теориям. Согласно общепринятым представлениям, углерод, связанный с четырьмя заместителями, должен иметь sp^3 -гибридизацию орбиталей, он находится в центре тетраэдра с углом между его любыми двумя связями 109° . А в пирамидане же все четыре связи апикального атома ориентированы из вершины пирамиды к плоскости ее основания. Соответственно, углы между связями – острые, намного меньше, чем 109° , и гибридизация вершинного атома не традиционная тетраэдрическая, а "вывернутая" тетраэдрическая! Такие структуры опровергают все представления классической стереохимии, описываемые в учебниках органической химии. Тем не менее нам удалось получить пирамиданы с атомами элементов

¹ Лаборатория и производство. 2018. № 1. С. 84–96

ПИРАМИДАНЫ

Пирамиданы (или [3.3.3]фенестраны) – высоконапряженные кластерные соединения в форме квадратных пирамид, содержащие в своей вершине атом углерода в "вывернутой" конфигурации, где все 4 заместителя при тетракоординированном углероде расположены по одну сторону плоскости, проходящей через апикальный атом. Пирамиданы обладают необычной структурой и неклассической природой связей между вершиной и основанием, которые не вписываются в рамки классических теорий строения органических соединений.

Полностью углеродный пирамидан, содержащий во всех своих вершинах атомы углерода, до сих пор изве-

стен лишь теоретически и изучен расчетными методами. Однако в последние несколько лет, благодаря развитию простых и эффективных методов синтеза, были получены элементоорганические аналоги пирамидана, содержащие в своей вершине тяжелые элементы 14-й группы. Кроме того, поскольку положительно заряженные атомы элементов 15-й группы и отрицательно заряженные атомы элементов 13-й группы изoeлектронны атомам 14-й группы, можно ожидать существования катионных пирамиданов и анионных пирамиданов с вершинами, образованными элементами 15-й и 13-й групп соответственно.

E = Элемент 15 группы

Катионные

E = Элемент 14 группы
[Ge, Sn, Pb]

Нейтральные

E = Элемент 13 группы

Анионные

Катионный фосфapiмидан был получен в две стадии: присоединение треххлористого фосфора к дилитиевой соли дианиона циклобутадиена с образованием ненасыщенной бициклической структуры,

так называемого хлорофосфахаузуена, с последующим окислительным дехлорированием кислот Льюиса (Лаборатория и производство. 2018. № 1. С. 84–96.).

Синтез хлороборапирамидана

Восстановление хлороборапирамидана

14-й группы, Ge, Sn, Pb, в вершине квадратной пирамиды. Синтез полностью углеродного пирамидана пока остается нерешенной задачей.

Для объяснения природы химической связи в неклассических пирамиданах невозможно было обойтись без помощи теоретиков, и я обратился к академику РАН Владимиру Исааковичу Минкину из Южного федерального университета (ЮФУ) в Ростове-на-Дону. Все, вероятно, помнят книгу "Теория строения молекул", которую написали Минкин, Симкин и Миняев, я и сам по ней учился в свое время. В.И.Минкин и Р.М.Миняев до сих пор работают в ЮФУ и по-прежнему занимаются теорией строения органических молекул. Квантово-химические расчеты группы В.И.Минкина подтвердили возможность образования таких соединений и объяснили необычную природу их химических связей.

Мы решили пойти еще дальше и синтезировать катионные и анионные пирамиданы. Первым был катионный фосапирамидан. Его получили присоединением треххлористого фосфора к литиевой соли дианиона циклобутадиена с образованием ненасыщенной бициклической структуры, так называемого хлорофосфаузуна. Он выступил прекурсором для катионного фосапирамидана, который образовывался при окислительном дехлорировании кислотой Льюиса¹.

Следующим шагом стал анионный пирамидан – борапирамидан, содержащий в вершине бор. И тут не обошлось без сюрпризов. При синтезе борапирамидана мы пошли путем, отработанным при получении фосапирамидана, – посредством реакции между дианионом циклобутадиена и треххлористым бором. Однако первый же результат был весьма неожиданным: вместо ожидаемого бициклического хлоробораузуна сразу образовался хлороборапирамидан с пятикоординированным бором в вершине. Для бора такая координация совершенно нехарактерна, он обычно трехкоординированный. Всего несколько статей описывают пятикоординиро-

ванный бор – но лишь в соединениях с тригонально-бипирамидальной геометрией, которая полностью согласуется с теорией отталкивания электронных пар. А у нас же получилась квадратно-пирамидальная структура: четыре связи бор образует с углеродным основанием, а пятую – с атомом хлора. Согласно классической теории, такого соединения не должно существовать! Однако теоретические исследования группы В.И.Минкина подтвердили, что такое соединение является вполне устойчивым энергетическим минимумом, несмотря на свою необычную геометрию².

Получив хлороборапирамидан, мы занялись исследованием его реакционной способности. В первую очередь мы стремились получить анионный борапирамидан восстановлением нейтрального прекурсора щелочными металлами. Моя студентка провела такую реакцию хлороборапирамидана, но по ошибке взяла большой избыток металлического лития, в результате вместо ожидаемого анионного пирамидана она получила ароматический аналог цикlopentadiенильного аниона (который в случае бора был дианионом), то есть дианион борапентадиена. Когда же я указал ей на ошибку и попросил повторить эту реакцию со стехиометрическим количеством, то есть с двумя эквивалентами лития, то результат получился точно таким же. Значит, такой моноциклический ароматический продукт термодинамически наиболее выгоден, что опять же подтвердили теоретические расчеты В.И.Минкина и его сотрудников.

Пирамиданы – не единственные соединения, исследуемые вашей группой, которые не укладываются в классическую теорию?

Конечно же, нет. Скажем, явление ароматичности для соединений с тяжелыми аналогами углерода. В университетах изучают правило ароматич-

² JACS 2018, 140 (9), 6053. DOI: 10.1021/jacs.8b03473

Примеры неплоских ароматических структур

ности Хюккеля, гласящее, что ароматическая система должна содержать $(4n + 2)$ π -электронов и плоское кольцо. Сегодня это правило – не догма, а лишь руководство к действию. Ему не подчиняется много ароматических соединений, особенно это касается требования плоского кольца. Скажем, бензол – плоский, анион цикlopentadiена – плоский, но возьмите мебиусовскую ароматику – такие структуры совершенно не плоские. Фуллерены C_{60} и C_{70} , ферроцен тоже не плоские, тем не менее ароматические соединения.

Несколько лет назад по приглашению журнала *Angewandte Chemie* я написал обзор по ароматичности³. Причем по ароматичности не классической органической, а именно среди соединений с тяжелыми элементами главных подгрупп. Эти соединения ведут себя совсем иначе, чем их углеродные аналоги. В отличие от углерода тяжелые элементы не любят образовывать двойные связи, их электроны не хотят делокализоваться, поэтому им труднее образовывать ароматические соединения. Про такие системы даже при формальном соблюдении шестиэлектронного правила Хюккеля трудно сказать, ароматические они или нет.

Ведь ароматичность – это не тот параметр, который можно экспериментально измерить, нет таких методов. Ароматичность можно оценить только расчетными методами. Есть три основных критерия ароматичности. Первый и, на мой взгляд, самый важный – энергетика реакции: насколько система стабилизируется в результате ароматической делокализации.

Второй критерий, основанный на магнитных явлениях, вызванных ароматичностью, был предло-

жен Шляйером⁴. Если в результате делокализации в системе возникает так называемый ароматический круговой ток (как, например, в бензоле), она считается ароматической. Для оценки магнитного параметра рассчитывают NICS(1) (Nucleus Independent Chemical Shift, ядерно-независимый химический сдвиг) – показатель абсолютного магнитного экранирования протона, помещенного в центре цикла на высоте 1 Å от его плоскости. Если NICS отрицательный – система ароматическая, для бензола он равен $(-10 \div -12)$. Если NICS существенно положительный, скажем, $(+10 \div +12)$ – система антиароматическая, NICS около нуля – неароматическая.

Третий критерий ароматичности – тот, который описывается в стандартных учебниках. Он структурный, геометрический, и гласит, что система должна быть плоской. Этот критерий, на мой взгляд, самый ненадежный для утверждения об ароматичности циклической системы.

Возьмем, например, дианион циклобутадиена. Он формально изоэлектронен аниону цикlopentadiена и бензолу, у всех этих систем по шесть π -электронов. Но между дианионом циклобутадиена и моноанионом цикlopentadiена принципиальная разница. При делокализации отрицательного заряда в моноанионе цикlopentadiена получается очень стабильная ароматическая система из шести π -электронов. Совсем не так в случае дианиона циклобутадиена – у него формально одна двойная связь и два отрицательных заряда, которые делокализируются в четырехчленном цикле. Делокализация должна приводить к ароматической стабилизации, но этому препятствует электростатическое расталкивание: два отрицательных заряда не могут находиться близко друг к другу. С одной стороны, стабилизация за счет делокализации, с другой – дестабилизация из-за электростатического отталкивания за счет той же делокализации. Получается, что "голому" дианиону циклобутадиена невыгодно быть плоским и ароматическим. Без противоионов он настолько нестабилен, что становится неплоским, изогнутым, приобретая таким образом конфигурацию бабочки. Однако если присоединить к дианиону циклобутадиена два противоиона, допустим, два катиона металла (например, лития), то часть отрицательного заряда гасится, электростатическое взаимодействие ослабевает, а ароматическая стабилизация сохраняется. Система опять становится плоской и ароматической.

³ Angew. Chem. Int. Ed. 2007. Vol. 46. P. 6596–6620.

⁴ J. Am. Chem. Soc. 1996. Vol. 118. P. 6317.

Аналоги циклобутadiенильного дианиона с тяжелыми атомами

Мы попытались применить этот прием для стабилизации тяжелых аналогов дианиона циклобутана – дианиона тетрасилациклобутана и дианиона тетрагермациклобутана, используя в качестве противоиона калий. Однако системы оказались неароматическими: их геометрия была неплоской, NICS(1) оказался положительным, и в результате делокализации не происходило сколько-нибудь заметной стабилизации. Но мы обнаружили, что геометрия, координация и характер связей системы напрямую зависят от противоиона. Используя литий вместо калия, мы получили систему с четырехкоординированными ионами металла и существенно более плоским четырехчленным циклом. Однако колоссальную ароматическую стабилизацию дала замена щелочных металлов на переходные – NICS(1) стал отрицательным, а центральный цикл – плоским. Таким образом нам удалось получить стабильную четырехчленную ароматическую систему с тяжелыми аналогами углерода!

Если присмотреться к последним структурам, то окажется, что они являются аналогами пирамидана, где

в вершине пирамиды вместо элемента главной подгруппы – переходный металл. В этих соединениях интересен характер связей между переходным металлом и циклобутadiеновым основанием. Казалось бы, что связь должна быть ионной, потому что это металл, хотя иногда металлы, даже литий, также образуют ковалентные связи. В сотрудничестве с академиком В.И. Минкиным мы посчитали порядки связей, распределение зарядов и вклад резонансных форм. Получилось, что связь примерно на 60% ковалентная и на 40% – ионная.

Еще одна фундаментальная проблема, исследованием которой мы заняты, – образование кратных связей между тяжелыми элементами главных подгрупп. Долгое время считалось, что образование подобных связей невозможно, однако такие соединения удалось получить. Наибольший интерес представляют гетероядерные соединения, в которых кратная связь образуется элементами разных групп. Конечно, чем ниже в периодической таблице находится элемент, тем менее устойчивы такие связи и тем меньше примеров подобных соединений. Например, до недавнего времени было известно только

два таких соединения германия и олова с тяжелыми элементами 15-й группы: фосфагермен ($P=Ge$) и фосфостаннен ($P=Sn$). В этом году мы опубликовали работу, в которой впервые описываем синтез и кристаллическую структуру соединения с двойной связью $Ge=As$ и доказываем кратный характер ее связи⁵.

Как видите, мы получаем неклассические, достаточно необычные соединения. Синтезируем их, исследуем структуру, природу связей, а затем пытаемся найти практическое применение для этих необычных веществ.

И удается находить практические применения?

Например, для чего может быть полезен пирамидан? Связи атома в вершине молекулы пирамиданов с основанием очень длинные. Длинные связи – это слабые связи, что дает нам надежду на использование пирамиданов для синтеза наночастиц, используя технологии термического разделения вершины и основания пирамиданов. А вершина – это элемент 14-й группы: кремний, германий, олово. Скажем, генерация наночастиц кремния – это очень трудная, но

двойных связей получать новые связи $Si=C$ или $Ge=C$. Такие тяжелые аналоги алкенов, как правило, очень нестабильны, но мономеры нам и не нужны. Напротив, если бы в условиях реакции проходила спонтанная полимеризация, то можно было бы получать уникальные кремний- и германийорганические гибридные полимеры с заданной тактичностью, высокой молекулярной массой и с высоким индексом полидисперсности. Такие полимеры можно отжечь и получить ценные композитные материалы, например, кремниевые или германиевые керамические композиты. Полимеры такого состава также очень интересны для многих приложений, в том числе медицинских. В этом направлении мы работаем в сотрудничестве с японскими специалистами в области материаловедения из Национального института науки и технологии (Advanced Industrial Science and Technology, AIST). Успех пока еще далек, но он, мы надеемся, придет.

В целом я активно ищу практическое применение для наших разработок, провожу переговоры с представителями фирм и промышленных компаний. Надеюсь, дальнейшие исследования будут направлены именно в сторону прикладных задач.

Вы постоянно упоминаете о взаимодействии с другими научными организациями и специалистами. Насколько подобное сотрудничество эффективно, приветствуют ли его ваши японские коллеги?

Для японцев важен результат. Если он есть – сотрудничай с кем угодно, нет – тут, конечно, могут быть проблемы. Сегодня наука продвинулась так далеко, возникло так много новых областей знаний, что просто невозможно объять все в рамках одной лаборатории. Пришло время специализации и, как следствие, – сотрудничества. Оно стало жизненно необходимым, в рамках одной страны или многих стран, ведь наука интернациональна. Только так можно охватить очень широкий спектр знаний. Современный химик в настоящее время должен иметь фундаментальную подготовку в своей научной области, но также общие познания в смежных областях, скажем, в физике или биологии. Например, экспериментатор, выполняющий синтез, должен иметь хотя бы общие представления в теоретической химии или физико-химических методах исследования. Еще лучше, если он может сам производить какие-то простые теоретические расчеты (хотя бы на уровне DFT) или делать рутинные спектроскопические измерения. Однако такого уровня недостаточно для глубокого и всестороннего изучения проблемы и подготовки хорошей статьи для таких топовых журналов, как Journal of the

Мы попытались создать кремниевую или германиевую версию метатезиса олефинов

и чрезвычайно важная задача. Мы сотрудничаем в данном направлении с лабораторией профессора Фабьена Дельпеша (Fabien Delpesh) в Национальном институте прикладных наук Тулузы (Франция).

Другое направление, которое может дать практический выход, – это метатезис. В 2005 году Роберт Граббс, Ричард Шрок и Ив Шовен получили Нобелевскую премию за разработку реакции метатезиса олефинов. Она заключается в перераспределении фрагментов двойной связи в молекулах олефинов с образованием новых непредельных соединений. Мы попытались создать кремниевую или германиевую версию метатезиса. То есть в результате перераспределения фрагментов

⁵ Chem. Comm. 2018. Vol. 54. P. 10947–10949.

American Chemical Society или Angewandte Chemie International Edition. И вот тут нужно хорошее сотрудничество со специалистами, когда один на высоком уровне делает одно, другой – другое, третий – третье, а потом все результаты объединяются. Именно такой подход к сотрудничеству, в том числе международному, дает самые хорошие результаты.

Например, у нас есть рентгеновский дифрактометр, с его помощью мы анализируем выращенные монокристаллы. Однако когда возникают серьезные вопросы по обработке данных рентгеновского анализа, что случается довольно часто, то я обращаюсь к профессиональному кристаллографу, Хайнцу Горнитцка (Heinz Gornitzka), с которым познакомился в Тулузе.

Я уже упоминал об очень тесном и чрезвычайно плодотворном сотрудничестве с академиком РАН Владимиром Исааковичем Минкиным из ЮФУ и его группой. Мы – экспериментаторы, они – теоретики. Поэтому, когда нужно теоретически осмыслить экспериментальные результаты, я обращаюсь к академику Минкину и его сотрудникам. Получается очень продуктивная комбинация эксперимента и теории. И таких примеров немало.

Заметно ли отличаются организация работы в японском университете, сами студенты от таких в других странах, где вам доводилось работать?

В Японии все подчинено результату, все очень скрупулезно и педантично, – японцы вообще такой народ. Впрочем, направленность на конечный результат характерна не только для Японии. Что резко отличает Японию – заметно, насколько мало общения между сотрудниками на посторонние, нерабочие, темы. Это полная противоположность тому, что я более 20 лет назад видел во Франции, где в рабочее время сотрудники могли долгое время обсуждать самые отвлеченные вопросы. Хотя это было давно, с тех пор минуло два десятилетия, сейчас ситуация кардинально меняется, появилась плеяда молодых, очень успешных французских профессоров, нацеленных на результат и уже многого добившихся.

Зато с научным общением в Японии все хорошо. Все обсуждают результаты друг с другом, особенно в рамках одной лаборатории или группы. Есть система научных семинаров, где каждый студент примерно раз в неделю отчитывается о проделанной работе. Но и в течение недели я со своими студентами анализирую результаты практически ежедневно.

Еще одна особенность – у нас практически вся экспериментальная работа, в том числе и на приборах,

лежит на студентах. Они сами работают на сложном оборудовании. Скажем, в университете есть парк ЯМР-спектрометров компании Bruker, студенты вполне самостоятельно работают на них. И на моей памяти не было случая, чтобы по их вине прибор вышел из строя. Конечно, к некоторым установкам, например, к рентгеновскому дифрактометру или

Иногда "не так" гораздо интереснее, чем ожидаемое "так"

очень дорогому времяпролетному масс-спектрометру с MALDI-ионизацией, мы студентов не допускаем – это действительно очень сложное оборудование.

Получив экспериментальный результат или сняв спектр, студент обсуждает его со мной. В синтетической химии во многих случаях что-то происходит не так, как хотелось и ожидалось. Причем иногда это "не так" гораздо интереснее, чем ожидаемое "так". Мы решаем со студентом, что можно сделать, чтобы получить хороший результат. Причем я стараюсь, чтобы студенты высказывали свое мнение, давали свою трактовку результатов, пусть и неправильную. Чтобы они для начала сами подумали, прежде чем услышать мое суждение.

Конечно, организация работы и обучения очень сильно зависит от руководителя группы. Многие профессора очень строго следят, чтобы все их указания точно выполнялись. Да и немало японских студентов любят, чтобы их направляли от начала и до конца. Однако я считаю, что надо давать простор для творчества и самостоятельного мышления. Тем, кто хочет проявлять инициативу, необходимо создавать все условия. Особенно это касается аспирантов, они должны работать самостоятельно. Такого подхода придерживаются многие молодые японские профессора. Они сами еще недавно были активными студентами и аспирантами, поэтому и к студентам у них отношение соответствующее.

Собственно, сама система образования в Японии направлена на поощрение самостоятельности сту-

дентов, в этом она аналогична американской системе. И чем старше курс, тем больше самостоятельности в выборе лекций, семинаров. В Японии очень важна система рейтингов студентов, какой ты на курсе – первый, или второй, или последний, это дает большие преимущества в дальнейшем. И чем активнее студент, чем лучше он учится и больше работает, тем выше он оказывается в этом списке.

Кому нужна наука, направленная на удовлетворение личных амбиций и интересов ученых?

Конечно, как и везде, студенты бывают разные – хорошие, очень хорошие и не очень хорошие. Но таких студентов, как японских, по их прилежанию, трудоспособности, стремлению к получению знаний, я не видел нигде. Ничего не могу сказать о современных российских студентах, так как не работал с ними в последнее время, однако более 20 лет назад я общался со студентами Высшего химического колледжа РАН. Это были очень умные ребята, победители олимпиад и химических конкурсов, в большинстве явно сильнее моих японских студентов. Что неудивительно – они проходили очень жесткий отбор. Но, обладая такой фундаментальной научной подготовкой, порой они не были достаточно трудоспособны и активны в практической работе. А химия – наука экспериментальная, сколько ни говори, без практической работы результата не будет. Надо для начала что-то сделать, чтобы потом было о чем говорить. С японскими студентами не нужно много слов: я ставлю задачу, они делают, потом обсуждаем результат, в итоге получается статья. А на своих аспирантов я просто не нарадуюсь – они все выполняют сами, порой даже статьи самостоятельно пишут, им нужна только консультационная поддержка.

Насколько сегодня востребована фундаментальная наука? Или все больше и больше отдается на откуп чисто практическим задачам?

Безусловно, фундаментальная или университетская наука как таковая необходима, и она сохранится, но ее роль будет меняться. Кому нужна наука, направленная исключительно на удовлетворение личных амбиций и интересов ученых? Стоит ли на это тратить деньги налогоплательщиков? Поэтому исчезнут те направления, которые не имеют практической ценности, пусть даже в отдаленном, но все-таки обозримом будущем. Их просто перестанут финансировать.

Мне кажется, фундаментальные, или, как еще говорят, – академические, исследования во многом будут развиваться в направлении наук о жизни. Также будут очень востребованы технологические направления – нанотехнологии, биотехнологии, новые материалы и т.п. Развитие получит та часть фундаментальной науки, которая будет обеспечивать задел и развитие этих прикладных направлений. Не случайно сейчас в ходу термин R&D – Research and Development, т.е. полный цикл работ от начальных научных исследований до промышленных разработок конечного продукта. Научные исследования не должны быть оторванными от жизни, а должны воплощаться в конкретных разработках. Поэтому сегодня фундаментальная наука все больше сливается с прикладной.

Российская наука соответствует этому тренду?

В России тенденции совершенно аналогичные, и они будут лишь усиливаться, поскольку это общемировой тренд. Регулярно посещая международные конференции, я всегда общаюсь с российскими учеными. Вижу, как из года в год усиливается представительство российских участников на таких форумах, растут количество и научный уровень докладов, это свидетельствует о росте уровня российской науки в целом и ее повышающейся активности на международной арене. Более того, расширяется ее география. Раньше на зарубежные конференции в основном ездили представители Москвы, реже – Санкт-Петербурга. А сейчас на них немало специалистов из других городов, в том числе из Сибири и Дальнего Востока.

Один из представителей российской химической науки, работы которого широко известны и признаны не только в стране, но и за рубежом – Валентин Павлович Анаников, заведующий лабораторией металлокомплексных и наноразмерных катализаторов ИОХ РАН, в 33 года ставший членом-корреспондентом РАН. То, что делает его лаборатория, как она оборудована, какие работы он со своими коллегами публикует, в каких журналах – это очень хорошо. И если российская наука будет развиваться в аналогичном направлении, она, естественно, будет среди мировых лидеров.

Спасибо за интересный рассказ.

С В.Я.Ли беседовала Н.И.Василевич

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ В ОБЛАСТИ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – ОСНОВА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

Москва, 15-17 мая 2019 года
ВДНХ, Павильон №75

ОРГАНИЗАТОРЫ:

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

METROLEXPO

МЕТРОЛОГИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ

CONTROL&DIAGNOSTIC

КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА

LABTEST

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

PROMAUTOMATIC

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

RESMETERING

УЧЁТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

WEIGHT SALON

ВЕСОВОЙ САЛОН

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 2018 года:

Участники – 296 компаний из 24 стран мира

Посетители – 5046 специалистов
из 63 регионов России

Площадь экспозиции – 6870 м²

Приборы и оборудование – 2145 единиц

Мероприятия съезда – 25 секций

Докладчики – 84 чел.

Делегаты – 980 чел.

ДИРЕКЦИЯ ФОРУМА

Тел./Факс: +7 (495) 937-40-23

E-mail: metrol@expoprom.ru

Спешите забронировать стенд
www.metrol.expoprom.ru