АНТРОПОГЕННЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ МОСКВЫ

УДК 543.51
БАК 02.00.02

Полякова О.В., к.б.н., **Лебедев А.Т.**, д.х.н., Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, moschops@yandex.ru; a.lebedev@org.chem.msu.ru

Чистота воздуха служит важнейшей характеристикой при оценке состояния окружающей среды, оказывающей влияние на здоровья населения. Поэтому улучшение качества воздушной среды, безусловно, является значимой не только научной, но и социальной задачей. Москва – один из крупнейших городов мира с населением более 12 миллионов человек. Это большой промышленный центр. Тысячи самых разнообразных химических соединений ежедневно оказываются в атмосфере города в связи с работой промышленных предприятий, транспорта, 20 ТЭЦ, строительных организаций и т. д. Однако официальные экологические лаборатории, проводящие мониторинг загрязнения атмосферы на регулярной основе, определяют лишь несколько показателей.

Прямые измерения загрязняющих веществ в атмосфере не всегда эффективны, и все более популярными методами анализа становятся косвенные оценки посредством анализа осадков. На основании хромато-масс-спектрометрических анализов образцов снега и дождя, выпадавших на территории Москвы в 2011–2018 годах, удалось идентифицировать и оценить уровни более 500 органических экотоксикантов. В настоящей работе основное внимание, помимо классических ксенобиотиков, уделено нестандартным антропогенным соединениям, которые редко попадают в сферу внимания экологов.

Развитие промышленности всегда сопровождается появлением новых соединений и материалов на их основе. Так или иначе, компоненты производимых человеком продуктов оказываются в различных объектах окружающей среды. Зачастую влияние этих веществ на окружающую среду и человека, в частности, исследуется только спустя какое-то время, когда концентрация данного компонента становится относительно высокой. Экологическая ситуация формируется под влиянием многих факторов, включая транспорт, воздушный перенос на дальние расстояния, наличие свалок, промышленных предприятий, ТЭЦ и т.д. Поэтому для адекватной оценки экологической ситуации, включающей как мониторинг концентраций уже известных соединений, так и обнаружение новых неизвестных веществ, необходимо регулярно проводить обзорные анализы образцов окружающей среды.

Однако в мировых списках регулируемых экотоксикантов фигурирует уже несколько тысяч органических соединений, и в настоящее время становится практически невозможным проводить регулярный мониторинг всех этих ксенобиотиков. Более того, в окружающей среде постоянно появляются новые антропогенные соединения и продукты их трансформации. Эффективное решение проблемы контроля должно начинаться с предварительного нецелевого анализа образцов, отобранных на конкретном объекте (завод, водоем, город, регион), в результате которого будет получен список приоритет-

ных экотоксикантов для данного объекта. Именно они становятся целевыми аналитами для последующего мониторинга на регулярной основе. К сожалению, официальные природоохранные лаборатории измеряют в России на регулярной основе содержание только неорганических газов, пыли, пятиоксида ванадия, бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, фенола, формальдегида, бенз[а]пирена. Причем общероссийский список контролируемых соединений никак не учитывает специфику конкретных регионов. Данных о нецелевом анализе с составлением списков реальных приоритетов нет.

Именно нецелевой анализ с попыткой установления природы максимального числа соединений в каждой пробе из объектов окружающей среды является задачей нашей лаборатории органического анализа химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Периодически, начиная еще с 1970-х годов, мы проводили единичные анализы воды, снега, дождя, почвы в разных регионах СССР, а позже и России. Конечно, чаще всего речь шла о загрязнении окружающей среды в Москве. В последнее время, благодаря возможности использования самого эффективного хромато-масс-спектрометрического оборудования, наши исследования стали носить более планомерный характер. Начиная с 2012 года, мы провели целенаправленное исследование по идентификации органических соединений в образцах дождя и снега, отобранных на территории Москвы. Для пробоподготовки в большинстве случаев мы использовали классическую методику Агент-

Рис.1. ГХ/МС хроматограмма по полному ионному току образца дождевой воды

ства по охране окружающей среды США 8270, нацеленную на соединения средней летучести, к которым принадлежит абсолютное большинство известных на сегодняшний день ксенобиотиков.

Масс-спектрометрия является на сегодняшний день наиболее чувствительным, информативным и надежным методом качественного и количественного анализа органических экотоксикантов в пробах объектов окружающей среды [1, 2]. В своей работе мы использовали методику Агентства по окружающей среде США 8270 [3] и прибор GC-MS-HRT+4D (LECO, USA) с разрешающей способностью более 25000, оснащенный неполярной (30 м) и среднеполярной (1,5 м) колонками. Этот прибор позволяет установить элементный состав компонентов смесей, повышая тем самым надежность идентификации как целевых, так и нецелевых компонентов [4]. Энергия ионизации составляла 70 эВ, сканируемые массы 29–500 Да. В качестве внутренних стандартов для количественной оценки использовали пердегтерированные нафталин, фенантрен и хризен. При идентификации веществ опирались на данные поиска в библиотеках масс-спектров NIST08-NIST17. Более тщательную идентификацию проводили, используя "ручную" расшифровку масс-спектров на основе известных спектроструктурных корреляций [5, 6]. Приоритетные экотоксиканты, входящие в список Агентства по охране окружающей среды США для метода 8270 [3], определяли количественно с использованием факторов отклика, рассчитанных по стандартным смесям (Mega Mix 8270, SV Internal Standard Mix 2 mg/ml; Restek). Для прочих соединений проводили полуколичественную оценку, принимая факторы отклика этих соединений равными

Рис.2. ГХ/ГХ-МС хроматограмма по полному ионному току образца дождевой воды

единице. Помимо классической электронной ионизации, в ряде случаев использовали ионизацию в тлеющем разряде, химическую ионизацию положительных и отрицательных ионов.

Анализ снежных проб для оценки состояния атмосферы стал использоваться в конце 1980-х годов во всем мире [7]. Мы неоднократно использовали его для проведения нецелевых анализов с целью обнаружения максимального числа органических соединений и составления списка возможных приоритетных загрязняющих веществ. Интересные результаты были получены для Москвы и Московской области, Карелии, Финляндии, Байкала [8–10]. Данные по мировому опыту масс-спектрометрических исследований по загрязнению снега органическими соединениями представлены в обзоре [7].

В результате проведенных в 2011–2013 годах анализов образцов снега было идентифицировано более 500 индивидуальных органических соединений. Основные результаты исследования опубликованы в работе [6]. Обнаруженные органические вещества были представлены следующими основными классами: полихлорированные бифенилы, терпены, насыщенные углеводороды, фталаты, карбонильные соединения, гликоли, органические эфиры фосфорной кислоты, хлорсодержащие соединения, ионол и родственные ему соединения, фураны, карбоновые кислоты и их эфиры, фенолы, спирты и простые эфиры, серосодержащие соединения, алкилзамещенные ароматические углеводороды, азотсодержащие соединения.

Интересно, что пробы дождевой воды (исследование 2017 года) оказались еще богаче [11]. Хроматограммы образцов содержали около 1000 пиков, каждый из которых соответствовал как минимум одному органическому соединению (рис.1, 2).

С разной степенью надежности в образцах дождевой воды удалось идентифицировать более 700 органических соединений, относящихся к различным классам химических веществ: полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), полихлорированные бифенилы, органофосфаты, диалкилфталаты, фенолы и алкилпиридины. 160 из этих соединений относятся к приоритетным или ранее не известным загрязняющим веществам.

Качественные составы химических соединений в изученных пробах были весьма схожи, хотя количественные характеристики заметно различались от пробы к пробе. Это свидетельствует о достаточно полном охвате всех полувolatile соединений, присутствующих в атмосфере города. Кроме приоритетных экотоксикантов, особое внимание было уделено веществам, встречающимся реже и для которых не удалось найти данных по их токсичности. Следует подчеркнуть, что использование снега или дождя для оценки загрязнения атмосферы носит косвенный характер. Снег служит отличной депонирующей матрицей, в которой даже весьма лабильные соединения, например фенолы, могут существовать достаточное время. Со снегом и дождем очень удобно проводить пробоподготовку, поскольку нет необходимости в серьезной очистке образца для устранения влияния мешающих компонентов, которая неизбежно приводит и к потерям целевых аналитов. Причем, если снег, отобранный в конце зимы, позволяет получить информацию о долговременном загрязнении среды (в течение зимы), то дождь дает информацию о загрязнении воздуха непосредственно в данное время в данной точке.

Следует понимать, что определенная концентрация ксенобиотика в осадках не может быть однозначно пересчитана в его концентрацию в атмосфере: по крайней мере, до настоящего времени соответствующих исследований и расчетов не проводилось. В отличие от атмосферы, воды и почвы ПДК экотоксикантов в снеге отсутствуют, поэтому сложно делать прямые выводы об опасности того или иного вещества на основании его концентрации. Чтобы сделать какую-то оценку реальной опасности обнаруженных соединений, мы сравнивали полученные величины с рыбохозяйственными ПДК [12], считая, что со временем все эти соединения с талыми водами окажутся в водоемах.

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) – наиболее изученный класс экотоксикантов. Низкомолекулярные ПАУ демонстрируют острую токсичность, в то время как высокомолекулярные ПАУ являются канцерогенами и мутагенами [13]. Первые существуют в основном в газовой фазе, последние преимущественно адсорбируются аэрозольными частицами за счет более высокой гидрофобности [14]. Во всех

образцах дождевой воды нами были определены все 16 приоритетных ПАУ. Фенантрен, флуорантен и хризен были определены в наибольших концентрациях по сравнению с остальными ПАУ. Эти результаты хорошо согласуются с полученными ранее данными по анализу снега [6], хотя уровни концентраций ПАУ в снеге для каждого из соединений выше, чем в дождевой воде. Это объясняется эффектом накопления загрязняющих веществ в снеге в течение как минимум 3 мес. Следует отметить, что в России нормативные значения определены только для двух ПАУ: 4 мкг/л для нафталина и 5 нг/л для бенз[а]пирена – опасного канцерогена. По нашим данным, уровни бенз[а]пирена превышали безопасный уровень в 6 образцах дождевой воды из 8. Высокие уровни бенз[а]пирена были зафиксированы в образцах снега (5–500 нг/л). Это означает, что в некоторых точках на северо-востоке Москвы рыбохозяйственная величина ПДК была перекрыта практически в 100 раз [12]. Суммарная концентрация нефтяных углеводородов, представленных в основном алифатическими соединениями (алканы и нафтенy), в образцах снега также была несколько выше установленной ПДК (50 мкг/л) [12].

Фенолы считаются приоритетными экотоксикантами во всем мире. Эти соединения могут появиться в атмосфере из-за первичных выбросов из промышленных или биогенных источников [15, 16], но могут представлять собой и вторичные продукты реакций, происходящих в атмосфере. Волкамер (Volkamer) и соавт. [17] продемонстрировали, что фенол может быть продуктом фототрансформации бензола в газовой фазе. Недавно нами было показано, что фенол присутствует уже во влаге облаков [18], причем может как образовываться в облаках в результате химических реакций, так и разлагаться под действием живущих в них бактерий [19]. Гомолог фенола 4-метилфенол может получаться в результате фототрансформации алкилбензола [20–21], а 4-нитрофенол – при нитровании фенола [22]. Тридцать два фенола были идентифицированы в образцах московской дождевой воды, девять из них включены в список приоритетных загрязняющих веществ США. Их уровни изменяются в диапазоне от нескольких нанограмм до более одного микрограмма на литр, с определенным доминированием незамещенного фенола, 4-метилфенола и 2-нитрофенола. Стоит отметить, что эти уровни ниже тех, о которых сообщалось ранее в образцах дождя во Франции [23], Швейцарии [24] и Германии [25, 26]. Наши данные показали, что концентрации 2,4-динитрофенола в дождевой воде Москвы были на порядок ниже, чем в упомянутых европейских странах.

Среди соединений, регулируемых в этой группе в России, наиболее опасным экотоксикантом считается незаме-

Табл.1. Концентрации фталатов в образцах дождевой воды (нг/л)

Фталат	Образцы дождевой воды							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Диметилфталат	48	34	29	64	29	177	54	43
Диэтилфталат	237	435	212	268	235	1180	232	190
Ди-изо-бутилфталат	724	951	16	845	261	2320	484	416
Ди-втор-бутилфталат	30	24	49	18	8,1	101	26	17
Дибутилфталат	3970	4460	29	3830	566	7600	1375	131
Бензилбутилфталат	3,2	7,3	17	25	1,5	6,6	3,1	1,5
Бис(2-этилгексил) фталат	673	789	48	1200	723	683	400	185
Всего	5685	6700	400	6250	1824	12068	2574	984

щенный фенол, ПДК которого составляет 1 мкг/л [12]. Этот уровень был превышен в одном из образцов дождевой воды. Ассортимент и уровни фенолов в московском снеге были ниже [6], и в значимых количествах был обнаружен исключительно незамещенный фенол (500 нг/л). Это может быть связано с его нестабильностью и разложением даже при низких температурах в снежной матрице. По нашим результатам, фенол можно включить в список приоритетных загрязняющих веществ для московского воздуха.

С широким распространением полимерных материалов связано также детектирование в окружающей среде антиоксидантов. Наиболее часто встречаются на территории России антиоксиданты на базе трет-бутилфенола, основное из них – 2,6-ди(трет-бутил)-4-метилфенол (ионол). Однако следует отметить, что в пробах снега 4-этил- и 4-нитропроизводные присутствуют практически в таких же количествах [6]. Токсичность этих соединений невысока, поэтому, несмотря на распространенность, их можно пока не включать в списки приоритетных экотоксикантов.

Фталаты представляют собой наиболее распространенный класс антропогенных загрязняющих веществ как в России, так и во многих других странах. Их высокая устойчивость и широкое использование в качестве пластификаторов в полимерах создали ситуации, когда вряд ли возможно найти образец окружающей среды в любой точке Земли, не содержащий фталатов. Несмотря на то что следы почти всех фталатов обнаруживались в бланках, уровень фталатов в дождевой воде и в снеге был очень высоким (табл.1). На рис.3 можно видеть разницу интенсивностей пиков фталатов в бланке и в одном из образцов.

Диметилфталат используется в качестве пластификатора для полимерных покрытий, является компонентом пестицидных препаратов, входит в состав репеллентов (применяются в России). Уровни диметилфталата в образцах дождевой воды хотя и отличались от образца к образцу, но были значительно ниже ПДК (300 мкг/л). Эти величины сравнимы с уровнями диметилфталата в парижской воде (116 нг/л) [27]. Диэтилфталат используется в аэрозолях [28] и косметических препаратах [29]. Есть некоторые данные по отрицательному воздействию диэтилфталата на нервную систему и жен-

Рис.3. Масс-хроматограммы диалкилфталатов по характерическому иону m/z 149 в бланке (оранжевый) и пробе дождя (синий)

Рис.4. Масс-хроматограммы, построенные по основным характеристическим ионам для тетра-, пента- и гексахлорбензолов

ские и мужские репродуктивные органы [30, 31]. Уровни этого соединения варьировались в диапазоне сотен нг/л, и лишь в одном образце они превысили 1 мкг/л. Результаты довольно близки к данным по парижской воде (333 нг/л) [27] и в то же время на два порядка ниже, чем в образцах снега, отобранных в марте 2012 года в Москве [6]. Дибутилфталат является наиболее распространенным пластификатором. В 1976 году он был запрещен как компонент косметической продукции директивой Европейского Союза 76/768/ЕЕС, а в 1999 году – в пластмассах для игрушек. В 2006 году дибутилфталат был включен в список потенциальных тератогенов в США. Уровни этого соединения в пробах дождя были зафиксированы в интервале 30–7600 нг/л, в образцах снега концентрация дибутилфталата превышала ПДК (для рыбохозяйственных водоемов России 1 мкг/л) на 2 порядка практически во всех пробах. Подобные уровни наблюдались и в парижской дождевой воде (592 нг/л) [27]. Значения концентрации дибутилфталата в московской дождевой воде были на два порядка ниже, чем в снеге. Однако, с учетом накопления дибутилфталата в снеге в течение 3–4 месяцев или около 100 дней, мы приходим к одним и тем же цифрам для дождя и снега. Очевидно, что это соединение является приоритетным экотоксикантом для Московского региона.

Бис(2-этилгексил)фталат очень часто обнаруживается в окружающей среде в России. Благодаря своей низкой стоимости, он по-прежнему используется как пластификатор и как компонент в гидравлических жид-

костях в конденсаторах. Поливинилхлоридные (ПВХ) продукты могут содержать до 40% этого фталата. Его уровни в анализируемых образцах дождя были достаточно высокими (до 1200 нг/л), но все равно в 10 раз ниже своего безопасного уровня [12]. Такая же ситуация наблюдалась и в образцах снега.

Хотя бензилбутилфталат был включен в список приоритетных загрязняющих веществ в США еще в 1979 году, в России до недавнего времени он появлялся в экологических образцах довольно редко. Сегодня этот фталат стал достаточно типичным и для России, хотя его уровни ниже, чем в европейских образцах. Так, [27] сообщают о 80 нг/л бензилбутилфталата в парижской дождевой воде, в то время как нами была зафиксирована его максимальная концентрация на уровне 25 нг/л.

Впервые синтезированные в 1929 году полихлорированные бифенилы (ПХБ) нашли широкое применение в промышленности благодаря высокой устойчивости к окислению. Они традиционно применялись как диэлектрические жидкости в трансформаторах и конденсаторах, в клеях и мастиках, как стабилизирующие добавки в поливинилхлоридных покрытиях, в качестве смазок, антипиренов, гидравлических жидкостей и т.д. Производство ПХБ было запрещено в 1986 году после обнаружения их высокой токсичности (в том числе отмечены нарушение работы эндокринной системы и нейротоксичность). Однако к тому времени около 2 миллионов тонн ПХБ были уже произведены и попали в окружающую среду. Из-за своей высокой химической устойчивости эти загрязняющие вещества практически всегда обнаруживаются в большинстве природных образцов. Их источники могут быть далеки от места обнаружения, так как трансграничные переносы этих стойких загрязняющих веществ могут быть очень эффективными. ПХБ обнаруживали в пробах дождевой воды в Швейцарии [32], США [33], Чешской Республике [34]. Москва не является исключением, мы определили 40 конгенеров ПХБ в московском снеге [6] в достаточно высоких концентрациях (7,3–22 нг/л), хотя вокруг Москвы нет никаких известных источников ПХБ (рис.4). Учитывая, что в России безопасное значение [12] для этих соединений предполагает их отсутствие, мы считаем, что эта группа соединений должна быть включена в перечень приоритетных загрязняющих веществ Московского региона.

Наше особое внимание привлек дихлорнитрометан (CHCl_2NO_2), обнаруженный во всех пробах снега 2012–2013 годов. Использование высокого разрешения позволило установить элементный состав ионов. Более того, удалось детектировать молекулярный ион, что позволило однозначно идентифицировать соединение как дихлорнитрометан [5]. Пик этого соединения был

достаточно интенсивным на хроматограммах по полному ионному току во всех образцах, а это означает, что его можно отнести к макрокомпонентам. Учитывая, что это соединение относится к группе летучих веществ, мы допускаем, что в процессе пробоподготовки, предназначенной для выделения полувolatile соединений [3], большая часть дихлорнитрометана могла быть потеряна, и реальные концентрации этого вещества могут быть на порядок выше. Расчет концентраций дихлорнитрометана без учета фактора отклика дал ориентировочное значение 20 плюс/минус 3 мкг/л во всех пробах снега, отобранных в 2012–2013 годах. В пробах дождя уровни дихлорнитрометана были определены в диапазоне 0,8–2,6 мкг/л. К сожалению, данные по токсичности этого соединения отсутствуют, поскольку специально оно не синтезируется. Единственным сообщением об обнаружении его в окружающей среде в осадках на территории Швеции и Польши служит работа [11]. Можно предположить, что один из возможных путей проникновения этого вещества в окружающую среду – испарение из водопроводной воды, поскольку известно, что дихлорнитрометан образуется в качестве побочного продукта дезинфекции воды [12]. Возможно также восстановление хлорпикрина (CCl_3NO_2), который до сих пор применяют в России как фумигант. Однако наибо-

лее вероятным источником этого соединения являются мусоросжигательные заводы [13]. Учитывая постоянное присутствие этого соединения в атмосфере Москвы в значительных количествах, имеет смысл провести оценку его токсичности.

Помимо дихлорнитрометана, заслуживает внимания еще одно соединение из класса летучих галогеналканов – 1,1,2,2-тетрахлорэтан. Это соединение входит в список приоритетных загрязняющих веществ в США [3]. Учитывая вновь, что использование методики пробоподготовки EPA 8270 приводит к потере летучих органических веществ, обнаружение в пробах снега довольно высоких концентраций тетрахлорэтана (особенно в пробе на 78 км МКАД) означает, что в действительности концентрация данного компонента в несколько раз больше. Принимая во внимание, что рыбохозяйственная ПДК для 1,1,2,2-тетрахлорэтана составляет 50 мкг/л [12], имеет смысл рассмотреть это соединение в качестве кандидата для списка приоритетных загрязняющих веществ для Москвы.

Сложные эфиры фосфорной кислоты были обнаружены в образцах и снега, и дождя. В отличие от большинства классов органических экотоксикантов, концентрации которых в снеге мало изменялись от года к году, уровни органических эфиров фосфорной кис-

РЕКЛАМА

ASSOCIATION OF
CHEMISTRY AND THE
ENVIRONMENT

I МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМ МЕТОДАМ АНАЛИЗА ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

С 22 по 27 июня 2020 года, Архангельск

22–27 июня 2020 года в Архангельске на базе Центра коллективного пользования “Арктика” Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова пройдет I Международная летняя школа по физико-химическим методам анализа объектов окружающей среды.

Организаторы школы – Всероссийское масс-спектрометрическое общество и Европейская ассоциация химии и окружающей среды (Association of Chemistry and Environment).

Обучение включает лекции, семинары и практические занятия. Для практической работы слушатели могут привезти реальные образцы, либо экспериментальная задача будет предложена преподавателем.

Планируется участие 15 человек из России и 15 человек из Европы.

ЯЗЫК ШКОЛЫ

Английский

АДРЕС ДЛЯ ОТПРАВКИ ЗАЯВКИ И РЕЗЮМЕ УЧАСТНИКА

mail@vmso.ru

vmso.ru

Рис.5. Кластеризация образцов по характерным специфичным малолетучим соединениям [40]

лоты (ОЭФК) с каждым годом возрастают. ОЭФК используются в качестве антипиренов, т.е. веществ, препятствующих возгоранию, пластификаторов, в качестве противопенных реагентов и добавок в смазочные материалы, растворы антифризов и гидравлические жидкости. За последние годы мировое потребление ОЭФК существенно выросло. В 2001 году их потребление в Западной Европе составило 83 000 т, тогда как в 1998 году – только 58 000 т. Трис(2-хлорэтил)фосфат включен Европейской Комиссией во второй список [15], а трис(1-хлор-2-пропил)фосфат (ТХПФ) и трис(1,3-дихлор-2-пропил)фосфат (ТДХПФ) – в четвертый список приоритетных экотоксикантов [16]. На сегодняшний день информации по концентрациям ОЭФК в объектах окружающей среды не так много, и ЕС пока еще продолжает оценку рисков, которые представляют данные соединения для окружающей среды. Информации о токсичности ОЭФК довольно мало, но, по некоторым данным, хлорированные ОЭФК, трибутилфосфат (ТБФ) и трис(2-этилгексил)фосфат (ТЭГФ) обладают пероральной токсичностью от низкой до средней. Трифенилфосфат (ТФФ) наиболее токсичен в отношении водных организмов. Концентрации органических фосфатов оказались наиболее высокими в западных пробах снега, исключение составили крезилфосфаты, равномерно распределенные по всему периметру МКАД. В пробах дождя уровни фосфатов находятся в диапазоне от сотен пикограмм до сотен нанограмм на литр, что согласуется с результатами, ранее полученными для дождевой воды в городах Германии [35, 36] и Италии [37].

Достаточно интересным и ранее не входившим в сферу внимания экологических служб классом органических загрязняющих веществ оказались легкие алкилпиридины. Интересно, что мы обнаружили алкилпиридины не только в пробах снега и дождя Москвы. Они присутствуют в воде облаков в центральной Франции [18], в дождевой воде в городе Вальпараисо (Чили) [38] и даже в арктическом снеге [39]. Их источником потенциально может быть транспорт, однако наши последние лабораторные исследования показали, что наиболее вероятно попадание пиридинов в окружающую среду во время торфяных пожаров. Их отличие от многих других регистрируемых соединений состоит в достаточно высокой растворимости в воде, что приводит к занижению количественных результатов определения в связи с неполным извлечением во время экстракции дихлорметаном. Это означает, что реальные уровни в атмосферном воздухе могут быть очень высокими. В образцах дождевой воды г. Москвы мы зарегистрировали пиридин и 18 алкилпиридинов в диапазоне концентраций 0,5–3500 нг/л, причем основной компонент – сам пиридин. Вероятно, имеет смысл сделать прямые замеры концентрации алкилпиридинов в воздухе города и сравнить полученные результаты с токсикологическими характеристиками этих соединений.

Ранее не вставал и вопрос детектирования в воздухе сульфонов. Три сульфона обнаружены практически во всех пробах снега. Максимальные концентрации зарегистрированы в пробе на 66-м км МКАД [6]. Источник

Рис.6. Хроматографический пик, экспериментальный и библиотечный масс-спектры бис(диэтилкарбамодитиоато-S,S') никеля [41]

этих соединений не очень понятен, однако они все чаще обнаруживаются в пробах окружающей среды.

Транспорт представляет собой наиболее вероятный источник дибензотиофенов, поскольку они служат компонентами дизельного топлива. Их равномерное распределение по всему периметру кольцевой дороги указывает на отсутствие других точечных источников. Элементарная сера, зарегистрированная в двух пробах снега, может быть связана с широким использованием природного газа, часто содержащего этот элемент.

Следует особо отметить, что использование метода ионного циклотронного резонанса с преобразованием Фурье [40] продемонстрировало, что сероорганические соединения являются основными малолетучими веществами, загрязняющими атмосферу Москвы. Более двух тысяч элементных составов (без разделения на изомеры) этих соединений было идентифицировано в пробах снега. Этим же методом удалось идентифицировать несколько тысяч соединений менее летучих, чем обычные экотоксиканты, определяемые методом ГХ/МС. Последующий хемометрический анализ привел к разделению проб на три группы, что связано с доминирующими в Москве юго-западными ветрами (рис.5). В частности, на севере Москвы специфичными оказались соединения группы CHOS, связанные, скорее всего, с выбросами SO_2 и последующими реакциями в атмосфере. На юго-востоке столицы специфичны окисленные в атмосфере углеводороды. Кроме того, для этого

района характерны соединения общей формулы $\text{C}_n\text{H}_{2n}-\text{N}_2\text{O}_4$, связанные с атмосферными реакциями окислов азота. В центре города преобладают соединения группы СНО: жирные кислоты, альдегиды и кетоны, а также производные ПАУ.

Отдельного упоминания заслуживают алкиловые эфиры N,N-диэтилдитиокарбаминовой кислоты. В пробах снега в 2011 году зарегистрировано 12 соединений этой группы в количестве от 0,05 до 0,28 мкг/л. Источники и назначение этих соединений, а также их токсикологические характеристики не очевидны. В 2012 и 2013 годах эти соединения детектировались лишь в следовых количествах, однако в пробах снега 2016 года [41], помимо эфиров и самой кислоты, обнаружены хлорпроизводные и даже металлоорганическое производное – бис(диэтилкарбамодитиоато-S,S') никель (рис.6). Источником этого соединения, скорее всего, служат автомобильные покрышки. Среди прочих азотсодержащих соединений можно выделить хиолин, изохиолин, N,N-диметил- и дибутилформамиды. В этой же серии проб идентифицированы два иодсодержащих соединения – иодхлорбензол и иоднитробензол, токсичность которых может быть весьма высокой.

В результате многолетних экспериментов по масс-спектрометрическому изучению органических полелетучих загрязняющих веществ в московском снеге и дожде идентифицировано несколько сотен индиви-

дуальных химических соединений. Среди известных экотоксикантов тревогу вызывают фталаты, полихлорированные бифенилы, бенз[а]пирен, тетрахлорэтан, фенолы. Для подавляющего большинства идентифицированных соединений величины ПДК отсутствуют, а информация о токсичности ограничена. Дихлорнитро-

метан, алкилпиридины, алкиловые эфиры N,N-диэтилдитиокарбаминовой кислоты, органофосфаты и многочисленные сероорганические соединения, безусловно, требуют как регулярных прямых замеров концентрации в воздухе, так и уточнения токсикологических характеристик.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Lebedev A.T.** Environmental mass spectrometry // *Ann. Rev. Anal. Chem.* 2013. V. 6. P. 163–189.
2. **Лебедев А.Т.** Масс-спектрометрия для анализа объектов окружающей среды. М.: Техносфера, 2013. 632 с.
3. Method 8270D: Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS). US Environmental Protection Agency, 2007.
4. **Lebedev A.T., Polyakova O.V., Mazur D.M., Artaev V.B.** The benefits of high resolution mass spectrometry in environmental analysis // *Analyst.* 2013. V. 138. No. 22. P. 6946–6953.
5. **Лебедев А.Т.** Масс-спектрометрия в органической химии. М.: Техносфера, 2015. 702 с.
6. **Polyakova O.V., Lebedev A.T., Mazur D.M., Bolshov M.A., Seregina I.F.** Estimation of contamination of atmosphere of Moscow in winter // *J. Anal. Chem.* 2012. V. 67. No. 14. P. 1039–1049; оригинальная русская версия в: Масс-спектрометрия. 2012. V. 9. No. 1. P. 5–15.
7. **Lebedev A.T., Mazur D.M., Polyakova O.V., Hanninen O.** Snow samples as markers of air pollution in mass spectrometry analysis. in *Environmental Indicators*, Ed. by R. Armon and O. Hanninen, Springer, 2015. 1068 p.
8. **Lebedev A.T., Poliakova O.V., Hanninen O.** The Sustainable City ed. By **C. Brebbia A.** Ferrante. UK: WIT Press Stevenage; 2000. P. 103–112.
9. **Lebedev A.T., Poliakova O.V., Hanninen O.** Organic pollutants in snow of urban and rural Russia and Finland // *Toxicological and Environmental Chemistry.* 2000. V. 75. P. 181–194.
10. **Lebedev A.T., Sinikova N.A., Nikolaeva S.N., Poliakova O.V., Khrushcheva M.L., Pozdnyakov S.** Metals and organic pollutants in snow surrounding an iron factory // *Environ. Chem. Lett.* 2003. V. 1. P. 107–112.
11. **Polyakova O.V., Artaev V.B., Lebedev A.T.** Priority and emerging pollutants in the Moscow rain // *Science of the Total Environment.* 2018. V. 645. P. 1126–1134.
12. Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. Изд-во ВНИРО, 2010. 214
13. **Perugini M., Visciano P., Giammarino A., Manera M., Di Nardo W., Amorena M.** Polycyclic aromatic hydrocarbons in marine organisms from the Adriatic Sea, Italy // *Chemosphere.* 2007. V. 66. P. 1904–1910.
14. **Tsapakis M., Stephanou E.G.** Polycyclic aromatic hydrocarbons in the atmosphere of the Eastern Mediterranean // *Environ. Sci. Technol.* 2005. V. 39. P. 6584–6590.
15. **Furuta C., Suzuki A.K., Wanatage G., Li C., Taneda S., Taya K.** Nitrophenols isolated from diesel exhaust particles promote the growth of MCF-7 breast adenocarcinoma cells. // *Toxicol. Appl. Pharmacol.* 2008. V. 3. P. 320–326.
16. **Trempe J., Mattrel P., Fingler S., Giger W.** Phenol and nitrophenols as tropospheric pollutants: emissions from automobile exhausts and phase transfer in the atmosphere // *Water Air Soil Pollut.* 1993. V. 68. P. 113–123.
17. **Volkamer R., Klotz B., Barnes I., Imamura T., Wirtz K., Washida N., Becker K.H., Platt U.** OH-initiated oxidation of benzene part I. Phenol formation under atmospheric conditions // *Phys. Chem. Chem. Phys.* 2002. V. 4. P. 1598–1610.
18. **Lebedev A.T., Polyakova O.V., Mazur D.M., Artaev V.B., Canet I., Lallement A., Vaïtilingom M., Deguillaume L., A-M Delort.** Detection of semi-volatile compounds in cloud waters by GC×GC-TOFMS. Evidence of phenols and phthalates as priority pollutants // *Environmental Pollution.* 2018. V. 241. P. 616–625.
19. **Lallement A., Besaury L., Tixier E., Sancelme M., Amato P., Vinatier V., Canet I., Polyakova O.V., Artaev V.B., Lebedev A.T., Deguillaume L., Mailhot G., Delort A.** Potential for phenol biodegradation in cloud waters // *Biogeosciences.* 2018. V. 15. P. 5733–5744.
20. **Herrmann H., Schaefer T., Tilgner A., Styler S.A., Weller C., Teich M., Otto T.** Tropospheric aqueous-phase chemistry: kinetics, mechanisms, and its coupling to a changing gas phase // *Chem. Rev.* 2015. V. 115. P. 4259–4334.
21. **Rayne S., Forest K., Friesen K.J.** Mechanistic aspects regarding the direct aqueous environmental photochemistry of phenol and its simple halogenated derivatives. A review // *Environ. Int.* 2009. V. 35. P. 425–437.
22. **Harrison M.A.J., Barra S., Borghesi D., Vione D., Arsene C., Lulian Olariu R.** Nitrated phenols in the atmosphere: a review // *Atmos. Environ.* 2005. V. 39. P. 231–248.
23. **Schummer C., Groff C., Chami J.A., Jaber F., Millet M.** Analysis of phenols and nitrophenols in rainwater collected simultaneously on an urban and rural site in east of France // *Sci. Total Environ.* 2009. V. 407. P. 5637–5643.
24. **Leuenberger C., Czuczwa J., Trempe J., Giger W.** Nitrated phenols in rain: atmospheric occurrence of phytotoxic pollutants // *Chemosphere.* 1988. V. 17. P. 511–515.
25. **Levsen F.K., Behnert S., Preiss B., Scoboda M., Winkler H.D., Zietlow J.** Organic compounds in precipitation // *Chemosphere.* 1990. V. 21. P. 1057–1061.
26. **Schussler W., Nitschke I.** Nitrophenols in precipitation // *Chemosphere.* 2001. V. 42. P. 277–283.
27. **Teil M.J., Blanchard M., Chevreuil M.** Atmospheric fate of phthalate esters in an urban area (Paris-France) // *Sci. Total Environ.* 2006. V. 354. P. 212–223.

28. **Ghorpade N., Mehta V., Khare M., Sinkar P., Krishnan S., Vaman Rao C.** Toxicity study of diethyl phthalate on fresh-water fish *Cirrhina mrigala* // *Ecotoxicol. Environ. Saf.* 2002. V. 53. P. 255–258.
29. **Api A.M.** Toxicological profile of diethyl phthalate: a vehicle for fragrance and cosmetic ingredients // *Food Chem. Toxicol.* 2001. V. 39. P. 97–108.
30. **Colon I., Caro D., Bourdony C.J., Rosario O.** Identification of phthalate esters in the serum of young Puerto Rican girls with premature breast development // *Environ. Health Perspect.* 2000. V. 108. P. 895–900.
31. **Miodovnik A., Engel S.M., Zhu C., Ye X., Soorya L.V., Silva M.J., Calafat A.M., Wolff M.S.** Endocrine disruptors and childhood social impairment // *Neurotoxicology*. 2011. V. 32. P. 261–267.
32. **Rossi L., de Alencastro L., Kupper T., Tarradellas J.** Urban storm water contamination by polychlorinated biphenyls (PCBs) and its importance for urban water systems in Switzerland // *Sci. Total Environ.* 2004. V. 322. P. 179–189.
33. **Poster D.L., Baker E.** Influence of submicron particles on hydrophobic organic contaminants in precipitation. 1. Concentrations and distributions of polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls in rainwater // *Environ. Sci. Technol.* 1995. V. 30. P. 341–348.
34. **Holoubek I., Klanova J., Jarkovsky J., Kohoutek J.** Trends in background levels of persistent organic pollutants at Kosetice observatory, Czech Republic // *J. Environ. Monit.* 2007. V. 9. P. 557–563.
35. **Fries E., Puttmann W.** Monitoring of the three organophosphate esters BP, TCEP and TBEP in river water and ground water (Oder, Germany) // *J. Environ. Monit.* 2003. V. 5. P. 346–352.
36. **Regnery J., Puttmann W.** Organophosphorus flame retardants and plasticizers in rain and snow from middle Germany // *Clean.* 2009. V. 37. P. 334–342.
37. **Bacaloni A., Cucci F., Guarino C., Nazzari M., Samperi R., Laganà A.** Occurrence of organophosphorus flame retardants and plasticizers in three volcanic lakes in central Italy // *Environ. Sci. Technol.* 2008. V. 42. P. 1898–1903.
38. **Cereceda F., Vidal V., Gonzalez Arancibia K., Lebedev A.T., Polyakova O.V., Artaev V.B.** Emerging contaminants in Valparaiso, Chile rain water: changes in composition and concentration levels over fifteen years (2003–2017) // 67TH ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics, Atlanta, USA, 2019.
39. **Lebedev A.T., Mazur D.M., Polyakova O.V., Kosyakov D.S., Kozhevnikov A.Yu., Latkin T.B., Andreeva Yu.I., Artaev V.B.** Semi Volatile Organic Compounds in the Snow of Russian Arctic Islands: Archipelago Novaya Zemlya // *Environmental Pollution*. 2018. V. 239. P. 416–427.
40. **Mazur D.M., Harir M., Schmitt-Kopplin P., Polyakova O.V., Lebedev A.T.** High field FT-ICR mass spectrometry for molecular characterization of snow board from Moscow regions // *Science of the Total Environment*. 2016. V. 557. P. 12–19.
41. **Mazur D.M., Polyakova O.V., Artaev V.B., Lebedev A.T.** Novel pollutants in the Moscow atmosphere in winter period: Gas chromatography-high resolution time-of-flight mass spectrometry study // *Environmental Pollution*. 2017. V. 222. P. 242–250.

РЕКЛАМА

**Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН
приглашает ученых и представителей бизнес-сообщества
16–19 декабря 2019 года
принять участие в ежегодном открытом конкурсе-конференции
научных работ
«ИНЭОС OPEN CUP 2019»**

Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН приглашает принять участие в ежегодном открытом конкурсе-конференции научных работ «ИНЭОС OPEN CUP». Для участия в конкурсе принимаются экспериментальные и теоретические работы в области химии элементоорганических соединений, высокомолекулярных соединений, органической химии, а также физико-химических методов исследования строения вещества, результаты которых были опубликованы в последние три года (с 2017 г. по настоящее время). Вместе с основным конкурсом пройдет и конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых, в котором предусмотрены устные доклады и стендовая сессия.

Работы для участия в конкурсе-конференции «ИНЭОС OPEN CUP» проходят двухуровневую экспертизу независимым жюри конкурса. Предусмотрены три главных премии и Гран-при — премия имени А.Н. Несмеянова, а также поощрительные призы для иногородних участников. Работы, имеющие выраженные прикладные перспективы, будут выделены в отдельную сессию очной части конкурса «ИНЭОС OPEN APPLIED».

Приглашаем к участию в конкурсе-конференции представителей инновационных компаний, отвечающих за новые направления развития и инновационный сектор в целом. Ваше участие в «ИНЭОС OPEN CUP» позволит обсудить и сформулировать направления сотрудничества науки и бизнеса, определить новые цели и формы взаимодействия, выявить направления создания новых конкурентоспособных продуктов и технологий. В этом году в конкурс введена новая прикладная сессия «ИНЭОС OPEN APPLIED», после которой состоится круглый стол «Прикладные аспекты химии элементоорганических соединений».

Прием заявок на конкурс — до 15 октября 2019 года

Подробная информация о конкурсе на сайте: www.ineos.ac.ru