НЕОБЫЧНЫЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 14-Й ГРУППЫ: ПЕНТА- И ГЕКСАКООРДИНИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

УДК 547.245
БАК 02.00.03

Бауков Ю.И., д.х.н., **Корлюков А.А.**, д.х.н., **Шмиголь Т.А.**, к.б.н., **Негребецкий В.В.**, д.х.н.,
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, negrebetsky1@rsmu.ru

Среди соединений кремния в нестандартных координационных состояниях важное место занимают гиперкоординированные, или гипервалентные, соединения. Термин "гипервалентность" означает, что в соединении или атоме (гипервалентные соединения, гипервалентные атомы) число валентных электронных пар превышает число имеющихся связывающих орбиталей [1]. В гипервалентных соединениях 14-й группы координационное число атома выше четырех.

В настоящем обзоре обобщены результаты недавних исследований новых соединений пента- и гексакоординированного кремния. Особое внимание уделено соединениям с координационным узлом $OSiC_3X$, где центральный атом Si связан с тремя атомами углерода, электроотрицательным заместителем X и атомом кислорода амидного фрагмента.

Тяжелые аналоги кремния, германий и олово, также способны образовывать гиперкоординированные соединения, однако они менее изучены.

В отличие от углерода, валентность которого не превышает четырех, атом кремния и его тяжелые аналоги способны образовывать устойчивые соединения с более высокими координационными числами. В начале XIX в. были изучены первые неорганические производные гексакоординированного кремния – аммиачный комплекс $SiF_4 \cdot 2NH_3$ (Дж.Гей-Люссак, 1809; Дж.Дэви, 1812) и соли несуществующей кремнефтористоводородной кислоты H_2SiF_6 – гексафторосиликаты (Й.Берцелиус, 1824). С начала прошлого столетия известна ацетилацетонатная соль $[Si(acac)_3]HCl_2$ – первое внутрикомплексное соединение гексакоординированного кремния (У.Дилтей, 1903) [2].

Менее устойчивые органические соединения гипервалентного кремния в течение долгих лет оставались фактически неизвестными и считались достаточно экзотическими. Их существование было строго доказано лишь в середине прошлого столетия [2]. Интерес к поиску и изучению новых соединений пентакоординированного кремния был стимулирован гипотезой об определяющей роли тригонально-бипирамидальных (ТБП) интермедиатов в реакциях нуклеофильного замещения у тетраэдрического атома кремния. К реакциям с участием таких интермедиатов относятся практически важные реакции гидролиза и алкоголиза хлорсиланов. В отличие от неустойчивого ТБП переходного состояния у центрального атома углерода в S_N2 -реакции, ТБП-

комплексы, содержащие атомы кремния и его тяжелых аналогов, достаточно устойчивы, и многие из них могут быть выделены в виде индивидуальных соединений.

Общеизвестными примерами соединений с координацией $N \rightarrow Si$ могут служить силатраны (1960-е годы) [3], а с координацией $O \rightarrow Si$ – драконоиды, получившие свое название с легкой руки академика М.Г. Воронкова (1970-е годы)[4] (рис.1).

МОДЕЛЬ ГИПЕРВАЛЕНТНОСТИ

Для объяснения ТБП-соединений кремния с одним электроотрицательным заместителем была предложена модель гипервалентности [1], согласно которой в акси-

Рис.1. Силатраны (а) и драконоиды (б)

Рис.2. Способность Si-заместителей к нуклеофильному замещению

альном фрагменте образуется четырехэлектронная трехцентровая (гипервалентная) связь между неподеленной электронной парой донора (D), 3p_z-электроном центрального атома кремния и валентным электроном его заместителя (X). Усиление координационной компоненты гипервалентной связи D → Si происходит не только при увеличении электроотрицательности заместителей у атома Si, но и при ослаблении ковалентной составляющей связи Si–X. Последнее свойство симбатно нуклеофугности заместителя X и выражено тем ярче, чем меньше других электроотрицательных заместителей (X = NaI, OTf, OR и др.) связано с атомом кремния [1].

Исследования гиперкоординированных комплексов кремния, германия и олова методами РСА и квантовой химии обобщены в обзорах [5, 6], где описаны основные закономерности изменения геометрии и электронного строения нейтральных и ионных ациклических и циклических элементоорганических комплексов с C,O-, O,O- и N,O-хелатными лигандами в зависимости от межмолекулярных взаимодействий и природы (электронодонорных или электроноакцепторных свойств) атомов координационного окружения кремния, германия и олова.

N-(ДИМЕТИЛСИЛИЛМЕТИЛ)-ПРОИЗВОДНЫЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ И АЦИКЛИЧЕСКИХ АМИДОВ

Наиболее изучены соединения пентакоординированного кремния, включающие координационный узел OSiC₃X (X – электроотрицательная группа), связанный с циклическим или ациклическим амидным фрагментом. Гипервалентное связывание O–Si–X обеспечивает (O→Si)-хелатную структуру таких молекул.

Образование пентакоординированных комплексов кремния может быть представлено как промежуточная ступень при протекании реакции S_N2-нуклеофильного замещения у тетракоординированного атома кремния [1, 7]. В соответствии с моделью, предложенной на основании данных РСА и подтвержденной данными ЯМР [8], степень внутримолекулярного взаимодействия (ВМВ) O→Si в этих соединениях симбатна не электроотрицательности заместителя у атома Si, а его способности к нуклеофильному замещению в реакциях S_N2-Si-типа (рис.2, M = Si). На этом рисунке показано, какая преимущественная структура соответствует наиболее часто встречающимся заместителям X.

На основании данных ЯМР-мониторинга была предложена нетривиальная схема получения пентакоординированных комплексов кремния и германия – производных циклических и ациклических амидов [1]. На первой, кинетически контролируемой стадии N-триметилсилиллактама (ТМС-лактама) или N-ТМС-метилацетамида пересилилируются диметилхлор-хлор-метилсиланом ClCH₂SiMe₂Cl или перегермируются диметилхлор-метилхлоргерманом ClCH₂GeMe₂Cl при относительно низких температурах (около –60°C для Si и около –20°C для Ge) с образованием промежуточных N-диметилхлорметилсилильных и -гермилных продуктов. Последние при повышении температуры в условиях термодинамического контроля претерпевают внутримолекулярную изомеризацию в O-диметилхлорсилил-(гермил)-имидаты – (N→Si)- и (N→Ge)-хелаты соответственно (рис.3) [1]. Пентакоординация кремния в промежуточных (N→Si)-хелатах установлена в растворе методом спектроскопии ЯМР ²⁹Si [1]. В случае стабильных при обычных температурах (N→Ge)-хелатов о пентакоординации атома Ge свидетельствуют данные РСА [9].

Реакции N-ТМС-амидов- и лактамов с ClCH₂SnMe₂Cl протекают по аналогичному механизму, но в более жестких условиях [10]. Продукты переметаллирования

Рис.3. Схема образования конечных продуктов в реакциях N-TMC-лактамов и N-TMC-метилацетамида с диметилхлорметилхлорсиланом и -германом

образуются при -20°C ; (N $\rightarrow$ Sn)-хелаты для производных лактамов – при $80\text{--}100^{\circ}\text{C}$, конечные (O $\rightarrow$ Sn)-хелаты – при $170\text{--}180^{\circ}\text{C}$. Оба типа хелатов в случае производных лактамов выделены в качестве индивидуальных соединений, их строение подтверждено данными ЯМР и в ряде случаев РСА [10].

При использовании двукратного избытка N-TMC-амидов в реакции с дихлорметилдихлорсиланом и -германом $(\text{ClCH}_2)_2\text{MCl}_2$ ($\text{M} = \text{Si}, \text{Ge}$) могут образоваться шестикоординированные комплексы кремния и германия, при этом на первой стадии образуется пентакоординированный комплекс, который далее реагирует со второй молекулой амида [1] (рис.4). Конечные бис-С,О-хелатные комплексы $[\text{R}_1\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R})\text{CH}_2]_2\text{SiCl}_2$ с координацией O $\rightarrow$ Si весьма неустойчивы и, как правило, не могут быть охарактеризованы рентгеноструктурным исследованием. Редким исключением служит пентакоординированный катионный комплекс $[(\text{MeC}(\text{O})\text{N}(\text{Me})\text{CH}_2)_2\text{Si}(\text{Cl})]^+\text{HCl}_2^-$, структура которого доказана РСА [11].

Внутримолекулярное координационное взаимодействие O $\rightarrow$ Si в Si-замещенных N-(диметилсилилметил) лактамах $\text{LacCH}_2\text{SiMe}_2\text{X}$ ($\text{X} = \text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}, \text{OC}(\text{O})\text{Me}, \text{OC}(\text{O})\text{CF}_3, \text{OSO}_2\text{Me}$) установлено методом ЯМР-спектроскопии [12] и подтверждено данными ИК-спектроскопии и кондуктометрии [13]. Определены спектроскопические критерии прочности такого связывания и установлено, что в бромиде и иодидах присутствует наиболее слабая

связь Si–X. Она способна к диссоциации в растворах, тогда как в остальных случаях наиболее слабой является связь O–Si. Это согласуется с преимущественными структурами, изображенными на рис.2.

В ряде реакций констатировалась высокая склонность к обмену заместителя у атома кремния, в частности хлора и других галогенов. Так, взаимодействие N-(галогенодиметилсилилметил)лактамов $\text{LacCH}_2\text{SiMe}_2\text{Hal}$ ($\text{Hal} = \text{F}, \text{Cl}, \text{Br}$) с галогенсиланами Me_3SiX привело к соответствующим Si-замещенным производным $\text{LacCH}_2\text{SiMe}_2\text{X}$ ($\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}, \text{OC}(\text{O})\text{Me}, \text{OC}(\text{O})\text{CF}_3, \text{OSO}_2\text{Me}$) [1, 7].

Методом конкурирующих реакций установлена повышенная реакционная способность N-(диметилхлорсилилметил)лактамов, содержащих пентакоординированный атом Si, по сравнению с триметилхлорсиланом в реакциях с реактивами Гриньяра. Например, силилгалогениды $\text{Lac}^5\text{CH}_2\text{SiMe}_2\text{Cl}$, $\text{Lac}^6\text{CH}_2\text{SiMe}_2\text{Cl}$, $\text{Lac}^7\text{CH}_2\text{SiMe}_2\text{Cl}$, содержащие пентакоординированный атом кремния, активнее триметилхлорсилана в реакции с бензилмагнийхлоридом PhCH_2MgCl с образованием тетракоординированных силанов $\text{Lac}^n\text{CH}_2\text{SiMe}_2\text{CH}_2\text{Ph}$ ($n = 5\text{--}7$). При этом их относительная реакционная способность составляет $\text{Me}_3\text{SiCl} : \text{Lac}^5\text{CH}_2\text{SiMe}_2\text{Cl} : \text{Lac}^6\text{CH}_2\text{SiMe}_2\text{Cl} : \text{Lac}^7\text{CH}_2\text{SiMe}_2\text{Cl} = 1 : 18 : 1,4 : 1,55$, причем наиболее активным оказалось производное пятичленного лактама [1].

Рис.4. Схема реакции N-TMC-амидов и -лактамов с бис(хлорметил)дихлорсиланом

а $R^1 = R^2 = \text{Me}$, $R^1, R^2 = (\text{CH}_2)_5$, C_6H_5 – дициклогексиламин

б $n = 1, 2$; $R, R_1 = \text{H, Me, Ph}$

в $R = \text{H, Ph}$

Рис.5. Синтез анионных трисхелатов пента- и гексакоординированного кремния с фрагментами пирокатехина (а) и 2-гидроксикислот (б, в)

КОМПЛЕКСЫ ПЕНТА- И ГЕКСАКООДИНИРОВАННОГО КРЕМНИЯ И ЕГО ТЯЖЕЛЫХ АНАЛОГОВ

Анионные смешанные комплексы. Нами были синтезированы анионные трисхелаты гексакоординированного кремния, в которых наряду с рассмотренными выше С,О-моноанионными хелатными лигандами присутствовали О,О-дианионные фрагменты пирокатехина (рис.5а) [14]. В то же время использование 2-гидроксикислот привело к образованию соответствующих моноанионных комплексов кремния – гексакоординированным хела-

там с одним С,О- и двумя бис-О,О'-хелатными лигандами (рис.5б). Атом Si в анионах этих солей гексакоординирован (координационный узел SiCO_5) в твердом состоянии (РСА), но пентакоординирован в растворе (ЯМР $\delta^{29}\text{Si} -91 \div -95$ м. д.) [15].

Переэтерификацией алкоксисилана $\text{PrnCH}_2\text{Si}(\text{OMe})_3$ гликолевой и дифенилгликолевой кислотами в присутствии дициклогексиламина ($\text{Prn} = \text{N-метилпиперидон}$) были синтезированы пентакоординированные анионные комплексы с двумя бис-О,О'-хелатными лигандами с фрагментами 2-гидроксикислот (рис.5в). Пентакоор-

Рис.6. Синтез биядерных хелатов с двумя мостиковыми тартратными лигандами

динация кремния в них подтверждена как в растворе (ЯМР ^{29}Si), так и в кристаллическом состоянии (РСА), координационный узел SiCO_4 [16].

Реакция с (R,R)-винной кислотой привела к новым двухзарядным дианионным комплексам кремния – биядерным хелатам с двумя мостиковыми тартратными тетраденатными (4-) лигандами (рис.6) [15]. Оба атома кремния в анионах этих солей пентакоординированы в кристаллах (РСА) и в растворе (ЯМР); внутримолекулярного координационного взаимодействия между атомами Si и атомом O лактамометильного лиганда R не происходит.

Рис.7. Региоселективное хелатирование в пентакоординированном хлорсилане $\text{MeC(O)N(CH}_2\text{C(O)NMe}_2\text{)CH}_2\text{SiMe}_2\text{Cl}$

Нейтральные монохелатные комплексы. Реакцией триметилсилильного производного бензоксазинона с $\text{ClCH}_2\text{SiMe}_2\text{Cl}$ получен $\text{BonCH}_2\text{SiMe}_2\text{Cl}$ – первый представитель нейтральных монохелатных комплексов пентакоординированного (РСА) кремния с бензоксазиносодержащим лигандом (BonCH_2 -) [7, 17]:

Гидролиз этого соединения до дисилоксана $(\text{BonCH}_2\text{SiMe}_2)_2\text{O}$ и последующая обработка $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$ дает монофторид $\text{BonCH}_2\text{SiMe}_2\text{F}$. Аналогичная последовательность реакций с использованием $\text{ClCH}_2\text{SiMe}_2\text{Cl}$ ведет к промежуточному дихлориду $\text{BonCH}_2\text{SiMe}_2\text{Cl}_2$, из которого синтезирован дифторид $\text{BonCH}_2\text{SiMe}_2\text{F}_2$. В полученных монофториде и дифториде атомы кремния пентакоординированы (РСА и спектроскопия ЯМР ^{19}F и ^{29}Si) [18].

Осуществлен синтез первых представителей оптически активных соединений пентакоординированного кремния – энантиомеров (O→Si)-хелатных производных N-ацетил-(S)-α-фенилэтиламина $\text{MeC(O)NCHR}^*\text{CH}_2\text{SiMe}_2\text{X}$ ($\text{R}^* = \text{CH(Ph)Me}$, $\text{X} = \text{F, Cl}$), которые представляют собой удобные модели для изучения стереодинамических процессов у ТБП атомов кремния и асимметрической индукции. Рентгеноструктурным исследованием подтверждена [3+2]-пентакоординация атома кремния в полученных комплексах с донорным атомом кислорода и атомом галогена в аксиальных положениях [19].

Интересным примером региоселективного хелатирования может служить реакция N',N'-диметиламида

Другой пример региоселективной реакции – взаимодействие $\text{ClCH}_2\text{SiMe}_2\text{Cl}$ с N-TMC-производными 2-аминопиридинов, приводящее к нейтральным комплексам с пентакоординированным атомом кремния, в которых имеет место (N→Si)-, а не (O→Si)-хелатирование (PCA) (рис. 8) [21].

Расщеплением связи Si→N в легкодоступных N-(диметилимидосилилметил)имидах эфиром BF₃ с хорошими выходами синтезированы N(диметилфторсилилметил)имиды. Атом кремния в полученных имидах пентакоординирован, однако координационное взаимодействие между атомами O и Si чрезвычайно слабое. Реакция представляет собой альтернативный путь к соответствующим фторсиланам и осуществлена на примерах производных фталимида (рис.9), сукцинимида и 2-пирролидона [22, 23].

Реакции О-ТМС-производного диметиламида L-миндальной кислоты с SiCl_4 и GeCl_4 привели к О,О'-монокелатным комплексам, пентакоординация атомов кремния и германия в которых доказана РСА [24] (рис.10а).

Большое внимание уделяется производным аминокислот, в частности пролина. Так, прямым N-диметилхлорсилилметилированием его N-метиламидов получены ранее неизвестные пентакоординированные C,O-хелатные комплексы [25] (рис.106).

www.labpro-media.ru

гического анализа электронной плотности и расчета химических сдвигов на ядрах ^{29}Si . Оказалось, что координационное состояние центрального атома кремния главным образом зависит от заместителя при аминокгруппе. В то время как в тозилных производных атом кремния тетракоординирован и соединение можно считать солью, нозильные производные проявляют характеристики ковалентных монокелатных комплексов пентакоординированного кремния (рис.11).

Нейтральные бис-хелатные комплексы. Метаноллиз в присутствии Et_3N или гидролиз в присутствии NaHCO_3 и последующая обработка $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$ бисхелатных нестабильных катионных комплексов, полученных *in situ* взаимодействием бис(хлорметил)дихлорсилана с соответствующими N-ТМС-лактамами, позволяет синтезировать нейтральные C,O-бисхелатные комплексы кремния – дифторсиланы $[(\text{MeC}(\text{O})\text{N}(\text{CHMePh})\text{CH}_2)_2]_2\text{SiF}_2$ [27] и $(\text{BonCH}_2)_2\text{SiF}_2$ [18], гексакоординация атома Si в которых, т.е. наличие дативного связывания в обоих фрагментах $\text{O} \rightarrow \text{Si}-\text{F}$, подтверждена методом PCA.

Рис.11. Структура бромида Ts-N-(Ac)CH₂C(O)N(Me)CH₂SiMe₂Br (а) и трифлата Ns-N-Pro-N(Me)CH₂SiMe₂OTf (б) по данным РСА

Катионные монохелатные комплексы. К настоящему времени синтезирован ряд катионных пентакоординированных C,O-хелатов – продуктов гидролиза первичных гидролитически нестабильных галогенидов или трифлатов [20, 25, 28]. В этих соединениях атомы Si пентакоординированы и имеют конфигурацию искаженной ТБП с атомами кислорода в аксиальных положениях. Один из них включен в пятичленный хелатный цикл и образует связь (C=)O–Si, тогда как атом кислорода сильанольной группы протонирован [20, 25, 28]:

Схема гидролиза моно-C,O-хелатных хлорсиланов предложена на основании рентгеноструктурных данных, ее этапы изображены на рис.12. В отсутствие оснований образуются продукты неполного гидролиза – сили-

локсонийхлориды [LCH₂SiMe₂OH₂]⁺Cl⁻ и дигидрохлориды (LCH₂SiMe₂)₂O·2HCl, в присутствии оснований, например NaHCO₃, – конечные продукты гидролиза, т.е. соответствующие дисилоксаны (LCH₂SiMe₂)₂O [29]. Атом кремния пентакоординирован в исходных хлоридах и силилоксонийхлоридах и тетракоординирован в дигидрохлоридах дисилоксанов. В конечных дисилоксанах взаимодействие между атомом кремния и атомами кислорода если и имеет место, то является чрезвычайно слабым [29].

Катионные бис-хелатные комплексы. Бис-(O→Ge)-хелат (L⁸CH₂)₂Ge(Cl)OTf – первый комплекс германия с установленной РСА структурой, содержащий 8-членный лактам (энантолактam), был получен взаимодействием дихлорида (L⁸CH₂)₂GeCl₂ с триметилсилилтрифлатом [30]:

Рис.12. Схема гидролиза моно-C,O-хелатных хлорсиланов

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

БИОТЕХПРОМ & АНАЛИТИКА

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

- Аналитика
- БИОФарма
- Функциональные продукты питания
- БИОЛаб
- БИОСофт
- БИОМед
- БИОАгро
- БИОВенчур, БИОФранчайзинг, Стартапы, Кластеры, Технопарки
- Промышленная биотехнология
- Лабораторная мебель БИОЛабДрайв

XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

БИОТЕХНОЛОГИЯ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОТОКИ ФОРУМА

- Фундаментальные вопросы биотехнологии
- Геномная инженерия
- Биотехнология и медицина
- Биофарма
- Биоинформатика
- Сельское хозяйство
- Life science

БИОСОН

27-29 МАЯ
МОСКВА
ГОСТИНЫЙ ДВОР

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

RED
GROUP

+7 (495) 780-41-09
+7 (495) 722-20-74

info@biomos.ru
www.biomos.ru

Рис.13. Биядерные бис-С,О-хелатные катион-анионные комплексы-бабочки с лактамометильными и амидометильными лигандами

Координационный полиэдр пентакоординированного атома германия в этом катионном комплексе является промежуточным между ТБП и квадратной пирамидой (КП); квантово-химические расчеты указывают на отсутствие дополнительного координационного связывания атома Ge и трифторметансульфонат-аниона [30].

При проведении реакции в условиях доступа влаги воздуха в присутствии HgCl_2 или Me_3SiOTf , а также в ряде случаев в отсутствие добавок выделены продукты частичного гидролиза – биядерные бис-С,О-хелатные катион-анионные комплексы-бабочки $[(\text{L}^n\text{CH}_2)_2\text{SiOSi}(\text{CH}_2\text{L}^n)_2]^{2+} \cdot 2\text{Y}^-$

с лактамометильными и амидометильными лигандами ($\text{L} = \text{L}^n$ ($n = 1-3$), $\text{MeC}(\text{O})\text{N}(\text{Me})$, Bon , Qon) (рис.13) [18, 31].

На рис.14 представлены пути превращения нестабильных первичных продуктов реакции между $(\text{ClCH}_2)_2\text{SiCl}_2$ и силилированными амидами и родственными соединениями, взятыми в соотношении 1:2, которые включают либо биядерные дисилоксановые дикатионные комплексы $[(\text{LCH}_2)_2\text{SiOSi}(\text{LCH}_2)_2]^{2+} \cdot 2\text{Y}^-$ (трифлаты, галогениды, меркураты или силилоксониевые производные), либо мооядерные бисхелаты $[(\text{LCH}_2)_2\text{Si}(\text{Hal})]^+ \cdot \text{Y}^-$ [31].

Взаимодействие полигалогенидов MeSiCl_3 и MeGeBr_3 с двумя эквивалентами S-триметилсилил-N,N-диметил-2-тиоацетамида дает О,S-бисхелатные катионные комплексы кремния и германия [32]:

Строение бисхелатов подтверждено РСА и ЯМР ^1H , ^{13}C , а комплекса кремния – также ЯМР ^{29}Si . Химсдвиг Si в CDCl_3 (–35,2 м.д.) типичен для пентакоординированных комплексов кремния [32].

Смешанные бисхелатные пентакоординированные катионные комплексы кремния, содержащие семичленный лактам и бензоксазинон, синтезированы реакцией транс-силилирования N-TMC-лактамов с $\text{ClCH}_2\text{SiMeCl}_2$ с последующей обработкой промежуточных монохелатов $[\text{LCH}_2\text{SiMe}(\text{CH}_2\text{Cl})\text{Cl}]$ диметиламидами О-TMC-2-гидроксикислот $\text{Me}_3\text{SiOCH}(\text{R})\text{C}(\text{O})\text{NMe}_2$ и затем Me_3SiX [33]. Полученные соединения – первые катионные комплексы, содержащие два С,О- и О,О-хелатных лиганда с двумя $\text{O} \rightarrow \text{Si}$ координационными

Рис.14. Схема превращений продуктов реакции бис(хлорметил)дихлорсилана с силилированными амидами и лактамами

ЛАБТЕСТ

WWW.LAB-TEST.RU

ЭЛЕМЕНТНЫЙ И МОЛЕКУЛЯРНЫЙ АНАЛИЗ
СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

- Prodigy Plus
- Prodigy 7
- Prodigy DCA

TELEDYNE LEEMAN LABS
Everywhereyoulook™

ICP-OES, DC/AC-Arc

Атомно-эмиссионные спектрометры
с индуктивно-связанной плазмой и
дугой постоянного и переменного тока

Новейший детектор на 3,4 млн пикселей

Специально разработан для спектрометров Prodigy.

Размерность: 1840 x 1840 пикселей. Размер пикселя 15 мкм.

Полное покрытие спектра от 165 до 1100 нм.

Одновременное считывание независимо от интенсивности линий.

Увеличенная в 40 раз скорость считывания.

Возможность проведения демонстрационного анализа на нашем оборудовании

TELEDYNE TEKMAR
Everywhereyoulook™

Анализаторы TOC и TN

Высокотемпературное каталитическое,
персульфатное и УФ-окисление

Headspace, Purge & Trap

Автоматизированные приставки
статической и динамической
газовой экстракции летучих
органических соединений

*Совместимы с хроматографами
всех производителей*

TELEDYNE LEEMAN LABS
Everywhereyoulook™

Анализаторы ртути

Атомно-абсорбционные и
флуоресцентные анализаторы
ртути в жидких и твёрдых пробах
в диапазоне концентраций
от сотых долей нг/л (ppt)

Возможность проведения демонстрационного анализа на нашем оборудовании

Системы лазерной абляции

Для масс-спектрометров с
индуктивно-связанной плазмой
(ICP-MS) любых типов и
производителей

266 нм; 213 нм; эксимерные 193 нм;
фемтосекундные

**TELEDYNE
CETAC TECHNOLOGIES**
Everywhereyoulook™

Системы автоматизации

Автосемплеры для спектрометров
АА, ICP-OES, ICP-MS, UV и т.д.

Системы распыления и десольватации

Ультразвуковые и мембранные
технологии для снижения матричных
эффектов и пределов обнаружения

Совместимы с ICP-OES и ICP-MS любых производителей

Рис.15. Синтез пентакоординированных цвиттер-ионных комплексов кремния с фрагментами 2-гидроксикислот и фрагментом пролина или саркозина

связями в SiC_2O_3 центральном координационном узле, с установленной методом PCA структурой:

Реакцией дихлорида $(\text{L}^5\text{CH}_2)_2\text{SnCl}_2$ с AgBF_4 получен неожиданный катион-анионный комплекс гиперкоординированного олова $\{[(\text{L}^5\text{CH}_2)_2\text{Sn}(\text{OH})]^+ \text{BF}_4^-\}_2$ с бидентатным C,O-хелатирующим лигандом [38]. В кристаллическом состоянии анионы BF_4^- связаны с дикатионами водородными связями $\text{O}\cdots\text{H}\cdots\text{F}$ (PCA). Октаэдрическая координация атомов Sn сильно искажена вследствие слабого дополнительного взаимодействия с сольватными молекулами диоксана:

Цвиттер-ионные комплексы. Взаимодействием N-триэтоксисилилметильных производных эфиров пролина и саркозина с двумя эквивалентами 2-гидроксикислот (гликолевой, диметилгликолевой, миндальной и дифенилгликолевой) синтезированы новые цвиттер-ионные комплексы, в которых пролиновый или саркозиновый фрагменты несут положительный заряд, в то время как атом кремния заряжен отрицательно (рис.15) [34]. Выделенные соединения имеют два O,O'-хелатных и одним потенциальный C,O-хелатный

лиганд и могут быть перспективны в качестве лекарственных средств. Пентакоординация кремния в комплексе с фрагментом саркозина ($\text{R}^3 = \text{R}^4 = \text{Me}$) и в двух производных пролина ($\text{R}^3 = \text{R}^4 = \text{H, Ph}$) подтверждена PCA.

ДИНАМИЧЕСКАЯ СТЕРЕОХИМИЯ ГИПЕРКООДИНИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ

Стереохимическая нежесткость – одно из наиболее примечательных свойств соединений с гиперкоординированными атомами кремния, германия и олова, хотя к настоящему времени оно исследовано в гораздо меньшей степени, чем их структурные особенности, специфическая реакционная способность и биологическая активность. Исследование стереохимической нежесткости методом динамического ЯМР на различных ядрах начало развиваться с 1992 г. и отражено в обзорах [35–37].

Обсудим результаты последних исследований на примере двух серий (O→Si)-хелатных пентакоординированных фторсиланов с фрагментом пролина – N'-метил-N'-(диметилфторсилилметил)-N-(органосульфонил)пролин-амидов [38, 39], а также N',N'-бис-(диметилфторсилилметил)-N-(органосульфонил)пролинамидов [40], содержащих один пента-, а другой – пента- и тетракоординированные атомы кремния соответственно:

Рис.16. Механизм пермутации, включающий диссоциацию связи Si–O

Исследование этих соединений, содержащих хиральный атом углерода, методами мультаядерной (^1H , ^{13}C , ^{19}F , ^{29}Si) спектроскопии ЯМР высокого разрешения выявило в центральном координационном узле температурно-зависимый обмен положениями экваториальных лигандов (пермутационная изомеризация). На основании анализа полной формы линии сигналов в спектрах ЯМР ^1H и рассчитанных активационных параметров процесса предложен механизм пермутации, первой стадией которого является диссоциация связи Si–O (рис.16) [38]. Нуклеофильное замещение группой F^- , который образуется в результате частичной диссоциации связи Si–F, происходит с инверсией конфигурации атома кремния, а последующее обра-

зование новой связи Si–O ведет к тому, что метильные группы у атома кремния меняются местами.

При комнатной температуре изученные комплексы существуют в растворах преимущественно в виде мономеров, причем повышение температуры ведет к диссоциации связи $\text{O} \rightarrow \text{Si}$ и закономерному увеличению вклада тетракоординированной формы [38]. При более низких температурах увеличение поляризации связи Si–Hal благоприятствует образованию димерных ассоциатов с мостиковыми атомами галогена [39]. Эти ассоциаты, по аналогии с внутримолекулярными драконоидами М.Г.Воронкова (способность к пермутации определяется строением комплексов [4]), названы В.В.Негребецким межмолекулярными драконоидами (2010 г.) (рис.17).

Рис.17. Равновесие между мономерными формами и димерными ассоциатами с мостиковыми атомами галогена – межмолекулярными драконоидами

Рис.18. Механизм псевдовращения, предлагаемый для метилдифторсилильных производных амидов, лактамов и имидов

Стереохимическая нежесткость N-(диметилгалогеносилилметил)-N-(1-фенилэтил)-ацетамидов в растворе изучена в работе [41].

Исследование комплексов кремния, связанного с двумя атомами фтора, методами ЯМР, ИК и РСА свидетельствует о том, что атом кремния в них пентакоординирован, и атомы фтора при нем находятся в апикальном и экваториальном положениях, а температурная зависимость сигналов в спектрах ЯМР ^{19}F говорит о пермутационной изомеризации в координационном окружении кремния [42]. Квантово-химические расчеты предсказывают, что наиболее вероятный механизм процесса включает позиционный обмен атомов F_1 and F_2 с сохранением координации $\text{O} \rightarrow \text{Si}$, подобный механизму псевдовращения (turnstile rotation mechanism) (рис.18).

АЗАСИЛАЦИКЛАНЫ – НОВЫЕ ТИПЫ АЗАЦИКЛАНОВ

В азасилацикланах атом кремния тетракоординирован, однако их образование происходит через промежуточные соединения с пентакоординированным атомом кремния. Синтез этих гетероциклических систем основан на способности незамещенных

Рис.19. Синтез различных азасилацикланов

и монозамещенных амидов карбоновых кислот, в том числе с функциональными группами в органическом радикале кислоты, к реакциям гетероциклизации под действием системы $(\text{Me}_3\text{Si})_2\text{NH}/\text{ClCH}_2\text{SiMe}_2\text{Cl}$ как циклосилилметилирующего реагента. Разработанная общая стратегия привела к синтезу новых типов азасилацикланов: 4-ацил-2,6-дисиламорфолинов, 4-ацил-2,6-дисилапиперазинов (рис.19а), 2-сила-5-морфолинонов (рис.19б) и 2-сила-5-пиперазинонов (рис.19в) – перспективных в качестве биологически активных веществ [43]. Схемы синтеза этих соединений показаны на рис.19 [20, 25, 44, 45].

Таким образом, соединения элементов 14 группы в гиперкоординированных состояниях представляют собой интерес как с теоретической, так и с практической точек зрения. Важность фундаментальных работ

по изучению особенностей строения и реакционной способности гиперкоординированных интермедиатов обусловлена их участием в таких промышленно важных реакциях, как гидролиз хлорсиланов и гидросилилирование. В то же время некоторые стабильные соединения этого класса могут найти свое применение в качестве лигандов в каталитически активных комплексах переходных металлов и биологически активных веществ. Препараты на основе пентакоординированного кремния, мивал и мигуген, разработанные в Иркутском институте химии им. А.Е.Фаворского, уже успешно применяются в медицине и в сельском хозяйстве.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 17-03-01211).

ЛИТЕРАТУРА

1. **Воронков М.Г., Пестунович В.А., Бауков Ю.И.** Пентакоординация кремния в производных амидов и гидразидов, содержащих группировку $\text{XMe}_2\text{SiCH}_2\text{N}$ // *Металлоорг. хим.* 1991. Т. 4. № 6. С. 1210–1227.
2. **Соммер Л.** Стереохимия и механизмы реакций кремний-органических соединений. М.: Изд-во "Мир", 1966. 190 с.
3. **Воронков М.Г., Дьяков В.М.** "Силатраны". Новосибирск: Наука, 1978. 208 с.
4. **Воронков М.Г.** Драконоиды: новые соединения гипервалентного кремния (обзор) // *Известия академии наук СССР.* 1991. Т. 12. С. 2624–2680. *Voronkov M.G., Izv. Akad. nauk SSSR,* 1991. V. 12. P. 2624–2680 (*Russ. Chem. Bull. Int. Ed.,* 1991, 12 Engl. Transl.).
5. **Корлюков А.А., Антипин М.Ю.** Исследование строения кристаллов органических и элементоорганических соединений с помощью современных квантово-химических расчетов с использованием теории функционала плотности // *Успехи химии.* 2012. Т. 81. № 2. С. 105–129.
6. **Корлюков А.А.** Структура, химическая связь и межмолекулярные взаимодействия в координационных соединениях четырехвалентных кремния, германия и олова // *Успехи химии.* 2015. Т. 84. № 4. С. 422–440.
7. **Macharashvili A.A., Shklover V.E., Struchkov Yu.T., Oleneva G.I., Kramarova E.P., Shipov A.G., Baukov Yu.I.** Model of the S_N^2 nucleophilic substitution at the Si atom: X-ray structural study of N-(halogenodimethylsilylmethyl)lactams // *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* 1988. V. 11. P. 683–685.
8. **Bassindale A.R., Baukov Yu.I., Borbaruah M., Glynn S.J., Negrebetsky V.V., Parker D.J., Taylor P.G., Turtle R.** Modelling nucleophilic substitution at silicon using solution ^{19}F NMR chemical shift, $^1\text{J}_{\text{SiF}}$ and $^2\text{J}_{\text{CF}}$ coupling constant data of pentacoordinate silicon compounds. Correlation with other magnetic nuclei and X-ray structures // *J. Organometal. Chem.* 2003. V. 669. No. 1–2. P. 154–163.
9. **Mozzchukhin A.O., Macharashvili A.A., Shklover V.E., Struchkov Yu.T., Shipov A.G., Sergeev V.N., Artamkin S.A., Pestunovich S.V., Baukov Yu.I.** Crystal and molecular structures of (O–Ge)-chelate 1-(dimethylchlorogermymethyl)pyrrolidone-2 and 1-(dimethylchlorogermymethyl)piperidone-2, and of (N–Ge)-chelate O-(dimethylchlorogermymethyl)-valerolactim and 2-(chlorodimethylgermylmethylthio)pyrrolidine-1. Structural correlations between derivatives of four- and five-coordinated germanium // *J. Organometal. Chem.* 1991. V. 408. No. 3. P. 305–322.
10. **Bylikin S.Yu., Shipov A.G., Negrebetsky V.V., Baukov Yu.I., Ovchinnikov Yu.E., Pogozhikh S.A., Pestunovich S.V., Belousova L.I., Belogolova E.F., Sidorkin V.F., Voronkov M.G., Pestunovich V.A., Kalikhman I., Kost D.** Reaction of N-trimethylsilyl derivatives of amides and lactams with chloro(chloromethyl)dimethylstannane. Crystal and molecular structure of 1-(chlorodimethylstannylmethyl)-2-piperidone // *J. Organometal. Chem.* 2006. V. 691. No. 4. P. 779–786.
11. **Шипов А.Г., Корлюков А.А., Крамарова Е.П., Архипов Д.Е., Быликин С.Ю., Хунцэ Фан, Погужих С.А., Мурашева Т.П., Негребетский В.В., Хрусталева В.Н., Овчинников Ю.Э., Бассиндэйл А., Тэйлор П., Бауков Ю.И.** Донорно-стабилизированные пентакоординированные катионные внутрикомплексные соединения кремния с двумя (O→Si)-координирующими лигандами // *ЖОХ.* 2011. Т. 81. № 12. С. 1963–1978.
12. **Пестунович В.А., Албанов А.И., Ларин М.Ф., Воронков М.Г., Крамарова Е.П., Бауков Ю.И.** Внутримолекулярная координация SiO в молекулах

- 1-(диметилхлорсиллилметил)-лактамов // Изв. АН СССР. Сер. хим. 1980. Т. 9. С. 2178–2179.
13. Бауков Ю.И., Крамарова Е.П., Шипов А.Г., Оленева Г.И., Артамкина О.Б., Албанов А.И., Воронков М.Г., Пестунович В.А. Синтез и некоторые свойства Si-замещенных N-(диметилсиллилметил)лактамов // ЖОХ. 1989. Т. 59. № 1. С. 127–145.
14. Корлюков А.А., Шипов А.Г., Крамарова Е.П., Негребецкий В.В., Бауков Ю.И. Синтез и особенности строения смешанных анионных комплексов гексакоординированного кремния с О,О-дианионными и С,О-моаноанионными хелатными лигандами // Изв. АН. Сер. хим. 2008. Вып. 10. С. 2055–2062.
15. Shipov A.G., Korlyukov A.A., Arkhipov D.E., Kramarova E.P., Negrebetsky V.V., Bylikin S.Yu., Nikolin A.A., Huntse Fan, Antipin M.Yu., Baukov Y.I. Synthesis and structural features of anionic chelates of hypercoordinate silicon, the derivatives of glycolic and tartaric acids. *Mendeleev Commun.* 2010. V. 20. № 5. P. 273–274.
16. Николин А.А., Корлюков А.А., Крамарова Е.П., Архипов Д.Е., Шипов А.Г., Бауков Ю.И., Негребецкий В.В. Синтез и особенности строения новых анионных комплексов пентакоординированного кремния, производных 2-гидроксикарбоновых кислот и 1-метилпиперазин-2,5-диона // Изв. АН. Сер. хим. 2019. Вып. 8. С. 1575–1579.
17. Артамкина О.Б., Крамарова Е.П., Шипов А.Г., Бауков Ю.И., Мачарашвили А.А., Овчинников Ю.Э., Стручков Ю.Т. N-(Диметилхлорсиллилметил)лактамы и родственные соединения в синтезе дисилоксанов. Молекулярная и кристаллическая структура хлоридов 2,2,5-триметил-3-(диметилсиллилметил)-4-оксазолидинона, 2,2-диметил-3-(диметилсиллил-метил)бензо-[2H]-1,3-оксазин-4-она и 1-(диметилсиллилметил)-4-фенил-2-пирролидона // ЖОХ. 1994. Т. 64. № 2. С. 263–272.
18. Шипов А.Г., Крамарова Е.П., Погожих С.А., Негребецкий В.В., Смирнова Л.С., Артамкина О.Б., Быликин С.Ю., Овчинников Ю.Э., Бауков Ю.И. Синтез, молекулярная и кристаллическая структура моно- и бисхелатных соединений гиперкоординированного кремния, содержащих 2,2-диметилбензо[2H]-1,3-оксазин-4-оно-3-метильный С,О-хелатирующий лиганд // Изв. АН/ Сер. хим. 2007. Вып. 3. С. 446–459.
19. Baukov Yu.I., Ovchinnikov Yu.E., Shipov A.G., Kramarova E.P., Negrebetsky V.V., Struchkov Yu.T. Synthesis and crystal structure of enantiomeric N-(dimethylfluorosilylmethyl)- and N-(dimethylchlorosilylmethyl)-[N-(S)-1-phenylethyl] acetamides // *J. Organometal. Chem.* 1997. V. 536–537. P. 399–403.
20. Shipov A.G., Kramarova E.P., Fang H.C., Arkhipov D.E., Nikolin A.A., Bylikin S.Yu., Negrebetsky V.V., Korlyukov A.A., Voronina N.A., Bassindale A.R., Taylor P.G., Baukov Yu.I. 1-Organosulfonyl-2-sila-5-piperazinones: synthesis, molecular and crystal structure, and chemical transformations into 2-aminoacid derivatives // *J. Organometal. Chem.* 2013. V. 741. –742. P. 114–121.
21. Бауков Ю.И., Шипов А.Г., Быликин С.Ю., Калашникова Н.А., Николин А.А., Архипов Д.Е., Крамарова Е.П., Корлюков А.А., Анисина Ю.Е., Негребецкий В.В. Новые О,О-, С,О- и С,N-хелатные комплексы кремния на основе 2-гидроксикислот и 2-ацетиламинопиридинов. XIII Андриановская конференция "Кремнийорганические соединения. Синтез, свойства, применение", 28 июня – 1 июля 2015, 1–3. С. 37. Москва, Россия, ИНЭОС.
22. Шипов А.Г., Крамарова Е.П., Мурашева Т.П., Артамкина О.Б., Негребецкий В.В., Погожих С.А., Бауков Ю.И., Погожих С.А., Овчинников Ю.Э., Воронков М.Г., Бассиндэйл А.Р., Тэйлор П.Г. Расщепление связи Si–N в N-(диметилимидосиллилметил)имидах и диметил(лактамометил)аминосиланах эфиром BF_3 – альтернативный путь получения N-(диметилфторсиллилметил)имидов и родственных соединений // Изв. АН, Сер. хим., 2006. Вып. 3. С. 558–561.
23. Николин А.А., Крамарова Е.П., Корлюков А.А., Архипов Д.Е., Шипов А.Г., Бауков Ю.И., Лагунин А.А., Шмиголь Т.А., Негребецкий В.В. Синтез и строение первого представителя пентакоординированных С,О-хелатов с дипептидным фрагментом – фторсилана Ts-Gly-(S)-Pro-N(Me) $\text{CH}_2\text{SiMe}_2\text{F}$ // Изв. АН. Сер. хим. 2017. Вып. 3. С. 571–573.
24. Bylikin S.Yu., Shipov A.G., Kramarova E.P., Negrebetsky V.V., Korlyukov A.A., Baukov Yu.I., Hursthouse M.B., Male L., Bassindale A., Taylor P. O,O-Monochelate complexes of silicon and germanium halides: the derivatives of L-mandelic N,N-dimethylamide // *J. Organometal. Chem.* 2009. V. 694. No. 2. P. 244–248.
25. Николин А.А., Архипов Д.Е., Шипов А.Г., Крамарова Е.П., Ковальчук Н.А., Корлюков А.А., Негребецкий В.В., Бауков Ю.И., Бассиндэйл А.Р., Тэйлор П.Г., Боуден А., Быликин С.Ю. Пентакоординированные хлорсиланы с С,О-хелатными лигандами на основе N-метил-N'-органосульфонилопролиамидов // ХГС. 2011. Т. 12. С. 1869–1890.
26. Корлюков А.А., Архипов Д.Е., Володин А.Д., Негребецкий В.В., Николин А.А., Крамарова Е.П., Шипов А.Г., Бауков Ю.И. Моно-С,О-хелатные бром- и трифлатсиланы с аминокислотным фрагментом: соли или ковалентно-связанные комплексы? // Изв. АН. Сер. хим. 2019. Вып. 1. С. 137–148.
27. Крамарова Е.П., Погожих С.А., Шипов А.Г., Негребецкий В.В., Николаева Т.П., Быликин С.Ю., Овчинников Ю.Э., Бауков Ю.И. Бис(О–Si)-хелатный бис{[N-(1-фенилэтил)]-ацетамидометил}дифторсилан – первый представитель стабильных соединений гексакоординиро-

- ванногокремниясдвумяС,О-хелатирующимилигандами// Изв. АН, Сер. хим. 2004. Вып. 1. С. 251–253.
28. Korlyukov A.A., Pogozhikh S.A., Ovchinnikov Yu.E., Lysenko K.A., Antipin M.Y., Shipov A.G., Zamyshlyayeva O.A., Kramarova E.P., Negrebetsky V.V., Yakovlev I.P., Baukov Yu.I. (Amidomethyl)dimethylsilanol hydrohalides: synthesis, crystal and molecular structure and characteristic features of the electronic structure and intra- and intermolecular coordination interactions // J. Organometal. Chem. 2006. V. 691. P. 3962–3975.
29. Шипов А.Г., Крамарова Е.П., Мурашева Т.П., Корлюков А.А., Погожих С.А., Тарасенко С.А., Негребетский В.В., Яковлев И.П., Бауков Ю.И. Схема гидролиза пентакоординированных хлорсиланов по данным рентгеноструктурного исследования // ЖОХ. 2011. Т. 81. № 12. С. 1979–1990.
30. Komissarov E.A., Korlyukov A.A., Kramarova E.P., Bylikin S. Yu., Negrebetsky V.V., Baukov Yu.I. Chloridobis[(2-oxoazocan-1-yl)methyl]germanium(IV) trifluoromethane-sulfonate // Acta Cryst. 2007. C63. m144–m146.
31. Овчинников Ю.Э., Погожих С.А., Разумовская И.В., Шипов А.Г., Крамарова Е.П., Быликин С.Ю., Негребетский В.В., Бауков Ю.И. Синтез, кристаллическая и молекулярная структура катион-анионных комплексов пентакоординированного кремния, содержащих дисилоксановые дикатионы с лактамометильными и N-метилацетамидометильнымиС,О-координирующими лигандами // Изв. АН. Сер. хим. 1998. Вып. 5. С. 997–1007.
32. Kalashnikova N.A., Bylikin S.Yu., Korlyukov A.A., Shipov A.G., Baukov Yu.I., Taylor P.G., Bassindale A.R. Cationic complexes of silicon and germanium with (O,S)-chelate ligands // Dalton Trans. 2012. V. 41. P. 12681–12682.
33. Baukov Yu., Kalashnikova N., Bylikin S., Nikolin A., Kramarova E., Vorobyev S.V., Shipov A., Korlyukov A., Arkhipov D., Negrebetsky V. Anionic, neutral, cationic, and zwitterionic chelates of hypercoordinated silicon, containing the derivatives of 2-acylaminopyridines and 2-hydroxy and 2-amino acids as ligands. Hyper- and hypocoordinated compounds of the group 14 elements. Russian-French Workshop. 28–30 august, 2017, Moscow, Russia.
34. Николин А.А., Крупина С.И., Архипов Д.Е., Крамарова Е.П., Корлюков А.А., Шкопоров А.Н., Шипов А.Г., Кафарская Л.И., Бауков Ю.И., Негребетский В.В. Синтез, строение и биологическая активность новых цвиттер-ионных комплексов пентакоординированного кремния на основе α-амино- и α-гидроксикислот // Вестник РГМУ. 2012. Т. 6. С. 70–75.
35. Негребетский В.В., Бауков Ю.И. Динамическая стереохимия гипервалентных соединений кремния, германия и олова, содержащихамидометильныеС,О-хелатирующие лиганды // Изв. АН. Сер. хим. 1997. Вып. 11. С. 1912–1934.
36. Негребетский В.В., Тандура С.Н., Бауков Ю.И. Стереохимическая нежесткость гиперкоординированных комплексов элементов 14-й группы // Успехи химии. 2009. Т. 78. № 1. С. 24–55.
37. Николин А.А., Негребетский В.В. Синтез, свойства и реакционная способность внутримолекулярных комплексов пентакоординированного кремния // Успехи химии. 2014. Т. 83. № 9. С. 848–883.
38. Nikolin A.A., Kramarova E.P., Shipov A.G., Baukov Yu.I., Negrebetsky V.V., Korlyukov A.A., Arkhipov D.E., Bowden A., Bylikin S.Yu., Bassindale A.R., Taylor P.G. Synthesis, structures, and stereodynamic behaviour of novel pentacoordinate fluorosilanes: fluorosilyl derivatives of proline // Organometallics. 2012. V. 31. No. 14. P. 4988–4997.
39. Николин А.А., Кузнецова О.В., Архипов Д.Е., Крамарова Е.П., Шипов А.Г., Егорочкин А.Н., Корлюков А.А., Бауков Ю.И., Негребетский В.В. Внутри- и межмолекулярные координационные взаимодействия в жидкой фазе с участием пентакоординированных фторсиланов на основе пролина // Изв. АН. Сер. хим. 2013. Вып. 8. С. 1892–1899.
40. Nikolin A.A., Kramarova E.P., Shipov A.G., Baukov Yu.I., Negrebetsky V.V., Arkhipov D.E., Korlyukov A.A., Lagunin A.A., Bylikin S.Yu., Bassindale A.R., Taylor P.G. N,N-Bis-(dimethylfluorosilylmethyl)amides of N-organosulfonylproline and sarcosine: synthesis, structure, stereodynamic behaviour and in silico studies // RSC Advances. 2016. No. 6. P. 75315–75327.
41. Negrebetsky V.V., Shipov A.G., Kramarova E.P., Negrebetsky V.V., Baukov Yu.I. Stereochemical non-rigidity of N-(dimethylhalogenosilylmethyl)-N-(1-phenylethyl) acetamides in solutions // J. Organometal. Chem. 1997. V. 530. No. 1. P. 1–12.
42. Negrebetsky V.V., Kramarova E.P., Shipov A.G., Baukov Yu.I., Korlyukov A.A., Arkhipov D.E., Bassindale A.R., Taylor P.G., Bylikin S.Yu. Synthesis, Structures and Stereodynamic Behavior of Pentacoordinate (O→Si)-Chelate Difluoro(methyl)silylmethyl Derivatives of Amides and Imides // J. Organometal. Chem. 2018. V. 872. P. 31–39.
43. Kurochka A.V., Afanasova O.A., Losev A.S., Mamaeva E.A., Bylikin S.Yu., Negrebetsky V.V., Kramarova E.P., Shipov A.G., Baukov Yu.I. Six- and seven-membered 1-oxa-4-aza-2-silacyclanes as possible correctors of adaptational mechanisms // Metal-Based Drugs. 1998. V. 5. No. 1. P. 25–33.
44. Крамарова Е.П., Негребетский В.В., Шипов А.Г., Бауков Ю.И. Однореакторный синтез 2,2,6,6-тетраметил-4-ацил-2,6-дисиламорфолинов // ЖОХ. 1994. Т. 64. № 7. С. 1222–1223.
45. Замышляева О.А., Шипов А.Г., Крамарова Е.П., Негребетский В.В., Овчинников Ю.Э., Погожих С.А., Бауков Ю.И. Синтез и некоторые химические свойства 4-ацил-2,6-дисилапиперазинов. Молекулярная и кристаллическая структура 2,2,6,6-тетраметил-4-формил-2,6-дисилапиперазина // ХГС. 1999. Т.8. С. 1077–1084.

Two in One!

Duetta™

**Новое решение HORIBA Scientific:
абсорбционный спектрометр и флуориметр в одном приборе**

- Измерение поглощения и флуоресценции в УФ-ВИД-БИК диапазоне 250 – 1000 нм со сверхбыстрым построением матриц возбуждения – излучения
- Получение спектров флуоресценции в мгновение ока < 300 миллисекунд
- Скоростная идентификация веществ < 1 минуты
- Новое программное обеспечение EzSpec™ для сенсорных экранов