Я ЛЮБЛЮ НАУКУ ВО ВСЕХ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯХ

Рассказывает лауреат Нобелевской премии по химии 2014 года Уильям Э. Мёрнер

Нобелевская премия по химии 2014 года была присуждена за разработку флуоресцентной микроскопии сверхвысокого разрешения, позволяющей получать изображения тонких биологических структур, которые ранее невозможно было получить с помощью оптического микроскопа. "Премия этого года – история о том, как оптический микроскоп стал наноскопом", – объявил Стаффан Нормарк, постоянный секретарь Королевской академии наук Швеции. Стефан Хелл (Институт биофизической химии им. Макса Планка, Геттинген, Германия), Уильям Мёрнер (Стэнфордский университет в Калифорнии, США) и Эрик Бетциг (Медицинский институт Говарда Хьюза в Вирджинии, США) заложили основы нового метода изучения единичных молекул.

С 1998 года по настоящее время У.Э.Мёрнер работает в Стэнфордском университете в Калифорнии, где руководит лабораторией, проводящей исследования биологических процессов.

В эксклюзивном интервью нашему журналу Уильям Э. Мёрнер рассказал о фундаментальных принципах и удивительных возможностях флуоресцентной микроскопии единичных молекул.

Вы получили Нобелевскую премию "за разработку флуоресцентной микроскопии сверхвысокого разрешения". В чем суть этого метода?

Когда вы визуализируете какой-либо объект с помощью оптического микроскопа, вы, по сути, используете отраженный от объекта свет. Возникает вопрос: какое разрешение теоретически возможно, другими словами, какое наименьшее расстояние может быть между объектами, чтобы микроскоп различал эти объекты как отдельные? Основная проблема заключается в том, что в традиционных микроскопах дальнего поля разрешение ограничено фундаментальным дифракционным пределом Аббе, который приблизительно равен половине длины волны λ , используемой для облучения. В соответ-

ствии с этим принципом разрешение световой микроскопии не может быть меньше 250 нм для видимого спектра. Это означает, что любое оптическое изображение, даже если это одна молекула, будет выглядеть как пятно диаметром 250 нм. Даже когда фактический размер объекта составляет 1 нм, он отобразится таким большим. Вирус, белок и малая молекула – все они будут выглядеть одинаково в традиционном световом микроскопе. Ключевая идея сверхвысокого разрешения – выход за пределы дифракционного предела. Сегодня мы можем преодолеть дифракционный барьер, повысить разрешение и увидеть очень мелкие детали. Некоторые особо точные методы позволяют достичь разрешения 1 нм, но обычно разрешение составляет около 10 нм.

Конечно, существуют электронная и рентгеновская микроскопия с гораздо более высоким разрешением. Электронная микроскопия визуализирует объекты в клетках практически с атомным разрешением, позволяя увидеть даже форму молекул. Однако она не позволяет изучать живые клетки или процессы, происходящие в них. Вы должны убить живой объект, нарезать его, зафиксировать и подвергнуть интенсивному излучению в высоком вакууме. В противоположность электронной микроскопии, задача световой микроскопии – не смотреть на отдельные атомы в молекуле. Свет обладает минимальной инвазивностью и не повреждает биологическую ткань. В отличие от пучка электронов, свет можно использовать для неинвазивного исследования с относительно небольшим возмущением образца, поэтому оптический флуоресцентный микроскоп служит важным инструментом для клеточной биологии. Кроме того, он позволяет делать не только статические снимки, но и наблюдать за движениями внутренних структур в живых клетках.

Существует еще одно преимущество. Обычно химики имеют дело с множеством молекул и изучают усредненные параметры для миллионов или миллиардов таких единиц. Однако каждая молекула ведет себя по-разному, и обычно не удается уловить гетерогенность такого поведения. Когда мы исследуем клетку, нас часто интересует определенный вид белка или какая-то другая биомолекула, и мы должны отличать эту молекулу от остальных – мы должны выделить ее из других молекул. В световой микроскопии это можно сделать, прикрепив флуоресцентную метку к интересующей биомолекуле. Минимальный размер исследуемого объекта – сам флуорофор, размер которого составляет около 1–2 нм. Используя флуоресцентную микроскопию сверхвысокого разрешения, мы можем наблюдать за поведением единственной молекулы, спрятанной глубоко в кристалле, полимере или клетке в присутствии от миллиардов до триллионов молекул растворителя или матрицы. Можно исследовать любой объект: клеточную мембрану, антитело, первичную ресничку, белок. Можно узнать больше о фундаментальных процессах внутри клеток, о поведении белков, ДНК и т.д., наблюдая за индивидуальным поведением каждой молекулы, а не за усредненными параметрами.

Каким образом проводится исследование, и какую именно информацию о молекуле вы получаете?

В большинстве экспериментов мы прикрепляем маленькие флуорофоры к большему объекту, и флуорофор показывает нам, где находится этот объект с точностью около 10 нм. Это позволяет наблюдать за молекулой: как она движется, что она делает и так далее. Если концентрация меченых молекул поддерживается низкой,

за один раз возбуждается только одна молекула флуорофора, поэтому мы можем выяснить ее точное положение, даже если фокусное пятно намного больше, чем размер флуорофора. Для этого мы выполняем процесс суперлокализации, который позволяет определить положение излучающего объекта по профилю его излучения. Например, нам удалось изучить поведение отдельных белков МНСII (основные комплексы гистосовместимости типа II), закрепленных на плазматической мембране клетки яичника китайского хомячка. Высокоаффинный антигенный пептид был помечен одним флуорофором для визуализации молекул МНСII, и видео движения этих флуоресцентных молекул в реальном времени продемонстрировало удивительный танец МНСII, который происходит на поверхности живых клеток. Диффузионные свойства движения и влияние на него холестерина были изучены моими студентами в сотрудничестве с Харденом Макконнеллом¹.

Еще один пример. Центриоль – важнейший компонент, участвующий в делении клеток – имеет трубчатую структуру диаметром 250 нм. В верхней части центриоли находится набор белков, среди которых белок CEP164. Благодаря связыванию со специфическими рецепторами на поверхности этот белок может локализоваться в 9 различных кластерах, расположенных вокруг кольца диаметром ~300 нм. Однако, глядя в обычный световой микроскоп, вы можете наблюдать только размытое изображение. Появление микроскопии сверхвысокого разрешения позволяет нам четко видеть девять отдельных ярких пятен, отвечающих локализации этого белка².

Изучение локализации молекул в клетке – это одно из применений флуоресцентной микроскопии. Еще одно – определение структуры объекта.

Предположим, у вас есть протяженная структура, например, микротрубочка, которая содержится в каждой клетке и представляет собой часть ее скелета. Микротрубочка – длинный тонкий объект, состоящий из множества копий молекулы тубулина, связанных в единое волокно, ее ширина очень мала, десятки нанометров, а длина достигает нескольких микронов. Если мы поместим флуоресцентные метки на молекулы тубулина, образующие длинную микротрубочку, то мы сможем изобразить структуру микротрубочки. Проблема в том, что если вы хотите получить структуру с высоким разрешением, вы должны поместить флуоресцентные

¹ Biophys J. 2002. V. 83. P. 2681–2692. DOI: 10.1016/S0006-3495(02)75277-6; Biophys J. 2006. V. 90. P. 927–938. DOI:10.1529/biophysj.105.070524

² Biophys. J. 2012. P. 102. P. 2926–2935. DOI: 10.1016/j.bpj.2012.05.015

Рис.1. Ключевая идея микроскопии сверхвысокого разрешения – активный контроль концентрации флуоресцирующих меток (а); изображение митохондрии в клетках COS-7 с помощью микроскопии с использованием флуоресценции полного внутреннего отражения (б), то же с помощью флуоресцентной микроскопии сверхвысокого разрешения (в)

метки очень плотно. Вы не сможете увидеть те участки, где меток нет, потому что визуализация происходит с помощью флуоресценции.

Однако суперлокализация работает хорошо, когда флуорофоры пространственно разделены. Когда структура содержит много флуоресцентных меток, и все метки излучают одновременно, мы получим размытое бесформенное пятно, потому что каждая флуоресцентная метка отображается как пятно с диаметром 250 нм, и эти пятна взаимно перекрываются. Обычный флуоресцентный микроскоп не позволяет определить структуру объекта при высокой концентрации меток из-за размывания пятен вследствие дифракции. Основная идея заключается в том, чтобы не позволить всем молекулам излучать одновременно. Предположим, что существует какой-то механизм, который позволяет флуорофорам включаться и излучать фотоны в одну часть времени, а выключаться и находиться в темном состоянии – в другую. Экспериментатор сможет использовать этот механизм для активного контроля концентрации излучающих молекул, снижая ее до очень низкого уровня, чтобы пятна изображения не перекрывались. Тогда, используя суперлокализацию, можно определить и записать расположение каждой молекулы в небольшой группе излучающих флуорофоров, при этом остальная часть меток остается

в темном состоянии. Как только первая группа молекул переходит в темное состояние, активируется другая группа флуорофоров, их локализация определяется и также записывается. Этот процесс повторяется много раз, позволяя получить изображения различных групп меток, активированных случайным образом. Изображение реконструируется, и получается изображение сверхвысокого разрешения в стиле пунтилизма, при этом проявляются детали, ранее скрытые из-за дифракционного предела (рис.1)³.

Таким образом, чтобы получить изображение отдельной структуры в сверхвысоком разрешении, мы должны активировать только несколько флуорофоров за раз. Это означает, что должен существовать какой-то фотохимический или фотофизический механизм, позволяющий активно контролировать концентрацию излучающих флуорофоров в определенный момент времени. Для решения этой задачи был предложен ряд методов: PALM, STORM, F-PALM, PAINT и другие, которые позволяют активировать лишь небольшое количество флуорофоров и оставлять большинство меток в выключенном состоянии. Эти методы составляют группу SMACM (однокомпонентная активная контрольная микроскопия).

Однако существует и другой подход для получения разрешения за пределами дифракционного барьера – микроскопия на основе подавления спонтанного испускания, или STED. Суть метода STED, предложенного Стефаном Хеллом, заключается в том, что образец освещают двумя разными лучами. Первый лазерный луч используется для возбуждения образца, и он дает обычное круглое пятно. Второй луч образует пятно в форме бублика и подавляет флуоресценцию по периметру светового пятна, вызванного первым лучом. В результате флуоресцируют только молекулы, находящиеся внутри "бублика", которые не затронул второй луч. Эффективный размер флуоресцентного пятна уменьшается, и мы видим флуоресценцию только очень маленького участка, меньше дифракционного предела.

Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки. Методы SMACM проще в исполнении. Но для определения точного положения требуется собрать много фотонов, и на это нужно время. STED может работать с большей скоростью, чем STORM или PALM. С другой стороны, STED – это метод сканирования, необходимо быстро перемещать два луча вместе от точки к точке вдоль образца, и это мешает увидеть образец в целом. К тому же STED – более сложный процесс, требующий использования дорогого коммерческого оборудования. Кроме того, не все флуоресцентные молекулы подходят для метода STED.

³ Faraday Discuss. 2015. V. 184. P. 9–36 DOI: 10.1039/c5fd00149h, Angew. Chem. Int. Ed. 2015. V. 54. P. 8067–8093 DOI: 10.1002/anie.201501949

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ ЕДИНИЧНЫХ МОЛЕКУЛ

1873

1873 Эрнст Аббе определил предел разрешения оптического микроскопа, который примерно составляет половину длины волны используемого света, т.е. $\sim 0,2$ мкм. Это означало, что ученые смогут различать клетки и некоторые органеллы, однако никогда не получат изображения вирусов или отдельных белков.

1987 Уильям Э. Мернер смог уловить сигнал единичной флуоресцентной молекулы пентацена в кристаллическом *p*-терфениле.

1994 Стефан Хелл опубликовал статью, описывающую метод микроскопии на основе подавления спонтанного испускания (STED). Световой импульс возбуждает все флуоресцентные молекулы, одновременно другой световой импульс гасит флуоресценцию всех молекул, кроме тех, которые находятся в нанометровой области в центре.

Микроскопия STED

1994

1995 Эрик Бетциг предложил концептуальную основу микроскопии единичных молекул. Различные флуорофоры – зеленые метки, красные метки и желтые метки – возбуждаются последовательно с помощью лазерного луча с различной длиной волны.

1997 У. Э. Мернер открыл фотоактивируемый зеленый флуоресцентный белок (GFP). После облучения светом с длиной волны 488 нм белок несколько раз мигает, а затем гаснет, но может быть вновь активирован светом с длиной волны 405 нм. После реактивации белок снова флуоресцирует при облучении светом 488 нм.

2006 Эрик Бетциг представил метод PALM (PhotoActivated Localization Microscopy) на конференции *Frontiers in Live Cell Imaging* в главном кампусе Национальных Институтов Здоровья в Бетесде, штат Мэриленд. Он получил изображение специфических белков в тонких срезах лизосом и митохондрий¹.

1995

2006

¹ Science. V. 2006. P. 313(5793), 1642–1645. DOI: 10.1126/science.1127344

Для визуализации объекта с высоким разрешением плотность помещенных на него флуоресцентных меток должна быть достаточно высокой: иногда требуется около ста меток на участок размером 250 нм. Не нарушается ли при этом структура молекулы?

Возмущение структуры зависит от типа маркеров и способа их размещения на объекте. Мы всегда задаем себе этот вопрос, и ответственность каждого исследователя состоит в максимально полном подтверждении того, что структура объекта не меняется. Но в целом мы считаем, что если флуорофор достаточно мал, возмущения нет. Предположим, у вас есть структура, состоящая из множества мономеров, например, микротрубочка. Если мы поместим большую метку на каждый мономер, это может нарушить структуру, это правда. Но мы можем поместить маленький флуорофор на каждую вторую или каждую третью повторяющуюся единицу. Для такого селективного введения метки требуется хорошая химия, но форма образованного объекта с меньшей вероятностью будет нарушена.

В одной из наших последних работ мы изучали гликокаликс – сильно гликозилированный экстрамембранный компонент, обнаруживаемый почти в каждой клетке. Хотя структура содержит много гликанов и сахаров, выступающих из мембраны, используя специально подобранные синтетические методы, мы сумели прикрепить метки только на сиаловые кислоты. Метка включала единственный флуорофор диаметром около 1 нм⁴. В этом исследовании мы объединили количественные изображения сверхвысокого разрешения с метаболическим мечением и транскриптомным анализом и непосредственно измеряли толщину гликокаликса в образцах первичной ткани и в культивируемых клетках. Мы отслеживали ее изменения на самых ранних этапах онкогенеза и определили функциональную роль гликокаликса при прогрессировании рака.

Вы фиксируете образцы в какой-то матрице или используете живые клетки?

Мы можем изучать как фиксированные, так и живые объекты. Оба подхода имеют преимущества и недостатки. Если вы используете фиксированный образец, ничто не движется, и у вас будет достаточно времени для съемки. Когда объект движется, мы должны очень быстро найти положение всех отдельных молекул прежде, чем объект изменит свою форму или начнет двигаться. Это означает, что нам нужно работать с камерой все быстрее и быстрее, чтобы собирать свет и зафик-

сировать структуру прежде, чем она изменится. Некоторым исследователям удастся сделать это с частотой 30 Гц, или 30 полных изображений в секунду. В этом случае вы сможете с высоким разрешением увидеть, как объект движется или меняет свою форму.

Мы обычно используем фиксацию для клеток млекопитающих, бактериальные клетки, как правило, изучаем живыми. Но выбор зависит от тех вопросов, на которые мы пытаемся найти ответ.

Можете ли вы получать трехмерные изображения?

Да, тем более, что наша жизнь протекает в трехмерном пространстве. Для получения 3D-изображения мы изменили конструкцию микроскопа. При использовании обычного микроскопа вы видите изображение на плоскости XY, при этом одна молекула образует одно пятно. Мы поместили в микроскоп дополнительные оптические компоненты, которые позволяют кодировать осевое положение излучающей молекулы по форме его изображения, например, с помощью функции рассеяния двойной спирали (DH-PSF). Теперь вместо одного пятна для флуоресцирующей молекулы микроскоп дает два пятна. Эти два пятна вращаются вокруг средней точки, напоминая двойную спираль в осевом направлении, и угол, образующийся линией между этими пятнами, зависит от координаты z⁵ (рис.2). Теперь мы можем наблюдать движение одной молекулы в трехмерном объеме во времени или получать трехмерное изображение структур, образованных ансамблем молекул.

Насколько сложное и дорогое оборудование требуется для флуоресцентной микроскопии сверхвысокого разрешения?

Минимальное оборудование – источник света, который необязательно, но предпочтительно представляет собой лазер, и очень хороший объектив для микроскопа, способный максимально эффективно фокусировать свет и собирать фотоны. Остальная часть микроскопа довольно обычная: набор фильтров и камера, хотя для того, чтобы увидеть отдельные световые пятна, можно использовать даже человеческий глаз. Обычно мы используем достаточно дорогую и качественную камеру, но также можно использовать камеру менее чем за 1000 долларов США. Такое оборудование доступно практически для любой лаборатории. Если вы являетесь экспертом в области оптики, вы можете купить все

⁴ Dev. Cell 2019. V. 49. P. 4559. DOI: 10.1016/j.devcell.2019.04.035

⁵ Nano Lett. 2010. V. 10, N 1. P. 211–218. DOI: org/10.1021/nl903295p, Current Opinion in Structural Biology 2013. V. 23. P. 778–787. DOI: org/10.1016/j.sbi.2013.07.010

компоненты и собрать их все вместе самостоятельно, или вы можете использовать коммерческий микроскоп. Некоторые из коммерческих микроскопов имеют возможность 3D, а некоторые – нет. В любом случае флуоресцентный микроскоп в 10 раз дешевле, чем электронный. А если вы соберете микроскоп самостоятельно, его стоимость сократится еще в 10 раз.

Каковы ваши текущие проекты?

Их много: практически каждый студент работает над своим собственным проектом. Мы используем микроскопию единичной молекулы, чтобы получать новые знания о природе. Мы применяем микроскопию сверхвысокого разрешения для изучения закономерностей локализации белка в бактериях, для определения структуры амилоидных агрегатов в клетках, для определения поведения сигнальных белков в первичной ресничке, для количественной оценки фотодинамики фотосинтетических белков и ферментов, а также для наблюдения за динамикой ДНК и РНК в клетках и бактериях. Нас интересует структура как таковая, если она никогда не наблюдалась до появления микроскопии сверхвысокого разрешения, а также динамика движения биологических молекул. Другие проекты касаются визуализации рака, изучения рецепторов на поверхности раковых клеток, участвующих в терапии PD1. Мы вовлечены в проект, связанный с производством и переработкой энергии молекулами, участвующими в фотосинтезе. Энергия солнца захватывается биосферой через белки фотосинтетической антенны, которые функционируют путем интеграции набора пигментов в каркас белка. Мы исследуем, как фотофизические свойства отдельных пигментных участков связаны с поведением комплекса в целом.

Большинство текущих проектов связано с биологией, однако флуоресцентная микроскопия может быть успешно применена в других областях. В качестве примера в материаловедении можно рассмотреть флуоресцентное изображение отдельных молекул террилена $C_{30}H_{16}$ в кристалле, покрытом тонкой пленкой п-терфенила. Можно заметить удивительную вещь: отдельные молекулы террилена путешествуют внутри кристалла на расстояния в несколько микрометров. Анализ их движения с помощью микроскопии единичной молекулы показывает, что молекулы террилена действуют как нанозонды, двигаясь вдоль длинных тонких трещиноподобных дефектов, которые трудно обнаружить другими методами⁶. Другие исследователи, такие

Рис.2. Схема получения трехмерного изображения методом функции рассеяния двойной спирали: две точки вращаются вокруг общего центра как функция координаты z (а); траектория движения единичной молекулы в клетке COLO205 (б)

как профессор Кристи Ландес из Университета Райса, изучают с помощью микроскопии сверхвысокого разрешения полимеры, важные для химического разделения.

Ваши исследования перекликаются с работами другого нобелевского лауреата Э.Бетцига. Существует ли между вами сотрудничество или вы разрабатываете свои идеи самостоятельно?

Мы не сотрудничали напрямую, хотя встречались много раз. Мы оба окончили Корнельский университет, хотя Бетциг окончил его несколько позже, чем я. Мы работали в разных лабораториях кафедры: я получил докторскую степень в экспериментальной физике твердого тела, Бетциг – в прикладной и инженерной физике. Но ученые всегда читают статьи своих коллег, и мы следили за научными достижениями друг друга. Я был очарован работами Бетцига по сканирующей ближнепольной микроскопии. Он, в свою очередь, интересовался нашими работами по низкотемпературной микроскопии единичных молекул высокого разрешения. Он всегда фокусировал свои исследования на повышении разрешения; мы больше интересовались научными аспектами и фундаментальными исследованиями. Наша научная группа обнаружила флуоресцентный белок и мерцание природных флуорофоров в 1997 году. А Бетциг использовал эти открытия для получения сверхвысокого разрешения. В некотором смысле я предоставлял ему фундаментальные элементы: наблюдение за отдельными молекулами, мерцание флуоресцентных белков, которые он использовал при разработке метода PALM.

⁶ J. Phys. Chem. B. 2006. V. 110, N 38. P. 18939–18944. DOI: org/10.1021/jp057570b

Такой обмен идеями – хороший пример взаимозависимой природы науки, даже если мы не сотрудничаем напрямую.

А как вы оцениваете российскую науку?

Российская наука очень впечатляет. У меня нет прямого сотрудничества с русскими учеными, но на протяжении многих лет я поддерживаю тесные отношения с Андреем Наумовым из Института спектроскопии РАН в Троицке. Его группа исследует низкотемпературные свойства единичных молекул. Я посещал конференции в России для того, чтобы узнать о работах Андрея,

а также слушал его выступления и выступления его коллег на других симпозиумах.

Вы получили образование в области физики и инженерии и Нобелевскую премию по химии. Кем вы себя ощущаете в большей степени: физиком, инженером или химиком?

Я не люблю быть запертым в каком-либо ограниченном пространстве. Я люблю науку во всех ее проявлениях. Моя жизнь в науке шла по следующему сценарию: я изучал одну область, был захвачен ею, затем другую область, которая также захватывала меня, и т.д.

АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ НАУМОВ

Профессор РАН, д.ф.-м.н. Андрей Витальевич Наумов – заведующий отделом спектроскопии конденсированных сред и лабораторией электронных спектров молекул Института спектроскопии РАН (ИСАН); заведующий кафедрой теоретической физики им. Э.В.Шпольского Московского педагогического государственного университета (МПГУ), ведущий российский

ученый в области селективной лазерной спектроскопии и флуоресцентной наноскопии.

А.В.Наумовым создан новый метод многопараметрической дальнеполевой спектрально-селективной диагностики объектов с нанометровым пространственным разрешением на основе техники детектирования бесфонных спектральных линий и флуоресцентных изображений гигантского количества одиночных органических молекул красителей, внедренных в качестве спектральных нанозондов в неупорядоченные твердые среды. Им проведены эксперименты, проясняющие микроскопическую природу эффектов мерцания люминесценции и спектральной диффузии одиночных полупроводниковых коллоидных оболочечных квантовых точек, а также разработаны и реализованы в эксперименте методы измерения индивидуальных параметров низкоэнергетических элементарных возбуждений туннельного и колебательного типа, параметров локальных полей в твердых средах с использованием техники криогенной спектроскопии одиночных молекул. Разработанные методы и полученные результаты востребованы в таких современных приложениях, как наносенсорика, биофизическая нанодиагностика и тераностика, квантовая оптика, проточная цитометрия, оптоэлектроника.

Наумов А.В. – член дирекции Совета по квантовой электронике и оптике Европейского физического общества; член экспертного совета РФФИ; эксперт РАН, РНФ, РИНКЦЭ; член бюро координационного совета профессоров РАН; член и председатель жюри различных международных премий; заместитель главного редактора журнала "Известия РАН: Серия физическая"; главный редактор журнала "Фотоника". А.В.Наумов – лауреат ряда престижных научных премий, среди которых медаль Президиума РАН для молодых ученых, медаль Academia Europaea, премия издательства Wiley VCH, Rusnanotech Prize, звание "Человек года наукограда Троицк".

Мы попросили Андрея Витальевича прокомментировать интервью с профессором У.Э.Мернером:

"Так получилось, что наши коллективы вот уже несколько десятилетий тесно связаны общим научным направлением, которое в самых общих терминах можно определить как "селективная лазерная спектроскопия сложных соединений и примесных конденсированных сред". У истоков этого научного направления стояли Э.В.Шпольской и его ученик Р.М.Персонов – основатели возглавляемых мною сейчас подразделений ИСАН и МПГУ. Кульминацией развития этого направления стали пионерские эксперименты по детектированию спектров одиночных молекул, проведенные проф. У.Э.Мернером и его сотрудником Л.Кадором (L.Kador) в 1989 году [1]. Интересно отметить, что наше плодотворное сотрудничество с Л.Кадором, который сегодня работает в Байройтском университете, Германия, начавшееся уже более 20 лет назад, продолжается и сейчас, в том числе в совместных работах с еще одним соавтором проф. Мернера – проф. Ю.Келером (J.Koehler, тот же университет). Значительная часть наших работ, посвященных флуоресцентной наноскопии с детектированием изображений одиночных квантовых излучателей, лежит непосредственно в сфере интересов проф. Мернера. Так, развивая технику детектирования спектров и изображений одиночных молекул в твердых матрицах при криогенных температурах, нам удалось впервые осуществить

А потом я соединял в единое целое все полученные мною знания. Действительно, мое первое образование было в области физики, в частности, я стал бакалавром в инженерии, математике и физике, докторскую степень я получил по физике. Но я работал над проблемами молекул в твердых телах на физическом факультете, так что на самом деле это была химическая физика. Затем, когда я пошел в индустрию, в компанию IBM, я работал в области физической химии, мне пришлось многому научиться и в некоторой степени стать экспертом в области молекул. После этого я получил предложение от химического факультета Университета Калифорнии,

где я проработал три года, по истечении которых перешел на химический факультет Стэнфордского университета. Я учу студентов общей и физической химии. Теперь мы работаем на стыке с биологией, и мне пришлось стать экспертом в биологических аспектах.

А в общем, на очень фундаментальном уровне: надо заниматься тем, что вам действительно нравится. Занятие наукой – это настоящее счастье, потому что вы узнаете, как устроен мир.

Спасибо за интересный рассказ

С проф. У.Э.Мернером беседовала Н.И.Василевич

многопараметрическую оптическую нанодиагностику твердых пленок и, таким образом, существенно расширить возможности флуоресцентной наноскопии в области материаловедения и нанотехнологий [2]. Начиная с 2009 года мы одними из первых в РФ стали развивать экспериментальный комплекс для подобных работ уже на отечественной базе. Сегодня мы проводим эксперименты по широкому кругу задач в области флуоресцентной наноскопии различных материалов и нанообъектов, в том числе полупроводниковых квантовых точек, центров окраски в алмазе, диэлектрических и гибридных наночастиц, функциональных органических макромолекул [3]. Наиболее близок к текущим работам группы проф. Мернера ряд наших проектов, связанных с развитием техники трехмерной наноскопии. Именно в работах У.Э.Мернера 10 лет назад была предложена и реализована идея модификации аппаратной функции точечного источника света с использованием инструментов адаптивной оптики [4]. При поддержке проф. Мернера и в сотрудничестве с коллегами из Самарского филиала ФИАН им. П.Н.Лебедева мы реализовали эту технику как при комнатной, так и при криогенных температурах, что открывает путь к очень интересным материаловедческим приложениям.

Наши взаимоотношения с У.Э.Мернером значительно укрепились в связи с проведением в России в 2018 году ведущей конференции по спектроскопии одиночных молекул – HBSM-2018 [5]. Основанная в 1987 году как ведущая конференция по селективной лазерной спектроскопии HBSM остается основной площадкой для общения специалистов в области флуоресцентной наноскопии и спектроскопии одиночных молекул. Международным программным комитетом было принято решение учредить международную премию и медаль имени Э.В.Шпольского, К.К.Ребане и Р.И.Персонова за выдающиеся результаты в области селективной лазерной спектроскопии. Во время этого визита проф. Мернеру вместе с еще одним пионером в области спектроскопии одиночных молекул проф. Мишелем Орритом было присвоено звание почетного профессора МПГУ.

Я хотел бы сказать, что нам фантастически повезло с возможностью иметь тесные дружеские взаимоотношения с У.Э.Мернером. Помимо беспрецедентной креативности в постановке новых задач, трудолюбия и работоспособности, я хотел бы отметить удивительную коммуникабельность и открытость проф. Мернера, его разносторонние интересы. Все это способствует развитию нашего научного направления, международного академического сотрудничества и дружбы между странами, что особенно важно в современных непростых условиях".

1. Naumov A.V. Low temperature spectroscopy of organic molecules in solid matrices: from the Shpol'sky effect to the laser luminescent spectromicroscopy for all effectively emitting single molecules // *Physics-Uspekhi*. 2013. V. 56, N 6. P. 605–622.
2. Naumov A.V., Gorshelev A.A., Gladush M.G., Anikushina T.A., Golovanova A.V., Koehler J., Kador L. Micro-Refractometry and Local-Field Mapping with Single Molecules // *Nano Letters*. 2018. V. 18, N 10. P. 6129–6134.
3. Eremchev I.Y., Eremchev M.Y., Naumov A.V. Multifunctional far-field luminescence nanoscope for studying single molecules and quantum dots (50th anniversary of the Institute of Spectroscopy, Russian Academy of Sciences) // *Physics-Uspekhi*. 2019. V. 62, N 3. P. 294–303.
4. Pavani S.R.P., Thompson M.A., Biteen J.S., Lord, S.J., Liu N., Twieg R.J., Piestun R., Moerner W.E. Three-dimensional, single-molecule fluorescence imaging beyond the diffraction limit by using a double-helix point spread function // *PNAS USA*. 2019. V. 106, N 9. P. 2995–2999.
5. Naumov A., Gladush M., Karimullin K. XIII International Conference on Hole Burning, Single Molecule, and Related Spectroscopies: Science and Applications (HBSM-2018): preface, EPJ Web Conf., 190, XIII International conference on hole burning, single molecules and related spectroscopies: science and applications (HBSM-2018), 2018, 00001.