ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

№ 2 2020

THE VETERINARIAN

ISSN 1998-698X
DOI: 10.33632/1998-698X

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
RESEARCH & INDUSTRIAL JOURNAL

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

В Федеральном центре токсикологической, радиационной и биологической безопасности разработана и выпускается ассоциированная вакцина против инфекционного кератоконъюнктивита крупного рогатого скота

Инфекционный кератоконъюнктивит крупного рогатого скота

— острое контагиозное заболевание, характеризующееся слезотечением, гиперемией сосудов конъюнктивы, светобоязнью, серозно-гнойным истечением, помутнением и изъязвлением роговицы, деформацией глазного яблока в виде кератоглобула или кератоконуса, частичной или полной потерей зрения пораженного глаза животного.

Применение данной вакцины обеспечивает надежную защиту от заболеваемости (95-97%).

Экономический ущерб от заболевания складывается из:

- потерь молочной продуктивности;
- потерь от снижения привесов;
- снижения племенной ценности;
- затрат на лечебные мероприятия.

**АНАЛОГОВ ВАКЦИНЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НЕТ**

С профилактической целью вакцину вводят двукратно, в дозах:

- телятам до 6 мес. — 3 см³;
- молодняку до 12 мес. — 5 см³;
- молодняку старше 1 года и коровам — 10 см³.

СОДЕРЖАНИЕ

Баратов М.О. АССОЦИИРОВАННЫЙ АНТИГЕН ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БРУЦЕЛЛЕЗА И ТУБЕРКУЛЕЗА	4
Кадиков И.Р., Бикташев Р.У., Вафин И.Ф., Корчемкин А.А., Закирова Г.Ш., Майорова Е.Н. ПРИМЕНЕНИЕ ШУНГИТА И ЦЕОЛИТА ПРИ КОНТАМИНАЦИИ РАЦИОНОВ СВИНЕЙ КАДМИЕМ И СВИНЦОМ	9
Кузьмина Н.Н., Петров О.Ю., Смоленцев С.Ю. ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО АНТИОКСИДАНТА ФЛАВОНОИДНОЙ ГРУППЫ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ	14
Лоувская О.Ю., Люлькова Л.С., Маркова Е.В., Матвеева И.Н., Преображенская А.С. ВЫДЕЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗОЛЯТА ВИРУСА БОЛЕЗНИ АУЕСКИ	21
Ндайикенгурукийе Девот ВЛИЯНИЕ СУХОГО ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА НА КОНВЕРСИЮ КОРМА И РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ КРЫС	26
Нургалиев Ф.М., Семенов Э.И., Поздеев О.К., Софронов П.В. ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ЯЗВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА СВИНЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ МИКОТОКСИНОВ И КОЛОНИЗАЦИЕЙ БАКТЕРИЯМИ РОДА HELICOBACTER	31
Осянин К.А., Хаммадов Н.И., Миргазов Д.А., Косарев М.А., Софронова А.В. СПЕЦИФИЧНЫЕ НУКЛЕОТИДНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ГЕНОМА БРУЦЕЛЛ ДЛЯ ВИДОВОЙ ПЦР ИНДИКАЦИИ	39
Прытков Ю.Н., Кистина А.А., Дорожкина Е.И., Макарова Л.Н., Люзгин А.С. ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ДОЙНЫХ КОРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЦИОНОВ С ХВОЙНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКОЙ	45
Тарасова Е.Ю., Семенов Э.И., Матросова Л.Е., Мишина Н.Н., Мухарлямова А.З. ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПРОФИЛАКТИКИ МИКОТОКСИКОЗОВ В ОТНОШЕНИИ АФЛАТОКСИНОВ	51
Шельмакова К.С., Мунгин В.В., Крисанов А.Ф. ВЛИЯНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО ПРЕМИКСА НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ В СУХОСТОЙНЫЙ И НОВОТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОДЫ	59
Эль-Себаей А.М., Абрамов П.Н. ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ГЕПАТОЦИТНАЯ ПРОИЗВОДНАЯ микроРНК КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БИОМАРКЕР ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У СОБАК	64

**АССОЦИИРОВАННЫЙ АНТИГЕН ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
БРУЦЕЛЛЕЗА И ТУБЕРКУЛЕЗА****Баратов М.О. – доктор ветеринарных наук**

Прикаспийский зональный научно-исследовательский ветеринарный институт
- филиал ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан»
(367000, РД, г. Махачкала, ул. Дахадаева 88, e-mail: alama500@rambler.ru)

*Проведены исследования по оценке результативности использования комбинации туберкулезного и бруцеллезного антигенов. Определено соотношение белковых и полисахаридных фракций при создании туберкулезного аллергена. Отражены этапы создания единого аллергена в разных соотношениях 1:0,25, 1:0,5, 1:0,75 и 1:1. Установлены оптимальные режимы постановки реакции и соотношение комбинации. Определена чувствительность в РСК с сыворотками крови 5 групп животных: иммунизированных вакцинами из штаммов 19 и 82; больных бруцеллезом; с гипериммунными сыворотками иммунизированных *M. bovis* кроликов; больных туберкулезом, а также здоровых. Установлено, что комбинация аллергенов микобактерий и бруцелл приводит к значительному повышению эффективности при выявлении комплементсвязывающих антител у больных бруцеллезом, а также иммунизированных вакцинами из шт. 19 и 82 животных. Показано, что смешанный антиген выявляет на 15-20% больше комплементсвязывающих антител, нежели бруцеллезный антиген. Наряду с этим, отмечено повышение чувствительности ассоциированного антигена при выявлении специфических антител у больных туберкулезом, а также у животных со смешанной инфекцией, о чем свидетельствуют результаты исследования 105 проб сывороток крови животных в хозяйстве, где двойная инфекция подтверждена результатами аллергических, патологоанатомических и лабораторных исследований. Исследования показали возможность использования ассоциированного антигена для одновременного выявления комплементсвязывающих бруцеллезных и туберкулезных антител в сыворотке крови. Полученные данные открывают перспективу использования антигенной комбинации в изучении вопросов диагностики смешанных инфекций у животных, что перспективно для повышения экономической эффективности и сокращения времени выявления эпизоотических и экономически значимых болезней.*

Ключевые слова: туберкулез, бруцеллез, ассоциированный антиген, РСК, комплементсвязывающие антитела, микобактериальный, диагностика.

Длительное хроническое течение бруцеллеза бессимптомным бактерионосительством нередко с незначительным количеством специфических антител в сыворотке крови, создает большие трудности в диагностике. Установлено важность серологических методов исследования в обеспечении своевременного и полного выявления зараженных бруцеллезом животных [1,5,6,7,8,9].

Наряду с этим отмечено, что в лабораторной ветеринарной практике для диагностики туберкулеза практически не используется кровь. Связано это с низкой результативностью серологических методов исследования при данной патологии, в связи с отсутствием достаточно специфических антигенов, иммунной ареактивностью животных и как следствие низким уровнем циркулирующих антител

[3,4]. Не смотря на возможность тесного длительного ассоциативного существования возбудителей этих хронических эпизоотически значимых болезней, в литературе имеются разрозненные данные о возможности использования единого иммунологического теста для выявления бруцеллеза и туберкулеза, что существенно затрудняет и сдерживает работы по оздоровлению хозяйств. Комбинированный тест позволил бы почти в 2 раза сократить работу ветеринарных специалистов, серологов, и настолько же экономить материальные расходы [2,10].

Цель исследования - изучение состава антигенной ассоциации микобактерии и бруцелл для использования в РСК в целях одновременного исследования сыворотки крови на обе болезни.

Материал и методы. Для создания туберкулезного антигена использовали в определенных соотношениях, полисахаридную фракцию бычьего типа микобактерии, метаноловый экстракт (Негр и Боке), сырой экстракт по Тогуновой и тканевой водный экстракт легкого КРС. Для оценки практической значимости комбинацию туберкулезного аллергена с единым бруцеллезным антигеном для РСК готовили в разных соотношениях, 1:0,25, 1:0,5, 1:0,75, 1:1. Оптимальные режимы постановки реакции и соотношения компонентов отработали с позитивными и негативными бруцел-

лезными и туберкулезными сыворотками. Многократными исследованиями установили время, экспозиции баксистемы - 45 минут, инкубации при 37 - 38⁰ С - 30 минут и выдержки на водяной бане после добавления гемсистемы – 20 минут, а также титр гемолизина -удвоенный, взвесь эритроцитов в гемсистеме - 2%, объем компонентов (антигенов) - 0,2 мл. Оценивали результаты после 17-18 часовой выдержки.

Результаты исследований. При определении чувствительности установили оптимальное соотношение 1:0,5 (табл. 1).

Таблица 1 -Комбинированный антиген в разных соотношениях

Кровь от больных	Количество	Ассоциированный антиген (единый бруцеллезный АГ+ микобактериальный АГ) использование в РСК при соотношениях	Выявлены комплементсвязывающие антитела в диагностическом титре
Бруцеллезом	53	1:0,25	38
		1:0,5	42
		1:0,75	42
		1:1	42
Туберкулезом	21	1:0,25	12
		1:0,5	19
		1:0,75	19
		1:1	19

Чувствительность РСК проверяли с сыворотками крови следующих групп животных: иммунизированных в разное время вакцинами из штамма 19 и 82; естественно больных бруцеллезом животных; с гипериммунными сыворотками кроликов, иммунизированных *M. bovis* по методу Фрейнда; естественно больных туберкулезом животных неблагопо-

лучного стада; здоровых по туберкулезу и бруцеллезу животных. Предварительные опыты были поставлены с позитивными бруцеллезными и туберкулезными сыворотками в разведениях соответственно 1:5 и 1:10. В качестве контроля использовали негативную сыворотку и ставили РСК с каждым антигеном в отдельности по следующей схеме (табл. 2)

Таблица 2 - Схема постановки РСК и результаты контрольного опыта с тремя антигенами

Антигены	Сыворотка		
	позитивная бруцеллезная (титр 1:5)	позитивная туберкулезная (титр 1:10)	негативная (титр 1:10)
Бруцеллезный АГ	задержка гемолиза	гемолиз	гемолиз
Туберкулезный АГ	гемолиз	задержка гемолиза	гемолиз
Ассоциированный АГ	задержка гемолиза	задержка гемолиза	гемолиз

Эти опыты показали возможность использования ассоциированного антигена в целях, одновременного обнаружения комплементсвязывающих бруцеллезных и туберкулезных антител в сыворотке крови при полном отсутствии перекрестных реакций. При определении чувствительности ассоциированного антигена установлено, что в реакции

связывания комплемента (РСК) с ассоциированным антигеном обнаруживаются комплементсвязывающие бруцеллезные антитела в разведениях сыворотки почти 2 раза превышающих таковых с единым бруцеллезом антигеном, при полном совпадении результатов с показателями реакций с микобактериальным антигеном.

Таблица 3 - Результаты исследования проб сывороток крови естественного больных и иммунизированных против бруцеллеза животных в РСК с тремя антигенами

Группы животных	Всего Количество	Число позитивных показаний (в титрах АГ) в РСК с:																				
		единым бруцеллезным АГ					Всего	%	туберкулезным АГ					Всего	%	ассоциированным АГ					Всего	
		1/5	1/10	1/20	1/40	1/80			1/10	1/20	1/40	1/80	1/160			1/5	1/10	1/20	1/40	1/80		
Естественно больные бруцеллезом	40	32	30	22	14	7	32	80	-	-	-	-	-	-	-	38	35	30	20	7	8	5
Иммунизированные штаммом 19 и 82	36	20	13	5	2	-	20	55,6	-	-	-	-	-	-	-	27	21	17	9		7	5
Неблагополучные по туберкулезу	753	-	-	-	-	-	-	-	49	24	18	9	3	49	6,5	49	24	18	9		9	0
Гипериммунные туберкулезные сыворотки	24	-	-	-	-	-	-	-	24	22	19	12	9	24	100	24	22	19	12		4	00
Здоровые	120	-	-	-	-	-	52	-		-				-	-			-				
Всего														75							38	

Примечание: в главном опыте были поставлены следующие контроли:

1. Позитивная бруц. сыворотка с единым бруцеллезным АГ - задержка гемолиза
2. Позитивная бруц. сыворотка ассоциированным АГ - задержка гемолиза
3. Позитивная бруц. сыворотка с туберкулезным АГ - полный гемолиз
4. Позитивная бруц. сыворотка с туберкулезным АГ - полный гемолиз
5. Позитивная туб. сыворотка с ассоциированным АГ - задержка гемолиза
6. Позитивная туб. сыворотка с бруцеллезным АГ - полный гемолиз

Многократными исследованиями выявлено закономерность полученных результатов. Как свидетельствуют данные таблицы 3, смешанный антиген выявлял на 15-20% больше комплементсвязывающих антител, нежели бруцеллезный антиген. Повышение чувствительности единого бруцеллеза антигена туберкулезным наблюдалось при всех исследованиях проб сывороток крови от животных неблагополучных по бруцеллезу и иммунизированных вакцинами из шт.19 и 82 стад, при полном отсутствии перекрестных реакций с чистым микобактериальным антигеном. Опыты так же показали, что при постановке РСК с сыворотками крови естественно больных туберкулезом и иммунизированных микобактериями животных, комплементсвязывающие антитела с ассоциированным антигеном обнаруживаются в значительной степени, чем при использовании микобактериального моноантигена точности совпало при расшифровке проб.

В целях определения эффективности использования ассоциированного антигена в производственных условиях провели серию опытов. Для этого 18 позитивных проб сывороток крови, полученных от животных неблагополучного по бруцеллезу, 17 позитивных проб сывороток от животных неблагополучных по туберкулезу и 120 проб сывороток от здоровых животных благополучных стад были объединены в одну серию. Целью явилось однократной постановкой РСК выявить позитивные пробы, а в последующем их дифференцировать.

Главный опыт ставили с разведенными до 1:80 сыворотками. При этом обнаружены 35 позитивные сыворотки. Их отделили и повторили РСК в одном разведении с использова-

нием туберкулезного антигена. В этом случае выявили 17 позитивных сывороток. Разница чисел между первой и повторной постановки реакции ($35-17=18$) составляли позитивные бруцеллезные сыворотки, полученные от животных неблагополучного по бруцеллезу хозяйства, что в Выбор туберкулезного антигена для повторной постановки РСК определялся тем, что во всех предыдущих исследованиях его показания полностью совпадали с показаниями ассоциированного антигена и позитивных туберкулезных сывороток, т.е. число постоянное. В случае использования в этих целях бруцеллезного антигена для РА и РСК, часть сывороток, содержащих комплементсвязывающие антитела обнаруживаемых смешанным антигеном оставались недовыявленными, и ошибочно причислялись к позитивным туберкулезным.

Представлял определенный интерес исследование сывороток крови от животных неблагополучных по обеим инфекциям. Для постановки опыта выбрали стадо коров в СПК «Львовский» Бабаюртовская зона отгонного животноводства Республики Дагестан, где систематически выделялись больные бруцеллезом и туберкулезом животные. Комиссионные аллергические исследования 317 голов выявили 56 голов, реагирующих на туберкулин (17,6%). Последующими патологоанатомическими и лабораторными исследованиями туберкулез подтвержден. В РСК исследовали 105 проб сывороток крови. Реакцию ставили параллельно с тремя антигенами и соответствующими контролями. Результаты исследования (табл. 4) подтвердили наши предположения о возможности одновременной серологической диагностики обеих инфекций в РСК с ассоциированным антигеном.

Таблица 4 - Результаты РСК с сыворотками крови животных неблагополучного по бруцеллезу и туберкулезу стад

Порядок постановки РСК	Количество проб	Позитивные показания с АГ						Результат
		ассоциированным		Единый бруцелл.		туберкулезным		
		число	%	число	%	число	%	
Все пробы сывороток	105	52	49,5	9	17,3	38	73,0	38 позит. туберкул.
позитивные с ассоциированным антигеном	52	РСК не ставится		РСК не ставится		38		14 позит. бруцелл.

Как показывают данные таблицы 4, РСК с единым бруцеллезным антигеном можно было и не ставить, так как разница по-

казаний реакции с ассоциированным антигеном и туберкулезным ($52-38=14$) показывает число позитивных бруцеллезных сывороток. В

данном случае, в РСК с ассоциированным антигеном обнаружили дополнительно 5 (10,6%) позитивные бруцеллезные сыворотки.

Заключение. Таким образом, лабораторные опыты и производственные испытания показали эффективность использования ассоциированного антигена в серологической диагностике бруцеллеза и туберкулеза. При этом решаются две важные задачи: повышается чувствительность существующего единого

бруцеллезного антигена для РА и РСК, что, несомненно, способствует наиболее полному выявлению в стадах больных бруцеллезом животных и сокращению сроков оздоровления неблагополучных хозяйств; позволяет одновременно ставить РСК и на туберкулез, сокращая при этом объемы работ, материальные расходы и рабочее время.

Литература

1. Абдулин, Х.Х. Серологическая диагностика бруцеллеза и пути повышения ее эффективности / Х.Х. Абдулин // Научные труды КазНИВИ. - 1980.-Т. 135.-С.16-20.
2. Баскаков, Н.И. Профилактика туберкулеза и бруцеллеза животных в Калужской области / Н.И. Баскаков, А.Н. Дерин, В.А. Бархударян // Ветеринария. - 2006. - №4. - С.3-8.
3. Воробьева, З.Г. Экспресс-диагностика туберкулеза крупного рогатого скота / З.Г. Воробьева, А.Л. Лазовская, К.Н. Слина // Ветеринарная патология. - 2004. - №1-2(9). - С. 126-127.
4. Донченко, А.С. Диагностика туберкулеза крупного рогатого скота / А.С. Донченко, Н.П. Овдиенко, Н.А. Донченко // Новосибирск. - 2004. - С.309.
5. Димова, А.С. Оценка технологичности различных противобруцеллезных вакцин и схем их применения на крупном и мелком рогатом скоте: Автореф. дисс. канд. вет. наук: 16.00.03 / А.С. Димова; ИЭВСиДВ, Новосибирск. - 2003. -22 с..
6. Косилов, И.А. Бруцеллез сельскохозяйственных животных/ И.А. Косилов, П.К. Аракелян, С.К. Димов, А.Г. Хлыстунов // Новосибирск. -1999. - С. 342.
7. Косилов, И.А. Противозoonотическая и противоэпидемическая эффективность специфической профилактики бруцеллеза овец / И.А. Косилов, П.К. Аракелян // Науч. обеспечение вет. пробл. в животноводстве. Новосибирск, - 2000. -С. 120-130.
8. Красиков, А.П. Методы диагностики и профилактики бруцеллеза и туберкулеза животных / А.П. Красиков, С.А. Панкратов // Омск. - 1988. - С. 17-26.
9. Нуратинов, Р.А. Патент 2111009 Способ серологической диагностики бруцеллеза крупного рогатого скота. 20.05 98.
10. Федченко, В.А. Рекомендации по профилактике и оздоровлению от туберкулеза и бруцеллеза крупного рогатого скота Торгайской области / В.А. Федченко, В. И. Белобаб, С.А.Кенжетаев // Аркалык. - 1982. 78 с.

ASSOCIATED ANTIGEN FOR THE DIAGNOSIS OF BRUCELLOSIS AND TUBERCULOSIS

Baratov M.O. - Doctor of Veterinary Sciences

Caspian Zonal Scientific Research Veterinary Institute
- Branch of the Federal State Budgetary Scientific

Institution "Federal Agrarian Scientific Center of Dagestan Republic"

(Republic of Dagestan, 367000 Makhachkala, Dakhadaev st., 88, e-mail: alama500@rambler.ru)

Studies have been conducted to evaluate the effectiveness of using a combination of tuberculosis and brucellosis antigens. The ratio of protein and polysaccharide fractions when creating a tuberculosis allergen was determined. The stages of creating a single allergen are reflected in different ratios 1: 0.25, 1: 0.5, 1: 0.75 and 1: 1. The optimal reaction mode and combination ratio were established. The sensitivity was determined in CSCs with blood serums of 5 groups of animals: immunized with vaccines from strains 19 and 82; patients with brucellosis; with hyperimmune sera of immunized M. bovis rabbits; tuberculosis patients, as well as healthy. It was found that the combination of mycobacteria and brucella allergens leads to a significant increase of efficiency in detecting complement-binding antibodies in patients with brucellosis, as well as immunized with vaccines from pc. 19 and 82 animals. It was shown that a mixed antigen reveals on 15-20% more complement-binding antibodies than a brucellosis antigen. Along with this, an increase of the

sensitivity of the associated antigen in detecting specific antibodies in patients with tuberculosis, as well as in animals with mixed infection, was observed, as evidenced by the study of 105 samples of animal blood serum in the farm, where a double infection was confirmed by the results of allergic, pathological and laboratory studies. Studies have shown the possibility of using of the associated antigen for the simultaneous detection of complement-binding brucellosis and tuberculosis antibodies in blood serum. The data obtained open the prospect of using of an antigenic combination in study of the diagnosis of mixed infections in animals, which is promising of increasing of economic efficiency and reducing the time for identifying epizootic and economic significant diseases.

Keywords: tuberculosis, brucellosis, associated antigen, CSC, complement-binding antibodies, mycobacterial, diagnosis.

References

1. Abdulin, H.H. Serological diagnosis of brucellosis and ways to increase its effectiveness / H.H. Abdulin // Scientific works of KazNIVI, Kazan. - 1980.-Т. 135.-S.16-20.
2. Baskakov, N.I. Prevention of tuberculosis and animal brucellosis in the Kaluga region / N.I. Baskakov, A.N. Derinov, V.A. Barkhudaryan // Veterinary Medicine.- 2006. - No. 4. - C.3-8.
3. Vorobyev, Z. G. Rapid diagnosis of cattle tuberculosis / Z.G. Vorobyev, A.L. Lazovskaya, K.N. Slinin // Veterinary Pathology. - 2004. - No. 1-2 (9). - P. 126-127.
4. Donchenko, A.C. Diagnosis of bovine tuberculosis / A.C. Donchenko, N.P. Ovdienko, H.A. Donchenko // Novosibirsk. - 2004. - P.309.
5. Dimova, A.C. Assessment of the manufacturability of various anti-brucellosis vaccines and schemes of their use in cattle and small cattle: Abstract of diss. of Cand. of Vet. Sciences: 16.00.03 / A.C. Dimova; IEVSiDV, - Novosibirsk. - 2003. - P. 22.
6. Kosilov, I.A. Brucellosis of farm animals / I.A. Kosilov, P.K. Arakelyan, S.K. Dimov, A.G. Khlystunov // Novosibirsk. -1999. - P. 342.
7. Kosilov, I.A. Antiepidemic and antiepidemic effectiveness of specific prophylaxis of sheep brucellosis / I.A. Kosilov, P.K. Arakelyan // Scientific. Providing of vet. prob. in livestock. - 2000. -C. 120-130.
8. Krasikov, A.P. Methods of diagnosis and prevention of brucellosis and animal tuberculosis / A.P. Krasikov, S.A. Pankratov // Omsk. - 1988. - P. 17-26.
9. Nuratinov, R.A. Patent 2111009 A method of the serological diagnosis of brucellosis in cattle. 20.05 98.
10. Fedchenko, V.A. Recommendations on the prevention and recovery from tuberculosis and brucellosis in cattle of the Torgai region / V.A. Fedchenko, V.I. Belobab, S.A. Kenzhetaev // Arkalyk. - 1982. - 78 p.

УДК: 636.4:619.615.916:661.183
DOI 10.33632/1998-698X.2020-2-9-14

ПРИМЕНЕНИЕ ШУНГИТА И ЦЕОЛИТА ПРИ КОНТАМИНАЦИИ РАЦИОНОВ СВИНЕЙ КАДМИЕМ И СВИНЦОМ

Кадиков И.Р. – доктор биологических наук, **Бикташев Р.У.** – доктор сельскохозяйственных наук,
Вафин И.Ф. – кандидат биологических наук, **Корчемкин А.А.** – кандидат биологических наук,
Закирова Г.Ш. – кандидат ветеринарных наук, **Майорова Е.Н.** – младший научный сотрудник

ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической,
радиационной и биологической безопасности»
(420075г., Казань, Научный городок - 2, e-mail: vnivi@mail.ru)

Изучены данные о продуктивности кроссбредных растущих свиней на фоне контаминации комбикормов 2 ПДК кадмия и 2 ПДК свинца сочетанно и применения высокодисперсных (1-6 мкм) шунгита и цеолита комбинированно в соотношении 1:1 в дозах 1% и 2% к рациону. Представлены сведения о приростах живой массы, конверсии корма, убойном выходе, биохимических показателях сыворотки крови. Установлено, что сочетанная контаминация кадмием и свинцом снижает

прирост живой массы свиней на 13,8%. Комбинированное применение сорбентов способствует уменьшению негативного воздействия тяжелых металлов, повышению отложения кальция и фосфора в костной ткани животных. Применение адсорбентов в дозе 2% к рациону позволяет повысить прирост живой массы свиней до значений близких к контролю, несмотря на удвоенную предельно допустимую концентрацию кадмия и свинца в рационе.

Ключевые слова: растущие свиньи, рационы, кадмий, свинец, шунгит, цеолит, прирост живой массы, конверсия корма, убойный выход.

В последние годы проводятся интенсивные исследования возможности применения энтеросорбентов для профилактики токсикозов животных [2-6, 9, 13-14] и птицы [14] при контаминации кормов тяжелыми металлами и микотоксинами. Есть сообщения о взаимоповышении адсорбционных свойств при сочетанном применении шунгита и цеолита [11]. Широкое применение шунгита происходит для целей очистки питьевой воды от примесей тяжелых металлов, пестицидов и других токсикантов. При этом шунгит переводит тяжелые металлы в нерастворимые карбонатные соли после взаимодействия с CO_2 , образующимся при окислении органики. Исходя из этого, целью наших исследований являлось изучение влияния введения в рационы растущих свиней высокодисперсных (1-6 мкм) шунгита и цеолита сочетанно на продуктивность, биохимические показатели сыворотки крови, конверсию корма и убойный выход.

Материал и методы. В соответствии с поставленной целью проведен опыт на растущих кроссбредных боровках по использованию шунгита и цеолита на фоне контаминации рационов 2ПДК кадмия и свинца сочетано.

Шунгит Зажогинского месторождения Республики Карелия и цеолит Шатрашанского месторождения Республики Татарстан были размолоты до дисперсности 1-6 мкм. Были сформированы 4 группы животных по принципу аналогов (происхождение, живая масса). В каждой группе находились 4 боровка. Карантинная выдержка длилась 10 суток. На начало опыта возраст животных составил 70 дней. Животных кормили полнорационными комбикормами в соответствии с нормами кормления при свободном доступе к питьевой воде. Опыт длился в течение 60 суток. Животных взвешивали перед постановкой опыта и в конце опыта. В конце опыта после CO_2 -наркоза животных декапитировали. У животных брали кровь для проведения биохимических исследований: в сыворотке крови определяли концентрацию общего белка, общего билирубина, глюкозы, альбуминовую и глобулиновую фракции белка, активность аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы (на анализаторе Analyst РД 200). Определяли убойный выход туши, прирост живой массы, конверсию корма. Схема опыта представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Схема опыта

Группа	Дозы кадмия, свинца (ПДК) и сорбентов (%)
1	Контроль - Основной рацион (ОР)
2	ОР+2ПДК Cd и Pb
3	ОР+2ПДК Cd и Pb+1% шунгита+1% цеолита
4	ОР+2ПДК Cd и Pb+2% шунгита+2% цеолита

Результаты исследований. Результаты представлены в таблицах 2 - 4. Из таблицы 2 видно, что максимальный прирост жи-

вой массы имели свиньи 1-й группы – 33,9 кг и свиньи 4-й группы – 31,3 кг.

Таблица 2 - Прирост живой массы свиней, конверсия корма

Группа	Живая масса в конце опыта, кг	Живая масса на начало опыта, кг	Прирост живой массы, кг	Прирост в сутки, г	Конверсия корма, кг/кг
1	57,37±2,62	23,47±0,53	33,9±3,05	565±12,63	3,15
2	53,02±3,65	23,80±0,35	29,2±3,44	487±57,37	3,65
3	53,42±2,61	23,75±0,41	29,7±3,07	495±51,17	3,59
4	55,00±1,41	23,67±0,13	31,3±1,44	522±24,01	3,41

Среднесуточный прирост живой массы свиней 1-й группы составил 565 граммов. На 1 кг прироста живой массы было затрачено 3,15кг комбикорма. Контаминация комбикорма 2ПДК кадмия и 2ПДК свинца снижала суточную продуктивность животных на 78 г или на 13,8%. При этом затрата корма повышалась на 15,9%. Сочетанное применение шунгита и цеолита в дозах 1% и 2% к рациону не предотвращало негативного воздействия

кадмия и свинца – продуктивность снижалась на 8,8-9,2% (табл.2).

Из таблицы 3 видно, что наибольший убойный выход имели животные 1-й (контрольной) группы – 63,4%. Контаминация комбикорма 2ПДК кадмия и свинца снижала убойный выход на 2,6%. На фоне применения сорбентов в дозе 1% снижение составило 3,5%, при дозе сорбентов 2% снижение составило только 0,9%.

Таблица 3 - Масса туши свиней и убойный выход

Группа	Масса туши, кг	Убойный выход, %
1	36,37±2,81	63,4
2	32,25±1,71	60,8
3	32,00±3,53	59,9
4	34,37±1,36	62,5

Как видно из таблицы 4, на начало опыта содержание общего белка в сыворотке крови свиней во всех группах составляло 67 г/л. В середине опыта в контроле произошло снижение до 60 г/л, а в опытных группах этот показатель был ниже на 4-7 г/л. На конец опыта в контроле показатель повысился до 72 г/л, во 2-й группе – до 66г/л, в 3-й группе – до 68 г/л, а в 4-й группе – 71 г/л. Что касается альбуминовой фракции, показатель до середины опыта не имел значительных различий между группами и только на конец

опыта возрос во всех группах. У-глобулиновая фракция до середины опыта не имела особых различий между группами и соответствовала физиологической норме [1]. К концу опыта отмечено резкое снижение показателя в 2 раза во всех группах. Активность АЛТ-азы до середины опыта была одинаковой во всех группах, но к концу опыта понизилась более, чем в 2 раза.

Активность АСТ-азы в контроле до середины опыта составляла 25-28 ед./л, а к концу опыта повысилась в 4 раза.

Таблица 4 - Биохимические показатели сыворотки крови свиней

Группа	Общий белок, г/л	Альбумин, %	У-Глобулины, %	АЛТ, ед/л	АСТ, ед/л	ЩФ, ед/л	Билирубин мкМ/л	Глюкоза, мМ/л
На начало опыта								
1	67±1,3	34±2,6	23±1,5	64±6,0	28±0,0	456±0	2,08±0	4,88±0,5
2	67±1,3	34±2,6	24±1,5	76±4,2	96±6,2	444±2	2,36±1	4,88±0,5
3	67±1,2	32±0,5	25±6,4	65±0,5	96±4,5	417±0	2,10±0	4,92±0,6
4	67±1,3	33±1,1	24±0,0	97±9,5*	97±8,8	469±0	2,20±0	4,86±0,5
В середине опыта								
1	60±0,8	34±0,0	26±0,3	61±0,3	25±0,0	466±5	2,43±0	4,88±0,5
2	56±0,0	31±0,1	25±0,0	57±0,3	19±0,0	434±8	2,01±0	4,85±0,5
3	55±0,8	32±0,5	22±0,2	56±0,0*	25±0,3	389±1	2,35±0	4,86±0,5
4	53±0,8*	29±0,0*	24±0,3	55±0,3*	22±0,5	387±1	2,27±0	4,83±0,5
На конец опыта								
1	72±2,2	60±4,6	12±6,4	28±0,8	113±22	440±7	2,11±0	4,98±0,6
2	66±1,6	58±0,0	8±4,8	36±0,3*	66±21*	407±8	2,22±0	4,38±0,4
3	68±1,6	59±0,2	9±4,9	35±3,7	100±25	444±5	3,80±0*	4,06±0,3
4	71±0,0	54±0,5*	17±1,5	19±3,4	105±33	512±9*	3,31±1	5,13±0,7
Ф.Н.	65-75	40,2	37	46	57	450	2,00	4,95

Примечание: Ф.Н. – физиологическая норма; * - P <0,05.

Во 2-й группе на начало опыта отмечена наибольшая активность АСТ-азы – 116 ед./л, к концу опыта она снизилась до 66 ед./л.

В 3-й группе показатель на начало опыта составлял 96 ед./л, в середине опыта – снизился до 25 и в конце опыта повысился до 100 ед./л.

Активность щелочной фосфатазы бала примерно одинаковой во всех группах на протяжении всего опыта и соответствовала физиологической норме, но к концу опыта показатель свиней 4-ой группы был наибольшим и составил 512 ед/л против 440 ед/л в контроле. Это свидетельствует об усилении отложения кальция и фосфора в костной ткани животных [8]. Концентрация билирубина и глюкозы во всех группах на протяжении опыта соответствовала физиологической норме.

Заключение. В целом можно констатировать, что удвоенная предельно допустимая концентрация кадмия и свинца в рационах свиней приводит к снижению продуктивности животных на 13,8% и сопровождается снижением убойного выхода на 2,6%. Комбинированное применение сорбентов способствует уменьшению негативного воздействия тяжелых металлов, повышению отложения кальция и фосфора в костной ткани животных. Применение адсорбентов в дозе 2% к рациону позволяет повысить прирост живой массы свиней до значений близких к контролю, несмотря на удвоенную предельно допустимую концентрацию кадмия и свинца в рационе. Применение сорбентов в указанных дозах позволяет минимизировать влияние кадмия и свинца на организм животных, но не гарантирует предотвращения металлотоксикоза.

Литература

1. Васильева, Е.А. Клиническая биохимия сельскохозяйственных животных / Е.А. Васильева – М.: Россельхозиздат, 1982. – 254 с.
2. Боголюбова, Н.В. Использование минерала шунгит в рационах жвачных животных: Методические рекомендации / Н.В. Боголюбова, В.Н. Романов, В.А. Девяткин и др. // Дубровицы: ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. – 2017. – 42 с.
3. Ежкова, А.М. Живая масса и состав крови телят в зависимости от формы и дозы применения кормовых добавок на основе сапропеля / А.М. Ежкова, И.А. Яппаров, В.О. Ежков и др. // Ветеринарный врач. – 2018. - № 4. – С. 48-53.
4. Ермакова, Е.И. Адсорбционные свойства бентонита и модифицированного бентонита в отношении тяжелых металлов и микроэлементов в рационах бычков / Е.И. Ермакова, К.Х. Папуниди, Р.У. Бикташев // Ветеринарный врач. – 2014. - № 2. – С. 7-10.
5. Горштейн, А.Е. Адсорбционные свойства шунгитов / А.Е. Горштейн, Н.Ю. Барон, М.Л. Сыркина // Изв. вузов, химия и химич. технология. – 1979.- Т. 22.- № 6. - С. 711–715.
6. Жиенбаева, С.Т. Шунгит в комбикормах для цыплят-бройлеров С.Т. Жиенбаева, А.И. Изтаев, К.А. Елеукунова // Известия Кыргызского Гос. тех. университета им. Р.И. Раззакова. – 2008. - № 13. – С. 191 – 193.
7. Калинин, Ю.К. Экологический потенциал шунгита. Сб. Шунгиты и безопасность жизнедеятельности человека // материалы первой всероссийской научно-практической конференции (3–5 октября 2006 г.) / под ред. Ю. К. Калинина. - Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. - с. 5–10.
8. Насонов, И.В. Методические рекомендации по гематологическим и биохимическим исследованиям у кур современных кроссов / И.В.Насонов, Н.В.Буйко, Р.П. Лизун и др. // Минск: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. – 2014. – 32 с.
9. Новожилова, О.А. Повышение эффективности производства яиц и мяса бройлеров на основе обогащения шунгитом комбикормов и питьевой воды для птицы: дисс. ... канд. сельскохозяйств. наук: 06.02.10 / Новожилова Ольга Александровна. – Вологда – Молочное, 2011. – 192 с.
10. Папуниди, К.Х. Биохимические показатели сыворотки крови лактирующих коров при контаминации рационов Т-2 токсином на фоне применения высокодисперсного кизельгура / К.Х. Папуниди, Р.У. Бикташев, С.Р. Буланкова // Ветеринарный врач. – 2014. - № 3. – С. 8-12.
11. Подчайнов, С.Ф. Минерал цеолит – умножитель полезных свойств шунгита / С.Ф. Подчайнов // Матер. Первой Всеросс. Науч.-практ. конф (3–5 октября 2006 г.). – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. – С. 10–74.
12. Семенов Э.И. Применение нового адсорбента «Модибент» для профилактики микотоксикозов / Э.И. Семенов, С.А. Танасева, А.Р. Валиев и др. // Ветеринарный врач. – 2017. - № 3. – С. 30-35.

13. Трemasова, А.М. Фармако-токсикологическое обоснование использования природного минерала шунгита и препаратов на его основе, наносорбентов полисорбин и полисорб в ветеринарии. – Дисс. докт. биол. наук 06.02.02. 06.02.03. / Трemasова Анна Михайловна – Казань, 2015. – 351 с.
14. Шарапова, В.Ю. Использование шунгита в кормлении кур-несушек / В.Ю. Шарапова, Н.А. Лери // Птицеводство. – 2010.- № 9. – С.31 – 33.

USING SHUNGITE AND ZEOLITE AT PIG DIETS CONTAMINATION BY CADMIUM AND LEAD

Kadikov I.R. – Doctor of Biological Sciences, Biktashev R.U. – Doctor of Agricultural Sciences, Vafin I.F. – Candidate of Biological Sciences, Korchemkin A.A. – Candidate of Biological Sciences, Zakirova G.Sh. – Candidate of Veterinary Sciences, Mayorova E.N. – Junior scientific collaborator.

FSBSI «Federal Centre for Toxicological, Radiation and Biological Safety»
(420075, Kazan, Nauchny Gorodok-2, e-mail: vnivi@mail.ru)

The article contains productivity data of crossbreed growing pigs at phone of combined diet contamination by 2MPC of cadmium and 2MPC of lead and using highdispersed shungite and zeolite in proportion 1:1 in doses 1-2%. Information about growth of living mass, feed conversion, slaughter outlet, biochemical indexes of serum are presented. Established that combined contamination by cadmium and lead decreases the living mass growth of pigs to 13,8%. Combined using of sorbents promotes the decrease of heavy metals negative influence, increases deposit of calcium and phosphorus in bone tissue of animals. Adsorbents using in dose 2% of diet allowsto increase living mass gain of pigs to control significance in spite of doubled MPC of cadmium and lead in diet.

Keywords: growing pigs, diets, cadmium, lead, shungite, zeolite, living mass growth, feed conversion, slaughter outlet.

References

1. Vasilyeva, E.A. Clinical biochemistry of agricultural animals / E.A. Vasilyeva – M.: Rosselkhozizdat, 1982. – 254 p.
2. Bogolubova, N.V. Using of shungite mineral in diets of ruminant animals / N.V. Bogolubova, V.N. Romanov, V.A. Devyatkin et.all. // Dubrovizy: FGBNUFNZVIGim. L.K. Ernsta. – 2017. – 42p.
3. Eghkova, A.M. Living mass and blood composition of calves in dependance of form and dose of food additives on base of sapropel / A.M. Eghkova, I.A. Yapparov, V.O. Eghkovet all. // The veterinarian. – 2018. - № 4. – P. 48-53.
4. Ermakova, E.I. Adsorbent properties of bentonite and modified bentonite concerning heavy metals and microelements in boole diet / E.I. Ermakova, K.H. Papunidi, R.U. Biktashev // The veterinarian. – 2014. - № 2. – P. 7-10.
5. Gorshtain, A.E. Adsorbent properties of shungites / A.E. Gorshtain, N.Yu. Baron, M.L. Syrkina // Gerold of institutes, chemistry and chemical technologies. – 1979. – I. 22. - № 6. – P. 711-715.
6. Gienbaeva, S.T. Shungite in kombifood for chicken-broilers / C.T. Gienbaeva, A.I. Iztaev, K.A. Eleukenova // Gerold of Kyrgyz State University R.I. Razzakov. – 2008. - № 13. – P. 191-193.
7. Kalinin, Yu.K. Ecologist potent of shungite. Sb. Shungites and human safety // Materials of the first Allrussia science-practical conference (3-5 oktober 2006) – Petrozavodsk: Karelia.
8. Nasonov, I.V. Methodical recommendations on haematological and Biochemical investigations with hens of modern crosses / I.V. Nasonov, N.V. Buyko, R.P. Lizun et.all. // Minsk-Belarus. – 2014. – 32 p
9. Novozhilova, O.A. Improving the production efficiency of eggs and broiler meat based on the enrichment of feed and drinking water for poultry with shungite: Diss. ... Cand. Agricultural farm. Sciences: 06.02.10 / Novozhilova Olga Aleksandrovna. - Vologda - Dairy, 2011. - 192 p.
10. Papunidi, K.H. Biochemical indexes of dairy cows serum at diets contamination by T-2 toxin and using highdispersed kizelgur / K.H. Papunidi, R.U. Biktashev, S.R. Bulankova // The Veterinarian. – 2014. - № 3. – P. 8-12.
11. Podchaynov, S.F. Mineral zeolite – intensifier of shungite useful properties / S.F. Podchaynov // Mater. of the first Allruss. Sci.-pract.konf (3-5 oktober 2006) – Petrozavodsk: Karelian scientific centre of RAN, 2007. – P. 6-74.

12. Semenov, E.I. Using of new absorbent «Modibent» for micotoxikosis prevention / E.I. Semenov, S.A. Tanaseva A.R. Valiev et all // The veterinarian. – 2017. - № 3. – P. 30-35.

13. Tremasova, A.M. Pharmacological and toxicological substantiation of the use of the natural mineral shungite and preparations based on it, nanosorbents polysorbine and polysorb in veterinary medicine. - Diss. Doct. Biol. Sciences 02/06/02. 02/06/03. / Tremasova Anna Mikhailovna – Kazan, 2015. -- 351 p.

14. Sharapova, V.Yu. Shungite using in hen feeding / V.Yu. Sharapova, N.A. Leri // Ptitsevodstvo. – 2010. - № 9. – P. 31-33.

УДК 636.5.033

DOI 10.33632/1998-698X.2020-2-14-20

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО АНТИОКСИДАНТА ФЛАВОНОИДНОЙ ГРУППЫ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

Кузьмина Н.Н. – аспирант, **Петров О.Ю.** - доктор сельскохозяйственных наук,
Смоленцев С.Ю. - доктор биологических наук

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»
(424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина 1, e-mail: rector@marsu.ru)

Исследования посвящены изучению влияния современного антиоксиданта флавоноидной группы «Дигидрокверцетин» в составе комбикорма на гематологические показатели цыплят-бройлеров кросса КОББ-500. Результаты свидетельствуют, что показатели крови цыплят опытных групп находились в пределах физиологической нормы. Содержание гемоглобина и эритроцитов в крови бройлеров, получавших дигидрокверцетин, повысилось и свидетельствует о повышении интенсивности окислительно-восстановительных процессов в организме. Количество лейкоцитов во всех группах находилось в норме, но в опытных группах отмечено их снижение, что свидетельствует о терапевтическом и иммуностимулирующем действии препарата. Содержание лимфоцитов возрастает, в пределах нормальных значений, в связи с применением антиоксиданта, а у цыплят контрольной группы их оказалось ниже нормы. Применение дигидрокверцетина обеспечило повышение уровня тромбоцитов в границах нормы. В исследовании установлено положительное влияние антиоксиданта на содержание общего белка и альбуминовой фракции в сыворотке крови и свидетельствует о повышении, в организме цыплят, интенсивности ассимиляционных процессов. Углеводный обмен оценивался по содержанию глюкозы, а снижение ее уровня характеризует повышенное расходование на энергетические нужды метаболизма в связи с интенсивным ростом бройлеров. В крови цыплят опытных групп содержание холестерина уменьшается как реакция организма, на изменившийся фактор кормления, поскольку дигидрокверцетин способствует снижению его уровня. Снижение концентрации ферментов и билирубина в крови цыплят опытных групп, в пределах нормальных значений, свидетельствует об улучшении функционального состояния печени, а повышение активности щелочной фосфатазы в 1,3-1,8 раза связано с активным ростом цыплят. Исследования показали, что содержание минеральных веществ в сыворотке крови цыплят-бройлеров во всех группах было в границах физиологической нормы, следовательно, антиоксидант не оказал отрицательного влияния на обменные процессы в организме цыплят-бройлеров.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, антиоксидант, дигидрокверцетин, комбикорм, морфологический состав крови, гематологические показатели, биохимические показатели крови.

Повышению реализации потенциала высокой продуктивности цыплят-бройлеров и улучшения качества продукции должна способствовать правильно организованная система их выращивания. Наиболее чувствительны к изменению условий содержания и кормления, поступлению в организм веществ,

используемых для роста и формирования продукции - молодые цыплята, особенно в начале выращивания.

Одной из основных причин, не позволяющих реализовать генетический потенциал мясной продуктивности цыплят-бройлеров в полной мере нередко являются нарушения об-

мена веществ. В связи с этим, возникает множество заболеваний сельскохозяйственной птицы и их падеж. Чаще сбои в обмене веществ возникают вследствие нарушения условий кормления и могут вызвать серьезные нарушения в жизнедеятельности всего организма.

Высокая энергия роста цыплят-бройлеров позволяет получать от них значительное количество продукции уже к 40-дневному возрасту. Но реализация биологического потенциала их продуктивности может сдерживаться различными факторами. Среди них низкое качество кормов, наличие инфекционных агентов, несоответствие условий микроклимата и содержания (повышенная плотность посадки), использование антибиотиков и дезинфекция, стрессовые ситуации (вакцинации, транспортировка). Для уменьшения негативного влияния некоторых из этих факторов могут использоваться всевозможные биологические добавки. А их применение служит экологически безопасным способом профилактики отрицательного воздействия на организм птицы

Производство экологически безопасной и конкурентоспособной продукции птицеводства должно основываться на современных технологиях, ориентированных на максимальную реализацию биологического потенциала продуктивности птицы. Мировой опыт стран с развитым птицеводством показывает, что формирование качества мясной продукции начинается с выращивания и контролируется на всех участках трофологической цепи «от фермы до прилавка» [2].

В связи с этим, можно получать сырье, для производства продуктов питания животного происхождения, с заданными характеристиками, за счет прижизненной модификации сырья [5], которая предполагает длительное скормливание кормов, обогащенных необходимым компонентом. Современная биотехнология позволяет производить множество доступных и безопасных для использования биологически активных добавок, среди которых наиболее актуальны препараты натурального происхождения. Среди них наиболее перспективным является дигидрокверцетин - природный антиоксидант растительного происхождения. Кровь является наилучшим индикатором, достаточно четко отражающим характер метаболизма в организме птицы, она входит в число важнейших систем организма и выполняет

незаменимую роль в его жизнедеятельности, поэтому по ней можно судить обо всех изменениях в обменных процессах и предсказывать появление первых клинических симптомов заболеваний [7].

Благодаря крови возможен обмен веществ – как главная функция живого организма [1]. Белковый, углеводный, жировой и минеральный виды обмена взаимосвязаны, соответственно нарушения в одном из направлений обмена веществ отражаются на любом другом. Следовательно, для поддержания высокого уровня продуктивности бройлеров следует контролировать множество показателей, свидетельствующих о состоянии здоровья птицы и течении обменных процессов. В зависимости от величины воздействия различных факторов, биохимические показатели крови могут изменяться и иметь различные значения в пределах нормы [6, 7].

В связи этим, изучены изменения показателей крови цыплят-бройлеров, характеризующих состояние их здоровья и обмена веществ в связи с добавлением к комбикорму современного природного антиоксиданта флавоноидной группы - дигидрокверцетина.

Материал и методы. Производственный опыт был проведен в условиях ООО Зверохозяйство «Кизнерское» на цыплятах-бройлерах кросса КОББ-500. Для исследования было отобрано 40 голов суточных цыплят-бройлеров, со средней живой массой $39,80 \pm 0,13$ г, из которых, по принципу аналогов, были сформированы, четыре группы по 10 цыплят в каждой. Они получали одинаковый основной рацион, состоявший из стартерного, ростового и финишного полнорационных комбикормов, применяемых на птицефабрике, в зависимости от периодов роста, и в соответствии с рекомендациями оригинатора для данного кросса.

По содержанию энергии и питательных веществ кормление бройлеров было одинаковым, но отличалось между группами количеством вводимой антиоксидантной добавки.

Цыплята контрольной группы получали только основной рацион, состоявший из полнорационного комбикорма (ПК), II-й опытной группы – ПК с добавлением антиоксиданта «Дигидрокверцетин» (ДГК) в количестве 0,50 г на 100 г комбикорма, III-й – 0,75 г на 100 г комбикорма и IV-й – 1,00 г на 100 г (ПК), соответственно (табл. 1).

Таблица 1 – Схема производственного опыта

Группы	Количество голов	Схема опыта
Контрольная	10	Полнораационный комбикорм (ПК)
I опытная	10	(ПК) + 0,50 г ДГК на 100 г комбикорма
II опытная	10	(ПК) + 0,75 г ДГК на 100 г комбикорма
III опытная	10	(ПК) + 1,00 г ДГК на 100 г комбикорма

Опыт длился в течение 40 суток, а для уточнения эффективности откорма бройлеров, продолжительность периода была увеличена до 60 дней.

При выращивании цыплят-бройлеров температурный и световой режимы, влажность воздуха, фронт кормления и поения птицы в период эксперимента соответствовали рекомендациям ВНИТИП.

Результаты исследований. Результаты изучения морфологического состава

крови входят в алгоритм диагностики большинства патологических процессов. И по содержанию эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина можно судить об интенсивности окислительно-восстановительных процессов в организме [4]. Полученные результаты исследований свидетельствуют, что морфологический состав крови цыплят опытных групп по большинству показателей находился в пределах физиологической нормы (табл. 2).

Таблица 2 – Морфологический состав крови цыплят-бройлеров

Показатель	Группа			
	Контрольная	I опытная	II опытная	III опытная
Гемоглобин, г/л	59,30±2,16	81,70±4,71*	91,00±0,71***	106,00±7,48**
Референтные значения	80-120 г/л			
Эритроциты, $\times 10^{12}/л$	3,10±0,22	3,30±0,29	3,30±0,18	3,60±0,18
Референтные значения	$3-4 \times 10^{12}/л$			
Лейкоциты, $\times 10^9/л$	40,00±1,19	39,60±0,79	28,00±1,59**	24,10±2,12**
Референтные значения	$20-40 \times 10^9/л$			
Лимфоциты, ед.	50,70±1,08	52,00±1,41	55,70±2,04	54,30±1,78
Референтные значения	52-60 ед.			
Тромбоциты, $\times 10^9/л$	33,00±3,24	66,00±7,87*	122,70±6,34**	140,70±4,55***
Референтные значения	$32-150 \times 10^9/л$			

Здесь и далее по тексту: *- P < 0,05, ** - P < 0,01, *** - P < 0,001

Содержание гемоглобина и эритроцитов в крови бройлеров, получавших в составе комбикорма дигидрокверцетин, находилось в пределах нормальных значений, но имело устойчивую тенденцию к увеличению – адекватно уровням препарата. Следует отметить, что по окончании научно-хозяйственного эксперимента в I, II и III опытных группах прослеживается повышение уровня гемоглобина в крови на 37,77 (P<0,05); 53,46 (P<0,01), и 78,75% (P<0,001). Содержание эритроцитов в крови цыплят опытных групп, по завершению периода откорма, имело тенденцию к возрастанию, относительно контроля - в I и II группах на 6,45 %, а в III группе - на 16,13 %. Это может свидетельствовать об активизации об-

менных процессов в тканях и, соответственно, усилении снабжения их кислородом и выведения продуктов метаболизма. Низкий уровень гемоглобина у цыплят контрольной группы говорит о возможном дефиците кислорода в тканях.

Наукой доказано, что повышение концентрации эритроцитов и содержания гемоглобина в крови объясняется усилением гемопоэза в костной мозговой ткани. По-видимому, активация гемопоэза является следствием применения антиоксиданта при кормлении птицы, что в определенной мере стимулирует увеличение количества эритроцитов и закономерное пропорциональное повышение содержания гемоглобина в крови.

Главная задача лейкоцитов – защита организма птицы от вредных воздействий окружающей среды путем выработки клеточных и гуморальных неспецифических и специфических факторов. Лейкоциты обладают фагоцитарной активностью и формируют гуморальный иммунитет организма. Повышение количества лейкоцитов в крови может свидетельствовать о наличии патологических процессов в организме.

В результатах исследований отмечено, что количество лейкоцитов во всех группах цыплят-бройлеров находилось в пределах физиологической нормы. По завершению выращивания цыплят, в опытных группах отмечено снижение количества лейкоцитов в сыворотке крови, относительно контрольной группы, на 1,00; 30,00 ($P<0,01$) и 39,75 % ($P<0,01$), соответственно. Что свидетельствует о терапевтическом и иммуностимулирующем действии препарата.

Лимфоцит – это разновидность лейкоцита, присутствующая в нормальной крови. Лимфоцит специализируется на борьбе с вирусами и некоторыми бактериями и относится к клеткам гуморального иммунитета. Значительное повышение показателя характерно при вирусных инфекциях и заболеваниях крови. Снижается он при различных иммунодефицитах, характерных для почечной недостаточности, при длительном голодании или переутомлении. Исследование морфологического состава крови цыплят-бройлеров показало, что

содержание лимфоцитов незначительно возрастает, в пределах нормальных значений, в связи с применением антиоксиданта в кормлении бройлеров на 2,56 % в I группе, на 9,86 % - во II и на 7,10 % - в III группе. В то же время установлено, что у цыплят контрольной группы значение изучаемого показателя оказалось ниже нормы.

Снижение уровня тромбоцитов может указывать на цирроз печени или анемию. В проведенном исследовании, полученные результаты показали, что применение дигидрохверцетина обеспечило повышение данного показателя в I - III опытных группах, относительно контроля, в 2,0; 3,7 и 4,3 раза ($P<0,05$ – $P<0,001$), соответственно, и было в границах нормы.

В результате проведенных биохимических исследований крови также установлено, что использование дигидрохверцетина способствует повышению интенсивности окислительно-восстановительных процессов, вследствие активизации обмена веществ и энергии.

Действие изучаемой добавки направлено на нормализацию метаболизма в организме бройлеров с целью повышения конверсии корма в продукцию и более полной реализации потенциала продуктивности.

К важнейшим показателям белкового обмена, имеющим клиническое значение, относится содержание общего белка плазмы крови и распределение его по отдельным белковым фракциям (табл. 3).

Таблица 3 – Биохимические показатели крови цыплят-бройлеров

Показатель	Группа			
	Контрольная	I опытная	II опытная	III опытная
Общий белок, г/л	29,70±1,78	31,70±2,48	36,00±0,71*	40,30±2,94
Референтные значения	32-47 г/л			
Альбумин, г/л	26,70±1,08	30,00±0,71	32,30±1,08*	34,70±2,27*
Референтные значения	31,4-36,1 г/л			
Глюкоза, ммоль/л	15,30±0,33	13,20±0,28*	10,70±0,08***	10,10±0,25**
Референтные значения	9,3-16,5 ммоль/л			
Холестерин, ммоль/л	4,50±0,07	4,00±0,11*	3,40±0,11**	3,30±0,11**
Референтные значения	3,4-4,6 ммоль/л			
АСТ, ммоль/л	321,50±6,27	311,70±3,32	310,30±1,51	310,20±5,22
Референтные значения	107-481 (~330) ммоль/л			
АЛТ, ммоль/л	5,90±0,29	4,40±0,63	2,00±0,07***	1,40±0,18***
Референтные значения	1,2-6,8 ммоль/л			
Щелочная фосфатаза, ед.	530,70±9,23	693,70±65,67	862,00±44,97**	976,30±25,31***
Референтные значения	770-1100 ед.			
Билирубин общий, мг%	0,163±0,063	0,140±0,074	0,127±0,015	0,120±0,044
Референтные значения	0,01-0,5 мг%			

Оценка белкового обмена по содержанию общего белка и альбуминовой фракции в сыворотке крови птицы показала его положительную динамику. У цыплят опытных групп белково- и альбуминсинтезирующая функции печени были интенсивней, что, очевидно, связано с лучшим усвоением азотистых веществ потребляемого корма, следовательно, и большим поступлением в кровь белковых продуктов. Соответственно, общее количество белка в сыворотке крови цыплят-бройлеров опытных групп, к окончанию периода выращивания, было выше, в среднем, на 21,21% ($P < 0,05$), чем в контрольной группе.

Однако по уровню общего белка нельзя объективно оценить уровень кормления, так как этот показатель может изменяться под воздействием многих факторов, не относящихся непосредственно к питанию, но характерных для некоторых нарушений обмена веществ и функции печени. В связи с этим, контролируется концентрация альбуминов в сыворотке крови. Основные функции альбуминов – поддержание онкотического давления, участие в транспорте свободных жирных кислот, билирубина, стероидных гормонов, магния, кальция, и т.д. Отмечено, что альбуминовая фракция белка, в период исследования, лучше мобилизуется на синтез тканей растущего организма. Концентрация альбуминов в сыворотке крови у цыплят-бройлеров опытных групп оказалась выше, в среднем, на 21,10 % ($P < 0,05$), чем у контрольных сверстников, но была в пределах нормальных физиологических значений, что характеризует повышение интенсивности ассимиляционных процессов в организме птицы.

Углеводы плазмы крови представлены, в основном, глюкозой. Поэтому углеводный обмен оценивался по ее содержанию глюкозы в крови птицы всех групп. Этот показатель зависит от сбалансированности рациона птицы, от состояния эндокринного аппарата, напряженности нервной системы и ряда других факторов. Полученные данные свидетельствуют, что уровень глюкозы находился в пределах нормальных физиологических значений. К окончанию периода откорма уровень глюкозы в крови птицы опытных групп оказался ниже, чем в контрольной группе, в среднем на 25,93 % ($P < 0,01$). Снижение уровня глюкозы в крови может указывать на повышенное ее использование как энергетической составляющей на

метаболические процессы, связанные с интенсивным ростом цыплят.

Липиды представляют собой гетерогенные вещества, выполняющие различные структурные и обменные функции. По строению и свойствам они весьма разнообразны. Кроме жирных кислот, в состав липидов входит и холестерин. В крови цыплят опытных групп его содержание уменьшается на 0,5 – 1,2 ммоль/л ($P < 0,05$ – $P < 0,01$), относительно контроля. Такая реакция организма, на изменившийся фактор кормления, связана с тем, что дигидрокверцетин, по известным данным [8], способствует снижению уровня холестерина в крови.

Для оценки влияния добавки дигидрокверцетина, в рационы цыплят опытных групп, на общий обмен веществ в их организме, были изучено влияние антиоксиданта на показатели активности сывороточных ферментов крови, отражающей течение обменных процессов и функциональное состояние печени. Наиболее характерные ферменты - это: щелочная фосфатаза, не являющаяся строго органоспецифическим ферментом, она отщепляет остаток фосфорной кислоты от ее органических соединений, аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспаратаминотрансфераза (АСТ), которые выполняют важную роль в обмене аминокислот. В биохимическом гомеостазе организма, ферменты крови реагируют наиболее быстро, а изменение их активности характеризует неспецифическую реакцию организма. Направление обмена веществ в организме цыплят-бройлеров определяется высокой интенсивностью их роста и об этом, в определенной степени, можно судить по активности ферментов переаминирования АЛТ и АСТ, играющих роль в процессах синтеза и распада аминокислот в организме. Щелочная фосфатаза участвует в обмене фосфорной кислоты, способствует транспорту фосфора в организме и влияет на рост костей. В связи с этим очевидно, что повышение уровня дигидрокверцетина в кормлении бройлеров обуславливает повышение активности щелочной фосфатазы в крови цыплят опытных групп в 1,3-1,8 раза ($P < 0,01$ – $P < 0,001$) в связи с их активным ростом. Организм цыплят-бройлеров должен быть обеспечен оптимальным количеством минеральных веществ. Наиболее важным является уровень и соотношение кальция и фосфора - они участвуют в обменных процессах организма птицы (табл. 4).

Таблица 4 – Содержание минеральных элементов в крови цыплят-бройлеров

Показатель	Группа			
	Контрольная	I опытная	II опытная	III опытная
Калий, ммоль/л	4,30±0,12	4,65±0,24	5,14±0,12*	5,26±0,14*
Референтные значения	4,7-5,8 ммоль/л			
Натрий, ммоль/л	119,00±1,41	144,67±8,04	148,67±1,47***	150,67±2,27**
Референтные значения	120,0-152,2 ммоль/л			
Кальций, ммоль/л	2,60±0,21	3,70±0,29	3,90±0,11*	4,50±0,25*
Референтные значения	2-5,5 ммоль/л			
Фосфор, ммоль/л	3,28±0,11	2,76±0,08*	2,26±0,08**	1,84±0,14**
Референтные значения	1,5-3,2 ммоль/л			

По результатам исследований установлено, что уровень кальция в сыворотке крови цыплят всех групп находился в пределах нормальных физиологических значений. Но его уровень в крови птицы опытных групп оказался выше, чем у аналогов в контроле, что косвенно свидетельствует об улучшении его усвоения из корма, благодаря добавлению дигидрокверцетина.

Фосфор входит в состав нуклеиновых кислот, регулирующих процессы прямого окисления углеводов, обмена аминокислот, гликолиза. В исследованиях отмечено, что процесс усвоения фосфорных соединений протекает особенно интенсивно. Содержание фосфора в сыворотке крови цыплят контрольной группы было выше физиологической нормы. При этом в опытных группах содержание фосфора было достоверно ниже, чем в контрольной группе на 15,85 ($P<0,05$); 31,10

($P<0,01$) и 43,90 % ($P<0,01$). Это согласуется с его взаимосвязью с кальцием в обмене и свидетельствует об активном участии в минеральном обмене и обеспечении потребности организма в этом элементе для пластических нужд.

Вывод. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что современный антиоксидант флавоноидной группы не оказывает негативного влияния на организм цыплят-бройлеров. Морфологические и биохимические показатели крови птицы опытных групп соответствовали референтным значениям, в отличие от контрольной, поскольку у них ряд показателей не соответствовал норме. Одновременно, анализ результатов убеждает в улучшении обменных процессов в организме цыплят-бройлеров, получавших дигидрокверцетин, что подтверждается увеличением их живой массы относительно контрольной группы.

Литература

1. Аршавский, И.А. Физиология кровообращения во внутриутробном периоде / И.А. Аршавский. – М.: Медгиз, 1960. – 234 с.
2. Астраханцев, А.А. Рост и развитие цыплят-бройлеров при использовании в рационе различных премиксов / А.А. Астраханцев // Достижения науки и техники АПК. – 2017. – №10(31). – С.78-80.
3. Белооков, А.А. Влияние микробиологических препаратов на конверсию питательных веществ корма в мясную продукцию / А.А. Белооков // Молочное и мясное скотоводство. - 2010. – № 6. – С. 11-12
4. Лоретц, О.Г. Динамика морфологических и биохимических показателей крови цыплят-бройлеров при использовании в рационе микробиологических препаратов / О.Г. Лоретц и др. // АВУ. - 2017. – №11. – С. 165.
5. Гиро, Т.М. Прижизненное формирование качественных характеристик экологически безопасного мясного сырья методом интенсификации механизмов метаболических процессов свинков / Т.М. Гиро и др. // Теория и практика переработки мяса. - 2016. – №1. – С. 32-45.
6. Ленинджер, А. Основы биохимии / А. Ленинджер. – М.: Мир, 1985. – 365 с. Т. 1
7. Корчагина, Ю.А. Биохимические исследования сыворотки крови: Информационный бюллетень / Ю.А. Корчагина // ИКС АПК Ярославской области. – 2010. - № 6.
8. Кузьмина, Н.Н. Перспективы применения дигидрокверцетина в лечебно-профилактическом питании / Н.Н. Кузьмина // Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. – 2019. – № 21. – С. 285-288.

INFLUENCE OF THE MODERN FLAVONOID ANTIOXIDANT DIHYDROQUERCETIN ON THE HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF BROILER CHICKENS

Kuzmina N.N. - Postgraduate, Petrov O.Yu. - Doctor of Agricultural Sciences,
Smolentsev S.Yu. - Doctor of Biological Sciences

FSBEI of HE "Mari State University"
(424000, Yoshkar-Ola city, Lenin Square 1, e-mail: rector@marsu.ru)

The research is devoted to the study of the influence of the modern flavonoid antioxidant "Dihydroquercetin" in compound feed on the hematological indicators of cross-Cobb-500 broiler chickens. The results show that the blood parameters of the experimental groups of chickens were within the limits of the physiological norm. The content of hemoglobin and red blood cells in the blood of broilers receiving dihydroquercetin increased and indicates an increase in the intensity of redox processes in the body. The number of white blood cells in all groups was normal, but in the experimental groups their decrease was noted, which indicates the therapeutic and immunostimulating effect of the drug. The content of lymphocytes increases, within normal values, due to the use of antioxidant, and in the control group of chickens, they were below the norm. The use of dihydro-quercetin provided an increase in platelet levels within the normal range. The study found a positive effect of the antioxidant on the content of total protein and albumin fraction in blood serum and indicates an increase in the intensity of assimilation processes in the body of chickens. Carbohydrate metabolism was assessed by glucose content, and a decrease in its level characterizes an increased expenditure on energy needs of metabolism due to the intensive growth of broilers. In the blood of chickens of experimental groups, the cholesterol content decreases as a reaction of the body to a changed feeding factor, since dihydroquercetin helps to reduce its level. A decrease in the concentration of enzymes and bilirubin in the blood of chickens of experimental groups, within normal values, indicates an improvement in the functional state of the liver, and an increase in the activity of alkaline phosphatase by 1.3-1.8 times is associated with the active growth of chickens. Studies have shown that the content of mineral substances in the blood serum of broiler chickens in all groups was within the limits of the physiological norm; therefore, the antioxidant did not have a negative effect on the overall processes in the body of broiler chickens.

Keywords: broiler chickens, antioxidant, dihydroquercetin, compound feed, blood morphological composition, hematological parameters, blood biochemical parameters.

References

1. Arshavskij, I.A. Physiology of blood circulation in the prenatal period.-M.: Medgiz, 1960. 234 p.
2. Astrahancev, A.A. Growth and development of broiler chickens when using different premixes in the diet / A.A. Astrahancev // Achievements of science and technology of agriculture. -2017. - №10 (31).- P. 78-80.
3. Belookov, A.A. Influence of microbiological preparations on the conversion of feed nutrients into meat products / A.A. Belookov // Dairy and meat cattle breeding. – 2010. - №6. - P.11-12.
4. Loretc, O.G. Dynamics of morphological and biochemical parameters of blood of broiler chickens when microbiological preparations are used in the diet / O.G. Loretc // AVU. - №11.-165p.
5. Giro, T.M. Lifetime formation of qualitative characteristics of ecologically safe meat raw materials by intensification of mechanisms of metabolic processes of pigs / T.M. Giro // Theory and practice of meat processing. – 2016. - №1. - P. 32-45.
6. Lenindzher A. Fundamentals of biochemistry.-M.: Mir, 1985. 365 p.
7. Korchagina, Yu.A. Biochemical studies of blood serum: newsletter / Yu.A. Korchagina // IKS APK Yaroslavl region. -2010. -№6.
8. Kuz'mina, N.N. Prospects of application of dihydroquercetin in therapeutic and preventive nutrition / N.N. Kuz'mina // Actual issues of improvement of production technology and processing of agricultural products. – 2019. - №21.- P. 285-288.

ВЫДЕЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗОЛЯТА ВИРУСА БОЛЕЗНИ АУЕСКИ

^{1,2} Лоивская О.Ю. – аспирант, ¹Люлькова Л.С. – доктор биологических наук,
¹Маркова Е.В. – кандидат сельскохозяйственных наук, ¹Матвеева И.Н. – доктор биологических наук, профессор, ¹Преображенская А.С. – соискатель

¹ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский
и технологический институт биологической промышленности
(141142, Московская область, пос. Биокомбината, ВНИТИБП, e-mail: biolog1967@mail.ru)
²ФКП «Щелковский биокомбинат»
(141142, Московская область, пос. Биокомбината, e-mail: LoivskayaOY@biocombinat.ru)

Статья посвящена выделению и идентификации изолята вируса болезни Ауески. Изолят вируса был выделен от кота, павшего на территории г. Москвы, от болезни Ауески в перевиваемой культуре клеток почки телёнка MDBK. В результате установлено, что изолят вируса высоко патогенен для лабораторных животных: кроликов, морских свинок и крыс. К изоляту вируса были чувствительны другие перевиваемые клеточные линии: Taurus-1 и ВНК-21. Характер ЦПД в разных культурах клеток был одинаковым. Способность к репродукции в культуре клеток изучаемого изолята вируса достигала максимума к 4-6 пассажу и составляла 6,81-7,61 lgТЦД₅₀/см³. Наличие вируса болезни Ауески подтверждено биопробой и другими лабораторными методами, в том числе ПЦР. Метод ПЦР позволил выявлять геном вируса в вирусосодержащем культуральном и в органно-тканном материале. Неспецифических реакций не наблюдалось. ПЦР-продукты обнаруживали ожидаемого размера. Вирусосодержащий материал изолята вируса болезни Ауески используется при изучении биологических и молекулярно-биологических свойств.

Ключевые слова: изолят вируса, культура клеток, репродукция, болезнь Ауески, цитопатическое действие, инфекционная активность, ПЦР.

Болезнь Ауески — острая вирусная болезнь домашних и некоторых диких животных, в том числе пушных зверей и грызунов, характеризуется лихорадкой, воспалением легких, признаками поражения головного и спинного мозга, что проявляется различными нервными расстройствами (сильное возбуждение, судороги, параличи), сильными зудом и расчесами у всех животных кроме свиней, норок и соболей. Болезнь Ауески распространена практически по всему миру и наносит большой экономический ущерб животноводству развитых стран. Возбудителем болезни является вирус, относящийся к семейству Herpesviridae, подсемейству Alphaherpesvirinae. Свиньи являются естественным хозяином вируса, остаются пожизненными его носителями, причем в любой момент возможна реактивация латентного возбудителя (Muñer et al., 2011).

Для культивирования вирусов перспективны перевиваемые линии клеток, так как обеспечивают получение больших объемов вирусосодержащего материала, который при-

меняется при исследовании биологических, молекулярно-генетических свойств вируса, а также используется в качестве лабораторной модели для изучения эволюции вируса, разработки средств диагностики и специфической профилактики (Fonseca et al., 2010; Steinrigl A. et al., 2012).

Целью настоящей работы было выделение и идентификация изолята вируса болезни Ауески.

Материал и методы. В исследованиях использовали изолят вируса болезни Ауески, который был выделен в г. Москва от кота. В работе использовали перевиваемую линию клеток почки теленка: MDBK. В качестве ростовых и поддерживающих сред применяли среды Игла, МЕМ отечественного и импортного производства. Из органов павшего от болезни Ауески кота (печень, лёгкие, лимфатические узлы, селезёнка) готовили 10 % суспензию в среде Игла (МЕМ; «Sigma», США, «HyClone», США) с добавлением антибиотиков (пенициллин и стрептомицин по 200-1000

ЕД на 1 мл, нистатина 20 ЕД на 1 мл). После осветления центрифугированием при 2000 об/мин суспензию вносили в культуральные флаконы со сформировавшимся монослоем клеток. Через 1 ч после адсорбции суспензию удаляли, вносили поддерживающую среду, содержащую 2% сыворотки крупного рогатого скота, и инкубировали до появления характерных признаков цитопатического действия вируса (ЦПД). Состояние монослоя клеток для определения ЦПД вируса оценивали при просмотре культуральных флаконов под инвертированным микроскопом Olympus CKX31 («Olympus Co.», Япония). Инфекционную активность вируса определяли титрованием в 1-2-суточных культурах перевиваемых линий клеток, выращенных в 96-луночных микропланшетах. Титр вируса рассчитывали по методу Рида и Менча и выражали в $\lg \text{TCID}_{50}/\text{см}^3$. Нуклеиновые кислоты выделяли с использованием набора «РИБО-сорб» (ООО «ИнтерЛабСервис», Россия). Материалом для

постановки ПЦР служили пробы культуральной вирусосодержащей жидкости, органов кролика, инфицированного полевым изолятом болезни Ауески, мозга ягнёнка и трупа кота, павшего от штамма вируса псевдобешенства, циркулирующего на территории г. Москвы. Конструирование специфических праймеров проводили с использованием программ Primer Select (DNASTAR). В качестве генетического маркера был выбрана нуклеотидная последовательность гена, кодирующего glycoprotein D. Предварительную оценку специфичности праймеров и ампликонов проводили с использованием «BLAST» (<http://blast.ncbi.nlm.nih.gov>). Синтез праймеров осуществляли в НПФ «Литех». Результаты ПЦР учитывали путём анализа продуктов амплификации методом электрофореза в 1-2% геле агарозы.

Результаты исследований. Характер ЦПД выделенного изолята вируса в культуре клеток MDBK представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Цитопатическое действие вируса в перевиваемой линии клеток: А — контрольная культура клеток, В — культура клеток на 3-и сут после заражения (увеличение $\frac{1}{2}150$, микроскоп Olympus CKX31, «Olympus Co.», Япония).

В процессе наработки вирусного материала изолята вируса болезни Ауески в монослойной перевиваемой культуре клеток MDBK установили, что к 4-6 пассажам вирус достигал максимальных титров. Оценивали величину накопления инфекционности вируса по наступлению 70-90% цитопатического эффекта. Репродуктивная способность изучаемого изолята вируса достигала максимума к 4-6 пассажу и составляла 6,81-7,61 $\lg \text{TCID}_{50}/\text{см}^3$. И дальнейшее пассирование не повышало исходной активности. Полученные результаты

свидетельствуют, что динамика адаптации изолята вируса не имела существенных различий, и после адаптации изолят вируса стабильно сохраняли свойственный ему уровень репродуктивной активности в течение всего периода исследований.

Исследования по определению оптимальной заражающей дозы проводились в трех повторностях, с последующим определением биологической активности вирусосодержащих суспензий. Результаты проведённых исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Накопление изолята вируса болезни Ауески в культуре клеток MDBK, в зависимости от инфицирующей дозы и сроков культивирования, (n=3)

Множественность заражения ТЦД ₅₀ /см ³	Биологическая активность в lg ТЦД ₅₀ /см ³ в различные сроки культивирования, час					
	12	24	36	48	60	72
0,0001	2,30±0,06	3,30±0,21	4,4±0,07	4,7±0,19	4,1±0,08	3,56±0,12
0,001	3,20±0,21	3,6±0,12	4,00±0,09	4,83±0,14	4,5±0,08	4,2±0,15
0,01	4,10±0,07	5,7±0,09	6,75±0,19	7,00±0,13	6,83±0,03	6,55±0,20
0,1	5,20±0,14	5,76,20	6,5±0,18	6,84±0,02	7,05±0,09	6,84±0,15
1,0	5,6±0,03	6,30,15	7,00±0,12	6,75±0,14	6,5±0,12	6,20±0,14

Как следует из данных таблицы 1, уровень накопления вируса в культуре клеток, инфицированной в дозах 0,0001 и 0,001 ТЦД₅₀/мл, достигал максимума через 48 ч и затем снижался. Активность вирусного материала из проб, инфицированных в дозе 1,0 ТЦД₅₀/см³, достигала максимума через 36 ч и затем также отмечалась тенденция к снижению. При инфицировании клеток вирусом в дозе 0,01-0,1 ТЦД₅₀/см³ максимальный уровень накопления вируса отмечали через 48-60 ч.

Оценку эффективности концентрации сыворотки крови в составе поддерживающей

среды проводили по результатам накопления вируса и состоянию культуры клеток. Результаты исследований представлены в таблице 2. Как следует из данных, представленных в таблице 2, использование в поддерживающей среде 2 и 5% сыворотки крупного рогатого скота существенно не оказывает заметного влияния на активности получаемых вирусосодержащих материалов штамма. Титры вируса были в пределах 7,5 lg ТЦД₅₀/см³. При 1% содержании сыворотки титр вируса был сравнительно ниже и составлял 6,23lg ТЦД₅₀/см³.

Таблица 2 – Накопление изолята вируса в культуре клеток с использованием поддерживающей среды с различным содержанием нативной сыворотки крупного рогатого скота (n=3)

Концентрация сыворотки крови крупного рогатого скота в поддерживающей среде, %	Срок появления ЦПД вируса в культуре клеток, час	Период культивирования вируса, час	Титр инфекционной активности вируса, lg ТЦД ₅₀ /см ³
1,0	24	48-72	6,23±0,13
2,0	24	48-60	7,6±0,19
5,0	24	48-60	7,5±0,21

Максимальное накопление вируса в вирусосодержащем материале происходило на 48-60 час. Очевидно, что этот период культивирования являлся оптимальным. При этом ЦПД составляло более 90% площади инфицированного монослоя. Сравнительная оценка вирулентности вируса, проведённая на лабораторных животных, показала, что изучаемый изолят вируса высокопатогенен для лабораторных животных: кроликов, морских свинок и крыс. Видовую принадлежность вируса, накапливаемого в культурах клеток, подтверждали выявлением генома методом ПЦР (рис. 2). Подобранные праймеры гибридизовались с нуклеиновыми кислотами

всех исследуемых препаратов, в которых содержался вирус болезни Ауески, и ограничивали продукты амплификации размером 194 п.о., что соответствовало рассчитанному значению. ПЦР позволял выявлять нуклеиновую кислоту вируса болезни Ауески в вирусосодержащем культуральном и органно-тканном материале павших домашних животных в количестве не менее 22 пг.

Из результатов, приведённых на рисунке 2, следует, что ПЦР позволяет амплифицировать фрагмент целевого гена размером 194 пар нуклеотидов (п.о.) в образцах, содержащих ДНК вируса болезни Ауески.

Рисунок 2 - Обнаружение ДНК вируса болезни Ауески методом ПЦР: дорожки

- 1, 7 – маркер – фрагмент ДНК известной молекулярной массы;
 2- ткань мозга ягнёнка,
 3 - вируссодержащей культуральной материал
 4 - ткань мозга кота;
 5,6 - ткань мозга кролика, инфицированного изолятом вируса (биопроба)

Заключение. Изолят вируса был выделен из проб органов погибшего от болезни Ауески кота. К изоляту вируса была чувствительна перевиваемая клеточная линия: MDBK. Способность к репродукции в культуре перевиваемых линиях клеток изучаемого изолята вируса достигала максимума к 4-6 пассажу и составляла $6,81-7,61 \lg \text{ТЦД}_{50}/\text{см}^3$. Видовую принадлежность вируса, накапливаемого в культурах клеток, подтверждали выявлением генома методом ПЦР и биопробой на кроли-

ках. Полученные экспериментальные данные показали, что только в пробах, (содержащих ДНК вируса болезни Ауески выявляли специфические продукты реакции ПЦР размером 194 п.н.

Вирусосодержащий материал изолята вируса болезни Ауески, полученный в различных культурах клеток, планируется использовать в дальнейших исследованиях для изучения его молекулярно-биологических свойств.

Литература

1. Богомолова, О.А. Чувствительность перевиваемых линий культур клеток Marc-145 и MA-104 к изоляту вируса цирковиральной инфекции свиней / О.А. Богомолова, И.Н. Матвеева, В.М. Попова // Научный альманах. - 2018. - № 5-2(43). - С. 166-169.
2. Маркова, Е.В. Изучение инфекционной активности нецитопатогенного цирковирала свиней 2 типа в реакции непрямой иммунофлуоресценции / Е.В. Маркова, И.Н. Матвеева, О.А. Богомолова, О.А. Гаджимурадов, И.В. Иванов, В.М. Попова, Л.А. Скороходова // Научный альманах. - 2018. - №7-1(45) - С.201-205
3. Матвеева, И.Н. Исследование новой питательной среды для культивирования клеток млекопитающих / И.Н. Матвеева, В.М. Попова, А.Я. Самуйленко, А.С. Дяченко, А.С. Преображенская // Технологии живых систем. - 2016. - № 1.- С. 83-86.
4. Преображенская, А.С. Использование ПЦР для выявления генома возбудителя болезни Ауески в биологическом материале / А.С. Преображенская, И.Н. Матвеева, А.С. Дяченко, В.М. Попова // Ветеринария и кормление. - 2014. - № 6. - С. 32.

5. Самуйленко, А.Я. Избранные труды. М.-2013.- 541 с.
6. Fonseca Jr. Molecular epidemiology of Brazilian pseudorabies viral isolates / Jr. Fonseca, A.A. Camargos et al. // Vet. Microbiol. - 2010a. - 141 (3-4). - P. 238-245.
7. Goldberg, T.L. Comparative utility of restriction fragment length polymorphism analysis and gene sequencing to the molecular epidemiological investigation of a viral outbreak / T.L. Goldberg, R.M. Weigel, E.C. Hahn, G. Scherba // Epidemiol. Infect. - 2001. - 126 (3). - P.415-424.
8. Müller, T. Characterization of pseudorabies virus of wild boar origin from Europe / T. Müller, B.G. Klupp, C. Freuling, B. Hoffmann, M. Mojczic, I. Capua, V. Palfi, B. Toma, W. Lutz, F. Ruiz-Fon, C. Gortázar, A. Hlinak, U. Schaarschmidt, K. Zimmer, F.J. Conraths, E.C. Hahn, T.C. Mettenleiter // Epidemiol. Infect. - 2010. - 138 (11). - P.1590-1600.
9. Müller, T. Pseudorabies virus in wild swine: a global perspective / T. Müller, E.C. Hahn, F. Tottewitz, M. Kramer, B.G. Klupp, T.C. Mettenleiter, C. Freuling // Arch.Virol. - 2011. - 156. - P.1691-1705.
10. Steinrigl, A. Detection and molecular characterization of Suid herpesvirus type 1 in Austrian wild boar and hunting dogs / A. Steinrigl, S. Revilla-Fernández, J. Kolodziejek, E. Wodak, Z. Bago, N. Nowotny, F. Schmoll, J. Köfer // Vet. Microbiol. - 2012. - 157 (3-4). - P.276-284.

ISOLATION AND IDENTIFICATION OF ISOLATED AUJESZKY'S DISEASE VIRUS

^{1,2} Loivskaya O.Yu. - Graduate student, ¹Lyulkova L.S. - Doctor of Biological Sciences,
¹Markova E.V. - Candidate of Agricultural Sciences, ¹Matveeva I.N. - Doctor of Biological Sciences,
 Professor, ¹Preobrazhenskaya A.S. - job seeker

¹Federal State Budgetary Scientific Institution All-Russian Research
 and Institute of Biological Industry
 (141142, Moscow region, village of Biocombinat, VNITIBP, e-mail: biolog1967@mail.ru)
²FKP "Schelkovo Biocombine"
 (141142, Moscow region, village of Biocombinat, e-mail: LoivskayaOY@biocombinat.ru)

The article is dedicated to isolation and identification of the Aujeszky's disease virus isolate. The virus isolate was isolated from a cat who died in Moscow from Aujeszky's disease in an inoculated culture of MDBK calf kidney cells. As a result, it was found that the virus isolate is highly pathogenic for laboratory animals: rabbits, guinea pigs and rats. Other transplantable cell lines were sensitive to the virus isolate: Taurus-1 and BHK-21. The nature of the CPP in different cell cultures was the same. The ability to reproduce in the cell culture of the studied virus isolate reached a maximum at passage 4-6 and amounted to 6.81-7.61 lg TCID₅₀ / cm³. The presence of Aujeszky's disease virus is confirmed by bioassay and other laboratory methods, including PCR. The PCR method made it possible to identify the virus genome in virus-containing culture and in organ-tissue material. Nonspecific reactions were not observed. PCR products showed the expected size. The virus-containing material of the Aujeszky's disease virus isolate is used in the study of biological and molecular biological properties.

Keywords: virus isolate, cell culture, reproduction, Aujeszky's disease, cytopathic effect, infectious activity, PCR.

References

1. Bogomolova, O.A. The sensitivity of transplanted cell culture lines of Marc-145 and MA-104 to the isolate of the circovirus infection of pigs / O.A. Bogomolova, I.N. Matveeva, V.M. Popova // Scientific almanac. - 2018. - No. 5-2 (43). - P.166-169.
2. Markova, E.V. The study of the infectious activity of non-cytopathogenic circovirus of pigs of type 2 in the reaction of indirect immunofluorescence / E.V. Markova, I.N. Matveeva, O.A. Bogomolova, O.A. Gadzhimuradov, I.V. Ivanov, V.M. Popova, L.A. Skorokhodova // Scientific almanac. - 2018. - № 7-1 (45) - P. 201-205.
3. Matveeva, I.N. Research of a new nutrient medium for the cultivation of mammalian cells / I.N. Matveeva, V.M. Popova, A.Ya. Samuilenko, A.S. Dyachenko, A.S. Preobrazhenskaya // Technologies of living systems. - 2016. - No. 1. - P. 83-86.

4. Preobrazhenskaya, A.S. The use of PCR to identify the genome of the causative agent of Aujeszky's disease in biological material / A.S. Preobrazhenskaya, I.N. Matveeva, A.S. Dyachenko, V.M. Popova // Veterinary medicine and feeding. - 2014. - № 6. - С. 32.
5. Samuilenko, A.Ya. Selected Works. M.-2013. - 541 p.
6. Fonseca Jr. Molecular epidemiology of Brazilian pseudorabies viral isolates / Jr. Fonseca, A.A. Camargos et al. // Vet. Microbiol. - 2010a. - 141 (3-4). -P. 238-245.
6. Goldberg, T.L. Comparative utility of restriction fragment length polymorphism analysis and gene sequencing to the molecular epidemiological investigation of a viral outbreak / T.L. Goldberg, R.M. Weigel, E.C. Hahn, G. Scherba // Epidemiol. Infect. - 2001. - 126 (3). - P.415-424.
7. Müller, T. Characterization of pseudorabies virus of wild boar origin from Europe / T. Müller, B.G. Klupp, C. Freuling, B. Hoffmann, M. Mojczic, I. Capua, V. Palfi, B. Toma, W. Lutz, F. Ruiz-Fon, C. Gorta'rzar, A. Hlinak, U. Schaarschmidt, K. Zimmer, F.J. Conraths, E.C. Hahn, T.C. Mettenleiter // Epidemiol. Infect. - 2010.-138 (11). - P. 1590-1600.
8. Müller, T. Pseudorabies virus in wild swine: a global perspective / T. Müller, E.C. Hahn, F. Tottewitz, M. Kramer, B.G. Klupp, T.C. Mettenleiter, C. Freuling // Arch.Virol. - 2011. - 156. - P.1691-1705.
9. Steinrigl, A. Detection and molecular characterization of Suid herpesvirus type 1 in Austrian wild boar and hunting dogs / A. Steinrigl, S. Revilla-Fernández, J. Kolodziejek, E. Wodak, Z. Bago, N. Nowotny, F. Schmoll, J. Köfer // Vet. Microbiol. - 2012. - 157 (3-4). - P.276-284.

УДК: 636.085.2:591.1

DOI 10.33632/1998-698X.2020-2-26-31

ВЛИЯНИЕ СУХОГО ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА НА КОНВЕРСИЮ КОРМА И РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ КРЫС

Ндайикенгурукийе Девот – аспирант

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия
ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана»
(420029, г. Казань, Сибирский тракт, 35, e-mail: lady.firaya@bk.ru)

Исследования выполнены на белых крысах линейной принадлежности в условиях вивария ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ в 2019 году. По методу групп-аналогов были сформированы 4 группы: контрольная и I-ая, II-ая, III-я опытные по 5 голов в каждой. Крысам контрольной группы скормили стандартный рацион на основе зернофуража. Крысы I-й, II-й, III-й опытных групп получали основной рацион, в котором соответственно 10, 20 и 30 % зерновой смеси заменяли аналогичным количеством СПП. Ежедневно проводился учет поедаемости кормов. В конце учетного периода опыта проведена декапитация по 3 крысы из каждой группы с целью контроля развития внутренних органов. В ходе исследования установлено, что конверсия кормов у крыс I-й, II-й, III-й опытных групп была выше на 34,1; 22,96 и 14,90% соответственно в сравнении с контрольными животными. Введение СПП в рационы крыс не оказало отрицательного влияния на развитие органов как сердце, легкие, печень, желудок и почки. Существенное влияние СПП отмечено на селезенку в III-й опытной группе. Масса органа на 175,65% была больше, чем у крыс контрольной группы ($P \leq 0,05$).

Ключевые слова: сухой птичий помет (СПП), кормление крыс, конверсия корма, внутренние органы, развитие.

Кормовая база сельскохозяйственных животных и птицы в России характеризуется преобладанием в комбикормах зернофуражных культур (пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы и овса). Эти культуры являются необходимыми в сфере обеспечения питания населения

и занимают основное положение среди продовольственных культур [2,3,4]. Объем поставок заводских комбикормов ежегодно сокращается. Комбикормовая промышленность уже сейчас испытывает дефицит источников протеина, что требует поиска альтернативных ре-

шений обеспечения мясопроизводящих предприятий комбикормами высокого качества с достаточным содержанием протеина. Для решения данной проблемы ученые многих стран мира предлагают использование различных видов нетрадиционных кормов в кормлении животных и птицы [6-14, 18].

Учитывая поголовье птицы у нас в стране и за рубежом, можно предположить масштабы загрязнения окружающей среды отходами жизнедеятельности животных. Использование СПП в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы позволяет решить проблему белкового питания, во-первых, сохранить в чистоте окружающую среду, во-вторых [15,20,18,21]. По результатам научных исследований установлено, что использование СПП в кормлении приводит к повышению продуктивности, снижению затрат кормов на единицу продукции, улучшению качества продукции и уменьшению загрязнения окружающей среды [16,18,19,22].

Однако, в связи с ограниченным количеством публикаций по использованию СПП в качестве кормовой добавки, питательность которого зависит от вида, возраста, технологических решений содержания птицы, способов переработки и обеззараживания, возникла необходимость в дополнительных исследованиях по определению безопасных доз

введения его в рационы, прежде всего лабораторных животных.

Целью исследований являлось изучение влияния СПП на развитие внутренних органов и конверсию корма в организме крыс.

Материал и методы. Лабораторный опыт по введению обеззараженного СПП в рационы крыс проводили в условиях вивария ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ в 2019 году. Для опыта были отобраны 20 белых крыс линейной принадлежности в возрасте 2-х месяцев. Опыт состоял из подготовительного и учетного периодов. В подготовительный период животные адаптировались к условиям опыта, проводили их взвешивание. По окончании периода все животные по принципу пар-аналогов с учетом живой массы были распределены на 4 группы (одну контрольную и три опытные) по 5 голов в каждой. Крысам контрольной группы скармливали основной рацион на основе кормосмеси из зернофуража. В рационы крыс I-й, II-й и III-й опытных групп вводили СПП (10, 20 и 30 % соответственно) взамен аналогичного количества зернофуража.

Обеззараживание птичьего помета проводили на СВЧ - установке. Продолжительность опыта составила 7 недель. Параметры микроклимата и условия содержания для всех подопытных крыс были одинаковыми и соответствовали рекомендациям ВНИТИП.

Таблица 1- Схема опыта на лабораторных животных

Группа	Количество голов	Продолжительность опыта (недель)	Характеристика кормов
Контрольная	5	7	Основной рацион (ОР)
I-я опытная	5	7	ОР + 10 % СПП
II-я опытная	5	7	ОР + 20 % СПП
III-я опытная	5	7	ОР+30 % СПП

Результаты исследований. Конверсия кормов и прирост живой массы являются одними из основных показателей, позволяющих судить об эффективности использования того

или иного корма в кормлении животных. Конверсия кормов у крыс подопытных групп представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Конверсия кормов у крыс за опытный период (n=5)

Группа	Израсходовано корма за учетный период, кг	Валовый прирост живой массы, кг	Расход корма на 1 кг прироста живой массы, кг	В % к контролю
Контрольная	3,58638	0,18725	19,153	100,0
I-я опытная	3,81411	0,30364	12,562	65,99
II-я опытная	4,69845	0,31841	14,756	77,04
III-я опытная	4,10605	0,25159	16,30	85,104

В наших исследованиях конверсия корма у крыс I-й, II-й и III-й опытных групп, получавших СПП 10, 20, 30 % взамен аналогичного количества зернофуража, была на

34,01; 22,96 и 14,90% соответственно выше по сравнению со сверстниками контрольной группы. Масса внутренних органов подопытных крыс представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Масса внутренних органов подопытных крыс, г

Орган	Группа (n=3)			
	Контрольная	I-я опытная	II-я опытная	III-я опытная
Сердце	1,156 ± 0,998	1,05 ± 0,045	1,146 ± 0,075	1,123 ± 0,008
Печень	10,003 ± 0,998	11,013 ± 0,934	11,3967 ± 0,656	9,92 ± 0,38
Легкие	2,206 ± 0,180	2,56 ± 0,297	2,426 ± 0,419	2,22 ± 0,095
Почки	2,063 ± 0,271	1,96 ± 0,19	2,2 ± 0,080	2,116 ± 0,202
Желудок	2,713 ± 0,316	2,466 ± 0,369	2,4 ± 0,081	2,116 ± 0,202
Селезенка	0,643 ± 0,057	0,693 ± 0,1035	0,9633 ± 0,101**	1,777 ± 0,48*

Установлено, что у крыс II-й и III-й опытных групп масса селезенки была на 49,74 ($p \leq 0,005$) и 175,65% ($p \leq 0,05$) больше, чем у крыс контрольной группы. Известно, что селезенка вырабатывает антибактериальные тела, повышающие устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, растворяет и поглощает попадающие в кровь поврежденные эритроциты и бактерии, принимает участие в образовании гемоглобина, в обмене веществ и служит дополнительным резервуаром крови. Наибольшее увеличение размеров селезенки наблюдалось у крыс III-й опытной группы с максимальной дозой введения СПП, что, по-видимому, обусловлено активизацией анти-токсической функции данного органа.

В подтверждении этого, у животных этой группы отмечается в ходе исследования морфологического состава крови повышение содержания лейкоцитов на 53,3 % по сравнению с физиологически обусловленными нормативами. Что касается размеров сердца, почек, желудка, легких и печени, по этим показателям разница между группами недостоверна, а их масса находилась в пределах физиологических норм.

Литература

1. Галимзянов, Р.Ф. Влияние полиферментного препарата «ГЛЮКОЛЮКС-Ф» на организм лабораторных крыс / Р.Ф. Галимзянов // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2015. - С. 35-38.
2. Гладиев, Р.Р. Продуктивные качества двух типов черного африканского страуса / Р.Р. Гладиев, В.И. Косилов, А. В. Папуша // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2015. - № 1 (51). - С. 122–125.
3. Драганова, Н.Г. Кормление животных / Н.Г. Драганова, Н.Г. Макарецца, В.В.Калашников. - М: М: РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева. -2011. - 562с.
4. Кузнецова, Т.С. Экзогенные ферменты расширяют возможности по использованию ржи в комбикормах для птиц / Т. С. Кузнецова // Зоотехния. - 2007. - №3. – С. 30-35.

Таким образом, использование СПП в кормлении крыс в дозе 10 и 20 % взамен зернового корма не оказало негативного влияния на развитие внутренних органов. Использование же СПП взамен 30 % зернофуража способствовало существенному повышению массы селезенки.

Заключение. На основании результатов проведенного эксперимента по изучению введения СПП 10, 20, 30 % в рационы крыс установлено, что:

1 конверсия корма улучшается на 34,1; 22,96 и 14,90% в сравнении со сверстниками контрольной группы;

2 применение СПП 10% и 20% в основном не оказывает отрицательного влияния на развитие внутренних органов как сердце, легкие, печень, желудок, почки;

3 СПП заметное влияние оказывает на развитие селезенки. У крыс II-й группы масса селезенки была увеличена на 49,74 ($p \leq 0,005$), III-й на 175,65% ($p \leq 0,05$) по отношению к показателю контрольных животных;

4 безопасными дозами применения СПП в кормлении крыс являются 10 % и 20 % от общей массы корма.

5. Мошкutelо, И. Нетрадиционные корма в свиноводстве / И. Мошкutelо // Комбикорма. - 2003. - № 6. - С. 49-50.
6. Никитин, А.Ю. Морфобиохимические показатели крови бройлеров при коррекции рациона тритикале и ферментными препаратами Ронозим и Ровабио / А.Ю. Никитин, И.В.Маркова, С.В. Лебедев // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2018.- Т. 101. - № 1. - С. 171-177.
7. Николаев, С.И. Эффективность использования зерен нут и сорго в кормлении кур-несушек промышленного стада / С.И. Николаев, А.К. Карапетян, И. Ю.Даниленко и др. // Известия. - 2018. - № 2 (50). - С. 270-280.
8. Павар, А.Н. Ветеринарно-санитарное обоснование использования сухого куриного помета в кормлении цыплят-бройлеров: автореф. дис. ... канд. вет. наук: 16.00.06 / Павар Авинаш Нанасакет. – Москва, 2001. - 19с.
9. Трещев, В.Г. Пайза в комбикормах для цыплят – бройлеров: автореф. дис. ... канд. с-х. наук: 06.02.02 / Трещев Владимир Григорьевич. - Сергиев Посад, 1997. –22с.
10. Фисинин, В. И Использование нетрадиционных кормов в рационе птицы / В.И Фисинин, И.А. Егоров, Т.Н. Ленкова // Птица и птицепродукты. - 2016. - № 4. - С. 14-17.
11. Фисинин, В. И Новое в кормлении птицы / В.И Фисинин // Птицеводство. - 1993. - № 5. - С. 34-36.
12. Фисинин, В. Тритикале - зерновой корм / В. Фисинин, З. Петрина, Н. Турбин // Птицеводство. - 1990.- № 9.- С. 23-24.
13. Чепрасова, О.В. Использование нетрадиционных кормов в рационах сельскохозяйственной птицы / О.В. Чепрасова, М.В. Кондрашова // Известия Нижегородского агроуниверситетского комплекса. - 2014. - № 2 (34). - С. 89-93.
14. Черных, Р.Н. Мука из семян проса и амаранта в комбикормах для цыплят-бройлеров / Р.Н. Черных, В.А Пепелина // Зоотехния. - 1996. - № 12. - С. 16-17.
15. El Boushy, A.R.Y. Poultry Feed from waste – Processing and use / A.R.Y. El Boushy, A.F.B. Van der Poel // Springer (eBook).-2012.
16. Ghaly, A.E. Drying of poultry manure for use as animal feed / A.E. Ghaly, K. N. Mac Donald // American Journal of Agricultural and Biological Sciences. - 2012. - 7(3). – P.239-254.
17. Gihad, E.A. Value of dried poultry manure and urea as protein supplements for sheep consuming low quality tropical hay / E.A. Gihad // Journal of Animal Science. - 1976. - 42 (3). – P.706-709.
18. Henuk, Y.L. Poultry manure: source of fertilizer, fuel and feed / Y.L. Henuk, J.G. Dingle // World's poultry science journal. – 2003. - 59 (3). – P.350-360.
19. Lanyasunya, T.P. Factor limiting use of poultry manure as protein supplement for dairy cattle on smallholder farms in Kenya / T.P. Lanyasunya, W.H Rong, S.A. Abdulrqzak, P.K. Kaburu, J.O. Makori, T. A. Onyango, D.M. Mwangi // Int.J. Poult.Sci. - 2006. - 5 (3). – P. 75-80.
20. Ravindran, V. Feed resources for poultry production in Asia and the Pacific. III. Animal protein sources / V. Ravindran, R. Blair // Word's Poultry Science Journal. - 1993. - Vol. 49. - P. 220 -235.
21. William, C.M. Management and utilisation of poultry wastes / C.M. William // Reviews of Environmental Contamination and Toxicology. – 1999. - Vol.162. – P.105-157.

THE EFFECT OF DRY POULTRY MANURE ON FEED CONVERSION AND DEVELOPMENT OF INTERNAL ORGANS RATS

Ndayikengurukiye Devote – Postgraduate

FSBEI of HE «Kazan State Academy
Veterinary medicine named after N.E. Bauman»
(420029, Kazan, Siberian tract, 35, e-mail: lady.firaya@bk.ru)

The studies were carried on white rats in the conditions of veterinary experimental laboratory of Kazan Veterinary Medicine University in 2019. Four groups of 5 rats were formed. The rats of the control group were fed a standard diet based on a wheat-barley mixture. The rats of the 1st, 2nd and 3rd experimental groups received the main diet, in which respectively 10, 20, and 30% of the grain mixture were proportionally replaced by dry poultry manure. Every day was taken into account food intake. At the end of

the experiment, 3 rats from each group were killed in order to study the development of internal organs. The experimental results showed that for the rats from the 1st, 2nd and 3rd experimental groups, the conversion of feed into meat was respectively 34.1, 22.96 and 14.90 % Higher, in comparison with the analogs of the control group. The use of dry poultry manure in rats feeding did not negatively affect development of their heart, liver, kidneys and stomach. The spleen mass for the rats of 2nd and 3rd experimental groups respectively increased by 49.7435 ($P \leq 0.005$) and 175.65% ($P \leq 0.05$), in comparison with the analogs of the control group.

Keywords: poultry manure, rats feeding, feed conversion, internal organs, development.

References

1. Galimzyanov, R.F. Influence of the multienzyme preparation "Glucolux-F" on the organism of laboratory rats / R.F. Galimzyanov // Scientific notes of Kazan State Academy of Veterinary Medicine named after N.E. Bauman. - 2015. - P.35-38.
2. Gladiev, R.R. Productive qualities of two types of black African ostrich / R.R. Gadiev, V.I. Kosilov, A.V. Papusha // Bulletin of the Orenburg State Agrarian University.- 2015.- No. 1 (51) .- P. 122–125.
3. Draganova, N.G. Feeding animals / N.G. Draganova, N.G. Makartseva, V.V. Kalashnikov. - M: M: RGAU- Moscow Artists Academy named after K.A. Timiryazev.-2011. – 562p.
4. Kuznetsova, T.S. Exogenous enzymes expand the possibilities for the use of rye in animal feed for birds / T. S. Kuznetsova // Zootechny. - 2007. - No. 3. – P. 30-35.
5. Moshkutelo, I. Non-traditional feed in pig farming / I. Moshkutelo // Compound feed. - 2003. - No. 6. - P. 49-50.
6. Nikitin, A.Yu. Morphobiochemical parameters of broiler blood during the correction of the diet of triticale and enzyme preparations Ronozim and Rovabio / A.Yu. Nikitin, I.V. Markova, S.V. Lebedev // Scientific notes of Kazan State Academy of Veterinary Medicine named after N.E. Bauman. - 2018. - T. 101. - No. 1. - P. 171-177.
7. Nikolaev, S.I. The effectiveness of the use of chickpeas and sorghum grains in feeding laying hens of an industrial herd / S.I. Nikolaev, A.K. Karapetyan, I. Yu. Danilenko and others // News. - 2018. - No. 2 (50). - P. 270-280.
8. Pavar, A.N. Veterinary-sanitary substantiation of the use of dry chicken litter in feeding broiler chickens: abstract. dis. ... cand. vet. Sciences: 16.00.06 / Pavar Avinash Nanasakhet. - Moscow, 2001. - 19s.
9. Treschev, V.G. Paiza in mixed feed for broiler chickens: abstract dis. ... cand. s. sciences: 06.02.02 / Treschev Vladimir Grigorevich. - Sergiev Posad, 1997. –22p.
10. Fisinin, V.I. Use of unconventional feed in the diet of poultry / V.I. Fisinin, I.A. Egorov, T.N. Lenkova // Poultry and poultry products. - 2016. - No. 4. - P. 14-17.
11. Fisinin, V.I. New in poultry feeding / V.I. Fisinin // Poultry farming. - 1993. - No. 5. - P. 34-36.
12. Fisinin, V. Triticale - grain feed / V. Fisinin, Z. Petrina, N. Turbin // Poultry farming. - 1990. - No. 9.- P. 23-24.
13. Cheprasova, O.V. The use of unconventional feed in the diets of poultry / O.V. Cheprasova, M.V. Kondrashova // Bulletin of the Lower Volga Agro-University Complex. - 2014. - No. 2 (34). - P. 89-93.
14. Chernykh, R.N. Flour from millet and amaranth seeds in compound feeds for broiler chickens / R.N. Chernykh, V.A. Pepelin // Zootechnics. - 1996. - No. 12. - P. 16-17.
15. El Boushy, A.R.Y. Poultry Feed from waste - Processing and use / A.R.Y. El Boushy, A.F.B. Van der Poel // Springer (eBook).- 2012.
16. Ghaly, A.E. Drying of poultry manure for use as animal feed / A.E. Ghaly, K. N. Mac Donald // American Journal of Agricultural and Biological Sciences. – 2012. - 7 (3). - P. 239-254.
17. Gihad, E.A. Value of dried poultry manure and urea as protein supplements for sheep consuming low quality tropical hay / E.A. Gihad // Journal of Animal Science. - 1976. - 42 (3). - P. 706-709.
18. Henuk, Y.L. Poultry manure: source of fertilizer, fuel and feed / Y.L. Henuk, J.G. Dingle // World's poultry science journal. - 2003. - 59 (3). - P. 350-360.
19. Lanyasunya, T.P. Factor limiting use of poultry manure as protein supplement for dairy cattle on smallholder farms in Kenya / T.R. Lanyasunya, W.H. Rong, S.A. Abdulrqzak, P.K. Kaburu, J.O. Makori, T. A. Onyango, D.M. Mwangi // Int.J. Poult.Sci. - 2006. - 5 (3). – P.75-80.

20. Ravindran, V. Feed resources for poultry production in Asia and the Pacific. III. Animal protein sources / V. Ravindran, R. Blair // Word's Poultry Science Journal. - 1993. - Vol. 49. - P. 220 -235.
21. William, C.M. Management and utilization of poultry wastes / C.M. William // Reviews of Environmental Contamination and Toxicology. - 1999. - Vol. 162. - P. 105-157.

УДК: 619:616.33-002

DOI 10.33632/1998-698X.2020-2-31-38

ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ЯЗВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА СВИНЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ МИКОТОКСИНОВ И КОЛОНИЗАЦИЕЙ БАКТЕРИЯМИ РОДА *HELICOBACTER*

¹Нурғалиев Ф.М. – кандидат ветеринарных наук, доцент, ²Семенов Э.И. – кандидат биологических наук, ³Поздеев О.К. – доктор медицинских наук, профессор, ¹Софронов П.В. – кандидат биологических наук

¹ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана»
(420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 35; e-mail: nurgalievfm@gmail.com)

²ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности»
(420075, г.Казань, Научный городок-2; e-mail: semyonovei@bk.ru)

³Казанская государственная медицинская академия
- филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
(420012 г. Казань ул. Бутлерова, 36; e-mail: ksma.rf@tatar.ru).

Проведено изучение поражения слизистой оболочки желудка и наличия бактерий рода *Helicobacter* желудка свиней на фоне контаминации рациона микотоксинами. Были сформированы 2 группы животных, по 4 боровка в каждой. Животных первой группы – кормили полнорационным комбикормом с добавлением микотоксинов (Т-2 токсин 200 мкг/кг, зеараленон 1 мг/кг, дезоксиниваленон 0,5 мг/кг корма). Животных второй группы кормили полнорационным комбикормом без добавления микотоксинов. Продолжительность эксперимента составила 60 суток. Для исследования были отобраны образцы с безжелезистого, кардиального, фундального и пилорического отделов желудка каждой свиньи. Данные образцы были подвергнуты макроскопическим, гистологическим, биохимическим, микробиологическим и молекулярно-генетическим исследованиям. Установлено, что при потреблении свиньями рациона с микотоксинами, возникает больший риск возникновения язвы желудка. Нами выявлена зависимость между наличием микотоксинов в кормах и обнаружением *H. suis* у свиней. В группе животных, получавших корма с добавлением микотоксинов хеликобактеры были обнаружены у 100%, тогда как в контроле факт колонизации слизистой оболочки желудка (СОЖ) был установлен у 75% животных. Можно полагать, что длительное поступление микотоксинов индуцирует развитие атрофических процессов в СОЖ, облегчает её колонизацию микроорганизмами, включая хеликобактеры, тем самым создавая предпосылки для развития язвенных процессов в СОЖ.

Ключевые слова: *Helicobacter suis*, микотоксины, свиньи, уреазная проба, лабораторная диагностика.

В свиноводстве в 2018 году наблюдались высокие темпы прироста производства продукции – оценочно, на уровне более 9%, и тенденция увеличения объемов продукции сохранялась в 2019-м. Благодаря планируемым денежным инвестициям из госбюджета в размере 300 миллиардов рублей прогнозируется

увеличение поголовья животных и мясной продукции на 80-100% [8]. Необходимо отметить, что производство свинины в личных подсобных хозяйствах, прежде достаточно стабильное по объемам значительно снижается. По данным Национального Союза Свиноводов для достижения прироста мясо-сырьевого сек-

тора вдвое необходимо модернизировать свиноводческие комплексы, совершенствовать инфраструктуру производства [7].

По мнению ряда специалистов большее увеличение поголовья скота может отразиться не на эффективности производства, а скорее ухудшит экологическую ситуацию в регионах. Поэтому необходимо интенсифицировать работу в свиноводческой отрасли с привлечением специалистов занимающихся наукой [1, 4]. Так, например, в британском Университете Лидса создали национальный центр исследований свиней, для основания центра было инвестировано 11000000 фунтов. Центр, в частности, будет специализироваться на исследовании поведения свиней, селекции с более крепким здоровьем кишечника и улучшенной устойчивостью к болезням, уменьшение использования антибиотиков в отрасли, производственных систем свиноводства и других задачах [3].

По мере организации эффективных систем и методов борьбы с одними заболеваниями в крупных свиноводческих хозяйствах промышленного типа важное значение приобретают другие. Меняются взгляды на природу заболеваний желудочно-кишечного тракта свиней, например, ушёл в историю такой собирательный нозологический термин, как «гастроэнтерит поросят». В последние годы широкое распространение получило заболевание - язвенная болезнь желудка свиней, которая приводит к гибели, вынужденному убою, недополучению привеса. Она сопровождается поражением желудка в виде гиперкератоза, эрозий и язв. Заболевание может возникать в любом возрасте, но чаще всего поражаются свиньи в убойном возрасте и свиноматки во время опороса [13, 20].

Несмотря на то, что течение данного заболевания часто бывает субклиническим, вопросы здоровья животных, экономические потери из-за снижения суточного привеса массы тела, снижение потребления корма и внезапной смерти имеют большое значение. В настоящее время это распространенное заболевание свиней во всем мире с преобладанием до 93% [13, 15]. В ходе исследования в Бельгии были обнаружены язвы желудка и/или сильные эрозии у 60% забитых свиней откормочного возраста и 97 % у свиноматок [20].

Распространенность и тяжесть поражений могут сильно различаться в работах исследователей. Причина этого, как мы думаем, может быть скрыта в многофакторной этиоло-

гии язвенной болезни свиней. Например, в своих работах исследователи указывают, что язвенную болезнь желудка свиней вызывают такие факторы как рацион, размер частиц корма, наличие токсикантов как природного, так и техногенного происхождения в кормах, состав микрофлоры желудка и инфицирование хеликобактериями [6, 11, 12].

Однако патогенез язвенной болезни желудка у свиней в значительной мере не изучен. Интересным представляется изучение действия микотоксинов в кормах на слизистую оболочку и изменение микрофлоры желудка свиней.

Среди природных токсинов наиболее распространенными и опасными являются микотоксины, вырабатываемые микроскопическими грибами. Микотоксины часто образуются на зерне и других кормах в районах с умеренным климатом, где преобладает высокая влажность и прохладная температура, особенно в случаях несоблюдения сроков уборки зерна и при недостаточной его сушке [9]. Протекают эти микотоксикозы чаще хронически и скрыто. Трихотеценовые микотоксины вызывают эпидермальный некроз, рвоту, язвенные поражения в ротовой полости, пищеводе, рубце, сычуге или желудке, кишечнике, диарею, увеличение времени свертываемости крови, геморрагии, отеки, гематопозитическую депрессию, лейкопению, тахикардию, отказ от корма, нарушение нервной деятельности, ослабление иммунных сил организма животного [10].

Некоторые трихотеценовые микотоксины, такие как токсины DON и T-2, могут непосредственно повреждать ткани слизистой оболочки путем нарушения эпителиального барьера кишечника и впоследствии облегчать транслокацию микробиоты кишечника и патогенов. В частности, нарушенные слизистые белки и гибель эпителиальных клеток из-за микотоксинов могут объяснять нарушение целостности эпителиального барьера, что, в свою очередь, усиливает бактериальные или вирусные патогенные инфекции и последующие воспалительные реакции [2, 18].

Хотя литература о микотоксинах богата сообщениями о расследовании клеточных механизмов, клеточной токсичности, связанной патологии и характеристик животных, исследования влияния этих соединений на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и кишечного микробиоценоза ограничены. Учитывая начальное взаимодействие микотоксинов с

эпителием кишечника, эта тема приобрела значительный исследовательский интерес в последнее десятилетие.

Ряд авторов указывает, что у свиней определенную роль в патогенезе язвенной болезни желудка играют бактерии *Helicobacter suis*, которые вызывают гиперкератоз, эрозии и образование язв [13, 20, 21]. В настоящее время общепринято мнение, что большинство гастродуоденальных язв у человека связаны с *Helicobacter pylori*. Данный микроорганизм вызывает развитие хронического активного гастрита, что может привести к язвенной болезни, атрофическому гастриту, аденокарциноме желудка или MALT-лимфоме желудка. В наши дни общепринята точка зрения, согласно которой *Helicobacter pylori* является главным фактором риска формирования хронического гастрита и триггером, запускающим в желудке острый воспалительный процесс у человека [5]. Также необходимо отметить, что у человека наиболее распространенным видом хеликобактерий после *H. pylori* является *H. suis*, который также вызывает заболевания ЖКТ у людей [5, 21].

Влияние на здоровье свиней, экономические потери для промышленного свиноводства и зоонозное значение бактерий рода *Helicobacter* обосновывают необходимость исследования этого микроорганизма.

Целью нашей работы было изучение характера поражений слизистой оболочки желудка свиней, обусловленных колонизацией бактериями рода *Helicobacter* на фоне контаминации кормов микотоксинами.

Материал и методы. Работа выполнена на кафедре микробиологии и лаборатории иммунологии и биотехнологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, и отделе токсикологии ФГБНУ «ФЦТРБ ВНИВИ».

Были сформированы 2 группы животных – поросят отъемышей, по принципу аналогов (происхождение, живая масса). В каждой группе находились 4 боровка, на начало опыта возраст которых составлял 70 дней. Карантинная выдержка длилась 10 суток. Животных первой группы – кормили полнорационным комбикормом в соответствии с нормами кормления при свободном доступе к питьевой воде с добавлением микотоксинов (Т-2 токсин 200 мкг/кг, зеараленон 1 мг/кг, дезоксиниваленон 0,5 мг/кг корма). Микотоксины вводили в комбикорм путем последовательного и ступенчатого тщательного перемешивания. Животных второй группы кормили полнорацион-

ным комбикормом без добавления микотоксинов. Продолжительность эксперимента составила 60 суток.

В конце эксперимента провели убой животных и проведена аутопсия. Желудок был извлечен и вскрыт вдоль большой кривизны желудка. После удаления содержимого желудка слизистую промывали стерильным физиологическим раствором и обследовали макроскопически. Характер поражений оценивали по шкале от 0 до 5 по методике предложенной J.J.C. Hensing [15], где: 0 = слизистая оболочка без нарушений, 1 = легкий гиперкератоз, занимающий менее 50% поверхности, 2 = тяжелый гиперкератоз, занимающий более 50% процентов поверхности, 3 = гиперкератоз и небольшое количество эрозий (менее 2.5 см и количеством не более 5), 4 = гиперкератоз и интенсивная эрозия (более 2.5 см и количеством более 5) и 5 = гиперкератоз и обширные эрозийные поражения (более 10 поражений и более 5 см) или изъязвления.

Для исследований у каждого животного отбирали образцы слизистой оболочки желудка (СОЖ) из безжелезистого, кардиального, фундального и пилорического отделов. Образцы были исследованы биохимическими, микробиологическими и молекулярно-генетическими методами.

Факт колонизации СОЖ свиней хеликобактерами подтверждали изучением мазков-отпечатков, которые готовили в первые 10 минут после убоя.

Уровни обсеменения СОЖ свиней хеликобактериями изучали в уреазном тесте, оценивая скорость изменения окраски раствора. *H. suis* продуцирует уреазу, которая расщепляет мочевины до аммиака и диоксида углерода. Быстрый уреазный тест регистрирует изменение pH среды. Биопсийный материал (0,01 г) погружали в 1 мл быстрого уреазного теста, выдерживали при температуре 37 °С, учет изменения окраски проводили через 30 минут, 1, 3 и 24 часа.

Молекулярно-генетическую идентификацию хеликобактеров проводили методом ПЦР в образцах СОЖ, отобранных из упомянутых отделов желудка свиней. Выделение ДНК из образцов проводили с использованием коммерческого набора реагентов «ДНК-СОРБЕНТ» производства ООО НПФ «Литех». Биоптаты слизистой оболочки желудков обрабатывали лизирующим раствором в течение 6 часов, инкубируя при 55 °С. В качестве отрицательного контроля использовали стериль-

ный физраствор. Образцы ДНК были заморожены при температуре -20°C до последующих анализов.

Родоспецифичную амплификацию хеликобактерий проводили, используя праймеры С97 GCTATGACGGGTATCC и С98 GATTTTACCCCTACACCA. Для амплификации готовили реактив по методике, предложенной М. Rocha. Для приготовления реакционной смеси использовали на одну пробу: дистиллированную воду - 12,61 мкл, диоксинуклеозидтрифосфатов - 2 мкл, реакционный буфер - 2 мкл, праймер С97 - 0,57 мкл, праймер С98 - 0,62 мкл и Taq-полимеразу - 0,2 мкл. Общий объём реакционной смеси вместе с исследуемым ДНК образцом составил 20 мкл.

Образцы ДНК, имеющие положительный результат в специфичной ПЦР для рода *Helicobacter*, подвергли видоспецифической ПЦР с целью детекции двух видов хеликобактеров *H. suis* и *H. pylori*.

Детекция *H. suis*. Определяемыми фрагментами ДНК являлись гомологичные участки гена 16S рДНК *H. suis* размером 433 п.о. Видоспецифическую ПЦР проводили с применением праймеров V832f TTGG-GAGGCTTTGTCTTTCCA и V1261r GATTAGCTCTGCCTCGCGGCT предложенных Dominic De Groote и соавт. по следующей программе: 94°C – 4 минуты; 94°C – 30 сек,

60°C – 60 сек, 72°C – 10 сек в течение 40 циклов.

Детекция *H. pylori*. Определяли фрагменты ДНК *H. pylori* набором реагентов «ХЕЛИКОПОЛ» производства ООО НПФ «Литех» согласно методике, предложенной производителем набора.

Амплифицированные продукты анализировали электрофорезом на 2% агарозном геле в буфере TBE, pH 8,4 (89 мМ Tris; 89 мМ борной кислоты; 2 мМ ЭДТА), окрашенный бромидом этидия (0,5 мкг/мл) и визуализированный в УФ-свете. В случае обнаружения ДНК бактерий рода *Helicobacter*, проводили межвидовую дифференцировку.

Материал для гистологических исследований фиксировали в буферном растворе 10%-го формалина. После обезвоживания, уплотнения взятого материала и приготовления блоков делали гистологические срезы толщиной 8 мкм. Окрашенные гематоксилин-эозином гистологические препараты изучали в светооптическом микроскопе (OLIMPUS CX31), оценивая изменения структуры органов и тканей, накладывая окуляр-насадку (МОВ-1-15х) и окуляр сетку.

Результаты исследований. Изначально каждый желудок был макроскопически исследован на наличие язвенных поражений (рис.1).

Рисунок 1 - Внешний вид СОЖ свиньи: Б – СОЖ здорового желудка свиньи; В – СОЖ свиньи с гиперкератозом и обширной эрозией (1 - cardia, 2 - pars cardiaca, 3 - curvature ventriculi majus, 4 - curvature ventriculi minus, 5 - pylorus, 6 - corpus ventriculi, 7 - diverticulum ventriculi, 8 - pars nonglandularis, 9 - gl. cardiae, 10 - gl. gastricae, 11 - gl. pyloricae; 12 - гиперкератоз и обширные эрозии).

Поражения слизистой желудка были выявлены во всех группах, показатели по шкале изъязвлений у животных в каждом эксперименте представлены в таблице 1. В первой группе во всех желудках нами были обнаружены изменения, характерные для 5 баллов; во

второй группе в 1 желудке изменений обнаружено не было, в 1 желудке характеризовался на 1 балл и в двух желудках на 2 балла. У 1 группы поросят, получавших корм с токсинами были обнаружены наиболее обширные поражения.

Таблица 1 - Макроскопическая картина слизистой оболочки желудков свиней

Группа животных	Макроскопический подсчет баллов по шкале поражений*					
	0	1	2	3	4	5
1 группа	—	—	—	—	—	4
2 группа	1	1	2	—	—	—

* Оценка поражений слизистой оболочки желудка по шкале от 0 до 5 [Hessing et al., 1992]

Результаты исследования биоптатов
Сю-теста производили через 30 минут, 1 час, 3

часа и 24 часа. Результаты представлены в
таблице 2.

Таблица 2 - Результаты уреазного теста и микроскопии мазков-отпечатков

№ группы	Материал для исследования взятый из отдела желудка	Сю-тест				Микроскопия
		30 минут	1 час	3	24	
1 группа	Безжелезистый	—	—	—	—	0
	Кардиальный	—	—	2	4	2
	Фундальный	4	4	4	4	4
	Пилорический	4	4	4	4	4
2 группа	Безжелезистый	—	—	—	2	0
	Кардиальный	—	—	—	4	1
	Фундальный	1	4	4	4	4
	Пилорический	4	4	4	4	4

Для исследований микроскопическим методом были изготовлены мазки-отпечатки безжелезистой части, слизистой кардиального, фундального и пилорического отделов желудка. В мазках-отпечатках на фоне окрашенной слизи обнаружили бледноокрашенные кокковидные, реже изогнутые и спиралевидные граммотрицательные палочки, диаметром от 0,2 до 0,8 мкм и длиной от 2 до 5 мкм. При культивировании исследуемого материала на селективных специальных питательных средах выделить микроорганизмы не удалось.

При ПЦР-исследовании образцов слизистой желудка свиней, отобранных у 8 голов, реакция С97/С98 выявила ДНК бактерий рода *Helicobacter* в 7 случаях, а именно в первой

группе у всех поросят, во второй группе у трех поросят.

Положительные в отношении бактерий рода *Helicobacter* образцы ДНК от 10 животных были протестированы с помощью видоспецифических праймеров *H. suis* и *H. pylori*. Во всех 7 случаях образцы были позитивными в отношении гена 16S рДНК *H. suis*. Все образцы в отношении генов ДНК *H. pylori* были негативными.

При гистологическом исследовании препаратов были выявлены изменения структуры СОЖ. Под влиянием микотоксинов у группы №1 наблюдали дистрофические изменения и признаки некроза секреторных клеток и лимфоидную инфильтрацию (рис. 2).

Рисунок 2 - Слизистая желудка, 1 группа, токсичный рацион, окраска гематоксилином Эрлиха, эозином водным, объектив x20.

Поражения СОЖ оказывало существенное влияние на продуктивность животных. При сравнении среднесуточного привеса поросят, между группами выявлено существенное различие. Прирост массы тела в первой группе (токсический контроль) был на 22,7% ($p<0,05$) меньше, чем во второй группе (биологический контроль).

Заключение. Известно, что длительное попадание микотоксинов в желудочно-кишечный тракт способствует развитию язвенных поражений СОЖ животных, обусловленных рядом патологических механизмов [19,20,21]. Нами выявлена

зависимость между наличием микотоксинов в кормах и обнаружением *H. suis* у свиней. В группе животных, получавших корма с добавлением микотоксинов хеликобактеры были обнаружены у 100%, тогда как в контроле факт колонизации СОЖ был установлен у 75% животных.

Можно полагать, что длительное поступление микотоксинов индуцирует развитие атрофических процессов в СОЖ, облегчает её колонизацию микроорганизмами, включая хеликобактеры, тем самым создавая предпосылки для развития язвенных процессов в СОЖ.

Литература

1. Бирюкова, А.В. Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 г. – новая экономическая реальность. Как сохранить конкурентные преимущества? / А.В. Бирюкова // X-е годовое общее собрание Национального Союза Свинозаводов. Свинозаводство-2019. Глобальные вызовы 2020 года: сумеем ли мы найти ответы? – Москва – 2019.
2. Борутова, Р. Микотоксины – входные ворота для инфекции / Р.Борутова, О. Аверкиева // Свинозаводство – 2016. – №2. – С.16 – 17.
3. В Британии создали Национальный центр исследования свиней. Режим доступа: <https://meatinfo.ru/news/v-britanii-sozdali-natsionalniy-tsentr-issledovaniya-sviney-403039>. – 4.02.2020.
4. Войтек, Б. Рацион здоровых свиней: управление ингредиентами как альтернатива кормовым антибиотикам / Б. Войтек // X-е годовое общее собрание Национального Союза Свинозаводов. Свинозаводство-2019. Глобальные вызовы 2020 года: сумеем ли мы найти ответы? – Москва. – 2019 г.
5. Голубкина, Е.В. Некоторые эпидемиологические аспекты хеликобактериоза / Е.В. Голубкина, Б.Н. Левитан, А.Р. Умерова, и др. // Астраханский медицинский журнал. – 2018. –Т. 13, № 2. – стр. 6-16
6. Дерезина, Т.Н. Этиопатогенетические аспекты язвенной болезни желудка у свиней в условиях ООО «РС Развильное» Песчанокосовского района Ростовской области / Т.Н. Дерезина, Т.М. Ушакова // Вестник Донского государственного аграрного университета. – 2017. – № 1(23.1). – С. 11-15.
7. Ковалев, Ю.И. Отчет о деятельности Национального Союза свиноводов за 2018 год. Войти в ТОП- 5 мировых экспортеров свинины: миф или реальность? / Ю.И. Ковалев // X-е годовое общее собрание Национального Союза Свинозаводов. Свинозаводство-2019. Глобальные вызовы 2020 года: сумеем ли мы найти ответы? – Москва. – 2019 г.
8. Костенко, О.В. Свинозаводство России: основные экономические характеристики отрасли / О.В. Костенко // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. –2019. – Т. 20., № 3. – С. 290-297.
9. Матросова, Л.Е. Мониторинг микроскопических грибов в сельскохозяйственной продукции Республики Татарстан / Л.Е. Матросова, О.К. Ермолаева, А.А. Иванов // Ветеринарный врач. - 2009. - № 3. - С. 52 – 53
10. Микотоксины (в пищевой цепи): монография / К.Х.Папуниди, М.Я.Тремасов, В.И. Фисинин [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Казань: ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», 2017. – 188с.
11. Папуниди, К.Х. Кормовые отравления и токсикоинфекции животных: монография / К.Х. Папуниди, А.И. Никитин, Э.И. Семёнов и др. – Казань: ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», 2018. – 212 с.
12. Язвенная болезнь желудка свиней. Режим доступа: https://piginfo.ru/disease/?ELEMENT_ID=5546&sphrase_id=8628. – 4.02.2020.
13. An experimental *Helicobacter suis* infection causes gastritis and reduced daily weight gain in pigs / Ellen De Bruyne [et al] // Veterinary Microbiology – 2012. – №160. – P. 449-454.

14. Apoptotic and proliferative activity of mouse gastric mucosa following oral administration of fumonisin B1 / Ali Mohammad Alizadeh [et al.] // Iran J Basic Med Sci. – 2015. – Vol. 18, №. 1 – P. 8-12.
15. Association between Helicobacter and gastric ulcer disease of the pars esophagea in swine. / Queiroz, D.M.D. [et al.] // Gastroenterology. – 1996. – Vol. 18, №. 1. – P. 19-27.
16. Changes in the mucous membrane of the pars oesophageal part of the stomach – prevalence and relations to stress / Hessing, J.J.C., et al. // Tijdschr. Diergeneesk. – 1992. – Vol. 117. – P. 445–450.
17. Long-term administration of the fungus toxin, sterigmatocystin, induces intestinal metaplasia and increases the proliferative activity of PCNA, p53, and MDM2 in the gastric mucosa of aged Mongolian gerbils / Masahiro Kusunoki [et al.] // Environ Health Prev Med. – 2011. – Vol. 16(4). – P. 224–231.
18. Pinton, P. Effect of Deoxynivalenol and Other Type B Trichothecenes on the Intestine: A Review / Pinton, P.; Oswald, I. // Toxins (Basel). – 2014. – Vol. 6, – P. 1615–1643.
19. The Expression of Type-1 and Type-2 Nitric Oxide Synthase in Selected Tissues of the Gastrointestinal Tract during Mixed Mycotoxicosis / Magdalena Gajęcka [et al.] // Toxins (Basel). – 2013. – Vol. 5(11). – P. 2281–2292.
20. The role of infectious agents in the development of porcine gastric ulceration / C. De Witte [et al.] // The Veterinary Journal. – 2018. – Vol. 236. – P. 56-61.
21. Ultrastructural and molecular characterization of non-Helicobacter pylori species in the gastric mucosa of naturally infected pigs / Letícia Y. Buck [et al.] // Brazilian Journal of Veterinary Pathology. – 2018. – Vol. 11(2). – P. 42-49.

GASTRIC ULCER IN PIGS AND CHANGES IN THE NUMBER OF BACTERIA OF THE GENUS HELICOBACTER UNDER THE MYCOTOXINS INFLUENCE

¹Nurgaliev F.M. – Candidate of Veterinary Sciences, ²Semenov E. I. - Candidate of Biological Sciences, ³Pozdeev O.K. – Doctor of Medical Sciences, professor, ¹Sofronov P.V. - Candidate of Biological Sciences

¹ FSBEI of HE "Kazan State Academy
Veterinary medicine named after N.E. Bauman
(420029, Kazan, Sibirsky Trakt St., 35; e-mail: nurgalievfm@gmail.com)
² Federal State Budgetary Scientific Institution Federal Center for Toxicology,
Radiation and Biological safety "
(420075, Kazan, Scientific Town-2; e-mail: semyonovei@bk.ru)
³ Kazan State Medical Academy
- Branch of FSBEI DPO "Russian Medical Academy
Continuing professional education»
(360012 Kazan, Butlerova St., 36; e-mail: ksma.rf@tatar.ru).

The study of the lesion of the gastric mucosa and the presence of bacteria of the genus Helicobacter in the pig's stomach against the ration contamination with mycotoxins was conducted. 2 groups of animals were formed, 4 boars in each. The animals of the first group were fed with complete feed with the addition of mycotoxins (T-2 toxin 200 µg, zearalenone 1 mg / kg, deoxynivalenol 0.5 mg / kg feed). The animals of the second group were fed with complete feed without the addition of mycotoxins. The duration of the experiment was 60 days. For the study, samples were taken from the iron-free, cardiac, fundal and pyloric stomachs of each pig. These samples were underwent to macroscopic, histological, biochemical, microbiological and molecular genetic studies. It was found that the consumption of a diet with mycotoxins by pigs causes a greater risk for stomach ulcers. We have found the dependence between the presence of mycotoxins in the feed and detection H. Suis in pigs. We have found H. Sui in 100% of cases in animals that were feed with the addition of mycotoxins. However, in control animal group the fact of H.suis colonization of gastric mucosa was found in 75% of cases. It can be assumed that the long receipt of mycotoxins induces subsequent progression of gastric mucosa atrophy and facilitate the process of colonization with microorganisms including H. Sui. It creates prerequisites for the progression of gastric mucosa ulcerative process.

Keywords: helicobacter Suis, mycotoxins, pigs, urease test, laboratory diagnostics.

References

1. Biryukova, A.V. Strategies for preventing the spread of antimicrobial resistance in the Russian Federation for the period until 2030 are a new economic reality. How to maintain competitive advantage? / A.V. Biryukova// X-th annual general meeting of the National Union of Pig Breeders. Pig production 2019. 2020 Global Challenges: Can We Find The Answers? Moscow June 27, 2019
2. Borutova, R. Mycotoxins - the entry gate for infection/ R.Borutova, O. Averkieva// Pig Production – 2016. - №2. – P.16-17.
3. In Britain, created a national center for the study of pigs. Access mode: <https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmeatinfo.ru%2Fnews%2Fv-britanii-sozdali-natsionalniy-tsentr-issledovaniya-sviney-403039-4.02.2020>.
4. Voitek, B. Healthy pig diet: managing ingredients as an alternative to feed antibiotics/ B.Voitek// X-th annual general meeting of the National Union of Pig Breeders. Pig production 2019. 2020 Global Challenges: Can We Find The Answers? Moscow June 27, 2019
5. Golubkina, E.V. Some epidemiological aspects of helicobacteriosis/ E.V.Golubkina,B.N.Levitan, A.R.Umerova, and others.//Astrakhan Medical Journal Volume 13, No. 2, 2018, pp. 6–16
6. Derzina, T.N. Etiopathogenetic aspects of gastric ulcer in pigs under the conditions of OOO RS Razvilnoye, Peschanokopsky District, Rostov Region/ T.N.Derzina, T.M. Ushakova//Bulletin of the Don State Agrarian University. - 2017. - No. 1 (23.1). - pp. 11-15.
7. Kovalev, Yu.I. Report on the activities of the National Union of Pig Breeders for 2018. Enter the TOP 5 world pork exporters: myth or reality? / Yu.I. Kovalev // X-th annual general meeting of the National Union of Pig Breeders. Pig production 2019. 2020 Global Challenges: Can We Find The Answers? Moscow June 27, 2019
8. Kostenko, O.V. Pig production in Russia: the main economic characteristics of the industry / O.V. Kostenko // Agricultural science of the Euro-North-East. 2019.Vol. 20. No. 3. pp. 290-297.
9. Matrosova, L.E. Monitoring of microscopic fungi in agricultural products of the Republic of Tatarstan / L.E. Matrosova, O.K. Ermolaeva, A.A. Ivanov // Veterinarian. - 2009. - No. 3. - pp. 52 – 53
10. Mycotoxins (in the food chain): monograph / K.Kh. Papunidi, M.Ya. Tremasov, V.I. Fisinin [et al.]. - 2nd ed., Revised. and add. - Kazan: Federal State Budgetary Institution "FTsTRB-VNIVI", 2017. – 188pp.
11. Papunidi, K.Kh. Feed poisoning and toxicoinfection of animals: monograph / K.Kh. Papunidi, A.I. Nikitin, E.I. Semenov et al. - Kazan: Federal State Budgetary Institution "FTsTRB-VNIVI", 2018. - 212 pp.
12. Pig gastric ulcer. Access mode:https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpiginfo.ru%2Fdisease%2F%3FELEMENT_ID%3D5546%26sphrase_id%3D86284.02.2020.
13. An experimental *Helicobacter suis* infection causes gastritis and reduced daily weight gain in pigs / Ellen De Bruyne [et al] // Veterinary Microbiology – 2012. – №160. – P. 449-454.
14. Apoptotic and proliferative activity of mouse gastric mucosa following oral administration of fumonisin B1 / Ali Mohammad Alizadeh [et al.] // Iran J Basic Med Sci. – 2015. – Vol. 18, №. 1 – P. 8-12.
15. Association between *Helicobacter* and gastric ulcer disease of the pars esophagea in swine. / Queiroz, D.M.D. [et al] // Gastroenterology. – 1996. – Vol. 18, №. 1. – P. 19-27.
16. Changes in the mucous membrane of the pars oesophageal part of the stomach – prevalence and relations to stress / Hessing, J.J.C., et al. // Tijdschr. Diergeneeskd. – 1992. – Vol. 117. – P. 445–450.
17. Long-term administration of the fungus toxin, sterigmatocystin, induces intestinal metaplasia and increases the proliferative activity of PCNA, p53, and MDM2 in the gastric mucosa of aged Mongolian gerbils / Masahiro Kusunoki [et al.] // Environ Health Prev Med. – 2011. – Vol. 16(4). – P. 224–231.
18. Pinton, P. Effect of Deoxynivalenol and Other Type B Trichothecenes on the Intestine: A Review / Pinton, P.; Oswald, I. // Toxins (Basel). – 2014. – Vol. 6, – P. 1615–1643.
19. The Expression of Type-1 and Type-2 Nitric Oxide Synthase in Selected Tissues of the Gastrointestinal Tract during Mixed Mycotoxicosis / Magdalena Gajęcka [et al.] // Toxins (Basel). – 2013. – Vol. 5(11). – P. 2281–2292.
20. The role of infectious agents in the development of porcine gastric ulceration / C. De Witte [et al] // The Veterinary Journal. – 2018. – Vol. 236. – P. 56-61.
21. Ultrastructural and molecular characterization of non-*Helicobacter pylori* species in the gastric mucosa of naturally infected pigs / Letícia Y. Buck [et al.] // Brazilian Journal of Veterinary Pathology. – 2018. – Vol. 11(2). – P. 42-49.

СПЕЦИФИЧНЫЕ НУКЛЕОТИДНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ГЕНОМА БРУЦЕЛЛ ДЛЯ ВИДОВОЙ ПЦР ИНДИКАЦИИ

Осянин К.А.— кандидат биологических наук, **Хаммадов Н.И.**— кандидат биологических наук,
Миргазов Д.А.— младший научный сотрудник, **Косарев М.А.** — кандидат биологических наук,
Софронова А.В.— кандидат биологических наук

ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической,
радиационной и биологической безопасности»,
(420075, г. Казань, Научный городок-2, e-mail: vnivi@mail.ru)

Цель исследования направлена на поиск специфичных локусов генома бруцелл для индикации видов *B. abortus*, *B. melitensis* и рода *Brucella* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени. Для определения специфичных локусов генома бруцелл в работе использовались ресурсы Национального центра биотехнологической информатизации (NCBI), с применением программных продуктов пакета VectorNTI 9.1.0 и утилиты BLAST. Для проведения амплификации использовались дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК) *B. abortus*, *B. melitensis*, *B. suis*, выделенные при помощи набора ДНК-сорб-В. ПЦР проводили на амплификаторе C1000 с оптическим блоком CFX96, BioRad. Были проанализированы нуклеотидные последовательности различных видов бруцелл. Определены специфичные участки генома, встречающиеся у всех представителей рода *Brucella*, а также маркерные локусы для видов *B. abortus* и *B. melitensis*. С учетом данных локусов был произведен дизайн и синтез праймеров и зондов для ПЦР. Для возможности проведения ПЦР в одной пробирке были использованы различные метки зондов для разных мишеней. Также был проведен ряд реакций с различными группами праймеров как в виде монотест-систем, так и в виде мультиплекса.

Ключевые слова: полимеразная цепная реакция, бруцеллез, локусы, геном, мультиплекс.

Род *Brucella* объединяет несколько самостоятельных видов, вызывающих заболевание у различных видов животных, а также человека. В данный род входят следующие биологические виды: *B. melitensis*, *B. abortus*, *B. suis*, *B. neotomae*, *B. ovis*, *B. canis*, *B. ceti*, *B. pinnipedialis* и *B. microti* [4]. Обнаружение в скотоводческом хозяйстве *B. abortus*, или овцеводческом хозяйстве и козых фермах *B. melitensis*, на свином комплексе *B. suis* является причиной неблагополучия по бруцеллезу согласно санитарным правилам (СП 3.1.7.2613-10) [8].

Особую актуальность представляет индикация вида *B. melitensis*, представляющего опасность для человека. Наиболее высокий уровень заболеваемости по России, вызванный *B. melitensis*, отмечается в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах [5].

Ограничения, накладываемые на продукцию животноводства при бруцеллезе и подходы к его ликвидации, зависят от биологического вида возбудителя [1]. Быстрая и точная индикация вида возбудителя бруцеллеза возможна при использовании ПЦР, ос-

нову которой составляет биоинформационный анализ [2]. Мультипраймерный подход, с использованием различных флуоресцентных меток, при постановке ПЦР позволяет идентифицировать различные виды патогенов [3,7]. Цель исследования направлена на поиск специфичных локусов генома бруцелл для индикации видов *B. abortus*, *B. melitensis* и рода *Brucella* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, с использованием различных каналов амплификации для проведения анализа в одной пробирке.

Материал и методы. Сконструированные праймеры синтезированы в виде лиофилизата с концентрацией при разведении 100 пкМ. Для проведения полимеразной цепной реакции данный концентрат был разведен до значения 10 пкМ. Компоненты реакционной смеси (ddH₂O, Буфер для ПЦР ×10, MgCl₂ 25мМ, dNTPs 2,5 мМ, Taqполимераза) применялись из набора R-412 (ЗАО Синтол). Для ПЦР амплификации использовались нуклеиновые кислоты, выделенные из бактериальных культур *B. suis*, *B. abortus* (штамм R1096), *B. melitensis* (штамм Rev1). Выделение нуклеино-

вых кислот производили набором «ДНК-Сорб-В» согласно инструкции производителя. ПЦР осуществляли на амплификаторе C1000 с оптическим блоком CFX96 (BioRad, USA).

Методика проведения ПЦР амплификации применялась индивидуально (специфично) для каждого вида.

Таблица 1 - Последовательность синтезированных праймеров и зондов

Определяемый патоген	Кодировка праймера / зонда	Нуклеотидная последовательность 5' -> 3'
род <i>Brucella</i>	Bru F	tcgaatggctcgggtgcca
	Bru R	cgggtaaagcgtcgccagaa
	Bru P	(Fam)cgatcaagtcgggcgctctgga(BHQ1)
<i>B. abortus</i>	Bruabortus F	gcaatcgtcgtattgccactataatcat
	Bruabortus R	gacggcgcagttctcgaaca
	Bruabortus P	(ROX)ccgaaaggatcagcgtgccagaa(BHQ2)
<i>B. melitensis</i>	Brumeli F	tgcttggcacctcggaacac
	Brumeli R	attcccgaaagccgatagagttga
	Brumeli P	(R6G)tgaagcgcgtgcagacaaatttgactcc(BHQ2)

Результаты исследований. В процессе исследований было проведено четыре различных эксперимента. Каждый из них осуществлялся согласно индивидуальному протоколу.

Все протоколы будут описаны ниже. Протокол №1. Проведение ПЦР с использованием моно-тест системы для индикации рода *Brucella*.

Таблица 2 - Состав реакционной смеси и протокол амплификации тест-системы для индикации рода *Brucella*

Реагент	Кол-во, мкл	Температура, С°	Время	
Состав реакционной смеси		Амплификация		
ddH ₂ O	3,5	95	3 мин	
Буфер для ПЦР ×10	1,5	95	10 сек	40 циклов
MgCl ₂ 25мМ	1,5	60	30 сек	
dNTPs 2,5 мМ	1,5	72	10 сек	
Bru F	0,5			
BruR	0,5			
Bru P	0,5			
Taq полимераза	0,5			
ДНК	5

Рисунок 1 - Результат амплификации ДНК с использованием моно-тест-системы для определения рода *Brucella*. График №1 – ДНК *Brucella abortus* штамм R1096, график №2 – ДНК *Brucella melitensis* штамм Rev1, график №3 – ДНК *Brucella suis*.

Как видно из рисунка 1, все пробы ДНК показали положительный результат ПЦР. Накопление флюоресценции доходило до значений 1400 у.е. Пороговые циклы графиков находились в диапазоне от 14 до 19. Таким образом, данная группа праймеров и зонда под-

ходит для индикации рода *Brucella* в качестве составляющей мультиплексной тест-системы.

Протокол №.2 Проведения ПЦР с использованием моно-тест системы для индикации вида *Brucella abortus*.

Таблица 3 - Состав реакционной смеси и протокол амплификации тест-системы для индикации вида *B.abortus*

Реагент	Кол-во, мкл	Температура, С°	Время	
Состав реакционной смеси		Амплификация		
ddH ₂ O	3,5	95	3 мин	
Буфер для ПЦР ×10	1,5	95	10 сек	40 циклов
MgCl ₂ 25мМ	1,5	60	30 сек	
dNTPs 2,5 мМ	1,5	72	10 сек	
Bruabortus F	0,5			
BruabortusR	0,5			
Bruabortus P	0,5			
Taq полимераза	0,5			
ДНК	5

Рисунок 2 - Результат амплификации ДНК с использованием моно тест-системы для определения вида *Brucella abortus*. График №1 – ДНК *Brucella abortus* штамм R1096, график №2 – ДНК *Brucella melitensis* штамм Rev1, график №3 – ДНК *Brucella suis*.

На рисунке 2 можно отметить накопление флюоресценции в пробе, содержащей ДНК *Brucella abortus*, достигающее до значений 500 у.е. Пороговый цикл данного графика имел значение 22.

В свою очередь в пробах, содержащих ДНК *B.suis* и *B.melitensis* накопление

флюоресценции вовсе отсутствовало, что говорит о специфичности данной группы праймеров и зонда по отношению к близким видам микроорганизмов внутри рода *Brucella*.

Протокол №.3 Проведения ПЦР с использованием моно-тест системы для индикации вида *Brucella melitensis*.

Таблица 4 - Состав реакционной смеси и протокол амплификации тест-системы для индикации вида *Brucella melitensis*

Реагент	Кол-во, мкл	Температура, С°	Время	
Состав реакционной смеси		Амплификация		
ddH ₂ O	3,5	95	3 мин	
Буфер для ПЦР ×10	1,5	95	10 сек	40 циклов
MgCl ₂ 25мМ	1,5	60	30 сек	
dNTPs 2,5 мМ	1,5	72	10 сек	
Brumeli F	0,5			
Brumeli R	0,5			
Brumeli P	0,5			
Taq полимераза	0,5			
ДНК	5

Рисунок 3 - Результат амплификации ДНК с использованием моно тест-системы для определения вида *Brucella melitensis*. График №1 – ДНК *Brucella abortus* штамм R1096, график №2 – ДНК *Brucella melitensis* штамм Rev1, график №3 – ДНК *Brucella suis*.

Как видно на рисунке 3, накопление флюоресценции происходило исключительно в пробе, содержащей ДНК *B.melitensis*. Значения флюоресценции были выше 700 у.е., пороговый цикл достигал значения 24. Таким обра-

зом, данный набор праймеров и зонда индицирует исключительно вид *B.melitensis*. Протокол №.4 Проведения ПЦР с использованием мультиплексной тест- системы для индикации видов *B.abortus*, *B.melitensis* и рода *Brucella*.

Таблица 5 - Состав реакционной смеси и протокол амплификации мультиплексной тест-системы для определения видов *B.melitensis*, *B.abortus* и рода *Brucella*.

Реагент	Кол-во, мкл	Температура, С°	Время	
Состав реакционной смеси		Амплификация		
ddH ₂ O	0,5	95	3 мин	
Буфер для ПЦР ×10	1,5	95	10 сек	40 циклов
MgCl ₂ 25мМ	1,5	60	30 сек	
dNTPs 2,5 мМ	1,5	72	10 сек	
Brumeli F	0,5			
Brumeli R	0,5			
Brumeli P	0,5			
Bruabortus F	0,5			
Bruabortus R	0,5			
Bruabortus P	0,5			
Bru F	0,5			
BruR	0,5			
Bru P	0,5			
Taq полимераза	0,5			
ДНК	5

Рисунок 4 - Результат амплификации ДНК с использованием мультиплексной тест-системы для определения видов *B.melitensis*, *B.abortus* и рода *Brucella*. График №1 – ДНК *Brucella abortus* штамм R1096, график №2 – ДНК *Brucella melitensis* штамм Rev1, графики №3 – ДНК *Brucella suis*.

В заключении было произведено соединение моно тест-систем в мультиплексную тест-систему для индикации видов *B.abortus*, *B.melitensis* и рода *Brucella*.

На рисунке 4 видно накопление флюоресценции происходило по специфичным каналам амплификатора, согласно выбранным меткам. В пробе, содержащей ДНК *B. abortus* накопление флюоресценции происходило по специфичному каналу ROX и по каналу, идентифицирующему род *Brucella*. В пробе, содержащей ДНК *B.melitensis* накопление сигнала происходило по специфичному каналу R6G и по каналу, индицирующему род *Brucella*. В свою очередь в пробе, содержащей ДНК *B.suis* накопление флюоресценции отме-

чалось только по каналу FAM, идентифицирующему род *Brucella*.

Заключение. На основании проведенной амплификации можно сделать вывод о возможности построения мультиплексной ПЦР тест-системы для диагностики видов *B.melitensis*, *B.abortus* и рода *Brucella* на основе разработанных моноплексных систем. Реакция может проводиться в одной пробирке, используя разные каналы амплификатора. Полученная тест-система снизит затраты на проведение диагностических исследований и ускорит процесс определения вида возбудителя, что позволит в короткие сроки принять необходимые мероприятия по ликвидации бруцеллеза в отдельных хозяйствах.

Литература

1. Агольцев, В.А. Эпидемиологические и эпизоотологические особенности бруцеллеза в Саратовской и в Западно-Казахстанской областях / В.А. Агольцев, С.Ю.Веселовский, А.А.Частов, О.М.Попова // Научная жизнь. – 2017.- № 7.-С. 92-100.
2. Адиева, А.А. Использование биоинформационных методов при конструировании праймеров конститутивного гена, кодирующего белок тубулин для проведения ОТ-ПЦР / А.А. Адиева, Г.Р. Израилова, Р.А. Халилов, М.Г. Меджидова, Ю.А. Умарова // Современные проблемы науки и образования. - 2016. - № 6. - С. 526-535.
3. Желудков, М.М. Резервуары бруцеллезной инфекции в природе / М.М. Желудков, М.М. Церельсон // Зоологический журнал. - 2010. - № 1(89). - С. 53-60.
4. Лямкин, Г.И. Обзор эпизоотической и эпидемической ситуации по бруцеллезу в Российской Федерации в 2013 г. и прогноз на 2014 г. / Г.И. Лямкин, С.И. Головнева, А.А. Худолеев, Е.Н. Чеботарева, Л.И. Шакирова, А.Н. Куличенко // Проблемы особо опасных инфекций. - 2014. - №2. - С. 29-32.
5. Ндаишимийе, Э.В. Биоинформационный анализ олигонуклеотидов для молекулярно-генетической индикации возбудителей аспергиллеза и аскосфероза пчел / Н.И. Хаммадов, К.А. Осянин, Т.Х. Фаизов, Э.А. Шуралев, М.Н. Мукминов // Ветеринарный врач. -2015.-№ 2. - С. 3-9.
6. Mustafa, A.S. Speciesidentification and molecular typing of human *Brucella* isolates from Kuwait/N. Habibi, A.Osman, F. Shaheed, M.W.Khan // PLoS One journal.pone.-2017.-0182111.-№12(8): e0182111. DOI: 10.1371.

7. Shevtsova, E. Epidemiology of brucellosis and genetic diversity of *Brucella abortus* in Kazakhstan / E. Shevtsova, A. Shevtsov, K. Mukanov, M. Filipenko, D. Kamalova, I. Sytnik, M. Syzdykov, A. Kuznetsov, A. Akhmetova, M. Zharova, T. Karibaev, P. Tarlykov, E. Ramanculov // PLoS One journal.pone. - 2016. - 0167496. - №11 (12): e0167496.DOI: 10.1371.

SPECIFIC NUCLEOTIDE SEQUENCES OF THE BRUCELLA GENOME FOR SPECIES-SPECIFIC PCR INDICATION

Osyenin K.A. - Candidate of Biological Sciences, Khammatov N.I. - Candidate of Biological Sciences, Mirgazov D.A. - Junior Researcher, Kosarev M.A. - Candidate of Biological Sciences, Sofronova A.V. - Candidate of Biological Sciences

FSBSI «Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety»,
(420075, Kazan, Nauchnyi gorodok-2, e-mail: vnivi@mail.ru)

The aim of the study is to search for specific loci of the brucella genome to indicate species of B. abortus, B. melitensis and the genus Brucella by real-time polymerase chain reaction. To determine the specific loci of the brucella genome, we used the resources of the National Center for Biotechnological Informatization (NCBI), using software products of the Vector NTI 9.1.0 package and the BLAST utility. For amplification, the DNA used was B. abortus, B. melitensis, B. suis, isolated using a DNA-sorb-B kit. The polymerase chain reaction was carried out on a C1000 thermocycler with a CFX96 optical unit, BioRad. The nucleotide sequences of various types of brucella were analyzed. Specific genome regions found in all representatives of the genus Brucella, as well as marker loci for the species B. abortus and B. melitensis, were determined. Based on these loci, design and synthesis of primers and probes for PCR was performed. To allow for PCR in a single tube, different probe labels were used for different targets. A series of reactions was also carried out with different groups of primers both in the form of mono test systems and in the form of a multiplex.

Keywords: polymerase chain reaction, brucellosis, loci, genome, multiplex.

References

1. Agol'cev, V.A. Epidemiological and epizootological features of brucellosis in the Saratov and West Kazakhstan regions/ V.A. Agol'cev, S.YU. Veselovskij, A.A. Chastov, O.M. Popova // Scientific life. - 2017. - № 7. - P. 92-100.
2. Adieva, A.A. The use of bioinformation methods in the design of primers for the constitutive gene encoding the tubulin protein for OT-PCR / A.A. Adieva, G.R. Izrailova, R.A. Halilov, M.G. Medzhidova, YU.A. Umarova // Modern problems of science and education. - 2016. - № 6. - P. 526-535.
3. Zheludkov, M.M. Reservoirs of brucellosis infection in nature / M.M. Zheludkov, M.M. Cerel'son // Zoological journal. - 2010. - № 1(89). - P. 53-60.
4. Lyamkin, G.I. Overview of the epizootological and epidemic situation of brucellosis in the Russian Federation in 2013 and the forecast for 2014g. / G.I. Lyamkin, S.I. Golovneva, A.A. Hudoleev, E.N. Chebotareva, L.I. Shakirova, A.N. Kulichenko // Especially dangerous infection. - 2014. - № 2. - P. 29-32.
5. Ndajishimije, E.V. Bioinformational analysis of oligonucleotides for molecular genetic indication of pathogens of aspergillosis and ascosporosis of bees / E.V. Ndajishimije, N.I. Hammadov, K.A. Osyanin, T.H. Faizov, E.A. Shuralev, M.N. Mukminov // The Veterinarian. - 2015. - № 2. - P. 3-9.
6. Mustafa, A.S. Species identification and molecular typing of human *Brucella* isolates from Kuwait / A.S. Mustafa, N. Habibi, A. Osman, F. Shaheed, M.W. Khan // PLoS One journal.pone. - 2017. - 0182111. - №12(8): e0182111. DOI: 10.1371.
7. Shevtsova, E. Epidemiology of brucellosis and genetic diversity of *Brucella abortus* in Kazakhstan / E. Shevtsova, A. Shevtsov, K. Mukanov, M. Filipenko, D. Kamalova, I. Sytnik, M. Syzdykov, A. Kuznetsov, A. Akhmetova, M. Zharova, T. Karibaev, P. Tarlykov, E. Ramanculov // PLoS One journal.pone. - 2016. - 0167496. - №11(12): e0167496.DOI: 10.1371.

ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ДОЙНЫХ КОРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЦИОНОВ С ХВОЙНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКОЙ

¹Прытков Ю.Н. – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ¹Кистина А.А. - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ¹Дорожкина Е. И. – аспирант, ¹Макарова Л.Н. – студент, ¹Люзгин А.С. – студент

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева»
(430005, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, 31; e-mail: kafedra_zoo@agro.mrsu.ru)

Научно-хозяйственный опыт, проведенный на коровах черно-пестрой породы в производственных условиях ООО СП «Богдановское» Старошайговского муниципального района Республики Мордовия, продолжался в течение лактации. По принципу пар-аналогов из коров-первотелок сформировали 4 группы, по 15 животных в каждой. Коровы контрольной группы получали хозяйственный рацион без хвойно-энергетической кормовой добавки. Аналогам 1-й, 2-й, 3-й опытных групп помимо основного рациона включали хвойно-энергетическую кормовую добавку, соответственно из расчета 12; 17; 22 г/кг сухого вещества рациона. Исследуемую добавку скармливали в составе кормосмеси. Условия кормления и содержания были одинаковыми для животных всех групп. Кровь брали у 5 коров от каждой группы из яремной вены утром до кормления разные физиологические периоды. Гематологические исследования проводили в физиологические периоды: в молозивный период, период раздоя и осеменения, конец лактации. Определяли в цельной крови уровень гемоглобина, содержание эритроцитов, лейкоцитов. В сыворотке крови исследовали общий белок, альбумины, глобулины и фракционный состав. Общий анализ форменных элементов крови показал, что максимальное содержание эритроцитов, гемоглобина выявлена у коров получавших в составе рационов хвойно-энергетическую кормовую добавку 17 г/кг сухого вещества рациона, что свидетельствует о лучшем обмене веществ у животных 2-й опытной группы. На основании данных морфологических и биохимических показателей крови животных, можно утверждать, что животные характеризовались повышенным уровнем окислительно-восстановительных процессов и более интенсивным обменом веществ. Оптимальной дозировкой скармливания хвойно-энергетической кормовой добавки 17 г/кг сухого вещества рациона.

Ключевые слова: коровы, хвойно-энергетическая кормовая добавка, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, общий белок, глобулины, альбумины, корма.

Одной из важнейших задач агропромышленного комплекса России в рамках Национального проекта является обеспечение рынка страны сырьем и качественными продуктами питания необходимого ассортимента. Ускоренное увеличение производства продукции животноводства высокого качества возможна при организации сбалансированного и полноценного кормления всех половозрастных групп животных кормами естественного происхождения. Полноценное питание способствует не только формированию физиологически здоровых животных, но и получения от них высокой продуктивности и качественной продукции. Для оптимизации питания с.-х.

животных на рынке реализуются различные биологически активные добавки, которые регулируют разные виды обмена веществ с учетом возраста, вида и направления продуктивности [1,2,3,4].

Одним из таких кормовых добавок является хвойно-энергетическая кормовая добавка на основе биомассы леса.

Многочисленные научные разработки и опыт животноводов-практиков доказывают утверждение о том, что полноценное кормление высокопродуктивных коров осуществляется с применением в рационах различных биологически активных кормовых добавок, в том числе и нового поколения.

Однако, существенными недостатками большинства кормовых добавок используемых в кормлении сельскохозяйственных животных является многокомпонентность. В связи с этим, в последнее время учеными и животноводами-практиками ведется постоянный поиск, разработка и апробация новых более дешевых и экологически чистых и безопасных кормовых добавок на основе мобильных комплексов по переработке биомассы леса [5, 6,7].

Известным является тот факт, что такие нетрадиционные кормовые добавки из отходов и побочных продуктов леса способствуют нормализации физиологических процессов в организме животных, продуктивность, усиливают резистентность организма. В России широко используются различные кормовые добавки с использованием отходов переработки леса как древесная зелень. Ветки и вершины, кора, отходы стволовой древесины, отходы химической переработки древесины. В зарубежных странах (США, Канада, Финляндия, Германия, Италия, Япония, Швеция) делают практические шаги по вовлечению лесных ресурсов в кормовой баланс: на специальных плантациях выращивают быстрорастущие древесные породы для кормового использования; изучают возможности перевода лиственных хозяйств на короткое бороты рубки; выводят новые породы скота, способные с большим эффектом потреблять грубые корма, в том числе из древесины. С учетом этого обстоятельства, сотрудниками ООО Научно-технического центра «Химинвест» (г. Нижний Новгород) на основе переработки древесной зелени хвойных пород, основанная на извлечении биологически активных веществ новым селективным экстрагентом, создана хвойно-энергетическая добавка, которая обладает улучшен-

ными эксплуатационными свойствами и обеспечивает длительное сохранение его потребительских качеств. Однако, имеется мало информации о влиянии добавки на показатели обмена веществ в организме коров. В связи с вышеизложенным, целью исследований явилось изучение влияния разных дозировок хвойно-энергетической добавки в рационах коров-первотелок на биохимический статус крови.

Материал и методы. Экспериментальная часть выполнялась в период с 2018 до 2019 гг. в производственных условиях ООО СП «Богдановское» Старошайговского муниципального района Республики Мордовия. Для проведения научно-хозяйственного опыта по принципу пар-аналогов, с учетом породы, возраста, живой массы, продуктивности и физиологического состояния были отобраны 60 голов первотелок чернопестрой породы и сформированы 4 группы по 15 голов в каждой. Содержание животных было привязным. Организован ежедневный моцион. Все животные были клинически здоровы. Кормление коров в ходе эксперимента было трехразовым и проводилось по распорядку дня принятому в хозяйстве. Рационы кормления животных составлялись согласно рекомендуемым детализированным нормам РАСХН (2003) с учетом возраста, живой массы, физиологического состояния и химического состава местных кормов.

Коровы-первотелки контрольной группы, получали основной рацион. Аналогам из 1-й опытной группы к основному рациону добавляли хвойно-энергетическую добавку в дозировке 12 г/кг сухого вещества рациона, 2-й, 3-й опытной групп по 17 и 22 г/кг сухого вещества соответственно с учетом рекомендации ВИЖа (1978) согласно схемы представленной в таблице 1.

Таблица 1 - Схема опыта

Группа	Уровень хвойно - энергетической кормовой добавки в рационе, г/кг сухого вещества
Контрольная	ОР (основной рацион)
1-я опытная	ОР +12 ХЭКД
2-я опытная	ОР +17 ХЭКД
3-я опытная	ОР +22 ХЭКД

Хвойно-энергетическую добавку скармливали индивидуально каждому животному. Рецептура хвойно-энергетической добавки разработана ООО Научно-

техническом центре «Химинвест». Добавка защищена патентом РФ. Допущена к производству и применению органом по сертификации продукции федерального

государственного бюджетного учреждения «Нижегородский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору». Хвойно – энергетическая добавка соответствует требованиям нормативных документов (ТУ 9759-011 4240035713, сертификат соответствия № РОСС RU. ПС04.Н00344, №1566267). Изготавливается из древесной зелени экологически чистым способом, по внешнему виду представляет собой однородную вязкую жидкость с хвойным запахом. В состав входит 80% глицерина дистиллированного медицинского ГОСТ 6824-96 (1-, 2-, 3- пропантриол), 20 % - натуральный носитель хвойная лапка. В ней содержится: обменной энергии 250 ккал/100г; витаминов - В1 – 0,17 мг/кг, В2 - 13 мг/кг, В3 – 2,3 мг/кг, В5 – 0,29 мг/кг, В6 – 0,1 мг/кг, фолиевой кислоты – 0,7 мг/кг; каротиноидов – 12-15 мг/100 г. В целях изучения влияния различных дозировок на морфологические и биохимические показатели крови утром до кормления, из яремной вены была взята кровь для биохимических исследований.

Результаты исследований. Одним из резервов роста продуктивности животных является повышение ими усвояемости питательных веществ используемых кормов. Являясь активатором многих ферментов, хвойно-

энергетическая кормовая добавка содействует деятельности микрофлоры рубца, оказывает значительное влияние на показатели переваримости и использования питательных веществ рационов. По результатам наших исследований установлено, что разные дозировки (12, 17, 22 г/кг сухого вещества) хвойно-энергетической кормовой добавки в рационах коров, оказали определенное влияние на гематологические показатели подопытных животных. Так, в крови коров 2-й опытной группы в молозивный период, отмечалось увеличение содержания эритроцитов и гемоглобина на 9,50 % и 9,52 % по сравнению с аналогами контрольной группы и на 6,26 % и 6,82%, чем у сверстниц 1-й опытной группы (табл.2).

Повышение в рационах коров 3-й опытной группы хвойно-энергетической кормовой добавки до 22 г/кг сухого вещества рациона способствовало незначительному снижению изучаемых показателей, но они были выше, чем у аналогов контрольной группы. Количество лейкоцитов почти не изменялось, наблюдалось лишь незначительное его повышение в крови животных контрольной группы. Все это свидетельствовало о более интенсивном течении окислительно-восстановительных процессов в организме животных.

Таблица 2 - Морфологические показатели крови коров

Группа	Эритроциты, 10 ¹² г/л	Лейкоциты, 10 ⁹ г/л	Гемоглобин, г/л
Молозивный период			
Контрольная	5,89±0,11	9,82±0,42	105,00±2,03
1-я опытная	6,07±0,15	9,36±0,37	107,66±2,33
2-я опытная	6,45±0,16	8,57±0,26	112,33±2,96
3-я опытная	6,11±0,17	9,08±0,38	115,00±2,31
Период раздоя и осеменения			
Контрольная	6,15±0,13	9,66±0,43	108,00±1,73
1-я опытная	6,36±0,12	9,15±0,55	110,66±2,96
2-я опытная	6,68±0,18	8,04±0,21	118,66±2,33
3-я опытная	6,29±0,20	8,83±0,20	113,00±2,89
Конец лактации			
Контрольная	6,05±0,14	9,75±0,35	106,66±2,85
1-я опытная	6,25±0,10	9,28±0,35	109,00±2,31
2-я опытная	6,55±0,20	8,31±0,33	115,00±2,08
3-я опытная	6,18±0,17	8,92±0,27	110,00±2,52

Таблица 3 - Биохимические показатели крови коров

Группа	Общий белок, г/л	Альбумины, г/л	Глобулины, г/л			
			всего	альфа	бетта	гамма
Молозивный период						
Контрольная	79,73±1,61	35,88±1,69	43,85±1,91	8,89±0,82	7,03±0,19	27,93±2,57
1-я опытная	82,20±1,58	36,99±1,42	45,21±2,12	10,00±0,56	8,28±0,71	26,93±1,52
2-я опытная	87,30±1,64	39,29±1,67	48,01±2,12	14,68±0,51	8,79±0,30	24,54±1,84
3-я опытная	84,20±1,74	37,89±1,42	46,31±2,56	12,50±0,83	8,48±0,57	25,33±1,32
Период раздоя и осеменения						
Контрольная	77,90±0,93	33,96±0,91	43,94±0,30	8,95±0,82	6,36±0,44	28,63±1,13
1-я опытная	81,30±1,23	35,45±0,94	45,85±0,56	10,38±0,81	7,68±0,63	27,79±1,08
2-я опытная	86,15±0,68	37,56±1,17	48,59±0,70	14,00±1,03	8,14±0,78	26,45±0,59
3-я опытная	84,60±1,26	36,88±0,88	47,72±0,67	11,80±0,72	7,99±0,49	27,93±1,05
Конец лактации						
Контрольная	76,70±0,91	32,86±0,94	43,84±0,81	7,31±0,60	6,00±0,12	30,53±1,52
1-я опытная	80,06±0,77	34,31±1,37	45,75±0,68	8,67±0,41	7,31±0,59	29,77±1,28
2-я опытная	85,38±0,42	36,58±0,86	48,80±0,51	12,25±0,91	7,80±0,71	28,75±1,48
3-я опытная	83,40±1,28	35,74±1,00	47,66±0,52	12,03±0,64	7,62±0,94	28,01±1,86

Важным показателем состояния белкового обмена в организме является содержание в крови белка, его основных фракций и их соотношение. Наши исследования показали, что применение хвойно-энергетической кормовой добавки в составе рационов коров 2-й опытной группы из расчета 17 г/кг сухого вещества рациона в молозивный период, привело к увеличению в их крови количества общего белка по сравнению с аналогами из контрольной группы на 9,50 % и на 6,20 %, чем 1-й опытной группы ($P < 0,001$).

Аналогичная закономерность выявлена по количеству альбуминов и глобулинов. В крови коров 2-й опытной группы содержание альбуминов на 9,50 % и глобулинов на 9,4 % больше, по сравнению со сверстницами контрольной группы и соответственно на 6,22, и 6,19 %, чем у животных 1-й опытной группы. Из фракции глобулинов наибольший удельный вес занимают гамма-глобулины, причем наи-

меньшая их концентрация во все возрастные периоды была у животных 2-й опытной группы. Количество альфа-, и бета-глобулинов в 2-й опытной группе было также выше соответственно на 14,92 и 10,87 % по сравнению с подопытными животными контрольной группы и соответственно на 9,93 и 6,68 %, чем у аналогов 1-й опытной группы.

Скармливание коровам хвойно-энергетической кормовой добавки из расчета 22 г/кг сухого вещества рациона способствовало незначительному снижению изучаемых показателей, но они были выше, чем у аналогов контрольной группы.

Закключение. Результаты производственных испытаний показали, что использование хвойно-энергетической кормовой добавки в рационах коров первотелок в разные периоды лактации и, особенно, в дозировке 17 г/кг сухого вещества рациона судя по динамике гематологических показателей способствовало активации обменных процессов.

Литература

1. Андреев, А.И. Показатели крови дойных коров при использовании в рационах разных видов силоса / А.И. Андреев, В.И. Чикунова, А.М. Гурьянов // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. - 2012. - № 4 (29). - С.42-45.
2. Калашников, А.П. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных / А.П.Калашников, В.И.Фисинин, В.В.Щеглов и др. // Справочное пособие 3-е издание переработанное и дополненное. - Москва, 2003. - 456 с.
3. Прытков, Ю.Н. Эффективность применения хвойно-энергетической кормовой добавки в молочном скотоводстве / Ю.Н. Прытков, А.А. Кистина, М.Ю. Червяков // Аграрный научный журнал. - 2015. - № 10. - С.17-20.
4. Прытков, Ю.Н. Влияние хвойно-энергетической добавки на переваримость и использование питательных и минеральных веществ рационов нетелями / Ю.Н. Прытков, А.А. Кистина, Г.Г. Брагин // Аграрный научный журнал. - 2017. - №12. - С.42-45.
5. Прытков, Ю.Н. Влияние селеноорганических препаратов в рационах коров черно-пестрой породы на обмен веществ и молочную продуктивность / Ю.Н. Прытков, А.А. Кистина // Аграрный научный журнал. - 2018. - № 1. - С.31-35.
6. Прытков, Ю.Н. Обогащение рационов нетелей хвойно-энергетической добавкой / Ю.Н. Прытков, А.А. Кистина, Е.И. Дорожкина // Точка роста эффективности АПК в условиях нестабильного рынка» «Мат.международн. научн.-прак. конф», г.Казань. - 2018. - С.299-304.
7. Prytkov, Y.N. Biological substantiation of application of the coniferous-energy supplement in feeding of heifers / Y.N. Prytkov, A.A. Kistina, V.P. Korotkiy, V.A. Ryzhov, V.I. Roshchin // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. - 2017. - T.9.- № 6. - P. 817-821.

DYNAMICS OF MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD OF DAIRY COWS USING DIETS WITH CONIFERO-ENERGYFEED ADDITIVE

Prytkov Y. N. - Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Kistina A. A. - Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Dorozhkina E. I. - Graduate student, Makarova L.N. – Student, Lyuzgin - Student

FSBEI of HE "National Research
Mordovian State University named after N. P. Ogarev "
(430005, Saransk, RP Yalga, Rossiyskaya St., 31; e-mail: kafedra_zoo@agro.mrsu.ru)

The scientific and economic experience conducted on cows of black and white breed in the production environment of LLC JV Bogdanovskoye in the Staroshaigovsky municipal district of the Republic of Mordovia continued during lactation. According to the principle of analog pairs, 4 groups of 15 animals in each were formed from first-calf cows. Cows of the control group received an economic diet without coniferous-energy feed additives. The analogues of the 1st, 2nd, 3rd experimental groups in addition to the main diet included coniferous-energy feed additive, respectively, from the calculation of 12; 17; 22 g / kg dry matter diet. The test additive was fed as part of a feed mixture. The feeding and keeping conditions were the same for animals of all groups. Blood was taken from 5 cows from each group from the jugular vein in the morning before feeding different physiological periods. Hematological studies were carried out in physiological periods: during the colostrum period, the period of milking and insemination, the end of lactation. The hemoglobin level, the content of red blood cells, and white blood cells were determined in whole blood. In serum, total protein, albumin, globulins and fractional composition were examined. A general analysis of blood cells showed that the maximum content of erythrocytes and hemoglobin was found in cows receiving coniferous-energy feed supplement of 17 g / kg of dry matter in the diets, which indicates the best metabolism in animals of the 2nd experimental group. Based on the data of morphological and biochemical parameters of the blood of animals, it can be argued that the animals were characterized by an increased level of redox processes and a more intense metabolism. The optimal dosage for feeding coniferous-energy feed additives is 17 g / kg of dry matter ration.

Keywords: cows, coniferous-energy feed additive, hemoglobin, red blood cells, white blood cells, total protein, globulins, albumin, feed.

References

1. Andreev, A.I. Blood indicators of dairy cows when used in the diets of different types of silo / A.I. Andreev, V.I. Chikunova, A.M. Guryanov // Agricultural ScienceEuro-Northeast. - 2012. - No. 4 (29). - P. 42-45.
2. Kalashnikov, A.P. Norms and diets of feeding agricultural animals / A.P. Kalashnikov, V.I. Fisinin, V. V. Shcheglov et al. // Reference manual 3rd edition revised and up to full. - Moscow, 2003. - 456p.
3. Prytkov, Yu.N. The effectiveness of the use of coniferous-energy feed additives in dairy cattle dstv / Yu.N. Prytkov, A.A. Kistina, M.Yu. Chervyakov // Agrarian scientific journal. - 2015. - No. 10. - P.17-20.
4. Prytkov, Yu.N. Effect of coniferous-energy supplement on digestibility and use of nutrients and minerals flax substances diets heifers / Yu.N. Prytkov, A.A. Kistina, G.G. Bragin // Agrarian Scientific Journal. - 2017. - No. 12. - S. 42-45.
5. Prytkov, Yu.N. The influence of organo-selenium preparations in the diets of cows of black and white dy metabolism and milk productivity / Yu.N. Prytkov, A.A. Kistina // Agrarian scientific journal. - 2018. - No. 1. - P. 31-35.
6. Prytkov, Yu.N. Enrichment of rations of heifers with coniferous-energy supplement / Yu.N. Prytkov, A.A. Kistina, E.I. Dorozhkina // The point of growth in the efficiency of the agro-industrial complex in an unstable market "" Mat. International. scientific-practical Conf ", Kazan. - 2018. - P. 299-304.
7. Prytkov, Y.N. Biological substantiation of application of the coniferous-energy supplement in feeding of heifers / Y.N. Prytkov, A.A. Kistina, V.P. Korotkiy, V.A. Ryzhov, V.I. Roshchin // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. - 2017. - T.9. - No. 6. - P. 817-821.

**ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ПРОФИЛАКТИКИ МИКОТОКСИКОЗОВ В ОТНОШЕНИИ АФЛАТОКСИНОВ**

Тарасова Е.Ю. – кандидат биологических наук, **Семенов Э.И.** – кандидат биологических наук,
Матросова Л.Е. – доктор биологических наук, **Мишина Н.Н.** – кандидат биологических наук,
Мухарлямова А.З. – ведущий инженер

ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической,
радиационной и биологической безопасности»
(420075, г. Казань, Научный городок - 2, e-mail: vnivi@mail.ru)

*Естественное присутствие микотоксинов в кормах и пищевых продуктах является серьезной проблемой во всем мире, которая может вызвать необратимые последствия со здоровьем людей и животных. Среди различных микотоксинов афлатоксины, представляющие собой низкомолекулярные соединения и продуцируемые *Aspergillus flavus* и *Aspergillus parasiticus*, считаются сильнейшими тератогенами, мутагенами и канцерогенами. В связи с этим проблема получения и поиска новых энтеросорбентов, также как и разработка новых сорбционных технологий, является очень актуальной. Поэтому идет постоянный поиск средств, не нарушающих гомеостаз и способных выводить из организма продукты нарушенного метаболизма, жизнедеятельности патогенных микроорганизмов и токсических соединений, полученных из внешней среды. Изучение адсорбционной способности бентонитов Биклянского и Тарн-Варского месторождений, нанотрубокгаллуазита, коммерческих препаратов (Полисорба ВП и Микосорба) *in vitro* в отношении афлатоксина B_1 показало, что именно галлуазит обладает наилучшими показателями сорбции (94,7%) и, в перспективе, может быть использован для борьбы с афлатоксикозами животных, птиц, а по пищевой цепочке и человека. При повышении pH среды с 2 до 8 у всех изучаемых адсорбентов наблюдалась десорбция афлатоксина B_1 с наименьшими показателями у галлуазита на уровне $0,3 \pm 0,1$ и наибольшими у Микосорба на уровне $6,7 \pm 0,9\%$ соответственно. Адсорбция нанотрубками афлатоксина B_2 составила $83,9 \pm 1,5\%$. При одновременном внесении в пробирки афлатоксинов B_1 и B_2 показатели сорбции у нанотрубокгаллуазита снижались на 3,9; 11,8; 4,0% в кислой, нейтральной, щелочной среде с учетом десорбции в отношении афлатоксина B_1 и 9,3; 2,3; 10,5% соответственно в отношении афлатоксина B_2 . Полученные данные делают нанотрубкигаллуазита очень интересными для дальнейших исследований в отношении других микотоксинов и их комбинаций, а также его всестороннего изучения в качестве средства, снижающего токсическую нагрузку на организм сельскохозяйственных животных и птицы.*

Ключевые слова: микотоксикоз, афлатоксин B_1 , афлатоксин B_2 , адсорбция, десорбция, энтеросорбент, бентонит, галлуазит, хроматограмма, нанотрубки.

Рост *Aspergillus flavus* и *Aspergillus parasiticus* в кормах при определенных условиях (относительная влажность воздуха 80-90%, влажность субстрата – 18%, температура 27-30°C) обычно сопровождается выработкой многих токсичных вторичных метаболитов, таких как афлатоксины B_1 , B_2 , G_1 и G_2 [12]. Среди этих метаболитов афлатоксин B_1 является наиболее опасным и распространенным микотоксином, обладающим гепатотоксичным, канцерогенным и мутагенным действием [9, 13]. Присутствие афлатоксина B_1

в рационе домашней птицы снижает выводимость, привесы цыплят, скорость роста, качество мяса и яиц, а также ухудшает коэффициент конверсии корма, повышает смертность и восприимчивость птиц к болезням, что негативно сказывается на получаемой производителем прибыли. Афлатоксины переходят из кормов для птицы и сельскохозяйственных животных в яйца, мясо, молоко и т.д., что представляет угрозу для здоровья конечных потребителей – людей [11]. Афлатоксин B_1 является третьей по значимости причиной рака

печени, особенно в странах Африки и в развивающихся странах Азии, и классифицируется Международным агентством по изучению рака, как канцероген первой группы с высоким риском развития гепатоцеллюлярной карциномы [7, 15].

В Российской Федерации от 40 до 100% кормов загрязнено грибами рода *Aspergillus*, из них до 20% обладают токсичностью. Сотрудники лаборатории микотоксинов ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» обнаруживали афлатоксины В₁, В₂, G₁, G₂ в кукурузе и ржи, выращенных в Республике Татарстан, а также в завезенном из других регионов страны зерне [4]. При мониторинге кормов для сельскохозяйственных животных, отобранных в Рязанской области, выявили, что большая часть образцов (95,98%) была благополучной по содержанию афлатоксинов, но 6,42% образцов были загрязнены афлатоксином В₁ в концентрациях от 0,0006 до 0,033 мг/кг. В 3,21% образцов концентрация афлатоксина В₁ превышала предельно-допустимую концентрацию для взрослых животных в 1,65 раза, а для молодняка в 3,3 раза [5]. Исследования 77 образцов кормов, поступивших из семи районов Калужской области, выявили зараженность грибами родов *Aspergillus* spp., афлатоксин В₁ обнаруживался в концентрации до 0,033, что не превышает ПДК для взрослых животных, но превышает ПДК для молодняка [1]. Для минимизации последствий, а так же с целью профилактики возникновения афлатоксикоза ветеринарные специалисты используют энтеросорбенты различной природы, неорганические, органические или их комбинации. Применение наноразмерных трубчатых глинистых минералов в качестве материалов для новых, передовых биомедицинских исследований вызывает во всем мире большой интерес.

Одним из перспективных, на наш взгляд, в отношении микотоксинов адсорбентом может стать природный наноматериал - галлуазит. Он химически подобен каолиниту за исключением того, что имеет высокое содержание гидратной воды, приводящей к изменению морфологии каналов [10]. Ранее нами [6] изучена сорбирующая способность галлуазита в отношении Т-2 токсина *in vitro*.

Галлуазит представляет собой полиморф каолинита, в котором листы сворачиваются, образуя пустые цилиндры. Типичные галлуазитовые нанотрубки имеют внутренний диаметр в диапазоне от 20 до 100 нм. Показано

также, что галлуазит обладает высокой адсорбционной способностью как для катионных, так и для анионных красителей [18]. Нанотрубки галлуазита используют для загрузки и хранения веществ различной природы с целью их дальнейшего пролонгированного высвобождения. Внутреннюю полость нанотрубки, имеющую положительный заряд, можно заполнять отрицательно заряженными молекулами ферментов, лекарственных препаратов и т.д. [14, 16]. Таким образом, нанотрубкигаллуазита открывают огромные возможности для создания кормовых добавок широкого и разнопланового действия, в которых связывание токсинов не будет являться единственным эффектом.

В зарубежной литературе имеется небольшое количество сообщений о применении нанотрубок галлуазита в качестве адсорбентов у животных. Они сводятся к успешному применению модифицированных стеарилдиметилбензиламмоний хлоридом нанотрубок свиноматкам с целью снижения негативных последствий, загрязненных зеараленоном кормов. Показано, что модифицированные таким образом нанотрубкигаллуазита минимизировали большинство токсических эффектов, вызванных зеараленоном, оказали положительное влияние на показатели роста, количество и диаметры мышечных волокон у поросят при отъеме [8]. Панье Zhang Y. et al. [17] также было показано, что модифицированные галлуазитовые нанотрубки предотвращали большинство изменений в репродуктивной функции у свиноматок и в развитии поросят, вызванных зеараленоном.

Данные по изучению адсорбции микотоксинов природным материалом галлуазитом в российской печати отсутствуют, поэтому целью наших исследований являлось изучение адсорбционной способности нанотрубок галлуазита *in vitro* в отношении афлатоксинов В₁ и В₂, а также их совместном внесении, в сравнении с алюмосиликатными глинами другого строения (бентониты Биклянского и Тарн-Варского месторождений), а также с коммерческими препаратами неорганической и органической природы.

Материал и методы. Адсорбционную способность энтеросорбентов в отношении афлатоксинов В₁ и В₂ *in vitro* определяли по методике, описанной Крюковым В.С. и соавт. (1992) с изменениями Трemasова М.Я. и соавт. (2005). Для этого в ряд пробирок с содержа-

нием 5 мл водно-солевого раствора вносили 10 мкл метанольного раствора афлатоксина В₁ или В₂ с концентрацией 1 мкг/мкл и исследуемые сорбенты в количестве 10 мг, контролем служила пробирка без добавления сорбента. Далее проводили экспозицию при постоянном встряхивании в течение 30 минут, при температуре 37°C и pH среды 7,0 и 2,0 (моделирование pH в желудке), затем раствор фильтровали, из фильтрата токсин переэкстрагировали в хлороформ трижды по 20 мл, хлороформенные экстракты объединяли и выпаривали досуха на ротационном испарителе. Для определения десорбции к осадкам, содержащим комплекс (афлатоксин+сорбент), добавляли 5 мл раствора, в котором создавали щелочную среду pH=8,0 (моделирование pH в кишечнике). Качественное и количественное определение остаточных количеств афлатоксина в сухом остатке проводили методом тонкослойной хроматографии с подтверждением ВЭЖХ. В работе использовали жидкостной хроматограф Agilent 1100Infinity с диодно-матричным и флуоресцентным детектором. Хроматографическое разделение осуществляли на колонке с обращенной фазой Reprosil ODS-AC 18 250*4мм. Подвижная фаза представляла собой трехкомпонентную смесь (ацетонитрил – метанол - деонизированная вода) в соотношениях 40:50:10 v/v. Объем впрыска поддерживали на уровне 20 мкл. Температура термостата колонки 30 °C. Проведено изучение показателей сорбции у таких неорганических адсорбентов, как алюмосиликатные глины месторождения которых находятся на территории Российской Федерации (бентониты Биклянский и Тарн-

Варский), нанотрубок галлуазита (Sigma-Aldrich), высококислотного, высокодисперсного кремнезема Полисорб ВП (Полисорб ООО, Россия) в сравнении с широко рекламируемым органическим адсорбентом Микосорб (Alltech, США).

Так как уровень pH у моногастричных и жвачных животных в желудочно-кишечном тракте значительно изменяется при переходе от проксимального к дистальному участку, важно, чтобы вещество, адсорбирующее микотоксины, могло удерживать их как в кислой среде желудка, так и в щелочной среде кишечника. Поэтому наше исследование включало в себя два этапа, что позволило проанализировать прочность комплекса микотоксин+адсорбент, сначала измерив количество связанного микотоксина при pH 2 (моделирование условий желудка), а затем определив отделение токсина от адсорбента во втором растворе при pH 8 (моделирование условий кишечника). Эффективность определяли сравнением начального связывания («непрочное связывание») с последующей десорбцией («прочное связывание»).

Данные усреднены и скомпилированы по результатам нескольких опытов, проведенных в разное время. Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием стандартного пакета программ Microsoft Excel.

Результаты исследований. Сорбционная активность энтеросорбентов по отношению к афлатоксину В₁ в кислой (pH 2) среде представлена на хроматограммах (рис. 1).

Рисунок 1 – Хроматограмма выхода афлатоксина В₁ при pH2 и внесении адсорбента (А – бентонит Биклянский; Б – бентонит Тарн-Варский; В – нанотрубки галлуазита; Г – Полисорб ВП; Д – Микосорб).

Показано, что адсорбция афлатоксина В₁ бентонитами Биклянского и Тарн-Варского месторождений составила $5,32 \pm 0,15$ и $8,75 \pm 0,11$ мкг, нанотрубка мигаллуазита – $9,52 \pm 0,21$, Полисорбом ВП – $8,10 \pm 0,19$; Микосорбом – $7,9 \pm 0,14$ мкг соответственно. Таким образом, все исследуемые образцы обладают адсорбционной активностью по отношению к афлатоксину В₁ in vitro с максимальными показателями на уровне 95,2% у галлуазита, что на 17,02% выше, чем у органического препарата сравнения Микосорба. Адсорбция в нейтральной среде (рН 7) показана на рис. 2. Установлено, что наименьшей адсорбционной активностью при рН 7 обладает бентонит Биклянского месторождения, при этом показатели сорбции у бентонита Тарн-Варского месторождения, галлуазита, Полисорба ВП и Микосорба были выше на

35,67; 38,68; 13,18; 15,19% соответственно. Адсорбционная активность усиливалась в нейтральной среде на 16,6 и 7,2% у бентонитов Биклянского и Тарн-Варского месторождений. Что объясняется тем, что значительная часть ёмкости катионного обмена бентонитов обусловлена изоморфными замещениями в решётке и поэтому не зависит от рН, но на боковых гранях бентонитовых частиц присутствуют гидроксильные группы, которые могут быть источником, зависящим от рН и кислотности [2].

Вследствие кристаллохимических особенностей строения глинистых минералов при изменении рН раствора происходит перезарядка торцевых участков глинистых частиц, поэтому адсорбционное равновесие в щелочной среде достигается быстрее, чем в кислой среде [3].

Рисунок 2 – Сравнительная характеристика сорбционной активности энтеросорбентов по отношению к афлатоксину В₁ в нейтральной (рН 7) среде (1 - бентонит Биклянский; 2 - бентонит Тарн-Варский; 3 - галлуазит; 4 – Полисорб ВП; 5 - Микосорб)

При повышении рН среды с 2 до 8 у всех изучаемых адсорбентов наблюдалась десорбция афлатоксина В₁ с наименьшими показателями у галлуазита на уровне $0,3 \pm 0,1$ и наибольшими у Микосорба на уровне

$6,7 \pm 0,9\%$ соответственно (рис. 3). Десорбция для бентонитов Биклянского и Тарн-Варского месторождений составила 0,06 и 0,07 мкг, для Полисорба ВП – 0,12 мкг афлатоксина В₁.

Рисунок 3 – Хроматограмма выхода афлатоксина В₁ при pH8 (А – нанотрубки галлуазита; Б –Микосорб).

Показатели истинной сорбции, которую мы определяли сравнением начального связывания («непрочное связывание») с по-

следующей десорбцией («прочное связывание») представлены в таблице 1.

Таблица 1 – «Истинная сорбция» энтеросорбентов по отношению к афлатоксину В₁

Название адсорбента	Адсорбция при pH2, %	«Истинная сорбция», %
Бентонит Биклянский	53,2±1,2	52,1±0,6
Бентонит Тарн-Варский	87,5±2,3	86,7±2,7
Галлуазит	95,2±0,7	94,7±0,8
Полисорб ВП	81,0±0,9	79,5±1,1
Микосорб	79,0±1,7	72,3±0,5

Из таблицы видно, что «истинная сорбция» коммерческих энтеросорбентов неорганической (Полисорб ВП) и органической природы (Микосорб) находится в одном диапазоне и составляет 72,3-79,5%. Максимальная адсорбция афлатоксина В₁ отмечалась у галлуазита, в связи с этим провели дальнейшее изучение нанотрубок в отношении афлатоксина В₂. Установлено, что сорбция афлатоксина В₂ в кислой среде снижалась на 8,9%, в

нейтральной среде на 9,5%, десорбция увеличилась с 0,3 до 2,4%, показатели «истинной сорбции» снижались на 10,8% соответственно адсорбции нанотрубками галлуазита афлатоксина В₁. Так как на практике корма редко контаминируются только одним микотоксином, проведен опыт по изучению адсорбции афлатоксинов В₁ и В₂ при одновременном внесении в пробирки с изучаемым адсорбентом галлуазитом (рис. 4).

Рисунок 4 – Показатели адсорбционной способности нанотрубок галлуазита в отношении группы афлатоксинов В₁ и В₂ (соотношение токсинов к сорбенту 1:1000)

Показано, что показатели сорбции у нанотрубок галлуазита снижались при одно-

временном внесении суммы афлатоксинов на 3,9; 11,8; 4,0% в кислой, нейтральной, щелоч-

ной среде с учетом десорбции в отношении афлатоксина В₁ и 9,3; 2,3; 10,5% соответственно в отношении афлатоксина В₂.

Заключение. Галлуазит представляет собой тип алюмосиликатной глины с полый нанотрубчатой структурой и набором характеристик, которые делают его дешевым, доступным, долговечным, механически прочным и биосовместимым. Показано, что именно галлуазит обладает наилучшими показателями сорбции (94,7%).

При повышении pH среды у всех изучаемых адсорбентов наблюдалась десорбция афлатоксина В₁ с наименьшими показателями у галлуазита на уровне $0,3 \pm 0,1$ и наибольшими у Микосорба на уровне $6,7 \pm 0,9\%$ соответственно. Адсорбция нано-

трубками афлатоксина В₂ составила $83,9 \pm 1,5\%$. При одновременном внесении в пробирки афлатоксинов В₁ и В₂ показатели сорбции у нанотрубок галлуазита снижались в пределах 3,9 - 11,8%.

Исследование показало, что в перспективе нанотрубки галлуазита можно рассматривать в качестве мощного инструмента для ослабления или предотвращения неблагоприятного воздействия афлатоксинов на животных, а также конечного потребителя – человека. В дальнейшем адсорбционную активность галлуазита *in vitro* необходимо подтвердить в опытах на лабораторных и сельскохозяйственных животных, т.к. в настоящее время нет моделей, полностью имитирующих условия желудочно-кишечного тракта.

Литература

1. Валиев, А.Р. Микотоксикологический анализ кормов из Калужской области / А.Р. Валиев, Н.Н. Мишина, Р.М. Потехина, С.А. Танасева, Л.А. Авакумова, А.И. Никитин, Э.И. Семенов // Материалы четвертого съезда микологов России: Современная микология в России. – 2017. – Т.7. – С. 191-192.
2. Оразова, С.С. Эффективность использования природных сорбентов восточного Казахстана в очистке воды от ионов тяжелых металлов (Cu²⁺) / С.С. Оразова, В.М. Белов, В.В. Евстигнеев // Известия Томского политехнического университета. – 2007. – Т. 311. – №2. – С. 150–152.
3. Соколов, В.Н. Глинистые породы и их свойства / В.Н. Соколов // Соросовский образовательный журнал. – 2000. – Т. 6. – №9. – С. 59–65.
4. Танасева, С.А. Афлатоксикоз свиней: эффективная схема лечения / С.А. Танасева, Л.Е. Матросова, Э.И. Семенов // Свиноводство. – №4. – 2016. – С. 51-53.
5. Танасева, С.А. Мониторинг афлатоксинов в кормах из Рязанской области / С.А. Танасева, В.И. Босяков // Материалы научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора В.А. Киршина: «Актуальные проблемы ветеринарной медицины». – Казань. – 2018. – С. 191-193.
6. Тарасова, Е.Ю. Поиск эффективных адсорбентов Т-2 токсина / Е.Ю. Тарасова, Э.И. Семенов, А.Р. Валиев, Л.Е. Матросова // Вестник Марийского государственного университета серия «Сельскохозяйственные науки. Экономические науки». – 2019. – Т.5. – №3. – С.322-329.
7. De Ruyc, K. Dietary mycotoxins, co-exposure, and carcinogenesis in humans: Short review / K. De Ruyc; M. De Boevre; I. Huybrechts; S. De Saeger // Mutat. Res. Rev. – 2015. – №766. – P. 32–41.
8. Gao, R. Modified halloysite nanotubes reduce the toxic effects of zearalenone in gestating sows on growth and muscle development of their offsprings / R. Gao, Q. Meng, M. Li et al. // Journal of Animal Science and Biotechnology. – 2016. – V. 29. – P. 7-14.
9. Hussain, Z. Residues of aflatoxin B1 in broiler meat: Effect of age and dietary aflatoxin B1 levels / Z. Hussain, M.Z. Khan, A. Khan, I. Javed, M.K. Saleemi, S. Mahmood, M.R. Asi // Food Chem. Toxicol. – 2010. – №48. – P. 3304–3307.
10. Ismail, H. The effect of halloysite nanotubes as a novel nanofiller on curing behavior, mechanical and microstructural properties of ethylene propylene diene monomer (EPDM) nanocomposites / H. Ismail, P. Pasbakhsh, M.N. Ahmad Fauzi, A. Abu Bakar // Polym Plast Technol. – 2009. – V. 48. – P. 313-323.
11. Khlangwiset, P. Aflatoxins and growth impairment: A review / P. Khlangwiset, G.S. Shephard, F. Wu // Crit. Rev. Toxicol. – 2011. – №41. – P. 740–755.
12. Pitt, J.I. A concise history of mycotoxin research / J.I. Pitt, J.D. Miller // J. Agric. Food Chem. – 2017. – №65. – P. 7021–7033.
13. Semenov, E.I. Joint effect of the mycotoxins T-2 toxin, deoxynivalenol and zearalenone on the weaner pigs against a background of the infection load / E.I. Semenov, M.Y. Tremasov, L.E. Matrosova,

E.Y. Tarasova, M.A. Kryuchkova, S.Y. Smolentsev, V.P. Korosteleva // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. - 2016. - V.7. - P. 1860-1868.

14. Vergano, V. Halloysite clay nanotubes for resveratrol delivery to cancer cells / V. Vergano, Y. Lvov, S. Leporatti // Macromol Biosci. - 2012. - V.12. - P. 1265-1271.

15. Wu, F. Public health impacts of foodborne mycotoxins / F. Wu, J.D. Groopman, J.J. Pestka // Rev Food Sci. Technol. - 2014. - №5. - P. 351-372.

16. Zhai, R. Immobilization of enzyme biocatalyst on natural halloysite nanotubes / R. Zhai, B. Zhang, L. Liu, Y. Xie, H. Zhang, J. Liu // Catalysis Commun. - 2010. - V.12. - P. 259-263.

17. Zhang, Y. Use of modified halloysite nanotubes in the feed reduces the toxic effects of zearalenone on sow reproduction and piglet development / Y. Zhang, R. Gao, M. Liu et al. // Theriogenology. - 2015. - V. 83. - P. 932-941.

18. Zhao, Y. Halloysite nanotube clay for efficient water purification / Y. Zhao, E. Abdullayev, A. Vasiliev et al. // Journal of Colloid and Interface Science. - 2013. - V. 406. - P. 121-129.

STUDY OF SORPTION ACTIVITY OF POTENTIAL MEANS OF PREVENTION OF MYCOTOXICOSIS AGAINST AFLATOXINS

Tarasova E.Yu. - Candidate of Biological Sciences, Semenov E.I. - Candidate of Biological Sciences, Matrosova L.E. - Doctor of Biological Sciences, Mishina N.N. -Candidate of Biological Sciences, Mukharlyamova A.Z. - Lead Engineer

FSBSI «Federal Center for Toxicology,
radiation and biological safety»
(420075, Kazan, Nauchniygorodok- 2, e-mail: vnivi@mail.ru)

*The natural presence of mycotoxins in feed and food is a serious problem worldwide that can cause irreversible health problems in humans and animals. Among the various mycotoxins, aflatoxins, which are low molecular weight compounds produced by *Aspergillus flavus* and *Aspergillus parasiticus*, are considered the strongest teratogens, mutagens and carcinogens. In this regard, the problem of obtaining and searching for new enterosorbents, as well as the development of new sorption technologies, is very urgent. Therefore, there is a constant search for drugs that do not violate homeostasis and are able to remove from the body products of impaired metabolism, the vital activity of pathogenic microorganisms and toxic compounds obtained from the external environment. In vitro study of the adsorption capacity of bentonites of Biklyansk and Tarn-Varfields, halloysite nanotubes, commercial preparations (Polysorb VP and Mikosorb) with aflatoxin B1 showed that halloysite has the best sorption rates (94.7%) and, in the future, may be used to fight aflatoxicosis of animals, birds, and in the food chain and humans. With an increase in the pH of the medium from 2 to 8, the desorption of aflatoxin B1 was observed in all studied adsorbents with the lowest values for halloysite at the level of 0.3 ± 0.1 and the highest for Mikosorb at the level of $6.7 \pm 0.9\%$, respectively. The adsorption of aflatoxin B2 by nanotubes was $83.9 \pm 1.5\%$. With the simultaneous introduction of aflatoxins B1 and B2 into test tubes, the sorption parameters of halloysite nanotubes decreased by 3.9; 11.8; 4.0% in an acidic, neutral, alkaline environment, taking into account the desorption for aflatoxin B1 and 9.3; 2.3; 10.5%, respectively, with respect to aflatoxin B2. The data obtained make halloysite nanotubes very interesting for further studies in relation to other mycotoxins and their combinations, as well as its comprehensive study as a means of reducing the toxic load on the body of farm animals and birds.*

Keywords: mycotoxicosis, aflatoxin B1, aflatoxin B2, adsorption, desorption, enterosorbent, bentonite, halloysite, chromatogram, nanotubes.

References

1. Valiev, A.R. Mycotoxicological analysis of feed from the Kaluga region / A.R. Valiev, N.N. Mishina, R.M. Potekhina, S.A. Tanaseva, L.A. Avakumova, A.I. Nikitin, E.I. Semenov // Materials of the Fourth Congress of Mycologists of Russia: Modern Mycology in Russia. - 2017. - T.7. - P. 191-192.

2. Orazova, S. S. Effectiveness of using natural sorbents of eastern Kazakhstan in water purification from heavy metal ions (Cu²⁺) / S.S. Orazova, V.M. Belov, V.V. Evstigneev // *Bulletin of the Tomsk Polytechnic University*. - 2007. - T. 311. - No. 2. - P. 150-152.
3. Sokolov, V.N. Clay rocks and their properties / V.N. Sokolov // *Soros Educational Journal*. - 2000. - T. 6. - No.9. - P. 59-65.
4. Tanaseva, S.A. Pig aflatoxicosis: an effective treatment regimen / S.A. Tanaseva, L.E. Matrosova, E.I. Semenov // *Pig production*. - No. 4. - 2016. - P. 51-53.
5. Tanaseva, S.A. Monitoring aflatoxins in feed from the Ryazan region / S.A. Tanaseva, V.I. Bosyakov // *Materials of the scientific-practical conference dedicated to the 90th birthday of Professor V.A. Kirshina: "Actual problems of veterinary medicine."* - Kazan. - 2018. - P. 191-193.
6. Tarasova, E.Yu. Search for effective T-2 toxin adsorbents / E.Yu. Tarasova, E.I. Semenov, A.R. Valiev, L.E. Matrosova // *Bulletin of the Mari State University series*. - 2019. - T.5. - No. 3. - P. 322-329.
7. De Ruyck, K. Dietary mycotoxins, co-exposure, and carcinogenesis in humans: Short review. / K. De Ruyck; M. De Boevre; I. Huybrechts; S. De Saeger // *Mutat. Res. Rev.* - 2015. - No. 766. - P. 32-41.
8. Gao, R. Modified halloysite nanotubes reduce the toxic effects of zearalenone in gestating sows on growth and muscle development of their offsprings / R. Gao, Q. Meng, M. Li et al. // *Journal of Animal Science and Biotechnology*. - 2016. - V. 29. - P. 7-14.
9. Hussain, Z. Residues of aflatoxin B1 in broiler meat: Effect of age and dietary aflatoxin B1 levels / Z. Hussain, M.Z. Khan, A. Khan, I. Javed, M.K. Saleemi, S. Mahmood, M.R. Asi // *Food Chem. Toxicol.* - 2010. - No. 48. - P. 3304-3307.
10. Ismail, H. The effect of halloysite nanotubes as a novel nanofiller on curing behavior, mechanical and microstructural properties of ethylene propylene diene monomer (EPDM) nanocomposites / H. Ismail, P. Pasbakhsh, M.N. Ahmad Fauzi, A. Abu Bakar // *PolymPlast Technol.* - 2009. - V. 48. - P. 313-323.
11. Khlangwiset, P. Aflatoxins and growth impairment: A review / P. Khlangwiset, G.S. Shephard, F. Wu // *Crit. Rev. Toxicol.* - 2011. - No. 41. - P. 740-755.
12. Pitt, J.I. A concise history of mycotoxin research / J.I. Pitt, J.D. Miller // *J. Agric. FoodChem.* - 2017. - No. 65. - P. 7021-7033.
13. Semenov, E.I. Joint effect of the mycotoxins T-2 toxin, deoxynivalenol and zearalenone on the weaner pigs against a background of the infection load / E.I. Semenov, M.Y. Tremasov, L.E. Matrosova, E.Y. Tarasova, M.A. Kryuchkova, S.Y. Smolentsev, V.P. Korosteleva // *Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences*. - 2016. - V.7. - P. 1860-1868.
14. Vergano, V. Halloysite clay nanotubes for resveratrol delivery to cancer cells / V. Vergano, Y. Lvov, S. Leporatti // *Macromol Biosci.* - 2012. - V.12. - P. 1265-1271.
15. Wu, F. Public health impacts of foodborne mycotoxins / F. Wu, J.D. Groopman, J.J. Pestka // *Rev Food Sci. Technol.* - 2014. - No. 5. - P. 351-372.
16. Zhai, R. Immobilization of enzyme biocatalyst on natural halloysite nanotubes / R. Zhai, B. Zhang, L. Liu, Y. Xie, H. Zhang, J. Liu // *Catalysis Commun.* - 2010. - V.12. - P. 259-263.
17. Zhang, Y. Use of modified halloysite nanotubes in the feed reduces the toxic effects of zearalenone on sow reproduction and piglet development / Y. Zhang, R. Gao, M. Liu et al. // *Theriogenology*. - 2015. - V. 83. - P. 932-941.
18. Zhao, Y. Halloysitenanotubule clay for efficient water purification / Y. Zhao, E. Abdullayev, A. Vasiliev et al. // *Journal of Colloid and Interface Science*. - 2013. - V. 406. - P. 121-129.

ВЛИЯНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО ПРЕМИКСА НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ В СУХОСТОЙНЫЙ И НОВОТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОДЫ

Шельмакова К.С. – аспирантка, Мунгин В.В. – доктор сельскохозяйственных наук,
Крисанов А.Ф. – доктор сельскохозяйственных наук

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарева»
(430005, г. Саранск, ул. Большевикская, 68, e-mail: kafedra_zoo@agro.mrsu.ru)

Высокая продуктивность коров, долголетие и здоровье одна из главных задач специалистов-животноводов. Напряженность организма при высокой продуктивности коров возрастает, в связи с чем требуется более тщательный подход в кормлении. Витаминную и минеральную недостаточность животные испытывают в первую очередь. Исследования, проведенные на молочно-товарной ферме в ООО «Нива» Октябрьского района г.о.Саранска, показали: включение в рационы коров премикса «ТРАУ» в количестве 150 г во второй группе на голову в сутки в сухостойный и новотельный периоды положительно отразилось на биохимических показателях крови, с одновременным увеличением удоев в период раздоя. В крови коров в сухостойный период благодаря премиксу увеличилось содержание общего белка на 3,6-5,8% и данное преимущество сохранялось до 60 дня лактации. Отмечено также достоверное повышение содержания резервной щелочности к третьему месяцу лактации.

Ключевые слова: коровы, кормление, премикс, кровь, биохимические показатели.

В современном животноводстве при индустриальных способах содержания животные испытывают значительные физические нагрузки из-за различных внешних раздражающих и стрессовых ситуаций. Особенно к этому чувствительны высокопродуктивные коровы, у которых чрезмерное физиологическое напряжение всех органов и высокий уровень обмена веществ в организме. В этих условиях животные предъявляют повышенное требование к питанию. Они должны быть обеспечены достаточным и оптимальным содержанием питательных, минеральных и биологически активных веществ в рационе. С этой целью широко используют различные добавки к рационам, в частности витаминно-минеральные премиксы [1,4]. О состоянии здоровья, интенсивности обмена веществ и продуктивности животных можно судить по биохимическим показателям крови.

Целью наших исследований было изучение влияния одного из витаминно-минеральных премиксов на биохимические показатели крови коров сухостойного и новотельного периода.

Материал и методы. Научно-хозяйственный опыт проведен в ООО «Нива» Октябрьского района г. Саранска на молочно-товарной ферме с привязной системой содержания, на коровах черно-пестрой породы со среднегодовым удоем 7,5- 8 тыс. кг. По принципу аналогов (возрасту, живой массе, продуктивности за предыдущую лактацию) были сформированы четыре группы в начале сухостойного периода (7 месяцев стельности) по 10 голов в каждой.

Для балансирования рационов коров в сухостойный и новотельный периоды применяли минерально-витаминный премикс, состав которого приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Премикс «ТРАУ» для крупного рогатого скота

Состав	№ 1- для сухостойных коров	№ 2-для лактирующих коров
Витамин А	300000 МЕ/кг	600000 МЕ
Витамин D3	6000 МЕ/кг	120000 МЕ
Витамин Е	1225 МЕ/кг	2500 МЕ
Медь	375 мг/кг	750 мг
Цинк	500 мг/кг	1000 мг
Марганец	250 мг/кг	500 мг
Йод	25 мг/кг	50 мг
Магний	110 г/кг	130 г
Хлорид	340 г/кг	116,70 г
Сера	30 г/кг	0,37 г
Селен	10 мг/кг	20 мг
Кобальт	10 мг/кг	20 мг
Кальций	-	160 г
Фосфор	-	1,20 г
Натрий	-	75,46 г
Калий	-	2,06 г

Минерально-витаминный премикс № 1 предназначен для сухостойных коров и скармливался в дозах: первая опытная группа по 100 г на голову в сутки, вторая – по 150 и третья – по 200 г. Животные контрольной группы его

не получали. В новотельный период коровы опытных групп ежедневно получали по 200 г премикса № 2, предназначенного для дойных коров, а особям контрольной группы он не скармливался (табл. 2).

Таблица 2 – Схема научно-хозяйственного опыта

Группа	Схема кормления	
	Сухостойный период	Новотельный период
Контрольная	Основной рацион (ОР)	Основной рацион (ОР)
I опытная	ОР+100 г премикса №1	ОР+200 г премикса №2
II опытная	ОР+150 г премикса №1	ОР+200 г премикса №2
III опытная	ОР+200 г премикса №1	ОР+200 г премикса №2

Рационы кормления составлялись согласно детализированным нормам РАСХН [2] с учётом химического состава местных кор-

мов. Состав рациона для сухостойных и новотельных коров представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Рацион коров сухостойного и новотельного периодов

Ингредиент	Период		
	Дойный	Сухостойный	Транзитный
Компоненты рациона			
Сенаж разнотравный, кг	20	10	10
Силос кукурузный, кг	18,4	6,9	7,2
Шрот подсолнечный, кг	2	1,9	1,9
Жом свекловичный сухой, г	844		-
Кукуруза (плющенная), кг	-	2,1	2,4
Дробина пивная сушёная, кг	2,7	2,6	1,8
Солодовые ростки, г	-	372	936
Смесь концентратов, кг	4,7		1,8
Солома ячменная, кг	-	2	-

Содержание питательных веществ			
ЭКЕ	21,515	12,598	13,642
ОКЕ	215,151	125,980	136,417
Сухое вещество, кг	20,545	12,577	12,580
Сырое протеин, г	3044,227	2121,788	2223,566
Перевариваемый протеин, г	2257,663	1556,879	1668,633
Расщепляемый протеин, г	2195,626	1603,815	1583,242
Нерасщепляемый протеин, г	848,601	517,973	640,324
Лизин, г	98,454	67,851	71,534
Метионин, г	49,056	34,551	34,669
Триптофан, г	29,204	20,079	23,224
Сырая клетчатка, г	3993,684	2762,586	2163,144
Крахмал, г	3768,728	1549,579	2567,640
Сахар, г	889,880	539,076	545,486
Сырой жир, г	734,501	494,230	467,724
Натрий, г	40,331	19,543	17,588
Хлор, г	123,392	60,027	53,749
Кальций, г	135,134	60,749	56,929
Фосфор, г	94,710	63,280	66,594
Магний, г	57,716	34,148	33,411
Калий, г	336,080	182,998	168,204
Сера, г	53,202	32,095	35,604
Железо, мг	7236,641	4649,439	3782,483
Медь, мг	259,622	168,011	156,929
Цинк, мг	958,498	604,446	579,750
Марганец, мл	1133,037	706,096	614,825
Кобальт, мг	6,493	3,355	3,409
Йод, мг	6,986	3,789	3,208
Каротин, мг	876,048	401,942	400,394
Витамин D, тыс. МЕ	4,532	2,175	2,170
Витамин E, мг	1851,952	733,832	825,661

В хозяйстве практикуется двукратная раздача кормов в виде кормосмеси. С первого дня эксперимента кормосмесь коров опытных групп обогащалась витаминно-минеральным премиксом согласно схеме применения (табл.2). Новотельные коровы опытных групп премикс №2 получали в одинаковой дозе, чтобы проследить последствия премикса сухостойного периода [3,5]. Содержание биохимических показателей в сыворотке крови определяли в Республиканской ветеринарной службе Республики Мордовия ГБУ «Мордовская Республиканская ветеринарная лаборатория».

Результаты исследований. Одним из основных биохимических показателей крови

коров является содержание общего белка. Наши исследования показали, что данные показатели у всех животных во всех периодах находились в пределах физиологической нормы.

Тем не менее, у коров опытных групп в сухостойный период отмечается тенденция к повышению общего белка в сыворотке крови. К моменту отела оно повысилось на 3,6-5,8% ($p>0,05$) и такое преимущество сохранялось до 60-го дня лактации. В этот период коровы получали другой премикс, который предназначен для лактирующих коров, но он не оказал аналогичного положительного действия, а на 90-й день лактации уровень общего белка был даже ниже, чем в контроле (табл.4).

Таблица 4 – Биохимические показатели крови сухостойных и новотельных коров

возраст	Общий белок, г/л				
	7 мес.	1 сут.	1 мес.	2 мес.	3 мес.
Контроль	7,43±0,392	7,68±0,303	7,67±0,287	7,47±0,140*	7,90±0,176*
1-опытная	7,67±0,518	8,13±0,322	8,01±0,19	7,98±0,374	7,64±0,598
2-опытная	7,97±0,579	7,98±0,194	7,96±0,308	8,14±0,268	7,55±0,037
3-опытная	7,78±0,156	7,96±0,140	8,32±0,609	7,95±0,053*	7,88±0,153*
возраст	Глюкоза, мг/%				
	7 мес.	1 сут.	1 мес.	2 мес.	3 мес.
Контроль	69,31±8,714	52,01±19,494	37,66±32,025	21,84±3,376	25,60±11,928*
1-опытная	78,55±4,62***	24,40±3,384	45,00±20,4***	22,00±2,148	33,83±22,1**2
2-опытная	73,24±7,422*	22,06±0,937	45,86±18,67**	34,50±12,80***	48,75±17,407
3-опытная	73,16±6,296*	23,98±2,396*	38,94±11,834	24,67±1,420*	28,53±0,919*
возраст	Фосфор, мМоль/л				
	7 мес.	1 сут.	1 мес.	2 мес.	3 мес.
Контроль	1,94±0,122	2,37±0,093	2,41±0,414	2,37±0,449	1,84±0,092
1-опытная	1,85±0,13	2,36±0,456	2,57±0,370	1,99±0,302	1,90±0,161
2-опытная	1,93±0,903	2,85±0,385	2,05±0,358	2,44±0,602	1,67±0,183
3-опытная	2,09±0,182	2,71±0,248	2,25±0,444	1,75±0,122	1,72±0,024
возраст	Резервная щелочность, об.%CO ₂				
	7 мес.	1 сут.	1 мес.	2 мес.	3 мес.
Контроль	39,80±1,305	40,03±1,019	40,17±0,410	38,53±0,233	36,60±0,055
1-опытная	41,23±1,802	40,87±0,775	41,57±1,077	39,50±0,611	39,10±0,40**
2-опытная	40,67±2,067*	40,47±1,071	39,20±1,682	37,30±1,082	44,07±1,714*
3-опытная	44,43±0,698	39,90±0,52	41,37±1,757	39,20±0,361	43,60±0,693***
возраст	Кальций, мМоль/л				
	7 мес.	1 сут.	1 мес.	2 мес.	3 мес.
Контроль	2,95±0,125	3,01±0,470	2,28±0,394	2,48±0,217	2,21±0,011
1-опытная	2,84±0,082	2,47±0,032	2,80±0,584	2,48±0,237	2,45±0,207
2-опытная	3,31±0,187	2,67±0,416	2,83±0,584	2,49±0,025	2,71±0,415
3-опытная	2,78±0,023	2,92±0,158	2,24±0,377	2,31±0,095	2,29±0,023

Примечание: * - $p \leq 0,05$; ** - $p \leq 0,01$; *** - $p \leq 0,001$

Скармливание коровам витаминно-минерального премикса, предназначенного для сухостойных коров, существенно повлияло на энергетический обмен. Известно, что функцию наиболее доступного источника энергии выполняет глюкоза. По нашим данным, у коров в период запуска (7 мес. стельности) содержание глюкозы превышало физиологическую норму. Однако к моменту отела (1-й день после отела) её уровень резко упал у всех коров опытных групп, содержание её было в 2 раза ниже физиологической границы. В то же время у контрольных животных её уровень снизился незначительно и не выходил за пределы физиологической нормы. К 30-дню лактации поло-

жение изменилось, содержание глюкозы у животных в опытных группах повысилось до нижней границы физиологической нормы, но в последствие отметилась тенденция к снижению и её содержание уже не поднималось до уровня сухостойного периода [6,7]. О состоянии бикарбонатной буферной системы плазмы крови можно судить по физиологической величине резервной щёлочности, которая колеблется в пределах 48-66 об. % CO₂. Чем больше двууглекислого натрия в плазме, тем больше её щёлочные резервы и буферная способность по отношению к кислотам.

По результатам исследований показатели резервной щёлочности в сыворотке

крови, как в контрольной, так и в опытных группах, находились близко к нижней границе физиологической нормы. Достоверное повышение её уровня наблюдалось у коров, получавших премикс, лишь на 3-ем месяце лактации. О состоянии минерального обмена в организме животных можно судить по содержанию в сыворотке крови общего кальция и неорганического фосфора. По своему содержанию и действию на биологические системы организма они занимают ведущее место среди других минеральных элементов. Ионы кальция способствуют возбуждению и сокращению мышечной ткани, поддерживают кислотно-щелочное равновесие в организме, участвуют во всех стадиях свертываемости крови. Ещё более многообразные функции выполняет фосфор, являясь наиболее активным элементом, он играет более важную роль в обмене белков, жиров и углеводов, в синтезе, ферментов, гормонов и витаминов. Наши исследования показали, что содержание изучаемых элементов у всех подопытных коров находилось в границе физиологической нормы. Скармлива-

ние коровам витаминно-минерального премиксов не оказало влияния на содержания кальция и фосфора в крови животных. Достоверных различий в их показателях по группам животных не установлено.

Заключение. На основании биохимических показателей крови можно утверждать, что премикс, предназначенный для сухостойных коров, положительно повлиял на содержание общего белка в сыворотке крови до 60 дней лактации. Также данный премикс повлиял на резкое снижение глюкозы в крови: в первый день после отела концентрация ее снизилась в два раза в сравнении с седьмым месяцем стельности, но к 30 дню лактации её уровень восстановился. Показатели резервной щелочности у всех подопытных животных находились ниже физиологической нормы. Достоверные повышения её в крови коров отмечались лишь на 3-ем месяце лактации. Содержание общего кальция и неорганического фосфора у всех коров находилось на границе физиологической нормы как в сухостойный, так и в новотельный периоды.

Литература

1. Кузнецов, С.Г. Минеральные добавки и витамины для животных / С.Г. Кузнецов // Достижения науки и техники АПК. – 1999. - №5. – С. 34-35.
2. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. Справочное пособие / Под ред. А.П. Калашникова, В.И. Фисинина, В.В. Щеглова, Н.И. Клейменова. – Москва, 2003. -456 с.
3. Организация научно-обоснованного кормления высокопродуктивного скота: практические рекомендации. Боровск, 2008. 43 с.
4. Подобед, Л.И. Почему премиксы эффективны не всегда? / Л.И. Подобед // Зоотехния. – 2002. №4. – С. 11-13.
5. Сафонов, В.А. Изменения биохимических показателей крови у высокопродуктивных коров во второй половине беременности и в послеродовой период / В.А. Сафонов, А.Г. Нежданов, М.И. Рецкий, В.И. Шушлебин // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. - 2008. - №3. - С. 74-76.
6. Физиологические потребности в питательных веществах и нормирование питания молочных коров: справочное руководство. Боровск, 2000. - 134 с.
7. Юдин, М.Ф. Физиологическое состояние организма коров в разные сезоны года / М.Ф. Юдин // Ветеринария. - 2001. - №2 - С. 38-41.

THE EFFECT OF VITAMIN-MINERAL PREMIX ON THE BIOCHEMICAL BLOOD PARAMETERS OF HIGHLY PRODUCTIVE COWS DURING DRY AND FRESH PERIODS

Shelmakova K.S. - Graduate student, Mungin V.V. - Doctor of Agricultural Sciences,
Krisanov A. F. - Doctor of Agricultural Sciences

FSBEI of HE "National Research Mordovian
State University named after N.P. Ogareva
(430005, Saransk, 68 Bolshevistskaya St., e-mail: kafedra_zoo@agro.mrsu.ru)

Cows' high productivity, longevity and health are one of the main targets of livestock specialists. The higher cow's productivity the more its organism tension, therefore more accurate feeding is required. Firstly, animals have vitamin and mineral deficiency. During the studies conducted on a dairy farm in LLC Niva in Oktyabrsky district of Saransk, the following has been revealed: inclusion in cows' rations the premix "TRAU" in the amount of 150 g. per head per day (in the second group) in dry and fresh periods had a positive effect on the biochemical parameters of blood, with a simultaneous increase in milk yield during milking. Due to the premix, the total protein content in the cows' blood in the dry period increased by 3.6-5.8% and this advantage was remaining until the 60th day of lactation. A significant increase in the content of reserve alkalinity by the third month of lactation was also noted.

Keywords: cows, feeding, premix, blood, biochemical parameters.

References

1. Kuznetsov, S. G. Mineral supplements and vitamins for animals / S.G. Kuznetsov // Achievements of science and technology of Agro-industrial complex. - 1999. - No. 5. - P. 34-35.
2. Norms and rations for farm animals feeding. Reference manual / Ed. A.P. Kalashnikova, V.I. Fisina, V.V. Shcheglova, N.I. Kleimenova. - Moscow, 2003. -456 p.
3. Organization of evidence-based feeding of highly productive livestock: practical recommendations. Borovsk. 2008.43 p.
4. Podobed, L.I. Why are premixes not always effective? / L.I. Podobed // Zootechnics. - 2002. No. 4. - PP. 11-13.
5. Safonov, V.A. Changes in blood biochemical parameters in highly productive cows in the second half of pregnancy and in the postpartum period / V.A. Safonov, A.G. Nezhdanov, M.I. Retsky, V.I. Shushlebin // Bulletin of the Russian Academy of Agricultural Sciences. - 2008. - No.3. - P. 74-76.
6. Physiological nutritional needs and rationing of dairy cows: a reference guide. Borovsk, 2000. - 134 p.
7. Yudin, M.F. The physiological state of cows' body in different seasons of the year / M.F. Yudin // Veterinary Medicine. - 2001. - No. 2 - P. 38-41.

УДК 63.636.7.045

DOI 10.33632/1998-698X.2020-2-64-73

ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ГЕПАТОЦИТНАЯ ПРОИЗВОДНАЯ микроРНК КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БИОМАРКЕР ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У СОБАК

Эль-Себаей А. М. – аспирант, **Абрамов П.Н.** – кандидат ветеринарных наук, доцент

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина»
(109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д.23; e-mail: dr.sebaey@yahoo.com)

Гиперлипидемия является одним из основных факторов риска развития стеатоза и фиброза печени, а также гипомобилизации желчного пузыря и образования холестериновых желчных камней, которые, если их не диагностировать на ранней стадии, могут являться факторами риска для жизни. Целью данного исследования было оценить возможное использование полученных из гепатоцитов сfa-микроРНК сыворотки (122, 34a и 21) в качестве раннего информативного и прогностического биомаркера желчнокаменной болезни (ЖКБ) у собак. При проведении исследований у всех больных животных диагностировали ЖКБ связанную со стеатозом и / или фиброзом, на основании результатов ультразвуковых и гистопатологических исследований. Биохимический анализ выявил значительное повышение аланинаминотрансферазы (АЛТ, $P < 0,05$), аспаратаминотрансферазы (АСТ, $P < 0,05$), щелочной фосфатазы (ЩФ, $P < 0,001$), гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ, $P < 0,001$), а также концентрации в сыворотке общего холестерина ($P < 0,001$) и триглицеридов ($P < 0,001$) у собак с ЖКБ и стеатозом печени (ЖКБ + С) или фиброзом (ЖКБ + Ф) по отношению к контрольной группе. Полученные из гепатоцитов сfa-miR-122 и 34a были значительно экспрессированы в сыворотке крови собак в группах ЖКБ + С ($P < 0,001$) и ЖКБ + Ф

*($P < 0,01$) по сравнению с контролем, тогда как *сfa-miR-21* регулировался только в сыворотке крови собак в группе ЖКБ + Ф по отношению к ЖКБ + С ($P < 0,01$) и контрольной группе ($P < 0,001$). Результаты исследования показали, что полученные из гепатоцитов *сfa*-микроРНК в сыворотке (122, 34а и 21) обычно связаны молекулярным путем с гиперлипидемией и могут рассматриваться как ранний информативный и прогностический биомаркер печеночного стеатоза и / или фиброза, ассоциируемого или приводящего к ЖКБ у собак.*

Ключевые слова: гиперлипидемия, стеатоз печени, фиброз печени, ЖКБ у собак, УЗИ, гистология, *сfa*-микроРНК.

Желчекаменная болезнь (ЖКБ) - это патологическое состояние, при котором в желчном пузыре обнаруживаются камни, в основном состоящие из холестерина, билирубината кальция и билирубина [16]. Большинство случаев ЖКБ у собак протекают бессимптомно. Поэтому если не проведена ранняя диагностика, то может возникнуть обструкция внепеченочных желчных путей из-за миграции одного или нескольких микролитов холестерина в общий желчный проток. Также это может привести к холециститу и острому панкреатиту [17, 23]. Этиопатогенез ЖКБ у собак до сих пор неизвестен и, вероятно, является многофакторным [20]. Таким образом, образование желчных конкрементов не может быть заранее предсказано для принятия профилактических мер, поэтому, как только они обнаружены во время диагностических исследований, рекомендуется профилактическая холецистэктомия, чтобы избежать осложнений и смертности [28]. Одна из гипотез заключается в том, что гиперлипидемия (гиперхолестеринемия и гипертриглицеридемия) будет способствовать накоплению холестерина в печени, повреждению гепатоцитов и фиброзу в ответ на поражение печени у животных, что может снизить чувствительность желчного пузыря к холецистокинину, перенасыщению желчи печеночным холестерином и развитию твердых пластинчатых кристаллов моногидрата [6,15,1,24,13].

К сожалению, современные биохимические тесты на заболевания печени результативны, но не достоверны на ранней стадии стеатоза печени, или при прогнозировании ЖКБ. Они информативны, когда болезнь прогрессирует [5,11,22]. С другой стороны, обычное ультразвуковое исследование не является чувствительным методом, если 30% или менее паренхимы печени подвержена стеатозу [26,8]. Таким образом, биопсия печени является золотым стандартом для диагностики стеатоза печени, ведущего к ЖКБ, но несмотря на это, не

может использоваться регулярно, поскольку это инвазивный диагностический инструмент, приводящий к серьезным осложнениям [27]. Идентификация неинвазивных сывороточных биомаркеров, отражающих молекулярные механизмы, участвующие в развитии гиперлипидемии и стеатоза, может сыграть ключевую роль в раннем прогнозировании, диагностике и даже профилактике холестериновых желчных камней.

Исследование микроРНК (короткие некодирующие РНК длиной 22 нуклеотида) было введено в качестве неинвазивного диагностического биомаркера из-за их секреции почти во все жидкости организма и наличия значительного соответствия между их уровнями в сыворотке и тканях при различных болезненных состояниях, таких как ожирение печени, фиброз печени и цирроз [25,10]. Хорошо известно, что *miR-122* как одна из наиболее распространенных микроРНК в гепатоцитах (приблизительно 70% всех печеночных микроРНК) в сочетании с другими формами микроРНК, такими как *miR-34a* и *miR-21*, как известно, играет решающую роль в регуляции экспрессии гена после транскрипции, которая связана с нарушением метаболизма липидов и холестерина в гепатоцитах [11,10].

Целью нашего исследования являлась оценка возможного использования полученных из гепатоцитов *сfa*-микроРНК сыворотки (122, 34а и 21) в качестве раннего информативного и прогностического биомаркера для диагностики стеатоза и / или фиброза печени, связанных с ЖКБ или приводящих к ней.

Материал и методы. Исследования проводили на чистопородных собаках (n=45) разной массы и возраста в Инновационном ветеринарном центре (ИВЦ), Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА. У тридцати собак, принадлежащих частным владельцам, при ультразвуковом исследовании (Mindray DC-8 Expert®, преобразователь 6,5–8 МГц, Китай),

были обнаружены камни в желчном пузыре, сопровождаемые диффузной гиперэхогенностью печени. Ультразвуковое исследование проводили в качестве быстрого неинвазивного метода для скрининга наличия или отсутствия камней в желчном пузыре и дифференцирования их от полипов желчного пузыря путем оценки гравитационной подвижности камней. На основании проведенного УЗИ (рис. 1), а также гистопатологических данных, животные были разделены на две группы ЖКБ + С и ЖКБ + Ф по 15 животных в каждой. Для сравнения, 15 клинически здоровых собак являлись контролем.

Сбор и обработка образцов Кровь брали в пробирку (Vacuette® GreinerBio-One GmbH) от всех животных контрольной и опытных групп. После взятия её оставили в холодильнике на 15 минут для максимального отведения сгустка. Сыворотку получали центрифугированием при 3000 об/мин в течение 10 минут при 20 °С на центрифуге CM-6 MSky Line (ELMI®, Латвия).

Отделенная сыворотка была распределена на два образца, первый из которых был направлен на биохимическое исследование, а второй был сохранен при -80 °С для анализа микроРНК. Кроме того, во время профилактической холецистэктомии от каждой собаки брали образцы печени при биопсии. Кроме того, у животных контрольной группы проводили биопсию печени под контролем УЗИ с использованием основной иглы (springcut®, Sterylab, Италия). Полученные образцы фиксировали в 10% формалине до гистопатологического исследования.

Анализ биохимических показателей сыворотки. Активность АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТ, амилазы и липазы в сыворотке, а также концентрацию общего белка (О. Белок), альбумина, общего билирубина (О. Билирубин), общего холестерина, триглицеридов, креатинина и глюкозы оценивали с использованием CatalystNSAID 6 Clip® and CatalystChem 17Clip® (IDEXX Laboratories®, США).

Гистопатологические исследования. Из полученных образцов печени готовили срезы толщиной 4 мкм которые окрашивали гематоксилином и эозином (Г&Э) (Кат. № RRSK26; AtomScientific®, Великобритания) для гистологического исследования [7]. Волокна соединительной ткани (коллаген типа I и III) в печени определяли по Picrosiriusred (Кат. № KT037; Diagnostic BioSystems®, Нидер-

ланды) [3]. Гистопатологическую оценку проводили с помощью микроскопа Микмед-5® (“ЛОМО”, Россия) [4].

Выделение РНК. Общую РНК, включая микроРНК, выделяли из каждого образца с использованием реагента для лизиса (QIAzol®) в составе набора для сыворотки / плазмы miRNeasy (Кат. № 217184 Qiagen®, Германия) в соответствии с инструкциями производителя. После этого, вариация от образца к образцу была нормализована во время процедуры выделения путем добавления 3,5 мкл синтетического *Caenorhabditis elegans* микроРНК-39 (cel-miR-39, Кат. № 219610, Qiagen®, Германия) в качестве контроля выброса к каждому денатурированному образцу сыворотки в $1,6 \times 10^8$ копий / мкл рабочего раствора [21].

Концентрацию и чистоту выделенных образцов РНК определяли путем измерения их оптической плотности при 260 нм и 280 нм с помощью Nanophotometer® (NP80, Германия) и соотношений РНК (A260: A280), равных и / или более чем в 1.6 [18].

Обратная транскрипция и количественное определение микроРНК с помощью полимеразной цепной реакции в реальном времени (ОТ-ПЦР). Выделенные образцы РНК подвергали обратной транскрипции с использованием набора miScriptIIRT (Кат. № 218160, Qiagen®, Германия) для получения комплементарной ДНК в соответствии с инструкциями производителя. ОТ-ПЦР проводили в системе обнаружения ПЦР в реальном времени CFX-96® (Bio-Rad, США) для определения относительной экспрессии выбранных микроРНК и экзогенного cel-miR-39 с использованием набора miScriptSYBRGreen ПЦР (Кат. № 218073 Qiagen®, Германия), как описано в справочнике miScript-ПЦР-System-справочник. Специфичные прямые праймеры для представляющих интерес cfa-микроРНК были разработаны Евроген Компани (Москва, Россия). Условия реакции амплификации ПЦР были следующими: 1 цикл в течение 15 минут начальной денатурации при 95 °С и 45 циклов 3-этапной ПЦР, включая 15 секунд денатурации при 94 °С, фазу отжига при 55 °С в течение 30 секунд, и фазу удлинения в течение 30 секунд при 70 °С. Все анализы проведены в трех повторностях для каждого образца, и средний порог цикла (СТ) каждой эндогенной cfa-микроРНК был оценен и нормализован относительно экзогенного синтетического кон-

троля (cel-miR-39), который добавляли во время выделения РНК, и все данные были относительно выражены как кратное изменение по сравнению с контролями с использованием сравнительного метода C_T (метод $2^{-\Delta\Delta C_T}$) [19].

Статистический анализ. Полученные данные были статистически обработаны с использованием SPSS версии 20,0 (IBM Corp., Нью-Йорк, США). Расчетные непрерывные переменные включали: возраст, живую массу, биохимические показатели, уровень экспрессии сfa-микроРНК в сыворотке. Категориальная переменная включала породу и пол. Тест Шапиро-Уилка использовали для определения нормального распределения непрерывных переменных. Все они были нормально распределены ($p > 0,05$), кроме уровней экспрессии сfa-микроРНК ($p < 0,05$). Следовательно, среднее $\pm$ стандартное отклонение (SD) использовали для выявления нормально распределенных переменных, в то время как значимые различия между группами оценивали путем применения

одностороннего ANOVA с последующим тестированием и коррекцией Бонферрони [14]. Кроме того, медиана и диапазон были использованы для описания уровней экспрессии микроРНК, а достоверные различия между группами оценивали с помощью теста Крускала-Уоллиса с последующим тестированием и коррекцией Бонферрони. Для всех результатов уровень значимости составлял $P < 0,05$.

Результаты исследований. Анализ таблицы 1 показал, что в обеих группах ЖКБ была в основном диагностирована у мелких пород самок собак, таких как Миниатюрная такса, Цвергшнауцер и Чихуахуа, и включала в себя неспецифические клинические признаки (прерывистая рвота, летаргия, анорексия, полиурия). Средний возраст животных опытных групп был выше ($P < 0,001$), по сравнению с животными контрольной группы.

По массе тела между группами нами достоверных отличий обнаружено не было ($P > 0,05$).

Таблица 1 - Породные, возрастные данные и пол, показатели массы тела у опытных и контрольной групп животных

Переменные	Группы, (n = 15)		
	Контроль	ЖКБ + С	ЖКБ + Ф
Порода (№)			
Цвергшнауцер	(3)	(4)	(5)
Гончая	(1)	(2)	(0)
Русский тойтерьер	(3)	(1)	(1)
Чихуахуа	(5)	(3)	(4)
Миниатюрная такса	(3)	(5)	(5)
Пол (№)	Самка (7), Самец (8)	Самка (12), Самец (3)	Самка (13), Самец (2)
Возраст (лет), Среднее $\pm$ SD	5,60 $\pm$ 1,44	8,02 $\pm$ 1,08***	8,70 $\pm$ 1,35***
Масса тела (кг), Среднее $\pm$ SD	5,60 $\pm$ 1,37	6,17 $\pm$ 1,42 ¹	6,88 $\pm$ 1,39

(* $P < 0,05$, ** $P < 0,01$, *** $P < 0,001$) между группами

Из данных таблицы 2 очевидно, что сывороточная активность АЛТ ($P < 0,05$), АСТ ($P < 0,05$) ЩФ ($P < 0,001$) и ГГТ ($P < 0,001$), а также концентрация общего холестерина ($P < 0,001$) и триглицеридов ($P < 0,001$) в сыворотке крови были значительно повышены у собак группы ЖКБ + С и ЖКБ + Ф по сравнению с контрольной группой, в то время как

при анализе всех остальных показателей (О. Белок, альбумина, О. Билирубин, глюкоза, креатинин, липаза и амилаза) значимых различий нами выявлено не было ($P > 0,05$).

При проведении гистологического исследования нами не отмечены патологические изменения в структуре печени у контрольной группы животных.

Таблица 2 - Биохимические показатели крови животных контрольной и опытных групп

Переменные	Groups		
	Контроль	ЖКБ + С	ЖКБ + Ф
АЛТ (ед/л)	41,12 ± 3,87	47,62 ± 4,36*	47,20 ± 4,26*
АСТ (ед/л)	33,36 ± 2,58	37,24 ± 4,69*	38,65 ± 3,30*
ЩФ (ед/л)	72,40 ± 4,12	102,08 ± 13,24***	115,14 ± 7,20***
ГГТ (ед/л)	6,91 ± 0,57	8,31 ± 1,14***	8,54 ± 0,82***
О. Белок (г/дл)	5,95 ± 0,45	5,81 ± 0,69	5,54 ± 0,67
Альбумин (г/дл)	2,84 ± 0,41	2,76 ± 0,29	2,69 ± 0,44
О. Билирубин (мкмоль/л)	4,24 ± 0,64	4,41 ± 0,57	4,36 ± 0,54
Холестерин (мкмоль/л)	5,12 ± 0,75	9,61 ± 1,19***	9,34 ± 1,25***
Триглицериды (мкмоль/л)	0,83 ± 0,21	2,53 ± 0,43***	2,24 ± 0,24***
Глюкоза (мг/дл)	4,36 ± 0,71	4,61 ± 0,42	4,55 ± 0,48
Креатинин (мкмоль/л)	44,76 ± 6,32	42,83 ± 5,69	45,24 ± 6,22
Липазы (ед/л)	125,36 ± 13,51	124,00 ± 10,21	126,14 ± 9,75
Амилаза (ед/л)	167,65 ± 15,13	172,52 ± 21,42	173,89 ± 19,53

(* P<.05, ** P<.01, *** P<.001). между группами

Скопление жира в гепатоцитах мы отметили в группе ЖКБ + С, которое прогрессировало в волокнистую соединитель-

ную ткань (коллаген типа I и III) у собак группы ЖКБ + Ф (рис. 2).

Рисунок 2 - Репрезентативная гистопатология у собак с ЖКБ + С и ЖКБ + Ф, а также у животных контрольной группы. Окраска гематоксилин и эозин. Не измененная паренхима печени (А). Микровезикулярный и макровезикулярный стеатоз у собак группы ЖКБ + С (Б). Прогрессирование стеатоза печени в фиброзную ткань (В). Красные коллагеновые волокна (типы I и III) в паренхиме печени (Г) у собак группы ЖКБ + Ф.

Сfa-miR-122 и сfa-miR-34a, полученные из гепатоцитов, были значительно экспрессированы в сыворотке крови собак в пре-

делах ЖКБ + С (изменение средней складки = 6,43 и 4,16 соответственно, P<0,001) и группы ЖКБ + Ф (изменение средней складки= 3,97 и

2,64 соответственно, $P < 0,01$) по сравнению с контролем. Полученный из гепатоцитов *сfa-miR-21* был только повышен в сыворотке крови собак в группе ЖКБ + Ф (изменение средней складки = 5,80) по отношению к животным группы ЖКБ + С ($P < 0,01$) и контрольной группы ($P < 0,001$).

Заключение. Проведенные исследования позволили заключить, что гиперлипидемия является основной причиной стеатоза пе-

чени, которая может способствовать образованию желчных камней или развитию фиброза. Исследование микроРНК (*сfa-miR-122*, *сfa-miR-34a*, *сfa-miR-21*) играет роль в изучении липидного обмена. Потенциально этот показатель выражен у собак с ЖКБ, связанной со стеатозом печени или фиброзом, и может в будущем служить новым неинвазивным диагностическим биомаркером для ранней диагностики ЖКБ и гепатопатий в целом.

Литература

1. Бартош, Л.Ф. Новые подходы к диагностике и лечению гиперкинетических дискинезий желчного пузыря в сочетании с хроническим некалькулезным холециститом / Л.Ф. Бартош, И.В. Балакина, Л.М. Гриднева // Клиническая медицина. - 2004. - № 9. - С. 57- 59.
2. Гуцол, Л. О. Роль микроРНК в регуляция метаболизма холестерина / Л. О. Гуцол, Е. Ю. Коршунова, С. Ф. Непомнящих // Современные проблемы науки и образования. - 2019. - № 4. - С. 144-154.
3. Иванченкова, Р.А. Инновации в диагностике и лечении желчнокаменной болезни / Р.А. Иванченкова, А.В. Егоров, А.Е. Леонович, Е.Р. Атькова // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. - 2012. - № 4. - С.66-73.
4. Мараховский, Ю.Х. Желчнокаменная болезнь: современное состояние проблемы / Ю.Х. Мараховский // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. - 2003. - № 1. - С. 81-92.
5. Arguello, G. Recent insights on the role of cholesterol in non-alcoholic fatty liver disease / G. Arguello, E. Balboa, M. Arrese, S. Zanlungo // Biochimica et Biophysica Acta-Molecular Basis of Disease. - 2015. - №. 1852 (9). - P.1765-1778.
6. Constantine, V.S. A combined tissue stain for the selective staining of collagen, elastic fibers and acidic carbohydrates / V. S. Constantine // J. Invest. Dermatol. - 1969. - №. 52. - P.353-356.
7. Cullen, J. M. Morphological classification of circulatory disorders of the canine and feline liver / J.M. Cullen et al. – In WSAVA standards for clinical and histological diagnosis of canine and feline liver disease, Philadelphia, PA Saunders Elsevier, Edinburgh, UK, 2006. – 41-59 p.
8. Das K. Non-Alcoholic Steatohepatitis / K.Das, P. Kar // J Assoc Physicians India. - 2005. - №. 53 - P.195-199.
9. Di Ciaula, A. Current views on genetics and epigenetics of cholesterol gallstone disease / A. Di Ciaula, D. Q. H. Wang, L. Bonfrate, P. Portincasa // Cholesterol. - 2013. - №. 2013. - P. 1-10.
10. Feldman, A.T. Tissue processing and hematoxylin and eosin staining / A.T. Feldman, D. Wolfe // Methods. Mol. Biol. - 2014. - №.1180. - P. 31-43.
11. Ferreira, D.M. Revisiting the metabolic syndrome and paving the way for microRNAs in non-alcoholic fatty liver disease / D.M. Ferreira, A.L. Simão, C.M. Rodrigues, R.E. Castro // FEBS J. - 2014. - №. 281. - P. 2503-2524.
12. Florescu, L.M. CT and MRI findings in biliary tract obstruction / L. M. Florescu, A.M. Lapadat, S. Bondari, I. Gheonea // European Congress of Radiology. - 2018. - №. 618. - P. 1-43.
13. Irvani, F. Role of MicroRNAs in Pathophysiology of Non-alcoholic Fatty Liver Disease and Non-alcoholic Steatohepatitis / F. Irvani, N. Hosseini, M. Mojarad // Middle East journal of digestive diseases. - 2018. - №. 10 (4). - P. 213.
14. Kakimoto, T. Effect of a high-fat-high-cholesterol diet on gallbladder bile acid composition and gallbladder motility in dogs / T. Kakimoto, H. Kanemoto, K. Fukushima, K. Ohno, H. Tsujimoto // American journal of veterinary research. - 2017. - №. 78 (12). - P. 1406-1413.

15. Kirkwood, B.R. Essential medical statistics / B.R. Kirkwood, J. Sterne. 2-nd ed. – Malden, MA: Blackwell, 2003.
16. Kutsunai, M. The association between gall bladder mucocoeles and hyperlipidaemia in dogs: a retrospective case control study / M. Kutsunai, H. Kanemoto, K. Fukushima, Y. Fujino, K. Ohno, H. Tsujimoto // *The Veterinary Journal*. - 2014. - №. 199 (1). - P.76-79.
17. Larson, M.M. Ultrasound imaging of the hepatobiliary system and pancreas / M.M. Larson // *Veterinary Clinics: Small Animal Practice*. - 2016. - №. 46 (3). - P.453-480.
18. Lee, S. Associations between serum leptin levels, hyperlipidemia, and cholelithiasis in dogs / S. Lee, O. K. Kweon, W. H. Kim // *PloS one*. - 2017. - №. 12 (10). - e0187315.
19. Lin, M.S. Aberrant expression of microRNAs in serum may identify individuals with pancreatic cancer / M.S. Lin, W.C. Chen, J.X. Huang, H.J. Gao, H.H. Sheng // *Int. J. Clin. Exp. Med*. - 2014. - №. 7. - P. 5226-5234.
20. Livak, K.J. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2- $\Delta\Delta$ CT method / K. J. Livak, T. D. Schmittgen // *Methods*. - 2001. - №. 25. - P. 402-408.
21. Mitchell, P.S. Circulating microRNAs as stable blood-based markers for cancer detection / P.S. Mitchell, R.K. Parkin, E.M. Kroh, B. R. Fritz, S.K. Wyman, E.L. Pogosova, D.W. Lin // *P NAS*. - 2008. - №. 105. - P. 10513-10518.
22. Mofrad, P. Clinical and histologic spectrum of nonalcoholic fatty liver disease associated with normal ALT values / P. Mofrad, M.J. Contos, M. Haque, C. Sargeant, R.A. Fisher, V. A. Luketic, A. J. Sanyal // *Hepatology*. - 2003. - №. 37 (6). - P. 1286-1292.
23. Pike, F.S. Gallbladder mucocoele in dogs: 30 cases (2000–2002) / F.S. Pike, J. Berg, N.W. King, D. G. Penninck, C.R. Webster // *Journal of the American Veterinary Medical Association*. - 2004. - №.224 (10). - P. 1615-1622.
24. Saraç, S. Leptin levels and lipoprotein profiles in patients with cholelithiasis / S. Saraç, A. Atamer, Y. Atamer, A.S. Can, A. Bilici, I. Taçyildiz, N. Yenice // *Journal of International Medical Research*. - 2015. - №.43 (3). - P. 385-392.
25. Schueller, F. The role of miRNAs in the pathophysiology of liver diseases and toxicity / F. Schueller, S. Roy, M. Vucur, C.Trautwein, T. Luedde, C. Roderburg // *International journal of molecular sciences*.-2018. - № 19 (1). - P. 261.
26. Spengler, E.K. Recommendations for diagnosis, referral for liver biopsy and treatment of non-alcoholic fatty liver disease and non-alcoholic steatohepatitis / E.K. Spengler, R. Loomba // *Mayo Clin Proc*. - 2015. - № 90. - P. 1233–1246.
27. Thampanitchawong, P. Liver biopsy: complications and risk factors / P. Thampanitchawong, T. Piratvisuth // *World journal of gastroenterology*. - 1999. - № 5 (4). - P. 301.
28. Youn, G. Outcome of elective cholecystectomy for the treatment of gallbladder disease in dogs / G. Youn, M. J. Waschak, K. A. Kunkel, P. D. Gerard // *Journal of the American Veterinary Medical Association*. - 2018. - №. 252 (8). - P. 970-975.

CIRCULATING HEPATOCYTE DERIVED MICRORNA AS A DIAGNOSTIC BIOMARKER OF GALLSTONE DISEASE IN DOGS

El-Sebaey A.M. – Postgraduate student,
Abramov P.N. – Candidate of Veterinary Science, Associate Professor

FSBEI of HE "Moscow State Academy of Veterinary
Medicine and Biotechnology - MVA named after K.I. Stryabin "
(109472, Moscow, Akademika Skryabin St., 23; e-mail: dr.sebaey@yahoo.com)

Hyperlipidemia is one of the major risk factors of hepatic steatosis and/or fibrosis together with a gallbladder hypomotility and cholesterol gallstone formation which if not diagnosed early would be life threatening. The aim of this study was to assess the possible use of hepatocyte derived serum cfa-miRNAs (122, 34a and 21) as an early informative and predictive biomarker of cholelithiasis in dogs. Fifteen healthy dogs were enrolled in the study together with thirty client-owned dogs that confirmed to have cholelithiasis associated with hepatic fatty changes and/or fibrosis based on ultrasonographic and histopathological findings. Biochemical analysis revealed the significant elevation of alanine aminotransferase (ALT, $P < 0.05$), aspartate aminotransferase (AST, $P < 0.05$), alkaline phosphatase (ALP, $P < 0.001$), gamma glutamyltransferase (GGT, $P < 0.001$) as well as the serum concentrations of total cholesterol ($P < 0.001$) and triglyceride ($P < 0.001$) in dogs of cholelithiasis and hepatic steatosis (GS+HL) or fibrosis (GS+HF) with respect to the control group. Hepatocyte derived cfa-miR-122 and 34a were significantly expressed in serum of dogs within GS+HL ($P < 0.001$) and GS+HF groups ($P < 0.01$) compared to control whereas cfa-miR-21 was only up regulated in serum of dogs within GS+HF group with respect to GS+HL ($P < 0.01$) and control group ($P < 0.001$). These results indicate that hepatocyte derived serum cfa-miRNAs (122, 34a and 21) usually related to the molecular pathway of hyperlipidemia and may be considered as an early informative and predictive biomarker of hepatic steatosis and/or fibrosis associated with or leaden to canine cholelithiasis.

Keywords: Hyperlipidemia, hepatic steatosis, hepatic fibrosis, canine cholelithiasis, ultrasonography, histopathology, cfa-miRNAs.

References

1. Bartosh, L.F. New approaches to the diagnosis and treatment of hyperkinetic gallbladder dyskinesia in combination with chronic non-calculous cholecystitis / L.F. Bartosh, I.V. Balakina, L.M. Gridneva // Clinical Medicine. - 2004. - No.9. - P. 57-59.
2. Gutsol, L.O. Role of the microRNAs in the regulation of cholesterol metabolism / L.O. Gutsol, E. Yu. Korshunova, S.F. Nepomnyashchikh // Modern problems of science and education. - 2019. - No. 4. - P. 144-154.
3. Ivanchenkova, R.A. Innovation in the diagnosis and treatment of gallstone disease / R.A. Ivanchenkova, A.V. Egorov, A.E. Leonovich, E.R. Atkova // Experimental and Clinical Gastroenterology. - 2012. - No.4. - P. 66-73.
4. Marakhovsky, Yu.Kh. Gallstone disease: the current state of the problem / Yu.Kh. Marakhovsky // Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology and Coloproctology. - 2003. - No.1. - P. 81-92.
5. Arguello, G. Recent insights on the role of cholesterol in non-alcoholic fatty liver disease / G. Arguello, E. Balboa, M. Arrese, S. Zanlungo // Biochimica et Biophysica Acta-Molecular Basis of Disease. - 2015. - No.1852 (9). - P. 1765-1778.

6. Constantine, V.S. A combined tissue stain for the selective staining of collagen, elastic fibers and acidic carbohydrates / V. S. Constantine // *J. Invest. Dermatol.* - 1969. - No.52. - P. 353-356.
7. Cullen, J.M. Morphological classification of circulatory disorders of the canine and feline liver/ J.M. Cullen et al. – In *WSAVA standards for clinical and histological diagnosis of canine and feline liver disease*, Philadelphia, PA Saunders Elsevier, Edinburgh, UK, 2006. – 41-59 p.
8. Das K. Non-Alcoholic Steatohepatitis / K. Das, P. Kar // *J Assoc Physicians India.* - 2005. - No. 53 - P. 195-199.
9. Di Ciaula, A. Current views on genetics and epigenetics of cholesterol gallstone disease / A. Di Ciaula, D. Q. H. Wang, L. Bonfrate, P. Portincasa // *Cholesterol.* - 2013.- No. 2013. - P. 1-10.
10. Feldman, A.T. Tissue processing and hematoxylin and eosin staining / A.T. Feldman, D.Wolfe // *Methods. Mol. Biol.* - 2014. - No. 1180. - P.31-43.
11. Ferreira, D.M. Revisiting the metabolic syndrome and paving the way for microRNAs in non-alcoholic fatty liver disease / D.M. Ferreira, A.L. Simão, C.M. Rodrigues, R.E. Castro // *FEBS J.* - 2014. - No.281. - P. 2503-2524.
12. Florescu, L.M. CT and MRI findings in biliary tract obstruction / L.M. Florescu, A.M. Lapadat, S. Bondari, I. Gheonea // *European Congress of Radiology.* - 2018. - No. 618. - P. 1-43.
13. Irvani, F. Role of MicroRNAs in Pathophysiology of Non-alcoholic Fatty Liver Disease and Non-alcoholic Steatohepatitis / F. Irvani, N. Hosseini, M. Mojarad // *Middle East journal of digestive diseases.*-2018. - No. 10 (4). - P. 213.
14. Kakimoto, T. Effect of a high-fat–high-cholesterol diet on gallbladder bile acid composition and gallbladder motility in dogs / T. Kakimoto, H. Kanemoto, K. Fukushima, K. Ohno, H. Tsujimoto // *American journal of veterinary research.* - 2017. - No. 78 (12). - P. 1406-1413.
15. Kirkwood, B.R. Essential medical statistics / B.R. Kirkwood, J. Sterne. 2-nd ed.– Malden, MA: Blackwell, 2003.
16. Kutsunai, M. The association between gall bladder mucocoeles and hyperlipidaemia in dogs: a retrospective case control study / M. Kutsunai, H. Kanemoto, K. Fukushima, Y. Fujino, K. Ohno, H. Tsujimoto // *The Veterinary Journal.* - 2014. - No. 199 (1). - P. 76-79.
17. Larson, M.M. Ultrasound imaging of the hepatobiliary system and pancreas / M.M. Larson // *Veterinary Clinics: Small Animal Practice.* - 2016. - No. 46 (3). - P. 453-480.
18. Lee, S. Associations between serum leptin levels, hyperlipidemia, and cholelithiasis in dogs / S. Lee, O. K. Kweon, W. H. Kim // *PloS one.* - 2017. - No. 12 (10). - e0187315.
19. Lin, M.S. Aberrant expression of microRNAs in serum may identify individuals with pancreatic cancer / M.S. Lin, W. C. Chen, J. X. Huang, H. J. Gao, H. H. Sheng // *Int. J. Clin. Exp. Med.* - 2014. - No.7. - P. 5226-5234.
20. Livak, K.J. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2– $\Delta\Delta$ CT method / K. J. Livak, T. D. Schmittgen // *Methods.* - 2001. - No. 25. - P. 402-408.
21. Mitchell, P.S. Circulating microRNAs as stable blood-based markers for cancer detection / P.S. Mitchell, R.K. Parkin, E.M. Kroh, B.R. Fritz, S.K. Wyman, E.L. Pogosova, D.W. Lin // *P NAS.* - 2008. - No. 105. - P. 10513-10518.
22. Mofrad, P. Clinical and histologic spectrum of nonalcoholic fatty liver disease associated with normal ALT values / P. Mofrad, M.J. Contos, M. Haque, C. Sargeant, R.A. Fisher, V. A. Luketic, A. J. Sanyal // *Hepatology.* - 2003. - No. 37 (6). - P. 1286-1292.
23. Pike, F.S. Gallbladder mucocoele in dogs: 30 cases (2000–2002) / F. S. Pike, J. Berg, N. W. King, D. G. Penninck, C. R. Webster // *Journal of the American Veterinary Medical Association.* - 2004. - No. 224 (10). - P. 1615-1622.

24. Saraç, S. Leptin levels and lipoprotein profiles in patients with cholelithiasis / S. Saraç, A. Atamer, Y. Atamer, A.S. Can, A. Bilici, I.Taçyildiz, N. Yenice // Journal of International Medical Research. - 2015. - No. 43 (3). - P. 385-392.
25. Schueller, F. The role of miRNAs in the pathophysiology of liver diseases and toxicity / F. Schueller, S. Roy, M. Vucur, C. Trautwein, T. Luedde, C. Roderburg // International journal of molecular sciences.-2018. - No. 19 (1). - P. 261.
26. Spengler, E.K. Recommendations for diagnosis, referral for liver biopsy and treatment of non-alcoholic fatty liver disease and non-alcoholic steatohepatitis / E.K. Spengler, R. Loomba // Mayo Clin Proc. - 2015. - No. 90. - P. 1233–1246.
27. Thampanitchawong, P. Liver biopsy: complications and risk factors / P. Thampanitchawong, T. Piratvisuth // World journal of gastroenterology. - 1999. - No. 5 (4). - P. 301.
28. Youn, G. Outcome of elective cholecystectomy for the treatment of gallbladder disease in dogs / G. Youn, M.J. Waschak, K.A. Kunkel, P.D. Gerard // Journal of the American Veterinary Medical Association.-2018. - No. 252 (8). - P. 970-975.

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПУБЛИКУЕМЫМ В ЖУРНАЛЕ «ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ»

Статьи для публикации в журнале принимаются как на русском, так и английском языках.

1. Для публикации статьи необходимо предоставить следующий пакет документов:

- текст статьи в электронном виде в формате Word, шрифт Times New Roman, 11 кегль, одинарный интервал. Высылается на электронную почту редакции: vetvrach-vnivi@mail.ru;
- объем статьи должен быть не менее 4-х страниц (без учета резюме на русском и англ. языках);
- экземпляр статьи, распечатанный на бумаге и подписанный всеми авторами;
- сопроводительное письмо организации (пишется в свободной форме на имя главного редактора);
- справка (образец на сайте www.vetvrach-vnivi.ru).

Вышеперечисленные документы высылаются почтой по адресу: 420075, г.Казань, Научный городок-2. ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» (для редакции).

2. Научные статьи излагаются по следующей схеме:

УДК (УДК, соответствующий тематике Вашей статьи, можно выбрать на сайте <http://teacode.com/online/udc/>);

название статьи - должно быть кратким, отражать суть материала;

авторы – Фамилия И.О. – ученая степень, ученое звание (если имеется) (пример: Иванов И.И. – доктор биологических наук, профессор);

место работы всех авторов - полное название организации, почтовый адрес, город, телефон, (с указанием кода города), эл. почта;

Реферат. Рекомендуемый объем не менее 200-250 слов. В начале РЕ повторяется название статьи. Реферат РЕ разбивается на абзацы. Реферат кратко отражает структуру работы. Очень не рекомендуем использовать слова "мы", "в статье" и "авторы". Вводная часть минимальна. Место исследования уточняется до области (края). Изложение результатов содержит КОНКРЕТНЫЕ сведения (выводы, рекомендации и т.п.). Допускается введение сокращений в пределах реферата (понятие из 2-3 слов заменяется на аббревиатуру из соответствующего количества букв, в 1-й раз дается полностью, сокращение – в скобках, далее используется только сокращение). Избегайте использования вводных слов и оборотов! Числительные, если не являются первым словом, передаются цифрами. Нельзя использовать аббревиатуры и сложные элементы форматирования (например, верхние и нижние индексы). Категорически не допускаются вставки через меню «Символ», знак разрыва строки, знак мягкого переноса, автоматический перенос слов.

Ключевые слова – не менее 5.

Текст статьи. Излагается структурировано: Введение. Материал и методы. Результаты исследований. Заключение. Каждый раздел начинается с красной строки. Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках арабскими цифрами [2, 4]. Единицы измерений и размерности даются по ГОСТу «Единицы физической величины» (в соответствии с Международной системой СИ).

Список использованной литературы. Оформляется по ГОСТу 7.1-2011. Не менее 7 источников.

3. Английская часть статьи. В нее входит: название статьи, авторы, название учреждения, резюме, ключевые слова, литература.

Summary: недопустимо использование машинного перевода!!! Вместо десятичной запятой используется точка. Все русские аббревиатуры передаются в расшифрованном виде, если у них нет устойчивых аналогов в англ. яз.

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

Статьи, оформленные не по требованиям журнала, к рассмотрению не принимаются.

REQUIREMENTS FOR ARTICLES PUBLISHED IN “THE VETERINARIAN” JOURNAL

Articles for publication in the journal are accepted in both Russian and English.

1. To publish an article, you must provide the following documents:

- text of the article in electronic form in Word format, font Times New Roman, 11 pt., single spacing. It shall be sent to the editors by email: vetvrach-vnivi@mail.ru;
- the article size should be at least four pages (excluding summaries in Russian and English);
- a copy of the article printed on paper and signed by all authors;
- cover letter of the organization (written in free form addressed to the Editor-in-Chief);
- reference (sample on the website www.vetvrach-vnivi.ru).

The above documents are sent by mail to: 420075 Kazan, Nauchniy Gorodok-2, Federal State Budgetary Research Institution (Editorial office) «Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety Russian Research Veterinary Institute» (FCTRBS-RRVI).

2. Scientific articles are presented as follows:

- UDC (UDC corresponding to the subject of your article can be chosen on the website <http://teacode.com/online/udc/>);

- title of the article - should be brief and reflect the subject of the material;
- authors – full name, academic degree, academic title (if any) (example: I.I. Ivanov - Doctor of Biological Sciences, Professor);
- place of work - full name of the organization, mailing address, city, phone (post code), e-mail;
- abstract. Recommended volume is at least 200-250 words. The title of the article is NOT repeated at the beginning of the abstract. The abstract is NOT divided into paragraphs. The abstract briefly reflects the structure of the research work. We strongly recommend not using the words "we", "in the article" and "authors". The introduction must be minimal. The place of research is specified to the region (area). The statement of results contains SPECIFIC information (conclusions, recommendations, etc.). It is allowed to introduce abbreviations within the abstract (a concept of 2-3 words is replaced by an abbreviation of the corresponding number of letters, first it is given in full, the abbreviation is in brackets, then only the abbreviation is used). Avoid using introductory words and phrases! Numerals, if not the first word, are transmitted in numbers. Abbreviations and complex formatting elements (for example, superscripts and subscripts) cannot be used in the research paper. Inserts through the “Symbol” menu, a line break, a soft hyphen, an automatic word wrap are strictly not allowed.

Keywords - at least 5.

- the text of the article. The following parts of the paper must be structured: Introduction, Materials and Methods, Results, Conclusion. Each section begins with a new line. References to the literature are given in the text in square brackets in Arabic numerals [2, 4]. Units of measurement and dimensions are given in accordance with GOST "Units of physical quantity" (International System of Units).

- list of the literature is issued in accordance with GOST 7.1-2011. At least 7 sources.

3. The English part of the article includes: title of the article, authors, name of the institution, summary, keywords, references.

Summary: machine translation is not allowed !!! Instead of a decimal comma, a dot is used. All Russian abbreviations are transmitted in decrypted form, if they do not have stable analogues in English.

Postgraduate students are not charged for publishing manuscripts.

Articles formatted not according to the requirements of the journal are not accepted for consideration

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ

ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» (ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

И.о. главного редактора **Василевский Николай Михайлович** - доктор ветеринарных наук, профессор ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»

Василевич Ф.И. - доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН, ректор МГАВМиБ им. К.И. Скрябина (Москва)

Донник И.М. - доктор биологических наук, профессор, академик РАН, вице-президент РАН (Москва)

Равилов Р.Х. - доктор ветеринарных наук, профессор, ректор КГАВМ им. Н.Э. Баумана (Казань)

Сибататуллин Ф.С. - доктор ветеринарных наук, профессор, член-корреспондент АН РТ, депутат Государственной думы РФ (Казань)

Смирнов А.М. - доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН (Москва)

Сочнев В.В. - доктор ветеринарных наук, профессор, член-корреспондент РАН (Н. Новгород)

Уша Б.В. - доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН (Москва)

Шабунин С.В. - доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН, директор ВНИИПФит (Воронеж)

Gormley E.R. - PhD Genetics (Дублин, Ирландия)

Harkiss G. - BSc, PhD (Эдинбург, Соединенное Королевство)

Kasem Soyong - BSc, PhD, Associate professor, президент ассоциации сельскохозяйственных технологий Юго-Восточной Азии (Бангкок, Тайланд)

РЕДАКЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Бикташев Р.У. - доктор сельскохозяйственных наук

Василевский Н.М. - доктор ветеринарных наук, профессор

Евстифеев В.В. - доктор биологических наук

Кадиков И.Р. - доктор биологических наук

Макаев Х.Н. - доктор ветеринарных наук, профессор

Низамов Р.Н. - доктор ветеринарных наук, профессор

Сантов В.Р. - доктор биологических наук

Тремасова А.М. - доктор биологических наук

Ответственный секретарь – Ю.В. Ларина

Подписной индекс: в Российской Федерации «Объединенный каталог. Пресса России. Газеты и журналы» - 43596

FSBSI «Federal Center for Toxicological, Radiation and Biological Safety» (FSBSI «FCTRBS-RRVI»).

EDITORIAL BOARD

Acting Editor-in-Chief **Vasilevsky Nikolay Mikhailovich** - Doctor of Veterinary Sciences, Professor of the FSBSI «FCTRBS-RRVI»

Vasilevich F.I. - Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Academician of the RAS, Rector of the Moscow SAVM named after K.I. Skriabin (Moscow)

Donnik I.M. - Doctor of Biology Sciences, Professor, Academician of the RAS, Vice-President of the RAS (Yekaterinburg, the Russian Federation)

Ravilov R.Kh. - Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Rector of the FSBEI HE Kazan SAVM (Kazan, the Russian Federation)

Sibatutullin F.S. - Doctor of Veterinary Sciences, Professor, corresponding member of the Academy of Sciences of RT (Kazan), member of the State Duma of the Russian Federation

Smirnov A.M. - Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Academician of the RAS (Moscow)

Sochnev V.V. - Doctor of Veterinary Sciences, Professor, corresponding member of the Academy of Sciences (NizhnyNovgorod)

Usha B.V. - Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Academician of the RAS (Moscow)

Shabunin S.V. - Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Academician of the RAS, Director of the Voronezh Scientific Veterinary Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy (Voronezh, the Russian Federation)

Gormley E.R. - Doctor PhD Genetics (Dublin, Ireland)

Harkiss G. - Dr. BSc., PhD (Edinburgh, the United Kingdom)

Kasem Soyong - Doctor PhD BSc., Associate Professor, President of the Association of Agriculture Technologies of the South east Asia (Bangkok, Thailand)

EDITORIAL EXPERT COUNCIL

Bikhtashev R.U. - Doctor of Agricultural Sciences

Vasilevsky N.M. - Doctor of Veterinary Sciences, Professor

Evstifeev V.V. - Doctor of Biological Sciences

Kadikov I.R. - Doctor of Biological Sciences

Makaev Kh.N. - Doctor of Veterinary Sciences, Professor

Nizamov R.N. - Doctor of Biological Sciences, Professor

Saitov V.R. - Doctor of Biological Sciences

Tremasova A.M. - Doctor of Biological Sciences

Executive Secretary – Yu.V. Larina

Subscription index: the Russian Federation "United catalogue. Russian Press. Newspapers and magazines" - 43596

Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство ПИ № ФС 77-77647 от 31.01.2020 г.

Адрес редакции, издателя

420075, г. Казань, Научный городок-2
ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»
Тел./факс: (843) 239-53-33
E-mail: vetvrach-vnivi@mail.ru

420075 Kazan, Nauchnyi Gorodok -2
FSBSI "FCTRBS-RRVI"
Tel./Fax: (843) 239-53-33
E-mail: vetvrach-vnivi@mail.ru

Выход в свет – 14.04.2020 г. Тираж 1350 экз. Свободная цена.

Журнал входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК.

Отпечатано в типографии «Альянс». ИП Зубков Владимир Львович. г. Казань, Сибирский тракт 34.

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

27-29 мая 2020 | Москва | ВДНХ | павильон №75

Салон «ЖИЗНЬ ФЕРМЕРА 2020»

27-29 мая 2020 г. в Москве на ВДНХ, в павильоне №75 состоится Салон «Жизнь фермера 2020» (www.rus-selo.ru). Организатор выставки - МСЕ «ЭкспоХлеб» - член Всемирной Ассоциации Выставочной Индустрии (UFI).

Компания ежегодно, на протяжении более 25 лет, проводит крупные международные выставки, которые пользуются популярностью среди специалистов не только в России, но и за рубежом.

Выставка включает в себя следующие разделы:

- Агрохимия. Растениеводство
- Животноводство. Птицеводство
- Ветеринария
- Корма;
- Пчеловодство

К участию в выставке приглашаются производители и поставщики техники, оборудования и материалов для производства, хранения и переработки животноводческой, птицеводческой и растениеводческой сельскохозяйственной продукции, производители кормов, ветеринарного оборудования и препаратов, оборудования для пчеловодства.

Экспозиции представят ветеринарные лаборатории и компании производственного сектора, ветеринарные фармакологические препараты, аппаратуру для проведения обработки животных, бесприборные средства диагностики животных, специальную одежду и средства защиты работников ферм, дезинфицирующие и антисептические средства, а также оборудование, используемое для их применения. Агрономы и селекционеры продемонстрируют приспособления и технологии для увеличения урожая, расскажут об авторских подходах к агротехнике различных культур и последних достижениях науки в области подкормок и средств защиты растений. Экспонентами раздела «Животноводство. Птицеводство» станут компании, занимающиеся производством оборудования для содержания и выращивания сельскохозяйственных животных и птицы. Тематический раздел «Корма» будет представлен производителями комбикормовой промышленности, кормовых добавок, кормами для домашних животных и оборудованием для их производства и переработки. К участию в разделе «Пчеловодство» приглашены пчеловоды-товаропроизводители, мастера по производству пчелинвентаря и воины, учебно-показательные пасеки, пчелопитомники, которые продемонстрируют свои достижения, товары для пасеки и продукты пчеловодства.

Деловая программа Салона посвящена вопросам реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участники обменяются опытом об эффективных методах развития агротуризма на базе фермерских хозяйств, обсудят особенности использования практик гастротуризма для привлечения посетителей. Также мероприятия деловой программы затронут наиболее актуальные темы и проблемы, с которыми сталкиваются сельхозтоваропроизводители.

Посетителями мероприятия станут специалисты в области ветеринарии и зоотехники, владельцы и руководители животноводческих и фермерских хозяйств, сельскохозяйственных и производственных кооперативов (СПК), представители крестьянско-фермерских (КФХ) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

В рамках Салона будет развернута Ярмарка, на которой посетителям предложат свою продукцию крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, мастера народных промыслов, пасечники, ремесленные пряничные мастерские, изготовители дикоросов, производители сопутствующего инвентаря, упаковки, сырья и ингредиентов, товаров для кондитеров.

Участие в Салоне «Жизнь фермера» - это возможность повысить узнаваемость бренда Вашей компании, привлечь внимание потенциальных покупателей к своей продукции и технологиям, обменяться опытом, наладить новые деловые контакты, найти перспективные каналы для сбыта и дистрибуции.

Регистрация СМИ доступна по ссылке <https://www.rus-selo.ru/akkreditatsiya-smi.html>

По вопросам участия в Салоне и деловой программе обращаться к Сорокиной Анне (e-mail: sa@expokhlebo.com) и Мочаловой Татьяне (e-mail: vet@expokhlebo.com),

по телефонам: (495) 755-50-38, (495) 755-50-35