УДК 556.552.2(1-924.16)

doi: 10.33933/2074-2762-2020-61-437-445

Особенности уровня режима озер Кольского полуострова

Е.В. Давыденко, Е.В. Гайдукова, М.С. Дрегваль

Российский государственный гидрометеорологический университет,
davydenko091@gmail.com

Приведены результаты обобщающего анализа уровня режима озер Куэтсъярви, Пул-озеро, Ловозеро, Умб-озеро, Пермус-озеро. Построены и проанализированы хронологические графики среднегодовых уровней воды исследуемых озер, выполнен анализ статистической структуры рядов, выявленные линейные тренды оценены на значимость, также приведены результаты спектрального анализа. Изучение особенностей уровня режима озер представляет интерес при долгосрочном прогнозировании, а также при расчете максимальных уровней воды различной обеспеченности.

Ключевые слова: озеро, уровень воды, спектральный анализ, цикличность, линейный тренд, стационарность рядов, многолетние колебания.

Features of the level regime of the Kola peninsula lakes

E.V. Davydenko, E.V. Gaidukova, M.S. Dregval

Russian State Hydrometeorological University

Natural lakes of the Kola Peninsula, located in the zone of excessive moistening, have been selected as the objects of study in this work. The article presents the results of a statistical analysis of the series of average annual water levels in the lakes of the Kola Peninsula. The homogeneity of most of the analysed series has been shown to be broken in terms of the average value and only in Lake Pul-ozero — in terms of dispersion. The water levels of the lakes have been established to be increasing in the long-term on the lakes Kuetsjärvi, Lovozero, Umb-ozero, Permuss-ozero. Significant trends have been revealed in the series of average annual levels of the lakes. The analysis of the chronological graphs of variation of the average annual water levels has revealed a general pattern, stating that the process of the lowest water content in lakes covers all the studied reservoirs simultaneously, while spring high-water periods are observed in different years. The series of average annual temperatures of air and precipitation have been analysed. Positive trends have been revealed in the series of annual precipitation and average annual air temperatures as well. Spectral analysis of the series of average annual water levels having been carried out, significant cycles of fluctuations have been identified. The study of the features of the level regime of lakes is of interest in long-term forecasting, as well as in calculating maximum water levels of various degrees of probability.

Keywords: lake, water level, spectral analysis, cyclicity, linear trend, stationarity of series, long-term fluctuations.

For citation: *E.V. Davydenko, E.V. Gaidukova, M.S. Dregval. Features of the level regime of the Kola peninsula lakes. *Gidrometeorologiya i Ekologiya*. Hydrometeorology and Ecology (Proceedings of the Russian State Hydrometeorological University). 2020. 61: 437—445. [In Russian]. doi: 10.33933/2074-2762-2020-61-437-445*

Введение

Кольский полуостров расположен на северо-западе Европейской части России, в Мурманской области. С трех сторон — севера, востока и юга — полуостров омывается Баренцевым и Белым морями. Полуостров входит в зону избыточного увлажнения и является озерным краем. Здесь насчитывается 107 146 озер, общая площадь зеркала которых составляет 8 195 км² или 6,3 % всей территории полуострова. Площадь водной поверхности менее 1 км² имеют 99 % озер. Подавляющее большинство озер являются сточными или проточными [1].

Изучение уровня режима озер является важной прикладной задачей. Озера — водоемы с замедленным водообменом, которые фиксируют водные ресурсы территории, и являются интегральным показателем увлажненности территории их бассейнов, а, следовательно, и изменений климата.

Климат Кольского полуострова находится под смягчающим влиянием окружающих его морей и особенно запасов тепла, приносимых северной ветвью теплого течения Гольфстрим. Одним из индикаторов изменения климата в атлантико-европейском секторе северного полушария является преобладание поступления в рассматриваемый район воздушных масс атлантического и арктического происхождения. Интенсивная циклоническая деятельность над Норвежским и Баренцевым морями создает своеобразный режим тепла и влаги на исследуемой территории [2, 3].

Цель статьи заключается в оценке уровня режима озер Кольского полуострова и в выявлении статистических особенностей в рядах уровней воды, которые могут быть следствием влияния изменяющего климата.

Материалы и методы

В качестве объектов исследования в данной работе были выбраны естественные сточные озера Кольского полуострова, расположенные в зоне избыточного увлажнения (табл. 1). На четырех из пяти выбранных водоемах средние многолетние амплитуды колебаний уровней воды имеют близкие значения и варьируются от 95 (Куэтсьярви) до 110 см (Пул-озеро).

Для оценки многолетней изменчивости уровней воды на исследуемых озерах анализировались данные о средних годовых значениях уровня воды $H(t)$ и последовательности ежегодных средних значений уровней $H_i(t)$ (где $i = 1, \dots, 12$ для всех месяцев года). Также были рассмотрены наименьшие за каждый год уровни воды на данных водоемах. Для оценки климата использовались данные наблюдений за температурой воздуха и осадками на метеостанциях Каневка, Ковдор, Мурманск, Янискоски (табл. 2). Эти метеостанции расположены равномерно по территории Кольского полуострова, что позволяет оценить климатические изменения по всей исследуемой области.

На рис. 1 представлена карта расположения метеостанций и гидрологических постов на озерах.

Таблица 1

Основные сведения об исследуемых озерах

Basic information about studying lakes

№ п/п	Озеро — пост	Период наблюдений	Площадь озера, км ²	Площадь водосбора, км ²	Удельный водосбор	Амплитуда, см
1	Куэтсьярви — пгт Никель	1949—2017	17	672	39,5	95
2	Пул-озеро — ст. Пулозеро	1931—2017	8,62	1130	131	110
3	Ловозеро — с. Ловозеро	1934—2017	223	3770	16,9	88
4	Умб-озеро — исток реки Умба	1931—2017	313	2380	7,60	72
5	Пермус-озеро — г. Оленегорск	1934—2017	24,4	503	20,6	73

Таблица 2

Основные сведения о метеостанциях

Basic information about meteorological stations

№ п/п	Индекс ВМО	Название метеостанции	Период наблюдений, годы		Высота станции, м БС
			температура	осадки	
1	22249	Каневка	1949—2018	1966—2018	149
2	22204	Ковдор	1952—2018	1966—2018	246
3	22113	Мурманск	1918—2018	1966—2018	57
4	22101	Янискоски	1955—2018	1970—2018	98

База исходных данных была сформирована с использованием Гидрологических ежегодников, базы данных «Основные гидрологические характеристики озер ЕТР» (ГГИ) и информационного ресурса meteo.ru.

Однородность рядов значений средних годовых уровней воды озер оценивалась по критериям Фишера и Стьюдента. Для оценки линейных трендов использовался критерий значимости выборочного коэффициента корреляции (R). Гипотеза об отсутствии тренда не опровергалась, если выполнялось условие $|R| < t_{2\alpha} \sigma_R$, при уровне значимости $2\alpha = 5\%$ [4].

Для изучения структуры временных рядов за весь период инструментальных наблюдений уровней воды исследуемых водных объектов был проведен спектральный анализ в программе *Statistica 6.0*.

Результаты

Установлено, что все ряды средних годовых уровней озер являются неоднородными. Четыре ряда из пяти (оз. Куэтсьярви, оз. Ловозеро, оз. Умб-озеро, оз. Пермус-озеро) являются неоднородными по среднему значению. Ряд уровней на озере Пулозеро неоднороден по дисперсии.

Для анализа уровня режима выбранных водоемов и выявления линейных трендов были построены хронологические графики хода средних годовых значений уровня воды (рис. 2). Качественная оценка хронологических графиков позволила выявить, что по величине среднегодового уровня на всех пяти озерах

Рис. 1. Карта расположения метеостанций и гидрологических постов на озерах.

Fig. 1. Map of the location of meteorological stations and hydrological posts on the lakes.

самым маловодным был 1960 г. Самым многоводным для озера Куэтсъярви был 1996 г., для Пермус-озера и Умб-озера — 1949 г., для Пул-озера — 1940 г., а для Ловозера — 1989 г. Но годы, в которых наблюдались наименьшие и наибольшие значения уровней воды, различны для всех озер.

Из анализа хронологических графиков хода средних годовых уровней воды выявлено, что на озерах Ловозеро, Умб-озеро и Пул-озеро в общем наблюдается высокая степень соответствия колебаний уровня воды, за исключением отдельных лет. Коэффициенты корреляции между уровнями этих озер больше 0,7. Общие закономерности флуктуаций уровня в водоемах, вероятно, связаны с поступлением воздушных масс атлантического и арктического происхождения, влиянию которых данные озера подвергаются одновременно из-за близкого расположения друг к другу.

На четырех из пяти рядов средних годовых уровней воды наблюдаются значимые тренды (табл. 3). Анализ полученных результатов показал, что в общем многолетнем разрезе наблюдается увеличение значений средних годовых уровней воды на всех водоемах, кроме озера Пул-озеро.

Рис. 2. Хронологические графики хода средних годовых уровней воды озер:

а) Куэтсъярви; б) Пермус-озеро; в) Ловозеро; г) Умб-озеро; д) Пул-озеро.

Fig. 2. Chronological graphs of the course of the average annual water levels of lakes:

а) Kuetsjärvi; б) Permус-озеро; в) Lovozero; г) Umb-озеро; д) Pul-озеро.

Таблица 3

Результаты оценки значимости
линейных трендов в рядах средних годовых уровней воды в озерах
Results of evaluating the significance
of linear trends in the series of average annual water levels in lakes

№ п/п	Озеро — пост	R	R^2	σ_R	$t_{2\alpha} \sigma_R$	$H_0: R = 0$
1	Куэтсъярви — пгт Никель	0,54	0,29	0,10	0,21	Опровергается
2	Пул-озеро — ст. Пулозеро	0,01	0,0001	0,11	0,22	Не опровергается
3	Ловозеро — с. Ловозеро	0,28	0,078	0,11	0,22	Опровергается
4	Умб-озеро — исток реки Умба	0,28	0,078	0,11	0,22	Опровергается
5	Пермус-озеро — г. Оленегорск	0,51	0,26	0,10	0,21	Опровергается

Увеличение значений средних годовых уровней воды, вероятнее всего, связано с изменением климата. Ряды средних годовых температур воздуха и сумм осадков также имеют положительные тренды (рис. 3). В некоторых рядах уровней воды, температур воздуха и годовых сумм осадков есть пропуски. Это связано с отсутствием наблюдений за некоторые месяцы, что не позволяет рассчитать средние годовые значения величин. Имеющиеся пропуски находятся в различных частях ряда, что в целом позволяет допустить, что их влияние на оценку значимости тренда не существенно.

Рис. 3. Хронологические графики хода средних годовых температур воздуха и осадков.

Fig. 3. Chronological graphs of the course of average annual air temperatures and precipitation on meteostations.

Изменение климата сказываются и на наименьших уровнях исследуемых озер. Для всех рядов уровней наблюдаются положительные тренды. На озерах Куэтсьярви и Пул-озеро эти тренды значимы.

Для изучения структуры временных рядов исследуемых водоемов в программе *Statistica 6.0* был проведен спектральный анализ. Для этого все ряды были стандартизированы, также были убраны тренды. Для оценки статистической значимости полученных спектров с помощью параметра χ^2 был рассчитан и нанесен на график односторонний уровень значимости 10 %. В результате на двух озерах было установлено наличие пиков спектральной плотности $S(\omega)$, которые соответствуют различным периодам колебаний уровня воды в озере и представлены на рис. 4.

На полученных периодограммах озер Куэтсьярви, Ловозеро и Пермус-озеро значимые пики отсутствуют, т. к. имеющиеся всплески находятся ниже принятого уровня значимости 10 %. Эти колебания могут быть связаны с автоколебаниями в системе океан—атмосфера [5]. Для озера Умб-озеро выявлены квази 4-летние флуктуации уровня (частота $0,24 \text{ год}^{-1}$). В спектрах уровня озеро Пул-озеро проявляются около 8-летние периоды колебаний (частота $0,12 \text{ год}^{-1}$).

Рис. 4. Графики спектральной плотности средних годовых уровней озер (пунктирной линией обозначены уровни значимости 10 %).

Fig. 4. Graphs of the spectral density of the average annual levels of lake (the dotted line indicates the 10% significance levels).

Для описания полученных результатов спектрального анализа использовались понятия «квази» и «около», т. к. выделенные циклы имеют небольшие вариации по временному сдвигу.

Выводы

Из анализа статистической структуры рядов средних годовых уровней воды ряда озер Кольского полуострова (Куэтсьярви, Пул-озеро, Ловозеро, Умб-озеро, Пермус-озеро) следует, что однородность большей части анализируемых рядов нарушена по среднему значению и только на озере Пул-озеро — по дисперсии.

Среднегодовые уровни воды озер увеличиваются: на озерах Куэтсьярви, Ловозеро, Умб-озеро, Пермус-озеро выявлены статистически значимые тренды на повышение уровней воды.

На озерах Умб-озеро и Пул-озеро выявлены 4-х и 8-летние циклы колебаний уровней воды. На остальных озерах такие флуктуации выявлены не были, т. к. полученные пики находятся ниже принятого уровня значимости.

Все исследуемые водные объекты имеют общую закономерность, которая состоит в том, что процесс наименьшей обводненности озер охватывает все изучаемые озера одновременно, тогда как многоводье наблюдается в различные годы. Маловодный год на всех озерах пришелся на 1960 г. Показано, что на всех представленных озерах наблюдается синхронность колебаний уровня воды.

Изучение особенностей уровня режима озер представляет интерес при долгосрочном прогнозировании, а также при расчете максимальных уровней воды различной обеспеченности.

Благодарности

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, № FSZU-2020-0009 «Исследование физических, химических и биологических процессов в атмосфере и гидросфере в условиях изменения климата и антропогенных воздействий».

Acknowledgments

The research was carried out with the financial support of the Ministry of science and higher education of the Russian Federation, № FSZU-2020-0009 “Research of physical, chemical and biological processes in the atmosphere and hydrosphere under climate change and anthropogenic impacts”.

Список литературы

1. *Мякишева Н.В.* Многокритериальная классификация озер. СПб.: Гидрометеиздат, 2009. 153 с.
2. *Малинин В.Н., Гордеева С.М.* Северо-Атлантическое колебание и увлажнение европейской территории России // Общество. Среда. Развитие. 2014. № 2. С. 191—198.
3. *Филатов Н.Н., Назарова Л.Е., Георгиев А.П., Семенов А.В., Анциферова А.Р., Ожигина В.Н., Богдан М.И.* Изменения и изменчивость климата европейского Севера России и их влияние на водные объекты // Арктика: экология и экономика. 2012. № 2 (6). С. 80—93.
4. *Сикан А.В., Малышева Н.Г., Винокуров И.О.* Статистические методы анализа гидрометеорологической информации. СПб.: РГГМУ, 2014. 76 с.
5. *Филатов Н.Н.* Изменения климата Восточной Фенноскандинавии и уровня воды крупнейших озер Европы. Петрозаводск, 1997.

References

1. *Myakisheva N.V.* *Mnogokriterial'naya klassifikatsiya ozer*. Multicriteria classification of lakes. Saint Petersburg: Gidrometoizdat, 2009: 153 p. [In Russian].
2. *Malinin V.N., Gordeeva S.M.* North Atlantic oscillation and humidification of the European territory of Russia. *Obshchestvo. Sreda. Razvitie*. Society. Environment. Development. 2014, 2: 191—198. [In Russian].
3. *Filatov N.N., Nazarova L.E., Georgiev A.P., Semenov A.V., Antsiferova A.R., Ozhigina V.N., Bogdan M.I.* Climate changes and variability in the European North of Russia and their impact on water objects. *Arktika: ekologiya i ekonomika*. Arctic: ecology and economy. 2012, 2 (6): 80—93. [In Russian].

4. *Sikan A.V., Malysheva N.G., Vinokurov I.O. Statisticheskie metody analiza gidrometeorologicheskoy informacii.* Statistical methods for the analysis of hydrometeorological information. SPb: RSHU, 2014: 76 p. [In Russian].
5. *Filatov N.N. Izmeneniya klimata Vostochnoy Fennoskandinavii i urovnya vody krupneyshikh ozer Yevropy.* Climate changes in Eastern Fennoscandia and the water level of the largest lakes in Europe. Petrozavodsk, 1997. [In Russian].

Конфликт интересов: конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 28.10.2020

Принята после доработки к публикации 02.12.2020

Сведения об авторах

Давыденко Екатерина Владимировна, старший преподаватель кафедры водно-технических изысканий, Российский государственный гидрометеорологический университет, davydenko091@gmail.com.

Гайдукова Екатерина Владимировна, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры инженерной гидрологии, Российский государственный гидрометеорологический университет, oderiut@mail.ru.

Дрегваль Мария Станиславовна, старший преподаватель кафедры инженерной гидрологии, Российский государственный гидрометеорологический университет, msdregval@mail.ru.

Information about authors

Davydenko Ekaterina Vladimirovna, Senior Lecturer, Department of Water Engineering Surveys, Russian State Hydrometeorological University, davydenko091@gmail.com.

Gaidukova Ekaterina Vladimirovna, PhD (Tech. Sci.), Associate Professor, Associate Professor, Department of Engineering Hydrology, Russian State Hydrometeorological University, oderiut@mail.ru.

Dregval Maria Stanislavovna, Senior Lecturer, Department of Engineering Hydrology, Russian State Hydrometeorological University, msdregval@mail.ru.