Coordenadores:

Luciano Lourenço

António Vieira

Metodologia de Análise de Riscos através de Estudos de Casos

RISCOS

Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Coimbra, 2018

Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os diferentes tipos de análise de riscos, pois reúne uma série de estudos sobre de diferentes casos de riscos, em que preocupa descrever com suficiente detalhe, para cada um deles, a metodologia usada para analisar cada tipo de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa que quando entramos na análise das características concretas de determinado risco, não possam existir nuances próprias, intrínsecas à sua especificidade, que merecem um tratamento particular.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande utilidade para todos os investigadores que se dediquem às temáticas nela tratadas, uma vez que aqui poderão encontrar a metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que poderá servir de suporte ao trabalho que pretendam realizar.

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA

ESTRUTURAS EDITORIAIS
Estudos Cindínicos

DIRETOR PRINCIPAL | MAIN EDITOR

Luciano Lourenço
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

DIRETORES ADJUNTOS | ASSISTANT EDITORS

António Amaro, Adélia Nunes, António Vieira, Fátima Velez de Castro
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

ASSISTENTE EDITORIAL | EDITORIAL ASSISTANT

Fernando Félix
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

COMISSÃO CIENTÍFICA | EDITORIAL BOARD

Ana Meira e Castro
Universidade do Porto

António Betâmio de Almeida
Instituto Superior Técnico, Lisboa

Cristina Queirós
Universidade do Porto

José Simão Antunes do Carmo
Universidade de Coimbra

Manuel João Ribeiro
Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa

Romero Bandeira
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto

Salvador Almeida
Universidade Lusófona do Porto

Carla Juscélia de Oliveira Souza
Universidade São João del Rei

Maria Augusta Fernández Moreno
Católica do Equador

Miguel Castillo Soto
Universidade do Chile

Purificación Flaño
Universidade de La Rioja

Rita Cássia de Souza
Universidade Federal de Uberlândia

Yolanda Hernandez Peña

Zeineddine Nouaceur
Universidade de Rouden

REVISORES CONVIDADOS | INVITED REVIEWERS

Airton Bodstein de Barro
Universidade Federal Fluminense

Albano Figueiredo
Universidade de Coimbra

Alecir Antônio Maciel Moreira
Universidade Federal de Minas Gerais

Anabela M. Ramos
MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente

Ana Monteiro de Sousa
Universidade do Porto

Angela Santos
Universidade de Lisboa

Franklin Trejo-Paredes
Univ. Nacional de Los Llanos Ezequiel Zamora

Helena Fernandez
Universidade do Algarve

Lais Nayara dos Reis
Universidade Estadual de Goiás

Lilian Moreira Bento
Universidade Federal de Uberlândia

Lúcio Cunha
Universidade de Coimbra

Marcelo Fragoso
Universidade de Lisboa

Maria José Roxo
Universidade Nova de Lisboa

Mario Talaia
Universidade de Aveiro

Maria Teresa Barral Silva
Universidade de Santiago de Compostela

Tomás Figueiredo
Universidade de Bragança

Ricardo A. C. Garcia
Universidade de Lisboa

Rui Ferreira Figueiredo
Universidade de Coimbra

LUCIANO LOURENÇO
ANTÓNIO VIEIRA
(COORDS.)

METODOLOGIA DE ANÁLISE DE RISCOS ATRAVÉS DE ESTUDOS DE CASOS

Edição

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Email: riscos@riscos.pt

URL: <https://www.riscos.pt/publicacoes/sec/>

COORDENAÇÃO EDITORIAL

Luciano Lourenço e António Vieira

IMAGEM DA CAPA

Karine Nieman

PRÉ-IMPRESSÃO

Fernando Félix

EXECUÇÃO GRÁFICA

Simões & Linhares, Lda.

ISSN

2184-5727

DOI (Série)

<https://doi.org/10.34037/978-989-54295-1-6>

Depósito Legal

449620/18

ISBN

978-989-54295-6-1

ISBN Digital

978-989-54295-2-3

DOI

https://doi.org/10.34037/978-989-54295-2-3_3

SUMÁRIO

PREFÁCIO	7
INTRODUÇÃO	9
 Estratégias de gestão e mitigação do risco sísmico: da avaliação ao planejamento de emergência Rui Maio, Tiago M. Ferreira e Romeu Vicente	 11
 Metodologias para a hierarquia de riscos de desastres: um estudo comparativo em Santos/SP, Brasil Carolina Iwane Hotta e Maria Isabel Castreghini de Freitas	 51
 Metodologia para delimitação de áreas de instabilidade de vertentes Antônio Amílcar Moura Alves da Silva	 85
 An early warning for soil moisture in Brazil, using radar data and normalized difference vegetation index Luciana Rossato Spatafora, Humberto Barbosa, Mercè Vall-llossera, Jojhy Sakuragi, Carlos Frederico de Angelis and José A. Marengo	 117
 Monitoramento das condições climáticas e do uso da cobertura vegetal em uma bacia hidrográfica no semiárido brasileiro, utilizando imagens landsat Ronildo Alcântara Pereira, Clênia Rodrigues Alcântara e Luiton Pereira Rocha	 139
 Aplicação da transformada de ondeletas a precipitação do estado do Maranhão - Brasil Adriana de Souza Costa, Célia Campos Braga, Wanessa Luana de Brito Costa e Edicarlo Pereira de Sousa	 179
 Landslide & rainfalls: press inventory, conditioning factors characterization and precipitation thresholds for Gipuzkoa province (Basque country) Txomin Bornaetxea, Orban Ormaetxea, Iñaki Antigüedad and Massimo Melillo	 201
 O trabalho de campo e o levantamento da profundidade, cor e textura de solos em áreas de risco a escorregamentos - os casos de Ubatuba e Santos/SP, Brasil Carolina Verbicaro Perdomo, Estéfano Seneme Gobbi e Francisco Sérgio Bernardes Ladeira	 223

SUMÁRIO

Métodos de bandas de controlo para avaliação de risco de exposição a nanopartículas fabricadas	
Ana C. Meira Castro, João Santos Baptista e Andréa Pereira	245
Levantamento de riscos ambientais para sistemas de drenagem alterados pelos canais derivados multifuncionais	
Renato Emanuel Silva e Silvio Carlos Rodrigues	261
Uma abordagem multidisciplinar para a aplicação de metodologias de padrões abertos e gestão de risco	
Mariza Ferreira da Silva	285
Análise e modelagem numérica da atmosfera na avaliação e prevenção de riscos decorrentes de eventos meteorológicos extremos: estudo de caso para Petrópolis, RJ - Brasil	
Marina Aires, Jorge Luiz Fernandes de Oliveira, José Maria de Castro Junior, Marília Mitidieri Fernandes de Oliveira e Nelson Francisco Favilla Ebecken	311
CONCLUSÃO	331

PREFÁCIO

O IV Congresso Internacional de Riscos, realizado na cidade de Coimbra, em maio de 2017, deu origem a uma série de trabalhos científicos, alguns dos quais foram publicados sob a forma de artigos na revista *Territorium*, n.º 25 (II), dedicado ao tema “Riscos e Educação”. Os restantes trabalhos, que foram submetidos e aceites para publicação, distribuem-se por quatro volumes da série de livros dedicada aos “Estudos Cindínicos” e que, como este tomo, versam sobre temas específicos.

A metodologia de “Análise de riscos” através de “Estudos de casos”, como o próprio nome indica, corresponde a uma obra de cariz didático, pois, através de doze diferentes estudos, dá conta de vários métodos de análise que, em função dos diversos tipos de risco abordados, podem ser usados não só para analisar o risco, mas também para gerir algumas das suas manifestações e, até, para mitigar as consequências destas.

Como o próprio título sugere, esta não é uma obra exaustiva sobre os diferentes tipos de análise de riscos, pois trata-se de uma série de estudos de diferentes casos de riscos, que se preocupa em descrever, com suficiente detalhe, a metodologia que foi usada para analisar cada um desses vários tipos de risco.

Ainda que, do ponto de vista metodológico, haja muitos aspetos comuns na análise dos diferentes tipos de risco, tal não significa que quando entramos na análise das características concretas de determinado risco, não possam existir nuances próprias, intrínsecas à sua especificidade, que mereçam um tratamento particular.

De facto, analisar riscos tão diferentes como o sísmico, ou o de movimentações em massa, ou aqueles que estão associados à vegetação, à precipitação e às condições climáticas ou, ainda, riscos industriais e ambientais, para referir apenas alguns dos que são abordados nesta obra, dá bem conta da diversidade dos aspetos que, como maior ou menor detalhe, podem ser tidos em conta na análise de riscos e, por conseguinte, da diversidade metodológica que será possível encontrar na sua análise, através dos exemplos apresentados neste volume.

Por isso, estamos convictos de que a edição desta obra será de grande utilidade para todos os investigadores que se dediquem às temáticas nela tratadas, uma vez

que aqui poderão encontrar a metodologia que os ajudará a desenvolver a sua pesquisa e que poderá servir de suporte ao trabalho que pretendem realizar.

Deste modo, por várias razões, justifica-se a publicação deste livro e a RISCOS sente-se orgulhosa de o poder incluir na sua Coleção sobre “Estudos Cindínicos”

Coimbra, 20 de julho de 2018

Luciano Lourenço

INTRODUÇÃO

Luciano Lourenço

Departamento Geografia e Turismo, CEGOT e RISCOs,
Universidade de Coimbra (Portugal)
ORCID: 0000-0002-2017-0854 luciano@uc.pt

Ainda que nem sempre os aspetos metodológicos sejam devidamente valorizados nos trabalhos científicos, o uso da metodologia adequada é fundamental não só para alcançar o objetivo proposto, mas também para o conseguir fazer com o mínimo dispêndio de tempo e de esforço, razões mais do que suficientes para que se lhe deva dedicar alguma atenção.

Ora, por essa razão e porque a metodologia para a análise de risco pode ser abordada sob várias perspetivas, nunca será por demais apresentar alguns exemplos desse tipo de abordagens.

Assim, nesta obra são divulgados vários exemplos de abordagens, através de diferentes estudos de casos, que, entre outros, passam pela proposição de diversa metodologia, a qual poderá ser usada para fins variados, designadamente para:

- i. Gestão e mitigação do risco sísmico, desde a avaliação até ao planeamento de emergência;
- ii. Hierarquização de riscos de catástrofes, tendo por base um estudo comparativo em Santos;
- iii. Delimitação de áreas de instabilidade em vertentes;
- iv. Emissão de alertas precoces para a humidade do solo no Brasil, usando dados de radar e de índices de vegetação;
- v. Verificação das condições climáticas e do uso da cobertura vegetal numa bacia hidrográfica no semiárido brasileiro, utilizando imagens *Landsat*;
- vi. Aplicação da transformada de ondeletas à precipitação do estado do Maranhão - Brasil;
- vii. Definição de limiares de precipitação responsáveis pela ocorrência deslizamentos na província de Gipuzkoa (País Basco);
- viii. Levantamento da profundidade, cor e textura de solos em áreas de risco a escorregamentos, com base no trabalho de campo em Ubatuba e Santos/SP, Brasil;

- ix. Avaliação de risco de exposição a nanopartículas fabricadas, através do método de bandas de controlo;
- x. Levantamento de riscos ambientais em sistemas de drenagem alterados pelos canais derivados multifuncionais;
- xi. Aplicação de padrões abertos à gestão de risco, através de uma abordagem multidisciplinar;
- xii. Avaliação e prevenção de riscos decorrentes de eventos meteorológicos extremos em Petrópolis, RJ - Brasil, através da análise e modelagem numérica da atmosfera.

A reunião deste conjunto de estudos permite mostrar a diversidade metodológica que pode ser aplicada à análise de riscos e, através dos estudos de casos apresentados, serve de exemplo para outros estudos que possam vir a ser desenvolvidos sobre os riscos aqui abordados.

Convicto de que este livro poderá ser útil a todos aqueles que se interessam pelos aspetos metodológicos que devem presidir à elaboração de estudos científicos, a RISCOS também não teve dúvidas em o incluir na sua série sobre “Estudos Cindínicos”, na expectativa de que ele possa contribuir para ajudar a aumentar o conhecimento de quem nele vier procurar informação.

Que seja útil não só aos investigadores, mas também aos decisores, são os nossos votos!

**APLICAÇÃO DA TRANSFORMADA DE ONDELETAS A
PRECIPITAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO – BRASIL**
**APPLICATION OF WAVELET TRANSFORM TO
PRECIPITATION IN THE STATE OF MARANHÃO – BRAZIL**

Adriana de Souza Costa

Dep. de Ciências Atmosféricas, Universidade Federal de Campina Grande (Brasil)
ORCID: 0000-0002-9250-0533 adriana.asc24@gmail.com

Célia Campos Braga

Dep. de Ciências Atmosféricas, Universidade Federal de Campina Grande (Brasil)
ORCID: 0000-0001-6383-3112 celiadca@hotmail.com

Wanessa Luana de Brito Costa

Dep. de Ciências Atmosféricas, Universidade Federal de Campina Grande (Brasil)
ORCID: 0000-0002-5904-3588 wanessaluanabc@hotmail.com

Edicarlos Pereira de Sousa

Instituto de Formação de Educadores Universidade Federal do Cariri (Brasil)
ORCID: 0000-0003-4262-544X edicarlos.pereira@ufca.edu.br

Resumo: O estado do Maranhão situa-se numa zona de transição entre o semiárido nordestino, a Amazônia e os chapadões do Brasil central, embora pertença a essa região não se encontra no polígono das secas, a distribuição espacial das chuvas é bastante irregular, o que submete o sistema agrícola da região a sérios problemas. Neste estudo analisou-se a variabilidade espacial e temporal da precipitação (PRP) e temperatura da superfície do mar (TSM), nas regiões de monitoramento do Pacífico Equatorial, utilizando a Transformada de Ondeletas (TO). Assim como, relacioná-los com mecanismos atmosféricos geradores de chuvas na região. Os resultados da aplicação da TO na PRP e TSM mostraram que o ciclo

anual é dominante em todas as regiões do Estado. Já para TSM, a escala anual é mais intensa no setor Leste do oceano, decrescendo no sentido Leste-Oeste, onde a escala decenal se torna mais acentuada. A análise da correlação mostrou que existe uma significativa associação entre o padrão de chuvas em cada região homogêneas (RH) e a TSM do oceano Pacífico Equatorial, em algumas regiões associação com a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), Vórtices Ciclônicos de Ar Superior (VCAS), e frentes frias.

Palavras-chave: Regiões homogêneas, TSM, oscilações.

Abstract: The state of Maranhão is located in a transition zone between the north-east semi-arid region, the Amazon region and the central Brazilian plains: although it belongs to this region it does not lie within the polygon of the droughts. The spatial distribution of rainfall is quite irregular, which exposes the region's agricultural system to serious problems. In this study the spatial and temporal variability of precipitation (PRP) and sea surface temperature (SST) were analysed in the monitoring regions of the equatorial Pacific using the Wavelet Transform (TO), relating them, too, to atmospheric mechanisms that generate rainfall in the region. The results of applying TO in PRP and SST showed that the annual cycle is dominant in all regions of the state. For SST, the annual scale is more intense in the eastern sector of the ocean, decreasing from east to west, where the ten-year scale becomes more pronounced. The correlation analysis showed that there is a significant association between the rainfall pattern in each homogeneous regions (RH) and the SST of the equatorial Pacific Ocean, in some regions associated with the Intertropical Convergence Zone (ITCZ), South Atlantic Convergence Zone (ZCAS), High Air Cyclonic Vortices (VCAS), and cold fronts.

Keywords: Homogeneous regions, SST, oscillations.

Introdução

A região Nordeste do Brasil é caracterizada pela irregularidade espacial e temporal da precipitação e dos processos de escoamento e erosão dos solos, como também pelo alto potencial para evaporação da água em função da enorme disponibilidade de energia solar e altas temperaturas durante todo o ano (Souza *et al.*, 1998). Na maior parte da região a precipitação é escassa e tem flutuações interanuais bastante acentuadas, ou seja, anos com secas severas ou com chuvas excessivas, que têm sido relacionadas aos padrões de anomalias de grande escala da circulação atmosférica global, principalmente o fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENOS).

Apresenta uma média pluviométrica variando entre 2000 mm na costa leste a 400 mm na região central (Silva, 2004). O clima encontrado na região vai desde semiárido (Polígono das secas, que apresenta precipitação média anual abaixo de 600 mm, e abrange os seguintes estados: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte de Minas Gerais), até tropical (Costa leste). Do ponto de vista climático a região Nordeste é considerada semiárida por apresentar substanciais variações temporal e espacial da precipitação, e elevadas temperaturas ao longo do ano (Azevedo *et al.*, 1998).

Em um estudo pioneiro, Walker (1928) documentou uma notável coincidência do aquecimento anômalo das águas superficiais no Pacífico equatorial e as secas do Nordeste do Brasil (NEB). Desde então, um grande número de estudos buscam um melhor entendimento dos mecanismos que causam as anomalias climáticas sobre o NEB, com foco no papel que o fenômeno ENOS exerce em tais anomalias. A literatura também mostra que a região Nordeste sofre influência das circulações atmosféricas, pois grande parte da variabilidade interanual da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) do Atlântico Tropical, são influenciadas pela atuação do ENOS na região equatorial do Pacífico.

O estado do Maranhão não se encontra no polígono das secas, apresenta condições climáticas bem definidas, embora a distribuição espacial e temporal da precipitação seja bastante irregular. Essa irregularidade na distribuição da precipitação é decorrente de alguns aspectos importantes: posição geográfica,

extensão territorial e suas feições fisiográficas, por estar localizado em uma região de transição que recebe influências das características climáticas do semiárido nordestino, da Amazônia e dos chapadões do Brasil central (Menezes, 2009) e (Nascimento, 2014).

Nos últimos tempos novas técnicas matemáticas e estatísticas têm sido desenvolvidas e introduzidas na literatura científica, com a finalidade de fornecer subsídios para a caracterização de regimes atmosféricos não lineares associados à natureza das variáveis meteorológicas e do meio ambiente (Vitorino *et al.*, 2006), (Braga *et al.*, 2014) e (Sousa, 2016). Esta pesquisa fez uso da Análise da Transformada em Ondeletas (TO), devido ser uma ferramenta poderosa para a análise de sinais não estacionários, permitindo identificar as principais periodicidades de uma série temporal e sua evolução (Torrence *et al.*, 1998). Essa técnica permite decompor uma série temporal em diferentes níveis de resolução tempo – frequência escala para determinar as componentes da variabilidade dominante.

Neste contexto, este estudo teve por objetivo fazer uma análise de multiresolução do sinal das chuvas em multiescalas de tempo ocorridas no estado do Maranhão e relacioná-las com as variações da TSM nas áreas monitoradas do Pacífico Equatorial e sistemas meteorológicos que influenciam as chuvas na região.

Área de estudo

O Estado do Maranhão é um dos estados do NEB, com área territorial de 331.983,293 km², limitado ao Norte pelo Oceano Atlântico, ao Sul e sudoeste pelo Estado de Tocantins, a Leste pelo Estado do Piauí e a Oeste pelo Estado do Pará (fig. 1). O regime pluviométrico maranhense é marcado pela presença de valores de precipitação elevados em sua porção norte-ocidental e, em consequência, a cobertura vegetal é constituída pela floresta tropical e campos periodicamente inundáveis, sendo denominada pré-amazônica. Da parte norte-oriental até a fronteira piauiense, compõe a zona de transição entre a floresta pré-amazônica e a vegetação de cerrado e caatinga. Na porção meridional verifica-se a ocorrência de extensos chapadões com formação de cerrados.

Fig. 1 - Distribuição espacial dos postos pluviométricos no Estado do Maranhão (Fonte: Costa 2016).

Fig. 1 - Spatial distribution of pluviometric stations in the State of Maranhão (Source: Costa, 2016).

Materiais e métodos

Dados

Foram utilizados valores médios de totais mensais e anuais de precipitação (mm) de 81 estações distribuídos no Estado, no período de 1987-2013. Esses dados foram obtidos no laboratório de meteorologia da Universidade Estadual

do Maranhão (UEMA) e Agência Nacional das Águas (ANA). A fig. 2 mostra a distribuição espacial dos totais médios anuais da precipitação. Observa-se que na faixa do litoral norte e noroeste do Estado os totais médios anuais ultrapassam 1900 mm, atingindo os menores valores inferiores a 700 mm na região central sul.

Fig. 2 - Variabilidade dos totais médios anuais da precipitação no período de 1987 a 2013 no Estado do Maranhão (Fonte: Costa, 2016).

Fig. 2 - Variability of mean annual precipitation totals from 1987 to 2013 in the State of Maranhão. (Source: Costa, 2016).

A delimitação das regiões homogêneas da precipitação teve por base 81 estações meteorológicas, obtida pelo método de agrupamento de Ward (1963), a partir da matriz dos fatores comuns espaciais e temporais mais expressivos. A aplicação do método a matriz de dados resultante da análise de componentes principais mensal e anual possibilitou dividir o Estado do Maranhão em 5 regiões homogêneas (RH) de precipitação (fig. 1). A RH1 possui 12 estações, cuja precipitação total média anual é superior a 1900 mm, encontra-se inserido no norte e noroeste do Estado, observa-se que esta região possui os maiores índices pluviométricos. A RH2 situada na região centro-norte do Estado, é composta por 8 estações, com precipitação total média anual superior a 1600 mm. A RH3 composta por 29 estações se estende diagonalmente desde o oeste/noroeste até a região nordeste do Estado, com totais médios anuais variando entre 1300 e 1700 mm. A RH4 pertence a região central-sul e sudeste, abrange uma grande área do Estado (24 estações), apresenta os menores índices pluviométricos que oscilam de 700 e 1300 mm (fig. 2). E a RH5 composta por 8 estações, se estende desde a extremidade oeste/sudoeste até o sul do Estado com totais médios anuais de precipitação entre 1300 a 1500 mm.

Os dados mensais de TSM foram obtidos através do site Climate Diagnostic Center/ National Oceanic and Atmospheric (<http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/climateindices/list/>), para o período de 1987 até o ano de 2013 e fazem referência as áreas de monitoramento do Pacífico Equatorial (NINO 1+2, NINO 3, NINO 3.4 e NINO 4).

Transformada de Ondeletas

A transformada de ondeleta refere-se a um conjunto de funções com forma de pequenas ondas geradas por translações $\psi(t) \rightarrow \psi(t+1)$ e escalonamentos $\psi(t) \rightarrow \psi(2t)$ de uma função ondeleta base $\psi_0(t)$, que possui energia finita, ou seja, um início e um fim, essa função é totalmente capaz de dilatar ou comprimir e é chamada de ondeleta-mãe (Torrence *et al.*, 1998) e (Morettin, 1999).

$$\Psi_{a,b}(t) = \frac{1}{\sqrt{a}} \Psi\left(\frac{t-b}{a}\right)$$

com $a, b \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$, sendo a o fator de dilatação e b o fator de translação. O fator $\frac{1}{\sqrt{a}}$ é chamado de constante de normalização.

A função ondeleta deve satisfazer às condições de admissibilidade. Em outras palavras $\int_{-\infty}^{+\infty} \Psi_0(t) dt = 0$ deve fornecer um resultado médio zero, e a função ondeleta deve ser unitária $\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi_0(t)|^2 dt = 1$ de $-\infty$ a $+\infty$ (Oliveira *et al.*, 2015).

Aplicou-se neste estudo a ondeleta base de “*Morlet*”, a qual possui uma ótima representação de sinais não estacionários obtidos na natureza, tais como simetria, ou não, e apresenta uma variação temporal suave ou brusca, e é dada por:

$$\Psi(t) = e^{i\omega_0 t} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

que representa uma onda modulada por um envelope Gaussiano, t parâmetro (adimensional) refere-se ao período ou escala temporais estudados e ω_0 (adimensional) à frequência do sinal.

A escolha da TO é realizada de acordo com o objetivo específico da pesquisa. No caso de um sinal de onda atmosférica, a ondeleta complexa de Morlet é uma das funções mais adequadas para proporcionar a compreensão dos padrões de precipitação (Oliveira *et al.*, 2015).

Determinação dos anos de El Niño e La Niña

As anomalias mensais para a classificação de anos de EL Niño (EN) e La Niña (LN) foram obtidas através da metodologia descrita em Trenberth (1997), que classifica os eventos em função das temperaturas do Pacífico nas regiões Niño 3.4. De acordo com a metodologia de Trenberth, se analisam as anomalias de TSM durante 5 meses, se o resultado for superior a $0,4^\circ\text{C}$ durante 6 meses ou mais, então esse período pode ser classificado como evento de EN. Para a classificação de anos de LN se aplica a mesma metodologia, mas com anomalia inferior a $-0,4^\circ\text{C}$. A seguir a classificação dos períodos de ENOS de 1972 a 2013 (TABELA I).

TABELA I - Classificação dos anos de El Niño e La Niña segundo a classificação de Trenberth (1997).

TABLE I - Classification of El Niño and La Niña years according to Trenberth's classification (1997).

EVENTOS DE EL NIÑO					EVENTOS DE LA NIÑA				
INICIO	FIM	DURAÇÃO	Média	Máximo	INICIO	FIM	DURAÇÃO	Média	Máximo
		(MESES)					(MESES)		
mai/72	mar/73	11	1,3°C	2,0°C	jun/73	jul/74	14	-1,3°C	-1,9°C
set/76	fev/77	06	0,7°C	0,8°C	out/74	mar/76	18	-0,9°C	-1,6°C
set/77	jan/78	05	0,7°C	0,8°C	out/84	jun/85	9	-0,8°C	-1,1°C
out/79	fev/80	05	0,5°C	0,6°C	mai/88	fev/89	13	-1,2°C	-1,8°C
abr/82	jun/83	15	1,3°C	2,1°C	ago/95	mar/96	8	-0,8°C	-1,0°C
set/86	fev/88	18	1,1°C	1,6°C	jul/98	mar/01	33	-1,0°C	-1,6°C
jun/91	jul/92	14	1,0°C	1,6°C	ago/07	jun/08	11	-1,0°C	-1,4°C
out/94	mar/95	06	0,8°C	1,0°C	nov/08	fev/09	4	-0,7°C	-0,8°C
mai/97	mai/98	13	1,6°C	2,3°C	jul/10	abr/11	10	-1,1°C	-1,4°C
jun/02	fev/03	09	0,9°C	1,3°C	ago/11	mar/12	8	-0,7°C	-0,9°C
jul/04	abr/05	10	0,6°C	0,7°C	-	-	-	-	
set/06	jan/07	05	0,8°C	1,0°C	-	-	-	-	
jul/09	abr/10	10	0,9°C	1,3°C	-	-	-	-	

Legenda: **FORTE** **MODERADO** FRACO

Resultados e discussão

Análise de Ondeletas para dados mensais de precipitação

Em cada uma das 5 regiões homogêneas (fig.1), selecionou-se uma localidade, ou seja, Maracaçumé (RH1), Pirapemas (RH2), Vargem Grande (RH3), Presidente Dutra (RH4), e Pindaré Mirim (RH5), do Estado que tivesse uma série climatológica mais longa de 1972 a 2013 e isenta de falhas, que melhor representasse cada RH, pois a aplicação da técnica da TO as médias mensais de cada RH, leva a uma suavização das interações entre as escalas. Este período de dados foi considerado apenas para a análise da TO aos dados de precipitação.

A análise de ondeleta para Maracaçumé pertencente a RH1, situada no norte do Estado apresenta escala anual dominante observa-se que esta região possui os maiores índices pluviométricos do Estado. Além do ciclo anual, cuja onda se propaga por toda a série temporal, observam-se ainda oscilações semianuais e intrassazonais associadas aos picos de maior precipitação, acima de 600 mm nos anos de 1980 e 2011 (fig. 3-a e 3-b). Também são vistos picos de menor significância na escala bianual, nota-se ainda, oscilações nas escalas de 4 e 8 anos nas décadas de 1970, 1980 e 1990, assim como na escala decenal, concordando com os picos de variância (fig 3-c).

Fig. 3 - Série temporal de precipitação (a), Escalograma de energia de ondeletas (b), Espectro global (c), para Maracaçumé.

Fig. 3 - Time series of precipitation (a), Wavelet energy scalogram, (b) Overall spectrum, (c), for Maracaçumé.

A análise da TO para o município de Pirapemas pertencente a RH2, também situada na região norte do Estado é ilustrada na fig. 4. Observam-se na série temporal (fig. 4-a) picos superiores a 500 mm nos anos de 1984, 1985, 1986, 1989, 1991, 2004 e 2008. Analisando o espectro de energia de ondeleta da precipitação, percebe-se que existe uma intensa energia associada à escala anual, com poucas interações com as escalas intrasazonal e semianual (fig. 4-b). Nota-se ainda, oscilações nas escalas de 4 e 8 entre a década de 1980 a 1990, como podem ser vistos os picos de variância observados na fig. 4-c, nos anos de 1984/1986, 2007 e 2008 os máximos de precipitação coincidem com anos de La Niña (TABELA I).

Fig. 4 - Série temporal de precipitação (a), Escalograma de energia de ondeletas (b), Espectro global (c), para Pirapemas.

Fig. 4 - Time series of precipitation (a), Wavelet energy scalogram (b), Overall spectrum (c), for Pirapemas

Na RH3, situada na diagonal que vai desde o oeste/noroeste até a região nordeste do Maranhão, analisou-se a localidade de Vargem Grande. Observa-se na série temporal máximos de precipitação nos anos de 1974, 1986, 1989, 2002, 2003, 2007 e 2008, nos demais anos as alturas pluviométricas são inferiores a 500 mm (fig. 5-a). A aplicação da TO mostrou no escalograma de energia de ondeletas a predominância do ciclo anual interagindo com escalas menores, estas interações estão associadas com as maiores alturas pluviométricas (fig. 5-b). Pelo escalograma ficam evidenciados núcleos de energia pouco significativos, nas escalas de tempo de 2 a 4 anos, como pode ser confirmado no espectro global (fig. 5-c).

Para a RH4 é analisada a localidade de Presidente Dutra, localizada na região central-sul e sudeste do Maranhão, apresenta precipitação superior a 400 mm nos anos de 1974, 1975, 1979, 1985, 1988, 1989, 1994, 1996, 1997, 2002 e 2008/2010 (fig. 6-a). A análise do espectro de energia de ondeleta evidencia o domínio da escala anual, com interações entre as escalas sazonais, semianuais e intrassazonais (fig. 6-b). O pico de variância pode ser visto na fig. 6-c, em escala anual e decenal. A série temporal mostra que o regime de chuva na região é diferenciado das regiões mais ao norte, com período de ocorrência de chuvas de novembro a maio, esta RH é caracterizada por apresentar os menores índices pluviométricos, a maior concentração de chuvas ocorre nos primeiros meses do ano

oriundos da atuação dos Vórtices Ciclônicos de Ar Superior (VCAS) em janeiro e fevereiro e da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) em março e abril (Gan e Kousky, 1986).

Na RH5, que se estende deste a extremidade oeste/sudoeste até o sul do Maranhão, analisou-se o município de Pindaré Mirim. A série temporal desta localidade apresenta

Fig. 5 - Série temporal de precipitação (a), Escalograma de energia de ondeletas, (b) Espectro global(c), para Vargem Grande.

Fig. 5 - Time series of precipitation (a), Wavelet energy scalogram, (b), Overall spectrum (c), for Vargem Grande.

Fig. 6 - Série temporal de precipitação (a), Escalograma de energia de ondeletas, (b) Espectro global (c), para Presidente Dutra.

Fig. 6 - Time series of precipitation (a), Wavelet energy scalogram (b), Overall spectrum (c), for Presidente Dutra.

precipitação acima de 500 mm nos anos 1978, 1985, 1986, 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 1998, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (fig. 7-a). A análise do espectro de energia de ondeleta mostra que assim como nas demais regiões a escala dominante é a escala anual, porém em alguns anos percebe-se que há um enfraquecimento dessa escala, poucas interações com escalas menores, e um pico maior na escala decenal, porém de significância estatística, tais informações podem ser confirmadas no escalograma de ondeleta global da fig. 7-c.

Conforme estudos realizados para o Maranhão, as regiões sul e sudoeste RH1 e Rh2 apresentam características amazônicas com chuvas mais intensas de novembro a abril e estão associadas aos VCAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e Frentes (Kousky, 1988) e (Nascimento, 2014).

Fig. 7 - Série temporal de precipitação (a), Escalograma de energia de ondeletas (b), Espectro global(c), para Pindaré Mirim.

Fig. 7 - Time series of precipitation (a), Wavelet energy scalogram (b), Overall spectrum (c), for Pindaré Mirim.

Análise da TSM

Aplicou-se TO para as áreas de TSM do Pacífico Equatorial, Niño1+2, Niño 3, Niño 3.4 e Niño 4 com o propósito de verificar possíveis influências sobre a pluviometria do estado Maranhão durante o período de 1987 a 2013.

As temperaturas médias na região do Niño 1+2 (fig. 8) são menores do que as áreas mais a oeste do Pacífico Equatorial onde as águas superficiais são mais aquecidas, devido à formação do ramo ascendente da Célula de Walker que ocorre sobre o Pacífico Oeste-Equatorial. A região do NIÑO 1+2 é a que apresenta maior variabilidade anual conforme indicado no espectro global. Observa-se também forte intensidade na escala de quatro anos, sobretudo de 1980 a 2000, modulando principalmente os anos de El Niño/La Niña. Pelas configurações da energia de ondeleta na escala de 4 anos se observa que os anos de 1992, 1997/1998, obtiveram valores mais elevados da TSM (evento forte de El Niño) (TABELA I).

Os resultados obtidos para a região do Niño 3 (fig. 9) apresenta configuração energética diferente, observa-se no espectro global de energia que a escala anual é menos intensa se comparada a área do Niño 1+2, porém, as escalas de quatro e dois anos são bastante caóticas. Destacam-se os anos de 1987/1988, 1997/1998 pela interação entre escalas de quatro e dois anos e a anual, com máximo de temperaturas nos referidos anos conforme a série temporal da TSM. Embora, não seja estatisticamente significativa, a escala de quatro anos é evidenciada cobrindo uma área maior no oceano que a região do Niño 1+2.

A região do Niño 3.4 (fig. 10) apresenta um enfraquecimento na escala anual. No espectro de energia é bem fortalecida a escala de quatro anos que interage com as escalas bianual e anual na década de 1990 e 2000 modulada pela escala de quatro anos.

Na região do Niño 4 (fig. 11) a escala anual enfraquece e quase não existe, isso pode ser explicado pela baixa variabilidade da TSM anual nesta região, ou seja, a variação térmica ao longo do ano é quase constante.

Percebe-se que à medida que vai se afastando da costa da América do Sul, as regiões dos Niño (3, 3.4 e 4) apresentam um enfraquecimento da energia na escala anual dando lugar a escala decenal. De acordo com Braga *et al.* (2014), a região tem pouco ou nenhuma relação com os eventos de ENOS.

Relação entre TSM e Precipitação

A seguir serão analisadas as correlações existentes entre Precipitação (PRP) e as TSM do Pacífico equatorial nas diferentes regiões homogêneas no estado do Maranhão.

Fig. 8 - Série temporal de TSM (a), Escalograma de energia de ondeletas (b), Espectro global para a área do Pacífico Niño 1+2 (c).

Fig. 8 - Time series of SST (a), Wavelet energy scalogram (b), Overall spectrum for the Pacific area Niño 1 + 2 (c).

Fig. 9 - Série temporal de TSM; (a), Escalograma de energia de ondeletas (b), Espectro global para a área do Pacífico Niño 3 (c).

Fig. 9 - Time series of SST (a), Wavelet energy scalogram (b), Overall spectrum for the Pacific area Niño 3 (c).

Fig. 10 - Série temporal de TSM (a), Escalograma de energia de ondeletas (b); Espectro global para a área do Pacífico Niño 3.4 (c).

Fig. 10 - Time series of SST (a), Wavelet energy scalogram (b), Overall spectrum for the Pacific area Niño 3.4 (c).

Fig. 11 - Série temporal de TSM (a), Escalograma de energia de ondeletas (b), Espectro global para a área do Pacífico Niño 4 (c).

Fig. 11 - Time series of SST (a), Wavelet energy scalogram (b), Overall spectrum for the Pacific area Niño 4 (c).

Para a RH1, a precipitação desta região foi a mais influenciada pelas variações de TSM, com os maiores valores de correlações no período estudado. As maiores correlações observadas ocorreram com as regiões do Niño 3 e 3.4, sendo que a maior correlação ocorreu com a TSM do mês de abril e a precipitação de abril (-0,72). Grande parte das chuvas da parte Norte do Estado se deve a presença da ZCIT que tem sua posição modulada pela TSM no Oceano Pacífico Equatorial e Atlântico Tropical (Hastenrath, 1990).

TABELA II - Coeficiente de correlação linear entre a TSM nas áreas dos Niños e a PRP do grupo RH1.

TABLE II - Coefficient of linear correlation between the SST in the areas of the Niños and the PRP of the RH1 group.

RH1	Niño 1+2	Niño 3	Niño 3.4	Niño 4
PRP/TSM	Mar	Abr	Abr	Abr
Abr	-0,55**	-0,72**	-0,63**	
Set				-0,55**

** 99 % de significância estatística, * 95 % de significância estatística.

A RH2 obteve correlações estatisticamente significativas $\alpha = 0,01$ em alguns meses, sendo que as maiores correlações $r = 0,65$ e $r = 0,61$ ocorreram entre a TSM de março com a PRP de abril na região do Niño 3 e TSM de abril com PRP de abril no Niño 3.4, respectivamente. Na primeira área há defasagem de um mês e na segunda verificou-se no mesmo mês. Com isso, pode-se concluir que os aumentos das TSM na área do Niño 3 e 3.4 são que mais contribuem para as chuvas na RH2.

TABELA III - Coeficiente de correlação linear entre a TSM nas áreas dos Niños e a PRP do grupo RH2.

TABLE III - Coefficient of linear correlation between the SST in the areas of the Niños and the PRP of the RH2 group

RH2	Niño 1+2	Niño 3	Niño 3.4	Niño 4
PRP/TSM	Abr	Mar	Abr	Fev
Mar				-0,48*
Abr	-0,47*	-0,65**	-0,61**	

** 99 % de significância estatística, * 95 % de significância estatística.

Na RH3, o efeito das variações da TSM do Pacífico Equatorial em relação à precipitação são bem perceptíveis, e principalmente na área dos Niños 3 e 3.4, apresentando as maiores correlações para esta RH, podendo ser destacada a região do Niño 3, onde a TSM de abril tem $r = -0,69$ com a PRP de abril (TABELA IV). Verifica-se que os padrões espaciais de correlação da precipitação com a TSM da região de Niño 3 são bastante parecidos aos padrões da TSM da região de Niño 3.4. A TSM na região do Niño 3 é a que apresenta maior associação com a PRP no Estado do Maranhão.

TABELA IV - Coeficiente de correlação linear entre a TSM nas áreas dos Niños e a PRP do grupo RH3.

TABLE IV - Coefficient of linear correlation between the SST in the areas of the Niños and the PRP of the RH3 group.

RH3	Ninó 1+2	Ninó 3	Niño 3.4	Niño 4
PRP/TSM	Mar	Abr	Abr	Fev
Abr	-0,57*	-0,69**	-0,61**	-0,50*

*** 99 % de significância estatística, * 95 % de significância estatística.*

Para a região RH4 que se encontra na parte central-sul da região. A maior correlação de $r = 0,53$ entre a TSM e PRP também se observa na área do Niño 3, no mês março e abril respectivamente.

TABELA V - Coeficiente de correlação linear entre a TSM nas áreas dos Niños e a PRP do grupo RH4.

TABLE V - Coefficient of linear correlation between the SST in the areas of the Niños and the PRP of the RH4 group.

RH4	Ninó 1+2	Ninó 3	Niño 3.4	Niño 4
PRP/TSM	Mar	Mar	Ago	Fev
Mar				-0,39
Abr	-0,47*	-0,53*		
Nov			-0,47*	

*** 99 % de significância estatística, * 95 % de significância estatística.*

Para a RH5 localizada na parte sul do Estado a maior correlação entre TSM e PRP foi de $r = 0,52$ para o nível de significância $\alpha = 0,01$ na área do Pacífico Niño 1+2, ocorreu entre a TSM de março e a PRP de abril (TABELA VI). Essa foi a única RH que apresentou correlação mais elevada na área do Niño 1+2.

TABELA VI - Coeficiente de correlação linear entre a TSM nas áreas dos Niños e a PRP do grupo RH5.

TABLE VI - CCoefficient of linear correlation between the SST in the areas of the Niños and the PRP of the RH5 group.

RH5	Niño 1+2	Niño 3	Niño 3.4	Niño 4
PRP/TSM	Mar	Mar	Fev	Abr
Abr	-0,52**	-0,49*	-0,37	
Jul				-0,47*

** 99 % de significância estatística, * 95 % de significância estatística.

Em síntese a aplicação da análise de correlação entre a TSM das áreas do Niño 1+2, 3, 3.4 e 4 mostrou que as chuvas nas regiões Norte e Nordeste do Estado do Maranhão tem uma grande dependência das condições das TSM do Oceano Pacífico Equatorial, já nas áreas noroeste e centro-sul essa dependência não se dá de forma tão marcante quando comparada com a parte mais ao norte.

Conclusão

A aplicação da Transformada de ondeletas as séries de precipitação em regiões homogêneas, no estado do Maranhão e nas áreas de TSM do Pacífico Equatorial possibilitou chegar as seguintes conclusões:

A aplicação da TO na PRP ressalta que o espectro global de energia da ondeleta é mais marcante no ciclo anual para todas as estações representativas das RH estudadas, além da escala anual, podem-se observar interações complexas de oscilações em diferentes escalas de tempo e mostrar que a construção das séries faz parte de interações complexas de ondulações em diferentes escalas. Assim como,

destacou nas diferentes escalas tempo, anos que ocorreram chuvas intensas nas regiões, possibilitando relacioná-los com os sistemas atmosféricos que atuam na produção das chuvas no Estado.

A análise da TO aplicada a TSM do Pacífico Equatorial apresenta a escala anual mais intensa na parte leste do oceano, decrescendo no sentido leste-oeste, onde a escala decadal se torna mais acentuada.

A análise da correlação mostrou que existe uma significativa associação entre o padrão de chuvas em cada RH e a TSM do oceano Pacífico Equatorial, possibilitando verificar como a chuva segue as variações da TSM. A RH5 é mais bem correlacionada com a TSM da região do Niño 1+2, enquanto que as RH1, RH2, RH3 e RH4, têm boas correlações com as áreas do Niño 3 e Niño 3.4. Grande parte das chuvas da parte Norte do Estado se deve a presença da ZCIT que tem sua posição modulada pela TSM no Oceano Pacífico Equatorial, e pelos VCAS. Na parte Sul, o Estado sofre influência da ZCAS e das Frentes Frias.

Referências bibliográficas

- Azevedo, P. V., Silva, B. B., Rodrigues, M. F. G. (1998). Previsão Estatística das Chuvas de Outono no Estado do Ceará. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v.13, n. 1, p. 19-30.
- Braga, C. C., Amanajás, J.C., Cerqueira, H. D. V., Vitorino, M. I. (2014). The Role of the Tropical and Pacific Oceans SST in Modulating the Rainfall of Paraíba State, Brazil. *Brazilian Journal of Geophysics*, v.32, n.1, p. 97.
- Costa, A. S. (2016). *Modulação regional das chuvas no estado do maranhão (dissertação de mestrado em meteorologia)*. Universidade Federal de Campina Grande. Campina Grande, 86 p.
- Gan, M. A., Kousky, V. E. (1986). Vórtices ciclônicos da alta troposfera no oceano Atlântico Sul. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v.1, p. 19-28.
- Hastenrath, S. (1990). *Prediction of northeast Brazil rainfall anomalies*, v.3, n. 8, p. 893-904.
- Kousky, V. E. (1988). Pentad outgoing longwave radiation climatology for the South American sector. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v.3, p. 217-231.
- Menezes, R. H. N. (2009). *Caracterização agroclimática e análise do rendimento agrícola do estado do Maranhão, Brasil (Tese Doutorado em Meteorologia)*. Universidade Federal de Campina Grande. Campina Grande, 168p.
- Moretton, P. A. (1999). *Ondas e ondeletas: da análise de Fourier à análise de ondeletas*. São Paulo: editora da Universidade de São Paulo.
- Nascimento, F. C. (2014). *Padrões climáticos associados à periodicidade de eventos extremos de precipitação no Estado do Maranhão (Dissertação Mestrado em Meteorologia)*. Universidade Federal de Campina Grande. Campina Grande, 108p.

- Oliveira, J. V., Vitorino, M. I., SÁ, L. D. A. (2015). Implication of Madden-Julian Oscillation phase on the Eastern Amazon climate. *Atmospheric Science Letters*, v.16, p. 318-323.
- Silva, V. P. R. (2004). On climate variability in Northeast of Brazil. *Journal of Arid Environments*. v.58, p. 575-596.
- Souza, E. B., Nobre, P. (1998). Uma revisão sobre o Padrão de Dipolo no Oceano Atlântico tropical. *Rev. Bras. Meteo.*, v. 13, p. 31-44.
- Sousa, E. P. (2016). *Padrões climáticos de eventos extremos de chuva utilizando análise multivariada e de ondeletas no estado de Minas Gerais (Tese de Doutorado em Meteorologia)*. Universidade Federal de Campina Grande. Campina Grande, 124 p.
- Torrence, C., Compo, G. P. (1998). A practical guide to wavelet analysis. *Bulletin of the American Meteorological Society*, v. 79, p. 61-78.
- Trenberth, E. K. (1997). The definition of El Niño. *Bulletin of the American Meteorological Society*, v. 78, p. 2771-2777.
- Vitorino, M. I., Braga, C. C., Brito, J. I. B. (2006). Análise da variabilidade de baixa frequência da precipitação sobre o estado da Paraíba. *XIV Congresso Brasileiro de Meteorologia, Florianópolis - SC*. Anais DVD-ROM, SBMET.
- Walker, G. T. (1928). Famines and the general air movement. *Beitrage zur Physik der freien Atmosphere*, v.14, p.88-93.
- Ward, J. H. J. (1963). Hierarchical grouping of optimize an objective function. *Journal of American Statistical Association*, v. 58, p. 236-244.

CONCLUSÃO

Luciano Lourenço

Departamento Geografia e Turismo, CEGOT e RISCOs,
Universidade de Coimbra (Portugal)
ORCID: 0000-0002-2017-0854 luciano@uc.pt

A publicação desta obra, além de satisfazer as naturais expectativas dos autores que nela colaboraram, visou reunir e divulgar diferentes métodos de análise de riscos, através de estudos de caso, os quais, de uma forma genérica, passaram pela recolha de informação, pelo desenvolvimento de investigação científica, pela compilação de estratégias e, por vezes, pela emanação de orientações com vista à mitigação do risco estudado.

Ora, todos estes aspetos podem vir a ser de grande utilidade, tanto para os investigadores que queiram desenvolver trabalhos semelhantes, como, sobretudo, para as entidades governamentais e as autoridades de proteção civil que, em face do exposto, poderão sentir necessidade de, eventualmente, repensar e ajustar algumas linhas orientadoras das suas missões, bem como de reorganizar os seus planos de intervenção.

Por outro lado, os cidadãos comuns, porventura aqueles que estejam mais despertados para a sua autoproteção, também poderão encontrar nesta obra informações úteis, que lhe permitem aprofundar os seus conhecimentos sobre diferentes aspetos da temática dos riscos.

De facto, esta obra contempla vários desses aspetos, de que nos permitimos destacar, entre outros, os seguintes:

- Metodologia de análise de riscos;
- Caracterização de diferentes tipos de risco;
- Diagnósticos, prognósticos e análises preventivas de catástrofes, enquanto plenas manifestações do risco;
- Aplicação dos sistemas de informação geográfica à análise espacial e cartografia de risco;
- Modelos e software para previsão de ocorrências;
- Planeamento de emergência;

- Educação para a redução do risco;
- Gestão participativa de segurança geradora de mudança de mentalidades;
- Atitudes de superação;
- Auxílio à tomada de decisão;
- Mecanismos de informação pública;
- Sistemas de pré-aviso à população;
- Conjugação da educação, do planeamento e da gestão de risco, como forma de tornar as sociedades mais resilientes às manifestações de risco.

Certamente que uma leitura atenta permitirá encontrar muitos outros aspetos, além destes que foram dados como exemplo, e que se revelarão preciosos para todos aqueles que pretendem aumentar os seus conhecimentos sobre os riscos e as suas manifestações.

SÉRIE
ESTUDOS CINDÍNICOS

Títulos Publicados:

- 1 *Incêndios em Estruturas. Aprender com o Passado;*
- 2 *Educação para a Redução dos Riscos;*
- 3 *Metodologia de Análise de Riscos através de Estudos de Casos;*

Volume em publicação:

- 4 *Riscos Hidrometeorológicos;*
- 5 *Pluralidade na Diversidade de Riscos;*

Tomos em preparação:

- 6 *Risco Sísmico - Aprender com o Passado;*
- 7 *Geografia dos Incêndios Florestais. 50 anos de Incêndios a queimar Portugal;*
- 8 *Efeitos dos Incêndios Florestais nos Solos de Portugal;*
- 9 *Floresta, Incêndios e Educação;*
- 10 *Redução do Risco e Educação.*

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia Física, pela Universidade de Coimbra, onde é Professor Catedrático.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos, entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais e internacionais.

António Vieira é geógrafo, doutorado em Geografia pela Universidade de Coimbra. É Mestre em Geografia, área de especialização em Geografia Física e Estudos Ambientais e Licenciado em Geografia, especialização em Estudos Ambientais pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. É professor auxiliar no Departamento de Geografia da Universidade do Minho, desenvolvendo atividades de investigação como membro integrado do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT – UM/UC/UP), do qual é Coordenador na Universidade do Minho.

É membro de diversas organizações científicas, nomeadamente a Associação Portuguesa de Geomorfólogos (APGeom, da qual é presidente desde 2017), e a Riscos – Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, sendo seu vice-presidente. É também membro da FUEGORED (Red Temática Nacional Efectos de los Incendios Forestales sobre los Suelos) e colaborador do GRAM (Grup de Recerca Ambiental Mediterrània).

Durante a sua carreira desenvolveu investigação no âmbito da geomorfologia granítica, do património geomorfológico e das alterações do uso do solo, debruçando-se atualmente sobre temáticas relacionadas com sistemas de informação geográfica e deteção remota e sua aplicação ao ordenamento do território, geomorfologia glacial e periglacial, património geomorfológico, processos erosivos na sequência de incêndios florestais e medidas de mitigação, entre outras.

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA