Coordenadores:

Luciano Lourenço

Fátima Velez de Castro

Pluralidade na Diversidade de Riscos

RISCOS

Associação Portuguesa de Riscos, *Prevenção e Segurança
Coimbra, 2018

A “Pluralidade na diversidade de riscos” é uma obra composta por um conjunto de onze capítulos, cujos autores procuraram refletir aprofundadamente sobre uma multiplicidade de situações de risco, centradas na dimensão da avaliação, do aperfeiçoamento, da previsão e da mudança de paradigmas. Os trabalhos apresentados derivam da investigação científica realizada na área da formação, do clima e da sensação térmica, do ambiente e da psique. A partir da análise da diversidade fatural, pretende-se contribuir para aprimorar as respostas através da mitigação das falhas e de novas possíveis soluções.

É neste contexto territorial cada vez mais complexo, que urge olhar para a os riscos de forma plural e diversa, para que os estudos cindínicos possam manter o seu carácter inovador e utilitário, colocando-se ao serviço dos profissionais atuantes em momentos de risco, dos investigadores e, acima de tudo, das populações afetadas.

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA

ESTRUTURAS EDITORIAIS
Estudos Cindínicos

DIRETOR PRINCIPAL | MAIN EDITOR
Luciano Lourenço

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

DIRETORES ADJUNTOS | ASSISTANT EDITORS
António Amaro, Adélia Nunes, António Vieira, Fátima Velez de Castro
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

ASSISTENTE EDITORIAL | EDITORIAL ASSISTANT
Fernando Félix
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

COMISSÃO CIENTÍFICA | EDITORIAL BOARD

Ana Meira e Castro
Universidade do Porto

Carla Juscélia de Oliveira Souza
Universidade São João del Rei

António Betâmio de Almeida
Instituto Superior Técnico, Lisboa

Maria Augusta Fernández Moreno
Católica do Equador

Cristina Queirós
Universidade do Porto

Miguel Castillo Soto
Universidade do Chile

José Simão Antunes do Carmo
Universidade de Coimbra

Purificación Flaño
Universidade de La Rioja

Manuel João Ribeiro
Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa

Rita Cássia de Souza
Universidade Federal de Uberlândia

Romero Bandeira
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto

Yolanda Hernandez Peña
Universidade Distrital Francisco José de Caldas

Salvador Almeida
Universidade Lusófona do Porto

Zeineddine Nouaceur
Universidade de Rouden

REVISORES CONVIDADOS | INVITED REVIEWERS

Adriana Panhol Bayma
Ministério do Meio Ambiente

Ney Roberto Vátimo Bruck
Universidade Federal de Pelotas

António José Bento Gonçalves
Universidade do Minho

Roberto Lamberts
Universidade Federal de Santa Catarina

Eliana Marta Barbosa de Morais
Universidade Federal de Goiás

Rui Gama
Universidade de Coimbra

Helena Fernandez
Universidade do Algarve

Teresa Durães Albuquerque
UIstituto Politécnico de Castelo Branco

João Santos Baptista
Universidade do Porto

Virgínia Maria Barata Teles
Universidade do Minho

Lúcio Cunha
Universidade de Coimbra

LUCIANO LOURENÇO
FÁTIMA VELEZ DE CASTRO
(COORDS.)

PLURALIDADE NA DIVERSIDADE DE RISCOS

Edição

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Email: riscos@riscos.pt

URL: <https://www.riscos.pt/publicacoes/sec/>

COORDENAÇÃO EDITORIAL

Luciano Lourenço e Fátima Velez de Castro

IMAGEM DA CAPA

Karine Nieman

PRÉ-IMPRESSÃO

Fernando Félix

EXECUÇÃO GRÁFICA

Simões & Linhares, Lda.

ISSN

2184-5727

DOI (Série)

<https://doi.org/10.34037/978-989-54295-1-6>

Depósito Legal

449622/18

ISBN

978-989-54295-5-4

ISBN Digital

978-989-54295-4-7

DOI

https://doi.org/10.34037/978-989-54295-4-7_5

SUMÁRIO

PREFÁCIO	7
INTRODUÇÃO	9
 Avaliação e adequação dos currículos de defesa civil dos cursos de formação e aperfeiçoamento do corpo de bombeiros do rio de janeiro com vista à redução do risco de desastres	
Adriana Aparecida Bianchi Azevedo	13
 O papel dos agrupamentos de corpos de bombeiros na mudança do paradigma da proteção civil municipal	
Óscar Ferreira Catarino e António Duarte Amaro	41
 Différences climatiques observées pour l'étude des précipitations et de la production de soja dans deux régions au Brésil	
Vinicius Carmellos	57
 Injustiça ambiental em um contexto industrial: Villa Hayes, Paraguai, como zona de sacrifício	
Lidia Susana Tellez Ramos, Leo Name e Céline Veríssimo	81
 Duas canções e o estresse pós-traumático	
Altino Bessa Marques Filho e Victor Hugo Ferreira Silva	103
 Como prever o isolamento térmico do vestuário para um ambiente térmico	
Mário Talaia	117
 As alterações climáticas e a proteção civil	
Nuno Gomes e Henrique Vicêncio	133
 Bank erosion risks in Ouerrha catchment in northern Morocco: assessment and development issues	
Mohammed El-fengour, Carlos Bateira, Abdelhak El-fengour, Abdelghani Houari and Mstafa Hmamouchi	155

SUMÁRIO

Evolução temporal (2009-2015) dos movimentos em massa na região leste do estado de São Paulo – Brasil	
Geórgia Jorge Pellegrina, Anna Silvia Palcheco Peixoto e Ilza Machado Kaiser	177
As áreas de preservação permanente e a sua importância na prevenção do risco (geomorfológico): estudo de caso em Santa Maria, RS, Brasil	
Fernanda Maria Follmann, Franciele da Silva, Eliane Maria Foletto e Francisco da Silva Costa	199
Riscos ambientais da exploração mineral na mina Pedra de Ferro-Caetité-BA	
Altemar Amaral Rocha e Vaneusa Silva Pereira	217
CONCLUSÃO	245

PREFÁCIO

Os riscos apresentam uma grande *diversidade*, quer nas causas que os podem originar, quer nas consequências que a sua manifestação pode determinar, pelo que só uma abordagem com *pluralidade* permite apresentar uma visão holística das múltiplas possibilidades de abordagem que os estudos dos riscos e das catástrofes proporcionam.

Ora, esta obra, em que são apresentadas várias perspetivas de análise, resulta precisamente de uma série de textos que, embora abordem temáticas diferentes, desde os riscos naturais aos antrópicos, e com estes materializados nos riscos tecnológicos e sociais, faz com que todos eles estejam ligados pelo mesmo fio condutor, que consiste em prevenir a sua manifestação, tomando as necessárias medidas de segurança, adequadas a cada tipo de risco, com o objetivo de reduzir os danos causados pelas suas manifestações.

Mas, como todos sabemos, entre a teoria e a aplicação prática existe um longo caminho que é necessário ir percorrendo e a publicação deste volume constitui mais um pequeno passo, no sentido de divulgar situações que poderiam ter sido evitadas ou, pelo menos, cujos efeitos poderiam ter sido bem mais reduzidos se houvesse uma melhor percepção dos riscos e uma maior cultura de segurança.

Com efeito, o objetivo desta série é o de ir dando alguns pequenos passos, visando esse objetivo, através da edição regular de novas obras que, todos os anos, ajudem a alertar para situações concretas de manifestações de riscos.

Tendo em consideração que o ano de 2018 foi o de arranque desta nova coleção e que, com a publicação deste volume, foram dadas à estampa cinco obras, não podemos deixar de considerar que a série arrancou com fulgor e será desejável que, no próximo ano, possa manter o mesmo ritmo de publicação.

Para que isso aconteça e porque a série está aberta à colaboração de todos quantos se preocupam com os riscos e as suas manifestações, sejam eles e elas associados ou não da RISCOS, contamos receber propostas para publicar livros nesta série, de modo a que ela possa ser útil a todos quantos pretendem reduzir os efeitos das catástrofes.

Coimbra, 30 de novembro de 2018.

Luciano Lourenço

INTRODUÇÃO

Fátima Velez de Castro

Departamento Geografia e Turismo, CEGOT e RISCOS,
Universidade de Coimbra (Portugal)
ORCID: 0000-0003-3927-0748 velezcastro@fl.uc.pt

Fernando Rebelo (2010), numa das suas obras derradeiras, onde sistematizou o desenvolvimento da relação entre a Geografia Física e os Riscos Naturais¹, ao invocar o contributo dos geógrafos percursos do estudo destes fenómenos em Portugal, deixou a seguinte reflexão:

“No entanto, se as observações «em cima do acontecimento» foram importantes para muitos geógrafos, foi quase sempre através do estudo de situações de crise acabadas de ocorrer que puderam deduzir como elas, frequentemente, resultavam da evolução de situações de perigo, que talvez pudessem ser evitadas” (Rebelo, 2010, p. 28).

Nesta obra intitulada “Pluralidade na diversidade de riscos”, agrupa-se um conjunto de capítulos, derivados do esforço de investigação científica de vários autores que, na sua essência, expressam essa mesma preocupação, ou seja, a de refletir aprofundadamente sobre uma multiplicidade de situações de risco, assim como as formas de mitigação. Tendo em conta as palavras componentes dos vários títulos enunciados, percebe-se a natureza do objetivo desta obra, centrada em quatro ações principais, a saber: *avaliar, aperfeiçoar, mudar paradigmas, prever*. No fundo, partir da diversidade fatual das causas das situações, pretende-se refletir sobre as formas de aprimorar as respostas através da mitigação das falhas, assim como de novas possíveis soluções. É nesta lógica epistemológica que, por um lado, se poderão corroborar e aperfeiçoar paradigmas; por outro, repensá-los numa lógica de mudança e de inovação.

¹ Rebelo, F. (2010), *Geografia Física e Riscos Naturais*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.

Os trabalhos aqui apresentados organizam-se em torno de quatro áreas temáticas, nomeadamente a formação; o clima e a sensação térmica; o ambiente; a psique.

No que diz respeito à *formação*, Adriana Azevedo apresenta um estudo em que pretende avaliar a adequação dos currículos de defesa civil para o corpo de bombeiros do rio de janeiro, tendo em vista a redução do risco de desastres. A sua pesquisa incidiu em cursos ministrados pela Escola Superior de Comando de Bombeiro Militar e na Academia de Bombeiro Militar D. Pedro II, através do levantamento das ementas, grade curricular e planos de sessão, sendo a metodologia utilizada de cariz empírico-analítico, com base na análise comparativa.

Já Óscar Catarino e António Amaro procuraram refletir sobre a mudança de paradigma da proteção civil municipal, tendo em conta o papel dos agrupamentos de corpos de bombeiros, no que diz respeito às respostas ao socorro dadas à população. Metodologicamente, os autores optaram pelo estudo de caso dos agrupamentos dos corpos de bombeiros de Mafra e Espinho, tendo sido realizadas entrevistas semiestruturadas, que serviram de base a uma análise de conteúdo.

Sobre a questão do *clima e da sensação térmica*, dois capítulos abordam áreas temáticas de interesse. Vinicius Carmellos compara a variabilidade das chuvas durante o cultivo da soja, tendo como referência o período temporal compreendido entre 1998-1999 e 2012-2013. A sua pesquisa centra-se na região noroeste do Rio Grande do Sul e na região Norte do Mato Grosso. O autor optou por uma abordagem estatística, analisando os dados mensais totais acumulados entre outubro e abril dos anos propostos, com posterior cálculo da correlação multivariada entre os fatores de precipitação, superfície cultivada e quantidade produzida.

Nuno Gomes e Henrique Vicêncio apresentam os resultados de um trabalho de investigação, cujo objetivo se centrou no estudo do grau de envolvimento dos municípios portugueses do continente, na problemática das alterações climáticas, além de analisarem os modos de articulação com a administração central, em especial com os organismos responsáveis pela proteção civil. Os autores basearam os procedimentos metodológicos num questionário em plataforma virtual (Google), o qual foi respondido por 278 Câmaras Municipais.

No que concerne à dimensão da sensação térmica, Mário Talaia analisou o conforto térmico, tendo em conta as condições termohigrométricas registadas em am-

biente específico. Com base na validação de um método de cálculo de isolamento térmico de vestuário, o autor intersecciona fatores como a temperatura do ar, a temperatura do termómetro húmido, entre outros, para perceber o nível de conforto dos intervenientes, na relação entre o contexto de exposição e o vestuário usado.

No que diz respeito ao *ambiente*, Geórgia Pellegrina, Anna Peixoto e Machado Kaiser, realizaram uma evolução temporal dos movimentos de massa na região leste do estado de S.Paulo, no Brasil, no período temporal de 2009 a 2015. Os autores pretenderam averiguar a relação entre a pluviosidade, a ocorrência de movimentos de massa, a densidade populacional e o número de indivíduos afetados. Do ponto de vista do método de trabalho, foram numeradas as ocorrências dos três períodos mais críticos do tempo em estudo, tendo sido a distribuição espacial das ocorrências e de suas vítimas comparadas com as precipitações normalizadas em função das normais pluviométricas e da densidade populacional dos municípios.

Já Fernanda Follmann, Franciele da Silva, Eliane Foletto e Francisco Costa, discutiram a importância das áreas de preservação permanente na prevenção do risco geomorfológico, na microbacia hidrográfica de Chácara das Flores, Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. O método utilizado permitiu combinar a cartografia da área em estudo com o mapa das áreas de risco geomorfológico.

Também Mohammed El-Fengour, Carlos Bateira, Abdelhak El-Fengour, Abdelghani Houari e Mstafa Hmamouchi apresentam um trabalho sobre os processos hidroerosivos nas Montanhas do Rif, em Marrocos, e de como este tipo de risco está a afetar as infraestruturas e territórios adjacentes (redes viárias, terrenos agrícolas, etc), com as consequências socio-económicas conexas. Para realização do estudo, os autores recorreram a fotografias aéreas, cartografia, assim como ao cálculo “*cumulative rainfall*”.

Valdemar Rocha e Vaneusa Pereira abordam o tema da exploração mineral no Maciço do Espinhaço, na Bahia, Brasil, dando conta dos riscos ambientais associados, assim como das alterações sócio-espaciais decorrentes, nomeadamente no que respeita ao acesso aos recursos hídricos. A metodologia usada baseou-se na recolha de dados em contexto de trabalho de campo, pela observação direta, assim como por captação de imagens fixas e realização de questionários por entrevista e por inquérito.

Lídia Ramos, Leo Name e Céline Veríssimo dão visibilidade ao caso de Vila Hayes, no Paraguai, refletindo sobre as injustiças ambientais e de como estas mais afetam populações vulneráveis, com fragilidades económicas e sociais. Os autores agruparam e discutiram um vasto conjunto de dados, reforçando o papel dos geógrafos enquanto ativistas e promotores da justiça social, dando voz à situação periclitante de comunidades de/em risco.

Por fim, a dimensão da *psique* está plasmada no capítulo de Altino Filho e Vitor Silva, que abordaram a questão do transtorno de stress pós-traumático, enfatizando o papel da música como ferramenta que coloca em evidência as angústias e os traumas da sociedade moderna. Tendo como base duas letras de canções, os autores realizaram uma análise de conteúdo, procurando evidenciar o benefício desta arte como difusora da dinâmica patológica em causa e, em certa medida, desconstruir os estereótipos em torno dos transtornos mentais.

Num contexto territorial cada vez mais complexo, é urgente olhar para a os riscos de forma plural e diversa, para que os estudos cindínicos possam manter o seu carácter inovador e utilitário, colocando-se ao serviço dos profissionais atuantes em momentos de risco, dos investigadores e, acima de tudo, das populações afetadas.

**EVOLUÇÃO TEMPORAL (2009-2015) DOS
MOVIMENTOS EM MASSA NA REGIÃO LESTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO – BRASIL**
**TREND (2009-2015) OF MASS MOVEMENTS
IN THE EAST REGION OF THE STATE OF
SÃO PAULO – BRAZIL**

Geórgia Jorge Pellegrina

Centro de Meteorologia de Bauru, Faculdade de Ciências, Univ. Estadual Paulista (Brasil)
ORCID: 0000-0003-3987-1519 georgia@ipmet.unesp.br

Anna Silvia Palcheco Peixoto

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Univ. Estadual Paulista (Brasil)
ORCID: 0000-0001-5867-2684 anna@feb.unesp.br

Ilza Machado Kaiser

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Univ. Estadual Paulista (Brasil)
ORCID: 0000-0002-7866-9113 ilzakaiser@feb.unesp.br

Resumo: As chuvas intensas, tanto de curta quanto de longa duração, fornecem condições favoráveis à diminuição da tensão efetiva do solo, e são os principais deflagradores dos movimentos em massa. Este trabalho explora a relação entre pluviosidade, densidade populacional, ocorrência de movimentos em massa e pessoas afetadas. A área de estudo abrange a região leste do estado de São Paulo (BR) no período de 2009 a 2015. Através da observação do número de ocorrências foram selecionados os três períodos mais críticos para análise detalhada. A distribuição espacial dessas ocorrências e de suas vítimas foi confrontada com as precipitações normalizadas em

função das normais pluviométricas e com a densidade populacional dos municípios. Os volumes pluviométricos foram totalizados por estação chuvosa. Os resultados indicam que nenhum dos fatores, se considerados de forma isolada, explica a distribuição de ocorrências. A relevância de atualizar o banco de dados, com a inserção das informações de forma georeferenciada fica evidente. A vinculação da análise das ocorrências com a densidade demográfica deve ser feita em uma escala mais detalhada.

Palavras-chave: Banco de dados, desastres naturais, movimentos em massa, eventos severos, gestão de riscos.

Abstract: Heavy rainfall, of both short and long duration, provides conditions that reduce the effective stress in soil, and thus acts as one of the main triggers of mass movements. The relationship between rainfall, population density, mass movement events and affected persons is studied. The study area covers the eastern region of the state of São Paulo (BR) from 2009 to 2015. The number of events were studied to select the three most critical periods for detailed analysis. The spatial distribution of these events and their victims were compared with standardized rainfall as a function of normal rainfall and the population density of the municipalities. The total amount of rainfall was calculated for each rainy season. The results show that none of the factors taken in isolation explains the distribution of events. The relevance of updating the database by including information in georeferenced form is evident. Linking the analysis of the events with the population density should be done on a more detailed scale.

Keywords: Database, natural disasters, mass movements, severe events, risk management.

Introdução

Os eventos atmosféricos que proporcionam grandes quantidades de precipitação podem deflagrar desastres naturais como movimentos em massa, erosões hídricas, inundações e alagamentos. Nos bancos de dados de desastres naturais os danos relacionados às vítimas são usualmente classificados como: desalojados, desabrigados, feridos e vítimas fatais. No estado de São Paulo, Brasil, as chuvas intensas são os principais agentes deflagradores dessas ocorrências.

Nesse estado essas chuvas ocorrem usualmente entre setembro a fevereiro e, não raro, se estendem até março. Sua incidência em ambientes urbanos expõe a população a situações perigosas e provoca avultados danos.

A análise do risco deve considerar vários fatores que potencializam o perigo e que se alteram ao longo do tempo: condições meteorológicas; suscetibilidade do local que é um fator intrínseco à geologia e à geomorfologia; forma de ocupação do espaço assim como vulnerabilidade da população. Este é um desafio a ser enfrentado, uma vez que as modificações devido às cicatrizes de desastres já ocorridas e alterações na forma de uso e ocupação do solo ocorrem a cada estação chuvosa. Sendo assim, embora por um lado a identificação dos fatores que atuam na ocorrência desses eventos seja dificultada pela dinâmica do processo, por outro lado é fundamental para a adoção de medidas preventivas ou corretivas.

Neste sentido, a espacialização das áreas atingidas por eventos severos, e seus impactos ao longo de um determinado período, torna possível a localização das áreas mais propensas às manifestações de riscos.

Do mesmo modo, os mapas resultantes das análises mostram ser uma importante ferramenta para a gestão de riscos, com o objetivo principal de prevenir perdas de vidas e danos ambientais.

Desastres Naturais no Brasil com ênfase na Região Sudeste

Nas últimas décadas houve um aumento na intensidade e na frequência dos desastres naturais em todo o globo terrestre. De acordo com o EM-DAT (2012), o aumento

mais significativo foi a partir da década de 50, agravando-se na década de 80, e baseado nos dados da Organização das Nações Unidas (ONU), o crescimento populacional mundial pode estar relacionado com a maior ocorrência de desastres no âmbito global.

Além da densidade demográfica que contribui para esse aumento de desastres naturais, outros fatores também interferem tais como: a localização geográfica; as características geológicas; geomorfológicas; o uso e ocupação da terra; a vulnerabilidade do local (educação, pobreza, cultura, quantidade de idosos e outros). Dessa maneira, existem regiões que são mais afetadas que outras em função tanto da magnitude e frequência dos processos, como da vulnerabilidade do local.

É importante considerar que atualmente as ocorrências são registradas com maior eficácia e contam com a facilidade da *internet* para divulgação imediata, justificando-se assim, a tendência crescente e significativa das notificações dos desastres dos últimos 15 anos.

Destaca-se que entre os piores desastres naturais ocorridos no mundo, 54 % estão relacionados com as instabilidades atmosféricas severas. No Brasil, o pior desastre natural ocorrido foi relacionado com movimentos em massa na Região Serrana do Rio de Janeiro em 2011. As regiões mais críticas afetadas por esses eventos no Brasil são as Regiões Sul, Sudeste e Nordeste. As inundações são as que mais afetam pessoas, seguidas dos movimentos em massa, e a Região Sudeste é a mais afetada, segundo o CEPED/UFSC (2013).

A distribuição de vítimas fatais causadas por movimentos em massa nos estados do Brasil, no período de 1928 a 2013, indicou o Rio de Janeiro como o estado de maior incidência com 3679 mortes (fig. 1). Destacam-se também os estados de São Paulo com 949 vítimas, Santa Catarina com 233 vítimas e Bahia com 276 vítimas (G. J. Pellegrina, 2015).

Algumas regiões dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, pertencentes à região Sudeste do Brasil, apresentam alta suscetibilidade aos movimentos em massa em função de uma conjunção de fatores tais como: características geológicas e geomorfológicas, o uso e ocupação do solo e do regime pluviométrico.

No estado de São Paulo, destacam-se as Regiões da faixa Leste: Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital, as Regiões da Serra do Mar (Baixada Santista e Litoral Norte) e o Vale do Paraíba (fig. 2), e no estado do Rio de Janeiro, as Regiões Serranas, essas com o maior número de pessoas afetadas e vítimas por movimentos em massa (M. J. Brollo e C. J. Ferreira, 2016).

Fig. 1 - Ocorrência de mortes provocadas por deslizamentos, em estados da Federação do Brasil, no período 1928 a 2013 (Fonte: G. J. Pellegrina, 2015).

Fig. 1 - Deaths caused by landslides in states in Brazil, in the period 1928 to 2013 (Source: G. J. Pellegrina, 2015).

Fig. 2 - Faixa Leste do estado de São Paulo (Fonte: Adaptado do mapa das Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) do estado de São Paulo do IGC (2014) sobre base da Wikimedia Commons (2017)).

Fig. 2 - Eastern strip of São Paulo state (Orange: Metropolitan Region of São Paulo; Red: Capital; Yellow: Baixada Santista Coast; Azul: North Coast; Green: Paraíba Valley) (Source: Adapted from the Hydrographic Units of Water Resources Management (UGRHI) of the state of São Paulo of IGC (2014) on the map of Wikimedia Commons Contributors (2017)).

A Defesa Civil do estado de São Paulo segue a nomenclatura do COBRADE (Código Brasileiro de Desastres) para classificação de desastres que são divididos nas categorias natural e tecnológica. Na categoria natural os desastres são classificados nos grupos geológico, hidrológico, meteorológico, climatológico e biológico. O grupo geológico está dividido em 4 subgrupos: terremoto e emissão vulcânica, sem registro na região e movimentos em massa e erosão com ocorrências significativas. O subgrupo movimentos em massa abrange: quedas, tombamentos e rolamento; deslizamentos; corridas de massas e subsidências/colapsos. O subgrupo erosão engloba: erosão costeira/marinha, erosão de margem fluvial e erosão continental (CEPED/UFSC, 2013).

M. J. Brollo e C. J. Ferreira (2016) quantificaram os desastres naturais no estado de São Paulo, no período de 2000 a 2015, seguindo a codificação COBRADE. Observaram que 36 % dos municípios de São Paulo foram alvos de desastres geológicos (dos subgrupos movimento em massa e erosão), 54 % foram atingidos por eventos decorrentes de fenômenos do tipo meteorológico (chuvas, temporais, raios, vendavais, granizo, etc.) e 53 % foram alvos de fenômenos do tipo hidrológico (inundação, enxurrada, alagamento, inundação costeira/ressaca). Segundo os autores somente a Capital recebe a classificação de ocorrência de acidentes muito alta, no Litoral Norte todos os municípios recebem a classificação alta exceto um município (Ilhabela), a Região Metropolitana e Baixada Santista tem municípios com classificação média a alta e no Vale do Paraíba a classificação de número de acidentes varia entre baixa, média e alta (fig. 3).

Analisando unicamente os desastres do grupo geológico M. J. Brollo e C. J. Ferreira (2016) observaram que o Vale do Paraíba apresenta municípios com exposição variando de baixa a muito alta, e a faixa do Litoral Norte uma classificação alta e, sobretudo muito alta (fig. 4). Com relação ao número de óbitos o Vale do Paraíba recebe a classificação alta e o Litoral Norte a classificação média (fig. 5).

A organização e sistematização das informações sobre desastres é um dos primeiros passos para a gestão de riscos. No Brasil, os primeiros bancos de dados foram disponibilizados ao público a partir de 2010, quando surgiu o Atlas Brasileiro de Desastre Naturais, com informações entre 1991 e 2010, e, em 2011, o Banco de Dados de Desastres Naturais do IPMet (Centro de Meteorologia de Bauru), com

Fig. 3 - Frequência de eventos por município e número de municípios em cada faixa de frequência no período 2000 a 2015 (Fonte: Modificado de M. J. Brollo e C. J. Ferreira, 2016).

Fig. 3 - Frequency of events by municipality and number of municipalities in each frequency band, in the period 2000 to 2015 (Source: Modified of M. J. Brollo and C. J. Ferreira, 2016).

Fig. 4 - Frequência de desastres geológicos e número de municípios em cada faixa de frequência no período 2000 a 2015 (Fonte: M. J. Brollo e C. J. Ferreira, 2016).

Fig. 4 - Frequency of geological disasters and number of municipalities in each frequency band, in the period 2000 to 2015 (Source: M. J. Brollo and C. J. Ferreira, 2016).

informações desde 1980, e o SIDEDEC – Sistema Integrado de Defesa Civil, com informações desde 2008. O banco do IPMet é alimentado com dados da defesa civil e da mídia, enquanto o do SIDEDEC utiliza apenas os dados da defesa civil (G. S. Vieira *et al.*, 2016).

Fig. 5 - Frequência de óbitos por Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) e número de municípios em cada faixa de frequência no período 2000 a 2015 (Fonte: M. J. Brollo e C. J. Ferreira, 2016).

Fig. 5 - Deaths per Hydrographic Units of Water Resources Management (UGRHI) and number of municipalities in each frequency band, in the period 2000 to 2015 (Source: M. J. Brollo and C. J. Ferreira, 2016).

Para um melhor conhecimento e compreensão das áreas afetadas faz-se necessária a utilização de um banco de dados com informações confiáveis e disponíveis ao usuário. Os dados armazenados no banco podem servir apenas para consultas ou servir para atributo básico em ciência de geoinformação.

G. Câmara e G. Ribeiro (2003) sugerem a utilização de uma única base de dados que integre informações espaciais provenientes de dados cartográficos, censitários, cadastro urbano e rural, imagens de satélites, ocorrência de eventos e mapas.

Na perspectiva moderna de gestão de desastres, toda ação de planejamento, ordenação ou monitoramento do espaço deve considerar a análise dos diferentes

componentes do ambiente, incluindo o meio físico-biótico, a ocupação humana e seu inter-relacionamento. O emprego de técnicas de sensoriamento remoto e de sistemas de informações geográficas auxilia muito a identificação de áreas de riscos. Diversos autores apresentaram grandes contribuições a respeito do uso dessa metodologia, reduzindo custos, elaborando mapas, subsidiando avaliações e decisões futuras de planejamento (G. Câmara e A. M. U. Monteiro, 2004; Van Westen *et al.*, 2006; T. M. Sausen e M. S. P. Lacruz, 2015; M. O. Xavier *et al.*, 2017).

Justificativa

A região do Vale do Paraíba e a região do Litoral Norte, destacada respectivamente em verde e azul na fig. 2, apresentam maior frequência de acidentes, no estado de São Paulo, causados pela geologia local (embasamento cristalino) com os processos de apropriação do território e de seus recursos (G. J. Pellegrina *et al.*, 2009a). Este é o caso de risco misto de componente geodinâmica, classificado por Lourenço (2007), quando além do fator antrópico, o evento está relacionado com as geodinâmicas, interna e externa, que actuam sobre a Terra.

A análise considerou os municípios do Vale do Paraíba e do Litoral Norte por serem regiões contíguas com padrão de ocupação semelhante. Por sua vez, foi excluída a capital (município de São Paulo) por apresentar, tanto um padrão de ocupação muito diferenciado, como um relevo menos acentuado.

Nestas regiões, o período chuvoso está sempre associado aos eventos de movimentos em massa. Foi escolhido como marco inicial do estudo o período entre setembro/2009 a março/2010, uma vez que apresentou um significativo número de pessoas afetadas, e a partir daí traçou-se um panorama da evolução destes eventos até março de 2015 (fig. 6).

A análise de movimentos em massa pode ser realizada com o foco em eventos pontuais isolados, normalmente relacionando o evento com a chuva do dia ou de dias imediatamente anteriores. Este tipo de análise fica prejudicado quando a rede pluviométrica não é suficientemente adensada, como é o caso, pois nem sempre se dispõe de registradores próximos aos locais de escorregamento.

Com efeito, a análise por episódio meteorológico fica prejudicada para grandes áreas em função da variabilidade espacial da chuva, especialmente nos eventos convectivos. Esta variabilidade espacial se reduz para volumes pluviométricos acumulados em intervalos temporais maiores, o que justifica a opção de considerar a época pluviosa de 6 meses.

Por último, é relevante a relação entre desastres e densidade populacional. Contudo, o banco de dados descreve as informações por município. Deste modo, a relação dessas duas variáveis só pode ser feita na escala municipal.

Metodologia

A partir do mapa geomorfológico do estado de São Paulo (IPT, 1981) foi feita uma caracterização da área de estudo.

Foi realizado um levantamento no banco de dados de desastres naturais do IPMet para quantificação do número de ocorrência dos eventos de movimentos em massa e suas reincidências, assim como as informações do número de danos e pessoas afetadas (desalojados, desabrigados, feridos e mortos) e dos eventos meteorológicos deflagradores. As informações do banco de dados foram organizadas por período e por tipo de desastre de movimentos em massa (quedas de barreira, deslizamentos de terras, escorregamentos de encostas e erosão hídrica). Foram elaborados histogramas comparativos por período chuvoso no Brasil (setembro a março do ano subsequente), desde 2009 a 2015 com o número de eventos de movimentos em massa. Esta análise embasou a seleção dos três períodos a serem detalhados neste estudo, considerando não apenas os desastres, mas também o número de pessoas afetadas (IPMet, 2016; G. J. Pellegrina *et al.*, 2009b).

Sendo assim, sempre considerando o período chuvoso de setembro a março, se verificou que o período 2009/2010 obteve o maior número de ocorrências (33) e pessoas afetadas (12761, sendo 2 vítimas fatais). Por sua vez, se ressalta que este período apresentou volumes de chuva acima das normais climatológicas. Na sequência, 2010/2011 e 2011/2012 apresentaram os menores números de ocorrências e afetados, e por este motivo foram descartados da análise. Na comparação dos três

períodos seguintes, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, o segundo teve menor número de ocorrências (fig. 6). Dessa maneira, a análise da evolução temporal, neste trabalho, considerou os períodos 2009/2010, 2012/2013 e 2014/2015, para os quais os resultados foram espacializados compondo mapas cronológicos.

Os totais mensais de chuvas acumuladas de cada período estudado foram coletados dos dados das estações meteorológicas do Banco de Dados Hidrológico do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica do estado de São Paulo), INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastre Naturais) para o período de 2009 a 2015. Os dados foram organizados considerando os períodos chuvosos, isto é, os totais pluviométricos dos meses de setembro a dezembro foram somados e a estes foram acrescidas as alturas pluviométricas dos meses de janeiro a março do ano subsequente.

Além disso, volumes pluviométricos típicos da região (normais pluviométricas) foram adotados a partir das normais climatológicas de cada município da área de estudo no site do CEPAGRI (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, Brasil), considerando o período de 1961 a 1990 CEPAGRI (2016).

Fig. 6 - Movimentos em massa, de 2009 a 2015: (a) Número de eventos por período chuvoso; (b) percentual do número de eventos por período chuvoso (Fonte dos dados: IPMet, 2016).

Fig. 6 - Mass movements, from 2009 to 2015: (a) Number of events per rainy period; (b) Percentual of the number of events per rainy period - 2009 to 2015 (Source: IPMet, 2016).

Para uma melhor visualização das variações dos totais pluviométricos acima e abaixo das condições normais procedeu-se uma normalização dos totais dos períodos chuvosos de 2009/2010; 2012/2013 e 2014/2015 registrados nas estações utilizando como referência a normal pluviométrica de cada município:

$$P_{ni} = (P_i \text{ (setembro a março)}) / (N_m \text{ (setembro a março)})$$

Sendo:

P_{ni} : precipitação normalizada da estação pluviométrica i ;

P_i (setembro a março): precipitação acumulada da estação pluviométrica i , no período de setembro a março;

N_m (setembro a março): normal climatológica do município em que se encontra a referida estação i , relativa ao período de setembro a março.

Deste modo, o total pluviométrico do período chuvoso (setembro a março) foi comparado à altura pluviométrica da normal climatológica correspondente ao mesmo período.

Esses valores foram inseridos em um ambiente SIG – Sistema de Informação Geográfica. O *software* utilizado foi o SPRING, que é um SIG com funções de processamento de imagens, análise espacial, modelagem numérica de terreno e consulta a bancos de dados espaciais – projeto desenvolvido INPE – Instituto de Pesquisas Espaciais (G. Câmara *et al.*, 1996; J. Garrido, 1996).

Os valores das normais pluviométricas dos locais de estudo foram georeferenciados com as latitudes e longitudes centrais dos municípios e foi gerado um mapa das normais climatológicas espacializadas.

Os valores normalizados das estações foram espacializados em função das coordenadas geográficas das estações meteorológicas. Esta representação permitiu identificar as regiões em que as chuvas foram superiores ou inferiores às normais climatológicas, já que quando P_{ni} for maior que o valor unitário, isso significa que choveu mais que a normal no período.

As espacializações foram feitas por meio de interpolação dos valores pontuais e o fator de ponderação utilizado foi o inverso do quadrado da distância, obtendo-se uma matriz de valores. Estes valores foram fatiados e classificados automaticamente no SIG.

Também foram inseridos em ambiente SIG os dados de densidade populacional por município obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), que constitui no principal provedor de dados e informações do Brasil.

Resultados

A partir do mapa geomorfológico do estado de São Paulo foi traçado um panorama geral da região de estudo em que se destaca que as grandes formações do relevo paulista e suas relações com a geologia estabelecem uma estrutura complexa com características próprias nessas regiões atingidas pelos movimentos em massa, em função de descontinuidades estruturais, dobramentos e falhas.

Parte da região de estudo está inserida no Planalto Atlântico que, de maneira genérica, é constituído por formas de topos convexos, elevada densidade de canais de drenagem e vales profundos. As altitudes variam de 600 até 2000 m. A litologia dominante é de Granitos, Gnaisses e Migmatitos, cujo lineamento das fraturas facilita a ocorrência de movimentos em massa. Nessa região está inserido o Vale do Paraíba.

A Serrania Costeira corresponde aos fronts das serras interiores (Serras do Mar e Paranapiacaba), que descem de altitudes de 800 a 1.200 m para as áreas baixas adjacentes ao mar, contendo feições como escarpas festonadas, espigões digitados, serras alongadas, morros paralelos, mar de morros, morros isolados, morrotes em meia-laranja e outras formas.

As características geomorfológicas aqui apresentadas dessas regiões mostram por si só a alta suscetibilidade a movimentos em massa para os municípios estudados. Acrescido a isso, o problema de habitações em áreas de riscos aliado à taxa de pobreza das populações atingidas aumenta ainda mais a vulnerabilidade local.

Nessas condições, o resultado da avaliação dos totais pluviométricos no período estudado em relação às normais climatológicas para o mesmo período auxilia na prevenção e tomadas de medidas emergenciais para se melhorar a resiliência dos municípios. Por exemplo, quando em dezembro se percebe que o período tende a volumes pluviométricos maiores que as normais, medidas como evacuação de áreas de riscos podem ser tomadas com mais segurança.

Posto isto, primeiramente são apresentadas as normais pluviométricas (CEPAGRI, 2016) em que se observa que a região do litoral e a região próxima à fronteira norte apresentam os maiores índices pluviométricos (fig. 7a). As regiões com as maiores densidades populacionais coincidem parcialmente com as regiões de maior índice pluviométrico (fig. 7b).

Exemplo da importância de se avaliar conjuntamente a geomorfologia, a densidade populacional e os volumes pluviométricos é o município de São José dos Campos que possui a maior densidade populacional e o maior PIB (Produto Interno Bruto) da região, o dobro da segunda colocada. As normais climatológicas altas associadas à suscetibilidade geomorfológica e à alta densidade populacional induziram a ocorrência de movimentos em massa e afetados em todos os períodos estudados.

Fig. 7 - Região de estudo: (a) Precipitações normais, (b) Densidades populacionais (Fonte dos dados: CEPAGRI, 2016 e IBGE, 2016).

Fig. 7 - Area studied: (a) Normal precipitation, (b) Population density (Source: CEPAGRI, 2016 and IBGE, 2016).

As precipitações normalizadas, em função das normais pluviométricas, para o período de 2009/2010, permitem observar que choveu mais que a normal em praticamente toda a região (fig. 8), a maior precipitação registrada foi 2810 mm no município de Ubatuba.

Registram-se valores muito acima das normais na região mais próxima do litoral, onde também é observado o maior número de eventos e o maior número de vítimas (fig.s 9 e 10). Foram documentadas duas fatalidades no município de São Luís do Paraitinga. Importante ressaltar que o município com maior densidade populacional, São José dos Campos, apresentou 350 pessoas afetadas.

O município São Luís do Paraitinga, com 9000 vítimas (marrom), foi seguido pelos de Guaratinguetá, Ubatuba e Aparecida (fig. 10), respectivamente com número de vítimas 1020, 801 e 691.

Fig. 8 - Precipitação normalizada, período 2009-2010 (Fonte dos dados: CEPAGRI, 2016).

Fig. 8 - Standardized rainfall in the period 2009-2010 (Source: CEPAGRI, 2016).

Fig. 9 - Número de eventos, período 2009-2010 (Fonte dos dados: IPMet, 2016).

Fig. 9 - Number of events in the period 2009-2010 (Source: IPMet, 2016).

Fig. 10 - Pessoas afetadas por município, período 2009-2010 (Fonte dos dados: IPMet, 2016).

Fig. 10 - Victims per municipality in the period 2009-2010 (Source: IPMet, 2016).

No período de 2012-2013, observou-se que na região leste choveu menos que as normais; na região central observaram-se valores próximos à normal e valores maiores que o dobro da precipitação normal na região próxima ao litoral (fig. 11).

Fig. 11 - Precipitação normalizada, período 2012-2013 (Fonte dos dados: CEPAGRI, 2016).

Fig. 11 - Standardized rainfall in the period 2012-2013 (Source: CEPAGRI, 2016).

Dentre os municípios com maior número de eventos, um localiza-se próximo à região com volumes acima das normais climatológicas. Outros dois municípios com maior número de eventos, localizam-se perto das regiões com precipitação próxima às normais pluviométricas (fig.s 12 e 13), porém com alta densidade demográfica.

Fig. 12 - Número de eventos, período 2012-2013 (Fonte dos dados: IPMet, 2016).

Fig. 12 - Number of events in the period 2012-2013 (Source: IPMet, 2016).

Fig. 13 - Pessoas afetadas por município, período 2012-2013 (Fonte dos dados: IPMet, 2016).

Fig. 13 - Victims per municipality in the period 2012-2013 (Source: IPMet, 2016).

No período 2014-2015, observou-se que a chuva foi inferior à normal climatológica, exceto para uma pequena faixa litorânea onde se concentrou também o maior número de eventos (fig. 14).

Neste período chuvoso foi registrado o maior número de eventos (12) dos três períodos estudados no município de São Sebastião (litoral). Estas ocorrências foram favorecidas pela geomorfologia e uso e ocupação desordenada do local (fig. 15).

O número de vítimas neste período foi significativamente inferior aos outros períodos analisados (fig.16).

Fig. 14 - Precipitação normalizada, período 2014-2015 (Fonte dos dados: CEPAGRI, 2016).

Fig. 14 - Standardized rainfall in the period 2014-2015 (Source: CEPAGRI, 2016).

Fig. 15 - Número de eventos para período 2014-2015 (Fonte dos dados: IPMet, 2016).

Fig. 15 - Number of events, in the period 2014-2015 (Source: IPMet, 2016).

Fig. 16 - Pessoas afetados por município, período 2014-2015 (Fonte dos dados: IPMet, 2016).

Fig. 16 - Victims per municipality in the period 2014-2015 (Source: IPMet, 2016).

Embora a chuva tenha sofrido variação nos três períodos estudados, observa-se a ocorrência de eventos nos três períodos para os municípios do litoral: Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião, favorecidos tanto pela geomorfologia local, como pela ocupação desordenada.

Quando se relaciona o número de vítimas em função da densidade populacional dos municípios para todo o período analisado observa-se uma pequena tendência do aumento de eventos com a densidade populacional (fig. 17), se bem que a densidade populacional não é a principal responsável pela ocorrência de eventos. Não foi incluído nesta análise um evento com mais de 9000 vítimas, ocorrido em 31 de dezembro de 2009 em São Luiz do Paraitinga. A introdução deste evento produziria uma distorção na escala uma vez que os demais eventos tem número de vítimas inferior a 1000.

Fig. 17 - Número de vítimas e função da densidade populacional para todo o período
(Fonte: IPMet, 2016 e IBGE, 2016).

Fig. 17 - Number of victims and population density for the whole period.
(Source: IPMet, 2016 and IBGE, 2016).

Verifica-se que existem municípios com baixa densidade com ocorrências mais elevadas que municípios mais populosos. É importante relembrar que a densidade populacional analisada por município não é representativa dos locais onde ocorrerem os

eventos. O intenso e desordenado processo de urbanização provoca, ora locais extremamente adensados, ora vazios populacionais, que se perdem nesta escala de análise.

A análise em escala espacial mais detalhada não foi possível uma vez que, até o momento, o banco de dados do IPMet não está georreferenciado.

É relevante mencionar que os registros do número de vítimas podem estar subestimados em função das deficiências nas notificações locais.

Conclusão

As regiões do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, que historicamente apresentam uma alta incidência de desastres naturais, exibem comportamento diferenciado entre os municípios estudados.

Para os três períodos selecionados, o comportamento da chuva (chuvas normalizadas) foi diferenciado, porém a região litorânea sempre apresentou trechos com precipitação acima das normais climatológicas.

O volume de precipitação acumulada em uma estação chuvosa não explica individualmente a distribuição de ocorrências por município. Porém, o monitoramento do volume pluviométrico mês a mês e sua comparação com a normal climatológica pode ser um indicativo de tomada de medidas emergenciais em regiões de alta suscetibilidade geomorfológica.

A escala de representação de eventos, assim como a densidade demográfica, ambas representadas por município, não parecem ser uma escala apropriada para este tipo de análise. Entretanto o banco de dados não fornece a informação georeferenciada específica de cada ocorrência, mas sim por município.

O IPMet está modificando o banco de dados introduzindo esta informação nos eventos que estão sendo alimentados, e nas informações que já estão armazenadas no banco.

A evolução temporal estudada abrange um período de transição no Brasil na gestão de desastres naturais em função das pressões dos Marcos Internacionais (Hiogo e Sendai) e de ocorrências significativas no país. Nesse período foram implantados o CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais) e o PPDC (Plano Preventivo de Defesa Civil) para muitos municípios do estado de São

Paulo. Estes planos visam permitir a implantação de medidas anteriores à ocorrência de acidentes, para reduzir perdas de vidas e minimizar os riscos. Um dos resultados práticos foi a melhora significativa no monitoramento com implantação de pluviômetros. No período de 2014/2015, os pluviômetros da região foram triplicados. A rede contava com 35 pluviômetros no início do período e passou a ter 90 pluviômetros.

Dentre os parâmetros estudados, o que apresentou maior variação foi o número de pessoas afetadas, destacando-se o município de São Luís do Paraitinga com 9004 pessoas afetadas no período de 2009/2010, onde foram registrados 9 eventos. Destaca-se que esse município apresenta pouca densidade demográfica com 17 hab/km², mas é caracterizado por ser uma região acidentada, relevo de espigões e cursos d'água sinuosos. O evento específico de 31/12/2009 envolveu não apenas escorregamentos de terra, mas também transbordamento de rios e córregos, mostrando a complexidade das ocorrências.

O período de setembro de 2009 a fevereiro de 2010 foi o mais crítico, visto que foram registrados os maiores volumes pluviométricos em todos os municípios. Este período esteve sob forte influência de sistemas frontais estacionários e formação de intensas chuvas convectivas, que mantiveram os totais acima da média climatológica.

Por último, ressalta-se a importância da incorporação de dados geomorfológicos e de uso e ocupação do solo; da utilização de uma escala mais detalhada para representar a densidade demográfica e da implantação de maior número de pluviômetros para o enriquecimento da análise. Essa é uma meta ambiciosa mas factível e necessária para um país com tantas desigualdades sociais e ambientais como o Brasil.

Bibliografia

- Brollo, M. J. e Ferreira, C. J. (2016). Gestão de riscos de desastres devido a fenômenos geodinâmicos no estado de São Paulo: Cenário 2000-2015. *Boletim do Instituto Geológico*, São Paulo, n.º 67. *IS-SN0100-431X. Disponível em: http://igeologico.sp.gov.br/files/2016/10/boletim_IG_vol_67.pdf
- Câmara, G., Casanova, M. A., Hemerly, A. S., Magalhães, G. C., Medeiros, C. B. (1996). *Anatomia de Sistemas de Informações Geográficas*. Campinas, UNICAMP. 193 p.
- Câmara, G. e Monteiro, A. M. U. (2004). Conceitos básicos em ciência da geoinformação. In: G. Câmara et al. (Ed.) *Introdução a ciência da geoinformação*, São José dos Campos: INPE. Disponível em: www.dpi.inpe.br/gilberto/livros.html. Acesso em : março de 2016.
- Câmara, G. e Ribeiro, G. (2003). Arquitetura de Sistemas de Informação Geográfica. In: *Introdução à Ciência da Computação*. INPE. Disponível em: <http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introducao/cap3-arquitetura.pdf>. Acesso em 17/02/2011.

- CEPAGRI-Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura. Disponível em: <http://www.cpa.unicamp.br/outras-informacoes/clima-dos-municipios-paulistas.html>. Acesso em novembro de 2016.
- CEPED/UFSC (2013). Centro Universitário sobre Estudos e Pesquisa sobre Desastres/Universidade Federal de Santa Catarina. *Atlas brasileiro de desastres naturais: 1991 a 2012*. Volume Brasil. Ed. 2. Florianópolis: CEPED/UFSC, 126 p
- Em-Dat. The OFDA/CRED International Disaster Database. Disponível em: <http://www.em-dat.net/>. Acesso em: Março de 2016.
- Garrido, J. (1996). Integrating remote sensing and GIS by object-oriented data modelling Computers & Graphics. *Spring*, 20: (3) 395-403.
- IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao.html>. Acesso em: novembro de 2016.
- IGC - INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO. Mapa das unidades hidrográficas de recursos hídricos do estado de São Paulo – UGRHI. Escala: 1:1.000.000. (2014). Disponível em <http://www.igc.sp.gov.br/produtos/ugrhi.html>. Acesso em março de 2017.
- IPMet - Centro de Meteorologia de Bauru. Disponível em: http://www.ipmet.unesp.br/index2.php?menu_esq1=&abre=ipmet_html/defesa_civil/index.php. Acesso em: novembro de 2016.
- IPT- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. MAPA Geomorfológico do Estado de São Paulo. Escala 1:1.000.000. Volumes I e II. Publicação 1183. São Paulo Brasil.
- Lourenço L. (2007). Riscos Naturais, Antrópicos e Mistos. Revista *Territorium* (Revista da Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança). Vol. 14. p 109-113. ISBN:0872-8941. Disponível em: <http://impactum-journals.uc.pt/territorium/article/view/3266/2513>
- Pellegrina, G. J. (2015). *Precipitação e movimentos de massa: contribuição à emissão de alerta nos municípios de Coimbra – Portugal e Campinas (SP) – Brasil (Tese de Doutorado)*. Apresentada ao Instituto de Geociências e Ciências Exatas do Campus de Rio Claro, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, área de Climatologia. 31-36.
- Pellegrina, G. J., Peixoto, A. S. P., Nunes, L. H. (2009a). Banco de dados para danos causados por eventos severos ocorridos no Estado de São Paulo, Brasil. *Anais da V Conferência Brasileira sobre Estabilidade de Encostas*. COBRAE. São Paulo. Brasil. 8 p.
- Pellegrina, G. J., Oliveira, M. A. A., Peixoto, A. S. P. (2009b). Elaboração de um Banco de Dados para Eventos Severos. Revista *Territorium* (Revista da Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança), Vol. 16. ISBN:0872-8941. Disponível em: <http://impactum-journals.uc.pt/territorium/article/view/3168/2419>
- Sausen, T. M., Lacruz, M. S. P. (2015). Organizadoras *Sensoreamento remoto para desastres*. Ofício de Textos. São Paulo p. 288
- Van Westen, C. J., Van Asch, T. W. J., Soeters, R. (2005). Landslide hazard and risk zonation; why is it still so difficult? *Bulletin of Engineering geology and the Environment* 65 (2), p.167–184.
- Viera, G. S., Peixoto, A. S. P., Kaiser, I. M. (2016) Análise da Estrutura dos Bancos de Dados de Desastres no Estado de São Paulo *Anais do XVIII Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica*. 8p.
- Xavier, M. O., Barella, C. F., Corteletti, R. C., Ferreira, S., Souza, T. S. A., Tavares, V. (2017) Banco de Dados de Movimentos Gravitacionais de Massa do Distrito Sede da Cidade Histórica de Ouro Preto (MG) para uso em Trabalhos Estatísticos de Mapeamento. *Anais da VII Conferência Brasileira sobre Estabilidade de Encostas*. COBRAE. Florianópolis-Santa Catarina-Brasil, 7 p.
- WIKIMEDIA COMMONS CONTRIBUTORS (2017) SaoPaulo Municip SaoPaulo.svg, Wikimedia Commons, the free media repository, disponível em: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:SaoPaulo_Municip_SaoPaulo.svg&oldid=275975884. Acesso em março de 2017.

CONCLUSÃO

Fátima Velez de Castro

Departamento Geografia e Turismo, CEGOT e RISCOS,
Universidade de Coimbra (Portugal)
ORCID: 0000-0003-3927-0748 velezcaastro@fl.uc.pt

Revisitando aqueles que foram os resultados dos trabalhos de investigação apresentados na obra “Pluralidade na diversidade dos riscos”, pode-se concluir que os investigadores e os profissionais ligados à área dos riscos, estão cada vez mais conscientes para a crescente complexidade dos territórios, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista humano. Já Luciano Lourenço (2015), na senda da discussão sobre a dimensão do pragmatismo e do risco¹, referia:

“Por isso, se, como parece, o objetivo de muitos estudos for a mitigação do risco, então teremos de ser pragmáticos e considerar não só a fase da pré-catástrofe (...) que naturalmente deverá ser de preparação, prevenção e previsão, mas também deverá ser tido em linha de conta o “durante”, correspondente à fase de socorro (...) [e] a fase de pós-catástrofe, durante a qual será necessário reconstruir a área afetada” (Lourenço, 2015, p. 5).

No fundo, a multiplicidade de situações quotidianas, leva a que de devam reequacionar procedimentos, assim como reestruturar cenários de atuação. Um dos campos a repensar será o da dimensão formativa, com a atualização dos conteúdos e da prática letiva, assim como da cooperação entre entidades ligadas aos riscos e à proteção civil, no sentido de congregar esforços e criar sinergias, que permitam respostas mais rápidas e eficazes.

Além disso, é fundamental estar alerta e alertar para as alterações ambientais. Nesta obra, chama-se a atenção para o fato de, por exemplo, as alterações dos níveis de pluviosidade em determinadas regiões, poderem contribuir para significativas

¹ Lourenço, L. (2015). Risco, perigo e crise: pragmatismo e contextualização. In Siqueira, A., Valêncio, N., Siena, M. e Malagoli, M.A., *Riscos de desastres relacionados à água*. São Paulo: RiMa Editora.

alterações dos sistemas económicos e produtivos, criando fragilidades sociais tendencialmente estruturais. Por outro lado, é necessário alertar os governos locais para situações de perigosidade ligadas a fenómenos excepcionais de diferente escala de afetação, quer no que diz respeito aos de rápida atuação (exemplo de precipitação intensa), como os de lenta progressão (por exemplo, o caso dos períodos de seca). Neste contexto, também é necessário alertar para a dimensão do ordenamento do território, e da forma como a construção habitacional e funcional pode gerar situações de perigo iminente em situação de risco natural.

Chamar a atenção para estas e outras situações, parece ser uma preocupação constante em todos os estudos apresentados nesta obra e, em geral, para toda a comunidade académica. Comunicar ciência, transpor o fosso que muitas vezes existe entre os cientistas e a comunidade civil, transferir o conhecimento, nem sempre é uma tarefa fácil e óbvia. Mas é necessária e cada vez mais urgente, para que os estudos científicos possam ser de/sobre/para a sociedade.

Nesta lógica, sugere-se uma possibilidade de comunicação através da música, seja como mecanismo de catarse para os afetados (por exemplo, por stress pós-traumático), seja por canal de divulgação de práticas e de comportamentos a adotar (por exemplo, em campanhas de prevenção). Além disso, o contexto escolar educativo, também virá reforçar esta perspetiva através da psicoeducação, educando e difundindo conhecimento para a população escolar e para a sociedade em geral.

Mas haverá mais para fazer no campo dos riscos. Esperamos, pois, que os estudos cindínicos possam vir a ganhar um destaque cada vez mais evidente no quotidiano, continuando sempre na senda da prevenção, mitigação e promoção da segurança e do bem-estar das populações, sobretudo dos mais vulneráveis.

SÉRIE
ESTUDOS CINDÍNICOS

Títulos Publicados:

- 1 *Incêndios em Estruturas. Aprender com o Passado;*
- 2 *Educação para a Redução dos Riscos;*
- 3 *Metodologia de Análise de Riscos através de Estudos de Casos;*
- 4 *Riscos Hidrometeorológicos;*
- 5 *Pluralidade na Diversidade de Riscos;*

Tomos em preparação:

- 6 *Risco Sísmico - Aprender com o Passado;*
- 7 *Geografia dos Incêndios Florestais. 50 anos de Incêndios a queimar Portugal;*
- 8 *Efeitos dos Incêndios Florestais nos Solos de Portugal;*
- 9 *Floresta, Incêndios e Educação;*
- 10 *Redução do Risco e Educação.*

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia Física, pela Universidade de Coimbra, onde é Professor Catedrático.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos, entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais e internacionais.

Fátima Velez de Castro é licenciada em Geografia (especialização em ensino), mestre em Estudos sobre a Europa e doutora em Geografia.

É Coordenadora do Mestrado em Ensino da Geografia no 3º Ciclo e Ensino Secundário (FLUC); Coordenadora do Conselho de Formação de Professores da mesma instituição; membro da Comissão Científica do Departamento de Geografia e Turismo da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; membro integrado do CEGOT (Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território).

É Tesoureira da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.

Foi Sub-Diretora do Curso de 1.º Ciclo (Licenciatura) em Geografia; membro do Conselho Pedagógico da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; coordenadora geral da Mobilidade da mesma instituição.

Tem cinco livros publicados (três da sua autoria e dois em co-autoria) e cerca de sessenta outras publicações (capítulos de livros, artigos científicos em revistas nacionais e internacionais, artigos em atas de congressos, etc.).

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA