Coordenadores:

Luciano Lourenço

Vicente de Paulo da Silva

Territórios em Risco

RISCOS

Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Coimbra, 2020

Os empreendimentos de grande magnitude têm provocado sérias transformações no espaço e, ao mesmo tempo, expõem territórios e populações a vulnerabilidades e riscos sem precedentes. Atualmente, a forma de apropriação do espaço é cada vez mais predatória ao ponto de colocar os territórios e as pessoas em risco. Assim, questionamos: Seria possível pensar uma vida segura no planeta? Nós, humanos, queremos garantir nossa vida na terra, repleta de mordomias, sem qualquer risco de prejuízo a essa condição de mordomia. Queremos o milagre, mas, sem merecê-lo e, isso é o que revela a relação de ganância e estupidez que, conforme Stephen Howking, são o que acabará com a vida na terra.

Não queremos mudar nosso modo de viver, nossos valores. O que isso nos inspira a pensar? Que sentimos fascinados pelo mundo das coisas; dos produtos industrializados; fascinados pela modernidade etc. esquecemos a essência da vida: a de que sem o chão, não se constrói nem se garante a segurança da casa. Ou seja, a casa é o planeta e os hábitos modernos simplesmente partem do princípio da exploração dos bens naturais até sua exaustão, esquecem o planeta.

Este livro vem contribuir com esse debate trazendo diferentes trabalhos de autores envolvidos com a temática dos Riscos, que ainda constituem desafios a investigadores e profissionais diversos, como a identificação de riscos e sua gestão, uma vez que vários países promovem políticas econômicas cada vez mais ameaçadoras à segurança das pessoas e sistemas vivos. Cada capítulo traz uma contribuição ao debate dos riscos, os quais podem se manifestar em forma de inundações em áreas urbanas, riscos socioambientais em comunidades pesqueiras, necessidade de implantação de unidades de conservação para amenizar riscos, dentre outros. Quem dera pudéssemos dizer “esta é uma obra de ficção”, mas, ao contrário, são aspectos reais de diferentes situações que expõem os territórios e as pessoas a riscos. Esperamos oferecer ao leitor uma contribuição aos estudos desse tema e desejamos uma boa leitura.

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA

ESTRUTURAS EDITORIAIS | EDITORIAL STRUCTURES
Estudos Cindínicos

DIRETOR PRINCIPAL | MAIN EDITOR

Luciano Lourenço

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

DIRETORES ADJUNTOS | ASSISTANT EDITORS

António Amaro, Adélia Nunes, António Vieira, Fátima Velez de Castro

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

ASSISTENTE EDITORIAL | EDITORIAL ASSISTANT

Fernando Félix

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

COMISSÃO CIENTÍFICA | EDITORIAL BOARD

Adélia Nunes

Universidade de Coimbra

Antenora Maria da Mata Siqueira

Universidade Federal Fluminense, Brasil

Ana Meira Castro

Instituto Superior de Engenharia do Porto

Carla Juscélia Oliveira Souza

Universidade de São João del Rei, Brasil

António Betâmio de Almeida

Instituto Superior Técnico, Lisboa

Esteban Castro

Universidade de Newcastle, Reino Unido

António Duarte Amaro

Escola Superior de Saúde do Alcoitão

José António Vega

Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Espanha

António Vieira

Universidade do Minho

José Arnaez Vadillo

Universidade de La Rioja, Espanha

Cármén Ferreira

Universidade do Porto

Lidia Esther Romero Martín

Universidade Las Palmas de Gran Canaria, Espanha

Fátima Velez de Castro

Universidade de Coimbra

Miguel Castillo Soto

Universidade do Chile

Helena Fernandez

Universidade do Algarve

Montserrat Díaz-Raviña

Inst. Inv. Agrobiológicas de Galicia, Espanha

Humberto Varum

Universidade de Aveiro

Norma Valencio

Universidade Federal de São Carlos, Brasil

José Simão Antunes do Carmo

Universidade de Coimbra

Ricardo Alvarez

Univ. Atlântica, Florida, Estados Unidos da América

Luciano Lourenço

Universidade de Coimbra

Victor Quintanilla

Universidade de Santiago de Chile, Chile

Romero Bandeira

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto

Virginia Araceli García Acosta

CIESAS, México

Tiago Ferreira

Universidade do Minho

Xavier Ubeda Cartaña

Universidade de Barcelona, Espanha

Tomás de Figueiredo

Instituto Politécnico de Bragança

Yvette Veyret

Universidade de Paris X, França

LUCIANO LOURENÇO
VICENTE DE PAULO DA SILVA
(COORDS.)

RISCOS
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA

TERRITÓRIOS EM RISCO

Edição

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Email: riscos@riscos.pt

URL: <https://www.riscos.pt/publicacoes/sec/>

COORDENAÇÃO EDITORIAL

Luciano Lourenço e Vicente de Paulo da Silva

IMAGEM DA CAPA

Karine Nieman

PRÉ-IMPRESSÃO

Fernando Félix

EXECUÇÃO GRÁFICA

Simões & Linhares, Lda.

ISSN

2184-5727

DOI (Série)

<https://doi.org/10.34037/978-989-54295-1-6>

Depósito Legal

478490/20

ISBN

978-989-54942-4-8

ISBN Digital

978-989-54942-5-5

DOI

https://doi.org/10.34037/978-989-54942-5-5_7

SUMÁRIO

PREFÁCIO	7
A importância dos movimentos em massa na dinâmica de vertentes no triângulo Mineiro/Alto Paranaíba: o emprego da análise multifatorial para a sua compreensão. Ensaio metodológico	
Jean Roger Bombonato Danelon e †Antônio de Sousa Pedrosa	9
Inundação em áreas urbanas do distrito sede do município de Petrópolis-RJ: a não observância dos aspectos geomorfológicos no planejamento urbano	
Stephany Emiliane Lopes da Silva, Rafael da Silva Nunes e Marcelo Motta de Freitas	47
Vulnerabilidades do sistema de transporte público às inundações na cidade de Belém (Brasil)	
Mírian Corrêa Dias e Claudio Szlafsztein	69
Os riscos sociais e o rio São Francisco: a categoria lugar e seu ensino como possibilidade de intervenção	
André Tomé de Assis	91
A contribuição da implantação de unidades de conservação para o fortalecimento da vulnerabilidade social de populações rurais - Bonito de Minas/MG	
Daniella Souza Mendonça e Monica Oliveira Alves	113
Serra do Mar (RJ) um território de risco? Aplicação do modelo de fragilidade ambiental, enquanto forma de análise integrada preditiva, a unidades ecodinâmicas	
Kátia Regina Góes Souza e Luciano Lourenço	137
Percepção de riscos socioambientais em comunidades pesqueiras: uma análise no litoral da Bahia, Brasil	
Erika Silva Vieira Serbeto, Raiza Rabelo Ramos Almeida e Fábio Pedro S. de Ferreira Bandeira	177

PREFÁCIO

Em 2014, Fritjof Capra já nos dizia que há soluções para os principais problemas do nosso tempo e, acrescentava, que algumas delas são, inclusive, simples. Entretanto, essas soluções, segundo ele, exigem mudanças em nossa percepção, pensamentos e valores. Por sua vez, em entrevista a Larry King, apresentador do programa Larry King Live, na emissora CNN, de acordo com o The hearty soul, Stephen Howking, famoso físico, reconhecido a nível mundial, falecido em 2018, afirmou que “*ganância e estupidez são o que acabará com a raça humana*”.

Tomando como ponto de partida essas afirmações, nos preocupamos em discutir a temática dos riscos sociais, econômicos e espaciais em função de grandes empreendimentos, que têm promovido sérias transformações no espaço em função da forma de apropriação do espaço e, conseqüentemente, destruição de territórios. Nesta abordagem, questionamos o caráter natural de acontecimentos que exigem, inclusive, uma avaliação mais ampla no sentido de perceber que, além do caráter natural, há o quesito Uso do Território como uma maneira de agravar as condições de riscos.

Um *tsunami*, um deslizamento de terras em função de chuva forte, inundação de áreas urbanas por conta de elevação de níveis de rios e córregos, por exemplo, constituem fenômenos naturais, mas, ainda assim, como o dissemos, devemos questionar o caráter natural de muitos acontecimentos de gravidade alta. Isso significa que podemos questionar até que ponto um evento natural é, sozinho, responsável por tragédias a ele atribuídas. Por exemplo, o que era ou não natural nos deslizamentos de terra da área serrana do Rio de Janeiro, Brasil, em 2010? O que era ou não natural no rompimento da barragem da Samarco em Mariana-MG em 2015? E no rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho-MG, em 2019? Como explicar que somente as causas naturais sejam responsáveis pelos incêndios florestais em Portugal como as recentes ocorrências? E na devastação causada pelo *tsunami* no Japão em 2011, ou o terremoto que causou aquele terrível *tsunami* que devastou milhares de vidas no dia 26 de dezembro de 2004 na Tailândia?

Ou seja, se em todos esses acontecimentos houve participação da natureza, é fato que em todos esses fenômenos houve sempre decisões humanas que agravaram as consequências.

Assim são os grandes empreendimentos. Tomam decisões que poderão afetar milhares de pessoas que muitas vezes nem sequer têm o conhecimento de que estão submetidas aos efeitos catastróficos das decisões. Pior ainda, é o fato de que os empreendedores que são responsáveis pelas obras serem, ao mesmo tempo, negligentes quanto à segurança das pessoas e dos lugares, por conta de ganância e estupidez, ou seja, ganância e estupidez marcam a forma de apropriação do espaço o que, consequentemente, coloca os Territórios em Risco.

Isso constitui, portanto, parte das reflexões contidas nesta obra que ora apresentamos, que é fruto dos trabalhos apresentados no III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos (SIAAR), realizado na Universidade Federal de Uberlândia, em junho de 2019, em parceria com a RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança. Os capítulos que compõem a obra aprofundam aspectos da temática que são de vital importância na atualidade, porque expõem, de maneira científica, os Territórios em Risco.

Uberlândia/MG, Brasil, novembro de 2020

Vicente de Paulo da Silva

**INUNDAÇÃO EM ÁREAS URBANAS DO DISTRITO
SEDE DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS-RJ:
A NÃO OBSERVÂNCIA DOS ASPECTOS
GEOMORFOLÓGICOS NO PLANEJAMENTO URBANO
FLOODING IN URBAN AREAS OF THE MAIN
DISTRICT OF PETRÓPOLIS-RJ:
THE NON-OBSERVANCE OF GEOMORPHOLOGICAL
ASPECTS IN URBAN PLANNING**

Stephany Emiliane Lopes da Silva

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Programa de Pós-graduação em Geografia (Brasil)
ORCI 0000-0001-5267-745X stephany-emiliane@hotmail.com

Rafael da Silva Nunes

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Departamento de Geografia e Meio Ambiente (Brasil)
ORCID: 0000-0003-2174-3105 rsngeo@gmail.com

Marcelo Motta de Freitas

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Departamento de Geografia e Meio Ambiente (Brasil)
ORCID: 0000-0002-2066-052X marcelomotta@puc-rio.br

Resumo: Cada vez mais o entendimento sinérgico dos processos físicos torna-se importante para estabelecerem-se possíveis resultantes de fenômenos que corroboram para o aumento da exposição de riscos de uma determinada população. Nos últimos anos, a Região Serrana do estado do Rio de Janeiro tem vivenciado um conjunto de acontecimentos que resultam destes processos, apresentando impactos econômicos, sociais e ambientais na região. Neste sentido,

o artigo busca abordar a dinâmica hidrológica das microbacias Alto Curso Piabanha e Quitandinha no Distrito Sede do Município de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, visando o entendimento dos processos de inundação urbana. A identificação e caracterização de elementos que compõe o meio físico, como o clima, a geomorfologia e a geologia apresentam-se como essenciais para que se possa entender a dinâmica geomorfológica e hidrológica dessas microbacias e, consequentemente, avaliar a vulnerabilidade da população às condições de risco de inundações.

Palavras-chave: Microbacia, risco de inundação, relevo.

Abstract: Increasingly, the synergistic understanding of physical processes is becoming important to establish possible outcomes of phenomena that confirm a given population's increased exposure to risk. In recent years, the Região Serrana in the state of Rio de Janeiro has experienced a series of events that result from these processes, with economic, social and environmental impacts in the region. This article sets out to approach the hydrological dynamics of the Piabanha's Upper Corse and Quitandinha watersheds of the headquarters district of the city of Petrópolis, in the state of Rio de Janeiro, with a view to understanding the flood processes. The identification and characterization of elements that make up the physical environment, such as climate, geomorphology, and geology are essential to understand the geomorphological and hydrological dynamics of these micro-watersheds and, consequently, to assess the population's vulnerability to flood risk conditions.

Keywords: Micro-watersheds , flood risk, relief.

Introdução

O crescimento das cidades no Brasil, na maior parte dos casos, não é planejado, sendo as mesmas, construídas de maneira espontânea em processos de autoconstrução pela própria população, dada a ausência de políticas públicas de habitação. Esta é uma condição comum aos centros urbanos nos países em desenvolvimento na América Latina. Há pouca ou nenhuma preocupação com os aspectos geomorfológicos dos sítios urbanos das cidades, gerando fatalmente condições de risco de desastres naturais como deslizamentos e inundações (Costa e Mendonça, 2008).

A Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, no litoral sudeste do Brasil, é um trecho da Serra do Mar formado por um conjunto de escarpas festonadas com alta densidade de drenagens e vales encaixados. Atribui-se a sua formação a processos tectônicos de movimentação vertical de conjuntos rochosos que lhe imprimem um formato de relevo, hoje, dissecado em planos de falhas e fraturas que garantem o entalhe dos vales fluviais (Asmus e Ferrari, 1978; Almeida e Carneiro, 1998; Cherem *et al*, 2013).

As feições encontradas na paisagem da Serra do Mar são produtos do trabalho intempérico e erosivo sobre tais estruturas herdadas desses eventos tectônicos que atualmente se mostram marcantes no relevo local. A ocupação dos vales da região serrana fluminense originou diversas cidades que, hoje, acomodam grandes contingentes populacionais em um modo de vida, em grande parte, urbano. Estas cidades espremem-se entre paredões rochosos em sítios urbanos de vales estreitos, como os das cidades de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis (a maior delas). Tais aglomerações urbanas são frequentes nos noticiários nacionais e internacionais pela condição de grande risco de deslizamentos de encostas e inundações e por serem recordistas de vítimas fatais em acidentes dessa natureza.

Petrópolis, a cidade escolhida para o presente estudo, situa-se em um relevo que varia de uma altitude média de 845 metros até altitudes superiores a 2.000m em suas montanhas mais elevadas. Particularmente, neste trecho se estende um substrato geológico associado às rochas do Complexo Rio Negro,

uma das unidades centrais da Faixa Móvel Ribeira, caracterizada como um arco magmático metamorfizado composto por ortognaisses, granitos e migmatitos, portanto rochas resistentes ao intemperismo que permitem seu entalhe concentrados em planos de fraqueza como fraturas, falhas e foliações (Heilbron *et al.* 1995; 2000; 2016).

Em relação à geomorfologia, podemos dizer que o município de Petrópolis está situado em um vale suspenso no reverso da Serra do Mar, cuja linha de cumeeada constitui o divisor de drenagens, com destaque para o pico do Açu, o mais alto deste alinhamento serrano, com 2180m. A cidade de Petrópolis está instalada em dois vales estreitos, que se estendem subparalelamente na direção aproximada NE. As drenagens são interrompidas por estrangulamentos na forma de cachoeiras (*knickpoints*) com pequenas retenções de sedimentos aluvionares, representando estreitas planícies locais. Estes vales, cercados por paredões rochosos, serviram de caminho do desenvolvimento do processo de urbanização da cidade, transformando as estreitas planícies e íngremes encostas em áreas ocupadas. Ao analisar a relação da ocupação com a morfologia do relevo Ab'Saber (1958) afirma que,

“No Estado do Rio de Janeiro, as regiões serranas de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo apresentam apenas minúsculas planícies de soleira, de conformação alveolar, onde as cidades se anicharam incomodamente, comprimidas entre as planícies rasa e os sopés relativamente íngremes dos morros e grandes blocos de esfoliação. Exceção feita das planícies estreitas e alongadas, somente alguns raros patamares de morros e ligeiras encostas de declive mais suave deram asilo às edificações urbanas. Neste particular, a cidade de Petrópolis apresenta-nos um belo exemplo de sítio urbano que forçou a interpenetração do sistema de ruas e pequenas praças por entre a trama dos vales que desembocam na planície alveolar principal da região” (Ab'Saber, 1958).

A dinâmica atmosférica regional define uma condição tropical, sujeita a chuvas torrenciais. Estas condições somadas às declividades de suas encostas e aos altos índices pluviométricos no verão, proporciona condições naturais aos eventos de deslizamentos e inundações. Tais aspectos topográficos, somados aos mecanismos climáticos frontais e orográficos vindos de sudoeste e noroeste, contribuem para a

dinâmica das fortes chuvas da região. As condições de risco se desenharam quando a densa ocupação se espalhou ao longo dos fundos de vale em grande parte encaixados ou com estreitas planícies de inundação. As áreas urbanizadas, promovendo processos de impermeabilização dos solos pela pavimentação, favorecem o escoamento superficial e a ocorrência de inundações.

Em seu processo histórico a cidade ainda impera, no final do século XIX, foi planejada, seguindo o curso dos três principais rios da cidade o Palatinado, Quitandinha e Piabanha, por meio da construção de grandes canais de drenagem presentes até hoje em seu centro histórico (Ambrozio, 2012).

O plano urbanístico, apresentado por Koeler no ano de 1843 (Ambrozio, 2012), para Petrópolis teve como objetivo modificar o velho estilo colonial de construir as casas de fundos para os rios que eram utilizados com a simples função de esgoto e construir ao longo das margens desses rios avenidas da Vila Imperial e vias de acesso para os demais bairros da cidade (Rabaço, 1985). Porém, a explosão do modelo urbano industrial do atual momento histórico garantiu a densa ocupação além dos limites onde os processos naturais atuam, próximas aos rios e em áreas de convergências de fluxos de drenagem. Somados ainda ao processo de impermeabilização de encostas pela urbanização, o resultado catastrófico das chuvas torrenciais configura-se em grandes inundações, além dos processos de deslizamentos. As análises geomorfológicas permitem uma melhor compreensão sobre os caminhos naturais dos fluxos líquidos e sólidos provenientes das encostas em eventos de grande precipitação, permitindo melhor planejamento do uso do solo, manejo e tomada de decisão acerca de potencialidades e riscos para a ocupação. Particularmente na porção mais a montante das drenagens do distrito sede do município de Petrópolis, a ocupação se concentra ao longo das margens do rio Piabanha e em seus estreitos vales, os quais apresentam pequenas planícies sujeitas à inundações. A drenagem principal ainda recebe o afluente Rio Quitandinha, também com planícies estreitas na área densamente urbanizada (fig. 1). O estudo em questão tem como objetivo caracterizar a dinâmica hidrológica das microbacias Alto Curso Piabanha e Quitandinha no Distrito Sede do Município de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, visando o entendimento dos processos de inundação urbana (fig. 1).

Fig. 1 - Representação da Localização da Área de Estudo, 2018.

Fig. 1 - Study Area Location, 2018.

Materiais e métodos

Para a investigação proposta, foram revisados diversos documentos e artigos referentes aos temas associados a desastres naturais de inundação e relatórios dos acidentes ocorridos na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, além do histórico de planejamento das drenagens artificiais e seus processos de canalização. Da mesma forma, foram avaliados os mapeamentos geológicos e geomorfológicos existentes para a área de estudo, assim como os artigos relativos às condições climáticas com foco nas dinâmicas de precipitação, sobretudo por tratar-se de uma área situada em ambiente tropical e de elevada altitude, sob fortes entradas de chuva.

Os mapeamentos foram realizados em ambiente de SIG, a partir do georreferenciamento de informações artográficas básicas, como topografia (1:50.000 do Instituto Brasileira de Geografia e Estatística – IBGE) e hidrografia, complementadas com bases temáticas de geologia e geomorfologia (da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM - Serviço Geológico do Brasil).

O *software Arcview* foi utilizado para criar os bancos de dados e realizar a integração de dados para a análise dos mapeamentos existentes. A partir do Mapa Geomorfológico de Dantas, 2015, foi refinado o detalhamento das unidades de relevo para o detalhe da área de estudo do Alto Curso do Rio Piabanha, a fim de se obter o Mapa de Caracterização do Relevo. A partir desse mapeamento foram cruzadas as informações do mapa de ocorrências da Defesa Civil Municipal com o objetivo de relacionar a morfologia local com as áreas de ocorrência de inundação. Por fim, foram realizados trabalhos de campo na área de estudo, com foco nas áreas de inundação e nas drenagens locais em virtude do processo de ocupação urbana.

Discussão e Resultados

O município de Petrópolis está situado em uma condição de relevo, associada às Serras mais altas do Planalto Sudeste Brasileiro abrangendo em parte a escarpa da Serra do Mar. A cidade de Petrópolis espalha-se desde a escarpa sul da Serra, voltada ao *Graben* da Baía de Guanabara, mas concentra-se principalmente em seu reverso, voltado para norte em direção ao *Graben* do Rio Paraíba do Sul (Asmus e Ferrari, 1978), no alto curso do Rio Piabanha e de seu afluente Rio Quitandinha. Nesta área jazem rochas de alto grau metamórfico e ígneas intrusivas, associadas a processos orogênicos ocorridos no final do Neoproterozóico. O grau de fraturamento e ocorrência de falhas nessas rochas estão associados, por sua vez, a eventos tectônicos rúpteis, posteriores, durante a abertura do Oceano Atlântico, no Cretáceo (Valeriano, *et al.*, 2012). Estas fraturas e falhas cumprem o papel de planos de fraqueza ao intemperismo e à dissecação fluvial, dando origem a uma rede hidrográfica entalhada em vales fluviais estreitos, encaixados ou com estreitas planícies fluviais (Guerra *et al.*, 2007a).

Contexto Geológico-geomorfológico e suas influências como condicionantes de risco.

A intensa atividade tectônica marca o planalto sudeste, ao longo de sua história evolutiva. A formação de seu substrato geológico tem origem em intensos processos de

metamorfismo e deformação estrutural das rochas, desde o paleoproterozóico, onde seus terrenos constituintes do embasamento já apresentavam complexos processos de formação, associados aos fechamentos de oceanos, formação de arcos magmáticos e colisões continentais, enquanto no neoproterozóico, os dados geocronológicos apontam suas principais datações para um auge metamórfico e deformacional do segmento central da faixa de dobramentos denominada Faixa Móvel Ribeira na Província Geológica Mantiqueira (Heilbron *et al.*, 1995; 2000; 2016). Nos estudos de Heilbron *et al.* (2004) os autores interpretam o segmento central da Faixa Móvel Ribeira em sua variedade de terrenos e no processo evolutivo de construção do alicerce do grande orógeno resultante da colisão de núcleos continentais e fechamento de pequenos oceanos. Os autores afirmam que o imbrincamento desses núcleos e materiais supracrustais foram processados em intenso metamorfismo e estruturação tectônica resultaram em um substrato geológico complexo que hoje se apresenta estruturado em granulitos e gnaisses de alto grau metamórfico, orto e paraderivados, com foliação principal alinhada de NE a SW, entremeados por granitos pre, sin e pós tectônicos (Heilbron *et al.*, 1995). As estruturas de falhas inversas, zonas de cisalhamentos e deformações dúcteis acompanham a orientação da foliação em seus eixos principais, registrando as diversas fases de deformação durante a orogenia. Em termos estruturais tal processo colisional leva as unidades litológicas a um alinhamento de orientação NE, justamente ortogonal a direção da colisão (Heilbron *et al.*, 2000).

Já no final do Jurássico e Cretáceo, o processo de Abertura do Oceano Atlântico interrompe drasticamente o trabalho erosivo destas drenagens e as reorganiza, de acordo com os eventos tectônicos associados. As bacias tafrogênicas abertas por estes eventos meso-cenozóicos espalham-se pela porção costeira do Brasil, revelando diversas fases de deposição em seus depocentros (Riccomini *et al.*, 2004 e 2010). No Vale do rio Paraíba do Sul e no litoral do Rio de Janeiro, diversas dessas bacias tafrogênicas foram mapeadas e analisadas em seus componentes estratigráficos. Riccomini *et al.* (2004) descreve este conjunto de estruturas tectônicas conjugadas em *horsts* e *grabens* de Rift Continental do Sudeste do Brasil (RCSB) caracterizadas por apresentarem ainda suas formações sedimentares associadas aos depocentros dos sistemas conjugados de *grabens*, desde a Bacia Sedimentar de Taubaté até Volta

Redonda, passando pela Bacia de Resende e extravasando o Vale do Rio Paraíba do sul para sudoeste em direção às bacias sedimentares de São Paulo e Curitiba, além das bacias mais próximas ao litoral, como Itaboraí e Macacu no *graben* da Baía de Guanabara ou ainda as deposições submersas no *graben* de São João.

Do ponto de vista estrutural, naturalmente estes eventos tectônicos associados à abertura atlântica são responsáveis pela formação de marcantes estruturas rúpteis, como falhas e fraturas de diversas direções. Como planos de fraqueza preferenciais para atuação dos processos intempéricos e, conseqüentemente, erosivos, são, por este motivo, reorganizadores de todo o sistema de drenagem nesta porção do continente, com cenários transitórios em cada fase de seu processo.

Particularmente no planalto sudeste a reorganização da rede de drenagem respondeu a todas as fases de mudança durante o dinamismo tectônico deste último evento e até hoje seus esforços de reajuste são sentidos no reafinamento das formas do relevo de suas bacias de drenagem. Em primeiro lugar são visíveis os encaixes dos eixos principais das drenagens nas estruturas do substrato geológico precambriano, porém estão sobrepostos um mosaico de organizações da rede de drenagem, resultantes de momentos diferentes das fases tectônicas até o sistema de *grabens* gerados no tectonismo tafrogênico da abertura oceânica com orientação geral subparalela às linhas de costa (Freitas, 2007). A área de estudo encontra-se neste contexto geológico, sendo caracterizada por uma bacia suspensa pela elevada topografia da Serra do Mar, um dos principais *horsts* locais, situado à beira do *graben* da Baía de Guanabara ao sul e limitado a norte pelo *graben* vale do Rio Paraíba do Sul.

A organização da rede de drenagem e a morfologia do relevo são controladas e organizadas pelas estruturas litológicas locais. A posição sobre a escarpa principal (limite do domínio serrano) e o padrão de fraturamento determinam as características gerais de relevo pelo controle estrutural. A geomorfologia da área de estudo corresponde a um quadro morfológico regional, relacionado aos efeitos de um tectonismo de grande escala e de fases erosivas sucessivas. São comuns na paisagem vales alongados, maciços graníticos íngremes, relevo com expressivos desníveis altimétricos, drenagens mais retilíneas e pouco meandradas, e planícies de inundação pouco alargadas, que somem para montante nos vales mais encaixados (Guerra *et al.*, 2007b).

Condições de Relevô e Risco

Na realização do mapeamento dos tipos de relevô observados nas microbacias Alto Curso Piabanha e Quitandinha, foi possível identificar variações tanto no sentido morfológico como no comportamento da drenagem (fig. 2). Na microbacia Alto Curso Piabanha notamos um domínio de relevô mais elevado constituído por morros mais altos e montanhas atreladas a rampas de alúvio-colúvio e de colúvio-tálus, sendo que esta última se encontra em destaque à medida que estão associadas a superfícies deposicionais bem inclinadas, constituídas por blocos de rochas deslocados, nos sopés das vertentes íngremes de maciços montanhosos. São comuns também planícies de inundação mais alargadas em meio a colinas e os morros mais elevados na drenagem principal da microbacia. Tal aspecto revela que episódios de inundações são menos recorrentes uma vez que, por ser uma bacia com drenagens meandradas mais distribuídas e com fundos de vale mais alargado, o escoamento da água em condições de alta pluviosidade têm sua vazão garantida. Conta ainda para esta condição, a manutenção destas áreas largas da planície fluvial pelo Engenheiro Köeller no planejamento dos canais em 1843, que cortam a cidade neste trecho. A dimensão dos canais permite ainda as vazões mais elevadas.

Há de ser feita uma ressalva em relação às muitas alterações feitas no relevô representadas pelas intervenções antrópicas, como o corte de taludes para a construção de estradas e ocupação, à medida que estas interferem nas condições hidrológicas locais das encostas. Boa parte desses cortes é feitos em antigos depósitos colúvio-aluvionares e quando cortados na base de seus taludes promovem a instabilização dos materiais, que em eventos de chuvas extremas, podem vir a solapar a base ocasionando em escorregamentos.

Vale ressaltar, ainda, a influência da ocorrência dos granitos que através de erosão diferencial formam grandes espigões rochosos no formato de “Pão de Açúcar” que acabam promovendo grandes contribuições de escoamento superficial ao longo de seus paredões rochosos, além de contribuírem em eventos extremos com materiais deslocados em forma de avalanches detríticas, quando tem a parte superior de seus topos deslocadas pela poro-pressão no contato solo-rocha ou por fraturas de alívio de pressão.

Fig. 2 - Representação da Caracterização do Relevo das microbacias analisadas (Alto Curso Piabanha e Quitandinha), 2019.

Fig. 2 - Characterization of the relief of the analysed micro-watersheds (Piabanha's Upper Corse and Quitandinha), 2019

Outro papel importante é aquele referente ao represamento gerado pelos estrangulamentos do relevo, na forma de cachoeiras locais ou *knickpoints*, visto que estas feições geomorfológicas represam a água a montante, proporcionando inundações e subida local do nível freático. Isso contribui para a subida da poropressão na base das encostas, podendo proporcionar deslizamentos nas encostas adjacentes às áreas de inundação. A funcionalidade dos *knickpoints* neste sentido, seria de “gargantas naturais” ou estrangulamentos, que fazem com que a capacidade dos rios de escoamento rápido seja reduzida. Soma-se ainda a isso, o entulhamento dos sedimentos no caso da ocorrência de deslizamentos, o que compromete ainda mais o escoamento das drenagens.

Contexto climático e condicionantes pluviométricos para as inundações

Um fator de extrema importância analítica para o entendimento do comportamento dos cursos e corpos d’água da região refere-se à dinâmica climática local e regional. Neste sentido, adotamos por base o trabalho de Alvares *et al.* (2014) que busca definir um padrão climático brasileiro bastante apurado, ou seja, em alta resolução. A partir dos dados disponibilizados pelos autores, a região encontra-se completamente inserida dentro da unidade climática Cfb. Esta unidade refere-se ao clima Subtropical úmido com verão temperado, cuja pluviosidade no mês mais seco é sempre superior aos 40 mm e a temperatura do mês mais quente é sempre inferior à 22°C e a temperatura do mês mais frio varia entre -3 °C e 18 °C.

Estas características são corroboradas pelos dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que apresentam informações para a estação de Petrópolis (83804) para o intervalo de anos de 1931-1960 (O Instituto não apresenta dados de Normais Climatológicas para a estação de Petrópolis em outros períodos. A janela e os dados apresentados referem-se a uma contextualização do comportamento pluviométrico e da temperatura nas proximidades da região em estudo. Observa-se que em relação aos índices pluviométricos médios mensais, os mesmos variam entre 316,6 mm (referente ao mês de dezembro) e 66,0 mm (no mês de julho). Já em relação à temperatura média mensal nota-se uma variação entre 21,0 °C no mês de fevereiro e 14,7 °C no mês de Julho (fig. 3).

Fig. 3 - Análise dos dados pluviométricos e de temperatura da estação Petrópolis entre os anos de 1931 e 1960 (Fonte: Adaptado de INMET).

Fig. 3 - Analysis of rainfall and temperature data from the Petrópolis station between 1931 and 1960 (Source: Adapted from INMET).

Este padrão climático, conforme definido pela EMBRAPA ([s/d]), apresenta “*Chuvas uniformemente distribuídas, sem estação seca*”, com precipitações que variam anualmente entre 1.100 e 2.000 mm. Esta definição pode ser observada quando se avaliam os dados disponibilizados pelo INMET para a estação entre os anos de 2008 e 2017, portanto, 10 anos. A partir da análise dos gráficos disponibilizados (fig. 4) sobre o comportamento pluviométrico anual da estação A610 (Pico do Couto) fica claro que a estação chuvosa estabelece-se notadamente nos meses de verão. Em grande parte dos anos (na janela temporal analisada) percebe-se que mesmo durante as estações secas, os aportes de precipitação são ainda significativos durante os meses de inverno.

A partir dos gráficos analisados, ao se observarem as precipitações máximas de cada um dos anos selecionados da estação Pico do Couto (em Petrópolis), verificamos que os registros pluviométricos mais elevados estabelecem-se entre os meses de novembro e abril (fig. 4).

- 2008: 173 mm (24/11/2008)
- 2009: 157 mm (19/01/2009)
- 2010: 300 mm (05/04/2010)
- 2011: 156 mm (12/12/2011)
- 2012: 225 mm (02/01/2012)
- 2013: 220 mm (18/03/2013)
- 2014: 118 mm (03/03/2014)
- 2015: Sem informação
- 2016: Sem informação
- 2017: 250 mm (16/07/2017)

Fig. 4 - Comportamento pluviométrico anual da estação A610 (Pico do Couto) localizada em Petrópolis entre 2008 e 2017 (Fonte: INMET).

Fig. 4 - Annual rainfall behaviour at station A610 (Pico do Couto), in Petrópolis, between 2008 and 2017 (Source: INMET).

Esta periodização das chuvas no município contribui também para alterações das vazões nos cursos d'água ao longo do ano. De acordo com dados apresentados pelo estudo 'Monitoramento do Rio Piabanha' desenvolvido pelo Comitê Piabanha e pela COPPE/UFRJ para o ano de 2012/2103 “[...] a vazão média do curso final do rio no período seco (21,76m³/s) teve elevação de 82% no período chuvoso, indicando o significativo aumento de volume e consequente fluxo de transporte neste período” (Comitê Piabanha, 2013, p. 24). Evidentemente que o aumento das vazões durante períodos chuvosos, aliados a outros fatores (sejam eles associados ao meio físico, biótico ou socioeconômico) contribui para a ocorrência de inúmeros fenômenos de inundação (foram retiradas informações a respeito das vazões dos rios da Quitandinha e do Rio Piabanha, a partir da Rede Hidrometeorológica Nacional, disponibilizados a partir da plataforma HidroWeb da Agência Nacional de Águas, no entanto, para as estações existentes, não foram encontrados dados de séries históricas para correlacionar as vazões máximas e médias com os índices pluviométricos registrados).

A partir dos dados apresentados, torna-se necessário uma avaliação sobre o potencial de ocorrência de inundações, associados ao município onde a região de estudo se localiza, especialmente àqueles vinculados a eventos que apresentam participação central do fenômeno pluviométrico e consequente aumento das vazões dos rios locais/regionais. De acordo com o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais – 1991- 2012 (UFSC, 2013), o município de Petrópolis apresenta-se como uma porção do estado do Rio de Janeiro com alta susceptibilidade à ocorrência de desastres. A dimensão dos danos humanos e materiais sofridos no município a partir da identificação dos eventos mais severos associados à inundações (TABELA I e TABELA II).

Há ainda de se salientar que o município de Petrópolis, de acordo com o Atlas supracitado, se estabelece no estado do Rio de Janeiro como o 4º município com maior número de mortos (total de 209) entre os anos de 1991 e 2012, ficando atrás apenas de Nova Friburgo (440), Teresópolis (312) e Niterói (334).

Apesar dos dados disponibilizados pelo Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, o documento referente à Elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro (que detalha as ocorrências de desastres naturais

TABELA I - Danos humanos relacionados aos eventos mais severos (1991-2012).

TABLE I - Human damage related to the most severe events (1991-2012).

Desastre	Ano	Mortos	Desabrigados	Desalojados	Afetados
Enxurradas	2003	17	88	20	1.512
	2008	9	81	1.800	45.000
	2011	71	187	6.956	50.000
Inundação	-	-	-	-	-
Alagamento	2010	-	-	-	30.000

Fonte: Adaptado de UFSC, 2013.

Source: Adapted from UFSC, 2013.

TABELA II - Danos materiais relacionados aos eventos mais severos (1991-2012).

TABLE II - Material damage related to the most severe events (1991-2012).

Desastre	Ano	Total Destruidas	Total Danificadas	Total
Enxurradas	2008	26	805	831
Inundação	-	-	-	-
Alagamento	2004	6	135	141

Fonte: Adaptado de UFSC, 2013.

Source: Adapted from UFSC, 2013.

entre o ano de 2000 e 2012 por Região Hidrográfica) apresenta outros dados complementares, indicando a data precisa e a causa das ocorrências existentes (COPPTEC, 2014). Os dados referentes ao município de Petrópolis apresentado pelo estudo citado corroboram com uma situação já identificada pelo Estado do Rio de Janeiro (TABELA III).

A partir de dados disponibilizados pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e elaborados pela Fundação Coppetec/Laboratório de Hidrologia da COPPE/UFRJ (2014), foram identificados cinco pontos de recorrência de fenômenos de inundação na região de interesse: três nas bacias do Rio Quitandinha e no Alto Curso do Piabanha e outros dois nas imediações (fig. 5)

TABELA III - Dados de identificação das ocorrências de desastres naturais registradas entre 2000 e 2012, por ano e mês, no município de Petrópolis.

TABLE III - Data identifying the occurrence of natural disasters recorded in the municipality of Petrópolis between 2000 and 2012, by year and month.

Ano	Mês	Data	Causa	Tipificação do Desastre	Fora de Casa	Mortes	Pessoas afetadas
2001	01	02/01	Chuva de 128 mm em 2h, causando deslizamentos e inundações	Enxurradas ou inundações bruscas	410	0	410
2001	12	20/12	Forte temporal com granizo	Vendavais ou tempestades	2	0	2
2001	12	24/1	Chuvas contínuas e pico de 300 mm em 24 h	Escorregamentos ou deslizamentos; Enchentes ou inundações graduais	5.107	38	10.230
2003	01	11/01	Chuva de 140 mm em 40 minutos	Enxurradas ou inundações bruscas / Escorregamentos e deslizamentos	108	17	1.512
2004	01	02/01	Chuvas intensas, alagamentos	Alagamentos	8	0	32
2004	01	02/01	Chuvas intensas, deslizamentos	Escorregamentos ou deslizamentos	159	0	159
2004	01	04/01	Chuvas intensas, corrida de massa na estrada União- Indústria km 1135	Corridas de massa	0	0	0
2004	02	04/02	Grande deslizamento	Escorregamentos ou deslizamentos	5	0	2.081
2004	11	29/11	Chuvas intensas, alagamentos	Enchentes ou inundações graduais	19	0	1.100
2004	12	21/12	Chuvas intensas	Enchentes, alagamentos, deslizamentos e corridas de massa	442	0	100.000
2005	11	30/11	Chuva de 160 mm em 17 h	Escorregamentos ou deslizamentos	37	0	100.000
2005	12	13/12	Chuva de 165 mm em 2 dias, em bairros do 1º distrito	Escorregamentos ou deslizamentos	19	0	30.000
2007	01	04/01	Chuva de 355 mm entre 3 e 4 jan	Escorregamentos ou deslizamentos	525	3	30.000
2007	12	16/12	Chuvas intensas	Escorregamentos ou deslizamentos	56	2	125
2008	02	03/02	Chuvas intensas, enxurradas, inundações	Enxurradas ou inundações bruscas	1.881	9	45.000
2009	01	19/01	Chuva de 212 mm em 3 dias	Escorregamentos ou deslizamentos	32	2	6.000
2009	10	10/10	Chuva de 135 mm desde o dia 9	Escorregamentos ou deslizamentos	21	4	6.200
2009	12	04/12	Chuva de 142 mm em 12 h, deslizamentos	Escorregamentos ou deslizamentos	66	1	10.000
2010	04	05/04	Chuva de 140 mm na noite de 5 para 6 de abril	Escorregamentos ou deslizamentos	27	0	15.000
2010	12	07/12	Chuva de 90 mm em 4:30 h	Escorregamentos ou deslizamentos	5	0	30.000
2010	12	23/12	Chuva de 90 mm em 7:40 h	Escorregamentos ou deslizamentos	8	0	3.500
2010	12	27/12	Chuva de 160 mm em 7:50 h, causando deslizamentos e inundações	Escorregamentos ou deslizamentos	21	0	30.000
2011	01	04/01	Chuvas intensas	Enxurradas ou inundações bruscas	0	3	10.000

Ano	Mês	Data	Causa	Tipificação do Desastre	Fora de Casa	Mortes	Pessoas afetadas
2011	01	12/01	Chuvas intensas (maior tragédia do país)	Escorregamentos ou deslizamentos / enxurradas ou inundações bruscas	7.143	76	50.000
2011	03	01/03	Chuvas intensas	Enxurradas ou inundações bruscas	27	0	10.000
2012	01	02/01	Deslizamentos	Escorregamentos ou deslizamentos	0	0	15.000
2012	10	23/10	Pancadas de chuva e fortes rajadas de vento	Vendavais ou tempestades	29	0	5.000

Fonte: Adaptado de COPPTEC, 2014 / Source: Adapted from COPPTEC, 2014.

Fig. 5 - Representação dos principais pontos (locais) de Inundação, levantados no âmbito do Plano Estadual de Recursos Hídricos na área de estudo (Fonte dos dados: Fundação Coppetec/Laboratório de Hidrologia da COPPE/UFRJ - 2014).

Fig. 5 - Representation of the main (local) flood points surveyed in the study area under the Plano Estadual de Recursos Hídricos (Data source: Fundação Coppetec / Laboratório de Hidrologia da COPPE/UFRJ - 2014).

Placido (2010) corrobora com as informações referentes às elevadas susceptibilidade de ocorrências de inundações locais. Ao realizar um levantamento quantitativo das inundações da bacia do rio Quitandinha (tendo-se por base informações levantadas em inúmeros registros jornalísticos entre os anos de 1966 e 2010), a autora indica 15 locais mais críticos na bacia, como as áreas que, no período analisado, apresentaram maiores recorrências quando de inundações locais (TABELA IV).

TABELA IV - Identificação dos pontos de alagamento e número de ocorrências registradas entre 1966 e 2010.

TABLE IV - Identification of flooding points and number of occurrences recorded between 1966 and 2010.

Ponto	Ponto de Alagamento	Rio	NO* entre os anos de 1966 e 2010	Inundações locais verificadas	% de Eventos
1	Rua Afrânio Melo Franco	Quitandinha	96	6	6,3%
2	Rua Dr. Thouzet	Quitandinha		16	16,7%
3	Volkswagen	Quitandinha		96	100,0%
4	Instituto Teológico Franciscano	Quitandinha		80	83,3%
5	COMDEP	Quitandinha		80	83,3%
6	Rua Alencar Lima	Quitandinha		14	14,6%
7	Rua do Imperador	Quitandinha		14	14,6%
8	Rua Saldanha Marinho	Aureliano		13	13,5%
9	Praça Pasteur	Aureliano		13	13,5%
10	Ponte Fones	Saturnino		18	18,8%
11	Rua Olavo Bilac	Saturnino		18	18,8%
12	Chácara Flora*	-		3	3,1%
13	Independência*	-		9	9,4%
14	Rua Getúlio Vargas*	-		5	5,2%
15	Valparaíso*	-		5	5,2%

* Número de Ocorrências.

Fonte/Source: Placido, 2010.

Considerações finais

O problema das cidades crescidas sem planejamento nos países em desenvolvimento é um quadro comum que infelizmente vitimam numerosos contingentes populacionais. No Brasil esta realidade se repete em diversas cidades, sendo agravada na Região Serrana do Rio de Janeiro, dominada por um relevo íngreme e vales estreitos, sob clima tropical de chuvas torrenciais. A geomorfologia da área do alto rio Piabanha e Quitandinha garantem uma funcionalidade hidrológica de suas bacias de drenagem associadas à respostas rápidas frente às entradas de chuva. A mudança de uso do solo definida pela ocupação que pavimentou grandes áreas das encostas, bem como as estreitas planícies fluviais, espremendo as áreas urbanas até os limites dos canais fluviais, garantiu a transformação do antigo ambiente de infiltração de áreas florestadas em ambientes produtores de escoamento superficial. Durante os eventos de chuva tropicais de alta intensidade o resultado esperado é a ocorrência de inundações que invadem contundentemente as áreas edificadas. O planejamento urbano histórico realizado na porção central do distrito sede de Petrópolis, ainda nos tempos imperiais pelo Engenheiro Köeler, demonstra nitidamente a eficiência das redes de drenagem artificiais que previram os altos níveis de enchentes em virtude das altas precipitações. Apesar de localizadas na porção mais a jusante da área de estudo, que justamente acumula mais fluxo hídrico, as inundações não ocorrem. Como prognóstico, ainda, podemos afirmar que o crescimento a montante sem planejamento pelas calhas e encostas das bacias irão agravar os problemas de inundação no distrito sede do município.

Referências bibliográficas

- Ab'Sáber, A. N. (1959). Tipos de drenagem labiríntica do Brasil. *Notícia Geomorfológica*, Campinas, v. 2, n.º 4, 50-51.
- Almeida, F. F. M. e Carneiro, C. D. (1998). Origem e evolução da Serra do Mar. *Revista Brasileira de Geociências*, n.º 28(2), 135-150.
- Ambrozio, J. C. G. (2012). O Território da Enfeuse e a Cidade de Petrópolis - RJ, Brasil. *Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona*, vol. XVI, n.º 418(39), 1-7.
- ASsmus, H. E. & Ferrari, A. L. (1978). *Hipótese sobre a causa do tectonismo Cenozóico na região sudeste do Brasil*. Projeto REMAC, 4, 75-88.

- COMITÊ PIABANHA (2019). Monitoramento Rio Piabanha - Maio/2012 a Abril/2013. 2013. Disponível em: http://comitepiabanha.org.br/downloads/monitoramento_piabanha_relatorio_final.pdf. Acesso em: 30 jul. 2019.
- COPPETEC (2014). Elaboração do plano estadual de recursos hídricos do Estado do Rio de Janeiro, Volume 2 Ocorrências de Desastres Naturais entre 2000 e 2012 por Região Hidrográfica. INEA, 120p. Disponível em: <http://www.agevap.org.br/downloads/Diagnostico-Vulnerabilidades-VolII.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2019.
- Cherem, L. F. S., Varajão, C. A. C., Magalhães Júnior, A. P.; Varajão, A. F. D. C., Salgado A. A. R., Oliveira, L. A. F., Bertolini, W. Z. (2013). O papel das capturas fluviais na morfodinâmica das bordas interplanálticas do sudeste do Brasil. *Revista Brasileira de Geomorfologia*, v. 14, 299-308.
- Costa, G. M. e Mendonça, J.G.(org) (2008). *Planejamento urbano no Brasil: trajetória, avanços e perspectivas*. Belo Horizonte: C/Arte, 304 p.
- Dantas, M. E. (2015). Biblioteca de Padrões de Relevô. In: *Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundação*. CPRM-SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL, 2015.
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGRONÔMICA - EMBRAPA (2019).Clima. [s.d]. Disponível em: <https://www.cnpf.embrapa.br/pesquisa/efb/clima.htm>. Acesso em: 29 jul. 2019.
- Freitas, M. M. (2007). Evolução da Paisagem Geomorfológica. In: *Paisagem, Espaço e Sustentabilidades: uma perspectiva multidimensional da geografia*. Rio de Janeiro: Editora PUC Rio, 91-128.
- Guerra, A. J. T., Gonçalves, L. F. H., Lopes, P. B. M. (2007b). Evolução histórico-geográfica da ocupação desordenada e movimentos de massa no município de Petrópolis, nas últimas décadas. *Revista Brasileira de Geomorfologia*, v.8, n.1, 35-43.
- Guerra, A.J.T, Lopes, P.B.M e Santos Filho,R.D. (2007). Características geográficas e geomorfológicas da APA Petrópolis, RJ. *Revista Brasileira de Geomorfologia*, v.8, n.1, p.77-86, 2007a.
- Heilbron, M., Eirado L. G., Almeida, J. (Org.) (2016). Mapa geológico e de recursos minerais do estado do Rio de Janeiro. Belo Horizonte: CPRM. 1 mapa. Escala 1:400.000. Programa geologia do Brasil. Mapas geológicos estaduais.
- Heilbron, M., Valeriano, C.. M., Valladares, C. S. e Machado, N. (1995). A orogênese Brasileira no segmento central da Faixa Ribeira, Brasil. *Revista Brasileira de Geociências*, 25(4): 245-266.
- Heilbron, M., Pedrosa-Soares, A. C., Campos Neto, M. C., Silva, L. C., Trouw, R. A. J., Janasi, V. A. (2004). Província Maqntiqueira. In: Mantessonet, V. Bartorelli, A., Carneiro, C.D.R. e Brito-Neves, B.B., Orgs. *Geologia do Continente Sul-Americano: evolução da obra de Fernando Flávio Marques de Almeida*. São Paulo, Ed.Beca, 203-236.
- Heilbron, M., Mohriak, W., Valeriano, C. M., Milani, E., Almeida J. C. H., Tupinambá, M. (2000). From collision to extension: the roots of the south-eastern continental margin of Brazil. In: TALWANI & MOHRIAK (eds). *Atlantic Rifts and Continental Margins*. American Geophysical Union, Geophysical Monograph Series, 115:1-34.
- INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA - INMET. Gráficos Climatológicos. Disponível em: <http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/graficosClimaticos>. Acesso em: 9 ago. 2019.
- INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA - INMET. Estações Automáticas – Gráficos. Disponível em: http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home/page&page=rede_estacoes_auto_grafs. Acesso em: 9 ago. 2019.
- Plácido, D. T. e Cunha, S. B. (2010). Enchentes na bacia do Rio Quitandinha (Petrópolis, RJ): 1966 a 2010. In: VIII Simpósio Nacional de Geomorfologia e o I Encontro Íbero-Americano de Geomorfologia, 2010, Recife. *Anais do VIII Simpósio Nacional de Geomorfologia I EncontroÍbero-Americano de Geomorfologia*.

- Riccomini, C. (1989). *O Rift continental do sudeste do Brasil (Tese de Doutorado)*. Apresentada ao Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 256 p.
- Riccomini, C., Grohmann, C. H., Sant'Anna, L. G., Hiruma, S. T. (2010). A Captura das Cabeceiras do Rio Tietê pelo Rio Paraíba do Sul. In: Mondensei-Gauttieri, M. C., Bartorelli, A. Carneiro, C. R., Lisboa, M. B. A. L.. A Obra de Aziz Nacib Ab'Sáber. São Paulo: Beca-BALL edições.
- Riccomini C.; Sant'Anna, L. G., Ferrari, A. L. Evolução geológica do Rift Continental do Sudeste do Brasil. In: Mantesso-Neto, V.; Bartorelli, A., Carneiro, C. D. R, Brito Neves, B. B. (Org.) (2004). Geologia do Continente Sul-Americano: evolução da obra de Fernando Flávio Marques de Almeida. São Paulo: Beca, 383-405.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC (2013). *Atlas brasileiro de desastres naturais: 1991 a 2012. Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres*. 2. ed. rev. ampl. – Florianópolis: CEPED UFSC.
- Valeriano, C. M. *et al.* (2012). Geologia e recursos minerais da folha Baía de Guanabara SF.23-Z-B-IV, estado do Rio de Janeiro escala 1:100.000 / Cláudio de Morisson Valeriano [et al.] ; organizador Luiz Carlos da Silva. – Belo Horizonte : CPRM, 2012. 156p. ; Mapa Geológico, escala 1:100.000 (série Geologia do Brasil), versão digital em CD-ROM, textos e mapas.

SÉRIE ESTUDOS CINDÍNICOS

Títulos Publicados:

- 1 *Incêndios em Estruturas. Aprender com o Passado;*
- 2 *Educação para a Redução dos Riscos;*
- 3 *Metodologia de Análise de Riscos através de Estudos de Casos;*
- 4 *Riscos Hidrometeorológicos;*
- 5 *Pluralidade na Diversidade de Riscos;*
- 6 *Risco Sísmico - Aprender com o Passado;*
- 7 *Territórios em Risco;*

Tomos em preparação:

- 8 *Resiliência ao Risco;*
- 9 *Madeira Região Resiliente;*
- 10 *Geografia dos Incêndios Florestais. 50 anos de Incêndios a queimar Portugal;*
- 11 *Efeitos dos Incêndios Florestais nos Solos de Portugal.*
- 12 *Floresta, Incêndios e Educação;*
- 13 *Redução do Risco e Educação.*

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia Física, pela Universidade de Coimbra, onde é Professor Catedrático.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos, entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais e internacionais.

Professor Vicente de Paulo da Silva, é brasileiro, nascido na pequena cidade de Nova Ponte, Estado de Minas Gerais, cuja área urbana foi submersa em função da construção de uma Usina Hidrelétrica de grande porte. Formou-se em Licenciatura Plena em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia/ MG - UFU (1988); concluiu o curso de Mestrado em Ciências (Geografia Humana) pela Universidade de São Paulo – USP (1994) e Doutorado em Ciências (Geografia Humana) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (2004).

Foi professor na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Vitória da Conquista/BA, entre os anos de 1990 a 2005. Desde 2005, é professor no Instituto de Geografia da UFU, onde atua com os componentes curriculares Estágio Supervisionado na graduação e com a disciplina Territórios em Risco: efeitos da apropriação do espaço por grandes empreendimentos na Pós-Graduação. É coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Efeitos e Riscos nos Grandes Empreendimentos – NEPERGE, onde realiza orientações de mestrado e doutorado e desenvolve diversas atividades como o Cine Riscos, Pesquisas, Extensão e Organização de Eventos. Em 2019, foi presidente da Comissão Organizadora do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos (SIAAR), ocorrido na UFU em parceria com a Associação RISCOS e a Universidade de Coimbra.

É representante titular do segmento Sociedade Civil na Câmara Técnica de Segurança de Barragens do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, indicado pelo Fórum Nacional da Sociedade Civil (FONASC-CBH), desde fevereiro de 2020, no qual se empenha na defesa da segurança da vida (humana e não humana) e do meio ambiente em relação à construção de barragens (Hidrelétricas, Usos Múltiplos ou de Mineração).

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA