GEOGRAFIA, RISCOS E PROTEÇÃO CIVIL

HOMENAGEM AO PROFESSOR DOUTOR
LUCIANO LOURENÇO

VOLUME 2

Coordenadores:
Adélia Nunes
António Amaro
António Vieira
Fátima Velez de Castro
Fernando Félix

RISCOS - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE RISCOS,
PREVENÇÃO E SEGURANÇA

GEOGRAFIA, RISCOS E PROTEÇÃO CIVIL

HOMENAGEM AO PROFESSOR DOUTOR
LUCIANO LOURENÇO

VOLUME 2

COORDENADORES:

Adélia Nunes

António Amaro

António Vieira

Fátima Velez de Castro

Fernando Félix

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos,
Prevenção e Segurança

FICHA TÉCNICA

Título: Geografia, Riscos e Proteção Civil.
Homenagem ao Professor Doutor Luciano Lourenço.
Volume 2

Edição: RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Coordenação: Adélia Nunes, António Amaro, António Vieira, Fátima Velez de Castro e Fernando Félix

Capa e contracapa: Fernando Félix

Concepção gráfica e paginação: Fernando Félix

Impressão: Simões & Linhares, Lda.

ISBN: 978-989-9053-05-2 **ISBN digital:** 978-989-9053-06-9

DOI: https://doi.org/10.34037/978-989-9053-06-9_1.2

Depósito Legal: 487457/21

1.ª Edição

Os trabalhos apresentados são da responsabilidade dos Autores.

PARCEIROS

FACULDADE DE LETRAS
UNIVERSIDADE DE
COIMBRA

DEPGEOTUR
DEPARTAMENTO
DE GEOGRAFIA
E TURISMO

Centro de Estudos de Geografia
e Ordenamento do Território

Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

REPÚBLICA
PORTUGUESA

Este trabalho é Financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do projeto “UIDB/GEO/04084/2020”.

This work is Financed by National Funds through the FCT - Foundation for Science and Technology under the project “UIDB/GEO/04084/2020”.

LUCIANO LOURENÇO NOS 25 ANOS DE ESCUTEIROS DA FUNDAÇÃO DO GRUPO DE ALBORAIA (VALÊNCIA),
COM A ESPOSA MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, EM 08/02/1995.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

COMPANHEIROS DE JORNADAS DE INVESTIGAÇÃO,
O FILHO JOÃO NUNO LOURENÇO E O TIO AGOSTINHO, EM JUNHO DE 2000.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

LUCIANO LOURENÇO, NO CHILE, NA EXPOSIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS,
NA ABERTURA DE UMA FAIXA DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS FLORESTAIS E
VISITA A UMA CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS, EM 12/11/1995.
FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

NUM ALMOÇO DO DIA DE CORPO DE BOMBEIROS DE MACAU, COM A RECEÇÃO DO ESCUDO DE ARMAS DO CB DE MACAU, ESTANDO REPRESENTADAS DELEGAÇÕES DE HONG KONG, PROVÍNCIA DE GUANGDONG (RPC), MACAU E A ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS, PORTUGAL, A 2 DE MAIO DE 1998.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

LUCIANO LOURENÇO, EM REPRESENTAÇÃO DA ENB - ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS, NA RECEÇÃO A DELEGAÇÃO DE BOMBEIROS DE MACAU, EM ABRIL DE 2000.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

LUCIANO LOURENÇO NA VISITA
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MÁRIO SOARES ÀS INSTALAÇÕES
DO NICIF, A 14/04/1994 E, AO
LADO, COM O MINISTRO DA
ADMINISTRAÇÃO INTERNA JORGE
COELHO E O PRESIDENTE DA
LIGA DOS BOMBEIROS
PORTUGUESES, LOURENÇO
BATISTA, EM 28/04/1997.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR
MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

LUCIANO LOURENÇO NUMA ALOCUÇÃO
DURANTE UM EPRIF - ENCONTROS
PEDAGÓGICOS SOBRE RISCO DE INCÊNDIO
FLORESTAL, EM 20/11/1995.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR
MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

LUCIANO LOURENÇO, NUMA DAS REUNIÕES DO PREFER - *SPACE-BASED INFORMATION SUPPORT FOR PREVENTION AND RECOVERY OF FOREST FIRES EMERGENCY*, DESENVOLVIDO POR UM CONSÓRCIO DE 8 INSTITUIÇÕES, ORIUNDAS DE 5 PAÍSES, EM 04/06/2015.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

LUCIANO LOURENÇO, NA SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO III SIMPÓSIO IBERO-AFRO-AMERICANO DE RISCOS, A 20 DE JUNHO DE 2019, NO INSTITUTO DE GEOGRAFIA, CAMPUS SANTA MÔNICA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA UBERLÂNDIA, MINAS GERAIS, BRASIL.

FOTOGRAFIA DOS ARQUIVOS DA RISCOS - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE RISCOS, PREVENÇÃO E SEGURANÇA, 2021.

PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA COMUNITÁRIA

Caminhos a percorrer

LUCIANO LOURENÇO, NUMA VISITA AO CIRCOSC - *CENTRE INTER REGIONAL COORDINATION SECURITE CIVILE*,
EM BORDEUS (FRANÇA), JUNHO DE 1987.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

A Avaliação de Riscos Climáticos nos Planos Municipais de Emergência em Portugal: métodos e experiência

António Lopes

ORCID: 0000-0002-9357-7639

antonio.lopes@campus.ul.pt

Marcelo Fragoso

ORCID: 0000-0001-7272-3089

mfragoso@campus.ul.pt

Ezequiel Correia

ORCID: 0000-0002-4026-7020

ezequielc@campus.ul.pt

Universidade de Lisboa, Centro de Estudos Geográficos, IGOT (Portugal)

Resumo

Procede-se a uma breve reflexão sobre as metodologias de avaliação da perigosidade, suscetibilidade e risco associados a diferentes tipos de condições atmosféricas adversas, no contexto do planeamento de emergência à escala municipal. A colaboração dos autores em diversos planos municipais de emergência desenvolvidos entre 2011 e 2014 suscitou a realização de diferentes abordagens metodológicas, sendo aqui sucintamente apresentados alguns exemplos respeitantes a perigos como o nevoeiro, as tempestades ou as ondas de calor, avaliados em diferentes territórios municipais como o Funchal, Oeiras e Setúbal. É destacada a importância deste tipo de avaliação dever ser suportado por um conhecimento das características topoclimáticas dominantes nas áreas em estudo e apontam-se algumas possíveis soluções para algumas dificuldades que são comuns neste tipo de planos, nomeadamente, no que diz respeito à informação climática de suporte.

Palavras-chave: Planos Municipais de Emergência, riscos climáticos, climas locais, eventos extremos.

Abstract

Emergency Plans and Climatic Risks in Portugal: methods and lessons learned. In this chapter, we present some considerations about the methodologies for climatic hazard, susceptibility, and risk assessment associated with different types of adverse atmospheric situations in the context of emergency plans at the municipal level in Portugal. The experience in various municipal emergency plans developed between 2011 and 2014, led to the comprehension of different methodological approaches, with some brief examples of natural hazards such as fog, storms, or heat waves, in different territories such as Funchal (Madeira), Oeiras, and Setúbal. This type of assessment must be supported by a knowledge of the dominant topoclimatic characteristics of the areas. Possible solutions are pointed out for certain difficulties that are common in these types of plans.

Keywords: Emergency plans, climatic risks, local climates, extreme events.

Introdução

Os Planos de Emergência de Proteção Civil Municipal em Portugal são atualmente elaborados de acordo com a Resolução n.º 30/2015 (Diretiva relativa aos Critérios e Normas Técnicas para a Elaboração e Operacionalização de Planos de Emergência de Proteção Civil) que revogou a Resolução n.º 25/2008 (Elaboração e Operacionalização de Planos de Emergência de Proteção Civil), e estabelecem, entre outras aspetos, que não os estritamente operacionais, a caracterização e tipificação dos riscos e as medidas de prevenção a adotar perante um evento extremo. Em 2009 foi publicado um guia para a produção de cartografia municipal de risco e para a construção de sistemas de informação geográfica de base municipal em matéria de riscos (Julião *et al.*, 2009), um texto essencial do ponto de vista conceptual, metodológico e normativo.

No referido “*Guia Metodológico*”, identificam-se os perigos/riscos a considerar na análise e no grupo dos perigos naturais consta a categoria dedicada às “*condições meteorológicas adversas*” (Julião *et al.*, 2009, p. 25), onde se incluem os “*Nevoeiros, Nevões, Ondas de Calor e de Frio e as Secas*”. As orientações são omissas em relação a outras condições atmosféricas adversas, que em Portugal têm ocasionado danos graves tanto nas populações como nos seus bens, como por exemplo as tempestades de vento e chuva intensa, as trovoadas e as DEA (Descargas Elétricas Atmosféricas).

A classificação dos perigos associados à ocorrência de condições atmosféricas suscetíveis de causar danos devido à sua magnitude e/ou duração, deve ter em conta as escalas espacial e temporal dos eventos. Distinguem-se, assim; i) os perigos associados a eventos extremos de curta duração, minutos a dias, e que se registam das escalas micro à mesoclimática, como, por exemplo, as tempestades e as temperaturas extremas; ii) os perigos correspondentes a eventos de longa duração, intrasazonais a plurianuais, e das escalas sinóptica à mesoclimática (Shi, 2019), como a seca. Será preferível, assim, falar-se de condições atmosféricas adversas, de natureza meteorológica e/ou climática.

É neste contexto de avaliação e definição dos riscos de condições atmosféricas adversas que os autores deste texto apresentam alguns exemplos e propostas metodológicas decorrentes da sua participação entre 2011 e 2014 em “Planos de Emergência de Proteção Civil” e “Cartografia de riscos naturais”, elaborados para nove territórios municipais da Área Metropolitana de Lisboa e na Ilha da Madeira (TABELA I).

A experiência foi rica, tanto em termos de execução desta parte dos planos (avaliação da perigosidade, suscetibilidade, e, por vezes, vulnerabilidade), como pela necessidade de retomar um corpo científico consolidado ao longo do último meio século de estudos

TABELA I - Quadro síntese com os perigos analisados entre 2011 e 2014.

Região/Municípios	Condições atmosféricas adversas						
	Nevoeiro	Nevões	Ondas de Calor	Vagas de Frio	Seca	Tempestades	Vento forte
Madeira e Porto Santo	•	•	•	•	•	•	
Funchal	•	•	•	•	•	•	
Porto Moniz	•	•	•	•	•	•	
Ribeira Brava	•	•	•	•	•	•	
Santana	•	•	•	•	•	•	
São Vicente	•	•	•	•	•	•	
Oeiras			•	•			•
Setúbal	•		•	•			•
Sesimbra	•		•	•			•

sobre os climas regionais e locais, publicados pela Escola Geográfica de Lisboa e dar-lhe aplicação prática na avaliação de riscos.

Os perigos climáticos avaliados pela equipa foram aqueles que, pela sua natureza e/ou possibilidade de registarem valores extremos, são potencialmente danosos para pessoas e bens, de acordo com necessidades das entidades responsáveis pela Proteção Civil nos diferentes territórios (TABELA I).

De acordo com o Julião *et al.* (2009), “[...] *as cartas de risco devem identificar e localizar convenientemente os perigos [...], permitindo proceder ao adequado enquadramento das dinâmicas naturais e antrópicas com tradução territorial [...]*” (p.35). A cartografia de suscetibilidade ao risco climático deverá, segundo o nosso ponto de vista, partir da noção de que o território não é climaticamente uniforme e que o conjunto de fatores geográficos (relevo, ocupação e cobertura do solo, proximidade a planos de água, continentalidade, entre outros), poderão determinar que cada elemento de paisagem apresente um comportamento climático diferenciado. Assumindo este pressuposto, antes de qualquer avaliação da perigosidade e dos elementos expostos, é muito importante proceder a uma análise das condições topoclimáticas no território municipal.

A dimensão territorial da escala local-topoclimática: as Unidades de Resposta Climática Homogénea (URCH)

Segundo Alcoforado (2010), a topoclimatologia está conotada com as escalas regional e local (tipicamente avalia a incidência climática em superfícies horizontais na ordem das dezenas de

quilómetros, na camada limite atmosférica) e estuda as interações entre os tipos predominantes de cobertura e ocupação do solo e a situação topográfica, com a dinâmica atmosférica da camada limite: “[...] e o “sinal” climático” resulta da integração de efeitos microclimáticos das áreas vizinhas, num mosaico de microclimas que se repete com uma certa regularidade” (p. 36).

Uma das formas de dar corpo a estes mosaicos climáticos locais é através da identificação de Unidades Morfoclimáticas (UMC) e dos tipos dominantes de ocupação e uso do solo que, associados, conduzem à identificação de Unidades de Resposta Climática Homogénea (URCH), ou Climatopos, que permitem uma caracterização climática conforme à diversidade territorial.

As UMC correspondem a grandes tipologias de relevo com distintas respostas climáticas locais (serras e colinas, planaltos, planícies, vales e depressões), obtidas a partir da aplicação de critérios topográficos, altitudinais e morfológicos e tendo em atenção o seu significado no que refere aos fatores do clima à escala local. Este sistema de avaliação dos climas locais pode ter várias componentes que traduzem as funções climáticas locais, ou seja todas as potencialidades que se pode obter dos processos atmosféricos (efeitos positivos) e sobrecargas (efeitos negativos), observados na camada limite atmosférica de cada subunidade.

Através da cartografia destes sistemas (que implicam fluxos radiativos, de energia, condições de ventilação, etc.) e das áreas que respondem diferenciadamente a cada um deles, procura-se fornecer elementos para apoiar a busca de soluções adequadas à diversidade climática do território e espacialmente definir medidas que não agravem os impactos negativos do clima regional.

As formas dominantes de relevo

As bases teóricas da topoclimatologia e dos fatores condicionantes do clima à escala local foram desenvolvidas em textos fundamentais como as obras de Geiger (1980 – 1ª edição de 1927, em alemão, “*Das Klima der bodennahen Luftschicht*”), Yoshino (1975) e Oke (1978). Em Portugal, estes fundamentos teóricos foram amplamente aplicados e consolidados em importantes estudos de climatologia, tais como os de Daveau *et al.* (1977), Alcoforado (1992) ou Alcoforado e Dias (2002), consolidando um suporte de conhecimento científico de valor inestimável.

Neste âmbito, as formas dominantes do relevo, constituem elementos fundamentais para a análise topoclimática do território, podendo aqui sintetizar-se alguns aspetos essenciais das suas características e funções climáticas:

- a. Os vales e depressões são geralmente áreas onde se formam sistemas de brisas decorrentes de contrastes térmicos locais. A acumulação de ar frio (denominado “lago de ar frio”), ocorre frequentemente no Inverno, especialmente durante as noites anticiclônicas com o forte arrefecimento radiativo das superfícies. Nas vertentes formam-se brisas de montanha descendentes (drenagem de ar frio e sistemas de ventos catabáticos). Em altitude, contracorrentes de drenagem fecham um ciclo de aquecimento superior e arrefecimento na superfície. Quando este sistema de brisas ocorre, formam-se cinturas térmicas (atmosfera junto ao solo mais aquecida) nas partes superiores ou intermédias dos vales. Sob o ponto de vista das funções climáticas destes sistemas, o aumento da frequência de nevoeiro e dos dias de geada durante a estação fria pode fazer perigar a circulação rodoviária e as culturas mais sensíveis. Como são sistemas locais de recirculação, podem ocorrer situações agravadas quando há emissões excessivas de poluentes, empobrecendo a qualidade do ar junto ao solo, por baixo da camada de inversão térmica. Nas noites de verão, essa circulação pode refrescar o ambiente e beneficiar termicamente os locais com ocupação humana. Neste caso, a função climática traduz-se num fator de alívio do stresse térmico humano. No verão, os fundos dos vales perpendiculares ao vento dominante (normalmente menos bem ventilados) podem estar mais aquecidos, sendo normalmente áreas de maior stresse térmico;
- b. As serras e colinas são áreas normalmente bem ventiladas, quando não têm uma ocupação do solo que aumente demasiado o atrito entre o deslocamento do ar e a superfície. Quando a rugosidade aerodinâmica é baixa ($z_0 < 0,1$ m), a velocidade do vento pode sofrer acelerações a barlavento e nos topos mais elevados dos relevos. Na realidade, dependendo da direção predominante do vento, do ângulo que é formado entre o fluxo e o alinhamento dos relevos, e a velocidade de escoamento do ar, podem-se formar zonas de turbulência mais ou menos complexas, sobretudo na zona de cavidade do fluxo a sotavento. Desde que não escoe em sistemas de circulação fechada (normalmente, em brisas), o vento é considerado um fator eficaz de dispersão de poluentes atmosféricos e de refrescamento da baixa troposfera. Áreas com maior velocidade do vento estão associadas a climatopos com potencial de arrefecimento pelo vento. As Serras e Colinas induzem também modificações dinâmicas nos fluxos atmosféricos com efeitos na nebulosidade e na precipitação, especialmente quando aqueles envolvem massas de ar húmido e instável. Em resultado destes efeitos orográficos, as vertentes mais expostas aos fluxos húmidos dominantes (sobretudo as de desnível mais acentuado, bem como as áreas culminantes e mais elevadas das serras e colinas registam condições mais frequentes de nebulosidade e incremento na precipitação;

- c. As planícies e plataformas litorais, distinguem-se das restantes unidades de relevo pela maior frequência de ocorrência de nevoeiros litorais e mistos (de advecção e irradiação), por verões frescos e invernos tépidos ou moderados e pela penetração de brisas de mar que geralmente transportam humidade e refrescam a ambiência atmosférica. Estas influências terminam geralmente nos relevos marginais que se opõem à penetração das massas de ar marítimas. As planícies situadas junto de estuários também se caracterizam por estes efeitos associados à presença de ar húmido e fenómenos de brisa, assim como pela maior propensão para o registo de nevoeiros;
- d. As vertentes constituem formas elementares de relevo que apresentam comportamentos climáticos muito diversos em função do seu declive e da sua exposição, quer relativamente à radiação solar, quer face aos fluxos atmosféricos dominantes. Para além do efeito de cintura térmica noturno (referido anteriormente), a exposição e o seu declive podem determinar variações na quantidade de radiação solar recebida. Vertentes expostas a norte estão normalmente mais arrefecidas, enquanto as temperaturas das expostas aos outros quadrantes dependem do ângulo de incidência, altura do Sol e do azimute solar. Vertentes soalheiras são aquelas que recebem maiores quantidade de densidade de fluxo energético: nas latitudes médias correspondem a exposições ao quadrante sul, com inclinações de 45° e normalmente estão mais aquecidas do nascer ao pôr do Sol.

Ocupação e cobertura do solo

Os tipos de ocupação do solo podem ser muito diversos e a sua função climática depende das características térmicas, propriedades refletivas (cor e albedo), rugosidade aerodinâmica, conteúdo de água, biomassa, etc. Na escala topoclimática (com dimensões horizontais entre as centenas a milhares de metros e movimentos verticais confinados sobretudo à camada limite atmosférica - na ordem das centenas de metros) as respostas climáticas são diferentes nas seguintes classes, a saber:

- a. Áreas florestais, de matas mais ou menos densas formadas por espécies folhosas e coníferas. Normalmente, a vegetação arbórea que as compõem possuem elementos superiores a 20 m de altura e fraca permeabilidade ao vento na zona do fuste. Constituem normalmente áreas de rugosidade aerodinâmica (z_0) superior a 0,7m. São espaços mais frescos devido ao sombreamento (diminuição da radiação solar direta) e ao fenómeno de evapotranspiração que reduz a temperatura do ar;

- b. Outros espaços cultivados ou com vegetação herbácea, são áreas com rugosidade aerodinâmica menor ($z_0 < 0,2\text{m}$) e mais bem ventilados do que os espaços florestados. Apesar de ocorrer evapotranspiração (dependendo da quantidade de biomassa verde), o seu potencial de arrefecimento é menor;
- c. Nas áreas urbanas de densidade variada e com rugosidades aerodinâmicas entre 0,5 e 1,5m, a velocidade do vento é reduzida pelo atrito provocado pelos elementos urbanos. Apesar disso, nalgumas ruas (à microescala), podem ocorrer acelerações devido ao efeito de canalização (efeito *venturi*). Estas acelerações ocorrem em áreas de estreitamento, esquinas de edifícios, etc., sobretudo nas ruas alinhadas e mais expostas aos ventos dominantes. Devido a vários fatores, como a geometria urbana, solos e superfícies seladas impermeáveis, cores dos edifícios que promovem a retenção de calor, emissões poluentes e de calor antrópico, pouca vegetação e diminuição do efeito de advecção e velocidade do vento, formam-se normalmente ilhas de calor urbano que chegam a atingir intensidades (entre os locais mais aquecidos de áreas densas e os mais frescos nos arredores) na ordem dos 3 a 6°C (valores médios obtidos a partir de estudos em cidades portuguesas);
- d. Os planos de água/albufeiras são áreas de forte evaporação, sobretudo com temperaturas elevadas. Possuem condições potenciais para o arrefecimento e elevação da humidade atmosférica para além do plano de água e formação de nevoeiros, brisas locais e diminuição das amplitudes térmicas. Provocam modificações dos fluxos de calor latente.

Avaliação dos riscos climáticos

A avaliação da perigosidade e da suscetibilidade são duas fases do processo de avaliação do risco. De acordo com o “*Guia Metodológico*”, entende-se por perigosidade, a “[...] *probabilidade de ocorrência de um processo ou ação (natural, tecnológico ou misto) com potencial destruidor (ou para provocar danos) com uma determinada severidade, numa dada área e num dado período de tempo*” (p. 21); e suscetibilidade, a “*incidência espacial do perigo*”, “*representável cartograficamente*” (*idem* p. 20).

Para a análise da perigosidade ou probabilidade do perigo, é fundamental não só a existência de séries climáticas suficientemente longas (pelo menos 30 anos, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, OMM) e homogêneas, como as estações meteorológicas devem ser distribuídas pelas várias URCH ou, pelo menos, pelas diversas UMC, para se ter uma visão clara das interações entre essas unidades e os processos atmosféricos na camada limite atmosférica dos locais em estudos. Todavia, este último requisito dificilmente é preenchido no

contexto nacional, atendendo à insuficiente densidade da rede de observação. De facto, nem a rede nacional do IPMA está adaptada aos estudos topoclimáticos, nem a maior parte dos municípios portugueses, *stakeholders* destes estudos, possuem redes de observação e recolha de dados meteorológicos com as características necessárias. O recurso à modelação geoestatística e física (modelos linearizados, CFD – *Computational Fluid Dynamics*, entre outros) é, por vezes, a forma de ultrapassar essa limitação.

O risco é a “[...] *probabilidade de ocorrência de um processo (ou ação) perigoso e respetiva estimativa das suas consequências sobre pessoas, bens ou ambiente, expressas em danos corporais e/ou prejuízos materiais e funcionais, diretos ou indiretos*” (Julião *et al.*, 2009, p. 22). Para a correta avaliação do risco climático será, segundo esta definição, necessário determinar o grau de perda de um elemento ou conjunto (vulnerabilidade) e o valor dos elementos expostos, informação essa que nem sempre é fácil de obter, o que limita uma avaliação rigorosa do risco. Neste trabalho apresenta-se um exemplo aplicado ao risco de vento forte, onde foi possível efetuar uma aproximação mais fiável através da utilização de uma base de dados contendo as quedas de elementos (sobretudo árvores e ramos) durante a ocorrência de tempestades de vento. Por ser caso único nos riscos climáticos e meteorológicos onde é possível chegar a esta fase da análise de risco, sugere-se a criação de bases de dados deste nível para os restantes elementos.

Exemplos de análises da perigosidade e suscetibilidade aos riscos climáticos.

Decorrente das considerações feitas na secção anterior, apresentam-se de seguida alguns exemplos de avaliação de perigosidade, suscetibilidade e vulnerabilidade, com base:

- Na relevância de fatores associados ao relevo, como no caso da ocorrência de nevoeiro na Ilha da Madeira, para delimitar os andares onde normalmente ocorrem;
- Em limiares de ocorrência e nas funções climáticas das diversas unidades territoriais, como no caso da ocorrência de Ondas de Calor no município de Setúbal;
- Em limiares de intensidade e modelação geoestatística, propondo-se uma tipologia de tempestades de vento e chuva, para a Madeira;
- Em limiares críticos e modelação física, como o exemplo que se apresenta sobre a ocorrência de vento forte no município de Setúbal e avaliação de danos no concelho de Oeiras.

A avaliação da suscetibilidade ao perigo teve por base a utilização de cartografia topoclimática, nomeadamente através do esboço de Unidades Morfoclimáticas e de Unidades de Resposta Climática Homogénea, quando foi possível obter informação sobre a ocupação e uso do solo. As deduções de cada unidade formam-se a partir do conhecimento científico da interação entre estes elementos e a camada limite atmosférica.

As fases de avaliação da perigosidade e suscetibilidade

a) O nevoeiro: um exemplo no Concelho do Funchal - Madeira.

Na ilha da Madeira o nevoeiro é, essencialmente, de origem orográfica. Devido ao vigor e à orientação do relevo, perpendicular à direção do vento predominante (NE e N), a parte superior da camada limite é preenchida praticamente ao longo de todo o ano por nuvens, cuja base se situa a 300-400 metros, a barlavento, e a cerca de 600 m a sotavento – vertente sul (Ribeiro, 1985 e Ferreira, 2005).

De acordo com as normais climatológicas de 1961-1990 e 1971-2000, na estação meteorológica mais elevada do concelho do Funchal (Areeiro) a ocorrência de nevoeiro é bastante frequente, registando-se em quase 2/3 do ano. Mesmo em julho e agosto, período em que as áreas mais elevadas da ilha ficam acima da inversão térmica de subsidência, o nevoeiro ocorre em quase metade dos dias. Já nas áreas mais baixas do concelho só esporadicamente ocorrem situações de nevoeiro, nos meses de fevereiro, março e maio, sendo o número médio anual de dias inferior a 1 no Funchal.

Devido à natureza do nevoeiro, a exposição e a altitude são determinantes para a sua ocorrência na Madeira (Mora, 2011). O fenómeno no concelho do Funchal, no flanco meridional da ilha, tem uma distribuição claramente contrastada (fig. 1): acima dos 600 metros, a cota a que normalmente se encontra a base das nuvens, a suscetibilidade é “Elevada”; abaixo daquela cota só esporadicamente ocorrem situações de nevoeiro, fruto da presença de nuvens baixas ou da ocorrência de nevoeiros litorais, pelo que se considera “Baixa” a suscetibilidade desta área.

Fig. 1 - Suscetibilidade de ocorrência de nevoeiro no concelho do Funchal.

b) As ondas de calor: o exemplo do concelho de Setúbal

Uma onda de calor pode ser definida de várias formas, de acordo com os fins pretendidos. Uma das mais usuais é a adotada pela OMM e difundida pelo IPMA, segundo a qual se considera que ocorre uma onda de calor quando num intervalo de pelo menos 6 dias consecutivos, a temperatura máxima diária é superior em 5°C ao valor médio diário no período de referência (*HWDI – Heat Wave Duration Index*). No entanto, pode-se criticar esta definição que “[...] *está mais relacionada com o estudo e a análise da variabilidade climática do que com os impactos na saúde pública*” (DGS, 2010, p.18). De acordo com os critérios identificados por esta instituição, para que ocorra uma “onda de calor” e se proceda à emissão de alerta amarelo são necessários 3 dias com temperatura máxima superior a 32°C (1 dia de registo e 2 dias de previsão) e 4 dias com temperatura mínima acima de 24°C (2 dias de registo e 2 dias de previsão)¹. Apesar de não ser possível utilizar os valores de previsão neste tipo de estudos, os limiares podem ser úteis na medida em que, de acordo com a DGS, traduzem valores críticos para a saúde humana, tornando-se mais adequados para aplicações ao conforto e saúde. Assim, utilizaram-se os seguintes critérios para a identificação de dias quentes: temperatura máxima $\geq 32^{\circ}\text{C}$; temperatura mínima $\geq 24^{\circ}\text{C}$; para a definição dos episódios quentes foram usados os seguintes critérios: dias isolados ou sequências de dias definidos pelos limiares descritos em a) e b).

Devido à indisponibilidade de séries de observações para Setúbal, a análise da perigosidade teve de ser efetuada a partir dos dados registados na estação meteorológica do Montijo, entre 1998 e 2011. O número de dias de calor extremo é reduzido: ocorreram 10 dias quentes, em 3 dos 14 anos analisados, sendo que apenas duas vezes os episódios tiveram duração superior a 1 dia, tendo o de maior dimensão ocorrido durante 3 dias, em julho de 2004. O valor mais elevado de temperatura, 42 °C, foi atingido no episódio de dois dias registado em agosto de 2003, durante a onda de calor que atingiu Portugal Continental. Não será alheio o efeito “amenizador” do oceano que reduz substancialmente a ocorrência deste perigo. Não obstante a temperatura máxima ter sido superior a 32 °C em diversos dias, a temperatura mínima foi sempre inferior a 24 °C. Ou seja, apesar de no período diurno os dias quentes serem frequentes na região, as noites têm temperaturas mais baixas do que o limiar adotado.

Parecendo evidente que a proximidade do estuário do Sado exerce um efeito moderador na temperatura do ar na parte oriental do concelho, deve-se ter também em conta a densidade de urbanização e a morfologia da Serra da Arrábida onde, os

¹ Estes valores pode variar de acordo com a região

estudos de climatologia local desenvolvidos por Alcoforado *et al.* (1993) e Mora (1998) revelaram condições particulares nos vales interiores: abrigados da influência do estuário do Sado e do vento regional, não raras vezes registam temperaturas máximas superiores a 40 °C.

Embora a ocorrência de episódios de calor tenha sobretudo um cariz regional, as características da ocupação do solo, como a densidade de urbanização ou a existência de manchas florestais, e a proximidade do mar, potenciam ou atenuam localmente os seus efeitos, pelo que a avaliação da suscetibilidade, teve em conta estes fatores.

Na maior parte do concelho de Setúbal a suscetibilidade à ocorrência de episódios de calor intenso é “Reduzida”, ou mesmo “Muito Reduzida” nas áreas com ocupação predominantemente “Florestal” (fig. 2), mas deve ser classificada como “Moderada” nas áreas densamente urbanizadas e nos vales interiores da Serra da Arrábida. Há que realçar, no entanto, que a temperatura não é o único parâmetro climático envolvido no conforto e na saúde, sendo a fisiologia humana um sistema complexo que reage a outras variáveis, como a humidade, a radiação (solar e infravermelho térmico) e o vento. Diversos estudos de avaliação do conforto térmico, referidos em Alcoforado e Andrade (2006), revelam que as áreas urbanas mais densas e com piores condições de ventilação ou menos permeáveis à penetração de brisas marítimas, registam um empobrecimento das condições de conforto térmico durante os dias muito quentes.

Fig. 2 - Suscetibilidade à ocorrência de ondas de calor no concelho de Setúbal.

c) As tempestades de vento, de chuva (ou ambas): os exemplos dos concelhos do Funchal e de Setúbal.

O risco de tempestade no “*Guia Metodológico*” é omissivo quanto ao tipo e critérios de classificação. No âmbito dos PMEPC da Madeira desenvolveu-se uma proposta de classificação dos episódios de vento forte e/ou chuva abundante, com base nos dados horários de precipitação e vento (Lopes *et al.*, 2011).

Distinguiram-se três tipos de Tempestades: de Precipitação Intensa – TPI; de Vento Forte – TVF; com ocorrência simultânea de Precipitação Intensa e Vento Forte – T(PI e VF). Foram considerados os limiares utilizados pelo Instituto de Meteorologia para a emissão de alertas (nível “amarelo”) no âmbito do Serviço Nacional de Proteção Civil (TABELA II).

TABELA II - Critérios para a identificação e classificação de tempestades.

Elementos climáticos	Parâmetro	Valor limiar	Classificação do Fenómeno identificado	
Precipitação	Precipitação total em 6 horas	> 30 mm (a)	Precipitação Intensa TPI	Verificando-se a) ou a) e b)
	Precipitação total em 1 hora	> 10 mm (b)		
Vento	Velocidade média em 1 hora	> 50 km/h (c)	Vento Forte TVF	Verificando-se c) ou c) e d)
	Rajada máxima em 1 hora	> 70 km/h (d)		
Precipitação e Vento (em associação)	Precipitação total em 6 horas	> 30 mm (a)	Precipitação Intensa e Vento Forte T(PI e VF)	Verificando-se a) ou a) e b) e c) ou c) e d)
	Precipitação total em 1 hora	> 10 mm (b)		
	Velocidade média em 1 hora	> 50 km/h (c)		
	Rajada máxima em 1 hora	> 70 km/h (d)		

Para a avaliação deste risco no concelho do Funchal foram analisados os registos respeitantes aos períodos 2000-2010 nas estações meteorológicas do Funchal/Observatório e 2002-2010 no Areeiro.

No período analisado, a frequência destes três tipos de tempestades (fig. 3) foi muito diferente nos dois locais, refletindo a forte diferença de altitude entre ambos e, sobretudo, as características muito particulares que decorrem da localização da estação do Areeiro, que determinam uma muito forte exposição à circulação atmosférica regional, já que se situa junto de um dos topos mais elevados da ilha da Madeira.

Fig. 3 - Número de dias de Precipitação Intensa – TPI, Vento Forte – TVF e ocorrência simultânea de Precipitação Intensa e Vento Forte – T(PI e VF): a) Funchal/Observatório; b) Areiro. (Fonte dos dados: Instituto de Meteorologia, IP).

Nos onze anos analisados da estação do Funchal/Observatório, registaram-se 35 eventos (3,2 por ano), mas apenas devidos a Precipitação Intensa (TPI) e ocorreram sempre na estação chuvosa, entre os meses de outubro e abril, com um máximo em novembro. Predominantemente, tiveram a duração de 1 dia (54% dos casos), tendo sido menos frequentes as TPI de 2 dias (32%) e só em 14% dos casos atingiram a duração de 3 dias. Maioritariamente, registaram-se em situações em que o vento no Funchal soprou de Oeste ou de Sudoeste. No entanto, o sítio onde está a estação meteorológica do Funchal/ Observatório, não é o melhor local para serem detetados episódios de vento forte, por estar numa posição sobranceira ao mar e inserida numa área muito urbanizada, que oferece maior resistência ao escoamento atmosférico do que um local mais desabrigado.

No Areiro, o número médio anual de eventos de TPI foi muito semelhante ao do Funchal (3,0), com um máximo em outubro. Mas o número total de dias Tempestades de Vento Forte (TVF) é muito significativo, 251), correspondendo a cerca de 8% do número global de dias que constituem o período analisado. Nesta estação meteorológica registaram-se ainda 80 ocorrências simultâneas de Precipitação Intensa e Vento Forte – T(PI e VF).

Relativamente aos dias de Vento Forte (TVF) e ocorrência simultânea de Precipitação Intensa e Vento Forte – T(PI e VF), o maior número verifica-se em dezembro. No entanto constata-se algumas diferenças no ritmo anual: enquanto os dias de Vento Forte (TVF) têm uma frequência repartida pelos doze meses do ano, as ocorrências simultâneas de Precipitação Intensa e Vento Forte – T(PI e VF) concentraram-se, quase totalmente, entre Outubro e Abril.

O evento TPI de 20 de fevereiro de 2010 constituiu um episódio notável em que o concelho do Funchal foi atingido por precipitações intensas em todo o seu território, sendo de destacar a particular abundância registada nos seus sectores mais elevados (fig. 4a), consequência provável de um incremento orográfico na formação

das precipitações. Tratou-se de uma tempestade que ocorreu na sequência de um prolongado período chuvoso na ilha da Madeira, tendo uma situação meteorológica adversa desencadeado uma aluvião excecional que atingiu, com especial intensidade, alguns concelhos da vertente sul da ilha, com destaque para os do Funchal e da ribeira Brava (SRES, 2011).

Nas áreas mais altas do concelho, devido à exposição à circulação atmosférica regional e ao incremento orográfico na formação das precipitações, a suscetibilidade à ocorrência de tempestades é “Elevada” (fig. 4b), com destaque para as situações de Vento Forte e Precipitação Intensa. Nas outras áreas a suscetibilidade é “Moderada”, assumindo maior importância as situações de Precipitação Intensa, sendo, no entanto, fraca a ocorrência de episódios de vento forte.

Fig. 4 - Precipitação diária total no dia 20 fevereiro de 2010 (a) (Fonte: SRES, 2011); e suscetibilidade de ocorrência de tempestades no concelho do Funchal (b).

Durante a ocorrência de tempestades de vento, a queda de elementos urbanos como árvores, cabos elétricos e outras estruturas, pode causar vítimas e/ou danos materiais avultados. A análise da suscetibilidade de uma região ao vento forte necessita de dados de velocidade e direções do fluxo do ar à escala horária, para avaliar a persistência deste elemento atmosférico, e sub-horária para estimar a intensidade das rajadas máximas horárias. O conjunto de dados meteorológicos disponíveis em estações meteorológicas da rede nacional (em média afastadas 50 km) é manifestamente insuficiente para se conhecerem as particularidades topoclimáticas de uma região. Para avaliar as condições de escoamento atmosférico em dias de tempestade devem ser usados outros métodos disponíveis, nomeadamente modelos numéricos linearizados (por exemplo produzidos

pelo software WAsP e WAsP Eng – fig. 5), ou CFD (*Computational Fluid Dynamics*). Sob o ponto de vista computacional os primeiros são os mais eficientes a produzir resultados, embora possuam algumas limitações técnicas, como por exemplo a estimação em zonas de esteira e declives de vertentes superiores a 30°.

Fig. 5 - Exemplo de velocidades do vento em Oeiras, estimadas com recurso ao software WAsP.

Estudos efetuados sobre os ventos fortes que motivam a queda de árvores e troncos em Lisboa (Lopes *et al.*, 2008b) evidenciaram as perturbações de Norte e Noroeste, Sul e Sudoeste (todo o ano) e a nortada (sobretudo no Verão) como as principais causas dessas quedas.

Segundo Lopes *et al.* (2008c) a velocidade de 7 m/s é o valor a partir do qual se verificam as ocorrências de quedas de ramos de árvores em Lisboa. Noutro estudo sobre o conforto mecânico em túnel de vento (Lopes *et al.*, 2008a) foi identificado o limiar crítico de 14 m/s, como o valor em que mais de metade dos indivíduos que participaram nos ensaios tiveram muita dificuldade em se movimentar. Esses limiares serviram de base para a identificação de dias de “vento forte” (>7 m/s) e “muito forte” (>14 m/s).

Para a análise da suscetibilidade à ocorrência de vento forte foi utilizado o software de modelação *WAsP Eng*, internacionalmente reconhecido para o estudo de ventos extremos. O modelo utiliza a topografia e as rugosidades aerodinâmicas das superfícies, que foram obtidas a partir de um MDT (com resolução de 30m) e as classes de ocupação/uso do solo GMES *Urban Atlas* (Agência Europeia do Ambiente). Foram estimados os ventos com velocidades superiores a 7 m/s para as direções dominantes identificadas na região (fig. 6).

Fig. 6 - Velocidades do vento estimadas a 10 m de altura, para uma situação de vento forte (7m/s) de Noroeste (a) e Sudoeste (b), hipoteticamente registado em Azeitão (canto superior esquerdo), num local de rugosidade aerodinâmica $z_0 = 0,05$ m.

Para cada direção foi classificada a suscetibilidade na área de estudo, de acordo com os limiares que constam na TABELA III.

TABELA III - Matriz de suscetibilidade ao vento forte de Noroeste e de Sudoeste, em Setúbal.

		Noroeste (m/s)		
		>14	7-14	<7
Sudoeste (m/s)	>14	Elevada	Elevada	Moderada
	7-14	Elevada	Moderada	Reduzida
	<7	Moderada	Reduzida	Reduzida

Nos topos das serras da Arrábida, S. Luís, Louro e S. Francisco, mais desprotegidos e elevados, podem ocorrer fortes acelerações do vento, o que confere a estas áreas uma suscetibilidade “Elevada”. Nos locais mais abrigados onde a rugosidade aerodinâmica é maior (e o atrito impõe uma redução da velocidade do vento, por exemplo na cidade de Setúbal) e nos vales interiores da cadeia da Arrábida, a suscetibilidade é “Reduzida”. A norte da Arrábida e na parte leste do concelho, onde imperam as superfícies aplanadas e vegetação predominantemente herbácea, as velocidades não sofrem grandes modificações em relação à condição inicial, o que determina uma suscetibilidade “Moderada” (fig. 7).

A fase de avaliação do risco: o exemplo do vento forte em Oeiras

Entre 2006 e 2010, as quedas de elementos urbanos mais frequentes registadas em Oeiras pelo CDOS de Lisboa, relacionadas com a ocorrência de vento forte,

Fig. 7 - Suscetibilidade aos ventos de Noroeste e Sudoeste, superiores a 7 m/s, em Setúbal.

corresponderam, essencialmente, a árvores (67%), sendo as restantes ocorrências de outras estruturas (27%) e apenas 6% quedas de cabos elétricos. Dado que as quedas de árvores constituem a maior parte das ocorrências e este tema ter sido já estudado em Lisboa (Lopes, *et al.*, 2008b e c), a análise da vulnerabilidade face aos ventos fortes no município de Oeiras centrou-se nas quedas de árvores de arruamento (excetua-se o restante parque verde urbano porque, normalmente nestes espaços, as quedas não são objeto de registo, a menos que provoquem danos em pessoas ou bens).

Essa avaliação (fig. 8), decorreu do seguinte critério: relação entre o total de árvores caídas nas ruas e o total de árvores de arruamento, ponderada pela sua área de distribuição em cada freguesia do concelho.

De um modo geral verifica-se que a vulnerabilidade estudada é maior nas áreas onde as quedas foram mais frequentes, nas freguesias de Oeiras e S. Julião da Barra, Cruz Quebrada-Dafundo e Barcarena (vulnerabilidade “Elevada” e “Muito Elevada”). Nas restantes freguesias a vulnerabilidade é “Moderada” e “Baixa”, apesar de nalgumas delas (Carnaxide, Linda-a-Velha e Paço de Arcos) terem ocorrido bastantes quedas.

Esta análise está limitada pela forma de recolha da informação pelos organismos envolvidos nas operações de socorro, na medida em que cada registo apenas contém a freguesia de ocorrência (algumas vezes a rua, mas normalmente sem um ponto exato de referência). Tal como já foi referido por Lopes *et al.* (2008c), seria de toda a conveniência

os agentes envolvidos nas operações de socorro registarem o local exato da ocorrência e, sistematicamente os seus impactes, através de GPS, de modo que em estudos futuros se possa chegar a uma espacialização mais fiável do risco associado ao perigo de vento forte.

Fig. 8 - Vulnerabilidade das árvores de arruamento durante a ocorrência vento forte no concelho de Oeiras.

Como foi referido anteriormente, os episódios de vento forte são frequentes no concelho de Oeiras pelo que se considera a sua probabilidade “Elevada” (TABELA IV). Por não se terem registado impactos significativos na população considerou-se, neste caso, a gravidade “Residual”. No entanto, dado que se têm registados bastantes quedas de elementos (sobretudo árvores), considerou-se como “Moderada” a gravidade no ambiente e na socioeconomia, resultando num risco “Elevado”.

TABELA IV - Matriz de risco de vento forte no concelho de Oeiras.

Categoria	Probabilidade	Gravidade				Risco
		população	ambiente	Socioeconomia	total	
Vento forte	elevada	residual	moderado	moderado	moderado	elevado

Conclusão

A avaliação da perigosidade, da suscetibilidade e da vulnerabilidade associadas às condições atmosféricas adversas constitui um desafio difícil para os peritos envolvidos na sua produção. Entre as diferentes dificuldades colocadas, sobressai o problema da escassez e/ou deficiente repartição espacial de séries climatológicas de observação das variáveis pretendidas disponíveis, de boa qualidade, fundamentais para suportar, nomeadamente, uma abordagem objetiva e robusta da perigosidade. Nalguns casos, o recurso a modelação física pode afigurar-se uma solução interessante e válida, como se mostrou nos exemplos do vento forte em Oeiras e Setúbal. Noutras situações, sobretudo quando o conhecimento sobre a frequência de ocorrência dos fenómenos perigosos no território é mais insuficiente, a avaliação da suscetibilidade, assente na análise dos seus fatores físicos condicionantes e predisponentes, apresenta-se como a abordagem mais apropriada, como se mostrou no caso das tempestades no Funchal.

Uma outra consideração que deve ser sublinhada após as reflexões apresentadas, é que o conhecimento do território, neste âmbito - relativamente às suas características climáticas - deverá, sempre que possível, descer à escala topoclimática. A definição e espacialização de unidades de resposta climática homogénea ou, pelo menos, de unidades morfoclimáticas mais relevantes no território municipal, afigura-se como um passo muito importante para a identificação dos climas locais e das funções climáticas predominantes nas áreas de estudo. Neste trabalho mostrou-se a importância das Unidades de Resposta Climática Homogêneas (URCH) para a avaliação da suscetibilidade dos territórios aos riscos climáticos e eventos meteorológicos extremos. Não só a espacialização dos riscos se torna mais clara (porque terá a sustentação nas bases físicas dos climas locais), mas também porque a cartografia de identificação de unidades espaciais homogéneas poderá constituir uma ferramenta de análise muito útil para os *stakeholders* da cartografia municipal de risco, já que possíveis medidas mitigadoras poderão ser equacionadas de modo mais específico e em função das características climáticas locais.

Bibliografia

- Alcoforado, M. J. (1992). *O Clima da Região de Lisboa. Contrastes e Ritmos térmicos*. Memórias do Centro de Estudos Geográficos, Lisboa, ISBN 972-636-094-3, 347 p.
- Alcoforado, M. J., Dias, M. H. (2002). *Imagens climáticas da região de Lisboa. Enquadramento na Diversidade Climática de Portugal Continental*. CD-Rom, CEG, Lisboa, ISBN: 972-636-133-8.
- Alcoforado, M. J. (2010). *Climatologia Urbana para o ensino*. Núcleo CliMA, 3, CEG, Lisboa. (ISBN: 978-972-636-209-8)

- Alcoforado, M. J., Andrade, E., Neves, M., & Vieira, G. (1993). Climas locais da Arrábida no Inverno. *Finis-terra*, XXVIII (55-56): 215-228.
- Alcoforado, M. J., Andrade, H. (2006). Nocturnal urban heat island in Lisbon (Portugal): main features and modeling attempts. *Theoretical and Applied Climatology*, 84, 151-159.
- D.G.S. – DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE (2010). *Plano de contingência para as ondas de calor*, Lisboa.
- Daveau, S., da Conceição Coelho, M., e Costa, V. G., & Carvalho, L. (1977). Répartition et rythme des précipitations au Portugal. Centro de Estudos Geográficos, Memórias, 3, Lisboa, 192 p., 3 mapas fora do texto.
- Daveau, S. e colaboradores (1985). *Mapas Climáticos de Portugal. Nevoeiro e Nebulosidade. Contrastes Térmicos*, Centro de Estudos Geográficos, Memórias, 7, Lisboa, 84 p., 2 mapas fora do texto.
- Daveau, S. e colaboradores (1985). *Mapas climáticos de Portugal. Nevoeiro e nebulosidade. Contrastes térmicos*. Lisboa, Memórias do Centro de Estudos Geográficos, 7.
- Ferreira, D. B. (2005). O ambiente climático. In, Medeiros, C.A., *Geografia de Portugal. Vol. I – O Ambiente Físico*. Círculo dos Leitores, Lisboa.
- Geiger, R. (1980). *Manual de Microclimatologia. O Clima da camada de ar junto ao solo* (tradução da 4ª edição, 1961). Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 556 p.
- Julião, R., Nery, F., Ribeiro, J. L., Castelo Branco, M., Zêzere, J. L. (2009). *Guia metodológico para a produção de cartografia municipal de risco e para a criação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) de base Municipal*. ANPC /DGOTDU, Lisboa.
- Lopes, A., Fragoso, M., Correia, E. (2011). Uma proposta de tipologia de tempestades no contexto da prevenção de riscos naturais em Portugal. In *VIII Congresso da Geografia Portuguesa*. APG, Lisboa, CD-ROM, ISBN:978-972-99436-4-5.
- Lopes, A., Lopes, S., Matzarakis, A., Alcoforado, M. J. (2011). Summer Sea breeze influence on human comfort during hot periods in Funchal (Madeira Island). *Meteorologische Zeitschrift*, 20(5): 553-564.
- Lopes, A., Oliveira, S. (2008a). Assessment of thermal and mechanical comfort of people based on wind tunnel experiments, ICB 2008, 18th *International Congress of Biometeorology*, Tokyo, 22-26 de Setembro.
- Lopes, A., Oliveira, S., Fragoso, M., Andrade, J., Pedro, P. (2008c). Wind risk assessment in urban environments: the case of falling trees during windstorm events in Lisbon, in K. Střelcová, et al (Eds.), *Bioclimatology and Natural Hazards*, Springer: 55-74.
- Lopes, A., Oliveira, S., Fragoso, M. (2008b). *Vento Forte e queda de árvores em Lisboa. Avaliação e primeiros resultados*, in Alcoforado, M. J. et al. (eds.) *Estudos sobre Cidades e Alterações Climáticas*. CEG/A.I.G.-E., 8: 71-91.
- Mora, C. (ed.) (2014). *Geografia Física em Regiões de Montanha: A Ilha da Madeira e as Serras da Arrábida e da Estrela. Homenagem a Orlando Ribeiro*, ULisboa, Centro de Estudos Geográficos, Grupo de Investigação em Alterações Climáticas e Sistemas Ambientais (ZEPHYRUS). Zephyrus 1, ISBN: 978-972-636-248-7, 89 p.
- Mora, C. (1998). *Aspectos do clima local da Arrábida*. Lisboa, Departamento de Geografia, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
- Oke, T. (1978). *Boundary Layer Climates*. Methuen, London, 372 p.
- Ribeiro, O. (1985). *A Ilha da Madeira até meados do século XX: estudo geográfico*. Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, Lisboa.
- Shi, P. (2019). *Disaster Risk Science*. Springer Singapore. DOI: <https://www.doi.org/10.1007/978-981-13-6689-5>
- SRES - SECRETARIA REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL (2010). *Estudo de Avaliação do Risco de Aluviões da Ilha da Madeira – Relatório Síntese*. Instituto Superior Técnico, Universidade da Madeira e o Laboratório Regional de Engenharia Civil.
- Yoshino, M. M. (1975). *Climate in a small area. An Introduction to Local Meteorology*. University of Tokyo Press, Tokyo, 549 p.

ÍNDICE

PENSAR A FLORESTA NA PERSPETIVA DOS RISCOS	
DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS À DIVERSIDADE ECOLÓGICA	19
 A investigação geográfica dos incêndios florestais em Portugal - Luciano Lourenço o grande impulsionador	
António Bento-Gonçalves e António Vieira	21
 Incêndios extremos em Portugal e na Grécia: reflexões sobre a importância da preparação e da comunicação do risco e da crise	
31	
Fantina Tedim, Vittorio Leone, Ângela Silva e Fernando Correia	
 A prevenção contra incêndios florestais em tempo de pandemia: A união entre experiência e inovação	
Adriana Aparecida Bianchi Azevedo e Fábio Pimentel Barcello	45
 Relações entre ocorrências de incêndios florestais e alteração no uso e cobertura do solo	
Fillipe Tamiozzo Pereira Torres	57
 Is native forest an alternative to prevent wildfire in the WUI in Central Portugal?	
Aline Silva de Oliveira, Joaquim Sande Silva, José Gaspar, Nuno R. G. Nunes Guiomar e Paulo M. Fernandes	67
 Avaliação de Risco de Incêndio Rural à escala local na região Centro de Portugal	
Sandra Oliveira, Rafaello Bergonse, Pedro Pinto Santos, Ana Gonçalves, Raquel Melo e José Luís Zêzere	79
 Identificação de unidades cartográficas de intervenção prioritária pós incêndio florestal na Serra de Monchique	
Filipe Pereira, Fernando Granja-Martins e Helena Maria Fernandez	91
 O estudo dos processos erosivos em áreas ardidas em Portugal: perspetiva geográfica	
António Vieira e António Bento-Gonçalves	103
 Dinâmica do armazenamento de carbono em áreas de matos de montanha: efeito do fogo controlado	
Felícia Fonseca, Diego Silva, Zulimar Hernández, Ana Caroline Royer, e Tomás de Figueiredo	115
 Sixty years of the development projects and combating the environment and natural resources degradation in arid and semi-arid areas in Rif mountains in Morocco	
Hanifa El Motaki, Abdelhak El-fengour and Aissa El Bouzidi	125

Grandes incendios forestales en España y alteraciones de su régimen en las últimas décadas

Xavier Úbeda, Jorge Mataix-Solera, Marcos Francos y Joaquim Farguell 147

Review of satellite based support to forest fire environmental impact assessment: the example of Arischia (Italy) forest fire

Giovanni Laneve, Valerio Pampanoni 163

Adaptaciones de los programas de prevención contra incendios forestales en Chile, ante un escenario cambio climático

Miguel Castillo Soto 179

Resiliência aos incêndios através da gestão da paisagem: perceção da população do Sabugal sobre o Programa de Transformação da Paisagem

Diogo Martinho, Pedro Saloio, Carlos Pinto e Adélia Nunes 199

Impacto de agentes de distúrbio nos serviços dos ecossistemas em povoamentos de pinheiro bravo na Serra da Lousã

Raúl Salas González e Beatriz Fidalgo 213

A Floresta no Município de Mortágua: serviços e riscos percecionados pela população residente

Lígia Mateus, Adélia Nunes, Albano Figueiredo e António Campar de Almeida 225

El eucalipto en la Península Ibérica y su impacto sobre los recursos hídricos

Francisco Díaz-Fierros Viqueira 239

Marketing Territorial na Sustentabilidade Económica e Ambiental: o caso da Mata do Buçaco

Paulo Simões 251

A Biogeografia da cor

Jorge Paiva 263

PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA COMUNITÁRIA

CAMINHOS A PERCORRER 275

2021: um tempo para revisitação da gestão do risco e de crises

António Betâmio de Almeida 277

Planos de Emergência de Proteção Civil

Antonio Duarte Amaro 301

Redução do risco de desastre em áreas urbanas: revisão conceptual e aplicação	
Tiago Miguel Ferreira	311
As operações de proteção civil nos territórios arquipelágicos nacionais: o emprego de recursos disponíveis e o reforço das capacidades	
Luis Neri	323
A Avaliação de Riscos Climáticos nos Planos Municipais de Emergência em Portugal: métodos e experiência	
António Lopes, Marcelo Fragoso e Ezequiel Correia	333
<i>Déficits</i> de governação de risco: uma leitura sobre a pandemia SARS-CoV-2	
Manuel Ribeiro	353
A problemática dos riscos costeiros no âmbito do Turismo Costeiro e Marítimo: o caso do município de Odemira	
Mónica Brito, e José Gouveia	367
Gestão territorial do risco na adaptação às alterações climáticas	
Alexandre O. Tavares e Neide P. Areia	387
Os observatórios sociais nos processos de redução dos riscos, desastres e catástrofes	
Antenora Maria da Mata Siqueira e Luana Fernandes dos Santos Azeredo	399
Compreensão dos riscos de desastres através de Banco de Dados e Sistema de Informação Geográfica na cidade de Natal, RN, Brasil	
Lutiane Queiroz de Almeida, Francisca Leiliane Sousa de Oliveira, Dyego Freitas Rocha, Ana Clara Celestino Belchior e Eduardo Sousa de Azevedo	411
A importância do uso da comunicação estratégica na proteção civil	
Albino Tavares	425
Segurança ocupacional em operações de colheita florestal	
Ana C. Meira Castro, João Santos Baptista e Killian S. Lima	435
Conceitos e terminologia em Medicina de Catástrofe. Sinopse	
Romero Bandeira e Sara Gandra	445
Estratégias de coping na gestão do stress associado à atividade profissional das forças policiais, bombeiros e emergência pré-hospitalar	
Cristina Queirós, Sílvia Monteiro Fonseca, Sara Faria, Sónia Cunha, Fernando Passos, Natália Vara e Rui Campos	463
Perturbação de stress pós-traumático em bombeiros: prevenção e intervenção	
Natália Vara, Sara Faria, Sílvia Monteiro Fonseca e Cristina Queirós	477
Emergency teams in their voice (PSP & GNR) factors of risk and resilience	
Carmen Diego Gonçalves	489

Como parâmetros que definem um Ambiente Térmico potenciam riscos:
estudo de casos

Mário Talaia 503

Segurança alimentar em Portugal e no Brasil: diferenças e equidades

Eurídice Alencastro, José Manuel Mendes e Ana Sancha Batista 517

Decision support systems and risk analysis for spatial planning

Nelson Mileu e Margarida Queirós 529

MENSAGENS PROSEPE 547

COORDENAÇÃO DISTRITAL 549

Mensagem da Coordenação Distrital dos Clubes da Floresta de Aveiro 550

Mensagem do Coordenador Distrital dos Clubes da Floresta de Braga 552

Mensagem do Coord. Distrital dos Clubes da Floresta de Castelo Branco 554

Mensagem do Coordenador Distrital dos Clubes da Floresta do Porto 555

Mensagem da Coord.^a Distrital dos Clubes da Floresta de Coimbra 558

Mensagem da Coordenadora Distrital dos Clubes da Floresta de Lisboa 560

Mensagem do Coord. Distrital dos Clubes da Floresta de Viana do Castelo ... 562

Mensagem da Coordenadora Distrital dos Clubes da Floresta de Viseu 564

CLUBES DA FLORESTA 567

Mensagem do Clube da Floresta os “Amigos dos Bacorinhos” 568

Mensagem do Clube da Floresta “Águia Real ” 570

Mensagem do Clube da Floresta “Borboleta e Amigos, Lda” 571

Mensagem do Clube da Floresta “*Canis lupus*” 572

Mensagem do Clube da Floresta os “Florestadores” 574

Mensagem do Clube da Floresta os “Laranjinhas de Amares” 576

Mensagem do Clube da Floresta “Marão Vida” 577

Mensagem do Clube da Floresta os “Micófilos” 578

Mensagem do Clube da Floresta os “Milhafrões” 580

Mensagem do Clube da Floresta “As Andorinhas” e “Ouriço” 582

Mensagem do Clube da Floresta “Ouriço” 584

Mensagem do Clube da Floresta “Pulmões do Mundo” 586

Mensagem do Clube da Floresta “Vamos Dar a Mão à Natureza” 587

LUCIANO LOURENÇO VIAJANDO PELO AMAZONAS AO PÔR DO SOL, EM 15/06/2012.

FOTOGRAFIA CEDIDA POR MARIA DA GRAÇA LOURENÇO, 2021.

Impressão:
Simões & Linhares, Lda.
Rua do Fetal, Lote 5
3020-923 Coimbra

Telefone: (0351) 239 084 200 | E-Mail: geral@simoeselinhares.pt
Web: <https://www.simoeselinhares.pt>

Setembro de 2021

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA

COIMBRA
2021