УДК 599.363:575.22 (571.65)

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СРЕДНЕЙ БУРОЗУБКИ (*Sorex caecutiens* LAXMANN, 1788) СЕВЕРНОГО ПРИХОХТЬЯ

В. В. Переверзева, Н. Е. Докучаев, А. А. Примаков, С. В. Киселев

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биологических проблем Севера
Дальневосточного отделения Российской академии наук, г. Магадан
E-mail: vvpereverzeva@mail.ru

Впервые исследована генетическая изменчивость гена и полипептида цитохрома *b* мтДНК средней бурозубки (*Sorex caecutiens*) Северного Приохотья. Изученная популяция имеет монофилетическое происхождение и относится к широко распространенной в Евразии митохондриальной линии. Установлен высокий уровень изменчивости нуклеотидной последовательности гена и аминокислотного состава полипептида цитохрома *b*. Результаты анализа свидетельствуют о действии стабилизирующего отбора на структуру данного фермента, а равновесное состояние изученных полиморфных аллозимных систем – о высоком уровне панмиксии в исследованной популяции. Показано, что даже в годы депрессии численность средней бурозубки достаточна для поддержания генетического разнообразия популяции.

Ключевые слова: средняя бурозубка, *Sorex caecutiens*, ген цитохрома *b* (*cytb*), модификация фермента цитохрома *b* (*Cytb*), аллозимная изменчивость, генетическое разнообразие, филогенетический анализ, Северное Приохотье.

ВВЕДЕНИЕ

Средняя бурозубка (*Sorex caecutiens* Laxmann, 1788) имеет обширный ареал, простирающийся от Скандинавии на западе до Чукотки на северо-востоке и о. Хоккайдо на юго-востоке Евразии. На материковой части Северо-Восточной Азии средняя бурозубка представлена двумя подвидами. Бассейны Индигирки, Колымы и Анадыря населяет *S. caecutiens koreni* Gl. Allen, 1914, а п-ов Камчатка и Северное Приохотье – *S. c. macrorygmaeus* Miller, 1901 (Юдин, 1989; Докучаев, 1990а, б). Занимая на большей части территории Северо-Восточной Азии в сообществах насекомоядных доминирующее положение, средняя бурозубка, тем не менее, в генетическом отношении остается мало изученным видом.

Исследование генетической изменчивости популяций, как важной части комплексного анализа внутривидового полиморфизма, в настоящее время относится к приоритетным научным направлениям. Генетические методы позволяют также реконструировать историю и пути расселения видов.

Ген цитохрома *b* (*cytb*) кодирует трансмембранный фермент цитохром *b* (*Cytb*) – ключевое звено дыхательной цепи переноса электронов. Уровень функциональной активности *Cytb* играет важнейшую роль в жизнеобеспечении и возможности адаптации организма к различным экологическим условиям. Вариабельность нуклеотидной последовательности гена *cytb*, кодирующего данный фермент, широко используется в популяционной генетике и молекулярной филогеографии различных видов млекопитающих (Abramson et al., 2012; Dąbrowski et al., 2013; Boratynski et al., 2014; Переверзева, Павленко, 2014; Григорьева и др., 2015; Малярчук и др., 2015; Kohli et al., 2015; Переверзева и др., 2018), включая представителей рода *Sorex* (Ohdachi et al., 1997, 2001, 2003, 2005, 2012; Demboski, Cook, 2003; Bannikova et al., 2010, 2018; Esteva et al., 2010; Hope et al., 2010, 2011; Koh et al., 2012).

Метод геле-электрофореза нативных белков-ферментов также широко используется в популяционной генетике (Фрисман и др., 2002, 2003, 2009, 2016; Засыпкин и др., 2007; Примаков, Засыпкин, 2011; Жигилева, 2014). Аллозимы, определяемые с помощью электрофореза, являются вариантами фермента и кодируются различными аллелями одного локуса. Данный метод вы-

являет 25–30% аминокислотных замен. Исследование достаточно большого набора локусов у репрезентативной выборки особей позволяет количественно определить генетическую изменчивость популяции. Параметрами изменчивости являются число полиморфных локусов, число и частота аллелей в них и средняя наблюдаемая гетерозиготность. Равновесное состояние популяции оценивается через распределение частот аллелей в полиморфных локусах (Айала, Кайгер, 1988; Картавцев, 2005).

Численность средней бурозубки в Северном Приохотье (бассейн р. Челомджа) по данным многолетних исследований в зависимости от сезона и года составляла от 0.1 до 15.5 экз. на 10 конусов-сут (Докучаев, 1990б). При снижении численности популяции происходит уменьшение генетического полиморфизма в результате дрейфа генов и эффекта «бутылочного горлышка». При росте численности популяции частота некоторых редких аллелей может возрасти (Айала, Кайгер, 1988). Исследование параметров аллозимной изменчивости и состояния некоторых ядерных локусов может выявить наличие или отсутствие влияния колебаний численности на изменение генетической структуры популяции у вида. Цель проведенного исследования – получение первичной информации о генетической изменчивости и структуре популяции средней бурозубки Северного Приохотья.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В мае – сентябре 2017 г. в долине р. Дукча (59°37.724' с. ш., 150°56.161' в. д.) было отловлено и подвергнуто генетическому исследованию 68 экз. средней бурозубки подвида *S. caecutiens macropygmaeus* Miller, 1901. Отлов проводили ловчими конусами с водой, что обеспечивало быструю гибель зверьков. Образцы мышечной ткани от каждой бурозубки замораживали и сохраняли при температуре -20°C.

Молекулярная генетика. Методами молекулярной генетики установлена полная нуклеотидная последовательность гена *cytb* у 41 экз. средней бурозубки. Выделение и очистку тотальной ДНК проводили по модифицированному методу (Fleming, Cook, 2002). Амплификацию нуклеотидной последовательности гена *cytb* вели с использованием составленных в лаборатории праймеров LSrxcytb GGA GTC TAA CCA TGA CTT ATG ACA TG и RSrxcytb GGT GGG GCT TAC GCT TCT TCC TTG ATG TCT. Строение данных олигонуклеотидов определено на основе информации о полной нуклеотидной последовательности мтДНК *S. caecutiens* GenBank № MF374796 (Jin et al., 2017). Условия полимеразной цепной реакции подбирали эмпирически: денатурирующая стадия 95°C – 5 мин; затем 32 цикла: 95°C –

45 с, 50°C – 30 с, 70°C – 2 мин 30 с; заключительная стадия – 72°C – 7 мин. Амплифицированный участок мтДНК очищали и подготавливали к секвенированию по стандартной методике с применением набора реагентов Diatom™ DNA Clean-Up «Лаборатория Изоген». Нуклеотидные последовательности гена *cytb* мтДНК определяли по стандартной методике с применением наборов для циклического секвенирования ДНК Big Dye Terminator v. 3.1 (Applied Biosystems, США) и генетического анализатора ABI 3500×L (Applied Biosystems, США). Для проведения филогенетического анализа, помимо собственных данных, использовали информацию GenBank о полных нуклеотидных последовательностях гена *cytb* у средней бурозубки № AB119181 – AB119192, AB062720 – AB062735 (Ohdachi et al., 2016, не опубликовано); KU760858 – KU760884 (Arai et al., 2016); GU929333 – GU929336 (Bannikova et al., 2010); JX192946 – JX192947 (Ohdachi et al., 2001). В качестве внешней группы использовали нуклеотидную последовательность гена *cytb* *Sorex isodon* GenBank № AB062736 (Ohdachi et al., 2016, не опубликовано). Дендрограмма филогенетических отношений *cytb*-гаплотипов *S. caecutiens* построена по методу максимального правдоподобия (ML) на основании бипараметрической модели дистанций Кимуры в пакете программ MEGA6.0.2.74 (Tamura et al., 2013). Статистическую достоверность в узлах ветвления филогенетического дерева оценивали бутстреп-методом (1000 итераций). Анализ генетических данных проводили с помощью пакетов программ MEGA 6.0.2.74 (Tamura et al., 2013), ARLEQUIN ver. 3.5 (Excoffier et al., 2005), Network 4.5.1.0 (Bandelt et al., 1999).

Программой MEGA 6.0.2.74 определяли сайты несинонимичных нуклеотидных замен и аминокислотные последовательности обнаруженных вариантов полипептида Cytb. В работе используется однобуквенное обозначение аминокислот, рекомендуемое ИЮПАК (IUPAC). Для анализа расположения аминокислотных замен в пространственной конфигурации фермента Cytb использовали схемы вторичных структур Cytb, представленные в работах (Howell, 1989; Kocher et al., 1989; Irwin et al., 1991; McClellan et al., 2005). Для оценки адаптивности изменений в гене *cytb* была использована программа TreeSAAP 3.2, которая определяет селективные воздействия в процессе кладогенеза на 31 структурное и биохимическое физико-химическое свойство аминокислот с использованием z-теста. Это позволило оценить замены аминокислот в восьми категориях значимости (mc) и определить тип отбора (Woolley et al., 2003). Консервативный / радикальный характер выявленных аминокислотных замен определяли и с применением других

подходов – модифицированного метода Грэнтсема (основан на сравнении состава, полярности и объема радикалов аминокислот) и функциональной близости аминокислот Бачинского (Бутвиловский и др., 2009).

Биохимическая генетика. Методом электрофореза нативных белков в полиакриламидном геле (ПААГ) исследованы образцы скелетной мускулатуры. У 68 экз. средней бурозубки протестированы локусы LDH-1, LDH-2, ME, IDH-1, IDH-2, PGD, GOT, ACP, EST-M; у 26 экз. – SOD, AK, GLO-I и GPI. **Разделение белков** проводили в 6.5–7.5%-ном ПААГ в трис-ЭДТА-боратной (Davis, Ornstein, 1959) и трис-глициновой (Peacock et al., 1965) буферных системах с использованием оборудования оригинальной конструкции (Засыпкин, 1983, 1986). Ферментативные активности выявлялись стандартными методиками, обозначения локусов приведены согласно сокращенному названию ферментов (Manchenko, 2003). Для определения соответствия наблюдаемых численностей генотипов ожидаемым по

распределению Харди – Вайнберга при выявленных частотах аллелей использовалась компьютерная программа CHNHW (Zaykin, Pudovkin, 1993).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Молекулярная генетика. У *S. caecutiens* ген *cytb* составляет 1140 пар нуклеотидов (пн) и расположен с 14213-й пн по 15352-ю пн полного генома мтДНК. Нуклеотидная последовательность гена *cytb* мтДНК исследованных нами средних бурозубок различалась по 38 локусам, что определяет наличие 28 гаплотипов гена *cytb* (рис. 1).

Полученные Scb1 – Scb28 нуклеотидные последовательности депонированы в GenBank (№ MN257335 – MN257362). Доля вариабельных сайтов составляет 0.0333 от общей длины гена *cytb*. Доля транзиций – 0.8947. Трансверсии обнаружены в 1-й и 3-й позициях кодона, их суммарная доля – 0.1053. Отношение частоты транзиций в 1 : 2 : 3 позициях кодона и соотношение трансверсий в 1 : 3 сайтах кодона показаны в таблице.

	1111223344	4455666677	7777888889	99999000	111	Модификации
	4788010123	3825356813	3568357890	11138019		полипептида
	5239149535	8652319490	8686459573	02507543		цитохрома b
	CGTCAGTGAC	TGGTAACTCC	CCTATCATAG	GGTCCTCC		Fscb2–Fscb7
Scb1			...G....A	A		
Scb2						FScb2
Scb3		T.				Fscb4
Scb4	.A.....		.T.....G.			FScb3
Scb5			A	A		Fscb2
Scb6	A..					
Scb7		C....	T...C....			
Scb8	.A.....					FScb3
Scb9			.T.....G.			
Scb10	.AC.....					FScb3
Scb11	G.....	T.				Fscb4
Scb12	G.	..A.....	T..			
Scb13	...T.....			.A.....		
Scb14	.A.T.....	C..		.C.....		FScb3
Scb15		T..	C..	T..		
Scb16		G....	..C..TG..			
Scb17	.A.....	.A.....				FScb3
Scb18	TA.....					Fscb5
Scb19		C..C.....				
Scb20		T..		T..		
Scb21	..C.....			C..		
Scb22				A.....		Fscb6
Scb23			T.....			
Scb24		.A.....	G.			
Scb25				T.		
Scb26	.A...A...					Fscb7
Scb27				T..		
Scb28	C..A	C.T				

Рис. 1. Гаплотипы гена цитохрома *b* и соответствующие им модификации полипептида цитохрома *b* *S. caecutiens* долины р. Дукча. Нуклеотидные замены представлены относительно последовательности варианта Scb1. Сайты замен показаны от начала гена цитохрома *b* (показаны гаплотипы, кодирующие модификации полипептида FScb2–FScb4. Остальные гаплотипы кодируют модификацию FScb1)

Fig. 1. Cytochrome *b* gene haplotypes and corresponding modifications of the cytochrome *b* polypeptide in *S. caecutiens* of the Dukcha River valley. Nucleotide substitutions are presented in relation to the sequence of variant Scb1. Substitution sites are shown from the beginning of the cytochrome *b* gene (the haplotypes encoding modifications of the FScb2–FScb4 polypeptide are noted. The remaining haplotypes encode an FScb1 modification)

Доля типов и позиций нуклеотидных замен в гене цитохрома *b* у *S. caecutiens* долины р. Дукча
Share of types and positions of nucleotide substitutions in the cytochrome *b* gene in *S. caecutiens* of the Dukcha River valley

Варианты замен	Тип нуклеотидной замены				
	Транзиция			Трансверсия	
	Позиция замены в кодоне				
	Первая	Вторая	Третья	Первая	Третья
Суммарная доля нуклеотидных замен	0.1316	0.0263	0.7368	0.0263	0.0789
Доля несинонимичных нуклеотидных замен	0.1053	0.0263	0.0000	0.0263	0.0000

На основании полиморфизма нуклеотидной последовательности гена *cytb* в исследованной выборке бурозубок рассчитаны индексы молекулярного разнообразия – гаплотипическое разнообразие составляет $h = 0.9561 \pm 0.0219$, нуклеотидное разнообразие $\pi = 0.002819 \pm 0.00165$, среднее число попарных различий между гаплотипами $P_i = 3.213415 \pm 1.693501$ и число варибельных сайтов $V = 38$. Ранее было показано (Avise, 2000), что высокие значения индексов молекулярного разнообразия означают стабильность популяции, которая в течение длительного времени имеет высокое значение эффективной численности. Проведенный тест на нейтральность (Tajima, 1989) дал достоверно высокое отрицательное значение $D = -2.22758$ ($P = 0.0010$), что свидетельствует об отсутствии эффекта прохождения популяцией через «бутылочное горлышко».

В исследуемой выборке бурозубок наиболее распространен гаплотип Scb1, реже встречались Scb2, Scb3, Scb5 и Scb6, а остальные варианты обнаруживались лишь в единичных экземплярах.

Доли гаплотипов в выборке составили: Scb1 – 0.1951; Scb2, Scb3 – 0.0732; Scb5, Scb6 – 0.0488; Scb4, Scb7–Scb28 – 0.0244.

Для определения филогенетических отношений *cytb*-гаплотипов в популяции средней бурозубки построена медианная сеть по принципу минимального числа нуклеотидных замен (рис. 2). Полученная конструкция имеет звездчатую структуру с гаплотипом-основателем Scb1. Различия в нуклеотидной последовательности между Scb1 и дочерними гаплотипами составляет 1–4 нуклеотидные замены. Медианная сеть включает единственный субкластер (Scb10, Scb14, Scb17, Scb18 и Scb26), образовавшийся от гаплотипа Scb8 в результате 1–3 нуклеотидных замен. Полученные данные могут свидетельствовать об эволюционном потенциале гаплотипа Scb8.

Филогенетические отношения *cytb*-гаплотипов *S. caecutiens*, представленных в GenBank и Scb1 – Scb28, отражены в схеме дендрограммы (рис. 3). На полученной ML-дендрограмме присутствуют три генетические клады *cytb*-гаплотипов средней бурозубки.

В кладу А входят гаплотипы с евразийской части ареала *S. caecutiens* от Финляндии до о. Сахалин, в том числе и найденные нами у экземпляров магаданского региона Scb1 – Scb28. Полученные данные свидетельствуют о принадлежности всех средних бурозубок, *cytb*-гаплотипы которых составляют кладу А, к единой генетической линии вида и имеющих, по-видимому, единое происхождение.

Гаплотипы бурозубок с собственно п-ова Корея оказались среди *cytb*-гаплотипов клады А (см. рис. 3).

Эффект основателей и микроэволюционные процессы в обособленной группе приводят к образованию уникальных генофондов. Кладу Б на дендрограмме образуют *cytb*-гаплотипы *S. caecutiens* с о. Чеджу (Jeju), расположенного к югу от п-ова Корея. Гаплотипы *S. caecutiens* о. Хоккайдо обособлены в кладу В. Генофонд данных островных популяций сформировался в результате длительной изоляции. Вполне закономерно, что у *S. caecutiens*, как и у других видов мелких млекопитающих, населяющих о. Хоккайдо, генофонд *cytb*-гаплотипов уникален (Iwasa et al., 2002; Abramson et al., 2012).

Найденные у средней бурозубки долины р. Дукча мутации нуклеотидной последовательности гена *cytb* в основном синонимичны, однако часть обнаруженных нуклеотидных замен приводит к аминокислотным замещениям. Доли несинонимичных замен представлены в таблице. С помощью пакета программ MEGA6 определены 7 модификаций аминокислотных последовательностей полипептида Cytb (FScb1 – FScb7), кодируемых *cytb*-гаплотипами Scb1 – Scb28. На рис. 1 показаны *cytb*-гаплотипы средней бурозубки, кодирующие модификации Cytb FScb2 – FScb7. Остальные гаплотипы, нуклеотидные замены в которых также представлены на рис. 1, кодируют наиболее распространенную аминокислотную последовательность FScb1. Исследование выявило наличие в популяции средней бурозубки долины р. Дукча достаточно высокий полиморфизм аминокислотной последовательности полипептида Cytb.

Sorex isodon AB062736

Рис. 2. Медианная сеть гаплотипов мтДНК *S. caecutiens* Северного Приохотья. Размер кругов пропорционален частоте варианта мтДНК. * – транзигция по 1-му нуклеотиду кодона, ** – транзигция по 2-му нуклеотиду кодона; † – трансверсия в 1-й позиции кодона, ‡ – трансверсия в 3-й позиции кодона. Цифрами обозначены сайты мутаций от начала гена цитохрома *b*; mv – медианный вектор

Fig. 2. Median haplotype network of mtDNA of *S. caecutiens* in Northern Priokhotye. Circle sizes are proportional to the mtDNA variant frequencies. * – transition by the 1st codon nucleotide, ** – transition by the 2nd codon nucleotide; † – transversion in the 1st codon position, ‡ – transversion in the 3rd codon position. Numbers indicate mutation sites from the beginning of the cytochrome *b* gene; mv is the median vector

Рис. 3. ML-филогенетическое дерево, построенное по данным об изменчивости нуклеотидной последовательности гена цитохрома *b* мтДНК *S. caecutiens*. На ветвях указаны бутстреп-индексы (> 50%)

Fig. 3. ML phylogenetic tree constructed from the data on the variability of the nucleotide sequence of *S. caecutiens* mtDNA cytochrome *b* gene. Branches indicate bootstrap indices (> 50%)

Наиболее распространена модификация FScb1, достаточно часто встречаются FScb2 – FScb4. Полипептидные последовательности FScb5 – FScb7 редки (см. рис. 1). Транзиция в первой позиции кодона **G172A** приводит к возникновению *cytb*-гаплотипа Scb8, который является основанием единственного субкластера (см. рис. 2). При сопоставлении рис. 1, 2 и 4 обращает на себя внимание факт наличия в субкластере гаплотипов, кодирующих модификации полипептида Cytb FScb3 (Scb8, Scb10, Scb14 и Scb17), FScb5 (Scb18) и FScb7 (Scb26), которые содержат аминокислотную замену D58N.

Были сопоставлены ML-дендрограмма филогенетических отношений *cytb*-гаплотипов *S. caecutiens* (см. рис. 3), сайты замен аминокислот и доли найденных модификаций полипептида (рис. 4). С помощью пакета программ MEGA6 проведено сравнение аминокислотных последовательностей полипептида Cytb образцов средней бурозубки долины р. Дукча и представленных

в GenBank образцов. Найдено, что у особей, *cytb*-гаплотипы которых входят в кладу А, наиболее представлены модификации FScb1 (AB028547, AB028548, AB028552, AB028555, AB062720, AB062732, AB062734, AB119181, AB119185, AB119189, AB119192, GU929333–GU929335) и FScb2 (AB028551, AB028554, AB028557, AB062725, AB062726, AB062728, AB062729, AB062731, AB119184, AB119190, AB119191, GU929336, MF374796). У экземпляров AB028549 и AB119186 определена модификация FScb6. Остальные *cytb*-гаплотипы, входящие в субкладу А, отличаются от FScb1 одной-тремя заменами и кодируют аминокислотные последовательности полипептида Cytb, не выявленные у особей средней бурозубки бассейна р. Дукча (см. рис. 4). Аминокислотные замены модификаций FScb3 – FScb5 и FScb7 уникальны для популяции Северного Приохотья. Замена L365I (FScb2) имеет место у ряда особей, несущих гаплотипы клады А, и у всех особей с гаплотипами клад Б и В (см. рис. 4).

САЙТЫ АМИНОКИСЛОТНЫХ ЗАМЕН В ПОЛИПЕПТИДЕ ЦИТОХРОМА *b* *Sorex caecutiens*

111 1222222223 333333
134567027 8122334590 002566
7699802816 9456580750 340445

КЛАДА А

FScb1	TSVLDMDMFT	IDTILVTTVI	VVFAVL
FScb2			I
FScb3	...N....		
FScb4		M...	
FScb5	...FN....		
FScb6			...M....
FScb7	...N.N...		
AB119182			A....I
AB119183			...L..I
AB119187	...I.....		
AB119188	A.....		I
AB028550		...T.A...	
AB028553		A...	
AB028556		...N.....	
AB062727			...TII
AB062730		...I.....	
AB062733			A....I
AB062735		A...	

доля модификаций
полипептида цитохрома *b*
в популяции *Sorex caecutiens*
долины р. дукча

0,5854
0,1220
0,1220
0,0976
0,0244
0,0244
0,0244

КЛАДА Б

AB062721	.N...V....	..A..I...V	I
AB062723	.N...V....	I...V	...M...I
AB062724	.N...V...N	I...V	I
JX192946	.N...V....	I...V	I
JX192947	.N...V.V..	I...V	I

КЛАДА В

AB028558		V...FI..A.	L....I
AB028564		I....	LM...I
KU760864		...FI..A.	L....I
KU760865		I....	L....I
KU760868	L.	V...FI..A.	L....I

Рис. 4. Сайты аминокислотных замен в полипептиде цитохрома *b* и доля его модификаций у *S. caecutiens* долины р. Дукча

Fig. 4. Amino acid substitution sites in the cytochrome *b* polypeptide and the proportion of its modifications in *S. caecutiens* of the Dukcha River valley

Замена V304M (FScb6) присутствует у экземпляров с гаплотипами AB062723 (клада Б) и AB028564 (клада В).

В кладе Б гаплотип JX192946 кодирует одинаковую аминокислотную последовательность с вариантом AB062722, остальные четыре модификации Cytb уникальные. У всех модификаций Cytb клады Б присутствуют уникальные аминокислотные замены S16N, M60V и I300V (см. рис. 4).

В кладе В гаплотипы AB028564 и KU760868 кодируют уникальные модификации Cytb. Найдено, что ряд *cytb*-гаплотипов клады В кодирует одинаковые аминокислотные последовательности:

1. AB028558 и AB028559, KU760862, KU760863, KU760866, KU760867, KU760869 – KU760874, KU760876 – KU760882;
2. KU760864 и AB028560;
3. KU760865 и AB028561 – AB028563, KU760858 – KU760861;
4. KU760875 и KU760883, KU760884.

У всех модификаций полипептида Cytb гаплотипов клады В присутствует уникальная замена V303L.

Следует отметить, что фермент Cytb относится к ключевым звеньям метаболизма. Cytb имеет два окислительно-восстановительных центра: Qo связан с внешней поверхностью мембраны митохондрии, Qi – с внутренней. На рис. 5 по-

казано расположение аминокислотных замен в полипептиде Cytb у средних бурозубок долины р. Дукча. Из шести найденных аминокислотных замен по одной приходится на консервативный и гипервариабельный, а четыре – на сайты, промежуточные по частоте аминокислотных замен. Найденные аминокислотные замены в модификациях полипептида FScb2, FScb4, FScb5 (L49F), FScb6 расположены в трансмембранной части фермента. Замена T240M модификации FScb4 локализуется в гипервариабельном, остальные – в промежуточных по вариабельности сайтах. Однако две аминокислотные замены найдены в каталитической Qo части фермента. Транзиция в первой позиции кодона G172A приводит к аминокислотной замене D58N в промежуточном по вариабельности сайте у модификаций FScb3, FScb5 и FScb7. Транзиция в первой позиции кодона G214A обуславливает аминокислотную замену D72N в консервативном по вариабельности участке Qo варианта энзима FScb7 (см. рис. 5).

Несомненно, изменения аминокислотной последовательности этого полипептида сразу же попадают под действие отбора. В генофонде вида могут закрепиться только нейтральные или адаптивные изменения. Для определения функциональной значимости аминокислотных замен проведен комплексный мониторинг всех исследуемых модификаций фермента Cytb.

Рис. 5. Локализация аминокислотных замен в структуре фермента цитохрома b *S. caecutiens* долины р. Дукча

Fig. 5. Localization of amino acid substitutions in the structure of the cytochrome b enzyme in *S. caecutiens* of the Dukcha River valley

TreeSAAP-анализ для всех тестируемых *cytb*-гаплотипов *S. caecutiens* позволил выявить одну аминокислотную замену D58N с $mc = 6$ на высоком уровне значимости лишь для гаплотипов Scb4, Scb14 и Scb21 ($z > 3.09$, $P < 0.001$), что показывает ее радикальный характер. Однако данная замена не имеет кладообразующего характера, что свидетельствует об отсутствии отбора, направленного на ее закрепление. Значения модифицированных дистанций Грэнтсема для выявленных аминокислотных замен позволяют оценить их все как консервативные.

Метод функциональной близости аминокислот разрешает считать замены T240M и V304M радикальными. Однако частота носителей соответствующих вариантов белков в выборке – 0.0976 и 0.0244, число кодирующих их гаплотипов – два и один соответственно. Столь низкие значения могут свидетельствовать о действии стабилизирующего отбора на носителей этих полипептидных вариантов и возможной элиминации их из популяции.

В целом проведенный комплексный анализ функциональной значимости модификаций фермента Cytb свидетельствует о каталитической близости всех форм энзима. Несомненно, что стабилизирующий отбор отсекал все формы полипептида, значительно понижающие функциональную эффективность фермента. Поэтому все проанализированные варианты белка Cytb, по-видимому, близки по каталитическим свойствам к наиболее распространенной у *S. caecutiens* Евразийского континента и функционально оптимальной модификации FScb1.

Биохимическая генетика. У исследованных средних бурозубок выявлено 11 ферментных си-

стем, которые кодируются 13 интерпретационными локусами. При использовании в качестве субстрата α -нафтилацетата для выявления эстераз на гелевом блоке проявляются две зоны активности. У гетерозиготных особей активность менее подвижной формы фермента состоит из четырех зон (что соответствует тримерной четвертичной структуре фермента), а более подвижной – из двух зон (фермент – мономер) (рис. 6). Имеет место полная корреляция генотипов по этим маркерам. При выявлении EST-D (субстрат – 4-метилумбилиферил ацетат) четко проявляется только активность тримерной эстеразы.

Найдено, что локусы LDH-1, LDH-2, IDH-1, IDH-2, SOD, GOT, AK, GLO-I и GPI мономорфны. Частоты основных аллелей в полиморфных маркерах генов – ME, PGD, EST-M, ACP – 0.890–0.984, наблюдаемая гетерозиготность – 0.191–0.032. В локусах ME, EST-M и ACP присутствует по одному альтернативному аллелю, в маркере PGD – два. Наблюдаемые численности генотипов в полиморфных системах соответствуют ожидаемым по распределению Харди – Вайнберга, что свидетельствует о равновесном состоянии популяции. Параметры аллозимной изменчивости выборки средней бурозубки низкие – средняя наблюдаемая гетерозиготность – 0.039, среднее число аллелей на locus – 1.385.

Ряд авторов методами биохимической генетики исследовали различные виды бурозубок (Gebczynski, Jacek, 1980; George, 1986; Heikkila, 1989). В обзоре (Heikkila, 1989) приведены данные по аллозимной изменчивости 14 видов рода *Sorex*, включая *S. caecutiens*. Параметры изменчивости для этого вида, полученные разными исследователями, основаны на изучении выборок от 5

Рис. 6. Активность и схема интерпретации локусов PGD и EST *S. caecutiens*

Fig. 6. Activity and interpretation scheme of the PGD and EST loci in *S. caecutiens*

до 37 экз. по 23–35 локусам. При этом гетерозиготность выборок составляла от 0.02 до 0.054. Эти значения сопоставимы с нашим результатом – 0.039. Выборки других видов рода *Sorex* также имеют близкие значения этого параметра. Так, гетерозиготность для выборок *S. araneus* в 100, 113 и 246 экз., рассчитанная на основании данных по 35, 27 и 23 локусам, составила 0.028, 0.041 и 0.04 соответственно. Как у *S. caecutiens* Северного Приохотья, так и в других популяциях средней бурозубки присутствует полиморфизм эстераз, локусы которых содержат 2–3 аллеля (Heikkilä, 1989). Предыдущими исследованиями в локусах LDH-1, LDH-2 и PGD некоторых выборок средней бурозубки было найдено по два аллеля (Heikkilä, 1989). Изученная нами популяция вида также обладает полиморфным локусом PGD, содержащим два аллельных варианта, но мономорфными маркерами LDH-1 и LDH-2. Таким образом, спектр полиморфных маркеров генов средней бурозубки Северного Приохотья имеет как сходство, так и отличия от других изученных популяций вида.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые проведен комплексный генетический анализ выборки *S. caecutiens macropygmaeus* Северного Приохотья. Получены молекулярно-генетические характеристики популяции, выявлен значительный полиморфизм нуклеотидной последовательности гена *cytb* и определен генетический профиль изученной выборки. Результаты соответствуют литературным данным (Nei, 1987; Hassanin et al., 1998; Nei, Kumar, 2000) о соотношении транзиций и трансверсий и обычном распределении нуклеотидных замен в триплетях.

Для бурозубок характерны высокие темпы размножения. Данная особенность позволяет отбору быстро накапливать витальные мутации. Степень полиморфизма гена *cytb* обусловила достаточно большие значения индексов молекулярного разнообразия (H , π , P_i , V) изученной выборки *S. caecutiens*. Известно, что высокий уровень гаплотипического и нуклеотидного разнообразия может означать стабильность популяции, которая в течение длительного времени имеет высокое значение эффективной численности (Avise, 2000). Достоверно отрицательное значение коэффициента Таджимы D указывает на отсутствие эффекта прохождения популяции через «бутылочное горлышко». Можно сделать вывод, что даже при максимальном падении численности остается достаточное количество животных для поддержания высокого генетического разнообразия в изученной популяции средней бурозубки.

Звездчатая структура медианной сети гаплотипов свидетельствует о монофилетическом происхождении популяции. Наиболее распро-

страненный *Scb1*, по-видимому, является предковым для большинства *cytb*-гаплотипов. Совокупное действие двух эволюционных факторов – высокой мутабельности и стабилизирующего отбора – может обуславливать наблюдаемое у средней бурозубки сопряжение полиморфизма гена *cytb* с конвергенцией полипептидных последовательностей фермента к наиболее распространенной и функционально оптимальной у средней бурозубки модификации энзима.

Низкие значения параметров аллозимной изменчивости изученной популяции *S. caecutiens* Северного Приохотья можно объяснить относительно небольшим спектром исследованных маркеров генов и действием отбора, поддерживающего относительно высокие частоты оптимальных аллелей в большинстве генных локусов. Равновесное состояние исследованных полиморфных систем свидетельствует о достаточном уровне панмиксии при высокой численности популяции. В целом полученные результаты свидетельствуют о благополучном состоянии популяции средней бурозубки в экологических условиях Северного Приохотья и генетической стабильности ее генофонда.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 18-04-00579.

ЛИТЕРАТУРА

- Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика: в 3-х т. М.: Мир, 1988. Т. 3. 336 с.
- Бутвиловский А. В., Барковский Е. В., Бутвиловский В. Э. и др. Основные методы молекулярной эволюции. Мн.: Белпринт, 2009. 216 с.
- Григорьева О. О., Борисов Ю. М., Стахеев В. В. и др. Генетическая структура популяций обыкновенной бурозубки *Sorex araneus* L., 1758 (Mammalia, Lipotyphla) на сплошных и фрагментированных участках ареала // Генетика. 2015. Т. 51, № 6. С. 711–723.
- Докучаев Н. Е. Сравнительный анализ двух подвидовых форм средней бурозубки материковой части Северо-Восточной Азии // Эволюционные и генетические исследования млекопитающих: тез. докл. Всесоюз. совещ. (Владивосток, 22–28 сент. 1990 г.). Владивосток: ДВО АН СССР, 1990а. Ч. 2. С. 80–82.
- Докучаев Н. Е. Экология бурозубок Северо-Восточной Азии. М.: Наука, 1990б. 160 с.
- Жигилева О. Н. Аллозимная изменчивость и генетическая структура популяций мышей *Apodemus agrarius*, *Mus musculus* и *Sylvaemus uralensis* (Rodentia, Muridae) Западной Сибири // Генетика. 2014. Т. 50, № 8. С. 950–958.
- Засыпкин М. Ю., Примаков А. А., Павленко М. В., Докучаев Н. Е. Генетическая гетерогенность полевой мыши (*Apodemus agrarius* Pallas, 1771) Магаданской области и юга Дальнего Востока России по результатам исследования аллозимной изменчивости // Вестник СВНЦ ДВО РАН. 2007. № 2. С. 49–55.
- Засыпкин М. Ю. Камера для электрофореза белков в пластинах полиакриламидного геля // Лабораторное дело. 1983. № 3. С. 58–59.

- Засыпкин М. Ю. Полуавтоматическая система для переноса белковых образцов из центрифуги в электрофоретическую камеру // Там же. 1986. № 2. С. 117–118.
- Картавец Ю. Ф. Молекулярная эволюция и популяционная генетика : учеб. пособие. Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2005. 234 с.
- Малярчук Б. А., Деренко М. В., Денисова Г. А. Изменчивость митохондриального генома росомахи (*Gulo gulo*) // Генетика. 2015. Т. 51, № 11. С. 1291–1296.
- Переверзева В. В., Примак А. А., Докучаев Н. Е. и др. Изменчивость гена цитохрома *b* мтДНК красносерой полевки (*Craseomys rufocanus* Sundevall, 1846) Северного Приохотья и бассейна р. Колыма // Вестник СВНЦ ДВО РАН. 2018. № 1. С. 101–112.
- Переверзева В. В., Павленко М. В. Разнообразие строения гена цитохрома *b* митохондриальной ДНК полевой мыши *Apodemus agrarius* Pallas, 1771 из популяций юга Дальнего Востока России // Известия РАН. Сер. биол. 2014. № 1. С. 5–16.
- Примак А. А., Засыпкин М. Ю. Аллозимная изменчивость и генетическая гетерогенность красной полевки *Clethrionomys rutilus* (Cricetidae) некоторых островов северной части Охотского моря // Вестник СВНЦ ДВО РАН. 2011. № 2. С. 100–105.
- Фрисман Л. В., Картавец И. В., Шереметьева И. Н. и др. Аллозимная дифференциация и кариотипические особенности восточноазиатских полевок Дальнего Востока России // Там же. 2016. № 3. С. 93–103.
- Фрисман Л. В., Картавец И. В., Павленко М. В. и др. Генетическая дифференциация дальневосточных лесных полевок (*Clethrionomys*, **Rodentia**) Приохотского региона // Там же. 2002. Т. 38, № 5. С. 655–664.
- Фрисман Л. В., Картавец И. В., Костенко В. А. и др. Геногеографическая изменчивость и генетическая дифференциация полевок-экономки (*Microtus oeconomus* Pallas, 1776, Cricetidae, Rodentia) Курильских островов // Генетика. 2003. Т. 39, № 10. С. 1363–1372.
- Фрисман Л. В., Коробицына К. В., Картавец И. В. и др. Серые полевки (*Microtus* Schrank, 1798) Дальнего Востока России: аллозимная и кариологическая дивергенция // Там же. 2009. Т. 45, № 6. С. 804–812.
- Юдин Б. С. Насекомоядные млекопитающие Сибири. Новосибирск : Наука, 1989. 360 с.
- Abramson N. I., Petrova T. V., Dokuchaev N. E. et al. Phylogeography of the gray red-backed vole *Craseomys rufocanus* (Rodentia: Cricetidae) across the distribution range inferred from nonrecombining molecular markers // Russian J. Theriol. 2012. Vol. 11, No. 2. P. 137–156.
- Arai S., Kang H. J., Gu S. H. et al. Genetic Diversity of Artybash Virus in the Laxmann's Shrew (*Sorex caecutiens*) // Vector-borne and zoonotic diseases. 2016. Vol. 16, No. 7. P. 468–475.
- Avice J. C. Phylogeography: the history and formation of species. Harvard Univ. Press, 2000. 447 p.
- Bandelt H. J., Forster P., Röhl A. Median-joining networks for inferring intraspecific phylogenies // Mol. Biol. Evol. 1999. Vol. 16. P. 37–48.
- Bannikova A. A., Chernetskaya D. M., Raspopova A. A. et al. Evolutionary history of the genus *Sorex* as inferred from multigene data and molecular clock of major divergence events with the implications for systematics // Zoologica Scripta. 2018. Vol. 47. Iss. 5. P. 518–538.
- Bannikova A. A., Dokuchaev N. E., Yudina E. V. et al. Holarctic phylogeography of the tundra shrew (*Sorex tundrensis*) based on mitochondrial genes // Biological Journal of the Linnean Society. 2010. Vol. 101, No. 3. P. 721–746.
- Boratynski Z., Melo-Ferreira J., Alves P. C. et al. Molecular and ecological signs of mitochondrial adaptation: consequences for introgression? // Heredity. 2014. Vol. 113, No 4. P. 277–286.
- Dąbrowski, M. J., Pomorski J. J., Gliwicz J. Cytochrome *b* gene (*cytb*) sequence diversity in a *Microtus oeconomus* population from Białowieża Primeval Forest // Acta Theriol. 2013. Vol. 58, No. 2. P. 119–126.
- Davis B. J., Ornstein L. A new high resolution electrophoresis method // Report Delivered at the New York Academy of Medicine on March 24, 1959. P. 112–118.
- Demboski J. R., Cook J. A. Phylogenetic diversification within the *Sorex cinereus* group (Soricidae) // Journal of Mammalogy. 2003. Vol. 84, No. 1. P. 144–158.
- Esteve M., Cervantes F. A., Brant S. V., Cook J. A. Molecular phylogeny of long-tailed shrews (genus *Sorex*) from México and Guatemala // Zootaxa. 2010. Vol. 2615. P. 47–65.
- Excoffier L., Laval G., Schneider S. Arlequin ver. 3.0: An integrated software package for population genetics data analysis // Evol. Bioinformatics Online. 2005. Vol. 1. P. 47–50.
- Fleming M. A., Cook J. A. Phylogeography of endemic ermine (*Mustela erminea*) in Southeast Alaska // Mol. Ecol. 2002. Vol. 11. P. 795–807.
- Gebczynski M., Jacek L. Biochemical variation in four species of Insectivora // Acta Theriologica. 1980. Vol. 25, No. 31. P. 385–392.
- George S. B. Evolution and historical biogeography of soricine shrews // Systematic Biology. 1986. Vol. 35, No. 2. P. 153–162.
- Hassanin A., Lecomte G., Tiller S. The “evolutionary signal” of homoplasy in protein-coding gene sequences and its consequences for a priori weighting in phylogeny // C. R. Acad. Sci. 1998. Vol. 321, No. 7. P. 611–620.
- Heikkilä J. Population genetics of north temperate shrews (Soricidae). A review // Ann. Zool. Fennici. 1989. Vol. 26. P. 459–467.
- Hope A. G., Waltari E., Dokuchaev N. E. et al. High-latitude diversification within Eurasian least shrews and Alaska tiny shrews (Soricidae) // J. of Mammalogy. 2010. Vol. 91, No. 5. P. 1041–1057.
- Hope A. G., Waltari E., Fedorov V. B. et al. Persistence and diversification of the Holarctic shrew, *Sorex tundrensis* (Family Soricidae), in response to climate change // Molecular Ecology. 2011. Vol. 20, No. 20. P. 4346–4370.
- Howell N. Evolutionary conservation of protein regions in the proton motive cytochrome *b* and their possible roles in redox catalysis // Jr. Mol. Evol. 1989. Vol. 29. P. 157–169.
- Irwin D. M., Kocher T. D., Wilson A. C. Evolution of the cytochrome *b* gene of mammals // J. Mol. Evol. 1991. Vol. 32. P. 128–144.
- Iwasa M. A., Kartavtseva I. V., Dobrotvorsky A. K. et al. Local differentiation of *Clethrionomys rutilus* in north-eastern Asia inferred from mitochondrial gene sequences // Mamm. Biol. 2002. Vol. 67. P. 157–166.
- Jin Z.-M., Zhu L., Ma J.-Z. Sequencing and analysis of the complete mitochondrial genome of the masked shrew

(*Sorex caecutiens*) from China // Mitochondrial DNA Part B. 2017. Vol. 2, No. 2. P. 486–488.

Kocher T. D., Thomas W. K., Meyer A. et al. Dynamics of mitochondrial DNA evolution in animals: Amplification and sequencing with conserved primers // Proc. Nati. Acad. Sci. USA. 1989. Vol. 86. P. 6196–6200.

Koh H. S., Jang K. H., In S. T. et al. Genetic distinctness of *Sorex caecutiens hallamontanus* (Soricomorpha: Mammalia) from Jeju island in Korea: cytochrome oxidase I and cytochrome b sequence analyses // Anim. Syst. Evol. Divers. 2012. Vol. 28, No. 3. P. 215–219.

Kohli B. A., Fedorov V. B., Waltari E., Cook J. A. Phylogeography of a Holarctic rodent (*Myodes rutilus*): testing high-latitude biogeographical hypotheses and the dynamics of range shifts // J. Biogeogr. 2015. Vol. 42, No. 2. P. 377–389.

Manchenko G. P. Handbook of detection of enzymes on electrophoretic gels : 2nd ed. CRC Press. Inc., Boca Raton, FL, 2003. 553 p.

McClellan D. A., Palfreyman E. J., Smith M. J. et al. Physicochemical evolution and molecular adaptation of the cetacean and artiodactyl cytochrome b proteins // Mol. Biol. Evol. 2005. Vol. 22. P. 437–455.

Nei M., Kumar S. Molecular evolution and phylogenetic. N. Y. : Oxford Univ. Press, 2000. 333 p.

Nei M. Molecular Evolutionary Genetics. N. Y. : Columbia Univ. Press, 1987. 495 p.

Ohdachi S., Dokuchaev N. E., Hasegawa M., Masuda R. Intraspecific phylogeny and geographical variation of six species of northeastern Asiatic *Sorex* shrews based on the mitochondrial cytochrome b sequences // Molecular Ecology. 2001. Vol. 10. P. 2199–2213.

Ohdachi S. D., Yoshizawa K., Hanski I. et al. Intraspecific phylogeny and nucleotide diversity of the least shrews, the *Sorex minutissimus* – *S. yukonicus* complex,

based on nucleotide sequences of the mitochondrial cytochrome b gene and the control region // Mammal Study. 2012. No. 37. P. 281–297.

Ohdachi S. D., Abe H., Oh H. S., Han S. H. Morphological relationships among populations in the *Sorex caecutiens/shinto* group (Eulipotyphla, Soricidae) in East Asia, with a description of a new subspecies from Cheju Island, Korea // Mammalian Biology. 2005. No. 70. P. 345–358.

Ohdachi S. D., Abe H., Han S. H. Phylogenetic positions of *Sorex* sp. (Insectivora, Mammalia) from Cheju Island and *S. caecutiens* from the Korean Peninsula, inferred from mitochondrial cytochrome b gene sequences // Zool. Sci. 2003. Vol. 20. P. 91–95.

Ohdachi S., Masuda R., Abe H. et al. Phylogeny of Eurasian soricine shrews (Insectivora, Mammalia) inferred from the mitochondrial cytochrome b gene sequences // Zool. Sci. 1997. Vol. 14. P. 527–532.

Peacock A. C., Bunting S. L., Queen K. G. Serum protein electrophoresis in acrylamide gel: patterns and theory // Science. 1965. Vol. 147, No. 3664. P. 1451–1453.

Tajima F. Statistical method for testing the neutral mutation hypothesis by DNA polymorphism // Genetics. 1989. Vol. 123, No. 3. P. 585–595.

Tamura K., Stecher G., Peterson D. et al. MEGA-6: Molecular Evolutionary Genetics Analysis version 6.0. // Mol. Biol. Evol. 2013. Vol. 30. P. 2725–2729.

Woolley S., Johnson J., Smith M. J. et al. TreeSAAP: Selection on amino acid properties using phylogenetic trees // Bioinf. Appl. Note. 2003. Vol. 19, No. 5. P. 671–672.

Zaykin D. V., Pudovkin A. I. Two programs to estimate significance of Chi-square values using pseudo-probability test // J. Heredity. 1993. Vol. 84. P. 152–155.

Поступила в редакцию 12.11.2018 г.

Поступила после доработки 27.12.2018 г.

GENETIC VARIABILITY OF THE LAXMANN'S SHREW (*SOREX CAECUTIENS* LAXMANN, 1788) IN THE NORTHERN PRIOKHOTYE

V. V. Pereverzeva, N. E. Dokuchaev, A. A. Primak, S. V. Kiselev

Institute of the Biological Problems of the North, Far-Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Magadan

Genetic variability of the mtDNA cytochrome b polypeptide of mtDNA of the Laxmann's Shrew (*Sorex caecutiens*) in the Northern Priokhotye has been researched for the first time. The studied population is of monophilic origin and belongs to the mitochondrial lineage widespread in Eurasia. A high level of variability of the nucleotide sequence of the gene and the amino acid composition of the cytochrome b polypeptide has been established. The analysis results testify to the effect of stabilizing selection on the structure of this enzyme, while the equilibrium state of the studied polymorphic allozyme systems indicates a high level of panmixia in the population researched. It has been shown that even in the years of low density, the number of the *S. caecutiens* is sufficient to maintain the genetic diversity of the population.

Keywords: Laxmann's Shrew, *Sorex caecutiens*, cytochrome b (*cytb*) gene, modification of cytochrome b enzyme (*Cytb*), allozyme variability, genetic diversity, phylogenetic analysis, Northern Priokhotye.

REFERENCES

- Abramson, N. I.; Petrova, T. V.; Dokuchaev, N. E.; Obolenskaya, E. V.; Lissovsky, A. A., 2012, Phylogeography of the Gray Red-Backed Vole *Craseomys rufocanus* (Rodentia: Cricetidae) across the Distribution Range Inferred from Nonrecombining Molecular Markers, *Russian J. Theriol.*, 11, 2, 137–156.
- Arai, S.; Kang, H. J.; Gu, S. H.; Ohdachi, S. D. et al., 2016, Genetic Diversity of Artybash Virus in the Laxmann's Shrew (*Sorex caecutiens*), *Vector-Borne and Zoonotic Diseases*, 16, 7, 468–475.
- Avice, J. C., 2000, *Phylogeography: the History and Formation of Species*, Harvard Univ. Press.
- Ayala, F. J.; Kiger J. A., 1988, *Modern genetics*, Moscow, Mir, 3 [In Russian].
- Bandelt, H. J.; Forster, P.; Röhl, A., 1999, Median-Joining Networks for Inferring Intraspecific Phylogenies, *Mol. Biol. Evol.*, 16, 37–48.
- Bannikova, A. A.; Chernetskaya, D. M.; Raspopova, A. A.; Alexandrov, D.; Fang, Yun; Dokuchaev, N. E.; Sheftel, B. I.; Lebedev, V. S., 2018, Evolutionary History of the Genus *Sorex* as Inferred from Multigene Data and Molecular Clock of Major Divergence Events with the Implications for Systematics, *Zoologica Scripta*, 47, 5, 518–538.
- Bannikova, A. A.; Dokuchaev, N. E.; Yudina, E. V.; Bobretsov, A. V.; Sheftel, B. I.; Lebedev, V. S., 2010, Holarctic Phylogeography of the Tundra Shrew (*Sorex tundrensis*) Based on Mitochondrial Genes, *Biological Journal of the Linnean Society*, 101, 3, 721–746.
- Boratynski, Z.; Melo-Ferreira, J.; Alves, P. C. et al., 2014, Molecular and Ecological Signs of Mitochondrial Adaptation: Consequences for Introgression?, *Heredity*, 113, 4, 277–286.
- Butvilovsky, A. V.; Barkovsky, E. V.; Butvilovsky, V. E.; Davydov, V. V. et al., 2009, *The Main Methods of Molecular Evolution*, Minsk, Belprint [In Russian].
- Dąbrowski, M. J.; Pomorski, J. J.; Gliwicz J., 2013, Cytochrome *b* Gene (*cytb*) Sequence Diversity in a *Microtus oeconomus* Population from Białowieża Primeval Forest, *Acta Theriol.*, 58, 2, 119–126.
- Davis, B. J.; Ornstein, L., 1959, **A New High Resolution Electrophoresis Method**, Report Delivered at the New York Academy of Medicine on March, 24, 112–118.
- Demboski, J. R.; Cook, J. A., 2003, Phylogenetic Diversification within the *Sorex cinereus* Group (Soricidae), *Journal of Mammalogy*, 84, 1, 144–158.
- Dokuchaev, N. E., 1990a, Comparative Analysis of Two Subspecies of the Laxmann's Shrew in the Continental Part of Northeast Asia, *Evolutionary and Genetic Studies of Mammals*, Abstracts of the All-Union Meeting, Vladivostok, Sept. 22–28, 1990, Vladivostok, FEB AN USSR, 2, 80–82 [In Russian].
- Dokuchaev, N. E., 1990b, *Ecology of Shrews in North-east Asia*, Moscow, Nauka [In Russian].
- Esteva, M.; Cervantes, F. A.; Brant, S. V.; Cook, J. A., 2010, Molecular Phylogeny of Long-Tailed Shrews (Genus *Sorex*) from México and Guatemala, *Zootaxa*, 2615, 47–65.
- Excoffier, L.; Laval, G.; Schneider, S., 2005, Arlequin ver. 3.0: An Integrated Software Package for Population Genetics Data Analysis, *Evol. Bioinformatics Online*, 1, 47–50.
- Fleming, M. A.; Cook, J. A., 2002, Phylogeography of Endemic Ermine (*Mustela erminea*) in Southeast Alaska, *Mol. Ecol.*, 11, 795–807.
- Frisman, L. V.; Kartavtseva, I. V.; Kostenko, V. A.; Sheremetyeva, I. N.; Chernyavskii, F. B., 2003, Gene-Geographic Variation and Genetic Differentiation in the Root Vole *Microtus oeconomus* Pallas, 1776 (Cricetidae, Rodentia) from the Kuril Islands, *Russian Journal of Genetics*, 39, 10, 1152–1160.
- Frisman, L. V.; Kartavtseva, I. V.; Pavlenko, M. V.; Kostenko, V. A.; Suzuki, H.; Iwasa, M.; Nakata, K.; Chernyavskii, F. B., 2002, Gene-Geographic Variation and Genetic Differentiation in the Red-Backed Voles of the Genus *Clethrionomys* (Rodentia, Cricetidae) from the Region of the Sea of Okhotsk, *Ibid.*, 38, 5, 538–547.
- Frisman, L. V.; Kartavtseva, I. V.; Sheremetyeva, I. N.; Pavlenko, M. V.; Korablev, V. P., 2016, Allozyme Differentiation and Karyotypic Features of East Asian Voles in the Russian Far East, *Bulletin of the North-East Science Center*, 3, 93–103 [In Russian].
- Frisman, L. V.; Korobitsyna, K. V.; Kartavtseva, I. V.; Sheremetyeva, I. N.; Vouta, L. L., 2009, Voles (*Microtus* Schrank, 1798) of the Russian Far East: Allozymic and Karyological Divergence, *Russian Journal of Genetics*, 45, 6, 707–714.
- Gebczynski, M.; Jacek, L., 1980, Biochemical Variation in Four Species of Insectivora, *Acta Theriologica*, 25, 31, 385–392.
- George, S. B., 1986, Evolution and Historical Biogeography of Soricine Shrews, *Systematic Biology*, 35, 2, 153–162.
- Grigoryeva, O. O.; Borisov, Y. M.; Stakheev, V. V.; Balakirev, A. E.; Krivonogov, D. M.; Orlov, V. N., 2015, Genetic Structure of the Common Shrew *Sorex araneus* L. 1758 (Mammalia, Lipotyphla) in Continuous and Fragmented Areas, *Russian Journal of Genetics*, 51, 6, 607–618.
- Hassanin, A.; Lecomte, G.; Tiller, S., 1998, The “Evolutionary Signal” of Homoplasy in Protein-Coding Gene Sequences and its Consequences for A Priori Weighting in Phylogeny, *C. R. Acad. Sci.*, 321, 7, 611–620.
- Heikkilä, J., 1989, Population Genetics of North Temperate Shrews (Soricidae), A Review, *Ann. Zool. Fennici*, 26, 459–467.
- Hope, A. G.; Waltari, E.; Dokuchaev, N. E.; Abramov, S.; Dupal, T.; Tsvetkova, A.; Henttonen, H.; MacDonald, S. O.; Cook, J. A., 2010, High-Latitude Diversification within Eurasian Least Shrews and Alaska Tiny Shrews (Soricidae), *J. of Mammalogy*, 91, 5, 1041–1057.
- Hope, A. G.; Waltari, E.; Fedorov, V. B.; Goropashnaya, A. V.; Talbot, S. L.; Cook, J. A., 2011, Persistence and Diversification of the Holarctic Shrew, *Sorex tundrensis* (Family Soricidae), in Response to Climate Change, *Molecular Ecology*, 20, 20, 4346–4370.
- Howell, N., 1989, Evolutionary Conservation of Protein Regions in the Proton Motive Cytochrome *b* and Their Possible Roles in Redox Catalysis, *J. Mol. Evol.*, 29, P. 157–169.
- Irwin D. M.; Kocher T. D.; Wilson A. C., 1991, Evolution of the Cytochrome *b* Gene of Mammals, *Ibid.*, 32, 128–144.

- Iwasa, M. A.; Kartavtseva, I. V.; Dobrotvorsky, A. K. et al., 2002, Local Differentiation of *Clethrionomys rutilus* in Northeastern Asia Inferred from Mitochondrial Gene Sequences, *Mamm. Biol.*, 67, 157–166.
- Jin, Z.-M.; Zhu, L.; Ma, J.-Z., 2017, Sequencing and Analysis of the Complete Mitochondrial Genome of the Masked Shrew (*Sorex caecutiens*) from China, *Mitochondrial DNA*, Part B, 2, 2, 486–488.
- Kartavtsev, Yu. F., 2005, Molecular Evolution and Population Genetics: Tutorial, Vladivostok, DVGU Publishing House [In Russian].
- Kocher, T. D.; Thomas W. K.; Meyer A. et al., 1989, Dynamics of Mitochondrial DNA Evolution in Animals: Amplification and Sequencing with Conserved Primers, *Proc. Nati. Acad. Sci. USA*, 86, 6196–6200.
- Koh, H. S.; Jang, K. H.; In, S. T.; Han, E. D.; Jo, J. E.; Ham, E. J.; Jeong, S. K.; Lee, J. H.; Kim, K. S.; Kweon, G. H., 2012, Genetic Distinctness of *Sorex caecutiens halamontanus* (Soricomorpha: Mammalia) from Jeju Island in Korea: Cytochrome Oxidase I and Cytochrome *b* Sequence Analyses, *Anim. Syst. Evol. Divers.*, 28, 3, 215–219.
- Kohli, B. A.; Fedorov, V. B.; Waltari, E.; Cook, J. A., 2015, Phylogeography of a Holarctic Rodent (*Myodes rutilus*): Testing High-Latitude Biogeographical Hypotheses and the Dynamics of Range Shifts, *J. Biogeogr.*, 42, 2, 377–389.
- Malyarchuk, B. A.; Derenko, M. V.; Denisova, G. A., 2015, Mitochondrial Genome Variability in the Wolverine (*Gulo gulo*), *Russian Journal of Genetics*, 51, 11, 1113–1118.
- Manchenko, G. P., 2003, Handbook of Detection of Enzymes on Electrophoretic Gels: 2nd ed. CRC Press. Inc., Boca Raton, FL.
- McClellan, D. A.; Palfreyman, E. J.; Smith, M. J. et al., 2005, Physicochemical Evolution and Molecular Adaptation of the Cetacean and Artiodactyl Cytochrome *b* Proteins, *Mol. Biol. Evol.*, 22, 437–455.
- Nei, M., 1987, Molecular Evolutionary Genetics, N. Y., Columbia Univ. Press.
- Nei, M.; Kumar, S., 2000, Molecular Evolution and Phylogenetic, N. Y., Oxford Univ. Press.
- Ohdachi, S. D.; Abe, H.; Han, S. H., 2003, Phylogenetic Positions of *Sorex* sp. (Insectivora, Mammalia) from Cheju Island and *S. caecutiens* from the Korean Peninsula, Inferred from Mitochondrial Cytochrome *b* Gene Sequences, *Zool. Sci.*, 20, 91–95.
- Ohdachi, S. D.; Abe, H.; Oh, H. S.; Han, S. H., 2005, Morphological Relationships Among Populations in the *Sorex caecutiens/shinto* Group (Eulipotyphla, Soricidae) in East Asia, with a Description of a New Subspecies from Cheju Island, Korea, *Mammalian Biology*, 70, 345–358.
- Ohdachi, S.; Dokuchaev, N. E.; Hasegawa, M.; Masuda, R., 2001, Intraspecific Phylogeny and Geographical Variation of Six Species of Northeastern Asiatic *Sorex* Shrews Based on the Mitochondrial Cytochrome *b* Sequences, *Molecular Ecology*, 10, 2199–2213.
- Ohdachi, S.; Masuda, R.; Abe, H.; Adachi, J. et al., 1997, Phylogeny of Eurasian Soricine Shrews (Insectivora, Mammalia) Inferred from the Mitochondrial Cytochrome *b* Gene Sequences, *Zool. Sci.*, 14, 527–532.
- Ohdachi, S. D.; Yoshizawa, K.; Hanski, I.; Kawai, K.; Dokuchaev, N. E.; Sheftel, B. I.; Abramov, A. V.; Moroldoev, I.; Kawahara, A., 2012, Intraspecific Phylogeny and Nucleotide Diversity of the Least Shrews, the *Sorex minutissimus*–*S. yukonicus* Complex, Based on Nucleotide Sequences of the Mitochondrial Cytochrome *b* Gene and the Control Region, *Mammal Study*, 37, 281–297.
- Peacock, A. C.; Bunting, S. L.; Queen, K. G., 1965, Serum Protein Electrophoresis in Acrylamide Gel: Patterns and Theory, *Science*, 147, Iss. 3664, 1451–1453.
- Pereverzeva, V. V.; Pavlenko, M. V., 2014, Diversity of the Mitochondrial DNA Cytochrome *b* Gene of the Field Mouse *Apodemus agrarius* Pallas, 1771 in the South of the Russian Far East, *Biology Bulletin*, 41, 1, 1–11.
- Pereverzeva, V. V.; Primak, A. A.; Dokuchaev, N. E.; Dubinin, E. A.; Evdokimova A. A., 2018, Variability of Cytochrome *b* Gene mtDNA of the Grey Red-Backed Vole *Craseomys rufocanus* Sundevall, 1846 from Northern Pryokhotye and Kolyma River Basin, *Bulletin of the North-East Science Center*, 1, 101–112 [In Russian].
- Primak, A. A.; Zasyepkin, M. Yu., 2011, Allozyme Variability and Genetic Heterogeneity of the Red-Backed Vole *Clethrionomys rutilus* (Cricetidae) of Some Islands in the Northern Part of the Sea of Okhotsk, *Ibid.*, 2, 100–105 [In Russian].
- Tajima, F., 1989, Statistical Method for Testing the Neutral Mutation Hypothesis by DNA Polymorphism, *Genetics*, 123, 3, 585–595.
- Tamura, K.; Stecher, G.; Peterson, D. et al., 2013, MEGA-6: Molecular Evolutionary Genetics Analysis Version 6.0., *Mol. Biol. Evol.*, 30, 2725–2729.
- Woolley, S.; Johnson, J.; Smith, M. J. et al., 2003, TreeSAAP: Selection on Amino Acid Properties Using Phylogenetic Trees, *Bioinf. Appl. Note*, 19, 5, 671–672.
- Yudin, B. S., 1989, Insectivorous Mammals of Siberia. Novosibirsk, Nauka, Russia [In Russian].
- Zasyepkin, M. Yu., 1983, The Chamber for Electrophoresis of Proteins in Polyacrylamide Gel Plates, *Laboratornoe Delo*, 3, 58–59 [In Russian].
- Zasyepkin, M. Yu., 1986, Semi-Automatic System for Transferring Protein Samples from a Centrifuge to an Electrophoretic Chamber, *Ibid.*, 2, 117–118 [In Russian].
- Zasyepkin, M. Yu.; Primak, A. A.; Pavlenko, M. V.; Dokuchaev, N. E., 2007, Genetic Heterogeneity in Field Mouse (*Apodemus agrarius* Pallas, 1771) in Magadan-skaya Oblast and in the South of the Russian Far East, as Assessed by the Allozyme Variability Data, *Bulletin of the North-East Science Center*, 2, 49–55 [In Russian].
- Zhigileva, O. N., 2014, Allozyme Variability and the Population Genetic Structure of the Mice *Apodemus agrarius*, *Mus musculus*, and *Sylvaemus uralensis* (Rodentia, Muridae) in Western Siberia, *Russian Journal of Genetics*, 50, 8, 838–845.