**INSTITUTO
NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN
AGROPECUARIA**

URUGUAY

**EL DECAIMIENTO DEL
PERAL EN URUGUAY:
ASPECTOS GENERALES Y
TRABAJOS
EXPERIMENTALES DE INIA
LAS BRUJAS**

Julio, 2020

**SERIE
TÉCNICA**

255

INIA

EL DECAIMIENTO DEL PERAL EN URUGUAY: ASPECTOS GENERALES Y TRABAJOS EXPERIMENTALES DE INIA LAS BRUJAS

Autor: Diego C. Maeso Tozzi¹

¹Ing. Agr. (M.Sc.) Programa Nacional de Investigación Producción Frutícola (INIA Las Brujas).

Título: EL DECAIMIENTO DEL PERAL EN URUGUAY: ASPECTOS GENERALES Y TRABAJOS EXPERIMENTALES DE INIA LAS BRUJAS

Autor: Diego C. Maeso Tozzi

Serie Técnica N° 255

© 2020, INIA

doi: <http://doi.org/10.35676/INIA/ST.255>

e-ISBN 978-9974-38-445-3

Editado por la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología del INIA
Avda. Italia 6201, Edificio Los Guayabos, Parque Tecnológico del LATU,
Montevideo - Uruguay
<http://www.inia.uy>

Quedan reservados todos los derechos de la presente edición. Esta publicación no se podrá reproducir total o parcialmente sin expreso consentimiento del INIA.

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

Integración de la Junta Directiva

Ing. Agr. José Bónica - Presidente

Ing. Agr. Walter Baethgen - Vicepresidente

**Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca**

Ing. Agr. Rafael Secco

Ing. Agr. Martín Gortari

Ing. Agr. Alberto Bozzo

Ing. Agr. Alejandro Henry

CONTENIDO

	Página
INTRODUCCIÓN	1
PARTE I: EL DECAIMIENTO DEL PERAL	2
Importancia y distribución mundial	2
Agente causal	2
Detección	3
Síntomas	6
Susceptibilidad de diversas especies, portainjertos y cultivares	15
Aspectos que inciden sobre la evolución y magnitud de los síntomas	16
Transmisión	16
Manejo	19
PARTE II: TRABAJOS EXPERIMENTALES DE INIA	23
Presencia de decaimiento y ' <i>Candidatus Phytoplasma pyri</i> ' en plantas de peral en Uruguay	23
Relevamiento preliminar	23
Ajuste del diagnóstico molecular	25
Seguimiento de la infección en plantas con diferentes combinaciones de cultivar, portainjerto y filtro	28
Evaluación de síntomas atribuibles al decaimiento del peral	29
Detección de fitoplasmas	34
Relación entre la detección de fitoplasmas y cultivares, portainjertos y/o filtros ...	36
Relación entre detección de fitoplasmas y síntomas	36
Estudios vinculados al vector	37
Presencia de síntomas y relación con la detección de fitoplasmas en plantas con diferente grado de ataque de psila	38
Detección molecular en psilas colectadas en montes de pera	40
Influencia de los tratamientos otoñales para el control de psila en la transmisión de CPP y presencia de la enfermedad	42
PARTE III: CONSIDERACIONES FINALES	46
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA	47

ÍNDICE DE FIGURAS

	Página
Figura 1. Distribución geográfica de ' <i>Candidatus Phytoplasma pyri</i> ' agente causal del decaimiento del peral	2
Figura 2. Fitoplasmas en floema de arándano (' <i>Candidatus Phytoplasma asteris</i> ') observados al microscopio electrónico	3
Figura 3. Presencia de fitoplasmas en floema de pera de Uruguay puestos en evidencia mediante la tinción DAPI	4
Figura 4. Decaimiento rápido en plantas del cultivar 'Williams' sobre <i>P. communis</i> cultivar 'Kirchensalle'	5
Figura 5. Curvado de hojas típico de decaimiento del peral. Lámina curvada sobre la nervadura central hacia abajo y bordes plegados hacia arriba	6
Figura 6. Enrojecimiento en el cultivar 'Williams'	7
Figura 7. Enrojecimiento en el cultivar 'Abate Fetel'	8
Figura 8. Enrojecimiento de follaje en el cultivar 'Kaiser'	9
Figura 9. Enrojecimiento en el cultivar 'Beurre Hardy'	10
Figura 10. Amarillamiento-enrojecimiento de follaje en el cultivar 'Conference'	11
Figura 11. Caída anticipada de follaje en el cultivar 'Doyenne du Comice'	12
Figura 12. Defoliación severa y muerte de plantas en otoño (cultivar 'Abate Fetel'/membrillero BA29)	12
Figura 13. Engrosamiento de nervaduras en hojas de pera asiática 'Nashi' (<i>P. serotina</i>)	13
Figura 14. Brotación irregular en primavera en plantas afectadas con decaimiento en el otoño anterior	13
Figura 15. Necrosis de vasos del portainjerto en zona de injerto. Planta del cultivar 'Abate Fetel' injertada sobre membrillero Adams	14
Figura 16. Formas de <i>Cacopsylla bidens</i> : adulto forma invernal, ninfa, forma de verano	18
Figura 17. Producción de mielecilla y posterior desarrollo de fumagina	18
Figura 18. Montes de nueve años de pera 'Abate Fetel' auto radicados sin síntomas de decaimiento, con control de vigor por poda de raíces, Bolonia, Italia	19
Figura 19. Reemplazo de plantas afectadas en monte de 'Abate Fetel'/membrillero BA 29, reemplazo al lado de planta enferma	20
Figura 20. Productos de la amplificación de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (f01/r01 primers) de muestras colectadas de montes de perales de Uruguay (línea 1 planta de pera italiana con decaimiento del peral, 2-6 muestras de pera de Uruguay con observación de fitoplasmas con tinción DAPI, líneas 7-9 muestras uruguayas sin observación de fitoplasmas con tinción DAPI, MADN marcador	24

	Página
Figura 21. Porcentaje de detección de fitoplasmas en un total de 27 muestras analizadas (nueve para cada uno de los tejidos comparados, floema de tallo, nervadura y raíz, en tres momentos diciembre 2006, marzo y junio 2007)	27
Figura 22. Electroforesis en gel de agarosa 1.5% en TAE 0,5X de los productos de la amplificación por PCR obtenida con los primeros f01 y r01. Foto L. González, M. Silvera	27
Figura 23. Electroforesis en gel de agarosa 2,5% en TAE 0.5X, restricción con RsA I. En el gel se observan en la línea 2 dos bandas correspondientes a la digestión ...	28
Figura 24. Vista general y detalle de algunas parcelas del experimento de combinaciones de cultivares/filtros/portainjertos. Temporada 2009	29
Figura 25. Detalle de síntomas en plantas del cultivar 'Abate Fetel' en algunas combinaciones. Otoño 2005	34
Figura 26. Evolución del porcentaje de detección de fitoplasmas en otoño mediante PCR en floema de base de ramas de dos años en plantas del ensayo de cultivares/portainjertos de peral. Referido sobre un total anual de 80 muestras. Período 2007-2010	35
Figura 27. Frecuencia de la detección de fitoplasmas en 27 plantas del experimento en el período 2007-2010	35
Figura 28. Vista general de las plantas de 'Williams'/membrillero afrancadas pertenecientes al ensayo de control de psila utilizadas en el estudio	38
Figura 29. Plantas con y sin síntomas del experimento sobre control de psila analizadas por infección de fitoplasmas, monte de 'Williams'/membrillero afrancado	39
Figura 30. Bandas correspondientes a fragmentos amplificados por PCR en grupos de individuos de <i>C. bidens</i>	41
Figura 31. Detección de fitoplasmas en psila en el período junio 2009-abril 2011 Los insectos fueron colectados y luego analizados en grupos de cinco individuos	41
Figura 32. Número de adultos de <i>C. bidens</i> por día (número de adultos en trampa dividido número de días en que la trampa estuvo expuesta) promedio de seis trampas pegajosas. Otoños 2013 y 2014	42
Figura 33. Detección de fitoplasmas en plantas de peral correspondientes a los tratamientos evaluados en muestras extraídas en tres fechas por temporada: otoño 2013 (arriba), otoño 2014 (abajo)	44
Figura 34. Frecuencia de detección de fitoplasmas durante la temporada (en porcentaje)	44
Figura 35. Detección de fitoplasmas por PCR en grupos de 5-10 insectos adultos colectados en el experimento	45

ÍNDICE DE CUADROS

	Página
Cuadro 1. Detección de fitoplasmas mediante tinción DAPI de floema tomado de plantas de peral de INIA Las Brujas y Melilla, abril 1995	24
Cuadro 2. Asociación entre la detección de fitoplasmas mediante tinción DAPI y algunos parámetros relevados en 1995	25
Cuadro 3. Detección de fitoplasmas en peral mediante PCR, ADN extraído mediante protocolo de Marzachi <i>et. al.</i> (1999). Influencia de tejido y momento de la toma de muestra	26
Cuadro 4. Combinaciones de cultivares-portainjertos y filtros incluidas en el experimento	28
Cuadro 5. Análisis del promedio de los resultados de las evaluaciones de epinastia en el período 2005 - 2011	30
Cuadro 6. Análisis del promedio de los resultados de las evaluaciones de enrojecimiento en el período 2005 - 2011	31
Cuadro 7. Análisis del promedio de los resultados de las evaluaciones de defoliación del período 2005 - 2011	32
Cuadro 8. Severidad de síntomas atribuibles al decaimiento del peral, promedio de tres evaluaciones y de las temporadas 2005 - 2011 para diferentes combinaciones de variedades/portainjertos	33
Cuadro 9. Detección de fitoplasmas por PCR en cada cultivar en el período 2007 - 2010 (en porcentaje)	36
Cuadro 10. Detección de fitoplasmas por PCR según portainjerto en el período 2007 - 2010 (en porcentaje)	36
Cuadro 11. Temporadas en las que se encontró relación estadísticamente significativa entre detección de fitoplasmas y presencia de síntomas en determinados cultivares y portainjertos	37
Cuadro 12. Detección de fitoplasmas y presencia de síntomas en experimento de control de psila	40
Cuadro 13. Número de adultos, ninfas y formación de mielecilla de <i>C. bidens</i> a final del ensayo, temporadas 2013 y 2014	43
Cuadro 14. Intensidad de enrojecimiento de follaje en febrero 2013 y 2014	43

PRÓLOGO

La presente publicación tiene como objetivo brindar información acerca de una importante enfermedad que afecta al cultivo del peral y que, desde hace algunos años ha sido detectada en nuestro país.

En una primera parte se realizará una descripción apoyada en referencias bibliográficas a nivel mundial, de forma que el lector cuente con información científica actualizada y de primer nivel, para luego presentar los avances logrados por nuestro grupo de trabajo durante los años 1995 a 2014.

El decaimiento del peral probablemente haya estado entre nosotros desde hace mucho tiempo, pero, es en estos últimos años que cobró importancia debido a algunos cambios introducidos en el cultivo y a la relevancia que ha cobrado su vector, la psila.

Nuestro interés inicial en esta enfermedad surgió a raíz de una ambiciosa iniciativa de INIA, a poco de su creación, que buscaba la producción de material de propagación de frutales de hoja caduca, incluyendo peral, libre de enfermedades, a través del cultivo de tejidos.

Así fue que se desarrollaron trabajos de investigación tendientes a determinar los principales problemas sanitarios transmisibles por vía propagativa en esos rubros, ajustar su diagnóstico, valorar la importancia relativa y conocer su epidemiología en nuestro medio. Entre ellos, se definió que el decaimiento del peral fuera uno de los priorizados para ese cultivo y, como veremos luego, los hechos posteriores confirmaron lo acertado de esa decisión.

Muchos colegas y estudiantes han participado y realizado valiosas contribuciones en los casi 20 años de trabajo en esta línea. Seguramente me olvide nombrar algunos, a los que pedimos disculpas desde ya, pero entre ellos debemos mencionar a las Lic. Anabel Martínez, y María T. Federici, a los Ing. Agr. Danilo Cabrera, Saturnino Núñez, Valentina Mujica, Diana Valle y Carolina Leoni, y a las Sras. Wilma Walasek, Lucía Goncálvez y Mariana Silvera.

Una mención especial es para la invalorable y desinteresada colaboración y guía del Dr. Luciano Giunchedi de la Università de Bologna a quien agradecemos profundamente y dedicamos esta publicación.

Finalmente el agradecimiento a los diferentes directores del Programa de Investigación en Producción Frutícola quienes priorizaron y apoyaron a esta línea de investigación incluyéndola en los distintos planes estratégicos del período.

INTRODUCCIÓN

El cultivo de la pera en Uruguay actualmente abarca 767 hectáreas, con una producción total cercana a las 5000 toneladas. Es realizado por 306 productores, fundamentalmente en la zona sur del país en los departamentos de Canelones y Montevideo. La producción es destinada en su mayor parte al consumo en fresco por el mercado interno, con un pequeño volumen de fruta exportada fundamentalmente a Brasil y Europa (256 toneladas).

Tradicionalmente, los montes uruguayos están compuestos en su mayoría por plantas del cultivar 'Williams' inicialmente injertadas sobre membrillero 'D'Angers' y luego afrancadas para superar la falta de afinidad. Los principales cultivares son 'Williams' (70%), 'Packahm's' (11%) y 'Abate Fetel' (15%) (MGAP-DIEA, 2016).

En los últimos años se ha registrado una importante disminución en el área e importantes cambios en el sistema de cultivo. Se han reemplazado plantaciones tradicionales por sistemas de alta densidad utilizando portainjertos de membrillero u otros que permiten lograr precocidad y limitar el vigor de la planta (Cabrera *et al.*, 2007).

Otro cambio introducido ha sido la disminución del uso de insecticidas en el cultivo, primero, limitando o eliminando algunos de

ellos (fosforados, dinitro orto cresol), y luego, a través de la implementación de un programa de manejo regional para los principales lepidópteros plaga basado en el uso de feromonas (Núñez y Scatoni, 2013; Zoppolo *et al.*, 2016). Este proceso que logra disminuir el impacto ambiental de los cultivos colateralmente ha posibilitado el aumento de plagas secundarias, entre ellas la psila del peral, la cual, a pesar de haber sido reportada en nuestro país desde 1942, recién aumentó su nivel de daño y adelantó su aparición en la temporada en los últimos años (Núñez y Paullier, 1991; Núñez y Scatoni, 2013; Mujica *et al.*, 2014).

Asociado a lo anterior ha sido frecuente observar desórdenes y muerte de plantas de peral con síntomas similares a los atribuidos a la enfermedad denominada decaimiento del peral. En muchos casos se comprobó su vinculación con la detección de fitoplasmas en el floema de las plantas afectadas, lo cual sumado a los dos factores de predisposición descritos (combinaciones cultivar/portainjertos y vector) nos enfatiza la relevancia de este problema sanitario y la necesidad de que sea considerado al tomar decisiones productivas para este cultivo, así como de obtener información experimental local, como la que se presenta en esta publicación.

PARTE I:

EL DECAIMIENTO DEL PERAL

IMPORTANCIA Y DISTRIBUCIÓN MUNDIAL

El decaimiento del peral, «pear decline» o «moria», es una enfermedad que afecta al cultivo en casi todas las zonas productoras del mundo. Es mencionado por primera vez en 1908 en el norte de Italia distribuyéndose posteriormente al resto de Europa fundamentalmente a España, Francia e Inglaterra (Nemeth, 1986; Avinent *et al.*, 1997; Giunchedi, 2003; García-Chapa, 2003). En Norteamérica se lo describe en 1948 (McLarty, 1948) en la Costa Oeste de Canadá (Hunter *et al.*, 2010) y de EE. UU. derivado de su introducción en portainjertos y del vector desde Europa. Desde allí alcanzó la Costa Este en los años 70 donde hizo estragos debido a la sensibilidad de los materiales utilizados (Seemüller, 1989). En África se le ha descrito en Túnez (Ben Khalifa *et al.*, 2007) y Libia (Aburkhes *et al.*, 1991) y en Asia en Irán (Salehi *et al.*, 2008), Turquía

(Sertkaya *et al.*, 2005) y el Líbano (Choueiri *et al.*, 2007).

En Sudamérica se reportó en Chile (Falcundo *et al.*, 2017), Argentina (Fernández y Conci, 2019) y Uruguay (Maeso *et al.*, 2012; Quiroga *et al.*, 2018). Una enfermedad de características similares inicialmente descrita en Australia y Taiwán posteriormente se demostró que es causada por otro patógeno: '*Candidatus Phytoplasma aurantifolia*'-related strains (Schneider y Gibbs, 1997; Liu *et al.*, 2007; Liu *et al.*, 2011).

Se puede decir que en estos momentos está presente en muchas de las áreas donde se realiza el cultivo (Figura 1).

AGENTE CAUSAL

El agente causal de esta enfermedad es un fitoplasma ('*Candidatus phytoplasma pyri*'), organismo relacionado con las bacterias gram positivas (Eubacteria- Clase

2

Figura 1. Distribución geográfica de '*Candidatus Phytoplasma pyri*' agente causal del decaimiento del peral. Extraído de <https://gd.eppo.int/taxon/PHYPPY/distribution>.

Mollicute). No posee pared celular por lo que adopta diferentes formas (pleomorfo) y habita en el floema de las plantas afectadas. '*Candidatus Phytoplasma pyri*' pertenece al subgrupo 16SrX-C del grupo de la proliferación del manzano, «apple proliferation, AP» (Lee *et al.*, 2000; Seemüller y Schneider, 2004).

DETECCIÓN

La forma de detección de fitoplasmas en tejidos vegetales ha evolucionado mucho en los últimos años. En un comienzo, simplemente se confirmaba su naturaleza infecciosa mediante la transmisión por injerto a huéspedes sensibles (*Pyrus communis* 'Doyenne du Comice' o *Pyronia veitchii*, EPPO/OEPP, 1999; Schneider, 1977).

Al conocerse el tipo de agente causal involucrado (en esos momentos conocidos como «MLOs-mycoplasmalike organisms»), se comenzó a utilizar la observación en cor-

tes ultrafinos de floema al microscopio electrónico (Figura 2) y en cortes histológicos bajo microscopio de fluorescencia mediante la tinción con DAPI (42 6 diamidino-2-phenylindole), por la cual los fitoplasmas en el floema toman una coloración azul fluorescente (Figura 3, Seemüller, 1976). Este procedimiento, a pesar de ser rápido y poco costoso, requiere de personal entrenado y posee cierto grado de subjetividad.

Muchos otros métodos de detección fueron evaluados posteriormente, pero recién con el desarrollo de las técnicas moleculares, específicamente la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), se logró disponer de métodos sensibles y específicos para la determinación de fitoplasmas y específicamente de '*Candidatus phytoplasma pyri*'. Existen numerosos reportes en el tema, simplemente mencionaremos que este método de diagnóstico/identificación consta de por lo menos cuatro etapas: toma de muestra, extracción de ADN, reacción de PCR,

Figura 2. Fitoplasmas en floema de arándano ('*Candidatus Phytoplasma asteris*') observados al microscopio electrónico. Foto Diego Maeso.

observación e interpretación de los resultados, y que, su éxito depende de ciertos detalles que deben ser tomados en cuenta.

Un aspecto muy relevante es el momento y forma de realizar el muestreo. Como veremos más adelante, la distribución del patógeno en la planta durante la estación es muy irregular, varía en los diferentes tejidos y depende mucho de los genotipos vegetales (Schörder, 2019). En general se recomienda tomar las muestras de tallos a fin de verano-comienzos de otoño, previo a la entrada en receso. En esos momentos la concentración del patógeno es más alta en la parte aérea. En el floema de la raíz la detección es efectiva durante todo el año, sin embargo, este no es un procedimiento muy práctico (Seemüller *et al.*, 1984). El avance de las técnicas utilizadas actualmente permite la detección en tallos desde comienzo

de invierno hasta primavera, principalmente en climas con inviernos no muy rigurosos y genotipos en los que permanece tejido floemático activo (García-Chapa, 2003b; Schörder, 2019).

El siguiente paso consiste en la extracción y enriquecimiento del ADN del fitoplasma, dado que la cantidad de ADN fitoplasmático es menor al 1% de la del huésped (Bertaccini, 2007). Esta se realiza en general siguiendo la metodología reportada por Ahrens y Seemüller (1992). Se han reportado varios métodos, kits comerciales y formas de extracción para facilitar este paso (Green *et al.*, 1999; Kummert y Rufflard, 1997), sin embargo, en nuestros trabajos los mejores resultados los hemos obtenido al utilizar la metodología mencionada por Marzachi *et al.*, 1999 modificada (Giunchedi com. pers.).

Figura 3. Corte transversal de floema de pera de Uruguay donde se evidencia la presencia de fitoplasmas (flechas) mediante la técnica de tinción DAPI. Foto L. Giunchedi.

Determinadas secuencias del patógeno pertenecientes al ADN ribosomal 16S y a la región inter génica 16S-23S, son amplificadas mediante el uso de primers específicos (Smart *et al.*, 1996), las que luego son visualizadas en geles de poliacrilamida como bandas de cierto tamaño acorde con la región amplificada. Existen diferencias en cuanto a las técnicas reportadas y a los primers utilizados. Algunas realizan solo una PCR con primers universales para todos los fitoplasmas (Lorenz *et al.*, 1995; Lee *et al.*, 1998) y luego cortan su producto con enzimas de restricción cuyos patrones permiten diferenciar a los fitoplasmas en grupos (Seemüller *et al.*, 1998). En otras, ese producto es sometido a otra PCR («anida-

da») utilizando un segundo par de primers, que permiten ser más específico y aumentar la sensibilidad de la detección (Deng y Hiruki, 1991; Scheneider *et al.*, 1995). Más recientemente se han desarrollado técnicas más avanzadas como de PCR en tiempo real y otras variantes que han aumentado la sensibilidad, especificidad y rapidez (Babini *et al.*, 2008; Aldaghi *et al.*, 2009; Nikolik *et al.*, 2010; Hodgetts *et al.*, 2009; Schröder, 2019).

Los métodos de detección aceptados para este patógeno por organizaciones sanitarias internacionales pueden ser consultados en EPPO (2006) y EUPHRESO (2011).

Figura 4. Decaimiento rápido en plantas del cultivar ‘Williams’ sobre *P. communis* cultivar ‘Kirchensallen’. Foto L. Giunchedi.

SÍNTOMAS

Como su nombre lo indica, la enfermedad provoca un decaimiento general de la planta cuya severidad y características depende de varios factores. Se describen dos tipos de decaimiento: rápido y lento.

El decaimiento rápido se produce en aquellos árboles injertados sobre portainjertos susceptibles (perales silvestres orientales, *Pyrus ussuriensis* y *P. serotina* o algunos tipos de *Pyrus communis*). En ese caso, las plantas en el verano o comienzo del otoño se marchitan rápidamente, se se-

can y su follaje se oscurece muriendo en cuestión de semanas o días.

En el decaimiento lento, también hacia fin de verano-principio de otoño, se observan tres tipos de síntomas: curvado, enrojecimiento y caída prematura del follaje.

En el curvado, las hojas se pliegan hacia abajo por su nervadura principal, mientras que sus bordes lo hacen hacia arriba (Figura 5). A medida que avanza la estación, las hojas toman coloración rojiza, la cual es diferente según los cultivares. A modo de ejemplo, la coloración en 'Williams' es púrpura brillante (Figura 6), en 'Abate Fetel', rojo-

Figura 5. Curvado de hojas típico de decaimiento del peral. Lámina curvada sobre la nervadura central hacia abajo y bordes plegados hacia arriba. Fotos D. Maeso.

Figura 6. Enrojecimiento en el cultivar 'Williams'. Fotos L. Giunchedi y D. Maeso.

vino (Figura 7), en 'Kaiser', rojo muy oscuro (Figura 8), mientras que, en otras, el follaje se enrojece parcialmente ('Beurre Hardy', Figura 9), no se enrojece sino que se vuelve amarillo ('Conference', Figura 10) o, directamente se cae ('Doyenne du Comice', Figura 11). En todos los casos, se produce una variación en la consistencia de las hojas, las

cuales se vuelven coriáceas o papiráceas perdiendo su natural flexibilidad.

Estos síntomas, dependiendo de la intensidad del ataque y el estado de la planta pueden ser seguidos de la caída prematura del follaje, independientemente del cultivar (Figuras 11 y 12).

Figura 7. Enrojecimiento en el cultivar 'Abate Fetel'. Fotos L. Giunchedi y D. Maeso.

Figura 8. Enrojecimiento de follaje en el cultivar 'Kaiser'. Fotos L. Giunchedi.

Figura 9. Enrojecimiento en el cultivar 'Beurre Hardy'. Fotos L. Giunchedi.

Figura 10. Amarillamiento-enrojecimiento de follaje en el cultivar 'Conference'. Fotos L. Giunchedi.

Figura 11. Caída anticipada de follaje en el cultivar 'Doyenne du Comice'. Foto L. Giunchedi.

Figura 12. Defoliación severa y muerte de plantas en otoño (cultivar 'Abate Fetel'/membrillero BA29). Foto D. Maeso.

Figura 13. Engrosamiento de nervaduras en hojas de pera asiática 'Nashi' (*P. serotina*). Fotos D. Maeso.

En los cultivares de pera asiática se observa necrosis y engrosamiento de las nervaduras (Figura 13) y, como se explicó, cuando son utilizadas como portainjertos se produce el decaimiento rápido.

A raíz de los perjuicios ocasionados en otoño se van generando problemas en la brotación y floración de las temporadas siguientes, las cuales son más débiles, las

hojas más pequeñas y se produce muerte de flores. En algunos países lo llaman «follaje transparente» y puede llegar incluso a la muerte del árbol (Figura 14). Síntomas similares se han visto en nuestro país, pero no han podido ser asociados totalmente con esta enfermedad y, seguramente se deban a un cúmulo de causas.

Figura 14. Brotación irregular en primavera en plantas afectadas con decaimiento en el otoño anterior. Fotos: D. Maeso y L. Giunchedi.

Para comprender la variación en síntomas se debe tener en cuenta que estos son el efecto de la acumulación de savia elaborada en la parte aérea. Esta acumulación se debe a alteraciones en el floema que implican una reducción en la circulación de la savia y que pueden ser consecuencia y estar influenciados por otras causas como la falta de afinidad copa-portainjerto (Doyle *et al.*, 1970).

Plantas de determinadas combinaciones pueden estar infectadas, pero no mostrar

síntomas externos porque no se altera el transporte de savia. Por eso es casi imposible, ante una planta aislada, determinar la causa sin efectuar un análisis de laboratorio y sin considerar al resto de otros factores que intervienen en conjunto.

Al descubrir la zona de injerto de plantas con los síntomas descritos se observa una línea oscura en el floema del portainjerto evidencia del bloqueo del pasaje de carbohidratos que causa la muerte de raíces (Figura 15).

Figura 15. Necrosis de vasos del portainjerto en zona de injerto. Planta del cultivar 'Abate Fetel' injertada sobre membrillero Adams. Fotos D. Maeso.

La expresión de los síntomas también es influenciada por el clima, siempre asociado con la fisiología de la planta que determina el comportamiento del floema tanto en el portainjerto como en la copa (Schneider, 1970).

Es por eso que, excepto bajo determinadas condiciones (portainjertos orientales), el impacto de la enfermedad en la vida de una planta está supeditado a la intensidad y la reiteración de los síntomas de decaimiento lento en el tiempo, lo cual es muy dependiente de la interacción genotipo-ambiente-patógeno (García-Chapa *et al.*, 2003).

SUSCEPTIBILIDAD DE DIVERSAS ESPECIES, PORTAINJERTOS Y CULTIVARES

Estudios realizados antes de conocer la naturaleza de la enfermedad, ya indicaban la presencia de un agente transmisible a plantas de peral injertadas sobre varios pies (semilla de *P. communis*, membrillero, pies orientales, etc.), presente tanto en plantas vigorosas como poco vigorosas poniendo en evidencia la diferente susceptibilidad a la infección (Doyle *et al.*, 1970).

Evaluaciones sobre plantines han reportado la resistencia de varias especies del género *Pyrus* (*P. betulifolia*, *P. elaeagnifolia*, *P. nivalis*, *P. pashia*, *P. syriaca*, *P. communis*, Westwood y Lombard 1982), *P. calleryana*, *P. betulifolia* (Seemüller *et al.*, 1998a) y de portainjertos clonales de membrilleros Quince A y C (*Cydonia oblonga*) (Westwood y Lombard, 1982; Poggi Pollini *et al.*, 1995).

También se señala la susceptibilidad de plantines de *P. pyrifolia*, *P. ussuriensis*, *P. amygdaliformis*, *P. caucasica*, *P. cordata*, *P. fauriei* y diferencias entre fuentes de *P. communis* (Seemüller *et al.*, 1998a).

Entre los portainjertos clonales derivados del cruzamiento de los cultivares de *P. communis* Old Home × Farmingdale (OH×F), se citan a OH×F87 como resistente y a OH×F69 como más susceptible (Seemüller *et al.*, 1998a).

Independientemente de los portainjertos, se señalan a los cultivares de *P. communis* 'Kaiser', 'Abate Fetel' y 'Conference' como los menos afectados, 'Bartlett' moderadamente, y a 'Comice' como el más afectado en cuanto a la severidad de síntomas foliares (Giunchedi *et al.*, 1995).

En plantas injertadas, se encontraron diferencias entre membrilleros como portainjertos de los cultivares 'Bartlett', 'Abate Fetel', 'Kaiser', 'Comice' y 'Conference'. Los árboles injertados sobre Membrillero A y Membrillero C presentaron síntomas más severos que aquellos sobre Membrillero BA29 y Membrillero CTS212 (Giunchedi *et al.*, 1995). Se piensa que las diferencias en la severidad de los síntomas se deben a la concentración de fitoplasmas que permiten en sus raíces (Bisognin *et al.*, 2008; Seemüller *et al.*, 2009).

Durante la epidemia entre 1950 y los años 60 en la Costa Oeste de Norteamérica con cultivares franceses, los síntomas más fuertes se observaron en plantas sobre portainjertos orientales de *P. pyrifolia* (syn. *P. serotina*) y *P. ussuriensis*, mientras que las plantas injertadas sobre *P. calleryana*, *P. betulifolia* y *P. communis* cv. 'Bartlett' y algunos portainjertos clonales de la serie OH×F presentaron síntomas moderados (Blodgett *et al.*, 1962; Westwood *et al.*, 1971). También se menciona la susceptibilidad de algunos portainjertos de semilla de *P. communis* (Westwood *et al.*, 1976; Westwood y Lombard, 1982; Seemüller *et al.*, 1986), lo cual coincide con lo encontrado en trabajos con plantines sin injertar.

En los portainjertos orientales se observó deposición de callosa, necrosis de floema, acumulación de almidón encima de la unión del injerto y falta de este debajo de esa línea lo cual se señala como una respuesta típica de portainjertos susceptibles (Blodgett *et al.*, 1962; Westwood *et al.*, 1971). Por lo anterior se concluye que esta enfermedad ocasiona problemas en la traslocación de carbohidratos desde la parte aérea a la raíz lo cual deriva en el decaimiento de los árboles (Batjer y Schneider, 1960; Blodgett *et al.*, 1962).

Como los fitoplasmas dependen de vasos de floema intactos, la degeneración del floema en la parte aérea durante el invierno disminuye su población y pasan a sobrevivir en las raíces donde existen vasos funcionales durante todo el año. Desde allí pueden recolonizar la parte aérea la primavera siguiente dependiendo del portainjerto (Schaper y Seemüller, 1982; Seemüller *et al.*, 1984).

ASPECTOS QUE INCIDEN SOBRE LA EVOLUCIÓN Y MAGNITUD DE LOS SÍNTOMAS

En condiciones de campo el vigor de la combinación cultivar-portainjerto es lo más importante en determinar la magnitud de los síntomas, incluso más que la sensibilidad de un portainjerto. Por esa razón portainjertos moderadamente resistentes a la colonización por fitoplasmas pero que generan plantas poco vigorosas, como los membrilleros, son los que evidencian los síntomas acentuados. Mientras que portainjertos sensibles que permiten la propagación de fitoplasmas, pero que resultan en plantas más vigorosas, como los francos de *Pyrus communis*, son los que evidencian síntomas leves.

Los efectos de los ataques producidos en los primeros años de vida (los primeros 5-6 años) son en general, como ocurre con otras enfermedades de este tipo, mucho más drásticos. Cuando las plantas se infectan en etapas más avanzadas, normalmente manifiestan síntomas otoñales leves, pero rara vez síntomas fuertes primaverales, salvo en aquellas combinaciones muy susceptibles.

La evolución de una planta afectada es diferente, como vimos, según el portainjerto sobre el cual está. Los árboles injertados sobre franco pueden presentar desarrollo reducido, enrojecimiento precoz de las hojas, escaso cuajado de flores, y reducción del tamaño de frutos. Sin embargo, cuando el portainjerto es membrillero, el cuadro sintomatológico puede evolucionar de dos

maneras según sea la reinfestación con psila y su vigor. Cuando la combinación es de vigor reducido y la planta está sujeta a ataques frecuentes de psila, el decaimiento lento lleva a la progresiva reducción de la actividad vegetativa con la eventual muerte del vegetal en 3-4 años. Cuando las plantas no están sujetas a ataques reiterados de psila, los síntomas permanecen 1-2 años y luego mejoran hasta volver a la normalidad.

El ciclo del patógeno dentro de la planta es diferente dependiendo del portainjerto. Durante la estación vegetativa, tanto el floema de la parte aérea como de la raíz se encuentran funcionales, pero cuando la planta entra en receso, solamente el floema de la raíz queda en funcionamiento y allí entra en juego la relación del patógeno con el portainjerto. Los pies francos favorecen la multiplicación del fitoplasma por lo que este puede permanecer en el floema de las raíces aún durante el receso. Contrariamente, los membrilleros no la favorecen y por lo tanto impiden su supervivencia durante el invierno en el floema radicular comenzando la nueva temporada libres o con poca infección.

Otro aspecto que se ha estudiado recientemente es la posibilidad de recuperación de plantas enfermas. Ese fenómeno ha sido reportado en enfermedades causadas por fitoplasmas en manzano, vid y damasco (Osler *et al.*, 2000; Osler *et al.*, 1993; Carraro *et al.*, 2004; Mussetti *et al.*, 2012) y está asociado a respuestas de resistencia inducida por parte de las plantas, especialmente aquellas que han estado sometidas a reiteradas infecciones.

TRANSMISIÓN

Los principales medios para la transmisión de esta enfermedad son el uso de materiales vegetativos infectados (Shalla *et al.*, 1964) y los insectos vectores.

La transmisión por materiales vegetativos es variable dada la irregular distribución del patógeno en la planta tanto dentro de esta como durante la temporada. General-

mente la transmisión por esta vía es mayor en plantas sobre franco o *Pyrus* spp. y hacia fin del período vegetativo (otoño) cuando la planta alcanza su título máximo de fitoplasmas en la parte aérea.

En un principio se pensó que el uso de yemas de podas sacadas en invierno evitaría la transmisión por injerto a las nuevas plantas debido a la baja concentración del patógeno fruto de la inactivación del floema en esa estación (Schaper y Seemüller, 1982; Babini *et al.*, 2008). Sin embargo, información posterior demuestra que esto puede no ocurrir en regiones con inviernos poco severos (Errea *et al.*, 2002; García-Chapa *et al.*, 2003b).

Sin lugar a duda, la forma más importante de transmisión de esta enfermedad es a través de su insecto vector: la psila del peral (Género *Cacopsylla*, Orden Hemiptera, Suborden Sternorrhyncha, Familia Psillidae).

Se ha comprobado la transmisión por dos especies: *Cacopsylla pyricola* en América del Norte y el Reino Unido (Gonzales *et al.*, 1963; Jensen *et al.*, 1964; Davies *et al.*, 1992) y *C. pyri* en Italia (Carraro *et al.*, 1998) y España (Avinent *et al.*, 1997). En Uruguay y otras regiones se encuentra presente *C. bidens* (Valle *et al.*, 2018) y si bien aún resta confirmarlo, probablemente también la transmite. En Taiwán se han detectado fitoplasmas asociados con una enfermedad similar en individuos de otras especies de psila, *C. chinensis* y *C. qianli* (Liu *et al.*, 2011).

La transmisión de fitoplasmas es del tipo persistente y propagativa. El patógeno ingresa al insecto, llega al intestino y lo atraviesa pasando a la hemolinfa y de allí a las glándulas salivales (Purcell *et al.*, 1981). La adquisición se realiza luego de pocas horas o días de alimentación, luego se requiere de un período de 10-45 días de latencia donde el fitoplasma circula y se multiplica (propagativa) en el insecto hasta llegar a las glándulas salivales y poder transmitir la enfermedad por largo tiempo (persistente).

Se ha confirmado que la transmisión por este insecto se puede registrar tanto durante la temporada vegetativa como en el rece-

so (Blomquist y Kirkpatrick, 2002). Sin embargo, algunos estudios sostienen que si bien las formas invernales pueden adquirir el fitoplasma todo el año (incluso de plantas en dormancia) solo lo transmiten a plantas en brotación (Carraro *et al.*, 2001).

Trabajos realizados en Cataluña indican que la proporción de insectos infectados va aumentando y es alta hacia el final de la temporada y que lo inverso ocurre con las formas invernales y que solo son infectivos aquellos adultos de invierno que adquirieron el fitoplasma en la etapa final de vegetación del cultivo. De acuerdo con ello no se produciría la adquisición de fitoplasmas a partir de plantas en receso (García-Chapa *et al.*, 2015).

Existen trabajos con una enfermedad similar «la proliferación del manzano» provocada por el fitoplasma '*Candidatus Phytoplasma mali*' y transmitida por un psílido relacionado (*Cacopsylla picta*) que sostienen que el insecto muestra preferencia por plantas enfermas. Esta preferencia sería estimulada por la emisión de sustancias inducidas por la presencia del patógeno que beneficiarían su transmisión. Un proceso similar puede registrarse durante la temporada de cultivo y así favorecer la transmisión de la enfermedad (Mayer *et al.*, 2008; Rid *et al.*, 2016).

La psila del peral tiene dos estados adultos morfológicamente diferentes, una forma invernal más oscura y grande y una de verano más pequeña castaño verdoso (Núñez y Paullier, 1991; Mujica *et al.*, 2014).

En Uruguay la presencia de adultos de invierno (Figura 16) comienza a mediados de abril-mediados de mayo y estos son las formas más móviles, y por ende las encargadas de diseminar la plaga y al fitoplasma entre temporadas y a distancia, habiéndose capturado hasta octubre (Núñez y Paullier, 1991; Núñez y Scatoni, 2013).

Las formas invernales invernan en grietas de la corteza, horquetas o en la base de las yemas, oviponen durante julio-agosto, y de ellos emergen ninfas que, en aproximadamente cinco semanas, en forma sincróni-

Figura 16. Formas de *Cacopsylla bidens*: adulto forma invernifera, ninfa, forma de verano (respectivamente, de izquierda a derecha). Fotos: D. Valle.

zada con la brotación, se convierten en adultos de verano.

Los adultos de verano (Figura 16) comienzan a aparecer desde octubre y se producen durante toda la temporada de crecimiento del peral hasta marzo y, sus poblaciones son inicialmente bajas (Núñez y Paullier, 1991; Núñez y Scatoni, 2013). Si bien no constituyen un problema como plaga hasta fin de verano-otoño, se encargan de transmitir la enfermedad aumentando el número de plantas infectadas y a la vez la proporción de insectos transmisores hacia el fin de temporada (Blomquist y Kirkpatrick, 2002; Süle *et al.*, 2007). Al llegar los meses de febrero-marzo se produce un incremento significativo de las poblaciones en planta y sus daños llegando a un máximo en abril lo cual coincide con la aparición de adultos de invierno (Núñez y Scatoni, 2013).

Los mayores ataques como plaga se registran en otoño, luego de la cosecha, lo cual se explica por la disminución del efecto sobre este insecto de los tratamientos para otras plagas aplicados durante la estación. En ese sentido también se piensa que el aumento de esta plaga a partir de los años 80 se debió al abandono de las aplicaciones de fosforados y de dinitro orto cresol (Núñez y Paullier, 1991).

Los daños directos producidos son derivados de la inyección de toxinas durante su alimentación que afecta la viabilidad de las yemas y debilita a la planta. A los daños indirectos derivados de la transmisión de fitoplasmas se agrega el crecimiento de fumagina sobre la mielecilla excretada por el insecto y el manchado (Figura 17).

Figura 17. Producción de mielecilla y posterior desarrollo de fumagina. Fotos L. Góngómez y M. Silvera.

MANEJO

El manejo de enfermedades ocasionadas por fitoplasmas en frutales de hoja caduca debe ser enfocado como una integración del manejo desde varios puntos de vista (Jarausch y Torres 2014).

En primer lugar, es conveniente partir de material propagativo libre de fitoplasmas, no tanto porque esta sea la forma más importante de transmisión, sino porque permite el transporte de la enfermedad a larga distancia lo cual es muy relevante en áreas donde el problema no existe. No tiene mucho efecto en un área donde la enfermedad es endémica y la reinfección seguramente será inmediata. Sin embargo, cuanto más temprano en la vida de una planta se registra la enfermedad peor serán las consecuencias en los años posteriores.

La eliminación del patógeno una vez que una planta ha sido infectada es prácticamente imposible. Se han realizado experiencias en el pasado más o menos exitosas mediante la inyección de antibióticos directamente al floema (específicamente tetraciclina) en el caso de plantas valiosas. Sin embargo, es una medida totalmente desaconsejable, incluso desde el punto de vista económico.

Por el momento la forma más eficaz de manejar la enfermedad es a través de la resistencia varietal. Ya hemos tratado el tema en la descripción de los síntomas, huéspedes y su relación con la enfermedad. El uso de portainjertos que impidan o desfavorezcan la permanencia del patógeno durante el invierno es una medida muy importante. Ello se traduce en que las plantas comiencen cada temporada sin infecciones o con nive-

Figura 18. Montes de nueve años de pera 'Abate Fetel' auto radicados sin síntomas de decaimiento, con control de vigor por poda de raíces, Bolonia, Italia. Foto D. Maeso.

les bajos del patógeno. El éxito de esta medida depende mucho de la respuesta a la reinfección durante la temporada, teniendo en cuenta que la mayor parte de los cultivares de *P. communis* permiten la presencia de fitoplasmas en su floema. Por lo tanto, el nivel de daño por la enfermedad dependerá si la combinación, dada su afinidad, es muy sensible a problemas en el transporte de savia. En general, la severidad de los ataques será mayor en combinaciones cultivar/portainjerto poco vigorosas que estimulan la precocidad grande y, de reiterarse durante varias temporadas puede afectar la planta y

ocasionarle la muerte (Giunchedi, 2003). El uso de portainjertos francos o plantas auto radicadas es reconocido como una de las medidas más efectivas. Estos raramente muestran síntomas de decaimiento, pero su manejo eventualmente debe ser complementado con medidas destinadas al control de su expansión vegetativa (poda de raíces).

Otro grupo de medidas son aquellas tendientes a evitar la transmisión, ya sea eliminando fuentes de inóculo o actuando sobre el insecto vector, fundamentalmente en las primeras temporadas de instalado el monte.

Figura 19. Reemplazo de plantas afectadas en monte de 'Abate Fetel'/membrillero BA 29, reemplazo al lado de planta enferma. Foto D. Maeso.

La eliminación de plantas enfermas, si bien contribuye disminuyendo la fuente de inóculo, dadas las características de la enfermedad, no se justifica, al menos que estas hayan permanecido enfermas por varias temporadas, no se prevea su mejoría y, por lo tanto, no sean económicamente rentables. A pesar de ello, en algunos casos en que se convive con la enfermedad, las plantas muy afectadas se van reemplazando gradualmente por plantas sanas y se aplican medidas de riego y fertilización complementarias en el resto del monte (Figura 19).

Dada la preferencia del vector por la exuberancia de crecimiento es conveniente no realizar medidas que promuevan gran actividad vegetativa, que favorece la infestación con psila (irrigación, fertilización nitrogenada, poda severa, etc.). Sin embargo, en algunos casos, como se mencionó en el párrafo anterior, aunque parezca contradictorio, estas medidas se utilizan como forma de ayudar a mejorar a las plantas con decaimiento lento aún productivas y evitar su deterioro. En estos casos lo importante es controlar estrictamente la presencia de psila que va a ser atraída por el nuevo crecimiento.

Si bien una de las primeras medidas utilizadas para prevenir el decaimiento del peral ha sido el control químico del vector, este está muy limitado en la actualidad y deberá realizarse mediante un esquema de tratamientos preciso en los momentos clave, con productos que, además de ser eficientes, tengan bajo impacto al ambiente y a la salud (Belien *et al.*, 2013). En ese sentido, desde el punto de vista de esta enfermedad es muy importante controlar al vector en el final de la temporada (formas invernantes) e inmediatamente cuando esta comienza (primeras generaciones), para evitar el pasaje del fitoplasma entre estaciones y disminuir el número de plantas infectadas temprano en la estación.

El control de psila en nuestro país generalmente se realiza cuando esta produ-

ce los mayores daños directos o ante una presencia importante de fumagina y no contempla a este insecto como vector.

Como alternativas al uso de insecticidas en otros países se están utilizando productos naturales que repelen o desestimulan la presencia del vector, tal es el caso de la arcilla caolinita (silicato de aluminio), el bicarbonato de potasio y los aceites minerales (Belien *et al.*, 2013).

Recientemente se está avanzando en la identificación de compuestos involucrados en las señales de atracción al vector por parte de plantas enfermas (se ha demostrado que plantas de manzano enfermas con proliferación emiten volátiles que atraen a *C. picta*, un psílido vector de la enfermedad). Estos podrán ser usados en un futuro como atrayentes en trampas, ya sea para monitoreo o para la atracción y destrucción masiva (Eben y Gross, 2013).

También se ha avanzado en la identificación y conservación de controladores biológicos del vector, lo cual ha sido favorecido por la racionalización del control químico y la valorización de otras prácticas sustentables en el cultivo. En ese sentido a nivel local se está estudiando el tema y se han logrado importantes avances habiéndose identificado varios artrópodos predadores y parasitoides de *C. bidens* y comprobado el efecto beneficioso de la conservación de la vegetación espontánea en montes comerciales (Valle *et al.*, 2015; 2016).

Otro aspecto que se está investigando a nivel mundial es acerca de la remisión de síntomas y de la infección en plantas enfermas. Este fenómeno se ha descrito en vides, manzanos y otros frutales (Musetti *et al.*, 2013) y se piensa que está vinculado a la acción de los llamados «microorganismos endófitos», o sea microorganismos que habitan en un vegetal pero que no producen síntomas. Esta reacción puede deberse a la acción directa de los endófitos por antagonismo o indirecta a través del desencadenamiento de reacciones de defensa por parte de la

planta (Romanazzi, 2013; Bianco *et al.*, 2013; Musetti *et al.*, 2013). Basándose en esto se está evaluando la aplicación de productos inductores de resistencia como forma de manejar enfermedades causadas por fitoplasmas (Musetti *et al.*, 2013, Romanazzi, 2013).

Por último, recientemente en Europa se ha difundido el uso de mallas con fines múltiples, entre los cuales está limitar o impedir la circulación de insectos lo que potencialmente podría disminuir problemas sanitarios y entre ellos dificultar o anular la transmisión del decaimiento del peral.

PARTE II: TRABAJOS EXPERIMENTALES DE INIA

La investigación llevada a cabo por INIA se inició en 1995 y fue continuada hasta el 2014. De acuerdo con los objetivos y enfoque puede ser dividida en tres partes.

En la primera, se buscó conocer si en Uruguay existía este importante problema sanitario presente en las principales regiones productoras del Hemisferio Norte e identificar su agente causal. En ella, como se mencionó, se contó con la colaboración del Dr. Luciano Giunchedi de la Università degli Studi di Bologna y, en un comienzo se llevó a cabo el análisis de muestras tomadas en un relevamiento. Este análisis detectó la presencia del fitoplasma '*Candidatus Phytoplasma pyri*' (CPP) en plantas de peral en nuestro país por lo que se ajustó localmente la detección por la técnica de PCR y se procedió a realizar la identificación del fitoplasma involucrado y compararlo con el existente en bases de datos mediante la secuenciación del fragmento amplificado (Martínez, 2008; Maeso *et al.*, 2012).

En la segunda parte de los trabajos experimentales (2005 - 2011) se realizó el seguimiento de la infección con CPP en un experimento de evaluación de diferentes cultivares, portainjertos y filtros llevado a cabo por el Programa Nacional de Investigación en Producción Frutícola en INIA Las Brujas y se buscó conocer su asociación con los síntomas observados (Maeso *et al.*, 2012).

Por último, en la tercera etapa (2009-14) los estudios se enfocaron en el estudio de la enfermedad vinculados a su insecto vector (Maeso *et al.*, 2012; Mujica *et al.*, 2014).

PRESENCIA DE DECAIMIENTO Y '*CANDIDATUS PHYTOPLASMA PYRI*' EN PLANTAS DE PERAL EN URUGUAY

Relevamiento preliminar

En abril de 1995 se realizó un relevamiento en el cual se tomaron 70 muestras de plantas de peral del campo experimental de INIA Las Brujas y de la zona productora de Melilla. Se colectaron sectores basales de ramas de 1-2 años y se registró el estado e historia de las plantas: presencia de enrojecimiento, epinastia (curvado de hojas), defoliación, ataques de psila, cultivar y portainjerto. Estas fueron enviadas al laboratorio del Dr. Giunchedi donde fueron analizadas mediante la tinción de cortes de floema con DAPI (4',6-diamidino-2-fenilindol), reactivo fluorescente que se adhiere al ADN y permitió conocer si estaban infectadas por fitoplasmas. Un pequeño grupo de muestras positivas y negativas según la técnica anterior fue analizado por PCR (reacción de cadena de la polimerasa), de reciente implementación en ese momento. Respecto a esta última técnica, se estudió el patrón de los fragmentos del producto amplificado luego de ser cortados por algunas enzimas de restricción (RFLP), encontrándose que correspondía al esperable a CPP. El resultado del diagnóstico efectuado se muestra en el Cuadro 1. En total se detectaron fitoplasmas en el 50% de las plantas relevadas. En la Figura 3 se puede observar la presencia de fitoplasmas en floema de las muestras mediante la tinción DAPI y, en la Figura 20, la banda amplificada mediante la técnica de PCR.

Cuadro 1. Detección de fitoplasmas mediante tinción DAPI de floema tomado de plantas de peral de INIA Las Brujas y Melilla, abril 1995.

Cultivar	Portainjerto	Lugar	Muestras con fitoplasmas/total	Porcentaje
‘Williams’	<i>P. betulifolia</i>	INIA LB A ^{1,3}	5/6	83
‘Sta. María’	<i>P. betulifolia</i>	INIA LB A ¹	3/6	50
‘Favorita’	<i>P. betulifolia</i>	INIA LB A ¹	3/6	50
SUBTOTAL			11/18	61
‘Williams’	<i>P. betulifolia</i>	INIA LB B ²	2/6	33
‘Sta. María’	<i>P. betulifolia</i>	INIA LB B ²	1/6	17
‘Favorita’	<i>P. betulifolia</i>	INIA LB B ²	2/6	33
SUBTOTAL			5/18	28
‘Williams roja’	Membrillo	INIA LB C	1/2	50
‘Packham’s’	<i>P. betulifolia</i>	Melilla A	2/3	67
‘Williams’	<i>P. betulifolia</i>	Melilla A	0/3	0
‘Williams’	<i>P. betulifolia</i>	Melilla B	3/6	50
‘Williams’	Membrillo	Melilla C	3/3	100
‘Williams’	<i>P. betulifolia</i>	INIA LB D	1/4	25
‘Williams’	<i>P. calleryana</i>	INIA LB D	2/4	50
‘Williams’	<i>Pyrus</i> sp. ‘Peracho’	INIA LB D	3/4	75
‘Williams’	<i>P. communis</i>	INIA LB D	2/4	50
TOTAL			35/70	50

¹ Espaldera con fuerte ataque de psila.

² Espaldera sin ataque de psila.

³ A, B, C, D: diferentes ubicaciones en INIA LB (campo experimental de INIA Las Brujas) y predios comerciales de la zona de Melilla, Depto. de Montevideo.

Figura 20. Productos de la amplificación de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (f01/r01 primers) de muestras colectadas de montes de perales de Uruguay (línea 1 planta de pera italiana con decaimiento del peral, 2-6 muestras de pera de Uruguay con observación de fitoplasmas con tinción DAPI, líneas 7-9 muestras uruguayas sin observación de fitoplasmas con tinción DAPI, M ADN marcador. Foto L. Giunchedi.

Cuadro 2. Asociación entre la detección de fitoplasmas mediante tinción DAPI y algunos parámetros relevados en 1995.

Característica	Grupo analizado	Número de muestras: con fitoplasma		Significancia prueba chi²
		Detectado	No detectado	
Alta infestación de psila	INIA LB A¹	11	7	9%
Baja infestación de psila	INIA LB B	16	20	
Color rojizo en follaje	Total de las muestras	23	16	10%
Color normal		7	14	
Color rojizo en follaje	Porta injerto <i>P. betulifolia</i>	15	12	8%
Color normal		7	18	
Color rojizo en follaje	'Williams'	15	10	10%
Color normal		3	9	
Color rojizo en follaje	Zona Melilla	7	6	2%
Color normal		0	9	
Hojas curvadas	Zona Melilla	5	3	15%
Follaje normal		0	4	
Caída prematura de hojas	'Williams'	16	7	1%
Sin caída		5	14	
Caída prematura de hojas	Zona Melilla	6	0	6%
Sin caída		2	4	

¹ A, B: diferentes ubicaciones en INIA LB (campo experimental de INIA Las Brujas)

Con los resultados y los datos relevados se hizo un análisis de asociación entre detección de fitoplasmas y diferentes parámetros del relevamiento construyendo un damero de contingencias que tomó en cuenta las cuatro posibilidades (atributo-infectada, atributo-sin infección, sin atributo-infectadas, sin atributo-no infectadas) mediante la prueba Chi². Se encontró asociación estadísticamente significativa entre la detección de fitoplasmas y la infestación con psila y con la presencia de color rojizo en el follaje y la defoliación prematura en el momento de tomar la muestra (Cuadro 2).

Todo ello permitió conocer la existencia de plantas infectadas con este fitoplasma y su asociación con la presencia de algunos de los síntomas descritos para el decaimiento del peral en determinado tipo de las muestras colectadas (caída prematura de

hojas en el cultivar 'Williams' y presencia de enrojecimiento en montes comerciales de la zona de Melilla). Es de destacar que en el momento que se hizo este trabajo la casi totalidad de los predios comerciales estaban formados por plantas del cultivar 'Williams' inicialmente injertadas sobre membrillero D'Anjou y luego afrancadas (Maeso *et al.*, 2012).

Ajuste del diagnóstico molecular

Durante el período 2006-2007 se realizó el ajuste de la detección del fitoplasma causante del decaimiento del peral por PCR en los laboratorios de INIA LB y se iniciaron los estudios posteriores en nuestro país (Martínez, 2008; Maeso *et al.*, 2012).

En un principio, utilizando nueve muestras procedentes de plantas con detección

en la temporada previa se determinó cuál era el protocolo de extracción de ADN, el momento del ciclo y la parte de la planta más adecuados para la toma de muestra para la detección de fitoplasmas en peral en nuestras condiciones.

El mejor procedimiento para la extracción de ADN de fitoplasmas en pera resultó ser el de Marzachi *et al.* (1999) frente al propuesto por Lee *et al.* (1995) y a una opción más fácil que implicaba el uso de un kit de extracción de ADN comercial (Genomic DNA extraction-Fermentas).

Los resultados obtenidos concuerdan con la bibliografía en que el mejor momento para detectar a este patógeno en perales es en otoño, previo a la entrada en receso (cua-

dro 3). Donde mejor se detectó fue en floema extraído de la base de ramas de 1-2 años, comparado con el de la nervadura central de las hojas (Figura 21). Solamente en una de las muestras se logró detectar al patógeno en floema de raíz. Si bien este tejido es aconsejado para realizar la detección durante todo el año, la toma de las muestras no fue sencilla lo cual seguramente perjudicó nuestra detección.

El protocolo con el cual se obtuvieron mejores resultados el de Marzachi *et al.* (1999), modificado por Giunchedi (Com. pers.).

En resumen, el procedimiento que mejor se ajustó a nuestras condiciones corres-

Cuadro 3. Detección de fitoplasmas en peral mediante PCR, ADN extraído mediante protocolo de Marzachi *et. al.* (1999). Influencia de tejido y momento de la toma de muestra.

Planta	Momento de extracción de muestra							
	Diciembre 2006 (crec. vegetativo)			Marzo 2007 (otoño)			Junio 2007 ¹ (receso invernal)	
	Tallo	Nerva- dura	Raíz	Tallo	Nerva- dura	Raíz	Tallo	Raíz
AF/Ad ²	-	-	+	+	+	-	+	-
AF/Ad	+ ⁶	-	-	+	+	-	-	-
AF/EMC ³	-	+	-	+	-	-	-	-
AF/EMC	-	-	-	+	-	-	-	-
AF/BA 29 ⁴	-	-	-	+	-	-	-	-
W/OH/EMC ⁵	-	-	-	+	+	-	-	-
W/OH/EMC	-	-	-	+	+	-	-	-
W/OH/EMC	-	-	-	+	+	-	-	-
W/OH/EMC	-	-	-	+	+	-	+	-

¹No se analizaron nervaduras en el mes de Junio ya que los árboles no tenían hojas en ese momento.

² AF/Ad = cultivar 'Abate Fetel' injertado sobre membrillero Adams.

³ AF/EMC = cultivar 'Abate Fetel' injertado sobre membrillero EMC.

⁴ AF/BA 29 = cultivar 'Abate Fetel' injertado sobre membrillero BA 29.

⁵ W/OH/EMC = cultivar 'Williams', interinjerto Old Home y pie membrillero EMC.

⁶+ = Detección de fitoplasmas mediante PCR.

Figura 21. Porcentaje de detección de fitoplasmas en un total de 27 muestras analizadas (nueve para cada uno de los tejidos comparados, floema de tallo, nervadura y raíz, en tres momentos diciembre 2006, marzo y junio 2007).

pondió al análisis de floema de la base de ramas de 1-2 años en otoño siguiendo el procedimiento de extracción de ADN de Marzachi *et al.* (1999).

Para la realización de la PCR se utilizaron los primers f01/r01 específicos para fitoplasmas de grupo SrX (f01: 5' CGGAAACTTTTAGTTTCAGT 3' y r01: 5' AAGTGCCCAACTAAATGAT 3'), Lorenz *et al.* (1995) y el siguiente ciclo de PCR: 94 °C 1 minuto, 55 °C 1 minuto y 15 segundos (34

repeticiones), 72 °C 1 minuto y 30 segundos y 72 °C 10 minutos.

Empleando la metodología ajustada se logró amplificar una banda con una dimensión cercana a 930 pb en plantas infectadas con fitoplasmas de este grupo (Figura 22). Para tener mayor certeza de que esa banda correspondía al fitoplasma causante de decaimiento del peral, a continuación, se observó el patrón de la longitud de los fragmentos del amplicon (RFLP) cortados por la en-

Figura 22. Electroforesis en gel de agarosa 1.5% en TAE 0,5X de los productos de la amplificación por PCR obtenida con los primers f01y r01. Foto Goncálvez, M. Silvera.

Figura 23. Electroforesis en gel de agarosa 2,5% en TAE 0,5X, restricción con *Rsa* I. En el gel se observan en la línea 2 dos bandas correspondientes a la digestión. Foto: A. Martínez, M.T. Federici.

zima de restricción *RSA* I (786,5 y 242 pb, Figura 23) el cual correspondió al esperable para CPP. Eso fue confirmado en estudios posteriores de 2009 en los que se enviaron a secuenciar amplicones de muestras seleccionadas los cuales coincidieron en el 100% de la identidad de los nucleótidos con las secuencias de ARN 16S ribosomal y del inter espaciamiento génico parcial 16S-23S de CPP (accesos AJ542543.1, AJ964959.1, Y16392.1, KF819362.1 y KF849463.1) reportadas en la base de datos NCBI (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide>).

SEGUIMIENTO DE LA INFECCIÓN EN PLANTAS CON DIFERENTES COMBINACIONES DE CULTIVAR PORTAINJERTO Y FILTRO

En una segunda parte de los trabajos se buscó caracterizar los síntomas de esta enfermedad en diferentes combinaciones de cultivares, portainjertos y filtros y su asociación con la infección con fitoplasmas. Para ello se realizó el seguimiento de síntomas y

la detección de la infección en un experimento que incluía 20 combinaciones diferentes de cultivares, portainjertos y filtros (cuadro 4). Este estaba dispuesto en un diseño de parcelas al azar con cuatro repeticiones y cada parcela constó de cuatro plantas de las que se evaluaron las dos centrales (Figura 24).

El experimento fue plantado en el año 2003 y el seguimiento fue realizado desde

Cuadro 4. Combinaciones de cultivares-portainjertos y filtros incluidas en el experimento.

Tratamientos	Combinación ¹	Vigor de la combinación
1	Williams/OH/BA29	Medio
2	Williams/BH/BA29	Medio
3	Williams/BA29	Medio
4	Williams/OH/EMC	Bajo
5	Williams/BH/EMC	Bajo
6	Williams/EMC	Bajo
7	Williams/OH/AD	Bajo
8	Williams/BH/AD	Bajo
9	Williams/AD	Bajo
10	Packham's/BA29	Medio
11	Packham's/EMC	Bajo
12	Packham's/ AD	Bajo
13	Abate Fetel/ BA29	Medio
14	Abate Fetel/EMC	Bajo
15	Abate Fetel/AD	Bajo
16	Abate Fetel	Alto
17	Williams/OHF40	Alto
18	Williams/OHF69	Alto
19	Abate Fetel/OHF40	Alto
20	Abate Fetel/OHF69	Alto

¹OH=Inter injerto Old Home, BA29, EMC y AD membrilleros, OHF40 y OHF69= cruzamiento de los cultivares de *P. communis* Old Home × Farmingdale (OH×F).

Figura 24. Vista general y detalle de algunas parcelas del experimento de combinaciones de cultivares/filtros/portainjertos. Temporada 2009. Fotos D. Maeso

fin de verano a receso en el período 2005 - 2011. Este consistió en la evaluación de síntomas y el análisis de fitoplasmas en otoño. Los resultados fueron sometidos a un análisis de varianza con posterior separación de medias y a un análisis de la asociación entre presencia de fitoplasmas y desarrollo de síntomas (χ^2).

Evaluación de síntomas atribuibles al decaimiento del peral

La evaluación de síntomas fue efectuada en tres oportunidades, la primera a inicio de síntomas, la siguiente a los 15-20 días, y la última, previo a la entrada en receso. En general, con variaciones entre años, correspondieron a: fin de marzo-principios de abril, mediados-fin de abril y principios de mayo. Los síntomas evaluados fueron epinastia

(«curvado» de hojas), enrojecimiento y defoliación. Para evaluar epinastia y enrojecimiento se usó una escala arbitraria 0-5, donde 0 = sin síntomas, 1 = leves, 2-3 = moderados y 4-5 = la mayor expresión de síntomas.

Con los resultados se realizó un análisis de varianza con posterior separación de medias para ver diferencias entre los tratamientos. Dada la cantidad de datos (tres evaluaciones por temporada y siete temporadas) se estimó una tendencia general en el período promediando los resultados de todas las temporadas de forma de señalar cuál/es de las combinaciones presentaban mayor magnitud de síntomas en el período. En los cuadros 5-7 se presentan los resultados obtenidos en cada evaluación y en el cuadro 8 el promedio de todas las evaluaciones de todo el período.

Cuadro 5. Análisis del promedio de los resultados de las evaluaciones de epinastia en el período 2005-2011¹.

Combinación cultivar/portainjerto ²	Evaluación 1 ³		Evaluación 2		Evaluación 3	
1 W/OH/BA29	2,8	e ⁴	2,7	f	3,1	c
2 W/BH/BA29	2,1	cde	2,3	bcdef	2,5	bc
3 W/BA29	2,1	cde	2,4	bcdef	2,6	bc
4 W/OH/EMC	2,0	cde	2,4	def	2,8	bc
5 W/BH/EMC	2,3	de	2,2	abcdef	2,5	bc
6 W/EMC	2,0	cd	2,1	abcde	2,6	bc
7 W/OH/AD	2,1	cde	2,5	ef	3,1	bc
8 W/BH/AD	2,2	cde	2,3	bcdef	2,9	bc
9 W/AD	2,3	cde	2,5	def	2,6	bc
10 PK/BA29	1,9	cd	2,2	abcdef	2,5	bc
11 PK/EMC	2,0	cd	2,0	abcd	2,2	B
12 PK/AD	2,0	cde	1,9	abc	2,4	bc
13 AF/BA29	1,6	bc	2,0	bcdef	1,9	a
14 AF/EMC	1,9	cd	2,2	cdef	1,8	a
15 AF/AD	1,9	cd	2,0	bcdef	2,0	a
16 AF	0,7	a	1,5	a	1,5	a
17 W/OHF40	1,7	bcd	2,2	bcdef	2,7	bc
18 W/OHF69	1,7	bcd	2,2	abcde	2,8	bc
19 AF/OHF40	1,8	bcd	2,3	bcdef	2,8	bc
20 AF/OHF69	1,2	ab	1,7	ab	1,7	a

¹ Epinastia= curvado de hoja según escala 0-5 donde 5 = síntomas más severos (Figura5).
² Las combinaciones corresponden a los cultivares 'Williams' (W), 'Abate Fetel' (AF), 'Packham's' (PK), inter injerto Old Home (OH) y portainjertos membrilleros BA29, EMC y AD; y cruzamientos de los cultivares de *P. communis* Old Home × Farmingdale OH×F (OHF40 y OHF69).
³ Evaluación 1: fin de marzo-principios de abril, evaluación 2: mediados-fines de abril y evaluación 3: principios de mayo.
⁴ Las medias seguidas por igual letra no difieren significativamente al 5% según la prueba Duncan de rangos múltiples.

Este análisis mostró que aquellas combinaciones auto radicadas o sobre OHF40 u OHF69 presentaron en general menor intensidad de síntomas (fundamentalmente enrojecimiento y defoliación) frente a aquellas en que se utilizan membrillero como portainjerto (Figura 25). En general, se observó que las combinaciones que produjeron plantas

menos vigorosas fueron las que mostraron los síntomas más intensos, por lo cual, sin tomar en cuenta los análisis de infección con fitoplasmas realizados, estarían en un principio relacionados con la falta de afinidad de este tipo de combinaciones, tal como se establece en la bibliografía.

Cuadro 6. Análisis del promedio de los resultados de las evaluaciones de enrojecimiento en el período 2005 - 2011¹.

Combinación cultivar/portainjerto ²		Evaluación 1 ³		Evaluación 2		Evaluación 3	
1	W/OH/BA29	1,0	EF ⁴	1,4	F	2,2	DEFG
2	W/BH/BA29	0,4	ABCD	0,9	DEF	2,4	EFG
3	W/BA29	0,6	DE	1,2	EF	2,3	DEFG
4	W/OH/EMC	0,5	CD	0,8	EF	1,9	BCDE
5	W/BH/EMC	0,4	BCD	0,8	DE	2,1	DEFG
6	W/EMC	0,7	DE	1,3	EF	1,9	CDEF
7	W/OH/AD	0,6	DE	1,0	EF	2,0	CDEF
8	W/BH/AD	0,5	DE	1,3	EF	2,3	DEFG
9	W/AD	0,5	DE	1,1	EF	1,7	BCDE
10	PK/BA29	0,7	DE	0,7	CD	1,1	ABC
11	PK/EMC	0,5	DE	0,8	CD	1,5	BCDE
12	PK/AD	0,7	DE	0,8	BCD	1,3	ABCD
13	AF/BA29	1,4	F	2,1	G	3,0	FG
14	AF/EMC	2,2	G	2,6	G	3,6	G
15	AF/AD	2,0	G	2,5	G	3,7	FG
16	AF	0,1	ABC	0,3	BCD	1,0	AB
17	W/OHF40	0,0	A	0,1	AB	0,8	AB
18	W/OHF69	0,1	AB	0,2	ABC	0,8	AB
19	AF/OHF40	0,1	A	0,0	A	0,6	A
20	AF/OHF69	0,4	ABCD	0,5	DE	1,3	ABC

¹ Enrojecimiento= enrojecimiento prematuro de follaje según escala 0-5 donde 5 = síntomas más severos (figs. 6-10).

² Las combinaciones corresponden a los cultivares 'Williams' (W), 'Abate Fetel' (AF), 'Packham's' (PK), inter injerto Old Home (OH) y portainjertos membrilleros BA29, EMC y AD; y cruzamientos de los cultivares de *P. communis* Old Home × Farmingdale OH×F (OHF40 y OHF69).

³ Evaluación 1: fin de marzo-principios de abril, evaluación 2: mediados-fines de abril y evaluación 3: principios de mayo.

⁴ Las medias seguidas por igual letra no difieren significativamente al 1% según la prueba Duncan de rangos múltiples.

Cuadro 7. Análisis del promedio de los resultados de las evaluaciones de defoliación del período 2005 - 2011.¹

Combinación cultivar/portainjerto ²		Evaluación 1 ³		Evaluación 2		Evaluación 3	
1	W/OH/BA29	0,8	BCD ⁴	2,4	FG	4,0	C
2	W/BH/BA29	0,3	ABC	1,8	DEFG	3,0	C
3	W/BA29	0,1	AB	1,6	DEF	3,4	C
4	W/OH/EMC	1,0	CD	2,8	EFG	3,8	C
5	W/BH/EMC	0,3	ABC	1,8	DEFG	3,3	C
6	W/EMC	0,6	ABCD	2,2	FG	3,8	C
7	W/OH/AD	0,5	ABCD	2,5	FG	4,0	C
8	W/BH/AD	0,4	ABC	1,9	EFG	3,3	C
9	W/AD	0,6	ABCD	2,4	FG	4,0	C
10	PK/BA29	0,6	ABCD	2,1	EFG	3,1	C
11	PK/EMC	0,4	ABC	2,2	FG	3,2	C
12	PK/AD	1,3	D	2,4	FG	3,2	C
13	AF/BA29	0,4	ABC	1,9	EFG	3,3	C
14	AF/EMC	0,3	ABC	1,7	DEFG	3,0	C
15	AF/AD	0,6	ABCD	2,3	FG	3,6	C
16	AF	0,0	A	0,1	A	0,8	A
17	W/OHF40	0,4	ABC	1,0	CDE	1,6	B
18	W/OHF69	0,0	A	0,7	BC	1,1	AB
19	AF/OHF40	0,1	AB	1,3	CDE	1,8	B
20	AF/OHF69	0,0	A	0,4	AB	0,8	A

¹ Defoliación = caída prematura de follaje, según escala 0-5 donde 5 = síntomas más severos (figs. 11-12).

² Las combinaciones corresponden a los cultivares 'Williams' (W), 'Abate Fetel' (AF), 'Packham's' (PK), inter injerto Old Home (OH) y portainjertos membrilleros BA29, EMC y AD; y cruzamientos de los cultivares de *P. communis* Old Home × Farmingdale OH×F (OHF40 y OHF69).

³ Evaluación 1: fin de marzo-principios de abril, evaluación 2: mediados-fines de abril y evaluación 3: principios de mayo.

⁴ Las medias seguidas por igual letra no difieren significativamente al 1% según la prueba Duncan de rangos múltiples.

Cuadro 8. Severidad de síntomas atribuibles al decaimiento del peral, promedio de tres evaluaciones y de las temporadas 2005 - 2011 para diferentes combinaciones de variedades/portainjertos (escala 0-5, 0 = sin síntomas, 1 = leve, 2-3 = moderado, 4-5 = severo).

Combinación cultivar/portainjerto ¹	Síntoma				Vigor
	Enrojecimiento ²		Defoliación ³		
W/OH/BA29	1,4 ⁴	f	2,4	fg	Medio
W/BH/BA29	0,9	def	1,8	defg	Medio
W/BA29	1,2	ef	1,6	def	Medio
W/OH/EMC	0,8	ef	2,8	efg	Bajo
W/BH/EMC	0,8	de	1,8	defg	Bajo
W/EMC	1,3	ef	2,2	fg	Bajo
W/OH/AD	1,0	ef	2,5	fg	Bajo
W/BH/AD	1,3	ef	1,9	efg	Bajo
W/AD	1,1	ef	2,4	fg	Bajo
PK/BA29	0,7	cd	2,1	efg	Medio
PK/EMC	0,8	cd	2,2	fg	Bajo
PK/AD	0,8	cd	2,4	fg	Bajo
AF/BA29	2,1	g	1,9	efg	Medio
AF/EMC	2,6	g	1,7	defg	Bajo
AF/AD	2,5	g	2,3	fg	Bajo
AF	0,3	bcd	0,1	a	Alto
W/OHF40	0,1	ab	1,0	cde	Alto
W/OHF69	0,2	abc	0,7	bc	Alto
AF/OHF40	0,0	a	1,3	cde	Alto
AF/OHF69	0,5	de	0,4	ab	Alto

¹ Las combinaciones corresponden a los cultivares 'Williams' (W), 'Abate Fetel' (AF), 'Packham's' (PK), inter injerto Old Home (OH) y portainjertos membrilleros BA29, EMC y AD, y cruzamientos de los cultivares de *P. communis* Old Home × Farmingdale OH×F (OHF40 y OHF69).

²Enrojecimiento= enrojecimiento prematuro de follaje según escala 0-3 donde 3=síntomas más severos (figs.6-10).

³ Defoliación = caída prematura de follaje, según escala 0-5, donde 5 = síntomas más severos (figs. 11-12).

⁴ Las medias seguidas por igual letra no difieren significativamente al 5% según la prueba Duncan de rangos múltiples.

Figura 25. Detalle de síntomas en plantas del cultivar 'Abate Fetel' en algunas combinaciones. Otoño 2005. Arriba izquierda Adams, arriba derecha EMC, abajo izquierda auto radicada, abajo derecha BA 29. Fotos D. Maeso.

Detección de fitoplasmas

Coincidiendo aproximadamente con la segunda fecha de evaluación, se analizó anualmente por PCR una de las plantas centrales de cada parcela, en lo posible la misma planta.

En la Figura 26 se muestra la evolución del porcentaje de muestras en las que se detectaron fitoplasmas durante 2007-2010. El porcentaje de detección varió entre temporadas y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las diferentes combinaciones. Si bien no se realizaron evaluaciones al respecto, las temporadas en las que la detección fue mayor, los ataques de psila en el experimento fueron más severos, lo cual seguramente favoreció

la transmisión. Al respecto, referimos al lector al apartado donde se describen los estudios de detección, sintomatología comparando niveles de ataque de la plaga.

Con esos resultados se analizó si la detección se repetía en las mismas plantas en el tiempo. Para ello se seleccionaron 27 plantas sobre las cuales se tenía seguridad que habían sido analizadas en todas las temporadas. Se encontró que la detección de fitoplasmas en la misma planta en dos temporadas seguidas se repitió en 22% de los casos (seis plantas) correspondientes a árboles injertados sobre los portainjertos OHF40, OHF69, auto radicadas y membrillero BA29. En dos plantas de la combinación Williams/filtro Beurre Hardy/membrillero BA29 la detección se repitió en tres tem-

Figura 26. Evolución del porcentaje de detección de fitoplasmas en otoño mediante PCR en floema de base de ramas de dos años en plantas del ensayo de cultivares/portainjertos de peral. Referido sobre un total anual de 80 muestras. Periodo 2007-2010.

poradas. En ocho plantas hubo detección en dos temporadas, agregándose a las seis mencionadas, dos del cultivar ‘Abate Fetel’ sobre los membrilleros BA29 y EMC (Figura 27). En general esto coincidiría con lo men-

cionado en la bibliografía en cuanto a que existen combinaciones en las que la infección tiene posibilidad de mantenerse entre temporadas en el floema de las raíces de algunos portainjertos.

Figura 27. Frecuencia de la detección de fitoplasmas en 27 plantas del experimento en el período 2007-2010.

Relación entre la detección de fitoplasmas y cultivares, portainjertos y/o filtros

Se analizó si existía asociación entre la detección de fitoplasmas en las 80 plantas analizadas y cultivares, portainjertos o filtros. Para ello se realizó la prueba Chi² a los datos presentados como alternativas en un damero de contingencias.

Únicamente en otoño 2007 se encontró asociación estadísticamente significativa entre la detección de fitoplasmas y el cultivar ‘Abate Fetel’. En el cuadro 9 se muestran los porcentajes de detección de fitoplasmas según cultivar, se observa que, a pesar de no existir asociación estadísticamente significativa en otras temporadas, la detección en este cultivar siempre fue mayor.

Tampoco se encontró asociación entre la detección del patógeno y el portainjerto usado en esas plantas (Cuadro 10). Sin embargo, al igual que el caso anterior hubo una tendencia a que la detección fuera mayor en plantas auto radicadas y con los portainjertos OHF40 y OHF69, los cuales son mencionados en la bibliografía como capaces de mantener altas poblaciones del patógeno, a pesar de que no fueron los que mostraron más síntomas de la enfermedad.

Relación entre detección de fitoplasmas y síntomas.

Con el mismo procedimiento que en el ítem anterior, se analizó si existía asociación entre la detección de fitoplasmas y la presencia de los síntomas evaluados, discri-

Cuadro 9. Detección de fitoplasmas por PCR en cada cultivar en el período 2007-2010 (en porcentaje).

Cultivar	2007 ¹	2008	2009	2010	Promedio del período	Número total de plantas
‘Abate Fetel’	41	4	54	54	38	24
‘Packham’s’	27	0	50	41	30	12
‘Williams’	7	7	50	29	23	44

¹Solamente para otoño 2007 existió asociación estadísticamente significativa al 5% por la prueba Chi².

Cuadro 10. Detección de fitoplasmas por PCR según portainjerto en el período 2007-2010 (en porcentaje).

Portainjerto	2007 ¹	2008	2009	2010	Promedio del período	Número total de plantas
BA29	20	0	40	15	19	20
EMC	20	0	50	15	21	20
AD	15	10	55	15	24	20
Auto radicada	50	0	25	25	25	4
OHF40	13	13	75	38	35	8
OHF69	25	13	63	38	35	8

¹ No se encontró asociación estadísticamente significativa entre la detección de fitoplasmas y los portainjertos por la prueba Chi².

Cuadro 11. Temporadas en las que se encontró relación estadísticamente significativa¹ entre detección de fitoplasmas y presencia de síntomas en determinados cultivares y portainjertos.

Relación entre detección de fitoplasmas en:	Presencia de:	
	Epinastia	Enrojecimiento
Total de plantas	2007, 2009	2007, 2009
‘Abate Fetel’	—	2008
‘Packham’s’	2009	2007
‘Williams’	—	2010
EMC	2010	2010
AD	2009	2009
OHF40	2007	2007
BA29	—	2007, 2010
OHF69	—	2007

¹Prueba Chi² al 5% de probabilidad.

minando entre las diferentes posibilidades (cultivares, portainjertos, etc.). Para ello se calculó el número de plantas con determinado grado de síntomas y se distribuyeron de acuerdo con si existía o no detección de fitoplasmas.

Usando el total de las plantas analizadas contra los síntomas en los tres momentos de evaluación, se encontró asociación estadísticamente significativa entre la detección y la presencia de epinastia y enrojecimiento severo (grado 3 o mayor) en las temporadas 2007 y 2010.

Separando a las plantas según cultivar, se encontró asociación entre detección de fitoplasmas y enrojecimiento en el cultivar ‘Abate Fetel’ en 2008, y epinastia en 2009 y enrojecimiento en 2007 y 2009 en el cultivar ‘Packham’s’, y epinastia en 2007 y enrojecimiento 2010 en el cultivar ‘Williams’.

Haciendo lo mismo para los portainjertos se encontró asociación entre detección de fitoplasmas y presencia de epinastia en plantas injertadas sobre membrillero EMC en 2010, membrillero AD en 2009, y OHF40 en 2007, y con enrojecimiento en plantas injertadas sobre BA29 (2007, 2010), EMC

(2010), AD (2009), OHF40 (2007) y OHF69 (2007).

La información resumida se muestra en el cuadro 11. De acuerdo a estos datos la relación entre detección de fitoplasmas con la presencia de epinastia y enrojecimiento dependió de las temporadas, quizás muy vinculado con el porcentaje de detección en cada una de ellas. Por esa razón no es posible realizar generalizaciones importantes al respecto.

ESTUDIOS VINCULADOS AL VECTOR

De acuerdo con los resultados descritos en el apartado anterior, la presencia de síntomas estuvo muy relacionada con la afinidad que presentaron las diferentes combinaciones de cultivar y portainjerto. Asimismo, se encontró que la infección por fitoplasmas en las diferentes temporadas estuvo muy influenciada por la intensidad del ataque del vector. Por esa razón los trabajos posteriores fueron orientados al estudio de la relación entre presencia de síntomas y detección de fitoplasmas en un solo tipo de planta

(para evitar la influencia del grado de afinidad) y con diferentes grados de ataque de la plaga. También en esta etapa de investigación se buscó detectar al patógeno en el vector y conocer si la detección variaba durante la temporada.

Presencia de síntomas y relación con la detección de fitoplasmas en plantas con diferente grado de ataque de psila

En un experimento sobre control de psila en plantas del cultivar 'Williams' sobre membrillero 'D'Anjou' afrancado ubicado en el campo experimental de INIA Las Brujas (Figura 28) se seleccionaron plantas con y sin síntomas (Figura 29) dentro de cuatro opciones diferentes en cuanto a forma de control y grado de ataque de la plaga (cuadro 12): 1) plantas tratadas con insecticida con ataque moderado de psila, 2) plantas sin tratamiento insecticida sin ataque de la plaga, 3) plantas sin tratamiento insecticida con ataque medio de la plaga y 4) plantas que habían recibido tratamientos con insecticidas pero con ataque severo. En cada

grupo se colectaron, muestras de ramas de dos años en cinco plantas con y sin síntomas atribuibles al decaimiento del peral (epinastia y enrojecimiento), las que fueron analizadas para conocer si estaban infectadas por fitoplasmas.

Los tratamientos insecticidas fueron aplicados en abril 2010 y las muestras colectadas en mayo 2010.

En el cuadro 12 se muestran los resultados de la detección. Un primer análisis global de la información nos indica que se detectaron fitoplasmas en la mayor parte de las plantas con síntomas (77%) y lo inverso ocurrió con las asintomáticas (13%). El grado de ataque del vector influyó en la frecuencia de detección del fitoplasma ya que cuando este fue fuerte, todas las plantas presentaban síntomas y estaban infectadas. Por el contrario, no se detectaron fitoplasmas en ninguna de las plantas sin síntomas. Cuando el ataque de la plaga fue moderado a bajo, algunas plantas sin síntomas estaban infectadas, lo cual, de acuerdo con lo expresado en la bibliografía se trataría de infecciones tardías. En ese cuadro también se puede observar que la realización de tratamien-

Figura 28. Vista general de las plantas de 'Williams'/membrillero afrancadas pertenecientes al ensayo de control de psila utilizadas en el estudio.

Figura 29. Plantas con y sin síntomas del experimento sobre control de psila analizadas por infección de fitoplasmas, monte de 'Williams'/membrillero afrancado.

tos insecticidas no influyó sobre el grado de ataque de la plaga en este monte en particular ya que los grupos de plantas seleccionadas que los recibieron presentaban niveles altos y moderados. No se puede dar una explicación concreta de por qué las plantas que no recibieron tratamiento (testigo sin tratar) presentaran niveles moderados o ba-

jos de ataque. Posiblemente fuera debido a la distribución irregular del insecto entre plantas. Independientemente de ello lo importante es que se confirma la asociación entre presencia de fitoplasmas-síntomas y alto ataque de psila observada en los primeros estudios de 1995.

Cuadro 12. Detección de fitoplasmas y presencia de síntomas en experimento de control de psila. Abril-mayo 2010.

Tratamiento ¹	Ataque de psila ²	Enrojecimiento/epinastia	Número de plantas	Número de plantas positivas PCR+	Porcentaje de detección
Control moderado	Moderado	con síntomas	5	5	100
	Moderado	sin síntomas	5	1	20
Testigo sin tratar ³	Bajo	Con síntomas	5	2	40
	Bajo	Sin síntomas	5	0	0
Testigo sin tratar	Moderado	Son síntomas	5	2	40
	Moderado	Sin síntomas	5	1	20
Control deficiente	Fuerte	Todas defoliadas y con síntomas	10	10	100

¹ Tratamientos insecticidas realizados abril 2010.

² Evaluaciones de ataque de psila y síntomas en planta realizados en mayo 2010.

³ En el análisis las plantas que no recibieron tratamientos insecticidas fueron separadas en dos grupos de acuerdo al nivel de ataque de la plaga.

Detección molecular en psilas colectadas en montes de pera

Para estudiar la variación en la detección de fitoplasmas en psila durante el ciclo se analizaron individuos adultos del vector colectados en diferentes cultivos durante el período mayo 2009 - abril 2011.

En un primer paso se ajustó la detección de fitoplasmas en psilas, para ello se utilizó un protocolo más simple de extracción que el empleado con las muestras vegetales (Zhang *et al.*, 1998). Los insectos fueron separados en grupos de 5-10 individuos adultos (según disponibilidad) y fueron macerados con nitrógeno líquido en tubos de microcentrifuga usando un micro pistilo de plástico. A cada tubo se le agregaron 250 µl de buffer CTAB (bromuro de cetil trimetil amonio) y se incubaron en baño maría a 60 °C por 30 minutos. Luego se agregaron 250 µl de una mezcla de cloroformo-isoamílico 24/1, se homogeneizaron con vortex y se centrifugaron a 10000 rpm por 20 minutos. El sobrenadante (200 µl) se transfirió a un nuevo eppendorf y se precipitó con el agregado de isopropanol a -20 °C. Se incubaron 30 minutos a -20 °C, luego se centrifugó a 10000 rpm por 40 minutos. Se

eliminó la fase acuosa y el pellet se limpió con el agregado de 500 µl de etanol 70% y centrifugación a 10000 rpm por 8 minutos. Se descartó el sobrenadante, se dejó secar el pellet y finalmente se lo resuspendió en 50 µl de agua milliQ y conservó a -20 °C hasta su utilización. El resto de la reacción PCR fue idéntica a la utilizada con las muestras vegetales.

La cantidad mínima de insectos a incluir en los grupos fue calculada en experimentos previos, en los cuales únicamente se pudo detectar fitoplasmas en grupos de cinco individuos o más (datos no mostrados). En la Figura 30 se muestran las bandas amplificadas que corresponderían a CPP en las pruebas PCR realizadas a grupos de cinco individuos de *C. bidens*.

Una vez ajustada la metodología de detección en insectos se realizaron colectas periódicas en tres montes de INIA Las Brujas y uno comercial en la zona de Melilla con historia de alta infestación con psila. Las colectas se efectuaron durante el período mayo 2009 - mayo 2011.

En la Figura 31 se muestra la evolución de la detección en los diferentes montes y la abundancia de insectos durante el período

Figura 30. Bandas correspondientes a fragmentos amplificados por PCR en grupos de individuos de *C. bidens*. Fotos: L. Goncálvez y M. Silvera.

de colecta. Si bien no se trata de una evaluación de la dinámica poblacional del insecto, se puede asumir como una medida indirecta de la disponibilidad de adultos durante ese lapso. Es de destacar que, desde el punto de vista de la potencial transmisión de la enfermedad, se detectaron fitoplasmas en *C. bidens* en todas las colectas, lo cual coincide con lo reportado en la bibliografía para otras *Cacopsylla* spp. Si bien no se

comprobó la transmisión a plantas de peral por parte de este insecto y específicamente de los individuos colectados en esta prueba, podemos sospechar que constituiría una fuente muy importante para que el patógeno sobreviva durante el receso en Uruguay tomando en cuenta la detección en las colectas del mes de junio en ambas temporadas (Figura 31).

Figura 31. Detección de fitoplasmas en psila en el período junio 2009 - abril 2011. Los insectos fueron colectados fueron analizados en grupos de cinco individuos. El número de grupo estuvo sujeto a la disponibilidad en cada fecha.

INFLUENCIA DE LOS TRATAMIENTOS OTOÑALES PARA EL CONTROL DE PSILA EN LA TRANSMISIÓN DE CPP Y PRESENCIA DE LA ENFERMEDAD

Durante los otoños de 2013 y 2014 se llevó a cabo un ensayo en el que se compararon diferentes esquemas de aplicación del insecticida Delegate WG (spinetoram) para el control de psila. El producto fue aplicado a una dosis de 15 g + 250 ml aceite por 100 litros de agua en un monte de peral Abate Fetel injertado sobre membrillero Adams de siete años en el campo experimental de INIA Las Brujas.

Los tratamientos comparados fueron: 1) testigo sin tratar, 2) cinco aplicaciones quincenales (a partir de inicio de marzo), 3) cuatro aplicaciones quincenales (mediados de marzo), 4) tres aplicaciones quincenales (a

partir de inicio de abril), 5) dos aplicaciones quincenales (a partir de mediados de abril) y 6) una aplicación (a fines de abril).

Durante marzo-mayo se registró la evolución de la plaga, los síntomas asociados a la enfermedad, y mediante PCR, la presencia de fitoplasmas en plantas e insectos adultos (en grupos 6-7 individuos).

En 2014 la captura de adultos en trampas amarillas engomadas (placas de 20 x 10 cm) fue muy baja (casi inexistente) comparada con 2013 (Figura 32). Esto se tradujo en registros menores de presencia de los diferentes estadios (ninfas, adultos y mielecilla) evaluados en 30 hojas por parcela. Tomando en cuenta únicamente la temporada 2013, el mejor control de *C. bidens* se obtuvo con un esquema de 3 a 5 aplicaciones de spinetoram, o sea, cubriendo fundamentalmente el período inicial (Cuadro 13).

Figura 32. Número de adultos de *C. bidens* por día (número de adultos en trampa dividido número de días en que la trampa estuvo expuesta) promedio de seis trampas pegajosas. Otoños 2013 y 2014. Nótese la diferente escala utilizada para los valores de cada temporada.

Cuadro 13. Número de adultos, ninfas y formación de mielecilla de *C. bidens* a final del ensayo, temporadas 2013 y 2014 (promedio de 30 hojas por parcela).

Tratamientos	Adultos		Ninfas		Mielecilla	
	7/5/2013	6/5/2014	7/5/2013	6/5/2014	7/5/2013	6/5/2014
Testigo sin tratar	16,0 b ¹	2,4	45,0 c	0,4	5,0 d	0,4
Cinco aplicaciones	5,0 a	0,4	1,0 a	0	0,2 a	0
Cuatro aplicaciones	5,6 a	0,6	1,6, a	0	1,2 b	0
Tres aplicaciones	6,4 a	0	6,2 a	0	3,0 c	0
Dos aplicaciones	21,6 b	0,4	11,6 b	0	4,4 d	0
Una aplicación	17,6 b	1	40,4 c	0,6	4,8 d	0,6

¹Las medias de cada fecha seguidas por igual letra no difieren significativamente al 5% según la prueba Duncan de rangos múltiples.

El nivel de enrojecimiento de follaje, medido con una escala visual 0-5, (donde 0 = sin enrojecimiento y 5 = total del follaje con enrojecimiento) también fue menor en 2014 y en ninguna de las temporadas guardó relación con el control de psila o con el número de aplicaciones de insecticida (cuadro 14).

La detección de ‘*Candidatus Phytoplasma pyri*’ realizada en cada fecha de acuerdo a la metodología ya descrita desde fin de febrero hasta mayo en seis plantas de cada tratamiento (plantas diferentes en cada oportunidad) también siguió la misma tendencia. En la temporada 2013 se detectaron fitoplasmas en 12 plantas en tres fechas (mediados de marzo, principio y mediados de abril), principalmente en la primera, mientras que en 2014 solamente en cinco muestras correspondientes a fin de febrero y una a principios de mayo (Figura 33). Esta información indicaría que la mayor parte de la infección se registraría previo a las primeras fechas de muestreo (Figura 34) y previo a la aplicación de los tratamientos. Esto podría explicar que no existan diferencias en la detección de fitoplasmas ni en la expresión de síntomas entre los diferentes tratamientos para el control del vector porque éstos fueron realizados luego de que ocurrió la mayor parte de la infección.

El análisis de seis grupos de 5-10 insectos en cuatro colectas (11/3, 1/4, 11/4 y 15/

Cuadro 14. Intensidad de enrojecimiento de follaje en febrero 2013 y 2014.

Tratamiento	2013	2014
1. Testigo sin tratar	2,3 ¹	0,24
2. Cinco aplicaciones	3,2	0,29
3. Cuatro aplicaciones	4,1	0,21
4. Tres aplicaciones	3,0	0,46
5. Dos aplicaciones	3,0	0,40
6. Una aplicación	2,5	0,38

¹ Según una escala 0-5 (donde 0 = sin enrojecimiento, 1 = algunas hojas que comienzan a enrojecer, 2 = menos del 50% del follaje con inicio de enrojecimiento, 3 = más del 50% del follaje con inicio de enrojecimiento, 4 = más del 50% del follaje enrojecido y 5 = total del follaje con enrojecimiento intenso).

5) en 2013 y dos en 2014 (14/4 y 9/5) utilizando la metodología ya descrita, permitió la detección del patógeno en un alto porcentaje de los grupos durante todo el período. En 2013 el porcentaje de grupos en los que se detectaron fitoplasmas aumentó hacia el fin del periodo (Figura 35) lo cual coincidiría con García-Chapa *et al.* (2015) y Blomquist y Kirkpatrick (2002).

De acuerdo con estos datos, ya al comienzo del experimento existía un porcentaje apreciable de vectores portadores de fitoplasmas que potencialmente pudieron haber transmitido la enfermedad antes de la aplicación de los tratamientos para el control del vector (Figura 34).

Figura 33. Detección de fitoplasmas en plantas de peral correspondientes a los tratamientos evaluados en muestras extraídas en tres fechas por temporada: otoño 2013 (arriba), otoño 2014 (abajo).

Figura 34. Frecuencia de detección de fitoplasmas durante la temporada (en porcentaje).

Figura 35. Detección de fitoplasmas por PCR en grupos de 5-10 insectos adultos colectados en el experimento.

PARTE III: CONSIDERACIONES FINALES

Tomando en cuenta los resultados de los trabajos descritos podemos realizar las siguientes consideraciones:

1. El fitoplasma '*Candidatus Phytoplasma pyri*' (CPP), organismo causal de la enfermedad conocida como «decaimiento del peral» está presente en nuestro país infectando plantas de peral de diferentes características.
2. Fue posible detectarlo utilizando la técnica de PCR en muestras de floema de la base de ramas de 1-2 años colectadas en otoño previo al receso y realizando la extracción de acuerdo con Marzachi *et al.* (1999).
3. Si bien en estos trabajos se utilizó la técnica de PCR directa con los primers f01/r01, los avances en lo referente a técnicas de detección indican que se lograrán mejores resultados empleando otras variantes, como una PCR anidada en la cual los productos amplificados son sometidos a una segunda reacción con primers específicos para CPP. Eso permitiría aumentar la sensibilidad y muy probablemente aumentaría el número de muestras con detección.
4. La importancia de esta enfermedad depende de la combinación cultivar/portainjerto ya que los síntomas observados en estos trabajos y atribuibles a decaimiento están muy ligados a la afinidad entre cultivar y portainjerto.
5. Esta sensibilidad deberá ser un factor para considerar en la elección de un portainjerto, fundamentalmente al utilizar combinaciones poco vigorosas y precoces como es tendencia en estos momentos a nivel local.
6. El porcentaje de infección de plantas con fitoplasmas encontrado estuvo muy relacionado con el nivel de la infestación de psila, siendo mayor en aquellas temporadas con ataques más fuertes. La asociación entre los síntomas y la detección de fitoplasmas fue mayor cuando las plantas estaban sometidas a fuertes ataques de la plaga.
7. Si bien aún *C. bidens* no está reportado como vector de la enfermedad, se detectaron fitoplasmas en este insecto durante todo el año, con una tendencia a aumentar la detección hacia fines del período vegetativo.
8. De acuerdo con lo anterior y en concordancia con la bibliografía, la transmisión podría registrarse desde inicio de brotación y, por lo tanto, el control tradicional del vector con insecticidas durante el otoño no la impidió ni siquiera aumentando el número de aplicaciones. En ese sentido para impedir el avance de esta enfermedad en un monte las medidas de manejo sobre el vector deberán realizarse temprano en la temporada apenas detectada su presencia en el cultivo.
9. Por todo lo visto, es necesario realizar un manejo integrado de esta enfermedad en el que se deben considerar los aspectos productivos y de rentabilidad en conjunto; tomar decisiones en lo referente a la combinación de cultivar/portainjerto a utilizar sabiendo de la distinta susceptibilidad; ajustar los momentos de intervención con insecticida y definir manejos de suelo promotores de enemigos naturales y/o predadores de la psila para disminuir su incidencia como vector.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- ABURKHES, M.M.; EL-GHAWAWI, H.; BEN TAHER, A.M.** 1991. Sanitary program for pome and stone fruits in Libya. En: XVth International Symposium on virus and virus diseases of temperate fruit crops, Vienna, Austria.
- AHRENS, U.; SEEMÜLLER, E.** 1992. Detection of DNA of plant pathogenic mycoplasma-like organisms by a polymerase chain reaction that amplifies a sequence of the 16S RNA gene. *Phytopathology*, 82(8):828–83
- ALDAGHI, M.; MASSART, S.; DUTRECQ, O.; BERTACCINI, A.; JIJAKLI, M.H.; LEPOIVRE, P.** 2009. A simple and rapid protocol of crude DNA extraction from apple trees for PCR and real-time PCR detection of 'Candidatus Phytoplasma mali'. *Journal of Virological Methods*, 156:96–101
- AVINENT, L.; LLÁCER, G.; ALMACELLAS, J.; TORÁ, R.** 1997. Pear decline in Spain. *Plant Pathology*, 46:694-698
- BABINI, A. R.; FIUMI, E.; GIUNCHEDI, L.; PIGNATTA, D.; POLLINI, C. P.; REGGIANI, N.** 2008. Investigations with real-time PCR assay on the transmissibility of pear decline phytoplasma. *Acta Horticulturae*, 781: 495-497
- BATJER, L.; SCHNEIDER, H.** 1960. Relation of pear decline to rootstocks and sieve-tube necrosis. *Proceedings American Society for Horticultural Science*, 76: 85-97
- BELIEN, T.; BANGELS, E.; PEUSENS, G.** 2013. Integrated control of psyllid (*Cacopsylla* sp.) vectors of European fruit tree phytoplasmas. *Phytopathogenic Mollicutes*, 3 (1): 31-36
- BEN KHALIFA, M.; MARRAKCHI, M.; FAKHFAKH, H.** 2007. 'Candidatus Phytoplasma pyri' infections in pear orchards in Tunisia. *Journal of Plant Pathology*, 89 (2):269-272
- BERTACCINI, A.** 2007. Phytoplasmas: diversity, taxonomy, and epidemiology. *Frontiers in Bioscience*, 12:673
- BIANCO, P.A.; MARZACHI, C.; MUSETTI, R.; NAOR, V.** 2013. Perspectives of endophytes as biocontrol agents in the management of phytoplasma diseases. *Phytopathogenic Mollicutes*, 3 (1): 56-59
- BISOGNIN, C.; SCHNEIDER, B.; SALM, H.; GRANDO, M. S.; JARAUSCH, W.; MOLL, E.; SEEMÜLLER, E.** 2008. Apple proliferation resistance in apomictic rootstocks and its relationship to phytoplasma concentration and simple sequence repeat genotypes. *Phytopathology*, 98(2):153-158
- BLODGETT, E. C.; SCHNEIDER, H.; AICHELE, M. D.** 1962. Behavior of pear decline disease on different stock-scion combinations. *Phytopathology*, 52(7):679-84
- BLOMQUIST, C.L.; KIRKPATRICK, B.C.** 2002. Frequency and seasonal distribution of pear psylla infected with the pear decline phytoplasma in California pear orchards. *Phytopathology*, 92(11):1218–1226
- CABRERA, D.; NÚÑEZ, S.; LEONI, C.; FEIPPE, A.; MAESO, D.; ZOPPOLO, R.** 2007. El cultivo del peral en Uruguay. *Fruticultura Profesional*, 168: 33-40
- CARRARO, L.; LOI, N.; ERMACORA, P.; GREGORIS, A.; OSLER, R.** 1998. Transmission of pear decline by using naturally infected *Cacopsylla pyri* L. *Acta Horticulturae*, 472:665-668
- CARRARO, L.; LOI, N.; ERMACORA, P.** 2001. The life cycle of pear decline phytoplasma in the vector *Cacopsylla pyri*. *Journal of Plant Pathology*, 83 (2):87-90
- CARRARO, L.; ERMACORA, P.; LOI, N.; OSLER, R.** 2004. The recovery phenomenon in apple proliferation infected apple trees. *Journal of Plant Pathology*, 86:141–146.

- CHOUERI, E.; SALAR, P.; JREIJIRI, F.; EL ZAMMAR, S.; DANET, J.L.; FOISAC, X.** 2007. First report and characterization of pear decline phytoplasma on pear in Lebanon. *Journal of Plant Pathology*, 89 (3, Supplement):S69-76
- DAVIES, D. L.; GUISE, C. M.; CLARK, M. F.; ADAMS, A. N.** 1992. Parry's disease of pears is similar to pear decline and is associated with mycoplasma-like organisms transmitted by *Cacopsylla pyricola*. *Plant Pathology*, 41:195-203
- DAVIES, D.L.; CLARK, M.F.; ADAMS, N.A.** 1998. The epidemiology of pear decline in the UK. *Acta Horticulturae*, 472, 669-672
- DENG, S.; HIRUKI, C.** 1991. Genetic relatedness between two non culturable mycoplasma-like organisms revealed by nucleic acid hybridization and polymerase chain reaction. *Phytopathology*, 81(12):1475-1479
- DOYLE, J.F.; O'REILLY, H.J.; NYLAND, G.; BEARDEN, B.; BETHELL, R.; HEMSTREET, C.; MOREHEAD, C.; SIBBETT, S.** 1970. Distribution of pear decline in California orchards. *California Agriculture*, 24 (6):14-15
- ERREA, P.; AGUELO, V.; HORMAZA, J.I.** 2002. Seasonal variations in detection and transmission of pear decline phytoplasma. *Journal of Phytopathology*, 150:439-443
- EUPHRESO FRUITPHYTOINTERLAB GROUP.** 2011. European interlaboratory comparison and validation of detection methods for '*Candidatus* Phytoplasma mali', '*Candidatus* Phytoplasma prunorum' and '*Candidatus* Phytoplasma pyri': preliminary results. *Bulletin of Insectology*, 64 (Supplement): S281-S284
- FACUNDO, R.; QUIROGA, N.; MÉNDEZ, P.; ZAMORANO, A.; FIORE, N.** 2017. First report of '*Candidatus* Phytoplasma pyri' on pear in Chile. *Plant Disease*, 101(5):830
- GARCIA-CHAPA, M.; LAVIÑA, A.; SANCHEZ, I.; MEDINA, V.; BATLLE, A.** 2003. Occurrence, Symptom Expression and Characterization of Phytoplasma Associated with Pear Decline Disease in Catalonia (Spain). *Journal of Phytopathology*, 151:584-590
- GARCIA-CHAPA, M.; SANCHEZ, I.; MEDINA, V.; VIRUEL, M.A.; LAVIÑA, A.; BATLLE, A.** 2003b. Seasonal detection of pear decline phytoplasma by nested-PCR in different pear cultivars. *Plant Pathology*, 52: 513-520
- GARCIA-CHAPA, M.; SABATÉ, J.; LAVIÑA, A.; BATLLE, A.** 2005. Role of *Cacopsylla pyri* in the epidemiology of pear decline in Spain. *European Journal of Plant Pathology*, 111: 9-17
- GIUNCHEDI, L.** 2003. Malattie da virus, viroidi e fitoplasmi degli alberi da frutto Edagricole. Bologna. 337 p.
- GONZALES, C.Q.; GRIGGS, W.H.; JENSEN, D.D.; GOTAN, S.M.** 1963. Role of pear psylla on pear decline. *California Agriculture*, 17:4-6.
- GREEN, M. J.; THOMPSON, D. A.; MACKENZIE, D. J.** 1999. Easy and efficient DNA extraction from woody plants for the detection of phytoplasmas by polymerase chain reaction. *Plant Disease*, 83(5):482-485
- HODGETTS, J.; BOONHAM, N.; MUMFORD, R.; DICKINSON, M.** 2009. Panel of 23S rRNA Gene-Based Real-Time PCR Assays for Improved Universal and Group-Specific Detection of Phytoplasmas. *Applied and environmental microbiology*, 75(9): 2945-2950
- HUNTER, D. M.; SVIRCEV, A. M.; KAVIANI, M.; MICHELUTTI R.; WANG, L.; THOMPSON, D.** 2010. First Report of Pear Decline Caused by '*Candidatus* Phytoplasma pyri' in Ontario, Canada. *Plant Disease*, 94(5):634
- JARAUSCH, B.; TORRES, E.** 2014. Management of phytoplasma-associated diseases. En: A. BERTACCINI (Ed.). *Phytoplasmas and phytoplasma disease management: How to reduce their economic impact* (pp. 199-208). Bologna Italy. IPWG International Phytoplasma Working Group.
- JENSEN, D. D.; GRIGGS, W. H.; GONZALES, C. Q.; SCHNEIDER, H.** 1964. Pear decline virus transmission by pear psylla. *Phytopathology* 54(11):1346-1351

- KUMMERT, J.; RUFFLARD, G.** 1997. A preliminary report on the detection of phytoplasmas by PCR. *Biochemica*, 1:19-22
- LEE, I.M.; BERTACCINI, A.; VIBIO, M.; GUNDERSEN, D.E.** 1995. Detection of multiple phytoplasmas in perennial fruit trees with decline symptoms in Italy. *Phytopathology*, 85(6):728-735
- LEE, I.M.; GUNDERSEN-RINDAL, D.E.; DAVIS, R.E.; BARTOSZYK, I.M.** 1998. Revised classification scheme of phytoplasmas based on RFLP analyses of 16S rRNA and ribosomal protein gene sequences. *International Journal of Systematic Bacteriology*, 48:1153-1169
- LEE, I.M.; DAVIS, R.E.; GUNDERSEN-RINDAL, D.E.** 2000. Phytoplasma: Phytopathogenic mollicutes. *Annual Review of Microbiology*, 54, 221-255
- LEMOINE, J.** 1991. Deperissement du poirier: role de *Psylla pyri* dans sa dissémination. *Arboriculture Fruitière*, 442: 28-32
- LIU, H.L.; CHEN, C.C.; LIN, C.P.** 2007. Detection and identification of the phytoplasma associated with pear decline in Taiwan. *European Journal of Plant Pathology*, 117:281-291.
- LIU, S.L.; LIU, H.L.; CHANG, S.C.; LIN, C.P.** 2011. Phytoplasmas of two 16S rDNA groups are associated with pear decline in Taiwan. *Botanical Studies*, 52: 313-320
- LORENZ, K. H.; SCHNEIDER, B.; AHRENS, U.; SEEMULLER, E.** 1995. Detection of the apple proliferation and pear decline phytoplasmas by PCR amplification of ribosomal and nonribosomal DNA. *Phytopathology*, 85(7):771-776
- MAESO, D.C.; MARTÍNEZ, A.; FEDERICI, M.T.; GONCALVES, L.; SILVERA, M.; CABRERA, D.; NÚÑEZ, S.; WALASEK, W.; GIUNCHEDI, L.** 2012. El decaimiento del peral en Uruguay: Generalidades y trabajos experimentales de INIA Las Brujas. En: Seminario de Actualización en Frutales de Pepita. INIA Las Brujas. Montevideo: INIA. p51-68 (Serie de Actividades de Divulgación, 687)
- MAESO, D.** 2014. El decaimiento del peral: Un problema adicional en ciertas combinaciones variedad-portainjerto. *Revista INIA*, 37:51-54.
- MARTÍNEZ, A.** 2008. Detección de fitoplasmas en plantas de peral y su relación con desórdenes del cultivo. Trabajo Especial II. Facultad de Ciencias. Universidad de la República. 116 p.
- MARZACHI, C.; ALMA, A.; D'AQUILIO, M.; MINUTO, G.; BOCCARDO, G.** 1999. Detection and identification of phytoplasma infecting cultivated and wild plants in Liguria (Italian Riviera). *Journal of Plant Pathology*, 81:127-136
- MAYER, C. J.; VILCINSKAS, A.; GROSS, J.** 2008. Pathogen-induced Release of Plant Allomone Manipulates Vector Insect Behavior. *Journal of Chemical Ecology*, 34:1518-1522
- MCLARTY, H.R.** 1948. Killing of pear trees. *Annual Report Canadian Plant Disease Survey*, 28:77
- MGAP-DIEA.** 2016. Encuesta frutícola de hoja caduca. Zafra 2016. Serie Encuestas N° 338. Consultada 20 nov 2019 https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/sites/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/files/2020-02/encuesta_fruticola_de_hoja_caduca_zafra_2016.pdf
- MUJICA, M.V.; VALLE, D.; ZOPPOLO, R.** 2014. Psila del peral, plaga antigua ¿problema nuevo? Consideraciones en el manejo de la psila del peral en el marco de un plan de manejo regional de plagas. *Revista INIA Uruguay*, 36: 28:31.
- MUJICA, M.V.; SILVERA, M.; GONCALVES, L.; LEONI, C.; MAESO, D.** 2014. Control químico de psila y su influencia sobre el decaimiento del peral y desórdenes asociados. En: Actualización técnica de Frutales de Pepita. INIA Las Brujas. Montevideo: INIA. p23-30 (Serie de Actividades de Divulgación, 739)
- MUSETTI, R.; FARHAN, K.; DE MARCO, F.; POLIZZOTTO, R.; PAOLACCI, A.; CIAFFI, M.; ERMACORA, P.; GRISAN, S.; SANTI, S.; OSLER, R.** 2012. Differentially-regulated defence genes in *Malus domestica* during phytoplasma infection and recovery. *European Journal of Plant Pathology*, 136 (1):13-19.

- MUSETTI, R.; ERMACORA, P.; MARTINI, M.; LOI, N.; OSLER, R.** 2013. What can we learn from the phenomenon of «recovery»? *Phytopathogenic Mollicutes*, 3 (1): 63-65
- NEMETH, M.** 1986. Virus, micoplasma, and rickettsia diseases of fruit trees. Budapest. Martinus Nijhoff Publishers. 840 p.
- NIKOLIC, P.; MEHLE, N.; GRUDEN, K.; RAVNIKAR, M.; DERMASTIA, M.** 2010. A panel of real-time PCR assays for specific detection of three phytoplasmas from the apple proliferation group. *Molecular and Cellular Probes*, 24:303-309
- NÚÑEZ, S.; PAULLIER, J.** 1991. Plagas del peral. Psila y agamuzado. Montevideo: INIA. 20 p (Boletín de Divulgación; 4)
- NÚÑEZ, S.; SCATONI, I.** 2013. Tecnología disponible para el manejo de plagas en frutales de hoja caduca. Montevideo: INIA Las Brujas. 150p (Serie Técnica; 210).
- OEPP/EPPO.** 1999. EPPO Standards PM 4/27 (1) Pathogen-tested material of *Malus*, *Pyrus* and *Cydonia*. Bulletin OEPP/EPPO, 29:239–252
- OEPP/EPPO.** 2006. EPPO Standards PM 7/62 (1) '*Candidatus* Phytoplasma mali'. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 36:121–126
- OEPP/EPPO.** 2006. '*Candidatus* Phytoplasma pyri'. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 36:127–128
- OEPP/EPPO.** 2018. EPPO Global Database Phytoplasma pyri (PHYPPY). Consultado 20 nov. 2019 de <https://gd.eppo.int/taxon/PHYPPY/distribution>.
- OSLER, R.; CARRARO, L.; LOI, N.; REFATTI, E.** 1993. Symptom expression and disease occurrence of a yellows disease of grapevine in northeastern Italy. *Plant Disease*, 77(5):496–498
- OSLER, R.; LOI, N.; CARRARO, L.; ERMACORA, P.; REFATTI, E.** 2000. Recovery in plants affected by phytoplasmas. En: Proceedings of the 5th Congress of the European Foundation for Plant Pathology, Taormina, Italy, September 18–22 2000, pp. 589–592.
- POGGI POLLINI, C.; BISSANI, R.; GIUNCHEDI, L.** 1995.- Overwintering of pear decline agent in some quince rootstocks. *Acta Horticulturae*, 386: 496-499
- PURCELL, A.H.; RICHARDSON, J.; FINLAY, A.** 1981. Multiplication of the agent of X-disease in a non-vector leafhopper *Macrostelus fascifrons*. *Annals of Applied Biology*, 99:283-289
- QUIROGA, N.; BATLLE, A.; LAVIÑA, A.; MAESO, D.; CONCI, L.; FERNÁNDEZ, F.; SOUSA, E.; FIORE, N.** 2018. Phytoplasmas infecting pome and stone fruits in South America and Iberian peninsula. *Phytopathogenic Mollicutes*, 8 (2):63-68
- RID, M.; MESCA, C.; AYASSE, M.; GROSS, J.** 2016. Apple proliferation phytoplasma influences the pattern of plant volatiles emitted depending on pathogen virulence. *Frontiers in Ecological Evolution*, 3:152
- ROMANAZZI, G.** 2013. Perspectives for the management of phytoplasma diseases through induced resistance: what can we expect from resistance inducers? *Phytopathogenic Mollicutes*, 3 (1): 60-62.
- SALEHI, M.; IZADPANAH, K.; TAGHAVI, S.M.; RAHIMIAN, H.** 2008. Characterization of a Phytoplasma Associated with Pear Decline in Iran. *Journal of Phytopathology*, 156:493–495
- SCHNEIDER, H.** 1970. Graft transmission and host range of pear decline causal agent. *Phytopathology* 60(2):204–207
- SCHNEIDER, H.** 1977. Indicator hosts for pear decline: symptomatology, histopathology, and distribution of mycoplasma-like organisms in leaf veins. *Phytopathology* 67(5):592-601
- SCHNEIDER, B., SEEMÜLLER, E., SMART, C.D., AND KIRKPATRICK, B.** 1995. Phylogenetic classification of plant pathogenic mycoplasma-like organisms or phytoplasmas. En: Razin S., Tully J.G. (eds). *Molecular and Diagnostic Procedures in Mycoplasma*, Vol. 1, pp 369-380. Academic Press, San Diego, CA, USA.

- SCHNEIDER, B.; GIBBS, K.S.** 1997. Detection of phytoplasmas in declining pears in Southern Australia. *Plant Disease*, 81(3):254-258
- SCHRÖDER, M.** 2019. Detection of '*Candidatus* Phytoplasma pyri' (pear decline agent) in pear trees by different diagnostic procedures in the seasonal course. *Journal für Kulturpflanzen*, 71 (7): S. 201–210
- SEEMÜLLER, E.** 1976. Investigations to demonstrate mycoplasma-like organisms in diseased plants by fluorescence microscopy. *Acta Horticulturae*, 67:109–111.
- SEEMÜLLER, E.; SCHAPER, U.; ZIMBELMANN, F.** 1984. Seasonal variation in the colonization patterns of mycoplasma-like organisms associated with apple proliferation and pear decline. *Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz*, 91:371–382
- SEEMÜLLER, E.** 1990. Pear decline. En: *Virus and virus-like diseases of pome fruits and simulating noninfectious disorders*. Fridlund, P.R., Ed. Washington State University. Cooperative Extension College of Agriculture and Home Economics. Special Publication SP0003, p. 188-201.
- SEEMÜLLER, E.; MARCONE, C.; LAUER, U.; RAGAZZINO, A.; GOSCHL, M.** 1998. Current status of molecular classification of the phytoplasmas. *Journal of Plant Pathology*, 80:3–26
- SEEMÜLLER, E.; SCHNEIDER, B.** 2004. '*Candidatus* Phytoplasma mali', '*Candidatus* Phytoplasma pyri' and '*Candidatus* Phytoplasma prunorum', the causal agents of apple proliferation, pear decline and European stone fruit yellows, respectively. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, 54:1217–1226
- SERTKAYA, G.; MARTINI, M.; ERMACORA, P.; MUSETTI, R.; OSLER, R.** 2005. Detection and Characterization of Phytoplasmas in Diseased Stone Fruits and Pear by PCR-RFLP Analysis in Turkey. *Phytoparasitica*, 33(4):380-390
- SEEMÜLLER, E.; MOLL, E.; SCHNEIDER, B.** 2009. Pear decline resistance in progenies of *Pyrus* taxa used as rootstocks. *European Journal of Plant Pathology*, 123(2):217-223
- SHALLA, T.A.; CARROLL, T.W.; CHIARAPPA, L.** 1964. Transmission of pear decline by grafting. *California Agriculture*, 18:4-5
- SMART, C.D.; SCHNEIDER, B.; BLOMQUIST, C.L.; GUERRA, L.J.; HARRISON, N.A.; AHRENS, U.; LORENZ, K.H.; SEEMÜLLER, E.; KIRKPATRICK, B.C.** 1996. Phytoplasma-specific PCR primers based on sequences of the 16S-23S rRNA spacer region. *Applied and environmental microbiology*, 62 (8):2988–2993
- SÜLE, S.; JENSER, G.; SZITA, E.** 2007. Management of pear decline caused by '*Candidatus* Phytoplasma pyri' in Hungary. *Bulletin of Insectology*, 60 (2): 319-320
- VALLE, D.; MUJICA, V.; ZOPPOLO, R.; MORELLI, E.** 2015. Manejo de la vegetación espontanea en la entrefila como alternativa para el control de la psila de peral *Cacopsylla pyricola* Foester, 1848 (hemiptera: psyllidae). *Entomología Mexicana*, 2:339-345
- VALLE, D.; MUJICA, V.; ZOPPOLO, R.; MORELLI, E.** 2016. Acercamiento a un manejo más agroecológico de la psila del peral. *Revista INIA* 45:22-24.
- VALLE, D.; BURCKHARDT, D.; MUJICA, V.; ZOPPOLO, R.; MORELLI, E.** 2017. The occurrence of the Pear Psyllid, *Cacopsylla bidens* (Sulc 1907) (Insecta: Hemiptera: Psyllidae), in Uruguay. *Checklist*, 13: 2088.
- WESTWOOD, M. N.** 1976. Inheritance of pear decline resistance. *Fruit Varieties Journal*, 30, 63–64
- WESTWOOD, M. N.; LOMBARD, P. B.** 1982. Rootstocks for pear. *Proceedings of the Oregon Horticultural Society*, 73:64–79

ZHANG, Y.-P.; UYEMOTO, J. K.; KIRKPATRICK, B. C. 1998. A small-scale procedure for extracting nucleic acids from woody plants infected with various phytopathogens for PCR assay. *Journal of Virological Methods*, 71:45-50

ZOPPOLO, R.; SCATONI, I.; DUARTE, F.; MUJICA, M.; GABARD, Z. 2016. Area-wide pest management in deciduous fruits of southern Uruguay. *Acta Horticulturae*.153-160. Doi: 10.17660/ActaHortic.2016.1137.21

INIA Dirección Nacional

Avenida Italia 6201,
Ed. Los Guayabos,
Parque Tecnológico LATU.
Montevideo
Tel.: 2605 6021
inia@inia.org.uy

INIA La Estanzuela

Ruta 50, Km 11
Colonia
Tel.: 598 4574 8000
Fax: 598 4574 8012
iniale@le.inia.org.uy

INIA Las Brujas

Ruta 48, Km 10
Canelones
Tel.: 598 2367 7641
Fax: 598 2367 7609
inia_lb@lb.inia.org.uy

INIA Salto Grande

Camino al Terrible
Salto
Tel.: 598 4733 5156
Fax: 598 4732 9624
inia_sg@sg.inia.org.uy

INIA Tacuarembó

Ruta 5, Km 386
Tacuarembó
Tel.: 598 4632 2407
Fax: 598 4632 3969
iniatbo@tb.inia.org.uy

INIA Treinta y Tres

Ruta 8, Km 281
Treinta y Tres
Tel.: 598 4452 2023
Fax: 598 4452 5701
iniatt@tyt.inia.org.uy

www.inia.uy