INSTITUTO
NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN
AGROPECUARIA

URUGUAY

MANEJO DEL SUELO EN PLANTACIONES DE CÍTRICOS y DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA RADICULAR

Setiembre, 2021

SERIE
TÉCNICA

259

INIA

MANEJO DEL SUELO EN PLANTACIONES DE CÍTRICOS y DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA RADICULAR

Autores: Alvaro Otero (*) y Carmen Goñi (**)

* Ing. Agr. M.Sc., Programa de Investigación en Producción Citrícola, INIA Salto Grande.

** Ing. Agr. M.Sc., Programa de Investigación en Producción Citrícola, INIA Salto Grande (hasta Marzo 2015).

Título: Manejo del suelo en plantaciones de cítricos y distribución del sistema radicular

Autores: Alvaro Otero y Carmen Goñi

Serie Técnica N° 259

© 2021, INIA

doi: <http://doi.org/10.35676/INIA/ST.259>

e-ISBN: 978-9974-38-458-3

Editado por la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología del INIA
Avda. Italia 6201, Edificio Los Guayabos, Parque Tecnológico del LATU, Montevideo,
Uruguay.
<http://www.inia.uy>

Quedan reservados todos los derechos de la presente edición. Esta publicación no se podrá reproducir total o parcialmente sin expreso consentimiento del INIA.

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

Integración de la Junta Directiva

Ing. Agr. José Bonica - Presidente

Ing. Agr. Walter Baethgen - Vicepresidente

Ministerio
**de Ganadería,
Agricultura y Pesca**

Ing. Agr. Rafael Secco

Ing. Agr. Martín Gortari

Ing. Agr. Alberto Bozzo

Ing. Agr. Alejandro Henry

CONTENIDO

Página

I. INTRODUCCIÓN

Sostenibilidad productiva, eficiencia y desarrollo de la intensificación sostenible	1
---	---

CAPÍTULO 1. MANEJO DEL SUELO EN LA CITRICULTURA DEL LITORAL NORTE DE URUGUAY	3
--	---

1. Introducción del área citrícola litoral norte.....	3
---	---

1.1 <i>Clima y suelos</i>	3
---------------------------------	---

1.2 <i>Variabilidad espacial de la infiltración</i>	7
---	---

1.3 <i>Descripción del manejo convencional de suelos</i>	8
--	---

1.4 <i>Temperatura del suelo</i>	8
--	---

1.5 <i>Precipitación y riesgo de erosión</i>	9
--	---

1.6 <i>Desarrollo radicular</i>	10
---------------------------------------	----

2. Estado de situación del suelo en plantaciones cítricas	12
---	----

3. Estrategias a tener en cuenta en el manejo del suelo	12
---	----

3.1 <i>Uso de coberturas (mulches) en el manejo del suelo</i>	13
---	----

3.2 <i>Experiencias con el uso de coberturas en Uruguay</i>	14
---	----

3.3 <i>Efectos del Mulching en las plantaciones de cítricos</i>	15
---	----

4. Manejo de la fila y la entrefila de plantación	21
---	----

4.1 <i>La importancia del carbono orgánico del suelo y las coberturas vegetales vivas en la entrefila de los cítricos</i>	21
---	----

4.2 <i>Coberturas vegetales en la entrefila de las plantaciones cítricas</i>	22
--	----

4.3 <i>Especies vegetales para coberturas vivas</i>	24
---	----

5. Conclusiones sobre el manejo del suelo en plantaciones con cítricos .	27
--	----

CAPÍTULO 2. SISTEMAS RADICULARES EN CÍTRICOS.....	28
1. Principales factores que influyen en el desarrollo de las raíces de los cítricos	28
1.1 El portainjerto	28
1.2 Hipoxia y anegamiento del suelo.....	29
1.3 Estrés Hídrico	33
1.4 Estratificación del Sistema Radicular	34
1.4.1 Distribución del sistema radicular de <i>Poncirus trifoliata</i>	35
1.4.2 Distribución del sistema radicular de <i>Poncirus trifoliata</i> en relación al manejo de la copa	36
1.4.3 Distribución del sistema radicular de <i>Poncirus trifoliata</i> en relación a la gestión del riego	38
2. Conclusiones sobre el sistema radicular de los cítricos en el norte de Uruguay	43
AGRADECIMIENTOS	45
BIBLIOGRAFÍA.....	45

I. INTRODUCCIÓN

Sostenibilidad productiva, eficiencia y desarrollo de la intensificación sostenible

El sector citrícola en Uruguay se ha caracterizado por una larga trayectoria de comercialización en el mercado europeo de fruta cítrica en fresco y más recientemente en el mercado norteamericano.

Hoy la citricultura de Uruguay se enfrenta a cambios que limitan su competitividad a corto plazo, entre otros: a) un mercado internacional más competitivo; b) cambios en la apreciación de la calidad de la fruta por los consumidores (calidad cosmética, propiedades nutraceuticas ausencia de semillas, bajos niveles de residuos); c) sistemas más sustentables y eficientes de producción y d) la aparición a nivel regional (Argentina, Brasil y Paraguay) del HLB, la enfermedad más destructiva conocida en la actualidad, mortal e incurable para los cítricos (Bové, 2006).

La innovación en sistemas de producción más sustentables y eficientes pasa por la identificación de puntos clave de mejora continua en el uso de los recursos naturales involucrados en todo el proceso de producción. Al mismo tiempo, los consumidores son cada vez más sensibles al cuidado de estos recursos (huellas del agua y del carbono), así como de los niveles de los residuos y sus efectos en el ecosistema.

En el sistema productivo de Uruguay, el suelo es uno de los reservorios más importantes de biodiversidad, y muchas veces olvidado en los sistemas intensivos de producción. En este sentido, se ha observado un cambio progresivo en lo que se entiende por calidad de un suelo. Arshad y Cohen (1992) definen la calidad del suelo como su capacidad para incorporar, almacenar y reciclar agua, minerales y energía (principalmente térmica) para la producción de cultivos, preservando un ambiente sano, mientras que Gregory *et al.*, (1994) refieren a su capacidad para funcionar adecuadamente con relación a un uso específico productivo. Más recientemente se han incorporado conceptos basados en la multifuncionalidad del suelo y no tanto en su uso específico, pero

estos conceptos siguen evolucionando (Singer y Erwing, 2000). La *Soil Science Society of America* (Karlen *et al.* 1997), define la salud de un suelo como la capacidad del mismo para funcionar dentro de los límites de un ecosistema natural o manejado, sostener la productividad de plantas y animales, mantener o mejorar la calidad del aire y del agua, y sostener la salud humana y el hábitat.

Como hace referencia Larkin (2015) los términos “calidad del suelo” y “salud del suelo” a menudo se usan indistintamente, y ciertamente fueron desarrollados a partir de los mismos conceptos básicos. En general, la calidad el suelo se refiere a la aptitud de un suelo en particular para un uso específico, mientras que la salud del suelo generalmente se refiere a aspectos más amplios y en sus múltiples funciones y hace hincapié en el suelo como un sistema integrado, dinámico y vivo.

El suelo es el ambiente natural de crecimiento y desarrollo del sistema radicular de los vegetales superiores y en particular de los cultivos agropecuarios. En este sentido, toda modificación en la calidad y salud del suelo afectará directamente el desempeño de toda la planta. Es por esta razón, que es tan importante para la sostenibilidad productiva de las plantaciones agropecuarias, el conocimiento de las características morfológicas y fisiológicas de las raíces de los diferentes cultivos, de su relación con la parte aérea de la planta y de la rizosfera.

El objetivo de esta publicación es compilar datos experimentales del área citrícola del litoral norte de Uruguay, que contribuyan al diseño de sistemas de producción más sustentables y eficientes en el uso de los recursos naturales, en particular a través del manejo del suelo, el agua y su impacto en la mejora del sistema radicular del principal portainjerto (*Poncirus trifoliata*) usado en la citricultura nacional.

CAPÍTULO 1. MANEJO DEL SUELO EN LA CITRICULTURA DEL LITORAL NORTE DE URUGUAY

1. Introducción del área citrícola litoral norte

La climatología del norte de Uruguay y en particular en el área del litoral del río Uruguay, ha sido propicia para el desarrollo de la citricultura, siendo el área donde comenzaron las primeras plantaciones comerciales con fines de exportación en la década de los 70, destacando la productividad de sus plantaciones y particularmente la calidad interna de la fruta para consumo en fresco. La citricultura de Uruguay cuenta con unas 14.646 ha, que hacen una producción anual de 264.054 toneladas, con una superficie regada del 60% (MGPA-DIEA, 2019). Las plantaciones de cítricos se encuentran instaladas hoy desde el norte hasta el sur del país, concentrándose mayoritariamente al norte (91% del área), con predominio del litoral norte del río Uruguay; el resto (9%) se encuentra distribuido principalmente en los departamentos de San José, Canelones, Montevideo y Colonia (MGAP-DIEA, 2019).

El portainjerto *Poncirus trifoliata* (L. Raf) es el más usado y con menor frecuencia el citrange Carrizo (*Citrus sinensis* Osb. x *Poncirus trifoliata* (L.) Raf.) y Citrumelo (*Poncirus trifoliata* (L.) Raf x *Citrus paradisi* Macf) (Carrau *et al.* 1993), si bien se han evaluado productivamente desde los años 80 un número muy importante de portainjertos en Uruguay (Carrau *et al.* 2001). Debido al carácter caducifolio del *Poncirus*, este portainjerto le ha conferido a la producción citrícola una herramienta importante en la mejora de la calidad del fruto, así como mayor tolerancia al frío.

1.1 Clima y suelos

Brevemente, el clima de Uruguay puede circunscribirse dentro de un clima templado, moderado y lluvioso y, de acuerdo con la clasificación climática de Köppen, queda incluido dentro del clima "Cfa" (Bidegain, M. 1997). Como menciona Severova (1997), la temperatura media anual de Uruguay es de unos 17,5 °C, variando desde los 20 °C en la zona noreste, hasta los 16 °C en la costa atlántica. Las isothermas tienen una orientación general del NE a SO y sus valores decrecen hacia el sudeste. Las temperaturas más altas se presentan en el mes de enero y febrero y las más bajas en junio y julio, de acuerdo con la región. La humedad relativa media anual oscila entre el 70% y el 75% en todo el país; el mes más húmedo es julio, con una media de 80% y el más seco es enero con una media de 65%. Las precipitaciones medias anuales tienen su valor mínimo hacia el sur sobre las costas del Río de la Plata con casi 1000 mm, registrándose sus valores máximos hacia el noreste, en la frontera con Brasil, con 1400 mm. El régimen de vientos más frecuentes acusa un marcado predominio del sector NE. Las velocidades medias son del orden de los 15 Km/h, con un máximo medio en las costas de Colonia que llega a 27 Km/h; son frecuentes los vientos superiores a 100 Km/h y las velocidades máximas registradas son del orden de los 200 Km/h.

El litoral norte del río Uruguay, principalmente Salto y Paysandú, presenta condiciones muy adecuadas para la producción de fruta fresca cítrica de calidad, por su alta heliofanía invernal y por su mayor radiación global incidente que, en conjunto con el tipo

de suelo, hace que esta región sea preferida para este tipo de cultivo, creando condiciones de mayor temperatura del aire en los meses estivales y reduciendo el riesgo de heladas en comparación a otras regiones del país.

En forma muy general, las plantaciones cítricas se encuentran sobre un gran número de grupos de suelos CONEAT, a pesar de que la clasificación CONEAT no es una clasifica-

ción taxonómica de los suelos del Uruguay (Figura 1 y Cuadro 1), permite observar la variabilidad de suelos en los que se encuentra instalada la citricultura de Uruguay. Los suelos predominantes en la citricultura en el área norte del país son Argisoles y Brunosoles, con un horizonte A franco y franco arenoso y un horizonte B arcilloso bien diferenciado, ambos de profundidad variable; como suelos asociados, tenemos Planosoles e Inceptisoles con cantos rodados.

Figura 1. Distribución de los predios citrícolas y principales grupos CONEAT con cítricos en Salto y norte de Paysandú.

Cuadro 1. Principales grupos de suelos CONEAT y características texturales del horizonte A, de los sitios plantados con cítricos en Salto y norte de Paysandú.

Grupo Coneat	Superficie (ha)	%	Acumulado	Gr CONEAT	Perfil	Espesor (cm)	Arena %	Limo %	Arcilla %
9.6	2117	14,2	14,2	9.2	N15-08	23	68	16	16
03.51	267	1,8	16,0	9.3	O22-04	54	75	13	12
9.2	400	2,7	18,7	9.6	USDA 4	27	81	7	13
9.3	1365	9,2	27,9	10.1	N21-02	29	27	37	36
10.1	358	2,4	30,3	10.2	O18-10	28	42	28	30
10.2	753	5,1	35,4	10.3	M25-05	28	28	49	23
11.6	676	4,6	39,9	11.6	O22-07	51	8	41	51
10.6a	238	1,6	41,5	10.6 a	L28-03	26	25	49	27
10.8b	467	3,1	44,7	10.8 a	J27-12	19	14	56	30
S09.10	299	2,0	46,7	S09.10	O10-26	26	82	8	10
S09.11	267	1,8	48,5	S09.21	O10-06	29	38	37	25
S09.20	1140	7,7	56,1	S09.20	O09-05	25	85	7	8
S09.21	1559	10,5	66,6	S10.10	O05-04	38	36	36	28
S10.10	247	1,7	68,3	S10.12	USDA 7	32	45	25	30
S10.12	388	2,6	70,9	S10.13	P21-07	31	12	56	31
S10.13	404	2,7	73,6	S10.21	O05-03	24	12	56	31
S10.21	1080	7,3	80,9

Figura 2. Variación de las clases texturales (arena, arcilla y limo) de los horizontes A y B en los suelos más representativos de la citricultura del litoral norte de Uruguay. Los puntos en rojo representan los porcentajes de arena, limo y arcilla de los horizontes A. Los puntos en azul representan los porcentajes de arena, limo y arcilla de los horizontes B.

La mayoría de los suelos del área citrícola del litoral norte, Salto y Paysandú, tienen un horizonte A menor a los 35 cm, asociado a un horizonte B arcilloso o franco arcilloso de diferenciación textural clara. La diferencia en las clases texturales del horizonte A y B, se puede apreciar en la figura 2, donde los horizontes B están comprendidos en clases texturales con mayor predominio de arcillas.

Esta diferenciación textural entre horizontes produce un cambio brusco en la dinámica del agua y de las raíces. A pesar de la alta variabilidad de suelos, el horizonte A, de características más livianas, permite altas infiltraciones superficiales, solamente limitadas por la alta diferenciación textural de sus horizontes, con cierta restricción en el flujo del agua en profundidad y en el desarrollo radicular (Figura 3).

Figura 3. Perfil típico de un suelo del área citrícola del litoral norte del río Uruguay.

1.2 Variabilidad espacial de la infiltración

En los predios citrícolas de *Salto y norte de Paysandú predominan los suelos con alta infiltración*, a pesar de que puede encontrarse áreas con suelos de menor tasa de infiltración, normalmente asociado a suelos de las zonas más bajas dentro de las plantaciones. En ambos casos, la variabilidad de la tasa de infiltración es relativamente alta, facilitando el desarrollo del riego localizado como principal método

de riego. En general, la tasa básica de infiltración (*lb*) superficial no tiene una distribución en forma simétrica, como podría esperarse en una distribución Gaussiana. Se encuentran frecuentemente situaciones con valores muy altos de infiltración, generalmente asociados a flujos preferenciales en la superficie del suelo en la fila de los árboles. Valores de coeficientes de variación (*CV*) mayores a 100% son frecuentes de encontrar, con valores de *lb* media entre 16 y 107 mm h⁻¹, con *CV* entre 117 y 132% (Figura 4) (López, 2014).

Figura 4. Distribución de frecuencia de la infiltración básica (*lb*, mm h⁻¹) en tres suelos plantados con árboles cítricos en plena producción. N° de muestras por hectárea y por suelo=30 (López, 2014).

En la mayoría de los sistemas de riego localizado por goteo, el emisor está colocado sobre la superficie del suelo, de manera que la superficie en la cual tiene lugar la infiltración al suelo del agua de riego es muy pequeña en comparación a la superficie total bajo la planta (Bresler, 1977). A pesar de que la descarga de la fuente de goteo es muy baja y el agua incide sobre una superficie muy reducida del suelo, se puede provocar un pequeño “charco” (Pizarro, 1990). *La selección del caudal del gotero es de alta importancia para evitar pérdidas puntuales de agua por escurrimiento. Dada la alta infiltración medida en suelos citrícolas y, especialmente por su alta variabilidad, la infiltración básica media debe ser tenida en cuenta en la selección de la descarga de los goteros o de los micro aspersores para el diseño de los sistemas de riego localizados. En observaciones de situaciones comerciales y en cálculos teóricos, el uso de goteros de más de 4 l h^{-1} , pueden ocasionar situaciones de encharcamiento y pérdidas superficiales puntuales dentro de las plantaciones* (López, 2014).

1.3 Descripción del manejo convencional de suelos

El diseño general de las plantaciones comerciales citrícolas de Uruguay se realiza en diferentes fracciones de la superficie del predio, llamadas “cuadros de producción”. Cada cuadro de producción está habitualmente compuesto por una variedad comercial, asociada a un determinado portainjerto y a una fecha de plantación, lo que facilita la operación del manejo general, nutricional, sanitario y del riego. El tamaño del cuadro de producción más frecuente en las plantaciones en Uruguay es de 2 ha. El perímetro de los cuadros de producción se encuentra generalmente compuesto de cortinas vegetales rompeviento que mejoran enormemente el control sanitario y la calidad externa de la fruta (Otero y Zefferino, 2007).

El manejo del suelo y de la entrefila de las plantaciones ha sufrido una evolución importante desde los comienzos de la citricultura, con la constante tradición de dejar empas-

tar la entrefila con vegetación espontánea y controlando su crecimiento con el uso de pasteras. Esta práctica, en conjunto con las aplicaciones sanitarias y de cosecha, produce una compactación importante en el suelo, especialmente en la huella de las máquinas cuando las condiciones del suelo no son adecuadas. En general en la fila de plantación se mantiene el suelo desnudo, sin malezas, mediante el uso de herbicidas selectivos o de amplio espectro, en función de las necesidades y de acuerdo con la población de malezas presentes. Esta práctica suele realizarse tanto en plantaciones nuevas como adultas, donde la copa de los árboles, al tocarse entre sí, suelen mantener cubierto el suelo. En los últimos años algunas modificaciones de esta práctica se han introducido en los diferentes predios, especialmente por motivos sanitarios, como ser la incorporación de biomasa vegetal a la fila bajo los árboles para mejorar el control de mancha negra (Pérez y Álvarez, 2015).

1.4 Temperatura del suelo

La temperatura es uno de los principales factores que afectan los procesos físicos, químicos y biológicos del suelo y, en consecuencia, influencia el ambiente donde crecen las plantas. Siguiendo la propuesta de Scott (2000), la temperatura del suelo es afectada por factores ambientales y por factores del suelo. Los factores ambientales más importantes son: la radiación solar incidente, la conducción del calor por la atmósfera, la condensación, la evaporación del suelo, la lluvia y el riego, el aislamiento de la superficie del suelo (cobertura o *mulching*) y la vegetación. Dentro de los factores del suelo, podemos destacar: la composición mineral, el contenido de agua del suelo, el color y las características térmicas del suelo (capacidad, conductividad y difusividad). El contenido de agua del suelo juega un papel muy importante desde el punto de vista práctico. En general, a medida que aumenta el contenido de agua en el suelo, la conductividad térmica y su difusividad también aumentan (Scott, 2000). En otras palabras, aumentando el contenido de agua del suelo

incrementamos la capacidad térmica, mientras que, si aumentamos el aire en el suelo, la reducimos. *Por esta razón, es una práctica frecuente en la citricultura aumentar el contenido de agua del suelo por el riego los días previos a una posible helada, de tal forma que el calor (energía) almacenado en el suelo durante el día pueda ser devuelto a la atmosfera durante el período de baja temperatura del aire y en consecuencia minimizar el efecto dañino de la helada sobre la planta.*

La composición textural y la materia orgánica del suelo tienen relación directa con el almacenaje de agua en el suelo (Tietje y Tapkenhinrichs. 1993; Wösten *et al.* 2001) y en consecuencia, con el potencial régimen térmico del suelo en cada estación el año. *En el área citrícola de Salto, durante los meses de diciembre y enero, los suelos desnudos pueden llegar a tener una temperatura máxima diaria de hasta 10°C por encima de la temperatura de un suelo cubierto por pastura, llegando a tener valores máximos mayores a 45°C a los 5 cm de profundidad (Figura 5).*

Figura 5. Evolución de la temperatura máxima promedio diaria del suelo a los 5 cm de profundidad en suelo desnudo (herbicida) y cubierto por pastura (5-10 cm). Las barras representan el desvío estándar de la media diaria. Suelo: Argisol Eutrico con horizonte A franco arenoso. Período 1985-2015. Salto.

1.5 Precipitación y riesgo de erosión

Como vimos anteriormente, la textura de los suelos predominantes en la región (Figura 2) son de texturas francas en el horizonte A, lo que permite una mayor infiltración de agua en el suelo y, en consecuencia, mayor eficiencia de uso del agua de lluvia; al mismo tiempo y en relación con su contenido de materia orgánica, son suelos más susceptibles a la erosión de la capa superficial por el impacto directo

de las gotas de agua. La energía cinética de las gotas de lluvias ocasiona la pérdida de partículas del suelo cuando libremente golpean su superficie. Este proceso de deterioro del suelo citrícola se encuentra muy asociado a las prácticas de manejo en la fila de plantación de los árboles, especialmente en la faja de aplicación con herbicida, exponiendo directamente la superficie del suelo a la inclemencia directa de la precipitación. Con frecuencia se puede ver cómo el suelo superficial se ha perdido

Figura 6. Pérdida paulatina del horizonte A del suelo por erosión superficial, dejando expuesto parte del sistema radicular del portainjerto *P. trifoliata*.

cerca del tronco del árbol, exponiendo la parte superior del sistema radicular (Figura 6). A diferencia de otras zonas cítricas donde la precipitación es más escasa, en Uruguay, la variabilidad de la frecuencia e intensidad de la precipitación, hacen muy poco apropiado para la conservación de la calidad del suelo, dejar zonas del suelo expuestas por largo tiempo sin cobertura vegetal alguna, facilitando enormemente el deterioro del mismo.

En consecuencia, los suelos predominantes de la región cítrica del litoral norte tienen propiedades térmicas e hídricas que los hacen muy apropiados para el cultivo de los cítricos pero que, para mantener su potencial productivo en el mediano y largo plazo, deben ser cuidados apropiadamente dada su fragilidad a la erosión y a la pérdida de carbono orgánico.

1.6 Desarrollo radicular

La temperatura del suelo no solo afecta la respuesta fisiológica de los portainjertos cítricos (Bevington y Castle, 1995), sino que también determina la respiración radicular y la microflora (Reichardt *et al.* 2000). Las altas temperaturas del suelo incrementan la respiración radicular (Atkin *et al.* 2000) y la conductividad hidráulica de la raíz (Syvertsen *et al.* 1983). La respiración de las raíces provee la energía necesaria para la absorción de iones, la síntesis y mantenimiento de la biomasa radicular, es altamente demandante de oxígeno y muy sensible a los cambios en la temperatura del suelo (Atkin *et al.* 2000). Por un lado, es beneficioso que la temperatura del suelo este a un nivel óptimo, pero por otro lado, altas temperaturas de suelo son perjudiciales para el funcionamiento de la planta (Bevington y Castle, 1995).

En plantas de portainjertos cítricos creciendo en vivero, bajo condiciones no óptimas de temperatura del suelo, la falta temporaria de oxígeno en el suelo (anegamiento) incrementa la respiración radicular y reduce más rápidamente el nivel de oxígeno en el suelo, en consecuencia, el sistema radicular decae más rápidamente, reduciendo el crecimiento y la acumulación de carbohidratos (Otero, 2016). La reducción del potencial hídrico de los tejidos de los portainjertos a 35°C en el suelo puede ser explicado por la reducción de la conductividad de la raíz (Syvertsen *et al.* 1983), en consecuencia, la planta comienza a no poder absorber agua, reduciendo su crecimiento y finalmente deshidratarse. Ya sea a nivel de macetas bajo invernadero o en condiciones de campo, la temperatura del suelo juega un rol importante en mantener el contenido de agua de la planta y su crecimiento bajo condiciones de anegamiento (Otero y Goñi, 2013; Otero, 2016).

Como se verá en extenso en el capítulo 2, las diferentes variedades de portainjertos

varían en su respuesta a la temperatura del suelo y también al anegamiento. Los portainjertos Citrange Carrizo y *P. trifoliata* son los portainjertos más utilizados en la citricultura uruguaya (Carrau *et al.*, 2001). El Citrange Troyer se encuentra en plantaciones relativamente viejas, y tiene su mayor crecimiento con temperaturas del suelo de 25°C. Esta misma tendencia del crecimiento en relación a la temperatura del suelo la podemos observar en *P. trifoliata*, pero con mayor crecimiento a 15 y 35°C que el portainjerto Troyer. Sin embargo, el Citrange Carrizo mantiene alto su crecimiento en las tres temperaturas del suelo evaluadas: 15, 25 y 35°C.

En condiciones de crecimiento con falta de oxígeno en el suelo, los Citranges Carrizo y Troyer son los portainjertos que tuvieron mayor pérdida de biomasa total con relación a cuando crecían sin anegamiento. El *P. trifoliata* es el portainjerto en el que menos se afectó su biomasa total por el efecto del anegamiento del suelo (Figura 7).

Figura 7. Biomasa total (brotes, hojas y raíces) de Citranges Carrizo, Troyer y *P. trifoliata* creciendo en macetas en invernáculo a diferentes temperaturas del sustrato; con y sin anegamiento (fila superior). Reducción porcentual de la biomasa total entre plantas anegadas y no anegadas a las diferentes temperaturas del sustrato (fila inferior). Barras en las columnas de las medias representan el error estándar de la media. Letras diferentes en las medias de la temperatura del sustrato corresponden a diferencias significativas por TRM Duncan ($p < 0,05$).

2. Estado de situación del suelo en plantaciones cítricas

Dado que la región del litoral norte fue la zona pionera en el desarrollo de la citricultura de exportación, coexisten una diversidad importante de situaciones de manejo del suelo de acuerdo con la edad de las plantaciones y la historia de manejo del predio. Teniendo en cuenta esta diversidad de situaciones, pueden identificarse algunos de los puntos débiles que afectan la sostenibilidad biológica y física del manejo del suelo tales como:

- Excesivo uso de herbicidas en la fila de plantación.
- Erosión evidente en los camellones de la fila de plantación.
- Formación de flujos preferenciales de agua sobre la superficie del suelo.
- Sistema radicular expuesto sobre la superficie del suelo.
- Fragilidad de suelos con horizonte A arenoso.
- Evidencias de compactación de suelos.
- Generación de resistencia en las malezas a ciertos herbicidas.
- Reducción de la infiltración.

La fragilidad de los suelos de la región, en combinación con manejos previos inadecuados, muchas veces asociados a una mala sistematización y replanteo de los cuadros, ha llevado a una pérdida progresiva en la calidad del suelo y, en consecuencia, a pérdidas de carbono y nutrientes en el suelo, con descensos de los rendimientos y aumento de los costos de producción.

3. Estrategias a tener en cuenta en el manejo del suelo

Los procesos de recuperación de la calidad del suelo son muy lentos, donde las técnicas de remediación de estos procesos están actuando simultáneamente con factores de deterioro del suelo.

Algunas estrategias que pueden aplicarse para un manejo sostenible de suelos en montes cítricos:

- Optimizar el manejo del agua y los nutrientes.
- Realizar aportes frecuentes de algún tipo de enmienda orgánica (estiércoles, compost).
- Dejar e incorporar restos vegetales en el cuadro (picado de la poda).
- Evitar dejar desnuda la superficie del suelo (degradación de la MO, aumento de erosión).
- Hacer un manejo equilibrado para el control de malezas (integrar la fenología de las malezas al control integrado con métodos físicos, mecánicos y químicos).
- Incorporar progresivamente el uso de coberturas vegetales en las entrefilas.
- Introducir el uso de coberturas (mulches) en las filas (reducción del uso de herbicidas, mejora en la temperatura del suelo, efectos positivos en el estado hídrico de las plantas).
- Reducir el pasaje de maquinarias (evitar problemas de compactación).
- Evitar el uso abusivo de herbicidas (el suelo totalmente limpio atenta contra la estabilidad de sus agregados por el aumento de la velocidad de oxidación de la materia orgánica en las capas superiores del suelo y genera problemas de compactación, infiltración y erosión).

Medida de manejo	Efecto
Evitar dejar el suelo desnudo en la fila	Reduce la erosión y la pérdida de nutrientes.
Aporte de enmiendas orgánicas en la fila	Aumenta la materia orgánica y la microflora del suelo, los nutrientes y la capacidad de almacenaje de agua.
Incorporación de restos vegetales (picado de resto de poda)	Evita el suelo desnudo y la reduce la erosión, en el largo plazo aumenta la materia orgánica superficial.
Uso de coberturas (mulch) en la fila	Reduce el uso de herbicidas, mejora el balance térmico del suelo, tiene efectos muy positivos en el estado hídrico de las plantas.
Incorporar progresivamente el uso de coberturas vegetales en las entrefilas	Mejora la transitabilidad de la maquinaria, reduce la erosión, hay mayor incorporación de materia orgánica al suelo.
Manejo integrado de herbicidas. Integrar la fenología de la maleza al control integrado con métodos físicos, mecánicos y químicos	Evita el suelo desnudo, reduce la erosión y pérdida de nutrientes.
Manejo integrado de herbicidas. Evitar el uso abusivo de herbicidas genéricos	Reduce de la contaminación ambiental.
Reducir el pasaje de maquinaria	Reduce la compactación y evita el deterioro de las raíces.

3.1 Uso de coberturas (mulches) en el manejo del suelo

El manejo del suelo con diferentes cubiertas (*mulch*) es una técnica conocida y utilizada desde hace tiempo en los cultivos hortifrutícolas a nivel mundial (Sirrine *et al.*, 2008), con gran éxito en la mejora de las propiedades físicoquímicas del suelo (Merwin *et al.*, 1994; Sánchez *et al.*, 2007; St. Laurent *et al.*, 2008), así como en las sanitarias y productivas, por efecto directo en el ambiente de crecimiento del sistema radicular de las plantas y las comunidades de la microflora del suelo (Yao *et al.*, 2005; Morlat y Jacquet, 2003; Pérez...). Las coberturas han mejorado la productividad de mandarinas y arándanos (Abouziena *et al.*, 2008; Burkhard *et al.*, 2009), generando mejores condiciones para la planta (Teravest *et al.*, 2015). La cobertura de la superficie del suelo con residuos vegetales es una importante técnica para modificar la temperatura del suelo (Van Doren y Allmaras, 1978), a pesar de que con el uso de estas coberturas podría existir inmovilización de nutrientes (Teasdale y Mohler, 2000).

Se han realizado experiencias con mulches de diverso tipo, realizados con materiales orgánicos naturales (chips, paja, compost, etc.) y sintéticos (plástico, textiles), o con

materiales inorgánicos (cantos rodados, piedras pequeñas).

Ventajas del uso de *mulching* en la fila de plantación:

- Se reduce el crecimiento de las malezas y las aplicaciones con herbicidas.
- Se reducen las pérdidas de agua por evaporación de la superficie del suelo; muy importante en el caso de cultivos regados.
- Se mantiene el contenido de agua del suelo.
- Mejora la calidad del suelo, por incremento de la actividad microbiana y reducción de la erosión superficial.
- Se mantiene un régimen térmico más apropiado para el crecimiento de las raíces.

Desventajas del uso de *mulching* en la fila de plantación:

- Aumenta el costo de la plantación.
- Requiere una adecuada selección de los materiales utilizados.
- La efectividad del *mulching* disminuye con el tiempo; hay que renovarlo.
- Algunos tipos de cubiertas favorecen el establecimiento de roedores y hormigas.
- Puede existir aumento del riesgo de incendios, con coberturas muy secas.

3.2 Experiencias con el uso de coberturas en Uruguay

Los primeros trabajos experimentales en fruticultura comenzaron en el cultivo del duraznero en el año 1985, bajo la coordinación de Goñi en la zona de Melilla (Montevideo) (Bonomi *et al.* 1987; Amighetti y Fitipaldo, 1989). El *mulching* resultó en una técnica eficaz en la mejora en la productividad y del balance del agua del suelo en cultivos sin riego, en relación al laboreo mecánico o al uso de herbicidas en fajas anchas, frecuentemente usado en la fruticultura de esos años (Goñi y Otero, 2010).

Posteriormente, los primeros experimentos en citricultura comenzaron en el año 2007, en plantaciones de naranja Valencia en secano en el área de la Colonia Osimani (Salto) (Goñi, 2007). Estos experimentos se llevaron a cabo en un suelo Argisol Dístico Ócrico, en una plantación del cv. Victoria Late® injertada en *Poncirus trifoliata* (L.) Raf, con un marco de plantación de 6 x 2 m. Se probaron dos coberturas vegetales en la entrefila: Raigrás

20 kg ha⁻¹ y *Ornithopus* 35 Kg ha⁻¹. En la fila se probaron dos materiales de cobertura (*mulching*): Chip de *Eucalyptus* compostado (52 kg m⁻²) con una relación C/N = 1,5 y compost vegetal (30 kg m⁻²) con una relación C/N = 10. El manejo sanitario del monte citrícola fue el estándar y con el uso de una fuente de nitrógeno de liberación lenta y con refertilización anual en las gramíneas y leguminosas.

Simultáneamente, se probaron otros materiales para la formación del mulch: cáscara de arroz, paja, plástico negro y se lo comparó con el compost, con el chip de *Eucalyptus* y con el testigo con aplicación de herbicida en toda la fila.

La principal razón en la selección del *Ornithopus* como cubierta vegetal viva en la entrefila fue su adaptación a suelos livianos y ácidos, su gran persistencia en condiciones extremas de suelo y su productividad en invierno y primavera. Por otro lado, la elección del Raigrás estuvo basada en la amplia adaptación a la región y en la muy buena producción de biomasa en otoño e invierno.

Figura 8. Cobertura en la fila de plantación: compost vegetal (A) y chips de *Eucalyptus* (1 año de estacionamiento antes de usarlos en la plantación de cítricos) (B). Cobertura en la entrefila de *Ornithopus* (C) y de Raigrás (D).

Compost 30 kg m²

Chip de Eucaliptus compostado
52 kg m²

3.3 Efectos del Mulching en las plantaciones de cítricos

Efectos del Mulching en el balance de agua del suelo

Al ser un suelo de textura muy liviana en el horizonte A, las variaciones en el contenido de agua del mismo son muy grandes, especialmente en verano. Como puede verse en la figura 9, existieron a lo largo del año varia-

ciones muy importantes del agua del suelo con los tres manejos del suelo: a) Testigo con el suelo descubierto por aplicación de herbicidas; b) chip de *Eucaliptus* y c) compost vegetal. El menor contenido de agua del suelo se registró durante el verano con el suelo descubierto (testigo), mientras que con el uso del mulch de *Eucaliptus* el contenido de agua en la superficie del suelo (0-10 cm) fue superior, con valores críticos en la parte superior del horizonte A (Figura 9).

Figura 9. Evolución del contenido volumétrico de agua (Hv%) en el suelo en el horizonte de 0-10 cm de profundidad.

Efecto del Mulching en la temperatura del suelo en la fila de plantación

Una de las grandes ventajas de las coberturas en las condiciones climáticas de Uruguay es la mayor estabilidad de la temperatura del suelo. Cuando se realiza un manejo con herbicida total en la fila, queda gran parte del suelo descubierto, expuesto directamente a la radiación solar, especialmente en plantaciones nuevas. Esto genera una amplitud térmica diaria muy alta en los primeros centímetros

del suelo, medida como la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima diaria en el suelo. Esta variación térmica no es favorable para el crecimiento de las raíces, ni para mantener un ambiente nutricional y microbiano apropiado para el funcionamiento del sistema radicular. Como observamos en la figura 10, cuando se utiliza algún tipo de cobertura (Chip de *Eucaliptus* o Compost), la amplitud térmica de la superficie del suelo se reduce. Este comportamiento se evidencia tanto en invierno como en verano (Figura 10).

Figura 10. Evolución de la temperatura el suelo a 10 cm de profundidad, con suelo descubierto (Testigo Herbicida) y con coberturas de Chip y Compost. A- Invierno y B- Verano.

Figura 11. Porcentaje del suelo cubierto por malezas en los tres manejos del suelo en la fila, a los 3 años de instalados los tratamiento. Las barras representan el desvío estándar de los valores. Letras diferentes en las medias de los manejos del suelo corresponden a diferencias significativas por TRM Duncan ($p < 0,05$).

Efecto del Mulching en el grado de enmalezamiento de la fila de plantación

La reducción del grado de enmalezamiento en la fila de plantación es un reflejo del éxito de la cobertura con chip, con valores mínimos de enmalezamiento luego de tres años desde la instalación. El compost, por su propia naturaleza rica en nutrientes y su textura relativamente fina en comparación con el chip de eucaliptus, permitió el crecimiento de mayor cantidad de malezas respecto al testigo con herbicida. El testigo solo manejado con aplicaciones de herbicida (tres veces por año) en la fila, fue el manejo con mayor cantidad de malezas en la fila y, en consecuencia, con una mayor competencia por agua y nutrientes, sin mencionar el efecto ambiental de la aplicación química del herbicida (Figura 11). La mayoría de los estudios a corto plazo han demostrado que los tratamientos que involucren coberturas para suprimir las malezas de las filas de árboles aumentan el crecimiento de los árboles y el rendimiento de los frutos durante el primer año después de la plantación en comparación con los tratamientos con presencia de malezas (Merwin y Stiles 1994; Abouziena *et al.* 2008).

Efecto del Mulching en el crecimiento y fisiología de la planta

Se ha podido observar una respuesta significativa en el desempeño fisiológico y productivo de las plantas cítricas cuando se usa algún tipo de cobertura en la fila de plantación, especialmente relacionada a la temperatura y la dinámica del agua en el suelo. El crecimiento de las plantas jóvenes, evaluado a través del volumen de copa alcanzado después de dos años con el uso de la cobertura, se incrementa significativamente con la cobertura con chip de *Eucaliptus* y compost en relación con el testigo con herbicida (Figura 12). Por otro lado, también la cobertura de chip aumentó la relación de la materia seca de la hoja en relación con su área foliar, medida correlacionada al funcionamiento general de la planta y a la eficiencia fotosintética (Syvertsen *et al.* 2003). La cantidad de materia seca por unidad de superficie foliar fue significativamente menor en las plantas con la cobertura con herbicida respecto a las plantas con chips de eucaliptus, pero no se diferenció significativamente de la cubierta con compost (Figura 13).

Figura 12. Volumen de copa al tercer año de instalación del ensayo. Letras diferentes en las medias de los manejos del suelo corresponden a diferencias significativas por TRM Duncan ($p < 0,05$).

Figura 13. Relación peso seco/superficie de la hoja (g MS. m⁻²) con los tres manejos del suelo en la fila. Letras diferentes entre tratamientos corresponden a diferencias significativas por TRM Duncan ($p < 0,05$).

La dinámica del agua en el cultivo de cítricos no solo es afectada por la cantidad de agua a la profundidad del sistema radicular, sino también por la demanda atmosférica y el tamaño del árbol. En este sentido existen varios indicadores del bienestar hídrico de la planta utilizados ampliamente en investigación y a nivel de plantaciones comerciales: el potencial hídrico de la hoja o del tallo, la conductancia estomática, la temperatura

de la canopia, el flujo del xilema y las micro variaciones diarias en el diámetro del tallo, del fruto o de la hoja, entre otros (Pearcy *et al.*, 2000). El valor de la conductancia estomática de la hoja (grado de apertura de los estomas) es una buena medida de la respuesta casi instantánea de la planta frente a la demanda atmosférica en función de la disponibilidad (tensión) del agua en la zona radicular (Hsiao y Xu, 2000) y de la

demanda atmosférica a lo largo del día. La conductancia estomática mide la velocidad del flujo de agua que se transmite a la atmósfera través de los estomas de la hoja, desde el mesófilo de la hoja (u otro órgano vegetal que presente estomas funcionales) hacia la atmósfera. Por otro lado, el potencial xilemático del tallo o de la hoja representa el valor de la fuerza de retención del agua por los tejidos de la hoja, del tallo o del órgano vegetal que se estudie (Figura 14). En términos generales, el grado de hidratación de la planta es menor a medida que el potencial xilemático disminuye (valores más negativos) (Jones, 1992).

En nuestro experimento, la conductancia estomática ($\text{mmol.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$) de las hojas de las plantas de Valencia late con los tres tipos de manejo de la fila de plantación, es relativamente baja incluso para el período estival, en comparación con valores de cítricos con un contenido de agua en el suelo sin restricciones (80 a $220 \text{ mmol.cm}^{-2}.\text{s}^{-1}$) (Figura 15). A pesar de ello, las plantas con la cobertura de chip en la fila mantuvieron mayor conductancia estomática especialmente al mediodía, cuando la demanda atmosférica es máxima. El testigo con herbicidas en la fila y la cobertura de compost siguieron la evolución de la demanda diaria con el cierre estomático al mediodía.

Figura 14. Potencial xilemático del tallo (Mpa) promedio en los tres manejos del suelo en la fila. Letras en las medias de los manejos del suelo diferentes corresponden a diferencias significativas por TRM Duncan ($p<0,05$).

Figura 15. Evolución diaria de la conductancia estomática en los tres manejos del suelo en la fila. Las barras representan el desvío típico de la media en cada momento del día (Otero *et al.* 2015).

El potencial hídrico de la hoja y el potencial xilemático son usados frecuentemente para describir el estado hídrico de la planta a nivel comercial, como es el caso de durazneros, olivos y vid (Hsiao, 1990; Ortuño *et al.*, 2000a; Ferreres y Goldhamer, 2003; Ferrara y Flore, 2003) o, a nivel de investigación en muchos cultivos, pasturas y árboles frutales como es el caso de los cítricos (Ortuño *et al.*, 2000b; Silva do Nascimento *et al.*, 2012). Las plantas con cobertura de chip presentaron los valores más altos del potencial xilemático, indicando mejor estado hídrico que las plantas con cobertura de compost o con aplicaciones de herbicidas en la fila, en verano en condiciones sin riego (Figura 15), lo que implica que los árboles con cobertura de chip pueden reponerse de un período de estrés hídrico con menores consecuencias negativas. Las diferencias observadas en el potencial del tallo son coherentes con los valores observados en la conductancia estomática; por tanto, las coberturas incrementan la conductancia estomática significando mejores condiciones de disponibilidad de agua en el suelo (Cregg y Schutzki, 2009).

Efecto del Mulching en la calidad de la fruta

Se pudo observar un beneficio en el uso de

chips de *Eucaliptus* en la calidad de la fruta cosechada. El tamaño de la fruta fue mayor en las plantas con la cobertura de chip, ya sea en su diámetro como en el peso promedio del fruto. El aumento del tamaño posiblemente está relacionado a las mejoras en condiciones hídricas de la planta en la cobertura de chip, en comparación con el compost o con el herbicida (Goñi y Otero, 2011). También el color de la fruta fue más anaranjado intenso, con una acidez menor y con un ratio azúcares/acidez mayor en el manejo con chip, a pesar de que no se encontraron diferencias en el contenido de sólidos solubles del jugo de los frutos. El aumento de la coloración del frutos en las plantas con chips podría deberse a que esta cobertura tiene un color de superficie más claro que el compost y el suelo con herbicida; aumentando en consecuencia la reflexión de radiación solar desde el suelo (Mesejo *et al.* 2012). Por otro lado, la reducción de la acidez podría explicarse por el mejor estado hídrico de las plantas bajo el chip de eucaliptus, presentando un efecto de dilución de los ácidos del fruto. Los demás parámetros clásicos de la calidad interna y externa de la fruta cítrica se mantuvieron semejantes entre los manejos de suelo observados (Cuadro 2).

Cuadro 2. Calidad interna y externa de la fruta en la cosecha de las plantas de Valencia late en las tres situaciones de manejo de la fila.

	Chip Eucaliptus		Compost		Herbicida Testigo	
Peso del fruto (g)	178,4	a	132,9	b	125,3	b
Diámetro del fruto (cm)	7,1	a	6,4	b	6,3	b
Altura del fruto (cm)	7,2	ns	6,3	ns	6,4	ns
Diámetro/Altura fruto	0,99	ns	1,07	ns	0,99	ns
Espesor de Cáscara (mm)	6,0	ns	6,0	ns	5,7	ns
Color relación a/b	0,30	a	0,27	b	0,29	ab
Índice de Color de los Cítricos	4,5	a	3,9	b	4,2	ab
% Cáscara	41,1	ns	44,3	ns	44,2	ns
% Jugo	50,2	a	46,0	ab	44,9	b
°Brix	10,0	ns	10,3	ns	10,6	ns
Acidez Titulable	1,64	b	2,01	a	1,94	a
Ratio Brix/Acidez	6,1	a	5,1	b	5,5	b

Medias en las filas seguidas de diferente letra son significativamente distintas Test Rangos Múltiples de Duncan ($p < 0,05$)

Efecto del Mulching en el rendimiento de frutos en la cosecha

En todos los años desde la plantación, el rendimiento de las plantas con cobertura de chip de *Eucaliptus* fue significativamente superior, a excepción del ciclo 2012-2013 en donde las plantas habían sufrido una importante merma de su foliaje y brotaciones debido a la helada imperante en la zona de julio de 2012 (Cuadro 3). El manejo de la fila solamente con herbicidas obtuvo el menor rendimiento acumulado

luego de 5 años de evaluación, mientras que el rendimiento de las plantas con la cobertura de compost orgánico fue intermedio, no diferenciándose significativamente ni del herbicida ni del chip de eucaliptus. Aunque no se presentan los datos, el mayor número de frutos en la cobertura con chips es lo que ha llevado a mayor rendimiento anual y acumulado. No se observa ninguna tendencia en los tres manejos del suelo, que permita aseverar que la alternancia productiva es afectada por los tratamientos.

Cuadro 3. Rendimiento de frutos en la cosecha desde el segundo año desde la plantación, en secano y bajo los tres manejos del suelo en la fila.

Años desde plantación	Rendimiento (ton.ha ⁻¹)					2009-13 Acumulado
	2008-09 2 año	2009-10 3 año	2010-11 4 año	2011-12 5 año	2012-13 ⁽¹⁾ 6 año	
Chip Eucaliptus	3,9 a	10,7 a	13,5 a	22,4 a	17,7 b	68,2 a
Compost	2,7 ab	7,6 b	9,8 b	19,3 b	21,5 a	60,9 ab
Testigo Herbicida	1,5 b	7,1 b	10,5 b	18,3 b	17,3 b	54,7 b

(1) Año de fuerte helada en Julio de 2012, afectando el desarrollo de plantas.
Medias en las columnas con diferente letra son significativamente distintas por TRM Duncan (p<0,5)

4. Manejo de la fila y la entrefila de plantación

4.1 La importancia del carbono orgánico del suelo y las coberturas vegetales vivas en la entrefila de los cítricos

El aumento de la erosión del suelo y su compactación, son quizás dos de las mayores consecuencias del manejo tradicional en los montes cítricos en Uruguay, especialmente en suelos de texturas superficiales livianas como es en la región del litoral norte del Uruguay (Goñi y Otero, 2012).

Una forma rápida para evaluar las pérdidas por erosión es la identificación de la fase de

erosión en función de la magnitud de la pérdida del horizonte A, sugeridas por Durán y García Préchac (2007) (Cuadro 4). Actualmente existen modelos empíricos de evaluación de la erosión del suelo a mediano y largo plazo. Estos modelos basados en la ecuación universal de pérdida del suelo (USLE) (Wischmeier y Smith, 1965, 1978, 1981) o su versión revisada (RUSLE)(Renard *et al.*, 1997) en función de las características del suelo, al paisaje, clima y del manejo de la secuencia de cultivos (RUSLE), muy apropiado para la toma de decisiones en secuencias de cultivos y pasturas, ha sido implementado en Uruguay por el MGAP, pero no está adaptado aún a condiciones de cultivos intensivos como la citricultura.

Cuadro 4. Categorías para identificar la intensidad de la erosión hídrica en suelos de Uruguay (Duran y García Préchac, 2007).

Grado de erosión	% del Horizonte A perdido	Codificación
Nula	0	0
Ligera	0-25	1
Moderada	25-50	2
Severa	50-75	3
Muy Severa	75-100	4

Desde el punto de vista práctico, Foster *et al.* (1985) y Rose (1994) citados por Duran y García Préchac (2007) describen el proceso de la erosión hídrica en tres etapas: desagregación, transporte y concentración del escurrimiento. Adaptando estos conceptos a las plantaciones cítricas, podemos identificar mejoras a incorporar en el manejo de las plantaciones para enlentecer alguna de estas tres etapas del proceso erosivo:

- Desagregación
 - o Mejora de la estabilidad estructural (C org/MO)
 - o Coberturas vegetales (vivas o muertas)
- Transporte
 - o Rugosidad
 - o Coberturas
 - o Orientar rugosidad cortando pendientes (contorno)
 - o Desviar el escurrimiento, detener o encauzar (terrazas, caminos rebajados).
- Concentración del escurrimiento
 - o Desagües cubiertos con vegetación
 - o Ningún surco a favor de la pendiente
 - o Evitar/corregir los flujos preferenciales en superficie: cruce de flujos a través de la fila de plantación.

Las medidas de manejo del suelo que llevan a un incremento del carbono orgánico y de la materia orgánica del suelo van a estar asociadas a una mejora de la estructura del sue-

lo, a una reducción de la erosión y compactación del suelo, y favorecerán la retención de agua en el perfil, el aporte de nutrientes e incremento de la actividad de la microfauna y microflora del suelo. En la última década, y a raíz de investigaciones rigurosas, se está haciendo especial énfasis en la capacidad del suelo en secuestrar el CO₂ de la atmósfera y en consecuencia un importante reservorio de carbono orgánico (Mazzoncini *et al.* 2009; Hutchinson *et al.* 2007).

4.2 Coberturas vegetales en la entrefila de las plantaciones cítricas

Las coberturas vegetales instaladas en la entrefila de las plantaciones cítricas en Uruguay no han sido fuertemente exploradas a pesar del potencial que presentan para mejorar la productividad y la biodiversidad del suelo en nuestra citricultura.

La cobertura vegetal viva permite controlar mejor la erosión del suelo, reduciendo el impacto de las gotas de la lluvia y aumentando la rugosidad de la superficie del suelo, reduciendo la velocidad del agua de escurrimiento y en definitiva de la erosión hídrica superficial. También ayuda a controlar la compactación, principalmente ocasionada por el pasaje reiterado de la maquinaria en la misma huella. La cobertura vegetal

compite con las malezas persistentes por espacio, mejorando a través de la especie seleccionada y de su sistema radicular, la calidad del suelo y ciclo de los nutrientes. Por último, la cobertura vegetal, permite un mejor manejo integrado de plagas y enfermedades en cítricos (mancha negra) con la implementación de la pastera ecológica (Pérez y Álvez, 2015) que al cubrir con biomasa vegetal las hojas de cítricos caídas en el suelo, interrumpe el ciclo de propagación de esta importante enfermedad de los cítricos de exportación.

Desde el punto de vista práctico, la cobertura vegetal en la entrefila tiene algunas ventajas y desventajas.

Dentro de las ventajas de la cobertura vegetal se puede mencionar que, al mejorar la estructura del suelo, aumenta los macroporos que, sinérgicamente con la mejora en el potencial de disponibilidad de agua del suelo, ocasiona que el ambiente de crecimiento de las raíces sea más favorable a las raíces y genera mayor actividad microbiana. Adicionalmente las coberturas reducen el efecto de la compactación del suelo ocasionado por el pasaje de maquinaria pesada en la entrefila de plantación.

Como desventajas podríamos citar el aumento de los costos adicionales al cultivo (que en realidad pasan a ser una inversión en el largo plazo), con fertilización adicional a la entrefila, manejo de corte y resiembra.

El empastado con vegetación espontánea es actualmente la técnica de manejo de la entrefila más utilizada en la citricultura de Uruguay. Esta técnica requiere de un mantenimiento con cortes frecuentes y tiene el riesgo con el correr del tiempo de que la gramilla (*Cynodon dactylon*) sea la especie predominante. La alternativa propuesta por Goñi (2007), fue la siembra directa en la en-

trefila de especies o mezclas de especies que favorecieran la mejora de la materia orgánica del suelo.

En el manejo de la materia orgánica en el suelo de los ecosistemas, especialmente en los agrícolas, es de primer interés la agregación y la fracción activa de la materia orgánica del mismo, debido a su papel central en la disponibilidad de nutrientes a mediano plazo y en la estabilidad estructural del suelo (Gosling, 2013). Con este enfoque, se midió la evolución de la materia orgánica y sus componentes particulados del suelo en plantaciones de cítricos con dos situaciones de manejo de la entrefila: a) en una situación clásica de empastado del suelo y b) en una situación con un manejo de siembra directa de cobertura vegetal; en este caso una mezcla de *Holcus* y Trébol blanco. Este estudio se realizó en un cuadro de naranja Navel con riego ubicado en INIA Salto Grande sobre un suelo Argisol Distrito durante 4 años. La evolución de la materia orgánica (expresada como carbono orgánico) se determinó desde la plantación; se partió con un nivel bajo de materia orgánica del suelo (1,27%) o su equivalente en carbono orgánico (0,74 %). El contenido de la materia orgánica del suelo fue aumentando lentamente en ambas situaciones de manejo de la entrefila, con una mayor incremento en la cobertura de la mezcla. -Sin embargo, el dato más relevante es el aumento (casi al doble) de la materia orgánica proveniente de las partículas de suelo más grandes (212 μm) (Figura 16). La fracción liviana (<53 μm) de la materia orgánica del suelo obtenida por densidad de partículas y la materia orgánica particulada (212 y > 53 μm) están estrechamente asociadas con el crecimiento de la microflora y el suministro de nutrientes (Haynes, 1999; Alvarez *et al.* 1998) y son también las fracciones de la materia orgánica del suelo que responden más rápidamente al manejo (Carter, 2002) tanto para su incremento como para su degradación.

	Testigo Cobertura Expontánea				Con Siembra de Cobertura			
	C. Org %	C-POM 212 μ m g .100 g ⁻¹	C-POM 53 μ m g .100 g ⁻¹	C_MOAM < 53 μ m g .100 g ⁻¹	C. Org %	C-POM 212 μ m g .100 g ⁻¹	C-POM 53 μ m g .100 g ⁻¹	C_MOAM < 53 μ m g .100 g ⁻¹
1997	0,73	0,061	0,049	0,730	0,72	0,058	0,046	0,633
2000	0,74	0,058	0,046	0,633	0,74	0,087	0,056	0,630
2002	1,19	0,100	0,080	0,110	0,84	0,110	0,060	0,670
2003	1,05	0,061	0,105	0,884	1,59	0,144	0,101	1,345

Figura 16. Evolución del carbono orgánico (Corg % $\cdot 1,72 = \text{MO\%}$) del suelo y los componentes de la materia orgánica particulada del suelo en el testigo empastado natural y el tratamiento con cobertura vegetal en la entrefila. C-POM: Carbono-Materia Orgánica Particulada, 212 μ m y 53 μ m. C-MOAM: Carbono-Materia Orgánica Asociada a la fracción Mineral < 53 μ m. Profundidad de 0-15 cm. Cobertura vegetal en la entrefila (siembra directa) de *Holcus* y Trébol blanco.

4.3 Especies vegetales para coberturas vivas

En la estación experimental INIA Salto Grande se han probado varias especies vegetales para su uso como cobertura viva en la entrefila de los cítricos. Dichos materiales fueron probados y sembrados en la entrefila de árboles de mediana edad (10-12 años). *Holcus* (5 kg semilla. ha⁻¹), trébol blanco (5 kg. ha⁻¹), trébol rojo (12 Kg. ha⁻¹), trébol alejandrino (12 Kg. ha⁻¹), Ornythopus (4 Kg. ha⁻¹), cebadilla (30 kg. ha⁻¹), Festuca (12 Kg. ha⁻¹) y Raigras (18 kg. ha⁻¹). La producción de biomasa, como parámetro del vigor de las pasturas, refleja el comportamien-

to esperado similar a siembras fuera de un sistema cítricolo. Existe una interacción importante del genotipo x el ambiente, reflejado en la variación de la producción anual de biomasa. En los años más favorables la cebadilla, la festuca, el raigrás y el trébol alejandrino fueron los que tuvieron mejor desempeño, mientras que, en años muy secos, la festuca y el lotus maku no alcanzaron buenos rendimientos en la primavera (Figura 17).

En general, las coberturas vegetales vivas mostraron una densa vegetación, incorporaron una cantidad importante de biomasa, y facilitaron el tránsito de maquinaria dentro de las entrefilas.

Figura 17. Producción de biomasa (Kg MS. ha⁻¹) verde de diferentes coberturas vegetales creciendo en la entrefila de cítricos por tres años. Sobre un suelo Argisol Dístico Ocrico Abrúptico. Muestreo realizado en primavera de cada año, durante tres años de evaluación. Las barras corresponden al error de la media.

Figura 18. *Holcus* “La Magnolia”, Trébol blanco “E. Zapicán” y *Holcus* con Trébol blanco creciendo en cobertura de entrefila de plantaciones cítricas. Salto.

105 días luego de la siembra

Cebadilla INIA Leona
30 Kg/ha

Festuca Estanduela Tacuabé
12 Kg/ha

105 días luego de la siembra

Raigras INIA Titán
18 Kg/ha

5. Conclusiones sobre el manejo del suelo en plantaciones con cítricos

La meta de mantener sistemas productivos sustentables y productivamente más adecuados al medio ambiente nos lleva a mejorar los actuales conceptos y técnicas utilizadas en el manejo de las plantaciones cítricas.

Los conceptos de calidad y salud del suelo están en continua evolución en el ámbito profesional, académico y en la sociedad en su conjunto.

Las técnicas convencionales de manejo del suelo en Uruguay han ocasionado un incremento en la compactación del suelo (especialmente en la entrefila), un aumento de la

erosión hídrica en la fila de plantación y frecuentemente un importante descontrol en el manejo de las malezas.

La propuesta de uso de técnicas de cobertura sobre la fila de plantación permite no solo un incremento en el rendimiento y calidad de fruta, sino una mejor eficiencia de uso del agua, mayor estabilidad en la temperatura del suelo y en consecuencia un sistema radicular más superficial y sano.

La propuesta de uso de coberturas vegetales vivas en la entrefila de plantación permite incorporar más y mejor materia orgánica al suelo, reduciendo la compactación y posiblemente mejorando las condiciones para el desarrollo de la microflora y microfauna del suelo.

CAPÍTULO 2. SISTEMAS RADICULARES EN CÍTRICOS

1. Principales factores que influyen en el desarrollo de las raíces de los cítricos

1.1 El portainjerto

La selección del portainjerto es uno de los factores importantes en el éxito de una plantación de cítricos. En las plantaciones comerciales, el portainjerto suele ser de un genotipo diferente a la variedad injertada sobre él, que puede no solo provenir de cruzamientos de diferentes especies dentro del género *Citrus* sino también de otros géneros relacionados con el *Citrus* como el *Poncirus*. Castel (1978) y Bowman y Joubert (2020) han hecho una revisión exhaustiva de los principales portainjertos utilizados en la citricultura, con énfasis en portainjertos de áreas más subtropicales como Florida (USA).

El portainjerto *Poncirus trifoliata* (L) Raf. no es ampliamente utilizado alrededor del mundo; su utilización se centra en climas con ambientes fríos tales como Japón, China, Uruguay y Argentina, y en otros países donde la citricultura pasa por períodos de bajas temperaturas (Forner-Giner *et al.*, 2020). En Uruguay el portainjerto *Poncirus trifoliata*, comúnmente llamado trifolia, es el portainjerto más utilizado en la citricultura nacional. Ya en el año 1996 se señalaba que más del 88% de la citricultura uruguaya estaba sobre diferentes selecciones de trifolia (MGAP-DIEA, 1996); esta tradición no ha cambiado sustancialmente. El trifolia tiene la característica de ser resistente a *Phytophthora* sp y virus de la Tristeza de los cítricos, presenta buena afinidad con la mayoría de las variedades comerciales de alto valor, imprime en la variedad una buena calidad de fruta, mayor tolerancia al frío y adaptación a distintos tipos de sue-

los. Por otro parte el tamaño de la copa de los árboles es mediano en comparación con variedades injertadas en portainjertos como Citrumelo o los diferentes Citranges. Como limitante, presenta susceptibilidad a algunas enfermedades (*exocortis*, *blight*) y a los suelos con pH alcalino o con presencia de calcáreo. Actualmente cerca del 90% de los montes de cítricos están sobre pie de trifolia, lo que sin duda es una situación que debe ser tomada en cuenta (Carrau *et al.*, 1993), por el potencial riesgo de que alguna enfermedad, principalmente virus, pueda romper la resistencia de este portainjerto, poniendo en riesgo toda la citricultura nacional (Rubio *et al.*, 2018).

El sistema radicular típico de los cítricos presenta dos estratos de crecimiento en el suelo (Castle, 1978). El primer estrato de raíces más superficiales que se encarga básicamente de la rápida absorción de agua y nutrientes aplicados en la primera capa de suelo. El segundo estrato está compuesto por raíces más leñosas y de mayor diámetro, relacionadas con las reservas, para prevenir casos extremos de deficiencia de agua y además suministra nutrientes que no fueron proporcionados por el primer estrato. Esta estratificación natural de las raíces de los cítricos es frecuentemente favorecida en la plantación de los árboles provenientes del vivero, ya que todavía se mantiene como una práctica común en algunas plantaciones de cítricos de la región, el corte de la raíz principal pivotante al transferir la planta de la maceta del vivero al campo, a los efectos de favorecer la formación de una mayor cantidad de raíces pequeñas. Sin embargo, con esta práctica se limita la capacidad de arraigamiento profundo del sistema radicular y se pierde una parte importante de las raíces que repercutirá en el

enlentecimiento del desarrollo de la copa de las nuevas plantas.

La información sobre la distribución de raíces de los portainjertos de citrus en el suelo es muy escasa en nuestra región y particularmente del trifolia. La cantidad de raíces de los cítricos puede fluctuar entre 300 y 1200 g de MS m⁻³ de suelo, dependiendo del portainjerto, la distancia entre árboles y la profundidad del suelo, (Castle, 1978, 1980).

1.2 Hipoxia y anegamiento del suelo

Uruguay tiene un clima con una gran variabilidad en la precipitación que, asociada a la época del año en que ocurre, a la topografía y al tipo de suelo, genera situaciones temporales de sequía y anegamiento. La hipoxia es la manifestación fisiológica de la respuesta de la planta a la reducción en la cantidad de oxígeno en el suelo, induciendo cambios metabólicos en el sistema radicular que inducen un aumento del estrés oxidativo y de la producción de etileno, modificando procesos

importantes en la dinámica del agua, de los nutrientes y del carbono dentro de la planta (Perata *et al.*, 2011). La compactación y el anegamiento reducen la disponibilidad de oxígeno en el suelo inhibiendo la respiración radicular y, por lo tanto, el crecimiento. Las condiciones de anaerobiosis además favorecen el desarrollo de hongos que causan la muerte de raíces y suprimen el desarrollo de micorrizas, disminuyendo también la absorción de agua y nutrientes (Kolowsky *et al.*, 1991).

Los cítricos toleran bien la falta de oxígeno en el suelo por excesos de agua (Camacho-Bustos, 1972; Syvertsen *et al.*, 1983; García-Sánchez *et al.*, 2007; Arbona *et al.*, 2009). La tolerancia al anegamiento en plantas cítricas de vivero ha sido asociada a la habilidad de mantener alta la conductividad radicular (Camacho-Bustos, 1972), así como las relaciones hídricas (Syvertsen *et al.*, 1983), en conjunto con la habilidad de mantener funcionando por más tiempo la maquinaria fotosintética (Arbona *et al.*, 2009).

Figura 19. Evolución del potencial redox del suelo (cantidad de O₂, mV) en macetas de 6 L a diferentes temperaturas dentro de las mismas.

En experimentos realizados en INIA Salto Grande se verificó que los portainjertos cítricos creciendo en macetas de 6 litros bajo invernáculo pueden desarrollar, a diferentes velocidades, condiciones de hipoxia (potencial redox < 0 mV) e incluso anoxia (-200 mV), en función de la temperatura del suelo en la zona radicular. Mientras que a 35°C las condiciones de hipoxia se producen a los 3-4 días de instalado el anegamiento, a 15°C estas condiciones se producen recién a los 12-14 días (Figura 19). Así mismo, todas las condiciones que favorecen el crecimiento de la microflora del suelo en las macetas favorecen el consumo de oxígeno del sustrato. Uno de los factores más importante en la reducción del oxígeno del suelo en condiciones de anegamiento es el aumento de la actividad microbiana (Reichardt *et al.*, 2000).

El crecimiento de los diferentes portainjertos de cítricos es afectado por el anegamiento del suelo y este efecto no solo está relacionado con el genotipo del portainjerto sino

también por la temperatura del suelo (Otero *et al.* 2013). Durante breves períodos de hipoxia, con temperaturas del suelo cercanas a 35°C , el crecimiento del portainjerto Citrange Carrizo se reduce notoriamente, más que en el portainjerto *P. trifoliata* (Otero *et al.* 2015). Esta interacción es tal que, a bajas temperaturas del suelo (15°C) en condiciones de anegamiento, el portainjerto *P. trifoliata* mantiene la tasa de fotosíntesis más alta y por más días mientras que, en el Carrizo o el Citrumelo, el crecimiento y la tasa de fotosíntesis disminuyen rápidamente (Otero *et al.*, 2015). Por otro lado, se han encontrado diferencias menores en la respuesta al anegamiento entre los diferentes clones de *Poncirus trifoliata*, con una leve mayor tolerancia del trifolia Tucumán, manteniendo el crecimiento por más tiempo en condiciones de estrés a diferentes temperaturas del sustrato (Otero *et al.* 2015), efecto que también es reflejado en el crecimiento de las raíces en función de la temperatura (Figura 20).

Figura 20. Peso fresco de platines de *P. trifoliata* var. Pomeroy, Rubidoux y Tucumán, creciendo en condiciones de anoxia y sin anoxia a diferentes temperaturas del suelo (fila superior). Diferencia de peso fresco entre las condiciones normales de crecimiento y las condiciones con anegamiento para los tres portainjertos a diferentes temperaturas del suelo (fila inferior). Las barras en las columnas representan el desvío de la media. Letras diferentes en las medias de la temperatura del sustrato corresponden a diferencias significativas por TRM Duncan ($p < 0,05$).

Figura 21. Visualización comparativa del desarrollo radicular de *P. trifoliata* var. Pomeroy, Rubidoux y Tucumán para diferentes temperaturas del sustrato en condiciones de crecimiento sin anegamiento, a los 22 días de comenzado el experimento.

Figura 22. Visualización comparativa del desarrollo radicular de *P. trifoliata* var. Pomeroy, Rubidoux y Tucumán para diferentes temperaturas del sustrato en condiciones de crecimiento con anegamiento, a los 22 días de comenzado el experimento.

En general el crecimiento de los portainjertos híbridos (Citranges Carrizo y Troyer y Citrumelo) es mayor que el crecimiento de los trifolias (CT-33, Rubidoux y Tucumán) en condiciones óptimas de temperatura del sustrato (25°C) (Figura 21-23). Sin embargo, cuando existen condiciones de falta de oxígeno en el suelo, la reducción del crecimiento en el Citrumelo es mayor que en los otros; mientras que el Carrizo presenta la menor reducción del crecimiento, destacando una tolerancia mayor a la anoxia que

los demás portainjertos probados. Los diferentes trifolias se mantienen en un rango intermedio de comportamiento. Mantener las funciones fisiológicas en niveles normales ante la presencia de un estrés abiótico es la característica principal de la tolerancia de un genotipo. En este sentido, el portainjerto Carrizo pudo mantener el contenido de agua de la planta por más tiempo en valores más altos que los demás portainjertos evaluados (Figura 24), evitando o retrasando la reducción del crecimiento.

Figura 23. Peso fresco total de las plantas (raíz, hojas y tallos) en los portainjertos Citranges Carrizo y Troyer, Citrumelo, y Trifolias CT-33, Tucumán y Rubidoux, creciendo en condiciones de estrés por anegamiento y sin anegamiento. Letras diferentes en las medias de los diferentes portainjertos corresponden a diferencias significativas por TRM Duncan ($p < 0,05$) entre plantas anegadas y no anegadas.

Figura 24. Diferencia del peso fresco promedio total (raíz, hojas y tallos) entre las plantas no anegadas y anegadas de los portainjertos Citranges Carrizo y Troyer, Citrumelo, y Trifolias CT-33, Tucumán y Rubidoux.

Figura 25. Evolución del potencial de tallo (Mpa) con anegamiento en las macetas y sin anegamiento para seis portainjertos. Las barras representan el error medio de las medias de los tratamientos.

1.3 Estrés Hídrico

El estrés hídrico desde el punto de vista fisiológico incluye pérdida de turgencia de los tejidos, reducción del crecimiento, cerramiento de los estomas, inhibición de la tasa fotosintética y disrupción del normal desempeño del metabolismo del nitrógeno y los carbohidratos (Kozlowki *et al.* 1991, Kozlowki, 1997). A nivel productivo, el estrés hídrico está asociado a las condiciones ambientales. Normalmente, las situaciones de déficit hídrico se presentan cuando la precipitación es inferior a la demanda del cultivo (ET cultivo). La intensidad del estrés está asociada a la mag-

nitud de la diferencia entre la precipitación y la demanda, así como al manejo y clase de suelo, y al genotipo. Desde el punto de vista productivo se considera déficit hídrico a la situación donde el contenido de agua del suelo esté limitando el máximo crecimiento o desarrollo de alguna de las fases fenológicas de la brotación, floración, cuajado y/o desarrollo del fruto.

Uruguay y en particular la zona citrícola del litoral norte del río Uruguay, frecuentemente tiene déficits hídricos climáticos de importancia dentro de los meses estivales (Figura 25).

Figura 26. Déficit hídrico climático expresado como la diferencia entre la precipitación mensual acumulada (mm) y la evapotranspiración de referencia mensual acumulada (ETo-PM56) (mm) para el período 1982-2016. Estaciones meteorológicas INIA-Gras.

Si bien Uruguay todavía tiene una proporción importante de su citricultura en secano, la incorporación de tecnologías de riego ha aumentado sustancialmente en los últimos 20 años (MGAP, 1996; Goñi *et al.* 2008; MGPA-DIEA, 2019). *Con más de 20 años de experimentación en tecnologías de riego en cítricos en INIA Salto Grande, el camino correcto en el desarrollo de sistemas de alta productividad y calidad, está asociado a la incorporación del riego y el manejo de la nutrición* (Goñi y Otero, 2011).

1.4 Estratificación del Sistema Radicular

Como se vio en el capítulo 1, los suelos donde se encuentran las plantaciones cítricas en el norte del país tienen como principal característica tener un horizonte B relativamente pesado a 35-45 cm de profundidad. Esta diferenciación textural entre horizontes limita en muchos casos la exploración radicular de los portainjertos cítricos. Esta estratificación del sistema radicular depende también de la variabilidad espacial del suelo, así como del portainjerto y de la variedad injertada sobre él (Castle, 1978).

1.4.1 Distribución del sistema radicular de *Poncirus trifoliata*

Podemos ver este concepto en uno de los suelos más representativos del área cítrica de Salto y norte de Paysandú, donde se describe el sistema radicular de cítricos en una plantación comercial realizado por Goñi (1997). En este estudio se empleó el método de calicata o de perfil cultural (Box, 1987). Se estudió el desarrollo del sistema radicular de plantas del cv Ellendale de 10 años edad sobre *Poncirus trifoliata* en condiciones de riego por goteo con dos emisores por planta, en un Argisol Subeutrico. En el sitio se abrieron seis calicatas entre árboles adyacentes desde el tronco en el sentido paralelo y perpendicular a la fila de plantación. Se midieron las raíces en las calicatas en el sentido de la fila de tronco a tronco de los árboles hasta los 70 cm de profundidad y en sentido perpendicular a la fila, se clasificaron las raíces en tres distancias desde la línea de plantación: bajo copa (0- 160 cm) del árbol, en la zona de goteo (160-240 cm) fin de la proyección de la copa sobre la entrefila y en la entrefila (240 a 300 cm) hasta una profundidad de 90 cm. Se contabilizó el número

de raíces mediante una grilla de 100 x 100 cm con una cuadrícula de divisiones de 10 x 10 cm. Las raíces se identificaron y se clasificaron según el diámetro en cinco categorías: <0,5 mm muy finas, 0,5-2 mm finas, 2-5 mm pequeñas, 5-10 mm medianas y grandes >10 mm.

A medida que el sistema radicular del *Poncirus trifoliata* profundiza en el perfil del suelo (Argisol Subéutrico) se evidencia una significativa disminución en el tipo y número de raíces. La gran mayoría de las raíces se encuentran a menos de 40 cm de profundidad y bajo la copa del árbol (Cuadro 5). En las

calicatas en sentido paralelo a la fila hay un predominio significativo en porcentaje de las raíces muy finas (<0,5 mm) en los primeros 20 cm, consecuencia directa de la línea de riego (goteros) (Figura 26a). Sin embargo, en aquellas calicatas orientadas en sentido perpendicular a la fila, además de una significativa disminución de los distintos tipos raíces a medida que nos apartamos del tronco, se constató un incremento de las raíces entre los 40-50 cm de profundidad de 5 -10 mm de diámetro, probablemente consecuencia del corte del eje principal de la raíz practicado en el manejo de vivero (Cuadro 5 y Figura 26b).

Cuadro 5. Distribución del número de raíces cada 100 cm² desde el tronco del árbol en profundidad, en plantas de Ellendale injertadas en *P. trifoliata* en calicatas perpendiculares a la fila de plantación.

Profundidad (cm)	Distancia desde el tronco (cm)		
	0-160	160-240	240-300
0-10	26,4 a	8,5 a	2,3 ab
10-20	13,9 b	8,8 a	1,9 bc
20-30	7,2 c	6,3 a	1,6 c
30-40	6,1 cd	3,2 b	2,9 a
40-50	2,4 de	2,1 b	1,8 bc
50-60	2,2 de	0,9 b	0,7 d
60-70	0,8 e	1,1 b	0,7 d
70-80	0,3 e	0,5 b	0,2 d
80-90	0,3 e	0,3 b	0,2 d

Medias en las columnas para cada distancia del tronco con distinta letra son significativas (p<0,01), según el test de TRM Duncan

Figura 27. Distribución porcentual del número y tipo de raíces (diámetro) en plantas de Ellendale sobre *P. trifoliata* desde el tronco hasta los 160 cm, en calicatas paralelas (A) en la fila de plantación y perpendiculares (B) a la misma.

Figura 28. Observación de la distribución del sistema radicular de Ellendale sobre *P. trifoliata* por el método de calicata o perfil cultural utilizado para el conteo de raíces. A) Alta concentración de raíces de *P. trifoliata* en los primeros 5 cm del suelo. B) Vista más detallada de las raíces muy finas en la capa superior del suelo. C) Grilla (10 x 10 cm) para el conteo de raíces en el perfil del suelo.

1.4.2 Distribución del sistema radicular de *Poncirus trifoliata* en relación al manejo de la copa

El manejo del suelo en la superficie y el manejo general del monte cítrícola tienen consecuencias importantes en la distribución de raíces de los cítricos, posiblemente por cambios en el ambiente de crecimiento de éstas (del régimen térmico, de la dinámica de agua, profundidad de arraigamiento) especialmente en las capas superiores del suelo.

Castle (1987) ha desarrollado una extensa descripción y caracterización de los portainjertos cítricos, sin embargo, a nivel nacional y a la hora de diseñar el sistema de plantación y de riego, poco conocemos sobre la influencia que tienen las prácticas de manejo

de la copa y del suelo sobre el sistema radicular de los portainjertos más utilizados en Uruguay.

Para mostrar el efecto de la radiación solar en el sistema radicular, Otero y Goñi (2003) desarrollaron un experimento en la Estación Experimental de INIA Salto Grande ($-31^{\circ}16'20,2''$; $-57^{\circ}53'25,7''$), en un suelo representativo del área cítrícola de Salto (Argisol Distrito Ocríco) en plantas adultas de naranja dulce del cv Spring Navel sobre *P. trifoliata* (Rubidoux) con riego. En el ensayo se comparó la distribución del sistema radicular en árboles de cítricos bajo coberturas con mallas reflectivas (Aluminet 50%). Para este estudio se utilizó el método del taladro (Box, 1987). Este taladro manual extrae un cilindro de suelo y raíces de 15 cm de largo

x 7 cm de diámetro. Las raíces se separaron del suelo mediante lavado continuo (Root Washer, DeltaT) y posteriormente se colocaron en la estufa a 65 °C hasta lograr peso constante. La extracción de suelo y raíces se realizó en 6 puntos radiales desde el tronco en un círculo bajo la zona de goteo de la copa del árbol (Figura 29). Las seis posiciones eran equidistantes al tronco alrededor de la copa y a dos profundidades en el suelo 0-20 y 20-40 cm. Las mallas reflectivas se mantuvieron sobre los árboles durante dos años consecutivos, colocadas en el sentido de las filas y a unos 50 cm por encima de la copa de los árboles y manteniendo tres niveles de carga de fruta: árboles con toda la fruta del año (83 Kg. planta⁻¹), con la mitad de la carga del año (41 Kg. planta⁻¹) y sin fruta. La evaluación del sistema radicular se realizó al final de los dos años bajo cubierta en plantas con malla y en plantas sin malla.

La cantidad de raíces en los primeros 20 cm del suelo (1,97 g MS. L⁻¹) fue un 49% mayor a la cantidad de raíces en el estrato inferior de 20 a 40 cm del suelo (1,30 g MS. L⁻¹) (Cuadro 6), estratificación semejante a la encontrada en las calicatas realizadas en el cv Ellendale (Cuadro 5). Por otro lado, la cantidad de raíces en el estrato de 0-40 cm del suelo es casi en un 51% (1,04 vs 1,58) menor en los árboles bajo cubierta parcial con mallas que en el sistema radicular de las plantas sin cobertura de mallas. Estos datos son muy interesantes de tener en cuenta cuando se diseñan sistemas productivos con cobertura total

de los árboles a nivel de campo, donde con la aplicación de mallas podríamos reducir el tamaño (cantidad de biomasa) del sistema radicular. La reducción de la radiación incidente sobre el árbol debido a las mallas al mismo tiempo, podría estar limitando la productividad en el mediano plazo (Syvertsen *et al.*, 2003).

La distribución del sistema radicular, y especialmente de las raíces de menor diámetro, es dinámica, aun teniendo en cuenta las características leñosas de los cítricos y, al igual que las brotaciones vegetativas en la copa, está influenciado por la la cantidad de frutos en desarrollo sobre la planta (Otero y Goñi, 2003). Esta relación entre los diferentes componentes de la planta ya fue descrita anteriormente (Stewart *et al.*, 1969, Goldschmidt y Golomb, 1982) y se ha asociado con los excesos de fructificación y el decaimiento (ej. cv Murcott), donde se comprobó que el desarrollo de frutos en exceso, llevan a una extenuación de las reservas de carbohidratos principalmente en su sistema radicular. En el caso de Navel, aunque en menor grado que en Murcott, se aprecia una disminución de la cantidad de raíces en el estrato del suelo de 0-40 cm, cuando las plantas tienen toda su carga de frutos, posiblemente como consecuencia a una reubicación transitoria de los fotosintatos (Smucker, 1984). De todos modos esta disminución atribuida a la carga de fruta es menor entidad que la disminución ocasionada por el efecto de la profundidad o por el efecto de la cobertura con mallas (Cuadro 6).

Cuadro 6. Cantidad de raíces y su contenido de carbohidratos de reserva, en árboles adultos de Spring Navel sobre *P. trifoliata* (Rubidoux) y su respuesta a la cobertura con mallas reflectivas y la carga de fruta.

Profundidad (cm)	Cubierta sobre los árboles	Carga de frutos	Cantidad de raíces en suelo g MS. L ⁻¹	Almidón mg. g ⁻¹ MS
0-20			1,97 a	129,6
20-40			1,30 b	129,1 ns
	Sin malla		1,58 a	128,1
	Con malla		1,04 b	130,3 ns
		Toda	1,24 b	130,4
		Mitad	1,28 b	135,7
		Nada	1,44 a	120,9 ns

Medias de columnas con distinta letra son estadísticamente significativas (p<0.05) según el TRM de Duncan

Las interacciones entre los tres factores estudiados (profundidad, presencia de mallas y cantidad de frutos en la planta) no fueron significativas.

1.4.3 Distribución del sistema radicular de *Poncirus trifoliata* en relación a la gestión del riego

Es ampliamente conocido en cultivos extensivos anuales que el contenido de agua y nutrientes, así como la estratificación del suelo, tienen un papel importante en el crecimiento y distribución espacial de las raíces (Arkin y Taylor, 1981). El riego es una tecnología que modifica la distribución de las raíces, incluso con la variabilidad de las precipitaciones de Uruguay, donde el riego localizado es siempre suplementario (Goñi, 2010). Estas características agroambientales de Uruguay hacen que no sea fácil confinar la mayoría del sistema radicular a un solo volumen de exploración, como sucede en los sistemas de producción de cítricos donde el riego es mandatorio.

Teniendo en cuenta estas características de Uruguay, se realizaron evaluaciones en la distribución espacial de raíces en plantas adultas de naranja cv Valencia late sobre *P. trifoliata* (CT33) en condiciones de riego por goteo y secano sobre un suelo (Brunosol Subeutrico FrAr) en la Estación Experimental INIA Salto Grande (Goñi, 2010). El sistema de plantación de los árboles era plano, sin camellones. Para este estudio se utilizó el método de extracción de columna de suelo (Box, 1987) (Figura 30). A tal efecto se empleó un muestreador neumático con un cilindro de 60 cm de largo x 10 cm de diámetro que permitía extraer una columna de suelo de las mismas dimensiones. Se evaluó la mitad del sistema radicular de cada árbol

teniendo como eje central la línea de plantación y a partir de ella y desde el centro del árbol, una configuración radial compuesta de 5 radios a 45° entre ellos. Los muestreos se realizaron en cada radio a 40, 80, 120 y 160 cm desde el tronco en sondeos de suelo hasta una profundidad de 60 cm, separándose las raíces del volumen de suelo cada 10 cm en cada columna de suelo. Las raíces se separaron del suelo mediante lavado continuo (Root Washer, DeltaT) y posteriormente se colocaron en estufa a 65 °C hasta lograr peso constante; el contenido de raíces se expresó como mg de peso seco por cm³ de suelo imperturbado.

La variación espacial de la distribución de raíces en el suelo con cateos neumáticos radiales al tronco no evidenció diferencias significativas en los totales acumulados entre la cantidad de raíces bajo riego y el secano (Figuras 29 y 30). La variabilidad y la cantidad anual de las precipitaciones en Uruguay permite que los árboles desarrollen raíces fuera del volumen de suelo regado. Sin embargo, el sistema radicular en ambos casos (régimen de riego y secano) tiene una alta agregación en profundidad del suelo. A pesar de que se encuentran raíces hasta los 50-60 cm de profundidad, la mayoría de estas están a menos de 20 cm. El crecimiento de las raíces hacia la entrefila es mayor que en profundidad, llegando a tener cantidades significativas de raíces a los 160 cm desde el tronco en condiciones de riego, permitiendo una exploración mayor del sistema radicular. Como se puede apreciar en las figuras 29 y 30, la agregación de raíces de las plantas bajo riego es mayor en muchos de los estratos, lo que puede ser explicado por el mayor crecimiento de las raíces de las plantas alrededor las líneas de riego.

Figura 29. Efecto del riego (A) y el secano (B) en la distribución espacial de la cantidad de raíces en los estratos horizontales del suelo cada 10 cm de profundidad en plantas adultas de Valencia sobre *P. trifoliata*.

Figura 30. Efecto del riego (A) y el secano (B) en la distribución espacial de la cantidad de raíces en los estratos verticales del suelo cada 40 cm de distancia del tronco en plantas adultas de Valencia sobre *P. trifoliata*.

Figura 31. A) Muestreador de raíces instalado en un brazo neumático pronto para muestrear en la línea de riego. B) Columna de suelo con las raíces extraídas por el muestreador neumático. El contenido de agua del suelo es determinante de la calidad de la extracción de la muestra.

En Uruguay, como vimos anteriormente, el régimen hídrico a que están sometidas las plantas (en riego y en secano) afecta la distribución de su sistema radicular. Por otro lado, como veremos a continuación, no se encontraron en el largo plazo diferencias mayores en la distribución del sistema radicular de árboles bajo riego, con diferentes laminas aplicadas.

Este concepto se puede evidenciar en otro estudio conducido por Gofii (Klisich y Garelli, 2011) en donde se comparó la distribución del sistema radicular en árboles de cítricos bajo riego por micro aspersores con un radio de mojado de 1,2 m y sometidos por 14 años a un estricto régimen de riego, diferenciados solamente por dos umbrales de agotamiento permitido del agua del suelo, como criterio para reponer la lámina de riego nuevamente hasta capacidad de campo. Los dos umbrales implementados en este experimento fueron del 25% y del 50% de agotamiento permitido del agua disponible hasta los 40 cm de profundidad. Este estudio se realizó en la Estación Experimental de INIA Salto Grande, en un suelo representativo del área citrícola de Salto (Argisol Distrito Ocrico Abruptico) en plantas adultas de mandarina Satsuma del cv Owari sobre *P. trifoliata* (Pomeroy).

Para este estudio se utilizó el método de extracción de columna de suelo (Box, 1987). A tal efecto se empleó un muestreador neumá-

tico con un cilindro de 60 cm de largo x 10 cm de diámetro que permite extraer una columna de suelo de las mismas dimensiones. Se diseñó un sistema de muestreo en toda la circunferencia del árbol, dividida en 8 radios a 45° entre sí. Las muestras fueron tomadas a lo largo de los radios a una distancia desde el tronco cada 40 cm: a los 40, 80, 120, 160, 200, 240, y 280 cm. En profundidad, se tomaron muestras cada 10 cm, hasta los 50 cm de profundidad (5 estratos de suelo). Las muestras fueron conservadas en cámara de frío para su conservación (-2° C) hasta su análisis. Las raíces se separaron del suelo mediante lavado continuo (Root Washer, DeltaT) y posteriormente se llevaron a un freezer a -50° C. Las raíces fueron deshidratadas por liofilización. La densidad de raíces se expresó en mg MS.cm⁻³ de suelo imperturbado.

La densidad promedio de raíces en todo en el volumen de suelo muestreado (mg MS.cm⁻³ de suelo), no es diferente significativamente entre los dos umbrales de riego utilizados (Figura 32), evidenciando que la cantidad de raíces en ambos sistemas es la misma para el volumen de suelo explorado (280 x 50 cm).

Los resultados demuestran que la cantidad de raíces va disminuyendo a medida que se distancian del tronco principal hacia la entrefila. La mayor presencia de raíces se presenta

en los primeros 80 cm desde el tronco y disminuye en forma significativa a partir de los 120 cm (Figura 33). Esta distribución se mantiene independientemente del régimen de riego utilizado, con una tendencia a aumentar la

cantidad de raíces cercanas al tronco (40 cm) en el caso del umbral con riego más frecuente (menor umbral de agotamiento); a pesar de ello esta diferencia no es estadísticamente significativa.

Figura 32. Densidad de raíces (mg MS.cm⁻³ de suelo) promedio de todos los muestreos bajo dos umbrales de agotamiento de agua en el suelo en mandarina cv Satsuma Owari injertada en *P. trifoliata* (Pomeroy). Las barras en las medias corresponden al error estándar. ns=diferencias entre las medias de los umbrales no significativas por TRM Duncan ($p<0,05$).

Figura 33. Distribución de la densidad promedio de raíces (mg MS.cm⁻³ de suelo) de acuerdo a la distancia desde el tronco bajo dos umbrales de agotamiento permitido de agua disponible en el suelo (25 y 50%). Satsuma Owari injertada en *P. trifoliata* (Pomeroy). Las barras en las medias corresponden al error estándar. Letras diferentes en las medias de las profundidades entre los dos umbrales corresponden a diferencias significativas por TRM Duncan ($p<0,05$) entre plantas anegadas y no anegadas.

Figura 34. Distribución de la densidad promedio de raíces (mg MS.cm⁻³ de suelo) de acuerdo a la profundidad bajo dos umbrales de agotamiento permitido de agua disponible en el suelo. Satsuma Owari injertada en *P. trifoliata* (Pomeroy). Las barras en las medias corresponden al error estándar.

El padrón de distribución de raíces en profundidad en este estudio fue similar a la distribución del *P. trifoliata* en otras condiciones. La gran mayoría de las raíces se encuentran a menos de 30 cm desde la superficie (Figura 34). El riego más frecuente, impuesto por un umbral de riego menor (25%), provocó que en los primeros 20 cm de suelo la densidad de raíces sea mayor que cuando se utiliza un régimen de riego más espaciado (50%). Sin embargo, el umbral de 50% de agotamiento del agua disponible, otorga mayor

homogeneidad de distribución de raíces en profundidad y distancia al tronco (Figura 33). Esto puede ser explicado por la menor frecuencia de riego, en el cual las raíces deben explorar mayor cantidad de suelo. Morgan *et al.* (2007) trabajando con portainjertos Swingle y Carrizo encontraron también un denso desarrollo radicular en los primeros 30 cm, a pesar de que los suelos donde se realizó el estudio eran arenosos y sin restricciones para el crecimiento de las raíces en profundidad.

Figura 35. Contenido de carbohidratos reductores y almidón en las raíces de *P. trifoliata* en los dos regímenes de riego a diferentes profundidades. A) Carbohidratos reductores (mg·g⁻¹ de MS); B) Almidón expresado como mg de glucosa·g⁻¹ de MS. Medias de las profundidades seguidas de diferente letras son significativamente distintas ($p < 0.05$) TRM Duncan.

El sistema radicular de los cítricos contiene una importante cantidad de carbohidratos, principalmente de almidón. En el portainjerto *P. trifoliata* se ha evidenciado que el contenido de azúcares reductores (fructosa, glucosa, sacarosa) cambia en función de la profundidad. Los tejidos de las raíces más profundas, (en general asociadas a reservas) contienen más carbohidratos reductores y totales que las raíces superficiales (Figura 35a y b). En los primeros 30 cm del suelo predominan las raíces finas y muy finas (Figura 35a), cuya actividad principal es la absorción de nutrientes y agua, y en menor medida las funciones de almacenaje y arraigamiento. Las funciones de almacenaje y arraigamiento requieren mayor

cantidad de carbohidratos. El régimen de riego influyó la distribución del contenido de almidón en profundidad (Figura 35b). El portainjerto *P. trifoliata* manejado en un régimen de riego que permite un mayor agotamiento del agua en el perfil del suelo (50%), desarrolla raíces que tienen significativamente más almidón a profundidades iguales y superiores a 30 cm.

2. Conclusiones sobre el sistema radicular de los cítricos en el norte de Uruguay

El *P. trifoliata* y sus híbridos son los portainjertos más usados en la región citrícola del litoral norte del río Uruguay, demostrando

excelente balance entre productividad, calidad de fruta y sanidad.

En base a los estudios llevados a cabo en suelos del área citrícola norte de Uruguay con el portainjerto (*Poncirus trifoliata*), podemos confirmar que la distribución espacial del sistema radicular del *P. trifoliata* es agregada, concentrándose el mayor número (90%) de raíces finas y muy finas en los primeros 30-40 cm del suelo. Contribuye a esta estratificación del sistema radicular la diferenciación textural de los suelos donde se encuentra la citricultura uruguaya, con un horizonte B pesado y compacto (muchas veces textural) normalmente a partir de los 30-40 cm de profundidad y en general, con sistemas de plantación en plano, sin el uso de alomados o camellones en la fila de plantación, que permiten aumentar el horizonte superficial, creando mejores condiciones para un mayor crecimiento radicular.

El sistema radicular del *P. trifoliata* se encuentra localizado (en mayor parte) en los 35-40 cm superiores del suelo, donde todas las medidas de fertilización, riego y manejo del suelo tienen efecto. Asimismo, se observa una alta predominancia de raíces finas en los primeros 20 cm de profundidad.

La cantidad de raíces disminuye desde el tronco hacia la entrefila. En particular, la cantidad de raíces es mayor bajo el área de proyección de la copa y disminuye en forma abrupta desde el borde de la copa hacia la entrefila.

En trabajos de invernáculo, la temperatura del sustrato ha sido determinante en el

crecimiento del portainjerto, especialmente cuando se está bajo un estrés inducido por el anegamiento. Con esta combinación de situaciones el trifolia Tucumán fue el portainjerto que menor pérdida de crecimiento tuvo en relación con el Rubidoux y el Pomeroy. Con estos tres orígenes de trifolia a mayor temperatura del suelo mayor es el daño inducido por la hipoxia. En consecuencia, es una práctica altamente recomendada evitar el anegamiento con el uso de sustratos en macetas bien aireados y con buen drenaje.

También en condiciones de invernáculo, pero con temperatura óptima de 25°C en el sustrato el citrange Carrizo fue el más tolerante a la hipoxia y el Citrumelo fue el más sensible, dejando los trifolias en un comportamiento intermedio.

Las prácticas de manejo y la combinación copa-portainjerto afectan también la cantidad de raíces de los cítricos. Las características físicas y químicas del suelo, los nuevos sistemas de plantación con camellones y/o con diferentes coberturas en la fila de plantación y de prácticas de fertirriego incidirán en la localización del sistema radicular y por tanto, en la capacidad de mejorar el control del desarrollo de la planta a través del manejo del agua y la nutrición. Esta información es extremadamente útil en el manejo de las estrategias de riego y nutrición en la citricultura, ya que, al conocer la profundidad efectiva de los sistemas radiculares de los cítricos en Uruguay, permite aumentar la precisión y en consecuencia la eficiencia de uso del agua y nutrientes cuando se emplean métodos (como el balance hídrico) para la gestión del agua en una plantación (Otero *et al.* 2017).

AGRADECIMIENTOS

Los autores quieren agradecer muy especialmente al Ing. Agr. Dario Saracho por el apoyo incondicional en el desarrollo de varios de los experimentos realizados, así como a la Ing. Agr. Pamela Lombardo por su contribución en el estudio la distribución espacial del sistema radicular de los cítricos. También agradecemos al Ing. Agr. Juan Catalogne y a su familia en cuyo predio se realizaron las primeras evaluaciones del sistema radicular en los cítricos.

No podemos olvidar el laborioso trabajo final de carrera de los estudiantes y actuales Ing. Agr. Alejandro Klisich y Diego Garelli, así de todo el esfuerzo de todo el equipo de trabajo de riego y nutrición de INIA Salto Grande.

Finalmente, los autores quieren agradecer a los Ing. Agr. Mariana Espino y Fernando Rivas, por las contribuciones y sugerencias significativas en la edición de esta serie técnica; así también a todo el equipo de la UCTT de INIA Salto Grande.

BIBLIOGRAFÍA

ABOUZIENA, H.F.; EL-METWALLY, I.M.; SHARMA, S.D.; M. SING. 2008. Comparison of weed suppression and mandarin fruit yield and quality obtained with organic mulches, synthetic mulches, cultivation and glyphosate. *HortScience* 43(3):795-799.

ALVAREZ, C.R.; ALVAREZ, R.; GRIGERA, S.; LAVADO, R.S. 1998. Associations between organic matter fractions and the active soil microbial biomass. *Soil Biol Biochem* 30:767-773.

AMIGHETTI, P.; FITIPALDO, R. 1989. Efecto de distintos manejos de suelo sobre la evolución del Nitrógeno y la Producción de un monte de durazneros. Monografía de grado, Ingeniero Agrónomo, UDELAR - Universidad de la República - Facultad de Agronomía.

ARBONA, V.; LÓPEZ-CLIMENT, M.F.; PÉREZ-CLEMENTE, R.M.; GÓMEZ-CÁDENAS, A. 2009. Maintenance of a high photosynthetic performance is linked to flooding tolerance in citrus. *Environmental and Experimental Botany* 66: 135-142.

ARKIN, G.F.; TAYLOR, H.M. 1981. Modifying the root environment to reduce crop stress. Eds ASAE. Michigan. USA. 407p.

ARSHAD, M. A.; COEN, G.M. 1992. Characterization of soil quality. Physical and chemical criteria. *Amer. J. of Alternative Agriculture* 7: 25-31.

ATKIN, O.K.; EDWARDS, E.J.; LOVEYS, B.R. 2000. Response of root respiration to changes in temperature and its relevance to global warming. *New Phytologist*. 147, 141-154.

BEVINGTON, K.B.; CASTLE, W.S. 1995. Annual Root Growth Pattern of Young Citrus Trees in Relation to Shoot Growth, Soil Temperature, and Soil Water Content. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 110(6):840-845.

BIDEGAIN, M.; CAFFERA, R.M. 1997. Clima del Uruguay. Red Académica Uruguaya. Universidad de la República. Último acceso abril 2020. Recuperado de https://www.rau.edu.uy/uruguay/geografia/Uy_c-info.htm.

BOVÉ, J. M. 2006. Huanglongbing: A destructive, newly emerging, century-old disease of citrus. *Journal of Plant Pathology*, 88, 7–37.

BONOMI, L.; FUSTER, F.; SARACHO, D. 1987. Influencia de las prácticas de manejo de suelo sobre la disponibilidad y absorción del nitrógeno por parte de un monte de durazneros (*Prunus Persica* Batch.) cv Rey del Monte. Tesis de Grado, Ingeniero Agrónomo, Universidad de la República. Facultad de Agronomía. Montevideo. Uruguay.

BOWMAN, KIM D.; J. JOUBERT. 2020. Citrus rootstocks. En: *The Genus Citrus*. Editores: Manuel Talon, Marco Caruso, Fred G. Gmitter, Woodhead Publishing, pages 105-127, ISBN 9780128121634. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812163-4.00006-1>.

BOX, J.E. 1987. Modern Methods for Root investigations. En: *Plant Roots: The Hidden Half*. Ed: Waisel Y.; Eshel, A. y Kafkati, U.M. Decker 10: 191-238.

BRESLER, E. 1977. Trickle-drip irrigation: Principles and applications to soil-water management. *Advances in Agronomy*, 29. USA. 344 - 393.

BURKHARD, N.; LYNCH, D.; PERCIVAL, D.; SHARIFI, M. 2009. Organic mulch impact on vegetation dynamic and productivity of highbush blueberry under organic production. *HortScience* 44(3)688-693.

CAMACHO-BUSTOS, S.E. 1972. Responses of four citrus species to soil flooding under greenhouse conditions. M.S. Thesis, University of California, Riverside. 47 p.

CARRAU, F.; FRANCO, J.; DIEZ, J. 1993. Evaluación de portainjertos cítricos: en naranja Valencia y Washington Navel, Tangor Ellendale y mandarina Satsuma. Montevideo. Uruguay. INIA (Serie Técnica N° 34).44 p.

CARRAU, F.; BISIO, L.; VIGNALE, B. 2001. Variedades y portainjertos cítricos en Uruguay. In: *Resúmenes 8º Congreso Nacional Sociedad Uruguaya de Horticultura*. Salto. Uruguay. Montevideo, INIA. pp. 1-7.

CARTER, M.R. 2002. Soil quality for sustainable land management: organic matter and aggregation interactions that maintain soil functions. *Agron J.* 94:38–47.

CASTLE, W. S. 1978. Citrus root systems; their structure, function, growth and relationship to tree performance. III Congress of the International Society of Citriculture. Sydney, Australia. Proceedings. Griffith, International Society of Citriculture. pp. 62-69.

CASTEL, W. S. 1980. Fibrous root distribution of Pineapple oranges trees on rough lemon rootstock at tree spacing. *Journal of the American Society for Horticultural Science*. 105: 478-480.

CASTLE, W.S. 1987. Citrus Rootstocks. En: *Rootstocks for fruit crops*. Ed: Rom, C.R. y F.R. Carlson. J. Wiley & Son. N. York. 361-399.

CREGG, B.M.; SCHUTZKI, R. 2009. Weed control and organic mulches affect physiology and growth of landscape shrubs. *HortScience* 44(5)1419-1424.

DORAN, J.W.; SARRANTONIO, M.; LEIBIG, M. 1996. Soil health and sustainability. In *Advances in Agronomy*, ed. DL Sparks, pp. 1–54. San Diego, CA: Academic.

DURÁN, A.; GARCÍA PRÉCHAC, F. 2007. Suelos del Uruguay. Origen, clasificación, manejo y conservación. Vol II. 358 p. Ed. Hemisferio Sur. Montevideo. Uruguay.

- FERERES, E.; GOLDHAMER, D.A.** 2003. Suitability of stem diameter variations and water potential as indicators for irrigation scheduling of almond trees. *J Hortic Sci Biotech* 78:139–144.
- FERRARA, G.; FLORE, J.A.** 2003. Comparison between different methods of measuring transpiration in potted apple trees. *Biol Plant* 46:41–47.
- FORNER-GINER, M.A.; CONTINELLA, A.; GROSSER, J.W.** 2020. Citrus Rootstock Breeding and Selection. En: Gentile A., La Malfa S., Deng Z. (eds) *The Citrus Genome. Compendium of Plant Genomes*. Springer, Cham.
- FOSTER, G.R.; YOUNG, R.A.; RÖMKENS, M.L.N.; ONSTAD, C.A.** 1985. Processes of Soil Erosion by Water. In: Follet, R.F. y B.A. Stewart (Eds) *Soil Erosion and Crop Productivity*, ASA, CSSA y SSA, Madison, WI, p:137-162.
- GARCIA-SANCHEZ, F.; SYVERTSEN, J.P.; GIMENO, V.; BOTIA, P.; PEREZ-PEREZ, J.G.** 2007. Responses to flooding and drought stress by two citrus rootstock seedlings with different water-use efficiency. *Physiologia Plantarum* 130: 532–542.
- GOLDSCHMIDT, E.E.; GOLOMB, A.** 1982. The carbohydrate balance of alternate bearing citrus trees and the significance of reserves for flowering and fruiting. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 107:206-208.
- GOÑI, C.** 1997. Estudio del sistema radicular del Trifolia. Reunión técnica INIA. Avances de resultados. Montevideo: INIA. (Serie Actividades de Difusión, 155). pp-45-51.
- GOÑI, C.** 2007. Oportunidades para el manejo de suelo en cítricos, con una óptica de conservación y mejora. Montevideo: INIA. (Serie Actividades de Difusión, 517). pp 26-33.
- GOÑI, C.** 2010. Comparación del sistema radicular bajo condiciones de riego y secano. En: III Simposio sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico en Citrus. Salto Uruguay. INIA.
- GOÑI, C.; MARTIN, D.; SAAVEDRA, C.** 2008. Censo Nacional de pequeños y medianos citricultores 2008. Ed. 1, Montevideo. Unidad de Comunicación y transferencia del INIA, v. 500, p. 76, ISBN: 9974382565.
- GOÑI, C.; OTERO, A.** 2010. El uso de mulches una opción más sustentable para cítricos. En: III Simposio sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico en Citrus (Salto, Uruguay). INIA.
- GOÑI, C.; OTERO, A.** 2011. Supplementary irrigation in Spring Navel orange and Satsuma Owari mandarin on temperate growing conditions. *Acta Horticulturae* 889: 331-338.
- GOÑI, C.; OTERO, A.** 2012. Citrus soil management can reduce the deterioration of soil conditions and improve sustainability production. En: *Striving for Sustainable High Productivity through Improved Soil and Crop Management. Special Issue Agrociencia Uruguay*. Septiembre 2012. P 89-97.
- GOSLING, P.; PARSONS, N.; BENDING, G.D.** 2013. What are the primary factors controlling the light fraction and particulate soil organic matter content of agricultural soils? *Biol Fertil Soils* 49, 1001–1014.
- GREGORY, E.G.; CARTER, M.R.; ANGERS, D.A.; MONREAL, C.M.; ELLERT, B.H.** 1994. Towards a minimum data set to assess soil organic matter quality in agricultural soils. *Canadian J. of Soil Sci.*
- HSIAO, T.C.** 1990. Measurements of plant water status. In: Stewart BA, Nielsen DR (eds) *Irrigation of agricultural crops*. Monograph no. 30, American Society of Agronomy, Madison, WI, pp 243–279.
- HSIAO, T.C.; XU, L. K.** 2000. Sensitivity of growth of roots versus leaves to water stress: biophysical analysis and relation to water transport. *Journal of Experimental Botany*, Oxford, v. 51, p. 1595-1616.

HAYNES, R.J. 1999. Labile organic matter fractions and aggregate stability under short-term, grass-based leys. *Soil Biol Biochem* 31:1821–1830.

HUTCHINSON, J.J.; CAMPBELL, C.A.; DESJARDINS, R.L. 2007. Some perspectives on carbon sequestration in agriculture. *Agric Forest Meteorol* 142:288–302.

JONES, H. 1992. *Plants and microclimate: a quantitative approach to environmental plant physiology*. 2nd Ed. Cambridge University Press. New York. USA.

KARLEN, D.L.; MAUSBACH, M.J.; DORAN, J.W.; CLINE, R.G.; HARRIS, R.F.; SCHUMAN, G.E. 1997. Soil quality: a concept, definition and framework for evaluation. *Soil Science Society of America Journal* 61, 4–10.

KLISICH, A.; GARELLI, D. 2011. Caracterización del sistema radicular del portainjerto *Poncirus trifoliata* (L) "Pomeroy" en un Argisol Dístico Ocríco Abruptico sobre formación Salto, bajo dos regímenes de riego. Trabajo final de Carrera. Facultad de Agronomía. Universidad de la República. Montevideo. Uruguay.

KOZLOWSKI, T.T. 1997. Responses of woody plants to flooding and salinity. *Tree Physiology Monograph* 1, 1–29.

KOZLOWSKY, T.; KRAMER, P. J.; PALLARDY, S.G. 1991. *The physiological ecology of woody plants*. San Diego, Academic Press. 657 p.

LARKIN, R.P. 2015. Soil Health Paradigms and Implications for Disease Management. *Annu. Rev. Phytopathol.* 53, 199–221.

LÓPEZ, D. 2014. Variabilidad espacial de la infiltración en tres tipos de suelo, en plantaciones de cítricos con riego, en el litoral norte del país. Tesis de grado. Facultad de Agronomía. Universidad de la República. Montevideo. Uruguay.

MAZZONCINI, M.; CANALI, S.; GIOVANNETTI, M.; CASTAGNOLI, M.; TITTARELLI, F.; ANTICHI, D.; NANNELLI, R.; CRISTANI, C.; BÀRBERI, P. 2009. Comparison of organic and conventional stockless arable systems: A multidisciplinary approach to soil quality evaluation. *Applied Soil Ecology*. Volume 44, Issue 2, 2010, Pages 124–132.

MERWIN, L.A.; STILES, W.C. 1994. Orchard groundcover management impacts on apple tree growth and yield and nutrient availability and uptake. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 119:209–215.

MESEJO, C.; GAMBETTA, G.; GRAVINA, A.; MARTINEZ-FUENTES, A.; REIG, C.; AGUSTI, M. 2012. Relationship between soil temperature and fruit colour development of 'Clemenpons' Clementine mandarin (*Citrus clementina* Hort ex. Tan). *J. Sci. Food Agric.*, 92: 520–525.
<https://doi.org/10.1002/jsfa.4600>

MGAP, 1996. Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Censo Nacional Citrícola. Montevideo. Uruguay. 100 p.

MGAP-DIEA, 2019. Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Encuesta Citrícola "Primavera 2018". Montevideo, Uruguay. (Serie Encuestas, 356), marzo 2019.

MORGAN, K.T.; OBREZA, T.A.; SHOLBERG, J.M.S. 2007. Orange tree fibrous root length distribution in space and time. *J. Amer. Soc. Hort. Sci.* 132 (2): 262–269.

MORLAT, R.; JACQUES, A. 2003. Grapevine root system and soil characteristics in a vineyard maintained long term with or without interrow sward. *Amer. J. Enol. Viticul.* 54:1–7.

ORTUÑO, M.F.; ALARCÓN, J.J.; NICOLÁS, E.; TORRECILLAS, A. 2004a. Comparison of continuously recorded plant-based water stress indicators for young lemon trees. *Plant Soil* 267:263–270.

ORTUÑO, M.F.; ALARCÓN, J.J.; NICOLÁS, E.; TORRECILLAS, A. 2004b. Interpreting trunk diameter changes in young lemon trees under deficit irrigation. *Plant Sci* 227:275–280.

OTERO, A. 2016. Temperatura y oxigenación del sustrato en el crecimiento de portainjertos en vivero. II Simposio Regional de Viveros Cítricos bajo Cubierta. Salto. 11-13 de mayo de 2016. Uruguay y Argentina.

OTERO, A.; GOÑI, C. 2003. Componentes del rendimiento en Valencia. INIA-SG. Montevideo: INIA. (Serie Actividades de Difusión, 336).

OTERO, A.; GOÑI, C. 2013. Estudios de la influencia del anegamiento y la temperatura del suelo sobre el desempeño de los portainjertos más usados en Uruguay. Salto Grande: INIA. (Serie Actividades de Difusión, 708).

OTERO, A.; GOÑI, C.; SYVERTSEN, J.P. 2004. Crop Load and Canopy Temperature Affect Leaf Characteristics and Net Gas Exchange of Spring Navel. *Hortscience*, v. 39 (4).

OTERO, A.; GOÑI, C.; SYVERTSEN, J.P. 2015. Flooding and soil temperature affect water relationship and photosynthesis of citrus rootstock leaves. *Proc XIIth Intl. Citrus Congress. Acta Horticulturae* 1065, ISHS 2015.

OTERO, A.; MONTOYA, F.; GARCÍA, C. 2017. Programación del Riego. Montevideo: INIA. (Serie Técnica, 232). 68 p.

OTERO, A.; ZEPPERINO, E. 2007. Algunos aspectos a tener en cuenta para el muestreo de árboles y frutas con síntomas de *Xanthomonas axonopodis* pv. *citri* en montes cítricos. Montevideo: INIA. (Serie Técnica, 171). 26 p.

PEARCY, R. W.; EHLENGER, J.R.; MOONEY, H.; RUNDEL, P.W. 2000. *Plant Physiological Ecology: Field methods and instrumentation*. Kluwer Academic Publishers. The Netherlands

PERATA, P.; ARMSTRONG, W.; VOESNEK, L. 2011. Plants and flooding stress. *New Phytologist* 190: 269–273

PÉREZ, E.; ALVES, P. 2015. Validación de una estrategia de manejo integrado para el control de Mancha Negra de los cítricos. En: INIA. Resultados de investigación en Citricultura: Genética, Sanidad, Productividad. (Serie Actividades de Difusión; 752). pp. 118-120.

PIZARRO, F. 1990. Riegos localizados de alta frecuencia (RLAF) goteo, microaspersión, exudación. 471 p.

REICHARDT, W.; INUBUSHI, K.; TIEDJE, J. 2000. Microbiological processes in C and N dynamics. En *Carbon and Nitrogen Dynamics in Flooded Soils*, Eds. G.J.D Kifk y D.C Oik. IRRI (International Rice Research Institute). Makati City. Philippines. 188 p.

RENARD, K.G.; FOSTER, J.M.; WEESIES, G.A.; MCCOOL, D.K.; YODER, D.C. 1997. Predicting soil erosion by water: a Guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE), USDA Agric Handbook N° 703, 404 p.

ROSE, C.W. 1994. Research progress on soil erosion processes and a basis for soil conservation practices. In: Lal. R. (Ed.) *Soil erosion research methods*, 2nd Ed., SWCS, St. Lucie Press, p:159-178.

RUBIO, L.; BERTALMÍO, A.; HERNÁNDEZ-RODRIGUEZ, L.; BENÍTEZ, M.J.; ARRUABARRENA, A.; RIVAS, F.; COLINA, R.; MAESO, D. 2018. Biological and molecular characterization of Uruguayan citrus tristeza virus field isolates. *Journal Plant Pathology* 101: 97. <https://doi.org/10.1007/s42161-018-0149-0>

SAS Institute Inc. 1990. SAS users guide SAS/STAT, version 6. SAS Inst. Inc. Cary, NC.

SÁNCHEZ, E.E.; GIAGETTO, A.; CICHON, L.; FERNANDEZ, D.; ARUANI, M.C.; CURRETTI, M. 2007. Cover crops influence soil properties and tree performance in an organic apple (*Malus domestica* Borkh) orchard in northern Patagonia. *Plant Soil* 292:193-205.

SCOTT, H.D. 2000. Soil physics: agricultural and environmental applications. Iowa State University Press. Ames. USA. 421 pp.

SEVEROVA, V. 1997. Clima del Uruguay. Red Académica Uruguaya. Universidad de la República. Acceso abril 2020. Recuperado de https://www.rau.edu.uy/uruguay/geografia/Uy_c-info.htm.

SILVA DO NASCIMENTO, A. K.; FERNANDES, P. D.; SUASSUNA, J. F.; MACEDO DE OLIVEIRA, A. C.; DA SILVA SOUSA, M. S.; CARVALHO MELO, C. A. 2012. Citrus genotypes of tolerance to water stress phase rootstock. *Revista Brasileira de Agricultura Irrigada*; Fortaleza Tomo 6, N° 1.

SINGER, M.; ERWIN, S. 2000. Soil quality. In: Sumner, M.E. (Ed.), *Handbook of Soil Science*. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, pp. G-271-G-298.

SIRRINE, JR.; LETOURNEAU, D.K.; SHENNAN, C.; SIRRINE, D.; FOUCH, R.; JACKSON, L.; MAGES, A. 2008. Impacts of groundcover management systems on yield, leaf nutrients, weeds, and arthropods of tart cherry in Michigan, USA, *Agriculture, Ecosystems & Environment*, Volume 125, Issues 1-4, 2008, Pages 239-245.

SMACKER, A.J.M. 1884. Carbon utilization and losses by plant root system. In *Roots, Nutrient and Water Influx and Plant Growth*. Ed: Barber, S.A. y D.R. Boulding. Publicación Especial N°49. Amer. Soc. of Agron. Madison. WI. 27-46.

ST LAURENT A.; MERWIN, L.A.; THIES, J. E. 2008. Long term orchard ground cover management system affect soil microbial communities and apple replant disease severity. *Plant Soil* 304: 209-225.

STEWART, I.; WHEATON, T.A.; REESE, R.L. 1969. 'Murcott' collapse due to nutritional deficiencies. *Proc. Fla. State Hort. Soc.* 81: IS-18.

SYVERTSEN, J.P.; ZABLOTOWICZ, R.M.; SMITH, JR M.L. 1983. Soil temperature and flooding effects on two species of citrus. 1. Plant growth and hydraulic conductivity. *Plant and Soil* 72:3-12.

SYVERTSEN, J.; GOÑI, C.; OTERO, A. 2003. Fruit Load and Canopy Shade Affect Leaf Characteristics and Net Gas Exchange of Spring Navel Orange Trees. *Tree Physiology*, v. 23 13, p. 899-906, 2003.

TEASDALE, J.; MOHLER, C. 2000. The quantitative relationship between weed emergence and the physical properties of mulches. *Weed Science*, 48(3), 385-392.

TERAVEST D, SMITH J, CARPENTER-BOGGS L, GRANATSTEIN D, HOAGLAND L, REGANOLD JP. 2011. Soil carbon pools, nitrogen supply, and tree performance under several groundcovers and compost rates in a newly planted apple orchard. *HortScience* 46:1687-1694.

TIETJE, O.; TAPKENHINRICHS, M. 1993. Evaluation of Pedo-Transfer Functions. *Soil Science Society of America Journal*, 57: 1088-1095.

VAN DOREN, D.M. JR.; ALLMARAS, M.R. 1978. Effect of residue management practices on the soil physical environment, microclimate, and plant growth. 49-83. In *crop residue management system*. W. R. Oschwald (ed). ASA. Spec. Pub. N° 31 Amer. Soc. of Agron. Madison. Wisc.

WISCHMEIER, W.H.; SMITH, D.D. 1965. Predicting rainfall-erosion losses from cropland east of the Rocky Mountains- Guide for selection of practices for soil and water conservation. *Agric Handbook N°282*, USDA. Washington.

WISCHMEIER, W.H.; SMITH, D.D. 1978. Predicting rainfall-erosion losses: A guide to conservation planning. Agric Handbook N°537, USDA. Washington.

WISCHMEIER, W.H.; SMITH, D.D. 1981. Predicting rainfall-erosion losses: A guide to conservation planning. Supplement to Agric Handbook N°537, USDA. Washington.

WÖSTEN, J.H.M.; PACHEPSKY, YA. A.; RAWLS, W.J. 2001. Pedotransfer functions: bridging the gap between available basic soil data and missing soil hydraulic characteristics. Journal of Hydrology. Volume 251, Issues 3–4, pp 123-150.

YAO, S.R.; MERWIN, L.A.; BIRD, G.W.; ABAWI, G.S.; THIES, J.E. 2005. Orchard floor management practices that maintain vegetative or biomass groundcover stimulate soil microbial community composition Plant soil 271: 377-389.

INIA Dirección Nacional

Avda. Italia 6201,
Ed. Los Guayabos,
Parque Tecnológico LATU.
Montevideo
Tel: 2605 6021
inia@inia.org.uy

INIA La Estanzuela

Ruta 50, Km 11
Colonia
Tel. 598 4574 8000
Fax 598 4522 4061
iniale@le.inia.org.uy

INIA Las Brujas

Ruta 48, Km 10
Canelones
Tel. 598 2367 7641
Fax 598 2367 7609
inia_lb@lb.inia.org.uy

INIA Salto Grande

Camino al Terrible
Salto
Tel. 598 4733 5156
Fax 598 4732 9624
inia_sg@sg.inia.org.uy

INIA Tacuarembó

Ruta 5, Km 386
Tacuarembó
Tel. 598 4632 2407
Fax 598 4632 3969
iniatbo@tb.inia.org.uy

INIA Treinta y Tres

Ruta 8, Km 281
Treinta y Tres
Tel. 598 4452 2305
Fax 598 4452 5701
iniatt@tyt.inia.org.uy

www.inia.uy