Banco de México
Documentos de Investigación

Banco de México
Working Papers

Nº 2006-05

Regresión Espuria y Tendencias Econométricas

Antonio E. Noriega

Banco de México, Universidad de Guanajuato

Daniel Ventosa-Santaulària

Universidad de Guanajuato

Abril 2006

La serie de Documentos de Investigación del Banco de México divulga resultados preliminares de trabajos de investigación económica realizados en el Banco de México con la finalidad de propiciar el intercambio y debate de ideas. El contenido de los Documentos de Investigación, así como las conclusiones que de ellos se derivan, son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente las del Banco de México.

The Working Papers series of Banco de México disseminates preliminary results of economic research conducted at Banco de México in order to promote the exchange and debate of ideas. The views and conclusions presented in the Working Papers are exclusively the responsibility of the authors and do not necessarily reflect those of Banco de México.

Regresión Espuria y Tendencias Econométricas*

Antonio E. Noriega[†]

Banco de México, Universidad de Guanajuato

Daniel Ventosa-Santaulària[‡]

Universidad de Guanajuato

Resumen

Este documento analiza las implicaciones asintóticas y de muestras finitas de diferentes tipos de no-estacionariedad entre la variable dependiente y la explicativa en un modelo lineal de regresión espuria. Estudiamos casos de no estacionariedad en las variables del modelo tanto determinísticos como estocásticos. En particular, derivamos el orden en probabilidad del estadístico t en una ecuación de regresión lineal bajo una variedad de procesos generadores de datos empíricamente relevantes en economía, y mostramos que el fenómeno de regresión espuria está presente en todos los casos considerados, cuando al menos una de las variables se comporta de manera no estacionaria. Experimentos de simulación confirman los resultados asintóticos.

Palabras Clave: Regresión espuria, tendencias, raíces unitarias, estacionariedad en tendencia, cambios estructurales.

Abstract

This paper analyses the asymptotic and finite sample implications of different types of non-stationary behavior among the dependent and explanatory variables in a linear spurious regression model. We study cases when the nonstationarity in the dependent and explanatory variables is deterministic as well as stochastic. In particular, we derive the order in probability of the t -statistic in a linear regression equation under a variety of empirically relevant data generation processes, and show that the spurious regression phenomenon is present in all cases considered, when at least one of the variables behaves in a nonstationary way. Simulation experiments confirm our asymptotic results.

Keywords: Spurious regression, trends, unit roots, trend stationarity, structural breaks.

JEL Classification: C12, C13, C22.

* Los autores agradecen a Carlos Capistrán y a Daniel Chiquiar por sus comentarios.

[†] Dirección General de Investigación Económica. Email: anoriega@banxico.org.mx.

[‡] Escuela de Economía. Email: dventosa@yahoo.com.

1. Introducción

En estudios recientes ha sido documentado que el fenómeno de regresión espuria está presente bajo diferentes formas de no estacionariedad en el proceso generador de datos (*PGD*). En particular, cuando las variables y_t y x_t son no estacionarias, independientes una de la otra, los mínimos cuadrados ordinarios (MCO) aplicados al modelo de regresión

$$y_t = \alpha + \delta x_t + u_t$$

tienen las siguientes implicaciones: 1) el estimador de MCO de δ ($\hat{\delta}$) no converge a su verdadero valor de cero, y 2) el estadístico t para probar la hipótesis nula $H_0 : \delta = 0$ ($t_{\hat{\delta}}$) diverge, indicando así la presencia de una relación espuria asintótica entre y_t y x_t .

La tasa a la cual $t_{\hat{\delta}}$ diverge depende del tipo de no estacionariedad presente en el proceso generador de y_t y x_t . En Phillips (1986), donde se asume una caminata aleatoria sin constante para ambas variables, el estadístico t es $O_p(T^{1/2})$. Para el caso de una caminata aleatoria con constante, Entorf (1997) muestra que $t_{\hat{\delta}}$ diverge a tasa T . Más recientemente, Kim, Lee y Newbold (2004) (KLN de ahora en adelante) muestran que el fenómeno de regresión espuria aún está presente cuando la no estacionariedad en las series individuales es de naturaleza determinista: encuentran que, bajo el supuesto de estacionariedad en tendencia lineal para ambas variables, el estadístico t es $O_p(T^{3/2})$. Extendiendo los resultados de KLN, Noriega y Ventosa-Santaulària (2005) (NVS de ahora en adelante), muestran que la adición de cambios estructurales en el *PGD* todavía genera el fenómeno de regresión espuria, pero a una tasa reducida de divergencia; i.e. $t_{\hat{\delta}}$ es $O(T^{1/2})$ bajo uno solo o múltiples cambios estructurales en cada variable. En todas estas investigaciones, el supuesto implícito es que ambas variables comparten el mismo tipo de no estacionariedad, ya sea estocástica (Phillips, Entorf), o determinista (KLN, NVS).¹

Si bien la literatura en este tema ha crecido considerablemente, todavía hay vacíos, particularmente cuando las regresiones involucran a variables con tipos mixtos de mecanismos de tendencia. El propósito de este documento es llenar estos vacíos, usando argumentos asintóticos y de simulación. Nuestros resultados revelan la presencia de regresiones espurias bajo una amplia variedad de combinaciones de *PGD* empíricamente relevantes, no explorados anteriormente en la literatura. Por ejemplo, consideramos regresiones de una caminata aleatoria con constante contra un proceso estacionario (con y sin cambios estructurales) en tendencia (y viceversa). La Sección 2 discute los *PGD* considerados. La teoría asintótica desarrollada en la Sección 3 muestra que la tasa a la cual el fenómeno ocurre es generalmente $T^{1/2}$, como fue predicho por Phillips (1998). Sin

¹Algunos trabajos relacionados comparten esta misma característica: Marmol (1995, 1996, 1998), Cappuccio y Lubian (1997), Granger et. al. (1998) y Tsay y Chung (1999).

embargo, para algunas combinaciones de mecanismos de tendencia la tasa de divergencia es mayor. También mostramos que la regresión espuria se desvanece cuando una de las variables es estacionaria. La Sección 4 presenta alguna evidencia de simulación para muestras finitas, mientras la Sección 5 concluye.

2. Mecanismos de tendencia en el proceso generador de datos

En una ecuación simple de regresión, la naturaleza del mecanismo de tendencia en las variables dependiente y explicativa no es conocida a priori. Esto se debe principalmente a la carencia de conocimiento económico sobre los mecanismos de tendencia. Estudiamos el fenómeno de regresión espuria bajo ocho diferentes *PGD*, ampliamente usados en investigación aplicada en economía.

Consideramos el siguiente modelo de regresión de mínimos cuadrados ordinarios:

$$y_t = \hat{\alpha} + \hat{\delta}x_t + \hat{u}_t \quad (1)$$

usado como vehículo para probar la hipótesis nula $H_0 : \delta = 0$. El siguiente supuesto resume los *PGD* considerados a continuación para las variables dependiente y explicativa en el modelo (1).

SUPUESTO. Los *PGD* para $z_t = y_t, x_t$ son los siguientes.

Caso	Nombre*	Modelo
1.	I(0)	$z_t = \mu_z + u_{zt}$
2.	I(0)+ce	$z_t = \mu_z + \sum_{i=1}^{N_z} \theta_{iz} DU_{izt} + u_{zt}$
3.	ET	$z_t = \mu_z + \beta_z t + u_{zt}$
4.	ET+ce	$z_t = \mu_z + \sum_{i=1}^{N_z} \theta_{iz} DU_{izt} + \beta_z t + \sum_{i=1}^{M_z} \gamma_{iz} DT_{izt} + u_{zt}$
5.	I(1)	$\Delta z_t = u_{zt}$
6.	I(1)+cte	$\Delta z_t = \mu_z + u_{zt}$
7.	I(1)+cte+ce	$\Delta z_t = \mu_z + \sum_{i=1}^{N_z} \theta_{iz} DU_{izt} + u_{zt}$
8.	I(2)	$\Delta^2 z_t = u_{zt}$

* ET, ce, y cte significan Estacionario en Tendencia, cambio estructural, y constante, respectivamente.

donde u_{yt} y u_{xt} son innovaciones independientes que obedecen las condiciones de nivel general del Supuesto 1 en Phillips (1986), y DU_{izt} , DT_{izt} son variables *dummy* que permiten cambios en el nivel y la pendiente de la tendencia, respectivamente, es decir, $DU_{izt} = \mathbf{1}(t > T_{b_{iz}})$ y $DT_{izt} = (t - T_{b_{iz}})\mathbf{1}(t > T_{b_{iz}})$, donde $\mathbf{1}(\cdot)$ es la función indicadora, y $T_{b_{iz}}$ es la fecha desconocida del i^{th} cambio estructural en z . Denotamos la fracción de cambio estructural como $\lambda_{iz} = (T_{b_{iz}}/T) \in (0, 1)$, donde T es el tamaño de muestra.

Note que los casos 5,6 y 7 pueden ser escritos como

$$\begin{aligned}
z_t &= z_0 + S_{zt} \\
z_t &= z_0 + \mu_z t + S_{zt} \\
z_t &= z_0 + \mu_z t + \sum_{i=1}^{M_z} \theta_{iz} DT_{izt} + S_{zt}
\end{aligned}$$

donde $S_{zt} = \sum_{i=1}^t u_{zi}$, $DT_{izt} = \sum_{i=1}^t DU_{izt}$, y z_0 es una condición inicial.

Los casos 1 y 2 han sido usados para modelar el comportamiento de variables (teóricamente) estacionarias en media, tales como tipos de cambio real, tasas de desempleo, los grandes cocientes (i.e. cociente producción-capital, cociente consumo-ingreso), y la cuenta corriente. Ejemplos de variables $I(0)$ e $I(0)$ con cambios estructurales han sido presentados en Perron y Vogelsang (1992), Wu (2000), y D'Adda y Scorcu (2003). Los casos 3 al 8 son ampliamente usados para modelar variables crecientes, reales y nominales, tales como producción, consumo, dinero, precios, etc. Las variables macro han sido descritas como $I(0)$ alrededor de una tendencia lineal, $I(0)$ alrededor de una tendencia lineal con cambios estructurales, e $I(1)$ en Perron (1992, 1997), Lumsdaine y Papell (1997), Mehl (2000), y Noriega y de Alba (2001). Las combinaciones del caso 8 con otros casos están frecuentemente detrás de la modelación empírica de especificaciones nominales expresadas en términos de variables $I(2)$ (nominales) e $I(1)$ o $I(0)$ +cambios estructurales (reales). Los modelos económicos que involucran variables $I(2)$ incluyen relaciones de demanda de dinero, paridad de poder de compra, inflación y sobreprecio. Ejemplos de variables descritas como $I(2)$ pueden ser encontrados en Juselius (1996, 1999), Haldrup (1998), Muscatelli y Spinelli (2000), Coenen y Vega (2001), y Nielsen (2002).

Los *PGD* incluyen mecanismos de tendencias deterministas y estocásticos, con 49 posibles combinaciones no estacionarias entre las variables dependiente y explicativa, donde el caso 1 es la referencia.²

El fenómeno de regresión espuria ya ha sido analizado para algunas pocas combinaciones de *PGD* en el Supuesto. Por ejemplo, el caso de ambas variables siguiendo una raíz unitaria (caso 5) fue estudiado por Granger y Newbold (1974) y Phillips (1986), y el caso 6 por Entorf (1997). El caso (3) de un modelo estacionario en tendencia para ambas variables fue estudiado por KLN, mientras su extensión a múltiples cambios estructurales (caso 4) fue analizado por NVS. Mezclas de procesos integrados fueron estudiados por Marmol (1995), quien considera los casos 5 y 8 (*y* sigue una raíz unitaria, mientras *x* sigue dos raíces unitarias, y viceversa). Muchas otras combinaciones, sin embargo, no han sido analizadas. Entre ellas, las combinaciones 3 – 6 y 4 – 6, las cuales tienen importancia práctica, dada la relevancia empírica de los cambios estructurales en las propiedades de series de tiempo de muchas variables macro.

²No consideramos los casos de procesos $I(1)$ con errores de memoria larga, y procesos fraccionalmente integrados, estudiados en Cappuccio y Lubian (1997), y Marmol (1998), respectivamente.

3. Teoría asintótica para regresiones espurias

Esta sección presenta el comportamiento asintótico del estadístico t para probar la hipótesis nula $H_0 : \delta = 0$ ($t_{\hat{\delta}}$) en el modelo (1) cuando las variables dependiente y explicativa son generadas de acuerdo a las combinaciones de *PGD* en el Supuesto.

En el siguiente Teorema, el cual recaba los principales resultados, una combinación de *PGD* es indicada por el par $i - j$, ($i, j = 1, 2, \dots, 8$) indicando que y_t es generado por el caso i , mientras que x_t por el caso j , ambos definidos en el Supuesto. Así, por ejemplo, la combinación 8 - 5 corresponde al modelo (1) donde y_t es $I(2)$ (caso 8), mientras que x_t es $I(1)$ (caso 5).

TEOREMA. *El orden de probabilidad de $t_{\hat{\delta}}$ en el modelo (1) depende de la combinación de *PGD* para y_t y x_t en el Supuesto, como sigue:*

- a) $t_{\hat{\delta}} = O_p(T^{-1/2})$ para la combinación de los casos 1 - 1;
- b) $t_{\hat{\delta}} = O_p(1)$ para la combinación de los casos 1 - i y $i - 1$, $i = 2, 3, \dots, 8$;
- c) $t_{\hat{\delta}} = O_p(T^{1/2})$ para la combinación de los casos $i - i$, $i = 2, 4, 5, 7, 8$,
y $i - j$; $i, j = 2, 3, \dots, 8$; $i \neq j$;
excepto para las combinaciones 3 - 3, 3 - 6, 6 - 3 y 6 - 6;
- d) $t_{\hat{\delta}} = O_p(T)$ para la combinación de los casos 3 - 6, 6 - 3 y 6 - 6;
- e) $t_{\hat{\delta}} = O_p(T^{3/2})$ para la combinación de los casos 3 - 3.

PRUEBA. Los resultados para las combinaciones 3 - 3 y 1 - 3 provienen de KLN; para 5 - 5, 6 - 6, 8 - 8, y 5 - 8 los resultados provienen de Phillips (1986), Entorf (1997), Marmol (1995), y Marmol (1996), respectivamente. La prueba para el resto de las 58 combinaciones se realizó con la ayuda del software *Mathematica*, y, debido a que la mecánica para obtener el orden de probabilidad es la misma para cada combinación de los *PGD*, solamente presentamos el procedimiento para una sola combinación, discutido en el Apéndice al final del documento.

El inciso a) del teorema muestra que, como se esperaba, cuando ambas variables son $I(0)$, el fenómeno de regresión espuria no está presente, debido a que el estadístico t se colapsa a cero (a tasa $\sqrt{T}$). El inciso b) indica que cuando una de las variables es $I(0)$ mientras que la otra sigue algunos de los casos no estacionarios, el estadístico t ni se colapsa a cero ni diverge a infinito; más bien, converge (a una constante, o a una variable aleatoria, dependiendo de los *PGD*). Vea los resultados de muestra pequeña de la siguiente sección). Para la mayoría de las combinaciones de casos, el estadístico t diverge (a tasa $\sqrt{T}$ o más rápido), indicando una relación espuria entre las variables independientes, como los incisos c)-e) lo muestran.

El Cuadro 1 resume los hallazgos anteriores. La simetría de los resultados implica que el orden de probabilidad no depende del tipo de no estacionariedad entre las variables dependiente y explicativa.

Cuadro 1. Ordenes de probabilidad de $t_{\hat{\delta}}$

<i>PGD</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
1	$T^{-1/2}$	1	1	1	1	1	1	1
2		$T^{1/2}$	$T^{1/2}$	$T^{1/2}$	$T^{1/2}$	$T^{1/2}$	$T^{1/2}$	$T^{1/2}$
3			$T^{3/2}$	$T^{1/2}$	$T^{1/2}$	T	$T^{1/2}$	$T^{1/2}$
4				$T^{1/2}$	$T^{1/2}$	$T^{1/2}$	$T^{1/2}$	$T^{1/2}$
5					$T^{1/2}$	$T^{1/2}$	$T^{1/2}$	$T^{1/2}$
6						T	$T^{1/2}$	$T^{1/2}$
7							$T^{1/2}$	$T^{1/2}$
8								$T^{1/2}$

Por lo tanto, cuando dos variables aleatorias independientes siguen cualquiera de las combinaciones no estacionarias considerada en el Supuesto, la inferencia por MCO indicará, asintóticamente, una relación significativa (espuria) entre ellas.

La teoría de representación desarrollada por Phillips (1998) muestra que un proceso de tendencia estocástica (o determinista) puede ser representado de varias maneras. En particular, puede ser escrito como una combinación lineal infinita de funciones de tendencia determinista (estocástica) con coeficientes aleatorios. En tal contexto asintótico, él muestra que los cocientes t de los coeficientes ajustados de la regresión divergen a tasa $O_p(T^{1/2})$. Los resultados del teorema anterior muestran que modelos relativamente simples de series de tiempo no estacionarias indican correctamente la presencia de la representación límite.³

4. Resultados experimentales

Calculamos las tasas de rechazo del estadístico t para probar la hipótesis nula $H_0 : \delta = 0$, en el modelo (1), usando un valor crítico de 1.96 (nivel de 5 %) para una distribución normal estándar. Para evaluar la utilidad de los resultados asintóticos presentados en el teorema para una muestra finita, las tasas de rechazo estuvieron basadas en datos simulados, para muestras de tamaño $T = 25, 50, 100, 250, 500, 1,000$, y $10,000$, bajo varias combinaciones de *PGD* en el Supuesto.⁴ En todos los experimentos, el número de réplicas es 10,000.

³Pocos casos no van en línea con los resultados de nivel general de Phillips (1998) en términos de tasas de divergencia. Estos son los casos 3–3, 3–6, y 6–6 (el primero estudiado en KLN y el último en Entorf (1997)). En los tres casos las tasas de divergencia son mayores.

⁴Los resultados experimentales de esta sección son limitados, y solamente sirven de guía para el comportamiento de muestra finita de algunos casos particulares. Los valores de los parámetros fueron inspirados en datos reales de Perron y Zhu (1995), que utilizan series históricas de PIB real per cápita para economías industrializadas.

Cuadro 2. Tasas de rechazo para $t_{\hat{\delta}}$; el caso de dos cambios estructurales

Combinaciones de casos (<i>PGD</i>) en el Supuesto												
<i>T</i>	1-7	2-2	2-4	2-6	3-4	3-6	4-4	4-6	4-7	4-8	6-8	7-8
25	.06	.06	.06	.07	.14	.25	.32	.61	.66	.65	.93	.94
50	.06	.06	.06	.06	.89	.95	.99	.99	.99	.94	.95	.96
100	.05	.05	.06	.06	1.0	.99	1.0	1.0	1.0	.97	.97	.97
250	.05	.05	.07	.07	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.98	.98	.98
500	.06	.05	.10	.10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.99	.99	.99
1000	.05	.05	.14	.15	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.99	.99	.99
10000	.05	.05	.80	.79	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Los valores de los parámetros en el *PGD* son los siguientes: $\sigma_z = 1$, $\phi_z = 0$, $\mu_x = 0,4$, $\mu_y = 0,7$, $\beta_x = 0,07$, $\beta_y = 0,04$, $\theta_{xi} = 0,07$, $\theta_{yi} = 0,04$, $\gamma_{xi} = 0,02$, $\gamma_{yi} = 0,04$, para $i = 1, \dots, M_z$, $M_z = 2$, para $z = x, y$. Los cambios estructurales en x (y) ocurren en el 20 % (40 %) y 70 % (80 %) del total de la longitud de los datos.

Cuadro 3. Tasas de rechazo para $t_{\hat{\delta}}$; el caso de cuatro cambios estructurales

Combinaciones de casos (<i>PGD</i>) en el Supuesto												
<i>T</i>	1-7	2-2	2-4	2-6	3-4	3-6	4-4	4-6	4-7	4-8	6-8	7-8
25	.06	.06	.06	.07	.18	.25	.81	.89	.97	.90	.93	.94
50	.06	.06	.07	.07	.94	.94	1.0	.99	.99	.96	.96	.96
100	.05	.05	.09	.09	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.97	.97	.97
250	.05	.05	.14	.14	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.98	.98	.98
500	.05	.05	.23	.23	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.99	.99	.99
1000	.05	.05	.41	.41	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.99	.99	.99
10000	.05	.08	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

El diseño experimental es como el del cuadro anterior, pero con $M_z = 4$, para $z = x, y$. Los cambios estructurales en x (y) ocurren en el 15 % (20 %), 30 % (35 %), 50 % (55 %) y 70 % (80 %) del total de los datos.

Los Cuadros 2 y 3 presentan tasas de rechazo bajo 12 diferentes combinaciones de *PGD* en el Supuesto. En el Cuadro 2, los casos donde los cambios estructurales son considerados (todos menos 3 – 6 y 6 – 8) incluyen 2 cambios estructurales, mientras que el Cuadro 3 muestra resultados cuando 4 cambios estructurales son permitidos. La columna etiquetada 1 – 7 en ambos cuadros presenta la contraparte de muestra finita del resultado $O_p(1)$ en el inciso *b*) del

teorema: el estadístico t no diverge, indicando que el fenómeno de regresión espuria no es un problema en muestras finitas. Los cuadros también muestran que una regresión sin sentido no es probable en muestras pequeñas ($25 \leq T \leq 250$) cuando una de las variables es generada por un proceso $I(0)$ con cambios estructurales (combinaciones de los casos $2 - 2$, $2 - 4$, y $2 - 6$), mientras no haya demasiados cambios estructurales.⁵ Para el resto de los casos, la relación sin sentido asintótica reportada en el teorema también es detectada en nuestros experimentos de simulación: el fenómeno de regresión espuria está presente inclusive en muestras tan pequeñas como de 25. Al comparar los resultados de los Cuadros 2 y 3, puede ser notado que una regresión sin sentido es más probable cuando se incrementa el número de cambios estructurales en el *PGD*.

5. Conclusiones

Este documento ha presentado un análisis asintótico y experimental del fenómeno de regresión espuria bajo una amplia variedad de procesos generadores de datos empíricamente relevantes en un modelo de regresión. El trabajo llena muchos vacíos dejados abiertos por la investigación previa en el área. En particular, muestra que el estadístico t para probar una relación lineal entre series de tiempo independientes diverge, si ambas variables exhiben un comportamiento no estacionario, debido ya sea a factores estocásticos (raíces unitarias) o deterministas (tendencias lineales y/o cambios estructurales).

Nuestros resultados particularizan los resultados generales de Phillips (1998) a modelos empíricamente útiles, al mostrar que el fenómeno de regresión espuria está presente para series de tiempo con mecanismos de tendencia relativamente simples. Este fenómeno depende de compartir tendencias y/o cambios estructurales en las variables dependiente y explicativa. Si el comportamiento no estacionario (estocástico o determinista) está solamente presente en una de las variables, la regresión espuria se desvanece. Nuestros experimentos de simulación revelan que una regresión espuria no es exclusivamente un fenómeno asintótico, también estará presente en muestras finitas para la mayoría de los *PGD* considerados.

Dados que los mecanismos de tendencia como los analizados aquí son una característica común del comportamiento de largo plazo en muchas series de tiempo macroeconómicas, la principal conclusión apunta a una alerta con respecto a las inferencias extraídas del análisis de regresión por MCO: la probabilidad de encontrar una correlación sin sentido entre series independientes no solo será alta en muestras finitas, sino que además crecerá con el tamaño de muestra.

⁵Para el caso 2-2 los resultados de la simulación no parecen detectar una regresión espuria inclusive con 10,000 observaciones. Para este caso particular, los resultados de muestra finita convergen muy lentamente a los asintóticos. Cuando el tamaño de muestra se incrementa a 100,000 (400,000), obtuvimos tasas de rechazo de 7.2% (11.8%) para $M_z = 2$, y 39.9% (91.9%) para $M_z = 4$.

6. Apéndice

Presentamos una guía de cómo obtener el orden en probabilidad de una combinación de *PGD*, particularmente, la combinación 1 – 7, para la cual

$$y_t = \mu_y + u_{yt}$$

$$x_t = x_0 + \mu_x t + \sum_{i=1}^{M_x} \theta_{ix} DT_{ixt} + S_{xt}$$

Los órdenes en probabilidad para el resto de los casos siguen las mismas etapas. Las demostraciones fueron auxiliadas por el software *Mathematica 4.1*. Los códigos correspondientes para todas las combinaciones de *PGD* están disponibles en www.ventosa-santaularia.com/NVS_06a.zip. A continuación, describimos las etapas involucradas en los cálculos computacionales.

Escribimos el modelo de regresión $y_t = \alpha + \delta x_t + u_t$ en forma matricial: $y = X\beta + u$. El vector de los estimadores por *MCO* es $\hat{\beta} = (\hat{\alpha} \quad \hat{\delta})' = (X'X)^{-1}X'y$, y el estadístico t de interés $t_{\hat{\delta}} = \hat{\delta} \left[\hat{\sigma}_u^2 (X'X)_{22}^{-1} \right]^{-1/2}$, donde $(X'X)_{22}^{-1}$ es el 2do elemento de la diagonal de $(X'X)^{-1}$ y $\hat{\sigma}_u^2 = T^{-1} \sum_{t=1}^T \hat{u}_t^2 = T^{-1} \sum_{t=1}^T (y_t - \hat{\alpha} - \hat{\delta}x_t)^2$. $t_{\hat{\delta}}$ es una función de los siguientes objetos:

$$\sum_{t=1}^T y_t = \mu_y T + \Sigma_{uy} T^{1/2}$$

$$\sum_{t=1}^T y_t^2 = (\mu_y^2 + \Sigma_{u2y}) T + 2\mu_y \Sigma_{uy} T^{1/2}$$

$$\sum_{t=1}^T x_t = \frac{1}{2} \left[\mu_x + \sum_{i=1}^{M_x} \theta_i (1 - \lambda_i)^2 \right] T^2 + \Sigma_{sx} T^{3/2} + \left[x_0 + \frac{1}{2} \left(\mu_x + \sum_{i=1}^{M_x} \theta_i (1 - \lambda_i) \right) \right] T$$

$$\sum_{t=1}^T x_t^2 = \left[\frac{1}{3} \mu_x^2 + \lambda^+ + \frac{1}{3} \mu_x \sum_{i=1}^{M_x} \theta_i (1 - \lambda_i)^2 (\lambda_i + 2) \right] T^3 + 2(\mu_x \Sigma_{tsx} + \Sigma_{ts1xi}) T^{5/2} + O_p(T^2)$$

$$\sum_{t=1}^T y_t x_t = \left[\frac{1}{2} \mu_y (\mu_x + \sum_{i=1}^{M_x} \theta_i (1 - \lambda_i)^2) \right] T^2 + O_p(T^{3/2})$$

con

$$\Sigma_{uy} = T^{-1/2} \sum_{t=1}^T u_{yt}$$

$$\Sigma_{u2y} = T^{-1} \sum_{t=1}^T u_{yt}^2$$

$$\Sigma_{sx} = T^{-3/2} \sum_{t=1}^T S_{xt}$$

$$\Sigma_{tsx} = T^{-5/2} \sum_{t=1}^T t S_{xt}$$

$$\Sigma_{ts1xi} = T^{-5/2} \sum_{i=1}^{M_x} \theta_i \left(\sum_{t=T_{b_i}+1}^T t S_{xt} - \lambda_i \sum_{t=T_{b_i}+1}^T S_{xt} \right)$$

$$\lambda^+ = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{M_x} \theta_i^2 (1 - \lambda_i)^2 + \sum_{i=1}^{M_x-1} \sum_{j=i+1}^{M_x} \theta_i \theta_j \left[\frac{2}{3} (1 - \lambda_{u(i,j)})^3 + \lambda_{d(i,j)} (1 - \lambda_{u(i,j)})^2 \right]$$

$$\lambda_{u(i,j)} = \max(\lambda_i, \lambda_j), \quad i, j = 1, 2, \dots, M_x$$

$$\lambda_{l(i,j)} = \min(\lambda_i, \lambda_j)$$

$$\lambda_{d(i,j)} = \lambda_{u(i,j)} - \lambda_{l(i,j)}$$

donde (vea por ejemplo Phillips (1986)),

$$\Sigma_{uy} \Rightarrow \sigma_y W_y(1)$$

$$\Sigma_{u2y} \Rightarrow \sigma_y^2$$

$$\Sigma_{sx} \Rightarrow \sigma_x \int_0^1 W_x(r) dr$$

$$\Sigma_{tsx} \Rightarrow \sigma_x \int_0^1 r W_x(r) dr$$

$$\Sigma_{ts1xi} \Rightarrow \sigma_x \sum_{i=1}^{M_x} \theta_i \int_{\lambda_i}^1 (r - \lambda_i) W_x(r) dr,$$

$\Rightarrow$ significa convergencia en distribución, y $W_z(r)$, $z = y, x$ es el proceso Wiener estándar sobre $r \in [0, 1]$.

Usando estas expresiones, *Mathematica* calcula la distribución límite del vector de parámetros y el resto de los elementos de $t_{\hat{\delta}}$ al factorizar las expresiones relevantes en potencias del tamaño de muestra. De esta manera, los órdenes en probabilidad pueden ser determinados, y la expresión límite obtenida, al retener solamente los términos asintóticamente relevantes, sobre una normalización adecuada. Del archivo de salida de *Mathematica* puede ser deducido que, para el caso que nos atañe,

$$T^{3/2} \hat{\delta} \left[\hat{\sigma}_u^2 T^3 (X'X)^{-1}_{22} \right]^{-1/2} = \hat{\delta} \left[\hat{\sigma}_u^2 (X'X)^{-1}_{22} \right]^{-1/2} = O_p(1),$$

como se reporta en el Teorema.

7. Referencias

- Cappuccio, N. y D. Lubian (1997), "Spurious Regressions Between $I(1)$ Processes with Long Memory Errors", *Journal of Time Series Analysis*, 18, 341-354.
- Coenen, G. y J.-L. Vega (2001), "The Demand for M3 in the Euro Area", *Journal of Applied Econometrics*, 16, 727-48.
- D'Adda, C. y A. E. Scorcú (2003), "On the Time Stability of the Output-Capital Ratio", *Economic Modelling*, 20, 1175-1189.
- Entorf, H. (1997), "Random Walks with Drifts: Nonsense Regression and Spurious Fixed-Effect Estimation", *Journal of Econometrics*, 80, 287-296.
- Granger, C.W.J. y P. Newbold (1974), "Spurious Regression in Econometrics", *Journal of Econometrics*, 2, 111-120.
- Granger, C.W.J., N. Hyung, y Y. Jeon (1998), "Spurious Regressions with Stationary Series", Mimeo.
- Haldrup, N. (1998), "An Econometric Analysis of $I(2)$ Variables", *Journal of Economic Surveys*, 12(5), 595-650.
- Juselius, K. (1996), "A Structured VAR under Changing Monetary Policy", *Journal of Business and Economic Statistics*, 16, 400-12.
- Juselius, K. (1999), "Price Convergence in the Medium and Long Run: An $I(2)$ Analysis of Six Price Indices", en Engle, R. F. y H. White (eds.): *Cointegration, Causality and Forecasting. A Festschrift in Honour of Clive W. J. Granger*, Oxford University Press.
- Kim, T.-H., Y.-S. Lee y P. Newbold (2004), "Spurious Regressions with Stationary Processes Around Linear Trends", *Economics Letters*, 83, 257-262.

- Lumsdaine, R.L. y D.H. Papell (1997), "Multiple Trend Breaks and the Unit Root Hypothesis", *The Review of Economics and Statistics*, 79, 212-218.
- Marmol (1995), "Spurious Regressions for $I(d)$ Processes", *Journal of Time Series Analysis*, 16, 313-321.
- Marmol, F. (1996), "Nonsense Regressions Between Integrated Processes of Different Orders", *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 58(3), 525-36.
- Marmol, F. (1998), "Spurious Regression Theory with Nonstationary Fractionally Integrated Processes", *Journal of Econometrics*, 84, 233-50.
- MATHEMATICA 4.1 (2000), Wolfram Research Inc.
- Mehl, A. (2000), "Unit Root Tests with Double Trend Breaks and the 1990s Recession in Japan", *Japan and the World Economy*, 12, 363-379.
- Muscatelli, V. A. y F. Spinelli (2000), "The Long-Run Stability of the Demand for Money: Italy 1861-1996", *Journal of Monetary Economics*, 45, 717-39.
- Nielsen, H. B. (2002), "An $I(2)$ Cointegration Analysis of Price and Quantity Formation in Danish Manufactured Exports", *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 64(5), 449-72.
- Noriega, A. y E. de Alba (2001), "Stationarity and Structural Breaks: Evidence from Classical and Bayesian Approaches", *Economic Modelling*, 18, 503-524.
- Noriega, A. y D. Ventosa-Santaulària (2005), "Spurious Regression Under Broken Trend Stationarity", Working Paper EM-0501, School of Economics, University of Guanajuato. Por aparecer en *Journal of Time Series Analysis*.
- Park, J. Y. y P. C. B. Phillips (1989), "Statistical Inference in Regressions with Integrated Processes: Part 2", *Econometric Theory*, 5, 95-131.
- Perron, P. (1992), "Trend, Unit Root and Structural Change: A Multi-Country Study with Historical Data", en *Proceedings of the Business and Economic Statistics Section*, American Statistical Association, 144-149.
- Perron, P. (1997), "Further Evidence on Breaking Trend Functions in Macroeconomic Variables", *Journal of Econometrics*, 80, 355-385.
- Perron, P. and T. J. Vogelsang (1992), "Nonstationarity and Level Shifts with and Application to Purchasing Power Parity", *Journal of Business and Economic Statistics*, 10(3), 301-20.
- Perron, P. y X. Zhu (2005), "Structural Breaks with Deterministic and Stochastic Trends", *Journal of Econometrics*, 129, 65-119.
- Phillips, P.C.B. (1986), "Understanding Spurious Regressions in Econometrics", *Journal of Econometrics*, 33, 311-340.
- Phillips, P.C.B. (1998), "New Tools for Understanding Spurious Regressions", *Econometrica*, 66(6), 1299-1325.
- Tsay, W.-J. y C.-F. Chung (1999), "The Spurious Regression of Fractionally Integrated Processes", Mimeo.
- Wu, J.-L. (2000), "Mean Reversion of the Current Account: Evidence from the Panel Data Unit-Root Test", *Economics Letters*, 66, 215-22.