Recorte do perfil climático de bacias hidrográficas do estado de Sergipe

Rio Sergipe, Rio Vaza Barris, Rio Japaratuba, Rio Real e Costeiras (Caueira-Abaís e Sapucaia)

ORGANIZADORES

INAJÁ FRANCISCO DE SOUSA

NEUMA RUBIA FIGUEIREDO SANTANA

Editora Poisson

1ª Edição
2020

Inajá Francisco de Sousa
Neuma Rubia Figueiredo Santana
(Organizadores)

Recorte do perfil climático de bacias
hidrográficas do estado de Sergipe: Rio
Sergipe, Rio Vaza Barris, Rio Japaratuba, Rio
Real e Costeiras (Caueira-Abaís e Sapucaia)

1ª Edição

Belo Horizonte
Poisson
2020

Editor Chefe: Dr. Darly Fernando Andrade

Conselho Editorial

Dr. Antônio Artur de Souza – Universidade Federal de Minas Gerais
Ms. Davilson Eduardo Andrade
Dra. Elizângela de Jesus Oliveira – Universidade Federal do Amazonas
Msc. Fabiane dos Santos
Dr. José Eduardo Ferreira Lopes – Universidade Federal de Uberlândia
Dr. Otaviano Francisco Neves – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Dr. Luiz Cláudio de Lima – Universidade FUMEC
Dr. Nelson Ferreira Filho – Faculdades Kennedy
Ms. Valdiney Alves de Oliveira – Universidade Federal de Uberlândia

Imagem da capa

Crislaine Melo Cardoso

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

R311

Recorte do perfil climático de bacias hidrográficas do estado de Sergipe: Rio Sergipe, Rio Vaza Barris, Rio Japaratuba, Rio Real e Costeiras (Caueira-Abaís e Sapucaia). Organização: Inajá Francisco de Sousa, Neuma Rubia Figueiredo Santana - MG: Poisson, 2020

Formato: PDF

ISBN: 978-65-5866-022-4

DOI: 10.36229/978-65-5866-022-4

Modo de acesso: World Wide Web

Inclui bibliografia

1. Meio Ambiente 2. Clima I. SOUSA, I. Inajá Francisco de
II. SANTANA, II. Neuma Rubia Figueiredo III. Título

CDD-577

Sônia Márcia Soares de Moura – CRB 6/1896

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

www.poisson.com.br

contato@poisson.com.br

PREFÁCIO

O E-book reúne trabalhos realizados pelos alunos de Mestrado e Doutorado que cursaram a disciplina Clima e Meio Ambiente do Curso de Pós Graduação em Recursos Hídricos da Universidade Federal de Sergipe. Os alunos são oriundos das mais variadas formações tais como: Agrônomos, Engenheiros Civil e Ambiental, Engenheiro Florestal, Engenheiro Químico e Biólogo.

Para o encerramento da disciplina foi colocado um desafio para que todos os alunos confeccionasse em grupo um trabalho com abordagem crítica baseado nos conhecimentos adquiridos e nas discussões ocorridas ao longo da disciplina. Nesse sentido, foram realizadas análises para as Bacias Hidrográficas de Sergipe: rio Sergipe, rio Vaza Barris, rio Japaratuba, rio Real e Costeiras (Caueira-Abais e Sapucaia) envolvendo as questões sobre o perfil climático correlacionando uma reflexão nos aspectos econômicos, social e ambiental com uma linguagem simples com o objetivo de atingir o público do ensino fundamental e médio.

Prof. Dr Inajá Francisco de Sousa

Coordenador do Programa de Pós Graduação em Recursos Hídricos - PRORH

AGRADECIMENTOS

A comissão organizadora e os autores vêm agradecer a CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pelo apoio financeiro na Publicação do E-Book **RECORTE DO PERFIL CLIMÁTICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE SERGIPE: RIO SERGIPE, RIO VAZA BARRIS, RIO JAPARATUBA, RIO REAL E COSTEIRAS (CAUEIRA-ABAÍS E SAPUCAIA)**, cujos recursos são oriundos do Processo: 88881.157414/2017-01 - Número do Auxílio: 1968/2017.

ORGANIZADORES

Inajá Francisco de Sousa

Possui graduação em Meteorologia pela Universidade Federal da Paraíba (1987), mestrado em Meteorologia pela Universidade Federal da Paraíba (1991), doutorado em Recursos Naturais pela Universidade Federal de Campina Grande (2005) e Pós-doutorado em modelagem hidrológica realizado no Instituto de Agricultura Sostenible - IAS/CISC realizado em Córdoba

Neuma Rubia Figueiredo Santana

Doutora e Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente PRODEMA-UFS (2011), especialista em Gestão de Recursos Hídricos -UFBA(2008) e Bióloga pela Faculdade de Tecnologia e Ciências-SSa (2006). Monitoramento de águas (manguezal, subterrânea e nascentes), relacionados a ações antrópicas e saúde. Atualmente é integrante do grupo de pesquisa ACQUA-UFS. Atua com projetos socioambiental e educação ambiental. Disciplina didáticas e metodologia para construção de TCC.

AUTORES

Ciro Lionel de Oliveira Félix	Mestrando em Recursos Hídricos
Clayane Matos Costa	Mestranda no Programa de Ecologia e Conservação
Cleide Cruz Soares	Mestranda em Recursos Hídricos (UFS)
Crislaine Melo Cardoso	Mestranda em Recursos Hídricos (UFS)
Daniela Ferreira Batista	Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil – Universidade Federal de Sergipe
Gabriel Oliveira Martins	Engenheiro Agrônomo (UFS), Especialista em Gestão Pública (IFPE) e Mestrando em Recursos Hídricos (UFS)
Jéssica Marcy Silva Melo Santos	Mestranda em Recursos Hídricos
José Carlos Benicio do Nascimento Filho	Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos
José Douglas Júnior Pereira de Andrade	Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos
Ketylen Vieira Santos	Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos
Laize Eloy Teixeira	Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil – Universidade Federal de Sergipe
Leandro de Santana Santos	Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil – Universidade Federal de Sergipe
Maria Gabriela Santos Oliveira	Doutoranda no Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente

Sumário

1 - Bacia hidrográfica do rio Real 07

Ciro Lionel de Oliveira Félix, Jéssica Marcy Silva Melo Santos

DOI:10.36229/978-65-5866-022-4.CAP.01

2 - Bacia hidrográfica do rio Sergipe..... 15

Clayane Matos Costa, José Carlos Benício do Nascimento Filho, Maria Gabriela Santos Oliveira

DOI:10.36229/978-65-5866-022-4.CAP.02

3 - Estudo da climatologia da bacia hidrográfica do rio Japaratuba.. 24

Daniela Ferreira Batista, Laize Eloy Teixeira, Leandro de Santana Santos

DOI:10.36229/978-65-5866-022-4.CAP.03

4 - Bacia hidrográfica do Vaza Barris..... 39

José Douglas Júnior Pereira de Andrade, Ketylen Vieira Santos

DOI:10.36229/978-65-5866-022-4.CAP.04

5 - Bacias hidrográficas costeiras Caueira-Abaís e do Sapucaia 55

Cleide Cruz Soares, Crislaine Melo Cardoso, Gabriel Oliveira Martins

DOI:10.36229/978-65-5866-022-4.CAP.05

CAPÍTULO

01

Bacia hidrográfica do rio Real

Ciro Lionel de Oliveira Félix

Jéssica Marcy Silva Melo Santos

1. CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO REAL

O gerenciamento dos recursos hídricos e o planejamento ambiental são fundamentais para preservação dos recursos naturais e o estudo das bacias hidrográficas está diretamente ligado a essas unidades de planejamento administrativo (NASCIMENTO; FERNANDES, 2017). O Estado de Sergipe é banhado por seis importantes bacias hidrográficas, sendo elas: Rio São Francisco, Rio Japaratuba, Rio Sergipe, Rio Vaza Barris, Rio Piauí e Rio Real.

A bacia hidrográfica do Rio Real, foco do presente estudo, é um rio federal que ocupa uma área de aproximadamente 4.972 km², estendendo-se entre os Estados de Sergipe e Bahia. Em Sergipe, essa bacia banha os municípios de Arauá, Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Itabaianinha, Itaporanga d'Ajuda, Lagarto, Pedrinhas, Poço Verde, Riachão do Dantas, Salgado, Santa Luzia do Itanhy, Simão Dias, Tobias Barreto, Tomar do Geru e Umbaúba. No Estado da Bahia, a bacia do Rio Real banha os municípios de Adustina, Cícero Dantas, Fátima, Heliópolis, Itapicuru, Jandaíra, Paripiranga, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal e Rio Real. Conta com uma população de 228.338 habitantes (IBGE, 2007).

Nos municípios banhados pela bacia do Rio Real são diversas as utilizações dos recursos hídricos. São elas: utilização para o abastecimento público, na produção agrícola para a irrigação, o turismo que gera emprego e renda, além da pesca. A bacia é ainda subdividida em sub-bacias, entre elas a Baixa do Tubarão e Tabatinga na Bahia, Jabiberi e Tamirim em Sergipe (SEMARH, 2010).

A Bacia Hidrográfica do Rio Real, drenando águas dos estados de Sergipe e Bahia, constitui-se como bacia hidrográfica sob domínio da União. O curso d'água principal é o Rio Real, que nasce no estado da Bahia, na serra do Tubarão, e delimita Sergipe e Bahia ao sul e sudeste, desaguando no Oceano Atlântico, aproximadamente a 140 km de sua nascente no município de Poço Verde, juntamente com o Rio Piauí, no estuário de Mangue Seco. Seus principais afluentes são: Caripau, Urubu, Jacarezinho, Jabiberi, Itamirim, Paripe e Indiaroba. (SEMARH, 2010).

Tabela 1. Principais sub-bacias da bacia hidrográfica do Rio Real.

Sub-bacias da Bacia do Rio Real	
Sub-bacia	Área (km ²)
Baixa do Tubarão (BA)	711
Jabiberi (SE)	424
Itamirim (SE)	467
Tabatinga (BA)	202
Outras bacias	2994

Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe, 2001.

2. PERFIL CLIMÁTICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO REAL

2.1. IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO DE PERFIL CLIMÁTICO DA BACIA

Foram coletados dados de Temperatura Média (T°), Precipitação (P) e Evapotranspiração (E) de estações meteorológicas localizadas nos municípios banhados pelo rio Real entre os anos de 2015 e 2019. Essas

informações foram tratadas e analisadas no software Microsoft Excel (2007), e estão apresentadas a seguir.

2.1.1. TEMPERATURA MÉDIA

A Tabela 1 apresenta as temperaturas médias mensais da Bacia do Rio Real (BRR) entre os anos de 2015 e 2019, pode-se observar que as T° variam ao longo do ano, apresentando as maiores temperaturas nos meses do verão e as menores no inverno, como é característico destas estações.

Entre os cinco anos avaliados, a maior T° foi registrada no mês de fevereiro de 2019 ($T^\circ = 30,75^\circ\text{C}$), já a menor foi em julho de 2017 ($T^\circ = 23,93^\circ\text{C}$), esses anos foram bem contrastantes, tendo a maior ($28,43^\circ\text{C}$) e a menor ($27,26^\circ\text{C}$) temperatura média anual, respectivamente. Os anos de 2015, 2016 e 2018 não variaram tanto em relação à T° anual, apesar de 2018 e 2017 serem os únicos anos que não apresentaram temperatura média superior a 30°C .

Tabela 2 - Temperatura Média Mensal ($^\circ\text{C}$) da Bacia do Rio Real entre os anos de 2015 a 2019.

Mês /Ano	2015	2016	2017	2018	2019
Janeiro	29,55	29,22	29,85	29,71	29,21
Fevereiro	29,80	29,44	29,95	29,84	30,75
Março	29,75	29,95	29,85	29,10	30,10
Abril	29,54	29,06	28,00	27,79	29,05
Maio	27,63	27,12	26,55	26,78	28,16
Junho	25,15	25,81	25,47	25,60	26,15
Julho	24,65	24,77	23,93	24,91	25,49
Agosto	24,30	25,62	24,54	25,93	26,16
Setembro	26,97	26,55	24,39	27,07	27,09
Outubro	28,08	28,77	26,29	28,68	28,45
Novembro	30,35	29,64	28,84	28,56	30,16
Dezembro	29,84	30,04	29,52	28,98	30,41
Média Anual	27,97	28	27,26	27,75	28,43

Fonte: Autores, 2020.

2.1.2. PRECIPITAÇÃO

Observa-se na Tabela 2 que novamente os anos de 2017 e 2019 foram contrastantes, tendo, respectivamente, a maior ($549,37\text{ mm}$) e a menor ($240,02\text{ mm}$) precipitação média acumulada no ano. Entre 2015 e 2017 houve um aumento no volume de chuva, enquanto após este ano, o volume começou a cair.

O maior volume de chuva registrado entre os anos avaliados foi em maio de 2016, o qual registrou um volume de $155,04\text{ mm}$. Em contrapartida, em agosto de 2019 praticamente não choveu na região da bacia, registrando um volume de $0,05\text{ mm}$. Os meses que compreendem o outono foram os que registraram as maiores precipitações e os da primavera são os que apresentaram os menores volumes de chuva.

Tabela 3 - Precipitação Média Acumulada Mensal (mm) da Bacia do Rio Real entre os anos de 2015 a 2019.

Mês /Ano	2015	2016	2017	2018	2019
Janeiro	5,30	122,80	0,25	13,18	10,82
Fevereiro	51,26	26,89	3,80	26,42	22,89
Março	18,05	11,68	56,75	37,33	98,05
Abril	52,16	0,86	152,00	44,68	7,27
Maio	95,29	155,04	80,70	29,46	5,94
Junho	75,76	38,19	21,00	36,57	5,61
Julho	58,50	28,58	7,50	16,34	6,35
Agosto	25,67	22,51	15,60	10,64	0,05
Setembro	11,57	0,32	63,00	0,90	2,72
Outubro	18,07	15,30	18,75	10,60	15,77
Novembro	0,40	1,75	31,60	63,45	35,90
Dezembro	8,14	21,20	98,42	61,82	28,67
Acumulado no ano	420,14	445,10	549,37	351,37	240,02

Fonte: Autores, 2020

2.1.3. EVAPOTRANSPIRAÇÃO

A Evapotranspiração (Tabela 4) não variou muito entre os cinco anos estudados e seguiu um padrão semelhante à T° , em que os maiores valores observados foram no verão e primavera e os menores no outono e inverno. O maior valor de E foi 5,06 mm dia⁻¹ registrado em novembro de 2015 e dezembro de 2019. Em julho de 2017, observou-se o registro da menor E dos cinco anos (2,02 mm dia⁻¹).

Tabela 4 - Valores médios da Evapotranspiração mensal (mm dia⁻¹) da Bacia do Rio Real entre os anos de 2015 a 2019.

Mês /Ano	2015	2016	2017	2018	2019
Janeiro	4,79	4,16	4,91	4,82	3,82
Fevereiro	4,66	4,56	4,84	4,64	4,33
Março	4,64	4,76	4,64	4,15	4,37
Abril	4,40	4,43	3,48	3,38	3,52
Maio	3,45	3,36	2,91	3,04	3,18
Junho	2,17	2,75	2,58	2,54	2,86
Julho	2,27	2,57	2,02	2,53	2,94
Agosto	2,50	3,23	2,60	3,12	3,55
Setembro	3,75	3,46	2,31	3,72	3,86
Outubro	4,16	4,30	3,28	4,32	4,26
Novembro	5,06	4,67	4,46	4,18	4,96
Dezembro	4,75	4,76	4,61	4,20	5,06

Fonte: Autores, 2020.

2.2. CONHECENDO O PERFIL CLIMÁTICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO REAL

De acordo com SEMARH (2010), o Rio Real corta o estado de Sergipe no sentido oeste-leste, configurando três regiões climáticas distintas:

- Região Subúmida: representando 15,45% da bacia, com temperatura variando de 32°C na máxima a 19°C na mínima, evapotranspiração anual de 1.300 mm e pluviometria média anual de 1.500mm. Nessa região estão inseridos os seguintes municípios: Cristinápolis, Indiaroba, e Tomar do Geru.
- Região de Agreste: representando 20,04% da bacia, com temperatura variando entre 32°C e 18°C, evapotranspiração anual de 1.200 mm e pluviometria média anual de 900mm. Essa região contempla os seguintes municípios: Tobias Barreto e Tomar de Geru (nordeste).
- Região Semiárida: representando 64,51% da bacia, com temperatura variando de 36°C a 16°C, evapotranspiração anual de 1.200mm e pluviometria média anual de 750mm. Essa região contempla os seguintes municípios: Poço Verde e Tobias Barreto (noroeste).

Possui cinco Unidades de Planejamento (UP), a saber: Alto Rio Real, Baixo Rio Real, Rio Itamirim, Rio Jabiberi e Médio Rio Real.

A área de estudo, assim como a região Nordeste, recebe interferência da atuação de sistemas meteorológicos como a Zona de Convergência Intertropical, das massas de ar Tropical Atlântica e Equatorial Atlântica, além dos sistemas frontológicos, os quais se individualizam na Frente Polar Atlântica e nas Correntes Perturbadas do Leste (ondas de leste), como também dos sistemas de brisas marítimas e terrestres, além de outros fatores associados à posição geográfica. A circulação atmosférica da bacia inferior do Rio Real é proveniente do Anticiclone Subtropical Semi-fixo do Atlântico Sul, que origina os Alísios de Sudeste responsáveis pelas elevadas temperaturas, caracterizando relativa estabilidade climática.

Para Botelho (2004), com a análise dos dados climáticos é possível compreender os períodos de maior precipitação e de uma provável estiagem, além de apontar as perdas por evapotranspiração, evidenciando as épocas de maior e menor volume de água para o consumo humano.

Segundo a classificação de Thornthwaite e Mather (1955), na área de estudo há dois tipos de climas: o Megatérmico Subúmido e o megatérmico sub-seco, resultado da sua posição latitudinal em relação ao equador geográfico e ao fato da região estar inserida no litoral oriental do Nordeste. Esses tipos climáticos são representados através dos balanços hídricos dos municípios de Indiaroba e Itabaianinha.

O clima Megatérmico Subúmido é influenciado pela proximidade com o mar havendo uma maior regularidade das precipitações, o que é assegurada pela atuação de dois sistemas meteorológicos: a propagação da Frente Polar Atlântica que é responsável pela intensidade das chuvas; e as Correntes Perturbadas de Leste, atuantes no litoral no período de abril a agosto (FRANÇA; CRUZ, 2007).

Com relação à Frente Polar Atlântica, Santana (2008, p. 56) ressalta:

A frente polar é um sistema de circulação proveniente do choque entre os ventos anticiclônicos da massa polar e da massa tropical atlântica, que provoca chuvas frontais e pós-frontais ao longo do litoral, principalmente no inverno.

A estação pluviométrica de Indiaroba está localizada numa área submetida ao clima Megatérmico Subúmido. Os maiores índices de pluviosidade ocorrem no outono-inverno, com concentração maior nos meses de abril, maio e junho. Com relação às médias anuais do período de 1970 a 2009, há uma regularidade de chuvas atingindo marcas muitas vezes maiores que 100 mm.

Os dados disponíveis da estação de Itabaianinha indicam uma área de clima megatérmico sub-seco. Num período de 1970 a 2009, as deficiências pluviométricas ocorrem entre os meses de outubro a fevereiro em que as precipitações não atingem 60 mm. Com relação às médias anuais, apenas os anos de 1974, 1975, 1985, 1988, 1989, 1997 e 2006 passaram dos 150 mm.

Com base nos dados, foram construídos os Gráficos 1 e 2, os quais ilustram o comportamento da P, T° e da E ao longo do ano para a região da Bacia do Rio Real.

O mês que mais chove na BRR é o mês de maio, o qual na média apresenta um volume de chuva de 73,28mm, seguido dos meses de abril e março, assim, a estação do outono é a mais chuvosa para a região em estudo, já a estação da primavera, para essa localidade, apresenta os menores volumes de chuva, sendo o mês de agosto que menos chove, em média 14,89mm seguido dos meses de setembro e outubro.

Em relação à T° (Gráfico da Figura 1) pode-se visualizar que há uma variação ao longo do ano na BRR, sendo que os meses de janeiro, fevereiro, março e dezembro apresentam as maiores temperaturas, e a partir do mês de abril cai em torno de 30 e começa a haver uma redução nessa, culminando nas menores T°, que são observadas no mês de julho. De agosto em diante, a temperatura começa a subir até chegar a 30°C.

Figura 1 - Valores médios da Pluviosidade Acumulada e Temperatura Média mensais da Bacia do Rio Real.

Fonte: Autores, 2020.

A evapotranspiração (Gráfico da Figura 2) segue um padrão semelhante ao da temperatura, em que os meses do verão possuem as maiores evapotranspirações do ano, em torno de 4,5 mm dia⁻¹, enquanto os meses que compreendem o inverno (2,4 mm dia⁻¹).

Figura 2- Valores médios da Pluviosidade Acumulada e Evapotranspiração mensais da Bacia do Rio Real.

Fonte: Autores, 2020.

3. INDICADORES E SUAS INTERFERÊNCIAS NO CLIMA

3.1. INDICADORES ECONÔMICOS

A região da Bacia do Rio Real, no ano de 2017, obteve um Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente R\$ 9.622.416.490,00, e como pode ser visto no gráfico 3, ele é composto pela administração pública (35%), agropecuária (16%), comércio e serviços (33%) e pela indústria (16%). A administração pública é a responsável, em grande parte dessa região, pelo PIB dos municípios, passando de 40% de participação em municípios como Pedrinhas (Sergipe) e Adustina (Bahia), no entanto, há municípios como Estância (Sergipe) e Rio Real (Bahia) que ela representa menos de 30 % do PIB do município.

Figura 3 - Composição do PIB da Região da Bacia do Rio Real no ano de 2017

Fonte: Autores, 2020.

O agronegócio é o grande responsável pelo PIB da região, embora a agropecuária participe apenas com 16% do PIB, grande parte das indústrias dessa região são agroindústrias que beneficiam produtos agrícolas com grãos, mel, carne bovina, dentre outros, além de parte do comércio e serviço atenderem à agropecuária com a venda de insumos agrícola e a prestação de serviço de consultorias agropecuárias, por exemplo.

O PIB per capita da região foi de aproximadamente R\$ 11.894,22, porém a média salarial das famílias que vivem na BRR é de dois salários mínimos e 48% da população dessa localidade sobrevivem com um renda per capita familiar inferior a meio salário mínimo, demonstrando que há uma desigualdade social nessa região e, conseqüentemente, uma concentração de renda.

3.2. INDICADORES AMBIENTAIS

Devido à sua grande área e também ao englobamento de vários rios com características variadas, a Bacia do Rio Real envolve diversos climas e regimes hidrológicos, além de possuir variedade climática tipicamente litorânea, que passa também por áreas de agreste e sertão. A partir da nascente até as proximidades dos municípios de Tomar do Geru e Rio Real, o rio Real apresenta-se como um rio intermitente, periodicamente, atravessando períodos de seca. Todavia, apresenta fluxo perene a partir dos municípios de Rio Real e Cristinápolis. As condições climáticas mais úmidas causam aumento do débito, da largura, da profundidade do canal e da velocidade média das águas. As condições climáticas subúmidas dominantes na área atenuam a ação de assoreamento dos rios e riachos pertencentes à bacia que literalmente entalham seus vales, favorecendo o carregamento de sedimentos até seus estuários. (VIRÃES, 2013)

As dunas da planície costeira do Rio Real, de formação Quaternária, são originadas através da deposição eólica dos sedimentos arenosos levados até a praia pela ação marinha, que aliada à intensidade dos ventos, corresponde ao principal fator de sua formação e mobilização (COSTA, 2011).

As árvores apresentam altura em torno de 15 metros e geralmente possuem troncos finos com copas largas e irregulares. À medida que esse porte vegetacional se distancia da praia, a intensidade da brisa marinha diminui, permitindo assim o desenvolvimento de árvores. (COSTA, 2011).

Tratando-se da atuação da variável climática sobre os manguezais, é relevante observar que pode haver expansão ou contração de habitat devido às modificações de precipitação, bem como mudanças nos padrões da vegetação decorrentes das alterações do nível do mar, perda de folhas em meio à infestação de insetos, sufocamento das raízes por sedimentos finos, ervas marinhas ou algas e a desestabilização de árvores por causa da erosão de sedimentos (TREWIN, 2013).

No caso dos mangues, sabe-se que o solo e o clima são fatores extremamente limitantes para a ocorrência, desenvolvimento e distribuição das espécies. Observou-se que existe uma forte influência das temperaturas mínimas e máximas sobre o tamanho das folhas dos manguezais. Essa afirmação mais uma vez mostrou como os mangues são sensíveis às mudanças ambientais em microescala, como também são importantes indicadores das mudanças climáticas, até mesmo partindo da análise de variáveis locais em uma escala temporal considerável. (SANTOS, 2016).

Quanto às frutíferas nativas, observou-se que a mangaba apresentará grande perda na sua distribuição geográfica para o ano de 2050. Além disso, grande parte dos municípios exploradores da mangaba não apresentará condições climáticas para o estabelecimento dessa espécie, comprometendo a sua conservação e a economia de populações rurais (MAGALHÃES, 2013).

A temperatura média ideal para o cultivo de coqueiros é de 27 °C, com oscilações diárias inferiores a 10°C. Os ventos fortes e com maior salinidade, queimam as folhas do coqueiro, o que retarda seu crescimento e pode até causar a morte de plantas (EMBRAPA, 2008).

3.3. INDICADORES SOCIAIS

Os municípios banhados pela bacia do Rio Real têm uma população estimada de 697.002,00 habitantes, 1.681,69 habitantes/km², com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) médio de 0,571. Sendo o município de Estância, em Sergipe, como o maior IDH de 0,674 e o menor em Itapicuru, na Bahia, com IDH de 0,486 (IBGE, 2020). O IDH inclui três aspectos de desenvolvimento em uma sociedade, saúde (longevidade), nível de educação e acesso à renda (PEREIRA NETO, 2020).

A influência das variações climática no IDH de uma bacia hidrográfica é observada nos setores da indústria, comércio, agricultura, saúde e acesso ao consumo. A exemplo de Estância com maior IDH entre os municípios inseridos na bacia hidrográfica do Rio Real, que tem como principais atividades econômicas a agricultura, pecuária e indústria de mineração. Quanto maior a geração de emprego e renda de uma região, maior o acesso ao consumo e serviços.

REFERÊNCIAS

- [1] BOTELHO, Rosângela G. M.; SILVA, Antonio Soares da. Bacia hidrográfica e qualidade ambiental. In: A. C. Vitte; A. J. T. Guerra (orgs.). Reflexões sobre a geografia física no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 2004.
- [2] COSTA, B. G. A Bacia Inferior Do Rio Real: Uma Análise Sócioambiental. Universidade Federal de Sergipe, p. 40, p. 61, São Cristóvão, 2011.
- [3] EMBRAPA. Clima e Ecofisiologia. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1106571/1/1.Climaeeconfisiologia.pdf>. Acesso em: 28 de julho de 2020.
- [4] FRANÇA, V. L. A.; M. T. S. CRUZ (Coords.). Atlas Escolar Sergipe: espaço geo-histórico e cultural. João Pessoa: Grafset, 2007.
- [5] IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa por municípios. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: 28 de julho de 2020.
- [6] Magalhães, M. R. Avaliação do impacto das mudanças climáticas na distribuição geográfica e na produtividade sustentável de *Hancornia speciosa* Gomes (APOCYNACEAE) – mangaba nos municípios brasileiros / Mara Rúbia Magalhães – Anápolis: Centro Universitário de Anápolis – UniEvangélica, p. 61, 2013.
- [7] NASCIMENTO, T. V. Do.; FERNANDES, L. F. Mapeamento de uso e ocupação do solo em uma pequena bacia hidrográfica da Amazônia. Ciência e Natura. v.39, n.1, p. 169-177, jan./abr. 2017.
- [8] PEREIRA NETO, C. O desenvolvimento humano no Espírito Santo nos anos 90: uma análise através do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Ajustado (IDHMA). COLÓQUIO – Revista do Desenvolvimento Regional. v. 17, n. 1, p. 86-104, jan./mar. 2020.
- [9] Santos, S. S. C. Modelagem de distribuição potencial e morfometria geométrica das populações florísitcas de mangues no litoral sul de Sergipe, Brasil. Orientadora Rosemeri Melo e Souza. – São Cristóvão, 2016.
- [10] SEMARH, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. Elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Caracterização e Diagnóstico Ambiental do Estado (RE-9) V.1, julho, 2010.
- [11] TREWIN, C. Mangrove and Saltmarsh Monitoring: Literature Review. Disponível em: <http://www.skm.com>. South Brisbane. Abril, 2013.
- [12] VIRÃES, M. V. Regionalização de Vazões nas Bacias Hidrográficas Brasileiras: estudo da vazão de 95% de permanência da sub-bacia 50 – Bacias dos rios Itapicuru, Vaza Barris, Real, Inhambupe, Pojuca, Sergipe, Japaratuba, Subaúma e Jacuípe. / Múcio Valença Virões. – Recife: CPRM, 2013.

02

Bacia hidrográfica do rio Sergipe

Clayane Matos Costa

José Carlos Benício do Nascimento Filho

Maria Gabriela Santos Oliveira

1. CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA

A bacia hidrográfica do rio Sergipe está localizada em sua totalidade no estado de Sergipe, possui aproximadamente 210 km de comprimento de curso principal e 3.673 km² de área (Figura 1). Limita-se ao norte com as bacias do rio São Francisco e do rio Japaratuba e, ao Sul com a bacia do rio Vaza-Barris. Seus principais afluentes pela margem esquerda são: os rios Pomonga, Parnamirim, Ganhamoroba e Cágado; e, pela margem direita, os rios Poxim, Sal, Cotinguiba, Jacarecica, Morcego, Jacoca, Campanha, Lajes e Melancia (SERGIPE, 2020; SERGIPE, 2002).

Figura 1: Localização da bacia hidrográfica do rio Sergipe.

Fonte: Autores, 2020.

A bacia é constituída por 26 municípios, dentre os quais oito possuem a totalidade de suas terras incluídas na bacia (Quadro 01) e 18 deles estão inseridos parcialmente (Quadro 02). A bacia drena aproximadamente 16,7% do estado de Sergipe (ARAÚJO, 2007).

Quadro 1 - Lista de municípios inseridos totalmente na bacia

Municípios inseridos totalmente na bacia do rio Sergipe	
Laranjeiras	Malhador
Moita Bonita	Nossa Senhora Aparecida
Riachuelo	Santa Rosa de Lima
Nossa Senhora do Socorro	São Miguel do Aleixo

Fonte: Autores, 2020.

Quadro 2 - Lista de municípios inseridos parcialmente na bacia

Municípios inseridos parcialmente na bacia do rio Sergipe	
Aracaju	Areia Branca
Nossa Senhora das Dores	Graccho Cardoso
Barra dos Coqueiros	Carira
Divina Pastora	Feira Nova
Itaporanga D'Ajuda	Maruim
Nossa Senhora da Glória	Ribeirópolis
Rosário do Catete	Siriri
Frei Paulo	Santo Amaro das Brotas
São Cristóvão	Itabaiana

Fonte: Autores, 2020.

O objetivo geral deste trabalho foi traçar o perfil climático da Bacia hidrográfica do Rio Sergipe através de informações de pluviosidade, temperatura e evapotranspiração, e por meio de trabalhos já publicados referentes à Bacia, identificar quais indicadores nas dimensões ambiental, social e econômica são afetados pelas alterações climáticas nas regiões que a compõe.

Este trabalho foi estruturado em três partes: a primeira que versará sobre as características gerais da bacia, a segunda que abordará o perfil climático dela, e na terceira parte, explanará sobre os indicadores e sua interferência no clima.

2. PERFIL CLIMÁTICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SERGIPE

2.1. IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO CLIMÁTICO DA BACIA

A Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH (1997) define a bacia hidrográfica como a unidade territorial para sua implementação através de seus Planos de Recursos Hídricos. Dessa forma, a caracterização de um perfil climático da bacia fornece um embasamento técnico para o diagnóstico da situação atual e o estabelecimento dos horizontes traçados no seu plano. Além disso, auxiliará o desenvolvimento de políticas públicas, tecnológicas e de educação para promoção do desenvolvimento sustentável da região, assim como a garantia dos usos múltiplos da água, de acordo com a PNRH.

2.2. LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS

Para a construção do perfil climático, obtiveram-se os dados de pluviosidade e temperatura de sete postos pluviométricos junto ao AgriTempo, que compreendeu uma série histórica de 2015 a 2020. A evapotranspiração foi estimada através do método Thornthwaite (1948), para esse cálculo os dados de temperatura média mensal e latitude foram também coletados na plataforma do AgriTempo. Os gráficos de pluviosidade, temperatura e evapotranspiração foram elaborados a partir da utilização da planilha eletrônica Microsoft Office Excel 2010. Os mapas utilizados foram elaborados do software QGIS (versão 3.4.14).

2.3. CONHECENDO O PERFIL CLIMÁTICO DA BACIA

A Figura 2 demonstra relação da precipitação e temperatura. É possível verificar que temperaturas mais baixas estão concentradas nos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro. Enquanto os maiores índices pluviométricos encontram-se nos meses de março, abril, maio e julho; visualizando médias entre 84, 95 mm e 45, 48 mm. Essa estação chuvosa anteriormente citada é resultado da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que está mais ao sul (SILVA et al., 2011)

Figura 2 – Gráfico de média de precipitação e temperatura mensal (2015-2020) na bacia hidrográfica do rio Sergipe.

Fonte: Autores, 2020

O mapa da Figura 3 projeta a variação espacial da pluviosidade da bacia pela aplicação do método de Thiessen. Nele podemos perceber maiores precipitações ao sudeste, na região costeira do estado.

Figura 3 - Distribuição espacial da precipitação média mensal da bacia hidrográfica do rio Sergipe, pelo método de Thiessen

Fonte: Autores, 2020

Quanto à evapotranspiração, verificou-se que os menores valores foram nos meses de junho, julho, agosto e setembro (Figura 4), meses esses que ocorrem leves declínios na temperatura média mensal.

Figura 4 - Gráfico de evapotranspiração da bacia hidrográfica do rio Sergipe (2015-2020)

Fonte: Autores, 2020

3. INDICADORES E SUAS INTERFERÊNCIAS NO CLIMA

A qualidade da água no Rio Sergipe possui uma grande variação na concentração de sais, pois reduz do montante à jusante, como consequência da maior incidência de chuvas, formação de rochas sedimentares e do aporte de água com baixo teor de salinidade nas regiões situadas no trecho inferior da bacia. Além de serem fatores que contribuem para boa recarga e grande renovação das águas subterrâneas, as quais alimentam os afluentes e proporcionam regime permanente a esse rio. No médio e alto curso do rio Sergipe, a qualidade físico-química da água apresenta-se de baixa à média qualidade e as vazões inferiores às do curso inferior, como consequência da prevalência de rochas cristalinas (SERGIPE, 2002).

A população da bacia está distribuída em 116.689 domicílios, destes 85,2% possuem água encanada e apenas 38,7% estão ligados à rede geral de esgoto. Aproximadamente 80% dos domicílios são atendidos com o sistema de coleta de lixo, o que não assegura condições adequadas de saneamento, tendo em vista que os resíduos urbanos são depositados em lixeiras a céu aberto (SERGIPE, 2002).

Figura 5 - Gráfico de domicílios com água encanada na bacia hidrográfica do rio Sergipe

Fonte: SERGIPE, 2002.

Figura 6 - Gráfico de domicílios com ligação a uma rede de coleta de esgoto

Fonte: SERGIPE, 2002.

Segundo dados do IBGE, em 2019, Sergipe possuía IDH de 0,665 e renda per capita de R\$980,00. As condições socioeconômicas da população da bacia do rio Sergipe podem ser analisadas a partir do nível de renda e dos anos de estudo da pessoa responsável pelo domicílio. Quanto ao nível de renda, 65,6% dos moradores enquadram-se nas categorias de baixa renda e 34,4% situam-se nas diversas classes de rendimento, sendo que, mais da metade destes, dispõem de 2 a 5 salários mínimos por mês. Quanto ao nível de escolaridade, 65,7% dos responsáveis pelo domicílio não completaram sequer o ensino fundamental e 5,7% deles estudaram durante 15 anos ou mais (SERGIPE, 2002).

Figura 7 - Gráfico de famílias que se enquadram como baixa renda na BHSE

Fonte: SERGIPE, 2002.

As principais atividades econômicas predominantes na bacia são a cana de açúcar, feijão, mandioca, coco, pecuária extensiva, extrativismo mineral e distrito industrial. No parque industrial (Quadro 03), as atividades são caracterizadas por indústrias do ramo de Fabricação de Produtos Cerâmicos (23%); Laticínios (6%) e Fabricação de Produtos de Limpeza (6%) (ROCHA et al., 2004).

Quadro 3 - Caracterização da tipologia industrial existente na bacia hidrográfica do Rio Sergipe.

Tipologia	%
Britamento, Aparelhamento e outros trabalhos em pedras	2%
Fabricação de produtos cerâmicos	23%
Laticínios	6%
Fabricação de produtos de limpeza	6%
Confecção de artigos do vestuário	6%
Torrefação e moagem de café	4%
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro	4%
Fiação e Tecelagem	4%
Fabricação de produtos químicos inorgânicos	4%
Fabricação de outros produtos alimentícios	4%
Fabricação de cimento	4%
Fabricação de artefatos têxteis	4%
Beneficiamento de fibras têxteis naturais	4%
Processamento, preservação e produção de conservas de frutas, legumes e outros vegetais	2%
Impressão e Serviços conexos	2%
Fabricação de refrigerantes e refrescos	2%
Fabricação de rações balanceadas para animais	2%
Fabricação de produtos químicos	2%
Fabricação de produtos diversos de metal	2%
Fabricação de produtos de plástico	2%
Fabricação de produtos de celulose e plástico	2%
Fabricação de móveis de madeira	2%
Fabricação de artefatos para indústria de extração mineral e construção civil	2%
Fábricas de copos	2%
Fábricas de calçados	2%
Confecções de roupas de banho	2%
Abates de reses, preparação de produtos de carne e de pescado	2%

Fonte: ROCHA et al., 2004.

Rocha et al., 2004 em sua pesquisa identificou que as áreas de agricultura e pastagem na bacia hidrográfica do rio Sergipe correspondem a 37,29% e 48,15%, respectivamente (Figura 08). Essas atividades contribuíram para a supressão da vegetação nas áreas que compreendem a bacia, permanecendo uma baixa cobertura de remanescentes florestais (5,60%), de mata ciliar e mangues (1,20%), de campo de restinga (2,13%), de brejo ou inundações (1,40%), de dunas e areal (0,17%), de rios e lagoas (1,09%), de urbanização e indústrias (1,97%) e outros (nuvens e sombras) (1,00%).

Figura 8 - Gráfico de vegetação e cobertura do solo na BHSE

Fonte: ROCHA et al., 2004

Figura 9 – Mapa de uso do solo na bacia hidrográfica do rio Sergipe

Fonte: Autores, 2020

Os problemas ambientais no rio Sergipe agravam-se devido ao aumento populacional das cidades localizadas em suas margens e afluentes. Esse aumento exerce pressão sobre os ecossistemas e provoca perdas naturais pelos desmatamentos, pela deficiência de sistemas de esgotos, pela extração de madeira, pelas construções de habitações, pelo uso intensivo de agrotóxicos, pelas contaminações de fontes de água, pelos aterros dos manguezais e pelas ocupações irregulares (ARAÚJO, 2006; MOURA JÚNIOR, 2010).

A demanda de água na bacia do rio Sergipe para os diversos usos é de 259.351 m³/dia, porém o volume de água gerado na bacia é de 54.9 mil m³/dia, oriundo, principalmente, do rio Jacarecica e de poços profundos, apontando um déficit hídrico em torno de 80% nesta, que é suprido pelo rio São Francisco. Os pequenos povoados rurais são abastecidos pelos poços perfurados na bacia, mesmo insuficientes para atender a demanda de abastecimento, os mananciais subterrâneos são significativos para o abastecimento da população rural residente na bacia (SERGIPE, 2002).

A concentração natural de sedimentos em suspensão nos canais estuarinos, como existente na bacia de drenagem do rio Sergipe, é sensível e vulnerável às ações humanas (agricultura, pavimentação, desmatamentos, construção e obras portuárias) e concomitantemente a falta de cuidados ambientais, em termos de planejamento e monitoramento, tem conduzido ao uso conflitivo das suas águas (FONTES, 2003).

As mudanças climáticas, além de alterarem as características do clima local, podem ocasionar diversos impactos sociais, ambientais e econômicos nas regiões afetadas, como a perda da biodiversidade, o aumento do potencial erosivo das chuvas, e consequentemente, da produção e carreamento de sedimentos aos rios, desastres naturais como inundações, secas e deslizamentos de encostas, deterioração da qualidade das águas por diversas intervenções humanas (Quadro 04). Diante desses fatos, ressalta-se a importância da realização de planejamento e gestão dos recursos hídricos existentes numa região, uma vez que eles são primordiais para o desenvolvimento de outros setores no país, dentre os quais se destacam a geração de energia elétrica, o saneamento, a indústria, a agricultura e o turismo (AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS, 2010).

Quadro 04: Indicadores afetados pelas alterações climáticas.

Indicadores		
Ambientais	Econômicos	Sociais
Acesso ao abastecimento de água	Lucratividade com a produção agrícola e animal PIB per capita	Acesso ao abastecimento de água
Estado qualitativo da água	PIB per capita	Renda domiciliar
Secas	Diversidade de culturas	Lazer/Turismo
Salinização das águas	Turismo	Nível de Escolaridade
Desmatamentos		Fome e desnutrição- Insegurança alimentar
Disponibilidade de água para dessedentação animal		Doenças
		Transmissão de vetores
		Acidentes e desastres – ex.: enchentes

Fonte: Autores, 2020

Quanto aos componentes do sistema turístico, estes poderão ser afetados quanto ao espaço geográfico turístico, demanda, oferta e agentes (GRIMM, ALCÂNTARA & SAMPAIO, 2018). O impacto na demanda turística pode ser afetada de forma direta e indireta. A primeira ocorre quando altera a escolha do destino, o período temporal da viagem, provocando a destruição da infraestrutura turística, o bloqueio de vias de acesso, a redução do período adequado de exposição solar, o estresse térmico, o aumento na incidência de câncer de pele, a destruição de praias e manguezais e a erosão costeira, já o segundo acontece quando afeta a qualidade da experiência, percepção adversa após algum evento extremo e na insegurança em relação ao destino (GRIMM, 2016).

As alterações climáticas podem produzir também impactos à saúde humana por diferentes vias (Figura 10). Uma delas é pelo efeito provocado pela dinâmica das doenças de veiculação hídrica e expansão de áreas de transmissão de doenças relacionadas a vetores, que podem se agravar com enchentes ou secas e afetar a qualidade e o acesso à água. Além das doenças respiratórias que são influenciadas pelas alterações de temperatura e umidade. O regime de chuva e concentração de poluição, impactam, principalmente nas áreas urbanas a qualidade do ar (Organização Pan-Americana da Saúde, 2008).

Figura 10 – Indicadores de sustentabilidade

Fonte: Autores, 2020

REFERÊNCIAS

- [1] AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS. Os efeitos das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos: desafios para a gestão. ANA, 2010.
- [2] ARAÚJO, H. M. P. Estuário do rio Sergipe: importância e vulnerabilidade. In: Rio Sergipe: Importância, Vulnerabilidade e preservação. Aracaju: ÓS Editora, 2006.
- [3] ARAÚJO, H. M. Análise socioambiental da bacia costeira do rio Sergipe. Tese de Doutorado. Departamento de Engenharia Agrônômica. Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão, SE. 2007.
- [4] BRASIL. Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Disponível em: <<http://www.camara.leg.br/legin/fed/lei/1997/lei-9433-8-janeiro-1997-374778-norma-pl.html>>. Acesso em: 10 out. 2013.
- [5] GRIMM, I. J.; ALCÂNTARA, L. C. S.; SAMPAIO, C. A. C. O turismo no cenário das mudanças climáticas: impactos, possibilidades e desafios. Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo. vol.12. nº3. São Paulo, 2018.
- [6] GRIMM, I. J. Mudanças climáticas e o turismo: estratégias de adaptação e mitigação. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná. 2016. Curitiba, 250p.
- [7] IBGE. Renda Per capita e IDH de Sergipe. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/se.html>. Acesso em: julho de 2020.
- [8] MOURA JÚNIOR, E. M. B. Conflitos ambientais e processos judiciais na bacia hidrográfica do rio Sergipe. Dissertação de Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Universidade Federal de Sergipe. 2010. Disponível em: https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/4128/1/EMANUEL_MESSIAS_BARBOZA_MOURA_J%c3%9aNIO.pdf
- [9] Organização Pan-Americana da Saúde. Mudanças climáticas e ambientais e seus efeitos na saúde: cenários e incertezas para o Brasil. Organização Pan-Americana da Saúde- Série Saúde Ambiental 1. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2008. ISBN: 978-85-87943-79-8
- [10] FONTES, A. L. ASPECTOS MORFOLÓGICOS DA PLANÍCIE ESTUARINA DO RIO SERGIPE(SE). II Congresso sobre Planejamento e Gestão das Zonas Costeiras dos Países de Expressão Portuguesa. 2003. Disponível em: <https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/1468/1/AspectosPlanicieEstuarina.pdf>
- [11] ROCHA, D.; BOLFE, E. L.; SANTOS, E. J.; BATISTA, L. S.; D'ÁVILA, J. S.; ZÁCARO, C. B.; LIMA, R. G. O.; LIMA, J. C. Caracterização da bacia hidrográfica do rio Sergipe. Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia em Resíduos e Desenvolvimento Sustentável. Costão do Santinho – Florianópolis – Santa Catarina. 2004. Disponível em: <https://www.ipen.br/biblioteca/cd/ictr/2004/ARQUIVOS%20PDF/06/06-012.pdf>
- [12] SERGIPE. Gestão participativa das águas de Sergipe. Secretaria de Estado do Planejamento e da Ciência e Tecnologia – SEPLANTEC. Superintendência de Recursos Hídricos – SRH. Aracaju, 2002. 72 p. Disponível em: https://www.semrah.se.gov.br/recursos-hidricos/wp-content/uploads/2018/01/publica%C3%A7%C3%A3o_cbh_vers%C3%A3o_final_com_capa.pdf Acesso em: julho de 2020.
- [13] SERGIPE. Hidrografia da bacia do rio Sergipe. Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca. 2020. Disponível em: <https://www.seagri.se.gov.br/informacoes/1/3/hidrografia>. Acesso em: Julho de 2020.
- [14] SILVA, V. P. R.; PEREIRA, E. R. R.; AZEVEDO, P. V.; SOUSA, F. A. S.; SOUZA, I. F. Análise da pluviometria e dias chuvosos na região Nordeste do Brasil. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental.v.15, n.2, p.131-138.2011.
- [15] THORNTHWAITE, C. W. Na approach toward a rational classification of climate. Geographical Review. 58:55-94, 1948.

CAPÍTULO 03

Estudo da climatologia da bacia hidrográfica do rio Japaratuba

Daniela Ferreira Batista

Laíze Eloy Teixeira

Leandro de Santana Santos

1. CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JAPARATUBA

A bacia hidrográfica do rio Japaratuba está localizada na região nordeste do estado de Sergipe e abrange 1.674,24Km², o que corresponde a 7,65% do território estadual. Essa bacia possui como rio principal o rio Japaratuba, com 113,21 Km de extensão, com nascente na serra da Boa Vista, na divisa entre os municípios de Feira Nova e Graccho Cardoso e deságua no oceano atlântico (SERGIPE, 2015).

Na Figura 01 estão representados os municípios inseridos totalmente e parcialmente na bacia hidrográfica do rio Japaratuba. Estão inseridos totalmente: Capela, Cumbe, Geral Maynard e Carmópolis; e parcialmente: Aquidabã, Barra dos Coqueiros, Divina Pastora, Feira Nova, Graccho Cardoso, Japaratuba, Maruim, Malhada dos Bois, Muribeca, Nossa Senhora das Dores, Pirambu, Rosário do Catete, Santo Amaro das Brotas e Siriri.

Figura 01 - Municípios inseridos na bacia do rio Japaratuba.

Fonte: Adaptado de Sergipe, 2015.

A bacia do rio Japaratuba subdivide-se em quatro unidades de planejamento: Japaratuba Mirim, Alto Japaratuba, Baixo Japaratuba e Siriri, como mostra a Figura 02. Segundo a Agência Nacional de Águas –

ANA (2018), as Unidades de Planejamento Hídrico (UPH) são formadas em decorrência de características geomorfológicas, hidrográficas e hidrológicas que permitem melhor organização e aproveitamento dos recursos hídricos.

Figura 02 - Unidades de Planejamento da bacia hidrográfica do rio Japarutuba.

Fonte: Autores, 2020.

2. CLIMATOLOGIA

2.1. IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO CLIMÁTICO DA BACIA

De acordo com Silva et al. (2019), entender conceitos ligados à meteorologia e à climatologia, torna-se cada vez mais necessários, visto que tais conceitos estão sendo incorporados ao dia a dia das pessoas, como por exemplo, na economia, na indústria, no comércio, no monitoramento de mitigação dos efeitos de desastres naturais, dentre outros.

Por ser uma variável no espaço e no tempo, o clima é considerado um regulador central, que influencia fatores bióticos e abióticos. Adicionalmente, estudos climatológicos são considerados interessantes para esclarecer, antever e entender o desenvolvimento e crescimento dos recursos naturais. Além disso, também constitui um importante fator de mudança na superfície da terra (OLIVEIRA; FERREIRA, 2017).

Segundo Molion (1987), o clima é determinado por fatores climáticos, como a circulação geral da atmosfera, cobertura vegetal, topografia local, ciclo hidrológico e as correntes. De maneira complementar, Tavares (2004) afirma que tais fatores, em estreitas interações, são responsáveis pela variabilidade climática de determinada localidade.

Desta forma, um passo importante para compreender a climatologia de uma bacia hidrográfica é estudar os elementos climáticos dessa localidade. A exemplo, destaca-se a temperatura sendo indispensável para a realização do balanço hídrico climatológico, o qual contabiliza a quantidade de água em um determinado intervalo de tempo que entra e sai de certa porção de solo (PEREIRA, 2005). Outro elemento climático importante é a precipitação, a qual constitui o elemento com melhor capacidade de traduzir as variações rítmicas presentes em um dado ano (BARROS; ZAVATTINI, 2009).

2.2. LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS

Para este estudo foram utilizados dados de precipitação e temperatura dos municípios inseridos totalmente e parcialmente na bacia hidrográfica do rio Japarutuba, disponíveis no Sistema de Monitoramento Agrometeorológico (Agritempo). Na Tabela 01 observam-se os municípios que possuem dados disponíveis e os períodos correspondentes.

Tabela 01 - Informações sobre dados disponíveis no Agritempo.

Posto	Município	Período
1	Capela	2015 a 2019
2	Aquidabã	2015 a 2019
3	Barra dos Coqueiros	2018 e 2019
4	Feira Nova	2018 e 2019
5	Malhada dos Bois	2018 e 2019
6	Muribeca	2018 e 2019
7	Rosário do Catete	2018 e 2019
8	Carmópolis	2018 e 2019
9	General Maynard	2018 e 2019
10	Nossa Senhora das Dores	2015 a 2019
11	Pirambu	2018 e 2019
12	Siriri	2018 e 2019
13	Gracho Cardoso	2015 a 2019
14	Santo Amaro das Brotas	2015 a 2019

Fonte: Autores, 2020.

Em virtude da dificuldade de obter dados de evapotranspiração para os municípios inseridos na bacia do rio Japarutuba, foi necessário estimar essa variável através de modelos empíricos. Para este estudo foi utilizado o modelo de Thornthwaite.

A partir dos dados coletados e gerados, foram elaborados mapas de temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura média mensal, evapotranspiração e precipitações acumuladas trimestrais, através do software *Qgis*, como mostram as Figuras 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13.

Figura 03 - Temperatura máxima (°C) da bacia hidrográfica do rio Japarutuba.

Fonte: Autores, 2020

Figura 04 - Temperatura média (°C) da bacia hidrográfica do rio Japarutuba.

Figura 05 - Temperatura mínima (°C) da bacia hidrográfica do rio Japarutuba.

Figura 06 - Precipitação acumulada trimestral (mm) – JAN/FEV/MAR.

Fonte: Autores, 2020.

Figura 07 - Precipitação acumulada trimestral (mm) – ABR/MAI/JUN.

Fonte: Autores, 2020.

Figura 08 - Precipitação acumulada trimestral (mm) – JUL/AGO/SET

Fonte: Autores, 2020.

Figura 09 - Precipitação acumulada trimestral (mm) – OUT//NOV/DEZ

Fonte: Autores, 2020.

Figura 10 - Evapotranspiração potencial acumulada trimestral (mm) - JAN/FEV/MAR

Fonte: Autores, 2020.

Figura 11 - Evapotranspiração potencial acumulada trimestral (mm) – ABR/MAI/JUN

Fonte: Autores, 2020.

Figura 12 - Evapotranspiração acumulada trimestral (mm) – JUL/AGO/SET

Fonte: Autores, 2020.

Figura 13 - Evapotranspiração acumulada trimestral (mm) – OUT/NOV/DEZ

Fonte: Autores, 2020.

Para definir a média climatológica da bacia, foram utilizados apenas os postos com dados de 2015 a 2019 (postos 1, 2, 10, 13 e 14), de forma a reduzir a propagação de erros. Além disso, levou-se em consideração a área de influência de cada posto sobre a bacia hidrográfica. As Figuras 14 e 15, representam a média mensal da bacia hidrográfica do rio Japarutuba para evapotranspiração e precipitação, respectivamente.

Figura 14 - Evapotranspiração potencial média mensal x temperatura média

Fonte: Autores, 2020.

Figura 15 - Precipitação média mensal x temperatura média

Fonte: Autores, 2020.

Ao avaliar as médias mensais para os anos de 2015 a 2019, verificou-se que os meses de junho, julho e agosto representam o trimestre de menor evapotranspiração, o que coincide com o período de menores temperaturas na região estudada. Dezembro foi o mês com maior evapotranspiração mensal, com 163 mm, seguido do mês de março com 162 mm.

Com relação às precipitações, o mês de maio foi o mais chuvoso, com 53mm, seguido do mês de março, com 51 mm. Já as menores precipitações ocorreram nos meses de setembro e outubro. Verificou-se que o período mais chuvoso não ocorreu no trimestre de junho, julho e agosto, como esperado para a região nordeste. Possivelmente, esse comportamento decorre da influência do posto de monitoramento do município de Capela, que apresentou climatologia destoante dos demais municípios limítrofes. Além disso, esse posto representa a maior área de influência na bacia, o que também contribuiu para esse resultado.

Ao observar a climatologia da bacia hidrográfica do rio Japarutuba, verificou-se que dezembro pode ser considerado um mês seco, já que apresenta a maior evapotranspiração média. Além disso, esse mês também é influenciado pelos déficits de precipitação dos meses de setembro e outubro.

Essa situação também é observada ao avaliar os mapas do Monitor de Secas da ANA (Figura 16). É possível verificar que para todo estado de Sergipe ocorreram secas nos meses de dezembro de 2015, 2016, 2018 e 2019.

Figura 16 - Situação das secas em Sergipe para os meses de dezembro de 2015 a 2019

Fonte: Adaptado de ANA, 2020.

Ao analisar os mapas fornecidos pelo monitor das secas, verificou-se que para o mês de dezembro, nos últimos cinco anos, na região da bacia do rio Japarutuba, predominou-se a seca leve à moderada. Conforme Tabela de impacto das secas disponível na página oficial do monitor de secas da ANA, as secas leves são caracterizadas pela diminuição de plantios e alguns déficits hídricos. Já a seca moderada caracteriza-se por provocar alguns danos às culturas e pastagens e apresentar reservatórios ou poços com níveis baixos, o que resulta na falta de água.

Essas características influenciam nas condições econômicas da região, uma vez que a principal ocupação da bacia é o cultivo de pastagens, seguido dos cultivos agrícolas. Além disso, a principal demanda hídrica da bacia é a irrigação, o que também é influenciado pelos déficits hídricos em decorrência das secas.

3. INDICADORES ECONÔMICOS, AMBIENTAIS E SOCIAIS

3.1. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

A partir do mapa de ocupação e uso do solo (Figura 17), é possível observar que o principal uso do solo na bacia hidrográfica do rio Japarutuba é a pastagem de gramíneas, seguido do uso agrícola para o plantio de cana-de-açúcar. Adicionalmente, segundo relatório executivo do plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Japarutuba (SERGIPE, 2015), a principal demanda hídrica na bacia é a irrigação, a qual utiliza vazão correspondente a $0,1833\text{m}^3/\text{s}$, seguido do uso para abastecimento humano que consome $0,1796\text{m}^3/\text{s}$, conforme Tabela 02.

Figura 17 - Mapa de Uso e Ocupação do solo

Fonte: Adaptado de Sergipe, 2015.

Tabela 02 - Demanda Hídrica

Unidade de planejamento (m³/s)	Abastecimento urbano (m³/s)			Irrigação (m³/s)	Pecuária (m³/s)	Indústria (m³/s)	Total (m³/s)
	Urbano	Rural	Total				
Alto Rio Japarutuba	.	0,00844	0,00844	0,083333	0,041537	.	0,133305
Rio Japarutuba Mirim	0,00825	0,00585	0,0141	.	0,007748	0,008333	0,030178
Rio Siriri	0,07353	0,01091	0,08444	0,0999999	0,013093	0,074458	0,271994
Baixo Rio Japarutuba	0,06278	0,00985	0,07263	.	0,009543	.	0,082172
Total	0,14456	0,03505	0,17961	0,183332	0,071921	0,082791	0,517649

Fonte: Adaptado de Sergipe, 2015.

A Bacia Hidrográfica possui um grande potencial econômico por abranger municípios detentores de campos petrolíferos e complexos minério-químico, grandes propriedades de produção agrícola, área de pastagem e desenvolvidas regiões comerciais. Dentro do complexo Minério-Químico, podemos destacar as atividades relacionadas ao petróleo, gás e recursos minerais. Na extração mineral, destaca-se o Campo Petrolífero de Carmópolis, o maior do país em terra firme, com área superior a 150 km², abrigando mais de 1.200 poços (SERGIPE, 2015).

Outro fator observado através do mapa de uso e ocupação do solo é a redução da vegetação nativa, representada pela classe florestas. Observa-se a retirada dessa vegetação para substituição por pastagens e áreas de cultivos, inclusive nas margens e nascentes dos corpos hídricos. Lei nº 12.651 de maio de 2012 (BRASIL, 2012) define essas áreas como Área de Preservação Permanente (APP), as quais devem ser protegidas, o que não é observado na área estudada.

3.2. PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB PER CAPITA)

No Figura 18 observou-se o valor do PIB per capita para os municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio Japarutuba. Verificou-se que os municípios de Rosário do Catete, Divina Pastora e Carmópolis possuem os maiores valores para a bacia, isso ocorre devido à influência da exploração de petróleo da região.

Figura 18 - PIB per capita

Fonte: IBGE, 2017.

3.3. POPULAÇÃO

No que diz respeito à capacidade de suporte ambiental, os problemas ocorridos na Bacia Hidrográfica do rio Japarutuba, têm se revelado com relativa gravidade, decorrentes, principalmente, pelo processo de ocupação humana, tanto do ponto de vista urbano, quanto agroindustrial e industrial (SERGIPE, 2015). Na bacia do rio Japarutuba nem todos os municípios estão totalmente inseridos, visto que a maior concentração populacional da bacia está localizada nas cidades de Capela (34.213hab), Barra dos Coqueiros (30.407hab), e Nossa Senhora das Dores (26.629hab), como pode ser verificado na Figura 19.

Figura 19. População

Fonte: IBGE, 2019

3.4. TAXA DE OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO

A exploração do petróleo também mostra influenciar na taxa de ocupação da população dos municípios, como mostra a Figura 20. Rosário do Catete possui a maior taxa de ocupação da bacia hidrográfica do rio Japarutuba com 20,5% da população ocupada, já a menor taxa corresponde ao município de Santo Amaro das Brotas, com 6,3%.

Figura 20. Taxa da população ocupada.

Fonte: IBGE, 2018.

3.5. QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

A Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (COHIDRO), como parte da elaboração do plano de recursos hídricos da bacia do rio Japarutuba (SERGIPE, 2015), realizou monitoramento da qualidade da água dessa bacia no período de 2010 a 2013. Foram monitorados três pontos: o ponto 1 no rio Japarutuba (localizado a jusante da sede municipal de Japarutuba); o 2 no rio Siriri (localizado a jusante da sede municipal de Rosário do Catete); e o 3 no rio Siriri (localizado na sede municipal General Maynard).

Em relação aos parâmetros analisados, avaliou-se Oxigênio Dissolvido (OD mg/L.O₂), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO mg/L.O₂) e Coliformes Termotolerantes (CTe UFC). Os padrões de qualidade monitorados foram comparados com os padrões das classes de água doce estabelecidos pela resolução 357 de 2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), a fim de definir o enquadramento do corpo hídrico em estudo.

De acordo com o resultado do monitoramento, o ponto 1 apresentou enquadramento equivalente à classe 01 da resolução CONAMA 357 de 2005, o ponto 2 apresentou OD de acordo com a classe 02 e demais parâmetros de acordo com a classe 03 desta resolução. Já o ponto 3 apresentou OD de acordo com a classe 02, DBO de acordo com a classe 03 e Coliformes Termotolerantes em desconformidade com a classe 01, 02 ou 03 dessa resolução.

A partir dessa análise, definiu-se a classe 03 da resolução CONAMA 357 (2005) para o trecho médio da bacia em estudo, porém para o trecho final não foi definido classificação quanto à qualidade da água.

3.5. ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Na Figura 21 observou-se a porcentagem da população dos municípios inseridos na bacia do rio Japarutuba que possuem acesso a esgotamento adequado. O município de Carmópolis é o que apresenta maior taxa de esgotamento adequado (83%), seguido do município de Barra dos Coqueiros, com 64,5%. As piores taxas são para os municípios de Nossa Senhora das Dores e Santo Amaro das Brotas, com 7,8% e 7,4%, respectivamente.

Figura 21 - População atendida com esgotamento adequado.

Fonte: IBGE, 2010.

Os baixos índices de esgotamento sanitário em alguns municípios, possivelmente, refletem na qualidade da água dos corpos hídricos. Isso ocorre devido à falta de sistemas de coleta de esgoto adequado, o que leva a população a buscar alternativas, como por exemplo, a construção de sistemas individuais. Em alguns casos, lançamento na rede de drenagem ou diretamente nos corpos hídricos.

Outro indicador importante para o saneamento é a taxa de atendimento do abastecimento de água. Na Figura 22 verificou-se a taxa da população atendida com abastecimento de água para os municípios da bacia hidrográfica do Japarutuba. O município de Carmópolis apresentou 100% da população atendida com abastecimento de água, seguido de Capela com 99,4%. As menores taxas foram para os municípios de Divina Pastora e Siriri, com 47,7% e 38,5%, respectivamente.

Figura 22. Percentual da população atendida com abastecimento de água

Fonte: SNIS, 2018.

3.6. SAÚDE DA POPULAÇÃO

De acordo com Sergipe (2015), Divina Pastora e Aquidabã são os municípios que apresentam maiores índices de doenças de veiculação hídrica, com 20,7% e 18,6%, respectivamente. Esses valores, possivelmente, estão associados à deficiência no sistema de saneamento básico desses municípios, sendo que Divina Pastora aparece no 17º lugar para atendimento da população com abastecimento de água e em 13º para esgotamento sanitário adequado. Aquidabã ocupa o 6º lugar para esgotamento adequado (com 37%) e em 10º para população atendida com abastecimento de água. Os demais municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio Japaratuba apresentam índices entre 2,8% a 9%.

REFERÊNCIAS

- [1] AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA (ANA). Unidades de Planejamento Hídrico. Disponível em: http://dadosabertos.ana.gov.br/datasets/04a2bb5750c8467c8216ea4cdd100efa_0. Acesso em: julho de 2020.
- [2] AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). Monitor de secas. Disponível em: <http://monitordesecas.ana.gov.br/dados-tabulares>. Acesso em: julho de 2020.
- [3] BARROS, J.R., ZAVATTINI, J.A.; Bases conceituais em climatologia geográfica DOI: 10.4215/RM2009.0816.0019, Instituto de Estudos Sócio-Ambientais da UFG Campus Samambaia, Goiânia - GO - Brasil, Mercator - Revista de Geografia da UFC, ano 08, número 16, 2009.
- [4] BRASIL. Lei 12.651 de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm>. Acesso em: julho de 2020.
- [5] BRASIL. Resolução n. 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 2018. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459>. Acesso em: Abril de 2020.
- [6] BRASIL. Sistema de Monitoramento Agrimeteorológico (Agrimtempo): dados meteorológicos para o estado de Sergipe. Disponível em: <https://www.agrimtempo.gov.br/agrimtempo/jsp/PesquisaClima/index.jsp?siglaUF=SE>.
- [7] BRASIL. Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento – SNIS. Disponível em: <<http://app4.cidades.gov.br/serieHistorica>>. Acesso em: Abril de 2020.
- [8] IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades@. Disponível em: <<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php>>. Acesso em: julho de 2020.
- [9] MOLION, L. C. B.; CAVALCANTI, F. A.; FERREIRA, M. E.; Influência da circulação do Hemisfério Norte na Precipitação pluviométrica da Amazônia: Um estudo de caso. 1987.
- [10] OLIVEIRA, D.; FERREIRA, C.; Aspectos climáticos da bacia hidrográfica do rio Preto – MG/RJ, Brasil, influência dos fatores geográficos na formação desse clima regional; GOT, Revista de Geografia e Ordenamento do Território versão On-line ISSN 2182-1267; GOT no.11 Porto jun. 2017. <http://dx.doi.org/10.17127/got/2017.11.013>.
- [11] PEREIRA, A.R. Simplificando o Balanço Hídrico de Thorntwaite - Mather. Bragantia, Campinas, v.64, n.2, p.311-313, 2005.
- [12] SERGIPE. Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba: relatório de resumo executivo. Aracaju: COHIDRO, 63p. 2015. Disponível em: http://68.183.18.153:81/portalrecursoshidricos/plano_bacias/BHJP_Completo/RESUMO%20EXECUTIVO/.
- [13] SILVA E. M.; FREITAS F. C. C.; NETO L. R. B.; GIRÃO A. F.; A Importância do Ensino de Climatologia nas Ações de Defesa Civil em Regiões de Vulnerabilidade Socioeconômica de Fortaleza/CE, Rev. bras. meteorol. vol.34 no.3 São Paulo July/Sept. 2019 Epub Oct 21, 2019, <https://doi.org/10.1590/0102-7786343045>.
- [14] TAVARES, A.C. Mudanças Climáticas. In GUERRA, A.J.T., VITTE, A.C. (Organizadores). Reflexões sobre a Geografia Física no Brasil. Ed Bertrand Brasil. Rio de Janeiro – RJ. 2004. 1ª Edição.
- [15] TUCCI CEM; Hespanhol I; Cordeiro Netto OM. Gestão da água no Brasil. Brasília: UNESCO, 2005. 191 p.

CAPÍTULO

04

Bacia hidrográfica do Vaza Barris

José Douglas Júnior Pereira de Andrade

Ketylen Vieira Santos

1. CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA

A Bacia Hidrográfica do Rio Vaza Barris (BHVB), Figura 1a, drena municípios dos estados da Bahia e Sergipe, cuja nascente está localizada na serra da Canabrava, no município Uauá-BA, como Pedra Mole, Frei Paulo, Campo do Brito, São Domingos, Itabaiana, Macambira, Aracaju, Areia Branca, Ribeirópolis, Carira, Itaporanga d'Ajuda, São Cristóvão, Simão Dias, Lagarto, Pinhão, Uauá, Canudos, Jeremoabo, Antas, Coronel de Sá, Jaguarari, Monte Santo, Euclides da Cunha, Cícero Dantas, Fátima, Adustina, Pedro Alexandre, Santa Brígida, Sítio do Quinto, Macururé, Novo Triunfo e Paripiranga. O rio Vaza Barris nasce no sopé da Serra dos Macacos, na Bahia, atravessa o Nordeste Baiano, Agreste e Leste de Sergipe até desaguar no oceano Atlântico, em Aracaju. A Figura 1b mostra como os municípios pertencentes à Bacia estão inseridos de forma integral ou parcialmente nela e de qual Estado faz parte.

Figura 1a. Bacia Hidrográfica do Rio Vaza Barris (BHVB)

Fonte: Autores, 2020.

Figura 1b. Municípios pertencentes à BHVB

Fonte: Autores, 2020.

A BHVB possui seis tipos de relevos, com base nas suas características principais, e são classificados como suave ondulado, forte ondulado e ondulado, plano e também uma pequena área que oferece relevo entre montanhoso e forte montanhoso. A Figura 2a expõe o perfil longitudinal da bacia, por sua vez a Figura 2b mostra como essa classificação está distribuída ao longo da bacia e suas respectivas porcentagens (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, 2013).

Figura 2a. Perfil longitudinal da bacia BHVB

Fonte: Autores, 2020.

Figura 2a. Tipos de relevo e declividade presentes na bacia

Fonte: Adaptado de CPRM, 2013

1.1. DADOS CLIMATOLÓGICOS DA BHVB

Os dados climáticos foram coletados do site Climatempo (www.climatempo.com.br) para todos os municípios pertencentes à BHVB. Foram selecionados os dados médios mensais de um período de 30 anos, de precipitação (precip.), temperatura mínima (Tmin) e temperatura máxima (Tmax), temperatura média (Tmed), conforme descritos nas ilustrações seguintes, que vai de Macambira até Paripiranga, vide Figuras 3a, 3b, 3c, 3d.

Figura 3a. Tabelas de Temperaturas mínimas, médias e máximas mensais da BHVB nos municípios de Macambira, Campo do Brito, São Domingos, Lagarto.

Macambira					Campo do Brito					São Domingos					Lagarto				
	Tmin	Tmed	Tmax	Precip		Tmin	Tmed	Tmax	Precip		Tmin	Tmed	Tmax	Precip		Tmin	Tmedia	Tmax	Precip
Jan	21,0	26,0	31,0	48,0	Jan	21,0	26,0	31,0	50,0	Jan	22,0	26,5	31,0	48,0	Jan	22,0	26,5	31,0	48,0
Fev	22,0	27,0	32,0	55,0	Fev	22,0	27,0	32,0	62,0	Fev	22,0	26,5	31,0	55,0	Fev	22,0	26,5	31,0	55,0
Mar	22,0	27,0	32,0	72,0	Mar	22,0	27,0	32,0	81,0	Mar	22,0	26,5	31,0	72,0	Mar	22,0	26,5	31,0	72,0
Abr	21,0	25,5	30,0	103,0	Abr	21,0	25,5	30,0	157,0	Abr	22,0	25,5	29,0	103,0	Abr	22,0	25,5	29,0	103,0
Mai	21,0	24,5	28,0	130,0	Mai	21,0	24,5	28,0	196,0	Mai	21,0	24,0	27,0	130,0	Mai	21,0	24,0	27,0	145,0
Jun	20,0	22,5	25,0	143,0	Jun	20,0	22,5	25,0	200,0	Jun	20,0	22,5	25,0	143,0	Jun	20,0	22,5	25,0	143,0
Jul	19,0	22,0	25,0	124,0	Jul	19,0	22,0	25,0	174,0	Jul	19,0	22,0	25,0	124,0	Jul	19,0	22,0	25,0	130,0
Ago	18,0	21,5	25,0	90,0	Ago	18,0	21,5	25,0	119,0	Ago	19,0	22,0	25,0	90,0	Ago	19,0	22,0	25,0	90,0
Set	19,0	23,0	27,0	54,0	Set	19,0	23,0	27,0	77,0	Set	19,0	23,0	27,0	54,0	Set	19,0	23,0	27,0	56,0
Out	20,0	25,0	30,0	40,0	Out	20,0	25,0	30,0	54,0	Out	20,0	24,5	29,0	40,0	Out	20,0	24,5	29,0	40,0
Nov	21,0	26,5	32,0	47,0	Nov	21,0	26,5	32,0	44,0	Nov	21,0	25,5	30,0	47,0	Nov	21,0	25,5	30,0	47,0
Dez	21,0	26,5	32,0	34,0	Dez	21,0	26,5	32,0	33,0	Dez	22,0	26,5	31,0	34,0	Dez	22,0	26,5	31,0	34,0
Média	20,4	24,8	29,1	***	Média	20,4	24,8	29,1	***	Média	20,8	24,6	28,4	***	Média	20,8	24,6	28,4	***
total	***		***	940,0	total	***		***	1247,0	total	***		***	940,0	total	***		***	963,0

Figura 3b. Tabelas de Temperaturas mínimas, médias e máximas mensais da BHVB nos municípios de Simão Dias, Itabaiana, Carira, Frei Paulo.

Simão Dias					Itabaiana					Carira					Frei Paulo				
	Tmin	Tmed	Tmax	Precip		Tmin	Tmed	Tmax	Precip		Tmin	Tmed	Tmax	Precip		Tmin	Tmedia	Tmax	Precip
Jan	21,0	26,0	31,0	48,0	Jan	21,0	26,0	31,0	50,0	Jan	21,0	26,0	31,0	48,0	Jan	22,0	26,5	31,0	48,0
Fev	22,0	27,0	32,0	55,0	Fev	22,0	27,0	32,0	62,0	Fev	22,0	27,0	32,0	45,0	Fev	22,0	26,5	31,0	56,0
Mar	22,0	26,5	31,0	72,0	Mar	22,0	27,0	32,0	81,0	Mar	22,0	27,0	32,0	67,0	Mar	22,0	26,5	31,0	72,0
Abr	21,0	25,5	30,0	103,0	Abr	21,0	25,5	30,0	160,0	Abr	21,0	25,5	30,0	82,0	Abr	21,0	25,0	29,0	103,0
Mai	20,0	24,0	28,0	130,0	Mai	21,0	24,5	28,0	196,0	Mai	21,0	24,5	28,0	101,0	Mai	21,0	24,0	27,0	132,0
Jun	19,0	22,5	26,0	150,0	Jun	20,0	22,5	25,0	200,0	Jun	20,0	22,5	25,0	125,0	Jun	20,0	22,5	25,0	143,0
Jul	18,0	21,5	25,0	124,0	Jul	19,0	22,0	25,0	174,0	Jul	19,0	22,0	25,0	101,0	Jul	19,0	22,0	25,0	124,0
Ago	18,0	21,5	25,0	95,0	Ago	18,0	21,5	25,0	125,0	Ago	19,0	22,0	25,0	69,0	Ago	18,0	22,0	26,0	92,0
Set	19,0	23,5	28,0	54,0	Set	19,0	23,0	27,0	77,0	Set	19,0	23,0	27,0	54,0	Set	19,0	23,0	27,0	54,0
Out	20,0	25,0	30,0	42,0	Out	20,0	25,0	30,0	56,0	Out	20,0	25,0	30,0	27,0	Out	20,0	25,0	30,0	40,0
Nov	20,0	26,0	32,0	47,0	Nov	21,0	26,5	32,0	44,0	Nov	21,0	26,5	32,0	30,0	Nov	21,0	26,5	32,0	47,0
Dez	21,0	26,5	32,0	34,0	Dez	21,0	26,5	32,0	33,0	Dez	21,0	26,5	32,0	31,0	Dez	22,0	27,0	32,0	34,0
Média	20,1	24,6	29,2	***	Média	20,4	24,8	29,1	***	Média	20,5	24,8	29,1	***	Média	20,6	24,7	28,8	***
total	***		***	954,0	total	***		***	1258,0	total	***		***	780,0	total	***		***	945,0

Figura 3c. Tabelas de Temperaturas mínimas, médias e máximas mensais da BHVB nos municípios de Itaporanga, Pedra Mole, Pinhão, Areia Branca, Adustina, Antas, Canudos, Cicero Dantas, São Cristóvão, Aracaju e Uauá

Itaporanga					Pedra Mole					Pinhão					Areia Branca				
	Tmin	Tmed	Tmax	Precip		Tmin	Tmed	Tmax	Precip		Tmin	Tmed	Tmax	Precip		Tmin	Tmedia	Tmax	Precip
Jan	22,0	26,5	31,0	50,0	Jan	22,0	26,5	31,0	48,0	Jan	21,0	26,0	31,0	48,0	Jan	22,0	26,5	31,0	50,0
Fev	22,0	26,5	31,0	62,0	Fev	22,0	27,0	32,0	55,0	Fev	22,0	27,0	32,0	55,0	Fev	22,0	26,5	31,0	62,0
Mar	22,0	26,5	31,0	81,0	Mar	22,0	27,0	32,0	72,0	Mar	22,0	27,0	32,0	72,0	Mar	22,0	26,5	31,0	81,0
Abr	22,0	25,5	29,0	157,0	Abr	21,0	25,5	30,0	103,0	Abr	21,0	25,5	30,0	103,0	Abr	22,0	25,5	29,0	157,0
Mai	21,0	24,0	27,0	196,0	Mai	20,0	24,0	28,0	130,0	Mai	21,0	24,5	28,0	130,0	Mai	21,0	24,0	27,0	196,0
Jun	20,0	22,5	25,0	200,0	Jun	20,0	22,5	25,0	143,0	Jun	20,0	22,5	25,0	143,0	Jun	20,0	22,5	25,0	200,0
Jul	19,0	22,0	25,0	174,0	Jul	18,0	21,5	25,0	124,0	Jul	19,0	22,0	25,0	124,0	Jul	19,0	22,0	25,0	174,0
Ago	19,0	22,0	25,0	119,0	Ago	18,0	21,5	25,0	90,0	Ago	18,0	21,5	25,0	90,0	Ago	19,0	22,0	25,0	119,0
Set	19,0	23,0	27,0	77,0	Set	19,0	23,0	27,0	53,0	Set	19,0	23,0	27,0	54,0	Set	19,0	23,0	27,0	77,0
Out	20,0	24,5	29,0	54,0	Out	20,0	25,0	30,0	39,0	Out	20,0	25,0	30,0	40,0	Out	20,0	24,5	29,0	54,0
Nov	21,0	25,5	30,0	44,0	Nov	20,0	27,0	32,0	47,0	Nov	21,0	26,5	32,0	47,0	Nov	21,0	25,5	30,0	44,0
Dez	22,0	26,0	30,0	44,0	Dez	21,0	26,5	32,0	33,0	Dez	21,0	26,5	32,0	34,0	Dez	22,0	26,5	31,0	33,0
Média	20,8	24,5	28,3	***	Média	20,3	24,7	29,1	***	Média	20,4	24,8	29,1	***	Média	20,8	24,6	28,4	***
total	***		***	1258,0	total	***		***	937,0	total	***		***	940,0	total	***		***	1247,0

Adustina					Antas					Canudos					Cicero Dantas				
	Tmin	Tmed	Tmax	Precip		Tmin	Tmed	Tmax	Precip		Tmin	Tmed	Tmax	Precip		Tmin	Tmedia	Tmax	Precip
Jan	21,0	26,0	31,0	46,0	Jan	21,0	26,0	31,0	52,0	Jan	18,0	23,5	29,0	109,0	Jan	21,0	26,0	31,0	46,0
Fev	22,0	27,0	32,0	51,0	Fev	21,0	26,5	32,0	49,0	Fev	19,0	24,5	30,0	77,0	Fev	21,0	26,5	32,0	51,0
Mar	22,0	26,5	31,0	70,0	Mar	21,0	26,0	31,0	71,0	Mar	19,0	24,0	29,0	108,0	Mar	21,0	26,0	31,0	70,0
Abr	21,0	25,5	30,0	75,0	Abr	21,0	25,5	30,0	77,0	Abr	18,0	23,0	28,0	47,0	Abr	22,0	21,0	30,0	75,0
Mai	20,0	24,0	28,0	80,0	Mai	20,0	24,0	28,0	77,0	Mai	17,0	21,5	26,0	17,0	Mai	20,0	24,0	28,0	80,0
Jun	19,0	22,5	26,0	91,0	Jun	19,0	22,5	26,0	94,0	Jun	16,0	20,0	24,0	21,0	Jun	19,0	22,5	26,0	91,0
Jul	18,0	21,5	25,0	80,0	Jul	18,0	21,5	25,0	79,0	Jul	15,0	19,5	24,0	13,0	Jul	18,0	21,5	25,0	80,0
Ago	18,0	21,5	25,0	55,0	Ago	18,0	22,0	26,0	55,0	Ago	16,0	20,5	25,0	9,0	Ago	18,0	22,0	26,0	55,0
Set	19,0	23,5	28,0	34,0	Set	18,0	23,5	29,0	29,0	Set	17,0	22,5	28,0	14,0	Set	18,0	23,5	29,0	34,0
Out	20,0	25,0	30,0	26,0	Out	19,0	25,0	31,0	23,0	Out	18,0	24,0	30,0	38,0	Out	19,0	25,0	31,0	26,0
Nov	20,0	26,0	32,0	47,0	Nov	20,0	26,0	32,0	38,0	Nov	18,0	24,0	30,0	92,0	Nov	20,0	26,0	32,0	47,0
Dez	21,0	26,5	32,0	41,0	Dez	21,0	26,5	32,0	42,0	Dez	18,0	23,5	29,0	126,0	Dez	21,0	26,5	32,0	41,0
Média	20,1	24,6	29,2	***	Média	19,8	24,6	29,4	***	Média	17,4	22,5	27,7	***	Média	19,8	24,6	29,4	***
total	***		***	696,0	total	***		***	686,0	total	***		***	671,0	total	***		***	696,0

Recorte do perfil climático de bacias hidrográficas do estado de Sergipe: Rio Sergipe, Rio Vaza Barris, Rio Japaratuba, Rio Real e Costeiras (Caueira-Abais e Sapucaia)

São Cristóvão					Aracaju					Uauá				
	Tmin	Tmed	Tmax	Precip		Tmin	Tmed	Tmax	Precip		Tmin	Tmed	Tmax	Precip
Jan	25,0	27,0	29,0	61,0	Jan	22,0	26,5	31,0	48,0	Jan	21,0	26,5	32,0	68,0
Fev	25,0	27,5	30,0	80,0	Fev	22,0	27,0	32,0	55,0	Fev	22,0	27,0	32,0	56,0
Mar	26,0	28,0	30,0	102,0	Mar	22,0	27,0	32,0	72,0	Mar	22,0	27,0	32,0	86,0
Abr	25,0	27,0	29,0	203,0	Abr	21,0	25,5	30,0	103,0	Abr	21,0	26,0	31,0	57,0
Mai	24,0	26,0	28,0	246,0	Mai	20,0	24,0	28,0	130,0	Mai	20,0	24,5	29,0	33,0
Jun	24,0	25,0	26,0	238,0	Jun	20,0	22,5	25,0	143,0	Jun	19,0	23,0	27,0	36,0
Jul	23,0	24,5	26,0	193,0	Jul	18,0	21,5	25,0	124,0	Jul	18,0	22,0	26,0	27,0
Ago	23,0	24,5	26,0	148,0	Ago	18,0	21,5	25,0	90,0	Ago	18,0	22,5	27,0	16,0
Set	23,0	24,5	26,0	100,0	Set	19,0	23,0	27,0	53,0	Set	19,0	24,5	30,0	13,0
Out	24,0	26,0	28,0	71,0	Out	20,0	25,0	30,0	39,0	Out	20,0	26,0	32,0	14,0
Nov	24,0	26,5	29,0	63,0	Nov	20,0	27,0	32,0	47,0	Nov	21,0	27,0	33,0	36,0
Dez	25,0	27,0	29,0	45,0	Dez	21,0	26,5	32,0	33,0	Dez	21,0	27,0	33,0	61,0
Média	24,3	26,1	28,0	***	Média	20,3	24,7	29,1	***	Média	20,2	25,3	30,3	***
total	***		***	1550,0	total	***		***	937,0	total	***		***	503,0

Figura 3d. Tabela de Temperaturas mínimas, médias e máximas mensais da BHVB nos municípios de Santa Brígida, Pedro Alexandre, Sitio do Quinto, Paripiranga, Jeremoabo, Monte Santo, Macururé, Novo Triunfo, Jaguarari, Fátima, Euclides da Cunha e Coronel João Sá

Coronel João Sá					Euclides da Cunha					Fátima					Jaguarari				
	Tmin	Tmed	Tmax	Precip		Tmin	Tmed	Tmax	Precip		Tmin	Tmed	Tmax	Precip		Tmin	Tmedia	Tmax	Precip
Jan	21,0	26,0	31,0	48,0	Jan	21,0	26,5	32,0	54,0	Jan	21,0	26,0	31,0	46,0	Jan	20,0	26,0	32,0	80,0
Fev	22,0	27,0	32,0	45,0	Fev	21,0	26,5	32,0	53,0	Fev	22,0	27,0	32,0	51,0	Fev	21,0	26,5	32,0	76,0
Mar	22,0	26,5	31,0	67,0	Mar	21,0	26,0	31,0	73,0	Mar	22,0	26,5	31,0	70,0	Mar	21,0	26,5	32,0	95,0
Abr	21,0	25,5	30,0	82,0	Abr	20,0	25,0	30,0	56,0	Abr	21,0	25,5	30,0	75,0	Abr	20,0	25,5	31,0	63,0
Mai	20,0	24,0	28,0	101,0	Mai	20,0	24,0	28,0	47,0	Mai	20,0	24,0	28,0	80,0	Mai	19,0	23,5	28,0	42,0
Jun	19,0	22,5	26,0	125,0	Jun	19,0	22,5	26,0	55,0	Jun	19,0	22,5	26,0	91,0	Jun	18,0	22,0	26,0	47,0
Jul	18,0	21,5	25,0	101,0	Jul	18,0	21,5	25,0	41,0	Jul	18,0	21,5	25,0	80,0	Jul	17,0	21,0	25,0	37,0
Ago	18,0	21,5	25,0	69,0	Ago	18,0	22,0	26,0	29,0	Ago	18,0	21,5	25,0	55,0	Ago	17,0	22,0	27,0	27,0
Set	19,0	23,5	28,0	38,0	Set	18,0	23,5	29,0	17,0	Set	19,0	23,5	28,0	34,0	Set	18,0	24,0	30,0	15,0
Out	20,0	25,0	30,0	27,0	Out	19,0	25,0	31,0	17,0	Out	20,0	25,0	30,0	26,0	Out	20,0	26,0	32,0	17,0
Nov	20,0	26,0	32,0	30,0	Nov	20,0	26,0	32,0	45,0	Nov	20,0	26,0	32,0	47,0	Nov	20,0	26,5	33,0	57,0
Dez	21,0	26,5	32,0	31,0	Dez	21,0	26,5	32,0	52,0	Dez	21,0	26,5	32,0	41,0	Dez	20,0	26,5	33,0	76,0
Média	20,1	24,6	29,2	***	Média	19,7	24,6	29,5	***	Média	20,1	24,6	29,2	***	Média	19,3	24,7	30,1	***
total	***		***	764,0	total	***		***	539,0	total	***		***	696,0	total	***		***	632,0

Jeremoabo					Macururé					Monte Santo					Novo Triunfo				
	Tmin	Tmed	Tmax	Precip		Tmin	Tmed	Tmax	Precip		Tmin	Tmed	Tmax	Precip		Tmin	Tmedia	Tmax	Precip
Jan	21,0	27,0	33,0	52,0	Jan	23,0	28,5	34,0	88,0	Jan	19,0	25,5	32,0	74,0	Jan	21,0	26,0	31,0	52,0
Fev	22,0	27,5	33,0	49,0	Fev	23,0	28,0	33,0	60,0	Fev	20,0	26,0	32,0	72,0	Fev	21,0	26,5	32,0	49,0
Mar	22,0	27,5	33,0	71,0	Mar	23,0	28,0	33,0	105,0	Mar	20,0	26,0	32,0	73,0	Mar	21,0	26,0	31,0	71,0
Abr	21,0	26,0	31,0	77,0	Abr	22,0	27,0	32,0	63,0	Abr	19,0	24,5	30,0	71,0	Abr	21,0	25,5	30,0	77,0
Mai	21,0	25,0	29,0	77,0	Mai	21,0	25,5	30,0	24,0	Mai	18,0	23,0	28,0	60,0	Mai	20,0	24,0	28,0	77,0
Jun	20,0	23,5	27,0	94,0	Jun	20,0	24,0	28,0	17,0	Jun	17,0	22,0	27,0	54,0	Jun	19,0	22,5	26,0	94,0
Jul	19,0	23,0	27,0	79,0	Jul	19,0	23,5	28,0	13,0	Jul	16,0	21,0	26,0	49,0	Jul	18,0	21,5	25,0	79,0
Ago	18,0	22,5	27,0	55,0	Ago	19,0	24,0	29,0	6,0	Ago	16,0	21,5	27,0	35,0	Ago	18,0	22,0	26,0	55,0
Set	19,0	24,5	30,0	29,0	Set	20,0	26,0	32,0	9,0	Set	17,0	23,0	29,0	19,0	Set	18,0	23,5	29,0	29,0
Out	20,0	26,0	32,0	23,0	Out	22,0	28,0	34,0	11,0	Out	18,0	25,0	32,0	29,0	Out	19,0	25,0	31,0	23,0
Nov	21,0	27,5	34,0	28,0	Nov	23,0	29,0	35,0	29,0	Nov	19,0	25,5	32,0	56,0	Nov	20,0	26,0	32,0	38,0
Dez	21,0	27,0	33,0	42,0	Dez	23,0	28,5	34,0	59,0	Dez	19,0	25,5	32,0	74,0	Dez	21,0	26,5	32,0	42,0
Média	20,4	25,6	30,8	***	Média	21,5	26,7	31,8	***	Média	18,2	24,0	29,9	***	Média	19,8	24,6	29,4	***
total	***		***	676,0	total	***		***	484,0	total	***		***	666,0	total	***		***	686,0

Recorte do perfil climático de bacias hidrográficas do estado de Sergipe: Rio Sergipe, Rio Vaza Barris, Rio Japarutuba, Rio Real e Costeiras (Caueira-Abais e Sapucaia)

Santa Brígida					Pedro Alexandre					Sítio do Quinto					Paripiranga				
	Tmin	Tmed	Tmax	Precip		Tmin	Tmed	Tmax	Precip		Tmin	Tmed	Tmax	Precip		Tmin	Tmedia	Tmax	Precip
Jan	23,0	28,5	34,0	52,0	Jan	22,0	27,5	33,0	48,0	Jan	21,0	26,0	31,0	52,0	Jan	21,0	26,0	31,0	48,0
Fev	23,0	28,5	34,0	43,0	Fev	23,0	28,0	33,0	45,0	Fev	22,0	27,0	32,0	49,0	Fev	22,0	27,0	32,0	55,0
Mar	23,0	28,0	33,0	73,0	Mar	23,0	28,0	33,0	67,0	Mar	22,0	26,5	31,0	71,0	Mar	22,0	26,5	31,0	72,0
Abr	22,0	27,0	32,0	72,0	Abr	22,0	27,0	32,0	82,0	Abr	21,0	25,5	30,0	77,0	Abr	21,0	25,5	30,0	103,0
Mai	21,0	25,5	30,0	59,0	Mai	21,0	25,0	29,0	101,0	Mai	20,0	24,0	28,0	77,0	Mai	20,0	24,0	28,0	130,0
Jun	20,0	23,5	27,0	69,0	Jun	20,0	23,5	27,0	125,0	Jun	19,0	22,5	26,0	94,0	Jun	19,0	22,5	26,0	143,0
Jul	19,0	23,0	27,0	60,0	Jul	19,0	23,0	27,0	101,0	Jul	18,0	21,5	25,0	79,0	Jul	18,0	21,5	25,0	124,0
Ago	19,0	23,5	28,0	38,0	Ago	19,0	23,0	27,0	69,0	Ago	18,0	21,5	25,0	55,0	Ago	18,0	21,5	25,0	90,0
Set	20,0	25,5	31,0	17,0	Set	19,0	24,5	30,0	38,0	Set	19,0	23,5	28,0	29,0	Set	19,0	23,5	28,0	54,0
Out	21,0	27,0	33,0	15,0	Out	20,0	26,0	32,0	27,0	Out	20,0	25,0	30,0	23,0	Out	20,0	25,0	30,0	40,0
Nov	22,0	28,0	34,0	24,0	Nov	21,0	27,5	34,0	30,0	Nov	20,0	26,0	32,0	38,0	Nov	20,0	26,0	32,0	47,0
Dez	23,0	28,5	34,0	42,0	Dez	22,0	28,0	34,0	31,0	Dez	21,0	26,5	32,0	42,0	Dez	21,0	26,5	32,0	34,0
Média	21,3	26,4	31,4	***	Média	20,9	25,9	30,9	***	Média	20,1	24,6	29,2	***	Média	20,1	24,6	29,2	***
total	***		***	564,0	total	***		***	764,0	total	***		***	686,0	total	***		***	940,0

Fonte: Autores, 2020.

Após análise dos dados climáticos de todos os municípios, foi gerada uma única Tabela com a média aritmética dessas informações para cada mês referência, de acordo com a Tabela 1. Essas médias foram calculadas somando o mesmo grupo mensal de todos os municípios e, em seguida, dividindo pela contagem desses números.

Tabela 1. Média geral dos dados climáticos para cada mês, envolvendo todos os municípios

Média geral dos dados climáticos para cada mês de todos os municípios que fazem parte da BHVB					
Mês	Tmin (°C)	Tmax (°C)	Tmed (°C)	Precip. (mm)	ETP TW (mm)
Jan	21,32	31,32	26,32	42,58	144,44
Fev	21,87	31,87	26,87	41,94	137,76
Mar	21,90	31,48	26,69	57,84	146,56
Abr	21,16	30,03	25,60	66,29	121,00
Mai	20,39	28,00	24,19	70,65	102,00
Jun	19,48	25,77	22,63	77,68	78,36
Jul	18,42	25,35	21,89	65,65	72,56
Ago	18,26	25,74	22,00	46,10	74,67
Set	18,90	28,19	23,55	27,94	91,87
Out	19,97	30,48	25,23	22,65	121,24
Nov	20,61	31,94	26,27	32,94	136,72
Dez	21,26	31,94	26,60	35,45	149,03

Fonte: Autores, 2020.

Com a falta de mais informações climáticas abrangendo todos os municípios da BHVB nos bancos de dados meteorológicos, a evapotranspiração de referência (ET_o) foi estimada pelo método de Thornthwaite (1948). Essa equação fundamenta-se num modelo trivial baseado em dados de temperatura média (T_{med}) e do fotoperíodo mensais. O fotoperíodo foi calculado em função da latitude da BHVB, que é 10'S e da declinação solar. O cálculo da ET_o foi estimado através da seguinte notação matemática (1):

$$ET_o = 16 \frac{N}{12} \frac{Nd}{30} \left(\frac{10T_{med}}{I} \right)^a \quad \text{Equação (1)}$$

Onde: T = temperatura média (°C); Nd = número de dias do mês (dias); N = duração média mensal do fotoperíodo do mês (h); I, a = índices de calor obtidos a partir de dados normais da região, calculados por:

$$I = \sum_{i=1}^{12} \left(\frac{T_{med}}{5} \right)^{1,514} \quad \text{Equação (2)}$$

Em que, Tmed = Temperatura média mensal mês no mês i;

$$a = 6,75 \times 10^{-7} I^3 - 7,71 \times 10^{-5} I^2 + 1,7912 \times 10^{-2} I + 0,49239 \quad \text{Equação (3)}$$

Utilizando os dados de Tmed (°C) e Precip (mm) da Tabela 2, teremos a seguinte ETo pelo método de Thornthwaite (Tabela 2):

Tabela 2. ETo mensal pelo método de Thornthwaite, envolvendo todos os municípios.

ETo (mm.mês-1)	MÊS					
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
	144.44	137.76	146.56	121.00	102.00	78.36
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	72.56	74.67	91.87	121.72	136.72	149.03

Fonte: Autores, 2020.

As Figuras 4 e 5, a partir de todos os dados coletados e dispostos em Figuras e Tabelas acima, objetiva apresentar todos os dados de uma forma mais visível e prática. Sobre os dados climáticos da bacia, temos a temperatura máxima e mínima e a precipitação e a evapotranspiração de referência (ETo) pelo método de Thornthwaite, relacionadas, respectivamente.

Figuras 4. Dados climáticos relacionando a evapotranspiração e precipitação da BHVB

Fonte: Autores, 2020.

Figura 5. Dados climáticos correlacionando a temperatura mínima e máxima da BHVB.

Fonte: Autores, 2020.

2. PERFIL CLIMÁTICO DA BHVB

Em Sergipe, a BHVB apresenta três regiões climáticas diferentes, no Agreste Sergipano, representado por 35,65% da área, com temperatura variando entre 32°C e 18°C, e índice pluviométrico médio anual de 850 mm, abrange os seguintes municípios: parte de Frei Paulo, Macambira, Campo do Brito e São Domingos. A região Subúmida, composta por 38,44% da bacia, apresenta temperatura variando de 19°C a 30°C e pluviometria média anual de 1.500 mm. Os municípios de Itaporanga d'Ajuda e São Cristóvão estão inseridos nessa área.

O Semiárido Sergipano, composto por 25,91% da área, possui temperatura que varia de 34°C a 16°C, e índice pluviométrico médio anual de 800 mm, estando inseridos nessa área os municípios de Pinhão, Pedra Mole, Oeste de Frei Paulo (SEMARH, 2010).

De acordo com a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (2013, p. 34).

“[...] Na bacia do rio Vaza Barris, por estar situada na zona intertropical, as temperaturas tendem a ser mais elevadas. Entretanto, por influência amenizadora dos alísios, as temperaturas médias situam-se entre 24 e 26 °C. As médias do mês mais frio variam entre 20° e 24°C, decrescendo nas cabeceiras da bacia, segundo o Relatório da Regionalização de Vazões da Sub-bacia 50 realizado pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) por solicitação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Ainda, segundo o mesmo relatório, de acordo com o critério de Koppen, as bacias dos rios Itapicuru e Vaza Barris estão incluídas na faixa dos climas do grupo A - Quente e Úmido e do grupo B5 - Semi-árido.”

O critério de Koppen é baseado em letras, nas quais ele classifica o clima dando maior atenção à sazonalidade e aos valores anuais e mensais de precipitação e temperatura. Os Quadros 1, 2 e 3 mostram os indicadores de acordo com a classificação de Koppen.

Quadro 1. Lista de indicadores de grupo.

Primeira Letra (Indicadores de Grupo)		
Código	Tipo	Descrição
A	Clima tropical	Climas megatérmicos; Temperatura média do mês mais frio do ano > 18°C; Estação invernal ausente; Forte precipitação anual (superior a evapotranspiração potencial anual)
B	Clima árido	Climas Secos (precipitação anual inferior a 500mm); Evapotranspiração potencial anual superior a precipitação anual; não existem cursos de água existentes.
C	Clima temperado ou clima temperado quente	Climas mesotérmicos; temperatura média dos 3 meses mais frios compreendido entre -3°C e 18°C; temperatura média do mês mais quente > 10°C; estações de verão e inverno bem definidas.
D	Clima continental ou climas temperados frios	Climas microtérmicos; Temperatura média do ar no mês mais frio < -3°C; Temperatura média do ar no mês mais quente > 10°C; Estações de verão e inverno bem definidas
E	Clima glacial	Climas polares e de alta montanha; Temperatura média do ar no mês mais quente < 10°C; Estação do verão pouco definida ou inexistente.

Fonte: adaptação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, 2009

Quadro 2. Lista de indicadores de tipo

Segunda Letra (Indicadores de Tipo)		
Código	Descrição	Aplica-se ao grupo
S	• Clima das estepes	B
	• Precipitação anual total média compreendida entre 380 e 760 mm	
W	• Clima desértico	B
	• Precipitação anual total média < 250 mm	
f	• Clima húmido	A-C-D
	• Ocorrência de precipitação em todos os meses do ano	
	• Inexistência de estação seca definida	
w	• Chuvas de Verão	A-C-D
s	• Chuvas de Inverno	A-C-D
w'	• Chuvas de Verão-outono	A-C-D
s'	• Chuvas de Inverno-outono	A-C-D
m	• Clima de monção	A
	• Precipitação total anual média > 1500 mm	
	• Precipitação do mês mais seco < 60 mm	
T	• Temperatura média do ar no mês mais quente compreendida entre 0 e 10°C	E
F	• Temperatura média do mês mais quente < 0°C	E
M	• Precipitação abundante	E
	• Inverno pouco rigoroso	

Fonte: adaptação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, 2009

Quadro 3. Lista de indicadores de sub-tipo.

Terceira Letra (Indicadores de sub-tipo)		
Código	Descrição	Aplica-se ao grupo
a : Verão quente	• Temperatura média do ar no mês mais quente > 22°C	C-D
	• Precipitação anual total média compreendida entre 380 e 760 mm	
b : Verão temperado	• Temperatura média do ar no mês mais quente < 22°C	C-D
	• Temperaturas médias do ar nos 4 meses mais quentes > 10°C	
c : Verão curto e fresco	• Temperatura média do ar no mês mais quente < 22°C	C-D
	• Temperaturas médias do ar > 10°C durante menos de 4 meses	
	• Temperatura média do ar no mês mais frio > -38°C	
d : Inverno muito frio	• Temperatura média do ar no mês mais frio < -38°C	D
h : seco e quente	• Temperatura média anual do ar > 18°C	B
	• Deserto ou semi-deserto quente (temperatura anual média do ar igual ou superior a 18°C)	
k : seco e frio	• Temperatura média anual do ar < 18°C	B
	• Deserto ou semi-deserto frio (temperatura anual média do ar inferior a 18°C)	

Fonte: adaptação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, 2009

Para um melhor entendimento, vejamos os dois mapas que apresentam os dados obtidos de precipitação e de temperatura, dispostos nas Figuras 6 e 7.

Figura 6. Mapa de temperatura por região da BHVB

Fonte: Autores, 2020.

Figura 7. Mapa de temperatura por região da BHVB

Fonte: Autores, 2020.

Outro fator importante para a análise climatológica da região é a análise do balanço hídrico mensal, considerando os meses analisados e os dados de precipitação e também a evapotranspiração de referência da bacia. De acordo com os dados coletados, dessa maneira, segue a demonstração, por meio da Tabela 3 e Figura 8.

Tabela 3. Balanço hídrico da bacia
Análise do Balanço Hídrico Mensal da bacia (mm)

MÊS	Precip.	ETP	ETR
Jan.	42,58	144,44	42,58
Fev.	41,94	137,76	41,94
Mar.	57,84	146,56	57,84
Abr.	66,29	121,00	66,29
Mai.	70,65	102,00	70,65
Jun.	77,68	78,36	77,68
Jul.	65,65	72,56	65,65
Ago.	46,10	74,67	46,10
Set.	27,94	91,87	27,94
Out.	22,65	121,24	22,65
Nov.	32,94	136,72	32,94
Dez.	35,45	149,03	35,45

Fonte: Autores, 2020.

Figura 8. Balanço hídrico mensal

Fonte: Autores, 2020.

3. INDICADORES ECONÔMICOS, AMBIENTAIS E SOCIAIS BHVB

A bacia hidrográfica é utilizada como unidade territorial de análise, planejamento e gerenciamento mais eficaz para caracterizar os recursos hídricos, minimizar os impactos e recuperar os transtornos ambientais, tais como poluição de afluentes de rio ou diminuição da mata ciliar. Nesse contexto, a bacia hidrográfica se constitui num sistema bem delimitado geograficamente, onde interagem a dimensão sócio-político-econômica da sociedade e a dimensão ambiental, nas quais estão presentes os recursos naturais, bem como as trocas (input e output) entre esses sistemas (SANTOS, 2004; WILLIAMS, 2007). Levando-se em consideração esse ponto de vista, é possível acompanhar as transformações na paisagem introduzidas pelo homem, e as respectivas respostas da natureza (ALMEIDA, 2007)

Na escala de mapeamento deste estudo (1:150.000) foi possível discriminar 15 (quinze) classes de uso e cobertura das terras. Os limites interfluviais da BHVB circunscrevem espaços biofísicos significativamente diferenciados, os quais abrigam atividades produtivas dependentes das características locais desses espaços.

As repercussões derivadas se refletem nas tipologias da cobertura das terras, sobretudo, na fitofisionomia das caatingas e na produção do espaço, identificadas por meio da análise sazonal do NDVI. A Figura 9 mostra que os valores do NDVI no período chuvoso são mais elevados (0.28 a 0.70), correspondendo a uma maior atividade fotossintética; no seco, conforme Figura 10, são muito menores (-0.40 a 0.08) o que indica a magnitude da redução pluviométrica e dos efeitos da sazonalidade sobre a vegetação.

Figura 9. Mapa do NDVI da BHVB no período chuvoso

Fonte: Batistella et al (2003).

Figura 10. Mapa do NDVI da BHVB no período de seca

Fonte: Batistella et al (2003).

As superfícies vegetadas, total ou parcialmente desfolhadas, as áreas de cultivo abandonadas, e os solos expostos, têm suas áreas ampliadas de tal forma, que os registros espectrais nas imagens de satélite não deixam dúvidas quanto à dimensão da sazonalidade presente na região.

Setores em que o NDVI se mantém elevado, tanto na estação chuvosa quanto na seca correspondem à caatinga com baixa caducifolia, podendo ser menos secos. Da mesma forma, onde os valores de NDVI permanecem baixos no período chuvoso, correspondem a solos expostos, lajedos, ou afloramentos, e/ou à caatinga *sensu stricto* ou com alto grau de caducifolia.

No entanto, as variações na intensidade da atividade fotossintética podem estar associadas a fatores diversos, desde as características da cobertura vegetal, as quais podem se diferenciar a partir da influência do relevo e dos solos, até aos diferentes usos da terra nas várias porções da bacia, Figura 11.

Figura 11. Mapa de uso, cobertura e degradação dos solos na BHVB

Fonte: RIOS e VALE (2014).

A agropecuária é a atividade produtiva mais importante, em especial a pecuária extensiva de caprinos, ovinos e, secundariamente de bovinos, e é praticada em 38,5% da área da bacia, principalmente sobre os pedimentos da depressão sertaneja. Nesses espaços são encontrados os mais baixos valores de NDVI (0.0 a 0.08), tanto no período seco quanto no chuvoso, o que indica acentuada antropização. O manejo Extensivo da pecuária fragmenta a caatinga e “preserva” remanescentes em manchas irregulares, que correspondem a aproximadamente 5% das áreas ocupadas.

As caatingas em diferentes graus de antropização ocupam 52,2% da bacia, mas apresenta importantes diferenças fitofisionômicas, sobretudo quanto à densidade, estratificação e diâmetro do dossel, bem como de sua composição florística. A capacidade de resiliência dessa vegetação depende de vários fatores: relevo, solos e distribuição das chuvas, bem como do tipo de manejo praticado nas atividades rurais.

É nesse cenário que o processo de desertificação tem início. Constata-se que na BHVB esse processo é derivado de variáveis, as quais envolvem desde a fragilidade ecológica e morfoclimática, até as atividades produtivas rurais, estando em conjunto, aceleram a degradação ambiental, reduzem a resiliência dos sistemas socioambientais e geram uma dinâmica, a qual retroalimenta e perpetua os danos que vêm atingindo a bacia.

Na região da bacia pertencente a Sergipe, as análises das imagens foram completadas com a utilização de fotografias aéreas georreferenciadas disponíveis para o litoral sergipano, na escala de 1:10.000

A utilização de mais esse recurso favoreceu maior segurança na interpretação das classes de uso do solo, sobretudo para avaliar algumas classes em que ocorreu massa de nuvens na imagem (comum em áreas costeiras).

A Tabela 4, apresenta, respectivamente, a quantificação e percentagem das classes de uso e cobertura do solo na área estudada.

Tabela 4. Classes de uso e ocupação de solo		
Quantificação das classes de uso e ocupação de solo		
Uso do Solo	(Área km ²)	% Relativa ao total
Fragmentos Florestais	347,02	13,10
Mata Ciliar	43,52	1,64
Mangue	66,49	2,51
Campos de Restinga	89,75	3,38
Corpos D'agua	58,39	2,20
Áreas Agrícolas	313,17	11,82
Áreas Embrejadas	2,94	0,11
Solo Exposto	3,55	0,13
Dunas E Areal	10,77	0,40
Pastagem	1.702,99	64,29
Nuvens	1,45	0,05
Áreas de Urbanização	8,78	0,33
TOTAL	2.648,82	100,00

Fonte: adaptado de BATISTELLA et al (2003).

A área total da bacia hidrográfica do rio Vaza-Barris é de aproximadamente 2.648,82 km². A forma de uso predominante na bacia é pastagem, com 64,29 %, de acordo com a Tabela acima.

A explicação está na característica da área, a qual é predominantemente rural. As pastagens ocupam a maior parte da área dos estabelecimentos agrícolas e são utilizadas para criação de animais, sobretudo a criação extensiva de gado, principalmente, nos municípios localizados no Agreste e no Sertão sergipano. Outra característica em relação ao solo é que ele é pobre.

A bacia do Vaza-Barris apresenta 13,10 % de área florestada. Ao analisar a região em questão, é possível observar a presença de fragmentos de mata, rodeados por áreas totalmente descaracterizadas da sua vegetação original devido à ocupação desordenada.

Do ponto de vista ecológico, a intensa redução da cobertura florestal regional traz implicações sobre a composição e distribuição de espécies vegetais e animais, processo que geralmente ocasiona a diminuição do fluxo gênico entre as populações, aumentando assim as chances de extinção local (PRIMACK & RODRIGUES, 2001).

As classes de área agrícola e solo exposto correspondem, respectivamente, a 11,82 e 0,13 % da área estudada. Sabemos que os métodos tradicionais de cultivo empregados estão diretamente relacionados aos problemas ambientais identificados na região. O emprego excessivo de fertilizantes tem causado problemas ambientais, como a contaminação do solo e a eutrofização de ambientes aquáticos.

A área coberta por mangues, campos de restinga e dunas e areal são ,respectivamente, 2,51 %, 3,38 e 0,40 % e abrange os ecossistemas costeiros da região.

Por fim, após todo o estudo de delimitação, uso e ocupação de área é possível levantar alguns possíveis indicadores socioeconômicos presentes no contexto da bacia. O Quadro 5 retrata bem alguns deles.

Quadro 5. Indicadores sócio-econômicos-ambientais.

Indicadores		
Indicadores Ambientais	Indicadores Sociais	Indicadores Econômicos
Desertificação	Benefícios sociais	Pecuária extensiva
Alterações no relevo	Renda alternativa	Produção agrícola
Retirada de vegetação existente	Acesso ao abastecimento de água, sendo os existentes precários e/ou inadequados	Agricultura de irrigação
Queimadas	Agricultura familiar	PIB per capita
Bioma adaptado as condições locais	Pobreza	Índice de desenvolvimento social (IBED)
Temperaturas elevadas devido à forte radiação solar	Vulnerabilidade social	Incentivo do Estado para a Expansão da Oferta de água
Influência da maritimidade nas áreas costeiras	Insegurança alimentar	
Salinização das águas	Doenças de veiculação hídrica	
Deposição de resíduos sólidos domiciliares e falta de saneamento		

Fonte: Autores, 2020.

REFERÊNCIAS

- [1] ANAIS XVII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO - SBSR, 2015, João Pessoa-Pb. Análise morfométrica e NDVI como subsídio para o estudo do processo de degradação dos solos na bacia hidrográfica do rio Vaza-Barris-Ba. João Pessoa-Pb: Inpe, 2015. 8 p. Disponível em: <http://www.dsr.inpe.br/sbsr2015/files/p0623.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2020.
- [2] ANAIS DO SIMPÓSIO REGIONAL DE GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO, 2014, Aracaju. NDVI COMO SUBSÍDIO PARA O ESTUDO DO PROCESSO DE DESERTIFICAÇÃO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VAZA-BARRIS –BAHIA. Aracaju: Geonordeste, 2014. 5 p. Disponível em: <http://docplayer.com.br/11700329-Ndvi-como-subsidio-para-o-estudo-do-processo-de-desertificacao-na-bacia-hidrografica-do-rio-vaza-barris-bahia.html>. Acesso em: 15 jul. 2020.
- [3] BATISTELLA, M., GUIMARÃES, M., MIRANDA, E. E., VIEIRA, H. R., VALLADARES, G. S., MANGABEIRA, J. A. C. & ASSIS, M. C. Monitoramento da expansão agropecuária na Região Oeste da Bahia. Embrapa Monitoramento por Satélite, Campinas, 39 p. (Documentos, 20), 2003.
- [4] KÖPPEN, W., 1918: Klassifikation der Klimate nach Temperatur, Niederschlag und Jahresablauf (Classification of climates according to temperature, precipitation and seasonal cycle). Petermanns Geogr. Mitt, 64, 193-203, 243-248. Disponível em: <http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/koeppen.htm>. Acesso em: 10 agosto 2020.
- [5] MAPEAMENTO DAS CLASSES DE USO E COBERTURA DO SOLO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VAZA-BARRIS, SERGIPE. Revista Multidisciplinar da Uniesp: Saber Acadêmico, v. 10, 2010. André Luiz Conceição Santos e Fabiana dos Santos P.57-67. Disponível em: http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20180403121158.pdf. Acesso em: 23 jul. 2020.
- [6] PUCGOIAS (Goiás). EVAPOTRANSPIRAÇÃO. Hidrologia Aplicada – CIV226. Disponível em: http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/17403/material/Cap%205_Evapotranspiracao_UFOP.pdf. Acesso em: 08 ago. 2020.
- [7] RIOS, Irialinne Queiroz; VALE, Raquel de Matos Cardoso do. O CONTEXTO CLIMATOBOTÂNICO DA BACIA HIDROGRÁFICA VAZA-BARRIS-BA E SUAS RELAÇÕES COM O PROCESSO DESERTIFICAÇÃO. In: Congresso Iberoamericano De Estudios Territoriales Y Ambientales, 2014, São Paulo. Congresso. São Paulo: Estudios Territoriales, 2014. p. 2670-2687. Disponível em: <https://docplayer.com.br/3479978-O-contexto-climatobotanico-da-bacia-hidrografica-vaza-barris-ba-e-suas-relacoes-com-o-processo-de-desertificacao.html>. Acesso em: 08 ago. 2020.
- [8] SILVA, Fernando Moreira da *et al.* SISTEMAS SINÓTICOS E CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA. In: SILVA, Fernando Moreira da; CHAVES, Marcelo dos Santos; LIMA, Zuleide Maria C. (org.). Geografia Física II. Natal: Edufrn, 2009. Cap. 06. p. 1-16. Programa de Universidade a Distância - UNIDIS grad. Disponível em: <https://www.passeidireto.com/arquivo/50090488/classificacao-de-koppen-geiger>. Acesso em: 15 jul. 2020.
- [9] SANTOS, A. L. C.; SANTOS, F. MAPEAMENTO DAS CLASSES DE USO E COBERTURA DO SOLO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VAZA-BARRIS, SERGIPE. SABER ACADÊMICO - UNIESP. 10 ed. Presidente Prudente, dez. 2010. Disponível em: <http://www.uniesp.edu.br/revista/revista10/pdf/artigos/06.pdf>. Acesso em: 10 agosto 2020.
- [10] THORNTON, C.W. NA APPROACH TOWARD A RATIONAL CLASSIFICATION OF CLIMATE. Geographical Review, 38: 55- 94, 1948. TURCO, J. E. P.;

CAPÍTULO

05

Bacias hidrográficas costeiras Caueira-Abaís e do Sapucaia

Cleide Cruz Soares
Crislaine Melo Cardoso
Gabriel Oliveira Martins

1. CARACTERIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS COSTEIRAS CAUEIRA-ABAÍS E DO SAPUCAIA

Quando se trata de planejamento territorial, as bacias hidrográficas são tidas como unidades básicas de análise para elaborar e aplicar medidas e ações de maneira a integrar a gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental. No Brasil, isso foi legitimado através da Lei 9.433/97, a Política Nacional de Recursos Hídricos. A delimitação desses territórios permite analisar de forma sistêmica, tanto fatores como relações ambientais, sociais e econômicas de acordo com as características de determinada bacia hidrográfica (CARVALHO, 2020).

O Estado de Sergipe teve seu mapa hidrográfico modificado no ano de 2015 através da Resolução nº 25 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, em que foram inseridas duas novas bacias: a Costeira do Sapucaia e a Costeira Caueira-Abaís (GOVERNO DE SERGIPE, 2015).

Essa nova divisão surgiu por conta das necessidades identificadas em estudos do Plano Estadual de Recursos Hídricos, o qual foi lançado em 2010 e fez o mapeamento da situação dos recursos hídricos no estado, visando facilitar a gestão, o planejamento e a execução de ações específicas em cada bacia. As bacias costeiras apresentam como características principais a presença de lagoas costeiras, de ecossistemas ambientalmente frágeis e cada vez mais modificadas pela ação antrópica.

A Bacia Costeira do Sapucaia (Figura 1) está totalmente inserida no estado de Sergipe e é constituída por parte dos municípios de Pirambu e Japarutuba, sua foz está localizada entre as desembocaduras dos Rios Japarutuba e São Francisco. A área total da bacia é de 118,33km² e os usos dessas águas são variados, destacando-se: o abastecimento humano, o uso doméstico, a piscicultura em barragens e tanques redes, a dessedentação animal e o lazer, sendo o último o mais relevante, principalmente devido às belezas cênicas presentes na bacia (SANTOS, 2016).

Já a Bacia Costeira Caueira-Abaís (Figura 1) abrange parte dos municípios de Itaporanga D'Ajuda e de Estância e possui 161,38km² de área total. Essa bacia integra uma área de grande relevância para o estado de Sergipe, no Litoral Sul, pois possui uma grande variedade de ecossistemas e atividades econômicas baseadas no turismo e lazer. O avanço da urbanização, sem o planejamento adequado nessa região, causa preocupação por ocorrer em áreas, as quais deveriam ser ambientalmente protegidas (MACEDO, 2014).

Considerando-se que as bacias hidrográficas são unidades de planejamento, análise e gestão ambiental de extrema importância, e a necessidade de se compreender a interação entre um ambiente fluvial e marinho e ainda a recente criação das bacias costeiras do estado de Sergipe, implicando em poucas informações e dados científicos sobre estas, o objetivo do presente estudo foi fazer um levantamento de dados meteorológicos dos municípios inseridos nas bacias estudadas, traçar o perfil climático destas, para finalmente identificar como a ação climática pode influenciar em indicadores ambientais, econômicos e sociais.

Figura 1: Mapa de localização das Bacias Costeiras Caueira-Abais e do Sapucaia

Fonte: Benicio consultoria ambiental, 2020.

2. PERFIL CLIMÁTICO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS COSTEIRAS CAUEIRA-ABAI E DO SAPUCAIA

2.1. IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO CLIMÁTICO DA BACIA

Nos últimos anos, mais exatamente nas últimas décadas, muitos países sofrem com fortes e consecutivos eventos climáticos extremos, que muitas vezes causam desastres naturais sobre as populações envolvidas. Muitos desses eventos estão relacionados a anomalias nas variáveis meteorológicas de precipitação, temperatura, pressão atmosférica, vento e também pela umidade do ar (ATAIDES e FURTADO, 2014).

Silva *et al.* (2019) afirma que a compreensão dos conceitos que envolvem os estudos do tempo meteorológico e do clima (climatologia), tornam-se cada vez mais necessários e, aos poucos, são incorporados ao cotidiano das pessoas em diferentes segmentos, tais como na economia, na indústria, no comércio e na prevenção, monitoramento e mitigação dos efeitos de desastres naturais. Esse efeito, ou melhor, a associação do clima com os aspectos socioeconômicos nas bacias Costeiras será observado no decorrer do trabalho.

2.2. LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS

Para realizar o estudo climatológico das bacias hidrográficas foi necessário realizar um levantamento de dados dos elementos e fatores climáticos da região. Assim, dados da temperatura do ar e precipitação em forma de chuva foram coletados, sendo importante entender que esses dados variam de lugar e com o decorrer do tempo, onde a latitude, o relevo, os ventos, as correntes oceânicas são fatores que interferem na dinâmica deles, interferindo diretamente na transformação da paisagem e do meio ambiente. Outro elemento importante para o estudo climático é a evapotranspiração, a qual transforma a água superficial em vapor, esta foi calculada pelo método de Thornthwaite Mather (1955), que tem por base a temperatura média e a pluviosidade

Foram utilizadas séries mensais entre os anos 2015 e 2019, totalizando 60 dados em cada município pertencente às bacias costeiras. Para os municípios de Itaporanga D'Ajuda e Estância utilizou-se o banco de dados do site AgriTempo, e para os municípios de Japarutuba e Pirambu, o banco de dados do CPTEC – Centro de Previsão de Tempo de Pesquisas Espaciais.

Para entender o perfil climático das bacias costeiras, primeiro foi necessário estudar o comportamento climático de cada município que compõe as bacias hidrográficas, para isso dispomos de gráficos relacionando os dados climáticos para cada município.

Na análise do climograma de Itaporanga D'ajuda-SE (Figura 2), percebeu-se que a temperatura máxima varia entre 29 – 36 °C, com temperaturas mais elevadas no mês de novembro; já a temperatura mínima varia entre 18 – 25 °C, com mínimas nos meses de julho e agosto, e temperatura média de 26,8 °C. A precipitação varia de 0,05 – 255 mm, com altas densidades pluviométricas em março e abril, decorrente em todos os anos, com exceção de 2018 (34,6 mm), o que explica a baixa temperatura nesses meses. Observou-se que nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro quase não houve precipitação, tal fato pode ser explicado devido às altas temperaturas registradas nesses meses.

Na análise das precipitações, observou-se que, a média das totais anuais foi de 33,6 mm, enquanto que a evapotranspiração foi de 142,6 mm. Ao analisar esses dois elementos por mês/ano no mesmo período (Figura 3), notou-se que somente nos meses de março e abril de 2017 a precipitação foi superior à evapotranspiração, nos demais meses, o índice de evapotranspiração foi superior à precipitação, comportamento esperado para a região.

Figura 2: Itaporanga D'ajuda-SE, relação das precipitações com as médias mensais da temperatura do ar máx, mín e média, no período de 2015 a 2019.

Fonte: Agritempo. Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 3: Itaporanga D'ajuda-SE, relação da precipitação e evapotranspiração no período de 2015 a 2019.

Fonte: Agritempo. Elaborado pelos autores, 2020.

Na análise do climograma de Estância-SE (Figura 4), percebeu-se que a temperatura máxima varia entre 29 – 35 °C, com temperaturas mais elevadas nos meses de janeiro, fevereiro, abril e novembro; já a

temperatura mínima varia entre 15 – 25 °C, com mínimas nos meses de junho, julho e agosto. É importante ressaltar que no período estudado só houve um registro de 15 °C em outubro de 2019, comportamento atípico para a região, concentrando a T_{mín} em 18 °C, possuindo temperatura média de 26,3 °C. A precipitação varia de 0,00 – 358 mm, com alta densidade pluviométrica em março e abril no ano de 2017, e comportamento variado ao decorrer dos anos. Notou-se que as somas mensais são menores que 150 mm chegando a 0,00 mm em muitos meses, tal fato pode ser explicado devido às altas temperaturas registradas nesses meses ou à falha na coleta das informações ou até mesmo à falta dela.

Na análise das precipitações, verificou-se que a média das totais anuais foi de 29,0 mm, enquanto que a evapotranspiração foi de 137,9 mm. Ao analisar esses dois elementos por mês/ano no mesmo período (Figura 5), foi observado que somente no mês de abril de 2017 a precipitação foi superior à evapotranspiração, ao passo que nos demais meses, o índice de evapotranspiração foi superior à precipitação, comportamento esperado para a região.

Figura 4: Estância-SE, relação das precipitações com as médias mensais das temperaturas máx, mín e média, no período de 2015 a 2019

Fonte: Agritempo. Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 5: Estância-SE, relação da precipitação e evapotranspiração no período de 2015 a 2019

Fonte: Agritempo. Elaborado pelos autores, 2020.

Na análise do climograma de Pirambu-SE (Figura 6), percebeu-se que a temperatura máxima varia entre 26 – 33 °C, com temperaturas mais elevadas nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e novembro; já a temperatura mínima varia entre 20 – 25 °C, com mínimas nos meses de janeiro e fevereiro, possuindo temperatura média de 26,6 °C, observando que o município possui temperaturas elevadas ao decorrer do período influenciando a precipitação.

A precipitação varia de 4,7 – 283,0 mm, com alta densidade pluviométrica em maio, junho e julho ao longo dos anos, mantendo um comportamento padrão ao decorrer dos outros meses, tal fato pode ser explicado devido às altas temperaturas registradas nesses meses.

Na análise das precipitações, verificou-se que a média das totais anuais foi de 68,5 mm, enquanto que a evapotranspiração foi de 140,5 mm. Ao analisar esses dois elementos por mês/ano no mesmo período (Figura 7), foi observado que nos meses de maio, junho e julho a precipitação foi superior à evapotranspiração, nos demais meses, o índice de evapotranspiração foi superior à precipitação, comportamento esperado para a região devido às altas temperaturas, como explicado anteriormente.

Figura 6: Pirambu-SE, relação das precipitações com as médias mensais das temperaturas máx, mín e média no período de 2015 a 2019

Fonte: CPTEC. Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 7: Pirambu-SE, relação da precipitação e evapotranspiração no período de 2015 a 2019

Fonte: CPTEC. Elaborado pelos autores, 2020.

Na análise do climograma de Japarutuba-SE (Figura 8), percebeu-se que a temperatura máxima varia entre 26 – 34 °C, com temperaturas mais elevadas nos meses de janeiro, março e novembro; já a temperatura mínima varia entre 19 – 24 °C, com mínimas nos meses de janeiro, fevereiro e abril, possuindo temperatura média de 26,4 °C, observando que o município possui temperaturas elevadas ao decorrer do período influenciando a precipitação. A precipitação varia de 2,8 – 317,8 mm com alta densidade pluviométrica em maio, junho, julho e setembro ao longo dos anos, e baixa pluviosidade em outubro, novembro e dezembro.

Na análise das precipitações observou-se que a média das totais anuais foi de 63,5 mm, enquanto que a evapotranspiração foi de 137,6 mm. Ao analisar esses dois elementos por mês/ano no mesmo período (Figura 9), foi observado que nos meses de maio e setembro de 2017 e junho e julho de 2019 a

precipitação foi superior à evapotranspiração, nos demais meses, o índice de evapotranspiração foi superior à precipitação, tal fato ocorreu devido à elevada temperatura nesse período.

Figura 8: Japarutuba-SE, relação das precipitações com as médias mensais das temperaturas máx, mín e média no período de 2015 a 2019

Fonte: CPTEC. Elaborado pelos autores, 2020.

Figura 9: Japarutuba-SE, relação da precipitação e evapotranspiração no período de 2015 a 2019

Fonte: CPTEC. Elaborado pelos autores, 2020.

Após a análise dos dados climatológicos dos municípios que fazem parte das bacias costeiras, verificou-se a similaridade climática destas, onde apresentam temperatura do ar, precipitação e evapotranspiração próximas, como também os períodos de ocorrência ao longo do ano, salvo alguns casos isolados, os quais acabam influenciando o município próximo.

A fim de visualizar melhor a distribuição média dos dados climáticos apresentados anteriormente, foram plotados os mapas climáticos das bacias costeiras, dos parâmetros climáticos (temperatura do ar, precipitação e evapotranspiração), os quais são apresentados nas Figuras 10, 11 e 12.

Figura 10: Mapa da temperatura média dos municípios que fazem parte das bacias costeiras: Bacia Caueira-Abais e Bacia Sapucaia. No período de 2015 a 2019

Fonte: Benicio consultoria ambiental, 2020.

Figura 11: Mapa da precipitação média dos municípios que fazem parte das bacias costeiras: Bacia Caueira-Abais e Bacia Sapucaia. No período de 2015 a 2019

Fonte: Benicio consultoria ambiental, 2020.

Figura 12: Mapa da evapotranspiração média dos municípios que fazem parte das bacias costeiras: Bacia Caueira-Abais e Bacia Sapucaia. No período de 2015 a 2019

Fonte: Benicio consultoria ambiental, 2020.

2.3. CONHECENDO O PERFIL CLIMÁTICO DA BACIA

As classificações climáticas de Koppen (1931) e Thorntwaite (1955) são universalmente as mais utilizadas, sendo a primeira baseada nas características térmicas e na distribuição sazonal da precipitação, e a segunda, fundamentada em dois índices climáticos principais (umidade e eficiência térmica) (AYOADE, 2010). Assim, o perfil climático das bacias costeiras foi definido pelos dois métodos.

Para o perfil climático de Koppen: Bacia Caueira-Abais e Bacia Sapucaia, apresentam, respectivamente, o tipo de clima Aw (Tropical seco) e Af (Tropical úmido). Apresentam mês mais frio maior que 18 °C, mês mais quente maior que 22 °C, chuva no mês mais seco menor que 60 mm e precipitação menor que 2500, classificando o tipo A (tropical). Para o indicador climático, tem para a bacia Caueira-Abais o tipo w, onde apresenta estação seca, característico por chuvas de verão; e para a bacia Sapucaia o tipo f, onde não apresenta estação seca, tendo ocorrência de precipitação em todos os meses do ano.

Para o perfil climático de Thornthwaite, foi necessário calcular os índices de umidade e aridez, segundo a metodologia, obtendo-se para a bacia Caueira-Abais os valores de Ia (27,3 – 92,0) e Iu (-55,2 – -16,4), para a bacia Sapucaia, os valores de Ia (32,3 – 81,1) e Iu (-48,7 – -19,3). Para ambas as bacias costeiras obtiveram-se o mesmo tipo de clima Ds,A, Semi-árido com grande deficiência no verão megatérmico. Para a chave inicial da classificação, encontra-se valor de Iu entre -66,7 e -33,3 (tipo D); chave secundária, encontra-se valor de Ia maior que 33,3 (tipo s₂); e para a chave terciária, o valor da evapotranspiração anual é maior que 1140,0 (tipo A') para ambas as bacias.

3. INDICADORES E SUA INTERFERÊNCIA NO CLIMA

O processo de ocupação litorânea através da inserção do ambiente praiano nos destinos turísticos é um aspecto que deve ser analisado com cautela, já que esta ocupação comumente é realizada sem o devido planejamento, além de não levar em consideração a fragilidade ambiental e a capacidade de resiliência destes ambientes, gerando impactos socioambientais negativos (OLIVEIRA E LIMA, 2010). Por outro lado, esses empreendimentos geram oportunidades para a população local.

Dessa forma, o litoral sergipano vem recebendo uma série de investimentos no turismo com a consequente urbanização, principalmente pela forte presença de segundas residências, a tradicional casa de praia, e também de infraestrutura turística, com a construção de bares, restaurantes, pousadas e orla, que acabam por dificultar a percolação da água da chuva, contribuindo para a geração de processos erosivos (SANTOS, 2015).

A figura 13 traz o mapa de uso e ocupação do solo e de cobertura vegetal da Bacia Costeira Caueira-Abais, evidenciando esse processo de urbanização, principalmente com fins turísticos.

Figura 13: Mapa de uso e ocupação do solo e de cobertura vegetal da Bacia Hidrográfica Costeira Caueira-Abais.

Fonte: Macedo, 2014.

Além disso, a bacia também é vastamente ocupada por vegetação de restinga, por culturas agrícolas (laranja, coco-da-baía, mandioca e batata doce), pastagens e mineração (extração de argila), sendo que para esta última realizar suas atividades, desmatou grande parte da mancha de Mata Atlântica presente na região (MACEDO, 2014). Os fatores climáticos característicos da região interferem no desenvolvimento das atividades agrícolas, restringindo essa prática ao cultivo de culturas típicas de áreas litorâneas, e com ciclos de cultivos dentro do período de maior concentração de chuva.

A cobertura vegetal de certa área vai influenciar diretamente o clima de diversas formas, influenciando no albedo, na umidade (e consequentemente nos valores de evapotranspiração) e também nas variações de temperatura. Como também tem um papel importante na proteção do solo, evitando ou amenizando a geração de processos erosivos, por exemplo, que podem vir a assorear os recursos hídricos da região e afetar a qualidade e quantidade dessas águas.

Outra questão a ser considerada nessa bacia é a presença de dunas que agem como um tipo de regulador térmico, absorvendo muita radiação solar durante o dia e emitindo calor aos poucos durante a noite, evitando assim que essa região possua grande amplitude térmica, sendo que a temperatura na bacia no período de 2015 a 2019 variou de aproximadamente 18 a 34 °C.

A característica climática geral da bacia, com excedentes hídricos entre os meses de abril e agosto, é fundamental para que os agricultores planejem e tenham êxito no desenvolvimento de atividades agrícolas, para que aconteça um equilíbrio entre evapotranspiração potencial e pluviosidade, essencial para manter a vegetação sempre verde (MACEDO, 2014).

Já a figura 14 traz o mapa de uso e ocupação do solo da Bacia Hidrográfica Costeira do Sapucaia, com predominância de vegetação de restinga, floresta ombrófila e cultivos agrícolas/solos expostos.

Figura 14: Mapa de uso e ocupação do solo da Bacia Hidrográfica Costeira do Sapucaia

Fonte: Santos, 2016.

De acordo com Santana (2016), a Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaia é amplamente antropizada, principalmente com atividades agropecuárias e de mineração, que contribuem para a degradação da vegetação. Além disso, para o desenvolvimento dessas atividades, certas intervenções são feitas, tais como: a construção de barramentos ao longo dos cursos dos rios para implantação ou suprimento de atividades econômicas; o uso de técnicas de manejo inadequadas no solo; a remoção da vegetação nativa e o uso de agrotóxicos tudo isso pode vir a contaminar recursos hídricos subterrâneos e superficiais, entre outros. Logo, isso muda e impacta direta ou indiretamente a bacia, podendo gerar problemas de ordem ambiental, econômica ou ainda social.

Por outro lado, a extração mineral em Japarutuba vem demonstrando sua importância para o desenvolvimento econômico e social no município e em municípios vizinhos, tendo em vista que essa atividade gera riqueza, renda e empregos formais e informais, melhorando assim, os valores do PIB per capita.

O coeficiente de compacidade da bacia indica que não há grandes susceptibilidades a enchentes, já que apresenta um formato alongado, isso considerando que seu entorno esteja devidamente preservado, o que não vem ocorrendo na Bacia Costeira do Sapucaia, a qual possui doze aglomerados populacionais nas proximidades dos rios. A maioria dessas pessoas fazem a lavagem de roupas e utensílios dentro do rio, degradando a qualidade da água devido à utilização de produtos de limpeza. Além disso, também deve-se considerar a agricultura, que utiliza grandes quantidades de agrotóxicos os quais são carreados para os mananciais e também para a utilização dos corpos d'água para lazer, gerando muitas vezes elevados volumes de resíduos sólidos que são depositados dentro dos rios ou no entorno (SANTOS, 2016).

Mesmo a bacia não apresentando tendência a enchentes, é importante considerar que um evento de chuva mais intenso associado a práticas de manejo e usos inadequados do solo podem influenciar na ocorrência

destas, que além de causar impactos econômicos, com a perda de bens materiais e culturas, podem causar perdas de vidas humanas e transmissão de doenças de veiculação hídrica.

O caráter sazonal de pluviosidade na bacia se reflete numa significativa redução das chuvas na primavera-verão, o que não chega a configurar um significativo período de estiagem quando comparado a outras áreas do sertão sergipano, mesmo a cobertura vegetal e o nível freático expressando essa redução hídrica.

No período mais seco (novembro a março) é que fica mais evidente essa deficiência hídrica, e consequentemente, são registrados os maiores valores da evapotranspiração potencial. Após esse período, em abril, começa a reposição de água no solo, concentrando todo o excedente hídrico entre os meses de maio e agosto.

Dessa maneira, é entre esses meses que a ação do intemperismo químico e dos processos morfogenéticos comandados pela água são intensificados, como por exemplo, o escoamento superficial e os movimentos de massa. Por outro lado, no verão, os processos associados ao escoamento superficial tornam-se pouco frequentes, a ação do intemperismo químico acaba se atenuando e o comportamento da dinâmica fluvial é alterado, refletindo-se na intermitência das drenagens (MACEDO, 2014).

Assim, de acordo com o perfil climático das bacias estudadas, é possível identificar alguns indicadores que podem ser afetados direta ou indiretamente pela ação climática, sendo eles:

4. INDICADORES DIRETOS

Ambientais: desmatamento, urbanização e proteção de habitats.

Econômicos: Produção agropecuária e produção industrial.

Sociais: saúde, eventos extremos (enchentes ou secas).

5. INDICADORES INDIRETOS

Ambientais: qualidade e quantidade de água, presença de agrotóxicos, fontes de poluição.

Econômicos: índice de geração de empregos formais, PIB per capita.

Sociais: taxa de mortalidade infantil, acesso à água tratada e esgotamento sanitário, doenças de veiculação hídrica, acesso ao lazer.

REFERÊNCIAS

- [1] Agritempo. Sistema de Monitoramento Agrometeorológico. Disponível em: <<https://www.agritempo.gov.br/agritempo/jsp/Estatisticas/index.jsp?sigla UF=SE>>. Acesso em: 9 de julho de 2020.
- [2] ATAIDES, R. S.; FURTADO, T. V. A importância da utilização das normais climatológicas para análise de variação climática. TCC. Instituto Federal de educação, ciência e tecnologia de Santa Catarina. Departamento acadêmico de saúde e serviços. Curso técnico de Meteorologia. Florianópolis, julho de 2014.
- [3] AYOADE, J. O. Introdução à climatologia para os trópicos. ed. 13 Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. p. 332.
- [4] CARVALHO, A. T. F. Bacia hidrográfica como unidade de planejamento: discussão sobre os impactos da produção social na gestão de recursos hídricos no Brasil. Caderno Prudentino de Geografia. Presidente Prudente, n. 42, v. 1, p. 140-161, jan-jun, 2020.
- [5] CPTEC. Disponível em: <<http://bancodedados.cptec.inpe.br/>>. Solicitação por e-mail em 22 de julho de 2020.
- [6] GOVERNO DE SERGIPE. Resolução nº 25, de novembro de 2015. Estabelece a divisão hidrográfica de Sergipe para implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 2015.
- [7] KÖPPEN, W. Grundriss der Klimakunde: Outline of climate science. Berlin: Walter de Gruyter, p. 388. 1931.
- [8] MACEDO, H. S. Ordenamento territorial-ambiental na Bacia Costeira Caueira/Abais. 2014, 190 f. Dissertação (mestrado em Geografia) - Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão/SE: UFS, 2014.
- [9] OLIVEIRA, E. J.; LIMA, R. M. M. Segunda residência: um alojamento turístico. In: Seminário Nacional de Governança Urbana e Desenvolvimento Metropolitano, 1. 2010. Natal/RN. Observatório das Metrôpoles. Natal/RN: UFRN, 2010.

- [10] SANTANA, F. DOS S. A dinâmica da rede hidrográfica da bacia do rio Sapucaia, Japaratuba/Pirambu-SE. Revista de Geociências do Nordeste. v. 2, p. 335-343, 27 out. 2016.
- [11] SANTOS, P. P. S. Entre a casa de praia e o imobiliário-turístico: a segunda residência no litoral sergipano. 2015, 282 f. Dissertação (mestrado em Geografia) – Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão/SE: UFS, 2015.
- [12] SANTOS, R. C. L. *et al.* Bacia Hidrográfica Costeira do Sapucaia, estado de Sergipe: uso e ocupação do solo. III Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste. Aracaju/SE, 2016.
- [13] SILVA, E. M.; FREITAS, F. C. C.; NETO, L. R. B.; GIRÃO, A. F.; GARCIA, C. A. P.; PINHO, L. U.; CATANHO, P. A. G. A importância do Ensino de Climatologia nas Ações de Defesa Civil em Regiões de Vulnerabilidade Socioeconômica de Fortaleza/CE. Revista Brasileira de Meteorologia, v.34, n.3, 369 – 378, 2019.
- [14] THORNTHWAITE, C.W.; MATHER, J.R. The water balance. Centerton, NJ: Drexel Institute of Technology - Laboratory of Climatology, 1955. 104p. (Publications in Climatology, vol. VIII, n.1)