TÓPICOS EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Gleica Soyan Barbosa Alves
Eliene de Oliveira
(Organizadoras)

Volume
21
Ano 2020

Editora Poisson

Gleica Soyan Barbosa Alves
Eliene de Oliveira
(Organizadoras)

Tópicos em Ciências da Saúde

Volume 21

1ª Edição

Belo Horizonte
Poisson
2020

Editor Chefe: Dr. Darly Fernando Andrade

Conselho Editorial

Dr. Antônio Artur de Souza – Universidade Federal de Minas Gerais

Msc. Davilson Eduardo Andrade

Dra. Elizângela de Jesus Oliveira – Universidade Federal do Amazonas

Msc. Fabiane dos Santos

Dr. José Eduardo Ferreira Lopes – Universidade Federal de Uberlândia

Dr. Otaviano Francisco Neves – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Dr. Luiz Cláudio de Lima – Universidade FUMEC

Dr. Nelson Ferreira Filho – Faculdades Kennedy

Msc. Valdíney Alves de Oliveira – Universidade Federal de Uberlândia

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

T674
Tópicos em Ciências da Saúde - Volume 21/ Organização: Gleica Soyán Barbosa Alves, Eliene de Oliveira, Editora Poisson - Belo Horizonte - MG: Poisson, 2020
Formato: PDF ISBN: 978-65-5866-037-8 DOI: 10.36229/978-65-5866-037-8
Modo de acesso: World Wide Web Inclui bibliografia
1.Saúde 2.Medicina 3. Enfermagem I. ALVES, Gleica Soyán Barbosa II. OLIVEIRA, Eliene de III. Título.
CDD-610
Sônia Márcia Soares de Moura - CRB 6/1896

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

www.poisson.com.br
contato@poisson.com.br

SUMÁRIO

Capítulo 1: Sistematização da assistência de enfermagem nos distúrbios renais em CTI: Insuficiência renal aguda e crônica, diálise peritoneal e hemodiálise..... 08

Rizocele da Silva, Lilia Costa Nascimento, Adriana Montenegro de Albuquerque

DOI: 10.36229/978-65-5866-037-8.CAP.01

Capítulo 2: Contribuições do enfermeiro da Estratégia Saúde da Família-ESF à saúde do adolescente 15

Ticiano Castro Luz, Rouslanny Kelly Cipriano de Oliveira, Iolanda Gonçalves de Alencar Figueiredo

DOI: 10.36229/978-65-5866-037-8.CAP.02

Capítulo 3: Cuidados paliativos, assistência domiciliar e a concepção dos cuidadores: Revisão Integrativa..... 30

Lúcia Maria Gomes de Santana, Sandra Maria Simões Ribeiro, Geórgia Maria Ricardo Félix dos Santos, Bernardo do Rego Belmonte, Maria Elaine da Silva

DOI: 10.36229/978-65-5866-037-8.CAP.03

Capítulo 4: A atuação da enfermagem na Atenção Primária frente a disfunção sexual no pós-parto..... 38

Angela Lima dos Santos Fonseca, Elizana Mulato Guedes, Maria Emanuely da Silva Irineu, Camila Priscila Abdias do Nascimento

DOI: 10.36229/978-65-5866-037-8.CAP.04

Capítulo 5: Atuação de enfermeiras(os) obstetras durante o trabalho de parto/parto: Relato de experiência 41

Maíra Maria Leite de Freitas, Juliana da Silva Magalhães, Cláudia Patrícia da Silva Ribeiro Menezes, Letícia Machado de Sousa, Claudiana dos Santos Silva, Antônio Gean Fernandes Lopes, Camila Ferreira da Silva, Maria Madalena da Silva Araújo, Adria Ferreira de Sousa

DOI: 10.36229/978-65-5866-037-8.CAP.05

Capítulo 6: *Baby blues* em mulheres primíparas: Sintomas e estados de humor nos primeiros quinze dias após o parto..... 47

Aline de Sousa Rocha, Benedita Maryjose Gleyk Gomes, Roberta Meneses Sousa, Andréia Sousa da Rocha Moraes, Marcos Antonio Silva Batista, Rosane Cristina Mendes Gonçalves

DOI: 10.36229/978-65-5866-037-8.CAP.06

SUMÁRIO

Capítulo 7: Intercorrências obstétricas e neonatais: Complicações que acometem o recém nascido..... 54

Andressa Teixeira Machado, Cleide Monteiro Zemolin, Caren Franciele Coelho Dias, Ezequiel da Silva, Clebiana Alves e Silva Diniz, Cláudia Maria Diaz

DOI: 10.36229/978-65-5866-037-8.CAP.07

Capítulo 8: Mães adolescentes: Direito à escolarização durante hospitalização do filho na UTI neonatal..... 61

Danúbia Ramos dos Santos Mozeléski, Luciane Costa Simões da Silva, Regina Maria Fialkoski Basso

DOI: 10.36229/978-65-5866-037-8.CAP.08

Capítulo 9: Análise do perfil nutricional e clínico de uma população infantil vivendo com HIV atendida em Serviço Especializado 68

Geani de Oliveira Marins, Nadir Machado Alves Cardoso, Myrna Maximiano Mendes Miranda, Lismeia Raimundo Soares, Kátia Calvi Lenzi de Almeida

DOI: 10.36229/978-65-5866-037-8.CAP.09

Capítulo 10: Perfil sociodemográfico e estilo de vida de indivíduos portadores de HIV/AIDS em hospital de referência no município de João Pessoa-PB 76

Catarina Alves de Lima Serafim, Leônia Maria Batista, Luciana Lucena Aranha de Macedo

DOI: 10.36229/978-65-5866-037-8.CAP.10

Capítulo 11: Atuação do Assistente Social em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos: Relato de experiência de desinstitucionalização de idosos de uma ILPI no município de Serra Talhada-PE 87

Mariana dos Santos Silva, Fábiana Maria de Santana, Josenildo André Barboza, Edilene Lopes de Pádua, Elizângela Maria Vieira Dantas, Edvânia de Sousa Cavalcante Melo

DOI: 10.36229/978-65-5866-037-8.CAP.11

Capítulo 12: A importância da dança como recurso auxiliar na assistência aos idosos do Projeto Envelhecendo com Saúde: Relato de experiência..... 91

Marina Gonçalves Assis, Diogo da Silva Jacinto Cirne, Kleyton Wesllen de Lima Ferreira, Rayssa Samilly Santos de Oliveira, Luiz Arthur Cavalcanti Cabral

DOI: 10.36229/978-65-5866-037-8.CAP.12

SUMÁRIO

Capítulo 13: Prevenindo quedas domésticas dos idosos através de estratégias educativas em saúde.....96

Jéssika Rayanne Batista Rocha, Gealdo Tavares Neto, Mariana Martins da Silva, Tacilla Maria Rodrigues Pereira, Joedna Martins Silva, Ramon Silva de Sousa

DOI: 10.36229/978-65-5866-037-8.CAP.13

Capítulo 14: A educação hídrica em um encontro com idosos 99

Bárbara Ebilizarda Coutinho Borges, Marília Rute de Souto Medeiros, Rafaela Carolini de Oliveira Távora, Nubia Maria Freire Vieira Lima

DOI: 10.36229/978-65-5866-037-8.CAP.14

Capítulo 15: O papel do enfermeiro nos Serviços de Urgência e Emergência103

Maíra Maria Leite de Freitas, Maria Madalena da Silva Araújo, Adria Ferreira de Sousa, Cláudia Patrícia da Silva Ribeiro Menezes, Leticia Machado de Sousa, Claudiana dos Santos Silva, Juliana da Silva Magalhães, Antônio Gean Fernandes Lopes, Camila Ferreira da Silva

DOI: 10.36229/978-65-5866-037-8.CAP.15

Capítulo 16: Desafios na inclusão social de surdos no contexto da saúde 111

Larissa Gonçalves Abrantes de Oliveira, Maria Jussiany Gonçalves de Abrantes

DOI: 10.36229/978-65-5866-037-8.CAP.16

Capítulo 17: Síndrome XYY: Breves observações para o aprendizado social 117

Michelly Patricia Mafra

DOI: 10.36229/978-65-5866-037-8.CAP.17

Capítulo 18: Tuberculose: Perfil sociodemográfico e frequência de abandono ao tratamento em hospital de referência no município de João Pessoa-PB 125

Camyla Caroliny Neves de Andrade, Leônia Maria Batista, Luciana Lucena Aranha de Macedo

DOI: 10.36229/978-65-5866-037-8.CAP.18

Capítulo 19: Materiais e métodos de higienização de próteses totais e parciais removíveis: Uma revisão de literatura 141

Ana Paula Santana Garcia, Bianca da Costa Teles, Bruna Valadão Fouchy, Carolina Modernel Soares, Kátia Cristiane Hall, Jacinta da Conceição Cezerilo Pataca

DOI: 10.36229/978-65-5866-037-8.CAP.19

SUMÁRIO

Capítulo 20: A eficácia dos testes clínicos de campo na avaliação da capacidade funcional dos pacientes com DPOC: Uma revisão de literatura 150

Leidyane de Almeida Gonçalves, Daniele Maria dos Santos, Alexa Alves de Moraes, Bárbara Renatha Afonso Ferreira de Barros Leite

DOI: 10.36229/978-65-5866-037-8.CAP.20

Capítulo 21: Hydroxychloroquine in fighting COVID-19: What led WHO to suspend clinical trial of drug? 158

Thyago José Arruda Pacheco, Danielle Galdino de Souza, Raquel Santos Faria, Laise Rodrigues de Andrade

DOI: 10.36229/978-65-5866-037-8.CAP.21

Autores: 166

Capítulo 1

Sistematização da assistência de enfermagem nos distúrbios renais em CTI: Insuficiência renal aguda e crônica, diálise peritoneal e hemodiálise

Rizocle da Silva

Lília Costa Nascimento

Adriana Montenegro de Albuquerque

Resumo: Tratamentos dialíticos são indicados para distúrbios da função renal, e requer dos profissionais de enfermagem capacidade para realizá-los. Objetivos: Apresentar os tipos de distúrbios renais e as terapias dialíticas bem como discutir a sistematização da assistência de enfermagem ao paciente crítico. Metodologia: Estudo descritivo do tipo revisão bibliográfica, nas bases de dado LILACS, BDENF, MEDLINE e SCIELO. Utilizado o operador booleano “AND” a fim de permitir o cruzamento simultâneo dos descritores. Foram incluídos estudos que apresentavam relação com a temática central, disponíveis na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol, no período de 2010 a 2016. Resultados e Discussão: A busca nas bases de dados resultou na coleta e análise de 15 artigos, que preencheram adequadamente os critérios e foram selecionados para inclusão no estudo. Os tratamentos dialíticos são comuns na prática clínica em nefrologia, envolve terapias avançadas tecnologicamente e uma equipe multidisciplinar ao paciente com IRA ou IRC, distúrbios que só tendem a aumentar, e que demandam de uma incidência elevada de internações em Unidades de Terapia Intensiva, principalmente os que têm outras comorbidades associadas. Entre tais profissionais, encontra-se o profissional de enfermagem, que lida diretamente na assistência a estes pacientes críticos de forma ampla. Conclusão: Foi possível encontrar na literatura vários discursos sobre os distúrbios renais bem como as terapias dialíticas para cada caso, e com isso fazer uma discussão sobre a assistência de enfermagem, que pode influenciar positivamente na prevenção destes danos, bem como atuar no adequado tratamento à pacientes críticos em UTI, impedindo outros desfechos negativos.

Palavras-chave: Insuficiência Renal, Hemodiálise, Diálise Peritoneal, Cuidados Críticos, Assistência de Enfermagem.

1. INTRODUÇÃO

Os distúrbios renais, geralmente são classificados em Insuficiência Renal Aguda (IRA) e Insuficiência Renal Crônica (IRC). Na fase aguda temos a IRA que se dá por alguma lesão no rim, onde neste caso, o tratamento consiste na substituição da função renal temporariamente para diminuir as prováveis complicações e reduzir os riscos de aumentar a lesão, sendo que a IRA é uma das complicações mais graves que ocorrem em pacientes de Unidade de Terapia Intensiva UTI (SILVA; THOMÉ, 2009). Ela pode se instalar em poucas horas ou em poucos dias, podendo prosseguir para IRC ou para melhora, a maioria dos casos de IRA é reversível, pois o rim é relativamente inerente, devido à sua capacidade de recuperar-se da perda quase total da função (PEREIRA et. al., 2014).

Enquanto a IRC vem a ser uma síndrome clínica causada pela perda progressiva e irreversível das funções renais, sendo uma doença com vários efeitos na vida do pacientes e de difícil tratamento, com sérias implicações físicas, psicológicas, socioeconômicas, mudanças no estilo de vida, diminuição da energia física e alteração da aparência pessoal e muitas vezes para família. O estresse das doenças renais afeta a autoestima, as relações familiares, além de quase todos os aspectos da vida diária do indivíduo acometido por esta complicação crônica. À medida que a função renal diminui e o paciente evolui para a IRC, ele apresenta em geral, falência de múltiplos órgãos. (MASCARENHAS et al., 2011).

Quando um paciente possui IRA ou IRC, deve ser estabelecido um tratamento conservador ou dialítico o mais precoce possível, caso isso não ocorra às complicações advindas da doença podem causar a morte. Entre os tratamentos ofertados, o mais utilizado é a hemodiálise, que deve ser realizada pelos portadores de IRC por toda a vida ou até se submeterem a um transplante renal, se for possível. Temos também a diálise peritoneal que consiste em um processo artificial no qual se retira por filtração, todas as substâncias indesejáveis presentes no organismo (MADEIRO et al., 2010).

A equipe de enfermagem envolvida tanto nas sessões de hemodiálise, como no tratamento, de forma geral, em pacientes com doença renal crônica seja na UTI ou no ambulatório, deve identificar as necessidades individuais, proporcionando meios de atendimento que visem uma melhor adequação do tratamento, ensinando o autocuidado e garantindo assim uma melhor qualidade de vida, com competência, habilidade e intervindo nas diferentes complicações decorrentes do tratamento (FERREIRA, 2014).

O presente estudo tem como objetivo apresentar os tipos de distúrbios renais e as terapias dialíticas bem como discutir a sistematização da assistência de enfermagem ao paciente crítico.

2. MÉTODOS

Com o intuito de alcançar o objetivo proposto realizou-se uma revisão bibliográfica. A coleta de dados foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde, por meio das bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Bases de Dados em Enfermagem (BDENF) e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE). A busca ocorreu no período de dezembro de 2016 a janeiro de 2017. Utilizaram-se os Descritores em Ciência e Saúde (DeCS): Insuficiência Renal, Hemodiálise, Diálise Peritoneal, Assistência de Enfermagem.

Como critérios de inclusão validaram as publicações de artigos disponíveis na íntegra e nos idiomas espanhol, inglês e português. Foram excluídos aqueles artigos que se apresentavam indisponíveis para leitura, incompletos, *downloads* mediante pagamento e que não mantiveram relação com a temática em questão. No intuito de simplificar e permitir a visualização de todo o processo de construção desta revisão bibliográfica, o quadro 1 apresenta os passos metodológicos desempenhados.

Quadro 1. Pesquisa por descritores isolados e cruzamento dos descritores.

DESCRIPTOR	CRUZAMENTO SIMULTÂNEO
DESC1: INSUFICIÊNCIA RENAL (42.224)	DESC 1 + DESC 2 + DESC 3 + DESC 4 = 120 publicações Seleção = 15 artigos
DESC 2: HEMODIÁLISE (21.024)	
DESC 3: DIÁLISE PERITONEAL (5.520)	
DESC 4: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (51.723)	

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Após seleção dos descritores no DeCS, foi realizado o cruzamento em pares de forma que todos os descritores pudessem ser cruzados, só então foi feito o cruzamento simultâneo de todos os descritores utilizando o operador booleano “AND”, dessa forma se obteve a amostra de 120 publicações, quando aplicado os critérios de exclusão e inclusão, a amostra reduziu-se a 37 artigos, desses, 14 não se relacionavam com a temática central, 02 eram repetidos e 03 só estavam disponíveis mediante pagamento, sendo assim a amostra final foi de 15 artigos inclusos no estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os distúrbios renais podem ser classificados em IRA e IRC e requer terapias para substituição da sua função (BRASIL, 2007).

4. INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA E CRÔNICA E TERAPIAS DE DIÁLISE

A IRA é uma doença ou síndrome clínica reversível, que provoca a perda súbita da função renal dentro de horas ou dias, resultando num acúmulo de uréia e creatinina no sangue, o que leva a distúrbios hidroeletrólíticos e acidobásicos, distúrbios no metabolismo do cálcio e fosfato, da pressão arterial, hormonais e de vitamina D, esta condição clínica que leva à oligúria ou anúria, mas a característica principal é a diminuição da Taxa de Filtração Glomerular. As causas são divididas em categorias, podendo ser de origem Pré-renal (diminuição do volume intravascular, insuficiência cardiovascular, Trombose ou estenose da artéria renal, medicamentos, diminuição da perfusão renal), Intrarrenal (Glomerulonefrite aguda, doença vascular, doença intersticial aguda, obstrução ou necrose tubular aguda) e Pósrenais causadas por obstrução ureteral e problemas vesicais (MORTON; FONTAINE, 2013). Em pacientes admitidos na UTI com Lesão Renal Aguda, 64,7% usavam medicamentos nefrotóxicos, estando a oligúria e os níveis baixos de albumina sérica, relacionados ao maior índice de mortes hospitalares (RUIZ, 2015).

A IRA pré-renal ocorre devido qualquer complicação fisiológica que resulte numa perfusão renal diminuída, como hipovolemia, insuficiência cardiovascular ou sepse e acomete boa parte de pacientes hospitalizados. Porém a IRA intra-renal inclui as complicações que causam danos glomerulares, chegando a acometer a maioria dos pacientes hospitalizados. A IRA pós-renal ocorre em menor proporção, apenas uma minoria é acometida, e é causada por qualquer condição que impeça o trajeto de urina ao ducto coletor do rim ao orifício uretral (MORTON; FONTAINE, 2013).

A necrose tubular aguda isquêmica é uma causa frequente de IRA em pacientes de UTI, estando envolvida com diversos fatores, desde sepse, perfusão insuficiente, até uso de medicamentos tóxicos aos rins. A isquemia acontece através de um processo, que inicialmente dura de horas a dias e causa dano às células epiteliais e endoteliais dos rins, levando a um processo inflamatório, o que resulta em disseminação da lesão alterando a taxa de filtração glomerular, durando de 1 a 2 semanas; consequentemente podem surgir distúrbios urêmicos, porém depois acontece a recuperação, as células epiteliais restauram-se e observa-se melhora da taxa de filtração glomerular (TOLWANI, 2012).

A IRA tende a progredir para DRC e mesmo quando pacientes com a lesão aguda são tratados com diálise, após a recuperação, ainda há risco de evoluir pra Doença Renal Crônica, e os fatores que envolvem esta condição são idade avançada, níveis baixos de albumina sérica, diabetes e gravidade da Lesão Renal Aguda, além de que o aumento do envelhecimento da população está relacionado com aumento da incidência de Lesão Renal Aguda com tendência a aumentar em décadas posteriores (CHAWLA; et al, 2011).

Pacientes acometidos de IRA, internados em Unidade de Terapia Intensiva-UTI, em países subdesenvolvidos/emergentes, ficam internados por mais tempo, tendo menos chance de recuperar a função renal, além de ficarem dependentes da diálise após alta hospitalar. Fatores como, ter idade avançada, morar em um país emergente e estar em uso de ventilação mecânica, o acometimento pelo HIV é outro fator importante de mortalidade que demanda maior tempo de internação e, portanto pacientes acometidos por HIV e IRA simultaneamente, que são internados em UTI, geralmente não tem bom prognóstico. Assim, estes fatores aumentam o risco para mortalidade e menor chance de recuperação da função renal, seja por um prognóstico limitado ou por dificuldade de acesso ao tratamento ideal (BOUCHARD et al, 2015; RANDALL et al, 2014).

A IRC é outra síndrome, caracterizada por perda progressiva da atividade renal, comumente irreversível, provocada por patologias que impedem a função dos rins, causando incapacidade de eliminar eletrólitos e conservar o equilíbrio hidroeletrólítico; e quando a função destes órgãos reduz em 12% da normal, é necessário tratamento dialítico ou transplante renal a fim de prevenir complicações maiores, evitar piora da função renal e impedir a progressão para doença renal em estágio terminal (MORTON; FONTAINE, 2013;

MACHADO; PINHATI, 2014). Algumas causas da IRC são mostradas na tabela1

Tabela 1: causas da insuficiência renal crônica

Hipertensão prolongada e grave
Diabetes Mellitus
Glomerulopatias
Nefrite Intersticial
Doença Renal hereditária, doença policística
Uropatia Obstrutiva
Transtorno desenvolvimental ou congênito

Fonte: Adaptado de Nettina, S.M : Prática de enfermagem (2012).

Pacientes com uma das condições, seja IRA ou IRC, necessitam de terapêutica dialítica, que inclui: a diálise peritoneal, diálise peritoneal intermitente, diálise peritoneal ambulatorial contínua, diálise peritoneal contínua assistida com cicladora e Hemodiálise; tendo em vista que nenhum emprego de fármacos é eficaz para os tais distúrbios (JERONIMO et al, 2011; TOLWANI, 2012).

A Diálise peritoneal é um processo de filtração do sangue, através da membrana peritoneal do abdome, constituída de muitos vasos sanguíneos, de onde retiram-se substâncias e água em demasia, que não são úteis para o corpo e deveriam ser eliminadas na urina. Há vários tipos de diálise peritoneal: Intermitente, Ambulatorial Contínua e Contínua Assistida com Cicladora/Automatizada (JERONIMO et al, 2011). Esta última versão pode ser usada em UTI, por possuir monitores próprios e um sistema automático de funcionamento, eliminando a necessidade de troca constante, pois ela mesma cicla a infusão e a remoção do líquido infundido e assim sucessivamente, sendo técnica usada em pacientes com acesso peritoneal permanente (MORTON; FONTAINE, 2013).

A hemodiálise é um processo de filtração do sangue que ocorre fora do corpo, por uma máquina de hemodiálise, que possui solução de diálise e filtro (dialisador), é comumente feita três vezes por semana, com sessões que duram entre 2-6 horas (JERONIMO et al, 2011), acontece por meio dos processos de difusão, convecção e ultrafiltração. A ultrafiltração é a passagem da água através da membrana do filtro para a solução de diálise através de pressão hidrostática entre o sangue e a solução; a difusão é passagem dos solutos de um local de maior concentração para a de menor concentração através da membrana semipermeável; enquanto que a convecção ocorre quando o gradiente de pressão transmembrana arrasta a água do plasma e solutos através da membrana (TOLWANI, 2012).

Muitas vezes, tratamento de diálise intermitente é realizado na UTI e problemas cardiovasculares são motivos frequentes de internação em pacientes renais crônicos, estes incluem: IAM, angina intratável, arritmia cardíaca, edema pulmonar (KLERDORF, 2013), pacientes idosos com IRA concomitantemente com outras comorbidades são comumente admitidos na UTI (RUIZ; et al, 2015).

Doença renal terminal é cada vez mais frequente e isto aumenta o número de internações em UTI, tornando-se as terapias dialíticas quase sempre necessárias nestes casos, sendo a decisão de utilizar hemofiltração venovenosa ou hemodiafiltração venovenosa contínua durante hemodiálise, determinadas

pelas instalações presentes na UTI. Enquanto que a hemodiálise é bem utilizada, a diálise peritoneal não tem indicação devido aderências, hérnias, risco de infecção, e até mesmo ausência de enfermeiro de diálise peritoneal que impossibilita um tratamento seguro. Ainda assim, não existem estudos que confirmem o modo ótimo de terapia de substituição renal em pacientes em diálise crônica que estão internados em UTI (ARULKUMARAN; et al, 2012).

5. COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À IRA, IRC E TERAPIAS DIALÍTICAS

As complicações da insuficiência renal aguda estão relacionadas com o tratamento dialítico durante as sessões de hemodiálise, sendo a idade do paciente e o sexo masculino como fatores diretamente ligados a estas complicações. Em relação às complicações intradialíticas observadas, podem ocorrer condições como hipotermia, coagulação do filtro, arritmias cardíacas, pressão venosa alta do sistema e hiperpotassemia, que é um agravamento que comporta maior risco de vida entre as alterações hidroeletrólíticas que ocorrem em pacientes com IRA (SILVA; THOMÉ, 2009).

Consequentemente as principais complicações da IRC incluem a hiperpotassemia, devido à excreção diminuída, acidose metabólica, pericardite, derrame pericárdico, hipertensão por causa da retenção de sódio e água (que é resolvida com a ultrafiltração, com finalidade de reduzir a hipervolemia do paciente), também podem ocorrer anemia, devido à produção de eritropoietina diminuída e doença óssea e calcificações metastáticas e vasculares, devido à retenção do fósforo, metabolismo anormal de vitamina D (ARULKUMARAN, 2011; SMELTZER; BARE, 2014),

Para realizar a terapia de hemodiálise é necessário um acesso vascular imediato conseguido ao inserir um cateter de dupla luz ou de múltiplas luzes na veia subclávia, jugular interna ou femoral, e são esses cateteres utilizados, que apresentam o maior risco de desenvolvimento de infecção primária da corrente sanguínea (PEREIRA et al., 2014). A fístula arteriovenosa (FAV) constitui a melhor opção de acesso vascular para o paciente submetido à hemodiálise crônica, m envolvem complicações como baixo fluxo, trombose, isquemia da mão, infecções e aneurisma ou pseudoaneurisma (SMELTZER; BARE, 2014). No início da diálise os distúrbios lipídicos colaboram para complicações cardiovasculares, sendo este um agravamento em potencial que pode causar a morte. Outras complicações incluem a anemia causada pela perda de sangue durante a hemodiálise, vômitos por causa de deslocamento rápido de líquidos, distúrbios do sono, falta de ar a medida que o líquido se acumula ao longo do tratamento, taquicardia, câibras musculares dolorosas, a hipotensão arterial é, sem dúvida, a principal complicação do tratamento hemodialítico, ocorrendo em até 20% das sessões (PEREIRA et al., 2014).

As complicações da diálise peritoneal (DP) na maioria das vezes são simples, entretanto se não for realizado o cuidado necessário podem-se tornar graves. A peritonite é uma das circunstâncias mais comuns, porém grave, caracterizada por dor abdominal difusa e hipersensibilidade de rebote mais tardiamente, a hipotensão e outros sinais de choque podem estar atrelados a uma infecção avançada, sendo necessário tratamento com antibióticos. Outra complicação é o extravasamento no local de inserção do cateter quando introduzido no peritônio. Complicações em longo prazo da DP incluem a hipertrigliceridemia, sugerindo que a terapia pode acelerar a aterogênese; hérnias abdominais devido à pressão intra-abdominal elevada, podendo ocorrer dor lombar, anorexia, alteração dos padrões de sexualidade e disfunção sexual (MORTON; FONTAINE, 2013).

6. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES SUBMETIDOS À TERAPIA DIALÍTICA

O profissional de enfermagem exerce papel importante nas terapias dialíticas, tanto antes do procedimento, durante e após estas terapias. Tem contribuição primordial para identificar os sinais clínicos da IRA, através da anamnese exame físico, onde pode identificar inúmeras causas que podem levar o paciente a desenvolvê-la, onde pode intervir para se restaurar o estado fisiológico normal do indivíduo, tendo em vista que a identificação precoce das causas pode melhorar o prognóstico do paciente com distúrbios renais. Assim, boas práticas envolvem a sistematização da assistência de enfermagem ao paciente crítico que é submetido a terapias dialíticas, sendo essencial para desenvolvimento de um cuidado de qualidade, pois auxilia no processo de organização da assistência (MORTON; FONTAINE, 2013; OLIVEIRA et al, 2008).

Quando o paciente necessita da terapia, antes de iniciar o procedimento, por exemplo, de diálise peritoneal, é necessário explicar todas as práticas que permeará o cuidado ao paciente, além de preparar os materiais a serem utilizados, inclusive aquecer o líquido de diálise à temperatura corporal através de

dispositivo específico para tal, assistir o paciente ao longo da terapia, verificando seus sinais vitais, inclusive o peso. Após o procedimento deve realizar um balanço desta diálise, mantendo os registros exatos de ingesta e débito e pesos totais com a mesma balança para avaliar as perdas e ganhos de volume, além destas descrições importantes é preciso monitorar o paciente através de seus sinais vitais, que podem ser valiosos para a enfermeira avaliar o estado volumétrico do paciente. Além destas responsabilidades, age na prevenção de complicações, a exemplo das infecções, tanto do peritônio quanto do cateter, através manuseio dos dispositivos com técnica asséptica (MORTON; FONTAINE, 2013).

O balanço Hídrico de forma geral é muito importante no paciente crítico, pois quando identificado positivo, pode trazer várias repercussões clínicas desfavoráveis, o que se deve muitas vezes a infusão de líquidos elevada, prejudicando os rins, que sofrem uma pressão intersticial elevada e leva a uma perfusão renal diminuída, consequentemente à Taxa de Filtração Glomerular diminuída, proporcionando a lesão renal (OLINDA et al, 2014). Nos pacientes críticos é de grande valia, fazendo parte da rotina do serviço, onde tais dados devem ser anotados adequadamente pela equipe de enfermagem, seu fechamento realizado pelo enfermeiro, facilitando para a equipe médica a adequação da volemia do paciente, pois uma taxa maior de mortalidade foi observada em pacientes com sobrecarga hídrica-acúmulo de líquidos >10% do peso na admissão (JERONIMO et al, 2011; VAARA et al., 2012).

O balanço da diálise peritoneal deve ser minuciosamente obedecido. Devem-se etiquetar todas as bolsas de diálise, verificar o peso de cada uma, somar o peso de todas e anotar na folha de balanço como peso inicial, seguir com a infusão obedecendo ao tempo prescrito, anotando o horário de início na folha de balanço, após o tempo de permanência prescrito do líquido na cavidade abdominal, iniciar a drenagem anotando o tempo de saída na folha de balanço, ao final da drenagem, pesar a bolsa coletora na balança e seguir com anotação (JERONIMO et al, 2011).

Mediante as várias terapias de diálise peritoneal existentes, infere-se aqui a necessidade das informações claras ao paciente pelo enfermeiro sobre tais terapias, sendo importante que tenha conhecimento delas para poder orientar o paciente adequadamente, tendo em vista que podem ser realizados no domicílio, desde que haja uma orientação minuciosa, principalmente para se reduzirem os índices de complicação.

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é o modelo metodológico ideal para o enfermeiro aplicar seus conhecimentos técnico-científicos na prática assistencial, favorecendo o cuidado e a organização das condições necessárias para que ele seja realizado (MATTOS, 2012).

7. CONCLUSÃO

Os Distúrbios renais são causas comuns de internamento em UTI, devido complicações decorrentes tanto da IRA e IRC. Foi possível encontrar na literatura estudos sobre as terapias dialíticas bem como as complicações na vida do paciente, e a partir destes achados foi possível observar a importância de uma assistência de enfermagem eficaz, que proteja os pacientes de danos que podem ser evitados, desde a contribuição na investigação e diagnóstico precoce de algumas patologias que podem influenciar para o aparecimento destes distúrbios, até mesmo na orientação adequada para interferir nos desfechos negativos da doença renal crônica e assim melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

REFERÊNCIAS

- [1] ARULKUMARAN, N; MONTERO, R.M; SINGER, M. Management of the dialysis patient in general intensive care. *British Journal of Anaesthesia* 108 (2): 183–92, 2012. Disponível em <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22218752>>.
- [2] JERONIMO, R. A. S; et al. Técnicas de UTI. 2 ed. São Paulo, Rideel, 2011.
- [3] BOUCHARD, J; et al. A Prospective International Multicenter Study of AKI in the Intensive Care Unit. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, Vol 10 August, 2015. Disponível em <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26195505>>.
- [4] BRASIL. Diretrizes da Associação Médica Brasileira Sociedade Brasileira de Nefrologia. de Insuficiência Renal Aguda da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Insuficiência Renal Aguda. 2007. Disponível em <https://sbn.org.br/app/uploads/Diretrizes_Insuficiencia_Renal_Aguda.pdf>.
- [5] CHAWLA, L.S; et al. The severity of acute kidney injury predicts progression to chronic kidney disease. *International Society of Nephrology*, 2011. Disponível em <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21430640>>.

- [6] FERREIRA, A. F. A. O papel do enfermeiro na assistência de enfermagem ao paciente em tratamento hemodialítico (Revisão de Literatura). Monografia (Pós Graduação em Nefrologia) – Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa INESP e Centro de Capacitação Educacional, Recife, 2014.
- [7] KLERDORF, H.P. Der Dialysepatient auf der Intensivstation. *Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin* 4, 2013. Disponível em <<http://link.springer.com/article/10.1007/s00063-012-0194-y>>.
- [8] MACHADO, G. R. G.; PINHATI, F. R. Tratamento de diálise em pacientes com insuficiência renal crônica. *Cadernos UniFOA, Volta Redonda*, n. 26, p. 137-148, dez. 2014.
- [9] MADEIRO, A. C.; MACHADO, P. D. L. C; et al. Adesão de portadores de insuficiência renal crônica aotratamento de hemodiálise. *Acta Paul Enferm* 2010;23(4):546-51. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ape/v23n4/16.pdf>> Acesso em: 24.jan.2017
- [10] MASCARENHAS, N. B; PEREIRA, A. et al. Sistematização da Assistência de Enfermagem ao portador de Diabetes Mellitus e Insuficiência Renal Crônica. *RevBras Enferm, Brasília* 2011 jan-fev; 64(1): 203-8. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/reben/v64n1/v64n1a31.pdf>> Acesso em: 24.jan.2017
- [11] OLINDA, N. A. M; et al. Balanço hídrico, injúria renal aguda e mortalidade de pacientes em unidade de terapia intensiva. *J Bras Nefrol* ;36(3):379-388, 2014. Disponível em <www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-28002014000300379>.
- [12] OLIVEIRA, S. M. de; et al. Elaboração de um instrumento da assistência de enfermagem na unidade de hemodiálise. *Acta paul. enferm;* 21(spe): 169-173, 2008. Disponível em <<http://pesquisa.bvsalud.org/ghl/resource/en/lil-485263>>.
- [13] PEREIRA, E. R; RIBEIRO, I. M. L; et al. Análise das principais complicações durante a terapia hemodialítica em pacientes com insuficiência renal crônica. *R. Enferm. Cent. O.*
- [14] Min. 2014 maio/ago; 4(2):1123-1134. Disponível em: <<http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/article/view/603>> Acesso em : 24.jan.2017.
- [15] RANDALL, D.W; et al. Acute kidney injury among HIV-infected patients admitted to the intensive care unit. *International Journal of STD & AIDS* 0(0) 1–7, 2014. Disponível em<<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25411349>>.
- [16] RUIZ, C; et al. Long-Term Mortality among Hospitalized Non-ICU Patients with Acute Kidney Injury Referred to Nephrology. *NephronClinicalPractice*, 2015. Disponível em<www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26277844>.
- [17] SILVA, G. L. D. F. da; THOMÉ, E. G. da R. Complicações do procedimento hemodialítico em pacientes com insuficiência renal aguda: intervenções de enfermagem. *Rev Gaúcha Enfem., Porto Alegre (RS)* 2009 mar; 30 (1): 33-9. Disponível em <http://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem/article/view/3844>> Acesso em: 24.jan.2017.
- [18] SMELTZER, S. M. N.; BARE, B. G. *Brunner&Suddarth: Tratado de Enfermagem MédicoCirúrgica*, 12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
- [19] TOLWANI, A. M.D. Continuous Renal-Replacement Therapy for Acute Kidney Injury. *The new England journal of medicine*, 367;26, 2012. Disponível em: <www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMct1206045>.
- [20] MORTON, P. G; FONTAINE, D. K. Cuidados Críticos de enfermagem: uma abordagem holística. Guanabara Koogan, 9 ed. Rio de Janeiro, 2013.
- [21] NETTINA, S. M. *Prática de enfermagem*. Guanabara Koogan, 9 ed. Rio de Janeiro, 2012.
- [22] VAARA, S. T; et al. Fluid overload is associated with an increased risk for 90-day mortality in critically ill patients with renal replacement therapy: data from the prospective
- [23] FINNAKI. study. *Critical Care* 16:R197, 2012. Disponível em <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3682299/pdf/cc11682.pdf>>.

Capítulo 2

Contribuições do enfermeiro da Estratégia Saúde da Família-ESF à saúde do adolescente

Ticiano Castro Luz

Rousslanny Kelly Cipriano de Oliveira

Iolanda Gonçalves de Alencar Figueiredo

Resumo: A adolescência é uma fase marcante na vida do ser humano, pois é a transição da infância para o início da vida adulta. A assistência em saúde nessa fase é fundamental para que os jovens vivam essa etapa de forma saudável, com informações seguras e menos vulneráveis ao risco de aquisição de problemas sociais e de saúde pública. Neste sentido, objetivou-se descrever as ações realizadas pelos Enfermeiros da Estratégia Saúde da Família voltadas à população adolescente. Trata-se de uma pesquisa descritivo-exploratória de natureza qualitativa. O estudo foi realizado no período de março a dezembro de 2017. Compôs sujeitos da pesquisa 15 enfermeiras da ESF da zona urbana de Picos-PI. A coleta aconteceu nos meses de setembro a novembro de 2017 e, somente iniciada após esclarecimento do participante sobre objetivo do estudo e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo foi submetido ao comitê de ética e pesquisa da UFPI com número de parecer 2.344.629 e autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde, de Picos-PI. Para a análise dos dados utilizou-se do referencial metodológico de Minayo. Da análise subjetiva sugeriram as categorias agrupadas em: Ações de enfermagem, promotoras de saúde do adolescente, Dificuldades e Limitações da enfermagem da ESF na assistência ao adolescente e Demandas Trabalhadas pela ESF na saúde do adolescente. Quanto ao perfil das participantes, prevaleceu o sexo feminino. De acordo com os achados, percebeu-se que são realizadas atividades pelos profissionais da ESF para os adolescentes, porém estas são, em sua grande maioria, pontuais e limitadas ao ambiente escolar ou delegadas ao Programa de Saúde na Escola. A intersetorialidade das ações se mostrou ainda muito tímida. Prevaleceu ações voltadas à prevenção de gravidez indesejada e do uso de álcool e outras drogas. No entanto, num rol de metodologias limitadas e repetitivas – palestra, apesar da construção, roda de conversas. A primeira foi apontada como principal fator dificultador para a implementação de atividades específicas para os adolescentes. Para tanto, o estudo deixou claro algumas lacunas ainda existentes, no que concerne às ações voltadas ao adolescente na atual prática assistencial da ESF e revela um novo desafio, de modo que o enfermeiro e sua equipe devam estar preparados para atuar junto aos adolescentes. Frente ao exposto, torna-se necessário esforço conjunto no sentido de minimizar essa problemática aqui elencada; participação dos gestores, maximizando oferta de insumos necessários para a realização do trabalho, estruturação física de serviços e principalmente humanos, na ótica da interdisciplinaridade e da intersetorialidade às ações primárias em saúde. A pesquisa teve como fator limitante a resistência dos profissionais enfermeiros e o envolvimento destes com a organização da UBS para receber a avaliação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB).

Palavras Chave: Enfermeiro, adolescente, estratégia de saúde da família.

1. INTRODUÇÃO

A adolescência é uma fase marcante na vida do ser humano, pois é a transição da infância para o início da vida adulta. Nesse período, o adolescente se depara com uma gama de dúvidas, anseios e medos. A assistência em saúde nessa fase é fundamental para que os jovens vivam essa etapa de forma saudável, com informações seguras e menos vulneráveis ao risco de aquisição de problemas sociais e de saúde pública.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1986), o período etário da adolescência e juventude compreende respectivamente aos 10 e 19 anos, e o período entre 15 e 24 anos de idade. O Ministério da Saúde compartilha desta referência. Destaca-se por ser uma fase de transformações físicas, psíquicas e sociais. Sendo, portanto, período em o que adolescente constrói sua personalidade, o que determinará sua postura na fase adulta (ALENCAR, 2009).

A população brasileira ultrapassa 190 milhões de pessoas, segundo o Censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Deste grupo, 34.236.060 encontram-se entre 15 e 24 anos. Assim sendo, os adolescentes e jovens representam mais de 20% de toda a população brasileira (IBGE, 2010). Esses dados mostram a relevância demográfica deste grupo e revelam a necessidade de se discutir as políticas públicas que atualmente atendem às diferentes demandas dessa classe, focalizando os processos de vulnerabilização a que esta população pode estar exposta, sobretudo na área da saúde (SANTOS e RESSEL, 2013).

Pensando e concebendo a adolescência como uma etapa das mais cruciais no processo de desenvolvimento humano e de determinação do indivíduo adulto, o Ministério da Saúde criou pela Portaria de nº 980/GM de 21/12/1989 o Programa Saúde do Adolescente (PROSAD), tendo como princípio básico a atenção integral com abordagem multiprofissional ao adolescente, por meio de um sistema hierarquizado que pudesse garantir a referência e contrarreferência nos diferentes níveis de complexidade da assistência (BRASIL, 2007).

Ainda com serviço de apoio à saúde do adolescente, foi criado através do Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, o Programa de saúde na escola/PSE, resultante do trabalho integrado entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, na perspectiva de ampliar as ações específicas de saúde aos alunos da rede pública de ensino: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, Educação de Jovens e Adultos. Esse programa preconiza que crianças, adolescentes e jovens escolares tenham acesso, pelo menos uma vez por ano, preferencialmente nos inícios dos períodos letivos, à avaliação clínica e psicossocial (BRASIL, 2008).

Para nortear ações integradas às outras políticas sanitárias e programas já existentes no SUS, frente aos desafios que a presente situação de saúde das pessoas jovens evidencia, o Ministério da Saúde propõe as Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde, baseadas na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens, sensibilizando gestores para uma visão holística do ser humano e para uma abordagem sistêmica das necessidades dessa população (BRASIL, 2010).

O Ministério da saúde (2013) determina que seja competência da Equipe de Saúde da Família desenvolver ações de atenção primária e organizar a rede de saúde do seu território, bem como promover articulações intra e intersetoriais, estabelecendo parcerias e corresponsabilidades para a elaboração, condução e avaliação de ações destinadas à prevenção de agravos, promoção e assistência à saúde de adolescentes e jovens.

Diante da importância da atenção à saúde do adolescente, é preciso que sejam realizadas ações para atender às necessidades desta clientela, inserida no contexto social, seja por meio da visita domiciliar, do atendimento individual, das atividades em grupos específicos para adolescentes, jovens e familiares, das ações educativas e de promoção à saúde, da participação juvenil e das atividades intersetoriais (BRASIL, 2007).

No tocante aos adolescentes, considerada usualmente como uma faixa etária pouco associada a problemas de saúde, é possível observar uma lacuna do processo de atenção da Estratégia Saúde da Família (ESF) voltada para este público específico. Não parece haver uma preocupação com a implementação de ações sistematizadas junto a tal grupo, e as ações usualmente realizadas se vinculam ao atendimento à livre demanda, assistindo-os apenas na queixa, e sem um olhar diferenciado para as peculiaridades desta faixa etária (HIGARASHI *et al.*, 2011)

Higarashi *et al.* (2011) concorda ainda que ações mais efetivas neste campo de atuação da ESF, e a busca pelo envolvimento cada vez maior desta parcela da comunidade nas ações básicas de saúde poderiam contribuir para a prevenção de inúmeros danos futuros, tanto para os adolescente como para a comunidade na qual estes estão inseridos. Nesse contexto, o enfermeiro e sua equipe, em função de sua capacidade de inserção nas comunidades atendidas, constituem-se em importante instrumento para a atuação direta junto ao adolescente.

Nessa perspectiva, faz-se necessária a realização de estudos que enfoquem essa problemática, pois é essencial que as ações em saúde realizadas pelo enfermeiro (a) da ESF sejam eficazes e acolhedoras, devendo o enfermeiro exercer a tarefa de educar e orientar a população adolescente sob seus cuidados. Assim, esse estudo adota como pergunta-problema o seguinte questionamento: Quais ações são desenvolvidas pelo enfermeiro da ESF à população adolescente, em um município do interior do Piauí?

Acredita-se que enfermeiros da ESF realizem ações em saúde voltadas para promoção da saúde do adolescente, incluindo-se a prevenção de doenças e agravos, sexualidade, saúde reprodutiva, hábitos saudáveis de vida e reabilitação da saúde.

Diante disso, torna-se pertinente a realização deste estudo, pois o tema saúde do adolescente vem despertando maior interesse dos profissionais dessa área, por se tratar de um grupo de indivíduos que se encontram em fase de mudanças tanto corporais como psicológicas e necessitam de uma maior atenção em saúde para que, assim, se possa compreender as necessidades e especificidades dessa faixa etária.

Objetiva-se descrever ações realizadas pelos Enfermeiros da Estratégia Saúde da Família voltadas à população adolescente. Além de traçar o perfil socioeconômico dos participantes da pesquisa; Conhecer a assistência de enfermagem prestada aos adolescentes; Reconhecer metodologias usadas na promoção da saúde dos adolescentes; Identificar as dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros na promoção da saúde daqueles.

Este estudo será de grande relevância para a enfermagem, visto que, a partir da análise das ações que atualmente são realizadas pelos enfermeiros da estratégia saúde da família, seja possível detectar prováveis deficiências nessa atenção e, espera-se que os resultados do estudo possam subsidiar novas estratégias e métodos a serem utilizados para promover a saúde desses jovens.

2. PERCURSO METODOLÓGICO

A fim de que os objetivos propostos fossem atingidos, foi necessário realizar pesquisa de campo, na lógica do aprofundamento do conhecimento acerca das questões que envolvem a assistência ao adolescente, no âmbito da atenção primária, a partir de ações da estratégia de saúde da família.

2.1 TIPO E NATUREZA DO ESTUDO

Trata-se de uma pesquisa do tipo descritivo-exploratória, de natureza qualitativa. As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. Já a pesquisa exploratória tem por objetivo familiarizar-se com um assunto ainda pouco conhecido, pouco explorado e a partir dela será possível conhecer mais sobre o assunto e construir hipóteses (GIL, 2010).

Este estudo tem uma abordagem qualitativa, que segundo Minayo (2010), é uma pesquisa capaz de agregar a questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais.

2.2 CENÁRIO E PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO

O presente estudo foi realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), localizadas na zona urbana do município de Picos-PI, no período de março a dezembro de 2017, com a participação de 15 enfermeiras. O referido município situa-se no centro sul do Piauí e conta atualmente com 36 UBS, onde atuam equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Destas, 25 estão localizadas na zona urbana e 11 na zona rural. Foram entrevistados 15 Enfermeiros da ESF da zona urbana do município supracitado, uma vez que o estudo atingiu a saturação teórica do conteúdo das entrevistas neste limite.

A Estratégia Saúde da Família (ESF) representa uma alternativa significativa e estruturante para a política de saúde brasileira, com vistas a atender ao disposto na Constituição Brasileira de 1988 sobre saúde, e aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), além de atender as diretrizes nacional de atenção à saúde do adolescente e Programa Saúde na Escola (PSE) (BRASIL; MENDES, 2012).

2.3 SUJEITOS DA PESQUISA

O estudo foi composto por 15 Enfermeiras que atuam na ESF da zona urbana do município de Picos-PI. Optou-se pela escolha do profissional enfermeiro pelo fato do mesmo fazer parte da equipe de profissionais que compõem a ESF e por este trabalhar em uma área adscrita junto à comunidade podendo, dessa forma, deter maior conhecimento da situação de saúde da população estudada.

Como critério de inclusão foi considerado o estar em pleno exercício da profissão, trabalhar na zona urbana e concordar de forma voluntária em participar do estudo. Foram excluídos todos os profissionais enfermeiros da zona rural, bem como todos aqueles que se encontravam em gozo de férias, licença maternidade ou afastados do serviço durante o período da coleta.

2.4 COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi realizada no período de setembro a novembro de 2017, guiada por um roteiro de entrevista semiestruturada contendo 09 questões, capazes de subsidiar análises dos dados e responder aos objetivos propostos, inicialmente. O instrumento foi enumerado de acordo com a ordem cronológica de ocorrência das entrevistas e abrangeram questões referentes a dados socioeconômicos e ações desenvolvidas pelo enfermeiro, direcionadas à população adolescente.

A entrevista semiestruturada compreende uma técnica de interação social utilizada com o objetivo de obtenção de dados, na qual combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender a indagação formulada, garantindo a manutenção do seu foco pelo entrevistador (MINAYO, 2012).

A pesquisa foi conduzida pela pesquisadora na sala da enfermeira, na própria UBS em que atua, sendo esta realizada de forma individual, com duração média de, no máximo, 30 minutos. Foi utilizado, com prévia autorização da entrevistada, um aparelho gravador a fim de evitar perdas de dados.

A entrevista foi desenvolvida com base em questionário composto por duas partes: a primeira consistiu em coletar informações acerca do perfil socioeconômico e a segunda, a partir da gravação das falas, relativa às questões subjetivas do estudo.

Foi utilizado para delimitação do quantitativo de entrevistas, o critério de 'saturação', segundo o qual se entende o conhecimento formado pelo pesquisador, no campo, de que conseguiu compreender a lógica interna do grupo ou da coletividade em estudo (MINAYO, 2010). Assim, o estudo atingiu a saturação teórica do conteúdo das entrevistas no limite de 15 participantes.

Os relatos foram posteriormente transcritos para análise, sendo que, as participantes entrevistadas foram identificadas por letras (E) e números (1 a 15), seguidos em ordem cronológica da entrevista, preservando dessa forma, a identidade das enfermeiras participantes, bem como o sigilo da pesquisa. Para efeito legal, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi colhido previamente, ao iniciar as entrevistas.

2.5 ANÁLISE DOS DADOS

Esta foi fundamentada na análise temática de Minayo (2010), que a define como sendo uma descoberta dos núcleos de sentidos, que constituem uma comunicação acerca da frequência ou da presença de algum significado para o objeto que está sendo analisado.

Assim como em Gomes (2002), a análise temática deste, compreendeu três etapas: pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Operacionalmente, a análise temática se desdobra em três etapas: pré-análise, que compreende a leitura flutuante do conjunto das comunicações, obtida com o material de campo; exploração do Material, onde o pesquisador busca encontrar categorias que são expressões ou palavras significativas em função das quais o conteúdo de uma fala será organizado, sendo o texto recortado em unidades de registro e, tratamento dos resultados Obtidos e interpretação,

momento em que se estabelecem articulações entre os dados e as referências teóricas da pesquisa, buscando responder as indagações desta com base em seus objetivos.

Os achados obtidos no referido estudo foram discutidos à luz da literatura pertinente sobre a temática, começando com a caracterização dos sujeitos da pesquisa e seguida pela análise das categorias que insurgiram e suas respectivas reflexões.

2.6 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DA PESQUISA

Com vistas às recomendações e normas éticas da pesquisa envolvendo seres humanos preconizados pela Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), o estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Piauí (UFPI) obtendo número de parecer 2.344.629 e, autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Todos os participantes foram convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), confeccionado em duas vias, ficando uma em posse do pesquisador e outra com o participante, visando garantir o anonimato e, preservar a autonomia para desistir, a qualquer momento, de participar da pesquisa, sem prejuízo de qualquer natureza.

Os participantes receberam orientações sobre os objetivos do estudo, bem como seus riscos e benefícios, garantindo o anonimato e sigilo dos dados obtidos. Assim, visando minimizar o risco de constrangimento em responder à entrevista, a coleta de dados ocorrerá em local reservado prévia e exclusivamente para esta finalidade. Por outro lado, a participação não implicará em nenhum benefício direto ao participante. Entretanto, a pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, podendo implicar em melhorias na assistência à saúde dos adolescentes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados aqui apresentados referem-se à interpretação dos dados coletados no composto de 15 enfermeiras, que atuam nas Unidades Básicas de Saúde da zona urbana, do município de Picos-PI. Inicialmente foram descritas as características socioeconômicas das participantes, relacionadas à faixa etária, sexo, cor, estado civil e números de filho e, em seguida, os aspectos relacionados à sua atuação profissional como renda, tempo de serviço na ESF e tempo de atuação na UBS, e por fim, das Categorias geradas (Ações de enfermagem, promotoras de saúde do adolescente, Dificuldades e Limitações da enfermagem da ESF na assistência ao adolescente e Demandas Trabalhadas pela ESF na saúde do adolescente), a partir da análise temática dos depoimentos.

3.1 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS DO UNIVERSO PESQUISADO

As tabelas que seguem consolidam os dados referentes às características socioeconômicas e da atuação profissional das enfermeiras participantes deste estudo.

Tabela 1 – Dados referentes à faixa etária, sexo, cor, estado civil, filho, nº de filhos. Picos-PI, 2017.

Variável de interesse	N	Variável de interesse	N
Faixa etária		Sexo	
24 a 28 anos	5	Feminino	15
33 a 35 anos	5		
37 a 44 anos	5		
Cor		Estado civil	
Branca	5	Solteiro	8
Parda	10	Casada	7
Filhos			
Não	8		
Sim	7		
		TOTAL 15	

FONTE: Elaboração da autora

No que concerne à faixa etária, a Tabela 1 mostra que as participantes do presente estudo estão equiparadas, sendo todos com (N = 5), diferente do que fora demonstrado nos estudos de Higarashi *et al.* (2011), onde cinco dos oito enfermeiros entrevistados possuem de 30 a 40 anos de idade, o que

demonstra um equilíbrio entre o número de profissionais que possuem mais experiência no serviço e aqueles que estão recentes na profissão. Quanto ao gênero, prevaleceu o sexo feminino, sendo a totalidade das entrevistadas, (N=15), corroborando com os estudos de Ribeiro, Nogueira e Assunção (2016), onde dos quinze enfermeiros entrevistados, evidenciou-se maior predominância de profissionais do sexo feminino 13 (86,6%) e 2 (13,34%) do sexo masculino.

Deste modo, evidencia-se que as práticas trabalhistas de profissionais do sexo feminino, nessa categoria, são maiores que do sexo masculino. As práticas profissionais são constituídas por saberes diferentes, sendo que, no Brasil as estatísticas de mulheres presentes no ensino superior são altas, uma vez que a enfermagem sempre foi vista como profissão para mulheres (RAMOS *et al.*, 2011).

No que tange à cor das entrevistadas, predominou a cor parda (N=10). Já no quesito estado civil, a maioria declarou-se solteira (N=8), e quanto ao número de filhos predominou as que não possuíam filhos (N=8), dentre as que afirmaram ter filhos, destacou aquelas com 3 filhos (N=3).

O fato de a maioria das entrevistadas serem solteiras e não possuírem filhos denota, em tese, que as mesmas possuem maior disponibilidade para dedicar-se às atividades laborais e à busca por qualificação, podendo desempenhá-las com maior rendimento do que aquelas que possuem família e filhos, resultados proporcionalmente encontrados por Fernandes *et al.* (2009), cujos entrevistados representou 92,2% do sexo feminino e 57,8% eram solteiras.

Tabela 2 – Dados referentes à renda, tempo de atuação ESF e tempo de atuação na UBS. Picos-PI, 2017.

Renda	N
1 a 3 salários mínimos	3
3 a 6 salários mínimos	6
Maior que 6 salários mínimos	6
Tempo de atuação na ESF	N
1 a 2 anos	7
9 a 11 anos	5
15 a 17 anos	3
Tempo de atuação na UBS	N
1 a 5 anos	8
9 a 11 anos	7
TOTAL	15

FONTE: Elaboração da autora

Constata-se a partir da tabela acima que a renda das entrevistadas, 6, estão equiparadas entre 3 e 6 salários mínimos e a renda acima de 6 salários mínimos (N = 6), quando se trata do tempo de atuação na ESF dos profissionais entrevistados, predomina-se os que possuem de 1 a 2 anos de atuação (N = 7). No que tange ao tempo de atuação na UBS, predominam os que possuem entre 1 a 5 anos (N = 8). Do mesmo modo, os estudos de Higarashi, Roecker, Baratieri e Marcon (2011) apontam que a renda mensal referida por cinco dos oito profissionais foi de R\$ 2.000,00 a R\$3.000,00. A variação salarial pode ocorrer possivelmente em decorrência de diversos vínculos empregatícios. Quanto ao tempo de atuação dos enfermeiros nas ESF, observa-se que 12 (80%) possuem acima de 24 meses na área, 2 (13,34%) de 6 a 12 meses e 1 (6,66%) de 12 a 24 meses, o que corrobora com os achados desta pesquisa.

A partir dos achados desta pesquisa é possível inferir que, embora a maioria das enfermeiras entrevistadas tenham, no máximo 2 anos de atuação para uma minoria de até 11 anos de atuação, estas, por sua vez, tendem a desempenhar um trabalho mais favorável dentro de sua área adscrita, uma vez que o tempo de atuação confere ao profissional o estabelecimento de vínculo e a construção de uma relação de confiança entre usuário-profissional. A esse respeito, será discutido com maior ênfase ao longo do trabalho.

3.2 AÇÕES DE ENFERMAGEM, PROMOTORAS DE SAÚDE DO ADOLESCENTE.

As informações deste permitiram conhecer atividades e metodologias de trabalho/abordagem que as profissionais, enfermeiras, mais utilizam na Estratégia de Saúde da Família-ESF em que atuam, para trabalhar as demandas de saúde do adolescente. Assim, quando questionadas sobre ações desenvolvidas e, como metodologicamente abordavam essa clientela, obteve os seguintes resultados:

“Sim, mais não muito frequente, às vezes uma vez ao ano, duas no máximo. Não é muito frequente não. Atualmente a gente trabalha mais no sentido de palestras de prevenção ao uso de drogas e de gravidez também por que aqui tem muitas adolescentes grávidas e também com relação à imunização são as atividades mais frequentes que a gente tem com os adolescentes [...]” (E-1)

“[...] Sim, a gente realiza uma a cada semestre. A atividade que realizamos com maior frequência é PSE, onde são realizadas rodas de conversas, palestras com dinâmicas para tentar chama atenção deles para o assunto. [...]” (E-14)

Os estudos de Ribeiro *et al.* (2016) corroboram com os achados desta pesquisa. Haja vista que naquela, as ações dos enfermeiros desenvolvidas na comunidade e nas escolas ocorrem por meio de palestras e atividades lúdicas e, eram realizadas apenas semestralmente ou anualmente. A esse respeito, cabe salientar que educação em saúde é uma ação que deve ocorrer continuamente na comunidade assistida, uma vez que palestras pontuais não surtem os efeitos desejados na clientela assistida, já que se pretende despertar, nesses, atitudes positivas e disposição para mudanças.

A importância da educação em saúde através do profissional enfermeiro é salutar, uma vez que não se atribui a responsabilidade em promover saúde e prevenir agravos à família e à escola. Nesse sentido, Raquel *et al.* (2013) assenta que o profissional de saúde deve estar preparado para essa ação, proporcionando um espaço para discussão e não transmitindo valores e experiências pessoais.

“[...] Primeiro, todo ano a gente faz levantamento do calendário vacinal deles, atividades educativas, a gente aproveita que a escola educa a maioria dos adolescentes da área, então a gente faz palestras educativas na escola sobre IST, dengue, cultura de paz, violência, então a gente aproveita o momento da escola [...]” (E-5)

Neste sentido, entende-se que a parceria entre a Atenção básica em saúde e a Rede escolar, ou seja, o desenvolvimento de ações intersetoriais é fundamental na concretização de ações de promoção em saúde e na potencialização do cuidado em saúde na infância e na juventude. Nestes achados podemos observar que o processo saúde-doença possui um impacto direto no processo de vivência dos estudantes, aonde se pode trabalhar o estereótipo do corpo perfeito, buscando hábitos saudáveis, bem em questões como a sexualidade, violência, preconceito e saúde mental.

Para Costa, Queiroz e Zeitoun (2012) a intersetorialidade atua na promoção da integralidade, caracterizando-se pela apreensão das necessidades do sujeito, a partir do encontro com a equipe de saúde. Para tanto, o autor reforça que são necessários novos modos de cuidados e de cuidar associando-se aos saberes técnicos, operantes, e às tecnologias relacionais e subjetivas. Nesta perspectiva, o profissional aproxima-se das necessidades dos usuários, promovendo acolhimento e favorecendo o vínculo.

Raquel *et al.* (2012) acrescenta que, apesar de existirem ações voltadas para a prevenção de agravos à saúde do adolescente, a frequência destes nos serviços de saúde brasileiros é ainda muito discreta, o que talvez seja reflexo da dificuldade dos próprios profissionais em elaborar e desenvolver trabalhos e atividades específicas para esta clientela, ratificado neste estudo por (E-13). Ao inferir que *“Sim, a frequência é uma ou duas vezes ao ano, não é muito frequente. Desenvolvemos mais atividades educativas, avaliação da caderneta e atividade no PSE. [...]”*. Percebe-se nesta fala que não há planejamento para o desenvolvimento das ações em saúde para o público adolescente como rotina, esta é executada à medida que o jovem procura a unidade de saúde ou por meio de ações pré-estabelecidas pelo PSE.

Neste sentido, em estudo realizado por Junior *et al.* (2016), os adolescentes revelam sentir falta de palestras que discorram sobre esse tema nas unidades de saúde, do mesmo modo, sentem falta de outras ações educativas com temas diversos que sejam pertinentes à sua faixa etária (RAQUEL *et al.*, 2012). A falta de planejamento específico e da realização rotineira de atividades voltadas ao público adolescente é demonstrada nas falas a seguir:

“[...]A gente realiza atividades voltadas aos adolescentes mais não tão frequente, geralmente uma atividade a cada três mês. Realizamos atividades na escola. São antropometria, atualização da caderneta de vacinação, atividade de educação em saúde sobre reprodução sexual, prevenção de DST's, gravidez na adolescência, prevenção da violência com a cultura da paz e em relação ao abuso de álcool e drogas. [...]” (E-9)

“[...]Sim, as atividades que a gente faz do adolescente é PSE, que é feito semestralmente nas escolas e também nas épocas certas, mais agora mesmo eu to fazendo mensalmente atualizando os cartões de vacina e também depende da necessidade ou não ou outra a gente tá fazendo palestra sobre DST's, drogas. [...]” (E-15)

No âmbito da atenção à saúde do adolescente é preciso que sejam realizadas ações para atender às necessidades desta clientela, inserida no contexto social, seja por meio da visita domiciliar, do atendimento individual, das atividades em grupos específicos para adolescentes, jovens e familiares, das ações educativas e de promoção à saúde, da participação juvenil, além de atividades intersetoriais (HIGARASHI, 2011).

Reconhece-se que o enfermeiro é um profissional de fundamental importância para o desenvolvimento das ações junto aos adolescentes. Seu trabalho, Conforme Descrito na PNAB (2012), no âmbito da atenção primária de saúde da família fundamenta-se no monitoramento das condições de saúde, no levantamento e monitoramento de problemas e no exercício de uma prática de enfermagem comunicativa.

Ainda de acordo com o autor acima, o desenvolvimento de ações intersetoriais na ESF respeita os pressupostos do Sistema Único de saúde – SUS, que prevê atendimento integral e equânime nos mais diversos níveis de atenção. No que se refere às práticas de enfermagem para os adolescentes com articulação entre profissionais de outros serviços e/ou setores, sobre isso o presente estudo revela proximidade:

“[...] então, a gente também trabalha essa questão do suicídio em parceria com o NASF principalmente com a psicóloga e assistente social pra tá tentando identificar precocemente adolescentes com essa vulnerabilidade, pra que a gente possa tá trabalhando com esses adolescentes a gente faz a triagem, eles são acolhidos e encaminhados para o profissional do NASF. [...]” (E-7).

“[...] Sim a gente realiza, eu juntamente com a equipe no NASF, uma vez no ano faz o PSE na escola e a gente fala sobre a saúde do adolescente [...]” (E – 8)

Frente aos depoimentos fica nítido quão importante é a atuação das redes de atenção à saúde e, de forma resolutiva, a fim de que o usuário atendido dentro desta, seja visto de modo integral. Costa e Ramires (2014) afirmam que uma rede de atenção à saúde bem organizada é capaz de modificar “a forma e o conteúdo do espaço/território. Uma vez que muda o conteúdo, muda com ele a história, e ao mudar a história muda com ele tudo que produz”. O autor supracitado ainda mostra que as redes de atenção à saúde caracterizam-se por manterem relações horizontais entre os pontos de atenção e a atenção primária em saúde; pela centralidade nas necessidades em saúde de uma população; pela responsabilização na atenção contínua e integral; pelo cuidado multiprofissional; pelo compartilhamento de objetivos e compromissos com os resultados sanitários e econômicos.

No tocante às metodologias de trabalho mais utilizadas no trato com os adolescentes, a quase totalidade dos enfermeiros entrevistados apontaram as atividades em grupo como a mais realizada, tendo como técnica principal a realização de rodas de conversa e palestra, onde a temática é livre e não imposta pelo profissional, o público ao longo da conversa vai sugerindo o tema que deseja conversar, conforme evidenciado nos depoimentos abaixo:

“[...] As metodologias usadas são palestras e rodas de conversas. A dificuldade falta de atenção deles as atividades desenvolvidas tanto na escola quanto no PSE. [...]” (E – 15)

“[...] a gente tenta buscar a atenção deles no colégio, mesmo através de conversa, roda de conversa, palestras no máximo isso mesmo[...]” (E – 1)

“[...] As metodologias são rodas de conversas, por que é assim, a gente tem atendimento com eles aqui, como eu disse, se algum adolescente chegar faz a escuta deles individual, mais quando a gente faz atividade coletiva é mais roda de conversa expondo as atividades que é pra ser realizada. [...]” (E – 2)

“[...] As metodologias usadas são palestras, rodas de conversas e o atendimento no posto que a consulta de enfermagem. [...]” (E – 14)

Frente aos achados é notório que o profissional de enfermagem desempenha na ESF importante papel de promoção da saúde, uma vez que atentam para os fatores condicionantes e determinantes de saúde, para a

melhoria da qualidade de vida dos usuários por eles assistidos, com valorização da participação ativa dos adolescentes no contexto das decisões e escolhas de temáticas a serem trabalhadas, priorizando a vulnerabilidade e o risco de adoecimento da população assistida e a união dos diversos setores da sociedade, nas ações. Dessa forma, considera-se que o trabalho desenvolvido, em tese, atende aos preceitos da atenção primária, que coloca que a prevenção em saúde é compreendida como um conjunto de medidas que visa prevenir o aparecimento de doenças, minimizar as consequências das mesmas e reduzir os fatores de risco que podem causá-las.

3.3 DIFICULDADES E LIMITAÇÕES DA ENFERMAGEM DA ESF NA ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE

O ser adolescente, público-alvo destas ações, não é uma clientela muito fácil de lidar, dadas as oscilações próprias desta fase do ciclo de vida. A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a adolescência como um processo fundamentalmente biológico, no qual se aceleram o desenvolvimento cognitivo e a estruturação da personalidade. Esta faixa etária passa por modificações físicas, psicológicas e sociais, possui propensão a formar grupos, surgimento de desejos, descoberta de afinidades e reflexões sobre planos para a vida.

A análise temática evidenciou, como segunda categoria temática, as ações realizadas na ESF pelo enfermeiro, voltadas aos adolescentes, apontando as dificuldades e limitações para o pleno desenvolvimento do seu trabalho:

"[...] As dificuldade, primeiro não temos um local onde eu possa tá reunindo adolescentes que tenham o mesmo tipo de problemática, que seria mais fácil a gente trabalhar, nós não temos insumo suficiente pra atrair a atenção deles e também os adolescentes, a maioria não se apegam a esse tipo de conversa, eles tentam desviar, [...]"(E – 1)

A esse respeito, Ribeiro *et al.* (2016) apontam em seu estudo que existe um grande entrave no contato adolescente e ESF. O referido estudo mostrou que grande parte dos profissionais de enfermagem (80%) possui dificuldade em trazer os adolescentes até a ESF, o mesmo ainda mostra que, além da dificuldade do contato com o adolescente, este último raramente procura a estratégia e demonstra pouco interesse e adesão às atividades que são propostas.

"[...] É adesão deles, fixa atenção deles é muito difícil, tudo pra eles viram uma piada, motivo de brincadeira, então pra você levar pra uma conversa seria e bem complicado e aí também se você marca uma coisa na unidade e coisa certa que não vem, vieram pra vacinação mais uma atividade somente eles não vem, então sempre que é feito a gente já vai pro colégio que é já pra pegar eles lá. [...]"(E – 3)

"[...] Eu acho muito tímida, eles chegam quando eles estão com algum problema de saúde, por isso que a gente procura na escola, por que a procura deles na unidade de saúde ainda é muito tímida, o que a gente vê é o adolescente chegando com algum problema instalado, eles não procuram a unidade pra prevenção, por isso que a gente vai até a escola que a gente tenha maior acesso a eles[...]" (E – 7)

"[...] A dificuldade é a organização da atividade. por que toda vez que a gente sai daqui pra ir pra escola, é um dia que deixa de atender, então que se organizar previamente pra isso pra poder ir atender na escolar, fora a organização de material com relação a adesão até que não tivemos problemas, por que como eles já estão na escola então bem simples de fazer o momento acontecer e aí tem a dificuldade deles virem ao posto por que é a desculpa de não poderem por que estão na escola, é a desculpa de não virem por causa do horário por que a gente atende aqui só a tarde, não por que de tarde é muito quente, por que de tarde vou pra não sei aonde, vou dormir e não vou, a dificuldade é essa. [...]" (E-4)

Raquel *et al.* (2013) reforça esse achado quando relata que a busca dos adolescentes e jovens pelos serviços de saúde e que a frequência de adolescentes e jovens nos serviços de saúde brasileiros é ainda muito ínfima, o que reflete na dificuldade em planejar ações estratégicas de trabalho com esse público e a oferta de trabalhos e atividades específicas desta clientela.

O processo participativo dos adolescentes nas atividades de educação em saúde está centrado nas ações desenvolvidas em escolas, embora as ações realizadas na Unidade Básica de Saúde ainda não configurem

uma realidade (VIEIRA *et al.*, 2014). Foi identificado neste estudo dados que confirmam essa realidade, como demonstram as falas a seguir:

“[...]Adesão deles à unidade não é boa, toda vez que marco alguma atividade eles não vão. Não possuímos grupos de adolescentes, tem resistência nas escolas quando a gente vai fazer PSE.(...)”(E-15), “...A adesão é muito baixa, os adolescentes pouco procuram a unidade e quando procuram já estão com a problemática instalada. Em grupo, por conta de serem realizadas na escola com PSE, bom aqui a gente tem muito caso de gravidez indesejada, já teve ano de pega umas 6 adolescentes gestantes. [...]”(E – 13)

Curiosamente em estudo realizado por Raquel *et al.* (2013), nenhum dos adolescentes referiu ter participado de atividades com o mesmo objetivo, promovidas por alguma unidade de saúde. Esse aspecto é preocupante, pois todos os adolescentes entrevistados eram cadastrados nas unidades de saúde da família. Esse dado reflete preocupante realidade quanto ao estabelecimento de vínculo entre ESF-Adolescente, se por um lado o profissional diz que oferta serviços, porém não há adesão, por outro o público refere que estas não existem, o que torna possível inferir que há sérios problemas de comunicação e entendimento entre a equipe de saúde e a comunidade.

Alguns profissionais expõem que não existe um responsável pela saúde do adolescente. Isto acontece pela inexistência de planejamento específico para o atendimento destes, momento em que poderia haver negociações e parcerias para o exercício das atividades programadas que completem essa faixa etária (COSTA; QUEIROZ; ZEITOUNE, 2012).

“[...]O que a gente mais sente falta é de um ter intersetorialidade, a gente que tirar o adolescente da ociosidade, a gente que levar pra uma prática de exercício, a gente até induz, só que na prática eles não têm muita oportunidade, eles não tem muito acesso, por exemplo, eles não têm uma quadra poliesportiva, eles não têm ações de cultura onde eles podem está se envolvendo, então eu acho que a maior dificuldade é a gente trazer a promoção e a prevenção, mais também poder ofertar pro adolescente a oportunidade de desnortear o caminho dele das drogas, da gravidez precoce, tá entendendo a maior dificuldade é essa, a gente não tem pra onde encaminha esses adolescentes. [...]”(E – 7)

A fala evidencia que o adolescente não tem um profissional específico responsável pelas suas demandas, nem tampouco um fluxo de atendimento em saúde a ser seguido dentro das redes de atenção. Em estudo realizado por Vieira *et al.* (2014) a maioria dos profissionais afirmou realizar atividades intersetoriais, sendo que elas se concentravam nas atividades realizadas nas escolas, quer seja através da realização de ações educativas ou na divulgação das atividades desenvolvidas na UBS. No entanto, somente pouco mais da metade dos profissionais afirmou realizar tais atividades, mostrando que a presença dos profissionais no contexto escolar ainda não acontece de forma efetiva, nem os demais dispositivos da saúde são ativados pelos profissionais da ESF, no que se refere à prestação de cuidados à saúde do adolescente.

No presente estudo, os profissionais enfermeiros afirmaram que, apesar de haver certa resistência pelos adolescentes quando o convite parte da ESF, quando as ações são mais lúdicas e dinâmicas, além de tempo para atendimento individual e específico ofertadas pelo CRAS e/ou NASF, estes têm maior receptividade e adesão à atividade proposta, como mencionado pelos participantes do estudo, nas falas abaixo elencadas:

“[...] Não, aqui nós temos o CRAS aqui na frente que ele tem o grupo de adolescente, mais como as atividades lá são atividades lúdicas eles participam que capoeira, jogo essas coisinhas aí que atrai atenção de adolescentes, eles participam. Agora pra posto de saúde, toda vez que a gente tentou fazer aparece um dois, três no máximo quatro adolescentes. Ruim, é ruim. [...]”(E – 1)

“[...] A maioria das atividades são grupo através do PSE, bom essa daqui é difícil por que aparece de tudo, mais as questões que eles mais demandam pra gente são as questões sexualidade por conta da curiosidade deles com o assunto e aí recentemente nessa última atividade quando a gente tratou sobre suicídio foi muito interessante por depois eles vieram procurar tirar suas dúvidas tanto com a gente e, principalmente com o NASF, através da psicóloga que era uma coisa que eu particularmente não conhecia como sendo uma demanda tão grande e se

mostrou ser uma demanda boa, mais acho que mais e a questão da sexualidade mesmo. [...]” (E – 4)

Costa, Queiroz e Zeitone (2012) mostram em seu estudo que é frequente a atenção e o planejamento dos profissionais de saúde da ESF voltados para a população em geral e alguns grupos específicos como a criança, o idoso, a gestante, e muitas vezes o público adolescente é esquecido, sendo favorecido apenas no contexto das ações programáticas como, planejamento familiar, pré-natal, prevenção do câncer do colo de útero.

Sendo assim, afim de os profissionais enfermeiros desenvolverem um trabalho a contento e integral com o público adolescente e jovem, faz-se necessário que essa demanda esteja dentro das prioridades de planejamento das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde de igual modo com os demais públicos assistidos pela UBS, possibilitando o estreitamento de vínculo e a adesão dos mesmos às atividades propostas, além de dar relevância às ações intersetoriais, que por sua vez viabilizam atendimento integral a este público.

3.4 DEMANDAS TRABALHADAS PELA ESF NA SAÚDE DO ADOLESCENTE

Tendo em vista a complexidade que envolve a atenção ao adolescente, no que se refere às suas vivências e manifestações, diante de situações vulnerabilizantes, em especial aquelas relacionadas à sua saúde, pode-se afirmar que a Estratégia Saúde da Família (ESF) se configura como um modelo de atenção à saúde, que pode favorecer a mudança da saúde do adolescente, por meio da capacidade de promover assistência integral continuada, amparada nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).

Dentre as demandas que o público adolescente leva ao profissional enfermeiro na ESF, destacaram-se aquelas referentes à saúde sexual e reprodutiva, saúde mental na adolescência: uso e dependência de álcool e outras drogas bem como as ações de prevenção ao uso de drogas desenvolvidas por estes profissionais.

“[...] Gravidez indesejável a gente tem muitos casos aqui, mais depois que esta gestante nosso objetivo que a gestação chegue até o final da melhor maneira possível para a criança e para a mãe, mais indesejada a maioria delas das adolescentes a gravidez é indesejada e com relação a infecção sexualmente transmissíveis sim atualmente eu estou com três casos não só em adolescente e só um mais os dois casos em mulheres, mais em adolescentes eu tenho sim. [...]” (E – 1)

“[...] tem bastantes adolescentes com gravidez indesejada, quando pergunta se elas aceitam a gestação elas dizem que sim, mais eu tenho certeza que no íntimo delas elas não queriam aqui por ainda são umas crianças, então acho que são gravidez indesejadas. Em relação as infecções, eu já peguei gardinerela mais é muito difícil por a gente detecta na prevenção e elas não vem é muito difícil [...]” (E – 8)

Enfermeiros que atuam nas ESF entendem que a integralidade do atendimento aos adolescentes e jovens é primordial para que se tenha uma atenção à saúde sexual e reprodutiva de qualidade voltada para este grupo etário, porém esta integralidade na maioria das vezes não é colocada em prática, conforme Ribeiro *et al.* (2016), haja vista que anualmente cerca de 70 mil adolescentes morrem de causas relacionadas à gravidez e ao parto, em países em desenvolvimento. As adolescentes que engravidam tendem a originar-se de domicílios de baixa renda e a apresentarem deficiência nutricional (ALMEIDA; ROCHA, 2015)

A esse respeito, Raquel *et al.* (2013) referem que a atenção ao adolescente ocorrido de forma fragmentada e a assistência a sua saúde sexual e reprodutiva precária, contribuindo para a manutenção dos casos de DST e gravidez indesejadas.

“[...] Não, é como eu disse, há dois anos atrás a gente não tinha, mais agora vamos começar a implantar [...]” (E – 7)

“[...] As atividades a gente não desenvolve muitas, é uma vez no ano no PSE, tem bastantes adolescentes com gravidez indesejada, quando pergunta se elas aceitam a gestação elas dizem que sim, mais eu tenho certeza que no íntimo delas elas não queriam aqui por ainda são umas crianças, então acho que são gravidez indesejada. (E-8)

Frente ao supracitado fica demonstrado que a maioria das ações de promoção e prevenção à saúde do adolescente ou acontece de forma pontual, ou é inexistente ou ainda fica isolado àquelas promovidas dentro do PSE, corroborando com os achados de Costa, Queiroz e Zeitoune (2012), onde os profissionais do seu estudo sinalizaram a inexistência de ações promotoras de acolhimento para os adolescentes, embora ressaltassem como ação fundamental. Assim, mesmo diante de limitações, os profissionais mostraram a necessidade de estabelecer estratégias para formação de vínculo com os adolescentes.

O acolhimento, quando realizado de forma adequada, possibilita a aproximação dos profissionais com os adolescentes que, por sua vez, proporciona o desenvolvimento do vínculo entre os mesmos. A relevância disto consiste no fato de tornar mais fácil a adesão do grupo às propostas de atendimento e atividades educativas, elaboradas pelos profissionais da equipe, agindo, portanto, como um elemento de captação dos adolescentes para o serviço de saúde (VIEIRA *et al.*, 2014).

Até aqui a maioria dos discursos chama atenção para a implementação de uma educação permanente e não pontual que não seja apenas voltada para as doenças e para a tentativa de mudança de comportamento dos indivíduos, com relação vertical e impositiva, mais que valorize as diversas dimensões do cuidado, de modo a aproximar a prática da educação em saúde da realidade social.

No tocante às demandas de saúde mental, álcool e outras drogas, Júnior *et al.* (2015) referem em seus estudos que, através de ações educativas e sensibilizadoras, é possível proporcionar aos adolescentes conhecimentos e informações que os possibilitem conviver com a realidade cotidiana do acesso às drogas, e fazer escolhas adequadas para sua vida.

Neste estudo as demandas que mais se destacaram foram aquelas geradas pelo uso e abuso de álcool e outras drogas, seguidas das consequências geradas pelo uso destas. Neste sentido, Teixeira e Taquete (2012) mostram em seu estudo evidências de que aquelas adolescentes que fazem uso dessas substâncias devem ser assistidas pelos profissionais que estão mais próximos da realidade dos mesmos, principalmente nesta fase de construção da personalidade, onde muitos se encontram em situação de vulnerabilidade social, o que pode carrear outras situações, como a exploração sexual comercial, além da possibilidade de gravidez indesejada, depressão ou mesmo suicídio.

“[...] Só nos colégios, é como eu estou te dizendo tem essa dificuldade da gente se aproxima dessas pessoas e todo ano a gente faz programa de saúde na escola, onde um dos temas é o consumo álcool e drogas, cultura da paz, a gente tenta se aproxima dessa maneira por que pra nós é única maneira de chegar neles.” (E-1)

“[...] esse aqui é muito complicado por que a gente conhece os casos das pessoas que fazem uso de droga, mais eles não assumem pra si e nem pra família que utilizam e a gente não pode força e não pode obrigar, lembro de uma vez que a gente quis fazer um grupo pra trabalhar esse tema não só voltado pro adolescente mais a população de maneira geral, e simplesmente não apareceu ninguém por que quando a ACS passava convidando eles diziam: eu não uso! sendo que a gente sabia que eles usavam. Então foi muito ruim ter preparado e ninguém ter aderido ao grupo e alternativa que a gente ver e trabalhar esse assunto através do PSE por que aqui na unidade não deu muito certo.” (E - 4)

“[...] Sim, sim a gente trabalha esse tema na escola e eu já precisei encaminhar e eu fiquei assim bastante triste e feliz, por que quando esse adolescente chegou pra mim a mãe veio desesperada por que ele estava com envolvimento com drogas, ele tinha sido abusado ,então assim eu não tinha pra onde encaminhar esse adolescente na rede, eu não tinha casa que podia atender ele, então eu encaminhei pro CAPS adulto mesmo e ai receberam ele lá fizeram o tratamento e conseguiram resgata esse adolescente, mais eu sinto falta da rede de atenção, um ponto onde a gente pudesse tá encaminhando esses adolescentes, então a rede não tá totalmente estruturada, isso dificulta um pouco pra gente.”(E-7)

Júnior *et al.* (2016) relata em seus achados que a ação educativa no combate à droga nas escolas deve ser desenvolvida na perspectiva de sensibilização e prevenção dos adolescentes e jovens, considerando os fatores de vulnerabilidade ao uso de drogas, e é através desta sensibilização aonde surge a confiança e o vínculo de confiança dos alunos com o profissional da saúde para falar sobre a temática.

No que se refere a ações desenvolvidas pela ESF para a prevenção do uso de drogas pelos adolescentes, as que mais foram relatadas foram aquelas desenvolvidas dentro do ambiente escolar como mostrado por E-1 e E-8 “[...] Sim o tema de álcool e drogas é trabalhado uma vez no ano no PSE, geralmente eu começo a dar a palestra, mais quem explana mais é a psicóloga e eu nunca encaminhei nenhum adolescente pro CAPS não, mais quem tem muito caso de drogas e álcool, tem bastante.” (E-8)

Nesse contexto de transformações e de tomada de decisões, podem surgir as crises, que, se não abordadas e solucionadas de forma adequada, podem incorrer em problemas, tais como uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas; práticas sexuais sem adoção de medidas de proteção; estabelecimento de conflitos de personalidade, que podem desencadear, desde dificuldade de relacionamento com os pais e demais pessoas de sua convivência, até atos desesperados de tentativa e/ou realização do suicídio, ou ainda, envolvimento nos grupos de tráfico de drogas e ingresso na criminalidade (HIGARASHI *et al.*, 2011).

Sendo assim, fica evidente o papel fundamental da equipe de saúde da família no PSF, no sentido de trabalhar mais de perto as questões que envolvem a atenção aos adolescentes. O impacto de ações mais efetivas e a busca pelo envolvimento cada vez maior deste grupo específico da comunidade nas ações básicas de saúde podem contribuir para a prevenção de inúmeros danos, com repercussões não somente restritas aos indivíduos atendidos, mas voltadas à comunidade, na qual estes estão inseridos.

Deste modo, ações positivas e planejadas, conduzidas adequadamente nesta fase de grande vulnerabilidade do ser humano, podem contribuir significativamente para a formação de cidadãos mais preparados para o futuro. Neste contexto, o enfermeiro e sua equipe de saúde da família, em vista de sua capacidade agregadora nas comunidades atendidas, representam instrumento poderoso para a atuação direta junto ao adolescente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa demarcou o interesse em investigar as contribuições do enfermeiro da estratégia saúde da família-ESF à saúde do adolescente. O conhecimento das ações executadas neste serviço faz-se necessária, bem como conhecer a população alvo estudada, uma vez que viabiliza a implementação de práticas e intervenções seguras. Informações como as evidenciadas neste estudo são importantes ferramentas tanto para os gestores do serviço quanto para os profissionais envolvidos, proporcionando aos mesmos a busca por iniciativas com o fim de minimizar as dificuldades apresentadas neste estudo.

Entre os dados obtidos, chamou bastante atenção o fato de que a maioria das enfermeiras, apesar de reconhecedoras da importância da realização de atividades de cunho preventivo à população adolescente, revelou não realizar, ou quando as realizam, estas ocorrem de maneira pontual, justificada na reduzida procura dos adolescentes pelo serviço de saúde ou a não adesão às práticas ofertadas. Este último tem sido apontado como um dos principais dificultadores para a implementação de atividades específicas para os adolescentes.

Os discursos permitiram apontar algumas prioridades para a intervenção educativa e assistencial, tais como: a realização de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, especialmente no que concernem as questões de sexualidade e uso de drogas; ações individuais executadas conforme a demanda espontânea na unidade de saúde (voltadas especialmente à recuperação da saúde), e no âmbito coletivo, por meio da organização e implementação de atividades sistematizadas, direcionadas a escolas e grupos de adolescentes na comunidade.

Assim, o estudo evidencia algumas lacunas, ainda existente no que concerne às ações voltadas ao adolescente na atual prática assistencial da ESF e revela um novo desafio, de modo que o enfermeiro e sua equipe devam estar preparados para atuar junto aos adolescentes.

Nesse sentido, emerge a necessidade de capacitação permanente dos profissionais, no sentido de incrementar ações de promoção da saúde e prevenção de doenças que levem em conta as peculiaridades e necessidades específicas dos adolescentes, propiciando melhor qualidade de vida e cidadania à população jovem.

Para tanto, o estudo deixou claro algumas lacunas ainda existentes, no que concerne às ações voltadas ao adolescente na atual prática assistencial da ESF e revela um novo desafio, de modo que o enfermeiro e sua equipe devam estar preparados para atuar junto aos adolescentes. Frente ao exposto, torna-se necessário esforço conjunto no sentido de minimizar essa problemática, aqui elencada; participação dos gestores, maximizando oferta de insumos necessários para a realização do trabalho, estruturação física, de serviços

e principalmente humanos na ótica da interdisciplinaridade e da intersetorialidade às ações primárias em saúde.

A pesquisa teve como fator limitante, a resistência dos profissionais enfermeiros e o envolvimento destes com a organização da UBS para receber a avaliação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB).

REFERÊNCIAS

- [1] ALENCAR, D. C; ALENCAR, A. M. P. G. O papel da família na adaptação do adolescente diabético. *Rev Rene*. v. 10, n. 1, p. 19-28. 2009.
- [2] BRASIL, Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde. Saúde integral de adolescentes e jovens: orientações para a organização de serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2007.
- [3] _____. Ministério da Saúde; Ministério da Educação. Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e de Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2010.
- [4] _____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Orientações básicas de atenção integral à saúde de adolescentes nas escolas e unidades básicas de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 1. ed., 1 reimpr. Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2013.
- [5] _____. Ministério da saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2012.
- [6] _____. Ministério da Saúde; Ministério da Educação. Programa Saúde na Escola. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2008.
- [7] _____. Ministério da Saúde (Br). Marco legal: saúde um direito de adolescentes. Brasília (DF): Gráfica MS; 2007.
- [8] COSTA, V. A.; RAMIRES, J. C. L. A importância das redes de saúde para o desenvolvimento da atenção primária em Pirapora. *Rev. Bras. De Geogr. Médica e da saúde*. v. 10, n. 18. P. 234-249, Jun 2014. Disponível em: <<http://www.seer.ufu.br/index.php/hygeia/article/view/26234/14867>> Acesso em: 21 out 2017
- [9] COSTA, R. F, QUEIROZ, M. V. O, ZEITOUNE, R. C. G. Cuidado ao adolescente: contribuições para a enfermagem. *Rev. enferm. UERJ*, Rio de Janeiro, 2012 abr/jun; v.20, n. 2, p.197-202.
- [10] COSTA, R. F. da; QUEIROZ, M. V. O.; ZEITOUNE, R. C. G. Cuidado aos adolescentes na atenção primária: perspectivas de integralidade. *Esc. Anna Nery*, Rio de Janeiro, v.16, n.3, Set. 2012 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-81452012000300006&script=sci_arttext>. Acesso em: 7 ago. 2017.
- [11] COSTA, R. F.; QUEIROZ, M. V. O.; ZEITOUNE, R. C. G.; Cuidados aos adolescentes na atenção primária: perspectiva de integralidade. *Escola Anna Nery*, v. 16, n. 3, p. 466-472, 2012. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ean/v16n3/06.pdf>> Acesso em: 21 out 2017.
- [12] FERNANDES, J. S., *et al.* Perfil dos enfermeiros das equipes de saúde da família. p. 6210, a. 2009. Disponível em: <www.abeneventos.com.br/anais_61cben/files/01888.pdf> Acesso em: 20 out 2017.
- [13] GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: <http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_esf.php> Acesso em: 16 abril 2017.
- [14] GOMES, R. A análise de dados em pesquisa qualitativa. In: MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa Social (Org.). Teoria, Método e Criatividade, Petrópolis: Vozes. 2002.
- [15] HIGARASHI, I. H. et al. Atuação do enfermeiro junto aos adolescentes: identificando dificuldades e perspectivas de transformação. *Rev. Enferm. UERJ*, Rio de Janeiro, v. 19, n. 3, p. 375-380, jul./set. 2011.
- [16] HIGARANHI, I. H. *et al.* Ações desenvolvidas pelo enfermeiro junto aos adolescentes no programa saúde da família em Maringá/Paraná. *Rev. Rene*, Fortaleza, v. 12, a. 1, p. 35-127; Disponível em: <www.revistarene.ufc.br/vol12n1_pdf/a17v12n1.pdf> Acesso em: 20 out 2017.
- [17] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. (2010). Sinopse dos resultados do Censo 2010. Recuperado em 25 de maio, 2012, de: <http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice>.
- [18] JÚNIOR, W. A. R. *et al.* Prevenção ao uso de drogas no ambiente escolar através do processo de sensibilização e conscientização. Prevenção do uso de drogas no ambiente escolar através do processo de sensibilização e conscientização. *Revista Cultural e científica do UNIFACEX*, v. 14, n. 1, 2016. Disponível em: <<https://periodicos.unifacex.com.br/Revista/article/download/694/pdf>> Acesso em: 21 out 2017

- [19] MINAYO, M. C. S.; DESLANDES, S. F; GOMES, R. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 29º ed. Petrópolis: Vozes, P. 70, 2010.
- [20] MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12. ed. São Paulo: Hucitec-Abrasco, 2012.
- [21] ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Saúde dos Jovens - um Desafio para a Sociedade. Relatório de um Grupo de Estudo da OMS sobre Jovens e Saúde para Todos. Série de Relatórios Técnicos 731. Genebra. (1986).
- [22] RIBEIRO, V. C. S. *et al.* Papel do enfermeiro da estratégia de saúde da família em prevenção da gravidez na adolescência. Rev. Enferm. Cent. O. Min. Jan-abr, 2016. V. 1, n. 6. P. 1957-1975. Disponível em: < <http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/article/view/881>> Acesso em: 24 out 2017.
- [23] RAMOS, F. R. S., *et al.* Formação ética do enfermeiro – indicativos de mudança na percepção de professores. Acta Paul Enferm, v. 24, n. 4, p. 92-485, 2011. Disponível em: < <http://www.scielo.br/pdf/ape/v24n4/a07v24n4.pdf> > Acesso em: 21 out 2017.
- [24] RAQUEL, *et al.* O cuidado de enfermagem na saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes. Adolesc. Saúde, RJ, v. 10, a. 1, p. 16-26, abril, 2013. Disponível em: < www.adolescenciaesaude.com/detalhe_artigo.asp?id=391> Acesso em: 20 out 2017.
- [25] TEIXEIRA, S. A. M; TAQUETTE, S. R. Violência e atividade sexual desprotegida em adolescentes menores de 15 anos. Rev Assoc Med Bras. v. 56, n. 4, p. 440-6. 2010.
- [26] VIEIRA, R. P. *et al.* Participação de adolescentes na estratégia saúde na família a partir da estrutura teórico-metodológica de uma participação habilitadora. Rev. Latino Am. Enferm. v. 22, n. 2, p. 16-309, 2014. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/rlae/v22n2/pt_0104-1169-rlae-22-02-00309.pdf> Acesso em: 21 out 2016
- [27] VIEIRA, T. F. Percepção de adolescentes em realidade de paternidade precoce. 2015. 60f. Monografia (Bacharelado em enfermagem). Universidade Federal do Piauí, Picos, 2013.

Capítulo 3

Cuidados paliativos, assistência domiciliar e a concepção dos cuidadores: Revisão Integrativa

Lúcia Maria Gomes de Santana

Sandra Maria Simões Ribeiro

Geórgia Maria Ricardo Félix dos Santos

Bernardo do Rego Belmonte

Maria Elaine da Silva

Resumo: **Objetivo:** Identificar as evidências científicas relacionadas a concepção dos familiares/ cuidadores sobre a assistência domiciliar do paciente em cuidados paliativos. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. O levantamento dos artigos foi realizado no meses de setembro a outubro de 2019 e revisado em outubro de 2020, nas bases de dados BDENF, SCIELO e biblioteca eletrônica LILACS publicados no período de 2009 a 2019. Foram utilizados os Descritores da Ciência e da Saúde: “assistência domiciliar”, “cuidados paliativos” e “cuidadores”, nos idiomas português, inglês e espanhol. **Resultados:** Foram selecionados 6 artigos em português. Após análise, emergiram três categorias: (1) A relevância da assistência domiciliar para o paciente em cuidados paliativos; (2) Dificuldades encontradas pelo cuidador/familiar na assistência domiciliar e (3) A importância da espiritualidade e da religiosidade por parte do cuidadores/familiares na assistência domiciliar. **Conclusão:** Permitiu-se com este estudo analisar a produção científica sobre a concepção do cuidador/familiar nos últimos dez anos, ressaltando as dificuldades e responsabilidades por eles encontradas no enfrentamento da doença. Espera-se que este trabalho possa contribuir para que novas pesquisas sejam desenvolvidas sobre essa temática.

Palavra-Chave: Assistência domiciliar, cuidados paliativos, cuidadores.

1. INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial de Saúde, (OMS) cuidados paliativos são medidas que acrescentam qualidade de vida aos pacientes e seus familiares que enfrentam uma doença que ameaça a vida. Nesse aspecto, torna-se essencial o controle da dor e de outros sintomas através da prevenção e alívio do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual.

A modalidade dos cuidados paliativos surgiu pela necessidade de melhorar a qualidade de vida desses pacientes portadores de doenças ameaçadoras da vida, assim como também de seus familiares; podendo esses cuidados serem realizados em instituições de saúde, ou no próprio domicílio desses pacientes (ANCP, 2012).

Sabe-se que nos dias atuais, em virtude do momento sócio-político, a assistência domiciliar, prestada nos lares, está em grande ascensão, principalmente no âmbito oncológico, devido a implantação dos cuidados paliativos na assistência domiciliar (FIGUEIREDO *et al.*, 2013). A assistência domiciliar pode ser definida, como um serviço de saúde realizado em ambiente domiciliar por sujeitos formais ou informais que tem por finalidade a promoção, restauração e manutenção do conforto e função dos clientes que precisam desse tipo de assistência para um morte digna (TURCOTTE, 2012).

O atendimento em domicílio proporciona ao paciente um cuidado humanizado e integral, contribuindo para a reintegração do paciente em seu núcleo familiar, por meio de uma maior aproximação da equipe multidisciplinar com a família (FRIPP *et al.*, 2012). Este cuidado em ambiente domiciliar traz benefícios para o paciente dando-lhe oportunidade de estar em um lugar conhecido, mantendo sua intimidade, podendo realizar algumas tarefas do seu cotidiano, mantendo alguns hábitos de lazer. Sua alimentação pode ser mais variada e elaborada a seu gosto e os horários são flexíveis. Fortalece-se assim sua autonomia e sua integridade como pessoa, e para os familiares que em sua maioria sentem-se satisfeitos em estar participando diretamente do cuidado. Ademais, estar-se-á respeitando a vontade do paciente de permanecer no domicílio (BRASIL, 2013).

Portanto, o objetivo deste trabalho é analisar a concepção dos cuidadores de pacientes em cuidados paliativos durante a assistência domiciliar, contribuindo para melhoria da qualidade de vida desse cuidador/familiar. Sendo formulada a seguinte questão norteadora: Quais as evidências científicas sobre o cuidador/familiar direcionado ao paciente em cuidados paliativos na modalidade de assistência domiciliar?

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa, desenvolvida com o intuito de unir e condensar estudos, com metodologias diversas, com a finalidade de prover um aprofundamento do conhecimento sobre o assunto estudado (SOARES *et al.*, 2014).

Segundo Mendes, Silveira e Galvão (2008) para elaborar uma revisão integrativa relevante é importante sistematizar as etapas de forma clara e objetiva, descritas diretamente, como:

- 1ª Etapa: Identificação do tema e seleção da questão norteadora;
- 2ª Etapa: Estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão;
- 3ª Etapa: Identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados;
- 4ª Etapa: Categorização dos estudos selecionados;
- 5ª Etapa: Análise e interpretação dos resultados;
- 6ª Etapa: Apresentação da revisão/síntese do conhecimento.

O levantamento bibliográfico foi realizado no período de setembro a outubro de 2019 e revisado em outubro de 2020, a busca dos artigos foi realizada nas bibliotecas eletrônicas *Latino-Americana e do Caribe em Ciências de Saúde* (LILACS), base de dados *Scientific Eletronic Libray Online* (SciELO), *Base de Dados Especializada em Enfermagem* (BDENF) disponibilizados diretamente por meio de pesquisa on-line, no período de 2009 a 2019 (últimos dez anos). Para o levantamento dos dados utilizaram-se os descritores presentes nos DeCS (Descritores da Ciência e da Saúde) em português: “assistência domiciliar” AND “cuidados paliativos” AND “cuidadores”, no idioma espanhol: “cuidado en el hogar” AND “cuidados paliativos” AND “cuidadores”, no idioma inglês: “home care” AND “palliative care” AND “caregivers”, cruzando-os com o operador lógico booleano “AND”. Como critérios de inclusão definiram-se: artigos científicos que se relacionaram com o tema, disponíveis na íntegra, publicados no período de 2009 a 2019 nos idiomas português, inglês e espanhol. Foram excluídos: teses, dissertações, revisão integrativa, resumos, monografias, editoriais e artigos que não trouxeram relação com a pergunta norteadora.

Foram analisados 6 artigos científicos publicados em periódicos nacionais e que tinham relação com a temática proposta. A Figura 1 mostra o fluxograma dos critérios de seleção dos artigos realizados da 1ª a 6ª etapa.

Figura 1- Fluxograma dos critérios de seleção dos artigos

Fonte: Dos Autores, 2019.

3. RESULTADOS

O Quadro 1 apresenta o material utilizado para realização desta pesquisa, segundo a categoria, base de dados, autor, ano, revista, local, título e objetivo. Após análise, emergiram três categorias: (1) A relevância da assistência domiciliar para o paciente em cuidados paliativos, com apenas 1 artigo; (2) Dificuldades encontradas pelo cuidador/familiar na assistência domiciliar, com 3 artigos e (3) A importância da espiritualidade e da religiosidade por parte do cuidadores/familiares na assistência domiciliar, com apenas 2 artigos.

Quadro 1 – Distribuição dos artigos por categoria, base de dados, autor, ano, revista, local, título e objetivo.

Categoria	Base de Dados/Categoria Profissional	Autor, Revista, Ano, Local	Título	Objetivo
I	LILACS Enfermagem	OLIVEIRA <i>et al.</i> Esc Anna Nery Rev Enferm. 2017. Recife PE.	Atendimento domiciliar oncológico: percepção de familiares/cuidadores sobre cuidados paliativos.	Conhecer a percepção do familiar/cuidador de pacientes com diagnóstico de câncer terminal em atendimento domiciliar sobre cuidados paliativos.
II	LILACS Psicologia	YAVO; CAMPOS. Psicol Teor Prat. 2016. São Paulo SP.	Cuidador e cuidado: o sujeito e suas relações no contexto da assistência domiciliar.	Conhecer características emocionais e o contexto do cuidador domiciliar, bem como o sentido do cuidar para esse sujeito.
II	LILACS Enfermagem	INOCENTI; RODRIGUES; MIASSO. Rev Eletrônica Enferm. 2009. Ribeirão Preto SP.	Vivências e sentimentos do cuidador familiar do paciente oncológico em cuidados paliativos.	Conhecer a vivência e sentimentos do cuidador familiar do paciente oncológico em cuidados paliativos.
II	LILACS Saúde Coletiva	FRATEZI; GUTIERREZ. Ciênc Saúde Coletiva. 2011. Rio de Janeiro RJ.	Cuidador familiar do idoso em cuidados paliativos: o processo de morrer no domicílio	Identificar e analisar o significado do processo de morrer para cuidadores familiares de pacientes idosos em cuidados paliativos.
III	LILACS Enfermagem	LIMA <i>et al.</i> Rev Pesqui Cuid Fundam. 2019. Pará PA.	Juntos resistimos, separados caímos: vivências de familiares cuidadores de pacientes oncológicos em cuidados paliativos.	Descrever a experiência de familiares cuidadores de pacientes oncológicos em cuidados paliativos.
III	LILACS Psicologia	MAFFEI <i>et al.</i> Psicol Teor Prat. 2019. São Paulo SP.	Estratégias de enfrentamento de cuidadores de pacientes em cuidados paliativos no domicílio.	Compreender as estratégias de enfrentamento de cuidadores de pacientes em cuidados paliativos.

Fonte: Dos autores, 2019.

4. DISCUSSÃO

1ª CATEGORIA - RELEVÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR PARA O PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS

Esta categoria aborda um artigo com grande relevância para essa discussão que é a assistência domiciliar nos cuidados paliativos ao paciente com uma doença ameaçadora da vida, proporcionando a este indivíduo a oportunidade de estar no seio da sua família no momento de fragilidade e incertezas, em que o convívio e o apoio familiar são primordiais para o enfrentamento da doença.

Segundo Oliveira *et al.*, (2017) a modalidade de cuidados paliativos em domicílio traz grandes benefícios para o cuidador e o paciente. É descrito que os cuidados paliativos podem reduzir o sofrimento do paciente e do cuidador, além de garantir a dignidade no processo de morrer, ressaltando que o apoio familiar é muito importante e que a figura do cuidador é fundamental. Destaca-se também, a importância da atuação da equipe de cuidados paliativos na assistência domiciliar, tendo como finalidade acompanhar a família e o cuidador por intermédio de orientações a nível domiciliar.

Na opinião do cuidador, para ofertar uma boa assistência, faz-se necessário que a equipe de saúde forneça informações de como realizar esse cuidado, oferecendo ao cuidador/ familiar a garantia de um cuidado seguro, e independente. Assim, os cuidadores/familiares necessitam de um apoio físico, emocional e espiritual, precisam perceber que estão seguros e aptos para a nova vivência (FONSECA; REBELO, 2011). Isso poderá tornar mínimo as aflições e permitirá a esse paciente qualidade de vida durante a prestação do cuidado (OLIVEIRA *et al.*, 2017).

É importante salientar que, há muitas vantagens na assistência domiciliar, entre elas: a liberdade para o paciente, por este sentir-se mais à vontade, além de que o cuidado em domicílio parece proporcionar certo conforto por estar sendo realizado no próprio recinto do paciente. Ademais, também permite um cuidado individualizado, direcionado a cada membro da família. Esse aspecto diferencia-se do cuidado hospitalar (OLIVEIRA *et al.*, 2012).

2ª CATEGORIA - DIFICULDADES ENCONTRADAS PELO CUIDADOR/FAMILIAR NA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

A segunda categoria elucida, em seus três artigos as dificuldades encontradas pelos cuidadores na assistência domiciliar, ressaltando a sobrecarga vivenciada por estes indivíduos marcada pela falta de apoio dos familiares, bem como pela abdicação da sua vida social para dedicar-se ao seu ente querido.

Yavo e Campos (2016) observou que a carga emocional se mostrou alta, refletindo na saúde física dos cuidadores, no seu autocuidado, podendo estes desenvolverem distúrbios psiquiátricos; além de outras patologias como: problemas na coluna; dores lombares; hipertensão. Por isso, se faz necessário uma maior atenção, voltada para este cuidador para que ocorra melhoria na sua qualidade de vida.

Destacam-se também, situações marcantes vivenciadas no cotidiano do cuidador no cuidar da pessoa amada. As ocorrências destacadas tem relações com os contra tempos da doença terminal, medo da morte do seu ente querido e foram marcadas pelas emoções de dor e sofrimento, além da falta de apoio nas divisões das tarefas (INOCENTI; RODRIGUES; MIASSO, 2009).

De acordo com Yavo e Campos (2016) o cuidar é um papel que pode ser dividido com outros membros da família, como irmãos, genros, marido e, até com o Estado. Todavia, embora reconhecendo, na prática, não há divisão de tarefas, sobrecarregando o cuidador, onde muitas vezes sentem-se desanimados pela falta de apoio, pelo abandono dos familiares e em ter que assumir o papel de cuidar sozinho.

No que se refere a terminalidade da vida, esta é constituída por uma fase difícil, que alcançam o paciente, a família e o cuidador que vivencia essa condição. Além disso, evidencia-se que os cuidadores enfrentam muitas dificuldades em virtude desta nova condição imposta, uma vez que quase sempre abandonam o seu modo de vida: abrindo mão do seu emprego, sua vida social, passando a concentrar toda a sua atenção para o seu ente querido (CUNHA; PITOMBEIRA; PANZETTI 2018).

Observou-se também, que essas mudanças despertam nos cuidadores diferentes sentimentos, tanto positivos: como de estar cuidando de alguém que ama; como negativos: pelo fato de sentirem-se sobrecarregados à nível físico, financeiro, emocional e social. Ressalta-se que os cuidadores parecem aceitar melhor o luto após a morte do seu ente querido, se o apoio necessário é fornecido em casa durante a assistência domiciliar. Entretanto, os resultados de estudos atuais indicam alta prevalência de depressão em cuidadores, cônjuges de pacientes em cuidados paliativos na assistência domiciliar (SOUZA; LOPES; BARBOSA, 2019).

CARVALHO *et al.*, (2015) verificaram que as dificuldades financeiras, considerando a baixa renda familiar e a falta de recursos para dar continuidade ao tratamento, podem trazer implicações diretas para a assistência domiciliar. Os autores destacaram também a dificuldade para encontrar ajuda de familiares ou pessoas próximas para a realização das atividades mais cansativas. Além disso, Fratezi e Gutierrez (2011) também observaram a falta de conhecimento técnico em assumir cuidados nunca antes executados por eles, e muitas vezes realizados sem orientação profissional, fazendo do cuidado com o outro um aprendizado constante, impulsionado pela necessidade de dependência do doente.

3ª CATEGORIA - A IMPORTÂNCIA DA ESPIRITUALIDADE E DA RELIGIOSIDADE POR PARTE DOS CUIDADORES/FAMILIARES

Na última categoria aborda-se sobre a religiosidade e espiritualidade por parte do cuidador/familiar, como alicerce para o enfrentamento do sofrimento e melhor aceitação relacionada a morte, como um processo natural da vida.

Para Lima *et al.*, (2019) a religiosidade e a espiritualidade na vida dos cuidadores têm grande influência, onde as práticas religiosas e espirituais foram enfatizadas como uma necessidade para minimizar as principais preocupações dos cuidadores. Estes quando possuem forte religiosidade e espiritualidade têm um melhor estado geral, bem-estar, mais confiança e tranquilidade para enfrentar os desafios impostos pela doença ameaçadora da vida (FRATEZI; GUTIERREZ, 2011; PAIVA *et al.*, 2015).

No estudo de Maffei *et al* (2019), a fé foi relatada por todos os entrevistados, como forma de conforto, proteção, amparo, segurança, consolo e fortalecimento espiritual. Evidencia-se que a religião ou a espiritualidade transmite paz e permite o enfrentamento das situações obrigatórias da doença, se assemelhando como acréscimo à esperança. Ressalta-se ainda que, nos cuidados ofertados, o paciente tem que ser visto em sua totalidade, e esses sentimentos encontram-se atrelados especialmente a religião (MARTINS *et al.*, 2018; RAHNAMA *et al.*, 2015).

De acordo com Lima *et al.*, (2019) a manutenção da religião alimenta o corpo espiritual do doente e do cuidador, despertando neles um sentimento de conforto, de aceitação, atribuindo para esta fase da vida como um carma, uma situação na qual já estava escrito que ele teria que passar, como uma questão de provação vinda de um ser superior o qual depositam toda a sua fé e buscam forças para continuar.

É importante ressaltar que, a espiritualidade do cuidador é um fator de cuidado sendo ela complexa de ser resumida. Ela representa a procura singular do ser humano para compreensão no contexto da existência e sentido da vida. Neste processo, pode ser entendida de várias maneiras, em virtude da concepção de cada indivíduo. Ela pode ser energia e transcendência, a ser demonstrada por meio de suas crenças, proporcionando a atenuação da dor (BRONDANI *et al.*, 2010; DEZORZI, 2006).

Reforça-se que a religião e a espiritualidade são consideradas por diversos autores, importantes aliados no processo de aceitação da doença e das atribuições impostas por ela, salientando que a espiritualidade e a religiosidade estão no interior de cada ser humano e se manifestam no cuidado com o outro. A espiritualidade e a religiosidade podem ser expressões de cuidado, quando contempla o zelo, o afago e o amor do cuidador pelo seu ente querido, revelando-se na capacidade de ter empatia, se colocando no lado do outro (BRONDANI *et al.*, 2010; PEDRO; MARCON, 2007; SILVEIRA; CALDAS; CARNEIRO, 2006).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Permitiu-se por este estudo analisar a produção científica sobre a concepção dos cuidadores/familiares de pacientes em cuidados paliativos em assistência domiciliar, nos últimos dez anos, demonstrando a importância, a necessidade de se conhecer essa modalidade de cuidado, bem como a escassez de estudos sobre o tema.

Diante do exposto, pode-se observar com esta revisão integrativa a importância desses cuidadores/familiares e as dificuldades por eles encontradas no enfrentamento da doença, devido as responsabilidades a eles atribuídas. Trata-se de uma realidade nunca antes vivenciada por ter este cuidador/familiar que modificar toda a sua rotina e muitas vezes tendo que abdicar da sua própria vida social, do seu emprego para prestar um melhor cuidado a seu ente querido, bem como, fornece a oportunidade de estar no seio de sua família, na finitude de seus dias.

Espera-se que este trabalho possa contribuir para que novas pesquisas sejam desenvolvidas sobre essa temática, a fim de que se amplie o conhecimento em uma área que tende a crescer a cada dia, devido ao aumento das doenças crônicas degenerativas e das políticas voltadas para os cuidados paliativos que buscam cada vez mais a humanização e a aproximação desse doente com a sua família.

REFERÊNCIAS

- [1] ANCP. Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Manual de Cuidados Paliativos ANCP Ampliado e atualizado 2. ed. 2012. 592 p.
- [2] BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno de atenção domiciliar. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 87 p.
- [3] BRONDANI, C. M. et al. Cuidadores e estratégias no cuidado ao doente na internação domiciliar. *Texto Contexto Enferm*, v. 19, n. 3, 2010.
- [4] CARVALHO, D. P. et al. Ser cuidador e as implicações do cuidado na atenção domiciliar. *Texto Contexto Enferm*, v. 24, n. 2, 2015.
- [5] CUNHA, A. S.; PITOMBEIRA, J. S.; PANZETTI, T. M. N. Cuidado paliativo oncológico: percepção dos cuidadores. *J Health Biol Sci*, v. 6, n. 4, 2018.
- [6] DEZORZI, LW. Diálogos sobre a espiritualidade no processo de cuidar de si e do outro para a enfermagem em terapia intensiva. 2006. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.
- [7] FIGUEIREDO, N. M. A. et al. *Enfermagem Oncológica: Conceitos e Práticas*. São Caetano do Sul: Yendis, 2014. 528 p.
- [8] FRATEZI, F. R.; GUTIERREZ, B. A. O. Cuidador familiar do idoso em cuidados paliativos: o processo de morrer no domicílio. *Ciênc Saúde Coletiva*, v.16, n. 7, 2011.
- [9] FONSECA, J. V. C.; REBELO, T. Necessidades de cuidados de enfermagem do cuidador da pessoa sob cuidados paliativos. *Rev Bras Enferm*, v. 64, n. 1, 2011.
- [10] FRIPP, J. C.; FACCHINI, L. A.; SILVA, S. M. Caracterização de um programa de internação domiciliar e cuidados paliativos no Município de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil: uma contribuição à atenção integral aos usuários com câncer no Sistema Único de Saúde, SUS. *Epidemiol Serv Saúde*, v. 21, n. 1, 2012.
- [11] INOCENTI, A.; RODRIGUES, I. G.; MIASSO, A. I. Vivências e sentimentos do cuidador familiar do paciente oncológico em cuidados paliativos. *Rev Eletrônica Enferm*, v. 11, n. 4, 2009.
- [12] LIMA, L. E. S. et al. Juntos resistimos, separados caímos: vivências de familiares cuidadores de pacientes oncológicos em cuidados paliativos. *Rev Pesqui Cuid Fundam*, v. 11, n. 4, 2019.
- [13] MAFFEI, B. et al. Estratégias de enfrentamento de cuidadores de pacientes em cuidados paliativos no domicílio. *Psicol Teor Prat*, v. 21, n. 3, 2019.
- [14] MARTINS, R. S. et al. Corporeidade de adoecidos oncológicos em cuidados paliativos: a vivência de familiares cuidadores. *Rev Pesqui*, v. 10, n. 2, 2018.
- [15] MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto Contexto Enferm*, v. 17, n. 4, 2008.
- [16] OLIVEIRA, M. B. P. et al. Atendimento domiciliar oncológico: percepção de familiares/cuidadores sobre cuidados paliativos. *Esc Anna Nery Rev Enferm*, v. 21, n. 2, 2017.
- [17] OLIVEIRA, S. G. et al. Internação domiciliar do paciente terminal: o olhar do familiar. *Rev Gaúcha Enferm* (online), v. 33, n. 3, 2012.
- [18] OMS. Organização Mundial de Saúde. Disponível em: <http://www.omsinternacional.org>. Acesso em: 20 jul. 2019.
- [19] PAIVA, B. S. R. et al. “Oh, yeah, I’m getting closer to god”: spirituality and religiousness of family caregivers of cancer patients undergoing palliative care. *Support Care Cancer*, v. 23, n. 8, 2015.
- [20] PEDRO, K. S.; MARCON, S. S. Perfil e vivência dos cuidadores informais de doentes crônicos assistidos pelo NEPAAF – Núcleo de estudos, pesquisa, assistência e apoio a família. *Online Braz J Nurs*, v. 6, 2007.
- [21] RAHNAMA, M. et al. Religion as an Alleviating Factor in Iranian Cancer Patients: a Qualitative Study. *Asian Pac J Cancer Prev*, v. 16, n. 18, 2015.
- [22] SILVEIRA, T. M.; CALDAS, C. P.; CARNEIRO, T. F. Cuidando de idosos altamente dependentes na comunidade: um estudo sobre cuidadores familiares principais. *Cad Saúde Pública*, v. 22, n. 8, 2006.

- [23] SOARES, C. B. et al. Revisão integrativa: conceitos e métodos utilizados na enfermagem. Rev Esc Enferm USP, v. 48, n. 2, 2014.
- [24] SOUZA, C. R.; LOPES, S. C. F.; BARBOSA, M. A. A contribuição do enfermeiro no contexto de promoção à Saúde através da visita domiciliar. Revista UFG, v. 6, 2019.
- [25] TURCOTTE, S. Atenção Domiciliar. UNA-SUS/UNIFESP, 2012. Disponível em: https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/pab/4/unidades_casos_complexos/unidade16/unidade16_ft_atencao.pdf. Acesso em: 20 ago. 2019.
- [26] YAVO, I. S.; CAMPOS, E. M. P. Cuidador e cuidado: o sujeito e suas relações no contexto da assistência domiciliar. Psicol Teor Prat, v. 18, n. 1, 2016.

Capítulo 4

A atuação da enfermagem na Atenção Primária frente a disfunção sexual no pós-parto

Angela Lima dos Santos Fonseca

Elizana Mulato Guedes

Maria Emanuely da Silva Irineu

Camila Priscila Abdias do Nascimento

Resumo: De acordo com a literatura 83% das mulheres nos primeiros 3 meses pós-parto vivenciaram problemas sexuais. Com isso o presente estudo tem o objetivo de analisar a assistência de enfermagem sobre a disfunção sexual no pós-parto e os principais fatores associados, cujo diagnóstico precoce pode ser realizado na atenção primária pelo enfermeiro durante o acompanhamento pré-natal e puerperal, devendo assistir a mulher de forma integral. Trata-se de uma revisão integrativa realizada por meio de coleta de dados a partir de levantamento bibliográfico, no período de março e abril de 2020. Foi constatada a escassez de estudos sobre o tema, sendo encontrados 10 artigos sobre a temática. Concluiu-se que a assistência prestada pelo enfermeiro em relação a identificação e detecção precoce das disfunções sexuais presentes no pós-parto é precária e que a consulta puerperal é realizada, na maioria das vezes, com foco apenas no recém-nascido, sugerindo uma má qualidade da assistência prestada a gestante e a puérpera no que se refere a sua sexualidade. Com isso é necessário que o enfermeiro realize um atendimento humanizado à mulher puérpera, atualizações e capacitações à cerca do tema.

Palavra-chave: Disfunção Sexual; Pós-Parto; Puerpério.

1. INTRODUÇÃO

As disfunções sexuais estão presentes em número significativo de mulheres ao longo de suas vidas, sendo que, no puerpério elas ficam mais vulneráveis ao aparecimento (VETTORAZZI, *et al.*, 2012). De acordo com a literatura 83% das mulheres nos primeiros 3 meses pós-parto vivenciaram problemas sexuais (Holanda, *et al.*, 2014).

Os fatores que contribuem para essa disfunção sexual, são as mudanças corporais ocorridas desde a gestação até o pós-parto, onde a maioria das mulheres permanecem com o abdome flácido e as mamas volumosas devido a amamentação, e em alguns casos a dispareunia e episiotomia/episiorrafia também são responsáveis pelo desconforto da mulher nesse período (MENDES, 2012). Mesmo sabendo que essas modificações são naturais e podem ser transitórias, elas podem influenciar e desencadear uma alteração na sexualidade (HOLANDA, *et al.*, 2014).

O diagnóstico da disfunção é de suma relevância e pode ser realizado precocemente na atenção primária, onde acontece o acompanhamento do pré-natal e puerperal pelo enfermeiro, em que este tem um papel importante de educador em saúde, devendo assistir a mulher de forma integral, na intenção de desmistificar dúvidas e cabe à ele ter um olhar especial em relação a sexualidade, pois ela interfere na qualidade de vida, além de estar geralmente associada a questões de saúde em geral (Tozo, *et al.*, 2007). A identificação precoce da disfunção sexual pelo enfermeiro é de suma importância para a detecção de conflitos emocionais e relacionais, além dos devidos encaminhamentos (HOLANDA, *et al.*, 2014).

Assim, o trabalho tem como objetivo analisar a assistência de enfermagem sobre a disfunção sexual no pós-parto e os principais fatores associados.

2. MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa, com intuito de buscar sintetizar e avaliar criticamente as evidências do tema investigado disponíveis, aumentando a capacidade de estudos sobre os dados do fenômeno. A questão norteadora da pesquisa foi: Qual a produção do conhecimento sobre assistência de enfermagem na disfunção sexual no pós-parto e os principais fatores associados.

A busca foi realizada nos meses de março e abril de 2020, nas seguintes bases de dados: *Lilacs* (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e *Scielo* (*Scientific Electronic Library Online*)

Realizamos a busca através dos descritores controlados: "consulta puerperal", "consulta puerperal pelo enfermeiro", "puerpério na atenção básica", e "disfunção sexual no pós-parto". Os artigos selecionados obedeceram aos critérios de inclusão: artigo original, publicados entre os anos de 2015 a 2020, responder à questão norteadora e estar na língua portuguesa, artigos completos e gratuitos, foram excluídos artigos repetidos e os que não respondiam ao objetivo da pesquisa. Depois de concluída a etapa da coleta inicial e aplicados os critérios de inclusão e exclusão mediante a leitura de cada estudo, a amostra constitui-se de 10 artigos, dos 20 artigos analisados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No presente estudo ao analisar os 10 artigos, evidencia a prevalência em 63% dos artigos selecionados, relacionando a episiotomia/episiorrafia e dispareunia, além das transformações corporais com o processo de disfunção sexual no pós-parto. A prevalência de disfunção sexual em nível mundial é elevada, apesar dos dados encontrados serem escassos e heterogêneos, (SILVA, *et al.*, 2017).

Uma das estratégias para o enfrentamento da disfunção sexual no pós-parto deve acontecer na atenção primária a saúde. O estudo realizado por Santos *et al.*, (2018) apontou que o acompanhamento pré-natal é realizado na maioria das vezes apenas com foco nas alterações biológicas causadas pela gestação, o que chama a atenção a falta de abordagem sobre a temática, tendo em vista que a maioria das mulheres retorna ao serviço de saúde no primeiro mês após o parto. Ficando nítido que os profissionais de saúde restringem assistência apenas no binômio mãe-filho relacionado a amamentação e vacinação. Isso pode indicar que as mulheres não recebem informações suficientes para compreenderem as causas do declínio sexual nesse período (CASSIANO, *et al.*, 2015).

Assim, o exercício satisfatório da sexualidade, incluindo a atividade sexual, durante a gravidez e após o parto, é uma preocupação não só da mulher, mas presente entre os casais, reforçando a necessidade do acolhimento das dificuldades pelos especialistas, principais agentes na promoção da saúde sexual, por

meio de esclarecimentos acerca das flutuações hormonais que ocorrem na gravidez e após o parto, com relação à função e aos interesses sexuais. Dentre os profissionais ressalta-se o enfermeiro, que possui um vínculo maior e de proximidade com a gestante na atenção primária como também é possuidor de componente educativo em sua prática de trabalho, podendo abordar estes aspectos durante a consulta de pré-natal e puerperal, porém nos estudos analisados os enfermeiros afirmaram que se não forem questionados ou indagados a abordar quanto a sexualidade, não tem iniciativa nesse sentido (VIEIRA, *et al.*, 2016). Embora frequentes, as disfunções sexuais, especialmente no pós-parto, podem passar despercebidas se os enfermeiros não estiverem atentos e não investigarem os fatores associados à sua presença (HOLANDA *et al.*, 2014). A alta prevalência desse distúrbio no período pós-parto sugere uma má qualidade da assistência prestada a gestante e a puérpera no que se refere a sua sexualidade (GUIMARÃES, 2015).

Nesse contexto a Política de Atenção Integral a Saúde da Mulher (PAISM), é uma grande aliada dos enfermeiros na assistência primária, norteando-os na perspectiva de uma assistência de forma holística, na qual a puérpera será assistida integralmente, podendo assim ter espaço para o diálogo, questionamentos acerca das alterações que possam estar influenciando para a disfunção sexual no pós-parto.

4. CONCLUSÕES

Esse estudo promoveu a reflexão sobre a importância do papel do enfermeiro no atendimento à mulher puérpera frente a situações de disfunção sexual, sendo um dos principais profissionais a detectar, diagnosticar e orientar a mulher diante dessa situação. Com isso, os trabalhos que deram subsídio a essa pesquisa demonstraram escassez de conhecimento profissional para lidar com o assunto e a necessidade de mais pesquisas na área, pois foi identificado que a mulher não é vista em toda sua integralidade na consulta puerperal, afetando a sua vida pessoal e conjugal, sendo necessário que o enfermeiro realize um atendimento humanizado à mulher puérpera e atualizações e capacitações à cerca do tema.

REFERÊNCIAS

- [1] BRASIL. Ministério da Saúde Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf. Acessado em 06 abr. 2020.
- [2] CASSIANO, A. N. et al., Percepção de enfermeiros sobre a humanização na assistência de enfermagem no puerpério imediato. Revista J. res.: fundam. care. online. Rio de Janeiro.v.7, n. 1, p. 2051-2060. 2015.
- [3] GUIMARÃES, J. V. Fatores de Risco Associados a Disfunção Sexual Feminina no Período Pós-parto. 2015. Monografia de Conclusão de curso (Especialização em Formação Pedagógica para profissionais de Saúde) CEFPEPS da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, GOIANIA-GOÍÁS, 2015.
- [4] HOLANDA, J. B. L. et al., Disfunção sexual e fatores associados relatados no período pós- parto. Revista Acta Paul Enferm. São Paulo. v. 27, n. 6, p 573-8. 2014.
- [5] MENDES, T. M. A. P. Vivências da Sexualidade nas Mulheres após o Nascimento do Primeiro Filho. Fatores Condicionantes do Bem-estar Sexual. 2012. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Coimbra, 2012.
- [6] SANTOS, J. S.; CUNHA, K. J. B.; GUIMARÃES, T. M. M. A sexualidade das mulheres durante o período gestacional: uma revisão de literatura. Revista Braz J Surg Clin, v. 21, n. 3, p. 104-109, 2018.
- [7] SILVA, B. C. A. DA. et al., Disfunção sexual feminina e parto normal: uma revisão integrativa da literatura. Revista Brasileira de Ciências da Saúde, v. 21, n. 4, p. 24182, 15 nov. 2017.
- [8] TOZO, I. M. et al., Disfunção sexual feminina: a importância do conhecimento e do diagnóstico pelo ginecologista. Revista Arq Med Hosp Fac Cienc Med Santa Casa São Paulo. São Paulo. v. 52, n. 3, p 94-9. 2007.
- [9] VETTORAZZI, J. et al., Sexualidade e puerpério: uma revisão da literatura. Revista HCPA. Porto Alegre. v. 32. n. 4, p. 473-479, 2012.
- [10] VIEIRA, T. G. et al., Percepção de gestantes acerca da sexualidade e o papel do enfermeiro como educador na atenção primária à saúde. Revista Temas em Saúde, João Pessoa, v.16, n. 2, p. 258-282, 2016.

Capítulo 5

Atuação de enfermeiras(os) obstetras durante o trabalho de parto/parto: Relato de experiência

Maíra Maria Leite de Freitas

Juliana da Silva Magalhães

Cláudia Patrícia da Silva Ribeiro Menezes

Letícia Machado de Sousa

Claudiana dos Santos Silva

Antônio Gean Fernandes Lopes

Camila Ferreira da Silva

Maria Madalena da Silva Araújo

Adria Ferreira de Sousa

Resumo: O presente estudo tem como objetivo relatar a atuação dos enfermeiros obstetras durante o trabalho de parto/parto no CPNi de maternidade secundária do município de Fortaleza. A pesquisa apresenta a estrutura da unidade hospitalar, o fluxo de atendimento, as atividades desempenhadas no trabalho de parto, os tipos utilização de métodos de alívio da dor (bola suíça, cavalinho, banqueta, banho de aspersão). Deste modo, para a assistência as parturientes em trabalho de parto de risco habitual, dispõe de 2 box que são destinados a pacientes com necessidade de monitoramento, sendo elas: trabalho de parto prematuro; Síndrome Hipertensiva Exclusiva da Gestação; indução para gravidez prolonga. Ressalta-se a importância da inserção do enfermeiro tanto ao contato com a paciente como também a busca pela qualificação profissional, onde a saúde está em constante mudança.

Palavras-chave: Enfermagem; Trabalho de parto humanizado.

1. INTRODUÇÃO

A Rede Cegonha (RC) foi lançada em março de 2011 e instituída pela Portaria de nº 1.459, de 24 de junho de 2011 e tem como missão a melhoria na assistência à gestante. Portanto, a RC prima ofertar práticas assistenciais de qualidade na atenção ao parto e ao nascimento do bebê, assim proporcionando a gestante, o direito ao acompanhante de livre escolha durante o período de internação.

Em consonância, as Casas de Parto Normal oferecem ambiência e promove qualidade para o binômio mãe-filho através da participação do acompanhante de livre escolha, permitindo que parturiente tenha autonomia e seja a protagonista deste evento gestacional. Com isso, nas Casas de Parto Normal o atendimento obstétrico e neonatal é realizado por enfermeiras(os) obstetras exercendo as atividades como: partear, métodos não farmacológicos de alívio da dor, oferta de líquidos, monitoramento dos Batimentos Cardio-fetais (BCFs). Tais cuidados assistenciais favorecem a confiança da parturiente com a equipe de enfermagem, promovendo segurança, tranquilidade e tornando o trabalho de parto menos doloroso e mais satisfatório (FERNANDES; ANDRADE; RIBEIRO, 2011).

Ademais considerando que o trabalho de parto é processo fisiológico, busca-se uma assistência de enfermagem menos invasiva, partindo do princípio de que a dor está relacionada com as contrações uterinas e que podem ser aliviadas com os métodos não farmacológicos e menos invasivos, buscando minimizar a ansiedade e a insegurança a parturiente durante o trabalho de parto e parto (CASTRO et al., 2014).

Vale ressaltar que o enfermeiro tem o papel coadjuvante durante a assistência ao parto, pois coloca em prática o seu conhecimento científico a serviço do bem-estar da parturiente. Com isso, o enfermeiro deve realizar orientações de todo o processo do trabalho de parto e reconhecer os momentos críticos em que suas intervenções serão importantes para assegurar a saúde de binômio mãe-filho (VELHO; OLIVEIRA; SANTOS, 2010).

Neste contexto a atuação do enfermeiro obstetra está regida na Lei nº 7498/86, de 25 de Julho, regulamentada pelo Decreto 94.406/87 que dispõem do exercício da enfermagem, no qual o artigo 11º das competências do profissional enfermeiro, no inciso II, destaca como incumbência de “assistir a parturiente e o parto normal; identificar distorcias obstétricas e tomar providencias até a chegada do médico, realizar episiotomia e episiorrafia sob anestesia local, quando necessário” (VELHO; OLIVEIRA; SANTOS, 2010).

Pelo exposto a pesquisa torna-se relevante por apresentar trabalho desempenhado pelos enfermeiros do CPNi e assim elencar a singularidade de ter-se uma prática de assistência humanizada durante a parturição. Portanto, o intuito é promover que o parto em seu processo fisiológico seja um momento acolhedor em que a parturiente possa ser a protagonista neste processo.

Diante disso o presente estudo tem como objetivo descrever a atuação do enfermeiro obstetra durante o trabalho de parto e parto.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência sobre a atuação de enfermeiro obstetra durante o trabalho de parto e parto em uma maternidade secundária situada no bairro Conjunto Ceará no município de Fortaleza – CE.

Esta Unidade Hospitalar dispõe de uma maternidade com aproximadamente 18 anos de existência. Em junho de 2019, teve uma mudança no tocante de assistência a parturiente, foi construído um novo prédio intitulado como Centro de Parto Normal Intra Hospitalar (CPNi).

As pacientes que buscam o atendimento obstétrico passam pelo acolhimento de classificação de risco, onde fica uma Enfermeira que realiza a escuta qualificada e é feita uma classificação de risco com base no protocolo de Manchester.

Deste modo, após a gestante ser classificada e mediante a cor da classificação é direcionada ao médico obstetra. Portanto, se a gestante se encontra em trabalho de parto ativo, ou seja, com dilatação cervical maior ou igual a 4 centímetros será encaminhada a sala de observação para ser realizar os exames básicos de internação: teste rápido de HIV e sífilis e cardiotocografia, concluso ela é encaminhada ao CPNi.

Salienta – se ainda que ao identificar gestantes com as Síndrome Hipertensiva Exclusiva da Gestação serão encaminhadas para a sala de observação para monitoramento em conformidade com a prescrição médica e posterior direcionamento para o CPNi.

A CPNi dispõe 4 salas de Pré-Parto, Parto e Pós-Parto (PPP) e 2 Box onde são destinados a parturiente que tenham a necessidade de uma assistência monitorada (alto risco), sendo elas: trabalho de parto pré-termo, síndromes hipertensivas específicas da gestação, como também aquelas pacientes que dão entrada em período expulsivo do parto.

Com a implantação do CPNi o enfermeiro obstetra tem a autonomia nos partos de risco habitual, onde são 9 enfermeiros capacitados e matriciados pela Maternidade terciária de referência do estado do Ceará.

Neste contexto, para fundamentação teórica, realizou-se a busca dos artigos indexados nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Livros e manuais. Foram utilizados como descritores: Trabalho de Parto, Assistência de Enfermagem e Humanização.

3. RESULTADOS

Os enfermeiros do CPNi ao receber uma parturiente realizam a admissão verificam os batimentos cardíaco-fetais (BCFs), monitoram a evolução do trabalho de parto (TP) utilizando o partograma, orientam e ofertam os métodos não farmacológicos de alívio da dor (bola, cavalinho, banqueta, dentre outros).

A literatura mostra que a inserção de enfermeiros diante do trabalho de parto tem desfecho positivo pois dão ênfase as boas práticas e os métodos não farmacológicos. Estudos mostram que enfermeiros obstetras tem habilidades, competências e humanização, logo, possibilitam um cuidado integral a parturiente, promovendo o processo fisiológico do parto, repercutindo positivamente na saúde materno infantil (REIS et al., 2015).

No CPNi os enfermeiros empoderados do conhecimento científico e das práticas assistenciais buscam desenvolver cuidados com as parturientes, cuidados estes, fundamentados nas recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS) que enfatizaram as mudanças na TP promovendo uma assistência humanizada e tornando o binômio mãe-filho como protagonistas do processo de parto e nascimento (POSSATI et al., 2017).

A Lei de nº 15.759, de 25 de Março de 2015 assegura o direito ao parto humanizado nos estabelecimentos públicos de saúde do Estado e elenca no 3º artigo os princípios de assistência a parturiente tais como:

- I- A harmonização entre segurança e bem-estar da gestante ou parturiente, assim como do nascituro;
- II- A mínima interferência por parte do médico;
- III- A preferência pela utilização dos métodos menos invasivos e mais naturais;
- IV- A oportunidade de escolha dos métodos natais por parte da parturiente, sempre que não implicar risco para sua segurança ou do nascituro;
- V- O fornecimento de informação à gestante ou parturiente, assim como ao pai sempre que possível, dos métodos e procedimentos eletivos.

Neste cenário o enfermeiro tem o papel crucial de promover a humanização da assistência ao TP tornando um marco vital para a mulher, garantindo assim um momento único, singular e natural.

3.1. MÉTODOS UTILIZADOS PARA ALÍVIO DA DOR NA CPNi

Sabe-se que a dor é um dos obstáculos no TP e com a atuação do enfermeiro obstetra há incentivo e encorajamento, propiciando a mulher autonomia para escolher a maneira mais confortável para tornar o momento mais relaxante. Para isso são utilizados métodos não invasivos a fim de reduzir a dor e promover a satisfação e conforto a parturiente.

Os principais métodos ofertados/ utilizados no CPNi em estudo foram: Bola Suíça, Cavalinho e Banho de Aspersão.

3.1.1 BOLA SUÍÇA

A bola suíça tem como objetivo de tornar a parturiente mais ativa durante o processo de parturição promovendo um relaxamento e diminuição da ansiedade. Deste modo, a bola suíça apresenta benefícios cruciais a parturiente como: trabalhar e fortalecer a musculatura do assoalho pélvico em movimentos circulares; corrigir a postura; promover a descida da apresentação fetal no canal e auxiliar no processo de dilatação. É classificada como um método de baixo custo para a instituição (OLIVEIRA; CRUZ, 2014).

Figura 1: Utilização da Bola Suíça pela equipe de enfermagem durante o TP.

Fonte: Internet, 2019

3.1.2. CAVALINHO

O Cavalinho é semelhante uma cadeira de assento investido, onde a parturiente pode apoiar o tórax e os braços jogando o peso para frente e com a ajuda do profissional ou do acompanhante a fim de realizar massagens na região lombar durante a contração (ALVES et al., 2015).

Figura 2: Utilização do Cavalinho pela equipe de enfermagem durante o TP.

Fonte: Internet, 2019.

3.1.3. BANHO DE ASPERSÃO

O banho de aspersão é bastante eficiente para promover o relaxamento e aliviar a dor. Durante o banho a mulher pode ficar sentada na bola suíça e o acompanhante ou o enfermeiro que está partejando pode realizar massageando na região lombar, aliando três métodos para alívio da dor.

Figura 4: Utilização do Banho de Aspersão pela equipe de enfermagem durante o TP.

Fonte: Internet, 2019.

3.2. OUTRAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO ENFERMEIRO OBSTETRA NA CPNi

O Enfermeiro do CPNi realiza a ausculta de BCF durante o TP, observando os parâmetros de 110 à 160 bpm, no período de em 30 e 30 minutos na fase ativa do TP e de em 5 e 5 minutos no período expulsivo.

Em consonância o enfermeiro realiza a instalação de cardiotocografia (CTG) e caso haja alguma intercorrência, identifica e intervém.

O Enfermeiro da assistência ao parto, presta os primeiros cuidados ao RN e a mãe. Intervém em casos de laceração, faz o contato pele a pele na primeira hora de vida, e todas as outras condutas inerentes ao pós-parto imediato.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Realizar este estudo foi de suma importância para conhecer o quão importante é a inserção do enfermeiro obstetra no TP fisiológico, como também o vínculo que é adquirido durante todo o processo de parto. Com isso, a presença do enfermeiro obstetra é crucial, pois os cuidados prestados, a escuta dos anseios e medos faz a diferença para as parturientes.

Foi possível perceber que com a modificação para quartos PPP a privacidade da parturiente aumentou, tornando o ambiente de parto mais íntimo e acolhedor, possibilitando também a equipe formar um maior vínculo com a paciente e tornar o cuidado mais individualizado.

Conhecer a rotina do CPNi mostrou a necessidade de os enfermeiros obstetras estarem em processo contínuo de qualificação, pois as atividades desenvolvidas são de enorme importância. Portanto, aprimorar o conhecimento científico, promover a confiança entre as parturientes e desempenhar a assistência com qualidade será um ponto norteador e primordial para a promoção de saúde do binômio mãe – filho.

REFERÊNCIAS

- [1] ALVES, C. A. et al. Humanização do parto a partir dos métodos não farmacológicos para alívio da dor: Relato de experiência". SANARE-Revista de políticas públicas.; v.14, p. 70-74, 2015.
- [2] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Gestação de alto risco: manual técnico/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 5. Ed – Brasília: Editora do Ministério da Saúde.; p.302, 2012.
- [3] CASTRO, A.S.; CASTRO, A.C.; MENDONÇA, A.C. Abordagem fisioterapêutica no pré-parto: proposta de protocolo e avaliação da dor. Fisioter. Pesqui.; v. 19, n. 3, p. 210-214, 2012.
- [4] FERNANDES, B.M.; ANDRADE, A.M.; RIBEIRO, L.C. "Avaliação do pré-natal de risco habitual realizado por enfermeiras obstetra de uma casa de parto". Revista de enfermagem do centro oeste mineiro.; v.1, p. 17-29, 2011.
- [5] MASCARENHAS, V.H.A. et al. Evidências científicas sobre métodos não farmacológicos para alívio a dor do parto. Acta paul. enferm.; v.32, n.3, p.350-357, 2019.
- [6] OLIVEIRA, F.A.M. et al "Reflexões acerca da atuação do enfermeiro na rede cegonha". Revista de enfermagem UFPE on line.; v. 10, n.2, p. 867-74, 2016.

- [7] OLIVEIRA, L.M.N.; CRUZ, A.G.C. "A utilização da Bola Suíça na promoção do parto humanizado." *Revista Brasileira de Ciências da Saúde*; v.18, n.2, p. 175-180, 2015.
- [8] POSSATI, A.B. et al. Humanização do parto: significados e percepções de enfermeiras. *Esc. Anna Nery*; v. 21, n. 4, 2017.
- [9] SAMPAIO, A.R.R.; BOUSQUAT, A.; BARROS, C. Skin-to-skin contact at birth: a challenge for promoting breastfeeding in a "baby friendly" public maternity hospital in Northeast Brazil. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*; v. 25, p. 281-290, 2016.
- [10] VELHO, M.B.; OLIVEIRA, M.E.; SANTOS, E.K.A. Reflexões sobre a assistência de enfermagem prestada à parturiente. *Rev. bras. enferm.*; v. 63, n. 4, p. 652-659, 2010.
- [11] REIS, T.R. et al. Enfermagem obstétrica: contribuições às metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. *Rev. Gaúcha Enferm.*; v. 36, n. spe, p. 94-101, 2015.

Capítulo 6

Baby blues em mulheres primíparas: Sintomas e estados de humor nos primeiros quinze dias após o parto

Aline de Sousa Rocha

Benedita Maryjose Gleyk Gomes

Roberta Meneses Sousa

Andréia Sousa da Rocha Moraes

Marcos Antonio Silva Batista

Rosane Cristina Mendes Gonçalves

Resumo: Logo após o concebimento do bebê, uma massa de mulheres tem demonstrado sinais de alterações de humor, usualmente denominado baby blues, este identifica-se por estado emocional alterado e por uma considerável melancolia, atingindo cerca de 80% das primíparas até o terceiro dia após o parto. Nesse sentido, o presente estudo tem a finalidade de abordar o baby blues em relação a sua classificação, descrevendo as alterações sofridas pela mulher no puerpério, lhes mostrando a possibilidade de identificação da sintomatologia originada do baby blues, onde elas possam compreender que existe uma tristeza materna passível de acontecer nesse período e que a mesma não é determinada como depressão. O método consiste numa revisão sistemática de literatura, onde se fez uso de matérias de produção nacional, bem como internacional, dessa forma possuímos uma ampla variedade de bases de dados que serviram como suporte. Diante os resultados, vemos o baby blues como um acontecimento que ocorre com frequência significativa, porem apresenta curto período de duração, não se fazendo necessário o acompanhamento médico, uma vez evidenciado esse fator, a família da gestante e o companheiro da mesma seriam os principais e mais importantes pontos de apoio para a sua positiva melhora. Conclui-se, portanto, que existe uma real necessidade do apoio familiar voltado a puérpera em situação do baby blues uma vez que o sofrimento em questão pode interferir no relacionamento do binômio mãe-filho.

Palavras-chave: Baby blues; parto; tristeza.

1. INTRODUÇÃO

O período puerperal pode ser abarbadado por diversas mudanças de humor em particular pela depressão pós-parto e o baby blues. A literatura brasileira faz uso das nomenclaturas e definições, síndrome da tristeza do pós-parto, ou baby blues, para a literatura inglesa, que também a caracteriza por sintomas como tristeza, irritabilidade e tendência a chorar nos primeiros dias do pós-parto (FAISAL-CURY et al., 2008).

Na fase gestacional é notório um grau de vulnerabilidade da mulher, uma vez que seu corpo, reestruturação hormonal, sua vida social e familiar está passando por fases de adaptação, não havendo um acolhimento humanizado e compreensão do seu estado por parte dos familiares e da equipe de saúde no período gravídico, a mesma se tornará suscetível ao desenvolvimento da tristeza puerperal. (MEDEIROS, CARVALHO E VENENO, 2017).

O próprio baby blues traz consigo uma incógnita: Uma vez que a experiência de viver a realização materna, que para muitas é motivo de extrema felicidade. O nascimento de um filho traz um determinado grau de melancolia? (LEAL, 2018).

O baby blues tem o sentido de impulsionar uma certa abertura da troca emocional entre a mãe e o seu filho, visto que notoriamente discerni três tipos de experiências emocionais no pós-parto mistura de emoções tristeza materna; melancolia intensa, permanente postpartum blues e sem postpartum blues (BYDLOWSKI, 2013).

Logo após o concebimento do bebê, uma massa de mulheres tem demonstrado sinais de alterações de humor, usualmente denominado baby blues. Devido a periodicidade dessa conjuntura o baby blues é apontado como um estado fisiológico certamente associado a alterações biológicas (BAİLARA et al., 2005).

O baby blues identifica-se por uma depressão mais plácida, estado emocional e melancolia, atingindo cerca de 80% das primíparas até o quinto dia após o parto. De praxe os sintomas podem desaparecer espontaneamente em cerca de 15 dias. Devido a sua elevada prevalência, é importante que a primípara seja orientada quanto as informações sobre a probabilidade dessa mudança de humor, seus sinais e sintomas momentâneo, caso seja necessário é importante que sejam orientadas quanto à procura de ajuda especializada se porventura os sintomas persistirem por mais de duas semanas (CAMACHO et al., 2006).

Nesse sentido, o presente estudo tem a finalidade de abordar o baby blues em relação a sua classificação, descrevendo as alterações sofridas pela mulher no puerpério, lhes mostrando a possibilidade de identificação da sintomatologia originada do baby blues, onde elas possam compreender que existe uma tristeza materna passível de acontecer nesse período e que a mesma não é determinada como depressão, uma vez que se apresenta de forma mais branda e acontecendo de maneira menos intensa, tanto no desenvolvimento quanto na durabilidade da instalação do adoecimento.

O artigo está disposto em sessões, que contemplam o referencial teórico onde é tratada a literatura de determinação da origem do baby blues, o baby blues em seu contexto geral e o apoio familiar voltado a puérpera quando em situação de baby blues, as sessões seguintes tratarão o método utilizado para a elaboração do artigo e os resultados e discussões como produto de todo o texto escrito, por fim as considerações finais, encerrando a ideia central e reafirmando os pontos de maior relevância encontrados ao longo desta produção.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. A ORIGEM DO BLUES

Primeiramente podemos encontrar várias nomenclaturas das quais designa-se o termo Blues na literatura, dentre elas estão baby blues, maternity blues, (blues materno ou da maternidade), postpartum blues, (blues do pós-parto), blues puerperal (melancolia puerperal) entre outros, os diversos nomes parecem indicar uma certa conformidade sobre o que o blues retrata. E por mais que ele apresente uma gama variada de cognomes, faz-se necessário entender primeiro onde originou-se o termo Blues (FOLINO, 2014).

O termo blues tem como significado a cor azul, a mesma possui a definição de “triste” “tristeza”, “melancolia” ou até mesmo “sem esperança”. Voltando na história que acontecia por volta de 1870 no sul dos Estados Unidos, os escravos das fazendas de algodão da época, nas margens do rio Mississipi, criavam e cantarolavam canções lastimosas e desanimadas, que mostravam o ritmo, a expressão e o desvio de um povo meramente menosprezado, separado e desafortunado (CORAGEM, 2015).

Os afro-americanos eram injustiçados com todas as maneiras de repressão, foi essa conjuntura histórica a responsável por arrojar o início do Blues em Nova Orleans. Antes de atribuir-se gênero musical, o blues foi de uma grande relevância histórica da tradição oral americana formada pelas as circunstâncias sociais da época. As canções de Blues poderiam ir da maior felicidade a melancolia mais obscura, o que significa que este estilo musical modula uma carga de sentimentos. Brotava então uma nova forma de sentença e que foi-se refletindo imediatamente a sociedade do seu tempo, o que não demorou muito para o blues tornar-se bastante admirado por todo o Mississipi Delta (PLANETA MUSICA, 2017).

Entretanto, o blues incorpora e conceitua não só apenas as privações e existências dos negros sulistas dos Estados Unidos, era um grito de liberdade por todos aqueles que se sentiam humilhados social e culturalmente, como maneira de vencer os obstáculos e sobreviver diante a pactos e ordens estabelecidos diariamente. Após o fim da opressão legítima, a escravidão, o blues seguiu-se apresentando como maneira de lutar mediante a submissão exigida pelo o cotidiano (PINHEIRO E MACIEL, 2011).

Além de ter influenciado o aparecimento de diversos gêneros musicais nos EUA, o blues é visto por poucos, mais do que um ritmo musical, sendo assim uma representação de estado de humor, onde arriscamos a dizer emocional. Pesquisadores do tema baby blues acreditam em um estado de espírito ou o meio do que se exterioriza esse estado de humor (FOLINO, 2014).

2.2. BABY BLUES

Tornar-se mãe não é tão simples como imaginamos. Em vez de esperar por um “episódio feliz”, diversas mulheres vivem mal o estado gravídico. Algumas mulheres, antes e após o parto estão cercadas por ideias atípicas, tendem a apresentar um choro frequente, julgam-se inaptas e que não possuem habilidades para zelar do seu filho, por esta razão geram duvidas também nos companheiros. (DAYAN, 2016).

A grande maioria das mães de primeira viagem vivenciam o “baby blues” ao longo das primeiras semanas após o parto, dentre os sintomas como a ansiedade, irritação e choro, normalmente pioram entre o terceiro ou quinto dia após o nascimento do bebê. Apesar de ser bastante comum, as mães que passam por este quadro, sentem-se envergonhadas por não estarem radiantes no momento que deveria ser o mais feliz da sua vida (HARVARD, 2011).

De acordo com Iaconelli (2005), o baby blues, no que lhe concerne, acomete cerca de 80% das mulheres, mas devido ao medo exposto consegue-se idealizar um índice até maior. A labuta de uma mãe com seu bebê recém-nascido é maçuda, exaustiva e sem retribuição ou reconhecimento do recém-nascido, a curto prazo. O bebê é incompressível em suas indigências, e isso torna-se complicado para que a mãe possa se doar, principalmente se a mesma estiver diante de um estado de agitação maníaca.

O período do pós-parto está associado a mudanças físicas e emocionais acentuadas, e por isso levam a ansiedade e distúrbios de humor, no baby blues ou postpartum blues, os sintomas são mais leves e também mais comuns, geralmente começa até três dias após o parto e é distinguido por variações bruscas de humor, como; melancolia, irritabilidade, impaciência, insônia, ansiedade, crises de choro, solidão e um sentimento de vulnerabilidade (MANJUNATH, VENKATESH E RAJANNA, 2011).

Os sintomas tendem a serem mais precisos no terceiro dia após o parto, tempo necessário para a mãe, constatar que o seu filho recém-nascido que ela aninha em seus braços não é mesmo que idealizou durante a gestação. É nesse instante onde a recém-mãe pode descobrir que seu bebê requer dela para tudo, não é apenas um tudo restrito ou partilhado, este bebê é único, singular e exige cuidado e atenção: alimentar, higienizar, aconchegar, cinesia, amor, afeto e tantas qualidades que apenas uma mãe pode ofertar para seu filho (GLASHAN, 2017).

O baby blues raramente necessita de intervenção profissional, sendo suficiente o suporte familiar para que a primípara se recupere, todavia, a constância e a extensão de seus sinais e sintomas podem ser indícios do desenvolvimento de depressão pós-parto (OLIVEIRA E BARBOSA, 2016).

2.3. APOIO FAMILIAR

No contexto a família é o bramido, no que tange, a transmissão de princípios e instruções, pois ela atua de forma direta e lépida no desenvolvimento pessoal e moral do ser humano, auxiliando-os no enfrentamento dos problemas, sendo olhada como uma menção no processo de formação individual e pessoal do indivíduo. Vale ressaltar que a família pode ser visualizada como uma unidade primordial do cuidado, desse modo, o apoio oferecido pela a mesma, pode ser de grande valia, pois corrobora para que as

necessidades dos sujeitos sejam prontamente supridas em inúmeros aspectos da vida, inclusive aqueles referentes a saúde e doença (MARQUES, 2015).

O amparo social em vários momentos da vida é essencial para atenuar episódios estressantes que ocorrem no cotidiano, precipuamente em momentos em que se percebe múltiplas mudanças psicossociais e fisiológicas, como por exemplo a gestação. (THIENGO et al., 2012).

No que se refere ao período gravídico da primípara, compreende-se que o apoio familiar é de grande relevância, visto que pode ser essencial no manejo de diversas exigências específicas após o parto. A gravidez e o puerpério são períodos difíceis, tanto biologicamente quanto psicologicamente, em consequência das alterações fisiológicas que preparam a gestante, para o parto, nascimento e os cuidados seguintes. Vale salientar que o apoio paternal durante o período do puerpério irá além do ato de prover, podendo ser entendido pela a sua cooperação em atividades direcionadas as puérperas, amparando-as em todas as dúvidas que estejam relacionadas a chegada do recém-nascido, oferecendo apoio emocional que convém com o momento abarcado da mulher. Auxiliando-as com o planejamento do parto ou até mesmo a escolha do nome do filho, mantendo-se informado acerca de todos os detalhes, assim garantindo que a primípara tenha um pós-parto saudável. Nesse período torna-se indispensável a acolhida dos familiares e sociedade (ROMAGNOLO et al., 2017).

O apoio familiar é imprescindível para adargar as mães nos momentos onde elas sentem-se hipersensibilizadas, seja em forma de afeto, companhia, assistência e de como atender as necessidades de um bebê, ou melhor, tudo que ajude a mesma sentir-se amada, apreciada, valorizada e segura, todavia a interação da família ajuda a assegurar o suporte social necessário (SANTOS E SERRALHA, 2015).

3. MÉTODO

Para alcançar os objetivos da pesquisa efetuou-se o levantamento bibliográfico nos seguintes meios eletrônicos: Scielo, LILACS, portal da CAPES, Medline, Fiocruz, Paho, Wholis, BDEF e BVS e BVS-Psi, nos meses de fevereiro e abril de 2019, publicações contendo informações relevantes quanto ao tema em questão. Foram utilizados como descritores para as bases de dados internacionais as palavras: *baby blues; postpartum blues; maternity blues; blues puerperal; transitory syndrome, third day syndrome e oversensitivity syndrome*. Para a base de dado nacional foram utilizados os termos: melancolia do pós-parto, síndrome da tristeza do pós-parto, tristeza materna e síndrome do terceiro dia. O critério de inclusão acerca de materiais de uso foi artigos, livros, revistas e sites que abordavam a temática.

Foram analisados 30 artigos referente ao tema e selecionado 16 artigos para o desenvolvimento da pesquisa. O critério de seleção se deveu ao fato de publicações atuais e relevantes sobre o assunto.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Diante de todo o exposto e das literaturas trabalhadas, vale apresentar de forma inicial a primeira origem do blues, quando Folino (2014), exhibe em suas definições, o blues com várias outras nomenclaturas, que convergem entre si e que de forma ampla não fogem à ideia original, nem tão pouco ao seu surgimento. Surgimento este que Coragem (2015), relata ter nascido das tristes histórias dos afro-americanos ainda no ano de 1870, no sul dos Estados Unidos, quando esses eram escravizados e viam no “cantar as suas melancolias”, um acalento para tamanho desprezo e abandono social, daí a sua primeira origem estar atrelada à música, ao blues, que em pouco tempo tomou ampla disseminação em todo o Mississipi Delta.

Compreender a origem do blues, é pressuposto para compreender o nascimento de toda uma história, ao passo que no primeiro momento o blues é visto como amparo as sofridas vivências dos afro- americano, ele também passa a ser percebido e lembrado, sempre que se fala em tristeza, lamento, sofrimento e melancolia, assim sendo, Folino (2014), vai além na sua compreensão, quando determina o blues como sendo muito mais que um ritmo musical, mas um estado de espírito com o intuito de externalizar um dado estado de humor.

Partindo desse ponto, temos o baby blues, que assim como o blues, retrata a tristeza e a melancolia, porem visto dentro de outros processos. Harvard (2011) relata que muitas mães de primeira viagem podem vivenciar no pós-parto, sintomas como irritabilidade, ansiedade e choro sendo este momento intitulado como, baby blues, ou ainda, maternity blues, (blues materno ou da maternidade), postpartum blues, (blues do pós-parto), blues puerperal, como anteriormente Folino (2014), já havia caracterizado.

É possível ainda destacar, que o número de mulheres que vivenciam o baby blues, é um número muito significativo, girando em torno de 80%, das puérperas, Iaconelli (2005) associa este intenso surgimento do blues materno, ao fato de a mãe vivenciar uma exaustiva atividade de cuidado, arregrada de uma dependência muito grande por parte do recém-nascido, o que por vezes, acaba por maximizar consubstancialmente o sofrimento materno, potencializando as crises de humor, a ansiedade, as crises de choro e maníaca, a insônia e ainda a vulnerabilidade e o medo da impotência diante de tantas ações que lhes requerem total e exclusiva dedicação.

Falcke e Wagner (2000), relatam que para muitas mulheres a maternidade é sustentada sob muitas expectativas, que fazem parte da cultura do desenvolvimento materno, permitindo que essas acreditem numa falsa maternidade perfeita, fazendo parecer que existe um amor inato da mãe para com o filho o que tornaria o cuidado e o saber lidar com a criança, como sendo uma situação intrínseca ao processo de se tornar mãe.

Glashan (2017), ainda determina que existe prazo para que esse sofrimento materno aconteça, e que este seria por volta do terceiro dia do pós-parto, quando ela constata que a criança a quem ela trouxe ao mundo, não é muitas vezes o que ela idealizou, mas é sobretudo uma gama variada de necessidades, como amor, carinho, atenção, amamentação, e uma grande dedicação diária, que exige dela, muito mais do que ela imaginou ser necessária. Contudo mesmo diante de tamanha expressão de sofrimento, Oliveira e Barbosa (2016), afirmam que não existe a necessidade de intervenção médica para com essa mãe, e que apenas o suporte familiar já seria fator ideal para que ela tenha uma significativa melhora.

Quando voltamos o olhar para a necessidade do suporte familiar, Marques (2015), determina que a família é o grupo social de desenvolvimento da formação pessoal e da capacidade dos enfrentamentos, diante do exposto, o seu suporte e acolhimento se tornam de grande valia para o indivíduo em sofrimento, permitindo que este seja assistido em variadas situações ao longo de toda a vida. Quando o sofrimento observado é o de mulheres no período do puerpério, muitas são as literaturas que classificam o período da gestação e pós-parto como difíceis de serem vivenciados, pois carregam juntos uma considerável gama de alterações psicológicas e biológicas, baseado nessa concepção Santos e Serralha (2015) pontuam que não resta dúvidas sobre a necessidade do acolhimento familiar para com a puérpera, fazendo com que a mesma se sinta amada, amparada e compreendida.

Romagnolo et al. (2017) destaca ainda a necessidade do cuidado e da participação direta do pai, em todo o contexto do desenvolvimento da gestação ao parto e posteriormente a ele, dizendo que o “ser pai”, está muito além de assistir apenas ao recém-nascido, mas consiste principalmente em acolher a companheira em todas as necessidades que forem apresentadas pela mesma.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao findar a presente revisão, teve como objetivo demonstrar a importância de cuidar e dar a devida atenção a puérpera, uma vez que a hipersensibilidade materna é bastante relevante no período do pós-parto. Vários sentimentos são narrados mostrando que a primípara se sente desassistida, com dificuldades em cuidar do recém-nascido, alterações no sono e repouso e em suas relações com o grupo familiar. Os sentimentos na ligação com o filho ganham aspectos negativos. Muitas das vezes as puérperas e as pessoas do seu convívio mais próximo associam a situação ao cansaço de lidar com o recém-nascido e com toda a demanda por ele exposta.

Diante do texto é notória a real necessidade de estudos mais aprofundados, voltados a temática, uma vez que os achados apontam para a carência de informações precisas sobre o baby blues, deixando muitas questões em aberto, como por exemplo a verdadeira origem do sofrimento, principais problemáticas que podem surgir com ele, influencia ou não de fatores hormonais e sua relação com o surgimento de sofrimentos depressivos mais severos.

Em consonância com toda a literatura trabalhada, o que se torna mais sólido e evidente é a necessidade do apoio da família e paterno a mulher em situação de *baby blues*, uma vez que a família vivencia junto a ela todo o processo gestacional, processo este que naturalmente já exige muito da mulher devido as várias alterações e transformações que a acometem, originando muitas vezes medos e angústias que podem influir sobre seu processo de pós-parto. A relação e aproximação com a família torna o estado menos doloroso e mais fácil de ser superado. A ansiedade e o medo são evidenciados, mas o sentimento de amor e alegria são explícitos.

REFERÊNCIAS

- [1] ANDRADE, M. et al. Tristeza materna em puérperas e fatores associados, revista portuguesa de enfermagem de saúde mental no.18, porto dez. 2017. Disponível em: <<https://bit.ly/2VMBhUQ>>. Acesso em: 07 fev. 2019.
- [2] BAÏLARA, K. M. et al. Le baby blues: caractérisation clinique et influence de variables psycho-sociales, L'encéphale vol 31, N° 3 - JUIN 2005. Disponível em: <<https://bit.ly/2DQnoec>>. Acesso em: 08 fev. 2019.
- [3] BYDLOWSKI, S. et al. postpartum blues: a marker of early neonatal organization? Infant mental health journal, 24 Sep 2013. Disponível em: <<https://bit.ly/2Y5q6Ec>>. Acesso em: fev. 2019.
- [4] CAMACHO, R. S. et al. Transtornos psiquiátricos na gestação e no puerpério: Classificação, Diagnóstico E Tratamento. Rev. psiquiatr. Clín. São Paulo, v. 33, n. 2, p.92- 102, 2006. Disponível em: <https://bit.ly/2GZHDGZ>>. Acesso em: 18 fev. 2019.
- [5] CORAGEM, H. caleidoscópio portal cultura, 20.... <. Disponível em: <https://bit.ly/2J2Nej9>>. Acesso em: 19 fev. 2019.
- [6] DAYAN, J. Les baby blues. 1. ed. France: Puf, 2016.
- [7] FAISAL-CURY, A. et al. Maternity “Blues”: Prevalence and Risk Factors, The spanish journal of psychology, Vol. 11, No. 2, 593-599, 2008. Disponível em: <<https://bit.ly/2WrGMp7>>. Acesso em: 19 mar. 2019.
- [8] FOLINO, C.S.G. Sobre dores e amores: caminhos da tristeza materna na elaboração psíquica da parentalidade. 2014. Tese (Doutorado em psicologia) – Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, São Paulo. Disponível em: <<https://bit.ly/2POhn6x>>. Acesso em: 20 abr. 2019.
- [9] GLASHAN, R.; melancolia, baby blues – acho que estou estranha. 2017. Disponível em: <<https://bit.ly/2WugXou>>. Acesso em: 20 abr. 2019.
- [10] HARVARD, M. Publishing: Beyond the “baby blues”. 2011. Disponível em: <<https://bit.ly/2VKPx0l>>. Acesso em: 20 abr. 2019.
- [11] IACONELLI, V. depressão pós-parto, psicose pós-parto e tristeza materna, Revista Pediatria Moderna, JUL/AGO, V. 41, N° 4, 2005. Disponível em: <<https://bit.ly/2YajdRY>>. Acesso em: 22 abr. 2019.
- [12] LEAL, F. A.; “Loucura Materna” No Pós-Parto: Via De Constituição Do Campo Materno, Revista Diálogos Possíveis, salvador, ano 17, número 1, P.81 -95, jan. /Jun. 2018. Disponível em: <<https://bit.ly/2vEkZ1t>>. Acesso em: 19 abr. 2019.
- [13] MARQUES, L. A. Apoio familiar às mulheres com sintomas de depressão pós-parto. 2015. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande, RS. Disponível em: <<https://bit.ly/2WtPH9o>>. Acesso em: 20 abr. 2019.
- [14] MEDEIROS, N. C. V.; CARVALHO, P. A.; VENENO, J.; A Relevância Da Detecção Precoce Dos Sinais E Sintomas Da Depressão Pós-Parto Em Puérperas Pelo Enfermeiro, centro universitário são lucas, 2017. Disponível em: <https://bit.ly/2VOaOpU>>. Acesso em: 19 abr. 2019.
- [15] MÚSICA, P: as origens do blues e seus personagens, 2017. Disponível em: <http://planetamusica.net/as-origens-do-blues-e-seus-personagens>. Acesso em: 19 fev. 2019.
- [16] NARASIMHAIAH, G. M. VENKATESH, G.; RAJANNA; postpartum blue is common in socially and economically insecure mothers. indian j community med, Jul-Sep 2011. Disponível em: <<https://bit.ly/2V0VJgo>>. Acesso em: 19 abr. 2019.
- [17] OLIVEIRA, I.; BARBOSA, F.C; depressão pós-parto e seus efeitos na relação mãe-bebê, faculdade ciências da vida – fev/nov 2016. Disponível em: <<https://bit.ly/301lxN2>>. Acesso em: 19 abr. 2019.
- [18] PICCININI, C. P. et al. Gestação e a constituição da maternidade, psicologia em estudo, Maringá. v. 13, n. 1, p. 63-72, jan. /mar. 2008. Disponível em: <https://bit.ly/2V4oJDJ>>. Acesso em: 20 abr. 2019.
- [19] PINHEIRO, M.S.; MACIEL, F.; blues Manifestação e inserção sociocultural do negro no início do século xx, revista outros tempos volume 8, número 12, dossiê história atlântica e da diáspora africana, dez. 2011. Disponível em: <<https://bit.ly/2VOf0La>>. Acesso em: 20 abr. 2019.
- [20] ROMAGNOLO, A. N. et al. A família como fator de risco e de proteção na gestação, parto e pós-parto, semina: ciências sociais e humanas, londrina, v. 38, n. 2, p. 133-146, jul. - dez. 2017. Disponível em: <<https://bit.ly/2JkQd5S>>. Acesso em: 19 abr. 2019.
- [21] SANTOS, L. P.; SERRALHA, C. A.; repercussões da depressão pós-parto no desenvolvimento infantil, universidade federal do triângulo mineiro – uftm – Brasil, jan-jun 2015. Disponível em: <<https://bit.ly/2LpAwNo>>. Acesso em: 19 abr. 2019.
- [22] THIENGO, D. L. et al. Depressão durante a gestação: um estudo sobre a associação entre fatores de risco e de apoio social entre gestantes, cad. Saúde colet., out 2012.

[23] Disponível em: < <https://bit.ly/2V6OoM4>>. Acesso em: 19 abr. 2019.

[24] FALCKE, D.; WAGNER, A. Mães e madrastas: mitos sociais e autoconceito. Estudos de Psicologia. Natal, v. 5, n. 2, p. 421-441, 2000. Disponível em: <https://bit.ly/2H3AiaK> Acesso em: 1 mai de 2019.

Capítulo 7

Intercorrências obstétricas e neonatais: Complicações que acometem o recém nascido

Andressa Teixeira Machado

Cleide Monteiro Zemolin

Caren Franciele Coelho Dias

Ezequiel da Silva

Clebiana Alves e Silva Diniz

Cláudia Maria Diaz

Resumo: Frente às mudanças fisiológicas e as possíveis complicações que podem ocorrer durante o período gravídico-puerperal e ao recém-nascido, esta pesquisa teve como objetivo conhecer as principais complicações que acometem o recém-nascido no trans e pós-parto. Estudo quantitativo, retrospectivo documental, realizado nos prontuários do ano de 2012 de um hospital de médio porte da cidade de Santa Maria, RS. Os dados foram analisados pelo método estatístico. Neste período ocorreram 794 partos, incluindo vaginais e cesarianas. Destes, foram analisados 789 prontuários, devido à disponibilidade dos mesmos durante o período de coleta de dados. Em relação ao total de nascimentos, 12% dos recém-nascidos receberam algum tratamento clínico, dentre estes 28% realizaram antibióticoterapia, 43% fototerapia e 29% necessitaram de cuidados mais intensos por complicações. Quanto à idade gestacional dos recém-nascidos, 50% eram a termo com idade gestacional entre 36 a 39 semanas e 37% de recém-nascidos pós-termo. No que diz respeito ao pré-natal, 40% das mães não realizaram o que preconiza o Ministério da Saúde, o que poderia evitar as complicações na hora do nascimento. A partir desses dados, destaca-se a importância dos profissionais que atuam nos hospitais, juntamente com as unidades de saúde e as instituições de ensino que atuam na saúde materno-infantil, em investir em grupos de preparo para a gestante.

Palavras-chaves: Recém-nascido; Complicações; Gravidez.

1. INTRODUÇÃO

Até o final dos anos 1960 a mulher era vista especificamente para realizar um papel reprodutivo e cuidador, responsável pela criação e cuidado com a saúde dos filhos e demais familiares. Neste período foi criado o primeiro programa referente a saúde da mulher, chamado de PSMI (Programa de Saúde Materno Infantil), que abrangia somente o circo gravídico-puerperal (pré-natal, parto e puerpério) (BRASIL, 2011).

Com o decorrer do tempo as mulheres foram conquistando seu espaço na sociedade, deixando de lado o papel apenas reprodutor, sendo valorizada como pessoa com necessidades de cuidado. A partir de então surge a Política Nacional de atenção à saúde da mulher, que mantém um cuidado integral a esta clientela.

Mesmo com todas as mudanças e evoluções referentes ao período gestacional, é indispensável o cuidado direcionado a saúde da mulher nos diferentes contextos onde esteja inserida. Neste estudo destacam-se, as complicações ocasionadas pelo descaso no cuidado e orientações da mulher na gestação.

Frente a isso, o Ministério da Saúde vem realizando estratégias para dar suporte na atenção ao período gravídico da mulher, como o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN), instituído pela Portaria do Gabinete Ministerial n.º 569, de 01/06/2000, que visa assegurar a melhoria do acesso da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério às gestantes e ao recém-nascido (RN) na perspectiva dos direitos de cidadania (BRASIL, 2002).

A gravidez produz complexas modificações no organismo da mulher, que apesar de ser um processo fisiológico, alguns fatores podem o limitar como patológicos, os quais podem ser evitados a partir de um acompanhamento pré-natal. A atenção pré-natal e puerperal deve acolher a mulher desde o início da gravidez, assegurando que o nascimento seja seguro e sem complicações para a mãe e o RN. Esta atenção deve ter como características essenciais a qualidade e humanização. É dever dos serviços e profissionais de saúde acolher com dignidade a mulher e o RN, enfocando-os como sujeitos de direitos (BRASIL, 2006a).

Conforme dados coletados no Sistema de Informação da Mortalidade (SIM) através da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde de Santa Maria, no ano de 2012, por município de ocorrência, foram notificados em Santa Maria 56 óbitos fetais (Natimortos), 30 óbitos neonatais precoces (0 a 6 dias) e 11 óbitos neonatais tardios (7 a 27 dias). Estes óbitos são divididos em categorias, são elas: óbitos reduzíveis por atenção a mulher na gestação, reduzíveis por atenção a mulher no parto, reduzíveis por adequada atenção ao RN, causas mal definidas e não evitáveis.

Justifica-se este estudo, pela complexidade do nascimento para o RN sendo relevante que os profissionais de enfermagem estejam instrumentalizados para atender as principais complicações que podem ocorrer. Assim, será possível prestar assistência com resolutividade ao RN, considerando sua história gestacional.

A partir destas reflexões tem-se como questão norteadora: Quais as principais complicações que acometem o recém-nascido com intercorrências no pré, trans e pós-parto em um Hospital de médio porte?

E como objetivo: Conhecer as principais complicações que acometem o recém-nascido no pré, trans e pós-parto.

2. METODOLOGIA

Estudo quantitativo, retrospectivo documental o qual está inserido na Linha de Pesquisa educação, sociedade e integralidade na saúde e que atende ao eixo temático Educação para o cuidado em saúde nos diferentes cenários sociais a qual integra o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Saúde (GIPES).

A pesquisa quantitativa tem como objetivo descobrir quantas pessoas de uma determinada população compartilha uma característica ou um grupo de características. Ela é projetada para gerar medidas precisas e confiáveis que permitam uma análise estatística (MORESI, 2003).

A pesquisa documental caracteriza-se como uma fonte de coleta de dados restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias (LAKATOS; MARCONI, 1991).

A pesquisa foi realizada em um Hospital de médio porte e média complexidade, localizado na região central do Rio Grande do Sul, que apresenta seis unidades de atendimento, dentre elas, a Unidade Obstétrica que atende com vinte leitos com quartos semiprivativos (de dois a quatro leitos) para o Sistema Único de Saúde (SUS), e quarto privativo para particulares. No mesmo andar se encontra o Centro Obstétrico, que apresenta quatro salas de parto, duas para a realização de parto normal e duas para cesáreas. A coleta dos dados ocorreu nos prontuários das gestantes que internaram nesta unidade, num recorde temporal de 1º de Janeiro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012. Os dados foram coletados, por

meio de um formulário preenchido baseado nos dados descritos nos prontuários. Os dados foram analisados pelo método estatístico.

As questões éticas seguiram a Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012, sendo registrada no Comitê de Ética sob o número 051.2011.2.

3. RESULTADOS

Conforme o sistema de controle de internação hospitalar foi realizado no ano de 2012 um total de 794 partos, incluindo vaginais e cesarianas. Destes foram analisados 789 prontuários, devido à disponibilidade dos mesmos durante o período de coleta de dados.

Do total de nascimentos, 12% (102) dos recém-nascidos (RNs) receberam algum tratamento clínico, dentre estes 27% (28) realizaram antibióticoterapia, 43% (44) fototerapia e 29% (30) necessitaram de cuidados mais intensos por complicações. Dos 789 prontuários de RNs que nasceram neste ano, 12% (30) apresentaram complicações e 40% (12) foram transferidos para UTI Neonatal.

A Figura 1 ilustra as intercorrências como asfixia neonatal (sofrimento fetal por dificuldades no parto, circulares de cordão e aspiração de mecônio); óbitos fetais e neonatais; Sífilis congênita; Mal formações; Hipoglicemia e casos não especificados que incluem prematuridade, hidrocele e desconforto respiratório.

Figura 1 – Tipos de intercorrências

No que se refere à idade gestacional (IG) dos RNs 50% (15) eram a termo com IG entre 36 a 39 semanas e 37% (11) de RNs pós termo. Grande parte dos RNs estavam com o peso adequado para o nascimento (Figura 2).

Figura 2 – Peso do RN ao nascer

Foi possível perceber uma variância quanto ao apgar em função das complicações que acometeram o RN no nascimento. Os nascidos vivos tiveram um aumento significativo do 1º minuto para o 5º. Porém, nenhum nascido vivo nasceu com apgar 0, somente os casos de feto morto (Figuras 3 e 4).

Figura 3 – Apgar 1º Minuto

Figura 4 – Apgar 5º Minuto

Em relação ao pré-natal, 40% (12) das mães não realizaram o que preconiza o Ministério da Saúde, este que considera o pré-natal completo acima de seis consultas e uma de puerpério. O que poderia evitar a maioria das complicações na hora do nascimento do RN. A Figura 5 mostra o percentual em relação ao número de consultas do pré natal.

Figura 5 – Número de Consultas de Pré Natal

4. DISCUSSÃO

A taxa de mortalidade infantil representa um dos indicadores mais analisados no Brasil, a qual é classificada em dois períodos: O neonatal, que abrange os óbitos ocorridos nos primeiros 27 dias de vida e o pós-neonatal, que abrange os óbitos ocorridos entre 28 dias de vida até o final do primeiro ano de vida. A mortalidade neonatal está relacionada às condições da gestação, do parto e da própria integridade física da criança, já a mortalidade pós-natal está associada às condições socioeconômicas e do meio ambiente, com predomínio de causa infecciosas (CALDEIRA et al., 2005).

As causas dos óbitos fetais e neonatais poderiam ser reduzidas a partir de uma assistência de pré-natal adequada, a qual poderia diagnosticar e intervir nos problemas gestacionais que podem levar a complicações no parto. Frente a isso os estados e municípios por meio das unidades de saúde devem integrar os níveis de atenção como promoção, prevenção e assistência à saúde da gestante e do recém-nascido, abrangendo o atendimento ambulatorial básico ao hospitalar de alto risco. Para ser considerado pré-natal deve se ter no mínimo seis consultas, sendo, uma no primeiro trimestre da gestação, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre (BRASIL, 2006b). É importante que o pré-natal inicie até os 120 dias de gestação, sendo realizados os exames laboratoriais necessários e orientações de enfermagem sobre os aspectos biológicos, psicológicos e emocionais que envolvem a gestação. A partir deste monitoramento, poderão ser identificados também os desvios nutricionais da gestante e do feto, o aporte de nutriente tanto insuficiente quanto excessivo, pode alterar o desenvolvimento fetal (PADILHA et al., 2007).

O baixo peso ao nascer (< 2.500g) geralmente está associado a mortalidade e morbidade neonatal e infantil. Já os casos de macrossomia fetal (> 4.000g) estão relacionados com a asfixia neonatal, maior risco de hipoglicemia fetal, rotura prematura de membranas, trabalho de parto prematuro, desproporção céfalo-pélvica, traumas esqueléticos, distúrbios hidroeletrólíticos, aspiração de mecônio, entre outros (AMORIN et al., 2009). Asfixia perinatal é uma injúria sofrida pelo feto ou pelo RN devido à má oxigenação (hipóxia) e/ou má perfusão (isquemia) de múltiplos órgãos. Associa-se a acidose láctica e, na presença de hipoventilação, a hipercapnia (ZACONETA, 2004). No RN várias causas ainda podem levar à asfixia

perinatal, entre elas trauma de parto, parto pélvico, síndromes aspirativas (síndrome de aspiração meconial, etc.), insuficiência respiratória de outras causas e crises de apnéia (DINIZ, 2001).

Segundo a *American Academy of Pediatrics* (1997) o escore de Apgar é insuficiente, como critério único, para o diagnóstico de asfixia perinatal. Portanto, a mesma reserva o termo asfixia para pacientes que apresentam os seguintes fatores associados: Acidemia metabólica ou mista profunda ($\text{pH} < 7,0$) em sangue arterial de cordão umbilical; Escore de Apgar de 0-3 por mais de 5 minutos; Manifestações neurológicas neonatais (ex: convulsões, coma ou hipotonia) e disfunção orgânica multisistêmica (ex: sistemas cardiovascular, gastrointestinal, hematológico, pulmonar ou renal).

Outro fator patológico que acomete o RN em função da má efetuação da assistência pré-natal é a Sífilis Congênita. A Sífilis é uma infecção causada pelo *Treponema pallidum*, por meio da transmissão sexual, esta desencadeia inúmeras complicações para a mulher grávida e seu feto. Quando adquirida durante a gravidez, pode levar a abortamento espontâneo, morte fetal e neonatal, prematuridade e danos à saúde do recém-nascido (SOUTHWICK et al, 2001). Com o advento da penicilina, na década de 1940 e a melhoria dos cuidados com a saúde os índices da doença diminuíram significativamente, entretanto, os números voltaram a crescer a partir da década de 1960 e, mais acentuadamente, na década de 1980, concomitantemente à popularização do uso do crack e cocaína e à maior liberação sexual (BRASIL, 2005).

Nas gestantes com sífilis recente não tratada, a taxa de transmissão vertical é de 70 a 100%, e na tardia de 30 a 40%, podendo ocorrer abortamento, natimorto ou morte perinatal em, aproximadamente, 40% das crianças infectadas (BRASIL, 2005). Sabe-se que a transmissão vertical do *T. Pallidum*, por via transplacentária, pode acontecer em qualquer período da gestação e está diretamente relacionada à treponemia materna (LORENZIA, 2001).

O enfermeiro tem um papel fundamental de promoção, prevenção à saúde da vida da mulher e em todos os níveis de assistência, realizando um cuidado de enfermagem antes da concepção fetal. O cuidado vai além da promoção dos métodos contraceptivos e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, o qual pode ocorrer nas escolas, em visitas domiciliares, meios de comunicação, entre outros. Na atenção básica, após a concepção fetal, deve-se trabalhar juntamente com os agentes comunitários de saúde, na busca ativa das gestantes para incentivo da realização do pré-natal adequado, e, à participação nos grupos de gestantes, que são de extrema importância para o preparo físico e psicológico na hora do parto e período puerperal.

Para o bom desenvolvimento do trabalho de parto, é necessário o bem estar físico e emocional da mulher, o que favorece a redução dos riscos e complicações. Para tanto, o respeito ao direito da mulher à privacidade, à segurança e ao conforto, com uma assistência humana e de qualidade, aliado ao apoio familiar durante a parturição, transformam o nascimento num momento único e especial (TEIXEIRA; BASTOS, 2009).

Na atenção hospitalar, a assistência à puerpera e ao RN, durante o pré, trans e pós-parto, deve ser humanizada, valorizando a singularidade de cada mulher. Nesse sentido, o papel da equipe de enfermagem é estabelecer com o paciente um diálogo, conduzindo a um relacionamento terapêutico, ou seja, à formação de um vínculo que auxilie a gestante ao enfrentamento e à vivência do momento mais importante de sua vida, sem conflitos e complicações, que é o nascimento de um novo ser gerado por ela.

É importante ressaltar que a enfermagem tem participado das principais discussões acerca da saúde da mulher, juntamente com movimentos sociais feministas, em defesa do Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento. Diante disto, o Ministério da Saúde tem criado portarias que favorecem a atuação destes profissionais na atenção integral à saúde da mulher, privilegiando o período gravídico puerperal, por entender que estas medidas são fundamentais para a diminuição de intervenções, riscos e consequente humanização da assistência, tanto em maternidades, como em casas de parto (BRASIL, 2003).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dos 789 prontuários de RNs que nasceram no ano da pesquisa, 30 apresentaram complicações e 12 foram transferidos para UTI Neonatal. Pode-se perceber um déficit no registro, em função dos horários de trabalho e das diversas atividades exercidas pelo enfermeiro durante o horário de trabalho, além da falta de médicos nas 24 horas no serviço e da reforma da unidade obstétrica, que prevaleceu por um período significativo, alterando a rotina dos atendimentos.

Em relação ao pré-natal, a maioria das mães não realizou o que preconiza o Ministério da Saúde, o que poderia evitar as complicações na hora do nascimento do RN. Frente a isso percebeu-se a importância do pré-natal completo, e da busca ativa das gestantes, pois o índice do pré-natal incompleto ainda é significativo. Muitas chegam à maternidade já no período de expulsão, mesmo assim, a maioria dos RNs nasceu saudável e sem nenhuma complicação aparente, nos primeiros dias de vida. Ainda que as complicações não foram expressivas em relação ao número de partos, poderiam ser evitadas por meio do preparo físico e mental das puérperas na hora do parto. Uma vez que, percebeu-se um número significativo de mulheres não colaborativas na hora do parto, o que põe em risco a saúde do RN.

A desproporção céfalo-pélvica também chama a atenção nesta pesquisa, como se pode perceber, o peso dos RNs com complicações oscilam na maioria entre 3.500kg a 4.500kg, o que deve ser considerado na hora do parto normal. Do total de nascimentos, 30 RNs receberam algum tratamento clínico, dentre estes foram submetidos a antibióticoterapia, a fototerapia e necessitaram de cuidados intensivos por complicações.

As intercorrências que se destacaram na hora do parto para o RN foram asfixia neonatal; óbitos fetais e neonatais; Sífilis congênita; Mal formações; Hipoglicemia e casos não especificados que incluem prematuridade, hidrocele e desconforto respiratório. Relativo à idade gestacional, metade dos nascimentos foram de RN a termo com IG entre 36 a 39 semanas e o restante de pós termo, sendo que a maioria dos RNs estavam com o peso adequado para o nascimento.

A partir destes dados destaca-se a importância dos profissionais da saúde que atuam nos hospitais juntamente com as unidades de saúde e as instituições de ensino que atuam na saúde materno-infantil, investir em grupos de preparo para a gestante.

REFERÊNCIAS

- [1] AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS. Intrapartum care. In: Guidelines for perinatal care. 4. ed. AAP; 1997; p.93-125.
- [2] AMORIN, M.M.T. et al. Fatores de risco para macrosomia em recém-nascidos de uma maternidade-escola no Nordeste do Brasil. Rev Bras Ginecol Obstet, v.5, n.31, p. 241-8, 2009.
- [3] BRASIL. Ministério da Saúde. Informes Técnico - Institucionais. Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento. Rev Bras Saude Mater Infant, Recife, v. 1, n. 2, 2002.
- [4] Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: Princípios e Diretrizes. 2ª reimpr. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.
- [5] Ministério da Saúde. Pré natal e puerpério: atenção qualificada e humanizada. Série A. Normas e Manuais Técnicos Série Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. Caderno nº 5. Brasília: Ministério da Saúde, 2006a.
- [6] Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas públicas de Saúde. Parto Aborto e Puerpério. Assistência humanizada à mulher. 2.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2003.
- [7] Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. Diretrizes para o Controle da Sífilis Congênita. Brasília: Ministério da Saúde, 2005.
- [8] Ministério da Saúde. Saúde Brasil. 117. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2006b.
- [9] CALDEIRA, A.P.; FRANÇA, E.; PERPÉTUO, I.H.O.; GOULART, E.M.A. Evolução da mortalidade infantil por causas evitáveis. Rev Saúde Pública. Belo Horizonte, v. 39, n. 1, p. 67-74, 2005.
- [10] DINIZ, E.M.A. Asfixia neonatal e função tireoidiana. Jornal Pediatria. Rio de Janeiro, v. 773, p. 155-6, 2001.
- [11] LAKATOS E.M; MARCONI M.A. Técnicas de pesquisa. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 1991.
- [12] LORENZIA, D.R.S.; MADI, J.M. Sífilis cogenita como indicador de assistência pré-natal. Rev Bras Ginecol Obstet, v. 23, n.10, p. 647-52, 2001.
- [13] MORESI, E. Metodologia da pesquisa. Programa de pós-graduação stricto sensu em gestão do conhecimento e tecnologia da informação. Brasília: s.d.t., 2003.
- [14] PADILHA, P.C. et al. Associação entre o estado nutricional pré-gestacional e a predição do risco de intercorrências gestacionais. Rev Bras Ginecol Obstet, v. 29, n.10, p. 511-8, 2007.
- [15] SOUTHWICK, K.L. et al. Maternal and congenital syphilis in Bolivia, 1996: Prevalence and risk factors. Bull World Health Organ, v. 79, n. 1, p.33-42, 2001.

[16] TEIXEIRA, K.C.; BASTOS, R. Humanização do parto. IX Congresso Nacional de Educação (EDUCERE) e III Encontro sul brasileiro de Psicopedagogia. Porto Alegre-RS. Out 2009. Disponível em: http://www.isad.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/2809_1187.pdf. Acesso em: 12 set. 2013.

[17] ZACONETA, C.A.M. Assistência ao Recém-Nascido de Risco. 2 ed. 2004. Disponível em: <http://faculadamedicina.ufpa.br/doc/Asfixia%20Perinatal.pdf>. Acesso em: 22 set. 2004.

Capítulo 8

Mães adolescentes: Direito à escolarização durante hospitalização do filho na UTI neonatal

Danúbia Ramos dos Santos Mozeléski

Luciane Costa Simões da Silva

Regina Maria Fialkoski Basso

Resumo: A criança e o adolescente têm o direito à educação garantido pela legislação vigente. Porém, muitas alunas adolescentes que acompanham seus filhos recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), não tem a oportunidade de prosseguir seus estudos, mesmo quando matriculadas. No Paraná, o Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (SAREH) desenvolve um processo de ensino e aprendizagem para as crianças internadas ou em tratamento, assim como para as mães adolescentes que acompanham seus filhos durante a internação na UTIN. As alunas não se encontram enfermas, mas temor, a angústia e a incerteza se apoderam delas. Apesar de não estarem no leito, sob efeito de medicamentos, precisam cuidar de seus filhos e o tempo para estudar normalmente é bem mais curto do que quando frequentavam a sua escola. Assim, há necessidade de se realizar adaptações curriculares para que possam continuar a aprender. O objetivo desse trabalho é demonstrar as possibilidades de ensinar as discentes que acompanham seus filhos internados em UTIN por meio de um processo de ensino e aprendizagem diferenciado. Para tanto, analisou-se o trabalho docente planejado e implementado à luz de autores como CECCIM e CARVALHO (1997), MATOS E MUGIATTI (2012) e FONSECA (2008). Também procurou-se amparar legalmente o processo por meio da legislação vigente como a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, a Lei 8069/90, dentre outros documentos.

Palavras-chave: SAREH. Mães adolescentes. Hospitalização. UTI Neonatal.

1. INTRODUÇÃO

A legislação em vigor ampara todas as crianças e adolescentes internados ou em tratamento ambulatorial que não podem frequentar a escola.

Muitas adolescentes têm filhos internados na UTIN e acabam ficando hospitalizadas juntamente com a criança para acompanhá-los no seu tratamento e durante este tempo ficam afastadas da escola. Também elas têm o direito à educação. Conforme afirma Castro in Pereira (2017, p. 49) “E, nesse contexto, é preciso lembrar-se das mães adolescentes que acompanham seus filhos e estão (ou não) matriculadas na escola”.

Então, para as mães adolescentes faz-se necessário que seja propiciada a escolarização no hospital para que continuem seus estudos, requerendo que os professores da classe hospitalar, implementem adaptações de método, objetivos e conteúdos a fim de que as alunas consigam dar sequência ao seu ano escolar.

Assim, o objetivo deste artigo é o de apresentar o trabalho da escolarização hospitalar realizado com as adolescentes mães de bebês internados na UTIN, indicando o amparo legal para tal trabalho e as práticas diferenciadas a serem implementadas no planejamento da escola hospitalar. As vivências de isolamento, que as discentes passam ao ter um filho devem ser consideradas, pois mesmo apresentando estresse, angústia, medo, ansiedade, preconceito e limitação de tempo, precisam continuar aprendendo os conteúdos escolares.

2. ESCOLARIZAÇÃO HOSPITALAR DAS MÃES ADOLESCENTES: AMPARO LEGAL

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 9394/96 (BRASIL, 1996) e o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90 (BRASIL, 1990) amparam todas as crianças e adolescentes quanto ao seu direito à educação.

As mães adolescentes, também têm o direito a continuar seus estudos. Tal garantia é explicitada pela Lei 6202/75 (BRASIL, 1975):

Art. 1º A partir do oitavo mês de gestação e durante três meses a estudante em estado de gravidez ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-lei número 1.044, 21 de outubro de 1969.

Parágrafo único. O início e o fim do período em que é permitido o afastamento serão determinados por atestado médico a ser apresentado à direção da escola.

Segundo o Parecer CNE/CEB 17/2001 (BRASIL, 2001), “O atendimento educacional especializado pode ocorrer fora de espaço escolar, sendo, nesses casos, certificada a frequência do aluno mediante relatório do professor que o atende”, sendo objetivos desse atendimento:

dar continuidade ao processo de desenvolvimento e ao processo de aprendizagem de alunos matriculados em escolas da Educação Básica, contribuindo para seu retorno e reintegração ao grupo escolar; e desenvolver currículo flexibilizado com crianças, jovens e adultos não matriculados no sistema educacional local, facilitando seu posterior acesso à escola regular.

As mães adolescentes acompanhantes de recém-nascidos em UTIN, sentem tristeza, angústia, medo e incerteza quanto ao diagnóstico, tratamento e cura de seu bebê, por isso, é imprescindível neste momento, que a pedagoga e os professores hospitalares mantenham contato com a escola de origem em que a jovem mãe está matriculada na Educação Básica, garantindo, conforme a resolução 41/95 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), p. 17, que todo adolescente tem direito ao “acompanhamento do curriculum escolar durante sua permanência hospitalar”, a fim de receber da escola atividades e/ou plano de trabalho docente, que sejam adaptados conforme as especificidades e necessidades para que possam continuar estudando.

De acordo com Assis (2009, p.92), dentre os objetivos do atendimento pedagógico hospitalar, estão:

- Manter o nível de vida tão normal quanto possível, enquanto o aluno permanecer no hospital, respeitando sua fase evolutiva e seu grau de compreensão.

- Facilitar a inclusão no ambiente familiar, escolar e social, quando do processo de alta hospitalar, atentando para os obstáculos de ordem física e de relacionamento.

A relação ensino-aprendizagem desenvolvida na Escola do Hospital engloba não somente os processos intelectivos, mas também os processos afetivos que acontecerão por meio das relações com os professores que num momento de isolamento da família, da escola, dos amigos e do seu dia a dia, podem criar vínculos que auxiliem a adolescente a passar por um momento tão difícil.

Uma gravidez na adolescência pode mudar drasticamente a dinâmica familiar. A gravidez nesse período acaba por proporcionar uma entrada precoce na vida adulta, prevendo também um amadurecimento e uma gama de responsabilidades que o adolescente ainda não está preparado para enfrentar. (ALMEIDA, AQUINO & BARROS, 2006)

Segundo relatório da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), publicado em fevereiro de 2018, a taxa de gravidez na adolescência, no Brasil, supera a média latino-americana e caribenha, causando preocupação, conforme afirma Marita Perceval, diretora regional da UNICEF: “Muitas meninas e adolescentes precisam abandonar a escola devido à gravidez, o que tem um impacto de longo prazo nas oportunidades de completar sua educação e se incorporar no mercado de trabalho, assim como participar da vida pública e política.”. Ainda segundo Perceval “Como resultado, as mães adolescentes estão expostas à situações de maior vulnerabilidade e a reproduzir padrões de pobreza e exclusão social”.

Para Barnet, Arroyo, Devoe e Duggan (2004) a escola tem um papel fundamental na inclusão e empoderamento social das adolescentes, principalmente relacionado com a evasão escolar, uma vez que a não escolarização pode ser considerada um fator de risco para a pobreza e dificuldades sociais e econômicas.

Nessa perspectiva, esse trabalho vem de encontro à uma realidade em que a escolarização hospitalar precisa ser incorporada ao cotidiano das adolescentes-mães que acompanham seus filhos internado na UTIN.

3. PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DIFERENCIADO

Quando se pensa numa escola hospitalar, não faz sentido planejar mapeamento de alunos, espaço delimitado e horários rígidos previamente definidos. Se para uma criança enferma o processo de ensino e aprendizagem deve ser adaptado conforme as especificidades do aluno, quanto mais uma adolescente que acompanha seu filho doente precisa de um planejamento diferenciado.

Segundo Vasconcellos (1995, p. 63) deve-se:

considerar, pois, o aluno real, concreto que efetivamente está na sala de aula, um ser que tem suas necessidades, interesses, nível de desenvolvimento (psicomotor, sócio-afetivo e cognitivo), quadro de significações, experiências anteriores (história pessoal), sendo bem distinto daquele aluno ideal, dos manuais pedagógicos (marcados pelos valores de classe) ou do sonho de alguns professores.

Ao se propor uma atuação diferenciada, faz-se necessário primeiramente compreender a realidade e as especificidades vivenciadas na adolescência. Segundo Moreira e cols. (2010) a adolescência pode ser considerada uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, período marcado por diversas mudanças biopsicossociais. Tal etapa precisa ser compreendida e acompanhada tanto pela família, quanto pelo Estado e escola, visando o desenvolvimento saudável do adolescente.

O dia a dia da adolescente-mãe normalmente apresenta-se repleto de temores e angústias. O bebê precisa ser cuidado por ela num momento em que as incertezas e os desafios se fazem presentes. Assim, é preciso ouvir a aluna por meio de uma escuta pedagógica, pois não basta saber a escola em que estuda e o ano escolar em que está matriculada. Segundo Ceccim e Carvalho (1997, p. 31):

O termo escuta provém da psicanálise e diferencia-se da audição. Enquanto a audição se refere à apreensão/compreensão de vozes e sons audíveis, a escuta se refere à apreensão/ compreensão de expectativas e sentidos, ouvindo através das palavras as lacunas do que é dito e os silêncios, ouvindo expressões

e gestos, condutas e posturas. A escuta não se limita ao campo da fala ou do falado, [mais do que isso] busca perscrutar os mundos interpessoais que constituem nossa subjetividade para cartografar o movimento das forças de vida que engendram nossa singularidade.

Portanto, por meio da escuta pedagógica, o professor e o pedagogo poderão descobrir quais vínculos a aluna tem com sua escola de origem, se gosta de estudar ou não, em quais disciplinas apresenta mais dificuldades e de quais prefere, desde quando frequentou a escola e se está matriculada. Muitas vezes o silêncio pode expressar anseios que a adolescente não fala e que podem ser percebidos pelo professor.

Mesmo a adolescente-mãe não estando doente, está internada com seu filho e, assim, há a necessidade de se conversar com a equipe de saúde para saber quais são as possibilidades de que a aluna estude, pois algumas vezes o bebê precisa de atendimento constante da mãe que não poderá estudar até que seja liberada para tal trabalho, em conformidade com a Resolução nº 02/2001 (BRASIL, 2001) que diz que “Os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de saúde, devem organizar o atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de frequentar as aulas”.

As equipes de educação e saúde devem partilhar de objetivos comuns, o desenvolvimento integral do educando, sendo importante se pensar no estado físico e emocional, mas também no cognitivo do aluno.

A discente poderá estar com seu emocional abalado e, num momento de adaptação ao bebê, há um tempo menor para estudos. Assim, necessitará de atividades adaptadas para aquele momento. Para tanto, os professores deverão inserir no seu planejamento adaptações curriculares de pequeno porte que, segundo o Projeto Escola Viva do Ministério da Educação (BRASIL, 2000, p.8) são alterações realizadas no currículo, pelo docente, com o intuito de favorecer a participação efetiva dos discentes os quais possuem necessidades especiais de ensino e aprendizagem.

A adaptação curricular não pode ser vista como sinônimo de currículo minimizado, pois deve ser desenvolvido com a aluna um trabalho organizado e sistematizado para que aprenda os conhecimentos escolares essenciais para seu ano escolar. Para Pereira (2017), deve haver profissionalismo, ética e sistematização no trabalho, para que os objetivos do atendimento escolar sejam alcançados.

Conforme a individualidade e as necessidades de cada aluna, a metodologia, o tempo, o espaço, os objetivos, os conteúdos, a avaliação e os recursos também deverão ser adaptados para que o processo de ensino e aprendizagem seja de qualidade.

Apesar de a aluna-mãe não estar enferma, pode-se considerar a afirmação de Matos e Mugiatti (2012, p. 115) para o trabalho que se desenvolverá:

A construção da prática pedagógica, para atuação em ambiente hospitalar, não pode esbarrar nas fronteiras do tradicional. As dificuldades, muitas vezes, persistem porque não se conseguem ver nelas a oportunidade de uma atuação diferenciada, pois os valores e as percepções de condutas e ações estão ainda muito enraizados nas formações reducionistas.

Assis (2011, p. 162) explicita que “O professor como mediador das relações interpessoais e dos objetos de conhecimento é quem busca motivar o aluno/paciente a superar suas dificuldades, fomentando o despertar do desejo de interagir e construir, de maneira participativa, valores, atitudes e saberes”.

Segundo Menezes (2010, p. 16) em artigo publicado no Caderno Pedagógico do SAREH:

Pensar no educando hospitalizado requer, sob ponto de vista pedagógico, estabelecer relações que possibilitem adequar as atividades desenvolvidas para um contexto educacional específico, de forma a produzir os saberes escolares. Assim, o educando que se encontra afastado da sua escola de origem, por período de longa permanência para tratamento de diferentes enfermidades, tem a possibilidade de estabelecer vínculos que contribuem para manter sua identidade enquanto sujeito do processo educativo, uma vez que está fora de sua rotina diária.

Assim, segundo o MEC (BRASIL, 2000, p. 24) a adaptação pode “ser a priorização de tipos de conteúdos, a priorização de áreas ou unidades de conteúdos, a reformulação da sequência de conteúdos, ou ainda, a eliminação de conteúdos secundários, acompanhando as adaptações propostas para os objetivos educacionais”.

Fonseca (2008, p. 54) também explicita acerca da adaptação de conteúdos afirmando que “o que se trabalha com o aluno são conteúdos essenciais, claro que os aprofundando na medida do interesse e da necessidade do aluno”.

Desta forma, os conteúdos indispensáveis para que acompanhe sua classe deverão ser trabalhados, mesmo que com metodologia, técnicas e recursos diferentes àqueles utilizados pelo professor de sua escola de origem.

E, conforme a Cartilha sobre Adaptações Curriculares de Pequeno Porte (BRASIL, 2000, p. 29), “o último tipo de adaptação que se sugere é a adaptação na temporalidade do processo de ensino e aprendizagem, tanto aumentando, como diminuindo o tempo previsto para o trato de determinados objetivos e os consequentes conteúdos”.

Segundo Menezes (2010, p. 24):

A iniciativa de se estabelecer um processo educacional específico para um espaço diferenciado, considerando o tempo de ensinar e o tempo de aprender, contribui também para a política nacional de humanização das instituições de saúde, uma vez que envolve a família, a escola, a equipe médica e os professores do Sareh.

Ceccim, em artigo publicado no Caderno Pedagógico do SAREH, (PARANÁ, 2010, p. 34) afirma que:

A proteção ao desenvolvimento cognitivo tem sido postergada na maioria das vezes, mas a proposta de classes educacionais em ambiente hospitalar viria preencher essa lacuna. O atendimento pedagógico, por operar com as aprendizagens complexas e com a mediação didático-educativa, próprias do trabalho escolar, traria ao ambiente hospitalar a garantia de proteção ao desenvolvimento psíquico e cognitivo, apropriando recursos de ensino-aprendizagem no projeto terapêutico.

Segundo Menezes, (2010, p. 15) “a Pedagogia Hospitalar pode contribuir para reforçar a autoestima, conferindo ao educando internado a possibilidade de contribuir para a continuidade de seu desenvolvimento, bem como lhe restituir um espaço de convivência social do qual é inesperadamente afastado”. Assim, os estudos na escola do hospital propiciam um investimento na autoestima além da aprendizagem de conteúdos.

O professor hospitalar precisa estar atento para entender quando é tempo de ensinar e quando é preciso deixar que a adolescente fique sozinha cuidando de seu filho. Há a necessidade de respeitar o tempo e as emoções da aluna.

Segundo Matos, no documento Cadernos Temáticos do Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar – SAREH (Paraná, 2010, p. 47), “é importante que se tenha claro o prejuízo relacionado ao afastamento da escola, com sérias implicações com a escolaridade e possibilidade de evasão definitiva” quando do não atendimento pedagógico hospitalar dessas adolescentes.

As alunas-mães precisam ter o seu direito à educação garantido e, ainda mais, necessitam de um processo de ensino e aprendizagem de qualidade que ao invés de dificultar seu o retorno à escola, possibilite a acolhida e a aprendizagem imprescindível para que continue estudando.

O hospital, mesmo parecendo um lugar apenas de dor e pavor, poderá reverter a situação de evasão escolar, ao trabalhar para que a aluna continue aprendendo e possa retornar à sua escola de origem.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao abordar o tema sobre escolarização hospitalar pensa-se nos alunos enfermos, mas esquece-se das mães adolescentes que estão acompanhando seus filhos recém nascidos na UTIN.

A legislação em vigor ampara todas as crianças e adolescentes quanto ao seu direito à educação. As mães adolescentes também precisam continuar estudando quando acompanham seus filhos hospitalizados. Nesses casos faz-se necessário que a equipe de saúde e de educação estejam coesas e que as adolescentes sejam encaminhadas e liberadas para o serviço de escolarização hospitalar. A educação pode ser um ambiente extremamente positivo para a adolescente encontrar suporte e apoio na construção de sua cidadania.

O retorno à escola quando seu filho recebe alta dependerá em grande parte, do trabalho escolar realizado no hospital, pois não apresentará defasagem quanto aos conteúdos essenciais que precisa aprender para acompanhar seu ano escolar.

REFERÊNCIAS

- [1] ALMEIDA MCC, AQUINO EML, BARROS AP. School trajectory and teenage pregnancy in three Brazilian state capitals. *Cad Saude Publica*. 2006 jul;22(7):1397-409
- [2] ASSIS, Walkíria de. *Classe hospitalar: um olhar pedagógico singular*. São Paulo: Phorte, 2009.
- [3] BARNET B, ARROYO C, DEVOE M, DUGGAN AK. Reduced school dropout rates among adolescent mothers receiving school-based prenatal care. *Arch Pediatr Adolesc Med*. 2004 Mar;158(3):262-8.
- [4] BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 22 abril 2016.
- Decreto-Lei n. 1.044/69, de 21 de outubro de 1969. Dispõe sobre tratamento excepcional para alunos portadores das afecções. *Diário Oficial da União*. Brasília, 21 out. 1969. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1044.htm. Acesso em: 5 maio de 2017.
- Lei nº 6202 de 17 de abril de 1975. Atribui à estudante em estado de gestação o regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-lei nº 1.044, de 1969, e dá outras providências. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para assuntos jurídicos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6202.htm. Acesso em: 10 maio 2017.
- Lei 8069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília: Presidência da República, 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm. Acesso em: 13 outubro 2016.
- Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 22 abril 2016.
- Ministério da Educação. Secretaria de Educação especial. Documento Classes Hospitalares e Atendimento Pedagógico Domiciliar: estratégias e orientações. Brasília: MEC; SEESP, 2002. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/livro9.pdf>. Acesso em: 17 abril 2013.
- Ministério da Educação. Parecer CNE/CEB 17/2001. Diretrizes nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília, 2001. Disponível em: <http://mobile.cnte.org.br:8080/legislacao-externo/rest/lei/78/pdf>. Acesso em: 14 fevereiro 2017.
- Projeto Escola Viva: garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na escola. Adaptações Curriculares de Pequeno Porte. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial. Brasília: 2000. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000449.pdf>. Acesso em: 8 setembro 2017.
- Resolução CNE/CEB nº 2 de 11 de setembro de 2001. Brasília: 2001. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf>. Acesso em: 22 abril 2016.
- [5] CECCIM. Ricardo B. Classes educacionais hospitalares e a escuta pedagógica no ambiente hospitalar. Caderno Temático. Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (SAREH). Secretaria de Estado da Educação. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência de Educação. Diretoria de Políticas e Programas Educacionais. Núcleo de Apoio ao SAREH. Curitiba: SEED-PR, 2010. Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_tematicos/tematico_sareh.pdf. Acesso em 11 junho 2016.
- [6] CECCIM, Ricardo B.; CARVALHO, Paulo R. A. (orgs). *Criança Hospitalizada: atenção integral como escuta à vida*. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 1997.
- [7] CONSELHO Nacional dos Direitos da Criança. Resoluções, junho de 1993 a setembro de 2004. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2004. 200p.
- [8] FONSECA, Eneida S. da. *Atendimento escolar no ambiente hospitalar*. São Paulo: Memnon, 2008.
- [9] MATOS, Elizete L. M.; MUGIATTI, Margarida M. T. de F. *Pedagogia Hospitalar: a humanização integrando educação e saúde*. Petrópolis/RJ: Vozes, 2012.
- [10] MENEZES, Cinthya V. A. de. Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Caderno Temático do Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (SAREH). Superintendência de Educação. Diretoria de Políticas e Programas Educacionais. Paraná: 2010. Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_tematicos/tematico_sareh.pdf. Acesso em: 15 março 2017.
- [11] Moreira RCR e cols. Pregnancy adolescent and school life: students' experiences from a public school. *Rev Enferm UFPE Online*. 2010. Acesso em: 18 abril 2017. Disponível em: http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/view/674/pdf_30

- [12] NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Taxa de gravidez adolescente no Brasil está acima da média latino-americana e caribenha. Disponível <https://nacoesunidas.org/taxa-de-gravidez-adolescente-no-brasil-esta-acima-da-media-latino-americana-e-caribenha/>. Acesso em 26 junho 2019.
- [13] PEREIRA, Rozeli de Fátima Pissaia Gabardo (organizadora). Escolarização Hospitalar: Um espaço desafiador. Curitiba: Appris, 2017.
- [14] VASCONCELLOS, C. S. Planejamento: plano de ensino-aprendizagem e projeto educativo. 4 ed. São Paulo: Libertad, 1995.

Capítulo 9

Análise do perfil nutricional e clínico de uma população infantil vivendo com HIV atendida em Serviço Especializado

Geani de Oliveira Marins

Nadir Machado Alves Cardoso

Myrna Maximiano Mendes Miranda

Lismeia Raimundo Soares

Kátia Calvi Lenzi de Almeida

Resumo: A transmissão vertical é a principal via de infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (Hiv) em crianças, esta exposição traz complicações imunológicas e possíveis prejuízos nutricionais, como o atraso no crescimento, desnutrição e dislipidemia. Estes achados efeitos adversos da terapia antirretroviral (TARV), vírus utilizada pela mãe. Além disso, crianças expostas podem sofrer prejuízos nutricionais como desnutrição, dislipidemia e. A má adesão e ou toxicidade aos antirretrovirais pode esgotar as opções de esquemas terapêuticos. O objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil sociodemográfico, nutricional, imunológico e lipídico de uma população infantil vivendo com Hiv, atendidas no Serviço de Assistência Especializada de Macaé, Rio de Janeiro-Brasil. Realizou-se um estudo descritivo transversal, retrospectivo por meio de levantamento da totalidade de prontuários referente a crianças vivendo com Hiv com diagnóstico confirmado, de ambos os sexos, com faixa etária de 2 até os 12 anos de idade, atendidos no Serviço de Assistência Especializada (SAE); investigou-se, dados sociodemográficos, clínicos e antropométricos.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos 10 anos houve um aumento na taxa de detecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (Hiv) em gestantes o que pode ser explicado pela ampliação do diagnóstico durante o pré-natal e aumento da prevenção da transmissão vertical (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). O aumento dos casos de infecção em mulheres heterossexuais e em idade reprodutiva, é o principal fator para o aumento dos casos de infecção viral em crianças (LIMA; PEREIRA, 2012).

A transmissão vertical é a principal via de infecção infantil. Esta pode ocorrer intraútero por meio da via transplacentária, durante o parto e/ou nascimento e por meio do aleitamento materno. Todas as crianças expostas ao Hiv precisam de monitoramento laboratorial de forma precoce, pois são considerados a possibilidade de efeitos adversos da terapia antirretroviral (TARV) utilizada pela mãe (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).

Para o início da TARV em crianças, deve-se considerar os aspectos especiais de cada faixa etária, possíveis riscos e benefícios. A utilização da terapia antirretroviral combinada com três fármacos, favorece a redução de infecções oportunistas e contribui para o aumento da expectativa de vida em crianças, adolescentes e adultos; no entanto, estudos evidenciam os efeitos colaterais de longo prazo, como obesidade central, dislipidemia e lipodistrofia (MARINS et al., 2017).

A má adesão e ou toxicidade aos antirretrovirais pode esgotar as opções de esquemas terapêuticos para o público infantil com Hiv, visto que, haverá necessidade da permanência da terapia antirretroviral por toda vida (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Neste contexto, a adesão à terapia é primordial para este público, pois a progressão da doença ocorre rapidamente em crianças comparado ao adulto, devido a imaturidade imunológica (MINISTERIO DA SAÚDE, 2018).

Estudos relatam que crianças com Hiv podem apresentar dificuldade de ganho de peso e em alguns casos, o risco de sobrepeso (SOUZA et al., 2018). Além disso, podem ser observados atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor (CORREA; AS, 2018) e ainda, comprometimento no crescimento e desnutrição (GOLUCCI et al., 2019). Estes efeitos deletérios, denotam uma população vulnerável em comparação com crianças não infectadas, e com maior risco de mortalidade por complicações relacionadas ao Hiv (GIMENÉZ; MORILLO, 2017).

Para tanto, é fundamental um acompanhamento clínico regular, essencial para a prescrição do tratamento antirretroviral de modo adaptado e oportuno ao estadiamento da puberdade, associado a um adequado estado nutricional garantindo assim peso e crescimento adequando para a faixa etária (PINHEIRO et al., 2013).

De acordo com o setor mundial sobre Hiv/Aids da *World Health Organization* (WHO), eliminar novos casos de infecção por Hiv em crianças constitui-se como estratégia primordial para alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas em reprimir a propagação do Hiv (WHO, 2011).

Deste modo, este estudo teve como objetivo caracterizar o perfil sociodemográfico, nutricional, imunológico e lipídico de uma população infantil vivendo com Hiv, atendida no Serviço de Assistência Especializada de Macaé, município situado no Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

2. MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo transversal, retrospectivo por meio de levantamento da totalidade de prontuários referente a crianças vivendo com Hiv com diagnóstico confirmado, de ambos os sexos, com faixa etária de 2 até os 12 anos de idade, atendidos no Serviço de Assistência Especializada (SAE) em Hiv/Aids e Hepatites Virais na cidade de Macaé no estado de Rio de Janeiro/Brasil, no período de agosto a dezembro de 2016. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por meio do cadastro no sistema nacional da Plataforma Brasil.

A amostra foi composta por 14 prontuários de crianças vivendo com Hiv cadastradas e atendidas pelo SAE de Macaé, de ambos os sexos e que estavam ou não em tratamento estável com terapia antirretroviral (TARV), e que apresentasse os exames de lipidograma e glicemia. A totalidade da amostra corresponde as crianças diagnosticadas com infecção pelo Hiv atendidas pelo serviço (SAE) do município de Macaé-RJ. Excluiu-se crianças com diagnóstico prévio de doença cardiovascular.

Investigou-se, em relação as crianças os dados sociodemográficos (gênero, idade, etnia, frequência escolar e município de residência área de moradia), clínicos (carga viral, contagem de linfócitos T CD4+, perfil lipídico e glicemia) e antropométricos. Foram avaliadas a especificação e o tempo de tratamento com o(s) antirretroviral(is). Os pontos de corte considerados para normalidade do perfil lipídico e glicemia foram indicados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (2015) e Sociedade Brasileira de Pediatria (2015) respectivamente.

As crianças foram classificadas pela curva de Peso/Idade de acordo com as curvas da Organização Mundial de Saúde, 2007. As categorias imunológicas se baseiam na contagem de linfócitos T CD4+ de acordo com a idade, conforme o *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). O estado nutricional foi verificado através da contagem total de linfócitos que foi obtida dos prontuários e classificada de acordo com Bernards, Jacobs e Rombeau (1986).

Os dados coletados foram expressos usando o Microsoft Excel® 2013, através da distribuição da frequência dos indivíduos nos grupos etários e para associação entre variáveis do estudo, assim como para caracterização sociodemográfica da amostra.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Titoneli e outros autores (2019), ainda existe uma fragilidade no rastreamento de gestantes que vivem com Hiv, isto é explicado pela ausência das mesmas no acompanhamento pelo pré-natal. Desta forma, muitas gestantes descobrem seu diagnóstico em períodos avançados da gestação. Apesar de algumas falhas na detecção precoce do Hiv em gestantes, houve uma redução progressiva de infecção por transmissão vertical desde o ano de 2007 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).

A transmissão vertical é a principal via de infecção em crianças e ainda que tenha se observado melhorias na incidência neste público nos últimos anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018), muitos são os desafios provenientes do cuidado à criança com Hiv, além disso, deparamo-nos com a escassez de estudos que abordem esta problemática (MIZIARA; ANDRADE, 2016).

Observou-se no estudo uma prevalência do gênero feminino com 57,1% (n = 8), e 50% (n = 7) das crianças com idade entre 6 e 9 anos. No estudo de Dias e colaboradores (2013), houve prevalência de crianças com Hiv do gênero masculino (n = 18), diferente do encontrado no presente estudo.

A respeito à zona de residência, 93% (n = 13) das crianças residem em área urbana do município de Macaé, Menezes e colaboradores (2018) também encontraram maior prevalência (32,2%) das infecções por Hiv no âmbito urbano em seu estudo. O mesmo foi relatado por Cabral e colaboradores (2015) no estado de Pernambuco, identificaram que a maior parte residia em zona urbana com 95,35% da amostra.

O município de Macaé-RJ possui alta concentração populacional no centro urbano iniciado na década de 70 com o aumento das atividades industriais relacionadas a petróleo e gás. Este processo de urbanização, concomitantemente com o intenso fluxo migratório provocou mudanças sociais, espaciais, políticas e econômicas no município de Macaé. Estes fatores podem estar associados aos desafios de controle da susceptibilidade ligadas a exposição ao Hiv, pois segundo Pereira e colaboradores (2014), características sociodemográficas e de comportamento podem apresentar impacto na transmissão da infecção, evidenciando a necessidade de planejamento e ações em serviços para minimizar os casos de novas infecções.

De acordo com a tabela 1, as crianças do estudo estão em idade escolar. Destas 64,2% (n = 9) frequentam a escola. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em seu artigo 53 da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, garante a criança e ao adolescente o direito a educação, assegurando a igualdade de condições para sua permanência na escola. No entanto, crianças e adolescentes vivendo com Hiv possuem medo de sofrer ações de preconceito na escola e entre amigos, isso pode prejudicar a frequência à escola e favorecer uma baixa adesão ao tratamento medicamentoso (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).

Estudos mostram que crianças vivendo com Hiv apresentam em seus discursos manterem o sigilo de sua condição sorológica, para evitarem situações de preconceito em seus meios sociais. Segundo Miziara e Andrade (2016), elas relatam medos e angústias relacionados ao HIV.

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica de crianças vivendo com HIV atendidas no SAE de Macaé-RJ, 2016.

Variáveis	Total	Feminino	Masculino
	n = (%)	n = (%)	n = (%)
Amostra	14 (100)	8 (57,1)	6 (43)
Faixa etária (anos)			
02-05	3 (21,4)	1 (7,1)	2 (14,3)
06-09	7 (50)	4 (28,5)	3 (21,5)
≥10	4 (28,5)	1 (7,1)	3 (21,5)
Cidade de Residência			
Macaé	12 (85,7)	6 (42,8)	5 (36)
Outras cidades	2 (14,2)	2 (14,2)	1 (7,1)
Zona de moradia			
Urbana	13 (93)	8 (57,1)	5 (36)
Rural	1 (7,1)	-	1 (7,1)
Etnia			
Branco	2 (14,2)	2 (14,2)	-
Pardo	2 (14,2)	2 (14,2)	-
Negro	-	-	-
Amarelo	1 (7,1)	-	1 (7,1)
Não identificado	9 (64,2)	4 (28,5)	5 (36)
Frequência escolar			
Frequenta	9(64,2)	5(35,6)	4(28,6)
Não frequenta	1(7,1)	-	1(7,1)
Não identificado	4 (28,5)	1 (7,1)	3 (21,5)
Uso Medicamentos			
Hipolipemiante	-	-	-

Frequência absoluta (n) e relativa (%)

Quando as crianças recebem o diagnóstico de infecção pelo Hiv, elas devem ser avaliadas de acordo com a carga viral e linfócitos T CD4+, para serem classificadas de forma clínica e imunológica, esta classificação relacionada com a carga viral é que irão definir o início da TARV em crianças maiores de 12 meses de idade. Antes de iniciar a TARV, deve ser realizado o teste de genotipagem do HIV. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014)

De acordo com a tabela 2, 50% (n = 7) das crianças do estudo estavam com carga viral indetectável e assintomáticas, denotando um bom estado clínico. Martins e outros autores (2017) observaram em seu estudo que crianças com idade inferior a 13 anos também estavam na fase assintomática ou leve.

O acompanhamento da carga viral é importante para reduzir os novos casos de infecção viral, visto que, segundo o estudo realizado por Cohen e colaboradores (2016), o risco de transmissão é insignificante quando PVHIV mantém a carga viral indetectável há pelo menos seis meses. Deste modo, a Sociedade Brasileira de Infectologia (2018) reitera a necessidade da adesão e permanência do tratamento com a terapia antirretroviral para supressão da transmissão do HIV.

Tabela 2. Perfil imunológico de crianças vivendo com HIV atendidas no SAE de Macaé-RJ, 2016.

Variáveis	n = (%)
Carga viral	
>1000 cópias/ml	3 (21,4)
<200 cópias/ml	2 (14,2)
Indetectável	7 (50)
Não informado*	2 (14,2)
Classificação imunológica Linfócito T CD4+	
Ausente/sem	7 (50)
Moderada	1 (7,1)
Grave	1 (7,1)

Frequência absoluta (n) e relativa (%); *não registrado em prontuário

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Crianças e Adolescentes (2017), o tratamento com a TARV objetiva, reduzir a morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida; propiciar crescimento e desenvolvimento adequados; poupar, melhorar ou reconstituir o funcionamento do sistema imunológico, diminuindo complicações infecciosas e não-infecciosas; beneficiar supressão máxima e prolongada da replicação do HIV, reduzindo o risco de resistência aos antirretrovirais e diminuir a toxicidade da TARV. O presente estudo encontrou 28,6% (n = 4) de crianças que não estavam em tratamento (tabela 3). Todas as crianças estudadas nesta pesquisa que estão em tratamento, utilizavam a terapia combinada, com três ou mais drogas. De acordo com o Ministério da Saúde (2014), a utilização de três drogas na TARV, reduziu a morbidade e mortalidade das crianças infectadas pelo HIV.

Dos antirretrovirais oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a população infantil, a maioria não foi estudada para este público e apresentam registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para adultos ou crianças acima de determinadas idades, até o momento os antirretrovirais oferecidos para as crianças são os mesmos ministrados em adultos, a farmacocinética difere pouco em relação aos adultos, a diferença está na diminuição da dosagem de acordo com a superfície corporal (FIOCRUZ, 2012).

Observa-se na tabela 3, a combinação de dois inibidores de protease (IP), o ritonavir e lopinavir. Utiliza-se o IP em casos de exposição intraútero ou perinatal à nevirapina ou em situações que nevirapina e efavirenz (EFV) não seja possível (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). O IP, tem sido relacionado com boa eficácia clínica, virológica e imunológica, além elevada barreira genética, onde o desenvolvimento de resistência requer acúmulo de mutações e pode ser utilizado quando o lactente é gravemente sintomático ou apresenta carga viral muito elevada.

Apesar da terapia antirretroviral ser considerada um fator protetor para lesão renal aguda em crianças com Hiv, observam-se efeitos colaterais de hipocalcemia e acidose metabólica renal relacionado principalmente com o uso de tenofovir (TDF) nos mesmos (SOARES et al., 2016). Observa-se na tabela 3 a utilização de TDF, assim o acompanhamento de função renal é primordial neste caso.

O esquema de segunda linha compreende a 2 Inibidores da enzima Transcriptase Reversa análogo de Nucleosídeo (ITRN) + IP/r (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017), do total estudado 3 crianças fazem uso deste esquema (tabela 3). A lipodistrofia está comumente presente em indivíduos que fazem uso de ITRN e os IPs; neste caso é percebido alteração na distribuição da gordura corporal associada a anormalidades bioquímicas, como por exemplo, a dislipidemia (SONAGLIO, 2011). As crianças do estudo também são expostas as alterações dislipidêmicas.

Tabela 3. Distribuição do esquema terapêutico utilizado pelas crianças estudadas atendidas SAE de Macaé-RJ, 2016.

Variáveis Esquema terapêutico	n = (%)
AZT+ 3TC+ NVP	1(7)
EFV+ Lopinavir/ritonavir + TDF	1 (7)
3TC+ Lopinavir/ritonavir + d4T	1 (7)
AZT+ 3TC+ Lopinavir/ritonavir	1 (7)
Sem medicação	4 (28,6)
Não informado*	6 (43)

Frequência absoluta (n) e relativa (%); *não registrado em prontuário; AZT= zidovudina; 3TC= lamivudina; NVP= nevirapina; EFV= efavirenz; TDF= tenofovir; d4T= estavudina; *Não registrado em prontuário.

As alterações na distribuição de gordura podem ser classificadas em lipoatrofia: redução de gordura em regiões periféricas como braços, pernas e face; lipohipertrofia: que é o acúmulo de gordura em região abdominal, presença de gibosidade dorsal; e ainda pode ocorrer a forma mista: caracterizada pela associação de componentes das duas formas anteriormente mencionadas (PALCHETTI et al., 2013). As alterações do tecido adiposo, caracterizando a lipodistrofia também possui impacto na qualidade de vida de PVHIV, os sinais físicos aparecem progressivamente e podem acometer crianças (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).

De acordo com o Ministério da Saúde (2014), espera-se que 50% das crianças que recebem TARV, irão apresentar alterações nos lipídios séricos, destacando o colesterol total e Lipoproteína de Baixa Densidade - colesterol (LDL-c). A tabela 4 demonstra alta prevalência no total de crianças com alteração lipídica em

algum tipo de molécula lipídica, a maior prevalência observada foi de 64,2% (n = 9) de crianças com LDL-c indesejável, seguido de colesterol total com 57,1% (n = 8) de crianças com valores indesejáveis. Resultados semelhantes foram encontrados por Sonaglio e colaboradores (2011) no estudo com pessoas de 3 a 19 anos com infecção viral.

Martins e outros autores (2017) ressaltam o risco para doenças cardiovasculares em crianças vivendo com Hiv. No presente estudo apenas 2 crianças não apresentaram alteração em nenhuma molécula lipídica estudada. Estudos mostram que o aumento de LDL-c está mais fortemente relacionado com o risco de aterosclerose quando comparado com colesterol total, por outro lado quanto maior a Lipoproteína de Alta Densidade – colesterol (HDL-c) menor é o risco para aterosclerose (DIRETRIZ BRASILEIRA DE DISLIPIDEMIA E PREVENÇÃO DA ATROSCLOEROSE, 2013).

Crianças e adolescentes brasileiros apresentam comportamento sedentário (GUERRA et al., 2016) o que traz impacto negativo para a saúde destes, além disso, o consumo de alimentos industrializados é alto neste público, principalmente por salgadinhos, bebidas açucaradas e guloseimas (MELO et al., 2018). Estes achados evidenciam o risco para obesidade e síndrome metabólica que se constitui como grave problema para crianças e adolescentes (FURLAN et al., 2018; HEIDMANN et al., 2019), sobretudo para pessoas que vivem com Hiv (ALVES et al., 2016).

Tabela 4. Concentração (mg/dl), entre meninas (n = 8) e meninos (n = 6) e ambos (total), para análises de perfil lipídico de crianças vivendo com Hiv atendidas no SAE de Macaé-RJ, 2016.

Variável	Feminino	Masculino	Total
Colesterol total	148,85 ± 63,43	169,87 ± 26,36	160,06 ± 48,56
Indesejável (>170mg/dl)	6 (42,8)	2 (14,3)	8 (57,1)
LDL-c	101,14 ± 21,31	76,85 ± 53,44	89 ± 42,45
Indesejável (> 110mg/dl)	5 (35,6)	4 (28,6)	9 (64,2)
HDL-c	43,71 ± 7,77	37,12 ± 22,39	40,2 ± 17,50
Indesejável (< 45mg/dl)	4 (28,5)	2 (14,3)	6 (43)
Triglicerídeos	107,71 ± 64,93	114,51 ± 61,97	111,34 ± 63,46
Indesejável (> 90mg/dl)	4 (28,5)	2 (14,3)	6 (43)

Média ± Desvio padrão, seguido da frequência absoluta (n) e relativa (%) de crianças que apresentaram valores indesejáveis. (HDL-c): lipoproteína de alta densidade, (LDL-c): lipoproteína de baixa densidade.

De acordo com a tabela 5, todas as crianças do gênero feminino (n = 6) apresentavam peso adequado para idade, e 83,3% (n = 5) do gênero masculino também apresentavam adequação. Souza e colaboradores (2018) também encontraram 100% (n = 13) de adequação no indicador de peso- para- idade nas crianças expostas ao Hiv em seu estudo. Diferente do encontrado no presente estudo, Paiva e outros autores (2018) encontraram maior prevalência de crianças com sobrepeso e obesidade, no entanto as mesmas não apresentavam infecção viral.

A obesidade é uma doença crônica de alta prevalência a nível mundial, os dados mais recentes a respeito desta condição clínica em crianças brasileiras foram publicados pela Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) (2008-2009), nela a prevalência do excesso de peso infantil atinge até 40% em algumas regiões brasileiras. Trata-se de um problema complexo e multifatorial (DIAS et al., 2017). Neste estudo (tabela 5), as crianças vivendo com Hiv apresentaram bons resultados no que se refere ao peso em relação a idade.

Tabela 5. Classificação de peso por idade das crianças de 0 a 10 anos estudadas vivendo com HIV atendidas no SAE de Macaé-RJ, 2016.

Variáveis	Feminino	Masculino
Peso/Idade	n = (%)	n = (%)
Amostra	6 (100)	6 (100)
Muito baixo peso	-	1 (16,6)
Baixo Peso	-	-
Peso adequado	6 (100)	5 (83,3)
Peso elevado	-	-

Frequência absoluta (n) e relativa (%)

Observa-se na tabela 5, que uma criança apresentava muito baixo peso para idade. Crianças vivendo com Hiv com baixo peso e déficit de crescimento apresentam maior risco de mortalidade (DIAS et al., 2012). Penda e outros autores (2018), encontraram 37,8% de crianças com Hiv abaixo do peso, no Hospital em Douala (Camarões - África) e concluíram que a infecção por Hiv afeta negativamente o estado nutricional de crianças.

4. CONCLUSÃO

A transmissão vertical é a principal causa de infecção em crianças. Diante da confirmação do diagnóstico de infecção viral, o tratamento antirretroviral garante a redução da morbidade e mortalidade neste público. No entanto, ainda que crianças vivendo com Hiv apresentem peso adequado para idade, carga viral indetectável e estejam assintomáticas de acordo com linfócitos T CD4+, as mesmas são alvo de alterações lipídicas com risco para doenças cardiovasculares considerando níveis indesejáveis de HDL-c e LDL-c.

REFERÊNCIAS

- [1] ALVES, Thiago Cândido; MORAES, Camila de; SANTOS, André Pereira dos; VENTURINI, Ana Cláudia Rossini; SANTANA, Rodrigo de Carvalho; NAVARRO, Anderson Marliere; MACHADO, Dalmo Roberto. Chance aumentada de síndrome metabólica em mulheres vivendo com HIV/AIDS e síndrome da Lipodistrofia. *Revista de Medicina*, 49 (5) p421-428, 2016.
- [2] DIAS, R. M. et al. Crianças HIV positivas: características antropométricas e Sociodemográficas. *Revista Paraense de Medicina*, v. 26, n. 4, out/dez 2012
- [3] DIAS, Patrícia Camacho; HENRIQUES, PATRÍCIA; ANJOS, Luiz Antonio dos; BURLANDY, Luciene. Obesidade e políticas públicas: concepções e estratégias adotadas pelo governo brasileiro. *Caderno de Saúde Pública*, 33(7), 2017.
- [4] R.S. Giménez, V.J. Morillo Social epidemiology in HIV/AIDS: what else should we consider to prevent the HIV/AIDS progression? *Soc Work Public Health*, 14 (2017), pp. 1-11
- [5] Souza, M.A., Gratão, L.H.A., Pereira, R.J. Perfil Antropométrico e Dietético de Crianças Expostas ao HIV. *Revista Cereus* p. 65-77, 2018
- [6] CABRAL, JVB; SANTOS, SSF; OLIVEIRA, CM. Perfil sociodemográfico, epidemiológico e clínico dos casos de HIV/AIDS em adolescentes no estado de Pernambuco. *Rev. Uniara*, v. 18, n. 1, p. 149-163. 2015.
- [7] CORREA, A. F.; SA, C. S. C. Vulnerabilidade socioambiental e desenvolvimento motor de lactentes expostos ao HIV. *Rev. Ciênc. Ext.* v.14, n.1, p.83-96, 2018.
- [8] FURLAN, Fabiana; SILVA, Gracielle Tais; COUTO, Isabella Cristina do; NUNES, Isabella Souza; ROSSI, João Vitor; ANGELIM, Letícia Silvestre; ALVES, Lívia Ferreira; MARTINS, José Luis Rodrigues; OLIVEIRA, Rodrigo Franco de. Síndrome Metabólica em Crianças e Adolescentes: revisão de literatura. III Congresso Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão (CIPEX) – Ciência para a educação das desigualdades, v2, 2018.
- [9] HEIDMANN, Luciana A; PROCIANOY, Renato S; SILVEIRA, Rita C. Prevalence of metabolic syndrome-like at 2 years of corrected age in very low birth weight preterm infants and associated factors. *Jornal de Pediatria*, 95(3) p291-297, 2019.
- [10] LIMA, M. I; PEREIRA, N. S. S. Conhecimento dos enfermeiros sobre a transmissão vertical do HIV. *Revista de Enfermagem UNISA*, v. 13, n. 2, p. 7-92, 2012.
- [11] GUERRA, Paulo Henrique; JÚNIOR, José Cazuza de Farias; FLORINDO, Alex Antonio. Comportamento sedentário em crianças e adolescentes brasileiros: revisão sistemática, *revista de Saúde Pública*, 50(9) 2016.
- [12] GOLUCCI, A. P. B. S; MARSON, F. A. L; VALENTE, M.F. F; BRANCO, M. M; PRADO, C. C; NOGUEIRA, R.J. N. Influência da terapia antirretroviral para a AIDS no padrão de crescimento v95 p7-17, 2019
- [13] Alceli Maria Fontanari Estrela Brasil, Cássia Regina Gotler Medeiros, Olinda Maria de Fátima Lechmann Saldanha. *ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: ANÁLISE DOS REGISTROS EM PRONTUÁRIOS*. Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 1, p. 265-276, 2015. ISSN 1983-0882
- [14] Secretaria de Vigilância em Saúde - Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico HIVAIDS 2018. Volume 49 nº53 Disponível em <http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2018/boletim-epidemiologico-hivaids-2018>

- [15] TITONELI, Carolina; ROCHA, Fernanda; CORTÁZIO, Leonardo; KISTENMACKER, Matheus; CUNHA, Tayssa; ESTEVES, Ana Paula. A relevância do uso da TARV na prevenção da transmissão vertical do Hiv. Revista Caderno de Medicina Vol 2. No 2, 2019.
- [16] ADRIANO CAVALCANTE SAMPAIO Qualidade dos prontuários médicos como reflexo das relações médico-usuário em cinco hospitais do Recife/PEAdriano Cavalcante Sampaio. — Recife: A. C. Sampaio, 2010 Tese (Doutorado em Saúde Pública) - Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo C
- [17] . Brasil. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 1.638/2002. Define prontuário médico e torna obrigatória a criação da Comissão de Revisão de Prontuários nas instituições de saúde. Brasília: O Conselho; 2002. [2 p.]. [acesso 2011 Maio 11]. Disponível em: http://www.portalmédico.org.br/resolucoes/cfm/2002/1638_2002.htm
- [18] MELO, Marina Clarissa; OLIVEIRA, Genykléia Silva de; SILVA, Ana Elizabeth Alves da; SILVA, Dalila Savana Pereira da; AZEVEDO, Thaís Keylla Barreto de. Crianças Pré-Escolares: uma revisão sobre o consumo de alimentos industrializados. Revista Humano Ser, 3(1), 2018.
- [19] IPEA 2009. Prontuários de bases de dados: informação sistematizada para as contas de saúde do Brasil / organizadora: Ana Cecília de Sá Campello Faveret. – Brasília : Ipea, 2009. 160 p
- [20] PAIVA, Ana Carolina Teixeira; COUTO, Crislaine Campagnoli do; MASSON, Adriano Pinheiro de Lemos; MONTEIRO, Cristiane Aparecida Silveira; FREITAS, Cristiane Fonseca. Obesidade Infantil : análises antropométricas, bioquímicas, alimentares e estilo de vida, Revista Cuidarte 9(3), 2018
- [21] Penda CI, Moukoko EC, Nolla NP, Evindi NO, Ndombo PK. Malnutrition among HIV infected children under 5 years of age at the Laquintinie hospital Douala, Cameroon. Pan Afr Med J. 2018;30:91
- [22] PINHEIRO, KMK; MASSAIA, IFDS; GORZONI, ML; MARROCHI, LC; FABBRI, RMA. Investigação de síndrome consumptiva. Arq. Med. Hosp. Fac. Cienc. Med. Santa Casa, São Paulo, SP, v. 56, n. 2, p. 87-95. 2011.
- [23] SOARES, D. S; CAVALCANTE, M. G; RIBEIRO, S. M. V; LEITÃO, R. C; VIEIRA, A. P. F; NETO, R da J. P; JUNIOR, G. B da S; DAHER, E de F. Acute kidney injury in HIV-infected children: comparison of patients according to the use of highly active antiretroviral therapy. Jornal de Pediatria 92 (6), p 631-637, 2016
- [24] SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA. Parecer técnico – Comitê Científico de HIV/AIDS. São Paulo, 2018. Acesso em 13 de jun de 2019. Disponível em <https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/125/2018/01/540b4eb3f9ac95db79b1e70d4587b724677ff53a4ea5c27612505d05f6e6d52e.pdf>
- [25] World Health Organization (WHO). Global health strategy of HIV/AIDS 2011-2015. Genebra: WHO; 2011.
- [26] MARTINS, P. C; LIMA, L. R.A; TEIXEIRA, D. M; CARVALHO, PETROSKI, E. D. Atividade física e gordura corporal de adolescentes vivendo com HIV: um estudo comparativo. Revista Paulista de Pedatria, 35(1), 2017.
- [27] MENEZES, A. M. F; ALMEIDA, K. T; NASCIMENTO, A. K. A; DIAS, G. C. M; NASCIMENTO, J. C. Perfil epidemiológico das pessoas soropositivas para HIV/AIDS. Revista de Enfermagem UFPE, 12(5), 1225- 32, 2018.
- [28] MIZIARA, L. A. F; ANDRADE, S. M. O de. O significado do HIV/AIDS na vida de crianças e adolescentes que vivem com a doença. Academia Paulista de Psicologia, v 36(9), 2016

Capítulo 10

Perfil sociodemográfico e estilo de vida de indivíduos portadores de HIV/AIDS em hospital de referência no município de João Pessoa-PB

Catarina Alves de Lima Serafim

Leônia Maria Batista

Luciana Lucena Aranha de Macedo

Resumo: A infecção pelo HIV e a AIDS constituem um dos mais preocupantes problemas de saúde pública mundial que vêm afetando as mais diversas culturas, diferentes níveis socioeconômicos e faixas etárias, explicando o seu rápido avanço e disseminação entre a população. O objetivo desta pesquisa foi traçar o perfil sociodemográfico e hábitos de vida relacionados a saúde dos portadores de HIV/AIDS atendidos no hospital de referência do município de João Pessoa-PB. Para tanto, foi realizado um estudo retrospectivo, documental, com delineamento transversal e abordagem quantitativa durante os meses de janeiro e fevereiro de 2017. A coleta de dados foi realizada por meio dos prontuários dos usuários do serviço. Os dados obtidos foram armazenados e analisados pelo programa IBM SPSS Statistics versão 20.0. Os dados foram apresentados em frequências absolutas e percentagens na forma de gráficos e tabelas. Observou-se que a maioria dos portadores de HIV/AIDS pertencia ao gênero masculino (71%), tinham idade entre 30-39 anos (35%), eram de cor parda (67%), solteiros(as) (63%), possuíam ensino fundamental completo (24%), trabalho assalariado (22%) e eram residentes na cidade de João Pessoa (46%). Metade (50%) tinha o hábito de fumar, 61% consumiam bebidas alcoólicas e 23% utilizavam drogas ilícitas. Para a maioria dos usuários, a forma de contágio foi por meio de relações sexuais (93%), sendo que a maioria (39%) se relacionou com pessoas do mesmo gênero. Em relação à soropositividade do parceiro, 36% dos indivíduos possuem parceiro fixo HIV+. Em suma, os perfis sociodemográfico e clínico, e o estilo de vida relacionado à saúde dos usuários atendidos no hospital de referência do município de João Pessoa-PB estão de acordo com as tendências nacionais, e a maioria desses indivíduos teve como forma de contágio as relações sexuais desprotegidas. Dessa forma, se faz necessário o maior incentivo ao comportamento de autoproteção, pois este reflete no perfil da infecção e na situação de saúde dessa população.

Palavras-Chave: HIV; AIDS; perfil sociodemográfico; perfil clínico.

1. INTRODUÇÃO

A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) se insere no grupo das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e tem como agente etiológico o vírus da imunodeficiência humana (HIV). Essa doença é caracterizada pela redução dos níveis de linfócitos T, principalmente do tipo CD4+, resultando na fragilidade do sistema imunológico, debilitando o seu portador (PIERI; LAURENTI, 2012).

A descoberta da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), na década de 80, fez-se um marco na história da humanidade. A AIDS constitui-se como um fenômeno global, dinâmico e instável, na qual, a forma de ocorrência nas mais diversas regiões do mundo decorre, dentre outros fatores, do comportamento humano individual e coletivo (BRITO; CASTILHO; SZWARCOWALD, 2000).

Nos últimos 30 anos a infecção pelo HIV e a AIDS tiveram implicações muito devastadoras para famílias, comunidades e países, tornando-se um dos mais desafiadores problemas para a saúde pública mundial (MARTINS et al., 2014).

Durante muito tempo a infecção pelo HIV foi associada ao comportamento homossexual, aos usuários de drogas injetáveis e as prostitutas. Entretanto, com o passar do tempo, identificou-se alterações no perfil dos portadores do vírus, principalmente devido à heterossexualização, feminilização, interiorização e pauperização da doença (GRUNER; SILVA, 2005).

Assim, nos últimos anos, a doença adotou um novo perfil. A transmissão heterossexual tornou-se a principal via de transmissão do vírus HIV e vem manifestando uma maior propensão de crescimento, acompanhada pelo aumento dos relatos dos casos de infecção em mulheres. Pode-se observar também, um processo de interiorização, que é caracterizado pelo acréscimo contínuo no número de casos da doença em pequenos municípios, como também, a pauperização da epidemia, ou seja, a doença que a princípio se estabeleceu nos estratos sociais de maior renda e escolaridade, atualmente, avança nos mais pobres e de menor escolaridade (GRUNER; SILVA, 2005).

A transmissão sexual é a principal via de transmissão desta infecção em adultos, sendo responsável por um total de 75% dos casos da doença no mundo. Mas, outras vias de transmissão também contribuem para o aumento gradativo do número de casos da doença, como a via vertical e a via parenteral (CARNICER-PONT; VIVES; BÁRBARA, 2011).

A transmissão vertical, na qual a criança é infectada pelo vírus ainda na gestação, durante o parto ou no ato da amamentação, é a via de transmissão mais prevalente na população pediátrica (BULTERYS, ELLINGTON, KOURTIS, 2010). É responsável por aproximadamente 90% dos casos da doença em crianças. Se durante a gestação e após o parto nenhuma intervenção for realizada, o risco da criança adquirir a infecção é superior a 45%. Porém, se for realizado o diagnóstico precoce e consequentemente o tratamento, o risco de infecção reduz para menos de 2% dos casos (COOPER *et al.*, 2002). Em aproximadamente 40% dos casos a transmissão de mãe para filho ocorre com o aleitamento materno (BULTERYS, ELLINGTON, KOURTIS, 2010).

A transmissão parenteral do HIV sempre esteve muito associada com o compartilhamento de seringas e outros instrumentos, principalmente devido à utilização de drogas injetáveis e a transfusão de sangue e hemoderivados (BASTOS, 2010; KURTH et al., 2011).

Após a infecção com o HIV, ocorre o aparecimento dos primeiros anticorpos anti-HIV entre a 3ª e 5ª semana. Esse intervalo entre a infecção com o vírus e a detecção de anticorpos é denominado janela imunológica. Os primeiros aspectos clínicos da doença são conhecidos como infecção aguda ou síndrome retroviral aguda e é caracterizada por uma rápida diminuição no número de células T-CD4+. Nessa fase, ocorre a produção diária de bilhões de partículas virais, a viremia plasmática atinge níveis elevados e o portador é considerado altamente infectante (FANALES-BELASIO *et al.*, 2010).

Assim como em outras infecções virais agudas, a infecção pelo HIV apresenta vários sinais e sintomas, sendo os principais: febre alta, adenopatia, faringite, exantema, mialgia e cefaleia. O portador pode desenvolver ainda, sudorese, linfadenomegalia, esplenomegalia, letargia, astenia, anorexia e depressão. Alguns indivíduos apresentam exantema, principalmente na face, pescoço e/ou tórax superior, mas pode afetar também os membros. Náuseas, vômitos, diarreia, perda de peso e úlceras também podem ocorrer (BRASIL, 2013).

A maioria dessas manifestações some entre 3 a 4 semanas, sendo que a linfadenopatia, letargia e astenia podem perdurar por meses. Após esse período ocorre a fase de latência clínica que é a fase sintomática da doença. Nessa etapa da infecção podem ocorrer alterações nos exames laboratoriais, sendo as mais comuns: plaquetopenia, anemia e leucopenia (BRASIL, 2013).

Como o sistema imunológico encontra-se comprometido, ocorre a diminuição da atividade imune e o portador do vírus pode desenvolver infecções oportunistas. Tais infecções são ocasionadas por agentes não patogênicos ao organismo ou por agentes considerados patogênicos, mas que nesse quadro adquirem uma agressividade maior. As infecções oportunistas mais frequentes entre os portadores de HIV são a pneumonia, tuberculose, candidíase e herpes, comprometendo significativamente o prognóstico desses indivíduos. Entretanto, essa situação varia dependendo da resposta individual de cada um à replicação viral e ao número de células T-CD4+ (FANALES-BELASIO *et al.*, 2010).

Enquanto o número de linfócitos T-CD4+ se encontra acima de 350 células/mm³, as infecções são geralmente bacterianas, como as infecções respiratórias. Porém, com a progressão da doença, observa-se uma resposta tardia à antibioticoterapia e a reativação de infecções antigas (BRASIL, 2013).

O diagnóstico da infecção pelo HIV se dá por meio de exames que identificam anticorpos anti-HIV no sangue. Além de confirmar o diagnóstico, esses exames também contribuem de forma efetiva para o monitoramento e o controle da evolução da doença (BUTTÒ *et al.*, 2010).

Os medicamentos utilizados para o tratamento da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) são chamados de antirretrovirais (ARVs) e são classificados de acordo com o seu mecanismo de ação. Atualmente, há mais de 36 fármacos ARVs disponíveis para o tratamento da infecção pelo HIV, todos eles aprovados pelo *Food and Drug Administration* (FDA), e estão distribuídos em cinco classes de medicamentos, são elas: inibidores da transcriptase reversa, inibidores da protease, inibidores de fusão, inibidores da integrase e antagonistas dos receptores da quimiocina CCR5 (SOUZA, 2005; LU; CHEN, 2010; GARRIDO *et al.*, 2010).

Os inibidores da transcriptase reversa são divididos em análogos de nucleosídeos e em não análogos de nucleosídeos. Esses fármacos atuam sobre a transcrição do DNA a partir do RNA e afetam a ação da enzima transcriptase reversa. Os inibidores da protease operam diretamente sobre a enzima protease que está relacionada ao processo de maturação da partícula viral (LU; CHEN, 2010). Os inibidores de entrada atuam de forma a intervir na ligação do vírus aos receptores dos linfócitos e, dessa forma, impossibilitam o processo de fusão do HIV na membrana celular e sua subsequente entrada na célula (SOUZA, 2005; ESTÉ; TELENTI, 2007) e os inibidores da integrase inibem a integração do genoma viral ao genoma da célula hospedeira (HAZUDA *et al.*, 2000).

A terapia antirretroviral é feita com base na combinação de fármacos pertencentes a diferentes classes. De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em adultos a terapia inicial de escolha consiste na associação de três ARVs, sendo dois inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos e um inibidor da transcriptase reversa não análogo de nucleosídeo, seguindo na primeira linha: Tenofovir 300 mg + Lamivudina 150 mg + Efavirenz 600 mg. Entretanto, a escolha pode variar, de acordo com o histórico de uso de ARVs, presença de co-morbidades, hábitos e estilo de vida de cada usuário (BRASIL, 2013).

O tratamento antirretroviral visa diminuir a carga viral para níveis inferiores a 50 cópias/ml. Os níveis plasmáticos do vírus e o número de células T-CD4+ devem ser monitorados periodicamente, tanto para início, alteração ou o acompanhamento do tratamento. Também se faz importante a realização de teste de resistência viral, para o monitoramento de possíveis mutações do vírus que possam comprometer a eficácia terapêutica. Além disso, a avaliação periódica de co-morbidades e da toxicidade medicamentosa constituem parâmetros valiosos para o acompanhamento dos usuários (HAMMER *et al.*, 2008).

Estudos realizados sobre a terapia antirretroviral têm evidenciado um declínio significativo da morbidade e da mortalidade por HIV, e consequentemente, o aumento na sobrevida dos portadores (ROSSI *et al.*, 2012). Entretanto, apesar de promover um aumento significativo na sobrevida dos portadores de HIV, os regimes terapêuticos de antirretrovirais, recomendados atualmente, possuem um alto grau de complexidade. São fármacos que devem ser utilizados por um período de tempo indeterminado, que necessitam de várias doses ao dia, de um grande número de comprimidos ou cápsulas, da ingestão de grande quantidade de líquidos e de restrições alimentares (CARVALHO *et al.*, 2003).

Assim, os esquemas da terapia antirretroviral são muitas vezes incompatíveis com as atividades diárias do usuário, o que vem a ser um grande entrave para o sucesso da terapia, já que, a não adesão ou negligência ao regime terapêutico (doses incorretas, falta de precisão no tempo ou adição de medicamentos) leva o usuário aos riscos da medicação, como a resistência viral, resultando em um não benefício terapêutico (KANAI; CAMARGO, 2002; BURGOYNE; TAN, 2008).

Portanto, devido à diversidade encontrada no país, como também, às alterações pelas quais a epidemia vem passando, afetando as mais diversas culturas, diferentes níveis socioeconômicos e faixas etárias, justifica-se a necessidade de conhecer o perfil das pessoas portadoras da doença.

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo traçar o perfil sociodemográfico e os hábitos de vida relacionados à saúde dos portadores de HIV/AIDS assistidos no hospital de referência do município de João Pessoa-PB.

2. METODOLOGIA

O trabalho consiste num estudo retrospectivo, documental, do tipo transversal e quantitativo, realizado com os portadores de HIV/AIDS acompanhados no hospital de referência em doenças infectocontagiosas do estado da Paraíba. Foram incluídos na pesquisa os prontuários dos portadores de HIV/AIDS, maiores de 18 anos, que foram assistidos pelo hospital de referência do estado da Paraíba no ano de 2015. E foram excluídos da pesquisa os prontuários que possuíam dados incompletos. No total, foram analisados 243 prontuários, dos quais, 43 foram excluídos da análise dos dados em virtude da ausência de informações, configurando assim um total de 200 prontuários, uma amostra representativa, conforme cálculo amostral de populações finitas, e correspondente a 31% da população atendida no ano de 2015. A coleta de dados ocorreu entre os meses de janeiro e fevereiro de 2017, no Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) do referido hospital, a partir da análise dos prontuários dos usuários acompanhados no ano de 2015, onde foram levantados o seu perfil sociodemográfico e clínico. O instrumento de pesquisa utilizado foi uma ficha de informações elaborada pelo pesquisador, que envolveu variáveis como: idade (em anos), gênero, estado civil, profissão/ocupação e procedência. Os dados obtidos foram armazenados e analisados pelo programa *IBM SPSS Statistics* versão 20.0, mediante análise descritiva, utilizando frequências, médias e desvio padrão. Os dados foram avaliados fazendo referência com a literatura e expressos em percentagem na forma de gráficos e tabelas. O presente estudo foi submetido à aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba e aprovado sob o protocolo nº0792/16.

3. RESULTADO E DISCUSSÕES

3.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO

O perfil dos usuários está expresso na Tabela 1, que apresenta as informações sociodemográficas em frequências e percentuais.

Tabela 1: Distribuição percentual dos portadores de HIV/AIDS segundo gênero, faixa etária, cor, estado civil, escolaridade e ocupação. João Pessoa-PB, 2017.

Variável	N	%
Gênero		
Masculino	142	71
Feminino	58	29
Faixa etária		
18-29 anos	47	24
30-39 anos	70	35
40-49 anos	42	21
50-59 anos	33	17
60-69 anos	06	03
70-79 anos	02	01
Cor		
Branca	51	26
Parda	133	67
Negra	16	08

(Continuação)

Tabela 1: Distribuição percentual dos portadores de HIV/AIDS segundo gênero, faixa etária, cor, estado civil, escolaridade e ocupação. João Pessoa-PB, 2017.

Variável	N	%
Estado civil		
Solteiro	126	63
Casado	32	16
União estável	23	12
Divorciado	12	06
Viúvo	06	03
Escolaridade		
Sem escolaridade	30	15
Fundamental incompleto	29	15
Fundamental completo	47	24
Médio incompleto	06	03
Médio completo	46	23
Superior in/completo	40	21
Ocupação		
Estudante	05	03
Desempregado	30	15
Autônomo	42	21
Assalariado	44	22
Funcionário público	22	11
Aposentado	12	06
Atividade rural	15	08
Do lar	29	15
Procedência		
João Pessoa	91	46
Região metropolitana	82	41
Interior	27	14

Após a análise dos prontuários, verificou-se que a amostra estudada era predominantemente masculina (71%), *evidenciando* que os homens ainda são os principais infectados pelo HIV. O perfil de usuários encontrado no estudo assemelha-se ao do estudo realizado por Castro e colaboradores (2013), com portadores de HIV/AIDS em Salvador-BA, no qual o sexo masculino teve prevalência sobre o feminino, com 70% dos usuários do gênero masculino. Na região nordeste, no ano de 2015, a razão de casos de portadores de HIV/AIDS era de 21 homens para cada 10 mulheres (BRASIL, 2016).

Segundo dados do Boletim Epidemiológico de HIV/AIDS de 2016, nos últimos dez anos, a incidência de HIV/AIDS em homens tem mostrado tendência ao crescimento. No ano de 2006 essa taxa foi de 24,1 casos/100 mil hab., em 2015 passou para 27,9, representando 15,9% de aumento. Já em relação às mulheres, observa-se tendência a queda dessa taxa, que foi de 15,8 casos/100 mil hab., em 2006, para 12,7 em 2015, totalizando uma redução de 19,6% (BRASIL, 2016).

A média de idade dos usuários do estudo foi de 36 anos (DP±12 anos), sendo que a maioria dos usuários (59%) apresentou-se no intervalo de idade de 30 a 39 anos, seguido dos entre 18 e 29 anos, e classificados como adultos jovens. Em concordância com isso, um estudo feito por Reis *et al.* (2011) com 228 indivíduos com HIV/AIDS em atendimento ambulatorial no interior do estado de São Paulo, identificou que 54% destes, encontravam-se na faixa etária de 20 a 39 anos.

Estudos nacionais e internacionais expressam que as idades mais acometidas pelo HIV/AIDS estão entre a segunda e a quarta década da vida (TOMAZELLI *et al.*, 2003; TOLEDO *et al.*, 2010) que corresponde às idades sexualmente ativas e reprodutivas.

Outro estudo que analisou o comportamento sexual da população brasileira detectou que entre as pessoas com vida sexual ativa, 28,5% estavam na faixa etária de 20 e 29 anos e 27,2% entre 30 e 39 anos. Verificou-se também que os indivíduos com idade entre 20 a 39 anos possuíam uma média de relações sexuais cerca de 50% maior do que aquela observada entre 14 a 19 anos, e o dobro da média quando comparado aqueles acima de 50 anos (BRASIL, 2003).

Porém, as incidências de infecção pelo HIV em indivíduos acima de 50 anos de idade é uma realidade. No presente estudo, 21% dos portadores de HIV/AIDS tinham 50 anos ou mais. Nesse sentido, Santos *et al.* (2002) demonstraram um envelhecimento nos casos de HIV ao identificarem um pequeno crescimento da incidência nas faixas etárias mais elevadas (de 40 a 59 anos).

Quanto à variável cor, 67% dos usuários são classificados como pardos, a segunda categoria mais frequente é a branca com 26% e a negra que representa apenas 8% do total de pessoas. Estudo conduzido em Natal-RN, também apresentou percentuais similares, onde a maior parte dos casos de HIV/AIDS estudados era de pessoas autodeclaradas pardas (53%), seguida de brancas (32%) e negras (15%) (SILVA *et al.*, 2016).

Isso pode ser atribuído ao fato das regiões norte e nordeste apresentarem uma maior concentração de negros e pardos, quando comparado as demais regiões do país, que se destacam com uma maioria branca, o que está de acordo com o perfil de miscigenação da população brasileira (IBGE, 2010).

Na última década, o povo brasileiro teve seu perfil modificado em termos de cor ou raça. Observa-se um menor percentual de indivíduos que se autodeclararam brancos e uma maior proporção dos que se declaram pretos ou pardos. Esse grupo que representava 44,7% da população em 2000 passou para 50,7% em 2010 (IBGE, 2010).

De acordo com o Boletim Epidemiológico de HIV/AIDS (2016) as taxas de casos de HIV/AIDS entre os indivíduos pardos teve um aumento significativo, enquanto que, apresentou uma queda significativa na população considerada branca (BRASIL, 2016).

No presente estudo, o estado civil que mais se destacou foi o solteiro (63%), seguido pelos casados (16%) e em união estável (12%), divorciados (6%) e viúvos (3%). Um estudo realizado com pessoas vivendo com HIV/AIDS na Bahia identificou um total de 74%, 16%, 8% e 2%, respectivamente, para a mesma variável (CASTRO *et al.*, 2013). Possivelmente esse fato está relacionado à multiplicidade de parceiros sexuais, já que, no estado civil solteiro, os indivíduos possuem uma maior diversidade de parceiros do que nas categorias casado e união estável (MARTINS; ARGENTA; GRUNNER, 2000).

Sobre a escolaridade, detectou-se que 54% não possuíam escolaridade ou tinham ensino fundamental completo/incompleto. Com essa distribuição de grau de instrução, pode-se considerar que os usuários desse serviço têm uma baixa escolaridade, estando de acordo com as tendências da infecção no país.

Diversos estudos têm apresentado essa característica, por exemplo, na pesquisa de Castro *et al.* (2013) a maioria (52%) dos indivíduos enquadrava-se na categoria ensino fundamental incompleto. Essa diminuição do grau de instrução dos portadores de HIV/AIDS tem sido amplamente relacionada como um indicador da pauperização da infecção (SANTOS *et al.*, 2002). Entretanto, no presente estudo, também se observou uma percentagem significativa de pessoas com ensino médio completo e ensino superior, demonstrando que a infecção pelo vírus acomete tanto pessoas de menor instrução, como as que possuem um grau de instrução maior.

A principal ocupação registrada foi o trabalho assalariado, com um percentual de 22%, incluindo-se no grupo de serviços que tradicionalmente comportam os indivíduos que possuem um baixo nível educacional e baixas remunerações mensais, estando de acordo com o nível de escolaridade encontrado na presente pesquisa.

Em relação à procedência, verificou-se que a maioria (46%) reside no município onde se localiza o serviço de saúde. Isso pode estar relacionado à maior facilidade de acesso e à proximidade entre sua residência e o atendimento. Também se deve levar em consideração a quantidade significativa de pessoas HIV+ procedentes das cidades adjacentes (41%), o que sugere a interiorização da doença.

Outro aspecto importante a ser considerado é que apenas 14% dos usuários soropositivos são procedentes do sertão do estado, isso possivelmente está relacionado ao fato de alguns hospitais mais próximos a essas localidades, já prestarem esse tipo de serviço.

Nos anos de 1980, o HIV/AIDS estava localizado, quase que somente, nos centros metropolitanos. Na presente década, cerca de 70% dos municípios brasileiros já tiveram ao menos um caso de infecção registrado. Enquanto nas cidades maiores dá-se uma desaceleração do crescimento dos casos, nos municípios menores ocorre uma expansão (RESUTO, 2000).

3.2. ESTILO DE VIDA RELACIONADO À SAÚDE

Em relação aos hábitos de vida (Tabela 2), percebe-se um percentual significativo de tabagismo (50%), etilismo (61%) e uso de drogas ilícitas (23%). Fato este bastante preocupante, já que, essas práticas podem aumentar potencialmente os problemas relacionados à saúde desses indivíduos.

Tabela 2: Distribuição dos usuários quanto ao tabagismo, utilização de bebidas alcoólicas e outras substâncias químicas. João Pessoa-PB, 2017.

Variável	N	%
Tabagismo		
Sim	100	50
Não	74	37
Sem informação	26	14
Consumo de bebidas alcoólicas		
Sim	121	61
Não	53	27
Sem informação	26	13
Uso de drogas ilícitas		
Sim	45	23
Não	129	65
Sem informação	26	13

O tabagismo está relacionado ao aumento do risco de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), câncer de pulmão, acidente cardiovascular e infarto. Já é descrito na literatura que fumantes HIV+ possuem uma maior probabilidade de adquirir DPOC do que fumantes HIV-. Já o consumo excessivo de álcool pode intensificar o risco de hepatotoxicidade associada ao uso de antiretrovirais. A bebida alcoólica é metabolizada no fígado e o aumento de gordura no sangue, causado por alguns medicamentos antirretrovirais, pode ser potencializado pelo álcool, levando a prejuízos significativos a esse órgão (CARDOSO; ARRUDA, 2005; MELO FILHO; SILVEIRA, 2007).

Em relação ao uso de drogas ilícitas, é um comportamento de risco à contaminação e transmissão do HIV. Os usuários de drogas injetáveis podem se infectar com o vírus por meio do compartilhamento de seringas, ou pela prática de relações sexuais sem preservativo, já que, estudos apontam que indivíduos sob efeito de álcool e drogas ilícitas têm maior risco de se envolverem em práticas sexuais inseguras (GRECO; LIGNANI; CARNEIRO, 2001).

3.3. CARACTERIZAÇÃO DA FORMA DE TRANSMISSÃO DO HIV E SOROPOSITIVIDADE DO PARCEIRO

Quanto à forma de exposição ao vírus (Gráfico 1), os usuários distribuíram-se nas categorias: sexual (93%), compartilhamento de agulhas/injetáveis (3%), ocupacional (2%), vertical (1%) e 2% não informaram. Observa-se então que a principal via de infecção pelo HIV foi a transmissão sexual. Esse resultado vai ao encontro do estudo realizado por Almeida *et al.* (2011), no município de Campina Grande, no estado da Paraíba, o qual identificou que 92,5% dos indivíduos infectados por HIV tinham contraído o vírus pela prática de sexo inseguro.

Gráfico 1: Distribuição dos usuários quanto à forma de exposição ao vírus HIV. João Pessoa-PB, 2017.

Os dados do Boletim Epidemiológico de HIV/AIDS (2016) mostram que para adolescentes e adultos, a principal via de transmissão do HIV é a sexual, tanto para homens (94,9%) como para mulheres (97,4%) (BRASIL, 2016).

Como o tipo de exposição ao HIV majoritário nos registros é o contato sexual sem proteção, a utilização de preservativos de modo adequada representa a principal maneira de diminuir o risco de infecção.

Nesse estudo, a via vertical não expressou percentuais muito significativos, apenas com 1% dos casos. Sobre isso, estudos relatam que a diminuição das taxas de transmissão vertical do HIV se dá as políticas públicas, como o diagnóstico da infecção na gestação e o tratamento das mulheres grávidas infectadas pelo vírus, diminuindo o risco de transmissibilidade ao feto (BRITO *et al.*, 2006).

Entre os usuários do sexo masculino, verificou-se a prevalência mais elevada de HIV+ no grupo homossexual (38,73%), seguido de heterossexuais (26,76%), bissexuais (6,33%) e transexuais (2,81%), como está expresso na Tabela 3. Dados do Ministério da Saúde indicam um aumento do número de casos de infecção pelo HIV por meio de relação homossexual no país (BRASIL, 2010). Na América Latina, aproximadamente 43,5% dos casos de HIV/AIDS estão relacionados à transmissão homo-bissexuais (CÁCERES; CHEQUER, 2000).

Tabela 3: Distribuição dos usuários quanto à orientação sexual e soropositividade do parceiro. João Pessoa-PB, 2017.

Variável	N	%
Orientação sexual		
Heterossexual	38	26,76
Homossexual	55	38,73
Bissexual	09	6,33
Transexual	04	2,8
Sem informação	36	25,38
Diagnóstico do parceiro		
Parceiro HIV+	72	36
Parceiro HIV-	11	06
Sem parceiro fixo	117	59

Em relação à transmissão heterossexual, verifica-se uma tendência crescente do número de mulheres nessa categoria. O que representa a maior vulnerabilidade feminina, tanto devido a fatores biológicos (anatomia feminina, grande concentração de HIV no sêmen e crença na fidelidade conjugal), tanto por razões culturais e sociais, como menos capacidade de negociar sexo com proteção. O panorama de infecção por HIV da mulher brasileira indica que a mesma vem se infectando no próprio lar, pelo seu

parceiro sexual fixo que, por sua vez, adquire a doença por meio de relações sexuais extraconjugais, bi ou heterossexuais. Isso também implica na infecção de crianças por via vertical (BASTOS; SZWARCOWALD, 2000).

Portanto, independente da orientação sexual, a prática sexual sem proteção e a multiplicidade de parceiros, quando somadas à utilização de bebidas alcoólicas e outras drogas constituem fatores de alto impacto à infecção pelo HIV, evidenciando a necessidade de ações de prevenção a essas práticas (FOLCH *et al.*, 2010).

A respeito da vida afetivo-sexual (Tabela 3), 59% dos indivíduos com HIV/AIDS não tinham parceiro fixo, enquanto que, 36% mantinham relacionamento com parceiro sexual-afetivo também portador do HIV e 6% conviviam com parceiro não infectado pelo HIV, ou seja, parceiro sexual sorodiferente.

Os relacionamentos afetivos são elementos da vida comprometidos pelo impacto pelo diagnóstico HIV+. O medo de transmissão do vírus para o(a) parceiro(a), além do próprio medo de ser rejeitado e abandonado, são sentimentos bastante decorrentes para as pessoas vivendo com o HIV/AIDS (REIS; GIR, 2005).

Um estudo realizado com 241 indivíduos com HIV/AIDS no Distrito Federal-DF identificou que o(a) parceiro(a) representa uma fonte de apoio, muitas vezes a única ou a mais frequente, para os indivíduos que vivem com o HIV, sendo um fator importante na qualidade de vida dessas pessoas (SEIDL, 2006).

4. CONCLUSÃO

Em suma, os perfis sociodemográfico e o estilo de vida da amostra estudada está de acordo com as tendências nacionais. Um fator importante ao ser observado é que a transmissibilidade do vírus está intimamente relacionada ao estilo de vida dos indivíduos, como as relações sexuais desprotegidas. Dessa forma, se faz necessário o maior incentivo ao comportamento de autoproteção, pois este hábito reflete no perfil da infecção e na situação de saúde desses indivíduos.

Assim, percebe-se a importância da equipe multiprofissional, composta por médicos, farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, entre outros, no acompanhamento de usuários soropositivos, para auxiliar e orientar esses indivíduos, reforçando a necessidade de adesão a terapia, intensificando a importância do sexo seguro e as demais questões relacionadas ao enfrentamento dessa condição

REFERÊNCIAS

- [1] PIERI, F. M.; LAURENTI, R. HIV/AIDS: Perfil Epidemiológico de adultos internados em Hospital Universitário. *Revista Ciência, Cuidado e Saúde*, v. 11, p. 144-152, 2012.
- [2] CARNICER-PONT, D.; VIVES, N.; BÁRBARA, J.C. Epidemiologia de la infección por virus de inmunodeficiencia humana. Retraso en el diagnóstico. *EnfermInfeccMicrobiolClin.*, v. 29, n.2, p. 144-151, 2011.
- [3] BULTERYS, M.; ELLINGTON, S.; KOURTIS, A.P. HIV-1 and breastfeeding: biology of transmission and advances in prevention. *Clin Perinatol.*, v. 37, n. 4, p. 807-824, 2010.
- [4] COOPER, E. R.; CHARURAT, M.; MOFENSON, L.; HANSON, C.; PITT, J.; DIAZ, C.; BLATTNER, W. Combination Antiretroviral Strategies for the Treatment of Pregnant HIV-1-Infected Women and Prevention of Perinatal HIV-1 Transmission. *JAIDS-HAGERSTOWN MD*, v. 29, n. 5, p. 484-494, 2002.
- [5] BASTOS, F.I.P. A nova agenda internacional e brasileira em política de drogas e prevenção do HIV/AIDS entre usuários de drogas. *Tempus - Actas de Saúde Coletiva*, v. 4, n. 2, p. 67-74, 2010.
- [6] KURTH, A. E.; CELUM, C.; BAETEN, J. M.; VERMUND, S. H.; WASSERHEIT, J. N. Combination HIV prevention: significance, challenges, and opportunities. *Curr HIV/AIDS Rep.*, v. 8, n. 1, p. 62-72, 2011.
- [7] FANALES-BELASIO, E.; RAIMONDO, M.; SULIGOI, B.; BUTTÒ, S. HIV virology and pathogenetic mechanisms of infection: a brief overview. *Ann Ist Super Sanità*, v. 46, n.1, p. 5-14, 2010.
- [8] BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos. In: Programa Nacional de DST E HIV. Brasília DF, 2013.
- [9] BUTTÒ, S.; SULIGOI, B.; FANALES-BELASIO, E.; RAIMONDO, M. Laboratory diagnostics for HIV infection. *Ann Ist Super Sanità*, v. 46, n.1, p. 24-33, 2010.
- [10] GARRIDO, C.; GERETTI, A. M.; ZAHONERO, N.; BOOTH, C.; STRANG, A.; SORIANO, V.; DE MENDOZA, C. Integrase variability and susceptibility to HIV integrase inhibitors: impact of subtypes, antiretroviral experience and duration of HIV infection. *J Antimicrob Chemother*, v. 65, n. 2, p. 320-326, 2010.

- [11] LU, X. F.; CHEN, Z. W. The development of anti-HIV-1 drugs. *Acta Pharm Sin*, v. 45, p. 165-176, 2010.
- [12] SOUZA, M. V. N. Fármacos inibidores de fusão: uma nova estratégia no combate à replicação do vírus VIH. *Acta Farm. Bonaerense*, v. 24, n. 2, p. 291-299, 2005.
- [13] ESTÉ, J. A.; TELENTI, A. HIV entry inhibitors. *Lancet*, v. 370, p. 81-88, 2007.
- [14] HAZUDA, D. J.; FELOCK, P.; WITMER, M.; WOLFE, A.; STILLMOCK, K.; GROBLER, J. A.; MILLER, M. D. Inhibitors of Strand Transfer That Prevent Integration and Inhibit HIV-1 Replication in Cells. *Science*, v. 287, n. 5453, p. 646-650, 2000.
- [15] HAMMER, S. M.; ERON, J. R. J. J.; REISS, P.; SCHOOLEY, R. T.; THOMPSON, M. A.; WALMSLEY, S.; JACOBSEN, D. M. Antiretroviral Treatment of Adult HIV Infection: 2008 - Recommendations of the International AIDS Society–USA Panel. *JAMA*, v. 300, n. 5, p. 555-570, 2008.
- [16] ROSSI, S. M. G. D.; MALUF, E. C. P.; CARVALHO, D. S.; RIBEIRO, C. E. L.; BATTAGLIN, C. R. P. Impacto da terapia antirretroviral conforme diferentes consensos de tratamento da Aids no Brasil. *Rev. Panam. Salud Publica*, Washington, v. 32, n. 2, p. 117-223, 2012.
- [17] CARVALHO, C. V. D.; DUARTE, D. B.; MERCHÁN-HAMANN, E.; BICUDO, E.; LAGUARDIA, J. Determinantes da aderência à terapia anti-retroviral combinada em Brasília, Distrito Federal, Brasil, 1999-2000. *Cad. Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 19, n. 2, p. 593-604, 2003.
- [18] BURGOYNE, R. W.; TAN, D. H. S. Prolongation and quality of life for HIV-infected adults treated with highly active antiretroviral therapy (HAART): a balancing act. *J Antimicrob Chemother*, v. 61, p. 469-473, 2008.
- [19] KANAI, R. M. T.; CAMARGO, E. A. Terapia de Aderência Antiretroviral. *J Bras Med*, v. 82, p. 14-20, 2002.
- [20] DE CASTRO, A. P.; MAGALHAES, A. A. M.; LIRIOB, M.; PASTEC, A. A. Perfil socioeconômico e clínico dos pacientes internados com HIV/Aids em hospital de Salvador, Bahia, 2013.
- [21] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Boletim epidemiológico HIV/AIDS. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.
- [22] REIS *et al.* Qualidade de vida, aspectos sociodemográficos e de sexualidade de pessoas vivendo com HIV/AIDS. *Texto & Contexto-Enfermagem*, v. 20, n. 3, p. 365-374, 2011.
- [23] TOMAZELLI, J. *et al.* Distribuição dos casos de AIDS em mulheres no Rio de Janeiro, de 1982 a 1997: uma análise espacial. *Cad Saúde Pública*, v. 19, p. 1049-61, 2003.
- [24] TOLEDO, L.S.G. *et al.* Características e tendências da AIDS entre idosos no Estado do Espírito Santo. *Soc Bras Med Trop*, v. 43, p. 264-7, 2010.
- [25] SANTOS, N. J. S. *et al.* A aids no estado de São Paulo. As mudanças no perfil da epidemia e perspectivas da vigilância epidemiológica. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, v. 5, n. 2, p. 286-310, 2002.
- [26] SILVA, R. A. R. *et al.* Perfil clínico-epidemiológico de adultos HIV-positivo atendidos em um hospital de Natal/RN. *Rev. pesquis. cuid. fundam.* (Online), p. 4689-4696, 2016.
- [27] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Indicadores Sociais Municipais: uma análise dos resultados do universo do Censo Demográfico. 2010.
- [28] MARTINS, T. A.; KERR, L. R. F. S.; KENDALL, C.; MOTA, R. M. S. Cenário epidemiológico da infecção pelo HIV e AIDS no mundo. *Revista Fisioterapia & Saúde Funcional*, v. 3, n. 1, p. 04-07, 2014.
- [29] RESUTO, T. J. O.; MENDES, S. N.; OLIVEIRA, M. T.; LOURENÇO, E. L. A assistência de enfermagem aos portadores de HIV/Aids no vislumar da sua epidemia em Ribeirão Preto. Relato de experiência de uma equipe de enfermagem. *Rev Esc Enferm USP*, 2000.
- [30] CARDOSO, G. P.; ARRUDA, A. As representações sociais da soro positividade e sua relação com a observância terapêutica. *Ciênc Saúde Coletiva*, v. 10, n. 1, p. 151-62, 2005.
- [31] MELLO FILHO, J.; SILVEIRA, L. M. C. Consulta conjunta: uma estratégia de capacitação para a atenção integral a saúde. *Rev Bras Educ Med*, v. 20, n. 2, p. 147-51, 2007.
- [32] GRECO, D. B.; LIGNANI, J. L.; CARNEIRO, M. Avaliação da aderência aos anti-retrovirais em pacientes com infecção pelo HIV/aids. *Rev Saúde Pública*, v. 35, n. 6, 2001.
- [33] ALMEIDA, E. L. D.; ARAÚJO, G. B. D. S.; SANTOS, V. A.; BUSTORFF, L. A. C. V.; PEREIRA, A. V. D. L.; DIAS, M. D. Adesão dos portadores do HIV/AIDS ao tratamento: fatores intervenientes. *Revista Mineira de Enfermagem*, v. 15, n. 2, p. 208-216, 2011.
- [34] BRITO, A. M.; SOUSA, J. L.; LUNA, C. F.; DOURADO, I. Tendência da transmissão vertical de Aids após terapia anti-retroviral no Brasil. *Revista Saúde Publica*, v. 40, p. 18-22, 2006.

- [35] CÁCERES, C., CHEQUER, P. Men who have sex with men and the HIV epidemic in Latin America and the Caribbean. In: XIII CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE AIDS. Anais. Durban, 2000.
- [36] BASTOS, F. I. P., SZWARCOWALD, C. L. AIDS e pauperização: principais conceitos e evidências empíricas. *Cad Saude Publica*, v. 16, p. 65-76, 2000.
- [37] FOLCH, C., CASABONA, J., MUNÓZ, R., GONZALES, V., ZARAGOZA, K. Incremento en la prevalencia del VIH y en las conductas de riesgo asociadas en hombres que tienen sexo con hombres: 12 años de encuestas de vigilancia conductual en Cataluña. *Gac Sanit*, v. 24, n. 1, p. 40-46, 2010.
- [38] REIS *et al.*. Qualidade de vida, aspectos sociodemográficos e de sexualidade de pessoas vivendo com HIV/AIDS. *Texto & Contexto-Enfermagem*, v. 20, n. 3, p. 365-374, 2011.
- [39] SEIDL, E. M. F., TRÓCCOLI, B. T. Desenvolvimento de escala para o suporte social em HIV/aids. *Psicol Teoria Pesq*, v. 22, n. 3, p. 317-26, 2006.

Capítulo 11

Atuação do Assistente Social em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos: Relato de experiência de desinstitucionalização de idosos de uma ILPI no município de Serra Talhada-PE

Mariana dos Santos Silva

Fábia Maria de Santana

Josenildo André Barboza

Edilene Lopes de Pádua

Elizângela Maria Vieira Dantas

Edvânia de Sousa Cavalcante Melo

Resumo: O novo contorno da população brasileira traz à institucionalização do idoso a pauta de reflexões de cunho social e político. O crescimento deste segmento populacional e suas implicações sociais remetem na viabilização de direitos sociais fazendo-se insurgente o chamado do profissional de Serviço Social para atuar na área do envelhecimento e suas complexidades. O objetivo do presente trabalho consiste em descrever a experiência da atuação do profissional de Serviço Social na desinstitucionalização de idosos em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos-ILPI. Justifica-se pela importância de compartilhar a abordagem da práxis do Serviço Social voltadas ao resgate do vínculo familiar a idosos institucionalizados, sendo ainda, fundamental o compartilhamento com demais profissionais da área as estratégias utilizadas para a desinstitucionalização. Trata-se de um relato de experiência vivenciado pela assistente social que atua em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos no município de Serra Talhada-PE, acerca das intervenções sociais realizadas para desinstitucionalização dos idosos. As intervenções foram realizadas no período de fevereiro a julho de 2017 sendo utilizados instrumentos técnicos do Serviço Social como a observação; entrevista e visita domiciliar proporcionando uma aproximação entre família e instituição. Na análise e interpretação dos dados percebe-se que a fragilização dos vínculos não ocorreu a partir da institucionalização, mas, em momentos anteriores. Elucidando que o indicador para a institucionalização estava vinculado à ausência de suporte familiar e não necessariamente atrelado à negligência ou abandono, mas, a conflitos familiares. Conclui-se que o atendimento ao idoso institucionalizado consiste em um desafio que exige do profissional de Serviço Social criatividade para ações interventivas na garantia e efetivação de direitos bem como, traçar estratégias de (re) construção dos vínculos afetivos familiares.

Palavras-Chave: Instituição de Longa Permanência para Idosos; Assistente Social; Desinstitucionalização.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos o envelhecimento populacional tem se caracterizado como uma realidade atrelada ao aumento da expectativa de vida, com impactos de natureza demográfico, socioeconômico, cultural e familiar. Estes impactos implicam em mudanças na sociedade e reflexão que versão no trato para com a pessoa senil e seus direitos sociais nas margens que se estendem desde as estruturas dos serviços ofertados até a prática dos profissionais que atuam com o envelhecimento. “A velhice como todas as situações humanas, em uma dimensão existencial: modifica a relação do indivíduo com o tempo e, portanto, sua relação com o mundo e com a própria história”.¹

O novo contorno da população brasileira traz à institucionalização do idoso a pauta de reflexões de cunho social e político. Assim, com o crescimento deste segmento populacional e suas implicações sociais que remetem na viabilização de direitos sociais fazendo-se insurgente o chamado do profissional de Serviço Social para atuar na área do envelhecimento na complexidade das expressões da questão social.

As Instituições de Longa Permanência para Idosos-ILPI são estruturadas na rede de proteção social como último recurso para atendimento aos idosos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA² conceitua a ILPI como uma instituição governamental ou governamental, com caráter de residência coletiva, destinada a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, sem referência familiar, caracterizadas pela dependência prolongada de cuidado. No Brasil, apontamentos históricos demarcam que as Instituições de Longa Permanência para Idosos, denominadas de asilos tinham uma ótica filantrópica e benemerente atrelada a congregações religiosas.³

A ILPI focalizada no presente trabalho refere-se ao Abrigo Ana Ribeiro, fundado em 1947, situada em Serra Talhada-PE a qual mantendo a tradição histórica constitui-se em uma instituição de caráter filantrópico.

Este trabalho justifica-se pela importância de compartilhar a abordagem da práxis do Serviço Social voltadas ao resgate do vínculo familiar a idosos institucionalizados, sendo ainda, fundamental o compartilhamento com demais profissionais da área as estratégias utilizadas para a desinstitucionalização.

Objetivou-se com o presente trabalho descrever a experiência da atuação do profissional de Serviço Social na desinstitucionalização de idosos em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência descritivo de ações realizadas por uma Assistente Social da equipe multidisciplinar do Projeto “Se Mexendo e Remexendo na Terceira Idade” da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania do município Serra Talhada.

A proposta de fortalecimento de vínculos familiares iniciou com estudo social dos prontuários com registros de informações pertinentes a história de vida dos idosos institucionalizados, apresentando os elementos concernentes aos seus vínculos familiares, comunitários e sociais. Com a apropriação destes dados, foi possível a utilização dos seguintes instrumentos técnicos do Serviço Social: Observação; Entrevista e Visita domiciliar. A intervenção técnica através da visita domiciliar proporcionou uma aproximação entre família e instituição. Nestas visitas, apresentou-se a possibilidade da (re) construção de vínculos afetivos familiares de 03 idosos entre os meses de referência de fevereiro a julho de 2017. A partir disto, as visitas domiciliares ocorreram sistematicamente semanalmente, seguidas de atendimentos individuais com familiares e idosos até chegar à desinstitucionalização.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A proteção social no Brasil tem como marco jurídico inicial a promulgação da Carta Magna de 1988 que assegurou direitos sociais de cidadania. Desta forma, à afirmação de direitos voltados a população idosa é demarcada através da promulgação de leis específicas que vislumbram os espaços dos idosos na sociedade como sujeito social e político. A Política Nacional do Idoso – PNI, promulgada em 1994 e o Estatuto do Idoso, em 2003, configuram-se como os marcos regulatórios dos direitos da população idosa.

O Serviço Social enquanto profissão inserida na divisão sócio técnica do trabalho intervém nas expressões da questão social, sendo assim, o envelhecimento populacional tem complexidades sociais que o olhar técnico do profissional de Serviço Social pode desvelar na realidade concreta, atuando na arena das

políticas sociais com o compromisso de defesa e garantia dos direitos sociais. Nesta perspectiva, o assistente social no exercício profissional desenvolverá uma prática junto ao idoso institucionalizado e a família considerando os aspectos sociais, econômicos e políticos que circundam a questão do idoso e suas relações afetivas permeando no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

No desenvolvimento da proposta de resgatar o vínculo afetivo familiar para com idosos foram utilizados os seguintes instrumentos técnicos do Serviço Social: Observação; Entrevista; Visita domiciliar; além do atendimento individualizado todos estes, lançados na intervenção social em cada momento e avanço de resultados. Salienta-se que a desinstitucionalização não estava no rol de objetivos do Assistente Social inicialmente prognosticado no Projeto de intervenção ao qual está vinculado dentro da instituição. Portanto, configurou-se como um desvelamento da realidade ali exposta. De acordo com Iamamoto⁴, os assistentes sociais são capazes de decifrar a realidade, e a partir dessa realidade construir sua proposta de trabalho de forma criativa, preservando e efetivando direitos, a partir das demandas que surgem no cotidiano.

Durante o período de fevereiro a julho com o processo de resgate dos vínculos familiares os familiares de 03 idosos passaram a realizar visitas constantes que posteriormente, resultaram na solicitação de desinstitucionalização a partir desta solicitação percebe-se a necessidade de trabalhar a família para o retorno do idoso ao seio familiar. Para tanto, foram utilizadas as estratégias de potencialização das visitas domiciliares semanalmente que visavam conhecer e acompanhar a dinâmica da família, orientando sobre a divisão de responsabilidades para prover o cuidado para com o idoso.

Vale salientar que a responsabilização da garantia dos direitos da pessoa idosa é da família; sociedade e do Estado. Nesta perspectiva Sposati⁵, corrobora que a compreensão de fortalecimento dos vínculos no âmbito da Proteção Social Básica elencada na Política de Assistência Social é um desafio, porquanto coopera para o entendimento que lidar com as vulnerabilidades no campo relacional está na responsabilidade da esfera pública. Assim, o envelhecimento não pode ser visualizado e discutido apenas como uma crescente de indicadores estatísticos, mas, ser compreendido a abranger mudanças sociais que implicam na dinâmica dos grupos familiares que cujas políticas públicas devem ser ofertadas pelo Estado para contemplar alternativas para esse segmento populacional.

Foram também, realizados atendimentos individuais a família e os idosos. Ressalta-se que apesar da maioria dos idosos institucionalizados na ILPI- Ana Ribeiro possuírem demência, os idosos que retornaram ao seio familiar tinha autonomia para expressar seus desejos. Sendo assim estes idosos expressavam claramente o anseio de retornar ao convívio familiar. Explicação dada por Neri⁶, que é no âmbito familiar, que o idoso realiza as relações afetivas e é em seu seio que ele almeja alcançar segurança e apoio.

Para além, foi utilizado à técnica da observação das visitas que os familiares realizavam aos idosos na instituição ficando, perceptível nas relações que existiam vínculos que necessitavam ser preservados assim como, preconiza o Estatuto do Idoso⁷ no Art. 49 que trata dos princípios que a ILPI deve adotar no atendimento ao idoso.

Observou-se neste contexto que a fragilização dos vínculos não ocorreu a partir da institucionalização, mas, em momentos anteriores. Estando elucidado que o indicador para a institucionalização nestes casos foi à ausência de suporte familiar que não estava necessariamente atrelado à negligência ou abandono, mas, também, a conflitos familiares; mudanças no contexto socioeconômico que remetem em exigências de disponibilidades para está inserido no mercado de trabalho. As idosas estavam institucionalizadas há cinco meses; seis anos e três anos respectivamente. Para tanto, Karsch apud Camarano⁸ pontua que a quebra dos vínculos nem sempre se constitui no motivo que induz as famílias a institucionalizar os idosos, não obstante que, essa decisão possa ocasionar o detrimento dos vínculos ou abandono do idoso.

Em um dos casos houve mais de uma solicitação de desinstitucionalização de membros da família, sendo realizado um estudo social das dinâmicas familiares e das relações de vínculo afetivo para com o idoso, articuladamente ao respeito à autonomia do idoso em indicar a residência de qual familiar gostaria de residir. Conforme Netto⁹ o (a) assistente social tem sua atuação pautada nos valores do projeto ético-político profissional tais como a equidade, justiça social, garantia de direitos e autonomia do sujeito social.

A desinstitucionalização ocorreu a partir do fortalecimento dos vínculos afetivos onde foi possível fortalecer laços e superar conflitos. Dois dos idosos retornaram para seus municípios de origem em: São José do Belmonte e Calumbi localizados respectivamente no Estado de Pernambuco. A terceira idosa permanece munícipe de Serra Talhada.

Faz-se necessário para que ocorra a desinstitucionalização conhecer a família em sua totalidade

entendendo-a como núcleo social básico de acolhida e proteção social, mas, que possui particularidades e fragilidades e desta forma, desmistificar o caráter punitivo da sociedade pela culpabilização da ausência de condições necessárias para a oferta do cuidado ao idoso.

4.CONCLUSÃO

O atendimento ao idoso institucionalizado consiste em um desafio que exige do profissional de Serviço Social criatividade para ações interventivas na garantia e efetivação de direitos bem como, estratégias de (re) construção dos vínculos afetivos familiares.

Por fim, destaca-se que a partir da experiência vivenciada, pode-se compreender como ocorreu a quebra dos vínculos cujos desdobramentos foram assinalados por conflitos que ocasionaram a institucionalização dos idosos na Instituição de Longa Permanência para Idosos.

REFERÊNCIAS

- [1] Beauvoir, S. A velhice. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.
- [2] Brasil, Ministério da Saúde. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC/ ANVISA nº 283, 26 de setembro de 2005. Disponível em:<http://www.saude.mg.gov.br/atos_normativos-legislacao-sanitaria/estabelecimentos-de-saude/atencao-ao-idoso/RES_283.pdf>. Acesso em 13 set. 2017.
- [3] Alcântara AO. Velhos institucionalizados e família: entre abafos e desabafos. Campinas: Alínea; 2004.
- [4] Iamamoto, m. V. O serviço social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional.21. Ed. São paulo: cortez, 2011.
- [5] Sposati, A. (Org.), Proteção Social e Cidadania: inclusão de idosos e pessoas com deficiência no Brasil, França e Portugal - 2. ed. - São Paulo: Cortez, 2008.
- [6] Nèri, A. L. As políticas de atendimento aos direitos da pessoa idosa expressa no Estatuto do Idoso. A Terceira Idade, v.16, n.34, p.7-24, 2005.
- [7] Brasil, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.
- [8] Karsch, U. M. "Idosos dependentes: famílias e cuidadores", in Cadernos de Saúde Pública, v. 19, n. 3, Rio de Janeiro, 2003.
- [9] Netto, J. P. A construção do projeto ético-político do Serviço Social. In: MOTA, A. E. et al. (Org.) 4.ed. Serviço Social e saúde: formação e trabalho profissional. São Paulo: Cortez; Brasília- DF: OPAS, OMS, Ministério da Saúde, 2009.

Capítulo 12

A importância da dança como recurso auxiliar na assistência aos idosos do Projeto Envelhecendo com Saúde: Relato de experiência

Marina Gonçalves Assis

Diogo da Silva Jacinto Cirne

Kleyton Wesllen de Lima Ferreira

Rayssa Samilly Santos de Oliveira

Luiz Arthur Cavalcanti Cabral

Resumo: Com o aumento do número de idosos no Brasil, adveio uma crescente quantidade de trabalhos publicados acerca desse público em seus mais distintos aspectos. Dentre estes, os fatores psicossociais têm apresentado associações evidentes com a qualidade de vida dessa população. É inserida neste contexto que a dança tem demonstrado ser grandes aliados nos cuidados do idoso. Desse modo, o objetivo desse estudo é relatar a experiência e os benefícios encontrados por meio da utilização da dança enquanto recurso auxiliar na assistência aos idosos participantes do projeto 'Envelhecendo com Saúde'. A pesquisa desenvolvida foi de cunho qualitativo, caracterizando-se como relato de experiência. A amostra analisada foi composta por um grupo de 37 idosos, sendo 35 do sexo feminino com idade de 66,40 ($\pm 4,75$) anos e 2 homens com idade de 65,00 ($\pm 7,07$) anos. Os dados desse estudo foram coletados a partir do dia 27 de março de 2017, em encontros semanais realizados nas terças ou quintas-feiras, no horário das 9h às 10h, na sala de dança da Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande (FCM). Para avaliar o grau de satisfação dos idosos com relação às aulas de dança foi elaborado e aplicado um questionário específico, em que os idosos deveriam responder o quão importante eram as aulas de dança nas suas vidas cotidianas por meio de alternativas objetivas. A experiência relatada nesse estudo vem a concordar com outros trabalhos publicados na área em relação aos benefícios da dança para a população idosa. Assim, espera-se que essa pesquisa contribua no incentivo a iniciativas para a utilização da dança como recurso integrante em programas para idosos, tendo em vista a relevância demonstrada por essa atividade não apenas no desenvolvimento de aptidões físicas, como também na melhora de aspectos psicossociais.

Palavras-chave: Dança; Envelhecimento Saudável; Exercício Físico; Idoso; Saúde do Idoso.

1. INTRODUÇÃO

Com o aumento da população de idosos do Brasil, é notória também a crescente quantidade de trabalhos publicados acerca do envelhecimento em seus mais distintos aspectos. Dentre as várias dimensões estudadas no ramo da gerontologia, os fatores psicossociais têm apresentado associações evidentes com a qualidade de vida do idoso.

Perracini e Fló (2009) enunciam que para a análise da funcionalidade humana, é possível destacar dois modelos, sendo estes o médico e o social. No modelo médico, a incapacidade está diretamente relacionada a enfermidades ou a outras condições de saúde. Enquanto o modelo social, por sua vez, estabelece a incapacidade como fruto de problemas socialmente estabelecidos.

É inserida neste contexto social que a dança e o lazer tem demonstrado ser grandes aliados nos cuidados do idoso. De acordo Gobbo (2005), a prática da dança para o idoso acarreta diversos benefícios para sua vida cotidiana, especialmente nas relações interpessoais, ou seja, é no fator social que a dança atua com maior eficiência.

Em concordância, Robatto (1994) declara que a dança está intimamente atrelada a processos de sociabilização e motivação. É uma prática para toda a vida, que desperta sentimentos e desenvolve não apenas os aspectos sociais nos idosos, mas também os processos de afetividade, possibilitando, desta forma, melhores condições para um envelhecimento saudável.

Nanni (1998) acrescenta que o ser humano tem utilizado a dança como linguagem corporal para simbolizar alegrias, tristezas, vida e morte, para celebrar o amor, a guerra, a paz, ou seja, para representar diversos aspectos da vida humana. Além disso, dançar é uma atividade que pode ser iniciada em qualquer época da vida, inclusive na terceira idade.

Além disso, as atividades físicas recreativas são recorrentemente constatadas como uma das formas de intervenção na atenção primária da saúde mais eficaz para a melhoria da qualidade de vida de idosos. A dança, por apresentar um marcante caráter de lazer, pode ser, portanto, inserida nesse rol de atividades de recreação ativa.

Neste contexto, a Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande desenvolveu o projeto de extensão Envelhecendo com Saúde, que visa propiciar uma assistência multidisciplinar para idosos residentes da comunidade do Itararé. Sendo assim, estudantes de educação física, enfermagem, nutrição, fisioterapia e medicina atuam em conjunto promovendo atividades diversas com o grupo de idosos integrantes.

Levando em consideração a relevância da dança enquanto ferramenta para a promoção de saúde no envelhecimento, os alunos de enfermagem junto a uma professora de Educação Física elaboraram um programa de aulas de dança semanais, atrelado às demais atividades desenvolvidas pelos estudantes de outros cursos nesse projeto.

Desse modo, o objetivo desse estudo é relatar a experiência e os benefícios encontrados por meio da utilização da dança enquanto recurso auxiliar na assistência aos idosos participantes do projeto Envelhecendo com Saúde.

2. METODOLOGIA

A pesquisa desenvolvida foi de cunho qualitativo, caracterizando-se como relato de experiência. A amostra analisada foi composta por um grupo de 37 idosos, sendo 35 do sexo feminino com idade de 66,40 ($\pm 4,75$) anos e 2 homens com idade de 65,00 ($\pm 7,07$) anos.. Todos os cálculos estatísticos de média e desvio padrão foram feitos por meio do programa Microsoft Office Excel 2007.

Os dados desse estudo foram coletados a partir do dia 27 de março de 2017, em encontros semanais realizados nas terças ou quintas-feiras, no horário das 9h às 10h, na sala de dança da Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande (FCM).

Em todos os encontros, antes de iniciar a aula de dança, os alunos do curso de enfermagem da FCM aferiam a pressão arterial (PA) de todos os idosos, no intuito de estabelecer uma noção mínima da capacidade que cada indivíduo apresentava para se submeter à prática de exercício físico naquele momento. Após a verificação da PA, os idosos eram então liberados para participar da aula, que, por sua vez, consistia em alongamentos estáticos e dinâmicos atrelados a passos de dança, sempre com acompanhamento musical.

Para avaliar o grau de satisfação dos idosos com relação às aulas de dança foi elaborado e aplicado um questionário específico, em que os idosos deveriam responder o quão importante eram as aulas de dança nas suas vidas cotidianas por meio de alternativas objetivas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pensando no envelhecimento, segundo NELSON et al (2007) é recomendado que se inicie um programa de atividades físicas com um trabalho de fácil realização, baixo impacto e intensidade, tendo em vista que a pessoa idosa, em geral, não apresenta condicionamento físico desenvolvido e pode ter limitações musculoesqueléticas. Neste sentido, as atividades mais indicadas para essa população são os exercícios aeróbicos, de força e resistência muscular, de flexibilidade e equilíbrio.

Desse modo, pode-se afirmar que dança se encaixa neste perfil de atividade física e, por este motivo, foi escolhida e introduzida de maneira progressiva. Pensando na melhor maneira de iniciar as aulas, tanto a intensidade, quando o nível de dificuldade dos passos foi aumentando com o passar do tempo, de acordo com as melhoras no condicionamento físico dos idosos participantes.

A partir da observação das aulas, foi evidente que o envolvimento dos idosos aumentou progressivamente. A princípio muitos participantes não se conheciam, então as primeiras dinâmicas de socialização por meio da dança mostraram-se bastante eficientes na introdução de um convívio social mais harmônico entre os integrantes do grupo.

A cada encontro, era perceptível a melhora no entrosamento dos participantes entre si, de modo que ao final do primeiro mês já era possível afirmar que o grupo estava sólido e que já havia uma comunicação mais eficaz nas relações idoso-idoso.

Outro fator interessante observado foi que o vínculo entre os integrantes também ficava mais intenso devido às semelhanças, por exemplo, na facilidade ou não para a aprendizagem de novos passos. Cada acerto era comemorado com bastante veemência, enquanto cada erro era motivo de riso e diversão.

Por apresentarem dificuldades similares, não houve exclusão durante as aulas. Ao invés disso, assim que aprendiam um novo passo, todos se mostravam extremamente prestativos a auxiliar aquele colega que ainda não havia conseguido.

A persistência do grupo para conseguir realizar todos os passos que lhe eram propostos foi notória e, por este motivo, visando recompensá-lo pelo comprometimento com as aulas, foi oferecida a oportunidade de participar de uma apresentação de dança em comemoração ao São João, visto este ser um evento festivo bastante valorizado na região de Campina Grande, na Paraíba. Como esperado, os idosos aceitaram a proposta e demonstraram bastante entusiasmo pela ideia.

Desse modo, a montagem coreográfica se iniciou a partir de passos que já vinham sendo trabalhados nas aulas e os ensaios se estenderam até o dia 31 de maio de 2017. Com a concordância de todos os idosos integrantes, foram agendados também ensaios extras.

Após semanas de dedicação, no dia 01 de junho de 2017, o grupo do Envelhecendo com Saúde apresentou duas coreografias de danças regionais: a quadrilha e a dança do boi. A apresentação ocorreu no estacionamento da Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande durante o evento conhecido como Feira Gastronômica, promovido por alunos e professores da instituição.

Nesta oportunidade, os idosos tiveram a chance de se apresentar com figurinos e maquiagem típica. Para tal, neste dia, integrantes do projeto dos cursos de Educação Física, Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia ajudaram com a organização dos idosos antes, durante e depois da apresentação, finalizando o evento com um lanche disponibilizado pelos alunos de nutrição.

Vale ressaltar ainda que o auxílio dos discentes do curso de enfermagem com relação ao acompanhamento, orientação e monitoramento dos idosos antes, durante e após as atividades realizadas se mostrou de extrema importância na prevenção de possíveis complicações locomotoras e emergências cardiovasculares.

Ademais, atreladas às aulas de dança, os alunos de enfermagem propuseram também ações educativas, tais como palestras para abordar temas como a Sexualidade na terceira idade, em que os alunos falaram sobre a diferença entre AIDS e HIV, a importância da autoimagem, além de terem ilustrado questões referentes à sexualidade na terceira idade por meio de uma peça teatral.

Essas intervenções se mostraram extremamente positivas, visto que os idosos envolveram-se em todas as atividades propostas e demonstraram gostar da maneira como as informações lhe foram colocadas. No entanto, foi evidente que a fluidez dessas ações se deu devido ao entrosamento previamente existente entre os idosos devido à prática regular da dança.

Quanto à aplicação do questionário para avaliação do grau de satisfação dos idosos com relação às aulas de dança, 100% dos participantes responderam que sentiram melhoras na saúde após o início das aulas do projeto, que não pensam em deixar de participar do projeto e que recomendariam a prática de dança para outros idosos.

Quando perguntados sobre o significado da dança para si, da seguinte maneira “para você, DANÇAR é?”, os resultados indicaram que 0% classificaram o ato de dançar como cansativo, 16% como bom, 35% como muito bom e 49% como essencial, conforme ilustra o gráfico abaixo.

Gráfico 1 – Relevância da dança para os idosos do projeto Envelhecendo com Saúde.

Fonte: da autora

4. CONCLUSÕES

A dança enquanto recurso para a assistência multidisciplinar proporcionada aos idosos do projeto Envelhecendo com Saúde mostrou-se como uma ferramenta de suma importância, visto que as aulas de dança apresentaram papel fundamental nos processos de socialização e integração dos idosos neste projeto.

Portanto, pode-se dizer que a experiência com a utilização da dança foi mais que satisfatória, tendo esta possibilitada a obtenção de uma ótica geral acerca das limitações físicas e psíquicas dos idosos integrantes, além de promover um apoio em detrimento à ausência desse no âmbito familiar e social.

Assim, dentro dos notórios resultados da prática desta atividade com os idosos ressaltam-se benefícios como o aumento significativo da autoestima e bem-estar dos participantes, o incremento da interação com os demais integrantes e até mesmo o desenvolvimento da capacidade cognitiva. Com relação a esta última, destaca-se que o formato das aulas de maneira coreografada serviu como um estímulo válido à memorização dos passos ensinados.

Além disso, é possível afirmar que a dança também representou essencial instrumento no aumento de adesão dos idosos participantes do projeto, visto que esta foi apontada por eles como uma das atividades mais atrativas.

Ademais, pode-se ainda enunciar que a dança mostrou-se como um recurso benéfico que pode ser utilizado por diversas áreas da saúde no intuito de garantir uma manutenção da autonomia e independência do idoso por meio de uma atividade lúdica e prazerosa.

Sendo assim, a experiência relatada nesse estudo vem a concordar com outros trabalhos publicados na área em relação aos benefícios da dança para a população idosa. Desse modo, espera-se que essa pesquisa contribua no incentivo a iniciativas para a utilização da dança como recurso integrante em programas para idosos, tendo em vista a relevância demonstrada por essa atividade não apenas no desenvolvimento de aptidões físicas, como também na melhora de aspectos psicossociais.

REFERÊNCIAS

- [1] ANDRADE, Michely dos Santos. Dança de salão e relações intergeracionais. *Revista Corpus et Scientia*. Rio de Janeiro, vol. 3, n 1. Agosto, 2007.
- [2] CARLI, S. C. O idoso e a dança: aptidão física, auto-imagem e auto-estima. Monografia de especialização. UFSC, Florianópolis, 2000.
- [3] FREITAS, M. A.; CALOU, J. L. S.; SANTOS, F. A. R. Os Benefícios da Dançaterapia em idosos com depressão. Congresso Internacional de Envelhecimento Humano. Campina Grande/PB. Junho, 2013.
- [4] LEAL, I. J.; HAAS, A. N. O Significado da dança na terceira idade. *Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano*. Jan/Jun. Passo Fundo, RS, p.64-71, 2006.
- [5] GIRALDI A; SOUZA, M. A. C. Dança para cadeirantes: um exemplo de superação. *Revista da Unifebe*. 9:188-97, 2011.
- [6] GOBBO, D. E. A dança de salão como qualidade de vida para a terceira idade. *Revista de Educação Física, Uniandrade, Curitiba, PR, Ano I, v2*, 2005.
- [7] MACIEL, Marcos Gonçalves. Atividade física e funcionalidade do idoso. *Motriz, Rio Claro*, v.16 n.4, p.1024-1032, out./dez. 2010.
- [8] MEIRELLES, M.A.E. Atividade Física na Terceira Idade. 3ª ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2000.
- [9] MERQUIADES, J. H. et. al. A Importância do Exercício Físico para a Qualidade de Vida dos Idosos. *Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício*. v.3, n.18, Nov/Dez. São Paulo, p. 597-614, 2009.
- [10] NAHAS, M.V. Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida: Conceitos e Sugestões para um Estilo de Vida ativo. 4ª ed., revisada e atualizada. Londrina, 2006.
- [11] NANNI, Dionísia. Dança Educação: Princípios, Métodos e Técnicas. 5. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 1998.
- [12] NELSON, M.E.; REJESKI, W. J.; BLAIR, S.N.; DUNCAN, P.W.; JUDGE, J.O.; et al. Physical activity and public health in older adults: recommendation from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. *Medicine Science Sports Exercise*. Aug; 39(8):1435-45, 2007.
- [14] PERRACINI, Monica Rodrigues; FLÓ, Claudia Marina. Fisioterapia: Teoria e Prática Clínica: Funcionalidade e Envelhecimento. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
- [15] ROBATTO, L. Dança em processo: a linguagem do indizível. Salvador: UFBA, 1994.
- [16] SILVA, A. H.; MAZO, G.Z. Dança para Idosos: uma alternativa para o exercício físico. *Cinergis*. v.8, n.1, Jan/Jun. Florianópolis, SC, p.25-32, 2007.
- [17] SOUZA, J. C. L. de; METZNER, A. C. Benefícios da dança no aspecto social e físico dos idosos. *Revista Fafibe On-Line*, ano VI, n.6, p. 8-13, novembro, 2013. Disponível em: <http://www.unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/revistafafibeonline/sumario/28/111220131856> 14.pdf. Acesso em: 19 de Outubro de 2017.
- [18] SOUZA, Caroline Protásio; FIGUEIREDO, Valéria Maria Chaves. Uma proposta de dança na melhor idade. *Pensar A Prática*, <http://dx.doi.org/10.5216/rpp.v4i0.80>, [s.l.], v. 4, 15 nov., 2006.
- [19] WITTER, C.; BURITI, M. de A.; SILVA, G. B.; NOGUEIRA, R. S.; GAMA, E. F.
- [20] Envelhecimento e dança: análise da produção científica na Biblioteca Virtual de Saúde. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, 16(1):191-199. Rio de Janeiro, 2013.

Capítulo 13

Prevenindo quedas domésticas dos idosos através de estratégias educativas em saúde

Jéssika Rayanne Batista Rocha

Gealdo Tavares Neto

Mariana Martins da Silva

Tacilla Maria Rodrigues Pereira

Joedna Martins Silva

Ramon Silva de Sousa

Resumo: **Introdução:** A população brasileira hoje consiste em um percentual de idosos elevado, assim, a saúde pública desenvolveu estratégias para que possam prevenir quedas domésticas e danos neurológicos e físicos nos idosos. As estratégias lançadas para que previnam essa problemática, vem a ser um índice satisfatório que inibe prejuízos na função, deambulação e autonomia da pessoa idosa, uma vez que sendo relatada a importância do autocuidado para familiares e cuidadores minimiza a prevalência de quedas domésticas. **Objetivo:** Relatar a importância da educação em saúde na atenção básica, com a finalidade de reduzir os casos de quedas domésticas. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, exploratória, realizada no período de março de 2017 com base na literatura disponível em bancos de dados BVS e LILACS. Foram utilizados 09 artigos para esse estudo. **Resultados:** Cerca de 50% dos artigos relata que ao possuir um ambiente adequado para o idoso, previne preocupações e acidentes, uma rampa, corrimão nos banheiros, não utilizar tapetes dentre outras prevenções, 30% refere que quando não há o cuidado, as quedas domésticas causam principalmente fraturas no quadril e fêmur, assim prejudicando a mobilidade da pessoa idosa, 20% relatam que o alto índice de morte de idosos por queda geralmente é por fraturas, danos neurológicos e afetam mais a população feminina. **Conclusão:** A enfermagem tem um papel singular a respeito da promoção de saúde, o enfermeiro da atenção básica pode atuar com medidas de prevenção de quedas e danos neurológicos e psicológicos, através de palestras e educando não só os idosos, mas também os seus familiares, mostrando que o cuidado doméstico é fundamental para que o idoso tenha acesso a toda casa e não corra o risco de cair e se tornar um incapaz. **Descritores:** Acidentes por quedas, educação em saúde, prevenção de acidentes.

Palavras-chave: Acidentes por quedas, educação em saúde, prevenção de acidentes.

1. INTRODUÇÃO

Segundo classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS), idosos são aqueles indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos de idade. A população idosa vem crescendo muito nos últimos anos, segundo o último censo realizado em 2010 pelo IBGE, em todo território brasileiro há um crescimento na população idosa comparada a pesquisa de 2000: Região Norte a proporção de idosos passou de 3,6% em 2000 para 4,6 em 2010, na região Nordeste passou de 5,8% em 2000 para 7,2% em 2010, Sul e Sudeste ambas apresentaram 8,1% em 2010 já em 2000 o Sul apresentou 3,0% e Sudeste 5,8% e por fim a região Centro-Oeste, que apresentou 4,3% em 2000 e já em 2010 5,8%. A alta demanda de envelhecimento populacional necessita de preparação e adequação dos serviços de saúde, incluindo a formação e capacitação de profissionais para o atendimento. Nesta perspectiva, as quedas de idosos são atualmente uma das preocupações em relação à promoção de saúde e qualidade de vida. A prevenção é importante no sentido de minimizar problemas secundários decorrente de quedas, tais como: fraturas e traumas psicológicos (DAS CP, JOSEPH S., 2005. Apud SIQUEIRA et al., 2007). Todas as pessoas podem sofrer quedas, independentemente da idade, mas para os idosos esse termo merece destaque, pois ocorre com alta frequência e pode levá-lo à incapacidade, injúria e até mesmo a morte. Seu custo social é imenso e torna-se maior quando o idoso tem diminuição da autonomia e da independência ou passa a necessitar de institucionalização (Fabrício, Rodrigues, Costa, 2004). O presente estudo tem como objetivo relatar a importância de educação em saúde para idosos, na estratégia de saúde da família, a fim de minimizar prevalência de quedas domésticas em uma população de idosos.

2. METODOLOGIA

Estudo descritivo e exploratório, realizado no período de março de 2017, trata-se de uma pesquisa bibliográfica com base na literatura disponível em bancos de dados virtuais. (83) 3322.3222 contato@conbracis.com.br www.conbracis.com.br Foram realizadas cinco etapas para construção dessa revisão: 1) definimos a temática abordada e alguns pontos específicos para a construção do artigo; 2) foram selecionados pontos para exclusão e inclusão de artigos para pesquisa; 3) Busca de artigos para construção do texto; 4) Análise crítica dos artigos selecionados; 5) Construção e exposição dos dados encontrados. A pesquisa foi realizada no período entre fevereiro e março de 2017 nos bancos dados e BVS (biblioteca virtual em saúde) incluindo LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific Electronic Library Online) com seguintes descritores: de acordo com o DeCs (descritores em ciências da saúde). Utilizamos os seguintes critérios para escolha dos artigos: Artigos com idioma português, artigos com texto completo com acesso online, artigos relacionados a idosos e artigos que abordam a temática “Prevenindo acidentes domésticos dos idosos através de estratégias educativas em saúde”. Foram encontrados 715 artigos com a palavra-chave “Acidentes por quedas”, 323 artigos com a palavra “Educação em saúde” e 55 com a palavra “prevenção de acidentes”. Foram selecionados 09 artigos para o estudo por seguir os critérios expostos pelo grupo.

3. DISCUSSÃO E RESULTADOS

A população idosa vem crescendo cada vez mais, cerca de 30% dos idosos sofrem queda ao menos uma vez ao ano, são mais frequentes em mulheres do que em homens e os riscos são mais elevados para idosos acima de 75 anos (PERRACINE E RAMOS, 2002). Cerca de 50% dos artigos relata que ao possuir um ambiente adequado para o idoso, previne preocupações e acidentes, uma rampa, corrimão nos banheiros, não utilizar tapetes dentre outras prevenções, 30% refere que quando não há o cuidado, as quedas domésticas causam principalmente fraturas no quadril e fêmur, assim prejudicando a mobilidade da pessoa idosa, 20% relatam que o alto índice de morte de idosos por queda geralmente é por fraturas, danos neurológicos e afetam mais a população feminina. Tendo em vista estes dados, é necessário o trabalho da enfermagem na atenção básica com diversas opções e estratégias políticas de prevenção de quedas, para homens e mulheres, com base em diferenças de gênero nos locais, circunstâncias e eventos que possam dar origem a quedas (BRASIL, 2010).

4. CONCLUSÃO

As quedas representam a causa com maior aumento proporcional no risco de internação, e sabe-se que os grupos de maior susceptibilidade para esse tipo de agravo são os idosos, por ser uma classe mais frágil e muitas das vezes já apresentarem alguns problemas de deambulação, visão e equilíbrio. É entre os idosos que se verifica a maior contribuição para a internação hospitalar, considerando que a população brasileira tem cada vez maior proporção de pessoas com 60 anos ou mais de idade (GAWRYSZEWSKI, 2010 apud BARROS et al. 2015). Durante a pesquisa observamos a alta incidência de casos de quedas por idosos ocasionando uma série de problemas como: fraturas leves ou graves, traumas psicológicos e até mesmo óbitos, isso traz muitos custos para SUS, as taxas de internação hospitalar em faixas etárias mais avançadas são mais elevadas quando comparadas com jovens. A Enfermagem tem um papel especial relacionado a saúde deste idoso, todos esses problemas podem ser evitados com ações de prevenção à saúde na atenção básica. O enfermeiro pode trabalhar com palestras educativas, orientando os idosos e familiares sobre as formas de prevenção de quedas domésticas na terceira idade, utilizar corrimão em banheiros, não utilizar tapetes espalhados pela casa, manter o chão sempre seco, trocar batentes por rampas, são algumas medidas de prevenção que podem ser citadas. Estimular os idosos sobre uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos também interferem indiretamente na prevenção de quedas, reduzindo os casos de osteoporose, diabetes e aumentando o fortalecimento dos ossos e músculos. Os objetivos traçados no presente trabalho pelo grupo foram alcançados, espera-se também que estes resultados estimulem os profissionais de saúde para pesquisarem e aprofundarem ainda mais na temática espera-se também que profissionais da atenção básica realizem ações, como uma estratégia de diminuir esses agravos, tendo em vista a alta complexidade da temática exposta.

REFERÊNCIAS

- [1] FABRÍCIO, Cristina coelho; RODRIGUES, Rosalina A Partezani; JUNIOR, Moacyr Lobo da Costa. Causas e consequências de quedas de idosos atendidos em hospital público. Revista Saúde Pública Vol.38 n.1, 2004
- [2] SIQUEIRA, Fernando V.; FACHINI, Luiz Augusto; PICCINI, Roberto X.; TOMASI, Eliane; THUMÉ, Eliane; SILVEIRA, Denise S.; VIEIRA, Vera; HALLA, Pedro C. prevalência de quedas em idosos e fatores associados. Revista de Saúde Pública. Vol.41 n.5, 2004.
- [3] LLANO, Patrícia Mirapalheta Pereira; DOS SANTOS, Fernanda; RODRIGUES, Mônica Canilha Tortelli; LEMÕES, Marcos Aurélio Matos; LANGE, Celmira; SANTOS, Silvana Sidney Costa. A família no cuidado ao idoso após o sofrimento por quedas. Revista online de pesquisa. Vol.8 n.3, 2016.
- [4] DE BARROS, Iracema Fabieli Oliveira; PEREIRA, Marisa Bastos; WEILLER, Teresinha Heck; ANVERSA, Elenir Teresinha Rizzeti. Internações hospitalares por quedas em idosos brasileiros e os custos correspondentes no âmbito do sistema único de saúde. Revista kairós Gerontologia. Vol.18 n. 4, 2015.
- [5] CHIANCA, Tania Couto Machado; DE ANDRADE, Caroline Rodrigues; ALBUQUERQUE, Juliana; WENCESLAU, Luísa Cristina Crespo; TADEU, Luiza Ferreira Ribeiro; MACIEIRA, Tamara Gonçalves Rezende; ERCOLE, Flávia Falci. Prevalência de quedas em idosos cadastrados em um centro de saúde de belo horizonte- MG. Revista Brasileira de enfermagem. Vol. 66 n.2, 2013.
- [6] AVEIRO, Mariana Chaves; DRIUSSO, Patrícia; BARHAM, Elizabeth Joan, PAVARINI, Sofia Cristina Iost; Oishi, Jorge. Mobilidade e risco de quedas de população idosa da comunidade de São Carlos. Ciencias e Saúde coletiva. Vol.17 n.9, 2012.
- [7] SOARES, Danilo Simoni; LUANE, Marques de Mello; DA SILVA, Anderson Soares; NUNES, Altacílio Aparecido. Análise dos fatores associados a quedas com fratura de fêmur em idosos: um estudo caso-controle. Revista brasileira de geriatria e gerontologia. Vol.18 n.2, 2015.
- [8] ROSA, Tábada, Samantha Marques; DE MORAES, Anaélina Bragança; PERIPOLLI, Angélica; FILHA, Valdete Alves Valentins dos Santos. Perfil epidemiológicos de idosos que foram a óbito por queda no Rio Grande do Sul. Revista brasileira de geriatria e gerontologia. Vol.18 n.1, 2015.
- [9] PERRACINI, M C; RAMOS, L R. Fatores associados a quedas em uma coorte de idosos residentes na comunidade. Rev Saude Publica. Vol.36 n.6, 2002.

Capítulo 14

A educação hídrica em um encontro com idosos

Bárbara Ebilizarda Coutinho Borges

Marília Rute de Souto Medeiros

Rafaela Carolini de Oliveira Távora

Nubia Maria Freire Vieira Lima

Resumo: O envelhecimento constitui-se por um conjunto de eventos que evoluem com o passar dos anos (CANCELA, 2007). O envelhecimento fisiológico, denominado senescência, compreende alterações nas funções orgânicas do indivíduo, com redução da capacidade de manter o equilíbrio homeostático de suas funções corporais (CANCELA, 2007). Sentir sede é um mecanismo para informar a necessidade de hidratação, no entanto, na população idosa esse gatilho se torna cada vez menos eficiente. Dessa forma, os indivíduos tem maior dificuldade para entender quando precisarão ser hidratados (GOMES, 2017). A ação educativa tem público-alvo os idosos que fazem parte do projeto de extensão intitulado “Acolhimento memórias: Assistência Multiprofissional em Saúde a indivíduos com Comprometimento Cognitivo Leve e Demências e aos cuidadores” na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (campus de Santa Cruz/RN) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No referido grupo foi tratado sobre a ingesta hídrica dos idosos, sobre a quantidade de água que eles consumiam, a quantidade ideal que se espera de um idoso, as consequências da desidratação no organismo, e se é possível substituí-la. Nas falas de cada idoso prevaleceu a baixa ingestão de água ou líquidos, e que quando o faziam não se era anotado ou contabilizado o volume de ingestão ou seu recipiente de consumo. Isso corrobora com o estudo de Hordonho (2015) em que foi avaliado 33 idosos, e como resultado foi observado que a quantidade de líquidos ingeridas por dia é de três copos para 39,4% dos idosos. A recomendação é de oito copos de água diários ou 1600ml, índices não atingidos. O valor total atingidos pelos idosos foi de 1000ml/dia. Por isso, discutiu-se também a cerca de opções para incentivar o consumo de água, por exemplo a utilização de água saborificada para estimular nos momentos e dias de falta de sede, sendo uma eficaz substituição para fomentar e desenvolver o hábito hídrico, junto a isso foi enfatizado que a troca da água natural por sucos ou chás não é recomendado, por esses líquidos apresentarem diversos complementos para que estejam pronto ao consumo.

Palavras-chave: Idoso; Água, Prevenção de doenças, Saúde, Educação em saúde.

1. INTRODUÇÃO

O indivíduo é considerado idoso quando chega aos 60 anos de idade (BRASIL, 2006). O envelhecimento constitui-se por um conjunto de eventos que evoluem com o passar dos anos (CANCELA, 2007). O envelhecimento fisiológico, denominado senescência, compreende alterações nas funções orgânicas do indivíduo, com redução da capacidade de manter o equilíbrio homeostático de suas funções corporais, (CANCELA, 2007). Percebe-se na constituição do organismo do idoso a redução da quantidade de água, embora haja a diminuição da sensação da sede, referida por muitos (BRASIL, 2006).

Sentir sede é um mecanismo para informar que necessita de hidratação, no entanto, na população idosa esse gatilho torna-se cada vez menos eficiente. Dessa forma, os indivíduos têm maior dificuldade para entender quando precisarão ser hidratados (GOMES, 2017). Assim, pode-se perceber, ainda, que o baixo consumo de água é um fator quase universal nesta população, pois os idosos costumam esquecer a hidratação ou quando o fazem é na hora de algum medicamento, consumindo pequenos volumes de água.

Popkin et al. (2010) mostrou que essa população não ingere líquidos para saciar – se da sede, mas o usa como um complemento de sua alimentação, ou como bebidas estimulantes, como o chá ou café, ou por prazer. No caso de bebidas alcoólicas, que promovem o prazer e a interação social. Os líquidos podem ser consumidos também por estimular energia (refrigerantes e leite) e são escolhidos de acordo com cada tipo para climas frios ou quentes.

Acrescenta-se que a água, como principal componente do nosso organismo, deve ser ingerida em quantidade adequada, especialmente, nesta fase da vida, para que se evitem transtornos ocasionados por sua deficiência, como a desidratação, constipação e insuficiência renal (GOMES, 2017, BRASIL, 2009). Dessa forma, a deficiência na ingestão hídrica leva ao ressecamento de fezes, tornando-as petrificadas e de grandes volumes e então difíceis de eliminar (KLAUS *et al.*, 2015).

O estudo de Markland *et al.* (2013) verificou que a baixa ingestão hídrica resultou em constipação de homens e mulheres e à hipotrofia hipotalâmica fisiológica. O hipotálamo é o local definido como o centro da sede, o pode explicar a queda da ingestão de água para esse grupo populacional.

Klaus *et al.* (2015) revelaram uma mediana de ingestão hídrica em indivíduos idosos de 700mL e que apenas 25,2% consomem entre 1500 e 2000 ml de água diariamente, volume ideal para a população. Equivalendo à oito ou dez copos de 200ml por dia.

O estudo de Gomes (2017) realizado com indivíduos idosos e lúcidos aponta que entre os 20 entrevistados, 80% demonstrou conhecimento sobre a importância do consumo de água e líquidos, junto com seus benefícios, no entanto relata dificuldade de ingerir, fato justificado pela menor frequência de sede nesta população pelas mudanças fisiológicas.

Com isso, o estudo justifica-se pela importância da divulgação da importância da ingestão hídrica na população idosa, considerando que o baixo consumo de água pode levar a diversas consequências em seu organismo, desde de pequenas alterações até condições crônicas, como a insuficiência renal.

Dessa maneira, a pesquisa tem por objetivo relatar uma ação educativa de discentes do curso de enfermagem e nutrição em um grupo de idosos participantes do projeto de extensão “Acolhimento memórias: Assistência Multiprofissional em Saúde a indivíduos com Comprometimento Cognitivo Leve e Demências e aos cuidadores”.

2. MÉTODOS

TIPO DO ESTUDO

Trata-se de relato de experiência de ação educativa destinada a idosos.

O relato de experiência se propõe a descrever uma experiência e contribuir de maneira relevante para a área em estudo. É uma descrição de um autor ou equipe sobre uma vivência profissional e pessoal, sendo ela exitosa ou não, mas que corrobore para a discussão, troca e proposição de ideias para prosperar o cuidado em saúde.

LOCAL DO ESTUDO E PARTICIPANTES

A ação educativa teve como público-alvo os idosos que faziam parte do projeto de extensão intitulado “Acolhimento memórias: Assistência Multiprofissional em Saúde a indivíduos com Comprometimento

Cognitivo Leve e Demências e aos cuidadores” na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (campus de Santa Cruz/RN) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Este grupo é multiprofissional, participando discentes do curso de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia. Acontecem intervenções da fisioterapia e ações de educação e promoção da saúde feita pelos alunos dos demais cursos.

Os encontros aconteciam uma vez por semana, e os idosos eram distribuídos em dois grupos com horários diferentes, antes da avaliação fisioterapêutica é realizado o encontro abordando algum tema escolhido pelos outros cursos.

Os participantes são idosos que frequentam a Clínica da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA), estes são convidados pelos discentes ou professores da referida clínica, e são pacientes que apresentam comprometimento cognitivo leve ou demência.

Os alunos dos cursos de enfermagem e nutrição reuniram – se para discutir sobre temas que poderiam ser abordados no grupo, assuntos considerados relevantes e comum no cotidiano dessas pessoas.

DESCRIÇÃO DA AÇÃO EDUCATIVA

A ação ocorreu em uma sala ampla destinada a intervenções da fisioterapia e antes dos exercícios, os idosos foram organizados em círculo junto com os discentes mediadores. Para dar início foi questionado como era a ingestão hídrica de cada um, pela quantidade, distribuição de horário e se a ingestão acontecia somente na tomada de seus medicamentos.

Iniciada a fala dos mediadores foi abordado sobre os valores esperados para ingestão de água, destacando-se que outros líquidos, como chás ou sucos não substituem a ingestão hídrica, por esses líquidos apresentarem diversos complementos para que estejam prontos ao consumo e que a desidratação poderia levar a diversas complicações, citando como exemplos a constipação, desidratação, cefaleia, dores nas articulações e sonolência.

Discutiu-se também a cerca de opções para incentivar o consumo de água, por exemplo a utilização de água saborificada para estimular nos momentos e dias de falta de sede, ela é uma eficaz substituição para fomentar e desenvolver o hábito hídrico (GOMES, 2017).

Destaca-se que durante todo o momento da ação foram criados espaços para comentários ou dúvidas dos idosos, estimulados por meio de perguntas dos moderadores do grupo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao iniciarmos a discussão do grupo, os idosos relataram inúmeros benefícios da ingestão hídrica e o quanto a hidratação os fazia bem, refletindo no organismo, pele e promoção de sua saúde.

Nas falas de cada idoso prevaleceu a baixa ingestão de água ou líquidos, e que quando o faziam não se era anotado ou contabilizado o volume de ingestão ou seu recipiente de consumo. Isso corrobora com o estudo de Hordonho (2015) em que foi avaliado 33 idosos, como resultado foi observado que a quantidade de líquidos ingeridas por dia é de 3 copos para 39,4% dos idosos. A recomendação é de oito copos de água diários ou 1600ml, índices não atingidos. O valor total atingidos pelos idosos foi de 1000ml/dia.

O estudo de Romero e Bordin (2009) realizado com idosos também resulta um maior consumo de água na população feminina do que na população masculina e baixos índices de ingestão hídrica do citado na literatura e dito como esperados, 10% dos participantes relataram consumir menos de 2 copos de água/dia e a maior parte, os 35% consomem de 2 até 4 copos/dia, e os 30% referem um consumo de 4 a 8 copos/dia e os últimos 25% tomam mais de 8 copos ao dia.

Ao mesmo tempo em que relataram suas dificuldades em promover essa ingestão, justificando pela falta de sede ou esquecimento. Com isso, abordamos que esse consumo é de fundamental importância para o organismo, pois é um ponto crucial para a prevenção de diversas complicações, como a insuficiência renal, desidratação, retenção de líquidos, ressecamento de mucosas, vertigens, cefaléia e outros.

Corroborando para o estudo de Araújo (2013) em que a maior parte dos participantes referiu cansaço físico, perda de atenção, concentração ou memória, cefaléia e perda de peso.

E Edmonds *et al.*, (2013) complementam referindo que a desidratação promove uma queda de desempenho das tarefas que apontam funcionamento da memória e psicomotor. E ainda que os adultos que vivem em sedentarismo e desidratados melhoram e promovem uma melhor performance após ingestão de uma bebida.

Do mesmo modo, o consumo de água pode variar de três até quatro ou mais copos ao dia, e em 10% da população idosa consome dois ou menos copos ao dia. Assim, esse baixo índice de ingestão é em virtude da recusa de muitos e então acabam realizando apenas em horários de medicamentos ou durante refeições (GOMES, 2017).

No mesmo estudo mostrou – se que os idosos do sexo feminino optam por sucos ou leite e os do sexo masculino escolhem da mesma forma, no entanto consomem durante as refeições, para que assim consigam atingir a meta diária para líquidos.

A partir disso tivemos a chance de demonstrar e expor diversas misturas de frutas que podem ser usadas nas receitas da água saborificada, ao mesmo tempo que enfatizou-se as diversas misturas que poderiam ser feitas, dependendo do gosto de cada pessoa e que o uso de cada fruta e combinação tem um objetivo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo descreveu a ação educativa executada com idosos participantes do projeto de extensão, possibilitou a identificação do consumo de água precário entre os idosos participantes do projeto e motivação. Dessa forma, percebe-se a necessidade o incentivo para a promoção e educação em saúde, enquanto discentes, a ação nos propiciou a oportunidade de falar e ouvir essa população.

A educação em saúde permitiu o crescimento profissional e debate de assuntos fundamentais para idosos, a escuta e orientação, empoderando os idosos para que possam protagonizar os assuntos relacionados ao seu cotidiano, de forma que eles poderão repensar seus hábitos e planejar suas ações no auto cuidado.

Foi gratificante como graduandos perceber a atenção que os idosos demonstraram sobre o assunto e os questionamentos realizados, ocasionando uma experiência de desenvolvimento pessoal, profissional e científico para todos os participantes.

REFERÊNCIAS

- [1] ARAUJO, M. L. A. A desidratação no idoso. 2013.
- [2] BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Alimentação saudável para a pessoa idosa: um manual para profissionais de saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde; 2009.
- [3] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília : Ministério da Saúde, 2006. 192 p.
- [4] CANCELA, D. M. G. O processo de envelhecimento. 2007.
- [5] EDMONDS, Caroline J. et al. Water consumption, not expectancies about water consumption, affects cognitive performance in adults. *Appetite*, [s.l.], v. 60, p.148-153, jan. 2013. Elsevier BV.
- [6] GOMES, T. de O. Influência do consumo de água e outros líquidos na saúde dos idosos residentes na Vila Vicentina-João Pessoa- PB. 2017.
- [7] HORDONHO, A. A. C; LUNA, A M L; SOUZA N A C. Avaliação da ingestão de líquidos em idosos atendidos numa clínica escola de um centro universitário em Maceió - AL.
- [8] KLAUS, Joice Herrmann et al . The prevalence of and factors associated with constipation in elderly residents of long stay institutions. *Rev. bras. geriatr. gerontol.*, Rio de Janeiro , v. 18, n. 4, p. 835-843, Dec. 2015.
- [9] MARKLAND, Alayne D et al. Association of Low Dietary Intake of Fiber and Liquids With Constipation: Evidence From the National Health and Nutrition Examination Survey. *The American Journal Of Gastroenterology*, [s.l.], v. 108, n. 5, p.796-803, 9 abr. 2013.
- [10] POPKIN, Barry M; D'ANCI, Kristen e; ROSENBERG, Irwin H. Water, hydration, and health. **Nutrition Reviews**, [s.l.], v. 68, n. 8, p.439-458, 20 jul. 2010.
- [11] ROMERO M F; BORDIN SM. Influência do consumo de água em indivíduos da terceira idade praticantes de hidroginástica na academia Fit Foz. Faculdade União das Américas – Uniamérica – Foz do Iguaçu/PR, 2009.

Capítulo 15

O papel do enfermeiro nos Serviços de Urgência e Emergência

Maíra Maria Leite de Freitas

Maria Madalena da Silva Araújo

Adria Ferreira de Sousa

Cláudia Patrícia da Silva Ribeiro Menezes

Leticia Machado de Sousa

Claudiana dos Santos Silva

Juliana da Silva Magalhães

Antônio Gean Fernandes Lopes

Camila Ferreira da Silva

Resumo: A pesquisa tem como objetivo realizar uma revisão descritiva da literatura sobre o papel do enfermeiro nos serviços de Urgência e Emergência. O presente estudo consistiu de uma revisão bibliográfica de literatura do tipo integrativa sobre o papel do enfermeiro nos serviços de Urgência e Emergência. Após pesquisa nas bases de dados Scielo, Bireme e Lilacs, foram encontrados 62 artigos que contemplavam o tema proposto. Obedecendo aos critérios de inclusão, foram selecionados 32 do Scielo, 30 do Lilacs e após a leitura e seleção dos artigos, foram incluídos no estudo, 03 do Scielo, 02 do Lilacs, assim totalizou-se apenas, 5 artigos que contemplavam todas as exigências metodológica. Realizou-se duas categorias temáticas: Papel e ações do enfermeiro dos serviços de EU e A Enfermagem e a urgência e emergência. Destarte, foi notável a visibilidade do papel do enfermeiro nos serviços de Urgência e Emergência, o qual a equipe de saúde reconhece a importância do enfermeiro frente a realização de suas atividades laborais, desempenhando-as com habilidade, ética e conhecimento técnico – científico. Observou-se também a necessidade da publicação de estudos sobre a temática.

Palavras – chave: Enfermagem. Urgência e Emergência. Enfermeiro.

1. INTRODUÇÃO

O Atendimento Pré-Hospitalar (APH) é uma assistência prestada, com um cuidado inicial, por ser o primeiro nível de atenção, aos indivíduos em quadros emergenciais, de natureza clínica, traumática, obstétrica, como também psiquiátrica, que podem culminar em sequelas ou até mesmo à morte. Assim, o APH pode variar de um simples esclarecimento ou orientação e coordenada médica por telefone até o envio direto de uma ambulância de suporte básico ou avançado ao local, com o objetivo e expectativa de garantir condições básicas indispensáveis de sobrevivência (COUTINHO, 2011).

O Ministério da Saúde implantou a “Rede de Atenção às Urgências e Emergências”, buscando sempre o acolhimento com classificação de risco e resolutividade, a organização da Rede de Urgência e Emergência (RUE) tem a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde com o objetivo de ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna. Ela é formada dos seguintes componentes: Promoção e prevenção, Atenção primária: Unidades Básicas de Saúde; UPA e outros serviços com funcionamento 24h; SAMU 192; Portas hospitalares de atenção às urgências – SOS Emergências; Enfermarias de retaguarda e unidades de cuidados intensivos; Inovações tecnológicas nas linhas de cuidado prioritárias: AVC, IAM, traumas e Atenção domiciliar – Melhor em Casa (BRASIL, 2018).

Nessa Rede existem as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas que constituem-se como componente da Rede de Urgência e Emergência (RUE) intermediário entre a atenção básica e a atenção hospitalar, tem como objetivos dar suporte à atenção básica para os casos agudos que ultrapassem sua capacidade de resolução e de reduzir o fluxo de usuários para as portas de entrada hospitalares (BRASIL, 2015).

O sistema de saúde brasileiro é composto por uma rede de serviços públicos e privados que são distintos, porém, relacionados. A rede pública é composta, particularmente, por unidades de atenção básica (95%) e serviços de emergência (65%) e a rede privada de serviços de atenção especializada (74%) e atenção hospitalar (79%). A procura pelos serviços de baixa complexidade e de emergência pela população com menor renda sugere menor acesso à atenção adequada. Essa falta de acesso à atenção ambulatorial especializada e hospitalar impacta o atendimento de emergência, que passa a ser a principal forma de acesso para especialidades e tecnologias médicas. A falta de tecnologia e apoio diagnóstico causa insatisfação da população com a rede básica, que procura o pronto atendimento como forma de realizar consulta médica, exames e obter o resultado no mesmo dia (OLIVEIRA *et al.*, 2013).

No Atendimento Móvel de Urgência, juntamente com o médico e o socorrista, o enfermeiro é responsável pela assistência, que tem como meta a reanimação e a estabilização do paciente no local de ocorrência e durante o transporte para o pré-atendimento fixo. Dada a necessidade de envolver técnicas complexas, além de manobras invasivas, essa assistência justifica a presença do enfermeiro e do médico na ambulância (AVELAR; PAIVA, 2010).

O problema da pesquisa em questão foi estudar o papel do enfermeiro nos serviços de urgência e emergência, assim tornando o estudo de extrema importância para a comunidade acadêmica, bem como, para os profissionais de saúde.

Ademais, a motivação para realizar a pesquisa floresceu durante as aulas do curso de Urgência e Emergência, no sentido de identificar o enfermeiro, como um agente promotor de saúde.

A pesquisa tem como objetivo realizar uma revisão descritiva da literatura sobre o papel do enfermeiro nos serviços de Urgência e Emergência.

2. METODOLOGIA

O presente estudo consistiu de uma revisão bibliográfica de literatura do tipo integrativa sobre o papel do enfermeiro nos serviços de Urgência e Emergência.

A revisão integrativa caracteriza-se pela análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de decisão e a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do estado do conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos, seguindo padrões para que os leitores consigam visualizar os resultados (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

Figura 01- Etapas da Revisão Integrativa

Fonte: Dados Fornecidos pelos autores

Na primeira etapa, foi elaborada a pergunta norteadora: Qual o papel do enfermeiro nos serviços de Urgência e Emergência? Buscou-se realizar um levantamento das variáveis envolvidas na pergunta norteadora a fim de definir de forma clara e concisa os principais questionamentos da pesquisa.

Para a construção da segunda etapa do estudo, foi realizada uma pesquisa nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Bireme) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), utilizando como descritores: Enfermagem, Urgência e Emergência, Enfermeiro. A pesquisa foi realizada utilizando os operadores booleanos OR e AND. O período da publicação dos periódicos foi de 2013 a 2018.

Para compor a amostra foram utilizados os seguintes Critérios de Inclusão: artigos disponíveis na íntegra nas bases de dados selecionadas, no idioma português, que abordassem o tema sobre o tema em questão e que respondessem a questão norteadora deste estudo. Foram excluídos do estudo editoriais, cartas ao editor, artigos de revisão e artigos que não abordassem a temática da revisão, artigos publicados em outros idiomas, os duplicados e os não disponíveis na íntegra.

No que concerne a terceira etapa, ocorreu a categorização dos estudos. De acordo com estudo feito, foram separados na seguinte categoria: o papel do enfermeiro nos serviços de Urgência e Emergência, que contemplou os seguintes itens: identificação do estudo, objetivos, aspectos metodológicos e, especificamente, aspectos relacionados ao papel do enfermeiro nos serviços de Urgência e Emergência. Para facilitar o acesso e a recuperação das informações, os artigos foram organizados e categorizados, cronologicamente possibilitando dessa forma o conhecimento da evolução histórica do fenômeno ou problema estudado.

Para a aplicação da quarta etapa foi realizado uma avaliação dos estudos incluídos na pesquisa. Nesta fase, os artigos selecionados foram analisados criticamente em relação aos critérios de autenticidade, qualidade metodológica, relevância das informações e representatividade. Após a leitura dos artigos escolhidos e a extração dos principais dados por meio do formulário, foi possível construir quadros com informações detalhadas de cada artigo, permitindo a análise posterior de forma a atender ao objetivo da pesquisa.

Na quinta etapa aplicou-se a interpretação dos resultados, portanto, ocorreu a análise crítica dos estudos incluídos e que tiveram como finalidade realizar a comparação com o conhecimento teórico, a identificação de conclusões e implicações resultantes da revisão integrativa. A identificação de lacunas permitiu-se que fossem apontadas sugestões pertinentes para futuras pesquisas.

Para a realização da sexta etapa da pesquisa, primou-se na síntese do conhecimento evidenciado nos artigos, portanto, consistiu na elaboração do documento contemplando a descrição das fases percorridas e os principais resultados evidenciados da análise dos artigos incluídos.

3. RESULTADOS

Após pesquisa nas bases de dados SciELO, Bireme e Lilacs, foram encontrados 62 artigos que contemplavam o tema proposto. Obedecendo aos critérios de inclusão, foram selecionados 32 do SciELO, 30 do Lilacs e após a leitura e seleção dos artigos, foram incluídos no estudo, 03 do SciELO, 02 do Lilacs, assim totalizou-se apenas, 5 artigos que contemplavam todas as exigências metodológica.

Organograma 01 – Resultado da pesquisa bibliográfica.

Quadro 01: Caracterização das publicações da revisão, segundo Ano, Autor e Título.

Estudo	Ano	Autor	Título
E01	2013	ALVES <i>et al.</i>	Atuação do enfermeiro no atendimento emergencial a usuários acometidos de infarto agudo do Miocárdio
E02	2016	MORAIS <i>et al.</i>	Competência legal do enfermeiro na urgência/emergência
E03	2016	BURIOLA <i>et al.</i>	Atuação do enfermeiro no serviço de emergência psiquiátrica: Avaliação pelo método de quarta geração
E04	2016	MARTINS	O Processo de Trabalho do Enfermeiro na Unidade de Urgência e Emergência de um Hospital Público
E05	2018	PERES <i>et al.</i>	Atuação do enfermeiro em um serviço de atendimento pré-hospitalar privado

Quadro 2: Caracterização das publicações da revisão, segundo objetivos e conclusões.

Estudo	Objetivo	Conclusões
E01	Analisar a assistência emergencial do enfermeiro frente ao usuário acometido por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM)	A pesquisa vislumbrou para a necessidade de melhoria, adequação da estrutura física acolhedora dos usuários portadores de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM).
E02	O estudo buscou conhecer quais procedimentos/aspectos/situações relacionados aos serviços de urgência/emergência foram objeto de regulamentação pelos conselhos de Enfermagem	O exame da legislação apontou a necessidade de uma maior regulamentação do exercício profissional e formação nessa área.
E03	Apreender a percepção de profissionais, usuários e familiares, acerca da atuação do enfermeiro em um serviço de emergência psiquiátrica.	Concluiu-se a que a utilização do método de Avaliação de Quarta Geração faz emergir o empoderamento dos grupos de interesse como protagonistas das transformações e que a atuação do enfermeiro é essencial para a humanização do cuidado e à dinâmica de trabalho multidisciplinar.
E04	Analisar os processos de trabalho de enfermeiros na unidade de atendimento de urgência e emergência em hospital de pronto-socorro, focalizando a articulação entre ações gerenciais e assistenciais do enfermeiro	Entre as ações do enfermeiro assistencial, destacam-se atividades de acolhimento com classificação de risco, assistência direta ao paciente grave, supervisão de enfermagem e assistência ao paciente aparentemente não grave
E05	Conhecer a percepção de trabalhadores de saúde sobre a atuação do enfermeiro em um serviço de atendimento pré-hospitalar.	O enfermeiro é de grande importância frente à equipe, desempenhando suas funções com habilidade e conhecimento

4. DISCUSSÃO

4.1. PAPEL E AÇÕES DO ENFERMEIRO DOS SERVIÇOS DE UE

O enfermeiro coordena as atividades da enfermagem, supervisiona e domina as dinâmicas do trabalho no serviço, além de avaliar pacientes no momento do atendimento, a fim de selecionar e encaminhar demandas que são consideradas de maior gravidade. Dessa forma, se constitui em elo do trabalho médico com os demais profissionais da equipe. O enfermeiro é responsável pela assistência direta ao paciente, juntamente com o médico e o(s) demais socorrista(s). Essa assistência tem por objetivo a reanimação e a estabilização do paciente no local de ocorrência e durante o transporte até a chegada ao ambiente hospitalar. Assim, justifica-se a presença do enfermeiro e do médico na ambulância pela necessidade de envolver técnicas complexas, além de manobras invasivas (PERES *et al.*, 2018).

Para Alves *et al.*, (2013) em seu estudo sobre emergências voltadas ao Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) ressalta que cabe ao enfermeiro, juntamente com sua equipe, providenciar a garantia de um acesso venoso periférico e calibroso para que através deste sejam administrados os fármacos necessários para a reabilitação do usuário portador do IAM. Vale ressaltar que os medicamentos são realizados conforme a prescrição médica.

No estudo de Buliola *et al.*, (2016) o enfermeiro foi apontado como pilar para a execução segura das ações de saúde, contato entre os membros da equipe multidisciplinar, bem como pela sua capacidade gerencial, que contribui para a organização da atenção qualificada e resolutive em saúde. A atuação do enfermeiro também foi evidenciada como altruística pelos familiares que necessitaram do serviço. Para tanto, o cuidado de enfermagem é visto como uma “tábua de salvação”, o que pressupõe que o cuidado prestado por esse profissional, à família, foi crucial para o enfrentamento do sofrimento, acarretado pela experiência de ter um membro familiar necessitando de um atendimento emergencial.

Os enfermeiros atuam tanto nas ações gerenciais, quanto nas assistenciais e, dessa maneira, há especificidades em suas ações que, de forma complementar, resultam em um trabalho integrado da equipe de enfermagem. Na unidade de urgência e emergência, a finalidade ou objetivo da unidade está definido e incorporado pelos enfermeiros. Assim, tendo maior finalidade de orientar o processo de trabalho, que é o de salvar vidas e tem como base de sustentação a prestação de assistência de qualidade, com agilidade e prevenção de agravos (MARTINS, 2016).

As ações do enfermeiro previstas nas resoluções dos Conselhos de alguns estados como por exemplo: Triagem de usuários (Decisão 084/2010/DF); Liberação imediata de ambulância (Parecer 060/2012/MS); Drenagem abcesso (Parecer 008/2009/AL e Parecer 35/2 012/SP); Lavagem de ouvido (Parecer 010/2007/SC; Decisão 024/2008/MT; Parecer 09/2009/AL; Parecer 11/2013/SP); Tamponamento nasal anterior e posterior (Parecer 04/1997/DF); Punção de veia subclávia (Parecer 015/2005/DF); Desfibrilação com equipamento manual (Parecer 26/2 013/SP); Sondagem nasogástrica, em usuário que fez uso de substância tóxica sem prescrição médica (Parecer 04/2002/DF); Sutura efetuada por profissional de enfermagem (Resolução Cofen 278/2003; Parecer 39/2 013/SP); Intubação traqueal por enfermeiros (Intubação traqueal por enfermeiros); Alteração e programação de parâmetros de ventilação mecânica na emergência (Parecer 46/2 010/SP; Parecer 67/2012/ MS).

Ademais, prima-se pela importância do enfermeiro nos serviços de Urgência e Emergência, uma vez que este profissional é habilitado para promover uma assistência com qualidade e pela ajuda indispensável atuação junto com a equipe médica, onde é necessário a exercer técnicas complexas e manobras invasivas para a reanimação e estabilização do paciente (PERES *et al.*, 2018).

Já Alves *et al.*, (2013) destacou a função do enfermeiro como ao profissional que providencia um acesso venoso periférico e calibroso para a administração de soros e medicamentos necessários para a reabilitação dos pacientes.

Deste modo, Buliola *et al.*, (2016) falou sobre a atuação do enfermeiro junto aos familiares que necessitaram do serviço fortificando o acompanhante no sentido que o mesmo enfrentasse o sofrimento acarretado pela experiência de ter um membro familiar necessitando de atendimento emergencial.

O destaque de Martins (2016) é que o enfermeiro que orienta o processo de trabalho é salvar vidas e, para tanto, tem como base de sustentação a prestação de assistência de qualidade, com agilidade e com prevenção de agravos.

Peres *et al.*, (2016) enfatiza as resoluções estaduais que regulamentam as atividades do enfermeiro na urgência e emergência sendo as principais: Triagem de usuários, Liberação imediata de ambulância, Punção de veia subclávia, Desfibrilação com equipamento manual e sondagem nasogástrica.

A atuação da enfermagem numa unidade de emergência tem assumido fundamental importância na articulação entre os vários profissionais da equipe, além de organizar o processo de trabalho da enfermagem, buscando concretizar as ações a serem realizadas junto com clientes, que buscam esses serviços para atender às suas necessidades de saúde-doença. Entretanto, observa-se a sobrecarga de trabalho e os profissionais da área voltados muitas vezes mais para a assistência do que para a administração do setor, ficando o gerenciamento em segundo plano, sendo essa atividade fundamental para o planejamento do processo de trabalho, determinando a qualidade do serviço e, conseqüentemente, uma melhoria na assistência prestada (ZAMBLAZI; COSTA, 2014).

O enfermeiro é fundamental dentro de uma equipe, no processo de cuidar, pois este é um elo entre o paciente, seus familiares e os demais profissionais, uma vez que deve estar se comunicando ativamente

com ambos os lados, para que consiga traçar um plano de cuidados de qualidade que abarque as necessidades do paciente, sempre buscando orientá-lo quanto ao uso dos medicamentos, às medidas de alívio e conforto além de incentivá-lo a manter o autocuidado. A enfermagem traz consigo um papel elementar, que perpassa as questões anatômicas, fisiológicas, patológicas, farmacológicas e educacionais, mas que acima de tudo, vê o indivíduo que está sob seus cuidados enquanto ser humano que possui necessidades ímpares que, na medida do possível, podem e devem ser atendidas (ADÃO; SANTOS, 2012).

Os profissionais de enfermagem, principalmente os que atuam em serviços de urgência e emergência, vivenciam constantemente o estresse no trabalho, pois é uma área que exige do profissional pleno controle e o paciente e família encontram-se em extrema vulnerabilidade (MENZANI; BIANCHI, 2009).

4.2. A ENFERMAGEM E A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

As unidades de urgência e emergência (UUE) constitui-se como um local de trabalho desafiante para profissionais de saúde, por conviverem com superlotação, demora no atendimento e tensão constante. No Brasil, a UUE é porta de entrada de grande parte dos usuários do sistema de saúde e exige da equipe um trabalho coeso, pois nesse serviço a atenção dispensada aos usuários depende de ações executadas com eficiência e resolutividade. Esse cenário se constitui no cotidiano de trabalho dos profissionais de saúde, com destaque para a equipe de enfermagem, pelo fato esses profissionais constituírem a maior força de trabalho da área da saúde (COELHO *et al.*, 2010).

A partir da instituição da Rede de Atenção às Urgências, amplia-se o conceito de saúde exigindo a participação multiprofissional no atendimento. A urgência é caracterizada por uma ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência imediata. Já a emergência é a constatação de risco iminente de vida ou sofrimento intenso, instituída por meio de práticas clínicas cuidadoras. Os departamentos de emergência são, portanto, locais que necessitam dar respostas rápidas, devendo ter uma equipe qualificada, que tenha facilidade de comunicação e capacidade de tomar decisões assertivas, uma vez que irá prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves (SILVA *et al.*, 2014).

O aumento crescente de pacientes que procuram os Serviços de Emergência (SE) nas últimas décadas e a consequente superlotação destes serviços é uma realidade mundial. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, este problema torna-se ainda mais grave, pois estes serviços se configuram muitas vezes como a principal porta de entrada ao sistema de saúde. Estudos relacionam a superlotação a aumento dos custos, decréscimo na eficiência e na qualidade da assistência, aumento na incidência de efeitos adversos e na mortalidade, traduzindo em baixo desempenho do sistema de saúde (BECKER *et al.*, 2015).

A Enfermagem em urgência e emergência tem avançado de maneira significativa nos últimos anos por ser uma especialidade de grande relevância e pelo elevado número de acidentes e de violência urbana que culminam, na maioria das vezes, com pessoas em estado crítico e com risco de morte. Essa crescente demanda do atendimento em urgência e emergência influencia de forma considerável na funcionalidade destes serviços e na saúde dos profissionais, podendo ser apontado na atualidade como um sério problema de saúde pública (AVELINO *et al.*, 2013).

Segundo Farias *et al.*, (2011), os profissionais da enfermagem que estão lotados nos setores de emergência e urgência são vencedores, pois estão ligados diretamente à doença, a dor e a morte. Convivendo continuamente com inúmeros sentimentos que os levam ao desgaste físico e mental, tendo que prestar assistência com qualidade num espaço físico que muitas vezes é desconfortável e frio.

Para tanto, Bezerra, Silva e Ramos (2012) constataam que o profissional de enfermagem, atuando no setor de urgência e emergência pode desencadear desgastes físico e emocional. Isso, porque o ambiente em que atua, em conjunto com uma equipe multiprofissional, exige resultados imediatos do processo de trabalho, responsabilizando-o pela qualidade do atendimento ao paciente. Além disso, esses profissionais têm de suportar continuamente o risco iminente de morte, onde a complexidade dos cuidados que prestam aliados aos fatores de âmbito pessoal.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho foi possível observar a variedade das funções do enfermeiro nos serviços de urgências e emergência. Deste modo, os usuários do serviço público, ainda desconhecem sobre o papel de atuação do enfermeiro, uma vez que até há variedades de atribuições laborais. Com isso, é necessário que os gestores que regulamentam o serviço público, tanto estado e municípios, realizem ações que promovam o papel do enfermeiro.

Destarte, foi notável a visibilidade do papel do enfermeiro nos serviços de Urgência e Emergência, o qual a equipe de saúde reconhece a importância do enfermeiro frente a realização de suas atividades laborais, desempenhando-as com habilidade, ética e conhecimento técnico – científico. Observou-se também a necessidade da publicação de estudos sobre a temática.

REFERÊNCIAS

- [1] ADÃO, R.S.; SANTOS, M. R. dos. Atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel. *Rev. Min. Enferm.*; v.16, n. 4, p. 601-608, 2012.
- [2] ALVES, T.E.; SILVA, M.G.; OLIVEIRA, L.C. et al. Atuação do enfermeiro no atendimento emergencial a usuários acometidos de infarto agudo do Miocárdio. Mossoró/RN/Brasil, 2010. *Rev enferm UFPE on line.*; v.7, p.176-83, 2013
- [3] AVELAR, V.L.L.M.; PAIVA, K.C.M. Configuração identitária de enfermeiros de um serviço de atendimento móvel de urgência. *Rev Bras Enferm.*; 2010; 63(6): 1010-8, 2010
- [4] AVELINO, F.V.; LEITE, A.R.; FERNANDES, M.A.; AVELINO, F.P.; MADEIRA, M.Z.; SOUSA, L.E. Estresse em enfermeiros do setor de urgência e emergência. *Rev enferm UFPI.*; v. 2, n. 3, p. 4-10, 2013.
- [5] BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Rede de Atenção às Urgências e Emergências: Avaliação da Implantação e do Desempenho das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). CONASS.; p. 400, 2015.
- [6] BRASIL. Palácio do Planalto. Ministério da Saúde. Manual instrutivo da Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Sistema Único de Saúde (SUS) / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada. Editora do Ministério da Saúde.; p.84, 2013.
- [7] BECKER, J.B.; LOPES, M.C.B.T.; PINTO, M.F.; CAMPANHARO, C.R.V.; BARBOSA, D.A.; BATISTA, R.E.S. Triage no Serviço de Emergência: associação entre as suas categorias e os desfechos do paciente. *Rev. Esc. Enferm. USP.*; v. 49, n. 5, p. 783-789, 2015.
- [8] BEZERRA, F. N.; Silva, T. M.; Ramos, V. P. Estresse ocupacional dos enfermeiros de urgência e emergência: Revisão Integrativa da Literatura. *Acta paul. enferm.*; v. 25, n. spe2, p. 151-156, 2012.
- [9] BURIOLA, A.A.; KANTORSKI, L.P.; SALES, C.A.; MARSUDA, L.M. Atuação do enfermeiro no serviço de emergência psiquiátrica.: Avaliação pelo método de quarta geração. *Texto Contexto Enferm.*; v. 25, n.1, 2016.
- [10] COELHO, M.F.; CHAVES, L.D.P.; ANSELM, M.L.; HAYASHIDA, M.; SANTOS, C.B. Análise dos aspectos organizacionais de um serviço de urgências clínicas: estudo em um hospital geral do município de Ribeirão Preto, SP, Brasil. *Rev Lat Am Enfermagem.*; v.18, n. 4, p. 770-777, 2010.
- [11] COUTINHO, K.C. Atividades do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar. Trabalho de conclusão de curso de Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre.; p. 56, 2011.
- [12] FARIAS, S.M.C.; Teixeira, O.L.C.; Moreira, W.; Oliveira, M.A.; Pereira, M. O. Caracterização dos sintomas físicos de estresse na equipe de pronto atendimento. *Rev. esc. enferm. USP.*; v.45, n.3, p.722-729, 2011.
- [13] MORAES, L.A.F.; MARTINI, J.G.; VARGAS, M.A.O.; REIBNITZ, K.S.; BITTENCOURT, J.V.O.V.; LAZZARI, D. Competência legal do enfermeiro na urgência/emergência. *Enfermagem Foco.*; v.7, n.1, p.18-23, 2016

- [14] MARTINS, B.R. O Processo de Trabalho do Enfermeiro na Unidade de Urgência e Emergência de um Hospital Público. Dissertação de Mestrado: Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Enfermagem.; p. 80, 2016.
- [15] MENZANI, G.; BIANCHI, E.R.F. Stress dos enfermeiros de pronto socorro dos hospitais brasileiros. *Rev. Eletr. Enf.*; v.11, n.2, p. 327-33, 2009.
- [16] MENDES, K.D.S.; SILVEIRA, R.C.C.P.; GALVÃO, C.M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto Contexto Enfermagem.*; v. 17, n. 4, p. 758-764, 2008.
- [17] NASCIMENTO, E.R.P.; HILSENDEGER, B.R.; NETH, C.; BELAVER, G.M. Classificação de risco na emergência: avaliação da equipe de enfermagem. *Revista de Enfermagem.*; v.19, n.1, p. 598-603, 2011.
- [18] SILVA, D.S.; BERNARDES, A.; GABRIEL, C.S.; ROCHA, F.L.R.; CALDANA, G. A liderança do enfermeiro no contexto dos serviços de urgência e emergência, *Rev. Eletr. Enf.*; v.16, n.1, p.211-9, 2014.
- [19] PERES, P.S.Q. et al. Atuação do enfermeiro em um serviço de atendimento pré-hospitalar privado. *Rev Fund Care Online.*; v.10, n.2, p.413-422, 2018.
- [20] SOUZA, M.T.; Silva, M.D.; Carvalho, R. Revisão integrativa de Literatura. O que e como. *Integrative review: what is it? How to do it? Einstein.*; v.8, p.102-6, 2010.
- [21] OLIVEIRA, G.N.; VANCINI-CAMPANHARO, C.R.; OKUNO, M.F.P.; BATISTA, R.E.A. Acolhimento com avaliação e classificação de risco: concordância entre os enfermeiros e o protocolo institucional. *Rev. Latino-Am. Enfermagem.*; v. 21, n.2, p. 07, 2013.
- [22] ZAMBAZI, B.R.B.; COSTA, A.M. Gerenciamento de enfermagem em unidade de emergência: dificuldades e desafios. *Rev Adm Saúde.*; v. 15, n. 61, p. 169-76, 2013.

Capítulo 16

Desafios na inclusão social de surdos no contexto da saúde

Larissa Gonçalves Abrantes de Oliveira

Maria Jussiany Gonçalves de Abrantes

Resumo: A palavra surdo-mudo não é adequada, assim como o termo deficiente, pois é uma forma de estigmatizar o indivíduo gerando preconceitos, o mais correto a ser utilizado tanto pela comunidade surda como pela sociedade em geral é apenas surdo. Os mesmos enfrentam dificuldades quanto a comunicação com as pessoas em instituições de saúde, embora, o acesso a esses tipos de serviços tenha melhorado, mas ainda existe a necessidade de profissionais capacitados para atender a uma demanda que requer atenção especial. Essa falta de comunicação gera barreiras nas relações com o outro e nos serviços de saúde não é diferente. Aprender uma nova língua requer tempo, prática e dedicação por parte dos profissionais e sociedade como um todo sendo de suma importância diante da assistência prestada, ampliando dessa maneira a acessibilidade frente a comunidade surda aos serviços de saúde. Portanto, deve haver uma preparação da população para inserir o surdo no meio social, acolhendo-o e atendendo-o de forma eficaz para que haja uma boa interação, pois, a inclusão não deve ser obtida através das limitações e sim, por suas capacidades e competências.

Palavras-chave: Surdos. Profissionais de saúde. Inclusão social. Capacitação.

1. INTRODUÇÃO

Desde a antiguidade, por volta do século XV, os surdos eram vistos como aqueles incapazes de serem ensinados, sendo excluídos da sociedade não podendo até mesmo possuir ou herdar propriedades, casar-se ou exercer sua cidadania através do voto. A inteligência dessas pessoas, pela ausência da oralidade, era menosprezada. Nessa época, os alunos eram proibidos de se comunicar com as mãos, chegando ao ponto de tê-las amarradas, uma forma de repressão a linguagem gestual.⁴

A surdez tem como característica principal a diminuição ou até mesmo a ausência na captação dos sons no ambiente, o que dificulta ou impossibilita o aprendizado da linguagem oral. O Sistema Único de Saúde (SUS) com seus princípios e diretrizes deixa falho na questão da igualdade, ou seja, um atendimento sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, sendo, portanto, marginalizados na sociedade, nos serviços, na saúde e em tantos outros ambientes.¹

Um aspecto importante é quanto a comunicação, adentrando em mais um princípio do SUS, a integralidade, com ações de promoção, proteção e recuperação, vendo o indivíduo em sua totalidade e não apenas um conjunto de partes, com isso, observando suas reais necessidades, prestando-lhe uma assistência humanizada, adequada e qualificada.¹³

Essa barreira da comunicação gera muitas dificuldades ao atendimento aos surdos. Não há acolhimento nem criação de vínculos entre profissionais e pacientes. Tendo estes muitas vezes ir aos serviços acompanhados de pessoas não surdas para poder serem atendidos, o que gera um certo constrangimento e ferindo os princípios éticos. Dessa forma, a capacitação ajudaria na promoção da educação em saúde afim de informar e orientar os que prestam a assistência.¹⁻¹⁶

Analisando a temática, fica a dúvida de como é feita essa comunicação e interação nos serviços de saúde. Portanto, o objetivo é de ampliar o conhecimento dos profissionais acerca da libras e a difusão da cultura surda.

Assim, esta pesquisa tem como justificativa a importância da qualificação dos profissionais frente as dificuldades no atendimento em estabelecimentos de saúde, levando muitas vezes a diagnósticos errados por não entender o que o paciente está relatando ou a não adesão ao tratamento por parte destes. Diante disso, observa-se a importância nessa formação em libras, havendo assim uma maior inclusão social, respeito e reconhecimento de suas especificidades.

2. METODOLOGIA

Esta é uma pesquisa com revisão bibliográfica envolvendo a comunidade surda, na qual se baseia no atendimento adequado e inclusivo de maneira integral de acordo com o amparo da legislação. Despertando assim o conhecimento, o respeito e a importância desta inclusão diante do desconforto e despreparo dos profissionais no atendimento a pessoas com surdez devido à falta de educação permanente nos serviços para um atendimento de qualidade.

Esta revisão revela que apesar das limitações esta população vem ganhando espaço de maneira ainda tímida, com sua maneira peculiar de ver o mundo através das expressões faciais e corporais e pela luta constante por mais direitos.

Para esta revisão, realizou-se uma pesquisa em bancos de dados como os sites do IBGE, Constituição Federal e artigos científicos retirados do google acadêmico e scielo, na qual se utilizou as seguintes palavras-chave: libras, surdos, inclusão social, profissionais de saúde e capacitação. A partir desse levantamento foram selecionados 1 livro, 1 cartilha e 15 artigos. O critério dessa seleção foi feito por meio do tema surdez na saúde e seus objetivos específicos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O principal exame de triagem auditiva neonatal é o de emissões fotoacústicas evocadas, o famoso teste da orelhinha, disponibilizado gratuitamente pelo SUS. Este é capaz de detectar precocemente a perda auditiva de recém-nascidos e sua incidência, ou seja, os casos novos, é de 1 a 2 para cada 1000 nascidos vivos.⁷

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010 existe 9,8 milhões de brasileiros com alguma deficiência auditiva. Uma parcela considerável e que ainda sofre muitos estigmas e preconceitos. Não há intérpretes suficientes para auxiliá-los, além da baixa oferta de empregos.¹

Diante do exposto, os serviços de saúde têm a obrigação de se adequar às necessidades da comunidade surda, para a prestação de um atendimento adequado nos três níveis de atenção (primária, secundária e terciária) gerando uma assistência mais humanizada e resolutiva.¹⁴ Como afirma a lei número 10.436 em seu artigo 3º parágrafo único:

As Instituições públicas e empresas cessionárias de serviços públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva, de acordo com normas legais em vigor.

Durante vários anos, a libras foi deixada de lado e apenas no século XX, mais precisamente no ano de 1950, é que a mesma foi sendo mais valorizada, porém, ainda hoje, os surdos além de sofrerem preconceitos são excluídos da sociedade.¹⁵

A lei nº 10.436 de 24/04/2002 foi um marco na história dos surdos, a mesma tornou a libras como língua oficial, onde passamos de um país monolíngue a bilíngue. Três anos depois, em 2006, o decreto nº 5626 regulamentou a referida lei.¹⁵

Através da comunicação pode-se gerenciar o cuidado de maneira individual conforme a necessidade do indivíduo.⁹

O processo de cuidar requer dedicação e compreensão das fragilidades, limitações e individualidades de cada ser. A comunicação é primordial nessa assistência, como afirma a cartilha Libras- Sinais de inclusão, 2010, p. 4:

Usar a língua de sinais é falar com as mãos e ouvir com os olhos é interagir com uma cultura que percebe o mundo através dos sinais, que experimenta deslumbramento quando entende e se faz entender, que convida, que troca, que aceita, que oferece.

Diante disto, percebe-se que comunicação é um grande obstáculo o que prejudica o atendimento como um todo. Fica a reflexão quanto a qualidade da assistência, pois, sabe-se que a forma de utilização da cultura surda é através de sinais, onde a voz são as mãos e corpos, assim como seus ouvidos são seus olhos. A entonação da mesma é feita pela expressão facial.³

Esta comunicação está relacionada a construção e desenvolvimento da identidade do indivíduo, expressão de sentimentos, interação social, construção de laços e vínculos, enfim, compreensão de mundo.¹¹

Os profissionais de saúde, muitos deles, não foram preparados na graduação para atender tal população, visto que na grade curricular a libras encontra-se como disciplina optativa, resultando na fragilidade do atendimento pela falta de compreensão entre as partes envolvidas, ou seja, emissor e receptor.⁸⁻⁹

Apesar da legislação vigente embasar a luta dos surdos pela inclusão na sociedade, a mesma é pouco difundida, sendo muitas vezes vistos como incapazes ou deficientes intelectuais, dependendo de familiares ou amigos para resolver coisas simples como por exemplo assuntos particulares, como se não fossem capazes de responder pelos seus atos. Vemos essas situações em órgãos ou instituições que não possuem intérpretes e nem pessoas capacitadas com o domínio da língua de sinais nestes locais.¹⁴⁻⁹

De acordo com a lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002, no seu artigo 1º parágrafo único, relata que:

Entende-se como Língua Brasileira de Sinais- Libras a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas no Brasil.

Entretanto, sabe-se que a língua de sinais não é universal, ou seja, cada país ou região tem sua estrutura própria gramatical. A libras é uma junção das mãos, movimentos e pontos de articulação, este último significa locais no ar ou no corpo onde os sinais são projetados.⁷

O acesso da pessoa surda aos serviços de saúde é bastante precário, haja visto que esses ambientes não possuem profissionais capacitados para atender a essa demanda. Observa-se o despreparo para compreendê-los, interferindo diretamente na qualidade do atendimento oferecido, a não procura pelos serviços de saúde como também a não adesão ao tratamento.⁹⁻⁸

As pessoas adoecem e necessitam de cuidados. Para a população não surda não há tanta limitação nesse quesito, já para as surdas, existe uma defasagem enorme na capacitação de profissionais em libras. Descrever sinais e sintomas por parte do paciente e qual conduta a ser seguida pelo profissional torna-se um verdadeiro desafio.¹⁻¹⁶

Para muitos estabelecimentos a solução do problema com a comunicação está no intérprete de libras que atua como um canal de intermediação entre surdos e ouvintes, porém, na maioria das vezes dá-se uma maior atenção ao intérprete do que ao próprio paciente, além da questão da privacidade que é quebrada.³

A presença deste intérprete está sendo de grande importância na busca da acessibilidade, no alcance de uma melhor qualidade de vida para quem depende destes para serem “ouvidos” e na desconstrução de termos pejorativos como: anormais, deficientes, coitados, incapazes, inválidos, dentre outros. Com a inserção deles possibilitou um maior acesso a informação e a participação de maneira mais ativa dos surdos na sociedade.¹⁰

Entretanto, a ausência destes e de profissionais sem a devida habilitação nas instituições de saúde dificultam muito a prestação de cuidados aos pacientes surdos.¹³

O conhecimento acerca da língua brasileira de sinais pelos ouvintes é bastante escasso o que reflete diretamente na inclusão social e na qualidade do atendimento. A acessibilidade é tida como uma forma de inclusão, assim como a importância de o profissional buscar se capacitar e das instituições prestadoras de serviços em oferecê-las.¹³

Toda língua tem a função de comunicar e de construir o pensamento, com a língua de sinais não é diferente, as relações sociais e interações fazem parte da construção do indivíduo e de sua subjetividade agregando culturas, valores, costumes e hábitos próprios.³

Entretanto, o não conhecimento dos sinais de saúde, ou seja, aqueles referentes a área da saúde geram também essa dificuldade na comunicação, tanto para o profissional como para o paciente, como por exemplo o sinal para pressão alta, diabetes, remédio, câncer, exame, cirurgia, doente, dentre outros. Muitas vezes se utiliza da leitura labial ou a escrita para o estabelecimento da interação entre ambos, mas nem sempre existe a compreensão pelo surdo devido à dificuldade com a língua portuguesa.⁶

Os profissionais são agentes de transformação para um atendimento de qualidade aos serviços prestados, buscando alternativas para a solução de problemas. Uma comunicação efetiva, por sua vez, é primordial nesse contexto, assim como a necessidade de capacitação pelos mesmos.³

Os surdos e outras pessoas portadoras de necessidades especiais passam por 4 fases: exclusão, segregação, integração e inclusão. Na primeira fase, há a rejeição pela sociedade devido a sua “anormalidade”, na segunda, são isolados do restante da população, mas agregados entre si, na terceira, se juntam aos demais indivíduos de forma ainda tímida e a quarta e última fase, a mais falada nos últimos tempos, relata o respeito da diversidade e respaldo dos seus direitos através das legislações, visto que, incluir significa também conhecer e valorizar a cultura do outro.¹²

Inclusão vai além da educação, se aplica no trabalho, cultura, lazer, e está presente em todos os espaços físicos e simbólicos, porém, este termo está intrínseco no indivíduo sendo revelado através das ações e atitudes diante das diferenças.²

O acolhimento faz parte do estabelecimento do direito a saúde e construção da cidadania de um povo, entretanto, torna-se um grande desafio para os profissionais, pois a comunicação interpessoal é quase inexistente. Analisando a temática, percebe-se que os pacientes surdos não utilizam o sistema de saúde como deveriam e como é seu por direito, pois com seus medos, angústias e frustrações tem seu cuidado fragmentado devido a uma barreira imposta na assistência.¹⁷

Assistência esta ineficaz pelo não domínio da língua de sinais, excluindo-se do direito básico garantido na Constituição Federal de 1988 no seu artigo 196, onde afirma que “a saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”. Este atendimento deveria ser conforme os princípios e diretrizes do SUS (universalidade, integralidade, direito a informação, equidade, este por sua vez se diferencia da igualdade, dentre outros) visando o autocuidado, além da prevenção e reabilitação do ser humano e de sua saúde de forma individual ou coletiva.⁸

A demanda de profissionais seja em escolas, instituições de saúde, bancos, dentre outros, é bastante escassa, pois os mesmos não possuem conhecimento suficiente para atender a uma população com necessidades específicas.⁵

Boa parte destes profissionais não conseguem se comunicar com pacientes surdos devido à falta de capacitação ou conhecimento insuficiente acerca da libras, interferindo diretamente na qualidade das consultas, na satisfação do cliente e nos serviços ofertados de uma maneira geral.¹

4. CONCLUSÃO

A libras é reconhecida como a segunda língua oficial do Brasil, porém, apesar de muitos conhecerem a mesma, poucas pessoas não surdas a utilizam. A importância dela na promoção da inclusão social e para um atendimento qualificado e humanizado é imprescindível.

Atualmente vem sendo discutidas e difundidas, de forma ainda pequena, ações de inclusão a uma comunidade com necessidades bem específicas como é a dos surdos, através de leis e decretos. Essa inclusão é apoiada no reconhecimento conforme a diferença e não deficiência, pois, sem a tão falada comunicação não há desenvolvimento do indivíduo.

Apesar das leis e decretos regularizarem a língua, a mesma precisa ser mais divulgada e incentivada na comunidade de ouvintes como forma também de inclusão. Inclusão esta baseada em trocas, descobertas, partilhas, eliminação de barreiras e necessidades de novas posturas com mudanças significativas frente ao “diferente”, transformando barreiras em rampas promovendo dessa forma a acessibilidade.

Espera-se que o Estado juntamente com os órgãos públicos promovam essas capacitações em prol de um atendimento de qualidade, proporcionando mais autonomia a essas pessoas esquecidas pela sociedade, além da necessidade de desenvolver mais ações voltadas a esse público e programas que visem a formação/capacitação dos profissionais melhorando dessa maneira a assistência a comunidade surda.

Não há educação continuada nos serviços, apesar da legislação garantir esses direitos, direitos estes que foram citados no decorrer da pesquisa, ocasionando uma atenção à saúde ineficaz pela falta de investimentos e um olhar voltado a essa população afim de aprimorar o cuidado.

REFERÊNCIAS

- [1] ALVES, Isadora Martins Naves; LEITE, Kellen Bruna de Sousa; FREITAS, Daniel Antunes. Projeto “libras em saúde”: combatendo a exclusão. Montes Claros, 2018.
- [2] CAMARGO, Eder Pires de. Inclusão social, educação inclusiva e educação especial: enlases e desenlases. Ciênc. educ. (Bauru) vol.23 no.1 Bauru, 2017.
- [3] CHAVEIRO, N. *et al.* Atendimento à pessoa surda que utiliza a língua de sinais, na perspectiva do profissional da saúde. Cogitare Enferm, 2010.
- [4] FELIPE, Tanya A. Libras em Contexto : Curso Básico : Livro do Estudante. 8ª. edição- Rio de Janeiro : WalPrint Gráfica e Editora, 2007.
- [5] GABRIEL, Diego Henrique Machado; SOBRINHO, Crislen Adrielle Luz; MARTINS, Tatiana Arantes; VALENTE, Tiago Neves Pereira. Capacitação em Libras na cidade de Posse-GO, 2016.
- [6] LESSA, Raiene Teixeira Cardoso; ANDRADE, Erci Gaspar da Silva. Libras e o atendimento ao cliente surdo no âmbito da saúde. Rev. Cient. Sena Aires. 2016; 5 (2): 95-104.
- [7] Libras. Sinais de inclusão. Universidade José do Rosário Vellano – UNIFENAS, 2010.
- [8] MARQUETE, Verônica Francisqueti; COSTA, Maria Antônia Ramos; TESTON, Elen Ferraz. Comunicação com deficientes auditivos na ótica de profissionais de saúde. Rev baiana enferm, 2018.
- [9] MOURA, Conceição de Maria Aguiar Barros; LEAL, Maria Eunice dos Anjos. Libras na Saúde – Ensino da Língua Brasileira de Sinais para Acadêmicos e Profissionais da Saúde. Revista Práticas em Extensão - São Luís, v. 03, nº 01, 2019.
- [10] OLAH, Lilian Vânia de Abreu Silva; OLAH, Naiane Caroline Silva. O intérprete de libras e a inclusão social do surdo. Revista Pandora Brasil Nº 24, 2010.
- [11] RAIMUNDO, Ronney Jorge de Souza; SANTOS, Thais Alves dos. A importância do aprendizado da comunicação em libras no atendimento ao deficiente auditivo em serviço de saúde. Revista eletrônica de educação da faculdade Araguaia, 2012.

- [12] REZENDE, Joseane Rosa Santos. Inclusão social: Libras- Língua falada com as mãos. REFACER v. 6, n. 1, 2017.
- [13] SILVA, NGPS, ANDRADE, EGS. Comunicação eficaz através da língua brasileira de sinais do profissional de enfermagem com os deficientes auditivos. Rev Inic Cient Ext., 2018.
- [14] SOARES, Maria Helena Alemany; PEREIRA, Joel Aroldo. Aprendendo Libras: Uma segunda língua, uma nova cultura. Caminho Aberto - Revista de Extensão do IFSC v.1, ano 2, nº 2, 2015.
- [15] SOUZA, Marcos Torres de; PORROZI, Renato. Ensino de Libras para os Profissionais de Saúde: Uma Necessidade Premente. Revista Práxis ano I, nº 2, 2009
- [16] SZESZ, Aryadyne Bueno Rocha; MANSANI, Fabiana Postiglione; SILVA, João Victor Chiquetto; BONFIM, Lincoln Denck de, FERNANDES, Mariane Marcelino. I curso de capacitação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) para futuros profissionais da área da saúde (2017): um relato de experiência. Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 5, n. 10, 2019.
- [17] TEDESCO, Janaina dos Reis; JUNGES, José Roque. Desafios da prática do acolhimento de surdos na atenção primária. Cad. Saúde Pública, vol.29, nº8, Rio de Janeiro, 2013.
- [18] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censo Demográfico Brasileiro 2010. Disponível em <<http://www.ibge.com.br>>, Acesso em: 16 fev. 2020
- [19] Lei nº 10.436 de 24/04/2002. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm>, Acesso em: 16 fev. 2020
- [20] Constituição Federal de 1988. Disponível em : <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> , Acesso em: 16 fev.2020

Capítulo 17

Síndrome XYY: Breves observações para o aprendizado social

Michelly Patricia Mafra

Resumo: Este trabalho refere-se a um estudo de caso fruto de vinte horas de estágio em Neuropsicopedagogia Clínica. Para a realização do estágio escolhe-se com a autorização da mãe, Felipe (nome fictício) criança do sexo masculino, 09 anos, diagnosticado há um ano com a síndrome XYY. Devido a características comuns – atraso no desenvolvimento, déficits de aprendizado, irritabilidade, distúrbios motores e no desenvolvimento da fala – foi diagnosticado com TEA aos 05 anos e TDAH como comorbidade. Porém, os sinais da aneuploidia XYY, estavam presentes: crescimento acima da média, atraso na fala e no desenvolvimento, agressividade, dificuldade de aprendizagem, mãos e pés maiores que a média. A proporção de aparecimento da síndrome na população é de 1/1000. Entende-se que na primeira infância, apenas pela observação comportamental, torna-se difícil o diagnóstico, sendo necessária a investigação genética do cariótipo, não sendo de fácil acesso para a maioria da população brasileira. Estudos prévios associaram a síndrome a criminalidade e até mesmo a psicopatia, ao passo que, os números divergem quando pesquisados na população geral. O indivíduo precisa ser entendido no seu meio biopsicossocial, levando-se em conta os estímulos e oportunidades que recebeu desde a infância. O prognóstico precisa ser repensado em termos de aspectos genéticos (inatos), mas especialmente os adquiridos (ambientais), este último campo de atuação da Neuropsicopedagogia.

Palavras-chave: Síndrome XYY. Aprendizado. Social. Neuropsicopedagogia.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho foi subsidiado pelas informações coletadas durante o Estágio em Neuropsicopedagogia Clínica. Felipe (nome fictício), 09 anos, diagnosticado com a síndrome XYY, síndrome de Jacobs ou ainda chamada de síndrome do super-macho. Diagnóstico que pode ser validado por médico neurologista após exame de cariótipo.

Este trabalho foi realizado a partir de dados obtidos no Estágio em Neuropsicopedagogia Clínica, no qual, o paciente pode participar de dez horas de avaliação e dez horas de intervenção. O setting clínico foi no Centro de Atenção Psicossocial Infante Juvenil de São José – SC. Espaço bastante favorável pelo consultório, sala de brinquedos, espaço para a avaliação motora. Também, espaço no qual pode interagir com outros profissionais que ali estavam.

Até por volta dos 08 anos de idade, Felipe recebia atendimento aos aspectos relacionados ao TEA, apresentando características de autismo de alto funcionamento, especialmente pela capacidade de memorização e criatividade. Também, diagnosticado com TDAH, pelo quadro de impulsividade e hiperatividade.

Na escola teve dificuldades de interação social desde o ingresso na educação infantil. Aprendia com lentidão e de um jeito diferente das demais crianças. Era extremamente impulsivo e agressivo, “querendo as coisas do jeito dele”.

Dificuldade para concluir as tarefas. Em casa, vê televisão, come, dança tudo ao mesmo tempo. Perde os objetos dentro de casa. É comum não saber onde estão os tênis. É destrambelhado (sic). Quando se sente frustrado é agressivo com os objetos. Já quebrou a televisão nova de casa. Ficaram quase um ano sem televisão em casa. Ganhou um celular de aniversário e também quebrou, agora está sem. Quando menor agredia as pessoas. Agora extravasa a irritação quebrando objetos, quando eles não correspondem ao esperado.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. BREVE HISTÓRICO DA SÍNDROME XYY

A síndrome XYY, afeta exclusivamente indivíduos do sexo masculino. Caracteriza-se por um Y a mais em cada cromossomo, informação que diferiu na literatura pesquisada. Ainda verificou-se diferença na literatura pesquisada quanto aos aspectos fenotípicos, aos níveis de testosterona, e a tendência em gerar indivíduos com outras síndromes genéticas. Entende-se que esses fatores possam diferir de indivíduo para indivíduo, não sendo o duplo Y determinante, nesses fatores.

Na população, a incidência é de 1 indivíduo nascido com a síndrome para cada 1.000 nascimentos. Não há ocorrências de novos casos estarem relacionados à transferência genética (pai para filho), os casos pesquisados são os mesmos da população geral.

As maiores das pessoas apresentam dois cromossomos, XX se tiver características sexuais femininas e XY para os que nascerem com características sexuais masculinas. No caso do indivíduo XYY, O Y a mais ocorre no momento da divisão celular, o espermatozóide oferece uma cópia extra do cromossomo Y, assim cada célula ao invés de receber 46 cromossomos, ele terá 47, sendo esse Y a mais.

Síndrome XYY, ou Síndrome de Jacobs, foi pela primeira vez relatada em 1961 por Sandberg et al. O indivíduo estudado era do sexo masculino, apresentava um ligeiro déficit cognitivo e dificuldade em manter-se empregado. A maioria de seus filhos não puderam ser avaliados geneticamente, pois foram para a adoção.

Em 1963, Hambert investigou num hospital sueco indivíduos com déficit cognitivo. Nesse estudo constatou-se a síndrome XYY não estava associada com aqueles que cometiam delitos.

Em 1965, Jacobs¹ investigou pessoas num hospital psiquiátrico na Escócia, no qual, 3% (09 indivíduos) apresentaram a síndrome. A diferença fenotípica relatada foi a estatura elevada desses pacientes. Nesse estudo os autores relatam comportamento agressivo e tendência a atos criminosos.

¹ Jacobs, nome dado a síndrome devido aos estudos de Patricia Jacobs ET al. Escocesa, geneticista. Seus estudos ficaram conhecidos devido a pesquisas no Hospital de Segurança Máxima na Escócia, em 1965. Dos 197 pacientes com QI abaixo do normal, sete eram portadores da síndrome XYY, sendo que do total do hospital 1,2% era portadores da síndrome, fato que associou a maior incidência da síndrome entre os ingressos do sistema prisional.

Em estudos posteriores, desses 09 indivíduos, 07 deles tinham Q.I. abaixo da média, entre 60 a 80. Esses homens tinham a personalidade impulsiva e que haviam cometido crimes por atitudes irresponsáveis e não pensadas. E que 05 dentre os 09 homens tiveram sérios problemas com figuras de autoridade, como professores e até mesmo a Polícia. Tinham vários registros por pequenos delitos.

Ainda esses homens tinham dificuldade em traçar planos para o futuro, e quando tinham planos eram irreais. Eram incapazes de manter emoções saudáveis, sentiam-se frustrados com frequência. Dificuldade em interpretar as emoções dos seus pares, e de manter relações sociais empáticas e duradouras.

Em 2012, geneticistas europeus e norteamericanos, concluíram que os 10% de Q.I. abaixo da média relacionavam-se ao baixo nível socioeconômico e não exatamente a síndrome e o que é confirmado é a tendência ao comportamento antissocial. Essas condições poderiam contribuir a prática de pequenos crimes e de agressividade, segundo estudos.

Pesquisas mais recentes, que contam com a ampliação dos estudos da neurociência, demonstram que as principais características relacionadas à síndrome do duplo Y, incluem dificuldade de aprendizagem, atraso no desenvolvimento de habilidades de fala e linguagem. Apresentam atraso no desenvolvimento de habilidades motoras, até mesmo para sentar e caminhar e tônus muscular hipotônico. São comuns tremores nas mãos e movimentos involuntários, como tiques motores.

Os problemas comportamentais e sociais também aparecem nos estudos relacionados à síndrome. Esses problemas incluem o TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, depressão, ansiedade, e TEA - Transtorno do Espectro Autista, esse fato explica o motivo de Felipe ter sido diagnosticado na primeira infância com o TEA. Interação social pobre, dificuldade na comunicação, inabilidade nas relações sociais.

Quanto às características de aparência física (fenótipo), incluem o aumento da gordura abdominal, a cabeça grande (macrocefalia), dentes maiores que a média (macrodontia), pés chatos (pés planus), quintos dedos que se curvam para dentro (clinodactilia), olhos amplamente separados (hipertelorismo ocular), também escoliose. Características, essas não aparecem na sua totalidade, porém são predominante nos casos.

2.2. A SÍNDROME E O DETERMINISMO SOCIAL

Na literatura estudada, encontra-se um pensamento dubio, de um lado associado à síndrome XYY ao caráter da tendência à delinquência e à criminalidade e outro não associando a síndrome a essa tendência. Nos estudos de Jacobs, dos criminosos psiquiátricos estudados observou-se o aumento em relação a população geral de 0,2%. A partir daí, a síndrome foi associada ao comportamento criminoso. Apesar de constatar um número ínfimo de pessoas pesquisadas, 09 indivíduos de um determinado Hospital na Escócia (Penitenciária para pessoas com transtornos mentais). Os outros estudos, prévios e posteriores não foram tão enfáticos quanto à tendência criminosa entre os portadores de tal síndrome.

Estudos mais recentes associam a delinquência, ao comportamento agressivo e violento a carência de oportunidades, a baixa escolarização, e a carência de estímulos, e ainda a formulação das leis que tendem a criminalizar a população mais carente de recursos econômicos.

Precisa-se levar em conta ainda que “(...) o fato de existir ainda um significativo preconceito relativamente à associação destas alterações cromossômicas a comportamentos agressivos e antissociais, quer na população geral quer entre os profissionais de saúde.” COSTA, 2017

As neurociências trouxeram o conceito de neuroplasticidade “como propriedade do sistema nervoso de alterar a sua função ou a sua estrutura em resposta às influências ambientais que o atingem” (LENT, 2018). Sabe-se que na infância essa capacidade é ainda maior, na qual, períodos críticos para cada aprendizado, também chamada de janela de oportunidade.

Espaço de atuação do neuropsicopedagogo, que através de testes padronizados qualitativos e quantitativos, encontra habilidades, potencialidades do indivíduo a fim de aprimorá-las. Na fase de avaliação aqueles aspectos motores, cognitivos, afetivos e pedagógicos que aparecem déficits são necessárias intervenções substanciais, nos sentido de aumentar sua potencialidade nessas áreas.

A chance do indivíduo alterar seu comportamento dependerá das oportunidades que o circundam, contando com a presença de profissionais da saúde e da educação, entendendo que novas trajetórias podem ser criadas, assim *“meu fenótipo, neste momento, foi determinado pela norma de reação de meu genótipo à sucessão de ambientes que encontrei durante a vida; meu fenótipo daqui a dez anos será determinado pelo meu genótipo modificado pelas respostas dadas aos ambientes que terei encontrado nesse meio-tempo”* (COSTA, 1970)

2.3. ESTUDO DE CASO

A gestação de Felipe foi sem intercorrências. O parto também. Nasceu a termo. Peso ao nascer 3.600. Apgar 1º, 2º. Parto cesáreo. Desde bebê era agitado. Aos dois meses já não dormia durante o dia. O desenvolvimento neuropsicomotor foi com um pequeno atraso. Atraso de dois ou três meses do esperado. Nada que chamasse a atenção do pediatra.

Aos 02 anos brincava enfileirando os objetos. Parecia metódico e precisava de rotina para manter-se estável. Quando foi para a educação infantil começou a aparecer maiores sintomas. Irritado quando frustrado. Interação social pobre. Foi dizer seu nome após os dois anos. Porém dormia bem à noite. Não chorava. Não houve desconfiança de qualquer alteração até 2014. Nesse ano ele teve uma espécie de surto. A mãe procurou ajuda médica, no qual, iniciaram-se as suspeitas.

O diagnóstico de TEA ocorreu somente aos 05 anos de idade no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil de São José - CAPSi. Boa saúde geral. Precisa usar lentes corretivas, porém no momento não usa porque a mãe cansou de comprar óculos. Já quebrou vários. Tem astigmatismo -2,75. Às vezes apresenta enurese noturna, raramente, mas ainda acontece de ter encoprese diurna. Primeiramente o diagnóstico foi de TEA, após de TDAH.

No ano de 2018 foi atendido por Neuropediatra, que após exames genéticos (cariótipo) recebeu o diagnóstico de trissomia XYY ou síndrome de Jacobs.

Quando menor era super organizado. Ao ir ao supermercado gostava de arrumar as prateleiras (03 anos). Hoje não é mais assim. Bagunça tudo. O quarto nem dá pra entrar. Até o terceiro ano escolar estudou numa escola particular. Nessa escola apresentava péssimo desempenho acadêmico e comportamental. Quando desejava o lanche do colega o pegava, corria para o banheiro para comer. Mudou nesse ano para a escola pública e teve uma ligeira melhora. Lia bem pouco no 3º ano. Nessa atual escola com a professora auxiliar, já lê tudo. Faz todas as tarefas sem ajuda.

Com o desenvolvimento, tem melhorado gradativamente o comportamento. Atualmente, não agride as pessoas. Quando menor jogava os objetos nas pessoas. Hoje, quando frustrado quebra os objetos.

2.3.1. RELATO DA AVALIAÇÃO NEUROPSICOPEDAGÓGICA

Nos jogos que envolviam criatividade, raciocínio, memória de curto prazo foi muito bem. Dificuldade no registro das informações e de fazer o passo a passo dos problemas de raciocínio lógico. Precisa aumentar seu tempo de concentração nas atividades. Explorar mais os jogos até esgotarem-se todas as possibilidades.

Felipe demonstrou impulsividade já no primeiro dia de avaliação. Chega ao local de atendimento, entra rapidamente no refeitório, na cozinha, na sala de grupos. Abre a geladeira mexe em tudo. Parece não ter limites. Trouxe pronto em recipiente plástico macarrão instantâneo (eram 17 horas). Ele mesmo que preparou, informou a mãe. Chegou com o macarrão, foi até a cozinha. Encontrou um sachê de molho pronto. Abriu e colocou em seu macarrão. Ignorando que, com certeza, o molho era de outra pessoa. E que precisava de autorização para fazê-lo.

No segundo dia de encontro, estando a mãe na recepção, ele vai até a sala de brinquedos, pega uma pá de plástico, vai até o pátio. Pega terra da horta e coloca uma boa quantidade de terra no carro da psicóloga e do médico psiquiatra. Não demonstra culpa pelo ocorrido. Quando censurado baixa a cabeça. O movimento do corpo não combina com a mímica facial, que é sem expressão.

Ao chegar ao consultório deseja escolher a atividade que quer fazer. Geralmente brincar, com brincadeiras que exigem movimento e força. Conversa-se sobre suas atitudes. Ele ouve com atenção, pede desculpas. Embora não se observou empatia com as pessoas que foram prejudicadas.

Durante as avaliações que exigiam a escrita ele não conseguiu completá-las, a letra é grande, e, ainda em momentos cursiva, outros caixa alta. Fez birra algumas vezes. Quando sabia responder fazia rapidamente. Na maioria das vezes de maneira oral, tendo bastante dificuldade no registro das informações.

Para fazer a avaliação de linguagem não queria responder as questões até o final. Sabia verbalizar as respostas sem precisar remeter novamente ao texto. Demonstrou ótima memória de curto prazo. Não aceitou ler o texto (nem em voz baixa ou alta). Apenas ouviu.

Tem o raciocínio rápido quando precisa solucionar problemas do cotidiano. Apresenta não apenas uma solução, mas é capaz de apresentar várias para o mesmo problema. É bastante criativo é capaz de criar jogos com facilidade.

Na Avaliação Lúdica fomos até a sala de brinquedos do CAPSi, estão disponíveis bolas, jogos de montar de peças grandes e pequenas, quebra-cabeças, cavalinhos e carrinhos, dentre outros. Foi proposto que escolhesse vários brinquedos e que levássemos a outra sala. O paciente é fechado a novas experiências, brinca somente com aquilo que já está acostumado. Quando sugiro um brinquedo ou brincadeira diz não conhecer e rejeita. Apesar do estímulo e sugestão de alguma brincadeira nova ele não aceita. Escolheu um skate de plástico, várias bolinhas, jogo de peças de montar, morcego equilibrista, dentre outros. O skate de plástico era frágil. Quebrou o skate, continuou brincando mesmo assim. Avisei-o que estava quebrado ele ignorou e continuou brincando.

Dados obtidos na observação lúdica: Iniciativa; Começa a brincar logo; Muda de brinquedo com frequência; É impulsivo; Não repete a brincadeira; Utiliza o brinquedo de acordo a função; Arrasta-se. Prefere estar no chão a utilizar a cadeira; Pouca ou quase nenhuma expressão facial; Usa mais força que o necessário; Criou estratégia para ganhar o jogo; Muita criatividade; Tolerante ao perder o jogo; Dificuldade na fala – se expressa mais por palavras que frases bem estruturadas; Dificuldade em entender as convenções sociais de vestimenta e comportamento.

Na avaliação de memória de Aprendizagem e Avaliação da linguagem lembrou imediatamente das figuras com exceção de uma: cavalo. No lugar dessa palavra disse: sapo. Lembrou que ainda faltava um animal.

Foi entregue a mãe e a professora o teste de Swanson, Nolan e Pelham - SNAP IV, para avaliação do TDAH. Dados obtidos do SNAP IV (Escores): Mãe: Desatenção (>1,5): 1,33, Hiperatividade (>1,5): 2,33, Comorbidade: (>1,5): 0,5 Professora: Desatenção (>1,5): 0,33, Hiperatividade (>1,5): 0,55, Comorbidade: (>1,5): 0,87.

Conclui-se que pela avaliação da mãe a criança é bem mais hiperativa que desatenta. Mãe não observa comorbidade. Para a professora o paciente não apresenta TDAH.

Fez com rapidez o teste de Raciocínio Lógico. Os primeiros problemas foram resolvidos com rapidez. Quando ficaram mais complexos negou-se a responder. Não faz contas. Faz cálculos mentais. Não registra.

Foi utilizada a Escala CARS. ChildHood Autism Rating Scale. Schopler, E; Reichler, RJ; Renner, BR. Essa escala foi utilizada para testar o autismo diagnosticado na infância. Apresenta 15 itens. “É sensível na distinção entre o autismo e outros atrasos no desenvolvimento” (Teixeira, 2016)

Teste de Funções executivas. Trilhas e Atenção por Cancelamento. Utilizado o livro da Memnon: Atenção e funções executivas. Volume 1. Como de costume fez rapidamente os testes. Foram testadas a atenção seletiva, atenção alternada e atenção sustentada. Apresentando os seguintes resultados: Atenção alternada: 72%, Atenção seletiva: 63%, Atenção sustentada: 86%.

Teste de Funções executivas. Torre de Londres O teste Torre de Londres (TOL) avalia a capacidade de decisão estratégica e de resolução de problemas em crianças de 04 à 13 anos. Baseia-se na utilização de um instrumento (incluso na caixa) que é constituído por três cavilhas de comprimentos diferentes, em que são colocadas três bolas (uma vermelha, uma verde e azul): a pessoa deve mover estas bolinhas em um determinado número de movimentos de modo a obter a configuração indicada pelo examinador.

Nesse teste obteve os resultados: Escore total: 29; Pontuação padrão: 107 (tabela).

Classificação: Pontuação-padrão entre 85 e 114: MÉDIA.

Para o comportamento motor foi utilizado o Test Gross Motor Development - TGMD-2. O TGMD-2 consiste em uma bateria de testes que avalia 12 habilidades motoras fundamentais (HMFs) divididas uniformemente em dois subtestes: habilidades de locomoção (corrida, galope, salto com um pé [saltitar], salto por cima, salto horizontal e deslocamento lateral) e de controle de objetos (rebater, quicar, agarrar, chutar, arremessar e rolar) ULRICH, 2000. A soma dos escores das seis habilidades em cada subteste é chamada de escore bruto

(EB) e varia de 0 a 48 para cada subteste. A pontuação mais alta indica maior proficiência e desenvolvimento. A soma dos escores dos dois subtestes resulta no quociente motor geral (QM), que pode chegar a 96.

No TGMD-2, além da soma dos escores das seis habilidades em cada subteste, pode ser utilizada a classificação por percentil, com base na idade e no sexo da criança. Altos escores na habilidade e posição elevada na classificação por percentil indicam que as crianças atendem aos critérios de desempenho e são competentes no aspecto motor (ULRICH, 2000).

Os Resultados obtidos foram: Habilidades de locomoção - Correr, galopar, saltitar, salto sobre obstáculo, salto horizontal e corrida lateral. Pontuação: 02 acertos - 04 erros; Controle de objetos - Rebater, quicar, receber, chutar, lançar e rolar a bola. Pontuação: 04 acertos - 02 erros. Dados que vieram a corroborar com a dificuldade motora para os portadores de síndrome XYY.

2.3.2. RELATO DA INTERVENÇÃO NEUROPSICOPEDAGÓGICA

A partir das avaliações considerou-se traçar metas para a melhoria do quadro de dificuldades motoras (fina e ampla), atenção e concentração.

A atividade foi Estimulação Cognitiva. Objetiva a concentração. Ele pedia para que eu lesse os enunciados. Demonstrou insegurança em não entender o que era pra fazer. Deixei-o bem a vontade para ler, voltar, perguntar. Ele leu sozinho e tentou resolver por si mesmo após sentir-se seguro.

Fez todas as fichas propostas corretamente. Ao terminar perguntava: - Está certo? Termina a atividade com sucesso.

Atividade: coordenação motora ampla e fina Teia de aranha – coordenação motora ampla. Consiste em prender em cada lado da sala o barbante, de tal forma que pareça uma espécie de teia. Passou pela “teia” ida e volta várias vezes. Chamou os profissionais do CAPSi para participar, a mãe também.

Outra atividade para o desenvolvimento da coordenação motora foi separar alimentos nos recipientes com pegador de macarrão. Alimentos escolhidos foram: balas coloridas, dois tipos de macarrão. Esses alimentos estão misturados num pote maior. Precisaram ser separados com um pegador de macarrão. Teve dificuldade para iniciar a atividade, se adaptar em segurar o pegador de macarrão. Tentou pegar com a mão os alimentos. Mas em seguida se adaptou e foi até o final. Relatou que sentia o mesmo cansaço na mão quando escrevia muito. É orientado sobre uns segundos de pausa e voltar a atividade, quando isso ocorrer.

3ª atividade: Grafismo às cegas. O E.V.A. foi fixado na parede numa altura acessível para a criança desenhar de tal forma que fique sentada no chão de forma confortável. Os olhos foram vendados e uma caneta entregue em sua mão. Oriento a tatear a folha para que saiba onde ela está. A partir daí o desenho é livre.

Felipe atingiu parcialmente o objetivo, pois fez um desenho de uma figura humana, porem confessou para fazer a cabeça (círculo) tirou um pouco a venda para dar uma “espiadinha”.

Xadrez. Combina-se em ler as regras. Não aceita ler. Vamos logo para o jogo. Ele disse que não sabia jogar, mas após iniciarmos demonstrou ter conhecimento do movimento das peças. Aceita bem as regras, concentra-se no jogo até o final. Nos demais dias após terminar a atividade sugiro jogar uma partida. Entretanto, nos demais dias não teve mais interesse. A motivação para a mesma atividade é bastante oscilante.

Coordenação Motora fina Massinha e argila. Felipe se propôs a fazer uma cidade à beira do mar. Fez um mar de massinha azul. Daí iniciou a fazer um prédio. Tentou fazê-lo quadrado, não conseguia. Sugeri o uso de uma régua. Ele fez birra.

Saímos da sala com objetivo de relaxar para que Enzo se acalmasse e para voltar à atividade.

Deixei-o andar um pouco de patinete (foi pega na sala de brinquedos). Então, chegou a hora de retornar. Fez birra de novo. Conversamos um pouco sobre sua ida ao 5º ano e seu aniversário em fevereiro, no qual fará 10 anos. Sugiro que fale de seus sentimentos naquele momento. Mas, não passaram de meras repetições: - Eu não quero!!!

Observa-se que quando atividade torna-se difícil para ele é bem mais fácil desistir. Não se sente triste por não ter feito. A dor de não conseguir mostrou-se superior da frustração de não ter tentado.

As metas iniciais foram atingidas no sentido de as avaliações foram realizadas e intervenções feitas. As metas intermediárias e finais não foram atingidas, pois há necessidade de maior tempo de atendimento neuropsicopedagógico. Em alguns momentos pela dificuldade de adesão do paciente.

Nenhum rótulo cabe ao Enzo. O estereótipo clássico de TEA, de TDAH e de trissomia XYY, nenhum deles é adequado para defini-lo. Ele é único. Por isso, que nenhum protocolo já pronto daria conta de atendê-lo com eficiência.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a Neuropsicopedagogia Clínica, pode em muito contribuir para o desenvolvimento de Felipe e de outros portadores da Síndrome nas áreas, emocionais, pedagógicas, motoras e cognitivas.

O diagnóstico prévio de quaisquer síndromes, transtornos ou deficiências é extremamente importante para influenciar a qualidade de vida desses indivíduos, gerando a oportunidade de um tratamento mais eficaz. Considerando que as crianças e adolescentes são sujeitos em desenvolvimento, compreendendo assim, que não estão prontos.

Nesse sentido, com os estímulos educacionais e sociais adequados podem constituir-se em pessoas felizes e capazes de viver sua capacidade humana em sua totalidade, contribuindo com a comunidade em que vivem.

As avaliações realizadas vieram a corroborar o que descreve a literatura pesquisada sobre as características da Síndrome. Entender substancialmente os limites e potencialidades do portador da Síndrome XYY, trará um melhor prognóstico para o paciente.

O paciente não precisa ser contido, sentar, escrever, não se sujar! Precisa aprender novos comportamentos. A capacidade de neuroplasticidade está presente capaz de “alterar a sua função ou a estrutura em resposta às influências ambientais que o atingem” (LENT, 2008)

Todos os indivíduos, inclusive os portadores da Síndrome XYY estão inseridos em contextos sociais mutantes. O genótipo diz muito sobre ele, mas não tudo. O ambiente social, sua família, escola e as oportunidades, os tratamentos que terá acesso ou não, influenciarão em quem será esse indivíduo.

O trabalho precisa ser multidisciplinar, contando com todos os profissionais envolvidos, de saúde, educação, e principalmente a família. Atendimentos pontuais e fragmentados, não demonstram resultados esperados.

Nosso paciente é único, assim como qualquer outra criança, para tal, um bom plano terapêutico individual, paciência, e profissionais comprometidos, dentre eles o Neuropsicopedagogo, atingiremos os objetivos.

REFERÊNCIAS

- [1] LENT, Robert (coordenador). Neurociência da mente e do comportamento. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2018
- [2] PAPALIA, Diane E.; FELDMAN, Ruth Duskin. Desenvolvimento Humano. 12ª edição. Artmed. Porto Alegre, 2013
- [3] RUSSO, Rita M.T. – Disciplinas: Fundamentos e Prática em Equipe Multiprofissional IV – Linguagem e V Habilidades Matemáticas, Avaliação e Intervenção e Estágio Supervisionado em Neuropsicopedagogia.
- [4] RUSSO, Margarida Toler. Neuropsicopedagogia Clínica. Introdução, Conceitos, Teoria e Prática. Editora Juruá. Curitiba, 2015
- [5] SEABRA, Alessandra Gotuzo e DIAS Natália Martins (organizadoras), Avaliação Neuropsicológica Cognitiva (1) – Atenção e funções executivas. Editora Memnon. São Paulo, 2012
- [6] TEIXEIRA, Dr. Gustavo. Manual do autismo. Editora BestSeller. 5ª edição. Rio de Janeiro, 2016
- [7] TEIXEIRA, Dr. Gustavo. Desatentos e hiperativos. Editora BestSeller. 6ª edição. Rio de Janeiro, 2017

<http://www.helioteixeira.org/ciencias-da-aprendizagem/teorias-e-conceitos-chava-o-que-e-cognicao/> Acesso: 03/02/2019

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-03072018000100006&lng=pt&nrm=iso. Acesso: 03/02/2019

<https://sites.google.com/site/marciocandiani/escala-cars-para-avaliacao-de-autismo> Acesso: 02/02/2019

<https://sbnpp.org.br/> Nota técnica nº 02/2017 Acesso: 03/02/2019

www.scaswebsite.com/docs/preschool-portuguese.doc Acesso: 01/02/2019

<https://www.webartigos.com/artigos/sindrome-de-jacobs-xyy/69746> acesso em 02/02/2019

bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/abpa/article/view/16621/15433 acesso em 02/02/2019

<https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/109336/2/234162.pdf> Dissertação de mestrado Acesso: 03/02/2019

<https://www.webartigos.com/artigos/sindrome-de-jacobs-xyy/69746> acesso em 02/02/2019

<https://ghr.nlm.nih.gov/condition/47xyy-syndrome> acesso em 02/02/2019

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gtr/conditions/C3266843/#> acesso em 03/02/2019

Capítulo 18

Tuberculose: Perfil sociodemográfico e frequência de abandono ao tratamento em hospital de referência no município de João Pessoa-PB

Camyla Caroliny Neves de Andrade

Leônia Maria Batista

Luciana Lucena Aranha de Macedo

Resumo: A tuberculose é uma das mais antigas doenças que acometem a humanidade. É uma doença infecciosa e transmissível, causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, atinge principalmente os pulmões, podendo também, manifestar-se em outros órgãos. O objetivo desta pesquisa foi delinear o perfil sociodemográfico e a frequência de abandono ao tratamento de usuários com tuberculose atendidos no hospital de referência do município de João Pessoa-PB. Para isso, foi realizado um estudo descritivo, documental e retrospectivo com abordagem quantitativa, durante o mês de fevereiro de 2017. A coleta de dados foi realizada por meio dos prontuários dos usuários do serviço. Os dados obtidos foram sumarizados e analisados por meio do programa IBM SPSS Statistics versão 20.0. Verificou-se que a maioria dos usuários com tuberculose eram do sexo masculino (65,7%), tinham idade entre 18-49 anos (69%), eram solteiros(as) (52%), possuíam ensino fundamental incompleto (35%), eram trabalhadores assalariados (31%), com renda familiar de até 1 salário mínimo (45%), de cor parda (48%), e eram procedentes da cidade de João Pessoa (56%). A maioria era não tabagista (68%) e não etilista (75%), e 18% utilizavam drogas ilícitas. Houve baixa prevalência de coinfeção com HIV/SIDA (14%). Em relação aos exames de diagnóstico, a baciloscopia foi a mais realizada (78%), destas, 78% deram positivas, seguido do exame radiológico (82%), destes, 87% deram sugestivos, a cultura foi realizada em 52% dos casos, e 62% positivas. Quanto a forma de admissão, 47% foi de retorno após abandono, e a forma clínica mais prevalente foi a pulmonar (88%), o esquema terapêutico mais utilizado foi o básico (93%). Em relação à frequência de abandono, observou-se que 49% já abandonaram o tratamento pelo menos uma vez (60%). A situação de encerramento foi na maioria dos casos alta por cura (44%), seguida de abandono (37%). Dessa forma, observou-se que a frequência de abandono ao tratamento foi elevada quando comparada a outros estudos, como também, acima do recomendado pelo Ministério da Saúde. Portanto, faz-se necessário maior incentivo por parte das organizações de saúde com ações de conscientização para os indivíduos com tuberculose, de forma a reduzir o abandono, bem como, a não adesão ao tratamento.

Palavras-Chave: Tuberculose; perfil sociodemográfico; abandono ao tratamento; não adesão.

1. INTRODUÇÃO

A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa transmitida pelas vias aéreas e provocada na maioria dos casos pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis* (também conhecida como bacilo de Koch-BK), podendo ser causada também, porém mais raramente, por outras espécies como a *Mycobacterium bovis*, *M. africanum* e *M. microti*. Pode acometer vários órgãos como os gânglios linfáticos, rins, ossos e meninges, mas os órgãos mais comumente atingidos são os pulmões, e manifestar-se clinicamente de inúmeras maneiras (KOZAKEVICH; SILVA, 2016; DALTRO, 2012).

É uma das doenças mais antigas da humanidade. Estima-se que o *Mycobacterium* teve origem há cerca de 150 milhões de anos, matando mais pessoas do que qualquer outro microrganismo patogênico. Existem relatos da doença em múmias egípcias, em trechos de livros hebraicos bíblicos, em antigos escritos chineses, e em estudos de Hipócrates na Grécia antiga, registrando o aparecimento letal do patógeno nas principais civilizações (KOZAKEVICH; SILVA, 2016).

Embora tenha sido prevalente na antiguidade, sua ampla expansão e disseminação ocorreu durante o período colonial, surgindo como a grande epidemia do século XVIII. Durante o século XVIII, quase 100% da população europeia foi infectada, e cerca de 25% dos adultos morreram. Impulsionada pela urbanização capitalista e pela aglomeração populacional das grandes cidades, a “grande peste branca”, como foi chamada a epidemia, continuou por mais de 300 anos, diminuindo sem nenhuma interferência humana. A razão para esse fato continua confusa, entretanto, considera-se que a melhoria das condições habitacionais, relacionada com uma imunidade deixada da seleção da população geneticamente resistente e melhoria dos hábitos alimentares, tenham contribuído para essa diminuição (KOZAKEVICH; SILVA, 2016).

A TB é transmitida, sobretudo pela via aérea, de pessoa a pessoa, por meio de um indivíduo bacilífero (doente que elimina bacilos no ar ambiente), que possui lesão pulmonar ou laríngea e que, ao tossir ou falar, expeli na atmosfera gotículas de secreção. A TB não é transmitida por meio do compartilhamento de escovas de dente, da comida, bebida, de apertos de mão ou beijo (COSTA *et al.*, 2012; CDCP, 2012; FERRI, *et al.*, 2014; BUSATTO *et al.*, 2015).

As gotículas contaminadas com o bacilo mais pesadas depositam-se no solo rapidamente, enquanto que as mais leves podem continuar em suspensão por várias horas. Quando essas gotículas são inaladas por pessoas saudáveis, provocam a infecção por *M. tuberculosis* e o risco de desenvolver a doença, pois alcançarão os alvéolos, onde os microrganismos podem se estabelecer e se desenvolver (COSTA *et al.*, 2012; BUSATTO *et al.*, 2015).

Diversos fatores facilitam o adoecimento do indivíduo tornando-o mais susceptível à manifestação da infecção, o que vai além da inalação do bacilo. É preciso também que o sistema imunológico esteja afetado. De acordo com o sistema imunológico esses fatores estão relacionados a idade avançada, ao estado nutricional do indivíduo, ao tabagismo e/ou etilismo, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) e/ou diabetes, ao uso de medicamentos imunossupressores, a históricos de gastrectomias, a insuficiência renal crônica, a paracoccidioidomicose, a leucoses, tumores, dentre outros. São consideradas também outras variáveis como carga bacilífera e a virulência do microrganismo que influenciam na manifestação da doença em indivíduos imunocompetentes (MELO *et al.*, 2009; COSTA *et al.*, 2012; BUSATTO *et al.*, 2015).

Quando os bacilos de Koch entram em contato com o indivíduo, podem acontecer três situações distintas: a resposta imune suprimir completamente o bacilo; o sistema imune não conseguir impedir a replicação dos bacilos, ocasionando a tuberculose primária e o sistema imune conseguir reprimir as bactérias em um granuloma, tornando-o latente, com futura possibilidade de desenvolvimento da tuberculose pós-primária ao esquivar-se do sistema imune (NORBIS *et al.*, 2013; FERRI, *et al.*, 2014).

A contaminação inicia a partir do momento que os BKs chegam aos alvéolos através do trato respiratório. Os bacilos são facilmente fagocitados por macrófagos alveolares que comumente conseguem destruir a bactéria, por meio da resposta imune inata do hospedeiro. Se passarem dessa primeira etapa de defesa, as bactérias iniciam sua multiplicação no interior dos macrófagos e espalham-se para as células adjacentes, como células epiteliais e endoteliais. Podendo migrar também para diferentes órgãos, por meio do sistema linfático e circulatório, atingindo assim uma elevada carga bacteriana em curtas semanas (DELOGU; SALI; FADDA, 2013; FERRI, *et al.*, 2014).

Posteriormente a reação inflamatória do sistema imune inato, o sistema imune adaptativo induz à translocação de linfócitos, neutrófilos e diferentes células imunes ao local primário de infecção (pulmonar), compondo um infiltrado celular que, depois, adquire a forma de um granuloma. Os bacilos

ficam abrigados e latentes dentro do granuloma, conservados pela resposta imune. Por motivos não esclarecidos, o sistema imune deixa controlar os bacilos e eles replicam-se descontroladamente, tornando a doença ativa, com a apresentação seguinte de sinais e sintomas (FERRI, *et al.*, 2014; DELOGU; SALI; FADDA, 2013).

A tuberculose, ao se deslocar para outros órgãos, é denominada de extrapulmonar, podendo ocorrer concomitantemente ou específica à forma pulmonar (NORBIS *et al.*, 2013). No início, em alguns casos, a TB pode apresentar-se sem sintomas específicos ou sem sintoma algum. Nessas circunstâncias, os riscos epidemiológicos do paciente, como viagens ou residência em áreas com prevalência conhecida de TB devem ser levados em consideração (FERRI, *et al.*, 2014).

Os sintomas da TB pulmonar ativa são tosse, às vezes, com muco ou sangue, dor torácica, fraqueza ou cansaço, perda de peso, febre e sudorese noturna. A tosse sanguinolenta está relacionada às etapas finais ou tardias da doença. Na forma latente, não são observadas manifestações dos sintomas (CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2012; WHO, 2014; FERRI, *et al.*, 2014).

O diagnóstico clínico da TB se dá através de manifestações que incluem tosse prolongada com duração de mais de três semanas, dor no peito, hemoptise, febre, sudorese noturna, perda de apetite, emagrecimento e fadiga. Além desse quadro clínico, é necessário realizar o diagnóstico laboratorial por meio de exames bacteriológicos, achados radiológicos, histopatológicos, imunológicos e moleculares, entre outros (WHO, 2012; COSTA *et al.*, 2012; ZOCHE; SILVA, 2009).

Os exames bacteriológicos envolvem essencialmente dois, a baciloscopia e a cultura para micobactérias. A baciloscopia é o método prioritário e mais utilizado na rotina dos serviços públicos de saúde devido a sua rapidez e menor custo. A pesquisa de BAAR é realizada através de esfregaço de amostra clínica, com observação ao microscópio de campo claro. O escarro é a amostra clínica mais utilizada. O material colhido deve ser proveniente da árvore brônquica, obtido por tosse profunda após a lavagem prévia da boca. (COSTA *et al.*, 2012; BUSATTO *et al.*, 2015).

Pelo fato de ser um método simples e seguro, deve ser realizado por todo laboratório público de saúde e pelos laboratórios privados habilitados. A baciloscopia do escarro, desde que realizada corretamente em todas as suas fases, permite a detecção de 60% a 80% dos casos de TB pulmonar, o que do ponto de vista epidemiológico é muito importante, visto que os casos bacilíferos são os responsáveis pela continuação da cadeia de transmissão (BUSATTO *et al.*, 2015).

As amostras comumente conduzidas para a análise do BK são escarro, lavado broncoalveolar, lavado brônquico, dentre outras, interligadas ao trato respiratório. Exames bioquímicos e radiológicos, como hemograma, podem colaborar no diagnóstico, guiando o médico para os testes mais específicos (CHANG *et al.*, 2008; FERRI, *et al.*, 2014).

O outro exame bacteriológico utilizado é a cultura. A cultura é um método de elevada especificidade e sensibilidade no diagnóstico da TB pulmonar e extrapulmonar. Os métodos clássicos para cultura de micobactérias utilizam a semeadura da amostra em meios de cultura sólidos (BUSATTO *et al.*, 2015; FERRI, *et al.*, 2014).

A cultura para BAAR é indicada nos casos de suspeita clínica, por causa de sintomas respiratórios, em situações com suspeita de baixa quantidade de bacilos, de coletas complicadas ou suspeita de TB extrapulmonar; exame de radiologia indicativo e baciloscopia repetidamente negativa; contato com pessoas infectadas por TB resistente a drogas; pacientes com antecedentes de tratamento prévio; pacientes imunodeprimidos, como os infectados por HIV, com finalidade de realizar o teste de sensibilidade a antimicrobianos (FERRI, *et al.*, 2014; BRASIL, 2008).

O diagnóstico da TB utilizando o exame histopatológico é realizado a partir da biópsia de tecidos que apresentam suspeita clínica da doença, tanto da forma clínica pulmonar como extrapulmonar. A confirmação diagnóstica é feita através da descoberta de lesão granulomatosa com ou sem necrose caseosa e também pela presença de BAAR no local da lesão (BRASIL, 2002; COSTA *et al.*, 2012).

A radiografia de tórax consiste também em um método diagnóstico de grande importância na investigação da TB. Deve ser solicitada para todo o paciente com suspeita clínica de TB pulmonar. Todavia, até 15% dos casos de TB pulmonar não demonstram alterações radiológicas, especialmente pacientes imunodeprimidos. O exame radiológico, em pacientes com baciloscopia positiva, tem como função principal a eliminação da suspeita de doença pulmonar associada (por exemplo, câncer de pulmão) que precise de tratamento concomitante. O estudo radiológico tem, ainda, função importante na diferenciação

de formas de TB de apresentação atípica e no diagnóstico de outras neuropatias no portador de HIV/AIDS ou de outros casos de imunodepressão (BUSATTO *et al.*, 2015).

Os testes imunológicos e moleculares também têm sido utilizados na descoberta da TB. Os testes imunológicos realizados são o teste tuberculínico e exames de liberação de interferon-gama. O teste tuberculínico é caracterizado pela inoculação via intradérmica da tuberculina e observar o aparecimento na pele de uma reação tardia de hipersensibilidade, após 48 e 72 horas. Devido a vacinação da população, esse teste possui baixa especificidade contra o *Bacillus Calmette-Guérin* (BCG) de *M. bovis* ou contra os que tiveram contato com alguma micobactéria não causadora de tuberculose (CHEE *et al.*, 2013).

O tratamento da TB baseia-se no uso conjunto de vários fármacos anti-tuberculose (anti-TB). Sendo necessário que possuam atividade bactericida, e que sejam capazes de prevenir a manifestação de bacilos resistentes e tenham atividade esterilizante. (VRANJAC, 2010).

A terapia empregada nesse tratamento possui capacidade de curar aproximadamente 100% dos casos novos, como também diminuir a taxa de mortalidade, o período de transmissão e, pode ainda, evitar que pessoas contaminadas evoluam para o adoecimento (BRASIL, 2002c; NAST, 2011).

Para que o tratamento seja iniciado é preciso que exames de cultura de escarro, baciloscopia, raios-X e prova tuberculínica (PPD) sejam realizados com o intuito de conter o aparecimento de bacilo resistente ao esquema do tratamento, evitando o abandono desses pacientes tuberculínicos (BRASIL, 2011; BERTAZONE; GIR; HAYASHIDA 2005; LIMA *et al.*, 2001; SILVA *et al.*, 2015).

Os esquemas terapêuticos no Brasil, para o tratamento da TB, são padronizados e tem suas doses distribuídas gratuitamente através dos programas ligados ao SUS. A escolha do esquema apropriado é feita de acordo com a forma clínica da doença, com a idade do paciente e com o histórico do tratamento anterior e seu resultado. Em todos os esquemas, os medicamentos são utilizados diariamente e devem ser administrados de preferência em uma dose única (BRASIL, 2002; NAST, 2011).

Os fármacos utilizados no tratamento da TB, rifampicina, isoniazida, etambutol, estreptomicina, etionamida e pirazinamida, são estabelecidos em esquemas de tratamento, que variam de acordo com a idade do doente, se é início de caso, se é regresso ao tratamento, após abandono, dentre outros fatores. Em todos os casos, deve-se realizar a cultura e o teste de sensibilidade a antibióticos (VRANJAC, 2010; FERRI, *et al.*, 2014).

Entretanto, devido à demora dos exames, todos os novos casos com baciloscopia positiva devem iniciar com uma terapia básica que é constituída por uma dose fixa combinada de rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol (RHZ/RHZE), nos primeiros dois meses, e por rifampicina e isoniazida (RH) nos quatro últimos meses, compondo, dessa forma, o regime de curta duração de 6 meses de tratamento. Para crianças (<10 anos de idade), são utilizados 3 medicamentos na 1ª fase (RHZ) e 2 medicamentos (RH) na 2ª fase. (JESUS *et al.*, 2012; SILVA *et al.*, 2015; BRASIL, 2011; FERRI, *et al.*, 2014).

O tratamento não se caracteriza apenas pela utilização dos medicamentos. É indispensável estabelecer uma conexão entre o usuário portador da tuberculose e o profissional de saúde, pois o recebimento de informações corretas acerca da doença e do tratamento promove uma boa relação do usuário com os profissionais da área da saúde, como também entre o usuário e o serviço de saúde, com a finalidade de estabelecer melhoras no prognóstico do tratamento do usuário. É necessário também retirar os obstáculos que atrapalham a adesão, lançando mão de estratégias de reabilitação social, aumento da autoestima, e melhora da qualificação profissional (BACHA, 2005; BRASIL, 2011; ANDRADE; VILLA; PILLON, 2005; ALBUQUERQUE *et al.*, 2001; HIJJAR *et al.*, 2007; SÁ *et al.* 2007; SILVA *et al.*, 2015).

A maior parte dos indivíduos portadores de tuberculose desistem pela dificuldade de consultas médicas, pela falta de apoio familiar, e pela não compreensão da doença potencializada pelo baixo nível de escolaridade, ou seja, são fatores predisponentes ao abandono do tratamento logo após o início deste (BRASIL, 2011; SILVA *et al.*, 2015). Contudo, os principais fatores para a desistência são os efeitos adversos, ocasionados pelos fármacos anti-TB, como náusea, vômito, dor abdominal, suor, prurido, dor articular, neuropatia periférica, hiperurecemia sem sintomas, hiperurecemia com artralgia, cefaleia, ansiedade, euforia e insônia (BRASIL, 2011). Dessa forma, observa-se que o tratamento da TB deve ter também acompanhamento psicológico e educacional para os pacientes (FERRI, *et al.*, 2014).

As reações aos medicamentos antituberculínicos são multifatoriais, os principais fatores relacionados são a dose, os horários de administração do medicamento, o estado nutricional, a idade, a utilização de álcool, as condições da função hepática e renal e a coinfeção pelo HIV (BRASIL, 2002c; NAST, 2011).

A adesão ao tratamento da TB é observada pelo o uso regular dos medicamentos, o cumprimento do regime prescrito e a presença regular às consultas médicas. Com a intenção de fortalecer a adesão ao tratamento e à prevenção do surgimento de cepas resistentes aos medicamentos, uma das últimas estratégias aconselhadas pela OMS foi o *Directly Observed Treatment Short-cours* (DOTS) que faz uso dos seguintes princípios: garantia da baciloscopia, vontade política, aquisição e distribuição regular de medicamentos, tratamento diretamente observado, e um sistema de informação adequado (BRASIL, 2002; NAST, 2011).

Diante disso, se torna importante conhecer os fatores que estão influenciando a adesão e não adesão ao tratamento da TB (KRITSKI *et al.*, 2007; NAST, 2011). Para que, com o conhecimento acerca do perfil dos usuários com tuberculose, sejam estabelecidas medidas de saúde com o objetivo de não só combater a transmissão da doença, mas também os agravantes causados pelo abandono e pela não adesão ao tratamento.

2. METODOLOGIA

O trabalho consistiu em um estudo descritivo, documental e retrospectivo com abordagem quantitativa, que teve como universo indivíduos portadores de tuberculose registrados no hospital de referência em doenças infectocontagiosas do estado da Paraíba, o Complexo Hospitalar de Doenças Infectocontagiosas Dr. Clementino Fraga, no ano de 2015. O universo de estudo consistiu em 693 casos de tuberculose registrados no ano de 2015 no Complexo Hospitalar Dr. Clementino Fraga – João Pessoa/PB. A amostra foi calculada a partir da fórmula estatística para populações finitas, a qual permitiu determinar um tamanho da amostra de 248 prontuários, cuja seleção se deu de forma aleatória. Foram incluídos neste trabalho indivíduos portadores de micobactérias, cujos exames diagnósticos deram positivo para o bacilo álcool ácido resistente (BAAR), por meio de métodos bioquímicos e/ou moleculares para determinação da espécie da micobactéria envolvida, e que realizavam o tratamento no Complexo Hospitalar de Doenças Infectocontagiosas Dr. Clementino Fraga. E foram excluídos da pesquisa os prontuários que possuíam dados incompletos. No total, foram analisados 270 prontuários, dos quais, 22 foram excluídos da análise dos dados devido à falta de informações, constituindo assim um total de 248 prontuários, uma amostra representativa, conforme cálculo amostral de populações finitas. A coleta de dados foi realizada durante o mês fevereiro de 2017, no Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) do referido hospital, a partir da análise dos prontuários dos usuários com tuberculose acompanhados no ano de 2015, em que foram levantados o perfil sociodemográfico e a frequência de abandono ao tratamento. O instrumento de pesquisa utilizado foi uma ficha de coleta elaborada pelo pesquisador, que envolveu as variáveis: idade (em anos), gênero, estado civil, ocupação, procedência, cor/raça, renda, tabagismo e etilismo, drogas ilícitas, exames de diagnóstico, abandono, situação de encerramento. Os dados objetivos dos prontuários foram sumarizados por análise quantitativa, com cálculos de medidas de posição e variabilidade. Os dados foram analisados por meio do programa estatístico SPSS (*Statistical Program for Social Science*) versão 20.0, utilizando-se da estatística qualitativa e inferencial. Os dados foram avaliados fazendo referência com a literatura e expressos em percentagem na forma de gráficos e tabelas. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba – CEP/CCS sob o protocolo nº0729/16.

3. RESULTADO E DISCUSSÕES

3.1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS USUÁRIOS COM TUBERCULOSE

Com base nos dados analisados e expressos na tabela 1 foi possível observar que dos 248 prontuários analisados, 66% dos usuários com tuberculose eram do sexo masculino (163) e 34% eram do sexo feminino (85).

Um estudo realizado por Figueiredo *et al.* (2015) assemelha-se ao resultado obtido no presente estudo, em que 63% dos indivíduos diagnosticados com tuberculose eram do sexo masculino. Outra pesquisa realizada por Costa *et al.* (2014) observou um resultado um pouco acima, em que 75,4% dos usuários eram do sexo masculino.

Tabela 1 – Distribuição percentual dos usuários com tuberculose segundo gênero, faixa etária, estado civil, escolaridade, ocupação, faixa de renda, cor e procedência, João Pessoa – PB, 2017

Gênero	Frequência	%
Feminino	85	34,3
Masculino	163	65,7
Faixa Etária		
Abaixo de 18 anos	16	6,5
De 18 a 29 anos	66	26,6
De 30 a 39 anos	55	22,2
De 40 a 49 anos	50	20,2
De 50 a 59 anos	35	14,1
De 60 a 69 anos	15	6,0
De 70 a 79 anos	8	3,2
80 anos ou mais	3	1,2
Estado civil		
Solteiro	128	51,6
Casado(a)	59	23,8
Viúvo(a)	12	4,8
Divorciado(a)	19	7,7
União estável	30	12,1
Escolaridade		
Analfabeto	47	19,0
Ensino fundamental incompleto	88	35,5
Ensino fundamental completo	42	16,9
Ensino médio incompleto	11	4,4
Ensino médio completo	32	12,9
Superior incompleto	3	1,2
Superior completo	9	3,6
Não informado	16	6,5
Ocupação		
Estudante	7	2,8
Desempregado	9	3,6
Trabalho assalariado	76	30,6
Aposentado/Pensionista	15	6,0
Autônomo/Profissional liberal	53	21,4
Atividade rural	18	7,3
Do lar	24	9,7
Auxílio do governo	3	1,2
Presidiário	6	2,4
Morador de rua	7	2,8
Não informou	30	12,1
Faixa de renda		
Inferior a 1 salário mínimo	34	13,7
Até 1 salário mínimo	111	44,8
De 1 salário a 3	27	10,9
3 a 5 salários	15	6,0
Acima de 5 salários	3	1,2
Sem renda	16	6,5
Não informado	42	16,9
Cor		
Parda	118	47,6
Negra	33	13,3
Branca	46	18,5
Não informado	51	20,6
Procedência		
João Pessoa	138	55,6
Região Metropolitana	68	27,4
Interior	42	17
Total	248	100,0

Fonte: Dados da pesquisa

Diversos estudos têm demonstrados resultados semelhantes, em que o sexo masculino é o mais atingido por essa doença (PILLER, 2012; CAVALCANTI *et al.*, 2006; COUTINHO *et al.*, 2012; PAIXÃO; GOTIJO, 2007). Fatores como o tabagismo, a maior ingestão de bebidas alcoólicas, e a maior preocupação com a saúde pelas mulheres são sugeridos por alguns autores como sendo a causa dessa diferença entre os sexos (MONTEIRO, GAZZETA, 2007; COUTINHO *et al.*, 2012).

Observou-se que os indivíduos com tuberculose estavam, em sua maioria, na faixa etária de 18 a 29 anos (26,6%), seguido da faixa etária de 30 e 39 anos (22,2%) e 40 a 49 anos (20,2%). O estudo realizado por Piller (2012) corrobora o presente estudo, no qual a tuberculose atingiu prioritariamente a faixa etária de 20 a 49 anos de idade. Em outra pesquisa desenvolvida por Neto *et al.* (2012) a faixa etária predominante também foi entre 20 e 40 anos (64%). Outros estudos também se assemelham quanto à faixa etária prevalente (CALIARI; FIGUEIREDO, 2012; DURANS *et al.*, 2013).

Provavelmente por estarem mais expostos aos fatores de risco, os indivíduos em idade trabalhadora, entre 20 e 59 anos demonstraram os maiores percentuais de acometimento de TB, dado que também é encontrado em todo o país e explica o agravante social e econômico que é a tuberculose (COELHO *et al.*, 2010, CHAIMOWICZ, 2001; COUTINHO, 2012).

Quanto ao estado civil foi observado que os indivíduos solteiros foram os mais acometidos pela tuberculose representando 51,6% (n=128), seguido dos casados com 23,8% (n=59). Uma pesquisa realizada por Dantas, Enders e Queiroz (2014) difere dos dados obtidos quanto ao estado civil dos doentes, nesse estudo houve um maior percentual de indivíduos casados (40%).

Em relação à escolaridade dos diagnosticados com tuberculose 35,5% possuem o ensino fundamental incompleto (n=88), 19% são analfabetos, 16,9% o ensino fundamental completo, e 12,9% o ensino médio completo, apenas 4,8% chegaram ao ensino superior.

Resultados semelhantes também foram encontrados por Neto (2012), em que 31% possuíam nível educacional de até quatro anos de estudo, por Figueiredo *et al.* (2015), no qual 51,5% possuía o ensino fundamental incompleto e por Dantas, Enders e Queiroz (2014), em que 40% estudaram até o ensino fundamental incompleto. A baixa escolaridade e o analfabetismo são fatores que levam aos indivíduos a desconhecem da importância e da frequência do tratamento, o que pode levar a interrupção do tratamento da TB (DURANS *et al.*, 2013; LOPES *et al.*, 2013).

Quando se analisou a variável ocupação, verificou-se que 30,6% dos casos eram de trabalhadores assalariados, 21,4% de trabalhadores autônomos, 12% não continha essa informação, 9,7% eram do lar, 7,3% eram trabalhadores rurais e 3,6% estavam desempregados. Tal percentual assemelha-se ao estudo realizado por Dantas, Enders e Queiroz (2014), no qual 33,3% eram trabalhadores assalariados, no entanto, difere do estudo realizado por Caliari e Figueiredo (2012) cuja ocupação era de 29% de aposentados, 35% desempregado e 32% do lar.

Em relação à faixa de renda observou-se que 44,8% recebiam até 1 salário mínimo, 16,9% dos prontuários não informavam a renda, 13,7% recebiam inferior a 1 salário mínimo, 10,9% de 1 salário a 3, 6,5% não possuíam renda, 6% recebiam 3 a 5 salários e apenas 1,2% acima de 5 salários mínimos. Os resultados obtidos nesse estudo demonstram-se abaixo dos dados obtidos em uma pesquisa realizada por Figueiredo (2015), em que 52,7% declararam possuir renda familiar entre 1 e 3 salários mínimos, e demonstraram-se semelhantes a desenvolvida por Paixão, Gotijo (2007), na qual 50% sobreviviam com renda per capita inferior ou igual a meio salário mínimo.

Observou-se em relação à raça/cor que 47,6% eram pardos, 18,5% eram brancos, 13,3% eram negros e 20,6% não tinham a raça/cor informado nos prontuários. Tais percentuais são corroborados pelos estudos realizados por Neto *et al.* (2012), em que 42% são pardos, 32% são brancos e 10% são negros, entretanto, diferem dos realizados por Figueiredo *et al.* (2015) em que 61% são brancos.

Em relação ao local de residência dos usuários com tuberculose, foi possível observar que mais da metade, 55,6%, residem na cidade de João Pessoa, 27,4% residem na região metropolitana, e 17% residem no interior do estado da Paraíba, conforme exposto na tabela 3 acima. Esses resultados obtidos podem ter se dado devido a dois motivos, primeiro, a cidade de João Pessoa e a região metropolitana são ambientes com mais aglomerados de pessoas, dessa forma, os fatores de riscos relacionados a transmissão a partir de indivíduos bacilíferos são aumentados, segundo, devido à expansão dos serviços de saúde para todo o estado Paraíba, os casos podem estar sendo notificados e tratados em hospitais e unidades básicas de

saúde regionais, não tendo, portanto, a necessidade de se deslocar até a capital para realização do tratamento da tuberculose.

3.2. ESTILO DE VIDA RELACIONADO À SAÚDE

Quanto ao estilo de vida relacionado à saúde, foi possível observar (Gráfico 1) que apenas 72 são tabagistas (29%), e 8 foram referidos como ex-tabagistas (3%). A relação de ex-tabagistas possivelmente está subnotificada devido à omissão por parte dos usuários, de terem sido fumantes no passado.

Gráfico 1 – Frequência de tabagismo em usuários diagnosticados com tuberculose, João Pessoa-PB, 2017

Fonte: Dados da pesquisa

Os dados obtidos nessa pesquisa são corroborados pelos estudos desenvolvidos por Ferreira, Alcântara e Kritski (2012), no qual obteve um resultado de 38% de fumantes, porém difere quanto ao número de ex-fumantes, em que eles representaram 49% da amostra estudada. Um estudo realizado por Figueiredo *et al.*, também se mostrou semelhante ao anterior, no qual 36% eram tabagistas ativos e 30,8% eram ex-tabagistas.

Segundo Ferreira, Alcântara e Kritski (2012) o tabaco é relacionado como sendo um fator que além de aumentar o risco de tuberculose (pulmonar), ele também dificulta e retarda o diagnóstico da doença, pois a tosse característica da tuberculose é habitualmente atribuída ao tabagismo. No presente estudo, o tabagismo e o ex-tabagismo não demonstraram associação significativa com a tuberculose.

Em relação a utilização de álcool foi observado que 25% são etilistas, e 75% são de não etilistas, no entanto, a definição de alcoolismo é subentendida para maior parte da população.

Gráfico 2 – Frequência de alcoolismo em usuários diagnosticados com tuberculose, João Pessoa-PB, 2017

Fonte: Dados da pesquisa

Segundo Veiga, Cantorani, Vargas (2016) o alcoolismo caracteriza-se como sendo uma doença crônica, primária, que possui fatores genéticos, fatores psicossociais e fatores ambientais influenciando seu desenvolvimento e manifestações. Caracteriza-se pela falta de controle com a bebida, em que se continua a

utilização uso de álcool apesar de suas consequências adversas, alterações no pensamento, negação notável. E estes sintomas podem ser contínuos ou periódicos (VEIGA; CANTORANI; VARGAS, 2016).

Resultado semelhante ao obtido nesta pesquisa foi encontrado por Caliari e Figueiredo (2012) em que a frequência de alcoolismo foi também de 25% (n=31). Outro estudo desenvolvido por Costa *et al.* (2014) demonstrou resultados acima do encontrado no presente estudo, no qual 32,5% consumiam bebida alcoólica de maneira exagerada. De fato, a utilização de álcool e outras drogas é um problema com profundas raízes sociais e configura-se como uma área importante de intervenção para a equipe multiprofissional de saúde (LOPES *et al.*, 2013).

Quanto à utilização de drogas ilícitas verificou-se que apenas 18% fazem uso de alguma droga ilícita (n=44), e 82% não utilizam (204), conforme expresso na tabela 2.

Tabela 2 – Distribuição dos usuários com tuberculose quanto à utilização de drogas ilícitas, João Pessoa-PB, 2017

Se faz uso de drogas ilícitas	Frequência	%
Sim	44	18
Não	204	82
Se sim, qual/quais?		
Maconha	9	20,5
Crack	12	27,3
Duas ou mais	6	13,6
Não informou qual	17	38,6
Total	248	100,0

Fonte: Dados da pesquisa

O resultado obtido no presente estudo assemelha-se ao obtido por Costa *et al.* (2014) em que 20% dos casos de tuberculose eram usuários atuais de drogas. As drogas ilícitas mais relatadas foram o Crack e a Maconha. Uma dificuldade encontrada nessa etapa da pesquisa foi a falta de registro de qual droga era utilizada pelo paciente, dessa forma, não foi possível realizar a correta caracterização da(s) drogas mais utilizadas.

3.3. ASPECTOS CLÍNICOS DOS USUÁRIOS COM TUBERCULOSE

A próxima etapa foi avaliar a frequência de coinfeção com o HIV, no qual se pode observar que dos 248 casos de tuberculose 14% apresentam coinfeção com o HIV/SIDA, conforme exposto no gráfico 3.

Gráfico 3 – Prevalência de coinfeções tuberculose/HIV-SIDA, João Pessoa-PB, 2017

Fonte: Dados da pesquisa

Esse resultado assemelha-se ao estudo realizado por Caliari e Figueiredo (2012) em que 18% dos testes para HIV em indivíduos diagnosticados com tuberculose deram positivos. Em outros estudos realizados por Neto *et al.* (2012) e Figueiredo *et al.* (2015) foram encontrados resultados superiores, em que a prevalência da coinfeção tuberculose/HIV foi de 39% e 50%, respectivamente. O HIV/SIDA eleva a probabilidade do surgimento da tuberculose entre infectados pelo bacilo para 10% ao ano, em comparação com 10% durante toda vida dos imunocompetentes (COSTA *et al.*, 2014).

Em seguida, verificou-se que a baciloscopia de escarro foi realizada em 78% dos casos, e destes, 78% deram positivos, e apenas 22% deram negativos para a presença de bacilos, conforme demonstrado na tabela 3.

Tabela 3 – Distribuição dos usuários com tuberculose de acordo com os exames de diagnóstico, João Pessoa-PB, 2017

Baciloscopia diagnóstica	Frequência	Porcentagem
Realizada	193	78
Não Realizada	55	22
Positiva	151	78
Negativa	42	22
Total	193	100
Raio X do tórax		
Realizado	203	82
Não realizado	45	18
Sugestivo	177	87
Normal	26	13
Total	203	100,0
Cultura diagnóstica		
Realizada	128	52
Não realizada	120	48
Positiva	80	62
Negativa	48	38
Total	128	100

Fonte: Dados da pesquisa

Os resultados obtidos nesse estudo assemelham-se aos resultados obtidos em um estudo realizado por Filha *et al.* (2012) em que a baciloscopia foi realizada em 85% dos casos e 69,4% obtiveram resultados positivos.

Outro estudo realizado por Durans *et al.* (2013) também obteve resultados semelhantes, em que 88,6% dos casos foi realizada a baciloscopia, porém os resultados positivos foram inferiores, quando comparados ao presente estudo, no qual 47,4% apresentaram-se positivos. Estes resultados comprovam que a baciloscopia é realmente o exame mais corriqueiramente utilizado nos serviços de saúde de todo país (PAIVA; PEREIRA; MOREIRA, 2011).

A prevalência da positividade da baciloscopia demonstra uma grande incidência de indivíduos bacilíferos. Os indivíduos bacilíferos que não continuam o tratamento, não cessam a cadeia epidemiológica da doença, eles permanecem transmitindo o bacilo, infectando novos indivíduos, ou até mesmo desenvolver formas mais graves e resistentes da infecção (DURANS *et al.*, 2013).

Em relação aos exames radiológicos, foi possível observar que este exame foi realizado em 82% dos casos, demonstrando-se sugestivo para a tuberculose em 87% dos casos, e apenas 13% apresentaram aspectos normais. O diagnóstico radiológico é considerado suspeito quando há imagem sugestiva de tuberculose ativa conforme as definições do II Consenso Brasileiro de Tuberculose, a exemplo de opacidade heterogênea, cavidades, consolidações, padrão reticulonodular, nódulos, banda parenquimatosa, dentre outros (MACIEL *et al.*, 2010). Um estudo realizado por Neto *et al.* (2012) obteve resultados semelhantes, em que 89% dos casos apresentaram imagens sugestivas para tuberculose na radiologia.

Como observado na tabela 3 acima, os exames de cultura foram realizados em apenas 52% dos casos, e destes, 62% deram positivos e 38% deram negativos. Os resultados obtidos no presente estudo apresentam-se superiores aos obtidos por Neto *et al.* (2012) em que os exames de cultura foram realizados em apenas 12% dos casos. E essa menor proporção dos exames de cultura em relação a baciloscopia se deve ao fato de que, embora sejam mais sensíveis, os exames de cultura são mais caros e mais demorados, em torno de 40 dias, dessa forma, não são rotineiramente utilizados (PAIVA; PEREIRA; MOREIRA, 2011).

Diante disso, considera-se como diagnóstico efetivo da tuberculose a presença de duas amostras de escarro com BAAR positivo, por meio da baciloscopia direta, ou uma amostra de escarro com BAAR

positivo acompanhado à radiografia de tórax sugestiva de tuberculose para a determinação de início do tratamento específico (MELLO, 2012).

3.4. FARMACOTERAPIA E ADEÇÃO AO TRATAMENTO DOS USUÁRIOS COM TUBERCULOSE

Em relação a forma de admissão no hospital Clementino Fraga, 47% dos casos foram de retornos após abandono, 39% foram de casos novos e 14% de recidivas da doença.

Gráfico 4 – Distribuição dos usuários com tuberculose de acordo com a forma de admissão no Complexo Hospitalar Dr. Clementino Fraga, João Pessoa-PB, 2017

Fonte: Dados da pesquisa

Um estudo realizado por Loureiro *et al.* (2014) difere do presente estudo, em que 87% dos casos eram casos novos ($n=97$) e apenas 13% eram de recidivas e retornos após abandono. Estudos realizados por Vieira *et al.* (2011) e por Caliar; Figueiredo (2015) também encontraram resultados superiores em relação ao número de casos novos, 77,5% e 85%, e inferiores em relação aos casos de recidiva, 9% e 8%, e reingresso após abandono, 9% e 5%, respectivamente. Diante disso, foi possível observar no presente estudo que houve uma redução de casos novos registrados no hospital Clementino Fraga quando comparado a estudos realizados em outras regiões do Brasil.

A recidiva da doença é uma situação possível, a qual necessita de uma abordagem criteriosa por parte do serviço de saúde, por meio de exames laboratoriais que confirmem ou não a doença. A presença de bacilos da tuberculose em indivíduos curados sugere que a recidiva da doença é causada pela existência de bacilos que permaneceram dormentes após o tratamento medicamentoso. A recidiva pode acontecer também devido a falhas na utilização dos medicamentos e no acompanhamento por parte da equipe profissional (VIEIRA *et al.*, 2011).

Como pode ser verificado na tabela 4, a forma clínica mais prevalente nos casos de tuberculose é a forma pulmonar com 88%, seguido da forma clínica ganglionar com 8% e da forma laríngea e pleural, ambas com 2%.

Tabela 4 – Distribuição dos usuários com tuberculose segundo forma clínica e esquema terapêutico, João Pessoa-PB, 2017

Forma clínica	Frequência	%
TB Pulmonar	220	88
TB Ganglionar	19	8
TB Laríngea	4	2
TB Pleural	5	2
Tipo de esquema		
Básico	231	93
Específico (TB Multirresistente)	17	7
Esquema terapêutico		
RZHE	227	92
RH	21	8
TOTAL	248	100,0

Fonte: Dados da pesquisa

Resultado semelhante a este foi encontrado por Caliari e Figueiredo (2015), em que 86% dos casos estudados portavam TB pulmonar. Outro estudo desenvolvido por Neto *et al.* (2012) também corrobora o presente estudo, no qual a forma clínica predominante foi tuberculose pulmonar (87%).

Assim como em outros estudos desenvolvidos por Costa *et al.* (2014), em que houve um amplo predomínio da TB pulmonar (94,9%), e por Durans *et al.* (2013), com 88,7% de predomínio da TB pulmonar. Esses valores corroboram os dados do Ministério da Saúde que mencionam que 80% dos casos de tuberculose ativa ocorrem na forma clínica pulmonar, onde está concentrado o maior percentual de abandono (DURANS *et al.*, 2013).

Em relação ao tipo de esquema de tratamento, pode-se observar que o esquema básico foi o mais utilizado, cerca de 93%, conforme descrito na tabela 4. Resultado semelhante a este foi encontrado por Costa *et al.* (2014) em que 140 (84,3%) dos doentes com tuberculose fizeram uso do esquema básico como forma de tratamento. Observou-se também que o esquema terapêutico mais utilizado foi o RZHE em 92% dos usuários, seguido do RH em apenas 8% dos casos, demonstrando, dessa forma, que a maioria dos usuários estavam na fase intensiva.

Com base nos dados analisados e expressos no gráfico 5, foi possível observar que em 49% dos casos de tuberculose houve abandono do tratamento.

Gráfico 5 – Prevalência de abandono dos usuários com tuberculose no hospital Clementino Fraga, João Pessoa-PB, 2017

Fonte: Dados da pesquisa

Os resultados obtidos no presente estudo diferem do estudo realizado por Monte (2013), no qual houve frequência de 4,5% de abandono nos casos notificados no Distrito Federal (2008-2012). Segundo o Ministério da Saúde (MS), é considerado abandono de tratamento quando o indivíduo não compare ao serviço de saúde por mais de 30 dias consecutivos após a data prevista para seu retorno. É recomendado que as taxas de abandono de tratamento não ultrapassem 5% (DURANS *et al.*, 2013; CAVALCANTE; SILVA, 2013). Dessa forma, os resultados encontrados nesse estudo se mostraram bastante elevados de acordo com o preconizado pelo MS.

Em relação a frequências de abandono foi observado que dos 121 indivíduos com tuberculose, 60 abandonaram apenas uma vez (50%), 36 abandonaram duas vezes (30%), 19 abandonaram três vezes (16%), 4 abandonaram quatro vezes (3,3%) e apenas 2 abandonaram cinco vezes (1,7%) conforme exposto no gráfico 6.

Gráfico 6 – Distribuição dos usuários com tuberculose de acordo com a frequência de abandono no hospital Clementino Fraga, João Pessoa-PB, 2017

Fonte: Dados da pesquisa

Segundo Filha *et al.* (2012), o enfrentamento do abandono da tuberculose deve considerar dois pontos, primeiro, os fatores relacionados aos hábitos do doente e a forma como o mesmo se apropria-se das informações sobre sua doença e o quanto é motivado a completar o tratamento, e segundo, e não menos importante, a maneira como o serviço de saúde se organiza.

O abandono do tratamento está relacionado a diversos de fatores que envolvem aspectos dos indivíduos e dos serviços de saúde, como o estigma que envolve a doença, o analfabetismo, a não aceitação da doença, o fato do usuário se considerar curado antes da cura concreta, impossibilidade de faltar ao emprego para ir às consultas, dificuldades no acesso às unidades de saúde para recebimento dos medicamentos, ausência de residência fixa, maus hábitos alimentares, intolerância medicamentosa, alcoolismo, presença de outras doenças, uso de drogas ilícitas e falta de apoio de familiar (DURANS *et al.*, 2013).

O abandono do tratamento favorece a resistência medicamentosa e constitui um fator que causa impactos negativos no controle da doença. Nas diversas regiões do Brasil a taxa de abandono varia de 4,5 a 20,3%, porém, a taxa de abandono apresentada no presente estudo se mostrou elevada, bastante acima da encontrada no país (PAIXÃO; GONTIJO, 2007).

Em seguida foi analisado a situação de encerramento dos indivíduos com tuberculose no ano de 2015, e foi possível observar que menos da metade finalizou o tratamento, no qual apenas 110 indivíduos (44%) completaram o tratamento, e 138 (56%) não completaram o tratamento. Dentre os 248 casos, 44% dos usuários com tuberculose evoluíram para a cura, 37% continuaram em situação de abandono, 13% transferiram para outra unidade de saúde, e 6% seguiram em tratamento, conforme descrito na tabela 5.

Tabela 5 – Distribuição segundo a situação de encerramento dos usuários com tuberculose, João Pessoa-PB, 2017

Situação de encerramento	Frequência	%
Alta por cura	110	44
Abandono	92	37
Segue em tratamento	15	6
Transferência	31	13
TOTAL	248	100,0

Fonte: Dados da pesquisa

Estudos realizados por Caliar e Figueiredo (2012), Cavalcante e Silva (2013) encontraram resultados acima dos obtidos no presente estudo em relação ao percentual de cura, os quais foram de 53%, e 60%, respectivamente. Entretanto, o percentual de abandono e o de transferência foram inferiores, apenas 8% de abandono e 1% de transferência, e 17% de abandono e 11% de transferência, respectivamente. Outro estudo realizado por Filha *et al.* (2012) encontrou resultados semelhantes em que houve um percentual de 71% de cura e 25% de abandono. Com isso, é possível inferir que, embora o percentual de abandono seja alto, aqueles que continuam o tratamento e concluem alcançam a cura completa da doença.

4. CONCLUSÃO

Diante dos resultados obtidos, foi possível concluir que os indivíduos com tuberculose analisados, eram, em sua maioria, do sexo masculino, com idade entre 18 a 59 anos, solteiros, com ensino fundamental incompleto, trabalhadores assalariados, com renda de até 1 salário mínimo, de cor parda e residentes da cidade de João Pessoa-PB.

Em relação ao estilo de vida, menos da metade é tabagista e etilista, e a maioria não faz uso de drogas ilícitas, dos que fazem, o crack e a maconha foram os mais relatados. Quanto aos aspectos clínicos houve baixa incidência de coinfeção com o HIV, e o exame de diagnóstico mais realizado foi a baciloscopia, a qual deu positiva quase que totalmente nos casos, e o raio X de tórax, o qual se mostrou sugestivo em quase todos os casos também. A cultura foi realizada em um pouco mais da metade dos casos e dentre eles mais da metade deu positiva.

Em relação à forma de admissão a maioria foi de retornos após abandono, a forma clínica mais prevalente foi a pulmonar e o esquema terapêutico mais utilizado foi o básico, utilizando as combinações 2RZHE e 4RH. A frequência de abandono ao tratamento foi elevada quando comparada a outros estudos, como também, acima do recomendado pelo MS. A maioria abandonou apenas uma vez.

A situação de encerramento mais prevalente foi a alta por cura, seguido de abandono ao tratamento. No entanto, embora a alta por cura seja mais prevalente, observa-se ainda que a frequência de abandono permanece alta, um fato preocupante para o controle da tuberculose.

Portanto, faz-se necessário maior incentivo por parte das organizações de saúde com ações de conscientização para os indivíduos com tuberculose, é preciso que ocorra o completo acompanhamento de uma equipe multiprofissional, com a finalidade de proporcionar todo apoio aos usuários no decorrer do tratamento da doença.

REFERÊNCIAS

- [1] ALBUQUERQUE, M. F. M.; LEITÃO, C. C. S.; CAMPELO, A. R. L.; SOUZA, W. V., SALUSTIANO, A. Fatores prognósticos para o desfecho do tratamento da tuberculose pulmonar em Recife, Pernambuco, Brasil. *Rev Panam Salud Publica*, v.9, n.6, p.368-374, 2001.
- [2] ALMEIDA, M. G.; BARBOSA, DRM; ALMEIDA, DFS. Epidemiologia e distribuição espacial de casos notificados de tuberculose multirresistente (TBM) no Brasil, 2008-2012. *Revista de epidemiologia e Controle de Infecção*, Santa Cruz, ano III, v. 3, n. 4, p. 117-122, 2013.
- [3] ANDRADE, R. L. P.; VILLA, T. C. S.; PILLON, S. A influência do alcoolismo no prognóstico e tratamento da tuberculose. *SMAD*, v.1, n.1, 2005.
- [4] BACHA, H. A Tuberculose: Diagnóstico e tratamento. *Prática Hospitalar*, ano VII, n.42, 2005.
- [5] BERTAZONE, E. C.; GIR, E.; HAYASHIDA, M. Situações Vivenciadas pelos Trabalhadores de Enfermagem na Assistência ao portador de Tuberculose Pulmonar. *Rev Latino-am Enfermagem*, v.13, n.3, 2005. p.374-381.
- [6] BRASIL. Manual de vigilância laboratorial da tuberculose e outras micobactérias. 2008.
- [7] BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Centro de Referência Prof. Hélio Fraga. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Controle da tuberculose: uma proposta de integração ensino/serviço. 5. ed. Rio de Janeiro: FUNASA/CRPHF/SBPT, 2002^a.
- [8] BRASIL. Ministério da Saúde. Plano Estratégico para o Controle da Tuberculose, Brasil 2007-2015. Brasília. Outubro de 2006.
- [9] BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Combate à Tuberculose, 1999.
- [10] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Manual técnico para o controle da tuberculose: cadernos de atenção básica. 6. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2002c.
- [11] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de vigilância em saúde. Departamento de vigilância epidemiológica. Programa Nacional de Controle da Tuberculose. Tuberculose no Brasil. Brasília, 2010a.
- [12] BRASIL. Ministério da Saúde. Tratamento diretamente observado (TDO) da tuberculose na atenção básica. Protocolo de Enfermagem. Brasília, 2011.
- [13] BRASIL. Tuberculose na atenção primária à saúde. Porto Alegre: Hospital Nossa Senhora da Conceição, 2011.
- [14] BUSATTO, C. Tuberculose ativa versus Tuberculose Latente: uma revisão de literatura. *Journal of Infection Control*, v. 4, n. 3, 2016.

- [15] CALIARI, J. S.; FIGUEIREDO, R. M. Tuberculose: perfil de doentes, fluxo de atendimento e opinião de enfermeiros. *Acta Paul Enferm*, v. 25, n. 1, p. 43-7, 2012.
- [16] CAVALCANTE, E. F. O.; SILVA, D. M. G. V. Perfil de pessoas acometidas por tuberculose. *Rev. Rene*, v. 14, n. 4, p. 720-9, 2013.
- [17] CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Tuberculosis (TB). 2012.
- [18] CHANG, K. C. *et al.* Supervised and induced sputum among patients with smear-negative pulmonary tuberculosis. *European Respiratory Journal*, Redwood, v. 31, n. 10, p. 85-90, 2008.
- [19] CHEE, C. B.-E. *et al.* Diagnosis and treatment of latent infection with *Mycobacterium tuberculosis*. *Official Journal of the Asian Pacific Society of Respirology*, Crawley, v. 18, n. 2, p. 205-216, 2013.
- [20] COSTA, M.; TAVARES V. R.; SILVA, A. C.; CAMPOS D. J.; BUENO S. K. Tuberculose: uma Revisão de Literatura. *Revista Eletrônica REFACER*, v.1, n.2, 2013.
- [21] COUTINHO, L. A. S. A.; OLIVEIRA, D. S.; SOUZA, G. F.; FILHO, G. M. C. F.; SARAIVA, M. G. Perfil Epidemiológico da Tuberculose no Município de João Pessoa-PB, entre 2007-2010. *Revista Brasileira de Ciências da Saúde*, 16(1), 35-42. 2012.
- [22] DA SILVA PAIVA, V.; PEREIRA, M.; DA SILVA MOREIRA, José. Perfil epidemiológico da tuberculose pulmonar em Unidade Sanitária de referência em Porto Alegre, RS. *Revista da AMRIGS*, v. 55, n. 2, p. 113-117, 2011.
- [23] DALTRO, M.E. *et al.* Aspectos da Saúde. In: *Recomendações para Projetos de Arquitetura de Ambientes de Tratamento da Tuberculose*. 2012. p.17-23.
- [24] DANTAS, D. N. A., ENDERS, B. C., DE QUEIROZ, A. A. R., COURA, A. S., DA SILVA, M. P. M., DE MENEZES, R. M. P. Fatores associados à primeira escolha de local para o diagnóstico da tuberculose. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, v. 35, n. 3, p. 75-81, 2014.
- [25] DELOGU, G.; SALI, M.; FADDA, G. The biology of *Mycobacterium Tuberculosis* Infection. *Mediterranean Journal of Hematology Infectious Diseases*, Roma, v. 5, n. 1, 2013.
- [26] DURANS, J. D. J. F., DE SÁ, É. M., PEREIRA, L. F. B., SOARES, D. L., OLIVEIRA, P. S., DE AQUINO, D. M. C., CALDAS, A. D. J. M. Perfil clínico e sociodemográfico de pacientes que abandonaram o tratamento de tuberculose no município de São Luís-MA. *Revista de Pesquisa em Saúde*, v. 14, n. 3, 2014.
- [27] FERREIRA, V. G.; ALCÂNTARA, C. C. S.; KRITSKI, A. L. Fatores associados à tuberculose pulmonar em pacientes que procuraram serviços de saúde de referência para tuberculose. 2012.
- [28] FERRI, A. O., AGUIAR, B., WILHELM, C. M., SCHMIDT, D., FUSSIEGER, F., PICOLI, S. U. Diagnóstico da tuberculose: uma revisão. *Revista Liberato*, v. 15, n. 24, 2014.
- [29] FIGUEIREDO, R. V. D., MÜLLER, A. M., DALCIN, P. D. T. R., SILVA, D. R. Perfil dos pacientes com tuberculose diagnosticados em hospital terciário de Porto Alegre. *Clinical and biomedical research*. Porto Alegre, 2015.
- [30] FILHA, M. M. T., DAUMAS, R. P., ALVES, L. C., LEIMANN, B. C. Q., ENGSTROM, E. M. Análise da tuberculose em uma unidade de Atenção Primária à Saúde na cidade do Rio de Janeiro: perfil clínico, resultado de tratamento e qualidade dos registros. *Cad. saúde colet.*, (Rio J.), v. 20, n. 2, 2012.
- [31] HIJJAR, M. A.; GERHARDT, G.; TEIXEIRA, G. M.; PROCOPIO, M. J. Retrospecto do controle da tuberculose no Brasil. *Rev. Saúde Pública*, 2007, v.41, supl.1, 2007. p.50-57.
- [32] JESUS, B. F. G.; SOUZA, P. G. O.; SILVEIRA, M. F.; SANTO, L. R. E. Perfil epidemiológico da tuberculose na cidade de Montes Claros de 2005 a 2009. *Rev. Bras. Farm.*, v.93, n.1, p.80-84. 2012.
- [33] KOZAKEVICH, Gabriel Vilella; DA SILVA, Rosemeri Maurici. TUBERCULOSE: REVISÃO DE LITERATURA. *Arquivos Catarinenses de Medicina*, v. 44, n. 4, 2016.
- [34] KRITSKI, Afrânio Lineu *et al.* Duas décadas de pesquisa em tuberculose no Brasil: estado da arte das publicações científicas. *Rev Saúde Pública*, São Paulo, v. 41, n. 1, p.9-14, 2007.
- [35] LIMA, M. B.; MELLO, D. A.; MORAIS, A. P. P.; SILVA, W. C. Estudo de casos sobre abandono do tratamento da tuberculose: avaliação do atendimento, percepção e conhecimentos sobre a doença na perspectiva dos clientes (Fortaleza, Ceará, Brasil). *Cad. Saúde Pública*, v.17, n.4, jul-ago. p.877-885. 2001.
- [36] LOPES, R. H., MENEZES, R. M. P. D., COSTA, T. D. D., QUEIROZ, A. A. R. D., CIRINO, I. D., GARCIA, M. C. D. C. Fatores associados ao abandono do tratamento da tuberculose pulmonar: uma revisão integrativa. *Revista Baiana de Saúde Pública*, v. 37, n. 3, p. 661-671, 2014.
- [37] LOUREIRO, R. B., VILLA, T. C. S., RUFFINO-NETTO, A., PERES, R. L., BRAGA, J. U., ZANDONADE, E., MACIEL, E. L. N. Acesso ao diagnóstico da tuberculose em serviços de saúde do município de Vitória, ES, Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 19, n. 4, p. 1233-1244, 2014.

- [38] MACIEL, E. L. N., GUIDONI, L. M., FAVERO, J. L., HADAD, D. J., MOLINO, L. P., JONHSON, J. L., DIETZE, R. Efeitos adversos causados pelo novo esquema de tratamento da tuberculose preconizado pelo Ministério da Saúde do Brasil. *J Bras Pneumol*, v. 36, n. 2, p. 232-8, 2010.
- [39] MELLO, F. C. Q. Abordagem diagnóstica da tuberculose pulmonar. *Pulmão RJ*, v. 21, n. 1, p. 27-31, 2012.
- [40] MONTE, Camila Cortez. Perfil dos casos notificados de tuberculose no Distrito Federal (DF), no período de 2008 a 2012. 2014.
- [41] NAST, Karoline. FATORES QUE INFLUENCIAM A ADESÃO E O ABANDONO AO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE: revisão integrativa. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 2011.
- [42] NETO, M. S., DA SILVA, F. L., DE SOUSA, K. R., YAMAMURA, M., POPOLIN, M. P., ARCÊNCIO, R. A. Perfil clínico e epidemiológico e prevalência da coinfeção tuberculose/HIV em uma regional de saúde no Maranhão. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v. 38, n. 6, p. 724-732, 2012.
- [43] NORBIS, L. *et al.* Tuberculosis: lights and shadows in the current diagnostic landscape. *New Microbiologica, Bologna*, v. 36, n. 2, p. 111-120, 2013.
- [44] PAIXÃO, L. M. M.; GONTIJO, E. D. Perfil de casos de tuberculose notificados e fatores associados ao abandono, Belo Horizonte, MG. *Revista de Saúde Pública*, v. 41, n. 2, p. 205-213, 2007.
- [45] PILLER, Raquel VB. Epidemiologia da tuberculose. *Pulmão RJ*, v. 21, n. 1, p. 4-9, 2012.
- [46] SÁ, L. D.; SOUZA K. M. J.; NUNES, M. G.; PALBA, P. F.; NOUGUEIRA, J. A.; VILLA, T. C. S. Tratamento da tuberculose em unidade de saúde da família: historias de abandono. *Texto contexto Enferm.*, v.16, n.4, out-dez, 2007. p.712-718.
- [47] VEIGA, C.; CANTORANI, J. R. H.; VARGAS, L. M. Qualidade de vida e alcoolismo: um estudo em acadêmicos de licenciatura em educação física. *Conexões*, v. 14, n. 1, p. 20-34, 2016.
- [48] VIEIRA, A. N., VIEIRA, C. P. D. B., PINTO, F. J. M., FIALHO, A. V. D. M. Estudo da tuberculose no município de Mossoró (RN) em 2008a. *Revista Baiana de Saúde Pública*, v. 34, n. 4, p. 879, 2011.
- [49] VRANJAC, A. Mudancas no tratamento da tuberculose. *Revista de Saúde Pública, Sao Paulo*, v. 44, n. 1, 2010.
- [50] WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global tuberculosis control: WHO report 2011. Geneva: 2011
- [51] WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global tuberculosis control: WHO report 2010. Geneva: 2010
- [52] WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global tuberculosis report. 2012. Disponível em:<<http://www.who.int/publications/guidelines/tuberculosis/en/>>.
- [53] ZOCHE, T. L.; DA SILVA, R. M. Tuberculose no município de Tubarão nos anos de 2000 a 2006: estudo epidemiológico. *Pulmão RJ*, v. 18, n. 2, p. 70-76, 2009.

Capítulo 19

Materiais e métodos de higienização de próteses totais e parciais removíveis: Uma revisão de literatura

Ana Paula Santana Garcia

Bianca da Costa Teles

Bruna Valadão Fouchy

Carolina Modernel Soares

Kátia Cristiane Hall

Jacinta da Conceição Cezerilo Pataca

Resumo: O presente estudo realizou uma revisão de literatura sobre os materiais e métodos de higienização de próteses totais e parciais removíveis. Nesse sentido, foi avaliado os materiais disponíveis no mercado e os métodos utilizados para limpeza do material protético, tais como: mecânico, químico e combinado. Além disso, foi analisado as consequências da falta de higienização correta relacionada na formação de biofilme e patologias. Desse modo, quanto à pesquisa, foi avaliada a opinião de diversos autores sobre o tema nas bases de dados: PubMed, SciELO, Web of Science, Cochrane, Google Acadêmico e pesquisas na biblioteca da Universidade Federal de Pelotas. Foram analisados 72 artigos sobre o tema para realizar a revisão de literatura. De maneira geral, constatou-se que o melhor método de higienização é combinado, porém é preciso de mais estudos na área para elaborar uma estratégia adequada, uma vez que o material protético e as condições física e mental do paciente influenciam no processo. Portanto, é de suma importância que o profissional cirurgião-dentista se mantenha atualizado sobre o tema, como também instrua seu paciente quanto ao modo de limpeza da prótese, seja ela total ou parcial.

Palavras-chave: higienização, próteses dentárias, métodos.

1. INTRODUÇÃO

O fenômeno da inversão da pirâmide etária é uma realidade mundial, em consequência disso, a preocupação com a saúde da população mais velha, tornou-se fundamental, mobilizando assim, países como o Brasil, a criar novas estratégias de saúde e bem-estar para esses indivíduos, inclusive na área odontológica, nessa perspectiva, próteses parciais ou totais são utilizadas como aparelhos artificiais, os quais têm a função de substituir os dentes a fim de solucionar as possíveis problemáticas causadas pela perda dentária, sendo mais comum na população de idade mais avançada (DOLORES et al., 2007).

Há séculos, a procura por meios artificiais para a substituição de dentes perdidos é um desafio para a sociedade; muito antes do surgimento da odontologia já havia a confecção desses aparelhos, os quais visavam à estética e à ostentação, visto que eram produtos de luxo fabricados por verdadeiros artistas. Na era atual, a prótese removível é definida como a especialidade da prótese relacionada com a reposição dos dentes e estruturas associadas em pacientes parcialmente ou totalmente desdentados, por meio de substitutos artificiais que possam assemelhar-se da forma mais verossímil ao tecido dentário (FARIAS NETO; CARREIRO; RIZZATTI-BARBOSA, 2011).

Nesse contexto, após a remoção dos dentes ocorrem mudanças em todas as estruturas envolvidas no processo da mastigação. Essas alterações acentuam-se proporcionalmente ao tempo em que se demora a reabilitar o paciente. Apesar disso, a prótese contribui para a melhora da mastigação, da fonação, da estética, do conforto psicológico, da ATM e dos tecidos ósseo e muscular (OLCHIK et al., 2013).

Por conseguinte, os microrganismos que formam o biofilme colonizam a superfície dentária e o tecido oral, podendo provocar cáries, gengivites e periodontites, que são as patologias mais frequentes que acometem os pacientes. Estas comunidades extremamente estruturadas, onde cada elemento desempenha um papel em prol do bem comum, são responsáveis por doenças nos seres humanos, nesse viés, em consequência da má higienização de próteses, ocorre a formação de biofilme, ou seja, os microrganismos organizam-se em comunidades e aderem-se à superfície das próteses, para aumentar suas chances de sobrevivência (SILVA; PARANHOS; ITO, 2002). Esses microrganismos formadores de biofilme colonizam-se não só na superfície das próteses, mas também no tecido oral, podendo provocar cáries, gengivites, periodontites e várias outras patologias (NUNES M., CASATI M., VILLALPANDO K, TEIXEIRA, 2007).

Nessa perspectiva, as duas características dos biomateriais que mais influenciam na sua capacidade de interagir com os microrganismos são a sua composição química e a sua superfície. Os componentes químicos podem resultar em mais adesão ou inibição bacteriana; de maneira geral, eles são compostos de polímeros ou ligas metálicas (MORAES et al., 2013). Ainda, as características da superfície da prótese são outro fator influente no mecanismo de adesão, uma vez que as superfícies porosas são mais propensas à adesão quando comparadas às superfícies polidas. Além disso, a concentração de eletrólitos, tais como KCl (cloreto de potássio) e NaCl (cloreto de sódio), bem como o pH no meio de cultura e o uso de antibiótico também podem influenciar na adesão bacteriana (CRISTINA et al., 2014).

O desconhecimento sobre a necessidade de realização da higiene oral, bem como a forma de se realizar a limpeza corretamente são as principais causas da inadequação dos cuidados relacionados à saúde bucal entre os indivíduos. É importante ressaltar que a ausência total ou parcial de dentes não significa que a limpeza e higienização da boca não sejam mais necessárias, uma vez que ocorrerá o acúmulo de alimentos nos espaços entre gengiva e bochecha, e também sobre a língua (MANUELA et al., 2017).

Da mesma maneira que a falta de dentes ocasiona uma série de alterações na qualidade de vida do paciente, a higienização inadequada ou sua não realização pode provocar sérias complicações na saúde oral, como alterações do paladar, alteração das bactérias presentes na cavidade bucal e a proliferação de bactérias patogênicas. Esse processo pode também gerar doenças do trato gastrointestinal, em consequência da constante deglutição das bactérias acumuladas na cavidade oral (COLUSSI; FREITAS, 2002).

No que diz respeito ao processo de higienização das próteses, os materiais e métodos utilizados devem ser ponderados. Dessa forma, existem mecanismos químicos e físicos para que se realize uma limpeza adequada. O método químico consiste em imergir a prótese em substâncias com ação de desinfecção, como o hipoclorito de sódio e a clorexidina, as quais são substâncias testadas e amplamente utilizadas na limpeza de próteses parciais e totais. Ademais, métodos mecânicos como a escovação com a escova dental, seja ela convencional ou elétrica, associada a agentes como a água, sabão neutro e dentifrício, além da promoção da saúde oral adequada. Importante considerar o fator da idade, visto que a grande parte dos pacientes é idosa, assim, a escovação e o cuidado com limpeza desses aparelhos podem ser acometidos por

fatores como a falta de orientação adequada e a perda da destreza manual, o que pode resultar na higienização incorreta do aparelho (BASTOS et al., 2015; GONÇALVES et al., 2011).

Dessa maneira, para alcançar o sucesso e a longevidade da prótese dentária são de extrema importância a adaptação, o acompanhamento e a orientação profissional acerca dos cuidados com a desinfecção e a higienização desses aparelhos. O acúmulo do biofilme sobre as estruturas da prótese podem desenvolver lesões patológicas na mucosa, como a candidíase oral, a estomatite protética além de desenvolver halitose, cálculos salivares e pigmentação, colocando em risco não só a saúde do paciente, como também a integridade do aparelho (BASTOS et al., 2015).

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar materiais e métodos existentes no mercado para a higienização de próteses dentárias totais e removíveis, bem como sua especificidade.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apontar as consequências da falta de higienização protética na saúde do paciente, bem como avaliar vantagens e desvantagens dos métodos de limpeza de próteses.

3. METODOLOGIA

3.1. DELINEAMENTO

Este trabalho foi elaborado através de um levantamento bibliográfico de artigos científicos, selecionados na conformidade dos limites dos assuntos aos objetivos deste trabalho. O levantamento foi realizado no período de Abril a Agosto de 2018. A pesquisa foi realizada em bases de dados online como: PubMed, SciELO, Web of Science, Cochrane, entre outras ferramentas de busca, como o Google Acadêmico, além de pesquisas realizadas na biblioteca da UFPel. Utilizou-se descritores: “higienizadores de dentadura, higiene bucal e prótese dentária” dando ênfase em publicações entre 1995 à 2018.

4. REVISÃO DA LITERATURA

A cavidade bucal constitui um ecossistema microbiológico onde os microrganismos encontram-se em equilíbrio saprofítico. Entretanto, a instalação de elementos artificiais na cavidade bucal, as próteses dentárias, capazes de restituir a forma, a função e a estética, podem interferir ou colaborar para o desenvolvimento clínico ou subclínico de processos patológicos resultantes da associação prótese – microrganismo (FALCÃO; SANTOS; SAMPAIO, 2004).

O uso de próteses dentárias provoca uma alteração qualitativa e quantitativa do biofilme na cavidade bucal. Essa alteração aumenta a predisposição dos pacientes ao desenvolvimento de patologias como a cárie dentária, as periodontopatias e os processos inflamatórios da mucosa. A higiene bucal e a higiene da prótese são essenciais para manter a saúde dos tecidos, prevenindo o desenvolvimento das patologias, e consequentemente aumentando a longevidade de uma reabilitação oral com próteses removíveis (FONSECA; AREIAS; FIGUEIRAL, 2007).

No trabalho de (GONÇALVES et al., 1995), analisaram a prevalência das lesões de mucosa bucal causadas pelo uso de próteses removíveis, e dentre as lesões encontradas destacaram-se a candidíase, a hiperplasia inflamatória e as úlceras traumáticas. Observaram, ainda, que o aparecimento dessas lesões estava relacionado à desinformação dos pacientes quanto às condutas de higiene e ao uso inadequado das próteses, no que se refere ao tempo de uso e frequência.

Os dados do estudo de (ARRUDA et al., 2017), mostraram que a falta de higiene adequada em próteses é comum em pacientes edentados, o que acarreta formação de biofilme e inflamações na mucosa oral causada por candidíase spp. Sendo a estomatite dentária a patologia mais comum entre os usuários de prótese. A combinação química e mecânica é a mais recomendada para a limpeza dentária, pois remove o biofilme, as manchas, possui ação antimicrobiana e baixo custo, entre outros benefícios.

4.1. MÉTODOS DE HIGIENIZAÇÃO

Para uma correta higienização efetiva das próteses totais, há disponíveis no mercado vários mecanismos e meios para o controle do biofilme, remoção de manchas e cálculos, entretanto muitos estudos concluem que uma grande porção dos usuários de próteses não sabem higienizá-las de forma correta. Esse fato é consequência dos pacientes ou não terem sido orientados corretamente pelos profissionais, ou por negligenciarem as informações passadas por estes (KAZUO et al., 2008).

Para (SILVA; SEIXAS, 2008), os agentes de limpeza são considerados ideais quando conseguem remover produtos orgânicos e inorgânicos da prótese, principalmente de regiões rugosas que estão em íntimo contato com os tecidos. Outras características são consideradas fundamentais, como ser de baixo custo, o que incentiva o seu uso, e ser bactericida e fungicida.

Os agentes de limpeza das próteses devem possuir requisitos básicos tais como: ser fácil de usar, ter um sabor agradável, não irritar a mucosa, ter compatibilidade com os materiais das próteses, removerem manchas assim como matéria orgânica e inorgânica, não deve causar corrosão da resina acrílica (GONÇALVES et al., 2011; SILVA et al., 2006).

4.1.1. MÉTODO MECÂNICO

O método mecânico de limpeza das próteses consiste no uso da escova dental convencional ou elétrica combinada com outros agentes como: a água, o sabão neutro e o dentífrico, sendo esse o mais utilizado quanto a higienização mecânica (GONÇALVES et al., 2011; SILVA et al., 2006; SILVA; SEIXAS, 2008).

Um dos métodos mais usuais de limpeza de próteses dentárias é a associação entre escovação e o uso de dentífricos. Esse é o método mais comumente utilizado pelos pacientes e o mais recomendado pelos cirurgiões dentistas, por ser simples de usar, ser de fácil acesso e de baixo custo (SILVA et al., 2006). Porém a maior desvantagem desse método é a ação abrasiva sobre os materiais componentes da prótese.

Essa abrasão pode resultar em perda de material, rugosidades, perda de brilho, além de gerar problemas de adaptação da própria prótese. Outra desvantagem é a de ser de difícil execução para pacientes com problemas de coordenação motora.

As escovas utilizadas para a limpeza dos dentes naturais não deveriam ser as mesmas utilizadas para a limpeza protética, devido a sua forma inadequada, onde o paciente acaba encontrando dificuldades para realizar uma limpeza efetiva, não alcançando todas as áreas tanto externas como internas da prótese, pelo risco de provocar acidentes durante a escovação, utilizando escovas que não se adaptem às superfícies e utilizando cerdas que provocam ranhuras na superfície polida do aparelho (CHENG et al., 2008).

A literatura mostra que a escova dental comum é mais utilizada para a limpeza de próteses do que a escova com formato anatômico desenvolvido para esse fim. As escovas protéticas possuem as cerdas mais macias comparadas às convencionais com o objetivo de não danificar o material polido da prótese, essas cerdas são distribuídas em tufo dos dois lados da cabeça, sendo um tufo mais grosso para a escovação da parte externa, e um mais comprido para atingir as partes mais profundas da região basal protética (MOURA et al., 2004).

Outro método mecânico disponível é o ultrassom que converte energia elétrica em mecânica com uma frequência de 20.000 ciclos/s. De acordo com (KAZUO et al., 2008), seu uso está indicado para pacientes com capacidade motora dificultada, é um método fácil e rápido na limpeza de próteses, se mostra bastante eficiente na remoção de cálculo, placa bacteriana e manchas de café e cigarro, é rápido na limpeza das próteses e fácil de usar, porém, pouco usado, provavelmente devido ao elevado custo do aparelho.

O método de desinfecção por micro-ondas consiste em imergir a prótese em água e levar o conjunto ao forno por seis minutos (MOURA et al., 2004). Se tratando de próteses parciais removíveis esse método só poderá ser utilizado nas próteses temporárias sem presença de grampos (KAZUO et al., 2008). É avaliado como um método atóxico, fácil, barato e acessível, entretanto pode vir a alterar as propriedades do material protético (KRONBAUER et al.; 2009).

4.1.2. MÉTODO QUÍMICO

O uso de substância química para higienização das próteses removíveis já é estabelecido na literatura. Esse método reduz a quantidade de microrganismos na superfície dessas próteses ajudando no seu controle e eliminação, na diminuição da inflamação da mucosa e da estomatite protética (SHEEN; HARRISON, [s.d.]).

O agente de limpeza ideal deve remover depósitos orgânicos e inorgânicos das superfícies polidas e especialmente das rugosas, ter ação bactericida e fungicida, ser compatível com o material da prótese, ser de fácil uso e baixo custo (MONTAGNER et al., 2009). É tido como vantajoso por englobar todas as áreas da prótese e não causar danos ao aparelho protético, no que se refere à abrasão, sendo um procedimento simples. Porém, como desvantagens principais, podem ser citadas o clareamento da resina acrílica, a corrosão e o alto custo (CRUZ, 2007).

O método químico consiste na imersão ou embebição das peças protéticas em substância higienizadora por um tempo determinado por cada fabricante e podem ser divididos em 5 grupos a depender do seu constituinte químico e mecanismo de ação: peróxidos, hipocloritos, ácidos diluídos, desinfetantes e enzimas (DOLORES et al., 2007). Este método tem sido preferido por pacientes deficientes e geriátricos que não conseguem escovar adequadamente suas próteses (MARIA; DA; ELEUTÉRIO, 2003).

Um ensaio clínico randomizado cruzado foi empregado para a avaliação do efeito das soluções, logo, o principal objetivo era testar as substâncias (hipoclorito de sódio e *ricinus communis*) utilizadas para remoção de biofilme, com isso constatou-se que as soluções de hipoclorito de sódio (0,10% e 0,20%) são eficazes para remoção do biofilme e consequentemente na redução das doenças relacionadas à presença do biofilme, e uma solução de 9% de *ricinus communis* não é eficaz na remoção de biofilme, mas reduz os sinais de estomatite em próteses (ARRUDA et al., 2017).

No estudo de (HAHNEL et al., 2012), avaliaram a formação do biofilme de *cândida albicans* em prótese dentária. O procedimento começou a partir de 4 revestimento de próteses moles a base de silicone, depois foram envelhecidas artificialmente, espécimes foram encubadas com saliva, algumas células aderentes das próteses mostravam *cândidas albicans* depois da encubação tanto em curto tempo (2hrs) e em longo prazo (24hrs), então foi utilizado NaOCl para a remoção do biofilme que mostrou uma eficácia significativa se comparada com a escovação normal e com outros produtos de limpeza para próteses.

Nesse mesmo estudo de (HAHNEL et al., 2012), foram analisados os efeitos das enzimas, solução de hipoclorito e a solução de peróxido. As enzimas mostraram menos atividade microbiana se comparado com hipoclorito e peróxido. A solução de peróxido alcalino apresentou uma boa atividade antimicrobiana contra o biofilme dentário, além da ausência de odor e sabor restante. A mais efetiva pode ser obtida com 0,5% de hipoclorito de sódio.

No estudo de (DE SOUSA PORTA et al., 2015), avaliaram o efeito do hipoclorito de sódio (NaOCl), na estabilidade da cor e na rugosidade superficial das dentaduras dos pacientes em estudo. Observou-se que a solução de NaOCl a 0,5% foi eficaz na redução dos microrganismos e não apresentou alterações significativas na cor ou na rugosidade da resina nas dentaduras. Os participantes relataram satisfação em relação ao resultado da limpeza após o tempo de estudo.

Outras substâncias químicas bastante utilizadas são os peróxidos alcalinos, eles estão disponíveis em forma de pós ou de pastilhas que são dissolvidos em água, podendo ser utilizados em próteses totais e parciais removíveis sem distinção (UCAR; ROJAS; BALLESTER, 2007). Esses químicos removem algumas manchas e depósitos leves, mas são menos efetivos na remoção de cálculos e manchas pesadas, ou seja, seu uso principal está indicado em próteses que são higienizadas frequentemente e que não acumularam depósitos pesados e firmemente aderidos.

Contatou-se que o uso do peróxido por apenas 15 minutos não foi eficiente para remoção do biofilme (ULUDAMAR et al., 2010). No entanto, se o peróxido for usado por um tempo prolongado pode causar clareamento do acrílico (MURATA et al., 2009). Além disso, como desvantagens podem causar edema local, inflamação e descamação da mucosa se as próteses não forem enxaguadas abundantemente após o uso do produto (GLASS et al., 2010).

A clorexidina faz parte dos agentes desinfetantes mais utilizados. A imersão das próteses diariamente numa solução de clorexidina 0,2% por poucos minutos causa uma redução significativa na quantidade de biofilme e promove uma melhora na mucosa de pacientes com estomatite protética, além de prevenir a recorrência da infecção. Entretanto, a acentuada descoloração que este produto provoca nas próteses torna-o inapropriado para o uso diário. O tempo de imersão da prótese depende do grau de diluição da clorexidina, que varia de 5 a 10 minutos a cada semana. Ela é ativa contra uma série de microrganismos, gram-positivos e gram-negativos, fungos, leveduras, anaeróbios facultativos e aeróbios. A adsorção da clorexidina pelos microrganismos resulta em mutação dos componentes intracelulares. Pequenas concentrações de clorexidina com substâncias de pequeno peso molecular como o fósforo e o potássio tem efeito bacteriostático. Em grandes concentrações, o efeito é bactericida porque precipita ou coagula o citoplasma (CHENG et al., 2008; NALBANT et al., 2008). Mesmo sendo eficientes na limpeza de próteses totais e parciais removíveis, existem poucos agentes químicos disponíveis no mercado nacional. Além disso, nem todos os pacientes têm condição financeira e orientação de adquirir tais produtos. Nos casos em que o usuário não tiver acesso a nenhum tipo de produto químico, a orientação é de que a prótese fique mantida imersa em água. Esta medida visa impedir que a resina perca água para o ambiente, e consequentemente, qualquer alteração dimensional da prótese.

É importante ressaltar que, no segundo semestre de 2018, a FDA (U.S. Food and Drug Administration), lançou uma nota de esclarecimento sobre reações alérgicas raras, contudo graves com o gluconato de clorexidina.

Os profissionais de saúde devem sempre perguntar aos pacientes se eles já tiveram reação a qualquer antisséptico antes de recomendar ou prescrever um gluconato de clorexidina produtos. Aconselhe os pacientes a procurar atendimento médico imediato se tiverem algum sintomas de uma reação alérgica ao usar os produtos. Considere usar alternativas anti-sépticos tais como povidona-iodo, álcoois, cloreto de benzalcônio, benzetônio cloro, ou paraclorometaxilenol (PCMX) quando qualquer alergia anterior à clorexidina gluconato é documentado ou suspeito (ANNOUNCEMENT, 2017).

Além das substâncias supracitadas, outras são indicadas para higiene química da prótese dentária como: peróxidos alcalinos, hipoclorito, ácidos, desinfetantes e enzimas, nesse contexto, ácidos são geralmente soluções de ácido hidrocloreídrico a 5% ou associados ao ácido fosfórico a 15%, particularmente efetivo na remoção de manchas que são resistentes à ação do hipoclorito. O ácido hidrocloreídrico apresenta-se na forma líquida e pode ser aplicado sobre a prótese com o uso de uma escova ou esponja, necessitando de um pequeno período de contato; a sua ação é rápida, porém pode causar danos acidentais durante seu uso, devendo assim ser manuseado com grande cuidado mesmo em concentrações diluídas (de 3% a 5%), (LUCENA et al., 2016).

As soluções ácidas agem dissolvendo componentes inorgânicos dos depósitos. Eles não são indicados para a limpeza de próteses parciais removíveis convencionais por causarem o enfraquecimento à parte metálica, podem ser utilizados para próteses parciais removíveis provisórias. Os ácidos agem tanto na superfície da resina como em profundidade e possuem ação fungicida principalmente sobre *Candida albicans* (PALUDO, 2014).

Usualmente essas substâncias são soluções de ácido hidrocloreídrico, podendo aparecer sozinhos ou combinados com ácido fosfórico, especialmente apropriado na remoção de manchas resistentes à ação dos hipocloritos. Apresentado na forma líquida é um dos mais utilizados, deve ser aplicado na prótese dental com uma escova ou esponja, necessitando de um pequeno período de contato, pois a sua ação higienizadora é rápida, entretanto pode causar danos acidentais durante o seu uso, dessa forma deve ser manuseado com extremo cuidado mesmo em concentrações diluídas (3 a 5%). Agem na prótese dental dissolvendo componentes inorgânicos dos depósitos (SOUZA; EM; DENTÁRIA, 2015).

O uso de enzimas vem sendo um dos métodos mais utilizados para controle de placa microbiana. Essas substâncias agem quebrando mucoproteínas, glicoproteínas e mucopolissacarídeos e são encontradas em forma de tabletes solúveis em água. Em relação ao seu funcionamento, possuem ótimo desempenho entre 35 graus e 65 graus, pois o produto dissolve melhor e tem mais efervescência nessa faixa de temperatura, elas também são capazes de remover *Candida albicans* da superfície da resina acrílica (PALUDO, 2014).

4.1.3. MÉTODO COMBINADO

Dentre os métodos de higienização de próteses removíveis, o mais indicado pelos cirurgiões dentistas é o combinado, que é a junção do método mecânico com o método químico, todavia a técnica mecânica consiste na escovação, com água e sabão neutro e a química é imergir a prótese em soluções químicas (ácidos diluídos, peróxidos alcalinos, clorexidina, enzimas), nesse sentido, a escovação da prótese deve ser feita da maneira correta, como indicada pelo dentista, e o paciente deve usar uma escova para a prótese e outra para a boca, a má higienização da prótese, causa halitose, lesões periodontais, entre outras patologias. O método combinado se mostra mais eficaz, pois somente a escovação não é capaz de remover todos os microrganismos, visto que a prótese possui depressões e irregularidades na resina (GONÇALVES et al., 2011).

No estudo de (PARAVINA; PIZZOLITTO; MACHADO, 2003), observou-se que ao esfregar a dentadura com uma escova de dente macia e sabão, solução desinfetante e usando um limpador ultrassônico, essa combinação de procedimentos foi bastante eficaz para a diminuição do número de microrganismos.

No estudo de (DOLORES et al., 2007), observou-se que a importância da associação métodos mecânico e químico na higienização de prótese total. É necessário que os portadores de aparelhos protéticos saibam realizar corretamente e diariamente a higienização mecânica das próteses e que façam uso de hipoclorito de sódio a 2,25% (água sanitária de uso doméstico) através da imersão da prótese em solução de 15 ml de hipoclorito de sódio em 200 ml de água durante 10 minutos, a cada 4 dias, pois após este período, inicia-se a recolonização nas próteses por *S. mutans* e *C. albicans*, associado à escovação. Esta técnica se mostrou muito eficiente por remover aproximadamente 100% do biofilme em 37% da amostra, não apresentando qualquer resultado ineficaz.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como principal objetivo avaliar a opinião de diversos autores sobre como promover uma higienização adequada das próteses totais e parciais removíveis. Com isso, chegou-se à conclusão de que a higienização mais eficaz é a combinação de métodos físicos e químicos, comprovando a afirmação de (GONÇALVES et al., 2011) sobre a ineficácia de somente a escovação para remoção do biofilme. Além disso, o estudo de (BASTOS et al., 2015) defende também a associação de métodos combinados como de fácil execução, viável e pouco dispendiosa. Logo, ambos autores defendem que é preciso o acompanhamento dos profissionais com seus pacientes para promoção da higienização eficaz das próteses seguindo um planejamento adequado de métodos combinados. Entretanto, é preciso mais estudos na área para elaborar um protocolo ideal de higienização de próteses totais e parciais removíveis.

Os profissionais da área da saúde devem manter-se atualizados sobre a combinação dos métodos de higienização mais eficaz, avaliando assim, de modo geral as condições do indivíduo que irá utilizar prótese removível, podendo esta ser total ou parcial. Nesse sentido, é preciso determinar a estratégia adequada para a limpeza da prótese. Além disso, é responsabilidade do odontólogo indicar acompanhamento periódico para evitar o desenvolvimento de doenças pela falta de higienização adequada, por isso, a instrução do paciente quanto à limpeza devida ao aparelho protético é de suma importância para promoção da saúde bucal dos usuários de próteses totais ou parciais removíveis

REFERÊNCIAS

- [1] ANNOUNCEMENT, S. FDA warns about rare but serious allergic reactions with the skin antiseptic chlorhexidine gluconate. 2017.
- [2] ARRUDA, C. N. F. DE et al. Effect of sodium hypochlorite and *Ricinus communis* solutions on control of denture biofilm: A randomized crossover clinical trial. *Journal of Prosthetic Dentistry*, v. 117, n. 6, p. 729–734, 2017.
- [3] BASTOS, P. L. et al. Métodos De Higienização Em Próteses Dentais Removíveis. *Revista Bahiana de Odontologia*, v. 6, n. 2, p. 129–137, 2015.
- [4] CHENG, Y. et al. Self-cleaning ability of a photocatalyst-containing denture base material. *Dental materials journal*, v. 27, n. 2, p. 179–86, 2008.
- [5] COLUSSI, C. F.; FREITAS, S. F. T. DE. Aspectos epidemiológicos da saúde bucal do idoso no Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 18, n. 5, p. 1313–1320, 2002.
- [6] CRISTINA, A. et al. MICROBIANA A DUAS RESINAS ACRÍLICAS USADAS EM PRÓTESE REMOVÍVEL: Polimetilmetacrilato e Poliamida. 2014.
- [7] CRUZ, P. C. Avaliação clínica da eficácia dos métodos químico (peróxido alcalino) e mecânico (ultra-som) frente à propriedade de remoção do biofilme de próteses totais Avaliação clínica da eficácia dos métodos químico (peróxido alcalino) e mecânico (ultra-som . 2007).
- [8] DE SOUSA PORTA, S. R. et al. Evaluation of sodium hypochlorite as a denture cleanser: A clinical study. *Gerodontology*, v. 32, n. 4, p. 260–266, 2015.
- [9] DOLORES, C. et al. Eficiência de substâncias químicas na remoção do biofilme em próteses totais. *Rev Odontol UNESP*, v. 36, n. 1, p. 53–60, 2007.
- [10] KRONBAUER, G.L. et al.; Efeito da desinfecção por micro-ondas sobre a microdureza de resina para base de prótese polimerizada por diferentes métodos. In: SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 10.,2009, Porto Alegre. Anais, Porto Alegre: PUCRS, 2009.
- [11] FALCÃO, A. F. P.; SANTOS, L. D. B.; SAMPAIO, N. D. M. Candidíase Associada a Próteses Dentárias. *Sitientibus*, Feira de Santana, n. 75, p. 135–146, 2004.
- [12] FARIAS NETO, A.; CARREIRO, A. DA F. P.; RIZZATTI-BARBOSA, C. M. A Prótese parcial removível no contexto da odontologia atual TT - The issue of the removable partial denture in modern dentistry. *Odontol. clín.-cient*, v. 10, n. 2, p. 125–128, 2011.
- [13] FONSECA, P.; AREIAS, C.; FIGUEIRAL, M. H. Higiene de próteses removíveis. *Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentaria e Cirurgia Maxilofacial*, v. 48, n. 3, p. 141–146, 2007.
- [14] GLASS, R. T. et al. Evaluation of microbial flora found in previously worn prostheses from the Northeast and Southwest regions of the United States. *Journal of Prosthetic Dentistry*, v. 103, n. 6, p. 384–389, 2010.
- [15] GONÇALVES, L. P. V. Onofre MA, Spoto MR, Scaf G. Estudo clínico das lesões de mucosa provocadas pelo uso de próteses removíveis. *Revista Brasileira de Odontologia*, 1995; 52(2):9-12.
- [16] GONÇALVES, L. F. F. et al. Higienização de Próteses Totais e Parciais Removíveis. *Revista Brasileira de Ciências da Saúde*, v. 15, n. 1, p. 87–94, 2011.
- [17] HAHNEL, S. et al. *Candida albicans* biofilm formation on soft denture liners and efficacy of cleaning protocols. *Gerodontology*, v. 29, n. 2, p. 1–9, 2012.
- [18] KAZUO, S. D. et al. Higienização Em Prótese Parcial Removível. *Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo*, v. 20, n. 2, p. 168–4, 2008.
- [19] LUCENA, A. G. et al. Avaliação da utilização e hábitos de higiene em usuários de prótese dentária removível. p. 193–197, 2016.
- [20] MANUELA, C. et al. Autopercepção de saúde bucal em idosos: estudo de base domiciliar. 2017.
- [21] MARIA, E.; DA, M.; ELEUTÉRIO, C. Uma Grande Descoberta : O Prazer Que a Higienização Bucal Correta E Bem Orientada Pode a Great Discovery : the Pleasure Provided By the Well Guided. p. 39–42, 2003.
- [22] MONTAGNER, H. et al. In vitro antifungal action of different substances over microwaved-cured acrylic resins. *Journal of Applied Oral Science*, v. 17, n. 5, p. 432–435, 2009.
- [23] MORAES, M. N. et al. Mechanisms of bacterial adhesion to biomaterials. *Revista Médica de Minas Gerais*, v. 23, n. 1, p. 99–104, 2013.

- [24] MOURA, J. S. et al. Influence of storage solution on enamel demineralization submitted to pH cycling. *Journal of applied oral science : revista FOB*, v. 12, n. 3, p. 205–208, 2004.
- [25] MURATA H., HONG G., LI Y., SADAMORI S., HAMADA T. Influence of denture cleansers on the color stability of three types of denture base acrylic resin. *Journal Prosthet Dent*, 101(3):205-13, 2009.
- [26] NALBANT, A. D. et al. Effectiveness of different cleaning agents against the colonization of *Candida* spp and the in Vitro detection of the adherence of these yeast cells to denture acrylic surfaces. *Yonsei Medical Journal*, v. 49, n. 4, p. 647–654, 2008.
- [27] NUNES M., CASATI M., VILLALPANDO K, TEIXEIRA, F. Contribution of dental biofilm study to the treatment of periodontal diseases Contribuição do estudo do biofilme dentário para o tratamento das doenças periodontais. v. 25, n. 1, p. 55–61, 2007.
- [28] OLCHIK, M. R. et al. O impacto do uso de prótese dentária na qualidade de vida de adultos e idosos. *Revista Kairós Gerontologia*, v. 16, n. 5, p. 107–121, 2013.
- [29] PALUDO, F. M. Higienização de Próteses Dentárias Removíveis: Uma Revisão de Literatura. p. 57, 2014.
- [30] PARAVINA, A.; PIZZOLITTO, A.; MACHADO, A. An infection control protocol: effectiveness of immersion solutions to reduce the microbial growth on dental prostheses. *J Oral Rehabil*, v. 30, p. 532–536, 2003.
- [31] SHEEN, S. R.; HARRISON, A. cleanser. v. 84, n. 6, [s.d.].
- [32] SILVA, C. H. L. et al. Levantamento do grau de instruções e dos materiais e métodos de higiene utilizados por usuários de próteses totais. *Revista de Odontologia da UNESP*, v. 35, n. 2, p. 125–131, 2006.
- [33] SILVA, C. H. L. DA; PARANHOS, H. DE F. O.; ITO, I. Y. Evidenciadores de biofilme em PT. *Pesquisa odontologica brasileira = Brazilian oral research*, v. 16, n. 3, p. 270–275, 2002.
- [34] SILVA, R.; SEIXAS, Z. Materials and methods for removable prostheses cleaning. *Int J Dent*, v. 7, p. 125–32, 2008.
- [35] SOUZA, K. R. D. E.; EM, H.; DENTÁRIA, P. Higienização em prótese dentária. 2015.
- [36] UCAR, A.; ROJAS, G.; BALLESTER, L. Acción de agentes químicos en la eliminación de *Candida albicans* sobre protesis dentales. *Acta Odontologica Venezolana*, v. 45, n. 2, p. 1–9, 2007.
- [37] ULUDAMAR, A. et al. In vivo efficacy of alkaline peroxide tablets and mouthwashes on *Candida albicans* in patients with denture stomatitis. *Journal of Applied Oral Science*, v. 18, n. 3, p. 291–296, 2010.

Capítulo 20

A eficácia dos testes clínicos de campo na avaliação da capacidade funcional dos pacientes com DPOC: Uma revisão de literatura

Leidyane de Almeida Gonçalves

Daniele Maria dos Santos

Alexa Alves de Moraes

Bárbara Renatha Afonso Ferreira de Barros Leite

Resumo: **Introdução:** A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) promove disfunções na musculatura periférica e respiratória, contribuindo para sensação de dispneia, fadiga e fraqueza, comprometendo o desempenho da força e muscular e capacidade funcional. **Objetivo:** Identificar os principais testes de campo validados para mensurar a capacidade funcional e força muscular periférica em indivíduos com DPOC. **Método:** Trata-se de uma revisão de literatura, utilizando as bases de dados BIREME, Cochrane, PEDro, Portal de Periódicos CAPES, PubMed, Scielo e Scopus, no período de setembro a outubro de 2017. **Resultados:** Foram identificados 1796 estudos, permanecendo 17 de acordo com os critérios de elegibilidade. Para avaliação da capacidade funcional, foram utilizados o Teste de Caminhada de Seis Minutos (TC6') (n=15), Teste de Sentar e Levantar (n=2), Teste "Up and Go" (n=2), Glittre-ADL (n=1), Incremental Shuttle Walking Test (n=1) e Acelerômetro Tridimensional (n=1). Para a força muscular periférica, a Dinamometria (força de preensão palmar/hangrip) foi um dos testes mais utilizados (n=4), bem como houve predominância da avaliação do músculo quadríceps femoral. **Conclusão:** Os testes funcionais são amplamente utilizados na prática clínica do fisioterapeuta, bem como nas pesquisas, destacando-se o TC6', o Teste de Sentar e Levantar e a Dinamometria.

Palavras-chave: DPOC; Tolerância ao exercício; Força muscular; Instrumentos; Avaliação.

Este estudo foi desenvolvido no Departamento de Fisioterapia da Universidade Estadual da Paraíba, sem auxílio de financiamento de agências de fomento ou qualquer tipo de investimento externo.

1. INTRODUÇÃO

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença de alta prevalência, prevenível, tratável e caracteriza-se pela obstrução do fluxo aéreo, o qual não é totalmente reversível. Corresponde à quarta causa de morte no mundo por doenças crônicas e as estimativas mostram que em 2020 será a terceira causa de morte, visto que o envelhecimento populacional e a exposição aos fatores de riscos contribuirão para esse resultado¹.

Essa doença promove diversas alterações no organismo, as quais não se restringem apenas ao sistema respiratório, repercutindo sistematicamente. Dentre essas alterações, ocorre disfunção dos músculos periféricos com modificações estruturais, a exemplo da redução da massa muscular - evidenciada pela redução da área de secção transversa do músculo -, desuso e imobilização, perda predominante de fibras de contração lenta e baixa capacidade oxidativa. Observa-se também a redução do metabolismo de fosfocreatina muscular, um dos principais fatores envolvidos no metabolismo anaeróbio láctico, resultando em lactacidose precoce. Desse modo, esses fatores contribuem para a perda da função muscular esquelética, evidenciada pela redução da força e da resistência muscular, predominantemente nos membros inferiores^{2,3}.

Além disso, a disfunção muscular também interfere no desempenho dos músculos respiratórios, contribuindo para o desenvolvimento da dispneia e assim provocando um ciclo de declínio funcional. O indivíduo com a disfunção muscular respiratória desenvolve dispneia, a qual dificulta a realização das suas atividades cotidianas, levando à inatividade física e contribuindo para a redução da qualidade de vida e da capacidade funcional, sendo esta definida como a capacidade de realizar as atividades da vida diária (AVD) de forma independente, sendo considerada um preditor de mortalidade^{4,5}.

Nesse contexto, concomitantemente à avaliação das variáveis respiratórias, é necessário avaliar a força muscular periférica e a capacidade funcional, dado que são essenciais para a prescrição do exercício, além de apresentarem valor prognóstico e contribuírem para o acompanhamento da evolução da doença. Quanto às formas de avaliação, vários métodos são utilizados na prática clínica e os mais empregados são os testes de campo, por serem de baixo custo, de fácil compreensão e reprodutibilidade, factíveis em diversos ambientes e geralmente mimetizam as atividades reais do indivíduo^{6,7}.

Ressalta-se a existência de uma variedade desses instrumentos, tais quais: Teste de Caminhada de Seis Minutos (TC6'), o Teste de Sentar e Levantar, Teste do Degrau, entre outros que avaliam a capacidade funcional. Para a avaliação da força muscular periférica, por sua vez, podem ser utilizados o Teste de uma Repetição Máxima (1RM), a Contração Isométrica Voluntária Máxima (CIVM), Teste Incremental de MMSS e MMII e a Dinamometria. Esses instrumentos são considerados ferramentas úteis na prática fisioterapêutica, porém muitos não apresentam validação para a população em questão.

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo identificar os principais testes de campo validados para mensurar a capacidade funcional e a força muscular periférica em indivíduos com DPOC, o qual contribuirá para a prática clínica, facilitando a escolha do teste mais adequado pelo profissional.

2. MÉTODOS

Trata-se de uma revisão bibliográfica, na qual foram utilizadas as bases de dados *BIREME*, *Cochrane*, *PEDro*, Portal de Periódicos CAPES, *PubMed*, *SciELO* e *Scopus*. A busca ocorreu em setembro e outubro de 2017, aplicando-se combinações entre o termo *COPD* e, pelo menos, um dos seguintes descritores: *Exercise Test*, *Muscle Strength* e *Exercise Tolerance*, bem como suas equivalências em português.

Foram incluídos estudos publicados nos últimos dez anos que avaliassem a capacidade funcional e força muscular periférica em indivíduos diagnosticados com DPOC, os quais deveriam ter idade igual ou superior a 40 anos e que não apresentassem doenças neuromusculares, alterações cognitivas e outras pneumopatias associadas.

Os critérios de exclusão compreenderam estudos cujo título e resumo não fossem pertinentes ao objetivo do presente estudo; estudos de revisão, séries de caso, estudos de caso, teses, dissertações e anais de congresso; estudos que compreenderam modelos experimentais; amostras de sujeitos com idade inferior a 40 anos; artigos com tempo de publicação maior que dez anos; e, por fim, estudos publicados em línguas que não fossem a Língua Portuguesa e Língua Inglesa.

A extração dos dados de cada estudo foi feita de forma independente pelo grupo de pesquisa, sendo os mesmos analisados de forma descritiva, de acordo com os critérios de elegibilidade adotados.

3. RESULTADOS

Na busca realizada foram encontrados 143 artigos na *Scielo*, 78 na *PubMed*, 79 no Portal de Periódicos CAPES, 316 na *Cochrane*, 454 na *Scopus*, 480 na BIREME, 246 na *PEDro*, totalizando 1796 estudos. Após a análise dos estudos, foram excluídos 1045 estudos após triagem inicial, por não atenderem aos critérios de elegibilidade, 617 depois de leitura do resumo e texto completos e 134 por duplicata. Sendo assim, 17 artigos foram incluídos no presente estudo para análise descritiva e síntese dos resultados. Todo processo de busca utilizado nas respectivas bases de dados e os motivos da exclusão foram apresentados no fluxograma, como recomendado pelo grupo PRISMA (**Fig.1**).

Os estudos totalizaram 3044 participantes, sendo estes compostos por homens e mulheres com estágio de DPOC de leve até muito grave. A **tabela 1** representa as características dos artigos incluídos quanto a autor, ano de publicação, atributos da população, testes utilizados para a capacidade funcional e força muscular periférica, principais resultados e conclusões.

Em relação aos desfechos dos artigos incluídos, 6 estudos avaliaram apenas o desfecho de capacidade funcional^{8,9,10,11,12,13}, 4 avaliaram a força muscular periférica^{14,15,16,17} e 9 avaliaram os dois simultaneamente^{18,19,20,21,22,23,24,25,26}. Para a capacidade funcional, todas as pesquisas adotaram o Teste de caminhada de seis minutos (TC6')^{8,9,10,11,12,13,18,19,20,21,22,23,24,25,26}, tanto como teste único, como também para servir de referência na comparação e validação de outros testes. Além do TC6, foram empregados o Teste de Sentar e Levantar em dois estudos^{19,20}, o Acelerômetro Tridimensional em um estudo⁸, o *Glittre-ADL* em um estudo¹³, o *Incremental Shuttle Walking Test* em um estudo¹², e o Teste "*Up and Go*" em dois estudos^{18,24}.

Na avaliação da força muscular periférica, a Dinamometria (força de preensão palmar/*hangrip*)^{14,17,19,21} foi um dos testes mais utilizados, bem como houve a predominância da avaliação do músculo quadríceps femoral^{15,16,17,20,21,22,23,24,25,26}. Os testes foram utilizados tanto de forma manual e analógica quanto computadorizada.

Figura 1. Fluxograma do processo de busca e seleção dos artigos.

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

TABELA.1 Caracterização dos estudos incluídos

AUTOR (ANO)	PARTICIPANTES	TESTES UTILIZADOS	RESULTADOS	CONCLUSÃO
<i>Amorim et al., (2014)</i>	40 indivíduos com DPOC	<u>Capacidade funcional</u> : TC6' e Acelerômetro tridimensional.	Menor tempo de caminhada (68,5 ± 25,8 min/dia vs. 105,2 ± 49,4 min/dia; p < 0,001), menor distância caminhada (3,9 ± 1,9 km/dia vs. 6,4 ± 3,2 km/dia; p < 0,001) e menor número de passos/dia em pacientes com DPOC quando comparados com o grupo controle.	Indivíduos com DPOC são menos ativos quando comparados a adultos saudáveis com idade semelhante.
<i>Ansari et al., (2012)</i>	188 indivíduos com DPOC	<u>Força muscular periférica</u> : Dinamometria (força preensão palmar)	A força de preensão palmar (expressa em porcentagem prevista, foi de 72 ± 15.5% em homens e 81 ± 18.2 em mulheres, do predito para essa população.	Redução da força de preensão palmar ocorre com mais frequência e, em maior medida, em pacientes com história de exacerbações frequentes de DPOC e está associada a um menor estado de saúde.
<i>Borel et al., (2009)</i>	16 indivíduos com DPOC	<u>Capacidade funcional</u> : Teste passo a passo de seis minutos; TC6'	A comprovação da reprodutibilidade do teste Stepper de seis minutos. Não houve diferença significativa na percepção média da fadiga das pernas no score de Borg (3,4 (2,5) para o teste passo a passo e 2,8 (2,1) para teste de caminhada de seis minutos).	Conclui-se que o teste stepper de seis minutos é um teste reproduzível, sensível, seguro, bem tolerado e viável para pacientes com DPOC.
<i>Gianjeppe-Santos (2014)</i>	24 indivíduos com DPOC	<u>Capacidade funcional</u> : Teste TUG e TC6'. <u>Força muscular periférica</u> : Dinamometria	TC6 = 370 m, Extensão do joelho = 291,9 N (86,8% do esperado), Abdução do quadril = 192,6 N (82,7% do esperado); 54% da amostra apresentou força reduzida para extensão de joelho.	A força dos MMII está associada à sintomatologia em pacientes com DPOC em reabilitação pulmonar e apresenta impacto negativo na capacidade funcional e na dispneia em pacientes com DPOC.
<i>Holland et al., (2014)</i>	19 indivíduos com DPOC	<u>Capacidade funcional</u> : TC6'	O número de voltas em casa foi de 20 ± 10 X 30 ± 18 comparado ao teste do hospital.	O TC6 realizado em casa não deve ser usado para comparar o desempenho de um paciente com DPOC porque pode subestimar os resultados.
<i>Nguyen, H. Q et al., (2015)</i>	558 indivíduos com DPOC	<u>Capacidade funcional</u> : TC6'	O ganho de força muscular nos MMII potencializa a capacidade funcional traduzido por uma melhor distância percorrida (± 43 m) no TC6.	Foi observado que os programas de reabilitação pulmonar contribuíram na capacidade de exercício de indivíduos com DPOC, evidenciado por resultados positivos no TC6.
<i>Calik-Kutukcu et al., (2014)</i>	20 indivíduos com DPOC	<u>Capacidade funcional</u> : TC6 e TSL <u>Força muscular periférica</u> : dinamometria (handgrip).	TC6 DPOC = 549 m; TC6 saudáveis = 620 m (diferença p<.05). Handgrip DPOC = 185 N, Handgrip saudáveis = 195 N (diferença não-significativa). Sentar e levantar DPOC = 16, saudáveis = 19 (diferença significativa com p<.05).	Capacidade de exercício, força e resistência muscular periférica estão severamente afetadas em pacientes com DPOC.

(continuação ...)

TABELA.1 Caracterização dos estudos incluídos

AUTOR (ANO)	PARTICIPANTES	TESTES UTILIZADOS	RESULTADOS	CONCLUSÃO
Oliveira et al., (2014)	53 indivíduos com DPOC	<u>Capacidade funcional: TC6 e ISMT.</u>	ISWT - Distância percorrida = 382m, % do previsto = 60%. TC6 - Distância percorrida = 445m, % do previsto = 75%.	Nos dois testes, houve redução da capacidade funcional.
Ozalevli et al., (2007)	53 indivíduos com DPOC	<u>Capacidade funcional: TC6 e TSL</u> <u>Força muscular periférica: teste manual de força muscular do quadríceps (Daniels Grading System).</u>	STS DPOC = 15/min; STS saudáveis = 20/min. TC6 DPOC = 112 m; TC6 saudáveis = 423 m. Força do quadríceps DPOC = 4, saudáveis = 5. Todas as diferenças entre DPOC e saudáveis significativas ($p < 0,05$).	O TC6 e o STS são capazes de determinar corretamente a capacidade funcional, mas o STS consegue estressar menos o indivíduo. A força muscular periférica do quadríceps encontra-se reduzida na população de DPOC, independente do sexo.
Pleguezuelos, et al., (2016)	28 indivíduos com DPOC	<u>Capacidade funcional: TC6</u> <u>Força muscular periférica: Teste isocinético em regime concêntrico (força muscular do quadríceps): Dinamômetro (de mão hidráulico):</u>	Menor distância percorrida durante o TC6 nos pacientes com DPOC que apresentaram maiores níveis de biomarcadores inflamatórios. A força dos flexores e extensores do joelho foi significativamente reduzida em pacientes com DPOC ($p \setminus 0,001$ e $p = 0,003$). A força média do punho (mão dominante) nos pacientes com DPOC era de 26,7 kg em comparação com 24 kg nos controles saudáveis.	A disfunção muscular em pacientes com DPOC difere em diferentes compartimentos musculares. A força muscular apresentou-se reduzida em maioria dos compartimentos musculares de pacientes com DPOC quando comparada com a força do grupo controle saudável.

4. DISCUSSÃO

O presente estudo identificou os principais testes de campo validados para a avaliação da capacidade funcional e força muscular periférica em indivíduos com DPOC, os quais representam importantes ferramentas na avaliação do paciente com a referida desordem respiratória.

De acordo com os estudos analisados, os testes abordados não foram utilizados apenas como método de acompanhamento de programas de reabilitação^{11,18}, mas também foram empregados no intuito de comparar os resultados obtidos com outros métodos de avaliação^{8,9,19,20,21,22,24}.

Embora a pesquisa tenha apontado para uma diversidade de instrumentos disponíveis para tal avaliação, este fato é capaz de gerar dúvidas quanto ao método mais utilizado e sensível para pacientes com DPOC. Assim, observou-se alta prevalência de utilização do TC6' para avaliação da capacidade funcional e a Dinamometria para mensuração da força muscular periférica.

4.1. AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE FUNCIONAL

Como descrito em vários estudos, o TC6' foi o mais utilizado^{8,9,10,11,12,13,18,19,20,21,22,23,24,25,26}, visto que avalia as respostas fisiológicas e o desempenho do indivíduo de forma global. O TC6 é considerado um teste submáximo, pois o indivíduo controla sua própria intensidade, sendo capaz de parar ou reduzir sua velocidade durante o teste, representando melhor o nível de exercício funcional para as atividades funcionais²⁷. Sua utilização foi tanto a nível ambulatorial e hospitalar, quanto a nível domiciliar, porém não foi adequado seu uso no atendimento domiciliar¹⁰.

Dos 15 estudos que utilizaram o teste em questão, seis foram realizados no Brasil^{8,12,13,18,22,23}, dois no Canadá^{24,25}, dois nos Estados Unidos^{11,26}, dois na Turquia^{19,20}, um na Austrália¹⁰, um na Espanha²¹ e, por fim, um na França⁹. A utilização frequente e difundida do TC6' possivelmente se deve pelo fato de ser

validado em vários idiomas, além de seu baixo custo e sua fácil compreensão para o paciente e profissional.

Em relação à distância percorrida por indivíduos com DPOC e averiguada pelo TC6', a menor distância percorrida detectada entre os estudos foi 112 metros²⁰, enquanto que em outros estudos houve uma maior distância percorrida, correspondendo a 548 metros, 483,7 metros e 444,1 metros, respectivamente^{8,9,19}. Observou-se que os indivíduos que realizaram o TC6 em domicílio apresentaram uma menor distância percorrida (391 metros) quando comparados aos indivíduos que realizaram o teste no ambiente hospitalar (421 metros)¹⁰. Essa diferença pode ser atribuída, provavelmente, ao espaço em que foi realizado o teste, na qual a ausência de uma pista adequada pode interferir nos resultados do teste²⁸.

Outro achado importante verificado foi que os indivíduos com DPOC na pré-reabilitação percorreram uma distância de 299 metros e após o programa de reabilitação conseguiram percorrer uma maior distância (343 metros)¹¹, provavelmente pela melhora da capacidade funcional, pois o programa de reabilitação contribui para a melhora da tolerância ao exercício, reduz a dispneia, melhora a qualidade de vida e reduz a utilização dos recursos de saúde²⁹.

Também foi verificada uma associação entre a redução da capacidade funcional em indivíduos com DPOC a disfunções musculares periféricas. Em um estudo, a força muscular do quadríceps femoral pôde prever a distância percorrida no TC6'²², bem como foi observado que o comprometimento da força muscular periférica, evidenciada pela redução da força muscular do quadríceps femoral, está relacionado com a diminuição da capacidade de exercício demonstrado por um declínio acentuado na distância percorrida pelos indivíduos com DPOC durante a realização do teste²⁶.

Além do TC6', o teste de Sentar e Levantar foi o segundo teste mais utilizado nos estudos^{19,20} sendo considerado uma alternativa ao TC6' por ser menos estressante ao paciente e mais fácil de aplicar do que o TC6'^{20,30}.

4.2 AVALIAÇÃO DE FORÇA MUSCULAR PERIFÉRICA

No tocante à avaliação da força muscular periférica, houve o predomínio da utilização da Dinamometria para membros superiores e inferiores, tanto de forma analógica através da força de preensão palmar^{14,17}, quanto de maneira isocinética para MMII, mais comum em laboratórios^{16,17,21,24,25}.

Dentre esses, houve predomínio da mensuração desta variável em membros inferiores (MMII) em relação aos membros superiores (MMSS), sendo o músculo quadríceps femoral avaliado por todos os autores que consideraram MMII em seus estudos^{15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,21}.

Com exceção de um estudo¹⁹, as demais pesquisas revelaram importantes perdas de força muscular nos participantes com DPOC, destacando-se uma amostra²⁴, a qual obteve apenas 68% da força esperada para extensão de joelho, bem como outro estudo¹⁴, em que os participantes apresentaram cerca de 72% da força esperada para a preensão palmar. Esses resultados, ainda, reforçam a ausência de um consenso em relação a quais membros - superiores ou inferiores - apresentam maior declínio de força em pacientes com DPOC. Alguns estudos sugerem perdas mais significativas em membros inferiores^{31,32}, uma vez que indivíduos acometidos pela disfunção usualmente evitam andar em decorrência da sensação de dispneia.

Embora diversos estudos tenham utilizado a Dinamometria computadorizada isocinética^{15,16,21,24,25}, a qual apresenta elevado custo e a torna frequentemente inacessível na prática clínica³³, a mensuração da força muscular também dispõe de dinamômetros de baixo custo e de fácil aplicação durante a contração isométrica voluntária máxima, a exemplo do dinamômetro portátil³⁴. A interpretação dos resultados obtidos pela Dinamometria, todavia, torna-se dificultada, uma vez que ainda não existem valores de referência para a força muscular periférica em indivíduos com DPOC, além de ser identificada uma carência quanto à exploração em profundidade das fórmulas de predição disponíveis na literatura científica³⁵.

5. CONCLUSÃO

De acordo com a pesquisa realizada, pode-se concluir que os testes funcionais são amplamente utilizados na prática clínica do fisioterapeuta, bem como nas pesquisas com reabilitação pulmonar em pacientes com DPOC. Destacam-se como os mais usuais e validados para diferentes populações o TC6', o Teste de Sentar e Levantar e a Dinamometria.

Portanto, sugere-se a utilização desses testes supracitados e a realização de novas pesquisas com outros instrumentos, a fim de ampliar as opções e acurácia na avaliação da capacidade funcional e força muscular periférica dos pacientes com DPOC.

AGRADECIMENTO

As autoras do presente artigo expressam seus agradecimentos a Vanessa Katllen Laurentino de Carvalho pelas contribuições na idealização inicial deste trabalho.

CONFLITO DE INTERESSE

As autoras declaram não haver conflitos de interesse.

REFERÊNCIAS

- [1] Gold Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Pocket guide to copd diagnosis, management, and prevention. 2017; 1-37.
- [2] Agustí AGN, Noguera A, Sauleda J, Sala S, Pons J, Busquets X. Systemic effects of chronic obstructive pulmonary disease. *Eur Respir J*. 2003; 21(2): 347-360. DOI: 10.1183/09031936.03.00405703.
- [3] Dourado VZ, Tanni SE, Vale SA, Faganello MM, Sanchez FF, Godoy I. Manifestações sistêmicas na doença pulmonar obstrutiva crônica. *J Bras Pneumol*. 2006; 32(2): 161-171. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1806-37132006000200012>.
- [4] Goldstein GCA. Capacidade funcional, autonomia e independência: definindo alguns termos importantes em gerontologia. Portal do envelhecimento [Internet]. 2009 [Acesso em: 2018 jan 9]; Disponível em: <http://www.portaldoenvelhecimento.com/saude/doenca/item/3912-capacidade-funcional-autonomia-e-independencia-definindo-alguns-termos-importantes-em-gerontologia>.
- [5] Moreira FBR. Avaliação da capacidade funcional do paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica: testes clínicos versus questionários [Dissertação]. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais; 2013.
- [6] Hernades NA, Karsten M. Porto Alegre: Artmed Panamericana; 2014.
- [7] Karloh M, Palú M, Mayer AF.. Methods for assessing functional capacity in patients with COPD. *ConScientiae Saúde*. 2014; 13(4): 663-649. DOI:10.5585/ConsSaude.v13n4.4830.
- [8] Amorim PB, Stelmach R, Carvalho CRF, Fernandes FLA, Pinto RMC, Cukier A. Barreiras associadas à menor atividade física em portadores de DPOC. *J Bras Pneumol*. 2014; 40(5):504-512. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1806-37132014000500006>.
- [9] Borel, B, Fabre C, Saison, S, Bart F, Grosbois JM. An original field evaluation test for chronic obstructive pulmonary disease population: the six-minute stepper test. *Clinical rehabilitation*. 2009; 24(1): 82-93. DOI: 10.1177/0269215509343848.
- [10] Holland AE, Rasekaba T, Júnior JFF, Bruge AT, Lee AL. The 6-minute walk distance cannot be accurately assessed at home in people with COPD. *Disability and rehabilitation*. 2015; 37(12): 1102-1106. DOI: 10.3109/09638288.2014.956815.
- [11] Nguyen H. Q, Harrington A, Liu ILA, Lee JS, Gould MK. Impact of pulmonary rehabilitation on hospitalizations for chronic obstructive pulmonary disease among members of an integrated health care system. *J of cardiopulmonary rehabilitation and prevention*. 2015; 35(5): 356-366. DOI: 10.1097/HCR.0000000000000128.
- [12] Oliveira LA, Mesquita R, Brito IL, Laburú VM, Pitta F, Probst VS. Relação do trabalho desenvolvido em testes máximo e submáximo de capacidade de exercício com o grau de obstrução ao fluxo aéreo em indivíduos com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. *Fisioterapia e Pesquisa*. 2014; 21(1): 81-86. DOI: 10.1590/1809-2950/484210114.
- [13] Santos K, Karloh M, Araujo CLP, D'Aquino AB, Mayer AF. Relationship between the functional status constructs and quality of life in COPD. *Fisioter. Mov*. 2014; 27(3): 361-369. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0103-5150.027.003.A006>.
- [14] Ansari K, Keaney N, Taylor I, Burns G, Farrow M. Muscle weakness, health status and frequency of exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease. *Postgraduate medical journal*. 2012; 88(1041): 372-376. DOI:10.1136/postgradmedj-2011-130293.
- [15] Spruit MA, Franssen FME, Rutten EPA, Wagers SS, Wouters EF. Age-graded reductions in quadriceps muscle strength and peak aerobic capacity in COPD. *Rev. bras. fisioter*. 2012; 16(2): 148-156. PMID: 22378475.

- [16] Vieira L, Bottaro M, Celes R, Viegas CAA, Silva CAM. Avaliação muscular isocinética do quadríceps em indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica. *Rev Port de Pneumol*. 2010; 16(5): 717-736. ISSN 0873-2159.
- [17] Silva KR, Marrara KT, Marino DM, Di Lorenzo VAP, Jamami M. Fraqueza muscular esquelética e intolerância ao exercício em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. *Rev. bras. fisioter*. 2008; 12(3): 169-175. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-35552008000300003>.
- [18] Gianjoppe-Santos J, Nyssen SM, Arcuri JF, Junior ADO, Jamami M, Di Lorenzo VAP. Influência da força muscular isométrica de membros inferiores sobre equilíbrio e índice BODE em pacientes com DPOC: estudo transversal. *Fisioter. Mov*. 2014; 27(4): 621-632. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0103-5150.027.004.A014>.
- [19] Calik-Kutukcu E, Savci S, Saglam M, Vardar-Yagli N, Inal-Ince D, Arikan H, et al. A comparison of muscle strength and endurance, exercise capacity, fatigue perception and quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease and healthy subjects: a cross-sectional study. *BMC Pul. Med*. 2014; 14(1): 1-10. Doi: 10.1186/1471-2466-14-6.
- [20] Ozalevli S, Ozden A, Itil O, Akkoclu A. Comparison of the Sit-to-Stand Test with 6 min walk test in patients with chronic obstructive pulmonary disease. *Respir. Med*. 2007; 101(2): 286-293. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rmed.2006.05.007>.
- [21] Pleguezuelos E, Esquinas C, Moreno E, Guirao L, Ortiz J, Garcia-Alsina J, et al. Muscular dysfunction in COPD: systemic effect or deconditioning?. *Lung*. 2016; 194(2): 249-257. DOI 10.1007/s00408-015-9838-z.
- [22] Rodrigues SL, Silva CAM, Amorim CF, Lima T, Ribeiro FA, Viegas CAA. Correlação entre hipoxemia moderada e função muscular esquelética periférica na doença pulmonar obstrutiva crônica-Estudo-piloto. *Rev. Portug. Pneumol*. 2008; 14(6): 769-785. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0873-2159\(15\)30286-5](https://doi.org/10.1016/S0873-2159(15)30286-5).
- [23] Rodrigues SL, Silva CAM, Lima T, Viegas CAA, Rodrigues MP, Ribeiro FA. Influência da função pulmonar e da força muscular na capacidade funcional de portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica. *Rev. Portug. Pneumol*. 2009; 15(2): 199-214. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0873-2159\(15\)30127-6](https://doi.org/10.1016/S0873-2159(15)30127-6).
- [24] Roig M, Eng JJ, MacIntyre DL, Road JD, Reid WD. Associations of the Stair Climb Power Test with muscle strength and functional performance in people with chronic obstructive pulmonary disease: a cross-sectional study. *Phys Ther*. 2010; 90(12): 1774-1782. DOI: 10.2522/ptj.20100091.
- [25] Roig M, Eng JJ, MacIntyre DL, Road JD, Reid WD. Deficits in muscle strength, mass, quality, and mobility in people with chronic obstructive pulmonary disease. *J Cardiopulm Rehabil Prev*. 2011; 31(2): 120-124. DOI: 10.1097/HCR.0b013e3181f68ae4.
- [26] Singer J, Yelin EH, Katz PP, Sanchez G, Iribarren C, Eisner MD, et al. Respiratory and Skeletal Muscle Strength in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. *J Cardiopulm Rehabil Prev*. 2011; 31(2):111-9. DOI: 10.1097/HCR.0b013e3182033663.
- [27] American Thoracic Society. ATS Statement: Guidelines for the Six-Minute Walk Test. *Am J Respir Crit Care Med*. 2002; 166(1): 111-117. DOI: 10.1164/ajrccm.166.1.at1102.
- [28] Beekman E, Mesters I, Hendriks E, Klaassen MP, Gosselink R, van Schayck OC, et al. Course length of 30 metres versus 10 metres has a significant influence on six-minute walk distance in patients with COPD: an experimental crossover study. *J Physiother*. 2013; 59(3): 169-176. DOI: 10.1016/S1836-9553(13)70181-4.
- [29] Florian J, Rubin A, Mattiello R, Fontoura FF, Camargo JJP, Teixeira PJZ. Impacto da reabilitação pulmonar na qualidade de vida e na capacidade funcional de pacientes em lista de espera para transplante pulmonar. *J Bras de Pneumol* 2013; 39(3): 349-356. ISSN (on-line): 1806-3756.
- [30] Meriem M, Cherif J, Toujani S, Ouahchi Y, Hmida AB, Beji M. Sit-to-stand test and 6-min walking test correlation in patients with chronic obstructive pulmonary disease. *Ann Thorac Med*. 2015; 10(4): 269-273. DOI: 10.4103/1817-1737.165289.
- [31] Gosselink R, Troosters T, Decramer M. Distribution of muscle weakness in patients with stable chronic obstructive pulmonary disease. *J Cardiopulm Rehabil*. 2000; 20(6): 353-360. PMID: 11144041.
- [32] Castagna O, Boussuges A, Vallier JM, Prefaut C, Brisswalter J. Is impairment similar between arm and leg cranking exercise in COPD patients?. *Respir Med*. 2007; 101(3): 547-553. DOI: 10.1016/j.rmed.2006.06.019.
- [33] Ponce DA, Martin CA, Martins D, Andrade MC. Conceitualização e Análise dos Dinamômetros Isocinéticos. *Brazilian Journal of Biomechanics*, Santa Catarina. 2011; 12(23): 57-66.
- [34] Maltais F, Decramer M, Casaburi R, Barreiro E, Burelle Y, Debigare R, et al. An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: update on limb muscle dysfunction in chronic obstructive pulmonary disease. *Am J Respir Crit Care Med*. 2014; 189(9): e15-e62. DOI: 10.1164/rccm.201402-0373ST.
- [35] Nellessen AG, Donária L, Hernandez NA, Pitta F. Análise de três diferentes fórmulas de predição de força muscular do quadríceps femoral em pacientes com DPOC. *J. Bras. Pneumol*. 2015; 41(4): 305-312. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1806-37132015000004515>.

Capítulo 21

Hydroxychloroquine in fighting COVID-19: What led WHO to suspend clinical trial of drug?

Thyago José Arruda Pacheco

Danielle Galdino de Souza

Raquel Santos Faria

Laise Rodrigues de Andrade

Abstract: **Purpose:** On March 11, 2020 the pandemic status of COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) was declared. The milestone of thousands of daily deaths from Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) was reached worldwide. So far, there is still no proven effective treatment against this disease. This study summarizes the main clinical findings on the use of hydroxychloroquine (HCQ) to treat COVID-19. The goal is to gather the evidence that led WHO to suspend the HCQ arm of its Solidarity Trial, contributing to the understanding of its denouement. **Methods:** LitCovid platform was searched for the term "hydroxychloroquine" in the "treatment" field. All clinical studies published in the period from January 1st to June 17th were included in the review. **Results:** We included ten articles on HCQ in COVID-19 positive patients (eight non-randomized and two randomized clinical studies). Most studies did not report a benefit in the use of HCQ. There is no evidence of decreased risk of intubation or death, and in some cases adverse effects have been reported, such as abnormal liver function, transient blurred vision, diarrhea. **Conclusions:** The overview of the available data on HCQ in COVID-19 patients can guide future studies, still needed to support public policies and health authorities in fighting COVID-19.

Keywords: hydroxychloroquine, clinical trials, COVID-19, SARS-CoV-2

1. INTRODUCTION

In late December 2019, a novel coronavirus called Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), began a global spread from China [1], leading the World Health Organization (WHO) to declare the pandemic status of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) on March 11, 2020 [2]. This is the third serious coronavirus outbreak in less than 20 years, but SARS-CoV-2 has led to more deaths. Up to 30th July 2020, 17,130,295 cases had been confirmed worldwide with 669,160 deaths, while 919 deaths by SARS-CoV and 858 by Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) were recorded in the same period [3, 4].

The overall case-fatality rate is about 2.3%, but reaches 14.8% in elderly patients (≥ 80 years) who develop severe symptoms, such as shortness of breath, chest pain, loss of speech or movement [5]. It is difficult to measure the actual mortality rate due to underreporting of cases. For example, in Santa Clara, California, the number of cases can be 50-85x greater than the reported cases, as it was found that 1.5% of the population in that region has antibodies against SARS-CoV-2. The mortality rate in the region is estimated to be 0.12-0.2% [6]. The cause for disparities in mortality rates is still not well understood. Some hypotheses have been proposed, including the circulation of different strains of the virus, idiosyncrasies in COVID-19 testing strategies, policies in countries, quality of and access to health care, demographic factors, as well as the prevalence of elderly people in a given population and socioeconomic factors [7, 8].

There is currently no proven effective treatment against COVID-19. The drug repositioning approach is a potential strategy in fighting the disease, because information about the safety profile, side effects, dosage and drug interactions is well described in the literature [9]. Chloroquine (CQ) and hydroxychloroquine (HCQ) are widely used in the treatment of malaria and rheumatic diseases, and have been suggested as COVID-19 treatments due to their anti-inflammatory and antiviral activities [10, 11].

Both CQ and HCQ can interfere with the glycosylation of cell surface angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) and reduce the binding efficiency between ACE2 and the SARS-Cov-2 spike protein, blocking virus fusion with the host cell. These drugs - weak bases - increase pH intracellular compartments, especially endosomes and lysosomes, which also seems to be crucial to blocking the entry and replication of the virus [12–15]. In particular, once HCQ enters antigen-presenting cells (APCs) and raises its lysosomal pH, it prevents antigen processing and major histocompatibility complex (MHC) class II-mediated autoantigen presentation to T cells [16, 17]. As a result, the activation of T cells and expression of CD154 and other cytokines, like interleukin-6 (IL-6), are repressed, attenuating a possible exacerbated inflammatory response [14, 16, 17].

The literature reports a higher toxicity associated with CQ than HCQ [13]. Conventionally, the maximum tolerable dose for CQ and HCQ is 500 mg and 1200 mg, respectively, but the antiviral effect achieved in 1200 mg of HCQ is equivalent to the use of 750 mg of CQ [18]. In more recent times, it has been shown that HCQ is more effective than CQ in inhibiting the SARS-CoV-2 infection in Vero cells (HCQ $EC_{50}=0.72 \mu M$, CQ $EC_{50}=5.47 \mu M$) [19]. Moreover, high mortality rates have been recorded in clinical trials with COVID-19 patients treated with CQ [20]. Although HCQ appears to outperform CQ, on June 17, WHO suspended the HCQ of its international clinical trial, called Solidarity Trial [21]. This study provides a narrative summary of the main clinical findings on the use of HCQ to treat COVID-19, contributing to the understanding of its denouement. Thus, we hope to offer support for the design of future studies and for health professionals' decision-making towards fighting COVID-19.

2. METHODS

Electronic searches were performed at LitCovid [22] for the term "hydroxychloroquine" in the "treatment" field. This review included all clinical trials published from January 1st to June 17th, the date on which the WHO announced the suspension of HCQ treatment in COVID-19 Solidarity Trial. The tracking of ongoing clinical tests was also carried out in the same period through Clinical Trial Tracker [23] and presented in terms of numbers (%).

3. RESULTS

On the LitCovid platform, HCQ or CQ appear as the most investigated drugs for COVID-19 treatment. Ten clinical studies regarding HCQ in COVID-19 patients were found (eight non-randomized and two randomized clinical studies) and are summarized in order of publication in Table 1. According to the Clinical Trial Tracker, by June 17th, 1932 clinical tests were in progress worldwide; 303 (15.68%) of these tests were with HCQ or CQ.

Table 1. Clinical studies on the use of hydroxychloroquine (HCQ) in COVID-19 patients

Reference	Study type (n=patients)	Country	Gender (n/N)	Average Age	Clinical condition (n/N)	ICU patients (n/N)
Gautret et al. [26]	Open-label, non-randomized study (n=36)	France	*F (21/36) **M (15/36)	45,1 years	Asymptomatic (6/36) Pneumonia (30/36) - Infection of the upper (22/36) and lower (8/36) respiratory tract	0/36
Gautret et al. [27]	Observational, non-randomized study (n=80)	France	†NR	52 years	NR	3/80
Million et al. [28]	Retrospective non-randomized study (n=1.061)	France	F (569/1.061) M (492/1.061)	43,6 years	NR	10/1.061
Molina et al. [29]	Observational, non-randomized study (n=11)	France	F (4/11) M (7/11)	58,7 years	Severe †COVID-19 (11/11) Obesity (2/11) Solid cancer (3/11) Hematological cancer (2/11) §HIV (1/11)	2/11
Yu, Wang and Li, [30]	Retrospective non-randomized study (n=568)	China	NR	68 years	Severe acute respiratory distress syndrome (n=568)	NR
Geleris et al. [31]	Observational, non-randomized study (n=1.376)	United States	NR	60-79 years	Moderate to severe respiratory illness (n=1.376)	246/1.376
Rosenberg et al. [32]	Observational, non-randomized study (n=1.438)	USA	F (580/1.438) M (858/1.438)	63 years	NR	NR
Chen et al. [35]	Randomized study (n=30)	China	NR	NR	NR	NR
Tang et al. [34]	Randomized study (n=150)	China	F (68/150) M (82/150)	46 years	Mild to moderate COVID-19 (148/150) Severe COVID-19 (2/150)	NR
Mahévas et al. [33]	Observational non-randomized study (n=181)	France	F (181/51) M (181/130)	60 years	NR	41/181

Table 1. (continued)

Table 1. Clinical studies on the use of hydroxychloroquine (HCQ) in COVID-19 patients

Reference	Treatment Protocol	Control group (n=patients)	Adverse effects	Mortality (n/N)	Main Findings
Gautret et al. [26]	^ε HCQ (200 mg, 3x/day, for 10 days) alone (n=20) or combined with ^ε AZM (500 mg on day 1 and 250 mg on day 2-5) (n=6)	Yes (n=16) Without treatment	NR	0/36	HCQ group: 57% negative ^ε PCR test on day HCQ+AZM group: 100% negative PCR on day 6
Gautret et al. [27]	HCQ (200 mg/day, 3x/day for 10 days) and AZM (500 mg on day 1 and 250 mg on day 2-5) (n=80)	No	NR	1/80	83% and 93% negative PCR test on days 7 and 8, respectively. 97.5% negative virus culture on day 5.
Million et al. [28]	HCQ (600 mg/day for 10 days) and AZM (500 mg on day 1 and 250 mg on day 2-4) (n=1.061)	No	24/1.061 Adverse effects: - Gastrointestinal; - Skin symptoms; - Headache; - Insomnia; - Transient blurred vision.	8/1.061	Virological cure in 91.7% patients within 10 days. 4.4% patients with prolonged viral carriage: negative viral culture at day 10. 0.75% patients died (respiratory failure) and 4.3% showed poor clinical outcome.
Molina et al. [29]	HCQ (600 mg/day for 10 days) and AZM (500 mg on day 1 and 250 mg on day 2-5) (n=11)	No	10/11 Adverse effect: - Fever	1/11	80% positive PCR test on day 5-6.
Yu, Wang and Li [30]	HCQ (200 mg, 2x/day, for 7-10 days) (n=48)	Yes (n=520) Antiviral drugs Immunoglobulin Immunoenhancer Antibiotics Interferon	NR	247/268 -HCQ group (9/48) -Control group (238/520)	HCQ group: significant reduction in the ^ε IL-6 level from 2,2 (8.3-118,9) to 5,2 (3,0-23,4) pg/ml. Control group: no difference in the IL-6 level
Geleris et al. [31]	HCQ (600 mg 2x/day on day 1.400 mg on day 2-5) (n=811)	Yes (n=565) NR treatment	NR	578/1.376 -Without intubation (166/578) -With intubation (246/578)	Without significant association with increased or decreased risk of intubation or death (risk rate of 1.04; 95% CI, 0.82 to 1.32).

Table 1. (continued)

Table 1. Clinical studies on the use of hydroxychloroquine (HCQ) in COVID-19 patients

Reference	Treatment Protocol	Control group (n=patients)	Adverse effects	Mortality (n/N)	Main Findings
Rosenberg et al. [32]	HCQ (n=271) AZM (n=211) HCQ+AZM (n=735) 21 days of treatment / dosage not informed	Yes (n=221) Without treatment	NR	292/1.438 - HCQ group (54/271) - AZM group (21/211) - HCQ+AZM group (189/735) - Control group (28/221)	Treatments were not significantly associated with differences in hospital mortality.
Chen et al. [35]	HCQ (400 mg/day for 5 days) (n=15)	Yes (n=15) Conventional treatment	7/30 - HCQ (4/15) - Control group (3/15) Adverse effects: - Diarrhea; - Abnormal liver function.	0/30	HCQ group: 86% negative viral Σ RNA on day 7; and 33.3% negative chest α CT for pneumonia. Control group: 93.3% negative viral RNA on day 7; and 46.7% negative chest CT for pneumonia.
Tang et al. [34]	HCQ (1.200 mg/day for 3 days + 800 mg/day on day 4-14 or -4-21) (n=70) and Standard of care (antiviral agents, antibiotics and systemic glucocorticoid therapy) (n=80)	Yes (n=80) -Antiviral agents -Antibiotics -Systemic glucocorticoid therapy	7/150 -HCQ (7/70) Adverse effects: -Diarrhea	0/150	Administration of HCQ did not result in a significantly higher probability of negative conversion than standard of care alone in patients admitted to hospital with mainly persistent mild to moderate COVID-19.
Mahévas et al. [33]	HCQ (600 mg/day) (n=84 HCQ within 48 hours of admission; n=8 HCQ more than 48 hours after admission) and control group (n=89)	Yes (n=89) -Tocilizumab; -Lopinavir; -Ritonavir; -Remdesivir.	NR	17/181 -HCQ within 48 hours of admission (9/84); -HCQ more than 48 hours after admission (0/8); -Control group (8/89).	HCQ treatment did not have any effect on survival without acute respiratory distress syndrome at day 21 after hospital admission. These results do not support the use of hydroxychloroquine in these patients.

Legend: (*) Female; (**) Male; (†) Not registered; (‡) Corona Virus Disease 2019; (§) Human Immunodeficiency Virus; (€) Hydroxychloroquine; (¥) Azithromycin; (¥) Polymerase Chain Reaction; (µ) Interleukine-6; (Σ) Ribonucleic acid; (Ω) Computed tomography.

4. DISCUSSION

Four months after the detection of SARS-CoV-2 in Wuhan, China, the novel virus has already spread to 188 countries/regions and threatened to be the greatest pandemic of modern times, with more than four million infected and the number of deaths growing at an alarming rate [24]. The drug repositioning approach is a possible alternative strategy for COVID-19 treatment and there seems to be a preference for HCQ over CQ due to previous evidence of less toxicity [9, 15]. In this study, we compiled recent clinical trials with HCQ for COVID-19 treatment. Relevant factors such as type of study, sample size, age of patients, clinical conditions and dosing regimens were considered for analysis.

Although there is a similar number of confirmed cases of COVID-19 between the sexes, men die more than women, 1.7% and 2.8 %, respectively [25]. No work has registered a significant difference in therapeutic intervention comparing men and women. According to Gautret et al. [26], Gautret et al. [27] and Million et

al. [28] there was a virological cure in over 80% of HCQ-azithromycin-treated patient, whereas Molina et al. [29] obtained the opposite results, and 8 out of 11 patients (about 70%) remained SARS-CoV-2-infected after receiving the same dosing regimens as Gautret et al. and reported adverse effects [26, 27]. These discrepant results may be a consequence, at least in part, of the different patients' health conditions in each study. The result of study by Yu, Wang and Li [30] agree that HCQ increases patient survival. However, the testing protocols were different (such as patient's clinical conditions, dosage and duration of treatment), which can lead to inaccurate interpretations. Other studies found no significant association between the use of HCQ and the evolution of the patient's clinical condition [31–33], in one, performed by Rosenberg et al. [32] the HCQ dosage was not even reported. All of the above observations are the result of non-randomized clinical trials. In this type of design, it is not possible to eliminate other factors that may have occurred concurrently with the implanted intervention, and that may have contributed to the change in the outcome.

The randomized clinical trial presented here evaluated high HCQ dosing regimens in mild or moderate COVID-19 cases [34]. In this work, the HCQ treatment showed no benefits in antiviral activity. In addition, 30% of patients presented adverse effects, gastrointestinal problems, a value approximately 3 times higher than in patients who did not receive HCQ. Also although Chen et al. has had 86% negative viral RNA on day 7, some patients have had adverse effects such as diarrhea and abnormal liver function [35].

There is evidence that HCQ can cause irreversible damage to the retina and disturbed heart rhythm (changes in the QT interval) [36, 37]. On 17 June 2020, WHO stopped the use of HCQ on COVID-19 patients in Trial Solidarity, an international clinical trial decision based on evidence from the Solidarity trial, UK's Recovery trial and a Cochrane review of other evidence on based on evidence that treatment with HCQ does not result in the reduction of mortality when compared to standard of care [21]. Despite this, some world leaders continue to systematically promote CQ or HCQ against COVID-19 without proven safety and efficacy. The US and Brazilian governments support the use of HCQ as a prophylactic measure against the new virus [38] and despite recognizing the risk of clinical decline, a new Brazilian protocol expands the use of CQ and HCQ, including for mild cases of the disease [39].

Given this scenario, it is important to note that the risks can outweigh the unproven benefits in some COVID-19 patients; therefore, prescriptions should be made with caution on a case-by-case basis. Moreover, the indiscriminate use of HCQ can cause a shortage on the market, harming patients who depend on the drug for the prevention and treatment of malaria and also for the treatment of some rheumatic diseases such as rheumatoid arthritis and lúpus [39]. In addition, recent randomized studies published after the suspension of testing by WHO, showed that hydroxychloroquine have no statistically significant benefit to treat COVID-19, and have also shown side effects in patients who were part of the hydroxychloroquine-treated group, corroborating the evidence that HCQ lacks proven efficacy and safety in COVID-19 [40, 41].

5. CONCLUSIONS

There is still not enough evidence of the effectiveness and safety of HCQ against SARS-CoV-2. WHO stopped the use of HCQ on COVID-19 patients based on evidence from the Solidarity trial and other studies detailed here. In most of the studies referenced here, there was no benefit in the use of HCQ. In addition to not promoting a reduction in hospitalizations or in mortality due to COVID-19, the drug caused adverse effects in some cases. The overview of the available data, as presented here, can guide future studies. More information about this drug is needed to support public policies and health authorities in fighting COVID-19.

5.1. CONFLICTS OF INTEREST

The authors declare that they have no conflict of interest.

5.2. ROLE OF THE FUNDING SOURCE

No funding was received.

5.3. ETHICAL APPROVAL

All analyses were based on previous published studies; thus, no ethical approval is required.

5.4. INFORMED CONSENT

All analyses were based on previous published studies; thus, no informed consent is required.

ACKNOWLEDGEMENTS

The authors gratefully acknowledge financial support from: the Brazilian National Council for Technological and Scientific Development (CNPq), *Coordinating Agency for Advanced Training of Graduate Personnel* (CAPES), *Foundation for Research Support of the Federal District* (FAPDF) and the Dean of Research and Post-Graduation of the University of Brasília (DPP-UnB).

REFERENCES

- [1] Wang L, Wang Y, Ye D, Liu Q (2020) A review of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) based on current evidence. *Int J Antimicrob Agents* 105948
- [2] WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>. Accessed 11 Jun 2020
- [3] Yang Y, Peng F, Wang R, Guan K, Jiang T, Xu G, Sun J, Chang C (2020) The deadly coronaviruses: The 2003 SARS pandemic and the 2020 novel coronavirus epidemic in China. *J Autoimmun* 102434
- [4] Home - Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. <https://coronavirus.jhu.edu/>. Accessed 30 Jul 2020
- [5] Wu Z, McGoogan JM (2020) Characteristics of and Important Lessons from the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72314 Cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. *JAMA - J Am Med Assoc* 323:1239–1242
- [6] Bendavid E, Mulaney B, Sood N, et al (2020) COVID-19 Antibody Seroprevalence in Santa Clara County, California. *medRxiv*
- [7] Dowd JB, Andriano L, Brazel DM, Rotondi V, Block P, Ding X, Liu Y, Mills MC (2020) Demographic science aids in understanding the spread and fatality rates of COVID-19. *Proc Natl Acad Sci* 117:9696–9698
- [8] Forster P, Forster L, Renfrew C, Forster M (2020) Phylogenetic network analysis of SARS-CoV-2 genomes. *Proc Natl Acad Sci* 117:9241–9243
- [9] Colson P, Rolain J-M, Lagier J-C, Brouqui P, Raoult D (2020) Chloroquine and hydroxychloroquine as available weapons to fight COVID-19. *Int J Antimicrob Agents* 105932:
- [10] Chang T-H, Wang L-F, Lin Y-S, Yang C-S, Yu C-Y, Lin Y-L (2014) 25: Hydroxychloroquine activates host antiviral innate immunity. *Cytokine* 70:33–34
- [11] Fantini J, Di Scala C, Chahinian H, Yahi N (2020) Structural and molecular modeling studies reveal a new mechanism of action of chloroquine and hydroxychloroquine against SARS-CoV-2 infection. *Int J Antimicrob Agents* 105960
- [12] Al-Bari MAA (2017) Targeting endosomal acidification by chloroquine analogs as a promising strategy for the treatment of emerging viral diseases. *Pharmacol. Res. Perspect.* 5:
- [13] Schrezenmeier E, Dörner T (2020) Mechanisms of action of hydroxychloroquine and chloroquine: implications for rheumatology. *Nat Rev Rheumatol* 1–12
- [14] Vincent MJ, Bergeron E, Benjannet S, Erickson BR, Rollin PE, Ksiazek TG, Seidah NG, Nichol ST (2005) Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread. *Virology* 2:69
- [15] Zhou D, Dai S-M, Tong Q (2020) COVID-19: a recommendation to examine the effect of hydroxychloroquine in preventing infection and progression. *J. Antimicrob. Chemother.*
- [16] Sperber K, Quraishi H, Kalb TH, Panja A, Stecher V, Mayer L (1993) Selective regulation of cytokine secretion by hydroxychloroquine: inhibition of interleukin 1 alpha (IL-1-alpha) and IL-6 in human monocytes and T cells. *J Rheumatol* 20:803–808
- [17] Wu SF, Chang C Bin, Hsu JM, Lu MC, Lai NS, Li C, Tung CH (2017) Hydroxychloroquine inhibits CD154 expression in CD4+ T lymphocytes of systemic lupus erythematosus through NFAT, but not STAT5, signaling. *Arthritis Res Ther* 19:1–14

- [18] Furst DE, Lindsley H, Baethge B, et al (1999) Dose-loading with hydroxychloroquine improves the rate of response in early, active rheumatoid arthritis: A randomized, double-blind six-week trial with eighteen-week extension. *Arthritis Rheum* 42:357–365
- [19] Yao X, Ye F, Zhang M, et al (2020) In vitro antiviral activity and projection of optimized dosing design of hydroxychloroquine for the treatment of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). *Clin. Infect. Dis.*
- [20] Borba MGS, Val FFA, Sampaio VS, et al (2020) Effect of High vs Low Doses of Chloroquine Diphosphate as Adjunctive Therapy for Patients Hospitalized With Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Infection. *JAMA Netw Open* 3:e208857
- [21] Solidarity clinical trial for COVID-19 treatments. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments>. Accessed 24 Jun 2020
- [22] Chen Q, Allot A, Lu Z (2020) Keep up with the latest coronavirus research. *Natur* 579:193
- [23] Global Coronavirus COVID-19 Clinical Trial Tracker.
- [24] Dong E, Du H, Gardner L (2020) An interactive web-based dashboard to track COVID-19 in real time. *Lancet Infect. Dis.*
- [25] Wenham C, Smith J, Morgan R (2020) COVID-19: the gendered impacts of the outbreak. *Lancet* 395:846–848
- [26] Gautret P, Lagier J-C, Parola P, et al (2020) Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial. *Int J Antimicrob Agents* 105949
- [27] Gautret P, Lagier J-C, Parola P, et al (2020) Clinical and microbiological effect of a combination of hydroxychloroquine and azithromycin in 80 COVID-19 patients with at least a six-day follow up: A pilot observational study. *Travel Med Infect Dis* 101663
- [28] Million M, Lagier J-C, Gautret P, et al (2020) Full-length title: Early treatment of COVID-19 patients with hydroxychloroquine and azithromycin: A retrospective analysis of 1061 cases in Marseille, France. *Travel Med Infect Dis* 101738
- [29] Molina JM, Delaugerre C, Goff J Le, Mela-Lima B, Ponscarne D, Goldwirt L, de Castro N (2020) No evidence of rapid antiviral clearance or clinical benefit with the combination of hydroxychloroquine and azithromycin in patients with severe COVID-19 infection. *Med Mal Infect* 10:
- [30] Yu B, Wang DW, Li C (2020) Hydroxychloroquine application is associated with a decreased mortality in critically ill patients with COVID-19. *medRxiv*
- [31] Geleris J, Sun Y, Platt J, et al Observational Study of Hydroxychloroquine in Hospitalized Patients with Covid-19. *N Engl J Med* 0:null
- [32] Rosenberg ES, Dufort EM, Udo T, et al (2020) Association of Treatment With Hydroxychloroquine or Azithromycin With In-Hospital Mortality in Patients With COVID-19 in New York State. *Jama* 12203:1–10
- [33] Mahevas M, Tran V-T, Roumier M, et al (2020) Clinical efficacy of hydroxychloroquine in patients with covid-19 pneumonia who require oxygen: observational comparative study using routine care data. *BMJ*. <https://doi.org/10.1136/bmj.m1844>
- [34] Tang W, Cao Z, Han M, et al (2020) Hydroxychloroquine in patients with mainly mild to moderate coronavirus disease 2019: open label, randomised controlled trial. *bmj* 369:
- [35] Jun C, Danping L (2020) A pilot study of hydroxychloroquine in treatment of patients with common coronavirus disease-19 (COVID-19). *J Zhejiang Univ (Medical Sci)* 49:0
- [36] Ruamviboonsuk P, Lai TYY, Chang A, Lai C-C, Mieler WF, Lam DSC, others (2020) Chloroquine and Hydroxychloroquine Retinal Toxicity Consideration in the Treatment of COVID-19. *Asia-Pacific J Ophthalmol* 9:85–87
- [37] Chen CY, Wang FL, Lin CC (2006) Chronic hydroxychloroquine use associated with QT prolongation and refractory ventricular arrhythmia. *Clin Toxicol* 44:173–175
- [38] Joint Statement From the United States of America and the Federative Republic of Brazil Regarding Health Cooperation | The White House.
- [39] (2020) Orientações do Ministério da Saúde para manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da COVID-19. Brasília
- [40] Skipper CP, Pastick KA, Engen NW, et al (2020) Hydroxychloroquine in Nonhospitalized Adults With Early COVID-19: A Randomized Trial. *Ann. Intern. Med.*
- [41] Mitja O, Corbacho-Monne M, Ubals M, et al (2020) Hydroxychloroquine for Early Treatment of Adults with Mild Covid-19: A Randomized-Controlled Trial. *Clin Infect Dis*. <https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1009>

Autores

GLEICA SOYAN BARBOSA ALVES (ORGANIZADORA)

Farmacêutica (UFAM - 2013), mestre em Saúde, Sociedade e Endemias na Amazônia (UFAM - 2016) professora assistente da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e Coordenadora do Curso de Engenharia Sanitária do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET). Tem experiência na área de Microbiologia, Epidemiologia, Biologia Molecular e Controle de Qualidade de Alimentos e Medicamentos.

ELIENE DE OLIVEIRA (ORGANIZADORA)

Graduada em Odontologia pela Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes (2017) e em Enfermagem pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas - FUNORTE (2011). Especialista em Saúde da Família. Especialista em Educação a Distância. Servidora pública efetiva no cargo de Odontólogo na Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG. Docente na Escola Técnica de Saúde do Centro de Educação Profissional e Tecnológica da Unimontes. Professora supervisora do Estágio em Saúde da Família do curso de Odontologia da FUNORTE. Possui experiência em Saúde Coletiva/Saúde da Família.

ADRIA FERREIRA DE SOUSA

Enfermeira Graduada pela Faculdade Integrada da grande Fortaleza-FGF. Curso Superior de Formação Específica em Gestão de Unidades de Saúde Pública pela Universidade Vale do Acaraú - UVA.

ADRIANA MONTENEGRO DE ALBUQUERQUE

Enfermeira. Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB-2019). Mestre em Enfermagem pela UFPB (2008). Especialista em Terapia Intensiva pela ENSINE (2006). Graduação em Enfermagem pela UFPB (1990). Licenciatura em Enfermagem pela UFPB (1991). Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Tratamento de Feridas (GEPEFE)/UFPB (2006 - Atual). Atualmente Professora Adjunta III da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG-2010). Tem experiência na área de Enfermagem, com ênfase em Terapia Intensiva Adulto, atuando em Terapia Intensiva Adulto e Oncológica, Trauma e Urgência e Emergência.

ALEXA ALVES DE MORAES

Fisioterapeuta pela Universidade Estadual da Paraíba com período sanduíche na Trinity College Dublin. Pós-graduada em Fisioterapia Neurológica Adulta (UniBF) e em Fisioterapia em Neuropediatria (UniBF). Mestranda em Fisioterapia pela Universidade Federal de Pernambuco. Fisioterapeuta do quadro efetivo da Divisão de Saúde da Universidade Federal de Viçosa.

ALINE DE SOUSA ROCHA

Enfermeira; especialista em UTI adulto e Nefrologia.

ANA PAULA GARCIA

Graduanda em Odontologia na Faculdade Federal de Pelotas (UFPEL); Atualmente faço parte do projeto de Triagem da Faculdade de Odontologia.

ANDRÉIA SOUSA DA ROCHA MORAIS

Pedagoga; Especialista em Gestão e Supervisão Escolar.

ANDRESSA TEIXEIRA MACHADO

Bacharel em Enfermagem pela UNIFRA, RS, Brasil. Pós graduada em Auditoria em Saúde pela UNINTER. Pós graduada em Atenção ao paciente crítico: Urgência, emergência e UTI pela UNINTER. Enfermeira Assistencial Hospital Universitário de Santa Maria.

ANGELA LIMA DOS SANTOS FONSECA

Aluna do 10º semestre do curso de Enfermagem da Universidade Potiguar - UnP. Técnica em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Participação no grupo de pesquisa em Qualidade do Cuidado e do Ensino de Saúde da Universidade Federal do Rio grande do Norte -UFRN. Monitora de ensino das disciplinas de Saúde da Mulher e Práticas de Enfermagem IV.

ANTÔNIO GEAN FERNANDES LOPES

Enfermeiro. Especialista em Terapia Intensiva. Atua como enfermeiro no Hospital e Maternidade Adolfo Bezerra de Menezes em Jaguaretama e no Hospital de Messejana.

BÁRBARA EBILIZARDA COUTINHO BORGES

Enfermeira formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pós graduação em andamento em UTI neonatal e pediátrica.

BÁRBARA RENATHA AFONSO FERREIRA DE BARROS LEITE

Graduação em Fisioterapia pela Faculdade Integrada do Recife(FIR) (2010); Pós-graduação em Fisioterapia Cardiopulmonar pela Faculdade Redentor (2012); Mestrado em Fisioterapia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) com a linha de pesquisa "Desempenho físico-funcional e qualidade de vida relacionados aos distúrbios respiratórios do sono, e Adaptações Cardiovasculares e Respiratórias ao Exercício Físico". Aluna do Doutorado em Saúde Integral (Estudos em Reabilitação, Avaliação e Desempenho Funcional, do(a) Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira-IMIP, em andamento)

BENEDITA MARYJOSE GLEYK GOMES

Enfermeira; Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional; Especialista em Saúde Mental.

BERNARDO DO REGO BELMONTE

Bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Mestre e Doutor em Bioquímica e Fisiologia (UFPE). Docente universitário.

BIANCA TELES

Graduanda em odontologia do 5º semestre na Universidade Federal de Pelotas.

BRUNA FOUCHY

Tem experiência na área de Odontologia.

CAMILA PRISCILA ABDIAS DO NASCIMENTO

Enfermeira formada pela Universidade Potiguar (UnP); Especialista em Urgência, Emergência e Trauma (UnP). Especialista em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP). Docente do Curso de Enfermagem e Medicina da Universidade Potiguar (UnP). Mestranda do Programa de Pós-graduação em Enfermagem (PGENF) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Membro do Grupo de Pesquisa em Tuberculose da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (GTB-UFRN).

CAMYLA CAROLINY NEVES DE ANDRADE

Farmacêutica pela Universidade Federal da Paraíba (2018). Atualmente Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos do Centro de Ciências da Saúde/UFPB, área de concentração Farmacologia, com ênfase nos seguintes temas: produtos naturais e sintéticos bioativos, citotoxicidade e atividade antitumoral, realizados no Laboratório de OncoFarmacologia (OncoFar), do Instituto de Pesquisa em Fármacos e Medicamentos (IPEFarM/UFPB). Tem experiência nas áreas de farmacologia de produtos naturais e sintéticos bioativos, avaliação da toxicidade não-clínica, citotoxicidade e atividade antitumoral.

CAREN FRANCIELE DIAS

Mestre em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), membro do Grupo de Pesquisa Trabalho, Educação, Saúde e Enfermagem da UFSM - linha de pesquisa Gestão e Atenção em Saúde e Enfermagem. Especialista em Gestão em Enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo/UNIFESP (2014) e em Gestão de Organização Pública em Saúde pela UFSM (2013). Graduada pelo Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para Educação Profissional e Tecnológica pela UFSM (2012). Graduação em Enfermagem Bacharelado - Centro Universitário Franciscano/UNIFRA (2008).

CAROLINA SOARES

Graduanda no curso de odontologia, no 6º semestre, pela Universidade Federal de Pelotas. Ensino médio completo no ano de 2012, pelo colégio Marista São Francisco.

CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM

Farmacêutica Generalista formada pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB (2019). Atualmente é aluna de Mestrado pelo Programa de Pós-graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos - PgPNSB (CCS/UFPB) (nível 6 na CAPES) na área de concentração Farmacologia.

CLÁUDIA MARIA DIAZ

Possui graduação em Enfermagem pela Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora Medianeira - FACEN (1994), graduação em Licenciatura em Enfermagem pela Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora Medianeira (1994), especialista em Administração de Serviços de Enfermagem (Faculdades Franciscanas - 1996) e em Enfermagem Obstétrica (Centro Universitário Franciscano - 2016), mestrado em Enfermagem (Universidade Federal de Santa Catarina - 2002), doutora em Ciências pelo Programa de Doutorado Interinstitucional Novas Fronteiras (DINTER - UNIFESP/UFRJ/ UFSM - 2014). É enfermeira da Universidade Federal de Santa Maria. Docente em regime parcial do Curso de Enfermagem e do Programa de Mestrado Profissional em Saúde Materno Infantil da Universidade Franciscana (UFN); Coordenadora do Curso de Especialização em Saúde Materna e Neonatal (UFN). Foi Coordenadora e Tutora do Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica (MS) (UFN). Tem experiência na área de Enfermagem, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde da mulher; enfermagem obstétrica; aleitamento materno; gestão e gerenciamento em enfermagem. Membro Participante do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Saúde- GIPES (UFN)

CLÁUDIA PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO MENEZES

Graduada em Enfermagem pelo Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE). Graduanda em Pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú (UVA). Mestre em Saúde da Criança

pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Especialista em Saúde Pública pela Universidade Estadual do Ceará (UECE).

CLAUDIANA DOS SANTOS SILVA

Graduada em Enfermagem pelo Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE). Pós-graduação em terapia intensiva pela universidade de Quixeramobim- UNIQ

CLEBIANA ALVES E SILVA DINIZ

Enfermeira pela Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, pós-graduada em Urgência e Emergência pela UNINTER, especialista em FORMAÇÃO INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, promovido pelo Núcleo de Educação, Avaliação e Produção Pedagógica em Saúde (EducaSaúde), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, realizou Residência Multiprofissional de Interiorização de Atenção a Saúde pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. (Texto informado pelo autor)

CLEIDE MONTEIRO ZEMOLIN

Possui graduação em ENFERMAGEM pela FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA (2005). Especialização em Terapia Intensiva Adulto pela FANESE e em Geriatria e Gerontologia pela Faculdade Dom Alberto, e atualmente é mestranda do Curso de Pós-graduação em Gerontologia pela Universidade Federal de Santa Maria. Atua como enfermeira assistencial do Hospital Universitário de Santa Maria.

DANIELE MARIA DOS SANTOS

Fisioterapeuta pela Universidade Estadual da Paraíba; Residente em Terapia Intensiva pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP-PE), no Hospital Dom Hélder Câmara (HDH)

DANIELLE GALDINO DE SOUZA

Possui bacharelado em Enfermagem pela Faculdade do Norte Goiano (FNG, 2015), especialização em Urgência e Emergência pelo Centro de Estudos de Pós-graduação em Medicina, Enfermagem e Nutrição (CEEN, 2017), mestrado em Nanociência e Nanobiotecnologia pela Universidade de Brasília (UnB, 2020). Tem experiência nas áreas de Gestação e Parto, Emergências Traumáticas e Biotecnologia, atuando principalmente nos seguintes temas: parto humanizado, gestação de alto risco, traumatismo crânioencefálico, nanoemulsão, óleo de peixe, inflamação, fibrose pulmonar.

DANÚBIA RAMOS DOS SANTOS MOZELÉSKI

PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional) em Língua Portuguesa pela UTFPR em Letras Português/Inglês pela UTP-PR, Especialista em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias pela FACINTER, Graduada em Letras Português/Inglês pela UTP- PR, possui treinamento para professores de Língua Inglesa pela Embassy of the United States, realizou cursos de aperfeiçoamento nas áreas de Educação Hospitalar e Educação Especial. Professora da área de Linguagens do SAREH (Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar) no Hospital Infantil Waldemar Monastier desde 2019. Professora de Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Reforço Escolar da Rede Estadual de Educação do Paraná desde 2003 .

DIOGO DA SILVA JACINTO CIRNE

Bacharel em Enfermagem pelo Centro Universitário UNIFACISA. Pós-Graduando em Pediatria e Neonatologia pela Faculdade INESP. Pós-Graduando em Urgência e Emergência pela FAVENI. Socorrista pelo curso de Capacitação de Socorrista do Instituto Compass LTDA - Resgate das Dunas. Enfermeiro do Programa Melhor em Casa de Campina Grande/PB. Enfermeiro Plantonista

do Hospital Municipal de Pocinho/PB. Preceptor de Estágio da UNIFACISA. Professor na Grau Técnico - CG. Participou como membro e Tesoureiro do Diretório Acadêmico de Enfermagem da UNIFACISA (2016-2018). Foi membro e diretor financeiro da LACEI/CG (Liga Acadêmica de Cuidados Emergenciais e Intensivos de Campina Grande). (2017-2019). Foi membro do Projeto de Extensão Envelhecendo com Saúde (2017-2018).

EDILENE LOPES DE PÁDUA

Graduação em Serviço Social pela Universidade Anhanguera-UNIDERP. Especialista em Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas e Psicopedagogia Institucional. Atualmente assistente social na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania de Serra Talhada-PE.

EDVANIA DE SOUZA CAVALCANTE MELO

Possui graduação em Serviço Social pela Universidade Anhanguera-UNIDERP. Atualmente é Gerente de Proteção Social Especial da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania do município de Serra Talhada-PE.

ELIZANA MULATO GUEDES

Discente do 10º semestre do curso de Enfermagem da universidade Potiguar-UNP. Técnica em Segurança do Trabalho pelo Instituto Ateneu - CV&C. Bolsista da Maternidade Irerê Pinto (Secretaria Municipal de Saúde, Natal, 2019-2020), também fui bolsista do Centro de Promoção a Saúde do Idoso, Programa de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, Campus Natal-Central, 2019. Atuei na docência como monitora de Fisiologia humana e Anatomia humana pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada (INTA, 2016). Participação no grupo de Pesquisa e Extensão Cuidadores do Coração- Instituto Superior de Teologia Aplicada (INTA, 2016).

ELIZÂNGELA MARIA VIEIRA DANTAS

Possui graduação em Serviço Social pela Universidade Católica de Pernambuco (2004). Atualmente é Gerente de Proteção Social Básica da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania do município de Serra Talhada - PE; e Tutora - Anhanguera Educacional - Polo Serra Talhada-PE. Tem experiência na área de Serviço Social.

EZEQUIEL DA SILVA

Enfermeiro com conhecimento em Gestão, assistência e educação continuada. Pós graduações Lato Sensu em "Gerontologia" com Tema Violência e Sexualidade em Idosos (2011); Pós graduado em "Gestão em Enfermagem" com Tema Sistema de Qualidade em ILPI (2014); Pós Graduado em "Docência do Ensino Superior" com Tema Desafios da Docência Brasileira no Ensino Superior na Modalidade a Distância (2018). Pós Graduando em "Enfermagem em Radiologia e Imagenologia" - (cursando). Pós Graduando em "Segurança do Paciente e Qualidade dos Serviços de Saúde" (Cursando). Mestrando em Radiologia IFSC.

FÁBIA MARIA DE SANTANA

Fisioterapeuta; Sanitarista; Especialização em Saúde Pública; Especialização em Saúde da Família; Especialização em Respiratória e UTI, Mestrado em Ciências da Saúde. Tem experiência de atuação em: Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF; Atendimento Hospitalar; Supervisora de estágio no Ensino Superior; Instituição de Longa Permanência para Idosos- ILPI e Coordenadora do Programa Tabagismo.

GEALDO TAVARES NETO

Bacharel em enfermagem pela faculdade Mauricio de Nassau; Pós graduado em enfermagem do trabalho e saúde ocupacional pela faculdade Educa mais; Graduando em medicina veterinária

GEANI DE OLIVEIRA MARINS

Doutoranda em Saúde Pública e Meio Ambiente pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP)/ Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Mestra em Ciências Ambientais e Conservação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)/Instituto Especializado de Biodiversidade e Sustentabilidade (NUPEM/UFRJ) com a pesquisa : Efeitos do consumo de linhaça orgânica sobre indicadores nutricionais de pessoas vivendo com Hiv/Aids no município de Macaé (RJ), concluída em 2019. Nutricionista pela mesma Universidade (UFRJ) em 2017.

GEÓRGIA MARIA RICARDO FÉLIX DOS SANTOS

Enfermeira, doutora em Bioquímica e Fisiologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Especialista em Enfermagem do Trabalho pela Faculdade Joaquim Nabuco. Atualmente é docente universitária.

IOLANDA GONÇALVES DE ALENCAR FIGUEIREDO

Enfermeira pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI (2007), graduada em Saúde Pública pela Universidade Estadual do Piauí (2002), graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Piauí (2004). Especialista em Saúde pública e Saúde da Família pela Universidade Cruzeiro do Sul-UNISUL-SP(2008), em Docência do Ensino Superior pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul- UFRGS, em Gestão em saúde pela Universidade Federal do Piauí-UFPI; Mestre em enfermagem em terapia intensiva pelo Instituto Brasileiro de Terapia Intensiva-IBRATI (2012). Professora Adjunta II do Curso de Enfermagem de Universidade Federal do Piauí/CSHNB/Picos/PI. Atualmente é membro do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente da cidade de Picos. com experiência em saúde pública na área de saúde do adolescente e segurança do paciente.

JACINTA PATACA

Medica dentista, possui mestrado integral em Medicina Dentaria pela Universidade Zambeze (2014). Docente e responsável pelo Registo académico no curso de Medicina Dentara na Universidade Zambeze-Faculdade de Ciências de Saúde-Tete. Provedora da EcoSIDA (2013-2014): Participação activa nas actividades de Testagem, Mobilização e palestras nos mercados e empresas, formação de provedores e educadores de Pares, planificação e estatística do programa de Luta contra o HIV e SIDA, Tuberculose e Malária no local de trabalho. Doutora em Ciências Odontológicas - Ênfase em Prótese Dentaria no Programa de Pos-graduação da Faculdade Federal de Pelotas. Tem experiência na área de Odontologia, atuando principalmente na área de estudos epidemiológicos, Associação entre estresse e disfonia, com disfunção temporomandibular em estudantes da Universidade Federal de Pelotas - Brasil - RS

JÉSSICA RAYANNE BATISTA ROCHA

Graduada em Bacharelado pela Faculdade Maurício de Nassau, Campus Campina Grande- PB, Pós-graduada em Urgência e Emergência pela FAVED, Pós-graduanda em Cardiologia e Hemodinâmica pelo grupo CEFAPP, Pós-graduanda em Saúde pública com ênfase em saúde da família- Sanitarista pela INESP.

JOEDNA MARTINS SILVA

Bacharel em enfermagem pela faculdade Maurício de Nassau; Enfermeira; Pós graduada em Urgência emergência e Uti pela Faculdade Inesp

JOSENILDO ANDRÉ BARBOZA

Graduado em Serviço Social pela Universidade Anhanguera UNIDERP e em Licenciatura Plena em Letras pela Faculdade de Formação de Professores de Serra Talhada - FAFOPST. Pós-graduado em Saúde Mental Faculdade Montenegro. Funcionário efetivo da Prefeitura de Serra Talhada, reconduzido ao cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, deste a gestão 2005 até o presente. Foi dirigente do COEGEMAS/PE por 2 mandatos e atualmente faz parte da direção do CONGEMAS (Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social) e Membro da Mesa Nacional da Gestão do Trabalho do SUAS, o qual foi eleito presidente em 2019.

JULIANA DA SILVA MAGALHÃES

Enfermeira. Especialista em Enfermagem em ginecologia e obstetrícia. Atua como Enfermeira Obstetra no Hospital Nossa Senhora da Conceição na CPNi.

KÁTIA CALVI LENZI DE ALMEIDA

Professora Associada de Patologia Geral na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Coordenadora do Laboratório de Patologia Toxicológica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Concluiu o Doutorado em Patologia Geral pela Universidade Federal Fluminense (UFF) em 2011 e Mestrado em Patologia Geral nesta mesma Universidade (UFF) em 2007. Possui graduação em Fisioterapia pela Escola Superior de Ensino Helena Antipoff (Pestalozzi), em 2003.

KÁTIA HALL

Graduanda do curso de Odontologia pela Universidade Federal de Pelotas (UFPeL). Atuou como bolsista no Programa de Iniciação ao Ensino pela Universidade Federal de Pelotas (UFPeL) durante o ano de 2018, na área de ciências morfológicas básicas. Durante o ano de 2019 atuou como voluntária no Programa de monitoria da Universidade Federal de Pelotas (UFPeL), na disciplina de Unidade Pré clínica I

KLEYTON WESLLEN DE LIMA FERREIRA

Bacharel em Enfermagem pelo Centro Universitário UNIFACISA. Dentre suas experiências acadêmicas, destacou-se como monitor das disciplinas Semiologia & Semiotécnica II e Urgência e Emergência. Participou de projetos extensionistas como o Envelhecendo com Saúde e atuou como diretor de pesquisa e extensão na Liga Acadêmica de Terapia Intensiva de Campina Grande (LATIN/CG). Possui experiências em extensão universitária pela Universidade Estadual da Paraíba, no Centro de Assistência e Informação Toxicológica - CIATox; e pelo Centro Universitário UNIFACISA na ala pediátrica da respectiva empresa, tendo como campos de estágios o Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes - HETDLGF e Hospital da Criança e do Adolescente de Campina Grande - HCA/CG.

LAISE RODRIGUES DE ANDRADE

Bióloga, graduada pela Universidade Federal de Goiás (2009), mestre em Biologia (área de concentração Biologia Celular e Molecular) pela mesma universidade (2012) e doutora em Nanociência e Nanobiotecnologia pela Universidade de Brasília (2017). Atualmente é professora adjunta do Instituto de Ciências Biológicas, departamento de Genética e Morfologia, da UnB. Atua, principalmente, na seguinte área da pesquisa: investigação pré-clínica, in vitro e in vivo, de sistemas nanoestruturados aplicados à terapia anticâncer

LARISSA GONÇALVES ABRANTES DE OLIVEIRA

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Especialista em Enfermagem do Trabalho pela Faculdades Integradas de Patos (FIP) em 2011. Especialista em

Saúde da Família pela Faveni (Faculdade Venda Nova do Imigrante) em 2020. Atualmente servidora pública no município de João Pessoa-PB.

LEIDYANE DE ALMEIDA GONÇALVES

Fisioterapeuta pela Universidade Estadual da Paraíba; Pós-graduanda em Fisioterapia Traumatológica e Esportiva

LEÔNIA MARIA BATISTA

Graduada em Farmácia pela Universidade Federal da Paraíba (1987), com especialização em Saúde Pública (1990), especialização em Homeopatia pela Associação Paulista de Homeopatia (2002), mestrado em Produtos Naturais pela Universidade Federal da Paraíba (1993) e doutorado em Biologia Funcional e Molecular pela Universidade Estadual de Campinas (2003). Atualmente é professora Titular da Universidade Federal da Paraíba, vinculada ao Departamento de Ciências Farmacêuticas, onde leciona as disciplinas de Farmacotécnica, Estágio de Vivência Magistral e Fitoterapia. É Tutora do Programa de Educação Tutorial (PET-Farmácia desde 2005), coordena o Serviço de Informação em Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos - SIPLAM. Na Pós-Graduação e Pesquisa é credenciada como membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, na área de concentração Farmacologia.

LETÍCIA MACHADO DE SOUSA

Acadêmica do Curso de Graduação em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

LILIA COSTA NASCIMENTO

Bacharela em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande; Pós-graduanda em Urgência e Emergência pela Faculdade Dom Alberto; Membro do grupo de estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Saúde e Enfermagem-GEPiSE-UFCG

LISMEIA RAIMUNDO SOARES

Possui Graduação em Nutrição pela Universidade Federal do Mato Grosso-UFMT (1998); Especialização em Nutrição Clínica pela Universidade Católica Dom Bosco-UCDB (2001); Mestrado em Ciências pelo programa de pós-graduação da Fisiopatologia Experimental da Faculdade de Medicina da USP-FMUSP (2011). Doutorado na linha de pesquisa em Investigação Clínica pelo Departamento Patologia da Faculdade de Medicina do ABC (2019).

LÚCIA MARIA GOMES DE SANTANA

Graduada em Enfermagem pela Faculdade de Comunicação Tecnologia e Turismo de Olinda (FACOTTUR). Atualmente é pós-graduanda em Saúde pública com ênfase em saúde da família pelo Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG). Interessa-se por enfermagem geriátrica e cuidados paliativos.

LUCIANA LUCENA ARANHA DE MACEDO

Professor Associado do Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal da Paraíba. Possui doutorado em Medicina Preventiva e Saúde Pública (Assistência e Atenção Farmacêutica) - Universidade de Salamanca- Espanha (2008), mestrado em Medicina Preventiva e Saúde Pública - Universidade de Salamanca- Espanha (2004), Farmácia Industrial (1998) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduação em Farmácia pela Universidade Federal da Paraíba (1995). Tem experiência na área de Farmácia Hospitalar e Farmácia Comunitária, com ênfase em Assistência Farmacêutica, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão e assistência farmacêutica hospitalar, segurança do paciente, farmácia clínica e atenção farmacêutica, adesão terapêutica e promoção e educação em saúde.

LUCIANE COSTA SIMÕES DA SILVA

Especialista em Gerenciamento do Ambiente Escolar: Supervisão e Orientação. Especialista em Educação Especial e Inclusiva com Ênfase em Deficiência Intelectual pela Faculdade São Braz. Graduada em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil - RS. Professora da Rede Estadual de Educação do Paraná desde 1988. Pedagoga do SAREH - Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar – desde 2018.

LUIZ ARTHUR CAVALCANTI CABRAL

Doutor e Mestre em Educação Física, pelo programa Novas Perspectivas de Investigação na Ciência da Atividade Física e Esporte, área de conhecimento Educação Física e Esporte, Faculdade de Educação Física e Desporto na Universidade de Granada/Espanha. Possui Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Estadual da Paraíba e Especialização em Atividade Física e Saúde na mesma instituição. Atualmente é coordenador e professor do curso de Educação Física, nas modalidades Bacharelado e Licenciatura, do Centro Universitário UNIFACISA, membro efetivo do grupo de pesquisa 'A Red Iberoamericana de Conocimiento Pleokinetic', registro nº 24692, pela Universidade de Granada/Espanha. e membro do Colegiado de Ensino Superior e Empregabilidade do CREF-10

MAÍRA MARIA LEITE DE FREITAS

Acadêmica do curso de Graduação em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará -UFC. Bolsista do PET-Saúde do Ministério da Saúde vinculado a universidade Federal do Ceará.

MARCOS ANTONIO SILVA BATISTA

Enfermeiro; Especialista Em Enfermagem Do Trabalho; Especialista Em Planejamento, Gestão E Assistência Em Saúde Mental; Especialista Em Centro Cirúrgico E Central De Material.

MARIA ELAINE DA SILVA

Possui graduação em Enfermagem pela Associação Caruaruense de Ensino Superior, Especialização em Enfermagem do Trabalho (CEFFAPE), Especialização em Saúde da Comunidade Multidisciplinar e Mestrado em Enfermagem e Educação em Saúde pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente é professora universitária. Tem experiência na área de Enfermagem, com ênfase em Enfermagem em Saúde Mental, Saúde Coletiva, Saúde do Trabalhador, Primeiros Socorros e Cuidados Paliativos.

MARIA EMANUELY DA SILVA IRINEU

Aluna do 10º semestre do curso de Enfermagem da Universidade Potiguar - UnP. Técnica em Enfermagem pela Escola técnica da UniFacex.

MARIA JUSSIANY GONÇALVES DE ABRANTES

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) em 2009. Especialista em Enfermagem do Trabalho pela Faculdades Integradas de Patos (FIP) em 2009. Atualmente fazendo Residência em Saúde da Família e Comunidade pela Faculdade Ciências Médicas (FCM)/ Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em João Pessoa-PB.

MARIA MADALENA DA SILVA ARAÚJO

Enfermeira Graduada pela Faculdade Integrada da grande Fortaleza-FGF. Enfermeira Especialista em Terapia Intensiva pela Faculdade Farias Brito-FFB. Especialista em Urgência e Emergência pela Faculdade de Quixeramobim-UNIQUE. cursando Especialização em Cardiologia e Hemodinâmica na Faculdade IDE.

MARIANA DOS SANTOS SILVA

Possui graduação em Serviço Social pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Serra Talhada (2012). Especialista em Saúde Pública e da Família com Ênfase em Sanitarismo. Atualmente é assistente social da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania atuando no desenvolvimento de projeto social na ILPI no município de Serra Talhada- PE.

MARIANA MARTINS DA SILVA

Bacharel em enfermagem pela faculdade Maurício de Nassau; Pós graduada em enfermagem em oncologia e hematologia pelo CEFFAP.

MARÍLIA RUTE DE SOUTO MEDEIROS

Enfermeira pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte/Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí - UFRN/ FACISA. Especialista em Saúde Coletiva com Ênfase em Saúde da Família - UFRN/ FACISA. Técnica em Segurança do Trabalho pelo Instituto de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN. Mestre em Saúde Coletiva pela UFRN/FACISA. Atualmente sou pesquisadora no "Projeto à formação no SUS para o Mais Médicos e Mais Especialidades" atuando como supervisora pedagógica - LAIS/PEPSUS, e Enfermeira plantonista no Hospital Maternidade Garibaldi Alves Filho da cidade de Lagoa Nova-RN. Áreas de pesquisa: envelhecimento ativo e saudável; saúde mental; saúde coletiva.

MARINA GONÇALVES ASSIS

Bacharel em Educação Física pelo Centro Universitário UNIFACISA e pós-graduanda em Educação Física Hospitalar pela FAMART. Laureada pela UNIFACISA como aluna detentora do melhor desempenho do curso de Bacharelado em Educação Física do semestre letivo 2019.2. Atuou como bolsista no projeto de extensão "Envelhecendo com Saúde" (2017-2019). Possui certificação internacional em Pilates Clássico, Ground Force Method e Dynamic Neuromuscular Stabilization Exercise I e II. Atua como pesquisadora na área das Ciências do Movimento Humano e possui experiência com dança, alongamento, atividades aquáticas, musculação, treinamento funcional e exercício para grupos especiais.

MICHELLY PATRICIA MAFRA

Graduação em Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina (2010). Pós graduação em Neuropsicopedagogia Clínica e Neuropsicopedagogia Institucional pela Censupeg (2019). Atualmente é assistente social na Secretaria Municipal de Saúde de São José SC, atuando no Ambulatório de Saúde Mental. Atuou no Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPSi) entre 2015 à 2019. Estudante de Pedagogia.

MYRNA MAXIMIANO MENDES MIRANDA

Possui graduação em Serviço Social pela Universidade Federal do Espírito Santo (2002). Tem experiência na área de Saúde Coletiva, com ênfase em HIV/AIDS e na área de Políticas Sociais, com ênfase em Políticas de Transferência de Renda e de Conselhos de Políticas e de Direitos. Possui Pós-Graduação *latu sensu* em Gestão Municipal de Políticas Públicas (2005), atuando na área de planejamento e avaliação de políticas sociais. Atualmente cursa graduação em Ciências Sociais.

NADIR MACHADO ALVES CARDOSO

Mestra em Ciência pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2013). Possui graduação em Farmácia pela Universidade do Grande Rio (2002). Atualmente é farmacêutico hospitalar da Fundação Municipal Hospitalar de Macaé e chefe de serviço da Prefeitura Municipal de Macaé. Tem experiência na área de Farmácia, com ênfase em Farmácia Hospitalar, atuando principalmente nos seguintes temas: alimentos e prevenção.

NÚBIA MARIA FREIRE VIEIRA LIMA

Fisioterapeuta, Doutora em Ciências Biomédicas pela UNICAMP e Professora adjunta da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA) desde 2014, onde leciona no Curso de Fisioterapia nas disciplinas de Atenção Fisioterapêutica em Aparelho Locomotor e e Estágio Supervisionado em Aparelho Locomotor e nos Programas de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e Ciências da Reabilitação (Mestrados Acadêmicos) nas disciplinas Tópicos em Instrumentos de Medida em Reabilitação Neurológica, Fundamentos de Bioestatística e Bioestatística para Reabilitação. Responsável por 8 instrumentos de medida em saúde traduzidos e validados no Brasil.

RAFAELA CAROLINI DE OLIVEIRA TÁVORA

Enfermeira. Docente UFRN-FACISA Adjunto I, docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva/FACISA. Doutora em Enfermagem (UFC), mestre em Cuidados Clínicos em Saúde em Enfermagem (UECE), Especialista em Enfermagem Clínica (UECE), Saúde da Pessoa Idosa (UFC) e Gestão de Serviços de Saúde (ESP). Pesquisadora Integrante do Projeto de Pesquisa Cuidado de Enfermagem na Saúde da Criança - CUIDENSC (UFC).

RAMON SILVA DE SOUSA

Graduado em enfermagem pelo o centro universitário Maurício de Nassau, pós graduando em saúde pública e saúde da família.

RAQUEL SANTOS FARIA

Atuou como Professora Substituta da disciplina Integração dos Processos Vitais, na Faculdade de Ceilândia - UnB. Possui Doutorado pelo programa de Biologia Animal da Universidade de Brasília, na área de tratamento de câncer com materiais nanoestruturados. Mestre em Ciências Biológicas na área de concentração Bioquímica e Genética, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. Possui Graduação em Ciências Biológicas - Bacharelado e Licenciatura pela Universidade Federal de Goiás.

RAYSSA SAMILLY SANTOS DE OLIVEIRA

Bacharel em Enfermagem pelo Centro Universitário UNIFACISA, Campina Grande/PB. Membro da LATIN/CG - Liga Acadêmica de Terapia Intensiva e Nutricional (2016-2017). Membro Bolsista do Projeto de Extensão Envelhecendo com Saúde (2017-2018). Monitora da disciplina Semiologia e Semiotécnica I (2017-2018).

REGINA MARIA FIALKOSKI BASSO

Especialista em Saúde para Professores do Ensino Fundamental e Médio pelo Departamento de Enfermagem da UFPR. Especialista em Educação Especial e Inclusão pela Faculdade São Braz. Graduada em História pela Universidade Tuiuti do Paraná. Professora da Rede Estadual do Paraná desde 2003 e Professora da Área de Ciências Humanas do SAREH - Serviço de Atendimento a Rede de Escolarização Hospitalar - desde 2011.

RIZOCELE DA SILVA

Bacharela em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande; Pós-graduada em Enfermagem Dermatológica pela Universidade Estácio de Sá; Técnica em enfermagem na Área Assistencial

ROBERTA MENESES SOUSA

Enfermeira; Especialista em Saúde do Idoso.

ROSANE CRISTINA MENDES GONÇALVES

Enfermeira; Especialista em Saúde Pública; Especialista em ativação de Processos de mudança na Formação de Profissional de Saúde.

ROUSLANNY KELLY CIPRIANO DE OLIVEIRA

Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente é plantonista - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, trabalhou como enfermeira - Clínica Santa Ana. Tem experiência na área de Enfermagem, atuando principalmente nos seguintes temas: urgência e emergência, Saúde do idoso e doenças crônicas.

SANDRA MARIA SIMÕES RIBEIRO

Bacharel em Enfermagem pela Faculdade de Comunicação Tecnologia e Turismo de Olinda (FACOTTUR). Pós-graduanda em Saúde pública com ênfase em saúde da família pelo Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG). Tem interesse pela área de enfermagem geriátrica e cuidados paliativos.

TACILLA MARIA RODRIGUES PEREIRA

Graduada em Bacharelado pela Faculdade Maurício de Nassau, Campus Campina Grande- PB, Pós-graduanda em Urgência e Emergência pela FAVED, Pós-graduanda em Cardiologia e Hemodinâmica pelo grupo CEFAPP

THYAGO JOSÉ ARRUDA PACHECO

Doutorando em Biologia Animal e mestre em Nanociência e Nanobiotecnologia pela Universidade de Brasília (UnB). Atua no melhoramento de entrega de nanocarreadores utilizando cloroquina. É bacharel em biotecnologia pela UnB e aluno de biologia da mesma universidade. Fez estágio profissionalizante no laboratório de Nanobioimagem da UnB otimizando o imageamento in vivo através de tomografia computadorizada e construção de modelos 3D

TICIANA CASTRO LUZ.

Enfermeira pela Universidade Federal do Piauí. Gestora em saúde na atenção básica do município de Simplício Mendes PI.