SAÚDE COLETIVA

ABORDAGEM TEÓRICA E VIVÊNCIAS PRÁTICAS

ORGANIZADORES

SAMILA SOUSA VASCONCELOS
GUILHERME PERTINNI DE MORAIS GOUVEIA
SAMARA SOUSA VASCONCELOS GOUVEIA
GABRIELA DANTAS CARVALHO

Editora Poisson

VOLUME

1

Samila Sousa Vasconcelos
Guilherme Pertinni de Moraes Gouveia
Samara Sousa Vasconcelos Gouveia
Gabriela Dantas Carvalho
(Organizadores)

Saúde coletiva: Abordagem teórica e vivências práticas Volume 1

1ª Edição

Belo Horizonte
Poisson
2021

Editor Chefe: Dr. Darly Fernando Andrade

Conselho Editorial

Dr. Antônio Artur de Souza – Universidade Federal de Minas Gerais
Msc. Davilson Eduardo Andrade
Dra. Elizângela de Jesus Oliveira – Universidade Federal do Amazonas
Msc. Fabiane dos Santos
Dr. José Eduardo Ferreira Lopes – Universidade Federal de Uberlândia
Dr. Otaviano Francisco Neves – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Dr. Luiz Cláudio de Lima – Universidade FUMEC
Dr. Nelson Ferreira Filho – Faculdades Kennedy
Msc. Valdiney Alves de Oliveira – Universidade Federal de Uberlândia

Revisores Ortográficos e Gramaticais

Alessandra Harumi Ribeiro Naka (Capítulos 1 e 2)
Jamilé Raquel Felix Sampaio (Capítulo 3)
Ana Christina de Sousa Damasceno (Capítulo 4).
Francisco Paulo Alves (Capítulos 5 e 6)

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

S255

Saúde coletiva: Abordagem teórica e vivências
práticas - Volume 1/ Organização: Samila Sousa
Vasconcelos, Guilherme Pertinni de Moraes Gouveia,
Samara Sousa Vasconcelos Gouveia, Gabriela Dantas
Carvalho, Editora Poisson - Belo Horizonte MG:
Poisson, 2021

Formato: PDF

ISBN: 978-65-5866-071-2

DOI: 10.36229/978-65-5866-071-2

Modo de acesso: World Wide Web

Inclui bibliografia

1.Saúde 2.Medicina 3. Fisioterapia I.VASCONCELOS,
Samila Sousa, II. GOUVEIA, Guilherme Pertinni de
Moraes III. GOUVEIA, Samara Sousa Vasconcelos IV.
CARVALHO, Gabriela Dantas V. Título.

CDD-610

Sônia Márcia Soares de Moura – CRB 6/1896

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

O conteúdo deste livro está licenciado sob a Licença de Atribuição Creative Commons 4.0.

Com ela é permitido compartilhar o livro, devendo ser dado o devido crédito, não podendo ser utilizado para fins comerciais e nem ser alterada.

Esse e outros títulos podem ser baixados gratuitamente em www.poisson.com.br
Entre em contato pelo contato@poisson.com.br

Organizadores

Samila Sousa Vasconcelos

Fisioterapeuta, mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Estadual do Ceará, docente do Centro Universitário Inta – Uninta. Integrante do Grupo de Pesquisa em Fisioterapia Avaliativa e Terapêuticas – GPFAT.

Email: samilasousa@hotmail.com

Guilherme Pertinni de Moraes Gouveia

Fisioterapeuta pela Universidade de Fortaleza (2006). Pós-graduado em Fisioterapia Cardiovascular e pneumofuncional (UNIFOR 2007), Saúde da Mulher (COFFITO – 2018) e Pesquisa Clínica (PROADISUS / Hospital Oswaldo Cruz – 2019). Mestre em Saúde Pública – UFC. Doutor em Ciências Medico-cirúrgicas – UFC. Atualmente é docente adjunto da Universidade Federal do Delta do Parnaíba – UFDPAr e Coordenador do Grupo de Pesquisa em Fisioterapia Avaliativa e Terapêuticas – GPFAT.

E-mail: gpfatufpi@gmail.com

Samara Sousa Vasconcelos Gouveia

Fisioterapeuta pela Universidade de Fortaleza. Especialista em Terapia Manual e Postural pela CESUMAR. Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Doutora em Ciências Médico-Cirúrgicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Professora adjunta do Curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba – UFDPAr. Integrante do Grupo de Pesquisa em Fisioterapia Avaliativa e Terapêuticas – GPFAT.

Email: samaragouveia@ufpi.edu.br

Gabriela Dantas Carvalho

Fisioterapeuta pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Especialista em Gestão Hospitalar. Mestre em Farmacologia (UFPI). Doutora em Biotecnologia (UFPI).

E-mail: ftgabrieladantas@hotmail.com

Prefácio

O livro “Saúde coletiva: abordagem teórica e vivências práticas - Vol. 1” trata de uma questão atual e desafiadora: como diferentes especialidades atuam e contribuem para o desenvolvimento da Saúde Coletiva e para garantir a continuidade do cuidado. Num momento de constante mudança que nossa sociedade passa, é extremamente necessário refletir sobre o papel dos trabalhadores e profissionais da área da saúde em diferentes realidades e contextos.

É satisfatório e necessário perceber que a construção do campo da Saúde Coletiva não pode ser considerada um processo finalizado. Pelo contrário, é um processo contínuo, em que se percebe uma constante expansão das possibilidades de atuação. Desta forma, faz-se necessário que a formação continuada seja buscada por cada profissional que atua nessa área de conhecimento.

Este livro foi organizado com o objetivo de que profissionais e pesquisadores reflitam sobre seu processo de formação, sua atuação, suas experiências e os instigue a buscar constantemente uma atualização de suas práticas e saberes.

O capítulo 1 apresenta a experiência da avaliação familiar de paciente idoso renal crônico, por meio do genograma, e suas relações ao funcionamento de sua família no processo saúde-doença. Trata ainda da importância de se utilizar recursos e ferramentas em saúde para que seja possível uma avaliação e uma assistência mais completa e holística.

O capítulo 2 trata da importância do equilíbrio orgânico e da terapia antioxidante para neutralizar a ação dos radicais livres que atuam no corpo humano, por meio da Terapia Ortomolecular e de como ela pode ser usada na prevenção e tratamento no campo da Saúde Pública.

O capítulo 3 mostra como a fisioterapia pode atuar nas Disfunções Sexuais Masculinas, que por meio de suas técnicas e recursos, é segura e eficaz no tratamento destas Disfunções, sendo comprovado por apresentar um bom nível de evidências.

No capítulo 4 há mais uma possibilidade de atuação da fisioterapia, descrevendo, por meio de uma revisão de literatura, sua importância para compor a equipe multiprofissional para atuar no climatério. A atuação do fisioterapeuta na Saúde Coletiva, dentro da APS é fundamental para um trabalho preventivo de educação em saúde e redução de danos à saúde.

Por fim, os capítulos 5 e 6 abordam, por meio de relatos de experiência, questões muito atuais, contemplando a temática da Saúde Pública e a pandemia da Covid-19. Enquanto o capítulo 5 aborda essa temática focando na Atenção Primária à Saúde, relatando a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde no enfrentamento à Covid-19, o capítulo 6 tem como enfoque a Atenção Terciária à Saúde, abordando os desafios dos fisioterapeutas intensivistas no combate à Covid-19 em um Hospital.

Esperamos que esse livro traga reflexões sobre o campo da Saúde Coletiva e sua permanente construção, que necessita de diálogo entre saberes, especialidades, áreas de atuação, e de profissionais empenhados em trabalhar, experimentar, refletir e difundir ideias.

Gabriela Dantas
Guilherme Pertinni
Samara Gouveia
Samila Sousa

SUMÁRIO

Capítulo 1: Avaliação familiar de paciente idoso renal crônico: Relato de experiência	08
--	----

Yaranara Linhares Aragão, Paulo Roberto Santos, Cibelly Allyne Siqueira Lima Freitas,
Maria Adelane Monteiro da Silva

DOI: 10.36229/978-65-5866-071-2.CAP.01

Capítulo 2: Terapia ortomolecular na saúde pública.....	16
--	----

Lara Ferreira Sousa Carvalho

DOI: 10.36229/978-65-5866-071-2.CAP.02

Capítulo 3: Fisioterapia nas disfunções sexuais masculinas	32
---	----

Guilherme Pertinni de Moraes Gouveia, Elisson de Sousa Mesquita Silva, Elivelton Sousa
Montelo, Felipe Andrade de Oliveira

DOI: 10.36229/978-65-5866-071-2.CAP.03

Capítulo 4: Climatério e saúde coletiva: Evidências da atuação do fisioterapeuta.....	47
--	----

Maria Gabriela Cardoso Teles Monteiro

DOI: 10.36229/978-65-5866-071-2.CAP.04

Capítulo 5: Papel dos agentes comunitários de saúde no enfrentamento da COVID-19 - relato de experiência	60
--	----

Gabriela Dantas Carvalho, Tiago da Rocha Oliveira, Guilherme Barroso Langoni de
Freitas, Guilherme Pertinni de Moraes Gouveia

DOI: 10.36229/978-65-5866-071-2.CAP.05

Capítulo 6: Os desafios do fisioterapeuta intensivista em meio à pandemia por COVID- 19	67
---	----

Rayanne Lima de Araujo, Érika Gracy Diniz Sousa, Laryssa Theodora Galeno de Castro,
Tiago da Rocha Oliveira

DOI: 10.36229/978-65-5866-071-2.CAP.06

Autores:	73
-----------------------	----

Índice Remissivo:	77
--------------------------------	----

Capítulo 1

Avaliação familiar de paciente idoso renal crônico: Relato de experiência

Yaranara Linhares Aragão

Paulo Roberto Santos

Cibelly Allyne Siqueira Lima Freitas

Maria Adelane Monteiro da Silva

Resumo: A Insuficiência Renal Crônica (IRC) consiste na perda irreversível da função dos rins de forma lenta e progressiva. O genograma é um diagrama que detalha a estrutura e o histórico familiar. Geralmente, incluem-se, pelo menos, três gerações. **Objetivo:** relatar a experiência da avaliação familiar de paciente idoso renal crônico e suas relações ao funcionamento de sua família no processo saúde-doença. **Metodologia:** Trata-se de um estudo do tipo descritivo-exploratório, desenvolvido a partir da confecção de genograma coletados durante as visitas domiciliares ao paciente durante o mês de março de 2020. **Resultados:** O grupo familiar é composto pelo paciente índice, sua esposa, duas filhas, um filho e uma neta. Foi possível identificar as fragilidades e vulnerabilidades presentes naquela família. **Discussão:** O processo de envelhecimento, acaba acometendo em algumas estruturas e manifestações de doenças crônicas (DC). A doença renal crônica (DRC) pode levar a inúmeras complicações caminhando para progressão à falência renal. Entende-se que o processo saúde e doença para pacientes renais crônicos ultrapassa o aspecto biológico e envolve todo o contexto social, político e cultural do indivíduo, incluindo sua família. **Considerações finais:** A avaliação familiar com genograma visa analisar fatos, pois além de aproximá-los dos desafios encontrados ao longo da construção do cuidado ele conseguiu ajudar no cuidado dessa família.

Palavras-Chave: Avaliação familiar, Renal Crônico, Idoso.

1 INTRODUÇÃO

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) consiste na perda irreversível da função dos rins de forma lenta e progressiva, e tem como principais causas a Hipertensão, Diabetes Mellitus e as Glomerulonefrites. Estudos apontam que, dentre outras causas, a IRC pode ser ainda ocasionada por infecções e obstruções do trato urinário, rins policísticos, medicações, agentes nefrotóxicos e distúrbios vasculares (FRAZÃO et al., 2014).

O número de doentes renais é crescente em todo o mundo e o Brasil já representa o terceiro maior mercado de hemodiálise. A IRC atinge, aproximadamente, 2 milhões de brasileiros. Destes, 70% tem dificuldades para conseguir atendimento especializado e diagnóstico, 70 mil estão em diálise e 25 mil já foram transplantados (FRAZÃO et al., 2014).

A satisfação dos idosos com relação ao funcionamento da família associa-se de forma reforçada com a percepção de coesão e de conforto emocional que derivam de suas relações com pessoas que lhes são significativas (RABELO; NERI, 2016).

A família pode ser compreendida como a célula mater da sociedade e o ambiente de maior convívio entre as pessoas, que tem como traço estruturante as articulações da consanguinidade, afinidade e descendência. Independentemente da conceitualização adotada, constitui um sistema social que desempenha funções importantes na sociedade, nomeadamente de natureza afetiva (CAVALCANTE et al., 2017).

As percepções das relações familiares dizem respeito à avaliação que a pessoa faz sobre a qualidade de suas relações, sobre o grau da eficácia exibida pela família no atendimento de suas necessidades e sobre o grau em que as relações familiares correspondem às suas expectativas (RABELO; NERI, 2016).

A convivência familiar entre idoso doente, com incapacidades físicas ou com saúde psicológica prejudicada sugere à família um conjunto de desafios com forte potencial para, por um lado, dar origem a conflitos; por outro, a novas formas de funcionamento e a novas configurações, por exemplo, coabitação entre membros idosos e não idosos (RABELO; NERI, 2016).

Para o idoso, é indispensável a presença de uma autoestima positiva, que leva o indivíduo a sentir-se confiante, adequado à vida, competente e merecedor, pois a autoestima é composta de sentimentos de competência e de valor pessoal, familiar acrescida de auto-respeito e auto-confiança (SILVA et al., 2020).

As avaliações e intervenções das famílias constituem um relevante processo para a coordenação do cuidado em todas as etapas existentes das ações de saúde. Conhecer sua estrutura e composição, observando como se organizam e interagem os membros que a compõem, é vital para o cuidado. A família é representada por divergentes definições e pelos mais variados conceitos e até mesmo atribuições, podendo também ser observada sob a ótica de diferentes teorias (FERREIRA; COUTINHO; NASCIMENTO, 2017).

Considerar o ambiente familiar como cenário de atuação na saúde dos pacientes ainda constitui-se um desafio para os profissionais de saúde, sobretudo em um contexto em que o cuidado está voltado, principalmente, para atender às necessidades do indivíduo (CAVALCANTE et al., 2017).

A família compõe o fundamental sistema de suporte ao idoso, embora as dificuldades vivenciadas na contemporaneidade, sendo haja relações familiares as que os idosos vivem com mais intensidade, e sendo que a importância da estrutura familiar na sua vida é fundamental, tendo implicações no seu bem-estar e respectiva qualidade de vida (CAVALCANTE et al., 2017).

Os trabalhos com as famílias podem ocorrer em contextos variados; na área da saúde, pode ocorrer no ambiente hospitalar e na comunidade. Conhecer sua estrutura,

sua composição, como os membros se organizam e interagem entre si e com o ambiente, os problemas de saúde, as situações de risco, os padrões de vulnerabilidade, é vital para o planejamento do cuidado à saúde (WRIGHT; LEAHEY, 2012).

O genograma é um diagrama que detalha a estrutura e o histórico familiar. Geralmente, incluem-se, pelo menos, três gerações e os membros da família são colocados em séries horizontais, que significam linhagens de geração, tendo a finalidade de obter uma visão geral da família, com o levantamento de dados relevantes sobre os relacionamentos ao longo do tempo, e também pode incluir dados sobre saúde, ocupação, religião, etnia e migrações, entre outras (WRIGHT; LEAHEY, 2012).

A avaliação das famílias com genograma é vista como um instrumento que permite entender a estrutura e o funcionamento familiar por meio do conhecimento da história da família obtendo dados médicos, sociais, culturais, traços individuais de comportamento e personalidade, e também dos vínculos e relações emocionais de cada grupo (SANTOS; GOMES, 2018).

Diante deste contexto, percebeu-se pouca produção científica sobre o tema. Diante, considerando a família, como fator de impacto na melhora da qualidade de vida dos pacientes o objetivo deste estudo é relatar a experiência da avaliação familiar de paciente idoso renal crônico e suas relações ao funcionamento de sua família no processo saúde-doença.

Para a fisioterapia, é de fundamental importância compreender o idoso de forma global, como condição vida familiar para um planejamento adequado do processo de cuidado desses indivíduos.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa que consistiu em um relato de experiência que descreveu aspectos vivenciados pela autora, na oportunidade de uma visita domiciliar a um paciente renal crônico após tratamento de COVID-19. Trata-se de um olhar qualitativo, que abordou a problemática desenhada a partir de métodos descritivos e observacionais. Os dados familiares foram coletados durante a visita domiciliar ao paciente onde forneceram os dados necessários para a elaboração da avaliação familiar. Por execução do mesmo foram considerados o contexto interno e externo da família e observados os aspectos relacionados ao comportamento entre as três gerações do paciente.

Para embasamento científico, foram utilizados dezoito artigos publicados em língua portuguesa e que estão disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que abrange diversas bases de dados, através dos descritores, genograma, avaliação familiar, renal crônico e idosos. Sendo também utilizados outras literaturas disponíveis que abordam a mesma.

3 RESULTADOS

O provedor do lar e paciente possui 69 anos, hipertenso, transplantado renal, obeso, realiza hemodiálise três vezes por semana, sendo esse casado e teve 3 filhos. O grupo familiar é composto pelo paciente índice, sua esposa, 2 filhas, 1 filho e 1 neta.

O genograma permitiu identificar as fragilidades e vulnerabilidades presentes naquela família. Sendo o índice cooperado e não estando com salário em dia, ficando com comprometimento da renda familiar para compra de utensílios domésticos e

medicamentos que estão sendo supridos por dois filhos que trabalham. A esposa é profissional do lar e cuida da neta para que a mãe possa trabalhar. A filha mais velha tem saúde comprometida devido a problemas reumáticos (LUPUS) que não consegue controlar e sempre está em crise.

Além disso, a utilização das ferramentas possibilitou uma avaliação das relações e a funcionalidade do grupo familiar e o grau de cuidado a que ele era submetido, além de perceber uma relação de cuidado/cuidador e dependência existente naquele grupo familiar devido às limitações físicas do paciente índice, o que alterava a rotina dos outros membros da família. Também se observou uma relação de distanciamento dos filhos com o pai devido o mesmo ser de uma personalidade forte e ser contrária a opinião dos filhos.

O grupo familiar foi classificado em fase do ciclo vital da seguinte forma: o grupo familiar como alargado ou extenso, sendo constituído por três gerações em diferentes fases do ciclo vital, em que o paciente índice se encontra como pessoa idosa, os filhos já foram criados e já conseguiram sua independência, porém ainda residem com os pais.

A ferramenta de avaliação da funcionalidade da família utilizada possibilitou a classificação do grupo familiar como funcional, pois havia boa comunicação clara e direta e as relações entre todos os indivíduos da residência eram harmoniosas entre eles, apesar de em diversos momentos haverem divergências de pensamentos, porém havia uma boa resolubilidade.

A relação direta com os desafios enfrentados no cuidado constitui-se como parte fundamental do processo de saúde-doença desse paciente. A aplicação destes instrumentos de abordagem familiar apresentou-se com uma grande importância para estender os conhecimentos e validá-los como recurso no vínculo com paciente.

4 DISCUSSÃO

4.1 IDOSO RENAL CRÔNICO

Os estudos populacionais vêm demonstrado que, conforme aumenta a idade, aumenta a prevalência das doenças crônicas, portanto, além das doenças cardiovasculares, os cânceres, as doenças respiratórias e as doenças endócrinas, como o diabetes (SANTOS; LIRA; FERNANDES, 2020).

O processo de envelhecimento acaba acometendo em algumas estruturas e manifestações de doenças crônicas (DC), os idosos encontram desafios em suas atividades de autogerenciamento do dia a dia. Eles lutam para controlar os sintomas, cumprir os regimes de tratamento, minimizar as consequências negativas da deterioração física e mudar seu estilo de vida para lidar com as limitações criadas pelas DC (LIMA; VASCONCELOS; BORBA, 2019).

As DC se caracterizam como um estado de doenças permanentes, que produzem alterações psicológicas irreversíveis e requerem um processo longo de reabilitação, observação, controle e cuidados. Entende-se que a doença causa desarmonia, desencadeando ansiedades na vida de muitos dos indivíduos acometidos (RUDNICKI, 2014).

A doença renal crônica (DRC) pode levar a inúmeras complicações, caminhando para progressão da falência renal. Esse fenômeno se deve ao fato de que os rins se caracterizam como órgãos fundamentais para o equilíbrio hidroeletrolítico e metabólico do organismo. Sendo assim, sua disfunção encontra-se associada ao aumento da morbimortalidade (SANTOS; LIRA; FERNANDES, 2020).

A DRC tem como definição a anormalidade da estrutura e/ou função renal, presente por mais de três meses, com implicações para a saúde, sendo necessário esclarecer a causa da doença, bem como definir seu estágio. Com isso, é possível identificar os riscos de desfechos adversos, relacionados ao comprometimento renal (GESUALDO et al., 2020).

A Sociedade Brasileira de Nefrologia afirma que cerca de 30% dos pacientes em diálise são idosos. Os idosos em hemodiálise possuem características clínicas peculiares que devem ser consideradas; de maneira geral, possuem maior número de comorbidades, necessitam de maior número de hospitalizações, consomem mais medicamentos e, proporcionalmente, utilizam mais os serviços de saúde do que a população mais jovem (GESUALDO et al., 2020).

A população brasileira nas últimas décadas vem passando por um processo de transformação demográfica que acaba induzindo à reflexão sobre os acontecimentos e consequências ligadas ao envelhecimento acelerado da mesma. O envelhecer é um processo natural, e cada pessoa o vivencia de uma maneira diferente. O idoso acometido por doença crônica quando sua condição de autonomia e a capacidade de autocuidado do idoso tornam-se comprometidas pela doença, tem seu quadro agravado quando a doença o transforma em dependente de outra pessoa um cuidador que em muitas vezes acaba sendo seu cuidador algum familiar (GURGEL; OLIVEIRA; SALLES, 2012).

4.2 RENAL CRÔNICO E AVALIAÇÃO FAMILIAR

A concepção de que o processo saúde e doença para pacientes renais crônicos ultrapassa o aspecto biológico e envolve todo o contexto social, político e cultural do indivíduo, incluindo sua família, tendo que se reorganizar e também se adaptar, pois o paciente necessita de cuidados. Os papéis e funções devem ser repensados e distribuídos de forma que se auxilie o paciente na elaboração de sentimentos confusos e dolorosos, provocados pelo processo do adoecer (CENTENARO, 2010).

A rotina desses pacientes é restrita a consultas médicas, sessões de hemodiálise em média três vezes por semana, por um período de quatro horas a sessão, estando o paciente restrito a uma dieta e principalmente limitado à execução de tarefas que requeiram esforços físicos, pois sentem-se muito fracos e cansados, na qual a família tem papel fundamental na participação em todo o processo do tratamento tornando essencial, uma vez que o paciente se sentirá apoiado e seguro para dar continuidade ao tratamento e melhorar seu convívio social (PEDROSO; SIQUEIRA, 2016).

Existem alguns instrumentos de avaliação familiar que podem ser utilizados como estratégias para auxiliar os profissionais de saúde a prestar assistência de forma integral. Assim, o genograma possibilita visualizar a adaptação familiar e identificar, especialmente para este estudo, os laços de afetividade, sendo registradas informações sobre os sujeitos de um grupo familiar, visando auxiliar na compreensão de diversos problemas clínicos familiares e o trajeto ao longo do tempo e das gerações (NOGUEIRA et al., 2017).

A avaliação e intervenção em saúde exigem a atualização de modelos que permitam a concepção de cuidados orientados tanto para a coleta de dados como para o planejamento das intervenções. Neste contexto, o Modelo Calgary de Avaliação da Família (MCAF) surge comum a perspectiva multidimensional de conhecer e avaliar famílias, englobando três dimensões: estrutural (composição, organização e características dos membros familiares), de desenvolvimento (estágios, tarefas e

vínculos) e funcional (atividades, comunicação e papéis familiares). Cada uma destas dimensões se integra em várias categorias e subcategorias que, no seu conjunto, permitem a avaliação sistêmica da família, numa perspectiva dinâmica e de continuidade (CAVALCANTE et al., 2017).

Para as famílias, viver o adoecimento implica em modificações no modo de vida e desenvolve formas de enfrentamento que levam a pessoa adoecida e sua família a restabelecerem novas relações com a vida. Estudos apontam que o envolvimento dos familiares no cuidado desde a instauração do adoecimento, marcado pelo amparo cotidiano para o tratamento, a doença e o desenvolvimento de aprimoradas formas de lidar com a situação instaurada (SOUZA et al., 2016).

As repercussões em todo o aspecto da vida do paciente e seus familiares que acompanham este processo são caracterizadas pela mudança de vida, incertezas, limitações e medos. É importante esclarecer que estas mudanças estão presentes, pois o paciente convive com situações impostas pelo tratamento, como mudança de hábitos alimentares, acesso venoso contínuo e dependência de uma máquina, mudando seu estilo de vida familiar e social. As necessidades da família que cuida têm sido alvo de vários estudos, concluindo para necessidades múltiplas e complexas, na sua grande maioria, fatores de sobrecarga emocional, física, social, espiritual e financeira (LIMA et al., 2017).

Buscar a qualidade de vida é um aspecto importante em pessoas com doenças crônicas graves e limitantes que se submetem a tratamentos prolongados e dolorosos e apresentam maior vulnerabilidade às comorbidades. No entanto, estes pacientes, em sua maioria, enfrentam o tratamento como uma modalidade dolorosa, sofrida, angustiante, com limitações físicas, sociais e nutricionais, dificultando, muitas vezes, a interação paciente-sociedade-família.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As utilizações das ferramentas em saúde permitem uma melhor identificação de fragilidades, vulnerabilidade, patologias prevalentes, funcionalidades das famílias DRC.

Os DRC têm sua qualidade de vida radicalmente mudada depois do diagnóstico e tratamento. São indivíduos complexos, não somente pelos fatores físicos, como também os emocionais e familiares.

A avaliação familiar com genograma visa analisar fatos, pois além de aproximá-los dos desafios encontrados ao longo da construção do cuidado, também torna as equipes de saúde aptas a conduzirem o processo, perpassando por todas as etapas da assistência à saúde integral, desde a criação de vínculo até a utilização de instrumentos para a construção de cuidado individualizado e com boa resolubilidade.

Durante o desenvolvimento deste estudo, constatamos a escassez de pesquisas que valorizem as perspectivas dos indivíduos com DRC e seus familiares, em especial o paciente idoso. Ademais, importa salientar que este estudo poderá contribuir com novas pesquisas acerca do tema, influenciando para elaboração de maiores investigações do DRC e sua família, agregando novos saberes e conhecimentos na oferta de um assistencialismo mais qualificado, holístico e humanizado.

Considera-se importante a continuidade de estudo sobre a temática de acompanhamento aos pacientes renais em tratamento de hemodiálise e suas famílias para que tenha uma maior interação como forma de sucesso no processo saúde-doença.

REFERÊNCIAS

- CAVALCANTE, A. E. S. et al. Aplicação do Modelo Calgary para Avaliação Familiar na Estratégia Saúde da Família. **Enfermagem Brasil**, v. 16, n. 2, p. 105–114, 2017.
- CENTENARO, G. A. A intervenção do serviço social ao paciente renal crônico e sua família. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 15, n. suppl 1, p. 1881–1885, jun. 2010.
- FERREIRA, P. D. M.; COUTINHO, D. H.; NASCIMENTO, A. A. P. O Genograma Como Instrumento De Avaliação Familiar: Uma Revisão Integrativa. **Cadernos De Educação, Saúde E Fisioterapia**, v. 3, n. 6, p. 20–28, 2017.
- FRAZÃO, C. M. F. DE Q. et al. Cuidados de enfermagem ao paciente renal crônico em hemodiálise. **Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste**, v. 15, n. 4, p. 701–709, 2014.
- GESUALDO, G. D. et al. Fragilidade e fatores de risco associados em pacientes com doença renal crônica em hemodiálise. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 11, p. 4631–4637, nov. 2020.
- GURGEL, D. A.; OLIVEIRA, F. P. A.; SALLES, H. S. . Cuidador de idoso doente crônico e suas dificuldades. **Revista Kairós Gerontologia**, v. 15, n. 2, p. 129–143, 2012.
- LIMA, L. R. DE et al. Percepções dos familiares frente ao cuidado com paciente em diálise renal. **Rev. enferm. UFPE on line**, v. 11, n. 7, p. 2704–10, 2017.
- LIMA, M. DE F. G.; VASCONCELOS, E. M. R. DE; BORBA, A. K. DE O. T. Instruments used to evaluate functional health literacy in elderly persons with chronic kidney disease: Integrative review. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 22, n. 3, 2019.
- NOGUEIRA, A. P. F. et al. A importância do uso do genograma para compreensão da dinâmica familiar. **Revista de Enfermagem UFPE on line**, v. 11, n. 12, p. 5110, 4 dez. 2017.
- PEDROSO, V. S. M.; SIQUEIRA, H. C. H. Insuficiência Renal Crônica: o Processo de Adaptação Familiar. **Ensaio e Ciência: C. Biológicas, Agrárias e da Saúde**, v. 20, n. 2, p. 79, 5 ago. 2016.
- RABELO, D. F.; NERI, A. L. Avaliação das Relações Familiares por Idosos com Diferentes Condições Sociodemográficas e de Saúde. **Psico-USF**, v. 21, n. 3, p. 663–675, dez. 2016.
- RUDNICKI, T. Doença renal crônica: vivência do paciente em tratamento de hemodiálise. **Contextos Clínicos**, v. 7, n. 1, 27 jun. 2014.
- SANTOS, M. V. B. DOS; LIRA, G. G.; FERNANDES, F. E. C. V. Adesão à medicação pelo paciente renal crônico em hemodiálise. **Rev. enferm. UFPE on line**, v. 14, p. 1–8, 2020.
- SANTOS, M. J. Z.; GOMES, I. C. O uso do genograma como recurso expressivo e objeto mediador em grupo de crianças e adolescentes. **Semina: Ciências Sociais e Humanas**, v. 39, n. 2, p. 197, 2018.
- SILVA, M. R. DA et al. Qualidade de vida de pacientes renais crônicos submetidos á

hemodiálise: Uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 4, p. 9344–9374, 2020.

SOUZA, Í. P. DE et al. Genogram And Eco-Map As Tools For Understanding Family Care In Chronic Illness Of The Young. **Texto & Contexto - Enfermagem**, v. 25, n. 4, 2016.

WRIGHT, L.; LEAHEY, M. **Enfermeiras e Famílias: Um guia para a avaliação e intervenção na família**. São Paulo: ROCA, 2012.

Capítulo 2

Terapia ortomolecular na saúde pública

Lara Ferreira Sousa Carvalho

Resumo: O termo “ortomolecular” é derivado da palavra grega orto (correto ou perfeito), correspondendo à correção molecular. A Terapia Ortomolecular tem como objetivo o restabelecimento do equilíbrio orgânico através de agentes antioxidantes, buscando neutralizar a ação dos radicais livres que atuam no corpo humano. A Terapia antioxidante reduz os radicais livres através do uso de: vitaminas, oligoelementos e minerais. Nesse capítulo abordaremos a aplicação da Terapia Ortomolecular como aliada na prevenção e tratamento na saúde pública.

Palavras-Chave: Terapia Ortomolecular, Radicais Livres, Saúde Pública.

1 INTRODUÇÃO

O termo “ortomolecular” é derivado da palavra grega orto (correto ou perfeito), correspondendo à correção molecular. A terminologia foi criada pelo cientista norte-americano Linus Pauling, que foi o responsável pela iniciação das teorias da medicina ortomolecular em terapêutica clínica (FERREIRA, 2004).

A Terapia Ortomolecular tem como objetivo o restabelecimento do equilíbrio orgânico através de agentes antioxidantes, buscando neutralizar a ação dos radicais livres que atuam no corpo humano. A Terapia antioxidante reduz os radicais livres através do uso de: vitaminas, oligoelementos e minerais. Nesse capítulo, abordaremos a aplicação da Terapia Ortomolecular como aliada na prevenção e tratamento na saúde pública (MONTEIRO, 2017).

Os radicais livres são moléculas que têm seus elétrons não pareados na órbita externa, característica que garante a sua instabilidade, desestabilizando outras moléculas que precisam ceder seus elétrons para o equilíbrio do radical. Essas moléculas têm vida média curta, multiplicam-se rapidamente buscando sua estabilidade. Existem duas formas de inibição ou término de multiplicação dos radicais livres (SIZER; WHITREY, 2003).

A primeira forma de inibição é quando o sistema antioxidante do próprio corpo libera enzimas que vão atuar diretamente na produção de diversos radicais livres. A segunda maneira de inibição dessas moléculas será através: da união de dois radicais livres, uma dessas moléculas cede elétron que não está pareado na órbita externa, acontecendo um pareamento automático (NUNES, 2018).

O organismo pode não conseguir bloquear a formação de substâncias tóxicas advindas do metabolismo do oxigênio. Esses quadros são comuns em processos de doenças, por exemplo. Nesse momento é necessária a intervenção exógena através de substâncias com propriedades antioxidantes. Os radicais livres se formam devido a diversas situações, tais como: exposição prolongada ao sol, diferentes substâncias químicas, radiações ionizantes (RAMOS et al, 2007).

2 MÉTODOS

As buscas foram realizadas em quatro bases de dados bibliográficas — PubMed, Web of Science, Google Acadêmico, Scielo e LILACS. Ao finalizar as pesquisas em cada base, as referências duplicadas foram excluídas.

Foram selecionados artigos publicados entre 2015 e 2019 (incluindo os disponíveis online nesse período e que foram publicados no ano subsequente). Foram selecionados artigos publicados em inglês e português.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 VITAMINA A

A Vitamina A ou Retinol é um micronutriente pertencente às vitaminas lipossolúveis, podendo ser encontrada no tecido animal predominantemente sob a forma de retinol ou de seus ésteres, de retinal e, em menor quantidade, como ácido retinoico. A vitamina A corresponde a um grupo de hidrocarbonetos insaturados com atividade nutricional, incluindo retinol e compostos relacionados, bem como alguns carotenoides. O retinol é um álcool primário que contém um anel β -ionona com cadeia

lateral insaturada, é encontrado em tecidos animais como éster retinila com ácidos graxos de cadeia longa. O retinal é o aldeído derivado da oxidação do retinol. O retinal e o retinol podem ser facilmente interconvertidos. O ácido retinoico é o ácido derivado da oxidação do retinal. Este ácido não pode ser reduzido no organismo e, assim, não pode originar retinal ou retinol. Os retinoides são essenciais para a visão, impedem o crescimento de células malignas, reprodução, crescimento e a manutenção dos tecidos epiteliais. Além disso, no ciclo visão a vitamina A é componente dos pigmentos visuais das células cones e bastonetes. A vitamina A é encontrada, em grande quantidade, como ésteres lipídicos nos tecidos animais como no fígado e no rim, também é encontrada na nata, manteiga e gema de ovo, grão de bico, frutas, leguminosas, plantas e vegetais amarelos e verde-escuros são boas fontes dietéticas de carotenos (GOMES; SAUNDERS; ACCIOLY, 2005; MOURÃO et al., 2005; SOUZA; BOAS, 2002).

A Deficiência de Vitamina A (DVA), ou hipovitaminose A, constitui um distúrbio nutricional com ampla distribuição geográfica, sobretudo nos países em desenvolvimento, e corresponde às condições de deficiência subclínica dessa vitamina. A carência prolongada leva à perda irreversível do número de células visuais. A escassez grave leva à xeroftalmia, o ressecamento patológico da conjuntiva e da córnea. Se não for tratada, a xeroftalmia resulta em cegueira em consequência da formação de tecido de cicatrização opaco. A vitamina A, administrada como retinol ou ésteres de retinila, é incorporada no tratamento de pacientes deficientes dessa vitamina. Estudos apontam que os carotenoides desempenham papel protetor fundamental contra doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Essa proteção é devida à ação antioxidante que a vitamina A (SOUZA; BOAS, 2002).

3.2 VITAMINA D

Essa vitamina apresenta sua forma biologicamente ativa como um hormônio. É produzida na pele através da energia dos raios ultravioleta, assim como também é proveniente da dieta. A vitamina D pode ser apresentada de duas formas: vitamina D2 ou ergocalciferol e a vitamina D3 ou colicaciferol. A forma mais predominante nos alimentos é a vitamina D2, sua deficiência causa uma doença chamada raquitismo. A vitamina D apresenta atividade anticancerígena e inibe o crescimento das células leucêmicas, das cancerígenas da mama, das células malignas de melanoma e conseguem inibir a carcinogênese química da pele (NORMAN, 2008).

3.3 VITAMINA E

A vitamina E é um termo que designa 8 compostos lipossolúveis. O processo de absorção intestinal é o mesmo, porém há uma diferenciação do processo de metabolismo desses compostos. A vitamina E é encontrada em alimentos de origem vegetal, como em vegetais verde-escuros, nas sementes oleaginosas, nos óleos vegetais e no germe de trigo. Ela também é encontrada em alimentos de origem animal, como: gema de ovo e fígado (MONTEIRO, 2017).

3.4 VITAMINA C

A vitamina C, ou ácido ascórbico, é hidrossolúvel e termolábil. A dose recomendada de vitamina C diária é de 100mg. Essa vitamina se apresenta de duas formas: reduzida e oxidada. A vitamina C desempenha papel importante agente como antioxidante. Sua forma oral está associada a uma diminuição de risco para certos tipos de câncer, doenças cardiovasculares e cataratas (MOURA, 2006).

A carência de vitamina C é responsável pelo escorbuto, no adulto, e pela doença de Barlow, em crianças. A Doença de Barlow é o prolapso da válvula mitral, é um problema cardíaco no qual a válvula que separa as câmaras superior e inferior do lado esquerdo do coração não fecha apropriadamente (SPINOSA; GÓRNIAC; BERNARDI, 2006).

A deficiência da vitamina C causa: manifestações hemorrágicas (petéquias, equimoses, sangramento das gengivas), edema nas articulações, fadiga, lassidão, tonteiras, anorexia, alterações cutâneas, infecções e morte. As principais fontes de vitamina C são: frutas cítricas, acerola, caju, couve-flor, salsa, batata doce, morangos, manga, pimentão doce, brócolis, goiaba, repolho; encontra-se também em fígado, leite e carne (MONTEIRO, 2017).

3.5 VITAMINA B1

Essa vitamina também é conhecida como tiamina. Ela é encontrada em: cereais, peixe, legumes e frutas. A carência de vitamina B1 gera distúrbios neurológicos, cardiovasculares e gastrointestinais. Quando há uma diminuição de tiamina no corpo, pode desencadear alterações no ritmo cardíaco, hipotensão, dores torácicas, abdominais, insuficiência renal e cardíaca. A tiamina atua na desintoxicação do corpo, retirando o chumbo do corpo. Esse metal pode se depositar no corpo e manifestar acometimentos em: cérebro, rins, fígado e em outros tecidos (KANEKO; HARVEY; BRUSS, 2008).

3.6 VITAMINA B2

Também conhecida como riboflavina, faz parte das vitaminas do complexo B. Pesquisas demonstram que a deficiência de riboflavina está relacionada a desenvolvimentos anormais no feto e, em humanos, vários estudos correlacionam a deficiência de riboflavina com quadros hematológicos, principalmente com aqueles relacionados ao sistema hematopoiético (GOMES, 2019).

Pesquisas na área de saúde pública relatam a importância da riboflavina como fator de proteção contra doenças cardiovasculares e processos tumorais. Devido a sua não toxicidade, a riboflavina é um forte candidato como agente redutor do ferro presente no grupo heme de proteínas, atuando como protetor de danos oxidativos em determinados tecidos (VOLPE, 2013).

A riboflavina tem como função recuperar a glutathione redutase, que atua repondo a glutathione oxidase em glutathione peroxidase e esta age na peroxidação lipídica. Indicativos apontam que a vitamina B2 é uma das substâncias comprovadamente mais eficazes na redução do colesterol, sendo, inclusive, mais segura do que as drogas prescritas normalmente para redução do colesterol (MOURA, 2006).

3.7 VITAMINA B3

A vitamina B3 é conhecida como niacina que é um termo genérico para descrever o ácido nicotínico ou a nicotinamida. Trata-se de uma vitamina hidrossolúvel. Sua síntese é insuficiente em humanos, necessitando ser suplementada. Por volta de 1950, alguns estudos correlacionavam a niacina como um potente aliado no tratamento de esquizofrenia. A niacina é amplamente distribuída nos alimentos de origem animal e vegetal. As principais fontes são carnes, cereais, leguminosas e sementes. Os alimentos ricos em triptofano também são fontes indiretas de niacina (FRANÇA, 2004).

3.8 VITAMINA B5

Essa vitamina também é conhecida como ácido pantotênico. Está envolvido no metabolismo de ácidos graxos, aminoácidos e carboidratos, na síntese de colesterol, hormônios esteróides, neurotransmissores, porfirinas e hemoglobina, participando da oxidação de ácidos graxos, piruvato e alfa-cetoglutarato, além de ser responsável pela acetilação de fármacos, como a sulfadimida e isoniazida (ALMEIDA-MURADIAN, 2003).

Essa vitamina é encontrada na gema do ovo, leite, leveduras, cereais. A niacina é necessária em quantidades que variam de 10 a 25 mg/kg da dieta. Dependendo da espécie, a conversão de 60 mg de triptofano produz 1 mg de niacina. Quando consumida em excesso (acima de 100 mg/kg) a niacina pode causar vasodilatação (KANEKO; HARVEY; BRUSS, 2008).

3.9 VITAMINA B6

Vitamina B6 é um termo generalizado utilizado para designar um grupo de vitaminas hidrossolúveis que compartilham a estrutura química 3-hidróxi-2-metil-5-hidroximetilpiridina. As diversas formas da vitamina B6 variam conforme o grupo químico ligado ao carbono 4 do anel de piridina: piridoxamina (PM), quando o substituinte é uma amina; piridoxina (PN), quando o substituinte é um álcool; e piridoxal (PL), quando o substituinte é um aldeído; e seus análogos fosforilados na posição 5'-hidroximetil, formando, respectivamente, piridoxamina-5'-fosfato (PMP); piridoxina-5'-hidroxifosfato (PNP) e piridoxal-5'-fosfato (PLP). Todos os três compostos, piridoxamina, piridoxina e piridoxal podem servir como ponto de partida para coenzima biologicamente ativa, piridoxal-fosfato. A vitamina B6 atua como uma coenzima de reações de transaminação, descarboxilação e raceminação de aminoácidos, além de funcionar como um cofator no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas (GOMES, 2019).

A vitamina B6 é encontrada em uma grande variedade de alimentos, tanto nas formas fosforiladas quanto nas não fosforiladas. Dentre as principais fontes estão aves, peixes, vegetais folhosos, grãos integrais, legumes, tomates e batatas. Os produtos de origem animal contêm sobretudo piridoxal e piridoxamina, enquanto os de origem vegetal possuem em especial a piridoxina. A carência de vitamina B6 em consequência da diminuição da ingestão dietética é rara, visto que essa vitamina é amplamente encontrada nos alimentos. A deficiência de vitamina B6 pode ocorrer também em razão à uma má absorção (patologia no intestino delgado, como ocorre na doença celíaca), uso de fármacos, alcoolismo e diálise renal. Estudos recentes sugerem que uma dieta rica em vitamina B12, vitamina B6 e folato, ou suplementação dessas vitaminas, reduziria de

forma significativa os níveis plasmáticos de homocisteína, que atualmente tem sido apontado como um fator de risco para osteoporose e fraturas ósseas. (COUSSIRAT et al., 2012; GOMES, 2019).

3.10 VITAMINA B12

A vitamina B12 é utilizada para duas reações enzimáticas essenciais: a síntese de metionina e a isomerização da metilmalonil-CoA, que é produzida durante a degradação de alguns aminoácidos e de ácidos graxo com número ímpar de átomos de carbono (CHAMPE; HARVEY; FERRIER, 2006). A vitamina B12 é encontrada principalmente no fígado, rins, coração animal e também na gema de ovo. É a única vitamina sintetizada na natureza apenas por micro-organismos do trato gastrointestinal (SPINOSA; GÓRNIK; BERNARDI, 2006).

3.11 VITAMINA K

A vitamina K é uma vitamina lipossolúvel que apresenta três diferentes conformações químicas: vitamina K1 (Fenacquinona), K2 (Menaquinona) e K3 (Menadiona). A vitamina K é responsável pela biossíntese dos fatores de coagulação e é indispensável no processo de carboxilação e ainda, interfere, na formação de proteínas presentes nos rins, no plasma e outros tecidos. A vitamina K é encontrada na couve-flor, no repolho, no espinafre, na gema do ovo e no fígado (MIRANDA et al., 2017; REZENDE et al., 2012).

A deficiência de vitamina K é incomum, pois quantidades adequadas são sintetizadas pela microflora intestinal ou obtidas pela dieta sob a forma K2 (menaquinona), uma vez que esta largamente distribuída nos alimentos de origem vegetal. A carência dessa vitamina acarreta prejuízos nas reações carboxilação, gerando proteínas subcarboxiladas, formas desprovidas de atividade biológica e hipoprotrombinemia. Em casos graves, pode haver quadros hemorrágicos ameaçadores à vida como um resultado de uma atividade inadequada dos fatores dependentes de vitamina K, corrigível por reposição de vitamina K, que também resulta na secreção de protrombina sub-carboxilada no plasma, chamada Proteína Induzida pela Ausência de vitamina. Atualmente vem crescendo o número de estudos epidemiológicos que enfocam as possíveis relações entre ingestão de vitamina K e Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DNCT), especialmente doenças cardiovasculares e saúde óssea. Tais estudos evidenciam a importância da ingestão adequada dessa vitamina (REZENDE et al., 2012; SOUZA; RODRIGUES; PENTEADO, 2012).

3.12 ÁCIDO FÓLICO

O ácido fólico é uma vitamina pertencente ao complexo B (vitamina B9), sendo essencial para a biossíntese de vários compostos, como: ácidos nucleicos, para formação das células sanguíneas (hematopoiese), e para o metabolismo dos aminoácidos. O termo “ácido fólico” refere-se especificamente ao ácido pteroilmonoglutâmico (2-amino-4-hidroxi-6 metilenoaminobenzol- L-glutâmico) e está presente em muitos alimentos. Como fontes de folato, podem ser destacados o feijão, brócolis, aspargo, espinafre,

vegetais com folhas verdes, abacate, batata, cenoura, couve, abóbora, laranja, queijo, maçã, leite e milho. Todavia, o ácido fólico é encontrado especialmente nas carnes (GOMES, 2019; RUBERT et al., 2017).

Níveis sorológicos impróprios de ácido fólico podem ser oriundos da absorção deficiente (causada por patologia do intestino delgado), por aumento na demanda (por exemplo, durante a gestação e a lactação), alcoolismo ou tratamento com drogas. Uma dieta sem folato pode causar uma deficiência em poucas semanas e está associada a uma série de doenças, como anemia megaloblástica, causada pela diminuição na síntese de purinas e timidina, o que leva a uma incapacidade da célula em produzir DNA e, assim sendo, essas células não podem se dividir, malformações congênitas, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Estudos recentes apontam que o ácido fólico é requisito no processo da multiplicação celular, interfere com o aumento dos eritrócitos, o alargamento do útero e o crescimento da placenta e do feto, sendo, portanto, indispensável durante a gestação (COUSSIRAT et al., 2012; GOMES, 2019).

3.13 MAGNÉSIO

O magnésio é um importante cátion intracelular e atua como cofator em mais de 300 reações metabólicas, sendo fundamental no metabolismo da glicose, na homeostase insulínica e glicêmica e na síntese de adenosina trifosfato, proteínas e ácidos nucleicos (ELIN, 2010). O mineral opera ainda na estabilidade da membrana neuromuscular e cardiovascular, na manutenção do tônus vasomotor e como regulador fisiológico da função hormonal e imunológica (VOLPE, 2013).

As principais fontes alimentares de magnésio são os cereais integrais, vegetais folhosos verdes, espinafre, nozes, frutas, legumes e tubérculos, como a batata (VOLPE, 2013). Segundo o Instituto de Medicina (1997), a recomendação de ingestão diária de magnésio é de 310 a 320 mg e 400 a 420 mg, para mulheres e homens adultos, respectivamente (ELIN, 2010).

Pesquisas mostram que a redução do consumo do magnésio gera no indivíduo risco de resistência à insulina, desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 e doenças cardiovasculares, além de estar relacionada a desordens neuromusculares e no metabolismo ósseo, arritmias cardíacas, hipertensão arterial, aterogênese e eclampsia (HATA et al., 2013; ORCHARD et al., 2014). No contexto de atividade física, a deficiência desse mineral gera alterações nas membranas celulares e a aumento na concentração de cálcio intracelular. Tal ação conjunta promove suscetibilidade a lesões, prejudicando o desempenho muscular (AMORIM; TIRAPEGUI, 2008).

O magnésio, assim como o cobre e o zinco, possui ação regulatória sobre o sistema imune. Em cenário de crise e desnutrição grave, esses micronutrientes encontram-se reduzidos (BRASIL, 2005; FALBO et al., 2006), o que pode acarretar disfunções imunológicas (CUNNINGHAM-RUNDLES; MCNEELEY; MOON, 2005; KEUSCH, 2003), acarretando na suscetibilidade a doenças oportunistas e infecções (SINGH, 2004).

3.14 COBRE

O cobre (Cu) está extensamente disposto na natureza e é considerado um dos elementos essenciais para o corpo humano, atuando em diversas funções bioquímicas como parte de muitas metaloproteínas e metaloenzimas (PINHEIRO, 2018). Esse mineral

é um importante cofator de várias enzimas, como citocromo C oxidase, superóxido dismutase, tirosinase, dopamina- β -hidroxilase e lisil oxidase (MONTEIRO, 2017).

Dentre alguns minerais, como manganês, selênio e zinco, o cobre é um antioxidante dietético. Os minerais agem inibindo a ação ou produção dos radicais livres, e, ainda, favorecendo o reparo e reconstituição de estruturas afetadas (LOCATELI et al., 2018). O mineral pode ser encontrado em alimentos como, mariscos, carnes, frutos do mar, nozes e feijão (HERNANDEZ; BONETE; MARTINEZ-ESPINOSA, 2015). A absorção do cobre é feita, majoritariamente, no intestino delgado, por meio do qual atravessa a membrana da mucosa, por difusão passiva. Com relação à alimentação, recomenda-se a ingestão de cerca de 2-3 mg de Cu por dia (MONTEIRO, 2017).

Nota-se excesso ou redução desses níveis em caso de má alimentação, insuficiência nutricional ou desordens genéticas, como a Síndrome de Menkes ou na Doença de Wilson. A deficiência do mesmo pode resultar em déficits hematopoiéticos, gerando anemia hipocrômica microcítica (baixo nível de hemoglobina), associada à leucopenia (baixo nível de leucócitos), neutropenia (baixos níveis de neutrófilos) e doenças cardiovasculares, pois sua concentração plasmática modifica o transporte de sódio pela membrana dos eritrócitos (PINHEIRO, 2018). Por se tratar de um mineral essencial, o cobre atualmente é centro de pesquisas focadas no combate ao câncer (NUNES, 2018).

3.15 POTÁSSIO

O potássio é um micronutriente que se encontra em maior quantidade no líquido intracelular e possui funções essenciais para o funcionamento adequado do organismo. Dentre elas, pode-se destacar a síntese de proteína e glicogênio e a transmissão de impulsos nervosos, para que ocorra a contração muscular. Além disso, este mineral é importante para manter o volume celular correto e auxiliar no controle da pressão arterial (NASCIMENTO; SANTIAGO; SANTOS, 2019).

Esse mineral atua na estabilidade neuromuscular e na ação contrátil dos músculos, pois este eletrólito permite um gradiente de concentração em relação ao meio extra e intracelular e, dessa forma, permite uma diferença entre os potenciais transmembrana. O potássio está presente em diversos alimentos de origem animal e vegetal, destacando-se as raízes e tubérculos amiláceos, os hortícolas, as frutas, os cereais integrais, os laticínios e o café (TURCK et al., 2016). Estudos apontam teores mais elevados de potássio nas amostras de figo seco, passas, amendoim, presunto e bacon, bacalhau fresco e sardinha (NASCIMENTO; SANTIAGO; SANTOS, 2019).

Quando se encontra insuficiente no indivíduo, permite o desenvolvimento de hipopotassemia ou hipocalemia, que causam grave risco de morte. O potássio quando ingerido nas quantidades adequadas provoca redução da pressão arterial por meio do mecanismo natriurético de redução da secreção do hormônio renina, proveniente da secreção renal (BATISTA et al., 2016). O mineral induz a perda pronunciada de água e sódio pelo corpo, formação de células musculares dos vasos, inibindo agregação plaquetária e a trombose, reduzindo a resistência vascular renal e elevação da filtração glomerular pelos rins. Atua também na atividade da bomba iônica de sódio e potássio (DOS SANTOS; VASCONCELOS, 2012).

3.16 MANGANÊS

O manganês é o 12º elemento mais abundante da superfície terrestre, correspondendo a aproximadamente 0,1% da crosta da Terra (GREENWOOD; EARNSHAW, 2012). Além do solo, ele também é identificado em alimentos e na água. Na natureza, é encontrado em forma de óxidos, hidróxidos, silicatos e carbonatos. Esse mineral é considerado de grande interesse comercial (ELIAS, 2019).

O organismo precisa de traços desse metal e isso pode ser obtido em uma dieta rica em alimentos saudáveis, pois é da ingestão que ocorre absorção de manganês para o corpo (ELIAS, 2019). Ele é encontrado em uma gama de produtos alimentícios, como vegetais, folhagens, alimentos de origem animal, leguminosas, frutas, mexilhões (CARRARA, 2020; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004), nozes e cereais (ARNDT, 2010) e em chás (YALÇIN; FILIK; APAK, 2012).

Os sintomas da deficiência de manganês incluem: perda de peso, fadiga, redução da fertilidade, dermatite, perturbação no metabolismo de ossos e cartilagens, alteração da síntese de insulina, redução da taxa de colesterol no sangue, intensificação de reações alérgicas e inflamatórias e malformações fetais (AFONSO, 2019).

O mineral é considerado como um micronutriente essencial por ser vital não só ao cérebro, como para todo o restante do organismo e a inúmeras funções metabólicas e celulares, uma vez que, participa como co-fator de várias enzimas como arginase, superóxido dismutase, piruvato carboxilase, glutamina sintetase. É imprescindível ao metabolismo de proteínas, aminoácidos, lipídeos e carboidratos, produção de ureia no fígado, prevenção ao estresse oxidativo das células do organismo, ao processo de mineralização óssea, formação da cartilagem, reprodução, resposta imune, regulação das atividades neuronais e à cicatrização de feridas (WILLIAMS et al., 2012). O manganês ajuda da metabolização de açúcares e gorduras e na formação óssea (ARAGÃO et al., 2016). Além disso, manganês é essencial na síntese do colesterol e da dopamina (neurotransmissor) (SANTAMARIA, 2008).

3.17 SÓDIO

O sódio é um cátion que se encontra em maior quantidade no líquido extracelular do organismo. Este mineral, localizado principalmente no meio extracelular, interage com vários nutrientes, especialmente com o potássio, presente em grande concentração no líquido intracelular. Ele realiza importantes funções no organismo, principalmente na manutenção da pressão osmótica, controle ácido básico e equilíbrio hídrico (COZZOLINO, 2020). O sódio está associado às funções vitais do organismo, ligado à contração muscular, propagação do influxo nervoso e equilíbrio dos fluídos celulares. Além disso, possui importância industrial e culinária (MIGUEL; DE CARVALHO; FREIRE, 2018).

Os alimentos industrializados são formulações realizadas por meio de substâncias retiradas de alimentos por métodos variados, contendo a presença de alta quantidade de sódio. Entretanto, esses alimentos devem ser consumidos moderadamente, pois apresentam baixa qualidade nutricional. Além de consumo excessivo de sódio, pode acarretar elevação da pressão sanguínea, caracterizada como um fator de risco para doenças renais e doenças cardiovasculares (BERTANI et al., 2019).

A redução do consumo exacerbada de sódio pode causar transtornos como pele seca, palpitações, hipotensão, letargia, fraqueza e convulsões (MIGUEL; DE CARVALHO;

FREIRE, 2018). O equilíbrio na ingestão de sódio e potássio é essencial na manutenção do balanço hidroeletrolítico, do volume sanguíneo e da atividade celular (ADROGUÉ; MADIAS, 2014). Sua atuação no equilíbrio ácido básico é fundamental para favorecer a manutenção das funções orgânicas. As mudanças provocadas no equilíbrio ácido básico propiciam a manifestações de sinais e sintomas clínicos, dentre eles destacam-se edema cerebral, redução da contração miocárdica, vasoconstrição pulmonar e vasodilatação sistêmica dentre outros (FURONI et al., 2010).

3.18 CÁLCIO

O cálcio é um dos minerais com mais proporções no organismo humano, armazenado principalmente nos ossos e dentes, tendo a manutenção do cálcio no plasma através da liberação de cálcio no sangue e vice-versa, dependendo do feedback solicitado. A absorção do cálcio ocorre no intestino delgado, mas uma absorção mais rápida será no duodeno em meio pH ácido (ESCOTT-STUMP; MAHAN; RAYMOND, 2013).

Tal mineral corresponde a cerca de 2% a 2,5% do valor presente no corpo humano (GRILLO et al., 2020). O cálcio pode ser encontrado no leite e nos produtos lácteos, em peixes em conserva com ossos, como o salmão e a sardinha, e vegetais de folhas verdes (brócolis, espinafre), o leite de soja, a mostarda e as leguminosas (HACK; DOS SANTOS, 2012). O cálcio é um macromineral, importante para manter ossos e dentes saudáveis, além de propiciar o relaxamento e a contração dos músculos e, ainda, colaborar com o funcionamento dos nervos, a coagulação do sangue, a regulação da pressão arterial e a saúde do sistema imunológico (GRILLO et al., 2020).

A deficiência de cálcio pode ainda provocar mineralização deficiente dos ossos e dos dentes, osteomalácia, osteoporose, tetania, raquitismo e parada do crescimento; já o excesso pode levar a quadros graves, como o bloqueio cardíaco e cálculos renais (GRILLO et al., 2020). A fraqueza óssea é refletida pelas quantidades abaixo dos valores de manutenção no fluído intracelular. Essa manutenção ocorre com a necessidade da vitamina D, fósforo e outros nutrientes. O paratormônio (PTH) é liberado quando há quantidades de cálcio insuficientes no organismo, sua alta secreção pode levar a uma diminuição da massa óssea (ESCOTT-STUMP; MAHAN; RAYMOND, 2013).

3.19 ZINCO

O zinco (Zn) é um dos elementos mais abundantes na natureza e depois do ferro é o oligoelemento em maior quantidade no corpo humano, apresentando extraordinária importância biológica e para a saúde (HAMBIDGE; KREBS, 2007; LANDER et al., 2001). É um metal intracelular envolvido em vários processos metabólicos, possuindo funções biológicas imprescindíveis para o crescimento e desenvolvimento adequados, atuando como catalisador, elemento estrutural das proteínas na estrutura e estabilização de membranas celulares ou como íon regulador (MARET; LI, 2009). O mineral está presente de forma armazenada nos músculos, fígado, entre outros tecidos (KOGAN; SOOD; GARNICK, 2017).

No organismo humano existem aproximadamente 2 a 3 g deste mineral, sendo que a maioria se encontra no músculo esquelético e seguidamente no osso, com predominância intracelular (RAMOS et al., 2007). O aporte de zinco pode ser obtido através de alimentos como a carne vermelha e os moluscos, como por exemplo as ostras,

sendo aconselhada uma ingestão de cerca de 11 mg por dia. A absorção do zinco presente nos alimentos ingeridos ocorre no intestino delgado numa percentagem entre os 15 a 40% (MYERS; NIELD; MYERS, 2012; PRASAD, 2013; RAMOS et al., 2014).

A deficiência de zinco leva principalmente à redução do sistema imunológico, que terá uma diminuição na produção de interleucina-2, atividade celular de NK comprometida, havendo uma diminuição da capacidade imune do organismo. Também há alguns sinais clínicos que são identificados: hipogonadismo, alopecia, falha na cicatrização de feridas e hipogeusia (ESCOTT-STUMP; MAHAN; RAYMOND, 2013). O zinco através do seu metabolismo está ligado à patologia da diabetes, dado que tem um papel fundamental no pâncreas e na regulação da glicose enquanto estimulante da transdução do sinal da insulina (PRASAD, 2013).

3.20 FERRO

O ferro é um mineral essencial para o organismo, exercendo grande função transportadora de oxigênio pelo sangue através das hemácias, localizado e armazenado na hemoglobina, suprimindo a necessidade de tecidos e órgãos, sendo também cofator de reações enzimáticas (PAIVA; RONDÓ; GUERRA-SHINOHARA, 2000). O mineral tem presença ainda na síntese de ácido desoxirribonucleico (ADN) e no metabolismo proteico (RAMOS et al., 2014). É encontrado em carnes de órgãos como o fígado, carnes vermelhas, peixes, aves, mariscos, gemas de ovo, legumes, frutas secas e folhas verde-escuras, pães e cereais enriquecidos com ferro (SOUZA, 2016).

É notória a diminuição na capacidade imunológica do indivíduo com deficiência de ferro, através de uma baixa produção de linfócitos T circulantes, prejudicando a resposta mitogênica do organismo. Além disso, o déficit no aprendizado e na memória podem ser índices da sua deficiência, uma vez que o ferro participa da formação de mielina nos neurotransmissores (ESCOTT-STUMP; MAHAN; RAYMOND, 2013). A anemia é uma doença causada pela falta de ferro, interferindo diretamente na produção de eritrócitos na medula óssea, na qual há um desequilíbrio entre degradação e perdas com a produção. Também haverá falha na produção quando houver inflamação, principalmente crônica. A partir das citocinas inflamatórias, irá ter apoptose em enzimas/citocinas precursoras para a eritropoietina (DAHLERUP; MOUM; LINDGREN, 2015).

3.21 SILÍCIO

O Silício pode ser encontrado em diversas concentrações na água, pois é derivado do desgaste das rochas e minerais do solo, sendo o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre (ROSSI; POLTRONIERI, 2019). Está presente também em vários tecidos do corpo humano, como no cabelo e nas unhas (BAREL et al., 2005). Altos níveis de silício são encontrados no refinamento de grãos como a cevada, aveia, farelo de arroz e farelo de trigo e até 50% do silício está presente nas cascas. Produtos como a farinha de grãos e cereais, pão, biscoito, arroz, bolo, massas e doces, ainda são altas fontes alimentares de silício (DE MEDEIROS et al., 2020).

Se trata de um oligoelemento responsável por regularizar o metabolismo celular e está presente no colágeno, que juntamente com a elastina e as glicoproteínas são responsáveis pela sustentação da derme (REBELLO, 2019). Ele é capaz de regenerar os

tecidos, recobrando seu tônus e sua elasticidade, pois possui o elemento catalisador necessário para relançar o fibroblasto. Também é capaz de estimular e acelerar a síntese de colágeno e elastina. (BERNARDES, 2009). Dessa forma, é possível determinar que o oligoelemento silício seja o mais indicado no tratamento do envelhecimento cutâneo.

A deficiência do Silício no organismo dos seres vivos pode trazer muitas repercussões negativas e principalmente interferir no crescimento e desenvolvimento de vários tecidos. A derme fica mais fina e perde elasticidade, as estruturas musculares e ósseas se atrofiam, enquanto as cartilaginosas continuam crescendo. Os primeiros sinais que indicam a passagem do tempo aparecem nos olhos e pescoço, logo seguido das rugas na testa, a caída das sobrancelhas e da ponta do nariz, a atrofia dos lábios, os sulcos a redor da boca, a perda da linha da mandíbula e do ângulo do pescoço, com seus frequentes acúmulos de gordura (KUMAR; MANDAL, 2019).

REFERÊNCIAS

ADROGUÉ, H. J.; MADIAS, N. E. Sodium surfeit and potassium deficit: Keys to the pathogenesis of hypertension. **Journal of the American Society of Hypertension**, v. 8, n. 3, p. 203–213, mar. 2014.

AFONSO, J. C. Manganês no brasil: descoberta, extração, consumo e comercialização numa perspectiva histórica. **Química Nova**, v. 42, n. 10, p. 1172–83, 2019.

ALMEIDA-MURADIAN, L. . Ácido pantotênico. In: PENTEADO, M. V. . (Ed.). . **Vitaminas: aspectos nutricionais, bioquímicos, clínicos e analíticos**. Barueri: Manole, 2003. p. 465–481.

AMORIM, A. G.; TIRAPGUI, J. Aspectos atuais da relação entre exercício físico, estresse oxidativo e magnésio. **Revista de Nutrição**, v. 21, n. 5, p. 563–575, out. 2008.

ARAGÃO, M. L. DE L. et al. A bioquímica do corpo humano: a importância dos elementos químicos. **Mostra Científica em Biomedicina**, v. 1, n. 1, 2016.

ARNDT, A. **Síntese, caracterização e estudo da ação neurotóxica de complexos de manganês(III) em Danio rerio**. [s.l.] Universidade de São Paulo - USP, 2010.

BAREL, A. et al. Effect of oral intake of choline-stabilized orthosilicic acid on skin, nails, and hair in women with photodamaged facial skin. **Journal of the American Academy of Dermatology**, v. 52, n. 3, p. P28, mar. 2005.

BATISTA, A. M. et al. Consumo Alimentar de Magnésio, Potássio e Fósforo por Adolescentes de uma Escola Pública. **Saúde e Pesquisa**, v. 9, n. 1, p. 73, 14 jun. 2016.

BERNARDES, H. **O que a dieta ortomolecular pode fazer por você**. 1. ed. [s.l.] Academia, 2009.

BERTANI, J. P. B. et al. Avaliação do consumo de fósforo, potássio e alimentos ultraprocessados em pacientes com doença renal crônica. **Arquivos de Ciências da Saúde**, v. 26, n. 2, p. 107, 15 nov. 2019.

BRASIL. **Manual de atendimento da criança com desnutrição grave em nível**

hospitalar. Brasília: Ministério da Saúde, 2005.

CARRARA, M. Y. W. **Desenvolvimento e validação de metodologia para determinação de nível de manganês em sangue total.** [s.l.] Universidade Estadual de Campinas, 2020.

CHAMPE, P. C.; HARVEY, R. A.; FERRIER, D. R. **Bioquímica ilustrada.** 3ª ed. Porto Alegre: Artmed Editora, 2006.

COUSSIRAT, C. et al. Vitaminas B12, B6, B9 e homocisteína e sua relação com a massa óssea em idosos. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 15, n. 3, p. 577–585, set. 2012.

COZZOLINO, S. M. F. **Biodisponibilidade de nutrientes.** 6ª ed. [s.l.] Manole, 2020.

CUNNINGHAM-RUNDLES, S.; MCNEELEY, D. F.; MOON, A. Mechanisms of nutrient modulation of the immune response. **Journal of Allergy and Clinical Immunology**, v. 115, n. 6, p. 1119–1128, jun. 2005.

DAHLERUP, J. F.; MOUM, B.; LINDGREN, S. Järnbrist och järnbristanemi är globala hälsoproblem. **Läkartidningen**, v. 112, n. DAAE, p. 1–3, 2015.

DE MEDEIROS, T. A. et al. Silício nos alimentos: uma revisão. **Advances in Nutritional Sciences**, v. 1, n. 1, p. 41–48, 16 set. 2020.

DOS SANTOS, T. M. P.; VASCONCELOS, S. M. L. Ingestão de Na⁺ e K⁺ versus HAS: bases para o seu manejo e protocolo de investigação. **Rev. bras. hipertens**, v. 19, n. 2, p. 51–55, 2012.

ELIAS, A. C. **Desenvolvimento de um procedimento para fracionamento de manganês de chá preto e detecção por voltametria de redissolução catódica.** [s.l.] Universidade Federal de Uberlândia, 2019.

ELIN, R. J. Avaliação do estado do magnésio para diagnóstico e terapia. **Magnes Res**, v. 23, n. 4, p. S-194-8, 2010.

ESCOTT-STUMP, S.; MAHAN, L. K.; RAYMOND, J. L. **Krause, alimentos, nutrição e dietoterapia.** São Paulo: Roca, 2013.

FALBO, A. R. et al. Implementação do protocolo da Organização Mundial da Saúde para manejo da desnutrição grave em hospital no Nordeste do Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 22, n. 3, p. 561–570, mar. 2006.

FERREIRA, R. Linus Pauling: por que Vitamina C? **Química Nova**, v. 27, n. 2, p. 356–357, abr. 2004.

FRANÇA, F. F. A. **Andrejus Korolkovas – Dicionário Terapêutico Guanabara.** 2004/2005 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.

FURONI, R. M. et al. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico. **Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba**, v. 12, n. 1, p. 1–5, 2010.

GOMES, G. **Ácido fólico e em excesso: efeitos sobre o metabolismo das vitaminas**

B2 e B6, o catabolismo do triptofano e a resposta imune. [s.l.] Universidade de São Paulo, 2019.

GOMES, M. M.; SAUNDERS, C.; ACCIOLY, E. Papel da vitamina A na prevenção do estresse oxidativo em recém-nascidos. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 5, n. 3, p. 275–282, set. 2005.

GREENWOOD, N. N.; EARNSHAW, A. **Chemistry of the Elements**. San Diego: Elsevier, 2012.

GRILLO, A. C. et al. Importância e atuação dos sais minerais no organismo. **Revista científica eletrônica de enfermagem da FAEF**, v. 4, n. 3, 2020.

HACK, J. A. S.; DOS SANTOS, S. A. Atividades Interativas e de Pesquisa para Abordagem do Tema: Alimentação e Fome Oculta. In: PARANÁ (Ed.). **O professor PDE e os desafios da escola pública Paranaense**. Paraná: Secretaria de Educação, 2012.

HAMBIDGE, K. M.; KREBS, N. F. Zinc Deficiency: A Special Challenge. **The Journal of Nutrition**, v. 137, n. 4, p. 1101–1105, 1 abr. 2007.

HATA, A. et al. Magnesium intake decreases Type 2 diabetes risk through the improvement of insulin resistance and inflammation: the Hisayama Study. **Diabetic Medicine**, v. 30, n. 12, p. 1487–1494, dez. 2013.

HERNANDEZ, J. R.; BONETE, M. J.; MARTINEZ-ESPINOSA, R. M. Propuesta de una nueva clasificación de los oligoelementos para su aplicación en nutrición, oligoterapia, y otras estrategias terapéuticas. **Nutrición Hospitalaria**, v. 31, n. 3, p. 1020–33, 2015.

INTAKES, I. OF M. (US) S. C. ON THE S. E. OF D. R. I. OF M. (US) S. C. ON THE S. E. OF D. R. **Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride**. Washington, D.C.: National Academies Press, 1997.

KANEKO, J. J.; HARVEY, J. W.; BRUSS, M. L. **Clinical biochemistry of domestic animals**. 6ª ed. San Diego: Elsevier, 2008.

KEUSCH, G. T. The History of Nutrition: Malnutrition, Infection and Immunity. **The Journal of Nutrition**, v. 133, n. 1, p. 336S–340S, 1 jan. 2003.

KOGAN, S.; SOOD, A.; GARNICK, M. S. Zinc and Wound Healing: A Review of Zinc Physiology and Clinical Applications. **Wounds**, v. 29, n. 4, p. 102–6, 2017.

KUMAR, J. P.; MANDAL, B. B. Inhibitory role of silk cocoon extract against elastase, hyaluronidase and UV radiation-induced matrix metalloproteinase expression in human dermal fibroblasts and keratinocytes. **Photochem. Photobiol. Sci.**, v. 18, n. 5, p. 1259–1274, 2019.

LANDER, E. S. et al. Initial sequencing and analysis of the human genome. **Nature**, v. 409, n. 6822, p. 860–921, 2001.

LOCATELI, G. et al. Fontes dietéticas de antioxidantes consumidas pela população brasileira: Inquérito Nacional de Alimentação 2008-2009. **BRASPEN J**, v. 33, n. 3, p. 238–247, 2018.

MARET, W.; LI, Y. Coordination Dynamics of Zinc in Proteins. **Chemical Reviews**, v. 109, n. 10, p. 4682–4707, 14 out. 2009.

MIGUEL, M. C.; DE CARVALHO, S. M. S.; FREIRE, V. F. Redução e consumo de sódio: trama entre cidade, alimentação e cidadania. **Fragmentos de Cultura**, v. 28, n. especial, p. 124–38, 2018.

MIRANDA, B. C. G. et al. O impacto da padronização de vitamina K em dietas hospitalares. **O Mundo da Saúde**, v. 41, n. 3, p. 333–342, 30 set. 2017.

MONTEIRO, J. C. M. **Oligoelementos na nutrição humana**. [s.l.] Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz, 2017.

MOURA, J. G. P. **Nutrientes e Terapêutica: como usá-los, quando usá-los, como avaliar suas carências, radicais livres na saúde**. 2ª ed. Rio Grande do Sul: Visão Artes, 2006.

MOURÃO, D. M. et al. Biodisponibilidade de vitaminas lipossolúveis. **Revista de Nutrição**, v. 18, n. 4, p. 529–539, ago. 2005.

MYERS, S. A.; NIELD, A.; MYERS, M. Zinc Transporters, Mechanisms of Action and Therapeutic Utility: Implications for Type 2 Diabetes Mellitus. **Journal of Nutrition and Metabolism**, v. 2012, p. 1–13, 2012.

NASCIMENTO, A. C.; SANTIAGO, S.; SANTOS, M. A importância do potássio na dieta da população portuguesa. **Instituto Nacional de Saúde**, n. 5, p. 24–30, 2019.

NORMAN, A. W. From vitamin D to hormone D: fundamentals of the vitamin D endocrine system essential for good health. **The American Journal of Clinical Nutrition**, v. 88, n. 2, p. 491S–499S, 1 ago. 2008.

NUNES, C. J. **Avaliação da potencialidade e dos mecanismos de ação de complexos dinucleares de cobre como agentes terapêuticos antitumorais**. [s.l.] Universidade de São Paulo, 2018.

ORCHARD, T. S. et al. Magnesium intake, bone mineral density, and fractures: results from the Women's Health Initiative Observational Study. **The American Journal of Clinical Nutrition**, v. 99, n. 4, p. 926–933, 1 abr. 2014.

PAIVA, A. A.; RONDÓ, P. H.; GUERRA-SHINOHARA, E. M. Parâmetros para avaliação do estado nutricional de ferro. **Revista de Saúde Pública**, v. 34, n. 4, p. 421–426, ago. 2000.

PINHEIRO, M. C. M. **Desenvolvimento de método para determinação de cobre em suplementos alimentares utilizando análise direta de sólidos em suspensão e GF AAS**. [s.l.] Universidade Federal Fluminense, 2018.

PRASAD, A. S. Discovery of Human Zinc Deficiency: Its Impact on Human Health and Disease. **Advances in Nutrition**, v. 4, n. 2, p. 176–190, 1 mar. 2013.

RAMOS, F. J. DOS et al. **Medicamentos, alimentos e plantas: as interações esquecidas?** 1. ed. [s.l.] Hollyfar – Marcas e Comunicação, Lda, 2014.

RAMOS, F. J. et al. **Manual de Interações Alimentos-Medicamentos**. Lisboa:

Sociedade editorial LL2, 2007.

REBELLO, T. **Guia de produtos cosméticos**. São Paulo: Senac, 2019.

REZENDE, J. R. et al. Diagnóstico da deficiência de vitamina K. **Revista Científica do ITPAC**, v. 5, n. 1, 2012.

ROSSI, L.; POLTRONIERI, F. **Tratado de Nutrição e Dietoterapia**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

RUBERT, A. et al. Vitaminas do complexo B: uma breve revisão. **Revista Jovens Pesquisadores**, v. 7, n. 1, p. 30, 5 jan. 2017.

SANTAMARIA, A. B. Manganese exposure, essentiality & toxicity. **The Indian journal of medical research**, v. 128, n. 4, p. 484–500, out. 2008.

SINGH, M. Role of micronutrients for physical growth and mental development. **The Indian Journal of Pediatrics**, v. 71, n. 1, p. 59–62, jan. 2004.

SIZER, F. S.; WHITREY, E. N. **Nutrição: conceitos e controvérsias**. São Paulo: Manole, 2003.

SOUZA, W. N. DE; RODRIGUES, M. L.; PENTEADO, M. D. V. C. Ingestão habitual de vitamina K em adultos e idosos. **Revista de Nutrição**, v. 25, n. 4, p. 507–515, ago. 2012.

SOUZA, R. E. G. **Saúde e Nutrição**. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

SOUZA, W. A.; BOAS, O. M. G. C. . A deficiência de vitamina A no Brasil: um panorama. **Revista Panamericana de Salud Publica**, v. 12, n. 3, 2002.

SPINOSA, H. S.; GÓRNIK, S. L.; BERNARDI, M. M. **Farmacologia aplicada à medicina veterinária**. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

TURCK, D. et al. Dietary reference values for potassium. **EFSA Journal**, v. 14, n. 10, p. e04592, out. 2016.

VOLPE, S. L. Magnesium in Disease Prevention and Overall Health. **Advances in Nutrition**, v. 4, n. 3, p. 378S–383S, 1 maio 2013.

WILLIAMS, M. et al. **Toxicological profile for manganese**. Atlanta: Agency for Toxic Substances and Disease Registry (EUA), 2012.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Manganese in drinking-water: Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-Water Quality**. [s.l.] World Health Organization, 2004.

YALÇIN, S.; FILİK, H.; APAK, R. Speciation analysis of manganese in tea samples using flame atomic absorption spectrometry after cloud point extraction. **Journal of Analytical Chemistry**, v. 67, n. 1, p. 47–55, 23 jan. 2012.

Capítulo 3

Fisioterapia nas disfunções sexuais masculinas

Guilherme Pertinni de Moraes Gouveia

Elisson de Sousa Mesquita Silva

Elivelton Sousa Montelo

Felipe Andrade de Oliveira

Resumo: As disfunções sexuais podem ser divididas em uma variedade de fatores etiológicos (orgânicos e psicológicos). A Fisioterapia Pélvica tem apresentado diversas modalidades de atendimentos efetivos. Desta forma, faz-se necessária uma pesquisa que reúna estas técnicas, visando auxiliar os fisioterapeutas nas escolhas terapêuticas baseadas em evidências científicas. **Objetivo:** Descrever, por meio de eixos temáticos, a atuação da fisioterapia em disfunções sexuais masculinas. **Métodos:** Trata-se de uma Revisão Integrativa, composta pelas seguintes etapas: identificação do tema e formulação da questão norteadora; delimitação de critérios de elegibilidade (inclusão e exclusão); identificação e seleção dos estudos; análise crítica dos artigos incluídos; interpretação dos resultados e exposição dos resultados. Optou-se por incluir estudos que abordassem a atuação fisioterapêutica nas disfunções sexuais masculinas (DSM), de qualquer orientação sexual, com idade superior a 17 anos, publicados no período entre 2015 a 2021, em qualquer idioma, nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde, Embase, CINAHL, PubMed, Scopus, Web Of Science e PEDro, utilizando na estratégia de busca os operadores booleanos AND e OR. **Resultados:** Após a retirada de duplicados, 134 artigos passaram pela elegibilidade, destes, 11 foram incluídos, 1 era ensaio clínico não randomizado e 11 ensaios clínicos aleatorizados. Desse total, 4 estudos abordavam condutas de treino do assoalho pélvico, eletroestimulação e vacuoterapia na Disfunção erétil; 3 pesquisas eram sobre tratamentos na ejaculação precoce expondo exercícios moderados associados ou não à medicamentos e 4 abordavam terapias de biofotomodulação, ultrassom e ondas de rádio na doença de Peyronie. **Conclusão:** A fisioterapia, por meio de suas técnicas e recursos, mostra-se segura e benéfica ao tratamento de DSM, sobretudo por apresentar boas evidências quanto a sua eficácia em algumas condições como disfunção erétil, ejaculação prematura e doença de Peyronie.

Palavras-chave: Modalidades em fisioterapia, Disfunção Sexual, Saúde dos homens.

1 INTRODUÇÃO

Conforme a Organização mundial da saúde – OMS, a sexualidade é entendida como um ponto central do ser humano que se faz presente no decorrer da vida, envolvendo sexo, gênero, identidades, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução, que pode ser experimentada e manifestada em pensamentos, fantasias, desejos e crenças como também pode ser influenciada por fatores biológicos, psicológicos, sociais, culturais, políticos, históricos, religiosos e espirituais (OMS, 2018).

Nesse contexto, a inserção do Homem nas estratégias que abordam a sexualidade com o objetivo de proporcionar melhores práticas de cuidados e autocuidados destinados à promoção de saúde sexual, ainda é marcada por tabus sociais, culturais e históricos quanto ao desempenho sexual, ereção e domínio sobre a parceira ou parceiro, o que às vezes não são condizentes com a realidade e, assim, podem causar problemas físicos e psicológicos que desencadeiam problemas sexuais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).

As disfunções sexuais podem ser divididas em uma variedade de fatores etiológicos, dentre os quais, geralmente, se encontram os orgânicos e psicológicos. Sua atual classificação relaciona disfunções às fases do ciclo de resposta sexual, e se apresentam como transtorno do desejo sexual hipoativo masculino (ausência ou deficiência de fantasias sexuais, pensamentos e desejo de atividade sexual), desordem erétil (incapacidade persistente ou recorrente de atingir ou manter uma ereção peniana adequada), ejaculação prematura (início persistente do orgasmo com estimulação sexual mínima) e ejaculação retardada (atraso acentuado na ejaculação) (PEIXOTO, 2017). Diante disso, é válido compreender qual o mecanismo fisiológico normal e patognômico que provoca essas disfunções.

Dessa maneira, a ereção peniana envolve a integração de impulsos nervosos, psicológicos e hormonais que são capazes de liberar neurotransmissores com a função de promover o relaxamento da musculatura lisa do pênis e, assim, aumentar o influxo de sangue dentro dos corpos cavernosos. Associado a isso, a contração da musculatura isquiocavernosa confere o estado de rigidez, além disso, a harmonia entre mediadores vasodilatadores e vasoconstritores dentro do pênis se faz importante para a manutenção da ereção, e quando há desarmonia entre eles, podem levar à disfunção erétil (MITIDIERI et al., 2020).

A perda da função erétil pode ocorrer em situações de longos períodos de ereção mesmo quando não há vontade sexual, caracterizando uma emergência urológica chamada de priapismo, que pode ser categorizado conforme o fluxo sanguíneo no corpo cavernoso de isquêmico quando o fluxo é baixo e não isquêmico quando o fluxo é alto. Isso se deve à obstrução de pequenos vasos sanguíneos e, em alguns casos, para o alívio da dor e detumescência, estratégias de oxigenação, aspiração e intervenção cirúrgica em casos extremos são necessárias (OLIVEIRA et al., 2020).

Além disso, uma outra disfunção sexual masculina muito prevalente é a ejaculação prematura, que é determinada pela incapacidade voluntária sobre o reflexo ejaculatório em que o homem atinge o orgasmo e ejacula antes ou logo após iniciar o ato sexual. Quando normal, a ejaculação envolve três etapas bem articuladas: emissão, expulsão e orgasmo, este último é dividido em quatro momentos: desejo, excitação, orgasmo e resolução (CROWDIS M, 2021; EL-HAMD; , RAMADAN SALEH, 2019).

Nos homens, o ápice da fase final do orgasmo é identificado pela rápida contração da musculatura pélvica inferior que fica em volta do ânus e dos órgãos sexuais primários, acompanhado de satisfação e aumento dos batimentos cardíacos (ANASTASI et al., 2019). A disfunção característica desta fase durante o ato sexual é chamada de

anorgasmia, definida quando há a redução da sensação orgástica, com isso, pode ocasionar uma redução da frequência de se relacionar sexualmente (IRFAN et al., 2020).

Entretanto, o desempenho sexual masculino também pode estar ligado a condições patológicas referentes à morfologia peniana, como doença de Peyronie (DP). Essa disfunção caracteriza-se pela presença de placas fibróticas decorrentes de uma deposição anormal de colágeno sob a túnica albugínea do pênis, podendo em alguns levar à deformação do órgão e pode ter acompanhamento de dor no local (BILGUTAY; PASTUSZAK, 2015). A prevalência da DP apresenta-se comumente na sexta década de vida, na faixa etária de 52 a 57 anos (MOHEDE et al., 2020).

A atuação fisioterapêutica no âmbito da urologia tem avançado cientificamente e crescido quanto à demanda de atendimento a esses pacientes (KANNAN et al., 2019). Entretanto, sabe-se que a sistematização de mais evidências ainda emerge de forma desafiadora, pois a quantidade de estudos que comprovem a eficácia de determinadas técnicas, recursos ou terapias combinadas variam de acordo com a prevalência de cada condição. Assim, há uma necessidade de uma integralização de pesquisas que demonstrem o papel da fisioterapia em condições urológicas, a fim de apontar estudos de qualidade acerca da segurança e da efetividade, assim como da identificação de lacunas no acervo científico dessa temática. Posto isso, o objetivo dessa pesquisa foi descrever, por meio de eixos temáticos, a atuação da fisioterapia em disfunções sexuais masculinas.

2 MÉTODOS

Trata-se de uma Revisão Integrativa (RI). Nesse tipo de pesquisa, busca-se reunir artigos relevantes sobre um determinado assunto, além de identificar lacunas sobre a temática e propor possíveis direcionamentos para futuras pesquisas e novas evidências (SOUSA et al., 2017). A RI é composta pelas seguintes etapas: 1) identificação do tema e formulação da questão norteadora; 2) delimitação de critérios de elegibilidade (inclusão e exclusão); 3) identificação e seleção dos estudos; 4) análise crítica dos artigos incluídos; 5) interpretação dos resultados; 6) exposição dos resultados de acordo com os estudos da inclusão final (SOUSA et al., 2020).

Obedecendo a primeira etapa, esse estudo buscou identificar o papel da fisioterapia nas disfunções sexuais masculinas de acordo com evidências científicas, assim a questão norteadora foi: “Qual o papel da fisioterapia nas disfunções sexuais masculinas?”.

Optou-se por incluir estudos que abordassem a atuação fisioterapêutica nas disfunções sexuais em homens, de qualquer orientação sexual, com idade superior a 17 anos. Assim, incluiu-se apenas estudos entre 2015 a 2021, em qualquer idioma, nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Embase, CINAHL, PubMed, Scopus, Web Of Science e PEDro. Nos critérios de exclusão definiram-se: estudos que não respondiam à questão norteadora da pesquisa, artigos que não tinham a fisioterapia como protagonista e trabalhos que tinham uma amostra de gênero mista.

Para as buscas nas bases utilizou-se a associação de Descritores da Saúde e os operadores booleanos “OR” e “AND”, as estratégias utilizadas nas buscas avançadas de títulos, resumos e descritores foram: “Erectile Dysfunction AND Physiotherapy”; Orgasm AND Man OR Men OR Males AND Physiotherapy; “Premature Ejaculation AND Physiotherapy”; “Peyronie AND Physiotherapy”. Após a clivagem e leitura crítica, a

escolha dos artigos incluídos foi decidida pelos autores, em consenso e os resultados foram sintetizados e estruturados por meio de eixos temáticos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A escolha dos estudos estruturou-se com base no rastreio de 134 estudos que abordavam atuações fisioterapêuticas em uma ou mais disfunção sexual masculina. Assim, 12 estudos compuseram a amostra final para a sintetização dos eixos temáticos, o processo das buscas à seleção está ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Fluxograma do processo de seleção dos estudos, Piauí, Brasil, 2021.

Fonte: Autores da pesquisa.

As pesquisas incluídas apresentam diferentes desenhos metodológicos e, com isso, tais características estão descritas no Quadro 1, bem como informações de identificação dos estudos (autores e ano), tipos de disfunções abordadas, desenhos das populações e grupos. Dos artigos incluídos, um é ensaio clínico sem randomização, e os outros onze são ensaios controlados aleatorizados (ECA).

Quadro 1: Identificações dos estudos incluídos, Brasil, 2021.

Autores e ano	Tipo de Estudo	Disfunções Sexuais	Amostra e Grupos	Objetivos	Conclusões
(FOJECKI; TIESSEN; OSTHER, 2017)	ECA	DE	125 homens com DE; Média de idades: 64 anos; GI: (n= 63); GS: (n= 63).	Avaliar a eficácia e o perfil de segurança de Li-EWST linear (LLi-ESWT) para ED.	LLi-ESWT usando 600 ondas de choque por tratamento, por 10 semanas (total de ¼ 6.000 ondas de choque), com uma densidade de fluxo de energia de 0,09 mJ / mm2 e uma frequência de 5 Hz não melhorou a função erétil em homens com DE.
(QI et al., 2017)	ECA	DE	60 homens; G1: (n= 30) – ESWT; G2: (n= 30) – DEV.	Fazer uma comparação preliminar das eficácias da ESWT e de um DEV no tratamento de TA em pacientes na China.	Tanto o DEV quanto o ESWT têm boa eficácia clínica no manejo da DE em pacientes chineses, e o efeito terapêutico da ESWT é comparável ao de um VED.
(CARBONI et al., 2018)	ECA	DE	22 homens com DE; Média de idades: 58.5 anos; GI: (n= 11); GC: (n= 11).	Avaliar o impacto da FES na função erétil em homens com DE.	A terapia com FES pode melhorar a função erétil e a qualidade de vida em homens com DE.
(MILIOS; ACKLAND; GREEN, 2020)	ECA	DE	97 homens com DE; Média de idades: 63 anos; GI: (n= 50); GC: (n= 47).	Avaliar o impacto do TMAP na DE e QV em um estudo prospectivo que comparou o TMAP de "cuidado usual" com uma intervenção de maior intensidade e volume de exercício	O TMAP, embora não tenha impacto imediato na melhora da função sexual, não causa danos e tem benefícios potenciais que se alinham com a progressão normal da recuperação do tecido erétil após a PR e pode ser utilizado como um componente adicional não invasivo da PR.

Quadro 1: Identificações dos estudos incluídos, Brasil, 2021.(Continuação)

Autores e ano	Tipo de Estudo	Disfunções Sexuais	Amostra e Grupos	Objetivos	Conclusões
(ABULSOROUR et al., 2015)	ECA	EP	74 homens com EP; Média de idades: 37.56 anos; G1: (n= 35); G2: (n= 39).	Comparar o resultado de uma terapia combinada de sertralina e reabilitação do assoalho pélvico em relação a qualquer uma delas, como uma terapia única, em pacientes com uma resposta insatisfatória ao tratamento apenas com o medicamento.	A reabilitação da musculatura do assoalho pélvico é um acréscimo importante às opções de tratamento da EP, seja em monoterapia ou associada à sertralina, principalmente em pacientes nos quais a disfunção do assoalho pélvico representa parte integrante da etiologia da EP.
(KILINC et al., 2018)	ECA	EP	105 homens com EP; G1: (n= 35, média de 28 anos); G2: (n= 35, média de 26.3 anos); G3: (n= 35, média de 27.9 anos).	Investigar a relação entre atividade física e EP e determinar se a atividade física moderada pode atrasar o tempo de ejaculação ou ser um tratamento alternativo para EP.	O estudo demonstrou uma associação entre atividade física moderada e tempo de ejaculação prolongado em pacientes com EP, e os resultados enfatizaram que a atividade física moderada pode ser tão eficaz quanto o tratamento com dapoxetina nesses pacientes.
(RODRÍGUEZ; MARZO; PIQUERAS, 2019)	ECA	EP	35 homens com EP; G1: (n= 17, com média de 33 anos); G2: (n= 18, com média de 33.11 anos).	Determinar a eficácia de uma nova TCC para o EP chamado TCE em combinação com um dispositivo de auxílio à masturbação.	A nova TCC para o tratamento da EP, na qual o programa de exercícios TCE é combinado com o uso de um dispositivo de masturbação, atinge significativamente mais melhorias nas medidas de resultados do que apenas o SCT. Esta combinação mostra-se promissora, embora a eficácia não possa ser avaliada definitivamente.

Quadro 1: Identificações dos estudos incluídos, Brasil, 2021.(Continuação)

Autore s e ano	Tipo de Estudo	Disfunções Sexuais	Amostra e Grupos	Objetivos	Conclusões
(KALININA et al., 2018)	ECA	DP	27 homens com DP; Média de idades: 45,5 anos; G1: (n=15); G2: (n=12).	Avaliar a eficácia do tratamento conservador na Doença de Peyronie	A terapia conservadora na DP é efetiva em pacientes em estágios iniciais da doença, com desvio moderado do pênis e placas de até 1,5 cm. A inclusão de Longidaza na terapia completa aumenta a eficácia do tratamento.
(MILIOS; ACKLAND; GREEN, 2020)	ECA	DP	43 homens com DP; GI: (n=23); GC: (n=20).	Determinar a eficácia de 12 atendimentos de UST como tratamento da DP.	UST é eficaz na eliminação da calcificação das placas fibróticas.
(MARETTI; CANALE, 2020)	ECA	DP	61 homens com DP; G1: (n=31, com média de 56 anos); G2: (n=30, com média de 58 anos.).	Avaliar o impacto do tratamento TCARE e sua associação com (HEP) na DP.	A administração de verapamil, obtida por HEP e precedida por TCARE nas áreas penianas afetadas por fibrose, pode tratar sintomas como dor e alterações estruturais, curvatura peniana e extensão da placa.
(PAVONE et al., 2017)	ECA	DP	96 homens com DP; GI: (n=64, com média de 59 anos); GS: (n=32, com média de 61 anos).	Avaliar a eficácia do tratamento TCARE na DP.	O tratamento TCARE reduz a dor significativamente, melhora a função erétil em homens com disfunção sexual, mas não reduz a curvatura do pênis de forma apreciável.

Fonte: Autores da pesquisa.

Legendas: ECA: Ensaio Controlado Aleatorizado; DE: Disfunção Erétil; GI: Grupo Intervenção, GS: Grupo sham; GC: Grupo Controle; FES: Estimulação elétrica funcional; Hz: Hertz; µs: Micro segundo; min: Minutos; cm: Centímetro; TMAP: Treino de fortalecimento assoalho pélvico; PR: Prostatectomia radical; Li-EWST: Terapia

extracorpórea de baixa energia por ondas de choque; G1: Grupo um; G2 Grupo dois; ESWT: Terapia extracorpórea por ondas de choque; DEV: dispositivo erétil a vácuo; DP: Doença de peyronie; UST: Ultrassom terapêutico; HEF: hidroeletoforese; TCARE: Dispositivo de Tratamento com Transferência de Energia Resistiva e Capacitiva; EP: Ejaculação prematura; EC: Ensaio clínico; TCC: Terapia cognitiva comportamental; TCE: Treino de controle do esfíncter.

De acordo com as informações sintetizadas após leitura dos estudos, emergiram três eixos temáticos acerca da atuação da fisioterapia em disfunções sexuais masculinas: Eixo 1: Fisioterapia na Disfunção Erétil; Eixo 2: Fisioterapia na Ejaculação prematura; Eixo 3: Fisioterapia na Doença de Peyronie.

3.1 EIXO 1- FISIOTERAPIA NA DISFUNÇÃO ERÉTIL

Dentre os fatores etiológicos, o pós-cirúrgico de prostatectomia radical apresenta uma ligação direta com a disfunção erétil, devido, sobretudo, à danificação parcial ou total dos nervos cavernosos e de outras estruturas adjacentes (CLAVIJO et al., 2017). Assim, como possíveis terapêuticas para o tratamento dessa condição incluem-se as injeções intracavernosas, com agentes vasogênicos (como prostaglandina E1, fentolamina, polipeptídeo intestinal vasoativo, papaverina e atropina), farmacoterapia intrauretral com supositórios de prostaglandina E1, cirurgia vascular e implantação cirúrgica de uma prótese peniana (PATEL; BENNETT, 2016).

Todas essas técnicas têm como um dos objetivos a preservação do que ainda resta de tecidos atingidos, a fim de manter e/ou melhorar a funcionalidade ou devolvê-la. Ademais, condutas não medicamentosas como compressão a vácuo, eletroestimulação do assoalho pélvico e condução de ondas de choque na região são também empregadas como parte de um tratamento integralizado e multiprofissional (RIVAL; CLAPEAU, 2017). Nessa perspectiva, condutas fisioterapêuticas não invasivas, como o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, podem ser uma opção para integrar o tratamento de algumas condições uroginecológicas, dentre elas, inclui-se a disfunção erétil (HACKETT et al., 2018).

3.1.1 TERAPIA EXTRACORPÓREA DE BAIXA ENERGIA POR ONDAS DE CHOQUE

A modalidade terapêutica com onda de choque de baixa energia não apresenta um mecanismo de ação conhecido, em contrapartida, a teoria da mecanotransdução é satisfatória por revelar seu efeito na estimulação dos canais da membrana celular para configurar uma nova atividade na expressão gênica. O estudo conduzido por Fojecki et al. (2017) realizaram aplicação de 6.000 ondas de choque durante o tratamento de 10 semanas em seu grupo ativo composto por 58 homens. A terapia pode estimular o crescimento de vasos sanguíneos com potencial recuperação de uma ereção espontânea, porém, o estudo presente com densidade de fluxo de energia de $0,9 \text{ mJ/mm}^2$ e uma frequência de 5Hz não demonstrou desenvolvimento da função erétil em homens com disfunção erétil.

3.1.2 TERAPIA EXTRACORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE E TERAPIA À VÁCUO

As terapias alternativas são amplamente utilizadas para o tratamento de DE, e o interesse por terapêuticas mais simples tem avançado consideravelmente, dentre elas, estão os dispositivos para terapia a vácuo que utiliza pressão negativa para distender os sinusóides corporais e aumentar o fluxo sanguíneo para o pênis. Acerca da terapia extracorpórea por ondas de choque, fisicamente é definida como ondas acústicas que desenvolvem forças mecânicas transitórias nos tecidos, configurando, assim, alterações biológicas vasculares. QI et al. (2017) utilizaram em seu estudo uma intensidade de 250 mmHg de pressão do vácuo com 15 minutos de duração, com frequência de duas vezes por semana, durante quatro semanas consecutivas. Dessa forma, fez-se a aplicação de 300 choques em cada 5 pontos de tratamento a uma densidade de energia de 1 bar (100 kPa) e uma frequência de 2 Hz, com cada paciente tratado duas vezes por semana. Os benefícios clínicos de ambos os tratamentos foram evidenciados em 4 semanas e sem diferença significativa, porém a taxa de sucesso da terapia extracorpórea por ondas de choque foi de 73,3%.

3.1.3 ELETROESTIMULAÇÃO FUNCIONAL

As intervenções fisioterapêuticas fornecem métodos não invasivos e indolores, que associados à compreensão da fisiologia da ereção buscam beneficiar os tratamentos para DE. O método FES tem demonstrado um efeito regenerativo sobre o endotélio, com a liberação de óxido nítrico, nesse sentido, Carboni et al. (2018) configuraram um estudo para contribuir com a hipótese da regeneração da musculatura lisa do corpo cavernoso e resultar no retorno venoso da função erétil. No estudo com 22 pacientes, com intervenção de FES (50Hz/500µs) por um total de 4 semanas, revelou o método estatisticamente significativo na função erétil, além de benéfico na qualidade de vida.

3.1.4 TREINO DE FORTALECIMENTO ASSOALHO PÉLVICO

Utilizando-se de um treinamento de contração de músculos do assoalho pélvico (TMAP), com ativação de fibras de contração rápida e lenta, em posturas em pé, um estudo investigou os efeitos deste protocolo sobre a DE e impacto na qualidade de vida em 97 homens com pós-operatório de prostatectomia. Dessa maneira, a alocação de grupos foi desenhada com 47 sujeitos em um grupo controle que realizaram "cuidado usual" de 3 séries de TMAP e um grupo de intervenção de 50 participantes que realizaram 6 séries dos mesmos exercícios, em pé, porém esse treino ocorreu 5 semanas antes do processo cirúrgico e estendeu-se até o pós operatório. Os autores concluíram que o TMAP é um método seguro ao paciente e tem potenciais benefícios para a recuperação do tecido erétil, embora não tenha impacto imediato na melhora da função sexual, ademais, pode ser utilizado como um componente adicional não invasivo no contexto da reabilitação da DE (MILIOS; ACKLAND; GREEN, 2020).

3.2 EIXO 2 - FISIOTERAPIA SOBRE A EJACULAÇÃO PREMATURA

3.2.1 EXERCÍCIOS FÍSICOS ISOLADOS E CONCOMITANTES À TERAPIA MEDICAMENTOSA

A literatura atual já aponta que a prática de atividades físicas promove benefícios significativos na saúde de forma geral. Sabendo disso, Kilinic e seus colaboradores (2018) buscaram determinar se a prática de exercícios físicos provoca efeitos positivos sobre a EP, comparado ao uso do medicamento Dapoxetina.

Os indivíduos do estudo foram alocados de forma aleatória em três grupos de 35 pessoas cada. O primeiro grupo fez uso do medicamento Dapoxetina de 30 mg, os integrantes do grupo 2 foram recomendados a praticarem exercício moderados por pelo menos 30 min durante 5 dias e o grupo 3 foi aconselhado a manter-se inativo, com atividade física mínima. Então, foram avaliados quanto ao tempo de ejaculação intravaginal.

Em 30 dias, obtiveram resultados significativamente menores nos escores da ferramenta de diagnóstico de ejaculação prematura para o grupo 1 e 2 comparado ao grupo 3. Relacionado ao tempo de ejaculação intravaginal no final do estudo, o grupo que realizou atividade física mínima produziu efeitos semelhantes àqueles que fizeram uso do medicamento Dapoxetina. Além disso, o grupo de atividade física moderada foi significativamente maior que o grupo de atividade física mínima, enfatizando, assim, que a prática de atividade física moderada pode ser eficaz tão quanto ao tratamento pelo medicamento Dapoxetina, porém é necessário maiores estudos para confirmar e fortalecer estes achados.

3.2.2 EXERCÍCIOS PODEM SER TÃO EFICAZES QUANTO AO USO DE MEDICAMENTOS?

Estudos farmacológicos têm relatado que a EP pode estar relacionada com a redução da transmissão de serotonina. Com base nisso, Kurkar e seus colaboradores (2015) objetivaram comparar o efeito da terapia farmacológica com Sertralina associada à reabilitação do assoalho pélvico em pacientes com EP com resposta insatisfatória para o tratamento de inibidores seletivos de recaptação de serotonina (SSRIs).

Compuseram uma amostra de 78 pacientes, estes foram tratados com uma única dose do fármaco Sertralina de 50mgs 3 horas antes da relação sexual por 8 semanas, ao retornarem à linha de base, foram submetidos ao tratamento de reabilitação do assoalho pélvico por 8 semanas. Os pacientes receberam exercício diário por um mês e três atendimentos de estimulação elétrica associada aos exercícios. Utilizou-se corrente interferencial por unidade de terapia, frequência de 0 a 50 Hz (rítmico) com variância de 0 a 100 mA, balanço de 50 Hz de intensidade de 100 mA e balanço padrão de 6/6, eletrodos colocados na parte inferior ao abdômen e dois na parte interna da coxa.

Os 12 atendimentos foram realizados com 20 min cada, além disso os exercícios foram executados 10 vezes de forma a contrair por 1 s e relaxar por 30 s o músculo pubococcígeo. Dessa forma, quando avaliaram o tempo de ejaculação intravaginal, os resultados da terapia do assoalho pélvico obtiveram tempo de latência ejaculatória intravaginal de 90 a 270 segundos, em comparação aos valores de base 20-110s. A terapia Sertralina atingiu 90-180 s e a combinação de ambas atingiu 180-420s.

Mostraram, dessa forma, que a Terapia do assoalho pélvico é satisfatória no tempo de ejaculação em pacientes com EP, e a associação de ambas as terapias é ainda melhor.

3.2.3 EXERCÍCIOS ESFINCTERIANOS E TERAPIA COMPORTAMENTAL COM ESTÍMULOS

O ensaio clínico controlado randomizado de Rodríguez, Marzo e Piqueras (2019) teve como objetivo avaliar a eficácia do treinamento de controle do esfíncter (TCE) sozinho e combinado com dispositivo de masturbação chamado Flip Zero by para exercícios individuais destinados ao tratamento da ejaculação prematura. A média de idade dos 35 participantes do estudo era de 33 anos, que foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos, 17 realizaram a terapia sem dispositivo e 18 realizaram dispositivo mais programa de exercícios.

Não houve diferenças estatísticas em ambos os grupos no que se refere aos valores no tempo de ejaculação intravaginal (IELT) antes do tratamento, enquanto que a partir da quarta semana de intervenção, foram obtidos valores significativos no IELT referente ao treinamento do controle do esfíncter associado ao uso do dispositivo de masturbação comparado ao grupo que somente executou o treinamento com exercícios sem uso de dispositivo. Chegando na 7ª semana houve resultados satisfatórios em ambos os grupos comparado aos valores basais de (IELT), mas ainda assim ocorreram diferenças intra grupo.

Sendo assim, o tratamento com exercícios associados ao dispositivo de masturbação alcança resultados satisfatórios no tratamento da EP do que apenas com a terapia comportamental de treinamento de controle do esfíncter, porém, ainda são necessários mais estudos de acompanhamento com grupo placebo, que possam reforçar a eficácia deste tratamento.

3.3 EIXO 3- FISIOTERAPIA NA DOENÇA DE PEYRONIE

A Doença de Peyronie como condição fibrosante do pênis apresenta em seu complexo de tratamento não cirúrgico e não invasivo, o tratamento fisioterápico com laser magnético, terapia de pressão negativa local, ultrassom terapêutico e tratamento com transferência de energia resistiva, capacitiva e suas associações (BILGUTAY; PASTUSZAK, 2015).

3.3.1 TRATAMENTO COM TERAPIAS COMBINADAS

Kalinina e seus colaboradores (2018) avaliaram a eficiência do tratamento conservador, no qual todos os pacientes receberam terapia combinada, dentre elas o tratamento fisioterápico que incluiu terapia à laser magnético na área da placa fibrótica do pênis e terapia de pressão negativa local. A amostra contou com 27 homens, com idade entre 25 e 66 anos, os quais receberam o tratamento para a doença de Peyronie com terapia de laser magnético com o dispositivo AMVL-01, que cria uma pressão negativa local a 2 atm no frasco e causa uma ereção de duração de 10-20 minutos. Seus resultados apresentam a terapia conservadora eficaz em pacientes em estágios iniciais da doença, com desvio moderado do pênis e placas de até 1,5 cm. Seus maiores benefícios foram encontrados com a associação da terapia medicamentosa.

3.3.2 TRATAMENTO COM ULTRASSOM TERAPÊUTICO

O Ultrassom terapêutico (UST) apresenta um papel importante no tratamento de lesões de tecidos moles desde 1930. No estudo de Milios e colaboradores (2020), foram realizados doze atendimentos de UST com duração de 10 minutos, por meio de aplicação direta na placa de fibrose peniana. A intensidade foi regulada conforme aplicação, com início de $1,5 \text{ W/cm}^2$ a $2,5 \text{ W/cm}^2$, mediante aumento gradual. 43 dos 46 participantes concluíram o estudo, e o grupo de intervenção diminuiu suas pontuações no Ultrassom Doppler Duplex Peniano (UDDP) e expôs redução significativa no ângulo de curvatura de 17° (38%) ao longo do tempo. O UST manifestou-se particularmente útil nas fases iniciais da DP, na redução da dor e deformidade peniana e aumento da função erétil, com eficiência na eliminação da calcificação das placas, confirmadas pelos exames de UDDP.

3.3.3 TRATAMENTO COM TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA RESISTIVA E CAPACITIVA

O tratamento utiliza duas formas diferentes de transferência de energia: capacitiva e resistiva. Assim, são usadas ondas de rádio de longa frequência, em que a aplicação consiste em duas placas colocadas uma em frente da outra e de um gerador elétrico, que ligado às armaduras, cria uma diferença de potencial que se traduz em uma carga positiva e uma carga negativa. Com isso, a movimentação dos eletrólitos gera um aumento de temperatura interna, envolvendo uma cascata de reações benéficas no corpo que ajuda a acelerar o processo de recuperação. Os efeitos biológicos produzidos são, principalmente, o aumento da microcirculação e da vasodilatação, em que a obtenção desses efeitos depende da quantidade de energia fornecida pelo dispositivo TCARE (MARETTI; CANALE, 2020; PAVONE et al., 2017).

Em seu estudo, Maretti e Canale (2020) avaliaram parâmetros de dor na ereção, função erétil e o desvio peniano em graus. Os participantes foram submetidos a 16 tratamentos, sendo dois por semana com o TCARE realizado com energia resistiva e cada tratamento com duração de 15 minutos. 30 participantes incluídos no tratamento com TCARE obtiveram melhora em relação à dor e à curvatura peniana (5 graus). Na fisioterapia já se utiliza o TCARE por conta de suas ações analgésicas, anti-inflamatórias e restauradoras. O quadro inflamatório e doloroso desenvolvido pela DP é reduzido pelo TCARE, que induz um aumento da microcirculação por meio do calor endógeno, o qual favorece a vasodilatação, promovendo a reparação da fibrose do tecido por meio dos processos naturais.

Pavone e seus colaboradores (2017) utilizaram Transferência de Energia Resistiva com aplicação direta na placa fibrótica peniana por meio de uma peça de mão específica em 3 atendimentos, durante 3 dias consecutivos, com duração de 5-8 minutos de atendimento. Seu estudo expôs os benefícios do TCARE na redução da dor peniana, bem mais rápido do que os tratamentos farmacológicos e evidenciou baixa eficiência para redução da placa de DP.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fisioterapia, por meio de suas técnicas, recursos e combinações, mostra-se segura e benéfica ao tratamento de disfunções sexuais masculinas, sobretudo por apresentar boas evidências quanto a sua eficácia em algumas condições. Na disfunção erétil, o tratamento fisioterápico pode ser significativo em condutas como terapia por

ondas de choque, de dispositivo a vácuo (vacuoterapia), eletroestimulação e terapia com TMAP. Na ejaculação prematura, a fisioterapia propicia melhora nesse quadro quando há uma combinação de exercícios mais específicos para o assoalho pélvico e treinos com estímulos de masturbação. Além disso, expõe-se importante quando se emprega atividades físicas moderadas com o uso de medicamentos. Na doença de Peyronie, terapias combinadas com biofotomodulação e pressão negativa associadas à terapia medicamentosa melhoram a ereção em sujeitos nos estágios iniciais da doença, com desvio moderado do pênis. Ademais, a aplicação do ultrassom terapêutico pode reduzir a dor e aumentar a função erétil, além de promover a eliminação da calcificação das placas fibróticas locais. Por fim, o tratamento com transferência de energia resistiva e capacitiva pode promover analgesia, melhorar a função erétil e reduzir a curvatura patológica. Essa conduta demonstrou indicativos de eficácia nessa condição associada ao uso de fármacos e também quando empregada de forma isolada.

REFERÊNCIAS

- ABULSOROUR, S. et al. Treatment of premature ejaculation: a new combined approach. **Egyptian Rheumatology and Rehabilitation**, v. 42, n. 1, p. 39, 2015.
- ANASTASI, G. et al. Neuroanatomy and function of human sexual behavior : A neglected or unknown issue ? n. August, p. 1–17, 2019.
- BILGUTAY, A. N.; PASTUSZAK, A. W. Peyronie’s Disease: A Review of Etiology, Diagnosis, and Management. **Current Sexual Health Reports**, v. 7, n. 2, p. 117–131, 2015.
- CARBONI, C. et al. An initial study on the effect of functional electrical stimulation in erectile dysfunction: a randomized controlled trial. **International Journal of Impotence Research**, v. 30, n. 3, p. 97–101, 22 jun. 2018.
- CLAVIJO, R. I. et al. Effects of Low-Intensity Extracorporeal Shockwave Therapy on Erectile Dysfunction: A Systematic Review and Meta-Analysis. **The Journal of Sexual Medicine**, v. 14, n. 1, p. 27–35, jan. 2017.
- CROWDIS M, N. S. **Premature Ejaculation**. Disponível em: <<https://www-ncbi-nlm-nih.ez17.periodicos.capes.gov.br/books/NBK546701/>>.
- EL-HAMD, M. A.; , RAMADAN SALEH, A. M. Premature ejaculation: an update on definition and pathophysiology. **Asian Journal of Andrology**, v. 21, n. July, p. 1–4, 2019.
- FOJECKI, G. L.; TIESSEN, S.; OSTHER, P. J. S. Effect of Low-Energy Linear Shockwave Therapy on Erectile Dysfunction—A Double-Blinded, Sham-Controlled, Randomized Clinical Trial. **The Journal of Sexual Medicine**, v. 14, n. 1, p. 106–112, jan. 2017.
- HACKETT, G. et al. British Society for Sexual Medicine Guidelines on the Management of Erectile Dysfunction in Men—2017. **The Journal of Sexual Medicine**, v. 15, n. 4, p. 430–457, abr. 2018.
- IRFAN, M. et al. Epidemiology of Male Sexual Dysfunction in Asian and European Regions: A Systematic Review. **American Journal of Men’s Health**, v. 14, n. 4, p. 155798832093720, 6 jul. 2020.

KALININA, S. N. et al. Assesment of the efficiency of conservative treatment of Peyronie's disease. **Urologicheskie vedomosti**, v. 8, n. 1, p. 5–10, 2018.

KANNAN, P. et al. Effectiveness of physiotherapy interventions for improving erectile function and climacturia in men after prostatectomy: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. **Clinical Rehabilitation**, v. 33, n. 8, p. 1298–1309, 15 ago. 2019.

KILINC, M. F. et al. Impact of physical activity on patient self-reported outcomes of lifelong premature ejaculation patients: Results of a prospective, randomised, sham-controlled trial. **Andrologia**, v. 50, n. 1, p. 1–7, 2018.

MARETTI, C.; CANALE, D. New therapeutical procedures of peyronie's disease: Transfer capacitive resistive energy in association with hydroelectrophoresis with verapamil. **International Journal of Pharmaceutical Research and Allied Sciences**, v. 9, n. 3, p. 16–23, 2020.

MILIOS, J. E.; ACKLAND, T. R.; GREEN, D. J. Peyronie's disease and the role of therapeutic ultrasound: A randomized controlled trial. **Journal of Rehabilitation Therapy**, v. 2, n. 2, p. 32–39, 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva : os homens como sujeitos de cuidado**. 1ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

MITIDIERI, E. et al. Pharmacology and perspectives in erectile dysfunction in man. **Pharmacology and Therapeutics**, v. 208, p. 107493, 2020.

MOHEDE, D. C. J. et al. Prevalence of Peyronie and Ledderhose Diseases in a Series of 730 Patients with Dupuytren Disease. **Plastic and Reconstructive Surgery**, v. 145, n. 4, p. 978–984, abr. 2020.

OLIVEIRA, C. et al. Prevalência de priapismo em indivíduos com doença falciforme e suas implicações na função sexual masculina. p. 1–6, 2020.

OMS. La salud sexual y su relación con la salud reproductiva: un enfoque operativo. **Human Reproduction Programme**, p. 1–12, 2018.

PATEL, C. K.; BENNETT, N. Advances in the treatment of erectile dysfunction: what's new and upcoming? **F1000Research**, v. 5, p. 369, 18 mar. 2016.

PAVONE, C. et al. Does Transfer Capacitive Resistive Energy Has a Therapeutic Effect on Peyronie's Disease? Randomized, Single-Blind, Sham-Controlled Study on 96 Patients: Fast Pain Relief. **Urologia Internationalis**, v. 99, n. 1, p. 77–83, 2017.

PEIXOTO, M. M. Sexual Problems: Dysfunction. In: **Neurology of Sexual and Bladder Disorders**. [s.l.] Elsevier, 2017. p. 603–21.

QI, T. et al. Comparison of the effects of extracorporeal shock wave therapy and a vacuum erectile device on penile erectile dysfunction: A randomized clinical trial. **Medicine**, v. 96, n. 44, p. e8414, nov. 2017.

RIVAL, T.; CLAPEAU, L. Efficacité de la rééducation du plancher pelvien dans la dysfonction érectile : revue de la littérature. **Progrès en Urologie**, v. 27, n. 17, p. 1069–1075, dez. 2017.

RODRÍGUEZ, J. E.; MARZO, J. C.; PIQUERAS, J. A. Efficacy of sphincter control training (SCT) in the treatment of premature ejaculation, a new cognitive behavioral approach: A parallel-group randomized, controlled trial. **PLoS ONE**, v. 14, n. 2, p. 1–13, 2019.

SOUSA, A. J. M. et al. Primary Health Care and COVID-19: An integrative review. **Revista Científica da Escola de Saúde Pública do Ceará**, v. 14, n. 1, p. 45–52, 2020.

SOUSA, L. M. M. et al. A metodologia de revisão integrativa da literatura em enfermagem. **Revista Investigação Enfermagem**, v. Ser. II, n. 21, p. 17–26, 2017.

Capítulo 4

Climatério e saúde coletiva: Evidências da atuação do fisioterapeuta

Maria Gabriela Cardoso Teles Monteiro

Objetivo: identificar na literatura, a importância da atuação do fisioterapeuta na saúde coletiva durante o período do climatério, junto à equipe multiprofissional. **Método:** revisão integrativa de literatura realizada nas bases de dados SciELO, LILACS via BVS, Pubmed e Cochrane Library, nos últimos cinco anos. A estratégia de busca foi fundamentada no método PICO com a utilização dos descritores e operadores booleanos: “fisioterapia ou modalidades de fisioterapia” e “climatério” e “qualidade de vida ou saúde coletiva”, nos idiomas português, inglês e espanhol. **Resultados:** Encontrou-se 511 artigos, e após os critérios de elegibilidade e leitura dos trabalhos, 20 estudos foram selecionados para esta revisão, evidenciando a atuação do fisioterapeuta em diferentes aspectos do período climatérico, atuando desde a prevenção de agravos à reabilitação de sintomas e manifestações relacionadas ao declínio da funcionalidade hormonal. Dentre os principais métodos e intervenções, destacam-se a massagem terapêutica, a prescrição de exercícios na terra ou em meio aquático, o pilates, o treinamento muscular do assoalho pélvico e as práticas integrativas e complementares. **Conclusão:** Embora a maior parte dos achados apontem para melhorias significativas, sejam aplicadas a nível individual ou coletivo, poucos dos estudos incluídos, fortalecem a prática das intervenções no primeiro nível de atenção à saúde. As informações sobre esse âmbito, ainda, são bastante exíguas na literatura, principalmente, ao considerar que se trata de uma profissão, tradicionalmente, vinculada ao campo da reabilitação, e com menor inserção no campo da promoção e da atenção à saúde.

Palavras-chave: Modalidades de Fisioterapia, Climatério, Saúde Coletiva.

1 INTRODUÇÃO

O climatério, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) corresponde a uma fase biológica da vida e não um processo patológico, que compreende a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da vida da mulher. É determinado pela queda de produção dos hormônios estrogênio e progesterona pelos ovários. O climatério tem início por volta dos 40 anos e se estende até os 65 anos. A menopausa é um marco dessa fase, correspondendo ao último ciclo menstrual, somente reconhecida depois de passados 12 meses da sua ocorrência e acontece geralmente em torno dos 48 aos 50 anos de idade (BRASIL, 2008).

Durante o climatério, cerca de 60 a 80% das mulheres referem algum tipo de sintoma, na sua maioria atribuída ao estado de hipoestrogenismo, que ocorre pelo declínio da função ovariana, sendo os sinais e sintomas mais comuns a irregularidade menstrual, aparecimento ou agravamento do quadro de tensão pré-menstrual e cólica menstrual, palpitações, tonturas, cansaço, diminuição da memória, cefaleia, dores articulares, ansiedade, irritabilidade, insônia, depressão, dispareunia, urgência miccional, cistite, incontinência urinária, secura vaginal e os “fogachos” ou ondas de calor (N PEIXOTO et al., 2015). É importante enfatizar que as queixas, que mais interferem na qualidade de vida da mulher no climatério são as de ordem psicossocial e afetiva, como tristeza, desânimo, cansaço, falta de energia, humor depressivo, ansiedade, irritabilidade, insônia, déficit de atenção, concentração e memória, anedonia e diminuição da libido (BRASIL, 2016). Entretanto, isto pode afetar cada mulher de um modo diferente, com sintomas variando na sua diversidade e intensidade, repercutindo nos seus sentimentos e na sua qualidade de vida (SANTOS et al., 2007).

As mulheres são a maioria da população brasileira e as principais usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS). Os profissionais de saúde que atendem a clientela feminina precisam adotar estratégias que evitem a ocorrência de oportunidades perdidas de atenção às mulheres no climatério. Pois, independentemente do grau de manifestação de sintomas, é fundamental que haja, nessa fase da vida, um acompanhamento sistemático visando à promoção da saúde, o diagnóstico precoce, o tratamento imediato dos agravos e a prevenção de danos, visto que múltiplas condições físicas e mentais podem estar envolvidas durante este processo (BRASIL, 2008). Ao observar essas condições ou sintomas e o fato de que essas mulheres viverão em média um terço de suas vidas, nota-se a importância de intervenções, que visem proporcionar uma melhor qualidade de vida.

A Atenção Básica ou Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção em saúde e é caracterizada por um conjunto de ações individuais e coletivas, que abrange promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral, que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades. Sua prática deve ser executada o mais próximo da vida das pessoas, através por exemplo, das Estratégias Saúde da Família (ESF), que é considerado como porta principal de entrada na rede de atenção à saúde (LAVRAS, 2011). O acolhimento às mulheres no climatério deve considerar alguns fatores importantes, como integralidade do cuidado, equidade e humanização. Exigindo assim, que os profissionais e equipes acolham as mulheres na fase climatérica incorporando aspectos importantes neste processo (UNA-SUS/UFMA, 2017).

O fisioterapeuta é um dos profissionais da saúde, apto a realizar atividades de promoção, prevenção, cura e recuperação à saúde, considerando todos os níveis de cuidado, a singularidade do sujeito e do meio ao qual ele está inserido, junto à equipe

multiprofissional (COSTA DA SILVA et al., 2019). O trabalho em equipes multiprofissionais na ESF é considerado um recurso importante para atingir um dos aspectos da integralidade nas práticas em saúde (PEREIRA; RIVERA; ARTMANN, 2013).

Além disso, o fisioterapeuta é um profissional que atua em diversas áreas e especialidades da saúde, dentre as quais está a saúde da mulher, onde exerce importante influência nos diferentes ciclos de vida da mesma, incluindo o período do climatério e menopausa, levando em consideração as manifestações clínicas decorrentes das mudanças endócrinas desse período, e tem como objetivo minimizar as alterações funcionais que podem ocorrer em diferentes sistemas orgânicos. Evidências demonstram que sua atuação envolve desde a educação em saúde para prevenção de agravos como câncer de mama por exemplo, visto que a menopausa tardia (após 55 anos) é um dos fatores de risco para o desenvolvimento da doença, além de treinamentos específicos para prevenção e tratamento em casos de disfunções do assoalho pélvico, disfunções sexuais e perda de massa óssea (BARACHO, 2018; COSTA DA SILVA et al., 2019; INCA, 2021).

A atenção à mulher no climatério está prevista nas diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (BRASIL, 2004). Assim, enfatiza-se a importância da inclusão, na agenda profissional, de atividades que contemplem a promoção da qualidade de vida desse grupo, ampliando o cuidado para além dos aspectos biológicos, o que aponta novamente a necessidade de uma abordagem multiprofissional. E, é neste contexto, que o objetivo deste trabalho é identificar na literatura, a importância da atuação do fisioterapeuta na saúde coletiva durante o período do climatério, junto à equipe multiprofissional.

2 MÉTODOS

Este estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa, que fornece uma sintetização de pesquisas publicadas e obtém conclusões a partir de uma pergunta norteadora. Esse método possibilita o levantamento e análise de publicações no contexto mundial de forma que seus resultados possam contribuir positivamente para a comunidade, bem como para a tomada de decisões nas condutas profissionais com base nas evidências científicas, aliadas à prática clínica. A preparação da estratégia se deu por meio de seis etapas interligadas: elaboração da pergunta norteadora, busca na literatura, coleta de dados, análise dos estudos incluídos, interpretação e discussão dos resultados e apresentação da revisão ou síntese do conhecimento (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). A pergunta norteadora foi construída por meio da estratégia PICO (P – população ou condição; I – intervenção; C – comparação; O – *outcomes*: resultados e desfechos) (SCHARDT et al., 2007) “qual a importância da atuação do fisioterapeuta na saúde coletiva durante o período do climatério?” conforme observa-se no quadro 1.

Quadro 1: Elementos da estratégia PICO, descritores e palavras-chave, Brasil. 2021

Componente	Definição	Descritores
P: (População/Condição)	Mulheres vivenciando o climatério	Climatério
I: (Intervenção)	Fisioterapeuta que atua na Saúde Coletiva	Fisioterapia; Modalidades de fisioterapia
C: (Comparação)	(Não se aplica ao estudo)	(Não se aplica ao estudo)
O: (Resultado/Desfecho)	Impacto positivo na qualidade de vida de mulheres durante o climatério por meio da atuação fisioterapêutica em ações coletivas	Qualidade de vida Saúde Coletiva

Fonte: MONTEIRO, 2021.

A busca na literatura foi realizada em fevereiro de 2021 nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Literatura Latino Americana Caribenha em Ciências da Saúde (LILACS) via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Pubmed e Cochrane Library, utilizando-se como estratégia de busca a combinação de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) com os operadores booleanos *OR* e *AND*. Ressalta-se que o elemento C da estratégia PICO não foi abordado, pois o objetivo não é comparar intervenções nem as áreas de atuação profissional, mas de forma objetiva apresentar a relevância da atuação do profissional fisioterapeuta junto à equipe multiprofissional.

Após a definição da estratégia PICO, foi optada por realizar a estratégia de busca avançada nas bases de dados, para contemplar da forma mais ampla possível o objetivo desta pesquisa: “fisioterapia ou modalidades de fisioterapia” e “climatério” e “qualidade de vida ou saúde coletiva”.

2.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Artigos científicos disponíveis na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol, publicados os últimos 5 anos, considerando os estudos do tipo ensaios clínicos randomizados (ECR). O espaço de tempo de 5 anos foi determinado com o objetivo de observar as evidências mais atuais acerca do assunto.

Foram excluídos os artigos que não apresentaram textos publicados na íntegra, dissertações ou teses, publicações fora do recorte temporal. Foram excluídos também os artigos que não apresentavam algum tipo de atuação ou intervenção fisioterapêutica.

2.2 SELEÇÃO DOS ARTIGOS

Inicialmente foi realizada a análise de títulos, seguida da leitura dos resumos para a identificação daqueles que seriam avaliados na íntegra, de forma independente. A análise dos dados permitiu avaliar as evidências, bem como identificar a necessidade de investigações futuras acerca da temática.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da combinação dos descritores foram obtidos 511 estudos: SciELO (0), LILACS via BVS (2), Pubmed (499), Cochrane Library (10) artigos. Após aplicação dos critérios de inclusão por meio de filtros selecionados nas bases de dados, 87 artigos foram selecionados para leitura dos títulos e resumos na íntegra. Em seguida, após avaliação por meio da leitura dos títulos e resumos, verificou-se que 67 não correspondiam à proposta deste trabalho, não estavam disponíveis na íntegra, não abordavam a atuação ou modalidade de atuação do fisioterapeuta ou correspondia a outro tipo de desenho metodológico. Assim, a revisão integrativa foi estruturada por meio de 20 artigos.

Os estudos analisados mostram resultados positivos da atuação da fisioterapia durante o período do climatério, evidenciando desde a terapia manual, com a massagem, orientação e monitoramento de exercícios, pilates, treinamento muscular do assoalho

pélvico, bem como, também, a fisioterapia aquática e as técnicas integrativas, por meio das terapias alternativas, como yoga, reflexologia e eletroacupuntura.

Os artigos contêm informações essenciais aos profissionais de saúde sobre o assunto, de modo que a aplicação deste conhecimento e a aquisição de habilidades melhorem o cuidado e promovam o alcance de desfechos positivos na assistência integral a mulheres durante o período do climatério. Além disso, evidencia-se a relevância da inserção do profissional fisioterapeuta no trabalho em equipe, somando resultados importantes na assistência à saúde.

3.1 EFEITOS DA MASSAGEM TERAPÊUTICA

A menopausa é um período em que podem ocorrer mudanças na saúde física, mental e sexual da mulher, acompanhado ou não de alguns sintomas, como distúrbios do sono, fadiga, diminuição do desejo sexual, podendo ainda algumas mulheres apresentarem condições médicas crônicas complexas. Nestes casos, sendo recomendada a terapia hormonal para reduzir a gravidade dos seus sintomas (SYDORA et al., 2018). No entanto, existem tratamentos não farmacológicos que podem melhorar a qualidade de vida e a percepção da imagem corporal em mulheres na menopausa. No estudo de Espí-López e colaboradores (2020) incluído nesta revisão, avaliou-se os efeitos benéficos da massagem craniofacial terapêutica na qualidade de vida, saúde mental, sintomas da menopausa e imagem corporal por meio de um ECR controlado. A amostra foi composta por 50 mulheres de 45 a 60 anos, na pós-menopausa encaminhadas por médicos da atenção primária. Incluiu-se mulheres sem ciclo menstrual há pelo menos um ano e que apresentavam pelo menos dois dos seguintes sintomas da menopausa: fogachos, sudorese, dificuldade em adormecer, alterações de humor, incontinência urinária e/ou secura vaginal.

O período de intervenção durou três semanas consecutivas (uma sessão semanal) com acompanhamento de um mês. Qualidade de vida, saúde mental e imagem corporal foram avaliadas em três momentos: no início do estudo, ao final e um mês após o término do tratamento. A massagem craniofacial apresentou efeitos positivos na percepção da qualidade de vida em relação aos sintomas sofridos pelas mulheres no climatério e foram observadas também melhorias na saúde mental e imagem corporal nesta população. Além disso, constitui uma opção terapêutica de baixo custo, baseada na atuação do fisioterapeuta.

Em um estudo semelhante, com período de intervenção também similar, onde também se verificou o impacto da massagem terapêutica, mas em pacientes em tratamento do câncer de mama, foi observada melhora significativa nos estados de ansiedade, qualidade do sono, qualidade de vida e funcionalidade (STURGEON et al., 2009).

A massagem é uma intervenção com alta segurança e baixo perfil de eventos adversos quando administrada por profissionais especializados. Apresenta evidências na redução do estresse, a ansiedade e a dor (FIECHTNER; BRODEUR, 2000). Seus mecanismos biológicos parecem estar relacionados a estimulação de receptores de pressão, melhorando a atividade vagal e reduzindo os níveis de cortisol (FIELD, 2014) facilitando o relaxamento melhorando a qualidade do sono e oferecendo uma sensação de paz e bem-estar, principalmente, na melhoria da qualidade subjetiva do sono em mulheres na pós-menopausa (HACHUL et al., 2014).

3.2 PILATES

Três dos artigos incluídos abordam sobre o pilates. O método representa um programa de exercícios físicos criados por Joseph Pilates e que trabalha movimentos corporais com seis princípios: respiração, controle, concentração, precisão, fluidez e centralização, desta forma, integrando corpo e mente (LOPES; RUAS; PATRIZZI, 2014).

No estudo de Aibar-Almazán e colaboradores (2019a), observaram os efeitos do treinamento de pilates na qualidade do sono, ansiedade, depressão e fadiga em mulheres na pós-menopausa. Cento e dez mulheres, residentes de uma comunidade, com 60 anos ou mais, participaram do ECR, sendo alocadas aleatoriamente em grupo controle ou pilates. Melhorias significativas foram observadas após a intervenção com treinamento de pilates por 12 semanas, na qualidade do sono, ansiedade, depressão e fadiga, avaliadas por meio de questionários específicos. De forma semelhante, no estudo de García-Garro e colaboradores (2020) por meio de um programa de exercícios de pilates de 12 semanas em mulheres pós-menopausa, observou-se que o pilates tem potencial para melhorar as habilidades cognitivas e funcionais entre mulheres com 60 anos ou mais.

Já em outro estudo desenvolvido, também, por Aibar-Almazán e colaboradores (2019b), avaliou-se os efeitos do pilates nos fatores de risco de queda em mulheres de 60 anos pós- menopausa, visto que, o risco de quedas tem sido fortemente vinculado ao gênero feminino entre mulheres na pós-menopausa. O hipoestrogenismo parece interferir no equilíbrio postural, explicando o aumento na frequência de quedas e fraturas no período pós-menopausa (EKBLAD et al., 2000). Além da idade e redução da densidade mineral óssea (SILVA et al., 2009). Em seus achados, Aibar-Almazán e colaboradores (2019b) concluíram que o grupo de intervenção com Pilates após 12 semanas com sessões de 60 minutos, apresentou valores significativos em relação à confiança no equilíbrio, menor medo de cair, melhorias estatisticamente significativas na velocidade e movimentos ântero-posteriores do centro de pressão com os olhos abertos e fechados. Corroborando com estes achados, mas com uma intervenção aplicada em espaço de tempo maior, de três meses, Souza e colaboradores (2013), também obteve resultados positivos, apresentando menor déficit de equilíbrio do que no pré-teste.

3.3 EXERCÍCIOS ORIENTADOS E MONITORADOS

Dos artigos incluídos, dois abordam a importância de exercícios físicos bem prescritos e orientados. No de Ganderton e colaboradores (2018) o objetivo foi determinar os efeitos dos exercícios direcionados sobre a dor e a função em mulheres na pós-menopausa com síndrome da dor trocantérica maior. Esta é uma queixa comum na APS, particularmente em mulheres com idade entre 45 e 63 anos. A condição envolve a patologia dos tendões glúteo médio e mínimo e/ou bursa trocantérica. Aqueles com a doença comumente descrevem dor na lateral da coxa ou em torno do trocanter maior do fêmur, apresentando implicações negativas sobre a qualidade de vida (FEARON et al., 2010). O programa de exercícios de 12 semanas orientado por um fisioterapeuta, incluiu exercícios isométricos, de fortalecimento e progressões de movimentos dinâmicos. A intervenção trouxe melhoras significativas na redução de dor lateral no quadril.

No estudo de Bittar e colaboradores (2016), avaliou-se o impacto de um programa de exercícios físicos supervisionados por fisioterapeutas, com pesos livres e faixas elásticas, na composição corporal (massa magra e massa gorda) em mulheres na pós-menopausa, comparado a um grupo de exercícios sem orientação do profissional.

Durante esta fase, com o início da perda óssea, há comumente uma associação a um declínio na massa muscular, provocando um aumento da massa gorda e ganho de peso corporal (STERNFELD et al., 2005). Após a intervenção de 12 meses com exercícios físicos, incluindo exercícios de impacto muscular e força e alongamento compostos por duas sessões semanais de 60 minutos, tendo a composição corporal determinada por densitometria, observou-se que o grupo orientado e monitorado por fisioterapeuta apresentou aumento da massa magra nos membros superiores e inferiores, evidenciando que o direcionamento no grupo em que houve o acompanhamento do fisioterapeuta obteve mais resultados.

3.4 EXERCÍCIOS NA ÁGUA

De três artigos incluídos que apontam os efeitos da atuação do fisioterapeuta utilizando a água como recurso, dois avaliaram os efeitos do treinamento aquático sobre os sintomas e a qualidade de vida em mulheres com osteoartrite de joelho. Como visto anteriormente, a redução hormonal vivenciada no período climatérico, favorece uma redução de densidade mineral óssea, o que pode predispor a condições de fragilidade óssea. Em um dos estudos, investigou-se os efeitos do treinamento intensivo de quatro meses com resistência aquática sobre a composição corporal e velocidade de caminhada em mulheres na pós-menopausa com osteoartrite leve de joelho, imediatamente após a intervenção e após 12 meses de acompanhamento (WALLER et al., 2017), evidenciando diminuição da massa gorda e melhora a velocidade de caminhada em mulheres na pós-menopausa com osteoartrite leve de joelho. Apenas as melhorias na velocidade de caminhada foram mantidas no acompanhamento de 12 meses. Já no segundo estudo, com a mesma intervenção e janela de tempo monitorada e avaliada, analisou-se os efeitos da associação do treinamento na água com a qualidade de vida percebida por estas mulheres, através de questionários. Não se obteve impacto de curto ou longo prazo na qualidade de vida em mulheres percebida. No entanto, uma pequena diminuição de curto prazo na rigidez do joelho foi observada (MUNUKKA et al., 2020).

No estudo de Casilda-López e colaboradores (2017) associou-se movimentos de dança aos movimentos aquáticos para avaliar seus efeitos combinados na funcionalidade, capacidade cardiorrespiratória, frequência cardíaca pós-exercício e fadiga em mulheres obesas na pós-menopausa e com osteoartrite de joelho. As variáveis foram avaliadas após a intervenção e no seguimento de três meses. Houve melhora significativa na função cardiorrespiratória, diminuição da frequência cardíaca pós-exercício e fadiga. A maioria dessas melhorias foram mantidas na avaliação de três meses.

3.5 TREINAMENTO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO

Seis artigos evidenciaram o treinamento muscular do assoalho pélvico (TMAP) como uma importante técnica aliada ao fisioterapeuta no manejo das condições associadas ao período climatérico. Os exercícios da MAP podem fortalecer os músculos adjacentes aos genitais e aumentar a força da MAP, portanto, tendo um efeito positivo na função sexual da mulher (PIASSAROLLI et al., 2010). Desta forma, três estudos que avaliaram um programa de TMAP nas disfunções sexuais, concluíram que os exercícios de MAP, incluindo encontros de educação sexual, têm o potencial de melhorar a função

sexual de mulheres na pós-menopausa e, portanto, sugerido para ser incluído em encontros de saúde projetados para mulheres na pós-menopausa, além disso, também, evidenciaram melhora da dor e qualidade de vida (NAZARPOUR et al., 2017, 2018; SCHVARTZMAN et al., 2019). Além destes, outros três artigos também evidenciaram, por meio do TMAP, a melhora da qualidade de vida em mulheres na pós-menopausa com incontinência urinária (BERTOTTO et al., 2017; MERCIER et al., 2019) e em casos associados a prolapso de órgãos pélvicos o TMAP apresenta menos efeitos colaterais do que o tratamento com pressários (PANMAN et al., 2016).

3.6 PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PICS)

A origem das práticas integrativas nos sistemas públicos de saúde vem de longa data. No Brasil esse movimento ganhou força a partir da Oitava Conferência Nacional de Saúde (1986), e desde então vem expandindo. As práticas envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio da integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Outro ponto compartilhado pelas práticas abrangidas nesse campo é a visão ampliada do processo saúde-doença e a promoção global do cuidado humano (TELESI JÚNIOR, 2016).

Na APS, as PICS podem ser ofertadas pelo mesmo profissional que realiza o cuidado convencional aos usuários, desde que tenha formação prévia para praticá-las – ou por profissional específico contratado para essa oferta de cuidado (BRASIL, 2018). Nesta revisão, incluiu-se estudos que apontaram para os efeitos da prática de yoga em grupo (JORGE et al., 2016; KOCH et al., 2017), durante o período do climatério, evidenciando redução nos níveis de estresse e sintomas de depressão, bem como efeitos na qualidade de vida. Esses resultados sugerem que a yoga promove mudanças psicofisiológicas positivas em mulheres na pós-menopausa e pode ser aplicada como terapia complementar a essa população. Outros dois estudos foram incluídos reportando os efeitos da reflexologia (GOZUYESIL; BASER, 2016; MAHDAVIPOUR et al., 2019), mostrando que esta pode ser eficaz na redução de problemas vasomotores e aumento da qualidade de vida em mulheres no período da menopausa, além de ser eficaz para reduzir sintomas relacionados à depressão. Trata-se de um método que defende a terapia reflexa, que se baseia na estimulação por pressão em pontos reflexos nos pés, que correspondem a partes do corpo, órgãos e sistemas, estimulando um aumento no suprimento de sangue ao órgão correspondente, produzindo efeitos terapêuticos (JONES et al., 2013). Dois estudos incluídos, também, evidenciaram o tratamento com eletroacupuntura sendo eficaz e seguro no alívio dos sintomas de depressão e na melhoria da qualidade de vida e depressão da perimenopausa (LI et al., 2018) e alívio eficaz em sintomas de incontinência urinária relacionados ao período pós-menopausa (WANG et al., 2019). A acupuntura incorporou a estimulação elétrica como mecanismo de ação, dando origem à eletroacupuntura. Devido ao grande interesse e à difusão de tal técnica no Brasil, o Ministério da Saúde incorporou a acupuntura ao Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2006), sendo também considerada como especialidade por oito Conselhos de Classe, dentre eles, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO, 2007). Enquanto ferramenta de trabalho fisioterapêutico, a eletroterapia encontra sua fundamentação nas interações provocadas em níveis celular, tecidual e sistêmico; conseqüentemente, no âmbito fisiológico (NOHAMA; SILVÉRIO-LOPES, 2009).

A respeito desta revisão, pode-se considerar como uma limitação, que o recorte temporal para a busca de artigos (limitados aos últimos cinco anos) não permite uma análise aprofundada e, historicamente, orientada acerca da evolução dos estudos científicos na temática. Destaca-se a necessidade da realização de estudos observando os efeitos destas intervenções, aliadas à educação em saúde e prevenção de agravos com desenho metodológico incluindo amostra das Unidades Básicas de Saúde e a Comunidade, para ampliar as informações sobre as repercussões no primeiro nível de atenção e enriquecer a compreensão e a prática clínica sobre o tema.

Em conclusão, como pôde ser observado, o fisioterapeuta trás evidências robustas de sua atuação em diferentes aspectos do período climatérico, atuando desde a prevenção de agravos à reabilitação de sintomas e manifestações relacionadas ao declínio da funcionalidade hormonal. A Massagem Terapêutica, a Prescrição De Exercícios na terra ou em meio aquático, o Pilates, o Treinamento Muscular do Assoalho Pélvico e as Práticas Integrativas e Complementares configuram os principais recursos e métodos aliados à atuação do Fisioterapeuta nesta fase. Embora a maior parte dos achados destas intervenções apontem para melhorias significativas, aplicadas a nível individual ou coletivo, poucos dos estudos incluídos, fortalecem a prática das intervenções no primeiro nível de atenção à saúde. As informações sobre esse âmbito ainda são bastante exíguas na literatura. O trabalho da fisioterapia, nesse primeiro nível é algo ainda relativamente novo, principalmente ao se considerar uma profissão tradicionalmente vinculada ao campo da reabilitação, e com menor inserção no campo da promoção e da atenção à saúde. No âmbito brasileiro, em sua maioria, o fisioterapeuta age na esfera privada. Ainda há muita desinformação, também, de profissionais de outras áreas que veem o fisioterapeuta dentro do paradigma da doença ou desconhecem qual deva ser a atuação desse profissional no campo da saúde da família.

A atuação do fisioterapeuta na Saúde Coletiva, dentro da APS é fundamental para que este possa agir, positivamente, na vida do indivíduo, antes da instalação de doenças, ou como neste caso, antes da mulher vivenciar o período do climatério, por meio de um trabalho preventivo de educação em saúde e redução de danos à saúde. Para alterar este cenário, é necessária uma releitura do papel da Fisioterapia, que deverá ir além das abordagens individuais, colocando-se, também, no âmbito da ação coletiva.

REFERÊNCIAS

AIBAR-ALMAZÁN, A. et al. Effects of Pilates training on sleep quality, anxiety, depression and fatigue in postmenopausal women: A randomized controlled trial. **Maturitas**, v. 124, p. 62–67, jun. 2019a.

AIBAR-ALMAZÁN, A. et al. Effects of Pilates on fall risk factors in community-dwelling elderly women: A randomized, controlled trial. **European Journal of Sport Science**, v. 19, n. 10, p. 1386–1394, 26 nov. 2019b.

BARACHO, E. **Fisioterapia aplicada à saúde da mulher**. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

BERTOTTO, A. et al. Effect of electromyographic biofeedback as an add-on to pelvic floor muscle exercises on neuromuscular outcomes and quality of life in postmenopausal women with stress urinary incontinence: A randomized controlled trial. **Neurourology**

and Urodynamics, v. 36, n. 8, p. 2142–2147, nov. 2017.

BITTAR, S. T. et al. Physical exercises with free weights and elastic bands can improve body composition parameters in postmenopausal women. **Menopause**, v. 23, n. 4, p. 383–389, abr. 2016.

BRASIL. **Política nacional de atenção integral à saúde da mulher: princípios e diretrizes**. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.

BRASIL. **Portaria nº 971, de 4 de maio de 2006: aprova a política nacional de práticas integrativas e complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde**. Brasília: Diário Oficial da União, 2006.

BRASIL. **Manual de atenção à mulher no climatério/menopausa**. Brasília: Ministério da Saúde, 2008.

BRASIL. **Protocolos da atenção básica: saúde das mulheres**. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

BRASIL. **Manual de implantação de serviços de práticas integrativas e complementares no SUS / Secretaria de Atenção à Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

CASILDA-LÓPEZ, J. et al. Effects of a dance-based aquatic exercise program in obese postmenopausal women with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. **Menopause**, v. 24, n. 7, p. 768–773, jul. 2017.

COFFITO, C. F. D. F. E. T. O. **Dispõe sobre a regulamentação da acupuntura. Resoluções n. 60/85 e 219/2000**. Brasília: Diário Oficial da União, 2007.

COSTA DA SILVA, J. F. et al. Relato de experiência de Fisioterapeutas na atenção básica com mulheres no período de menopausa e climatério. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 24, p. e883, 15 jun. 2019.

EKBLAD, S. et al. Disturbances in postural balance are common in postmenopausal women with vasomotor symptoms. **Climacteric**, v. 3, n. 3, p. 192–198, 3 jan. 2000.

ESPÍ-LÓPEZ, G. V. et al. The beneficial effects of therapeutic craniofacial massage on quality of life, mental health and menopausal symptoms and body image: A randomized controlled clinical trial. **Complementary Therapies in Medicine**, v. 51, p. 102415, jun. 2020.

FEARON, A. M. et al. Does Ultrasound Correlate with Surgical or Histologic Findings in Greater Trochanteric Pain Syndrome? A Pilot Study. **Clinical Orthopaedics & Related Research**, v. 468, n. 7, p. 1838–1844, jul. 2010.

FIECHTNER, J. J.; BRODEUR, R. R. Manual and manipulation techniques for rheumatic disease. **Rheumatic Disease Clinics of North America**, v. 26, n. 1, p. 83–96, fev. 2000.

FIELD, T. Massage therapy research review. **Complementary Therapies in Clinical Practice**, v. 20, n. 4, p. 224–229, nov. 2014.

GANDERTON, C. et al. Gluteal Loading Versus Sham Exercises to Improve Pain and Dysfunction in Postmenopausal Women with Greater Trochanteric Pain Syndrome: A Randomized Controlled Trial. **Journal of Women's Health**, v. 27, n. 6, p. 815–829, jun. 2018.

GARCÍA-GARRO, P. A. et al. Effectiveness of A Pilates Training Program on Cognitive and Functional Abilities in Postmenopausal Women. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 17, n. 10, p. 3580, 20 maio 2020.

GOZUYESIL, E.; BASER, M. The effect of foot reflexology applied to women aged between 40 and 60 on vasomotor complaints and quality of life. **Complementary Therapies in Clinical Practice**, v. 24, p. 78–85, ago. 2016.

HACHUL, H. et al. The beneficial effects of massage therapy for insomnia in postmenopausal women. **Sleep Science**, v. 7, n. 2, p. 114–116, jun. 2014.

INCA. **Instituto Nacional do Câncer**. Disponível em: <<https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-mama>>. Acesso em: 12 mar. 2021.

JONES, J. et al. Is There a Specific Hemodynamic Effect in Reflexology? A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. **The Journal of Alternative and Complementary Medicine**, v. 19, n. 4, p. 319–328, abr. 2013.

JORGE, M. P. et al. Hatha Yoga practice decreases menopause symptoms and improves quality of life: A randomized controlled trial. **Complementary Therapies in Medicine**, v. 26, p. 128–135, jun. 2016.

KOCH, A. K. et al. The effects of yoga and self-esteem on menopausal symptoms and quality of life in breast cancer survivors—A secondary analysis of a randomized controlled trial. **Maturitas**, v. 105, p. 95–99, nov. 2017.

LAVRAS, C. Atenção primária à saúde e a organização de redes regionais de atenção à saúde no Brasil. **Saúde e Sociedade**, v. 20, n. 4, p. 867–874, dez. 2011.

LI, S. et al. A Multicenter, Randomized, Controlled Trial of Electroacupuncture for Perimenopause Women with Mild-Moderate Depression. **BioMed Research International**, v. 2018, p. 1–7, 29 maio 2018.

LOPES, E. D. DE S.; RUAS, G.; PATRIZZI, L. J. Efeitos de exercícios do método Pilates na força muscular respiratória de idosas: um ensaio clínico. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 17, n. 3, p. 517–523, set. 2014.

MAHDAVIPOUR, F. et al. The effects of foot reflexology on depression during menopause: A randomized controlled clinical trial. **Complementary Therapies in Medicine**, v. 47, p. 102195, dez. 2019.

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. DE C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & Contexto - Enfermagem**, v. 17, n. 4, p. 758–764, dez. 2008.

MERCIER, J. et al. Pelvic floor muscle training as a treatment for genitourinary syndrome

of menopause: A single-arm feasibility study. **Maturitas**, v. 125, p. 57–62, jul. 2019.

MUNUKKA, M. et al. Effects of progressive aquatic resistance training on symptoms and quality of life in women with knee osteoarthritis: A secondary analysis. **Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports**, v. 30, n. 6, p. 1064–1072, 19 jun. 2020.

N PEIXOTO, L. et al. Perfil e intensidade de sintomas de mulheres no climatério avaliadas em unidades básicas de saúde de Presidente Prudente. **Colloquium Vitae**, v. 7, n. 1, p. 85–93, 20 abr. 2015.

NAZARPOUR, S. et al. Effects of Sex Education and Kegel Exercises on the Sexual Function of Postmenopausal Women: A Randomized Clinical Trial. **The Journal of Sexual Medicine**, v. 14, n. 7, p. 959–967, jul. 2017.

NAZARPOUR, S. et al. Beneficial effects of pelvic floor muscle exercises on sexual function among postmenopausal women: a randomised clinical trial. **Sexual Health**, v. 15, n. 5, p. 396, 2018.

NOHAMA, P.; SILVÉRIO-LOPES, S. Influência da frequência estimulatória envolvida nos efeitos analgésicos induzidos por eletroacupuntura em cervicalgia tensional. **Brazilian Journal of Physical Therapy**, v. 13, n. 2, p. 152–158, abr. 2009.

PANMAN, C. M. C. R. et al. Effectiveness and cost-effectiveness of pessary treatment compared with pelvic floor muscle training in older women with pelvic organ prolapse: 2-year follow-up of a randomized controlled trial in primary care. **Menopause**, v. 23, n. 12, p. 1307–1318, dez. 2016.

PEREIRA, R. C. A.; RIVERA, F. J. U.; ARTMANN, E. The multidisciplinary work in the family health strategy: a study on ways of teams. **Interface (Botucatu)**, v. 17, n. 45, p. 327–40, 2013.

PIASSAROLLI, V. P. et al. Treinamento dos músculos do assoalho pélvico nas disfunções sexuais femininas. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 32, n. 5, maio 2010.

SANTOS, L. M. et al. Síndrome do climatério e qualidade de vida: uma percepção das mulheres nessa fase da vida. **Revista APS**, v. 10, n. 1, p. 20–26, 2007.

SCHARDT, C. et al. Utilization of the PICO framework to improve searching PubMed for clinical questions. **BMC Medical Informatics and Decision Making**, v. 7, n. 1, p. 16, 15 dez. 2007.

SCHVARTZMAN, R. et al. Physical Therapy Intervention for Women With Dyspareunia: A Randomized Clinical Trial. **Journal of Sex & Marital Therapy**, v. 45, n. 5, p. 378–394, 4 jul. 2019.

SILVA, R. B. et al. Frequência de quedas e associação com parâmetros estabilométricos de equilíbrio em mulheres na pós-menopausa com e sem osteoporose. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 31, n. 10, p. 496–502, out. 2009.

SOUZA, D. D. C. D. et al. Efeitos de um programa de exercícios aquáticos resistidos em

mulheres hipertensas. **Revista Kairós Gerontologia**, v. 16, n. 2, p. 39–49, 2013.

STERNFELD, B. et al. Menopause, Physical Activity, and Body Composition/Fat Distribution in Midlife Women. **Medicine & Science in Sports & Exercise**, v. 37, n. 7, p. 1195–1202, jul. 2005.

STURGEON, M. et al. Effects of Therapeutic Massage on the Quality of Life Among Patients with Breast Cancer During Treatment. **The Journal of Alternative and Complementary Medicine**, v. 15, n. 4, p. 373–380, abr. 2009.

SYDORA, B. C. et al. Patient characteristics, menopause symptoms, and care provided at an interdisciplinary menopause clinic: retrospective chart review. **Menopause**, v. 25, n. 1, p. 102–105, jan. 2018.

TELESI JÚNIOR, E. Práticas integrativas e complementares em saúde, uma nova eficácia para o SUS. **Estudos Avançados**, v. 30, n. 86, p. 99–112, abr. 2016.

UNA-SUS/UFMA. **Abordagem integral e processo de trabalho no cuidado às mulheres no climatério**. São Luis: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, 2017.

WALLER, B. et al. Effects of high intensity resistance aquatic training on body composition and walking speed in women with mild knee osteoarthritis: a 4-month RCT with 12-month follow-up. **Osteoarthritis and Cartilage**, v. 25, n. 8, p. 1238–1246, ago. 2017.

WANG, W. et al. Electroacupuncture for postmenopausal women with stress urinary incontinence: secondary analysis of a randomized controlled trial. **World Journal of Urology**, v. 37, n. 7, p. 1421–1427, 13 jul. 2019.

Capítulo 5

Papel dos agentes comunitários de saúde no enfrentamento da COVID-19 - relato de experiência

Gabriela Dantas Carvalho

Tiago da Rocha Oliveira

Guilherme Barroso Langoni de Freitas

Guilherme Pertinni de Moraes Gouveia

Resumo: A reforma do modelo assistencial em saúde no Brasil, culminou, na década de 1980, na criação do Sistema Único de Saúde (SUS), pautado nos princípios da universalidade, integralidade, equidade. Assim, em 1991, visando a ampliação da atenção à saúde, foi implantado o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), com objetivo de integração da saúde à comunidade. O trabalho desenvolvido pelo profissional ACS é regido pela Portaria nº 2.436 visando regulamentar antecipadamente o maior número de situações presentes no dia a dia da realização do trabalho. No contexto da pandemia o ACS destaca-se como fundamental na atenção básica, difundindo informações adequadas e apoiando a identificação e a vigilância ativa, para o cuidado das pessoas e grupos de risco no seu território. Objetivo: Realizar um relato de experiência acerca do trabalho desenvolvido pelos ACS em um ano de pandemia pelo COVID-19. Resultados: A ESF trabalha no formato de dedicação integral à saúde da comunidade, consolidando o vínculo com o usuário, esse vínculo se consolida através das visitas domiciliares. As visitas comumente realizadas dentro da casa dos moradores, passaram a ser realizadas com o distanciamento, onde os ACS permaneciam do lado de fora, conduzindo a triagem da população afetada. Outro ponto importante levantado foi quanto ao risco de contaminação que estes profissionais são submetidos diariamente ao transitar entre território e unidade de saúde. De acordo com a ACS, após um ano de pandemia pelo COVID-19, ainda se deparam com o grande desafio de conscientizar da população do risco de infecção, visto que a atuação dessa categoria já era considerada essencial no trabalho de educação em saúde nos domicílios, a pandemia consolida e efetiva essa atuação. O ACS se comporta diante da comunidade como um líder local, e deve ser exemplo diante do comportamento social. Conclusão: Fica claro a importância do ACS no desenvolvimento das atividades da AB, e que este tem sido fundamental no processo de educação da população com acolhimento, orientações e esclarecimentos.

Palavras-chave: Agente Comunitário de Saúde, Pandemia, SUS.

1 INTRODUÇÃO

A reforma do modelo assistencial em saúde no Brasil, culminou, na década de 1980, na criação do Sistema Único de Saúde (SUS), pautado nos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização e participação social (FRAGA, 2011). Com a criação do SUS, o modelo centrado na assistência médica, que considera o hospital como seu lugar principal de ação, não apresentava mais perspectivas de atendimento às demandas de saúde da população (BRASIL, 2000).

O fortalecimento da Atenção Básica (AB) à saúde passa a ter lugar de destaque entre os programas e investimentos do Ministério da Saúde (MS), onde em 1991, visando a ampliação da atenção à saúde, foi implantado o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), seguido da criação do Programa de Saúde da Família (PSF) em 1994, passando a ser considerado como Estratégia de Saúde da Família (ESF) em 1997 (BORNSTEIN; DAVID; ARAÚJO, 2010).

A AB é desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, sob a forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações (BRASIL, 2011). A AB, na proposta da ESF, age por meio de uma equipe multiprofissional, responsável por uma determinada população que varia de 2.400 a 4.500 pessoas e é formada por, no mínimo, um médico generalista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 4 a 6 agentes comunitários de saúde (ACSs) (BRASIL, 2002, 2009). Esta proposta, enfoca na família como unidade de ação programática de saúde, e não somente o indivíduo, sendo introduzida a noção de área de cobertura a ser contabilizada por família.

Essa integração da saúde à comunidade é desenvolvida pelos ACS. O trabalho desenvolvido por estes profissionais é regido pela Portaria nº 2.436 visando regulamentar antecipadamente o maior número de situações presentes no dia a dia da realização do trabalho (BALLARD et al., 2020). Cada ACS deve visitar pelo menos uma vez por mês cada uma das famílias cadastradas no território que compreende a microárea sob sua responsabilidade (DE BARROS et al., 2010; MACIEL et al., 2020).

No entanto esta prática tem sofrido a modificação desde março de 2020, com o alastramento da infecção dado pela COVID-19, necessitando sofrer adaptações para a manutenção da assistência à população sem expor os profissionais aos riscos de contaminação. A reorientação do processo de trabalho do ACS em apoio às equipes de saúde ocorreu de modo a cumprir as premissas da AB (BRASIL, 2020a).

Considerando o papel de destaque dos ACSs, enquanto profissionais integrantes das ESF, no que compete à promoção, prevenção e controle de agravos, nesse momento de pandemia, suas atuações são fundamentais. Elas auxiliam, por exemplo, na contenção da transmissão do vírus, difundindo informações adequadas e apoiando a identificação e a vigilância ativa, para o cuidado das pessoas e grupos de risco no seu território.

Este trabalho objetiva, por meio de um relato de experiência descrever o trabalho desenvolvido pelos ACS em um ano de pandemia, como forma de caracterizar o papel destes profissionais na AB, bem como os desafios e riscos apresentados.

2 METODOLOGIA

Esta pesquisa consistiu em um relato de experiência realizado entre janeiro a março de 2021, com descrição dos aspectos vivenciados por uma ACS atuante na comunidade de Oiticicas, Distrito do município de Viçosa do Ceará, na qual tem prestado

serviço à comunidade durante a pandemia. Trata-se de um olhar qualitativo, com abordagem da problemática desenhada a partir de métodos descritivos e observacionais.

A presente pesquisa encontra-se de acordo com as diretrizes para pesquisa envolvendo humanos preconizadas pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde 466/12. A participação da entrevistada se deu por meio da assinatura do termo de consentimento livre esclarecido (TCLE), sendo a mesma esclarecida quanto a finalidade do estudo e lhe assegurando o direito à privacidade, confidencialidade e de retirar seu consentimento sem que lhe ocasionasse algum prejuízo.

A ACS entrevistada tem 53 anos e 24 anos de atuação como ACS da respectiva localidade, prestando atendimento por meio de visitas domiciliares, nas quais realiza a triagem dos grupos de riscos para vacinação, identifica população infectada e realiza o encaminhamento dos atendimentos médicos e internação hospitalar.

A coleta dos dados ocorreu por entrevista semiestruturada, composta 9 questões, com tempo médio de 1 hora para resposta. O roteiro da entrevista foi elaborado de acordo com a fundamentação teórica sobre o tema abordado e os objetivos que nortearam a pesquisa, abordando de forma subjetiva os seguintes questionamentos: Quais as dificuldades encontradas no primeiro momento para dar continuidade às visitas domiciliares? Como foi o processo de adaptação população e ACS? Foi possível conduzir as demandas da população? Como está sendo a vacinação?

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A AB contempla o acolhimento, a garantia da acessibilidade e a utilização dos serviços de saúde pelos usuários, a cada nova necessidade ou a cada novo episódio de um problema de saúde, considerando os aspectos geográficos, organizacionais, socioculturais e econômicos (BRASIL, 2017). Neste sentido, a ESF trabalha no formato de dedicação integral à saúde da comunidade, consolidando o vínculo com o usuário, conhecendo sua residência, os membros de sua família, sua história de vida, saúde e doença (ALONSO; BÉGUIN; DUARTE, 2018).

Quando questionada sobre o desenvolvimento das visitas domiciliares a ACS descreve que estas foram mantidas, em especial, nos momentos de pico de contaminação, quando era necessário realizar a intervenção precoce, principalmente devido ao desconhecimento dos sintomas da doença pela população. No entanto, ela descreve que as visitas comumente realizadas dentro da casa dos moradores, passaram a ser realizadas com o distanciamento, onde os ACS permaneciam do lado de fora, conduzindo a triagem da população afetada. Haines et al. (2020) apontam que as visitas domiciliares são oportunidades chave para diagnóstico situacional das vulnerabilidades, pois permite identificar usuários/famílias em extrema pobreza, insegurança alimentar, assim como grupos vulneráveis.

Um ponto importante a ser investigado é quanto ao risco de contaminação que estes profissionais são submetidos, em especial, no início da pandemia, quando os testes de detecção da contaminação eram limitados e/ou inexistentes. Dentro desta temática, foi percorrido que no primeiro momento do surto a equipe da ESF da referida comunidade foi reunida e orientada quanto aos devidos cuidados a serem tomados nas atividades mantidas junto à população, bem como foi realizado a entrega de kit de material para uso individual, contendo equipamentos de proteção individual (EPIs), dentre eles: óculos e máscara N95, bem como álcool em gel para assepsia.

O MS, por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, publicou em 2020 as “Orientações gerais sobre a atuação do ACS frente à pandemia de Covid-19 e os registros a serem realizados no e-SUS APS”, na qual destaca os cuidados a serem tomados nas visitas domiciliares: Não proceder às atividades dentro domicílio; priorizar visita aos pacientes de risco; manter distanciamento do paciente de no mínimo 1 metro; higienizar as mãos com álcool em gel; nos casos de visita às pessoas com suspeitas de Covid-19, sempre utilizar máscara cirúrgica e garantir uso de EPI apropriado (BRASIL, 2020b).

De acordo com a ACS, após um ano de pandemia pelo COVID-19, ainda se deparam com o grande desafio de conscientizar da população do risco de infecção:

“A população de Oiticicas tem acesso à informação, internet, eles acompanham as notícias de contaminação e morte pelo COVID-19, porém aqui, pelo regime de controle, dado as barreiras sanitárias impostas pela gestão municipal, bem como a própria localização de Oiticicas, facilita o controle da transição viral de meios externos. Por um lado, isso é bom, mas pelo outro, faz com que a população não acredite na gravidade da doença, banalizando a necessidade do uso de máscara”.

Segundo Brasil (2020a), a atuação do ACS já possuía como essencialidade o trabalho educativo visando prevenção de doenças e promoção da saúde às famílias e às comunidades. No atual contexto, foi imprescindível o reforço desta ação como forma de fomentar a comunidade sobre a situação epidemiológica, transmissão viral, sinais e sintomas, orientações quanto ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), distanciamento social, bem como medidas de higienização e uso de máscaras (BRASIL, 2020c).

No entanto, a ACS destaca o desafio de não desassistir a população quanto as demais comorbidades, uma vez que a população local apresenta um alto percentual de gestantes, crianças menores de um ano, bem como hipertensos e diabéticos. Quando questionada como então era feita a logística para assistir à população sem gerar aglomeração a mesma descreve que houve uma organização na UBS local. Foi implantado um cronograma semanal subdividido para cada ACS conduzir aqueles necessitados de consultas, que as demais demandas como a distribuição de medicamentos e afins eram realizados pelos ACS junto às visitas domiciliares. Goldfield et al. (2020) descreveram que apesar do atual cenário epidemiológico, ressalta-se que as epidemias de arboviroses não deixaram de existir, logo é fundamental que os ACS aproveitem as oportunidades supracitadas para orientar sobre medidas de prevenção da dengue, zika e chikungunya, bem como sintomas e busca por atendimento na unidade de saúde.

Segundo a entrevistada o ACS se comporta diante da comunidade como um líder local, e devem ser exemplos diante do comportamento social. Conforme relatado, ter esse papel gera uma maior responsabilidade, principalmente dentro do atual cenário, onde estes, apesar de serem promotores da saúde, também são pessoas e que por vezes temiam em manter suas atividades e acabarem se expondo, mesmo tomando todos os devidos cuidados. Outro fator importante a se destacar, é a obrigatoriedade do ACS residir dentro da microárea ao qual o mesmo atende, essa realidade intensifica a responsabilidade. Conforme relatado, os demais profissionais como médico, enfermeira, técnicos e afins após finalizar sua carga-horária retornam para a cidade, enquanto que os ACS se mantêm localmente, o que dificulta até mesmo o autocuidado.

Ao questionar qual o momento mais desafiador, a ACS relata que o início da pandemia e o momento dos picos dos surtos:

“Lidar com qualquer doença já é um processo desafiador, mas estar como porta de entrada em uma situação desconhecida é desesperador. Conseguir passar segurança a população e saber tomar as decisões de forma apropriada é imprescindível. Neste momento de guerra sanitária todos querem se proteger, quando chegava alguém de fora para se proteger na casa de algum familiar a população ficava enfurecida, ou seja, além de promover os serviços técnicos da profissão, o ACS ainda tem que intervir em demandas que vão além das possibilidades profissionais”.

Em contrapartida aos desafios impostos pela COVID-19, a ACS complementa que o momento de maior alívio foi a chegada da vacina, colocando os profissionais de saúde como grupo prioritário. Segundo a mesma, a partir deste momento o desafio era triplicado: manter as demandas comuns, continuar promovendo a educação sanitária da população e agora realizar a triagem dentro da microárea da população com idades autorizadas à população.

“A vacinação tem sido um novo desafio, há uma divergência entre a população. Existem aqueles que anseiam por serem vacinados logo e não podemos antecipar. A vacinação é um procedimento rigoroso. E existem aqueles, em especial, os idosos que se negam a serem vacinados, uns por medo, outros por terem ouvido/assistido algo sobre a vacina, ou ainda por fatores religiosos”.

A pandemia da COVID-19, nesse aspecto, tem revelado a necessidade de estratégias educacionais que alcancem as crenças pessoais e a visão de mundo amplamente influenciadas por fatores históricos, culturais e sociais, uma vez que estas determinam os comportamentos e as escolhas individuais, as quais podem, neste momento, ser um desafio para os profissionais que estão diretamente envolvidos no enfrentamento da SARSCoV-2 (MACIEL et al., 2020).

4 CONCLUSÃO

Diante do relatado fica claro a importância do ACS no desenvolvimento das atividades da AB, e que este tem sido fundamental no processo de educação da população com acolhimento, orientações e esclarecimentos. No entanto, diante do atual cenário, fica claro a sobrecarga destes profissionais, que mesmo tendo uma carga-horária de trabalho a ser desempenhada, esta se confunde com o convívio social destes com a comunidade, dado a obrigatoriedade de residir na microárea.

Mesmo com a vacina, é importante ressaltar que a mesma não evita transmissão e o aparecimento de efeitos moderados. Além disso, estes profissionais têm estado na linha de frente para combater esta doença infectocontagiosa assim como lidam com tantas outras diariamente. Baseado nisso, destaca-se a reflexão e possíveis estudos sobre processos de capacitação, a forma de supervisão adotada para esse agente, a concepção das equipes, coordenadores e a visão dos usuários sobre o trabalho do ACS.

REFERÊNCIAS

- ALONSO, C. M. DO C.; BÉGUIN, P. D.; DUARTE, F. J. DE C. M. Work of community health agents in the Family Health Strategy: meta-synthesis. **Revista de Saúde Pública**, v. 52, p. 14, 26 fev. 2018.
- BALLARD, M. et al. Prioritising the role of community health workers in the COVID-19 response. **BMJ Global Health**, v. 5, n. 6, p. e002550, 4 jun. 2020.
- BORNSTEIN, V. J.; DAVID, H. M. S. L.; ARAÚJO, J. W. G. DE. Agentes comunitários de saúde: a reconstrução do conceito de risco no nível local. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v. 14, n. 32, p. 93–101, mar. 2010.
- BRASIL. **Guia Prático do Programa de Saúde da Família**. Brasília: Ministério da Saúde, 2000.
- BRASIL. **Lei nº 10.507 de 10 de julho de 2002**. Cria a pro ed. Brasília: Diário Oficial da União, 2002.
- BRASIL. **O Trabalho do Agente Comunitário de Saúde**. Il. (Série ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.
- BRASIL. **Portaria GM de nº 2.488 de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitár**. Brasília: Diário Oficial da União, 2011.
- BRASIL. **Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde**. Brasília: Diário Oficial da União, 2017.
- BRASIL. **Orientações gerais sobre a atuação do ACS frente à pandemia de Covid-19 e os registros a serem realizados no e-SUS APS**. Brasília: Ministério da Saúde, 2020a.
- BRASIL. **Recomendações para Adequação das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde Frente à Atual Situação Epidemiológica Referente ao Covid-19**. Brasília: Ministério da Saúde, 2020b.
- BRASIL. **Orientações para a organização das ações no manejo do novo coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2020c.
- DE BARROS, D. F. et al. O contexto da formação dos agentes comunitários de saúde no Brasil. **Texto & Contexto - Enfermagem**, v. 19, n. 1, p. 78–84, mar. 2010.
- FRAGA, O. . **Agente Comunitário de Saúde: Elo entre a comunidade e a equipe ESF**. [s.l.] Universidade Federal de Minas Gerais, 2011.
- GOLDFIELD, N. I. et al. COVID-19 Crisis Creates Opportunities for Community-Centered Population Health. **Journal of Ambulatory Care Management**, v. 43, n. 3, p. 184–190, jul. 2020.

HAINES, A. et al. National UK programme of community health workers for COVID-19 response. **The Lancet**, v. 395, n. 10231, p. 1173–1175, abr. 2020.

MACIEL, F. B. M. et al. Agente comunitário de saúde: reflexões sobre o processo de trabalho em saúde em tempos de pandemia de Covid-19. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. suppl 2, p. 4185–4195, out. 2020.

Capítulo 6

Os desafios do fisioterapeuta intensivista em meio à pandemia por COVID-19

Rayanne Lima de Araujo

Érika Gracy Diniz Sousa

Laryssa Theodora Galeno de Castro

Tiago da Rocha Oliveira

Resumo: A doença que deu origem a uma pandemia, foi inicialmente identificada como uma pneumonia na cidade de Wuhan, na China em dezembro de 2019, onde se alastrou por todo mundo tirando a vida de centenas de pessoas e recebendo o nome de Covid-19. Os profissionais da área de Saúde têm três vezes mais chances de contrair o vírus do que a população em geral, sendo importante efetivar o cuidado a esses profissionais. Métodos: Trata-se de um relato de experiência, escrito mediante a realidade e a perspectiva de uma fisioterapeuta atuante na linha de frente no combate à covid-19 em um Hospital de referência de Imperatriz - MA. Resultados e Discussão: Apesar do contexto desafiador da pandemia, os fisioterapeutas compulsoriamente se reinventaram num esforço sobre-humano para tentar corresponder a expectativa do que lhes era exigido. A carga horária exaustiva, falta de EPIs e materiais, a vivência constante com as mortes dentro dos hospitais culminam para um desgaste físico, mental e emocional que só tempo dirá o quão reparáveis são. Conclusão: Fica evidente a sobrecarga de trabalho e sobrecarga emocional dos profissionais de saúde, sobretudo fisioterapeutas, cenário este que foi potencializado pela pandemia. É necessário a capacitação contínua dos profissionais intensivistas para melhor abordagem e cuidado ao paciente com COVID-19.

Palavras-chave: COVID-19, Fisioterapia, Saúde do trabalhador.

1 INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2019, a cidade de Wuhan, na China, vivenciou um surto de infecção respiratória de causa até então desconhecida (HEYMANN; SHINDO, 2020). Em janeiro de 2020, pesquisadores identificaram um novo coronavírus (SARS-CoV-2) como agente causador de uma síndrome respiratória aguda grave, denominada doença do coronavírus 2019, ou popularmente COVID-19 (CHENG; SHAN, 2020). Nesse mesmo mês, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, sendo decretado pandemia em 11 de Março de 2020.

As manifestações clínicas da COVID-19 são muito amplas, podendo variar de sintomas simples a graves, sendo o quadro clínico inicial caracterizado como uma síndrome gripal. Pacientes com COVID-19 podem sentir tosse, dispneia, coriza, dores de garganta, febre, entre outros sintomas associados. Há ainda os portadores assintomáticos, os quais também possuem importância epidemiológica, visto que são potenciais transmissores do vírus. A via de transmissão entre humanos é através do contato com secreções de pessoas infectadas, ou gotículas respiratórias em superfícies ou suspensas no ar (CAVALCANTE et al., 2020).

O diagnóstico é feito através da coleta de materiais respiratórios e o estudo radiológico torácico é frequentemente essencial para a avaliação de pacientes com suspeita de COVID-19, podendo ser realizado através da tomografia computadorizada, no qual evidencia opacidades em vidro fosco e áreas de consolidação, às vezes com morfologia arredondada e distribuição periférica (BERNHEIM et al., 2020; LIMA, 2020).

Após o reconhecimento da doença, é necessário isolamento rígido, evitando assim a disseminação do vírus, que possui alta taxa de transmissibilidade, portanto, a OMS instituiu medidas importantes para a prevenção e enfrentamento a serem adotadas, que vão de cuidados individuais à coletivos, tais como uso de máscara e distanciamento social. (OMS, 2020). Como parte primordial no cuidado direto de pacientes com suspeita ou confirmados ao COVID-19, estão os profissionais de saúde.

Entre eles encontram-se os fisioterapeutas intensivistas, que atuam sobretudo no suporte ventilatório. Em vista disso, o fisioterapeuta enquanto membro da equipe multidisciplinar, atua na ressuscitação cardiopulmonar, auxílio à intubação traqueal, e procedimentos que possuem particularidades nos pacientes com COVID-19 (TEIXEIRA et al., 2020).

Como atribuições do fisioterapeuta é imprescindível esse profissional estar atualizado em suporte ventilatório nos pacientes que necessitam de ventilação mecânica, ventilação não-invasiva, oxigenoterapia suplementar, manobras de reexpansão pulmonar e desobstrução brônquica. Além disso, os efeitos da imobilidade no leito sobre todo o organismo devem ser preconizados, como a realização de exercícios durante o período de internação (MATTE et al., 2020).

Para tais ações, são necessárias capacitações para melhor combater à pandemia, sabendo que esse momento exige ações e serviços de saúde com profissionais capacitados visto que, os pacientes graves requerem tecnologias de cuidado de alta complexidade, assim, é necessário atualização constante sobre as práticas clínicas ofertadas ao paciente e práticas de autocuidado dos profissionais (LACAZ et al., 2019).

A exposição dos profissionais de saúde no cuidado direto a paciente e os principais desafios vivenciados pelos profissionais de saúde no enfrentamento da pandemia são a elevada transmissibilidade do vírus, a falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), a sobrecarga de trabalho e os impactos na saúde mental (LACAZ et al., 2019; TEIXEIRA et al., 2020).

A literatura científica aponta que os profissionais da área de Saúde têm três vezes mais chances de contrair o vírus do que a população em geral. Visto que no Brasil, cerca de 3,5 milhões de trabalhadores atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) na linha de frente, percebe-se a exposição e contaminação em massa desses profissionais. Posto isto, em meio ao caos vivenciado em uma pandemia, preservar a vida e saúde dos trabalhadores da linha de frente garantirá a oferta de cuidado integral a saúde da população em geral (GOUMENOU et al., 2020). Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo relatar a experiência de uma fisioterapeuta intensivista atuante na linha de frente no combate à COVID-19.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, desenvolvido mediante a realidade e a perspectiva de uma fisioterapeuta atuante na linha de frente no combate à COVID-19 em Imperatriz - MA. A vivência descrita ocorreu no período de 08 de Abril de 2020 a 18 de Fevereiro de 2021, em um hospital de referência regional do Estado, o qual possuía três UTIs, sendo duas delas com disposição de 10 leitos e a outra com 12, além de três enfermarias com capacidade para 24 pacientes e uma equipe composta por 26 fisioterapeutas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ninguém poderia prever e nem tão pouco se salvaguardar do cenário caótico que perduraria todo o 2020 e até a referida data de 2021 ainda se encontra sem perspectiva de resolução, a pandemia por COVID 19. Previamente o sistema de saúde brasileiro já vivenciava uma conjuntura desfavorável, iniciada com o subfinanciamento causado pela aprovação da Emenda Constitucional n.º 95 aprovada em 2016 que limita as despesas e investimentos públicos no âmbito da saúde (AMORIM; MORGADO, 2016).

Outro fator desencadeante que contribuiu para complicar ainda mais o enfrentamento da pandemia que se instalou, foi a mudança regida pela nova Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) que trouxe consigo a desconfiguração do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) que afetou a diretamente a atuação do profissional de fisioterapia (MOROSINI; FONSECA; LIMA, 2018).

O contexto supracitado culminou com a crise causada pela pandemia, panorama este que abriu viés para o reconhecimento da fisioterapia como peça fundamental no cuidado aos pacientes críticos, em contramão expôs uma realidade já relatada por outros autores: profissionais desqualificados para o manejo em atenção terciária, circunstancia na qual, em sua maioria, se tratavam de profissionais que além da falta de experiência igualmente não dispunham de capacitação e/ou atualização profissional.

Por conseguinte, a crise abrangeu além da falta de recursos humanos, a falta de insumos, o que limitava os desfechos suplantando os esforços máximos das equipes. Circunstância que intensificou a ansiedade e a insegurança que afligiam os profissionais, essencialmente aqueles que atuavam na linha de frente, uma vez que o temor em ser contaminado era constante, somado ao receio de transmitir à família e, portanto, muitos optaram por se isolar do ambiente familiar, o que colaborou ainda mais para a instabilidade emocional, presente continuamente.

Outrossim, as condições precárias se somavam às cargas excessivas de trabalho, indo ao encontro da apreensão e frustração que assolava tanto profissionais quanto familiares e, sobretudo, os pacientes. Com o avançar da pandemia, o que antes era apenas medo, se tornava realidade, e então constantemente presenciávamos situações que demandavam aos profissionais inverter os papéis para se tornar familiares e outras vezes o próprio paciente, nesses momentos os limiares eram esquecidos e as equipes que já se encontravam fragilizadas passavam a se questionar quem seria o próximo.

Diante desse cenário cujas demandas para o setor da saúde são inúmeras, as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) têm sido foco das atenções. Onde os leitos que nelas encontram-se disponíveis, são computados por região e estado em todo o Brasil e diariamente é noticiado a quantidade de leitos crítico ocupados, objetivando deliberar sobre as medidas de controle da pandemia (GARCIA et al., 2021). Ademais por tratar-se de uma patologia desconhecida a necessidade de atualização acerca da temática se fez ainda mais presente, pois a constantemente os documentos oficiais, que norteiam as condutas dos profissionais de fisioterapia, eram modificados e atualizados a medida em que se constatava algo novo a respeito da COVID 19.

A despeito do contexto desafiador da pandemia, os fisioterapeutas compulsoriamente se reinventaram num esforço sobre-humano para tentar (inutilmente) corresponder a expectativa do que lhes era exigido. Paralelamente concorrendo com a desvalorização da profissão, na qual mesmo diante da nova perspectiva de protagonismo necessitou pleitear a implementação do fisioterapeuta em regime de plantão de 24h em UTI, ou quando este era demandado simultaneamente em setores diferentes, nos quais haviam 22 pacientes em cada um, atingindo sua capacidade máxima.

Estes fatores descritos anteriormente como causa do adoecimento psicológico neste público, vão ao encontro do estudo de Silva e colaboradores (2018) que evidenciou uma elevada prevalência de Síndrome de *Burnout* em fisioterapeutas intensivistas atuantes no setor público na cidade de Recife - PE, corroborando com outros estudos que apesar de não identificarem a síndrome, constataam um alto índice de exaustão emocional que reflete o risco em desenvolver a doença (CALDART et al., 2020; NASCIMENTO et al., 2017).

Dentro de um setor de emergência e UTI COVID, o fisioterapeuta intensivista atua em diversas situações, seja no suporte ventilatório em intubação endotraqueal, seja na condução de pronação, ajuste da ventilação mecânica e orientações. O trabalho é contínuo e incessante, o desgaste físico e emocional é mais intenso que em outros setores dentro do hospital. A falta de materiais e equipamentos de proteção individual impactam diretamente na qualidade da assistência, gerando medo e frustrações nos profissionais, o descontentamento é notório.

Ademais, visto as rigorosas medidas que os serviços de saúde adotam para contenção da infecção, o contato direto entre psicólogos e as pessoas que têm COVID-19 costuma ser uma coisa distante da realidade (JIANG et al., 2020). Consequentemente, os profissionais da saúde que trabalham na linha de frente, como fisioterapeutas, enfermeiros e médicos, tornam-se os responsáveis por oferecer apoio psicológico às pessoas que buscam os serviços de saúde ou que estão hospitalizadas (DUAN; ZHU, 2020).

No entanto, os profissionais também sofrem pressões psicológicas, principalmente pelo medo diante da incerteza das condições futuras, tendo em vista a proporção da pandemia em países desenvolvidos e no Brasil que possui menos recursos, onde a calamidade nos serviços de saúde já existe antes do coronavírus. Portanto, é

preciso que os profissionais de saúde sejam atendidos em suas inquietações e desamparos, visto que a regressão da pandemia depende disso (PORTUGAL et al., 2020).

4 CONCLUSÃO

Diante do exposto, fica evidente a sobrecarga de trabalho e emocional dos profissionais de saúde, sobretudo fisioterapeutas, cenário este que foi potencializado pela pandemia. Contudo, esta categoria já se encontrava com desgaste psicológico precedente aos recentes acontecimentos, fato este que alerta para a urgência de implementação de políticas que contemplem a saúde mental desses indivíduos.

Além disso, as intervenções psicológicas devem promover a saúde mental desses profissionais não só durante a pandemia, mas após. Visto que o momento exigirá uma readaptação social e um preparo psicológico para lidar com as perdas e transformações pessoais e profissionais que cada um viveu durante o momento crítico pelo qual cada um passou.

No que diz respeito ao fisioterapeuta e seus desafios no cenário da pandemia, percebe-se a necessidade de contínua capacitação para melhor abordagem ao paciente, mas além disso, reitera-se a carência de profissionais nas unidades de terapia intensiva, causando sobrecarga aos que estão nesse meio. A pandemia contribuiu também para ressignificar as práticas dessa categoria, porém é necessário mais estudos e políticas públicas para melhor suporte a fisioterapeuta intensivista.

REFERÊNCIAS

AMORIM, M. C. S.; MORGADO, F. PEC 241 – O congelamento dos recursos para a saúde dos brasileiros. **Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba**, v. 18, n. 3, p. 177–178, set. 2016.

BERNHEIM, A. et al. Chest CT Findings in Coronavirus Disease-19 (COVID-19): Relationship to Duration of Infection. **Radiology**, v. 295, n. 3, p. 200463, 1 jun. 2020.

CALDART, C. et al. Presença da síndrome de Burnout em fisioterapeutas que atuam em unidades de terapia intensiva adulto. **Cad. Edu Saúde e Fis**, v. 7, n. 13, p. e071407, 2020.

CAVALCANTE, J. R. et al. COVID-19 no Brasil: evolução da epidemia até a semana epidemiológica 20 de 2020. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 29, n. 4, ago. 2020.

CHENG, Z. J.; SHAN, J. 2019 Novel coronavirus: where we are and what we know. **Infection**, v. 48, n. 2, p. 155–163, 18 abr. 2020.

DUAN, L.; ZHU, G. Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic. **The Lancet Psychiatry**, v. 7, n. 4, p. 300–302, abr. 2020.

GARCIA, G. P. A. et al. Utilização de equipamentos de proteção individual para atendimento de pacientes com covid-19: revisão de escopo. **Rev Gaúcha Enfer**, v. 42, n. ESP, p. e20200150, 2021.

GOUMENOU, M. et al. COVID-19 in Northern Italy: An integrative overview of factors

possibly influencing the sharp increase of the outbreak (Review). **Molecular Medicine Reports**, v. 22, n. 1, p. 20–32, 16 abr. 2020.

HEYMANN, D. L.; SHINDO, N. COVID-19: what is next for public health? **The Lancet**, v. 395, n. 10224, p. 542–545, fev. 2020.

JIANG, X. et al. Psychological crisis intervention during the outbreak period of new coronavirus pneumonia from experience in Shanghai. **Psychiatry Research**, v. 286, p. 112903, abr. 2020.

LACAZ, F. A. DE C. et al. Movimento da Reforma Sanitária e Movimento Sindical da Saúde do Trabalhador: um desencontro indesejado. **Saúde em Debate**, v. 43, n. spe8, p. 120–132, 2019.

LIMA, C. M. A. DE O. Information about the new coronavirus disease (COVID-19). **Radiologia Brasileira**, v. 53, n. 2, p. V–VI, abr. 2020.

MATTE, D. L. et al. O fisioterapeuta e sua relação com o novo SARS-CoV-2 e com a COVID-19. **ASSOBRAFIR Ciência**, v. 11, n. Supl1, p. 17, 3 set. 2020.

MOROSINI, M. V. G. C.; FONSECA, A. F.; LIMA, L. D. DE. Política Nacional de Atenção Básica 2017: retrocessos e riscos para o Sistema Único de Saúde. **Saúde em Debate**, v. 42, n. 116, p. 11–24, jan. 2018.

NASCIMENTO, C. P. et al. Síndrome de Burnout em fisioterapeutas intensivistas. **Revista Pesquisa em Fisioterapia**, v. 7, n. 2, p. 188, 29 maio 2017.

OMS. **Rational use of personal protective equipment (PPE) for coronavirus disease (COVID-19): interim guidance [Internet]**. [s.l.] Organização Mundial da Saúde, 2020.

PORTUGAL, J. K. A. et al. Percepção do impacto emocional da equipe de enfermagem diante da pandemia de COVID-19: relato de experiência. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 46, p. e3794, 21 maio 2020.

SILVA, R. A. D. DA et al. Síndrome de Burnout: realidade dos fisioterapeutas intensivistas? **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 25, n. 4, p. 388–394, dez. 2018.

TEIXEIRA, C. F. DE S. et al. A saúde dos profissionais de saúde no enfrentamento da pandemia de Covid-19. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 9, p. 3465–3474, set. 2020.

Autores

Cibelly Aliny Siqueira Lima Freire

Enfermeira pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Especialista em Educação Profissional (FIOCRUZ), Mestre em Enfermagem Clínica- Cirúrgica (UFC), Doutora em Enfermagem (UFC) e Pós-Doutorado em Enfermagem (UFPR).
E-mail: cibellyaliny@gmail.com

Elisson de Sousa Mesquita Silva

Acadêmico de Fisioterapia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba – UFDPPar. Integrante do Grupo de Pesquisa em Fisioterapia Avaliativa e Terapêuticas – GPFAT.
E-mail: elissonmesquita01@gmail.com

Elivelton Sousa Montelo

Acadêmico de Fisioterapia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba – UFDPPar. Integrante do Grupo de Pesquisa em Fisioterapia Avaliativa e Terapêuticas – GPFAT.
E-mail: elivelton.s.m@hotmail.com

Érika Gracy Diniz Sousa

Fisioterapeuta pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Pós- graduada em Fisioterapia em Terapia Intensiva Adulto, Pediátrico e Neonatal pela faculdade INSPIRAR. Especialista em Saúde da Família e Comunidade pela UFPI em caráter de Residência.
E-mail: erikagracy@gmail.com

Felipe Andrade de Oliveira

Acadêmico de Fisioterapia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba – UFDPPar. Integrante do Grupo de Pesquisa em Fisioterapia Avaliativa e Terapêuticas – GPFAT.
E-mail: feandoli@outlook.com

Gabriela Dantas Carvalho

Fisioterapeuta pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Especialista em Gestão Hospitalar. Mestre em Farmacologia (UFPI). Doutora em Biotecnologia (UFPI).
E-mail: ftgabrieladantas@hotmail.com

Guilherme Barroso Langoni de Freitas

Farmacêutico pela Universidade Severino Sombra. Mestre em Química – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor em Medicina Interna – Universidade Federal do Paraná.

E-mail: guilhermearroso@ufpi.edu.br

Guilherme Pertinni de Moraes Gouveia

Fisioterapeuta pela Universidade de Fortaleza (2006). Pós-graduado em Fisioterapia Cardiovascular e Pneumofuncional (UNIFOR - 2007), Saúde da Mulher (COFFITO - 2018) e Pesquisa Clínica (PROADISUS / Hospital Oswaldo Cruz - 2019). Mestre em Saúde Pública – UFC. Doutor em Ciências Medico-cirúrgicas – UFC. Docente da Universidade Federal do Delta do Parnaíba – UFDPAr e Coordenador do Grupo de Pesquisa em Fisioterapia Avaliativa e Terapêuticas – GPFAT.

E-mail: gpfatufpi@gmail.com

Lara Ferreira Sousa Carvalho

Fisioterapeuta pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Especialista em Fisioterapia Dermato-Funcional. Integrante do Grupo de Pesquisa em Fisioterapia Avaliativa e Terapêuticas – GPFAT.

E-mail: laracarvalhofg@gmail.com

Laryssa Theodora de Castro Galeno

Fisioterapeuta pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Residente em Urgência e Emergência – Centro Universitário Inta – UNINTA. Pós-graduada em fisioterapia hospitalar pela Faculdade INSPIRAR.

E-mail: laryssatheodora@hotmail.com

Maria Adelane Monteiro da Silva

Enfermeira pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Especialista em Enfermagem Obstétrica Educação Profissional (FIOCRUZ), Mestre em Enfermagem Clínica-Cirúrgica (UFC), Mestrado e Doutorado (UFC), Pós-doutorado (UFC).

E-mail: adelanemonteiro@hotmail.com

Maria Gabriela Cardoso Teles Monteiro

Fisioterapeuta pela Universidade Federal do Piauí – UFPI, Mestre em Ciências Biomédicas – UFPI, Pós Graduada em Saúde da Mulher – UNINOVAFAPI, Pós Graduada em Saúde da Família e Comunidade – UFPI.

E-mail: gabitelesmonteiro@hotmail.com

Paulo Roberto Santos

Médico pela Universidade Federal Fluminense, Especialista em Nefrologia (HSE), Especialista em Administração Hospitalar e Gestão da Qualidade (UECE), Mestre em Clínica médica (UFC), Doutor em Ciências Médicas (UFC).

E-mail: prsantos@fortalnet.com.br

Rayanne Lima de Araujo

Fisioterapeuta pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Especialista em caráter de Residência em Urgência e Emergência – Centro Universitário Inta – UNINTA. Pós-graduada em Fisioterapia Geriátrica e Gerontológica – FAVENI.

E-mail: rayanneujo@gmail.com

Tiago da Rocha Oliveira

Fisioterapeuta pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Especialista em caráter de Residência em Saúde da Família pela Escola de Saúde Pública Visconde Sabóia (ESPVS). Residente em Urgência e Emergência – Centro Universitário INTA – UNINTA.

E-mail: tiagofisio18@gmail.com

Yaranara Linhares Aragão

Fisioterapeuta pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada (2012), Mestranda em Saúde da Família (UFC), Especialista em Saúde Integral do Adolescente (2011) e Terapia Intensiva (2015). Fisioterapeuta SEST SENAT Sobral- Ceará.

E-mail: yaranaralinhaires@hotmail.com

ÍNDICE REMISSIVO

A

Ácido fólico, 22, 23
Atenção Básica, 53, 62, 66, 68, 73, 78, 81
Avaliação familiar, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14

B

Biofotomodulação, 35, 48

C

Cálcio, 23, 27
Climatério, 5, 7, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 64, 65
Cobre, 23, 24, 32, 33
Covid-19, 6, 70, 73, 74, 75, 81
Criança, 4

D

Desgaste psicológico, 80
Disfunção erétil, 35, 42, 48
Disfunção sexual, 36, 37, 41
Doença de Peyronie, 41, 42, 46
Doença renal crônica, 8, 12, 15, 30
Doenças crônicas, 8, 12, 14

E

Educação em saúde, 5, 54, 61, 66
Ejaculação precoce, 35
Eletroneuroestimulação, 35, 42, 44, 48
Envelhecimento, 8, 12, 13, 29
Equipamentos de proteção individual, 70, 78, 79, 81
Estratégia de Saúde da Família, 68
Exercícios, 35, 40, 44, 45, 46, 48, 51, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 77

F

Ferro, 20, 27, 28, 33
Fisioterapeuta intensivista, 7, 75, 78, 79, 80
Fisioterapia, 4
Fisioterapia aquática, 56
Fisioterapia Pélvica, 34

G

Genograma, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16

I

Instrumentos de avaliação familiar, 13
Integralidade, 53, 54, 66, 68

M

Magnésio, 23, 29, 30
Manganês, 24, 26, 29, 30
Massagem terapêutica, 51, 56
Modalidades de fisioterapia, 51, 52, 55

O

Ondas de choque, 39, 42, 44, 48

P

Pandemia, 6, 7, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81
Pilates, 51, 56, 58, 61, 63
Potássio, 24, 26, 27, 30, 32
Práticas integrativas e complementares, 51, 60, 61, 62
Processo saúde-doença, 5, 8, 11, 15, 60
Pronação, 79

Q

Qualidade de vida, 10, 11, 14, 16, 39, 44, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64

R

Radicais livres, 5, 17, 18, 24, 32
Riscos de contaminação, 68

S

Silício, 28, 29, 30
Sistema antioxidante, 18
Sobrecarga, 14, 71, 75, 78, 80
Sobrecarga de trabalho, 75, 78, 80
Sódio, 24, 26, 27, 32
Suporte ventilatório, 77, 79

T

Terapia Ortomolecular, 5, 17, 18

Treinamento muscular do assoalho pélvico, 51, 56, 59

Treino do assoalho pélvico, 35

U

Ultrassom, 35, 42, 46, 47, 48

V

Vacuoterapia, 35, 48

Visitas domiciliares, 8, 66, 69, 70

Vitamina, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 31, 32, 33

Z

Zinco, 23, 24, 27, 28