11
volume

Editora Poisson

Editora Poisson

Ciência e Tecnologia dos Alimentos

Volume 11

1ª Edição

Belo Horizonte
Poisson
2021

Editor Chefe: Dr. Darly Fernando Andrade

Conselho Editorial

Dr. Antônio Artur de Souza – Universidade Federal de Minas Gerais

Msc. Davilson Eduardo Andrade

Dra. Elizângela de Jesus Oliveira – Universidade Federal do Amazonas

Msc. Fabiane dos Santos

Dr. José Eduardo Ferreira Lopes – Universidade Federal de Uberlândia

Dr. Otaviano Francisco Neves – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Dr. Luiz Cláudio de Lima – Universidade FUMEC

Dr. Nelson Ferreira Filho – Faculdades Kennedy

Msc. Valdiney Alves de Oliveira – Universidade Federal de Uberlândia

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

C569

Ciência e Tecnologia dos Alimentos–Volume 11/ Organização Editora
Poisson – Belo Horizonte - MG: Poisson - 2021

Formato: PDF

ISBN: 978-65-5866-097-2

DOI: 10.36229/978-65-5866-097-2

Modo de acesso: World Wide Web

Inclui bibliografia

1. Tecnologia de Alimentos 2. Alimentos 3. Nutrição I. Título

CDD-664.005

Sônia Márcia Soares de Moura – CRB 6/1896

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

www.poisson.com.br

contato@poisson.com.br

SUMÁRIO

Capítulo 1: Análise de redução do teor de sódio em pão de forma	06
Mayara de Lara Santos, Carolina Schneider, Crislayne Teodoro Vasques, Maiara Pereira Mendes, Denise de Moraes Batista da Silva, Antônio Roberto Giriboni Monteiro	
DOI: 10.36229/978-65-5866-097-2.CAP.01	
Capítulo 2: Desenvolvimento de pães de forma a partir da substituição parcial da farinha de trigo por farinha de banana verde	09
Genilson de Paiva, Luiz Fernando Dias Ferreira, Mônica Ribeiro Pirozi, Bruna Magnago Bernabé, Milena Bratz Bickel, Alciro Lamão Lazzarini	
DOI: 10.36229/978-65-5866-097-2.CAP.02	
Capítulo 3: Pão sem glúten elaborado com farinha de arroz e adicionado de zeína ..	12
Raíssa Ingrid Santana Araujo Costa, Jideane Menezes Santos, Glenda Barros Matos, Paula Taís Maia Santos, Thaís Sader de Melo, Patrícia Beltrão Lessa Constant	
DOI: 10.36229/978-65-5866-097-2.CAP.03	
Capítulo 4: Efeito do processamento sobre a composição de minerais em farinha de banana verde.....	16
Genilson de Paiva, Mônica Ribeiro Pirozi, Edimar Aparecida Filomeno Fontes, Luiz Fernando Dias Ferreira, Bruna Magnago Bernabé, Érica Nascif Rufino Vieira	
DOI: 10.36229/978-65-5866-097-2.CAP.04	
Capítulo 5: Curvas de secagem e coeficiente de difusão de banana (<i>Musa paradisíaca</i> L.)	22
Luciana Alves da Silva, Carla Rosalyn Baca Arévalo, Aroldo Arévalo Pinedo, Carlos Alberto Baca Maldonado, William Renzo Cortez-Vega, Sandriane Pizato, Rosalinda Arévalo Pinedo	
DOI: 10.36229/978-65-5866-097-2.CAP.05	
Capítulo 6: Farinha da casca de maracujá (<i>Passiflora edulis f. flavicarpa</i>): Obtenção e caracterização da composição físico-química	30
Ingrid Rodrigues Martins, Isabelly Silva Amorim, Eduardo Saymon Santos da Silva, Danyelly Silva Amorim, Jamille de Sousa Monteiro, Kássia Rodrigues da Costa Sena, Francisca Mariane Martins Araújo, Maria Regina Sarkis Peixoto Joele	
DOI: 10.36229/978-65-5866-097-2.CAP.06	
Capítulo 7: Bolinho de arroz com ora-pro-nóbis: Análise química e sensorial	39
Amanda de Ávila Silveira, Carla Regina Amorim dos Anjos Queiroz, Claudia Maria Tomás Melo, Deborah Santesso Bonnas	
DOI: 10.36229/978-65-5866-097-2.CAP.07	
Capítulo 8: Avaliação descritiva de chocolates com redução de açúcares	46
Viviane de Paula Acosta Iglesia	
DOI: 10.36229/978-65-5866-097-2.CAP.08	

SUMÁRIO

Capítulo 9: Influência dos níveis de concentração de bacon na reologia da maionese 52

Hugo Dias Figueira, William Soares da Silva, Pablo Luan de Jesus Dantas, Tailane Vieira Costa
DOI: 10.36229/978-65-5866-097-2.CAP.09

Capítulo 10: Enriquecimento de néctar de guabiroba (*Campomanesia Xanthocarpa Berg*) com soro do leite: Efeito nas características físicas, químicas e sensoriais 56

Anne Herenize Lemos, Simone Segunda, Rubia Viana Batista, Luciano Tormen, Cátia Tavares dos Passos Francisco, Larissa Canhadas Bertan
DOI: 10.36229/978-65-5866-097-2.CAP.10

Capítulo 11: Qualidade dos alimentos comercializados nas feiras de Francisco Beltrão-PR..... 66

Andréa Cátia Leal Badaró, Vaneza Paula Poplawski Carneiro, Bianca de Lima, Marciana da Silva Gonçalves
DOI: 10.36229/978-65-5866-097-2.CAP.11

Capítulo 12: Pigmentos cloroplásticos, fenóis totais e potencial antioxidante da azeitona (cv. 'Arbequina') cultivada na Região da Campanha do Rio Grande do Sul..... 72

Bruna da Fonseca Antunes, Erick Soares Fernandes Oliveira, Wellington Freitas Gonçalves, Fernanda Germano Alves Gautério, Miriane Lucas Azevedo
DOI: 10.36229/978-65-5866-097-2.CAP.12

Capítulo 13: Modelagem e simulação de evaporadores utilizando *software livre Scilab* 77

Mariana Ferreira Silva, Jamille Coelho Coimbra, Márcia Cristina Teixeira Ribeiro Vidigal
DOI: 10.36229/978-65-5866-097-2.CAP.13

Capítulo 14: Agrotóxicos em erva-mate: Uma abordagem quanto aos fungicidas ditiocarbamatos 83

Ingrid Duarte dos Santos, Rosselei Caiel da Silva, Ionara Regina Pizzutti, Roger Wagner, Julia Paula Neu, Robson Dias Wouters, Marlos Eduardo Zorzella Fontana
DOI: 10.36229/978-65-5866-097-2.CAP.14

Autores:..... 94

Capítulo 1

Análise de redução do teor de sódio em pão de forma

Mayara de Lara Santos

Carolina Schneider

Crislayne Teodoro Vasques

Maiara Pereira Mendes

Denise de Moraes Batista da Silva

Antônio Roberto Giriboni Monteiro

Resumo: O elevado consumo de sal (cloreto de sódio) é uma das maiores preocupações das autoridades de saúde pública em todo o mundo. Existem fortes evidências científicas que uma dieta rica em sódio é responsável pelo aumento de vários problemas de saúde. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar se a indústria está seguindo as estratégias de redução de sódio na produção do pão de forma e comparar os resultados com as metas para 2020 de redução de sódio acordada entre o governo brasileiro e representantes das indústrias de alimentos. Para isso, as amostras foram adquiridas no comércio local Maringá/PR, sendo quatro marcas distintas de pão de forma, as quais a escolha se deu pela alta frequência de consumo diário e por possuir grande procura e aceitação por parte dos consumidores brasileiros. As amostras foram trituradas separadamente e agrupadas por marca e identificados por MP1, MP2, MP3 E MP4. Foram realizadas análises de teor de sódio nas 4 marcas de pão forma. Todas as amostras analisadas apresentaram diferenças significativas entre si. Os resultados encontrados nas amostras MP1 e MP4 constatarem-se fragilidades no monitoramento do teor de sódio em alimentos industrializados no Brasil, que poderão comprometer a efetividade dessa estratégia na saúde.

Palavras-chave: Monitoramento, alimentos industrializados, recomendação, redução.

1. INTRODUÇÃO

Globalmente, a ingestão média diária de sal é muito superior ao nível recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a média atual de consumo por pessoa é de 9-12g por dia. O limite considerado pela OMS não passa de 5g por pessoa, ou seja, está sendo consumido mais que o dobro da recomendação máxima (OMS, 2012). No entanto, o consumo excessivo de sódio tem sido associado a efeitos negativos para a saúde, é um dos principais contribuintes para hipertensão e doenças cardiovasculares (HENDRIKSEN, *et al.*, 2014; KLOSS, *et al.*, 2015).

A redução do teor de sal nos alimentos, é um grande desafio do ponto de vista tecnológico e sensorial, uma vez que resulta não apenas em redução do gosto salgado e na aceitabilidade, mas também pode impactar nas funções que este ingrediente desempenha na produção e conservação de muitos alimentos. (ANTÚNEZ, *et al.*, 2016; SILOW, *et al.*, 2016; ZANDSTRA *et al.*, 2016). O pão é um alimento largamente consumido no Brasil. Todavia, o alto teor de sal presente no pão tem sido alvo de preocupação.

Em 2011, o Ministério da Saúde firmou acordo com grandes associações nacionais alimentícias com o objetivo de reduzir o teor de cloreto de sódio nos alimentos, com a finalidade de estabelecer metas nacionais para reduzir o teor de sódio nos alimentos processados (ANVISA, 2015; Moura *et al.*, 2008).

O objetivo do presente trabalho foi avaliar se a indústria está seguindo as estratégias de redução de sódio na produção do pão de forma. Para isso foram analisadas cinco marcas presentes no mercado e bastante consumidas pela população em geral. E verificar se o teor de sódio está dentro da meta estabelecida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária/ANVISA para 2020.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para as análises, foram coletadas quatro marcas distintas de pão de forma, as quais a escolha se deu pela alta frequência de consumo diário e por possuir grande procura e aceitação por parte dos consumidores brasileiros. As amostras foram adquiridas em supermercado do município de Maringá/PR. As amostras foram trituradas separadamente e agrupadas por marca e identificados por MP1, MP2, MP3 E MP4.

O teor de sódio nos pães de forma foram analisados nas diferentes marcas pelo método de espectrofotômetro de absorção atômica Varian®, modelo SpectrAA-50B (AOAC, 1966). Este método apresenta ampla faixa de detecção, alta seletividade, precisão e exatidão, além de excelente sensibilidade e reprodutibilidade dos resultados. Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), no qual foi aplicado o teste de Tukey, para comparar as médias, ao nível de 5% de significância conforme software de Assistência Estatística – Assistat, versão 7.7 pt. Atual. 01/03/2017

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todas as marcas de pães de forma analisadas apresentaram diferença significativas conforme descrito na Tabela 01. As amostras MP3 e MP2 apresentaram teor de sódio de 322,65mg/100g e a MP2 252,97 mg/100g, respectivamente, sendo que ambas estão abaixo do limite de referência estabelecida pelo ministério da saúde afirmado pelo termo de compromisso 035/2011 de 13 de dezembro de 2011que estabelece as metas nacionais para a redução do teor de sódio em alimentos processados, como pão de forma, devem alcançar um teor máximo de 400mg /100g de sódio, meta 2020. Essas metas para redução do teor de sódio foram estabelecidas de forma gradativas ao longo dos anos.

O estudo de Antúñez, *et al.*, (2016) propõe uma redução gradativa de sal em pão, os resultados obtidos sugerem que o teor de sal no pão pode ser reduzido em até 10% sem afetar sensorialmente a percepção do consumidor, estas reduções devem ser implementadas em um adequado e longo tempo. Uma vez que, as reduções muito drásticas em um curto espaço de tempo, geralmente resultam em um alto risco de migração dos consumidores para produtos mais ricos em sal.

Tabela 1 – Teor de Sódio em pão de forma.

Marcas	Na(mg/100)
MP1	409,44 ^b ±0,73
MP2	252,97 ^d ±0,58
MP3	322,65 ^c ±0,66
MP4	418,80 ^a ±0,44

* Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa ($p \leq 0,05$) pelo teste de Tukey.

Em relação aos termos de compromisso 035/2011, através dos resultados pode-se observar que a meta estabelecida para 2020, não vem sendo cumprida conforme acordado pois ainda consta produtos no mercado acima da meta estabelecida para 2020, conforme desmostrado na MP1 e MP4. Isso ocorre devido à ausência de monitoramento do teor de sódio em alimentos industrializados no Brasil como a falta da periodicidade das análises.

4. CONCLUSÃO

Diante dos resultados destacam a importância das ações que foram desenvolvidas pelo governo em conjunto com as associações das indústrias para a redução do teor de sódio nos alimentos processados. Mas é necessário que o papel da Agência Nacional da Vigilância Sanitária/ANVISA, seja fortalecido e apoiado, para que o monitoramento do teor de sódio nos alimentos processados no Brasil seja colocado de fato como estratégia de prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis DCNTs. Caso contrário, essas fragilidades poderão comprometer a eficácia desta estratégia regulatória na prevenção e controle de DCNTs no Brasil.

REFERÊNCIAS

- [1] ANTÚNEZ, L.; GIMÉNEZ, A.; ARES, G. A consumer-based approach to salt reduction: Case study with bread. *Food Research International*, v. 90, p. 66-72, 2016.
- [2] Association of Official Analytical Chemists. *Official Methods of Analysis*. Arlington, AOAC, 1984. Arlington, AOAC, 1966.
- [3] BRASIL- Informe técnico N. 035/2011 termo de compromisso entre o Ministério da Saúde e as entidades representantes do setor produtivo 2011.
- [4] BRASIL- Informe técnico n. 69/2015- teor de sódio nos alimentos processados). Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/388729/Informe+T%C3%A9cnico+n%C2%BA+69+de+2015/85d1d8f0-5761-4195-9aee-e992abd29b3e>. Acesso em: 15/05/2020
- [5] BRASIL. Resolução RDC nº 54, de 12 de novembro de 2012. Regulamento Técnico sobre Informação Nutricional Complementar. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0054_12_11_2012.html> Acesso em: 26 de agosto. 2020.
- [6] FERREIRA, D. F. Sisvar: a Guide for its Bootstrap procedures in multiple comparisons. *Ciência e Agrotecnologia*, v. 38, n.2, p. 109-112, 2014.
- [7] HENDRIKSEN, M. A. H.; HOOGENVEEN, R. T. HOEKSTRA, J.; GELEIJNSE, J.M.; BOSHUIZEN, H. C.; RAAIJ, J. M. A. Potential effect of salt reduction in processed foods on health. *The American Journal of Clinical Nutrition*, v.99, p. 446-453, 2014.
- [8] KLOSS, L. MEYER, J. D.; GRAEVE, L.; VETTER, W. Sodium intake and its reduction by food reformulation in the European Union — A review. *NFS Journal*, v 1, p 9-19, 2015.
- [9] MOURA, S. A.; BEZERRA, P. R. A.; PETER-SON, K. E.; SICHIERI, R. Dietary sources of sodium in-take in Brazil in 2008-2009. *J Acad Nutr Diet*, v. 113, p.1359-65, 2008.
- [10] SILOW, C.; AXEL, C.; ZANNINI, E.; ARENDT, E. K. Current status of salt reduction in bread and bakery products – A review, *Journal of Cereal Science*, v 72, p 135-145, 2016.
- [11] WHO: Guideline: Sodium intake for adults and children. World Health Organization (WHO), Geneva, 2012.
- [12] ZANDSTRA, E. H.; LION, R.; NEWSON, R. S. Salt reduction: Moving from consumer awareness to action. *Food Quality and Preference*, v. 48, p. 376-381, 2016.

Capítulo 2

Desenvolvimento de pães de forma a partir da substituição parcial da farinha de trigo por farinha de banana verde

Genilson de Paiva

Luiz Fernando Dias Ferreira

Mônica Ribeiro Pirozi

Bruna Magnago Bernabé

Milena Bratz Bickel

Alcio Lamão Lazzarini

Resumo: A polpa da banana verde é fonte de amido resistente e seu emprego para produção de farinha resulta em um ingrediente para produtos de panificação, agregando saudabilidade. Desta forma, buscou-se a produção de farinha de banana verde por método tradicional (FBV_T) e farinha de banana verde modificada (FBV_M) na produção de pães de forma, com substituição parcial da farinha de trigo. Estes foram processados segundo formulação padrão modificada (0%, 15%, 30% e 45% de FBV_T e FBV_M, respectivamente). Após assamento estes foram avaliados quanto à perda de massa, volume específico, densidade e firmeza. Ambas formulações a 15% foram equivalentes ao padrão, enquanto a 45% apresentou elevada firmeza do miolo, reduzido volume específico e elevada densidade. As formulações com até 30% de FBV_T e 45% de FBV_M resultaram em alterações das propriedades físicas dos pães, contudo devem ser avaliadas quanto à aceitação sensorial.

Palavras-chave: *Musa spp*, panificação, amido resistente, novos produto, firmeza.

1. INTRODUÇÃO

A industrialização da banana verde é uma importante alternativa para redução de perdas, antes de se tornar perecível (FAO, 2018). Um exemplo é a farinha de banana verde (FBV) para uso como ingrediente na panificação e confeitaria, como pães, biscoitos e bolos.

A FBV possui efeitos benéficos à saúde, devido ao teor de amido resistente (AR) (58,43 % m.m⁻¹, em b. s.) (PAIVA, 2018). Este não é digerido pelas amilases pancreáticas no intestino delgado e possui propriedades semelhantes às fibras solúveis, é fermentado total ou parcialmente pelas bactérias do cólon, com benefícios para a microbiota intestinal (ENGLYST et al., 1992).

O emprego de farinha mista de trigo e FBV para formulação de pães, com substituição até 30% tem sido avaliado com impacto negativo em relação à cor mais escura e ao menor volume, porém com aceitação sensorial satisfatória e aumento de AR e fenólicos (ORMENSESE, 2010).

Contudo, são escassos as bibliografias relativas ao emprego de farinha de banana verde pré-gelatinizada para produtos de panificação. Esta pesquisa avaliou o impacto da substituição parcial de farinha de trigo (15%, 30% e 45%) por farinha de banana verde (FBV_T e FBV_M) sobre as propriedades físicas (densidade, volume específico e firmeza) em pão de forma.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A FBV tradicional (FBV_T) foi obtida com adaptações de Ormenese (2010), usando bananas, sub-grupo “Prata”, cultivar Vitória, colhidas verdes (estágio 01) e acondicionadas a 4°C até o processamento (PAIVA, 2018). Ao passo que, a FBV modificada (FBV_M) foi obtida por meio de pré-gelatinização do amido (Paiva, 2018), que baseia-se no cozimento das bananas verdes (121°C e 1,5 kgf.s⁻¹, por 30 min.) e estocagem a 4°C por 24 h, antes do descasque, corte e secagem.

Avaliou-se o efeito da substituição parcial de farinha de trigo, a 15%, 30% e 45%, por FBV_T e FBV_M, em relação a um controle (0% FBV). Os pães foram processados pelo método da AACC 10-10 (2000) e formulação padrão da AACC 10-90 (2000).

Após resfriamento por 6,0 horas, foram avaliados (AACC, 2000) em relação perda de massa (% m.m⁻¹), volume específico (cm³.g⁻¹) e densidade [g.(cm³)⁻¹]. A firmeza (N) foi determinada em texturômetro TA XT Express (ORMENSESE, 2010).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A perda de massa durante o forneamento mostra como os ingredientes afetam a capacidade de retenção de água, interferindo diretamente na qualidade final. Na Figura 1-A nota-se que a formulação 15% e 30% de FBV_T, obtiveram uma menor perda de água, contudo não houve diferença entre FBV_M e farinha de trigo, independente do nível de substituição.

Figura 1. Perda de massa (A), densidade (B), volume específico (C) e firmeza (D) do miolo de pães forma, com substituição parcial de farinha de trigo por farinha de banana verde (FBV)

Estas alterações se devem à presença de amido granular na FBV_T e amido retrogradado na FBV_M, que podem modificar a proporção de água livre disponível, para evaporação durante o cozimento da massa de pães (PAIVA, 2018). O aumento de fibras na massa de pães aumenta a firmeza do miolo, altera cor e o sabor, aumenta a absorção de água e reduz tolerância à fermentação.

O aumento de FBV na formulação impactou negativamente sobre o volume específico e a densidade no miolo do pão, como mostram as Figuras 1B e 1C. Consequentemente resultando um miolo com textura mais densa, ao passo que observou-se maior intensidade para FBV_T.

O volume específico e a densidade mostram a relação entre o teor de sólidos e a fração de ar existente no miolo. Massas com valores de densidade alta e/ou volume específico baixo, podem apresentar aspecto desagradável ao consumidor, que está associado ao alto teor de umidade, que dificulta mastigação e reduz a conservação.

A análise de firmeza (Figura 1-D) mostrou que a substituição ao nível de 15% por FBV não afeta a firmeza do miolo do pão, mas a 30% ocorre aumento cerca de três vezes e a 45% tem-se um aumento cerca de cinco vezes, especificamente na FBV_M.

Na Figura 2 são mostradas as imagens de fatias transversais de pães, indicando diferenças marcantes entre os produtos como a coloração do miolo e tamanho dos alvéolos. Nas FBV's observa-se a distribuição heterogênea e maiores alvéolos em comparação ao padrão.

Figura 2. Imagem do miolo do corte transversal de pães de forma, padrão e com substituição parcial de farinha de trigo por farinha de banana verde (FBV) a 30% m.m⁻¹

4. CONCLUSÃO

A FBV_M, em geral, apresentou melhores resultados nas propriedades físicas que a FBV_T, até o nível de 45% na elaboração dos pães de forma. Os testes preliminares indicam que a substituição de 15% de farinha de trigo por FBV atinge resultados semelhantes ao padrão.

AGRADECIMENTOS

Ao INCAPER-ES, pelo fornecimento das bananas verde, para processamento de farinha e ao Ifes pela concessão de bolsa de iniciação científica para essa pesquisa.

REFERÊNCIAS

- [1] AACC - American Association of Cereal Chemists. Approved methods of the AACC. 11th Ed. St. Paul, 2000. Disponível em: <http://methods.aaccnet.org/summaries/10-05-01.aspx>. Acesso em: 01 de setembro de 2020.
- [2] ENGLYST, H.N.; KINGMAN, S.M.; CUMMINGS, J.H. Classification and measurement of nutritionally important starch fractions. *European Journal of Clinical Nutrition*, v. 46, p. s33-s50, 1992.
- [3] ORMENESE, R. C. S. C. Obtenção de farinha de banana verde por diferentes processos de secagem e aplicação em produtos alimentícios. 2010. 156 p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Alimentos, Campinas, 2010.
- [4] PAIVA, G. Impacto do processamento sobre os teores de amidos resistente e lentamente digerível em banana verde. 2018. 131 f. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) -Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2018.

Capítulo 3

Pão sem glúten elaborado com farinha de arroz e adicionado de zeína

Raíssa Ingrid Santana Araujo Costa

Jideane Menezes Santos

Glenda Barros Matos

Paula Taís Maia Santos

Thaís Sader de Melo

Patrícia Beltrão Lessa Constant

Resumo: A busca por uma dieta isenta de glúten tem crescido pelos consumidores, principalmente por portadores de doenças célicas. Assim, surgiu a necessidade de estudar as características tecnológicas dos substitutos de glúten para elaboração de pães. A partir disto, o presente trabalho objetivou-se em desenvolver pães isento de glúten elaborados com farinha de arroz e adicionado de zeína, afim de verificar suas características panificáveis. A metodologia se baseou em analisar a cor das amostras, segundo o sistema CIELab, seguida da firmeza segundo a metodologia da AACCC (74-09) com adaptações. Os resultados obtidos mostram que a coloração da crosta e do miolo dos pães com zeína obtiveram influência dos pigmentos do milho, tornando-os amarelados, enquanto o controle permaneceu com a coloração clara. A análise de firmeza apontou que houve diferença significativa, a $p < 0,05$, entre os tratamentos, quanto a crosta e o miolo, de modo que o tratamento controle obteve maiores valores (9314 gf e 6452 gf respectivamente). A continuidade dos estudos é interessante para resolver questões relacionadas a cor, no entanto, este trabalho mostra que é possível obter um produto sem glúten com boas características panificáveis.

Palavras-chave: pão; glúten; farinha de arroz; zeína.

1. INTRODUÇÃO

O pão é obtido, tradicionalmente, a partir da farinha derivada do trigo e isto porque há a presença de proteínas (gluteninas e prolaminas) que possuem a capacidade de formar a rede de glúten na massa. Contudo, o consumo do glúten pode provocar reações adversas, tais como alergia ao trigo e doença celíaca (CAUVAIN; YOUNG, 2009; O'SHE; ARENDT; GALLAGHER, 2014). A doença celíaca é uma intolerância alimentar que inviabiliza o metabolismo do glúten e seu tratamento é feito a partir da dieta isenta do mesmo (CJAZABULSA, 2014). Devido à falta de produtos disponíveis no mercado consumidor, a adesão a este tipo de dieta torna-se muito difícil. Sendo assim, verificou-se a necessidade de estudar as características tecnológicas de alguns substitutos de glúten.

A farinha de arroz é utilizada como fonte de amido base na preparação de pães sem glúten devido ao baixo nível de prolamina, e além disso, o arroz possui características nutricionais favoráveis, como baixo teor de sódio, gordura e alta quantidade de hidratos de carbono facilmente digeríveis (SILVA, 2014). As fontes de proteínas também vêm sendo investigadas para melhorar a qualidade dos pães isentos de glúten, a exemplo da zeína, nome de uma das principais proteínas derivadas do endosperma dos grãos de milho, representando cerca de 60% de suas proteínas totais, classificada no grupo das prolaminas (FRANCO, 2015; PAPALIA & LONDERO, 2015).

Neste contexto, o presente trabalho foi realizado com o objetivo de desenvolver pães isentos de glúten elaborados com farinha de arroz e adição de zeína, afim de verificar algumas características panificáveis, como cor e firmeza.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Foram preparadas 2 formulações dos pães que variaram no teor de zeína (0g e 32g) e no carbonato de cálcio (0g e 10g), tendo a mesma composição nos demais ingredientes, sendo eles água (400g), farinha de arroz (400g), óleo de girasol (24g), açúcar refinado (20g), sal (8g), fermento biológico (8g) e goma xantana (8g).

Após a pesagem dos ingredientes, a produção dos pães seguiu-se pela homogeneização dos mesmos em batedeira (Arno planetária BPA). Logo após, foram enformados e levados para a câmara BOD permanecendo por 40 minutos a uma temperatura de 29 °C. Em seguida, os pães foram assados, em máquina de pão (Panificadora Multi Pane 2 Britânia), e arrefecidos a temperatura ambiente.

Para avaliar os produtos obtidos foram realizadas a avaliação instrumental da cor, com o auxílio de um colorímetro (Minolta – CR 10), de acordo com o sistema CIELab (MINOLTA, 2013). Na sequência fez-se a análise de firmeza, onde cada amostra foi colocada no centro da plataforma do Analisador de Textura (CT3™ Texture Analyzer), de acordo com a metodologia de AACC (74-09) (2000) com adaptações. Todas as análises foram realizadas em triplicata e avaliadas estatisticamente pelo software Assistat versão 7.7 PT por Análise de Variância (ANOVA) e teste de médias de Tukey ($p \leq 0,05$).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 ANÁLISE DE COR

A análise da cor da crosta e do miolo dos pães foram realizadas utilizando-se os parâmetros expressos no sistema CIELab e seus resultados estão expressos na Tabela 1.

Tabela 1 - Parâmetros de cor da crosta e miolo dos pães obtidos pelo sistema CIELab e analisados pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$) seguido de seus desvios-padrões.

Formulação	Crosta			Miolo		
	a*	b*	L*	a*	b*	L*
Controle	4,47±1,3a	28,43±4,0a	50,17±9,3a	4,90±0,0a	29,30±0,4a	56,50±1,2a
Zeína	13,43±1,0b	43,27±1,4b	47,87±2,6a	11,70±0,4b	41,93±1,3b	47,77±2,7b

Médias seguidas por letras iguais, na mesma coluna, não diferem estatisticamente ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey.

Quanto maior os valores do parâmetro “a” mais escura é a coloração tanto da crosta quanto do miolo. Já

com relação aos valores de “b” quanto mais alto mais forte a coloração amarelada ou dourada. A formulação contendo zeína (proteína do milho) obteve valores maiores nesses parâmetros devido ao pigmento do milho que permaneceu mesmo após a extração da proteína, resultando em pães mais amarelados. Por fim, quanto ao valor de “L” obteve-se que não houve diferença estatística ($p < 0,05$) quanto a crosta dos pães, contudo têm-se que a formulação controle obteve maior média para o miolo, o que pode ser explicado pela maior refletância da luz, traduzindo-se em pães de coloração clara e, consequentemente, pobres em açúcares.

3.2 ANÁLISE DE FIRMEZA

Os valores das médias de firmeza obtidas tanto para o miolo quanto para a crosta dos pães (controle e com zeína) diferiram estatisticamente entre si a $p \leq 0,05$ pelo teste de Tukey (Figura 1).

Figura 1 – Médias das firmezas da crosta e do miolo dos pães analisadas pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$).

Fonte: Próprio autor.

O tratamento controle obteve maiores valores de firmeza para a crosta (9314gf) e miolo (6453gf), e isto pode ser explicado devido a retrogradação do amido na crosta (aspecto denso) e a ocorrência de uma rede não estruturada e não tão definida para o miolo, o que causa a liberação mais rápida do ar para o ambiente, provocando o seu murchamento e, consequente, compactação do pão.

4. CONCLUSÃO

A continuidade dos estudos é interessante para resolver questões relacionadas a cor, no entanto, podemos concluir que o emprego da zeína propiciou uma melhor estrutura no pão deixando-o mais macio, o que torna o seu emprego interessante, uma vez que esta possibilita um maior aprisionamento do ar no miolo do pão, impedindo sua compactação após o forneamento.

AGRADECIMENTOS

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) pela estrutura e a CAPES pelo suporte financeiro.

REFERÊNCIAS

- [1] AMERICAN ASSOCIATION OF CEREAL CHEMISTS – AACC. Approved methods of the AACC. 10th ed. St. Paul, 2000.
- [2] CAUVAIN, S. P.; YOUNG, L. S. Tecnologia da panificação. vTrad. Carlos David Szlak. 2 ed. Editora Manole, Barueri, São Paulo, 2009.
- [3] CJAZABULSA, G. Non-coeliac Gluten Sensitivity - A new disease with gluten intolerance. Clinical Nutrition Poland. 2014.
- [4] FRANCO, V. A. Desenvolvimento de Pão Sem Glúten Com Farinha de Arroz e De Batata-Doce. Orientador: Dr. Flávio Alves da Silva. 2015. Tese (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.

- [5] MINOLTA. Konica minolta sensing americas: Entendendo o Espaço de Cor L*a*b*. Disponível em:
- [6] <<http://sensing.konicaminolta.com.br/2013/11/entendendo-o-espaco-de-cor-lab/>>. Acesso em: 28/06/2019.
- [7] O'SHEA N.; ARENDT, E. and GALLAGHER, E. State of the Art in Gluten Free Research. *Journal of FoodScience*, v. 79, n. 6, 2014.
- [8] PAPALIA, I. S.; LONDERO, P. M. G.; Extração de zeína e sua aplicação na conservação de alimentos.
- [9] *Ciência Rural*, v. 45, n. 2, p. 552-559, Santa Maria, 2015. <http://dx.doi.org/10.1590/0103-8478cr20131649>.
- [10] SILVA, J. F.; Desenvolvimento de mixes de panificação isentos de glúten a partir de subprodutos alimentares. Orientador: Dra. Anabela Cristina da Silva Naret Moreira Raymundo. 2014. Tese (Mestrado em Engenharia Alimentar) - Universidade de Lisboa, Lisboa, 2014.

Capítulo 4

Efeito do processamento sobre a composição de minerais em farinha de banana verde

Genilson de Paiva

Mônica Ribeiro Pirozi

Edimar Aparecida Filomeno Fontes

Luiz Fernando Dias Ferreira

Bruna Magnago Bernabé

Érica Nascif Rufino Vieira

Resumo: Neste estudo, avaliou-se o efeito do processamento da banana verde sobre a composição de minerais na farinha de banana verde, obtida com casca (FBV-CC) e sem casca (FBV-SC), e por método modificado de processamento, que consistiu na pré-gelatinização e retrogradação do amido por meio de autoclavagem e refrigeração das bananas, antes da secagem (FBV-CCM e FBV-SCM). Observou-se que o potássio (K) é o mineral mais abundante nas FBV's, seguido do magnésio (Mg), sódio (Na) e fósforo (P). Com exceção de cobre (Cu), ferro (Fe) e P, os demais minerais encontram-se em maior concentração na FBV-CC em relação à FBV-SC, mostrando que a casca contribuiu para aumentar suas concentrações. Com exceção do Cu, não houve diferença ($p>0,05$) do conteúdo de minerais entre FBV-CC e FBV-CCM, indicando que não ocorrem perdas de minerais na modificação do processamento. Houve aumento significativo ($p<0,05$) de K, Mg, Na, Cu, Fe, e Mn na FBV-SCM relação à FBV-SC, indicando que pode haver lixiviação destes da casca para a polpa, durante autoclavagem das bananas. Portanto, a composição de minerais na FBV é afetada pelo tipo de processamento.

Palavras-chave: *Musa sp*; valor nutricional; secagem.

1. INTRODUÇÃO

As bananas são normalmente comercializadas *in natura*, no entanto, as perdas pós-colheita são muito elevadas. Além disso, aproximadamente 10 a 15% das bananas não têm valor comercial, resultando em grande desperdício de recursos (BI et al, 2017). Devido à natureza climática da banana, esta torna-se muito suscetível à deterioração em um curto período de armazenamento (ANYASI, JIDEANI e MCHAU, 2018).

Nas últimas décadas, muitas variedades híbridas de banana, algumas das quais resistentes à pragas e doenças, foram avaliadas quanto às propriedades agrônômicas, adaptação às diferentes condições de cultivo, aceitação para consumo *in natura* e recomendações para cultivo em várias regiões do país (SILVA et al., 2002; LIMA et al., 2005; DONATO et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2008; SILVA JUNIOR et al., 2009; FARIA et al., 2010; AZEVEDO et al., 2010; PIMENTEL et al., 2010; VENTURA et al., 2011; SANTOS, 2011; BARKER et al., 2011; GARRUTI et al., 2012). Contudo, são escassos os estudos quanto ao processamento.

O emprego de banana verde para produção de farinha proporciona benefícios significativos para a sustentabilidade da bananicultura, reduzindo perdas. Uma vez que a matéria-prima pode ser aproveitada integralmente, antes de atingir o estágio de maturação para consumo *in natura*, em que se torna perecível. Além disso, é possível a produção de farinha a partir da casca e com a casca, minimizando a geração de resíduo e agregando propriedades nutricionais (RODRIGUES e LEITE, 2008; HASLINDA et al., 2009; INYANG e EKOP, 2015).

A farinha de banana verde (FBV) é um alimento amiláceo, fonte de fibras, amido resistente, minerais e compostos fenólicos (BORGES, PEREIRA e LUCEMA, 2009; HASLINDA et al, 2009; MENEZES et al., 2011; VATANASUCHART et al., 2012, ANYASI, JIDEANI e MCHAU, 2013; LIAO e HUNG, 2015; SÁNCHEZ-RIVERA et al, 2017; ANYASI, JIDEANI e MCHAU, 2018). Além de ser uma das principais fontes de potássio (HASLINDA et al, 2009; ANYASI, JIDEANI e MCHAU, 2013). Os minerais presentes na banana, e em maior proporção, são magnésio (Mg), potássio (K), fósforo (P) e cálcio (Ca) (BORGES, PEREIRA e LUCEMA, 2009; MENEZES et al., 2011; ANYASI, JIDEANI e MCHAU, 2013).

Devido à elevada concentração de amido (mais de 70 % b.s.), o processamento de banana verde para produção de farinha é potencialmente importante para a agroindústria de alimentos (WALISZEWSKI et al., 2003). A grande disponibilidade da matéria-prima e o baixo custo de processamento da farinha de banana verde coloca a fruta em posição vantajosa como substituto da farinha de trigo (ANYASI, JIDEANI e MCHAU, 2018) e seu emprego como ingrediente na formulação de pães, biscoitos e massas alimentícias, como substituto parcial de outras farinhas (SEBRAE, 2008; POIANI et al., 2008; HASLINDA et al, 2009; MARTINEZ-CASTAÑO et al, 2019).

Além disso, a FBV agrega propriedades funcionais devido ao conteúdo apreciável de amido resistente e sua eficácia na redução do índice glicêmico (LIAO e HUNG, 2015). Segundo PAIVA (2018), a FBV possui teor de amido resistente (AR) de 58,43 % m.m⁻¹ em base seca. Este não é digerido pelas amilases pancreáticas no intestino delgado e possui propriedades semelhantes às fibras solúveis, é fermentado total ou parcialmente pelas bactérias do cólon, com benefícios para a microbiota intestinal (ENGLYST et al., 1992).

Atualmente, existem diferentes métodos para processamento de FBV, com casca ou sem casca, com diferenças quanto à operação de descasque, métodos de inibição enzimática, espessura do corte da polpa, métodos e temperaturas de secagem, umidade final, com pré-gelatinização do amido pelo cozimento da banana, tratamentos com enzimas para desramificação de amilopectina, além da cultivar de banana e do grau de maturação (MUYONGA, RAMTEKE e EIPESON, 2001; BORGES, LUCEMA e PEREIRA, 2009; STRINGHETA e BERTOLDI, 2009; ORMENESE, 2010, VATANASUCHART et al., 2012; LIAO e HUNG, 2015; PAIVA, 2018), consequentemente resultando em produtos com propriedades muito diferentes.

Sendo assim, este estudo avaliou o impacto do processamento de FBV sobre a composição de minerais, empregando bananas com e sem casca, e submetidas ou não a pré-gelatinização por autoclavagem, antes da operação de secagem.

2. MATERIAL E MÉTODO

2.1. MATÉRIA-PRIMA

Os cachos de banana (*Musa spp.*) verde, da cultivar BRS Vitória, subgrupo prata, foram obtidos na Fazenda Experimental do INCAPER, município de Alfredo Chaves - ES (latitude 20°37'0,1''S e longitude 41°46'50''W a 25 metros de altitude em relação ao nível do mar). Os cachos foram colhidos no estágio 1 de maturação (completamente verdes), em média 90 a 120 dias após florescência, transportados para o Laboratório de Processamento Vegetal (TPV) no IFES - Campus Venda Nova do Imigrante, e armazenados a 4 °C (PAIVA, 2018), até o processamento (máximo 15 dias).

2.2. FARINHA DE BANANA VERDE

Foram obtidos quatro tipos de FBV, conforme adaptações dos processamentos propostos por Muyonga, Ramteke e Eipeson (2001); Stringheta e Bertoldi (2009), Ormenese (2010) e Vatanasuchart et al. (2012): farinha de banana verde com casca (FBV-CC) e farinha de banana verde sem casca (FBV-SC), farinha de banana verde com casca modificada (FBV-CCM) e farinha de banana verde sem casca modificada (FBV-SCM),

Inicialmente, bananas verdes (estagio 1 de maturação), foram higienizadas (hipoclorito de sódio 100 mg.Kg⁻¹), descascadas ou não, fatiadas manualmente (0,5 cm), imersa em solução de ácido cítrico (0,5 g.100g⁻¹), submetidas a secagem (70 °C e 1,5 m.s⁻¹) (secador tipo cabine). Após o resfriamento a temperatura ambiente, foram moídas (Moinho de facas Marconi®) e peneiradas (0,5 mm). Assim, foram obtidas a FBV-CC e FBV-SC (Figura 1).

Para modificação do processamento (Figura 1), as bananas verdes e higienizadas foram previamente cozidas em autoclave vertical (121 °C a 1,5kgf.cm⁻¹ por 30 min), imediatamente refrigeradas a 4 °C e mantidas por 24h. Depois, uma parte das bananas cozidas foram mantidas com casca e outra sem casca, fatiadas e submetidas à secagem para obtenção de FBV-CCM e FBV-SCM. O tratamento térmico promove a gelatinização do amido e o armazenamento sob refrigeração é empregado para formação de amido resistente tipo 3 (PAIVA, 2018).

Figura 1. Representação esquemática do processamento de farinha de banana verde.

A FBV-CC e FBV-CCM foram obtidas conforme esquema apresentado na Figura 1, suprimindo a etapa de descasque. Todos os quatro tipos de FBV foram envasados em filme de polietileno de baixa densidade e armazenados sob refrigeração (4 °C) até o momento das análises.

2.3. ANÁLISE DE MINERAIS

A determinação dos principais minerais presentes em FBV ($\text{mg}\cdot 100\text{g}^{-1}$) foram fósforo (P), potássio (K), magnésio (Mg), ferro (Fe), cálcio (Ca), cobre (Cu), zinco (Zn), manganês (Mn), e sódio (Na). Cerca de 0,500 g de amostras de FBV foram previamente digeridos em 15,0 ml de solução nitro-perclórica (1:4) a 200 °C. O sódio e o potássio foram determinados por fotometria de chama utilizando fotômetro de chama. Cálcio, magnésio, ferro, cobre, zinco e manganês foram determinados por absorção atômica utilizando espectrofotômetro de absorção atômica. O mineral fósforo foi determinado por espectrofotometria a 725 nm pelo método 986.24 (AOAC, 2012).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1 encontram-se os resultados da análise de macro e micro-minerais para as FBV obtidas dos quatro processamentos aplicados.

Tabela 1. Conteúdo médio de minerais, expresso em base seca, em farinha de banana verde ($\text{mg}\cdot 100\text{g}^{-1}$).

Minerais	FBV-CC	FBV-SC	FBV-CCM	FBV-SCM
P	73,56 $\pm$ 12,21 _a	58,72 $\pm$ 9,44 _a	79,30 $\pm$ 10,02 _a	64,99 $\pm$ 6,86 _a
K	963,19 $\pm$ 72,67 _a	556,65 $\pm$ 98,96 _b	1049,04 $\pm$ 94,65 _a	1039,49 $\pm$ 91,60 _a
Ca	55,78 $\pm$ 8,57 _a	23,98 $\pm$ 6,46 _b	68,28 $\pm$ 7,97 _a	28,61 $\pm$ 7,32 _b
Mg	90,99 $\pm$ 6,72 _a	65,33 $\pm$ 3,56 _b	103,48 $\pm$ 8,44 _a	87,95 $\pm$ 2,05 _a
Na	87,85 $\pm$ 0,24 _a	40,65 $\pm$ 0,26 _b	94,95 $\pm$ 8,71 _a	89,01 $\pm$ 0,43 _a
Cu	0,35 $\pm$ 0,02 _c	0,33 $\pm$ 0,03 _c	1,06 $\pm$ 0,05 _a	0,74 $\pm$ 0,06 _b
Fe	3,00 $\pm$ 0,63 _b	2,25 $\pm$ 0,32 _b	2,70 $\pm$ 0,09 _b	4,37 $\pm$ 0,16 _a
Zn	1,38 $\pm$ 0,28 _a	0,92 $\pm$ 0,05 _b	1,41 $\pm$ 0,15 _a	1,12 $\pm$ 0,02 _{ab}
Mn	1,84 $\pm$ 0,35 _{ab}	0,94 $\pm$ 0,06 _c	2,32 $\pm$ 0,21 _a	1,55 $\pm$ 0,16 _b

FBV-CC: farinha de banana verde com casca; FBV-SC: farinha de banana verde sem casca; FBV-CCM: farinha de banana verde com casca modificada e de FBV-SCM: farinha de banana verde sem casca modificada. Médias (n=3) seguidas de mesma letra, na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p > 0,05$).

De forma geral, os resultados mostram que o maior conteúdo mineral foi relativo ao teor de potássio, seguido do magnésio, fósforo, sódio e cálcio, assim como em trabalho de Haslinda et al. (2009).

A compilação de diferentes trabalhos em revisão de ANYASI, JIDEANI e MCHAU, (2018), mostra o mesmo perfil de minerais, porém em menores concentrações para farinha de polpa de banana verde para K ($460\text{ mg}\cdot 100\text{g}^{-1}$); Mg ($36\text{ mg}\cdot 100\text{g}^{-1}$); e P ($27\text{ mg}\cdot 100\text{g}^{-1}$).

Analizando a cultivar de banana comercial da Nigéria, INYANG e EKOP (2015) obtiveram farinha de polpa de banana verde com teores reduzidos de K ($382,41\text{ mg}\cdot 100\text{g}^{-1}$) e Mg ($41,62\text{ mg}\cdot 100\text{g}^{-1}$).

Borges, Lucema e Pereira (2009), que trabalharam com FBV, também do grupo prata, determinaram maiores níveis de K ($1180\text{ mg}\cdot 100\text{g}^{-1}$), Mg ($70,00\text{ mg}\cdot 100\text{g}^{-1}$) e P ($100,00\text{ mg}\cdot 100\text{g}^{-1}$).

A análise do conteúdo de minerais nos quatro tipos de FBV sugere que, com exceção de Cu, Fe e P os demais minerais avaliados encontram-se em maior concentração na FBV-CC em relação à FBV-SC, mostrando que a casca pode contribuir para aumentar suas concentrações na farinha (HASLINDA et al., 2009). A cultivar avaliada por Haslinda et al. (2009) apresentou níveis de K e Mg, na farinha de polpa de banana verde, semelhantes aos níveis da cultivar Vitória na FBV-CC.

Com exceção do Cu, não houve diferença significativa ($p > 0,05$) quanto ao conteúdo de minerais entre FBV-CC e FBV-CCM, sugerindo que não houve perdas de minerais na modificação do processamento de FBV. Ao passo que, Liao e Hung, 2015, obtiveram redução do resíduo mineral fixo de 2,5% para 0,87%, quando aplicaram método modificado, porém cozinhando a farinha da polpa de banana verde, tratada com enzima pullulanase.

Aumento significativo ($p < 0,05$) nos níveis de K, Mg, Na, Cu, Fe, e Mn na FBV-SCM em relação à FBV-SC indica que na autoclavagem das bananas com casca, pode haver lixiviação destes minerais da casca para a polpa. O que confere vantagens a essa de modificação no processamento, uma vez que resulta em um processo de fortificação da farinha com minerais.

4. CONCLUSÕES

A composição média de minerais em farinha de banana verde é afetada pelos métodos de processamento, exibindo aumento significativo de K e Mg na farinha de banana verde com casca em relação à farinha de banana verde sem casca.

A modificação do processamento tradicional, por cozimento prévio das bananas, resulta em aumento dos níveis de minerais na farinha de banana verde modificada e sem casca, equivalente ao perfil de minerais na farinha de banana verde com casca.

Uma vez que o perfil de mineral também é fortemente influenciado pela cultivar, é relevante novos estudos quanto às diferenças entre cultivares para modificação do processamento.

REFERÊNCIAS

- [1] ANYASI, T. A.; JIDEANI, A. I. O.; MCHAU, G. R. A. Functional properties and postharvest utilization of commercial and noncommercial banana cultivars. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*. Vol.12, 2013.
- [2] ANYASI, T. A.; JIDEANI, A. I. O.; MCHAU, G. R. A. Phenolics and essential mineral profile of organic acid pretreated unripe banana flour. *Food Research International*, 104, p. 100-109, 2018.
- [3] AOAC - Association of Official Analytical Chemists. *Official methods of analysis of AOAC international*. 16th ed. Gaithersburg, USA, 2012.
- [4] AZEVEDO, V. F.; DONATO, S. L. R.; ARANTES, A. M.; MAIA, V. M.; SILVA, S. O. Avaliação de bananeiras tipo prata, de porte alto, no semiárido. *Ciência e Agrotecnologia*, Lavras, v. 34, n. 6, p. 1372-1380, nov./dez., 2010.
- [5] BARKER, D. L.; FONTES, P. S. F.; FONTES, A. G.; BERILLI, A. P. C.; PIRES, P. D. Z. Desenvolvimento da Bananeira Japira (*Musa Spp.*) em Função da Adubação Nitrogenada. *Anais do VII Simpósio de Iniciação Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação*. Serra-ES: IFES. 2011.
- [6] BI, Y.; ZHANG, Y.; JIANG, H.; HONG, Y.; CHENG, Z. G. L.; LI, Z.; LI, C. Molecular structure and digestibility of banana flour and starch. *Food Hydrocolloids*, 72, p. 219-227, 2017.
- [7] BORGES, A. M.; PEREIRA, J.; LUCENA, E. M. P. Caracterização da farinha de banana verde. *Ciênc. Tecnol. Aliment.*, Campinas, 29(2): 333-339, abr.-jun. 2009
- [8] DONATO, S.L.R.; SILVA, S.O.; LUCCA FILHO, O.A.; LIMA, M.B.; DOMINGUES, H.; ALVES, J.S. Comportamento de variedades e híbridos de bananeira (*Musa spp.*), em dois ciclos de produção no sudoeste da Bahia. *Revista Brasileira de Fruticultura*. v.28, p.139-144, 2006.
- [9] ENGLYST, H. N.; KINGMAN, S. M.; CUMMINGS, J. H. Classification and measurement of nutritionally important starch fractions. *European Journal of Clinical Nutrition*. 46 (Suppl. 2), p. s33-s50. 1992.
- [10] FARIA, H. C.; DONATO, S. L. R.; PEREIRA, M.C. T.; SILVA, S. O. Avaliação filotécnica de bananeiras tipo terra sob irrigação em condições semiáridas. *Ciência e Agrotecnologia*, Lavras, v. 34, n. 4, p. 830-836, jul./ago., 2010.
- [11] GARRUTI, D. S.; MATIAS, M. L.; FACUNDO, H. V. V.; SILVA, E. O.; COSTA, J. N.; SILVA, M. A. A. P. Aceitação de cultivares de bananas resistentes à Sigatoka Negra junto ao consumidor da região Nordeste do Brasil. *Ciência Rural*. Santa Maria, v.42, n.5, p.948-954, maio, 2012.
- [12] HASLINDA, W. H.; CHENG, L. H.; CHONG, L. C.; AZIAH, A. A. N. Chemical composition and physicochemical properties of green banana (*Musa acuminata balbisiana Colla* cv. Awak) flour. *International Journal of Food Sciences and Nutrition*, 60(S4): p. 232-239, setembro de 2009.
- [13] INYANG, U. E.; EKOP, V. O. Physico-Chemical Properties and Anti-nutrient Contents of Unripe Banana and African Yam Bean Flour Blends. *International Journal of Nutrition and Food Sciences*. 4(5): 549-554. 2015.
- [14] LIAO, H.; HUNG, C. Chemical composition and in vitro starch digestibility of green banana (cv. Giant Cavendish) flour and its derived autoclaved/debranched powder. *LWT - Food Science and Technology*, 64, p. 639-644, 2015.
- [15] LIMA, M.B.; SILVA, S.O.; JESUS, O.N.; OLIVEIRA, W.S.J.; GARRIDO, M.S.; AZEVEDO, R.L. Avaliação de cultivares e híbridos de bananeira no recôncavo baiano. *Ciência e Agrotecnologia*. v.29, p.515-520, 2005.

- [16] MARTÍNEZ-CASTAÑO, M.; LOPERA-IDARRAGA, J.; PAZMIÑO-ARTEAGA, J.; GALLARDO-CABRERA, C. Evaluation of the behaviour of unripe banana flour with non-conventional flours in the production of gluten-free bread. *Food Science and Technology International*, 26(2), 2019.
- [17] MENEZES, E. W.; TADINI, C. C.; TRIBESS T. B.; ZULETA, A.; BINAGHI, J.; PAK, N.; VERA G.; DAN, M. C. T.; BERTOLINI, A. C.; CORDENUNSI, B. R.; Lajolo, F. M. Chemical Composition and Nutritional Value of Unripe Banana Flour (*Musa acuminata*, var. Nanicao) *Plant Foods for Human Nutrition*, 66, p. 231–237, 2011.
- [18] MUYONGA, J. H.; RAMTEKE, R. S.; EIPESON, W. E. Predehydration steaming changes physicochemical properties of unripe banana flour. *Journal of Food Processing and Preservation*, 25, p. 35-47, 2001.
- [19] OLIVEIRA, T. K.; LESSA, L. S.; SILVA, S. O.; OLIVEIRA, J. P. Características agronômicas de genótipos de bananeira em três ciclos de produção em Rio Branco, AC. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*. Brasília-DF, v.43, n.8, p.1003-1010, agosto de 2008.
- [20] ORMENESE, R. C. S. C. Obtenção de farinha de banana verde por diferentes processos de secagem e aplicação em produtos alimentícios. 2010. 156 p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Alimentos, Campinas, 2010.
- [21] PAIVA, G. Impacto do processamento sobre os teores de amidos resistentes e lentamente digerível em banana verde. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Viçosa. Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Viçosa-MG. 2018. 132p.
- [22] PIMENTEL, R. M. A.; GUIMARÃES, F. N.; SANTOS, V. M.; RESENDE, J. C. F. Qualidade pós-colheita dos genótipos de banana PA 42-44 e prata-anã cultivados no Norte de Minas Gerais. *Revista Brasileira de Fruticultura*. Jaboticabal - SP, v. 32, n. 2, p.407-413. Junho de 2010.
- [23] POIANI, L. M.; BORGES, M. T. M. R.; VILAS BOAS, E. V. B.; LICHTENBERG, L. A.; GODOY, R. C. B. Aproveitamento industrial dos descartes de pós-colheita. *Informe Agropecuário*. Belo Horizonte: Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG. V. 29. No 245, jul/ago. 2008.
- [24] RODRIGUES, M. G. V.; LEITE, M. A. V. Aspectos Socioeconômicos da Bananicultura. *Informe Agropecuário*. Belo Horizonte: Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG. V. 29. No 245, jul/ago. 2008.
- [25] SÁNCHEZ-RIVERA, M. M , NÚÑEZ-SANTIAGO, M. C.; BELLO-PÉREZ, L. A.; AGAMA-ACEVEDO E.; ALVAREZ-RAMIREZ, J. Citric acid esterification of unripe plantain flour: Physicochemical properties and starch digestibility. *Starch-Stärke* 69, p. 9-10, 2017.
- [26] SANTOS, P. N. Características fisiológicas e bioquímicas das bananeiras “prata”, “japira” e “vitória”. Alegre, ES: Dissertação (Mestrado em Biologia Vegetal). Universidade Federal do Espírito Santo. 2011.
- [27] SEBRAE. Banana: Estudo de Mercados. Relatório Completo. SEBRAE/ESPM, 2008.
- [28] SILVA JUNIOR, J. F. et al. Banana Japira: Variedade do tipo Pacovan resistente à sigatoka-negra recomendada para o Vale do Rio Siriji, PE. MAPA/EMBRAPA Tabuleiros Costeiros/EMBRAPA Mandioca e Fruticultura Tropical. Dezembro de 2009.
- [29] SILVA, S. O.; FLORES, J. C. O.; LIMA NETO, F. P. Avaliação de cultivares e híbridos de bananeira em quatro ciclos de produção. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, Brasília, v. 37, n. 11, p. 1567-1574, nov. 2002.
- [30] STRINGHETA, P. C.; BERTOLDI, M. C. Banana-passa e Farinha de Banana. *Boletim de Extensão*, No. 56. Viçosa-MG: UFV, 2009.
- [31] VATANASUCHART, N; NIYOMWIT, B.; NARASRI, W. Resistant starch, physicochemical and structural properties of bananas from different cultivars with an effect of ripening and processing. *Kasetsart Journal (Natural Science)*, 46: 461 – 472. 2012.
- [32] VENTURA, J. A.; et al. Vitória e Japira – Novas cultivares de bananeira. Instituto Capixaba de Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural – INCAPER. Vitória, ES. 2011.
- [33] WALISZEWSKI, K. N.; APARICIO, M. A.; BELLO, L. A.; MONROY, J. A. Changes of banana starch by chemical and physical modification. *Carbohydrate Polymers*. 52, p. 237–242. 2003.

Capítulo 5

*Curvas de secagem e coeficiente de difusão de banana (*Musa paradisíaca* L.)*

Luciana Alves da Silva

Carla Rosalyn Baca Arévalo

Aroldo Arévalo Pinedo

Carlos Alberto Baca Maldonado

William Renzo Cortez-Vega

Sandriane Pizato

Rosalinda Arévalo Pinedo

Resumo: A banana-pão ou banana-sapo (*Musa paradisíaca* L.) é uma fruta que compõe a família da Musaceae com grande potencial nutricional. Objetivou-se, nesse trabalho, avaliar as curvas de secagem de fatias da banana-pão e ajuste de modelos matemáticos das curvas de secagem. A secagem convectiva foi realizada em secador de bandejas com velocidade do ar a $1,5 \text{ m s}^{-1}$ em diferentes condições de temperatura. O tempo requerido para a secagem do produto até uma umidade menor de 10% em Ubu, porcentagem ótima para condições de conservação de alimentos, foram 12, 10 e 9 horas para as temperaturas de 40, 50 e 60 °C, respectivamente. As curvas de secagem foram ajustadas ao modelo de difusão de Fick para placa plana considerando as amostras como uma lâmina infinita. O modelo matemático Logarítmico e Page tiveram os melhores ajustes aos dados da cinética e os coeficientes de difusão efetiva do modelo de Fick variou de $0,9250 \cdot 10^{-10}$ a $1,3793 \cdot 10^{-10} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$.

Palavras-chave: Convecção forçada. Modelo matemático de Page. Ajuste de curvas de secagem.

1. INTRODUÇÃO

O processo de secagem ou desidratação envolve vários fenômenos de transferência de calor e massa de forma simultânea. De acordo com Hadrich e Kechaou (2009) existem modelos matemáticos ditos como eficazes utilizados para desenhar o comportamento de secagem de alimentos, desde os farináceos até os alimentos ricos em umidade como frutas.

A utilização desses modelos ajuda pesquisadores a realizar uma melhor otimização, integração e controle de energia durante o processo de secagem. Quando a atividade da água (A_w) é reduzida ao nível mínimo, onde se encontra um ponto de equilíbrio e estabilidade de água livre dentro do alimento, a deterioração química e biológica tende a ser minimizada, processo que ajuda na conservação dos alimentos e seu armazenamento em longos períodos (Mghazli et al., 2017).

A banana está entre as plantas mais antigas e mais valorizadas dos trópicos e subtópicos em todo o mundo. A Índia é o principal produtor de banana do mundo, seguido pela China, Indonésia, Brasil, Equador e Filipinas (Tunckal; Doymaz, 2020). As bananas ou plátanos como são conhecidos mundialmente, tiveram sua origem nas regiões sudeste da Ásia e do Pacífico, cuja vegetação natural pode ser encontrada alguns exemplares de forma nativa, sendo frutas conhecidas como tropicais e cultivadas em muitos países (Khampakool, Soisungwan & Park, 2019).

A banana-pão, sapo verde, sapucho, tapocho apresenta frutos com arestas bem definidas e muito resistente às inundações, se desenvolvem espontaneamente em zonas inundáveis, não é muito cotizado como alimento humano (CUÑACHI, 2014).

Portanto, o objetivo deste estudo foi realizar a cinética de secagem de fatias *in natura* banana pão/sapo (*Musa paradisiaca* L.) em estágio verde para estudo do comportamento da fruta sob o método de conservação em três temperaturas. Realizar a análise do comportamento da secagem em modelos matemáticos, calculando posteriormente a difusão efetiva e propriedades termodinâmicas de cada amostra.

2. MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS

2.1. MATERIAL VEGETAL

A banana-pão (também conhecido como banan-sapo), foi adquirido no mercado local da cidade de Dourados/MS, os frutos em cachos foram transportados até os laboratórios do Curso de Engenharia de Alimentos da UFGD. As bananas estágio verde foram selecionados e eliminados aquele que apresentavam danos mecânicos, em seguida foram lavados e sanitizados em hipoclorito de sódio 1% por 15 min, após este tempo foram descascados e colocados em água gelada com 0,5% de ácido ascórbico para prevenir a oxidação. Realizou o fatiamento mecânico em rodela, ajustando o fatiador a espessura de 0,4 cm, para padronização das amostras.

2.2. SECAGEM

O processo de secagem foi realizado com um secador de bandejas, a temperaturas de 40, 50 e 60 °C e velocidade de 1,5 m/s, até obter temperatura constante, que variou para cada temperatura estudada.

Antes da secagem determinou-se a umidade inicial das fatias da banana pão *in natura* através do método de secagem em estufa até alcançar peso constante (AOAC, 1990).

O secador utilizado é a nível laboratorial que consta de uma câmara de secagem onde são colocadas as bandejas, e nessas depositadas as amostras. O sistema de pré-aquecimento do ar é dado por um conjunto de resistências elétricas e um sistema de circulação do ar que consta de um ventilador. Um anemômetro é utilizado para o controle da velocidade do ar quente foi inserido na parte interna do secador.

Antes da secagem das amostras, o secador foi ligado meia hora antes para estabilizar a temperatura. Uma vez estabilizada a temperatura, as bandejas contendo as fatias de bananas foram colocadas dentro do compartimento do secador, para assim iniciar o processo de secagem. As amostras foram retiradas do secador durante a primeira hora em intervalos de 15 minutos, após em intervalos de 1 hora até obter o equilíbrio dinâmico constante nas amostras de Ubu (umidade em base úmida) menor que 10%. O peso das amostras em cada bandeja, inicialmente, foi de aproximadamente 400 gramas, sendo que foi feita a secagem em triplicata para cada temperatura.

2.3. TEOR DE UMIDADE E MODELOS MATEMÁTICOS

Os diferentes teores de umidade de acordo com o intervalo de tempo e sua pesagem foi calculado a partir da diferença entre o peso inicial e a pesagem, considerando a perda de peso. Os teores de umidade nas diferentes temperaturas foram convertidos em relação a umidade (MR), conforme a equação 1. Vale ressaltar que o MR é adimensional.

$$MR = \frac{(Mx - Mxo)}{(Mxi - Mxo)} \quad (\text{eq. 1})$$

onde, MR a razão de teor de água (valor adimensional), Mx é o teor de água do produto representado em base seca (b.s); Mx 0 o teor de água de equilíbrio do produto (b.s.) e Mxi o teor de água inicial do produto (b.s).

2.4. PARÂMETROS ESTATÍSTICOS

Os modelos matemáticos utilizados na análise da cinética de secagem foram selecionados de acordo com a literatura, sendo eleitos os modelos de Difusão aproximada, Logaritmico, Midilli, Newton e Page, conforme Tabela 1.

Tabela 1. Modelos Matemáticos utilizados na cinética de secagem da banana pão

Nome do Modelo	Designação do Modelo	Equações
Difusão Aproximada	$MR = a \exp(-kt) + (1-a) \exp(-kbt)$	(2)
Logaritmico	$MR = a \exp(-kt) + c$	(3)
Midilli	$MR = a \exp(-ktn) + bt$	(4)
Newton	$MR = \exp(-kt)$	(5)
Page	$MR = \exp(-ktn)$	(6)

2.5. COEFICIENTE DE DIFUSÃO (D_{ef}) E INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NO D_{ef}

O coeficiente de difusão foi calculado utilizando a Equação 7, baseada na teoria da difusão líquida, e a equação de Arrhenius utilizada na avaliação da influência da temperatura no coeficiente de difusão efetivo.

$$MR = \frac{(Mx - Mxo)}{(Mxi - Mxo)} = \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} \exp\left[-(2n+1)^2 \pi^2 D_{ef} \left(\frac{t}{4L}\right)^2\right] \quad (\text{eq. 7})$$

$$D_{ef} = D_0 \exp \frac{-E_a}{RT_{ab}} \quad (\text{eq. 8})$$

Onde: D_i = coeficiente de difusão efetivo ($m^2 s^{-1}$); L = espessura do produto (m); t = tempo de secagem (s); n = número de termos do modelo. D_0 = fator pré-exponencial; E_a = energia de ativação ($kJ mol^{-1}$); R = constante universal dos gases ($8,314 kJ kmol^{-1} K^{-1}$); T_a = temperatura absoluta (K).

2.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para o ajuste experimentalmente da cinética de secagem foi utilizado o programa computacional Statistica versão 8.0 utilizando-se a análise de regressão não-linear, pelo método Quasi-Newton. A qualidade do ajuste dos modelos matemáticos aos dados estatísticos observados, foi avaliada pelo coeficiente de determinação (R^2), qui-quadrado (χ^2) e o erro quadrático médio da raiz (RMSE, Root Mean Square Error).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observa-se na Figura 1 o gráfico das curvas de secagem nas temperaturas de 40, 50 e 60 °C das fatias de banana-pão até atingirem uma umidade final menor que 10% Ubu. As curvas de secagem foram plotadas com os valores da relação de umidade (adimensional) em relação ao tempo. É possível observar que com o aumento da temperatura do ar de secagem há uma redução no tempo de secagem até o equilíbrio de teor de água seja acertado. O tempo necessário para atingir a umidade de equilíbrio da amostra na temperatura de 40°C foi 33,6% maior que a 60°C, e aproximadamente 17% em comparação a temperatura de 50 °C.

Figura 1. Curvas de secagem dos dados observados da cinética de secagem de fatias de banana-pão, secas nas temperaturas de 40, 50 e 60°C até umidade menor que 10% em Ubu.

De acordo com Fiorentin et al. (2010) esta diferença entre os tempos de secagem de 40 a 60 °C, ocorre porque em temperaturas mais altas a amostra passa a reduzir sua umidade mais rapidamente no início da secagem e por conseguinte o tempo de secagem é requerido será menor. O efeito citado é observado por diversos autores em suas pesquisas como na secagem de banana da terra (Leite et. al., 2015), bagaço de uva fermentado (Deamici et. al., 2016) e secagem de morangos (Oliveira et. al., 2015).

Com o processo de secagem os teores de umidade encontrados para cada tempo foram utilizados para calcular os valores de razão de umidade (MR) experimentais, esses, por sua vez, empregados para ajustar os cinco modelos matemáticos escolhidos (Tabela 1). A comparação entre os valores da razão de umidade (MR) observados versus os MR preditos pelos modelos matemáticos estão apresentados nas Figuras 2, 3 e 4. Segundo Corrêa et al. (2010) a figura foi construída para melhorar a abrangência do ajustamento dos modelos utilizados aos dados obtidos nas secagens, podendo afirmar que quanto mais próximos os dados experimentais estiverem da reta, maior será a igualdade entre os valores. Analisando as figuras, é possível afirmar que os dados experimentais e preditos de quase todos os modelos estão bem ajustados, com exceção do modelo matemático de Midilli.

Figura 2. Valores de razão de umidade observados e preditos pelos cinco modelos matemáticos durante a secagem das fatias de banana-pão na temperatura de 40°C.

Figura 3. Valores de razão de umidade observados e preditos pelos cinco modelos matemáticos durante a secagem das fatias de banana-pão na temperatura de 50°C.

Figura 4. Valores de razão de umidade observados e preditos pelos cinco modelos matemáticos durante a secagem das fatias de banana-pão na temperatura de 60°C

A Tabela 2 apresenta os parâmetros de ajustes das equações de Difusão aproximada, Logarítmico, Midilli, Newton e Page em relação aos dados coletados durante a cinética de secagem das fatias de banana-pão. Pode-se constatar que dentre os modelos testado os que melhor se ajustaram as temperaturas de secagem foram o modelo Logarítmico e o modelo de Page, estes apresentaram os maiores valores de R^2 e os menores RMSE. Vale ressaltar que os modelos de Difusão Aproximada e Newton também podem ser utilizados para estimar os dados experimentais, visto que apresentam $R^2 \geq 0,990$ e $RMSE < 0,1$.

Tabela 2. Coeficientes de determinação (R^2), qui-quadrado (χ^2) e o erro quadrático médio da raiz (RMSE) para os cinco modelos matemáticos utilizados para descrever o processo de secagem da banana a 40, 50 e 60 °C.

Nome do modelo	Temperaturas de Secagem								
	40 °C			50 °C			60 °C		
	R^2	χ^2	RMSE	R^2	χ^2	RMSE	R^2	χ^2	RMSE
Difusão Aproximada	0,998	5,19E-04	2,28E-02	0,999	3,89E-04	1,97E-02	0,997	1,18E-03	3,44E-02
Logarítmico	1	3,33E-04	1,82E-02	0,999	4,90E-04	2,21E-02	0,998	6,55E-04	2,56E-02
Midilli	0,928	2,52E-02	1,59E-01	0,818	6,60E-02	2,57E-01	0,946	2,18E-02	1,48E-01
Newton	0,99	2,85E-03	5,34E-02	0,99	2,98E-03	5,46E-02	0,987	3,76E-03	6,13E-02
Page	0,999	4,61E-04	2,15E-02	0,999	3,00E-04	1,73E-02	0,997	9,95E-04	3,15E-02

O coeficiente de determinação (R^2), apresentou-se alto em pelo menos quatro modelos matemáticos, acima de 98%, indicando qualidade nos ajustes, exceto o modelo matemático de Midilli, que apresentou valores de R^2 baixo de 95%, para ambas as temperaturas de secagem estudadas (40, 50 e 60 °C). De acordo com Madamba et al. (1996) esses resultados indicam uma representação satisfatória do fenômeno em estudo, pois o valor mínimo para se ter uma reprodução aceitável dos modelos é R^2 maior que 95%. Trabalhos científicos semelhantes, como de Henríquez et al. (2014) que secaram cascas de maçãs e Oliveira et. al. (2020) que desidrataram polpa de caju em diferentes temperaturas e concentrações (°Brix), também encontraram coeficientes de determinação elevados ($> 99\%$) para seus modelos matemáticos.

Os coeficientes dos modelos matemáticos têm relação com a temperatura de secagem e o teor de umidade da amostra. De acordo com Silva et. al. (2015) tal fenômeno indica que conforme vai aumentando as temperaturas de secagem a velocidade em que a água é retirada da amostra é acelerada, ação atribuída a elevação da taxa de secagem. Ou seja, os valores de k aumentam gradativamente conforme o aumenta-se a

temperatura, pois está associado com a facilidade de remover umidade da amostra. Esse fenômeno pode ser visto facilmente na Tabela 3, onde para todos os modelos descritos houve um crescimento nos valores de k gradativo para cada temperatura de secagem.

Tabela 3. Constantes de secagem (k) dos modelos matemáticos analisados durante a secagem da banana-pão a 40, 50 e 60 °C.

Nome do modelo	Temperatura de secagem (°C)		
	40	50	60
Difusão Aproximada	$k=0,00699$	$k=0,0089$	$k=0,0100$
Logarítmico	$k=0,0025$	$k=0,0035$	$k=0,0033$
Midilli	$k=0,0000$	$k=0,0000$	$k=0,0000$
Newton	$k=0,0037$	$k=0,0047$	$k=0,0053$
Page	$k=0,0007$	$k=0,0007$	$k=0,0008$

O modelo matemático Midilli, foi o que apresentou a menor constante de secagem ($k \text{ min}^{-1}$) para as três temperaturas avaliadas com a velocidade de ar de 1,5 m/s ($k = 0,0000$), seguido do modelo Page com valores menores que 0,0007, desta forma, tais modelos correspondem às menores taxas de secagem. Para o modelo de Difusão Aproximada, nas três temperaturas de secagem, deparou-se com os maiores valores de k em comparação aos outros modelos, sendo que, para 60 °C atingiu-se o máximo de k . O efeito indica que com o aumento da temperatura do ar de secagem, houve uma diminuição do tempo necessário para que as bananas atingissem o teor de água de equilíbrio.

A segunda Lei de Fick descreve muito bem o comportamento dinâmico do processo de secagem durante o período de taxa decrescente de transferência de umidade em relação do tempo, já que a difusão efetiva (Def) é o principal mecanismo de transferência de massa (Henríquez et al., 2014). O aumento da temperatura afetou diretamente na difusão efetiva da amostra, houve uma diminuição na Def quando comparadas as temperaturas de 40, 50 e 60 °C, sendo $0,9250 \times 10^{-10}$, $1,2333 \times 10^{-10}$ e $1,3793 \times 10^{-10} \text{ (m}^2 \text{ s}^{-1}\text{)}$

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os modelos de secagem estudados, o modelo Logarítmico e o modelo de Page se ajustaram satisfatoriamente às curvas de secagem obtidas experimentalmente para as fatias de banana-pão. A temperatura de secagem foi influenciada na cinética, sendo que houve uma diminuição na Def quando comparadas as temperaturas de 40 e 60 °C. Se considerar o binômio tempo/temperatura mais eficiente para uso futuro como conservação da banana-pão, o ideal para esse tipo de material vegetal fatiados a 0,4 cm, seria na temperatura de 60 °C.

REFERENCIAS

- [1] AOAC, AOAC: Official Methods of Analysis, Off. Methods Anal. Assoc. Off. Anal. Chem. Int. (1990).
- [2] CORRÊA, P. C.; OLIVEIRA, G. H. H.; BOTELHO, F. M.; GONELI, A. L. D.; CARVALHO, F. M. Modelagem matemática e determinação das propriedades termodinâmicas do café (*Coffea arabica* L.) durante o processo de secagem. *Revista Ceres*, v. 57, n. 5, p. 595–601, 2010.
- [3] DEAMICI, Kricelle M. et. al. Drying kinetics of fermented grape pomace: Determination of moisture effective diffusivity. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*. Campina Grande. v.20, n.8, p.763-768, 2016. <https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v20n8p763-768>.
- [4] FIORENTIN, L. D. et al. Determinação da cinética e das isotermas de secagem do bagaço da laranja. *Acta Scientiarum Technology*, v. 32, n. 2, 12 jul. 2010.
- [5] HADRICH, Bilel; KECHAOU, Nabil. Mathematical modeling and simulation of shrunk cylindrical material's drying kinetics—Approximation and application to banana. *Food And Bioproducts Processing*, [s.l.], v. 87, n. 2, p.96-101, jun. 2009. Elsevier BV.
- [6] HENRÍQUEZ, C. et al. Kinetic modeling of phenolic compound degradation during drum-drying of apple peel by-products. *Journal of Food Engineering*. v. 143, p. 146–153, 2014.
- [7] KHAMPAKOOL, Apinya; SOISUNGWAN, Salinee; PARK, Sung Hee. Potential application of infrared assisted freeze drying (IRAFD) for banana snacks: Drying kinetics, energy consumption, and texture. *LWT*, [s.l.], v. 99, p.355-363, jan. 2019. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2018.09.081>.

- [8] LEITE, Ana et. al. Contração volumétrica e cinética de secagem de fatias de banana variedade Terra. *Pesquisa Agropecuaria Tropical*, Goiânia, v. 45, n. 2, p. 155-162, abr./jun. 2015.
- [9] LOPES, R. G. M. de; MELO, J. C. S. de; BADARÓ, A. D. S.; COSTA, C. H. C.; DANTAS, H. C.; DANTAS, E. H. Mathematical correlation of the specific mass of cashew pulp at diferente temperatures and concentrations. *Brazilian Journal of Development*. Curitiba, v. 6, n. 5, p.27844-27849, may. 2020. DOI:10.34117/bjdv6n5-290
- [10] MADAMBA, P. S.; DRISCOLL, R. H.; BUCKLE, K. A. The thin-layer drying characteristics of garlic slices. *Journal of Food Engineering*, v. 29, n. 1, p. 75–97, jul. 1996.
- [11] MGHAZLI, Safa et al. Drying characteristics and kinetics solar drying of Moroccan rosemary leaves. *Renewable Energy*, [s.l.], v. 108, p.303-310, ago. 2017. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2017.02.022>.
- [12] OLIVEIRA, Gabriel Henrique Horta de, et. al. Modelling and thermodynamic properties of the drying of strawberries. *Brazilian Journal of Food Technology*. Campinas, v. 18, n. 4, p. 314-321, out./dez. 2015. <http://dx.doi.org/10.1590/1981-6723.5315>.
- [13] ROBERTS, J. S.; KIDD, D. R.; PADILLA-ZAKOUR, O. Drying kinetics of grape seeds. *Journal of Food Engineering*. v. 89, p. 460–465, 2008. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2008.05.030.
- [14] SILVA, L.A. et al. Cinética de secagem e difusividade efetiva em folhas de jenipapo (*Genipa americana* L.). *Rev. bras. plantas med., Botucatu*, v. 17, n. 4, supl. 2, p. 953-963, 2015 . https://doi.org/10.1590/1983-084X/14_106
- [15] TUNCKAL, Cüneyt; DOYMAZ, İbrahim. Performance analysis and mathematical modelling of banana slices in a heat pump drying system. *Renewable Energy*, [s.l.], v. 150, p.918-923, maio 2020. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2020.01.040>.

Capítulo 6

*Farinha da casca de maracujá (*Passiflora edulis f. flavicarpa*): Obtenção e caracterização da composição físico-química*

Ingryd Rodrigues Martins

Isabelly Silva Amorim

Eduardo Saymon Santos da Silva

Danyelly Silva Amorim

Jamille de Sousa Monteiro

Kássia Rodrigues da Costa Sena

Francisca Mariane Martins Araújo

Maria Regina Sarkis Peixoto Joele

Resumo: O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá e os seus resíduos gerados durante o processamento das indústrias de polpa de frutas, na maioria das vezes são descartados ou utilizados como compostagem. As cascas, que compreendem a maior parte do fruto podem ser aproveitadas como fonte de novas alternativas tecnológicas, econômicas e ambientais. Diante disto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a composição físico-química da farinha obtida da casca de maracujá. Nas amostras de farinha foram quantificados os teores de umidade, proteínas, cinzas, lipídeos, fibra bruta, carboidratos, valor calórico, carotenoides e parâmetros de cor instrumental. O rendimento da farinha casca de maracujá foi de 6,86% em relação à quantidade inicial de cascas utilizadas. A farinha apresentou 8,49% de umidade, com bom estado de conservação e qualidade, com teor de cinzas (6,01%), proteínas (17,52%), lipídeos (2,04%) e carboidratos (65,97%), de acordo com os padrões estabelecidos nas legislações vigentes. O conteúdo de fibras alimentares (69,63%) é considerado bem elevado. Porém, foi identificado valor inferior para o teor de carotenoides totais (3,03 mg/100g), o que pode ter sido afetado pelo processo de secagem, indicando que o tempo e temperatura aplicada afetou de forma negativa este parâmetro. Refletindo diretamente na cor do produto analisado, onde as coordenadas de cor, L*, a* e b*, demonstram maior luminosidade, vermelho menos intenso e cor amarela mais perceptível. Os resultados obtidos demonstram que a farinha da casca de maracujá pode ser considerada como fonte de fibras alimentares, sendo considerado um alimento funcional, de grande relevância, pois reduz o desperdício, podendo ser empregada para agregar valor na produção das agroindústrias e ainda limitar a poluição ambiental.

Palavras-Chave: Aproveitamento de resíduos agroindustriais. Fibra alimentar. Alimento funcional.

1. INTRODUÇÃO

O maracujá é conhecido popularmente por diversos nomes regionais, porém seu nome científico é *Passiflora edulis f. flavicarpa*, da família *Passifloraceae*. É um dos frutos mais cultivados pelo mundo, sendo o Brasil o maior produtor mundial, contribuindo com aproximadamente 95% da produção, utilizado em geral no preparo de sucos (CORREIA; ARAUJO, 2010; FAO, 2018). O fruto é formado por epicarpo, flavedo (casca), mesocarpo ou albedo (parte branca), arilo carnoso, endorcapo (polpa) e sementes (MARTÍNEZ et al., 2012; VIEIRA et al., 2015).

A casca do maracujá corresponde em torno de 60% do fruto e segundo Fernandes et al. (2008), podem ser transformados em coprodutos alimentares, devido serem ricas em fibras, em especial, de pectina. Que podem ser utilizadas para a produção de farinhas e adicionadas em doces, geleias, bebidas ou como espessante em gelados comestíveis. Com propriedades importantes para prevenir doenças, principalmente as relacionadas a distúrbios gastrointestinais e do coração.

Além do mais, a casca deste fruto possui disponibilidade de outros nutrientes como a presença de niacina (vitamina B3) que atua no crescimento e produção de hormônios, e minerais, tais como o ferro, que tem o papel de prevenir a anemia, e o cálcio que contribui com a manutenção óssea (CÓRDOVA et al., 2005; LÓPEZ-VARGAS et al., 2013; COELHO et al., 2016). Existem, também, os antioxidantes, que possuem atividade anti-hipertensiva e capacidade de reduzir os níveis de glicose e colesterol. Portanto, o maracujá é um fruto que apresenta um grande potencial, em termos de alimento funcional, sendo necessários mais estudos, sobretudo de espécies cultivadas e produzidas no Brasil (CANTERI, 2010; ZERAIK et al., 2010).

Os resíduos gerados durante o processamento de polpa de frutas nas indústrias de alimentos, geralmente, são destinados à alimentação animal, no entanto, estudos comprovam a qualidade e o potencial nutricional dessas biomassas, podendo ser ótimas alternativas para a obtenção de novos subprodutos alimentícios. Resultando em retornos econômicos e financeiros para as indústrias, além disso, diminui a produção de lixo orgânico e favorece a segurança alimentar de forma sustentável (BUD; NARAIN, 2009; AQUINO et al., 2010; COELHO; WOSIACKI, 2010; NATIVIDADE, 2010; SILVA; RAMOS, 2010; CÓRDOVA et al., 2013; GIUNTINI et al., 2018).

Dentre as possibilidades de viabilizar o aproveitamento dos resíduos formados durante a produção do suco de maracujá tem-se o desenvolvimento de produtos a partir de sua casca. Neste contexto, uma das opções é a secagem em sistemas de circulação de ar, que é uma das tecnologias mais aplicadas para a obtenção de farinha como ingrediente alimentar (ROMELLE; ASHWINI; MANOHAR, 2016). O processo de secagem em alimentos tem a finalidade de remover a água disponível, tornando os nutrientes presentes mais concentrados, facilitando assim a extração e quantificação dos mesmos, além de prolongar o tempo de vida útil dos alimentos em temperatura ambiente, resultando, desta forma em uma maior valorização dos produtos processados.

Portanto, devido os efeitos positivos à saúde, e a necessidade de uma alimentação mais saudável, Medeiros et al. (2009), afirmam que a farinha da casca de maracujá é uma alternativa importante, pois é rica em inúmeros nutrientes, sendo possível sua incorporação no desenvolvimento de novos produtos (SANTANA et al., 2011).

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo desenvolver a farinha da casca de maracujá e analisar sua composição físico-química, tendo em vista futura aplicações tecnológicas e deste modo, reduzir o impacto ambiental causado por este resíduo agroindustrial.

2. METODOLOGIA

O presente estudo foi realizado no Laboratório de Análise de Alimentos da Universidade do Estado do Pará e no Laboratório de Físico-química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará / Campus Castanhal. Os frutos utilizados no experimento foram adquiridos no comércio local do município de Castanhal – PA. Foi realizada uma pré-seleção dos maracujás, adotando critérios, como aspecto visual e danos visíveis aparentes.

2.1. OBTENÇÃO E PREPARO DA MATÉRIA-PRIMA

Inicialmente, os frutos foram limpos com o auxílio de esponja e água corrente, para a remoção de sujidades presentes nas cascas, em seguida foram sanitizados por imersão em solução de hipoclorito de sódio a 200 ppm por 15 minutos, com posterior enxague em água corrente, para a retirada do excesso de cloro, tal procedimento está em acordo com o manual sobre processamento mínimo de frutas, difundido pela Embrapa (BASTOS, 2006). Após esta etapa, os frutos foram despulpados de forma manual, com o auxílio de faca inoxidável, e as cascas separadas para a produção da farinha.

2.2. OBTENÇÃO DA FARINHA DA CASCA DO MARACUJÁ

As cascas foram depositadas em bandejas de aço-inox, e em seguida acondicionadas em estufa com circulação de ar. O processo de secagem ocorreu por um período de 48 horas, em temperatura constante de 60°C, conforme Santos et al. (2017), com adaptações. Posteriormente, o resíduo seco foi triturado em liquidificador doméstico e refinado em peneira de 0,25 mm. Em seguida, a farinha da casca de maracujá (Figura 1) foi armazenada em embalagens de polietileno até a realização das análises.

Figura 1 – Farinha da casca do maracujá (*Passiflora edulis f. flavicarpa*), obtida a partir do método de secagem

Fonte: autores

2.3. AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO FÍSICO-QUÍMICA

As análises de umidade, cinzas, proteínas, lipídeos, fibra bruta e carboidratos foram realizadas em triplicata. O teor de umidade foi determinado em estufa com circulação de ar à 105 °C, até obtenção de peso constante e as cinzas (matéria mineral) por método gravimétrico de incineração em mufla com temperatura de 550 °C. O teor de proteína bruta foi avaliado pelo método quantitativo, em destilador Kjeldahl, a partir do teor de nitrogênio total, utilizando o fator de correção de 6,25. Os lipídeos totais foram determinados pelo método Soxhlet (AOAC, 2005). A fibra alimentar total foi determinada pelo método de AOAC (2005) que se baseou na dissolução da amostra, sucessivamente em solução ácida, básica e com acetona. O resíduo não dissolvido constituiu a fibra. O teor de carboidratos foi calculado por diferença, Equação 1.

$$E = 100 - (A + B + C + D) \quad (1)$$

Onde:

A = Proteínas;
B = Lipídeos;
C = Umidade;
D = Cinzas;
E = Carboidratos.

O valor calórico, expresso em Kcal/100g, foi avaliado de acordo com os fatores de conversão de Atwater, de acordo com a Equação 2 (BRASIL, 2003).

$$VC = P \cdot 4 + C \cdot 4 + (L \cdot 9) \quad (2)$$

Onde:

P = Proteínas;

C = Carboidratos;

L = Lipídeos.

2.4. QUANTIFICAÇÃO DE CAROTENOIDES TOTAIS

O teor de carotenoides totais foi avaliado, de acordo com metodologia proposta por Talcott e Howard (1999), com modificações. Foram pesadas 2 g de amostra e acrescentadas em 10 mL de solução etanol – acetona (1:1 v/v), a mistura foi homogeneizada e filtrada em papel filtro por duas vezes, até o resíduo mostrar coloração esbranquiçada. O filtrado foi transferido para balão volumétrico de 25 mL, e posteriormente, ajustado o volume com água destilada. A absorbância foi medida a 450 nm em espectrofotômetro (SP Spectrum 2000). Os valores encontrados foram expressos em µg de carotenoides por grama de farinha da casca de maracujá, de acordo com a Equação 3:

$$C = \frac{A \cdot V \cdot 10^4}{E \cdot P} \quad (3)$$

Onde:

A = absorbância lida;

V = volume do solvente utilizado para a diluição da amostra;

E = absortividade de 2000;

P = quantidade de amostra.

2.5. AVALIAÇÃO DA COR INSTRUMENTAL

A análise de cor foi realizada em colorímetro portátil da marca Konica Minolta (CM-A177) em diagrama tridimensional de cores, com leitura das coordenadas: L^* referente a luminosidade do preto (0) ao branco (+100), a^* que varia do verde (-60) ao vermelho (+60), e b^* do azul (-60) ao amarelo (+60).

3. RESULTADOS/DISCUSSÕES

O rendimento de farinha da casca de maracujá foi de 6,86 % em relação ao peso total da casca *in natura*. Valor próximo (10,84%) foi observado por Xavier, Souza e Cândido (2015), no mesmo tipo de farinha. Conforme Rybka, Lima e Nassur (2018), tais valores podem estar correlacionados, especificamente pela quantidade de água disposta na composição da casca deste fruto.

3.1. AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO FÍSICO-QUÍMICA

Os resultados da composição físico-química e valor energético da farinha da casca de maracujá encontram-se na Tabela 1. A farinha da casca de maracujá avaliada apresentou valor de umidade de acordo com o preconizado na RDC nº 263 de 22 de setembro de 2005, que estipula que as farinhas vegetais devem apresentar no máximo 15% de teor de água em sua composição. Este resultado foi similar ao de Cazarin et al. (2014), também ao avaliar farinha de casca de maracujá (9,48%). Assim como, Moreno (2016), que ao avaliar os teores de umidade das farinhas das cascas de abacaxi e manga obtiveram valores de umidade de 9,53% e 5,87%, respectivamente. As variações identificadas nos resultados, quando

correlacionado com os demais autores, são atribuídas as diferentes composições das cascas, assim como os cultivos dos frutos, irrigação, adubação ou não do solo, dentre outros fatores (BERTAGNOLLI et al., 2014; CAZARIN et al., 2014). Santos et al. (2017), ressalta a importância desse parâmetro para determinar a composição e suscetibilidade de um alimento, pois está diretamente relacionado com a conservação e qualidade do produto.

Tabela 1 – Média dos resultados da composição centesimal e energética das amostras da farinha da casca de maracujá

Determinações	Valores
Umidade (%)	8,49 ± 0,06
Cinzas (%)	6,01 ± 0,02
Proteínas (%)	17,52 ± 0,25
Lipídeos (%)	2,04 ± 0,15
Fibras (g/100g)	69,73 ± 0,03
Carboidratos (%)	65,97 ± 0,13
Valor calórico (Kcal/100g)	346,94 ± 0,04

Valores expressos em média ± desvio-padrão.

De acordo com a legislação brasileira o limite máximo do teor de cinzas em farinhas vegetais é 6%, portanto, a farinha avaliada encontra-se do padrão recomendado pela legislação vigente (BRASIL, 2005). Santana et al. (2011), encontraram resultado similar, onde relataram que o teor de cinzas foi de 6,88%. Enquanto, Silva et al. (2015), obtiveram valores acima (8,70 %) do parâmetro estipulado pela legislação.

As variações nos teores de proteínas totais, nas farinhas dos resíduos de frutas estão relacionadas aos diferentes métodos de secagem aplicada e também nas condições de adubações, principalmente nitrogenadas, influenciam (CARVALHO, 2008; CAVALCANTI, 2011). O teor de proteínas do presente estudo é considerado maior em comparação com os valores descritos na literatura. Dias e Plácido (2016), ao analisarem os teores de proteínas em diferentes temperaturas de secagem (40 °C, 50 °C, 60 °C e 70 °C) para obtenção da farinha de maracujá observaram maior valor de proteínas a 60 °C (11,43%) e menor percentual a 70°C. Possivelmente, tal redução ocorreu devido à complexação do nitrogênio com outros compostos, ocasionando a desnaturação das proteínas. Já Catarino e Seibel (2017), ao elaborarem a farinha da casca de maracujá com secagem na temperatura de 65°C, por quatro dias, obtiveram valor de proteína de 4,44%.

O baixo valor de lipídios encontrado na farinha de maracujá do presente estudo está de acordo com a literatura, pois Cazarin et al. (2014) e Silva et al. (2015), observaram respectivamente, 0,31% e 1,00%.

A farinha analisada pode ser considerada um alimento com fonte de fibra alimentar apresentando conteúdo superior a 69,63%, acima do estabelecido pela legislação, mínimo de 25% (RDC 54/2012, BRASIL, 2012). O percentual de fibra bruta da farinha da casca de maracujá é maior do que os resultados apresentados por Souza (2008), com 66,37%, Canzarin et al. (2014) com 65,22% e Silva et al. (2015) com 28,28% para produto similar também elaborado com casca de maracujá. Apenas López-Vargas (2013), encontrou teor de fibra alimentar mais elevado (71,73%). Ao comparar o teor de fibra bruta de farinhas elaboradas com manga (51,20%) e uva (58,01%), determinados por Ajila et al. (2010) e Bender et al. (2016), respectivamente, os valores foram inferiores ao desta pesquisa.

As fibras alimentares exercem efeito positivo no organismo humano, pois auxiliam na redução do aparecimento de doenças, como diabetes, cardiovasculares, obesidade, câncer de colorretal, síndrome do cólon irritável, dentre outras. Além disso, a ingestão diária proporciona o alívio da constipação e controle de peso (LAMOUNIER et al., 2015; BULTOSE, 2016; GIUNTINI et al., 2018; MENEZES, 2018).

A farinha da casca do maracujá apresentou valor de carboidratos superior ao valor detectado por Storck et al. (2015), em farinha do resíduo de uva (45,80%) e equivalente a farinha do resíduo de maçã (67,40%) observado por Silva et al. (2017).

O valor calórico médio da farinha da casca de maracujá é considerado baixo, próximo ao valor identificado por Canteri (2010), em farinha do pericarpo do maracujá-amarelo (250 kcal/100g de produto). Galeno e Rezende (2013) avaliaram a substituição parcial da farinha de trigo pela farinha da casca de maracujá na elaboração de bolos, e observaram que a medida que aumentava o percentual de farinha de casca do maracujá diminuía o valor calórico dos produtos, indicando que a farinha obtida é menos energética quando comparada a farinha de trigo integral. A partir desse resultado, pode-se dizer que a farinha da

casca de maracujá é ótima substituta para o desenvolvimento de produtos menos calóricos, podendo ser direcionada ao público que busca a redução de peso corporal.

3.2. QUANTIFICAÇÃO DE CAROTENOIDES TOTAIS

A quantificação de carotenoides totais, disponíveis no subproduto desenvolvido a partir do resíduo de maracujá, encontra-se na Tabela 2.

Tabela 2 – Teores médios e desvio padrão da quantificação de carotenoides totais da farinha da casca de maracujá

Parâmetro	Teor (mg/100g)
Carotenoides	3,03 ± 0,04

Valores expressos em média ± desvio-padrão.

O valor médio de carotenoides totais nas amostras de farinha da casca de maracujá encontra-se próximo ao determinado por Moreno (2016), em amostras de farinha das cascas de abacaxi e manga, 3,55 mg/100g e 3,81 mg/100g de extrato, respectivamente. Enquanto que os valores de carotenoides (21,25 mg/100g) nos frutos *in natura* de maracujá-amarelo encontrados por Silva e Mercadante (2002), são muito superiores, indicando que durante o processo de secagem houve perda significativa desse composto. Ueno et al. (2007), afirmam que a elevada temperatura, por um período prolongado, ocasiona a degradação de alguns compostos, inclusive de carotenoides, devido à sensibilidade a altas temperaturas e luminosidade, afetando de forma negativa na cor dos alimentos.

3.3. AVALIAÇÃO DA COR INSTRUMENTAL

Os resultados de análise cor, da farinha da casca de maracujá apresentou maior valor da coordenada b^* , cor amarela mais intensa, e menores valores de L^* e a^* , baixa luminosidade e cor vermelha menos intensa. As diferentes técnicas de processamento, assim como a temperatura de secagem tem efeito significativo na cor de farinhas (ORIKASA et al., 2010).

Tabela 3 – Valores médios e desvio padrão das coordenadas de cor, obtidas a partir da farinha da casca de maracujá submetida ao processo de secagem.

Coordenadas de cor	Valores
L^*	32,71 ± 0,03
a^*	4,30 ± 0,01
b^*	18,57 ± 0,02

Valores expressos em média ± desvio-padrão.

Ortolan et al. (2010), observaram que a farinha de trigo em estudo apresentou resultados maiores de luminosidade (97,50) e coordenada b^* (7,67), em comparação com esta pesquisa. Em contrapartida, Dias e Plácido (2016), ao analisaram a mesma farinha após secagens com temperaturas distintas (60 °C e 70 °C), notaram que houve impactos na cor, proporcionando maior cromaticidade nas coordenadas a^* , característico da disponibilidade de compostos escuros e menor valor de L^* . Já Silva et al. (2015), ao avaliarem a coloração da casca de maracujá, obtiveram alto índice de luminosidade, com 69,12, e não foi identificado a cor, azul, verde ou vermelho, representadas pelas coordenadas a^* e b^* , tendo ênfase apenas na coloração amarela.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A farinha obtida a partir da casca de maracujá apresentou características compatíveis com os padrões estabelecidos pela legislação em vigor. A farinha elaborada apresentou baixo percentual de umidade, o que reduz as possibilidades de proliferação de microrganismos. A avaliação da composição centesimal indicou que os constituintes de maior relevância foram às frações de fibras alimentares e carboidratos, ou seja, fonte natural de fibras e com alto poder nutritivo. A farinha elaborada pode ser um alimento alternativo consumido de forma direta ou incorporado em produtos alimentícios funcionais, podendo,

assim agregar valor nutricional.

Sendo assim, os resultados encontrados abrem novas perspectivas para o aproveitamento dos resíduos gerados por agroindústrias, tornando-os viáveis, do ponto de vista econômico, social e ambiental, como potencial de exploração e nutricional.

AGRADECIMENTOS

Aos laboratórios da Universidade do Estado do Pará e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará / Campus Castanhal, pela oportunidade da realização e efetivação das análises.

REFERÊNCIAS

- [1] AACC - American Association of Cereal Chemists. Official methods of analysis of AOAC. 18th ed. St. Paul, 2005.
- [2] ABUD, A. K. S.; NARAIN, N. Incorporação da farinha de resíduo do processamento de polpa de fruta em biscoitos: uma alternativa de combate ao desperdício. *Brazilian Journal of Food Technology*, Campinas, v. 12, n. 4, p. 257-65, 2009.
- [3] AJILA, C. M.; AALAMI, M.; KRISHNARAU, R.; RAO, U. P. Mango peel powder: A potential source of antioxidant and dietary fiber in macaroni preparations. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, v.11, n.1, p. 219-224, 2010.
- [4] AQUINO, A. C. M. de S.; MÔES, R. S.; LEÃO, K. M. M.; FIGUEIREDO, A. V. D.; CASTRO, A. A. Físico-química e aceitação sensorial de biscoitos tipo cookies elaborados com farinha do resíduo de acerola. *Revista do Instituto Adolfo Lutz*, São Paulo, v. 69, n. 3, p. 379-386, 2010.
- [5] BASTOS, M. do S. R. Processamento mínimo de frutas. Embrapa Informação Tecnológica, Brasília - DF, 2006.
- [6] BENDER, A. B. B.; LUVIELMO, M. de M.; LOUREIRO, B. B.; SPERONI, C. S.; BOLIGON, A. A.; DA SILVA, L. P.; PENNA, N. G. Obtenção e caracterização de farinha de casca de uva e sua utilização em snack extrusado. *Brazilian Journal of Food Technology*, v. 19, e2016010, 2016.
- [7] BERTAGNOLLI, S. M. M.; SILVEIRA, M. L. R.; FOGAÇA, A. O.; UMAN, L.; PENNA, N. G. Bioactive compounds and acceptance of cookies made with Guava peel flour. *Food Sci. Technol*, Campinas, v. 34, n. 8, p. 303-308, 2014.
- [8] BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003. Regulamento técnico sobre rotulagem nutricional de alimentos embalados. *Diário Oficial da União; Poder Executivo*, 23 dezembro de 2003.
- [9] BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução RDC nº 263 de 22 de setembro de 2005. Regulamento Técnico para produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos. *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 23 set. 2005, Seção1, p. 368-9.
- [10] BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução RDC nº 54, de 12 de novembro de 2012. Regulamento Técnico sobre Informação Nutricional Complementar. *DOU. Diário Oficial da União, Poder Executivo*, DF, Brasília, 2012.
- [11] BULTOSE, G. Functional Foods: dietary fibers, prebiotics, probiotics, and synbiotics. *Encyclopedia of Food Grains*. Elsevier, p.11-16, 2016.
- [12] CANTERI, M. H. G. Caracterização comparativa entre pectinas extraídas do pericarpo de maracujá-amarelo (*passiflora edulis f. flavicarpa*). 162 f. 2010. Tese (Doutorado em Tecnologia de Alimentos) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010.
- [13] CARVALHO, M. G. Barras de cereais com amêndoas de chichá, sapucaia e castanha-do gurguéia, complementadas com casca de abacaxi. *Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Alimentos)* - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2008.
- [14] CAVALCANTI, M. T. SILVA, V. C.; DA COSTA, T. S.; FLORÊNCIO, I. M.; FLORENTINO, E. R. Obtenção do amido do endocarpo da manga para diversificação produtiva na indústria de alimentos. *Revista Verde*, v. 6, n. 5, p. 80-83, 2011.
- [15] CAZARIN, C. B. B.; DA SILVA, J. K.; COLOMEU, T. C.; ZOLLNER, R. de L.; JUNIOR, M. R. M. Capacidade antioxidante e composição química da casca de maracujá (*Passiflora edulis*). *Ciência Rural*, v. 44, n. 9, p. 1699-1704, 2014.
- [16] COELHO, E. M.; GOMES, R. G.; MACHADO, B. A. S.; OLIVEIRA, R. S.; LIMA, M. dos S.; DE AZÊVEDO, L. C.; GUEZ, M. A. U. Passion fruit peel flour - technological properties and application in food products. *Food Hydrocolloids*, v. 62, p. 158-164, 2016.

- [17] COELHO, L. M.; WOSIACKI, G. Avaliação sensorial de produtos panificados com adição de farinha de bagaço de maçã. *Ciência e Tecnologia de Alimentos*, Campinas, v. 30, n. 3, p. 582-588, 2010.
- [18] CÓRDOVA, K. R. V.; GAMA, T. M. M. T. B.; WINTER, C. M. G.; KASKANTZIS NETO, G.; DE FREITAS, R. J. S. Physical and chemical characteristics of the shell of yellow passion fruit (*Passiflora edulis Flavicarpa Degener*) obtained by drying. *Boletim do Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos*, Curitiba v. 23, n. 2, p. 221-230, 2013.
- [19] CORREIA, R. C.; ARAUJO, F. P.; ARAUJO, J. L. P. Maracujá (*Passiflora cincinnata*) – alternativa para o incremento da fruticultura de sequeiro no semiárido brasileiro. Embrapa, Petrolina, 2010.
- [20] DIAS, L. G.; PLÁCIDO, D. G. R. Aproveitamento da casca do maracujá em formulações de bebidas lácteas saborizadas com boca boa (*Buchenavia Tomentosa*). 2016. 97 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Rio Verde, 2016.
- [21] FERNANDES, A. F.; PEREIRA, J.; GERMANI, R.; OIANO-NETO, J. Efeito da substituição parcial da farinha de trigo por farinha de casca de batata (*Solanum Tuberosum* Lineu). *Ciência e Tecnologia de Alimentos*, Campinas, v. 28 (Supl.), p. 56-65, 2008.
- [22] FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS [FAO]. 2018. Crops. Disponível em: <<http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC>>. Acesso em: 12 maio. 2018.
- [23] GALENO, G. N.; REZENDE, A. J. Avaliação físico-química de bolos produzidos com diferentes níveis de farinha da casca de maracujá. *Revista de Divulgação Científica Sena Aires*, v. 5, p. 129-133, 2013.
- [24] GIUNTINI, E. B.; MENEZES, E. W. Funções plenamente reconhecidas de nutrientes - fibra alimentar. *International Life Sciences Institute do Brasil*, v. 18, p. 67, 2018.
- [25] LAMOUNIER, M. L.; ANDRADE, F. das C.; DE MENDONÇA, C. D.; MAGALHÃES, M. L. Desenvolvimento e caracterização de diferentes formulações de sorvetes enriquecidos com farinha da casca da jabuticaba (*Myrciaria cauliflora*). *Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes*, v. 70, n. 2, p. 93. 2015.
- [26] LÓPEZ-VARGAS, J. H.; FERNÁNDEZ-LÓPEZ, J.; PÉREZ-ÁLVAREZ, J. A.; VIUDA-MARTOS, M. Chemical, physico-chemical, technological, antibacterial and antioxidante properties of dietary fiber powder obtained from yellow passion fruit (*Passiflora edulis* var. *flavicarpa*) co-products. *Food Research International*, v. 51, p. 756-763, 2013.
- [27] MARTÍNEZ, R.; TORRES, P.; MENESES, M. A.; FIGUEROA, J. G.; PÉREZ-ÁLVAREZ, J. A.; VIUDA-MARTOS, M. Chemical, technological and in vitro antioxidant properties of mango, guava, pineapple and passion fruit dietary fiber concentrate. *Food Chemistry*, v. 135, p. 1520-1526, 2012.
- [28] MEDEIROS, J. dos S.; DINIZ, M. de F. F. M.; SRUR, A. U. O. S.; PESSOA, M. B.; CARDOSO, M. A. A.; DE CARVALHO, D. F. Ensaios toxicológicos clínicos da casca do maracujá amarelo (*Passiflora edulis*, f. *flavicarpa*), como alimento com propriedade de saúde. *Revista Brasileira de Farmacognosia*, v. 19, n. 2, p. 394-399, 2009.
- [29] MORENO, J. S. Obtenção, caracterização e aplicação de farinha de resíduos de frutas em cookies. 2016. 81 f. Dissertação (Mestrado em Ciência de Alimentos) – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Itapetinga, 2016.
- [30] NATIVIDADE, M. Desenvolvimento, caracterização e aplicação tecnológica de farinhas elaboradas com resíduos da produção de suco de uva. 2010. 202 f. Dissertação (Mestrado em Ciência dos Alimentos) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2010.
- [31] ORIKASA, T.; WU, L.; ANDO, Y.; MURAMATSU, Y.; ROY, P.; YANO, T.; SHIINA, T.; TAGAWA, A. Hot air drying characteristics of sweet potato using moisture sorption isotherm analysis and its quality changes during drying. *International Journal of Food Engineering*, v. 6, n. 2, 2010.
- [32] ORTOLAN F.; COELHO, H. S.; GOULARTE, V. D.; MOLINA, P. D. da S.; AIRES, E. M.; CORREA, K. V. L. Caracterização da cor de massas frescas elaboradas com farinha de trigo de diferentes genótipos durante o período de armazenamento. *Congrega URCAMP*, 2010.
- [33] ROMELLE, F. D.; ASHWINI, R. P.; MANOHAR, R. S. Chemical composition of some selected fruit peels. *European Journal of Food Science and Technology*, v. 4, n. 4, p. 12-21, 2016.
- [34] RYBKA, A.; LIMA, A.; NASSUR, R. Caracterização da farinha da casca de diferentes cultivares de manga. *Enciclopédia Biosfera*, v. 15, n. 27, p. 12-21, 2018.
- [35] SANTANA, F. C.; SILVA, J. V.; SANTOS, A. J. A. L.; ALVES, A. R.; WARTHA, E. R. da S. A.; MARCELLINI, P. S.; SILVA, M. A. A. P. Desenvolvimento de biscoito rico em fibras elaborado por substituição parcial da farinha de trigo por farinha da casca do maracujá amarelo (*Passiflora edulis FLAVICARPA*) e fécula de mandioca (*Manihot esculenta CRANTZ*). *Revista Alimentação e Nutrição*, Araraquara, n. 3, p. 391-399, 2011.

- [36] SANTOS, E. da N.; BERREZA, E. dos A.; DA SILVA, L. M. A.; CAVALCANTI, M. T. Elaboração e caracterização da farinha do fruto da castanhola (*Terminalia catappa* Linn). Revista Verde e Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v. 12, n.2, p. 362, 2017.
- [37] SILVA, M. A. P.; CAGNIN, C.; CALIARI, M.; CARVALHO, B. S.; PLACIDO, G. R.; SILVA, R. M.; SOARES, J. C.; LIMA, M. S.; ARAUJO, V. F. P.; CARMO, R. M. Mass loss, physicochemical characteristics of passion fruit peel (*Passiflora Edulis* Sims) submitted drying process. African Journal Of Agricultural Reserarch, v. 10, n. 45, p. 4142-4149, 2015.
- [38] SILVA, M. B.; RAMOS, A. M. Composição química, textura e aceitação sensorial de doces em massa elaborados com polpa de banana e banana integral. Revista Ceres, Viçosa, v. 56, n. 5, p. 551-554, 2010.
- [39] SILVA, S. R.; MERCADANTE, A. Z. Composição de carotenoides de maracujá-amarelo (*Passiflora edulis flavicarpa*) *in natura*. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 22, n. 3, dez. 2002.
- [40] STORCK, C. R.; BASSO, C.; FAVARIN, F. R.; RODRIGUES, A. C. Qualidade microbiológica e composição de farinhas de resíduos da produção de suco de frutas em diferentes granulometrias. Brazilian Journal of Food Technology, v. 18, n. 4, p. 277-284, 2015.
- [41] TALCOTT, G. J.; HOWARD, L. R. Phenolic autoxidation is responsible for color degradation in processed carrot puree. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 47, p. 2109-2115, 1999.
- [42] UENOJO, M.; MAROTISTA JUNIOR, M. R.; PASTORE, G. M. Carotenoides: propriedades, aplicações e biotransformação para formação de compostos de aroma. Química Nova, São Paulo, v. 30, n. 3, p. 616-622, 2007.
- [43] VIEIRA, A. R.; VINGELIENE, S.; CHAN, D. S. M.; AUNE, D.; ABAR, L.; ROSENBLATT, D. N.; GREENWOOD, D. C.; NORAT, T. Fruits, vegetables, and bladder cancer risk: a systematic review and meta-analysis. Cancer Medicine, v. 4, p. 136-146, 2015.
- [44] XAVIER, G. F.; SOUZA, B. S.; CÂNDIDO, T. A. T. Determinação da composição centesimal da casca e da farinha da casca de maracujá. p. 6, 2015.
- [45] ZERAIK, M. L.; PEREIRA, C. A. M.; ZUIN, V.; YARIWARE, J. H. Passion fruit: a functional food?. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 20, p. 459-471, 2010.

Capítulo 7

Bolinho de arroz com ora-pro-nóbis: Análise química e sensorial

Amanda de Ávila Silveira

Carla Regina Amorim dos Anjos Queiroz

Claudia Maria Tomás Melo

Deborah Santesso Bonnas

Resumo : Uma alimentação adequada e saudável é um direito humano garantido pela da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e pode ser alcançada por meio de uma dieta alimentar que atenda às necessidades biológicas e sociais dos indivíduos. A Ora-pro-nóbis (OPN), *Pereskia aculeata* Mill., é uma hortaliça pertencente às Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) que pode contribuir para melhoria da alimentação, pois quando essas hortaliças são utilizadas, a dieta pode adquirir maior valor nutricional. Foram elaborados bolinhos de arroz com adição de folhas de Ora-pro-nóbis *in natura* (0% -padrão, 2,5% e 5%) e realizou-se a caracterização química e análise sensorial em teste de aceitação em escala hedônica de 9 pontos. Verificou-se altos índices de aceitabilidade e igualdade entre os bolinhos na avaliação sensorial dos atributos cor, sabor, aroma e textura. Nas análises químicas, os bolinhos adicionados de ora-pro-nóbis, apresentaram menor teor de água e maior teor de proteínas, comparativamente aos bolinhos sem adição de PANC. Os teores de cinzas e lipídeos foram iguais entre as formulações adicionadas e o teor de fibra bruta foi 2,5% maior que o padrão. Os bolinhos de arroz formulados com Ora-pro-nóbis são uma opção para melhoria nutricional do produto tradicional, especialmente em relação ao conteúdo proteico.

Palavras-Chave : Planta alimentícia não convencional (PANC). *Pereskia aculeata* Mill. Alimentos tradicionais.

1. INTRODUÇÃO

As hortaliças possuem grande potencial para tornar a alimentação humana mais saudável, por possuírem em sua constituição fibras alimentares, antioxidantes, macro e micronutrientes e vitaminas (BRASIL, 2010). Uma alimentação adequada e saudável é um direito humano garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Ela pode ser alcançada por meio de uma dieta alimentar que atenda às necessidades biológicas e sociais dos indivíduos, dando ênfase aos alimentos regionais, com respeito ao seu significado socioeconômico e cultural (BRASIL, 2006).

Como parte das plantas alimentícias não convencionais (PANCs), a Ora-pro-nóbis (OPN), *Pereskia aculeata* Mill., pode contribuir para melhoria da alimentação, pois quando essas hortaliças são utilizadas, a dieta pode adquirir maior valor nutricional (ROMANO et al., 2017).

A Ora-pro-nóbis é uma hortaliça não convencional utilizada tradicionalmente por parte da população mineira, especialmente nas regiões mineradoras e no Triângulo Mineiro. Embora seja conhecida desde os tempos da escravidão, vem ganhando interesse em pesquisas e destaque nos últimos anos, por sua composição em substâncias bioativas e nutrientes (TAKEITI et al., 2009; ALMEIDA et al., 2014; SOUZA et al., 2016).

Em sua composição, há elevados teores de proteínas, daí o motivo de ser popularmente conhecida como carne verde ou carne de pobre (SILVA et al., 2010), fibras, vitaminas A e C, ácido fólico e minerais, principalmente ferro, zinco, cálcio, magnésio e manganês (TAKEITI et al., 2009; PINTO, SCIO, 2014).

Outra característica atraente da Ora-pro-nóbis é a sua versatilidade; pode ser utilizada de diversas maneiras, na forma *in natura*, processada em alimentos cozidos, ou ainda utilizada na forma pré-seca, como farinha. Pode ser utilizada em preparados doces e salgados (QUEIROZ et al., 2015). Assim, a OPN pode contribuir para o atendimento de uma demanda do mercado por alimentos funcionais (KINUPP; LORENZI, 2014), além de contribuir na busca e na implementação de uma alimentação mais saudável à população.

O bolinho de arroz é um produto tradicional e bem aceito na culinária mineira. Seu sabor agrada aos consumidores e aliado à facilidade de preparo e baixo custo, torna-se muito atraente. Porém, no aspecto nutricional, ele contém altos teores de carboidrato (devido ao seu ingrediente principal, o arroz), alto teor de lipídios, devido ao processo de fritura, e baixo teor de fibras. Ao se propor uma modificação para melhoria da qualidade de um produto alimentício, para além da composição nutricional adequada, ele deve agradar o consumidor. Para que isso ocorra, deve haver um equilíbrio entre diferentes atributos de qualidade sensorial, como forma, cor, aparência, odor, sabor, textura, consistência e a interação dos diferentes componentes, a impressão geral. Esses atributos devem, imprescindivelmente, ser otimizados para o alcance de um equilíbrio integral e, com isso, uma boa qualidade e aceitabilidade (GUTKOSKI et al., 2007).

Assim, esse trabalho objetivou formular e analisar química e sensorialmente um bolinho de arroz elaborado com OPN *in natura*, em formulações com acréscimo de 2,5 e 5% folhas na formulação tradicional (0%).

2. MATERIAL E MÉTODOS

A obtenção das matérias primas para a formulação dos bolinhos de arroz foi realizada no comércio local, com exceção das folhas de ora-pro-nóbis, colhidas na própria fazenda do IFTM campus Uberlândia. As folhas foram coletadas da área experimental de cultivo das plantas e, em seguida, lavadas e sanitizadas com hipoclorito de sódio 100 ppm, com enxague em água corrente.

O bolinho de arroz foi formulado com as folhas de ora-pro-nóbis *in natura*, nas concentrações 2,5% e 5%; além de uma formulação padrão, sem OPN (0%). Para sua formulação, o arroz (880 g), juntamente com os demais ingredientes, foi processado em liquidificador, ovo (5 unidades), sal (10 g) e leite (110 mL). Essa massa básica foi dividida e as folhas foram acrescentadas para compor os percentuais de cada tratamento. As quantidades utilizadas estão apresentadas na Tabela 1. Após o preparo da massa básica, as folhas de Ora-pro-nóbis foram picadas e incorporadas à massa para obtenção dos percentuais de 2,5% e 5% da folha *in natura*, em relação ao total de massa.

Tabela 1. Formulações utilizadas na preparação do bolinho de arroz, com 0%, 2,5% e 5% de folhas *in natura* de Ora-pro-nóbis.

Bolinho de arroz	0% (padrão)	2,5%	5%
Massa básica (g)	416	416	416
OPN (<i>in natura</i>) (g)	0	10,7	21,9
Total antes de fritar (g)	416	426,7	437,9

Todos os bolinhos foram moldados com 20 g cada (pesados em balança) e fritos em óleo vegetal previamente aquecido, até que ficassem com coloração levemente dourada, por cerca de 6 minutos, a aproximadamente 180 °C.

Para a análise sensorial, foram elaborados somente bolinhos com adição de ora-pro-nóbis (2,5% e 5%), sendo a formulação padrão (0%), utilizada apenas para as análises físico-químicas, por já ser um produto tradicional. A pesquisa foi aprovada pelo CEP sob n. 2.717.679. Para as análises físico-químicas, foram realizadas dez repetições de cada tratamento (0%, 2,5% e 5%), perfazendo 30 parcelas para análise. A análise sensorial foi realizada no Laboratório de Análise Sensorial do IFTM Campus Uberlândia. O teste foi feito em cabines individuais, com as amostras oferecidas codificadas (765 e 091, para as concentrações de 2,5% e 5%, na ordem). Avaliou-se os atributos: impressão geral, cor, aroma, sabor e textura, utilizando-se escalas hedônicas estruturadas de 9 pontos (1: desgostei extremamente a 9: gostei extremamente, Figura 1), e, calculou-se o índice de aceitabilidade pelo resultado da impressão geral por meio da equação: $IA = (M/MN) \times 100$, em que IA é o índice de aceitação, M é a média das notas obtidas neste parâmetro e MN é a maior nota recebida.

A caracterização química foi realizada no laboratório de Físico-química do Instituto (IFTM) conforme parâmetros e metodologias do Instituto Adolfo Lutz para pequena escala, com exceção da análise de fibras que seguiu os parâmetros de Campos, Nussio e Nussio (2004). Foram determinados os teores de umidade, cinzas, proteínas, fibras, lipídeos e, por diferença da composição centesimal, o teor de carboidratos. Algumas análises sofreram as alterações descritas na **Tabela 2**.

Tabela 2. Alterações realizadas no padrão de análises determinado pelo Instituto Adolfo Lutz (2008).

Análise	Procedimento Padrão	Procedimento Novo
Determinação de cinzas	Secar a amostra em chapa elétrica antes de levar à mufla	Utilizou-se a mesma amostra que já havia sido encaminhada à estufa para determinação de umidade
Determinação de lipídeos	Usar balão de fundo chato na extração	Foi usado o tubo reboiler
	Utilizar o éter em quantidade suficiente para um Soxhlet e meio	Foi utilizado 20 mL de éter para cada tubo, com sua respectiva amostra

Todos os resultados passaram por tratamento estatístico utilizando o software Agroestat e tiveram as médias avaliadas pelo teste de Tukey, a 5% de significância.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A inclusão de folhas de Ora-pro-nóbis *in natura*, em 2,5 e 5% em relação a massa básica de bolinho de arroz, não promoveu alteração que influenciasse o processo de moldagem ou fritura dos mesmos. Visualmente, os bolinhos ficaram com aspecto que lembrou a presença de temperos verdes (como salsa e cebolinha) (**Figura 1**), o que pode ter afetado positivamente a análise sensorial do mesmo.

Figura 1. Aspecto visual dos bolinhos de arroz elaborados com folhas de Ora-pro-nóbis *in natura*, nas concentrações de 2,5 (esquerda) e 5% (direita).

Fonte: SILVEIRA, et. al (2020).

A análise sensorial contou com a participação de 35 provadores não treinados, com idades entre 19 e 76 anos. As notas atribuídas aos bolinhos (Tabela 3) permitem inferir a boa aceitabilidade do produto, já que para todos os atributos testados, nas duas formulações, houve nota máxima, 9 (gostei muitíssimo), e não ocorreu nenhuma nota mínima, 1 (desgostei muitíssimo). Além disso, afirma-se que os atributos cor, sabor, aroma e textura das duas formulações com folhas de Ora-pro-nóbis foram iguais ($p < 0,01$), todos com notas médias maiores ou iguais a 7,9.

Tabela 3. Notas máxima (M), mínima (m), média ($\bar{x}$) e desvio-padrão (DP) das notas dos provadores para os parâmetros cor (C), sabor (S), aroma (A) e textura (T) do Bolinho de arroz formulado com 2,5 e 5% de folhas de Ora-pro-nóbis *in natura*.

Atributos	Bolinho de Arroz							
	2,5%				5%			
	M	m	$\bar{x}$	DP	M	m	$\bar{x}$	DP
Cor**	9	7	8,5 _a	0,6	9	6	8,4 _a	0,8
Sabor**	9	2	8,1 _a	1,4	9	4	8,2 _a	1,2
Aroma**	9	6	8,2 _a	0,9	9	2	7,9 _a	1,5
Textura**	9	4	8,4 _a	0,8	9	3	8,4 _a	0,9

**Significativo ao nível de 1% de probabilidade. Letras diferentes na linha significam diferença significativa no teste de comparação de médias de Tukey a 95% de probabilidade.

Em relação às avaliações específicas de cada atributo, observou-se notas máximas e médias altas, assim como notas mínimas também altas para a maioria dos atributos nas duas formulações. A média geral para cada atributo os coloca no padrão entre “gostei muito – nota 8 e gostei muitíssimo – nota 9). Um dos fatores que pode ter levado aos resultados apresentados foi a utilização de folhas de OPN *in natura*, que não confere um sabor pronunciado ao produto. E, sabendo-se que essas contêm aproximadamente 90% de água (PINTO, SCIO, 2014) em sua composição, entende-se que a concentração real dos compostos responsáveis pelas percepções sensoriais foi baixa o suficiente para não alterar muito as propriedades organolépticas originais do bolinho de arroz. Isso quer dizer, que, se fossem utilizadas folhas secas, o produto teria tido acréscimo de cerca de 0,25% e 0,5% de Ora-pro-nóbis na formulação.

Em relação à cor, o tom verde das folhas *in natura* se assemelhou à cor de temperos usuais em bolinhos, afastando possível repulsa pela cor verde que poderia ser percebida em alguns alimentos (**Figura 1**). Da mesma forma, sabor, aroma e textura não foram negativamente afetados pela presença das folhas de Ora-pro-nóbis na formulação, pelo contrário, se igualaram na avaliação sensorial positiva dos provadores.

Segundo Dutcosky (2007), o índice de aceitabilidade de 70% já indica que o produto é aceito pelos provadores e seria aceito pelos consumidores. Os bolinhos tiveram índice de aceitabilidade equivalentes a 94,9% e 93,7%, respectivamente, para 2,5 e 5% de acréscimo de folhas de OPN. Estes resultados foram

muito elevados, o que representa grande viabilidade sensorial desse produto, ou seja, as formulações agradaram aos provadores.

A caracterização físico-química permitiu quantificar e comparar o conteúdo nutricional do bolinho de arroz adicionado com as folhas (2,5% e 5%) com o produto padrão (sem folhas, 0%) (**Tabela 4**).

Tabela 4. Média ($\bar{x}$) e desvio-padrão (DP) dos teores de umidade, cinzas, lipídeos, proteínas, fibras e carboidratos encontrados no Bolinho de arroz formulado com 0%, 2,5% e 5% de folhas de Ora-pro-nóbis *in natura*.

Propriedades	Bolinho de Arroz					
	0%		2,5%		5%	
	$\bar{x}$	DP	$\bar{x}$	DP	$\bar{x}$	DP
Umidade**	55,21 _a	0,19	53,70 _b	0,37	43,45 _c	0,20
Cinzas**	0,21 _b	0,64	0,35 _a	0,40	0,28 _{ab}	0,34
Lipídeos**	6,27 _b	1,47	7,48 _{ab}	1,48	8,67 _a	1,56
Proteínas**	4,09 _c	0,97	5,25 _b	0,85	6,50 _a	0,32
Fibras**	10,47 _b	1,97	13,60 _a	2,61	4,48 _c	0,65
Carboidratos	23,75	---	19,62	---	36,62	---

*,**Significativo ao nível de 5 e 1% de probabilidade. Letras diferentes na linha significam diferença significativa no teste de comparação de médias de Tukey a 95% de probabilidade.

É nítida a percepção de que a adição de ora-pro-nóbis, mesmo em baixas concentrações, na formulação do bolinho de arroz, provocou alterações na composição centesimal desse produto, em função das diferenças estatísticas percebidas pela análise de variância ($p < 0,01$). O nível de umidade reduziu significativamente conforme a concentração de OPN aumentou, o que garante ao produto menor susceptibilidade a condições favoráveis de desenvolvimento microbológico (ALMEIDA, 2016). Uma possível explicação para essa observação é que, embora esteja sendo adicionado um vegetal *in natura* à formulação básica do bolinho de arroz (alto teor de umidade), as folhas foram acrescidas e não substituíram parte da massa básica por folhas.

Com o acréscimo de OPN houve diferença no teor de cinzas ($p < 0,01$). Os teores de cinzas nos bolinhos com Ora-pro-nóbis foram semelhantes entre si; e o bolinho com 2,5% de acréscimo apresentou maior teor de cinzas que o bolinho padrão (0%). O aumento no teor de cinzas pela adição de Ora-pro-nóbis em formulações já foi verificado por SATO et. al (2019) e ROCHA et al. (2008) e decorre do alto conteúdo de resíduo mineral que as folhas de OPN *in natura* apresentam (OLIVEIRA et al., 2013).

A análise de proteínas mostrou como uma pequena quantidade de Ora-pro-nóbis pode melhorar a qualidade do alimento quanto a esse nutriente e como a presença dessas folhas são capazes de enriquecer nutricionalmente os produtos aos quais são adicionadas (BRASIL, 1998). Os bolinhos de arroz com Ora-pro-nóbis foram mais proteicos ($p < 0,01$) que a formulação sem acréscimo de folhas e o bolinho com acréscimo de 5% de folhas apresentou maior teor de proteínas que o bolinho com apenas 2,5%. Em relação ao bolinho padrão, houve aumento no teor de proteínas de 28,4% e 58,9%, respectivamente em relação aos bolinhos 2,5% e 5% de acréscimo de folhas. Resultados semelhantes foram observados por ROCHA et. al (2008).

O teor de lipídeos foi influenciado pela adição de OPN ($p < 0,01$), não havendo diferença significativa somente entre as formulações de 2,5% e 5% ($p < 0,05$). ROCHA et al. (2008), ao analisar físico-quimicamente macarrão adicionado de Ora-pro-nóbis na concentração 2%, também não identificou aumento no teor de lipídeos em relação ao produto-padrão (sem acréscimo de Ora-pro-nóbis). O teste de Tukey, mostrou que o bolinho 5% apresentou maior teor de lipídeos que o padrão 0%. Um dos fatores que poderia ter influenciado nesse resultado, além da própria presença da OPN, seria o processo de fritura dos bolinhos, imerso em óleo vegetal. Assim sendo, pode ter havido influência do processo causando maior retenção de gordura no produto final.

Houve diferença no teor de fibra bruta nos bolinhos ($p < 0,01$). Os bolinhos 2,5% apresentaram maior teor de fibra bruta, com quase 30% a mais que o bolinho padrão. Esse dado permite afirmar que a Ora-pro-nóbis é responsável por aumentar os teores de fibra quando adicionada aos alimentos. Porém, a fibra bruta no bolinho 5% apresentou-se menor que o bolinho padrão, o que é um resultado inesperado.

Considerando-se isso, o teor de carboidratos, obtido por diferença, apresentou um resultado acima do esperado para essa formulação.

O aumento da proteína e do carboidrato, pode ser de grande importância. Pois dietas com maiores níveis e relação proteínas/carboidratos se mostram mais eficientes para o controle de glicemia e insulina, auxiliando, assim, na perda de gordura corporal com preservação de massa muscular ao longo do processo de emagrecimento (SANTESSO et al., 2012).

Para que os percentuais de nutrientes fossem mais pronunciados no produto em questão poder-se-ia utilizar folhas de ora-pro-nóbis dessecada. Pois a alta proporção de umidade em folhas *in natura* agregam menor concentração real dos nutrientes do que os que poderiam ser incorporados com as folhas previamente secas. Pelos resultados apresentados, há indicação de que formulações com maiores teores de Ora-pro-nóbis *in natura* poderiam ser produzidas e testadas.

4. CONCLUSÃO

A caracterização dos bolinhos de arroz acrescidos de folhas de Ora-pro-nóbis *in natura* apresentou, no geral, melhor qualidade nutricional quando comparados à formulação padrão.

O bolinho de arroz, adicionado de OPN, foi sensorialmente bem aceito pelos provadores, indicando, dessa forma, boa aceitabilidade dos consumidores quanto a esse produto.

Esses resultados mostram que a adição de uma PANC, como a Ora-pro-nóbis, pode alterar as características nutricionais de um alimento e, ainda sim, manter alta aceitação dos provadores.

REFERÊNCIAS

- [1] ALMEIDA, M. E. F.; JUNQUEIRA, A. M. B.; SIMÃO, A. A.; CORRÊA, A. D. Chemical characterization of the non-conventional vegetable known as Ora-pro-nobis. Bioscience Journal, Uberlandia, v. 30, supplement 1, p. 431-439, June/14
- [2] ALMEIDA, I. S. (2016). Avaliação bromatológica da farinha de sementes de jaca (*Artocarpus heterophyllus* Lam.) como possível substituinte da aveia para elaboração de barras de cereais (Trabalho de conclusão de curso). Faculdade Maria Milza, Governador Mangabeira.
- [3] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria nº 31, de 13 de janeiro de 1998. Aprova o Regulamento Técnico referente a Alimentos Adicionados de Nutrientes Essenciais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 jan. 1998.
- [4] BRASIL. Portaria Interministerial nº 66 de 25 de agosto de 2006. Altera os parâmetros nutricionais do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 28 de agosto de 2006. BRASIL, 2006.
- [5] BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Manual de hortaliças não convencionais. Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo. – Brasília: Mapa/ACS, 2010. 92 p.
- [6] CAMPOS, F. P. D.; NUSSIO, C. M. B.; NUSSIO, L. G. Métodos de análise de alimentos. 1ª. ed. Piracicaba, SP: FEALQ, v. 1, 2004. 135 p.
- [7] DUTCOSKY, S. D. Análise sensorial de alimentos. 2. ed. Champagnat: Curitiba, 2007. 244p.
- [8] GUTKOSKI, L. C.; BONAMIGO, J. M. A de.; TEIXEIRA, D. M. F de.; PEDÓ, I. Desenvolvimento de barras de cereais à base de aveia com alto teor de fibra alimentar. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v.27, n. 2, p. 355-363, 2007.
- [9] INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz. v. 1: Métodos químicos e físicos para análise de alimentos, 4ª. Edição. São Paulo: IMESP, 2008.
- [10] KINUPP, V. F.; LORENZI, H. Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) no Brasil: guia de identificação, aspectos nutricionais e receitas ilustradas. São Paulo: Plantarum, 2014. 768p.
- [11] OLIVEIRA, DCS; WOBETO, C; ZANUZO, MR; SEVERGNINI, C. 2013. Composição mineral e teor de ácido ascórbico nas folhas de quatro espécies olerícolas não-convencionais. Horticultura Brasileira. 31: 472-475.
- [12] PINTO, N.C.C.; SCIO, E. The biological activities and chemical composition of *Pereskia* species (Cactaceae) – A review. Plant Foods Hum Nutr, v.69, p. 189–95, 2014.
- [13] QUEIROZ, C. R. A. A.; RIBEIRO, L.; GOMES, L. B. P.; MELO, C. M. T.; ANDRADE, R. R. Ora-pro-nóbis em uso alimentar humano: percepção sensorial. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v. 10, n. 3, p. 1-5, 2015.

- [14] ROCHA, D. R. C.; PEREIRA JÚNIOR, G. A.; VIEIRA, G.; PANTOJA, L.; SANTOS, A. S., & PINTO, N. A. V. D. (2008). Macarrão adicionado de Ora-pro-nóbis (*Pereskia aculeata* Miller) desidratado. *Alimentos e Nutrição*, 19(4), 459-465.
- [15] ROMANO, B. C.; MÉLLO, M. H. G.; MELO, F. R. G.; BRONZI, E. S.; AREVABINI, C. A. M. Desenvolvimento de bala de ora-pro-nóbis: uma alternativa para o consumo de nutrientes. *Linguagem Acadêmica. Batatais*, v. 7, n. 5, p. 57-66, 2017.
- [16] SANTESSO, N.; AKL, E.A.; BIANCHI, M.; MENTE, A.; MUSTAFA, R.; HEELS-ANSDELL, D.; SCHÜNEMANN, H.J. Effects of higher-versus lower-protein diets on health outcomes: a systematic review and meta-analysis. *European journal of clinical nutrition*. Vol. 66. Núm. 7. p.780-788. 2012.
- [17] SATO, R.; CILLI, L. P. L.; OLIVEIRA, B. E.; MACIEL, V. B. V.; VENTURINI, A. C.; YOSHIDA, C. M. P. Nutritional improvement of pasta with *Pereskia aculeata* Miller: a non-conventional edible vegetable. *Food Sci. Technol*, Campinas, 39(Suppl. 1): 28-34, June 2019.
- [18] SILVA, D. O.; HELBIG, E.; VARGAS, C. G.; SEIFERT, M.; DODE, J.; SILVA, A. L. Efeito da dieta contendo *Pereskia aculeata* Miller e da restrição parcial de proteínas em ratos. Artigo publicado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS), 2010.
- [19] TAKEITI, C. Y.; ANTONIO, G. C.; MOTTA, E. M. P.; COLLARES-QUEIROZ, F. P.; PARK, K. J. Nutritive evaluation of a non-conventional leafy vegetable (*Pereskia aculeata* Miller). *International Journal of Food Sciences and Nutrition*, Campinas, 60 (S1), 148-160, 2009.

Capítulo 8

Avaliação descritiva de chocolates com redução de açúcares

Viviane de Paula Acosta Iglesia

Resumo: O objetivo do trabalho foi avaliar 22 rótulos de chocolates com redução de açúcares segundo a legislação. Foi realizada uma avaliação descritiva conferindo as informações declaradas nos rótulos com as legislações gerais de alimentos. Os resultados apresentados foram os mais representativos de toda a avaliação. Os polióis apresentaram uma quantidade declarada mais expressiva dentre os carboidratos. 44% das amostras não consideraram lactose como um tipo de açúcar. 100% das amostras declararam possuir maltitol em sua formulação e 86% também declaram possuir polidextrose. Dentre os indicadores avaliados (denominação de venda, declaração dos açúcares abaixo dos carboidratos e declaração da informação nutricional) de acordo com as Resoluções e Portaria, 26% foram insatisfatórios, sendo que, 68% em relação à declaração da informação nutricional. Concluímos que são necessários maiores estudos para que as informações declaradas sejam as mais fidedignas ao alimento e, com isso, possamos ter informações mais seguras.

Palavras-Chave: rotulagem; carboidratos; restrição de açúcares; edulcorantes; informação nutricional.

1. INTRODUÇÃO

A rotulagem dos alimentos é obrigatória em todos os alimentos e bebidas que são embalados na ausência do consumidor. Com o objetivo de informar, o rótulo se constitui em um poderoso instrumento de comunicação entre a indústria e seus consumidores (Machado, 2015). Segundo a Resolução RDC nº 259/02 (Brasil, 2002), rotulagem é toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou gráfica, escrita, impressa, estampada, gravada, gravada em relevo ou litografada ou colada sobre a embalagem do alimento.

Os edulcorantes são definidos como substâncias utilizadas para introduzir um sabor doce aos alimentos e são classificados em naturais, nutritivos ou calóricos e, em sintéticos, não nutritivos ou não calóricos. Os edulcorantes naturais, nutritivos ou calóricos subdividem-se em carboidratos ou derivados, tais como os açúcares refinados, xarope de milho rico em frutose, frutose, glicose, mel, lactose, maltose, polióis e outros, e em peptídeos e derivados, como aspartame, alitame e outros. Os edulcorantes não nutritivos podem ser substâncias artificiais ou naturais, geralmente centenas de vezes mais doces do que o açúcar, mas que não oferecem nenhum poder energético, incluindo o maltitol, sorbitol, sucralose e vários outros (Food Ingredients Brasil, 2010).

Os carboidratos são um grupo diversificado de substâncias com uma variedade de propriedades químicas, físicas e fisiológicas. Embora os carboidratos sejam principalmente substratos para o metabolismo energético, eles podem afetar a saciedade, a glicose no sangue e a insulina, o metabolismo lipídico e, através da fermentação, exercem um grande controle sobre a função do cólon, incluindo hábito intestinal, trânsito, metabolismo e equilíbrio da flora comensal e saúde das células epiteliais do intestino. Essas propriedades têm implicações para a saúde geral, dentre elas, a diabetes (Cummins e Stephen, 2007).

Os açúcares representam a forma mais comum e conhecida de edulcorantes, amplamente distribuídos na natureza (Food Ingredients Brasil, 2013). São considerados ingredientes multifuncionais, pois além de adoçantes, são agentes espessantes, umectantes, conservantes, solubilizantes, estabilizantes e, ainda, atuam modificando a textura, fornecendo volume, realçando aroma e sabor, modificando a aparência e atuando como precursor de aroma, sabor e coloração (Food Ingredients Brasil, 2010). O termo "açúcares" é convencionalmente usado para descrever os mono e dissacarídeos nos alimentos. Os três principais monossacarídeos são glicose, frutose (mais doce de todos os carboidratos) e galactose. Glicose e frutose livres ocorrem no mel e frutas cozidas ou secas, em pequenas quantidades e, em maiores quantidades, em frutas e bagas. Já os principais dissacarídeos são a sacarose e a lactose. A sacarose é encontrada amplamente em frutas, bagas e vegetais e pode ser extraída da cana-de-açúcar ou beterraba, e a lactose, como o principal açúcar do leite (Cummins e Stephen, 2007).

Os polióis são denominados açúcares dos álcoois, assim como edulcorantes de corpo e, na indústria alimentícia são empregados juntamente com os edulcorantes intensos, quando há necessidade de restrição de açúcar. Possuem valor calórico e dulçor um pouco abaixo do açúcar, porém são usados em maiores quantidades dando corpo e textura aos alimentos. Constituem uma classe especial de carboidratos, podendo ser monossacarídeos (sorbitol, manitol, xilitol, eritritol) e dissacarídeos (maltitol, lactitol, isomalte) e misturas de sacarídeos e polissacarídeos hidrogenados (xarope de glicose hidrogenado) (Aditivos e Ingredientes, 2017).

O trabalho teve por objetivo avaliar rótulos de diferentes tipos de chocolates com redução de açúcares confrontando as informações declaradas com as legislações gerais de alimentos.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma avaliação descritiva de 22 rótulos de amostras colhidas pela Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo entre o período de 2013 a 2020. As amostras foram compostas por chocolates direcionados a uma população específica, dentre os quais, chocolates e cremes de avelã para dietas de ingestão controlada/redução de açúcares e chocolates com ausência de açúcares adicionados. As amostras foram subdivididas em quatro grupos: ovos, tabletes/barras, bombons e cremes de avelã e, por tipo de chocolate, ao leite, branco e meio amargo.

Para avaliação dos rótulos foram utilizadas três legislações vigentes, sendo elas, as Resoluções ANVISA RDC nº 54 de 12/11/2012 (informação nutricional complementar) (Brasil, 2012), nº 360 de 23/12/2003 (tabela de informação nutricional) (Brasil, 2003) e a Portaria SVS/MS nº 29 de 13/01/1998 (alimentos para fins especiais) (Brasil, 1998). Nesta avaliação foram considerados os seguintes parâmetros: declaração da quantidade de carboidratos e seus componentes, distribuição de edulcorantes na composição das amostras e conformidade de três indicadores com as legislações (denominação de venda, declaração dos açúcares abaixo dos carboidratos e declaração da informação nutricional).

Na avaliação da declaração da quantidade de carboidratos e seus componentes foram avaliados 16 rótulos, sendo, 4 ovos, 4 tabletes, 6 bombons e 2 cremes de avelãs e por se tratar de amostras com diferentes porções todas as amostras foram calculadas para 100g para fins de comparação. Para os demais parâmetros (distribuição de edulcorantes e conformidade dos indicadores) foram avaliados 22 rótulos (5 ovos, 7 tabletes, 8 bombons e 2 cremes de avelã). A diferença no quantitativo final entre os diferentes parâmetros se deu pelo fato de que não foram considerados os chocolates meio amargos para o primeiro parâmetro devido a sua composição (ausência de adição de leite). Todos os parâmetros foram analisados estatisticamente e apresentados na forma de gráficos e tabela.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. DECLARAÇÃO DA QUANTIDADE DE CARBOIDRATOS E SEUS COMPONENTES

Na Figura 1 observamos que todas as amostras possuem em torno de 40-45% de carboidratos em sua composição. De acordo com as Resoluções ANVISA RDC nº 360/03 (Brasil, 2003) e nº 54/12 (Brasil, 2012), quando houver declaração de informação nutricional complementar sobre quantidade de açúcares ou a declaração da quantidade de açúcares por escolha do fabricante, é obrigatório à declaração da quantidade de açúcares e/ou polióis e/ou amido e/ou outros carboidratos, logo abaixo da declaração dos carboidratos. Diante disso, notamos que dentre os componentes declarados nos rótulos, aquele que apresentou dados mais representativos foi a adição de polióis. Esse resultado foi corroborado com os resultados da distribuição dos edulcorantes, uma vez que alguns polióis fazem parte da lista de edulcorantes constante na Resolução RDC nº 18/08 (Brasil, 2008).

Figura 1 – Distribuição da quantidade dos carboidratos e seus componentes entre os grupos

Também foram avaliadas as intersecções das tabelas de informação nutricional (declaração de açúcares) e as listas de ingredientes quanto à declaração de ingredientes contendo lactose (leite em pó e/ou soro de leite e/ou creme de leite). Segundo a Resolução ANVISA RDC nº 360/03 (Brasil, 2003), os açúcares são todos os mono e dissacarídeos presentes em um alimento que são digeridos, absorvidos e metabolizados pelo ser humano, e pela a lactose ser um dissacarídeo (glicose + galactose) considerado como um tipo de açúcar, deve ser declarado na tabela de informação nutricional no componente “açúcares”. Deste modo, observamos que 44% dos rótulos avaliados não declararam lactose como sendo um tipo de açúcar, quando considerado a presença de, pelo menos, um ingrediente contendo lactose na lista de ingredientes. Dentre as amostras que declararam lactose (38%) logo abaixo dos açúcares, 50% somam a lactose aos açúcares e outro componente (polióis ou amido) para totalizar os carboidratos totais e 33% declaram a lactose como sendo um tipo de açúcar.

3.2. DISTRIBUIÇÃO DOS EDULCORANTES

Na Figura 2 observamos a distribuição e o tipo dos edulcorantes dentre os 22 rótulos avaliados. 100% das amostras, independente do grupo ou do tipo de chocolate, contém em sua composição o edulcorante “maltitol”. Segundo um documento publicado pela Food Ingredients, em chocolates, o maltitol pode substituir todo o açúcar (quando estiver acima de 50% da composição) permitindo uma redução de 12-15% de calorias ou ser utilizado proporcionalmente com polidextrose ou inulina, resultando em 23% de redução de calorias. Também de acordo com este documento, o maltitol é parcialmente metabolizado e a ingestão de 50g/dia não causa transtornos intestinais, apesar da IDA (ingestão diária aceitável) não ser especificada.

Figura 2 – Distribuição dos edulcorantes na composição das amostras

A polidextrose não é considerada como um edulcorante pela Resolução RDC nº 18/08 (Brasil, 2008), porém possui função adoçante e de redução de açúcares e gorduras. Na figura 3 observamos que 86% das amostras tiveram adição de polidextrose, mostrando a formulação de maltitol com polidextrose em chocolates.

Figura 3 – Porcentagem de amostras contendo polidextrose na composição

3.3. CONFORMIDADE DOS INDICADORES

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos através da avaliação da rotulagem quanto aos indicadores que possuem maiores probabilidades de não conformidade em relação às legislações, Resoluções RDC nº 54/12 (Brasil, 2012), nº 360/03 (Brasil, 2003) e a Portaria nº 29/98 (Brasil, 1998).

A denominação de venda foi avaliada segundo a Portaria nº 29/98, itens 2.3 e 8.1.1, que tratam sobre designação dos alimentos convencionais seguida da finalidade a que se destina (para dietas com ingestão controlada/redução de açúcares). As Resoluções RDC nº 360/03 (Brasil, 2003) e nº 54/12 (Brasil, 2012) verificaram se todas as tabelas de informação nutricional declararam açúcares abaixo dos carboidratos, uma vez que 100% das amostras apresentaram redução de açúcares em suas formulações. E a Resolução RDC nº 54/12 (Brasil, 2012) também foi aplicada em relação as declarações: “Sem adição de açúcares”, “Zero adição de açúcares”, “Zero açúcares” e “Sem açúcares”.

Tabela 1 – Conformidade dos indicadores de acordo com as legislações vigentes

	Denominação de venda	Declaração dos açúcares abaixo dos carboidratos	Declaração da Informação Nutricional	TOTAL
Satisfatório	22 (100%)	20 (91%)	7 (32%)	49 (74%)
Insatisfatório	0 (0%)	2 (9%)	15 (68%)	17 (26%)
Total	22 (100%)	22 (100%)	22 (100%)	66 (100%)

Os 9% de insatisfatoriedade quanto à declaração dos açúcares abaixo dos carboidratos deveu-se a ausência da mesma. Já, em relação aos 68% da declaração da informação nutricional referiu-se a diferentes condições relacionadas ao atributo “açúcares”, não atendidas, tais como, 87% aplicaram a(s) frase(s) exigidas para as condições do atributo “açúcares” diferente do previsto e 60% utilizou a palavra “açúcar” ao invés de “açúcares”.

Na avaliação geral, 74% dos indicadores avaliados foram satisfatórios em relação às legislações aplicadas. E 68% dos 26% de amostras insatisfatórias deu-se pela não aplicação correta de todas as condições obrigatórias.

4. CONCLUSÕES

Diante de todos os resultados encontrados concluímos que o entendimento das Resoluções RDC nº 360/03 e nº 54/12 quanto à definição de açúcares ainda não está claro para todos os fabricantes e quanto à aplicação das frases exigidas para a declaração de informação nutricional complementar há necessidade de ajuste em relação ao entendimento da expressão “deve ser declarada junto à INC”.

Deste modo, atentamos para necessidade de maiores estudos em relação a essa categoria de alimentos (dietas para ingestão controlada/redução de açúcares), uma vez que atendem a uma população específica e que está aumentando gradativamente. A fonte de informações para este público específico é o rótulo, portanto, quanto mais verdadeiras as informações forem da composição, maior a segurança no consumo destes produtos.

REFERÊNCIAS

- [1] Aditivos e Ingredientes. (2017). Polióis – Aplicação e Metabolismo, 48-57.
- [2] Brasil, Ministério da Saúde. (1998). Aprova o Regulamento Técnico referente a Alimentos para Fins Especiais (Portaria SVS/MS nº 29 de 13/01/1998). Diário Oficial da União.
- [3] Brasil, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. (2002). Aprovar o Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados (Resolução ANVISA RDC nº 259 de 20/09/2002). Diário Oficial da União.
- [4] Brasil, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. (2003). Aprovar o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, tornando obrigatória a rotulagem nutricional (Resolução ANVISA RDC nº 360 de 23/12/2003). Diário Oficial da União.
- [5] Brasil, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. (2008). Dispõe sobre o “Regulamento Técnico que autoriza o uso de aditivos edulcorantes em alimentos, com seus respectivos limites máximos” (Resolução ANVISA RDC nº 18 de 24/03/2008). Diário Oficial da União.
- [6] Brasil, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. (2012). Dispõe sobre o Regulamento Técnico sobre a Informação Nutricional Complementar (Resolução ANVISA RDC nº 54 de 12/11/2012). Diário Oficial da União.
- [7] Cummins, J. H., Stephen, A. M. (2007). Carbohydrate terminology and classification. *European Journal of Clinical Nutrition*, 61(Suppl 1), S5-S18
- [8] Food Ingredients Brasil. (2010). Adoçantes calóricos e não calóricos – parte II, 15, 22-35.
- [9] Food Ingredients Brasil. Adoçantes calóricos e não calóricos – parte I, 27-43.
- [10] Food Ingredients Brasil.(2013). Dossiê edulcorantes, 24, 28-52.
- [11] Machado, R. L. P. (2015). Manual de Rotulagem de Alimentos. Rio de Janeiro: Embrapa

Capítulo 9

Influência dos níveis de concentração de bacon na reologia da maionese

Hugo Dias Figueira

William Soares da Silva

Pablo Luan de Jesus Dantas

Tailane Vieira Costa

Resumo: A maionese é um alimento semissólido com elevado teor de gordura. O objetivo deste trabalho foi estimar as propriedades reológicas da maionese com a adição de diferentes concentrações de óleo de bacon (4.31, 17.21, 30.11 e 43.01 %), seguindo uma metodologia padrão de preparo de maionese. Utilizando o ensaio de extrusão inversa, foi possível mensurar a Firmeza, Consistência, Coesividade e Índice de Viscosidade. Os resultados observados demonstraram que todas as variáveis estudadas apresentaram ajuste para modelo de 1º grau, no qual um aumento gradual da resistência a fluidez pode ser observado na medida do aumento da concentração de bacon na formulação. A adição de óleo do bacon na formulação da maionese, se mostrou viável do ponto vista reológico para um nível intermediário dentro dos níveis estudados, onde a concentração de 30.11% desse se mostrou ideal.

Palavras-chave: Propriedades; Modelo; Óleo; Fluidez.

1. INTRODUÇÃO

A maionese é um produto alimentar de elevado valor calórico resultante do seu elevado teor de gordura, onde, há um interesse na produção de versões menos calóricas com reduzido teor de gordura ou mesmo isentas de gordura, mas mantendo as características sensoriais do produto tradicional. Para além do desenvolvimento de opções mais saudáveis, as empresas alimentares estão, igualmente, a apostar na diversificação de sabores para atender às diversas preferências dos consumidores e, desta forma, conseguir aumentar as suas quotas de mercado. Exemplos desta diversificação são as maioneses com sabor alho ou o ketchup picante ou com sabor maçã (Correia, 2016). As gorduras e os óleos são produtos provenientes do processamento industrial das carnes, grãos de oleaginosas e de alguns cereais. (Pupa, 2004).

Ademais, a banha do porco pode ser comparada diretamente com a gordura do bacon por ambas derivarem do mesmo animal, onde, segundo Handayani et al. (2014), o valor nutricional dessa possui cerca de 40% de gordura saturada, 48% de gordura monoinsaturada e 12% de gordura poli-insaturada, além de conter proteínas de alto valor biológico, cálcio e vitamina B12.

Segundo Santos et al. (2013), o conceito mais defendido é de que o consumo de MUFA (ácidos graxo-monoinsaturados) não afeta significativamente os níveis de colesterol total circulantes, enquanto o consumo de SFA (ácidos graxos saturados) aumenta os níveis de colesterol. Porém, os efeitos do ácido graxo saturado na prevenção de risco de doença cardiovascular são controversos. Em relação à hipertensão, em um estudo não foi verificada associação entre SFA e incidência de hipertensão arterial, após ajuste por idade, IMC (índice de massa corpórea) e consumo de álcool. Já em outro estudo, o consumo de SFA foi associado positivamente com diminuição das pressões sistólica e diastólica, mantendo a controvérsia sobre efeitos no aumento da pressão arterial” e ainda, “alguns estudos recentes mostram efeitos benéficos do consumo de SFA, tais como: associação inversa dos SFA com progressão da aterosclerose coronariana em mulheres pós-menopausa e associação inversa de SFA com mortalidade por AVE (acidente vascular encefálico)”. Deixando claro a inexistência de provas irrefutáveis que apontem que o consumo de SFA seja maléfico para a saúde.

O ensaio de extrusão inversa (back extrusion) é uma alternativa para determinação da fluidez de um alimento, em comparação com os viscosímetros tradicionais. Normalmente, a força máxima necessária para realizar a extrusão é medida e usada como um índice de qualidade da textura. Este tipo de ensaio é usado em líquidos viscosos, géis, gorduras e frutas e vegetais frescos e processados. Uma vez que a extrusão requer que o fluxo de alimentos sob pressão, parece razoável usá-lo em alimentos que irão fluir bastante facilmente sob uma força aplicada (como a maionese) e não o usar naqueles alimentos que não fluem facilmente, como pão, bolo, biscoitos, cereais de café da manhã e doces. É chamado de "ensaio de extrusão inversa" porque o alimento se move na direção oposta ao êmbolo (Bourne, 1978).

Assim, o objetivo desse trabalho foi investigar a influência da concentração de bacon, nos parâmetros reológicos da maionese utilizando o ensaio de extrusão inversa.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Para preparo da maionese, utilizou-se uma receita padrão, seguindo o que está preconizado em Brasil (2005). Para isso foram utilizados 5 níveis de concentração de óleo de bacon, que seguem na Tabela 1:

Tabela 1 – Proporções de mistura de óleo de bacon ao óleo vegetal

Tratamentos	Óleo vegetal(ml)	Óleo do bacon(ml)
1	222	10
2	192	40
3	162	70
4	132	100
5	102	130

Demais ingredientes utilizados na formulação da maionese são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Ingredientes

Ingredientes	Peso(g)	Unidade
Ervas finas	5	----
Sal	5	----
Mostarda	5	----
Limão	8,75	----
Ovo	----	2

As análises mecânicas foram conduzidas no Laboratório de Ensaio e Materiais (LABEM) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. Com a utilização de um texturômetro da marca Stable Micro Systems (SMS), modelo TA. HD Plus, pelo método de extrusão inversa. As amostras foram dispostas em beckers de 100 ml, sendo utilizado 60 % da capacidade de volume. Cada ensaio foi programado com as seguintes configurações: 80 mm de altura até a base, velocidade de teste 1 mm/s, velocidade de retorno 10 mm/s, a probe utilizada foi o disco de 55mm de diâmetro que penetrou a maionese cerca de 25 mm. O experimento foi conduzido em um Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), com ensaios em quintuplicatas e três repetições (n=3). Os dados obtidos foram submetidos a regressão linear (considerando as 5 concentrações de bacon 4,3%; 17,2%; 30,1%; 43,1% e 56%) com nível de significância de 5% através do programa computacional Sistema para Análise de Variância - SISVAR (Ferreira, 2011).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O ensaio de extrusão inversa retorna 4 parâmetros relacionados a fluidez, a saber: Firmeza, Consistência, Coesividade e Índice de Viscosidade (IV).

A análise de regressão para os dados do estudo ajustou modelos de primeiro grau para todos as variáveis do ensaio em função da concentração de óleo de bacon (Conc), que seguem apresentados pelas equações 1,2,3 e 4.

$$\text{Firmeza} = 6,37\text{Conc} + 167,06 \quad (1)$$

$$\text{Consistência} = 19,67\text{Conc} + 1165,43 \quad (2)$$

$$\text{Coesividade} = 4,28\text{Conc} + 133 \quad (3)$$

$$\text{IV} = 14,87\text{Conc} + 666,8 \quad (4)$$

Os valores de coeficientes de determinações (R^2) são respectivamente 0,81;0,84;0,84 e 0,89. A Falta de ajuste foi não significativa para todos os modelos. Assim, mais de 80% do fenômeno é explicado pelos modelos apresentados, com os parâmetros significativos ($p = 0,0145$; $p=0,026$; $p=0,0385$ e $p=0,023$).

Para todas as variáveis (Firmeza, Consistência, Coesividade e IV) observou-se um aumento progressivo na resistência a fluidez da maionese com o aumento consequente da concentração de óleo de bacon.

Esse fenômeno está associado a alta quantidade de gordura saturada presente. De acordo Ramalho et al. (2016), a razão dos ácidos graxos com insaturação cis e seus derivados apresentarem ponto de fusão mais baixos que os saturados é a dificuldade de “empacotamento” entre as cadeias, de forma que a interação intermolecular entre elas se reduz. Já no caso dos ácidos saturados, a estrutura destes ácidos possui rotação livre, favorecendo uma melhor interação entre as cadeias carbônicas, o que resulta numa força de atração maior e pontos de fusão mais altos. Nesse caso, a Firmeza (força necessária para deformação), Coesividade (força máxima suportada antes da ruptura do material), Consistência (energia necessária para fazer o alimento escoar) e o I.V (representada pelo peso da amostra na probe, indicando a fluidez) será maior quanto mais atração houver entre as cadeias.

O óleo de bacon, como dito, é em sua maioria composto de ácidos graxos saturados, logo, após o resfriamento da maionese ele tende a retomar suas características estruturais de gordura sólida novamente. A maionese tradicionalmente é considerada um plástico de Bingham.

Segundo Fennema et al. (2010), “a origem estrutural do comportamento plástico das gorduras sólidas pode ser atribuída a sua capacidade de formar redes tridimensionais de pequenos cristais de gordura dispersos, em matrizes de óleo líquido. Sob determinada aplicação de tensão, existe uma pequena deformação da amostra, mas as ligações fracas entre os cristais de gordura não são rompidas. Quando a tensão inicial de cisalhamento é ultrapassada, as ligações fracas são rompidas e os cristais de gordura deslizam um contra o outro, conduzindo à fluidez da amostra. Uma vez que a força é removida, o fluxo para os cristais de gordura começam a formar ligações com seus vizinhos novamente. A taxa em que esse processo ocorre pode ter implicações econômicas para a funcionalidade do produto.” Assim, a tensão inicial de cisalhamento de uma gordura tende a crescer com o aumento do conteúdo de gordura sólida. Portanto, uma maionese que apresente uma estrutura muito rígida (como foi o caso dos tratamentos 4 e 5), tem a sua fluidez comprometida no momento do consumo, o que não é desejável.

Nesse caso, o tratamento mais adequado levando em consideração os aspectos sensoriais (flavor), aparência pastosa (reológicos) e os benefícios pontuais do SFA já apontados seria o tratamento 3, (com 30,11% de óleo de bacon).

Estudos subsequentes em potenciais envolvendo avaliações físico químicas e análise sensorial demonstram viabilidade.

4. CONCLUSÃO

A adição de óleo do bacon na formulação da maionese, se mostrou viável do ponto vista reológico para um nível intermediário dentro dos níveis estudados.

O ensaio de extrusão inversa se apresenta como uma excelente alternativa na determinação da fluidez de alimentos.

Além disso, objetivando potencializar a qualidade sensorial da maionese, estudos subsequentes são recomendados. Tanto por agregar valor, quanto como opção de alimentos saudáveis e ampliação da inovação no mercado de alimentos.

REFERÊNCIAS

- [1] BOURNE, Malcolm C. Texture profile analysis. 1978.
- [2] BRASIL. RESOLUÇÃO-RDC Nº 276, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. *Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária*, p. 1, 2005.
- [3] CORREIA, Tiago Miguel Susano. *Desenvolvimento de novas formulações de maionese e ketchup*. 2016. Tese de Doutorado.
- [4] FENNEMA, Owen R.; DAMODARAN, Srnivivasan; PARKIN, K. L. Química de alimentos de Fennema. *Editorial Acribia*, Espanha, 1258p, 2010.
- [5] FERREIRA, D. F. Sisvar: a computer statistical analysis system. *Ciência e Agrotecnologia, Lavras*, v. 35 (6), p. 1039-142, 2011.
- [6] HANDAYANI, Dian et al. A high-dose shiitake mushroom increases hepatic accumulation of triacylglycerol in rats fed a high-fat diet: underlying mechanism. *Nutrients*, v. 6, n. 2, p. 650-662, 2014.
- [7] PUPA, Júlio Maria Ribeiro. Óleos e gorduras na alimentação de aves e suínos. *Revista Eletrônica Nutritime*, v. 1, n. 1, p. 69-73, 2004.
- [8] RAMALHO, Hugo F.; SUAREZ, Paulo AZ. A Química dos Óleos e Gorduras e seus Processos de Extração e Refino. *Revista Virtual de Química*, v. 5, n. 1, p. 2-15, 2013.
- [9] SANTOS, Raul D. et al. I Diretriz sobre o consumo de gorduras e saúde cardiovascular. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 100, n. 1, p. 1-40, 2013.

Capítulo 10

Enriquecimento de néctar de guabiroba (Campomanesia Xanthocarpa Berg) com soro do leite: Efeito nas características físicas, químicas e sensoriais

Anne Herenize Lemos

Simone Segunda

Rubia Viana Batista

Luciano Tormen

Cátia Tavares dos Passos Francisco

Larissa Canhadas Bertan

Resumo: O enriquecimento de néctar de frutas nativas através da utilização de subprodutos de alto valor nutritivo é uma alternativa que visa atender a demanda da população mundial com relação a produtos saudáveis e diferenciados. Além disso, disponibiliza nutrientes de forma diferenciada, valoriza a produção, geração de empregos e renda de produtores da agroindústria familiar. Neste contexto, o presente trabalho buscou avaliar o efeito da adição de soro de leite em néctar de guabiroba (*Campomanesia Xanthocarpa Berg*), nas características físico-químicas, microbiológicas e sensoriais. Para isto, realizou-se análises de pH, acidez titulável, umidade, cinzas, gordura, fibras, sólidos solúveis, cor, análise microbiológica e análise sensorial em quatro formulações de néctar de guabiroba adicionado de soro de leite em diferentes proporções, a saber: 100:0, 80:20, 70:30 e 60:40. Os resultados demonstraram que todas as bebidas foram bem aceitas sensorialmente. Com relação às características físico-químicas, observou-se que a adição de soro de leite nos néctares elevou o teor de minerais assim como o pH e a umidade das bebidas. Em contrapartida, o teor de fibras diminuiu devido à diluição dos néctares. As análises microbiológicas apresentaram resultados dentro dos padrões exigidos pela legislação. De modo geral, a adição de soro de leite ao néctar de guabiroba demonstrou-se uma alternativa interessante para o enriquecimento e diversificação do produto.

Palavras-chave: néctar, soro de leite, guabiroba, bebidas enriquecidas.

1. INTRODUÇÃO

A crescente demanda e tendência dos consumidores a alimentos mais saudáveis e com ingredientes funcionais, levou as indústrias à busca pelo desenvolvimento de produtos inovadores, incluindo o mercado de alimentos frescos, prontos para comer e nutritivos, como frutas minimamente processadas e sucos de frutas (CASSANI, et al., 2017). O néctar é uma bebida popular e que contém diversos nutrientes provindos das frutas e é definido na legislação como bebida não fermentada, obtida da diluição em água potável da parte comestível do vegetal ou de seu extrato, adicionado de açúcares, destinada ao consumo direto (BRASIL, 2009). Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas não Alcoólicas (ABIR, 2020) o consumo per capita no mercado brasileiro de néctares no ano de 2018 foi de 8,14 L/habitante, tendo um aumento de 31,2% em relação ao ano anterior. O setor de sucos em geral teve um aumento de 5,7% em sua produção.

O estado do Paraná possui uma grande diversidade de espécies frutíferas nativas com potencial para industrialização, entre elas a guabiroba, uma fruta nativa da família Myrtaceae que tem alta aceitabilidade devido as suas características sensoriais. A guabiroba ainda apresenta elevados teores de fibra alimentar e umidade, assim como concentrações consideráveis de minerais como potássio, fósforo, magnésio e ferro, bem como de vitamina C, flavonoides, compostos fenólicos totais, carotenoides totais, sendo uma ótima fonte antioxidante e de outros componentes importantes nutricionalmente. Logo, a guabiroba possui alto potencial para uso na indústria alimentícia, para o desenvolvimento de produtos diferenciados, como sucos, néctares, sorvetes, bebidas lácteas, doces em massa, geleia, entre outros, que atendam as expectativas do consumidor quando se refere ao aporte nutricional. Além disso, a utilização da guabiroba pode compor uma alternativa de renda para o agronegócio familiar, trazendo um novo produto ao mercado e contribuindo para o aproveitamento de um recurso natural subutilizado (SANTOS, 2011; SANTOS et al., 2013a; SANTOS et al., 2013b; ALVES et al., 2013).

O leite e seus derivados têm um papel muito importante mundialmente, contribuindo para um estilo de vida mais saudável, devido a sua grande fonte de nutrientes, como proteínas, gorduras, carboidratos, minerais e vitaminas. Seu consumo é geralmente associado à prevenção de diversas doenças, como desnutrição, diabetes, hipertensão e câncer. A utilização de um subproduto, como a proteína do soro de leite, na elaboração de bebidas de sucos de fruta e outras preparações alimentícias têm recebido grande atenção por promover o uso dos sólidos do soro de leite, além de suas propriedades funcionais e nutricionais e sua alta biodisponibilidade. Seus vários benefícios à saúde se devem aos componentes, que tem propriedades terapêuticas e medicinais, como os aminoácidos essenciais, reguladores de crescimento, moduladores e protetores contra infecções bacterianas, atividade antiviral e anticoagulante e propriedades redutoras em radicais livres, inibindo a oxidação de lipoproteínas. (RAJORIA; CHAUHAN; KUMAR, 2015; PELEGRINE & CARRASQUEIRA, 2015; AMARAL, et al., 2018; SILVA et al., 2019).

Desse modo, com o intuito de aumentar a competitividade, o desenvolvimento de produtos enriquecidos e a utilização de matérias-primas consideradas nutraceuticas, este trabalho teve como objetivo a avaliação das características físico-químicas e sensoriais da adição de soro de leite em néctar de guabiroba (*Campomanesia Xanthocarpa* Berg) em diferentes proporções.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. MATERIAL

Polpa de guabiroba (*Campomanesia Xanthocarpa* Berg), soro de leite em pó parcialmente desmineralizado (doador pela empresa Alibra Ingredientes Ltda) e goma xantana (doador pela empresa Doce Aroma Aditivos e Ingredientes Ltda).

2.2. MÉTODOS

2.2.1. DESPOLDAMENTO DA GUABIROBA

As guabirobas foram higienizadas e sanitizadas em solução de hipoclorito de sódio (15 mL/L) por 15 min., sendo posteriormente imersas em água e levadas à despoldadeira previamente higienizada, utilizando peneira de 0,6 mm. A massa de polpa obtida foi armazenada em freezer horizontal (-18°C) até o momento de sua utilização.

2.2.2. ELABORAÇÃO DAS FORMULAÇÕES DE NÉCTAR COM E SEM ADIÇÃO DE SORO DE LEITE

O néctar foi elaborado pela mistura de polpa de guabiroba com água mineral na proporção de 1:1 (v/v), adicionado de sacarose até 13 °Brix (LEITÃO, 2007) e goma xantana (0,2% m/v). Paralelamente, para a elaboração das bebidas enriquecidas com soro de leite, este foi reconstituído em água mineral a 14% (m/v) de sólidos totais. Posteriormente, para as bebidas enriquecidas, foi adicionado soro ao néctar nas proporções de 20, 30 e 40% (v/v) e homogeneizadas. Os néctares com e sem adição de soro foram pasteurizados em banho-maria a 85°C por 10 min e acondicionadas em garrafas de vidro previamente higienizadas e esterilizadas. As bebidas foram resfriadas à 6°C e armazenadas sob refrigeração ($4 \pm 2^\circ\text{C}$). Todas as análises físicas, químicas e microbiológicas foram realizadas no terceiro dia após o processamento das bebidas. A Figura 1 apresenta o fluxograma de elaboração das quatro formulações.

Figura 1 – Fluxograma de elaboração dos néctares de guabiroba com e sem adição de soro de leite.

2.2.3. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS BEBIDAS

A caracterização centesimal seguiu as metodologias do Instituto Adolfo Lutz (2008) (ZENEON et al., 2008), sendo elas: pH (metodologia n. 017/IV), acidez total titulável (metodologia n. 038/IV), sólidos solúveis (metodologia n. 010/IV), umidade (metodologia n. 012/IV), cinzas (metodologia n. 018/IV) e lipídios totais (metodologia n. 321/IV com adaptações). Além disso, as amostras foram caracterizadas quanto o ratio (sólidos solúveis/Acidez titulável), teor de fibras (NOLLET, 2004) e cor (MCGUIRE, 1992).

2.2.4. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DAS BEBIDAS

As quatro formulações de néctar foram avaliadas com relação à *Staphylococcus aureus*, *Salmonella* sp., bolores e leveduras e coliformes totais e termotolerantes, utilizando-se as metodologias descritas por Silva, Junqueira e Silveira (1997).

2.2.5. ANÁLISE SENSORIAL DAS BEBIDAS

As análises sensoriais dos néctares de guabiroba enriquecidos com soro do leite (Protocolo CAAE: 32003414.3.0000.5564) foram realizadas com todas as proporções propostas (100:0, 80:20, 70:30 e 60:40) após 3 dias da elaboração da bebida. As amostras codificadas com números de três dígitos foram apresentadas de forma aleatória e monádica, em copos brancos descartáveis, com aproximadamente 20

mL do produto e temperatura de apresentação de 50°C. No teste de aceitação, as amostras foram julgadas por 49 provadores não treinados e os atributos aparência, cor, aroma, sabor e consistência, foram analisados com a utilização de uma ficha contendo uma escala hedônica com 9 pontos, onde 1 = desgostei muitíssimo e 9 = gostei muitíssimo. Para a intenção de compra foi utilizada a mesma ficha contendo uma escala estruturada de cinco pontos, onde 1 = certamente não compraria e 5 = certamente compraria. (DUTCOSKY, 2019).

2.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA

As análises físico-químicas foram realizadas em triplicata, sendo que calculou-se as médias e intervalos de confiança. As médias obtidas nos resultados foram avaliadas através de análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey, com nível de significância de 5%.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO

3.1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS BEBIDAS

Na Tabela 1 apresenta os resultados da caracterização das bebidas elaboradas. A formulação de néctar 60:40 possui maior teor de acidez titulável em ácido cítrico (0,28%) que as demais formulações. A legislação brasileira é omissa com relação à fixação dos padrões de qualidade de néctar de guabiroba, não tendo limites descritos para adição de ácido cítrico a esse produto. Santos et al (2013a) estudaram a quantificação dos principais fitoquímicos bioativos no suco de gabioba (*Campomanesia xanthocarpa* Berg) e obtiveram valores de acidez titulável de 1,39%. Jakhar (2019) estudou a influência nutricional da adição de soro do leite (10, 20, 30 e 40%) em suco de maçã (80, 70, 60 e 50%) adoçado (10% de sacarose). O autor observou que a adição de soro provocou aumento da acidez da bebida, sendo o maior valor para 40% e o menor para 10%. Comportamento semelhante foi observado no presente estudo.

Já com relação aos valores de pH, não foi observada diferença estatística entre as formulações, porém com a adição do soro houve um ligeiro aumento. O pH mais elevado com a adição do soro, deve-se ao fato que o soro de leite possui pH próximo à neutralidade e quando adicionado ao néctar, com pH mais baixo, causou esta elevação. Além disso, a diluição da polpa para formulação das bebidas contribuiu com o aumento do pH. Silva (2015) desenvolveu e avaliou néctares à base de gabioba em diferentes períodos de armazenamento e observou que o pH do néctar elaborado com a polpa de gabioba variou entre 5,61 e 4,41 para o primeiro dia de armazenamento e 4,44 a 4,02 para o último dia de armazenamento.

Tabela 1. Caracterização dos néctares de guabiroba simples e adicionado de soro do leite.

Caracterização	Néctar de guabiroba com soro do leite (v/v)			
	100:00	80:20	70:30	60:40
Acidez titulável (%)	0,20 ± 0,02 ^a	0,20 ± 0,02 ^a	0,24 ± 0,01 ^a	0,28 ± 0,02 ^b
pH	4,10 ± 0,00 ^a	4,50 ± 0,00 ^a	4,40 ± 0,00 ^a	4,50 ± 0,00 ^a
Sólidos solúveis (°Brix)	13,93 ± 0,06 ^a	14,53 ± 0,06 ^{bc}	14,13 ± 0,15 ^b	14,23 ± 0,06 ^c
Ratio	68,64 ± 7,91 ^a	72,72 ± 5,84 ^a	59,48 ± 1,52 ^a	63,13 ± 1,04 ^a
Umidade (%)	85,14 ± 0,03 ^a	84,62 ± 0,04 ^b	85,16 ± 0,01 ^a	85,11 ± 0,02 ^a
Cinzas (%)	0,17 ± 0,01 ^a	0,28 ± 0,01 ^a	0,33 ± 0,01 ^a	0,39 ± 0,01 ^a
Lipídios (%)	0,93 ± 0,14 ^a	1,22 ± 0,07 ^a	1,17 ± 0,04 ^a	1,24 ± 0,09 ^a
Fibras (%)	4,00 ± 0,10 ^a	3,30 ± 0,20 ^b	2,30 ± 0,20 ^b	2,30 ± 0,10 ^a
L*	40 ± 1,7 ^c	47 ± 1,6 ^b	48 ± 3,1 ^{ab}	50 ± 1,6 ^a
Hue	76,4 ± 0,5 ^a	77,7 ± 0,4 ^b	78,7 ± 0,5 ^b	79,5 ± 0,4 ^c
Chroma	36,7 ± 1,1 ^a	41,1 ± 1,1 ^b	39,6 ± 1,5 ^b	40,3 ± 0,6 ^b

** Média e desvio padrão de triplicatas. A-b Médias com letras minúsculas iguais, numa mesma linha, não diferem ao nível de P>0.05.

Os resultados de sólidos solúveis variaram entre 14,53 e 13,93°Brix, sendo o menor valor para o néctar puro (100%) e o maior para o néctar adicionado de 20% de soro. Assim, a formulação 100:0 diferiu de todas as demais e a formulação 60:40 diferiu estatisticamente apenas da formulação 70:30. Durante a elaboração do néctar, o mesmo foi corrigido para obter um teor de sólidos de 13°Brix e posteriormente foi submetido ao processo de pasteurização. O processo de pasteurização proporcionou evaporação de parte da água presente no néctar, o que pode ter provocado um aumento na concentração de sólidos solúveis. Faraoni et al. (2008) estudou o efeito do tratamento térmico, congelamento e da embalagem sobre o armazenamento de polpa de manga orgânica. A autora observou que as polpas pasteurizadas apresentaram um aumento no teor de sólidos solúveis, provavelmente em razão da perda de água para o ambiente, durante o processo térmico. De acordo com a Instrução normativa nº 12, o padrão para teor de sólidos solúveis totais em diversos néctares de frutas tropicais como pitanga, manga, entre outras, varia entre 11 e 13° Brix (BRASIL, 2003).

A partir dos resultados de sólidos solúveis e da acidez observada nas amostras (Tabela 1), é possível calcular a razão entre estes resultados, obtendo-se assim o ratio. De acordo com 60oni net al. (2017), esta análise está relacionada com a percepção dos constituintes químicos do produto pelo paladar e olfato humano, sendo indicativa da qualidade do produto, já que representa o equilíbrio entre o sabor ácido e doce. Os resultados de ratio obtidos neste trabalho não apresentaram diferença estatística entre si com 5% de significância. Assim, observa-se que os néctares de guabiroba apresentam uma elevada quantidade de sólidos solúveis e menor proporção de ácido quando comparado com o néctar avaliado por Figueira et al. (2010) e com a polpa de guabiroba analisada Santos et al (2013^a). Isso pode ser devido à alta concentração de sólidos solúveis (13,93-14,53°Brix) presente nos néctares, além disso, a baixa acidez apresentada pelos mesmos (0,20-0,28%) resultando em um alto valor de Ratio.

Em relação a % de umidade (Tabela 1) apenas a amostra 80:20 (84,62%) diferiu das demais estatisticamente apresentando menor média. De acordo com Toro-Sierra et. Al (2013), o soro de leite possui teor de umidade entre 93 e 94% enquanto a polpa de guabiroba, segundo Santos et al (2013^a) e Alves et al. (2013), entre 79 e 80%. Assim, percebe-se que há uma tendência de aumento da quantidade de água presente nos néctares devido à adição de soro de leite. Considerando que os parâmetros tempo e temperatura de pasteurização foram iguais para todas as formulações, a diferença observada na formulação 80:20 (84,62%) pode estar relacionada a interações entre compostos da bebida e as moléculas de água, que minimizaram a evaporação desta.

Com relação às % de cinzas (Tabela 1), a formulação contendo a maior quantidade de soro de leite (60:40) apresentou valores mais elevado ($0,39 \pm 0,01\%$). Estes resultados já eram esperados, pois o soro de leite utilizado no enriquecimento dos néctares possuía um teor de aproximadamente 1,3% de cinzas. Os valores obtidos na análise dos néctares nesse estudo foram menores que os encontrados por Jakhar (2019) em análises de produto semelhante. No entanto, devido ao teor de minerais no soro de leite ser maior que o teor de minerais na guabiroba, a adição do soro é uma alternativa para o aumento de minerais nas formulações.

O resultado obtido na determinação de lipídios (Tabela 1) da amostra de néctar sem adição de soro reafirma o dado obtido por Santos et al (2013^a), com 0,93% de lipídios na polpa de guabiroba. Não houve diferença estatística entre as formulações, no entanto, percebe-se uma tendência ao aumento no teor de lipídios proporcional ao aumento da concentração de soro, sendo que a formulação 60:40, que possuía mais soro, apresentou maior porcentagem de lipídios (1,24%). Alves et al. (2013) em estudo sobre a caracterização física e química da polpa e resíduo de guabiroba, obtiveram um valor de lipídios de 0,55%, ou seja, aproximadamente 50% do teor observado neste trabalho. Deve-se considerar que as análises do presente trabalho foram realizadas em base seca, o que gera um valor mais elevado que em base úmida. Além disso, como já citado, o local e clima de produção, além do estágio de maturação da guabiroba interfere na composição da mesma, o que explica o desvio entre os resultados.

Comparando os teores de fibras (Tabela 1) encontrados para as diferentes amostras, pode-se observar que o néctar sem adição de soro de leite (100:0) apresentou maior teor de fibras, com $4 \pm 1\%$. Este resultado deve-se ao fato que a adição de soro ao néctar torna-o mais diluído e consequentemente, quanto maior o teor de soro presente na formulação, menor a porcentagem de fibra. Adicionalmente, o soro do leite fornecido não apresenta fibras em sua composição. Alves et al (2013), ao analisar a polpa de guabiroba, obteve uma porcentagem de $7,10 \pm 0,03\%$ de fibras. Já Duarte et al (2009) observaram teores de $1,94 \pm 0,10\%$ para polpa de guabiroba. Comparando-se os valores obtidos neste trabalho com os citados acima, percebe-se que a porcentagem de fibra obtida foi baixa, considerando que a polpa de guabiroba está presente em maior concentração que o soro nas formulações. Uma possível causa para obtenção destes resultados está relacionada com o método de análise, pois, em algumas etapas, realizaram-se

transferências das amostras do papel filtro para o balão e vice-versa, sendo que durante estas, parte da amostra ficava retida no papel ou nas paredes do tubo digestor, devido à dificuldade de transferi-la totalmente e consequentemente, o resultado obtido pode não condizer com o conteúdo real de fibras presente nas amostras. Além disso, como já citado, a diluição do néctar contribui para diminuição da porcentagem obtida.

Em relação a cor (Tabela 1) das bebidas elaboradas é possível observar da Figura 2^a e 2b. O valor de L^* (Luminosidade) das bebidas foram 40, 47, 48 e 50 para néctar 100:00, 80:20, 70:30 e 60:40, respectivamente. Os resultados obtidos para o néctar sem adição de soro são menores que os encontrados por Santos (2011) que foi 57, ao analisar polpa de guabiroba. Essa diferença está relacionada com a diluição necessária da polpa para elaboração do néctar. Além disso, a adição de soro provocou um acréscimo no valor de L^* , ou seja, um aumento da luminosidade. A solução de soro reconstituída tinha uma coloração branca, a qual pode ter provocado tal efeito. Caldeira et al (2010) utilizaram diferentes proporções de iogurte e soro lácteo obtidos com leite de búfala para o desenvolvimento de uma bebida láctea sabor morango, onde um aumento da quantidade de soro, provocou um aumento do valor de L^* . Quando o ângulo Hue estiver entre 0° e 90° , quanto maior este for, mais amarela é a amostra e quanto menor for, mais vermelha é a amostra. Analisando a Tabela 1, observa-se que os néctares nas proporções 100:0 e 60:40 diferiram das demais amostras e entre si, sendo possível perceber um aumento no valor do ângulo Hue proporcional ao aumento na quantidade de soro adicionada, ou seja, a tonalidade dos néctares diminuiu com a adição de soro de leite. Com relação à variável Chroma, que indica a intensidade (saturação) da cor, o néctar 100:0 apresentou diferença significativa das demais formulações, com menor valor ($36,7 \pm 1,1$). A análise de Chroma está relacionada com a concentração ou pureza da cor, variando de 0 (zero) a 60 (sessenta), sendo que quanto mais próximo de 0 (zero), mais opaca é amostra. Assim, percebe-se que a adição do soro aos néctares tornou-os mais translúcidos, ou menos opacos que a formulação que não continha soro.

Figura 2: (A) Néctar de guabiroba 100% e soro do leite reconstituído, (B) néctar adicionado de soro do leite nas proporções de 60:40, 70:30 e 80:20 v/v.

3.2. ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DAS BEBIDAS

Os resultados obtidos nas análises microbiológicas das formulações são apresentados na Tabela 2. Como pode-se observar com relação às análises microbiológicas, todas as amostras estavam dentro dos parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 2001). De acordo com a RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001, para néctares de frutas exige-se apenas análise de coliformes totais, no entanto, como os néctares foram adicionados de soro de leite, passaram por várias etapas de manipulação e apresentam caráter ácido, investigou-se também a presença dos demais microrganismos citados, já que estes fatores possibilitam o seu crescimento.

Tabela 2 - Resultados das análises microbiológicas obtidos para as bebidas

Microrganismo	Amostras	Resultado	Padrão
<i>Staphylococcus aureus</i>	Néctar 100:0	$<1,0 \times 10^2$ UFC/mL	$<1,0 \times 10^2$ **
	Néctar 60:40	$<1,0 \times 10^2$ UFC/mL	
	Néctar 70:30	$<1,0 \times 10^2$ UFC/mL	
	Néctar 80:20	$<1,0 \times 10^2$ UFC/mL	
<i>Salmonella sp.</i>	Néctar 100:0	Ausente	Ausência*
	Néctar 60:40	Ausente	
	Néctar 70:30	Ausente	
	Néctar 80:20	Ausente	
<i>Bolores e leveduras</i>	Néctar 100:0	$1,4 \times 10^4$ UFC/mL	10**
	Néctar 60:40	$1,5 \times 10^4$ UFC/mL	
	Néctar 70:30	$1,7 \times 10^4$ UFC/mL	
	Néctar 80:20	$1,3 \times 10^4$ UFC/mL	
<i>Coliformes totais</i>	Néctar 100:0		Ausência*
	Néctar 60:40		
	Néctar 70:30	Ausente	
	Néctar 80:20		
<i>Coliformes termotolerantes</i>	Néctar 100:0		Ausência*
	Néctar 60:40		
	Néctar 70:30	Ausente	
	Néctar 80:20		

*(BRASIL,2001); **(BRASIL,1996).

Por se tratar de um produto ácido, as possíveis contaminações dos néctares ocorreriam devido à ação de microrganismos tolerantes a pH mais baixos, como bactérias lácticas, bolores e leveduras. As bactérias produtoras do ácido láctico, como por exemplo, os *Lactobacillus*, são microaerófilas e tolerantes a meios ácidos. De maneira geral, possuem baixa resistência térmica, sendo destruídas quando submetidas ao tratamento térmico. As degradações causadas pelas bactérias geram produtos como o diacetil, que induz odor forte e sabor desagradável ao produto, o CO₂ e o ácido láctico (CUI et al., 2019).

A Tabela 2 apresenta resultados para bolores e leveduras no limite permitido pela legislação, ou seja, na ordem de 10⁴ UFC/mL. Segundo Raybaudi-Massilia et al. (2009), os fungos oriundos da microbiota natural de frutas desenvolvem-se em amplas faixas de pH e atividade de água, porém apresentam baixa resistência ao tratamento térmico e por isso o processo de pasteurização é suficiente para sua eliminação. Além da microbiota da fruta, os fungos estão presentes em todo o ambiente, sendo facilmente carregados pelo ar. Desta maneira, os resultados observados para uma quantidade de fungos no limite permitido devem-se provavelmente a uma contaminação dos néctares após o processo de pasteurização, visto que no momento do processamento a circulação de ar e de pessoas no laboratório não foi controlada.

3.3. ANÁLISE SENSORIAL DAS BEBIDAS

Nos atributos aparência, cor, aroma, sabor e consistência (Tabela 3) não se observou diferença estatística entre as amostras, sendo que todas obtiveram média de notas entre 6 e 8, correspondente na escala a “gostei ligeiramente” e “gostei regularmente”, respectivamente. Com relação à análise de intenção de compra, a formulação 100:0 apresentou diferença estatística quando comparada às demais formulações, com a melhor média ($3,9 \pm 0,29$), correspondendo a “possivelmente compraria”, na escala. As notas obtidas para as demais bebidas correspondem a “talvez comprasse, talvez não comprasse”.

Tabela 3 – Resultados obtidos na análise sensorial das bebidas

Atributos	Néctar de guabiroba com soro do leite (v/v)			
	100:00	80:20	70:30	60:40
Aparência	7,4 ± 0,5 ^a	7,1 ± 0,4 ^a	7,1 ± 0,4 ^a	6,9 ± 0,4 ^a
Cor	7,5 ± 0,5 ^a	7,5 ± 0,4 ^a	7,3 ± 0,4 ^a	7,2 ± 0,4 ^a
Aroma	6,9 ± 0,5 ^a	6,4 ± 0,5 ^a	6,6 ± 0,5 ^a	6,3 ± 0,4 ^a
Sabor	6,9 ± 0,6 ^a	6,5 ± 0,5 ^a	6,6 ± 0,5 ^a	6,6 ± 0,5 ^a
Consistência	7,0 ± 0,6 ^a	6,9 ± 0,5 ^a	6,9 ± 0,5 ^a	6,7 ± 0,5 ^a
Intenção de compra	3,9 ± 0,3 ^a	3,3 ± 0,3 ^b	3,4 ± 0,3 ^b	3,3 ± 0,3 ^b

* Média e desvio padrão de triplicatas. a-b Médias com letras minúsculas iguais, numa mesma linha, não diferem ao nível de $P > 0.05$.

Pelegrini e Carrasqueira (2015) estudaram a influência da adição de soro do leite em bebidas de abacaxi e tomate. Os autores relataram que todos os sucos de frutas, preparados a partir de soro de leite apresentaram ótima aceitabilidade. Talma et al. (2010), ao analisar suco de uva adicionado de soro de leite nas proporções 40, 60, 80 e 100%, obteve boa aceitação para as formulações 40 e 60%, com média de notas correspondentes a “gostei extremamente” e “gostei moderadamente” respectivamente. No entanto, a formulação contendo 100% de soro de leite foi rejeitada, com média de notas correspondentes à “desgostei moderadamente” e “desgostei extremamente”, respectivamente.

Analisando os dados obtidos neste trabalho, pode-se afirmar que as amostras foram bem aceitas sensorialmente e são comercialmente viáveis. Comparando-se com os resultados obtidos por outros autores, percebe-se que a adição parcial de soro a bebidas proporciona características sensoriais aceitáveis em produtos semelhantes ao estudado.

4. CONCLUSÃO

Com relação caracterização físico-químicas das bebidas desenvolvidas, o teor de ácido cítrico foi maior nas formulações 60:40 e 70:30 devido à adição do mesmo para correção do pH, sendo que a formulação 60:40 apresentou maior teor entre todas as amostras, com $0,28 \pm 0,05\%$. Já o pH variou entre 4,1 e 4,5, não apresentando diferença estatística entre si. Os resultados de sólidos solúveis variaram entre 14,64 e 13,72°Brix, sendo o menor valor para o néctar puro (100%) e o maior para o néctar adicionado de 20% de soro. Os resultados de ratio não apresentaram diferença estatística entre as amostras. Na análise de umidade, observou-se uma tendência de aumento nas formulações com adição de soro, sendo que as médias entre as amostras variaram entre 84,53 e 85,23%. A adição do soro de leite provocou aumento o teor de cinzas das formulações sendo que a formulação 60:40 apresentou maior valor, com média de $0,39 \pm 0,01\%$ e a formulação 100:0 apresentou o menor teor, com $0,17 \pm 0,08\%$ de cinzas. O teor de lipídeos das bebidas foram reduzidos apresentando valores variando de 0,93% (néctar 100:0) a 1,24% (néctar 60:40). Quanto às fibras, a formulação 100:0 apresentou maior teor e as formulações 60:40 e 70:30 apresentaram os teores mais baixos. Na análise de cor, observou-se um aumento da luminosidade das bebidas devido a adição de soro. Com relação às análises microbiológicas, todas as formulações estavam dentro dos parâmetros determinados pela legislação. O néctar de guabiroba adicionado de soro de leite em diferentes proporções foi bem aceito sensorialmente e apresentou-se comercialmente viável na pesquisa de intenção de compra. Assim, o enriquecimento de néctar de guabiroba com soro de leite demonstrou-se uma boa fonte de cinzas para a bebida, além de torná-la diferenciada. Além disso, observou-se que estudos sobre a guabiroba e o processamento da mesma são escassos, o que exalta a importância do desenvolvimento de novas pesquisas sobre esta fruta, tendo em vista as suas características nutricionais e sua versatilidade com relação ao processamento.

REFERÊNCIAS

- [1] ABIR, Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerante e Bebidas não Alcoólicas. Revista ABIR, edição 2019/2020. Disponível em: <https://abir.org.br/abir/wp-content/uploads/2020/03/revista-abir-2020.pdf>. Acesso em: 16/12/2020.
- [2] ALVES, A. M.; ALVES, M. S. O.; FERNANDES, T. de O.; NAVES, R. V.; NAVES, M. M. V. Caracterização física e química, fenólicos totais e atividade antioxidante da polpa e resíduo de guabiroba. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v.35, n.3, p.837-844, 2013.
- [3] AMARAL, G.V.; SILVA, E.K.; CAVALCANTI, R.N.; MARTINS, C.P.C.; ANDRADE, L.G.Z.S.; MORAES, J.; ALVARENGA, V.O.; GUIMARÃES, J.T.; ESMERINO, E.A.; FREITAS, M.Q.; SILVA, M.C.; RAICES, R.S.L.; SANT'ANA, A.S.; MEIRELES, M.A.A.; CRUZ, A.G. Whey-grape juice drink processed by supercritical carbon dioxide technology: Physicochemical characteristics, bioactive compounds and volatile profile. Food Chemistry, v. 239, p.697-703, 2018.
- [4] BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Regulamento técnico de identidade e qualidade de leite em pó. Diário Oficial da União, Brasília, 1996.
- [5] BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA – Ministério da Saúde. Resolução da diretoria colegiada da Secretaria de Vigilância Sanitária nº 12. Diário Oficial da União, Brasília, 2001.
- [6] BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - RDC nº 12, de 04 de setembro de 2003. Regulamento técnico para fixação dos padrões de identidade e qualidade gerais para néctares. Brasil, 2003.
- [7] BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Decreto nº 6.871, de 4 de junho de 2009. Regulamento Técnico que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 4 de junho de 2009.
- [8] CALDEIRA, L. A.; FERRÃO, S. P. B.; FERNANDES, S. A. de A.; MAGNAVITA, A. P. A.; SANTOS, T. D. R. Desenvolvimento de bebida láctea sabor morango utilizando diferentes níveis de iogurte e soro lácteo obtidos com leite de búfala. Ciência Rural, Santa Maria, v.40, n.10, p.2193-2198, 2010.
- [9] CASSANI, L.; TOMADONI, B.; PONCE, A.; AGÜERO, M. V.; MOREIRA, M. R. Combined Use of Ultrasound and Vanillin to Improve Quality Parameters and Safety of Strawberry Juice Enriched with Prebiotic Fibers. Food and Bioprocess Technology, v.10, p.1454–1465, 2017.
- [10] CUI, S.; ZHAO, N.; LU, W.; ZHAO, F.; ZHENG, S.; WANG, W., & CHEN, W. Effect of different Lactobacillus species on volatile and nonvolatile flavor compounds in juices fermentation. Food Science & Nutrition, v.7, n. 7, p.2214-2223, 2019.
- [11] DUARTE, W. F.; DIAS, D. R.; PEREIRA, G. V. M.; GERVÁSIO, I. M.; SCHWAN, R. F. Indigenous and inoculated yeast fermentation of guabiroba (*Campomanesia pubescens*) pulp for fruit wine production. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, v.36, p.557-569, 2009.
- [12] DUTCOSKY, S. D. (2019). Análise Sensorial de Alimentos (Champagnat - Pucpress (ed.); 5a edição).
- [13] FARAONI, A. S.; RAMOS, A. M.; STRINGHETA, P. C.; LAUREANO, J. Efeito dos métodos de conservação, tipos de embalagem e tempo de estocagem na coloração de polpa de manga “Ubá” produzida em sistema orgânico. Revista Ceres, v. 55, p. 504-511, 2008.
- [14] FIGUEIRA, R.; NOGUEIRA, A. M. P.; VENTURINI FILHO, W. G.; DUCATTI, C.; QUEIROZ, E. C.; PEREIRA, A. G. de S. Análise físico-química e legalidade em bebidas de laranja. Alimentos e Nutrição, Araraquara, v.21, n 2, p.267-272, 2010.
- [15] JAKHAR, M. Development of Whey with Apple Juice and Appraisal of their Nutritional Qualities. Asian Journal of Dairy and Food Research, v.38, n. 2 (April-June 2019).
- [16] LEITÃO, A. M. Estabilidade físico-química, microbiológica e sensorial de néctar de amora-preta (*Rubus spp.*), Cv. Tupy, embalado em polipropileno, no armazenamento. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia Agroindustrial), Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Pelotas, 2007, 64 p.
- [17] MCGUIRE, R. G. Reporting of objective colour measurements HortScience, Alexandria, v.27, n.12, p. 1254-1255, 1992.
- [18] NOLLET, L. Handbook of food analysis: physical characterization and nutrient analysis. New York: Marcel Dekker, 2004. 03 volumes. 875 p.
- [19] PELEGRINE, D. H. G.; CARRASQUEIRA, R. L. Whey uses in nutritional beverages enrichment: sensorial analysis. Revista de Ciência & Tecnologia, v. 18, p. 3-11, 2015.
- [20] RAJORIA, A.; CHAUAN, A.K.; KUMAR, J. Studies on formulation of whey protein enriched concentrated tomato juice beverage. Journal of Food Science and Technology, v.52, p.885-893, 2015.

- [21] RAYBAUDI-MASSILIA, R.M., MOSQUEDAMELGAR, J., SOLIVA-FORTUNY, R., MARTÍN BELLOSO O. Control of pathogenic and spoilage microorganisms in fresh-cut fruits and fruit juices by traditional and alternative natural antimicrobials. *Comprehensive Reviews of Food Science and Food Safety*. v. 8, p.157-180, 2009.
- [22] SANTOS, M. S. Impacto do processamento sobre as características físico-químicas, reológicas e funcionais de frutos da guabirobeira (*Campomanesia Xanthocarpa* Berg) – Tese (Doutorado em Tecnologia de Alimentos), Universidade Federal do Paraná, Curitiba/PR, 2011.
- [23] SANTOS, M. S., CORREIA, C. H., PETKOWICZ, C. L. DE O., CÂNDIDO, L. M. B. Quantification of the major bioactive phytochemical in the gabioba (*Campomanesia xanthocarpa* Berg) juice. *Acta Scientiarum Technology*, Maringá, v.35, n.4, p. 783-787, 2013a.
- [24] SANTOS, M.S.; LIMA, J.J.; PETKOWICZ, C. L. DE O.; CÂNDIDO, L. M. B.; Chemical characterization and evaluation of the antioxidante potential of gabioba jam (*Campomanesia xanthocarpa* Berg). *Acta Scientiarum Agronomy*. Maringá, v.35, n.1, p.73-82, 2013b.
- [25] SILVA, N.; JUNQUEIRA, V.C.A.; SILVEIRA, N. F. A. Manual de métodos de análises microbiológica de alimentos. São Paulo: Varela, 1997,295p.
- [26] SILVA, C. L. Desenvolvimento e avaliação físico-química de néctares à base de Gabioba (*Campomanesia pubescens*) em diferentes períodos de armazenamento. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Alimentos). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. 2015. 51f.
- [27] SILVA, E.K; GUIMARÃES, J.T.; COSTA, A.L.R.; CRUZ, A.G.; MEIRELES, M.A.A. Non-thermal processing of inulin-enriched soursop whey beverage using supercritical carbon dioxide technology. *The Journal of Supercritical Fluids*, v.154, p.1-9, 2019.
- [28] TALMA, S. V.; FIRMINO, F. C.; MARTINS, E. M. F.; MINIM, V. P. R.; MARTINS, M. L. Suco de uva enriquecido com soro: elaboração e aceitabilidade sensorial. *Revista do Instituto de Laticínios “Cândido Tostes”*, v.65, n. 373, p.20-24, 2010.
- [29] TONIN, J.; MACHADO, J.T.M. BENATI, J.A.; ROHRIG, B.; SOBUCKI, L., CHASSOT, T.; SCHNEIDER, E.P. Yield and quality of fruits of strawberry cultivars in an organic production system. *Científica Journal of Agrarian Science*, v.45, p.271–277, 2017.
- [30] TORO-SIERRA, J.; SCHUMANN, J.; KULOZIK, U. Impact of spray-drying conditions on the particle size of microparticulated whey protein fractions. *Dairy Science & Technology*, v.93, p.487-503, 2013.
- [31] ZENEBOM, O.; PASCUET, N. S.; TIGLEA, P. (2008). Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz. Métodos Químicos e Físicos para Análise de Alimentos. Instituto Adolfo Lutz (IAL). São Paulo/SP

Capítulo 11

Qualidade dos alimentos comercializados nas feiras de Francisco Beltrão-PR

Andréa Cátia Leal Badaró

Vaneza Paula Poplawski Carneiro

Bianca de Lima

Marciana da Silva Gonçalves

Resumo: O aumento da venda de produtos *in natura* em feiras livres tem aumentado a preocupação com as condições higiênico-sanitárias desse tipo de comércio. O objetivo deste trabalho foi avaliar produtos comercializados nas feiras, quanto as boas práticas, rotulagem e nível de contaminações microbianas dos alimentos. Foi realizado um levantamento das condições de funcionamento das feiras de Francisco Beltrão – PR, e os dados nortearam várias ações, como oficinas e treinamentos sobre a qualidade dos alimentos e sua correta forma de comercialização nas feiras. Foram realizadas análises microbiológicas de 30 amostras de alimentos, e os resultados mostraram Salmonella em 20% das amostras, Estafilococos em 13,3% e Coliformes em 6,6%, indicando baixas porcentagens de contaminação, que pode estar associado às ações de orientação sobre boas práticas de manipulação de alimentos e sua adoção como rotina. Pode-se constatar a contribuição destas ações na melhoria da qualidade dos alimentos ofertados nas feiras do município.

Palavras-chave: qualidade dos alimentos; treinamentos de boas práticas; contaminação microbiana dos alimentos.

1. INTRODUÇÃO

As feiras livres são caracterizadas como um mercado varejista ao ar livre, organizadas pela municipalidade como serviço de utilidade pública e voltadas para a distribuição de gêneros alimentícios e produtos básicos (Mascarenhas e Dolzani, 2008).

Francisco Beltrão-PR ocorrem semanalmente 8 Feiras entre agroecológicas, livre de agrotóxicos, e a feira livre do Produtor Rural, todas compostas por integrantes da agricultura familiar, sendo 32 feirantes da área alimentícia que produzem e comercializam produtos panificados, vegetais, alguns produtos de origem animal. Existem ainda 10 barracas de produtos prontos para lanche, de consumo imediato (Francisco Beltrão, 2019).

No entanto, um dos problemas associados às feiras é a falta de cuidado ao manipular e comercializar os alimentos, propiciando a veiculação de diversas doenças. A inocuidade dos alimentos deve ser inserida como prioridade na agenda da saúde pública, sendo o comércio em ambientes de mercados e feiras classificados como alto risco (Marins et al., 2014).

As questões higiênico-sanitárias da venda desses produtos são sempre uma preocupação dos órgãos reguladores destas feiras, e os consumidores exigem, cada vez mais, o fornecimento de alimentos com qualidade e seguros. Para que tal demanda seja atendida, é imprescindível que os feirantes tenham noção de boas práticas de manipulação e coloquem na prática em seu dia a dia.

As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) são caracterizadas como aquelas causadas de ingestão de alimentos ou água contaminados, e atualmente é um dos problemas de grande preocupação em relação a saúde pública e bem-estar das pessoas.

São várias as patologias com sua origem da ingestão de alimentos contaminados. Os agentes mais citados são bactérias, porém outros agentes etiológicos podem originar patologias como os fungos e suas toxinas, vírus, protozoários e vários parasitas. Dentre as bactérias, destacam-se *Salmonella* spp., *Escherichia coli* e *Staphylococcus aureus*, comumente associados a surtos de doenças gastroentéricas (Franco e Landgraf, 2008).

A forma de exposição e armazenamento inadequados dos alimentos, aliados às más condições de higiene, podem proporcionar a contaminação e o desenvolvimento de microrganismos indesejáveis em alimentos que são destinados principalmente para comercialização em ambiente natural, como a maioria dos produtos presentes nas feiras (Soares et al., 2014).

Diante da preocupação crescente dos feirantes e do setor que regula estas feiras quanto a inocuidade destes alimentos, realizou-se um projeto, composto por várias ações, com objetivo de estabelecer um levantamento das condições sanitárias das feiras e das barracas, seguido da realização de oficinas e orientações para implantação das melhorias necessárias, e por fim um diagnóstico por meio de análises microbiológicas de alimentos ali comercializados, de forma a avaliar como as orientações repassadas impactaram nos resultados microbiológicos, confirmando a efetividade das ações de melhoria da qualidade dos alimentos.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Inicialmente, foi elaborado e aplicado um questionário estruturado para obter dados e saber sobre das especificidades e condições sanitárias de 20 barracas das feiras do centro e dos bairros, quais os cuidados praticados, os produtos vendidos, investimentos e o nível de conhecimento dos feirantes acerca de boas práticas.

Após aplicação dos questionários, os dados foram compilados e elaborado um plano de ação composto de oficinas e treinamentos dos pontos identificados mais críticos, que poderiam comprometer a qualidade dos alimentos e que estariam em desacordo com as normas sanitárias vigentes.

Depois de realizados os treinamentos, iniciou-se a fase de monitoramento da qualidade microbiológica, com coletas de amostras semanalmente, que eram analisadas quanto sua carga microbiana afim de determinar se os alimentos comercializados atendiam a legislação brasileira em vigor.

Foram coletadas amostras de 8 produtos já prontos para consumo direto na feira livre da região central e 22 amostras das feiras dos bairros de Francisco Beltrão – PR, totalizando 30 amostras avaliadas. Estas amostras foram acondicionadas individualmente em embalagens plásticas estéreis, identificadas e transportadas em caixas isotérmicas até o Laboratório de Microbiologia da Universidade Tecnológica

Federal do Paraná (UTFPR) – Câmpus Francisco Beltrão, onde foram realizadas as análises de contagem de *Estafilococos* coagulase positiva, número mais provável de coliformes termotolerantes e presença de *Salmonella* spp.. As metodologias utilizadas são descritas no Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos e Água (Silva et al., 2017).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados obtidos com a aplicação dos questionários demonstram que 50% (n=10) dos feirantes possuem fundamental incompleto, 25% (n=5) possuem ensino médio incompleto e outros 25% (n=5) possuem ensino médio completo. O grau de escolaridade pode influenciar na percepção e nas atitudes que estes feirantes adotam sobre as boas práticas, assim como a abordagem que deve ser dada nos treinamentos e instruções a serem repassadas acerca do assunto.

Quanto ao tempo que já trabalham nas feiras, observou-se que 40% (n=8) estão no ramo há 1 ano ou menos, 35% (n=7) estão nas feiras entre 2 a 3 anos e 20% (n=4) estão há mais de 10 anos. Considerando a infraestrutura que possuem para trabalhar, 65% possuem galpão de produção/seleção, 70% possuem tanque ou pia e apenas 1 (5%) possui equipamento de frio exclusivo para resfriar os produtos. Em relação à estrutura das barracas, apenas 35% (n=7) possuem pia e acessórios para lavagem das mãos durante o momento da feira.

Quanto ao grau de prioridade que a atividade exerce sobre o seu rendimento econômico, 60% (n=12) dos feirantes disseram que é média, 25% disseram ser baixa e 15% ser alta, sendo que 85% (n=17) deles empregam exclusivamente da mão de obra familiar na produção e na barraca, e 75% (n=15) consideram o comércio e rendimentos obtidos na feira bom, sendo que 80% (n=16) realizam cálculos de custos e rendimentos.

Quando questionados sobre o uso de uniformes, 80% (n=16) responderam que usam algum tipo de uniforme, e foi citado que era composto de touca (55%, 11), jaleco (45%, 9), calçado fechado (40%, 8), calça comprida (20%, 4) e luvas (10%, 2). Quanto aos hábitos de higiene, 65% (n=13) tocam em dinheiro e nos alimentos, 60% (n=12) usam algum tipo de adorno e um deles se declarou fumante.

Na figura 1 pode-se observar algumas informações quanto as boas práticas de manipulação. Observa-se que 70% dos feirantes declaram conhecer sobre as boas práticas, 75% sabem que os alimentos podem causar doenças, 80% já recebeu orientações e 60% já participou de cursos sobre o tema. A grande maioria, 85% disse ter interesse em participar de mais treinamentos e cursos sobre o tema.

Figura 1 – Respostas sobre boas práticas de manipulação obtidas dos feirantes de Francisco Beltrão – PR, 2019.

*BPM = Boas práticas de manipulação
Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Assim, numa próxima etapa do projeto, foram organizados e realizados oficinas e seminários sobre a qualidade dos alimentos comercializados nas feiras livres, com ampla participação de todos os feirantes (Figura 2). Foram ainda desenvolvidas e distribuídas cartilhas informativas sobre cada tema que era abordado nos eventos realizados, de modo a facilitar o aprendizado melhorando o aproveitamento por contribuir como material de apoio à rotina dos feirantes (Figura 3).

Figura 2 – Registros fotográficos do Seminário sobre boas práticas para feirantes de Francisco Beltrão, 2019.

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Figura 3 – Exemplo de material impresso distribuído no Seminário sobre boas práticas para feirantes de Francisco Beltrão, 2019.

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Na sequência, foram realizadas as análises microbiológicas de 30 amostras de alimentos e os resultados comparados com os parâmetros definidos pela Resolução de Diretoria Colegiada RDC-nº 12/2001 da Anvisa (Brasil, 2001). Pode-se constatar que 2 delas (6,67%) estavam acima dos limites para coliformes termotolerantes (Figura 4), sendo uma amostra de salame e a outra de caldo de cana.

Este grupo de bactérias é bastante investigado em alimentos, pois representam a espécie *E. coli*, fornecendo informações acerca das condições higiênicas do produto, pois indicam contaminação de origem fecal e possível presença de patógenos. O uso destes microrganismos como indicadores de contaminação se baseia principalmente no fato de que são encontrados exclusivamente e em grande número nas fezes de humanos e animais (Franco e Landgraf, 2008; Forsythe, 2002). Sua presença indica contaminação dos alimentos quando os manipuladores negligenciam as Boas Práticas de Manipulação, e demonstrando que os produtores e feirantes precisam dar mais importância aos seus processos de higienização, principalmente das mãos e do seu ambiente de trabalho e contato com os alimentos.

Nas contagens de estafilococos coagulase positiva foram encontradas 4 amostras (13,33%) que não atendiam à legislação (Figura 4), sendo amostras de filé de tilápia, coxinha, biscoito de polvilho e bolacha caseira. A espécie *Staphylococcus aureus* faz parte da microbiota normal de mucosas e pele, podendo ser transmitida aos alimentos por contato direto (pelas mãos) ou indireto (como saliva, espirro e tosse). Nos alimentos, podem se multiplicar e produzir enterotoxinas, a partir de contagens em torno de 106 UFC/g podem causar surtos. A ingestão destas enterotoxinas podem causar vômito em poucos minutos, seguido de diarreia, sendo que os sintomas duram pouco mais que 6 horas (Franco e Landgraf, 2008; Forsythe, 2002).

Figura 4 – Classificação das amostras de alimentos comercializados nas feiras livres de Francisco Beltrão – PR, baseada nos parâmetros da RDC nº 12/2001*.

* Resolução de Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil, 2001).
Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Um dos principais problemas observados nos resultados obtidos foi em relação à presença de *Salmonella*, pois identificou-se a possível presença desta bactéria em 20% (n=6) das amostras analisadas (Figura 4), gerando grande preocupação em relação aos alimentos produzidos e vendidos na feira. As amostras foram de caldo de cana, coxinha, suco de laranja, espetinho, queijo e brócolis. *Salmonella* spp. representa um grupo de microrganismos que causam doenças em humanos e animais, podendo ser encontrados no trato gastrointestinal de mamíferos, aves, anfíbios e répteis. As espécies desse gênero causam sintomas como diarreia, vômitos, febre e dores abdominais, sendo que alguns casos podem apresentar septicemia (Franco e Landgraf, 2008).

No geral, os resultados mostraram baixas porcentagens de contaminação, o que pode estar associado as oficinas e treinamentos ofertados sobre boas práticas de manipulação de alimentos e sua adoção como rotina, constatando a contribuição positiva das ações para a melhoria da qualidade dos alimentos ofertados nas feiras do município.

4. CONCLUSÕES

Diante da preocupação dos responsáveis pelas feiras com a inocuidade dos alimentos ali comercializados, realizou-se este projeto, com um diagnóstico do nível de adoção das boas práticas de manipulação, elaboração e impressão material didático sobre “Boas Práticas de Manipulação de Alimentos”, realização de treinamentos e oficinas sobre Boas Práticas de Manipulação e controle de qualidade de alimentos, visando a melhoria da situação encontrada no diagnóstico e adequando à legislação de acordo com realidade de cada produtor.

Na sequência, foram realizadas análises microbiológicas de alimentos comercializados nas feiras para avaliar a qualidade dos alimentos fornecidos à população, de forma a conferir se as informações repassadas nas atividades de capacitação estavam sendo efetivas para a qualidade final dos alimentos.

Este projeto vem estabelecendo importante parceria, com apoio técnico, científico e laboratorial às demandas da Secretaria de Agricultura do município, e tem colaborado com a qualificação profissional dos

feirantes e agricultores familiares que, ao adotarem práticas adequadas de produção e manipulação higiênica dos alimentos, podem fornecer produtos seguros e com melhor qualidade para a população.

AGRADECIMENTOS

As autoras agradecem à Fundação Araucária, à PROREC-UTFPR, à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, e especialmente aos feirantes que contribuíram com informações e amostras que geraram os dados desta pesquisa.

OBSERVAÇÃO

Este trabalho foi apresentado no 7º Simpósio de Segurança Alimentar – Inovação com Sustentabilidade, que aconteceu de forma Online entre os dias 27 a 29 de outubro de 2020, em Bento Gonçalves - RS.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Brasil, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. (2001). *Regulamento Técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos*. (Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001). Diário Oficial da República Federativa do Brasil.
- [2] Forsythe, S. J. (2002). *Microbiologia da segurança alimentar*. (2. ed). Porto Alegre: Artmed.
- [3] Francisco Beltrão, Secretaria de Agricultura. (2019) Dados do Município. Disponível em: <http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br/secretarias/agricultura/geral/dados-do-municipio/>
- [4] Franco, B. D. G. M. & Landgraf, M. (2008). *Microbiologia dos alimentos*. (1. ed). São Paulo: Editora Atheneu.
- [5] Marins, B. R., Tancredi, R. C. P. & Gemal, A. L. (2014). *Segurança alimentar no contexto da vigilância sanitária: reflexões e práticas*. Rio de Janeiro: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/Fundação Oswaldo Cruz.
- [6] Mascarenhas, G. & Dolzani, M. C. S. (2008) Feira Livre: Territorialidade Popular e Cultura na Metrópole Contemporânea. *Ateliê Geográfico*, 2(2), 72-87. A.Silva, n., Junqueira, V. C. A., Silveira, N. F. A., taniwaki, M. H., Gomes, R. A. R. & Okazaki, M. M. (2017). *Manual de métodos de análise microbiológica de alimentos e água*. (5. Ed). São Paulo: Editora Blucher.
- [7] Soares, M. D. J, Mendes, L. M. M. & Messias, C. M. B. O. (2014). Feiras livres: avaliação da estrutura física e do comércio. *Revista Baiana de Saúde Pública*, 38(2), 318-326. Disponível em <http://rbsp.sesab.ba.gov.br/index.php/rbsp/article/view/581/1128>.

Capítulo 12

Pigmentos cloroplásticos, fenóis totais e potencial antioxidante da azeitona (cv. 'Arbequina') cultivada na Região da Campanha do Rio Grande do Sul

Bruna da Fonseca Antunes

Erick Soares Fernandes Oliveira

Wellington Freitas Gonçalves

Fernanda Germano Alves Gautério

Miriane Lucas Azevedo

Resumo: O fruto da oliveira (*Olea europaea* L.) cultivar 'Arbequina' tem demonstrado boa produtividade na Região da Campanha, estas apresentam um bom potencial de extração de azeites de alta qualidade, com características sensoriais apreciáveis. Ademais, as azeitonas apresentam um elevado teor de pigmentos como clorofilas e carotenoides e compostos fenólicos, que contribuem no potencial antioxidante. O objetivo deste estudo foi determinar o potencial antioxidante e os teores de fenóis totais, clorofilas totais, 'a' e 'b' e carotenoides totais de frutos de azeitona, cv. 'Arbequina', in natura, da Região da Campanha do RS. Foram realizadas análises para determinar o potencial antioxidante, compostos fenólicos, carotenoides totais e clorofilas totais, 'a' e 'b'. Foi encontrada uma atividade antioxidante de $80,95 \pm 1,79\%$ de inibição do radical DPPH e teores de compostos fenólicos de $100,10 \pm 1,63$ mgGAE.g⁻¹, carotenoides totais de $311,66 \pm 0,99$ mg β caroteno.100g⁻¹ e de clorofilas totais, 'a' e 'b', respectivamente, $252,96 \pm 2,51$ mg.100g⁻¹, $91,67 \pm 1,18$ mg.100g⁻¹ e $161,29 \pm 1,39$ mg.100g⁻¹.

Palavras-Chave: *Olea europaea* L.; composto fenólico; carotenoide; clorofila.

1. INTRODUÇÃO

A oliveira (*Olea europaea* L.) é pertencente à família botânica Oleaceae, sendo categorizada como uma das frutíferas mais antigas cultivadas pelo ser humano, sendo a única espécie dessa família com frutos comestíveis (COUTINHO, 2007). O fruto maduro da oliveira (azeitona) pode ser consumido ou utilizado para extração de azeite, líquido amarelo-esverdeado, transparente e aromático, usado desde tempos remotos como ingrediente culinário (MELLO & PINHEIRO, 2012).

A ‘Arbequina’ é uma cultivar oriunda de Arbeca, na Espanha; apresenta elevada produtividade, bom rendimento graxo e excelente qualidade do azeite produzido (COUTINHO, JORGE; COSTA, 2007).

A azeitona tem em sua constituição básica uma pele exterior, formada de compostos celulósicos, produtos aromáticos e corantes naturais, em seu interior uma polpa contendo grande parte dos ácidos graxos presentes e um caroço que tem por finalidade proteger o material genético da planta e armazenar substâncias nutritivas. O fruto é impróprio a ser consumido *in natura*, uma vez que apresenta um componente responsável pelo amargor denominado de oleuropeína, um glicosídeo presente naturalmente nas azeitonas. (ARROYO-LÓPEZ, 2010).

Nos últimos anos, o consumo de azeite de oliva culminou com a expansão do cultivo da oliveira, uma vez que é atribuído ao consumo do azeite propriedades preventivas e terapêuticas (MALHEIRO, 2010). A implantação de olivais obedece a fatores relevantes como escolha de cultivares. Para condições de cultivo em solos brasileiros, deve-se escolher cultivares exigentes de menores quantidades de horas de frio e com desenvolvimento vegetativo menos vigoroso. Para tal, os cultivares comerciais ‘Arbequina’, ‘Koroneiki’ e ‘Arbosana’ têm sido testados com satisfação no Brasil para extração de azeite e o cultivar ‘Ascolana’ para a produção de azeitonas de mesa (BERTONCINI, 2012).

No que concerne a propriedades preventivas é pertinente citar a presença de um alto teor de compostos bioativos nas azeitonas, em especial os polifenóis, como o hidroxitirosol, oleuropeína, tirosol, entre outros, que são considerados os maiores contribuintes para a atividade antioxidante dos alimentos (RIOS; GUTIERRES-ROSALES, 2010). A função dos compostos fenólicos é devida as suas propriedades de oxirredução que desempenham papel essencial na absorção e neutralização de radicais livres estando presentes em uma grande variedade de produtos industrializados, vegetais e frutas (DEGÁSPARI, 2004).

O objetivo deste estudo foi determinar o potencial antioxidante e os teores de fenóis totais, clorofilas totais, ‘a’ e ‘b’ e carotenoides totais de frutos de azeitona, cv. ‘Arbequina’, *in natura*, da Região da Campanha do Rio Grande do Sul.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Os frutos de azeitona da cultivar ‘Arbequina’, foram colhidos na safra de 2016 em um olival de uma indústria de extração de azeites, localizada no município de Candiota/RS, acondicionados em embalagens plásticas (PEBD), transportados até o laboratório do Curso de Engenharia de Alimentos, campus Bagé, da Universidade Federal do Pampa e armazenados em freezer ($-18\pm 2^{\circ}\text{C}$) até o momento das análises.

2.1. DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE

A atividade antioxidante dos extratos de azeitonas foi avaliada através do método adaptado de Brand-Williams et al. (1995), que se baseia capacidade dos compostos presentes nas amostras em sequestrar o radical estável DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil). O radical DPPH é considerado estável à temperatura ambiente produzindo uma solução violeta quando adicionada ao metanol, já que há uma transferência de elétrons por ação de um antioxidante, ocorre uma diminuição da absorbância a 517 nm, descolorindo a solução. A quantificação da atividade antioxidante foi expressa em percentual de inibição do DPPH frente ao extrato.

2.2. DETERMINAÇÃO DE FENÓIS TOTAIS

A determinação do conteúdo total de fenóis presente foi realizada conforme o método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteu, desenvolvido por Singleton & Rossi (1965) com modificações, onde, através das reações colorimétricas obtidas no reagente, realizaram-se leituras de absorbância a 765 nm. O procedimento de extração envolveu etapas consecutivas de filtração e repouso. O conteúdo de fenóis totais foi calculado através da curva padrão de ácido gálico e os resultados foram expressos em mg de ácido gálico.g⁻¹ de matéria fresca (MF).

2.3. DETERMINAÇÃO DE CLOROFILAS TOTAL, 'A' E 'B'

As amostras de 1g de frutos foram maceradas em almofariz em presença de 5 mL de acetona a 80% (v/v). O material foi centrifugado a 4000±5000 g por 10 minutos e o sobrenadante transferido para um balão volumétrico de 25 mL, completando-se o volume com acetona 80% (v/v). A absorbância da solução foi obtida por espectrofotometria a 647 e 663 nm. Os teores de clorofilas totais, 'a' e 'b' foram calculados através das equações (eq. 1, 2, 3) estabelecidas por Lichtenthaler (1987). Os resultados foram expressos em mg.100g⁻¹ de matéria fresca (MF).

$$Chl\ Totais = 7,15 * (A_{663}) + 18,71 * (A_{647}) \quad eq.1$$

$$Chl\ 'a' = 12,25 * (A_{663}) - 2,79 * (A_{647}) \quad eq.2$$

$$Chl\ 'b' = 21,50 * (A_{647}) - 5,10 * (A_{663}) \quad eq.3$$

2.4. DETERMINAÇÃO DE CAROTENOIDES TOTAIS

O conteúdo de carotenoides totais foi determinado segundo metodologia de Rodriguez-Amaya (1999). Triturou-se 5g da amostra em presença de celite, extraiu-se com acetona gelada, e após foi realizada uma filtração a vácuo e lavagem com acetona gelada, até total remoção do pigmento. Após a etapa de extração, o pigmento foi transferido para um funil de separação, onde foi adicionado éter de petróleo e água até a completa remoção da acetona. Foi realizada leitura da absorbância do extrato etéreo em espectrofotômetro (BEL 2000 UV), no comprimento de onda de 450 nm. A quantificação dos carotenoides foi feita de acordo com equação (eq. 4) e o resultado expresso em mg de β-caroteno por 100 g de fruto *in natura*.

$$Carotenoides\ Totais = \frac{Absorbância \times volume\ do\ extrato\ (mL) \times 10^6}{2500 \times 100 \times g_{amostra}} \quad eq. 4$$

2.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os resultados obtidos para os extratos de azeitona foram avaliados em triplicata e expressos em média com seu desvio padrão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos na análise de azeitonas da cv. 'Arbequina' estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Análises de azeitona da cv. 'Arbequina'

Atividade Antioxidante (% inibição)	Fenóis Totais (mg GAE.g ⁻¹)	Carotenoides Totais (mg βcaroteno.100g ⁻¹)	Clorofila Total (mg.100g ⁻¹)	Clorofila 'a' (mg.100g ⁻¹)	Clorofila 'b' (mg.100g ⁻¹)
80,95±1,79	100,10±1,63	311,66±0,99	252,96±2,51	91,67±1,18	161,29±1,39

Os extratos de azeitona cv. 'Arbequina' sofreram análises colorimétrica para determinar a atividade antioxidante, que apresentou 80,95% de inibição do radical DPPH. Em pesquisas realizadas por Garbi et al. (2005), no qual foi determinada a atividade antioxidante do extrato alcoólico de azeitonas do cv. 'Arauco', obteve-se um valor de 40,5% de inibição do DPPH, resultado este inferior ao encontrado no presente estudo, denotando que a cultivar 'Arbequina' possui alta capacidade antioxidante e apresenta-se como uma fonte de compostos bioativos. O conteúdo de compostos bioativos está fortemente correlacionado com a capacidade antioxidante das frutas, que por sua vez esta relacionada com o retardo do envelhecimento e a prevenção de varias doenças, devido as suas propriedades de reagir com os radicais livres, protegendo os tecidos do organismo humano contra o estresse oxidativo e patologias associadas (CANUTO et al., 2010).

Também, foram realizados ensaios colorimétricos pelo método de Folin-Ciocalteu, para identificar o teor de compostos fenólicos totais, onde este apresentou 100,10±1,63 mg GAE.g⁻¹ (Equivalente em ácido gálico). Segundo estudo realizado por Scognamiglio et al. (2012), em azeitonas cultivadas no sul da Itália para identificar a atividade antioxidante, o teor de fenóis totais das cv. 'Salella' (330,2±2,3 mg GAE.g⁻¹), 'Pisciottana' (219,6±7,0 mg GAE.g⁻¹) e 'Frantoio' (198,2±3,6 mg GAE.g⁻¹) apresentaram altos índices, valores estes superiores aos encontrados no presente estudo. Porém, essa diferença pode ser explicada pelo fato destas cultivares italianas serem autóctones, uma vez que a cv. 'Arbequina', cultivada na região da Campanha, é um clone trazido da Espanha. Pois, o teor desses compostos pode variar nos alimentos conforme a região de plantio, tipo de solo, exposição solar, índice pluviométrico, estágio de maturação, espécie e cultivar (VENDRAMINI; TRUGO, 2004).

Com relação aos pigmentos cloroplásticos, o teor de carotenoides totais foi de 311,66±0,99 mg βcaroteno.100g⁻¹, este valor é considerado alto, pois em estudo realizado por Pestana-Bauer, Gularte-Dutra e Zambiasi (2011), em azeitonas da cv. 'Caroleia' de dupla finalidade, cultivadas no sul do Brasil, estas apresentaram 2,15 mg βcaroteno.100g⁻¹. Para clorofilas totais foi encontrado um teor de 252,96±2,51 mg.100g⁻¹, para clorofilas 'a' e 'b' foram identificados um total de 91,67±1,18 mg.100g⁻¹ e 161,29±1,39 mg.100g⁻¹, respectivamente, mesmo comportamento dos carotenóides totais, quando comparamos com o estudo conduzido por Pestana-Bauer, Gularte-Dutra e Zambiasi (2011), onde foram obtidos para clorofila total, 'a' e 'b', respectivamente, 0,96 mg.100g⁻¹, 0,39 mg.100g⁻¹ e 0,58 mg.100g⁻¹. Tais diferenças observadas tanto para carotenoides totais, quanto para clorofilas totais, 'a' e 'b' podem ter ocorrido devido ao estágio de maturação no momento da colheita, ou devido às diferenças de pigmentação características da cultivar ou, ainda, devido às condições edafoclimáticas das distintas regiões e safra.

4. CONCLUSÕES

Devido à considerável atividade antioxidante e expressivos teores de compostos fenólicos e às altas concentrações de carotenoides totais, clorofilas totais, 'a' e 'b' da azeitona cv. 'Arbequina' estudada, esta apresenta potencial para ser utilizada na extração de azeites com propriedades bioativas, além de ser empregada no desenvolvimento de produtos alimentícios, de forma a ser fonte natural de compostos antioxidantes e por representar uma alternativa de extração de pigmentos cloroplásticos.

REFERÊNCIAS

- [1] ARROYO-LÓPEZ, F. N. Technology and Education Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology. 2. ed. Valencia: Méndez-vilas A., 2016.
- [2] BERTONCINI, E. I. CULTIVO DE OLIVEIRAS NO ESTADO DE SÃO PAULO. Pesquisa & Tecnologia, São Paulo, v. 9, n. 2, p.1-10, dez. 2012.
- [3] BRAND-WILLIAMS, W.; CUVELIER, M. E.; BERSER, C. Use of a Free Radical Method to Evaluate Antioxidant Activity. Lebensm. Wiss. Technol., v. 28, p. 25-30, 1995.
- [4] CANUTO, G. A. B.; XAVIER, A. A. O.; NEVES, L. C.; BENASSI, M. T. Caracterização físico-química de polpas de frutos da Amazônia e sua correlação com a atividade anti-radical livre. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 32, n. 4, p. 1196-1205, 2010.
- [5] COUTINHO, E. F.; JORGE, R. O.; COSTA, V. B. Cultivares de Oliveira. In: COUTINHO, E. F. (Org.). A cultura da Oliveira. 1. ed. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, p. 39-49, 2007.
- [6] CUSTÓDIO, T. Azeites extra-virgem comerciais: composição em compostos voláteis e relação com parâmetros químicos de qualidade. Dissertação de Mestrado, Universidade do Porto. 2009.
- [7] DEGÁSPARI, C. H. PROPRIEDADES ANTIOXIDANTES DE COMPOSTOS FENÓLICOS. Visão Acadêmica, Curitiba, v. 5, n. 1, p.33-40, abr. 2004.
- [8] GARBI, M. R. O.; TORRES, R. P.; FILHO, J. M. Determinação dos compostos fenólicos e avaliação da atividade antioxidante dos extratos etéreo, alcoólico e aquoso de quatro variedades de azeitona cultivadas no Brasil. Nutrire: rev. Soc. Bras. Alim. Nutr.= J. Brazilian Soc. Food Nutr., São Paulo, SP, v. 30, p. 1-438, 2005.
- [9] LICHTENTHALER, H. K. Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembranes. Methods Enzymol., v. 148, p. 350-381, 1987.
- [10] MALHEIRO, R. Influência da cultivar nas características físico-químicas, sensoriais e biológicas de azeitonas verdes descaroçadas. Dissertação de Mestrado. Escola Superior Agrária de Bragança. 2010.
- [11] MELLO, L. D.; PINHEIRO, M.F. Aspectos Físicos-Químicos de Azeites de Oliva e de Folhas de Oliveira Provenientes de Cultivares do RS, Brasil. Alimentos e Nutrição, v.23, n.4, p.537-548, 2012.
- [12] PESRANA-BAUER, V.R.; GOULART-DUTRA, F. L.; ZAMBIAZI, R.C. Caracterização do fruto da oliveira (variedade Carolea) cultivada na região sul do Brasil. Alim. Nutr., Araraquara, v.22, n. 1, p. 79-87, 2011.
- [13] RIOS, J.J.; GUTIÉRREZ-ROSALES, F. Comparison of methods extracting phenolic compounds from lyophilized and fresh olive pulp. LWT - Food Science and Technology, v. 43, p. 1285-1288, 2010.
- [14] RODRIGUEZ-AMAYA, D.B. A guide to carotenoids analysis in foods. ILSI Press: Washington, p. 64, 1999.
- [15] SCOGNAMIGLIO, M.; D'ABROSCA, B.; PACIFICO, S.; FIUMANO, V.; DE LUCA, P.F.; MONACO, P.; FIORENTINO, A. Polyphenol characterization and antioxidant evaluation of Olea europaea varieties cultivated in Cilento National Park (Italy). Food Research International, v. 46, p. 294-303, 2012.
- [16] SINGLETON, V. L.; ROSSI, J. A. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic phosphotungstic acid reagents. Am. J. Enol. Viticult., v. 16, p. 144-158, 1965.
- [17] VENDRAMINI, A.L.; TRUGO, L.C. Phenolic compounds in acerola fruit (Malthighia puniceifolia, L.). Journal of Brazilian Chemical Society, v. 15, n. 5, p. 664-668, 2004.

Capítulo 13

Modelagem e simulação de evaporadores utilizando software livre Scilab

Mariana Ferreira Silva

Jamille Coelho Coimbra

Márcia Cristina Teixeira Ribeiro Vidigal

Resumo: Evaporadores são equipamentos de troca térmica empregados no meio industrial com a função de aumentar o teor de sólidos. Este estudo teve como objetivo obter um modelo matemático a ser empregado na simulação do processo de evaporação do leite, sendo desenvolvido utilizando o software *Scilab*. A abordagem fenomenológica foi utilizada para descrever os balanços de massa e energia, tal que o modelo estático foi associado a um método de iteração. Além disso, adotou-se equações empíricas referentes às propriedades termofísicas do leite, constituído de 87% de água e 13% de sólidos, e do vapor gerado. Os resultados dinâmicos da simulação do acúmulo de massa de leite e de água dentro do evaporador apresentam comportamento de redução ao longo do tempo, já a modelagem estática permitiu a realização de correlações com as variáveis do modelo.

Palavras-chave: evaporadores de múltiplo-efeito; concentração do leite; modelagem matemática; Scilab.

1. INTRODUÇÃO

A evaporação é uma operação unitária que emprega o calor para realizar a concentração de sólidos o que leva a redução da atividade de água, permitindo maior conservação dos produtos, bem como a agregação de valor ao produto final.

Conforme reportado por Foust et al. (2011), nas operações que envolvem evaporação, a representação principal do custo do processo está relacionada ao vapor de água consumido. Esse custo pode ser reduzido pela reutilização do vapor gerado. Aliado à redução de custos, surge a modelagem matemática de processos e a simulação computacional, consideradas técnicas integradas (ÖREN, 2010), que permitem dimensionar o equipamento e contribui para determinação de condições ótimas de operação.

Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi realizar a descrição matemática de um evaporador que compõe o sistema de múltiplo efeito empregado na concentração do leite.

2. MATERIAL E MÉTODOS

1.1. MODELAGEM DINÂMICA

Considerou-se que não há troca térmica direta entre evaporado/condensado e as equações dinâmicas de Balanço de Massa (Equação 1) e o Balanço por Componentes (Equação 2) foram obtidas.

$$\frac{d\mu}{dt} = F - V - L \quad (1)$$

Em que: F = Vazão de leite que alimenta o evaporador (kg/s), V = Vazão de vapor evaporado do leite que sai do equipamento (kg/s) e L = Vazão de leite na saída do evaporador (kg/s)

$$\frac{d(\mu \cdot x)}{dt} = F \cdot x_{FW} - L \cdot x_{iw} - V \quad (2)$$

Em que: x_{FW} = Composição aquosa da alimentação de leite, i = Número do evaporador e x_{iw} = Composição aquosa do leite que sai do equipamento no evaporador i

A partir destas equações foi montado um esquema utilizando a ferramenta *Xcos* do *Scilab*, a fim de obter uma solução gráfica que representasse o processo dinâmico no interior de um evaporador para o balanço de massa.

1.2. MODELAGEM ESTÁTICA

Para o modelo estático utilizou-se do método proposto por Araújo (2012) para o dimensionamento do sistema de evaporadores de múltiplos efeitos. Inicialmente, foram formulados o balanço de massa global e o balanço de massa por componentes, estes expressos pelas equações 3 e 4, em que i refere-se ao número do efeito.

$$L_{i-1} = V_i + L_i \quad (3)$$

$$L_{i-1} \cdot x_{L_{i-1}} = L_i \cdot x_i \quad (4)$$

Para garantir consistência ao modelo matemático (número de incógnitas equivalente ao número de equações matemáticas obtidas pelo modelo) e determinar as variáveis de interesse, foi necessário representar os balanços de energia. Utilizou-se o balanço de energia para determinação das entalpias e do calor latente de vaporização, como exibido na Equação 5.

$$L_{i-1}h_{i-1} + V_{i-1}\lambda_{i-1} = L_i h_i + V_i H_i \quad (5)$$

Em que: λ = Calor latente de vaporização da água (J), H_i = Entalpia do vapor no efeito i (J) e h_i = Entalpia do leite no efeito i (J)

Neste estudo, considerou-se que a Elevação do Ponto de Ebulição varia em função da composição de sólidos do fluido a ser evaporado baseando-se nas equações determinadas por Castro (2006) para o leite segundo às equações 6 e 7. Assumindo-se que as áreas de transferência de calor são iguais em cada efeito, tem-se a equação 11, para um evaporador de três efeitos.

$$EPE = -2,087 + 15,6016 \cdot x + (0,0172 - 0,0188 \cdot x) \cdot T_{sat} \quad (6)$$

$$T_{sat}(P) = \frac{(-3920,1)}{(\ln(\frac{P}{133,32}) - 18,472)} + 42,014 \quad (7)$$

$$\sum_i^3 \Delta T = [(T_0 - T_1) - EPE_1] + [(T_1 - T_2) - EPE_2] + [(T_2 - T_3) - EPE_3] = T_0 - T_a - \sum_i^3 EPE_i \quad (8)$$

em que P é a pressão no interior do evaporador (Pa), T_0 é a temperatura de entrada vapor de aquecimento (K), T_i é a temperatura do vapor que sai no efeito i (K) e EPE_i é a elevação do ponto de ebulição do leite (K) no efeito i .

Uma vez que cada efeito possui e depende de um coeficiente global, para a variação de temperatura para cada efeito, obteve-se a equação 9, que permitiu determinar a temperatura interna de cada efeito pela equação 10.

$$\Delta T_i = \sum_{i=1}^3 \Delta T_i = \frac{\frac{1}{U_i}}{\frac{1}{U_1} + \frac{1}{U_2} + \frac{1}{U_3}} \quad (9)$$

$$T_i = T_{i-1} - \Delta T_i \quad (10)$$

em que U_i é o coeficiente de troca térmica no evaporador i (W/m²K).

Assim, foi possível determinar a entalpia da solução e, partir destes valores, obteve-se um sistema de equações por meio do balanço de energia do sistema. Ao resolvê-lo, obteve-se a vazão do vapor e de líquido em cada efeito.

Com todas as incógnitas determinadas, tornou-se possível determinar a área de troca térmica do evaporador, a qual foi determinada pela equação 11.

$$A_i = \frac{V_{i-1} \cdot \lambda_i}{U_i \cdot \Delta T_i} \quad (11)$$

em que A_i é a área de troca térmica no evaporador do efeito i (m²).

Admitiu-se como razoável um erro de até $\pm 10\%$ do valor da área de troca térmica média. Caso a diferença fosse inferior a este critério, a área de transferência adotada foi o valor médio com os valores de cada corrente determinados anteriormente. Caso a diferença fosse superior, procedeu-se a um processo de iteração iniciado com a definição de novos valores para temperatura e entalpia, a fim de obter um valor mais próximo do valor real.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

1.1. MODELAGEM DINÂMICA

O modelo resultante foi então resolvido obtendo-se o comportamento dinâmico das variáveis operacionais de interesse. A solução do sistema de equações matemáticas não lineares proposta foi realizada utilizando a ferramenta *Xcos* do software *Scilab*.

A simulação foi feita para o primeiro efeito e a Figura 1 é apresentada o comportamento da massa de leite no evaporador ao longo do tempo. Verificou-se que a massa de leite com vazão de 4,17 kg/s, atingiu o estado estacionário em 3,5 horas, momento que é estabelecida a concentração de sólidos desejada, tendo-se como massa de leite final próxima a 1,03 kg/s, cujo valor foi próximo ao esperado, obtido partindo-se do balanço de massa por componentes.

Figura 1 – Acúmulo de massa de leite ao longo do tempo (horas) no evaporador.

O comportamento da curva mostrou-se coerente, uma vez que quanto maior o tempo dentro do equipamento, menor a quantidade de leite final, devido à perda de água pela evaporação.

Figura 2 – Acúmulo de água (kg) ao longo do tempo (horas) no evaporador.

A Figura 2 evidenciou a quantidade de água acumulada no evaporador durante o processo de evaporação. Notou-se que, com o passar do tempo, mais água foi retirada da alimentação. Observou-se, que a partir de 1,7 horas de operação, o estado estacionário foi atingido, sendo desnecessário estender sua duração.

1.2. MODELAGEM ESTÁTICA

Para aplicação do modelo matemático obtido, considerou-se que o leite cru apresenta inicialmente uma fração de sólido de 13 % e a temperatura de ebulição com 101 °C. Além disso, considerou-se uma vazão de fluido de alimentação equivalente a 15000 kg/h ou 4,17 kg/s e uma pressão de operação de 20 kPa. Para o leite em pó, na evaporação espera-se um teor de sólidos final de próximo à 50 %, enquanto para o leite evaporado espera-se cerca de 28 %.

Pela comparação entre os produtos, apresentado na Tabela 1, é possível notar o requerimento de maior área de troca térmica em condições que exigem maior teor de sólidos. Isso porque quanto maior a área de troca térmica, maior a quantidade de calor trocada entre a superfície e o líquido, atingindo em um mesmo intervalo de tempo o mesmo teor de sólidos.

Tabela 1 - Comparativo Leite Evaporado e Leite em Pó.

Variável	Leite em Pó	Leite Evaporado
xf	0,13	0,13
x3	0,50	0,28
F	4,17	4,17
V0	1,1824	1,0007
L1	3,3994	3,6225
L2	2,3811	2,8877
L3	1,0800	1,9361
V1	0,7705	0,5475
V2	1,0184	0,7349
AM	25,7	11,3

Maior vazão de vapor permite maior transferência de calor e consequentemente, maior evaporação da água do leite. Em casos de aumento da temperatura de vapor, para uma mesma vazão, houve uma redução na área de transferência de calor, conforme apresentado na Figura 3.

Figura 3 – Relação Temperatura do Vapor (°C) e Área de Transferência (m²).

Outra variável que exerceu grande influência no modelo foi a pressão de operação, de modo que quanto menor a pressão menor foi a área de transferência de calor requerida (Figura 4). Isto porque os menores valores de pressão de operação estão associados aos menores pontos de ebulição, facilitando o processo de evaporação.

Figura 4 – Relação Temperatura do Vapor e Área de Transferência.

Não há interferência significativa da pressão de operação com a fração de sólidos retirada em cada efeito, assim como a temperatura do vapor e a temperatura de alimentação.

4. CONCLUSÕES

O modelo matemático possui diversas vantagens como a possibilidade de prever valores de consumo de vapor, variações nas frações de sólidos e perfis de temperatura em função de parâmetros de processo, servindo como excelente ferramenta para estudar modificações de projeto sob distintas condições operacionais.

Tal simulação poderá ser utilizada para processos de evaporação de múltiplo efeito de outros produtos, sendo necessário alterar somente as equações específicas para o leite, como Elevação do Ponto de Ebulição, Capacidade Calorífica e Entalpia.

REFERÊNCIAS

- [1] ARAUJO, E. C. C. Evaporadores. São Carlos – SP. EDUFSCAR, 2012. 89p.
- [2] CASTRO, S. S. Avaliação Experimental e Modelagem da Elevação do Ponto de Ebulição do Leite Adicionado de Sacarose. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa - MG, 2006.
- [3] FOUST, A. S. et al. Princípios das Operações Unitárias. 2ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 670p.
- [4] ÖREN, T.I. Simulation and reality: The big picture. International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing, v.1, p.1-25, 2010.

Capítulo 14

Agrotóxicos em erva-mate: Uma abordagem quanto aos fungicidas ditiocarbamatos

Ingrid Duarte dos Santos

Rosselei Caiel da Silva

Ionara Regina Pizzutti

Roger Wagner

Julia Paula Neu

Robson Dias Wouters

Marlos Eduardo Zorzella Fontana

Resumo: A erva-mate tem se popularizado cada vez mais devido suas diversas propriedades farmacológicas tais como, antioxidante, antiinflamatória, antiproliferativa, antimutagênica e antiobesidade. Nesse sentido, indústrias farmacêutica, cosmética e de bebidas aumentaram as pesquisas sobre potenciais novos produtos derivados da erva-mate devido à presença de fitoquímicos, incluindo alcalóides, compostos fenólicos, flavonóides e saponinas triterpênicas. Entretanto, há uma grande preocupação quanto a presença de agrotóxicos nessa cultura. A água, por exemplo, é responsável por considerável degradação dos agrotóxicos em solução e muitos estudos demonstraram que alguns agrotóxicos podem ser transferidos para a infusão em diferentes proporções. No Brasil, ainda não existem agrotóxicos autorizados para o cultivo da erva-mate, porém o controle químico da maioria das pragas é feito de acordo com as recomendações para outras culturas. Assim, esta revisão tem como objetivo apresentar uma visão geral sobre as principais características da erva mate e avaliar o risco associado à contaminação por agrotóxicos, mais especificamente fungicidas ditiocarbamatos. A importância toxicológica desses fungicidas em alimentos e bebidas está relacionada aos seus metabólitos, dissulfeto de carbono (CS₂) – considerado um agente neuropático geral, e etilenotiureia (ETU) – conhecido por alterar a função da tireoide e suspeito de causar certas toxicidades, como efeitos imunotóxicos, carcinogênicos, teratogênicos e mutagênicos. Portanto, tendo em vista o valor social e econômico da erva-mate, além do seu alto consumo, principalmente no sul do Brasil, é de suma importância que se tenha conhecimento sobre a qualidade desta matéria-prima para produção de formulações farmacêuticas, nutracêuticas e, na forma mais popular, mate ou chimarrão.

Palavras-Chave: *Ilex paraquariensis*; chimarrão; contaminantes; mancozebe; cromatografia gasosa, dissulfeto de carbono.

1. INTRODUÇÃO

Ilex paraguariensis, conhecida como erva-mate, é originária da América do Sul, encontrada no Paraguai, Argentina, Uruguai e no Sul do Brasil (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) sendo um importante produto comercial da América Latina, no qual está se popularizando em todo o mundo (Silveira et al., 2017; Lutomski et al., 2020). Nesse contexto, o Brasil é o maior produtor e a Argentina é o maior exportador de erva-mate (Santos et al., 2020). Dados de 2017 apontam o Rio Grande do Sul como responsável por aproximadamente 80% das 35 mil toneladas de erva-mate brasileira exportadas para 39 países, com destaque para Uruguai, Chile, EUA, Alemanha e Espanha (IBRAMATE, 2018). Nesses países, as folhas secas e picadas (constituindo cerca de 95%) e os caules da erva-mate são amplamente consumidos na forma de infusões (Ferreira et al., 2014) devido ao seu sabor, aroma, estimulante, promotor da saúde e atributos nutricionais (Lutomski et al., 2020).

A erva-mate tem se popularizado ao longo dos anos devido a diversas propriedades farmacológicas incluindo capacidade antioxidante, antiinflamatória, antiproliferativa, antimutagênica e antiobesidade. Ademais, estudos apontam que a mesma pode contribuir na prevenção do desenvolvimento de câncer e doenças cardiovasculares (Silveira et al., 2017; Lutomski et al., 2020; Derosa et al., 2020; Rachel et al., 2020). Recentemente, as indústrias farmacêutica, cosmética e de bebidas aumentaram as pesquisas sobre potenciais novos produtos derivados da erva-mate devido à presença de fitoquímicos, incluindo alcalóides, compostos fenólicos, flavonóides e saponinas triterpênicas (Bracesco et al., 2011; Olivari et al., 2020; Santos et al., 2020).

O chá de erva-mate, denominado mate ou chimarrão, é caracterizado por uma infusão parcial, na qual a erva-mate permanece parcialmente imersa em água quente, em temperatura entre 70 e 80 °C. Uma das principais características do consumo deste é que ele é ingerido continuamente ao longo do dia, com os indivíduos ingerindo até 1 L de infusão a cada 1 hora, permitindo a ingestão contínua de compostos presentes nas folhas secas (Bracesco et al., 2011). Desta forma, a grande preocupação da população que consome mate ou chimarrão é a presença de agrotóxicos. A água é responsável por considerável degradação dos agrotóxicos em solução (Hwang et al., 2003) e muitos estudos demonstraram que os pesticidas organoclorados, organofosforados, piretróides e neonicotinóides (Witczak et al., 2018; Jiang et al., 2020) podem ser transferidos para a infusão em diferentes proporções.

No Brasil, ainda não existem agrotóxicos autorizados para o cultivo da erva-mate, porém o controle químico da maioria das pragas é feito de acordo com as recomendações para outras culturas. Entre os pesticidas popularmente usados na erva-mate estão os inseticidas carbaril e dimetoato, e os fungicidas captana e ditiocarbamato (DTC), especialmente mancozebe (etilen bis-ditiocarbamato (EBDC)) (Daniel, 2009).

Os DTC são fungicidas não sistêmicos, cuja toxicidade aguda é muito baixa para mamíferos, sendo os principais efeitos irritação nos olhos, erupções cutâneas, garganta irritada, espirros e inflamação do nariz. No entanto, seus efeitos crônicos incluem desregulação endócrina, alteração da resposta do sistema imunológico, defeitos de desenvolvimento em crianças e doença de *Parkinson* (Atuhaire et al., 2017; Abdourahime et al., 2019).

A importância toxicológica desses fungicidas em alimentos e bebidas, especialmente EBDC, está relacionada aos seus metabólitos, dissulfeto de carbono (CS₂) – considerado um agente neuropático geral, e etilenotioureia (ETU) – conhecido por alterar a função da tireoide e suspeito de causar certas toxicidades, como efeitos imunotóxicos, carcinogênicos, teratogênicos e mutagênicos (Bianchi et al., 2020; Atuhaire et al., 2017; Ripollés et al., 2012).

DTC apresenta baixa solubilidade na maioria dos solventes orgânicos, geralmente são instáveis na presença de umidade, água e/ou oxigênio e facilmente degradáveis e metabolizados, principalmente em pH entre 7 e 9 (Chawla et al., 2019). Cabe ressaltar que o pH da infusão de erva mate é de, aproximadamente, na faixa entre 6,8 e 7,5.

Tendo em vista o valor social e econômico da erva-mate, além do seu alto consumo, principalmente no sul do Brasil, é de suma importância que se tenha conhecimento sobre a qualidade desta matéria-prima para produção de formulações farmacêuticas, nutracêuticas e, na forma mais popular, mate ou chimarrão. Os agrotóxicos são compreendidos dentro do grupo dos contaminantes mais importantes em alimentos e, portanto, esta revisão tem como objetivo apresentar uma visão geral sobre as principais características da erva mate e avaliar o risco associado à contaminação por agrotóxicos, mais especificamente fungicidas ditiocarbamatos.

2. ERVA MATE

Ilex paraguariensis é uma espécie florestal nativa, que de acordo com sua classificação taxonômica atual, integra a família *Aquifoliaceae* e o gênero *Ilex*, no qual estão incluídas algumas centenas de espécies espalhadas pelo planeta (Gerhardt, 2013). Constitui em árvores de folhas perenes, que possui entre quatro e oito metros de altura quando adulta, mas que pode atingir um tamanho maior quando as condições forem favoráveis ao seu crescimento, cujas folhas e ramos finos são processados e beneficiados para darem origem aos subprodutos (Saidelles et al., 2010).

Tem origem nas regiões subtropicais e temperadas da América do Sul, ocorrendo naturalmente na Argentina, Brasil e Paraguai. Por volta de 80% do total da produção está no Brasil, distribuindo-se entre os Estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul (Maccari et al., 2000). Nos estados da região sul do Brasil, essa planta possui exploração econômica em cerca de 560 municípios, o que representa mais de 110 mil hectares (Chechi, 2014). O cultivo da erva-mate é realizado por pequenos produtores rurais ou pelas próprias indústrias ervateiras (Resende et al., 2000). Devido a cultura da erva mate ter um grande valor comercial e social, foi considerada a árvore símbolo do estado do Rio Grande do Sul.

A erva-mate foi classificada cientificamente em 1820 pelo botânico francês Saint-Hilaire e desde então é consumida em forma de mate ou chimarrão, nas conhecidas cuias, onde o chá é obtido pela infusão das folhas da erva-mate (*Ilex paraguariensis*) dessecadas, ligeiramente tostadas e esmigalhadas, cujo consumo é mais frequente na região sul, centro-oeste e sudeste do Brasil (Bracesco et al., 2011), e atualmente utilizada a matéria-prima para diversos produtos (IBRAMATE, 2017). A mesma tem sido explorada tanto pela indústria de alimentos (tererê, chimarrão, chá mate solúvel, chá mate verde, chá mate tostado, refrigerante, bebidas energéticas, balas, ingredientes para produtos alimentícios) quanto pela indústria química (tintas e resinas, desinfetantes e adstringentes) e farmacêutica (medicamentos, cosméticos e perfumaria) (Da Croce, 2000; Medrado e Mosele, 2004).

As bebidas à base de erva mate apresentam uma infinidade de propriedades, nutritivas e medicinais, conferindo-lhe um grande potencial de aproveitamento (Vieira, 2009). A erva-mate possui em sua composição alcalóides (cafeína, teofilina e teobromina), vitaminas (A, B1, B2, C e E), minerais (alumínio, cálcio, fósforo, ferro, magnésio, manganês e potássio), aminoácidos essenciais, carboidratos (frutose, glicose e sacarose), lipídeos (óleos essenciais e substâncias ceráceas), além de celulose, dextrina e gomas (Barboza, 2006; Junior, 2006; Frizon, 2011).

Além disso, com um sabor amargo característico, sua infusão é uma das bebidas que apresenta quantidades significativas de compostos fenólicos de interesse nutricional, como flavonóides, ácidos fenólicos e taninos (Bertè, 2011). Esses compostos fenólicos são prontamente absorvidos pelo organismo e responsáveis por seus efeitos antioxidantes *in vitro* e *in vivo* (Bastos et al., 2006). Sendo assim, tal consumo pode ser benéfico à saúde, visto sua comprovada atividade antioxidante e outros efeitos terapêuticos como ação anti-inflamatória, controle de dores de cabeça e obesidade, combate à fadiga, retenção de líquido, hipertensão, digestão lenta e desordens hepáticas (Bastos et al., 2003; Bravo et al., 2007).

3. AGROTÓXICOS

Com o aumento da população mundial, e das tecnologias, o consumo de alimentos vem crescendo constantemente no Brasil, e, conseqüentemente, o aumento do uso de agrotóxicos. O termo agrotóxico tem origem do grego, onde *agros* (campo) + *tokicon* (veneno). Outros nomes que se destacam pelos produtores rurais são os termos "defensivos agrícolas", "pesticidas", "praguicidas", "agroquímicos", "produtos fitossanitários" e "biocidas". Incluem-se nestes termos todos os produtos de natureza tóxica usados na agricultura, para o manejo de pragas, doenças e plantas daninhas (Ribas e Matsumura, 2009).

O Brasil é campeão mundial de uso de agrotóxico, embora não seja o campeão mundial de produção agrícola. Conforme o Boletim anual do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em 2019 a venda interna total de produtos formulados "Químicos e Bioquímicos" totalizou 620.537,98 toneladas de ingredientes ativos, o que representa um aumento de aproximadamente 13% nas vendas internas em relação a 2018. Os agrotóxicos mais comercializados foram os formulados a base dos ingredientes ativos: Glifosato; 2,4-D; Mancozebe; Acefato; Atrazina; Clorotalonil; Dicloreto de Paraquate; Malationa; Enxofre e Clorpirifós (IBAMA, 2019).

Os agrotóxicos, além de cumprirem o papel de proteger as culturas agrícolas das pragas, doenças e plantas daninhas, também podem oferecer riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Seu uso frequente, muitas vezes de forma incorreta, favorece os riscos de contaminação de diversos compartimentos ambientais, como a contaminação de solos agrícolas, de águas superficiais e subterrâneas e de alimentos, podendo, em episódios mais graves, inviabilizar o consumo destes. Isso pode apresentar, consequentemente, riscos de efeitos negativos em organismos terrestres e aquáticos, como intoxicação pelo consumo de água e de alimentos contaminados, além da intoxicação ocupacional de trabalhadores e produtores rurais (Jardim et al., 2009).

Os agrotóxicos podem ser classificados como inseticidas (controle de insetos), fungicidas (controle de fungos), herbicidas (controle de plantas e ervas daninhas), desfolhantes (controle de folhas indesejadas), fumigantes (controle de bactérias do solo), rodenticidas ou raticidas (controle de roedores/ratos), nematocidas (controle de nematoides) e acaricidas (controle de ácaros) (Ribas e Matsumura, 2009).

4. DITIOCARBAMATOS

Ditiocarbamatos (DTCs) são a principal classe de fungicidas empregada mundialmente no controle de aproximadamente 400 patógenos e tem seu emprego permitido para diversas culturas agrícolas, sendo registrados no Brasil (Caldas et al., 2004), nos EUA, em todos os países membros da União Europeia (Blasco et al., 2004) e em muitos outros países. A definição de resíduo atual de ditiocarbamatos em conformidade com os limites máximos de resíduos de alimentos é o total de resíduos decorrentes do uso de qualquer ou cada fungicida ditiocarbamato determinado como dissulfeto de carbono (CS_2) (Chawla et al., 2019; Caldas et al., 2001).

Os DTCs são compostos organosulfurados que agem de maneira efetiva contra um largo espectro de doenças causadas por fungos, em grande parte das culturas agrícolas, abrangendo desde o cultivo de plantas ornamentais, frutas e hortaliças até cereais de grande importância econômica (Blasco et al., 2004).

A maioria dos ditiocarbamatos, entre eles, tiram, ferbam, ziram, manebe, mancozebe, zinebe e propinebe foi desenvolvida no início da década de 1930 e 1940, e até os dias atuais estes compostos são largamente empregados tanto sozinhos quanto combinados com outros fungicidas (Rosa, 2010). Tiram, o primeiro DTC usado como fungicida desde 1934, demonstrou ser um fungicida eficaz para o tratamento de sementes, mas não um produto particularmente forte quando aplicado como fungicida foliar. O mancozebe foi introduzido no mercado global de fungicidas em 1962, tornou-se o mais importante comercialmente de todos os DTC e seu uso provavelmente aumentará na década de 2020 devido ao seu baixo preço, demanda global por alimentos e eficácia fungicida não seletiva (Brasil, 2018; Runkle et al., 2017). O mancozebe é o terceiro agrotóxico mais vendido no Brasil, atrás apenas dos herbicidas glifosato e ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D). O estado do Rio Grande do Sul é responsável por aproximadamente 25% do total de DTC comercializado no Brasil, e 98% é representado pelo mancozebe (Brasil, 2018).

Uma vez que o mancozebe não se apresentou estável nos estudos de hidrólise que simulam as condições de processamento padrão, o único produto de degradação de interesse toxicológico formado em temperaturas elevadas é a ETU, em outras palavras, para avaliação de risco a ETU é considerada toxicologicamente mais importante em comparação ao próprio fungicida que a deu origem – mancozebe (EFSA, 2016). Em estudo realizado com feijão verde (Marshall, 1982), contendo, inicialmente, em média $1,5 \text{ mg kg}^{-1}$ de EBDC e níveis muito baixos de seu metabólito ETU, após fervura em água quente por 3 min, nenhum resíduo de EBDC foi detectado, no entanto, o feijão continha em média $0,14 \text{ mg kg}^{-1}$ de ETU, estável tanto em altas temperaturas como em água. Em um estudo de hidrólise simulando condições padrão de ebulição de alimentos, 88% do metiram foi degradado em ETU. Tendo em vista as estruturas semelhantes de metiram e mancozebe, um comportamento semelhante de ambos os compostos em condições de hidrólise é esperado (Abdourahime et al., 2019).

Atualmente, cinco ditiocarbamatos são registrados em 47 culturas no Brasil: o tiram, para aplicação no solo e tratamento de sementes, o metam-sódio para tratamento de solo, e o mancozebe, metiram e propinebe para aplicação foliar e mancozebe para o pós-colheita (ANVISA, 2020).

4.1 QUÍMICA DOS DITIOCARBAMATOS

Os DTC são derivados do ácido ditiocarbâmico ($\text{NH}_2\text{CS}_2\text{H}$), análogos dos carbamatos (CH_3NO_2), onde ambos os átomos de oxigênio são substituídos por átomos de enxofre. São sintetizados a partir da reação de amina primária e secundária com dissulfeto de carbono sob condições alcalinas (Kanchi et al., 2013) e

seus principais produtos da hidrólise e fotólise são os metabólitos ETU, etilenoureia (EU) e CS₂ (Garcinuño et al., 2004).

Baseado na estrutura do esqueleto de carbono, os DTC são categorizados em subclasses, dependendo da natureza do elemento que forma um complexo com o esqueleto organosulfurado (Van Lishaut, 2000; Crnogorac e Schwack, 2009). Portanto, seu uso, suas estruturas químicas registradas no Brasil e os subclasses, aos quais pertencem estão apresentados na Tabela 1 (ANVISA, 2020).

Tabela 1. Estruturas e características dos ditiocarbamatos de uso permitido no Brasil.

Ditiocarbamatos	Subclasses	Fórmula Estrutural	Uso no Brasil
Mancozebe	Etilenobis-ditiocarbamato (EBDC)		Aplicação foliar em 51 culturas e em pós colheita por imersão de frutos em 3 culturas
Metiram	Etilenobis-ditiocarbamato (EBDC)		Aplicação foliar 22 culturas e por sulco de plantio em 1 cultura
Propinebe	Propilenobis-ditiocarbamato (PBDC)		Aplicação foliar em 9 culturas
Tiram	Dimetil-ditiocarbamato (DMDC)		Tratamento de semente em 12 culturas e solo 2 culturas
Metam-sódico	Metil-ditiocarbamato (MDDC)		Aplicação no Solo em 6 culturas

4.2 TOXICIDADE

Estes fungicidas são largamente usados na agricultura devido a sua baixa toxicidade aguda, baixo custo de produção e baixa persistência ambiental (Van Lishaut, 2000; Crnogorac e Schwack, 2009). Nos últimos anos, esses fungicidas têm recebido uma atenção especial devido aos riscos do consumo de alimentos e bebidas contendo os produtos de degradação, a ETU, produzida pelos etilenobisditiocarbamatos (EBDC), e propilenotioureia (PTU), produzida pelos propiebisditiocarbamatos (PBDC). Esses metabólitos se mostraram carcinogênicos e mutagênicos em ratos (Araujo, 2019).

As intoxicações por DTC frequentemente ocorrem através das vias oral e respiratória, podendo também ser absorvidos pela via cutânea. Nos casos de exposição intensa provocam dermatite, faringite, bronquite e conjuntivite (EPA, 2001).

Mancozebe é o fungicida mais comercializado e utilizado no Brasil, e seus resíduos, bem como dos demais DTC, foram os mais detectados em alimentos em programas de monitoramento (Jardim e Caldas, 2012), incluindo o programa oficial brasileiro – Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA). A presença destes resíduos em alimentos e os riscos potenciais da população brasileira avaliados no Brasil não excede a Ingestão Diária Aceitável (IDA) estabelecida, exceto para o metam sódico. No entanto, os dados de ingestão podem ser superestimados, uma vez que não levado em consideração o processamento dos alimentos, como cozimento ou a retirada das cascas e sementes (Souza, 2009), bem como a taxa de transferência que ocorre durante a infusão.

4.3 LIMITES MÁXIMOS DE RESÍDUOS (LMR)

Para garantir a qualidade de alimentos produzidos no Brasil, a Agência Nacional Vigilância Sanitária (ANVISA), desde o ano 2001, criou o PARA, com o objetivo de avaliar os níveis de resíduos de agrotóxicos nos alimentos de origem vegetal comercializados e verificar se os mesmos estão dentro dos Limites Máximos de Resíduos (LMR) estabelecidos pela Anvisa, e publicados em monografia específica para cada agrotóxico.

Segundo a Resolução nº 165, de 29 de agosto de 2003 (Brasil, 2003), LMR é definido como a quantidade máxima de resíduo de agrotóxico ou afim oficialmente aceita no alimento, em decorrência da aplicação adequada numa fase específica, desde sua produção até o consumo, expressa mg kg^{-1} , ou seja, a quantidade máxima de resíduo de um agrotóxico que pode estar legalmente presente nos alimentos, sem causar danos à saúde do consumidor.

Atualmente, o método mais utilizado para determinação de DTC em alimentos consiste em uma análise indireta, avaliando a concentração de CS_2 encontrada. O LMR estabelecido para este grupo de pesticidas é expresso em $\text{mg CS}_2 \text{ kg}^{-1}$, e a origem desse CS_2 , ou seja, qual composto foi aplicado no campo, não pode ser identificado na análise (Mello, 2014). Sendo assim os valores de IDA para os DTC autorizados no Brasil estão indicados na Tabela 2 (BRASIL, 2002).

Tabela 2. Ingestão Diária Aceitável (IDA) para os ditiocarbamatos autorizados no Brasil.

Ditiocarbamatos	IDA ($\text{mg kg}^{-1} \text{ p.c.}^*$)
Mancozebe	0,03
Metiram	0,03
Propinebe	0,005
Tiram	0,05
Metam-sódico	-

*peso corpóreo

Em tese, culturas onde apenas um ingrediente ativo é permitido, não deveriam ser encontrados resíduos de outros DTC. Entretanto, como o método de análise indireta não determina o DTC, e sim seu produto de degradação CS_2 , não é possível identificar se o agricultor usou um produto de uso proibido no Brasil, ou não permitido para a cultura em que o fungicida foi registrado.

No Brasil não existem agrotóxicos autorizados para o cultivo da erva-mate, porém o controle químico da maioria das pragas é feito de acordo com as recomendações para outras culturas, desta forma resíduos de agrotóxicos podem ser encontrados na erva mate e transferidos para os produtos derivados, incluindo o mate ou chimarrão.

4.4 MÉTODOS ANALÍTICOS PARA DETERMINAÇÃO DE DITIOCARBAMATOS

Usando diferentes métodos de extração e análise, muitos estudos foram conduzidos para determinar ditiocarbamatos em frutas e vegetais (Patsakos et al. 1992; Kundu et al. 2012; Rani et al. 2013). Os DTCs têm baixíssima estabilidade em várias matrizes alimentares e apresentam baixa solubilidade na maioria dos solventes orgânicos e na água. Portanto, eles não podem ser extraídos ou analisados diretamente, tampouco usando métodos multirresíduos como o QuEChERS (Chawla et al., 2019). Ou seja, os métodos utilizados para a determinação de ditiocarbamatos são bastante diferentes da maioria dos métodos de análises de resíduos de agrotóxicos. Essa elevada instabilidade na presença de umidade e oxigênio torna estes compostos difíceis de serem analisados (Stertz e Freitas, 2003).

Com requisitos mais rigorosos para a confirmação de resíduos (SANTE, 2015) e níveis máximos de resíduos, métodos novos e rápidos para a estimativa de ditiocarbamatos foram desenvolvidos e validados em matrizes alimentares e vegetais. Métodos para determinar essa classe de fungicidas são baseados na hidrólise ácida para CS₂ (Mujawar et al. 2014; Liu et al. 2015) na presença de cloreto de estanho (II) (Dasgupta et al. 2012). Se a origem do CS₂ é conhecida, por exemplo, pelo uso conhecido de um determinado DTC, um fator de conversão apropriado pode ser utilizado para dar um resultado expresso como o DTC correspondente do resultado de CS₂. Em um estudo realizado por Pizzutti et al. (2017) o thiram foi usado para os estudos de validação. Neste caso, 1 mol thiram se decompõe para gerar 2 mol de CS₂ (Figura 1). A massa molecular do thiram é 240 g e de CS₂ é 76 g (2 mol = 152 g). O fator de conversão é, portanto, 240/152 = 1,58, e a concentração de thiram = concentração de CS₂ × 1,58 (Coldwell et al., 2003).

Figura 1. Reação da hidrólise do thiram.

A maioria dos métodos de análises está baseada na quantificação do CS₂, por Espectrofotometria de Absorção Molecular ou por Cromatografia Gasosa, após digestão ácida das amostras (Garcinuño et al., 2004). Pizzutti et al. (2017) compararam o desempenho dos métodos de cromatografia gasosa utilizando três diferentes sistemas de detecção (detecção por captura de elétrons (ECD), detecção fotométrica por chama pulsada (PFPD) e espectrometria de massa (MS)) com método espectrofotométrico UV-Vis para determinação de DTCs em alface. Os autores concluíram que os métodos cromatográficos se mostraram mais simples, rápidos e mais sensíveis em relação a espectrofotometria UV-Vis. Em relação aos detectores cromatográficos o GC-PFPD e GC-ITD-MS foram mais seletivos e mais específicos do que o método GC-ECD.

Somado a isso, qualquer método analítico desenvolvido precisa ser validado e com isso, há a necessidade de vários processos desde a busca de uma boa linearidade, recuperação, precisão, exatidão, entre outros. A validação deve ser suficientemente abrangente para atender às necessidades de uma determinada aplicação ou área de aplicação. É uma avaliação importante para a qualidade das medições, rastreabilidade e confiabilidade, ou seja, o responsável pela realização dos estudos deve ser competente na área e precisa ter conhecimento suficiente sobre o trabalho, sendo capaz de tomar as decisões apropriadas durante a realização do mesmo (INMETRO, 2020).

5. CONCLUSÃO

A erva-mate tem se popularizado cada vez mais devido as diversas propriedades farmacológicas como capacidade antioxidante, antiinflamatória, antiproliferativa, antimutagênica e antiobesidade. No Brasil, não existem agrotóxicos autorizados para o cultivo da erva-mate, porém o controle químico da maioria das pragas é feito de acordo com as recomendações para outras culturas. Entre os agrotóxicos popularmente usados na erva-mate está o mancozebe – um ditiocarbamato. Dentro desta perspectiva, é indiscutível o valor social e econômico da erva-mate, além do seu alto consumo, principalmente no sul do Brasil sendo de suma importância que se tenha conhecimento sobre a qualidade desta matéria-prima para produção de chá-mate, formulações farmacêuticas e na forma mais popular, como é o caso do mate ou

chimarrão. Portanto, estudos envolvendo a determinação de agrotóxicos, em especial fungicidas ditiocarbamatos devem ser incentivados com o intuito de resguardar a saúde dos consumidores desta bebida típica bem como visando à obtenção de produtos de qualidade.

REFERÊNCIAS

- [1] ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br>
- [2] ARAUJO, F. J. M. Análise De Resíduos De Fungicidas Ditiocarbamatos Em Hortaliças Produzidas Na Região De Vargem Bonita, Distrito Federal, Universidade de Brasília, 2019.
- [3] ATUHAIRE A.; KAYE, E.; MUTAMBUZE I.L.; MATTHEWS G.; FRIEDRICH, T.; JØRS, E. Assessment of Dithiocarbamate Residues on Tomatoes Conventionally Grown in Uganda and the Effect of Simple Washing to Reduce Exposure Risk to Consumers. *Environmental Health Insights*. v. 11, 2017.
- [4] BIANCHI, S.; NOTTOLA, S.A.; TORGE, D.; PALMERINI, M.G.; NECOZIONE, S.; MACCHIARELLI G. Association between Female Reproductive Health and Mancozeb: Systematic Review of Experimental Models, 2020.
- [5] BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, Boletins anuais de produção, importação, exportação e vendas de agrotóxicos no Brasil, 2018.
- [6] BARBOZA, L. M. V. Desenvolvimento de bebida à base de erva-mate (*Ilex paraguariensis* Saint Hilaire) adicionada de fibra alimentar. 236 f. Tese (Doutorado em Tecnologia de Alimentos) - Setor de Tecnologia, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2006.
- [7] BASTOS, D. H. M.; TORRES, E. A. F. S. Maté (*Ilex paraguariensis*) beverages and public health. *Journal Brazilian of Society and Food Nutrition*. São Paulo, SP. v. 26, p. 77-89, 2003.
- [8] BASTOS, D. H. M.; FORNARI, A. C.; QUEIROZ, Y. S.; TORRES, E. A. F. S. Bioactives compounds content of chimarrão infusions related of the moisture of yerba maté (*Ilex paraguariensis*). *Brazilian Archives of Biology and Technology*, v. 49, n. 3, p. 399-404, 2006.
- [9] BERTÉ, K.A.S. Tecnologia da erva-mate solúvel. Tese (doutorado) Universidade Federal do Paraná, Setor de Tecnologia, Programa de Pós-graduação em Tecnologia de Alimentos, Curitiba, 2011.
- [10] BLASCO, C.; FONT, G.; PICÓ, Y. Determination of dithiocarbamates and metabolites in plants by liquid chromatography-mass spectrometry, *Journal of Chromatography A*, v. 1028, p. 267-276, 2004.
- [11] BRACESCO, N.; SANCHEZ, A. G.; CONTRERAS, V.; MENINI, T.; GUGLIUCCIA. Recent advances on *Ilex paraguariensis*: Minireview. *Journal of Ethnopharmacology*, v. 136, p. 378-384, 2011.
- [12] BRASIL. Decreto nº 4.074, de janeiro de 2002. Sistema de Informações sobre Agrotóxicos. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).
- [13] BRASIL. Ministério da Saúde, Agência de Vigilância Sanitária. Resolução RE Nº 165, de 29 de agosto de 2003. Disponível em: http://www.lex.com.br/doc_6225065_RESOLUCAO_RE_N_165_DE_29_DE_AGOSTO_DE_2003.aspx
- [14] BRAVO, L.; GOYA, L.; LECUMBERRI, E. LC/MS characterization of phenolic constituents of mate (*Ilex paraguariensis* St. Hill.) and its antioxidant activity compared to commonly consumed beverages. *Food Research International*, v. 40, n. 3, p. 393-405, 2007.
- [15] CALDAS, E.D., CONCEICAO, M.H., MIRANDA, M.C.C., DE SOUZA, L.C.K.R., LIMA, J.F. Determination of dithiocarbamate fungicide residues in food by a spectrophotometric method using a vertical disulfide reaction system. *Journal of Agriculture Food Chemistry*. v. 49, n. 10, p. 4521-4525, 2001.
- [16] CALDAS, E. D., MIRANDA, M. C. C., CONCEIÇÃO, M. H., SOUZA, L. C. K. K.
- [17] Dithiocarbamates residues in Brazilian food and the potential risk for consumers. *Food and Chemical Toxicology*. v. 42, p. 1877-1883, 2004.
- [18] CHAWLA, S.; PATEL, H.K.; KALASARIYA, R.L.; SHAH P.G. Validation and analysis of thiram, a dithiocarbamate, as CS₂ from soybean (*Glycine max*) samples on GC-MS. *International Journal of Environmental Science and Technology*. v. 16, 6991-6998, 2019.
- [19] CHECHI, L. A.; Erva-mate: história, tradição e mercado no sul do Brasil, Mercosur, 2014. <http://fidamercosur.org/claeh/experiencias/experiencias-en-la-regi%C3%B3n/894-erva-mate-hist%C3%B3ria-tradi%C3%A7%C3%A3o-e-mercado-no-sul-do-brasil>
- [20] COLDWELL, M. R.; PENGELLY, I.; RIMMER, D. A.; Determination of dithiocarbamate pesticides in occupational hygiene sampling devices using the isooctane method and comparison with an automatic thermal desorption (ATD) method. *Journal of Chromatography A*, v. 984, n. 1, p. 81-88, 2003.

- [21] CRNOGORAC, G.; SCHWACK, W. Residue analysis of dithiocarbamate fungicides. *Trends in Analytical Chemistry*, v. 28, n. 1, p. 40-50, 2009.
- [22] Da CROCE, D. M. Cadeias produtivas do estado de Santa Catarina: erva-mate. Epagri, Boletim Técnico n. 112, Florianópolis, SC, p. 41. 2000.
- [23] DANIEL, O.; Erva mate: sistema de produção e processamento industrial, Dourados, MS, 2009.
- [24] DASGUPTA S., MUJAWAR S., BANERJEE K., HUEBSCHMANN H. Analysis of dithiocarbamate pesticides by GC-MS. Thermo-Fischer Application Note 10333, 2012.
- [25] DEROSA, G.; MAFFIOLI, P.; BD, A.D.A. *Ilex paraguariensis*, white mulberry and chromium picolinate in patients with pre-diabetes, p. 1377-1384, 2020.
- [26] EFSA, Modification of the existing maximum residue level for mancozeb (expressed as carbon disulfide) in persimmons, *European Food Safety Authority Journal*. v. 14, 4495, 2016.
- [27] ABDOURAHIME H., ANASTASSIADOU M., ARENA M., AUTERI D., BARMAZ S., BRANCATO A., BURA L., CARRASCO CABRERA L., CHAIDEFTOU E., CHIUSSOLO A., COURT MARQUES D., CRIVELLENTI F., DE LENTDECKER C., EGSMOSE M., FAIT G., FERREIRA L., GATTO V., GRECO L., IPPOLITO A., ISTACE F., JARRAH S., KARDASSI D., LEUSCHNER R., LOSTIA A., LYTHGO C., MESSINETTI S., MIRON I., MOLNAR T., PADOVANI L., PARRA MORTE J. M., PEDERSEN R., RACZYK M., REICH H., RUOCCO S., SAARI K.E., SANTOS M., SERAFIMOVA R., SHARP R., STANEK A., STREISSL F., STURMA J., SZENTES C., TERRON A., TIRAMANI M., VAGENENDE B., VAINOVSKA P., VILLAMAR-BOUZA L. Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance mancozeb. *EFSA J.* Dec 16. v. 18, n. 12, 2019.
- [28] EPA. The determination of whether dithiocarbamate pesticides share a common mechanism of toxicity, Health Effects Division, Office of Pesticide Programs. Environmental Protection Agency, Washington, DC, EUA, p. 38, 2001.
- [29] FERREIRA, T.; MEINHART A.D.; BALLUS C.A.; GODOY, H.T. The effect of the duration of infusion, temperature, and water volume on the rutin content in the preparation of mate tea beverages: An optimization study. *Food Research International*, n. 60, p. 241-245, 2014.
- [30] FRIZON, C, N, T. Propriedades físico-químicas, sensoriais e estabilidade de uma nova bebida contendo extrato de erva-mate (*Ilex paraguariensis* St. Hil.) e soja (glycine max). Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de alimentos, Setor de Tecnologia, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2011.
- [31] GARCINUÑO, R.M.; FERNÁNDEZ-HERNANDO, P.; CÁMARAB, C. Simultaneous determination of maneb and its main metabolites in tomatoes by liquid chromatography using diode array ultraviolet absorbance detection, *Journal of Chromatography A*, v. 1043, p. 225-229, 2004.
- [32] GERHARDT, Marcos; História Ambiental da Erva-Mate, Tese apresentada ao Programa de Pós Graduação em História, Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis (SC), 2013. <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/107480/318857.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- [33] HWANG, E. S.; CASH, J. N.; ZABIK M. J. Determination of degradation products and pathways of mancozeb and ethylenethiourea (ETU) in solutions due to ozone and chlorine dioxide treatments. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. v. 51, p. 1341-1346, 2003.
- [34] IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Relatórios de comercialização de agrotóxicos, atualizado em 07 de out. 2020. Disponível em: <http://ibama.gov.br/agrotoxicos/relatorios-de-comercializacao-de-agrotoxicos>. Acesso em 12/12/2020.
- [35] IBRAMATE, Instituto Brasileiro Da Erva-mate; Origem, Ilópolis - RS - Brasil, 2017. Disponível em: <http://ibramate.com.br/origem/>
- [36] IBRAMATE, Instituto Brasileiro Da Erva-mate; Diagnóstico da cadeia produtiva da erva mate, (2018).
- [37] INMETRO, Orientação Sobre Validação De Métodos Analíticos, DOQ-CGCRE-008, Coordenação Geral de Acreditação, 2020. https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/51020/1586959964DOQ-Cgcre-8_08.pdf
- [38] JARDIM, A.N.O.; CALDAS, E. D. Brazilian monitoring programs for pesticide residues in food - Results from 2001 to 2010. *Food Control*, v.25, p. 607-616, 2012.
- [39] JARDIM, I. C. S. F.; ANDRADE, J. de A.; QUEIROZ, S.C. do N. de. Residues of pesticides in food: a global environmental preoccupation - Focussing on apples. *Quím. Nova*, São Paulo, v. 32, n. 4, p. 996-1012, 2009.
- [40] JIANG, M.; ZHANG, W.; ZHANG, T.; LIANG, G.; HU B.; HAN P. Assessing transfer of pesticide residues from chrysanthemum flowers into tea solution and associated health risks, *Ecotoxicology and Environmental Safety*. v. 187, p. 109859, 2020.
- [41] JUNIOR, E, L, C. Teores de metilxantinas e compostos fenólicos em extratos de erva-mate (*Ilex paraguariensis* St. Hil.). Tese apresentada a Universidade Estadual de Maringá, como parte das exigências do Programa de Pós-graduação em Agronomia, para obtenção do título de Doutor em Agronomia-Área de Concentração em Produção Vegetal. Maringá, 2006.

- [42] KANCHI, S.; SINGH, P.; BISETTY, K. Dithiocarbamates as hazardous remediation agent: A critical review on progress in environmental chemistry for inorganic species studies of 20th century. *Arabian Journal of Chemistry*, v. 7, p. 11–25, 2013.
- [43] KUNDU C., GOON A., BHATTACHARYA A. Persistence behaviour of fungicidemixture (benalaxyl-M 4% + mancozeb 65%) WP in grapes. *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*. v. 89, p.1253–1257, 2012.
- [44] LIU S., BAI A., ZHOU L., YU C., LI Y., FAN S., PAN. Dissipation and residues of thiram in potato and soil. *Journal of Chemistry*, Article ID 623847, 2015.
- [45] LUTOMSKI, P.; GOŹDZIEWSKA, M.; FLOREK-ŁUSZCZKI, M. Health properties of Yerba Mate. *Annals of Agricultural and Environmental Medicine*. v. 27, 310–313, 2020.
- [46] MACCARI, A.J.; SANTOS, A.P.R. Produtos alternativos e desenvolvimento da
- [47] tecnologia Industrial da cadeia produtiva de erva mate. MTC/CNPQ/PADCT, Curitiba, PR, 2000.
- [48] MARSHALL, W.D. Preprocessing oxidative washes with alkaline hypochlorite to remove ethylenebis (dithiocarbamate) fungicide residues from tomatoes and green beans, *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. 30, p. 649–652, 1982.
- [49] MEDRADO, M. J. S.; MOSELE, S. H. O futuro da investigação científica em ervamate. Colombo, Paraná: Embrapa Florestas, 2004 (Série Documentos).
- [50] MELLO, D. C. Determinação dos fungicidas ditiocarbamatos etilenobisditiocarbamatos (ebdc) e propinebe em alimentos por HPLC-UV. Dissertação de Mestrado Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade de Brasília, Brasília, 2014.
- [51] MUJAWAR S., UTTURE S., FONESCA E., MATARRIA J., BANERJEE K. Validation of a GC-MS method for the estimation of dithiocarbamate fungicide residue and safety evaluation of mancozeb in fruits and vegetables. *Food Chem* 150:175–181, 2014.
- [52] OLIVARI, S.; PAZ, Á.J.; GUTIÉRREZ, D.; GONZÁLEZ-WELLER, A.; HARDISSON, G. Macroelement, trace element, and toxic metal levels in leaves and infusions of yerba mate (*Ilex paraguariensis*). p. 21341–21352, 2020.
- [53] PATSAKOS P.G., LIAPIS K., MILIADIS G.E., ZAFRIOU K. Mancozeb residues on feld sprayed apricots *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*. v. 48, p. 756, 1992.
- [54] PIZZUTTI, I.R., DE KOK A., DA SILVA R.C., ROHERS, G.N. Comparison between three chromatographic (GC-ECD, GC-PFPD and GC-ITD-MS) methods and a UV-Vis spectrophotometric method for the determination of dithiocarbamates in lettuce. *Journal of the Brazilian Chemical Society*. v. 28, p. 775–781, 2017.
- [55] RACHEL, M.; CALIXTO, P.; RECH, D.; SANTOS, V.L.; NIXDORF, S.L.; FAGUNDES, T.R.; ANN, R.; DAVIS, H.; BASTOS-NETO, J.C.; ZANANDREA, A.C.; VICTORINO V.J.; BASTOS, F.F.; LUCIA, V.; BASTOS, C. Chimarrão consumption and prognostic factors in breast cancer: Correlation with antioxidants and blood caffeine levels. *Phytoterapy Research*. p. 1–10, 2020.
- [56] RANI, R., SHARMA, V.K., RATTAN, G.S., SINGH, B., SHARMA, N. Dissipation of residues of mancozeb and metalaxyl in tomato (*Solanum lycopersicum* L.). *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*, v. 90, p. 248, 2013.
- [57] RESENDE, M. D. V.; STURION, J. A.; CARVALHO, A. P.; SIMEÃO, R. M.; FERNANDES, J. S. C. Programa de melhoramento da erva-mate coordenado pela EMBRAPA – resultados da avaliação genética de populações, progênes, 56 indivíduos e clones. Radial: Embrapa florestas, circular técnica 43, p. 67, Colombo, 2000.
- [58] RIBAS, P. P.; MATSUMURA, A. T. S. A química dos agrotóxicos: impacto sobre a saúde e meio ambiente. *Revista Liberato*, v. 10, n. 14, p. 149-158, 2009.
- [59] RIPOLLÉS, C.; SANCHO J. V.; LÓPEZ F.J.; HERNÁNDEZ, F. Liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry for the residue determination of ethylenethiourea (ETU) and propylenethiourea (PTU) in water, *Journal of Chromatography A*. v. 1243 p. 53–61, 2012.
- [60] ROSA, A.C. P. Avaliação dos teores de resíduos do pesticida ditiocarbamato no solo de uma cultura de couve (*Brassica Oleracea* L.) utilizando cloridrato de L-cisteína para preservação das amostras, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2010.
- [61] RUNKLE, J.; FLOCKS, J.; ECONOMOS, J.; DUNLOP, A.L. A systematic review of Mancozeb as a reproductive and developmental hazard. *Environment International*. v. 99, p. 29–42, 2017.
- [62] SAIDELLES, A. P.F.; KIECHNER, R.M.; SANTOS, N.R.Z.; FLORES, E.M.M.; BARTZ F.B. Análise de metais em amostras comerciais de erva-mate no sul do Brasil. *Alimentos e Nutrição Araraquara*. v.21, n.2, p.259-265, 2010.
- [63] SANTOS, M.C.D.; AZCARATE S.M.; LIMA K.M.G.; GOICOECHEA, H.C. Fluorescence spectroscopy application for Argentinean yerba mate (*Ilex paraguariensis*) classification assessing first- and second-order data structure properties. *Microchemical Journal*. v. 55 p. 104783, 2020.

- [64] SILVEIRA T.F.F.; MEINHART, A.D.; DE SOUZA T.C.L.; CUNHA, E.C.E.; DE MORAES, M.R.; GODOY, H.T. Chlorogenic acids and flavonoid extraction during the preparation of yerba mate based beverages, *Food Research International*. v. 102, p. 348–354, 2017.
- [65] SOUZA, L. A. F. de; Validação de metodologia analítica para determinação de resíduos de fungicidas ditiocarbamatos em tomate por espectrofotometria, Faculdade de Farmácia da UFMG Belo Horizonte, MG, 2009.
- [66] STERTZ, S. C., FREITAS, R. J. S., *Rev. Ecotox. Meio Amb.*, v. 13, p. 45-52, 2003.
- [67] VAN LISHAUT, H.; SCHWACK, W. Selective trace determination of dithiocarbamate fungicides in fruits and Vegetables by Reversed-Phase Ion-Pair Liquid Chromatography with Ultraviolet and Electrochemical Detection. *Journal of Association of Official Analytical Chemists International*, v. 83, n. 3, p.720-727, 2000.
- [68] VIEIRA M. A. Análise de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) nas etapas do processamento da erva-mate (*Ilex paraguariensis*) e caracterização química dos resíduos da trituração para o desenvolvimento de produto. Tese (Doutorado em Ciências dos Alimentos) – programa de Pós-Graduação em Ciência dos Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009.
- [69] WITCZAK, A.; ABDEL-GAWAD, H.; ZALESK, M.; POHORYLO, A. Tracking residual organochlorine pesticides (OCPs) in green, herbal, and black tea leaves and infusions of commercially available tea products marketed in Poland, *Food Additives & Contaminants: Part A*. v. 35, 2018.

Autores

ALCIRO LAMÃO LAZZARINI

Possui formação técnica em Agropecuária pela Escola Agrotécnica Federal de Alegre-EAFA (1981), Graduação de LICENCIATURA EM CIÊNCIAS AGRÍCOLAS pelo INSTITUTO SUPERIOR DE CS AGRÁRIAS INCORP. / UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (1992), Pós Graduação em Fruticultura Comercial pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS-UFLA (2007), Pós Graduação em Educação do Campo pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO-UFES (2010). MESTRE EM AGROECOLOGIA PELO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO-CAMPUS DE ALEGRE (2020). Possui experiência na área de Educação do Campo e Juventude Rural como Monitor das Escolas Famílias Agrícolas-EFA. extensionista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural INCAPER. Com experiência na área de Agronomia, com ênfase em Extensão Rural e experiência em organização rural, desenvolvimento local sustentável, e na área produtiva principalmente em cafés arábica e conilon, bovinocultura leiteira, citricultura, viticultura, bananicultura e olericultura, dentre outras, e na área de cunho ambiental e agroecológica. Atualmente, Coordenador do Centro Regional de Desenvolvimento-Rural Litoral Sul do INCAPER.

AMANDA DE ÁVILA SILVEIRA

Formada em Confeitaria Profissional e Avançada no Instituto de Gastronomia das Américas - IGA/Uberlândia; Graduada em Tecnologia de Alimentos e pós-graduanda em Controle de Qualidade em Processos Alimentícios pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro - IFTM. Realizou estágio na Secretaria de Agropecuária, Abastecimento e Distritos da Prefeitura Municipal de Uberlândia na área de Segurança e Qualidade Alimentar. Na maior parte da graduação, foi aluna de Iniciação Científica em pesquisa com Ora-pro-nóbis, uma Planta Alimentícia Não Convencional (PANC). Participou de projetos de extensão de grande importância municipal (Saberes e Sabores, Menu IFTM), regional (IFTM Itinerante) e internacional (LAPASSION).

ANDRÉA CÁTIA LEAL BADARÓ

Médica Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com Especialização em Controle de Qualidade de Produtos de Origem Animal pela Universidade Federal de Lavras (UFLA), Mestrado em Ciência da Nutrição pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Docente do Departamento de Engenharia de Alimentos na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Câmpus Francisco Beltrão. Representante da Região Sul na Rede Brasileira de Pesquisadores em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Atua nos seguintes temas: Microbiologia de Alimentos, Tecnologia de Alimentos, Boas Práticas de Manipulação, Segurança Alimentar, Treinamentos de Manipuladores, Vigilância Sanitária, Qualidade dos Alimentos e Alimentos Seguros.

ANNE HERENIZE LEMOS

Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal da Fronteira Sul (2015) e em Matemática pelo Centro Universitário UNINTER (2020). Participou de projeto de pesquisa sobre levantamento da produção de frutas nativas na região da Cantuquiriguaçu (Cnpq/2011-2013) e desenvolvimento de néctar de guabiroba enriquecido com soro de leite (projeto de TCC - 2015). Atuou no Controle de Qualidade em frigorífico (2015-2017) e laticínio (2018-2020).

BIANCA DE LIMA

Discente de Engenharia de Alimentos na Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR. Atuou como voluntária em projetos de extensão como instrutora em desenho técnico para alunos de ensino médio de Francisco Beltrão. Desenvolveu ações de melhoria da qualidade de alimentos comercializados na feira do produtor rural de Francisco Beltrão, participou do projeto UTFPR Sem Fronteiras, e de projetos sobre valorização da cerveja artesanal com frutos regionais. Foi bolsista do Programa de Educação Tutorial - PET e atualmente atua no controle de qualidade em uma indústria de massa e biscoitos.

BRUNA DA FONSECA ANTUNES

Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Pampa (2015) e mestrado em Nutrição e Alimentos pela Universidade Federal de Pelotas (2018). Possui experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal, atuando principalmente em análise e controle de qualidade de alimentos, desenvolvimento de novos produtos alimentícios, processamento de frutas, produtos da árvore da oliveira, com ênfase em compostos bioativos e atividades biológicas. Membro do corpo editorial da Revista Azeites & Olivais.

BRUNA MAGNAGO BERNABÉ

Graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Espírito Santo (2012) e Mestra em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Espírito Santo (2014). Atualmente cursa pós-graduação, nível doutorado, em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa.

CARLA REGINA AMORIM DOS ANJOS QUEIROZ

Possui graduação em Licenciatura em Química pela Universidade Federal de Uberlândia (1996), graduação em Bacharelado em Química pela Universidade Federal de Uberlândia (1999) e mestrado em Química pela Universidade Federal de Uberlândia (2001). Em 2008 concluiu especialização em Educação Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. Em 2012 concluiu o doutorado em Agronomia (Ciência do Solo) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente é professora do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - campus Uberlândia. Tem experiência na área de Química, com ênfase em análise química de material vegetal, composição centesimal de alimentos e crescimento de plantas.

CAROLINA SCHNEIDER

Graduada em Nutrição pelo Centro Universitário de Maringá (2020)

CÁTIA TAVARES DOS PASSOS FRANCISCO

Engenheira de Alimentos (FURG-2003), Mestre em Engenharia e Ciência de Alimentos (FURG-2006) e Doutora em Microbiologia Agrícola e do Ambiente (UFRGS-2010). Atua na Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Laranjeiras do Sul, desde 2010, no curso de Engenharia de Alimentos, atuando principalmente nos CCRs de microbiologia de alimentos, engenharia bioquímica e análise sensorial; e colabora no programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, ministrando a disciplina de Microbiologia Avançada de Alimentos. Desenvolve pesquisa com bactérias ácido lácticas e colabora em projetos de desenvolvimento de produtos. Na extensão atua em cursos de boas práticas de fabricação.

CLAUDIA MARIA TOMÁS MELO

Possui graduação pela Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia, UFU, (1996), mestrado em Engenharia Química pela UFU (1998) e doutorado em Engenharia Mecânica, também, pela Universidade Federal de Uberlândia (2004). Atualmente é professora titular e atua como docente, no Instituto Federal do Triângulo- Campus Uberlândia, ministrando aulas para o curso de Tecnologia em alimentos, curso Técnico em Meio Ambiente, Curso de Especialização em Controle de Qualidade em processos Alimentícios e no curso de mestrado tecnológico em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Realiza pesquisas na área de análises físico química de água, alimentos e efluentes, com base no controle de qualidade alimentício e ambiental, visando a química verde com um planeta mais sustentável.

CRISLAYNE TEODORO VASQUES

Doutoranda pelo curso de Ciência de Alimentos pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) (2019). Mestre em Ciência de Alimentos pela Universidade Estadual de Maringá (2018). Especialista em Controle de Qualidade e Processamento em Alimentos pela Universidade Estadual de Maringá (2014). Graduada em Nutrição pelo Centro Universitário de Maringá (2009). Atuou como gerente de unidade na empresa GRSA - Solução em Alimentação e em Serviços de Suporte, com experiência na área de gestão e controle de qualidade em Unidade de Alimentação e Nutrição - UAN. Atualmente é coordenadora e docente no Curso Técnico em Nutrição e Dietética, no Colégio Estadual Unidade Polo. Docente no curso de Nutrição no Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR) Maringá/PR.

DANYELLY SILVA AMORIM

Mestranda em Ciência de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Graduação em tecnologia de alimentos pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Tecnologia de Alimentos, atuando principalmente nos seguintes temas: aproveitamento de resíduos de frutas na elaboração de alimentos, qualidade nutricional e compostos bioativos de alimentos.

DEBORAH SANTESSO BONNAS

Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Lavras, UFLA, (1987), mestrado em Ciências dos Alimentos pela UFLA (1991) e doutorado em Ciências dos Alimentos pela UFLA (2002). Em 1998, ingressou na Rede Federal, na Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde e, em 1999, na Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Ciência e Tecnologia de Alimentos, atuando principalmente nos seguintes temas: boas práticas de fabricação, segurança alimentar, higiene, microbiologia de alimentos e análise sensorial. Atualmente ocupa o cargo de reitora do IFTM eleita para o período de 2020 a 2023.

DENISE DE MORAES BATISTA DA SILVA

Atualmente é Doutoranda em Ciência de Alimentos na Universidade Estadual de Maringá. Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Norte do Paraná (2015) e mestrado em Mestrado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Maringá (2018). Atuou como Instrutor de curso livre - Dutra Lopes e Lopes LTDA e Instrutora de Aprendizagem Industrial em Encontro Fraternal Lins de Vasconcellos e atualmente é Laborarista em Cocamar Cooperativa Agroindustrial - Matriz realizando análises reológicas e de qualidade em Trigo, Farinha e Farelo de Trigo. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Engenharia de Alimentos, atuando principalmente nos seguintes temas: extrusão, sensorial, resíduo, análise físico-químicas e salinidade.

EDIMAR APARECIDA FILOMENO FONTES

Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa (1994), graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa (1994), mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa (1997) e doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa (2002). Atuou como professora no Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba e atualmente é professora do Departamento de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Ciência e Tecnologia de Alimentos, atuando principalmente nos seguintes temas: Processamento de Alimentos, Conservação de Alimentos, Cinética de processos, Análise de Alimentos, Química de Alimentos e Estatística Experimental

EDUARDO SAYMON SANTOS DA SILVA

Possui graduação em Tecnologia de Alimentos pela Universidade do Estado do Pará (2016).

ÉRICA NASCIF RUFINO VIEIRA

Professora da Universidade Federal De Viçosa no Departamento de Tecnologia de Alimentos. Doutora (2011) e Mestre (2004) em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa e Graduada (2002) em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal, especialmente Frutas e Hortaliças, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento de produtos, processamentos de alimentos, minimamente processados, alimentos funcionais (probióticos), análise de compostos bioativos e conservação de alimentos.

ERICK SOARES FERNANDES OLIVEIRA

Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Pampa (2018), mestrando em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, possuindo experiência com extração e encapsulação de bioaromas, desenvolvimento de novos produtos alimentícios e análises de biocompostos fitoquímicos. Possui experiência na área industrial em manufatura de produtos cosméticos e alimentícios, atuando em qualidade, processos de melhoria contínua e gestão de pessoas.

FERNANDA GERMANO ALVES GAUTÉRIO

Possui Doutorado em Biotecnologia pela Universidade Federal de Pelotas - UFPel (2012); Mestrado em Engenharia e Ciências de Alimentos pela Universidade Federal do Rio Grande - FURG (2008); Especialização em Ciência dos Alimentos pela Universidade Federal de Pelotas (2011) e Graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Rio Grande - FURG (2006). Atualmente é professora na Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA - Campus Bagé, ministrando disciplinas para o Curso Superior de Engenharia de Alimentos.

FRANCISCA MARIANE MARTINS ARAÚJO

CEO da iQuality, auditora das principais normas de Qualidade e já ajudou várias empresas a implantar o sistema de Qualidade, Certificações e Assuntos regulatórios junto aos órgãos de fiscalização. Atua como pesquisadora, onde possui artigos publicados em eventos nacionais e internacionais. Possui uma visão sistemática dos sistemas de Qualidade, sua experiência abrange todos os pontos da cadeia de produção.

GENILSON DE PAIVA

Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa (1997), mestrado (2000) e doutorado (2018) em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente é professor do Curso Técnico em Agroindústria e Licenciatura em Ciência e Tecnologia de Alimentos do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES), Campus de Venda Nova do Imigrante. Tem experiência na área de Segurança Alimentar, Ciência e Tecnologia de Alimentos, atuando principalmente nos seguintes temas: Análises físico-químicas de Alimentos, Análise Sensorial de Alimentos e Ciência e Tecnologia de Amido.

GLENDA BARROS MATOS

Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Sergipe (2018). Mestranda do Programa de Pós Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Sergipe. Já atuou em pesquisa utilizando o método de microencapsulação por coacervação complexa, tendo como material de parede goma de cajueiro, para encapsulação de

material oleoso (corante de urucum) e em pesquisa cujo foco era a obtenção de corante natural utilizando como matéria prima brácteas de Bougainvillea.

HUGO DIAS FIGUEIRA

Bacharelando em Engenharia de Alimentos na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Atuou como IC no projeto de nome EFEITO DA FILTRAÇÃO SOBRE AS CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS, CONSTITUINTES FENÓLICOS E COR DA POLPA DE NONI em 2018, no Centro de Desenvolvimento e Difusão de Tecnologias (CEDETEC). Atualmente atua como IC no Laboratório de Ensaio Mecânicos também do CEDETEC.

INGRID DUARTE DOS SANTOS

Graduada em Farmácia (2013) pela Universidade Franciscana. Possui mestrado pelo Programa de Pós Graduação em Química da Universidade Federal de Santa Maria, onde desempenhou suas atividades no Centro de Pesquisa e Análise de Resíduos e Contaminantes (CEPARC). Atualmente é doutoranda em Ciência e Tecnologia dos Alimentos na mesma Universidade. Possui experiência na área de Química Analítica, atuando principalmente no desenvolvimento, validação e otimização de métodos para análise de micotoxinas e agrotóxicos em alimentos, utilizando cromatografia líquida e gasosa, especialmente LC-MS/MS e GC-MS. Possui experiência na área da Qualidade com ênfase na implantação de Sistema de Gestão da Qualidade e acreditação de laboratórios de ensaio segundo a NBR ISO/IEC 17025:2017. Além disso, atua na área de Ciência dos Alimentos com ênfase na determinação de compostos voláteis e na análise de precursores de sabor, como ácidos graxos e caracterização metabólica de alimentos.

INGRYD RODRIGUES MARTINS

Possui graduação em Tecnologia de Alimentos pela Universidade do Estado do Pará (2018). Mestrado em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares (Em andamento). Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Higiene e Controle de Qualidade / Pesquisa e Desenvolvimento de novos produtos / Microbiologia.

IONARA REGINA PIZZUTTI

Graduada em Química Industrial pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), realizou o mestrado e o doutorado na área de Química Analítica com ênfase em agrotóxicos, nesta mesma Universidade. Atualmente, é Professora Associada IV da UFSM, atuando principalmente no desenvolvimento, otimização, validação e aplicação de métodos multirresíduos e também de métodos individuais para determinação de resíduos de agrotóxicos e outros contaminantes (como micotoxinas), em alimentos como frutas, vegetais, grãos, vinhos, sucos, alimentos processados entre outros, bem como em matrizes ambientais como água, solo, camas biológicas, matrizes biológicas, entre outras, utilizando GC e LC, especialmente GC-MS/MS e LC-MS/MS. Fundou o Centro de Pesquisa e Análise de Resíduos e Contaminantes (CEPARC) no Departamento de Química da UFSM, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão, tanto em nível de graduação como de pós-graduação. É professora do Programa de Pós-graduação em Química (PPGQ) e do Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia dos Alimentos (PPGCTA) da UFSM.

ISABELLY SILVA AMORIM

Mestranda em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Pará. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Tecnologia de Alimentos, atuando principalmente nos seguintes temas: utilização de resíduo de frutas em alimentos, qualidade nutricional e bioativa de alimentos.

JAMILLE COELHO COIMBRA

Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa (2012), mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2015) e é doutoranda em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa. Tem experiência na área de Engenharia Química, com destaque em reatores químicos, e ênfase particular na área de modelagem, simulação, controle de sistemas de polimerização e CFD. Atualmente, vem desenvolvendo pesquisas no tema: fenômenos de transporte aplicados à biosseparação de processos via CFD.

JAMILLE DE SOUSA MONTEIRO

Tecnologia de Alimentos pela Universidade do Estado do Pará. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Tecnologia de Produtos de Origem Animal. E experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Tecnologia de Alimentos.

JIDEANE MENEZES SANTOS

Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Sergipe (2018) e, mestrado em andamento em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Sergipe.

JÚLIA PAULA NEU

Química licenciada pela Universidade Federal de Santa Maria (2014-2019),. Atuou como bolsista de Projeto de Ensino, na Floricultura do Colégio Politécnico-UFSM, 2012-2019. Participou como integrante do Grupo GEPACES, no departamento de Solos do CCR/UFSM(2019). Técnica em Agropecuária (2012-2014), pelo Colégio Politécnico-UFSM. Atualmente é aluna do Mestrado em Química- área de Concentração Química Analítica, sob orientação da Dra. Ionara Regina Pizzutti.

KÁSSIA RODRIGUES DA COSTA SENA

Engenheira de Alimentos pela Universidade Federal do Maranhão - UFMA. Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho - Galileo Business School. Pós graduanda Lato Sensu em Segurança Alimentar e Controle de Qualidade na Indústria de Alimentos - UEPA e Mestranda do Curso de Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares - IFPA.

LARISSA CANHADAS BERTAN

Possui graduação em Farmácia pela Universidade do Sagrado Coração (1997). Pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (1999) obteve a habilitação em Farmacêutico Bioquímico, opção: Alimentos. Possui mestrado em Alimentos e Nutrição (2003) e doutorado em Tecnologia de Alimentos (2008), ambos pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Tem experiência na área de tecnologia de alimentos de origem animal e vegetal, embalagens biodegradáveis e ativas. Atualmente é professora Associada I e coordenadora do Curso de Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos - PPGCTAL, do Campus Laranjeiras do Sul, da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS).

LUCIANO TORMEN

É bacharel, licenciado, mestre e doutor em química pela Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, com experiência em espectrometria atômica e preparo de amostras. Desde 2011 é docente na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus de Laranjeiras do Sul, onde atua e tem interesse na obtenção e caracterização de extratos vegetais, medidas de capacidade antioxidante, oxidação de lipídios e análises por CG-MS

LUIZ FERNANDO DIAS FERREIRA

Professor do Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Venda Nova do Imigrante. Graduação em Engenharia de Alimentos, Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, ambos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (1996 e 1999) e Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa (2010). Possui experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal, Desenvolvimento de Novos Produtos e Aproveitamento de Resíduos da Agroindústria de Alimentos.

MAIARA PEREIRA MENDES

Doutora e mestre em Ciência de Alimentos pela Universidade Estadual de Maringá. Possui graduação em Tecnologia em Processos Químicos pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Atualmente é professora mediadora do curso de Tecnologia em Segurança Alimentar na Unicesumar. Atuando principalmente nos seguintes temas: tecnologia de amido e cereais, modificação de amido, extrusão.

MÁRCIA CRISTINA TEIXEIRA RIBEIRO VIDIGAL

Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa (2006), mestrado (2009) e doutorado (2013) em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela mesma instituição. É professora do Departamento de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa/UFV. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, atuando principalmente nos seguintes temas: modelagem e simulação de processos e produtos na indústria de alimentos, estudo das propriedades tecnológicas de biomoléculas, reologia, análise sensorial e nanotecnologia.

MARCIANA DA SILVA GONÇALVES

Discente de Engenharia de Alimentos na Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR. Atuou como bolsista no projeto de extensão coletando e analisando amostras sobre ações de melhoria da qualidade de alimentos comercializados na feira do produtor rural de Francisco Beltrão.

MARIA REGINA SARKIS PEIXOTO JOELE

Possui graduação em Química Industrial pela Universidade Federal do Pará (1987), especialização em Planejamento, Gestão e Educação Profissional na Universidade Federal do Pará (2002), mestrado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas (1996) e doutorado em Ciências Agrárias pela Universidade Federal Rural da Amazônia (2011). Atualmente é docente do Instituto Federal de Educação do Pará. É professora permanente do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares / IFPA e do Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos / UFPA. Tem experiência na área de Engenharia de Alimentos, com ênfase em Tecnologia, atuando principalmente em: tecnologia de carnes e derivados, tecnologia de frutas e hortaliças, alimentos com reduzido teor de gordura, embalagem de alimentos e análises física e sensorial de alimentos.

MARIANA FERREIRA SILVA

Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa (2020), onde fez iniciação científica com o tema "Modelagem e predição das propriedades reológicas de iogurte natural". Desenvolveu pesquisa na Universidad Nacional del Sur (Argentina) no departamento de Engenharia Química em Modelagem de extrusão, e direcionou o trabalho de conclusão de curso em Modelagem e simulação de evaporadores de múltiplos efeitos.

MARLOS EDUARDO ZORZELLA FONTANA

Doutorando em Química Analítica pelo programa de pós-graduação em química da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. Formou-se em Química Industrial por essa mesma instituição em 2016. Atualmente Pesquisador do Centro de Pesquisa e Análise de Resíduos e Contaminantes (CEPARC/UFSM) , atuando principalmente no desenvolvimento, validação e otimização de multimétodos para análise de micotoxinas e pesticidas em alimentos, utilizando Cromatografia Gasosa (GC-TQ-MS/MS) e Cromatografia Líquida (LC-TQ-MS/MS). Possui também experiência com a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017).

MAYARA DE LARA SANTOS

Graduada em Nutrição pelo Centro Universitário de Maringá (2020)

MILENA BRATZ BICKEL

Estudante de Graduação em Bacharel em Ciência e Tecnologia de Alimentos no Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Venda Nova do Imigrante.

MIRIANE LUCAS AZEVEDO

Possui Graduação em Bacharelado em Química de Alimentos pela Universidade Federal de Pelotas (2002), Especialização em Desenvolvimento Sustentável e Meio-ambiente pela Universidade da Região da Campanha (2004), Mestrado em Ciência e Tecnologia Agroindustrial pela Universidade Federal de Pelotas (2008), Doutorado em Ciência e Tecnologia Agroindustrial pela Universidade Federal de Pelotas (2011). Atualmente é Professora da Universidade Federal do Pampa - campus Bagé, nas áreas de Tecnologia de Produtos de Origem Animal e Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal.

MÔNICA RIBEIRO PIROZI

Graduada em Agronomia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (1989), Mestre em Ciências dos Alimentos (Universidade Federal de Lavras, 1995), e Ph.D. em Grain Science and Industry (Kansas State University, 2003). Concluiu pos-doutorado na Kansas State University, em colaboração com USDA, em 2011. É Professora Associada do Departamento de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa desde 1996 e atualmente ocupa o cargo de Coordenadora de Curso de Graduação em Engenharia de Alimentos. Atua no ensino, pesquisa e extensão na área de Ciência e Tecnologia de Cereais, com ênfase em panificação, qualidade tecnológica da farinha de trigo, química de grãos e farinhas de cereais. Linhas de Pesquisa: Relação entre composição proteica e qualidade tecnológica de trigo; Proteínas anticongelantes em cereais; Farinhas isentas de glúten; Fortificação/processamento de arroz; Farinhas mistas; Características de amido e farinhas de banana. Atuou na Chefia do Departamento de Tecnologia de Alimentos (2004-2008) e tem participado ativamente em outros Conselhos da UFV.

PABLO LUAN DE JESUS DANTAS

Graduando em andamento em Engenharia de alimentos pela Uesb; participou como IC atuando no subprojeto de pesquisa intitulado: Estudo das propriedades físicas e reológicas de óleos vegetais submetidos a diferentes tratamentos de frituras (2017-2018); Participou como IC atuando no Projeto de pesquisa intitulado: Comportamento mecânico e reológico de queijo de coalho condimentado armazenados sob refrigeração (2018-2019).

PATRÍCIA BELTRÃO LESSA CONSTANT

Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal da Paraíba (1996), mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa (1999) e doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa (2003). Foi professora efetiva da Universidade Federal do Ceará por 5 anos. Atualmente é professora

associada da Universidade Federal de Sergipe. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Ciência de Alimentos, atuando principalmente nos seguintes temas: corantes naturais, microencapsulação e alimentos funcionais

PAULA TAÍS MAIA SANTOS

Graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos e produção industrial. Teve participação em bolsa de iniciação científica, pela Universidade Federal de Sergipe e FAPITEC. Apresentou um resumo na X Brazilian Meeting of Science & Technology for Food and Beverages e apresentou um trabalho no 7º Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Atualmente, cursa o mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Sergipe em parceria com a EMBRAPA (PE)

RAÍSSA INGRID SANTANA ARAUJO COSTA RAI_INGRID@HOTMAIL.COM

Mestranda do Programa de Pós Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Sergipe. Graduada de Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), com experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos. - Graduanda sanduíche pelo Programa Brasileiro de Mobilidade Científica, Ciências Sem Fronteiras (CAPES), onde cursou Food Science pela Minnesota State University (MNSU), Mankato. Nesta graduação obteve experiência na área de Cromatografia líquida e gasosa e Biotecnologia. - Possui curso de Auditor Interno do Sistema de Gestão Integrado (SGI), o qual visou a NBR ISO 9001:2015, NBR ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007, pela Escola de Produção e Negócios Estado da Arte, Aracaju, SE.

ROBSON DIAS WOUTERS

Graduando em Engenharia Química pela Universidade Franciscana - UFN. Analista nível médio do Centro de Pesquisa e Análise de Resíduos e Contaminantes (CEPARC), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), atuando no desenvolvimento e validação de novos métodos analíticos para determinação de resíduos de pesticidas e micotoxinas, empregando cromatografia líquida (LC-TQ-MS/MS) e cromatografia gasosa (GC-TQ-MS/MS e GC-ECD).

ROGER WAGNER

Professor Associado vinculado ao Depto. de Tecnologia e Ciência dos Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e bolsista produtividade em pesquisa (PQ-2) do CNPq CA AL. Possui graduação em Farmácia - Tecnologia dos Alimentos pela UFSM e doutorado em Ciência de Alimentos pela UNICAMP. Realizou seu pós-doutoramento na UFSM através do programa PRODOC-Capes (2008-2009). Atua no Programa de Pós-graduação de Ciência e Tecnologia dos Alimentos (PPGCTA-UFSM) orientando alunos de mestrado e doutorado. Atua na área da ciência dos alimentos com ênfase na pesquisa do aroma e sabor dos alimentos, compostos voláteis, cromatografia em fase gasosa e espectrometria de massas, técnicas de preparo de amostra e análise de precursores de aroma, como ácidos graxos e aminoácidos, caracterização metabólica e metabolômica de frutos e microorganismos.

ROSSELEI CAIEL DA SILVA

Possui graduação em Farmácia, com ênfase em Tecnologia de Alimentos (2003), mestrado (2005) e doutorado (2011) em Química, pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Atualmente é pesquisadora no Centro de Pesquisa e Análise de Resíduos e Contaminantes (CEPARC/UFSM). Tem experiência em Desenvolvimento de Novos Produtos Alimentícios e Controle de Qualidade em Alimentos.

RUBIA VIANA BATISTA

Possui graduação em Engenharia de Alimentos (2016) e Mestrando em Ciência e Tecnologia de Alimentos (2020) pela Universidade Federal da Fronteira Sul. Participou de projetos de pesquisa na área de desenvolvimento de produtos à base de tilápia e de iogurte tipo "sundae" com adição de geleia de jabuticaba com fibras. Foi auxiliar de controle de qualidade e encarregada do setor de embalagem em abatedouro e fábrica de conserva de suínos e analista de laboratório em posto de recepção e resfriamento de leite.

SIMONE SEGUNDA

Graduada em Engenharia de Alimentos (2015) pela Universidade Federal da Fronteira Sul, possui cursos de especialização no setor de moagem de trigo e controle de qualidade do trigo e farinhas. Possui experiência profissional como analista de qualidade e assistente de laboratório, ambos no setor de moagem de trigo.

TAILANE VIEIRA COSTA

Graduanda em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Técnica em informática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Se dedicou a iniciação científica de 2017 a 2019 no Centro de Desenvolvimento e Difusão de Tecnologias (CEDETEC) na área de propriedades físicas de alimentos. Atualmente, está na área de fermentação de vegetais.

THAÍS SADER DE MELO

Graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Sergipe e recém pós-graduada com mestrado em Calidad, desarrollo e innovación de alimentos pela Universidad de Valladolid (España). Tem experiência em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfases em Engenharia de Alimentos e gastronomia.. Bolsista no Programa institucional de bolsas de iniciação científica da UFS-PIBIC. Desde 2014 é Microempreendedora individual da Mania Doce Confeitaria. Foi uma das 8 bolsistas na Fundación Alicia (Barcelona/2018), onde pôde fazer parte de projetos para desenvolvimento de produtos em escala industrial, porém com ênfase em alta gastronomia, como preza a escola e as indústrias nas quais presta serviço dita escola.

VANEZA PAULA POPLAWSKI CARNEIRO

Economista Doméstica pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (2005). Possui especialização em Gestão Empresarial pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (2010) e Agricultura Orgânica pela Faculdade Futura (2019). Mestre em Plantas Medicinais e Fitoterápicos na Atenção Básica; Mestrado Profissional - Universidade Paranaense - UNIPAR (2020). Graduanda em Nutrição pela Universidade Paranaense (início 2020). Atua como Economista Doméstico na Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão.

WELLINGTON FREITAS GONÇALVES

Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Pampa (2019). Possui experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Engenharia de Alimentos atuando no desenvolvimento de novos produtos à base de tomate e quantificação de fitoquímicos.

WILLIAM SOARES DA SILVA

William Soares é Professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Graduado e Mestre em Engenharia de Alimentos. Atualmente está cursando Mestrado em Liderança, Gestão e Coaching no Mundo VUCA . Possui experiência em Engenharia de Alimentos com ênfase em

AUTORES

Engenharia de Processos atuando nos seguintes temas: Liderança, Gestão e Coaching, Fenômenos de Transferência, Reologia e Textura de Alimentos.