Editora Poisson

Semiárido Brasileiro

5

Volume

Ano 2020

Editora Poisson

Semiárido Brasileiro

Volume 5

1ª Edição

Belo Horizonte
Poisson
2020

Editor Chefe: Dr. Darly Fernando Andrade

Conselho Editorial

Dr. Antônio Artur de Souza – Universidade Federal de Minas Gerais

Msc. Davilson Eduardo Andrade

Dra. Elizângela de Jesus Oliveira – Universidade Federal do Amazonas

Msc. Fabiane dos Santos

Dr. José Eduardo Ferreira Lopes – Universidade Federal de Uberlândia

Dr. Otaviano Francisco Neves – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Dr. Luiz Cláudio de Lima – Universidade FUMEC

Dr. Nelson Ferreira Filho – Faculdades Kennedy

Msc. Valdiney Alves de Oliveira – Universidade Federal de Uberlândia

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

S471

**Semiárido Brasileiro - Volume 5/Organização
Editora Poisson - Belo Horizonte - MG:
Poisson, 2020**

Formato: PDF

ISBN: 978-65-86127-03-4

DOI: 10.36229/978-65-86127-03-4

**Modo de acesso: World Wide Web
Inclui bibliografia**

**1. Recursos Hídricos 2. Ecologia.
3. Tecnologia I. Título**

CDD-333

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

www.poisson.com.br

contato@poisson.com.br

SUMÁRIO

Capítulo 1: Análise de Contribuição das Histórias em Quadrinhos como Recurso Didático no Ensino da Química 08

José Raul da Silva Domingos, Jessia Estefânia de Oliveira Amorim Silva, Zenilda Garcia Ferreira, Marcilanne Flausino da Silva, Ilauro de Souza Lima

DOI: 10.36229/978-65-86127-03-4.CAP.01

Capítulo 2: Prestação de consultoria técnica para plano de manutenção predial das Escolas Municipais da Cidade de Monteiro-PB 12

Drially Aline Santos de Moraes, Emerson Renildo Silva Santos, Gustavo Cavalcanti Concerva, Eduardo da Cruz Teixeira, Camila Macêdo Medeiros

DOI: 10.36229/978-65-86127-03-4.CAP.02

Capítulo 3: A Benzedura como ofício tradicional no Semiárido Piauiense 20

Alaine Alves da Silva Luz, Cláudia Regina Coelho Gomes, Gelson Pereira de Andrade, Maria Alvenir Barros Vieira, Adauto Neto Fonseca Duque

DOI: 10.36229/978-65-86127-03-4.CAP.03

Capítulo 4: Qualidade dos dados das declarações de nascidos vivos das mães adolescentes no Semiárido da Paraíba 28

Basílio Henrique Pereira Júnior, Carlos Sérgio Araújo dos Santos, Tiê Dias de Farias Coutinho, Neir Antunes Paes

DOI: 10.36229/978-65-86127-03-4.CAP.04

Capítulo 5: Perfil socioeconômico das famílias de reassentados do Empreendimento da Usina Hidrelétrica de Irapé, Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, Brasil 37

Martionei Leite Gomes, Elida Elizena Carneiro de Matos, Nilton Fernandes de Oliveira, Adriano Campos Lemos, Amanda Cardoso de Oliveira Silveira Cassette

DOI: 10.36229/978-65-86127-03-4.CAP.05

Capítulo 6: Mecanismos de favelização e segregação urbana: Considerações acerca das áreas de risco, prevenção e solução de desastres ambientais..... 44

Osires de Medeiros Melo Neto, Gustavo Correia Basto da Silva, Carmem Júlia Firmino Araruna, Carlus Alberto Oliveira dos Santos, Gabriel Gomes Passos de Caldas Lacerda, Waleska Fernanda Souto Nóbrega

DOI: 10.36229/978-65-86127-03-4.CAP.06

Capítulo 7: A educação do campo em uma perspectiva agroecológica no Assentamento Zumbi dos Palmares – Mari – PB..... 49

Edvaldo Carlos de Lima, Juliane Faustino da Silva, Lenira Lins da Silva

DOI: 10.36229/978-65-86127-03-4.CAP.07

SUMÁRIO

Capítulo 8: Agrofloresta como modelo de produção no Semiárido..... 28

Letícia de Oliveira Bezerra, Débora Candido, Amaury Alves da Silva Junior, Euler dos Santos Silva, Nayane da Silva Lima, Darlene Sausen

DOI: 10.36229/978-65-86127-03-4.CAP.08

Capítulo 9: Importância ambiental e socioeconômica da Apicultura: Uma investigação na vila de Miranda, município de Parambu-Ceará 65

Lucas Alves de Sousa, Juliana Rodrigues de Sousa

DOI: 10.36229/978-65-86127-03-4.CAP.09

Capítulo 10: Crescimento de *Salicornia ramosissima* em resposta a aplicação de diferentes condicionadores e níveis de umidade de um solo salino-sódico 69

Luiz Guilherme Medeiros Pessoa, Natália Alves Santos, Jéssica Patrícia de Oliveira, Luiz Filipe dos Santos Silva, Eduardo Silva dos Santos, Alexandre Campelo de Oliveira, Maria Betânia Galvão dos Santos Freire, Josimar Gurgel Fernandes

DOI: 10.36229/978-65-86127-03-4.CAP.10

Capítulo 11: Relação da produção secundária com a diversidade taxonômica e funcional de poliquetas em estuários no semiárido 74

Francieli Ferreira Paiva, Dalescka Barbosa de Melo, Joseline Molozzi

DOI: 10.36229/978-65-86127-03-4.CAP.11

Capítulo 12: Avaliação sazonal da abundância de *Chironomidae* (Diptera) em um reservatório urbano e implicação sobre a qualidade ambiental..... 83

Evaldo de Lira Azevêdo, Wilza Carla Moreira Silva, Ricássio Alves de Sousa, Tágina Isabel Abrantes de Assis, Daniele Jovem da Silva Azevêdo

DOI: 10.36229/978-65-86127-03-4.CAP.12

Capítulo 13: Restauração ecológica em áreas de ocorrência da desertificação: Uma análise da regeneração natural de clareiras reflorestadas com a faveleira nos anos de 1999-2006-2009-2015, no Município de São José do Seridó/RN 89

Josimar Araújo de Medeiros, Vlândia Pinto Vidal de Oliveira

DOI: 10.36229/978-65-86127-03-4.CAP.13

Capítulo 14: Importância da Associação Oito Verde para a recuperação da mata ciliar do Açude de Boqueirão – PB 97

Luzimar Joventina de Melo, Vênia Camelo de Souza, Ivan Sergio da Silva Oliveira, Josivania Ribeiro da Silva

DOI: 10.36229/978-65-86127-03-4.CAP.14

SUMÁRIO

Capítulo 15: Olimpíada do Meio Ambiente - Uma ação de Educação Ambiental do CAVN em Escolas Públicas de Ensino Médio da Paraíba 105

Apoena Urquiza da Silva, Rodrigo Ronelli Duarte de Andrade, Josivania Ribeiro da Silva, Alex da Silva Barbosa, Vênia Camelo de Souza

DOI: 10.36229/978-65-86127-03-4.CAP.15

Capítulo 16: Municipalização do licenciamento ambiental em Campina Grande/PB 114

Renan Rey Costa Rodrigues, Lucas Senna Rodrigues Agra, Rui de Oliveira

DOI: 10.36229/978-65-86127-03-4.CAP.16

Capítulo 17: Identificação de tendências hidrológicas no município de Feira de Santana Bahia, Nordeste Brasileiro 122

Tiago Bentes Mandú, Ana Carla dos Santos Gomes, Gilvani Gomes de Carvalho, Eduardo Almeida da Silva

DOI: 10.36229/978-65-86127-03-4.CAP.17

Capítulo 18: Identificação de secas meteorológicas a longo prazo a partir de um posto pluviométrico em Aiuaba-CE 127

Tiago Bentes Mandú, Ana Carla dos Santos Gomes, Lorena Martina Trindade de Lima, Giovana Deponte Galetti, Gilvani Gomes de Carvalho, Eduardo Almeida da Silva

DOI: 10.36229/978-65-86127-03-4.CAP.18

Capítulo 19: Uso do rejeito de mineração para produção de microesferas de sinalização viária 132

Barthira Almeida Nunes, Priscila Thalita Barros de Lima, Maryanne Fernandes Formiga Dantas, Tardelles Oliveira Santos, Ana Luíza da Silva Teodoro

DOI: 10.36229/978-65-86127-03-4.CAP.19

Capítulo 20: Descoloração de corante têxtil utilizando o fungo filamentoso *Aspergillus* sp. URM 5741 136

Nayara Vitória dos Santos Cruz, Anna Gabrielly Duarte Neves, Karolaine da Conceição Gama Santos, Raphael Luiz Andrade Silva, Arthur Filipe Ferreira Pequeno, Romero Marcos Pedrosa Brandão Costa, Márcia Vanusa da Silva, Ana Lucia Figueiredo Porto

DOI: 10.36229/978-65-86127-03-4.CAP.20

SUMÁRIO

Capítulo 21: Influência dos parâmetros de deposição e do tratamento superficial dos substratos nas propriedades ópticas e morfológicas de revestimentos absorvedores a base de cromo..... 143

Tiago Oliveira de Belmont Fonseca, Kelly Cristiane Gomes, Gabriela Oliveira Galvão, Ronny Peterson da Nobrega Goncalves, Aline da Silva Oliveira

DOI: 10.36229/978-65-86127-03-4.CAP.21

Capítulo 22: Aperfeiçoamento de coletores solares térmicos via superfícies seletivas 152

Philippe Pereira Moreira, Amanda Bastos Trovão Forte, Leonardo Bitu Correia Leandro, Kelly Cristiane Gomes, José Felix da Silva Neto

DOI: 10.36229/978-65-86127-03-4.CAP.22

Capítulo 23: Desenvolvimento de um heliógrafo do tipo *Campbell-Stokes* por Manufatura Aditiva 159

Vinícius de Paulo Marques, Wanderley Ferreira de Amorim Júnior, Júlio Mannuel Tavares Diniz

DOI: 10.36229/978-65-86127-03-4.CAP.23

Autores:..... 168

Capítulo 1

Análise de Contribuição das Histórias em Quadrinhos como Recurso Didático no Ensino da Química

José Raul da Silva Domingos

Jessia Estefânia de Oliveira Amorim Silva

Zenilda Garcia Ferreira

Marcilanne Flausino da Silva

Ilauro de Souza Lima

Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar um estudo crítico sobre a utilização das histórias em quadrinhos nas salas de aula como uma ferramenta didática para o ensino de química, abordando elementos referentes a criatividade, ensino e a inspiração artística que são expostas aos estudantes. As histórias em quadrinhos são sequências de pictografias que possuem uma narrativa através de balões de fala. Existem diversos tipos de histórias em quadrinhos, sendo cada um particular de sua região de origem, como as comcs dos EUA, os mangás do Japão, as bandas desenhadas de Portugal e as HQs do Brasil. Trabalha-se também com a utilização de animações feitas adaptando-se histórias em quadrinhos, onde trabalhando com uma imersão ainda maior devido a inserção de movimento contínuo e a sonoplastia, consequentemente trazendo uma nova forma de aprendizagem. Dentro desta lógica, o artigo trabalha com elementos que podem ser considerados fundamentais para um aprendizado diferenciado em sala de aula, pois ele insere novas ferramentas didáticas que podem ser trabalhados e debatidos por professores e alunos, além de que ao trabalhar com quadrinhos trabalhamos com outros elementos, como interpretação, desenvolvimento artístico, criatividade. A inserção de quadrinhos e de seus gêneros em sala de aula traga um envolvimento maior dos alunos em sala de aula e um prazer maior em ler e aprender.

Palavras-chave: Histórias em quadrinhos, Lúdico, Química.

1. INTRODUÇÃO

As Histórias em Quadrinhos (HQs) podem ser consideradas uma inovação para o ensino, pelo menos ao que se refere a educação informal, mediante a contribuição de Maurício de Souza (FERNANDES, 2018.), ao criar as HQs da turma da Mônica. Nessas histórias foi apresentado para o público infantil uma educação de cunho contemporâneo, como: educação fiscal, financeira, orientação sexual, educação no trânsito e poluição. Este direcionamento foi apregoado desde 2010 nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Esta abordagem deve ser dada desde os anos iniciais do ensino fundamental, perceber a preocupação em tratá-la com mais rigor desde os PCN, através dos temas transversais, fortalecendo-se ainda mais com a BNCC.

De acordo com Motta (2013), as histórias em quadrinhos são estruturas narrativas formadas pela sequência de pictogramas no quais são inseridos elementos da escrita fonética. Segundo Farias (2001), os pictogramas é parte de um conjunto de símbolos gráficos, em sua maioria figuras, que visualmente representa objetos, ações ou conceitos. Por outro lado, as HQs são únicas por conter elementos verbais e não verbais, fazendo com que haja uma formação de uma linguagem sofisticada e com expressões ilimitadas (FRANCO, 2008, p. 25).

Devido a essas considerações, podemos utilizar as HQs como uma proposta didática, porque mostra aos alunos diferentes formas de absorver o conteúdo de modo muito descontraído. Uma HQ, em certos momentos, pode tornar-se mais imersivo que uma aula convencional, isso auxiliaria o estudante a compreender o conteúdo contido no quadrinho (NEVES, 2012).

A finalidade principal deste trabalho é apresentar o uso das HQs como ferramenta didática para ensino de química, no qual especialmente tratarmos os conteúdos ácidos e base, funções orgânicas e estequiometria. Tendo como objetivos específicos: a) tornar o ensino de química mais agradável para os discentes das escolas públicas; b) valorizar as artes através da educação científica; c) buscar novos métodos de ensino para a valorização dos conteúdos básicos de HQs; d) buscar a curiosidade de cada estudante através das histórias em quadrinhos.

2. METODOLOGIA

A metodologia consistiu na realização de oficinas didático - pedagógicas para instruir os estudantes na técnica de criação de HQs e a sua aplicação para o ensino de conteúdos básicos de Química. A abordagem da pesquisa foi do tipo pesquisa-ação desenvolvida com os estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José Rodrigues de Ataíde, localizado na cidade Itatuba – PB, como também para estudantes do primeiro e períodos intermediários do curso de Licenciatura em Química da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), localizada na Cidade de Campina Grande – PB. O processo metodológico foi suportado, inicialmente, num pré-questionário, sendo que depois da aplicação da oficina com as HQs confeccionadas, foi aplicado também um pós-questionário. Seguidamente, os estudantes do ensino médio e também, os universitários receberam HQs dos conteúdos ácidos e base, funções orgânicas e estequiometria, previamente pensados e adaptados as suas realidades. E novamente, eles foram confrontados com o ato de confeccionar as HQs por meio da aplicação do pós-questionário.

3. DESENVOLVIMENTO

Desenho é uma forma de manifestação da arte, o artista transfere para o papel imagens e criações da sua imaginação. É basicamente uma composição bidimensional constituída por linhas, pontos e forma. É diferente da pintura e da gravura em relação à técnica e o objetivo para o qual é criado. O desenho é utilizado nos mais diversos segmentos profissionais, tornando a arte diversificada a diferentes contextos. Existe o desenho de projetos, onde é trabalhada toda estrutura e detalhe de uma construção, há também o desenho de composição pictórica, quando o artista expressa no papel situações que estão ocorrendo em tempo real, esse tipo de desenho é bastante utilizado em tribunais durante julgamentos, em que a presença de câmeras fotográficas ou algo do gênero não é permitida, os desenhistas tentam retratar de forma mais real possível todos os momentos e detalhes do julgamento, para que, quando outras pessoas olharem o desenho tenham a sensação de que estavam presentes na cena (PERCÍLIA, 2017).

As HQs nascem como gênero em 1895, com a publicação da primeira tirinha que convencionou a utilização de sua linguagem, tal qual conhecemos hoje (FERNANDES. 2006). Atualmente, os quadrinhos são amplamente utilizados em disciplinas como língua portuguesa, sociologia, história, filosofia, dentre outras, porém podemos utilizá-la em outras áreas, como as ciências exatas e da natureza. O ensino da química não

foge à regra das disciplinas em que os estudantes possuem dificuldade, então, utilizar os quadrinhos como metodologia em sala de aula, visando auxiliar no ensino da mesma, acaba tornando-se algo de interesse, tanto dos alunos quanto dos professores.

De acordo com Silva e Galvão (2009), a arte é componente fundamental no processo de formação do ser humano. No momento em que se discute a educação com o objetivo de preparar-nos para o exercício da cidadania, com conhecimentos que acumulamos durante todo o nosso processo de aprendizagem, nos torna capazes de inserir-nos na realidade de forma a modificá-la de maneira positiva, indubitavelmente, a arte é crucial para o desenvolvimento da criatividade e abstração humana.

Por lidar com elementos humanísticos, a utilização dos quadrinhos, que passamos a considerar como mais um dos diversos tipos de arte, deve ser apresentado ou estudado como algo familiar e mais profundo, sobretudo, quando envolver conteúdos de disciplinas que integram o currículo escolar de estudantes do ensino médio e universitário.

Tendo em vista estas considerações, podemos então citar os vários tipos de quadrinhos existentes. Apesar de ter começado nos Estados Unidos da América (EUA), as comics (DUTRA, 2002) acabaram se espalhando pelo mundo, integrando os diversos estilos de arte e cultura de cada local, no Brasil as HQs são chamadas de histórias em quadrinhos, em Portugal são chamadas de bandas desenhadas (SANTOS e GANZAROLL, 2011) e no Japão são chamados de mangás, cada qual com o seu estilo, mas a essência é a mesma, são quadros com pictogramas onde temos uma estrutura de narração (UETA e GUSHIKEN, 2011).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudantes possuem uma certa dificuldade de estudar a disciplina de química, além de apresentar rejeição à mesma, então a utilização de HQs pode auxiliar os alunos a compreenderem melhor o conteúdo devido a serem expostos a uma leitura totalmente diferente do livro didático.

De início, a maior parte dos estudantes estudavam química somente para “passar de ano”, tanto no ensino básico, quanto na Universidade. Com a realização das oficinas, os estudantes adquiriram um interesse para as atividades lúdica da HQs e alguns até passaram a gostar dos conteúdos ao invés de ter aversão. Enfim, constatou-se uma motivação dos estudantes diante da nova proposta além do que eles já estavam acostumados, despertando-os a curiosidade e incentivo para o aprendizado dos conceitos básicos da disciplina de química.

Os resultados da pesquisa foram satisfatórios, pois, inicialmente, os conhecimentos prévios dos estudantes atestaram que eles não enxergavam a arte como um meio de ensino e após a aplicação das oficinas, houve uma melhor uma aceitação dos conteúdos básicos de química, tornado melhor a abordagem de ensino, motivando e inovando como recurso pedagógico.

Torna-se imprescindível que os estudantes consigam trabalhar com a utilização de quadrinhos, pois é o mesmo que irá fazer a ponte entre os quadrinhos e o conteúdo abordado em sala de aula. Torna-se fundamental, então, o professor ter essa qualificação no que diz respeito a trabalhar com o conteúdo em sala de aula, para saber com que elementos de determinados quadrinhos devem ser trabalhados para uma maior compreensão por parte dos docentes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos então considerar as HQs como uma importante ferramenta didática em sala de aula, pois diante do que foi exposto, consideramos como uma forma de ver determinado conteúdo exposto pelo professor de uma forma diferente, sendo está enxergada de maneira descontraída e sem o rigor de uma aula convencional.

Temos, então, a utilização das histórias em quadrinhos como fundamental para a aprendizagem dos docentes na disciplina, pois ela proporciona uma releitura do conteúdo exposto em forma de aula de uma forma diferente e apresenta uma interdisciplinaridade, onde trabalhamos com elementos referentes a diversas disciplinas, como artes e português. Essa interdisciplinaridade contribui para um conhecimento mais aprofundado por parte do estudante.

REFERÊNCIAS

- [1] DUTRA, J. P. Histórias e Histórias em Quadrinhos a Utilização das HQS com Fonte Histórica Política – Social. Ilha de Santa Catarina (SC) 2002.
- [2] FARIAS, P. Fontes que não servem para escrever: algumas considerações sobre 141 o status tipográfico dos dingbat. Revista da ADG (Associação dos Designers Gráficos), São Paulo, p. 49 - 51, 01 mar. 2001.
- [3] FRANCO, E. HQ Expandida: das HQ trônicas Aos Plug-Ins De Neocortex. VENTURELLI, S. e ROCHA, C. (Orgs.). Anais do 15 Encontro Internacional de Arte e Tecnologia Brasília, Brasil: Universidade de Brasília, 2016.
- [4] FERNADES, V. S. Quadrinhos: Eu Entendi as Referências de Alan Moore: Watchmen 1986-1987 E V De Vingança 1982 Universidade do Sagado Coração – Bauru – SP 2016.
- [5] PERCÍLIA, E. "Desenho"; Brasil Escola. Disponível em <<http://brasilecola.uol.com.br/artes/desenho.htm>>. Acesso em 29 de outubro de 2017.
- [6] MOTTA, R. L.; CORREIA, W. F. Design De Histórias em Quadrinhos Digitais. SBC – Proceedings of SBGames, 2013 Art & Design Track – Full Papers.
- [7] NEVES, C. S. A História Em Quadrinhos Como Recurso Didático em Sala de Aula. Universidade Aberta do Brasil. Universidade de Brasília Instituto de Artes. Departamento De Artes Visuais. Palmas - Tocantins 2012.
- [8] SANTOS, M. O.; GANZAROLLI, M. E. Histórias em Quadrinhos: Formando Leitores. TransInformação, Campinas, 23(1):63-75, jan./abr., 2011.
- [9] SILVA, M. B.; GALVÃO, A. M. O. Concepções de Arte na Educação. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.35, p. 141-159, set.2009.
- [10] UETA, T. M.; GUSHIKEN, Y. Mangá em Cuiabá: Circulação e Consumo de Cultura Pop Japonesa no Centro Geodésico da América do Sul. Universidade Federal de Mato Grosso – Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, 2011.

Capítulo 2

Prestação de consultoria técnica para plano de manutenção predial das Escolas Municipais da Cidade de Monteiro-PB

Drially Aline Santos de Moraes

Emerson Renildo Silva Santos

Gustavo Cavalcanti Concerva

Eduardo da Cruz Teixeira

Camila Macêdo Medeiros

Resumo: Atualmente, está cada vez mais frequente a ocorrência de diversos desastres em edificações devido à falta de manutenção predial, como o incêndio que destruiu o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que acabou com um dos acervos históricos culturais mais importante do país, e o incêndio que causou o desmoronamento de um prédio no centro de São Paulo, resultando em diversas vítimas fatais e feridos. A manutenção predial visa preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações, incluindo todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho decorrente da deterioração dos seus componentes, ou de atualizações nas necessidades do seu usuário (ABNT NBR 5674/2012). Diante disto, este trabalho teve como objetivo a elaboração do Plano de manutenção predial de unidades escolares do município de Monteiro/PB, de acordo com a NBR 5674/2012, através de inspeções locais, laudos técnicos e assessoria aos gestores das unidades escolares e à Secretaria de Educação Municipal. Durante a execução do projeto, foram feitas visitas à Secretaria de Educação do Município de Monteiro; à Escola Municipal Napoleão Santa Cruz Neto; à Creche Municipal Francisca Mineiro Silva. Em ambas as edificações foram observados problemas relativamente pequenos na estrutura como trincas no piso e rachaduras, além de infiltrações. Todas as patologias encontradas merecem uma atenção, porém inicialmente constatou que não há, ainda, um risco para os usuários, entretanto, caso continue sem a devida manutenção, pode agravar.

Palavras-chave: Manutenção, Escolas, Edificações.

1. INTRODUÇÃO

A manutenção predial visa preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações, incluindo todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho decorrente da deterioração dos seus componentes, ou de atualizações nas necessidades dos seus usuários (ABNT NBR 5674/2012).

Nesse contexto é inviável, sob o ponto de vista econômico, e inaceitável, sob o ponto de vista ambiental, considerar as edificações como produtos descartáveis, passíveis da simples substituição por novas construções quando os requisitos de desempenho atingem níveis inferiores àqueles exigidos pela ABNT NBR 15575/2013. Isto exige que a manutenção das edificações seja levada em conta tão logo elas sejam colocadas em uso (ABNT NBR 5674/2012).

Segundo Martins (2008), a manutenção preventiva representa um conjunto de atividades que visa evitar falhas nas instalações, com o comprometimento da sua performance.

De acordo com Creder (2007), toda a instalação deve ser periodicamente verificada por pessoas credenciadas ou qualificadas, com uma frequência que varia de acordo com a importância da instalação. A manutenção recupera e conserva a capacidade funcional de sistemas e elementos construtivos, ela não tem como objetivo principal o de reformar ou alterar características de projeto, apesar de alertar quanto a isso e propor estudos de intervenção (IBAPE, 2009).

Para Lacerda et al. (2016), a manutenção em prédios públicos, mais especificamente, unidades escolares, deve ser levada em conta, tendo em vista manter sua funcionalidade, que não é somente a de abrigar os usuários, como também desempenhar função social, proporcionando segurança e bem-estar.

A Manutenção Predial em escolas públicas não é tratada de forma preventiva, pois o que ocorre é o ato de consertar o que foi quebrado ou estragado (FONSECA, 2010). Manzano e Matos (2006) diz que a falta de manutenção preventiva em instituições públicas de ensino tem comprometido cerca de 10% das vagas disponibilizadas pela rede estadual de educação.

O objetivo deste trabalho consiste na elaboração do Plano de manutenção predial de unidades escolares do município de Monteiro/PB, de acordo com a NBR 5674/2012, através de inspeções locais, laudos técnicos e assessoria aos gestores das unidades escolares e a Secretaria de Educação Municipal.

2. METODOLOGIA

As Principais atividades consistiram, primeiramente em realizar uma leitura e revisão bibliográfica atualizada com toda a equipe. Com a finalidade de dar andamento ao projeto de forma adequada. Além disso, foram realizadas reuniões quinzenais com a equipe e semanais com o bolsista para as demandas urgentes. A partir das reuniões, foram feitas visitas às escolas, por meio de agendamento junto a Secretaria de educação do município, com o intuito de fazer a inspeção predial da edificação.

Após as visitas, foi elaborado o Plano de manutenção predial, com base na ABNT NBR 5674- Manutenção de edificações- Requisitos para o sistema de gestão e manutenção.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O primeiro imóvel visitado trata-se da Escola Municipal Napoleão Santa Cruz Neto, localizada na Rua Sizenando Rafael, na cidade de Monteiro-PB.

Imagem 1: Fachada da Escola Napoleão Santa Cruz Neto

Fonte: Autor

A edificação possui 6 salas de aula; 1 sala dos professores; 1 sala do diretor; 1 recepção; 1 secretaria; 4 sanitários; 1 pátio; 1 laboratório; 2 reservatórios de água potável; 1 área de serviço; 1 cozinha e 1 dispensa.

As patologias encontradas na sala de leitura e no pátio consistiram em fissuras na alvenaria e no pátio, respectivamente.

Imagens 2 e 3: Fissuras na Alvenaria e nos pilares

Fonte: Autor

Outras patologias também foram observadas na edificação, como infiltração nas tubulações de ar condicionado e rachaduras na alvenaria.

Imagens 4 e 5: infiltração e rachaduras na alvenaria

Fonte: Autor

O segundo imóvel visitado foi a Creche Municipal Francisca Mineiro Silva, localizada Rua José Marcelino Pereira, na cidade de Monteiro-PB.

Imagem 6: Fachada da Creche Francisco Mineiro Silva

Fonte: Autor

A edificação possui 9 salas de aula; 1 sala dos professores; 1 sala do diretor; 1 recepção; 1 secretaria; 5 sanitários; 1 almoxarifado; 1 pátio; 1 anfiteatro; 1 lactário; 1 refeitório; 1 cozinha; 1 área de serviço; 1 brinquedoteca; 1 depósito; 2 reservatórios de água e 1 dispensa.

As patologias encontradas foram trinca no piso e rachaduras na alvenaria, sendo ambas localizadas na área externa.

Imagens 7 e 8: Trincas no piso e rachaduras na alvenaria

Fonte: Autor

Ambas as edificações são relativamente novas e bem conservadas, não apresentando patologias graves, no entanto, é importante a execução de manutenções periódicas não só preventivas mas também corretivas.

A partir disso, foram elaborados planos de manutenção preventiva e corretiva com a finalidade de oferecer informações básicas e objetivas para a execução da manutenção.

Tabela 1: Plano de manutenção preventiva

Adaptação da tabela A1 NBR 5674/2012				
Período	Sistema	Elemento/Componente	Atividade	Responsável
Diariamente	Sistemas hidrossanitários	Reservatório de água potável	Verificar nível dos reservatórios e o funcionamento das bóias.	Servidor da unidade
A cada 15 dias	Sistemas hidrossanitários	Bomba de água potável e água servidas	Verificar o funcionamento e alternar a chave no painel elétrico para utilizá-las em sistema de rodízio, quando aplicável.	Servidor da unidade
A cada 1 mês	Revestimento de parede e piso/ teto	Pedras naturais (mármore, granito e outros)	Verificar e se necessário, encerar as peças polidas.	Servidor da unidade
	Sistemas hidrossanitários	Ralos, grelhas, calhas e canaletas	Limpar o sistema das águas pluviais e ajustar a periodicidade em função da sazonalidade, especialmente em época de chuvas intensas.	Servidor da unidade
		Bombas de incêndio	Testar seu funcionamento, observada a legislação vigente.	Equipe de manutenção/Empresa capacitada

(Continuação)

Tabela 1: Plano de manutenção preventiva

Adaptação da tabela A1 NBR 5674/2012

Período	Sistema	Elemento/Componente	Atividade	Responsável
A cada três meses	Esquadrias de alumínio	Esquadrias de alumínio	Efetuar limpeza geral das esquadrias e seus componentes.	Servidor da unidade
	Sistemas hidrossanitários	Caixas de esgoto, de gordura e de águas servidas	Efetuar limpeza geral.	Equipe de manutenção/ Empresa capacitada
A cada ano	Estrutural	Lajes, vigas e pilares	Verificar a integridade estrutural conforme ABNT NBR 15575.	Empresa especializada
	Impermeabilização	Áreas molhadas internas e externas, piscinas, reservatórios, coberturas, jardins, espelhos d'água	Verificar sua integridade e reconstituir a proteção mecânica, sinais de infiltração ou falhas da impermeabilização exposta.	Equipe de manutenção /Empresa capacitada
	Rejuntamentos e vedações	Rejuntamentos e vedações	Verificar sua integridade e reconstituir os rejuntamentos internos e externos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, peças sanitárias, bordas de banheiras, chaminés, grelhas de ventilação, e outros elementos.	Equipe de manutenção/ Empresa capacitada
	Revestimentos de parede, piso e teto	Paredes externas / fachadas e muros	Verificar a integridade e reconstituir, onde necessário	Equipe de manutenção/ Empresa capacitada
	Adaptação da tabela A1 NBR 5674/2012 (Continuação)			
	Revestimentos de parede, piso e teto	Piso acabado, revestimento de paredes e tetos	Verificar a integridade e reconstituir, onde necessário	Equipe de manutenção/ Empresa capacitada
A cada ano	Esquadrias em geral	Esquadrias em geral	Verificar falhas de vedação, fixação das esquadrias, guarda-corpos, e reconstituir sua integridade, onde necessário	Empresa especializada
		Esquadrias em geral	Efetuar limpeza geral das esquadrias incluindo os drenos, reapertar parafusos aparentes, regular freio e lubrificação Observar a tipologia e a complexidade das esquadrias, os projetos e instruções dos fornecedores	Empresa especializada

(continuação)

Tabela 1: Plano de manutenção preventiva

Adaptação da tabela A1 NBR 5674/2012				
Período	Sistema	Elemento/Componente	Atividade	Responsável
A cada ano	Vidros e seus sistemas de fixação	Vidros e seus sistemas de fixação	Verificar a presença de fissuras, falhas na vedação e fixação nos caixilhos e reconstituir sua integridade, onde necessário	Empresa especializada
	Sistemas hidrossanitários	Tubulações	Verificar as tubulações de água potável e servida, para detectar obstruções, falhas ou entupimentos, e fixação e reconstituir a sua integridade, onde necessário	Equipe de manutenção/ Empresa capacitada
		Metais, acessórios e registros	Verificar os elementos de vedação dos metais, acessórios e registros	Equipe de manutenção
	Sistema de cobertura	Sistema de cobertura	Verificar a integridade estrutural dos componentes, vedações, fixações, e reconstituir e tratar, onde necessário	Equipe de manutenção/ Empresa capacitada
A cada dois anos	Esquadrias e elementos de madeira	Esquadrias e elementos de madeira	Verificar e, se necessário, pintar ou executar tratamento específico recomendado pelo fornecedor	Equipe de manutenção/ Empresa capacitada
	Esquadrias e elementos de ferro	Esquadrias e elementos de ferro	Verificar e, se necessário, pintar ou executar tratamento específico recomendado pelo fornecedor	Equipe de manutenção/ Empresa capacitada
	Instalações elétricas	Tomadas, interruptores e pontos de luz	Verificar as conexões, estado dos contatos elétricos e seus componentes, e reconstituir onde necessário	Equipe de manutenção/ Empresa capacitada/ Empresa especializada
A cada três anos	Fachada	Fachada	Efetuar lavagem, verificar os elementos e, se necessário, solicitar inspeção, atender às prescrições do relatório ou laudo de inspeção	Equipe de manutenção/ Empresa capacitada/ Empresa especializada

Tabela 2: Plano de manutenção corretiva

Plano de manutenção predial corretiva			
Serviço à executar	Prazo	Profissional	Quantidade
Reparação de fissuras na alvenaria	Planejamento conforme verba disponível	Empresa Terceirizada	1
Recuperação de rachaduras na alvenaria	Planejamento conforme verba disponível	Empresa Terceirizada	1
Aplicação de impermeabilizante em regiões com infiltração	Planejamento conforme verba disponível	Empresa Terceirizada	1
Recuperação de trincas no piso	Planejamento conforme verba disponível	Empresa Terceirizada	1
Projeto para acessibilidade de acordo com a NBR 9050 na Escola Napoleão Santa Cruz Neto	Planejamento conforme verba disponível	Profissionais Terceirizados	1

Por se tratar de uma edificação pública, a execução do serviço de manutenção depende de fatores primordiais como disponibilidade de verba e de materiais necessários.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, em nosso trabalho buscamos propor ações de manutenção preventivas e corretivas nas escolas municipais da cidade de Monteiro/PB, a fim de contribuir para o bom funcionamento das edificações e consequentemente para o bom desempenho das atividades educacionais. Através das inspeções, encontramos patologias como fissuras e rachaduras na alvenaria, além de infiltrações e trincas no piso, tais problemas não apresentam um risco para os alunos e funcionários, porém, é importante que haja a manutenção adequada para garantir o bom funcionamento das edificações.

Ademais, ressaltamos a importância de novos projetos direcionados à manutenção de edificações públicas, podendo abranger não somente unidades escolares, mas também, edifícios públicos em geral.

REFERÊNCIAS

- [1] ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio de Janeiro. NBR5674:2012 – Manutenção de edificações – Procedimento. Rio de Janeiro: 2012.
- [2] ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio de Janeiro. NBR 15.575-Edificações Habitacionais – Desempenho – Requisitos Gerais —2013.
- [3] Creder, Hélio, Instalações Elétricas, 15a Edição, LTC, 2007.
- [4] Fonseca, Flavio Formagio. Manutenção Predial Preventiva. Estudo de Caso - Colégio Estadual Marcelino Champagnat – Londrina - Pr. 2010. 98 pg. Monografia - Especialização em Construção de Obras Públicas - Universidade Federal do Paraná (UFPR). Londrina-Pr.
- [5] IBAPE/SP. Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo. Inspeção Predial - Checkup predial: guia da boa manutenção. Leude, 2009.
- [6] Lacerda, Diego Jorge de Melo; Conceição, Gustavo Aparecido da; Yonamine, Marcelo. Manutenção em Escolas Públicas. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência parcial para obtenção do título de Engenheiro Civil à Universidade Santa Cecília, 2016.
- [7] Manzano, Reginaldo de Matos; Matos, Waldir da Silva. Elaboração e Desenvolvimento de um Manual Prático de Manutenção Preventiva Destinado a Instituições Públicas de Ensino. Monografia – Centro de Estudos de Desenvolvimento Empresarial e Tecnológico. Londrina: UNIFIL/2007.

Capítulo 3

A Benzedura como ofício tradicional no Semiárido Piauiense

Alaine Alves da Silva Luz

Cláudia Regina Coelho Gomes

Gelson Pereira de Andrade

Maria Alvenir Barros Vieira

Adauto Neto Fonseca Duque

Resumo: O objetivo do presente artigo científico é apresentar uma primeira reflexão sobre os saberes e as práticas tradicionais dos rezadores e benzendeiras no semiárido piauiense. Procuramos evidenciar as diferentes formas de aquisição, execução e transmissão desses saberes nos dias atuais, assim como elencar algumas rezas por eles pronunciadas como procedimentos de cura. O trabalho é resultado de uma pesquisa de campo e bibliográfica que teve na entrevista semiestruturada com duas benzendeiras e um rezador de três cidades do semiárido piauiense: Picos, Paulistana e Sussuapara, o principal instrumento de coleta de dados. A análise qualitativa dos dados foi realizada a luz dos pressupostos teóricos de Chartier (1990), Alberti (2004), Sousa (2013), Quintana (1999) e Santos (2009), dentre outros autores, e a partir dela podemos inferir que a memória dessa prática permanece viva no semiárido piauiense até os dias atuais por intermédio dos sujeitos praticantes através do exercício diário do ofício de curar através da reza.

Palavras-chave: Benzedura. Semiárido. Piauí. Tradições. Reza

1. INTRODUÇÃO

A prática da benzedura como um ofício da cura de doenças físicas e espirituais está presente na sociedade brasileira desde os tempos coloniais. Nesse período, essas práticas foram alvo de perseguição pela igreja católica, sendo criticadas como atos de bruxaria, atualmente elas apresentam uma forte correlação e influência do catolicismo. Desde essa aproximação com a Igreja, a benzedura vem sendo compreendida como práticas de cura de doenças físicas espirituais alcançadas através da fé e abençoadas por Deus.

Conforme entendimento de Sousa (2013), o vínculo construído com a Igreja católica, permitiu que alguns praticantes de benzeduras caracterizassem esse saber não como algo que foi adquirido historicamente, instruído por meio de outras pessoas, mas sim um dom privilegiado que lhes foi dado por Deus. Por conseguinte, o termo curandeirismo foi substituído por benzedura e as práticas dos rezadores como um fenômeno respaldados por santos milagreiros.

Sousa (2013) observa, ainda, que por conta desse reconhecimento e de outros fatores de ordem financeira, as pessoas passaram a privilegiar os rezadores deixando de lado até mesmo consultas feitas por um médico formado, afinal, as rezas e ervas se tornaram certeza de cura para aquelas pessoas. Conclui a autora supracitada que a partir dessa perspectiva se expandiu o número de rezadores e benzedeiros no Brasil tanto na zona rural quanto na zona urbana.

Questionamos na pesquisa desenvolvida, como os saberes tradicionais relacionados a arte da cura por exercício da reza sobrevivem nos dias atuais diante do avanço de inúmeras tecnologias que amparam a prática médica científica? Interessa-nos analisar as atividades de cura das benzedoras e benzedores piauienses, tendo como suporte a pesquisa de campo, com fundamentação qualitativa. No decorrer do trabalho serão abordados alguns fatores como: o contexto histórico da aquisição de seus saberes, a execução do saber tradicional aqui estudado além das formas de transmissão para as gerações mais jovens no contexto de uma sociedade globalizada e cada vez mais amparada pelos recursos da tecnologia.

As narrativas aqui apresentadas foram obtidas através de entrevistas semiestruturadas a partir das técnicas de história oral delineadas por Alberti (2004). Conforme entendimento do autor, a história oral fundamenta-se na realização de entrevistas com sujeitos históricos que presenciaram ou testemunharam acontecimentos ou conjunturas em determinados tempos e contextos. Nessa perspectiva, entrevistar os mestres das benzeduras no semiárido piauiense significa recuperar memórias e resgatar experiências de histórias vividas através do trabalho com o testemunho oral de indivíduos ligados por traços comuns.

As análises elaboradas foram construídas a partir dos pressupostos conceituais delimitados por Chartier (1990, p.23) em torno do termo práticas culturais, por entendermos os ofícios da cura através de rezas como um saber fazer tradicional que articulado à outras práticas (políticas, sociais, discursivas) permite ao sujeito histórico “[...] reconhecer uma identidade social, exibir uma maneira própria de estar no mundo, significar simbolicamente um estatuto e uma posição”.

Como considerações finais nos é possível afirmar que a memória dessa prática permanece no semiárido piauiense até os dias atuais por intermédio dos sujeitos praticantes desse saber, pautada pelos acontecimentos históricos que possuem nos seus determinados ofícios. Cada geração possui sua própria identidade, caracterizada não só pela forma dos seus conhecimentos ou práticas da arte da cura através das rezas, mas também pelos fatores que impediam tal prática. Em contrapartida observamos também as semelhanças e dessemelhança desses sujeitos, suas práticas, ofícios e reconstrução dos seus saberes. Fatores esses que contribuem para a permanência de um valioso saber oral e caracterizado como ato de amor ou dom instituído por Deus.

2. METODOLOGIA

O trabalho de investigação por nós realizado, se caracteriza como uma pesquisa Histórico Cultural em seus entrelaçamentos interdisciplinares com a História da Educação, podendo ser classificada como do tipo descritiva com abordagem qualitativa das fontes de informação. Adotamos como recorte espacial da investigação parte do território brasileiro conhecido como a região centro sul do Piauí – semiárido piauiense.

As localidades envolvidas na pesquisa – Picos, Paulistana e Sussuapara – assim como os sujeitos partícipes, foram selecionados a partir indicações aleatórias, ou seja, a uma *amostragem teórica* (FLICK, 2009) considerando que em um primeiro momento não foi possível conhecer, de fato, a localização dos espaços e nem a extensão dos sujeitos que poderiam ser envolvidos na pesquisa.

Por conseguinte, a seleção aconteceu por contatos prévios com algumas secretarias municipais de cultura, com os sindicatos de trabalhadores rurais, com os movimentos eclesiais de base, com os sindicatos de professores, entre outras organizações de movimentos sociais, que realizam trabalhos de caráter artístico e cultural com crianças e jovens no semiárido piauiense.

Para a tessitura do texto, selecionamos somente as narrativas de 3 (três) benzedores tradicionais sendo 2 (duas) bezendeiras e 1 (um) rezador, moradores de três cidades do semiárido piauiense: Picos, Paulistana e Sussuapara. O roteiro das entrevistas semiestruturadas que realizamos com eles foram cuidadosamente estruturado em 4 (quatro) eixos: 1) trajetória de vida dos mestres; 2) saberes e práticas tradicionais do seu domínio; 3) formas de aprendizagem; c) formas de ensinamento e aprendizes. Conforme autorização dos entrevistados por Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), as entrevistas puderam ser gravadas e/ou filmadas, além de fotografadas.

A análise dos dados percorreu 3 (três) etapas: pré-análise do roteiro e as respostas, exploração do material obtido e tratamento dos resultados com inferências e interpretações à luz da literatura teórico-metodológica selecionada.

3. DESENVOLVIMENTO

Para saber como se dá a construção das identidades culturais de benzedoras e benzedores é necessário compreender o significado da palavra e do ato de benzer no Brasil. Segundo levantamento realizado por Melo (2017, p. 6) benzer consiste no ato de dar a bênção, é “[...] o ato de benzer inicia-se com a benzedora fazendo o sinal da cruz em gestos compassados e em seguida realizando as orações junto ao doente”. Para Quintana (1999), a benzedura pode ser qualificada como um exercício principalmente terapêutico, realizada pela ligação entre aquele que precisa ser benzido e aquele que benze, sendo que este desempenha um papel de intermediador entre o santificado e o humano visando a restauração e uma boa disposição por meio de algum tipo de prece.

A pessoa que pratica a benzedura possui conhecimentos formais e informais sobre essas práticas, que na maioria das vezes, são transmitidos pela tradição oral. De acordo com Santos (2009), geralmente são pessoas do sexo feminino que consomem as benzeduras, acionando conhecimentos do catolicismo como súplicas e rezas em prol de recuperar o equilíbrio psicofisiológico dos indivíduos que procuram sua ajuda. Para benzer podem ser utilizados diversos elementos como ramos verdes, linha e pano, gesticulando com a mão direita o sinal da cruz, diversas rezas, entre outros. Muitas vezes, não é necessário que o cliente esteja presente, como a intenção é afastar os males de pessoas, animais ou objetos, portanto basta alguém dizer o seu nome e o endereço.

Em alguns lugares, as praticantes de rezas são chamadas de curandeiras, em outros de rezadeiras e noutros de benzedoras. Neste trabalho, optou-se pelo uso dessa última nomenclatura por ser a mais utilizada pelos habitantes do semiárido piauiense. As mulheres benzedoras e os homens benzedores estão presentes diversos lugares do Brasil, porém, é na região Nordeste que atuam com maior recorrência. Ao definir os sujeitos que exercem o ofício de benzer, Cascudo (2001, p.587), assim descreve: “Mulher, geralmente idosa, quem tem ‘poderes de cura’ por meio de benzimento”.

Oliveira (1985) também apresenta as mulheres as principais praticantes da benzedura:

Geralmente é a de que seja uma mulher casada, mãe de alguns filhos, pobre, que conheça rezas, ervas, massagens, cataplasmas, chás e simpatias, que tenha um quê de mistério, que lide com a magia, feitiçaria e bruxaria. E essa imagem corresponde àquilo que é a benzedora. Ela é tudo isso e um pouco mais. Ela é uma cientista popular que possui uma maneira muito peculiar de curar: combina os místicos da religião e os truques da magia aos conhecimentos da medicina popular (Oliveira, 1985, p.25).

No que tange a filiação religiosa das bezendeiras no Brasil, Santos (2007), observa que, geralmente, elas são consideradas católicas por apresentarem em suas bênções, alguns elementos referentes ao catolicismo. Todavia, no Rio Grande do Norte foram localizadas algumas benzedoras “evangélicas” e outra seguidora do “culto da jurema”. Sendo assim, não é correto afirmar que as benzeduras são práticas dos adeptos ao catolicismo, pois existem benzedoras e benzedores com diferentes crenças e religiões, que benzem de formas distintas com o intuito de curar as enfermidades psicológicas ou físicas daquele que está necessitando.

A prática desses conhecimentos, foram induzidos do campo para a cidade tanto por homens quanto por mulheres, essas são características que se diferenciam conforme a cultura local e a necessidade de cada população. É sobre a prática cultural no semiárido piauiense, que trataremos a seguir.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Atualmente os saberes tradicionais de benzer para curar as pessoas estão presentes principalmente no sertão nordestino. No Piauí, os ritos das benzeduras encontram-se presentes, principalmente, nas cidades com poucos habitantes. Essas pessoas são reconhecidas na comunidade onde habitam como seres experientes, de conhecimento inestimável e são respeitados por todos da região.

Especificamente no semiárido piauiense, a prática de benzer ainda permanece como um saber tradicionalmente reconhecido por muitos como nas cidades de Sussuapara, Paulistana e Picos. Nessas cidades foram encontradas duas benzedadeiras e um benzedeiro que praticam esse saber desde a sua infância. Conforme seus depoimentos, percebemos a valorização das pessoas com a sua prática e a procura constante pelas suas orações de cura. As rezas são praticadas em suas casas onde se utiliza apenas de plantas medicinais como: pião roxo, quebra pedra, dentre outros. Em alguns casos se utiliza apenas as palavras que são pronunciadas de forma rápida e acompanhadas de fé. Essas similitudes e diferenças nos foram relatadas em algumas minúcias que aqui apresentaremos através das narrativas dos mestres em rezas para curar Maria Antônia dos Anjos Filha, Raimundo Nonato Pereira e Nazaré Lima de Sousa

Tempo de aprender a rezar

Maria Antônia dos Anjos Filha, também conhecida como Dona Lurdinha, é natural da cidade de Sussuapara-PI, cidade pequena do semiárido piauiense com cerca de 6.000 (seis mil) habitantes. Filha de lavradores, Dona Lurdinha afirma que sempre seguiu a profissão dos pais, estudou apenas dois meses, pois não havia escolas na época de sua infância. Ela casou-se e teve três filhos. Durante a entrevista ela revela boa parte de sua infância, relatando as dificuldades encontradas na maioria das famílias que moravam na pequena cidade que naquela época era considerada município da cidade Picos.

Como de costume, as crianças daquela região gostavam de brincadeiras de roda. Mas a tradição considerada predominante entre as meninas era aprender a rezar com as mulheres mais velhas. A sua infância foi marcada por muita diversão, o ato de aprender a rezar era uma diversão extra após as brincadeiras de roda. Segundo ela: “As brincadeiras de minha infância era aprender a reza. Depois que nó rezava um bocado, aí era história de Trancoso que a mulher ensinava pra nós, quando acabava nós ia brincar de roda”. (Anjos Filha, 2018, p.02).

Como tradição da época, as meninas não trabalhavam [na roça] por serem muito novas e também não poderiam estudar por falta de escolas. Sua escolarização não aconteceu pela falta de condições dos pais em contratar um mestre-escola para todos os filhos. Apenas seu irmão aprendeu a ler e escrever, com um professor chamado Luiz Bilizaro. Com isso a preocupação das meninas era apenas aprender a rezar e as rezas de cura Anjos Filha (2018) diz ter aprendido aos 10 (dez) anos de idade com sua avó, Dona Rosalina, e uma vizinha, Dona Antônia. Essas mulheres se dedicavam um mês para ensinar cada menina a rezar, como também faziam reuniões nos terreiros das casas com todas as meninas. Ela relata que as mulheres mais velhas tinham bastante preocupação em repassar o saber tradicional das rezas para as meninas, para que a tradição fosse mantida até os dias atuais. Isso também ocorre devido à crença que as pessoas tinham da cura através das rezas e benzeduras.

Assim como Anjos Filha (2018) o mestre de reza Pereira (2018) foi educado nos saberes das rezas, distante dos bancos escolares. Raimundo Nonato Pereira nascido em 23 de fevereiro de 1923, nascido e criado em Barra, localidade pertencente à cidade de Paulistana-PI, é um rezador conhecido por toda a região e macrorregião. Seu Nonato da Barra, como é assim chamado por todos, é lavrador e casado com dona Maria há 60 anos, com quem teve dez filhos.

Ao falarmos da sua infância e quais as brincadeiras que o mesmo praticava, ele mostra em poucas palavras o quanto seus pais eram autoritários:

[...] nunca fui de brincadeira não toda vida fui sempre uma pessoa que foi furando brincadeira, fui criado pelo trabalho de campo, de roça, de tudo. Meus pais era muito carrasco, queria era que a gente trabalhasse e andasse direitinho pra num ter nenhuma confusão. (Pereira, 2018, 01).

Afirma, ainda, não ter sido escolarizado em nenhuma etapa da sua vida, mas ressalva a importância dos saberes aprendidos em suas experiências cotidianas. Em suas palavras “ [...] toda coisa que a gente faz a gente pega estudo, não tenho memória, mas meu estudo é pouco né, mas achei boa gente que me ensinasse boas obra aprendi quase sem fazer o estudo [...]”, (Pereira, 2018, p 01).

Entre os aprendizados adquiridos no transcurso das suas vivências, Pereira (2018) coloca em destaque o seu interesse por aprender a rezar, revelando que a busca por esse saber tradicional foi uma iniciativa dele:

Ah num foi gente conhecido daqui não, por onde eu andava eu procurava, ai eu procurava boas obra e dava um agradinho ai a memória era boa e eu aprendia. Eu procurava ai a pessoa dizia: você é um homi inteligente e você tem um dão [...] se você tiver um dão de rezar em gente não carece de você esgugitar, deixa está que Deus chega o dom de você achar uma pessoa e indicar toda oração do você rezar em gente. Você acha um veinho ou uma veinha que diz: ‘ô minha fia eu vou te ensinar’. Você vai dando um cruzado de fumo a ela, um tiquinho de açúcar pá tomar uma chirca de café, ai vai aprendendo, num é hoje que só quer é dinheiro não, naqueles tempo haver das coisas era mais fácil. (Pereira, 2018, p. 04).

Através de itinerário semelhante, aprendeu a rezar Nazaré Lima de Sousa. Nascida em uma cidadezinha do semiárido piauiense, Santana-PI, onde viveu até seus vinte anos de idade, em uma família com 10 (dez) pessoas. Sousa (2018), teve 7 (sete) irmãos, passou sua infância ajudando seus pais na lida de casa e debulhando feijão para ser vendido na feira. Nas poucas horas vagas, costuma brincar de professora, comidinha e fabricar panelinhas de barro.

Quando mocinha, passou a frequentar uma escola que funcionava ao lado da paróquia e tinha como professor o coroinha da Igreja. Sua escolarização durou cerca de 3 (três) a 4 (quatro) anos, sendo interrompida pela decisão do pai em partir da cidade com a família intencionando melhorar as condições de sobrevivência. Conforme depoimento de Sousa (2018), somente aos 40 (quarenta) anos de idade aprendeu a rezar através de uma senhora que morava próximo de sua casa, o interesse em aprender essa prática partiu dela própria, só vendo a senhora rezar nas outras pessoas.

O perfil socioeconômico revelado por nossos entrevistados, confirmam as afirmações de Sousa e Cardoso (2016) quando descreve que a maioria absoluta dos praticantes do ofício de rezador possuem baixo poder aquisitivo e pouca ou nenhuma escolaridade. Confirma-se, também, através das entrevistas que o exercício desse ofício é geralmente praticado por mulheres, que construíram esse saber ao longo na sua vida por meio das mulheres mais velhas da região ou da família. Os homens desse ofício mais conhecidos como rezadores/benzedeiros, carregam seu histórico com base nos conhecimentos absorvidos pela fé, diferentemente das mulheres que se envolviam a aprender com as avós ou vizinhas.

A pratica da reza de cura

De acordo com as entrevistas realizadas durante o desenvolvimento desse trabalho, percebemos que a prática de benzer as pessoas tem a finalidade de curar malefícios à saúde humana sejam eles corporal e\ou espiritual. Comumente, as práticas da reza ocorrem no âmbito domiciliar do rezador, como revela Pereira (2018) as pessoas, quando doentes, procuram por ele espontaneamente, não existe divulgação, propaganda. Todavia, Anjos Filha (2018) afirma ter praticado a reza de cura até mesmo para hospitais a convite dos familiares dos doentes.

No exercício do ofício rezavam para a cura de vários malefícios como: dor de cabeça, cobreiro (uma doença que cria uma cinta vermelha na barriga), dor de garganta com campainha caída, quebrante, dirmintidura e vento caído, principalmente. O ritual da cura envolve o uso de três galhos pequenos de algumas plantas específicas a exemplo do pião roxo, arruda, mussambê, quebra pedra, no final de cada oração a galho da planta deve ser jogado fora. Sousa (2018) ressalva que seguindo a tradição do que lhe foi ensinado as rezas de cura só podem ser realizadas até às 18:00 horas sob o risco de não funcionarem.

Segundo Anjos Filha (2018), as rezas mais solicitadas pelas pessoas que a procuram são aquela destinadas a curar quebrante, dor de cabeça e dirmintidura:

Reza para curar quebrante

Quebrante te botaram.

Com três tiraria.

Os três que te botou.

Com três tiraria.

Com a graça de Deus,

E da virgem Maria. (recitar 3 vezes).

Logo em seguida, reza um pai nosso, uma ave Maria e santa Maria e oferece a nosso senhor Jesus Cristo.

a) **Reza para curar a dor na cabeça**

Sol brilhante que no céu foi criado.

Lua, sol e sereno.

Sai da cabeça de (diz o nome da pessoa)

Para não fazer morada. (recitar 3 vezes)

Reza um pai nosso, ave Maria e Santa Maria e oferece a nosso senhor Jesus Cristo.

b) **Reza para dirmintidura**

Carne quebrada.

Osso rendido.

Dirmintidura, triadura.

Assim eu cozo para São Furtuoso (recitar 3 vezes).

Reza um pai nosso, ave Maria e Santa Maria e oferece a nosso senhor Jesus Cristo.

Observamos que os benzedores do semiárido piauiense costumam acreditar mais em curas com remédios caseiros feitos com ervas ou rezas de que em medicamentos industrializados e vendidos em farmácias por essa razão, sempre que alguém procura por suas orações além das rezas eles costumam fazer indicações de remédios caseiros, denominados de chás e garrafadas. Segundo Boing e Stancik (2013), essa prática de receitar infusões de ervas nos possibilita constar que os rezadores possuem um certo conhecimento sobre as plantas medicinais, procedimentos de cura e saberes religiosos.

A socialização dos saberes tradicionais da reza

A prática cultural de rezar para curar algumas doenças não se apresenta como um conhecimento fácil de ser transmitido nos tempos atuais. Seja pela mudança nas tradições das famílias dos rezadores, seja pelos efeitos de uma sociedade tecnológica onde o acesso à internet permite a “consulta médica” a qualquer momento, ou, seja pela crença dos rezadores de que quanto mais os saberes de cura são repassados, mais eles vão perdendo a força, o fato é que poucos são os rezadores ainda conhecidos nas cidades do semiárido onde realizamos a pesquisa.

Apesar de não seguir o costume de repassar as rezas para as jovens da família, Anjos Filha (2018, p. 05) permanece crente no poder do seu ofício de rezadora: “Eu acho assim, que toda uma vida a pessoa precisa de dôtô (médico), se num deu jeito, só da a reza. Abaixo de Deus é a reza. Aí tem que continua a reza. Eu digo que num vai acaba nunca, todo mundo tem fé em reza”.

Já para Pereira (2018), a reza de cura não é um conhecimento secular que possa ser ensinado ou aprendido por qualquer pessoa, é um dom. Deus é quem toca na pessoa para que identifique o dom do outro e indique as obras para a sua aprendizagem. Para ele não adianta procurar a reza se você não tem fé. Seus saberes não são repassados para nenhum de seus filhos ou para qualquer outra pessoa, pois segundo ele isso pode deixar a sua reza fraca. Movido pela fé ele apenas dispõe de um dom atribuído a ele por Deus. No seu parecer “Cada qual que aprendeu fica com si, nem os filhos a gente pode ensinar, porque se ensinar atrasa o rezador”. (Pereira, 2018, p. 03).

A exemplo dos outros rezadores entrevistados, Sousa (2018) não transmite os saberes tradicionais da reza de cura. Ressalva que o interesse tem que partir das próprias e que essa prática se adquire através de muita dedicação e, acima de tudo, fé. Mas reconhece que se tiver que ensinar a alguma menina o ofício de rezar para curar, repetiria os procedimentos através dos quais aprendeu: observa os rezadores, anotar a reza, ler, memorizar e aprender. Depois é só praticar, começando por malefícios pequenos como mal olhado, até chegar em problemas mais complexos como o cobreiro.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim como noutras partes do Brasil, as práticas tradicionais de cura através de rezas no semiárido piauiense surgiram a partir de uma miscigenação cultural de diferentes povos e saberes. Trata-se de uma tradição que, guardadas as alterações promovidas pelo tempo, permanece nas sociedades contemporâneas o reconhecimento da sua utilidade e significado.

No semiárido piauiense, a importância adquirida pelos rezadores por aqueles que acreditam na cura através das palavras de fé ou ervas é satisfatória para esses benzedeiros. Para eles essas práticas devem permanecer no mundo por toda a vida, eles acreditam que são necessárias assim como os médicos para a sociedade.

Nota-se que os conhecimentos sobre as benzeduras, são transmitidos de geração em geração. Embora não exista uma intencionalidade dos mestres benzedeiros em formar um grupo de aprendizes. Considerada um dom dado por Deus, o candidato a aprendiz deve sentir o chamado da fé e procurar o conhecimento da reza por conta própria. Talvez, por essa razão, o número de rezadores nunca seja o destaque dessa prática.

Observamos por fim, que permanece uma forte religiosidade e fé presente em todas as práticas de benzeduras. Destacando-se, sobremaneira, a conexão dos rezadores com o catolicismo.

REFERÊNCIAS

- [1] Alberti, V. Manual de história oral.. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getulio Vargas, 2004 (a). v. 1.
- [2] Anjos Filha, Maria Antônia dos. Maria Antônia dos Anjos Filha: depoimento [mai. 2018]. Entrevistadora: Alaine Alves da Silva Luz. Picos (PI): Universidade Federal do Piauí, 2018. Gravação digital em celular. Entrevista concedida ao Projeto de Extensão Sujeitos, saberes e práticas educativas\UFPI\Picos.
- [3] Boing, Lúcio; Stancik, Marco Antônio. Benzedeiros e benzimentos: práticas e representações no município de Ivaiporã/PR (1990-2011). Ateliê de História UEPG, 1(1): 85-96, 2013.
- [4] Calainho, Daniela Buono. Jesuítas e Medicina no Brasil Colonial. Tempo, Rio de Janeiro, nº 19, pp. 61-75. Disponível em: < <http://www.scielo.br/pdf/tem/v10n19/v10n19a05.pdf> >. Acesso em 10 out. 2018.
- [5] Cascudo, Luís da Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. 10. ed. São Paulo: Global, 2001.
- Calheiros, Karla Rachel Jarsen de Melo. A cura através da fé: Um olhar sobre as benzedoras/rezadeiras alagoanas. Belo Horizonte/MG, 2017. Disponível em: <<https://even3.azureedge.net/anais>>. Acesso em: 8 set. 2019.
- [7] Costa, Jakline; Cardoso, Karoline. Povos indígenas no Brasil: rituais da cura entre os indígenas do Brasil no século XVII. [S.l.]. 2016. Disponível em: <<http://povosindigenasdobrasil.blogspot.com/2016/07/rituais-da-cura-entre-os-indigenas-do.html?m=1> > Acesso em: 10 out. 2018.
- [8] Nascimento, Danielle Gomes do; AYALA, Maria Ignez Novais. As práticas orais das rezadeiras: um patrimônio imaterial presente na vida dos Itabaianenses. ISSN 1981- 4526.PPG-LET-UFRGS. Porto Alegre. vol. 09, n. 01. 2013.
- [9] Oliveira, E. R. de. O que é benzeção. São Paulo: Editora brasiliense, 1985.
- [10] Pereira, Raimundo Nonato. Raimundo Nonato Pereira: depoimento [mai. 2018]. Entrevistadora: Cláudia Regina Coelho Gomes . Picos (PI): Universidade Federal do Piauí, 2018. Gravação digital em celular. Entrevista concedida ao Projeto de Extensão Sujeitos, saberes e práticas educativas\UFPI\Picos.
- [11] Quintana, A. M. (1999). A ciência de benzedura: mau-olhado, simpatias e uma pitada de psicanálise. Bauru, SP: Edusc.
- [12] SANTOS, Francimário Vito dos. O ofício das rezadeiras como patrimônio cultural: religiosidade e saberes de cura em Cruzeta na região do Seridó Potiguar. Revista CPC, São Paulo, n. 8, p. 6-35, maio 2009/out. 2009.
- [13] SANTOS, Francimário Vito dos. O ofício das rezadeiras: um estudo antropológico sobre as práticas terapêuticas e a comunhão de crenças em Cruzeta. 197f. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2007.

- [14] Silva, Giselda Shirley da. A arte de benzer e uso das plantas medicinais: práticas e representações orais de benzedeiras e rezadores acerca do saber fazer em João Pinheiro (MG). Campinas, 2013.
- [15] Sousa, Nazaré Lima de. Nazaré Lima de Sousa: depoimento [mai. 2018]. Entrevistador: Gelson Andrade. Picos (PI): Universidade Federal do Piauí, 2018. Gravação digital em celular. Entrevista concedida ao Projeto de Extensão Sujeitos, saberes e práticas educativas\UFPI\Picos.
- [16] Sousa, Ronald Felipe Barreto. Pra curar tem que ter fé: Benzedeiras e rezadores- memórias de indivíduos numa perspectiva histórica. Universidade Estadual do Ceará (UECE), 2013.
- [17] Stancik, M.A. Medicina e Saúde no Brasil: dos pajés e físicos aos homens de ciência do século XX. Esboços. Vol.16, Nº 21, p. 111-136, 2009.
- [18] Viotti, Ana Carolina de Carvalho. As práticas e os saberes médicos no Brasil colonial (1677 1808). França: [s.n.], 2012. 179 f. Disponível em:
<https://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.franca.unesp.br/Home/Pos-graduacao/dissertacao-final_ana-carolina-viotti.pdf&ved=2ahUKEwjCsJuDhJPcAhVMlpAKHRkwDZ8QFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw0lmy1FjbQJA41Z21fYmsF>
Acesso em: 10 out. 2018.

Capítulo 4

Qualidade dos dados das declarações de nascidos vivos das mães adolescentes no Semiárido da Paraíba

Basílio Henrique Pereira Júnior

Carlos Sérgio Araújo dos Santos

Tiê Dias de Farias Coutinho

Neir Antunes Paes

Resumo: A maternidade na adolescência é uma situação em saúde delicada que requer atenção e estudos especializados. A avaliação dos registros vitais é uma importante fonte de informação muito pouco estudada do ponto de vista demográfico na saúde materno-infantil, particularmente quanto aos indicadores vitais. Teve-se como objetivo avaliar a qualidade dos dados das mães adolescentes a partir das declarações de nascimento de seus filhos para o período 2010 e 2015 do semiárido paraibano. Foi realizado o Teste Qui-quadrado de Pearson para avaliar as relações entre as variáveis: Duração da Gestação, Número de Consultas Pré-natal, Tipo de Parto e Peso ao nascer. Concluiu-se que o Semiárido da Paraíba está caminhando para a universalização dos registros da declaração de nascidos vivos no período estudado e que há evidências de associações entre essas variáveis cujo conhecimento pode ser visto para subsidiar o planejamento das ações de cuidado e proteção da saúde materno-infantil.

Palavras-chave: Semiárido Brasileiro, Qualidade dos Dados, Saúde Materna, Saúde do adolescente.

1. INTRODUÇÃO

As variáveis que constam na declaração de nascimento dos filhos das mães adolescentes mostram-se como importantes sinalizadores para detectar as condições de saúde materna-infantil e se prestam para auxiliar no planejamento das políticas públicas. A maternidade na adolescência, em muitos casos, pode ser considerada uma situação de vulnerabilidade infantil, tendo em vista que a gravidez adolescente é um problema de saúde pública (ANDRADE et al., 2019).

No Brasil, a região do Semiárido, com uma população de 22 milhões de habitantes (Censo de 2010) tem sido marcada historicamente por desigualdades socioeconômicas e dados deficientes nas estatísticas vitais. Observou-se no passado recente que as informações são subnotificadas que a qualidade do preenchimento das variáveis nas declarações de nascimentos não é completa. (PAES; MELO; BRAGA, 2017).

Sendo as estatísticas vitais a matéria-prima de importantes indicadores na saúde materna, para a produção de informações confiáveis em saúde é necessário que os dados possuam alta qualidade ou que, mesmo na presença de erros, possam ser detectados e corrigidos (PAES, 2018).

Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade das informações sobre as mães adolescentes geradas pelas declarações de nascimentos dos seus filhos no Semiárido da Paraíba e investigar possíveis associações entre as variáveis da saúde materno-infantil, no período de 2010 e 2015. Desta maneira, espera-se traçar um perfil da situação dessas estatísticas, que possam auxiliar a tomada de decisão da gestão em saúde em ações mais efetivas na rede assistencial do Semiárido paraibano para as mães adolescentes.

2. METODOLOGIA

2.1. FONTE E BASE DE DADOS

As fontes oficiais das declarações de nascimento são o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE; <http://www.ibge.gov.br>) e o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) do Departamento de Informática do SUS (<http://tabnet.datasus.gov.br>) do Ministério da Saúde.

Os dados básicos sobre nascimentos para este trabalho foram coletados através do Banco de Dados do SINASC. Este sistema objetiva não somente levantar o número real dos filhos nascidos vivos, tecnicamente conhecido como Declaração de Nascido Vivo (DN), em um espaço geográfico ano a ano, mas também, conhecer variáveis importantes para analisar as condições da saúde materna que estão presentes na DN.

As variáveis pesquisadas se referem diretamente à saúde da materno-infantil, as quais constam na DN foram: *consultas pré-natal*; *duração da gestação*; *tipo de parto* e *peso ao nascer*. A variável *duração da gestação* foi categorizada em *prematuro* (quando a criança nasceu com menos de 37 semanas de gestação) e *não prematuro* (quando nasceu com 37 semanas ou mais). A variável *peso ao nascer* foi categorizada em *baixo peso* (quando a criança nasceu com menos de 2500 gramas) e *não baixo peso* (quando ela nasceu com 2500 gramas ou mais). Essas categorizações foram baseadas na Classificação da Sociedade Brasileira de Neonatologia. Foram investigados os dados referentes aos anos de 2010 e 2015 dos 194 municípios da Paraíba que fazem parte do Semiárido Brasileiro.

Pelo Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), foram acessados os códigos atribuídos a cada município e, com eles, foi construída uma base de microdados relativa a cada nascimento ocorrido em 2010 e 2015 para todos os municípios do Semiárido paraibano. Destes foram selecionados os microdados das mães entre 10-19 anos de idade. As bases foram organizadas e analisadas utilizando o software livre R Studio versão 3.6.2.

2.2. AVALIAÇÃO DA COBERTURA DOS REGISTROS DOS NASCIDOS VIVOS

A Razão de Sexo (RS) permite testar a qualidade das estatísticas do registro de nascimento da população por sexo. Esse indicador pode ser considerado um bom indicativo da qualidade global dos dados estatísticos demográficos por sexo ao nascer, o qual é obtido pela relação dos nascidos vivos masculinos com os nascidos vivos femininos ocorridos em um determinado período (PAES, 2018). Outro método mais utilizado para avaliar a cobertura dos registros dos nascidos vivos é dado pela razão entre o número de Nascimentos observados (N_{obs}) e Nascimentos estimados (N_{est}):

$$C = \frac{NV_{obs}}{NV_{est}}$$

O NV_{est} é calculado pela soma do produto entre as Taxas Específicas de Fecundidade (TEF) em intervalos quinquenais entre as faixa etárias das mães de 10-49 anos de idade, multiplicado pelo total de mulheres dos mesmos intervalos etários (PAES, 2018). Os valores dos NV_{est} foram obtidos do site do IBGE para o ano de 2015. Considerou-se que a cobertura estimada para os intervalos etários de 15-49 anos é a mesma para o intervalo 10-14 anos.

2.3. AVALIAÇÃO DA COMPLETUDE DAS INFORMAÇÕES

Foi avaliada a completude das variáveis: *consultas pré-natal; duração da gestação; tipo de parto e peso ao nascer* extraídas da DN. As informações definidas como incompletas ou nulas foram aquelas cujos campos não estavam preenchidos ou com informações ignoradas. Para a avaliação do grau de completude foi utilizada a classificação proposta por Romero e Cunha (2016) onde: *Excelente* (menor de 5%), *Bom* (5 a 10%), *Regular* (10 a 20%), *Ruim* (20 a 50%) e *Muito ruim* (50% ou mais). Após a análise da completude, foram excluídos da base de dados dos nascidos vivos as observações que apresentaram variáveis com dados incompletos.

2.4. ASSOCIAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS

Foi realizado o teste Qui-quadrado de Pearson. Esse teste não exige uma distribuição simétrica dos dados e pode ser utilizado para comparar a distribuição dos eventos nas amostras, a fim de avaliar se as proporções observadas destes eventos mostram ou não diferenças significativas.

Foi elaborado um Teste de Hipótese para calcular a Hipótese nula (H_0) de que não haveria evidências da relação entre as variáveis testadas para análise estatística e a Hipótese Alternativa (H_1) indicando essa possível relação entre essas variáveis. Foi considerado um Intervalo de Confiança de 99%, com um p-valor menor que 0,01.

O presente estudo utilizou dados secundários do IBGE e do SINASC. Por serem provenientes de bancos de dados de domínio público, disponibilizados online, justifica-se o não encaminhamento para aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa, segundo o que estabelece o inciso III, artigo primeiro da Resolução nº 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. Esta pesquisa foi realizada no Laboratório de Estudos Demográficos do Departamento de Estatística da Universidade Federal da Paraíba.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em 2010 e 2015, respectivamente, foram registrados 7.318 e 7.149 nascidos vivos de mães adolescentes no Semiárido da Paraíba, correspondendo a 6,28% e 6,10% do número de nascidos vivos total de todas as idades da mãe do estado, respectivamente nesses anos. A relação dos registros de nascidos vivos entre os sexos foi calculada pela RSN, conforme apresentada na Tabela 1. A RSN encontrada para os dois anos do estudo indicam que de modo geral os quantitativos dos registros de nascimentos para ambos os sexos se enquadram dentro dos padrões de aceitabilidade encontrados na grande maioria das regiões do mundo, com uma variação da RSN de 100,0 a 105,0 (PAES, 2018). Ou seja, para o Semiárido paraibano em 2010, para cada 100 meninas nasceram 105,6 meninos; já para 2015, essa relação foi de 100,0 para 104,8.

Tabela 1. Frequência, porcentagem e Razão de Sexo dos nascidos vivos por sexo dos registros das adolescentes do semiárido paraibano, 2010 e 2015.

	Frequência		Porcentagem (%)	
	2010	2015	2010	2015
Masculino	3.678	3.568	51,36	51,18
Feminino	3.482	3.403	48,64	48,82
Total	7.160	6.971	100	100
RSN	105,6	104,8	-	-

Fonte: SINASC, 2019

Por sua vez, foi calculado a cobertura dos registros de nascidos do Semiárido da Paraíba para o ano de 2015 pelo método proposto por Paes (2018), onde o N_{obs} foi coletado do SINASC e o N_{est} foi extraído do IBGE. Estimou-se a cobertura em 99,22%, o que aponta aproximadamente uma universalidade para o registro de nascidos vivos.

Os resultados referentes a análise descritiva das variáveis: consultas pré-natal; duração da gestação; tipo de parto e peso ao nascer são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Medidas descritivas das variáveis materno-adolescentes do Semiárido da Paraíba para o total dos anos 2010 e 2015

Variável	Mínimo	Mediana	Média	Máximo	Não preenchidos	Completeness (%)
Nº consult. pré-natal	1	4	3,54	9	35	99,73
Duração da gestação	1	5	4,88	9	182	98,75
Peso ao nascer (g)	200	3.200	3.175	6.650	2	99,99
Tipo de Parto*	-	-	-	-	25	99,83

*A variável *tipo de parto* é apresentado em duas opções (vaginal ou cesáreo), sendo essas: 55,61% vaginal; 44,39% cesáreo. Fonte: SINASC – Ministério da Saúde, 2019

De acordo com os resultados, nota-se que de um total de 14.465 registros de nascidos vivos, para os anos de 2010 e 2015, 244 registros possuíam dados não preenchidos. Desse modo, eles foram excluídos do estudo. Além disso, foram detectados mais 106 possíveis registros preenchidos incorretamente. A exclusão destes com os 244 não preenchidos resultou em 350 exclusões. Do ponto de vista estatístico da representatividade, esse montante, no entanto, não traz consequências comprometedoras aos indicadores calculados a partir deles, devido a que apenas 2,42% dos registros totais foram excluídos. Assim foi utilizado um banco de dados final com 14.135 registros para a análise das associações entre as variáveis.

A Figura 1 mostra por meio do boxplot a dispersão da idade média das mães adolescentes do semiárido paraibano nos anos 2010 e 2015:

Figura 1. Boxplot: Idade das mães adolescentes do Semiárido da Paraíba, anos 2010 e 2015

Fonte: SINASC – Ministério da Saúde, 2019

Segundo a Figura 1, observa-se que o número de nascidos vivos concentra-se entre mães adolescentes dos 16 aos 18 anos de idade no Semiárido da Paraíba, porém houve presença de casos entre 10-15 anos de idade.

A Tabela 3 mostra o comportamento da duração da gestação destas mães no período da adolescência. As categorias seguem a classificação do Ministério da Saúde. Os dados representam o conjunto dos anos de 2010 e 2015 do Semiárido da Paraíba.

Tabela 3. Duração da gestação das mães adolescentes do Semiárido Paraibano nos anos de 2010 e 2015

Nº de semanas	Frequência (n)	Porcentagem (%)
<22	1	0,0
22-27	63	0,4
28-31	144	1,0
32-36	1.567	11,1
27-41	11.965	84,6
>42	395	2,8
Total	14.135	100

Fonte: SINASC, 2019

Baseado na variável *duração das semanas de gestação*, os recém-nascidos foram reclassificados segundo a Classificação proposta pela Sociedade Brasileira de Neonatologia (2017) entre: “não prematuros” os que nascerem com mais de 37 semanas de gestação e “prematuros” os que nascerem abaixo de 37 semanas de gestação. Os resultados desta nova classificação estão na Tabela 4:

Tabela 4. Variáveis: *Duração da gestação, tipo de parto, número de consultas pré-natal e peso ao nascer* das adolescentes do Semiárido paraibano para o total dos anos de 2010 e 2015.

Variável	Categorias	Frequência (n)	Porcentagem (%)
Duração da gestação	Não prematuro	12.360	87,4
	Prematuro	1.775	12,6
Tipo de Parto Nº de consultas pré-natal	Vaginal	7.832	55,4
	Cesáreo	6.303	44,6
	Nenhuma	179	1,3
	1-3	822	5,8
	4-6	4.543	32,1
	>7	8.591	60,8
Peso ao nascer (g)	<2.500	1.117	7,9
	≥2.500	13.018	92,1

Fonte: SINASC, 2019. Elaboração própria

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os recém-nascidos com maior risco de morte e incapacidade são aqueles com complicações relacionadas à prematuridade, lesão cerebral no momento do parto, infecções bacterianas graves, icterícia e/ou condições congênitas. Além disso, o custo financeiro e psicológico para suas famílias podem trazer consequências no seu desenvolvimento emocional e cognitivo (OMS, 2015).

A mãe adolescente de um bebê prematuro vivencia um período de estresse e preocupações, incluindo insegurança quanto aos cuidados, medo diante do momento de fragilidade e risco ao qual o filho está exposto, ansiedade em relação as possíveis patologias que a criança pode desenvolver, tratamento e recuperação do bebê (BARROSO, PONTES E ROLIM, 2015).

Em 2017, segundo dados da OMS, aproximadamente 2,5 milhões de recém-nascidos morreram nos primeiros 28 dias de vida no mundo, a maioria por causas evitáveis. Desdes óbitos neonatais, 80% tinham baixo peso ao nascer e em média 65% eram prematuros (OMS, 2019).

Observa-se que 55,4% das mães adolescentes do semiárido paraibano tiveram parto normal, porém houve uma porcentagem elevada de partos cesáreos (mais de 40% dos casos), mas esse não é um fenômeno isolado, já que percebe-se uma elevação expressiva nas taxas de cesáreas em praticamente todo o mundo, ultrapassando o percentual de 10 a 15% dos partos, que é considerado aceitável e justificável pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2015).

A indicação do tipo de parto deve ser baseada em motivos clínicos consistentes e em situações específicas. A cesárea é um procedimento cirúrgico e tem como finalidade intervir quando riscos são maiores diante dos benefícios do parto normal, sendo indicada apenas em casos necessários.

Além dos riscos do procedimento cirúrgico, as mulheres submetidas à cesárea apresentam risco de desenvolvimento de infecções, hemorragias e em futuras gestações podem apresentar riscos a saúde materna e infantil como: placenta prévia, acretismo placentário, hemorragia pós-parto e histerectomia.

Outro fator relacionado a saúde gestacional é a cobertura do programa pré-natal. Estudos mostram que, quanto maior o número de consultas pré-natal, menores são as taxas de mortalidades neonatal e materna. Um pré-natal completo pode minimizar as prevalências de prematuridade, reduzir o número de bebês com baixo peso ao nascer, além de combater a hipertensão e anemia no período gestacional. A OMS preconiza de 4 a 8 consultas com profissionais de saúde ao longo de sua gravidez (ANJOS e BOING, 2016; OPAS, 2016; OMS, 2015).

A Tabela 4 mostra que cerca de 8% dos nascimentos foram com baixo peso. Segundo a OMS, um a cada sete bebês nascem com baixo peso e esse é um grande desafio de saúde pública, pois aqueles que sobrevivem têm um risco maior de desnutrição, problemas físicos e de desenvolvimento mais tarde na vida, incluindo diabetes e doenças cardiovasculares (OPAS, 2019).

A Tabela 5 mostra o cruzamento entre as variáveis peso ao nascer e duração da gestação e a Tabela 6 peso ao nascer e número de consultas pré-natal.

Tabela 5. Frequência absoluta e relativa segundo *peso ao nascer* e *duração da gestação* para as adolescentes do semiárido paraibano, 2010 e 2015.

Peso ao nascer	Duração da gestação				Total	
	Não prematuro		Prematuro			
	n	%	n	%	n	%
Baixo peso	448	40,1	669	59,9	1.117	100
Não baixo peso	11.912	91,5	1.106	8,5	13.018	100
Total	12.360	100	1.775	100	14.135	-

FONTE: SINASC, 2019

A Tabela 5 mostra que dos 1.117 registros de nascimento que nasceram abaixo do peso, 59,9% deles nasceram prematuros, indicando uma possível associação entre essas variáveis na adolescência, necessitando ser melhor investigado os fatores que levam a essa relação.

Diversos fatores influenciam a variável *Peso ao nascer* e um deles é a nutrição materna. Nos primeiros meses do período gestacional, os enjoos ocasionados por alterações hormonais podem gerar na gestante maior dificuldade para alcançar o valor calórico estimado para esse período e, consequentemente, ela perde peso. A persistência dessa deficiência coloca a mãe e o feto em situação de risco nutricional, principalmente pela carência de micronutrientes para a formação fetal intra-uterina (CUNHA, et. al, 2016).

A Tabela 6 mostra que 18,7% das mães adolescentes realizaram menos de 4 consultas pré-natal, fugindo do parâmetro da OMS que preconiza entre 4-8 consultas. A gestação, principalmente na adolescência, é um período que impõe necessidades nutricionais adequadas. A nutrição correta é primordial para a saúde da mãe e do bebê. O diagnóstico de anemia da mãe no período gestacional (diagnosticado nos encontros do pré-natal) e a prematuridade, por exemplo, podem ser fatores de risco para o baixo peso da criança ao nascer (GONÇALVES et. al, 2019).

Tabela 6. Frequência absoluta e relativa segundo *peso ao nascer* e *número de consultas pré-natal* para as adolescentes do semiárido paraibano, 2010 e 2015.

Peso ao nascer	Nº de consultas pré-natal								Total	
	Nenhuma		1-3		4-6		>7			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Baixo peso	33	3	175	15,7	496	44,4	413	37	1.117	100
Não baixo peso	146	1,1	647	5	4.047	31,1	8.178	62,8	13.018	100
Total	179	-	822	-	4.543	-	8.591	-	14.135	100

FONTE: SINASC, 2019

A Tabela 7 mostra a relação entre as variáveis *peso ao nascer* e *tipo de parto*. Observa-se que, entre mães adolescentes que tiveram parto vaginal, 64,1% apresentaram recém-nascidos com baixo peso, enquanto que 35,9% das crianças que nasceram com baixo peso, suas mães tiveram parto cesáreo.

Gonzaga et. al (2016) mostraram que existe uma associação entre o baixo peso do recém-nascido e o parto cesáreo nas puérperas. Porém a causa ainda não está bem explicada, dado que fatores como a

prematuridade e complicações clínico-obstétricas também podem influenciar na escolha da cesariana para a gestante, onde nesses casos o parto cesáreo seria indicado.

Entretanto, Oliveira et al. (2016) mostram que, com o passar dos anos, o parto cesáreo mudou o seu cenário e funcionalidade na atenção a saúde materna, deixando de ser um procedimento para melhorar os resultados perinatais e transformou-se em um produto de consumo no mercado, onde as menores taxas de cesáreas são entre as mulheres mais pobres e as mais altas estão entre as gestantes com poder aquisitivo mais elevado.

Tabela 7. Frequência absoluta e relativa segundo *peso ao nascer* e *tipo de parto* para as adolescentes do semiárido paraibano, 2010 e 2015.

Seminário parabenizando, 2016 e 2017:						
Peso ao nascer	Tipo de Parto				Total	
	Cesáreo		Vaginal			
	n	%	n	%	n	%
Baixo peso	401	35,9	716	64,1	1.117	100
Não baixo peso	5.902	45,3	7.116	54,7	13.018	100
Total	12.360	-	6.303	-	7.832	-

FONTE: SINASC, 2019.

Diversas pesquisas vêm alertando para a associação entre a gestação no período da adolescência e o risco elevado de recém-nascidos (RN) pequenos para a idade gestacional. Além da maior probabilidade dos RN de gestantes adolescentes nascerem com baixo peso, alguns estudos mostram taxas maiores de morbidade e de mortalidade nesse grupo etário (OLIVEIRA et. al, 2018).

A Tabela 8 mostra a relação entre as variáveis *duração da gestação* e o *número de consultas pré-natal* realizadas pelas adolescentes. Esses resultados mostram que um número considerável de mães adolescentes que tiveram filhos não prematuros estão realizando acima de 4 consultas pré-natais. Nota-se que 63,3% delas realizaram mais de 6 consultas e não tiveram filhos prematuros. Porém, pontua-se que, das mães que tiveram filhos prematuros, 13,6% delas realizaram apenas 1-3 consultas.

A gestante adolescente dá início ao pré-natal um pouco mais tarde e acaba por fazer um menor número de consultas, quando comparada às mulheres com vinte anos ou mais. Esta situação pode ser considerada como um fator de risco tanto para a saúde materna, como para a criança (HYDALL, DUARTE e COSTA, 2018).

Tabela 8. Frequência absoluta e relativa segundo *duração da gestação* e *número de consultas pré-natal* para as adolescentes do semiárido paraibano, 2010 e 2015.

Duração da gestação	Nº de consultas pré-natal (em semanas)								Total	
	Nenhuma		1-3		4-6		>7			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Não prematuro	137	1,1	580	4,7	3.800	30,7	7.843	63,5	12.360	100
Prematuro	42	2,4	242	13,6	743	41,9	748	42,1	1.775	100
Total	179	-	822	-	4.543	-	8.591	-	14.135	-

FONTE: SINASC, 2019.

A Tabela 9 mostra a associação entre as variáveis *duração da gestação* e *tipo de parto*. Observa-se que dos partos prematuros, 34,3% das mães adolescentes tiveram parto cesáreo e 65,7% tiveram parto vaginal. Porém, das mães que tiveram filhos não prematuros, 46,1% tiveram cesariana e 53,9% tiveram parto normal. A duração da gestação é um dos componente mais importantes do desenvolvimento intra-uterino, sendo as gestações com nascimento prematuro (inferior a 37 semanas) um risco elevado para a mortalidade neonatal. Nas pesquisas sobre sobrevivência infantil, a duração da gestação é considerada um importante indicador para a viabilidade do recém-nascido (ORTIZ, 2016).

Tabela 9. Frequencia absoluta e relativa segundo *tipo de parto* e *duração da gestação* para as adolescentes do semiárido paraibano, 2010 e 2015.

Duração da gestação	Tipo de Parto				Total	
	Cesáreo		Varginal			
	n	%	n	%	n	%
Não prematuro	5.694	46,1	6.666	53,9	12.360	100
Prematuro	609	34,3	1.166	65,7	1.775	100
Total	6.303	-	7.832	-	14.135	-

FONTE: SINASC, 2019

Foi realizado o Teste qui-quadrado bilateral de independência entre as variáveis: peso ao nascer, duração da gestação, tipo de parto e número de consultas pré-natal. Os resultados estão apresentados na Tabela 10.

Tabela 10. Resultados do Teste Qui-quadrado entre as variáveis: peso ao nascer, duração da gestação, tipo de parto e número de consultas pré-natal, no semiárido paraibano, 2010 e 2015.

Cruzamento das variáveis	Qui-quadrado	Significância Assintótica Bilateral (p-valor)
Peso ao nascer e duração da Gestação	2.474,832	0,000*
Peso ao nascer e tipo de parto	37,084	0,000*
Peso ao nascer e número de consultas	399,54	0,000*
Duração da gestação e número de consultas	408,433	0,000*
Duração da gestação e tipo de parto	86,84	0,000*

Fonte: SINASC, 2019

*significativo ao nível de 0,0001

Os resultados da Tabela 10 indicam que é possível rejeitar a Hipótese nula (H_0) de que não há relação entre as variáveis: *duração da gestação*; *número de consultas pré-natal*; *tipo de parto* e *peso ao nascer*, onde todos os cinco cruzamentos entre variáveis realizados apresentaram p-valor < 0,001. Consequentemente aceita-se a Hipótese alternativa (H_1) que há evidências de diferenças significativas entre os cruzamentos realizados, indicando uma associação da frequência relativa entre variáveis cruzadas. Ou seja, o peso ao nascer está associado com a duração da gestação, o tipo de parto e o número de consultas pré-natal. Por sua vez, a duração da gestação está associada o número de consultas pré-natal e o tipo de parto. Essas associações estão em conformidade com os resultados encontrados nos cruzamentos entre estas variáveis apresentados nas tabelas anteriores.

4. CONCLUSÕES

O fato da cobertura dos nascimentos ter atingido em 2015 uma cobertura de 99,22% serve como indicativo da proximidade da universalidade dos registros de nascimento no Semiárido paraibano. Esse alto nível de qualidade foi verificado tanto na cobertura dos registros dos NV como no preenchimento das variáveis analisadas nesse estudo, com um percentual de preenchimento acima de 95%.

As variáveis associadas a saúde materno-adolescente revelaram problemas com percentuais elevados ou fora do preconizado pela OMS. Com relação ao *número de consultas pré-natal*, ainda existem mães com menos de quatro encontros (7,1%). Concernente a *duração da gestação* 12,6% dos registros apresentaram prematuridade, acima da taxa de prematuros brasileira (9,2%). A variável *peso ao nascer* apresentou 7,9%, abaixo da média nacional que é de 8,1%. A variável *tipo de parto*, especificamente a categoria *parto cesáreo* foi a que apresentou maior distância da média ideal (10-15%) com 44,6% registros, seguindo uma tendência mundial de aumento do número de partos cesáreos.

Elevados níveis dessas variáveis geram novos desafios a serem alvos preferenciais das políticas de saúde materno-infantil das adolescentes, em particular do Semiárido da Paraíba. Essa contribuição atinge seu propósito de alertar as autoridades e gestores competentes para os cuidados e atenção a serem prestados a essa população vulnerável de adolescentes que merece atenção e cuidado especial, particularmente em se tratando de uma região com inúmeros problemas assistenciais e de desenvolvimento, os quais estão interrelacionados.

REFERÊNCIAS

- [1] Andrade et al. O cuidado da criança por mães adolescentes. *Journal of Nursing UFPE/Revista de Enfermagem UFPE*, v. 13, 2019. Disponível em: <<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/236228>> Acesso em 18 out 2019.
- [2] Anjos, Juliana Cristine dos; Boing, Antonio Fernando. Diferenças regionais e fatores associados ao número de consultas de pré-natal no Brasil: análise do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos em 2013. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, v. 19, p. 835-850, 2016. Disponível em: <<https://www.scielo.org/article/rbepid/2016.v19n4/835-850/>> Acesso em: 30 out 2019.
- [3] Barroso, Monique Linhares; Pontes, Aline Lopes; Rolim, Karla Maria Carneiro. Consequências da prematuridade no estabelecimento do vínculo afetivo entre mãe adolescente e recém-nascido. *Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste*, v. 16, n. 2, p. 168-175, 2015. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/pdf/3240/324038465005.pdf>> Acesso em: 30 out 2019.
- [4] Gonçalves, Irene da Silva Araújo; Priore, Silvia E.; Costa, Glaucê D. Anemia na gestação e peso ao nascer do recém-nascido: Revisão Sistemática/Anemia in pregnancy and birth weight of the newborn: systematic review. *Brazilian Journal of Development*, v. 5, n. 10, p. 18892-18907, 2019. Disponível em: <<http://brjd.com.br/index.php/BRJD/article/view/3743>> Acesso em: 18 Out 2019.
- [5] Gonzaga, Isabel Clarisse Albuquerque, et al. Atenção pré-natal e fatores de risco associados à prematuridade e baixo peso ao nascer em capital do nordeste brasileiro. *Ciência & Saúde Coletiva*, vol 6, nº 21, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.org/scielo.php?pid=S1413-81232016000601965&script=sci_arttext&tlng=pt> Acesso em: 21 Out 2019.
- [6] Hydall, Ana Rosa Sales; Duarte, Risauda Nóbrega; da Costa, Ruth Silva Lima. Partos prematuros em adolescentes em Rio Branco-Acre no ano de 2015. *DêCiência em Foco*, vol 2, nº 1, 2018. Disponível em: <<http://revistas.uninorteac.com.br/index.php/DeCienciaemFoco0/article/view/144>> Acesso em: 22 Out 2019.
- [7] Oliveira, Alane Cabral Menezes de et al. Estado nutricional materno e sua associação com o peso ao nascer em gestações de alto risco. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 23, p. 2373-2382, 2018. Acesso em: <<https://www.scielo.org/article/csc/2018.v23n7/2373-2382/>> Acesso em 30 out 2019.
- [8] Oliveira, Rosana Rosseto de et al. Fatores associados ao parto cesárea nos sistemas público e privado de atenção à saúde. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, v. 50, n. 5, p. 733-740, 2016.
- [9] Organização Pan-Americana de Saúde. Mulheres grávidas devem ter acesso aos cuidados adequados no momento certo, afirma OMS. Disponível em: <https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5288:mulheres-gravidas-devem-ter-acesso-aos-cuidados-adequados-no-momento-certo-afirma-oms&Itemid=820> Acesso em: 31 out 2019.
- [10] Organização Pan-Americana de Saúde. Um em cada sete bebês em todo o mundo nascem com baixo peso. Disponível em: <https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5935:um-em-cada-sete-bebes-em-todo-o-mundo-nascem-com-baixo-peso&Itemid=820> Acesso em: 31 out 2019.
- [11] Ortiz, Luis Patrício. A mortalidade neonatal no Estado de São Paulo: níveis e tendências segundo a duração da gestação. *Anais*, 2016, 1-14. Disponível em: <<http://www.abep.org.br/~abeporgb/publicacoes/index.php/anais/article/viewFile/1547/1510>> Acesso em: 23 Out 2019.
- [12] Paes, Neir Antunes; Melo, Ianne Rafaella Santos; da Silva Braga, Jessica. A qualidade dos registros de nascimentos e as condições de vida do Semiárido brasileiro: construção de indicadores sintéticos. *Anais*, p. 1-18, 2017. Disponível em: <<http://www.abep.org.br/~abeporgb/publicacoes/index.php/anais/article/viewFile/2733/2632>> Acesso em 18 Out 2019.
- [13] Paes, Neir Antunes. *Demografia estatística dos eventos vitais*. 2ª Edição. João Pessoa: Editora CCTA, UFPB, 2018.
- [14] Romero, Dalia E.; DA Cunha, Cynthia Braga. Disponibilidade e qualidade da informação epidemiológica e demográfica no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) e no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) para menores de um ano. *Anais*, p. 1-18, 2016. Disponível em: <<http://www.abep.org.br/~abeporgb/publicacoes/index.php/anais/article/download/1545/1508>> Acesso em: 18 Out 2019.
- [15] World Health Organization et al. Survive and thrive: transforming care for every small and sick newborn. 2019. Disponível em: <<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326495/9789241515887-eng.pdf>> Acesso em 30 out 2019.

Capítulo 5

Perfil socioeconômico das famílias de reassentados do Empreendimento da Usina Hidrelétrica de Irapé, Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, Brasil

Martionei Leite Gomes

Elida Elizena Carneiro de Matos

Nilton Fernandes de Oliveira

Adriano Campos Lemos

Amanda Cardoso de Oliveira Silveira Cassette

Resumo: A usina hidrelétrica de Irapé (UHE Irapé), localizada no Rio Jequitinhonha, no Estado de Minas Gerais é considerada um marco na área de construção de barragens no Brasil. O presente estudo objetivou traçar o perfil socioeconômico das famílias de reassentados remanescentes da UHE Irapé, utilizando-se uma abordagem quantitativa de pesquisa, por meio de um levantamento censitário. Seiscentos e uma famílias foram identificadas como reassentadas, dentre as quais quatrocentas e uma permaneceram em seus locais de reassentamento, sendo possível entrevistar trezentos e sessenta e oito. O número de indivíduos somando todos os núcleos familiares são mil duzentos e oitenta, com uma média de 3,5 indivíduos. Considerando todo o universo amostral foi observado uma maior presença de população masculina, economicamente ativa, com ensino fundamental completo ou incompleto, que trabalha direta ou indiretamente em suas propriedades rurais, mas necessitam de outras atividades e/ou benefícios fora do âmbito da propriedade para sobreviver. Com relação as organizações sociais, foi observado que 90% dos grupos familiares participam de algum tipo de associação, demonstrando que essas organizações podem ser potencializadas com vistas ao desenvolvimento econômico. Transcorridos mais de 10 anos desde o início da operação da UHE Irapé, observa-se ainda disparidades em relação ao perfil socioeconômico das famílias de reassentados remanescentes.

Palavras-chave: Perfil socioeconômico, Reassentamento, Hidrelétrica, UHE Irapé.

1. INTRODUÇÃO

A geração de energia elétrica a partir de energia hidráulica é responsável por mais de 60% da capacidade de geração energética do Brasil (ANEEL, 2019). A escolha por usina hidrelétrica (UHE) no Brasil se deve principalmente pela segurança temporal no provimento de energia em função da construção de reservatórios, pelo o potencial hídrico disponível e a necessidade de expansão da capacidade geradora do país (MORETTO *et al.*, 2012).

A UHE Irapé, localiza-se no Rio Jequitinhonha, dois quilômetros abaixo da foz do Rio Itacambiruçu, entre os municípios de Berilo e Grão Mogol, no Vale do Jequitinhonha, no Estado de Minas Gerais. Localizada em uma região de fitofisionomia de cerrado e alguns elementos isolados de caatinga, apresenta uma fauna variada e um complexo de afloramentos rochosos abruptos (EIA/RIMA, 1993). A UHE Irapé teve sua operação independente de energia iniciada no ano de 2006, sob propriedade e operação da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). A UHE Irapé possui uma extensão de 510 m, 208 metros de altura de barragem, área alagada de cerca de 137 km² e uma potência instalada de 399 MW, energia suficiente para atender uma cidade de 1 milhão de habitantes (CEMIG, 2019).

O projeto de reassentamento involuntário do empreendimento da UHE Irapé foi coordenado pela CEMIG que identificou diferentes soluções aos 1200 núcleos familiares envolvidos. Do montante, pouco mais de 50% fizeram opção por reassentamento em novas terras, sendo que para cada núcleo familiar foi dada a possibilidade de escolher entre 3 fazendas de reassentamento, as demais foram realocadas na área remanescente ou indenizadas com dinheiro (EIA/RIMA, 1993; BRASIL, 2002).

Segundo a CEMIG, o Termo de Acordo da UHE Irapé é considerado um dos maiores e mais completos já desenvolvido pelo setor elétrico em área rural no Brasil, beneficiando mais de 600 grupos familiares em reassentamentos, com lotes mínimos correspondentes a um módulo fiscal, que na região, varia entre 40 e 50 hectares, mais o acréscimo da reserva legal em separado, perfazendo uma área total de cerca de 58.000 hectares. Foram construídas nas áreas de reassentamento, 484 casas, com área mínima de 62,8 m², de padrão compatível com as normas de engenharia. Além das novas terras, houve ainda indenização pelas benfeitorias, plantações e animais, assistência técnica rural, preparação para o plantio e insumos para produção inicial (CEMIG, 2019).

Contudo, apesar dos grandes esforços empenhados objetivando minimizar os impactos às famílias no decorrer do processo, sabe-se que cada família é uma unidade funcional específica, que ocupa espaços diferenciados em sua própria luta, com seus próprios modos de vida, costumes e sistemas (BASTOS; TRAD, 1998). E por mais que as tratativas tenham sido adequadas do ponto de vista técnico e financeiro, tratavam-se de populações que viviam muitas vezes em situação de absoluto alheamento social, técnico e político e fortes vínculos ao meio ambiente, com isso, complexidades subjetivas não podem ser desprezadas. Em função disso, é de grande relevância a realização de estudos que avaliem os aspectos socioeconômicos dos reassentados, uma vez que a população teve a sua realidade de vida fortemente modificada.

Desta forma, o presente estudo objetivou compreender a realidade socioeconômica das famílias de reassentados do empreendimento UHE Irapé, no Vale do Jequitinhonha, no Estado de Minas Gerais, através da investigação do perfil socioeconômico atual, transcorridos mais de 10 anos desde o início da operação da UHE Irapé.

Entende-se que ao se aproximar desses grupos familiares, por meio da realização do projeto, além de uma melhor percepção da situação socioeconômica dos realocados, possam ser identificados processos de articulações que ainda possam ser ativados somando aos que já foram implementados anteriormente, como é o caso das organizações sociais locais, comunitárias, familiares e culturais, que podem ser potencializadas enquanto pontos de agregação com vistas ao desenvolvimento econômico.

2. METODOLOGIA

Para a realização do presente estudo foi utilizada uma abordagem quantitativa de pesquisa, por meio de um levantamento censitário para mensuração da situação socioeconômico das famílias de reassentados.

De acordo com a resolução nº 510/2016 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CONEP) por se tratar de uma pesquisa censitária cujo objetivo é uma melhor compreensão de características de uma população específica, visando a melhoria de ações para a mesma, não é requerido registro, nem avaliação pelo sistema CONEP.

O levantamento censitário foi realizado através da aplicação de um questionário semiestruturado padronizado, elaborado em conjunto pela equipe do projeto e pelo Instituto Pólis Pesquisa Ltda¹. O questionário foi desenvolvido dentro de critérios rigorosos de controle metodológico, procurando assegurar a confiabilidade dos dados. O mesmo questionário foi aplicado em todos os domicílios, de forma a possibilitar a comparação das informações obtidas.

O questionário foi aplicado no período de Março a Junho de 2019, junto aos núcleos familiares reassentados remanescentes as margens direita e esquerda do Rio Jequitinhonha, rio de referência para região, ao longo de diferentes municípios da região conhecida como Vale do Jequitinhonha, localizada no Norte do Estado de Minas Gerais. O questionário foi respondido apenas por um representante, maior de idade, de cada um dos núcleos familiares. Os dados obtidos através da aplicação dos questionários foram compilados em banco de dados contendo as informações pertinentes e tratados através de análise estatística descritiva com valores absolutos e percentuais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A área de influência de uma usina hidrelétrica engloba todos os municípios que possuem porções afetadas pela formação do reservatório. No caso da UHE Irapé, a área de influência do seu reservatório é formada por 7 municípios, sendo: José Gonçalves de Minas, Leme do Prado, Turmalina e Berilo, localizados na margem direita do Rio Jequitinhonha e Botumirim, Cristália e Grão Mogol localizados na margem esquerda do rio (CEMIG, 2019).

Segundo informações apuradas junto as lideranças ou pessoas de referências nas fazendas de reassentamento, um total de 601 famílias foram reassentadas, no período de 2003 e 2005, época compreendida entre o desvio do Rio Jequitinhonha para o início da construção da barragem da UHE Irapé e o início do enchimento do reservatório. Além disso, foi possível identificar que destas, somente 401 permaneceram em seus locais de reassentamento, caracterizando uma taxa de permanência de 67,0%. Através do presente estudo foi possível entrevistar 368 núcleos familiares remanescentes, atingindo dessa forma uma taxa de cobertura de 92,0% do universo amostral.

Os 368 núcleos familiares reassentados da UHE Irapé são compostas por 1280 integrantes, com uma média de 3,5 indivíduos por núcleo familiar. Os remanescentes foram localizados em 86 fazendas de reassentamento, dentre elas, 25,8% foram realocados dentro do seu município de origem e 74,2% foram realocados em municípios distintos ao de origem.

As fazendas de reassentamento encontram-se distribuídas em 18 municípios da região Norte do Estado de Minas Gerais, sendo que 31 fazendas estão localizadas a margem direita do Rio Jequitinhonha e 55 a margem esquerda do rio, sendo a distância média da moradia de origem para a fazenda de reassentamento de 163,4 km. Os municípios que concentram o maior número de famílias reassentadas remanescentes são Botumirim e Cristália a margem esquerda do rio e Leme do Prado e José Gonçalves de Minas a margem direita do rio (Tabela 1).

¹ Instituição privada de pesquisa, com sede em Belo Horizonte/MG, que desenvolve pesquisas sociais, de opinião e de mercado para organismos governamentais e não-governamentais.

Tabela 1 – Caracterização geral das fazendas de reassentados remanescentes.

Rio Jequitinhonha	UHE Irapé	Municípios	Fazendas	Famílias	Famílias (%)
Margem Esquerda	158,0 km	Botumirim	14	70	19,1%
Margem Esquerda	103,0 km	Cristália	32	66	17,9%
Margem Direita	54,8 km	Leme do Prado	8	39	10,7%
Margem Direita	30,9 km	José G. de Minas	4	31	8,4%
Margem Direita	177,0 km	Itamarandiba	5	26	7,1%
Margem Esquerda	218,0 km	Janaúba	3	21	5,7%
Margem Direita	90,4 km	Turmalina	4	19	5,2%
Margem Direita	330,0 km	Francisco Dumont	1	19	5,2%
Margem Esquerda	80,3 km	Grão Mogol	3	18	4,9%
Margem Direita	217,0 km	Água Boa	3	17	4,6%
Margem Direita	245,0 km	Diamantina	1	10	2,7%
Margem Esquerda	150,0 km	Itacambira	1	9	2,4%
Margem Esquerda	174,0 km	Francisco Sá	1	9	2,4%
Margem Direita	192,0 km	Aricanduva	1	5	1,4%
Margem Direita	201,0 km	Angelândia	1	3	0,8%
Margem Direita	38,5 km	Berilo	1	2	0,5%
Margem Direita	166,0 km	Capelinha	2	2	0,5%
Margem Esquerda	315,0 km	Montes Claros	1	2	0,5%
Total	$\bar{x}$ = 163,4 km	18	86	368	100%

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

As paisagens geográficas predominantes nas fazendas de reassentamento são relevos de chapada e baixa na margem direita do rio e mista e baixa na margem esquerda do rio. As paisagens mistas, principalmente nas propriedades da margem esquerda, mesclam paisagens de baixas com chapada, tabuleiro e morro (Tabela 2).

Tabela 2 – Paisagem geográfica das fazendas de reassentados remanescentes.

Paisagem Geográfica	Margem Direita	Margem Esquerda	Total
Baixa	39 (24,7%)	79 (37,6%)	118 (32,1%)
Chapada	84 (53,2%)	25 (11,9%)	109 (29,6%)
Grota	25 (15,8%)	1 (0,5%)	26 (7,1%)
Tabuleiro	9 (5,7%)	8 (3,8%)	17 (4,6%)
Mista	1 (0,6%)	90 (42,9%)	91 (24,7%)
Não soube identificar	0 (0,0%)	7 (3,3%)	7 (1,9%)
Total	100%	100%	100%

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Considerando os 368 núcleos familiares de reassentados da UHE Irapé, 79,9% das fazendas são domiciliadas por uma família principal, 10,9% por uma família principal e uma família secundária e 9,2% por um único morador. Vale ressaltar que se utilizou o conceito de família do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a saber “Família – Conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco na unidade doméstica. Família principal – Núcleo familiar da pessoa responsável pela unidade doméstica (que é também a pessoa responsável pelo domicílio) com apenas uma família. Família secundária - Núcleos familiares em uma mesma unidade doméstica”.

Dentre os indivíduos que compõe os grupos familiares de reassentados remanescentes há uma maior presença de população masculina, com idade média de 36,4 anos, sendo a maior frequência de indivíduos na faixa etária de 25-45 anos. Nesse quesito é importante considerar que segundo definição do IBGE (2016) esta parcela da população está inserida no grupo conhecido como população economicamente ativa (PEA), composto por indivíduos de 10 a 65 anos de idade (Figura 1).

Com relação a inserção no sistema de ensino formal, somente 24,6% dos indivíduos se encontram frequentes em escolas formais. Considerando o universo amostral em sua totalidade, 53,5% dos indivíduos possuem ensino fundamental completo ou incompleto e 14,2% não possuem nenhum tipo de formação escolar formal.

Avaliando a questão do trabalho nas propriedades rurais dos reassentados, 65,4% dos indivíduos ainda trabalham direta ou indiretamente em suas propriedades (Figura 1).

Considerando os núcleos familiares, a renda familiar de 63% dos reassentados remanescentes é composta por rendimentos que derivam da terra e de outras atividades e/ou benefícios fora do âmbito da propriedade rural, ao passo que, somente 4,3% destes possuem renda familiar derivada exclusivamente da exploração da terra (Figura 1).

Figura 1 - Perfil socioeconômico das famílias de reassentados remanescentes do empreendimento UHE Irapé.

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Observou-se ainda, que na margem esquerda do rio de referência existe uma maior frequência de grupos familiares que vivem exclusivamente de outras atividades e rendimentos que não advém do manejo da terra em comparação a margem direita. Da mesma forma, na margem direita são mais frequentes rendimentos compostos por um conjunto de atividades relacionadas à propriedade e também atividades independentes da propriedade (Tabela 3).

Tabela 3 – Composição da renda familiar das famílias de reassentados remanescentes.

Composição da Renda Familiar	Margem Direita	Margem Esquerda	Total
Exclusiva exploração da terra	9 (5,7%)	7 (3,3%)	16 (4,3%)
Exploração da terra e outras fontes	135 (85,4%)	97 (46,2%)	232 (63,0%)
Outras fontes de renda	14 (8,9%)	106 (50,5%)	120 (32,6)
Total	158 (100%)	210 (100%)	368 (100%)

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Dos 368 núcleos familiares de reassentados remanescentes, 321 forneceram informações que possibilitaram o cálculo estimado da renda média familiar. A renda média estimada foi de R\$ 1831,91, sendo a renda média dos grupos familiares da margem direita de R\$2293,00 e da margem esquerda de R\$1457,00. Através da análise desse fator podem ser percebidas discrepâncias de caráter econômico entre os reassentados em diferentes margens do rio de referência. Fator que requer mais investigações e detalhamentos para definição concreta das razões.

Ao avaliar as condições da renda familiar para proporcionar uma vida de qualidade, os reassentados da UHE Irapé se dividem em três grupos: 43,8% consideram que os rendimentos da família são sempre suficientes para viverem bem; 49,2% concordam que os rendimentos da família são “quase sempre” suficientes para viverem bem; e apenas 7,1% assinalam que os rendimentos da família são insuficientes para viverem bem.

Para 75,5% dos entrevistados remanescentes na área de realocação, a condição de vida deles e de familiares é considerada melhor atualmente do que antes do processo de reassentamento, 18,2% consideraram que não houve alteração em suas condições de vida, 5,7% entendem que as condições de vida eram melhores antes do reassentamento. Retratando que para a grande maioria das famílias de reassentados remanescentes a efetivação do empreendimento contribuiu para a elevação da qualidade de vida.

Quando os entrevistados compararam sua condição de vida atual com aquela que tinham antes do reassentamento, a maioria expressiva dos respondentes consideraram melhorias em relação a um conjunto de atributos associados principalmente à mobilidade e deslocamento, como: melhoria no acesso ao comércio (92,4%), no acesso dos jovens à escola (90,4%) e no acesso à prestação do serviço público de saúde (89,1%). Em menor proporção, mas ainda em alta frequência, houve, para 68,2% avaliação de melhoria na forma como exploram hoje os recursos naturais para gerar renda. Indicando dessa forma requisitos e uma percepção dos indivíduos acerca da relação econômica e da qualidade de vida.

Considerando a disposição em investir na propriedade reassentada, mais da metade dos grupos familiares remanescentes (56,4%) expuseram o desejo de ampliar a atividade produtiva associada ao uso da terra e 1,4% delas demonstraram ter vontade de iniciar uma nova atividade comercial na terra, retratando uma disposição dos indivíduos em trabalhar no campo.

Com relação a participação em organizações sociais locais, comunitárias, familiares e culturais, 89,4% dos grupos familiares afirmaram participar de algum tipo de associação para atividades em grupo, ao passo que 10,6% assinalaram não participar de nenhuma das formas consideradas para reuniões e atividades em grupo. Confirmando a hipótese inicial de que estas organizações possam ser potencializadas enquanto pontos de agregação, principalmente entre as famílias com disposição em ampliar a atividade produtiva com vistas ao desenvolvimento econômico.

Com vistas a expectativa de futuro na visão dos núcleos familiares de reassentados remanescentes, investigou-se a proposição de planos para os 5 anos subsequentes e 79,6% das famílias entrevistadas demonstraram o desejo de continuar vivendo em sua atual propriedade, 6,0% relataram que gostariam de permanecer em sua propriedade, mas desejariam que seus filhos mais jovens pudessem viver em outras localidades com melhores condições, 7,6% afirmaram que gostariam de se mudar de sua propriedade atual e 6,8% não projetaram planos futuros. Evidenciando com isso que mesmo considerando todo o processo de reassentamento, a maioria das famílias deseja permanecer nas propriedades reassentadas e consequentemente ampliar as atividades produtivas associadas aos usos da terra.

Transcorridos mais de 10 anos desde o início da operação da UHE Irapé, percebe-se ainda disparidades em relação ao perfil socioeconômico das famílias de reassentados remanescentes, demonstrando a necessidade de novos esforços que visem principalmente a reativação econômica.

Acrescentando ao exposto, experiências e resultados obtidos de projetos do porte da UHE Irapé, se constituem um importante elemento de contribuição para o setor elétrico, assim como para outros setores da sociedade, na medida em que geram conhecimento a partir de experiências anteriores oportunizando o aprimoramento de metodologias aplicadas e inovação do processo com oportunidade de replicação das ações implementadas e avaliadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O levantamento censitário atingiu uma cobertura de 92% do universo pesquisado tendo reunido dados primários inéditos acerca das famílias reassentadas remanescentes nos territórios de destino. Contudo, pouco ainda se sabe em relação às outras 200 famílias reassentadas, que emigraram, com isso, a proposição de estudos que visem compreender o processo migratório destas famílias reassentadas se tornam imprescindíveis para compreensão do processo de implementação da UHE Irapé, visto que os trabalhos dessa área na grande maioria das vezes se limitam à situação dos núcleos familiares remanescentes, de certa forma, relegando o fator emigração.

REFERÊNCIAS

- [1] ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. BIG – Banco de Informações de Geração. Disponível em: <<http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil.cfm>>. Acessado em 14 de Outubro de 2019.
- [2] Bastos, Ana Cecília de Souza; TRAD, Leny A. Bonfim. A Família enquanto Contexto de Desenvolvimento Humano: Implicações para a Investigação em Saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 3, n. 1, p. 106–115, 1998.
- [3] Brasil. Ministério Público Federal. Procuradoria da República em Minas Gerais. *Termo de Acordo que celebram o Ministério Público Federal, o Estado de Minas Gerais, a Companhia Energética de Minas Gerais e a Fundação Estadual do Meio Ambiente*. Belo Horizonte, 2002.
- [4] Brasil. Resolução Nº 510, DE 07 de Abril de 2016. Brasília, DF, 2016. Disponível em: <<http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf>>. Acessado em 15 de Outubro de 2019.
- [5] CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais. Irapé. Disponível em: <http://www.cemig.com.br/ptbr/A_Cemig_e_o_Futuro/sustentabilidade/nossos_programas/ambientais/Irape/Pagina_s/usina.aspx>. Acessado em 14 de Outubro de 2019.
- [6] EIA/Rima CEMIG, Estudo de Viabilidade e Relatório de Impacto Ambiental Usina Hidrelétrica de Irapé. Belo Horizonte, Minas Gerais. Dezembro de 1993.
- [7] IBGE. Censo Demográfico 2010. Rio de Janeiro, RJ, 2016. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/97/cd_2010_familias_domicilios_amostra.pdf>. Acessado em 15 de Outubro de 2019.
- [8] Moretto, Evandro Mateus *et al.* Histórico, tendências e perspectivas no planejamento espacial de usinas hidrelétricas brasileiras: A antiga e atual fronteira amazônica. *Ambiente e Sociedade*, v. 15, n. 3, p. 141–164, 2012.

Capítulo 6

Mecanismos de favelização e segregação urbana: Considerações acerca das áreas de risco, prevenção e solução de desastres ambientais

Osires de Medeiros Melo Neto

Gustavo Correia Basto da Silva

Carmem Júlia Firmino Araruna

Carlus Alberto Oliveira dos Santos

Gabriel Gomes Passos de Caldas Lacerda

Waleska Fernanda Souto Nóbrega

Resumo: Este capítulo possui como objetivo, realizar uma abordagem teórica acerca dos processos de favelização e segregação urbana, considerando essas áreas como sendo de risco e necessidade de meios para prevenção e solução de desastres naturais.

Palavras-chave: Migração, Urbanização, Encostas, Deslizamento, Contenção

1. INTRODUÇÃO

Os movimentos migratórios normalmente ocorrem em cidades e capitais das quais demandam acentuadas concentrações de pessoas para a realização de mão de obra. De acordo com Matos (2012), este acontecimento deve ser conceituado como incontestável ao decorrer do desenvolvimento da humanidade, tanto no Brasil quanto nas demais nações do mundo. Contudo, há outros fatores que podem provocar o episódio destes acontecimentos.

O evento da migração para a zona urbana não é decorrente de apenas um fato. Este pode ocorrer em ação de diversos fatores diferentes. Porém, estes fatores devem ser muito persuasivos para que o migrante escolha-o fazer, sendo que, em geral, as pessoas não desejam sair de seus locais de origem e perder seus vínculos com a população local, com seus familiares e amigos. Ao migrarem para a cidade, a maioria dos jovens não possuem condições econômicas de viverem nos centros urbanos, e precisam se alojar em locais mais vulneráveis – áreas de risco – dos quais apresentam custos de manutenção de vida menores.

As cidades, muito provavelmente, não estão preparadas para receber grandes quantidades de indivíduos oriundos da zona rural. Estas vem crescendo de forma desordenada, sem que sejam realizados planejamentos urbanos. Este acontecimento faz com que a qualidade de vida da população seja afetada, haja vista que se torna difícil a disponibilização de lazer, saúde, emprego, habitação e educação eficaz para todos (SILVA, 2007). Estas pessoas acabam se instalando em locais de riscos como encostas e morros, vivendo numa construção insegura e irregular. A defesa civil – conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os desastres naturais e os incidentes tecnológicos, preservar a moral da população e restabelecer a normalidade social – deve agir de forma mais minuciosa em áreas de riscos, visando medidas de prevenção e solução para construções já existentes nesses locais. Existem custos de prevenção que na maioria são evitados pelos governos, acarretando maiores gastos após ocorrências de desastres, nos quais o governo deve realizar custos com obras de limpeza, reconstrução da área destruída, entre outros.

O padrão de desenvolvimento das sociedades humanas ao longo de sua história, e principalmente a partir da Revolução Industrial, tem sido severo e predatório aos ecossistemas, logo insustentável e causador de uma série de danos socioambientais, dentre os quais incontáveis riscos à saúde das populações silvestres e também humanas (CANO, 1989).

Segundo D'Ottaviano et al., (2008) nos últimos anos, a expansão da zona urbana tem sido caracterizada pelo surgimento de duas cidades diferentes, sendo uma definida por ser aquela localizada nas regiões centrais, legalizada, que concentra parte da população de classe média e alta e a outra cidade dada como ilegal, sendo destinada às casas da população de classe baixa, que são definidas pela criação de lotes e loteamentos irregulares, localizando-se, normalmente, nas regiões municipais onde ocorre a instalação de periferias e favelas. A distribuição urbana está associada sobretudo à condição socioeconômica dos moradores. Os que detêm de maior poder aquisitivo se matam no centro do município onde os terrenos possuem melhor localização e a qualidade de vida é bem valorizada. Já as pessoas de menor poder aquisitivo, adquirem terrenos mais baratos, localizados quase sempre nas extremidades da cidade, nas áreas mais distantes do centro, popularmente conhecidas como periferias e zonas de risco.

Áreas de risco são lugares onde é aconselhada a não construção de casas ou instalações, pois são muito expostas a desastres naturais, como desabamentos e inundações. Esses espaços vem aumentando constantemente nos últimos 10 anos, especialmente devido à própria ação humana. No Brasil, vêm sendo executados vários projetos no sentido de reestruturação de algumas áreas, conscientização da população, etc. As áreas cruciais de risco são aquelas sob encostas de morros inclinados ou à beira de rios. Existem vários serviços de assistência a população em casos de emergência. A principal instituição encarregada pelo monitoramento das áreas de risco é a Defesa Civil.

Foi particularmente a partir dos anos 60 que estudos técnicos a respeito de riscos, de caráter quantitativo, desenvolveram-se em diversas disciplinas, como toxicologia, epidemiologia, psicologia e engenharia (Guivant, 2000, p.285). O risco foi apontado, com base nesse comportamento técnico- quantitativo, um acontecimento hostil, uma atividade ou uma configuração física com determinadas probabilidades objetivas de causar destruições e que pode ser presumido através de cálculos de níveis de aceitabilidade, criando-se standards por meio de métodos diferenciados. Manifesta-se, assim, uma grande demanda por quantificação, mensuração, calculabilidade, com perspectivas ao controle dos respectivos fenômenos.

Diante do exposto, o corrente estudo apresenta como objetivo realizar uma abordagem teórica acerca dos processos de favelização e segregação urbana, considerando essas áreas como sendo de risco e necessidade de meios para prevenção e solução de desastres naturais.

2. METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura utilizando como fonte de pesquisa as seguintes bases de dados: ASCE Library – American Society of Civil Engineers, Banco de teses e dissertações da CAPES e IBGE, durante o intervalo de 2003 a 2019. A busca foi conduzida por um pesquisador e foram incluídos os estudos que envolviam os processos de segregação urbana, alojamento em áreas de risco, medidas de prevenção e solução de desastres naturais. Foram excluídos estudos que abordavam desastres acarretados por negligência técnica em construções urbanas por não estarem incluídos no escopo da presente pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O início do período de chuvas amplia os riscos de inundação, desabamentos de casas e deslizamentos de terra. Existem vestígios nítidos para reconhecer e evitar as grandes tragédias. Postes, cercas e árvores que começam a inclinar indicam que o terreno está se movendo. Trincas nas paredes ou no chão e degraus, junto aos barrancos, são outro vestígio de alerta. Deslizamentos de terra são um sério problema enfrentado por centenas de cidades brasileiras.

O problema ocorre bastante pela ocupação desordenada destas áreas de risco. A remoção da cobertura original de vegetação, que é encarregada pela consistência do solo, associada aos altos índices pluviométricos, registrados principalmente no verão, são um convite às catástrofes que amedrontam as pessoas que vivem nestas áreas.

Existem fatores que contribuem para a ocorrência dos deslizamentos de encostas, são eles: inclinação acentuada do terreno, que impulsiona a água da chuva, fornecendo um forte potencial de destruição; espessura do solo, pois solos mais rasos são naturalmente mais instáveis, além de absorverem menos água; desmatamento e ocupação de encostas, somadas às chuvas intensas; deslocamento de rochas ou sedimentos, os chamados movimentos de massa; construção de moradias frágeis em áreas de solo raso e inclinação acentuada; precariedade nos mecanismos de prevenção e na fiscalização de ocupações de áreas de risco.

As bananeiras tão comuns nas paisagens dos morros, apesar de pertencerem à família das herbáceas, têm uma ação muito negativa quando instaladas em encostas. Desenvolvem-se sobre colúvios – conjunto de sedimentos composto de argila, siltica e grãos de quartzo que geralmente estão depositados em cima de grandes rochas – ou aterros não compactados, normalmente com a presença de lixo orgânico, aproveitando a boa porosidade e permeabilidade desses depósitos para acumular grandes volumes de água, de que necessitam para o seu metabolismo. São especialmente exuberantes as bananeiras nascidas próximas a fossas e locais de lançamento de águas residuais. Suas raízes não cumprem o papel de estruturação dos solos desempenhado por outros vegetais, sendo frequentemente responsáveis pelo arrastamento desses solos durante os deslizamentos.

O mapeamento destas áreas de risco é o passo inicial para prevenir o incidente de tragédias. Entretanto, boa parte destes lugares já são bem eminentes, principalmente pelas autoridades municipais e estaduais que fiscalizam mais de perto o problema. Em muitos casos, famílias estão sendo deslocadas destas áreas, apesar de algumas resistirem à saída. A ocupação irregular é mais um problema social que urbanístico em nosso país. E quando se fala de deslizamentos, é muito difícil responsabilizar sua origem a apenas um aspecto causador.

Em geral, as ocorrências decorrem da ação ou reação combinada de vários fatores: naturais, antrópicos, de legislação e gestão pública, principalmente. Assim sendo, a educação ambiental deve ser preferida em todos os níveis, envolvendo os legisladores, gestores públicos e a população em geral. Os habitantes instalados nesses lugares perigosos dificilmente querem deixar suas casas para morarem em outra localidade.

É dever do município desenvolver programas de prevenção de pessoas nessas áreas, mas é dever também realocar as mesmas para residências seguras, salubres, com acesso a rede de distribuição de água, esgotamento sanitário e energia elétrica. Em casos que não há como prevenir por já estarem situadas nesses locais de riscos e existindo a possibilidade de executar medidas de contenção do solo, é exercício sim do governo executar obras de contenção para segurança da população, evitando desastres socioambientais. Segundo dados do IBGE, no Brasil, cerca de 27 mil áreas com risco de desastres são habitadas. De acordo com um estudo divulgado pelo IBGE, 8.270.127 habitantes vivem em áreas consideradas de risco, onde a maioria das ocorrências é de enchentes e deslizamentos.

No ranking do IBGE, a região que ocupa o primeiro lugar é a sudeste em quantidade de pontos com ameaça: 17.175; em seguida o Nordeste com 5.471; o Sul tem 3.402; o Norte 1.553; e no Centro-Oeste, 59. Existem diversas maneiras para prevenir e solucionar deslizamentos de encostas. O solo deve ser estabilizado e contido por meio de obras de engenharia, a fim de trazer segurança e bem estar a população que habita nessas proximidades. As soluções estruturadoras para os morros são aquelas que possibilitam condições de estabilidade, que só se viabilizam quando a encosta é tratada como um todo, com soluções combinadas de retaludamento, de proteção superficial com materiais naturais e artificiais e de drenagem adequada à microbacia em questão, além de obras de estrutura de contenção, tais como muros de arrimo, quando necessários. Obras pontuais, mesmo aquelas que empregam muros de arrimo, podem perder sua eficiência em pouco tempo, chegando até a serem destruídas, pela ausência de harmonia com o resto da área. Alvos de erosão ou infiltração na descontinuidade de obra/solo surgem depressa após a sua conclusão. Nos acontecimentos de avanço de massas já escorregadas ou resultantes de corridas, as respostas são achadas em barreiras naturais ou artificiais, realizadas com vegetação ou muros convencionais. É fundamental a visita de inspeção, para conhecer as características particulares de cada lugar (litologia, morfologia, drenagem).

Essas soluções servem de apoio nas decisões permitindo a escolha do tipo de obra e serviço que melhor se adequa à estabilização da encosta. Demonstrem também como objetivo incentivar a inovação para adaptação e/ou modificação total ou parcial das técnicas expostas, diante das características geotécnicas encontradas, dos recursos e mão de obra disponíveis e de outros fatores condicionantes. Lembrando que a drenagem, o esgotamento sanitário e o lixo são elementos relevantes para a manutenção da estabilidade das encostas. As edificações que se encontrarem total ou parcialmente sobre a massa rompida e a menos de 5 metros da fenda, no topo devem ser removidas imediatamente; na base da encosta, deverão ser removidas as casas que fiquem nas imediações da frente do deslizamento, sendo que a distância depende das dimensões da ruptura e do volume de solo envolvido no processo, mas não deve ser inferior a 10 metros; em encostas muito íngremes, essas distâncias precisam ser redimensionadas em função da geometria da encosta e da superfície de ruptura.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, pode-se alegar que os fluxos migratórios não são fenômenos resultantes apenas das grandes cidades, mas também de cidades pequenas e do interior dos estados. Isso ocorre devido a necessidade do indivíduo em trabalhar, estudar, buscar oportunidades de lazer, praias, entre outros. O difícil é a realidade que encontram ao chegarem lá: cidades sem planejamento urbano para imigrantes, falta de fiscalização e apoio do governo para construção de casas em locais seguros. Em sua maioria, a única solução para eles é se instalarem em locais distantes do centro, onde as leis não são impostas e a população é carente de saneamento, segurança e sistema viário eficiente.

Estas instalações ocorrem geralmente em áreas de riscos como encostas e morros, que precisam de obras de engenharia para firmar o solo e prepara-lo para as construções, evento que não ocorre nas periferias. Portanto, o apelo que se faz é que o governo busque otimizar seu sistema de fiscalização de obras irregulares, que a gestão pública busque solução de realocação da população para locais dignos de moradia, e sejam realizadas execuções de obras para estabilização de solos com e sem estrutura de contenção, decidindo após uma avaliação técnica da área.

REFERÊNCIAS

- [1] Alheiros, M. M.; Souza, M. A. A.; Bitoun, J.; Medeiros, S. M. G. M.; Junior Amorim, W. M. Manual de ocupação dos morros da região metropolitana do recife. Recife. 2003.
- [2] Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Acesso em: 20/07/19.
- [3] Maragon, M. Geotecnia de contenções. Tópicos em Geotecnia e Obras de Terra. Universidade Federal de Juiz de Fora. 2009.
- [4] Martins, K. G. Expansão urbana desordenada e aumento dos riscos ambientais à saúde humana: o caso brasileiro. Planaltina – DF. 2012.
- [5] Silva, J. C. B. Muito além da questão ambiental: discursos sobre as gestões dos riscos no contexto das emergências e desastres. Recife. 2017.
- [6] Sopran, G. C.; Debarba, A. L. O surgimento e aumento da população das periferias da região oeste de Santa Catarina: uma abordagem teórica. 2017.
- [7] Vargas, M. A. R. Construção social da moradia de risco: a experiência de Juiz de Fora (MG), 2006.

Capítulo 7

A educação do campo em uma perspectiva agroecológica no Assentamento Zumbi dos Palmares – Mari – PB

Edvaldo Carlos de Lima

Juliane Faustino da Silva

Lenira Lins da Silva

Resumo: A discussão referente ao meio ambiente e as práticas de desenvolvimento sustentável também precisam estar integradas a educação do campo, a preocupação a respeito da preservação do espaço como um todo, deve estar na pauta de abordagem dessas instituições. Este trabalho tem por objetivo analisar e evidenciar os princípios do manejo dos recursos naturais do Assentamento Zumbi dos Palmares no município de Mari-PB. A preservação dos lençóis freáticos e veios d'água que estão presentes na superfície e no subsolo são uma preocupação dos camponeses que procuram manter uma produção agroecológica, sem uso de agroquímicos. Colaborando assim, para a preservação dessas nascentes e de todo conjunto de recursos naturais. Os procedimentos metodológicos pautaram-se em pesquisa de campo, entrevistas com os camponeses integrantes do assentamento, registros fotográficos e levantamento bibliográfico das obras de autores que abordam a presente temática. Os resultados obtidos permitem inferir que o Assentamento Zumbi dos Palmares ao elencar a preservação do meio ambiente e desenvolver práticas de desenvolvimento sustentável, promove a autonomia e a preservação não só ao que concerne a produção agrícola, mas também permite que a instituição de ensino inserida no assentamento tenha a possibilidade de utilizar a agroecologia como metodologia de ensino. Assim, observa-se como abordagens referentes a sustentabilidade por parte das comunidades do campo permitem a integração do todo, que perpassa desde a produção agroecológica até as instituições de ensino.

Palavras-chave: educação do campo, agroecologia, meio ambiente, sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

A educação do campo é um paradigma que vem ganhando espaço na sociedade atual, evidenciando a importância da educação como elemento para o desenvolvimento do campo. Visando atribuir um novo paradigma que contemple a realidade das escolas do campo, visto que, os movimentos sociais visam implementar processos de formação humana, baseado no trabalho e nas formas de produção sustentáveis atreladas a educação.

Da mesma forma, a agroecologia como metodologia nas escolas do campo busca contribuir para ruptura do modelo de educação atual, que tem como base interesses capitalistas. Com isso, trabalhar a perspectiva agroecológica é pensar em um novo modelo de sociedade. Considerando, que é no contexto marcado por uma rápida expansão do agronegócio, que a agroecologia assume o papel de construir um novo projeto de desenvolvimento econômico e social. Todavia, é possível identificar que a educação do campo abrange um conjunto de propostas educacionais na perspectiva agroecológica.

Diante das intempéries existentes no campo brasileiro, um fator que permanece em evidência, é a luta dos movimentos sociais, principalmente a do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que vem lutando para estabelecer uma agricultura limpa. Esse processo ocorre de forma lenta, estruturada na educação do campo e fundamentada em princípios agroecológicos. O objetivo é propor um modelo sustentável de agricultura no espaço rural, que seja elemento de valorização da agricultura camponesa antagônica à agricultura capitalista.

Diante do contexto atual e da importância da temática abordada, o objetivo deste trabalho está pautado em analisar a educação do campo na perspectiva agroecológica. Buscando evidenciar os princípios do manejo dos recursos naturais do Assentamento Zumbi dos Palmares no município de Mari-PB. Enquanto metodologia, optamos por utilizar em primeiro momento uma pesquisa bibliográfica com respaldo teórico em autores que abordam a temática da educação do campo e a agroecologia. Como referencial teórico podemos destacar por exemplo: Caldart (2012), Guhur e Toná (2012), Villar (2013) entre outros autores. Atrelado a isto, a pesquisa em campo foi fundamental para constatar as informações presentes neste trabalho.

Portanto, a agroecologia enquanto princípio da educação do campo vem ganhando espaço nas discussões referentes a temática. Havendo assim, uma necessidade de compreender as interfaces da educação do campo integrada a agroecologia, e como esta proposta vem interferindo no processo de desenvolvimento do Assentamento Zumbi dos Palmares e a valorização da agricultura camponesa enquanto produção sustentável.

2. METODOLOGIA

Os procedimentos e caminhos metodológicos utilizados para dar embasamento ao presente trabalho pautaram-se na pesquisa e análise da revisão bibliográfica de alguns autores que abordam em suas obras o tema central da presente temática ou temas relacionados a mesma. Sejam eles, meio ambiente, educação do campo, assentamentos de reforma agrária e sustentabilidade.

Optou-se então, pela utilização de pesquisa de campo para observação das questões e temáticas relacionadas ao meio ambiente e a sustentabilidade do Assentamento Zumbi dos Palmares em Mari-PB, e como essas questões estão inseridas no contexto das escolas do campo do referido assentamento, e de que forma a agroecologia, a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente podem estar atrelados à dinâmica das instituições de ensino do campo.

Além disso, foram aplicados na pesquisa de campo, questionários abertos direcionados aos professores e membros da administração da escola e também aos moradores da referida comunidade, gravações em áudio e registros fotográficos também foram utilizados. Dessa forma, tem-se a pesquisa de campo como indispensável para elaboração da presente discussão.

3. EDUCAÇÃO DO/NO CAMPO

Diante da diversidade e pluralidade existente no âmbito social, a educação em toda sua conjuntura apresenta-se de maneira plural e heterogênea, elaborada no intuito de atender a toda e qualquer realidade e aos mais diversos espaços existentes. É necessário então, considerar e analisar o processo educativo a partir de uma perspectiva cultural, social, política e econômica.

Logo, é necessário o entendimento de que a escola é um importante espaço de construção e reconhecimento pessoal, de identidade, voltada a atender as especificidades e particularidades existentes. Neste sentido,

Os processos educativos se desenvolvem a partir de diferentes configurações. A pluralidade de espaços, tempos e linguagens deve ser não somente reconhecida, como promovida. A educação não pode ser enquadrada numa lógica unidimensional, aprisionada numa institucionalização específica. É energia de vida, de crescimento humano e de construção social. O importante é seu horizonte de sentido: formar pessoas capazes de ser sujeitos de suas vidas, conscientes de suas opções, valores e projetos de referência e atores sociais comprometidos com um projeto de sociedade e humanidade. (Candau, 2008, p. 13).

Dessa forma, o âmbito educacional se configura em um espaço que pode ir além da função de ensinar, podendo proporcionar ao aluno uma formação cidadã que tenha como base e princípio o seu cotidiano, sua realidade. Além do ensino e da aprendizagem em si, devem ser consideradas questões como interculturalidade e multiculturalismo na escola, ou seja, as particularidades de cada realidade referentes as comunidades e contextos sociais em que as instituições de ensino estão inseridas.

Nesse contexto se insere a educação do/no campo, resultado das históricas lutas dos movimentos sociais no campo, como é o caso do MST, de ativismo político social que une forças para promover dignidade e qualidade de vida no campo, com acesso a terra por parte dos camponeses, tendo como principal foco o trabalhador do campo e a Reforma Agrária.

Mas a trajetória do MST foi produzindo um alargamento das concepções e das tarefas tanto de formação como da educação que hoje elas, em muitos momentos, se entrelaçam, ainda que sem perder sua especificidade. Na prática, afinal, o centro das preocupações de ambas está na formação humana, desdobradas em questões específicas da formação dos sujeitos sem-terra e dos lutadores do povo, conforme ela aconteça em um outro tempo da vida, na escola ou em outros lugares. (Caldart, 2012, p. 284).

A educação do campo procura então estabelecer suas especificidades e particularidades por meio de princípios, no intuito de fundamentar os preceitos que circundam o âmbito educacional no campo, buscando evidenciar a importância que ela tem enquanto função social, que se integra a sociedade de forma a contribuir positivamente para uma educação que faça a diferença e que possa abranger toda a circunstância da comunidade em que a escola possa estar inserida.

A escola vinculada e integrada ao cotidiano do aluno, caracteriza uma questão importante, que é a de proporcionar aos sujeitos do campo, autonomia e emancipação, podendo a partir disso corroborar para que haja uma formação educacional centrada no processo de reconhecimento e de construção de uma identidade que seja condizente com a realidade e meio que o cerca. Logo, o diálogo é de extrema importância nesse processo, pois a comunidade e a escola precisam estar próximas e intimamente correlacionadas.

Dessa forma, há a necessidade por parte da educação do campo de analisar e de fazer um resgate histórico das vivências e lutas no campo, no intuito de situar o aluno a respeito do espaço que o cerca, uma vez que a estrutura social atual de uma determinada comunidade, é resultado dos saberes construídos socialmente e em uma perspectiva histórica.

Muitas são as dificuldades a serem superadas pela educação do campo, o acentuado processo de exclusão que os povos do campo sofreram ainda se reflete na contemporaneidade. Assim, a educação pensada pelos movimentos sociais visa para a comunidade uma conformidade e equilíbrio entre o espaço em que a escola está inserida, no caso a realidade agrária, e a própria conjuntura educacional.

Segundo Caume (2006), antes das lutas efetivas por uma educação do campo por parte do MST, principalmente nos assentamentos de Reforma Agrária, as escolas tinham a função prioritária de dar ocupação as crianças. Este contexto se desfaz ao passo que a ideia de uma educação que tenha função social e que dê retorno para a sociedade se institui. Logo, as mães juntamente com as professoras desencadeiam as primeiras discussões a respeito de escolas que de fato, proporcionem uma formação mais sólida e que sobretudo, possa dar retorno em um futuro não distante.

A essa conjuntura se incorpora a formação dos professores para atuar nessas instituições, pois devem estar preparados para atender as especificidades da realidade do campo, integrando ao ensino, metodologias que possam vir a ajudar no processo de ensino e aprendizagem dos discentes como a agroecologia, com práticas de produção agrícola que evidenciem acima de tudo com o meio ambiente.

4. ASPECTOS AGROECOLÓGICOS E EDUCAÇÃO DO CAMPO

A agroecologia é um paradigma considerado recente, surgindo por volta de 1930, estabelecendo um novo conceito de agricultura. Este conceito está voltado para o desenvolvimento agrícola sustentável considerando várias dimensões ecológicas, econômicas e socioculturais no campo brasileiro. Segundo Gubur e Toná (2012), este termo se popularizou apenas nos anos 80, como viés sociológico voltado para análise dos agroecossistemas.

Pode-se dizer então, que avaliar este modelo de produção nos ajuda entender à trajetória do surgimento da agricultura sustentável como fator contraditório a agricultura convencional. Neste contexto, fica claro que a grande preocupação presente nesta ciência não se restringe apenas aos problemas com doenças, pragas e o solo, mas, com o conjunto que forma o agrossistema. Como bem nos assegura Gubur e Toná (2012), a partir dos anos 70 a agricultura passou por intensas transformações como resultado dos pacotes tecnológicos criados na revolução verde, promovendo a transição da agricultura tradicional para uma agricultura com técnicas modernas, conhecida atualmente como agronegócio. Não é exagero afirmar que através do surgimento desse modelo de agricultura, ocorreu a expansão da produção de alimentos no que se referem as diversas fronteiras agrícolas existentes.

Assim, preocupa o fato de que o agronegócio está provocando sérios problemas ambientais, isso porque a agricultura capitalista vem importunando uma série de malefícios, através de tecnologias agressivas e uso excessivo de agrotóxicos, monoculturas e sementes transgênicas em prol do lucro (Costa, 2018).

Conforme explicado acima é interessante, aliás, afirmar, que a agroecologia se contrapõe ao agronegócio, se sobrepondo a busca pelo entendimento dos vários processos que constituem o funcionamento das unidades de produção existentes na extensão rural. Assim, requer levar em consideração, práticas tradicionais e os conhecimentos empíricos acumulados pelos próprios agricultores. Deste modo não parece haver razão para discordar da agroecologia enquanto alternativa de fortalecimento econômico, social e territorial da agricultura camponesa. Desta forma, os movimentos sociais do campo vêm abordando em seus discursos este modelo de produção como estratégia política de desenvolvimento para o campo e a sociedade.

Conforme Tadin e Guhur (2019), a prática agroecológica enquanto modelo de produção está sendo disseminada no contexto atual, derivando de uma nova relação entre o homem e a natureza em confronto com o agronegócio. Os autores deixam claro que se trata inegavelmente de uma tentativa de estabelecer a sustentabilidade atrelada ao desenvolvimento social e econômico promovendo a manutenção da soberania alimentar no meio rural.

Na realidade, a educação do campo se reveste de particular importância no estabelecimento desta nova concepção de desenvolvimento territorial e organizacional dos assentamentos. Sob essa ótica, ganha relevância a adoção da agroecologia como metodologia de ensino, bem como a necessidade da formação de professores para trabalhar com esta nova dimensão. Este novo paradigma é compreendido não apenas como um princípio educativo, mas como elemento de valorização da agricultura camponesa defendida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) dentro da luta pela Reforma Agrária.

Pode-se dizer que foi a partir da construção de uma relação didática e metodológica ligada aos fundamentos da agroecologia, que emerge a educação do campo como uma ponte para o ensino de um modelo agrícola sustentável. Neste contexto, fica claro a existência da necessidade de valorizar a produção camponesa. O mais preocupante, contudo, é constatar que a agroecologia continua sendo considerada um termo estático, visto que, ela tem sua importância dentro dos movimentos sociais do campo principalmente na via campesina, MST entre outros. Isso porque envolve um conjunto de características culturais, sociais e econômicas específicas, antagônicas a agricultura capitalista.

Ora, em tese, é necessário considerar a realidade social e cultural, local para de fato a educação do campo ser estabelecida enquanto um modelo educacional que preze à realidade sócio-econômico-ambiental. É importante considerar que a agroecologia vem se firmando como um paradigma junto a educação do campo como resultado das lutas que envolvem camponeses sem-terra, indígenas e outras organizações não governamentais. Isso porque diante do rápido processo de desenvolvimento do modelo socioeconômico atual, afeta as várias categorias sociais existentes no campo brasileiro. Neste caso, faz-se pertinente evidenciar a participação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) que luta contra a hegemonia capitalista ao introduzir dentro da sua luta, a preocupação com os aspectos educacionais interligados ao agroecológico, inserido nas escolas que trabalham com educação do campo.

De acordo com os autores Guhur e Toná as concepções agroecológicas compõem um conjunto de estratégias contra o agronegócio como está explícito abaixo.

Nessa concepção, 'a agroecologia inclui: o cuidado e defesa da vida, produção de alimentos, consciência política e organizacional'. Compreende-se que ela seja inseparável da luta pela soberania alimentar e energética, pela defesa e recuperação de territórios, pelas reformas agrária e urbana, e pela cooperação e aliança entre os povos do campo e da cidade. A agroecologia se insere, dessa maneira, na busca por construir uma sociedade de produtores livremente associados para a sustentação de toda a vida, sociedade na qual o objetivo final deixa de ser o lucro, passando a ser a emancipação humana (Guhur, Toná, 2012, p.66).

Os autores deixam claro na fala acima, que o foco da agroecologia está no desenvolvimento de uma agricultura sustentável. Esse é o motivo pelo qual é importante frisar esse ponto, uma vez que há a necessidade de alimentar o desejo de uma preservação ambiental para além do interesse meramente econômico. Por isso, orientar uma luta social e política atrelada ao assistencialismo direcionado aos agricultores em uma visão ecológica, seria na verdade, uma forma de lutar contra os avanços das corporações agroindustriais hegemônicas que avançam no espaço rural.

Sendo assim, a agroecologia inserida na educação do campo como princípio educativo permite uma troca de conhecimento entre os alunos, professores e agricultores interessados no desenvolvimento de uma agricultura agroecológica, preocupada com o meio ambiente. Desta forma, há uma preocupação por parte do MST, inserido em uma luta histórica de transição agroecológica, através da compreensão da necessidade das famílias camponesas em retomar seu território de produção e manutenção da soberania alimentar.

A educação do campo vem assumindo o papel de formar pessoas conscientes da urgência em pensar formas de estabelecer uma relação entre homem e natureza. Consciência essa, que foi perdida a partir da entrada do capitalismo no campo. O objetivo é estabelecer uma nova sociedade consciente e com princípios de produção agrícola fundamentados na agroecologia.

5. GESTÃO AGROECOLÓGICA NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES

Um dos princípios fundamentais do manejo de recursos naturais no Assentamento Zumbi dos Palmares é a preservação dos lençóis freáticos e veios d'água que estão presentes na superfície e no subsolo. Os camponeses de algum modo mantêm preservadas as nascentes no momento em que o lençol freático atinge a superfície. Apesar da falta de proteção nas áreas de nascentes, os camponeses mantêm estes recursos livres de contaminações agroquímicas.

Através dos estudos realizados no Assentamento Zumbi situado em área de Reforma Agrária, é possível afirmar que o mesmo é constituído como um espaço de luta e resistência das famílias assentadas que buscam condições dignas de vida. Desta forma, o modelo característico de produção que marca o assentamento é a produção agroecológica, influenciando principalmente na saúde dos camponeses e refletindo diretamente na proteção ambiental. Isso demonstra preocupação com a gestão dos recursos naturais no assentamento e a atenção referente aos riscos do uso de agrotóxicos nas lavouras. Visto que, é uma das principais formas de contaminação do solo e fontes de água de acordo com (Cunha 2011).

O Assentamento Zumbi dos Palmares, possui 1.200 hectares subdividido em lotes para 82 famílias, que residem no local. Atualmente, 20% da área não ocupada obrigatoriamente deve ser conservada como área de preservação, tanto da vegetação nativa como das nascentes de água doce. Assim, as famílias não podem cultivar ou colocar animais nessas áreas.

Na figura 1 e 2 destacadas a seguir, há uma nascente de água doce conhecida popularmente como olho d'água, no qual os moradores vem tentando mantê-la preservada e sem contaminação por dejetos, produtos agroquímicos e lixo, embora não apresente estratégias aos arredores da fonte para evitar contaminações na mesma.

Figura 1: área de preservação de uma nascente no Assentamento Zumbi dos Palmares

Fonte: Trabalho de Campo, 2019

Figura 2: Área de preservação de uma nascente no Assentamento Zumbi dos Palmares

Fonte: Trabalho de Campo, 2019

Neste espaço composto por famílias inseridas no Programa de Reforma Agrária, é importante salientar que a produção agrícola do assentamento caracteriza-se por ter uma vertente agroecológica, portanto, diversificada e rica em variedades de produtos como por exemplo: feijão, milho, batata doce, hortaliças, frutíferas e macaxeira considerada o principal produto. Todos estão livres de agrotóxicos, popularmente conhecido como veneno. Combatido pelo movimento que está a frente do assentamento, no caso o MST.

Geralmente, as plantações são realizadas aos redores das residências para subsistência das famílias, ou em áreas coletivas destinadas a cooperativa do assentamento, em seguida o lucro é dividido entre os produtores. Enquanto técnica, é utilizado o sistema de rotação e consórcio, envolvendo várias culturas no mesmo espaço trabalhadas em conjunto utilizando roça manual e cultivo utilizando trator. Grande parte é produzida de forma artesanal, resultando em uma produção limitada que não condiz com o potencial produtivo do assentamento.

Com relação ao manejo da terra o mesmo ocorre de forma manual, as ferramentas são enxadadas, foices e as vezes trator, algumas produções recebem irrigações com o sistema de gotejamento, como as hortas. Os defensivos agrícolas são naturais e desenvolvidos pelos próprios camponeses para eliminar pragas e doenças nas lavouras. Além de contribuir para a preservação do solo, fauna, flora e dos lençóis freáticos. Os alimentos saudáveis influenciam na saúde da própria comunidade e as pessoas que compram estes produtos nas feiras livres na cidade de Mari e outras cidades circunvizinhas.

As imagens 3 e 4, referem-se ao cultivo de uma horta orgânica no lote de um dos moradores que entrevistamos. É interessante deixar claro que esses produtos são direcionados para o consumo próprio, os excedentes são comercializados nas feiras livre e através de atravessadores.

Também são fornecidos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), inclusive a escola do assentamento faz parte deste programa.

Figura 3: Cultivo de horta orgânica no Assentamento Zumbi dos Palmares

Fonte: Trabalho de Campo, 2019

Figura 4: Cultivo de horta orgânica no Assentamento Zumbi de Palmares

Fonte: Trabalho de Campo, 2019

O Setor da Educação no MST, vem lutando para implantar esta prática na grade curricular das escolas do campo. Porém não vem sendo um trabalho fácil, pois requer formação do corpo docente e projetos para desenvolver a agroecologia como metodologia de ensino, vinculado ao projeto de Reforma Agrária. A alguns anos o movimento vem idealizando este projeto com matriz voltada para a defesa da vida, afim de estabelecer uma relação entre campo e cidade.

Todos os aspectos abordados anteriormente fazem parte da perspectiva agroecológica, a preocupação com o solo, fauna, flora, e produção de alimentos saudáveis que podem ser empregados como conteúdos da agroecologia. Visto que, faz parte da realidade dos educandos, camponeses do Assentamento Zumbi dos Palmares. A escola que recebe o mesmo nome do assentamento, é legalmente reconhecida como Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Zumbi dos Palmares, a mesma vem tentando implantar uma perspectiva interdisciplinar utilizando temas transversais com conteúdos agroecológicos estabelecendo um diálogo com os currículos contribuindo no processo de ensino-aprendizagem.

Várias temáticas podem ser abordadas para construir junto aos alunos, conhecimentos com vertentes agroecológicas e manutenção do desenvolvimento sustentável no assentamento, como por exemplo: conhecimentos tradicionais dos camponeses em relação a agricultura, produção agroecológica dos alimentos produzidos nos lotes, produção de sementes crioulas, conservação das nascentes e à problemática da utilização de venenos. Além, desses pontos que podem ser trabalhados, o cultivo de hortas orgânicas na escola, enquanto ferramenta metodológica é imprescindível, para que as crianças compreendam desde cedo todo o processo do manejo e preparação correta da terra, como o cultivo do alface, coentro, couve, tomate. Através da horta é plausível ensinar valores culturais, sociais e ambientais, e também Ciências, Geografia, Matemática e outros componentes curriculares de forma prática.

Entretanto, desenvolver a agroecologia como metodologia na Escola Zumbi dos Palmares é um desafio, considerando a necessidade da formação e capacitação do conjunto pedagógico para implementar práticas agroecológicas na escola, atrelado a isso, uma infraestrutura adequada. A própria realidade do educando pode ser utilizada neste processo, já que faz parte do seu cotidiano familiar.

Segundo Caldart (2015), existe uma razão para buscar estabelecer uma educação do campo ligada a agroecologia nas escolas, seria a valorização das diferentes dimensões da vida e especificamente em sua ampla diversidade. A escola Zumbi, inserida em uma realidade de Reforma Agrária, vem lutando para implantar a agroecologia nos currículos, isso significa que a escola têm o grande desafio de formar cidadãos conscientes da necessidade e importância da hegemonia da agricultura camponesa.

Dada à importância do tema, portanto, torna-se necessário o desenvolvimento de projetos que visem à formação de educadores capacitados para atuar neste contexto, assim possam desencadear habilidades e competências para garantir um ensino que compete com a realidade dos educandos. Todavia, seria um grande passo para garantir uma educação de qualidade e, assim, efetivar a agroecologia como prática pedagógica diferenciada.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observa-se então, o leque de abordagens que podem ser desencadeadas a partir da análise da agroecologia integrada ao âmbito rural, especificamente nos assentamentos de Reforma Agrária, em que há a produção agrícola em uma perspectiva natural, sem uso de agroquímicos, tendo como princípio e base para toda prática referente a produção, o meio ambiente e a sustentabilidade, uma vez que a preservação dos recursos naturais é de extrema importância para que haja não somente um desenvolvimento econômico, mas também humano e social.

A essa conjuntura se integra a educação do campo, que ao estar diretamente relacionada aos processos de produção agrícola das comunidades rurais, também traz para o âmbito escolar as discussões referentes a sustentabilidade, e isso em uma perspectiva prática, ou seja, trazer a realidade do aluno para a sala de aula, promovendo a troca de saberes e de vivências, uma vez que os discentes e seus familiares estão diretamente incorporados ao processo de produção e de preservação do meio.

O Assentamento Zumbi dos Palmares ao preservar nascentes de água, ter uma porcentagem de seu lote destinada a áreas de preservação e não utilizar agrotóxicos na produção agrícola, promove a conscientização de toda a comunidade, desde as famílias responsáveis pela produção agrícola até as pessoas que compram os alimentos na feira livre.

Apesar da discussão referente a agroecologia como metodologia de ensino nas escolas do campo ainda ser um grande desafio, as lutas por parte dos movimentos sociais e sindicais em superar as dificuldades estruturais é evidente. A formação adequada de professores, com capacitação pedagógica condizente com a realidade do campo é necessária. Incorporando ao processo de ensino e aprendizagem a realidade do aluno.

REFERÊNCIAS

- [1] Costa, Rafaella. Agroecologia nas escolas do campo: caminhos e metodologias. MST, Bahia, 20.Nov.2018.Disponível em: <<http://www.mst.org.br/2018/11/20/importancia-da-agroecologia-no-curriculo-das-escola-do-campo.html>>. Acesso em: 20 Outubro 2019.
- [2] Candau, Vera Mandau. Reinventar a escola. 6.ed. Petrópoles, RJ: vozes, 2008, 258 p.
- [3] Caume, David José. O MST e os assentamentos de reforma agrária: a construção de espaços sociais e modelares. - Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo Fundo; Goiânia; Ed. Da Universidade Federal de Goiás, 2006. 304p.
- [4] Caldart, Roseli Salete. Pedagogia do movimento sem-terra. 4.ed. São Paulo: Expressão popular, 2012, 448 p.
- [5] Caldart, Roseli Salete. Escolas do campo e Agroecologia: uma agenda de trabalho com a vida, 2015, mimeo.
- [6] Cunha, Geane Gonçalves de. Análise do processo de formação do Assentamento Zumbi dos Palmares, Mari/PB. 2011. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Geografia)-Universidade Estadual da Paraíba, Guarabira, 2011, 43 p.

[7] Guhur, D. M. P.; Toná, N. Agroecologia. In: Caldart, R. S.; Pereira, I. B.; Alentejano, P.; Frigotto, G. (org). Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, São Paulo: Expressão Popular, 2012. p.59-67.

[8] Villar, J. P.; Cardoso, I. M.; Ferrari, E. A.; Dal Soglio, F. K. Os caminhos da agroecologia no Brasil. In: GOMES, João Carlos Costa; ASSIS, William Santos de. (Org.). Agroecologia princípios e reflexões. 1. ed. Brasília: Embrapa, 2013. v. 1, p. 37.

Capítulo 8

Agrofloresta como modelo de produção no Semiárido

Letícia de Oliveira Bezerra

Débora Candido

Amaury Alves da Silva Junior

Euler dos Santos Silva

Nayane da Silva Lima

Darlene Sausen

Resumo: As agroflorestas ou sistemas agroflorestais (SAF) são um modelo de produção que visa simular as condições naturais encontradas no meio ambiente, com o intuito de realizar uma exploração mínima e consciente dos recursos naturais, tentando promover ao máximo uma reposição destes recursos. Foi realizado um levantamento de dados a respeito do local de implantação, da estrutura já existente e das pretensões do produtor. A partir destes dados foram selecionadas as espécies que iriam compor o SAF levando em consideração a utilização dos produtos oriundos destas espécies e a capacidade de mutualismo, de forma que diminuísse os gastos com produção, manutenção e promovesse uma regeneração do solo. Com base nas espécies selecionadas foi proposto um modelo de como seriam alocadas em campo de modo que não houvesse uma intervenção no desenvolvimento umas das outras e realizado um orçamento de implantação e manutenção deste SAF para cinco anos. Apesar de ter apresentado um elevado custo de implantação, chegou-se a conclusão que os SAF são um modelo de produção indicado para o semiárido em substituição ao monocultivo, tendo em vista que promove um aumento da diversidade e como consequência uma diminuição do desenvolvimento de doenças em plantas, diminui a evapotranspiração das espécies, assim aumentando os intervalos de irrigação, promove uma fixação biológica de nitrogênio por meio das leguminosas e possui um rápido retorno do investimento inicial assim, justificando a adesão deste modelo de produção em pequenas propriedades.

Palavras-chave: Agrossilvipastoril, Conservação do solo, Diversidade, Sustentabilidade, Sistema integrado.

1. INTRODUÇÃO

Devido aos avanços tecnológicos das últimas décadas e ao modelo de produção que priorizava o cultivo especializado de uma única espécie, seja de *commodities*, como a soja e o milho, seja de outros produtos de origem florestal ou animal, como a celulose ou a carne, o Brasil se tornou um grande produtor mundial de alimentos (BARBOSA, et al., 2019; ARAÚZ FILHO; PLACHA, 2018; MACEDO; NISHIZAKI JÚNIOR, 2017). Essa agricultura intensiva estabelecida pelo sistema monocultor estimula a indústria de insumos e implementos agrícolas e acelera o crescimento da economia (TEIXEIRA, 2005). No entanto, esse estilo de produção requer o uso de muito insumo e é pouco conservacionista (GRAIN, 2014; SHIVA, 2003 apud MOTTER, 2010).

A monocultura é um sistema de produção **de uma única espécie vegetal** ou animal, sendo normalmente realizada em extensas áreas e com o uso intensivo de insumos (ZIMMERMANN, 2009). Interessante devido sua alta capacidade de produção de alimento e/ou produtos madeireiros, em contra partida, é uma técnica de cultivo com alto impacto ambiental, tendo em vista, que faz supressão da vegetação pré-existente para substituí-la pela cultura a ser explorada, com isso, o habitat que ali existia será desfeito, reduzindo as condições favoráveis a vida e ao desenvolvimento de espécies nativas (ZIMMERMANN, 2009; SOARES ; PORTO, 2007).

As agroflorestas ou sistemas agroflorestais (SAF) são um modelo de produção que possui um baixo impacto ambiental, pois, preconizam que em uma mesma área de plantio possa ser utilizada para explorar culturas agrícolas e florestais, além de introduzir a pecuária no mesmo sistema, ou seja, faz um uso efetivo da terra e é capaz de possibilitar a produção animal num mesmo local (EMBRAPA, 2016). Sua utilização possui grande importância socioeconômica e ecológica, contribuindo, inclusive, com a segurança alimentar e nutricional a nível de agricultura familiar (VALENTE, 2002).

Este modelo visa simular as condições naturais às quais possuem grande diversificação de fauna e flora, diversificação essa que promove um menor desenvolvimento de doenças e maior reposição de matéria orgânica por meio da decomposição de serapilheira (RIBASKI, 2020). Nestes ambientes há um microclima local que proporciona uma menor evapotranspiração das culturas além de manter o solo com uma temperatura quase constante e ideal para o desenvolvimento das plantas, além auxiliar na diminuição de pragas e doenças de plantas devido à grande diversidade de culturas em diferentes fases fenológicas presentes em um mesmo ambiente, promove a diversificação de insetos sendo estes polinizadores ou não, dentre outros benefícios (AYRES; RIBEIRO, 2010 apud SILVA; DRUMOND; BAKKE, 2014). Ou seja, os SAF apresentam-se como solução para as produções em pequena escala que fazem uso de monoculturas.

Entretanto, a implantação dos SAF atualmente ainda possui um custo elevado, o que dificulta a substituição da monocultura por este sistema de produção. Porém vale ressaltar, que apesar de possuir um custo elevado de implantação, estes sistemas possuem um custo menor de manutenção quando comparados aos cultivos de monoculturas, pois apresentam uma menor taxa de desenvolvimento de pragas e doenças e necessitam de uma menor reposição de nutrientes no solo, ou seja, o custo de implantação acaba sendo dissolvido ao longo dos anos por possuir um menor custo de manutenção (EMBRAPA, 2016).

A utilização de SAF em pequenas propriedades rurais e que apresentam solos degradados devido ao seu mau uso é de grande importância, pois além de manter uma exploração constante de produtos agrícolas por meio do produtor rural devido à grande diversidade de culturas presentes, auxilia na recuperação destes solos por meio da deposição de matéria orgânica promovida pelas espécies florestais. Assim, o objetivo do trabalho foi implantar um SAF em uma propriedade agrícola em substituição ao modelo atual de produção de monocultura, que apresenta áreas de desertificação e necessita de uma produção constante de alimentos para venda e para alimentação animal, desta forma, além de ser um sistema de produção ambientalmente adequado ainda atenderá as exigências de produção da unidade familiar.

2. METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho, no mês de abril de 2019, foi realizado um questionário semiestruturado com o responsável pela propriedade para a caracterização da área e reconhecimento dos interesses do produtor quanto ao modo de produção de sua propriedade. De posse destes dados iniciou-se uma intensa pesquisa bibliográfica para selecionar as espécies agrícolas, arbóreas e animais que melhor atenderiam aos interesses do proprietário, trazendo retorno econômico e ambiental para a propriedade e ao mesmo tempo e que ao mesmo tempo fossem compatíveis com as condições de cultivo do local.

A propriedade fica localizada no município de Alto Rodrigues, na região central do estado do Rio Grande do Norte - RN, apresenta área total de 38,4ha das quais apenas 10% da mesma encontra-se preservada e 90% são destinadas a pecuária e a agricultura (Figura 1). Esta propriedade vem sendo utilizada para estas atividades desde os anos 70 e passada de pai pra filho há três gerações, sem muito conhecimento por parte dos antigos proprietários. Uma pequena parcela da propriedade já integra algumas culturas como forma de recuperar parte da área da propriedade que já se encontra em processo de degradação devido a falta do uso de métodos e técnicas de produção adequadas ao longo dos anos.

Figura 1. Localização da propriedade onde foi instalado o SAF no município de Alto Rodrigues – RN

O clima do local é do tipo de estepes - BSh, segundo a classificação climática de Köppen-Geiger, pertencendo ao bioma Caatinga. A pluviosidade anual média é de 500 mm, onde o período chuvoso concentra-se entre os meses de fevereiro à abril, apresenta altitude de 17m em relação ao nível do mar e temperatura anual média entre 30 e 40°C. Já o terreno apresenta relevo plano, solo arenoso e argilo-arenoso, onde a fertilidade do solo arenoso é considerada baixa e do solo argilo-arenoso de fertilidade média, com profundidade de aproximadamente 2 e 1,20m, respectivamente (HOLANDA et al., 2017).

Esta propriedade possui infraestrutura necessária para implantação e utilização do SAF como disponibilidade hídrica através de um poço tubular com vazão de $20\text{m}^3.\text{h}^{-1}$, reservatórios para armazenar água da chuva com capacidade total de 176m^3 , secador solar com área total de 200m^2 que pode ser utilizado para produção de feno e secagem de grãos, instalações para criação de ovinos, aves e unidade de processamento de produtos apícolas.

3. DESENVOLVIMENTO

A área destinada para a implantação do SAF possui 10 ha e como critério para selecionar as espécies que irão compor o sistema levou-se em consideração além da utilização da cultura e valor econômico a sua capacidade de mutualismo com outras espécies, tornando o sistema o mais sustentável, de forma que minimize os gastos e auxilie no processo de regeneração do solo. Em função disto, selecionou-se as espécies de eucalipto citriodora, moringa, leucena, milho BRS 3046, feijão BR 17 gurguéia, tifton 85, goiaba paluma, melancia crimson sweet, girassol, canafistula e abelha para compor o SAF. Ainda fazem parte do sistema os ovinos swinga que permanecerão estabulados e irão compor o SAF de modo que serão alimentados com a forragem proveniente do sistema e seus dejetos serão utilizadas como fonte de adubo orgânico. As espécies que irão compor o SAF suas principais características e grau de mutualismo são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Caracterização das espécies que serão utilizadas no SAF.

Nome científico	Nome comum	Utilização	Capacidade de mutualismo
Corymbia citriodora	Eucalipto citriodora	Produção de biomassa, madeira de excelente qualidade, produção de pólen e néctar e produção de óleos essenciais.	Mutualismo com as abelhas e fornecendo serapilheira para deposição de matéria orgânica para as outras culturas.
Moringa oleifera	Moringa	Alimentação animal.	Alimentação dos ovinos.
Leucaena leucocephala	Leucena	Alimentação animal.	Alimentação dos ovinos.
Zea mays	Milho BRS 3046	Ensilagem, venda de espigas e derivados.	Incorporação de massa verde para adubação das culturas sucessoras.
Phaseolus vulgaris	Feijão BR 17 gurguéia	Venda de grãos, fixação biológica de N e adubação verde.	Incorporação de massa verde e nitrogênio para adubação das culturas sucessoras.
Cynodon spp.	Tifton 85	Cobertura do solo e fenação.	Alimentação dos ovinos.
Psidium guajava	Goiaba paluma	Venda dos frutos, pasto apícola e deposição de serapilheira.	Mutualismo com as abelhas e fornecendo serapilheira para deposição de matéria orgânica para as outras culturas.
Citrullus lanatus	Melancia crimson sweet	Venda dos frutos e pasto apícola.	Incorporação de massa verde para adubação das culturas sucessoras.
Helianthus annuus	Girassol	Forragem, pasto apícola e venda da semente.	Mutualismo com as abelhas e incorporação de massa verde.
Senna multijuga	Canafistula	Forragem, sombreamento do apiário e pasto apícola.	Mutualismo com as abelhas, fornecedora de serapilheira para deposição de matéria orgânica para as outras culturas e alimentação dos ovinos.
Apis mellífera	Abelha	Venda de mel, pólen, cera, própolis, apitoxina e polinização das espécies presentes no SAF.	Polinização cruzada das culturas existentes no SAF aumentando a diversidade genética, produtividade e resistência a pragas.
Ovis aries	Ovino swinga	Venda da carne e utilização do esterco.	Será alimentado com a forragem produzida no SAF e fornecerá esterco para adubação orgânica.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para fazer a distribuição das espécies na área, foi considerada a melhor forma de dispor as culturas em relação ao formato da área, que possibilitasse fácil acesso, mecanização e manejo da irrigação. Desta forma, as plantas serão distribuídas uniformemente, obedecendo a um padrão pré-determinado com os espaçamentos constantes, pré-definidos para todas as espécies, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2. Especificações de implantação das espécies que serão utilizadas no SAF.

Cultura	Especificações da implantação
Eucalipto citriodora	Compreendem oito áreas de 8 x 394m, cada, no sentido Leste/Oeste, seguindo o espaçamento de 4m entre as fileiras e 4m entre plantas, com um total de 1.576 plantas.
Moringa	Compreendem três áreas de 3 x 116m, cada, no sentido Norte/Sul, com o espaçamento de 1,5m entre as fileiras e 1,5m entre plantas, com um total de 464 plantas.
Leucena	Compreendem três áreas de 3 x 116m, cada, no sentido Norte/Sul, com o espaçamento de 1,5m entre as fileiras e 1,5m entre plantas, com um total de 464 plantas.
Melancia crimson sweet	Compreende uma área de 28 x 394m, no sentido Leste/Oeste, com o espaçamento de 2m entre as fileiras e 2m entre plantas, com um total de 2.758 plantas.
Milho brs 3046	Compreende uma área de 28 x 394m, no sentido Leste/Oeste, com o espaçamento de 1m entre as fileiras e 0,5m entre plantas, com um total de 22.064 plantas.

(continuação)

Tabela 2. Especificações de implantação das espécies que serão utilizadas no SAF.

Cultura	Especificações da implantação
Feijão br 17 gurguéia	Compreende uma área de 28 x 394m, no sentido Leste/Oeste, com o espaçamento de 2m entre as fileiras e 1m entre plantas, com um total de 5.516 plantas.
Goiaba paluma	Compreendem três áreas de 28 x 394m, cada, no sentido Leste/Oeste, com o espaçamento de 6m entre as fileiras e 6m entre plantas, com um total de 919 plantas.
Tifton 85	Compreendem três áreas de 28 x 394m, cada, no sentido Leste/Oeste, onde o plantio será realizado a lanço, sem espaçamento definido.
Girassol	Compreende uma área de 6 x 116m, no sentido Norte/Sul, com o espaçamento de 1m entre as fileiras e 0,25m entre plantas, com um total de 2.784 plantas.
Canafístula	Compreende uma área de 10 x 116m, no sentido Norte/Sul, com o espaçamento de 10m entre as fileiras e 10m entre plantas, com um total de 11 plantas.
Abelhas africanizadas	Será alocada uma colmeia embaixo de cada árvore de Canafístula, aproximadamente 10 colmeias.
Ovino swinga	Os animais ficarão estabulados onde receberão a forragem produzida pelo sistema.

As espécies serão implantadas simultaneamente, ou seja, as espécies arbóreas conviverão permanente com outras espécies vegetais de ciclo mais curto e porte pequeno ou mesmo cultivos perenes e animais domésticos. Para tanto, foi levado em consideração o desenvolvimento fenológico de cada cultura utilizada, para melhor fazer a distribuição e escolha da época de inserção no sistema para que não haja alteração no seu ciclo de desenvolvimento nem na produção esperada.

Para a implantação das culturas, no planejamento foi analisado as funções ambientais da área escolhida para a intervenção, a conexão dentro da paisagem, condições de insolação, água, declividade, solo, vento e logística para produção. Com isso chegou-se a um modelo de disposição das mudas e sementes no terreno (Figura 2) que contemplam todos esses fatores e vão ao encontro dos interesses do produtor.

Figura 2. Croqui de como serão dispostas as espécies na área a ser implantado o SAF.

A análise da implantação do SAF também contempla um orçamento anual e total para custeio de preparo de solo, insumos, tratos culturais e fitossanitários, embalagens, mão de obra, manutenção, limpeza, reparações, colheitas e outras operações que fazem parte do processo produtivo das espécies. O orçamento resumido em cada espécie, anos após a implantação do SAF é apresentado na Tabela 3.

Tabela 3. Orçamento da implantação e manutenção do SAF por 5 anos.

Cultura	Ano					Valor total por cultura (R\$)
	1º (R\$)	2º (R\$)	3º (R\$)	4º (R\$)	5º (R\$)	
Eucalipto	8.004,0	1.282,0	1.417,0	1.417,0	2.703,0	14.823,0
Moringa	1.745,0	1.155,0	1.290,0	1.290,0	1.290,0	6.770,0
Leucena	2.106,6	1.155,0	1.290,0	1.290,0	1.290,0	7.131,6
Melancia	6.162,4	4.962,7	4.962,7	4.962,7	4.962,7	26.013,2
Milho	4.254,6	4.254,6	4.254,6	4.254,6	4.254,6	21.273,0
Feijão	3.328,2	3.328,2	3.328,2	3.328,2	3.328,2	16.641,0
Goiaba	9.627,8	2.852,7	4.191,1	3.975,8	3.487,7	24.135,3
Tifton	12.780,9	2.354,5	2.489,5	2.489,5	2.489,5	22.604,1
Girassol	2.716,39	2.716,4	2.716,4	2.716,4	2.716,4	13.581,9
Valor total por ano (R\$)	50.725,9	24.061,1	25.939,5	25.724,2	26.522,1	152.973,15

A partir deste orçamento foi possível inferir que o custo de implantação de um SAF possui um valor elevado, o que pode gerar resistência inicial por parte do proprietário para a implementação, dificultando a substituição da monocultura por este sistema de produção por pequenos agricultores rurais. Porém, também foi analisando os possíveis retornos que este SAF será capaz de gerar e a partir deste levantamento é possível afirmar que a partir de 1,5 anos consegue-se obter um retorno suficiente para custear os gastos de implantação e ainda obter lucro.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A agrofloresta é economicamente viável e também restabelece as condições naturais, promove um aumento da diversidade e como resultado há uma diminuição das doenças de plantas, reconstituição da microbiota do solo, diminuição dos riscos de erosão, geração de um microclima local e diminuição da evapotranspiração das plantas. Desta maneira, o intervalo entre as irrigações aumenta e diminuindo o volume de água utilizado além, de outros benefícios que esse sistema de produção é capaz de promover. Haja vista de tantas qualidades as agroflorestas são uma ótima alternativa de produção para pequenos produtores rurais da região do semiárido nordestino.

REFERÊNCIAS

- [1] Araúz Filho, C.; Placha, G. Perspectivas do agronegócio brasileiro para 2019. Gazeta do Povo. Disponível em: <<https://www.gazetadopovo.com.br/opiniaio/artigos/perspectivas-do-agronegocio-brasileiro-para-2019-325ubivqh0ggolf73feywjj2/>>. Acesso em: 22 de ago. de 2019.
- [2] Barbosa, R. A. et al. Expansão da monocultura de eucalipto das indústrias de papel e celulose: uma arena de conflitos ambientais. *Polêm!ca*, v.19, n.1, p. 69-90, 2019.
- [3] EMBRAPA. Integração lavoura pecuária floresta: ILPF em num3r05. Portal EMBRAPA, p. 01-06, 2016. Disponível em: <<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/158636/1/2016-cpamt-ilpf-em-umeros.pdf>>. Acesso em: 10 jun. 2019.
- [4] Grain. Hambrientos de tierra: lospueblos indígenas y campesinos alimentanal mundo com menos de um cuarto de latierra agrícola mundial. Informe Barcelona, 2014.
- [5] Holanda, J. S. et al. Indicação para adubação de culturas em solos do rio grande do norte, Documentos 46 EMPARN, ISSN 0103-4197, p. 07, 2017.
- [6] Macedo, E. F. S.; Nishizaki Júnior, N. A importância do planejamento logístico com foco no crescimento da demanda da cadeia produtiva de alimentos até 2050. *Rafas*. v.3, n.3, p.31-45, 2017.
- [7] Motter, A. F. C. Monocultura da eficiência capitalista, *Revista Espaço Acadêmico*, n° 107, p. 96, 2010.
- [8] Ribaski, J. As vantagens dos Sistemas Agroflorestais. Disponível em: > <<https://www.grupocultivar.com.br/artigos/as-vantagens-dos-sistemas-agroflorestais>>. Acesso em: 02 de jan. de 2020.
- [9] Silva, T. T. et al. Sistema agroflorestral em Nova Olinda, Ceará: Uma experiência de sucesso, *Revista Verde*, v. 09, p. 162 – 171, 2014.

- [10] Soares, W. L.; Porto, M. F. Atividade agrícola e externalidade ambiental: uma análise a partir do uso de agrotóxicos no cerrado brasileiro. *Revista Ciência & Saúde Coletiva*. v.12, n.1, 2007.
- [11] Teixeira, J. K. Modernização da Agricultura No Brasil: Impactos Econômicos, Sociais e Ambientais. *Revista Eletrônica da Associação dos Geógrafos Brasileiros*; v.2, n.2, set. 2005.
- [12] Tonial, J. C. Falta de alimentos no mundo: problema de escassez ou de distribuição? *JURIS*, v.14, p. 69-80, 2009.
- [13] Valente, F. L. S. O direito humano à alimentação. Editora Cortez, 2002.
- [14] Zimmermann, C. L. Monocultura e transgenia: impactos ambientais e insegurança alimentar. *Veredas do Direito*. v.6, n.12, p.79-100, 2009.

Capítulo 9

Importância ambiental e socioeconômica da Apicultura: Uma investigação na vila de Miranda, município de Parambu-Ceará

Lucas Alves de Sousa

Juliana Rodrigues de Sousa

Resumo: A apicultura representa uma excelente alternativa de complementação de renda para os agricultores. Esta atividade é considerada sustentável e grande aliada na preservação ambiental. Assim, este trabalho teve como objetivo, estudar e avaliar o conhecimento dos produtores da comunidade de Miranda município Parambu-CE sobre a apicultura, sua interação com o meio ambiente e a contribuição da mesma na melhoria de vida. A pesquisa foi desenvolvida em um período de sete meses (maio a novembro de 2018) no qual foram coletados e analisados dados dos apicultores. Para isso, foram feitas entrevistas semiestruturadas com os apicultores da comunidade, além das observações em campo. Os dados foram agrupados em categorias temáticas. Os resultados demonstraram a presença de 04 tipos diferentes de famílias em relação a forma de obtenção de renda, sendo 33,5% pluriativas e 66,5% agrícolas. Os apicultores do distrito apresentaram uma renda média de R\$ 965,00 antes da apicultura, e renda de R\$ 2.398,00 depois da apicultura. Concluímos que na área estudada a apicultura não traz prejuízos para o meio ambiente. E que o aumento proporcionado na renda foi um incentivo ao pequeno produtor rural em desenvolvê-la.

Palavras-Chave: Agricultura Familiar. Sustentabilidade. Meio Ambiente.

1. INTRODUÇÃO

A apicultura é uma atividade agrícola que vem crescendo, atualizando e se destacando nas suas formas de manejo e benefícios sociais. Com isso, nos últimos anos tem aumentado o número de pessoas que incluíram a apicultura como uma fonte alternativa de emprego e renda (DUARTE, 2017).

Hoje, a apicultura é considerada a atividade agrícola mais sustentável e grande aliada na preservação ambiental. Essa atividade do ponto de vista social, econômico e ambiental torna-se importante, pois proporciona o fluxo de renda, favorece a fixação do homem do campo e a preservação da flora nativa (OLIVEIRA, 2011).

Segundo Graeff (2011) a apicultura no Brasil gera em torno de 350 a 400 mil empregos para o homem do campo e 16 mil nas indústrias de processamento dos derivados dessa atividade, números que refletem na exportação do mel para outros países.

No município de Parambu no distrito de Miranda, a apicultura foi incentivada e implanta com maior destaque em 2002, com apoio do Governo do Estado do Ceará, quando o projeto para aquisição dos equipamentos apícolas foi aprovado e liberado, surgindo desta forma mais uma fonte de renda para a agricultura familiar desse distrito.

Levando em consideração a apicultura como uma atividade de valor econômico e social para as famílias desse município. Esta pesquisa procura averiguar quais conhecimentos os apicultores da comunidade de Miranda detêm sobre a apicultura, seus impactos sobre a sociedade, ambiente e economia do local investigado.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo localiza-se no Município de Parambu distrito de Miranda, na Região Nordeste do Brasil, distante 405 km da capital Fortaleza/CE. O tipo climático de Parambu, de acordo com a classificação de Köppen, é o Bsw'h'.

Para a realização deste estudo, optou-se por uma pesquisa qualitativa, com entrevistas semiestruturadas realizadas com os apicultores do distrito de Miranda (Parambu-CE). A amostra utilizada para a execução da pesquisa foi de seis apicultores cadastrados (86%) na Associação dos Apicultores de Miranda (APM). Esta associação no período da pesquisa contava com um total de sete associados.

Os dados obtidos foram agrupados em categorias temáticas como: Aspectos sociais dos participantes; Aspectos econômicos; Tipologias das Famílias e Aspectos ambientais. A determinação das tipologias das famílias foi realizada conforme as atividades desenvolvida por cada uma delas, descrevendo 11 tipos de famílias, seguindo os princípios metodológicos criados por Batista Junior (2013).

Os dados referentes a identificação das espécies vegetais, foram obtidos a partir das citações do nome popular de cada planta pelos entrevistados, pelas observações das espécies em campo e pelo uso de bibliografia especializada.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados obtidos a partir da execução desta pesquisa foram analisados e agrupados em categorias que emergiram diante da relevância das seguintes temáticas:

Aspectos sociais dos participantes:

Com relação a profissão exercida pelos entrevistados registrou-se que além da apicultura, 04 deles exercem atividades como agricultores; 01 artesão e 01 Funcionário Público. Destes apenas 01 (16,7%) pertence ao sexo feminino e 05 (83,3%) ao sexo masculino, com idades entre 36 e 70 anos. A pesquisa constatou ainda que os apicultores do distrito de Miranda, possuem uma média aritmética de idade de 58 anos. Dos quais, em média 13 anos são destinados a atividade apícola.

Quando questionados sobre o que consideram como mais importante para uma boa qualidade de vida, os apicultores pontuaram a saúde como o requisito principal para se viver bem, meio ambiente equilibrado vem em segundo, com fauna e flora existentes e diversificada para o equilíbrio ambiental. Para quase todos a educação vem em terceiro, o dinheiro em quarto, em quinto os apicultores avaliaram como sendo o emprego, em sexto vêm as associações, e por último a infraestrutura, as boas estradas, luz, água, esgoto e outros.

Aspectos econômicos:

No que se refere a renda familiar mensal das famílias dos apicultores, foi constatado que antes da apicultura teriam uma média de R\$ 965,00 mensais, contudo depois da apicultura a renda média mensal passa a ser em torno de R\$ 2.398,00, demonstrando assim, uma melhoria significativa na sua fonte de renda.

Figura 1. Renda familiar antes da apicultura e aumento do lucro da renda familiar em porcentagem (%)

Na pesquisa realizada por Duarte (2017) com 05 (cinco) maiores apicultores da Associação Cacoalense de Apicultores em Cacoal – RO, a apicultura apresenta-se como uma atividade extremamente rentável, pois a margem de lucro médio encontrada com base nas informações levantadas ao longo da pesquisa foi de 81,06%, sendo extremamente elevada, se comparada com outras formas de produção agrícola.

Nesta linha de raciocínio Silva (2014) considera a apicultura como uma das grandes opções para os pequenos produtores rurais, por proporcionar a família o aumento expressivo da sua renda, através do aproveitamento da potencialidade natural do meio ambiente e de sua capacidade produtiva.

Tipologias das Famílias:

Na produção familiar, é preciso que sejam adaptadas certas maneiras produtivas para que se aumente a produção e a obtenção de lucros. Com base na análise dos sistemas de atividade dos apicultores nesse estudo no distrito de Miranda foram encontrados apenas 04 tipos diferentes de sistemas familiares, destas 02 são famílias pluriativas e 04 são famílias agrícolas. A partir desses resultados podemos observar a existência de mais famílias agrícolas no distrito estudado em torno de 66,6%, enquanto as pluriativas do representam aproximadamente 33,2% dos tipos encontrados. Contudo, não foi registrado na área nenhuma família com o sistema patronal.

Estes resultados diferem dos encontrados na pesquisa de campo desenvolvida por Batista Junior (2013), onde as famílias pluriativas representaram 67% de todos os tipos encontrados e as famílias agrícolas registraram 33% no município de Sisal – BA.

Aspectos ambientais:

A partir das respostas dos entrevistados foram listadas as espécies vegetais mais visitadas pelas abelhas (*Apis mellífera scutellata*) durante o período chuvoso e o período seco.

Tabela 1. Plantas mais visitadas pela *Apis melífera scutellata*, durante o período chuvoso e seco

Período Chuvoso		Período Seco	
Nome Popular	Nome Científico	Nome Popular	Nome Científico
Marmeleiro	<i>Croton sonderianus</i>	Aroeira	<i>Myracrodruon urundeuva</i>
Bamburral	<i>Hyptis umbrosa</i>	Angico Preto	<i>Anadenanthera colubrina</i>
Jitirana	<i>Ipomoea sericophylla</i>	Algaroba	<i>Prosopis juliflora</i>
Velame	<i>Croton heliotropiifolius</i>	Juazeiro	<i>Aspidosperma pyrifolium</i>
Cajueiro	<i>Anacardium occidentale</i>	Pereiro	<i>Aspidosperma pyrifolium</i>
Mata-pasto	<i>Senna obtusifolia</i>	Cajueiro	<i>Anacardium occidentale</i>
Jurema Branca	<i>Mimosa verrucosa</i>	Jurema Preta	<i>Mimosa tenuiflora</i>
Catingueira	<i>Caesalpinia pyramidalis</i>	Pau Ferro	<i>Libidibia ferrea</i>
Quebra Panela	<i>Alternanthera tenella</i>	Feijão Brabo	<i>Cynophalla flexuosa</i>

As informações obtidas reafirmam o comportamento fenológico das espécies encontradas. De acordo com Silva (2014) as espécies *Croton sonderianus* mull. Arg. (Marmeleiro) e *Myracrodruon urundeuva* (Aroeira) são as preferidas pelas abelhas, e responsáveis pela produção de mel com sabor muito apreciado e de alto valor comercial.

Ao serem questionados a respeito das características da caatinga, ao entrevistados demonstraram conhecimento sobre essa fisionomia, conceituando-a da seguinte maneira:

“Trata-se da mata que vivemos, um ambiente seco, no inverno é verde e no verão as folhas caem para consumir menos água”. (Apicultor A)

Esse xerofitismo, que caracteriza essa vegetação, é básico para a morfologia das espécies componentes. As folhas, em sua maioria pequenas, se alegram de cor no período de chuva e desaparecem durante as estiagens. Essa característica constitui em um dos meios mais eficazes de autoproteção das plantas na falta de umidade do solo estabelecendo menor consumo de água (PRADO, 2004).

4.CONCLUSÕES

Com esta pesquisa concluímos que a atividade apícola é de fundamental importância para manutenção da vegetação da caatinga além de ampliar a renda das propriedades, sobretudo na agricultura familiar. Esta atividade se apresentou como uma excelente fonte de renda extra para as famílias do meio rural dessa região, tornando-se uma eficiente estratégia de sobrevivência no semiárido desenvolvida por esses agricultores. Por meio da apicultura essas famílias podem conseguir um complemento de renda, através de uma ocupação que não provoca impactos negativos ao meio ambiente.

REFERÊNCIAS

- [1] Batista Junior, J. L. Impacto econômico e social da apicultura na agricultura familiar do território do Sisal, semiárido da Bahia. 2013. 56 f. TCC (Graduação) - Curso de Zootecnista, Universidade Federal da Bahia Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia Departamento de Zootecnia, Salvador, 2013.
- [2] Costa, J. M. O. Caracterização da flora apícola na área de manejo da caatinga no assentamento Renascer Prata /PB. 2014. 35 f. Monografia (Especialização) - Curso de Desenvolvimento e Meio Ambiente, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Monteiro, 2014.
- [3] Duarte, R. P. Custos e retorno da produção de mel para o apicultor no município de Cacoal Rondônia. 2017. 27 f. Tcc (Graduação) - Curso de Ciências Contábeis, Acadêmico de Ciências Contábeis, Universidade Federal de Rondônia– Unir, Cacoal - RO, 2017.
- [4] Graeff, I. Apicultura como instrumento de educação ambiental, no contexto social, econômico e ambiental. 2011. 58 f. Monografia (Especialização) - Curso de Educação Ambiental, Centro de Ciências Rurais, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2011.
- [5] Oliveira, R. R. Gestão da apicultura no Distrito Federal. 2011. 42 f. TCC (Graduação) - Curso de Administração, Departamento de Administração, Universidade de Brasília, Brasília, 2011.
- [6] Prado, D. E. As caatingas da América do Sul. In: Leal, I. R. & Tabarelli, M. (Eds.). Ecologia e Conservação da Caatinga. Recife: Editora Universitária: Ufpe, 2004. Cap. 01. p. 03-75.
- [7] Silva, J. C. Apicultura: gerando emprego e renda no município de São Felix - PB. 2014. 29 f. TCC (Graduação) - Curso de Geografia, Universidade Estadual da Paraíba, Itabaiana - Pb, 2014.

Capítulo 10

Crescimento de Salicornia ramosissima em resposta a aplicação de diferentes condicionadores e níveis de umidade de um solo salino-sódico

Luiz Guilherme Medeiros Pessoa

Natália Alves Santos

Jéssica Patrícia de Oliveira

Luiz Filipe dos Santos Silva

Eduardo Silva dos Santos

Alexandre Campelo de Oliveira

Maria Betânia Galvão dos Santos Freire

Josimar Gurgel Fernandes

Resumo: A *Salicornia ramisissima* J. Woods é uma espécie halófito promissora para uso em áreas salinizadas de regiões semiáridas, tanto por ser uma cultura de valor econômico como por contribuir para a recuperação dessas áreas. O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficiência do uso de condicionadores de solo em potencializar o crescimento da *Salicornia ramosíssima* J. Woods em diferentes condições de umidade do solo. As plantas de *Salicórnia* foram cultivadas em vasos contendo 6 kg de solo por vaso, tratado com as seguintes misturas de condicionadores: Controle – sem condicionador; gesso + matéria orgânica; enxofre elementar + matéria orgânica; e gesso + enxofre elementar + matéria orgânica. As plantas de *Salicórnia* submetidas aos condicionadores foram cultivadas sob dois níveis de umidade: 35 e 85% da capacidade de campo. A aplicação dos condicionadores de solo associada a um maior nível de umidade do solo promoveu um aumento significativo no crescimento das plantas de *Salicórnia*. Dentre os condicionadores testados, o que promoveu maior crescimento da *Salicórnia* foi a mistura gesso + matéria orgânica. A *Salicórnia* associada ao uso de condicionadores de solo pode ser utilizada para extrair sais de ambientes salinos, sendo uma técnica de suma importância para recuperar solos salinos, possibilitando o retorno do solo ao processo de produção agrícola.

Palavras-chave: Semiárido, Solos salinos e sódicos, Produção agrícola

1. INTRODUÇÃO

Considerando que o aumento populacional é estimado para alcançar 9 bilhões de pessoas até 2050 (United Nations, 2014), que as áreas salinizadas aumentam a uma taxa de 10% ao ano e que as estimativas indicam que até 2050 mais de 50% das terras aráveis serão salinizadas (Jamil et al., 2011), há a necessidade de recuperar estas áreas para torná-las produtivas novamente, contribuindo para o aumento de terras cultiváveis em regiões semiáridas (Leal et al., 2019). Desta forma, é necessário o desenvolvimento de tecnologias alternativas rápidas e eficientes para manejar plantas em solos salinos (Liu et al., 2019).

Diante deste contexto, o uso de culturas com potencial agrícola e tolerante a altos níveis de sais vem a ser uma alternativa promissora para a produção vegetal no semiárido do Brasil. Neste sentido, *Salicornia sp.* tem sido reconhecida como uma das culturas mais promissoras para cultivo em solos salinizados principalmente pelo fato destas serem vantajosamente usadas como alimentos alternativos em substituição aos alimentos para animais (Nedjimi and Beladel, 2016). Dentre estas, a *Salicornia ramisissima* J. Woods é uma espécie halófito anual que tolera altos níveis de sais (Rubio-Casal et al., 2003) e é promissora para uso em áreas salinizadas de regiões semiáridas, tanto por ser uma cultura de valor econômico como por contribuir para a recuperação dessas áreas. No entanto, informações na literatura em relação à adaptação desta espécie em solos do semiárido brasileiro são escassas ou inexistentes e precisam ser melhor compreendidas.

Alguns trabalhos existentes na literatura, para o semiárido brasileiro, tem investigado o efeito do uso de condicionadores de solo em recuperar áreas salinas e sódicas. Porém estes trabalhos têm enfatizado os propósitos ou de potencializar a extração de sais e sódio por plantas de *Atriplex* (Miranda et al., 2011; Miranda et al., 2018; Leal et al., 2019), ou de atenuar os efeitos salinos em culturas forrageiras (Stamford et al., 2002; de Andrade et al., 2018; Jesus et al., 2019). Do mesmo modo, o manejo de solos salinos com o uso destes condicionadores pode potencializar o crescimento de *Salicornia sp.* e sua capacidade de extrair sais, contribuindo para uma maior eficácia da fitodessalinização dessas áreas.

Como o crescimento e o potencial de extração de sais por espécies halófitas é dependente no teor de água no solo (de Souza et al., 2011; Melo et al., 2016), é importante investigar a performance da *Salicornia* em extrair sais, bem como a eficácia do uso de condicionadores em potencializar a extração de sais pela *Salicornia*, em condições de baixo e alto conteúdo de água no solo, a fim de entender a cultura com relação aos limites e compensações de tolerância aos sais e água.

Com o propósito de possibilitar o crescimento e a produção vegetal em áreas degradadas por sais, bem como potencializar a extração de sais pelas plantas halófitas, o presente estudo teve como objetivo avaliar a eficiência do uso de condicionadores de solo em potencializar o crescimento da *Salicornia ramosissima* J. Woods em diferentes condições de umidade do solo.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi conduzido em casa-de-vegetação da Unidade Acadêmica de Serra Talhada – Universidade Federal Rural de Pernambuco, localizada na cidade de Serra Talhada, semiárido de Pernambuco. O experimento foi estabelecido sobre um Cambissolo, classificado como salino-sódico, segundo Richards (1954). O solo foi coletado da camada superficial (0-20 cm) e peneirado em malha de 4 mm para o experimento e 2 mm para as análises de caracterização química e física, realizadas conforme os métodos propostos por Richards (1954) e Embrapa (1997) – Tabela 1.

Tabela 1. Características físicas e químicas do Cambissolo utilizado no experimento

pH	CE _{es} dS m ⁻¹	P mg kg ⁻¹	K ⁺	Na ⁺ — cmol _c kg ⁻¹ —	CTC	PST	Argila — % —	Silte	Areia
6.1	29	83.86	0.48	7.77	21.73	35.75	17	34	49

CE_{es}: Condutividade elétrica do extrato de saturação; CTC: Capacidade de Troca de Cátions; PST: Porcentagem de Sódio Trocável.

Plantas de *Salicornia ramosissima* J. Woods foram cultivadas em vasos contendo 6 kg de solo por vaso, tratado com as seguintes misturas de condicionadores: Controle – sem aplicação de condicionador (apenas plantas de *Salicornia*); gesso + matéria orgânica; enxofre elementar + matéria orgânica; e gesso +

enxofre elementar + matéria orgânica. As plantas de Salicórnia submetidas aos condicionadores de solo foram cultivadas sob dois níveis de umidade: 35 e 85% da capacidade de campo. Desta forma, o experimento consistiu de um arranjo fatorial 4 x 2 – 4 diferentes misturas de condicionadores de solo e dois níveis de umidade do solo, conduzido num delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições.

As doses de matéria orgânica usada foram de 30 t ha⁻¹, a de enxofre elementar (S⁰) foi de 3,97 t ha⁻¹ e a de gesso (CaSO₄.2H₂O) foi de 16,9 t ha⁻¹. Os solos contidos nos vasos foram misturados com seu respectivo condicionador de solo e mantidos nos respectivos níveis de umidade. As plantas de Salicórnia foram transplantadas para os vasos 30 dias após a aplicação dos condicionadores, a fim de promover as reações químicas entre solo – condicionadores.

As plantas foram cultivadas até 90 dias após o transplantio, onde houve a coleta para pesagem da matéria fresca da parte aérea. Posteriormente as plantas de Salicórnia foram submetidas a secagem em estufa (65 °C) para pesagem e determinação da matéria seca da parte aérea. A biomassa relativa da Salicórnia foi expressa pela relação entre a biomassa produzida sob os diferentes condicionadores de solo e a biomassa obtida pelo controle (plantas de Salicórnia sem aplicação de condicionadores).

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, ao nível de significância de $P < 0.05$. Um teste de comparação de médias foi aplicado quando as variáveis foram significativamente diferentes entre si.

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

A figura 2 mostra o efeito interativo entre os condicionadores de solo x níveis de umidade do solo sobre o crescimento da Salicórnia. A aplicação dos condicionadores de solo associada a um maior nível de umidade do solo promoveu um aumento significativo ($P < 0.05$) no crescimento das plantas de Salicórnia, o que pôde ser observado pelos maiores valores médios das variáveis estudadas - matéria fresca, matéria seca e biomassa relativa (Figuras 2a, b e c, respectivamente). Segundo Leal et al. (2019), a aplicação desses condicionadores de solo é justificada pelo fato deles promoverem aumentos significativos na extração de íons tóxicos do solo, como Na⁺ e Cl⁻.

Taxas de crescimento e produção de matéria seca são considerados como bons critérios para avaliar o grau de estresse e a habilidade de uma planta para se adaptar para condições de salinidade (Leal et al., 2008). Independentemente do condicionador aplicado, as plantas de Salicórnia tiveram o crescimento significativamente aumentado em relação ao controle – Salicórnia sem aplicação de condicionadores de solo, sendo que este crescimento foi potencializado nas plantas submetidas ao maior nível de umidade do solo (85% da capacidade de campo).

Embora a estatística não tenha mostrado diferenças significativas para o crescimento da Salicórnia, em relação aos condicionadores estudados para o nível de umidade de 85% da capacidade de campo, verificamos que o gesso + matéria orgânica apresentou maiores valores médios em relação aos demais, para as variáveis estudadas. Como as espécies halófitas têm mostrado o crescimento estimulado a concentrações de NaCl que são prejudiciais a maioria das espécies não-halófitas (Osmond et al., 1980), os dados obtidos neste estudo podem ser atribuídos ao aumento de Ca²⁺ na solução do solo como resultado da adição de gesso, que promove o deslocamento do Na⁺ do complexo sortivo para a solução do sol (Leal et al., 2008) facilitando a absorção deste elemento pelas plantas de Salicórnia.

Em condições de baixo nível de umidade do solo (35% da capacidade de campo), o efeito do gesso foi mais pronunciado sobre o crescimento da Salicórnia, em relação aos demais condicionadores de solo testados – 7,63 g de matéria fresca, 1,73 g de matéria seca e 179% de biomassa relativa. Isto correspondeu a valores 1,70, 1,81 e 1,78 vezes maior que o tratamento controle, respectivamente. Apesar disso, a aplicação de enxofre + matéria orgânica e gesso + enxofre + matéria orgânica aumentaram significativamente a biomassa relativa da Salicórnia – 20 e 10% respectivamente, em relação ao controle, sob condições de baixo nível de umidade do solo (Figura 2c).

Figura 2. Matéria fresca (a), seca (b) e biomassa relativa (c) das plantas de Salicórnia em função dos condicionadores e níveis de umidade do solo testados, aos 90 dias do transplante. Letras maiúsculas indicam diferenças significativas entre os condicionadores de solo e letras minúsculas entre os níveis de umidade do solo, ao nível de 0,05 de significância pelo teste de Tukey. $n = 4$.

Os dados obtidos neste estudo são de grande relevância levando em consideração que o semiárido brasileiro apresenta o solo sob condições de baixa umidade durante grande parte do ano. Desta forma, isso pode não apenas reduzir o crescimento da *Salicórnia*, bem como retardar a recuperação destas áreas.

4.CONCLUSÕES

O manejo da *Salicórnia* associada ao uso de condicionadores de solo e níveis de umidade é uma estratégia de grande importância para potencializar a extração de sais em solos salinos de regiões semiáridas, possibilitando o retorno do solo ao processo de produção agrícola.

O uso dos condicionadores de solo são fortemente influenciados pelo teor de umidade dos solos, o que vai governar a eficácia dos mesmos. Através deste estudo foi possível observar que o nível de umidade do solo equivalente a 85% da capacidade de campo promoveu um maior crescimento das plantas de *Salicórnia*, o que foi comprovado pelos maiores valores de matéria fresca, seca e biomassa relativa.

Dentre os condicionadores testados, o que promoveu maior crescimento da *Salicórnia* foi a mistura gesso + matéria orgânica. Neste estudo, a matéria fresca, seca e biomassa relativa foram superiores para esta mistura, em relação às demais, independentemente do nível de umidade testado.

REFERÊNCIAS

- [1] De Andrade JJ, de Oliveira FJM, Pessoa LGM, Nascimento SAS, de Souza ES, Barros Júnior G, Miranda MFA, de Oliveira AC, Freire MBGS (2018) Effects of elemental sulfur associated with gypsum on soil salinity attenuation and sweet sorghum growth under saline water irrigation. *Aust J Crop Sci.* 12 (02): 221-226.
- [2] de Souza ER, Freire MBGS, Nascimento CWA, Montenegro AAA. 2011. Fitoextração de sais pela *Atriplex nummularia* Lindl. sob estresse hídrico em solo salino sódico. *Rev Bras Eng Agric Ambient.* 15, 477-483.
- [3] Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 1997. Manual de métodos de análises de solo, 2nd.; Rio de Janeiro (Brazil): Centro de Pesquisa de Solos.
- [4] Jamil A, Riaz S, Ashraf M, Foolad MR. 2011. Gene expression profiling of plants under salt stress. *Crit Rev Plant Sci.* 30(5):435–458.
- [5] Jesus KN, Althoff, TD, Marin AMP, Sousa AR, Martins JCR, Araújo Filho RN, Costa Primo D, Menezes RSC, Antonino ACD, Sampaio EVSB. 2019. Use of Maize Straw or Animal Manure as an Alternative to Gypsum to Ameliorate Saline-Sodic Soils. *Journal of Experimental Agriculture International.* 32, 3, 1-11.
- [6] Leal IG, Accioly AM, Nascimento CWA, Freire MBG, Montenegro AAA, Ferreira FDL. 2008. Fitorremediação de solo salino sódico por *Atriplex nummularia* e gesso de jazida. *Rev Bras Ciênc Solo.* 32(3): 1065–1072.
- [7] Leal LSG, Pessoa LGM, de Oliveira JP, Santos NA, Silva LFS, Júnior GB, Freire MBG dos S, de Souza ES. 2019. Do applications of soil conditioner mixtures improve the salt extraction ability of *Atriplex nummularia* at early growth stage? *Int J Phytoremed.* 21(12): 1-8.
- [8] Liu H, Khan MY, Carvalhais LC, Delgado-Baquerizo M, Yan L, Crawford M, Dennis PG, Singh B, Schenk PM. 2019. Soil amendments with ethylene precursor alleviate negative impacts of salinity on soil microbial properties and productivity. *Nature*, 9, 1-13.
- [9] Melo H. D, Souza ER, de Almeida B. D, Freire MBG, Maia FE, Melo HF, de Souza ED, Almeida BG, de Freire MDS, Maia FE. 2016. Growth, biomass production and ions accumulation in *Atriplex nummularia* Lindl grown under abiotic stress. *Rev Bras Eng Agric Ambient.* 20, 2, 144–151.
- [10] Miranda MA, Oliveira EEM, Santos KCF, Freire MBG, Almeida BD. 2011. Condicionadores químicos e orgânicos na recuperação de solo salino-sódico em casa de vegetação. *Rev Bras Eng Agric Ambient.* 15(5):484–490.
- [11] Miranda MFA, Freire MBG dos S, Almeida BG, Freire AG, Freire FJ, Pessoa LGM. 2018. Improvement of degraded physical attributes of a saline-sodic soil as influenced by phytoremediation and soil conditioners. *Arch Agron Soil Sci.* 64:1207–1221. doi: 10.1080/03650340.2017.1419195.
- [12] Nedjimi, B., Beladel, B. 2016. Chemical composition of *Salicornia arabica* (L.), a potential halophyte for arid rangelands. *Rangeland J.* 38, 103–107.
- [13] Osmond CB, Bjorkman O, Anderson DJ. 1980. Physiological processes in plant ecology. Toward a synthesis with *Atriplex*. New York (NY): Springer-Verlag.
- [14] Richards LA. 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. Washington: U.S. Department of Agriculture (USDA: Agriculture Handbook 60).
- [15] Rubio-Casal AE, Castillo JM, Luque CJ, Figueroa ME. 2003. Influence of salinity on germination and seeds viability of two primary colonizers of Mediterranean salt pans. *J Arid Environ* 53:145–154
- [16] Stamford NP, Silva AJ, Freitas AD, Araújo Filho JT. 2002. Effect of sulphur inoculated with *Thiobacillus* on soil salinity and growth of tropical tree legumes. *Bioresource Technology*, 81, 53-59.
- [17] United Nations. 2014. Concise Report on the World population situation in 2014. New York (NY): Department of Economic and Social Affairs Population Division, ST/ESA/SER.A/354. [accessed 2019 Jul 29]. <http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/index.shtml>.

Capítulo 11

Relação da produção secundária com a diversidade taxonômica e funcional de poliquetas em estuários no semiárido

Franciely Ferreira Paiva

Dalescka Barbosa de Melo

Joseline Molozzi

Resumo: O objetivo deste trabalho é relacionar a diversidade taxonômica e funcional dos poliquetas com a produção secundária em estuários no semiárido, testando as seguintes hipóteses: (i) a diversidade funcional apresenta relação positiva com a produção secundária, quanto maior a diversidade funcional, maior será a produção secundária; e (ii) a produção secundária apresenta relação positiva principalmente com as características funcionais das espécies que apresentam maior biomassa, como sugerido pela hipótese da razão de massa. As coletas de amostras foram realizadas nos estuários localizados no semiárido brasileiro: Paraíba, Mamanguape e Passos. Foram selecionadas cinco características funcionais dos poliquetas: tamanho máximo do corpo, estratégia alimentar, vida útil, desenvolvimento larval e fecundidade. Para medir a diversidade funcional foi calculado a Entropia quadrática de RAO, a Riqueza funcional e o CWM, e para mensurar a diversidade taxonômica foi utilizado o índice de Diversidade de Shannon-Wiener e a Riqueza taxonômica. A biomassa dos poliqueta foi mensurada para a utilização no cálculo de produção secundária proposto por Brey (2001). O aumento da diversidade taxonômica nos estuários Passos e Paraíba se dá concomitante com o aumento da produção secundária. No estuário Paraíba quanto maior a diversidade funcional dos poliquetas, maior a produção secundária. No estuário Mamanguape a produção secundária não apresentou relação com diversidade taxonômica e funcional. Contudo, a diversidade taxonômica pode prever melhor o processo de produção secundária nos estuários em estudo. Quanto as características funcionais é necessário investigar como a função de cada característica pode influenciar os níveis de produção secundária nos ecossistemas.

Palavras-chave: Produtividade, Produção bentônica, Biomassa.

1. INTRODUÇÃO

O processo de avaliação do funcionamento dos ecossistemas deve levar em consideração aspectos que englobem tanto a estrutura das comunidades como abundância e riqueza taxonômica, além das funções ecossistêmicas, como fluxo de energia e produtividade (BLOMBERG & MONTAGNA, 2014). De acordo com Blomberg e Montagna (2014), a produtividade é tida como um componente funcional de grande importância nos ecossistemas, que pode ser mensurada através da produção secundária, onde a energia produzida pelos produtores primários é convertida pelos consumidores secundários através da sua biomassa.

A produção secundária é a quantidade de biomassa potencialmente disponível para o nível trófico superior ao longo do tempo em determinada área, podendo trazer inferências sobre processos que ocorrem a nível ecossistêmico (HERSHEY *et al.*, 2010; DOLBETH *et al.*, 2012). A produção secundária pode ser vista como uma medida direta para quantificar a disponibilidade e provisionamento de energia no ecossistema (HAINES-YOUNG & POTSCHIN, 2013). Estudos já mostram que pode existir uma relação positiva entre o aumento da produção secundária e a diversidade das comunidades (NAEEM *et al.*, 2009; SOLAN *et al.*, 2012; DOLBETH *et al.*, 2015).

A diversidade apresenta componentes taxonômicos e funcionais (THOMPSON *et al.*, 2015). A diversidade taxonômica pode ser mensurada através da riqueza e equitabilidade das espécies numa comunidade (SHANNON & WEAVER, 1949). A diversidade funcional é medida pela variação, abundância e distribuição das características funcionais das espécies numa comunidade (ex., modo de alimentação, tamanho do corpo) (RICOTTA & MORETTI, 2011; LAURETO *et al.*, 2015). A diversidade funcional de uma comunidade apresenta maior relação com processos ecossistêmicos do que quando analisado a diversidade taxonômica (LAVOREL & GRIGULIS, 2012; FU *et al.*, 2014). A hipótese da razão de massa, diz que as características funcionais das espécies que representam a maior parte da biomassa em determinado nível trófico, ou seja, as espécies dominantes em biomassa, podem exercer um maior efeito sobre os processos ecossistêmicos (GRIME, 1998). Desta forma, relacionar a produção secundária e a diversidade funcional das comunidades pode fornecer informações sobre a importância da manutenção da biodiversidade para a produtividade ecossistêmica (AARNIO *et al.*, 2011).

A comunidade de poliquetas apresenta grande diversidade taxonômica e funcional (TWEEDLEY *et al.*, 2012). Esses organismos são importantes produtores secundários, visto que participam dos processos de decomposição, ciclagem de nutrientes e fluxo de energia para os níveis tróficos superiores, através da sua biomassa (NUNES *et al.*, 2008; TWEEDLEY *et al.*, 2012). Nos ecossistemas estuarinos especificamente, a produção secundária da comunidade macrobentônica corresponde a duas vezes maior do que a produtividade secundária pelágica (BLOMBERG & MONTAGNA, 2014).

Os estuários apresentam alta produtividade, servindo como locais de reprodução, refúgio e alimentação para inúmeras espécies (ELLIOT & MCLUSKY, 2002; KAISER *et al.*, 2005). Estes ecossistemas apresentam grandes concentrações de matéria orgânica de origem principalmente alóctone, proveniente da região de mangue, assim as comunidades bentônicas que habitam os estuários podem apresentar uma produção secundária alta (MCLUSKY *et al.*, 2004; DOLBETH *et al.*, 2011).

Desta forma, buscamos relacionar a diversidade taxonômica e funcional com a produção secundária dos poliquetas em estuários no semiárido, testando as hipóteses de que (i) a diversidade funcional é o componente de diversidade que apresenta relação positiva com a produção secundária, visto que todos os mecanismos pelos quais a diversidade afeta o funcionamento dos ecossistemas depende fortemente das características funcionais das comunidades; e (ii) a produção secundária apresenta relação positiva principalmente com as características funcionais das espécies que apresentam maior biomassa na comunidade, como sugerido pela hipótese da razão de massa.

2. METODOLOGIA

2.1. ÁREA DE ESTUDO E DESENHO AMOSTRAL

As coletas para o estudo foram realizadas em três ecossistemas estuarinos, o estuário do Rio Paraíba (6° 54'14"-7° 07'36" S; 34° 58'16" - 34° 49'31" O), estuário do Rio Mamanguape (6° 43'02"- 6° 51'54" S; 35° 67'46"- 34° 54'04" W), localizados no estado da Paraíba/Brasil, e o estuário do Rio dos Passos (8° 37'67"- 8° 40'50" S; 35° 5'81"- 35° 6'44" O) localizado no estado do Pernambuco/Brasil (Figura 1).

O clima na região é do tipo "As" (Tropical with dry summer) de acordo com a classificação de Köppen-Geiger, e o período de chuva se dá entre os meses de fevereiro e agosto e a estiagem entre outubro e dezembro (ALVARES *et al.*, 2013).

Figura 1: Mapa da área de estudo com os estuários Mamanguape (A) e Paraíba (B), localizados no estado da Paraíba/Brasil, e o estuário Rio dos Passos (C), localizado no estado de Pernambuco/Brasil. Distribuição dos doze pontos de coleta nas quatro zonas (Z1, Z2, Z3 e Z4) ao longo do corpo estuarino.

As coletas foram realizadas no período de novembro de 2016 nos três estuários. Em cada estuário foram definidas quatro zonas de amostragem, sendo uma zona a montante (próximo ao rio), duas zonas intermediárias e uma zona a jusante (próximo ao mar), de acordo com o gradiente de salinidade no estuários. As amostragens foram realizadas na região subtidal dos estuários e durante a maré baixa. Em cada zona estabelecida, foram amostrados três pontos, cada ponto com três réplicas, totalizando 36 unidades amostrais por estuário (Figura 1).

2.2. IDENTIFICAÇÃO DA MACROFAUNA ESTUARINA E CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

A coleta dos macroinvertebrados bentônicos foi realizada em cada unidade amostral, utilizando-se uma draga modelo van Veen, com 477 cm² de área amostral. Após a coleta, o material foi lavado em peneiras sobrepostas de malhas 1 e 0,5 mm. Em laboratório os organismos foram triados e conservados em etanol a 70%. Após esta separação, os poliquetas foram identificados ao menor nível taxonômico possível (família/gênero) com chave especializada (AMARAL & NONATO, 1996).

Foram selecionadas cinco características funcionais dos poliquetas, totalizando dezessete categorias. Essas características foram selecionadas visto que potencialmente podem refletir padrões na comunidade de acordo com os fatores ecossistêmicos como, I) tamanho máximo do corpo: pequeno (2,5-21 mm), médio (21-100 mm) e grande (>100 mm); II) estratégia alimentar: predador (alimenta-se de presas vivas), detritívoro (alimenta-se de pedaços de animais mortos ou vivos), herbívoro (consome materiais vegetais marinhos, como algas), depositívoro (ingere partículas de material mineral diluídas) e suspensívoros (alimenta-se de partículas selecionadas na coluna d'água); III) vida útil: vida curta (<1 ano), vida média (1-3 anos) e vida longa (>3 anos); IV) desenvolvimento larval: desenvolvimento direto (sem fase larval), desenvolvimento lecitotrófico (à custa de recursos internos, ou seja, gema) e desenvolvimento plânctotrófico (alimentado pelo menos em parte, por materiais capturados a partir do plâncton); e v) fecundidade: fecundidade baixa (1-2500 ovos), fecundidade média (2500-100,000 ovos) e fecundidade alta (>100.000 ovos). As informações sobre as características funcionais dos poliquetas foram coletadas dos bancos de dados on-line MarLIN (MARLIN, 2006), Polytraits (FAULWETTER *et al.*, 2014) e Genus Trait Handbook, como também em artigos publicados (FAUCHALD & JUMARS, 1979; JUMARS *et al.*, 2015).

2.3. ÍNDICES DE DIVERSIDADE TAXONÔMICA E FUNCIONAL

Como medida da diversidade taxonômica foi calculado os índices de Diversidade de Shannon-Wiener e a Riqueza taxonômica. O índice de Diversidade de Shannon-Wiener leva em consideração a riqueza e a equitabilidade das espécies em determinada comunidade. A Riqueza taxonômica considera o número de diferentes táxons em cada local (SHANNON & WEAVER, 1949).

Para medir a diversidade funcional foi calculado a Entropia quadrática de RAO, a Riqueza funcional e o CWM (característica funcional média por amostra ponderada pela abundância relativa de espécies ou biomassa) (VILLÉGER *et al.*, 2008; LEPSŠ *et al.*, 2011). O índice de Entropia quadrática de RAO é um modelo generalizado do índice de diversidade de Simpson que calcula a dissimilaridade entre dois indivíduos aleatórios na comunidade baseado em uma única característica funcional ou várias características (LEPSŠ *et al.*, 2011). A Riqueza funcional representa o valor do espaço funcional que é preenchido pela comunidade, sem levar em consideração a abundância das espécies e não apresenta um valor de superior limite (VILLÉGER *et al.*, 2008). O CWM foi calculado com base na biomassa dos indivíduos para cada categoria de características funcionais, expressando o valor médio da característica funcional, ponderado pela biomassa relativa de espécies, representando assim a característica dominante na comunidade (LEPSŠ *et al.*, 2011).

3. MEDIDA DE PRODUÇÃO SECUNDÁRIA

Para estimar a biomassa, os organismos foram colocados em estufa a 60° C durante 72 horas e posteriormente pesados, em seguida, submetidos à combustão em forno mufla a 550° C por 8 horas, onde novamente foram pesados e então determinado o peso seco livre de cinzas (AFDW). A biomassa estimada foi utilizada para o cálculo da produção secundária proposto por Brey (2001), na versão do modelo 4-04 disponível on-line em uma planilha de cálculo (Brey 4-04) (<http://www.thomas-brey.de/science/virtualhandbook/navlog/index.html>). Este método proposto por Brey (2001) é capaz de estimar a produção anual dos macrobentos e é considerado como um dos métodos empíricos mais robustos (DOLBETH, 2005). As conversões necessárias para o cálculo foram: 1 g AFDW=23,33 kJ, para a classe Polychaeta (BREY, 2001). Os resultados finais foram convertidos para g AFDW m⁻² yr⁻¹ (produção secundária anual).

4. ANÁLISE DE DADOS

Para verificar a relação da produção secundária com a diversidade taxonômica e funcional em cada estuário, inicialmente, os dados de abundância e biomassa foram transformados em log (x+1). Para verificar a correlação e significância entre os índices de diversidade taxonômica e funcional com a produção secundária foi aplicado o coeficiente de correlação de Spearman (P ≤0.05). A correlação de Spearman avalia a intensidade da relação entre duas variáveis, seja linear ou não (SPEARMAN, 1904). Posteriormente, foram gerados modelos de regressão linear para cada um dos índices que apresentaram correlação significativa com a produção secundária.

Todas estas análises foram realizadas no software R, versão 1.9.0, utilizando o pacote 'FD' função dbFD e functcomp (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2012).

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram identificados 1.480 poliquetas, sendo 619 no estuário Rio dos Passos, 329 no Paraíba e 532 no Mamanguape. A correlação de Spearman mostrou que a produção secundária apresentou correlação significativa positiva com a Diversidade de Shannon-Wiener e a Riqueza taxonômica nos estuários Rio dos Passos e Rio Paraíba (Tabela 1). O mesmo não foi verificado no estuário Rio Mamanguape.

Tabela 1: Valores da correlação de Spearman da relação entre a produção secundária e a diversidade taxonômica e funcional nos estuários Rio dos Passos, Rio Paraíba e Rio Mamanguape. Valores de P significativo em negrito.

Estuário	Shannon-Wiener		Riqueza taxonômica		RAO		Riqueza funcional	
	R	P	R	P	R	P	R	P
Rio dos Passos	0.59	0.0005	0.64	0.0001	0.35	0.05	0.48	0.009
Rio Paraíba	0.71	0.0001	0.72	<0.001	0.52	0.01	0.01	0.9
Rio Mamanguape	0.18	0.3	0.31	0.09	0.14	0.4	0.02	1

A Entropia quadrática de RAO apresentou relação positiva e significativa com a produção secundária nos estuários Rio dos Passos e Rio Paraíba. A Riqueza funcional apresentou correlação significativa positiva com a produção secundária apenas no estuário Rio dos Passos (Tabela 1). A produção secundária no estuário Rio Mamanguape não apresentou correlação significativa com a diversidade funcional dos poliquetas.

Os modelos de regressão linear gerados mostraram que quanto maior a diversidade taxonômica da comunidade de poliquetas nos estuários Rio dos Passos e Rio Paraíba, maior é a produção secundária (Figura 2).

Figura 2: Análise de regressão linear entre os índices de diversidade taxonômica (Diversidade de Shannon-Wiener e Riqueza taxonômica) com a produção secundária no estuário Rio dos Passos e Rio Paraíba.

Apesar da Entropia quadrática de RAO e Riqueza funcional apresentarem correlação significativa positiva com a produção secundária no estuário Rio dos Passos, não foi encontrada uma tendência linear nem estatisticamente significativa de acordo com a inferência do modelo de regressão (Figura 3). No estuário Rio Paraíba o aumento da Entropia quadrática de RAO se dá concomitante com o aumento da produção secundária como mostra a Figura 3.

Figura 3: Análise de regressão linear entre os índices de diversidade funcional (Entropia quadrática de RAO e Riqueza funcional) com a produção secundária no estuário Rio dos Passos e Rio Paraíba.

Sendo assim, nossa primeira hipótese explica em parte a relação diversidade/produktividade, visto que a diversidade taxonômica também apresentou relação positiva com a produção secundária nos estuários analisados. Bolam e Eggleton (2014) analisando a relação diversidade/produktividade com a macrofauna, concluíram que a análise das características funcionais da comunidade descreve melhor o funcionamento do ecossistema do que a estrutura taxonômica.

O que pode ter influenciado a relação da diversidade taxonômica com a produção secundária nos nossos resultados foi o fato de analisarmos apenas a comunidade de poliquetas, diferentemente de Bolam e Eggleton (2014) que analisou toda a macrofauna. Os autores destacam que a escala espacial também pode ter influência sobre a diferença nas respostas das características funcionais e da estrutura taxonômica em relação a processos ecossistêmicos. O estudo de Bolam e Eggleton (2014) em grande escala geográfica (abrangendo toda a plataforma continental do Reino Unido) mostrou que a análise da estrutura taxonômica pode trazer inferências a processos ecossistêmicos diferentes de quando se é analisado a composição funcional. Enquanto em estudos de escalas menores pode haver maior similaridade entre as repostas geradas pela composição funcional e taxonômica. Nossos estuários podem ser considerados escalas espaciais pequenas quando comparadas aos estudos abrangendo toda a plataforma continental do Reino Unido. Assim se faz necessário a investigação da diversidade taxonômica e funcional sobre as funções ecossistêmicas em diferentes escalas espaciais. Para o estuário Rio Mamanguape a produção secundária não apresentou relação com a diversidade taxonômica e funcional dos poliquetas, isto pode ter se dado ao fato da baixa riqueza de espécies e a dominância de táxons generalistas como *Laeonereis* e *Lumbrineris*. A dominância de táxons generalista numa comunidade pode ocasionar homogeneização biótica e comprometer processos e serviços ecossistêmicos (MORI *et al.*, 2018).

Quanto as características funcionais, no estuário Rio dos Passos a produção secundária apresentou correlação significativa e positiva com as categorias alimentadores de suspensão e detrito; e no estuário Paraíba com a categoria de fecundidade baixa. No estuário Rio Mamanguape nenhuma categoria das características funcionais apresentaram correlação com a produção secundária.

No estuário Rio Paraíba, a relação da produção secundária com poliquetas de fecundidade baixa pode ter se dado ao fato de que os organismos que apresentam menores taxas de fecundidade investem em gerar indivíduos com melhores aptidões, seja de competição e/ou aquisição de recursos (WILLIAMS, 1996). Podendo então, ao longo do tempo os espécimes com fecundidade baixa contribuírem de forma mais eficiente para a produção secundária. Nossa segunda hipótese baseada na razão de massa de Grime (1998) foi refutada, visto que as categorias de características funcionais que apresentaram correlação com a produção secundária nos estuários não tiveram os maiores valores de biomassa.

O modelo de regressão linear gerado com as categorias de características funcionais que apresentaram correlação significativa com a produção secundária mostrou que no estuário Rio dos Passos a medida que se aumenta os alimentadores de detrito se tem o aumento da produção secundária (Figura 4).

Figura 4: Análise de regressão linear entre os CWMs das características funcionais e a produção secundária nos estuários Rio dos Passos e Rio Paraíba.

A estratégia oportunista dos alimentadores de depósito pode contribuir para uma maior biomassa das espécies que apresentam este hábito alimentar, em contrapartida, a produção sustentada por estas espécies pode prejudicar o funcionamento do ecossistema, diminuindo a diversidade funcional (DOLBETH *et al.*, 2015). Apesar dos organismos alimentadores de suspensão no estuário Rio dos Passos, e de fecundidade baixa no estuário Rio Paraíba apresentarem correlação significativa positiva com a produção secundária, a tendência gerada pelo modelo de regressão não foi linear nem estatisticamente significativa.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A resposta da produção secundária em relação diversidade taxonômica e funcional pode variar dependendo da composição e estrutura da comunidade de poliquetas de acordo com cada estuário. Contudo, a diversidade taxonômica pode prever de forma mais eficiente o processo de produção secundária nos estuários em estudo. A relação da diversidade funcional com a produção secundária no estuário Rio Paraíba nos sugere que quando se trata de comunidades biológicas correlacionadas a processos ecossistêmicos se faz necessário a análises tanto de aspectos taxonômicos quanto funcionais da comunidade. Visto que cada componente da diversidade pode trazer explicação a nível de processos que ocorrem nos ecossistemas. Quanto as características funcionais que podem se relacionar com a produção secundária, se faz necessário investigar como a natureza e a função de cada atributo funcional numa comunidade pode influenciar os níveis de produção secundária nos ecossistemas. Sendo assim, para se ter uma maior explicabilidade sobre os fatores que afetam o funcionamento dos ecossistemas, assim como a relação diversidade/produtividade se faz necessário investigar aspectos que englobem tanto a estrutura quanto a funcionalidade das comunidades.

REFERÊNCIAS

- [1] AARNIO, K., Mattila, J., Törnroos, A., & Bonsdorff, E. (2011). Zoobenthos as an environmental quality element: the ecological significance of sampling design and functional traits. *Marine Ecology*, 32, 58-71. Doi:10.1111/j.1439-0485.2010.00417.x
- [2] AESA (2018). Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba. Disponível em: < <http://www.aesa.pb.gov.br/>>. Acesso 13 de jun.2018.
- [3] Alvares, C. A., Stape, J. L., Sentelhas, P. C., DE MORAES, G., Leonardo, J., & Sparovek, G. (2013). Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, 22(6), 711-728. Doi: 10.1127/0941-2948/2013/0507
- [4] Amaral, A. C., & Nonato, E. F. (1996). *Annelida Polychaeta - Características, glossário e chaves para famílias e gêneros da costa brasileira*. Editora a UNICAMP, Campinas, SP, p. 124.
- [5] Blomberg, B. N., & Montagna, P. A. (2014). Meta-analysis of Ecopath models reveals secondary productivity patterns across the Gulf of Mexico. *Ocean & coastal management*, 100, 32-40. Doi:10.1016/j.ocecoaman.2014.07.014
- [6] Bolam, S. G., & Eggleton, J. D. (2014). Macrofaunal production and biological traits: spatial relationships along the UK continental shelf. *Journal of Sea Research*, 88, 47-58. Doi:10.1016/j.seares.2014.01.001
- [7] Brey, T. (2001). Population Dynamics in Benthic Invertebrates. A Virtual Handbook. **Version 01.2**. <http://www.thomas-brey.de/science/virtualhandbook/navlog/index.html> Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Germany.
- [8] Dolbeth, M., Cardoso, P. G., Grilo, T. F., Bordalo, M. D., Raffaelli, D., & Pardal, M. A. (2011). Long-term changes in the production by estuarine macrobenthos affected by multiple stressors. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 92(1), 10-18. Doi:10.1016/j.ecss.2010.12.006
- [9] Dolbeth, M., Cusson, M., Sousa, R., & Pardal, M. A. (2012). Secondary production as a tool for better understanding of aquatic ecosystems. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 69(7), 1230-1253. Doi:10.1139/f2012-050
- [10] Dolbeth, M., Dolédec, S., & Pardal, M. A. (2015). Relationship between functional diversity and benthic secondary production in a disturbed estuary. *Marine Ecology Progress Series*, 539, 33-46. Doi:10.3354/meps11473
- [11] Faulwetter, M. S., Markantonatou, M. V., Pavloudi, M. C., Papageorgiou, N., Keklikoglou, M. K., Chatzinikolaou, E., Pafilis, E., Chatzigeorgiou, G., Vasileiadou, K., Dailianis, T., Fanini, L., Koulouri, P., & Arvanitidis, C. (2014). Polytraits: A database on biological traits of marine polychaetes. *Biodiversity data journal*, (2). Doi:10.3897/BDJ.2.e1024
- [12] Fauchald, K., & Jumars, P. A. (1979). The diet of worms: a study of polychaetes feeding guilds. *Oceanogr. Mar. Biol. Annu. Rev.* 17, 193-284.
- [13] Grime, J. P. (1998). Benefits of plant diversity to ecosystems: immediate, filter and founder effects. *Journal of Ecology*, 86, 902-910. Doi:10.1046/j.1365-2745.1998.00306.x
- [14] FU, H., Zhong, J., Yuan, G., NI, L., XIE, P., & CAO, T. (2014). Functional traits composition predict macrophytes community productivity along a water depth gradient in a freshwater lake. *Ecology and Evolution*, 4(9), 1516-1523. Doi:10.1002/ece3.1022
- [15] Haines-Young R., & Potschin M. (2013). Common International Classification of Ecosystem Services (CICES): consultation on version 4, August-December 2012. EEA Framework Contract No EEA/IEA/09/003. University of Nottingham.
- [16] Jumars, P. A., Dorgan, K. M., & Lindsay, S. M. (2015). Diet of worms emended: an update of polychaete feeding guilds. *Ann. Rev. Mari. Sci.* 7, 497-520.
- [17] Kaiser, M. J., Attrill, M. J., Jennings, S., Thomas, D. N., & Barnes, D. K. (2011). *Marine ecology: processes, systems, and impacts*. Oxford University Press.
- [18] Lavorel, S., & Grigulis, K. (2012). How fundamental plant functional trait relationships scale-up to trade-offs and synergies in ecosystem services. *Journal of Ecology*, 100(1), 128-140. Doi:10.1111/j.1365-2745.2011.01914.x
- [19] Laureto, L. M. O., Cianciaruso, M. V., & SAMIA, D. S. M. (2015). Functional diversity: an overview of its history and applicability. *Natureza & Conservação*, 13(2), 112-116. Doi.org/10.1016/j.ncon.2015.11.001
- [20] Lepš, J., de Bello, F., Smilauer, P., & Dolezal, J. I. (2011). Community trait response to environment: disentangling species turnover vs intraspecific trait variability effects. *Ecography*, 34, 856-862. Doi:10.1111/j.1600-0587.2010.06904.x

- [21] Marlin (2006). BIOTIC - Biological Traits Information Catalogue. Marine Life Information Network Available from: Marine Biological Association of the United Kingdom, Plymouth. www.marlin.ac.uk/biotic.
- [22] Mclusk, D. S., Elliott, M., & Elliott, M. (2004). The estuarine ecosystem: ecology, threats and management. Oxford University Press on Demand.
- [23] Mori, A., S., Forest, I., & Rupert, S. (2018). β -Diversity, Community Assembly, and Ecosystem Functioning. *Trends in Ecology & Evolution*, 2389. Doi:10.1016/j.tree.2018.04.012
- [24] Naeem, S., Bunker, D., Hector, A., Loreau, M., & Perrings, C. (2009). Biodiversity, ecosystem functioning, and human wellbeing: an ecological and economic perspective. Oxford University Press, Oxford.
- [25] Nunes, M., Coelho, J. P., Cardoso, P. G., Pereira, M. E., Duarte, A. C., & PARDAL, M. A. (2008). The macrobenthic community along a mercury contamination in a temperate estuarine system (Ria de Aveiro, Portugal). *Science of the total environment*, 405(1-3), 186-194. Doi:10.1016/j.scitotenv.2008.07.009
- [26] R Development Core Team (2012). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna.
- [27] Ricotta, C., & Moretti, M. (2011). CWM and Rao's quadratic diversity: a unified framework for functional ecology. *Oecologia*, 167(1), 181-188. Doi:org/10.1007/s00442-011-1965-5
- [28] Shannon, C. E. & Weaver, W. (1949). *The Mathematical Theory of Communication*. Urbana, Illinois, University of Illinois Press.
- [29] Solan, M., Aspdén, R. J., & Paterson, D. M. (2012). Marine biodiversity and ecosystem functioning: frameworks, methodologies, and integration. Oxford University Press, Oxford.
- [30] Spearman, C. (1904). The Proof and Measurement of Association between Two Things. *The American Journal of Psychology*, 15(1), 72-101. Doi:10.2307/1412159
- [31] Thompson, P. L., Davies, T. J., & Gonzalez, A. (2015). Ecosystem functions across trophic levels are linked to functional and phylogenetic diversity. *PLoS One*, 10(2), E0117595. Doi.org/10.1371/journal.pone.0117595
- [32] Tweedley, J. R., Warwick, R. M., Valesini, F. J., Platell, M. E., & POTTER, I. C. (2012). The use of benthic macroinvertebrates to establish a benchmark for Evaluating the environmental quality of microtidal, temperate southern hemisphere estuaries. *Marine Pollution Bulletin*, 64(6), 1210-1221. Doi:10.1016/j.marpolbul.2012.03.006
- [33] Villéger, S., Mason, N. W. & Mouillot, D. (2008). New multidimensional functional diversity indices for a multifaceted framework in functional ecology. *Ecology*, 89, 2290-2301. Doi:10.1890/07-1206.1
- [34] Williams, D. D. (1996). Environmental constraints in temporary fresh waters and their consequences for the insect fauna. *Journal of the North American Benthological Society*, 15(4), 634-650.

Capítulo 12

Avaliação sazonal da abundância de Chironomidae (Diptera) em um reservatório urbano e implicação sobre a qualidade ambiental

Evaldo de Lira Azevêdo

Wilza Carla Moreira Silva

Ricássio Alves de Sousa

Tágina Isabel Abrantes de Assis

Daniele Jovem da Silva Azevêdo

Resumo: A avaliação temporal da abundância de organismos é uma das formas de analisar a qualidade ambiental de ecossistemas. Entre os diversos bioindicadores da qualidade de ecossistemas aquáticos, destaca-se a família Chironomidae (Diptera), a qual apresenta gêneros adaptados a diferentes gradientes ambientais. O objetivo deste trabalho foi avaliar a abundância de gêneros da família Chironomidae (Diptera) e inferir sobre a qualidade ambiental de um reservatório urbano, considerando a variação sazonal (período de seca e cheia). O estudo foi realizado no reservatório Senador Epitácio Pessoa (Açude Grande), Cajazeiras – PB. Para a coleta dos organismos foi utilizado um corer (1000 ml). Após a coleta as amostras foram tratadas e identificadas com bibliografia especializada. Os gêneros identificados foram *Chironomus* (170 ind.), *Polypedilum* (9 ind.), *Aedokritus* (2 ind.), *Cladopelma* (2 ind.), *Dicrotendipes* (2 ind.), *Larsia* (2 ind.) e *Tanytarsus* (2 ind.). No entanto, o gênero *Chironomus* só ocorreu no período de cheia. A alternância dos gêneros e as suas diferentes abundâncias refletiram a variabilidade do gradiente ambiental no reservatório. Mesmo apresentando elevado grau de poluição, existe mudanças do nível de degradação ambiental entre os períodos de seca e cheia.

Palavras chave: Degradação ambiental; Avaliação temporal; Insetos aquáticos; Reservatórios urbanos.

1. INTRODUÇÃO

A avaliação da abundância de organismos é reconhecida como uma das maneiras de analisar a qualidade ambiental de ecossistemas. Os ambientes aquáticos estão sujeitos a uma dinâmica sazonal, o que influencia na distribuição da abundância de organismos. Nesse sentido, para um monitoramento ambiental adequado é essencial avaliar as variações das comunidades aquáticas considerando a sazonalidade a que os ecossistemas estão submetidos. Entre os diversos organismos aquáticos utilizadas no biomonitoramento (ex.: peixes, fitoplâncton, zooplâncton, macrófitas), registra-se a família Chironomidae (Diptera) (Figura 1). Essa família desempenha papel importante nas cadeias tróficas aquáticas, sendo o maior elo entre os produtores e consumidores secundários (TOKESHI, 1995).

Figura 1: Exemplos de larvas da família Chironomidae.

Fonte: Autores.

O sucesso da família Chironomidae na exploração de uma vasta gama de condições tróficas é consequência da sua grande capacidade de adaptação fisiológica, permitindo que os indivíduos vivam em ambientes onde temperatura, pH, oxigênio dissolvido, poluição, salinidade, profundidade e produtividade variam amplamente (HELSON et al., 2006). Alguns gêneros são considerados indicadores de condições ambientais, e a abundância que apresentam pode ser utilizada em estudos de avaliação do ecossistema e no biomonitoramento (ex.: MOLOZZI et al., 2012). A abundância dos gêneros também varia fortemente com os extremos de seca e cheia mesmo em ecossistemas alterados.

Ecossistemas urbanos, geralmente encontram-se altamente impactados, caso do açude Epitácio Pessoa, localizado em Cajazeiras, PB – Brasil. O crescimento da cidade ao entorno do açude não foi acompanhado pela preocupação de conservar a qualidade ambiental. Assim, o reservatório começou a ser poluído principalmente por esgotos (ARRUDA, 2014). Mesmo estando altamente poluído, o reservatório é considerado um dos principais cartões postais da cidade (Figura 2).

Figura 2: Vista parcial do reservatório Senador Epitácio Pessoa, Cajazeiras – PB.

Fonte: Autores

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a abundância de gêneros da família Chironomidae (Diptera) e inferir sobre a qualidade ambiental do Açude Grande, Cajazeiras - PB, considerando a variação sazonal (período de seca e cheia).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 ÁREA DE ESTUDO

O estudo foi realizado em dez locais de amostragem no reservatório urbano Senador Epitácio Pessoa - Açude Grande (6°53'16.98"S, 38°34'3.25"O) localizado no município de Cajazeiras, Paraíba – Brasil (Figura 3). Este reservatório sofre de diversos impactos ambientais.

Figura 3: Reservatório Senador Epitácio Pessoa, localizado na zona urbana da cidade de Cajazeiras – PB, Brasil. * Os pontos em amarelo indicam os locais de amostragem.

Fonte: Google Earth.

2.2 COLETA E PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS

Foram realizadas duas amostragens sazonais, sendo uma no mês de novembro de 2018 (período de seca) e outra no mês de abril de 2019 (período de cheia). Vinte amostras foram obtidas, considerando os dois períodos. Amostras de sedimento foram coletadas, com auxílio de um corer (1000 ml) para acesso às larvas de Chironomidae. Em campo, o sedimento foi transferido para sacos plásticos e conservado em formaldeído a 4%. Em laboratório, as amostras foram lavadas em peneiras de malha de 500µm e armazenadas em álcool a 70%. O procedimento de identificação foi realizado com auxílio de estereoscópio de luz e microscópio. As larvas foram identificadas ao nível de gênero com auxílio de chave de identificação especializada (TRIVINHO-STRIXINO, 2011). Na figura 4 é possível observar alguns procedimentos realizados.

Figura 4: Alguns procedimentos de amostragem realizados durante a realização do estudo. A – Amostragem utilizando corer, B – Fixação das amostras utilizando formol, C – Processo de lavagem das amostras, D – Triagem para separação das larvas de Chironomidae do sedimento.

Fonte: Autores.

2.3 ANÁLISE DE DADOS

Os dados foram plotados em planilhas de dados. A avaliação dos gêneros mais abundantes em cada período (seca e cheia) foi realizada por meio de uma análise de “*Similarity Percentage*” (SIMPER). Os dados biológicos foram transformados em raiz quadrada e o coeficiente *Bray-Curtis* foi considerado para as análises (CLARKE; WARWICK, 2001). Para avaliar a existência de diferença da abundância de gêneros de Chironomidae entre os períodos, foi realizada uma análise de significância (“*Permutational Analysis of Variance Univariate*” - PERMANOVA) (Anderson, 2001; Anderson et al., 2008) com 9999 permutações, $p \leq 0,05$. Para visualização do padrão de distribuição da abundância entre os períodos foi realizada uma MDS. Todas as análises estatísticas foram realizadas programa PRIMER-6 + PERMANOVA (*Systat Software, Cranes Software International Ltd., ANDERSON et al., 2008*).

3. RESULTADOS

Durante os dois períodos sazonais (seca e cheia) foram registrados 189 espécimes, agrupados em sete gêneros. Os gêneros identificados e suas respectivas abundância absolutas foram: *Chironomus* (170), *Polypedilum* (9), *Aedokritus* (2), *Cladopelma* (2), *Dicrotendipes* (2), *Larsia* (2) e *Tanytarsus* (2).

Houve diferença significativa da abundância dos gêneros entre os períodos de seca e cheia (PERMANOVA: Pseudo $F_{1,19} = 1,79$, $P = 0,02$). Por meio da análise de Percentagem de Similaridade (SIMPER) foi possível verificar que os gêneros mais abundantes no período de seca foram *Polypedilum* (50%), *Cladopelma* (16,7%) e *Tanytarsus* (16,7%); já no período de cheia houve dominância do gênero *Chironomus* (100%) (Tabela 1).

Tabela 1: Gêneros que mais contribuíram para composição da família Chironomidae no reservatório Epitácio Pessoa. Valores em porcentagem (%) resultantes da SIMPER.

Gênero de Chironomidae (Diptera) por período sazonal	Abundância em porcentagem
Seca	
<i>Polypedilum</i>	50%
<i>Cladopelma</i>	16,7%
<i>Tanytarsus</i>	16,7%
Cheia	
<i>Chironomus</i>	100%

A análise espacial dos dados (MDS) corroborou com as diferenças de abundância encontradas entre os dois períodos sazonais, uma vez que ocorreu agregação dos locais de amostragem, com a formação de dois grupos distintos de locais de amostragem com base nos períodos analisados (Figura 5).

Figura 5: Visualização espacial da distribuição da abundância de gêneros de Chironomidae entre os dois períodos sazonais por meio da MDS.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Larvas de *Polypedilum* são registradas em alta abundância em ecossistemas de águas mornas, rasas, eutrofizados, sujeitas à secagem e ambientes artificiais (JACOBSON; PERRY, 2007). O gênero *Cladopelma* é relacionado a ambientes com concentrações elevadas de matéria orgânica e, ocorre em maiores abundâncias em períodos de estiagem (LIMA et al., 2013). Diferente dos dois gêneros anteriores, o *Tanytarsus* tem sido relacionado, mais frequentemente, a ambientes com menores cargas de poluição, tendo em vista que apresentam pouca hemoglobina em sua linfa o que os torna mais sensíveis à degradação ambiental (KUZMANOVIC et al., 2017).

O gênero *Chironomus* também tem sido associado a ambientes altamente degradados. É o gênero de Chironomidae que possui maior tolerância à poluição orgânica, isso se deve às elevadas concentrações de hemoglobina em sua linfa, fazendo com que consigam manter o metabolismo aeróbio mesmo em condições de baixas concentrações de oxigênio (BARBOUR et al., 1996). Nesse sentido, vários estudos têm registrada elevadas abundâncias de *Chironomus* em ambientes altamente degradados, incluindo períodos pós chuva (ex.: AZEVÊDO et al., 2017; MACHADO et al., 2015). Outro fator que favorece sua dominância é a condição de generalista e não apresentar exigência de habitats para se desenvolver (VIZCARDI; GIL, 2015).

A alternância dos gêneros de Chironomidae e as suas diferentes abundâncias refletiram a flutuação do gradiente ambiental no reservatório Senador Eptácio Pessoa. Mesmo apresentando elevado grau de poluição, existe mudanças do nível de degradação ambiental entre os períodos de seca e cheia. Assim, a qualidade ambiental entre os períodos, avaliada com bases nos gêneros identificados, permite afirmar que durante a seca a poluição orgânica é menor que no período de cheia, o que promovendo dominância do gênero *Chironomus*.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradem ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq pela viabilização do projeto Macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores de qualidade ambiental do Açude Grande, Cajazeiras – PB, aprovado no Edital nº 16/2018 – PIBIC/EM.

REFERÊNCIAS

- [1] ANDERSON, M.; GORLEY, R.; CLARKE, K. PERMANOVA. for PRIMER: guide to software and statistical methods. PRIMER-E, Plymouth, UK, 2008.
- [2] ARRUDA, M. S. M. O espaço em construção: ocupação e usos das áreas no entorno do Açude grande na cidade de Cajazeiras, PB. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, 2014.
- [3] AZEVÊDO, E. L. et al. Application of a statistical model for the assessment of environmental quality in neotropical semi-arid reservoirs. *Environmental monitoring and assessment*, v. 189, n. 2, p. 65, 2017.
- [4] BARBOUR, M. T. et al. A framework for biological criteria for Florida streams using benthic macroinvertebrates. *Journal of the North American Benthological Society*, v. 15, n. 2, p. 185-211, 1996.
- [5] HELSON, J. E. et al. Larval chironomid community organization in four tropical rivers: human impacts and longitudinal zonation. *Hydrobiologia*, v. 559, n. 1, p. 413-431, 2006.
- [6] JACOBSEN, Richard E.; PERRY, Sue A. *Polypedilum nubifer*, a chironomid midge (Diptera: Chironomidae) new to Florida that has nuisance potential. *Florida Entomologist*, v. 90, n. 1, p. 264-268, 2007.
- [7] KUZMANOVIC, Maja et al. Environmental stressors as a driver of the trait composition of benthic macroinvertebrate assemblages in polluted Iberian rivers. *Environmental research*, v. 156, p. 485-493, 2017.
- [8] LIMA, F. B. Diversity and spatial and temporal variation of benthic macroinvertebrates with respect to the trophic state of Lake Figueira in the South of Brazil. *Acta Limnologica Brasiliensia*, v. 25, n. 4, p. 429-441, 2013.
- [9] MACHADO, Nadja Gomes et al. *Chironomus* larvae (Chironomidae: Diptera) as water quality indicators along an environmental gradient in a neotropical urban stream. *Revista Ambiente & Água*, v. 10, n. 2, p. 298-309, 2015.
- [10] MOLOZZI, J. et al. Development and test of a statistical model for the ecological assessment of tropical reservoirs based on benthic macroinvertebrates. *Ecological Indicators*, v. 23, p. 155-165, 2012.
- [11] TRIVINHO, S.; STRIXINO, G. Larvas de Chironomidae (Diptera) do estado de São Paulo: Guia de identificação e diagnose dos gêneros. São Carlos. PPG-ERN/UFSCAR, 2011.

- [12] TOKESHI, M. Species interactions and community structure. In: The Chironomidae. Springer, Dordrecht, 1995. p. 297-335.
- [13] VIZCARDI, C.; GIL, P. Estructura de las comunidades Macrozoobentónicas de los Humedales de Ventanilla, Callao, Perú. In: Anales Científicos. Universidad Nacional Agraria La Molina, 2015. p. 1-11

Capítulo 13

Restauração ecológica em áreas de ocorrência da desertificação: Uma análise da regeneração natural de clareiras reflorestadas com a faveleira nos anos de 1999-2006-2009-2015, no Município de São José do Seridó/RN

Josimar Araújo de Medeiros

Vlândia Pinto Vidal de Oliveira

Resumo: Para testar a hipótese de que é possível a restauração florestal de áreas degradadas na caatinga com o plantio da faveleira, o presente trabalho objetivou avaliar o recrutamento de plantas provenientes do campo nativo adjacente em clareiras florestais (CFs) reflorestadas com o vegetal nos anos de 1999, 2006, 2009 e 2015, no município de São José do Seridó/RN. Utilizou-se mudas com mais de três meses de germinação, plantadas em condições de campo. A abertura das covas e o plantio ocorreu com a participação dos agricultores, foram dispensados tratamentos culturais e o isolamento da área do pastoreio. A avaliação do recrutamento de plantas da vizinhança no entorno das faveleiras ocorreu na estação chuvosa de 2019. Foram registradas 173 faveleiras nas quatro CFs e 459 plantas recrutadas, com amplo domínio da jurema preta (343). As demais espécies foram a faveleira, craibeira, velame, xique-xique, pereiro, cardeiro, coroa de frade, palmatória e algaroba. Com exceção da faveleira, todas verificadas no campo nativo do entorno das CFs. Na CF1 constatou-se o recrutamento nas nove faveleiras (10 espécies). Na CF2, em 40 (93%) (seis espécies). Na CF3 em 17 (35%) (duas espécies). Na CF4 em 20 (30%) (uma espécie). Constatou-se que a comunidade em processo de regeneração sob as faveleiras gradativamente vem aproximando-se da comunidade vegetal do entorno. A maior diversidade de espécies constatada na CF1, cujo plantio realizou-se em 1999, em comparação com a CF4, em 2015, são indícios robustos de que o plantio do vegetal vem induzindo o processo de sucessão ecológica nas CFs.

Palavras-chave: Restauração florestal, Desertificação, Caatinga, faveleira.

1. INTRODUÇÃO

A vegetação constitui um componente fundamental na estabilidade do bioma Caatinga. Por conseguinte, as estratégias conservacionistas para as áreas degradadas devem passar pela restauração desse componente (Poggiani, 1992; SER, 2004). A caatinga compreende um domínio morfoclimático essencialmente brasileiro. Essa formação vegetal, que na língua indígena significa “mata branca” é composta por uma grande biodiversidade vegetal e animal, adaptados as condições de semiaridez, cobrindo genericamente o Semiárido brasileiro (SAB) (Leal et al., 2003; Giuliatti et al., 2004). De acordo com Blackie et al. (2014) a região brasileira da caatinga compreende uma das mais extensas formações de florestas secas e mais ricas em espécies na América Latina e se encontra entre os ecossistemas florestais do mundo menos estudados e mais ameaçados.

É detentora de grande valor socioeconômico para o homem, no tocante a alimentação humana e animal, uso medicinal, uso de frutos, casca e raízes, produtos madeireiros, lenha, carvão e produtos industriais (fibras, óleos, resinas, ceras, tanino, madeira para diversas finalidades), além da preservação do solo, dos recursos hídricos e da fauna (Leal et al., 2003). De acordo com Giuliatti et al., (2004); Drumond et al. (2016) na caatinga são encontradas plantas que tem usos diversos, de sorte que a sua preservação é essencial para a saúde e qualidade de vida das pessoas.

De acordo com Albuquerque e Melo (2018) a Caatinga tem cerca de 50% de sua área degradada e parte importante disso está se transformando em desertos. No Estado do Rio Grande do Norte as áreas sujeitas à desertificação (ASD), correspondem a 95,21% do território, representando 159 municípios dos 167 existentes. (PAE/RN, 2010). Nas áreas com essas características a restauração ecológica via reflorestamento, compreende uma das ações mais sensatas em função dos impactos positivos causados no sistema solo-água-fauna-flora (Duque, 1980; Poggiani, 1992). De acordo com o estudo de Pinto et al. (2018) a plantação de árvores remove grande quantidade de dióxido de carbono da atmosfera, contribuindo na mitigação das alterações climáticas. Todavia, os projetos dessa natureza, para o SAB, vários problemas são recorrentes. Além de muitas espécies não conseguirem suportar as condições de semiaridez quando trata-se de espécies muito palatáveis pelos animais de criação, as possibilidades de êxito são remotas (Giuliatti, 2004; Fabricante et al., 2017).

O conceito de restauração ecológica considerado no trabalho em tela foi o aplicado pela Society for Ecological Restoration International – SERI (2004) que entende essa prática como sendo a ciência, prática e arte de assistir e manejar a recuperação da integridade ecológica dos ecossistemas, incluindo um nível mínimo de biodiversidade e de variabilidade na estrutura e funcionamento dos processos ecológicos, considerando-se seus valores ecológicos, econômicos e sociais. Portanto, uma atividade intencional que inicia ou acelera a recuperação de um ecossistema em relação a sua saúde, integridade e sustentabilidade (SERI, 2004). De acordo com Peres et al. (2013) essa é a definição de maior consenso no campo da restauração ecológica. Por conseguinte, será considerada no estudo em tela.

Nas palavras de Martins (2009), constata-se uma divisão entre um sentido restrito e amplo do termo restauração no meio acadêmico. Enquanto o sentido restrito sai na defesa de uma volta a condição ecológica original ou no retorno completo do ecossistema degradado às condições ambientais de vegetação, fauna, solo, hidrologia, etc. O entendimento da visão mais ampla da restauração, por sua vez, objetiva uma recuperação à longo prazo da integridade ecológica, biodiversidade e estabilidade do ecossistema. Por conseguinte, abrindo alas para uma maior flexibilização dos projetos de restauração, por atribuir uma importância maior à criação de condições ecológicas favoráveis à sucessão e ao aumento da biodiversidade. (Martins, 2009; Maron et al., 2012).

No seu estudo Maron et al. (2012), também avaliaram que recuperar os serviços ecossistêmicos geralmente é possível, embora a recuperação do ecossistema que foi destruído ser praticamente impossível. Encontra-se alinhado com esse segundo entendimento o campo teórico de inserção das inquietações do estudo em tela. Quanto a origem de mudas para plantio, SERI (2004); Drumond et al. (2016) ressaltaram a importância do uso de espécies nativas em projeto dessa natureza.

Outra recorrência divergente nos estudos sobre restauração ecológica se refere a diversidade de plantas a serem usadas em atividades restauradoras. Enquanto Brancalion et al. (2010) sugerem que o sucesso da restauração depende do plantio de uma diversidade de espécies com funções definidas. Na visão de Durigan et al. (2010) essa prática não garante o sucesso. Esses autores defendem que até mesmo plantios monoespecíficos podem desencadear a sucessão rumo a ecossistemas saudáveis e biodiversos.

A proposta de restauração de paisagens degradadas pela desertificação, com a introdução da faveleira (*Cnidoscolus quercifolius*) se encontra alinhada com essa matriz teórica. Muito resistente a semiaridez, esse vegetal apresenta até oito metros de altura total acompanhado de dossel de igual valor, elevado porte de massa verde e longevidade estimada em um século (Medeiros; Aloufa, 2015), potencializando a ação nucleadora. Apesar disso, sua distribuição geográfica apresenta-se difusa pelo território (Andrade, 2007). É um vegetal endêmico da caatinga pertencente a família Euphorbiaceae (Duque, 1980; Andrade, 2007) que apresenta potencialidades para contribuir na reprodução social dos remanescentes do campo e na restauração ecológica de áreas degradadas, por ser resistente a semiaridez. Outra variável que endossa o uso do vegetal na restauração florestal se refere a viabilidade do plantio, sem que para isso seja necessário a interrupção do pastoreio (Medeiros; Aloufa, 2015; Medeiros, 2018;).

Muitos trabalhos tem reconhecido a força dos seres humanos na mitigação dos problemas ambientais (PAN-Brasil, 2004; Porto-Gonçalves, 2012; Ricklefs, 2015). Porto-Gonçalves (2012) ressaltou que a enorme diversidade de povos e cultura, são uma dádiva da floresta tropical, assim como essas populações também contribuíram na formação dessas florestas. O envolvimento de trabalhadores no reflorestamento de paisagem degradada alinha-se com essa perspectiva teórica. Em face dos antecedentes relatados o trabalho em tela foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o recrutamento de plantas provenientes do campo nativo adjacente em clareiras florestais (CFs) reflorestadas com a faveleira nos anos de 1999, 2006, 2009 e 2015, no município de São José do Seridó/RN.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DO ESTUDO

A municipalidades da pesquisa localiza-se ao Centro-Sul do Estado do Rio Grande do Norte, na região de planejamento Seridó. A distância rodoviária da sede dessa municipalidade para Natal, capital do Estado é pouco mais de 240 km (Figura. 1)

Figura 1: Localização geográfica do município de São José do Seridó/RN, local de realização da pesquisa.

Fonte: Elaborado por Marcos Alexandre, 2018

Localiza-se conforme Felipe e Carvalho (2001), na Depressão Sertaneja². É banhado pelas águas da Bacia Hidrográfica Piranhas-Açu e está incluído no domínio da Caatinga. Quanto ao clima, predomina o tipo Tropical Quente e Seco ou Semiárido (Felipe; Carvalho, 2001). Apresenta temperatura média anual de 27,5 °C, com máximas de 33 °C, mínimas de 18 °C e insolação de aproximadamente 2.455 horas/ano, sujeito à influência dos ventos alísios secos do Nordeste (IDEMA, 2004). As médias de chuvas oscilam entre 400 e 600 mm, concentrados nos primeiros meses do ano, além de mal distribuídas no tempo e no espaço.

² Terrenos baixos situados entre as partes altas do Planalto da Borborema e da Chapada do Apodi, com estrutura geológica constituída por rochas cristalinas e terrenos antigos, com origem no Pré-Cambriano

A flora predominante, diante das adversidades climáticas, é caracterizada segundo Duque (1980), pela presença de vegetação baixa, muito espaçada, com capins (poáceas) e solo muito erodido, com o predomínio do pereiro e arbustos isolados (caatinga hiperxerófitas). Em consonância com essa classificação, na área do estudo, em meio a remanescentes de caatinga, constata-se a presença de clareiras florestais, caracterizadas pela ausência de espécies de ciclo perene. Essas áreas apresentam relevo levemente inclinado e na maior parte do ano permanecem sem cobertura vegetal. O tipo de solo dominante é o Neossolo Litólico, pouco desenvolvido, raso e com a presença de pontos de afloramento rochosos (BEZERRA JÚNIOR e SILVA, 2007). A área do estudo localiza-se há 12 km da sede do município, na localidade rural São Paulo.

2.2. PROCEDIMENTOS

As favelerias onde realizou-se o estudo foram resultantes de plantio em quatro CFs no início da estação chuvosa, respectivamente, nos anos de 1999, CF1; 2006, CF2; 2009, CF3 e 2015, CF4. Ambas se encontram separadas por mata nativa e em área de pastoreio. Utilizou-se mudas com mais de três meses de germinação, fornecidas pela municipalidade de São José do Seridó/RN. Foram plantadas em condições de campo. Ou seja, não foi feita adubação no solo e a irrigação foi tão somente a proveniente das chuvas. Na vegetação do campo nativo do entorno das CFs não registrou-se a presença da faveleira.

No entorno da cova de todas as mudas, no ato do plantio, a pequena inclinação na direção do colete foi completada com pedras para viabilizar a coleta de água da chuva e de partículas orgânicas e inorgânicas transportadas pelas enxurradas e pelo vento. A abertura das covas e o plantio das faveleiras ocorreu com a participação dos agricultores que são proprietários da área. Não foram efetuados tratos culturais nem isolamento da área do pastoreio.

A avaliação do recrutamento de plantas no entorno das faveleiras ocorreu na estação chuvosa de 2019 (meses de fevereiro e março). Identificou-se o nome popular das plantas recrutadas num raio de 80 cm contado a partir do colete das faveleiras contabilizadas nas quatro CFs. As espécies identificadas foram confrontadas com a vegetação do campo nativo das respectivas clareiras. Foram contabilizadas e feita a identificação do nome popular e o nome científico de todos os táxons da vegetação permanente que se encontravam vivas. A identificação do nome popular foi realizada pelos autores³ com a participação de agricultores que atuam na área. Para a identificação do nome científico utilizou-se os inventários florísticos realizados por Andrade (2007), nos municípios de Acari e Serra Negra do Norte/RN, Santa Luzia/PB, Petrolina/PE e Juazeiro/BA.

As informações acerca dos usos das plantas identificadas no entorno das faveleiras por parte da população que desenvolve atividades agropecuárias na área foi realizado através de entrevistas semiestruturadas realizadas com sete agricultores (quatro homens e três mulheres) que desenvolvem atividades agropecuárias na propriedade. No ensejo também realizou-se a medição da altura total (AT) das faveleiras com uso de uma régua graduada e ampla cobertura fotográfica dos elementos vegetativos encontrados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As faveleiras onde realizou-se o inventário das plantas recrutadas no seu entorno, foram plantadas em quatro CFs nos anos de 1999, CF1; 2006, CF2; 2009, CF3 e em 2015, CF4. O plantio ocorreu através de mudas na época com mais de três meses de idade. Corroborando com essa assertiva, Drumond et al. (2016) avaliaram que o plantio de mudas de espécies arbóreas/arbustivas ser o mais adequado na restauração de áreas desmatadas.

As quatro CFs do estudo apresentavam problemas de degradação ambiental a vista variável que motivou a introdução do vegetal pois para Medeiros e Aloufa (2015) é endêmica da Caatinga, reconhecida pela resistência em ambientes com essa fisionomia e capaz de superar a pressão do pastoreio, uma vez que as folhas e galhos são pouco palatáveis para os animais de criação quando se encontram verdes. Em concordância com essa assertiva Pinto et al. (2018, p. 29) ressaltaram que o plantio de muda representa uma técnica de condução da regeneração natural em “[...] áreas inseridas em paisagens muito fragmentadas [...]”.

³ O primeiro autor do trabalho em tela realiza atividades na área da pesquisa há quatro décadas, dedicando-se a agricultura e a pecuária. Nas duas últimas décadas também tem realizado atividades de pesquisa. Por conseguinte, tem conhecimento sobre o nome popular de maior das plantas encontradas no local.

Esse tipo de restauração florestal é caracterizada por Brancalion et al. (2015) como dirigida e é empregada em áreas degradadas cujas possibilidades de desenvolvimento espontâneo da vegetação são remotas.

Outra motivação para o uso desse vegetal foi o interesse dos agricultores pelo plantio nas suas terras pela possibilidade de produção de alimentos para uso no suprimento animal, além de não ser registrada nas adjacências das CFs objeto do estudo em tela. Essa observação empírica está em sintonia com o disposto pela SERI (2004, p. 5) ao ressaltar que a restauração na maior parte dos casos “[...] as crenças e práticas culturais são levadas em conta para ajudar a dar forma ao que será realizado sob a rubrica de restauração”. Na sua análise sobre esse assunto, Porto-Gonçalves (2012) relatou que a questão ambiental é muito grave para ficar apenas como objeto de preocupação de ambientalistas.

A área de localização das CFs é explorada em caráter permanente com o pastoreio. Por conseguinte, o plantio foi realizado com animais de permeio, contrariando aportes teóricos (Drumond et al., 2016; Pinto et al., 2018) que ressaltaram que em projetos de restauração florestal o cercamento da área é fundamental para assegurar os resultados. Apesar de para a SERI (2004, p. 4) “[...] a restauração ecológica é indefensável se não apoiar a base ecológica da sobrevivência humana”. Nesse caso, entendido como a manutenção dos animais pastando na área. Em consonância com essa citação, observações *in loco* na área das CFs 1, 2 e 3, onde a presença de bovinos é permanente, o consumo das folhas à medida que começa a senescência após o final da estação úmida, vem sendo recorrente. É importante ressaltar que o consumo dessa parte do vegetal, além da valia reconhecida pelos criadores, tem despertado o interesse de pesquisadores (Duque, 1980; Medeiros; Aloufa, 2015; Medeiros, 2018), em função de ser muito palatável e rica em proteínas, compreendendo relevante opção para a engorda principalmente de caprinos e ovinos (Duque, 1980; Andrade, 2007).

O plantio das faveleiras nas quatro CFs não careceu de fontes orçamentárias diretas uma vez que as mudas foram doadas e transportadas até a área de plantio pela municipalidade, enquanto a perfuração das covas e o plantio foi realizado pelos agricultores (as) que atuam na área e a implantação de estrutura para isolamento foi dispensada. Esse percurso metodológico contrapõe-se ao disposto pela CEPAN (2018) ao ressaltar que a restauração ecológica é uma atividade complexa e cara. Embora corrobora com o disposto por Brasil (2004); Porto-Gonçalves (2012) e Ricklefs (2015) com relação a necessidade do envolvimento das populações locais nas ações cujo foco é a mitigação dos problemas socioambientais dos locais onde se encontram suas histórias de vida.

Foram registradas 173 faveleiras resultante de plantio nas quatro CFs do estudo e um total de 459 plantas recrutadas, com amplo domínio da jurema preta. Contabilizou-se 343 indivíduos pertencentes a esse táxon (74%) sendo o único registro nas quatro CFs. Para Garígllo et al. (2010) esse vegetal é característico de sítios degradados. As demais espécies foram o velame, xique-xique, pereiro, cardeiro, faveleira, coroa de frade, palmatória, craibeira e algaroba. Com exceção da faveleira, todas verificadas no campo nativo do entorno das respectivas clareiras. Em consonância com essa assertiva, SERI (2004) ressaltou que o conhecimento e a valorização dos fragmentos de vegetação nativa remanescentes são fundamentais para a restauração e conservação da biodiversidade, enquanto Martins et al. (2012) notabilizou que aspectos da ecologia da paisagem como a análise de fragmentos florestais remanescentes e seu potencial como fonte de diversidade para a regeneração natural são de relevância para melhorar a qualidade e sustentabilidade das áreas restauradas e reduzir os custos dos projetos de restauração (Figura 2).

Figura 2: Recrutamento das espécies jurema-preta (A), xique-xique (B), velame (C) e pereiro (D) no entorno de faveleiras.

Fonte: Arquivos dos autores.

Entre as 10 espécies identificadas, a excessão da algaroba, craibeira, velame e a coroa de frade, as demais foram registradas por Andrade (2007) em levantamento realizado nos municípios de Serra Negra do Norte e Acari/RN e Juazeiro/BA. Conforme as entrevistas realizadas com moradores, são de uso corrente por parte da população que exercem atividades agropecuárias na área objeto do trabalho de restauração ecológica, quer seja na alimentação dos animais, madeireiro (estacas, moirões, lenha, cabos para ferramentas) e produção de remédios. Corroborando com essa assertiva Pinto et al. (2018, p. 56) relataram que “Dentre os benéficos diretos de um programa de restauração ecológica pode-se elencar as oportunidades de emprego e renda”. As sementes da faveleira e os frutos do xique-xique e da coroa de frade também são usados na alimentação humana. Essa assertiva corrobora com o descrito por Blackie et al. (2014) ao destacar que as florestas secas desempenham um papel em muitos dos serviços ambientais que apoiam de forma direta e indireta a segurança alimentar particularmente em tempos de escassez.

O uso em potencial direto e indireto das espécies registradas nas CFs por parte da população local revela a importância da restauração florestal para os assentamentos humanos remanescentes das áreas de caatinga que dependem em caráter imediato dos bens ambientais fornecidos pela vegetação. Em corroboração com essas informações, Albuquerque e Melo (2018, p. 41) ressaltaram que “Normalmente, as plantas da Caatinga são de múltiplo uso, o que significa que, se uma espécie é utilizada como alimento, provavelmente também pode ser usada na medicina e até mesmo como combustível.” As faveleiras plantadas no ano de 1999 (CF1), constatou-se o recrutamento de plantas (RP) nas nove plantas registradas (100%). Na CF2, cujo plantio realizou-se em 2006 foram registradas 43 faveleiras vivas com o registro de RP em 40 (93%). Na CF3 registrou-se 48 faveleiras, com RP em 17 (35%), enquanto na CF4, 65 faveleiras com RP em 20 (30%). A altura total média das faveleiras registradas nas quatro CFs foi de 5,80 m (CF1), 3,36 m (CF2), 1,39 m (CF3) e 0,48 m (CF4).

O processo gradativo de povoamento do entorno das faveleiras por essências do campo nativo adjacente corrobora com o descrito pela SERI (2004, p. 9) ao destacar que uma das metas para a restauração de qualquer ecossistema natural “[...] é recuperar os processos autogênicos ao ponto em que a assistência do restaurador não seja mais necessária”, tomando como base ecossistemas de referência existentes na paisagem regional. A tabela 1 apresenta a diversidade de elementos florísticos registrados nas CFs objeto do estudo em tela.

Tabela 1: Detalhe das famílias, nome científico e popular das espécies da caatinga identificadas no entorno das faveleiras plantadas nas quatro clareiras florestais, respectivamente, nos anos de 1999, 2006, 2009 e 2015.

Família/Espécie	Nome comum	CF1	CF2	CF3	CF4
Apocynaceae <i>Aspidosperma pyrifolium</i>	Pereiro	x	x		
Cactaceae <i>Pilosocereus gounellei</i> <i>Opuntia palmadora</i> <i>Opuntia inamoena</i> <i>Cereus jamacaru</i>	Xique-xique Palmatória Coroa de frade Cardeiro	x x x x	x x		
Euphorbiaceae <i>Croton moritibensis</i> <i>Cnidocolus quercifolius</i>	Velame Faveleira	X x	x	x	
Fabaceae <i>Prosopis juliflora</i>	Algaroba	x	x		
Bignoniaceae <i>Tabebuia aurea</i>	Craibeira	x			
Mimosaceae <i>Mimosa acutistipula</i>	Jurema-preta	x	x	x	x

Fonte: Elaboração dos autores

É importante registrar que as faveleiras da CF1 se encontram em idade reprodutiva. Por conseguinte, novas áreas vem sendo povoadas pelo vegetal através de processos naturais e/ou via intervenção humana (plano de mudas). Entre o total de faveleiras inventariadas (171) nas quatro CFs não registrou-se nenhum indivíduo morto. Conforme Duque (1980); Medeiros e Aloufa (2015); Medeiros (2018) esse vegetal poderá ser aproveitado para a primeira fase de reflorestamentos de áreas desmatadas e com ocorrência de processo erosivo, enquanto para Paterno et al. (2016) o vegetal é uma espécie enfermeira do bioma caatinga.

4. CONCLUSÕES

Constatou-se que a comunidade em processo de regeneração sob as faveleiras gradativamente vem aproximando-se do ecossistema de referência em riqueza de espécies. Prova dessa constatação é a presença de 10 espécies na CF1 cujas faveleiras foram plantadas em 1999, enquanto na CF4 cujo plantio foi realizado em 2015, uma única espécie foi registrada.

A maior diversidade de espécies constatada na CF1 entre as faveleiras plantadas em 1999 e o plantio realizado no ano de 2015 são indícios robustos de que o plantio do vegetal vem induzindo o processo de sucessão ecológica nas CFs. Em caráter grafativo também tem ocorrido o RP. Na CF1 foram registrados elementos florísticos em 100% das faveleiras, enquanto na CF2 em 93%, na CF3 em 35% e na CF4 em 30%.

O aproveitamento da faveleira e das demais espécies que vem sendo recrutadas nas atividades humanas, associado as condições elementares que tem viabilizado o recatingamento de áreas degradadas, exposto na pesquisa em tel, são indícios robustos de que representa uma estratégia do ponto de vista socioambiental e socioeconômico, passível de ser replicada na restauração florestal de áreas degradadas da caatinga.

REFERÊNCIAS

- [1] Albuquerque, U. P.; Melo, F. P. L. Socioecologia da caatinga. In: Ciência e cultura. vol.70, n. 4. São Paulo, 2018. p. 40-44.
- [2] Andrade, L. A. Ecologia da faveleira na caatinga: bases para exploração como lavoura xerófila. João Pessoa/PB: Impressos Adilson, 2007.
- [3] Blackie, R.; Baldauf, C.; Gautier, D.; Gumbo, D.; Kassa, H.; Arthasarathy, N.; Paumgarten, F.; Sola, P.; Pulla, S.; Waeber, P.; Sunderland, T. As florestas tropicais secas: o estado de conhecimento global e recomendações para futuras pesquisas. Indonésia: Centro de Pesquisa Florestal Internacional (CIFOR), 2014. (Documento para discussão).
- [4] Brancalion, P.H.S., Rodrigues, R.R., Gandolfi, S., Kageyama, P.Y., Nave, A.G., Gandara, F.B., Barbosa, L.M. & Tabarelli, M. Instrumentos legais podem contribuir para a restauração de florestas tropicais biodiversas. Revista Árvore. 34: 455-470, 2010.
- [5] Brancalion, P.H.S.; Gandolfi, S.; Rodrigues, R. R. Restauração florestal. São Paulo: Oficina de textos, 2015.
- [6] Brasil, Ministério do Meio Ambiente. Atlas das áreas susceptíveis a desertificação no Brasil. Brasília: MMA, 2007.
- [7] Brasil, Ministério do Meio Ambiente (MMA). Programa de Ação Nacional de Combate a Desertificação e Mitigação dos Efeitos das Secas – PAN-Brasil. Brasília: MMA, 2004.
- [8] Bezerra Júnior, G. O.; Silva, N. M. Caracterização geoambiental da Microrregião do Seridó Oriental do Rio Grande do Norte. Holos, 2, p.78-91, 2007.
- [9] Drumond, M. A.; Kiill, L. H. P.; Ribaski, J.; Aidar, S. T. Caracterização e usos das espécies da caatinga: subsídio para programas de restauração florestal nas unidades de conservação da caatinga (UCCAs). Petrolina/PE: Embrapa Semiárido, 2016.
- [10] Duque, J. G. Solo e água no polígono das secas. 4 ed. Mossoró. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 1980.
- [11] Durigan, G., Engel, V.L., Torezan, J.M., Melo, A.C.G., Marques, M.C.M., Martins, S.V., REIS, A. & Scarano, F.R. Normas jurídicas para a restauração ecológica: uma barreira a mais a dificultar o êxito das iniciativas. Revista Árvore. 34: 471-485, 2010.
- [12] Felipe, J. L. A.; Rocha, A. P. B.; Carvalho, E. A. Atlas escolar Rio Grande do Norte: estudo geo-histórico e cultural. 2 ed. João Pessoa: Grafset, 2011.
- [13] Fabricante, J. R.; Araújo, K. C. T.; Manfio, M.; Siqueira Filho, J. A. Mortalidade de mudas de espécies nativas sob efeito do pastejo de caprinos, ovinos e emas: implicações para projetos de recuperação/restauração de áreas degradadas na caatinga. Nativa, Sinop, v.5, n.6, p.410-413, 2017.
- [14] Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca no Estado do Rio Grande do Norte - PAE/RN. Nata/RN, 2010.
- [15] Garíglío, M. A.; Sampaio, E. V.S. B.; Cestaro, L. A.; Kageyama, P. Y. Uso sustentável e conservação dos recursos florestais da caatinga. Brasília/DF: Serviço Florestal Brasileiro, 2010.

- [16] Giuliatti, A. A. et al. Diagnóstico da vegetação nativa do bioma Caatinga. Brasília: Ministério do Meio Ambiente. 2004. Disponível em: http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/18267/1/Biodiversidade_Caatinga_parte2.pdf. Acesso em abril/2019.
- [17] Idema. Diretrizes para política de controle da desertificação no Rio Grande do Norte. Natal, 2004.
- [18] Leal, I. R; Tabarelli, M.; SILVA, J. M. C. Ecologia e Conservação da Caatinga. Recife : Ed. Universitária da UFPE, 2003.
- [19] Martins, S. V. Recuperação de áreas degradadas. Viçosa, MG: Aprenda Fácil Editora, 2009.
- [20] Martins, S.V.; Miranda Neto, A.; Ribeiro, T.M. Uma abordagem sobre diversidade e técnicas de restauração ecológica. In: Martins, S.V. (Ed.) Restauração ecológica de ecossistemas degradados. Viçosa: Editora UFV, 2012. p. 17-60.
- [21] Maron, M., Hobbs, R.J., Moilanen, A., Matthews, J.W., Christie, K., Gardner, T.A., Keith, D.A., Lindenmayer, D.B. & Mcalpine, C.A. Faustian bargains? Restoration realities in the context of biodiversity offset policies. *Biological Conservation* 155: 141-148, 2012.
- [22] Medeiros, J. A.; Aloufa, M. A. I. Revegetação de área em processo de desertificação com a Faveleira (*Cnidocolus quercifolius* Pohl) no município de São José do Seridó/RN. *Revista Brasileira de Geografia Física*. v. 08 n. 04, p. 1158-1175, 2015.
- [23] Medeiros, J. A. Reabilitação de áreas em processo de desertificação no semiárido norterio-grandense com a faveleira: espécie-chave cultural do bioma caatinga. 2018. 151 f. Tese (Doutorado em desenvolvimento e meio ambiente). Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, Natal, 2018.
- [24] Paterno, G.B., Siqueira Filho, J.A.; Ganade, G. Species-specific facilitation, ontogenetic shifts and consequences for plant community succession. *Journal of Vegetation Science* (2016). Disponível em: < <http://www.crad.univasf.edu.br/arquivos/artigos/jvs12382.pdf> >. Acesso em dezembro de 2018
- [25] Peres, C. A.; Barlow, J.; ; Gardner, T. A.; Vieira, I. C. G. (Orgs.). Conservação da Biodiversidade em paisagens antropizadas do Brasil. Curitiba: Ed. UFPR, 2013. 587p.
- [26] Poggiani, F. O reflorestamento no Nordeste brasileiro: consequências ecológicas. Piracicaba/SP: v. 3, n. 10, p. 85-95, 1982.
- [27] Porto-Gonçalves, C. V. O desafio ambiental. 3 ed. – Rio de Janeiro: Record, 2012.
- [28] Ricklefs, R. E. A economia da natureza. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
- [29] Ross, J. S. Os grandes domínios de vegetação: o caso brasileiro. In: Geografia do Brasil. 5 ed. Editora da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008.
- [30] Pinto, S. R. R.; Freitas Neto, J. J.; Favero, G. E. Avaliação de oportunidades de restauração de paisagens florestais para o Estado de Pernambuco. Recife: CEPAN, 2018.
- [31] Society For Ecological Restoration - Seri - International Science and Policy Working Group. The SER primer in ecological restoration (Version 2). 2004. Disponível em: < Disponível em: <file:///D:/Esp%20chace/Restaura%C3%A7%C3%A3o%20de%20paisagens/Lido%203.pdf> >. Acesso em 10 de junho de 2018.

Capítulo 14

Importância da Associação Oito Verde para a recuperação da mata ciliar do Açude de Boqueirão – PB

Luzimar Joventina de Melo

Vênia Camelo de Souza

Ivan Sergio da Silva Oliveira

Josivania Ribeiro da Silva

Resumo: A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a comunidade educativa tem a tomada de consciência de sua realidade global, do tipo de relações que os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados de ditas relações e suas causas profundas. Este trabalho teve como objetivo diagnosticar as ações da APA8VERDE na cidade de Boqueirão, PB enfatizando sua importância para a recuperação da mata ciliar do açude Epitácio Pessoa em Boqueirão (PB). A pesquisa foi realizada na associação de proteção Ambiental APA8VERDE em Boqueirão-PB através de diagnóstico das ações ambientais efetivadas e realizadas, por meio de entrevistas com responsáveis, vivenciando essas ações, e participando do trabalho às margens do açude de Boqueirão. Como resultados podemos observar os cuidados com a preservação do nosso ecossistema, através da produção e plantio de mudas de espécies nativas, frutíferas e ornamentais, bem como, o fortalecimento e estímulo á comunidade para participarem dessa importante atividade ambiental, através da recuperação da mata ciliar no entorno do açude Epitácio Pessoa (Boqueirão).

Palavras-Chave: reflorestamento; Educação ambiental; açude Epitácio Pessoa.

1. INTRODUÇÃO

A educação ambiental pode ser entendida por processos dos quais o indivíduo e o coletivo constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências direcionada a conservação do meio ambiente, que é um bem de uso comum do povo, efetivo à saudável condição de vida e sustentabilidade. (Brasil, 1999). Se desenvolve, mediante uma prática que vincula o educando com a comunidade, valores e atitudes que promovem um comportamento dirigido a transformação superada dessa realidade (CEAES, 1976).

Educação ambiental desenvolve-se num contexto de complexidade, procurando trabalhar não apenas a mudança cultural, mas também a transformação social, assumindo a crise ambiental como uma questão ética e política." (Mousinho, 2003).

A Mata ciliar é a formação vegetal nas margens dos rios, lagos, represas e nascentes. Também é conhecida como mata de galeria, mata de várzea, vegetação ou floresta ripária. Considerada pelo Código Florestal Federal como "área de preservação permanente", com diversas funções ambientais, devendo respeitar uma extensão específica de acordo com a largura dos rios, córregos, lagos, represas e nascentes.

A restauração de áreas degradadas como por exemplo as que são atingidas por queimadas, é de extrema importância para o equilíbrio ecológico, considerando os inúmeros benefícios que se é adquirido através dela, onde restaurar florestas é mais que simplesmente repor árvores em um determinado local, porém restaurar implica em recuperar todas as funções ecológicas da floresta, além de repor e permitir a viabilidade da grande maioria de suas espécies (Coelho, 2010).

Em resposta aos problemas socioambientais que vem aumentando com o forte ritmo do desmatamento no município de Boqueirão e regiões circunvizinhas, a educação ambiental deve se tornar uma causa maior, onde de fato a vivência venha a formar cidadãos atuantes e conscientes das atribuições com a proteção do meio ambiente, viabilizando uma ação sólida e significativa para o ambiente e para a população.

A associação de proteção Ambiental APA8VERDE exerce um trabalho voltado para a plantação e distribuição de mudas com intuito de recuperar a mata ciliar em torno do açude de Boqueirão (Epitácio Pessoa), obtendo êxito por meio do trabalho social, ambiental e cultural com crianças e jovens. Essa ação não visa apenas a recuperação e reposição da mata nativa, mas também do ser humano, por meio da conscientização de proteger e fortalecer o meio em que vivem. Este trabalho teve como objetivo diagnosticar as ações da APA8VERDE na cidade de Boqueirão, PB enfatizando sua importância para a recuperação da mata ciliar do açude de Boqueirão.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. AÇUDE DE BOQUEIRÃO

O açude de boqueirão está localizado no rio Paraíba, que é o maior curso d'água do estado e tem suas nascentes nas proximidades da cidade de Monteiro, desaguando no Oceano Atlântico entre os municípios de Cabedelo e Lucena.

No Diário Oficial da União de 19 de maio de 1954 – Declara-se de utilidade pública, para efeito de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, áreas de terreno necessária à construção do açude público Boqueirão, no município de Cabaceiras.

A construção do açude solucionou o grave problema de abastecimento d'água de Campina Grande, pois a cidade ressentia-se de fontes de águas potáveis para a sua população, desde a inauguração do seu abastecimento urbano em 1939, em que tinha como fornecedora a represa de Vaca Brava, situada nas proximidades do município de Areia, no Agreste paraibano.

Um estudo desenvolvido no início dos anos 2000 pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) revelou que o volume hídrico acumulado no açude sofreu uma redução de 67,27% nos últimos 20 anos. Na época de sua construção, a capacidade de armazenamento do açude inicialmente era de 536 milhões de metros cúbicos, mas com o assoreamento essa capacidade foi reduzida para 436 milhões. A sua lâmina d'água abrange uma superfície em torno de 2.700 hectares. Nesse mesmo período, segundo dados da pesquisa, o número de ligações de água em prédios residenciais e comerciais em Campina Grande aumentou em 102,9%, as quais passaram de 40.298, em 1983, para 81.796, em 2003. Conforme a Aesa (2019), o reservatório passou de um volume de 93.124.411 m³ (22,62%) para 94.547.282 m³ (22,97%).

2.2. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

No ano de 2007 foi iniciado um trabalho inicial de plantações de árvores na cidade de Boqueirão, pois era visível a necessidade de arborizar toda a cidade. Em 2013, foi lançado o projeto oito verde, no qual, através de plantio de mudas e um trabalho educativo com a comunidade visava minimizar a evaporação e o assoreamento no açude, que apresentava problemas recorrentes da ação humana principalmente pelo avanço da agricultura.

Em 2014, foi fundada uma Associação de proteção ambiental, com o nome fantasia de APA8VERDE, com a finalidade de preservar as nascentes dos rios, as matas ciliares e desenvolver a conscientização ambiental nas escolas. Ao decorrer deste tempo, em decorrência do déficit de árvores foi necessária a expansão do projeto às cidades circunvizinhas. Desde o início no ano de 2007, chegamos a marca de 300 mil (trezentas mil) mudas de árvores doadas e plantadas no cariri paraibano.

O intuito de recuperar a mata nativa vem do indicador do desflorestamento, objetivando assim a produção de mudas nativas, que serão essenciais para o município de Boqueirão, com a recuperação da mata ciliar em torno da bacia de captação de água do açude Epitácio Pessoa.

A partir de uma ação de grande mobilização com o intuito de expandir o projeto em demais localidades, foi ampliando e propagando a distribuição de mudas e folhetos nas cidades de Campina Grande, João Pessoa, Cabaceiras, Barra de São Miguel, Serra Branca, Boa Vista, Soledade, Monteiro, Mogeiro, São João do Cariri, Taperoá, Boqueirão, Caturité, Alcantil, Santa Cecília, Umbuzeiro, Lagoa Seca entre outras.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 LOCAL DA PESQUISA

O Açude Epitácio Pessoa (Fig. 1), popularmente conhecido como Boqueirão, é uma represa localizada no município de Boqueirão, Paraíba. Sua bacia se estende pelos municípios de Boqueirão, Cabaceiras e Barra de São Miguel e abastece as cidades paraibanas de Campina Grande, Boqueirão, Queimadas, Pocinhos, Caturité, Riacho de Santo Antônio, Barra de São Miguel e outras. O clima de toda a região da bacia é tropical quente e seco, com máxima de 37 °Celsius e mínimas de 16 °C.

A precipitação média na região é de 600 mm/ano, caracterizando-se um clima de semiárido. O açude, que está situado na sub-bacia hidrográfica do Alto Paraíba, que juntamente com as sub-bacias do rio Taperoá e do Médio e Baixo Paraíba constituem a bacia hidrográfica do rio Paraíba, abrange uma área de 19.088,5 km², o que corresponde a 34% do território paraibano. Os 78 municípios inseridos nela abrigam uma população em torno de 1,8 milhão de habitantes, aproximadamente, 55% da população total do estado.

Figura 7. Açude Epitácio Pessoa

3.2. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Os procedimentos metodológicos adotados no decorrer da pesquisa foram: a) Estudo documental e bibliográfico; b) Visita a campo para reconhecimento e determinação da área de estudo; c) Levantamento da qualidade ambiental da área por meio de análises in loco e coleta de dados e informações; d) Análises dos dados coletados e) Organização e sistematização dos dados coletados. Buscou-se as referências necessárias para o desenvolvimento do trabalho, a primeira etapa constituiu-se de um levantamento bibliográfico por meio de pesquisas em artigos, monografias e relatórios que abordassem sobre o contexto em estudo nesse trabalho. Posteriormente a etapa da pesquisa documental e bibliográfica, procedeu-se à escolha do local para realização da pesquisa, seguida de uma visita a campo para reconhecimento e determinação da área de estudo. No que tange a delimitação da área de estudo, recorreu-se as informações de dados primários e secundários, bem como, utilizou-se de alguns componentes principais, tais como: aspectos ambientais e a disponibilidade hídrica, intervenções humanas no local.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As matas ciliares vêm sofrendo degradações, principalmente nas áreas urbanas, com a retirada parcial ou total da vegetação nessa faixa, a qual deveria ser mantida intacta por garantir a preservação dos recursos hídricos, a estabilidade geológica e a biodiversidade (Terres; Muller, 2008; Andrade et al., 2005; Durigan; Silveira, 1999). Observou-se que o trabalho da APA8VERDE as margens do açude de Boqueirão são de suma importância para a recomposição da mata ciliar, conscientização dos moradores e trabalhadores deste local e já foi observado grandes diferença no comportamento das pessoas e na mata ciliar às margens do açude. O açude Epitácio Pessoa é responsável pelo abastecimento da cidade de Campina Grande e mais oito municípios da região.

Na Tabela 1, podemos observar algumas espécies utilizadas na recuperação da mata ciliar pelo projeto da APA8VERDE.

Tabela 1. Espécies frutíferas plantadas pela Associação oito verde para recuperação de Mata ciliar

Espécies		
Nome comum	Nome científico	Função
Mulungu	Erthrina sp.	Florestal
Barriguda	Eiba sp	Florestal
Craibeira	Tabebuia sp	Florestal
Cliricídia	Gliricídia sepium	Florestal
Umbu	Spondia tuberosa	Frutífera
Umbu	mobin	Frutífera
Castanhola	Terminalia catappa	Frutífera
Avelós	tirucalli	Florestal
Mangaba	Hancornia speciosa	Frutífera
Graviola	Annona muricata	Frutífera
Pitanga	Eugenia uniflora	Frutífera
Algodão	Ghossypium hirsutum	Cultura Agrícola
Bambu	Punica granatum	Florestal
Romã	Punica granatum	Frutífera
Cardeiro	Scleronema micranthum (Duke)	Florestal
Eucalipto	Eucalyptus sp.	Florestal
Laranja	Citrus sp	Frutífera
Pau-Brasil	Caesalpinia sp.	Florestal
Leucena	Leucaena	Florestal
Angico	Anadenanthera sp.	Florestal

Diagnóstico das ações da APA8VERDE no Açude de Boqueirão, registro das ações desenvolvidas pela APA8VERDE no açude de Boqueirão, PB. Na figura 2 podemos observar a degradação realizada pela ação antrópica.

Figura 8. Ação de antrópica degradação.

A interferência humana em áreas alteradas, buscando restabelecer os processos ecológicos e portanto, a retidão ecológica com vegetação natural, requer esforços diferenciados, dependendo da história e da degradação de cada situação do mosaico ambiental e das características de seu despejo expressando sua capacidade de auto- recuperação. (Rodrigues e Gandolfi, 2000 apud Ariki, 2005).

O trabalho da Associação oito verde visa a conscientização ambiental das pessoas, com isso, são realizadas atividades de conscientização e distribuição de mudas. Na figura 3 (A e B) é possível observar a distribuição de mudas e palestra sobre conscientização ambiental.

Figura 9. (A) Distribuição de mudas. (B) Palestra sobre conscientização ambiental

A educação ambiental se insere como ponto fundamental para a conscientização das pessoas, para que os recursos naturais sejam utilizados de forma sustentável garantindo que estes possam ser utilizados pelas gerações presentes e futuras, buscando mudanças de hábitos e atitudes, formando um equilíbrio entre a sociedade e a natureza, garantindo qualidade de vida, sem desrespeitar o meio ambiente (Asano e Poletto, 2017).

Na figura 4 (A e B) é possível observar a confecção de mudas e em seguida o plantio, a ação tem a colaboração efetiva da comunidade.

Figura 10. (A) Mudas produzidas pela Associação. (B) Momento de plantio das mudas

O reflorestamento é necessário quando há uma perda significativa de área devastada, e essa prática recupera o meio ambiente e vem sendo cada dia mais discutida, tanto nos tipos de atividades de recuperação quanto na sua necessidade, sendo uma prática muito antiga de diferentes povos, em épocas históricas diferentes e de regiões diversas e inclusive recentemente caracterizava-se essa restauração como uma atividade sem vínculo estruturado nem concepções teóricas, sendo executada normalmente como uma prática de plantio de mudas com objetivos muito privativos, como controle de erosão, estabilização de taludes, melhoria visual entre outros (Rodrigues, 1999 apud ARAKI, 2005).

Na figura 5 (A e B) observa-se o dia de campo realizado pela associação e a realização de tratos culturais nas árvores.

Figura 11 (A) Dia de campo realizado pela associação. (B) Realização de tratos culturais nas árvores.

Toda a vegetação natural presente ao longo das margens dos rios, e ao redor de nascentes e de reservatórios, deve ser preservada. De acordo com o artigo 2º desta lei, a largura da faixa de mata ciliar a ser preservada está relacionada com a largura do curso d'água.

É realizado o abraço das águas, também é uma ação ambiental realizada pela Associação, onde observamos a figura 8 (A e B), o abraço das águas e em seguida a mata ciliar em recuperação.

Figura 12. (A) Abraço das águas. (B) Recuperação da mata ciliar

Um dos principais alvos da APA8VERDE é tornar a mata ciliar um berçário para propagação de sementes nativas, frutíferas, ornamentais da região, haja vista que o principal é a recuperação da mata ciliar nas margens do rio Paraíba e Taperoá, trazendo de volta a fauna e a flora, ao meio ambiente.

Diante essa realidade, há a necessidade de continuidade e desenvolvimento de novos trabalhos de Educação Ambiental voltados para as diversas práticas de conservação da mata ciliar do açude de Boqueirão permitindo que essas pessoas envolvidas continuem sendo agentes multiplicadores para a recuperação e manutenção da Mata ciliar do açude Eptácio Pessoa.

No planejamento, implantação e manejo na arborização, a educação ambiental é uma necessidade, porque possibilita que o indivíduo e a coletividade construam valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas, para a conservação e adequação da própria arborização, ou seja, cada vez mais é reconhecida a necessidade de uma educação para promover a participação efetiva dos cidadãos nas ações que envolvem a arborização e no conhecimento das espécies adequadas.

A educação ambiental é o ponto de partida para uma gestão ambientalmente correta e de alcance social mais amplo. O convívio harmonioso entre a natureza e as cidades é uma proposta que deve ser estimulada por todos aqueles que desejam a preservação dos recursos naturais.

5. CONCLUSÕES

A associação fortalece, estimula e envolve as pessoas a participarem dessa importante atividade, que é a reconstrução da mata ciliar, aos arredores do açude de Boqueirão (Eptácio Pessoa).

O trabalho da APA8VERDE é de suma importância para a recomposição da mata ciliar, conscientização dos moradores e trabalhadores deste local onde já é observado grande diferença no comportamento das pessoas para reflorestamento da mata ciliar.

A Educação Ambiental foi efetivada na comunidade através das várias ações desenvolvidas com a participação do público envolvido e moradores do entorno do açude Eptácio Pessoa.

REFERÊNCIAS

- [1] AESA (Agência Estadual das Águas da Paraíba). Disponível em: <http://www.aesa.pb.gov.br/aesa-website/> Acesso em 10/06/2019.
- [2] Andrade, J.; Sanquetta, C. R.; Ugaya, C. Identificação de Áreas Prioritárias para Recuperação da Mata Ciliar na UHE Salto Caxias. Espaço Energia, n. 3, 2005.
- [3] Alvarenga, A. P. Avaliação inicial da recuperação da mata ciliar em nascentes. 175 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal). Universidade Federal de Lavras, UFLA, 2004.

- [4] Ação 8 Verde promove doações de mudas em oito municípios na Semana do Meio Ambiente. Paraíba Cultural. Disponível em: <http://paraibacultural.com.br/portal/apa-8-verde-semana-do-meio-ambiente/> . Acesso em: 15 nov. 2018.
- [5] Asano, J.G.P.; Poletto, R.de S. Educação ambiental: em busca de uma sociedade sustentável, e os desafios enfrentados nas escolas. Revista Caderno Pedagógico,Lajeado, v. 14, n. 1, 2017.
- [6] Chaves, M. M. F. Reflorestamentos Mistos com Essências Nativas para Recomposição de Matas Ciliares. Boletim Agropecuário. Lavras: UFLA, 1999.
- [7] Conferência SUB-Regional de Educação Ambiental para a Educação Secundária – Chosica/Peru,1976.
- [8] Durigan, G.; Silveira, E. R. Recomposição de mata ciliar em domínio de cerrado, Assis, SP. Scientia Florestalis, v. 56, p.135-144, 1999.
- [9] IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.
- [10] Martins, S. V. Recuperação de matas ciliares. Ed. Aprenda fácil. Viçosa – MG, 2001.
- [11] Mousinho, P. Glossário. In: Trigueiro, A. (Coord.) Meio ambiente no século 21. Rio de Janeiro: Sextante. 2003.

Capítulo 15

Olimpíada do Meio Ambiente - Uma ação de Educação Ambiental do CAVN em Escolas Públicas de Ensino Médio da Paraíba

Apoena Urquiza da Silva

Rodrigo Ronelli Duarte de Andrade

Josivania Ribeiro da Silva

Alex da Silva Barbosa

Vênia Camelo de Souza

Resumo: A Olimpíada do Meio Ambiente (OMA) é uma realização do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros (CAVN) e Comissão do Meio Ambiente (CMA), do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA), Campus III da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Teve por objetivos promover a Educação Ambiental para discentes e docentes do Ensino Médio de escolas públicas da Paraíba, a partir de uma competição científica na forma de uma olimpíada de conhecimento, estimulando a prática do consumo consciente, e contribuindo para a integração dessas escolas com o CAVN. Como referenciais teóricos utilizamos a Lei 9.795/99, sobre a Educação Ambiental, e a Resolução Nº 02/2012 - CNE, que Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Em 2019, aconteceu a 3ª edição da OMA, em duas etapas: a 1ª etapa com provas objetivas aplicadas em cada escola, com a finalidade de selecionar os 5 melhores estudantes para participarem da 2ª etapa, que ocorreu no dia 05 de junho, Dia do Meio Ambiente, no CAVN, no turno da tarde, com aplicação de uma prova, com 20 questões objetivas, onde foram classificados os estudantes com melhores pontuações individuais e as melhores escolas, na média final. Alcançamos 1.549 inscrições na 1ª etapa, de 35 escolas visitadas, e 1.337 estudantes participaram da prova da 1ª etapa, sendo 139 classificados para a 2ª etapa. Na 2ª etapa recebemos no CAVN, 106 estudantes e 37 acompanhantes, de 25 escolas. A Olimpíada do Meio Ambiente na sua terceira edição alcançou abrangência regional, sendo uma ação ambiental que precisa ser ampliada para outras escolas públicas de Ensino Médio.

Palavras-chave: Educação Ambiental, Competição Científica, Escola Pública.

1. INTRODUÇÃO

A Educação Ambiental aborda temáticas sensíveis que envolvem a relação entre sociedade e natureza e com isso, promove posicionamentos mais éticos frente às demandas socioambientais. Nesse viés, as práticas extensionistas como propõe a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) buscam atuar como coadjuvantes no processo educativo, oportunizando a transformação de uma sociedade mais justa e sustentável.

Pensando nisso, em 2017 foi criada a Olimpíada do Meio Ambiente (OMA) no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros (CAVN) por meio da Comissão do Meio Ambiente do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA), Campus III da UFPB, com o intuito de estimular o debate sobre temas relacionados à Educação Ambiental, no âmbito dos estudantes do ensino médio do CAVN/CCHSA/UFPB.

A 1ª edição do evento contou com a participação de 120 estudantes. Os 20 melhores colocados participaram de uma visita técnica ao Jardim Botânico Benjamim Maranhão e ao Parque Zoobotânico Arruda Câmara, ambos na cidade de João Pessoa, PB.

Em sua 2ª edição, em 2018, a comissão da II OMA decidiu ampliar o público alvo, tendo em vista a responsabilidade social do CAVN e da UFPB frente à comunidade do seu entorno. Nesse sentido, as ações foram estendidas às seguintes escolas estaduais: Escola Cidadã Integral Técnica José Rocha Sobrinho, da cidade de Bananeiras, PB e Escola Cidadã Integral Dr. Alfredo Pessoa de Lima, da cidade de Solânea, PB.

As questões das provas da II OMA abrangeram os temas: Ecologia, Educação Ambiental, Resíduos Sólidos, Desequilíbrios Ambientais e Biosfera e foram aplicadas em duas etapas. A 1ª Etapa, que contou com mais de 250 inscritos, ocorreu no dia 24 de maio de 2018. Na ocasião foi aplicada uma prova escrita, constando 15 (quinze) questões objetivas de múltipla escolha, aplicada na escola de origem dos estudantes. A comissão da olimpíada corrigiu e informou a cada escola o nome dos 10 primeiros colocados, aptos a participarem da 2ª etapa.

A 2ª Etapa, ocorrida no dia 05 de junho de 2018, constou de prova escrita, com 20 (vinte) questões inéditas e de múltipla escolha, sendo aplicada no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, em horário pré-definido e com duração de uma hora. A avaliação teve como objetivo testar o conhecimento geral dos estudantes em relação à temáticas ambientais. Ao final da realização das provas, os estudantes participaram de momentos para conhecimento das atividades da Semana do Meio Ambiente do CCHSA/CAVN, enquanto aguardavam a Cerimônia de Premiação, que ocorreu ao fim do mesmo dia no Auditório do CAVN, como culminância das ações desenvolvidas.

Em 2019, a III Olimpíada do Meio Ambiente seguiu as mesmas etapas da edição anterior, no entanto expandiu suas ações e limites de atuação. Inserimos a OMA como uma ação de extensão da UFPB e visitamos 35 escolas públicas de 22 cidades da Paraíba, localizadas no entorno do CAVN/CCHSA/UFPB.

Alcançamos 1.549 inscritos na 1ª etapa, oriundos de 32 escolas. Destes, 139 estudantes foram classificados para a 2ª etapa. No dia 05 de junho, recebemos no CAVN, 106 estudantes e 37 acompanhantes (professores, pedagogos e diretores), de 25 escolas.

Ao longo de suas edições, a Olimpíada do Meio Ambiente contou com o suporte e parcerias importantes das escolas. Levando em consideração o alcance e visibilidade dessa ação de extensão a cada edição, é importante avaliar os seus efeitos e aplicabilidades.

2. METODOLOGIA

A III Olimpíada do Meio Ambiente teve início com a publicação da portaria da comissão organizadora, no dia 05 de fevereiro de 2019. Em pouco mais de um mês de atividades, a comissão elaborou o projeto e o regulamento, e este último foi publicado em 19 de março.

As inscrições na olimpíada aconteceram do dia 01 de abril ao dia 10 de maio. Entre os dias 04 a 24 de abril, a comissão se dividiu e visitou 35 escolas, levando o convite oficial para participação na III OMA, cartazes e folders, além de um formulário para preenchimento com os dados da escola e das pessoas responsáveis para contato.

Figura 1 - Material de divulgação (esquerda) e equipe da OMA em visita nas escolas (direita).

Fonte: Arquivo pessoal (2019).

A partir dessas informações, criou-se uma lista no aplicativo Whatsapp para, a cada semana, ser enviada uma mensagem informando aos professores e dirigentes das escolas os prazos das inscrições, bem como para atendimento às dúvidas que surgiam ao longo do processo.

Pensando no alcance que as redes sociais possuem, também foi criado um perfil no Instagram, onde se trabalhou a divulgação da olimpíada e o compartilhamento de informações importantes referentes aos prazos e fases. Esse perfil também contribuiu para a interação dos envolvidos a partir da utilização de ferramentas do aplicativo para promoção do conhecimento através dos quizzes, um jogo de perguntas e respostas, que nesse caso envolveu as temáticas que são abordadas na OMA.

A própria equipe selecionou as questões para a elaboração das provas da 1ª etapa. Após a impressão as provas foram entregues em cada escola. Novamente, se contou com a equipe que se dividiu para deixar as provas nas escolas anteriormente visitadas.

A olimpíada aconteceu em duas etapas: a 1ª etapa, ocorrida no dia 22 de maio, onde foi aplicada uma prova escrita, com 15 (quinze) questões objetivas de múltipla escolha, com duração de uma hora, na escola de origem do inscrito, em turno e horário definido pela própria escola.

Após a aplicação, os professores da própria escola corrigiram e encaminharam para a comissão da III OMA o nome dos 5 primeiros colocados, que participaram da 2ª etapa. No caso de empates, foram utilizados critérios de desempates constantes no regulamento.

A 2ª etapa foi aplicada no dia 05 de junho, com 20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha, no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, no horário das 13:30h às 14:30h.

Chegando ao CAVN/CCHSA, os representantes das escolas se dirigiram à entrada do auditório, onde foi realizado o credenciamento e entregues os kits da olimpíada. Em seguida, eram conduzidos às salas do Bloco Alcides Marcelino, onde foram aplicadas as provas.

Pontualmente às 13:30h iniciaram-se a aplicação das provas. Enquanto os estudantes realizavam a prova, os acompanhantes das escolas se reuniram em uma sala ao lado, para analisar a prova que estava sendo aplicada, verificando a coerência das questões com o assunto informado e com as respostas apresentadas no gabarito.

Ao término da aplicação, as provas foram distribuídas para os respectivos acompanhantes de cada escola, para que cada um realizasse a correção, de acordo com o gabarito.

Figura 2 – Aplicação da prova da 2ª etapa no CAVN (esquerda) e acompanhantes das escolas (direita).

Fonte: Arquivo pessoal (2019).

Durante a aplicação das provas, foi oferecido um lanche aos professores, pedagogos e diretores com alguns produtos alimentícios produzidos no Campus III. Após o término das provas, cada estudante ao lanche recebeu sua medalha de participação.

Após a correção, os participantes foram conduzidos para o Auditório do CAVN para assistirem à palestra intitulada: Impactos Ambientais e Resíduos Sólidos, ministrada pelas professoras Dra. Maria do Socorro Lopes Cavalcanti e Dra. Márcia Maria Fernandes.

Após a palestra, ocorreu a Cerimônia de Premiação, com a entrega das medalhas de classificação e dos troféus para as escolas mais bem classificadas. Também foram entregues mudas de árvores de ipês amarelo e roxo, produzidas no viveiro de produção de mudas da instituição.

Figura 3 – Cerimônia de Premiação: medalhas e troféus (esquerda) e distribuição de mudas para cada escola participante da 2ª etapa (direita).

Fonte: Arquivo pessoal (2019).

3. DESENVOLVIMENTO

A Lei 9.795/99 (BRASIL, 1999) dispõe sobre a Educação Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental.

Em seu Art. 1º, encontramos a seguinte definição sobre Educação Ambiental:

Entendem-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

Na Seção II, intitulada Da Educação Ambiental no Ensino Formal, o Art. 10 diz que: *A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal.*

Na Seção III - Da Educação Ambiental não Formal, no seu Art. 13, inciso II, encontramos a justificativa legal para a proposta da Olimpíada do Meio Ambiente, na definição de uma ação de educação não-formal: "A

ampla participação da escola, da universidade e de organizações não-governamentais na formulação e execução de programas e atividades vinculadas à educação ambiental não-formal”.

Reigota (2014) nos diz que a Educação Ambiental como educação política está comprometida com a ampliação da cidadania, da liberdade, da autonomia e da intervenção direta dos cidadãos na busca de soluções e alternativas que permitam a convivência digna e voltada para o bem comum.

Atualmente é muito comum ouvirmos falar de Educação Ambiental e de como a escola pode e deve trabalhar o assunto, e isso parece estar presente não só no meio acadêmico e seus meios de comunicação, mas também nas políticas públicas que orientam a Educação Ambiental escolar (FREIRE *et. al.*, 2016).

A Resolução Nº 2/2012 do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2012, p.), estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, e ressalta em seu Art. 2º que:

A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental.

Nos artigos seguintes, a mesma resolução, menciona que: a Educação Ambiental visa à construção de conhecimentos, ao desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a comunidade de vida, a justiça e a equidade socioambiental, e a proteção do meio ambiente natural e construído (Art. 3º), que é construída com responsabilidade cidadã, na reciprocidade das relações dos seres humanos entre si e com a natureza (Art. 4º), que não é atividade neutra, pois envolve valores, interesses, visões de mundo e, desse modo, deve assumir na prática educativa, de forma articulada e interdependente, as suas dimensões política e pedagógica (Art. 5º) e que deve adotar uma abordagem que considere a interface entre a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, superando a visão despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente na prática pedagógica das instituições de ensino (Art. 6º).

Dessa forma, verifica-se que a Educação Ambiental deve englobar diversos aspectos para além da “visão naturalista”, como o social, ético, político, pedagógico, cultural, produtivo, artístico, onde inclua o ser humano como parte integrante e essencial do ambiente.

A Educação Ambiental para sustentabilidade é responsável por despertar a consciência ecológica e deve indicar que o crescimento industrial, técnico e urbano descontrolado tende não só a destruir toda a vida nos ecossistemas locais, mas também degradar a biosfera e, por fim, ameaçar a vida em si mesma, incluindo a humana, a qual faz parte da biosfera, ensinando também que a ameaça mortífera é de natureza planetária, e sendo assim a consciência ecológica é uma componente da nova consciência planetária (SOUZA, 2011, p. 135).

O CAVN/CCHSA tem uma história e um caráter essencialmente agrários, seja no ensino, na pesquisa e na extensão, e encontra-se, desde longa data, inserido nesse contexto, desenvolvendo projetos e pesquisas de cunho ambiental e ecológico, buscando ações cada vez mais sustentáveis para suas atividades, como pode ser verificado, por exemplo, na publicação: *Meio Ambiente: os desafios do mundo contemporâneo* (ONE; ALBUQUERQUE, 2018).

Segundo Bernardo e Prieto (2010), existe um consenso sobre a necessidade da problematização das questões ambientais em todos os níveis de ensino, porém, ainda há resistências e/ou incompreensões sobre a interdisciplinaridade e a transversalidade, que resultam em uma aparente baixa eficácia das ações de Educação Ambiental nos ambientes escolares.

A Olimpíada do Meio Ambiente é uma ação de educação não-formal, que busca apresentar ao público-alvo uma visão mais ampla da Educação Ambiental, conforme apresentado nos referenciais teóricos acima.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Das 35 escolas visitadas em abril de 2019, recebemos 1.549 inscrições de 32 escolas (3 não participaram). Do total de inscritos, 1.337 participaram da prova da 1ª etapa e destes, 139 foram classificados para a 2ª etapa.

Na 2ª etapa, ocorrida no dia 05 de junho no CAVN, contamos com a presença de 106 estudantes e 37 acompanhantes, de 25 escolas.

Foram distribuídas 92 medalhas com os estudantes, sendo 34 de ouro, 32 de prata e 26 de bronze. A Tabela 1 apresenta a média final por escolas.

Tabela 1. Resultado individual dos estudantes na 2ª etapa da III OMA.

Classificação	Escola	Cidade	Pontos
1º Lugar	E.E.E.F.M. Pedro Ribeiro de Lima	Riachão	13,5
	Colégio Agrícola Vidal de Negreiros	Bananeiras	13,3
2º Lugar	ECI Jose Bronzeado Sobrinho	Remígio	13,0
	ECI José Soares de Carvalho	Guarabira	13,0
3º Lugar	IFPB - Campus Guarabira	Guarabira	12,6
	E.E.E.F.M. Arlindo Ramalho	Solânea	12,5
4º Lugar	E.E.E.F.M. Prof. M. Gertrudes C Neves	Caiçara	12,2
5º Lugar	E.E.E.F.M. Antônio Bento	Serraria	12,0
6º Lugar	ECI Marcia Guedes Alcoforado de Carvalho	Belém	11,8
7º Lugar	E.E.F.M. João de Freitas Mauzinho	Sertãozinho	11,5
8º Lugar	E.E.E.F.M. Dr. Tercílio Teixeira da Cruz	Tacima	11,3
9º Lugar	ECI senador humberto lucena	Cacimba de Dentro	11,2
10º Lugar	ECI Sagrado Coração de Jesus	Duas Estradas	11,0
	ECIT Dr. Alfredo Pessoa de Lima	Solânea	11,0
11º Lugar	ECI Augusto de Almeida	Pirpirituba	10,8
12º Lugar	ECIT José Rocha Sobrinho	Bananeiras	10,3
13º Lugar	E.E.E.F.M. Sílvio Porto	Pilõesinhos	10,0
	ECIT Min. José Américo Almeida	Areia	10,0
14º Lugar	ECI Benjamim Maranhão	Araruna	9,5
15º Lugar	E.E.E.F.M. Maria Jose Miranda Burity	Serra da Raiz	9,3
	ECI Efigênio Leite	Borborema	9,3
16º Lugar	E.N.E. Prof. Pedro Augusto	Bananeiras	8,7

Fonte: Olimpíada do Meio Ambiente (2019).

Durante a 2ª etapa, foi aplicado um formulário de avaliação da III OMA para os estudantes e para os acompanhantes. Para os estudantes, ao entregarem a prova, foi solicitado o preenchimento da avaliação. Para os acompanhantes, ao final da correção das provas, foi solicitado o preenchimento da avaliação.

O formulário buscou avaliar, basicamente, três aspectos do projeto: as provas da 1ª e 2ª etapas, a comunicação da OMA, e a organização da olimpíada.

As respostas a cada item constante dos aspectos encontravam-se em uma escala de 0 à 10, sendo considerado de 0 à 3 = INSATISFATÓRIO, de 4 à 6 = REGULAR, e de 7 à 10 = SATISFATÓRIO.

Os resultados dos formulários foram organizados e estão apresentados na Quadro 1.

Quadro 1. Quantidade total, porcentagens individuais e por bloco das respostas ao formulário de avaliação da III OMA.

1 - Provas	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quanto à coerência das questões da 1ª etapa:	-	1	-	-	-	2	2	6	15	32	60
%		0,8				1,7	1,7	5,1	12,7	27,1	50,8
	0,8			3,4			95,8				
Quanto à coerência das questões da 2ª etapa:	-	-	-	1	-	2	2	19	17	37	40
%				0,8		1,7	1,7	16,1	14,4	31,4	33,9
	0,8			3,4			95,8				
Quanto ao recebimento das provas da 1ª etapa:	4	1	1	2	-	5	-	7	4	22	72
%	3,4	0,8	0,8	1,7		4,2		5,9	3,4	18,6	61,0
	6,8			4,2			89,0				
2 - Comunicação	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quanto à divulgação da III OMA:	1	-	1	2	2	5	10	19	21	18	39
%	0,8	-	0,8	1,7	1,7	4,2	8,5	16,1	17,8	15,3	33,1
	3,4			14,4			82,2				
Quanto ao envio de informes durante a III OMA:		-	1	2	1	5	4	19	20	25	41
%	0,0		0,8	1,7	0,8	4,2	3,4	16,1	16,9	21,2	34,7
	2,5			8,5			89,0				
Quanto à publicação do gabarito da III OMA:	3	-	3	-	1	1	6	9	18	30	47
%	2,5		2,5		0,8	0,8	5,1	7,6	15,3	25,4	39,8
	5,1			6,8			88,1				
Quanto à publicação dos resultados da III OMA:	2	-	-	1	2	-	-	9	14	32	58
%	1,7			0,8	1,7			7,6	11,9	27,1	49,2
	2,5			1,7			95,8				
3 - Organização	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quanto ao regulamento da III OMA:	1	-	1	-	-	-	4	4	13	20	75
%	0,8		0,8				3,4	3,4	11,0	16,9	63,6
	1,7			3,4			94,9				
Quanto à recepção e credenciamento na 2ª etapa:	-	-	-	1	1	-	1	4	5	15	91
%				0,8	0,8		0,8	3,4	4,2	12,7	77,1
	0,8			1,7			97,5				
Quanto à organização do espaço físico para a 2ª etapa:	-	-	-	-	-	-	3	-	4	11	100
%							2,5		3,4	9,3	84,7
	0,0			2,5			97,5				
Quanto à dinâmica de aplicação da prova da 2ª etapa:	1	-	-	1	-	-	-	3	3	17	93
%	0,8			0,8				2,5	2,5	14,4	78,8
	1,7			0,0			98,3				

Fonte: Olimpíada do Meio Ambiente (2019).

Verificamos que, em todos os aspectos, a porcentagem de respostas satisfatórias supera os 82%.

Tabela 2. Classificação das questões da 2ª etapa da III OMA, com a respectiva porcentagem de acertos.

Questão	Temas	Acertos
1	Desequilíbrios Ambientais	89,6 %
2	Desequilíbrios Ambientais	44,3 %
3	Educação Ambiental	79,2 %
4	Desequilíbrios Ambientais	72,6 %
5	Ecologia	60,4 %
6	Semiárido	34,9 %
7	Semiárido	26,4 %
8	Semiárido	53,8 %
9	Educação Ambiental	26,4 %
10	Educação Ambiental	56,6 %
11	Biosfera	50,0 %
12	Resíduos sólidos	77,4 %
13	Resíduos sólidos	52,8 %
14	Resíduos sólidos	39,6 %
15	Ecologia	58,5 %
16	Desequilíbrios Ambientais	25,5 %
17	Ecologia	41,5 %
18	Ecologia	45,3 %
19	Biosfera	21,7 %
20	Educação Ambiental	91,5 %

Fonte: Olimpíada do Meio Ambiente (2019).

Também foi realizada uma análise das 20 questões da prova da 2ª etapa. De acordo com os temas sugeridos no regulamento, as questões foram classificadas da seguinte forma, com a respectiva porcentagem de acertos.

Organizando por tema, verificamos as seguintes proporções de acertos: Biosfera obteve 35,8 % dos acertos; Desequilíbrios Ambientais obteve 58% dos acertos; Ecologia obteve 51,4%; Educação Ambiental obteve 63,4 % dos acertos; Resíduos sólidos obteve 56,6 % dos acertos; Semiárido obteve 38,3 % dos acertos.

Percebemos, então, que, dos seis temas propostos para a prova, o tema Educação Ambiental teve a maior porcentagem de acertos enquanto o tema Semiárido teve a menor, nessa etapa. A questão 20, sobre Educação Ambiental foi a que teve mais acertos, enquanto a questão 19, sobre Biosfera, teve a menor quantidade de respostas certas.

Foi verificado, durante as visitas e aplicação da 2ª etapa a necessidade de um detalhamento e ampliação dos conteúdos a serem trabalhados na próxima olimpíada, tanto por parte dos professores das escolas participantes que acharam os temas fornecidos no regulamento muito genéricos, como intermanamente, a própria comissão discutiu e reviu a possibilidade de ampliação e detalhamento, inclusive para a inclusão de outros aspectos, como o social, ético, político, pedagógico, cultural, produtivo e artístico nas próximas edições.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Olimpíada do Meio Ambiente é uma ação de extensão integradora do CAVN em Escolas Públicas de Ensino Médio do estado da Paraíba. A proposta tem crescido a cada edição e cada vez mais tem tido uma grande aceitação nas escolas onde é aplicada.

Procurou-se premiar o maior número de estudantes e escolas na segunda etapa, fato que contribui para o engajamento e interesse por temas relacionados ao Meio Ambiente e a Educação Ambiental.

A análise das questões podem indicar os temas ou assuntos que necessitam ser melhor trabalhados no Ensino Médio nas escolas participantes da III OMA e que poderão nortear futuras palestras e apresentações nas escolas.

Para a IV OMA, pretende-se ampliar ainda mais os limites de aplicação, trabalhando com escolas públicas de todo o estado da Paraíba, aumentando as parcerias e propiciando assim, mais oportunidades para os estudantes do ensino médio do nosso estado.

REFERÊNCIAS

- [1] Bernardo, M. B. J.; Prieto, E. C. Educação Ambiental: disciplina versus tema transversal. Rev. Eletrônica Mestr. Educ. Ambiental, v. 24, 2010.
- [2] Brasil, Lei Nº 9.795/1999, Política Nacional de Educação Ambiental. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, de 27 abr. 1999.
- [3] Brasil, Resolução CNE Nº 02/2012, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental.
- [4] Freire, L. M.; Santos, A. P. N. S.; Miceli, B. S. A educação ambiental nos conteúdos de ecologia de livros didáticos de Biologia do Ensino Médio. Revista Práxis, v. 8, n. 16, dez., 2016.
- [5] ONE, G. M. C.; Albuquerque, H. N. Meio Ambiente: os desafios do mundo contemporâneo (Org.) IMEA, João Pessoa, PB, 2018.
- [6] Reigota, M. O que é Educação Ambiental. Coleção Primeiros Passos, Vol. 292. Ed. Brasiliense, 1ª ed., 2014.
- [7] Souza, S.C. Pedagogia da Fraternidade Ecológica: Educação para a Sustentabilidade Ambiental. In: SEABRA, G. Educação ambiental no mundo globalizado. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2011, p.125.

Capítulo 16

Municipalização do licenciamento ambiental em Campina Grande/PB

Renan Rey Costa Rodrigues

Lucas Senna Rodrigues Agra

Rui de Oliveira

Resumo: O licenciamento ambiental é um dos mais importantes instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente para defesa do meio ambiente à disposição da sociedade civil e do Poder Público. Através dele, busca-se o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o meio onde o homem vive mediante um controle prévio e continuado acompanhamento das atividades capazes de gerar impactos sobre o meio ambiente, sendo um processo administrativo complexo que tramita perante a instância administrativa responsável pela gestão ambiental, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. Nesse sentido, esta pesquisa objetiva caracterizar a municipalização do licenciamento ambiental em Campina Grande/PB. Tratando-se de um estudo exploratório, com abordagem quantitativa, realizado com base em dados das licenças emitidas pelo órgão estadual licenciador – SUDEMA e o órgão municipal licenciador – SESUMA, no período de 2004 a 2018. Os resultados corroboraram a existência de uma tendência de decaimento numérico nas licenças emitidas pela SUDEMA, enquanto há uma tendência de crescimento nas licenças emitidas pela SESUMA. De maneira geral, o resultado dessa descentralização do licenciamento ambiental entrega ao município mais uma responsabilidade que se junta às atribuições de políticas básicas que já se encontram com dificuldades de implementação. Nesse cenário, com a municipalização, faz-se necessário o fortalecimento do órgão local de meio ambiente e, em paralelo, pensar e agir com soluções econômicas, políticas, sociais, fiscais e institucionais para se evitar problemas já existentes no licenciamento estadual e federal no nível municipal.

Palavras-chave: Municipalização do licenciamento ambiental, descentralização do licenciamento ambiental, caracterização do licenciamento ambiental.

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento econômico em decorrência da Revolução Industrial desencadeou sérios problemas ambientais para as sociedades subsequentes que cresceu sem controle através da exploração desordenada de recursos naturais. O descarte inadequado dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos no meio ambiente, simultaneamente ao crescimento descontrolado da população e dos grandes centros urbanos, sem uma gestão ambiental adequada, conduziram e contribuíram para os problemas ambientais atuais (Henry, 1998).

Somente nas últimas décadas, a questão relativa ao meio ambiente tem sido relevantemente abordada, devido à difusão de conhecimentos por meios acadêmicos, pelos movimentos ambientalistas e pela mídia. Nessa perspectiva, o acesso às informações sobre as consequências da gestão de recursos naturais que comprometam sua sustentabilidade estão cada vez mais acessíveis à população, podendo ser notadas por todos, principalmente por meio das experiências diárias. É nesse sentido que o município é o espaço das vivências cotidianas, podendo ser considerado, dessa forma, como a escala em que essa percepção socioambiental é mais notada (Brasil, 2009; Farias, 2011).

Nessa perspectiva, destacam-se a importância da municipalização da gestão ambiental e a responsabilidade social das empresas, que devem buscar incorporar os aspectos ambientais, econômicos e sociais, que caracterizam o desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, está inserido dois importantes marcos normativos: a Constituição Federal, que incumbe ao Poder Público e a coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado e, ademais, atribui competência ambiental comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios; e a Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA, tendo como um de seus instrumentos o Licenciamento Ambiental. A referida Lei institui também o Sistema Nacional de Meio Ambiente – Sisnama, que visa estabelecer um conjunto articulado e integrado, formado pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, com atribuições, regras e práticas específicas que se complementam (Brasil, 2009; Rodrigues, 2010).

O sistema de licenciamento ambiental tem por finalidade assegurar que o meio ambiente seja devidamente considerado quando a instalação e operação de empreendimentos e obras. Com esse entendimento, devem ser consideradas questões das mais variadas ordens, como a ecológica, a econômica, a cultural, a jurídica e a social. A concessão da licença ambiental deve estar atrelada ao fato de que precisam ser atendidas as exigências da legislação ambiental e a concretização da responsabilidade empresarial (Farias, 2011).

O licenciamento ambiental é estruturado em vários processos pela Resolução Conama nº 237/1997, art. 8º. Para cada processo, é necessária a licença adequada, tais como: licença prévia (LP) no planejamento de um empreendimento ou de uma atividade, licença de instalação (LI) na construção da obra e licença de operação (LO) na operação ou funcionamento. Estes são atos diretamente relacionados que têm como objetivo verificar se um empreendimento está efetivamente adequado aos padrões de qualidade ambiental prescritos pela legislação ou pelo órgão ambiental competente (Brasil, 1997; Farias, 2011).

Entretanto, ainda que dividido em etapas, não se pode esquecer que o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo único, em que a etapa anterior sempre condiciona a etapa seguinte, de maneira que, não sendo concedida a licença prévia, por exemplo, não se podem conceder as licenças de instalação e de operação (Oliveira, 2005; Farias, 2011).

Os processos de licenciamento e autorizações para intervenção ambiental de empreendimentos podem também ser definidos por instrumentos legais estaduais e municipais dos órgãos licenciadores. Os tipos de licenças no Estado da Paraíba podem ocorrer por meio das seguintes licenças: Autorização Ambiental (AA), Autorização para Uso Alternativo do Solo, Autorização para o Uso do Fogo Controlado, Autorização para Exploração Florestal, Autorização para Homologação de Pátio, Licença Simplificada (LS), Licença de Instalação e Operação (LIO), Licença de Operação para Pesquisa Mineral (LOP), Licença de Alteração (LA), Declaração de Dispensa de Licença, Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos e Renovação/Revalidação de Licença (Milaré, 2013; Brasil, 2016; Sudema, 2019).

Os empreendimentos são licenciados pelo órgão ambiental competente de acordo com a Resolução CONAMA nº 237/1997, que regulamentou a atuação do SISNAMA na execução do licenciamento ambiental e, em obediência ao critério constitucional da responsabilidade compartilhada entre os entes federados, ou seja, a proteção ambiental é objeto comum entre a União, o Estado e o Município. A competência para o licenciamento está estabelecida nesses três níveis (BRASIL, 1981; BRASIL, 1997; BRASIL, 2009), conforme especificado nos Art. 4º, 5º e 6º da Lei 6938/1981:

Art. 4º - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental, a que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional;

Art. 5º - Compete ao órgão ambiental estadual ou de Distrito Federal o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades;

Art. 6º - Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio (Brasil, 1997).

A Lei Complementar nº 140 de 2011 representou um importante marco regulatório na agenda ambiental do país por ter aprimorado a definição de competências entre os entes federativos nas ações de proteção ao meio ambiente estimulando a municipalização. Antes da lei, era mais frequente a ocorrência de conflitos quando entes federativos, sobretudo municipais, julgavam-se competentes para realizar o licenciamento ambiental (Brasil, 2011; Farias, 2011).

Na gestão ambiental compartilhada, acontece a cooperação e integração estabelecidas entre os entes da federação, de forma a assegurar a qualidade ambiental necessária à manutenção e melhoria da qualidade de vida e ao desenvolvimento sustentável, através de uma repartição adequada de responsabilidades e recursos. Ainda, a municipalização da gestão ambiental poderá estar associada à inúmeras possibilidades de interação entre os Estados e a União, compartilhando responsabilidades em condições de autonomia, cooperação e complementaridade (Brasil, 2009).

O município, ao assumir seu papel constitucional, traz uma série de benefícios, como: proximidade dos problemas a enfrentar e melhor acessibilidade dos usuários aos serviços públicos; maiores possibilidades de adaptação de políticas e programas às peculiaridades locais; melhor utilização dos recursos e mais eficiência na implementação de políticas; maior visibilidade e consequentemente mais transparência na tomada de decisões; e democratização dos processos decisórios e de implementação, favorecendo a participação da população envolvida e as condições para negociação de conflitos. Por outro lado, a maioria dos municípios sofre com a falta de estrutura física, capacidade técnica, recursos financeiros, falta de interesse dos gestores locais e a possibilidade de aliciação em vista do poder local, que inviabilizam a efetivação da Política Ambiental no âmbito dos municípios (Brasil, 2009; Costa, 2014).

É importante ressaltar que mesmo com essas políticas descentralizadoras, a maioria dos processos de licenciamento ainda se concentra no âmbito estadual da federação brasileira. Em 2015, aproximadamente 30% dos municípios brasileiros declararam emitir licença ambiental. Mas essa realidade vem mudando, trazendo benefícios como a redução da carga de processos que têm se acumulado em diversos órgãos estaduais de meio ambiente, transferindo aos municípios o licenciamento de atividades de menor porte e potencial poluidor. Segundo estimativas da Confederação Nacional de Municípios (CNM), cerca de 70% dos pedidos que tramitavam na década passada nos órgãos estaduais poderiam ser licenciados pelos municípios, dos quais boa parte refere-se a empresas de pequeno porte e microempresas. A descentralização tornaria o sistema mais ágil e deixaria os órgãos estaduais concentrados em empreendimentos mais complexos (CNM, 2009; Barbosa et al., 2010; IBGE, 2016).

Desse modo, para que a descentralização seja eficaz, é preciso haver planejamento ambiental e territorial, além da conscientização da sociedade, pois esta será considerada peça fundamental para a fiscalização e cobrança do efetivo processo de licenciamento ambiental, havendo assim uma maior interação do homem com o meio ambiente. Apenas através da descentralização do licenciamento ambiental, os poderes serão compartilhados entre os entes federativos e também entre a comunidade, que se sentirá parte do processo de manutenção e equilíbrio da qualidade do seu território, resultando dessa forma, uma melhoria para todo o meio ambiente que nos rodeia (Costa, 2014).

Nascimento (2017), a partir de análises feitas em 84 municípios de 20 estados do país, foi constatou que a municipalização do licenciamento tem atribuído mais uma camada de responsabilidades aos municípios, que já se encontram fragilizados no contexto federativo brasileiro. A municipalização corre o risco de reproduzir no nível municipal os problemas já existentes no licenciamento estadual e federal. Os resultados mostraram uma acentuada percepção de que os municípios brasileiros têm baixa capacidade institucional, sobretudo na falta de recursos humanos e financeiros nos órgãos ambientais municipais, os quais podem acabar desempenhando suas funções de forma precária (Neves, 2016).

A CNM (2016), destaca que, desde a Constituição de 1988, praticamente nenhuma fonte de recurso significativa e exclusiva para a gestão ambiental foi destinada aos municípios, forçando-os a se adequar ao máximo aos critérios estabelecidos por cada Estado. Tais critérios frequentemente são difíceis de serem alcançados e, sem apoio técnico e financeiro, os municípios acabam custeando, com dificuldade, uma gestão ambiental simplória.

No município de Campina Grande, a municipalização do licenciamento aconteceu somente em 2009, através do Convênio de cooperação entre o Governo do Estado da Paraíba, através da SUDEMA e o Município de Campina Grande, através da Coordenadoria de Meio Ambiente da Secretaria de Planejamento. No convênio, foi definida a competência entre os órgãos Estadual e Municipal, no qual, o processo de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados na cidade e consideradas de médio porte e pequeno potenciais poluidores ficaram sobre a responsabilidade do município, excluindo-se do licenciamento municipal as atividades de exploração de recursos minerais e os postos de revenda e comercialização de combustíveis.

2. METODOLOGIA

O estudo foi realizado com base em dados das licenças emitidas em Campina Grande/PB pelo órgão estadual licenciador (SUDEMA), disponíveis no seu endereço eletrônico (www.sudema.org.br) no período de 2009 a 2018, e pelo órgão municipal licenciador (SESUMA), disponíveis no seu endereço eletrônico (www.sesuma.org.br) e no seu setor de licenciamento. O município de Campina Grande é o segundo mais populoso da Paraíba, com população estimada de 407.472 habitantes e área de 593,026 km² (IBGE, 2018). É considerado um dos principais polos industrial da Região Nordeste, bem como se destaca como centro educacional e tecnológico. Possui o segundo maior PIB entre os municípios paraibanos, representando 15,63% do total das riquezas produzidas na Paraíba e sua região metropolitana é formada por dezenove municípios.

Figura 1: Localização do Município de Campina Grande

Fonte: Autor (2019)

Destaca-se que os relatórios das licenças expedidas pela SUDEMA abrangem todo o estado da Paraíba, portanto, a pesquisa foi restringida apenas para o município de estudo - Campina Grande. A quantidade total de licenças expedidas pelo órgão estadual foi relacionada com a quantidade de licenças expedidas no município com vistas ao estabelecimento da participação municipal no processo de licenciamento.

Para a finalidade do estudo, foi obtido o total de licenças expedidas conforme os dados dos relatórios gerados, em um período que se iniciou em 01/01/2004 até 31/12/2018, pela SUDEMA e em 2009, quando o Termo de Convênio entre Estado e Município atribuiu atividades de licenciamento à SESUMA, até 31/12/2018. Os dados foram coletados em intervalos de um ano (01/01/2008 a 31/12/2008, por exemplo) e tabelados. Através deles, foram gerados gráficos que possibilitaram uma melhor análise das licenças expedidas em Campina Grande.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 2 apresenta o panorama geral do número de licenças expedidas pelos dois órgãos ambientais no decorrer do período estudado.

Figura 2: Licenças emitidas pela Sudema e Sesuma

Fonte Dados da pesquisa

Verifica-se uma tendência de decaimento numérico nas licenças emitidas pela SUDEMA, enquanto há uma tendência de crescimento nas licenças emitidas pela SESUMA. O maior registro pela SUDEMA foi de 510 licenças emitidas em 2008 e o menor registro, após esse ano, foi de 186 licenças emitidas em 2018. Enquanto que, o menor número de licenças emitidas pela SESUMA foi de nove em 2009 e o seu maior registro foi de 156 licenças emitidas em 2018. Após o convênio, já referido, a SUDEMA teve uma redução de 63,53%, que começou com o início do trabalho da SESUMA, apresentando esta um crescimento superior a 17 vezes com relação à sua quantidade inicial, diminuindo a diferença entre os dois órgãos ambientais de 388 licenças, emitidas em 2009, para 30, em 2018.

O quantitativo percentual de licenças emitidas pela SUDEMA no município de Campina Grande em relação ao total do estado da Paraíba, de 2004 a 2018, está quantificado na Figura 3:

Figura 3: Quantitativo percentual do total de licenças emitidas em Campina Grande pela SUDEMA

Fonte: Dados da Pesquisa

Um fato a ser observado corresponde ao início do licenciamento pela SESUMA em 2009, a partir do Termo de Convênio (celebrado entre o Estado e o Município), ter surgido logo após o ano de maior quantidade de licenças emitidas no município pela SUDEMA, representando 19,71% das licenças emitidas em todo o estado; desse modo, a necessidade de uma descentralização e desconcentração contribuiu para o surgimento do órgão municipal. Com isso, o percentual de licenças emitidas no município pelo órgão estadual passou a representar 7,30% no ano de 2018.

Isso reflete o efeito da desconcentração do processo de licenciamento na esfera estadual, pela delegação de atribuição à autoridade pública municipal, contribuindo para tornar o sistema mais ágil, deixando o órgão estadual concentrado em empreendimentos mais complexos, promovendo a gestão ambiental compartilhada entre os órgãos do SISNAMA.

É importante destacar que a municipalização da gestão ambiental está de acordo com a Constituição Federal, que atribui competência ambiental comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios bem como a Lei Complementar Federal nº 140/2011, que atribui aos municípios o licenciamento de atividades e empreendimentos de impacto local, estando de acordo com os critérios mínimos, elencados pela referida lei, da estrutura dos órgãos ambientais municipais para a realização do licenciamento (Brasil, 1988; Brasil, 2011; Brasil, 2016).

A ação ambiental dos municípios pode estar associada a inúmeras possibilidades de interação entre os Estados e a União, compartilhando responsabilidades em condições de autonomia, cooperação, complementaridade e minimização dos conflitos de competência entre os órgãos ambientais, podendo haver diminuição da morosidade nos processos de licenciamento no país (Brasil, 2016).

Desse modo, é nítida a interferência e a importância da sociedade nas questões ambientais do Brasil, desde que a legislação brasileira começou a tomar forma diante da pressão dos movimentos ambientais nas décadas de 1960 e 1970. Portanto, para que a descentralização seja eficaz, é preciso haver conscientização da sociedade, pois esta será considerada peça fundamental para a fiscalização e cobrança do efetivo processo de licenciamento ambiental, havendo assim uma gestão participativa do meio ambiente.

O levantamento alinhou-se a estudos prévios e diplomas legais que incentivam o crescimento da municipalização do licenciamento ambiental e trás a preocupação sobre a possível fragilidade institucional do município em capacitação de recursos humanos, financeiros e materiais para atender demandas cada vez maiores. As soluções para futuros problemas na municipalização do licenciamento devem ser buscadas, assim como os empreendimentos que o órgão licencia necessitam de suas licenças prévias para um planejamento sustentável.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O licenciamento ambiental constitui-se em um efetivo instrumento da defesa do meio ambiente à disposição da sociedade civil e do Poder Público. Na evolução temporal do licenciamento nos órgãos ambientais do município de Campina Grande/PB, verificou-se uma tendência de decaimento numérico nas licenças emitidas pela SUDEMA (órgão estadual), enquanto há uma tendência de crescimento nas licenças emitidas pela SESUMA (órgão municipal).

Durante o período analisado, a pesquisa contabilizou 4507 licenças expedidas do órgão licenciador estadual para o município de Campina Grande, e 831 licenças expedidas pelo órgão licenciador municipal.

É notório na realidade brasileira o precário quadro institucional do licenciamento municipal. A descentralização do licenciamento ambiental entrega aos municípios mais uma responsabilidade que se mistura às atribuições de políticas básicas, como saúde e educação, logo os municípios, mesmo dispondo de recursos assegurados constitucionalmente, encontram dificuldades de implementação. Nesse contexto, há a necessidade de estudos qualitativos e quantitativos que indique se a SESUMA tem capacidade em atender demandas cada vez maiores.

Assim, sugere-se que estudos futuros avancem na investigação de soluções para a municipalização do licenciamento e a capacitação do órgão municipal em atender demandas de licenças e empreendimentos de portes e potenciais poluidores cada vez maiores. Nesse cenário, há uma expectativa de um licenciamento ambiental desburocratizado e de maior transparência, diminuindo a morosidade nos processos de licenciamento e minimizando os conflitos de competência entre os órgãos ambientais.

REFERÊNCIAS

- [1] Barbosa, G. L. Corrêa, R. G.; Perez, I. C.; Johnsson, R. M. F.; Pereira, L. F. M.; Bustamante, M. N. Descentralização do licenciamento ambiental no estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Instituto Estadual do Ambiente, 2010.
- [2] Brasil. Lei complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011. Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp140.htm> Acesso em 30 de maio de 2019, 2011.
- [3] Brasil. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Brasília, 1981.
- [4] Brasil. Ministério do Meio Ambiente. Procedimentos de licenciamento ambiental do Brasil. Maria Mônica Guedes de Moraes e Camila Costa de Amorim, autoras; Marco Aurélio Belmont e Pablo Ramosandrade Villanueva, Organizadores. Brasília: MMA, 2016.
- [5] Brasil. Programa nacional de capacitação de gestores ambientais: licenciamento ambiental. Ministério do Meio Ambiente, Brasília: MMA, 2009.
- [6] Brasil. Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Disponível em: <<http://www2.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html>>. Acesso em: 23 de maio de 2019. 1997.
- [7] CNM. Diagnóstico da municipalização do meio ambiente no Brasil. Brasília: Confederação Nacional de Municípios, 2009.
- [8] Costa, G. M. da; Santos, Alane Regina Rodrigues dos; Santos, Andréia Rodrigues dos. A descentralização do licenciamento ambiental e sua integração com o ordenamento dos municípios. Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, Rio de Janeiro, p.1-7, 2014.
- [9] Farias, T. Licenciamento ambiental e a responsabilidade social da empresa. In: Agenda Ambiental: Gestão Socioambiental. (A. A. P. de Sousa; D.F. de Oliveira; G. G. de Farias; M. T. Jordão. Org.), Campina Grande: EDUEPB, 2011.
- [10] Henry, W. et al. Dicionário de ecologia e ciências ambientais. São Paulo: Melhoramentos, 1998.
- [11] IBGE. Pesquisa de informações básicas municipais – perfil dos municípios Brasileiros 2015. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016.
- [12] Milaré, E. Direito do ambiente. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
- [13] Nascimento, T.; Fonseca, A. A descentralização do licenciamento ambiental na percepção de partes interessadas de 84 municípios brasileiros. Desenvolvimento e meio ambiente, v. 43, 2017.

- [14] Neves, E. M. S. C. Institutions and environmental governance in Brazil: the local government's perspective. *Revista de economia contemporânea*, 492-516, 2016.
- [15] Oliveira, A. I. de A. *Introdução à Legislação Ambiental Brasileira e Licenciamento Ambiental*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
- [16] Rodrigues, G. S. S. C. A análise interdisciplinar de processos de licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais: conflitos entre velhos e novos paradigmas. *Revista Sociedade & Natureza, Uberlândia*, v. 22, n. 2, p. 267-282, ago. 2010.
- [17] Sudema. Tipos de Licença Ambiental. 2019. Disponível em: <<http://sudema.pb.gov.br/licencas-ambientais>> Acesso em: 10 de maio de 2019.

Capítulo 17

Identificação de tendências hidrológicas no município de Feira de Santana Bahia, Nordeste Brasileiro.

Tiago Bentes Mandú

Ana Carla dos Santos Gomes

Gilvani Gomes de Carvalho

Eduardo Almeida da Silva

Resumo: As mudanças climáticas têm efeito significativo nos múltiplos usos da água no nordeste brasileiro, pois causam alterações no regime de fluxo nas bacias hidrográficas. O objetivo deste estudo é identificar a ocorrência ou não de tendências em registros de nível do rio no município de Feira de Santana-BA. Para isso, utilizou-se dados mensais de nível do rio (cota), registrados pela estação fluviométrica N° 51460000 que está localizada na Lat. 12°13'59,16"S e Long. 39°2'45,96"W a uma altitude de 119 m, pertencente à Agência Nacional das Águas (ANA), para o período de janeiro de 1986 a dezembro de 2017. As análises de tendências dos dados também foram realizadas através dos testes de Mann-Kendall sazonal (SMK), teste de Pettitt (TP) e Estimador de Tendência de Sen (ETS), todos performados a 1% ($\alpha \leq 0,001$) de confiabilidade. O SMK detectou tendência significativa negativa, indicando que o nível do rio vem diminuindo, o TP aponta que a mudança ocorreu em 2006 e o ETS indica magnitude de 0,06, também foram observadas alterações para os meses de maio, junho, julho, agosto e dezembro. Espera-se que os resultados desse estudo possam colaborar com o entendimento do comportamento hidrológico no semiárido nordestino.

Palavras-Chave: Semiárido nordestino, Mann-Kendall sazonal, Mudanças Climáticas.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, em inglês) na América Latina, até o final desse século o aquecimento global, ocasionado por ações antrópicas, pode causar um aumento de 1°C a 4°C na temperatura do continente e ocasionar mudanças no regime pluviométrico, alterações que podem gerar um aumento considerável na ocorrência de ondas de calor, secas e inundações severas, assim como sérios impactos em sistemas humanos, ecossistemas e serviços associados (IPCC, 2014). Melo et al., (2018) afirmam que as mudanças climáticas têm efeito significativo nos múltiplos usos da água no nordeste brasileiro.

Segundo Marengo et al., (2016), projeções em climas futuros apontam uma diminuição na disponibilidade de água para agricultura irrigada e uso humano devido a reduções na precipitação e aumento da evapotranspiração. Melo et al., (2018) apontam que essas mudanças causam alterações no ciclo hidrológico e na circulação de rios e lagos no Nordeste do Brasil (NEB). O IPCC (2014) afirma que o semiárido nordestino é uma das regiões mais vulneráveis à insegurança alimentar, hídrica e energética, além de extremos da variabilidade climática seja ela natural ou causada por ações antrópicas, podendo acarretar sérios danos nesse local.

Para Yevjevich (1972), tendência em uma série temporal pode ser definida como uma mudança sistemática e contínua em qualquer parâmetro de uma dada amostra, excluindo-se alterações periódicas ou quase periódicas. Para identificar essas tendências existem diversos métodos estatísticos, dentre eles, destaca-se o teste de Mann-Kendall (MK), que de acordo com Vieira et al., (2018) é a metodologia indicada pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) para estudos hidrológicos dessa natureza.

Salviano et al., (2016) identificaram tendências positivas no regime pluviométrico da região da Nordeste, principalmente no semiárido, porém Feira de Santana não possui uma série consistente de dados pluviométricos, o que inviabiliza estudos diretos dessa variável. Entretanto, Chen e Grasby (2014) mostram que redução no nível e descarga de rios pode estar diretamente relacionada com uma redução a longo prazo no regime pluviométrico, então estudos em registros fluviais podem ajudar na identificação de alterações pluviométricas como é mostrado por Marengo et al., (2016).

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo identificar a ocorrência ou não de tendências em registros de nível do rio no município de Feira de Santana-BA para o período de 1987 a 2017.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Feira de Santana (12°16'S e 38°58'W) é um município do estado da Bahia, nordeste brasileiro. É a primeira cidade do interior nordestino em população e a segunda mais populosa do estado, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 609.913 habitantes. Sua localização geográfica está ilustrada na Figura 1. De acordo com a classificação de Köppen-Geiger, o município possui classificação 'Aw', um clima tropical com índice pluviométrico de aproximadamente 750 mm por ano. Foram utilizados dados mensais de nível do rio (cota), registrados pela estação fluviométrica N° 51460000 que está localizada na Lat. 12°13'59.16"S e Long. 39°2'45.96"W a uma altitude de 119 m e pertencente à Agência Nacional das Águas (ANA) para o período de janeiro de 1986 a dezembro de 2017.

Inicialmente foi utilizada a estatística descritiva, que de acordo com Parsons (2014) é utilizada para descrever e resumir um conjunto de dados por meio de medidas de tendência central e de dispersão, como a média e a mediana. Para análise de possíveis tendências, utilizou-se o método estatístico não-paramétrico Mann-Kendall Sazonal (SMK), que é uma adaptação feita por Hirsch e Slack em 1984 no teste de Mann-Kendall (MK), pois o MK apresenta forte sensibilidade em possíveis sazonalidades e correlação existente nos dados o que pode distorcer as estimativas do mesmo (BLAIN, 2010). Sempre que existir valores $-1,96 \leq Z \leq 1,96$, considera-se que pode existir tendência no conjunto de dados e caso esteja no intervalo de confiança adotado, nesse estudo 1% ($\alpha \leq 0,001$) é considerada estatisticamente significativa. Mais detalhes do SMK podem ser encontrados em Blain (2010).

Figura 1. Representação da área de estudo

Fonte: IGBE (2018) adaptado pelos autores.

O SMK não fornece informações nem da magnitude nem do ponto onde aconteceu a mudança e por esse motivo seu uso foi complementado pelo Teste de Pettitt (TP) e Estimador de tendência de Sen (ETS). O TS foi proposto por Pettitt em 1979, também é um teste não-paramétrico e é utilizado para identificar o ponto de mudança em um conjunto de dados com base na versão da estatística de Mann-Whitney, para maiores informações sobre o TS consultar Uiliana et al., (2015). A magnitude das tendências que o SMK identificar serão obtidas pelo ETS, que assim como os dois métodos citados acima é não-paramétrico e permite uma estimativa robusta da inclinação da série temporal (PARSONS, 2014).

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

A variação mensal do nível do rio trimestral está contido na Figura 2. O período de janeiro a março (3A) mostra uma variabilidade acentuada no mês de janeiro em 2002, 2004, 2012 e 2015, valores acima de 300 cm só são observados para os anos de 1992 e 2008, para o mês de fevereiro e em março somente em 1997. Na Figura 2B temos o segundo trimestre do ano, que quando comparado com o anterior apresenta uma variabilidade mais concentrada entre 120 e 210 cm, com destaque para abril que teve o maior e o menor registro do trimestre de 233 e 100 cm, respectivamente. Para o período de julho a setembro (Figura 2C) observa-se um comportamento mais uniforme, diferentemente dos outros trimestres, esse os meses apresentampadrão similar seja em declínios (1993 e 2011) ou em picos (2010 e 2016). O último trimestre do ano (Figura 2D) apresenta variação temporal similar com o período de janeiro a março, o mês de novembro mostra pontos discrepantes em 1995, 2000 e 2005, já outubro assim como março mostra apenas um ano com medidas acima de 200 cm, dezembro destaca-se com o maior valor observado no período (427,0 cm) e também é observado uma acentuação nos anos de 2013-2014.

Os pontos discrepantes descritos acima coincidem com a ocorrência do evento ENOS (*El Niño* Oscilação Sul) que acarreta alterações no ciclo hidrológico do Nordeste, conforme foi mostrado por Sousa et al., (2016).

Figura 2: Comportamento do nível do rio A) janeiro a março, B) abril a junho, C) julho a setembro e D) outubro a dezembro, em Feira de Santana-BA para o período de 1987 a 2017.

O resultado dos testes estatísticos empregados está contido na Tabela 1, onde apenas os meses que apresentam significância foram mostrados. O SMK aponta um declínio para a série, que de acordo com o teste de Pettitt ocorreu em 2006, com magnitude superior a 0,05 cm. Para todos os meses apresentados, observou-se uma redução superior a 0,5 cm que ocorreram entre o fim do século passado e o início desta década. Mostrando que o comportamento hidrológico da região apresenta redução temporal, que pode estar relacionada com mudanças climáticas globais.

Tabela 1: Testes aplicado a medidas de nível do rio em Feira de Santana para o período de 1987 a 2017.

	Mann-Kendall sazonal		Teste de Pettitt		Estimador de tendência de Sen	
	Z	p-value	Ano de Mudança	p-value	Magnitude (cm)	p-value
Série total	-4,79	< 0,001	2006	< 0,001	- 0,06	< 0,001
Maio	- 2,55	< 0,001	1997	< 0,001	- 1,58	< 0,001
Junho	- 2,96	< 0,001	2006	< 0,001	- 1,33	< 0,001
Julho	- 2,12	< 0,001	1997	< 0,001	- 1,04	< 0,001
Agosto	- 2,11	< 0,001	1997	< 0,001	- 0,92	< 0,001
Dezembro	- 2,11	< 0,001	2001	< 0,001	- 1,21	< 0,001

Foram identificadas alterações no ciclo hidrológico no estado da Bahia por Melo et al., (2018), achados que corroboram com os resultados obtidos nesse estudo, Tabari et al., (2012) também têm os mesmos resultados na região semiárida do Irã, indicando a necessidade de estudos sobre o tema.

4.CONCLUSÕES

Diante do exposto, deve-se notar que os resultados deste trabalho não são suficientes para confirmar os efeitos das mudanças climáticas em Feira de Santana. Estudos posteriores são necessários para abordar as causas da diminuição do nível do rio e suas relações com a precipitação e o aquecimento global. Este trabalho contribuiu para fornecer informação à cerca de alterações no nível do rio no município de estudo, gerando informação essencial para os gestores, ajudando-os a tomar melhores decisões em relação à gestão de recursos no futuro.

REFERÊNCIAS

- [1] Blain, G. C. Detecção de tendências monótonas em séries mensais de precipitação pluvial do Estado de São Paulo. *Bragantia*, v.69, n.4, 2010.
- [2] Chen, Z. & Grasby, S. E. Reconstructing river discharge trends from climate variables and prediction of future trends. *Journal of Hydrology*, v.511, p.267-278, 2014.
- [3] Ibge, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. < www.ibge.gov.br/censo2010 >. Acesso em 28 de novembro de 2018.
- [4] Ipcc. Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Cambridge University Press, Cambridge), 2014.
- [5] Marengo, J. A.; Cunha, A. P.; Alves, L. M. A seca de 2012-15 no semiárido do Nordeste do Brasil no contexto histórico. *Climanálise*, v.3, p.49-54, 2016.
- [6] Melo, M. M. M. S.; Santos, C. A. C. D.; Olinda, R. A. D.; Silva, M. T.; Abrahão, R.; Ruiz-Alvarez, O. Trends in Temperature and Rainfall Extremes near the Artificial Sobradinho Lake, Brazil. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v.33, n.3, p.426-440, 2018.
- [7] Parsons, K.C. Human thermal environments: the effects of hot, moderate, and cold environments on human health, comfort, and performance. Boa Raton: CRC Press, p. 560, 2014.
- [8] Salviano, M. F.; Groppo, J. D.; Pellegrino, G. Q. Análise de tendências em dados de precipitação e temperatura no Brasil. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v.31, n.1, p.64-73, 2016.
- [9] Tabari, H.; Bghari, H.; Talaee, P. Temporal trends and spatial characteristics of drought and rainfall in arid and semiarid regions of Iran. *Hydrological processes*, v.26, n.22, p.3351-3361, 2012.
- [10] Uliana, E.; da Silva, D. D.; Morgan Uliana, E.; Silveira Rodrigues, B. & de Paula Corrêdo, L. Análise de tendência em séries históricas de vazão e precipitação: uso de teste estatístico não paramétrico. *Ambiente & Água-An Interdisciplinary Journal of Applied Science*, v.10, n.1, 2015.
- [11] Vieira, A.S.A.; Crispim, D.L.; Rodrigues, R.S.S.; Silva, I.Q.; Pessoa, F.C.L. Resposta hidrológica às mudanças climáticas em Caparema-PA um município da Amazônia. *Revista Geonorte*, v.9, n.32, p.67-79, 2018.
- [12] Yevjevich, V. Stochastic process in hydrology. *Water Resources*, 1972.

Capítulo 18

Identificação de secas meteorológicas a longo prazo a partir de um posto pluviométrico em Aiuaba-CE.

Tiago Bentes Mandú

Ana Carla dos Santos Gomes

Lorena Martina Trindade de Lima

Giovana Deponte Galetti

Gilvani Gomes de Carvalho

Eduardo Almeida da Silva

Resumo: Pesquisas recentes sobre as secas no Nordeste mostram que no século XX ocorreram mais de 20 períodos de estiagens, algumas das quais classificadas como extremas. O objetivo desse estudo é identificar secas de longo prazo utilizando o Índice de Precipitação Padronizado (IPP) no município de Aiuaba-CE. Foram utilizados dados mensais de precipitação pluvial, registrados por um posto pluviométrico, localizado na Lat. 6°34'1,2"S e Long. 40°7'0,098"W, pertencente a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME). O período dos dados ocorre de janeiro de 1978 a novembro de 2018, utilizou-se o IPP na escala 12 para identificação desses eventos. O IPP detectou 129 meses com características de seca, sendo 21 extremas; 27 severas; 21 moderadas e 60 leves. As secas extremas foram observadas nos anos de 1983, 1998, 2013 e 2017, para os dois primeiro anos mencionados nota-se que o período coincide com a ocorrência da fase quente do evento climático extremo ENOS (*El Niño* Oscilação Sul) que ocasiona secas no norte e nordeste do Brasil. Espera-se que os resultados desse estudo possam colaborar com o entendimento de secas no semiárido nordestino.

Palavras-Chave: Semiárido nordestino, Déficit hídrico, Variabilidade climática.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com Magalhaes *et al.*, (1988), a região semiárida do nordeste brasileiro ocupa uma área territorial de aproximadamente 1.542.000 km², mais de 15% da extensão territorial do Brasil. Da Silva *et al.*, (2011) afirmam que a região Nordeste do Brasil (NEB) apresenta uma forte irregularidade espaço-temporal em seu regime pluviométrico. Segundo Vieira *et al.*, (2015), o NEB é uma região vulnerável a extremos de variabilidade climática, cenários globais e regionais de mudanças climáticas assinalam que essa região pode ser afetada no futuro por um forte déficit de precipitação e aumento da aridez.

Eakin *et al.*, (2014) afirmam que eventos de secas são um processo natural e sua ocorrência afeta diretamente os habitantes do semiárido nordestino, acarretando deficiência energética, hídrica, além de trazerem riscos à segurança alimentar dos habitantes. Marengo *et al.*, (2013) ressaltam que condições de seca não prejudicam o Nordeste inteiro, a área afetada é conhecida como “polígono das secas” que envolve os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. De acordo com Santos *et al.*, (2017), a ocorrência de extremos climáticos em todo o globo terrestre pode ser quantificada por índices meteorológicos como o Índice de Precipitação Padronizado (IPP), que consegue estimar déficits hídricos em diversas escalas de tempo.

O IPP é utilizado devido a sua simplicidade e eficácia na identificação de eventos secos e chuvosos de diferentes magnitudes em vários períodos diferentes (1, 3, 12 e 24 meses), o que auxilia no monitoramento e entendimento da dinâmica temporal do fenômeno. Uma das grandes vantagens do IPP é necessitar apenas de dados de precipitação em seu cálculo, como o índice é padronizado a classificação de suas categorias podem ser utilizadas em qualquer região do mundo (HAYES, 2000).

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo utilizar o Índice de Precipitação Padronizado (IPP) para identificar a ocorrência de secas a longo prazo no município de Aiuba-CE para o período de 1978 a 2018.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O município de Aiuba (06° 34' S e 40° 07' W) pertence ao estado do Ceará, localizado na microrregião do Sertão de Inhamuns e tem população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 16.203 habitantes, sua localização geográfica está ilustrada na Figura 1. O clima dominante é tropical quente semiárido com precipitação acumulada média anual inferior a 600 mm (IBGE, 2018). Utilizou-se dados mensais de precipitação pluvial, registrados por um posto pluviométrico localizado na Lat. 6°34'1,2"S e Long. 40°7'0,098"W pertencente à Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), para o período de janeiro de 1978 a novembro de 2018.

Figura 1. Representação da área de estudo

Fonte: IBGE (2018) adaptado pelos autores.

O Índice de Precipitação Padronizado (IPP) foi proposto inicialmente por McKee *et al.*, (1993), é um índice determinado a partir de uma função de densidade gama que descreve as séries temporais e pode ser calculado para diversas escalas de tempo (HAYLES, 2000). Então, a probabilidade acumulada de cada mês é estimada, aplicando essa probabilidade a função inversa se tem o valor do IPP (SOUSA *et al.*, 2016). A escala adotada nesse estudo foi 12 que é vastamente utilizada pela comunidade científica para identificar secas a longo-prazo, o *software* R 3.5.1 com ajuda do pacote 'IPP' foram utilizados para calcular o IPP. As categorias do índice são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. Classificação de secas do IPP.

Valores IPP	Classe
$\leq -2,0$	Seca Extrema
-1,99 a -1,50	Seca Severa
-1,49 a -1,0	Seca Moderada
-0,99 a -0,50	Seca Leve
-0,49 a 0,49	Quase Normal

Fonte: Modificado de McKee *et al.* (1993).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O período de análise consistiu em 39 anos (1979-2018), ou seja, 468 meses que estão divididos pela escala do índice e mostrados na Tabela 2. A condição de normalidade representa 43,8% dos dados totais, o que significa comportamento próximo ao esperado, foram observados 128 meses (27,4%) em condição de secas, divididos nas categorias de seca extrema (4,3%); seca severa (5,8%); seca moderada (4,5%) e seca leve (12,8%).

Os 21 eventos de seca extrema (Tabela 2) ocorreram em 8 meses (maio a dezembro) dos anos de 1983 e 1998, quatro meses (março a junho) de 2013 e em janeiro de 2017, as secas de anos de 1983 e 1998 coincidem com a ocorrência do evento ENOS (*El Niño* Oscilação Sul) em sua fase quente seguindo a tabela de ocorrência do fenômeno mostrada por Vieira *et al.*, (2018). As secas severas ocorreram em dez diferentes anos, com destaque para os anos de 1993, 2001 e 2013 por compreender no mínimo um trimestre, também se destaca os anos de 1981, 1984, 1998, 1999 e 2015 por ter apenas um mês de ocorrência, todos observados no primeiro semestre do ano. Já as secas moderadas e leves ocorreram em 23 anos distintos e para essa categoria, ressalta-se episódios maiores que 10 meses nos anos de 1979, 2015 e 2016.

Tabela 2. Ocorrências e percentuais das frequências dos eventos de IPP-12 para o município de Aiuaba-CE no período de 1979 a 2018.

Categoria	IPP-12 meses	
	Ocorrência (meses)	(%)
Seca extrema	21	4,5
Seca severa	27	5,8
Seca moderada	21	4,5
Seca leve	60	12,8
Próximo ao normal	205	43,8

A série temporal do IPP-12 é mostrada na Figura 2, onde é possível observar variabilidade maior entre as escalas -2 e 2, secas extremas foram observadas nos anos de 1983, 1998, 2013 com quatro meses ou mais de ocorrência, o que indica que esse cenário perdura por no mínimo um trimestre, a exceção é observada em 2017 onde o evento teve duração de apenas um mês (janeiro). Foram observados 21 e 27 meses de secas severas e moderadas, respectivamente, que ocorreram em diversos anos do período analisado. Esses eventos podem interferir em diversos segmentos da população do município, podendo citar a agricultura e

a pesca, pois são atividades que dependem de condições climáticas favoráveis como mostrado por Morton *et al.* (2006).

Figura 2: Variação do IPP na escala de 12 meses em Aiuaba – CE para o período de 1979 a 2018.

Fechine (2015), utiliza o IPP para identificação de secas na região metropolitana de Fortaleza, também no estado do Ceará e observa eventos de forte seca para os anos de 1983 e 1998 o que corrobora com os achados desse estudo, mostrando que esses eventos afetaram a capital e o interior do estado Ceará e podem ter afetado outros estados do nordeste brasileiro, estudos posteriores são necessários para validar essa hipótese.

O registro mais baixo do IPP durante o período analisado ocorreu entre 2012-2013, Marengo *et al.*, (2013) mostram que foi nesse período que o nordeste brasileiro vivenciou a mais severa seca das últimas décadas, corroborando com os achados desse estudo. Sousa *et al.*, (2016) mostraram que o evento ENOS é dos causadores das secas que atingem a bacia do rio Paraguaçu na Bahia, e nossos resultados mostram que o mesmo ocorre no sudoeste do estado do Ceará. Salientando que esse índice utiliza apenas de dados mensais de precipitação pluvial em seu cálculo, o que é uma grande vantagem, pois a região do semiárido nordestino ainda não possui quantidade satisfatória de estações meteorológicas e as medidas de precipitação pluvial podem ser feitas por postos pluviométricos e estações fluviométricas, órgãos como a Agência Nacional das Águas (ANA) e a Fundação Cearense de Recursos Hídricos (FUNCEME) possuem esses tipos de observações na região.

4.CONCLUSÕES

Diante do exposto, foi observado que eventos de secas são comuns no município de Aiuaba e a metodologia adotada foi capaz detectar tais ocorrências, foram identificadas 21 ocorrências de secas extremas, 27 secas severas, 21 secas moderadas e 60 secas leves, que juntas são 27,4% dos registros totais, ou seja, dos 468 meses analisados 129 meses o IPP identificou algum tipo de seca. Espera-se que esse estudo possa colaborar com o entendimento de secas no semiárido nordestino e na utilização de metodologias que sejam capazes de identificá-las, uma vez que esses eventos afetam diretamente a população desse município.

REFERÊNCIAS

- [1] Da Silva, V. P.; Pereira, E. R.; de Azevedo, P. V.; De Sousa, F. D. A.; de Sousa, I. F. Análise da pluviometria e dias chuvosos na região Nordeste do Brasil. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, v. 15, n. 2, p. 131-138, 2011.
- [2] Eakin, H.C.; Lemos, M.C.; Nelson, D.R. Differentiating capacities as a means to sustainable climate change adaptation. *Global Environmental Change*, v.27, p.1-8, 2014.
- [3] Fechine, J. A. L. Identificação de secas meteorológicas na região metropolitana de Fortaleza, usando o índice de precipitação padronizada (SPI). *Boletim de Geografia*, v.33, n.2, p.18-33, 2015.

- [4] Hayes, M.J. Revisiting the SPI: clarifying the process. 2000.
- [5] Ibge. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em < <https://www.ibge.gov.br/> >. Acesso em 20 de novembro de 2018.
- [6] Mckee, T.B.; Doesken, N.J.; Kleist, J. The relationship of drought frequency and duration to time scales. In: Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology. American Meteorological Society, p. 179-183, 1993.
- [7] Magalhães, A. R., Filho, H. C., Garagorry, F. L., Gasques, J. G., Molion, L. C. B., Neto, M. da S. A., Nobre, C. A., Porto, E. R., And Rebouças, O. E.; 'The Effects of Climatic Variations on Agriculture in Northeast Brazil', in Parry, M. L., Carter, T. R., and Konijn, N. T. (eds.), The Impact of Climatic Variations on Agriculture, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, p. 273–377, 1988.
- [8] Marengo, J.A.; Alves, L.M.; Soares, W.R.; Rodriguez, D.A.; Camargo, H.; Riveros, M.P.; Pabló, A.D. Two Contrasting Severe Seasonal Extremes in Tropical South America in 2012: Flood in Amazonia and Drought in Northeast Brazil. *Journal of Climatology*, v. 26, p.9137-9154, 2013.
- [9] Morton, D. C., Defries, R. S., Shimabukuro, Y. E., Anderson, L. O., Arai, E., Del Bon Eipprito-Santo, F., ... & Morisette, J. Cropland expansion changes deforestation dynamics in the southern Brazilian Amazon. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v.103, n.39, p.14637-14641, 2006.
- [10] Santos, S. R. Q. D., Braga, C. C., Sansigolo, C. A., & Santos, A. P. P. D. Determination of Homogeneous Precipitation Regions of the Standardized Precipitation Index (SPI) in the Eastern Amazon. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v.32, n.1, p.111-122, 2017.
- [11] Vieira, A.S.A.; Criipm, D.L.; Rodrigues, R.S.S.; Silva, I.Q.; Pessoa, F.C.L. Resposta hidrológica as mudanças climáticas em Caparema-PA um município da Amazônia, *Revista Geonorte*, v.9, n.32, p.67-79, 2018.
- [12] Vieira, R.M.S.P.; Tomasella, J.; Alvala, R.C.S.; Sestini, M.F.; Affonso, A.G.; Rodriguez, D.A.; Barbosa, A.A.; Cunha, A.P.M.A.; Valles, G.F.; Crepani, E.; de Oliveira, S.B.P.; de Souza, M.S.B.; Calil, P.M.; de Carvalho, M.A.; Valeriano, D.M.; Campello, F.C.B.; Santana, M.O. Identifying areas susceptible to desertification in the Brazilian northeast. *Solid Earth*, v.6, p.347–360, 2015.

Capítulo 19

Uso do rejeito de mineração para produção de microesferas de sinalização viária

Barthira Almeida Nunes

Priscila Thalita Barros de Lima

Maryanne Fernandes Formiga Dantas

Tardelles Oliveira Santos

Ana Luíza da Silva Teodoro

Resumo: Os sistemas de sinalização são constituídos por marcas viárias, marcações, símbolos e legendas, em tipos e cores variadas. São constituídos por conjuntos de sinais de trânsito aplicados nas vias públicas com o objetivo de garantir melhor fluidez do trânsito promovendo a segurança dos veículos e pedestres. Frente a isto, a sinalização horizontal constituída de linhas, marcações, símbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias, utilizam em suas pinturas microesferas de vidro, as quais promovem a refletividade nas vias demarcadas. O presente trabalho tem como objetivo substituir e aprimorar a matéria-prima utilizada na fabricação das microesferas, no sentido de diminuir os custos de produção e ao mesmo tempo melhorar as características físicas do produto final. Ao longo dos estudos, foram analisados e testados dois materiais alternativos, o vidro reciclável e o mineral quartzo. Tais materiais, quando comparados apresentaram resultados distintos, onde o quartzo, apesar de mostrar limitações ao longo do processo de modelagem, revelou aspectos bastante satisfatórios em relação ao vidro reciclável quanto as propriedades do quartzo.

Palavras-chave: Sinalização Viária. Microesferas Retrorrefletivas. Vidro. Quartzo.

1. INTRODUÇÃO

Segundo o CNT - Código Nacional de Trânsito em seu Anexo II, item 2, “Sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento da via. Têm como função organizar o fluxo de veículos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situações com problemas de geometria, topografia ou frente à obstáculos; complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação”.

Ainda, o capítulo VII “Da Sinalização de Trânsito” do CNT, art. 80, parág. 1º, reza que: “A sinalização será colocada em posição e em condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do Contran – Conselho Nacional de Trânsito.”

A sinalização horizontal tem o objetivo de prover informações visuais para os motoristas e/ou usuários das vias, com intuito de aumentar a segurança e a fluidez no trânsito, independente das condições adversas de tempo (LIBERALESSO, 2014).

Os materiais utilizados para sinalização horizontal podem ser tintas, termoplásticos, ou pré-fabricados (elastoplásticos). Os termoplásticos são misturas constituídas por veículos (resinas), partículas sólidas (cargas, pigmentos e microesferas de vidro) e aditivos. Quanto ao tipo, de aplicação podem ser classificados em extrudados ou aspergidos. Os pré-fabricados ou elastoplásticos são filmes, películas ou fitas constituídas por veículos (resinas), partículas sólidas (cargas, pigmentos e microesferas de vidro) e aditivos, fornecidos em espessuras definidas por ocasião da fabricação, cuja aplicação é feita através da colagem no pavimento. As microesferas, nosso material de estudos, se enquadram na primeira classificação, aplicadas como elementos ópticos para sinalização retrorrefletiva. A adição de microesfera é para aumentar a visibilidade dos motoristas a noite em uma determinada distância, cuja consequência é aumentar a segurança nas vias e rodovias.

Para obtermos essa refletividade das microesferas Moreira e Menegon (2003) citam que existem três tipos de reflexão da luz: Reflexão Especular, Reflexão Difusa e Retrorreflexão. A Reflexão Especular, esta acontece quando a luz incide sobre a superfície, e esta reflete na direção oposta e não ao motorista, desta forma, este tipo de fenômeno pode ser facilmente observado quando um filme de água recobre a sinalização viária no pavimento, e a luz do farol incide, ocorrendo um efeito espelho (especular); Reflexão Difusa, acontece quando a luz do farol incide sobre uma superfície rugosa, e os raios de luz são refletidos em várias direções. Uma sinalização sem a adição de microesferas provoca este fenômeno; a Retrorreflexão acontece quando a luz incidente do farol sobre a sinalização viária no pavimento é redirecionada a sua fonte, tornando este material visível a noite. Este fenômeno acontece quando a luz atinge as microesferas de vidro que estão na película de tinta.

Sua reflexão é resultado natural e característico do vidro esférico, que possui alto grau de refletividade sob incidência de luz, seja de faróis de carro ou lanternas, proporcionando assim uma adequada demarcação e sinalização.

Normalmente são fabricadas com vidro do tipo soda-cal-sílica ($\text{Na}_2\text{-CaO-SiO}_2$), com o teor de sílica elevado, sendo superior a 65%.

As propriedades físicas das microesferas mais comumente utilizadas na demarcação viária são as seguintes:

- Índice de refração: 1,5 mínimo
- Densidade de massa: 2,3 a 2,6 g/cm³
- Esfericidade: 75 % mínimo
- Dureza: 5
- Distribuição granulométrica: diâmetros variam de 2,36 a 0,063 mm

Apesar das características de resistência, refletividade e dureza atenderem o estabelecido pela ABNT, observamos uma possibilidade para substituir a matéria-prima que é o vidro por quartzo afim de reduzir impactos ambientais nas regiões de mineradoras que extraem rocha ornamental, obedecendo as normas padrão das características físicas e ópticas das microesferas.

As mineradoras que extraem rochas ornamentais geram uma grande quantidade de rejeitos ocasionados pelos desmontes, por isso o percentual de recuperação é baixo, deixando empilhadas grandes quantidades

de fragmentos de rocha. O material rejeitado, depositado em pilhas, possuem finos que podem causar sérios impactos de degradação ambiental pois, as partículas finas suspensas no ar, causam doenças decorrente da inalação constante dessas partículas finas de sílica. Para isto, está sendo proposto utilizar o quartzo como refletivo nas tintas para sinalização viária com o intuito de reduzir as pilhas de rejeito oriundas da extração.

O quartzo é um dos minerais mais abundantes na crosta terrestre, 12% (FRONDEL, 1962 *apud* GUZZO, 2008) bem formados com dimensões e colorações variadas, ametista, citrino, quartzo esfumado, quartzo róseo, quartzo hialino ou cristal de rocha, sendo este último o tipo de quartzo mais adequado para o estudo em questão, devido ao seu alto grau de transparência e suas características que se assemelham ao vidro. A demanda de quartzo tem sido muito sensível às mudanças tecnológicas, tendo em vista as propriedades físicas e químicas que este mineral apresenta.

O quartzo é um mineral de dureza 7,0 (escala de Mohs), sétil, sem plano de clivagem, pelo fato de sua estrutura ser uma cadeia tridimensional de tetraedros de $(\text{SiO}_4)^{-4}$ interligados e fratura conchoidal a subconchoidal (FRONDEL, 1962 *apud* GUZZO, 2008). Possui grande resistência química, sendo inerte para a maioria dos compostos químicos, com exceção de agentes alcalinos e ácidos fluorídrico e fosfórico (GUZZO, 2008).

Também apresenta viscosidade muito alta, e seu processo de desvitrificação ocorre após prolongada exposição do material à temperaturas muito altas. Devido ao alto grau de pureza, este mineral possui propriedades óticas, influenciadas pela transparência, melhores do que a dos vidros tradicionais, apresenta também um brilho vítreo (HELIOSQUARTZ, 2017). O índice de refração desse mineral está entre 1,53 e 1,55.

Em relação às propriedades térmicas, apresenta resistência às altas temperaturas e ao derretimento, +/- 1500°C, além de possuir excelente estabilidade térmica, principalmente em comparação aos vidros tradicionais, se constantemente aquecido à 1200°C por cerca de uma hora, o material não muda de cor.

Cabe ressaltar que na Região Nordeste do Brasil cerca de 80% da produção mineral são de minerais industriais (LINS, 2008). Dentre os litotipos, destacam-se os pegmatitos, fontes importantes de vários destes minerais, como quartzo (incolor ou hialino, róseo e morion), feldspatos, micas e caulim. Contêm ainda gemas de alto valor, como águas-marinhas e turmalinas elbaítas, que quando exploradas, geram uma enorme quantidade de rejeitos de minerais industriais, incluindo-se o quartzo (MIRANDA, 2012).

Na Paraíba, os depósitos de pegmatitos se concentram na Província Pegmatítica da Borborema (PPB). A proximidade com o município de Campina Grande facilita a comercialização e valorização da matéria-prima regional.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

As amostras de quartzo branco foram obtidas na empresa FUJI S/A - Mármore e Granitos LTDA, localizada no município de Parelhas – Rio Grande do Norte.

Foram utilizados britador de mandíbulas, moinho de discos e peneiras vibratórias para adequar o material. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Análises Minerais – LAM, localizado na Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A refletividade no vidro é obtida através da esfericidade. Conseguimos adequar o quartzo dentro da granulometria estabelecida padrão. Obtivemos resultados esperados devido às propriedades do quartzo e vidro serem bastante próximas. O quartzo tem boa refletividade, mesmo sem as amostras estarem esféricas, quando incide o feixe de luz.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As microesferas são de grande importância na sinalização viária, estudá-las e promover novas alternativas para o desenvolvimento e aprimoramento das mesmas é o grande desafio desta pesquisa.

Os recursos minerais encontrados em abundância em nossa região, dentre eles o quartzo, são de grande valia, principalmente em virtude do seu baixo custo.

Os resultados foram bem satisfatórios quanto a refletividade do mineral quando reduzida a granulometria do quartzo, garantido refletividade sob incidência de luz. Com o resultado obtido é possível viabilizar o rejeito como matéria-prima para microesferas e reduzir as pilhas de rejeito nas mineradoras.

REFERÊNCIAS

- [1] Guzzo, P.L., 2008. Quartzo. In: Rochas & Minerais Industriais: Usos e Especificações. Ed.: A.B. Luz e F.A.F. Lins. Editora do CETEM, 2ª edição, Rio de Janeiro, (pp. 681-721).
- [2] Heliosquartz. Propriedades do Quartzo. Disponível em: www.heliosquartz.com/prodotti/propriedades-do-quartzo. Acesso em: 19 de agosto de 2017.
- [3] Liberalesso, R., 2014. Avaliação crítica da sinalização empregada nas travessias de pedestres situadas na BR-287 e RS-509. Rio Grande do Sul. Trabalho Conclusão de Curso - Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Maria.
- [4] Lins, F. A. F., 2008. Panorama das rochas e minerais industriais no Brasil. In: Rochas & Minerais Industriais: Usos e Especificações. Ed.: A.B. Luz e F.A.F. Lins. Editora do CETEM, 2ª edição, Rio de Janeiro (pp. 3-23).
- [5] Miranda, M. R., 2012. Caracterização espectroscópica e alteração da cor por radiação gama e tratamentos térmicos de quartzo róseo-leitoso da Província Pegmatítica da Borborema. Pernambuco. Programa de Pós Graduação em Engenharia Mineral, Universidade Federal de Pernambuco.
- [6] Schwab, M. S. F., 1999. Estudo do desempenho dos materiais de demarcação viária retrorrefletivos. Minas Gerais. Tese de Mestrado – Rede Temática em Engenharia de Materiais, Universidade Estadual de Minas Gerais.

Capítulo 20

*Descoloração de corante têxtil utilizando o fungo filamentoso *Aspergillus* sp. URM 5741*

Nayara Vitória dos Santos Cruz

Anna Gabrielly Duarte Neves

Karolaine da Conceição Gama Santos

Raphael Luiz Andrade Silva

Arthur Filipe Ferreira Pequeno

Romero Marcos Pedrosa Brandão Costa

Márcia Vanusa da Silva

Ana Lucia Figueiredo Porto

Resumo: Corantes sintéticos são os mais usados nas fábricas têxteis e de tinturarias, devido a facilidade de uso, custo-benefício e quantidade de cores, em comparação com corantes naturais. Sua utilização desmedida tem causado impactos devido a liberação em efluentes das indústrias têxteis, portanto, sendo necessário alternativas para remoção desses compostos antes de serem lançados em conjunto com os efluentes nos diversos ambientes. Dessa maneira, o presente trabalho objetivou realizar a descoloração do corante comercial têxtil 78GR Turquesa, a fim de avaliar sua remoção através do emprego do fungo filamentoso do gênero *Aspergillus* sp URM 5741. A partir da utilização da biomassa fúngica em quantidade de 1 g, 4 g e 8 g para descoloração do corante em agitação (120 RPM) durante 2 horas. Foi observado que a porcentagem de descoloração aumentou em relação ao tempo e a quantidade de biomassa, sendo obtido 69% de descoloração do corante com apenas 1g, 92% com 4g e 98% com 8g de biomassa, apenas nos primeiros 15 min de experimento. Conclui-se assim que o microrganismo *Aspergillus* sp., apresentou capacidade em descolorir esse corante, em pequenas quantidades de biomassa e pouco tempo. Portanto, o gênero *Aspergillus* é um potencial microrganismo a ser empregado no tratamento de áreas contaminadas por corantes têxteis, de forma barata, rápida e eficiente.

Palavras-chave: Biorremediação, Corante sintético, Fungos filamentosos.

1. INTRODUÇÃO

Com a crescente urbanização e industrialização, diversos compostos químicos, incluindo compostos orgânicos, como os corantes, têm sido extensivamente produzidos e utilizados diariamente (Rani *et al*, 2014). Os corantes se aderem ao substrato por compatibilidade, fornecendo cor pelo menos temporariamente, a partir de retenção mecânica, ligações iônicas, ligações químicas covalentes ou por adsorção física (Manage, 2017). Os corantes sintéticos são os mais usados nas fábricas têxteis e de tinturarias, devido a características como: facilidade de uso, custo-benefício e quantidade de cores, quando comparados aos corantes naturais (Namdhari *et al*, 2012).

Atualmente são conhecidos mais de 100 mil corantes sintéticos, no entanto, não se conhece a quantidade exata em toneladas da produção desses corantes, sabendo-se, entretanto, que dois terços equivalem a corantes têxteis (Garg e Tripathi, 2017; Santos *et al.*, 2017). Do equivalente de corantes utilizados nas indústrias, aproximadamente 15% é perdido durante o processamento, por não se aderirem às fibras de têxteis, sendo descartados nos efluentes ou tornando-se lodos (Maganha de Almeida *et al.*, 2018).

A molécula dos corantes apresenta, em geral, pelo menos um grupo aromático, podendo conter benzenos, xilenos, toluenos, naftalenos e outros compostos aromáticos, o que pode lhes conferir características tóxicas, mutagênicas, carcinogênicas e bioacumulativas com uma concentração de apenas 3%, mesmo após tratamento (Przystas *et al.*, 2018).

Segundo Faryal e Hameed (2005) as águas residuais das indústrias que atingem os corpos hídricos superficiais, são provavelmente a maior fonte de contaminação tóxica no meio ambiente, acarretando em riscos à saúde dos ecossistemas de forma principal aos animais e seres humanos (Asgher *et al*, 2013). Além disso a presença de corantes nos corpos de água interfere de modo negativo na sua estética, solubilidade de gases, turbidez e na transparência, mesmo em pequenas concentrações (Dharajiya *et al*, 2016), sendo assim é essencial o tratamento das águas residuais antes de seu descarte no meio ambiente.

Com o disseminado uso de corantes sintéticos, a problemática ambiental mais difícil de reparar é justamente remover esses corantes dos efluentes, onde alguns métodos são usados como tratamento (Gül e Dönmez, 2012), classificados como procedimentos físicos, químicos e/ou biológicos. Segundo El-Rahim e colaboradores (2017) os métodos químicos são os mais utilizados pelas indústrias, e muitas vezes dão origem a outros componentes químicos, ou seja, subprodutos que também são poluentes. Tratamentos físicos e químicos tais como, troca iônica, filtração por membrana, utilização de reagentes de Fenton, osmose reversa, fotoquímica, carvão ativado e ozonização, são geralmente utilizados, entretanto esses métodos acabam originando compostos secundários na forma de lodo, os quais possuem componentes químicos prejudiciais, causando um problema de descarte (Singh *et al*, 2018).

A partir das desvantagens das técnicas físico-químicas e seus elevados custos para o tratamento, os métodos biológicos surgem como uma alternativa bastante viável. Os tratamentos biológicos têm sido atrativos, principalmente por causarem baixíssimo impacto no ecossistema, por apresentarem ótima relação custo-benefício, além de converter componentes de origem orgânica em produtos não tóxicos (Karim *et al*, 2017; Ameen e Alshehrei, 2017).

A descoloração de corantes têxteis por meio do método biológico, pode ser realizada por diversos microrganismos, como bactérias, fungos e algas (Telke *et al*, 2010). Destacando-se os fungos filamentosos, que de acordo com Khan e Fulekar (2017) são atrativos para a biorremediação sobretudo pela capacidade de realizar auto peletização. Além disso os fungos são os microrganismos mais eficazes para tratar resíduos têxteis e realizar a descoloração, pois possuem vantagens em relação aos seres unicelulares, pois seus micélios são capazes de dissolver substâncias insolúveis através da síntese de enzimas extracelulares (Dewi *et al*. 2018).

Dessa forma, o presente estudo teve por objetivo realizar a descoloração do corante comercial têxtil 78GR Turquesa (Corafix) da Coratex®, obtido das lavanderias do Polo de Confeções de Pernambuco, utilizando o fungo filamentoso *Aspergillus* sp. URM 5741, avaliando sua capacidade de descoloração ao longo do tempo e a relação da quantidade de biomassa e a eficiência do processo.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 PREPARAÇÃO DO CORANTE

O corante comercial têxtil 78GR Turquesa (Corafix) da Coratex®, foi fornecido pelo Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP), obtido das lavanderias do Polo de Confeções de Pernambuco. Para aplicação

experimental, foi feita uma solução de corante em água deionizada. A concentração final utilizada nos experimentos foi de 50 mg/L.

Preparação da biomassa fúngica

O fungo filamentosso utilizado como agente biorremediador foi o *Aspergillus* sp. URM 5741, obtido na coleção da Micoteca URM da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Pernambuco, Brasil, e mantidas em *Czapek Dox Agar* (Himedia®).

Para fermentação e obtenção da biomassa, o fungo foi inoculado em tubos de ensaio contendo meio Batata Dextrose Ágar (BDA) (KASVI®), incubados a 30°C durante 120 horas. Após completamente esporulados, os esporos foram ressuspensos em uma solução contendo 5ml de salina (0,9%) estéril e 20µL de *Tween* 80, e inoculados em frascos de 250ml contendo 90ml de caldo glicosado (10g/L de extrato de carne, 3g/L de peptona e 20g/L de glicose), na concentração de 10⁴ UFC/mL, incubados a 30°C em agitação (120 RPM) durante 96 horas.

Processo de descoloração

Para esse processo, a biomassa obtida foi lavada e seca em bomba a vácuo, para estimar o peso seco de 1g, 4g e 8g. Essa biomassa foi colocada em frascos de 250 mL, posteriormente hidratada em 90mL de água deionizada e colocada em agitação (120 RPM) durante 15min. Foram adicionados então, 10mL do corante preparado e colocados em agitação (120 RPM). O processo foi monitorado durante 120 min, numa cinética observada a cada 15min, em triplicata. As alíquotas, retiradas durante os processos foram centrifugadas a 12000 RPM durante 5 minutos e o sobrenadante analisado por espectrofotometria UV-VIS de onda simples no comprimento de máxima absorbância do corante (627nm), e os resultados apresentados em porcentagem, segundo a fórmula de Govindwar e colaboradores (2014):

Onde, $Descoloração (\%) = (Absorbância\ inicial - Absorbância\ observada) / Absorbância\ inicial \times 100$

Curva de calibração do corante e determinação da capacidade de sorção dos micélios

Para determinar a concentração final após a descoloração foi construída uma curva de calibração do corante de zero a 50 mg/L, analisada em espectrofotometria UV-VIS conforme o comprimento de máxima absorbância do corante. Para determinar a capacidade adsorptiva da biomassa dos fungos foi utilizada metodologia adaptada de Santhi e colaboradores (2009), conforme a equação: $q = (C_0 - C_f)V/W$, onde q expressa a quantidade de corante adsorvido pelo biosorvente (mg/g), C₀ é a concentração inicial do corante (mg/L), C_f a concentração final do corante (mg/L), V o volume da solução de corante (L) e W o peso do biosorvente utilizado (g).

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

A fermentação submersa permite aos fungos filamentosos, sobretudo fungos do gênero *Aspergillus* uma formação de *pellets* de micélio que favorecem o processo adsorptivo, chamado ainda de biossorção. Em geral, a adsorção ocorre por interações entre a molécula do corante e a parede celular do fungo, assim, a quantidade de biomassa influi na razão superfície/volume e consequentemente no tempo de descoloração do corante em solução (Vijayaraghavan e Yun, 2007).

A porcentagem de descoloração observada foi aumentada em relação ao tempo e a quantidade de biomassa utilizada (Fig. 1). Onde foi possível obter 69% de descoloração do corante nos primeiros 15 min com apenas 1g de biomassa viva do fungo *Aspergillus* sp. URM 5741, bem como 92% com 4 g de biomassa e 98% com 8 g. Em todos os casos, foi possível observar uma porcentagem de descoloração maior que 60%, em curto período de tempo. Uma eficiência similar foi observada no trabalho de Almeida e Corso (2019), na descoloração de um composto dos corantes *Acid Blue 161* e *Procion Red MX-5B* que utilizou 5 g da biomassa viva de *A. niger*, com um monitoramento de 180 min, onde chegou a descoloração máxima.

Ainda em relação a concentração de biomassa e capacidade de descoloração, o corante Reactive Red 31 foi descolorido por *Aspergillus bombycis*, onde a máxima descoloração foi atingida pela amostra contendo 12 g de biomassa fúngica (99,58%), mas ótimos resultados também foram encontrados utilizando 10 g e 8 g

apresentando respectivamente 99,37% e 98,18% em um período de 12 horas com o corante na concentração de 20 mg/L (Khan e

Fulekar, 2017). Entretanto ao comparar com o presente estudo, observa-se uma melhor eficiência da cepa *Aspergillus* sp. URM 5741 que descoloriu de forma máxima o corante (50 mg/L) com 8 g de biomassa em apenas 2 horas.

Figura 1 - Taxa em porcentagem de descoloração, em relação ao tempo do processo, utilizando diferentes quantidades de biomassa.

Fonte: Próprio autor.

Diversas espécies do gênero *Aspergillus* já foram estudadas em processos de descoloração, na Tabela 1. Podem ser verificados dados relativos a outros estudos demonstrando a relação da concentração do corante com o tempo da descoloração, onde a eficiência varia de acordo com a concentração do corante, porém ao comparar com o presente estudo, todos os demais trabalhos apresentam uma distinta eficiência de acordo com a cinética, pois todos os trabalhos levaram no mínimo 24 horas para o processo de descoloração.

Tabela 1. Descoloração de corantes sintéticos por diferentes espécies de *Aspergillus*

Microrganismo	Corante	Concentração do corante (mg/L)	Tempo	Taxa de descoloração	Referências
<i>A. flavus</i>	Reactive Red 198	50 mg/L	24 horas	99,11%	Esmaili e Kalantari (2011)
<i>A. flavus</i> A5p1	Direct Blue 71 Direct Blue 86 Reactive Blue 19	1000 mg/L 1000 mg/L 500 mg/L	8 dias	75,8% 89,8% 72,5%	Ning <i>et al</i> (2018)
<i>A. allhabadii</i> <i>A. sulphureus</i> <i>A.s niger</i>	Reactive Blue MR	200 mg/l	10 dias	95,13% 93,01% 82,62%	Namdkari <i>et al</i> (2012)
<i>A. sp.</i> URM 5741	78GR Turquesa (Corafix)	50 mg/L	2 horas	100%	Presente estudo

Fonte: Próprio autor.

Na presente investigação a descoloração máxima foi atingida em 120 min com 8 g de biomassa, chegou, também nesse tempo, a 99% com 4 g, no entanto ao calcular uma previsão linear com base nos valores da equação linear média (y) e R^2 nota-se que a previsão indica uma descoloração máxima em aproximadamente 114 min. Essa diferença de eficiência entre a previsão e o resultado obtido, ocorreu possivelmente, por mesmo após a centrifugação, partículas de micélio interferirem nas leituras de

absorbância. Isso é verificado através da uniformidade dos dados, calculada pelo desvio padrão (DP) entre as absorbâncias, onde para o corante bruto o DP observado foi de 0,007, enquanto ao aproximar-se do período entre 60-90 minutos, aumenta exponencialmente de forma a apresentar os seguintes DPs: 0,026 em 60min, 0,033 em 75min e 0,061 em 90min.

Quando analisada a capacidade adsorptiva da biomassa é possível notar que a mesma diminui à medida que se aumenta a biomassa utilizada (Fig. 2). O mesmo foi observado por Almeida e Corso (2019), que observam que apesar da descoloração ter sido mais rápida e eficiente com o aumento da massa do biosorvente, há uma diminuição da capacidade de sorção dos *pellets* do fungo, possivelmente ocorrendo pela diminuição da superfície de contato da biomassa com o meio, por não permitir a descompactação das hifas. É possível ainda, relacionar esse efeito a maior disponibilidade de superfície de contato, que faz com que rapidamente o corante se fixe a *pellets* diferentes, fazendo com que não se utilize totalmente a capacidade da biomassa, isso fica claro quando observado que nos primeiros 15 min a concentração do corante no meio era apenas de 1,6 mg/L no tratamento com 8 g, enquanto apresentou 26,3 mg/L no tratamento com 1g.

Figura 2: Capacidade de adsorção da biomassa do fungo *Aspergillus* sp. URM 5741

Fonte: Próprio autor.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a problemática atual relacionada ao descarte inadequado de corantes sintéticos nos corpos hídricos, e com o elevado custo dos métodos químicos e físicos, a biorremediação surge como uma vantajosa alternativa. A partir deste estudo foi possível constatar que, a cepa

Aspergillus sp. URM 5741 possui a habilidade em descolorir o corante têxtil 78GR Turquesa (Corafix), mesmo em pequenas quantidades de biomassa, como foi constatado no experimento contendo apenas 1 g, além de ter demonstrado máxima descoloração, durante o processo de apenas 2 horas na utilização de 4 e 8 g de biomassa. Mesmo tendo obtido os promissores resultados, entende-se que ainda são necessários mais estudos a fim de verificar possíveis condições que possam favorecer o processo de descoloração, como temperatura, pH e tempo, além de realizar demais experimentos utilizando diversos tipos de corante verificando assim a possibilidade de descoloração pela cepa fúngica em questão.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Programa Institucional de Bolsas em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico (CNPq) e a Universidade Federal Rural de Pernambuco, pelo auxílio financeiro, assim como ao Laboratório de Tecnologia de Bioativos (LABTECBIO), pelo suporte com os equipamentos.

REFERÊNCIAS

- [1] Almeida, E. J. R.; Corso, Decolorization and removal of toxicity of textile azo dyes using fungal biomass pelletized. *International Journal of Environmental Science and Technology*. v. 16, n. 3, p. 1319- 1328, 2019
- [2] Ameen, F.; Alshehrei, F. Biodegradation optimization and metabolite elucidation of Reactive Red 120 by four different *Aspergillus* species isolated from soil contaminated with industrial effluent. *Annals of microbiology*, v. 67, n. 4, p. 303-312, 2017.
- [3] Asgher, M. *et al.* Enhanced decolorization of Solar brilliant red 80 textile dye by an indigenous white rot fungus *Schizophyllum commune* IBL-06. *Saudi journal of biological sciences*, v. 20, n. 4, p. 347-352, 2013.
- [4] Dewi, R. S.; *et al.* Bioremediation of Indigosol Blue 04B Batik Effluent by Indigenous Fungal Isolates, *Aspergillus* spp. *Omni-Akuatika*, v. 14, n. 2, p. 11-20, 2018.
- [5] Dharajiya, D.; Shah, M.; Bajpai, B. Decolorization of Simulated Textile Effluent by *Phanerochaete chrysosporium* and *Aspergillus fumigatus* A23. *Nature Environment & Pollution Technology*, v. 15, n. 3, 2016.
- [6] EL-Rahim, W. M. A. *et al.* Optimization of conditions for decolorization of azo-based textile dyes by multiple fungal species. *Journal of biotechnology*, v. 260, p. 11-17, 2017.
- [7] Esmaeili, A.; Kalantari, M. Bioremoval of an azo textile dye, Reactive Red 198, by *Aspergillus flavus*. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*, v. 28, n. 3, p. 1125-1131, 2012.
- [8] Faryal, R. A. N. I.; Hameed, A. Isolation and characterization of various fungal strains from textile effluent for their use in bioremediation. *Pakistan Journal of Botany*, v. 37, n. 4, p. 1003-1008, 2005.
- [9] Garg, S. K.; Tripathi, M. Microbial strategies for discoloration and detoxification of azo dyes from textile effluents. *Research Journal Microbiology*, v. 12, p. 1-19, 2017.
- [10] Govindwar, S. P. *et al.* Decolorization and degradation of xenobiotic azo dye Reactive Yellow-84A and textile effluent by *Galactomyces geotrichum*. *Chemosphere*, v. 109, p. 234238, 2014.
- [11] Gül, Ü. D.; Dönmez, G. Effects of dodecyl trimethyl ammonium bromide surfactant on decolorization of Remazol Blue by a living *Aspergillus versicolor* strain. *Journal of Surfactants and Detergents*, v. 15, n. 6, p. 797-803, 2012.
- [12] Karim, M. E.; Dhar, K.; Hossain, M. T. Co-metabolic decolorization of a textile reactive dye by *Aspergillus fumigatus*. *International journal of environmental science and technology*, v. 14, n. 1, p. 177-186, 2017.
- [13] Khan, R.; Fulekar, M. H. Mineralization of a sulfonated textile dye Reactive Red 31 from simulated wastewater using pellets of *Aspergillus bombycis*. *Bioresources and Bioprocessing*, v. 4, n. 23, 2017.
- [14] Kumar, C. G., Mongolla, P., Joseph, J., Sarma, V. U. M. Decolorization and biodegradation of triphenylmethane dye, brilliant green, by *Aspergillus* sp. isolated from Ladakh, India.
- [15] Maganha de Almeida, A. C.; Backhaus, J.; Corso, C. R. Recycling food waste to clean water: the use of a biodigester's residual liquid inoculum (RLI) to decolourise textile azo dyes. *Water Science and Technology*. v. 77, n. 2, p. 398-408, 2018.
- [16] Manage, P. M. Decolorization of CI Direct Blue 201 Textile dye by native bacteria. *International Journal of Multidisciplinary Studies*. v. 4, n. 1, 2017.
- [17] Namdhari, B. S. *et al.* Decolorization of reactive blue MR, using *Aspergillus* species isolated from textile waste water. *ISCA J Biol Sci*, v. 1, n. 1, p. 24-29, 2012.
- [18] Ning, C. *et al.* Decolorization of a variety of dyes by *Aspergillus flavus* A5p1. *Bioprocess and Biosystems Engineering*. v. 41, n. 4, p. 511-518, 2018.
- [19] Olufunke, F. O. T. *et al.* Isolation, characterization and decolorization of textile dyes by fungal isolates from textile effluents. *International Journal of Biological Research*. v. 4, n.1, p. 46-51. 2016.
- [20] *Process Biochemistry* 47 (2012) 1388–1394.
- [21] Przysaś, W.; Zabłocka-Godlewska, E.; Grabińska-Sota, E. Efficiency of decolorization of different dyes using fungal biomass immobilized on different solid supports. *Brazilian Journal of Microbiology*, v. 49, n. 2, p. 285-295, 2018.
- [22] Rani, B. *et al.* Bioremediation of dyes by fungi isolated from contaminated dye effluent sites for bio-usability. *Brazilian Journal of Microbiology*, v. 45, n. 3, p. 1055-1063, 2014.
- [23] Santhi, T. *et al.* Uptake of cationic dyes from aqueous solution by bioadsorption onto granular *Cucumis sativa*. *Journal of Applied Sciences in Environmental Sanitation*, v. 4, n. 1, p. 29-35, 2009.
- [24] Santos, E. M. A. *et al.* Anaerobic reactor type UASB conjunction with process Fenton to remove color and chemical oxygen demand textile industry of synthetic wastewater. *Engenharia Sanitaria e Ambiental*, v. 22, n. 2, p. 285-292, 2017.

[25] Singh, A. *et al.* Decolorization of Reactive Yellow 17 Dye Using *Aspergillus tamarii*. Environmental Pollution. v. 77, p. 309- 316, 2018.

[26] Telke, A. A. *et al.* Biochemical characterization and potential for textile dye degradation of blue laccase from *Aspergillus ochraceus* Ncim-1146. Biotechnology and Bioprocess Engineering, v. 15, n. 4, 2010.

[27] Vijayaraghavan, K.; Yun, Yeoung-Sang. Utilization of fermentation waste (*Corynebacterium glutamicum*) for biosorption of Reactive Black 5 from aqueous solution. Journal of Hazardous Materials, v. 141, n. 1, p. 45-52, 2007.

Capítulo 21

Influência dos parâmetros de deposição e do tratamento superficial dos substratos nas propriedades ópticas e morfológicas de revestimentos absorvedores a base de cromo

Tiago Oliveira de Belmont Fonseca

Kelly Cristiane Gomes

Gabriela Oliveira Galvão

Ronny Peterson da Nobrega Goncalves

Aline da Silva Oliveira

Resumo: As fontes de energia não renováveis são as fontes energéticas mais utilizadas atualmente, o que contribui para o aumento do efeito estufa no planeta. Neste sentido, as energias renováveis se mostram como alternativas às fontes convencionais, com destaque para a energia solar. Uma das formas de aproveitamento desta energia é a energia solar térmica, onde a radiação é utilizada para o aquecimento de fluidos, através das tecnologias de concentração solar ou em coletores solares planos para o aquecimento de água até médias temperaturas. Nestes equipamentos um dispositivo utilizado para otimizar sua eficiência são Superfície Solar Seletiva ou SSS. Este trabalho tem como objetivo avaliar a influência dos parâmetros de eletrodeposição e do tratamento superficial dos substratos utilizados nas propriedades ópticas e morfológicas de revestimentos absorvedores a base de cromo. Desta forma, foram realizados dois tipos de tratamentos superficiais em substratos de aço inoxidável AISI 304 (limpeza por hexano e tratamento mecânico via lixamento), bem como foram utilizados dois tipos de banhos eletrolíticos (B1 e B2) a base de cromo, variando o tempo de eletrodeposição (60, 120 e 300 s). Os revestimentos produzidos foram caracterizados pelas técnicas de Espectroscopia no UV-Vis-NIR, Perfilometria Óptica e Microscopia Eletrônica de Varredura. Os resultados das caracterizações, óptica e morfológica, mostraram que o tempo de deposição e o tipo de banho eletrolítico utilizado apresenta grande influência nos percentuais de absorvância dos revestimentos, onde foi observado que tempos de deposição de 120 s são mais viáveis em termos de economia e propriedades ópticas, bem como o banho tipo 2 apresentou os melhores resultados com percentuais de absorvância, na ordem de 97%. Foram observados ainda que o banho promoveu uma morfologia que possibilitou o fenômeno de armadilhas ópticas favorecendo uma rugosidade mais adequada para a absorção solar. Ao final do trabalho, observou-se que os melhores revestimentos produzidos, em termos de economia e propriedades ópticas, foram os Filmes F8 e F9.

Palavras-chave: Tratamento superficial, Morfologia, Rugosidade, Superfície solar seletiva.

1. INTRODUÇÃO

As fontes renováveis de energia são um assunto primordial para o mundo devido a demanda energética crescente de toda a sociedade. Tendo em vista que o grande consumo energético associado a falta de investimento no setor e ao consumo indiscriminado dos combustíveis fósseis podem culminar em um desabastecimento de energia que atingirá toda a sociedade, as energias renováveis vêm ganhado espaço no setor energético pela sua diversidade, sustentabilidade e capacidade de geração de energia com menor agressão ao meio ambiente (COSTA; PRATES, 2005; VILLALVA; GAZOLI, 2012).

A energia solar térmica ou conversão solar térmica, entre os meios de produção energética, vem recebendo grande destaque devido tanto a sua aplicação no aquecimento de fluídos, bem como para a geração de eletricidade, através da utilização de sistemas solares térmicos - SST (GOLDEMBERG, 2012; MEDEIROS, 2016; GOMES et al., 2017). No entanto, uma das limitações destes dispositivos refere-se a sua estabilidade nas temperaturas de trabalho acima de 100 °C.

Neste sentido, visando minimizar as limitações dos sistemas solares térmicos são aplicados revestimentos absorvedores denominados de Superfície Seletiva Solar (SSS) que apresentam propriedades seletivas, ou seja, que possuem a função principal de aumentar a eficiência de absorção da radiação solar e minimizar as perdas térmicas, sendo estes revestimentos (GOMES, 2001).

As SSS são produzidas através de diversas técnicas de obtenção, tais como: Sol-gel, Magnetron Sputtering, Deposição química por vapor, Evaporação pirolise, Pintura, Eletrodeposição, entre outros (KENNEDY, 2002; MEDEIROS et al., 2019). Devido a sua versatilidade, baixo custo e obtenção de grandes áreas de deposição simultânea, a formação de revestimento metálico com elevada aderência e propriedades físico-químicas de grande interesse a seletividade solar, entre outros, a Eletrodeposição (processo de deposição eletroquímica) é uma das técnicas com maior emprego para a obtenção das SSS (WINDOW; RITCHIE; CATHRO, 1978; AGUILAR et al., 2003; DARYABEGY e MAHMOODPOOR, 2006; PECEQUILO; PANOSSIAN, 2010; MEDEIROS et al., 2019).

Dentre os vários parâmetros adotados na técnica de eletrodeposição que podem influenciar o desempenho da SSS, destacam-se: o tipo de limpeza do substrato, a rugosidade dos substratos, o tempo de eletrodeposição, o tipo de banho eletrolítico utilizado, entre outros (LAMPERT e WASHBURN, 1979; SMITH; TEYTZ; HILLERY, 1983; SMITH; MCPHEDRAN; DERRICK, 1985; BHOWMIK et al., 2001; MOISE; CLOOTS; RULMONT, 2001; AGUILAR et al., 2003; JAFARI; ROZATI, 2011; PIRATELLI FILHO, 2011; PROTSENKO et al., 2011; CAO et al., 2014; GOMES et al., 2017; SHEU et al., 2016).

Outro parâmetro de grande relevância é o tipo de material utilizado na obtenção das SSS. A Tabela 1 apresenta os principais tipos de materiais depositados através de várias técnicas, assim como os tipos de substratos utilizados e os níveis de absortância e emitância normalmente atingidos.

Tabela 1. Métodos de fabricação de superfície seletiva solar. Adaptado de Kennedy (2002).

Material	Substrato	Processo de fabricação	Absortância (%)	Emitância a 100°C (%)
CuFeMnO ₄ /silica	Vidro Si	Sol-gel	60	29-39
NiCrOx	Aço	Sputtering	80	14
Cr, Fe, Mo, SS, Ta, Ti, W	Cu	DC Sputtering	84-90	3,5-6
Ge Si	Cu Aço	Pintura	91 83	7 7
Cr:SiO ₂	Cu Al	DC (<i>Direct Current</i>) Sputtering	90-96	3-14
Cromo negro	Cu Aço	Eletrodeposição	97	9

Nesta pesquisa optou-se pelo emprego da técnica de Eletrodeposição e a utilização do cromo como material seletivo absorvedor, em virtude, especialmente, das propriedades ópticas (absortância e emitância) das SSS obtidas, de acordo com o exposto nas referências.

Neste sentido, neste trabalho serão avaliados a influência dos parâmetros de deposição (tempo de deposição e tipo de banho eletrolítico) e do tratamento superficial dos substratos que receberão o revestimento absorvedor, correlacionando os mesmos com a absortância e morfologia dos filmes obtidos.

2. METODOLOGIA

Para concretizar o objetivo da pesquisa, foi estabelecido o programa experimental descrito a seguir: I) Determinação dos parâmetros de deposição; II) Preparo dos banhos eletrolíticos; III) Tratamento Superficial dos Substratos; IV) Obtenção dos filmes absorvedores; e v) Caracterização óptica e morfológica.

2.1. DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DE DEPOSIÇÃO

Para a eletrodeposição foi utilizado um eletrodo inerte de Pb-Sb (95-5%) conectado ao polo positivo (ânodo), enquanto o substrato foi conectado ao polo negativo (cátodo) da fonte de alimentação, tendo os mesmos sido imersos nos banhos eletrolíticos propostos no trabalho. A corrente do sistema foi oriunda de uma fonte de tensão da marca Agilent modelo E3631A. Para a realização do experimento foram mantidas fixas uma corrente de 5A e distância de trabalho de 15 mm com base nos trabalhos de Medeiros et al. (2019). A variação de tempo (60, 120 e 300 s) de deposição teve como objetivo determinar as melhores condições de realização do processo para obtenção de filmes mais absorvedores.

2.2. PREPARO DOS BANHOS ELETROLÍTICOS

Foram utilizados dois tipos de banhos eletrolíticos de cromo com o objetivo de avaliar a influência dos mesmos nas propriedades ópticas e morfológicas dos filmes produzidos. O banho 1 (B1), foi baseado nos trabalhos de Daryabegy e Mahmoodpoor (2006) e o banho 2 (B2) foi baseado nos trabalhos de Aguilar et al. (2003). A Tabela 2 apresenta a composição química de cada tipo de banho.

Tabela 2. Composição Química dos Banhos Eletrolíticos utilizados neste trabalho.

Tipo de Banho	Reagentes e quantitativos	Referência
B1	700 ml de água destilada 247 g/L de Trióxido de Cromo (CrO_3) 0,854 g/L de Ácido hexafluorossilícico (H_2SiF_6)	Daryabegy e Mahmoodpoor (2006)
B2	400 ml de água destilada 364 g/L de Trióxido de Cromo (CrO_3) 1,8 ml/L de Ácido hexafluorossilícico (H_2SiF_6) 9,1 g/L de Carbonato de Bário (BaCO_3) 2,3 g/L de Nitrato de Potássio (KNO_3)	Aguilar et al. (2003)

2.3. TRATAMENTO SUPERFICIAL DOS SUBSTRATOS

Foram utilizados substratos de aço inoxidável AISI 304 com dimensões de 30 x 30 mm e que passaram por dois tipos de tratamentos superficiais, sendo parte submetidos a limpeza desengordurante com hexano (LH) durante 15 min e posterior lavagem em água destilada, seguido de banho ultrassônico por 15 min em uma solução de álcool isopropílico, de acordo com a metodologia de Vilela (1985) e outra parte submetida a processos mecânicos de lixamento (TM), sendo utilizado uma lixa de 400 mesh, conforme os trabalhos de Axelbaum e Brandt (1987) e Quintana e Sebastian (1994). O procedimento de lixamento foi realizado em uma politriz lixadeira de velocidade variável (PVV) da marca Teclago, tendo os substratos sido lixados com uma rotação de 100 rpm durante 1 min em sua posição vertical e em seguida rotacionados a 90° e submetidos novamente a 1 min de lixamento. Após esse procedimento, os substratos foram embebidos em álcool isopropílico e realizado banho ultrassônico durante 15 min a fim de eliminar quaisquer impurezas que viessem a influenciar nos resultados.

A Tabela 3 apresenta a nomenclatura adotada para as amostras após a determinação dos parâmetros de deposição, o preparo dos banhos eletrolíticos e o tratamento superficial dos substratos.

Tabela 3. Nomenclatura adotada para as amostras e os parâmetros de eletrodeposição.

Amostras	Banho eletrolítico	Tratamento Superficial do Substrato	Corrente (A)	Distância eletrodos (mm)	Tempo de eletrodeposição (seg)
F1	B1	LH	5	15	60
F2					120
F3					300
F4		TM			60
F5					120
F6					300
F7	B2	LH			60
F8					120
F9					300
F10		TM			60
F11					120
F12					300

A fim de garantir a confiabilidade dos resultados finais das análises aos quais os filmes foram submetidos, foram realizadas réplicas e tréplicas de cada condição de amostra. Em todas as amostras foi utilizada a metodologia de “batente”, na qual somente uma parte do substrato sofre deposição. Essa metodologia foi empregada com o objetivo de proporcionar a determinação da espessura do filme e pode ser observada na Figura 2.

Figura 2. Metodologia da construção de batente: (A) Substrato antes do tratamento mecânico; (B) Após tratamento mecânico e com batente; (C) Substrato eletrodepositado com batente.

2.4. CARACTERIZAÇÃO DOS FILMES PRODUZIDOS

As medidas de absorvância e refletividade dos revestimentos foram acessadas pela Espectrofotometria de UV-Vis-NIR operando na região de 220 nm a 1400 nm, utilizando o acessório de esfera de integração em espectrofotômetro da Shimadzu, modelo UV-2600. A rugosidade e espessura dos filmes foram obtidas pela Perfilometria Óptica com o auxílio de um perfilômetro óptico sem contato modelo CCI MP, fabricado pela Taylor Hobson. A análise morfológica dos filmes foi realizada em Microscópio Eletrônico de Varredura LEO1430. A amostra foi metalizada de modo a promover uma melhor visualização de sua morfologia.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. ESPECTROSCOPIA DE UV-VIS-NIR

A Figura 3 apresenta a distribuição espectral dos percentuais de absorvância para os filmes produzidos neste trabalho, bem como a média de absorvância e desvio padrão dos mesmos.

Figura 3. Espectro da absorvância dos Filmes produzidos e média de absorvância.

Pela Figura 3(a) pode-se observar que os filmes F8, F9, F11 e F12 (os dois primeiros do tratamento com limpeza com hexano e os dois últimos com o tratamento mecânico) apresentaram os melhores resultados de percentuais de absorvâncias e apresentaram os menores valores de desvio padrão (Fig. 3b). Observa-se ainda que os tempos de 120 e 300 s promoveram melhores resultados de absorvância para esses tratamentos, destacando-se um incremento na absorvância de 60 s para 120 s, bem como de 120 s para 300s. Estes resultados também foram observados por Lee et al. (2000) e Lee (2007), que analisou as características ópticas de superfícies solares de cromo negro.

Pela Figura 3b pode-se observar que os Filmes F8 e F9 apresentaram as maiores absorvâncias médias, na ordem de 97%, bem como os Filmes F11 e F12. Contudo os dois primeiros filmes (tratamento com hexano) apresentaram os menores percentuais de desvio padrão, que foram na ordem de $\pm 0.1\%$.

Analisando a influência do tipo de banho eletrolítico, pode-se observar na Figura 4, que o Banho 2 promoveu melhores resultados de absorvância, independente do tipo de tratamento superficial dos substratos, bem como do tempo de deposição.

Figura 4. Influência do tipo de banho eletrolítico nos percentuais de absorvâncias dos filmes produzidos.

3.2. PERFILOMETRIA ÓPTICA

A Tabela 4 apresenta os valores dos parâmetros de rugosidade R_p , R_v e dos filmes eletrodepositados, bem como as espessuras dos mesmos e os valores de absorptância observados para cada filme produzido.

Tabela 4. Relação entre os parâmetros de Rugosidade, as espessuras dos filmes e os valores de percentuais de absorptância com desvio padrão observados.

Amostras	Ra (μm)	Rv (μm)	Rp (μm)	Espessura (μm)	Absortância Média (%)	Desvio Padrão (%)
F1	0,114	0,422	0,411	0,785	87,67	1,64
F2	0,150	0,848	0,623	-	90,00	3,01
F3	0,348	0,917	1,588	1,247	84,23	2,79
F4	0,222	0,814	0,897	-	89,26	1,57
F5	0,151	0,659	0,758	0,737	88,84	5,53
F6	0,471	1,808	1,975	-	89,68	1,78
F7	0,434	1,900	2,048	-	93,92	3,79
F8	0,477	1,888	1,833	-	97,17	0,07
F9	0,462	1,466	1,411	2,207	97,28	0,10
F10	0,233	1,079	0,886	-	92,12	3,88
F11	0,285	1,348	1,404	3,263	96,88	0,44
F12	0,409	1,598	1,713	8,333	97,09	0,23

R_p (máxima altura de pico do perfil da rugosidade); R_v (máxima profundidade de vale do perfil da rugosidade); R_a (desvio médio aritmético do perfil da rugosidade)

Pode-se observar pela Tabela 4 um incremento nos valores de rugosidade dos filmes produzidos com o aumento do tempo de eletrodeposição independente do tipo de tratamento superficial adotado. Estes resultados foram observado por Window, Rirchie e Cathro (1978) que avaliaram o crescimento dos valores do parâmetro R_a com o aumento do tempo de deposição na obtenção de SSS de cromo negro em substratos de metal polido com valores de R_a na ordem de $0,12 \mu\text{m}$ para filmes eletrodepositados por 55 segundos, e que estão compatíveis com os observados neste trabalho. Pode-se observar, que quando comparado os tipos de banhos, o B2 apresentou os maiores valores de rugosidades médias, bem como os maiores percentuais de absorptâncias, evidenciando que a composição química do banho afeta o tipo de morfologia dos filmes produzidos. Isto está evidenciado na Figura 5, quando analisado o comportamento dos filmes em função do parâmetro R_a e sua absorptividade

Figura 5. Relação entre a Rugosidade média e a Absortância dos filmes produzidos.

Analisando o tipo de tratamento, observou-se que o Tratamento Mecânico (TM) não apresentou relevância significativa nos perfis de rugosidades dos filmes produzidos, onde foram observados valores de rugosidade semelhantes para ambos os tipos de banhos. Isto pode está relacionado, tanto a granulometria utilizada para a realização do lixamento, quanto ao tempo empregado no mesmo, e que podem não ter sido os mais adequados.

Já quando analisado os resultados obtidos para o tratamento a base de hexano, o mesmo sofreu influência do tipo de banho eletrolítico, apresentando uma maior interação com este, e produzindo rugosidades com valores variando entre 0,11 a 0,48 μm .

A Figura 6 exibe a microestrutura em 3D dos Filmes F5 e F9, onde é possível notar que a morfologia dos filmes apresenta grande influência nos percentuais de absortância obtidas. Segundo Cuomo et al. (1975), uma superfície constituída por uma rigorosa floresta de agulhas alinhadas com diâmetros de mesma dimensão que o comprimento de onda da luz visível e com distanciamento da ordem de muitos comprimentos de onda permite a absorção com elevada eficiência em função das múltiplas reflexões à proporção que os fótons penetram o labirinto de agulhas. Dessa maneira, observando a Figura 5, é possível constatar que o aumento dos parâmetros R_p , R_v e R_a podem ter promovido essa construção de “labirinto de agulhas” que favoreceu a absorção.

Figura 6. Perfilometria de superfície dos filmes eletrodepositados F5 e F9.

3.3. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA

A Figura 7 apresenta a morfologia dos filmes F5 e F11, onde percebe-se que apesar da sua morfologia apresenta algumas semelhanças, em termos de se tratar de uma estrutura microfissurada ao longo da sua superfície, conforme observados em trabalhos semelhantes (MEDEIROS et al., 2019).

Figura 7. Micrografias dos filmes F5 e F11, eletrodepositados com os banhos B1 e B2, respectivamente.

Contudo, observa-se que o filme F5 oriundo do banho B1, apresenta uma morfologia superficial mais lisa, quando comparado ao filme F11 que apresenta ao longo da sua superfície numerosos cristais lamelares homogêneos, que podem ter vindo a contribuir para a elevada absorptância do filme.

O fenômeno de armadilhas ópticas, no qual as múltiplas reflexões da radiação incidente aumentam a probabilidade de absorção é outro fator relevante que pode ter tido um papel importante para o elevado percentual de absorptância do filme F11. Esta mesma morfologia do filme F11 foi observada por Aguilar et al. (2003) trabalhando com filmes absorvedores a base de cromo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As SSS a base de cromo produzidas, nestre trabalho, apresentaram potencial uso de aplicação em como revestimento seletivo de coletores solares, em função dos altos níveis de absorptâncias obtidos.

As SSS obtidas pelo banho B2 apresentaram melhores propriedades ópticas, em termos de absorptância, e menores desvios em relação aos filmes obtidos através do banho 1.

Em relação aos tratamentos superficiais do substrato percebe-se que o tratamento com hexano mostrou-se ligeiramente mais eficaz que o tratamento mecânico em termos de apresentarem menores desvio padrão nos percentuais de absorptância, se tratando de um tratamento mais homogêneo.

O tempo de eletrodeposição de 120 s mostrou-se o mais viável para a produção comercial desses revestimentos, uma vez que apresentou resultados tão satisfatórios quanto o tempo de 300 s, porém com uma maior economia de recursos energéticos. Esses parâmetros também proporcionaram os menores desvios padrão, evidenciando assim a homogeneidade das propriedades dos filmes obtidos pelo processo de eletrodeposição.

As SSS que apresentaram morfologia mais rugosas, ou seja, com os maiores valores dos parâmetros Ra, Rv e Rp, foram também aqueles que promoveram os melhores valores de absorptância, provenientes dos “labirintos de agulhas” que aprisionam a radiação em suas estruturas.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o suporte técnico dos Laboratórios de Síntese e Caracterização de Filmes Finos (LabFilm), Tecnologia de Novos Materiais (TECNOM) e Laboratório Integrado de Biomateriais (LABIO) da UFPB. Agradecem ainda às instituições brasileiras de fomento CAPES e CNPq pelo suporte financeiro no desenvolvimento do trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] Aguilar, M.; Barrera, E.; Palomar-Pardavé, M.; Huerta, L.; Muhl, S. Characterization of black and white chromium electrodeposition films: surface and optical properties. *Journal of non-crystalline solids*, v. 329, n. 1-3, p. 31-38, 2003.
- [2] Axelbaum, R.L.; Brandt, H. The effect of substrate surface preparation on the optical properties of a black chrome solar absorber coating. *Solar Energy*, vol. 39, n.3, pp. 233-241, 1987
- [3] Bhowmik, N.C.; Rahman, J.; Khan, M.A.; Mazumder, Z.H. Preparation of selective surfaces and determination of optimum thickness for maximum selectivity. *Renewable energy*, v.24, n.3-4, p.663-666, 2001.
- [4] Cao, F.; Mcenaney, K.; Chen, G.; Ren, Z. A review of cermet-based spectrally selective solar absorbers. *Energy & Environmental Science*, v. 7, n. 5, p. 1615-1627, 2014.
- [5] Costa, R.C.; Prates, C.P.T. O Papel das Fontes Renováveis de Energia no Desenvolvimento do Setor Energético e Barreiras à sua Penetração no Mercado. BNDES Setorial, RJ, n.21, p. 5-30, 2005.
- [6] Cuomo, J.J.; Ziegler, J.F.; Woodall, J.M. A new concept for solar energy thermal conversion. *Applied Physics Letters*, v. 26, n. 10, p. 557-559, 1975.
- [7] Daryabegy, M.; Mahmoodpoor, A.R. Method of manufacturing absorbing layers on copper for solar applications (I). *IESCO Jour. of Science and Technology*, v.2, n.1, p.35-39, 2006.
- [8] Goldemberg, J.; Lucon, O. *Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2011.

- [9] Gomes, C.A.S. Estudo Comparativo de Superfícies Seletivas para Coletores Solares. 2001. Dissertação (Mestrado Eng. e Ciências de Materiais) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2001.
- [10] Gomes, K.C.; Medeiros, I.D.M.; Galvão, G.O.; Leite, K.S.; Silva, A.K.B. Avaliação das características da cinza do bagaço da cana-de-açúcar obtida por moagem de alta energia. *Revista InterScientia*, v.5, n.2, p. 39-50, 2017.
- [11] Jafari, S.; Rozati, S.M. Characterization of black chrome films prepared by electroplating technique. In: *World Renewable Energy Congress-Sweden*; 8-13 May; 2011; Linköping; Sweden. Linköping University Electronic Press, p. 3999-4005, 2011.
- [12] Kennedy, C.E. Review of mid-to high-temperature solar selective absorber materials. *National Renewable Energy Lab.*, Golden, 2002.
- [13] Lampert, C.M.; Washburn, J. Microstructure and optical properties of black chrome before and after exposure to high temperatures. In: *Second Annual Conference on Absorber Surfaces for Solar Receivers*, 1979.
- [14] Lee, K.D.; Jung, W.C.; Kim, J.H. Thermal degradation of black chrome coatings. *Solar energy materials and solar cells*, v. 63, n. 2, p. 125-137, 2000.
- [15] Lee, K.D. Preparation and characterization of black chrome solar selective coatings. *Journal of Korean Physical Society*, v. 51, p. 135, 2007.
- [16] Medeiros, I.D.M. Superfícies seletivas a base de polímeros inorgânicos para coletores solares de média e alta temperatura. 2016. Dissertação (Mestrado em Energias Renováveis) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016.
- [17] Medeiros, I.D.M.; Gomes, K.C.; Gonçalves, R.P.N., Galvão, G.O. Selective solar surface solar based on black chromium: influence of electrodeposition parameters in the absorption of surfaces. *Materials Research*, v.22, n.2, 2019.
- [18] Moise, V.; Cloots, R.; Rulmont, A. Study of the electrochemical synthesis of selective black coatings absorbing solar energy. *Intern. Jour. Inorganic Materials*, v. 3, n. 8, p. 1323-1329, 2001.
- [19] Pecequillo, C.V.; Panossian, Z. Estudo do mecanismo de eletrodeposição do cobre a partir do HEDP por meio da técnica eletroquímica de medição do potencial de circuito aberto. In: *Congresso Brasileiro de Corrosão*, 2010, Fortaleza. Anais... Fortaleza, 2010.
- [20] Piratelli Filho, A. Rugosidade superficial. *Seminário de Metrologia*, v. 3, 2011.
- [21] Protsenko, V.S.; Danilov, F.I.; Gordienko, V.O.; KWON, S.C.; Kim, M.; Lee, J.Y. Electrodeposition of hard nanocrystalline chrome from aqueous sulfate trivalent chromium bath. *Thin Solid Films*, v. 520, n. 1, p. 380-383, 2011.
- [22] Quintana, J.; Sebastian, P.J. The influence of various substrate treatments on morphology and selective absorber characteristics of electrochemical black chrome. *Solar Energy Materials and Solar Cells*, v.33, pp. 465-474, 1994.
- [23] Sheu, H.H.; LU, C.E.; Lee, H.B.; PU, N.W.; WU, P.F.; Hsieh, S.H.; GER, M.D. Electrodeposition of black chromium-cobalt alloy based on trivalent sulfate electrolyte. *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*, v. 59, p. 496-505, 2016.
- [24] Smith, G.B.; Teytz, K.; Hillery, P. The substrate impact on the structure and thermal stability of solar selective black chrome. *Solar Energy Materials*, v.9, n. 1, p. 21-41, 1983.
- [25] Smith, G.B.; Mcphedran, R.C.; DERRICK, G.H. Surface structure and the optical properties of black chrome. *Applied Physics A*, v. 36, n. 4, p. 193-204, 1985.
- [26] Vilela, M.F. Obtenção de uma superfície seletiva de cromo negro depositada em um substrato de aço inoxidável (AISI 304) para conversão térmica de energia solar. 1985. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 1985.
- [27] Villalva, M.G.; GAZOLI, J.R. Energia solar fotovoltaica: conceitos e aplicações. 1ª Edição. São Paulo. EditoraÉrica, 2012.
- [28] Window, B.; Ritchie, I. T.; Cathro, K. Selective electroplated chromium blacks. *Applied optics*, v. 17, n. 16, p. 2637-2644, 1978.

Capítulo 22

Aperfeiçoamento de coletores solares térmicos via superfícies seletivas

Philippe Pereira Moreira

Amanda Bastos Trovão Forte

Leonardo Bitu Correia Leandro

Kelly Cristiane Gomes

José Felix da Silva Neto

Resumo: A conversão solar térmica se mostra promissora, mas ainda enfrenta limitações. O nordeste brasileiro está entre melhores índices de irradiação do mundo, tornando interessante investir em energia solar. Para que um trocador de calor apresente um bom desempenho, é preciso absorver bem a radiação e possuir estabilidade térmica. A absorção está relacionado com uma propriedade óptica, a absortividade, e com a energia necessária para que haja transições eletrônicas, o *band-gap*. Como se trata de um fenômeno de superfície, foi proposto revestir os coletores solares com superfícies seletivas, materiais com propriedades ópticas adequadas. Portanto, o objetivo deste trabalho trata-se do aperfeiçoamento de superfícies seletivas a partir do estudo da absortividade e do *band-gap* de filmes a base de óxido de cromo e dióxido de silício, construídos por sputtering, revestindo substratos de aço inoxidável. Para isso, foram fabricados seis grupos de filmes com diferentes parâmetros, em seguida foi realizada a espectrofotometria UV-Vis para determinar suas propriedades ópticas. Os resultados encontrados revelaram que os filmes propostos melhoram sensivelmente a absortividade total do aço inoxidável. O *band-gap* dos revestimentos produzidos está em uma região de curto comprimento de onda. Provavelmente, a absorção se dá, além do efeito de transições eletrônicas relacionado ao *band-gap* dos materiais que compõe o revestimento, pelo efeito de interferência destrutiva da radiação no interior dos filmes.

Palavras-chave: Conversão solar térmica, Sputtering, Superfícies seletivas, Cromo Negro.

1. INTRODUÇÃO

Em decorrência da conscientização ambiental e das mudanças climáticas, tem-se buscado cada vez mais um desenvolvimento sustentável. De acordo com Tiba et al. (2000), o desenvolvimento sustentável caracteriza-se por atender as necessidades do presente sem comprometer a demanda das gerações futuras. Em contrapartida, a demanda global por energia, em 2017, cresceu acima da média dos últimos dez anos (ALVES, 2018).

Devido a esses fatores, tem-se buscado investir em energias alternativas e renováveis a fim de suprir tal demanda energética de maneira sustentável. No Brasil, de acordo com o Balanço Energético Nacional (BEN), ao comparar os anos de 2017 e 2018 observa-se que há uma queda de 5,5% na oferta interna das fontes não-renováveis, enquanto as fontes renováveis apresenta um crescimento de 3,4%, em especial a energia solar (316,1%).

A região do Nordeste brasileiro possui um índice de irradiação que varia entre 1.752 a 2.190 kWh/m² por ano (ALVES, 2018; PACHECO, 2006, p.4-11). “Isto coloca o Nordeste em posição de destaque em relação às demais regiões do mundo com maior potencial de energia solar” (PACHECO, 2006, p.4-11). Uma maneira simples para aproveitar a radiação solar é aplicar diretamente como fonte de energia térmica, para aquecimento do ambiente ou de fluidos ou para a geração de potência mecânica ou elétrica (PACHECO, 2006, p.4-11).

Esse sistema possui boa relação custo-benefício, pois o elevado custo para aquecer o fluido através de formas convencionais de energia faz com que o investimento inicial em equipamentos do sistema solar térmico seja facilmente compensado (MOGAWER; SOUZA, 2004). Para isso, são empregados trocadores de calor especiais, chamados de coletores solares, que capta a energia da radiação solar.

Um dos fatores mais importantes no desempenho dos coletores solares é a sua estabilidade térmica a altas temperaturas, uma vez que os materiais podem apresentar mudanças estruturais a nível molecular e modificar suas propriedades. Por isso a conversão solar térmica encontra limitações quando se pretende aquecer fluidos a 100°C ou acima desta temperatura (SILVA NETO, 2017).

Em decorrência disso, estudam-se meios de melhorar essas propriedades de forma que apresentem um comportamento adequado para a captação da energia térmica. Como esses fenômenos ocorrem acerca de a 1 µm de sua camada mais externa (*fenômeno de superfície*) (INCROPERA et al., 2017, p. 492), foi proposto que os coletores fossem revestidos com um material que tivessem boas propriedades ópticas para tal aplicação, chamadas superfícies seletivas. (TABOR, 1961; KOKOROPoulos et al, 1959; SHAFFER, 1958). O comportamento ideal de uma superfície seletiva está mostrado na Fig. 1.

Figura 1 – Comportamento de uma superfície seletiva ideal.

Fonte: Lu et al, 2019.

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é aperfeiçoar superfícies seletivas compostas por cromo e dióxido de silício construídas a partir do processo de *sputtering*, e avaliar a sua absorptividade (α). Notadamente, serão avaliados filmes cuja composição e geometria construtiva foram propostas por Silva Neto (2017), com ênfase no entendimento da contribuição do mecanismo de absorção intrínseca (via transições eletrônicas) inerentes a esse revestimento.

2. DESENVOLVIMENTO

Como toda radiação incidente só pode ser absorvida, refletida e/ou transmitida, a soma dessas parcelas correspondem a 100% da radiação (INCROPERA et al., 2017, p. 494). Assim, esses termos podem ser quantificados de acordo com a Eq. 1.

$$\alpha_{\lambda} + \rho_{\lambda} + \tau_{\lambda} = 1 \quad (1)$$

onde α_{λ} é a absorptividade espectral, ρ_{λ} a refletividade espectral e τ_{λ} a transmissividade espectral.

Portanto, caso os materiais sejam opacos ($\tau_{\lambda} = 0$), a partir da medição experimental da refletividade (ρ_{λ}) é possível calcular a absorptividade espectral (α_{λ}).

Como a radiação solar é difusa, a absorptividade total de uma superfície pode ser expressa matematicamente pela Eq. 2 (INCROPERA et al., 2017, p. 511-5012).

$$\alpha = \frac{\int_0^{\infty} \alpha_{\lambda} G_{\lambda}(\lambda) d\lambda}{\int_0^{\infty} G_{\lambda}(\lambda) d\lambda} \quad (2)$$

onde α é a absorptividade total; $G_{\lambda}(\lambda)$ é a radiação incidente em função do comprimento de onda (λ).

Um dos fatores que influenciam a absorptividade de um sólido é a configuração eletrônica que este apresenta. Esta configuração indicará se a absorção da radiação será maior ou menor, em determinado comprimento de onda, em virtude da quantidade de energia necessária para fazer um elétron passar da banda de valência para a banda de condução (CALLISTER JR.; WILLIAM, D, 2012). O *band-gap* de um material é o parâmetro que quantifica a energia necessária para essa passagem.

Para determinar o *band-gap* de um material, conforme Mendonça (2018 apud LÓPEZ; GÓMEZ, 2012), pode ser utilizado o método proposto por Tauc (1972) adaptado pela equação de *Kubelka-Munk* expressa na Eq. 3:

$$F(R) = \frac{(1-R)^2}{2R} \quad (3)$$

onde R é o valor da refletividade e $F(R)$ é chamado de função *Kubelka-Munk* e é proporcional à absorptividade. Por outro lado, a energia associada à radiação para determinado comprimento de onda é dada pela Eq. 4.

$$E = \frac{hc}{\lambda} \quad (4)$$

onde E é a energia da radiação (eV), h é a constante de Planck ($6,626 \times 10^{-34}$ J $\times$ s), c é a velocidade da onda eletromagnética ($2,998 \times 10^8$ m/s no vácuo).

Assim, baseado nas Eq. 3 e 4 é possível construir um gráfico $(F(R) \times E)^2$ vs E e assim, obter as energias associadas às transições eletrônicas diretas (*band gap*), extrapolando a região reta dessa curva e extraindo o valor da interseção entre extrapolação e o eixo das abscissas ($F(R) = 0$) (MENDONÇA, 2018).

3.METODOLOGIA

Inicialmente os filmes foram construídos, compostos por Cr e SiO₂, utilizando a técnica *sputtering*, sob duas condições distintas. Na primeira, os filmes foram depositados em 3 camadas diferentes e na segunda condição, em 2 camadas diferentes. Esses filmes foram depositados em aço inoxidável AISI 304 e a Fig. 2 mostra esquematicamente sua estrutura. Esses dois filmes serão referenciados como grupos 1 e 2, respectivamente.

Figura 2 – Configuração dos revestimentos estudados.

Fonte: Autor.

Para avaliar como cada camada do filme se comporta isoladamente, as mesmas foram depositadas em substrato de vidro, separadamente, nas mesmas condições dos grupos 1 e 2.

No total, as amostras foram classificadas em 6 (seis) grupos de acordo com os parâmetros em que foram fabricados, cada grupo contendo 3 (três) amostras. As condições de cada grupo estão mostradas na Tab. 1.

Tabela 1 – Condições de camadas dos filmes.

GRUPO	CAMADA 1	CAMADA 2	CAMADA 3	SUBSTRATO
1	50nm de espessura (cromo 40% em massa)	100nm de espessura (cromo 70% em massa)	150nm de espessura (cromo puro)	Aço inox
2	50nm de espessura (cromo 40% em massa)	100nm de espessura (cromo 70% em massa)	-----	Aço inox
3	50nm de espessura (cromo 40% em massa)	100nm de espessura (cromo 70% em massa)	150nm de espessura (cromo puro)	Vidro
4	50nm de espessura (cromo 40% em massa)	100nm de espessura (cromo 70% em massa)	-----	Vidro
5	-----	100nm de espessura (cromo 70% em massa)	-----	Vidro
6	50nm de espessura (cromo 40% em massa)	-----	-----	Vidro

Fonte: Autor.

Após a construção dos filmes, as amostras foram analisadas a partir da Espectrofotometria UV-Vis, na faixa de 220 a 1400nm, para a caracterização física da absorvidade. Os grupos 1 e 2 (sobre aço inox), foram analisados a partir da refletividade, enquanto os demais grupos (depositados em vidro) com base na transmissividade. A absorvidade das amostras foram calculadas com base nas Eqs. 1 e 2. A medição da absorvidade do aço inox sem revestimento também foi realizada para a avaliação do impacto do filme sobre as propriedades deste material.

Em seguida, foi feito um estudo para determinar os *band-gaps* das amostras. Esta determinação foi feita com base nas Eqs. 3 e 4. Logo após, foram selecionadas as amostras com os melhores resultados de cada grupo para compará-las entre si. Ainda que a Eq. 3 esteja expressa em função da refletividade, esta equação foi aplicada nos grupos 3 ao 6 em função da transmissividade, devido a consideração $\rho = 0$.

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 3 exibe as curvas de absorptividade espectral do aço puro (sem filmes) e dos filmes depositados em aço (grupos 1 e 2). Observa-se que ambos os filmes possuem absorptividade maior ao longo de todo o espectro estudado em comparação com o aço puro, contribuindo com um aumento significativo dessa propriedade. O grupo 1 exibe um melhor resultado em relação ao grupo 2, principalmente na faixa em torno de 540 a 940nm de comprimento de onda. Isto revela que a camada de cromo puro sob o filme contribui com a absorptividade. É interessante notar que o aço puro apresenta uma queda na região compreendida entre 220 e 540nm, aproximadamente, porém os filmes demonstram um comportamento crescente nesse intervalo.

Figura 3 – Absortividade dos filmes depositados em aço.

Fonte: autor.

A Tabela 2 mostra a absorptividade total das amostras. É visível que o grupo composto por duas subcamadas sobre o filme de cromo puro (grupo 1) expressou melhor comportamento. O filme composto por duas subcamadas sobre o aço (grupo 2) também exibiu boa absorptividade (94%).

Tabela 2 – Absortividade total das amostras estudadas.

AMOSTRA	ABSORTIVIDADE TOTAL
AÇO PURO	72,8964 %
GRUPO 1	96,9800 %
GRUPO 2	94,4719 %

Fonte: Autor.

A Figura 4 mostra os *band-gaps* dos grupos 3 ao 6. O grupo 3 apresenta um valor de 2,81eV, enquanto que os grupos 4, 5 e 6 apresentaram os valores de 3,43, 3,36 e 3,66eV, respectivamente. Note que os *band-gaps* calculados correspondem, aproximadamente, aos picos de absorptividade observados na Fig. 3, pois a absorptividade é maior no comprimento de onda responsável pela transição eletrônica, que é um dos principais mecanismos de absorção da radiação. A Tabela 3 relaciona os *band-gaps* calculados com os comprimentos de onda correspondentes.

Figura 4 – *Band-gap* dos filmes depositados em vidro.

Fonte: Autor.

Tabela 3 – *Band-gap* das amostras estudadas.

AMOSTRA	BAND-GAP	COMPRIMENTO DE ONDA ASSOCIADO (nm)
GRUPO 3	2,81eV	440
GRUPO 4	3,43eV	361
GRUPO 5	3,36eV	369
GRUPO 6	3,66eV	338

Fonte: Autor.

É possível que a presença de cromo nas amostras esteja formando o composto Cr_2O_3 (SILVA NETO, 2017 apud CHIAVERINI, 1986), que de acordo Reddy et al (1998), possui um *band-gap* de 2,58 eV, próximo ao *band-gap* calculado para o grupo 3 (2,81eV).

Considerando a avaliação das amostras dos grupos 4 ao 6, a proximidade entre os valores de *band-gap* encontrados pode estar relacionada com a quantidade mássica de cromo nos filmes e/ou a espessura das camadas, dado que os filmes de 150 e 100nm (grupos 4 e 5, respectivamente) mostram valores mais baixos, enquanto que o filme de 50nm (grupo 6) tem um *band-gap* mais elevado.

Além disso, é pouco provável que tais grupos absorvam energia por meio da formação de Cr_2O_3 . Essa absorção pode ser atribuída a algum outro tipo de óxido de cromo que tenha se formado, ou até mesmo por algum composto com os elementos Cr-O-Si, conforme evidenciado por Silva Neto (2017).

A absorção em outras regiões do espectro pode estar ocorrendo a partir da interferência óptica destrutiva da radiação provocada pelas reflexões múltiplas entre as camadas (SILVA NETO, 2017).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A condição de revestimento avaliada no grupo 1 foi a que apresentou maior valor de absortividade total. Apesar de um valor um pouco inferior, o grupo 2 também se mostra interessante como revestimento para aumentar a absorção do substrato de aço inox.

Em relação aos mecanismos de absorção destes revestimentos, pode-se concluir que os grupos 1 e 2 apresentaram um *band-gap* em uma faixa espectral de curto comprimento de onda, o que está associado a

fótons mais energéticos. A formação do óxido de cromo III (Cr_2O_3) pode estar acontecendo e contribuindo para a absorção nessa faixa de radiação.

Provavelmente, o principal mecanismo de absorção se dá por meio de múltiplas reflexões entre as camadas e, por isso, a presença da camada de cromo puro no grupo 1 reforçou esse mecanismo.

REFERÊNCIAS

- [1] Alves, L. B. Energias Renováveis: análise da geração fotovoltaica no Brasil e Goiás. 2018.. Instituto Mauro Borges (IMB), Goiânia. Doutor em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Goiás (UFG/GO). Mestre em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa (UFV/MG).
- [2] Callister JR., William, D. Ciência e Engenharia dos Materiais – Uma Introdução. 8 ed, Rio de Janeiro. LTC, 2012.
- [3] Chiaverini, V. Tecnologia Mecânica. McGraw-Hill, São Paulo, 2 ed., 1986.
- [4] Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Balanço Energético Nacional 2019: Ano-base 2018. Rio de Janeiro, 2019.
- [5] Incropera, F. P. et al. Fundamentos de Transferência de Calor e Massa. 7 ed. Rio de Janeiro. Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda – LTC. 2017. p. 492-548.
- [6] Kokoropoulos, P.; Salam, E.; Daniels, F. Selective Radiation Coatings. Preparation and high temperature stability. 1959. Solar Energy, v. 03, p. 19-23.
- [7] López, R.; Gómez, R. Band-gap Energy Estimation From Diffuse Reflectance Measurements on sol-gel and Commercial TiO_2 : A Comparative Study. 2012. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 1, v. 61, p. 1-7.
- [8] Lu, B. Et Al. Preparation And Thermal Stability Of A Novel Mid-Temperature Air-Stable Solar Selective Coating. Applied Surface Science, V. 487, P. 840–847, 1 Set. 2019.
- [9] Mendonça, B. J. Produção e Caracterização de Filmes Finos de TiO_2 . 2018. São Paulo. Dissertação de Mestrado – Universidade de São Paulo. Instituto de Física. Departamento de Física Nuclear.
- [10] Mogawer, T.; Souza, T. M. Sistema solar de aquecimento de água para residências populares. 2014. Centro de Energias Renováveis, Unesp.
- [11] Pacheco, F. Energias Renováveis: Breves Conceitos. Economia em Destaque. Conjuntura e Planejamento, Salvador: Sei, n. 149, p. 4-11. 2006.
- [12] Reddy, R. R. et al. Optical electronegativity and refractive index of materials. 1998. Department of Physics, Sri Krishnadevaraya University, Anantapur 515 003, India.
- [13] Shaffer, L.H. Wavelength-dependent (selective) processes for the utilization of solar energy. Solar Energy, 1958. v. 2, p. 21-26.
- [14] Silva Neto, J.F. Desenvolvimento de Superfícies Seletivas para Coletores Solares com Deposição Multicamadas de Cr e SiO_2 . Orientador: Prof. Dr. Sandro Marden Torres. 2017. 97f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) -- Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. Centro de Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. 2017.
- [15] Tabor, H. Solar collectors, selective surfaces and heat engines. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 1961. v. 47, p. 1271–1278.
- [16] Tiba, C. et al. Atlas Solarimétrico do Brasil: banco de dados solarimétricos. 2000. Recife. Ed. Universitária da UFPE. 111 p.
- [17] Wood, D. L.; Tauc, J. Weak Absorption Tails in Amorphous Semiconductors. Physical Review B, 1972. p. 3144-3151.

Capítulo 23

Desenvolvimento de um heliógrafo do tipo Campbell-Stokes por Manufatura Aditiva

Vinícius de Paulo Marques

Wanderley Ferreira de Amorim Júnior

Júlio Mannuel Tavares Diniz

Resumo: Para se ter conhecimento da quantidade de horas de sol uma determinada região ficou exposta é necessário o uso de instrumentos chamados de heliógrafos, podendo ser analógicos ou digitais. Tal instrumento é de grande importância para diferentes áreas, tais como a agricultura, produção de energia solar, meteorologia e entre outras. Contudo, seja qual for o tipo de heliógrafo, esses instrumentos são bastante custosos e não estão disponíveis no mercado brasileiro. Assim, o objetivo deste trabalho é desenvolver um protótipo de baixo custo de um heliógrafo que possa ser utilizado para fazer o registro da quantidade de horas em que uma região ficou exposta a luz do sol. Para isso, seu método de fabricação é a manufatura aditiva, permitindo que qualquer pessoa no mundo tenha acesso ao heliógrafo e possa fabricá-lo. Com o intuito de se chegar a tal propósito, foi utilizada duas metodologias de projeto, uma que possibilita a compreensão de cada sistema e subsistema que compõe o heliógrafo e outra que permite organizar e dividir em etapas o desenvolvimento do projeto. O trabalho resultou em uma concepção de um heliógrafo do tipo Campbell-Stokes para regiões de baixa latitude. Além do mais, um modelo paramétrico que possibilita o dimensionamento de um heliógrafo em função de um componente foi desenvolvido.

Palavras-chave: Heliógrafo, Campbell-Stokes, manufatura aditiva, impressão 3D.

1. INTRODUÇÃO

O uso de fontes alternativas de energia vem crescendo consideravelmente nas últimas décadas. Uma delas é a energia solar, a qual é proveniente da luz e do calor emitidos pelo sol. Essa fonte pode ser convertida nas energias fotovoltaica e térmica, logo, o período de tempo em que a luz solar incide sobre uma determinada localidade por dia é fundamental, período esse definido como insolação, que é medida em horas (WAYBACK MACHINE, 2003).

O registro do número de horas de insolação pode ser feito através de um instrumento chamado heliógrafo, o qual parte do princípio de realizar a queima de um papel através da concentração dos raios solares (MARTINS, 2012).

Existem vários modelos de heliógrafos e de diferentes tamanhos, no entanto, eles são bastante custosos e não há disponibilidade para compra no mercado nacional, o que leva a importação desses instrumentos para suprir as necessidades locais.

Este trabalho almeja desenvolver um heliógrafo para regiões tropicais/equatoriais, isto é, para locais de baixa latitude. Tendo como método de fabricação a manufatura aditiva (impressão 3D), outro objetivo deste trabalho é que o heliógrafo desenvolvido possa ser fabricado por qualquer pessoa do mundo com acesso a uma impressora 3D.

2. METODOLOGIA

O desenvolvimento do heliógrafo foi baseado nas seguintes metodologias de projeto, o triângulo de projeto e o fluxograma de desenvolvimento de projeto.

Figura 2 – Triângulo de Projeto.

Fonte: (AMORIM JÚNIOR, 2019).

Na Figura 1 é possível observar como a metodologia do triângulo de projeto é estruturada. Ela consiste de três segmentos, são eles o design e geometria, os materiais e métodos de fabricação e os modelos matemáticos e físicos, sendo cada um dos segmentos uma fonte de informação dependente dos demais, por isso esse método é apresentado em forma de triângulo (AMORIM JÚNIOR, 2019). O uso do triângulo de projeto se dá pela “passagem” do mesmo pelos sistemas e subsistemas que compõem o produto, analisando-os de acordo com cada vértice e como esse influencia os demais e vice-versa (SILVA, 2018).

Figura 2 – Fluxograma das etapas da metodologia de projeto.

Fonte: Autoria própria

A Figura 2 apresenta o método do fluxograma de desenvolvimento de projeto, que consiste de várias fases, as quais são cumpridas em ordem cronológica, e que na maioria dos casos se aplica a todos os projetos. Na primeira fase dessa metodologia são estabelecidos os requisitos do produto, reunindo todas as informações necessárias para o desenvolvimento do produto. Na segunda, a ideia ou ideias são apresentadas em desenhos esquemáticos e diagramas, nos quais é possível ter uma melhor compreensão do produto demandado. Na terceira, é feito o dimensionamento do produto com base nas solicitações e esforços esperados. Na quarta, são apresentados todos os desenhos técnicos do produto para que sua fabricação seja possível. Na última fase, obtém-se o produto em sua forma física, estabelecida e dimensionada nas etapas anteriores, além disso, por meio provas de conceito, tem-se conhecimento se as especificações do projeto são suscetíveis de serem exploradas de uma maneira útil (BACK, 1983 apud FLORÊNCIO, 2015, p. 25 – 27).

3.DESENVOLVIMENTO

Durante a pesquisa informacional, o heliógrafo do tipo Campbell-Stokes proposta pela patente IS:7243-1974 foi escolhido como modelo a ser seguido por se adaptar melhor aos objetivos do projeto. Essa patente de nacionalidade indiana descreve um heliógrafo para regiões tropicais e foi desenvolvida pelo Comitê Secional de Instrumentos Meteorológicos da Índia (METEOROLOGICAL INSTRUMENTS SECTIONAL COMMITTEE, 1974).

Para a concepção baseada no heliógrafo proposto pela patente IS:7243-1974, todas as suas peças foram projetadas para serem fabricadas por meio da manufatura aditiva. Na Figura 3 é possível observar a concepção do heliógrafo desenvolvido durante este trabalho.

Figura 3 – Concepção do heliógrafo do tipo Campbell-Stokes desenvolvido durante o projeto.

Fonte: Autoria própria.

Por se tratar de um produto fabricado por manufatura aditiva, possui baixo peso, o que limita sua resistência aos fenômenos da natureza, como o vento ou a chuva, os quais podem virar ou derrubá-lo. Logo, as cavidades presentes em sua base são para depositar pedras, areia ou qualquer material ou objeto que aumente seu peso e reduza a distância entre o seu centro de gravidade e a superfície onde o heliógrafo será posicionado, o que previne que ele seja virado ou derrubado por esses fenômenos.

Com a concepção do heliógrafo desenvolvida durante o projeto conceitual, deu-se início ao projeto preliminar, no qual as dimensões do produto e material em que será fabricado foram estabelecidos.

Durante o projeto preliminar, grande parte das dimensões do heliógrafo foram calculadas por meio de um modelo paramétrico. Essas dimensões estabelecidas pelo modelo paramétrico dependem somente do diâmetro da lente esférica (lente composta por um substrato de vidro em forma de esfera) e do seu índice de refração, esse que depende do material em que é fabricada. Conhecendo esses dados é possível obter a distância focal efetiva *EFL* da lente esférica, que consiste na distância entre o seu centro até o ponto onde os feixes de luz são focalizados. As demais dimensões estão diretamente ou indiretamente ligadas a essa propriedade. A distância focal efetiva *EFL* é dada pela equação a seguir.

$$EFL = \frac{nD}{4(n-1)}$$

Onde *D* e *n* são o diâmetro da lente esférica e seu índice de refração, respectivamente. Utilizou-se do Microsoft Excel para construir o modelo paramétrico em uma planilha, a qual foi desenvolvida pelo autor deste trabalho e nela é possível se obter 24 variáveis para o dimensionamento do protótipo. Essas variáveis são inseridas diretamente e indiretamente no software de modelagem 3D. A equação que determina a distância focal efetiva *EFL* está plotada na Figura 4. A planilha que contém o modelo paramétrico pode ser observada na Figura 5.

Figura 4 – Gráfico Diâmetro x EFL.

Fonte: Autoria própria.

Nesse gráfico é possível entender como a distância focal efetiva varia em função do diâmetro da lente esférica, tendo o índice de refração fixado em 1,512, que é o índice do cristal N-BK7.

Figura 5 - Planilha desenvolvida para calcular as principais dimensões.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Campbell-Stokes Sunshine Recorder Design							
2								
3	The design of this sunshine recorder depends only on the diameter of the sphere and the index of refraction of its material.							
4	Then insert the chosen diameter for the sphere and its refractive index:				Diameter:	25.00	mm	
5					Index:	1.512		
6								
7	Parameters		Value	Unit/Type				
8	diameter_of_glass_sphere		25.000	mm				
9	effective_focal_length		18.457	mm				
10	back_focal_length		5.957	mm				
11	radius_of_the_bowl		18.341	mm				
12	half_slot_width_of_card_straight		7.230	mm				
13	half_bowl_height_cross_section		11.230	mm				
14	bowl_thickness		5.000	mm				
15	radius_of_the_sphere_support		25.902	mm				
16	thickness_of_the_sphere_support		9.000	mm				
17	mobile_clamp_sphere_length		39.402	mm				

Fonte: Autoria própria.

Neste trabalho, o material da lente esférica foi o N-BK7, que possui um índice de refração igual a 1,512 (REFRACTIVE INDEX DATABASE, 2019), e o diâmetro escolhido foi de 25 mm (milímetros). Já o material que compõe as peças desse produto foi definido como o filamento de ABS Premium, pois apresenta uma melhor resistência à luz do sol e à altas temperaturas, quando comparado aos materiais que estavam disponíveis.

Com o término da etapa de projeto preliminar, o projeto detalhado foi iniciado, e assim todas as suas demais dimensões foram definidas e um modelo do heliógrafo em CAD foi desenvolvido. A partir disso, desenhos técnicos das peças do heliógrafo foram produzidos com o objetivo de que outros pudessem refazê-las em CAD ou fabricá-las por meio de usinagem. Na Figura 6 é possível ter uma ideia do tamanho do heliógrafo desenvolvido.

Figura 6 – Vistas frontal e lateral do instrumento.

Fonte: Autoria própria.

Por fim, a etapa de construção do protótipo e prova de conceito foi realizada. A construção do protótipo se deu por meio de manufatura aditiva através da técnica Modelagem por Deposição de Material Fundido (FDM), com um preenchimento de 30% de material.

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao término de sua fabricação, percebeu-se que o produto final apresentava problemas. A Figura 7a apresenta um dos problemas que surgiram durante a fase de construção do protótipo, uma peça com geometria “quadriculada” foi gerada durante a sua impressão, isso ocorreu em virtude da conversão do arquivo CAD original da peça para o formato STL, em que não foi levado em conta a resolução. A solução desse problema foi lixar algumas superfícies da peça e retirar estruturas de certas regiões, mostrado na Figura 7b.

Figura 7 – (a) Peça fabricada com geometria quadriculada. (b) Correções feitas.

Fonte: Autoria própria

Outro problema que surgiu na fabricação das peças foi a diferença entre as dimensões das peças em CAD e das peças fabricadas, uma diferença entre 0,5 e 0,8 mm, isso ocorreu por que o efeito de contração do material não foi considerando quando as peças foram dimensionadas. A Figura 8 ilustra correções realizadas para que o encaixe das peças fosse possível, correções essas que se deu na forma do lixamento de certas superfícies de algumas peças.

Figura 8 – Correções feitas em algumas peças.

Fonte: Autoria própria.

Em virtude do preenchimento escolhido e também do tamanho do protótipo, houve a falha do fixador móvel da lente esférica, o qual se partiu na região rosqueada. A Figura 9 apresenta esse problema. Como essa peça ficou inutilizável, a lente esférica foi colada no fixador fixo utilizando uma cola instantânea.

Figura 9 – Fixador móvel rompido em virtude do seu tamanho e seu preenchimento de 30%.

Fonte: Autoria própria.

A base do heliógrafo também teve problemas durante a sua fabricação, surgiram fraturas durante o processo de impressão, isso ocorreu devido a umidade presente no filamento de impressão. Isso foi corrigido deixando a filamento em um forno apropriado para retirar a umidade durante um período de 8 horas, e a fabricação dessa peça foi feita de uma maneira mais lenta, durando aproximadamente 8 horas, almejando evitar que problema se repetisse.

Após os reparos necessários, o protótipo foi montado e colocado em prova, como pode ser observado na Figura 10. O custo total de fabricação foi em torno de 350 reais.

Figura 10 – Protótipo do heliógrafo montado e realizando uma prova de conceito.

Fonte: Autoria própria.

As provas de conceito foram realizadas em um espaço aberto e que não ocorresse sombra sobre o protótipo nesse mesmo espaço. O papel utilizado para a realização das provas de conceito foi o papel sulfite, também conhecido como papel comum branco, que é o papel utilizado no dia a dia para impressão. No papel foi impresso uma escala graduada desenvolvida pelo autor deste trabalho, a qual possibilitasse o conhecimento do tempo de insolação registrado, além disso, foi acrescentado um fundo azul escuro para facilitar a queima do papel.

Figura 11 – Papel queimado durante as provas de conceito.

Fonte: Autoria própria.

Como pode ser observado na Figura 11, as linhas de queimaduras no papel não estão alinhadas, isso ocorreu devido aos posicionamentos diferentes do protótipo com relação ao norte magnético do planeta, pois o instrumento deveria estar alinhado com o norte geográfico, que apresenta uma diferença entre 20 a 30° do norte magnético (como o campo magnético se altera ao longo do tempo, essa diferença varia, atualmente em São Paulo a diferença entre os nortes magnético e geográfico é de 23 graus) (MOLINA, 2012 apud SILVA, 2018, p. 57).

No entanto, mesmo com o erro de calibração do instrumento, é possível afirmar que o instrumento é sensível a luz do sol e também ao alinhamento com o norte geográfico do planeta.

Três provas de conceito foram realizadas, uma no período da manhã, outras duas no da tarde. A tabela 1 apresenta os dados dessas provas.

Tabela 1 - Características das provas de conceito realizadas.

	1ª Prova	2ª Prova	3ª Prova
Data	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019
Início	08:15	11:13	12:47
Término	10:03	12:47	14:50
Duração do experimento em minutos	108	94	123
Tempo de insolação	60	42	54

Fonte: Autoria própria.

Um décimo na escala graduada equivale a 6 minutos, com isso é possível obter o tempo de insolação registrado.

É mostrado na Tabela 1, que o término do segundo teste acontece no mesmo instante que o terceiro teste inicia, isso ocorreu por que foi feito o alinhamento com o norte, pois o ponto focal de luz saiu do papel para o suporte dos cartões à medida que a Terra fazia seu movimento de rotação. Logo, foi necessário o realinhamento do instrumento, e assim, iniciando um novo teste.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados mencionados anteriormente mostraram que é viável a construção de um heliógrafo por manufatura aditiva, baseado nos modelos tipo Campbell-Stokes encontrados no mercado.

O modelo paramétrico que foi desenvolvido durante o projeto possibilita a construção de heliógrafos de diferentes tamanhos.

A falta de maior conhecimento sobre a técnica FDM de manufatura aditiva resultou em dificuldades e falhas na construção do protótipo.

O protótipo se demonstrou funcional quando realizado os testes, mesmo apresentando dificuldades e falhas em sua construção

REFERÊNCIAS

- [1] Amorim Júnior, Wanderley Ferreira. Máquinas de Elevação e Transporte: Triângulo de Projeto. Campina Grande – PB: Universidade Federal de Campina Grande 18 mar. 2019, 30 mai. 2019. Notas de Aula.
- [2] Edmund optics. Understanding ball lenses. [s. l.], 20-?. Disponível em: <<https://www.edmundoptics.com/resources/application-notes/optics/understanding-ball-lenses/>>. Acesso em: 7 abr. 2019.
- [3] Florêncio, T. H. N. Desenvolvimento de um Canhão Disruptor para Neutralização de Artefatos explosivos para uso da Polícia Militar em Campina grande. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Departamento de Engenharia Mecânica, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2018.
- [4] Marques, Vinícius. desenvolvimento de um Heliógrafo do tipo Campbell-Stokes POR Manufatura Aditiva. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Departamento de Engenharia Mecânica, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2019.
- [5] Martins, Samantha. Bola de Cristal?. [S. l.], 21 mar. 2012. Disponível em: <<http://meteoropole.com.br/2012/03/bola-de-cristal/>>. Acesso em: 18 mar. 2019.
- [6] Meteorological Instruments Sectional committe. Sunshine Recorder [Pg. 21: Meteorological Instruments]. Depositante: Indian Standards Institution. IS 7243. Depósito: 31 jan. 1974. Concessão: set. 1974. Disponível em: <<https://archive.org/details/gov.in.is.7243.1974/page/n15>>. Acesso em: 4 maio 2019.
- [7] Silva, B. P. Relatório de Estágio Supervisionado na Empresa Suna Engenharia. 2018. Relatório de Estágio (Graduação em Engenharia Mecânica) - Departamento de Engenharia Mecânica, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2018.
- [8] Wayback Machine. Glossário de termos técnicos em radiação atmosférica. [S. l.], 1 jan. 2003. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20090324103521/http://www.cptec.inpe.br/satelite/metsat/pesquisa/gloss1/gloss_fo.htm#heli%C3%B3grafo>. Acesso em: 20 mar. 2019.

Autores

ADAUTO NETO FONSECA DUQUE

Graduado em História pela Universidade Federal do Amazonas (2000). Mestre em História pela Universidade Federal do Ceará (2004). Professor efetivo na Universidade Estadual do Piauí, Campus Professor Barros Araújo, na cidade de Picos. Tem experiência na área de docência (História da América, História da África, História da Educação e História do Direito). Atua como pesquisador em temas como diversidade étnica e cultural, quilombos na contemporaneidade, identidade, oralidade e escravidão. Desenvolve pesquisa sobre história e memória nas comunidades quilombolas no vale do rio Guaribas. Atualmente, orienta e pesquisa trabalhos com a temática Tradições e Saberes no semiárido piauiense.

ADRIANO CAMPOS LEMOS

Especialista em Planejamento e Gestão Ambiental e Gestão Empresarial. Engenheiro de Meio Ambiente da CEMIG Geração e Transmissão S.A.

ALAINÉ ALVES DA SILVA LUZ

Graduanda do VI Período do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Piauí- CSHNB/PICOS. Professora titular no Ensino Fundamental- Séries Iniciais no Instituto Monsenhor Hipólito (2018). Participação como monitora da VII Semana Acadêmica de Pedagogia (2017); Atividade de extensão História e História da Educação: práticas e metodologias; Curso Alfaletando (2018); Participou do Programa Extensão Tradições do Semiárido Piauiense/Projeto Sujeitos, Saberes e Práticas Tradicionais do Semiárido Piauiense. Participação do VIII Semex (2018). Apresentação na modalidade Comunicação Oral no VI CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO-CONEDU (2019).

ALEX DA SILVA BARBOSA

Possui Pós-Doutorado em Biotecnologia Vegetal - Universidade Federal da Paraíba (2015), com experiência nas áreas de Horticultura e Extensão Rural. Foi Extensionista da EMPAER, atualmente é Professor do Departamento de Agricultura da Universidade Federal da Paraíba, Campus III, Bananeiras. Atua no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, nos Cursos Técnicos em Agropecuária e Nutrição e Dietética, no Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias (Agroecologia) e como Professor Pesquisador na Universidade Aberta do Brasil - UAB (UFPB - Virtual).

ALEXANDRE CAMPELO DE OLIVEIRA

Possui Doutorado em Agronomia\ Ciências do Solo pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (2012). Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em Química, Fertilidade do Solo e Nutrição mineral de plantas. Professor Adjunto da Universidade Federal Rural de Pernambuco, unidade acadêmica de Serra Talhada (UAST/UFRPE). Professor permanente do programa de Pós-Graduação em produção vegetal da Unidade Acadêmica de Serra Talhada com ênfase em nutrição mineral de plantas e dinâmica da matéria orgânica e química do solo.

ALINE DA SILVA OLIVEIRA

Engenheira de energias renováveis e Mestranda em Energias Renováveis na Universidade Federal da Paraíba.

AMANDA BASTOS TROVÃO FORTE

Graduanda em Engenharia de Energias Renováveis pela Universidade Federal da Paraíba. Na Universidade, é membro do ramo estudantil IEEE UFPB, membro do capítulo IEEE PES (Power and Energy Society) e do grupo de afinidade WIE (Women in Engineering). Atualmente estuda sobre dimensionamento e construção de revestimentos opticamente seletivos para sistemas de aproveitamento solar híbridos (PVT).

AMANDA CARDOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA CASSETTE

Doutora em Ciências, Docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Betim - MG, Brasil

AMAURY ALVES DA SILVA JUNIOR

Técnico em Agropecuária pela Escola Agrícola de Jundiá / Universidade Federal do Rio Grande do Norte(2015); Graduando em Engenharia Agrônômica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com interesse nas áreas de Engenharia Agrícola e Ciências dos Solos.

ANA CARLA DOS SANTOS GOMES

Possui Graduação em Engenharia Agrícola pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões/URI - Santiago (2002). Especialização em Ciências Ambientais pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões/URI - Santiago (2004). Mestrado (2007) e Doutorado (2011) pela Universidade Federal de Santa Maria/UFSM no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola. Área de Concentração: Engenharia de Água e Solos; Linha de Pesquisa: Tecnologia e Manejo de Sistemas Irrigados. Atualmente atua como Docente (Campus Alegrete) e como Coordenadora de Extensão Tecnológica (Pró-Reitoria de Extensão - Reitoria) do Instituto Federal Farroupilha.

ANA LUÍZA DA SILVA TEODORO

Engenheira de Minas pela Universidade Federal de Campina Grande e Engenheira de Segurança do Trabalho

ANNA GABRIELLY DUARTE NEVES

Bacharela em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (PPGCB) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Experiência na área de biologia molecular e biotecnologia de microrganismos, em temas como: bactérias edáficas, identificação intraespecífica, diversidade bacteriana. Atualmente trabalha no Laboratório de Tecnologia de Bioativos (LABTECBIO), com a aplicação de fungos filamentosos para biorremediação de efluentes industriais, com foco em efluentes têxteis.

APOENA URQUIZA DA SILVA

Discente do curso Bacharelado em Agroindústria do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Técnica em Agroindústria pelo Colégio Agrícola Vidal de Negreiros (CAVN/UFPB).

ARTHUR FILIPE FERREIRA PEQUENO

Graduação em andamento em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Atualmente desenvolve projetos no Laboratório de Tecnologia de Bioativos/UFRPE. Tem experiência na área de Microbiologia, Bioquímica, Biotecnologia e Biorremediação.

BARTHIRA ALMEIDA NUNES

Engenheira de Minas pela Universidade Federal de Campina Grande e Mestranda em Exploração Petrolífera e Mineral - Universidade Federal de Campina Grande.

BASÍLIO HENRIQUE PEREIRA JÚNIOR

Mestrando em Modelos de Decisão em Saúde (UFPB). Especialista em Fisioterapia Aquática (UNINASSAU). Graduado em Fisioterapia (UNIPÊ).

CAMILA MACÊDO MEDEIROS

Possui graduação em Engenharia Civil pela UFCG (2009) e mestrado em Engenharia Civil e ambiental pela UFCG (2012). Atualmente é professora Efetiva no IFPB, Campus Monteiro.

CARLOS SÉRGIO ARAÚJO DOS SANTOS

Possui graduação em Estatística pela Universidade Federal da Paraíba. Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Doutorando em Modelos de Decisão e Saúde pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente é Professor da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG no Centro de Ciências e Tecnologia Agro-Alimentar, CCTA. Atua como pesquisador do grupo de pesquisas Demográficas - UFPB. Tem experiência na área de Modelos de Regressão (com ênfase em Modelos com erros simétricos, Modelos Lineares Generalizados e Modelos não-lineares) e Demografia (com ênfase em distribuição espacial, Estatísticas vitais, Natalidade e Mortalidade).

CARLUS ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS

Cirurgião Dentista – Unipê. Especialista em Microbiologia Avançada Unileya – DF. Mestrando em Odontologia pela Universidade Estadual da Paraíba

CARMEM JÚLIA FIRMINO ARARUNA

Engenheira Civil pela Universidade Federal de Campina Grande. Mestranda em Engenharia Civil e Ambiental pela Universidade Federal de Campina Grande.

CLÁUDIA REGINA COELHO GOMES

Acadêmica do curso de Pedagogia na Universidade Federal do Piauí- CSHNB/Picos. Participou durante um ano e seis meses do programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência- PIBID. Participou do Programa Extensão Tradições do Semiárido Piauiense/Projeto Sujeitos, Saberes e Práticas Tradicionais do Semiárido Piauiense. Atualmente faz parte do Projeto de Extensão de Rede de Educação no Trânsito.

DALESCKA BARBOSA DE MELO

Mestranda em Ecologia e Conservação pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação (PPGEC) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Graduada em Licenciatura plena em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Integrante do Laboratório de Ecologia de Bentos, desenvolvendo pesquisas na área de Ecologia de Macroinvertebrados Bentônicos em estuários tropicais e reservatórios do Semiárido.

DANIELE JOVEM DA SILVA AZEVÊDO

Doutora em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, pela Universidade Federal de Minas Gerais (2018). Mestre em Ecologia e Conservação (2013) (PPGEC-UEPB). Graduada em Ciências Biológicas (Licenciatura e Bacharelado) pela Universidade Estadual da Paraíba. Possui experiência na área de Ecologia aquática, atuando principalmente nos seguintes temas: biomonitoramento de bacias hidrográficas, modelagem preditiva e elaboração de ferramentas de suporte à reabilitação; ecologia de comunidades (fitoplâncton e macroinvertebrados bentônicos) e atributos funcionais. Atualmente desenvolve projeto de Pós-doutorado Júnior, junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais e Biotecnologia pela Universidade Federal de Campina Grande.

DARLENE SAUSEN

Graduada em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, 2010); Mestre em Agronomia, com linha de pesquisa em Fisiologia e manejo de culturas agrícolas (UFSM, 2013); Licenciada em Educação Profissional pelo Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para o Ensino Profissional (UFSM, 2014); Doutora em Agronomia pelo Programa de Pós-graduação em Agronomia (UFSM, 2016), área de concentração Produção Vegetal. Foi professora nos cursos de Engenharia Agrônômica e Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Amazonas (UFAM, 2016) e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) nos cursos de Engenharia Agrônômica, Engenharia Florestal e Zootecnia. Atualmente realiza pesquisa nas áreas de Manejo de cultivos hortícolas, Entomologia Geral, Interação solo-planta-atmosfera e Agricultura 4.0.

DÉBORA CANDIDO

Diretora Executiva Responsável da Empresa Júnior Agro Mais Assessoria e Consultoria Agrícola da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), graduanda em Engenharia Agrônômica e técnica em Meio Ambiente pela Escola Técnica Estadual (ETECVAV-SP).

DRIALLY ALINE SANTOS DE MORAES

Possui curso técnico profissionalizante em Técnico em Edificações pelo IF-Sertão- PE (2018), Ensino médio pelo IF- Sertão-PE. Graduanda em Tecnologia em Construção de Edifícios pelo IFPB.

EDUARDO ALMEIDA DA SILVA

Graduando em Meteorologia pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) . No ano de 2017, participou como bolsista do Programa de Monitoria da UFCG e pelo CTRN (Centro de Tecnologia e Recursos Naturais), sob orientação da professora Dra. Célia Campos Braga, atuando na qualidade de monitor da componente curricular Meteorologia Básica. Tem noções de alguns softwares estatísticos como por exemplo: Visão geral do R, elementos básicos do R, inserção de dados, funções de uso comum no R, programação, carregamento e instalação de pacotes, dados univariados qualitativos e quantitativos, distribuições e simulações, visão geral sobre a estrutura e utilização de outros softwares estatísticos. Uso de planilhas eletrônicas como ferramenta auxiliar na elaboração de gráficos, introdução ao processador de texto LaTeX, introdução ao aplicativo Minitab, introdução ao aplicativo SPSS. Tem experiência com o software ERDAS IMAGINE 9.1 e tem noções do Qgis. Atualmente participa do Grupo de Pesquisa em Geotecnologias e Modelagem de Risco Ambiental, sob orientação do professor Dr. Madson Tavares Silva.

EDUARDO DA CRUZ TEIXEIRA

Professor EBTB do IF-Sertão-PE, Campus Salgueiro, Graduado em Tecnologia de Construção de Edifícios pelo IFPB (2008), Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais, UFCG (2012).

EDUARDO SILVA DOS SANTOS

Possui graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (2007). Mestrado e Doutorado em Engenharia Agrícola (UFRPE). Tem experiência na área de Engenharia Agrícola, com ênfase em Engenharia de água e solo, atuando principalmente nos seguintes temas: sustentabilidade e aluvião.

EDVALDO CARLOS DE LIMA

Professor-DE da Universidade Estadual da Paraíba - Campus III. Pós-doutorado em Geografia, com pesquisa em Educação do Campo, pela Universidade Estadual de Londrina/PR. Doutorado em Geografia pela UFPE - Universidade Federal de Pernambuco - Campus de Recife/PE (2011). Possui Mestrado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2006), Bacharelado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita" (2002) e Graduação em Geografia pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita" (1999). Coordenador do Centro de Estudos Agrários e do Trabalho - CEAT, membro do Centro de Estudos de Geografia do Trabalho - CEGeT e do Grupo de Pesquisa Urbana, Rural e Ambiental - TERRA. Avaliador Ad Hoc da FUNDECT/CAPES. Coordenador do Projeto Universal MCTI/CNPQ14/2014 e Parecerista de Revistas. Tem Participação em projetos de pesquisas nacionais e internacionais. Conta com experiência na área de Geografia Humana e Regional, com ênfase em Geografia Agrária, atuando principalmente nos seguintes temas: Questão Agrária Brasileira, Educação do/no Campo, PRONERA ? Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, Movimentos Sociais no Campo, Acampamentos de Reforma Agrária, Conflitos pela Terra. Autor do livro: Dissidência e Fragmentação da luta pela terra na "Zona da Cana" Nordeste: o estado da questão em Alagoas, Paraíba e Pernambuco. - 1.ed. - Curitiba, PR: CRV, 2013, 238 p. ISBN 978-85-8042-698-4.

ELIDA ELIZENA CARNEIRO DE MATOS

Mestranda do Curso de Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local do Centro Universitário UNA - MG. Pesquisadora do projeto pela Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana.

EMERSON RENILDO SILVA SANTOS

Possui curso técnico profissionalizante em Técnico em Edificações pelo IF-Sertão- PE (2018), Ensino médio pelo IF- Sertão-PE. Graduando em Tecnologia em Construção de Edifícios pelo IFPB

EULER DOS SANTOS SILVA

Graduando em Engenharia Agrônoma, Diretor do setor de Marketing da Agro Mais, assessoria e consultoria agrícola. Com conhecimento em excel e pacote Adobe. Com histórico de monitoria em Ciências do solo, Manejo do solo e Fertilidade do solo.

EVALDO DE LIRA AZEVÊDO

Possui Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual da Paraíba (2011), mestrado em ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO pela Universidade Estadual da Paraíba (2013) e doutorado em ETNOBIOLOGIA E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (2018). É professor de Biologia Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB, Campus Cajazeiras. Desenvolve pesquisas com macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores e, Etnobiologia.

FRANCIELY FERREIRA PAIVA

Graduada em Ciências Biológicas, Mestre em Ecologia e Conservação pela Universidade Estadual da Paraíba. Atualmente cursa doutorado em Ecologia e Conservação na Universidade Estadual da Paraíba. Desenvolve pesquisa no Laboratório de Ecologia de Bentos. Tem experiência na área de Ecologia, com ênfase em Ecologia de reservatórios, estuários e macroinvertebrados bentônicos.

GABRIEL GOMES PASSOS DE CALDAS LACERDA

Graduando em Engenharia Civil - Unipê

GABRIELA OLIVEIRA GALVÃO

Engenheira de Energias Renováveis e Mestranda em Engenharia Mecânica na Universidade Federal da Paraíba

GELSON PEREIRA DE ANDRADE

Gelson Pereira de Andrade, graduando do VI de Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí-CSHNB/Picos. Tem experiência em Filosofia, Artes Cênicas. Desenvolve atividades de pesquisa no campo de Direitos Humanos. Participou do Programa Extensão Tradições do Semiárido Piauiense/Projeto Sujeitos, Saberes e Práticas Tradicionais do Semiárido Piauiense. Atualmente participa do Projeto de Extensão: Direitos Humanos em Pauta.

GILVANI GOMES DE CARVALHO

Natural de Natal-RN. Bacharel em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2012), com ênfase em química de produtos naturais e química orgânica. Graduada em Meteorologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mestranda em meteorologia no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Durante a graduação em Meteorologia tem trabalhado com modelagem numérica aplicado à energia eólica, utilizando o modelo RegCM e o WRF. Também tem conhecimento em Fortran, GrADS, Linux, R, entre outros.

GIOVANA DEPONTE GALETTI

Graduada no curso de Meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas e membro do Diretório Acadêmico da Meteorologia. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Meteorologia, principalmente nas áreas de Agrometeorologia e Instrumentação Meteorológica.

GUSTAVO CAVALCANTI CONCERVA

Possui curso técnico profissionalizante em Técnico em Edificações pelo IF-Sertão- PE (2018), Ensino médio pelo IF- Sertão-PE. Graduando em Tecnologia em Construção de Edifícios pelo IFPB

GUSTAVO CORREIA BASTO DA SILVA

Cirurgião Dentista pela Universidade Estadual da Paraíba
Especialista em Saúde Coletiva pela Universidade Federal da Bahia
Especialista em Micropolítica da Gestão e do Trabalho em Saúde pela Universidade Federal Fluminense
Mestre em Saúde Pública pela Universidade Estadual da Paraíba
Doutorando em Odontologia pela Universidade Estadual da Paraíba

ILAURO DE SOUZA LIMA

Professor Associado B com dedicação exclusiva da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA desde 2006, possui graduação em Química Industrial, graduação em Licenciatura em Química (1999), Mestrado em Físico-química pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (2000) e Doutorado em Química Inorgânica pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (2005). o Pesquisador é líder do grupo de pesquisa GEPAMEN - Grupo de Estudos em Pesquisa Ambiental e Metodologias de Ensino, no qual, a partir da educação em ciências e ambiental, propõe metodologias alternativas de material de baixo custo e pesquisas ambientais relativas ao processo ensino e aprendizagem na área da Química e Ciências. Atualmente, atua tanto na área de estratégias para o ensino de química, quanto na síntese e caracterização de nanocompósitos de quitosana-inorgânicos.

IVAN SÉRGIO DA SILVA OLIVEIRA

Técnico Agrícola com habilitação em Agroindústria pelo Colégio Agrícola Vidal de Negreiros (CAVN). Experiência Profissional em Extensão Rural pela ONG AGEMTE (Assessoria de Grupo Especializada Multidisciplinar em Tecnologia e Extensão), programa de ATES/INCRA. Graduado no curso de Bacharelado em Agroecologia, Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA), Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Mestrando pelo Programa de Pós Graduação em Ciências Agrárias (Agroecologia), CCHSA/UFPB.

JÉSSIA ESTEFÂNIA DE OLIVEIRA AMORIM SILVA

Cursando 7º Semestre de Bacharel em Química Industrial na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Pesquisadora do Laboratório de Pesquisa e bolsista de Ciências Ambientais - UEPB / PIBIC / CNPQ para Iniciação Científica no projeto Avaliação.

JÉSSICA PATRÍCIA DE OLIVEIRA

Graduanda em agronomia na Universidade Federal Rural de Pernambuco e membro do Núcleo de Pesquisa em Solos de Semiárido (NUPSSE - UFRPE/UAST). Participante de projetos de extensão e de iniciação científica na região da bacia hidrográfica do rio Pajeú - PE.

JOSÉ FELIX DA SILVA NETO

Possui graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Atualmente é Professor Adjunto C1 no Centro de Energias Alternativas e Renováveis (CEAR) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Tem experiência em pesquisa nos seguintes temas: materiais ativados alcalinamente, modelagem numérica e degradação de polímeros em meio aquoso supercrítico. Atualmente trabalha no desenvolvimento de novos materiais para utilização como superfícies seletivas absorvedoras da radiação solar, utilizadas em coletores solares de médias e altas temperaturas. No desenvolvimento destes revestimentos absorvedores, tem estudado a deposição de filmes finos nanocompósitos por PVD (Magnetron Sputtering).

JOSÉ RAUL DA SILVA DOMINGOS

Graduando em Licenciatura em Química pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) desde 2014. Realizou o projeto de extensão: PROJETO CTS-ARTE I UTILIZANDO O DESENHO EM QUADRINHOS NO ENSINO MÉDIO E PÚBLICO E UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA VALORIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS BÁSICOS DE QUÍMICA. Realizou o projeto de extinção PROJETO CTS-ARTE II: UTILIZANDO O DESENHO ARTÍSTICO PARA DIVULGAR AÇÕES, ATIVIDADES.

JOSELINE MOLOZZI

Professora da Universidade Estadual da Paraíba. Tem experiência na área de Ecologia, com ênfase, em Ecologia de Reservatórios e de Estuários, atuando principalmente nos seguintes temas: biomonitoramento, macroinvertebrados bentônicos, modelos preditivos e desenvolvimento de índices bióticos.

JOSIMAR ARAÚJO DE MEDEIROS

Possui graduação em Geografia - UFRN-CERES-CAMPUS DE CAICÓ (1993), Esp. em Bioecologia/UFRN, em Geografia do Semiárido/IFRN, Mestrado em ENGENHARIA SANITÁRIA e Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, ambos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (2004). É professor da rede Estadual de Ensino do RN há 33 anos. Tem experiência na área de Geografia atuando principalmente nos seguintes temas: meio ambiente, desenvolvimento, água, semiárido, combate à desertificação, desenvolvimento sustentável e educação ambiental. Também já atuou no Grupo de Estudos sobre a Desertificação no Seridó (GEDS); como professor substituto na UFRN, Curso de Geografia; no Curso de Especialização em

Geografia e Gestão Ambiental da FIP e no Curso de Turismo da Faculdade Católica Santa Teresinha (FCST), Caicó/RN. Por mais de 20 anos trabalhou na agricultura, no Seridó do Rio Grande do Norte.

JOSIVANIA RIBEIRO DA SILVA

Possui mestrado em Tecnologia Agroalimentar pela Universidade Federal da Paraíba e graduação em Química pela Universidade Estadual da Paraíba. Atualmente é professora do Departamento de Ciências Básicas e Sociais da Universidade Federal da Paraíba, campus III, Bananeiras. Leciona a disciplina química no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros nos Cursos Técnicos de Agropecuária e Agroindústria.

JOSIVÂNIA RIBEIRO DA SILVA

Possui graduação em Licenciatura Plena em Química pela Universidade Estadual da Paraíba (2002). Atualmente é professora da Universidade Federal da Paraíba. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Química Orgânica.

JULIANA RODRIGUES DE SOUSA

Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Regional do Cariri - URCA e Mestre em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal do Ceará - UFC, atuou como professora substituta na Universidade Estadual do Ceará.

JULIANE FAUSTINO DA SILVA

Graduanda no curso de Geografia da Universidade Estadual da Paraíba, campus III. É membro do centro de estudos agrários e do trabalho, e pesquisadora do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica- PIBIC. Desenvolve pesquisa na área de Geografia agrária com ênfase em Educação do campo. Atualmente é monitória voluntária do projeto de extensão: Mapas na sala de aula: cartografia escolar na educação geográfica.

JÚLIO MANNUEL TAVARES DINIZ

Possui graduação em Física (Licenciatura Plena) pela Universidade Estadual da Paraíba (2011), Mestrado e Doutorado em Meteorologia pela Universidade Federal de Campina Grande (2014/2018). Possui experiência na área de Geociências, atuando principalmente nos seguintes temas: Física do Solo e Física da Atmosfera.

KAROLAINÉ DA CONCEIÇÃO GAMA SANTOS

Graduanda de Bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Tem experiência na área de biotecnologia com ênfase em análises físico-químicas e microbiológicas. Atualmente é aluna de iniciação científica no Laboratório de Tecnologia de Bioativos (LABTECBIO) com atuação na biorremediação de efluentes industriais têxteis, tendo ênfase na aplicação de fungos filamentosos.

KELLY CRISTIANE GOMES

Professor Associado do Centro de Energias Alternativas e Renováveis da Universidade Federal da Paraíba. Ministra aulas na Pós-Graduação em Energias Renováveis e na Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UFPB. Orientadora de Mestrado e Doutorado, possui Mestrado (2008) e Doutorado (2011) em Engenharia Mecânica pela UFPB. Coordena o Laboratório de Síntese e Caracterização de Filmes Finos do DEER/CEAR. Atua na área de Materiais Aplicados as Energias e Processos de Fabricação com enfoque nos seguintes temas: Processos de Fabricação de Materiais Termo eficientes, Superfícies Solar Seletivas, Filmes Finos, Materiais Alcalinamente Ativados, Materiais Termomecânicos eficientes, Reaproveitamento de materiais, Beneficiamento e

transformação de materiais, Recursos renováveis, Durabilidade dos materiais e Caracterização (ótica, térmica, microestrutural, morfológica e mecânica) dos materiais.

LENIRA LINS DA SILVA

Graduanda do curso de Licenciatura Plena em Geografia, membro do Centro de Estudos Agrários e do Trabalho e pesquisadora do Programa de Bolsas de Iniciação Científica/PIBIC. Já atuei como monitora do projeto de Extensão: da bússola ao mapa digital: uso de recursos materiais didáticos para o ensino e pesquisa em Geografia. Atualmente sou monitora voluntária do componente curricular de Geografia da População e do projeto de extensão: Mapas na sala de aula: cartografia escolar na educação geográfica. Interessa-se por Geografia Agrária com pesquisa sendo desenvolvida na linha de Educação do campo.

LEONARDO BITU CORREIA LEANDRO

Tem experiência na área de Engenharia de Energia, com ênfase em Fontes Renováveis de Energia, atuando principalmente nos seguintes temas: modelagem numérica, nano/micro materiais, energia solar térmica, superfícies seletivas e absorvedoras, comportamento e óptico dos materiais, simulação computacional fluidodinâmica, energia eólica e biomassa.

LETÍCIA DE OLIVEIRA BEZERRA

Técnica em Agropecuária pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN, 2017) e graduanda em Engenharia Agrônoma pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente participa dos grupos de pesquisa GEFRUTI e RGEM, ambos da UFRN e possui interesse na área de fitotecnia com foco em fruticultura, melhoramento vegetal, produção de plantas medicinais e sistemas agroflorestais.

LORENA MARTINA TRINDADE DE LIMA

Aluna de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Meteorologia do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Graduada em Meteorologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde desenvolvi pesquisas voltadas para a avaliação do padrão do ENOS nas características das Linhas de Instabilidade que se formam na região Norte do Brasil. Possuo conhecimento na área da geociência, com ênfase em Meteorologia, atuando principalmente na área de sensoriamento remoto, mesoescala e interação oceano-atmosfera.

LUCAS ALVES DE SOUSA

Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará – UECE.

LUCAS SENNA RODRIGUES AGRA

Graduado em Construção de Edifícios pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (2016), graduando do décimo período no curso de Bacharelado em Engenharia Civil pelo Centro Universitário UNIFACISA e pós-graduando em Projeto, Dimensionamento e Modelagem de Estruturas e Fundações pelo IPOG. Analista Corporativo atuando há mais de cinco anos no setor de infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba.

LUIZ FILIPE DOS SANTOS SILVA

Técnico em agropecuária pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano (2016). Atualmente cursa Agronomia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco/Unidade Acadêmica de Serra Talhada, bolsista de Iniciação Científica (PIBIC) da UFRPE/UAST. Membro do Núcleo de Pesquisa em Solos de Semiárido (NUPSSE - UFRPE/UAST).

LUIZ GUILHERME MEDEIROS PESSOA

Engenheiro Agrônomo e Doutor em Ciência do Solo pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atualmente é professor Adjunto na Universidade Federal Rural de Pernambuco/Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Professor permanente dos Programas de Pós-Graduação em Produção Vegetal (UAST/UFRPE) e Engenharia Ambiental (UFRPE/Sede). Trabalha em Parceria com pesquisadores da UFRPE; da UFPE; da EMBRAPA; do Department of Ecosystem Science and Management da Texas A & M University; do United States Department of Agriculture (USDA) / Grassland Soil and Water Research Laboratory, TX, USA; e do US Department of the Interior - Bureau of Land Management, Utah State Office, Salt Lake Field Office. Tem desenvolvido trabalhos com ênfase para o semiárido, relacionados ao manejo de solo-água-plantas na agricultura bioassalada; dinâmica de nutrientes no sistema solo-planta sob estresse hídrico e salino; recuperação e revegetação de áreas degradadas; modelagem; e ecologia.

LUZIMAR JOVENTINA DE MELO

Graduada em Ciências Agrárias - Universidade Federal da Paraíba. Pós-graduando Educação Ambiental e desenvolvimento Sustentável - grupo FAVENE Aluna especial de mestrado Ciências Agrárias (Agroecologia) - Universidade Federal da Paraíba Aluna do curso Técnico em Nutrição e Dietética - Colégio Agrícola Vidal de negreiros- UFPB

MARCILANNE FLAUSINO DA SILVA

Graduada em Licenciatura em Biologia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (2014); Especialização em Saúde Pública pelo Instituto de Educação Superior da Paraíba (2015); Graduação em Licenciatura em Química pela Universidade Estadual da Paraíba (2019).

MARIA ALVENIR BARROS VIEIRA

Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará (1991), Mestra em Educação pela Universidade Federal do Piauí (2002) e Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2011). Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Piauí onde ministra as disciplinas História Geral da Educação, História da Educação Brasileira, História da Educação no Piauí e Legislação e Organização da Educação Básica e desenvolve atividades de pesquisa no campo das sociabilidades educativas de crianças e jovens no Brasil dos séculos XVIII e XIX.

MARTIONEI LEITE GOMES

Doutorando do Curso de Geografia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – MG. Coordenador do Projeto pela Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana.

MARYANNE FERNANDES FORMIGA DANTAS

Engenheira de Minas pela Universidade Federal de Campina Grande.

NATÁLIA ALVES SANTOS

Graduada em agronomia na Universidade Federal Rural de Pernambuco e membro do grupo de pesquisa do CNPq intitulado Núcleo de Estudos, Pesquisa e Práticas Agroecológicas do Semiárido (NEPPAS - UFRPE/UAST). Participante de projetos de extensão e de iniciação científica na região da bacia hidrográfica do rio Pajeú e do Núcleo de Pesquisa em Solos de Semiárido (NUPSSE - UFRPE/UAST).

NAYANE DA SILVA LIMA

Técnica em Mineração pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Atualmente, graduanda do curso de Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

NAYARA VITÓRIA DOS SANTOS CRUZ

Graduanda no curso de bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), sendo vinculada ao programa de iniciação tecnológica. Atualmente faz parte do laboratório de tecnologia de bioativos (LABTECBIO), onde trabalha na utilização de fungos para a Biorremediação de efluentes têxteis.

NEIR ANTUNES PAES

Pós-doutorado pela Escola de Saúde Pública da Universidade do Porto - Portugal (2013). Pós-doutorado pela Johns Hopkins Public Health School - USA (2005). Doutorado em Demografia da Saúde pela London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London (1993). Mestrado em Estatística pela Universidade de São Paulo (1982), Pós-graduação em Demografia pelo CELADE (Centro Latinoamericano de Demografia) - Chile, 1983. Graduação em Estatística pela Universidade Católica de Pernambuco (1976).

NILTON FERNANDES DE OLIVEIRA

Doutorando do Curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa – MG. Gerente do projeto pela CEMIG Geração e Transmissão S.A.

OSIRES DE MEDEIROS MELO NETO

Engenheiro Civil pela Universidade Federal de Campina Grande
Especialista em Geotecnia pela UniBF
Mestrando em Engenharia Civil e Ambiental pela Universidade Federal de Campina Grande

PHILIPPE PEREIRA MOREIRA

Graduando de Engenharia de Energias Renováveis pela Universidade Federal da Paraíba, estudou sobre a influência da carga horária no processo de aprendizagem do aluno de ensino superior, participa de Projeto de Iniciação Científica atuando na caracterização química e morfológica de superfícies seletivas fabricadas por sputtering. Atualmente estuda sobre a estabilidade térmica de superfícies seletivas a base de cromo e dióxido de silício.

PRISCILA THALITA BARROS LIMA

Engenheira de Minas pela Universidade Federal de Campina Grande e Mestranda em Exploração Petrolífera e Mineral - Universidade Federal de Campina Grande.

RAPHAEL LUIZ ANDRADE SILVA

Bacharel em Ciências Biológicas (2013) pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Mestre em Biotecnologia Industrial/UFPE (Área de concentração: Bioquímica, Biotecnologia e Microbiologia Aplicada) (2017). Doutorado em andamento no Programa de Pós Graduação em Biociência Animal/ UFRPE (Área de concentração: Biotecnologia). Desenvolveu projetos de pesquisas no Laboratório de Saneamento Ambiental (DEC/CTG/UFPE), na área de concentração Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos e no Laboratório de Biologia Molecular/Dept. de Bioquímica/UFPE. Atualmente desenvolve projetos no Laboratório de Tecnologia de Bioativos/UFRPE. Tem experiência na área de Microbiologia, Bioquímica, Biotecnologia e Biorremediação.

RENAN REY COSTA RODRIGUES

Graduado em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Estadual da Paraíba - UEPB (2019), graduando em Ciência da Computação na UEPB. Trabalho nas áreas de licenciamento ambiental e auditoria ambiental em Campina Grande/PB e região.

RICÁSSIO ALVES DE SOUSA

Estudante do Curso Integrado em Edificações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba- Campus Cajazeiras. Participa de projetos relacionados a temas ambientais.

RODRIGO RONELLI DUARTE DE ANDRADE

Possui graduação em Licenciatura Plena em Física pela Universidade Estadual da Paraíba (1999), mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Paraíba (2004) e doutorado em Engenharia Mecânica, na área de Termofluidos, pela Universidade Federal da Paraíba (2008). Atualmente é professor de Física do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da Universidade Federal da Paraíba, no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, no Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, Campus III, Bananeiras. Tem experiência na área de Física Geral e Termofluidos, atuando principalmente nos seguintes temas: refrigeração solar, energia solar e eficiência energética.

ROMERO MARCOS PEDROSA BRANDÃO COSTA

Professor e Pesquisador, é Biomédico formado pela Universidade Federal de Pernambuco (2007) com experiência Teórica e Prática em Diagnóstico Clínico-Laboratorial. Possui Mestrado em Bioquímica e Fisiologia pela Universidade Federal de Pernambuco - CNPq (2009), Doutorado em Ciências Biológicas pela UFPE- FACEPE (2012) com ênfase em Bioquímica de Proteínas e aplicações biomédicas, Pós-doutorado pelo Programa Nacional de Pós-doutorado, UFRPE, PNPd CAPES / FACEPE (2013-2015); Pós-doutorado pelo Programa Pesquisador Visitante Especial - PVE?s, CAPES (2015 - 2016); Pós-doutorado pelo Programa Nacional de Pós-doutorado, UFRPE, PNPd CAPES / FACEPE (2016-2019); Especialização em Gestão Pública pela Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE (2019).

RONNY PETERSON DA NOBREGA GONCALVES

Engenheiro Mecânico e Mestrando em Engenharia Mecânica na Universidade Federal da Paraíba

RUI DE OLIVEIRA

Engenheiro Civil, Mestre e Doutor em Engenharia Civil. Professor Associado do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental do Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual da Paraíba. Tem experiência em pesquisa na área de Engenharia Sanitária, com ênfase em Técnicas Convencionais de Tratamento de Águas e Gestão da Qualidade da Água.

TÁGINA ISABEL ABRANTES DE ASSIS

É estudante do Curso Integrado em Edificações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba- Campus Cajazeiras. Participa de projetos relacionados a temas ambientais.

TARDELLES OLIVEIRA SANTOS

Engenheira de Minas pela Universidade Federal de Campina Grande.

TIAGO BENTES MANDÚ

Bacharel em Ciências Atmosféricas na Universidade Federal do Oeste do Para. Durante a graduação no período de 2017-2019 atuei como presidente do Centro Acadêmico de Ciências Atmosféricas (CA-ATM) e membro do colegiado do referido curso. Fui bolsista de iniciação científica na área de hidroclimatologia (2017-2018) e em Biometeorologia Humana (2018-2019), atualmente sou monitor de alunos indígenas do Instituto de Engenharia e Geociências (IEG-UFOPA) na área de Programação e Física. Durante o período de 13 a 27 de fevereiro de 2019 participei do programa de mobilidade Acadêmica Externa Nacional na Universidade Federal do Rio Grande do Norte onde desenvolvi pesquisas voltadas a modelagem estocástica aplicada à biometeorologia humana. Participo de grupos de pesquisas e detenho premiações em atividades acadêmicas e possuo experiência e interesse nas áreas de Biometeorologia humana, Climatologia, Eventos climáticos extremos, estresse térmico humano, Conforto térmico interno e externo, Ondas de calor e frio, modelagem dinâmica do clima, modelagem estatística, ondas e análise de dados meteorológicos de superfície utilizando linguagem de programação. Tenho conhecimentos em R, Python Shell script, MATLAB, Fortran, CDO e Grads.

TIAGO OLIVEIRA DE BELMONT FONSECA

Engenheiro Químico e Mestrando em Engenharia de Energias Renováveis na Universidade Federal da Paraíba.

TIÊ DIAS DE FARIAS COUTINHO

Doutoranda em Modelos de Decisão e Saúde na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Mestre em Demografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Bacharel em Estatística pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Tem experiência no ensino de disciplinas da estatística para cursos de nível superior.

VÊNIA CAMELO DE SOUZA

Bióloga pela UEPB, Doutora em Agronomia, linha de pesquisa Ecologia Vegetal e Meio Ambiente, pela UFPB. Atualmente professora Titular do Departamento de Ciências Básicas e Sociais do CCHSA/UFPB, disciplina Biologia, atuando no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros e na Pós-Graduação em Ciências Agrárias (Agroecologia), como Vice-Coordenadora e Orientadora.

VINÍCIUS DE PAULO MARQUES

Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Certificação Lean Six Sigma Yellow Belt. Conhecimento na área de P&D, desde projeto informacional até a construção e teste de protótipo. Projeto Scuderia UFCG, entre os anos 2015 e 2017.

VLÁDIA PINTO VIDAL DE OLIVEIRA

Professora Titular do Departamento de Geografia da UFC e pesquisadora do CNPq na área de Geografia Física. Doutorado em Engenharia Agrônoma no Programa Agricultura e Meio Ambiente em Zonas Áridas da Universidade de Almería-Espanha (UAL). Geóloga (UNIFOR); Mestrado em Agronomia (Solos e Nutrição de Plantas); Professora de curso de Graduação e Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) em Geografia e do Programa em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA).

WALESKA FERNANDA SOUTO NÓBREGA

Cirurgião Dentista pela Universidade Federal de Campina Grande. Especialização em Especialização em Saúde Coletiva e da Família pelo Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic. Especialização em Especialização em Saúde Coletiva: concentração monitoramento, avaliação pela Universidade Federal da Bahia. Mestrado em Saúde Pública pela Universidade Estadual da Paraíba. Doutorando em Odontologia pela Universidade Estadual da Paraíba.

WANDERLEY FERREIRA DE AMORIM JÚNIOR

Possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG,1999). Mestrado "sanduíche" em Engenharia Mecânica (UFCG, 2002) em Blindagem para Proteção Balística, realizado na COPPE/PEMM/Universidade Federal do Rio de Janeiro e em conjunto com Instituto Militar de Engenharia e Centro Tecnológico do Exército(CTEx). Doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais (COPPE/UFRJ, 2007, (Compósito Espesso para fins estruturais e balísticos por RTM)), desenvolvido em conjunto com a EQ/UFRJ e CTEx). Pós-Doutorado (Eng. Materiais/UFCG,2009). Engenheiro de P&D da Empresa Estratégica de Defesa ARMTEC Tecnologia em Robótica (2011). Atualmente é Professor Adjunto da Unidade Acadêmica de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Coordena pesquisa pós-doutorado em Empresa Estratégica de Defesa e de inovação e base tecnológica ARMTEC Tec. Robótica (PNPD 2010/CNPq). Pesquisador LaMMEA/UFCG (Lab. associado do INCT ? Estruturas Inteligentes em Engenharia). Coordenador do convênio da UFCG com a empresa de Blindagens Balísticas BCA Textil. Tendo participado de projetos de diversos equipamentos, máquinas e sistemas robóticos (Blindagens Balísticas Compósita, Metálica, Compósita tipo Sanduíche Nível IIA, IIIA, III), robô submarino tipo ROV, robô sob lagartas anti-bomba tipo VTNT/UGV, outros) . Temas de pesquisa: Materiais Compósitos, Blindagens para Proteção Balística, Projeto de Sistemas Mecânicos.

WILZA CARLA MOREIRA SILVA

Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal da Paraíba, Brasil(2004). Professor Titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba , Brasil.

ZENILDA GARCIA FERREIRA

Cursando 8º Semestre de Bacharel em Química Industrial na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Pesquisadora do Laboratório de Pesquisa e Ciências Ambientais - UEPB / PIBIC / CNPQ para Iniciação Científica no projeto Avaliação. Comparativa de Espumas de Poliuretano, a Base de Petróleo e de Óleo de Mamona, Com/Sem Resíduos Agroindustriais Para Adsorção de Compostos Orgânicos Em Corpos Aquáticos e no projeto Produção do Biogás a Partir do Bagaço de Malte.

ISBN: 978-65-86127-03-4

CSL

9 786586 127034