Ciência e Tecnologia dos Alimentos

7
volume

Editora Poisson

Editora Poisson

Ciência e Tecnologia dos Alimentos Volume 7

1ª Edição

Belo Horizonte
Poisson
2020

Editor Chefe: Dr. Darly Fernando Andrade

Conselho Editorial

Dr. Antônio Artur de Souza – Universidade Federal de Minas Gerais

Msc. Davilson Eduardo Andrade

Dra. Elizângela de Jesus Oliveira – Universidade Federal do Amazonas

Msc. Fabiane dos Santos

Dr. José Eduardo Ferreira Lopes – Universidade Federal de Uberlândia

Dr. Otaviano Francisco Neves – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Dr. Luiz Cláudio de Lima – Universidade FUMEC

Dr. Nelson Ferreira Filho – Faculdades Kennedy

Msc. Valdiney Alves de Oliveira – Universidade Federal de Uberlândia

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

C569

**Ciência e Tecnologia dos Alimentos-Volume 7/
Organização Editora Poisson – Belo
Horizonte – MG: Poisson – 2020**

Formato: PDF

ISBN: 978-65-86127-19-5

DOI: 10.36229/978-65-86127-19-5

Modo de acesso: World Wide Web

Inclui bibliografia

**1. Tecnologia de Alimentos 2. Alimentos
3. Nutrição I. Título**

CDD-664.005

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

www.poisson.com.br

contato@poisson.com.br

SUMÁRIO

Capítulo 1: Análise físico-química e quimiométrica de polpa de Bacaba (*Oenocarpus Bacaba*)..... 7

Diego da Silva Pinheiro, Diego Lisboa dos Santos, Raimunda Daniela Santos Ferreira, Paula Maria Melo da Silva, Allyson Allennon Pinheiro do Rosário, José Marcos Nobre de Moura Júnior, Madson Costa Ribeiro, Charles Alberto Brito Negrão, Ewerton Carvalho de Souza, Antonio dos Santos Silva

DOI: 10.36229/978-65-86127-19-5.CAP.01

Capítulo 2: Caracterização físico-química do licor de Pitaya (*Hylocereus Undatus*) em função do tempo de infusão obtida a partir de duas fontes alcoólicas..... 15

Edna Jaila Menezes da Silva, Gabriela da Silva Melo Carvalho, Thiago Feliph Silva Fernandes, Helane Cristina Aguiar Santos, Lucas Guilherme Araujo Soares, José Luiz Moraes

DOI: 10.36229/978-65-86127-19-5.CAP.02

Capítulo 3: Estudo da qualidade físico-química de iogurtes sabor morango comercializados no Município de Parauapebas-PA..... 22

Camila Barroso da Silva, João Paixão dos Santos Neto, Pamela Stephany Jennings Cunha, Igor Vinícius de Oliveira, Wilton Pires da Cruz, Priscilla Diniz Lima da Silva Bernardino, Ernestina Ribeiro dos Santos Neta, Kaliandra Souza Alves, Fábio Israel Martins Carvalho, Priscilla Andrade da Silva

DOI: 10.36229/978-65-86127-19-5.CAP.03

Capítulo 4: Qualidade físico-química de carnes moídas bovina *in natura* comercializadas no Município de Parauapebas-PA..... 28

Camila Barroso da Silva, Elda de Souza Leite, Jocyel Caetano da Silva, Mychelle Cristina Alves dos Santos, Vilson Cleber Fusco da Silva, Bianca de Jesus Figuerêdo Dias, João Paixão dos Santos Neto, Igor Vinícius de Oliveira, Priscilla Diniz Lima da Silva Bernardino, Ernestina Ribeiro dos Santos Neta, Kaliandra Souza Alves, Priscila Andrade Silva

DOI: 10.36229/978-65-86127-19-5.CAP.04

Capítulo 5: Caracterização físico-química e microbiológica de kaftas elaboradas com carne caprina e farinha de aveia (*Avena Sativa L.*)..... 33

Hudson Chagas da Silva, Thaianny Ruth da Silva, Íris Braz da Silva Araújo, Camila Sampaio Mangolim, Isabelle de Lima Brito Polari, Edvaldo Mesquita Beltrão Filho, Amanda Marília da Silva Sant'Ana

DOI: 10.36229/978-65-86127-19-5.CAP.05

Capítulo 6: Caracterização física e química do fruto do maxixe-bravo (*Cucumis dipsaceus Ehrenb*)..... 40

Antonio Daniel Buriti de Macedo, Ana Paula Moisés de Sousa, Jaciara Dantas Costa, Macielly Buriti de Macedo, Danilo Lima Dantas, Marisa de Oliveira Apolinário, Ana Regina Nascimento Campos

DOI: 10.36229/978-65-86127-19-5.CAP.06

SUMÁRIO

Capítulo 7: Caracterização físico-químico de geleia de abacaxi (*Ananas comosus*) comercializadas em Belém/ Pará 46

Helen Carolline Alcântara Negrão, Adriellen Saraí de Lima Gonçalves, João Pedro dos Reis Lima, Lucas dos Santos Nunes, Allyson Allennon Pinheiro do Rosário, José Marcos Nobre de Moura Júnior, Ewerton Carvalho de Souza, Ivan Carlos da Costa Barbosa, Charles Alberto Brito Negrão, Ronaldo Magno Rocha, Antonio dos Santos Silva

DOI: 10.36229/978-65-86127-19-5.CAP.07

Capítulo 8: Avaliação da qualidade do néctar de bacuri produzido em escala piloto 52

Andréa Cardoso de Aquino, Kaliana Sitonio Eça, Gustavo Adolfo Saavedra Pinto, Hosiberto Batista de Sant'Ana

DOI: 10.36229/978-65-86127-19-5.CAP.08

Capítulo 9: Quantificação de fenólicos totais e flavonoides totais na farinha de sementes de graviola submetida à fermentação em estado sólido..... 58

Luciana Cristina Lins de Aquino Santana, Juliana dos Santos Lima

DOI: 10.36229/978-65-86127-19-5.CAP.09

Capítulo 10: Avaliação do efeito estabilizante e antioxidante do óleo de laranja sobre nanoestruturas contendo óleo de açaí..... 63

Cássia Almeida Brito, Izabel Jales Ferreira, Maxwell de Paula Cavalcante, Livia Rodrigues de Menezes

DOI: 10.36229/978-65-86127-19-5.CAP.10

Capítulo 11: Obtenção e caracterização de filmes com adição de óleo essencial de cravo-da-india 69

Raquel Costa Chevalier, Sandriane Pizato, Rosalinda Arévalo Pinedo, William Renzo Cortez-Vega

DOI: 10.36229/978-65-86127-19-5.CAP.11

Capítulo 12: Produção e determinação do teor de ácido acético no vinagre artesanal de maçã gala (*Malus domestica* Bork) 73

Kaio José Barra da Cruz, Bianca Farias Gaia, Tiago Gonçalves Durão, Pablo Souza de Sá, Fernanda de Souza Costa, João da Silva Carneiro

DOI: 10.36229/978-65-86127-19-5.CAP.12

SUMÁRIO

Capítulo 13: Educação alimentar e nutricional: Contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e técnicas de preparo, hábito alimentar saudáveis e incentivo ao consumo de alimentos dos adolescentes de Ensino Fundamental de uma escola no Município de Seropédica – RJ. 78

Maria Rosa Figueiredo Nascimento, Vânia Madeira Nunes Policarpo, Barbara Cristina Vicente, Dominic Salvador Reynaldo, Beatriz de Oliveira Lopes

DOI: 10.36229/978-65-86127-19-5.CAP.13

Capítulo 14: Perfil sensorial e microbiológico de Sous vide de Tambaqui (*Colossoma macropomum*) in natura com molho de Jambu..... 89

Maria Renara Alves Rodrigues, Danyelly Silva Amorim, Jamille de Sousa Monteiro, Ketlen Yumi Ito da Silva, Lorena de Lima Rodrigues, Rennan Wellington Ramos Alves

DOI: 10.36229/978-65-86127-19-5.CAP.14

Capítulo 15: Produção e avaliação sensorial do néctar misto de Cupuaçu com Cajá. 94

Ruanis Silva Araujo, Gabrielly Pereira de Araujo, Taysa Katlyn Lima Borges, Artur Carvalho Ferreira, Fábio Israel Martins Carvalho, Priscilla Andrade Silva

DOI: 10.36229/978-65-86127-19-5.CAP.15

Capítulo 16: Formulação e análise sensorial de iogurte saborizado com polpa de Cupuaçu (*Theobroma grandiflorum* S.) obtido a partir do leite bovino produzido no Sudeste do Pará 104

Diogo Leandro Silva Carvalho, Leomara Pessoa Brito, Roberta Quintino Pinto, Silvia Letícia Vieira Matos, Thamirys Paulino de Souza, Igor Vinícius de Oliveira, Priscilla Diniz Lima da Silva Bernardino, Ernestina Ribeiro dos Santos Neta, Kaliandra Souza Alves, Priscilla Andrade Silva

DOI: 10.36229/978-65-86127-19-5.CAP.16

Capítulo 17: Licor misto de Taperebá (*Spondias mombin* L.) e Cupuaçu (*Theobroma grandiflorum*): Produção e análise sensorial 113

Naiane Caetano da Silva Leal, Carlos José de Oliveira Melo, Theimmy Pereira de Oliveira, Igor Vinícius de Oliveira, Claudete Rosa da Silva, Josiane Pereira da Silva, Wilton Pires da Cruz, José Nilton da Silva, Vicente Filho Alves Silva, Priscilla Andrade Silva

DOI: 10.36229/978-65-86127-19-5.CAP.17

Capítulo 18: Produção e aceitabilidade de geleia mista de goiaba e mamão 120

Vilson Cleber Fusco da Silva, Daylon Aires Fernandes, João Paixão dos Santos Neto, Igor Vinícius de Oliveira, Josiane Pereira da Silva, Wilton Pires da Cruz, José Nilton da Silva, Vicente Filho Alves Silva, Fábio Israel Martins Carvalho, Priscilla Andrade Silva

DOI: 10.36229/978-65-86127-19-5.CAP.18

SUMÁRIO

Capítulo 19: Desenvolvimento de método por Clue-em-em para detecção de adulterantes em café torrado e moído.	127
--	-----

Víctor de Carvalho Martins, Cinthia de Carvalho Couto, Otniel Freitas-Silva, Renata Galhardo Borguini, Manuela Cristina Pessanha de Araújo Santiago, Ana Cristina Miranda Senna Gouvêa, Ronnel Luiz de Oliveira Godoy

DOI: 10.36229/978-65-86127-19-5.CAP.19

Capítulo 20: Prospecção de enzimas lipolíticas na fermentação de resíduos Agroindustriais utilizando <i>Yarrowia Lipolytica</i>	133
--	-----

Mayara Kuasnei, Thainara Amanda Duarte Vendruscolo, Vanessa Gomes da Silva, Thiago Bergler Bitencourt

DOI: 10.36229/978-65-86127-19-5.CAP.20

Capítulo 21: Aproveitamento de resíduos agroindustriais na alimentação humana.	138
--	-----

Antonio Manoel Maradini Filho, Luísa Oliveira Mendonça, Nicolay da Silveira Menditi

DOI: 10.36229/978-65-86127-19-5.CAP.21

Autores:	147
-----------------------	-----

Capítulo 1

Análise físico-química e quimiométrica de polpa de Bacaba (Oenocarpus Bacaba)

Diego da Silva Pinheiro

Diego Lisboa dos Santos

Raimunda Daniela Santos Ferreira

Paula Maria Melo da Silva

Allyson Allennon Pinheiro do Rosário

José Marcos Nobre de Moura Júnior

Madson Costa Ribeiro

Charles Alberto Brito Negrão

Ewerton Carvalho de Souza

Antonio dos Santos Silva

Resumo: A Amazônia é a floresta tropical com a mais *rica* biodiversidade do planeta, abrigando árvores nativas que compõem seu bioma. Dentre elas se encontram as bacabeiras, e uma das espécies mais conhecidas é a *Oenocarpus bacaba*. Os frutos da bacaba fornecem um “vinho”/polpa nutritivo, de cor creme-leitosa e muito consumido na Amazônia. Devido a grande importância do consumo de polpas, é de grande importância um padrão de qualidade estabelecido que mostre as melhores condições e coletas adequadas, possibilitando a aquisição de uma polpa saudável que poderá ser utilizada com diferentes objetivos. O objetivo deste trabalho foi a investigação físico-química das polpas de bacaba comercializadas em Belém e Vigia, e a discriminação destas através de técnicas multivariadas. Foram adquiridas quatro amostras em cada município. Os resultados obtidos para as amostras de Belém e de Vigia, respectivamente, foram: 5,88 e 5,61 (pH); 0,33 mS/cm e 0,30 mS/cm (condutividade elétrica); 2,03° Brix e 1,88° Brix (sólidos solúveis totais); 81,42 % e 80,28 % (umidade); 1,55 % e 1,41 % (cinzas totais); 1,23 % e 1,23 % (cinzas insolúveis); 0,12 % e 0,11 % (acidez); 1,02 g/mL e 1,01 g/mL (densidade). Os resultados de pH, umidade, cinzas totais, sólidos solúveis totais e densidade e se mostraram suficientes para uma perfeita separação entre as amostras conforme sua origem, quando se empregou análise de componentes principais (PCA) e análise hierárquica de agrupamentos (HCA).

Palavras-Chave: Polpas de frutas, controle de qualidade, Amazônia.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil apresenta uma diversidade de palmeiras nativas, com cerca de 37 gêneros e 387 espécies já descritas, sendo que dentre essas palmeiras se tem a bacabeira que fornece um fruto oleaginoso (Figura 1), normalmente consumido pela população ribeirinha e indígena da Amazônia (SEIXAS et al., 2016).

Figura 1. Bacabeira (Roney, 2015).

A Amazônia é a maior floresta tropical existente, com a mais rica biodiversidade do planeta. A região abriga árvores nativas que compõem seu bioma, dentre elas se encontram as bacabeiras, e uma das espécies nativas da Amazônia mais conhecidas é a *Oenocarpus bacaba*, distribuída pela bacia Amazônica com maior frequência nos estados do Amazonas e Pará (MEDEIROS, 2005).

Os frutos da bacaba fornecem um “vinho” – como a polpa também é denominada – bastante nutritivo, de sabor agradável, de cor creme, leitosa, e sendo muito consumido na Amazônia com farinha de mandioca e açúcar (MEDEIROS, 2005). Ele é mais oleoso que o de açaí e é um dos sabores preferidos em Belém e cidades do interior do Pará. Esse nome vem do contraste das cores do açaí escuro e da bacaba mais clara. Em Belém, justamente na época de maior escassez de açaí no mercado, a bacaba entra com toda a força, em um sistema de revezamento (SHANLEY e MEDINA, 2005).

Segundo Canuto *et al.* (2010), a caracterização físico-química de parâmetros para controle de qualidade é importante para o conhecimento da matéria-prima e/ou produtos derivados em termos de qualidade, composição química, e do ponto de vista comercial, para agregar valor ao produto final como alimento funcional.

Devido a grande importância do consumo de polpas para diferentes fins, é de grande importância um padrão de qualidade estabelecido, que mostrará as melhores condições e coletas adequadas, possibilitando a aquisição de uma polpa saudável que poderá ser utilizada com diferentes objetivos (DOMINGUES, CARVALHO e BARROS, 2014). Uma das maneiras de se estabelecer esse padrão é através de ensaios químicos e físico-químicos considerando as diferentes localidades comercializadoras.

2. OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho foi investigar e comparar o perfil físico-químico das polpas de bacaba comercializadas em dois municípios paraenses (Belém e Vigia) e possivelmente discriminar estas polpas através de técnicas estatísticas multivariadas (HCA e PCA).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. COLETA DAS POLPAS

As amostras foram coletadas nos municípios de Belém e Vigia, localizados no Estado do Pará, tendo sido adquiridas diretamente em pontos de venda deste produto em cada cidade. Depois de adquiridas, as amostras foram transportadas, sob refrigeração, para o Laboratório de Física Aplicada à Farmácia (LAFFA), da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Pará (UFPA), onde foram acondicionadas em recipientes de plástico ou de vidro, com tampas até o momento de suas análises.

3.2. AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS POLPAS

As análises físico-químicas das polpas de bacaba seguiram as metodologias recomendadas pelo Instituto Adolfo Lutz (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008) e foram efetuadas em triplicata para cada uma das oito amostras investigadas.

3.2.1. DETERMINAÇÃO DO PH

A determinação do pH foi efetuada após o preparo de uma solução aquosa a 10% p/v da polpa do fruto e com o uso de um potenciômetro previamente calibrado com soluções padrão de pH 4 e 7, e a subsequente imersão do eletrodo na amostra, com leitura direta no visor do aparelho.

3.2.2. DETERMINAÇÃO DA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (CE)

A determinação da condutividade elétrica foi efetuada após preparo de uma solução aquosa a 10 % p/v da polpa do fruto e com o uso de um condutivímetro elétrico portátil (Instrutherm, CD 880) previamente calibrado com solução de calibração 1432 $\mu\text{S}/\text{cm}$. A leitura foi realizada diretamente no visor do equipamento.

3.2.3. DETERMINAÇÃO DE SÓLIDOS SOLÚVEIS TOTAIS (SST)

Com o auxílio de um refratômetro de Abbe (ATAGO 090), foi determinada a quantidade de sólidos solúveis totais contidos nas polpas em análise, transferindo de 3 a 4 gotas de amostra homogeneizada para o prisma do refratômetro, sendo feita a leitura diretamente na escala em graus Brix.

3.2.4. DETERMINAÇÃO DA UMIDADE/ PERDA POR DESSECAÇÃO

A quantidade total de umidade presente nas amostras foi determinada utilizando a remoção de líquido por aquecimento direto de 3 g da polpa em estufa a 105º C até peso constante. A perda de massa apresentada é expressa em porcentagem.

$$U = 100 - \frac{N \cdot 100}{p}$$

Onde: U: Umidade; N: perda de massa (g) e p: massa da amostra (g).

3.2.5. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CINZAS TOTAIS

Foram utilizados 3 g da polpa que foi pesada em cadinho de porcelana previamente tarado, para que haja a incineração em forno mufla a 450°C, até formação de cinzas brancas, para determinar a quantidade total de resíduo mineral presente na amostra, através da equação a seguir.

$$CT\% = \frac{N \cdot 100}{p}$$

Onde: CT: Cinzas totais; N: massa de cinzas (g) e p: massa da amostra (g).

3.2.6. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CINZAS INSOLÚVEIS EM ÁCIDO CLORÍDRICO

Ao cadinho utilizado na determinação de cinzas totais, contendo o resíduo, foram adicionados 25,0 mL de ácido clorídrico (70 g/L). A mistura foi fervida durante 5 minutos em chapa aquecedora, e, em seguida, filtrada com papel de filtro qualitativo, lavando-o com água quente. O papel de filtro contendo o resíduo foi transferido para o cadinho original e incinerado a 800° C até massa constante. Então, para o cálculo do teor de cinzas insolúveis em ácido, foi empregada a equação a seguir.

$$C_{ins} = \frac{(A - B) \cdot 100}{C}$$

Onde: A = Peso do recipiente + resíduo; B = Peso do recipiente e C = Peso da amostra original

3.2.7. DETERMINAÇÃO DE ACIDEZ TITULÁVEL

Foram pesados 5 g da amostra homogeneizada em frasco Erlenmeyer de 250 mL, que foram diluídas com aproximadamente 50 mL de água, adicionando em seguida 3 gotas de fenolftaleína. Titulada com solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 mol/L, sob agitação constante, até coloração rósea persistente. A acidez foi então determinada com o emprego da equação abaixo.

$$A = \frac{V \cdot Fat \cdot C}{m} \cdot 100$$

Onde: A = acidez (g/100 g); V = volume de solução de hidróxido gasto na titulação; C = concentração da solução de NaOH; Fat. = fator de correção da solução de NaOH; e m = massa de amostra pesada.

3.2.8. DENSIDADE

Foram pesadas as massas de polpas de bacaba contidas em picnômetros de 50 mL, sendo então a densidade determinada via equação a seguir.

$$d = \frac{m}{v}$$

Onde: d: densidade (g/mL); m: massa da amostra (g); v: volume (mL).

3.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA

3.3.1. ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS

Aos dados físico-químicos encontrados e padronizados se aplicou a técnica multivariada de análise de componentes principais (PCA) para se verificar a separação das amostras conforme a empresa produtora da polpa, e para tal se fez uso do programa MINITAB 17.

3.3.1. ANÁLISE HIERÁRQUICA DE AGRUPAMENTOS

Também foi processada uma análise hierárquica de agrupamentos (HCA), considerando os dados padronizados, ligações completas e distâncias euclidianas, para se verificar o grau de similaridade das amostras estudadas e formação de possíveis agrupamentos entre as amostras conforme as empresas produtoras das polpas. Nesta técnica também se utilizou o programa MINITAB 17.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Os resultados obtidos para os parâmetros físico-químicos estudados estão dados nas tabelas 1 e 2 a seguir, em termos de média de três replicatas seguida do desvio padrão.

Tabela 1. Resultados de pH, condutividade elétrica, acidez e umidade das polpas de bacaba estudadas

AMOSTRA	pH	CE (mS/cm)	SST (° Brix)	UMIDADE (%)
B1	5,96 ± 0,10	0,33 ± 0,03	2,00 ± 0,00	81,44 ± 0,06
B2	5,87 ± 0,00	0,32 ± 0,05	2,00 ± 0,00	81,27 ± 0,09
B3	5,81 ± 0,10	0,34 ± 0,06	2,03 ± 0,06	81,52 ± 0,08
B4	5,86 ± 0,17	0,31 ± 0,02	2,07 ± 0,06	81,46 ± 0,10
GERAL	5,88 ± 0,06	0,33 ± 0,01	2,03 ± 0,03	81,42 ± 0,11
V1	5,66 ± 0,25	0,30 ± 0,00	1,83 ± 0,06	90,28 ± 0,07
V2	5,66 ± 0,07	0,29 ± 0,01	1,90 ± 0,00	75,66 ± 15,11
V3	5,57 ± 0,01	0,30 ± 0,00	1,87 ± 0,06	81,10 ± 0,32
V4	5,56 ± 0,01	0,30 ± 0,01	1,90 ± 0,00	74,09 ± 0,62
GERAL	5,61 ± 0,06	0,30 ± 0,01	1,88 ± 0,03	80,28 ± 7,31

Legenda: B (Belém) e (Vigia) são os municípios aos quais as polpas de bacaba foram coletadas. CE = condutividade elétrica; SST = sólidos solúveis totais.

Tabela 2. Resultados de cinzas totais, cinzas insolúveis, densidade e sólidos solúveis totais das polpas estudadas

AMOSTRA	CINZAS TOTAIS (%)	CINZAS INSOLÚVEIS (%)	ACIDEZ (g/100g)	DENSIDADE (g/mL)
B1	0,95 ± 0,38	0,78 ± 0,40	0,11 ± 0,01	1,01 ± 0,04
B2	1,78 ± 0,34	1,01 ± 0,96	0,12 ± 0,00	1,03 ± 0,21
B3	1,63 ± 0,50	1,42 ± 0,49	0,12 ± 0,01	1,01 ± 0,03
B4	1,82 ± 0,44	1,69 ± 0,41	0,14 ± 0,01	1,03 ± 0,05
GERAL	1,55 ± 0,41	1,23 ± 0,41	0,12 ± 0,01	1,02 ± 0,08
V1	1,30 ± 0,69	1,14 ± 0,62	0,14 ± 0,03	1,01 ± 0,02
V2	1,73 ± 0,76	1,54 ± 0,80	0,10 ± 0,01	1,01 ± 0,01
V3	1,02 ± 0,30	0,86 ± 0,30	0,09 ± 0,01	1,01 ± 0,01
V4	1,59 ± 1,00	1,37 ± 1,00	0,10 ± 0,01	1,01 ± 0,01
GERAL	1,41 ± 0,32	1,23 ± 0,29	0,11 ± 0,02	1,01 ± 0,00

Legenda: B (Belém) e (Vigia) são os municípios aos quais as polpas de bacaba foram coletadas.

Os resultados encontrados para o pH nos dois diferentes municípios foram iguais a 5,88 (Belém) e 5,61 (Vigia), mostraram-se superiores, portanto em desacordo, quando comparados aos padrões de identidade e qualidade para as polpas em estudo estabelecidos pela literatura encontrada, que é de 5,3 (CANUTO, 2010). Segundo Batista (2013), umas das possibilidades de entendimento para elevados valores se dão ao fato de os frutos poderem ter sido influenciados pelo estágio inadequado de maturação para fins de processamento. Os resultados encontrados também concordam com o valor médio de pH, igual a 5,83, encontrado por Seixas et al. (2016), que estudaram polpas deste fruto provenientes da zona rural da cidade de Pimenta Bueno-RO, na Amazônia Ocidental.

Em relação à condutividade elétrica (CE), não foi possível a comparação dos resultados da polpa analisada para este parâmetro, por esses não existirem na literatura e não constarem na legislação. Os valores 0,33 mS/cm e 0,30 mS/cm foram os encontrados para as polpas de Belém e Vigia, respectivamente.

A CE está relacionada com espécies eletricamente carregadas presentes nas soluções. Como os valores médios encontrados para os dois grupos de amostras são próximos, há uma indicação de que a presença de íons nos dois grupos amostrais seja equivalente.

O teor de sólidos solúveis totais (SST) apresenta correlação com teores de açúcares e ácidos orgânicos, característica de interesse para produtos comercializados *in natura*, pois o mercado consumidor prefere frutos doces, sendo assim pode ser considerado como ideais valores de SST abaixo ou iguais a 2,0° Brix (CANUTO, 2010). Portanto, de acordo com os valores encontrados, de 2,03° Brix e 1,88° Brix, para Belém e Vigia, respectivamente, as polpas dos dois municípios estão de acordo à literatura.

De acordo com Canuto (2010), para polpas os resultados de umidade, ou perda por dessecação, devem ter um máximo de 87,6%, desta forma, os resultados médios de umidade encontrados para as polpas, que foram 81,42 % (Belém) e 80,28 % (Vigia) estão condizentes com esta literatura. Valores muito elevados de umidade em uma polpa de frutas facilita a proliferação de microrganismos nesses meios, o que não deve ocorrer nas amostras analisadas.

Não há resultados na legislação para os teores de cinzas totais e de cinzas insolúveis em ácido, porém, suas análises são relevantes, uma vez que expressa o teor de substâncias inorgânicas (minerais) totais presentes na amostra de alimentos, sendo consideradas como medidas gerais de qualidade e, com frequência, utilizadas como critérios na identificação dos alimentos (MESQUITA et al., 2014). Os valores obtidos para o teor de cinzas totais para as polpas de bacaba provenientes do município de Belém foram de 1,55 % e de 1,41 % para o município de Vigia. Seixas et al. (2016) encontraram em seus estudos um teor médio de cinzas totais igual a 1,53 % que é concordante com os resultados obtidos no presente trabalho. Para a análise de cinzas insolúveis em ácido clorídrico, os resultados obtidos foram 1,23 % e 1,23 % para Belém e Vigia, respectivamente.

O teor de acidez das polpas de frutas é responsável pelo sabor ácido ou azedo dos frutos, e também é de grande importância para o estado de conservação de um produto alimentício, pois os ácidos encontrados contribuem para o aroma da fruta, o que é um atrativo para os consumidores (BATISTA, 2010). A tabela 2 mostra em relação ao parâmetro acidez, para as polpas de Belém o valor médio de 0,12 g/100g e para as polpas de Vigia o valor médio de 0,11 g/100g, sendo que esses resultados estão próximos ao reportado por Canuto (2010), que é de 0,10 g/100g. A acidez diminui o amadurecimento dos frutos, e uma sugestão relevante é que os baixos valores são devido à utilização desses em um estágio inadequado de maturação ou à diluição das amostras (BATISTA, 2010).

Destaca-se ainda que, tanto o elevado valor de pH das amostras quanto os baixos teores de acidez, indicam que a bacaba apresenta uma polpa de pequena acidez, o que sugere que a bacaba tem propensão de ao desenvolvimento de microrganismos e processos enzimáticos, e assim, ela pode apresentar uma vida de prateleira curta quando armazenada a temperatura ambiente (CECCHI, 2003; SOUZA, 2007; SEIXAS et al., 2016).

Os valores obtidos para a densidade aparente foram de 1,02 g/mL para polpas de Belém e 1,01 g/mL para polpas de Vigia, sendo essas densidades muito próximas a da água pura (1,00 g/mL).

4.2. ANÁLISES ESTATÍSTICAS

Ao se aplicar a análise de componentes principais aos dados dos parâmetros físico-químicos estudados, se obteve a Figura 2 a seguir.

Figura 2. Gráfico dos escores para as polpas de bacaba estudadas

Legenda: A letra V representa amostras de Vigia e a letra B amostras de Belém.

Nota-se que os parâmetros estudados foram eficientes e suficientes para fazer a discriminação da polpa de bacaba conforme sua origem, o que também foi confirmado pela análise hierárquica de agrupamentos, cujo gráfico está na Figura 3.

Figura 3. Dendrograma para as polpas de bacaba estudadas

Legenda: A letra V representa amostras de Vigia e a letra B amostras de Belém.

A análise hierárquica de agrupamentos verificou não haver qualquer semelhança ou similaridade entre as polpas de bacaba provenientes de Belém e as de Vigia.

5. CONCLUSÃO

A caracterização de parâmetros físico-químicos para controle de qualidade para polpas das espécies frutíferas amazônicas permite valorizar esses produtos como alimento funcional e oferece opção de atividade sustentável para a população dessas regiões, agregando valores e qualidade ao produto final.

Com as análises de parâmetros físico-químicos realizadas pôde ser demonstrado que as polpas provenientes dos dois municípios paraenses apresentaram semelhantes índices de pH, todavia superiores conforme o estabelecido pela literatura, a qual tem o prevê valores inferiores a 5,3 como o ideais para a polpa estudada.

Os resultados obtidos para os teores de sólido solúveis totais mostram que apenas as polpas provenientes do município de Vigia estão de acordo com a literatura encontrada. Para o parâmetro umidade, os valores mostraram-se condizentes em relação à literatura, que estabelece como valor máximo 87,6%. Porém, diferentemente ocorre nos teores de acidez, os quais estão superiores ao limite adequado de qualidade, segundo a literatura.

Não foram encontrados resultados na literatura e na legislação para as análises de cinzas totais, cinzas insolúveis em ácido, densidade e condutividade elétrica, sendo assim, o presente estudo pode preencher em parte essa lacuna existente na literatura.

As análises estatísticas multivariadas (análise de componentes principais e hierárquica de agrupamentos) se mostraram eficientes na distinção das polpas conforme sua origem geográfica (Belém ou Vigia), se tomando como base os parâmetros físico-químicos estudados neste trabalho, logo, se pode usar essas técnicas associadas a tais parâmetros no controle de qualidade dos produtos estudados em termos de distinção de suas origens.

REFERÊNCIAS

- [1] BATISTA, A. G., *et al*; Parâmetros de qualidade de polpas de frutas congeladas: uma abordagem para produção do agronegócio familiar no Alto Vale do Jequitinhonha. *Tecnol. & Ciên. Agropec.* João Pessoa, v.7, n.4, p.49-54, dez. 2013.
- [2] CANUTO, G. A. B., XAVIER, A. A. O., NEVES, L. C., BENASSI, M. T.; Caracterização físico-química de polpas de frutos da amazônia e sua correlação com a atividade anti-radical livre. *Rev. Bras. Frutic., Jaboticabal - SP*, v. 32, n. 4, p. 1196-1205, Dezembro 2010.
- [3] CECCHI, H. M. Fundamentos teóricos e práticos em análises de alimentos. 2. Ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2003.
- [4] DOMINGUES, A. F. N., CARVALHO, A. V. e BARROS, A. M.; Caracterização Físico-Química da Polpa de Bacabi (*Oenocarpus mapora* H. Karsten). *Boletim de Desenvolvimento e Pesquisa*. Fevereiro, 2014.
- [5] INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas analíticas do instituto Adolfo Lutz. São Paulo, 2008, v. 1.
- [6] MEDEIROS. M. S.; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, EMBRAPA Rondônia - Bacaba (*Oenocarpus bacaba* Mart.); 2005.
- [7] MESQUITA, F. V.; LIMA, M. O.; ARAÚJO, J. M.; RIBEIRO, O. A. S.; CRAVEIRO, R. L.; Composição centesimal de frutos típicos da região do Vale do Juruá-Amazônia Ocidental. *Enciclopédia Biosfera, Centro Conhecer – Goiânia*, v.10, n.19, 2014.
- [8] PEREIRA, S. A., ALVES, H. P., SOUSA, C. M. e COSTA, G. L. S.; Prospecção Sobre o Conhecimento de Espécies Amazônicas – inajá (*Maximiliana maripa* Aublt.) e bacaba (*Oenocarpus bacaba* Mart.). *Revista GEINTEC*; 2013. Vol. 3/n. 2/ p.110-122.
- [9] RONEY, M. Conheça o poder nutricional da Bacaba, a prima pobre do açaí. *Bacaba News, da floresta para o mundo*, Amapá, 2015.
- [10] SEIXAS, F. R. F.; SESQUIM, E. A. R.; RAASH, G. S.; CINTRA, D. E. Características físico-química e perfil lipídico da bacaba proveniente da Amazônia Ocidental. *Brazilian Journal of Food Research*, v. 7, n. 3, 105, 2016.
- [11] SHANLEY, P. e MEDINA, G; Frutíferas e Plantas Úteis na Vida Amazônica - Bacaba. P 185 e 186. 2005.
- [12] SOUSA, M. B. Mirtilo – qualidade pós-colheita: Diversificação da produção frutícola com novas espécies e tecnologias que assegurem a qualidade agro-alimentar. 8. Ed. [s.l.]: Po Agro De&d, 2007.

Capítulo 2

Caracterização físico-química do licor de Pitaya (Hylocereus Undatus) em função do tempo de infusão obtida a partir de duas fontes alcoólicas

Edna Jaila Menezes da Silva

Gabriela da Silva Melo Carvalho

Thiago Feliph Silva Fernandes

Helane Cristina Aguiar Santos

Lucas Guilherme Araujo Soares

José Luiz Moraes

Resumo: Objetivo do presente trabalho foi avaliar as características físico-químicas do licor de Pitaya em função do tempo de infusão a partir de duas fontes alcoólicas. O estudo foi desenvolvido no Laboratório de química da Universidade Federal Rural da Amazônia, campus Capitão Poço. Para a elaboração dos tratamentos fez-se uso do Delineamento Inteiramente Casualizados, em esquema fatorial 2x2. Já as análises físico-químicas foram realizadas no Laboratório de Processamento de Alimentos do Centro de Tecnologia Agropecuária (CTA) localizado na Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém-PA. Para a preparação do licor foram utilizados os seguintes ingredientes: aguardente, vodca, açúcar e água. Para a obtenção dos extratos alcoólicos, utilizou-se o processo de infusão. Posteriormente ao preparo, os recipientes foram acondicionados em temperatura ambiente. As variáveis analisadas foram: Potencial Hidrogeniônico (pH), Sólidos Solúveis Totais (°Brix), Acidez Total Titulável (ATT). O resultado de pH, acidez total, e o sólidos solúveis totais (°Brix apresentaram maior desempenho em relação ao teor alcoólico tanto em 7 a 14 dias de infusão. Para o pH o licor com aguardente obteve maior resultado com tempo de infusão de 14 dias. Em relação aos valores médios dos sólidos solúveis identificaram-se significativas variações nos teores. Com relação aos dias ambas as fontes tiveram bons resultados aos 7 dias. E para o processamento de licores de pitaya o tempo de infusão aos 14 dias foi o mais indicado. Conclui-se que os melhores resultados das variáveis pH, acidez titulável e %Brix do licor de pitaia foi o obtidos na fonte alcoólica aguardente num tempo de 14 dias.

Palavras-Chave: Tempo de Extração, Cactáceas, Processamento de Licor, Bebida.

1. INTRODUÇÃO

A pitia-vermelha [*Hylocereus undatus* (Haw) Britton & Rose] de polpa branca, é uma fruta tropical que possui um potencial agrônomo e econômico crescente no mercado consumidor, devido principalmente às suas características nutricionais, o que justifica o seu cultivo promissor (ABREU et al, 2012; MARQUES et al., 2011).

Os preços atrativos cotados no mercado (regional, nacional e/ou internacional), atrelado a tendência do consumo em frutas, com alto valor nutricional, associado à manutenção da saúde, têm estimulado a ampliação e intensificação do cultivo da pitia (SILVA et al., 2011; DUARTE, 2013). De acordo com os autores Junqueira et al. (2002) e Shetty et al. (2012), além do consumo *in natura*, a pitia é processada nas formas de suco, sorvetes, vinhos, saladas, entre outras sobremesas.

Entretanto, a alta perecibilidade e a curta vida útil pós colheita dos frutos têm gerado impactos econômicos e dificuldade para o produtor em manter intacto a qualidade físico-química da fruta até o consumidor final (SAGAR; SURESH KUMAR, 2010). Pois, após a colheita, inúmeras reações bioquímicas modificam a qualidade dos frutos (aparência, textura e perdas nutricionais, entre outras), fator este preponderante para redução da aceitação dos consumidores (CHIN et al., 2015; GUERRERO-BELTRÁN et al., 2015).

Nesse sentido, os efeitos negativos podem ser superados com o processamento da fruta, transformando-a em matéria-prima para preparação de inúmeros produtos, como licor artesanal (TEIXEIRA et al., 2010). O licor é o produto obtido pela combinação de componente alcoólico, água, açúcar e extratos ou substâncias que fornecem aroma e sabores (VIERA et al., 2010). De acordo com a legislação brasileira, licores são definidos como uma bebida com um teor alcoólico entre 15 a 54% em volume, preparados com extrato combinados com e sem teor alcoólico, no qual, a substância não alcoólica deve ser de origem vegetal ou animal (BRASIL, 2009).

Os licores são uma categoria de bebidas que está em constante renovação, tanto pela evolução tecnológica como pela diversidade de sabores, restando um volume de vendas anuais ao redor de sete milhões de litros, representando cerca 2,9% do mercado brasileiro de bebidas alcoólicas (ABRABE, 2014; SOUSA, 2015). Ainda de acordo com Datamark (2015), o mercado consumidor brasileiro de licores cresce a uma taxa de 5,1% ao ano, no qual, representa boas perspectivas nesse segmento ao produtor.

Dessa forma, pode-se dizer que a produção de licores pode representar uma forma de incremento da renda familiar. Além disso, se torna uma alternativa aos entraves de comercialização relacionados ao excedente da produção e aos períodos de preços baixos praticados no mercado em determinados períodos (TEIXEIRA, 2010).

A possibilidade de renda aos pequenos produtores, por meio da elaboração de licor dos frutos excedentes e com menor valor comercial, torna-se um excelente potencial mercadológico de frutas (BARROS et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2015). Dessa forma, objetivou-se avaliar as características físico-químicas do licor de Pitia em função do tempo de infusão a partir de duas fontes alcoólicas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fruticultura é um dos setores de maior destaque do agronegócio brasileiro, por meio de uma grande variedade de culturas produzidas em todo o país e em diversos climas, conquistando resultados expressivos e gera oportunidades para os pequenos negócios brasileiros. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas no mundo, ficando atrás apenas da China e Índia, o que mostra a relevância do setor para a economia brasileira (SEBRAE, 2015; SOARES et al., 2017).

A pitia (*Hylocereus undatus*), é uma espécie de cactácea exótica, que apresenta grande potencial alimentício, comercial e farmacêutico, e que vem ganhando espaço no setor agrícola no Brasil (NUNES et al., 2014).

A fruta pode ser consumida em forma *in natura* e/ou processada em formas de suco, sorvetes, vinhos, saladas, entre outras sobremesas. Do ponto de vista farmacêutico pode ser utilizado com regulador de pressão arterial (tônico cardíaco), anti-inflamatório e antidiabético (DUARTE, 2013). Além disso, em termos nutricionais, a fruta contém na sua composição de 30 a 55 g/L de glicose, 4 a 20 g/L de frutose e vitamina C (em baixas quantidades), bem como, compostos bioativos e fenólicos (LIMA, 2013).

De acordo com a Lei n. 8.918, de 14 de julho de 1994, regulamentada pelo Decreto n. 6.871, de 4 de junho de 2009, licores são definidos como bebida com graduação alcoólica de quinze a cinquenta e quatro por

cento em volume (15-54%), a vinte graus Celsius (20°C), e um percentual de açúcar superior a trinta gramas por litro (30g/L), elaborado com álcool etílico potável de origem agrícola, ou destilado alcoólico simples de origem agrícola ou bebidas de origem vegetal ou animal, substâncias aromatizantes, saborizantes, corantes e outros aditivos permitidos em ato administrativo complementar (STADNIK et al., 2015).

Conforme Teixeira et al. (2010) a produção de licores constitui uma forma de contornar os problemas relacionados à perecibilidade de frutas. Além disto, é uma alternativa para enfrentar os problemas relacionados ao excesso de produção e baixos preços praticados em alguns períodos. Além disso, permite a obtenção de um produto rico em compostos fenólicos, proveniente dos frutos utilizados. O processamento de licores é simples, exigindo pouca tecnologia, possível de ser desenvolvido em pequenas agroindústrias (RODRIGUES, 2017).

Neste contexto, nota-se a utilização ampla de frutas no processamento de licores, tais como: abacaxi (TEIXEIRA et al., 2012), tangerina (ALMEIDA et al., 2012), açaí (OLIVEIRA; SANTOS, 2011), maracujá (DIAS et al., 2011), camu-camu (VIEIRA et al., 2010), graviola (OLIVEIRA et al., 2014).

Na elaboração de licores é importante a realização de análises dos parâmetros físico-químicos dentre os quais tem-se os sólidos solúveis totais (°Brix) que conforme Martins et al. (2015), são usados como índice de maturidade para alguns frutos, e indicam a quantidade de substâncias que se encontram dissolvidos no suco, sendo constituído na sua maioria por açúcares. Outro parâmetro importante é o pH, o qual segundo Schmidt (2014), em alimentos e bebidas é importante, pois determina o índice de deterioração, atividade enzimática, textura, retenção de sabor e odor, estabilidade e escolha da embalagem.

3. METODOLOGIA

Para a realização do presente estudo, foram elaboradas e avaliadas quatro amostras experimentais em duas fontes alcoólicas durante o processo da elaboração e caracterização físico-química da bebida do fruto. Para a elaboração dos tratamentos fez-se uso do Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), em esquema fatorial 2x2.

A preparação do licor foi realizada no Laboratório de química (multiusuário), localizado na Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Capitão Poço - PA. Já as análises físico-químicas foram realizadas no Laboratório de Processamento de Alimentos do Centro de Tecnologia Agropecuária (CTA) localizado na Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém-PA.

Na elaboração do licor foram necessários alguns ingredientes sendo eles: aguardente, vodca, açúcar e água, produtos adquiridos em supermercados da cidade de Capitão Poço, e a pitaya adquirida no mercado municipal do bairro da Pedreira, na cidade de Belém-PA. Da pitaya, foi utilizada apenas a parte interior, ou seja, a polpa do fruto.

Para o processo da elaboração e caracterização físico-química das amostras, as frutas foram lavadas e escovadas com uma solução de hipoclorito a 0,1% por 10 minutos. Em seguida foram lavadas novamente com água destilada para tirar o excesso de cloro, a secagem ocorreu normalmente à temperatura ambiente, em seguida foi feito o despulpamento manual. Após essa etapa, a polpa foi cortada em cubos sobre bandejas plásticas, com o auxílio de facas de aço inoxidável ambas devidamente higienizadas, em seguida a polpa foi colocada em recipientes de vidro também higienizado.

Para a obtenção dos extratos alcoólicos, utilizou-se o processo de infusão que foi preparado a partir de 184,16g de polpa da Pitaya e 120 ml de álcool. Foram realizadas duas infusões para cada uma das fontes alcoólicas. Após esse preparo, os recipientes foram acondicionados em temperatura ambiente em um período de 7 a 14 dias.

A calda ou xarope foi preparada após o período da infusão de cada tratamento, com a proporção de 2:1 (m/v) de açúcar refinado comercial (sacarose) e água. Para o preparo da calda foi utilizado um fogão convencional, uma panela e foi adicionado 1800g de açúcar para 3L de água fervendo, sob o efeito de agitação até completar a dissolução, durante um período de mais ou menos 20 minutos. Logo em seguida a calda foi esfriada a banho maria, e misturada ao extrato alcoólico.

Para a formulação das quatro bebidas foram misturados o extrato alcoólico e a calda na proporção 2:1. Após esse processo, os licores foram homogeneizados e armazenados em recipientes plásticos, mantidos em repouso para ocorrer a incorporação do açúcar, até o momento em que foram realizadas as análises físico-químicas.

Os licores foram submetidos às análises físico-químicas de pH, sólidos solúveis totais, e acidez total em número de triplicatas. Sendo a determinação do pH feita por meio de leitura direta, utilizando-se um potenciômetro digital previamente calibrado. Para determinar os sólidos solúveis, fez-se uso da leitura direta de um refratômetro de bancada, utilizando-se refratômetro digital DR – A1, ATAGO, sendo necessário calibrar com água destilada. Para determinar a acidez total Titulável, foi realizada a titulação com solução de Hidróxido de Sódio 0,1 mol.L⁻¹ padronizada, onde foi usado a fenolftaleína como indicador. Os resultados foram expressos em miliequivalência do soluto por litro de solvente (meq/L). Todos os procedimentos realizados conforme o manual do IAL, 2008.

Os dados foram submetidos a análises de variância, e a comparação de medidas, realizada pelo teste de correlação e teste de Student a 5% de probabilidade com auxílio de software Assistat 7.7.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aceitação do licor por parte dos consumidores depende do equilíbrio entre o teor alcoólico e o teor de açúcar, que ocorre após o processo de realização da calda e mistura com o extrato alcoólico. A legislação brasileira permite uma extensa faixa de utilização de açúcar, sendo assim os valores encontrados nos tratamentos vodca e aguardente aos 7 foram aproximados ao da legislação brasileira que preconiza valores superiores a 30 g/L, no entanto para os mesmos tratamentos aos 14 dias, os valores foram levemente distantes do que aconselha a legislação. Esse fato pode estar relacionado ao tempo de infusão como também ao estágio de maturação das frutas utilizadas para a elaboração do licor, conforme a (Tabela 1).

Tabela 1: Resultado dos valores do teor de açúcar no licor de pitaya (*Hylocereuspolyrhizus*) em duas diferentes fontes alcoólicas.

Tratamentos	Fontes alcoólicas	Teor de açúcar (g/l)
T1	Aguardente	25,06
T2	Vodca	28,9
T3	Aguardente	19,73
T4	Vodca	16,53

Tratamento t1 e t2 (infusão de 7 dias), tratamento t3 e t4 (infusão de 14 dias). Fonte: autoria própria

De acordo com a análise de variância ($p \leq 0,05$), para a variável pH, houve efeito significativo, apenas para os fatores isolados de fonte alcoólica e tempo de infusão. Enquanto para o °Brix, ocorreu resposta significativa para a interação entre os fatores. Porém, não houve efeito dos tratamentos para a acidez (Tabela 2).

Tabela 2. Resumo da análise de variância e coeficiente de variação de experimento com diferentes fontes alcoólicas (FA) e tempos de infusão (TI) para as variáveis pH, % Acidez e % Brix.

Fonte de Variação	GL	pH	Quadrado Médio %Acidez	%Brix
Fonte Alcoólica (FA)	1	0,0120*	0,02430 ^{ns}	0,30 ^{ns}
Tempo de Infusão (TI)	1	0,0085*	0,60750 ^{ns}	234,97*
FA x TI	1	0,0003 ^{ns}	0,32670 ^{ns}	37,10**
Tratamento	2	0,0070*	0,31950 ^{ns}	90,79**
Resíduo	8	0,0013	0,15120	1,18
CV (%)		0,80	17,17	4,81

** significativo ao nível de 1% de probabilidade ($p < 0,01$): * significativo ao nível de 5% de probabilidade ($0,01 \leq p < 0,05$); ns: não significativo ($p \geq 0,05$), CV (%): coeficiente de variação. Fonte: Autoria própria

Houve maior resultado para a variável pH nos licores com a fonte alcoólica proveniente da cana-de-açúcar e com tempo de infusão de 14 dias. Entretanto não houve diferença estatística da fonte e do tempo de infusão para a % Acidez (Tabela 3). Este valor pode ser comparado ao valor do pH encontrado por Vieira et al. (2010) (licor de camu-camu (*Myrciariadubia*), pH = 3,60) e por Leite et al. (2012) (licor de mangaba (*Hancorniaspeciosa*), pH = 3,83). Para Macedo, 2001, o pH fornece uma indicação do seu grau de deterioração e é importante na apreciação do estado de conservação de um alimento. Assim, pode-se dizer

que os valores encontrados no licor de Pitaya é considerado ácido, o que não favorece o desenvolvimento microbiano, dando estabilidade ao produto, com isso os produtos com valores de pH próximos à 4,5 apresentam boa conservação, conforme verificado por Macedo, (2001).

O alto índice de acidez Titulável encontrado (Tabela 3), mostra que a Pitaya é uma fruta de sabor ácido, comparando com os resultados obtidos por Andrade et al., 1997, que ao analisar a polpa de araçá boi obteve um valor de 2,73g/100 ml para acidez. Dessa forma pode-se dizer que o teor da acidez presente no licor de Pitaya pode ser considerado satisfatório, pois conforme a legislação brasileira (Brasil, 2009) estabelece 0,40g/100 ml para acidez nos seus licores.

Tabela 3. Potencial Hidrogeniônico (pH) e % Acidez Total de licores com diferentes fontes alcoólicas (FA) e tempos de infusão (TI).

Fonte alcoólica	pH	% Acidez Total
Aguardente	4,52 a	22,2 a
Vodca	4,46 b	23,1 a
Tempo de Infusão		
7	4,46 b	20,40 a
14	4,51 a	24,90 a

* Médias seguidas de letras distintas diferem entre si na coluna (minúsculas) pelo teste de Student a 5% de probabilidade. Fonte: Autoria própria

De acordo com os resultados da interação fonte alcoólica e tempo de infusão, pode-se observar para a variável % Brix que com o uso da aguardente foi inferior a vodca aos 7 dias e superior aos 14 dias. Em relação aos dias, ambas as fontes apresentaram maiores respostas aos 7 dias (Tabela 4).

Tabela 4. Interação dos fatores fontes alcoólicas (FA) e tempos de infusão (TI) para a variável % Brix.

Fonte alcoólica	Tempo de infusão (dias)	
	7	14
Aguardente	25,06 Ba	19,73 Ab
Vodca	28,90 Aa	16,53 Bb

*Médias seguidas de letras distintas diferem entre si na coluna (maiúsculas) e linhas (minúsculas) pelo teste de Student a 5% de probabilidade. Fonte: Autoria própria

Em relação aos valores médios dos sólidos solúveis identificaram-se significativas variações nos teores. Conforme a legislação brasileira essas variações são aceitáveis, uma vez que se possui uma grande faixa de utilização de açúcar na produção dos licores que varia de no mínimo 100 g.L⁻¹ até a saturação dos açúcares em quantidades superiores a 350 g. L⁻¹.

5. CONCLUSÕES

A fonte alcoólica aguardente com o tempo de infusão de 14 dias apresentou maior valor de pH. Em relação índice de acidez titulável, a pitaia apresentou alto valores, caracterizando-a como uma fruta ácida. Dessa forma pode-se dizer que o teor da acidez presente no licor de pitaia pode ser considerado satisfatório, pois está de acordo com que a legislação brasileira estabelece para acidez nos seus licores que é 0,40g/100ml.

Já para variável % Brix que com o uso da aguardente foi inferior a vodca aos 7 dias e superior aos 14 dias. Em relação aos dias, ambas as fontes apresentaram melhores respostas aos 7 dias.

REFERÊNCIAS

- [1] ABRABE - Associação Brasileira de Bebidas. Mercado - Categorias de bebidas: Licores. Disponível em: <<http://www.abrabe.org.br>>. Acessado em: 30 jun. 2014 apud SOUSA, M. B. Elaboração de um licor a base de acerola (*Malpighia emarginata*) com mel. 2015. Trabalho de conclusão de curso (Bacharel em Farmácia) Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão.
- [2] ABREU, WILSON CÉSAR DE, LOPES, CRISTIANE DE OLIVEIRA, PINTO, KELLY MOREIRA, OLIVEIRA, LETÍCIA ALMEIDA, CARVALHO, GUSTAVO BACELAR MOREIRA DE, & BARCELO, MARIA DE FÁTIMA PÍCCOLO. (2012). Características físico-químicas e atividade antioxidante total de pitaias vermelha e branca. *Revista do Instituto Adolfo Lutz (Impresso)*, 71(4), 656-661. 2020, de http://periodicos.ses.sp.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0073-98552012000400007&lng=p&tlng=pt.
- [3] ALMEIDA, E. L. et al. Elaboração de licor de casca de tangerina. *Alimentos e Nutrição*, v.23, p.259-265, 2012.
- [4] BARROS, J. C. et al. Obtenção e avaliação de licor de leite a partir de diferentes fontes alcoólicas. *Global Science and Technology*, v.1, p.27-33, 2008.
- [5] BRASIL. Casa Civil. Decreto nº 6.871, de 4 de junho 2009. Regulamenta a lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, classificação, o registro, a inspeção e a fiscalização da produção e do comércio de bebidas. *Diário Oficial da União*. Acesso em: 31 agosto 2018, 19h30min.
- [6] BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Decreto nº 6.871, de 4 de junho de 2009. Regulamenta a Lei nº 8918, de 14 de julho de 1994. *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 5 de jun. 2009.
- [7] Chin, SK, Siew, ES, e Soon, WL (2015). Características de secagem e avaliação da qualidade de fatias de kiwi pelo método de secagem por convecção natural a ar quente. *International Food Research Journal*, 22 (6), 2188-2195.
- [8] DATAMARK Market Intelligence Brazil. Liqueurs. 2015 Disponível em: . Acesso em: 03 mar. 2016.
- [9] DIAS, S. C. et al. Caracterização físico-química e sensorial do licor de corte do maracujá amarelo. *Enciclopédia Biosfera*, v.7, p.1405-1412, 2011.
- [10] DUARTE, M. H. Armazenamento e qualidade de pitaias *Hylocereus undatus* (Haw.) Britton & Rose, submetida à adubação. Lavras, 2013. 113p. Dissertação (mestrado). Universidade Federal de Lavras, Lavras.
- [11] GUERRERO-BELTRÁN JA, RUIZ-HERNÁNDEZ F., WELTI-CHANEZ J. (2015) Ameixa mexicana (*Spondias purpurea* L.) Propriedades de sorção de umidade. Em: Gutiérrez-López G., Alamilla-Beltrán L., del Pilar Buera M., Welty-Chanez J., Parada-Arias E., Barbosa-Cánovas G. (eds) Estresse hídrico em produtos biológicos, químicos, farmacêuticos e alimentares Sistemas. Série de Engenharia de Alimentos. Springer, Nova Iorque, NY.
- [12] HERBACH, K. M.; ROHE, M.; STINTZING, F. C.; CARLE, R. Structural and chromatic stability of purple pitaya (*Hylocereus polyrhizus* [Weber] Britton & Rose) betacyanins as affected by the juice matrix and selected additives. *Food Research International*, Barking, v. 39, n. 10, p. 667-677, dec. 2006.
- [13] HERNÁNDEZ, Y. D. O. *Hacia aconocimiento y a conservación de a pitahaya*. Oaxaca: IPN-SIBEJCONACYT-FMCN, 2000. 124 p.
- [14] JUNQUEIRA, K.P.; JUNQUEIRA, N.T.V.; RAMOS, J.D.; PEREIRA, A.V. Informações preliminares sobre uma espécie de pitaya do Cerrado. Planaltina-DF: Embrapa Cerrados, 2002. 18p. (Documentos, 62).
- [15] LEITE, N. D.; PLÁCIDO, G. R.; FURTADO, D. C.; OLIVEIRA, K. B.; MOURA, L. C.; SILVA, K. S. Avaliação físico-química e sensorial de licor de mangaba. In: I Congresso de Pesquisa e Pós-Graduação do Câmpus Rio Verde do IFGoiano, 2012.
- [16] LIMA, C. A.; FALEIRO, F. G.; JUNQUEIRA, N. T. V. Diversidade genética intra e interespecífica de pitaias com base nas características físico-químicas de frutos. *Revista Brasileira de Fruticultura*, Jaboticabal, v. 35, n. 4, p. 1066-1072, 2013.
- [17] MACEDO, J.A.B. Métodos laboratoriais de análise físico-química e microbiológicas. Águas e águas. Jorge Macedo. Juiz de Fora, 2001. p 01-52
- [18] MARQUES, V. B.; MOREIRA, R. A.; RAMOS, J. D.; ARAÚJO, N. A.; SILVA, F. O. R. Fenologia reprodutiva de pitaias-vermelhas no município de Lavras-MG. *Ciência Rural*, Santa Maria, v.41, n.6, p.984-987, 2011.
- [19] MARTINS, J. J. A.; LEITE FILHO, M. T.; SANTOS, Y. M. G.; MARTINS, A. N. A.; SILVA, L. A.; ROCHA, A. P. T. Características físico-químicas de Toranja Produzida no Brejo Paraibano. 1º Simpósio Nordeste de Química. Natal, RN, 2015.
- [20] NUNES, E. N.; SOUSA, A. S. B. de.; LUCENA, C. M. de.; SILVA, S. de M.; LUCENA, R. F. P. de.; ALVES, C. A. B.; ELESBÃO ALVES, R. E. Pitaias (*Hylocereus* sp.): Uma revisão para o Brasil. Gaia Scientia, 2014.
- [21] OLIVEIRA, E. N. A. DE; SANTOS, D. C. Processamento e avaliação da qualidade de licor de açaí (*Euterpe oleracea* Mart.). *Revista do Instituto Adolfo Lutz*, v. 70, p. 534-41, 2011.

- [22] OLIVEIRA, E. N. A. et al. Estabilidade física e química de licores de graviola durante o armazenamento em condições ambientais. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, v. 19, p. 245-251, 2015.
- [23] OLIVEIRA, E.N.A. et al. Agroindustrial utilização of soursop (*Annona muricata* L.) for production of liqueurs: Sensory evaluation. *Journal Of Biotechnology And Biodiversity*. v.5, p. 33-42, 2014.
- [24] RODRIGUES, V. N. Licor de guabiroba (*Campomanesia xanthocarpa*): análise mercadológica, desenvolvimento e caracterização físico-química e sensorial. Laranjeiras do Sul, 2017, 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Alimentos) UFFS, 2017.
- [25] Sagar, VR e Suresh Kumar, P. (2010). Avanços recentes na secagem e desidratação de frutas e legumes: uma revisão. *Jornal de Ciência e Tecnologia de Alimentos*, 47(1), 15-26. PMID: 23572596. <http://dx.doi.org/10.1007/s13197-010-0010-8>.
- [26] SCHMIDT, L. Produção de licores à base de cachaça e identificação do seu perfil sensorial. Santo Antônio da Patrulha, 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Agroindustrial: Indústrias Alimentícias) FURG, 2014.
- [27] SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Mercado de fruticultura: panorama do setor no Brasil. Boletim de inteligência, outubro 2015.
- [28] SHETTY, A. A.; RANA, M. K.; PREETHAM, S. P. *Cactus*: a medicinal food. *Journal of Food Science and Technology*, Trivandrum, v. 49, n. 5, p. 530-536, may 2012.
- [29] SHETTY, A. A.; RANA, M. K.; PREETHAM, S. P. *Cactus*: a medicinal food. *Journal of Food Science and Technology*, Trivandrum, v. 49, n. 5, p. 530-536, may 2012.
- [30] SILVA, J. A. A.; GRIZOTTO, R. K.; MIGUEL, F.B.; BÁRBARO, I. M. Caracterização físico-química de frutos de clones de doviális (*Dovyalis abyssinica* warb), **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v.33, n.1, p.466-472, 2011. Número especial.
- [31] SILVA, J. A. A.; GRIZOTTO, R. K.; MIGUEL, F. B.; BÁRBARO, I. M. Caracterização físico-química de frutos de clones de doviális (*Dovyalis abyssinica* warb), **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v.33, n.1, p.466-472, 2011. Número especial.
- [32] SOARES, A. P.; OLIVEIRA, E. N. A.; FEITOSA, R. M.; SILVA, R. C.; ARAÚJO, K. T. A. Perfil sensorial e aceitação de licores mistos de acerola e goiaba xaropado com mel. *Revista Brasileira de Agrotecnologia*. v. 7, n. 2 (2017) p 126 – 13.
- [33] SOUSA, M. B. Elaboração de um licor a base de acerola (*Malpighia emarginata*) com mel. 2015. Trabalho de conclusão de curso (Bacharel em Farmácia) Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão.
- [34] STADNIK, P.; BORGES, S.; BORGES, D. Avaliação da qualidade de licor de maçã com hortelã (*Mentha* s.p.) elaborado com açúcar orgânico em substituição ao açúcar convencional. *Connectionline*. n 12, 2015.
- [35] Teixeira, L. J. Q.; ROCHA, C. T.; JUNQUEIRA, M. S.; CARNEIRO, C. S.; SARAIVA, H. S. Determinação da cinética de extração alcoólica no processamento de licor de café. *Enciclopédia Biosfera*, v.6, n.9, p.8, 2010.
- [36] TEIXEIRA, L. J. Q.; ROCHA, C. T.; JUNQUEIRA, M. S.; SARAIVA, S. H. Determinação da cinética de extração alcoólica no processamento de licor de café. *Enciclopédia Biosfera*, v.6, p.1-9. 2010.
- [37] TEIXEIRA, L. J. Q. et al. Determinação da proporção de açúcar e fruta necessários para conferir os atributos ideais ao licor de abacaxi. *Enciclopédia Biosfera*, v.8, p.1883-1889, 2012.
- [38] VIEIRA, V. B. et al. Produção, caracterização e aceitabilidade de licor de camu-camu (*Myrciaria dubia* (H.B.K.) McVaugh). *Alimentos e Nutrição*, v.21, p.519-522, 2010.
- [39] VIERA, V.B.; RODRIGUES, J.B.; BRASIL, C.C.B.; ROSA, C.S. Produção, caracterização e aceitabilidade de licor de camu-camu (*Myrciaria dubia* (H.B.K.) mcvaugh). *Alimentos e Nutrição*, Araraquara, v. 21, n. 4, p. 519-522, 2010.

Capítulo 3

Estudo da qualidade físico-química de iogurtes sabor morango comercializados no Município de Parauapebas-PA

Camila Barroso da Silva

João Paixão dos Santos Neto

Pamela Stephany Jennings Cunha

Igor Vinícius de Oliveira

Wilton Pires da Cruz

Priscilla Diniz Lima da Silva Bernardino

Ernestina Ribeiro dos Santos Neta

Kaliandra Souza Alves

Fábio Israel Martins Carvalho

Priscilla Andrade da Silva

Resumo: O iogurte destaca-se no mercado, pois, além de trazer grandes benefícios a saúde humana apresenta boa aceitabilidade por parte dos consumidores. Sendo assim, objetivou-se analisar os parâmetros físico-químicos, bem como, verificar se os produtos apresentam conformidade com a Legislação Brasileira vigente (Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA). Para a caracterização dos produtos foram realizadas as seguintes análises, de acidez total titulável (ATT), pH, teor de sólidos solúveis (TSS), umidade, cinzas, lipídios, proteínas, carboidratos e valor energético total (VET) de iogurtes sabor morango comercializados no Município de Parauapebas-PA. Os resultados das análises químicas dos produtos foram submetidos à análise de variância através do teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os iogurtes foram separados por selo de inspeção federal, estadual e municipal. Quanto aos resultados da análise de pH os produtos apresentaram variação média estatística entre si ($p < 0,05$), onde o valor de maior relevância foi para o produto 2 (5,17) com Selo de Inspeção Federal (SIF), para valores de sólidos solúveis totais o produto 7 com selo de inspeção municipal (SIM) apresentou o maior valor médio (18,33 g/100g), nos teores de acidez titulável total dois produtos (1 e 2) não estavam na faixa padrão da exigido pela legislação brasileira vigente, apresentando resultados inferiores 0,51 g/100g, e 0,50 g/100g respectivamente, os teores de umidade o maior valor médio foi obtido pelo produto 2 83,71 g/100g com SIF, quanto as cinzas o produto que se sobressaiu com o maior valor médio foi o 3 (0,81 g/100g) com SIF, dos lipídios analisados 3 produtos estavam em desconformidade com a legislação brasileira (1,4,e,5) apresentando valores de 2,64 g/100g; 1,26 g/100g; e 1,11 g/100g respectivamente. Já para teores de proteína todas se apresentavam nas faixas estabelecidas por lei, onde o valor mínimo é de 2,9 (g/100g). Nos carboidratos analisados o produto 5 com selo de inspeção estadual (SIE) se evidenciou com o maior valor médio (14,58 g/100g), e o menor e maior valor encontrados para valor energético total foram 69,74 kcal/100g e 104,93 kcal/100g dos produtos 4 e 7 respectivamente. Logo, a maioria dos produtos iogurtes de morango avaliados apresentaram-se dentro dos parâmetros físico-químicos exigidos pela Legislação Brasileira vigente.

Palavras-chave: Produto lácteo. Polpa de frutas. Industrializados. Caracterização.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil é tradicionalmente um grande produtor de leite, logo, sua atividade que começou com características extrativistas, já ocupa posição de destaque no cenário econômico nacional, sendo, atualmente, um dos principais agronegócios do Brasil (Siqueira et al., 2010). Em 2017 a produção de leite no país foi de 6,44 bilhões de litros, com um aumento de 3,2% em relação ao ano anterior (IBGE, 2018). Desta forma, com a grande expansão da produção do leite pelo país, buscou-se alternativas de enriquecer o produto a partir de seus derivados (iogurtes, queijos, bebidas, etc.).

O iogurte, produto obtido a partir da fermentação do leite pela ação de cultura láctea mista de *Lactobacillus bulgaricus* e *Streptococcus thermophilus* em simbiose, destaca-se por ser um produto bastante consumido pela população, uma vez, que esse alimento traz inúmeros benefícios a saúde humana, devido as suas proteínas de alto valor biológico, além de apresentar resultados satisfatórios quanto as suas características sensoriais (ROCHA, 2008).

O consumo mundial de iogurte destacou-se na década de 1960 devido à adição de polpa de frutas para atenuação do sabor ácido (Moreira et al., 1999). Desde então, esse produto ganhou espaço no dia a dia, passando a fazer parte dos hábitos alimentares de muitas pessoas (Ribeiro, 2010). Mas para que o produto chegue a mesa do consumidor de forma segura e saudável é necessário que haja um controle de qualidade rigoroso em todas as etapas do processo produtivo que vai desde a extração do leite até a comercialização do produto.

2. MATERIAL E MÉTODOS

As caracterizações físico-química dos iogurtes de morango comercializados no município de Parauapebas-PA foi realizada na Universidade Federal Rural da Amazônia, no Campus de Parauapebas Pará, localizada nas coordenadas geodésicas 49°51'19" W latitude, 06°12'58" S longitude, com altitude de 197m (com o auxílio do GPS portátil, Modelo eTrex 10, Garmin).

As 7 amostras de iogurte sabor morango foram adquiridas nas redes de supermercados do município de Parauapebas-PA, sendo as amostras 1,2,3 e 4 com selo de inspeção federal (SIF), a amostra 5 com selo de inspeção estadual (SIE) e as amostras 6 e 7 com selo de inspeção municipal (SIM). As seguintes análises foram realizadas em triplicata (n=3) para cada amostra adquirida.

- **pH:** determinado em potenciômetro digital (Marca Hanna Instruments, Modelo HI9321) previamente calibrado com soluções tampões de pH 4 e 7, de acordo com o método 981.12 da Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 1997).
- **Acidez total titulável (ATT):** realizada por titulometria com solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 N até a primeira coloração rosa persistente por aproximadamente 30 segundos, e fator de conversão do ácido láctico foi de 90.08 (AOAC, 1997).
- **Teor de sólidos solúveis (TSS):** foram quantificados nas amostras, por meio de leitura direta em refratômetro de bancada segundo AOAC (1997).
- **Umidade:** determinada por gravimetria, em estufa (Marca Tecnal Modelo TE – 395) de acordo com o método 920.151 da AOAC (1997).
- **Cinzas:** as amostras foram incineradas em forno tipo mufla a 550°C, de acordo com o método 930.05 da AOAC (1997).
- **Proteínas:** foram determinadas de acordo com Método do Biureto descrito por Layne (1957). É um método colorimétrico, cuja cor, que varia de rosa a púrpura, é formada devido ao complexo de íons de cobre e o nitrogênio das ligações peptídicas, obtidas quando soluções de proteínas em meio fortemente alcalino são tratadas com soluções diluídas de íons cúpricos. Esses compostos têm absorção máxima em $\lambda = 540$ nm. E foram lidos em espectrofotômetro do tipo uv-visível (Marca Biospectro, Modelo SP- 220)
- **Lipídios:** determinado através da extração com mistura de solventes a frio, Método de Bligh e Dyer (1959).

- **Carboidratos:** foi calculado por diferença, segundo Resolução nº 360 de 23 de dezembro de 2003 (ANVISA, 2003). Carboidratos (%): $[100 - (\% \text{ umidade} + \% \text{ proteína} + \% \text{ lipídios} + \% \text{ cinzas})]$.
- **Valor energético total (VET):** foi estimado (kcal/100g) utilizando-se os fatores de conversão de Atwater: 4 kcal/g para carboidratos e proteínas e 9 kcal/g para lipídios segundo Anderson et al. (1988) e a Resolução nº 360 de 23 de dezembro de 2003 (ANVISA, 2003).

Os resultados das análises físico-químicas dos iogurtes comercializados foram avaliados através das médias aritméticas submetidas à análise de variância, e quando apresentaram diferenças foram comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o software SAS® versão 9.4 (SAS INSTITUTE, 2013).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores médios obtidos nas determinações de pH, TSS e ATT podem ser verificados na Tabela 1 e a caracterização físico-química dos produtos, pode ser visualizada na Tabela 2.

Tabela 1 - Análise de pH, TSS e ATT de iogurtes comercializados em Parauapebas-PA

Produto	pH	TSS (°Brix) *	ATT (g/100g) *
1 (SIF)	3,80 ± 0,10 ^c	13,33 ± 0,27 ^d	0,51 ± 0,01 ^d
2 (SIF)	5,17 ± 0,12 ^a	13,17 ± 0,29 ^d	0,50 ± 0,05 ^d
3 (SIF)	4,37 ± 0,15 ^{bc}	17,17 ± 0,21 ^b	0,69 ± 0,02 ^c
4 (SIF)	4,07 ± 0,06 ^{bc}	15,17 ± 0,24 ^c	0,80 ± 0,02 ^b
5 (SIE)	3,80 ± 0,06 ^c	17,67 ± 0,58 ^{ab}	0,88 ± 0,01 ^a
6 (SIM)	4,04 ± 0,15 ^{bc}	15,17 ± 0,28 ^c	0,80 ± 0,03 ^b
7 (SIM)	4,55 ± 0,07 ^{ab}	18,33 ± 0,29 ^a	0,68 ± 0,03 ^c
DMS	0,62	0,96	0,07
F calc.	14,53	107,27	99,93
CV	5,23	2,20	3,72

*Resultados em base úmida. TSS – Teor de sólidos solúveis; ATT- Acidez total titulável (expressa em ácido láctico); SIF – Selo de Inspeção Federal; SIE – Selo de Inspeção Estadual; SIM – Selo de Inspeção Municipal. DMS – Diferença mínima significativa; médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. CV – Coeficiente de variação experimental; Os valores representam a média ± Desvio padrão de três replicatas (n=3).

Para os valores de pH, observou-se que todas as amostras apresentaram variação média estatística entre si ($p < 0,05$) (Tabela 1). Os menores valores médios obtidos foram para os produtos 1 (3,80) e 5 (3,80). Ressalta-se que valores de pH para iogurtes não são encontrados na legislação brasileira. Segundo Fernandes et al. (2013) valores de pH entre 3,7 e 4,6 são normalmente encontrados em iogurtes de frutas industrializados, mas os valores ideais devem estar entre 4,0 e 4,4. No presente trabalho três amostras encontraram-se em valores ideais, e três estavam em parâmetros aceitáveis de acordo com Fernandes et al., (2013) e apenas a amostra 2 apresentou valor superior (5,17) aos encontrados.

As possíveis causas para a variação da faixa de pH dos produtos caracterizados se devem a falta de controle de qualidade das matérias-primas, da cultura utilizada na fabricação do iogurte, no bioprocessamento, transporte e armazenamento do produto final. Silva et al. (2012) afirma que os valores de pH implicam na atividade metabólica das bactérias, o que pode favorecer um grupo de micro-organismos em detrimento do outro (efeito antibiótico).

No caso da fermentação do iogurte, bactérias do gênero *Lactobacillus* crescem e toleram pH menores do que as pertencentes ao gênero *Streptococcus*. Então acredita-se que alguma falha ocorreu no bioprocessamento de fabricação que beneficiou o crescimento de bactérias do gênero *Streptococcus* as quais produziram menos ácido, fazendo com o que pH ficasse um pouco mais alto.

Ainda na Tabela 1, o maior valor médio de sólidos solúveis totais (TSS) encontrado neste trabalho foi do produto 7 (18,3°Brix), quanto aos menores valores, os produtos 1 e 2 destacaram-se com 13,3 e 13,1°Brix, respectivamente. Resultados encontrados por Rodrigues et al., (2012) para iogurtes sabor morango foram na faixa de 16 a 21°Brix. Valores estes, distintos quando comparados ao obtido neste trabalho. Resende et al. (2010) avaliaram quatro cultivares distintas de morangueiro, e observaram que os valores médios de sólidos solúveis totais ficaram em torno de (6,12; 7,50; 5,91 e 5,88°Brix), sendo assim, uma hipótese a ser levantada sobre os valores de TSS obtidos neste trabalho é que a polpa acrescentada no iogurte pode ter interferido no resultado final para este parâmetro, uma vez, que não se têm informações sobre as cultivares de morango utilizadas na fabricação do produto.

De acordo com Legislação brasileira vigente (Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento -Mapa) os valores de acidez total titulável (ATT) para iogurtes em geral estão entre 0,6 a 1,5% (g/100 g ácido láctico) (BRASIL, 2007). Desta forma, cinco produtos (3, 4, 5, 6 e 7) avaliados estão dentro deste parâmetro e duas amostras (1 e 2) apresentaram desconformidade com a legislação vigente (Tabela 1). O maior valor médio encontrado para este parâmetro foi (0,88 g/100g) para o produto 5 e os menores valores ficaram para os produtos 1 e 2 (0,51 e 0,50 g/100g) respectivamente. Vários são os fatores que podem causar variação na acidez, entre eles estão o processamento inadequado dos produtos, falha nas condições higiênico-sanitárias e ausência de controle da temperatura durante o armazenamento dos mesmos (SILVA et al., 2012).

Sendo assim, alguns desses fatores podem ter contribuído para a possível variação dos resultados. Essa variação de acidez pode acarretar no desenvolvimento de microrganismos mais tolerantes, como fungos filamentosos e leveduras, ocasionando modificações organolépticas indesejáveis, o que pode causar rejeição por parte dos consumidores (FERNANDES et al., 2013).

Tabela 2 - Análises físico-químicas de iogurtes comercializados em Parauapebas-PA

Produto	UMI* (g/100g)	CIN* (g/100g)	LÍP* (g/100g)	PROT* (g/100g)	CARB* (g/100g)	VET (kcal./100g)
1 (SIF)	83,65 ± 0,08 ^a	0,54 ± 0,01 ^d	2,64 ± 0,31 ^c	4,81 ± 0,11 ^d	8,38 ± 0,18 ^d	76,52
2 (SIF)	83,71 ± 0,53 ^a	0,65 ± 0,02 ^c	3,48 ± 0,25 ^b	4,22 ± 0,12 ^f	8,06 ± 0,22 ^d	80,44
3 (SIF)	82,20 ± 0,53 ^b	0,81 ± 0,02 ^a	1,24 ± 0,19 ^d	4,41 ± 0,14 ^e	11,35 ± 0,33 ^b	74,20
4 (SIF)	83,36 ± 0,49 ^a	0,79 ± 0,00 ^{ab}	1,26 ± 0,14 ^d	5,10 ± 0,13 ^c	9,50 ± 0,56 ^c	69,74
5 (SIE)	80,21 ± 0,07 ^c	0,79 ± 0,03 ^{ab}	1,11 ± 0,03 ^d	3,30 ± 1,24 ^g	14,58 ± 1,34 ^a	81,51
6 (SIM)	83,61 ± 1,33 ^a	0,54 ± 0,02 ^d	4,29 ± 0,31 ^a	5,40 ± 0,10 ^b	6,12 ± 1,24 ^e	84,69
7 (SIM)	77,66 ± 0,17 ^d	0,73 ± 0,08 ^b	3,69 ± 0,28 ^{ab}	7,00 ± 1,00 ^a	10,93 ± 0,92 ^b	104,93
DMS	0,97	0,07	0,66	0,28	0,89	-
F calc.	134,37	69,59	95,39	407,71	223,12	-
CV	0,42	3,51	9,33	2,05	3,23	-

*Resultados em base úmida. UMI – umidade; LIP – lipídios; PROT – proteínas; CARB – Carboidratos; VET – Valor energético total; SIF – Selo de Inspeção Federal; SIE – Selo de Inspeção Estadual; SIM – Selo de Inspeção Municipal.

DMS – Diferença mínima significativa; medias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. CV – Coeficiente de variação experimental. Os valores representam a média ± Desvio padrão de três replicatas (n=3).

Na Tabela 2, dos valores de umidade encontrados nos sete produtos de iogurtes, o produto 7 obteve o menor valor médio (77,6g/100g), já o maior valor obtido foi para a amostra 2 (83,7g/100g) ($p < 0,05$). Pacheco et al. (2015) obteve valores de umidade para iogurte tradicionais sabor morango nas faixas de (75,0 a 82,0g/100g) valores próximos aos encontrados no presente trabalho. A umidade é um parâmetro de extrema importância dentro das análises, pois a quantidade de água encontrada em alimentos pode interferir no produto final. Além disso, este parâmetro para iogurte está relacionado com sua estabilidade microbiológica, composição nutricional e aceitação sensorial (Oliveira et al., 2017).

Sobre os teores de cinzas os valores observados foram para o produto 1 (0,54g/100g) e produto 6 (0,54g/100g), enquanto o produto 3 (0,81g/100g) obteve o maior valor. Rodas et al (2001) obteve resultados para iogurtes industrializados de (0,60 a 0,77g/100g) resultados estes, que se assemelham aos encontrados. Embora não tenham sido determinados os compostos individuais das cinzas, Queiroz (2014), afirma que os minerais encontrados em maior quantidade em produtos lácteos, como o iogurte, são o cálcio, magnésio, fósforo e potássio.

Segundo a Instrução Normativa nº 46, de 23 de outubro de 2007, os valores adequados de lipídios para leites fermentados parcialmente desnatado e integral são de 0,6 a 2,9 e 3,0 a 5,9(g/100g) respectivamente. Sendo assim, das 7 amostras analisadas 6 se enquadraram em iogurtes integrais (1,2,4,5,6 e 7) e uma amostra apresentou característica de iogurte parcialmente desnatado (3) (Tabela 2). Das amostras integrais, 3 apresentaram desconformidade com a legislação e 3 conformidade, e o único produto classificado como parcialmente desnatado esteve dentro da faixa exigida por lei (Brasil, 2007). Para os menores e maiores valores médios obtidos neste parâmetro estavam as amostras 5 (1,11g/100g) e 6 (4,29g/100g) (Tabela 2).

O teor de gordura do leite pode variar devido a fatores como raça, período de lactação, sanidade e alimentação fornecida ao animal. Porém fraudes por adição de água são fatores frequentes que podem gerar tal desconformidade do produto (PEREIRA, 2016). Acredita-se que algum destes fatores pode ter influenciado na qualidade da matéria-prima do iogurte fazendo com que o produto não estivesse na faixa de gordura recomendada.

Os valores de proteínas expostos na Tabela 2 ficaram na faixa entre 3,3 a 7,0g/100g e todas as amostras para esse parâmetro diferiram-se estatisticamente entre si ($p < 0,05$). Então pôde-se afirmar que os sete produtos se encontraram de acordo com legislação vigente, uma vez que, o valor mínimo indicado é 2,9 (g/100g) (BRASIL, 2007).

Esses valores também coincidem quando comparados ao experimento de Medeiros et al., (2011) que apresentaram resultados de 4,8 e 4,7g/100g de proteínas em iogurtes sabor jaca. A ocorrência de fraude no leite pode alterar as características físico-químicas, afetando sua qualidade nutricional e gerando prejuízo para o processamento de derivados (FERNANDES, 2013) estes fatores, porém, não se aplicam aos resultados deste trabalho, uma vez, que todos estão em conformidade.

Para o teor de carboidratos, os resultados obtidos neste trabalho variaram de 6,12 a 14,58g/100g, valores médios bem distintos quando comparados entre si ($p < 0,05$) (Tabela 2). Rodas et al. (2001) ao avaliar 8 amostras de iogurte com polpas de frutas obtiveram resultados para carboidratos em uma faixa de 15,1 a 17,4g/100g e Pacheco (2015), conseguiu 9,1 a 15,6g/100g, valores superiores quando comparados aos obtidos neste trabalho. Uma possível explicação para estes resultados se deve a desconformidade no teor de lipídios dos produtos avaliados nos diferentes selos de inspeções.

Quanto aos resultados obtidos nos valores energéticos totais (VET) de cada amostra analisada foi observada uma faixa que vai de 67,9 a 104,9 kcal/100g. Rodas et al., (2001) encontraram valores próximos em suas análises (89 a 97kcal/100g) ao avaliarem a viabilidade de bactérias lácticas em iogurtes com frutas.

4. CONCLUSÃO

Através das análises físico químicas propostas pelo estudo conclui-se que o valor de pH que obteve maior destaque foi o produto 2, para valores de TSS o produto 7 apresentou o maior valor médio, na acidez total titulável 2 produtos não estavam na faixa padrão da exigido pela legislação brasileira vigente, quanto aos teores de umidade, o maior valor médio observado pela amostra 2. Quanto as cinzas a marca que se sobressaiu com o maior valor médio foi a 3. Dos lipídios analisados, 3 amostras estavam em desconformidade com a legislação. Para os teores de proteínas, todas as amostras apresentaram-se nas faixas estabelecidas por lei. Quanto aos carboidratos, a marca 5 se destacou das demais amostras com o maior valor médio. E o menor e maior valor encontrados para VET foram 69,7 e 104,9 para os produtos 4 e 7 respectivamente.

Em termos gerais a maioria dos produtos dos iogurtes de morango avaliados apresentaram-se dentro dos parâmetros físico-químicos exigidos pela Legislação brasileira vigente. Estudos mais aprofundados (microbiológicos) poderiam ser realizados para que o consumidor de Parauapebas-PA possa obter maior conhecimento da qualidade dos derivados lácteos que estão disponíveis nas redes de supermercado do município.

REFERÊNCIAS

- [1] ANDERSON, L.; DIBBLE, M. V.; TURKKI, P. R.; MITCHEL, H. S.; RYNBERGEN, H. J. Satisfazendo as normas nutricionais. In: nutrição 17 ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988 cap.10, p.179-1989
- [2] ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003. Aprova o Regulamento Técnico sobre rotulagem nutricional de alimentos embalados. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]. Brasília, p.4, dez. 2003. Seção 1.
- [3] ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS. Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 16th ed. Washington, DC, 1997.
- [4] Bligh, E. C.; DYER, W. J. A rapid method of total lipid and purification. Canadian Journal Biochemistry Physiology, Ottawa, v. 37, p. 911-917, 1959.
- [5] FERNANDES, E. N.; ABREU, C. C.; OLIVEIRA, I. C.; RASMINI, J. P. A.; CUNHA, A. F. Qualidade físico-química de iogurtes comercializado em viçosa (MG). In: V Simpósio de Produção Acadêmica, 5., 2013, Viçosa. Anais. Viçosa: FACISA/UNIVIÇOSA, 2013. p. 519-524.
- [6] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA - IBGE. Indicadores IBGE. Estatística da Produção Pecuária 2018.
- [7] LAYNE, E. Spectrophotometric and turbidimetric methods of measuring proteins. In: COLOWICK, S.P. E KAPLAN, N.O. eds. Methods in enzymology, New York, Academic Press, v. 3, 447-454, 1957.
- [8] MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 28, de 12 de junho de 2007. Aprova o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Composto Lácteo. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]. Brasília, p.8, jun. 2007, nº 113, seção 1.
- [9] MEDEIROS, T. C.; MOURA, A. S.; ARAÚJO, K. B. DE; AQUINO, L. C. L. de. Elaboração de iogurte de jaca: Avaliação físico-química, microbiológica e sensorial. Scientia Plena, Sergipe, v. 7, n. 9, p. 2-4, mar/jun, 2011.
- [10] MOREIRA, R. S.; SCHWAN, R. F.; CARVALHO, E. P.; FERREIRA, C. Análise microbiológica e química de iogurtes comercializados em Lavras – MG. Food Science and Technology, Lavras, vol.19, n.1, jan 1999 p.147-152.
- [11] OLIVEIRA, J. F.; GARCIA, L. N. H.; PASTORE, V. A. A.; RAGHIANTE, F.; POSSEBON, F. S.; PINTO, J. P. A. N.; MARTINS, O. A. Qualidade de iogurtes de coco e morango. Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal, v.11, n.4, out - dez 2017. p. 416 – 425.
- [12] PACHECO, H. F. B.; SIGOLO, L. M. N.; RIBEIRO, A. P. B.; OLIVEIRA, J. M. Composição centesimal de iogurtes tradicionais e iogurtes líquidos: incompatibilidade com as descrições da rotulagem. Revista Instituto Adolfo Lutz, v.7, n.4, set. 2015 p. 381-389.
- [13] PEREIRA, A. K. A. Elaboração e avaliação de iogurte adicionado com preparado de banana e tamarindo. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação em tecnologia de alimentos) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Currais novos, 2016.
- [14] QUEIROZ, M. B. Elaboração e Caracterização Físico-Química e Sensorial de Iogurte Prebiótico de Acerola. 2014. 42 f. TCC (Técnico em Alimentos) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros, 2014.
- [15] RESENDE, J.T.V.; MORALES, R. G. F.; FARIAS, M. V.; RISSINI, A. L. L.; CAMARGO, L. K. P.; CAMARGO, C. K. Produtividade e teor de sólidos solúveis de frutos de cultivares de morangueiro em ambiente protegido. Horticultura brasileira., v. 28, n. 2, abr.- jun. 2010 p.115-189.
- [16] RIBEIRO, A. M.; ANDREOLLI, E. F. MENEZES, L. A. A. Elaboração de iogurte de chocolate com menta. 2011. Trabalho de conclusão de curso (graduação em tecnologia de alimentos) – Universidade tecnologia federal do Paraná, medianeira, 2011.
- [17] ROCHA, C. Elaboração e avaliação de iogurte sabor frutos do cerrado. Boletim do CEPPA, Curitiba, v. 26, n. 2, p. 255-266, 2008.
- [18] RODAS, M. A. B.; RODRIGUES, R. M. M. S.; SAKUMA, H.; TAVARES, L. Z.; SGARBI, C. R.; LOPES, C. C. W. Caracterização físico-química, histológica e viabilidade de bactérias lácticas em iogurtes com Frutas. Ciência Tecnologia de Alimentos, Campinas, v.1 n.1, out. 2001. p. 304 – 309.
- [19] RODRIGUES, L. A.; RODRIGUES, G. K.; CORINGA, A. O.; GONÇALVES, T. O. de. Determinação dos sólidos solúveis totais (°Brix), pH e condutividade em bebidas lácteas comercializadas em Cuiabá/MT In: Congresso Brasileiro de Química, 26. 2012, Recife: química dos alimentos resumo... Recife 2012.
- [20] SAS INSTITUTE. SAS for Windows, versão 9.4 SAS®: SAS User guide. Carry, 2013.
- [21] SILVA, C. L.; MACHADO, B. T.; SILVEIRA, M. L. R.; ROSA, C. V.; BERTAGNOLLI, S. M. M. Aspectos microbiológicos, pH e acidez de iogurtes de produção caseira comparados aos industrializados da região de santa maria – RS. Disc. Scientia. Série: Ciências da Saúde, Santa Maria, v. 13, n. 1, out. 2012. p.111-120.
- [22] SIQUEIRA, K.B.; CARNEIRO, A.V.; ALMEIDA, M.F.; SOUZA, R.C.S.N.P. O mercado lácteo brasileiro no contexto mundial. Embrapa Gado de Leite. Juiz de Fora, Dezembro, 2010, 12 p. (Circular Técnica n. 104)

Capítulo 4

Qualidade físico-química de carnes moídas bovina in natura comercializadas no Município de Parauapebas-PA

Camila Barroso da Silva

Elda de Souza Leite

Jocyel Caetano da Silva

Mychelle Cristina Alves dos Santos

Vilson Cleber Fusco da Silva

Bianca de Jesus Figuerêdo Dias

João Paixão dos Santos Neto

Igor Vinícius de Oliveira

Priscilla Diniz Lima da Silva Bernardino

Ernestina Ribeiro dos Santos Neta

Kaliandra Souza Alves

Priscila Andrade Silva

Resumo: A carne moída é o produto obtido a partir da moagem de massas musculares de carcaças de bovinos, seguido de imediato resfriamento ou congelamento. O presente trabalho teve como objetivo avaliar os parâmetros físico-químicos da carne bovina moída comercializadas em diferentes supermercados no município de Parauapebas-PA. Para a determinação físico-química foram adquiridas amostras de seis estabelecimentos da região. Foram feitas análises de temperatura, pH, CRA, cocção, acidez titulável, umidade e cinzas. Os resultados foram submetidos a análise de variância através do teste de Tukey a 5% de probabilidade. A análise química demonstra que os parâmetros avaliados estão de acordo com a literatura e legislação. No entanto, os valores encontrados durante a filtragem nas amostras dos produtos 2, 3 e 4 apresentaram inconformidade com a legislação, o tempo de filtração de 10 minutos ou mais foram caracterizadas como carne suspeita ou alterada. As médias de temperatura da amostra e o teste de cocção para o produto 1 apresentaram inconformidade com a Instrução Normativa Nº 83, de 21 de novembro de 2003. Diante disso, acredita-se que os estabelecimentos devam ser fiscalizados com maior rigor e que ações educativas para os consumidores devam ser oferecidas visando a garantia da qualidade alimentar.

Palavras-chave: Carcaça de bovinos; análises e consumidores.

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, houve grandes transformações no consumo de carnes por parte da população brasileira (Travassos; Coelho, 2017). Aponta que uma das formas de carne mais consumidas no Brasil é a moída. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) carne triturada deve ser designada carne moída, deve conter qual espécie animal o seu origem e deve ser mantida em temperatura não superior a 10° C. Não é necessário especificar o sexo do animal e é facultativo nomear o corte que a carne moída foi obtida. Possui como composição obrigatória, massas musculares esqueléticas de bovinos. As carnes utilizadas na elaboração devem ter sido submetidas aos processos de inspeção conforme prescritos no Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem (Mapa, 2003).

A definição de carne moída segundo o Anexo II da Instrução Normativa Nº 83, de 21 de novembro de 2003, trata-se do produto cárneo obtido a partir da moagem de massas musculares de carcaças de bovinos, sendo a venda da carne moída permitida se a moagem for feita mediante na presença do consumidor (BRASIL, 2003).

A carne bovina é um alimento nobre de fundamental importância na alimentação humana, tanto pelo seu valor nutritivo quanto pelo seu valor sensorial. A partir de suas gorduras, proteínas e vitaminas, a carne serve para a produção de energia, produção de novos tecidos orgânicos e para a regulação dos processos fisiológicos (PIGARRO; SANTOS, 2008).

A carne na forma moída é amplamente consumida, pela versatilidade de pratos que permite elaborar. Além, da sua facilidade de preparo e pelo seu baixo custo (OLIVEIRA et al., 2008).

Por ser constituída da fragmentação dos tecidos e liberação de suco celular ela se apresenta como um alvo de contaminação por microrganismos. Por isso, boas práticas de manipulação e fabricação devem ser adotadas, a fim de evitar a contaminação assim como a deterioração do produto (FERREIRA; SIMM, 2012). Outro fator extremamente relevante é a higiene dos equipamentos e utensílios utilizados na manipulação da carne, seja durante o processamento ou no preparo doméstico (LOGUERCIO et al., 2003). Assim que sair do equipamento de moagem a carne moída deverá estar em temperatura nunca superior a 7°C e ser submetida, imediatamente, ao congelamento (rápido ou ultra-rápido) ou ao resfriamento (MAPA, 2003). Diante do exposto, tem-se por objetivo avaliar os parâmetros físico-químicos da carne bovina moída comercializadas em diferentes supermercados comerciais no município de Parauapebas-PA.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Foram coletadas seis amostras de carne moída em diferentes redes de supermercados no município de Parauapebas-PA. Para fins de sigilo cada amostra foi denominada 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os dados foram coletados no mês de junho de 2019, constituindo-se de duas etapas: I- coleta da amostra de carne moída in natura; II- análise físico-química realizada no Laboratório de Análise de Alimentos da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, Campus de Parauapebas, região sudeste do Estado do Pará, localizada nas coordenadas geodésicas 49°51'19" W latitude, 06°12'58" S longitude, com altitude de 197m (com o auxílio do GPS portátil, Modelo eTrex 10, Garmin).

As carnes estavam armazenadas em balcão refrigerado nos supermercados, alojados em bandejas plásticas e foram retiradas do centro da mesma, a fim de coletar uma amostra composta representativa. Cada alíquota possuía peso médio de 300 g, e após a pesagem foi aferida ainda no estabelecimento a temperatura inicial das alíquotas, depois foram embaladas em sacos plásticos e transportadas em caixa térmica até o Laboratório da UFRA. Cada amostra foi dividida em triplicata para realização das análises.

As seguintes análises foram realizadas em triplicata (n=3) nas carnes moídas adquiridas: pH: determinado em potenciômetro da marca Hanna Instruments, modelo HI9321, previamente calibrado com soluções tampões de pH 4 e 7, de acordo com o método 981.12 da AOAC (1997). Capacidade de retenção de água (CRA): pesou-se em balança analítica aproximadamente 2 g de cada amostra. Depois as amostras foram envolvidas em papel filtro e submetidas a pressão de 10 kg por 5 minutos. Decorrido o tempo todas as amostras foram pesadas novamente para a quantificação da perda de água. Na prova de cocção foram pesadas aproximadamente 20g de cada amostra em um Becker de 250ml, cobriu-se bem com água destilada, e tampou-se o Becker com vidro de relógio. Depois foi aquecido até o início dos primeiros vapores, para perceber o odor dos vapores produzidos. Foram aquecidos por mais 5 minutos, e observou-se as características do caldo e da carne. As análises de acidez total titulável (ATT), umidade e cinzas foram realizadas conforme as técnicas da AOAC (1997).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores médios obtidos na caracterização física e química da carne moída podem ser observados nas Tabelas 1 e 2.

A qualidade de uma carne é controlada pelos fatores extrínsecos e intrínsecos, os fatores extrínsecos são representados por efeitos relacionados a característica da carne e ao exterior, o ambiente, a exemplo: (i). a manipulação indevida, (ii). contaminação cruzada, (iii). higiene, (iv). umidade relativa do ar, (v). temperatura de acondicionamento, entre outros. Já os fatores intrínsecos são altamente importantes, já que a carne é considerada um ótimo meio de cultura, por apresentar alta atividade de água ($A_w > 0,95$).

Tabela 1. Características físico-químicas das carnes moídas.

Produtos	pH	Acidez (%)	CRA (%)	Umidade (%)	Cinzas (%)
1	5,82 ± 0,06 ^{ab}	0,48 ± 0,05 ^c	60,67 ± 1,35	72,49 ± 0,22 ^{bc}	0,85 ± 0,01 ^b
2	5,73 ± 0,02 ^b	0,60 ± 0,8 ^{bc}	63,85 ± 4,44	75,91 ± 0,45 ^a	0,92 ± 0,01 ^a
3	5,86 ± 0,01 ^a	0,49 ± 0,04 ^c	59,18 ± 3,97	71,19 ± 1,31 ^{dc}	0,95 ± 0,00 ^a
4	5,90 ± 0,04 ^a	0,68 ± 0,01 ^b	67,61 ± 2,46	67,77 ± 0,57 ^e	0,82 ± 0,05 ^b
5	5,50 ± 0,02 ^c	0,95 ± 0,03 ^a	68,47 ± 6,90	69,24 ± 1,06 ^{de}	0,74 ± 0,02 ^c
6	5,50 ± 0,02 ^c	0,88 ± 0,03 ^a	65,63 ± 0,10	74,55 ± 1,21 ^{ab}	0,80 ± 0,02 ^{bc}
DMS	0,09	0,13	10,68	2,47	0,06
Fcal	86,44	56,43	2,76	35,56	35,85
CV	0,58	6,69	6,06	1,25	2,64

Segundo Mancini; Hunt (2005), as carnes com uma coloração escura, além de apresentar pH inadequado, têm efeitos na qualidade e na vida útil deste produto. O manejo inadequado dos animais pré-abate possibilita uma queda do pH, devido à diminuição da reserva de energia (insuficiente para transformação em ácido láctico). Com o esgotamento do glicogênio muscular, o processo de transformação pós-mortem ocasiona uma alteração do grau de acidez da carne (pH elevado), resultando em cortes escuros. Neste sentido, o pH se caracteriza como um importante indicador da qualidade da carne, que influencia a aparência dos cortes e atributos de qualidade sensoriais (maciez, cor, sabor e odor).

O pH das amostras analisadas variou entre 5,50 e 5,90 (Tabela 1), estão de acordo com os limites permitidos pela legislação vigente para carne in natura (BRASIL, 1981). Valores próximos foram verificados por Mujica et al. (2015), também em carne moída (5,12 e 5,48). Nenhuma das amostras estavam fora do padrão estabelecido pelo Laboratório Nacional de Referência Animal (LANARA) (BRASIL, 1989), que considera carnes moídas com pH acima de 6,4 em início de decomposição.

De acordo com o estudo de Roça e Serrano (1995), os valores de acidez total titulável em carne bovina estavam na faixa de 2,0 a 3,2 %. Os valores das análises dos produtos estão próximos a 1,0% (Tabela 1). Porém, Matos et al. (2007) demonstraram valores de acidez titulável entre 1,0 a 2,5% em matéria-prima bovina para fabricação de embutidos.

Os valores de capacidade de retenção de água (CRA) das amostras avaliadas variaram entre 59,18 e 68,57% (Tabela 1), e não houve diferença estatística entre as amostras. Na legislação em vigor, não existem parâmetros para a CRA. Em geral, em tecido muscular magro é observado um teor de 65 a 80% e esta alta porcentagem ocorre devido à sua natureza bioquímica polar, quando comparado com o tecido adiposo, o qual possui moléculas não-polares, nas quais dificilmente a água se dissolve (PRANDL et al., 1994; ABERLE et al., 2001; NELSON; Cox, 2006).

A formação de ácido láctico e a consequente queda do pH post mortem são responsáveis pela diminuição da capacidade de reter água da carne. Essas reações causam uma desnaturação e perda da solubilidade das proteínas musculares, ou seja, o número de cargas negativas. Consequentemente, estes grupos não têm capacidade de atrair água, pois somente os grupos hidrofílicos carregados possuem esta capacidade. O efeito do pH na capacidade de retenção de água é denominado de efeito de carga neutra. A capacidade de retenção de água é menor em pH 5,2-5,3, ou seja, no ponto isoelétrico da maior parte das proteínas musculares (PEDERSEN, 1975).

Os valores de umidade variaram de 67,77 até 75,91%. Os resultados corroboram com os referenciados por Taco (2011) 72,70% e USP (2008) 65,80%. Os teores de cinzas apresentaram-se entre 0,74 e 0,95% (Tabela 1). Segundo Rodrigues; Andrade (2004), quando o teor de gordura na carne é maior, há tendência de diminuição do teor de umidade, de proteína e de minerais, possivelmente porque a gordura ocupa o espaço no interior da carne desses constituintes, observa-se esta tendência na amostra 3.

Tabela 2. Característica física da carne moída

Produtos	FiltraçãoTempo (minutos)	Temperatura C°	Prova de Cocção	
			Odor	Textura
1	<10	20 ± 0,03 ^a	Amoniacal	Pouco firme
2	>10	14 ± 0,02 ^b	Típico	Pouco firme
3	>10	18 ± 0,02 ^b	Típico	Pouco firme
4	>10	18 ± 0,03 ^a	Típico	Firme
5	≥5	12 ± 0,02 ^b	Típico	Firme
6	≥5	15 ± 0,03 ^a	Típico	Firme

Considerou-se a classificação da carne de acordo com o tempo de filtração: carne fresca e sã, (5 minutos); carne de média conservação (6 a 10 minutos); carne suspeita, provavelmente alterada (10 minutos ou mais). Com base no teste, os produtos 5 e 6 estavam frescos, o produto 1 em média conservação e os produtos 2, 3 e 4 como carne suspeita ou alterada (Tabela 2).

As temperaturas de armazenamentos das carnes moídas variaram de 12 a 20°C (Tabela 2), sendo que o produto 1 encontra-se fora dos padrões de temperatura ideal para conservação de carne moída instituída pela Instrução Normativa Nº 83, de 21 de novembro de 2003 (BRASIL, 2003).

Durante a coleta das amostras notamos que vários refrigeradores não apresentavam termômetros porém, a temperatura de armazenamento é um elemento extremamente importante para a conservação do alimento, pois a velocidade de multiplicação das bactérias é influenciada entre outros fatores, pela temperatura (HAZELWOOD; MCLEAN, 1998; MORANDINI et al., 2001). Morandini et al. (2001), verificaram a qualidade microbiológica de carne moída resfriada, vendida a varejo no Rio Grande Sul, encontraram balcões frigoríficos cujas temperaturas variavam de 0°C a 12°C e nesses mesmos balcões, 93,5% das amostras apresentaram-se impróprias para o consumo, de acordo com a análise de coliformes fecais. De acordo com a NTE 01/95, os alimentos comprovadamente congelados devem ser mantidos em temperatura igual ou inferior a -18°C (RECIFE, 1995). Para Bramorski et al. (2005), a falta de controle de temperatura de conservação dos alimentos perecíveis pode provocar perdas econômicas e nutricionais do produto, além de comprometer a segurança sanitária e alterar características sensoriais como sabor, odor, cor e textura.

A perda de peso por cocção é influenciada especialmente pela quantidade de gordura subcutânea existente na carcaça que vai favorecer a capacidade de retenção de água. As propriedades físicas da carne, como firmeza e textura, são difíceis de avaliar objetivamente. Estes fatores são geralmente avaliados por análise sensorial (visual, tátil e degustativa). De acordo com a Tabela 2, podemos observar que apenas o produto 1 estava com odor amoniacal, estando assim imprópria para consumo.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, o controle da temperatura de refrigeração da carne moída é um problema real nos estabelecimentos no município de Parauapebas, desta forma a fiscalização deve ser mais exigente no que diz respeito ao cumprimento das boas práticas, já que grande parte das amostras analisadas encontravam-se armazenadas sob temperaturas insatisfatórias. Isso é um dos fatores que contribui com um produto de baixa qualidade.

Embora tenham sido verificadas variações quanto aos aspectos físico-químicos dos tratamentos analisados, a maioria encontram-se em consonância com o observado na literatura e legislação vigente, exceto para o pH da amostra 4, que apresentou a maior média de pH e consequentemente menor teor de umidade, fator que pode alterar a qualidade visual (cor escura) e sensorial (sabor e odor).

REFERÊNCIAS

- [1] ABERLE, E.D. FORREST, John C; GERRARD, David e Mills, Edward. Principles of meat science. 4. ed. Dubuque, Iowa: Kendall Hunt Publishing Company, 2001. Cap. 2; 8; 9, 354p.
- [2] AOAC- Association of Official Analytical Chemistry. Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemistry. 16. ed. Arlington: Washington, v. 1-2, 1997.
- [3] BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório Nacional de Referência Animal (Lanara). Portaria 001, de 07 de outubro de 1981. Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem animal e seus ingredientes: métodos físico-químicos. Diário Oficial da União, Brasília, DF. 13 de out. de 1981.
- [4] BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento. Instrução Normativa nº 83, de 21 de novembro de 2003. Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Carne Moída de Bovino. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], 24 nov. 2003, Seção 1.
- [5] BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento. Métodos Analíticos para Controle de Produtos de Origem Animal e seus Ingredientes – Lanara. Brasília, 1989.
- [6] FERREIRA, R. S; SIMM, E. M. Análise microbiológica da carne moída de um açougue da região central do município de Pará de Minas/MG. SynThesis Revista Digital, FAPAM, Pará de Minas, n.3, 37 - 61, abr. 2012.
- [7] HAZELWOOD, D.; Mclean, A. C. Manual de higiene para manipuladores de alimentos. São Paulo: Varela, 1998. 140p. IBGE.
- [8] LOGUERCIO, A. P.; SILVA, W. P.; ALEIXO, J. A. G. Condições higiênico-sanitárias no processamento de carne bovina moída. Revista Higiene Alimentar, São Paulo v.14, n.72, p.60-65, 2002.
- [9] MANCINI, R. A.; HUNT, M. C. Current research in meat color. Meat Science, v. 71, p. 100–121, 2005.
- [10] MORANDINI, L. M. B. et al. Qualidade microbiológica de carne moída resfriada. In: IV Simpósio Latino-Americano de Ciência de Alimentos, Campinas, 4 . 2001.
- [11] NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger princípios de bioquímica. 4.ed. São Paulo: Sarvier, 2006. 1202p.
- [12] OLIVEIRA, M. M. M.; BRUGNERA, D. F.; MENDONÇA, A. T.; PICCOLI, R. H. Condições higiênico-sanitárias de máquinas de moer carne, mãos de manipuladores e qualidade microbiológica de carne moída. Ciência agrotecnológica, Lavras, v. 32, n. 6, p. 1893-1898, 2008.
- [13] PIGARRO, M.A.P; SANTOS, M. Avaliação microbiológica da carne moída de duas redes de supermercados da cidade de Londrina- PR. Trabalho de conclusão de curso (Pós-Graduação em Higiene e Inspeção de Produtos de Origem Animal) - Instituto Qualittas, Universidade Castelo Branco, 2008.
- [14] PRANDL, O.; FISCHER, A.; SCHMIDHOFER, T.; SINELL, H. J. Tecnologia e higiene de la carne. Zaragoza: Acríbia, 1994. 854 p.
- [15] RECIFE. Prefeitura da Cidade. Norma Técnica Especial - NTE nº 01, de 1995. Temperatura de alimentos comercializados.
- [16] ROÇA, R. O.; Serrano, A. M. Influência do banho de aspersão ante morte na eficiência da sangria e parâmetros bioquímicos de carne bovina. Pesquisa Agropécuaria Brasileira, Brasília, v 30, n. 8. 1995.
- [17] TRAVASSOS, G. F.; COELHO, A.B. Padrão de Substituição entre Carnes no Consumo Domiciliar do Brasil. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 55, p. 285-304, 2017.
- [18] UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas). Tabela brasileira de composição de alimentos - Taco. 4. ed. rev. e ampl. Campinas: UNICAMP/NEPA, 2011. 161 p.
- [19] USP (Universidade Estadual de São Paulo). Tabela brasileira de composição de alimentos, versão 5.0. São Paulo: USP, 2008.

Capítulo 5

Caracterização físico-química e microbiológica de kaftas elaboradas com carne caprina e farinha de aveia (Avena Sativa L.)

Hudson Chagas da Silva

Thaianny Ruth da Silva

Íris Braz da Silva Araújo

Camila Sampaio Mangolim

Isabelle de Lima Brito Polari

Edvaldo Mesquita Beltrão Filho

Amanda Marília da Silva Sant'Ana

Resumo: A carne caprina é uma importante proteína animal. É uma carne com alto valor nutricional, fonte de vitaminas do complexo B e aminoácidos essenciais. Uma oportunidade para valorizar a atividade da caprinocultura e diversificar o mercado de derivados cárneos consiste na utilização da carne caprina na elaboração de produtos. Kafta é um produto típico árabe, tradicionalmente feito com carne moída de carneiro, adicionada de condimentos e especiarias, e moldada manualmente ao longo de um espeto. O consumo de farinha de aveia (*Avena sativa* L.) é benéfico para a saúde humana, pois constitui-se de um cereal com excelente valor nutricional, rico em fibras. Assim, este trabalho objetiva desenvolver e caracterizar os aspectos físico-químicos, microbiológicos, a capacidade de retenção de água e a cor instrumental de Kaftas elaboradas com carne caprina e farinha de aveia (*Avena sativa* L.). As kaftas elaboradas com farinha de aveia apresentaram valores superiores de umidade, proteína e cinzas, quando comparado à Kafta elaborada com amido. As kaftas apresentaram baixa luminosidade (L^*), com predomínio do componente amarelo (b^*) e do componente vermelho (a^*). A perda de água durante a centrifugação foi menor em KAV do que em KAM, sugerindo que a Kafta elaborada com Farinha de aveia apresentou uma maior capacidade de retenção de água (CRA) do que a Kafta elaborada com amido. Todas as amostras estavam dentro dos padrões da legislação vigente em relação aos aspectos microbiológicos. A utilização da fibra (farinha de aveia) melhorou os aspectos nutricionais e a cor do produto, o que é interessante para atender aos desejos dos consumidores atuais, que buscam cada vez mais saudabilidade. Ainda, esta pesquisa demonstrou que as kaftas podem elaboraas com boa qualidade higiênico sanitária, o que garante uma maior segurança para o consumidor.

Palavras chave: derivados caprinos, alimento funcional, carne

1. INTRODUÇÃO

Durante muitos anos, o Nordeste brasileiro tem se destacado na criação de pequenos ruminantes, como caprinos (Carvalho; Souza, 2008). A caprinocultura é uma atividade de extrema importância para esta região, tanto no âmbito sociocultural, influenciando na fixação do homem no campo e na manutenção da atividade produtiva para as gerações seguintes, seja no âmbito econômico, por possibilitar gerar uma fonte de renda para os pequenos produtores (BATISTA; SOUZA, 2015).

O levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE), em 2018, apontou cerca de 10,6 milhões de cabeças no efetivo de caprinos, e a região Nordeste detém de mais de 93% desses animais (10.047.575 milhões), onde a Paraíba está em 5º lugar entre os estados nordestinos, com 649.136 animais. A carne caprina é uma importante proteína animal. É uma carne com alto valor nutricional, fonte de vitaminas do complexo B e aminoácidos essenciais, e é considerada magra, com pouca gordura subcutânea, intermuscular e intramuscular, (HAENLEIN, 1992). Apesar disso, o consumo de carne caprina ainda é pequeno no país, quando comparado a carne bovina, suína e de frango. São consideradas produtos benéficos que podem favorecer aspectos da saúde humana, sendo inclusive fornecedoras de gorduras benéficas, além de ser rica em outros nutrientes (MADRUGA; BREASSAN, 2011; POLIDORI et al., 2011).

Uma oportunidade para valorizar a atividade da caprinocultura e como uma opção para diversificar o mercado de derivados cárneos, consiste na utilização da carne caprina na elaboração de produtos. O consumidor atual procura cada vez mais produtos rápidos e saudáveis, valorizando cada vez mais o valor nutricional do alimento que consome. Essa busca por uma vida saudável por parte do consumidor tem impulsionado a indústria de alimentos a elaborar novos produtos com a utilização de matérias primas e ingredientes que possam proporcionar benefícios à saúde (SOUSA et al., 2012).

Kafta é um produto típico árabe, tradicionalmente feita com carne moída de carneiro, adicionada de condimentos e especiarias, e moldada manualmente ao longo de um espeto, não tendo ainda regulamentação e legislação para sua fabricação no Brasil (VIEGAS, 2014). É também conhecida como espetinho de carne. Na busca por alimentos mais saudáveis, o uso da fibra dietética na formulação de produtos cárneos é uma opção interessante, pois aumenta o rendimento e melhora a textura, além do benefício para a saúde do consumidor (SHIMOKOMAKI, 2006). O consumo de farinha de aveia (*Avena sativa* L.) é benéfico para a saúde humana, pois constitui-se de um cereal com excelente valor nutricional, com aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas e sais minerais indispensáveis ao organismo humano e, principalmente, pela elevada concentração de fibras (BORGES et al., 2006). Assim, este estudo teve como objetivo desenvolver e caracterizar os aspectos físico-químicos e microbiológicos, incluindo a cor instrumental e a capacidade de retenção de água de kaftas elaboradas com carne caprina e farinha de aveia (*Avena sativa* L.).

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. ELABORAÇÃO DAS KFTAS

Para produção de cada tipo de kafta, utilizou-se um fluxo de processo a seguir: 2,5 Kg de carne caprina foram pesadas. Em seguida, a carne foi moída e adicionada dos ingredientes após pesagem de cada um. Posteriormente, as kaftas foram moldadas em espetos após embalagem em sacos plásticos de 4 x 23 cm. Cada Kafta pesou em média 70 gramas. As formulações das kaftas caprinas com a utilização de farinha de aveia (KAV) ou amido (KAM) podem ser observadas na Tabela 1.

Tabela 1. Formulações das Kaftas caprinas com farinha de aveia (KAV) e amido (KAM)

Ingredientes	Kav (g)	Kam (g)
Carne caprina	2500	2500
Farinha de aveia	200	-
Amido	-	300
Alho	30	30
Pimenta do reino	18	18
Cebolinha	175	175
Glutamato	15	15

2.2. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E COR INSTRUMENTAL

As Kaftas foram analisadas quanto à composição físico-química (umidade, proteína, gordura, cinzas) e cor instrumental. O teor de cinzas e a umidade foi determinado pelas metodologias recomendadas pela Association of Official Analytical Chemist Methods (AOAC, 2012). A umidade foi determinada por secagem em estufa a 105 °C e as cinzas por incineração em forno mufla estabilizado a temperatura de 550 °C. A determinação de lipídios foi realizada pelo método de Folch et al. (1957). As proteínas foram obtidas por espectroscopia na região do ultravioleta visível (UV/VIS), utilizando o método do biureto (GORNALL et al., 1949). A determinação do pH foi realizada com auxílio de um pHmetro de bancada modelo PHS-3E da marca Ionlab, Brasil. A cor instrumental foi determinada de acordo com o sistema CIE (Commission Internationale de l'Eclairage) L^* , a^* , b^* e L^* , c^* , h^* (CIE,1996). Todas as análises foram realizadas em triplicata.

2.3. CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE ÁGUA

A capacidade de retenção de água das amostras de Kafta foram avaliadas pela perda por centrifugação, de acordo com o método de Herrero et al. (2005). Dois gramas de cada amostra foi envolvida com papel de filtro e centrifugada a baixa velocidade (1500 g) durante 5 min a 4 °C. A perda por centrifugação foi medida como perda de peso durante a centrifugação e expressa em porcentagem do peso inicial da carne. Todas as análises foram realizadas em triplicata.

2.4. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

Para avaliar a qualidade microbiológica das kaftas, foram quantificados os coliformes totais e *E. coli* (NMP/g), estafilococos coagulase positiva (UFC/g) e verificou-se a presença de *Salmonella* spp./25g, de acordo com as metodologias recomendadas pela APHA (2001). As amostras de kafta foram submetidas à diluição seriada (10-1, 10-2 e 10-3) em água peptonada tamponada para análise de coliformes e *E. coli* pelo método NMP e de estafilococos coagulase positiva por contagem de colônias em superfície. A quantificação dos coliformes totais foi efetuada após teste confirmativo em Caldo Bile Verde Brilhante (VB), seguida pela quantificação da *E. coli* usando reagente de Kovacs nos mesmos tubos. Para a quantificação de estafilococos coagulase positiva, utilizou-se o Ágar Baird-Parker (BP) e colônias suspeitas foram submetidas ao teste de produção de coagulase. Utilizou-se, para avaliação de *Salmonella*, como pré-enriquecimento, Água Peptonada Tamponada e, como enriquecimento, os Caldos Tetrationato (TT) e Selenito Cistina (SC). Para plaqueamento diferencial, foram utilizados Ágar Hecktoen e Ágar *Salmonella*-Shigella. Colônias suspeitas foram estriadas em tubos contendo Ágar Ferro Tríplice Açúcar (TSI) e Ágar Lisina Ferro (LIA). Para a análise de clostrídios sulfito-redutores utilizou-se o Ágar Tryptose Sulfito Cicloserina (TSC) com adição de sobrecamada e incubação sob anaerobiose a 46°C/24h.

2.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística foi realizada utilizando-se uma análise de variância (ANOVA). Os dados foram analisados utilizando-se o software Statistica®, versão 7.0 (Statsoft, USA). Diferenças foram consideradas significativas quando $p < 0,05$.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em relação à composição físico-química das kaftas caprinas, foi possível observar que as kaftas elaboradas com farinha de aveia apresentaram valores superiores ($p < 0,05$) de umidade, proteína e cinzas, quando comparado à Kafta elaborada com amido (KAM) (Tabela 2). A presença da aveia aumentou o teor de proteínas do produto, além do teor de fibras. A elaboração de Kaftas com utilização de fibra dietética, melhora e agrega valor à carne caprina, podendo reduzir o nível de rejeição da mesma além de beneficiar a saúde do consumidor (SOUZA et al., 2012).

Tabela 2. Composição físico-química das Kaftas caprinas com farinha de aveia (KAV) e amido (KAM)

Parâmetros (%)	KAV	KAM
Umidade	65,32 ^a (± 0,19)	62,89 ^b (± 0,77)
Proteína	23,25 ^a (± 1,00)	15,89 ^b (± 0,94)
Gordura	4,65 ^a (± 0,39)	4,65 ^a (± 0,39)
Cinzas	1,73 ^a (± 0,07)	1,02 ^b (± 0,02)
pH	4,99 ^a (± 0,02)	5,10 ^a (± 0,02)

Além disso, o maior teor de umidade nas amostras KAV pode ser justificado pelo fato da farinha aveia, em produtos cárneos, aumenta a retenção de água no produto (SEABRA et al., 2002). Não foram observadas diferenças nos teores de gordura ($p > 0,05$) nas kaftas caprinas elaboradas com farinha de aveia ou amido. Na Tabela 3, é possível observar os valores de cor instrumental de kaftas caprinas. A luminosidade, é um atributo de cor que varia de 0 a 100. Foi possível observar que a Kafta KAM apresentou luminosidade (valor L^*) superior ($p < 0,05$) em relação à Kafta KAV, o que pode ser explicado pela adição de amido, que conferiu um tom mais claro ao produto.

Tabela 3. Cor instrumental das Kaftas caprinas com farinha de aveia (KAV) e amido (KAM)

Parâmetros (%)	KAV	KAM
L^*	53,8 ^b (± 0,60)	56,8 ^a (± 0,50)
a^*	2,6 ^a (± 0,10)	2,3 ^b (± 0,10)
b^*	21,6 ^a (± 0,50)	21,8 ^a (± 0,40)
C^*	21,57 ^a (± 0,50)	21,87 ^a (± 0,50)
h°	82,77 ^a (± 0,20)	83,60 ^a (± 0,80)

No espaço colorimétrico CIELab, a^* e b^* referem-se às coordenadas de cromaticidade verde (-) /vermelho (+) e azul(-)/amarelo(+), respectivamente (CIE, 1996). A Kafta preparada com aveia apresentou valor positivo de a^* , sendo maior ($p < 0,05$) que a kafta elaborada com amido, indicando maior tendência a coloração vermelha em KAV, o que pode influenciar positivamente na aceitação do consumidor, que procuram nos derivados cárneos tons que fiquem mais próximos à matéria-prima. O valor de b^* não foi influenciado ($p > 0,05$) pela utilização de amido ou aveia. Assim, as amostras de kafta caprina apresentaram baixa luminosidade (L^*), com predomínio do componente amarelo (b^*) e do componente vermelho (a^*), sugerindo que a cor vermelha amarelado contribuiu mais para a cor final do produto. A cor da carne é um fator de qualidade de importância fundamental para a comercialização e consumo, já que o consumidor a relaciona com os atributos sensoriais (ALBERTI, 2000). A cor da carne deve-se principalmente à presença de mioglobina e, em menor grau, à hemoglobina, sendo que no tecido muscular a mioglobina contribui com um percentual de 80 a 90% do pigmento total (PARDI et al., 2001).

O espaço de cor L^*C^*h , semelhante ao CIELab, L^* indica luminosidade, C^* representa a saturação, e h é o ângulo de tonalidade. Não foram observadas diferenças entre as amostras KAV e KAM em relação ao índice de saturação C^* e ângulo h . Neste espaço de cor, O valor de saturação C^* , representa a distância do eixo de luminosidade (L^*) e inicia em zero no centro. Quanto maior o croma maior a saturação das cores perceptíveis aos humanos (Pathare et al., 2013). Os valores das amostras foram de 21,57 a 21,87, indicando baixa saturação. O ângulo de tonalidade, que começa no eixo $+a^*$ (vermelho) e se movimenta em sentido anti-horário, é expresso em graus, e os valores observados (82,77° – 83,60°), indicam tendência à cor amarela, pois está próxima aos 90°, que é amarelo ($+b^*$).

A perda de água durante a centrifugação foi menor ($p < 0,05$) em KAV (13,16%^b ± 1,62) do que em KAM (27,54%^a ± 0,98), sugerindo que a Kafta elaborada com Farinha de aveia apresentou uma maior capacidade de retenção de água (CRA) do que a Kafta elaborada com amido (Figura 1), corroborando também com o maior valor de umidade observado em KAV.

De acordo com Seabra et al. (2002), a CRA é caracterizada como a habilidade da carne para reter parcial ou totalmente a água nela contida. A farinha de aveia auxilia também na retenção de água promovendo uma sensação bucal similar à da gordura sem alteração no sabor cárneo (SEABRA et al., 2002). Além disso, o pH, que ficou abaixo do ponto isoelétrico das proteínas de 5,2-5,3 (ROÇA, 2000), pode ter auxiliado na retenção de água. Segundo Ordóñez (2005), o declínio do pH abaixo do ponto isoelétrico é favorável a retenção de água devido ao aumento dos espaços entre os filamentos das fibras causados pela repulsão entre as cadeias polipeptídicas (ORDÓÑEZ, 2005).

Figura 1 – Percentual de Perda de água por centrifugação para indicar a Capacidade de Retenção de água (CRA) das Kaftas caprinas com farinha de aveia (KAV) e amido (KAM).

Todas as amostras de kafta apresentaram ausência de *Salmonella* sp. em 25 g das amostras e de *Clostridium* sulfito redutor (Tabela 4). O padrão microbiológico adotado no Brasil para carne e produtos cárneos resfriados ou congelados "in natura", carne moída e carnes preparadas cruas congeladas ou não, como bifes e outros, de acordo com a Resolução - RDC nº12 (2001) exige ausência de *Salmonella* sp., em 25g. Assim, todas as amostras analisadas apresentaram-se estando dentro dos padrões da legislação vigente.

A contagem de *Estafilococos* spp. neste estudo obteve média máxima de $2,4 \times 10^3$ UFC/g. Nenhuma colônia típica foi confirmada como sendo de *Estafilococos* coagulase positiva. De acordo com a Resolução RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001, os limites aceitáveis para produtos cárneos crus, refrigerados ou congelados, de *Estafilococos* coagulase positiva/g é de 5×10^3 UFC/g e o limite aceitável de *Clostridium* sulfito redutor é de até 5×10^2 UFC/g. O *Clostridium* sulfito redutor é um microrganismo patogênico de grande incidência em carnes cruas (OLIVEIRA et al., 2008).

Tabela 4. Qualidade microbiológica das Kaftas caprinas com farinha de aveia (KAV) e amido (KAM).

Microrganismo	Kaftas	
	KAV	KAM
Coliformes a 35°C (NMP/g)	<0,3	<0,3
Coliformes a 45°C (NMP/g)	<0,3	<0,3
<i>Estafilococos</i> spp. (UFC/g)	$2,3 \times 10^2$	$2,4 \times 10^3$
<i>Salmonella</i> sp./25g	Ausência	Ausência
<i>Clostridium</i> sulfito redutor a 46°C/g	Ausência	Ausência

Os coliformes totais são indicadores das condições higiênico-sanitária em que kaftas foram processados e sua presença evidencia o potencial risco que o produto pode oferecer aos consumidores. Os resultados demonstram que o processamento adequado utilizado para a elaboração das kaftas pode aumentar a segurança alimentar e a eliminação de bactérias patogênicas. É fundamental os cuidados com a higiene durante o preparo dos alimentos para controle de contaminação que possam causar doenças relacionadas ao consumo dos alimentos.

4. CONCLUSÕES

A utilização da carne caprina para a elaboração de kafta é uma alternativa para agregar valor à essa matéria-prima, permitindo uma inovação na agroindústria de produtos cárneos. A utilização da fibra (farinha de aveia) melhorou os aspectos nutricionais e a cor do produto, o que é interessante para atender aos desejos dos consumidores atuais, que buscam cada vez mais produtos saudáveis e com impacto positivo na saúde.

Ainda, esta pesquisa demonstrou que as kaftas podem elaboradas com boa qualidade higiênico sanitária, o que garante uma maior segurança para o consumidor. Novos estudos são necessários para aprofundar os conhecimentos sobre a utilização de carne caprina e de fibras alimentares na elaboração de kaftas.

REFERÊNCIAS

- [1] ALBERTI, P. Medición del color. In: Cañeque e Sañudo, 2000. Metodología para el estudio de la calidad de la canal y de la carne en ruminantes. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Monografías INIA: Ganadera n.1, p.158-166. 2000.
- [2] AOAC. Official methods of analysis (19th ed.). Gaithersburg, MD: AOAC Intl. 2012.
- [3] APHA – American Public Health Association. Committee on Microbiological for Foods. Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 4.ed. Washington:American Public Health Association, 2001. 676p.
- [4] BATISTA, N. L.; SOUZA, B. B. Caprinovinocultura no Semiárido brasileiro - fatores limitantes e ações de mitigação. Revista Agropecuária Científica no Semiárido, v. 11, n. 2, p. 1-9, 2015.
- [5] CARVALHO, D. M.; SOUZA, J. P. Análise da cadeia produtiva da caprinovinocultura em Garanhuns. XLVI Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural.
- [6] CORREA, J. E. Nutritive Value of Goat Meat. Ed. Alabama Cooperative Extension System. Alabama A&M and Auburn Universities. 2011. 5p. Disponível em: <http://www.aces.edu/pubs/docs/U/UNP-0061/UNP-0061.pdf> Acesso: 23.09.19.
- [7] FOLCH, J.; LEES, M.; SLOANE-STANLEY, G. A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. The Journal of Biological Chemistry, v. 226, p. 497-509, 1957.
- [8] GORNALL, A. G.; BARDAWILL, C. J.; MAXIMA, M. D. Determination of serum proteins by means of biuret reaction. Journal of Biological Chemistry, v.177, p.751-766, 1949.
- [9] HAENLEIN, G.F.W. Role of goat meat and milk in human nutrition. In: Anais V Int. Conf. on Goats, New Delhi, India, 2-8 March. Pre-Conference Proceedings Invited Papers, v.2, part. 2, p.575-580, 1992.
- [10] HERRERO, A. M.; CARMONA, P.; GARCÍA, M. L.; SOLAS, M. T.; CARECHE, M. Ultrastructural changes and structure and mobility of myowater in frozen-stored hake (*Merluccius merluccius* L.) muscle: Relationship with functionality and texture. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 53, p. 2558-2566, 2005.
- [11] HOFFMANN, J. F.; SAINZ, R. L.; NASCIMENTO, C. O.; BOSENBECKE, V. K. Pensar A Educação Profissional a Distância a Partir do olhar do egresso do Curso Técnico Em Agroindústria. Momento: diálogos em educação, v. 28, n. 1, p. 312-327, 2019.
- [12] MADRUGA, M. S.; BRESSAN, M.C. Goat meats: Description, rational use, certification, processing and technological developments. Small Ruminant Research, v. 98, p.39-45, 2011.
- [13] MADRUGA, M. S. et al. Carnes caprina e ovina: processamento e fabricação de produtos derivados. Tecnol. & Ciên. Agropec., v. 1, n. 2, p.61-67, dez. 2007.
- [14] MALANCHEN, B. E. et al. Composição e propriedades fisiológicas e funcionais de aveia. Fag Journal of Health, p. 185-200, 2019.
- [15] OLIVEIRA, M. M. M.; BRUGNERA, D. F.; MENDONÇA, A. T.; PICCOLI, R. H. Condições higiênico-sanitárias de máquinas de moer carne, mãos de manipuladores e qualidade microbiológica da carne moída. Ciênc. agrotec. v.32, n.6, p. 1893-1898, 2008.
- [16] ORDÓÑEZ, J. A. Tecnologia de Alimentos de Origem Animal. v. 2. São Paulo: Artmed, 2005. 279p.
- [17] PARDI, M. C.; SANTOS, I. F.; SOUZA, E. R.; et al. Ciência, higiene e tecnologia da carne. 2ª ed. Goiânia, UFG, 2001. 623p.
- [18] PATHARE, P. B.; OPARA, U. L.; AL-SAID, F. A. Colour Measurement and Analysis in Fresh and Processed Foods: A Review. Food Bioprocess Technol. v. 6, p. 36-60, 2013.

- [19] PENA, C. Produção de carne caprina: situação atual e perspectivas. 2015. Disponível em: <http://criacaodeanimais.blogspot.com/2009/01/produo-de-carne-caprina-situao-atual-e_3092.html>. Acesso em: 19 nov. 2019.
- [20] POLIDORI, P.; ORTENZI, A.; VINCENZETTI, S. et al. Dietary properties of lamb meat and human health. *Mediterr. Journal Nutr. Metab.* v. 4, p. 53-56, 2011.
- [21] RESTAURANTE ABU-ZUZ. O que é uma kafta? 2014. Disponível em: <<https://abuzuzrestaurante.wordpress.com/2014/03/20/o-que-e-um-kafta/>>. Acesso em: 05 dez. 2019.
- [22] ROÇA, R. O. Propriedades da carne. UNESP: Botucatu-SP. p.1-10. Disponível em: <http://pucrs.campus2.br/~thompson/Roca107.pdf>. Acesso em: 16/03/2020.
- [23] SEABRA, L. M. J. et al. Fécula de Mandioca e farinha de aveia como substitutos de gordura na formulação de hambúrguer de carne ovina. *Ciência e Tecnologia de Alimentos*, v. 22, n. 3, p. 244- 248, 2002.
- [24] SHIMOKOMAKI, M. et al. Atualidades em ciência e tecnologia de carnes. São Paulo: Livraria Varela, 2006, 236p.
- [25] SOUSA, L. G. et al. Adição de fibra alimentar em Kafta caprina – qualidade física e aceitação sensorial. In: VII Connepi Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, Palmas, Tocantins, 2012.
- [26] VIEGAS, C. R. Qualidade da carne de cordeiros desmamados com diferentes idades e elaboração de produtos cárneos. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, 2014. 75p.
- [27] VIEIRA, A. A. L. B.; OLIVEIRA, E. R.; ARAÚJO, R. O.; SOUSA NETO, J. M. *Revista Científica da Faculdade Darcy Ribeiro*, n. 4, p. 32-37, 2013.

Capítulo 6

*Caracterização física e química do fruto do maxixe-bravo (*Cucumis dipsaceus* Ehrenb)*

Antonio Daniel Buriti de Macedo

Ana Paula Moisés de Sousa

Jaciara Dantas Costa

Macielly Buriti de Macedo

Danilo Lima Dantas

Marisa de Oliveira Apolinário

Ana Regina Nascimento Campos

Resumo: O maxixe-bravo (*Cucumis dipsaceus* Ehrenb) planta originária da Etiópia, assim é chamado em algumas regiões do nordeste brasileiro. No Brasil essa planta não é muito conhecida, e geralmente nasce e cresce nos campos de pastagens, por isso pouco se tem conhecimento quanto as suas características físicas e químicas, tão pouco sobre seu potencial nutricional. Acredita-se que esta planta seja tóxica, e se consumida traga danos à saúde. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização física e química do maxixe-bravo (*C. dipsaceus* Ehrenb). Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Bioquímica e Biotecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Campina Grande. Os frutos do maxixe-bravo que foram utilizados nesse estudo foram coletados no sítio Bom Sucesso, Município Sossego-PB. A caracterização do maxixe-bravo mostrou que o fruto possui elevado teor de água (88,24 %), pH de 4,93, resíduos minerais de 8,16 % e valor apreciável de proteína bruta (11,12 %), exibindo valores superiores a outras Cucurbitaceae como: maxixe comum, melão e pepino. Além disso, os resultados mostraram altos teores de K (73,31 %), Ca (12,08 %), Mg (4,58 %) e P (3,62 %), destacando-se ainda altos valores de Zn (0,19 %).

Palavras-chave: *Cucumis dipsaceus* Ehrenb, Biometria, potencial nutricional.

1. INTRODUÇÃO

A família Cucurbitaceae abrange cerca de 118 gêneros e 825 espécies e, aproximadamente 26 espécies são cultivadas como hortícolas em diversas regiões do mundo. As Cucurbitáceas são cultivadas principalmente para a produção de frutos, no entanto, algumas espécies são cultivadas com finalidade decorativa, como é o caso da cultura da abóbora (*Cucurbita pepo* L.) (ALMEIDA, 2002).

O maxixe-bravo, assim como é chamado em algumas regiões do nordeste brasileiro, é taxonomicamente definido pelo reino Plantae, classe Magnoliopsida, ordem Cucurbitales, família Cucurbitaceae, gênero: *Cucumis*, espécie *Cucumis dipsaceus* Ehrenb (LATA e MITTAL, 2015).

Esta espécie é originária da Etiópia e distribuída nos países vizinhos da África, como o Quênia, Somália, Tanzânia, Uganda e distrito de Sudão (LATA e MITTAL, 2015). Segundo Chandran; Nivedhini; Parimelazhagan (2013), o *C. dipsaceus* é conhecido por vários nomes como "cabaça carda, pepino árabe, ouriço, pepino do diabo" e outros.

Os frutos do *C. dipsaceus* se apresentam verdes quando imaturos e à medida que se tornam maduros vão apresentando coloração amarelada. Em alguns países, as folhas desta planta são consumidas regularmente como um vegetal comum, no entanto, pouco se tem feito para avaliar os parâmetros que poderiam apoiar a sua utilização como vegetal (CHANDRAN *et al.*, 2013).

Segundo Nivedhini; Chandran; Parimelazhagan (2014), o fruto apresenta teor nutricional apreciável, por apresentar teores de proteínas, minerais e aminoácidos satisfatórios. No entanto, o fruto só poderia ser recomendado para consumo humano após o cozimento adequado, por apresentar fatores antinutricionais que pode ser reduzida por tratamento térmico ou cozimento.

No Brasil, essa planta é pouco conhecida, geralmente essa espécie nasce e cresce nos campos de pastagens e pouco se tem conhecimento quanto as suas características físicas e químicas, tão pouco sobre seu potencial nutricional. Normalmente, essa planta não é utilizada na alimentação humana nem de animais. Acredita-se que esta planta seja tóxica, e se consumida traga danos à saúde. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi estudar a caracterização física e química do maxixe-bravo (*C. dipsaceus* Ehrenb).

2. METODOLOGIA

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Bioquímica e Biotecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Educação e Saúde (UFCG/CES).

A. Os frutos do maxixe-bravo (*C. dipsaceus* Ehrenb) que foram utilizados nesse estudo foram coletados no sítio Bom Sucesso (latitude 6°43'55.4"S; longitude 6°43'55.4"S), localizado a aproximadamente 9 km da cidade de Sossego-PB. O município situa-se na Mesorregião do Agreste Paraibano e Microrregião do Curimataú Ocidental, localizado a 227 km de João Pessoa.

Inicialmente, os frutos foram selecionados, utilizando os sadios e que apresentassem o mesmo estágio de maturação. Em seguida, os frutos foram higienizados, com escova para retirar todas as sujeiras presentes, colocados em solução clorada por 10 minutos e lavados em água corrente.

Figura 1. A) Maxixe-bravo (*Cucumis dipsaceus* Ehrenb) B) Fruto do Maxixe-bravo.

2.1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO FRUTO DO MAXIXE-BRAVO

A medição do comprimento e do diâmetro dos frutos foi realizada com paquímetro digital, ZAAS precision, e os resultados expressos em centímetro. A circunferência, determinada com fita métrica, foi obtida medindo-se a região mediana do fruto e também expressa em centímetros.

Para determinação da densidade (g.cm^{-3}), o volume foi obtido por meio da imersão do fruto inteiro em água contida em proveta graduada e, o volume foi verificado pelo deslocamento da coluna de água.

Também foi realizada a pesagem individual dos frutos, iniciando com a massa total, seguido pela determinação da massa da casca e massa da polpa. A massa de sementes (m_s) dos frutos foi obtida por diferença entre a massa total (m_t) e o somatório da massa da casca (m_c) e da polpa (m_p), conforme Equação 1. As massas foram determinadas em balança digital analítica, Shimadzu AY 220 e, os resultados expressos em gramas.

$$m_s = m_t - (m_c + m_p) \quad (1)$$

2.2. CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO MAXIXE-BRAVO

2.2.1. TEOR DE ÁGUA

O teor de água das amostras foi determinado após secagem em estufa Modelo BIOPAR, a 105° C, até peso constante, de acordo com metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008).

2.2.2. PH

A determinação do pH foi realizada através de medidas potenciométricas do líquido sobrenadante, em peagâmetro da Marca Metrohm 744 pH METER, conforme metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008).

2.2.3. ACIDEZ TITULÁVEL

A metodologia seguida foi descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008) e baseia-se na titulação com hidróxido de sódio 0,1M até o ponto de viragem com o indicador fenolftaleína.

2.2.4. RESÍDUO MINERAL FIXO

Para a determinação do resíduo mineral foi realizada incineração em mufla da marca FHME DIGI MEC a 550 °C, por 6 horas, de acordo com a metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008).

2.2.5. DETERMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS MINERAIS

Os minerais foram identificados e quantificados por Espectrômetro de Fluorescência de Raios-X por Energia Dispersiva; o equipamento utilizado foi o Shimadzu EDX-720.

2.2.6. PROTEÍNA BRUTA

O método Kjeldahl, (Tedesco *et al.*, 1995) foi utilizado para determinação de proteína bruta (PB). A determinação de proteína por esse método compreende por três etapas: digestão, destilação e titulação. O fator de conversão utilizado foi 6,25.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO MAXIXE-BRAVO

Os resultados da biometria dos frutos de maxixe-bravo são apresentados na Tabela 1. O valor médio do comprimento e do diâmetro aferidos foram de 6,08 e 3,85 cm, respectivamente, e o valor médio para a circunferência foi 12,953 cm. Quanto à densidade encontrada para os frutos o valor variou de 0,85 a 0,98 g.cm⁻³.

Tabela 1. Biometria do maxixe-bravo (*C. dipsaceus* Ehrenb).

Medidas	Valor máximo	Valor mínimo	Média*
Comprimento (cm)	6,12	5,67	6,08 ± 0,270
Diâmetro (cm)	4,06	3,59	3,85 ± 0,163
Circunferência (cm)	14,01	12,08	12,95 ± 0,549
Densidade (g.cm ⁻³)	0,98	0,85	0,93 ± 0,045

*Média de 30 amostras

Os valores médios de comprimento e circunferência foram próximos aos encontrados por Mladenović *et al.*, (2012) ao estudarem a caracterização física de diferentes espécies da família cucurbitácea, inclusive a *C. dipsaceus* Ehrenb, e obtiveram 5,0 cm de comprimento e 11,0 cm de circunferência para os frutos. Quanto ao diâmetro, o valor médio encontrado está dentro do estabelecido por Lata e Mittal (2015) que descrevem um diâmetro entre 2,5 - 4,0 cm, para este fruto.

Na Tabela 2 são apresentados os valores das massas do fruto de maxixe-bravo, assim como, as massas da polpa, casca e sementes separadamente, com a finalidade de calcular a porcentagem correspondente a cada parte em relação à massa total do fruto.

Tabela 2. Massa do maxixe-bravo (*Cucumis dipsaceus* Ehrenb).

Massa (g)	Valor máximo	Valor mínimo	Média*	Total (%)
Fruto inteiro	57,622	39,254	48,26 ± 5,96	100
Casca	31,508	19,988	24,11 ± 3,65	49,95
Polpa	14,503	8,165	10,52 ± 2,16	21,83
Sementes	16,824	10,95	13,63 ± 1,93	28,24

*Média de 30 amostras

O valor médio encontrado para a massa total do fruto foi de aproximadamente 48,26 g. A massa total do maxixe-bravo mostrou-se ser bem superior a massa dos frutos do maxixe comum (*Cucumis anguria* L.) como registrado por Medeiros *et al.* (2010) que obtiveram média de 22,63 g para massa dos frutos adultos.

A casca apresentou massa média de 24,11 g, a polpa de 10,52 g e as sementes de 13,63 g. A massa total dos frutos é constituída de aproximadamente 49,95 % de casca, 21,83 % de polpa e 28,24 % de sementes.

3.2. CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO MAXIXE-BRAVO

Na Tabela 3 são apresentados os valores médios dos resultados das análises químicas do maxixe-bravo e seus constituintes. O fruto inteiro apresentou 88,24 % de teor de água, pH de 4,93, acidez titulável de 7,30 %, resíduo mineral de 8,16% e proteína bruta de 11,12 %. A polpa apresentou 95,49 % de teor de água, pH de 4,83, acidez titulável de 8,66 % e resíduo mineral de 0,93 %. A casca apresentou 91,89% de teor de água, pH de 5,38, acidez titulável de 3,2 %, resíduo mineral 6,28 %. Para as sementes, os valores foram: teor de água de 63,37 %, pH de 6,49, acidez titulável de 3,45 % e para o resíduo mineral de 0,79 %.

Os dados referentes ao teor de água são similares ao encontrado por Nivedhini; Chandran; Parimelazhagan (2014) quando caracterizaram quimicamente o *C. dipsaceus* Ehrenb. Com relação ao valor de resíduo mineral, o teor encontrado neste trabalho mostrou-se inferior, sendo o valor observado por estes autores de 17,8%.

O valor de pH observado no maxixe-bravo está próximo do pH do maxixe comum (*C. anguria*) encontrado por Nascimento; Nunes; Nunes (2011) que verificaram pH igual 5,36, sendo possível verificar que não há diferença significativa entre as duas variedades de cucurbitácea com relação ao valor de pH.

Tabela 3. Caracterização química do maxixe-bravo (*C. dipsaceus* Ehrenb).

	Fruto inteiro	Polpa	Casca	Sementes
Teor de água (%)	88,24 ± 1,05	95,49 ± 0,15	91,89 ± 0,04	63,37 ± 0,80
pH	4,93 ± 0,05	4,83 ± 0,03	5,38 ± 0,03	6,49 ± 0,04
Acidez titulável (%)	7,30 ± 0,38	8,66 ± 0,12	3,20 ± 0,11	3,45 ± 0,11
Resíduos minerais (%)	8,16 ± 0,07	0,93 ± 0,01	6,28 ± 0,16	0,79 ± 0,25
Proteína bruta (%)	11,12 ± 0,45	-	-	-

O maxixe-bravo apresentou valor de proteína bruta superior ao encontrado por Nivedhini *et al.* (2014) que verificaram um valor de 8,6 %. Chandran; Nivedhini; Parimelazhagan (2013) ao estudarem a composição nutricional e propriedades antioxidantes do *C. dipsaceus* Ehrenb verificaram que a folha da planta apresenta 10,8 % de proteína bruta.

O maxixe-bravo apresentou valores de proteína bruta bem superiores a outras espécies de Cucurbitaceae como o maxixe comum, melão (*Cucumis melo* L.) e pepino (*Cucumis sativus* L.) com respectivos valores de proteína, 1,4; 0,7 e 0,9 % (TACO, 2011).

Os constituintes minerais do maxixe-bravo são apresentados na Tabela 4, destacam-se os valores significativos para o potássio (K) de 72,31 %, cálcio (Ca) de 12,08 %, magnésio (Mg) de 4,58 % e fósforo (P) de 3,62 % e traços de S, Si, Zn e Cu. Nivedhini; Chandran; Parimelazhagan (2014) estudando a composição química e a atividade antioxidante do fruto do *C. dipsaceus*, também verificaram valores expressivos de K, Ca, P, Fe.

Com relação aos constituintes do fruto, a polpa mostrou ser rica em K (91,06 %) e Ca (7,87%), a casca exibiu valores expressivos de K (67,52 %), Ca (20,24 %) e Mg (4,01). Quanto as sementes, apresentaram valores apreciáveis de K (49,39 %), P (26,21 %), Mg (13,28 %) e Ca (5,49 %).

NRC (2001) evidencia a importância dos minerais para o bom funcionamento do organismo, crescimento normal e reprodução de animais. Os minerais: cálcio, fósforo, sódio, cloro, potássio, magnésio e enxofre são mencionados como macrominerais, aqueles necessários em quantidades maiores. Estes são componentes estruturais importantes dos ossos e de outros tecidos e servem como constituintes importantes de fluidos corporais.

Tabela 4. Constituintes minerais da Maxixe-bravo (*Cucumis dipsaceus* Ehrenb).

Minerais (%)	Fruto inteiro	Polpa	Casca	Sementes
K	72,31	91,06	67,52	49,39
Ca	12,08	7,87	20,24	5,49
Mg	4,58	ND	4,01	13,28
Fe	0,39	0,13	0,17	1,69
P	3,62	0,23	0,35	26,21
S	0,24	0,24	0,37	ND
Si	1,78	0,17	2,01	1,52
Zn	0,19	0,05	0,08	0,96
Cu	0,07	0,06	0,07	0,19

ND: não detectado.

4. CONCLUSÃO

A caracterização do maxixe-bravo mostrou que o fruto possui elevado teor de água (88,24 %) sendo entre as partes que compõe o fruto, a polpa com maior valor individual (95,49 %). Apresentou pH de 4,93, acidez titulável de 7,30 % e resíduos minerais 8,16 %.

O maxixe-bravo apresentou valor apreciável de proteína bruta (11,12 %), exibindo valores superiores a outras Cucurbitaceae como; maxixe comum, melão e pepino. Além disso, os resultados mostraram altos teores de potássio, cálcio, magnésio e fósforo.

REFERÊNCIAS

- [1] ALMEIDA, D. P. F. Cucurbitáceas hortícolas. Resumo. Faculdade de Ciências, Universidade do Porto. Disponível em <<http://dalmeida.com/hortnet/apontamentos/Cucurbitaceas.pdf>> Acessado em 17 de maio de 2016.
- [2] CHANDRAN, R.; Nivedhini, V.; Parimelazhagan, T. Nutritional composition and antioxidant properties of cucumis dipsaceus ehrenb. ex spach leaf. The Scientific World Journal, p. 9, 2013.
- [3] INSTITUTO ADOLFO LUTZ (São Paulo). Métodos físico-químicos para análises de alimentos. Coordenadores: Odair Zenebon; Neus Sadoco Pascuet & Pablo Tigea. São Paulo, Ed. 4, 1ª Edição Digital, 2008.
- [4] LATA, S.; Mittal, S. K. Pharmacognosy, phytochemistry and pharmacology of cucumis dipsaceus ehrenb. International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research, v. 7, n. 3, p. 446–449, 2015.
- [5] MEDEIROS, M. A. ; Grangeiro, L. C.; torres, S, B.; Freitas, A. V. L. Maturação fisiológica de sementes de maxixe (Cucumis anguria L.). Revista Brasileira de Sementes, v. 32, n. 3, p. 17–24, 2010.
- [6] MLADENović, E.; BERENJI, J.; Kraljević–Balalić, M.; Ćukanović, J.; Blagojević, I. multivariate Analysis of Species FROM CUCURBITACEAE FAMILY. Original Scientific paper, v. 44, n. 2, p. 227–234, 2012.
- [7] NASCIMENTO, A. M. C. B.; Nunes, R. G. F. L.; Nunes, L. A. P. L. Elaboração e avaliação química, biológica e sensorial de conserva de maxixe (Cucumis anguria L.). Revista ACTA Tecnológica-Revista Científica, v. 6, n. 1, 2011.
- [8] NIVEDHINI, V.; Chandran, R.; Parimelazhagan, T. Chemical composition and antioxidant activity of Cucumis dipsaceus Ehrenb. Ex Spach fruit. International Food Research Journal, v. 21, n. 4, p. 1465–1472, 2014.
- [9] NRC. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 7. ed. Washington, 2001.
- [10] TACO. Tabela brasileira de composição de alimentos. 4 ed. rev. ed. Campinas- SP, 2011.
- [11] TEDESCO, J. M. et al. Análise de solo, plantas e outros materiais, Porto Alegre, 1995.

Capítulo 7

Caracterização físico-químico de geleia de abacaxi (Ananas comosus) comercializadas em Belém/ Pará

Helen Carrolline Alcântara Negrão

Adriellen Saraí de Lima Gonçalves

João Pedro dos Reis Lima

Lucas dos Santos Nunes

Allyson Allennon Pinheiro do Rosário

José Marcos Nobre de Moura Júnior

Ewerton Carvalho de Souza

Ivan Carlos da Costa Barbosa

Charles Alberto Brito Negrão

Ronaldo Magno Rocha

Antonio dos Santos Silva

Resumo: O abacaxi é uma das frutas mais apreciada no mundo todo devido aos seus benefícios. Neste trabalho será discutido a respeito de um dos produtos obtidos a partir do abacaxi: a geleia. Nesse sentido, devido sua grande comercialização no mercado, sabe-se que há fatores que interferem na qualidade do produto, por isso, será verificado parâmetros físico-químicos dos produtos, sendo este light e tradicional. Os parâmetros considerados foram: pH, condutividade elétrica (CE), densidade, sólidos solúveis totais (SST), sendo todas as análises realizadas em triplicata. Com isso, a condutividade elétrica apresentada foi 0,65 mS/cm (A) e 0,52 mS/cm (B). O pH variou entre 3,30 (A) e 3,11 (B). O teor de Sólidos Solúveis Totais determinou 31,1º Brix (A) e 56,3º Brix (B). A densidade diferenciou entre 1,20 g/mL (A) e 1,39 g/mL (B). No que se refere à umidade, obteve-se 69,01% (A) e 35,99% (B). Parâmetros estes que apresentaram, de forma geral, características físico-químicas boas relacionadas com valores expressos ideais, concordantes com a legislação vigente e demonstrando atender ao controle de qualidade estabelecido. As técnicas estatísticas empregadas conseguiram discriminar as amostras conforme sua marca.

Palavras-chave: Alimentos, Derivados de Frutas, Estatística Multivariada, Controle de Qualidade.

1. INTRODUÇÃO

O abacaxi, nome científico *Ananas comosus*, pertence à família Bromeliaceae e gênero *Ananas* Mill. A espécie é nativa da América do Sul. O fruto possui polpa amarela e formato cilíndrico, é composto por dezenas de frutinhos que se desenvolvem em torno do seu eixo central, no ápice encontram-se as folhas, denominadas de coroa (UnB Web, 2016).

Segundo Licodiedoff (2008), essa é uma das frutas mais apreciada no mundo todo. Isso ocorre devido ser rico em vitaminas, sais minerais e açúcares, além de ser consumido em estado in natura, ele também serve como matéria prima para industrialização de diversos produtos, tais como: sucos, gelatinas, geleias, licor, vinagre e até mesmo em cosméticos, tal versatilidade faz com que seja possível cumprir com a demanda daqueles que procuram opções saudáveis na sua alimentação.

O abacaxi é considerado um fruto de grande aceitação pelo seu aroma e sabor. É consumido não só pelo seu sabor refrescante e ácido, mas também por suas qualidades nutricionais. Desse modo, o suco de abacaxi é altamente dietético e energético; 150 mL de suco contém aproximadamente 150 quilocalorias e teor de açúcar variando entre 12 e 15 %, dos quais aproximadamente 66 % são sacarose e 34 % açúcares redutores (MEDINA, 1978; GONÇALVES et al., 2010).

O fruto é abundante em açúcar, se amadurecido na planta, e muito rico em sais minerais e vitaminas A, B1, B2 e C, em que cada 100 g de polpa fresca de abacaxi contém aproximadamente 50 quilocalorias, 89 % de água, 0,3 % de proteína, 0,5 % de lipídios, 5,8 % de glicídios, 3,2 % de celulose e 0,3 % de sais, apresentando quantidade considerável de potássio, ferro, cálcio, manganês e magnésio (GOMES, 1976; SOARES et al., 2004).

Já a geleia é o produto obtido pela cocção das frutas inteiras ou em pedaços, da polpa ou do suco de fruta, adicionados de açúcar e água e concentrados até consistência gelatinosa. Segundo Multon (2000), de maneira geral, a geleia é considerada uma rede tridimensional sólida que envolve a pectina, o açúcar e o ácido, retraindo uma fase líquida em sua estrutura.

A liberação da fase líquida das geleias, conhecida como sinérese, é um dos principais problemas que ocorre durante o armazenamento do produto, que contribui para depreciar sua aparência. Fatores como pré-gelatinização antes e durante o envase, valores de pH inferiores ao ideal, diferencial de sólidos entre a fruta e o gel e deficiência na hidratação da pectina contribuem para a formação da sinérese (MAIA, 1997; JOHNSON, 2001).

Compreende-se que o abacaxi além de possuir importância para a saúde humana, por ser uma fonte de vitaminas indispensáveis para o homem, e diurético, essa fruta também possui sua importância no mercado consumidor, pois, diversos produtos são feitos a partir da polpa. Nesse sentido, desde sua fabricação até a chegada aos consumidores, o produto passa por inúmeras etapas.

Dessa forma, substâncias químicas do produto podem ser modificadas alterando a cor, aroma ou até mesmo o sabor, devido à forma de como são expostas ao meio externo, isto é, seu armazenamento. Isso faz com que haja uma perda principalmente da função do produto, além de causar contaminação alimentar, em casos extremos, perdendo assim sua confiabilidade. Sendo assim, cresce a necessidade de analisar de forma físico-química do produto para garantir eficácia e segurança à sociedade consumidora.

2. OBJETIVOS

Este trabalho teve como objetivo a caracterização físico-química da geleia de abacaxi da mesma marca, mas de duas formulações distintas: light (amostras A) e tradicional (amostras B), além de discriminar tais geleias conforme a formulação empregando duas técnicas estatísticas multivariadas (análise de componentes principais e análise hierárquica de agrupamentos).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. AMOSTRAS

Foram coletadas oito amostras da mesma marca, entre light e tradicional, aqui mencionadas de A e B, respectivamente. Em seguida foram levadas para o Laboratório de Física Aplicada à Farmácia (LAFFA) da Universidade Federal do Pará (UFPA) para realizar as análises físico-químicas, seguindo metodologias estabelecidas pelas normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008), tendo sido cada parâmetro realizado em triplicata.

3.2. PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Foram analisados os seguintes parâmetros físico-químicos:

3.2.1. DETERMINAÇÃO DE PH

Para a determinação do pH, foi pesado na balança 5 g das amostras A e B da geleia de abacaxi, após isso, foi acrescentado 50 mL de água destilada na amostra, com auxílio de uma espátula, foi feita a mistura até ela se homogeneizar. Na solução resultante introduziu-se o eletrodo de um pHmetro previamente calibrado.

3.2.2. CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (CE)

Para determinar a condutividade elétrica foi adicionado à mesma solução preparada para a medição de pH, um eletrodo chamado de condutivímetro portátil previamente calibrado o qual indicou a condutividade elétrica da solução diretamente no visor do aparelho.

3.2.3. DENSIDADE

Foi usado uma proveta com medida de 10 mL para medir certa quantidade de amostras, as quais foram pesadas através da balança analítica, e por fim foi calculado sua densidade por meio da fórmula (1), em que d é a densidade (g/mL); m é a massa da amostra (g); e v é o volume (mL).

$$d \text{ (g/mL)} = \frac{m}{v} \quad (1)$$

3.2.4. SÓLIDOS SOLÚVEIS TOTAIS (SST)

Foi determinado através de leitura direta em refratômetro manual, colocando-se sobre o prisma pequena quantidade de geleia de abacaxi das amostras A e B. Os resultados foram expressos em ° Brix.

3.3.5. TEOR DE UMIDADE

Pesou-se aproximadamente 2 g da amostra A em cápsula de porcelana, após isso, foi colocada em estufa a 105° C por 24 horas, em seguida foi feito o mesmo procedimento para a amostra B. Ao sair da estufa, foi colocada em dessecador em temperatura ambiente e logo após pesada. Os resultados foram expressos em porcentagem (%) e obtidos pela equação (2), onde m_f representa o conjunto a Massa da cápsula + amostra após a secagem, m_c representa a massa da cápsula vazia e m_0 a massa inicial da amostra.

$$\text{Umidade (\%)} = 100 - \left(\frac{(m_f - m_c)}{m_0} \cdot 100 \right) \quad (2)$$

3.3. ANÁLISES ESTATÍSTICAS MULTIVARIADAS

Foi aplicado o teste t de Student aos dados obtidos para se avaliar se os resultados obtidos para cada um dos cinco parâmetros podem ser considerados iguais ou não entre si, adotando-se um nível de confiança de 95%. Também foram aplicadas as técnicas estatísticas multivariadas de análise de componentes principais (ACP) e análise hierárquica de agrupamentos (AHA) aos dados obtidos e padronizados, se empregando a distância euclidiana como métrica e ligação completa.

4. RESULTADO E DISCUSSÃO

Os resultados das análises físico-químicas estão dados na Tabela 1, onde são apresentados valores médios de duas determinações por amostra, seguido do desvio padrão.

Tabela 1– Resultados dos 5 parâmetros da caracterização físico-química da geleia de abacaxi.

Amostra	pH	CE (mS/cn)	SST (°Brix)	Densidade (g/ml)	Umidade (%)
A1	3,3 ± 0,1	0,65 ± 0,01	31,2 ± 0,3	1,08 ± 0,08	68,47 ± 0,73
A2	3,3 ± 0,0	0,65 ± 0,00	31,1 ± 0,2	1,14 ± 0,04	68,46 ± 0,73
A3	3,3 ± 0,0	0,65 ± 0,00	31,0 ± 0,0	1,17 ± 0,02	69,03 ± 0,25
A4	3,3 ± 0,0	0,65 ± 0,00	31,3 ± 0,2	1,17 ± 0,03	68,23 ± 0,65
A5	3,3 ± 0,0	0,65 ± 0,00	31,1 ± 0,2	1,20 ± 0,00	67,87 ± 0,19
A6	3,3 ± 0,0	0,65 ± 0,00	31,1 ± 0,2	1,24 ± 0,03	69,87 ± 0,21
A7	3,3 ± 0,0	0,64 ± 0,01	31,1 ± 0,2	1,204 ± 0,16	69,76 ± 0,08
A8	3,3 ± 0,0	0,64 ± 0,01	31,1 ± 0,2	1,30 ± 0,00	70,36 ± 0,74
Geral	3,30a ± 0,02	0,65a ± 0,01	31,1a ± 0,2	1,20a ± 0,10	69,01a ± 0,29
B1	3,1 ± 0,1	0,52 ± 0,01	53,6 ± 0,3	1,29 ± 0,17	34,81 ± 1,30
B2	3,1 ± 0,0	0,52 ± 0,00	53,6 ± 0,3	1,47 ± 0,05	37,03 ± 0,35
B3	3,1 ± 0,0	0,52 ± 0,01	56,4 ± 2,4	1,39 ± 0,06	36,21 ± 0,80
B4	3,1 ± 0,0	0,51 ± 0,01	56,4 ± 0,6	1,40 ± 0,03	37,09 ± 0,28
B5	3,1 ± 0,0	0,52 ± 0,01	57,2 ± 0,3	1,38 ± 0,00	37,02 ± 0,65
B6	3,1 ± 0,0	0,52 ± 0,00	57,2 ± 0,3	1,37 ± 0,01	37,21 ± 0,49
B7	3,1 ± 0,0	0,52 ± 0,01	57,6 ± 0,6	1,40 ± 0,00	31,33 ± 8,19
B8	3,1 ± 0,1	0,52 ± 0,01	58,4 ± 0,9	1,38 ± 0,01	37,25 ± 0,14
Geral	3,11b ± 0,03	0,52b ± 0,01	56,3b ± 1,9	1,39b ± 0,06	35,99b ± 2,72

Legenda: Letras iguais sobre as médias significam não haver diferença significativa, com 95 % de significância, conforme aplicação do teste t de Student.

Observa-se que o pH obtido foi de 3,30 para a Amostra A e 3,11 para B. Segundo Albuquerque (1995) o pH ideal para geleias deve estar entre 3,0 e 4,0, quando o pH for maior poderá ocorrer a sinérese, nesse sentido, pode-se considerar que as geleias expressas estão em boas condições.

O valor da condutividade elétrica para as amostras industrializadas da geleia de abacaxi foi de 0,65 mS/cm para amostras da formulação A e 0,52 mS/cm para B. Indicando que a formulação A apresenta maior quantidade de íons presentes.

A densidade encontrada foi de 1,20 g/mL para as amostras da formulação A e de 1,39 g/mL para as amostras da formulação B, porém a legislação não especifica valores para esses parâmetros.

A legislação brasileira para geleias de frutas (BRASIL, 1978) rege que para a geleia extra o teor de sólidos solúveis totais deve ser de no mínimo 60° Brix. Os teores de sólidos solúveis totais encontrados neste trabalho foram de 31,1° Brix para formulação A e 56,3° Brix para a formulação B, a qual são diferentes aos encontrados por Licodiedoff et al. (2010b), que ao avaliarem geleia de abacaxi encontraram valores de 65 ° Brix a 70 ° Brix. Destaca-se ainda que o valor inferior de sólidos solúveis totais encontrados para a marca A já era esperado, pois por ser light deve conter uma menor quantidade de açúcar adicionado na sua formulação, sendo esse o principal constituinte dos sólidos solúveis totais de um alimento.

Para o teor de umidade em geleias, segundo a Anvisa (1978), é estipulada no máximo de 38 % (m/m). Mota (2006) encontrou valores de umidade de 45,23 % ao analisar as alterações físico-químicas da geleia de amora-preta, tendendo a aumentar ao longo do armazenamento. Já nos resultados obtidos para a geleia de abacaxi, se encontrou 69,01% para a formulação A e 35,99% para a formulação B, evidenciando que, para a primeira, tem-se um valor acima do estipulado pela Anvisa e, para a segunda, um valor abaixo com diferença de 2,01% do estabelecido.

A aplicação da técnica estatística multivariada de análise de componentes principais (ACP) aos dados físico-químicos gerou o gráfico presente na Figura 1.

Figura 1. Gráfico das duas primeiras componentes principais

Percebe-se que a aplicação da técnica ACP aos dados conseguiu separar as amostras em dois grupos distintos, conforme as duas formulações (A e B), sendo que as duas primeiras componentes principais (CP 1 e CP 2) juntas conseguem explicar 99,8 % da variabilidade dos dados.

A aplicação da técnica estatística multivariada de análise hierárquica de agrupamentos (AHA) aos dados obtidos gerou o dendrograma presente na Figura 2, onde são apresentadas as amostras agrupadas conforme suas similaridades.

Figura 2. Dendrograma para as amostras de geleias estudadas

O dendrograma (Figura 2) mostra claramente que as amostras pertencentes ao grupo A são 100 % não similares às amostras da formulação B, o que indica que as análises químicas realizadas e a aplicação AHA são suficientes para discriminar as amostras de geleia conforme sua formulação.

5. CONCLUSÃO

O abacaxi é mundialmente consumido, seja in natura ou através de seus derivados, como geleias, por exemplo. Desse modo, vários fatores podem influenciar de modo a alterar a forma padrão desse produto. Com isso, a partir dos dados obtidos por meio da análise físico-química, e da comparação com outros trabalhos, verificou-se que os parâmetros usados apresentaram, de forma geral, valores expressos ideais, concordantes com a legislação vigente e demonstrando atender ao controle de qualidade estabelecido. Nesse sentido, podemos concluir que a geleia de abacaxi, seja na forma light ou tradicional, estão adequada para consumo, trazendo assim benefícios para o consumidor. Já a aplicação das técnicas estatísticas multivariadas (ACP e AHA) foram capazes de discriminar as amostras conforme suas formulações, e, desta forma, provam que tais formulações são distintas entre si e que se pode distinguir a formulação a que pertence uma amostra dessa geleia se realizando as análises químicas efetuadas acopladas às técnicas estatísticas empregadas.

REFERENCIAS

- [1] AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução CNNPA/ ANVISA/ MS nº 12, de 30 de março de 1978. Aprova as normas técnicas especiais relativas a alimentos e bebidas. Brasília, 1978. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/12_78_geleia.htm>. Acesso em: 08 ago. 2019.
- [2] ALBUQUERQUE, J. P. (1995). Fatores que influem no processamento de geleias e geleiadas de frutas. ANVISA. Resolução RDC no 3, de 02 de janeiro de 2001. Regulamento técnico sobre edulcorantes em alimentos. On-line. Disponível em: . Acesso em: 08 ago. 2019.
- [3] BRASIL. Agência Nacional de vigilância sanitária. (1978). Legislação para Alimentos.
- [4] FURTADO, M.A.M.; FERRAZ, F.O Determinação de Umidade em Alimentos por Intermédio de Secagem em Estufa Convencional e Radiação Infravermelha – Estudo Comparativo Em Alimentos Com Diferentes Teores De Umidade. UFJF: 2007. Disponível em: < <http://www.ufjf.br/laaa/files/2008/08/04-7%C2%BA-SLACA-2007.pdf> >. Acesso em: 09 maio 2019.
- [5] GOMES, R.P. II Fruticultura especial. In: Gomes, R.P. Fruticultura brasileira. São Paulo: Nobel p.72-75, 1976.
- [6] INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz. Métodos físico-químicos para análises de alimentos. 4ª ed. (1ª Edição digital), 2008.
- [7] JOHNSON, S.R. Preserve it right making fruit spreads. Iowa State University of Science and Technology, Ames. PM 1366, September, 2001.
- [8] LICODIEDOFF, S. Influência do teor de pectinas comerciais nas características físico-químicas e sensoriais da geleia de abacaxi (*Ananas comosus* (L.) Merrill). 2008. 119f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Alimentos) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, 2008.
- [9] MAIA, L. L. M. Curso de Processamento de Frutas: Geleia e doce em massa. Programa de Capacitação Tecnológica Sebrae/Embrapa, 23 a 27 de junho de 1997 - Rio de Janeiro, 1997.
- [10] MEDINA, J. C.; BLEINROTH, E. W.; DE MARTIN, Z. J.; SOUZA JUNIOR, A. J.; LARA, J. C. C.; HASHIZUME, T.; MORETTI, V. A.; MARQUES, J. F. FrutasTropicais 2 - Abacaxi. Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL, 1978.
- [11] MOTA, R. V. Caracterização física e química da geleia de amora-preta. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 26, n. 3, p. 539-543, 2004.
- [12] MULTON, J. L. Aditivos y auxiliares de fabricación en las industrias agroalimentarias. Zaragoza: Acribia, 2000.
- [13] SOUZA, I.; GASPAR, C.; LAUREANO, O. Geleias hipocalóricas de sumo de uva. In: 3rd Simpósio de vitivinicultura do alentejo. Resumos... Évora- Portugal, 1995, V.1, p.9-19.
- [14] UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB WEB. História do Abacaxi. Brasília, 2016. Disponível em: < http://web.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=426&Itemid=376 > Acesso em: 08 Ago. 2019.

Capítulo 8

Avaliação da qualidade do néctar de bacuri produzido em escala piloto

Andréa Cardoso de Aquino

Kaliana Sitonio Eça

Gustavo Adolfo Saavedra Pinto

Hosiberto Batista de Sant'Ana

Resumo: O objetivo deste trabalho foi elaborar o néctar de bacuri em escala piloto com aplicação de enzimas e otimizar o processo de pasteurização. O estudo teve início com a avaliação da ampliação da escala da produção do néctar de bacuri e a otimização da temperatura de pasteurização (80, 90, 100, 110 e 120 °C), em pasteurizador tubular por meio de análises microbiológicas, químicas e físico-químicas. O néctar de bacuri elaborado em escala piloto, nas condições de 1:2 de polpa e água, maceração enzimática com aplicação de 40 $\mu\text{L} \cdot 100\text{gpolpa}^{-1}$ de Pectinex XXL e 100 $\mu\text{L} \cdot 100\text{gpolpa}^{-1}$ de Celluclast, incubação em reator de agitação, 80 minutos de incubação, temperatura de incubação de 30 °C, agitação de 200 rpm, pasteurização a 80 °C durante 15 segundos em pasteurizador tubular e envase asséptico em capela, conseguiu obter segurança microbiológica, além de não apresentar alterações significativas, sinalizando viabilidade para comercialização.

Palavras-Chave: frutas regionais, bacuri, maceração enzimática, redução da consistência, processamento de néctar.

1. INTRODUÇÃO

Sampaio et al. (2005) apontaram o bacuri como um fruto com grande potencial econômico, possuindo excelentes características sensoriais e nutritivas, e que apresenta condições favoráveis para a extensão de sua industrialização. Segundo Clemente e Venturieri (1990), o sabor e o aroma altamente atrativos do bacuri garantem seu lugar no mercado de frutos regionais.

Apesar de ser muito apreciada nas regiões onde é cultivada, a polpa de bacuri pode enfrentar dificuldades para ser industrializada, devido sua elevada consistência e alta aderência à semente, tornando seus produtos muito espessos, difíceis de serem comercializados conforme as exigências estabelecidas pela legislação do setor (Aquino, 2008).

A aplicação de enzimas “macerantes” na polpa de bacuri pode reduzir a sua consistência, e assim possibilitar sua utilização como matéria-prima na elaboração de outros produtos, como néctares, inserindo-os dentro dos padrões exigidos pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, por meio da Instrução Normativa nº12, de 4 de setembro de 2003.

No Brasil, a utilização de enzimas no processamento de bebidas de frutas já é comum em escala industrial, principalmente no caso de obtenção de sucos de maçã, uva e na produção de vinhos cidra (Santin, 2004).

A vida útil destas bebidas é influenciada por diversos fatores, entre eles o desenvolvimento de microrganismos deteriorantes, reações enzimáticas e outras reações químicas que comprometem a qualidade sensorial do produto, além de diminuir a qualidade nutricional. Além da matéria-prima, a qualidade desses produtos é influenciada por mudanças que podem ocorrer durante o seu processamento, especialmente na concentração ou tratamento a altas temperaturas (Pirillo e Sabio, 2009).

Este trabalho tem como objetivo a elaboração do néctar de bacuri em escala piloto com aplicação de enzimas e otimizar o processo de pasteurização, através da avaliação de fatores que influenciam direta ou indiretamente na sua qualidade.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. MATÉRIA-PRIMA

Os frutos foram adquiridos na CEAPI (Centro de Abastecimento do Piauí), localizado em Teresina/PI, e levados para Fortaleza/CE. Para o transporte, os frutos foram embalados em sacos trançados de polietileno. O transporte até o Laboratório de Processos Agroindustriais da Embrapa Agroindústria Tropical de Fortaleza/CE ocorreu por meio rodoviário (600 km). Depois de sua chegada até o processamento (≈ 12 h), os frutos ficaram armazenados em câmara fria a 10 °C.

A polpa de bacuri foi obtida a partir de seleção, lavagem com água clorada a 100 ppm de cloro livre durante 20 min. A abertura dos frutos foi realizada com um martelo de borracha, seguida de remoção da polpa, manualmente. A polpa foi separada da semente em despulpadeira BONINA modelo 0,25 df com peneira de 2,5 mm de diâmetro. A polpa extraída foi embalada em sacos de polietileno, fechados com seladora Sulpac SP-350, e finalmente, armazenada em freezer a -20 °C.

As preparações enzimáticas comerciais utilizadas foram Pectinex XXL e Celluclast, cedidas gentilmente pela Novo Nordisk® Bioindustrial do Brasil Ltda.

2.2. PROCESSAMENTO DO NÉCTAR DE BACURI EM LARGA ESCALA

O processamento do néctar de bacuri em larga escala pode ser sintetizado no esquema apresentado na Figura 1.

Figura - 1 Etapas do processamento do néctar de bacuri em larga escala. A) Pesagem; B) Reator tilizado na maceração enzimática da polpa de bacuri; C) Agitador utilizado no reator; D) Homogeneização; E) Formulação do néctar; F) Pasteurizador tubular Armfield FT74X; G) Capela de envase Armfield T83.

Inicialmente, pesou-se uma quantidade suficiente de polpa (Figura 1A) para formulação do néctar contendo 20 % de polpa de bacuri. A polpa foi levada para um reator BIOFLO 3000 (Figura 1B) com capacidade para 12 L. Em seguida, adicionou-se água mineral na proporção 1:2 (polpa:água). Devido à elevada consistência da polpa, utilizaram-se dois agitadores do tipo m11078 (Figura 1C) no reator. A homogeneização foi realizada com agitação de 250 rpm durante 2 min (Figura 1D). Após a homogeneização, 40 $\mu\text{L} \cdot 100\text{gpolpa}^{-1}$ de Pectinex XXL e 100 $\mu\text{L} \cdot 100\text{gpolpa}^{-1}$ de Celluclast foram adicionados no reator, agitando-se a 200 rpm por 20 s. A incubação foi realizada sob condições controladas (200 rpm/30 °C/80 min). Após a maceração enzimática, a polpa de bacuri foi diluída em água mineral e recebeu sacarose (Figura 1E). Para o processo de pasteurização utilizou-se um pasteurizador tubular contínuo Armfield FT74X UHT/HTST com tempo de retenção de 15 s e vazão 9 L/h (Figura 1F). O néctar foi envasado em uma capela de envase Armfield FT83 (Figura 1G), acoplada ao pasteurizador.

2.3. ESTUDO DA PASTEURIZAÇÃO DO NÉCTAR DE BACURI EM ESCALA PILOTO

Nesta etapa realizou-se o estudo da pasteurização do néctar de bacuri, utilizando o pasteurizador tubular Armfield FT74X UHT/HTST com tempo de retenção de 15 s e vazão 9 L.h⁻¹. As temperaturas de pasteurização estudadas foram de 80, 90, 100, 110 e 120 °C.

2.3.1. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

A contagem de mesófilos totais e bolores e leveduras foram feitas de acordo com a metodologia proposta por Vandersant e Splittstoesser (1992).

2.3.2. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Foram realizadas análises de açúcares redutores (Miller, 1959), Sólidos solúveis totais (AOAC, 1995), Cor instrumental (colorímetro digital MINOLTA CR-300, utilizando escala CIELab), Hidroximetilfurfural (HMF) e Furfural por HPLC (condições: coluna Agilent Zorbax SB C-18, mantida a 25 °C; detector ultravioleta/visível Varian a 276 nm, tendo acetonitrila/água (2:8) com 1 % de ácido acético como eluente em fluxo de 0,7 mL min⁻¹. O volume de amostra injetada foi de 20 µL. As amostras foram previamente centrifugadas e filtradas em membrana de acetato de celulose ME25 com 0,45 µL e D13 mm. Corrida de 7 minutos. Pressão de 100-99 bar. Tempo de retenção: HMF (3,4 min) e furfural (5,5 min). Todas essas análises foram realizadas em triplicata.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como pode-se observar na Tabela 1, os resultados referentes à avaliação microbiológica realizada nos néctares pasteurizados (NP80, NP90, NP100, NP110 e NP 120) apresentaram contagem de bolores e leveduras inferior ao néctar sem pasteurização (NSP), conforme esperado, já que a pasteurização visa à redução da carga microbiana, permitindo adequação as conformidades da Portaria nº 451, de 19 de setembro de 1997, do Ministério da Saúde, que regulamenta os padrões microbiológicos para sucos concentrados congelados, sucos e refrescos in natura, preparado para refrescos e refrigerantes, sucos concentrados adicionados ou não de conservantes, polpas e produtos de frutas, cujos valores máximos permitidos para bolores e leveduras estão entre 10² e 10⁴ UFC/mL (Brasil, 1997).

Tabela - 1 Valores médios obtidos nas análises microbiológicas dos néctares de bacuri pasteurizados.

Amostra ^a	Contagem de bolores/leveduras (UFC/mL)
NSP	3,87 x 10 ⁵
NP80	< 1,0
NP90	<1,0
NP100	<1,0
NP110	<1,0
NP112	<1,0

*Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5%.

a NSP: néctar de bacuri sem pasteurização; NP80: néctar de bacuri pasteurizado a 80°C; NP90: néctar de bacuri pasteurizado a 90°C; NP100: néctar de bacuri pasteurizado a 100°C; NP110: néctar de bacuri pasteurizado a 110°C; NP120: néctar de bacuri pasteurizado a 120°C.

Assim como o presente trabalho, Rivas et al. (2006) também revelaram redução na contagem de bolores e leveduras após pasteurização do suco misto de laranja e cenoura, que passou de 1,5 x 10⁴ para < 1 UFC/mL. Dutra et al. (2010) observaram contagem de bolores e leveduras inferior a 10 UFC/mL na pasteurização do suco de tangerina nas temperaturas entre 88 e 100 °C e tempo entre 16 e 44 segundos. Sukasih e Setyadjit (2008) estudando a resistência térmica de microrganismos no suco de pomelo revelaram que para se produzir este suco é necessário que o mesmo seja submetido à pasteurização nas condições de 85 °C durante 11,26 minutos.

Na Tabela 2 estão apresentados os valores médios obtidos nas análises químicas e físico-químicas realizadas nos néctares de bacuri formulados em diferentes temperaturas de pasteurização.

Tabela - 2 Valores médios obtidos nas análises físico-químicas dos néctares de bacuri pasteurizados.

Amostra ^a	GRT (mg/g)	SST (°Brix)	Cor (L*)	Cor (a*)	Cor (b*)
NSP	30,54 ± 0,39 c d	13,65 ± 0,06 b	43,31 ± 0,05 b	-1,87 ± 0,03 c d	6,37 ± 0,00 d
NP80	22,31 ± 0,31 e	12,90 ± 0,00 c	44,09 ± 0,27 a b	-1,69 ± 0,09 b c	7,28 ± 0,01 b
NP90	30,30 ± 0,71 d	14,20 ± 0,10 a	44,85 ± 0,13 a	-2,01 ± 0,07 d	7,63 ± 0,04 a
NP100	32,66 ± 0,86 c	14,05 ± 0,06 a	42,74 ± 0,71 b	-1,32 ± 0,02 a	6,70 ± 0,11 c
NP110	38,43 ± 0,49 b	13,95 ± 0,06 a b	43,20 ± 0,46 b	-1,56 ± 0,06 b	7,14 ± 0,01 b
NP112	42,69 ± 0,01 a	12,40 ± 0,10 d	43,29 ± 0,14 b	-1,72 ± 0,04 b c	7,10 ± 0,00 b

*Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5%.

^a NSP = néctar de bacuri sem pasteurização; NP80 = néctar de bacuri pasteurizado a 80°C; NP90 = néctar de bacuri pasteurizado a 90°C; NP100 = néctar de bacuri pasteurizado a 100°C; NP110 = néctar de bacuri pasteurizado a 110°C; NP120 = néctar de bacuri pasteurizado a 120°C.

Com relação ao teor de GRT, a amostra NP80 apresentou um valor significativamente menor ($p < 0,05$) em relação à amostra NSP. Já as amostras NP90, NP100, NP110 e NP120, apresentaram valores significativamente maiores ($p > 0,05$) em relação às amostras NSP e NP80, indicando uma possível perda de água e, conseqüentemente, concentração no teor de GRT.

Para o teor de SST, houve um aumento significativo ($p < 0,05$) do teor de SST nas amostras com pasteurização até 100°C (NP100) e um decréscimo nos teores de SST nas amostras com pasteurização acima de 100°C (NP110 e NP120). Este aumento decorreu, provavelmente devido à perda de água ou a hidrólise de algum amido ainda presente nos tecidos (Cantillano et al., 1981).

Para Sugai et al. (2002) as diferenças existentes no valor de SST do suco podem explicadas em princípio pela variação existente na própria matéria-prima e principalmente pelos eventos que ocorrem durante a passagem do suco num trocador de calor.

A amostra NP90 apresentou maiores valores de L^* (44,85) e b^* (7,63), além do menor valor de a^* (-2,01), indicando que a pasteurização a 90°C tornou o néctar mais claro e amarelado que as demais devido, principalmente ao valor de b^* , correspondente a relação amarelo-azul (valores positivos e valores negativos, respectivamente). A amostra NP100 apresentou efeito contrário, mas somente para os valores de L^* (42,74) e a^* (-1,32). As demais amostras revelaram valores intermediários em relação às amostras NP90 e NP100, sendo que a amostra sem pasteurização (NSP) foi a que apresentou menor valor de b^* conferindo a esta amostra tonalidade mais escura. Este resultado deve-se ao fato de que a pasteurização, provavelmente inativou as enzimas, inclusive a polifenol oxidase presente em frutas, a qual é responsável pelo escurecimento. No entanto, essas pequenas diferenças de cor, observadas por meio do colorímetro, são dificilmente percebidas pela visão humana.

Vendruscolo (2005) observou que a pasteurização a 100°C durante 10 minutos promoveu maior luminosidade na polpa de carambola, tornando-a mais clara e com maior aceitação.

Outro fator que indica escurecimento, e conseqüente perda da qualidade de um produto após o tratamento térmico, é a formação dos compostos furfural e hidroximetilfurfural (Kaanane et al., 1988). O furfural é produto da decomposição do ácido ascórbico, o qual sofre polimerização como um aldeído ativo podendo combinar-se com aminoácidos e o hidroximetilfurfural é formado a partir de açúcares juntamente com aminoácidos, contribuindo, em ambos os casos, para o escurecimento do produto sob influência da temperatura (Solomon et al., 1995). O presente trabalho não detectou formação de furfural e hidroximetilfurfural em nenhuma das amostras, explicando, em parte, porque a pasteurização nas temperaturas estudadas não promoveu escurecimento, não afetando a qualidade do néctar de bacuri.

Giovanelli e Lavelli (2002) avaliaram o efeito do processamento térmico e da estocagem de produtos processados de tomate a 30, 40 e 50 °C por 90 dias e relataram que a polpa de tomate, após tratamento térmico quase dobrou a formação de furosina de 70,6 para 131,5 mg/100g proteína e a de hidroximetilfurfural quase triplicou de 13,5 para 32,9 mg Kg⁻¹ massa seca. Rivas et al. (2006) observaram que a pasteurização a 98 °C por 21 segundos não promoveu formação de hidroximetilfurfural no suco misto de laranja e cenoura, sendo que a quantidade de 0,013 mg/mL de hidroximetilfurfural foi mantida após a pasteurização.

4. CONCLUSÕES

Todos os processamentos térmicos estudados proporcionaram a adequação aos parâmetros microbiológicos preconizados pela RDC nº12/01.

Uma perda significativa de GRT e SST foi observada após a pasteurização a 80°C. Todavia, verificou-se uma tendência de aumento de GRT e de SST com a elevação da temperatura de pasteurização a partir de 90°C. Já os néctares submetidos a pasteurizações de 110 e 120 °C apresentaram um decréscimo nos valores de SST.

A pasteurização não promoveu escurecimento no néctar de bacuri e isto foi comprovado pela ausência do composto furfural e hidroximetilfurfural após o processamento, para as temperaturas estudadas. Além disso, a maceração enzimática, possivelmente, conseguiu reduzir o tamanho das partículas e fibras da polpa de bacuri, permitindo a pasteurização sem apresentar problemas de entupimento.

O processo estudado possibilitou a obtenção de parâmetros adequados para formulação de néctar de bacuri, em escala piloto, a partir da polpa macerada enzimaticamente da fruta, em condições assépticas de envase e microbiológicas aceitáveis e sem promover escurecimento do produto final.

REFERÊNCIAS

- [1] AQUINO, A. C. (2008) Eficiência da maceração enzimática da polpa de bacuri (*platanus insignis mart.*). Dissertação de Mestrado. Tecnologia de Alimentos, UFC – Universidade Federal do Ceará, 115 p.
- [2] BRASIL. (1997) Ministério da Saúde. Portaria nº 451, de 19 de setembro de 1997. Princípios gerais para o estabelecimento de critérios e padrões microbiológicos para alimentos. Diário Oficial [da] República do Brasil, Brasília, DF, 22 set.
- [3] AOAC. (1995) Association Of Official Analytical Chemists. Official methods Association Of Official Analytical Chemists. 16ed, Arlington, VA, USA, v.2, 1141 p.
- [4] CANTILLANO, R. F. F.; Camelatto, D. & Medeiros, A. R. M. (1990) Efeito do grau de maturação na conservação de maçãs cv. Golden Delicious. In: Congresso Clement, C. R.; Venturieri, G. A. Bacuri e cupuassu. In: Nagy, S.; Shaw, P.E.; Wardowski, W.G. (Eds.) Fruits of tropical and subtropical origin. Composition, properties and uses. Lake Alfred: Florida Department of Citrus, p.178-192.
- [5] DUTRA, A. S.; Furtado, A. A. L.; Oiano-Neto, J. & Passos, J. (2010) Efeito do processamento térmico nas propriedades físico-químicas e microbiológicas do suco de tangerina var. murcott. 3º Simpósio de Segurança Alimentar. Florianópolis/SC.
- [6] GIOVANELLI, G. & Lavelli, V. (2002) Evaluation of heat and oxidative damage during storage of processed tomato products. I. Study of heat damage indices. J. Sci. Food Agric., v.82, p.1263-1267.
- [7] KANANNE, A.; Kane, D. & Labuza, T.P. (1988) Time and temperature effect on stability of Moroccan processed orange juice during storage. Journal of Food Science, Chicago, v. 53, n. 5, p. 1470-1473.
- [8] MILLER, G.L. (1959) Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugars. Analytical Chemistry, v.31, p.426-428, 1959.
- [9] PIRILLO, C. P. & Sabio, R. P. (2009) 100% suco: nem tudo é suco nas bebidas de frutas. Hortifruti Brasil, Piracicaba, v. 8, n. 81, p. 6-13.
- [10] RIVAS, A.; Rodrigo, D.; Martínez, A.; Barbosa-Cánovas, G. V.; Sampaio, E. V. S. B.; Pareyn, F. G. C.; Figueirôa, J. M. & Santos Júnior, A. G. (2005) Espécies da flora nordestina de importância econômica potencial. 1ed. Recife: APN. v.1, 331 p.
- [11] SANTIN, M. M. (2004) Aplicação de tratamento enzimático combinado a microfiltração na clarificação de suco de pêssego. Dissertação de Mestrado. Curso de Engenharia de Alimentos, URI – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, 89 p.
- [12] SUKASIH, E. & Setyadit. (2008) Study on heat resistance and heat adequacy to inactivate microorganism population in pasteurized pure citrus juices cv. siam. Indonesian journal of agriculture, v. 1, n.1, p. 22-27.
- [13] SOLOMON, O.; Svanberg, U.; Sahlstrom, A. Effect of oxygen and fluorescent light on the quality of orange juice during storage at 8°C. Food Chemistry, Essex, v. 53, n. 4, p. 363-368, 1995.
- [14] SUGAI, Y. A.; Shigeoka, S. D.; Badolato, G. G.; Tadini, C. C. Análise físico-química e microbiológica do suco de laranja minimamente processado armazenado em lata de alumínio. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 22, n. 3, p. 233-238, 2002.
- [15] VANDERSANT, C.; Splittstoesser, D. F. Compendium of methods for the microbiological examination of foods, 3rd ed. Washington, APHA. p.153-165, 1992.
- [16] VENDRÚSCOLO, A. T. Comportamento reológico e estabilidade física da polpa de carambola (*Averrhoa carambola L.*). Dissertação de Mestrado. Curso de Engenharia de Alimentos, UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina, 90 p., 2005.

Capítulo 9

Quantificação de fenólicos totais e flavonoides totais na farinha de sementes de graviola submetida à fermentação em estado sólido

Luciana Cristina Lins de Aquino Santana

Juliana dos Santos Lima

Resumo: Este trabalho objetivou quantificar os teores de fenólicos totais e flavonoides totais na farinha de sementes de graviola submetida à fermentação em estado sólido (FES) utilizando o fungo *Aspergillus niger*. As fermentações foram realizadas utilizando as seguintes condições: temperatura de incubação de 30°C e umidade inicial da farinha de 50%, temperatura de 40°C e umidade inicial da farinha de 30% e temperatura de 40°C e umidade inicial da farinha de 70%. A maior quantidade de compostos fenólicos e flavonoides totais foi obtida quando utilizado temperatura de fermentação de 40°C e umidade inicial da farinha de 30 e 70%, respectivamente. Este resultado correspondeu a aumento de fenólicos e flavonoides totais de 70,0 e 24,1%, respectivamente em relação ao obtido na farinha não fermentado. A farinha de sementes de graviola fermentada demonstrou potencial como fonte natural de compostos bioativos.

Palavras-chave : biotecnologia, fruta, resíduo, compostos bioativos

1. INTRODUÇÃO

Os resíduos de frutas devido ao elevado teor nutricional, apresentam potencial para serem utilizados como substrato em processos biotecnológicos. O nordeste brasileiro, especialmente o estado de Sergipe se destaca por apresentar condições climáticas favoráveis à produção de diversas frutas exóticas como a graviola. Uma das formas de consumo da fruta é a comercialização de polpas de frutas, cujo processamento resulta em grandes quantidades de resíduos, comumente descartado em lixos ou destinado para alimentação animal. Atualmente várias pesquisas tem utilizado resíduos agroindustriais, principalmente as cascas e sementes de vegetais e frutas, como substrato em processos fermentativos, para a extração e/ou produção de compostos bioativos. O uso de resíduos como matriz sólida na fermentação em estado sólido é vantajoso por possuírem baixo custo, pela possibilidade de obtenção de produtos de alto valor agregado e por apresentarem em sua composição, matéria orgânica passível de consumo pelos micro-organismos (Dey et al., 2016).

A fermentação em estado sólido utilizando cepas de *Aspergillus* é bastante conhecida por produzir uma variedade de enzimas que podem agir específica e efetivamente para hidrolisar matrizes da parede celular das plantas, aumentar a atividade biológica do material fermentado liberando compostos fenólicos insolúveis (Magro et al., 2019). O *A. niger*, por exemplo, tem sido usado em processos de FES devido à sua capacidade de sintetizar mais de 19 tipos de enzimas, como celulase, pectinase, protease, entre outras. Estas enzimas podem atuar na liberação de compostos fenólicos, como também ajudam na degradação da parede celular das sementes oleaginosas, levando à liberação da maior parte do óleo dos substratos (Dulf et al., 2015; Dulf et al., 2017).

Nos últimos anos alguns pesquisadores têm empregado a FES para aumentar ou produzir compostos bioativos (fenólicos e/ou flavonoides) em resíduos tais como bagaço de maçã, farelo de trigo, efluente do óleo de palma, chá-verde, feijão preto, resíduo de café, resíduos de frutas cítricas, dentre outros (Lee et al., 2008; Ajila et al., 2011; Jamal et al., 2011; Machado et al., 2012; Kim et al., 2013; Dey; Kuhad, 2014; Madeira Jr et al., 2014; Teles et al., 2019).

2. OBJETIVO

Este trabalho objetivou quantificar os teores de compostos bioativos (fenólicos e flavonoides totais) obtidos na farinha de sementes de graviola após fermentação em estado sólido utilizando *A. niger*.

3. METODOLOGIA

3.1. OBTENÇÃO DA FARINHA DO RESÍDUO DE GRAVIOLA

O resíduo (polpa e sementes) proveniente do processamento da polpa de graviola (*Annona muricata*) foi fornecido pela indústria Pomar do Brasil localizada na cidade de Aracaju-SE. As sementes foram manualmente separadas e lavadas em água corrente. Em seguida, foram secas em secador de bandeja (Pardal-PE 100, Brasil) com circulação de ar à temperatura de 60°C por 20h, trituradas em liquidificador industrial e esterilizadas por 15 min à temperatura de 121°C.

3.2. FUNGO

O fungo *Aspergillus niger* (IOC 3677) foi adquirido da coleção de culturas do Instituto Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro, Brasil) e mantido em tubos inclinados contendo ágar batata dextrose à 4°C.

3.3 EXPERIMENTOS FERMENTATIVOS

As fermentações foram conduzidas em placas de petri contendo 10g da farinha e uma suspensão de esporos de *A. niger* em solução contendo 4,0% de glicose e 1,0% de extrato de levedura. A suspensão de fungo foi adicionada à farinha em quantidade para obter uma concentração final de 10^7 esporos/g de farinha.

As fermentações foram realizadas nas seguintes condições: 1) temperatura de incubação de 30°C e umidade inicial da farinha de 50%, 2) temperatura de 40°C e umidade inicial da farinha de 30%, e 3) temperatura de 40°C e umidade inicial da farinha de 70%. Estas condições foram baseadas em estudos prévios realizados pelo nosso grupo de pesquisa (Santos et al., 2012). As placas foram incubadas em estufa e nos tempos de 120, 240 e 360 h um fermentado foi removido para a extração e quantificação dos compostos fenólicos totais e flavonoides totais.

A extração dos compostos bioativos da farinha não fermentada e fermentada foi realizada em Erlenmeyers contendo 10 g do resíduo e 40 mL de acetona à 80% (v/v) (Silva et al., 2014 com algumas modificações). A extração foi conduzida em agitador magnético, a temperatura de 25°C por 15 min. Em seguida, os extratos foram filtrados em papel filtro Whatman e o sobrenadante foi analisado quanto aos teores de compostos fenólicos totais e flavonoides totais. Os extratos obtidos a partir dos fermentados das condições 1, 2 e 3 foram nomeados como SGF1, SGF2 e SGF3, respectivamente.

3.4. ANÁLISE DE FENÓLICOS TOTAIS

A quantificação de compostos fenólicos totais no extrato da farinha não fermentada e nos extratos da farinha fermentada foi realizada pelo método de Folin-Ciocalteu (Rufino et al., 2010 com algumas modificações). Alíquotas de 0,5 mL dos extratos foram transferidas para tubos de ensaio e adicionou-se 2mL de solução do reagente Folin-Ciocalteu (Sigma) 1N e 2 mL solução de carbonato de sódio 10% (p/v). Em seguida, as amostras foram homogeneizadas em vórtex e deixadas em local escuro por 30 min. Após este tempo, fez-se medidas de absorbância à 765 nm (Espectrofotômetro, marca Spectrum). O branco foi realizado com os mesmos reagentes, substituindo os extratos por água destilada. Uma curva de calibração foi obtida a partir de diferentes concentrações de ácido gálico 0,78; 1,56; 3,12; 6,25; 12,5; 25; 50 e 100 mg/mL. Os resultados foram convertidos e expressos em mg equivalente de ácido gálico (EAG)/g seca de farinha.

3.5. ANÁLISE DE FLAVONOIDES TOTAIS

A quantificação de flavonoides totais nos extratos foi realizada segundo metodologia descrita por Chang et al. (2002), com algumas modificações. Alíquotas de 1,5 mL de extrato foram colocadas em tubos de ensaio e misturadas à 1,5 mL de cloreto de alumínio 2% (p/v). Em seguida, as amostras foram homogeneizadas em vórtex e mantidas em repouso no escuro por 30 min. As absorbâncias das amostras foram lidas à 415 nm. O teor de flavonoides totais foi determinado através da curva de calibração de quercetina obtida nas concentrações de 1,05; 2,10; 4,21; 8,43; 16,87; 33,75 µg/mL. Os resultados foram expressos em mg de quercetina (QCE)/g seca de farinha.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A máxima quantidade de compostos fenólicos totais foi obtida nos extratos oriundos de 120h de fermentação, sendo valores de 1.760,0; 2.134,6; e 1.438,7 mg EAG/g seco de resíduo, para SGF1, SGF2 e SGF3, respectivamente (Tabela 1). Após este tempo, houve a diminuição dos compostos até 360 h de fermentação. Este resultado pode ser devido à degradação dos compostos fenólicos e/ou à polimerização dos fenólicos liberados através da oxidação de enzimas ativadas durante a FES, como resposta ao estresse induzido no fungo devido pela depleção de nutrientes do substrato durante esta fase da fermentação e/ou oxidação de compostos fenólicos, por meio de biossíntese dos ácidos durante o processo de fermentação (Kim et al., 2013; Zhang et al., 2017).

Em comparação ao teor de fenólicos totais obtidos na farinha de sementes de graviola não fermentada (1.257,0 mg EAG/g de fenólicos totais) verificou-se que a FES proporcionou um aumento de 40,0; 70,0 e 14,5% destes compostos, após as fermentações nas condições 1, 2 e 3, respectivamente. O maior aumento foi obtido quando utilizado farinha com 30% de umidade inicial e temperatura de fermentação de 40°C.

Ávila et al. (2011), Dey et al. (2016) e Torres-Leon et al. (2019) também obtiveram aumento no teor de compostos fenólicos após a fermentação de bagaço de maçã com *Phanerocheate chysosporium*, bagaço de ameixa com *Rhizopus oligosporus* e semente de manga mexicana com *A. niger*, respectivamente. Entretanto, alguns pesquisadores como Shin et al. (2019) tem obtido diminuição no teor de fenólicos totais no farelo de arroz preto após fermentação por *Aspergillus awamori*.

Em relação aos flavonoides totais, os extratos dos fermentados 1 e 2 demonstraram diminuição no teor destes compostos em relação ao extrato da farinha não fermentada (Tabela 2). O aumento destes compostos de 24,1 % foi verificado apenas quando realizada a fermentação na temperatura de 40°C da farinha com umidade inicial de 70% durante 120h (868,7 mg/g seca). Jamal et al. (2011) tem relatado que a diminuição de compostos bioativos após o processo fermentativo pode estar associada ao esgotamento dos nutrientes, resultando no próprio consumo destes compostos pelo micro-organismo.

Tabela 1. Teores de fenólicos totais nos extratos em acetona 80% obtidos da farinha de sementes de graviola fermentada

Extratos	Fenólicos totais (mg EAG/g seca de farinha)			
	Tempo de fermentação (h)			
	0	120	240	360
SGNF	1.257,0	-	-	-
SGF1		1.760,0±3,5	1.034,5±25,1	660,4 ±12,7
SGF2		2.134,6±2,3	1.007,6±10,2	918,3±110
SGF3		1.438,7±71,3	1.345,5±208,7	605,0±3,5

SGNF = farinha de sementes de graviola não fermentada; SGF1- extrato da farinha de sementes de graviola com umidade inicial da farinha de 50% e temperatura de fermentação de 30°C; SGF2 - extrato da farinha de sementes de graviola com umidade inicial da farinha de 30% e temperatura de fermentação de 40°C; SGF3- extrato da farinha de sementes de graviola com umidade inicial da farinha de 70% e temperatura de fermentação de 40°C.

Tabela 2. Teores de flavonoides totais nos extratos em acetona 80% obtidos da farinha de sementes de graviola fermentada

Extratos	Flavonoides totais (mg QCE/g seca de farinha)			
	Tempo de fermentação (h)			
	0	120	240	360
SGNF	700,0	-	-	-
SGF1	-	162,4±4,1	76,0±2,5	107,9 ±15,1
SGF2	-	73,7±16,1	68,5±0,0	64,0±5,2
SGF3	-	868,7 ±12,5	787,2±20,2	325,0±7,7

SGNF = farinha de sementes de graviola não fermentada; SGF1- extrato da farinha de sementes de graviola com umidade inicial da farinha de 50% e temperatura de fermentação de 30°C; SGF2 - extrato da farinha de sementes de graviola com umidade inicial da farinha de 30% e temperatura de fermentação de 40°C; SGF3- extrato da farinha de sementes de graviola com umidade inicial da farinha de 70% e temperatura de fermentação de 40°C.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A FES da farinha de sementes de graviola utilizando *A. niger* proporcionou aumento de compostos fenólicos e flavonoides totais em relação ao resíduo não fermentado em 120 h de fermentação, sendo o valor máximo obtido quando utilizado resíduo com umidade inicial de 30 e 70%, respectivamente e temperatura de incubação de 40°C. O resíduo de graviola comumente descartado pelas indústrias processadoras de polpas de frutas demonstrou potencial para ser utilizado como substrato em processos biotecnológicos para a obtenção de compostos bioativos.

REFERÊNCIAS

- [1] Ájila, C.M.; Brar, S.K.; Verma, M.; Tyagi, R.D.; Valero, J.R. Solid-state fermentation of apple pomace using *Phanerocheate chrysosporium*– Liberation and extraction of phenolic antioxidants. *Food Chemistry*, v. 126, p. 1071–1080, 2011.
- [2] Chang C.C.; Yang M.H.; Wen H.M.; Chern, J.C. Estimation of total flavonoid content in propolis by two complementary colorimetric methods. *Journal of Food Drug Analysis*, v. 10, p. 178-82, 2002.
- [3] Dey, T.B.; Kuhad, R.C. Enhanced production and extraction of phenolic compounds from wheat by solid-state fermentation with *Rhizopus oryzae* RCK2012. *Biotechnology Reports*, v. 4, p. 120–127, 2014.
- [4] Dey, T. B.; Chakraborty, S.; Jain, K. K.; Sharma, A.; Kuhad, R. C. Antioxidant phenolics and their microbial production by submerged and solid-state fermentation process: A review. *Trends in Food Science & Technology*, v. 53, p. 60-74, 2016.
- [5] Dulf, F. V.; Vodnar, D. C.; Dulf, E. H. Tosa, M. I. Total phenolic contents, antioxidant activities, and lipid fractions from berry pomaces obtained by solid- state fermentation of two *Sambucus* species with *Aspergillus niger*. *Food Chemistry*, v. 63, p. 3489-3500, 2015.
- [6] Dulf, F. V.; Vodnar, D. C.; Dulf, E-H.; Pintea, A. Phenolic compounds, favonoids, lipids and antioxidant potential of apricot (*Prunus armeniaca* L.) pomace fermented by two filamentous fungal strains in solid state system. *Chemistry Central Journal*, v. 11, n. 92, 2017.
- [7] Jamal, P.; Idris, Z.M.; Alam, M.Z. Effects of physicochemical parameters on the production of phenolic acids from palm oil mill effluent under liquid-state fermentation by *Aspergillus niger* IBS-103ZA. *Food Chemistry*, v.124, p. 1595–1602, 2011.
- [8] Kim, M.J.; John, K.M.M.; Choi, J.N.; Lee, S.; Kim, A.J.; Kim, Y.M.; Lee, C.H. Changes in secondary metabolites of green tea during fermentation by *Aspergillus oryzae* and its effect on antioxidant potential. *Food Research International*, v. 53, p. 670–677, 2013.
- [9] Lee, I.; Hung, Y.H.; Chou, C. Solid-state fermentation with fungi to enhance the antioxidative activity, total phenolic and anthocyanin contents of black bean. *International Journal of Food Microbiology*, v. 121, p. 150-156, 2008.
- [10] Machado, E.M.S.; Rodriguez-Jasso, R.M.; Teixeira, J.A.; Mussatto, S.I. Growth of fungal strains on coffee industry residues with removal of polyphenolic compounds. *Biochemical Engineering Journal*, v. 60, p. 87– 90, 2012.
- [11] Madeira Jr, J.V.; Nakajima, V.M.; Macedo, J.A.; Macedo, G.A. Rich bioactive phenolic extract production by microbial biotransformation of Brazilian Citrus residues. *Chemical Engineering Research and Design*, v. 92, p. 1802–1810, 2014.
- [12] Magro, A. E. A.; Silva, L. C.; Rasesa, G. B.; Castro, R. J. S. Solid-state fermentation as an efficient strategy for the biotransformation of lentils: enhancing their antioxidant and antidiabetic potential. *Bioresources and Bioprocessing*, v. 6, n. 38, 2019.
- [13] Rufino, M.S.M.; Alves, R.E.; Brito, E.S.; Pérez- Jiménez, J.; Saura-Calixto, F.; Mancini-Filho, J. Bioactive compounds and antioxidant capacities of 18 non-traditional tropical fruits from Brazil. *Food Chemistry*, v. 121, p. 996–1002, 2010.
- [14] Santos, R.C.A.; Araújo, K.B.; Soares, C.M.F.; Aquino, L.C.L. Evaluation of temperature and moisture response surface on the fermentation of lipase pumpkin seeds using *Aspergillus niger*. *Acta Scientiarum Technology*, v. 34(3), p. 255–260, 2012.
- [15] Silva, L.M.R.; Figueiredo, E.A.T.; Ricardo, N.P.S.; Vieira, I.G.P.; Figueiredo, R.W.; Brasil, I.M.; Gomes, C.L. Quantification of bioactive compounds in pulps and by-products of tropical fruits from Brazil. *Food Chemistry*, v. 143, p. 398–404, 2014.
- [16] Shin, H.-Y.; Kim, S.-M.; Lee, J.H.; Lim, S.-T. Solid-state fermentation of black rice bran with *Aspergillus awamori* and *Aspergillus oryzae*: Effects on phenolic acid composition and antioxidant activity of bran extracts. *Food Chemistry*, v. 272, p. 235–241, 2019.
- [17] Teles, A.S.C.; Chávez, D.W.H.; Oliveira, R.A.; Bom, E.P.S.; Terzi, S.C.; Souza, E.F.; Gottschalk, L.M.F.; Tonon, R.V. Use of grape pomace for the production of hydrolytic enzymes by solid-state fermentation and recovery of its bioactive compounds. *Food Research International*, v. 120, p. 441–448, 2019.
- [18] Torres-Leon, C.; Ramirez-Guzman, N.; Ascacio-Valdes, J.; Serna-Cock, L.; Correia, M.T.S.; Contreras-Esquivel, J.C.; Aguilar, C.N. (2019) Solid-state fermentation with *Aspergillus niger* to enhance the phenolic contents and antioxidative activity of Mexican mango seed: A promising source of natural antioxidants. *LWT - Food Science and Technology*, v. 112, p.108-236, 2019.
- [19] Zhang, X-Y.; Chen, J.; Li, X-L.; Yi, K.; Ye, Y.; Liu, G.; Wang, S-F.; Hu, H-L.; Zou, L.; Wang, Z-G. Dynamic changes in antioxidant activity and biochemical composition of tartary buckwheat leaves during *Aspergillus niger* fermentation. *Journal of Functional Foods*, v. 32, p. 375-381, 2017.

Capítulo 10

Avaliação do efeito estabilizante e antioxidante do óleo de laranja sobre nanoestruturas contendo óleo de açaí

Cássia Almeida Brito

Izabel Jales Ferreira

Maxwell de Paula Cavalcante

Lívia Rodrigues de Menezes

Resumo: Neste trabalho foram obtidas suspensões de partículas de Policaprolactona/Pluronic mediante a técnica de nanoprecipitação. Foi verificado a influência do óleo de laranja e açaí em propriedades como estabilidade e empacotamento das cadeias poliméricas, bem como sua propriedade antioxidante. Os resultados apontam que as partículas são nanométricas, e com adição do óleo de laranja houve um ganho de estabilidade e aumento do empacotamento das cadeias dos polímeros, além de se verificar uma eficácia dos óleos em relação a propriedade antioxidante dos mesmos.

Palavras-chave: Nanoprecipitação; Óleos essenciais; Nanoestruturas coreshell.

1. INTRODUÇÃO

O açaí, *Euterpe oleracea* Martius., é uma oleaginosa que pertence à família Arecaceae amplamente encontrada no norte da América do Sul, que apresenta em maior ocorrência e de importância econômica nas planícies do estado do Pará ^[1] ^[2].

Devido à sua composição fitoquímica, o açaí apresenta uma versátil aplicação, como, por exemplo, tendo um potencial uso no campo da oncologia, atuação como agente antioxidante, antiinflamatório, agente de contraste por conta do seu aporte de ferro, bem como ser um substituto viável para corantes sintéticos ^[1]. No entanto, a natureza hidrofóbica do óleo de açaí acaba impondo algumas limitações para o seu uso em sistemas biológicos, principalmente para aplicações que tenham como interesse a via de administração intravenosa ^[1].

Assim, tentando melhorar os parâmetros de solubilidade desse óleo, e consequentemente elevar a solubilidade dos mesmos no plasma humano, um mecanismo interessante é sua encapsulação em sistemas contendo uma cobertura hidrofílica. Entretanto, para garantir a melhor veiculação dessas partículas, é necessário que tenham uma estabilidade no tamanho nanométrico. Para isso, é interessante adicionar à formulação um potencial estabilizante, que no caso deste trabalho, foi utilizado o óleo de laranja, como um estabilizante natural aos sistemas propostos ^[3]. O óleo de laranja, por sua vez, possui entre seus constituintes flavonóides cítricos que apresentam atividade anticancerígena, antimicrobiana e antioxidante, favorecendo também uma propriedade sinérgica entre os óleos utilizados em relação a ação antioxidante ^[4].

As partículas foram obtidas por nanoprecipitação seguindo a metodologia descrita por Tavares *et al.*, 2017 ^[5] variando-se as proporções de óleo de açaí (OA) nas formulações (5%,10% e 15%) e mantendo-se fixa a proporção de 5% de óleo de laranja (OL). As partículas foram caracterizadas quanto ao tamanho antes e após a liofilização pelo espalhamento dinâmico de luz (DLS), em relação ao empacotamento das cadeias poliméricas com a difração de raios-x (DRX) e verificada a sua atividade antioxidante com o teste EC50 (DPPH).

2. METODOLOGIA

Para o presente estudo, as nanopartículas (Figura 1) foram obtidas pela técnica da nanoprecipitação, onde foram preparadas uma fase aquosa (Pluronic F-127/Água destilada) e uma fase oleosa (Acetona/PCL/óleo de açaí) na presença ou na ausência de óleo de laranja. A proporção fase aquosa/fase oleosa foi de 2:1 (v/v) e a proporção em massa PCL/Pluronic foi de 1:1 (m/m).

Figura 1. Configuração das nanopartículas obtidas pela técnica de nanoprecipitação

Os sistemas foram obtidos com teores de 5%, 10% e 15% de óleo de açaí (OA) (m/m) em relação a massa de PCL e a concentração fixa de 5% para o óleo de laranja (OL). A fase oleosa foi obtida a partir da solubilização da PCL e dos óleos em acetona. Para tal, os sistemas foram mantidos sob agitação magnética, em recipiente fechado e a uma temperatura em torno de 50-60 °C para a completa solubilização do polímero. A fase aquosa foi obtida também sob agitação magnética em temperatura ambiente.

A fase orgânica foi vertida na fase aquosa, com o auxílio de um funil de fluxo laminar, e posteriormente as partículas permaneceram sob agitação por 72h para a evaporação do solvente orgânico. As amostras foram secas em liofilizador com as condições de 487 µHg, 217 Vca e -47°C por 72h.

Os diâmetros de partícula foram determinados a partir da técnica de DLS utilizando o equipamento Malvern Instruments zetasizer Nano S90. As análises utilizaram 12 corridas e foram realizadas em triplicada na temperatura de 25 °C e em pH próximo a 6.

A difração de raios X foi realizada no difratômetro Rigaku Miniflex com passo de 0,05°/s, a 25 °C, variando 2θ de 2 a 50°, utilizando as amostras liofilizadas.

A atividade antioxidante foi estimada utilizando o reagente 2,2 difenil-1-picril-hidrazil (DPPH). Foi utilizada uma solução metanólica de DPPH, a 6.10^{-5} M, para esta avaliação. A análise foi realizada a partir do uso de 0,5 mL dessa solução que foi colocada em contato com cada formulação. Após 30 minutos de contato, mensurou-se a absorbância das soluções no comprimento de onda de 517 nm. Foi estimado após a absorbância o cálculo dos valores de EC50.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os sistemas foram caracterizados por dls, a fim de se determinar o tamanho médio das partículas, a estabilidade das suspensões obtidas, bem como avaliar o impacto dos óleos de açaí e laranja utilizados (figura 2 e 3). A figura 2 mostra a variação nos diâmetros ao longo de 3 meses e pode-se observar que todos os sistemas apresentaram tamanho nanométrico, entre aproximadamente 175-250 nm. Os tamanhos encontrados no presente estudo corroboram dados de estudos similares utilizando a técnica de nanoprecipitação com as matrizes de pcl e pluronic [5,6]. A formulação sem nenhum dos óleos (puro), tende ao envelhecimento logo após 1 mês de análise o que pode decorrer de um efeito do tipo blindagem do potencial eletrostático da pcl pelo pluronic, tendo uma redução desse na nanoestrutura, uma vez que, o tensoativo possui caráter não iônico [7-9].

Com os sistemas contendo apenas o oa, foi verificado um aumento no tamanho da partícula, que pode ser um indício da entrada do óleo no interior da partícula. Nestes casos, o óleo não influenciou no envelhecimento do sistema. Quando adicionado o ol foi verificado uma melhora, considerável, na estabilidade das partículas durante os meses avaliados (principalmente nos teores de 5% e 10% de oa + ol), e um aumento no tamanho das partículas em relação daquelas contendo apenas o açaí. Isso indica também, a possível inserção desse segundo óleo no interior do sistema. Na formulação contendo 15% oa + ol, provavelmente o excesso de óleo pode ter desestabilizado a suspensão de nanopartículas levando a coalescência do sistema logo após 1 mês de avaliação.

Na figura 3, os sistemas após a liofilização estão representados. Observou-se que os sistemas que receberam adição de óleo de laranja apresentaram maior estabilidade no tamanho das partículas ao longo dos meses, quando comparados aos sistemas com apenas óleo de açaí, indicando um possível efeito crioprotetor deste óleo fato este já observado para outros óleos essenciais [5].

Figura 2: Estabilidade das partículas durante 3 meses

Figura 3: Diâmetro hidrodinâmico das partículas antes e após a liofilização

Em relação a análise de DRX (Figura 4) foi avaliado, o impacto da adição dos óleos de açaí e laranja utilizados, no empacotamento das cadeias de Pluronic e PCL. Foi observado que a PCL apresenta dois picos de difração centrados em 21,6 e 23,8°, referentes respectivamente aos planos (100) e (200) característicos da organização ortorrômbica de sua célula unitária [10,11], o Pluronic F-127 por sua vez, apresenta-se com dois picos de difração centrados em 19,2 e 23,4° exibindo um perfil de difração compatível com outros estudos para esta matriz [12,13].

As nanopartículas obtidas exibem os planos cristalinos de ambos polímeros utilizados, apresentando ligeiros deslocamentos. Quanto a encapsulação do óleo de açaí, foi verificado que a presença desse óleo promove algumas modificações no empacotamento tanto para o Pluronic quanto para a PCL, onde é visto o deslocamento para ângulos menores indicando que pode existir óleo de açaí presente tanto na parte interior quanto na camada mais exterior da nanopartícula e este, consequentemente, está promovendo um afastamento das cadeias dos polímeros utilizados. Não foi verificado, de maneira geral, nenhuma alteração significativa ao adicionar o OL nos perfis de difração já observados para as nanopartículas carregadas com o OA.

Figura4: Difração de Raios-X das amostras obtidas e puro

Os resultados de EC50, utilizando o reagente 2,2-Difenil-1-picril-hidrazil (DPPH), Figura 5, indicam uma maior atividade antioxidante do óleo de laranja em relação ao óleo de açaí. A adição dos óleos simultaneamente nas formulações exibe um maior potencial antioxidante que os óleos usados isoladamente demonstrando assim, um aumento da eficácia dessa propriedade.

Figura 5. Teste de EC50 para indicar a atividade antioxidante dos óleos

4.CONCLUSÕES

Nas amostras com teores de 5% e 10% de OA + OL houve um aumento significativo na estabilidade das formulações, indicando que o OL é um potencial estabilizante natural. Em relação ao tamanho das partículas, todas se mantiveram nanométricas, entretanto ao ser adicionado tanto o OA, quanto OL ao sistema foi perceptível tamanhos maiores de partículas, indicando a inserção dos óleos no interior das nanoestruturas. Além disso, foi observado modificações no empacotamento das cadeias dos polímeros usados apontando que também pode haver óleo na fase externa da partícula, permitindo o afastamento das cadeias poliméricas. Em relação ao teste EC50 foi verificado uma eficácia dos óleos empregados quanto a propriedade antioxidante.

REFERÊNCIAS

- [1] POZO-INSFRAN, D. D.; BRENES, C. H.; TALCOTT, S. T. Phytochemical Composition and Pigment Stability of Açai (*Euterpe oleracea* Mart). *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, v. 52, p. 1539-1545, 2004.
- [2] CONTENTE, D. M. L. Obtenção e Caracterização de Nanoemulsão Óleo em Água a partir de Óleo de Açai (*Euterpe oleracea* M.), (93 f). Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal do Pará, 2016.
- [3] FUENTES, M. V.; MUEHLMANN, L. A.; LONGO, J. P. F.; SILVA, J. R.; FASCINELLI, M. L.; SOUZA, P.; FARIA, DEGTEREV, I. A.; RODRIGUEZ, A.; CARNEIRO, F. P.; LUCCI, C. M.; ESCOBAR, P.; AMORIM, R. F. B.; AZAVEDO, R. B. Photodynamic therapy mediated by acai oil (*Euterpe oleracea* Martius) in nanoemulsion: A potential treatment for melanoma. *Journal of Photochemistry & Photobiology, Biology*, v. 166, p. 301-310, 2017.
- [4] JORGE, N.; SILVA, A. N.; ARANHA C. P. M. Antioxidant activity of oils extracted from orange (*Citrus sinensis*) seeds. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, v.88, p.951-958, 2016.
- [5] TAVARES, M. R.; MENEZES, L. R.; FILHO, J. C. D.; CABRAL, L. M.; TAVARES, M. I. B. Surface-coated polycaprolactone nanoparticles with pharmaceutical application: Structural and molecular mobility evaluation by TD-NMR. *Polymer Testing*, v. 60, p. 39-48, 2017.
- [6] ROCHA, L. V. M.; MERAT, L. C.; MENEZES, L. R.; FINOTELLI, P. V.; SILVA, P. S. R. C.; TAVARES, M. I. B. Extract of curcuminoids loaded on polycaprolactone and pluronic nanoparticles: chemical and structural properties. *Applied Nanoscience*, v. 10, p. 1141-1156, 2020.
- [7] WANG, L. Y.; LIYA, E. Y.; LAI, J. Y.; CHUNG, T. S. Effects of Pluronic F127 on phase inversion and membrane formation of Pan hollow fibers for air filtration. *Journal of Membrane Science*, v. 584, p. 137-147, 2019.
- [8] MISHRA, J.; MISHRA, A. K. Estimation of Micropolarity and Microviscosity of Pluronic F127–Surfactant Mixed Systems Using Fisetin as a Fluorescent Molecular Probe. *ChemistrySelect*, v. 4, p. 4074-4082, 2019.
- [9] BRANCA, C.; D'ANGELO G. Aggregation behavior of pluronic F127 solutions in presence of chitosan/clay nanocomposites examined by dynamic light scattering. *Journal of Colloid and Interface Science*, v. 542, p. 289-295, 2019.
- [10] Yakub, Gyuldzhan, Milena Ignatova, Nevena Manolova, Iliya Rashkov, Reneta Toshkova, Ani Georgieva, and Nadya Markova. Chitosan/ferulic acid-coated poly (ϵ -caprolactone) electrospun materials with antioxidant, antibacterial and antitumor properties." *International Journal of Biological Macromolecules* 107 (2018): 689-702.
- [11] YILDIRIM, S.; DEMIRTAŞ, T. T.; DINÇER, C. A.; YILDIZ, N.; KARAKEÇİLİ, A. 2018. Preparation of polycaprolactone/graphene oxide scaffolds: A green route combining supercritical CO₂ technology and porogen leaching. *The Journal of Supercritical Fluids*, v. 133, p.156-162, 2018.
- [12] LI, Z.; PENG, S.; CHEN, X.; ZHU, Y.; ZOU, L.; ZHOU, W.; LIU, W.; LIU, C. Effect of dynamic high pressure microfluidization on structure and stability of pluronic F127 modified liposomes. *Journal of Dispersion Science and Technology*, v. 40, p 982-989, 2019.
- [13] SHATALOVA, O. V.; KRIVANDIN A. V.; AKSENOVA N. A., SOLOV'EVA, A. B. Structure of pluronic F-127 and its tetraphenylporphyrin complexes: X-ray diffraction study. *Polymer Science Series A*, v. 50, p. 417-421, 2008.

Capítulo 11

Obtenção e caracterização de filmes com adição de óleo essencial de cravo-da-india

Raquel Costa Chevalier

Sandriane Pizato

Rosalinda Arévalo Pinedo

William Renzo Cortez-Vega

Resumo: Este trabalho teve como objetivo desenvolver filmes a base de fécula de mandioca e avaliar os efeitos das concentrações de argila montmorilonita, óleo essencial de cravo (OEC) e do plastificante glicerol sobre as características de cor, opacidade, permeabilidade a vapor da água (PVA) e solubilidade. Substituindo as embalagens plásticas, reduzindo assim os resíduos gerados. A aceitabilidade do produto está visualmente ligada ao mesmo, logo as análises de cor de filmes são de extrema importância. Foram desenvolvidos pela técnica de “casting”, que consiste na secagem em superfície. Os valores de luminosidade variaram entre 72,16 e 69,41%. Os valores de opacidade apresentaram aumento com a adição de glicerol, variando de 35,21 a 20,24%. Os valores solubilidade, de 25,67 a 13,0%. Os valores de permeabilidade ao vapor de água (PVA) variaram entre 4,37 a 3,75 g.mm/KPa.m².dia. Conclui-se que a coloração e opacidade dos filmes de fécula de mandioca dependem da concentração dos componentes utilizados.

Palavras-chaves: filmes comestíveis; plastificantes; fécula; casting.

1. INTRODUÇÃO

A utilização de filmes e revestimentos comestíveis surgem como uma alternativa para a substituição dos filmes plásticos sintéticos (Pérez-Córdoba et al., 2018). Uma vez que, a população se tornou mais consciente da importância de utilização de medidas que venham minimizar os impactos ambientais gerados pela grande produção de lixo, oriundo principalmente de materiais plásticos. Com isso, temos os filmes que são caracterizados como uma fina camada de materiais poliméricos de macromoléculas que são secos e podem atuar como uma barreira, fornecendo proteção eficaz a produtos alimentares contra a deterioração acelerada (Wongphan & Harnkarnsujarit, 2020). Tem sido utilizado como sistemas de liberação controlada para atingir locais específicos, produtos farmacêuticos e ingredientes alimentares (Siddiqui, Garg & Sharma, 2011; Motedayen, Khodaiyan & Salehi, 2013). Já o revestimento é caracterizado como uma solução a ser aplicada sobre o alimento com objetivo de aumentar a vida útil, contribuindo para a preservação da textura e do valor nutricional dos produtos (Pizato et al., 2020). Estes revestimentos têm sido muito utilizados para aplicação produtos hortícolas minimamente processados e produtos cárneos (Chevalier et al., 2018; Pizato et al., 2020; Maringgal et al., 2020 & Umaraw et al., 2020).

Na produção dos filmes comestíveis a técnica mais utilizada é o *casting*, que compreende o preparo de uma solução filmogênica, aplicação dessa solução num suporte adequado, seguida de secagem em condições controladas. Essa técnica foi utilizada por Nakashima, Chevalier & Cortez-Vega (2016), onde desenvolveram e caracterizaram filmes de colágeno com adição de óleo essencial de cravo-da-índia, utilizando a argila MMT (Montmorilonita) como material de reforço nos filmes. O objetivo da adição de argila é melhorar as propriedades mecânicas e de barreira, através da dispersão uniforme da argila, que diminui a mobilidade molecular da matriz (ALEXANDRE & DUBOIS, 2000).

Na formação dos filmes, é necessário escolher os biopolímeros, plastificantes e os óleos ideais, obtendo as suas propriedades principalmente frente a solubilidade em água e sua capacidade de interação molecular. Podem também ser utilizados filmes a base de soluções emulsionadas, que podem encapsular compostos bioativos ou de interesse, e contribuir para uma liberação controlada (Xu et al., 2020; Dammak, Lourenço & Sobral 2019). E para contornar os problemas relacionados a estabilidade destas emulsões podem utilizar-se de partículas sólidas, como nanocristais e nanofibras de celulose (Li et al., 2020).

Este trabalho teve como objetivo desenvolver filmes a base de fécula de mandioca e avaliar os efeitos das concentrações de argila montmorilonita, óleo essencial de cravo (OEC) e do plastificante glicerol sobre as características de cor, opacidade, PVA e solubilidade.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Para a produção dos filmes os autores utilizaram fécula de mandioca comercial, glicerol como agente plastificante, argila Montmorilonita K10 e o óleo essencial de cravo-da-índia. Os filmes foram preparados utilizando-se de 5 ensaios com 3 repetições.

A solução filmogênica foi preparada hidratando-se 2g de colágeno em 100 mL de água destilada durante 30 minutos em temperatura ambiente. Após esse período, a solução foi aquecida em placa de aquecimento sob agitação magnética. Ao atingir a temperatura de 83°C, foram adicionados argila, plastificante, óleo essencial, por 30 minutos, nas concentrações de cada ensaio como descritos na Tabela 1.

Para a formação do filme, utilizou-se o método “casting”, onde se espalhou 30 mL da solução filmogênica em placas de acrílico com 9 cm de diâmetro, e foram secados à temperatura de 40°C na estufa de secagem com circulação de ar (Marconi, modelo MA035, São Paulo, Brasil) até que a água fosse totalmente evaporada. Após a secagem, os filmes foram armazenados por 24 h, até o início das análises, em dessecadores mantidos a 20°C e umidade relativa de 75%. A umidade relativa foi controlada usando solução saturada de cloreto de sódio, até o início das análises.

Tabela 1. Concentrações de argila montmorilonita (MMT), óleo essencial de cravo (OEC) e glicerol.

TRATAMENTOS	MMT (g)	OEC (mL)	G (% Glicerol/ 100g de fécula de mandioca)
T1	0,2	0,12	35
T2	0,2	0,48	25
T3	0,8	0,12	35
T4	0,8	0,48	25
T5	0,5	0,30	30

MMT: Argila Montmorilonita, OEC: Óleo essencial de cravo e G: Glicerol.

Os filmes foram caracterizados quanto a cor e opacidade, solubilidade em água e PVA. Foi realizada a análise estatística apresentando a média e desvio padrão e analisados pelo teste de Tukey a 5% de significância, utilizando o Statistica 6.1.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Pela análise dos resultados de cor e opacidade dos filmes pode-se observar que os parâmetros L^* , a^* , b^* e opacidade dos filmes que são apresentados na Tabela 2, as variações desses parâmetros estão de acordo com a adição dos componentes dos filmes (glicerol, argila, óleo essencial e fécula de mandioca). O parâmetro b^* apresentou valores próximo ao amarelo variando de $-4,03 \pm 0,32$ a $-2,08 \pm 0,13$. E o parâmetro a^* em todas amostras apresentaram valores negativos e próximos de 0, que implica em filmes com pouca tendência a cor esverdeada, pois quanto maior o valor negativo do parâmetro, mas tende ao verde. A luminosidade dos filmes varia $69,41 \pm 0,31$ a $72,16 \pm 0,24$. Com o aumento da concentração de óleo essencial de cravo e glicerol utilizados nos filmes, diminui-se a luminosidade. Observa-se que com o aumento da concentração de óleo essencial de cravo e glicerol utilizados nos tratamentos T2 e T4 dos filmes, aumentou a luminosidade, uma vez quanto maior a concentração de óleo essencial de cravo e glicerol, maior é a luminosidade. A maioria dos filmes elaborados apresentou luminosidade acima de 70, de forma que, quanto mais próximos de 100, mais transparentes.

Tabela 2. Resultados de cor e opacidade dos filmes de fécula de mandioca.

Tratamentos	L^*	Parâmetros Chroma a^*	Chroma b^*	Opacidade (%)
T1	$72,05 \pm 0,11^a$	$-1,17 \pm 0,11^a$	$-4,03 \pm 0,32^a$	$21,39 \pm 0,28^d$
T2	$72,16 \pm 0,24^a$	$-1,30 \pm 0,26^a$	$-3,26 \pm 0,18^{ab}$	$20,24 \pm 0,17^d$
T3	$69,41 \pm 0,31^c$	$-1,26 \pm 0,08^a$	$-2,08 \pm 0,13^b$	$30,37 \pm 0,22^c$
T4	$72,10 \pm 0,22^a$	$-1,46 \pm 0,09^a$	$-2,26 \pm 0,19^b$	$32,22 \pm 0,89^b$
T5	$71,20 \pm 0,36^b$	$-1,43 \pm 0,15^a$	$-2,13 \pm 1,21^b$	$35,21 \pm 0,77^a$

Médias de 3 repetições $\pm$ desvio padrão. Letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem entre si, pelo Teste de Tukey ($p < 0,05$).

Em relação a opacidade filmes obtiveram maior opacidade no tratamento T5. Uma vez que valores baixos indicam filmes transparentes e altos na opacidade indicam filmes opacos. Os aumentos da opacidade dos filmes foram caracterizados pelo aumento da concentração de glicerol e do óleo essencial. O que foi observado por outros autores também, em que associaram esse aumento da opacidade a concentração do plastificante e a concentração do óleo essencial utilizado (SILVA et al., 2020).

Em relação as análises de solubilidade e PVA, podemos observar os valores obtidos na Tabela 3. A solubilidade variou de $13,0 \pm 0,07\%$ a $25,67 \pm 0,11\%$, e todos os tratamentos realizados no ensaio apresentaram diferença significativa ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey. Para os testes de PVA o tratamento T2 apresentou o maior valor ($4,21 \text{ g.mm/m}^2.\text{dia.KPa}$) não apresentando diferença significativa em relação ao T1, e diferindo significativamente dos outros tratamentos.

Tabela 3. Resultados de solubilidade e permeabilidade dos filmes de fécula de mandioca.

Tratamentos	Parâmetros	
	Solubilidade (%)	PVA ($\text{g.mm/m}^2.\text{dia.KPa}$)
T1	$23,83 \pm 0,23^b$	$4,05 \pm 0,10^b$
T2	$25,67 \pm 0,11^a$	$4,21 \pm 0,09^{ab}$
T3	$13,00 \pm 0,07^d$	$4,04 \pm 0,13^{bc}$

T4	13,2±0.05 ^d	4,37±0,11 ^a
T5	15,2±0.04 ^c	3,75±0,12 ^c

Médias de 3 repetições ±desvio padrão. Letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem entre si, pelo Teste de Tukey ($p < 0,05$).

A permeabilidade ao vapor de água variou de 4,37±0,11 e 3,75±0,12 g.mm/KPa.m².dia Estes valores foram bem próximos aos encontrados por Fakhouri et al. (2007) com filmes a base de amido e gelatina onde a permeabilidade ao vapor de água variou de 4,22 a 5, 53g.mm/kPa.m².dia para os filmes.

4. CONCLUSÃO

Portanto, através desse estudo podemos verificar como as concentrações de plastificante, óleo, argila e do biopolímero (fécula de mandioca) utilizado afetam nas propriedades físicas dos filmes. Que os parâmetros de solubilidade e permeabilidade a vapor de água foram melhores para o tratamento T2, que era o filme com maior concentração de óleo essencial de cravo, menor concentração do plastificante e de argila, diante das formulações escolhidas. Além de apresentar os maiores valores de luminosidade, característica muito desejada para filmes.

REFERÊNCIAS

- [1] ALEXANDRE, M.; DUBOIS, P. Polymer-layered silicate nanocomposites: preparation, properties and uses of a new class of materials. *Materials Science and Engineering*, v.28, p.1-63, 2000.
- [2] CHEVALIER, R.C.; Pizato, S.; de Lara, J.A.F.; Cortez-Vega, W.R. Obtaining protein isolate of tilapia (*Oreochromis niloticus*) and its application as coating in fresh-cut melons. *Journal of food safety*, v. 38, n. 5, p. e12496, 2018.
- [3] DAMMAK, I.; Lourenço, R.V.; Sobral, P.J.A. Active gelatin films incorporated with Pickering emulsions encapsulating hesperidin: Preparation and physicochemical characterization. *Journal of Food Engineering*, v. 240, p. 9-20, 2019.
- [4] FAKHOURI, F.M.; Fontes, L.C.B.; Gonçalves, P.V.D.M.; Milanez, C.R.; STEEL, C.J.; Queiroz, F.P.C. Filmes e coberturas comestíveis compostas à base de amidos nativos e gelatina na conservação e aceitação sensorial de uvas Crimson. *Ciência e Tecnologia de Alimentos*. v.27, p.369- 375, 2007
- [5] LI, H.; Zhou, J.; Zhao, J.; LI, Y.; LU, K. Synthesis of cellulose nanocrystals-armored fluorinated polyacrylate latexes via Pickering emulsion polymerization and their film properties. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*, p. 111071, 2020.
- [6] MARINGGAL, B.; Hashim, N.; Tawakkal, I.S.M.A.; Mohamed, M.T.M. Recent advance in edible coating and its effect on fresh/fresh-cut fruits quality. *Trends in Food Science & Technology*, V. 96, p. 253-267, 2020.
- [7] MOTEDAYEN, A. A.; Khodaiyan, F.; Salehi, E. A. Development and characterisation of composite films made of kefir and starch. *Food Chemistry*, 136(34), 1231-1238, 2013.
- [8] NAKASHIMA, A.Y.; Chevalier, R.C.; Cortez-VEGA, W.R. Development and characterization of collagen films with added essential oil of clove India. *Journal of bioenergy and food science*, v. 3, n. 1, p. 50-57, 2016.
- [9] PÉREZ-CÓRDOBA, L.J.; Norton, I.T.; Batchelor, H.K.; Gkatzionis, K.; Spyropoulos, F.; Sobral, P.J.A. Physico-chemical, antimicrobial and antioxidant properties of gelatin-chitosan based films loaded with nanoemulsions encapsulating active compounds. *Food Hydrocolloids*, v. 79, p. 544-559, 2018.
- [10] PIZATO, S.; dos Santos, B.M.M.; Santiago, N.G.; Chevalier, R.C.; Pinedo, R.A.; Cortez-Vega, W.R. Use OF Chitosan AND Xanthan GUMS TO Extend THE Shelf LIFE OF Minimally Processed Broccoli (*Brassica oleracea L. Italica*). *Carpathian Journal of Food Science & Technology*, v. 12, n. 1, p. 157-167, 2020.
- [11] SIDDIQI, M. N.; GARG, G.; Sharma, P. K. A short review on "A novel approach in oral fast dissolving drug delivery system and their patents". *Advances in Biological Research*, 5(6), p. 291-303, 2011
- [12] SILVA, R.S.; dos Santos, B.M.M.; Fonseca, G.G.; Prentice, C.; Cortez-VEGA, W.R. Analysis of Hybrid Sorubim Protein Films Incorporated with Glycerol and Clove Essential Oil for Packaging Applications. *Journal of Polymers and the Environment*, v. 28, n. 2, p. 421-432, 2020.
- [13] UMARAW, P.; Munekata, P.E.S.; Verma, A.K.; Barba, F.J.; Singh, V.P.; Kumar, P.; Lorenzo, J.M. Edible films/coating with tailored properties for active packaging of meat, fish and derived products. *Trends in Food Science & Technology*, v.98, p. 10-24, 2020.
- [14] WONGPHAN, P.; Harnkarnsujarit, N. Characterization of starch, agar and maltodextrin blends for controlled dissolution of edible films. *International Journal of Biological Macromolecules*, v.156. p. 80-93, 2020.
- [15] XU, Y.; CHU, Y.; Feng, X.; Gao, C.; WU, D.; Cheng, W.; MENG, L.; Zhang, Y.; TANG, X. Effects of zein stabilized clove essential oil Pickering emulsion on the structure and properties of chitosan-based edible films. *International Journal of Biological Macromolecules*, v.156, p.111-119, 2020.

Capítulo 12

Produção e determinação do teor de ácido acético no vinagre artesanal de maçã gala (Malus domestica Bork)

*Kaio José Barra da Cruz
Bianca Farias Gaia
Tiago Gonçalves Durão
Pablo Souza de Sá
Fernanda de Souza Costa
João da Silva Carneiro*

Resumo: O vinagre é usado no mundo inteiro como conservante de alimentos ou condimentos. Além disso, é indispensável à alimentação humana, devido sua ação nutritiva e biorreguladora. Existem vários tipos de vinagres, tais como de álcool, amora preta, maçã etc. Sua produção pode ser feita através dos métodos artesanais e industriais. Deste modo, este trabalho mostra a produção e determinação do teor do Ácido Acético no vinagre artesanal de maçã gala (Malus domestica Bork). As análises ocorreram no Laboratório de Química da UEPA – Cametá-PA, onde, inicialmente houve a higienização das maçãs e, posteriormente o corte das amostras. Em seguida, em recipientes de vidro foram adicionados os pedaços de maçã em cubos, 250 mL de água destilada e 5 g de açúcar mascavo. Após as datas estabelecidas e o processo de fermentação realizado, as respectivas amostras foram determinadas por titulações afim de estabelecer o teor de Ácido Acético. Com os resultados obtidos foi possível observar que as amostras do vinagre caseiro apresentaram, em média, baixo teor de Ácido Acético, 1,84% m/v (21 dias), este fato pode ser explicado pelo fato de se tratar de um vinagre artesanal, aonde não houve o inóculo de micro-organismo responsável pela fermentação acética rápida, e devido o tempo baixo de incubação para tal fermentação, porém, alguns fatores podem ser melhorados no processo tais como a granulometria das frações de maçã e a adição de álcool e outros aditivos para acelerar o processo.

Palavras-chave: Ácido acético. Produção. Vinagre Artesanal.

1. INTRODUÇÃO

O Vinagre é uma solução líquida, destinado ao consumo humano, onde se utiliza matérias prima de origem agrícola, que possuem amido ou açúcares, produzido a partir do duplo processo de fermentação, alcoólica e acética. Pode-se obter uma coloração clara, sendo incolor ou a cor da matéria prima que lhe deu origem (ANAV, 2010). Quando ingerido, no organismo humano aumenta a atividade dos fermentos gástricos e ao mesmo tempo promove um efeito excitante da glândula pancreática e é considerado um produto superior em relação a outros alimentos ácidos pelo fato de conter o ácido acético que entre os ácidos orgânicos é o mais dissociável e favorável à digestão (Bortolini et al. 2001; Hoffmann, 2006).

A maçã do tipo Gala (*Malus domestica* Bork) é originária da Nova Zelândia. Os frutos possuem um formato ovoide e alongado, com coloração vermelha e uma aparência bonita. O peso médio varia de 150g a 200g com boa proporção de açúcares e ácidos (Ushirozawa, 1978).

O vinagre de maçã por possuir grandes teores de potássio, fósforo, magnésio, enxofre, cálcio, flúor e silício se destaca dos outros tipos de vinagres. A presença destes componentes e do ácido málico fazem do vinagre de maçã um alimento com grande potencial medicinal (Richware, 2003).

O ácido acético é muito utilizado na indústria alimentícia como conservante. Pois, apresenta ação bactericida e, por isso, utilizam o vinagre na higienização de vegetais e utensílios da cozinha (ANAV, 2010)

A produção do vinagre ocorre através de dois processos bioquímicos: fermentação alcoólica que se caracteriza por um processo anaeróbico, onde as leveduras utilizam o açúcar para a transformação em etanol e gás carbônico (Caetano e Madaleno, 2011). Seguido por fermentação acética no qual transforma álcool em aerobiose em ácido acético, obtido por bactérias acéticas, onde constitui uma importante função na produção do vinagre (EMBRAPA, 2002; Hoffmann 2006).

O processamento do vinagre pode ser realizado pelo método artesanal ou pelos processos industriais, tais como: Fielding process; processo lento, também conhecido por contínuo ou Orleans; e pelo processo rápido, também chamado de semicontínuo ou submerso (Llaguno; Polo, 1991).

Os vinagres de frutas possuem uma alta qualidade sensorial e nutritiva, quando comparados a outros tipos de vinagres, tendo como características próprias sabor e aroma. Sob o aspecto nutricional, têm vitaminas, ácidos orgânicos, proteínas e aminoácidos provenientes do fruto e da fermentação alcoólica (Aquarone et al., 2001).

Os vinagres tradicionais são produzidos a partir da fermentação espontânea, que contém diversos tipos de micro-organismos, originando um produto com sabor e aroma diferenciados e únicos (Nie et al., 2015).

O vinagre pode ser produzido de forma artesanal utilizando produtos vegetais que contenham em sua composição amido e açúcar. Podendo ser produzido de maneira simples, utilizando materiais de baixo custo e reutilizados.

Deste modo, o referido trabalho mostra a produção e determinação do teor do ácido acético no vinagre de frutos de maçã produzidos artesanalmente.

2. METODOLOGIA

A produção de vinagre artesanal e a análise dos parâmetros do teor de ácido acético foram desenvolvidas no Laboratório de Química, localizado na Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus XVIII-Cametá-PA.

O fruto da maçã utilizada para a produção de Vinagre foi obtida em um Hortifrúti do município de Cametá-PA. Os frutos foram higienizados, cortados em cubos com tamanho de aproximadamente 1 cm². Em seguida, pesou-se 200 g dos cubos de maçã, acondicionados em potes de vidro, levando em consideração que foram utilizados 6 potes de vidro previamente esterilizados. Além das maçãs, foram adicionados 250 mL de água destilada e 5 g de açúcar do tipo mascavo em cada pote. Por fim, vedado os gargalos com pano morim, conforme a Figura 1.

Figura 1 - Produção de vinagre de Maçã.

Para a verificação do teor de ácido acético os potes de vinagre foram analisados respectivamente em 0,5, 1, 2, 7, 14 e 21 dias, realizadas em triplicata.

A determinação do ácido acético foi realizada com é descrito por Baccan (2001), com modificações. Em cada amostra de vinagre realizou-se a titulação, onde foi utilizado 1 mL de vinagre artesanal e 9 mL de água destilada em um Erlenmeyer, em seguida adicionou-se 3 gotas de indicador fenolftaleína. Por fim a solução foi titulada com solução de hidróxido de sódio 0,096 mol L⁻¹ (previamente padronizada) até o aparecimento de coloração rósea.

O teor de ácido acético nas amostras de vinagre foi determinado pela seguinte equação:

$$M \times Fc \times V(NaOH) = \frac{m(CH_3COOH)}{\frac{P.M}{1000}}$$

$$m \text{ ————— } 1mL \quad (1)$$

$$x \text{ ————— } 100mL \quad (2) \quad x = \% \quad (3)$$

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Durante a etapa de elaboração dos vinagres, houve um acompanhamento periódico através de análises de álcool e acidez total.

O Ácido Acético é o principal constituinte do vinagre e, para a determinação deste ácido foram feitas titulações de neutralização com solução de Hidróxido de Sódio (NaOH). Para esta reação de neutralização a proporção estequiométrica de NaOH e Ácido Acético foi de 1:10.

Na primeira amostra (0,5 dias), a média das triplicatas foi 0,5 mL da solução de NaOH para a neutralização e o teor de Ácido Acético determinado foi de 0,28% m/v. Para a segunda amostra (1º dia) houve o consumo de 0,9 mL de NaOH, sendo assim encontrando o teor de 0,51% m/v. A terceira amostra (2º dia) utilizou-se 1,2 mL da Solução de NaOH, obtendo o teor de Ácido Acético de 0,69 m/v. Para a quarta amostra (7º dia) o consumo da solução de NaOH foi de 1,4 mL e o teor de Ácido Acético obtido foi de 0,80 % m/v. Para a quinta amostra (14º dia) foi consumido 2,2 mL de NaOH e o teor de Ácido Acético foi de 1,26 % m/v. Para a última amostra (21º dia) o consumo de NaOH teve um aumento de 3,2 mL e o teor de Ácido Acético de 1,84% m/v, conforme mostra a figura 2.

Figura 2 - Variação da concentração de ácido acético em função do tempo.

Com o passar dos dias a coloração do líquido ficou mais clara e o odor mais forte, isso é devido à fermentação ocorrida ao longo dos dias, que altera as propriedades iniciais dos vinagres.

Segundo os resultados obtidos por Pedroso (2003) que foram, respectivamente, os seguintes valores de produtividade de ácido acético: 2,37; 3,36; 1,60; 2,04 sendo produzidos pelo biorreator airlift, no qual foi interrompido quando a concentração de ácido atingiu em torno de 4,5 g de ácido acético. Porém, houve a necessidade de adição de álcool a 94° GL, pelo fato do fermentado de maçã utilizado possuir um teor alcoólico baixo para esse processo, fazendo com que o tempo gasto para obter os produtos prontos ocorresse entre 8 a 12 dias.

Dessa forma, considerando os resultados de Pedroso, por ser um vinagre artesanal não há o inoculo de micro-organismo responsável por uma fermentação acética rápida e, em virtude de não ocorrer à adição de álcool, o processo ocorre de forma lenta, sendo assim é preciso um maior período para que o vinagre esteja em boas condições de consumo, segundo a legislação.

5. CONCLUSÃO

O vinagre artesanal, além de ser de baixo custo e fácil produção, possibilita uma grande variedade de sabores, haja vista que o preparo baseia-se na fermentação.

Após a elaboração deste trabalho, pode se dizer que é possível produzir vinagres de forma artesanal em nosso dia a dia, porém, devido a vários fatores, dentre eles a falta de controle sobre o processo fermentativo, o qual demanda maior tempo de encubação para que o teor de ácido acético atinja os níveis que a legislação brasileira preconiza como ideal, para ser um vinagre de qualidade.

Durante o período de análise deste trabalho, não foi possível que o vinagre produzido estivesse com o teor de ácido acético estabelecido como padrão, no Brasil. No entanto, pode-se deduzir de forma empírica, que a utilização de um período maior de encubação, pode-se produzir um vinagre com teor de ácido acético, próximo ao valor de 4% padrão.

Contudo, excetuando o fator tempo de preparo e análise, que a produção de vinagre de forma artesanal é altamente viável, pois existe uma gama muito grande de matéria prima, que pode ser usada para variar a produção, podendo-se obter uma grande variedade de aromas e sabores. Portanto, o principal objetivo deste trabalho foi alcançado, determinar o teor de ácido acético com o passar do tempo, no vinagre artesanal e, foi possível sugerir algumas das vantagens e desvantagens que tal procedimento apresenta.

REFERÊNCIAS

- [1] AQUARONE, E.; LIMA, U.A.; BORZANI, W.; SCHMIDELL, W. *Biotechnologia na produção de alimentos*. Vol. 4. Editora Blücher, São Paulo, 523 p., 2001.
- [2] BACCAN, N., ANDRADE, J. C., GODINHO, O. E. S., BARONE, J. S. *Química analítica quantitativa elementar*. 3. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2001, 245p.
- [3] BORTOLINI, F.; SANT'ANNA E. S.; TORRES R. C.; Comportamento das Fermentações
- [4] Alcoólica e Acética de Sucos de Kiwi (*Actinidia deliciosa*); Composição dos Mostos e Métodos de Fermentação Acética. *Ciência e Tecnologia de Alimentos*, v. 21, n. 2, p.236-243, maio-ago. 2001.
- [5] CAETANO Alessandra Carolina. G.; MADALENO, Leonardo Lucas. Controle de contaminantes bacterianos na fermentação alcoólica com a aplicação de biocidas naturais. *Ciência e Tecnologia*, Jaboticabal, v.2, n.1, p.27-37, jan. 2011.
- [6] EMBRAPA, Elaboração de vinagre, Bento Gonçalves, RS, Embrapa Uva e Vinho, v. 3, n; 36, p. 9-31, Set. 2002. ISSN 1678-8761.
- [7] HOFFMANN, A., *Sistema de Produção de Vinagre*. Embrapa Uva e Vinho, Sistemas de Produção, Pelotas. 10f. 2006. ISSN 1678-8761.
- [8] LLAGUNO, C.; POLO, M. C. *El Vinagre del Vino*. Ebcomp, S.A, Bergantin, Madrid, Espanha, 1991.
- [9] NIE, Z.; ZHENG, Y.; DU, H.; XIE, S.; WANG, M. Dynamics and diversity of microbial community fermentation of Shanxi aged vinegar. *Food Microbiology*. v. 47, p. 62-68, 2015.
- [10] PEDROSO, P. F. R. *Produção De Vinagre De Maçã Em Biorreator Airlift*. 72 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis – SC, 2003.
- [11] RICHWARE. Disponível em :<<http://www.richware.com.br>>, 12/08/2019.
- [12] USHIROZAWA, K. *Cultura de maçã: a cultura catarinense*. Florianópolis: EMPASC, 1978. 275.

Capítulo 13

Educação alimentar e nutricional: Contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e técnicas de preparo, hábito alimentar saudáveis e incentivo ao consumo de alimentos dos adolescentes de Ensino Fundamental de uma escola no Município de Seropédica – RJ

*Maria Rosa Figueiredo Nascimento
Vânia Madeira Nunes Policarpo
Barbara Cristina Vicente
Dominic Salvador Reynaldo
Beatriz de Oliveira Lopes*

Resumo: O alimento é essencial para a manutenção da vida, como já dizia nossas avós: “saco vazio não para em pé”. Assim como qualquer máquina precisa de energia ou um bom combustível para funcionar, o corpo humano também necessita de vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos, ácidos graxos, fibras, para garantir seu pleno funcionamento gerando energia e garantindo saúde para as atividades cotidianas. O organismo que não recebe as quantidades ideais desses nutrientes diariamente está sujeito a doenças geradas pela desnutrição, como alguns tipos de anemias, baixa de imunidade, problemas hormonais dentre outras consequências. As políticas voltadas para Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil possuem um marco importante para evolução da saúde e garantias de sobrevivência das camadas mais vulneráveis da população que passou a acessar alimentos essenciais diariamente mudando aspectos nutricionais desta população. Por este motivo um laço fraternal na história de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é percebido por envolver cuidados com o outro. Considerada um dos pilares das políticas implantadas à época, ainda na atualidade é considerada um importante instrumento para promoção de hábitos alimentares saudáveis. Este estudo ocorreu no segundo semestre de 2019, foi realizado no Centro de Atenção Integral à Criança – CAIC Paulo Darcos Filho, *campus* da UFRJ no Município de Seropédica – Rio de Janeiro. Foi executado na cozinha experimental do CAIC com participação de 39 alunos do nono ano de escolaridade durante quatro meses com carga horária total de 240 horas. Inicialmente foi dividido em 2 fases, iniciando com avaliação dos hábitos alimentares e em seguida com aplicação das aulas teóricas e práticas. Teve como objetivos o fortalecimento das principais ações promotoras da alimentação saudável entre os adolescentes primando pelo desenvolvimento de habilidades culinárias e socialização de saberes ao em torno do cotidiano alimentar dos alunos e suas famílias, levou-se em consideração questões de acessibilidades relacionadas ao estilo de vida, hábitos culturais e sensoriais contemporâneos. A metodologia permeou entre métodos quanti-qualitativos com utilização da avaliação de observações da percepção dos adolescentes sobre a importância das aulas em suas vidas; avaliação sensorial com registro de observações sobre aceitação das receitas e questionários diagnósticos para verificação dos hábitos alimentares. Os resultados mostraram-se positivos durante as aulas todos demonstraram interesse em participar na confecção das receitas e com perguntas e discussões sobre os pratos elaborados correlacionando com experiências do cotidiano em suas casas, outros demonstraram desconhecimento e interesse em aprender. Quanto à aceitação das receitas 100% dos alunos dos questionários foram tabelados e compilados em grupos de respostas. O resultado do questionário envolveu 27 participantes e mostrou que 100% dos pais (n=27) tem o hábito diário de comer “arroz, feijão e algum tipo de carne bovina, de frango e de peixe em geral”, com menor proporção para carne de peixe; registrou-se que 82% (n=22) tem o hábito de consumir ovos e apenas 44% (n=12) consomem legumes e verduras com frequência.

Conclui-se que a realização destas práticas foi positiva e expôs a necessidade de incluir de forma mais efetiva a EAN de forma transversal nos conteúdos mínimos como recomendam os Parâmetros Nacionais Curriculares (1996) e a portaria Interministerial de 2011. As aulas permear falta efetiva da EAN nas salas de aula, sem o uso da parte prática da preparação e no costume de consumo de alimentos naturais e mais saudáveis. Embora seja inegável a conquista da EAN nas escolas, ainda existe um lapso entre teoria e prática, mostrando que as estratégias predominantemente utilizadas são focadas em uma metodologia tradicional de ensino-aprendizagem que nem sempre se mostram satisfatórios na construção de conhecimentos práticos e hábitos da vida cotidiana.

Palavras-chave: Segurança alimentar, técnicas de pré-preparo, Alimentação saudável.

1. INTRODUÇÃO

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é um programa do governo federal, que garante recursos financeiros aos municípios a fim de propiciar alimentação de qualidade aos alunos da educação básica das escolas públicas brasileiras, sendo um forte elemento para a melhora do hábito alimentar de crianças e adolescentes e uma forma de trabalhar educação nutricional nas escolas (BRASIL, 2013).

A alimentação escolar é defendida como um direito dos estudantes e considerada uma das estratégias de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Esse programa consiste em um conjunto de ações, que devem ser desenvolvidas de forma participativa e Inter setorial, e visam o direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade. Esse acesso deve ser em quantidade suficiente, e não comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. As práticas alimentares devem ser baseadas na promoção da saúde e respeitar a diversidade cultural e serem sustentáveis no âmbito ambiental, cultural, econômico e social (CONSEA, 2007; NEVES, 2018).

O trio Frutas, Legumes e Verduras (FLV) é amplamente conhecido por sua importância na saúde, sendo recomendado o consumo de 400g/dia segundo o Guia Alimentar da População Brasileira. Diversos estudos nacionais mostram que a ingestão de FLV por adolescentes se mostra abaixo das recomendações, tanto em frequência quanto em quantidade, variando de 2,7% a 15% o consumo adequado entre a população mais jovem. (BRASIL, 2014; ASSIS et al, 2010; MUNIZ et al, 2013; NEUTZLING, 2010; COSTA et al, 2012).

Em contrapartida há um aumento do consumo de alimentos processados e ultra processados, que são produtos com maior densidade energética, maior quantidade de gordura saturada e gordura trans e carboidrato refinado e com baixo conteúdo de fibras, vitaminas e minerais quando comparados a produtos *in natura* e minimamente processados (LOUZADA et al, 2015).

Neste contexto, o estímulo e o apoio à agricultura familiar têm se mostrado relevantes para a formulação e a implementação de ações municipais de SAN e de desenvolvimento local, que visem promover o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). Assim, a produção de alimentos, especialmente a da agricultura familiar, tem se fortalecido com iniciativas de articulação de políticas públicas, a exemplo do PNAE com o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) (SARAIVA, 2012).

As políticas de alimentação e nutrição possuem um laço fraternal na história de Educação Alimentar e Nutricional (EAN), sendo um dos pilares das políticas da época, considerada um importante instrumento para promoção de hábitos alimentares saudáveis. Esse tema teve uma crescente relevância de 1940 a 1960, associado às campanhas de introdução de novos alimentos, nas práticas educativas e nas medidas adotadas para enfrentamento de carências alimentares específicas. (BOOG, 1997).

À vista disso, é proposto o uso da culinária como ferramenta de EAN, pois permite manter a mensagem de sustentabilidade nutricional que se almeja promover, proporcionando discutir o conceito ampliado de saúde-doença e seus determinantes sociais. Esta vivência utiliza todos os sentidos sensoriais dos participantes, possibilitando a articulação de caminhos que levam o conceito da ciência da nutrição ao dia-a-dia, mobilizando o interesse e dando perspectiva de mudança por um processo de reflexão conjunta entre o profissional e usuário a partir de concretização de ideias de saúde e prazer ao se alimentar (MENEZES; MALDONADO, 2015).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Tratou-se de um estudo transversal analítico que utilizou a metodologia ativa envolvendo o ensino da nutrição através de projetos com professores coordenadores das ações e os estudantes como sujeitos ativos da aprendizagem (BUSS; MACKEDANZ, 2017). Foi de caráter quanti qualitativa onde foram envolvidas 2 turmas de nono ano com 39 alunos (17 meninos e 22 Meninas) em idade entre 13 a 18 anos.

O estudo fez parte de um projeto de extensão intitulado: “Fortalecendo a Alimentação Saudável no Ensino Fundamental” que segue a linha de trabalho do Setor de Alimentação e Nutrição da unidade escolar que há 14 anos trabalha na com ações de Educação Alimentar e Nutricional envolvendo toda comunidade escolar incluindo as famílias dos alunos. As ações deste projeto ocorreram entre os meses de agosto e dezembro de 2019 no Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC), Paulo Darcos Filho campus da UFRRJ no Município de Seropédica – RJ.

O projeto foi executado na cozinha experimental do CAIC e visou realizar aulas expositivas e práticas com uso de data show e oficinas culinárias respectivamente. O projeto foi dividido em duas fases.

Na fase 1 do projeto, foram ministradas aulas teóricas, a primeira aula abordou aspectos da Segurança Alimentar e Nutricional voltados para sanidade dos alimentos. Utilizou-se como referência a RDC 216/04, numa linguagem compatível a faixa etária dos estudantes. Dinâmicas de grupo também foram valorizadas nesta etapa a fim de harmonizar o grupo e despertar interesse pelo assunto.

Dentro dos aspectos nutricionais iniciou-se com abordagem nos macro e micronutrientes, destacando seus benefícios para o bom funcionamento do corpo humano. Para noções sobre quantidades, ingredientes e receitas uma aula prática foi ministrada com foco nos diversos tipos pesos e medidas, interpretação das receitas, tipos de cocção e organização da cozinha.

O Guia Alimentar para a População Brasileira foi utilizado, com o principal objetivo de mostrar as variadas e novas formas de como se alimentar melhor incluindo-se neste tópico noções de educação para o consumo. Na fase 2 do projeto foram ministradas oficinas culinárias sobre cocção dos tipos de arroz: Integral, parboilizado e branco, com objetivo de expor aos alunos diferentes tipos deste cereal, seu rendimento e as melhores técnicas de prepara-lo. Para mostrar a versão saudável de alguns lanches utilizados no cotidiano do público adolescente hambúrgueres caseiros foram confeccionados com participação de todos, logo após aconteceu a montagem dos sanduíches com pão e hortaliças, bebida gaseificada e biscoitos amanteigados. O objetivo foi de estimular as habilidades culinárias para redução no consumo de alimentos processados e ultra processados e despertar a percepção de que se pode comer algo que satisfaça o paladar e remeta às memórias afetivas. Na aula de Brigadeiro utilizando a biomassa o conceito foi de replicar receitas de grande aceitabilidade com a substituição de ingredientes tradicionais; o pão integral foi um pedido dos alunos para aprender a arte da panificação, aproveitando essa oportunidade foi ensinado um pão funcional enriquecido com aveia e farinha de trigo integral, na aula seguinte seguimos com uma receita típica de desjejum, a granola, com alimentos simples e baratos como aveia, flocos de arroz, semente de girassol, uvas passas amendoim e coco ralado sempre salientando os benefícios da fibra alimentar contida nas receitas. Com a intenção de estimular o maior uso de alimentos *in natura*, ensinamos macarrão de abobrinha com molho de tomate. O ciclo de aulas práticas finalizou com uma abordagem mais consciente sobre o aproveitamento integral de alguns alimentos. A casca de vários alimentos como: abacaxi, se tornou um belo chá com gengibre e a casca da manga em uma deliciosa geleia. Foi feito também batata rústica para aumentar o consumo de fibra existente na casca. Na última aula a confecção de uma geleia de frutas da estação trouxe de volta uma cultura antiga de conservação de frutas na qual aprenderam a esterilizar os recipientes, mediar o ponto da geleia e realizar o envase adequado.

A finalidade foi de promover a autonomia e independência com desenvolvimento de habilidades técnicas essenciais no preparo de receitas.

Este trabalho ainda se utilizou de dois questionários contendo questões abertas para a condução das demandas abordadas no projeto. O primeiro foi aplicado aos alunos, durante uma das aulas práticas e o segundo enviado aos pais para preenchimento em casa. Os resultados foram tabelados e compilados em grupos de respostas.

O projeto foi vinculado a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), os responsáveis dos alunos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido conforme a resolução 196 de 1996 do Conselho Nacional de Saúde.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante as dinâmicas nas aulas teóricas e práticas, observou-se que os alunos demonstraram grande interesse pelo tema com participação ativa nas aulas práticas e teóricas. Foi percebido que os alunos possuíam conhecimentos básicos sobre boas práticas na manipulação de alimentos e acerca dos conceitos de alimentação saudável apresentados pelo guia alimentar. Sugere-se que este fato está alinhado ao trabalho do Setor de Alimentação e Nutrição que trabalhou com estes alunos por nove anos na atenção às práticas para alimentação saudável. Fato que desconstruiu uma barreira quanto a melhor forma de se alimentar para se obter um estilo de vida mais natural e menos industrializado.

Nas aulas práticas foi observado grande interesse pelas experiências culinárias e manipulação dos alimentos. Os momentos mais instigantes foram durante as observações a cerca da transformação dos gêneros sob cocção com os aromas liberados provocando a sensação de alegria e fome.

Quando na finalização dos pratos, alguns relataram já possuir experiências culinárias em suas casas, seja por ajudar nas atividades domésticas ou auxiliar os pais no trabalho, com funções relacionadas a alimentação. Os momentos de degustação eram os mais animados, pois, os alunos tinham o reconhecimento que aquela preparação foi fruto das habilidades deles e que melhorou a percepção de capacidade própria de cada um, dentro dos limites e possibilidades individuais de cada participante.

As aulas práticas de preparação de alimentos foram embasadas na necessidade de criar hábitos alimentares que sejam mantidos até a vida adulta, consequentemente podendo influenciar o estado nutricional e as escolhas alimentares futuras além de prepará-los para vida cotidiana onde o preparo das refeições requer habilidades que perpassam pelo planejamento, aquisição, cuidados e preparo, até chegar ao consumo. Contudo, considerando a vida contemporânea onde as pessoas estão perdendo o hábito de fazerem suas refeições devido a falta de tempo, percebe-se então, que a grande vantagem de quem passa pelas experiências que as aulas proporcionam se traduz na possibilidade de ações sustentáveis relacionadas as escolhas alimentares, seja comida fora de casa, seja confeccionando as refeições em casa. Durante as aulas, o Guia Alimentar para População Brasileira, no tópico Rotulagem de Alimentos agregou mais reforço na hora da compra, momento pelo qual os estudantes mostraram maior interesse. Relataram observar a qualidade dos alimentos adquiridos pela família. Segundo Sampaio et al. 2007, aulas práticas se mostraram uma forma mais efetiva de fazer uma intervenção significativa do estilo de vida e até contribuindo para promoção da saúde.

Durante as aulas práticas foram observadas muitas reações dos alunos, na primeira aula foram surpreendidos com o tempo de preparo e o rendimento de cada tipo de arroz trabalhado, a degustação do arroz integral gerou uma grande impressão com o sabor e a técnica de cozimento que o tornava macio e saboroso.

Na aula de preparo de Hambúrguer, os adolescentes ficaram animados com essa produção pois, se tratava de um alimento muito consumido, logo, a degustação foi o momento ápice.

A confecção dos biscoitos amanteigados e da bebida gaseificada foi um sucesso, eles não acreditavam que teriam um resultado tão similar ao industrial, porém, feito de forma caseira e com qualidade nutricional melhorada.

O brigadeiro de biomassa foi interessante, os alunos ficaram surpresos quanto ao alcance da textura normal do brigadeiro sem os ingredientes comumente utilizados como o leite condensado.

Fazer pão e granola foi uma experiência sensorial incrível, ainda que o pão caseiro não tenha demonstrado a maciez esperada e o sabor costumeiro do pão francês tradicional a aceitabilidade observada foi boa pois consumiram voluntariamente toda produção.

Quanto ao macarrão de abobrinha e o molho de tomate confitado foi observado ser o prato menos aceito para degustação, por se tratar de uma simulação da massa tradicional de macarrão na qual os mesmos ficaram temerosos ao degustar, mesmo assim, todos foram convidados a experimentar a receita feita por eles, após a degustação houve boa aceitação. Segundo Nascimento et al, 2016, a não aceitação da alimentação pode ser justificada por alguns motivos como: falta de atrativos e preferências no cardápio, alimento inadequado para a faixa etária e também pela falta de apetite.

Aproveitar integralmente os alimentos foi tema de grande valia, ao observar a conscientização dos alunos quanto a desigualdade na distribuição dos alimentos a toda população e desperdício das partes ainda comestíveis da maioria dos alimentos.

O resultado da degustação com a geleia de frutas, mesmo sem açúcar, revelou aos estudantes que as frutas da safra apresentam alto teor de doçura, vitaminas e minerais, observou-se grande interesse em replicar a receita para uso familiar, desmitificando o conceito que geleia é um produto de luxo, sem contar que foi de interesse dos adolescentes saber que a esterilização do recipiente e o envase a vácuo mantém a geleia própria para o consumo por até 3 meses.

A educação alimentar e nutricional (EAN) entra como tema transversal nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, sendo incluso nas disciplinas de ciências e biologia, segundo a Lei 13.666/2018. O objetivo é proporcionar aos estudantes o conhecimento sobre os nutrientes alimentares e suas funções no organismo conforme as necessidades nutricionais de cada indivíduo durante o curso da vida levando em consideração os aspectos do clima da região onde vive.

Tais conteúdos visam também levar à compreensão de como o processo de deterioração dos alimentos acontece juntamente com as técnicas desenvolvidas para conservação. (BRASIL, 2018)

A prática de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) se mostra relevante para a promoção do estilo de vida e alimentação saudável, porém não tem o devido investimento e apoio, exibindo uma lacuna entre teoria e prática, mostrando a necessidade de intervenções dinâmicas e inovadoras baseadas na educação em saúde. Este campo demonstra necessitar de métodos que consigam passar toda a subjetividade que permeiam dos processos educativos e seus fatores associados, como as crenças, histórias e valores alimentares construídos ao longo da vida (RAMOS et al, 2013).

A pesquisa sobre o consumo alimentar realizada com o questionário nº 1 aos 39 alunos, 37 responderam. Foram tabelados e compilados em grupos de respostas.

No questionário foram aplicadas as seguintes perguntas: “O que você entende por alimentação saudável?” **Tabela 1**; “Em sua opinião, sua alimentação é saudável? Por quê?” **Tabela 2**; “Seus pais já conversaram com você sobre alimentação saudável? Se sim, como foi?” “Qual a visão de seus pais sobre o tema?” **Tabela 3** “Seus professores já mencionaram em alguma aula, o Guia Alimentar para a população Brasileira publicado em 2014?” **Tabela 4**.

Tabela 1 – Padrão de resposta para a pergunta: “O que você entende por alimentação saudável?” Aplicado aos alunos das turmas de 9º ano (2019).

Grupos de Resposta	N = 37	%
Ser Saudável	11	30,00
Ter equilíbrio na alimentação	5	13,50
Comer apenas alimentos benéficos ao corpo	4	10,80
Alimentação com FLV	6	16,00
Não comer “Besteiras”	3	8,00
Outros	6	16,00
Não respondeu	1	3,00

Na tabela 1, foi observado que predominou em 30% (n=11) a resposta “Ser Saudável”, porém os alunos não sabiam discorrer sobre o que efetivamente é ter hábitos de vida saudável. Em algumas respostas foi documentado que a uma percepção “Corpo x Saúde” e a preocupação com a forma física de alguns adolescentes: “Ser saudável, e ter um corpo moderado”; “Entendo que a alimentação saudável é um meio para melhorar nossa vida em questão de emagrecer, ter uma vida mais saudável”.

A percepção sobre o que é ser saudável e sobre saúde dos jovens é bastante ligada aos determinantes sociais e as vivências destes, levando em consideração o ambiente em que vivem e a apropriação dos bens simbólicos e materiais de sua realidade (ANHAS; CASTRO-SILVA, 2017).

Há um impacto maior, sobre o estilo de vida e comportamentos, a percepção corporal do que o real estado nutricional. As meninas, principalmente, se preocupam mais com sua imagem, tendo maior suscetibilidade há buscar atitudes extremas quanto aos hábitos alimentares para inferir sobre seus corpos (SILVA et al., 2015).

Foi relatado por 16 % (n=6) dos adolescentes, a importância do consumo de FLV para a prevenção de doenças “Que as pessoas que tem uma alimentação com frutas e legumes além de viver mais, tem uma boa saúde, energia e etc.”.

Apesar dos adolescentes mostrarem ter certo conhecimento sobre alimentação saudável, isto não reflete diretamente as suas escolhas alimentares. Alimentos nutricionalmente inadequados são mais acessíveis, com menor custo de aquisição, provocando um distanciamento entre a noção de alimentação saudável e o efetivamente praticado na realidade diária dos jovens (LEME; PHILIPPI S; TOASSA, 2010).

Tabela 2 – Padrão de resposta para a pergunta: “Em sua opinião, sua alimentação é saudável? Por quê?”. Aplicado aos alunos das turmas de 9º ano (2019).

Grupos de Resposta	N = 37	%
Sim	5	14
Não	22	60
Mais ou menos	7	19
Não soube responder	3	8

Em relação a alimentação, 60% (n=22) dos adolescentes reconhecem que não possuem uma alimentação saudável. Os alunos demonstraram uma grande propensão a escolher alimentos rápidos e práticos para se consumir durante o dia, principalmente na ausência dos pais, os mesmos afirmam não ser a melhor opção quanto a qualidade nutricional. Esse hábito formado na adolescência além de modificar o desenvolvimento natural do corpo, traz uma cultura de alimentação rápida substituindo as refeições convencionais, sendo justificado pelos jovens por serem fáceis e rápidos de adquirir (RYDELL et al., 2008)

Em um estudo longitudinal realizado por Bauer et al, 2009, sobre a tendência de consumo de *fast food* em adolescentes norte-americanos entre 1999 e 2004, que contou com a participação de 2.516 jovens, foi constatado um aumento no consumo deste tipo de alimentação na transição entre o começo e a metade da adolescência, e entre os adolescentes do gênero masculino pertencentes à menor camada de renda.

Tabela 3 – Padrão de resposta para a pergunta: “Seus pais já conversaram com você sobre alimentação saudável? Se sim, como foi? Qual a visão de seus pais sobre o tema?” Aplicado aos alunos das turmas de 9º ano (2019).

Grupos de Resposta	N = 37	%
Sim	18	49
Não	17	46
Não lembra ou não soube responder	2	5

49% (n=18) afirmam que os pais conversam sobre a importância alimentação saudável. O nível de acesso à informação é proporcional ao nível de escolaridade do chefe da família e também dos demais membros, pois além de estar correlacionado a uma renda mais elevada, permitindo acesso e maior disponibilidade, refletindo na qualidade da alimentação familiar, também entende-se que proporcionalmente ao nível a escolaridade, o indivíduo tem maior acesso a informações, incluindo as nutricionais, que afetam diretamente escolhas variadas e saudáveis nos momentos de compras dos gêneros alimentícios da casa (ARANCETA et. al., 2003).

Tabela 4 – Padrão de resposta para a pergunta: “Seus professores já mencionaram em alguma aula o Guia Alimentar para a população Brasileira publicado em 2014?” Aplicado aos alunos das turmas de 9º ano (2019).

Grupos de Resposta	N = 37	%
Não	20	54
Apenas da Pirâmide alimentar	5	14
Não lembra ou não soube responder	12	30

Na tabela 4, 54% (n=20) dos estudantes referente a questão alegam não ter conhecimento e 30% (n=12) não se lembram sobre o diálogo de alimentação saudável e guia alimentar na escola. 14% (n=5) alegaram se lembrar de ser abordado o tema “alimentação saudável”, sendo a matéria que eles tiveram contato com o tema foi Educação Física, na qual ainda exemplificaram ser utilizada a pirâmide alimentar. Magalhães e Castilho (2013) em sua pesquisa sobre a utilização da expressão gráfica o Guia Alimentar para a população brasileira aplicada ao PNAE, apurou que 50% das vezes, esse tema é abordado na disciplina de ciências mais frequentemente, sendo seguido por 25% em todas as disciplinas, e 25% em momentos não especificados.

A pirâmide alimentar foi um instrumento predecessor dos Guias Alimentares, foi desenvolvida pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em 1992. Phillip e colaboradores (1999), elaboraram a partir da pirâmide da USDA a pirâmide alimentar brasileira, sendo esta primeira representação gráfica de orientação alimentar e nutricional desenvolvida para a realidade brasileira, respeitando as diferentes realidades regionais e hábitos alimentares.

A pirâmide alimentar se baseia em divisões por nutrientes, grupos alimentares e porções, sendo esse último não muito bem especificado, com uma visão focada em nutrientes e não em alimentos em si.

Por conta disso, havia uma dificuldade da população em geral na interpretação e montagem das refeições diárias de modo adequado, sempre superestimando algumas porções e minimizando outras (GAO, 2006). Por conta dessas limitações, foi lançada em 2014 a última versão do Guia Alimentar, onde foi abandonado

o uso da Pirâmide Alimentar, pois não deixava claro nem a parte quantitativa, nem qualitativa dos grupos alimentares (BRASIL, 2014)

De acordo com Caroline Hunt (1916), propôs o primeiro guia alimentar com recomendações de uma dieta saudável. Na década de 1940, após as novas recomendações do *National Research Council*, surgiu o guia alimentar popularmente chamado *Basic Seven Food Guide* com alternativas alimentares durante a Segunda Guerra Mundial, por conta de escassez de alimentos, porém era de difícil compreensão e faltam as porções dos alimentos (MYERS; BRITTEN; DAVIS, 2001).

No questionário 2, apenas 27 pais e responsáveis deram retorno. As respostas foram tabeladas e compiladas em grupos de respostas. No questionário foram aplicadas as seguintes perguntas: “Quais são os alimentos mais consumidos em casa na alimentação da família?” **Tabela 5**; “O que você entende por alimentação saudável?” **Tabela 6**; “De que forma você incentiva a alimentação saudável dos seus filhos?” **Tabela 7**; “Você notou alguma mudança no comportamento alimentar dos adolescentes após as oficinas realizadas no CAIC as sextas-feiras?” **Tabela 8**; “Foi praticado alguma receita das oficinas em casa? Se sim, como foi? Quem deu a iniciativa?” **Tabela 9**

Tabela 5 – Padrão de resposta de acordo com os alimentos citados para a pergunta “Quais são os alimentos mais consumidos em casa na alimentação da família?”. Aplicado aos pais das turmas de 9º ano (2019).

Grupos de Resposta	N = 27	%
Arroz, feijão e carnes em geral.	27	100
Ovo	22	82
Legumes e verduras	12	44
Frutas	5	19
Leites e Derivados	3	11

100% dos pais (n=27) tem o hábito diário de comer “Arroz, feijão e carne bovina, de frango e de peixe em geral”, o qual alguns especificaram comer todos os dias. Foi relatado ainda que 82% (n=22) dos respondentes tem o hábito de consumir ovos e apenas 44% (n=12) consomem legumes e verduras com frequência. O momento de refeição familiar é uma oportunidade na qual as crianças e jovens têm a possibilidade de ter como modelo social os irmãos, amigos e adultos. Nesse momento, desde a introdução alimentar, a criança pode ser chamada atenção sobre sua forma de se portar a mesa ou ser encorajada e estimulada a comer determinados alimentos, moldando as escolhas e preferências alimentares. Utilizar alimentos açucarados como recompensas e coação para o consumo de alimentos com baixa palatabilidade, como vegetais, criam aspectos negativos sobre estes (BIRCH, 1992).

Tabela 6 – Padrão de resposta para a pergunta “O que você entende por alimentação saudável?”. Aplicado aos pais das turmas de 9º ano (2019).

Grupos de Resposta	N = 27	%
Consumir FLV	11	41
Consumir nutrientes	5	19
Comer para ter boa saúde e/ou um bom corpo	11	41

41% (n= 11) dos pais relatam que no seu entendimento, ter uma alimentação saudável é consumir FLV. Os pais são os primeiros educadores de alimentação e nutrição, sendo a família o primeiro pilar na formação do comportamento alimentar através da socialização. O processo de aprendizagem tem início desde o momento do nascimento da criança, tendo os fatores culturais e psicossociais como influencia as experiências alimentares da criança. Nas estratégias utilizadas pelos pais, o contexto social adquire um papel de extrema influencia neste processo alimentar e de criação de preferências a alimentos específicos que as crianças desenvolvem.

Estes métodos podem manifestar tanto estímulos favoráveis como desfavoráveis na aprendizagem dos hábitos alimentares, nas preferências por alimentos e no autocontrole no consumo de alimentos (RAMOS; STEIN, 2000).

Tabela 7 – Padrão de resposta para a pergunta “De que forma você incentiva a alimentação saudável dos seus filhos?”. Aplicado aos pais das turmas de 9º ano (2019).

Grupos de Resposta	N = 27	%
Disponho de FLV em casa	7	26
Falo da importância de ter um corpo saudável e manter a saúde	10	37
Peço ajuda nas preparações	1	4
Dou exemplos	2	7
Digo a eles o que devem comer	7	26

37% (n=10) dos pais afirmam que falam da importância de se manter o corpo saudável e a necessidade de manter uma alimentação adequada para permanecer saudável e 25,92% (n=7) alegaram que falam diretamente para seus filhos o que eles devem ou não devem comer, porém apenas 7% (n=2) a relataram que de fato dão exemplos do que eles consideram uma alimentação saudável. A estrutura familiar e o padrão de consumo estabelecido na rotina da família têm influência direta nas escolhas e padrões de consumo alimentar de crianças e jovens. Pais representam tanto um modelo como a primeira referência para os filhos de hábitos e preferências alimentares, sendo fundamentais nesta influência (COBELO, 2004).

26% (n=7) afirmaram que a melhor forma que eles veem de incentivar a alimentação de seus filhos é manter sempre disponível em casa opções de frutas e verduras. A disponibilidade de alimentos em casa é descrita como um fator importante sobre a escolha alimentar em crianças e adolescentes, pois a ausência do alimento reduz a oportunidade de consumo deste para a criança, delimitando as preferências pelo alimento em questão (ESTIMA; PHILIPPI; ALVARENGA, 2009).

E apenas 4% (n=1) dos pais pediam ajuda na hora de preparar as refeições como forma de incentivar hábitos mais saudáveis de alimentação. Em um estudo com objetivo de analisar a preocupação materna em ter uma alimentação saudável, Boutelle e colaboradores (2007) analisaram o comportamento e ambiente familiar de 917 pares de mãe e filhos adolescentes e foi observado que as mães que alegavam maior preocupação com a alimentação dos filhos buscavam manter sempre em casa, frutas e vegetais, servindo com frequência vegetais no jantar e possuíam uma menor aquisição de salgadinhos e refrigerantes. Porém, a preocupação e ações maternas não refletiam diretamente o consumo regular das refeições e de frutas, vegetais e leite de seus filhos.

Tabela 8 – Padrão de resposta para a pergunta “Você notou alguma mudança no comportamento alimentar dos adolescentes após as oficinas realizadas no CAIC as sextas-feiras?”. Aplicado aos pais das turmas de 9º ano (2019).

Grupos de Resposta	N = 27	%
Sim	9	32
Não	10	38
Não, mas houve comentários em casa	8	30

Para a questão todos os pais perceberam mudanças no comportamento alimentar de seus filhos (tabela 8), 32% (n=9) afirmam que notaram efetivamente uma alteração no comportamento alimentar dos filhos e 30% (n=8) constataram que apenas foi comentado sobre as aulas mostrando um impacto positivo das atividades, e quanto a execução da receita feita em casa **Tabela 9** apenas 26% responderam sim, sendo que a iniciativa foi por conta dos adolescentes e 67% não tentaram praticar em casa, isto explica a possível falta do alimento em casa dito pelos próprios estudantes.

Tabela 9 – Padrão de resposta para a pergunta “Foi praticado alguma receita das oficinas em casa? Se sim, como foi? Quem deu a iniciativa?” Aplicado aos pais das turmas de 9º ano (2019).

Grupos de Resposta	N = 27	%
Sim, por iniciativa dos pais	2	7
Sim, por iniciativa dos filhos	7	26
Não	18	67

A modificação de fatores internos, como percepção, conhecimento prévio e dúvidas, pode facilitar a mudança de um comportamento individual. Tais fatores dispõem não apenas das informações e ações necessárias para que a mudança ocorra, mas também de uma peça-chave para o autodesenvolvimento, influenciando os aspectos de adesão e motivação para aderir um padrão esperado de hábitos alimentares (ASSIS; NAHAS, 1999).

Para o crescimento, desenvolvimento e saúde, de crianças, uma nutrição e alimentação adequadas são consideradas condições básicas e fundamentais que influenciam no rendimento escolar (NASCIMENTO et al, 2016), logo, a alimentação saudável está relacionada com a aprendizagem e com a formação de hábitos alimentares saudáveis (RAPHAELLI et al., 2017).

4. CONCLUSÃO

A realização deste estudo expôs a falta efetiva da EAN nas salas de aula, sem o uso da parte prática da preparação e no costume de consumo de alimentos naturais e mais saudáveis. Embora seja inegável a conquista da EAN nas escolas, ainda existe um lapso entre teoria e prática, mostrando que as estratégias predominantemente utilizadas são focadas em uma metodologia tradicional de ensino-aprendizagem que nem sempre se mostram satisfatórios na construção de conhecimentos práticos e hábitos de vida.

A realização das oficinas de culinárias assim como as aulas de higiene e manipulação propõe um modelo de ação educativa menos teórica e mais voltada a realidade cotidiana dos alunos, proporcionando operacionalização de habilidades culinárias, reflexão e motivação de práticas alimentares saudáveis.

A maioria dos alunos afirmou não possuir conhecimento sobre o Guia Alimentar da População Brasileira indicando que este documento não é trabalhado durante as aulas do currículo mínimo como tema transversal, embora a EAN esteja inserida em caráter transversal numa base curricular, tornando questionável como tem sido a inserção do tema alimentação e nutrição nos currículos escolares, além de evidenciar a importância de um profissional atualizado sobre os instrumentos a serem utilizados para EAN. Demonstram ainda o uso desatualizado de materiais como foi constatado neste estudo, com a pirâmide alimentar.

Um das limitações presentes foi a falta de um retorno integral dos pais dos alunos participantes, o que reduziu a amostra. Mesmo com tal ocorrido foi visto que há uma preocupação por parte dos pais sobre a forma como seus filhos se alimentam, porém, muitos não sabem como mudar tal cenário, recorrendo a apenas conversa e não a exemplos práticos. Nesse quesito, mostra-se a importância da integração entre os pais e a escola para melhor obter resultados pelos jovens.

Correlacionando as respostas recolhidas nos questionários e o observado durante as oficinas, pode-se notar que houve mudanças positivas nos hábitos e percepção dos alimentos pelos adolescentes, mostrando que a vivência prática demonstrou um impacto positivo na maioria dos adolescentes.

REFERÊNCIAS

- [1] ANHAS, D. M. I. Castro, S.; C. R. Sentidos atribuídos por adolescentes e jovens à saúde: desafios da Saúde da Família em uma comunidade vulnerável de Cubatão, São Paulo, Brasil. *Saúde e Sociedade*, v. 26, n. 2, 2017.
- [2] ARANCETA, J.; Érez-R, C.; Ribas, L.; Serra, M. L. I. Sociodemographic and lifestyle determinants of food patterns in Spanish children and adolescents: the enKid study. *Eur J Clin Nutr.*; 57 (suppl 1):s40-s44, 2003
- [3] ASSIS, M. A.; Calvo, M. C. M. Kupek; Vasconcelos, E.; F. A. G. Campos, V. C.; Machado, M. Costa, F. F.; ANDRADE D. F. Qualitative analysis of the diet of a probabilistic sample of schoolchildren from Florianópolis, Santa Catarina State, Brazil, using the Previous Day Food Questionnaire. *Cad. Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 26, n. 7, p. 1355-1365, July 2010.

- [4] ASSIS, M.A.A.; Nahas, M.V. - aspectos motivacionais em programas de mudança de comportamento alimentar. *Rev. Nutr.*, Campinas, 12(1): 33-41, jan./abr., 1999
- [5] BAUER KW, Larson NI, Nelson MC, Story M, Neumark-Sztainer D. Fast food intake among adolescents: secular and longitudinal trends from 1999 to 2004. *Prev Med.*;48(3):284-7 2009
- [6] BIRCH LL. Children's preferences for high fat foods. *Nutr Rev.* 50:249-55. 1992
- [7] BOOG, M.C.F. Educação nutricional: passado, presente e futuro. *Rev Nutr.* 1997; 10(1):5-19.
- [8] BOUTELLE K.N, Birkeland R.W, Hannan P.J., STORY M, Eumarkstainer D. Associations between maternal concern for healthful eating and maternal eating behaviors, home food availability and adolescent eating behaviors. *J Nutr Educ Behav.* 39:248-56. 2007;
- [9] BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. *Diário Oficial União.* 18 jun 2013; Seção 1.
- [10] BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. *Guia alimentar para a população brasileira* / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed., 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014
- [11] BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Programa Nacional de Alimentação Escolar. Educação Alimentar e Nutricional – EAN. 2019.
- [12] BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Lei nº 13.666, de 16 de maio de 2018. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. *Diário Oficial Uniao.* 16 maio 2018; Seção 1
- [13] BUSS, C, Mackedanz, L.; F. O ensino através de projetos como metodologia ativa de ensino e de aprendizagem. *Revista Thema.* 14. 122-131. 10.15536/thema.14.2017.122-131.481. (2017).
- [14] CONSEA. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – por um desenvolvimento sustentável com soberania e segurança alimentar e nutricional. Relatório final. Fortaleza: Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 2007.
- [15] COBELO, A. W. O papel da família no comportamento alimentar e nos transtornos alimentares. In: PHILIPPI ST, ALVARENGA M, eds. *Transtornos alimentares – uma visão nutricional.* São Paulo: Manole; 119p. 2004
- [16] COSTA, L.C.F., de Vasconcelos, F.A.G., Corso, A.C.T. Fatores associados ao consumo adequado de frutas e hortaliças em escolares de Santa Catarina, Brasil. *Cad. Saúde pública.* Rio de Janeiro, v. 28, n. 6, p. 1133-1142, June 2012
- [17] ESTIMA, C. C. P.; Philippi, S. T; Alvarenga, M. S. Fatores determinantes de consumo alimentar: por que os indivíduos comem o que comem? *Rev Bras Nutr Clin*; 24 (4): 263- 8 2009.
- [18] GAO X., WILDE P. E., Lichtenstein A. H., Tucker K. L. The 2005 USDA Food Guide Pyramid Is Associated with More Adequate Nutrient Intakes within Energy Constraints than the 1992 Pyramid. *The Journal of Nutrition*, Volume 136, Issue 5, May 2006, Pages 1341–1346
- [19] LEME A. C., Philippi S. T., Toassa E. C. Práticas e percepções alimentares: o que os adolescentes pensam sobre uma alimentação saudável? *Rev Bras Nutr Clin* 2011; 25(1):1-20.
- [20] LOUZADA, M.L.C.; Martins, A. P. B. Alimentos Ultraprocessados e perfil nutricional no Brasil. *Rev Saúde Pública*, 2015
- [21] MAGALHÃES, A. M. L; Castilho L. F. *A População Brasileira: Um Estudo Aplicado ao PNAE; 2013; ... Utilização de Expressão Gráfica do Guia Alimentar para a População* ..<https://www.escavador.com/sobre/6289802/> (2013
- [22] MENEZES, M.G.F., Maldonado, L.A. Do nutricionismo à comida: a culinária como estratégia metodológica de educação alimentar e nutricional. *Revista HUPE*, Rio de Janeiro, 2015;14(2):82-89
- [23] MUNIZ, L. C.; Zanini; R.V.; Schneider. B. C; Prevalência e fatores associados ao consumo de frutas, legumes e verduras entre adolescentes de escolas públicas de Caruaru, PE. *Ciênc. Saúde coletiva*, Rio de Janeiro v. 18, n. 2, p. 393-404, fev. 2013 .
- [24] MYERS EF, BRITTEN P, Davis CA. Past, present, and future of the food guide pyramid. *J Am Diet Assoc.* 2001; 101(8):881-5
- [25] NASCIMENTO, M. C. P. S. et al. Avaliação da adesão e aceitabilidade dos cardápios do Programa de Alimentação Escolar em escolas municipais de Itapetinga – BA: indicadores de desperdício de alimentos. *Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental.* Santa Maria, v. 20, n. 1, jan.-abr. 2016, p. 73-85. *Revista do Centro de Ciências Naturais e Exatas – UFSM.* ISSN: 22361170.

- [26] NEVES, D. C. G. das. Análise de Políticas Públicas Intersetoriais de Fortalecimento da Agricultura Familiar e de Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil e o caso de um município do Espírito Santo. 2018. 87f. Dissertação (Mestrado Profissional em Práticas em Desenvolvimento Sustentável) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
- [27] NEUTZLING, M. B.; Assunção M. C. F.; Cavada, M. . Hábitos alimentares de escolares adolescentes de Pelotas, Brasil. *Rev. Nutr. Campinas*, v. 23, n. 3, p. 379-388, jun. 2010 . .
- [28] PHILIPPI ST, LATTERZA, AR, CRUZ ATR, RIBEIRO LC. Pirâmide alimentar adaptada: guia para escolha dos alimentos. *Rev Nutr.* 1999; 12(1):65-80.
- [29] RAPHAELLI, C. O. et al. Adesão e aceitabilidade de cardápios da alimentação escolar do ensino fundamental de escolas de zona rural. *Brazil Journal Food Technology.*, Campinas, v. 20, e2016112, 2017.
- [30] RAMOS, F.P.; SANTOS, L.A.S; Reis, A.B.C. Educação alimentar e nutricional em escolares: uma revisão de literatura. *Cad. Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 29, n. 11, p. 2147-2161, nov. 2013 .
- [31] RAMOS, M.; STEIN L. M.; Desenvolvimento do comportamento alimentar infantil. *J. pediatr. (Rio J.)*. 2000; 76 (Supl.3): S229-S237
- [32] RYDELL SA, HARNACK LJ, OAKES JM, STORY M, JEFFERY RW, FRENCH SA. Why eat at fast-food restaurants: reported reasons among frequent consumers. *J Am Diet Assoc.* 2008;108(12):2066-70.
- [33] SAMPAIO, H.A.C.; SABRY, M.O.D.; RÊGO, J.M.C.; PASSAMAI, M.P.B.; SÁ, M.L.B.; MATOS, M.R.T.; PASSOS, T.U. Estado nutricional de escolares de um bairro da periferia da cidade de Fortaleza-Ceará. *Revista Nutrição em Pauta*, n.84, p.26.mai. /jun. 2007.
- [34] SARAIVA, E. B.; Silva- A. P. F.; Sousa- A.A.G.; Cerqueira- F.; Chagas. C. M.; Tora N. Panorama da compra de alimentos da agricultura familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. *Ciênc. Saúde coletiva*. 2013, vol.18, n.4, pp.927-935. ISSN 1413-8123.
- [35] SERRANO, S. Q., VASCONCELOS, M. G. L., SILVA, G. A. P., CERQUEIRA, M. M. O., PONTES CM. Percepção do adolescente obeso sobre as repercussões da obesidade em sua saúde. *Rev Esc Enferm USP* 2010; 44(1):25-31
- [36] SILVA, S. U.; BARUFALDI, L.A.; ANDRADE, S. S. C. A.; SANTOS, M.. A. S.. ESTADO nutricional, imagem corporal e associação com comportamentos extremos para controle de peso em adolescentes brasileiros, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar de. *Revista Brasileira de Epidemiologia*. v. 21, suppl 12018, 2015

Capítulo 14

*Perfil sensorial e microbiológico de Sous vide de Tambaqui (*Colossoma macropomum*) in natura com molho de Jambu*

Maria Renara Alves Rodrigues

Danyelly Silva Amorim

Jamille de Sousa Monteiro

Ketlen Yumi Ito da Silva

Lorena de Lima Rodrigues

Rennan Wellington Ramos Alves

Resumo: O *Sous vide* é uma técnica que permite promover o vácuo e combiná-lo à cocção controlada resultando em um produto pronto, que pode ser consumido imediatamente, ou resfriado/congelado, para consumo posterior. Objetivou – se elaborar o *Sous vide* de tambaqui com molho de jambu, assim como avaliar a aceitabilidade do produto e o aspecto microbiológico do mesmo. Foi utilizada como matéria-prima o tambaqui (*Colossoma macropomum*) adquirida em um criatório da cidade de Redenção-PA, e para o molho utilizou-se como ingrediente principal o jambu (*Acmella oleracea*). Foram realizadas análises sensoriais, assim como tais avaliações microbiológicas: coliformes, aeróbios mesófilos e *salmonella*. Foi perceptível que a formulação de *Sous vide* de tambaqui com molho de jambu apresentou ótimos resultados sensoriais, com índice de aceitação superior a 70% e situou – se dentro dos parâmetros microbiológicos esperados para o processamento desta técnica.

Palavras chave: *sous vide*, jambu, análise sensorial, análises microbiológicas.

1. INTRODUÇÃO

No cenário nacional, o Brasil apresenta grande destaque em relação a produção de pescado, já que, possui uma disponibilidade hídrica, clima favorável e ocorrência natural de espécies aquáticas que compatibilizam interesse zootécnico e mercadológico. O estado do Pará por sua vez, representa potência na piscicultura brasileira, visto que, oferece uma produção aquícola, extensão territorial, disponibilidade hídrica, produção dos ingredientes para formulação de rações, vocação agropecuária, logística favorável à exportação por via marítima, elevado consumo per capita de pescado, bem como a condição de exploração dos principais estoques pesqueiros (BRABO et al, 2016).

Dessa forma, a espécie de peixe mais conhecida e estudada no estado do Pará é o tambaqui (*Colossoma macropomum*) que pertence à uma espécie de peixe nativa da bacia amazônica com alto valor comercial, podendo chegar a um metro de comprimento e 30 kg de peso. É considerado um peixe excelente para cultivo por apresentar qualidades zootécnicas e de manejo que permitem um bom rendimento em cativeiro (ARAÚJO et al, 2016; ALMEIDA, 2011).

Com o manejo apropriado de espécies de tambaqui, a piscicultura torna-se uma alternativa para se atender novos ramos de mercado, compostos por consumidores cada vez mais exigentes quanto à higiene e qualidade do produto, uma vez que, a forma de apresentação dos peixes nativos brasileiros para a comercialização restringe o consumo sobretudo devido à falta de praticidade e de padronização do produto (BOMBARDELLI et al., 2005).

Devido à falta de apresentação dos peixes, a indústria de beneficiamento oferece vários produtos e subprodutos para os consumidores, com o intuito de agregar valor à atividade de pescado e para a variedade dos novos produtos derivados deles (ALMEIDA, 2011). Sendo assim, o *Sous vide* é uma técnica que permite promover o vácuo e combiná-lo à cocção controlada resultando em um produto pronto, que pode ser consumido imediatamente, ou resfriado/congelado, para consumo posterior (UFSDA, 2005).

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo elaborar o *Sous vide* de tambaqui com molho de jambu, assim como avaliar a aceitabilidade do produto e o aspecto microbiológico do mesmo.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Obtenção da matéria-prima

Foi utilizada como matéria-prima o tambaqui (*Colossoma macropomum*) adquirida em um criatório da cidade de Redenção-PA. A matéria-prima foi acondicionada em recipiente térmico contendo gelo, a uma temperatura de 5°C e transportada até o Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade do Estado do Pará – Campus XV até o momento do processamento. Os ingredientes utilizados para elaboração do molho foram obtidos no comércio local.

Preparação do molho

Para elaboração do molho utilizou-se como ingrediente principal o jambu (*Acmella oleracea*). Para isso, foram realizados testes preliminares através de diferentes formulações até se obter a formulação desejada para elaboração do produto final, conforme descrito na tabela 01. Inicialmente todos os ingredientes foram triturados com o auxílio de um liquidificador industrial e armazenados sob refrigeração.

Tabela 01- Formulação do molho para *Sous vide* a partir do Jambu.

COMPONENTES	FORMULAÇÃO (%)
Água	55
Jambu desidratado	8
Orégano desidratado	5
Cebola desidratada	20
Vinagre de maçã	8
Sal	4
Total	100

Autores, 2017.

Elaboração do *Sous Vide*

Para o desenvolvimento do *Sous vide*, o tambaqui foi lavado em água corrente, eviscerado e filetado, obtendo-se porções de aproximadamente 150g. As porções foram colocadas em embalagens alimentar de nylon/lisa coextrusada com polietileno sendo adicionado 50 ml do molho. Em seguida as amostras foram embaladas a vácuo e submetidas ao processo de pasteurização em banho-maria a 60 °C por 20 min, a partir do momento em que o centro da peça alcançou a temperatura de processo. Imediatamente após o tratamento térmico, as amostras foram refrigeradas até o momento das análises.

Análise Sensorial

A avaliação sensorial foi realizada utilizando 20 provadores não treinados, selecionados por terem interesse em participar do teste. Cada provador recebeu uma amostra de aproximadamente 25g, a qual foi aquecida em banho-maria a 60°C durante 5min. A qualidade do produto foi avaliada considerando os atributos: aparência, aroma, sabor, textura, e avaliação global segundo metodologia de Dutcosky (2009).

Análise Microbiológica

Foram realizadas as seguintes avaliações microbiológicas: coliformes, aeróbios mesófilos e *salmonella*. Todas as análises microbiológicas foram realizadas seguindo a metodologia descrita no Manual Determinações microbiológicas (APHA, 2001).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com a tabela 02, os resultados demonstram que a maioria dos atributos sensoriais da formulação *Sous vide* de tambaqui, obtiveram médias de aceitação quanto ao escore sensorial hedônico “gostei moderadamente”. Dessa forma a utilização dos peixes nativos da região na realização de subprodutos, facilita o acesso da população de baixa renda a alimentos funcionais.

Tabela 02- Médias de aceitação dos atributos sensoriais da formulação de *sous vide* de tambaqui *in natura* com molho de jambu.

Atributos	Amostra 326
Aparência	6,35 ± 2,12
Aroma	6,45 ± 2,12
Sabor	7,10 ± 2,12
Textura	7,15 ± 3,54
Avaliação Global	7,15 ± 4,95

Fonte: Autores, 2017.

Quanto aos índices de aceitabilidade dos atributos sensoriais do *Sous vide* expressos na tabela 03, os valores de aceitação ficaram intercalados entre 70,56% e 79,44% para aparência e textura respectivamente, uma vez que, de acordo com Finger et al. (2010) para um bom resultado o índice de aceitação deve ser superior a 70%. Resultados esses corroborantes com os valores obtidos de Araújo et al (2016), que realizaram *Sou vide* de tambaqui com molho de manjeirício e shoyo e também obtiveram o

índice de aceitabilidade superior à 70%. De acordo com Lopes et al (2011), o teste de aceitabilidade tem o intuito de demonstrar a viabilidade da produção, indicando possível comercialização.

Tabela 03. Índice de aceitação (%) dos atributos sensoriais da formulação de sous vide.

Atributos	Amostra 326
Aparência	70,56
Aroma	71,67
Sabor	78,89
Textura	79,44
Avaliação Global	79,44

Fonte: Autores, 2017.

De acordo com a tabela 04, cujo está expresso os resultados da análise microbiológica do *Sous vide*, pode – se confirmar que quanto ao grupo coliformes, o mesmo não apresentou contaminação, evidenciando boas práticas de higiene por parte dos manipuladores. Segundo Oliveira et al. (2013) essas bactérias são utilizadas como indicadores higiênico-sanitários da manipulação de alimentos, uma vez que, matérias-primas com baixa carga microbiana são fundamentais para garantir a segurança dos produtos.

No que tange aos aeróbios mesófilos, a legislação não prevê um limite máximo e mínimo para essas bactérias em produtos provenientes de pescado, no entanto, o produto apresentou contaminação de $7,23 \times 10^6$ UFC/ml deste microrganismo. De acordo com Kirschink e Viegas (2009) populações altas de mesófilos, podem reduzir a vida útil de um alimento. Em relação à análise de salmonella, o produto apresentou ausência em 25g da amostra estando de acordo com o que é preconizado Brasil (2001).

Na presente pesquisa, os resultados microbiológicos satisfatórios, indicam que o processamento do *sous vide* de tambaqui, foi realizado dentro dos padrões adequados de higiene e sanitização, e as condições de temperatura e embalagem durante o armazenamento do produto foram mantidas corretamente.

Tabela 04- Resultado das análises microbiológicas da formulação de *Sous vide*.

ANÁLISES	SOUS VIDE
Coliformes (NPM/ml)	Ausente
Aeróbios Mesófilos (UFC/ml)	$7,23 \times 10^6$
<i>Salmonella sp./25g</i>	Ausente

Fonte: Autores, 2017.

4. CONCLUSÃO

Conclui-se que a formulação de *Sous vide* de tambaqui com molho de jambu apresentou ótimos resultados sensoriais, com índice de aceitação superior a 70% para todos os atributos e avaliação global, revelando que o desenvolvimento deste subproduto poderá contribuir com o acesso da população de baixa renda e indicando a possibilidade de comercialização.

Quanto às análises microbiológicas, a mesma estava de acordo com a RDC nº12 de 02 de janeiro de 2001, situando – se dentro dos parâmetros esperados para o processamento desta técnica, por possuírem um ótimo teor de frescor e baixas cargas de microrganismos deteriorantes, evidenciando potencial de inclusão no mercado.

REFERÊNCIAS

- [1] ALMEIDA HCG. Efeito da técnica sous vide em filés de tambaqui cultivados na Amazônia. Belém – PA, 2011.
- [2] APHA – AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Committee on Microbiological for Foods. Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 4.ed. Washington: American Public Health Association, 676p, 2001.
- [3] ARAÚJO CS. et al. Estudo da vida comercial de Sous Vide de tambaqui (*Colossoma Macropomum*) armazenado sob congelamento. Gramado, out. 2016.
- [4] BOMBARDELLI, R. A.; SYPERRECK, M. A.; SANCHES E. A. Situação atual e perspectivas para o consumo, processamento e agregação de valor ao pescado. Ciências Veterinárias e Zoologia, Umuarama, 8(2):181-195. 2005.

- [5] BRABO MF. et al. Cenário atual da produção de pescado no mundo, no Brasil e no estado do Pará: ênfase na aquicultura. set.2016.
- [6] BRASIL, Resolução-Rdc nº 12, de 02 de janeiro de 2001. Anexo – Regulamento técnico sobre os padrões microbiológicos para alimentos. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/RDC_12_2001.pdf/15ffddf6-3767-4527-bfac-740a0400829b>. Acesso em: 22 jun. 2017.
- [7] DUTCOSKY SD. (2009). Análises Sensorial de Alimentos. Varela, São Paulo.
- [8] FINGER C.L et al. A. Desenvolvimento, análise sensorial de petit suisse de maracujá e mexerica. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2010. Disponível em: <<http://www.utfpr.edu.br/.../Q%20Finger%20et%20al%20-%2072-75.pdf>>. Acesso em: 20 jun. 2017.
- [9] KIRSCHINK.P.G; VIEGAS, E.M.M. Efeito da lavagem e da adição de aditivos sobre a estabilidade de carne mecanicamente separada de tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*) durante a estocagem a -18°C. Ciência e Tecnologia de Alimentos, São Paulo, v.29, p.200-206, 2009.
- [10] LOPES VM. et al. Aplicação de testes de aceitabilidade por nutricionistas em escolas públicas do Estado de Goiás. 2011.
- [11] OLIVEIRA, A.B.A. et al. Avaliação da presença de microrganismos indicadores higiênico-sanitários em alimentos servidos em escolas públicas de Porto Alegre, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, 18(4):955-962, 2013.
- [12] USFDA, FOOD CODE ANNEX 6 Food Processing Criteria. Disponível em: <<http://www.cfsan.fda.gov/~acrobat.fc05-a6.pdf>>. Acessado em 22 jun. 2017, (2005).

Capítulo 15

Produção e avaliação sensorial do néctar misto de Cupuaçu com Cajá

Ruanis Silva Araujo

Gabrielly Pereira de Araujo

Taysa Katlyn Lima Borges

Artur Carvalho Ferreira

Fábio Israel Martins Carvalho

Priscilla Andrade Silva

Resumo – O mercado para bebidas desenvolvidas a partir de misturas de frutas se encontra em expansão, ainda mais quando se trata de frutas tropicais. A complementação de nutrientes fornecidos pelas diferentes frutas tem como objetivo, melhorar as características nutricionais. O presente trabalho tem como intuito elaborar, avaliar as características físico-químicas, palatabilidade e aceitação sensorial, para identificar a melhor formulação produzida, de acordo com os ingredientes de composição, sendo – Formulação 1: água potável, polpa da fruta do cupuaçu, açúcar; Formulação 2: água potável, polpa da fruta de cupuaçu e de cajá, açúcar. No qual em sua produção foram utilizadas duas formulações de polpas dissolvidas em água (F1: 30% de polpa de cupuaçu e 70% de água; F2: 30% de polpa de fruta mistas composta por 50% de cupuaçu e 50% cajá, diluídas em 70% de água). Para a caracterização físico-química dos produtos elaborados foram realizadas as análises de pH, acidez total titulável e sólidos solúveis totais. Para a avaliação sensorial foram realizados os testes de aceitabilidade para os seguintes parâmetros: aparência, aroma, textura, sabor e impressão global; assim como o índice de aceitação e a intenção de compra dos produtos. Os resultados das análises físico-químicas e sensoriais dos produtos artesanais foram submetidos à análise de variância através do teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para os néctares formulados, os valores de pH, sólidos solúveis totais e acidez total titulável estão de acordo com o padrão de identidade e qualidade de néctar de cupuaçu e de cajá definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Houve uma boa aceitação sensorial e intenção de compra na avaliação dos provadores pelos produtos, propondo que a bebida elaborada possa apresentar uma fonte de renda adicional aos pequenos produtores rurais.

Palavras-chave: Frutas tropicais; caracterização e aceitação.

1. INTRODUÇÃO

Na região Amazônica, a agricultura familiar se manifesta de forma mais característica que em outras regiões, constituindo a base onde se aplica a extração dos recursos naturais e a maior parte da produção de alimentos. Há a predominância nessa região de agricultores familiares em áreas de fronteira e em áreas antigas de colonização, produzindo culturas temporárias e permanentes, além da exploração extrativa, ocasionando mudança da base produtiva em suas propriedades com a integração ao mercado (SANTOS; MITJA, 2012; GALVÃO et al., 2005).

A fruticultura participa diretamente na economia do país através do valor das exportações e mercado interno, e pode-se salientar ainda a importância no caráter econômico-social, uma vez que está presente em todos os estados brasileiros, sendo responsável pela geração de 5,6 milhões de empregos diretos, o equivalente a 27% do total da mão de obra agrícola do país (FACHINELLO et al., 2011).

O Brasil é considerado terceiro produtor mundial em frutas frescas e o primeiro em frutas tropicais, pois apresenta condições ideais de cultivo para a grande maioria das espécies nativas e exóticas, favorecendo características como sabor, aroma e constituição nutricional dos frutos (FAO, 2009).

O cupuaçu (*Theobroma grandiflorum*) e o cajá (*Spondias mombin*) são frutos oriundos da região amazônica e tem se destacado por suas marcantes características organolépticas como aroma, sabor e textura. É grande a comercialização dessas frutas in natura ou industrializadas, e são amplamente utilizadas para a produção de sucos, compotas, licores, tortas, sorvetes, óleos, entre outros produtos (CANUTO et al., 2010; MOURA et al., 2011).

O cupuaçuzeiro é uma planta cujo tamanho varia entre 6 m e 8 m de altura, e sua copa pode apresentar 7 m de diâmetro, seu florescimento ocorre de dois a três anos após ser plantado. Os frutos possuem tamanhos e formatos diversos, variando entre 10 cm e 40 cm de comprimento e o peso entre 300 g e 4 kg. As maiores produções concentram-se nos estados do Pará, Amazonas, Rondônia e Acre (ROCHA, 2015).

O cajá, também conhecido como taperebá, pertencente à família Anacardiaceae, é uma planta que pode alcançar uma altura de até 30 m. A floração da planta pode começar a partir do quarto ano após o plantio. Os frutos são característicos com uma coloração amarela, possui uma pequena camada de mucilagem ao entorno do caroço, apresentando ótimas características nutricionais (SANTOS et al., 2010).

O transporte *in natura* de ambos os frutos às longas distâncias não é viável devido a sua alta perecibilidade, desta maneira, faz-se necessário o tratamento dos frutos. A despolpa, e produção artesanal ou industrial de derivados do cupuaçu são de extrema importância mercadológica, pois conserva as características nutricionais e sensoriais por mais tempo e com uma boa qualidade (MARTINS, 2008; FREIRE et al., 2009).

O néctar é uma alternativa interessante, sendo ele uma bebida não fermentada, obtida da dissolução em água potável da parte comestível da fruta, açúcares e ácidos quando necessário. O néctar é destinado ao consumo direto e possui uma validade média de 12 meses, sendo um produto que apresenta baixo custo de produção e grande valor agregado (MATOS, 2013).

Segundo a Instrução Normativa nº 12, de 4 de setembro de 2003 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, o artigo 3º diz que o néctar, cuja quantidade mínima de polpa de uma determinada fruta não tenha sido fixada em Regulamento Técnico específico, deve conter no mínimo 30% (m/m) da respectiva polpa, ressalvado o caso de fruta com acidez ou conteúdo de polpa muito elevado ou sabor muito forte e, neste caso, o conteúdo de polpa não deve ser inferior a 20% (m/m).

A elaboração do presente trabalho fundamenta-se no enriquecimento e fornecimento de novas tecnologias aos pequenos produtores rurais, para uma melhor eficiência e aproveitamento da produção de frutas tropicais. Objetiva-se elaborar duas formulações de néctares e avaliar as características físico-químicas e sensoriais dos produtos produzidos a partir de polpas de frutas obtidas no município de Parauapebas-PA.

2. MATERIAL E MÉTODOS

As polpas dos frutos de cupuaçu e cajá foram obtidas através de produtores de polpas artesanais no município de Parauapebas, localizado no sudeste do Estado do Pará.

Os produtos elaborados foram desenvolvidos na Universidade Federal Rural da Amazônia, no Campus de Parauapebas-PA, localizada nas coordenadas geodésicas 49°51'19" W latitude, 06°12'58" S longitude, com altitude de 197m (com auxílio do GPS portátil, modelo eTrex 10, marca Garmin), assim como todas as análises físicas, físico-químicas e sensorial.

Para a produção dos néctares utilizou-se duas formulações: F1, apresentando 30% de polpa de cupuaçu e 70% de água; F2, apresentando 30% de polpa de fruta mistas composta por 50% de cupuaçu e 50% cajá, diluídas em 70% de água. Às formulações dos néctares (F1 e F2) foram acrescidas em função do teor de sólidos solúveis, segundo o cálculo, a quantidade de açúcar suficiente para elevar o teor de sólidos para 17 °Brix por balanço de massa. Os néctares foram pasteurizados a 90 °C por 30 segundos, para a limpeza das bebidas foi realizada a filtração. Envazados e mantidos sob refrigeração a 8 °C até o momento das análises. Na Figura 1 o fluxograma do processo dos néctares está descrito e podem ser visualizadas as etapas realizadas no processamento dos mesmos.

Calculou-se a quantidade de sacarose suficiente para elevar o teor de sólidos solúveis do néctar 17 °Brix, utilizando-se o cálculo de balanço de massa: $M_p \times ^\circ\text{Brix}_p + M_a \times ^\circ\text{Brix}_a = M_{\text{produto}} \times ^\circ\text{Brix}_{\text{produto}}$. Onde: $^\circ\text{Brix}_a = ^\circ\text{Brix}$ do açúcar; M_p = massa do produto néctar

Figura 1. Fluxograma da produção dos néctares de cupuaçu e misto de cupuaçu com cajá.

As seguintes análises foram realizadas em triplicata (n=3) nos néctares elaborados:

- **pH:** determinado em potenciômetro da marca Hanna Instruments, modelo HI9321, previamente calibrado com soluções tampões de pH 4 e 7, de acordo com o método 981.12 da AOAC (1997).
- **Acidez total titulável (ATT):** realizada por titulometria com solução de hidróxido de sódio 0,1 N até a primeira coloração rosa persistente por aproximadamente 30 segundos, e fator de conversão do ácido cítrico foi de 64,02 (AOAC, 1997).
- **Sólidos solúveis totais (SST):** foram quantificados nas amostras, por meio de leitura direta em refratômetro de bancada segundo AOAC (1997).

A avaliação sensorial foi realizada na Universidade Federal Rural da Amazônia no Campus de Parauapebas, por 100 provadores não treinados, selecionados aleatoriamente, de ambos os sexos, com faixa etária de 18 a 60 anos, pertencentes a comunidade acadêmica da UFRA. Para cada avaliador foi entregue uma ficha com o Termo de Consentimento Livre Esclarecido para Análise Sensorial (Figura 2), em seguida o mesmo recebeu aproximadamente 30 mL das formulações de néctar refrigeradas (8 °C), servidas em copinhos descartáveis (de 50 mL) codificados com números de três dígitos aleatórios, um copo com água (de 150 mL) e bolacha água e sal, sendo-lhe solicitado avaliar cada amostra, individualmente, quanto a aparência, aroma, textura, sabor e impressão global (modo geral do produto), utilizando uma ficha de avaliação (Figura 3) com uma escala hedônica de nove pontos, ancorados em seus extremos nos termos gostei muitíssimo (9) e desgostei muitíssimo (1) (ABNT, 1993; ABNT, 1998; DUTCOSKY, 2007; STONE; SIDEL, 1993).

Em seguida, foi solicitada a avaliação dos produtos quanto ao teste de intenção de compra, a fim de verificar se o produto seria bem comercializado ou não, com uma escala hedônica de 5 pontos, de acordo com o método de Dutcosky (2007).

Após a análise, calculou-se o índice de aceitabilidade (IA) das formulações, de acordo com a seguinte fórmula: $IA (\%) = A \times 100 / B$ Em que, A = nota média obtida para o produto e B = nota máxima dada ao produto (DUTCOSKY, 2007),

Os resultados das análises sensoriais dos néctares de cupuaçu e misto de cupuaçu com cajá foram submetidas à análise de variância, e comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o software SAS® versão 9.4 (SAS INSTITUTE, 2013).

Figura 2. Termo de consentimento livre esclarecido para análise sensorial.

<p style="text-align: center;">TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO</p> <p>Projeto: Produção e avaliação sensorial do néctar misto de cupuaçu com cajá.</p> <p>Responsáveis: Ruanis Silva Araújo, Gabrielly Pereira de Araújo, Taysa Katlyn Lima Borges, Artur Carvalho Ferreira, Fábio Israel Martins Carvalho e Priscilla Andrade Silva.</p> <p>Convidamos você a fazer parte de uma pesquisa para o Trabalho de Pesquisa sobre “Produção e avaliação sensorial do néctar misto de cupuaçu com cajá”. É um estudo que envolve vários participantes, dos Cursos de Graduação de Agronomia da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, sob orientação dos Professores Priscilla Andrade Silva e Fábio Israel Martins Carvalho e exige que você deguste (prove) produtos. Portanto, se você tiver algum problema com relação à ingestão de produtos com cupuaçu, cajá e açúcar, tais como: alergia ou qualquer outro problema de saúde NÃO poderá participar dos testes. A sua identidade será preservada. Caso concorde em participar, por favor, assine o seu nome abaixo, indicando que leu e compreendeu a natureza e o procedimento do estudo e que todas as dúvidas foram esclarecidas</p> <p>Data: _____ / _____ / _____</p> <p>Assinatura: _____</p> <p>Nome: _____</p> <p>Endereço: _____</p> <p>Assinatura do(s) pesquisador(es): _____</p> <p>Assinatura da(s) testemunha(s): _____</p>

Figura 3. Ficha sensorial utilizada nos testes de aceitação e intenção de compra dos produtos.

Nome: _____ Idade: _____
 Contato: _____ Data: ____/____/2020

AMOSTRA NÚMERO _____

Você está recebendo uma amostra codificada de um **NÉCTAR DE CUPUAÇU E CAJÁ**. Por favor, avalie a amostra, e na escala abaixo, indique o quanto você gostou ou desgostou da mesma.

9. Gostei muitíssimo	☐ APARÊNCIA ☐ AROMA ☐ TEXTURA ☐ SABOR ☐ IMPRESSÃO GLOBAL
8. Gostei muito	
7. Gostei moderadamente	
6. Gostei ligeiramente	
5. Nem gostei, nem desgostei	
4. Desgostei ligeiramente	
3. Desgostei moderadamente	
2. Desgostei muito	
1. Desgostei muitíssimo	

SE ESTE PRODUTO ESTIVESSE À VENDA NOS MERCADOS, QUAL SERIA SUA ATITUDE?

☐ Certamente compraria
☐ Possivelmente compraria
☐ Talvez comprasse / talvez não comprasse
☐ Possivelmente não compraria
☐ Certamente não compraria

Comentários: _____

OBRIGADO!!!

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores médios obtidos para os parâmetros avaliados, pH e sólidos solúveis totais (SST) não diferiram ($p > 0,05$) entre as duas formulações de néctar (F1: 30% de polpa de cupuaçu e F2: 30% de polpa mista de cajá e cupuaçu). Para os teores de acidez total titulável (ATT) foram maiores no néctar F1 ($p < 0,05$) (Tabela 1).

Tabela 1. Características físico-químicas dos néctares artesanais de cupuaçu e misto de cupuaçu com cajá.

Parâmetros	F1	F2
pH	3,51 ± 0,03 ^a	3,50 ± 0,03 ^a
SST (°Brix)	17,0 ± 0,02 ^a	17,1 ± 0,05 ^a
ATT (g/100g ácido cítrico)	0,55 ± 0,03 ^a	0,43 ± 0,01 ^b

F1: 30% de polpa mista de cajá e cupuaçu. F2: 30% de polpa de cupuaçu. SST – Sólidos solúveis totais. ATT – Acidez total titulável. Resultados em base úmida. Médias seguidas pela mesma letra na mesma linha não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Os valores representam a média ± desvio padrão de três replicatas (n = 3).

Os valores encontrados para o pH nas duas formulações de néctar foram de 3,51 (F1) e 3,50 (F2) (Tabela 1). Uma vez que a legislação brasileira vigente estabelece o mínimo de 2,20 para a polpa de cajá e 3,0 para polpa de cupuaçu (MAPA, 2018). E se levar em consideração que as formulações foram processadas com 30% de polpa, os resultados foram satisfatórios e também estão dentro da faixa ácida (abaixo de 4,5), o que contribui para a segurança alimentar dos néctares elaborados (JAY, 2005). Arantes (2012) ao analisar a rotulagem e as características físico-químicas de néctar de maracujá amarelo, encontrou valores médios de pH na faixa de 2,78 a 3,03. Os valores de pH obtidos estão próximos aos observados por Silva (2016) em seu trabalho sobre elaboração de néctar misto de manga e maracujá (2,86 a 3,33).

Os valores de sólidos solúveis totais do presente estudo foram de 17,00 e 17,10 °Brix para as formulações F1 e F2, respectivamente (Tabela 1). Segundo os padrões de identidade e qualidade gerais para sucos de frutas estabelecidos pela Instrução Normativa nº 37, de 1 de outubro de 2018 (MAPAb, 2018), o valor mínimo é de 9°Brix para os sucos de cajá e cupuaçu, logo ambas as formulações estão dentro dos padrões exigidos para o produto. Valor próximo aos encontrados neste estudo foram verificados por Bezerra et al. (2013) (18,2 °Brix) ao avaliarem o comportamento reológico de suco misto elaborado com frutas tropicais (acerola, maracujá e taperebá).

A acidez total titulável é um dos critérios utilizados para a classificação das frutas, devido ao acentuado sabor, logo teores elevados de acidez dos frutos, permite maior diluição de seu produto que, por conseguinte, aumenta o rendimento na industrialização dos sucos (Sacramento et al., 2007; Silva; 2016). No estudo em questão foi verificado o teor de acidez de 0,55 (F1) e 0,43 g/100g (F2) de ácido cítrico, para as duas formulações de néctar de cupuaçu e mista de cupuaçu com cajá (Tabela 3), logo os valores encontram-se de acordo com o padrão de identidade qualidade de néctar de cajá definido pela Instrução Normativa nº 12, de 4 de setembro de 2003, a qual estabelece limite mínimo de 0,20 g/100g (MAPAa, 2003). Nogueira (2017) observou valores de 0,59 a 1,08 g/100g de ácido cítrico em sua avaliação de parâmetros físico-químicos de néctares de abacaxi, acerola, goiaba, manga, maracujá, morango e uva.

De acordo com Moura et al. (2011), a ATTT mínima para o néctar deve ser de 0,20 g/100g, em seu estudo sobre o processamento e utilização da polpa de cajá. Uma possível explicação para o valor obtido neste estudo encontrar-se superior é a mistura da polpa de cajá com a polpa de cupuaçu.

Os valores de pH, SST e ATTT (Tabela 1) encontrados neste estudo assemelham-se aos valores observados por Matos (2013), que obteve os valores de 3,46; 15° Brix e 0,50 g/100g, respectivamente, ao estudar a avaliação físico-química e sensorial de néctar de cupuaçu.

Quanto ao perfil dos participantes da avaliação sensorial dos produtos elaborados, foram entrevistados consumidores de ambos os sexos, 52% dos provadores eram do sexo feminino e 48% do sexo masculino, com idade entre 18 e 60 anos. O maior percentual de consumidores encontrou-se na faixa etária entre 18 e 20 anos (50%), seguido por aqueles entre 20 e 40 anos (46%) e os demais entre 40 e 60 anos (4%) (Gráficos 1 e 2).

Gráfico 1. Perfil dos provadores por sexo submetidos a análise sensorial.

Gráfico 2. Faixa etária dos provadores submetidos a análise sensorial.

De acordo com a Tabela 2 pode ser observado que não houve diferença significativa ($p > 0,05$) para os atributos sensoriais aparência, aroma, textura, sabor e impressão global nas duas formulações de néctar (Tabela 2). As formulações de néctares produzidas e analisadas obtiveram boa aceitação com notas variando de 7,59 a 8,12, o que corresponde na escala hedônica “gostei moderadamente” e “gostei muito”. Rodrigues et al. (2013) obtiveram valores próximos de notas atribuídas, de 6,39 a 7,49 com 102 provadores ao pesquisarem a qualidade sensorial de néctares de maracujás BRS Ouro Vermelho produzidos em diferentes sistemas de cultivo.

Tabela 2. Avaliação sensorial dos produtos artesanais sabor misto de cupuaçu com cajá e cupuaçu.

Atributos	F1	F2	CV (%)	DMS	F calculado
Aparência	7,92 ± 1,06 ^a	8,12 ± 0,96 ^a	12,59	0,401	0,89
Aroma	8,06 ± 1,18 ^a	8,07 ± 0,90 ^a	13,05	0,418	0,01
Textura	7,59 ± 1,29 ^a	7,77 ± 1,07 ^a	15,44	0,471	0,53
Sabor	7,96 ± 1,19 ^a	8,10 ± 0,88 ^a	13,05	0,416	0,46
Impressão Global	7,84 ± 1,15 ^a	7,92 ± 0,92 ^a	13,22	0,413	0,14

F1: 30% de polpa de cupuaçu. F2: 30% de polpa mista de cajá e cupuaçu. DMS – Diferença mínima significativa; médias seguidas pela mesma letra na mesma linha não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade; CV - coeficiente de variação experimental. Os valores representam a média ± desvio padrão de cem replicatas ($n = 100$).

Com relação aos índices de aceitação para a impressão global, observou-se 87,11% de aceitação para a Formulação 1 e 88,00% para a Formulação 2 (Tabela 3). Segundo Teixeira, Meinert e Barbetta (1987), para que o produto seja considerado aceito tratando-se de suas propriedades sensoriais, é necessário que se obtenha um índice de aceitabilidade de, no mínimo, 70%.

Tabela 3. Índice de aceitação dos produtos com base no atributo impressão global.

Índice de Aceitabilidade (%)	
Formulações	Néctar
F1 (30% polpa de cupuaçu)	87,11
F2 (30% polpa mista de cajá com cupuaçu)	88,00

Os valores representam o índice de aceitação calculado com base na nota atribuída pelos 100 provadores

Para o teste de intenção de compra dos néctares de cupuaçu e misto de cupuaçu com cajá 72% dos provadores assinalaram que certamente comprariam e possivelmente comprariam a formulação de néctar de cupuaçu e 76% assinalaram que certamente comprariam e possivelmente comprariam formulação de néctar misto de cupuaçu com cajá se estivessem disponíveis no mercado (Gráfico 3), o que reforça a boa aceitação das bebidas estudadas. Silva (2016) obteve valores inferiores de intenção de compra, de 62,02 a 67,50%, ao avaliar diferentes concentrações de polpa de maracujá e manga ao formular bebida mista.

Gráfico 3. Intenção de compra para os néctares artesanais de cupuaçu e misto de cupuaçu com cajá.

F1: 30% de polpa de cupuaçu. F2: 30% de polpa mista de cajá e cupuaçu. CC (Certamente Compraria), PC (Possivelmente Compraria), TC (Talvez Compraria), PNC (Possivelmente Não Compraria) e CNC (Certamente Não Compraria).

Para intenções de compra os valores foram bastante favoráveis, pois mais de 70% dos avaliadores certamente comprariam ou possivelmente comprariam o produto, mostrando que o produto tem potencial a ser explorado e comercializado, tendo em vista um mercado favorável, mas é necessário mais estudos referentes ao produto em na região sudeste do Pará.

4. CONCLUSÃO

De acordo com as análises de pH, SST e ATT realizadas nos produtos elaborados, verifica-se que estes encontram-se de acordo com os padrões de comercialização segundo as Instruções Normativas nº 12 de 4 de setembro de 2003 e nº 37 de 1 de outubro de 2018 do Ministério da Agricultura e Abastecimento para néctares e sucos de frutas tropicais.

Os néctares de cupuaçu e misto de cupuaçu com cajá mostraram-se produtos interessantes levando em consideração suas características sensoriais e apresentaram potencial tecnológico, principalmente tratando-se do aspecto da agregação de valor ao produto amazônico/regional. Ambas as formulações apresentadas podem ser comercializadas no mercado com um panorama de sucesso, em virtude da boa avaliação e aceitação pelos provadores.

REFERÊNCIAS

- [1] ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12806. Análise sensorial dos alimentos e bebidas: terminologia. São Paulo: ABNT, 1993. 8p.
- [2] ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14141. Escalas utilizadas em análise sensorial de alimentos e bebidas. São Paulo, 1998, 3p.
- [3] AOAC - ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS. Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 16th ed. Washington, DC, 1997.
- [4] ARANTES, P. C. Análise de rotulagem e das características físico-químicas de néctar de maracujá amarelo (*Passiflora edulis* f. *Flavicarpa*). 2012. 45f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Graduação em Química Industrial). Universidade Federal de Goiás - UFG, Anápolis-GO, 2012.
- [5] BEZERRA, C. V.; SILVA, L. H. M. DA; COSTA, R. D. S. DA; MATTIETTO, R. A.; RODRIGUES, A. M. C. Comportamento reológico de suco misto elaborado com frutas tropicais. *Brazilian Journal of Food Technology*, Campinas, v. 16, n. 2, p. 155-162, abr./jun. 2013.
- [6] CANUTO, G. A. B.; XAVIER, A. A. O.; NEVES, L. C.; BENASSI, M. T. Caracterização físico-química de polpas de frutos da Amazônia e sua correlação com a atividade anti-radical livre. *Revista Brasileira de Fruticultura*, Jaboticabal, n.4 p. 1196-1205, 2010.
- [7] DUTCOSKY, S. D. Análise Sensorial de Alimentos, 2. ed. Curitiba: Champagnat, 2007. 123p.
- [8] FACHINELLO, J. C.; PASA, M. S.; SCHMITZ, J. D.; BETEMPS, D. L. Situação e perspectivas da fruticultura de clima temperado no Brasil. *Revista Brasileira de Fruticultura*, Jaboticabal – SP, Volume Especial, e. 109-120, out. 2011.
- [9] FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 2009. <http://www.fao.org/docrep/012/i0680e/i0680e00.htm>.
- [10] FREIRE, M. T. A.; PETRUS, R. R.; FREIRE, C. M. A.; OLIVEIRA, C. A. F.; FELIPE, A. M. P. F.; GATTI, J. B. Caracterização físico-química, microbiológica e sensorial de polpa de cupuaçu congelada (*Theobroma grandiflorum* Schum). *Brazilian Journal of Food Technology*. Preprint Series, n. 347, 2009.
- [11] GALVÃO, E. U. P.; MENEZES, A. J. E. A. DE; VILAR, R. R. L.; SANTOS, A. A. R. dos. Análise da renda e da mão-de-obra nas unidades Agrícolas Familiares da Comunidade de Nova Colônia, Município de Capitão Poço, Pará. *Amazônia: Ciência & Desenvolvimento*, Belém, v. 1, n. 1, jul. /dez. 2005.
- [12] JAY, J. M. Microbiologia de alimentos, 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 711 p.
- [13] MAPAa - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa Nº 12, de 4 de setembro de 2003. Aprova o Regulamento Técnico para Fixação dos Padrões de Identidade e Qualidade Gerais para Sucos e Néctares Tropicais. *Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]*. Brasília, p.174, set. 2003. Seção 1.
- [14] MAPAb - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa Nº 12, de 4 de setembro de 2003. Aprova o Regulamento Técnico para Fixação dos Padrões de Identidade e Qualidade Gerais para Sucos e Polpas de Frutas. *Diário Oficial [da República Federativa do Brasil]*. Brasília, p.23, out. 2018. Seção 1.
- [15] MARTINS, V. B. Perfil sensorial de suco tropical de cupuaçu (*Theobroma grandiflorum* Schum) com valor calórico reduzido. 2008. 141 p. Tese (Doutorado em Alimentos e Nutrição) – Faculdade de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008.
- [16] MATOS, O. R. Avaliação físico-química e sensorial de néctar de cupuaçu. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)-Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, 2013.
- [17] MOURA, C. L. A.; PINTO, G. A. S.; FIGUEIREDO, R. W. Processamento e utilização da polpa de cajá (*Spondias mombin* L.). *Boletim do Centro de Pesquisa de Processamento de Alimentos*, v. 29, n. 2, 2011.
- [18] NOGUEIRA, C. T. Avaliação de parâmetros físico-químicos de néctares de abacaxi, acerola, goiaba, manga, maracujá, morango e uva. 2017. 67 f. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Departamento Acadêmico de Alimentos. Campo Mourão – Paraná, 2017.
- [19] RODRIGUES, J. S. Q.; PINELLI, L. L. O.; RODRIGUES, N. G.; LIMA, H. C. DE; COSTA, A. M.; SILVA, C. H. O.; JUNQUEIRA, N. T. V.; CHIARELLO, M. D. Qualidade sensorial de néctares de maracujás BRS Ouro Vermelho produzidos em diferentes sistemas de cultivo. *Revista Ceres*, Viçosa, v. 60, n.5, p. 595-602, 2013.
- [20] ROCHA, C. Podas drásticas ajudam a reduzir a vassoura-de-bruxa do cupuaçuzeiro. EMBRAPA-Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 2015. Disponível em:< <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/6692656/podas-drasticas-ajudam-a-reduzir-a-vassoura-de-bruxa-do-cupuacuzeiro>>. Acesso em: 22 de Abril de 2019.
- [21] SACRAMENTO, C. K. DO; MATOS, C. B.; SOUZA, C. N.; BARRETTO, W. S.; FARIA, J. C. Características físicas, físico-químicas e químicas de cajás oriundos de diversos municípios da região Sul da Bahia. *Magistra*, Cruz das Almas - BA, v. 19, n. 4, p. 283-289, 2007.

- [22] SANTOS, M. B. CARDOSO, R. L.; FONSECA, A. A. O.; CONCEIÇÃO, M. N. Caracterização e qualidade de frutos de umbu-cajá (*Spondias tuberosa* x *S. mombin*) provenientes do recôncavo sul da Bahia. *Revista Brasileira de Fruticultura*, v. 32, n. 4, 2010.
- [23] SANTOS, A. L.; MITJA, D. Agricultura familiar e desenvolvimento local: os desafios para a sustentabilidade econômico-ecológica na comunidade de Palmares II, Parauapebas, PA. *Interações, Campo Grande*, v. 13, n. 1, p. 39-48, jan./jun. 2012.
- [24] SAS INSTITUTE. SAS for Windows, versão 9.4 SAS®: SAS User guide. Carry, 2013.
- [25] SILVA, R. A. A. da. Elaboração de néctar misto de manga e maracujá. 2016. 65f. Monografia (Graduação em Engenharia de Alimentos). UFMA, Imperatriz-MA, 2016.
- [26] STONE, H. S.; SIDEL, J. L. *Sensory Evaluation Practices*. 2ed. San Diego: Academic Press, 1993. 338p.
- [27] TEIXEIRA, E.; MEINERT, E.; BARBETTA, P. A. *Análise sensorial de alimentos*. Florianópolis: Ed. da Universidade Federal de Santa Catarina, 1987. 180 p.

Capítulo 16

*Formulação e análise sensorial de iogurte saborizado com polpa de Cupuaçu (*Theobroma grandiflorum* S.) obtido a partir do leite bovino produzido no Sudeste do Pará*

Diogo Leandro Silva Carvalho

Leomara Pessoa Brito

Roberta Quintino Pinto

Silvia Letícia Vieira Matos

Thamirys Paulino de Souza

Igor Vinícius de Oliveira

Priscilla Diniz Lima da Silva Bernardino

Ernestina Ribeiro dos Santos Neta

Kaliandra Souza Alves

Priscilla Andrade Silva

Resumo: O cupuaçuzeiro é uma das espécies fruteiras nativas das matas da região Amazônica. O iogurte é um produto altamente recomendado pelas suas características sensoriais, probióticas e nutricionais, por ser rico em proteínas, cálcio e fósforo, conter baixo teor de gorduras. objetivou-se com esse trabalho desenvolver formulações e avaliar por meio de análise sensorial a aceitação de iogurte acrescido com polpa de cupuaçu, como uma alternativa para o processamento do fruto e ampliando a variedade de sabores de iogurte no mercado. Foram elaboradas três formulações de iogurte, F1: Iogurte Natural, F2: Iogurte saborizado (xarope de cupuaçu 25%) e F3: Iogurte bifásico (iogurte + geleia de cupuaçu). Para a avaliação sensorial foram realizados os testes de aceitabilidade para os seguintes parâmetros: aparência, aroma, textura, sabor e impressão global; assim como o índice de aceitação e a intenção de compra dos produtos. Os resultados das análises sensoriais dos produtos foram submetidos à análise de variância através do teste de Tukey a 5% de probabilidade. Participaram do estudo 100 pessoas, sendo a maioria do sexo feminino (60%) e minoria do sexo masculino (40%), com faixa etária maior que 18 anos. Para o atributo aparência apenas o iogurte natural obteve maior nota. No atributo textura todos os tratamentos foram atribuídos notas superiores a 7,0, caracterizando o gosto regular dos provadores pelas amostras. Quanto ao aroma pode se observar a maior média o iogurte saborizado e a menor média o iogurte natural, com médias 7,57 e 6,86, respectivamente. No atributo sabor, o iogurte saborizado e o iogurte bifásico obtiveram as maiores médias de aceitação, 8,44 e 8,20, respectivamente. Ao analisar o critério de impressão global o iogurte natural exibiu o menor índice aceitabilidade entre os provadores, e em todos os tratamentos foram atribuídas notas superiores a 7,5. O iogurte saborizado apresentou a maior intenção de compra. Sensorialmente as formulações iogurte saborizado e iogurte bifásico apresentaram médias superiores a 7, indicando um bom potencial de consumo.

Palavras-chave: Frutífera amazônica, processamento e aceitabilidade.

1. INTRODUÇÃO

O cupuaçu (*Theobroma grandiflorum* Schum.) é uma das fruteiras nativa das matas da região Amazônica. O cupuaçu é apreciado por apresentar polpa ácida e de aroma intenso. Devido ao seu sabor marcante, a polpa dos frutos não é consumida na forma in natura, porém é bastante utilizada para fabricação de sucos, sorvetes, licores, compotas, geleias, cremes, doces, entre outros (MARTIN, 2013). Em 2017 a área plantada no Pará foi cerca de 9.738 hectares, com produção em torno de 29.558 toneladas e rendimento médio de 3.111 kg/ha (SEDAP-PA, 2017).

A Legislação Brasileira (BRASIL, 2007) define iogurte como o produto obtido por fermentação láctica mediante ação de cultivos de microorganismos específicos, cuja fermentação se realiza com cultivos protosimbóticos de *Streptococcus salivarius* subsp. *thermophilus* e *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus* (VIEIRA et al., 2017).

O iogurte é um produto altamente recomendado pelas suas características sensoriais, probióticas e nutricionais, por ser rico em proteínas, cálcio e fósforo, conter baixo teor de gorduras e fonte de minerais como zinco e magnésio e o seu valor nutricional é superior ao do leite em conteúdo de vitaminas do complexo B, sendo mais facilmente aceito por indivíduos com intolerância à lactose (MEDEIROS et al., 2011).

Na atualidade cresce o número de pessoas que busca um retorno “às origens”, e a isto se incorpora a busca por alimentos fabricados artesanalmente de características únicas, com menos aditivos químicos e que sejam produzidos em baixa escala (FERNANDEZ; ZANELA, 2009)

A Instrução Normativa nº46, de 23/11/2007 (BRASIL, 2007) estabelece os parâmetros físico-químicos e características sensoriais do iogurte. As características sensoriais envolvem parâmetros como aspecto, cor, odor e sabor. Quanto ao primeiro parâmetro deve possuir consistência firme, pastosa, semissólida ou líquida. A cor deve ser branca ou de acordo com a(s) substância(s) alimentícia(s) e/ou corante(s) adicionado(s). O odor e sabor podem ser característicos ou de acordo com a(s) substância(s) alimentícia(s) e/ou substâncias aromatizante(s)/saborizante(s) adicionado(s). Quanto aos requisitos físico-químicos o iogurte deve possuir acidez entre 0,6 a 1,5 (g de ácido láctico/100g) e não deve conter etanol. Quanto ao conteúdo de matéria gorda e proteínas inferiores, ocorre maior flexibilidade, sendo aceitável proporções inferiores ao estabelecido pela legislação para o leite fermentado com agregados, açucarados e/ou saborizados.

Diante da potencialidade de desenvolvimento de novos produtos através da utilização de frutas regionais, objetivou-se com esse trabalho desenvolver formulações e avaliar por meio de análise sensorial a aceitação de iogurte acrescido com polpa de cupuaçu, como uma alternativa para o processamento do fruto e ampliando a variedade de sabores de iogurte no mercado.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Os produtos foram elaborados na Universidade Federal Rural da Amazônia, no Campus de Parauapebas-PA, localizada nas coordenadas geodésicas 49°51'19" W latitude, 06°12'58" S longitude, com altitude de 197m (com auxílio do GPS portátil, modelo eTrex 10, marca Garmin). Para a elaboração dos iogurtes foram utilizados os seguintes produtos: leite bovino pasteurizado e integral, leite em pó, iogurte natural, açúcar refinado, polpa de cupuaçu e xarope de glucose. Todos os ingredientes foram obtidos no mercado local no município de Parauapebas, localizado no sudeste do Estado do Pará.

O fluxograma contendo todas as etapas do processamento é apresentado na Figura 1. Foram elaboradas três formulações de iogurte, F1: Iogurte Natural, F2: Iogurte saborizado (xarope de cupuaçu 25%) e 3) F3: Iogurte bifásico (iogurte + geleia de cupuaçu). Para o processamento do iogurte adicionou-se ao leite bovino, 10% de açúcar refinado e 5% de leite em pó, porcentagens baseadas na quantidade de leite empregada (4 litros). O tratamento térmico teve duração de 30 minutos, mantendo o produto em temperatura de 60°C ou 65°C. Posteriormente o produto foi submetido ao banho de gelo até atingir a temperatura de 43°C ou 45°C. Utilizou-se o iogurte natural como fonte da cultura láctica necessária para o processo de fermentação.

Somente as Formulações 2 e 3 passaram pela etapa de saborização, realizada após a elaboração do xarope e geleia de cupuaçu. Primeiramente realizou-se a homogeneização da polpa em liquidificador industrial, sendo acrescido 500ml de água para obtenção de produto com melhor consistência.

Ambas seguiram o mesmo fluxograma de processamento (Figura 1), contudo foram empregadas diferentes quantidades de açúcar e xarope de glucose: (Xarope de cupuaçu: 22% g de xarope de glucose e 78% g de açúcar); (Geleia de cupuaçu: 20% de xarope de glucose e 80% de açúcar).

Adicionou-se a polpa de cupuaçu, xarope de glucose e açúcar em duas panelas de alumínio, de acordo com a quantidade referente a cada uma das receitas. Foram submetidas à cocção até atingirem 65 °Brix (geleia) e 50 °Brix (xarope). Agregou-se o xarope ao iogurte natural através de mistura manual e a geleia foi adicionada na parte inferior dos recipientes formando uma amostra bifásica composta pela camada de geleia e iogurte natural.

Figura 1. Fluxograma da produção dos iogurtes de cupuaçu.

A seguinte análise foi realizada em triplicata (n=3) nos iogurtes elaborados: Sólidos solúveis totais (SST): foram quantificados nas amostras, por meio de leitura direta em refratômetro de Abbe aparelho calibrado à temperatura ambiente, com água destilada segundo AOAC (1997).

Realizou-se um teste sensorial com 100 provadores não treinados, constituída pela comunidade acadêmica da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, campus de Parauapebas. As amostras de aproximadamente 20 ml foram codificadas com números de três dígitos, marcadas em copos de polietileno transparente, oferecidas aos provadores juntamente com um copo de água e biscoitos salgados. Foram fornecidas fichas com o Termo de Consentimento Livre (Figura 2) e uma ficha de avaliação (Figura 3) contendo a escala hedônica estruturada de 9 pontos (variando de 1: desgostei muitíssimo a 9: gostei muitíssimo) (ABNT, 1993; ABNT, 1998; DUTCOSKY, 2007; STONE; SIDEL, 1993).

A intenção de compra foi avaliada utilizando uma escala hedônica de 5 pontos (Figura 3), referente aos termos 1 – não compraria ao 5 – certamente compraria de acordo com o método de Dutcosky (2007).

O índice de aceitabilidade (IA) das formulações de iogurte foram calculadas de acordo com a seguinte fórmula: $IA (\%) = A \times 100 / B$ Em que, A = nota média obtida para o produto e B = nota máxima dada ao produto (DUTCOSKY, 2007).

Os dados foram analisados com auxílio do software estatístico SAS® versão 9.4, através da análise de variância (ANOVA) com comparação de médias realizada pelo teste de média de Tukey, avaliados com nível de 5% de significância (SAS INSTITUTE, 2013).

Figura 2. Termo de consentimento livre esclarecido para análise sensorial.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO
<p>Projeto: Formulação e análise sensorial de iogurte saborizado com polpa de cupuaçu (<i>Theobroma grandiflorum</i> S) obtido a partir do leite bovino produzido no sudeste do Pará.</p>
<p>Responsáveis: Diogo Leandro Silva Carvalho, Leomara Pessoa Brito, Roberta Quintino Pinto, Sílvia Letícia Vieira Matos, Thamirys Paulino de Souza e Priscilla Andrade Silva.</p>
<p>Convidamos você a fazer parte de uma pesquisa para o Trabalho de Pesquisa sobre “Formulação e análise sensorial de iogurte saborizado com polpa de cupuaçu (<i>Theobroma grandiflorum</i>) obtido a partir do leite bovino produzido no sudeste do Pará.”. É um estudo que envolve vários participantes, dos Cursos de Graduação de Agronomia da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, sob orientação dos Professores Priscilla Andrade Silva e exige que você deguste (prove) produtos. Portanto, se você tiver algum problema com relação à ingestão de produtos com cupuaçu, leite e açúcar, tais como: alergia ou qualquer outro problema de saúde NÃO poderá participar dos testes. A sua identidade será preservada. Caso concorde em participar, por favor, assine o seu nome abaixo, indicando que leu e compreendeu a natureza e o procedimento do estudo e que todas as dúvidas foram esclarecidas</p>
<p>Data: ____ / ____ / ____</p>
<p>Assinatura: _____</p>
<p>Nome: _____</p>
<p>Endereço: _____</p>
<p>Assinatura do(s) pesquisador(es): _____</p>
<p>Assinatura da(s) testemunha(s): _____</p>

Figura 3. Ficha sensorial utilizada nos testes de aceitação e intenção de compra dos produtos.

Nome: _____ Idade: _____
 Contato: _____ Data: ____/____/2020

AMOSTRA NÚMERO _____

Você está recebendo uma amostra codificada de um **IOGURTE SABORIZADO COM POLPA DE CUPUAÇU**. Por favor, avalie a amostra, e na escala abaixo, indique o quanto você gostou ou desgostou da mesma.

9. Gostei muitíssimo	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> ☐ APARÊNCIA ☐ AROMA ☐ TEXTURA ☐ SABOR ☐ IMPRESSÃO GLOBAL </div>
8. Gostei muito	
7. Gostei moderadamente	
6. Gostei ligeiramente	
5. Nem gostei, nem desgostei	
4. Desgostei ligeiramente	
3. Desgostei moderadamente	
2. Desgostei muito	
1. Desgostei muitíssimo	

SE ESTE PRODUTO ESTIVESSE A VENDA NOS MERCADOS, QUAL SERIA SUA ATITUDE?

☐ Certamente compraria
☐ Possivelmente compraria
☐ Talvez comprasse / talvez não comprasse
☐ Possivelmente não compraria
☐ Certamente não compraria

Comentários: _____

OBRIGADO!!!

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com relação às diferentes formulações foi possível observar que todos os valores para Sólido solúveis totais (SST) apresentaram diferença significativa ($p < 0,05$) entre os produtos, observando que o iogurte saborizado apresentou média de 23,33 °Brix (Tabela 1), sendo superior ao iogurte natural (15,33 °Brix), explicado pelo fato que os açúcares presentes na polpa de cupuaçu possivelmente elevou o teor de SST do produto final. Na avaliação de dez tipos de iogurtes saborizados com frutas, Oliveira et al. (2017) observou valores de SST variando entre 9,70 e 20,20 °Brix. O iogurte bifásico obteve a maior média (32 °Brix), evidenciando o maior teor de SST devido a adição da geleia de cupuaçu nesta formulação. No iogurte natural obteve-se menor média (15,33 °Brix), diferindo dos demais com relação aos teores de SST. Não existem valores tabelados pela legislação do teor de SST para iogurte natural (COSTA, 2017), porém segundo Almeida et al. (2016), iogurtes naturais industrializados apresentam em média 10° Brix, sendo este valor inferior ao encontrado nesse estudo.

Tabela 1. Teor de Sólidos solúveis totais nas diferentes formulações de iogurte.

Parâmetro	Iogurte natural	Iogurte saborizado	Iogurte bifásico
SST (°Brix)	15,33 ± 0,57 ^a	23,33 ± 0,57 ^b	32,00 ± 0,00 ^c

SST – Sólidos solúveis totais. Médias seguidas pela mesma letra na mesma linha não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Os valores representam a média ± desvio padrão de três replicatas (n = 3).

O perfil dos provadores da análise sensorial para as formulações elaboradas foi composto de 100 consumidores de iogurte não treinados de ambos os sexos, sendo 60% do sexo feminino e 40% do sexo masculino (Gráfico 1), diferindo dos dados observado por Oliveira et al. (2011) em sua análise sensorial de iogurte de açaí, em que 68% eram do sexo masculino e 32% do sexo feminino.

Gráfico 1. Perfil dos provadores por sexo submetidos a análise sensorial.

A faixa etária dos participantes variou entre 18 a 40 anos. O maior percentual de consumidores encontrou-se na faixa entre 20 e 40 anos (86%), e o menor percentual se compreendeu na faixa entre 18 e 20 anos (12%) (Gráfico 2). Os dados para faixa etária se diferiram dos estudos de Oliveira et al. (2011), que na qual a maior percentagem de participação dos provadores da análise sensorial era na faixa de 15 a 20 anos.

Gráfico 2. Faixa etária dos provadores submetidos a análise sensorial.

A média das notas atribuídas pelos provadores aos atributos avaliados nas diferentes formulações pode ser observada na Tabela 2. Para o atributo aparência, o iogurte natural obteve maior nota, 8,05 avaliado como “Gostei muito”. Todavia não houve diferença significativa no nível de 5% de probabilidade em relação ao iogurte saborizado (7,92). O iogurte bifásico diferiu ($p < 0,05$) das demais formulações, com a menor média para este atributo. Medeiros et al. (2011) observaram valores semelhantes para aparência de dois tipos de iogurte saborizado com frutas, com médias que variaram entre 7,70 e 7,30.

Tabela 2. Avaliação sensorial das diferentes formulações artesanais de iogurte.

Atributos	Iogurte natural	Iogurte saborizado	Iogurte bifásico	CV (%)	DMS	F calc.
Aparência	8,05 ± 1,28 ^A	7,92 ± 1,08 ^A	7,36 ± 2,39 ^B	14,68	0,541	5,16
Textura	7,05 ± 1,92 ^B	7,70 ± 1,61 ^A	7,74 ± 1,87 ^A	16,53	0,587	5,01
Aroma	6,86 ± 1,93 ^B	7,57 ± 1,51 ^A	7,10 ± 1,80 ^{AB}	18,09	0,615	3,92
Sabor	6,76 ± 2,02 ^B	8,44 ± 1,10 ^A	8,20 ± 1,26 ^A	12,88	0,476	40,74
I. Global	6,86 ± 1,83 ^B	8,19 ± 1,40 ^A	7,69 ± 1,65 ^A	14,08	0,506	19,9

DMS – Diferença mínima significativa; médias seguidas pela mesma letra na mesma linha não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade; CV - coeficiente de variação experimental. Os valores representam a média ± desvio padrão de cem replicatas (n = 100).

No atributo textura houve diferença estatística ($p > 0,05$) apenas para a formulação iogurte natural, sendo o que apresentou menor aceitação entre os provadores. Em todos os tratamentos foram atribuídas notas superiores a 7,0, caracterizando o gosto regular dos provadores pelas amostras. A média de aceitação dos iogurtes saborizado e bifásico foram de 7,70 e 7,74, respectivamente. Resultado semelhante foi obtido por Figüeiro et al. (2017) em que 52% dos provadores atribuíram nota 7,0 e 8,0 para o iogurte de kefir com cupuaçu e mel. Santos et al. (2014) ao compararem a aceitação sensorial de iogurte natural e iogurte acrescido de diferentes porcentagens de inulina, obtiveram média de 7,10 para o iogurte natural sem adição de inulina, corroborando com os resultados encontrados nesse estudo.

No atributo sabor, o iogurte saborizado e o iogurte bifásico obtiveram as maiores médias de aceitação, com 8,44 e 8,20, respectivamente. Siqueira et al. (2011) estudando iogurte de leite de búfala saborizado com cupuaçu com torta da castanha-do-Pará obteve média 8,0 e Gomes et al. (2016) testando a aceitabilidade de iogurte grego com adição de doce de cupuaçu, para atributo sabor, recebeu média 7,72.

Quanto ao aroma pode se observar que as três formulações se diferiram estatisticamente, apresentando a maior média o iogurte saborizado e a menor média o iogurte natural, com médias 7,57 e 6,86 respectivamente (Tabela 2). Uma possível justificativa para explicar a menor aceitação do aroma do iogurte natural é pelo fato que o mesmo não apresenta o cupuaçu em sua formulação.

Em relação a aceitabilidade das formulações com base o atributo de impressão global observou que iogurte saborizado obteve maior aceitação, com 91% (Tabela 3), seguido do iogurte bifásico e natural, com índice de aceitabilidade de 85,44 e 76,22% respectivamente.

Tabela 3. Índice de aceitação das formulações de iogurte com base no atributo impressão global.

Índice de Aceitabilidade (%)	
Formulações	(%)
Iogurte natural (sem saborização)	76,22
Iogurte saborizado (25% polpa de cupuaçu)	91,00
Iogurte bifásico (Iogurte + geleia de cupuaçu)	85,44

Os valores representam o índice de aceitação calculado com base na nota atribuída pelos 100 provadores.

Partindo disso, pode se perceber que os três tipos de iogurte foram aceitos pelos provadores, tendo em vista que, para um produto ter uma boa aceitação deve apresentar um índice igual ou superior a 70% (PEUCKERT et al., 2010).

No Gráfico 3 pode-se observar que entre os produtos elaborados, o que obteve uma maior intenção de compra foi o iogurte saborizado com 86%, afirmando que certamente e possivelmente comprariam o produto, caso ele estivesse a venda no mercado. Queiroz et al. (2001) estudando iogurte de leite de búfala saborizado com cupuaçu observou uma aceitação 99,6%, devido ao fato da preferência dessa fruta pela população da região norte do país. O iogurte com menor aceitação do público foi o natural, sem saborização, por ser o tipo mais comum entre os consumidores.

Gráfico 3. Intenção de compra para as formulações artesanais de iogurtes.

CC (Certamente Compraria), PC (Possivelmente Compraria), TC (Talvez Compraria), PNC (Possivelmente Não Compraria) e CNC (Certamente Não Compraria).

4. CONCLUSÃO

As diferentes formulações de iogurtes apresentaram um bom potencial de consumo, levando em consideração as características sensoriais. Sendo que o iogurte saborizado demonstrou as maiores médias para os atributos aroma, sabor e impressão global. O iogurte bifásico apresentou a maior média para textura e o iogurte natural para aparência. As formulações demonstraram ser promissoras para o mercado regional, tendo em vista um elevado índice de aceitabilidade e intenção de compra, como uma tecnologia de processamento que agrega valor aos laticínios da região norte do país.

REFERÊNCIAS

- [1] ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12806. Análise sensorial dos alimentos e bebidas: terminologia. São Paulo: ABNT, 1993. 8p.
- [2] ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14141. Escalas utilizadas em análise sensorial de alimentos e bebidas. São Paulo, 1998, 3p.
- [3] ALMEIDA, D. K. C.; ALMEIDA, C. A. F., FERREIRA, C. C.; SILVA, G. N., XAVIER, A. D. C. S.; CARDOSO, A. S. Análise de sólidos solúveis totais e pH em bebidas industrializadas e a relação com a cárie dental e erosão ácida. In: XXV Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos. FAURGS, Gramado/RS. 2016.
- [4] AOAC - ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS. Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 16th ed. Washington, DC, 1997.
- [5] BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 47, de 23 de outubro de 2007. Diário Oficial da União, Brasília, 2007.
- [6] COSTA, J. D. Secagem de iogurte natural por *cast-tape* sob vácuo. 103 p. *Dissertação* (Mestrado em Engenharia de Alimentos) - Centro tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017.
- [7] DUTCOSKY, S. D. Análise Sensorial de Alimentos, 2. ed. Curitiba: Champagnat, 2007. 123p.
- [8] FERNANDEZ, V. N. V.; ZANELA, M. B. Tipos de produtos lácteos consumidos na cidade de Porto Alegre/RS e possibilidades à agroindústria de base ecológica. In: Congresso Brasileiro de Agroecologia, 6., 2009, Curitiba. Anais. Curitiba: Socla, 2009.

- [9] FIGUÊIREDO, A. N. B.; NASCIMENTO, F. G.; SOUSA, J. M.; MIRANDA, R.; CARVALHO, S. K. S.; SILVA, M. T. S. Elaboração de iogurte de kefir com cupuaçu e mel. In: Anais da Mostra de Pesquisa em Ciência e Tecnologia 2017. Anais...Fortaleza (CE) DeVry Barsil–Damasio–Ibemec, 2019. Disponível em: <<https://even3.azureedge.net/anais/47989.pdf>>. Acesso em: 01 jul. 2019.
- [10] GOMES, L. B.; DOS SANTOS, E. C. S.; MOISÉS, C.; MEDEIROS, C. V. L.; PEREIRA, K. D. L. Aceitabilidade do iogurte tipo grego com adição de doces de frutas Amazônia. In: Congresso Técnico e científico da Engenharia e Agronomia. Foz do Iguaçu, 2016.
- [11] MARTIN, L. G. P. **Estudo da secagem da polpa de cupuaçu por atomização. 2013.** Dissertação (Mestrado em Engenharia agrícola) – Faculdade de Engenharia Agrícola, Universidade Estadual de Campina. São Paulo, 2013.
- [12] MEDEIROS, T. C.; MOURA, A. S.; ARAÚJO, K. B. DE.; AQUINO, L. C. L. DE. Elaboração de iogurte de jaca: Avaliação físico-química, microbiológica e sensorial. Scientia Plena, v.7, n. 9, 2011.
- [13] OLIVEIRA, C. L.; ANDRADE, F. A.; FERNANDES NETO, J. Á.; NOBRE, M. S. C.; OLIVEIRA, T. A.; CATÃO, M. H. C. V. Influência das propriedades físico-químicas dos iogurtes no desenvolvimento da erosão dental. Archives of health investigation. Paraíba, v. 6, n. 5, p. 235-39, 2017.
- [14] OLIVEIRA, P. D.; LIMA, S. C. G.; JÚNIOR, J. B. L.; ARAÚJO, E. A. F. Avaliação sensorial de iogurte de açaí (euterpe oleracea mart) tipo “sundae”. Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, v. 66, n. 380, p. 5-10, Mai/Jun, 2011.
- [15] PEUCKERT, Y. P.; VIERA, V. B.; HECKTHEUER, L. H. R.; MARQUES, C. T.; ROSA, C. S. D. Caracterização e aceitabilidade de barras de cereais adicionadas de proteína texturizadas de soja e camucamu (*Myrciaria dúbia*). Revista Alimentos e Nutrição, Araraquara, v. 21, n. 1, p. 147-152, 2010.
- [16] QUEIROZ, L. S. O.; JÚNIOR, J. D. B. L.; VIEIRA, L. C.; SOUSA, C. L. Características físico-químicas, microbiológicas e aceitabilidade de iogurte de leite de búfala para merenda escolar. Belém: Embrapa Amazônia oriental, 17 p.; 22 c. – (Embrapa Amazônia Oriental. Documentos, 109). ISSN 1517-2201. 2001.
- [17] SANTOS, K. A.; SANTOS, E. F. DOS.; MANHANI, M. R.; SANCHES, F. L. F. Z.; BALLARD, C. R.; NOVELLO, D. Avaliação das características sensoriais e físico-químicas de iogurte adicionado de inulina. Revista Uniabeu, Belford Roxo, v. 7, n. 15, p. 50-65, jan-abr. 2014.
- [18] SAS INSTITUTE. SAS for Windows, versão 9.4 SAS®: SAS User guide. Cary, 2013.
- [19] SEDAP-PA, Governo do Estado do Pará. Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Estado do Pará, 2017. Disponível em: <<http://www.sedap.pa.gov.br/agricultura.php>>. Acesso em: 23 jun. 2019.
- [20] SIQUEIRA, L. S.; SOUSA, F. F.; LOURENÇO JÚNIOR, J. B.; NERES, L. S. Iogurte de leite de búfala saborizado com cupuaçu (*Theobroma grandiflorum* Schum) e enriquecido com torta de castanha-do-pará (*Bertholletia excelsa* Bonpl). Higiene Alimentar, v.25, n.194/195, p.1.314-1.316. 2011.
- [21] STONE, H. S.; SIDEL, J. L. Sensory Evaluation Practices. 2ed. San Diego: Academic Press, 1993. 338p.
- [22] VIEIRA, A. F.; SILVA, R. R. L.; ALVES, D. E. G.; MORAIS, H. M. B. R.; SANTOS, D. C. Processamento e caracterização de iogurte de limão. Revista Brasileira de Tecnologia Agroindustrial, Ponta Grossa, v. 11, n. 2: p. 2420-2436, jul./dez. 2017.

Capítulo 17

*Licor misto de Taperebá (*Spondias mombin* L.) e Cupuaçu (*Theobroma grandiflorum*): Produção e análise sensorial*

Naiane Caetano da Silva Leal

Carlos José de Oliveira Melo

Theimmy Pereira de Oliveira

Igor Vinícius de Oliveira

Claudete Rosa da Silva

Josiane Pereira da Silva

Wilton Pires da Cruz

José Nilton da Silva

Vicente Filho Alves Silva

Priscilla Andrade Silva

Resumo: A venda de frutas processadas facilita a aquisição de produtos prontos para consumo, por ampliar a preservação e disponibilidade em qualquer época do ano. As bebidas alcoólicas ocupam lugar de destaque em qualquer civilização e as bebidas de frutas tem ganhado espaço no mercado. Considerando os licores como uma alternativa para o aproveitamento de frutas regionais, agregando valor e possibilitando a geração de renda no âmbito da agricultura familiar, o objetivo deste estudo foi produzir e realizar análise sensorial de quatro formulações de licor misto, com diferentes proporções de taperebá e cupuaçu. Foram elaboradas quatro formulações de licores mistos de cupuaçu e taperebá, sendo a Formulação 1, com 90% de calda de cupuaçu e 10% de calda de taperebá; Formulação 2, com 70% de calda de cupuaçu e 30% de calda de taperebá; Formulação 3, com 50% de calda de cupuaçu e 50% de calda de taperebá; Formulação 4, com 30% de calda de cupuaçu e 70% de calda de taperebá. Os produtos foram submetidos à análise sensorial e posteriormente a análise estatística, pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o software SAS. Todos os licores apresentaram boa aceitação pelos provadores, logo mantiveram-se dentro da faixa de nota correspondente a afirmativa de “gostei moderadamente”. Os licores mistos de cupuaçu e taperebá são produtos que possuem potencial exploração de mercado, pois agregarem valor à produção de frutas amazônicas, tendo como reforço a boa avaliação e aceitação dos provadores.

Palavras-chave: Frutas regionais; Agricultura familiar; Frutas Amazônicas.

1. INTRODUÇÃO

O taperebá (*Spondias mombin* L.) também conhecido como cajá, é uma espécie frutífera caducifólia de origem da região amazônica e da mata atlântica, podendo chegar a medir 18 a 25m de altura e seus frutos são elípticos ou globosos, do tipo drupa, com polpa succulento-fibrosa, de sabor doce-acidulado, cor variando do amarelo ao alaranjado devido aos carotenoides, que além de dar cor ao fruto, também dá um apelo funcional significativo, é rico em taninos, propiciando um alimento rico em antioxidantes naturais (MATTIETTO et al., 2010), muito comercializado nas regiões norte e nordeste em feiras livres para consumo in natura ou para preparo de sucos (CUNHA et al., 2011).

Apresenta boas características agrônômicas, tecnológicas e nutricionais, com potencial econômico capaz de colocá-lo no mesmo nível de importância de outras espécies tradicionais como cupuaçu e o açaí, pois segundo Almeida et al. (2014) a produção de taperebazeiro em consórcio, não apresenta prejuízos significativos para outras espécies, em comparação com os benefícios adquiridos, o tornando potencialmente disponível para diversos usos.

O cupuaçu (*Theobroma grandiflorum*) é uma espécie de origem amazônica que tem grande importância econômica, pois a polpa é consumida de diversas formas (COHEN & JACKIX, 2005; ALVES, 1999), é uma espécie frutífera e chega a medir de 4 a 10 m de altura, 7 m de diâmetro de copa, o fruto apresenta características de acidez, teor de pectina, aroma ativo e sabor muito agradável, constituindo uma importante matéria-prima para a indústria de processamento (SOUZA et al., 1999).

A venda de frutas processadas vem aumentando devido à melhoria na qualidade dos produtos ofertados, facilidade de aquisição de produtos prontos para consumo, pela ampliar a preservação e por colocar essas frutas disponíveis em qualquer época do ano (SEBRAE, 2014);

As bebidas alcoólicas ocupam lugar de destaque em qualquer civilização e são classificadas, segundo a Legislação Brasileira, em bebidas fermentadas, destiladas, destilo-retificadas ou por misturas, já o licor diz respeito à bebida alcoólica que contém elevada proporção de açúcar (superior a 30 g/litro), alto teor alcoólico (15 a 54% em volume a 20°C) e um princípio aromático extraído de raízes, sementes, frutas e cascas de plantas, em medidas adequadas, sem que haja fermentação durante sua elaboração (VIERA et al., 2010).

Considerando os licores como uma alternativa para o aproveitamento de frutas regionais, agregando valor e possibilitando a geração de renda para agricultores familiares, o objetivo deste estudo foi produzir e realizar análise sensorial de quatro formulações de licor misto, com diferentes proporções de taperebá e cupuaçu.

2. MATERIAL E MÉTODOS

As frutas foram utilizadas na forma de polpa, e adquiridas no mercado local. As formulações do licor misto foram realizadas no Laboratório de Alimentos da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), no município de Parauapebas.

A priori do preparo das formulações todos os utensílios utilizados foram lavados com detergente neutro e sanitizados em solução a 200 ppm de cloro ativo e água potável.

As caldas de taperebá e cupuaçu foram preparadas separadamente. Em ambas se utilizou 60% de polpa da fruta e 40% de açúcar, misturados em liquidificador com uma dada quantidade de água filtrada, para facilitar a mistura, em seguida, o conteúdo foi ao fogo para cocção até atingir o ponto de fio. As caldas prontas foram resfriadas em banho-maria.

Após o preparo das caldas, realizou-se as misturas em diferentes proporções para compor as formulações. Foram preparadas quatro formulações de licor misto de taperebá e cupuaçu: Formulação 1, com 90% de calda de cupuaçu e 10% de calda de taperebá; Formulação 2, com 70% de calda de cupuaçu e 30% de calda de taperebá; Formulação 3, com 50% de calda de cupuaçu e 50% de calda de taperebá; Formulação 4, com 30% de calda de cupuaçu e 70% de calda de taperebá.

Após a mistura das caldas, foi adicionado o volume de cachaça. Todas as formulações continham 44,5 % de calda mista de frutas e 55,5% de cachaça, com teor alcoólico de 39%, totalizando 100% do produto.

Os licores elaborados foram envasados em garrafas de vidro com capacidade de 1,2 L que foram vedados e postos para repouso por 15 dias, com a finalidade de harmonizar e concentrar o aroma e o sabor das frutas sobre o álcool. Após o repouso, os licores foram filtrados e novamente envasados para a análise sensorial. A Figura 1, possui as etapas realizadas para o preparo das formulações dos licores mistos de cupuaçu e taperebá, em forma de fluxograma:

Figura 1. Fluxograma do preparo das formulações dos licores mistos de cupuaçu e taperebá.

Na análise sensorial, participaram 100 provadores não treinados, selecionados aleatoriamente, de ambos os sexos, com faixa etária de 18 a 60 anos, todos pertencentes a comunidade acadêmica da UFRA. Todos receberam um Termo de Consentimento Livre Esclarecido, com todas as orientações, e a assinatura deste, na concordância em participar voluntariamente do teste.

A análise sensorial foi realizada com base no preenchimento de uma ficha avaliativa, na qual o provador avaliou os atributos aparência, aroma, textura, sabor e impressão global das amostras de licores, através de escala hedônica de nove pontos, com extremidades denominadas em “gostei muitíssimo” (9) e “desgostei muitíssimo” (1), termos que indicam as expressões verbais hedônicas (STONE; SIDEL, 1993).

Junto a análise sensorial foi aplicado o teste de intenção de compra, com uma escala hedônica de 5 pontos, com extremidades denominadas “certamente compraria” (5) e “certamente não compraria” (1) (DUTCOSKY, 2007).

As amostras foram servidas a 20°C, em copos descartáveis, com quantidade de 30 mL de cada amostra, previamente codificadas com números aleatórios de três dígitos, acompanhadas de água potável em temperatura ambiente e bolacha água e sal, para limpeza da boca antes e entre as avaliações das formulações dos licores.

O índice de aceitabilidade (IA) das formulações, foi calculado com base nos dados do atributo impressão global, e conforme a fórmula: $IA (\%) = A \times 100 / B$ Em que, A = nota média obtida para o produto e B = nota máxima dada ao produto (DUTCOSKY, 2007),

Os resultados da análise sensorial dos licores mistos de cupuaçu com taperebá, foram submetidas à análise de variância, e comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade, com auxílio do software SAS® versão 9.4 (SAS INSTITUTE, 2013).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na avaliação sensorial, verificou-se que 68% dos provadores eram do sexo feminino e 32% do sexo masculino (Gráfico 1), distribuídos na faixa etária de 18 a 53 anos, sendo que 64% tinham entre 18 e 27 anos, 28% entre 28 e 37 anos e 8% entre 38 e 53 anos (4%) (Gráfico 2).

Gráfico 1. Perfil dos provadores por sexo submetidos a análise sensorial.

Gráfico 2. Faixa etária dos provadores submetidos a análise sensorial.

De acordo com a Tabela 1, todas as formulações avaliadas demonstraram boa aceitação em todos os atributos avaliados na análise sensorial, com notas variando de 7,15 a 7,90, valores que representam, “gostei moderadamente”.

Para os atributos de aparência, textura, aroma e sabor não houve diferença significativa ($p > 0,05$) em nenhuma das formulações avaliadas como verificado na Tabela 1. Em estudo de Nascimento et al. (2010) a avaliação sensorial de licor de acerola com abacaxi, obtiveram notas médios de 7,42 e 6,98, para os atributos de textura e aroma, respectivamente, valores esses semelhantes ao registrados neste trabalho.

Houve diferença estatística para o atributo de impressão global na Formulação 3, indicando que a formulação com 50% de cupuaçu e 50% de taperebá não agradou os provadores neste quesito.

Tabela 1. Avaliação sensorial dos licores mistos de cupuaçu com taperebá.

Atributos	Formulações				DMS	CV(%)
	F1	F2	F3	F4		
Aparência	7,15±1,58 ^a	7,84±1,01 ^a	7,84±1,00 ^a	7,90±1,01 ^a	0,609	15,11
Textura	7,77±1,00 ^a	7,79±1,05 ^a	7,68±1,00 ^a	7,76±0,97 ^a	0,523	13,02
Aroma	7,88±1,11 ^a	7,46±0,64 ^a	7,62±0,99 ^a	7,71±1,05 ^a	0,500	12,58
Sabor	7,64±0,98 ^a	7,83±1,14 ^a	7,57±1,03 ^a	7,68±1,12 ^a	0,557	13,99
Impressão Global	7,58±1,08 ^{ab}	7,86±0,64 ^a	7,15±0,72 ^b	7,67±0,97 ^a	0,488	12,46

Médias com letras iguais, na mesma linha, não diferem entre si pelo Teste de Tukey, a 5% de probabilidade. F1: 90% de calda de cupuaçu e 10% de calda de taperebá. F2: 70% de calda de cupuaçu e 30% de calda de taperebá. F3: 50% de calda de cupuaçu e 50% de calda de taperebá. F4: 30% de calda de cupuaçu e 70% de calda de taperebá. Coeficiente de variação (CV%). Diferença mínima significativa (DMS).

A diferença mínima significativa (DMS) e o coeficiente de variação (CV), em todas as avaliações propostas, demonstram boa precisão experimental, de acordo a classificação dos CV (Lúcio et al., 1999). O CV constituiu-se numa estimativa do erro experimental, em relação à média geral do ensaio, portanto é uma medida de avaliação da qualidade experimental, assim como a DMS. Pimentel-Gomes (1990) classificou o CV como baixo, quando inferiores a 10%; médios, entre 10 e 20%; altos, quando estão entre 20 e 30%; e muito altos, quando são superiores a 30%, portanto quanto mais alto o valor do CV, menor é a precisão experimental do ensaio.

O índice de aceitação ou aceitabilidade, com base no atributo impressão global, concluiu que houve 84,22%, 87,33%, 79,37% e 85,22% de aceitação para as Formulações 1, 2, 3 e 4, respectivamente (Tabela 2), provando que todas as formulações foram bem aceitas pelo público provador. Para Dutkoski (1996) e Geócze (2007), é critério para boa aceitação valores iguais ou maiores que 70%, o que reafirma a resultado deste experimento.

Tabela 2. Índice de aceitação dos produtos com base no atributo impressão global.

Formulações	Índice de Aceitabilidade (%)
F1 - 90% cupuaçu e 10% taperebá.	84,22
F2 - 70% cupuaçu e 30% taperebá.	87,33
F3 - 50% cupuaçu e 50% taperebá.	79,37
F4 - 30% cupuaçu e 70% taperebá.	85,22

Os valores representam o índice de aceitação calculado com base na nota atribuída pelos 100 provadores.

No teste de intenção de compra dos licores mistos de cupuaçu e taperebá verificou-se que as Formulação 1 e 2 apresentaram maior intenção de compra, logo a respostas “certamente comprariam” foi de 28% e 32%, respectivamente e “possivelmente comprariam”, foi de 42% para ambas as formulações. A Formulação 3, apresentou decaimento na resposta “certamente comprariam” em comparação com “possivelmente comprariam” (22% e 54%, respectivamente). A Formulação 4, foi a que apresentou os mais altos índices de rejeição, quando comparadas as demais, logo a taxa de possíveis compradores indecisos foi de 18% enquadrados na resposta “talvez comprasse/talvez não comprasse”, aliado aos 8% e 6% de provadores que “possivelmente não compraria” e “certamente não compraria”, respectivamente, confirmam que esta formulação teria certo grau de resistência à uma possível compra (Gráfico 3).

Gráfico 3. Intenção de compra para os licores misto de cupuaçu com taperebá.

F1 - 90% cupuaçu e 10% taperebá; F2 - 70% cupuaçu e 30% taperebá; F3 - 50% cupuaçu e 50% taperebá; F4 - 30% cupuaçu e 70% taperebá.

4. CONCLUSÃO

Os licores mistos de cupuaçu e taperebá são produtos que possuem potencial exploração de mercado, pois agregarem valor a produção de frutas tipicamente amazônicas, tendo como reforço a boa avaliação e aceitação dos provadores.

Todos os licores apresentaram boa aceitação pelos provadores, logo mantiveram-se dentro da faixa de nota correspondente a afirmativa de “gostei moderadamente”. Contudo houve uma tendência positiva no que diz respeito a intenção de compra para as Formulações 1, 2 e 3, porém a Formulação 4 não conquistou a intenção de compra dos provadores, sendo, portanto, não indicada para comercialização assim como as anteriores. Entretanto faz-se necessários mais estudos referentes a utilização de frutas tropicais amazônicas para elaboração de produtos deste segmento.

REFERÊNCIAS

- [1] ALMEIDA, O. F. et al. Concorrência Promovida Pelo Taperebazeiro Sobre o Cupuaçuzeiro, Em Sistema Agroflorestal. Embrapa Amazônia Oriental. Belém, PA. Agosto, 2014.
- [2] ALVES, R. M. Programa de melhoramento genético e adaptação de espécies vegetais para a Amazônia oriental: Cupuaçuzeiro. Embrapa, Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Oriental. Belém, 1999.
- [3] COHEN, K. O.; JACKIX, M. N. H. Estudo do Liquor de Cupuaçu. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 25, n. 1, p. 182-190, jan./mar. 2005.
- [4] CUNHA, A. C. et al. Efeito da Espessura da Polpa, Tamanho e Peso de Frutos de Taperebá (*Spondias mombin* L.) Sobre o Parasitismo Natural (Himenoptera: Brachonidae) em mosca-das-frutas (Diptera: Tephritidae). Revista de Agricultura. v. 86, n.2, p.125-133, 2011.
- [5] DUTCOSKY, S. D. Análise sensorial de alimentos. 2 ed. ver. e ampl. Curitiba: Champagnat, 239p. 2007.
- [6] DUTCOSKI, S. D. Análise sensorial de alimentos. Curitiba: Champagnat, 1996. 123 p.
- [7] GEÓCZE, A. C. Influência da preparação de licor de jaboticaba (*Myrciaria jaboticaba* Vell berg) no teor de compostos fenólicos. 2007. 81f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Farmácia, UFMG, Belo Horizonte, 2007.
- [8] LÚCIO, A.D.; STORCK, L.; BANZATTO, D.A. Classificação dos experimentos de competição de cultivares quanto a sua precisão. Pesquisa Agropecuária Gaúcha, v.5, p.99-103, 1999.
- [9] MATTIETTO, R. A.; LOPES, A. S.; MENEZES, H. C. DE. Caracterização física e físico-química dos frutos da cajazeira (*Spondias mombin* L.) e de suas polpas obtidas por dois tipos de extrator. Food Technol, Campinas, v. 13, n. 3, p. 156-164, jul./set. 2010.
- [10] NASCIMENTO, NT do et al. Elaboração de um licor funcional a base de Acerola (*Malpighia emarginata*) com Abacaxi (*Ananas comosus*). Connepi, Sobrak, p. 1-6, 2010.
- [11] PIMENTEL-GOMES, F. Curso de estatística experimental. 13.ed. Piracicaba: Nobel, 1990. 468p.

- [12] SAS INSTITUTE. SAS for Windows, versão 9.4 SAS®: SAS User guide. Carry, 2013.
- [13] SEBRAE. Negócios 2014: FLV processados. Disponível em: <<http://www.sebraemercados.com.br/negocios-2014-flv-processados/>>. Acessado em: 24 de abril de 2019 às 18:48 h.
- [14] SOUZA, A. G. C. et al. A cultura do cupuaçu. Embrapa Amazônia Ocidental. Manaus. Dezembro, 1999.
- [15] STONE, H.; SIDEL, J.L. Sensory evaluation practices. 2. ed. San Diego: Academic Press, 1993.
- [16] VIERA, V. B. Produção, Caracterização e Aceitabilidade de Camu-Camu (*Myrciaria dúbia* (H.B.K) McVaugh). Alimentos Nutricionais. v. 11, n.4, p. 519-522, 2010.

Capítulo 18

Produção e aceitabilidade de geleia mista de goiaba e mamão

Vilson Cleber Fusco da Silva

Daylon Aires Fernandes

João Paixão dos Santos Neto

Igor Vinícius de Oliveira

Josiane Pereira da Silva

Wilton Pires da Cruz

José Nilton da Silva

Vicente Filho Alves Silva

Fabio Israel Martins Carvalho

Priscilla Andrade Silva

Resumo: Geleias são produtos preparados com frutas, sucos ou extratos aquosos das mesmas, onde podem apresentar frutas inteiras, partes ou pedaços, podendo ter várias formas. O objetivo do presente trabalho foi elaborar e avaliar sensorialmente a geleia mista de goiaba e mamão, frutos produzidos e comercializados apenas in natura na região sudeste do Pará, afim de atender a demanda dos produtores rurais do município de Parauapebas-PA. Os frutos selecionados de mamão e goiaba foram adquiridos na feira de agricultura familiar da região. Foram elaboradas duas formulações de geleia (F1: 50% de goiaba e 50% de mamão; F2: 25% de goiaba e 75% de mamão). Para a avaliação sensorial foram realizados os testes de aceitabilidade para os seguintes parâmetros: aparência, aroma, textura, sabor e impressão global; assim como o índice de aceitação e a intenção de compra dos produtos. Os resultados das análises sensoriais dos produtos foram submetidos à análise de variância através do teste de Tukey a 5% de probabilidade. Todos os parâmetros avaliados no teste de aceitação sensorial obtiveram notas médias entre 7 (gostei moderadamente) e 8 (gostei muito), indicando aceitação e intenção de compra dos produtos por parte dos provadores. De acordo com os resultados obtidos, os produtos podem se tornar uma opção de aproveitamento integral dos frutos de goiaba e mamão, independente das proporções de mamão, pelos agricultores familiares do município de Parauapebas-PA, além de uma fonte alternativa de geração de renda para os mesmos.

Palavras-chave: Frutas in natura; Proporções; Aproveitamento; Aceitação Sensorial.

1. INTRODUÇÃO

A Normativa nº15/78 da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA, 2001), diz que geleias deve ser um produto preparado com frutas, sucos ou extratos aquosos das mesmas, onde podem apresentar frutas inteiras, partes ou pedaços, podendo ter várias formas. Os quais podem ser adicionados açúcares, água, pectina, ácidos, entre outros ingredientes permitidos, de forma, a assegurar sua conservação. A geleia é um tipo de doce de fruta que não contém toda a polpa da fruta, possui um aspecto semitransparente e uma consistência, devido à pectina presente nas frutas (RORIZ, 2010).

Dentre os diversos tipos de frutas utilizadas na produção de geleias tem-se a goiaba e o mamão, que segundo Embrapa (2013) são frutos de grande importância nas regiões subtropicais e tropicais devido ao valor nutritivo da fruta, consumo *in natura*, grande aplicação industrial e por se desenvolver em condições adversas de climas.

As geleias mistas associam características de duas ou mais frutas, permitindo a obtenção de produtos com maior valor nutricional e propriedades sensoriais agradáveis, agregando valor e criando possibilidades de conquistar maior espaço junto ao mercado consumidor. Algumas pesquisas têm sido realizadas neste sentido. Ferreira et al. (2011) realizaram estudo com geleias mistas de melancia com tamarindo e obtiveram geleias com elevada aceitação sensorial. Singh et al. (2009) avaliaram a aceitação de diferentes geleias mistas de frutas e verificaram maior aceitação para a geleia de mamão com abacaxi, indicando o potencial do mamão na elaboração destes produtos.

O mamão é um fruto produzido em quase todo o país, sendo consumido tanto na forma *in natura*, quanto na forma de produtos industrializados. De acordo com Brazilian fruit (2014) o Brasil é o segundo maior produtor mundial de mamão, perdendo apenas para a Índia, tendo uma produção anual em torno de 1,5 milhão de toneladas por ano, sendo o segundo maior produtor e uns dos principais países exportadores do mundo (IBGE, 2017).

A goiaba é um alimento de grande valor nutritivo, possui quantidades razoáveis de sais minerais, e é rica em vitamina A, B1, B2 e B6. (PORTAL SÃO FRANCISCO, 2009). Dentre as frutas tropicais, a goiaba vem ganhando grande destaque por ser uma das mais apreciadas, devido às suas características de sabor e aroma e pelo seu elevado valor nutritivo (GONGATTI NETTO et al., 1996).

Com o aumento da preocupação das pessoas por alimentos mais saudáveis e com a grande demanda da indústria alimentícia, torna-se cada vez mais necessária a produção de alimentos que além de satisfazer o desejo do consumidor, possam ser aliados no combate a várias doenças que ocorrem por carências nutricionais (BORTOLUZZI, 2009).

Por tanto, o objetivo do presente trabalho foi elaborar e avaliar sensorialmente a geleia mista artesanal de goiaba e mamão, que são produzidos e comercializados apenas *in natura* na região, afim de atender a demanda dos produtores rurais do município de Parauapebas-PA, garantindo segurança alimentar e principalmente evitar o desperdício de alimentos.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Os frutos selecionados de mamão (*Caricca Papaya* L.) e goiaba (*Psidium guajava* L.) foram adquiridos na Feira de Agricultura Familiar no Município de Parauapebas, região sudeste do Estado do Pará, com as seguintes coordenadas geográficas: 6º 04' 15.6" de latitude Sul e 49º 51' 41.0" longitude a Oeste (com auxílio do GPS portátil, modelo eTrex 10, marca Garmin). Os frutos foram transportados em sacos de polietileno, os quais foram selecionados 50% dos frutos maduros e 50% de vez. Foram elaboradas 2 formulações de geleia (F1: 50% de goiaba e 50% de mamão; F2: 25% de goiaba e 75% de mamão).

As duas formulações elaboradas de geleia foram desenvolvidas na Universidade Federal Rural da Amazônia, no campus de Parauapebas - PA. A pré-lavagem das frutas selecionadas foi realizada com a imersão das frutas em água, na sequência a pós lavagem ocorreu a sanitização em água clorada a 200 ppm; o descascamento das frutas foi realizado de forma manual com a utilização de faca aço inox, após o descascamento foi adicionado 20% de água para extrair a polpa das frutas de goiaba e mamão em liquidificador industrial, sendo que a polpa da goiaba foi peneirada para eliminar as sementes após esse procedimento.

Para garantir uma parte de pectina foram adicionados mais 20% de albedo extraído do mesocarpo do fruto do maracujá (*Passiflora edulis*) para garantir melhor estrutura da geleia. A extração do albedo do maracujá sem casca foi realizada sob cocção com a proporção de 1:1 (água e albedo) do maracujá

submetidos a um branqueamento por temperatura entre 90-110°C por 30 minutos em fogão industrial, em seguida, o albedo foi processado em liquidificador industrial para obtenção de uma pasta.

Foi avaliado o balanço de pH da polpa de mamão e goiaba após a mistura das mesmas, com o objetivo de corrigir o pH para 3 com a adição de ácido cítrico. Após este processamento ocorreu a adição de 20% de xarope de glucose, sendo utilizado a mesma proporção de pectina natural (albedo) e 25% de sacarose (açúcar refinado).

O ponto de cozimento final da geleia foi determinado em refratômetro para mensurar o índice de refração e obter a concentração ideal de sólidos solúveis da geleia em 65 °Brix. Calculou-se a quantidade de sacarose suficiente para elevar o teor de sólidos solúveis da geleia para 65 °Brix, utilizando-se o cálculo de balanço de massa: $M_p \times ^\circ\text{Brix}_p + M_a \times ^\circ\text{Brix}_a = M_{\text{produto}} \times ^\circ\text{Brix}_{\text{produto}}$. Onde: °Brix_a = °Brix do açúcar; M_p = massa do produto néctar. Em seguida a geleia foi submetida em banho maria com água gelada com o objetivo de baixar a temperatura da geleia, posteriormente as geleias foram envazadas em potes de vidros esterilizados e armazenadas em temperatura de refrigeração (8°C).

A avaliação sensorial foi realizada na Universidade Federal Rural da Amazônia no Campus de Parauapebas, por 100 provadores não treinados, selecionados aleatoriamente, com faixa etária de 18 a 60 anos. Para cada avaliador foram entregues uma ficha com termo de consentimento, em seguida receberam uma amostra de aproximadamente 20g de cada formulação de geleia, servidas em copinhos descartáveis (de 50 mL), codificados com três dígitos aleatórios, um copo de 150ml de água e um biscoito de água e sal. Na ocasião foram avaliados individualmente as amostras quanto a aparência, aroma, textura, sabor e impressão global.

O método aplicado para a avaliação sensorial dos estruturados foi o afetivo, também chamado de teste de aceitabilidade com escala hedônica, expressando o quanto gosta e desgosta das amostras, nesta escala varia de nove (gostei muitíssimo) a um (desgostei muitíssimo) permitindo assim a análise estatística dos resultados (ABNT, 1993; ABNT, 1998; DUTCOSKY, 1996; STONE; SIDEL, 1993). Na ocasião foram avaliados os produtos quanto a intenção de compra em uma escala hedônica de uma a cinco pontos de acordo com o método de Dutcosky (2007). Após a análise, calculou-se o índice de aceitabilidade (IA) das formulações, de acordo com a seguinte fórmula: $IA (\%) = A \times 100 / B$ Em que, A = nota média obtida para o produto e B = nota máxima dada ao produto (DUTCOSKY, 2007),

Os resultados das características avaliadas foram submetidos em análise de variância e as médias, quando significativas, comparadas em teste de Tukey a 5% de ($p < 0,05$) probabilidade, com auxílio do software SAS® versão 9.4 (SAS INSTITUTE, 2013).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Sobre a análise sensorial, na Figura 1 pode ser observado a distribuição de sexo dos provadores.

Quanto ao perfil dos participantes da avaliação sensorial das geleias mista mistas, foram entrevistados consumidores de ambos os sexos, 60% dos provadores eram do sexo feminino e 40% do sexo masculino, com idade entre 18 e 60 anos. O maior percentual de consumidores encontrou-se na faixa etária entre 20 e 40 anos (73%), seguido por aqueles entre 41 e 60 anos (14%) e os demais entre 18 e 20 anos (13%).

Figura 1. Sexo dos provadores submetidas a análise sensorial.

É importante que se conheça o perfil dos consumidores do produto formulado, pois estas informações irão definir as preferências dos provadores. Sabe-se que a aceitação e a escolha de um produto são afetadas por fatores que incluem atributos sensoriais do produto, que interagem com fatores comportamentais e psicológicos do consumidor. Nesse sentido, a qualidade sensorial do alimento e a manutenção da mesma favorecem a fidelidade do consumidor a um produto específico em um mercado cada vez exigente (TEIXEIRA, 2009).

De nada vale um produto que tenha excelentes características químicas, físicas e microbiológicas, se as suas características sensoriais não satisfizerem às expectativas do consumidor. A qualidade do produto deve ser ditada, levando em consideração as percepções do consumidor, cabendo a ele determinar os parâmetros de qualidade do produto (MININ, 2013).

Na Tabela 1, podem ser visualizados os valores médios das notas obtidas nos atributos sensoriais para as duas formulações de geleias mistas goiaba e mamão.

TABELA 1. Média das notas atribuídas pelos provadores da sensorial de geleia mista de goiaba e mamão

Atributos	Formulação 1	Formulação 2	CV (%)	Fcal	DMS
Aparência	8,16 ± 0,89 a	8,14 ± 1,11a	12,32	0,01	0,40
Aroma	7,97 ± 1,29 a	8,22 ± 1,00 a	14,21	1,15	0,46
Sabor	8,01 ± 1,04 a	7,79 ± 1,12 a	13,71	1,02	0,43
Textura	7,90 ± 1,07 a	7,74 ± 1,17 a	14,39	0,51	0,45
Impressão global	7,98 ± 1,08 a	8,03 ± 1,07 a	13,41	0,06	0,43

F1: 50% de goiaba e 50% de mamão; F2: 25% de goiaba e 75% de mamão. DMS – Diferença mínima significativa; CV – Coeficiente de Variação; Fcal. – F calculado. Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Os valores representam a média ± desvio padrão de 100 provadores (n = 100).

De acordo com a Tabela 1 pode ser observado que não houve diferença significativa ($p > 0,05$) para todos atributos sensoriais (aparência, aroma, sabor, textura, sabor e impressão global) nas duas formulações de geleias mistas goiaba e mamão, isso indica que as proporções de goiaba e mamão estudadas agradaram sensorialmente os potenciais consumidores.

Os atributos avaliados na análise sensorial obtiveram médias das notas variando entre 7,74 e 8,22 representados pela escala hedônica “gostei moderadamente” e “gostei muito” (Tabela 2), comportamento semelhante foi observado nos resultados encontrados por Conceição et al. (2012), onde observou valores médios de 7,54 a 7,82 para os parâmetros aparência, aroma, sabor, consistência e cor do produto geleia mista de acerola com goiaba.

Com relação aos índices de aceitação para a impressão global, observou-se 88,67% de aceitação para a Formulação 1 e 89,22% para a Formulação 2 (Tabela 2). De acordo com Teixeira, Meinert e Barbeta (1987) é necessário que o produto obtenha um índice de aceitabilidade de, no mínimo 70%, valores superiores foram encontrados no presente trabalho.

Tabela 2. Índice de aceitação dos produtos com base no atributo impressão global.

Índice de Aceitabilidade (%)	
Formulações	Geléia
F1 (50% de goiaba e 50% de mamão)	88,67
F2 (25% de goiaba e 75% de mamão)	89,22

Os valores representam o índice de aceitação calculado com base na nota atribuída pelos 100 provadores.

Cruz (2016) constatou valores próximos aos averiguados no presente trabalho (Tabela 2) com índices de aceitação de 78,11 a 85,56% quando realizaram o estudo sensorial após a elaboração de diferentes formulações de geleias de mamão adicionadas a farinha da semente de mamão.

Observa-se através da Figura 2, que para as geleias a Formulação 1 obteve 82% e a Formulação 2: 82% de intenção de compra dos provadores, confirmando que “possivelmente” ou “certamente” comprariam o produto se o encontrassem à venda. Viana et al. (2012) observaram valores também acima de 70% para a intenção de compra ao traçarem o perfil sensorial de geleias mistas de mamão com araçá-boi.

Figura 2: Intenção de compra das geléias

Os elevados percentuais de intenção de compra observados no referido estudo (Figura 2) indicam que ambas as formulações estudadas apresentam potencial de venda caso as geleias estejam dispostas nas prateleiras dos supermercados.

4. CONCLUSÃO

As duas formulações de geleias apresentam baixo custo, alto rendimento e elevada aceitabilidade sensorial, além de boa intenção de compra. Logo, estes produtos podem se tornar uma opção de aproveitamento integral das frutas goiaba e mamão quando a produção *in natura* superar a demanda, agregando valor aos frutos e reduzindo nas perdas e sazonalidade dos mesmos, despontando como uma fonte alternativa de geração de renda aos agricultores familiares do Sudeste do Pará

REFERÊNCIAS

- [1] ABIA - Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação. Legislação Brasileira para geleia de frutas. 2001.
- [2] ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12806. Análise sensorial dos alimentos e bebidas: terminologia. São Paulo: ABNT, 1993. 8p.
- [3] ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14141. Escalas utilizadas em análise sensorial de alimentos e bebidas. São Paulo, 1998, 3p.
- [4] AOAC - ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS. Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 16th ed. Washington, DC, 1997.
- [5] BORTOLUZZI, R. C. Aplicação de Fibra Obtida da Polpa de Laranja na Elaboração de Mortadela de Frango. 83 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de ciências farmacêuticas da universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
- [6] CONCEIÇÃO, A. L. S.; CEDRAZ, K. A.; SANTOS, C. C. DOS; SILVA, M. S. DA; CARDOSO, R. L. Elaboração e caracterização química, físico-química e sensorial de geleia mista de acerola com goiaba. Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer, Goiânia, v. 8, n. 15; p. 832 – 841, 2012
- [7] CRUZ, V. A. Desenvolvimento de geleia de mamão formosa (*Carica papaya* L.) sob diferentes concentrações e métodos de secagem das sementes. 2016. 91 f. Dissertação de Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Uberaba. Minas Gerais, 2016.
- [8] DUTCOSKY, S. D. Análise Sensorial de Alimentos, 2. ed. Curitiba: Champagnat, 2007. 123p.
- [9] EMBRAPA. Preparo artesanal de geleias e geleiadadas. *Embrapa* Clima Temperado. *Pelotas, RS*. 2013.
- [10] FERREIRA, R.M.A.; AROUCHA, E.M.M.; GÓIS, V.A.; SILVA, D.K.; SOUSA, C.M.G. Qualidade sensorial de geleia mista de melancia e tamarindo. Revista Caatinga, Mossoró, v. 24, n. 2, p.202-206, 2011.
- [11] IBGE. PAM - Produção agrícola municipal, instituto brasileiro de geografia e estatística. 2017.
- [12] MINIM, V. P. R. Análise Sensorial: estudos com consumidores. Viçosa: Editora UFV, 2013.
- [13] GONGATTI NETTO, A.; GARCIA, A.E.; ARDITO, E.F.G.; GARCIA, E.C.; BLEINROTH, E.W.; MATALLO, M.; CHITARRA, M.I.F.; BORADIN, M.R. Goiaba para exportação: procedimentos de colheita e pós-colheita: Ministério da Agricultura Rural. Brasília: EMBRAPA-SPI, 1996. 35p.
- [14] PORTAL SÃO FRANCISCO. Goiaba. São Francisco, 2009. Disponível em: <<http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/goiaba/goiaba-3.php>>. Acesso em: 04, jun. 2019.

- [15] RORIZ, V. Nutrição em Foco. São Paulo, 2010, v. 1. 65 p.
- [16] SAS INSTITUTE. SAS for Windows, versão 9.4 SAS®: SAS User guide. Cary, 2013.
- [17] SINGH, S.; JAIN, S.; SINGH, S. P.; SINGH, D. Quality changes in fruit jams from combinations of different fruit pulps. *Journal of Food Processing and Preservation*, Hoboken, v.33, p.41-47, 2009.
- [18] STONE, H. S.; SIDEL, J. L. *Sensory Evaluation Practices*. 2 ed. San Diego: Academic Press, 1993. 338p.
- [19] TEIXEIRA, E.; MEINERT, E.; BARBETTA, P. A. *Análise sensorial de alimentos*. Florianópolis: Ed. da Universidade Federal de Santa Catarina, 1987. 180 p.
- [20] TEIXEIRA, L. V. Análise Sensorial na Indústria de Alimentos. *Revista Instituto Candido Tostes*. n. 366, v. 64, p.12-21, 2009.
- [21] VIANA, E. S.; JESUS, J. L. DE; REIS, R. C.; FONSECA, M. D.; SACRAMENTO, C. K. do. Caracterização físico-química e sensorial de geleia de mamão com araçá-boi. *Revista Brasileira de Fruticultura*, Jaboticabal - SP, v. 34, n. 4, p. 1154-1164, dez., 2012

Capítulo 19

Desenvolvimento de método por Clue-em-em para detecção de adulterantes em café torrado e moído

Víctor de Carvalho Martins

Cinthia de Carvalho Couto

Otniel Freitas-Silva

Renata Galhardo Borguini

Manuela Cristina Pessanha de Araújo Santiago

Ana Cristina Miranda Senna Gouvêa

Ronoel Luiz de Oliveira Godoy

Resumo: Com um aumento crescente da produção e consumo em escala mundial, o café tem sido investigado com o intuito de minimizar os prejuízos à sua qualidade, como as recorrentes práticas de adulteração. O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma metodologia por Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência e Espectrometria de Massas Sequencial (CLUE-EM-EM) e determinar marcadores químicos para diferentes adulterantes do café comercial. Entre as metodologias desenvolvidas, o método por Cromatografia com Interação Hidrofílica (CIH) apresentou melhor resolução cromatográfica, sendo utilizado para analisar os grãos de arroz, milho, cevada e soja, após processo térmico similar ao café, quanto à presença de diferentes carboidratos. Através da razão massa/carga e do perfil de fragmentação, foi confirmada inicialmente a diferenciação dos adulterantes com base nos grupos de oligossacarídeos. Os experimentos com *blends* preparados de café possibilitou a detecção de fraudes com: (a) milho pela presença de maltotriose; (b) arroz pela presença de maltotriose e rafinose; (c) cevada pela presença de maltotriose, rafinose e nistose; e (d) soja pela presença de rafinose e estaquiose. Estes resultados indicaram que foi possível detectar a presença dos adulterantes em café torrado e moído através de uma metodologia por CLUE-EM-EM.

1. INTRODUÇÃO

Os frutos do cafeeiro, pertencente à família Rubiaceae, são responsáveis por prover uma das bebidas mais apreciadas em todo o mundo e cujos consumo e produção mundiais apresentam um aumento crescente nas últimas décadas. A qualidade do café pode ser influenciada por diferentes fatores, como a espécie botânica utilizada, as condições do processo de torrefação e até a ocorrência de adulterações (Franca et al., 2005; Gonzalez-Rios et al., 2007; ABIC, 2015; ICO, 2015).

Desde 1851, são observados relatos de fraudes em café por adição de matérias-primas de menor custo, como raiz de chicória, milho e cevada, e atualmente diversos órgãos internacionais e nacionais tem atuado na garantia da qualidade do café (Lancet, 1851; Oliveira et al., 2015). Até o início de 2013, a Instrução Normativa de nº16 de 24 de maio de 2010 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Brasil, 2010) encontrava-se em vigor e reprovava cafés torrados em grãos e cafés torrados e moídos quando estes apresentam teor de impurezas, sedimentos e matérias estranhas igual ou superior a 1,0%. Há uma forte tendência para que entre em vigor uma instrução normativa mais rígida, sendo necessário o desenvolvimento de métodos que empreguem técnicas analíticas com maior sensibilidade e seletividade.

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um método de detecção por Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência acoplada a Espectrometria de Massas Sequencial (CLUE-EM-EM), determinando os carboidratos marcadores de adulteração por adição de arroz, milho, soja e cevada em café comercial e estimando os parâmetros de validação do método.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 MATERIAIS, SOLVENTES E EQUIPAMENTOS

Para o desenvolvimento do método cromatográfico, foram adotados inicialmente padrões, da marca Sigma-Aldrich® (Alemanha), dos seguintes carboidratos:

Tabela 1 – Relação entre os carboidratos e os prováveis adulterantes utilizados.

Analitos	Massa Molar (g.mol ⁻¹)	[M+Na] ⁺	Indicativo de Adição
Maltose	342,1162	365,1059	Milho
Rafinose	504,1690	527,1587	Soja
Estaquiase	666,2218	689,2115	
Kestose	504,1690	527,1587	Cevada
Nistose	666,2218	689,2115	

Fonte: Os autores.

Os solventes acetonitrila e metanol, grau LC-MS, e ácido fórmico, grau de pureza 98-100%, foram da Merck® (Alemanha). A água purificada empregada nos experimentos foi obtida pelo sistema de purificação de água Milli-Q® Gradient 10A Millipore® e Elix® /RiOs™ 5 (EUA). Adquiriu-se também grãos de café torrado, milho, soja, cevada e arroz integral no comércio varejista da cidade do Rio de Janeiro – RJ.

Foram utilizados um cromatógrafo líquido de ultra eficiência Acquity UPLC® acoplado a um espectrômetro de massas de alta resolução Synapt® modelo G1 com ionização por eletronebulização e analisadores do tipo quadrupolo e tempo de voo (QTdV), da empresa Waters® (EUA), e colunas Acquity UPLC® BEH do tipo C₁₈ (2,1 mm x 150 mm, 1,7 µm), também da Waters® (EUA), e Kinetex® HILIC 100Å (2,1 mm x 50 mm, 1,7 µm), da marca Phenomenex® (EUA).

2.2 EXPERIMENTAL

Preparo de solução-padrão: Foram pesados 1 mg de cada padrão de carboidrato em balão volumétrico de 50,00 mL, resultando em uma solução-padrão com concentração de 20 $\mu\text{g.mL}^{-1}$. Realizou-se ainda uma diluição 1:4 (v/v) para obtenção de solução-padrão a 5 $\mu\text{g.mL}^{-1}$ de cada carboidrato. Outra solução foi preparada de maneira similar utilizando como solvente um extrato cafeico obtido a partir da aplicação da metodologia de Macrae (1998) em grãos de café torrados.

Determinação do método por CLUE-EM-EM: O método cromatográfico foi estabelecido através de um estudo com o emprego de diferentes tipos de fase estacionária; tipos de solventes e de composição da fase móvel, em % v/v; do volume de vazão, em mL.min^{-1} ; e da temperatura da coluna, em $^{\circ}\text{C}$. Foi adotado o método por Cromatografia com Interação Hidrofílica (CIH), com a utilização de coluna HILIC e fase móvel em gradiente de acetonitrila e solução aquosa de ácido fórmico a 0,1% (v/v), conforme Tabela 2, com os parâmetros volume de injeção de 1,0 μL , fluxo de 0,5 mL.min^{-1} , temperatura da coluna de 35°C e tempo de corrida de 10 min. As condições do espectrômetro de massas foram empregadas de acordo com Martins et al. (2015), com a detecção dos adutos de sódio $[\text{M}+\text{Na}]^{+}$ e fragmentação por energias de colisão de 15,0 V para os íons de m/z 365, 25,0 V para íons de m/z 527 e 30,0 V para íons de m/z 689.

Tabela 2 – Composição da fase móvel: acetonitrila (A) e solução aquosa de ácido fórmico a 0,1% (B).

Tempo de Corrida (min)	A	B
0,0	92,0	8,0
2,9	92,0	8,0
3,0	90,0	10,0
6,8	90,0	10,0
7,3	60,0	40,0
8,3	60,0	40,0
8,8	92,0	8,0
10,0	92,0	8,0

Fonte: Os autores.

Torrefação dos adulterantes do café: Os grãos de milho, cevada, arroz e soja foram encaminhados para o Laboratório de Micologia, localizado na Planta-Piloto de Pós-Colheita da Embrapa Agroindústria de Alimentos, onde foram submetidos ao tratamento térmico similar ao utilizado para torrefação do grão de café verde e obtidas amostras moídas com coloração semelhante ao café comercial.

Análise de açúcares solúveis: A partir das amostras *in natura* e torradas, foram obtidos, pelo método de Macrae (1998), extratos de açúcares para milho, cevada e arroz. Para o estudo com soja, adotou-se o método abordado por Oliveira et al. (2010) devido ao seu conteúdo proteico. Procedeu-se, portanto, a verificação por CLUE-EM-EM da presença e ausência dos analitos, antes e após o processamento térmico, determinando os carboidratos específicos como marcador de adulteração para cada tipo de grão.

Preparo de blends de café: Foram preparados *blends* de café com cada adulterante torrado nas concentrações de 0,2%, 1,0%, 5,0% e 25,0% (m/m). Foram obtidos extratos aquosos a 4% (m/v) por ultrassom em 20 min. Para purificação dos extratos, empregou-se as etapas de centrifugação a 6000 rpm por 10 min; microcentrifugação do sobrenadante a 12000 rpm por 10 min (duas vezes); filtração a 0,22 μm ; e purificação em cartucho tipo Sep-Pak C_{18} com ativação com solução de acetonitrila a 90% (v/v).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram desenvolvidos dois métodos cromatográficos tanto por Fase Reversa (FR), utilizando coluna contendo fase estacionária C_{18} , quanto por CIH através do uso de coluna de sílica. O primeiro método mostrou-se inviável devido à baixa repetitividade dos tempos de retenção dos analitos em corridas cromatográficas realizadas em diferentes dias. Segundo Walter et al. (2005), a perda de resolução está relacionada com a interrupção e o reinício do fluxo de fase móvel altamente aquosa (acima de 90% v/v) em colunas de fase reversa, sobretudo aquelas que possuem poros de diâmetros médios menor que 20 nm, como as colunas para CLUE. Quando o fluxo cessa, a pressão liberada favorece a saída da fase móvel dos poros da fase estacionária apolar, principalmente na saída da coluna, região mais próxima a pressão atmosférica, o que diminui a interação entre fase estacionária e fase móvel.

O segundo método, por CIH, apresentou boa resolução cromatográfica e maior estabilidade entre corridas cromatográficas e dias de análise e, por este motivo, foi adotado para o estudo dos adulterantes. A Figura 1 refere-se ao cromatograma da solução-padrão em água, cujo perfil foi similar para a solução-padrão em extrato cafeeiro.

Figura 1 – Cromatograma do pico base, por CLUE-EM, da solução-padrão a $5,0 \mu\text{g.mL}^{-1}$ em água, com detecção da maltose ($t_r = 0,85$), kestose ($t_r = 1,73$), rafinose ($t_r = 2,06$), nistose ($t_r = 3,48$) e estaquiose ($t_r = 5,27$).

Fonte: Os autores.

Após a determinação do método, foi realizado o estudo de cada adulterante, verificando o possível efeito do processamento térmico. Os resultados estão dispostos na Tabela 3.

Tabela 3 – Detecção dos analitos, por CLUE-EM-EM, nas matrizes *in natura* e torrada.

Matriz	Condições	Íons observados
Arroz	<i>In natura</i>	Presença de rafinose
	250°C por 30 min	Ausência de rafinose
Milho	<i>In natura</i>	Presença de maltose e rafinose
	250°C por 30 min	Presença de maltose
Cevada	<i>In natura</i>	Presença de kestose, rafinose e nistose
	250°C por 100 min	Ausência de kestose, rafinose e nistose
Soja	<i>In natura</i>	Presença de rafinose e estaquiose
	245°C por 15 min	Presença de rafinose e estaquiose

Fonte: Os autores.

Entre os adulterantes, a soja apresentou maior facilidade de diferenciação, sendo confirmada a possibilidade de detecção por rafinose e estaquiose, enquanto o extrato aquoso de milho foi o único em que foi possível identificar a presença de maltose, mesmo que em baixa intensidade. Destaca-se ainda a ausência dos analitos, sobretudo kestose e nistose, no teste com cevada torrada, podendo ser associado ao elevado tempo de exposição ao calor.

Os extratos de arroz, cevada e milho apresentaram ainda dois íons de m/z 527 e 689, que se referem aos isômeros de rafinose e kestose e de estaquiose e nistose. O íon de m/z 527 foi identificado como a maltotriose, pela relação m/z observada e pelo perfil de fragmentação. O aduto sodiado proveniente da maltotriose apresenta uma menor tendência a fragmentação do que a kestose e a rafinose, na energia de colisão de 25,0 V, conforme Figura 2.

Figura 2 – Comparação entre os espectros de massas sequencial (EM-EM) dos isômeros rafinose, kestose e maltotriose, sob energia de colisão de 25,0 V.

Fonte: Os autores.

Portanto, é possível diferenciar os extratos de soja dos demais adulterantes através da comparação dos espectros de massa dos isômeros de m/z 527. O íon de m/z 689 apresentou comportamento similar a maltotriose, sendo necessário o estudo da fragmentação da maltotetraose.

Quanto às análises em triplicata dos *blends* de café, todos os oligossacarídeos observados nos *blends* foram ausentes na amostra pura de café torrado e moído (Tabela 4).

Tabela 4 – Oligossacarídeos detectados nas amostras de café.

	$[M + Na]^+ - 527 \text{ u}$	$[M + Na]^+ - 689 \text{ u}$
Café	-	-
Café + Arroz	Rafinose e Maltotriose	-
Café + Cevada	Rafinose e Maltotriose	Nistose
Café + Milho	Maltotriose	-
Café + Soja	Rafinose	Estaquiose

Fonte: Os autores.

Além disso, a seletividade do método foi garantida justamente através dos perfis de fragmentação por CID (collision-induced dissociation). Sob energia de colisão no transfer de 25 V, o isômero maltotriose se difere da rafinose pela alta intensidade da molécula sodiada, devido a maior estabilidade da ligação glicosídica α ($1 \rightarrow 4$) em relação a ligação α, β ($1 \leftrightarrow 2$). Entre os isômeros de m/z 689 u, a fragmentação da estaquiose fornece apenas íons fragmentos pela perda de 162 u ($[M + Na - 162]^+$), enquanto para nistose também são observados íons pela perda de 180 u ($[M + Na - 180]^+$). O limite de detecção foi estimado ao nível de adulteração de 0,2% (m/m), referente à menor concentração de *blend* analisado e inferior ao nível permitido da legislação anterior vigente de 1,0 % (Brasil, 2010).

4. CONCLUSÕES

O estudo do efeito da torrefação sobre os adulterantes do café comercial, a partir da metodologia cromatográfica desenvolvida, permitiu a diferenciação entre diferentes adulterantes torrados. O preparo de *blends* entre um café isento de adulteração e estes materiais vegetais possibilitou determinar que diferentes adulterações podem ser detectadas como: (a) com milho pela presença de maltotriose; (b) com arroz pela presença de maltotriose e rafinose; (c) cevada pela presença de maltotriose, rafinose e nistose; e (d) soja pela presença de rafinose e estaquiose. Com a seletividade garantida pelo perfil de fragmentação e baixo limite de detecção de adulterantes, a análise por CLUE-EM-EM pode contribuir para uma maior fiscalização e expansão da indústria brasileira de café.

AGRADECIMENTOS

À Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) junto ao Consórcio Pesquisa Café, e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), pelo apoio financeiro concedido.

REFERÊNCIAS

- [1] ABIC - Associação Brasileira de Indústria de Café (2015). *Indicadores de Desempenho da Cafeicultura Brasileira*. Disponível em <http://www.abic.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=52>
- [2] Brasil, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2010). *Regulamento Técnico para o Café Torrado em Grão e para o Café Torrado e Moído* (Instrução Normativa nº 16, 24 de maio de 2010). Diário Oficial da República Federativa do Brasil.
- [3] Franca, A. S., Mendonça, J. C. F., Oliveira, S. D. (2005). Composition of green and roasted coffees of different cup qualities. *LWT - Food Science and Technology*, 38 (7), 709-715.
- [4] Gonzalez-Rios, O., Suarez-Quiroz, M. L., Boulanger, R., Barel, M., Guyot, B., Guiraud, J., Schorr-Galindo, S. (2007). Impact of “ecological” post-harvest processing on coffee aroma: II. Roasted coffee. *Journal of Food Composition and Analysis*, 20 (3-4), 297-307.
- [5] ICO - International Coffee Organization (2015). *Trade Statistic Tables*. . Disponível em http://www.ico.org/trade_statistics.asp?section=Statistics
- [6] Macrae, R (1998). *Food Science and Technology – A series of monographs: HPLC in food analysis* (2. ed.). Cambridge, Massachusetts: Academic Press.
- [7] Martins, V. C., Godoy, R. L. O., Laudeauzer, C. M., Gôuvea, A. C. M. S., Santiago, M. C. P. A., Borguini, R. G., Pacheco, S., Nascimento, L. S. M., Braga, E. C. O. (2015). Definição de parâmetros em espectrometria de massas sequencial para detecção de fraudes em café. *Semioses*, 9 (1), 1-7.
- [8] Oliveira, E. M. M., Farah, A., Silva, O. F., Souza, A. M., Santos, T. F., Santiago, M. C. P. A. (2015). *Coffee in Health and Disease Prevention - Chapter 105 - Overview of Currently Applied Techniques for Detection of Adulterants in Coffee and Potential Use of DNA-Based Methods as Promising New Analytical Tools*. San Diego: Academic Press.
- [9] Oliveira, M. A., Carrão-Panizzi, M. C., Mandarino, J. M. G., Leite, R. S., Campos Filho, P. J., Vincentini, M. B. (2010). Quantificação de teores de açúcares, oligossacarídeos e amido em genótipos/cultivares de soja (*Glycine Max* (L) Merrill) especiais utilizados para alimentação humana. *Brazilian Journal of Food Technology*, 13 (1), 23-29.
- [10] The Lancet (1851). Coffee, and its adulterations. *The Lancet*, 57 (1427), 21-26.
- [11] Walter, T. H., Iraneta, P., Capparella, M. (2005). Mechanism of retention loss when C₈ and C₁₈ HPLC columns are used with highly aqueous mobile phases. *Journal of Chromatography A*, 1075, 177-183.

Capítulo 20

Prospecção de enzimas lipolíticas na fermentação de resíduos Agroindustriais utilizando Yarrowia Lipolytica

Mayara Kuasnei

Thainara Amanda Duarte Vendruscolo

Vanessa Gomes da Silva

Thiago Bergler Bitencourt

Resumo: Os resíduos provenientes da indústria de alimentos envolvem quantidades apreciáveis de casca, caroço e entre outros resíduos. Esses materiais, são grande fonte de matéria orgânica, que são possíveis de serem reaproveitados, além de servirem como fonte de proteínas, enzimas, fibras, etc. As enzimas são proteínas globulares sintetizadas por organismos de seres vivos que catalisam reações bioquímicas, agindo como catalisadores ideais na tecnologia de alimentos. As lipases, enzimas que provocam hidrólise de gorduras, podem ser utilizadas como aditivos em alimentos para modificar e realçar as propriedades organolépticas de produtos. Contudo, o presente trabalho tem como principal objetivo produzir lipases a partir da hidrólise de resíduos industriais com a utilização da levedura *Yarrowia lipolytica*.

Palavras-Chave: enzimas, lipases, resíduos industriais.

1. INTRODUÇÃO

As enzimas são proteínas globulares solúveis sintetizadas pelos organismos de seres vivos com a finalidade específica de catalisar reações bioquímicas, que não ocorreriam sob as condições fisiológicas habituais. Elas agem sob condições moderadas, o que as tornam catalisadores ideais para tecnologia de alimentos, onde o fabricante pretenda modificar as matérias-primas alimentícias, não prejudicando seus nutrientes essenciais. Exemplos da utilização de enzimas em alimentos seriam a fabricação de cerveja, vinhos, queijo e pães (KOBELITZ, 2008). Elas fornecem substrato, ajudam na produção de flavor, além de criar estrutura de alimentos. As enzimas podem estar presentes nos alimentos de forma natural, sendo responsáveis por modificações nos mesmos que podem ser benéficas ou prejudiciais (ORDÓÑEZ, 2005).

Com o desenvolvimento de metodologias mais limpas e de baixo custo, as enzimas tornaram-se indispensáveis para a produção de muitos compostos. A exploração da biodiversidade na busca de novos catalisadores por técnicas de seleção de microrganismos, de plantas ou de células animais representam os métodos tradicionais de descobertas de novas enzimas para o desenvolvimento da biocatálise em escala industrial (COTTERIL, 1991). Neste caso, os microrganismos são de particular interesse devido ao curto período de geração, grande diversidade de processos metabólicos e enzimas envolvidas e não há um número limitado de microrganismos na natureza que possam ser testados, os quais são bastante diferentes entre si (ZANOTTO, 2009).

As lipases (3.1.1.3.triacilglicerol hidrolases) são enzimas hidrolíticas presentes em diversos organismos, incluindo animais, plantas, fungos e bactérias (COSTA; AMORIM, 1999). Possuem massa molar em torno de 40 a 50 Kda, com mais ou menos 300 resíduos de aminoácidos. São conhecidas por catalisarem em seu meio natural, a hidrólise de ésteres, especificamente triacilgliceróis em ácidos graxos livres, di e monoacilglicerol e glicerol (FABER, 2005). Possuem também a função de catalisar a reação inversa executando esterificações, transesterificações (acidólise, interesterificação, alcoólise), aminólise e tiotransesterificação em solvente orgânico anidro, em sistema bifásico ou em solução micelar com alta especificidade (LIMA, 2005). As lipases são enzimas extracelulares produzidas por fungos tais como *Aspergillus mucus*, *Rhizopus penicillium*, *Geotrichum sp*, *Bacillus megaterium*, *Metarhizium anisopliae*, *Penicillium wortmanii* e por leveduras como *Tulopsis sp* e *Candida sp*. Algumas bactérias que produzem lipases são *Pseudomonas sp*, *Achromobacter sp* e *Staphylococcus sp*. (LIMA, 2005, SILVA, 2005, CARVALHO 2005) Destes organismos, as lipases de *Aspergillus sp*, *Mucor sp*, *Rhizopus sp* e *Candida sp* entre outras já estão disponíveis comercialmente (NOVOZYMES, 2016, AMANO, 2016). Os vegetais também têm sido amplamente estudados como fontes de lipases, como por exemplo, extratos de látex de *Carica papaya* e das folhas de *Ananas comosus*. Estes extratos podem ser utilizados em escala industrial para síntese de um similar ao Salatrim, que é um triacilglicerol estrutural de baixa caloria obtido a partir de interesterificação de óleo de soja hidrogenado (12% de C16 e 88% de C18) e tributirina (PAQUES, 2006). Em alimentos elas agem em: maturação acelerada de queijos, melhora a textura de pães, aumentando a capacidade de retenção de água e diminuindo a sinérese, o que prolonga a vida de prateleira do mesmo e além de ser utilizada para produção de margarina (KOBELITZ, 2008).

São conhecidos como resíduos na indústria de alimentos, parte da matéria prima não utilizadas no processamento do produto principal. Esses resíduos tempos atrás tinha o sentido de perda, pois muito pouco deles eram aproveitados para a produção de novos produtos. Hoje em dia muitos desses resíduos são transformados em subprodutos. No Brasil essa política tem progredido, especialmente na área de vegetais, onde tem destaque o setor de frutas (ENVANGELISTA 2008). Os resíduos provenientes da indústria de alimentos envolvem quantidades apreciáveis de casca, caroço e entre outros resíduos. Esses materiais, são grande fonte de matéria orgânica, servem como fonte de proteínas, enzimas e óleos essenciais, passíveis de recuperação e aproveitamento (COELHO et al., 2001).

A *Yarrowia lipolytica*, segundo Coelho et al. (2010), é um microrganismo que está sendo muito estudado pois é uma levedura estritamente aeróbica capaz de produzir metabolitos importantes e possuindo uma atividade secretora intensa, o que justifica esforços no sentido de utilizá-lo na indústria. Um dos mais importantes produtos segregados por este microrganismo é a lipase, que é uma enzima que atrai o interesse dos cientistas e investigadores industriais, porque pode ser explorada para várias aplicações em detergentes, alimentos, farmacêutica e indústrias ambientais. Sendo uma levedura estritamente aeróbica, o seu crescimento é afetado pela quantidade de oxigênio disponível no meio de cultura, por isso um portador de oxigênio para meios de cultura beneficia a taxa de crescimento da *Yarrowia lipolytica* e sua produção de enzimas extracelulares, aumentando a produtividade lipase. Este microrganismo por sua vez é amplamente conhecido pela produção de ácido cítrico a partir de uma variedade de fontes de carbono, incluindo açúcares, alcanos, óleos vegetais, hidrolisados de amido, etanol entre outros (GONÇALVES, 2014). A capacidade de várias espécies de *Yarrowia lipolytica* na degradação de uma variedade de

compostos orgânicos, incluindo hidrocarbonetos alifáticos e hidrocarbonetos aromáticos e muitas vezes acompanhada pela produção biosurfactantes.

Frente a isso, o presente trabalho tem como principal objetivo medir a potencial aplicação de *Yarrowia lipolytica* na produção de enzimas com atividades lipolíticas utilizando 8 (oito) resíduos agroindustriais de diferentes procedências e 2 (duas) fontes de carbono extensamente produzidas na região de Laranjeiras do Sul – PR, para fins comparativos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 SELEÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS

As fontes de carbono (casca de abóbora - *Curcubita spp.*, casca de Batata-Doce - *Ipomoea batatas*, casca de mandioca-vermelha - *Manihot esculenta*, casca de laranja - *Citrus X sinensis*, casca de melão - *Cucumis melo*, semente de abacate - *Persea americana*, casca de maracujá - *Passiflora edulis*, Milho - *Zea mays*, casca de Banana - *Musa paradisiaca*, aveia - *Avena sativa*), foram obtidas em propriedades de agricultura familiar na cidade de Laranjeiras do Sul – PR.

Os resíduos foram mantidos a -10 °C, até seu processamento. O material foi descongelado e secado em estufa a 50 °C, durante 24 h, triturado em moinhos de faca e peneirado em peneiras da série Tyler (6-8 mesh) e então estocado em temperatura ambiente. Antes do processo de fermentação, os resíduos foram autoclavados a 121 °C, durante 15 min. Após resfriamento, os resíduos foram transferidos, em condições assépticas, para as colunas de Rambault, previamente esterilizadas, e inoculado com 10^7 células de *Yarrowia lipolytica*, incubado a 30 °C, durante 9 dias.

2.2 PREPARO DO INÓCULO

Em um balão volumétrico colocou-se glicose (2%) (Alphatec), peptona (1%) (Himedia®), extrato de levedura (0,5%) (Himedia®), ágar (2%) (Alphatec) e água destilada e levados ao microondas para garantir que a solução esteja certamente homogeneizada. As placas de Petri foram colocadas na capela e ligadas a luz UV por 20 minutos para esterilização. A mistura (GYP) foi autoclavada e então distribuídos em placas de Petri na capela de fluxo laminar já esterilizadas. Após o preparo do GYP nas placas foi feita a repicagem da levedura por esgotamento e colocado na estufa para o seu crescimento.

A contagem de células (10^7 células) foi realizada em solução salina 0,9% utilizando a escala de turbidez de McFarland.

2.3 MEIO DE CULTIVO E CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS/PRODUÇÃO DE LIPASES

Para a produção de lipases foram utilizados como fontes de carbono citados acima nas concentrações de 5%, 10% e 15%, no qual foi suplementado com os seguintes nutrientes: NaNO_3 (1%) (Dinâmica®), KH_2PO_4 (0,1%) (Impex), $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (0,05%) (Alphatec), e Tween 20 (1%) (Vetec™). Os nutrientes utilizados foram de acordo com Santos et al., com modificações.

Os experimentos foram realizados em colunas de Rambault (15 mL) com volume inicial de meio de cultivo com cerca de 14 mL. Logo após a adição da levedura, estes foram submetidos a banho Dubnoff (Nova Instruments) sem agitação por cerca de 9 dias a uma temperatura de 30 °C.

2.4 QUANTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA

A atividade enzimática foi determinada com base na hidrólise enzimática do acetato de isoamila (Impex) o qual dispensa sistemas de emulsão por se tratar de um éster de cadeia curta (FABER, 2005). Neste modo, após a fermentação adicionou-se 1,0 g do éster (7,7 mmol) (Dinâmica®), 60 mL de água destilada. Esta mistura foi submetida a banho Dubnoff por 1 hora (60 minutos) a 150 rpm.

Ao término da reação, as misturas reacionais foram tituladas com uma solução de NaOH (0,5 M) (Dinâmica®) na presença do indicador fenolftaleína até o aparecimento da cor rosa. A atividade lipolítica preliminar foi determinada como quantidade de enzima que liberou 1 umol de ácido carboxílico por minuto. Os valores obtidos estão demonstrados na Tabela 1.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os valores das determinações de cálculo de atividade enzimática estão na Tabela 1.

Tabela 1. Atividade enzimática em termos de atividade lipolítica com o emprego de diferentes resíduos em diferentes concentrações.

Resíduos empregados	Atividade enzimática/ U/g Fonte de Carbono (%) ¹		
	5	10	15
Casca de Abóbora - <i>Curcubita spp</i>	n.d. ²	8,92	13,92
Casca de Batata-Doce <i>Ipomoea batatas</i>	4,75	6,5	9,15
Casca de Mandioca-Vermelha - <i>Manihot esculenta</i>	6,67	11,3	12
Casca de Laranja - <i>Citrus X sinensis</i>	7,92	8,58	14
Milho - <i>Zea mays</i> ³	1,83	4,5	6,92
Casca de Banana - <i>Musa paradisiaca</i>	9,75	18,42	23,75
Aveia - <i>Avena sativa</i> ³	3,75	10,5	10,08
Casca de Abacate - <i>Persea americana</i>	6,5	11,92	17,58
Casca de Melão - <i>Cucumis melo</i>	12,33	24,83	26,42
Casca de Maracujá - <i>Passiflora edulis</i>	12,92	23,08	27,17

¹Condições reacionais: 30 °C, 150 rpm, 1h

²n.d. – não determinado devido a contaminação.

³resíduo utilizado em sua forma integral.

As enzimas microbianas produzidas por levedura são muito utilizadas, porque além de ser consideradas como bons produtores de lipases elas são extracelulares, o que facilita sua recuperação do meio de cultivo.

Na determinação de atividade enzimática em diferentes concentrações 5%, 10% e 15% verificou-se que a levedura *Yarrowia lipolytica* obteve melhor rendimento dessa atividade na concentração de 15% de praticamente todos os resíduos, como pode ser observado na Tabela 1. A levedura *Yarrowia lipolytica* apresentou uma fase de adaptação, onde o microrganismo sintetiza as enzimas necessárias ao metabolismo dos componentes presentes no meio.

Observa-se portanto, que houve uma maior atividade na concentração de 15% utilizando o resíduo de casca de maracujá, tendo uma atividade enzimática de 27,17 U/g, além de o resíduo Casca de melão apresentar resultados similares de 26,42 U/g.

Estudos mais detalhados em outras condições reacionais (temperatura, composição do meio, modos de agitação, etc) devem ser realizados afim de que se otimize a produção de enzimas com atividades lipolíticas e que possam futuramente ser isoladas e utilizadas em diferentes processos na indústria de alimentos.

4. CONCLUSÃO

A cultura brasileira na sua produção está provocando muitas perdas, diminuindo a disponibilidade de recursos para a população. Uma alternativa que vem crescendo é o aproveitamento de resíduos, principalmente casca de certas frutas como matéria prima para a produção de alguns alimentos que podem ser incluídos na alimentação humana. Nesse trabalho observou-se que a utilização de resíduos, empregado a levedura *Yarrowia lipolytica* para a produção de enzimas, pode ser um processo simples e bastante promissor no que diz respeito à produção de enzimas com extensas aplicações na indústria de alimentos e que dispense altos custo de produção.

REFERÊNCIAS

- [1] Carvalho, P. O.; Calafatti, M. M., Silva, D. M.; Contesini, F. J.; Bizaco, R.; (2005) Quim. Nova, Vol. 28, No. 4, 614-621.
- [2] Coelho, Z. A. M. Amaral, F. F. P. Belo, I. (2010). *Yarrowia lipolytica*: an industrial workhorse. Current Research, Technology and Education Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology, 930-944.
- [3] Coelho M. A. Z., Leite, S. G. F., Rosa, M. D. F., Furtado, A. A. L. (2001). Aproveitamento de resíduos agroindustriais: produção de enzimas a partir da casca de coco verde. Boletim do Centro de
- [4] Pesquisa e Processamento de Alimentos, 19(1), 37-42.
- [5] Costa, U. E. V.; Amorim, N. L. H.; (1999). O emprego de lipases como agentes de resolução cinética de enantiômeros em síntese orgânica: aspectos gerais sobre a influência do solvente. Instituto de Química Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 22(6), 91501-970.
- [6] Cotteril, I. C.; Sutherland, A.G.; Roberts, S.M.; (1991) J. Chem. Soc. Perkin. Trans., 1, 6, 1365-1368.
- [7] Evangelista, J. (2008). Tecnologia de Alimentos. (2. Ed.). São Paulo: Atheneu.
- [8] Faber, K.; Kroutil, W.; (2005), Curr. Opin. Chem. Biol., 9, (2): 181-187.
- [9] Gonçalves, F. A. G.; Colen, G.; Takahashi, J. A.; (2014) *Yarrowia lipolytica* and Its Multiple Applications in the Biotechnological Industry, Volume 2014, Article ID 476207.
- [10] Messias, J. M., da Costa, B. Z., de Lima, V. M. G., Giese, E. C., Dekker, R. F. H., & de Melo Barbosa, A. (2011). Lipases microbianas: Produção, propriedades e aplicações biotecnológicas. Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas, 32(2), 213-234.
- [11] Koblitz, M. G. B. (2008) Bioquímica de alimentos: teoria e aplicações práticas. (1. ed.), Guanabara.
- [12] Lima, V. M. G.; “Produção e Purificação da Lipase de *Bacillus megaterium* CCOC-P2637 e sua Aplicação em Biocatálise em Solventes Orgânicos”, Tese de Doutorado. Departamento de Bioquímica – UFPR, 2004.
- [13] Lima, V. M. G., Krieger, N., Mitchell, D. A., Fontana, J. D.; (2004) Biochem. Eng. J., 18 (1), 65-71.
- [14] Ordóñez, J. A. (2005). Tecnologia de alimentos: componentes dos alimentos e processos. (1. ed.). Porto Alegre: Artmed.
- [15] Paques, F.W.; Macedo, G. A.; (2006) Quím. Nova, 29, 1, 93-99.
- [16] Silva, W. O. B., Mitidieri, S., Schrank, A., Vainstein, M. H.; (2005) Process Biochem. 40, 1, 321-326.
- [17] Souza D.G.; Rocha, C. M. M.; Lima, J. M. M.; Silva, C.A. A. (2013). Detecção de lipase por cepa de *Rhizopus arrhizus* var. *arrhizus*. Resumos Expandidos do I CONICBIO. v (2).
- [18] Zanotto, S. P.; Romano, I. P.; Lisboa, L. U. S., Duvoisin Jr, S.; Martins, M. K., Lima, F. A., Silva, S. F., Albuquerque, P. M., (2009), J. Braz. Chem. Soc., 20, 6, 1046-1059.
- [19] The Novozymes Latin America Ltda disponível em <http://www.novozymes.com.br>. (b) Amano Enzym Inc. Disponível em amano.co.jp

Capítulo 21

Aproveitamento de resíduos agroindustriais na alimentação humana

Antonio Manoel Maradini Filho

Luísa Oliveira Mendonça

Nicolý da Silveira Menditi

Resumo: Nos últimos anos vários órgãos governamentais e muitas indústrias vem demonstrando crescente preocupação com o meio ambiente no sentido de diminuir ou buscar formas de aproveitamento de resíduos sólidos gerados pela maioria dos processos agroindustriais. As elevadas quantidades de subprodutos agroindustriais gerados quando não reaproveitados, acabam sendo descartados ao meio ambiente e por apresentarem alta composição orgânica, esses descartes representam fontes de sérios problemas. Esses resíduos apresentam quantidades apreciáveis de cascas, bagaços, caroços e sementes que representam importante fonte de matéria orgânica, além de fornecerem nutrientes como proteínas, fibras, óleos essenciais, vitaminas e minerais e outras substâncias biologicamente ativas benéficas à saúde humana como antioxidantes, compostos fenólicos, fitormônios entre outros. A uva é utilizada na indústria alimentícia na elaboração de vinhos, sucos, geleias e uva passas, gerando muito resíduo, que normalmente não é aproveitado como deveria, deixando assim, de agregar valor a um produto com grande potencial de utilização. O gergelim (*Sesamum indicum* L.) é uma das primeiras espécies de oleaginosas domesticadas pelo homem, sendo na atualidade uma das dez principais oleaginosas do mundo. A torta ou farelo do gergelim obtido da prensagem dos grãos para a extração do óleo tem excelente composição de aminoácidos importantes, tais como metionina, cistina, arginina e leucina, e pode se constituir em uma excelente fonte de proteínas e de fibras alimentares. Uma das áreas com maior interesse de estudo e inovação na indústria de alimentos é a de formulação de produtos nutritivos, saudáveis e sensorialmente agradáveis, com efeitos fisiológicos benéficos. A elaboração de diversos produtos de panificação tais como pães, bolos, massas, barras de cereais e biscoitos a partir de misturas de farinha de trigo com outras farinhas obtidas a partir de subprodutos agroindustriais vêm demonstrar a viabilidade da utilização de matérias-primas de baixo valor agregado, disponibilizando nova opção de produtos mais nutritivos e saudáveis e podendo proporcionar ainda o aumento de renda dos pequenos produtores rurais.

Palavras-chave: farinha de bagaço de uva; farelo de gergelim; produtos de panificação; coprodutos agroindustriais; novos produtos.

1. INTRODUÇÃO

Tem-se observado nos últimos anos uma atenção especial no sentido de diminuir ou buscar formas de aproveitamento de resíduos sólidos gerados pela maioria dos processos agroindustriais. Esses resíduos provenientes da indústria de alimentos apresentam quantidades apreciáveis de cascas, bagaços, caroços, sementes, entre outros. De acordo com Coelho et al. (2001) esses materiais representam importante fonte de matéria orgânica, além de fornecerem nutrientes como proteínas, fibras, óleos essenciais, vitaminas e minerais e outras substâncias biologicamente ativas, benéficas à saúde humana, como antioxidantes, compostos fenólicos, fitormônios e outros.

Vários órgãos governamentais e muitas indústrias vem demonstrando crescente preocupação com o meio ambiente, mobilizando vários segmentos do mercado, no sentido de criar e aplicar uma política ambiental que diminua os impactos negativos à natureza. Os resíduos industriais, depois de gerados, necessitam de destino e tratamento adequados, pois, além de criar potenciais problemas ambientais, esses resíduos representam perdas de matérias-primas e energia que poderiam ser (re)aproveitados, exigindo, ainda, investimentos significativos em seu tratamento e disposição final para diminuir a poluição (PELIZER, et al., 2007).

Segundo Pelizer, et al., (2007) muito se tem falado atualmente em Gestão Ambiental e certificação da ISO 14000, conjunto de normas que determinam diretrizes para garantir que o desenvolvimento de atividades dos mais diversos segmentos sejam realizadas sem transgredir as leis ambientais vigentes, visto que, os principais países desenvolvidos estão, cada vez mais, preocupados principalmente com o meio ambiente e a sustentabilidade do planeta.

Essa preocupação com o meio ambiente tem levado ao estudo e à viabilização de projetos que visam à sustentabilidade do sistema de produção industrial. A indústria de alimentos produz uma série de resíduos com alto valor de utilização (PELIZER et al., 2007).

Inúmeros estudos utilizando resíduos industriais do processamento de alimentos têm sido realizados com objetivo de seu aproveitamento, minimizando o impacto ambiental dessas indústrias na região onde estão situadas e ainda agregando valor aos produtos do mercado (PELIZER et al., 2007).

Lallo et al. (2003) estudaram a possibilidade de substituição da silagem de milho pela silagem de resíduo industrial de abacaxi em ração de gado de corte. Ferrari et al. (2004) realizaram um estudo para caracterizar e verificar o melhor aproveitamento das sementes excedentes do processamento do suco do maracujá na alimentação humana. Borges et al. (2004) desenvolveram um estudo sobre a viabilidade da utilização de resíduos das indústrias de conserva de abacaxi da região de Pelotas – RS para a produção de suco.

Kobori e Jorge (2005) realizaram um estudo, cuja finalidade foi caracterizar os óleos extraídos das sementes de laranja, maracujá, tomate e goiaba, como aproveitamento de resíduos industriais. Segundo os autores as análises realizadas indicaram que esses óleos possuem características físico-químicas semelhantes a alguns óleos comestíveis, podendo ser uma nova fonte de óleos para o consumo humano.

Reda et al. (2005) fizeram a caracterização dos óleos essenciais de limão rosa e de limão siciliano, considerados resíduos industriais e concluíram que apresentam propriedades semelhantes aos dos óleos comestíveis com boa perspectiva de utilização na produção de alimentos.

Outros trabalhos estudaram a bioutilização de vários resíduos como: palha de trigo (ABDULLAH et al. 1985), resíduos da batata doce (YANG et al. 1993), polpa de maçã residual da indústria de suco (JOSHI e SANDHU 1996) e o bagaço de cana-de-açúcar (MONTEIRO et al., 1991; BRAVO et al., 1994; PELIZER et al., 2007) para enriquecimento proteico de ração animal.

2. UTILIZAÇÃO DA FARINHA DO BAGAÇO DE UVA NA ELABORAÇÃO DE MUFFINS

O Brasil cultiva basicamente duas espécies de uva, *Vitis vinífera*, que é destinada principalmente à elaboração de vinhos e outros produtos finos e *Vitis labrusca*, destinada à produção de vinhos de mesa, sucos e seus derivados, além do consumo *in natura* correspondendo a 80% da produção nacional (SAUTTER, 2003; CAMARGO e NACHTIGAL, 2007).

A uva é uma das frutas mais consumidas em todo o mundo, seja na forma *in natura* ou processada e recebe grande atenção como uma fonte importante de compostos ativos biologicamente, que são benéficos à saúde humana (SHRIKHANDE, 2000; ORAK, 2007).

É composta basicamente de açúcares, ácidos, pectinas, gomas, compostos aromáticos e compostos fenólicos e durante a maturação sofrem um acréscimo de alguns destes constituintes como os açúcares, ácidos, compostos fenólicos, vitaminas e minerais, que são responsáveis pelo crescimento da baga da uva, acúmulo de açúcares, formação de taninos, diminuição de ácidos e por consequência, formação de aromas (PEIXOTO, 2000).

Do total de produtos industrializados elaborados a partir da uva, especialmente de cultivares de *Vitis labrusca*, 77% representam os vinhos de mesa, 9% são sucos de uva e os restantes são doces, geleias, graspa, entre outros. Grande parte da produção brasileira de uvas e derivados é destinada ao mercado interno. O suco de uva é o principal produto de exportação, em volume, representando cerca de 15% do total destinado ao mercado externo. Apenas 5% da produção de uvas de mesa é destinada à exportação e menos de 1% dos vinhos produzidos são comercializados fora do país (IBRAVIN, 2010).

O Brasil produz grande quantidade de subprodutos da industrialização da uva a cada safra, representando cerca de 10% a 15% do total vinificado, porém, estes são praticamente desprezados (WENDLER, 2009). Os principais subprodutos obtidos na vinificação sofrem separações nas etapas de esmagamento e prensagem das uvas e somente reduzidas quantidades destes são aproveitadas (TORRES et al., 2002 citado por ROCKENBACH, 2008).

Segundo Rockenbch (2008) os subprodutos, representados pelo bagaço, obtidos na indústria vinícola correspondem a 20% do total do fruto, podendo ser reaproveitados para produção de alimentos nutritivos ricos em antioxidantes naturais e fibras.

Os subprodutos da vinificação são o bagaço, as sementes, a casca, resíduos da polpa da uva (borra), folhas e engaço, sendo resultado do esmagamento da baga por um processo tecnológico adequado de separação do suco ou mosto. O bagaço é, portanto, obtido por meio das prensagens das partes sólidas da uva e do mosto, que constituem a matéria-prima da vinificação. Representa 12% a 15% em peso da matéria-prima inicial, sendo composto por açúcares e outros glicídios, proteínas e fibras e, nas sementes encontra-se um alto teor lipídico (SILVA et al., 2001; SILVA et al., 2005).

Mesmo depois da extração do suco ou da elaboração do vinho, os resíduos ainda contêm compostos como antioxidantes, açúcares e outros glicídios, proteínas, corantes entre outros, com atividades potencialmente funcionais, que evidenciam seu elevado potencial para a sua utilização no desenvolvimento de novos produtos destinados ao consumo humano (CAMPOS, 2005; SILVA et al., 2005; FERRARI, 2010).

De acordo com Araújo (2010) citado por Perin e Schott (2011), a farinha obtida dos subprodutos da uva possui um alto teor de fibras e alta quantidade de flavonoides e, assim como a uva, representa uma importante fonte de antioxidantes naturais, servindo para combater os radicais livres, prevenindo doenças degenerativas. Desta forma, a farinha do bagaço de uva pode ser utilizada na elaboração de diversos produtos como biscoitos, pães, bolos, barras de cereais, massas caseiras, vitaminas e sucos.

A farinha de uva auxilia ainda no tratamento de doenças circulatórias, diminui o aparecimento de varizes, auxilia na prevenção de problemas cardiovasculares, na prevenção da artrite, ajuda a minimizar danos no fibroma, e no combate de doenças de pele, como psoríase e eczema (ARAÚJO, 2011).

O uso de farinhas compostas empregadas em produtos panificados não é recente e vem se expandindo cada vez mais, sendo utilizada na elaboração de bolos e biscoitos, uma vez que estes produtos apresentam uma alta aceitabilidade, sendo consumido por pessoas de diferentes faixas etárias (EL-DASH, CABRAL e GERMANI, 1994).

A viabilidade técnica e econômica do uso de farinhas mistas em produtos panificados é bem empregada no setor industrial alimentício. Uma das tecnologias mais empregadas consiste na secagem de resíduos para obtenção de farinha como ingrediente alimentar para posterior incorporação nos mais diversos alimentos, objetivando a substituição parcial ou até total à farinha de trigo (ABUD et al., 1994; MATIAS et al., 2005).

Atualmente, a forma de aproveitamento dos subprodutos das indústrias de sucos e vinhos brasileiras é a produção de ração animal e adubos após passarem por um processo de compostagem (MARASCHIN et al., 2002).

As elevadas quantidades de subprodutos agroindustriais gerados quando não reaproveitados, acabam sendo descartados ao meio ambiente e por apresentarem alta composição orgânica, esses descartes representam fontes de sérios problemas. A liberação excessiva de nutrientes como o fósforo e nitrogênio pela matéria orgânica, pode causar eutrofização de ambientes aquáticos, com consequente redução de oxigênio dissolvido, ocasionando a morte de organismos aeróbios e assim causando o desequilíbrio do ecossistema local (PELTZER et al., 2008).

Assim, cresce a preocupação com os impactos ambientais e com os índices de desperdícios elevados causados por indústrias alimentícias, aumentando o interesse de pesquisas a fim de encontrar alternativas viáveis para o aproveitamento do subproduto na elaboração de produtos para o consumo humano (GARMUS et al., 2009 citado por FAVARIN, 2012).

2.1. UTILIZAÇÃO DO RESÍDUO DA EXTRAÇÃO DE ÓLEO OU DE SÓLIDOS SOLÚVEIS DE GERGELIM NA ELABORAÇÃO DE BISCOITOS

Nos últimos anos o gergelim tem despertado o interesse de produtores e empresários brasileiros que buscam uma cultura alternativa para alimentação e exploração agrícola viável. É um alimento de alto valor nutricional, rico em óleo e proteínas, possuindo também função alimentar. Seus grãos possuem diversas aplicações na indústria de fármacos, cosméticos e óleo-química. A torta obtida da prensagem dos grãos se constitui em excelente concentrado para alimentação animal. Devido a sua tolerância à seca e facilidade de cultivo, apresenta alto potencial agrônomo. É uma cultura que se insere tanto nos tradicionais sistemas de cultivo como na agricultura sustentável e orgânica (EMBRAPA, 2000).

Uma das áreas com maior interesse de estudo e inovação na indústria de alimentos é a de formulação de produtos nutritivos, saudáveis e sensorialmente agradáveis, com efeitos fisiológicos benéficos. Com muitas vantagens e diferenças dos alimentos convencionais, o mercado para esses produtos conhecidos como “alimentos funcionais” está crescendo constantemente em todo o mundo (KONG et al., 2014).

A torta de gergelim é um subproduto da indústria do óleo que pode ser recuperada e utilizada como um produto de alto valor agregado. Entretanto, em diversos países produtores dessa semente, esse subproduto é, em geral, descartado ou usado como ração animal. Estudos recentes revelam que uma quantidade significativa de antioxidantes está presente na torta de gergelim. Sendo assim, esse produto está sendo subaproveitado, fato este, já ressaltado por diferentes autores (SUJA et al., 2004; SUJA et al., 2005; MOHDALY et al., 2010; RESHMA et al., 2010; MOHDALY et al., 2011).

2.3. O GERGELIM

O gergelim (*Sesamum indicum* L.) é uma espécie de oleaginosa, que pertence à família pedaliácea. Suas sementes são pequenas, apresentando formato achatado e coloração variando do branco ao preto. A semente de gergelim é um cultivo mundialmente difundido devido ao seu alto teor de gorduras, sendo a nona oleaginosa mais cultivada mundialmente (NAMIKI, 1995; BELTRÃO e VIEIRA 2001).

De acordo com Barros e Santos (2002) o cultivo do gergelim apresenta grande potencial econômico devido às possibilidades de exploração, podendo ser usado pelas indústrias de alimentos, química e farmacêutica.

As sementes de gergelim podem ser consumidas *in natura* ou utilizadas para complementar produtos confeitados, como os de panificadoras. É rica em constituintes minerais, principalmente cálcio, ferro, fósforo, potássio, magnésio, zinco e selênio, conforme Namiki (1995).

Segundo levantamento estatístico feito pelo IICA (2004), 88% do comércio mundial deste produto é de sementes, seguido pela torta (8%) e óleo com 4%. A principal demanda de gergelim provém da indústria alimentícia, sendo que 70% da produção, na maioria dos países importadores, são utilizadas para a elaboração de óleo e farinha.

O gergelim é originário da África, sendo que neste continente encontra-se a maioria das espécies silvestres do gênero *Sesamum*. Na Ásia, por sua vez, é encontrada a maioria das espécies cultivadas. No Brasil, essa semente foi introduzida pelos portugueses no século XVI, sendo plantada, tradicionalmente, na Região Nordeste para consumo local.

Atualmente, o gergelim vem sendo explorado comercialmente no Centro-Oeste e Sudeste, especialmente no Estado de São Paulo, para atender o segmento agroindustrial de óleos e de alimentos in natura (ARAÚJO et al., 2006).

A cultura do gergelim apresenta excelente potencial econômico, agrônômico e social graças às suas características de tolerância à seca, facilidade de manejo e à obtenção de sementes com teores de óleo superior a 50%, com elevada estabilidade química (ARAÚJO et al., 2006).

A importância econômica dessa semente vem crescendo gradualmente, devido às descobertas de novas formas de aproveitamento do grão e de seus subprodutos. O mercado do gergelim é sempre crescente, nos setores de panificação e de biscoitos (BARROS e SANTOS, 2002).

Esse aumento crescente, no que se refere à popularização do consumo de gergelim no Brasil se iniciou na década de 1980, com a instalação da rede norte-americana de fast-food McDonald's® no país. As sementes de gergelim são colocadas na parte superior dos pães utilizados nos sanduíches dessa rede de lanchonetes. Dessa forma, a sua utilização em pães alavancou o consumo que, desde então, passou a crescer à razão de 10% ao ano, tendo em vista que diversas padarias começaram a usar o gergelim na elaboração dos mais diversos tipos de pães, bolos e biscoitos, mas ainda assim a utilização da semente e dos subprodutos de gergelim apresenta-se baixo (ARRIEL et al., 2009).

2.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS E NUTRICIONAIS DAS SEMENTES

O gergelim desempenha um importante papel na nutrição humana. Suas sementes são usadas principalmente para produção de óleo, mas também na produção de pasta (Tehineh) e em formulações de alguns alimentos (ELLEUCH et al., 2014).

Essa oleaginosa possui alto valor nutritivo, devido à quantidade elevada de proteínas, lipídeos, sais minerais e vitaminas importantes (KAYA et al., 2008).

Segundo Elleuch et al (2014) a composição química do gergelim comprova que a semente é uma importante fonte de lipídeos (44-58%), proteínas (18-25%), carboidratos (13,5%) e cinzas (5%).

O óleo que é extraído das sementes é muito rico em ácidos graxos insaturados, principalmente o oleico (41-45%) e o linoleico (31-42%) (HWANG e SHYU, 2001). É um óleo especial e muito procurado, devido a sua estabilidade química. Alimentos produzidos com o óleo de gergelim ficam livres de rancidez num período dez vezes maior do que aqueles fabricados com qualquer outro óleo vegetal conhecido (FIRMINO, 2001).

Também podem ser destacados como principais minerais presentes nas sementes de gergelim, o cálcio, fósforo e ferro. A maior quantidade desses minerais e outros micronutrientes do gergelim se localizam na casca, ocasionando perdas quando é feita a retirada dessa camada protetora das sementes (ARRIEL et al., 2009).

Os teores de fenólicos do gergelim ficam em torno de 700 mg 100 g⁻¹ de acordo com Rangkadilok et al. (2010). Valores inferiores (em torno de 260 mg 100 g⁻¹) foram encontrados por Silva et al. (2011). Mohdaly et al. (2010) realizaram um estudo utilizando torta de gergelim e obtiveram valores ainda menores de fenólicos totais, 81 mg 100 g⁻¹.

2.5. O RESÍDUO DE GERGELIM (“TORTA DE GERGELIM”)

A torta de gergelim é um subproduto da indústria do óleo e do extrato hidrossolúvel que pode ser recuperada e utilizada como um produto de alto valor agregado. No entanto, em diversos países produtores dessa semente, esse subproduto é, em geral, descartado ou usado como ração animal. Estudos recentes revelam que uma quantidade significativa de antioxidantes está presente na torta de gergelim. Desta forma, esse produto está sendo subaproveitado, como ressaltado por diferentes autores (SUJA et al., 2004; SUJA et al., 2005; MOHDALY et al., 2010; RESHMA et al., 2010).

Em relação aos aspectos industriais e ambientais é fundamental o reaproveitamento dos resíduos industriais, visando melhor aplicação da matéria-prima e consequente redução de poluentes ao meio ambiente (PRIMO, 2008).

Vários estudos tem sido realizados com o objetivo de aumentar a utilização dos resíduos gerados pelas indústrias tanto para geração de energia como para a alimentação humana e animal (PRIMO, 2008).

Durante a extração do óleo das sementes de gergelim, quando realizada a frio e sem uso de solventes (prensagem a frio dos grãos), gera-se como subproduto a torta, que ainda apresenta uso muito restrito, mas de acordo com alguns autores pode ser utilizada para fins alimentícios por apresentar excelentes características nutricionais (BELTRÃO e VIEIRA, 2001; MILANI et al., 2005).

A torta constitui também excelente concentrado proteico para a alimentação de bovinos, suínos e aves (BELTRÃO e VIEIRA, 2001; PRIMO, 2008).

De acordo com Morrison (1966) o resíduo da prensagem das sementes de gergelim apresenta elevado teor proteico, elevada concentração de aminoácidos e baixo teor de fibras (Tabela 1).

Tabela 1- Composição média da torta de gergelim.

Constituintes	%
Umidade	8,2
Lipídeos	12,8
Proteínas	39,7
Carboidratos	22,8
Fibras	4,7
Cinzas	11,8

Fonte: Morrison (1966).

A literatura sobre a utilização da torta de gergelim na alimentação de humanos ou animais ainda é muito escassa.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O bagaço da uva, como subproduto, possui uma rica composição nutricional e funcional. Tal fato favorece sua utilização, como exemplo, na elaboração de farinhas que poderão permitir o enriquecimento de diversos produtos em termos de nutrientes e ainda aumentar o faturamento das indústrias vinícolas, além de prevenir a poluição ambiental por meio do resíduo gerado.

O resíduo de gergelim, conhecido como “torta”, obtido durante o processo de extração do óleo ou da produção do extrato hidrossolúvel de sua semente, é um subproduto de baixo valor de mercado, mas rico em proteínas com alto valor nutritivo, alta taxa de eficiência proteica e adequado perfil de aminoácidos essenciais, além de excelente fonte de fibras alimentares e antioxidantes naturais, sugerindo ser uma potencial fonte de proteína vegetal de baixo custo para a alimentação humana. Além disso, o extrato hidrossolúvel do gergelim como substituto do leite de origem animal é uma alternativa para que pessoas intolerantes à lactose possam consumir o produto. Desta forma, acredita-se ser uma alternativa viável o aproveitamento desse resíduo na formulação de alimentos, tais como bolos, pães e biscoitos, a fim de torná-los com maior valor nutricional e menor custo, trazendo mais saúde e qualidade de vida para quem os consumir.

REFERÊNCIAS

- [1] ABDULLAH, A. L.; Tengerdy, R. P.; Murthy, V. G. Optimization of solid substrate fermentation of wheat straw. *Biotechnology and Bioengineering*, v. 27, p.20-27, 1985.
- [2] ABUD, A. K. S.; Santos, M. N.; Silva, R. P. Obtenção da Farinha da Semente da Jaca: Estudo de sua Viabilidade em Substituição à Farinha de Trigo. In: Congresso Brasileiro de Fruticultura, 13, 1994, Salvador. Anais... Jaboticabal: SBF, v. 3, p.1069-1069.

- [3] ARAÚJO, L. Farinha de uva: benefícios. 2011. Disponível em: <http://naturalervas.blospot.com.br/2011/02/farinha-de-uva-beneficios-posted-on-11.html>. Acesso em: 05 de out. 2015.
- [4] ARAÚJO, A. E. D.; Soares, J. J.; Beltrão, N. E. D. M.; Firmino, P. D. T. Cultivo do gergelim. Campina Grande, PB: Embrapa, 2006.
- [5] ARIEL, N. H. C.; DI Mauro, A. O.; Zingaretti, S. M.; Bakke, O. A.; Trevisoli, S. H. U.; Costa, M. M.; Capeloto, A.; CORRADO, A. R. Técnicas multivariadas na determinação da diversidade genética em gergelim usando marcadores RAPD. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 41, n. 5, p. 801-809, maio 2009.
- [6] BARROS, M. A. L.; Santos, R. B. Situação do Gergelim nos Mercados Mundial e Nacional, 1995 a 2002. Ministério da agricultura, pecuária e abastecimento- Circular 67, Campina Grande, 2002.
- [7] BELTRÃO, N. E. M.; Vieira, D. J. R. O agronegócio do gergelim no Brasil. Embrapa Algodão, Campina Grande, PB. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2001. 348p.
- [8] BORGES, C. D.; Chim, J. F.; Leitão, A. M.; pereira, E; Luvielmo, M. M. Produção de suco de abacaxi obtido a partir dos resíduos da indústria conserveira. Boletim CEPPA, v. 22, n. 1, p. 23-34, 2004.
- [9] BRAVO, O.; FERRER, A.; Aiello, C.; Ledesma, A.; Dávila, M. Growth of *Chaetomium cellulolyticum* in solid-state fermentation of sugar cane bagasse treated with water and alkali at several liquid/solid ratios. Biotechnology Letters, v. 16, n. 8, p. 865-870, 1994.
- [10] CAMARGO, U. A.; Nachtigal, J. C. Recomendações para produção de videiras em sistemas de base ecológica. Embrapa Uva e Vinho, 2007. Disponível em: <http://www.cnpuv.embrapa.br/publica/documentos/doc065.pdf>. Acesso em: 20 de set. 2015.
- [11] CAMPOS, L. M. A. S. de. Obtenção de extratos de bagaço de uva *Cabernet Sauvignon* (*Vitis vinifera*): Parâmetros de processo e modelagem matemática. 2005. 123f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Alimentos), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.
- [12] COELHO, M. A. Z.; Leite, S. G. F.; Rosa, M. F.; Furtado, A. A. L. Aproveitamento de resíduos agroindustriais: produção de enzimas a partir da casca de coco verde. Boletim CEPPA, Curitiba, v. 19, n. 1, p. 33-42, 2001.
- [13] EL-DASH, A. A.; Cabral, L. C.; Germani, R. Uso de farinha mista de trigo e soja na produção de pães. In: EMBRAPA. Coleção Tecnologia de Farinhas Mistas. Brasília: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, v. 3, 1994.
- [14] ELLEUCH, M.; Bedigian, D.; Maazoun, B.; Besbes, S.; Blecker, C.; ATTIA, H. Improving halva quality with dietary fibers of sesame seed coats and date pulp, enriched with emulsifier. Food Chemistry, v. 145, p. 765–771, febr. 2014.
- [15] EMBRAPA. Gergelim – Apresentação do Produto. 2000. Disponível em: <http://www.embrapa.br/produtos/gergelim>. Acesso em: 10/10/2015.
- [16] FAVARIN, F. R.; Stork, C. R.; Rodrigues, A. C.; Bosi, G. F.; Basso, C. Caracterização bromatológica de resíduos da produção de suco in natura. In: XVI SEPE – Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão – Aprender e empreender na educação e na ciência, Santa Maria, v. 3, 2012.
- [17] FERRARI, V. A sustentabilidade da vitivinicultura através de seus próprios resíduos. 2010, 26f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas), Universidade de Caxias do Sul, 2010.
- [18] FERRARI, R. A.; Colussi, F.; Ayub, R.A. Caracterização de subprodutos da industrialização do maracujá - Aproveitamento das sementes. Revista Brasileira de Fruticultura, v. 26, n. 1, p. 101-102, 2004.
- [19] FIRMINO, P. T. Caracterização química de semente de gergelim (*Sesamum indicum* L.) BRS 196 (CNPA G-4). EMBRAPA-CNPA, Instrução Técnica nº 117, Campina Grande, 2001. 2p.
- [20] HWANG, L. S.; SHYU, Y-S. Antioxidative activity of the crude extract of lignin glycosides from unroasted Burma black sesame meal. Food Research International, v. 40, n. 5, p. 357-365, jul. 2001.

- [21] IBRAVIN. Instituto Brasileiro de Vinhos. A vitivinicultura brasileira. 2010. Disponível em <http://www.ibravin.org.br/brasilvitivinicola.php>. Acesso em: 10 de out. 2015.
- [22] (IICA) INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA (IICA). Cadena Agroindustrial del Ajonjolí de Nicaragua. Managua, Nicaragua, 2004. 91 p.
- [23] KAYA, S.; Deniz, C.; Kahyaoglu T.; Kapucu S. Colloidal stability and rheological properties of sesame paste. *Journal of food Engineering*, v. 87, n. 3, p. 428-435, Aug. 2008.
- [24] KOBORI, C. N. e Jorge, N. Caracterização dos óleos de algumas sementes de frutas como aproveitamento de resíduos industriais. *Ciência e Agrotecnologia*, v. 29, n. 5, p. 1008-1014, 2005.
- [25] KONG, W.; WEI, R.; Logrieco, A. F.; WEI, J.; WEN, J.; XIAO, X.; YANG, M. Occurrence of toxigenic fungi and determination of mycotoxins by HPLC-FLD in functional foods and spices in China markets. *Food Chemistry*, v. 146, n. 4, p. 320-326, 2014.
- [26] JOSHI, V. K. e Sandhu, D. K. Preparation and evaluation of an animal feed byproduct produced by solid-state fermentation of apple pomace. *Bioresource Technology*, v. 56, n. 2-3, p. 251-255, 1996.
- [27] LALLO, F. H.; Prado, I.N.; Nascimento, W.G.; Zeoula, L.M.; Moreira, F.B.; Wada, F. Y. Níveis de substituição da silagem de milho pela silagem de resíduos industriais de abacaxi sobre a degradabilidade ruminal em bovinos de corte. *Revista Brasileira de Zootecnia*, v. 32, n. 3, p. 719-726, 2003.
- [28] MARASCHIN, R. P.; Ianssen, C.; Vendruscolo, L. F.; Dias, P. F.; CARO, M. S. B.; Maraschin, M. Biomassa residual proveniente da indústria viti-vinícola: Perspectivas de aproveitamento. *Biotechnologia Ciência & Desenvolvimento*, Florianópolis, v. 29, n. 5, p. 142-145, nov-dez, 2002.
- [29] MATIAS, M. F. O.; Oliveira, E. L.; Margalhães, M. M. A.; Gertrudes, E. Use of fibers obtained from the cashew (*Anacardium occidentale*, L) and guava (*Psidium guajava*) fruits for enrichment of food products. *Brazilian Archives of Biology and Technology*, Curitiba, v. 48, Special number, June, p. 143-150, 2005.
- [30] MILANI, M.; GONDIM, T. M. S.; COUTINHO, D. Cultura do Gergelim, Circular Técnica 83, Campina Grande, p. 1-10, 2005.
- [31] MOHDALY, A. A. A.; Smetanska, I.; Ramadan, M. F.; Sarhan, M. A.; e Mahmoud, A. Antioxidant potential of sesame (*sesamum indicum*) cake extract in stabilization of sunflower and soybean oils. *Industrial Crops and Products*, v. 34, n. 1, p. 952- 959, 2011.
- [32] MOHDALY, A. A. A.; Sarhan, M. A.; smetanska, I.; Mahmoud, A. Antioxidant properties of various solvent extracts of potato peel, sugar beet pulp and sesame cake. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, v. 90, n. 2, p. 218-226, 2010.
- [33] MONTEIRO, J. B. R.; Silva, D. O.; Moraes, C. A. Produção de biomassa proteica de *Trichoderma reesei* e *Rhizopus oligosporus* em bagaço de cana-de-açúcar. *Revista de Microbiologia*, v. 22, n. 2, p. 164-169, 1991.
- [34] MORRISON, F.B.; Alimentos e alimentação dos animais. São Paulo: Melhoramentos, 1966. 892p.
- [35] NAMIKI, M. The chemistry and physiological functions of sesame. *Food Reviews International*, v. 11, n. 2, p. 281-329, 1995.
- [36] ORAK, H. H. Total antioxidant activities, phenolics, anthocyanins, polyphenoloxidase activities of selected red grape cultivars and their correlations. *Scientia Horticulturae*, v. 111, n. 3, p. 235-241, 2007.
- [37] PEIXOTO, C. Enologia e outras bebidas. 2000, 46p. Disponível Em: <http://opac.iefp.pt:8080/images/winlibimg.exe?key=&doc=69677&img=705>. Acesso em: 26 de set. 2015.
- [38] PELIZER, L. H.; Pontieri, M. H.; Moraes, I. O. Utilização de resíduos agro-industriais em processos biotecnológicos como perspectiva de redução do impacto ambiental. *Journal of Technology Management & Innovation*, v. 2, n. 1, p. 118-127, 2007.
- [39] PELTZER, P. M.; Lajmanovich, R. C.; Sánchez-Hernandez, J. C.; Cabagna, C. C.; Attademo, A. M.; Bassó, A. Effects of agricultural pond eutrophication on survival and health status of *Scinax nasicus tadpoles*. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, Zabrze, v. 70, n. 1, p. 185-197, 2008.

- [40] PERIN, E. C.; Schott, I. B. Utilização de farinha extraída de resíduos de uva na elaboração de biscoito tipo *cookie*. 2011. 61f. Trabalho de conclusão de Curso (Bacharelado em Tecnologia em Alimentos), Universidade Federal Tecnológica do Paraná, Francisco Beltrão, 2011.
- [41] PRIMO, A. P. Torta de gergelim na alimentação de frangos de corte. 2008, 59f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2008.
- [42] RANGKADILOK, N.; Pholphana, N.; Mahidol, C.; WONGYAI, W.; Saengsooksree, K.; Nookabkaew, S.; SATAYAVIVAD, J. Variation of sesamin, sesamol and tocopherols in sesame (*sesamum indicum* L.) seeds and oil products in Thailand. *Food Chemistry*, v. 122, n. 3, p. 724-730, 2010.
- [43] REDA, S. Y.; LEAL, E. S.; BATISTA, E. A. C.; BARANA, A. C.; SCHNITZEL, E.; CARNEIRO, P. I. B. Caracterização dos óleos das sementes de limão rosa (*Citrus Limonia* Osbeck) e limão siciliano (*Citrus limon*), um resíduo agroindustrial. *Ciência e Tecnologia de Alimentos*, v. 25, n. 4, p. 672-676, 2005.
- [44] RESHMA, M. V.; Balachandran, C.; Arumughan, C.; Sunderasan, A.; Sukumaran, D.; Thomas, S.; Saritha, S. S. Extraction, separation and characterization of sesame oil lignin for nutraceutical applications. *Food Chemistry*, v. 120, n. 4, p. 1041-1046, 2010.
- [45] ROCKENBACH, I. I. Compostos Fenólicos, Ácidos Graxos e Capacidade Antioxidante do Bagaço da Vinificação de Uvas Tintas (*Vitis vinifera* e *Vitis labrusca*). 2008. 112f. Dissertação (Mestrado em Ciência dos Alimentos), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.
- [46] SAUTTER, C. K. Avaliação da presença de resveratrol em suco de uva. 2003. 135f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia dos Alimentos), Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2003.
- [47] SHRIKHANDE, A. J. Wine by-products with health benefits. *Food Research International*, v. 33, n. 6, p. 469-474, 2000.
- [48] SILVA, G. B.; Motebeller, D. C.; Nunes, S. P.; Saraiva, S. H.; Teixeira, L. J. Q.; Junqueira, M. S.; Sartori, M. A. Influência da temperatura no processo de maceração para produção de extrato hidrossolúvel de gergelim. XVI Encontro Latino Americano de Iniciação Científica, outubro, 2012.
- [49] SILVA, E. R.; Martino, H. S. D.; Moreira, A. V. B.; Arriel, N. H. C.; Silva, A. C.; Ribeiro, S. M. R. Capacidade antioxidante e composição química de grãos integrais de gergelim creme e preto. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, Brasília, v. 46, n. 7, p. 736-742, 2011.
- [50] SILVA, S.; MATIAS, A. A.; Duarte, C.; Coelho, A. V.; Bronze, M. R. Identificação de glicosídeos de flavonóis em subprodutos da vinificação por HPLC com diferentes detectores e hifenado com espectrometria de massa. *Ciência Técnica Vitivinícola*, v. 20, n. 1, p. 17-33, 2005.
- [51] SILVA, M. R.; Borges, S.; Martins, K. A. Avaliação química, física e sensorial de biscoitos enriquecidos com farinha de jatobá-do-cerrado e de jatobá-da-mata como fonte de fibra alimentar. *Brazilian Journal of Food Technology*, Campinas, v. 4, p. 163-170, 2001.
- [52] SUJA, K. P.; Abraham, J. T.; Thamizh, S. N.; Jayalekshmy, A.; Arumughan, C. Antioxidant efficacy of sesame cake extract in vegetable oil protection. *Food Chemistry*, v. 84, n. 3, p. 393-400, 2004.
- [53] SUJA, K. P.; Jayalekshmy, A.; Arumughan, C. Antioxidant activity of sesame cake extract. *Food Chemistry*, v. 91, n. 2, p. 213-219, 2005.
- [54] WENDLER, D. F. Sistema de gestão ambiental aplicado a uma vinícola: um estudo de caso. 2009. 176f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção), Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria 2009. Disponível em: http://cascavel.cpd.ufsm.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2817. Acesso em: 10 de out. 2015.
- [55] YANG, S. S.; Jang, H. D.; LIEW, C. M.; Du Preez, J. C. Protein enrichment of sweet potato residue by solid-state cultivation with mono and co-cultures of amylolytic fungi. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*, v. 9, n. 2, p. 258-264, 1993.

Autores

ADRIELLEN SARAÍ DE LIMA GONÇALVES

Graduanda em Farmácia pela Faculdade de farmácia da Universidade Federal do Pará, tendo experiência com análises químicas de produtos alimentícios. Integrante do laboratório de Física Aplicada à Farmácia (LAFFA) da UFPA.

ALLYSON ALLENNON PINHEIRO DO ROSÁRIO

Graduado em Farmácia pela UFPA (2018). Tem experiência com Química de Alimentos e Chás medicinais. Membro do Laboratório de Física Aplicada à Farmácia (UFPA).

ALLYSON ALLENNON PINHEIRO DO ROSÁRIO

Graduado em Farmácia pela Faculdade de farmácia da Universidade Federal do Pará, tendo experiência com análises químicas de produtos alimentícios. Integrante do laboratório de Física Aplicada à Farmácia (LAFFA) da UFPA.

AMANDA MARILIA DA SILVA SANTANA

Doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos -UFPB. Mestra em Ciência e Tecnologia de Alimentos - UFPB. Nutricionista. Docente do Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial, Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, Universidade Federal da Paraíba - Campus III. Bananeiras - PB.

ANA CRISTINA MIRANDA SENNA GOUVÊA

Farmacêutica formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1984), com habilitação em Indústria Farmacêutica (2006) e Indústria e Análise de Alimentos(2008) pela mesma Universidade. Mestre e Doutora em Ciências no programa de Pós- Graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Realizou período Doutorado Sanduíche na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (Portugal). Pós-Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição (PPGAN/UNIRIO) na pesquisa sobre Métodos de Extração de Proteínas. Tem sete anos de experiência em dispensação farmacêutica. Possui também experiência em análises relacionadas ao controle de qualidade dos medicamentos e insumo farmacêutico ativos vegetais, participou de atividades desde aquisição a fabricação de medicamentos, incluindo a amostragem para análises físico-químicas e microbiológicas dos insumos ativos vegetais, e no setor de Garantia da Qualidade, especificamente na seção de Validação e Estabilidade. Tem nove anos de experiência em análises instrumentais com ênfase na área de Cromatografia Líquida e Espectrometria de Massas. Experiência na área de Bioquímica, com atuação em temas relacionados a alimentos funcionais e controle de qualidade de processos com ênfase em monitoramento de compostos bioativos.

ANA PAULA MOISÉS DE SOUSA

Graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Campina Grande (2013) e mestrado em Ciências Naturais e Biotecnologia pela Universidade Federal de Campina Grande (2016). Atualmente, é aluna de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola. Tem experiência em iniciação à docência como monitora bolsista em genética geral. Participou de projetos de pesquisa na área de Biologia Molecular e Biotecnologia atuando nos seguintes temas: bioprospecção de genes, interação molecular planta-patógeno, fermentação semissólida, enriquecimento proteico e tecnologia de alimentos.

ANDRÉA CARDOSO DE AQUINO

Graduação em Engenharia de Alimentos, mestrado em Tecnologia de Alimentos e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Ceará. Professora Adjunto A do Departamento de Engenharia de Alimentos da UFC, ministrando as disciplinas de Operações Unitárias na Indústria de Alimentos II e Tecnologia do Açúcar e Derivados. Coordenadora de projetos de extensão, atuando na capacitação de mulheres carentes de comunidades localizadas na cidade de Fortaleza por meio de cursos sobre elaboração de produtos alimentícios. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, atuando em desenvolvimento de produtos açucarados, substituição de compostos, extração de pigmentos naturais, maceração enzimática, reologia e secagem de polpa de frutas.

ANTONIO DANIEL BURITI DE MACEDO

Graduação em Licenciatura em Química pela Universidade Federal de Campina Grande (2016) e mestrado em Ciências Naturais e Biotecnologia pela Universidade Federal de Campina Grande (2018). Atualmente, é aluno de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos pela Universidade Federal de Campina Grande. Tem experiência em iniciação à docência como monitor em Química Geral I. Participou de projetos de pesquisa na área de Química e Biotecnologia atuando nos seguintes temas: fermentação semissólida, enriquecimento proteico e tecnologia de alimentos.

ANTONIO DOS SANTOS SILVA

Químico, Físico e Estatístico, formado pela UFPA. Tem experiência com análises de produtos alimentícios e chás medicinais. Professor Adjunto 2 da Faculdade de Farmácia da UFPA. Coordenador do Laboratório de Física Aplicada à Farmácia (Faculdade de Farmácia da UFPA).

ANTONIO DOS SANTOS SILVA

Físico (licenciatura e bacharelado); Químico (licenciatura e industrial); Estatístico (bacharelado); Mestre (em Física e em Química); Doutorando (Química Analítica). Especialista em Metodologia do Ensino de Biologia e Química; Educação a Distância: Gestão e Tutoria e em Ludopedagogia. Professor Adjunto da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Pará. Tem experiência em análises químicas de produtos alimentícios (polpas de frutas, licores, mel, etc.). Professor responsável pelo Laboratório de Física Aplicada à Farmácia (LAFPA) da UFPA.

ANTONIO MANOEL MARADINI FILHO

Engenheiro de Alimentos – Universidade Federal de Viçosa (1980). Doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos – Universidade Federal de Viçosa (2014). Professor Adjunto da Universidade Federal do Espírito Santo – CCAE-Alegre-ES – Disciplinas: Tecnologia de Grãos e Cereais; Tecnologia de Bebidas e Refrigerantes; Gestão da Qualidade em Indústria de Alimentos; Tecnologia de Açúcar e Alcool; Uso do Frio na Indústria de Alimentos; Trabalho de Conclusão de Curso I. Tem marcante experiência na área de Ciência e Tecnologia de Amido, Grãos e Cereais, atuando de 1984 até 2010 em Empresas Alimentícias de grande porte, com ênfase no desenvolvimento e formulação de produtos, bem como em Avaliação e Controle de Qualidade e na implantação de Programas de Qualidade e de Boas Práticas de Manufatura para Indústrias Alimentícias. Conta ainda com bons conhecimentos e habilidades na Supervisão e Gerenciamento de Produção em Indústrias de Panificação e Massas Alimentícias.

ARTUR CARVALHO FERREIRA

Graduando em Agronomia pela Universidade Federal da Amazônia (UFRA), participou do programa de indução de resistência de plantas a patógenos do laboratório de fitopatologia da Universidade Federal de Viçosa (UFV) interação patógeno-hospedeiro, atua atualmente na área de gestão tributária de ITR (imposto sobre a propriedade territorial rural) como diretor do Departamento de Arrecadação Municipal de Parauapebas (DAM). Áreas de interesse: Gestão, produção vegetal, proteção de plantas e governança.

BARBARA CRISTINA VICENTE

Graduanda em Nutrição pela IBMR.

BEATRIZ DE OLIVEIRA LOPES

Formação em Economia Doméstica Pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Especialização em Nutrição Clínica pela Universidade Candido Mendes, Brasil(2019),Nutricionista pela faculdade Bezerra de Araújo, RJ, Mestranda em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UFRRJ, Rio de Janeiro

BIANCA DE JESUS FIGUERÊDO DIAS

Possui ensino médio, pela Escola Estadual de Ensino General Euclides Figueiredo (2006). Graduanda em Zootecnia pela Universidade Federal Rural da Amazônia (2014). Tem experiência na área de Zootecnia.

BIANCA FARIAS GAIA

Graduação em Bacharelado em Tecnologia de Alimentos pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). Especialista em Vigilância sanitária e controle de qualidade pela Estácio de Sá.

CAMILA BARROSO DA SILVA

Possui graduação em Zootecnia pela Universidade Federal Rural da Amazônia (2019). Tem experiência na área de Zootecnia, com ênfase em processamento tecnológico de produtos de origem animal.

CAMILA BARROSO DA SILVA

Possui graduação em Zootecnia pela Universidade Federal Rural da Amazônia (2019). Tem experiência na área de Zootecnia, com ênfase em processamento tecnológico de produtos de origem animal.

CAMILA SAMPAIO MANGOLIM

Doutora em Ciência de -UEM. Mestra em Ciências de Alimentos - UEM. Engenheira de Alimentos - UEM. Docente do Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial, Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, Universidade Federal da Paraíba - Campus III. Bananeiras - PB.

CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA MELO

Possui Graduação em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia (2019). Participou do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica na área de Melhoramento Vegetal. Áreas de interesse: Tecnologia de Alimentos, Produção Vegetal e Melhoramento Vegetal.

CÁSSIA ALMEIDA BRITO

Graduada do curso de Licenciatura em Química, pela instituição de ensino Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ (2017). Mestra em Ciência e Tecnologia de Polímeros pelo Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano (IMA/UFRJ) (2019). Doutorado em andamento pelo Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano (IMA/UFRJ). Participou de projetos que visavam a avaliação da atividade antioxidante e estabilizante do óleo de laranja sobre sistemas nanoestruturados contendo óleo de açaí (2018); obtenção de copolímeros utilizando derivado do limoneno e anidrido tetrahidroftálico para a produção de poliésteres funcionalizáveis (2019). Atualmente, estuda sobre sistemas acrílicos particulados contendo fármacos por reação de UGI para o tratamento de neoplasias malignas.

CINTHIA DE CARVALHO COUTO

Atualmente é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição (PPGAN/UNIRIO). Recentemente, fez um período de mobilidade acadêmica na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (2018-2020). Mestre em Alimentos e Nutrição pelo Programa de Pós-graduação em Alimentos e Nutrição (PPGAN-UNIRIO). Nutricionista graduada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2014).

CLAUDETE ROSA DA SILVA

Possui graduação em Licenciatura em ciências Físicas e Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá (1997), Especialização em Genética e Evolução pela Universidade Estadual de Maringá (2000), mestrado e Doutorado em Genética e Melhoramento pela Universidade Estadual de Maringá, com ênfase em Melhoramento de plantas visando resistência a doenças. Realizou Estágio Pós-Doutorado com Bolsa do Programa de Apoio a Projetos Institucionais com a Participação de Recém-Doutores (PRODOC - CAPES), desenvolvendo pesquisas relacionadas ao Melhoramento Genético do Feijoeiro Comum. Atualmente, Professor Adjunto em exercício na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). Tem experiência na área de Biotecnologia com ênfase em Marcadores genéticos RAPD, SCAR e SSR. Atua em pesquisas aplicadas ao melhoramento genético de plantas, Estudos de Diversidade genética e Estrutura populacional.

DANILO LIMA DANTAS

Possui graduação em química na Universidade Federal de Campina Grande, e mestrado em química pura e aplicada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, atualmente sendo doutorando pela Universidade Rural de Pernambuco. Apresenta experiência em projetos pedagógicos e de pesquisa, tendo a área de pesquisa voltado a química dos alimentos.

DANYELLY SILVA AMORIM

Possui graduação em tecnologia de alimentos pela Universidade do Estado do Pará (2019). Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Tecnologia de Alimentos, atuando principalmente nos seguintes temas: aproveitamento de resíduos de frutas na elaboração de alimentos, qualidade nutricional e compostos bioativos de alimentos.

DAYLON AIRES FERNANDES

Discente de Agronomia da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), sendo voluntário de projetos vinculados na área de pesquisa em genética e melhoramento de plantas. Realizando pesquisa com foco em germoplasmas de milho crioulo e feijão caupi na região sudeste do Pará.

DIEGO DA SILVA PINHEIRO

Graduado em Química Licenciatura pela UFPA (2016). Foi bolsista de Iniciação científica no Laboratório de Controle de Qualidade e Meio Ambiente (LACQUAMA) (2013 - 2016). Foi integrante/pesquisador do Grupo de Ensino de Química (GREQ, 2017) da UFPA. Atualmente atua como docente contratado pela SEDUC-PA. Membro do Laboratório de Física Aplicada à Farmácia.

DIEGO LISBOA DOS SANTOS

Graduado em Licenciatura em Química pela UFPA (2014). Mestre em Química Analítica pela UFPA (2016). Tem experiência na área de Química, com ênfase em Química Analítica realizando análises físico-químicas, químicas e nutricionais em plantas medicinais e frutas regionais da Amazônia. Professor de Química e Ciências pela SEDUC PA. Membro do Laboratório de Física Aplicada à Farmácia da UFPA.

DIOGO LEANDRO SILVA CARVALHO

Graduado em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Parauapebas. Participou do Programa Institucional de bolsas de Iniciação Científica-CNPq. Atuou no Programa de Monitoria como monitor das disciplinas de Entomologia I, Entomologia II e Entomologia Florestal dos cursos de Agronomia e Engenharia Florestal. Áreas de interesse: Proteção de plantas, entomologia agrícola, tecnologia de alimentos, produção vegetal, fruticultura e olericultura.

DOMINIC SALVADOR REYNALDO

Graduanda em Nutrição pela UNESA. Curso de Fitoterapia pela ABFIT.

EDNA JAILA MENEZES DA SILVA

Engenharia agrônoma, formada pela UFRA, Campus Capitão Poço. No período da graduação foi estagiária no laboratório de fisiologia vegetal e atualmente trabalha como educadora de ciências agrárias no município de Goianésia PA

EDVALDO MESQUITA BELTRÃO FILHO

Doutor em Zootecnia. Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos -UFPB. Agrônomo. Docente de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial, Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, Universidade Federal da Paraíba - Campus III. Bananeiras - PB.

ELDA DE SOUZA LEITE

Possui ensino médio, pela Escola Modelo Pitágoras (2013). Graduanda em Zootecnia pela Universidade Federal Rural da Amazônia (2014). Tem experiência na área de Zootecnia.

FABIO ISRAEL MARTINS CARVALHO

Possui graduação em Química Bacharelado pela Universidade Federal do Pará (2003), mestrado em Química pela Universidade Federal do Pará (2008). Doutorado em Química (área: Química Analítica) pela Universidade Federal do Pará (2015). Tem experiência na área de Química e Ciências Ambientais (Química Ambiental), com ênfase em Cromatografia Gasosa e Líquida, atuando principalmente nos seguintes temas: contaminantes traço orgânicos (BTEX e HPA) e inorgânicos (metais pesados). Atualmente, faz parte do quadro de professores da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Campus de Parauapebas. Também é pesquisador colaborador do grupo de pesquisa Estudos Ecotoxicológicos dos Sistemas Amazônicos da UFRA e do Grupo de Espectrometria Analítica Aplicada (GEAAp) da UFPA.

FERNANDA DE SOUZA COSTA

Graduação em Bacharelado em Tecnologia de Alimentos pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). Possui experiência em análises de espectrofotometria para quantificação de compostos bioativos pelo método Folin Ciocalteu.

GABRIELA DA SILVA MELO CARVALHO

Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia (2017). Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em Agronomia, produção de mudas, plantas medicinais e aromáticas e produção de alimentos.

GABRIELLY PEREIRA DE ARAÚJO

Graduanda em Agronomia pela UFRA, participante do Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, atuando desde 2019. Interessa-se por Tecnologia de Alimentos, Proteção de Plantas e Produção Vegetal.

GUSTAVO ADOLFO SAAVEDRA PINTO

Graduação em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Bioquímica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisador da Embrapa e, atualmente, chefe-adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Agroindústria Tropical, em Fortaleza. Orientador da Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará e do Programa de Biotecnologia da Rede Nordeste de Biotecnologia (RENORBIO). Tem experiência na área de Processos Bioquímicos, atuando principalmente nas seguintes linhas: bioconversão de resíduos e co-produtos agroindustriais e maceração enzimática de polpas de frutas tropicais.

HELANE CRISTINA AGUIAR SANTOS

Engenheira Agrônoma, formada pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Campus Capitão Poço. Atualmente, cursa doutorado em Agronomia, com ênfase em Irrigação e drenagem. Possui experiência de atuação em docência acadêmica na área de ciências exatas, com as disciplinas de Matemática básica e financeira, Cálculo integral e diferencial, Álgebra Linear e Estatística.

HELEN CAROLLINE ALCÂNTARA NEGRÃO

Graduanda em Farmácia pela Faculdade de farmácia da Universidade Federal do Pará, tendo experiência com análises químicas de produtos alimentícios. Integrante do laboratório de Física Aplicada à Farmácia (LAFFA) da UFPA.

HOSIBERTO BATISTA DE SANT'ANA

Graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Química-Física do Petróleo pela Université Blaise Pascal, França. Professor Associado IV do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará. Coordenador do Grupo de Pesquisa em Termofluidodinâmica Aplicada da UFC. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PQ-2/CNPq), atuando na área de Engenharia Química, com ênfase em Físico-Química e Termodinâmica Química Aplicadas, nos temas: análise PVT, corrosão, tecnologia de emulsões, extração supercrítica, predição de propriedades termofluidodinâmica e de transporte.

HUDSON CHAGAS DA SILVA

Discente do curso Técnico em Agroindústria do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros - CAVN, Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, Universidade Federal da Paraíba - Campus III. Bananeiras - PB.

IGOR VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia (2011). Mestre em Bioquímica e Fisiologia Vegetal na mesma instituição (2014). Tendo atuado como extensionista, instrutor (professor) no SENAR-PA, professor voluntário na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e desde 2015 atua como Técnico Administrativo em Educação (cargo: Engenheiro Agrônomo), na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.

IGOR VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia (2011). Mestre em Bioquímica e Fisiologia Vegetal na mesma instituição (2014). Tendo atuado como extensionista, instrutor (professor) no SENAR-PA, professor voluntário na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e desde 2015 atua como Técnico Administrativo em Educação (cargo: Engenheiro Agrônomo), na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.

IGOR VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia (2011). Mestre em Bioquímica e Fisiologia Vegetal na mesma instituição (2014). Tendo atuado como extensionista, instrutor (professor) no SENAR-PA, professor voluntário na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e desde 2015 atua como Técnico Administrativo em Educação (cargo: Engenheiro Agrônomo), na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.

IGOR VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia (2011). Mestre em Bioquímica e Fisiologia Vegetal na mesma instituição (2014). Tendo atuado como extensionista, instrutor (professor) no SENAR-PA, professor voluntário na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e desde 2015 atua como Técnico Administrativo em Educação (cargo: Engenheiro Agrônomo), na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.

IRIS BRAZ DA SILVA ARAÚJO

Doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos -UFPB. Mestra em Tecnologia Agroalimentar - UFPB. Engenheira de Alimentos. Docente de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial, Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, Universidade Federal da Paraíba - Campus III. Bananeiras - PB.

ISABELLE DE LIMA BRITO POLARI

Doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos -UFPB. Mestra em Ciência e Tecnologia de Alimentos - UFPB. Nutricionista. Docente de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial, Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, Universidade Federal da Paraíba - Campus III. Bananeiras - PB.

IVAN CARLOS DA COSTA BARBOSA

Possui graduação em Licenciatura Plena em Ciências (habilitação em Química) e mestrado em Química Analítica. É especialista em Metodologia do Ensino de Biologia e Química, especialista em Educação a Distância: Gestão e Tutoria e especialista em Ludopedagogia. Atualmente, é docente efetivo (Química) na Universidade Federal Rural da Amazônia (Campus Belém) e cursa doutorado em Ciências Ambientais.

IZABEL JALES FERREIRA

Graduada do curso de Licenciatura em Química, pela instituição de ensino Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ (2017). Mestra em Ciência e Tecnologia de Polímeros pelo Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano (IMA/UFRJ) (2020). Tem experiência na área de Química, com ênfase no ensino de Química. Possui também experiência em fotoquímica com ênfase em cromatografia líquida, espectrofotometria, processos oxidativos avançados para degradação de compostos persistentes no ambiente, desinfecção bacteriana e ecotoxicologia terrestre. Desenvolveu sistemas a base de matrizes poliméricas hidrofílicas visando a liberação prolongada de óleos essenciais para o tratamento de lesões por HPV e obtenção de nanopartículas poliméricas para liberação modificada de agentes terapêuticos.

JACIARA DANTAS COSTA

Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Campina Grande (2015), Mestrado em Ciências Naturais e Biotecnologia pela Universidade Federal de Campina Grande (2018), Doutorado em Engenharia de Processos (UFCEG) em andamento. Tem experiência na área de Engenharia de Alimentos, com ênfase em elaboração de novos produtos e fermentação semissólida, com as seguintes linhas de pesquisa: físico-química, microbiológica e análise sensorial de alimentos.

JAMILLE DE SOUSA MONTEIRO

Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Tecnologia de Produtos de Origem Animal. E experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Tecnologia de Alimentos.

JOÃO DA SILVA CARNEIRO

Graduação em Bacharelado em Química pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Doutorado em Química Orgânica (UFPA). Professor Adjunto do Departamento de Ciências Naturais da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Líder do Grupo de Pesquisa em “Química, Ensino de Química e Meio Ambiente” da UEPA.

JOÃO PAIXÃO DOS SANTOS NETO

Possui graduação em Tecnologia de Alimentos pelo Instituto Federal de Alagoas - Matriz (2013), mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro (2016) e doutorado em Agronomia (Produção Vegetal) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2018). Atualmente é investigador científico do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em conservação e pós-colheita de produtos vegetais.

JOÃO PAIXÃO DOS SANTOS NETO

Possui graduação em Tecnologia de Alimentos pelo Instituto Federal de Alagoas - Matriz (2013), mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro (2016) e doutorado em Agronomia (Produção Vegetal) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2018). Atualmente é investigador científico do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em conservação e pós-colheita de produtos vegetais.

JOCYEL CAETANO DA SILVA

Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Produção Animal, melhoria da produção e da qualidade dos produtos e serviços de origem animal. Dedicou ao estudo de Melhoramento Genético Animal, produção e reprodução de peixes. Entre suas principais obras de monografia, destacam-se "Viabilidade econômica na produção intensiva de pirarucu (Arapaima gigas) em tanque-rede e tanque-lona em Parauapebas-PA". E "Qualidade físico-química de carnes moídas bovina in natura comercializadas no Município de Parauapebas-PA. Concluídos em 2019.

JOSÉ LUIZ MORAES

Graduação em Química Industrial (UFPA/1972) // Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos/UFPB/1979 // Graduação em Medicina Veterinária/FCAP/1997 // Especialização em Acupuntura/CBES/2008 // Doutorado em Medicina Veterinária/UFF/2011. Atua na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos de Produtos de Origem Animal e Vegetal/ Toxicologia Ambiental

JOSÉ MARCOS NOBRE DE MOURA JUNIOR

Graduado em Farmácia pela Faculdade de farmácia da Universidade Federal do Pará, tendo experiência com análises químicas de produtos alimentícios. Integrante do laboratório de Física Aplicada à Farmácia (LAFFA) da UFPA.

JOSIANE PEREIRA DA SILVA

Professora da Universidade Federal Rural da Amazônia - Campus Parauapebas. Engenheira Agrônoma, graduada pela Universidade Federal Rural da Amazônia, em Belém-Pará, com mestrado pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" Faculdade de Ciências Agronômicas Campus de Botucatu é doutorado em Produção Vegetal, pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP/Jaboticabal. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em Tecnologia, Manejo e Processamento Pós-Colheita de Plantas Hortícolas.

JOSIANE PEREIRA DA SILVA

Professora da Universidade Federal Rural da Amazônia - Campus Parauapebas. Engenheira Agrônoma, graduada pela Universidade Federal Rural da Amazônia, em Belém-Pará, com mestrado pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" Faculdade de Ciências Agronômicas Campus de Botucatu é doutorado em Produção Vegetal, pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP/Jaboticabal. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em Tecnologia, Manejo e Processamento Pós-Colheita de Plantas Hortícolas.

JULIANA DOS SANTOS LIMA

Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado da Bahia (2010) e mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Sergipe (2014). Atualmente é técnico de laboratórios da Faculdade Pitágoras de Serrinha (BA) e professora rede emergencial - Colégio Estadual Normal de Serrinha. Tem experiência na área de Microbiologia, com ênfase em Microbiologia, atuando principalmente nos seguintes temas: análise de alimentos, hortaliças, água, microrganismos,, infecções alimentares, carcaças de frangos e vitamina C.

KAIO JOSÉ BARRA DA CRUZ

Graduando em licenciatura plena em Ciências Naturais com Habilitação em Química pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). Bolsista do Programa Instrucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e inovação (PIBIT) e Monitor do Laboratório de Química (UEPA).

KALIANA SITONIO EÇA

Graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas, com doutorado sanduíche na University of Alberta, Canadá, e pós-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. Professora Adjunto A do curso de Engenharia de Alimentos na Universidade Federal do Ceará. Ministra as disciplinas de Fenômenos de Transporte na Indústria de Alimentos I e Fenômenos de Transporte na Indústria de Alimentos II. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, atuando em concentração por membranas, compostos bioativos, extração a partir de vegetais, filmes e coberturas biodegradáveis, microencapsulação.

KETLEN YUMI ITO DA SILVA

Graduanda no curso Tecnologia de Alimentos pela Universidade do Estado do Pará, Campus XX. Nível intermediário de entendimento do idioma inglês e pacotes Office, cursos na área de alimentos como Segurança e qualidade na indústria alimentícia, Manipulação de alimentos, Boas práticas nos serviços de alimentação. Experiência de 3 meses no laboratório de físico-química em uma indústria de polpas de frutas, aplicação de check list na lanchonete instalada da Universidade do Estado do Pará (Campus XX) junto a uma elaboração de relatório.

LEOMARA PESSOA BRITO

Graduanda em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, já atuou como monitora de Sociologia Antropologia e Extensão Rural dos cursos de Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia, participou do grupo de estudos em Produção de Animais Ruminantes – GERPA Campus UFRA Parauapebas na área de bovinocultura leiteira, atua atualmente na área implantação e manejo de sistemas agroflorestais como estagiária em meio ambiente na empresa Floretas Engenharia. Áreas de interesse: Produção vegetal e animal, fruticultura, sementes, agroecologia, manejo florestal, fitopatologia e entomologia

LÍVIA RODRIGUES DE MENEZES

Formada em Odontologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Mestre e Doutora em Ciências e Tecnologia de Polímeros pelo Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano (IMA/UFRJ). Tem interesse nas áreas de pesquisa, como: Nanocompósitos poliméricos, sistemas nanoestruturados para regeneração tecidual guiada, matrizes para liberação modificada de fármacos e antioxidantes naturais, resinas compostas odontológicas, sistemas adesivos dentinários e análises térmicas de compósitos e Nanocompósitos poliméricos. Atuou como professora substituta de Março de 2018 a Junho de 2019 e atualmente é Professora Adjunta do curso de Nanotecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro ministrando disciplinas de Síntese de Polímeros e Nanomateriais.

LORENA DE LIMA RODRIGUES

Graduanda em Tecnologia de alimentos pela Universidade do Estado do Pará (UEPA).

LUCAS GUILHERME ARAUJO SOARES

Técnico em Agropecuária, formado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará- Campus Castanhal. Realizou estágios na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (EMATER), Agência de Defesa Agropecuária do Pará (ADEPARÁ), e Dendê do Tauá S/A (DENTAUA). Graduando em Agronomia na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Campus Capitão Poço, atualmente é técnico agrícola efetivo da Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Esperança do Piriá - Pará, atuando nas atividades de orientação, coordenação e execução de trabalhos, relacionados à pesquisa das técnicas agrícolas.

LUCIANA CRISTINA LINS DE AQUINO SANTANA

Atualmente é Professora Associada Nível III do Departamento de Tecnologia de Alimentos (DTA) da Universidade Federal de Sergipe. Doutora em Engenharia Química na área de concentração Desenvolvimento de Processos Biotecnológicos pela Faculdade de Engenharia Química da UNICAMP. Professora permanente do Programa doutorado da Rede Nordeste de Biotecnologia (RENORBIO) da Universidade Federal de Sergipe, Programa de mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos (PROCTA) e Programa de mestrado em Biotecnologia (PROBIO) da Universidade Federal de Sergipe. Coordenadora do Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Bioengenharia. Atualmente desenvolve pesquisas envolvendo os seguintes temas: Potencial antimicrobiano e antioxidante de óleos essenciais, extratos de frutas regionais e exóticas. Desenvolvimento de coberturas comestíveis incorporadas com compostos bioativos e sua aplicação na conservação de alimentos; Microbiologia de Alimentos, Controle de qualidade microbiológica de alimentos; Desenvolvimento e otimização de Processos Biotecnológicos; Aproveitamento de resíduos agroindustriais para obtenção de enzimas e compostos bioativos de interesse comercial através de processos fermentativos.

LUÍSA OLIVEIRA MENDONÇA

Engenheira de Alimentos pela Universidade Federal do Espírito Santo (2017). Bolsista do programa de iniciação científica com os projetos: “Elaboração de pão utilizando farinha de fruta pão” e “Utilização da farinha do bagaço de uva na elaboração de muffins”. Pós-graduanda em Engenharia e Gestão de Produção pelo Centro Universitário de Maringá. Vivência em Indústria de Alimentos e de Embalagens Plásticas, com 2 anos de experiência em controle de qualidade de processos e produtos acabados. Trabalha atualmente na Guarani-Plast, Miraf, MG, como encarregada de Qualidade.

MACIELLY BURITI DE MACEDO

Nutricionista formada pelo CES/UFCEG (2017). Atualmente é aluna do Programa de Pós Graduação em Ciências Naturais e Biotecnologia (PPGCN/Biotec/CES/UFCEG). Atua como Responsável Técnica do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do município de, Sossego, Paraíba. Tem experiência na área de Nutrição Clínica e Dietética nos diferentes ciclos da vida, Tecnologia dos alimentos referente à elaboração de produtos, aproveitamento integral de alimentos, análise sensorial e físico-química de alimentos, com ênfase na Qualidade Nutricional de Alimentos e Gastronomia.

MANUELA CRISTINA PESSANHA DE ARAUJO SANTIAGO

Engenheira Química formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ocupa cargo de Analista A no Laboratório de Cromatografia Líquida da Embrapa Agroindústria de Alimentos. Atua nas áreas de química analítica, com ênfase em cromatografia líquida aplicada à área de alimentos, e controle de qualidade de processos, com ênfase no monitoramento de compostos bioativos.

MARIA RENARA ALVES RODRIGUES

Tecnóloga de Alimentos e Pós Graduada em Segurança Alimentar e Controle da Qualidade na Indústria de Alimentos pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). Exerceu atividades de monitoria no Laboratório de Microbiologia da UEPA, atualmente é Analista de Laboratório na área de Controle de Qualidade na empresa Xingu Fruit Polpas de Frutas Indústria e Comércio LTDA. Possui conhecimentos na área de Tecnologia de Alimentos.

MARIA ROSA FIGUEIREDO NASCIMENTO

Possui graduação em Economia Domestica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (1986), mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2008) e Doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2014). Atualmente é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, atuando principalmente nos seguintes temas: alimentação, processamento de alimentos, boas práticas de higiene e manipuladores de alimentos, aproveitamento de resíduos, técnicas de pré-preparo.

MARISA DE OLIVEIRA APOLINÁRIO

Bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Especialista em Aquicultura pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Mestre em Biologia Animal pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPB) e Doutora em Ciências Biológicas (Zoologia) pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Atualmente é professora Associada da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), atuando principalmente nos seguintes temas: alimentação, fisiologia do comportamento, cultivo e reprodução de peixes. Coordenadora do Laboratório de Peixes e Aquicultura e da Unidade de Beneficiamento de Pescado do Centro de Educação e Saúde/ CES/UFCG.

MAXWELL DE PAULA CAVALCANTE

Graduado em Licenciatura em Química pelo IFRJ, tem experiência na área de ensino de Química. Participação na área de Ciência e tecnologia de Polímeros na função de iniciação científica por 5 anos nos quais atuou principalmente nas áreas de: nanocompósitos poliméricos biocompatíveis visando a área de engenharia óssea, desenvolvimento de blendas poliméricas, hidrogéis poliméricos, obtenção de sistemas acrílicos para aplicações oftálmicas e desenvolvimento de sistemas nanoestruturados para liberação controlada de fármacos. Mestre em Ciência e Tecnologia de Polímeros pelo IMA/UFRJ (2019) e atualmente doutorando em Ciência e Tecnologia de Polímeros pelo IMA/UFRJ.

MAYARA KUASNEI

Graduada em Engenharia de Alimentos da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), campus Laranjeiras do Sul - PR. Durante a graduação, participou do projeto de Avaliação da extração de compostos fenólicos na erva mate (*Ilex paraguariensis*), utilizando como solventes líquidos iônicos. Além disso, foi bolsista do Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica, no projeto de pesquisa intitulado Emprego de *Yarrowia lipolytica* na bioconversão de resíduos agroindustriais em biomassa. Também foi monitora das disciplinas de Microbiologia geral, Cálculo II, Cálculo III, Álgebra linear e Física III. Realizou estágio supervisionado obrigatório no setor de Produção na Cooperativa Central Aurora alimentos, por onde trabalhou por 8 meses. Atualmente é mestranda em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

MÔNICA RIBEIRO PIROZI

Ph.D. em Ciência e Indústria de Grãos pela Kansas State University (2003). Professora Associado da Universidade Federal de Viçosa desde março de 1996. Possui experiência na área de Ciência e Tecnologia de Cereais e Amido, com atuação marcante em ensino, pesquisa e extensão na área.

MYCHELLE CRISTINA ALVES DOS SANTOS

Atualmente graduanda em Zootecnia pela Universidade Federal Rural da Amazônia - Campus de Parauapebas. Bolsista de iniciação científica- PIBIC /CNPq entre 2016 e 2018 e atualmente bolsista de iniciação científica PIBIC/UFRA. Participou de projeto de pesquisa intitulado Estratégia para redução do ciclo produtivo de bovinos de corte na Amazônia.

NAIANE CAETANO DA SILVA LEAL

Engenheira Agrônoma pela Universidade Federal Rural da Amazônia (2019). Participou do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, nas modalidades voluntário (2018) e bolsista (2019), em pesquisa na área de Fitotecnia, com ênfase em Olericultura. Áreas de interesse: Agroecologia, Recuperação de Áreas Degradadas, Manejo e Conservação do Solo, Produção Vegetal, Fitotecnia, Ciência e Tecnologia de Alimentos.

NICOLY DA SILVEIRA MENDITI

Engenheira de Alimentos pela Universidade Federal do Espírito Santo (2017), onde foi bolsista do programa de iniciação científica com os projetos: “Avaliação da composição físico-química, capacidade antioxidante e do teor de compostos fenólicos de extrato hidrossolúvel de gergelim” e “Elaboração de biscoito utilizando resíduo de gergelim, “torta”: teste de aceitação”. Pós-graduada em Engenharia de Produção pela Universidade Candido Mendes (2019). Atualmente trabalha na Nestlé S.A. como Analista de Garantia da Qualidade na fábrica Chocolates Garoto em Vila Velha, ES.

OTNIEL FREITAS-SILVA

Possui graduação em Engenharia Agrônoma pela Universidade Federal Rural da Amazônia (1988), Mestrado em Agronomia (Proteção de Plantas) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1992) e Doutorado em Engenharia Química e Biológica pela Universidade do Minho, Portugal. Atualmente é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Agroindústria de Alimentos) e docente permanente dos Programas de Pós Graduação em Alimentos e Nutrição (PPGAN) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e em Ciência e tecnologia de alimentos (PPGCTA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Faz parte do Grupo Técnico de Contaminantes em Alimentos coordenado pela Anvisa. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em Fitopatologia, e segurança e inocuidade das cadeias agro-alimentares, atuando principalmente nos seguintes temas: castanha-do-Brasil, café, fungos e micotoxinas, patologia pós-colheita e segurança de alimentos.

PABLO SOUZA DE SÁ

Graduando em licenciatura plena em Ciências Naturais com Habilitação em Química pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). Bolsista-Voluntário do Programa Instrucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e inovação (PIBIT) e Monitor do Laboratório de Microbiologia (UEPA).

PAMELA STEPHANY JENNINGS CUNHA

Graduação em Tecnologia Agroindustrial pela Universidade do Estado do Pará (2009). Graduação em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia (2019). Pós graduada em processamento e controle da qualidade de carne, leite e ovos pela Universidade Federal de Lavras (2010).

PAULA MARIA MELO DA SILVA

Licenciada em Química pela UFPA. Mestranda em Química Inorgânica (UFPA). Tem experiência em análises de alimentos, óleos vegetais e em plantas medicinais. Membro integrante do Laboratório de Física Aplicada à Farmácia (LAFFA) da UFPA.

PRISCILLA ANDRADE SILVA

Possui Graduação em Tecnologia de Alimentos pela Universidade do Estado do Pará (2009) e Graduação em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia (2019). Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Pará (2011). Doutorado em Agronomia (Fisiologia e Bioquímica) pela Universidade Federal Rural da Amazônia e sanduíche pela Universidade Federal de Viçosa (2016). Atualmente Professora Adjunta da UFRA- Campus Belém. Linhas de Pesquisa: Processamento Tecnológico de Produtos de Origem Animal e Vegetal, Bioquímica e Fisiologia da Produção Vegetal.

PRISCILLA DINIZ LIMA DA SILVA BERNARDINO

Possui graduação em Zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2002.2). Mestrado em Engenharia Química, com área de concentração Processos: alimentos e biotecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2005.2). Doutora em Eng. química na mesma área de concentração do mestrado e pela mesma instituição. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos e Laticínios com ênfase em Tecnologia de lácteos, microbiologia de Alimentos, Biotecnologia de alimentos, atuando principalmente nos seguintes temas: micro-organismos psicrotróficos, tecnologia aplicada a: leite de cabra, leite de búfala e bovino, composição físico-química e análise sensorial. Ministrei na zootecnia a disciplina de Higiene Zootécnica. No curso técnico de alimentos no IFRN as disciplinas de Higiene e Segurança Alimentar; Tecnologia de Carnes, Pescados e Frutas II e Legislação Aplicada a Alimentos. Ministrei na pós graduação Segurança dos Alimentos em Unidades Gastronômicas da Universidade potiguar o módulo de Microbiologia de Alimentos. Consultora PAS Indústria e Multiplicadora Pas Campo. Professora Adjunto IV da UFPB campus III, responsável pela disciplina Ciência e Tecnologia de Laticínios, foco do meu concurso. Atualmente em Colaboração técnica para a UFRA.

RAIMUNFA DANIELA SANTOS FERREIRA

Especialização em andamento em Docência no Ensino de Libras (ESAMAZ). Mestrado em Química Analítica pela UFPA, com experiência em análises de alimentos e plantas medicinais. Licenciada em Química pela UFPA. Professora de Química no Ensino Médio, na SEDUC PA. Membro do Laboratório de Física Aplicada à Farmácia da UFPA.

RAQUEL COSTA CHEVALIER

Doutoranda em Engenharia de Alimentos na Universidade Estadual de Campinas- Unicamp, Mestra em Engenharia de Alimentos na Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP, Graduada em Engenharia de Alimentos na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), foi aluna bolsista do PIBIC- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, financiada pelo Cnpq (2016-2017) ,do grupo BIOENG (Grupo de Estudos e Pesquisa Bioengenharia) da Faculdade de Engenharias (FAEN), da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).Foi aluna Bolsista do programa PET- Programa de Educação Tutorial, ano 2014-2016. Possui experiência na área de filmes e revestimentos comestíveis, produção e caracterização de sistemas emulsionados como matriz de encapsulação de compostos bioativos.

RENNAN WELLINGTON RAMOS ALVES

Graduando em Tecnologia de alimentos pela Universidade do Estado do Pará (UEPA).

ROBERTA QUINTINO PINTO

Graduanda em agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, realizou estágio na área de assistência técnica e extensão rural na Secretária Municipal de Produção Rural de Parauapebas – SEMPROR. Servidora Pública municipal, atuando na área da educação para o trânsito (Núcleo de Educação para o Trânsito) no Departamento Municipal de Trânsito e Transporte – DMTT. Áreas de interesse: apicultura e meliponicultura, produção vegetal e animal, sanidade e bem-estar animal, floricultura e paisagismo, ciência e tecnologia dos alimentos.

RONOEL LUIZ DE OLIVEIRA GODOY

Possui graduação em Farmácia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1976), mestrado em Química de Produtos Naturais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1981) e doutorado em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1992). Atualmente é pesquisador A da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Química de Produtos Naturais, atuando principalmente nos seguintes temas: CLAE, CLAE-EM-EM, irradiação de alimentos, óleo essencial compostos bioativos como Vitamina C, Carotenoides, Flavonoides e Ácidos Fenólicos.

ROSALINDA ARÉVALO PINEDO

Possui graduação em ENGENHARIA DE ALIMENTOS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA (1996), Mestrado em Eng. Química (2002) e Doutorado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas (2007). Pós-doutorado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas/ UNICAMP (2010). Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Ciência e Tecnologia de Alimentos de produtos vegetais e animais. Desenvolve pesquisa na área de produtos de origem vegetal e animal. Atualmente é professora associada da Universidade Federal da Grande Dourados.

RUANIS SILVA ARAÚJO

Engenheiro Agrônomo pela Universidade Federal Rural da Amazônia-UFRA, pós-graduando (MBA) em Agronegócio, Gestão Empresarial e Inteligência Competitiva pela Faculdade Metropolitana, mestrando em Produção Animal na Amazônia pela UFRA. Já atuou como monitor de Fisiologia Vegetal dos cursos de Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia, participou do Programa Institucional de Voluntário de Iniciação Científica. Áreas de interesse: produção vegetal e animal, análise de alimentos, ecofisiologia vegetal, germinação, agroecologia, apicultura e meliponicultura.

SANDRIANE PIZATO

Tecnóloga em Alimentos, com ênfase em Industrialização de Carnes pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2008). Especialista em Frutas e Hortaliças pela Universidade Federal de Pelotas (2011). Mestre (2011) e Doutora (2015) em Engenharia e Ciência de Alimentos pela Universidade Federal de Rio Grande. Pós-Doutorado em Bioprocessos e Biotecnologia pela Universidade Federal da Grande Dourados (2016). Atua na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, carnes, controle de qualidade, filmes e coberturas em alimentos. Ministrou aulas no Instituto Federal de Santa Catarina e foi professora Colaboradora na Universidade Estadual de Maringá.

SILVIA LETÍCIA VIEIRA MATOS

Tecnóloga em gestão ambiental pela Universidade Uniasselvi. Graduanda em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia-UFRA, participante do Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, atuando desde 2019. Áreas de interesse: Tecnologia de Alimentos, Proteção de Plantas e Produção Vegetal.

TAYSA KATLYN LIMA BORGES

Graduanda em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, atuando no Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica na área de Química. Áreas de Interesse: Química, Tecnologia de alimentos, Produção vegetal e Administração.

THAINARA AMANDA DUARTE VENDRUSCOLO

Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS (2018). Durante o período de graduação participou do projeto de iniciação científica na área de bioconversão de resíduos agroindustriais para produção de biomassa por *Yarrowia Lipolytica* (2015/2016). Além disso, participou do projeto de iniciação científica com o assunto de influência de diferentes métodos de secagem e da temperatura nas características físicas e químicas do gengibre (2017), no qual realizou seu Trabalho de Conclusão de curso. Atualmente está atuando no abatedouro de aves C. Vale - Cooperativa Agroindustrial como Analista de Planejamento e Controle de Produção.

THAMIRYS PAULINO DE SOUZA

Possui Graduação em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia. Já atuou como monitora de Estatística experimental dos cursos de Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia, participou do Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica. Áreas de interesse: Agroecologia, fruticultura, economia e administração rural e proteção de plantas.

THEIMMY PEREIRA DE OLIVEIRA

Graduando em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). Participou do treinamento no Grupo de Estudos em Produção de Animais Ruminantes de Carajás – GEPARC/Campos Parauapebas, na área de nutrição de Ruminantes, no período de Janeiro a Julho de 2018. Áreas de interesse: Administração, Agricultura de Precisão, Tecnologia de Alimentos, Solos.

THIAGO BERGLER BITENCOURT

Possui graduação em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina (2003), mestrado e doutorado em química orgânica pela mesma instituição (2006 e 2010). Tem experiência na área de Biocatálise, com ênfase em aplicação de lipases, atuando principalmente nos seguintes temas: lipases, epoxidação e formação de oxaziridinas. Possui projetos de pesquisa na área de biocatálise de processos fermentativos empregando leveduras na bioconversão de resíduos agroindustriais em biomassa com alto valor nutritivo e isolamento de enzimas com atividade lipolítica. Professor de Química geral e orgânica e atualmente é Coordenador Acadêmico na Universidade da Fronteira Sul - UFFS - no Campus de Laranjeiras do Sul - PR.

THIAGO FELIPH SILVA FERNANDES

Engenheiro Agrônomo, formado pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Campus Capitão Poço. Foi estagiário na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) Amazônia Oriente, onde foi bolsista de Iniciação Científica CNPq na área de melhoramento genético de plantas. Atualmente, é mestrando em Agronomia (Produção Vegetal) na Universidade Estadual Paulista, Campus Jaboticabal, onde desenvolve pesquisa em Fisiologia Vegetal [cultura do mamoeiro]: com método não destrutivos utilizando a espectroscopia do infravermelho próximo (NIR).

TIAGO GONÇALVES DURÃO

Graduando em licenciatura plena em Ciências Naturais com Habilitação em Química pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). Bolsista PIBIC em andamento.

VANESSA GOMES DA SILVA

Possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina (2005), mestrado em Ciência Animal, área de concentração Sanidade Animal pela Universidade Estadual de Londrina (2008). Tem experiência na área de Microbiologia Veterinária, com ênfase em Doenças Infecciosas e Microbiologia de Alimentos, atuando principalmente nos seguintes temas: bacteriologia, doenças bacterianas de peixes, qualidade microbiológica do pescado. Atua como Médica Veterinária pela Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), campus Laranjeiras do Sul. Atualmente é doutorando no Programa de Pós-graduação em Ciência Animal pela Universidade Estadual de Londrina (UEL)

VÂNIA MADEIRA NUNES POLICARPO

Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil(2004)

Professor de Nutrição e Alimentação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro , Brasil

VÍCTOR DE CARVALHO MARTINS

Atualmente doutorando em Química pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ, na linha de pesquisa de Química de Produtos Naturais. Outras titulações incluem: mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos (UFRRJ - Embrapa), bacharel em Química com Atribuições Tecnológicas (IFRJ) e licenciado em Química (AVM - UCAM). Minистраção e participação em diversos cursos de extensão no IFRJ (Jornadas de Química - JQUIM, SEMATEC) e na UFRRJ (Escolas de Verão do Instituto de Química). Experiência em análise instrumental (cromatografia líquida e espectrometria de massas), química e análise de alimentos, fitoquímica clássica, óleos essenciais, entre outros.

VILSON CLEBER FUSCO DA SILVA

Possui ensino médio pelo Colégio Generalíssimo Deodoro (2001). Graduando em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA (2014).

VILSON CLEBER FUSCO DA SILVA

Possui ensino médio pelo Colégio Generalíssimo Deodoro (2001). Graduando em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA (2014).

WILLIAM RENZO CORTEZ-VEGA

Possui graduação em Engenharia de Alimentos - Universidad Nacional San Agustin (1999), especialização em Higiene e Ciência de alimentos pelo Centro Universitário Filadélfia (2004), especialização em Tecnologia de Frutas e Hortaliças pela Universidade Federal de Pelotas (2010), mestrado em Engenharia e Ciência de Alimentos pela Universidade Federal do Rio Grande (2007) e doutorado em Engenharia e Ciência de Alimentos pela Universidade Federal do Rio Grande (2011). Pós- doutorado em Engenharia de Alimentos pela FURG (2012). Atualmente é professor adjunto IV da Universidade Federal da Grande Dourados. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Engenharia de Alimentos.

WILTON PIRES DA CRUZ

Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal do Pará (2007), mestrado em Produção Vegetal pela Universidade Federal do Tocantins (2011) e doutorado em Agronomia (Entomologia Agrícola) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2015). Atuou como docente substituto do curso de Agronomia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e agrônomo da Prefeitura Municipal de Marabá. Atualmente é Engº Agrônomo da Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus de Parauapebas. Desenvolve trabalhos principalmente nos

seguintes temas: Ácaros predadores da família Phytoseiidae, biodiversidade, dinâmica populacional de ácaros plantícolas.

WILTON PIRES DA CRUZ

Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal do Pará (2007), mestrado em Produção Vegetal pela Universidade Federal do Tocantins (2011) e doutorado em Agronomia (Entomologia Agrícola) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2015). Atuou como docente substituto do curso de Agronomia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e agrônomo da Prefeitura Municipal de Marabá. Atualmente é Eng^o Agrônomo da Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus de Parauapebas. Desenvolve trabalhos principalmente nos seguintes temas: Ácaros predadores da família Phytoseiidae, biodiversidade, dinâmica populacional de ácaros plantícolas.

ISBN: 978-65-86127-19-5

CDL

9 786586 127195

ISBN: 978-65-86127-19-5

CDL

9 786586 127195