Ciência e Tecnologia dos Alimentos

8
volume

Editora Poisson

Editora Poisson

Ciência e Tecnologia dos Alimentos

Volume 8

1ª Edição

Belo Horizonte
Poisson
2020

Editor Chefe: Dr. Darly Fernando Andrade

Conselho Editorial

Dr. Antônio Artur de Souza – Universidade Federal de Minas Gerais

Msc. Davilson Eduardo Andrade

Dra. Elizângela de Jesus Oliveira – Universidade Federal do Amazonas

Msc. Fabiane dos Santos

Dr. José Eduardo Ferreira Lopes – Universidade Federal de Uberlândia

Dr. Otaviano Francisco Neves – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Dr. Luiz Cláudio de Lima – Universidade FUMEC

Dr. Nelson Ferreira Filho – Faculdades Kennedy

Msc. Valdiney Alves de Oliveira – Universidade Federal de Uberlândia

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

C569

**Ciência e Tecnologia dos Alimentos-Volume 8/
Organização Editora Poisson – Belo
Horizonte – MG: Poisson – 2020**

Formato: PDF

ISBN: 978-65-86127-66-9

DOI: 10.36229/978-65-86127-66-9

Modo de acesso: World Wide Web

Inclui bibliografia

**1. Tecnologia de Alimentos 2. Alimentos
3. Nutrição I. Título**

CDD-664.005

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.

www.poisson.com.br

contato@poisson.com.br

SUMÁRIO

Capítulo 1: Comparação físico-química de frutos convencionais e orgânicos da região de Sobral/CE..... 07

Layana Mary Frota Menezes, Antonio Gilvan Rodrigues de Souza, Andryenne Veras Sousa, Demiles Henrique Silva, Antonia Ariana Camelo Passos
DOI: 10.36229/978-65-86127-66-9.CAP.01

Capítulo 2: Avaliação físico-química, quimiométrica e sensorial de iogurte grego 12

Pablo Henrique Franco Santos de Souza, Larysse Vasconcellos Pacheco, Lisa Maria Mendes de Almeida Souza, Marcos Antônio Moura da Silva Filho, Allyson Allennon Pinheiro do Rosário, José Marcos Nobre de Moura Júnior, Zimara Nyusa de Melo Tavares, Charles Alberto Brito Negrão, Ewerton Carvalho de Souza, Antonio dos Santos Silva

DOI: 10.36229/978-65-86127-66-9.CAP.02

Capítulo 3: Produção e avaliação físico-química de uma cerveja artesanal puro malte com adição de extratos de *Syzygium aromaticum* e *Cinnamomum zeylanicum*. 18

Jaqueline Santos Mesquita, Janyne Palheta Ramos, Gustavo Oliveira Everton, Silvio Carlos Coelho, Victor Elias Mouchrek Filho

DOI: 10.36229/978-65-86127-66-9.CAP.03

Capítulo 4: Estudo físico-químico, quimiométrico e sensorial de suco de cajú..... 34

Cristiano Max Celestino Negrão, Ivan Pereira da Silva, Joyce Pantoja Braga, Allyson Allennon Pinheiro do Rosário, José Marcos Nobre de Moura Júnior, Charles Alberto Brito Negrão, Madson Costa Ribeiro, Ewerton Carvalho de Souza, Ivan Carlos da Costa Barbosa, Antonio dos Santos Silva

DOI: 10.36229/978-65-86127-66-9.CAP.04

Capítulo 5: Parâmetros físicos de carne caprina marinada com condimento à base de abacaxi 41

Keliane da Silva Maia, Maria Érica da Silva Oliveira, Thiago Mendes Fernandes, Francisca Kelia Duarte Dias, Francielle Gurgel Castro Alves, Jéssica Taiomara Moura Costa Bezerra de Oliveira, Patrícia de Oliveira Lima

DOI: 10.36229/978-65-86127-66-9.CAP.05

Capítulo 6: Avaliação da informação nutricional contida nos rótulos de alimentos destinados para lactentes..... 46

Catherine Teixeira de Carvalho, José Douglas Bernardino Domingos, Antônio Alef Pereira de Oliveira, Isabelle de Lima Brito, Amanda Marília da Silva Sant'Ana, Adriele Ferreira Matos, Suerlândio Maceió de Farias, Francisco de Assis Oliveira, Mirelly Aline Martins de Souza

DOI: 10.36229/978-65-86127-66-9.CAP.06

SUMÁRIO

Capítulo 7: Avaliação da qualidade microbiológica de *Sushi* comercializado em restaurantes no município de Juazeiro do Norte - CE..... 52

Élida Amélia de Sousa Costa, Ana Vitorino Félix, Amanda Bezerra de Sousa, Joana D'arc Alves de Freitas, Maria Klevyany Nascimento, Janeanne Nascimento Silva Lopes

DOI: 10.36229/978-65-86127-66-9.CAP.07

Capítulo 8: Análises para controle de qualidade de amostras de méis das abelhas *Apis mellífera* L. e *Melipona subnitida* D. do Ceará e do Mato Grosso..... 56

Sarah Geysa de Oliveira Ribeiro, Maria da Conceição Tavares Cavalcanti Liberato, Kamila de Lima Barbosa, Dayanne Cipriano Costa da Silva, Geovana Costa Aguiar, Álvaro Ventrini Vasconcelos

DOI: 10.36229/978-65-86127-66-9.CAP.08

Capítulo 9: Produção de alimentos funcionais (geleias) a partir de frutas regionais e da mucilagem da chia (*Salvia hispanica* L) 59

Álvaro Ventrini Vasconcelos, Dayanne Cipriano Costa da Silva, Geovana Costa Aguiar, Kananda Lara Santos Sales, Sarah Geysa de Oliveira Ribeiro, Maria da Conceição Tavares Cavalcanti Liberato

DOI: 10.36229/978-65-86127-66-9.CAP.09

Capítulo 10: Formulação e avaliação da estabilidade de corante de açaí (*Euterpe oleracea* M.)..... 65

Patrícia Beltrão Lessa Constant, Andréa Gomes da Silva, Glenda Barros Matos, João Antônio Belmino dos Santos, Ângela da Silva Borges, Paulo Roberto Gagliardi

DOI: 10.36229/978-65-86127-66-9.CAP.10

Capítulo 11: Análise de edulcorantes declarados em rótulos de preparados sólidos para refresco..... 70

Ana Karoline Nogueira Freitas, Lailton da Silva Freire, Maracélia Carla Vieira de Oliveira, Herlane Chaves Paz, Rosana Martins Carneiro

DOI: 10.36229/978-65-86127-66-9.CAP.11

Capítulo 12: Clorador de passagem artesanal: Caracterização, eficiência e custos 74

Clélia Cristina Almeida da Silva, Jéssica Reis Pedrosa, Sônia de Oliveira Duque Paciulli, Alberto Schwaiger Paciulli, Ian Duque Paciulli, Gaby Patricia Terán Ortiz

DOI: 10.36229/978-65-86127-66-9.CAP.12

SUMÁRIO

Capítulo 13: Determinação preliminar da quantificação do teor de compostos fenólicos e atividade antioxidante da polpa da Acerola 80

Fabíola Ribeiro de Paula, Hanna Santos Muniz, Geovana Costa Aguiar, Álvaro Ventorini Vasconcelos, Maria da Conceição Tavares Cavalcanti Liberato

DOI: 10.36229/978-65-86127-66-9.CAP.13

Capítulo 14: Fruto camu-camu (*Myrciaria Dubia*) como nova fonte de nutrientes: Compostos bioativos e atividade antioxidante 83

Jiuliane Martins da Silva, Kamila de Cássia Spacki, Brenda de Oliveira Gomes, Catarina de Mesquita Oliveira, Marcos Antonio Matiucci, Joice Camila Martins da Costa, Oscar de Oliveira Santos Júnior

DOI: 10.36229/978-65-86127-66-9.CAP.14

Capítulo 15: O uso do café como aromatizante na produção de cervejas 88

Larissa Grazielle Rauber Duarte, João Batista de Almeida e Silva

DOI: 10.36229/978-65-86127-66-9.CAP.15

Capítulo 16: Protease alcalina e ácido tricloroacético na obtenção de hidrolisados de plasma suíno..... 93

Eduarda Baggio Paglia, Cristine Vogel, Anieli Pinto Kempka

DOI: 10.36229/978-65-86127-66-9.CAP.16

Capítulo 17: Avaliação do teor de desoxinivalenol em farinhas de trigo utilizadas em panificadoras..... 99

Rosselei Cael da Silva, Ionara Regina Pizzutti, Ingrid Duarte dos Santos, Andressa Lanza, Eunice Valduga Jamile Zeni

DOI: 10.36229/978-65-86127-66-9.CAP.17

Autores:..... 105

Capítulo 1

Comparação físico-química de frutos convencionais e orgânicos da região de Sobral/CE

Layana Mary Frota Menezes

Antonio Gilvan Rodrigues de Souza

Andrynne Veras Sousa

Demiles Henrique Silva

Antonia Ariana Camelo Passos

Resumo: O trabalho tem o objetivo de comparar a qualidade de frutos convencionais disponibilizadas na região de Sobral, CE com frutos orgânicos adquiridos na cidade de Meruoca, CE. Os frutos foram adquiridos nos mercados da cidade, higienizados e estudados por meio de análises físico-químicas. As análises foram realizadas em triplicata nos dias 0 e 14 no Instituto Federal, *campus* Sobral. Em seguida, foram realizadas análise de pH, sólidos solúveis e teor de cinzas conforme Adolfo Lutz (2008), acidez total titulável (AOAC, 1990). Após a obtenção dos resultados, os dados foram avaliados para a obtenção da média e desvio padrão. Os valores no dia 0 para sólidos solúveis totais variaram entre 5,25° a 10°, 2,24 a 3,25 para pH, 0,03 a 0,31 de acidez e de 1,4 a 1,8 para cinzas. No dia 14, houve variação de sólidos solúveis totais de 5,26 a 10,25°, pH de 1,54 a 3,43, acidez de 0,06 a 0,74 e cinzas variando entre 1,1 a 2,0 para frutos convencionais e orgânicos. De acordo com os dados obtidos pode-se concluir as frutas convencionais e orgânicas dos tempos 0 e 14, atenderam a legislação brasileira.

Palavras-chave: Avaliar; Saudável; Qualidade.

1. INTRODUÇÃO

A preocupação com uma alimentação saudável ocasiona a busca por alimentos que ofereçam propriedades que vão além de nutrir, mas também proteger o organismo de enfermidades (FREITAS et al., 2010). Um produto orgânico é muito mais que um alimento sem agrotóxicos e sem aditivos químicos, visto que é o resultado de um sistema de produção agrícola que busca manejar, de forma equilibrada, o solo e os demais recursos naturais (água, plantas, animais, insetos), conservando-os a longo prazo e mantendo a harmonia desses elementos entre si e os seres humanos (KATHOUNIAN, 2001).

Atualmente, o consumidor está mais consciente em consumir alimentos com propriedades funcionais, como as frutas e hortaliças (MATTOS et al., 2009). Porém, 78% de alguns tipos de frutas e hortaliças podem conter alto índice de contaminação por agrotóxicos ou podem apresentar características físico-químicas diferentes em relação à alimentos de origem orgânica (GORENSTEIN, 2004), além de que os frutos e vegetais são componentes importantes em uma dieta saudável, sendo fonte de vitaminas, minerais e de compostos biologicamente ativos (KMIECIK, 2004).

Para que o tempo de conservação seja maximizado e ocorra redução das perdas pós-colheita mantendo-as conservadas para um tempo maior de consumo, é importante que se conheça e utilize as práticas adequadas de manuseio principalmente durante as fases de colheita e pós-colheita (SILVA et al., 2013), além de que os consumidores cada vez mais conscientes estão exigindo produtos mais seguros e com menor impacto ao meio ambiente e à saúde humana (BEIRÃO-DA-COSTA et al., 2014).

O Brasil produz cerca de 43 milhões de toneladas de frutas tropicais, subtropicais e de clima temperado por ano, e isso proporciona ao país a grande diversidade de frutas que ele possui o ano inteiro (IBRAF, 2009). A acerola (*Malpighia emarginata* DC), fruto delicado e originário das Antilhas, tem grande importância nutricional por ser fonte natural de vitamina C (JACOB; BURRI, 1996). No Brasil, a acerola é plantada em todas as regiões. Pernambuco, Ceará e Bahia são os maiores estados produtores, concentrados 70% da produção nacional (FIGUEIREDO NETO et al., 2014; OLIVEIRA, et al., 2003).

A manga (*Mangifera indica* L) é uma fruta pertencente à família *Anacardiaceae* e à ordem *Sapindales*, presente em diversas partes do mundo, especialmente nos países tropicais (OLIVEIRA et al., 2016). Possui cerca de 1000 variedades, das quais poucas são cultivadas em grande escala. A manga é cultivada em mais de 103 países, sendo a segunda fruta tropical mais plantada (JAHURUL et al., 2015).

Devido às variedades remontantes e à forma como a produção está organizada é possível oferecer limão do “dia” durante todo o ano. Contudo, torna-se vantajoso ter disponível no mercado um produto com características pós colheita nos meses de menor produção pelo seu tipo de plantio e/ou no período em que os frutos atingem preço mais elevado (Trigo et al., 2015).

Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar as características físico-químicas de frutos comercializados na cidade de Sobral-CE, comparando referente ao seu cultivo em sistema convencional e frutos cultivados em sistema orgânico.

2 METODOLOGIA

2.1. PROCEDIMENTO DE RECEPÇÃO DOS FRUTOS

Os frutos convencionais foram adquiridos no supermercado na cidade de Sobral (CE), e os frutos orgânicos foram adquiridos na cidade de Meruoca (CE), devidamente selecionados com semelhanças em seus atributos de qualidade, como cor, uniformidade e grau de maturação. Foram armazenados em recipientes plástico, em seguida, lavados com água corrente e permaneceram em água clorada (100 ppm de cloro ativo) por 10 minutos e acondicionados em geladeiras usual.

2.3 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Para realização das análises, as amostras foram cortadas em cubos pequenos e maceradas para uma massa em torno de 50g, adicionadas em béqueres e codificadas. Foram realizadas as análises no laboratório de Bromatologia, no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia, IFCE na cidade de Sobral, CE. As análises físico-químicas foram realizadas nos tempos 0 e 14 dias, sendo elas, sólidos solúveis totais (SST) e expresso em °Brix, pH com a utilização do pHmetro digital, acidez total titulável (ATT) e teor de Cinzas por meio da incineração do material em mufla a 550°C. Todas as análises foram

realizadas conforme metodologia preconizada pelo Instituto Adolfo Lütz (2008). Foram realizadas em triplicatas com amostras de frutas convencionais e orgânicas respectivamente de acerola, manga e limão.

2.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os resultados foram tabulados e seguidos da determinação da média e desvio padrão por meio do ANOVA em planilha Excel com um suplemento do programa de estatística *Statistic 7.0*.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1, estão apresentados os valores médios (média $\pm$ desvio padrão) das amostras dos frutos convencionais e orgânicos no dia 0, com relação aos valores dos parâmetros físico-químicos.

Tabela 1. Valores médios (média $\pm$ desvio padrão) das amostras dos frutos convencionais e orgânicos com relação aos parâmetros físico-químicos.

Análises Dia 0						
	ACON ⁵	AOR ⁶	MCON ⁷	MOR ⁸	LCON ⁹	LOR ¹⁰
Sólidos solúveis ¹	5,25 ^b $\pm$ 0,005	5,25 ^b $\pm$ 0,009	10 ^a $\pm$ 0,006	10,00 ^{ab} $\pm$ 0,003	5,00 ^a $\pm$ 0,007	10,00 ^b $\pm$ 0,008
pH	3,25 ^b $\pm$ 0,005	2,95 ^a $\pm$ 0,007	3,13 ^b $\pm$ 0,006	3,98 ^a $\pm$ 0,007	2,55 ^b $\pm$ 0,003	2,24 ^a $\pm$ 0,002
Acidez titulável ³	0,05 ^a $\pm$ 0,150	0,50 ^b $\pm$ 0,267	0,03 ^a $\pm$ 0,136	0,05 ^b $\pm$ 0,217	0,13 ^b $\pm$ 0,466	0,31 ^a $\pm$ 0,620
Cinzas ⁴	1,8 ^b $\pm$ 0,141	1,4 ^a $\pm$ 0,070	1,7 ^a $\pm$ 0,212	1,6 ^b $\pm$ 0,141	1,4 ^b $\pm$ 0,070	1,4 ^b $\pm$ 0,282

(¹) Resultados expressos em ^gBRIX, (³) Resultados expressos em g ác. Cítrico/100g, (⁴) Resultados expressos em %, (⁵) ACON (Acerola convencional), (⁶) AOR (Acerola orgânica), (⁷) MCON (Manga convencional), (⁸) MOR (Manga orgânica), (⁹) LCON (Limão convencional), (¹⁰) LOR (limão orgânico).

Tabela 2. Valores médios (média $\pm$ desvio padrão) das amostras dos frutos convencionais e orgânicos com relação aos parâmetros físico-químicos. Letras minúsculas sobrescritas distintas na mesma linha indicam diferença significativa a 5% ($p < 0,05$) os frutos convencionais e orgânicos.

Análises Dia 14						
	ACON ⁵	AOR ⁶	MCON ⁷	MOR ⁸	LCON ⁹	LOR ¹⁰
Sólidos solúveis ¹	6,16 ^a $\pm$ 0,030	5,26 ^b $\pm$ 0,040	10,25 ^b $\pm$ 0,090	10 ^{ab} $\pm$ 0,020	5,25 ^b $\pm$ 0,060	10,25 ^a $\pm$ 0,050
pH	2,73 ^a $\pm$ 0,050	2,04 ^b $\pm$ 0,070	3,43 ^a $\pm$ 0,080	2,66 ^b $\pm$ 0,040	2,14 ^a $\pm$ 0,060	1,54 ^b $\pm$ 0,070
Acidez titulável ³	0,17 ^b $\pm$ 0,723	0,43 ^a $\pm$ 0,713	0,06 ^b $\pm$ 0,428	0,74 ^a $\pm$ 0,041	0,22 ^{ab} $\pm$ 0,510	0,28 ^{ab} $\pm$ 0,633
Cinzas ⁴	2,0 ^a $\pm$ 0,565	1,1 ^b $\pm$ 0,141	1,6 ^b $\pm$ 0,141	1,6 ^b $\pm$ 0,070	1,3 ^a $\pm$ 0,141	1,5 ^b $\pm$ 0,212

(¹) Resultados expressos em ^gBRIX, (³) Resultados expressos em g ác. Cítrico/100g, (⁴) Resultados expressos em %, (⁵) ACON (Acerola convencional), (⁶) AOR (Acerola orgânica), (⁷) MCON (Manga convencional), (⁸) MOR (Manga orgânica), (⁹) LCON (Limão convencional), (¹⁰) LOR (limão orgânico).

Na acerola houve um aumento significativo nos sólidos solúveis do dia 14^o em relação ao dia 1^o. Sendo na amostra convencional no dia 14^o diferença significativa em relação a orgânica. No entanto, de acordo com a PORTARIA N^o 94, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 (MAPA), as acerolas orgânicas quanto as convencionais nos dois tempos estão dentro do padrão estabelecido, não ultrapassando o valor, sendo ele 5,50.

Na característica de sólidos solúveis da manga convencional e orgânica do dia 0 não foi diagnosticada diferença significativa entre elas, no entanto as amostras do dia 14, obtiveram diferença nos resultados, porém o padrão exigido na legislação para esse fruto é 12, sendo assim mesmo havendo alteração nas amostras, essa mudança não afetou no seu padrão, estando todas as amostras dentro dos parâmetros exigidos de acordo com a legislação que fala especificamente do fruto.

Analisando os resultados das amostras de limão convencional e orgânico foi possível observar que houve diferença significativa entre eles nos dois tempos. O teor de sólidos solúveis está acima dos valores obtidos por Viana (2010), (8,5%), e Neves et al. (2008), (8,2%), no estudo do limão *Tahiti*.

Sabendo que a umidade é um dos grandes problemas para a conservação das frutas, os resultados diferiram tanto no em frutos convencionais como orgânico, como no requisito tempo de armazenamento.

Os valores de pH apresentados para mangas convencionais e orgânicas tiveram variações, tanto em relação as amostras quanto ao tempo. Onde que o pH médio apresentado para ambas foi em torno de 3,13

e 3,98. Segundo Neves et al. (2008), avaliando a qualidade físico-química de mangas ‘Tommy Atkins’ em ambiente sem controle da temperatura e umidade relativa (30 ± 3 °C e 70 ± 5 % de UR), verificaram que no âmbito da colheita o pH presente foi de 3,45. A legislação exige pH de 3,3 a 4,5 para garantir a conservação sem a necessidade de tratamentos térmicos muitos elevados, o que colocaria em risco a qualidade da polpa de manga (BRASIL, 2000). Dentro do que a legislação brasileira permite para polpa de manga, mesmo tendo variação está dentro dos padrões estabelecidos pela legislação.

Nas amostras de limão ambas as amostras houveram resultados diferentes. O limão orgânico apresentou uma variação significativa em relação ao tempo, onde que o mesmo apresentou no decimo quarto dia (14) o valor de 1,54 ou seja, por ser uma fruta cítrica, medida de pH de acordo com a (Tabela 2) apresentada acima é considerado abaixo do aceitável. Pois a legislação preconiza que o mínimo deve ser de 2,7 e o máximo de 3,8 (Instrução normativa nº 01, de 7 de janeiro de 2000). Observa-se então que alguns fatores podem ter favorecido esse pH, como o ponto de maturação do fruto, ocasionando um resultado fora do permitido pela legislação.

Os valores médios de pH da acerola foi de 2,4 a 3,25, onde que o resultado obtido na amostra de acerola orgânica no tempo 14 foi um pH muito abaixo, ou seja, de acordo com o resultado apresentado na (Tabela 2) está abaixo do permitido pela legislação que o mínimo é 2,80 para polpa de acerola (BRASIL, 2000).

Segundo os resultados obtidos na análise de acidez total titulável, foi possível observar que houve diferença significativa entre elas tanto no dia 0 como no dia 14, sendo o orgânico mais ácido que o convencional por não sofrer alterações de compostos químicos. De acordo com a PORTARIA Nº 94, do Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento (MAPA), é permitido no mínimo 0,80. Dessa forma nota-se que apesar de haver muita diferença entre elas em ambos os tempos, todas permanecem ainda dentro no padrão segundo a legislação citada acima.

Comparando os resultados com a tabela acima, foi possível observar que que todas as amostras convencionais e orgânicas, do tempo 0 e tempo 14 tiveram diferenças entre si, no entanto destacou-se a manga orgânica do tempo 14 que sofreu uma maior alteração sendo a única amostra que ultrapassou o valor exigido pela legislação, essa alteração está associada ao tempo entre o dia 0 e 14.

Comparando os resultados de acidez do limão convencional e orgânico nos dois tempos, foi possível observar que todos os resultados diferiram entre si sendo o limão orgânico dos dois tempos mais ácidos que os limões convencionais. Todos abaixo do padrão estabelecido pelo Regulamento Técnico para fixação dos padrões de identidade e qualidade para suco de limão, sendo esse padrão máximo 5,0.

Para as quantidades de cinzas, os valores encontrados variaram de 1,4% a 2,0% entre os frutos, com diferença estatística ($p < 0,05$) entre os frutos convencionais e orgânicos. De acordo com MENDONÇA (2006) ao avaliar a Caracterização da composição química e do rendimento dos resíduos industriais do limão Tahiti, foi-se encontrado uns resultados de cinzas para com um percentual de 5,15% para o flavedo do limão, que foram superiores aos encontrados no presente trabalho. Além disso, folhas, cascas e as sementes apresentam os maiores teores de substâncias nutricionalmente importantes, como as fibras e os minerais (VILAS BOAS et al., 2011).

As amostras de manga orgânica não diferiram estatisticamente entre si ($p < 0,05$) nos dias 0 e 14, apresentando estabilidade de minerais em relação aos outros frutos no decorrer do tempo. De acordo com FARAONI (2009), que caracterizou orgânica cultivar ubá, em Minas Gerais da região da Zona da Mata e encontrou resultados de cinzas de 0,74%, que foi de resultado inferior ao obtido no presente trabalho.

As amostras orgânicas apresentaram o dobro de perda de massa do que as amostras convencionais em todos nos três frutos.

4 CONCLUSÃO

A escolha desses frutos é devida o seu alto consumo na região, no qual de acordo com os dados obtidos e discutidos, pode-se concluir que as caracterizações físico-químicas não diferem de forma alarmante os frutos convencionais dos orgânicos, agora diferem nos tempos, devido serem altamente perecíveis, com isso notamos a importância dos cuidados e um armazenamento necessário para prolongar sua vida útil.

REFERÊNCIAS

- [1] BRASIL. Legislação de Instrução normativa Nº 1 de 7 de Janeiro de 2000, do Ministério da Agricultura. Diário Oficial da União, Brasília, Nº 6, 10 de Janeiro de 2000. Seção I, p.54 – 58. Aprova os Regulamentos Técnicos para fixação dos padrões de identidade e qualidade para polpas e sucos de frutas.
- [2] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. PORTARIA Nº 94, (MAPA). Diário Oficial da República Federativa do Brasil, DE 30 DE AGOSTO DE 2016.
- [3] COSTA, B.S.; GUEDES M.M.C.; PINTO F.M.M.; EMPIS, J.; MOLDÃO, M.M. Alternative sanitizing methods to ensure safety and quality of fresh-cut kiwifruit. *Journal of Food Processing and Preservation*, v.38, p.1-10, 2014.
- [4] FARAONI, A. S.; RAMOS, A.M.; STRINGHETA, P.C.; Caracterização da manga orgânica cultivar ubá. *Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais*, v. 11, n. 1, p. 9-14, 2009.
- [5] FIGUEIREDO, N.A.; REIS, D.S.; ALVES, E.; GONÇALVES, E.; ANJOS, F.C.; FERREIRA, M. Determinação de vitamina c e avaliação físico- química em três variedades de acerola cultivadas em Petrolina- PE. *Revista Nucleus* 11(1): 83-92, 2014.
- [6] FREITAS, A.A.; DETONI, A.M.; CLEMENTE, E.; OLIVEIRA, C.C. Determinação de resveratrol e características químicas em sucos de uvas produzidas em sistemas orgânico e convencional. *Revista Ceres*. Vol. 57. Num. 1. p. 1-5. 2010.
- [7] GORENSTEIN, O. Monitoramento de resíduos de agrotóxicos em frutas e hortaliças frescas comercializadas na Ceagesp: análise de resultados de 2003. *Informações Econômicas*, São Paulo, v.34, n.10, out. 2004.
- [8] IBRAF – Instituto Brasileiro de Frutas. Fruticultura, 2009. Disponível em: <http://www.ibraf.org.br/imprensa/0901_FrutasBrasileirasAscensao.asp>. Acesso em: 09 de jan. 2019.
- [9] INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz: Métodos Químicos para Análise de Alimentos. 2. Ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 533 f, 2008.
- [10] JACOB, R. A.; BURRI, B. Oxidative damage and defense. *American Journal of Clinical Nutrition*, Bethesda, v. 63, n. 6, p. 985-990, 1996.
- [11] JAHURUL, M. H. A.; ZAIDUL, I. S. M.; GHAFOR, K.; AL-JUHAIMI, F. Y.; NYAM, KAR-LIN.; NORULAINI, N. NA.; SAHENA, F.; MOHD OMAR, A. K.; Mango (*Mangifera indica* L.) by-products and their valuable components: A review. *Food Chemistry*, v. 183, p. 173-180, 2015.
- [12] KHATOUNIAN CA. A reconstrução ecológica da agricultura. Botucatu: Agroecologia, 348p. 2001.
- [13] KMIĘCIK, W.; LISIEWSKA, Z.; SLUPSKI, J.; Effects of freezing and storage of frozen products on the content of nitrate, nitrites, and oxalates in dill (*Anethum graveolens* L.). *Food Chem*, 86:105-111, 2004.
- [14] MATTOS, L.M.; MORETTI, C.L.; MOURA, M.A.; MALDONADE, I.R.; SILVA, E.Y.Y. Produção segura e rastreabilidade de hortaliças. *Horticultura brasileira*, 27: 408-413. 2009.
- [15] MENDONÇA, L. M. Caracterização da composição química e do rendimento dos resíduos industriais do limão Tahiti (*Citrus latifolia* Tanaka). *Ciência Tecnologia em Alimentos*, v. 26, p. 870-874, 2006.
- [16] NEVES, L.C.; BENEDETTE, R.M.; SILVA, V.X.; PRILL, M.A.S.; ROBERTO, S.R.; VIEITES, R.L. Qualidade pós-colheita de mangas, não refrigeradas, e submetidas ao controle da ação do etileno. *Revista Brasileira Fruticultura*, Jaboticabal, v.30, n.1, p.94-100, 2008.
- [17] OLIVEIRA, B. G.; COSTA, H. B.; VENTURA, J. A.; KONDRATYUK, T. P.; BARROSO, M. E. S.; CORREIA, R. M.; PIMENTEL, E. F.; PINTO, F. E.; ENDRINGER, D. C.; ROMÃO, W. Chemical profile of mango (*Mangifera indica* L.) using electrospray ionisation mass spectrometry (ESI-MS). *Food Chemistry*, v. 204, p. 37-45, 2016.
- [18] OLIVEIRA, J. R. P.; SOARES, W. S.; GRAZZIOTTI, P. H.; KOBAYASHI, A. K. Produção de Mud. In: RITZINGER, R.; KOBAYASHI, A. K.; OLIVEIRA, J. R. P. (Org.). *A cultura da aceroleira*. 1. ed. Cruz das Almas, BA: Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, p. 73-88, 2003.
- [19] SILVA, F.O.; SOUZA, A. M.; OLIVEIRA, E. M. M. Potencial da ozonização no controle de fitopatógenos em pós-colheita. In: Luz, W. C. da. (org.). *Revisão anual de patologia de plantas*. 1.ed. Passo Fundo: Gráfica e Editora Padre Berthier dos Missionários da Sagrada Família, v.21, p.96-130. 2013.
- [20] TRIGO, M.J.; SAPATA, M.M.; FERREIRA, A.; RAMOS, A.C.; SOUSA, M.B.; ANDRADA, L.; MARTINS, M.P.; SERRANO, M.C. Sumo de limão concentrado (parte II/II) Estabilidade durante o armazenamento. *Tecnoalimentar* n.º4 - Transformação: 4-8. 2015.
- [21] VIANA, D. S. Lima ácida (*Citrus latifolia*, Tanaka), cv. Tahiti, de cultivos convencional e orgânico biodinâmico: avaliação da capacidade antioxidante dos sucos in natura e clarificados por membranas de microfiltração. *Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro*, Rio de Janeiro, 100f, 2010.
- [22] VILAS, B. Manejo de Resíduos da Agroindústria. *Revista de Lavras: UFLA/FAEPE*, 110 p. 2001.

Capítulo 2

Avaliação físico-química, quimiométrica e sensorial de iogurte grego

Pablo Henrique Franco Santos de Souza

Larysse Vasconcellos Pacheco

Lisa Maria Mendes de Almeida Souza

Marcos Antônio Moura da Silva Filho

Allyson Allennon Pinheiro do Rosário

José Marcos Nobre de Moura Júnior

Zimara Nyusa de Melo Tavares

Charles Alberto Brito Negrão

Ewerton Carvalho de Souza

Antonio dos Santos Silva

Resumo: O iogurte grego tradicional é um produto de textura e consistência um pouco mais densa comparada aos outros iogurtes presentes no mercado, encontra suas raízes na criação de ovelhas por pastores da península balcânica, sendo este de uma receita milenar. No Brasil, ganhou terreno no ano de 2012 e conseguiu se expandir para diferentes marcas. Este trabalho teve como objetivo realizar a análise físico-química e sensorial do iogurte grego, de modo a verificar a aceitabilidade e preferência entre duas marcas conhecidas no mercado, aqui nomeadas de A e B, sendo estas adquiridas em supermercados de Belém, logo em seguida foi feita a discriminação via análise de componentes principais (PCA). A condutividade elétrica obtida foi de 1,44 mS/cm (A) e 1,29 mS/cm (B). Os valores de pH encontrados foram próximos de 4,0 para ambas as marcas. Os teores de sólidos solúveis encontrados foram 21,44° Brix (A) e 19,4° Brix (B). A densidade foi de 1,11 g/mL (A) e 1,13 g/mL (B), respectivamente. Os teores de umidade encontrados foram de 73,68 % (A) e 74,29 % (B). Ao se aplicar PCA aos valores encontrados e que mostraram diferença significativa, conforme teste t de Student ($p < 0,05$), se observou uma perfeita discriminação das amostras conforme a marca de iogurte estudada.

Palavras-chave: Alimento, Análise multivariada, Controle de qualidade.

1. INTRODUÇÃO

O iogurte é um produto derivado do leite, sendo uma espécie de coalhada que recebeu a ação de bactérias fermentadoras que produzem ácido láctico. Sua origem remete aos povos europeus do oriente e árabes. Sendo, atualmente, produzido em vários países com distintos nomes.

A palavra iogurte, da qual nos servimos, segundo a literatura estrangeira da Europa e da América, para designar um produto similar feito com leite de vaca, mesmo com fermento búlgaro "maya", só é empregado entre nós pela população turca. Tem certamente origem árabe, como também a palavra "maya" (BEHMER, 1984).

Considerado um produto de origem ovina, o verdadeiro iogurte grego tem um sabor azedo e é tido como um alimento nutricional, e muitas vezes terapêutico pela sua qualidade digestiva, para os povos da península balcânica. O que diferencia um iogurte grego dos demais é a sua textura e consistência que é um pouco mais cremosa, porém deve-se levar em consideração que por ser uma receita antiga tem muitas variáveis.

As diferenças se dão pela falta de definição do conceito "iogurte grego". O iogurte grego, mas grego mesmo, feito e consumido em larga escala na Grécia, costumeiramente é caseiro. E como qualquer comida caseira, cada casa tem a sua receita, a depender do gosto pessoal (FERREIRA, 2014).

No Brasil, existe um amplo mercado de iogurtes gregos, sendo este visto, muitas vezes, como um produto sofisticado. O primeiro iogurte com o rótulo grego foi lançadas em 2012, logo em seguida, muitas outras marcas foram incluindo o grego em seu rol. No momento presente, foram produzidos iogurtes gregos saborizado, com frutas, light, etc.

2. OBJETIVOS

Este trabalho teve como objetivo realizar um estudo de parâmetros físico-químicos e uma análise sensorial de iogurtes gregos com a intenção de contribuir para o controle de qualidade do produto, e aplicar análise multivariada (PCA) para distinguir as amostras conforme a fábrica produtora.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. AMOSTRAS

Foram coletadas dez amostras de duas marcas distintas, aqui denominadas de A e B, em supermercados de Belém do Pará. Em seguida, as amostras foram levadas para o Laboratório de Física Farmacêutica, da Faculdade de Farmácia, da Universidade Federal do Pará (UFPA) para se realizar as análises físico-químicas, seguindo metodologias estabelecidas pelas normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008). Tais amostras foram mantidas a temperatura de cerca de 4º C, em geladeiras, até o momento das análises. Para uma melhor condução dos procedimentos metodológicos, as amostras sofreram homogeneização prévia antes de cada análise efetuada.

3.2. PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

3.2.1. DETERMINAÇÃO DO PH

Para a determinação do pH, pesou-se 5 g das amostras de iogurte que foram dissolvidos em 50 mL de água destilada. Na solução resultante, introduziu-se o eletrodo de um pHmetro (HandLab 2) previamente calibrado com soluções tampão de pH 4,0 e 7,0. A leitura foi realizada diretamente no visor do aparelho.

3.2.2. SÓLIDOS SOLÚVEIS TOTAIS (SST)

Determinados através de leitura direta em refratômetro portátil (ATAGO 090), colocando-se sobre o prisma 1 gota da amostra de iogurte. Os resultados foram expressos em ° Brix.

3.2.3. UMIDADE

Pesou-se aproximadamente 3 g da amostra em cápsula de porcelana, previamente seca e tarada, colocada em estufa a 105° C até peso constante. Em seguida foi colocada em dessecador até a temperatura ambiente e logo após pesada. Os resultados foram expressos em porcentagem (%) e obtidos pela equação (1), onde m_{ca} é a massa da cápsula com a amostra já seca; m_c a massa da caçarola e m_a é a massa inicial da amostra.

$$\text{Umidade (\%)} = \left[100 - \left(\frac{m_{ca} - m_c}{m_1} \right) \cdot 100 \right] \quad (1)$$

3.2.4. DENSIDADE

Para calcular a densidade foram introduzidos 10 mL de iogurte em uma proveta previamente tarada e o conjunto foi pesado em uma balança analítica. Calculou-se os valores de densidade através da equação (2).

$$d = \frac{m}{v} \quad (2)$$

onde d é a densidade (g/mL), m é a massa da amostra (g) e v é o volume da amostra (10 mL).

3.2.5. CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Para a determinação da condutividade elétrica (CE) foi adicionado à mesma solução preparada para a medição de pH, o eletrodo de um condutivímetro portátil (Instrutherm CD 080), previamente calibrado com solução padrão de 1,43 mS/cm, indicando a condutividade elétrica da solução diretamente no visor do aparelho.

3.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Aos dados físico-químicos encontrados e que ao se aplicar o teste t de *Student* com 95 % de significância se mostraram estatisticamente diferentes conforme a empresa produtora se aplicou a técnica multivariada de análise de componentes principais (PCA), empregada aos dados previamente padronizados, para se verificar a separação das amostras conforme as marcas produtoras de iogurte grego, e para tal se fez uso do programa MINITAB 14.

3.4. ANÁLISE SENSORIAL

Nesse estudo foi empregada uma ficha de avaliação (figura 1) para o teste de aceitação utilizando escala hedônica de 9 pontos ou categorias, a qual foi aplicada a 100 provadores não treinados. A elaboração de tal ficha seguiu as recomendações de Memim (2013). As amostras foram codificadas e apresentadas em copos plásticos de 50 mL, sendo solicitando aos provadores para que avaliassem as amostras A e B, e, entre a degustação de uma e outra amostra, foi solicitado que bebessem um pouco de água (para lavar o palato).

Figura 1 – Ficha para análise sensorial.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – FACULDADE DE FARMÁCIA

PESQUISA DE ACEITAÇÃO DE IOGURTE GREGO ORIGINAL

ENTREVISTADO: _____ DATA: _____ IDADE: _____ SEXO: () M () F

1- Experimente cada uma das amostras servidas a você, sendo que entre cada provação, beba um pouco de água, por favor, depois, de uma nota para cada amostra servida conforme a escala abaixo.

(1) Desgostei extremamente

(2) Desgostei muito

(3) Desgostei moderadamente

(4) Desgostei ligeiramente

(5) Nem desgostei, nem gostei

(6) Gostei ligeiramente

(7) Gostei moderadamente

(8) Gostei muito

(9) Gostei extremamente

Amostra: _____ Nota: _____

Amostra: _____ Nota: _____

2- Qual amostra você preferiu? R: _____

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Os resultados das cinco análises físico-químicas realizadas estão dados na Tabela 1, onde são apresentados valores médios de três determinações por amostra, seguido do desvio padrão.

Tabela 1 – Resultados dos cinco parâmetros estudados, para as duas marcas de iogurte grego

Amostra	Umidade (%)	C.E (mS/cm)	SST (° Brix)	pH	Densidade (g/mL)
A1	70,65 ± 0,72	1,46 ± 0,00	21,00 ± 0,00	4,13 ± 0,06	1,07 ± 0,03
A2	84,49 ± 2,50	1,45 ± 0,01	21,67 ± 0,58	4,03 ± 0,06	1,10 ± 0,03
A3	65,62 ± 9,91	1,45 ± 0,01	22,00 ± 0,00	4,10 ± 0,00	1,07 ± 0,02
A4	69,36 ± 7,05	1,45 ± 0,01	21,67 ± 0,58	4,10 ± 0,00	1,23 ± 0,19
A5	78,34 ± 6,96	1,45 ± 0,02	21,00 ± 0,00	4,10 ± 0,00	1,10 ± 0,01
A6	73,53 ± 0,33	1,43 ± 0,00	21,00 ± 0,00	4,10 ± 0,00	1,14 ± 0,03
A7	74,16 ± 1,18	1,44 ± 0,00	21,67 ± 0,58	4,10 ± 0,00	1,09 ± 0,01
A8	73,98 ± 0,17	1,44 ± 0,00	21,67 ± 0,58	4,10 ± 0,00	1,10 ± 0,03
A9	74,06 ± 0,33	1,43 ± 0,00	21,33 ± 0,58	4,10 ± 0,00	1,12 ± 0,01
A10	74,12 ± 0,40	1,43 ± 0,00	21,33 ± 0,58	4,10 ± 0,00	1,12 ± 0,03
Geral	73,68^a ± 9,02	1,44^a ± 0,01	21,43^a ± 0,50	4,10^a ± 0,03	1,11^a ± 0,07
B1	80,53 ± 1,62	1,32 ± 0,02	19,00 ± 1,00	4,10 ± 0,00	1,07 ± 0,03
B2	72,87 ± 0,81	1,29 ± 0,02	19,00 ± 1,00	4,10 ± 0,00	1,10 ± 0,03
B3	80,00 ± 4,40	1,31 ± 0,00	18,67 ± 0,58	4,03 ± 0,06	1,07 ± 0,02
B4	76,00 ± 3,09	1,30 ± 0,02	19,67 ± 0,58	4,10 ± 0,00	1,23 ± 0,19
B5	71,92 ± 1,43	1,30 ± 0,02	18,67 ± 0,58	4,10 ± 0,00	1,10 ± 0,01
B6	72,32 ± 1,38	1,31 ± 0,00	20,33 ± 1,15	4,10 ± 0,00	1,14 ± 0,03
B7	73,99 ± 2,17	1,30 ± 0,02	20,00 ± 0,00	4,10 ± 0,00	1,09 ± 0,01
B8	72,30 ± 1,32	1,27 ± 0,00	19,67 ± 1,15	4,10 ± 0,00	1,10 ± 0,03
B9	71,85 ± 0,39	1,28 ± 0,00	19,33 ± 0,58	4,03 ± 0,06	1,12 ± 0,01
B10	71,73 ± 0,36	1,27 ± 0,01	19,67 ± 0,58	3,97 ± 0,06	1,12 ± 0,03
Geral	74,29^a ± 1,30	1,29^b ± 0,02	19,40^b ± 0,85	4,08^a ± 0,05	1,13^a ± 0,05

Legenda: A e B são as marcas estudadas. C.E = condutividade elétrica; SST = sólidos solúveis totais. Mesma letra nas médias das duas marcas significa não haver diferença significativa conforme o teste t de *Student* ($p > 0,05$) (VIEIRA, 2011).

Na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO, 2011), os valores de referência para a umidade de iogurte natural é de 90 %, porém, a umidade das amostras de iogurte grego estão mais próximas as de queijos *petit suisse* com 72,2 %, já que os valores médios obtidos foram iguais a 73,68 % e 74,29 %, respectivamente para as marcas A e B.

Conforme Aldrigue et al. (2002, apud MARTINS et al. 2013), a umidade de um alimento está relacionada com sua estabilidade, qualidade e composição e pode afetar o armazenamento, a embalagem e o processamento. Desta forma, os valores de umidade encontrados para os produtos em análise, por mais que não estejam próximos aos estabelecidos pela legislação pertinente ao produto, atesta uma boa qualidade destes iogurtes frente à ação de deterioração microbiológica.

Ao falar sobre Condutividade Elétrica (CE), estamos falando sobre a possibilidade de determinados materiais conduzirem energia elétrica, o que, geralmente, se deve aos sais dissolvidos em solução. Os valores médios de condutividade elétrica foram de 1,44 mS/cm e 1,29 mS/cm, respectivamente para A e B. Desta forma, a marca A apresenta uma formulação que, provavelmente, contenha mais sais.

Conforme Chaves et al. (2004), os sólidos solúveis totais (SST) não representam a água, porém todas as demais composições de uma determinada matéria-prima que entra em ebulição a temperaturas inferiores ou iguais a 105° C, e, na análise de alimentos, contribui para verificar o teor de açúcares presente em um produto. Os teores de sólidos solúveis totais foram de 21,44° Brix e 19,4° Brix para os iogurtes gregos das marcas A e B, respectivamente, estando estes distantes das normas da legislação brasileira que determina um valor de 15 a 18 °Brix. Todavia, segundo Varnan *et al.* (1995, apud Ramos *et al.* 2009) o iogurte grego é produzido com um processo de dessoragem, assim, com uma significativa concentração de sólidos totais, não tendo valores de referência específicos.

Segundo Umbelino *et al.* (2001, apud MARTINS *et al.* 2013), o pH ideal está na faixa de 4,50 a 4,60. De maneira, que os valores de pH encontrados foram iguais 4,10, para a marca A e 4,08 para a marca B, estando estes resultados de acordo com a legislação brasileira que estipula 3,6 a 4,5, e o descrito por Umbelino et al. (2001).

De acordo com Klein e Richards (2003, apud Mantovani *et al.* 2012) na produção de iogurte costuma-se aumentar a quantidade de sólidos totais presentes no leite através da adição de leite em pó, concentrado proteico de soro e soro de leite, além de outros ingredientes.

Para densidades foram encontrados os seguintes valores 1,11 g/mL e 1,13 g/mL para as marcas de A e B respectivamente.

4.2. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Aos dados dos parâmetros físico-químicos que apresentaram diferenças significativas ao se aplicar o teste t de Student, foi aplicado à análise de componentes principais (PCA) que gerou o gráfico contido na Figuras.

Figura 2 – Gráfico das duas componentes principais.

Percebe que a análise de componentes principais (PCA) aplicada aos dados físico-químicos referentes às amostras de iogurte grego se mostrou satisfatória para discriminar as amostras de acordo com a origem das amostras (fábricas produtoras), haja vista que se formaram dois conjuntos bem distintos na Figura 2.

4.3. ANÁLISE SENSORIAL

Os provadores eram 52 % do gênero masculino, sendo predominantemente da faixa etária entre 16 a 20, com 46 %; entre 21 e 25 eram 44 %; entre 26 e 29 eram 8 %; entre 30 a 46 eram 2 %. Os entrevistados preferiram a marca A, com 52 % de preferência. Todavia, ao se analisar as notas dadas por esses mesmos provadores, obtiveram-se as notas médias de 7,18 e 6,94, respectivamente para a marca A e B, confirmando a preferência sugerida.

5. CONCLUSÃO

Todas as análises empregadas foram para avaliar a qualidade e aceitação das duas marcas testadas. Todos os processos aplicados foram de essencial contribuição para os resultados. Os parâmetros físico-químicos realizados inferiram que as amostras A e B apresentaram valores de pH semelhantes e próximos a 4, estando de acordo com a literatura.

Para os teores de sólidos solúveis totais e condutividade elétrica as amostras das marcas A e B diferiram em seus resultados, evidenciando que tais marcas apresentam formulações distintas.

Para densidade e umidade os resultados estatísticos não foram significativamente diferentes, porém, a umidade das amostras Grego, em relação a iogurtes convencionais, mostraram uma diferença na umidade, demonstrando assim uma proximidade de umidade do iogurte grego com queijos *petit suisse*.

A aplicação de análise de PCA em relação aos dados físico-químicos revelou uma separação total das duas amostras, mostrando que os testes foram efetivos para a distinção das marcas.

REFERÊNCIAS

- [1] BEHMER, M. L. A. Tecnologia do leite: leite, queijo, manteiga, caseína, iogurte, sorvetes e instalações: produção, industrialização, análise. São Paulo: Nobel, 1984.
- [2] CHAVES, M.C.V.; GOUVEIA, J.P.G.; Almeida, F.A.C.; Leite, J.C.A.; Silva, F.L.H. O. Caracterização físico-química do suco da acerola. Rev. Biol. Ciênc. Ter., v 4, 2004.
- [3] FERREIRA, G. S. Iogurte grego do Brasil, só mesmo no Brasil. Disponível em: < <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral, iogurte-grego-do-brasil-so-mesmo-no-brasil, 177996e> > Acesso em: 17 mar. 2019.
- [4] INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas Analíticas do instituto Adolfo Lutz. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008.
- [5] MANTOVANI, Daniel et al. Elaboração de iogurte com diferentes concentrações de sólidos totais, análise físico-química e perfil da textura. Disponível em: < <https://periodicos.utfpr.edu.br/rbta/article/view/777/886> > Acesso em: 31 mar. 2019.
- [6] MARTINS, G. H. et al. Perfil físico-químico, sensorial e reológico de iogurte elaborado com extrato hidrossolúvel de soja e suplementado com insulina. Disponível em: < <http://www.deag.ufcg.edu.br/rbpa/rev151/Art1510.pdf> > Acesso em: 31 mar. 2019.
- [7] MINIM, V. P. R. Análise Sensorial: estudos com consumidores. Viçosa, MG: UFV, 2013.
- [8] RAMOS, T. M. Perfil de Textura de Labneh (Iogurte grego). Disponível em: < <https://www.revistadoilct.com.br/rilct/article/view/85/90> > Acesso em: 17 mar. 2019.
- [9] TACO. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. São Paulo: NEPA- UNICAMP, 2011.
- [10] VIEIRA, S. Introdução à Bioestatística. 4ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

Capítulo 3

Produção e avaliação físico-química de uma cerveja artesanal puro malte com adição de extratos de Syzygium aromaticum e Cinnamomum zeylanicum

Jaqueline Santos Mesquita

Janyne Palheta Ramos

Gustavo Oliveira Everton

Silvio Carlos Coelho

Victor Elias Mouchrek Filho

Resumo: Este trabalho produziu uma cerveja artesanal puro malte seguindo as características do estilo German Pilsen com de adição dos extratos de Syzygium aromaticum (cravo-da-índia) e Cinnamomum zeylanicum (canela) a formulação da bebida produzida. Para produção da bebida fez-se uso dos processos de moagem do malte, mosturação, clarificação, fervura, resfriamento, fermentação, maturação, carbonatação e envase. De acordo com os resultados, a cerveja foi classificada segundo a legislação em função das características da fermentação e do produto acabado e, ao avaliarmos os parâmetros extrato primitivo, observa-se que o resultado de 12,21 pode ser classificado como cerveja extra ($EP \geq 12\%$ e $\leq 14\%$); o álcool em volume (%v/v), o qual obteve-se resultado de 5,2, foi classificada como cerveja de alto teor alcoólico, e que se enquadra dentro do limite do estilo German Pilsen, 4,4 a 5,2%. Em relação ao amargor, o valor de 17,82 está abaixo da faixa limite especificado pelo Beer Judge Certification Program – BJCP, porém dentro da faixa de uma Belgian Blonde Ale (IBU entre 15 e 30). A elaboração da cerveja utilizando ingredientes diferenciados acrescentaram atributos característicos ao produto. Com isso, o desenvolvimento desses produtos com sabores e aromas variados vem ao encontro das necessidades atuais do consumidor.

Palavras-chave: cerveja puro malte; especiarias; análise físico química.

1. INTRODUÇÃO

A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida no mundo, estando presente na alimentação humana desde 8000 a.C. Têm grande aceitação popular devido aos seus atributos sensoriais, junto com seus benefícios a saúde, valor nutritivo e diversidade de apresentação¹. É definida pela legislação brasileira como sendo a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro oriundo de malte de cevada e água potável, por ação de levedura, com adição de lúpulo².

A cerveja especial ou artesanal é uma categoria que abriga as cervejas de qualidade superior e de alto valor agregado. Em geral, estas utilizam receitas ou processos de fabricação diferentes das de fabricação em larga escala. Caracterizam-se por serem feitas com alguma diferenciação quando comparada com as cervejas industriais mais populares, sendo produzidas em pequena escala, por um processo de fermentação relativamente lento³.

A cerveja artesanal tem a capacidade de aliar um produto de alta qualidade voltado para um público cada vez mais rigoroso com suas escolhas de consumo, uma vez que a qualidade é o critério de maior importância na avaliação do consumidor para compra de cervejas diferenciadas⁴. O mercado brasileiro de cervejas tem ganhado destaque na última década, se fixando entre os quatro maiores do mundo, juntamente com China, Estados Unidos e Alemanha. A cerveja tipo Pilsen é líder absoluta de preferência entre o consumidor brasileiro, correspondendo a 98% do total consumido⁵.

As especiarias são tradicionalmente utilizadas para agregar sabor ou aroma aos alimentos e bebidas. A canela é uma das mais conhecidas e utilizadas, sendo reconhecida por possuir diversas propriedades benéficas à saúde, dentre elas a atividade antimicrobiana, antioxidante, anti-inflamatória e sobre o controle glicêmico. Vários relatos abordaram as numerosas propriedades da canela nas formas de casca, óleos essenciais, casca em pó e compostos fenólicos, e cada uma dessas propriedades pode desempenhar um papel fundamental na saúde humana. Ao observar todos os benefícios que a canela pode trazer à saúde, associado ao seu sabor e aroma agradável, é interessante introduzi-la na alimentação. Ela pode ser consumida na forma de chá, aromatizante de bebidas ou salpicá-la em cima de frutas⁶.

Assim com a canela, outra especiaria muito interessante para estudos acadêmicos, é o cravo-da-índia (*Syzygium aromaticum*), que é uma gema floral seca, e vem sendo usado principalmente como condimento na culinária, devido ao seu marcante aroma e sabor, conferido por um composto fenólico volátil, o eugenol⁷. Sua composição química é constituída principalmente por eugenol, acetato de eugenol, betacariofileno, ácido oleânico, e substâncias das classes: triterpeno, ceras vegetais, cetonas, resinas, taninos e esteróis. O eugenol apresenta efeito anti-inflamatório, cicatrizante, analgésico e é eficaz no combate e diminuição de bactérias presentes na boca. Seus efeitos medicinais compreendem o tratamento de náuseas, flatulências, indigestão, diarreia. Com propriedades antibactericidas é também usado como anestésico e antisséptico para o alívio de dores de dente⁸.

Em virtude da globalização o que tange as bebidas alcóolicas, e a preocupação e interesse dos consumidores em apreciarem tipos variados deste produto, utilizando-se de fórmula especificada no “guia de estilos de cervejas BJCP 2015”, em que o objetivo é a obtenção de uma cerveja artesanal que apresente características peculiares dos extratos das especiarias adicionadas durante o processo de produção, visando disponibilizar ao banco de dados novas fórmulas que atendam aos interesses de micro cervejeiros que estão cada vez mais inseridos neste ramo. Assim, os diversos tipos de cerveja existentes estão mais acessíveis, e os fabricantes são estimulados a produzir e disponibilizar inúmeras variações da bebida no mercado, buscando atender esse novo desejo do consumidor⁵. Portanto, este estudo teve por objetivo a produção de uma cerveja artesanal, estabelecendo uma formulação seguindo os parâmetros adaptados de uma cerveja German Pilsen recebendo de forma inédita a adição de extratos hidroalcoólicos de *Syzygium aromaticum* e *Cinnamomum zeylanicum*, avaliando a qualidade da cerveja artesanal produzida por meio dos parâmetros físicos químicos e comparando-os com os especificados pela legislação vigente⁹.

2. METODOLOGIA

Foi padronizada a formulação da cerveja que teve como intuito seguir o estilo de uma German Pilsen e foram também realizados o preparo e o controle físico-químico da cerveja elaborada.

As metodologias e técnicas empregadas nos procedimentos tiveram como base o Manual de Métodos Químicos e Físico-químicos para análises de alimentos do Instituto Adolf Lutz¹⁰ usando como parâmetros as respectivas instruções normativas e decretos dos ingredientes analisados.

A cerveja foi elaborada utilizando 26 L de água mineral, malte pilsen 5 kg, lúpulo de amargor (Magnum) 15,23 g, lúpulo de aroma (Tradition) 15,23 g, levedura Yeast – M15- Empire Ale 11,5 g, para volume de 20 litros. A cerveja estilo German Pilsen possui as características apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. Característica da cerveja estilo German Pilsen

Parâmetros	Dados do Estilo
IBU (Amargor)	25 – 45
SRM (Cor - referência americana)	2 – 5
ABV (Teor alcoólico)	4,4 – 5,2
OG (Densidade inicial)	1,044 – 1,050
FG (Densidade final)	1,008 – 1,013

Fonte: Beer Judge Certification Program-BJCP

Foram utilizados 14 litros de água no processo de brassagem, sendo que 4 litros previstos por serem absorvidos pelos grãos e 2 litros previstos pela evaporação durante a fervura. Para lavagem dos grãos foram utilizados 12 litros de água e 22 litros para iniciar a fervura, conforme mostra a Tabela 2.

Tabela 2. Cálculo da água de processo

Água	Volume (l)
Volume inicial da água (VIA)	14
Volume da água absorvido pelos grãos (VAAG)	4
Volume da água evaporado na fervura (VAEF)	2
Volume da água na lavagem dos grãos (VALG)	12
Volume inicial da fervura (VIF)	22

2.1. MOAGEM

Pesou-se 5 kg do malte de cevada. O malte foi moído de forma artesanal utilizando o moedor manual para expor o endosperma amiláceo a ação enzimática e utilizar as cascas do malte na filtração do mosto (Figura 1).

Figura 1. Malte após o processo de moagem

A moagem e a determinação da eficiência da moagem, seguiu-se a metodologia da microcervejaria DRAGON. Realizou-se o peso do malte e da eficiência da moagem conforme as Equações. 1 e 2.

Eq. 1:

$$PTM = 5 \times V_{\text{cerveja}} \text{ (L)} \times [OG - SG]$$

Onde: V_{cerveja} : Volume da Cerveja; OG: Densidade Inicial; FG: Densidade Final; SG (densidade original) = $1 + \sum K_1 \times (M_{\text{adjuntos}} / V_{\text{mosto}})$.

Eq. 2:

$$\text{Eficiência da Moagem} = \frac{\text{Massa do malte moído (g)}}{\text{Massa do malte em grão (g)}}$$

A cor potencial foi obtida através da Tabela 3 de equivalência de malte do fornecedor (INDUPROPRIAL).

Tabela 3. Determinação da cor cerveja

Malte	Porcentagem (%)	Peso (kg)	Cor (EBC)	Cor Potencial (°L/Kg/Litro)
Pilsen	100	1,9	4	$4 \times 4,24 = 8,056$
Total	100	1,9	-	-

O resultado da cor potencial (Equação 3) foi de 16,96 e a cor inicial (Equação 4) (EBC), que foi corrigida para (SRM) = 9 através do gráfico de Daniels (11).

Eq. 3:

$$\text{Cor potencial (°L/kg/L)} = 4,24 \times \text{Cor (EBC)}$$

Eq. 4:

$$\text{Cor inicial} = \frac{\sum \text{Pesos dos Maltes} \times \text{Cor Potencial}}{\text{volume de Cerveja (L)}}$$

2.2. BRASSAGEM

Colocou-se 14 litros de água a uma temperatura de 50 °C durante 30 minutos e em seguida foi adicionado todo o malte moído ajustando a temperatura para 65 °C (Figura 2).

Figura 2. Processo de brasagem

Essa etapa objetivou solubilizar as substâncias do malte em água, promover a goma ou pasta e hidrolisar o amido transformando-o em açúcar. Elevou-se a temperatura para 65 °C por 40 minutos, após esse tempo elevou-se novamente a temperatura para 72 °C por 20 minutos. Para a inativação das enzimas elevou-se a temperatura para 78 °C durante 10 minutos. De 30 em 30 minutos mediu-se a densidade, o °Brix e realizou-se o teste de iodo a fim de verificar a sacarificação do malte (Figura 3).

Figura 3. Teste de sacarificação

2.3. RECIRCULAÇÃO, LAVAGEM DOS GRÃOS E FILTRAÇÃO

Após os 90 minutos do processo de brassagem o mosto foi recirculado, coletando-se o líquido da parte inferior da panela e adicionado sobre superfície dos grãos para clarificar o mesmo (Figura 4) por um tempo de 10 minutos com o fogo desligado e deixando o mesmo menos turvo possível (Figura 5). Depois de recolhido o mosto clarificado e filtrado transferiu-o para outro recipiente realizando-se a lavagem dos grãos (Sparge), através de uma colher de metal perfurada com 12,445 litros de água a uma temperatura variando entre 75-77 °C para extração dos açúcares residuais até completar o volume inicial de fervura de 22 litros de mosto.

Figura 4. Processo de recirculação, lavagem e filtração dos grãos

Figura 5. Mosto clarificado

2.4. FERVURA

Após a filtração, o mosto foi submetido à 1 hora de fervura (Figura 6), adicionando-se 15,23 g do lúpulo de amargor Magnum no início da fervura e 15,23 g do lúpulo de aroma Tradition a 15 minutos do final (Equação 5, Tabela 4).

Figura 6. Mosto submetido ao processo de fervura

Eq. 5:

$$\text{Peso do Lúpulo (PL)} = 2,5 \times \sum \alpha \text{ AA\%} + \sum \beta \text{ AA\%} / 100$$

Tabela 4. Cálculo do peso do lúpulo e o amargor em IBU

Porcentagem	Lúpulo	α - ácido	β - ácido	Peso (g)	Tempo
50%	Magnum	10 - 14 %	4,5 - 7 %	15,23	60 minutos
50%	Tradition	3,5 - 7%	3 - 6 %	15,23	15 minutos

A verificação do amargor em IBU foi calculada pela fórmula de Ranger (Equação 6)¹¹.

Eq. 6:

$$\text{IBU} = \frac{0,1 \times \text{Fator de utilização} \times \text{AA\%} \times \text{Massa do lúpulo}}{\text{volume (L)} \times C_1}$$

Onde: C_1 = Fator de ponderação em função da densidade original (OG); AA% = Ácidos alfa característicos de cada lúpulo (Tabela disponibilizada pelo fornecedor); V = Volume cerveja produzido em litros.

A taxa de evaporação horária e total foi calculada com base na Equação 7.

Eq. 7:

$$\text{Taxa de evaporação horária e total (TE\% /h)} = \frac{(\text{volume inicial} - \text{volume final}) \times 60 \times 100}{\text{volume inicial} \times \text{tempo (min)}}$$

Onde: volume Inicial = volume da caldeira cheia; volume final = volume de apronte; tempo (min.) = tempo de fervura.

O rendimento prático foi calculado com base na Eq. 8.

Eq. 8:

$$\text{Rendimento prático (\%)} = \frac{\text{Vol(hl)} \times 0,96 \times \text{Extrato} \left(\frac{\text{kg}}{\text{hl}} \right) \times 100}{\text{Total de materia prima (kg)}}$$

Onde: Vol (hl) = volume de preparo; Extrato (kg/hl) = extrato em grau Plato (°P); 0,96 = taxa de compensação; Obs: Em termos de processo cervejeiro atualmente o rendimento varia em torno de 70 - 75%.

2.5. RESFRIAMENTO E AERAÇÃO DO MOSTO

Após a o processo de fervura introduziu-se o Chiller de imersão no mosto quente e fez o whirlpool (vórtex no fundo da panela) e conectou-se a água da torneira (Figura 7).

Figura 7. Introdução do chiller de imersão ao mosto quente

Quando a temperatura atingiu próximo de 30 a 35 °C, colocou-se a panela no banho de gelo para que a mesma ficasse entre 15 - 22 °C (Figura 8); temperatura ideal para a fermentação da levedura. Em seguida retirou-se o mosto resfriado passando para o fermentador, a fim de fazer a separação do trub (sedimento). Depois com uma colher de polietileno esterilizada, aerou-se o mosto durante 5 minutos (dosagem de oxigênio entre 7 – 9 mg. L⁻¹).

Figura 8. Resfriamento em banho de gelo

2.6. FERMENTAÇÃO

Foi transferido todo o mosto resfriado e clarificado para o balde fermentador com cuidado de não levar resíduo no fundo da panela. A levedura (Yeast – M15 – Empire Ale), utilizada, foi hidratada com 100 mL de água destilada estéril, e em seguida, foi inoculada no balde fermentador com sistema de airlock deixando-a fermentar a uma temperatura regulada por um termostato a 20 °C por um período de 10 dias. O procedimento experimental descrito pode ser observado na Figura 9.

Figura 9. Fermentação (a) hidratação da levedura (b) inoculação da levedura (c) fermentador com o sistema de airlock

2.7. MATURAÇÃO

No processo de maturação o mosto fermentado permaneceu no mesmo fermentador, onde foi feita a diminuição da temperatura para 3 °C por 10 dias. A partir do terceiro dia foram injetados os extratos de *Syzygium aromaticum* (cravo-da-índia) e *Cinnamomum zeylanicum* (canela).

A temperatura foi mantida constante com o objetivo de clarificar a cerveja. Além de inativar totalmente a levedura e decantá-la para o fundo do fermentador aumentando a clarificação tornando-a mais límpida.

2.8. PREPARO DOS EXTRATOS

Foram preparadas duas soluções, a primeira com 10g de canela em pó para 150mL de água e outra solução de 1g de cravo da índia para 150 mL de água destilada. Ambas foram submetidas a aquecimento na chapa aquecedora até início da fervura e deixou-se ferver por 5 minutos. Os extratos foram filtrados e injetados na cerveja.

2.9. PRIMING

Para realização do Priming fez-se uma solução de água com açúcar refinado na proporção de 200 g para 300 mL de água aquecendo até a dissolução e ebulição durante 5 minutos (Figura 10).

Figura 10. Preparo do açúcar invertido

A partir dessa solução foi retirado 6,3 mL para cada garrafa de 600 mL. O cálculo para o Priming foi feito segundo a fórmula de Dias (Equação 9)¹¹.

Eq. 9:

$$Q_p = R \times [\text{Vol. de CO}_2 - \text{Vol. de CO}_2 \text{ Residual}] \times V(\text{L}) \text{ ou (g) cerveja}$$

Onde: Q_p = Peso do Priming em gramas para referida carbonatação; Vol. de CO_2 = volume de dióxido de carbono necessário conforme o estilo de cerveja (2.6); Vol. de CO_2 Residual = volume de dióxido de carbono produzido na fermentação da cerveja e ainda impregnado na mesma. (0,85); R = uma constante referente ao açúcar de cana (4); V = Volume de cerveja produzida em litros.

2.10. ENVASE

Para o envase foram utilizadas garrafas de vidro de 600 mL, e tampas metálicas, onde foram colocados em álcool 70° para prevenir contaminação da cerveja e para a fixação das tampas nas garrafas foi utilizado o arrolhador metálico.

Figura 11. Envase (a) higienização das garrafas de vidro (b) fixação das tampas metálicas após preenchimento das garrafas (c) cerveja envasada

2.11. CONTROLE DE QUALIDADE DA CERVEJA

Para a realização das análises do controle de qualidade da cerveja fez-se uso da metodologia e tabelas preconizadas pelo Manual de Métodos Químicos e Físico-Químicos para Análises de Alimentos do Instituto Adolf Lutz – IAL (2008)¹⁰. Os parâmetros analisados foram: densidade relativa, teor alcoólico em volume (%v/v), teor alcoólico em massa (%m/m), extrato real (%m/m), extrato aparente (%m/m), extrato original (%m/m), pH, amargor (UA), turbidez (EBC), cor (EBC), acidez total (%v/v) e valor calórico (cal). Os parâmetros físico-químicos foram comparados a legislação vigente⁵.

2.12. DETERMINAÇÃO DE PH

Para a medição do pH, foi necessário descarbonatar previamente a amostra. Mediu-se 50 mL da amostra em um béquer e realizou-se posterior leitura no pHmetro de marca Onda Científica – mod, TCP - 01, no qual foi inserido o eletrodo de vidro combinado na amostra, anotando o resultado da leitura.

2.13. DETERMINAÇÃO DE TURBIDEZ

Mediu-se 10 mL da amostra, colocando-a na cubeta do turbidímetro (da marca Technal), previamente calibrado, para a leitura direta. Em seguida foi transformado o resultado da unidade NTU para EBC (Convenção dos cervejeiros europeus), 1 NTU = 0,25 EBC.

2.14. DETERMINAÇÃO DE COR

Mediu-se 10 mL da amostra descarbonatada colocando-a na cubeta de quartzo do espectrofotômetro à 400 nm (Equação 10-11). Em seguida foi acertado o zero da absorbância com água destilada, lavada a cubeta, enchida com a amostra e feita a leitura da absorbância em triplicata.

Eq. 10:

$$\text{Coloração EBC} = A_{430} \times f \times 25 \text{ (para cervejas escuras)}$$

Onde: f= fator de diluição; A_{430} = Absorbância a 430 nm. Para transformar em SRM: $\text{SRM} = \text{EBC} \times 0,508$; $\text{EBC} = \text{SRM} \times 1,97$.

Eq. 11:

$$\text{Coloração EBC} = A_{430} \times 25 \text{ (para cervejas claras)}$$

Onde: f= fator de diluição; A_{430} = Absorbância a 430 nm. Para transformar em SRM: $\text{SRM} = \text{EBC} \times 0,508$; $\text{EBC} = \text{SRM} \times 1,97$.

2.15. ACIDEZ TOTAL TITULÁVEL

Foi transferido com o auxílio de uma pipeta volumétrica, 10 mL da amostra descarbonatada para Erlenmeyer de 250 mL. Em seguida foi adicionado 50 mL de água destilada neutralizada e quente, adicionado 3 gotas de fenolftaleína a 1% e titulado com a solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 0,1 N padronizada, até a mudança de coloração roxo-violeta (róseo). A acidez total foi calculada com base na Equação 12.

Eq. 12:

$$\text{Acidez Total} \left(\% \frac{V}{V} \right) = \frac{V_t \cdot f_c \cdot 10}{A}$$

Onde: V_t = Volume Titulado; f_c = Fator de correção do NaOH à 0,1 N; A= Volume da amostra.

2.16. DENSIDADE RELATIVA A 20 °C/20 °C COM PICNÔMETRO

Lavou-se o picnômetro com álcool e enxaguou-se posteriormente com éter, deixando-o secar naturalmente. Em seguida pesou-se a vidraria vazia e anotou-se o peso obtido; em seguida ele foi preenchido com água destilada a 20 °C e verificou-se o seu peso (Equação 13). Lavou-se e secou-se o picnômetro, procedendo da mesma forma com a amostra descarbonatada.

Eq. 13:

$$\text{Densidade Relativa à } 20^\circ \frac{C}{20^\circ C} = \frac{M_{am} - M_p}{M_{H_2O} - M_p}$$

Onde: M_{am} = Massa (g) do picnômetro com a mostra; M_{H_2O} = Massa (g) do picnômetro com água; M_p = Massa em grama do picnômetro (g) vazio.

2.17. DETERMINAÇÃO DE EXTRATO REAL

Transferiu-se 20 mL da amostra descarbonatada para uma cápsula de porcelana previamente aquecida em estufa a 105 °C por 1 h. Resfriou-se em dessecador e pesou-se.

Foi aquecida a amostra em banho-maria até a secagem. Em seguida levou-se a cápsula de porcelana contendo a amostra para a estufa a 105 °C durante 1 h, resfriando em dessecador e pesando novamente. O extrato real foi calculado com base na Equação 14.

Eq. 14:

$$\text{Extrato Real } \left(\% \frac{\text{m}}{\text{v}} \right) = \frac{100 \cdot p}{V}$$

Onde: P = Massa do resíduo em gramas; V= Volume da amostra em mL.

2.18. DETERMINAÇÃO DO EXTRATO PRIMITIVO

Foi determinado por meio da equação de Balling, que envolve os valores de teor alcoólico e extrato real. Filtrou-se aproximadamente 100 mL da amostra descarbonatada e determinou-se a densidade relativa a 20 °C/20 °C do filtrado. O extrato primitivo foi calculado com base na Equação 15.

Eq. 15:

$$\text{Extrato Primitivo } \left(\% \frac{\text{m}}{\text{m}} \right) = \frac{[(P \cdot 2,066) + ER] \cdot 100}{[100 + (P \cdot 1,066)]}$$

Onde: P = % de álcool em peso; ER = Porcentagem do Extrato Real.

2.19. DETERMINAÇÃO DO EXTRATO APARENTE

Ao obter a densidade relativa, determinou-se o extrato aparente convertendo a densidade relativa à 20 °C / 20 °C em percentagem de extrato.

2.20. ÁLCOOL EM VOLUME OU GRAU ALCOÓLICO A 20 °C

Transferiu-se 100 mL da amostra descarbonatada para um conjunto de destilação. Em seguida recolheu-se 75 mL do destilado em um balão volumétrico de 100 mL, contendo 10 mL de água destilada, foi completado o volume do balão com água destilada. Homogeneizou-se a amostra, determinando a densidade relativa da solução a 20 °C pelo picnômetro. Reverteu-se o resultado da densidade relativa do destilado em álcool em volume, utilizando a tabela de percentagem de álcool em volume a 20 °C (% v/v) correspondente à densidade relativa a 20 °C.

2.21. ÁLCOOL EM PESO

Utilizou-se o mesmo procedimento do álcool em volume para determinar o teor de álcool em peso das amostras. A graduação alcóolica foi obtida a partir da conversão da densidade relativa do destilado, utilizando a tabela de conversão da densidade relativa a 20 °C/20 °C em percentagem de álcool em peso.

2.22. DETERMINAÇÃO DO AMARGOR

Pipetou-se 5 mL da amostra e transferiu-se para um Erlenmeyer de 125 mL com rolha acrescentando tiras plásticas para evitar espumas. Adicionou-se 0,5 mL de solução de ácido clorídrico (HCl) a 10% e 10 mL de Iso-Octano no Erlenmeyer, colocando posteriormente no agitador magnético por 20 min. Em seguida foi transferida a fração superior (límpida) do Iso-octano para uma cubeta de quartzo de 10 mm com tampa, procedendo a leitura em espectrofotômetro à 275 nm.

Antes da leitura, o equipamento foi calibrado com uma amostra em branco contendo 0,5 mL de ácido clorídrico (HCl) a 10% e 10 mL de Iso-octano (Equação 16).

Eq. 16:

$$UA = A_{275} * 50$$

Onde: UA = Unidade de Amargor; A_{275} = absorvância do extrato a 275 nm; 50 = Fator da curva padrão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. PRODUÇÃO DA CERVEJA

A moagem requerida no início do processo obteve um resultado satisfatório observando uma eficiência de moagem de 0,81. Para o processo de brassagem foram utilizados 14 litros de água para 5 kg de malte, observou-se então que foram absorvidos 4 litros de água pelos grãos. Após 1 h e 30 min foi feita a verificação da taxa de evaporação na fervura do mosto, encontrando o valor de 2 L. Para a lavagem dos grãos utilizou-se 12,44 L e o volume inicial de fervura inicial foi de 22 L. Ao final do processo de clarificação foi obtido um rendimento de 26 L de mosto.

Enquanto a taxa de evaporação, segundo o cálculo citado neste trabalho, obteve 9,615%, equivalente a 961,5 mL/h. Para Kunze¹², a taxa de evaporação tradicionalmente varia entre 10 a 15%. Além do controle do extrato e taxa de evaporação, determinou-se o volume do rendimento prático e controle de perdas, obtendo 48%. Em termos de processo cervejeiro, atualmente, o rendimento varia em torno de 70 – 75%. O valor abaixo do estimado pode ser explicado devido a utilização de equipamentos artesanais não automatizados.

O mosto inicial apresentou 5 °Brix e densidade de 1,015. O extrato final após a fervura apresentou 13 °Brix e densidade de 1,051. Dessa forma, encontra-se acima do limite ao se comparar ao estilo *German Pilsen*, porém, está dentro da faixa de uma *American Wheat Beer* (1,042 a 2,055 OG) segundo o Guia de Estilos – BJCP¹³. O teor alcoólico final do produto foi 5,2 v/v, encontrando-se dentro do limite de uma *German Pilsen*. A carbonatação foi satisfatória, com a presença de microbolhas de gás carbônico. Os lúpulos dos tipos Magnum e Tradition conferiram aroma e amargor, respectivamente à cerveja. Além dos extratos adicionados na etapa de maturação que também confeririam aroma e sabor.

Em seu estudo, Flores¹⁴ que tinha como objetivo elaborar, por meio do processo artesanal, avaliar as características físico-químicas e sensoriais de cervejas à base de chocolate e caramelo, obteve como resultado a densidade do mosto no tempo final de fervura apresentando valores muito próximos, entre 1,051 e 1,052 g. mL em uma cerveja artesanal de chocolate com caramelo. Da mesma forma foram observados resultados semelhantes no estudo de Schiaveto¹⁵, que obteve a densidade do mosto cervejeiro próxima a 1,050 g. mL e reduzindo conforme o processo de fabricação, confiabilizando que os resultados obtidos neste presente trabalho estão dentro dos padrões esperados.

Em sua pesquisa que consistiu na produção de uma cerveja com adição de lascas Zingiber officinale (gengibre), Tozetto¹⁶ obteve no mosto inicial 6 °Brix, densidade de 1,025 e no extrato de fervura final 8,45 °Brix, densidade de 1,031. O valor menor de °Brix no final de fervura em comparativo com o presente trabalho pode ter sido em decorrência da adição do extrato usado. O valor de 13 °Brix na etapa final de resfriamento, indica a concentração de açúcares disponíveis na solução do mosto para o fermento realizar as devidas conversões em álcool, calor e dióxido de carbono até consumir todo o substrato dito fermentescível. Conforme avança o tempo de fermentação é natural que ocorra a queda no valor de extrato¹⁷.

3.2. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

Na Tabela 5 são descritos os resultados das análises físico-químicas da cerveja produzida.

Tabela 5. Resultados das análises físico-químicas da cerveja produzida.

Parâmetros	Unidade	Valor
pH	-	4,5±0,01
Turbidez	EBC	14,5±0,00
Cor	EBC	15,85±0,00 (SRM=8,1026)
Acidez Total	% v/v	2,70±0,064
Densidade Relativa	a 20°C	1,013
Álcool em Volume	% v/v	5,2±0,10
Álcool em Peso	% m/m	4,20
Extrato Real (ER)	% m/m	5,41±0,09
Extrato Primitivo (EP)	% m/m	13,48±0,08
Extrato Aparente (EA)	% m/m	3,35
Amargor	UA	17,82±0,18
Calorias	Cal	289

Na Tabela 5 descrita acima, apresenta os resultados obtidos durante a avaliação da qualidade da bebida, que em alguns parâmetros serviram de comparativo com o estilo de cerveja *German pilsen* do manual BJCP. A cerveja produzida foi classificada segundo a legislação² em função das características da fermentação e do produto acabado e ao avaliarmos os parâmetros extrato primitivo observa-se que o resultado de 12,21 pode ser classificado como cerveja extra (EP ≥ 12% e ≤ 14%). Já o álcool em volume (%v/v) o qual obteve-se resultado de 5,2 considera a cerveja analisada como de alto teor alcoólico, e se enquadra dentro do limite do estilo *German Pilsen* entre 4,4 a 5,2%. Em relação ao amargor, o valor de 17,82 está abaixo da faixa limite do estilo de uma *German Pilsen* de acordo com o Beer Judge Certification Program – BJCP porém dentro da faixa de uma *Belgian Blonde Ale* (IBU entre 15 e 30).

A cor está relacionada a cevada utilizada assim como também adjuntos, fermento e adição de extratos e frutas à bebida. No trabalho foi utilizado o malte estilo Pilsen, obtendo o valor de 15,85 EBC, classificando a cerveja como clara (< 20 unidades de EBC) e de acordo com a escala americana, o valor de 8,10 está acima do limite do estilo *German Pilsen* (2 a 5 SRM) se enquadrando também dentro da faixa do estilo *Belgian Blonde Ale*. Essa alteração pode ser justificada pela quantidade de malte utilizado durante a formulação da bebida. Em comparativo com Santos¹⁵, que teve como produção uma cerveja pilsen adicionada de mel, obteve coloração 4,10, que da mesma forma obteve um produto mais claro devido a adição do mel.

Segundo Leiper e Miedl¹⁸ no tratamento a frio, a cerveja deve ser refrigerada (-1 a 0 °C), sem congelamento, para garantir a precipitação de partículas e o trabalho de Miedl e Bamforth (19) indicou que um curto período de temperatura muito baixa (-2,5 °C) de armazenamento antes da filtração pode ser tão benéfico para a estabilidade coloidal como períodos mais longos em temperaturas menos frias. Para a produção desta cerveja fez-se de alta fermentação (Ale) com temperaturas maiores que 0 °C obtendo turbidez 14,5 EBC. Santos (2019) produziu duas cervejas Ale, das quais uma é puro malte e a outra o autor utilizou mel como adjunto. Para a cerveja puro malte obteve-se turbidez igual a 6,06 EBC, e com 25% de mel como adjunto obteve-se turbidez equivalente a 5,40. A alta turbidez pode estar relacionada ao processo artesanal de produção dessa cerveja assim como a coleta da amostra com uma alta concentração de partículas decantadas no fermentador.

Ao comparar o produto à formulação *German Pilsen*, a cerveja produzida obteve um amargor baixo. O estilo *German Pilsen* segundo o manual BJCP possui um intervalo de 25 – 45 IBU, enquanto esta obteve 17,82. Ao fazer a formulação, calculou-se a quantidade de lúpulo a ser adicionada durante a etapa de fervura. Para este trabalho, adicionou 15,23 g do lúpulo Magnum, o qual é responsável pelo amargor da bebida, e 15,23 g do lúpulo Tradition, responsável pelo aroma. Este valor baixo do amargor pode ser explicado pelo tempo de residência de cada lúpulo durante a fervura, assim como a quantidade adicionada. Esta quantidade foi desproporcional ao produto desejado. Para que o amargor estivesse dentro dos devidos limites, seria necessário aumentar a quantidade de lúpulo Magnum e diminuir a quantidade de lúpulo Tradition.

De acordo com Compton²⁰, a cerveja deve apresentar o pH dentro da faixa de 3,8 a 4,7 para ser considerada normal. Dentre as Ales inglesas, o pH está no intervalo de 4,0 a 4,2, as Lambic de 3,4 a 3,9 e as de trigo de 3,2 a 3,4²¹.

O pH de 4,5 da cerveja produzida revela que não há presença de sabor ácido no produto final bem como indica a ausência de autólise das leveduras. O pH da cerveja produzida (4,5) seguiu a tendência apresentada por Santos²² que obteve valor de 4,5 ao trabalhar com emprego de arroz torrado como adjunto e com Duarte²³ que ao usar extrato de café como adjunto obteve pH igual a 4,57.

Sendo assim, a cerveja produzida caracterizou-se como de alta fermentação (Ale), extra quanto ao extrato primitivo (13,48%), alto teor alcoólico (5,2% Vol.), e clara, quando a cor (<20 EBC).

4. CONCLUSÃO

Com relação às análises físico-químicas a cerveja produzida foi avaliada como de alta fermentação, cor clara, alto teor alcoólico e extra, em função do extrato primitivo. Podemos dizer que as características da cerveja atenderam ao propósito do estilo fabricado, conferindo o sabor e o aroma como diferenciais. Os resultados mostraram que adição do extrato de *Syzygium aromaticum* (cravo-da-índia) e *Cinnamomum zeylanicum* (canela) podem ser favoráveis ao processo em termos de aroma e sabor sem prejudicar as características sensoriais da cerveja. Dessa forma a utilização de extratos pode ser uma das alternativas para agregar maior valor à cerveja, que no Brasil é pouco consumido, além de diferenciar das demais cerveja disponíveis no mercado. Desse modo, diante das diversas potencialidades das especiarias utilizadas para produção da cerveja, e no que elas podem oferecer para a indústria cervejeira, é interessante a realização de outros estudos envolvendo o tema sejam desenvolvidos, a fim de se avaliar o seu uso em diferentes concentrações, aplicações em diferentes etapas do processo produtivo entre outras aplicabilidades tecnológicas do ramo cervejeiro.

REFERÊNCIAS

- [1] Bamforth, C.W. Beer – A quality perspective. USA: Elsevier, 2009. [Link]
- [2] Brasil. Decreto n. 6.871, de 4 de junho de 2009. Regulamenta a Lei n. 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas. Brasília, 2009. [Link]
- [3] Brewers Association. Craft Brewer Defined. [Link]
- [4] Deliberalli, C.C. Monografia, Universidade Federal do Paraná, 2015. [Link]
- [5] Receita Federal Do Brasil. Sistema de Controle de Produção de Bebidas - Sicobe. Brasília. 2016. [Link]
- [6] Canela, uma especiaria. Centro de Nutrição Funcional. 12 de julho de 2017. [Link]
- [7] Gracie, A.R. O Poder da Canela- *Cinnamomum* Sp. 29 de julho de 2019. [Link]
- [8] Nascimento, Gislene GF, Locatelli, Juliana, Freitas, Paulo C. e Silva, Giuliana L. (2000). Atividade antibacteriana de extratos vegetais e fitoquímicos em bactérias resistentes a antibióticos. *Brazilian Journal of Microbiology*, 31 (4), 247-256. [CrossRef]
- [9] Brasil (a). Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Decreto nº 6.871, de 04 de junho de 2009. Regulamenta a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas. *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 5jun. 2009. Seção 1. [Link]
- [10] IAL - Instituto Adolfo Lutz - Normas Analíticas: métodos químicos e físicos para a análise de alimentos. 4 ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. [Link]
- [11] Dias, A.T. “Cervejar é preciso”...cálculo cervejeiro para elaboração de receitas. 1.ed. Belo Horizonte: Letramento, 2016. 206p.
- [12] Kunze, W. (2004), *Technology of Brewing and Malting*. Terceira edição. Editora Westkreuz-Druckerei Ahrens KG. Berlin, 948p.
- [13] BCJP - Beer Judge Certification Program 2015 Style Guidelines (2015). [Link]
- [14] Flores A.B.; Gräff, A.; Cornelius, E.; Souza, C.F.V. (2015), “Perfil sensorial e avaliações físico-químicas de cerveja artesanal de chocolate e caramelo”, *Revista Destaques Acadêmicos*, 158-166. [Link]

- [15] Schiaveto, P. Parâmetros: Densidade. [[Link]
- [16] Tozetto, L. M. Dissertação de Mestrado, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2017. [Link]
- [17] Sichieri, A.P.M.P. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2013. [Link]
- [18] 17 Morado, R. Larousse da cerveja. São Paulo: Larousse do Brasil, 2009, 357.
- [19] Leiper, K. A., Miedl, M. Colloidal stability of beer. In: Bamforth, C. W. Beer: a Quality Perspective. Burlington: Academic Press 2009, 111-161. [Link]
- [20] Miedl, M.; Bamforth, C. W. The relative importance of temperature and time in the cold conditioning of beer. Journal of the American Society of Brewing Chemists 2004, 75-78. [CrossRef]
- [21] Compton, J. Beer quality and taste methodology. In: BRODERICK H.M. (Dir). El cervecero en la practica: a manual for the brewing industry. 2 ed. Madison: Impressions, 1978.
- [22] Bushman Z. Quality control in beer production pH, 2015. [Link]
- [23] SANTOS, C.D.O. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2011. [Link]
- [24] DUARTE, L.G.R. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2015. [Link]

Capítulo 4

Estudo físico-químico, quimiométrico e sensorial de suco de cajú

Cristiano Max Celestino Negrão

Ivan Pereira da Silva

Joyce Pantoja Braga

Allyson Allennon Pinheiro do Rosário

José Marcos Nobre de Moura Júnior

Charles Alberto Brito Negrão

Madson Costa Ribeiro

Ewerton Carvalho de Souza

Ivan Carlos da Costa Barbosa

Antonio dos Santos Silva

Resumo: A obtenção de suco concentrado de frutas é uma atividade agroindustrial importante, pois agrega valor econômico à fruta, evitando desperdícios e minimizando perdas que podem ocorrer durante a comercialização do produto in natura, com a finalidade de produzir suco. Este produto é produzido através do líquido que pode ser extraído de quase todos os tipos de frutos, e está amplamente disponível no comércio por representar uma enorme facilidade na hora de preparar qualquer bebida de frutas e por não representar riscos à saúde. Este trabalho objetivou avaliar em termos físico-químicos sucos concentrados de caju industrializados de duas marcas (A e B), adquiridos em supermercados de Belém e fazer a discriminação deles via PCA e HCA. A condutividade elétrica obtida foi de 2,92 mS/cm (A) e 3,53 mS/cm (B). Os valores de pH encontrados foram de 2,80 (A) e 3,24 (B). As viscosidades encontradas foram de 59,15 cSt (A) e 76,66 cSt (B). Os teores de voláteis foram de 89,14 % (A) e 90,47 % (B). Os teores de sólidos solúveis encontrados foram 6,95 Brix (A) e 10,46 Brix (B). Os valores para densidade foram de 1,014 g/mL (A) e 1,058 g/mL (B). Ao se aplicar PCA e HCA aos valores encontrados e que mostraram diferença significativa (teste t de Student, $p < 0,05$), se observou uma discriminação de 100 % das amostras conforme as marcas dos sucos concentrados. Na análise sensorial, os entrevistados preferiram a marca B, com 72 % de preferência, ficando a marca A com 26 % da preferência e 2 % não tiveram preferência entre as marcas.

Palavras-chave: Bebidas Não-alcóolicas, Frutas, Análise Multivariada.

1. INTRODUÇÃO

O caju (*Anacardium occidentale L.*) é um fruto típico do norte e nordeste do Brasil, sendo que seu cultivo e importância econômica têm crescido nas últimas décadas. O cultivo do cajueiro é realizado visando principalmente à produção de castanha de caju, sendo o aproveitamento do pseudofruto ainda mínimo em relação à quantidade de matéria-prima disponível. O consumo do pseudofruto fresco ainda é limitado. Entretanto, o suco de caju é amplamente aceito pela população, tanto na forma pronta para beber como na forma concentrada (ZEPKA *et al.*, 2009).

O mercado interno consome em torno de 40 mil toneladas de suco de caju, o que é considerado muito pouco em relação à produção e a ampliação do mercado exportador que necessita de melhorias no que diz respeito à tecnologia dos processos que propiciam a melhoria do produto como, por exemplo, a diminuição da adstringência bem como uma boa política mercadológica para que o produto tenha ampla aceitação, qualidade e visibilidade nos aspectos que tangem seu consumo e mercado.

Os consumidores de alimentos industrializados têm se preocupado cada vez com a qualidade nutricional e sensorial dos mesmos demandando produtos naturais que não possuam conservantes químicos que comprometam sua qualidade. Os sucos de frutas tropicais atendem a esses requisitos por serem ricos em sais minerais, açúcares, vitaminas e substâncias antioxidantes. Nesse contexto, o suco de caju passa pela análise de qualidade em que empresas buscam a cada dia aperfeiçoar e melhorar o produto afim de que seus consumidores estejam satisfeitos com o mesmo, neste caso as técnicas de produção devem ser eficazes e apresentar tecnologia satisfatória de processamento e conservação a fim de manter as características originais da fruta.

As análises sensoriais e químicas são importantes métodos para se observar e analisar a adesão ao produto bem como constatar sua qualidade perante o paladar do consumidor. Muitos produtos industrializados possuem ampla divulgação nas mídias, nos mercados em geral, mas muitas vezes não respondem positivamente quando analisados pelos consumidores o que torna o consumo do produto pouco confiável, muitos consumidores compram desconhecendo suas características químicas e de qualidade, apesar da análise sensorial não atender a maioria dos padrões de análise química, ela ainda possibilita a diferenciação do alimento no aspecto do “esse é bom”. A análise química do produto em si é imprescindível no aspecto de garantir a qualidade e o controle sobre o alimento, pois tal análise possibilita observar os métodos de produção e sua eficácia no processamento e conservação do produto.

2. OBJETIVOS

Este trabalho teve como objetivo realizar a avaliação físico-química e sensorial de sucos de caju industrializados de duas fábricas (aqui denominadas de A e B) e comercializados em Belém do Pará, e fazer a discriminação de tais sucos por meio de análise multivariada: análise hierárquica de agrupamentos (HCA) e análise de componentes principais (PCA).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. COLETA DAS AMOSTRAS

Foram coletadas dez amostras de duas marcas distintas, aqui denominadas como A e B, contabilizando vinte amostras no geral, e em seguida foram levadas ao Laboratório de Física Aplicada à Farmácia (LAFFA), da Faculdade de Farmácia (UFPA), onde permaneceram lacradas e sob refrigeração até o momento da realização das análises físico-químicas, que seguiram metodologias estabelecidas pelas normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008). Antes de cada análise as amostras foram homogeneizadas para melhor condução das análises efetuadas.

3.2. DETERMINAÇÃO DO PH

Para a determinação do pH foi medido cerca de 50 mL de cada amostra com a ajuda de uma pipeta, e depois foi introduzido o eletrodo de um pHmetro (HandLab 2) previamente calibrado com solução tampão de pH 4,0 e 7,0.

3.3. SÓLIDOS SOLÚVEIS TOTAIS

Foram determinadas por meio de leitura direta através de um refratômetro manual (Instrutherm, AT 090), colocando-se sobre o prisma uma gota da amostra de suco. Os resultados foram expressos em ° Brix.

3.4. UMIDADE

Pesou-se 3 g de cada amostra em cápsula de porcelana, previamente seca e tarada, e depois o conjunto amostra mais cápsula foi levado para estufa a 105° C até peso constante, e, em seguida foi colocado em dessecador até alcançar a temperatura ambiente. Os resultados foram expressos em % e obtidos pela Equação 1.

$$\text{Umidade (\%)} = \left[100 - \left(\frac{m_{ca} - m_c}{m_1} \right) \cdot 100 \right] \quad (1)$$

em que m_{ca} é a massa da caçarola com a amostra já seca; m_c a massa da caçarola e m_a é a massa inicial da amostra.

3.5. CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Para a determinação da condutividade elétrica (CE), 50 mL de cada amostra foram pipetados para um bquer de 100 mL e um eletrodo de um condutivímetro portátil (Instrutherm, CD 080), previamente calibrado com solução padrão de 1,43 mS/cm, foi introduzido na amostra, sendo a condutividade elétrica da amostra diretamente lida no visor do aparelho.

3.6. DENSIDADE

Para calcular a densidade foram introduzidos 10 mL de suco em um picnômetro previamente tarada e o conjunto foi pesado em uma balança analítica. Calculou-se os valores de densidade através da Equação 2.

$$d = \frac{m}{v} \quad (2)$$

onde d é a densidade (g/mL), m é a massa da amostra (g) e v é o volume da amostra (10 mL).

3.7. VISCOSIDADE

Foi determinada através da medição do tempo de escoamento da amostra em um viscosímetro tipo copo Ford número 3, e a leitura de tempo (t) convertida para viscosidade (v) através da Equação 3, fornecida pelo fabricante.

$$v = 2,31 \cdot (t - 6,58) \quad (3)$$

3.8. ANÁLISE SENSORIAL

Foi aplicado um teste de aceitação dos dois sucos estudados, contando com a participação de 100 provadores não treinados, sendo que cada um deles preencheu uma ficha, elaborada conforme Minim (2013), representada na Figura 1.

Figura 1 – Modelo de ficha para a análise sensorial aplicada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – FACULDADE DE FARMÁCIA

PESQUISA DE ACEITAÇÃO DE SUCO CONCENTRADO DE CAJU

No ENTREVISTADO: _____ DATA: _____ IDADE: _____ SEXO: () M () F

1- Experimente cada uma das amostras servidas a você, sendo que entre cada provação, beba um pouco de água, por favor, depois, de uma nota para cada amostra servida conforme a escala abaixo.

(1) Desgostei extremamente
 (2) Desgostei muito
 (3) Desgostei moderadamente
 (4) Desgostei ligeiramente
 (5) Nem desgostei, nem gostei
 (6) Gostei ligeiramente
 (7) Gostei moderadamente
 (8) Gostei muito
 (9) Gostei extremamente

Amostra: _____ Nota: _____

Amostra: _____ Nota: _____

2- Qual amostra você preferiu? R: _____

3.9. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para cada um dos seis parâmetros físico-químicos estudados (pH, condutividade elétrica, sólidos solúveis totais, viscosidade, densidade e umidade), foi realizado um teste t de Student ($p < 0,05$) via o programa BioStat 5.0 com a finalidade de se descobrir se tais parâmetros são significativamente diferentes conforme a marca do suco.

Também foram executadas análises multivariadas (de componentes principais, PCA e hierárquica de agrupamentos, HCA), se utilizando o programa MINITB 16, para se evidenciar a possibilidade de discriminação das amostras conforme sua origem (fábrica produtora).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICO

Os resultados das análises físico-químicas estão dados na Tabela 1, onde são apresentados valores médios de três determinações por amostra, seguido do desvio padrão.

Amostra	Umidade (%)	C.E. (mS/cm)	SST (graus Brix)	pH	Densidade (kg/m ³)
A1	94,06 ± 0,20	2,33 ± 0,01	6,80 ± 0,01	2,80 ± 0,00	10,16 ± 0,31
A2	85,77 ± 0,21	3,00 ± 0,02	6,90 ± 0,01	2,80 ± 0,00	10,12 ± 0,29
A3	94,10 ± 0,22	3,00 ± 0,00	7,00 ± 0,00	2,80 ± 0,00	10,11 ± 0,30
A4	94,03 ± 0,19	2,97 ± 0,02	7,00 ± 0,00	2,80 ± 0,00	10,15 ± 0,31
A5	94,18 ± 0,20	3,01 ± 0,01	7,00 ± 0,01	2,80 ± 0,00	10,13 ± 0,29
A6	94,11 ± 0,21	2,97 ± 0,02	7,00 ± 0,01	2,80 ± 0,00	10,13 ± 0,31
A7	93,93 ± 0,20	2,97 ± 0,01	7,00 ± 0,00	2,80 ± 0,00	10,13 ± 0,30
A8	94,07 ± 0,22	2,97 ± 0,00	7,00 ± 0,01	2,80 ± 0,00	10,16 ± 0,31
A9	94,16 ± 0,20	2,89 ± 0,02	7,00 ± 0,01	2,80 ± 0,00	10,13 ± 0,32
A10	94,11 ± 0,20	3,00 ± 0,03	7,00 ± 0,01	2,80 ± 0,00	10,15 ± 0,28
Geral	93,25^a ± 0,20	2,92^a ± 0,02	6,97^a ± 0,01	2,80^a ± 0,00	10,14 ± 0,31
B1	88,58 ± 0,18	3,45 ± 0,01	10,30 ± 0,00	3,20 ± 0,00	10,56 ± 0,31
B2	89,58 ± 0,20	3,42 ± 0,02	10,50 ± 0,01	3,20 ± 0,00	10,69 ± 0,33

(continuação)

Amostra	Umidade (%)	C.E. (mS/cm)	SST (graus Brix)	pH	Densidade (kg/m ³)
B3	90,07 ± 0,21	3,47 ± 0,04	10,50 ± 0,01	3,30 ± 0,00	10,89 ± 0,29
B4	90,01 ± 0,20	3,42 ± 0,02	10,10 ± 0,00	3,30 ± 0,00	10,52 ± 0,31
B5	89,69 ± 0,18	3,49 ± 0,01	10,30 ± 0,01	3,30 ± 0,00	10,57 ± 0,30
B6	89,80 ± 0,21	3,53 ± 0,02	10,50 ± 0,01	3,30 ± 0,01	10,61 ± 0,34
B7	89,60 ± 0,20	3,61 ± 0,01	10,50 ± 0,00	3,20 ± 0,00	10,46 ± 0,33
B8	89,59 ± 0,20	3,65 ± 0,01	10,50 ± 0,01	3,20 ± 0,02	10,50 ± 0,30
B9	90,69 ± 0,23	3,65 ± 0,03	10,50 ± 0,00	3,20 ± 0,00	10,51 ± 0,30
B10	90,69 ± 0,7	3,61 ± 0,02	10,50 ± 0,01	3,20 ± 0,00	10,52 ± 0,29
Geral	89,83^b ± 0,21	3,53^b ± 0,03	10,42^b ± 0,01	3,24^b ± 0,00	10,58^b ± 0,30

Legenda: A e B são as marcas estudadas. C.E = condutividade elétrica; SST = sólidos solúveis totais. Mesma letra nas médias gerais das duas marcas significa não haver diferença significativa conforme o teste t de student ($p > 0,05$).

A condutividade elétrica média obtida foi de 2,92 mS/cm, para as amostras da marca A, e de 3,53 mS/cm, para as amostras da marca B. Tais resultados são significativamente diferentes, conforme o teste t de Student ($p < 0,05$). Não há valores estipulados para esse parâmetro na legislação brasileira (BRASIL, 2000). Todavia, esse parâmetro se relaciona com as espécies iônicas presentes nas soluções, desta forma a diferença de CE entre as marcas sugere diferenças de formulações do produto, principalmente em termos de constituintes que liberem íons na solução.

Os valores médios de pH encontrados foram de 2,80, para as amostras da marca A, e de 3,24, para as amostras da marca B, sendo significativamente diferentes, conforme o teste t de Student ($p < 0,05$). Não há valores estipulados para esse parâmetro na legislação brasileira (BRASIL, 2000). Esses resultados são similares aos encontrados por Gomes et al. (2012), que estudaram sucos concentrados comercializados em Arapongas (PR), de três marcas, obtiveram valores de pH iguais a 2,83; 2,85 e 3,49. E são inferiores aos encontrados por Castro et al. (2007), que, ao estudarem sucos integrais de caju de três fábricas e comercializados em Governador Valadares, Minas Gerais, encontraram pH médio de 3,38; 3,42; e 3,78. Valores de pH baixos são associados a altos teores de açúcar, o que favorece o armazenamento do suco em temperatura ambiente, pois diminuem o desenvolvimento de microrganismos.

As viscosidades encontradas tiveram médias de 59,15 cSt (para a marca A) e 76,66 cSt (para a marca B). Elas se mostraram significativamente distintas (teste t de Student, $p < 0,05$) e não há um valor padronizado na legislação nacional (BRASIL, 2000). Tais valores de viscosidade sugerem ser o suco de caju um líquido pouco viscoso, o que facilita seu processo de envase.

Os teores de voláteis médios ou umidade foram de 89,14 % (marca A) e 90,47 % (marca B), que se mostraram significativamente distintas (teste t de Student, $p < 0,05$) e não há um valor padronizado na legislação nacional (BRASIL, 2000).

Os teores médios de sólidos solúveis totais encontrados foram 6,95° Brix (marca A) e 10,46° Brix (marca B), que foram considerados como significativamente distintos conforme o teste t de Student ($p < 0,05$). Tais valores concordam com a legislação vigente, que estipula um mínimo de 5° Brix para sucos de caju (BRASIL, 2000), sendo inferiores aos valores encontrados por Castro et al. (2007), que foram de 9,8° Brix; 11,0° Brix e 11,5° Brix, e aos de Gomes et al. (2012), que foram de 10,31° Brix; 10,36° Brix e 11,98° Brix.

Percebe-se também que a marca B é a mais viscosa e ao mesmo tempo a de maior teor de sólidos solúveis totais, pois a presença de maior sólidos dispersos no meio líquido influencia diretamente na viscosidade do produto.

Os valores médios para densidade foram de 1,014 g/mL (marca A) e 1,058 g/mL (marca B), que se revelaram ser significativamente distintos (teste t de Student, $p < 0,05$). A legislação brasileira não fixa valores para esse parâmetro (BRASIL, 2000), sendo que os resultados obtidos neste trabalho são inferiores aos encontrados por Soares et al., (2004), que foi em torno de 1,47 g mL⁻¹, mas similares aos encontrados por Gomes et al. (2012), que foram de 1,00 g mL⁻¹; 1,02 g mL⁻¹ e 1,09 g mL⁻¹. Bonomo et al. (2009) relatam que os valores de densidade do suco de caju são fortemente dependentes do valor de SST. Os autores encontraram valores médios de 1,039 e 1,035 g mL⁻¹ para suco de caju com 11,2° Brix. Isso é notado no presente estudo, pois a marca B apresentou a maior densidade e tem o maior teor de SST.

4.2. ANÁLISE MULTIVARIADA

Aos dados dos parâmetros físico-químicos foi aplicada uma análise de componentes principais (PCA), conduzida com dados padronizados, e uma análise hierárquica de agrupamentos (HCA), conduzida se tomando ligações diretas, distância euclidiana e valores padronizados das medidas, as quais geraram os gráficos contidos nas Figuras 2 e 3.

Figura 2 – Gráfico das duas componentes principais.

Figura 3 – Dendrograma correspondente aos dados estudados.

Evidencia-se através dos gráficos acima que os parâmetros físico-químicos estudados foram capazes de discriminar as amostras conforme suas origens (fábricas produtoras), o que sugere que as formulações dos sucos industrializados por tais fábricas diferirem bastante, não havendo uma padronização desse produto.

4.3. ANÁLISE SENSORIAL

Os provadores eram 60 % do gênero feminino, sendo predominantemente da faixa etária entre 10 a 21 anos, com 34 %; entre 22 e 35 anos, eram 28 %; entre 36 e 49 anos, eram 22 % e entre 50 e 72 eram 16 %. Os entrevistados preferiram a marca B, com 72 % de preferência, ficando a marca A com 26 % da preferência e 2 % não tiveram preferência entre as marcas. Todavia, ao se analisar as notas dadas por esses mesmos provadores, obtiveram-se as notas médias de 5,78 e 6,81, respectivamente para a marca A e B. A marca preferida era menos ácida que a outra e tem um teor de SST superior a outra marca. Além disso, sua viscosidade e densidade são mais elevadas, dando uma maior consistência ao produto. Desta forma, tais aspectos físico-químicos associados aos sucos de caju parecem levar a uma preferência do consumidor.

5. CONCLUSÃO

As marcas de suco de caju estudadas neste trabalho apresentaram todos os seis parâmetros físico-químicos significativamente distintos entre as duas marcas. Estando tais parâmetros condizentes com outros trabalhos presentes na literatura e com a legislação vigente. Também o emprego de técnicas estatísticas multivariadas (PCA e HCA) aos dados obtidos sugerem ser as formulações dos sucos dependentes das fábricas produtores e, assim, se pode discriminar perfeitamente as amostras de acordo com a sua origem.

Os participantes da análise sensorial apontaram a marca B como preferida, sendo a marca mais densa e viscosa, menos ácida e com mais sólidos solúveis totais presentes em sua formulação, o que sugere que tais condições desses parâmetros levam a preferência dos consumidores de sucos de caju.

REFERÊNCIAS

- [1] BONOMO R. C. F., Fontan, R. C. I., de Souza, T. S., Veloso, C. M., Reis, M. F. T., Castro, S. S., Thermophysical properties of cashew juice at different concentrations and temperatures. *Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais*, Campina Grande, v.11, n.1, p.35-42, 2009.
- [2] BRASIL. Leis, Decretos, etc. Instrução Normativa nº 1, de 7 jan. 2000, do Ministério da Agricultura. *Diário Oficial da União*, Brasília, n. 6, 10 jan. 2000. Seção I, p. 54-58. [Aprova os Regulamentos Técnicos para fixação dos padrões de identidade e qualidade para polpas e sucos de frutas].
- [3] CASTRO, M. V.; OLIVEIRA, J. P.; Magalhães JÚNIOR, M. J.; Assunção, E. A. O.; Brasil, A. P.; Rabelo, F. L. A.; Vale, C. H. B. *Análise Química, Físico-Química e Microbiológica de Suco de Frutas Industrializados*. *Diálogos & Ciência*, ano V, n. 12, 2007.
- [4] INSTITUTO ADOLFO LUTZ. *Métodos Químicos e Físicos para Análises de Alimentos*. Normas Analíticas v.1, 3ª ed. São Paulo, 2008.
- [5] GOMES, M. J. N.; KADER, Y. N. A. M.; Ellensohn, R. M.; Cunha, M. E. T.; Barine, C. S. *Análise Físico-Química de Suco de Caju Concentrado*. *Enciclopédia Biosfera*, Centro Científico Conhecer, Goiânia, v.8, n.15; p. 2019, 2012.
- [6] MINIM, V. P. R. *ANÁLISE SENSORIAL: ESTUDO COM CONSUMIDORES*. 3ª ed. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2013.
- [7] SOARES, L. M. V., Shishido, K., Moraes, A. M. M., Moreira, V. A., Mineral composition of brazilian concentrate fruit juices. *Ciência e Tecnologia de Alimentos*, Campinas, v. 24, n. 2, p.202, 2004
- [8] ZEPKA, L. Q., Borsarelli, C. D., Silva, M. A. A. P., & Mercadante, A. Z. Thermal degradation kinetics of carotenoids in a cashew apple juice model and its impact on the system color. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 57(17), 7841–7845, 2009.

Capítulo 5

Parâmetros físicos de carne caprina marinada com condimento à base de abacaxi

Keliane da Silva Maia

Maria Érica da Silva Oliveira

Thiago Mendes Fernandes

Francisca Kelia Duarte Dias

Francyelle Gurgel Castro Alves

Jéssica Taiomara Moura Costa Bezerra de Oliveira

Patrícia de Oliveira Lima

Resumo: Teve-se como objetivo na presente pesquisa a avaliação do efeito da marinação com um aditivo natural à base de abacaxi sobre as características físicas da carne caprina. A carne caprina foi adquirida e dividida (pesos iguais) em 3 amostras: Controle (carne in natura), em T1 (Tempero comercial) e em T2 (Tempero natural elaborado à base de abacaxi). A amostra Controle não foi submetida a nenhum tratamento e foi armazenada sob refrigeração (5°C) até a realização das análises físicas. As amostras de carne caprina marinadas em Tempero Comercial (T1) e em Tempero a base de abacaxi (T2) foram submetidas ao processo de imersão em recipientes contendo as devidas soluções, utilizando a proporção tempero: carne de 2:1 (v/p), por um período de seis horas. Após o tempo de imersão, foi feita a drenagem por 5 minutos e as amostras foram armazenadas sob refrigeração a 5°C até a realização dos parâmetros físicos. Para a caracterização do tempero natural elaborado, foram realizadas as análises de umidade, cinzas, proteínas totais, carboidratos e valor energético. Nas amostras Controle, T1 e T2 foram realizadas as análises de Potencial Hidrogeniônico (pH), Capacidade de Retenção de Água (CRA), Perda de Peso no Cozimento (PPC) e Força de Cisalhamento (FC). Em relação às análises da composição nutricional do tempero a base de abacaxi, verificou-se um baixo teor de gorduras, além de baixo valor calórico. Para os parâmetros físicos da carne caprina, os valores de pH do tratamento T2 diferiu significativamente do Controle e T1. O resultado da CRA da amostra T2 demonstrou-se significativamente diferente da amostra Controle. Em relação aos valores de perda de peso por cocção (PPC), verificou-se uma que as amostras T1 e T2 não diferiram significativamente entre si. Para os resultados de FC (Força de Cisalhamento), as amostras T1 e T2 diferiram significativamente da amostra Controle. De modo geral, o tempero à base de abacaxi pode ser utilizado em processos de marinação de carne, porém, são necessárias novas pesquisas visando à obtenção de mais informações.

Palavras-Chave: aditivos naturais; conservação; marinação; qualidade.

1. INTRODUÇÃO

A carne caprina apresenta vantagens em comparação às carnes bovina e suína, devido a suas características sensoriais singulares, como sabor, maciez e suculência, menor teor de gordura, colesterol e calorias. Somado a estas, a carne caprina apresenta elevado índice de proteína, ferro e ácidos graxos insaturados, características que impulsionam consideravelmente o consumo dessa carne e, consequentemente, sua comercialização e seus meios de produção. Além disso, a expansão do consumo da carne caprina está atrelada à melhoria da sua qualidade, além do aumento de oferta e campanhas de divulgação dos seus valores nutricionais (MADRUGA e BRESSAN, 2011; MADRUGA *et al.*, 2007).

Apesar do crescimento, o aproveitamento tecnológico da carne caprina tem sido pouco explorado, observando-se um menor número de produtos ofertados ao consumidor nos principais pontos de venda em comparação ao de outras espécies. Percebendo isso, a indústria de alimentos e as instituições de pesquisa vêm investindo na aplicação de tecnologias que propiciem o desenvolvimento de produtos com custo acessível e que atendam às expectativas do consumidor (MADRUGA *et al.*, 2005).

Uma das tecnologias em expansão é a marinação: prática de adicionar sal, fosfatos, ácidos e condimentos a carne antes de serem embalados em molho aromatizante contendo ervas ou especiarias. Essa técnica pode ser utilizada como prática culinária para fins de saborização, entretanto, pelas suas propriedades de conservação, expandiu a nível industrial, sendo comum no processamento industrial de frangos, suínos e em proporções menores de bovinos (SCHIRMER; HEIR; LANGSRU, 2009). Nesse contexto, a produção de carnes marinadas industriais vem substituindo as tradicionais carnes vendidas *in natura* no varejo. Outrossim, o ato de marinar atribui sabor, melhora a textura e aumenta a conservação da carne. Segundo Daguer, Assis e Bersot (2010) as vantagens deste método é a simplicidade do processo, o baixo custo, além de permitir produção em baixa escala. De acordo com Gamage, Mutucumarana e Andrew (2017), o processo de marinação por imersão é capaz de melhorar a cor dos produtos cárneos.

Segundo Chaudhary *et al.* (2019), o abacaxi é conhecido como a rainha das frutas devido ao seu excelente sabor e aroma. É bom para o sistema digestivo e ajuda a manter o peso ideal e a nutrição equilibrada. Assim, novas tecnologias para o uso do abacaxi são importantes para atender à demanda de consumidores que desejam produtos saudáveis, nutritivos e naturais. Na indústria alimentícia, a fruta abacaxi destaca-se para o uso como amaciamento de carnes devido os altos níveis de bromelina na sua composição, enzima que possui amplo uso em razão de sua atividade proteolítica (quebra de ligações peptídicas), que é utilizada ainda para clarificação de cervejas, preparação de alimentos infantis, fabricação de queijos, entre outros (COELHO *et al.*, 2011). Assim, o uso do abacaxi como aditivo natural e coadjuvante no processo de marinação de carne caprina é altamente justificável.

Dessa forma, a aplicação da marinação em produtos naturais pode influenciar algumas características almejadas pelos consumidores, como sabor, maciez e suculência, aumentando, assim, a oferta de um produto com características sensoriais diferentes e com mais nutrientes. Nesse contexto, objetivou-se avaliar o efeito da marinação com um aditivo natural à base de abacaxi sobre as características físicas da carne caprina.

2. METODOLOGIA

Para a realização da pesquisa, foi utilizada carne caprina adquirida no mercado local da cidade de Mossoró/RN. As amostras coletadas foram imediatamente encaminhadas, sob condições de refrigeração, ao LANIS – Laboratório de Análises Instrumentais e Sensoriais, da Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA.

A partir da peça de carne adquirida, foi retirada a gordura externa ao músculo, outros tecidos e ossos, permanecendo apenas o tecido muscular. A carne foi dividida (pesos iguais) em 3 amostras distribuídas em: Controle (carne *in natura*), em T1 (Tempero comercial) e em T2 (Tempero natural elaborado a base de abacaxi). O Tempero comercial utilizado foi adquirido no comércio local da cidade de Mossoró-RN. O Tempero natural a base de abacaxi foi elaborado com os ingredientes que estão sumarizados na Tabela 1.

Tabela 1: Ingredientes utilizados na elaboração de tempero natural a base de abacaxi.

Ingredientes	Quantidade
Suco de abacaxi*	700ml
Vinagre	300ml
Cebola	100g
Alho	50g
Gengibre em pó	15g
Canela em pó	12g
Pimenta do reino	15g
Sal	13g
Cravo da Índia	3g

*suco na proporção de 1:1 (água + polpa)

Para a elaboração do tempero natural a base de abacaxi, todos os ingredientes foram homogeneizados, utilizando-se um liquidificador, por aproximadamente 3 minutos e, em seguida, filtrados. Posteriormente, o líquido foi envasado em recipiente de vidro (esterilizado), deixando-se transbordar para que não houvesse ar no recipiente, e foi conservado em refrigeração (5°C).

Foi realizada a caracterização físico-química do tempero elaborado a base de abacaxi. As análises de composição centesimal do tempero seguiram os métodos da AOAC (2011). A umidade foi determinada por gravimetria, com secagem do material em estufa a 105°C ± 2°C. As cinzas foram determinadas por incineração em mufla, a 550°C. O teor de Proteínas Totais foi determinado pelo método de Kjeldahl, utilizando fator de conversão 6,25 para conversão em proteína bruta. O teor de lipídios foi determinado pelo método Folch *et al.* (1957). A determinação de carboidratos foi calculada por diferença, subtraindo-se de 100 os valores encontrados para umidade, cinza, lipídio e proteínas. O valor energético do tempero foi calculado pela soma e multiplicação dos macronutrientes (proteína, carboidrato, lipídio) pela quantidade de energia fornecida por cada um (% de proteína x 4 kcal + % de lipídios x 9 kcal + % de carboidratos x 4 kcal) e expresso em Kcal/100g, de acordo com metodologia proposta por Ribeiro *et al.* (2003).

A amostra Controle não foi submetida a nenhum tratamento e foi armazenada sob refrigeração (5°C) até a realização das análises físicas. As amostras de carne caprina marinadas em Tempero Comercial (T1) e no Tempero a base de abacaxi (T2) foram submetidas ao processo de imersão em recipientes contendo as devidas soluções, utilizando a proporção tempero: carne de 2:1 (v/p), por um período de seis horas. Após o tempo de imersão, foi feita a drenagem por 5 minutos e depois as amostras foram armazenadas sob refrigeração a 5°C até a realização dos parâmetros físicos.

Nas amostras Controle, Tempero Comercial (T1) e Tempero a base de abacaxi (T2) foram realizadas as análises de potencial Hidrogeniônico (pH), Capacidade de Retenção de Água (CRA), Perda de Peso no Cozimento (PPC) e Força de Cisalhamento (FC). As medidas do potencial Hidrogeniônico (pH) foram realizadas utilizando-se pHmetro portátil (Portable Meat pH Meter - HI99163), devidamente aferido. A análise de Capacidade de Retenção de Água (CRA) foi determinada baseando-se na metodologia realizada por Sanfelice *et al.*, (2010). A Análise de Perda de Peso no Cozimento (PPC) seguiu a metodologia adaptada por Bridi e Silva (2009). As amostras usadas para PPC foram também utilizadas para a análise da Força de Cisalhamento (FC) (MONTE *et al.*, 2007), que foi determinada utilizando-se um texturômetro (TA-XT EXPRESS da Stable Micro System) controlado por computador, com lâmina Warner-Bratzler, operando com velocidade de 20 m/s. As amostras a serem analisadas foram cortadas em cubos de 1,0 cm de aresta. A força de cisalhamento das amostras representou o valor da dureza de cada tratamento.

As análises foram submetidas a teste de comparação de média de Tukey, em nível de probabilidade de 5% ($p < 0,05$), utilizando o programa SISVAR, versão 4.2 (FERREIRA, 2003).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados das análises de composição centesimal do tempero a base abacaxi estão expressos na Tabela 2.

Tabela 2 – Caracterização físico-química do tempero a base de abacaxi

Análises	(g/100g)
Umidade	90,02
Cinzas	1,08
Lipídeos	1,2
Proteínas	0,40
Carboidratos	7,3
Valor calórico	41,6*

* Valor expresso em kcal/100g

As análises da composição nutricional do tempero a base de abacaxi evidenciaram a presença de nutrientes estruturais em sua composição, baixo teor de gorduras, além de baixo valor calórico. O abacaxi *in natura* tem em sua composição um teor de umidade de 86,3%, proteína em torno de 0,9g, lipídeos 0,1g, carboidrato 12,3g e cinzas 0,4g (TACO, 2011).

De acordo com Putra, Wattanachant e Wattanachant (2019), o abacaxi é um ingrediente opcional no preparo de carne. Além das boas propriedades amaciadoras, o odor específico dessa fruta deve ser considerado. Assim, é importante encontrar um produto que minimize o odor resultante da carne caprina. Portanto, recomendam-se novos usos de derivados do abacaxi em processos de marinação de carne caprina.

A Tabela 3 sumariza os resultados dos parâmetros físicos da carne caprina das amostras Controle, T1 e T2.

Tabela 3 – Parâmetros físicos da carne caprina marinada com aditivos naturais

Parâmetros	Controle	T1	T2	CV (%)	P
pH	6,01 ^a	5,76 ^a	5,03 ^b	3,09	0,0052
CRA (%)	67,64 ^a	55,11 ^{ab}	52,23 ^b	8,15	0,0336
PPC (%)	29,89 ^b	35,48 ^{ab}	37,38 ^a	7,38	0,0481
FC (Kg-f)	2,43 ^b	4,15 ^a	4,13 ^a	7,13	0,0018

*Valores com letras sobrescritas iguais, em uma mesma linha, não diferem estatisticamente ao nível de 5% pelo teste de Tukey. pH: Potencial Hidrogeniônico; CRA: Capacidade de retenção de água; PPC: Perda de peso na cocção; FC: Força de cisalhamento; Controle (Carne *in natura*); T1 (Tempero comercial); T2 (Tempero Natural a base de abacaxi).

O emprego da marinação com o tempero a base de abacaxi modificou os parâmetros físicos da carne caprina. Os valores de pH das amostras Controle e T1 não apresentaram diferença significativa entre si, entretanto, o tratamento T2 diferiu significativamente de ambos. Bressan *et al.* (2001) determinaram que o pH final varia de acordo com a espécie, peso no momento do abate, sexo do animal, dentre outros, podendo oscilar entre 5,5 a 5,8 em músculos de contração rápida e de 5,8 a 6,4 em músculos de contração lenta. O valor de pH da amostra submetida ao tratamento T2 diferiu dos demais em virtude de o tempero natural conter, em sua composição, ácido acético, além da presença de abacaxi. De acordo com Neves (2009), o abacaxi possui pH que varia de 3,5 a 4,0.

A CRA é a capacidade que a carne tem para reter água após a atuação de mecanismos físicos, como corte, aquecimento, moagem ou pressão (MONTE *et al.*, 2012). O resultado da CRA da amostra T2 demonstrou-se significativamente diferente da amostra Controle. Esse fato pode estar relacionado às mudanças no pH muscular ocorridas após a marinação, que alteraram, assim, a capacidade de retenção de água das proteínas da carne. O valor do pH da amostra T2 foi de 5,03, valor próximo ao ponto isoelétrico da proteína da carne, fazendo com que este provoque a menor solubilidade e, por isto, maior precipitação das proteínas, interferindo na CRA (DAMODARAN; PARKIN; FENNEMA, 2010; HUSS, 1995; ORDOÑEZ-PEREDA, 2007). Segundo Karlsdottir (2009), a capacidade de retenção de água no músculo depende principalmente das condições das proteínas miofibrilares, do espaço entre os filamentos e de quanta água está localizada intracelularmente.

Em relação aos valores de perda de peso por cocção (PPC), verificou-se que as amostras T1 e T2 não diferiram significativamente entre si, porém, a amostra T2 teve uma diferença significativa quando comparado com a amostra Controle. A maior perda de peso na cocção observada na amostra T2 pode ser justificada pela influência da capacidade de retenção de água nas estruturas da carne (BOUTON; HARRIS; SHORTHORSE, 1971), já que essa amostra obteve menor valor de CRA que a amostra Controle.

Para os resultados de FC (Força de Cisalhamento), as amostras T1 e T2 não diferiram significativamente entre si, no entanto, diferiram significativamente da amostra Controle, que teve o menor valor de força de cisalhamento. Para Monte *et al.*, (2012), a carne com a força de cisalhamento acima de 11 kg-f é classificada como dura, entre 8 e 11 kg-f, aceitável e abaixo de 8 kg-f, a carne é classificada como macia. Portanto, as amostras analisadas na presente pesquisa podem ser consideradas macias, apesar de os valores das amostras T1 e T2 terem valores superiores à amostra Controle.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tempero à base de abacaxi pode ser utilizado como aditivo natural para marinação de carne caprina, podendo melhorar o odor e o sabor da carne, agregando valor ao abacaxi, que poderá ser utilizado em novos nichos de mercado.

São necessárias novas pesquisas, principalmente em relação à avaliação sensorial, visando à obtenção de informações que possam contribuir para o desenvolvimento de cadeia produtiva da carne caprina e de temperos naturais.

REFERÊNCIAS

- [1] AOAC. Association of Official Analytical Chemists. Official Methods of Analysis of AOAC INTERNATIONAL. 19th Edition, AOAC International, Gaithersburg, MD, USA, www.eoma.aoac.org, 2011.
- [2] BOUTON, P. E.; HARRIS, P. V.; SHORTHORSE, W. R. Effects of ultimate pH upon the water-holding capacity and tenderness of mutton. *Journal of Food Science*, v. 36, p. 435-439, 1971.
- [3] BRESSAN, M. C.; PRADO, O. V.; PÉREZ, J. R. O.; LEMOS, A. L. S. R.; BONAGURIO, S. Efeito do peso ao abate de cordeiros Santa Inês e Bergamãcia sobre as características físico-químicas da carne. *Ciência e Tecnologia de Alimentos*. [online]. 2001, vol. 21, n. 3, p. 293-303.
- [4] BRIDI, A. M.; SILVA, C. A. Avaliação da carne suína. Londrina: Midiograf, 2009. 120p.
- [5] CHAUDHARY, V.; KUMAR, V.; VAISHALI, S.; SINGH, K.; KUMAR, R.; KUMAR, V. Pineapple (*Ananas cosmosus*) product processing: A review. *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, v. 8, n. 3, p. 4642-4652, 2019.
- [6] COELHO, D. F.; PAULO A. G. S.; SILVEIRA, E.; PESSOA JÚNIOR, A.; TAMBOURGI, E. B. Purificação de bromelina dos resíduos de abacaxi (*Ananas cosmosus* L. Merrill) por sistemas bifásicos aquosos PEG/Sal. *Exacta*, São Paulo, v. 9, n. 3, p. 333-338, 2011.
- [7] DAGUER, H.; ASSIS, M. T. Q. M.; BERSOT, L. S. Controle da utilização de ingredientes não cárneos para injeção e marinação de carnes. *Ciência Rural*, v. 40, n. 9, p. 2037-2046, 2010.
- [8] DAMODARAN, S.; PARKIN, K. L.; FENNEMA, O. R. Química de Alimentos de Fennema. 4^a Edição. Artmed, 2010. 900p.
- [9] FERREIRA, D.F. SISVAR versão 4.2. Lavras, Universidade Federal de Lavras, 2003.
- [10] FOLCH, J.; LEES, M.; STANLEY, G. H. S. A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. *The Journal of Biological Chemistry*, v.226, n.1, p.497-509, 1957.
- [11] GAMAGE, H. G. C. L.; MUTUCUMARANA, R. K.; ANDREW, M. S. Effect of Marination Method and Holding Time on Physicochemical and Sensory Characteristics of Broiler Meat. *The Journal of Agricultural Sciences*, v. 12, n. 3, p.172-184, 2017.
- [12] HUSS, H. H. Quality and quality changes in fresh fish. Roma: FAO Fisheries Technical Paper, n. 348, 1995. 195p.
- [13] KARLSDOTTIR, M. G. Application of additives in chilled and frozen whitefish fillets: Effects on chemical and physicochemical properties. Master' thesis in School of Health Sciences, Ed. University of Iceland, Reykjavik, Iceland, 2009. 118p.
- [14] PUTRA, A. A.; WATTANACHANT, S.; WATTANACHANT, C. Sensory-related Attributes of Raw and Cooked Meat of Culler Saanen Goat Marinated in Ginger and Pineapple Juices. *Tropical Animal Science Journal*, v. 42, n. 1, p.59-67, 2019.

- [15] MADRUGA, M. S.; BRESSAN, M. C. Goat meats: Description, rational use, certification, processing and technological developments. *Small Ruminant Research*, v. 98, p. 39-45, 2011.
- [16] MADRUGA, M. S.; SOUSA, W. H.; MENDES, E. M. S.; BRITO, E. A. Carnes caprina e ovina: processamento e fabricação de produtos derivados. *Revista Tecnologia & Ciência Agropecuária*, João Pessoa, v.1. n.2, p.61-67, 2007.
- [17] MADRUGA, M. S., SOUSA, W. H., MENDES, E. M. S., BRITO, E. A. Processamento de carnes caprina e ovina: alternativas para aumentar o valor agregado do produto. In: Emepa. Documentos, 44. Caprinos e ovinos: produção e processamento. João Pessoa, p. 107-135, 2005.
- [18] MONTE, A. L. D. S.; SELAIVE-VILLARROEL, A. B.; GARRUTI, D. D. S.; ZAPATA, J. F. F.; BORGES, Â. S. Parâmetros físicos e sensoriais de qualidade da carne de cabritos mestiços de diferentes grupos genéticos. *Ciência e Tecnologia de Alimentos*, v. 27, n. 2, p. 233-238, 2007.
- [19] MONTE, A. L. S.; GONSALVES, H. R. O.; VILLARROEL, A. B. S.; DAMACENO, M. N.; CAVALCANTE, A. B. D. Qualidade da carne de caprinos e ovinos: uma revisão. *ACSA – Agropecuária Científica no Semi-Árido*, v.8, n.3, p11-17, 2012.
- [20] NEVES, L. C. Manual pós-colheita da fruticultura brasileira. Londrina, PR: EDUEL, 2009. 494p.
- [21] ORDOÑEZ-PEREDA, J. A. *Tecnologia de Alimentos: Alimentos de Origem Animal*. v.2. Porto Alegre: Artmed, 2007. 280p.
- [22] RIBEIRO, P.; MORAIS, T. B.; COLUGNATI, F. A. B.; SIGULEM, D. M. Tabelas de composição química de alimentos: análise comparativa com resultados laboratoriais. *Revista de Saúde Pública*, 2003.
- [23] SANFELICE, C.; MENDES, A. A.; KOMIYAMA, C. M.; CAÑIZARES, M. D. C.; RODRIGUES, L.; CAÑIZARES, G. I.; ROÇA, R. O.; ALMEIDA, I. C. L. P.; BALOG, A. Avaliação e caracterização da qualidade da carne de peito (*Pectoralis major*) de matrizes pesadas em final de ciclo produtivo. *Ciência e Tecnologia de Alimentos*, Campinas, 30(Supl.1), p.166-170, maio 2010.
- [24] SCHIRMER, B. C., HEIR, E., & LANGSRUD, S. Characterization of the bacterial spoilage flora in marinated pork products. *Journal of Applied Microbiology*, v. 106, n. 6, p. 2106-2116, 2009.
- [25] TACO. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos / NEPA – UNICAMP.- 4. ed. rev. e ampl.. -- Campinas: NEPAUNICAMP, 2011. 161 p.

Capítulo 6

Avaliação da informação nutricional contida nos rótulos de alimentos destinados para lactentes

Catherine Teixeira de Carvalho

José Douglas Bernardino Domingos

Antônio Alef Pereira de Oliveira

Isabelle de Lima Brito

Amanda Marília da Silva Sant'Ana

Adriele Ferreira Matos

Suerlândio Maceió de Farias

Francisco de Assis Oliveira

Mirelly Aline Martins de Souza

Resumo: Uma alimentação complementar adequada compreende alimentos ricos em micronutrientes, ausente do excesso de sal ou condimentos, de boa aceitação pela criança, em quantidade apropriada. O conhecimento sobre a alimentação da criança é essencial para uma avaliação e orientação adequada sobre sua alimentação. Os alimentos apresentados às crianças nos primeiros anos têm impacto no modo como elas irão desenvolver seus hábitos alimentares durante toda a vida. Se logo nas primeiras refeições elas se deparam com alimentos processados, cheios de conservantes, torna-se mais difícil mudar os hábitos futuramente (SÁ, 2015). Diante deste contexto, há necessidade de regulamentar e fiscalizar os produtos alimentícios industrializados que são oferecidos às crianças, com atenção especial aos lactentes. A importância da existência de legislações que regulamentem os padrões de identidade e qualidade que determinem as normas de rotulagem dos produtos alimentícios torna-se evidente o desenvolvimento do setor alimentício, existindo preocupação com o consumidor, onde as informações devem estar ao alcance da sua compreensão. As legislações deveriam ser suficientes para coibir qualquer desentendimento entre indústria e consumidor. Nesse sentido, o trabalho tem como objetivo realizar uma pesquisa de campo para avaliar qualitativamente e quantitativamente as informações nutricionais dos rótulos de diferentes alimentos disponíveis no mercado específico para lactentes.

Palavras-Chave: alimentação, infantil, substituição.

1. INTRODUÇÃO

Uma alimentação complementar adequada compreende alimentos ricos em energia e micronutrientes, sem contaminação, ausente do excesso de sal ou condimentos, de boa aceitação pela criança, em quantidade apropriada, fáceis de preparar a partir dos hábitos alimentares da família. A criança 29 (vinte e nove) dias de nascido até 02(dois) anos possui um mecanismo de auto- regulação de ingestão diária de energia, o pequeno volume do estômago da criança pequena (30-40 ml/kg de peso) pode impedi-la de alcançar suas necessidades energéticas se a dieta for de baixa densidade energética, quando a criança recebe grande quantidade de energia dos alimentos complementares, ela poderá reduzir a ingestão de leite materno. (BROWN KH et al.,1995)

Quando o crescimento do indivíduo é insatisfatório com a amamentação exclusiva nos primeiros seis meses, antes de se recomendar a introdução da alimentação complementar é recomendada uma avaliação em busca do fator, se a criança não esta ingerindo pouco leite materno por má técnica de amamentação ou algum outro fator.

A atualização do conhecimento sobre a alimentação da criança é essencial para a avaliação e a orientação adequada sobre sua alimentação de maneira qualitativa e/ ou quantitativa adequada para suprir suas necessidades nutricionais definidas pelo crescimento e desenvolvimento da criança, o consumo precoce de alimentos complementares interfere na manutenção do aleitamento materno, mas, muitos desses alimentos não suprem as necessidades nutricionais desse ciclo de vida, na qual a velocidade de crescimento é alta, tornando os lactentes mais vulneráveis tanto à desnutrição quanto a deficiências de micronutrientes. (ZEITLIN MT, 1997)

Nessa fase inicial de alimentação manifestam-se as predisposições genéticas pela preferência de sabor doce, rejeição aos sabores azedos e amargos e certa indiferença pelo sabor salgado. A aceitação de novos alimentos e volumes a serem consumidos pode ser determinado pelo tempo o qual permitirá a atuação dos mecanismos reguladores do apetite e saciedade se dispondo ao risco de interferência negativa na capacidade de auto- regulação da ingestão alimentar.

Os alimentos apresentados às crianças logo nos primeiros anos da infância têm impacto no modo como elas vão desenvolver seus hábitos alimentares durante toda a vida. Se logo nas primeiras refeições elas se deparam com alimentos processados, cheios de conservantes, sucos de caixinha, chamados de "naturais", mas lotados de açúcar e sódio, fica mais difícil mudar os hábitos depois. Só que é exatamente o que vem acontecendo nas famílias brasileiras (SÁ, 2015).

Diante deste contexto brasileiro, há a necessidade de regulamentar e fiscalizar os produtos alimentícios industrializados que são oferecidos às crianças, com atenção especial aos lactentes, pois estão em fase de formação e necessitam de uma alimentação com quantidades e qualidade de nutrientes. Para isto, a RDC nº 359, de 23 de Dezembro de 2003, regulamenta as porções e medidas informadas nos rótulos dos alimentos, e a RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003, trata da obrigatoriedade das informações sobre os nutrientes presentes em determinado alimento, levando-se em consideração que, o conhecimento sobre os nutrientes contidos no produto viabilizam o consumo adequado de nutrientes.

A importância da existência de legislações que regulamentem os padrões de identidade e qualidade e que determinem as normas de rotulagem dos produtos alimentícios torna-se evidente desenvolvimento do setor alimentício, existindo preocupação com o consumidor, onde as informações devem estar ao alcance da sua compreensão, as legislações deveriam ser suficientes para coibir qualquer desentendimento entre setor industrial e consumidor, frente às resoluções, analisando dados quantitativos e qualitativos da conformidade e da não conformidade dos rótulos dos alimentos frente à legislação brasileira.

Nesse sentido, o trabalho tem como objetivo realizar uma pesquisa de campo para avaliar qualitativamente e quantitativamente as informações nutricionais dos rótulos de alimentos diferentes, amostras/marcas disponíveis no mercado local específico para lactentes. Diante deste contexto, a referida pesquisa se justifica por ser de extrema importância para conhecer e avaliar a qualidade e a quantidade de nutrientes que estão presentes nos alimentos industrializados oferecidos no mercado para o consumo de crianças de até dois anos de idade.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O delineamento deste estudo é uma análise descritiva dos rótulos de fórmulas lácteas e farinhas lácteas, coletados no comércio local da cidade de Solânea- PB, onde foi realizada uma avaliação dos dados de valor nutricional declarados obrigatoriamente nos rótulos dos referidos produtos.

O processo de coleta de dados foi iniciado com a escolha aleatória de 05 (cinco) amostras de fórmulas lácteas e de 05 (cinco) amostras de farinhas lácteas de diferentes marcas, encontradas no comércio. Seguida ao processo de coleta foi feita uma avaliação para verificar se os rótulos estavam em conformidade com legislação vigente da ANVISA (RDC 360/03), observando-se a existência de informações sobre o tamanho da porção e a medida caseira.

Foi realizado uma avaliação acerca dos teores de sódio, gorduras totais e gorduras trans e suas respectivas quantidades apresentadas no produto, por se tratarem de nutrientes, que se consumidos em excesso, prejudicam a saúde.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela 1 descrita abaixo mostra o resultado das análises entre as diferentes marcas de farinha láctea, e dos nutrientes presentes no produto de acordo com o rótulo nutricional.

TABELA 1 - Comparação entre todos os itens do rótulo nutricional de farinha láctea de acordo com a RDC 360 de 2003.

FARINHA LÁCTEA		AMOSTRAS				
Nutrientes		Marca A	Marca B	Marca C	Marca D	Marca E
Valor Energético	kcal	77	123	79	86	90
	%	4	6	**	5	**
Carboidratos	g	18	22	18	20	19
	%	6	7	*	5	6
Proteínas	g	1,30	3,9	1,5	2,6	2,9
	%	2	5	**	3	5
Gorduras Totais	g	0,68	2,0	0	1,5	1,7
	%	1	4	**	3	4
Gorduras Saturadas	g	0	1,3	0	1,0	0,9
	%	0	6	**	5	3
Gorduras Trans	g	0	0	0	0	0
	%	0	**	**	**	**
Fibra Alimentar(g)	g	0,250	NT	0	0	0,137
	%	1	NT	**	0	0,50
Sódio (mg)	g	40	19	57	38	52
	%	2	1	**	2	**

Fonte: Própria (2018)

Obs: ** (Valor diário não estabelecido); 0 (Quantidade insignificativa)

Na tabela acima, destaca-se a marca B, com um elevado valor energético, devido aos índices elevados de proteínas, carboidratos e gorduras totais presentes em sua composição, em relação às marcas A, C, D e E. A marca B apresenta uma quantidade muito baixa de sódio, entretanto, não apresenta quantidades significativas de fibra alimentar. Portanto, a marca B não está adequada para o consumo de lactentes por ser muito calórica, e apresentar quantidades significativas de gorduras saturadas.

A marca C apresenta quantidades muito baixas de proteínas, que são indispensáveis para o desenvolvimento da criança na fase de lactente. A marca C também não apresenta quantidades significativas de lipídios e fibras alimentares. Em contrapartida apresenta elevados índices de sódio, não sendo recomendada para o consumo de lactentes.

As amostras D e E apresentam quantidades de nutrientes bem próximos. No entanto, a amostra D não apresenta quantidade significativa de fibra alimentar, e a E uma quantidade significativa de sódio.

Em comparação as marcas B, C, D e E, a marca A apresenta-se como mais adequada para o consumo por ser menos calórica, apresentar quantidades significativas de proteínas e fibras alimentares. A marca A não possui gorduras saturadas, e não apresenta quantidades significativas de gorduras trans, sendo, portanto a mais recomendada para o consumo de lactentes.

TABELA 2 – Demonstra o resultado das análises entre as diferentes marcas de fórmulas lácteas, e dos nutrientes presentes no produto, comparação entre todos os itens do rótulo nutricional de fórmulas lácteas (por 100 ml de fórmula reconstituída) acordo com a RDC 360 de 2003.

FÓRMULA LÁCTEA	AMOSTRAS					
	Nutrientes	Marca A	Marca B	Marca C	Marca D	Marca E
Valor Energético	kcal	67	67	66	67	65
	%	**	**	**	**	**
Carboidratos	g	7,2	7,3	6,8	61	65
	%	**	**	**	**	**
Proteínas	g	1,2	1,7	1,8	1,1	1,4
	%	**	**	**	**	**
Gorduras Totais	g	3,7	3,4	3,5	3,2	3
	%	**	**	**	**	**
Gorduras Saturadas	g	1,4	1,3	2,1	1,7	1,5
	%	**	**	**	**	**
Gorduras Trans	g	0	0	0	0	0
	%	**	**	**	**	**
Fibra Alimentar(g)	g	0,44	0	0	0	0
	%	**	**	**	**	**
Sódio (mg)	g	17mg	19mg	18mg	19mg	19mg
	%	**	**	**	**	**

Fonte: Própria (2018)

Obs: ** (Valor diário não estabelecido)

Em análise realizada na tabela 2, pode-se observar que as marcas A, B, C, D e E de fórmulas lácteas não se distanciam significativamente entre os nutrientes que compõe a sua formulação. Entretanto, a marca C se destaca por apresentar um elevado índice de gorduras saturadas em relação às outras marcas, não sendo, portanto recomendada para o consumo.

A marca A apresenta-se como mais indicada para o consumo, pois possui um índice mais baixo de sódio, em relação às outras analisadas. Outro componente presente na marca A, que está ausente nas marcas B, C, D e E, é a fibra alimentar, que contribui com a regulação intestinal. Em relação ao sódio, a marca A contém o menor índice, em relação às outras marcas analisadas.

4. CONCLUSÕES

A análise dos rótulos das embalagens, evidenciou que, os produtos comercializados na cidade de Solânea-PB destinados aos lactentes, apresentam em sua composição percentuais de nutrientes adequados para o consumo do público-alvo, entretanto há algumas ressalvas em relação as composições nutricionais, que podem influenciar na qualidade da alimentação e nas escolhas dos seus alimentos futuramente. Portanto classifica-se como apropriados para o consumo dos lactentes, tanto quantitativamente como qualitativamente, apresentando conformidade com a RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003, a marca analisada “A” de farinha láctea, e a marca analisada “A” de fórmula láctea.

REFERÊNCIAS

- [1] ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003. Aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, tornando obrigatória a rotulagem nutricional. Disponível em: <<http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=9059&word>>. Acesso em 07 de out. de 2016.
- [2] ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 359, de 23 de dezembro de 2003. Aprovar o Regulamento Técnico de Porções de Alimentos Embalados para Fins de Rotulagem Nutricional. Disponível em: <<http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=9058&word>>. Acesso em 07 de out. de 2016.
- [3] BROWN, KH el al. Sate of the art review paper for the meeting on Consultation on complementary feeding. Montpellier, France, 1995.
- [4] SÁ, Vanessa. Os perigos dos alimentos industrializados para a saúde das crianças - e como livrar-se deles, 2015. Disponível em: <<http://mdemulher.abril.com.br/>>. Acesso em: 07 out. 2016.
- [5] ZEITLIN MT, Ahmed NU. Nutritional correlates of frequency and length of breastfeeding in rural Bangladesh. Early Hum Develop. 1995;41:97-100.

Capítulo 7

Avaliação da qualidade microbiológica de Sushi comercializado em restaurantes no município de Juazeiro do Norte - CE

Élida Amélia de Sousa Costa

Ana Vitorino Félix

Amanda Bezerra de Sousa

Joana D'arc Alves de Freitas

Maria Klevyany Nascimento

Janeanne Nascimento Silva Lopes

Resumo: A qualidade do peixe fresco pode ser influenciada por hábito não higiênico dos manipuladores, podendo comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento, o consumo do pescado in natura representa um grande risco a saúde coletiva, por não haver barreiras térmicas (cozção), para a esterilização do alimento e assim garantir sua inocuidade. O sushi é um alimento típico da culinária japonesa a base de pescado cru e/ou arroz japonês e/ou alga marinha, preparado manualmente. O objetivo desse trabalho foi verificar através de análises microbiológicas a qualidade de sushi comercializados em restaurantes no Município de Juazeiro do Norte – CE e comparar os resultados com os parâmetros estabelecidos pela Legislação Brasileira RDC nº 12/2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para avaliação microbiológica foram coletadas três amostras de restaurantes no Município de Juazeiro do Norte – CE, a fim de avaliar sua qualidade. Os parâmetros avaliados foram Coliformes a 45°C, *Staphylococcus aureus* e presença de *Salmonella* spp. Diante dos resultados, verificou-se que todas as amostras encontraram-se dentro dos padrões para contagem de coliformes fecais e obtiveram a ausência de *Salmonella* e *Staphylococcus aureus*, estando dentro dos limites permitido pela legislação vigente, podendo servir de parâmetro para avaliar a qualidade sanitária de sushi comercializada no município de Juazeiro do Norte-CE.

Palavras-chave: Consumidores; Pescado; Qualidade.

1. INTRODUÇÃO

Do ponto de vista da saúde pública a população deve ter ao seu alcance alimentos de boa procedência e qualidade, dentro dos padrões normatizados, não apenas em valores nutricionais, mais também em condições higiênico-sanitárias, livres de agentes microbianos, físicos ou químicos nocivos que possam de alguma forma, afetar a saúde do consumidor (CORREIA & RONCADA, 2002).

Ainda de acordo com Correia & Roncada (2002), a qualidade do peixe fresco pode ser influenciada por hábito não higiênico dos manipuladores, podendo comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento, o consumo do pescado *in natura* representa um grande risco a saúde coletiva, por não haver barreiras térmicas (cocção), para a esterilização do alimento e assim garantir sua inocuidade.

O sushi é um alimento típico da culinária japonesa a base de pescado cru e/ou arroz japonês e/ou alga marinha, preparado manualmente. Este prato está tornando-se popular em outros países além do Japão. No Brasil, esse tipo de culinária também faz muito sucesso, principalmente, em cidades com grande fluxo de turistas. O consumo crescente desse tipo de alimento vem-se tornando uma preocupação para a saúde pública, não só pelo fato de ser um produto altamente perecível mas também devido aos aspectos higiênico-sanitários de sua preparação e conservação. Além de parasitas, a ingestão de pratos não cozidos pode veicular outros patógenos humanos (SANTOS et al., 2012).

A contaminação de alimentos de origem marinha por bactérias Gram-negativas patogênicas ao homem é de grande interesse do ponto de vista da saúde pública. As enterobactérias incluem mais de 27 gêneros e inúmeras espécies de microrganismos, sendo que alguns destes são habitantes comuns dos intestinos de animais de sangue quente, enquanto outros são agentes causadores de toxinfecções, febre entérica e disenteria. A maioria das cepas de *Escherichia coli* não é patogênica, sendo benéfica para o intestino. As bactérias são excretadas em grande número com as fezes, podendo vir a contaminar a água e os alimentos. Nos alimentos, o estudo da presença desse coliforme é de extrema importância, não apenas como eventual deteriorante, mas também sendo considerado o melhor indicador da sua contaminação fecal. O reservatório natural de *Salmonella* é o trato intestinal de mamíferos, aves e répteis, e podem alcançar o ambiente aquático através da contaminação fecal e, desta forma serem detectadas em peixes e produtos pesqueiros (VIEIRA, 2004).

A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), do Ministério da Saúde, através da RDC nº 12 de 02 de janeiro de 2001, estabelece os padrões microbiológicos sanitários para alimentos destinados ao consumo humano, define no item 22b do anexo I (Pratos Prontos para Consumo), as análises dos seguintes patógenos: Coliformes a 45°C; *Estafilococos* coagulase positiva; *Salmonella* spp. e *Vibrio parahaemolyticus* (BRASIL, 2001).

O objetivo desse trabalho foi verificar através de análises microbiológicas a qualidade de sushi comercializados em restaurantes no Município de Juazeiro do Norte – CE e comparar os resultados com os parâmetros estabelecidos pela Legislação Brasileira RDC nº 12/2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Foram coletadas três amostras de diferentes estabelecimentos especializados na comercialização desse tipo de produto. Durante a coleta, cerca de 100g de amostra foi adquirida em cada unidade de alimentação da maneira como estavam expostas e acondicionadas em sacos estéreis, sendo posteriormente armazenadas em isopor isotérmico com baterias de gelo. As amostras foram processadas dentro do período máximo de 2 horas a partir do momento da coleta e foram encaminhadas ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos da Faculdade de Tecnologia CENTEC FATEC – Cariri para as análises microbiológicas.

Empregou-se a técnica de tubos múltiplos para a pesquisa de Coliformes a 45°C a partir de testes presuntivos utilizando Caldo Lauril Sulfato Tryptose (LST) e testes confirmativos empregando Caldo E. coli (EC). Para a análise de *Estafilococos* coagulase positiva, utilizou-se o método de plaqueamento em ágar Baird-Parker enriquecido com solução de gema de ovo, este meio possibilita a evidência das atividades proteolíticas e lipolíticas dos *Estafilococos*, através do aparecimento de um halo de precipitação e um de clarificação ao redor da colônia. A prova da coagulase também efetuada nas análises, baseia-se na comprovação da capacidade de coagular o plasma pela ação da enzima coagulase.

Para a análise de *Salmonella*, foi retirado 1 mL de cada amostra diluída e utilizado para inocular 10 mL de caldo tetrationato e 10 mL de caldo selenito-cistina e incubados a 24h po 36°C. Após a incubação, alíquotas de cada tubo foram estriadas em placas de ágar hectoen e ágar salmonella-shigella e incubados a 24h por 36°C. Colônias com características típicas do gênero *Salmonella* foram repicadas e submetidas à identificação morfo-tintorial e bioquímica e testadas com soro polivalente para *Salmonella*

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados encontrados (Tabela 1) indicam que, todas as amostras, estavam aptas para o consumo, segundo a RDC n. 12/01 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2001).

Tabela 1 –Avaliação da qualidade microbiológica de suchis comercializados em restaurantes.

Parâmetro	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Padrão
<i>Staphylococcus</i>	Ausente	Ausente	Ausente	5×10^2 NMP/g
<i>Salmonella spp.</i>	Ausente	Ausente	Ausente	Ausência
Coliformes a 45°C	<3	<3	<3	10^2 NMP/g

NMP: Número Mais Provável

Lima et al. [sd] encontraram do total de amostras analisadas, o grupo de Coliformes Termotolerantes (45°C) variou de < 3,0 a >110 NMP/g, destas, 40% (8 amostras) dos estabelecimentos não especializados apresentaram valores acima do permitido pela Legislação Vigente (10^2), e 20% (4 amostras) oriundas dos estabelecimentos especializados mostraram não conformidade, sendo consideradas insatisfatórias para o consumo, já que é um indicativo da presença de bactérias de origem fecal.

Pinheiro et al. (2006), numa pesquisa realizada na cidade de Fortaleza-CE observou níveis de contaminação acima do permitido para coliformes termotolerantes em 30% das amostras de sushi e sashimi.

Santos et al. (2012), analisaram 35 amostras de suchis comercializados em restaurantes de Aracaju, SE e constataram que das 20 amostras positivas para *S. aureus*, 4 (11,4%) apresentaram níveis acima do limite permitido pela legislação.

Segundo Martins(2006), as bactérias do gênero *Staphylococcus* são habitantes usuais da pele, das membranas mucosas, do trato respiratório superior e do intestino do homem e animais. A partir destes, as bactérias podem atingir o ar, água, solo, leite, esgoto e qualquer superfície ou objeto que tenha entrado em contato com o infectado. Desta forma, todos os alimentos ficam sujeitos a contaminação, e se os mesmos apresentarem boas condições para o crescimento do patógeno, o alimento será uma fonte de intoxicação. Portanto, a contaminação pode ter acontecido através do manipulador do sushi e/ou uma matéria-prima de má qualidade.

Todas as amostras encontraram-se dentro dos padrões para contagem de coliformes fecais, *Staphylococcus aureus* e obtiveram a ausência de *Salmonella*, indicando que não houve contaminação fecal nas amostras.

4. CONCLUSÕES

Portanto, diante dos resultados podemos concluir que as amostras de sushi apresentaram-se aptas para o consumo humano, podendo servir de parâmetro para avaliar a qualidade sanitária de sushi comercializada na cidade de Juazeiro do Norte-CE. De acordo com os dados obtidos, foi possível verificar que os profissionais responsáveis pela manipulação e distribuição de produto a base de pescado cru, obedecem as medidas pré-estabelecidas referentes a qualidade higiênico-sanitárias e aplicação correta de Boas Práticas de Fabricação (BPF's), a fim de controlar os possíveis riscos potenciais a saúde do consumidor.

REFERÊNCIAS

- [1] BRASIL. ANVISA – RDC Nº12, 02 de Janeiro de 2001 da Agência de Vigilância Sanitária do Ministério da saúde. Regulamento técnico sobre os padrões microbiológicos para alimentos. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/-legis/resol/12_01rdc.htm>. Acesso em abril de 2011.
- [2] CORREIA, M.; RONCADA, M. J., Características microscópicas de queijos prato, mussarela e mineiro comercializados em feiras livres da Cidade de São Paulo. Revista Saúde Pública. Vol. 31, 2002; 296-301p.
- [3] LIMA, R. M. T.; SHINOHARA, N. K. S.; SIQUEIRA, L. P.; LIMA, R. C. T.; PIRES, E. F.; XIMENES, G. N. C.; BARBOSA, V. B. Avaliação microbiológica de suchis e sashimis comercializados na cidade do Recife – PE. Relatório de Estágio. [sd].
- [4] MARTINS, F. de O. Avaliação da qualidade higiênico-sanitária de preparações (sushi e sashimi) a base de pescado cru servidos em bufês na cidade de São Paulo. 2006. (Dissertação de Mestrado), Programa de Pós-graduação em Saúde Pública da Faculdade de São Paulo da Universidade de São Paulo, Campinas, 2006.
- [5] PINHEIRO, H.M.C.; VIEIRA, R.H.S.F.; CARVALHO, F.C.T.; REIS, E.M.F.; SOUSA, O.V.; VIEIRA, G.H.F.; RODRIGUES, D.P. Salmonella sp. e coliformes termotolerantes em sushi e sashimi comercializados na cidade de Fortaleza- Ceará. Boletim Técnico-Científico do CEPENE. 14: 23-31, 2006.
- [6] SANTOS, A.A.; SIMÕES, G. T. N.; CRUZ, M. M. FERREIRA, N. S. S.; LIMA, R. T. C.; TUNON, G. I. L. Avaliação da qualidade microbiológica de suchi comercializado em restaurantes de Aracaju, Sergipe. Scientia Plena, vol. 8, num. 3, 2012.
- [7] VIEIRA, R.H.S.F. Microbiologia, higiene e qualidade do pescado: teoria e prática. São Paulo: Varela, 2004. 380 p.

Capítulo 8

Análises para controle de qualidade de amostras de méis das abelhas Apis melífera L. e Melipona subnitida D. do Ceará e do Mato Grosso

Sarah Geysa de Oliveira Ribeiro

Maria da Conceição Tavares Cavalcanti Liberato

Kamila de Lima Barbosa

Dayanne Cipriano Costa da Silva

Geovana Costa Aguiar

Álvaro Ventorini Vasconcelos

Resumo: Análises físico-químicas controlam a qualidade do mel, que se tornam impróprios por problemas na coleta, no envase e conservação. Muitas vezes os defeitos prejudicam consumidores. A legislação Brasileira para mel indica a realização das reações de Fiehe (indica a presença de Hidroximetilfurfural), a prova de Lugol (indica adição de xaropes de açúcar) e o pH das amostras. Esta pesquisa objetivou avaliar o mel de Apis mellifera L. do Mato Grosso e dois méis do Ceará, um de Apis mellifera L. da cidade de Russas e outro de Melipona subnitida D. de Maracanaú. O mel do Mato Grosso apresentou resultado positivo para a prova de Lugol enquanto que os do Ceará apresentaram resultado negativo. Quanto ao pH excetuando-se o de Mato Grosso os outros apresentaram-se dentro da Legislação.

Palavras chave: Mel; Ceará e Mato Grosso; Controle de qualidade

1. INTRODUÇÃO

Quando se trabalha com mel, é comum encontrar variações na sua composição física e química, tendo em vista que variados fatores interferem na sua qualidade, como condições climáticas, estágio de maturação, espécie da abelha, processamento e armazenamento, além do tipo de florada (SILVA et al., 2004 citado por MENDES et al., 2009). O mel é constituído de diferentes açúcares, predominando os monossacarídeos glicose e frutose. Apresenta também teores de proteínas, aminoácidos, enzimas, ácidos orgânicos, substâncias minerais, pólen e outras substâncias, sacarose, maltose, malesitose e outros oligossacarídeos (incluindo dextrinas). Além de pequenas concentrações de fungos, algas, leveduras e outras partículas sólidas resultantes do processo de obtenção do mel (CODEX STANDARD FOR HONEY, 2001 citado por MENDES et al., 2009). Tendo em vista estas variáveis da composição físico-química do mel objetivou-se neste trabalho comparar os méis dos estados do Mato Grosso e Ceará de diferentes abelhas em relação aos testes de identificação de adulteração e o pH indicado nos parâmetros da instrução normativa de número 11 do ministério da agricultura (BRASIL, 2018).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O pH das amostras de mel foram medidos por potenciometria em um pHmetro, de acordo com a metodologia de Bognadov e colaboradores (1999), dissolveu-se 10g da amostra em 75mL de água deionizada, a determinação foi feita em triplicata. O teste de Fiehe foi realizado segundo os métodos analíticos do Laboratório Nacional de Referência Animal, LANARA (1981) e baseado na reação que ocorre entre a solução clorídrica de resorcina e o hidroximetilfurfural (HMF), que indica a presença de substâncias produzidas durante o superaquecimento do mel ou a adição de xaropes de açúcares. O procedimento consistiu em pesar 5 g da amostra em um béquer de 50 mL e em seguida adicionar 5 mL de éter etílico em agitação vigorosa. A camada etérea formada foi transferida para um tubo de ensaio onde adicionou-se 5 gotas da solução clorídrica de resorcina. A solução ficou em repouso por 10 minutos. Na presença de glicose comercial ou de mel superaquecido, observa-se uma coloração vermelho intensa, indicando a fraude. O teste de Lugol foi realizado com base na reação da solução de Lugol para identificar a presença de amido e dextrinas presente no mel (CANO; NAGATO; DURAN, 2005). Inicialmente 10g das amostras de mel foram diluídas em 20mL de água destilada para um béquer de 250 mL. Em seguida as amostras foram deixadas em banho-maria por 1 hora e ao término desse período resfriadas à temperatura ambiente. Adicionou-se 0,5mL da solução de Lugol e observou-se possíveis modificações de cor, onde na presença de adição de xaropes de açúcar a solução mudaria de cor do castanho avermelhado ao azul. A intensidade da cor depende da qualidade e da quantidade das dextrinas ou amido, presentes na amostra adulterada.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Embora o pH não seja indicado, atualmente, como análise obrigatória no controle de qualidade dos méis brasileiros, mostra-se útil como variável auxiliar para avaliação da qualidade (SILVA et al., 2004 citado por MENDES et al., 2009). Os méis apresentaram valores semelhantes de pH que se enquadram nos parâmetros sugeridos na instrução normativa de número 11 do ministério da agricultura (BRASIL, 2018). A reação de Fiehe é um teste qualitativo com o objetivo de indicar a presença de Hidroximetilfurfural (HMF) que segundo Vilhena & Almeida-Muradian (1999) é utilizado como indicador de qualidade, já que sua origem está relacionada com a degradação de enzimas presentes nos méis, ele também ressalta que o HMF pode ser encontrado em pequenas quantidades em méis recém-colhidos, mas a presença de valores mais altos podem indicar alterações provocadas pelo armazenamento prolongado em temperatura ambiente alta ou superaquecimento. Todos os méis analisados apresentaram resultado positivo para esse teste com destaque para o mel de *Apis mellifera* do estado do Mato Grosso que apresentou uma coloração vermelha mais intensa. Em relação a prova de Lugol que tem como o objetivo de identificar adição de amido ou dextrinas para fraudar o mel, podendo ser identificada com a alteração da cor do castanho avermelhado ao azul, as amostras do mel de *Apis mellifera* L. da região de Russas - Ceará e de *Melipona subnitida* D. de Maracanaú também do Ceará não apresentaram modificações da sua coloração através da reação de Lugol enquanto que o mel *Apis mellifera* do estado do Mato Grosso apresentou uma mudança de coloração do amarelado característico do mel para um amarelo levemente amarronzado.

Figura 1: Resultado dos testes de fiehe e lugol para os méis de *Apis mellifera* Mato Grosso, *Apis mellifera* L. Russas-CE e *Melipona Subnitida* D. Maracanaú-CE

Tabela de testes comparativos entre os méis do estado do Ceará e Mato Grosso

Testes	Mel de <i>Apis mellifera</i> Mato Grosso	Mel de <i>Apis mellifera</i> L. Russas-CE	Mel de <i>Melipona Subnitida</i> D. Maracanaú-CE	Parâmetros (BRASIL,2018)
pH	4,24	3,61	3,36	3,3 – 4,6
Fiehe	positivo	positivo	positivo	
Lugol	positivo	negativo	negativo	negativo

4. CONCLUSÕES

A três amostras de mel estudadas apresentaram um resultado de pH que se enquadra nos parâmetros da legislação atual, além de resultados positivos na prova de Fiehe, todavia o mel de *Apis mellifera* do Mato Grosso demonstrou resultado positivo no teste de Lugol, enquanto que os méis de *Apis mellifera* L. da região de Russas - Ceará e de *Melipona subnitida* D. de Maracanaú também do Ceará demonstraram resultado negativo. Em virtude disso os resultados apresentados neste trabalho mostram que os méis de origem do estado do Ceará apresentaram resultados satisfatórios em relação aos testes efetuados.

REFERÊNCIAS

- [1] BRASIL. Instrução Normativa do Ministério da Agricultura e do Abastecimento. 2018.
- [2] BOGDANOV, S., LULLMANN, C., MARTIN, P., VON DER OHE, W., RUSSMANN, H., VORWOHL, G., ODDO, L. P., SABATINI, A. G., MARCAZZAN, G.L., PIRO, R., FLAMINI, C., MORLOT, M., LHÉRITIER, J., BORNECK, R., MARIOLEAS, P., TSIGURI, A., KERKULIET, J., ORTIZ, A., IVANOV, T., DARCY, B., MOSSEL, B., VIT, P. Honey quality and international regulatory standards: review by the international honey commission. *Bee World*, v.80. n.2. p. 61-69, 1999.
- [3] CANO, C. B; NAGATO, L. A. F; DURAN, M. C. Açúcares e produtos correlatos. In: INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Métodos físico-químicos para análise de alimentos. 4 ed. Brasília: ANVISA, 2005. cap.7, p. 321-343.
- [4] LABORATÓRIO NACIONAL DE REFERENCIA ANIMAL. Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem animal e seus ingredientes: II – métodos físicos e químicos. Brasília: Ministério da Agricultura, v. 2, p. 1-15, 1981.
- [5] Mendes, C. G.; Silva, J. B. A.; Mesquita, L. X.; Maracajá, P. B. As análises de mel: Revisão. *Revista Caatinga*, Mossoró, v. 22, n. 2, p. 7-14, 2009. Disponível em: <<https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/caatinga/article/view/789>> Acesso em: 12 jul. de 2019
- [6] VILHENA, F.; ALMEIDA-MURADIAN, L.B. Manual de análises físicoquímicas do mel. 1.ed. São Paulo: APACAME, 1999. 16p.

Capítulo 9

Produção de alimentos funcionais (geleias) a partir de frutas regionais e da mucilagem da chia (Salvia hispanica L)

Álvaro Ventorini Vasconcelos

Dayanne Cipriano Costa da Silva

Geovana Costa Aguiar

Kananda Lara Santos Sales

Sarah Geysa de Oliveira Ribeiro

Maria da Conceição Tavares Cavalcanti Liberato

Resumo: Com o aumento da expectativa de vida e a incidência cada vez maior de doenças crônicas, a população mundial passou a ter uma procura cada vez maior de produtos que possam servir como alimentos mais saudáveis. O consumo de frutas e suas polpas têm sido muito recomendados por seu valor nutricional. Trabalhos recentes têm apontado esses alimentos como fontes de compostos fenólicos com ação antioxidante. A comunidade científica vem buscando comprovar a influência de determinados alimentos na redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis. A chia (*Salvia hispanica* L.) é uma semente nativa do México rica em fibra solúvel. Ela possui em sua composição grande teor de ácidos graxos essenciais. Este trabalho busca aliar frutas típicas da caatinga com a semente de chia na produção de alimentos funcionais. Foram avaliados os aspectos físico-químicos, fitoquímicos e biológicos, tanto dos frutos como da chia e em seguida das geleias produzidas.

Palavras-chave: Frutas; Geleias; Alimentos funcionais;

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a ANVISA no Brasil, em abril de 1999, foi criada a portaria nº 338 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que regulamenta o alimento funcional como um alimento ou ingrediente que além das funções nutricionais básicas, quando consumido como parte da dieta usual produz efeitos metabólicos e/ou fisiológicos e/ou efeitos benéficos à saúde. Alimentos funcionais são produtos que contêm em sua composição constituintes biologicamente ativos que promovem efeitos metabólicos ou fisiológicos no organismo resultando em redução do risco de desenvolvimento de doenças (RIBEIRO et al., 2012). São conhecidos como ingredientes ativos os compostos com atividade funcional, presentes em um alimento, que possuem propriedades biológicas importantes, como por exemplo: Oligossacarídeos, Polissacarídeos, Compostos Fenólicos, Vitaminas, Fibras alimentares. Os ingredientes ativos também são chamados de fitoquímicos ((STÜRMER, 2003). Para esse projeto foram selecionadas as seguintes frutas: Acerola (*Malpighia emarginata*), Umu-Cajá (*Spondias mombin* L.) e Caju (*Anacardium occidentale* L.). Nativa do México, a semente da chia (*Salvia hispânica* L.) é altamente nutritiva. Possui entre seus constituintes proteínas, fibras e ácidos graxos essenciais. Na culinária é usada como semente inteira, farinha, mucilagem e óleo. O Ceará está no domínio da Caatinga, um bioma semiárido exclusivamente brasileiro, caracterizado por ter seu período chuvoso restrito a três ou quatro meses do ano e alta biodiversidade e como consequência, a Caatinga se destaca por possuir muitas fruteiras exclusivas com um imenso potencial para exploração comercial, agroindustrial no setor alimentício e fitoterápico. Atualmente, não existe produção em escala comercial dos frutos da Caatinga. Porém mesmo assim, já existe uma demanda para a fabricação de frutas desidratadas, polpas, sucos, picolés, sorvetes, geléias, doces e licores (LUCENA; MAJOR; BONILLA, 2015). A produção de geléias de frutas associada a chia eleva o valor nutricional e econômico do produto.

1.1 MATERIAL E MÉTODOS

Obtenção das Amostras: Foram obtidos e avaliados 3 diferentes frutos, a saber: acerola, cajá umbu e caju, coletadas durante seus períodos de safra. A semente de chia e o açúcar foram obtidos no comércio local, enquanto o Ácido Cítrico PA de grau alimentício e a pectina para fins alimentícios foram obtidos em empresas especializadas.

Métodos para Caracterização Química, Avaliação das Atividades Biológicas dos frutos e da semente de chia: Os frutos foram adquiridos e transportados ao Laboratório de Bioquímica e Biotecnologia da Universidade Estadual do Ceará. Em seguida foram selecionados e lavados com água e detergente neutro, imersos durante 1 minuto em água a 5°C com 200 mg/L de Hipoclorito de Sódio (pH 6,5), com o objetivo de remover microrganismos e resíduos que porventura estejam nas superfícies dos frutos. Em seguida os frutos foram descascados e triturados para extração do suco (EMBRAPA, 2003).

pH: Para medição do pH, foi utilizado 15 mL da polpa de cada amostra e diluído em 15 mL de água destilada. Em seguida levou-se para o pHmetro para que fosse realizada a leitura.

Brics: A análise foi realizada através do método de refratometria, usando-se o refratômetro (BRASIL, 2005). Foram transferidas 3 gotas da amostra para o prisma do refratômetro BioBrics, onde foi feita a leitura.

Determinação do Ponto de Maturação do Fruto: O teste foi feito de acordo com a metodologia descrita em INSTITUTO ADOLFO LUTZ (2008) baseado na relação entre teor de sólidos solúveis e o teor de ácidos tituláveis. Ele é utilizado para determinar o estágio de maturação da matéria prima, determinando o balanço do sabor doce e ácido.

2. ATIVIDADES FITOQUÍMICAS E BIOLÓGICAS

Análise de Compostos Fenólicos: A determinação do teor de fenóis totais foi feita utilizando-se o método de Folin-Ciocalteu. Para cada amostra padrão foram dissolvidos 7,5mg da polpa em metanol. Em seguida transferiu-se para um balão volumétrico de 25mL no qual se completou o volume final com MeOH e agitou-se para completa diluição. Para as triplicatas, foram retiradas uma alíquota de 100µL dessa solução com 500µL de Folin-Ciocalteu acrescentando-se em seguida 6 mL de água destilada e 2mL de Carbonato de Sódio (Na₂CO₃) à 15%. A mistura foi novamente agitada por 1min adicionando-se o seu o volume a um balão de 10 ml com água destilada (1,4 mL). As amostras foram deixadas no escuro junto com o branco

por um período de 2 horas. Após esse tempo, as amostras foram lidas em um espectrofotômetro UV-Vis com absorvância das amostras em 750 nm utilizando-se nas cubetas: 1ª cubeta: contendo o branco (toda a mistura sem a amostra) e na 2ª cubeta: contendo a amostra.

Análise do teor de Flavonoides: Para determinação de flavonóides foi utilizado o método de Dowd adaptado por Arvouet-Grand, Vennat, Pourrat e Legret (1994). Para a solução padrão foram adicionados 5 ml de polpa/ geléia diluídos em metanol para um balão de 25 ml. Para as triplicatas do teste, foram utilizadas 2 ml da solução padrão, 1 ml de solução de Cloreto de Alumínio a 2,5% levando-se para um balão de 25 ml completando-se com água destilada. À solução branco foi adicionado 1ml de Cloreto de Alumínio completando-se o volume com água. As amostras foram colocadas no escuro por 30 min e lidas no espectrofotômetro na absorvância de 415 nm.

Determinação da atividade antioxidante pelo método DPPH: Para a análise da atividade antioxidante foi utilizado o método do DPPH (BRAND WILLIAMS, 1995). A capacidade sequestradora do radical livre DPPH, utiliza o radical estável 1,1-difenil-2-picril-hidrazil (DPPH) que contém uma coloração púrpura e observou-se se os antioxidantes presentes na amostra são capazes de reduzi-lo à 1,1-difenil-2-picril-hidrazina, que apresenta uma cor amarelada. Inicialmente foi pesado 15 mg de amostra e solubilizou-se em 1,5 mL de MeOH, em seguida foram feitas as diluições seguindo o padrão de concentração em relação a solução-mãe. Foram adicionadas 3,9 mL da solução metanólica de DPPH e 0,1mL da amostra na concentração a ser testada. A absorvância foi medida a 515nm e os resultados foram expressos em IC₅₀ (mg/mL) extrapolando-se a partir da curva dose-resposta. As análises foram realizadas em triplicata. O ácido ascórbico foi usado como controle positivo para o teste. A atividade antioxidante foi calculada como segue: % Inibição = [(absorvância do branco – absorvância da amostra) / absorvância do branco] x 100. A média de triplicatas IC₅₀ (concentração que causa 50% inibição) para cada amostra foi determinada graficamente (BLOIS, 1958; BRAND-WILLIAMS et al, 1995).

Extração da mucilagem da semente de chia: Para a extração da mucilagem da chia, foram aquecidos 800 mL de água destilada a 80° C, e então adicionou-se 20 g de semente de chia (1:40 chia: água), mantendo o aquecimento com agitação durante 2 horas. Em seguida, a mistura água e chia foi centrifugada por 20 minutos à 20 °C, em rotação de 3500 rpm.

Industrialização da geléia: As geléias foram fabricadas seguindo 2 formulações diferentes: uma com a adição de pectina e a outra com a adição de mucilagem de chia. Em seguida realizadas comparações para ver qual produto final foi o melhor. As formulações feitas foram:

Formulações	Pectina ou chia	Polpa da fruta	Açúcar	Ácido cítrico
F1	1% de pectina	50%	50%	0,65%
F2	1% de mucilagem de chia	50%	50%	0,65%

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram obtidos os seguintes resultados para os testes de pH, Brics e ponto de maturação de modo a se observar se as características das frutas estavam dentro dos parâmetros para a produção das geléias.

PH

Acerola	Caju	Cajá
3,4	4,5	3,2

Brics

Frutas	Acerola	Caju	Cajá
Brics	3º	10º	11º

Ponto de maturação

Fruta	Ácido Orgânico	Brics	Ponto de maturação
Acerola	1,92	3º	64
Caju	0,3504	10º	3,504
Cajá	1,408	11º	12,8

Verificou-se que o valor da acerola e do caju apresentaram um valor de pH elevado para a obtenção da geléia, enquanto que o cajá se manteve dentro do padrão. O pH ideal para a formação de gel é de 3,0 a 3,2 e quando o pH do suco de frutas é elevado, é necessário a adição de um ácido (Ácido Cítrico), para a obtenção da geléia. A Acidez excessiva pode causar desidratação e hidrólise da pectina, resultando em sinérese. Valores de pH, abaixo ou acima daqueles considerados ótimos para formação de gel (3,0 a 3,2), diminuem a firmeza do produto final (FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS, 1985).

Em seguida, avaliou-se as atividades fitoquímicas para identificar a presença de fenóis e flavonóides para efeito de comparação entre a quantidade presente na fruta e nas diferentes formulações de geléias. Compostos fenólicos são importantes para o metabolismo das plantas e também são importantes para a saúde dos seres humanos devido às suas características, especialmente relacionadas às suas propriedades antioxidantes. Os compostos fenólicos compreendem os flavonóides e não flavonóides. Os flavonóides são compostos polifenólicos, que ocorrem em alimentos de origem vegetal.

Fenóis presentes nas frutas:

Frutas	Triplicata 1	Triplicata 2	Triplicata 3	Média	Desvio padrão
Acerola	0,343	0,367	0,426	18,19	-1,98
Caju	0,06	0,05	0,056	3,14	-0,23
Cajá	0,034	0,016	0,025	1,73	-0,41

Fenóis presentes nas Geléias:

Geléia	Triplicata 1	Triplicata 2	Triplicata 3	Média	Desvio padrão
Acerola pectina	0,013	0,021	0,021	1,12	+/-0,44
Acerola chia	0,017	0,023	0,012	1,37	+/-0,25
Caju pectina:	0,003	0,002	0,001	0,66	+/-0,04
Caju chia	0,012	0,027	0,001	1,18	+/-0,60
Cajá pectina	0,015	0,019	0,03	1,56	+/-0,36
Cajá chia	0,021	0,003	0,012	1,12	+/-0,41

Flavonóides presentes nas frutas:

Fruta	Triplicata 1	Triplicata 2	Triplicata 3	Média	Desvio padrão
Acerola	0,057	0,06	0,059	0,51	+/-0,023
Caju	0,031	0,028	0,028	0,06	+/-0,026
Cajá	0,2	0,114	0,117	1,79	+/-0,736

Flavonóides presentes nas Geléias:

Fruta	Triplicata 1	Triplicata 2	Triplicata 3	Média	Desvio padrão
Acerola pectina	0,107	0,098	0,094	1,13	+/-0,10
Acerola chia	0,078	0,082	0,086	0,86	+/-0,06
Caju pectina:	0,158	0,177	0,382	3,23	+/-1,87
Caju chia	0,202	0,25	0,355	3,69	+/-1,18
Cajá pectina	0,057	0,048	0,072	0,52	+/-0,18
Cajá chia	0,054	0,07	0,081	0,66	+/-0,20

Com isso foi possível notar que durante o processo de industrialização as geléias perderam grande parte de seus compostos fenólicos, sendo o aquecimento uma das prováveis causas responsáveis por tais perdas.

4. CONCLUSÃO

Com base nos resultados previamente observados observou-se que apesar da necessidade da adição do Ácido Cítrico como estabilizante na acerola e no caju, foi possível elaborar as geléias em ambas as suas formulações, além de se notar que a geléia feita a partir da formulação de chia demonstrou-se mais eficaz que a geléia feita com pectina.

5. AGRADECIMENTOS

REFERÊNCIAS

- [1] MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 398, de 30 de abril de 1999: REGULAMENTO TÉCNICO QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES BÁSICAS PARA ANÁLISE E COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADES FUNCIONAIS E OU DE SAÚDE ALEGADAS EM ROTULAGEM DE ALIMENTOS. Diário oficial da união, http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/1999/prt0398_30_04_1999.html.
- [2] DE FREITAS, Jullyana Borges; CÂNDIDO, Thalita Lin Netto; SILVA, Mara Reis. Geleia de gabirola: avaliação da aceitabilidade e características físicas e químicas. *Pesquisa Agropecuária Tropical*, v. 38, n. 2, p. 87-94, 2008.
- [3] FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS. Manual para fabricação de geléias. Belo Horizonte: Governo do Estado de Minas Gerais/Secretaria do Estado de Ciência e Tecnologia, 1985.
- [4] JACQUES, Andressa Carolina et al. Doce em massa de amora preta (*Rubus spp*): análise sensorial e de fitoquímicos Blackberry Jam (*Rubus spp*): sensory evaluate and phytochemicals. *Alimentos e Nutrição Araraquara*, v. 20, n. 4, p. 625-632, 2010.
- [5] LUCENA, E. M. P. de; MAJOR, I. ; BONILLA, O. H. Frutas da Caatinga Cearense. – Fortaleza: EdUECE, 2015.156p.
- [6] OLIVOS-LUGO, B. L.; VALDIVIA-LÓPEZ, M. Á.; TECANTE, A. Thermal and Physicochemical properties and Nutritional Value of the Protein Fraction of Mexican Chia Seed. (*Salvia hispanica* L.) *Food Science and Technology International*, v.16(1), 89-96, 2010.
- [7] RIBEIRO, E. P.; SERAVALLI, E. A. G. Química de Alimentos. 1ª Ed. São Paulo: Edgard Blücher. 2004.
- [8] STÜRMER, J. Comida: um santo remédio – 4ª Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 199p.

Capítulo 10

Formulação e avaliação da estabilidade de corante de açaí (Euterpe oleracea M.)

Patrícia Beltrão Lessa Constant

Andréa Gomes da Silva

Glenda Barros Matos

João Antônio Belmino dos Santos

Ângela da Silva Borges

Paulo Roberto Gagliardi

Resumo: No presente trabalho o açaí foi avaliado como uma potencial matriz antociânica para obtenção de corante natural alimentício. Foi desenvolvida e avaliada a estabilidade de formulações de corante de açaí, obtidas pelo uso de matérias-primas e métodos físicos diferentes. As matérias-primas do corante formulado utilizadas como veículo e estabilizantes ao mesmo tempo, foram maltodextrina e beta-ciclodextrina. Como métodos de secagem, foram utilizados atomização por “spray drier” e liofilização. A secagem por “spray-drier” levou a pequena perda do pigmento antociânico, não sendo observada praticamente presença de corante degradado no produto em pó. Isso é vantajoso, pois a armazenagem do produto na forma de pó é mais conveniente que na forma líquida. Aparentemente a desidratação das formulações não contribuiu para a formação de complexos entre a antocianina e o carboidrato veículo. Nas condições de análise, todas as formulações apresentaram desempenho semelhante no que diz respeito à estabilidade do pigmento frente à luz.

Palavras-chave: Açaí, corante, formulação, estabilidade.

1. INTRODUÇÃO

Comercialmente, o corante de antocianinas é obtido principalmente a partir de cascas de uva, que são subprodutos da indústria de sucos e vinhos. O método consiste na extração com água sulfitada, dessulfitação, purificação parcial e concentração, seguida de atomização para obtenção de um pó hidrossolúvel (Francis, 1999).

Vários trabalhos têm sugerido formas de aumentar a estabilidade do produto final. A copigmentação é uma das formas citadas (Jackman et al., 1987; Wrolstald, 2000; Markakis, 1982). Perin (1999) estudou a estabilidade dos extratos bruto e purificado obtidos de berinjela (*Solanum melongena* L.) em função dos efeitos degradativos da luz e temperatura em diferentes níveis de pH, com a adição de ácido gálico, beta-ciclodextrina, ácido tânico e rutina, para atuar como copigmentos em três razões molares de copigmento/pigmento e verificou que os copigmentos apresentaram efeitos distintos nas diversas situações de armazenamento avaliadas.

Dada a importância e relevância de estudos com pigmentos naturais, o objetivo deste trabalho foi desenvolver e estudar a estabilidade de formulações de corante de açaí, obtidas pelo uso de matérias-primas e métodos físicos diferentes. Foram avaliados o efeito do emprego da maltodextrina e da betaciclodextrina como agentes estabilizantes e o efeito da secagem da formulação como um agente promotor de uma maior interação pigmento agente estabilizante, pelos métodos de atomização por spray dryer e liofilização.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Pigmentos Naturais e Secagem da Universidade Federal de Viçosa, Viçosa– MG e Laboratório de Química e Bioquímica de Alimentos. Da Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE.

2.1. MATERIAL

As matérias-primas empregadas foram maltodextrina e β -ciclodextrina comerciais, como veículo e estabilizantes, e extrato concentrado de antocianina de açaí como corante. O material utilizado para embalagem do produto foi PET/Al/PE (polietileno tereftalato+ alumínio+ polietileno).

2.2. MÉTODOS

O extrato antociânico foi obtido a partir do fruto do açaizeiro fresco, que foi macerado em etanol 70% acidificado com HCl a pH 2, durante 48 horas, a temperatura ambiente (em torno de 30 °C), ao abrigo de luz. O extrato assim obtido foi imediatamente concentrado sob pressão reduzida à temperatura de 39 ± 1 °C até se obter um volume final correspondente a 20% do volume original.

A partir dos agentes veículos e estabilizantes, maltodextrina e betaciclodextrina, foram efetuadas duas formulações descritas na Tabela 1.

Tabela 1: Formulações empregadas.

Formulações		
Formulação	Concentração dos carboidratos	Relação extrato corante/carboidrato (v/p)
MD	30% maltodextrina DE 20	1:2
MDBeta	30% maltodextrina DE 20, 1,5% betaciclodextrina	1:2

Um terço da formulação foi armazenada sob refrigeração para uso como testemunha nos testes de estabilidade. Um terço foi submetido à atomização em “spray drier” e o restante à liofilização. As condições de secagem por atomização foram: vácuo de 30 mbar; temperatura do ar de entrada 170 ± 10 °C; temperatura do ar de saída de 90 ± 5 °C; e pressão manométrica positiva.

A quantidade de emulsão atomizada para cada amostra foi em média de 150 mL, e o tempo de secagem variou de 15 a 20 minutos. O processo foi efetuado com três repetições para cada formulação.

As condições de secagem por liofilização foram: pressão 4,2 mm Hg; temperatura do condensador de -40 ± 5 °C. O tempo de processo foi de aproximadamente 7 horas. O material se encontrava congelado na forma de uma fina camada (5 mm) em placas de vidro com diâmetro de 10 cm.

Os produtos recolhidos na forma de pó foram acondicionado em sacos PET/Al/PE (polietilenotereftalato + alumínio + polietileno), fechados a vácuo e armazenados sob refrigeração, em temperatura de -18 °C.

O teor antociânico das formulações, antes e após a secagem foi determinados segundo metodologia de Fuleki e Francis (1968b).

A cor foi qualificada por meio da leitura direta de reflectância das coordenadas “L”, “a” e “b”, empregando a escala Cielab em colorímetro Color Quest XE de Hunter.

A avaliação da estabilidade a luz foi feita segundo metodologia descrita por Constant (2003) com avaliação da cor por colorímetro ao longo do período de armazenamento.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O teor antociânico do extrato utilizado para obtenção das formulações foi 2,156 mg/mL. A Tabela 2 mostra o teor de antocianinas para todas as formulações testadas, antes e após a desidratação.

Tabela 2: Teor de antocianinas para as formulações antes e após a secagem.

Amostra	Teor de antocianina (mg/mL)		Índice de degradação (ID)
	Extrato formulado	Produto em pó ressuscitado	
MD-A	0,336	0,294	1,02304
MD-L	0,336	0,329	1,00017
MDBeta-A	0,235	0,224	1,01144
MDBeta-L	0,235	0,234	1,00001

O índice de degradação (ID), foi calculado pela razão entre o teor de antocianina calculado pelo método simples e o teor calculado pelo método diferencial de pH (Fuleki e Francis, 1968b). Podemos observar que para todos os produtos em pó, esse valor é bem próximo de 1, que significa pouca presença de componentes degradados. Os valores de ID encontrados para as formulações foram inferiores aos encontrados por Main et. al. (1978), para as mesmas condições de secagem (temperatura de entrada e saída do ar de secagem) e teor de sólidos solúveis, para os pigmentos de uva, significando que menos componentes degradados foram gerados na atomização do extrato de açaí.

A Tabela 3 mostra alguns parâmetros calculados a partir da coordenadas colorimétricas, que expressam as variações das amostras quanto a sua cor.

Tabela 3: Parâmetros colorimétricos das formulações armazenados em presença de luz.

Amostras	Parâmetros Colorimétricos					
	ΔL^*	Δa^*	Δb^*	$\Delta c'$	$\Delta h'$	ΔE^*
MB	-8,53	-20,84	-12,67	-24,31	-0,05	25,84
MD	7,64	-16,07	-13,64	-19,95	-0,18	22,43
MD-A	8,69	-15,85	-12,18	-19,03	-0,17	21,80
MD-L	10,79	-17,20	-11,08	-19,87	-0,15	23,13
MDBeta	9,55	-18,14	-7,17	-19,43	-0,08	21,72
MDBeta-A	13,93	-18,93	-8,55	-20,62	-0,10	25,01
MDBeta-L	11,26	-17,77	-6,87	-18,98	-0,11	23,13

Todas as amostras apresentaram Δa^* e Δb^* negativo significando a perda da cor vermelha e ganho de coloração azulada, respectivamente. Com exceção da amostra MB, as demais apresentaram ΔL positivo, ou seja, tornaram-se mais luminosas.

A amostra MB era constituída apenas de corante dissolvido em água. As outras eram constituídas por maltodextrina e algumas também beta- ciclodextrina. Fica evidenciado que as diferenças nos resultados de luminosidade devem-se a presença ou ausência do carboidrato em questão.

Tanto para a coordenada “c*”, quanto para a coordenada “h*”, a tendência de variação observada para as amostras ao longo do tempo sob o efeito da luz foi pequena e, de fato, nenhuma amostra se destacou quanto a apresentação de maior estabilidade. Ao contrário do que foi observado por Rosa et. al. (2000), para outra fonte antocianina, o efeito benéfico da adição de maltodextrina e atomização, no presente, não foi verificado. Não houve diferenças entre estas formulações.

Tais resultados evidenciam que o calor ao qual o pigmento foi submetido durante a atomização por “spray-drier”, se não o beneficia promovendo supostas ligações entre o pigmento e o carboidrato veículo, ao menos não o desestabiliza. A facilidade de manipulação e a faixa de aplicações para o corante na forma de pó são maiores que na forma líquida. Além disso, a antocianina é mais susceptível a degradação em meio aquoso, de forma que mantê-la sob armazenamento na forma de pó é muito mais vantajoso.

As amostras MD-A e MD-L apresentaram comportamentos bastante similares, com constantes de variação bem próximas (principalmente “c”), o que reforça a suposição de que o calor no processo de atomização não afetou significativamente a formulação. Comparando-se as amostras MD e MD-A verificou-se que, para ambas, tanto a variação da saturação quanto da tonalidade também permaneceram próximas, indicando que o calor, devido ao processo de desidratação, além de não ter sido prejudicial também não as beneficiou, ou seja, não promoveu complexação entre o agente veículo e o pigmento, suficientemente forte que se mantivesse nas condições de análise (formulação dissolvida em meio aquoso).

Ao comparar a amostra MD-A e MDBeta observou-se que a última apresentou maior variação na saturação e menor na tonalidade. Assim os resultados desse trabalho vão de encontro à teoria de Dangles et. al. (1992), segundo a qual a betaciclodextrina pode promover a inclusão da antocianina, principalmente na forma estrutural sem cor, levando a diminuição da intensidade percebida.

A amostra MB foi a que apresentou, embora discretamente, maior variação em ΔE , indicando um possível efeito benéfico dos veículos em estudo.

4. CONCLUSÕES

A secagem por “spray-drier” da formulação promoveu pequena perda do pigmento antocianico não sendo observada a presença significativa de corante degradado no produto em pó. A desidratação das formulações não contribuiu para a formação de complexos entre a antocianina e o carboidrato em uso. Não foram observados efeitos benéficos da secagem ou deletérios do processo de secagem sobre o corante, o que é vantajoso, pois a armazenagem do pigmento na forma de pó é mais conveniente que na forma líquida, tanto por uma questão de volume ocupado como pelo fato da antocianina ser mais estável em ausência de água. Nas condições de análise, nenhuma formulação apresentou desempenho destaque no que diz respeito à estabilidade do pigmento.

REFERÊNCIAS

- [1] DANGLES, O. STECKEL, C. Wigand, M. C., Brouillard, R. Two very distinct types of anthocyanin complexation: copigmentation and inclusion. *Tetrahedron*. p.5227-5230, 1992.
- [2] FRANCIS, F. J. *Colorants*. Minnesota: Eagan Press, 1999. 145p. (Eagan Press Handbook Series).
- [3] FULEKI, T. e FRANCIS, F. J. Quantitative methods for anthocyanins. 2 Determination of total anthocyanin and degradation index for cranberries juices. *Journal of Food Science*. v. 3, p.78-83, 1968b.
- [4] JACKMAN, R. L., YADA, R. Y., Tung, M. A. e Speers, R. A. Anthocyanins as food colorants – a review. *Journal of Food Biochemistry*. v.11, p.201-247, 1987.
- [5] MAIN, J. H., Clydesdale, F. M., Francis, F. J. Spray drying anthocyanin concentrates for use as food colorantes. *Journal of Food Science*. v.43, n.6, 1978, p.1693-1697.
- [6] MARKAKIS, P. Stability of anthocyanins in foods. In: MARKAKIS, P., *Anthocyanins as Food Colors*. New York: Academic Press, 1982, p.163-178.

- [7] PERIN, J. D. Efeito de Diferentes Copigmentos Sobre A Estabilidade de Antocianinas Extraídas de Berinjela (*Solanum melongena* L.). 1998. 77p. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Universidade Federal de Viçosa, 1998.
- [8] ROSA, L.C..C., Stringheta, P.C., Silva, P.C. Obtenção e estabilidade de antocianina de capim gordura na forma de corante em pó. Livro de Resumos do XVII Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos. V. 2, p.27, 2000.
- [9] WROLSTAD, R. E. Anthocyanins. In: LAURO, G. J. e Francis F. J. Natural Food Colorants- Science and Technology. New York: marcel Dekker, Inc., p. 237-252, 2000.

Capítulo 11

Análise de edulcorantes declarados em rótulos de preparados sólidos para refresco

Ana Karoline Nogueira Freitas

Lailton da Silva Freire

Maracélia Carla Vieira de Oliveira

Herlane Chaves Paz

Rosana Martins Carneiro

Resumo: Dentre os aditivos empregados nos preparados sólidos para refresco estão os edulcorantes, substâncias diferentes do açúcar que conferem sabor doce aos alimentos e podem ser naturais ou artificiais. Seu uso em bebidas permite a diminuição do aporte calórico, além de reduzir os malefícios da ingestão de açúcar. Para garantir a segurança de consumo, os edulcorantes artificiais possuem limites máximos estabelecidos pela legislação em vigor e Ingestão Diária Aceitável definida pela Food and Agriculture Organization (FAO). Sendo este o interesse do presente trabalho avaliar os tipos e quantidades permitidas de edulcorantes declarados nos rótulos de preparados sólidos para refresco. Os resultados obtidos das 78 amostras coletadas mostraram que o acesulfame de potássio (100,0%) foi o edulcorante mais utilizado nos preparados sólidos para refresco, seguido de aspartame, ciclamato de sódio e sacarina sódica. Todos os teores de edulcorantes estão dentro do permitido pela legislação vigente.

Palavras-Chave: Aditivos. Rotulagem. Saúde.

1. INTRODUÇÃO

Dentre os aditivos utilizados em preparados sólidos para refresco, estão os edulcorantes que segundo a Portaria nº540/1997 os define como substâncias diferentes dos açúcares que conferem sabor doce ao alimento (Brasil, 1997). São substâncias utilizadas especialmente em produtos dietéticos e podem ser naturais ou artificiais (Silva, 2000).

A sacarina, aspartame, acesulfame de potássio, ácido ciclâmico (ciclamate) são alguns dos edulcorantes artificiais permitidos pela legislação brasileira, seja para substituir parcialmente ou totalmente o açúcar adicionado em produtos (Brasil, 2008).

A utilização de edulcorantes em bebidas diminui o aporte calórico, além de ser vantajoso por reduzir os malefícios causados pela ingestão de sacarose, como a obesidade, diabetes e cárie dental. O mercado de edulcorantes associados a bebidas está em expansão devido também aos padrões estéticos estarem vinculados ao baixo peso corpóreo atualmente (Marcellini *et al.*, 2006).

Como forma de garantir a segurança no consumo de edulcorantes artificiais, foram estabelecidos limites máximos para seu uso (Rodrigues *et al.*, 2012). Além de terem suas ingestões diárias aceitáveis (IDA) definidas pela Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

Com isso, o estudo teve como objetivo analisar os edulcorantes declarados nos rótulos de preparados sólidos para refresco e observar se estão nos valores estabelecidos pela Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº18 (Brasil, 2008).

2. MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal, descritivo-observacional com abordagem qualitativa e quantitativa, no período do mês de novembro a janeiro de 2014. Para fins deste trabalho, inicialmente foi realizado um levantamento dos produtos comercializados em todas as redes de supermercados da cidade. Em seguida, como resultado do levantamento realizado, foi possível identificar um total de 78 produtos, de sabores diversos, de nove marcas de preparados sólidos para refresco. Após a colheita dos produtos, partiu-se para posterior análise dos rótulos quanto a presença e quantidades de edulcorantes, tomando por base a RDC nº 18/2008 (Brasil, 2008). Os dados foram tabulados e analisados pelo Programa Microsoft Excel 2010, determinando-se as médias, frequências absolutas e relativas, e construção de tabelas e gráficos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os edulcorantes presentes nos rótulos foram o aspartame, a sacarina sódica, o ciclamate de sódio e o acesulfame de potássio, sendo estes artificiais. Todas as marcas analisadas (n=9) declararam mais de um edulcorante em sua formulação. Essa combinação de edulcorantes é muito utilizada durante o processamento destes produtos por trazer vantagens como, aumento da estabilidade do produto, melhorar a qualidade da doçura, reduzir os efeitos indesejáveis de alguns edulcorantes, reduzir custos à indústria e obter edulcorantes com características similares à sacarose (Reis *et al.*, 2009).

O acesulfame apresentou-se em 78 (100%) das amostras analisadas, seguida do aspartame encontrado em 72 (92,3%), ciclamate em 59 (75,6%) e a sacarina em 48 (61,5%) amostras, conforme mostra a Figura 1.

Figura 1 – Valores dos edulcorantes encontrados nos preparados sólidos

Conforme mostra a Figura 1, dentre os edulcorantes encontrados, o acesulfame foi o que apareceu em todas as embalagens e sua utilização deve-se por sua estabilidade a altas temperaturas e alta solubilidade em água. Não há consenso sobre sua possível toxicidade quando a dosagem consumida é maior que sua IDA de 15mg/Kg (Rodrigues *et al.*, 2012).

Resultados semelhantes foram encontrados por Soares *et al.* (2013) ao analisarem refrigerantes e chás comercializados no Brasil, e por Rodrigues *et al.* (2012) ao avaliarem rótulos de vários produtos alimentícios em busca de conhecer os edulcorantes utilizados.

Já o aspartame, segundo edulcorante mais encontrado, não deixa sabor residual amargo, não é calórico e as objeções sobre seu uso dizem respeito à toxicidade dos três componentes derivados do seu metabolismo (Baruffaldi, 1998), que produz metanol, fenilalanina e ácido aspártico, caso seja consumido em doses elevadas pode provocar alterações em alguns parâmetros bioquímicos e no sistema nervoso central (León *et al.*, 2013).

Sua IDA é de 40 mg/Kg e por conter fenilalanina é prejudicial aos portadores de fenilcetonúria, doença onde não há conversão do aminoácido fenilalanina em tirosina, ocasionando alterações significativas no cérebro (Rodrigues *et al.*, 2012). Tal informação deve constar nos rótulos conforme exigido pela RDC nº 18/ 2008.

O ciclamato de sódio e a sacarina sódica são os que aparecem em menor quantidade nos preparados sólidos. Por possuírem sódio, responsável pelo aumento da pressão arterial, não é recomendado seu uso por pessoas que precisam restringir ou diminuir o consumo de sódio, como é o caso dos hipertensos. O ciclamato apresenta IDA de 11mg/Kg enquanto a sacarina tem IDA de 5mg/Kg (Rodrigues *et al.*, 2012).

Das nove marcas utilizadas no estudo, somente uma não declarou aspartame em sua lista de ingredientes enquanto três marcas não declararam ciclamato e quatro a adição de sacarina. Para garantir a segurança do consumo, além da Ingestão Diária Aceitável, os edulcorantes artificiais possuem limites máximos estabelecidos no país (Brasil, 2008) e, por suas quantidades estarem descritas no rótulo, torna-se possível verificar se estão dentro do permitido. Nas amostras analisadas, os teores de edulcorantes apresentaram-se abaixo dos valores máximo estabelecidos, conforme mostra a Tabela 1.

Tabela 1 – Valor médio dos edulcorantes encontrados nos preparados sólidos

Edulcorantes	Quantidade média encontrada (mg/100mL)	*Legislação (mg/100 mL)
Acesulfame-K	3,4	26,0
Aspartame	24,4	56,0
Ciclamato de sódio	19,0	56,0
Sacarina sódica	2,1	10,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2015;* Brasil, 2008.

Acesulfame-K e sacarina sódica são os edulcorantes com os menores valores e bem abaixo dos seus limites máximos definidos, isso se deve a serem edulcorantes usados em conjunto com outros para melhorar o poder adoçante nos produtos e, são utilizados com outros edulcorantes, porém, em menor quantidade. No estudo realizado foi possível observar que dos edulcorantes o ciclamato de sódio e o aspartame foram os adicionados em maiores quantidades nos produtos analisados. Também foi visto a quantidade média de edulcorante por sabor, 15 no total, sendo os sabores mais conhecidos apresentados conforme mostra a Tabela 2.

Tabela 2 – Quantidade média dos edulcorantes por sabor

Edulcorantes (mg/100ml)				
Sabores	Aspartame	Acesulfame-K	Ciclamato	Sacarina
Abacaxi	28,4	3,7	16,5	2,1
Goiaba	25,2	4,3	22,3	2,0
Laranja	22,9	3,3	24,0	2,2
Manga	25,2	3,9	19,3	1,9
Maracujá	21,7	3,3	26,6	3,3
Morango	21,8	2,9	17,2	2,3
Uva	29,1	3,9	17,3	2,1

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

O sabor maracujá possui os maiores valores para ciclamato e sacarina. Para aspartame quem detém a maior quantidade é o sabor uva enquanto para acesulfame é o sabor goiaba. Em relação aos sabores com a menor quantidade, o sabor maracujá possui a menor quantidade para aspartame, o sabor morango para acesulfame, o sabor abacaxi para ciclamato e o sabor manga para sacarina.

Todos os edulcorantes declarados nos rótulos possuem sua toxicidade estudada e com seu uso que não ultrapassando o máximo da ingestão diária não trará riscos a saúde.

4. CONCLUSÃO

Os edulcorantes utilizados nos preparados sólidos para refresco se resumiram em aspartame, sacarina sódica, ciclamato de sódio e acesulfame-k. A escolha dos edulcorantes utilizados por algumas marcas impede que alguns grupos de pessoas com restrições alimentares possam consumir o produto. Considerando a RDC nº18, os produtos analisados estão dentro dos padrões estabelecidos, evidenciando a tendência das indústrias de informar ao consumidor claramente o que está sendo oferecido.

REFERÊNCIAS

- [1] BARUFFALDI, R. Fundamentos da tecnologia de alimentos. v. 3. São Paulo: Atheneu, 1998. 301 páginas.
- [2] BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Portaria n.540, de 27 de outubro de 1997. Aprova o Regulamento Técnico: Aditivos Alimentares – definições, classificação e emprego. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1997.
- [3] . Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Resolução RDC n. 18, de 24 de março de 2008. Aprova o Regulamento Técnico que autoriza o uso de aditivos edulcorantes em alimentos, com seus respectivos limites máximos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2008.
- [4] LEÓN, R. C.; REYES, M. de la L. R.; Bustamante, N. A.; Martínez, M. M. P. Características de los edulcorantes no calóricos y su uso em niños. Acta Pediátr. Mex., v. 34, n. 3, p. 141-153, 2013.
- [5] MARCELLINI, P. S.; Deliza, R.; Bolini H. M. A. Caracterização sensorial de suco de abacaxi concentrado, reconstituído e adoçado com diferentes edulcorantes e sacarose. Aliment. Nutr., v.17, n.2, p. 143-150, 2006.
- [6] REIS, R. C.; Minim, V. P. R.; DIAS, B. R. P.; Chaves, J. B. P.; Minim, L. A. Impacto da utilização de diferentes edulcorantes na aceitabilidade de iogurte “light” sabor morango. Aliment. Nutr., v.20, n. 1, p. 53-60, 2009.
- [7] RODRIGUES, F.; SALDANHA, T.; Barbosa, M. I. M. Avaliação da presença de edulcorantes nos rótulos de produtos alimentícios. Acta Tec., v. 7, n. 1, p. 38-43, 2012.
- [8] SILVA, João Andrade. Tópicos da tecnologia dos alimentos. São Paulo: Livraria Varela, 2000. 231 páginas.
- [9] SOARES, K. C.; MOUCA, T. L.; POLTRONIERI, F. Caracterização de edulcorantes presentes em refrigerantes e chás comercializados no Brasil. Nutrire, v. 38, n. Suplemento (12º Congresso Nacional da SBAN), p. 203-203, 2013.

Capítulo 12

Clorador de passagem artesanal: Caracterização, eficiência e custos

Clélia Cristina Almeida da Silva

Jéssica Reis Pedrosa

Sônia de Oliveira Duque Paciulli

Alberto Schwaiger Paciulli

Ian Duque Paciulli

Gaby Patricia Terán Ortiz

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência do clorador de passagem artesanal no processo de desinfecção da água. Foram realizadas visitas “in loco” em 12 propriedades rurais, avaliando as fontes de água, os reservatórios de água, e avaliando o sistema de cloração durante um período de 30 dias. As amostras de água foram analisadas para determinação dos teores de cloro total, de pH, dureza, alcalinidade, turbidez, sólidos totais, amônia, contagem total de bactérias, coliforme total e termotolerantes. Em relação do sistema de cloração avaliado, foram identificadas três versões diferentes do equipamento e todos se mostraram de fácil aquisição e montagem. As análises físico-químicas e microbiológicas se encontram dentro dos padrões exigidos pela legislação vigente. Os produtores demonstram satisfação em relação ao custo/benefício do equipamento, e o sistema avaliado mostrou-se com potencial para a utilização no tratamento de água de pequenas comunidades rurais.

Palavras-Chave: Cloração, queijo, qualidade.

1. INTRODUÇÃO

O estado de Minas Gerais é o primeiro produtor de leite e queijos no país, contribuindo, em ambos os casos com um terço da produção nacional. A produção e comercialização do queijo Minas artesanal constitui a única fonte de renda de muitas famílias agrícolas, sendo à base da economia para muitos municípios e em Minas Gerais representa um fator social de grande importância (EMATER, 2012).

Com a finalidade de preservar essa tradição, o processo de fabricação do queijo Minas Artesanal foi tombado pela lei 14.185, de 31 de janeiro de 2002 (BRASIL, 2002). Essa mesma lei define os queijos artesanais como sendo aquele processado conforme a tradição histórica e cultural da região do Estado de Minas onde for produzido, a partir de leite integral de vaca, fresco e cru, retirado e beneficiado nas queijarias. As queijarias são estabelecimentos situados na propriedade rural, destinadas exclusivamente à produção do queijo Minas artesanal e para o cumprimento da legislação deve aplicar as boas práticas de fabricação em toda cadeia produtiva do queijo (MARTINS, 2006). Entre os parâmetros determinados pela legislação vigente, a água utilizada nas propriedades rurais produtoras de queijos artesanais deve atender no mínimo, aos padrões de potabilidade preconizados por lei.

A qualidade da água deve ser o primeiro parâmetro a ser observado com vistas à eficiência dos sistemas de produção de leite. Trabalhos de Britten et al. (2003), Dams (2013), Iramain et al (2013) demonstraram a interferência que a qualidade da água impõe no aumento da contagem de células somáticas no leite, na incidência de mastite em bovinos, na higienização das instalações e equipamentos utilizados pelo produtor de leite, principalmente quando ocorrem alterações físicas, químicas e microbiológicas na água utilizada. Entretanto de acordo com Nascimento et al., (2012) de modo geral, pouca atenção se dá ao tratamento de águas para propriedades rurais.

Na microrregião da Canastra, nas propriedades rurais do município de Medeiros, a água é utilizada em abundância, não somente na higienização dos equipamentos de ordenha como também para o consumo familiar. A origem da água nestas propriedades provém principalmente de minas d'água onde as distâncias de captação ao local de armazenamento variam em média de 300 metros. Devido a sua heterogeneidade econômica, geográfica e social, também do ponto de vista regional, a região apresenta problemas distintos, em relação ao tratamento da água, o que requer diferentes técnicas para sua solução. Assim em função dessas características muitas unidades familiares ainda carecem de processos de desinfecção confiáveis, de baixo custo e compatíveis com a realidade local.

A priorização de uma desinfecção da água, de forma eficaz, como barreira de segurança microbiológica, deve ser considerada ação prioritária. Portanto, a necessidade constante do desenvolvimento, adequação e reavaliação de tecnologias de desinfecção da água, principalmente aquelas voltadas para pequenas comunidades e que ainda não tem acesso a água tratada, é de fundamental importância para a qualidade de vida da população. Face ao exposto, o presente trabalho tem como objetivo estudar a eficiência e o custo/benefício do clorador de passagem artesanal utilizado pelas famílias rurais da região de Medeiros para tratamento da água utilizada nas queijarias.

2. METODOLOGIA

O projeto foi realizado em 12 propriedades rurais no município de Medeiros, de acordo com listagem fornecida pela EMATER envolvendo unidades produtoras de queijo Minas Artesanais com o sistema do clorador de passagem artesanal implantado. As análises foram realizadas no laboratório de Análises Microbiológicas e físico-química do departamento de Ciências Agrárias do IFMG - Campus Bambuí.

As amostras de água foram coletadas em cada propriedade para realização das análises físico-químicas e microbiológicas. Foram coletadas amostras na fonte da água utilizada na propriedade após o sistema de cloração. Os frascos utilizados para coleta foram de material transparente e incolor, com capacidade mínima de 250 ml e estéreis. Durante a coleta da água o local e frasco foram devidamente higienizados com algodão embebido em álcool 70% e devidamente identificadas. As amostras de água foram coletadas no período vespertino e conservadas a uma temperatura de cerca de 4°C até a sua análise. O período de tempo decorrido entre a coleta da amostra e a realização da análise foi no prazo máximo de vinte e quatro horas. As coletas foram realizadas de acordo com as Normas da NBR 9898 da ABNT (1987). Após a coleta, as amostras, foram transportadas em caixas isotérmicas para os laboratórios do IFMG- Campus Bambuí.

Para as análises diárias dos níveis de cloro, os produtores das propriedades estudadas receberam treinamento e um kit rápido para determinação do cloro total e residual para coleta e análise durante 30 dias. Foram coletadas amostras de água para determinação dos teores de cloro total e para análises de pH, dureza, alcalinidade, turbidez, sólidos totais, amônia através do Fotocolorímetro multiparâmetro, microprocessado. A metodologia utilizada foi de acordo com Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater-APHA (2001). Para a contagem de Coliformes/ *Escherichia coli* foi utilizado o petrifilm Coliformes/*E.coli* (AOAC 991.14 – Contagem de Coliformes e *E. coli* em Alimentos, Película Reidratável Seca). Para a contagem total de mesófilos, foi utilizada placas petrifilm. A peptona bacteriológica e permite as diluições das amostras e as pipetas estéreis de 1 ml serão para os plaqueamentos, após as placas de petrifilm serão incubadas e foram contadas segundo metodologia descrita por APHA (2001).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Durantes das visitas e entrevistas nas propriedades rurais foi verificado que o produtor tem consciência da necessidade de tratar a água para ser utilizada nas queijarias, da importância da filtragem e cloração da água. Isto porque todos os produtores entrevistados, estavam com as unidades produtoras de queijo cadastradas no Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) ou em fase de cadastramento e, portanto, fizeram treinamento de Boas Práticas de Fabricação. A lei nº 14.185/02 (Brasil, 2002), para registro das queijarias, exige que a água utilizada na limpeza e produção do queijo seja clorada.

Durante as entrevistas, foram identificados três tipos de cloradores artesanais na região de Medeiros e utilização de dois tipos de filtros diferentes, conforme figura 1.

Figura 1. Versões dos cloradores de passagem artesanal utilizados nas propriedades rurais. Primeira versão (1A); segunda versão (1B) e terceira versão (1C) e filtro de água industrial (1B).

A primeira versão do clorador (1A) foi instalada há 4 anos e foi substituída pela segunda versão (1B) em função da redução do tamanho e custo do equipamento. A segunda versão foi substituída pela terceira versão (1C) com a adição de um registro que possibilitou maior facilidade de calibração do equipamento. Todos os cloradores são constituídos de PVC e verificou-se que os equipamentos ainda não tiveram substituição das peças por desgaste, embora todos estejam em locais expostos ao sol e sem cobertura.

Os modelos do clorador de passagem artesanal se mostraram de fácil montagem, pois suas peças são adquiridas em qualquer estabelecimento que comercialize peças destinadas a tubulações hidráulicas, possibilitando assim, além da fácil aquisição e montagem, um custo operacional bastante acessível. Verificou-se que em 70% das propriedades foi necessária a utilização apenas do filtro industrial e em 30% foi necessário instalar além do filtro industrial (1D), o filtro biológico. Observou-se nas propriedades avaliadas que a periodicidade de limpeza do filtro do sistema é de 15 dias.

A relação entre a versão do clorador e a quantidade de cloro livre encontrados durante o período de medição realizado pelos produtores, estão expressos na Tabela 1.

Tabela 1: Relação versão do clorador de cada produtor e a quantidade de cloro livre encontrada na água durante o período de 30 dias

Versão Clorador	Nº de dias de Medição	Cloro Livre (ppm) máximo	Cloro Livre (ppm) mínimo	Cloro Livre (ppm) médio
V1	31	2,50	0,20	1,24
V2	30	1,50	0,20	1,24
V3	30	1,50	0,20	1,50

*Médias obtidas de 126 amostras

Verificou-se durante o período avaliado, que os cloradores de passagem mantêm o ajuste necessário, independentemente da versão, atendendo a demanda das reações químicas e manter o nível de cloro residual viável para a eliminação das bactérias. Os resultados das amostras de água após tratamento, quanto ao cloro total e para as análises microbiológicas estão apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2. Resultados das análises para cloro total e microbiológicas para as amostras de água coletadas nas propriedades rurais da região de Medeiros

Parâmetro	Amostras*	Legislação
CT	3 ppm	2 a 3 ppm
Coliformes Totais	Ausente em 100 ml	Ausente em 100 ml
Termotolerantes	Ausente em 100 ml	Ausente em 100 ml
Contagem Total de Bactérias	<1,0 x 10 ¹ UFC/ml	<1,0 x 10 ¹ UFC/ml
*Médias obtidas de 12 amostras		

Os resultados demonstram que as amostras de água se apresentaram dentro dos padrões para cloro total e das análises microbiológicas segundo a Lei Estadual no 14.185, de 31 de janeiro de 2002 (BRASIL, 2002). Os resultados para as análises físico-químicas realizadas estão expressos na Tabela 3 para as amostras de água coletadas após a cloração.

Tabela 3: Resultados Físico-químicos para a amostra de água obtida após cloração da água

	Cloretos (ppm)	pH	Cor (uH)	Nitrito (ppm)	Dureza (ppm)	Ferro (ppm)	Nitrato (ppm)
Amostras	0	6,28±0,9	14,17±5,13	0,0025±004	14±11,4	0	0,49±0,27
Padrão	Máx 250	6 a 9,5	Max 15	Max 1	Max 500	Max 0,3	Max 10

Médias obtidas de 24 repetições

Os resultados mostraram que os níveis de cloretos, pH, cor nitrito, dureza, ferro e nitrato da água após cloração, se encontram dentro padrões dos exigidos pela legislação vigente, podendo ser utilizada nas queijarias sem afetar as características físico químicas e sensoriais do queijo produzido.

As projeções dos gastos com a cloração estão expressos na Tabela 4.

Tabela 4: Resultados obtidos em relação aos custos relativos ao sistema de cloração de água

Item	Média (R\$)
Preço de cada pastilha	1,86
Volume da caixa d'água (L)	616,67
Número de dias de Experimento	29,92
Número médio de pastilhas gastas no primeiro dia	5,58
Volume de água para cada pastilha inicial (L)	110,45
Número de pastilhas no experimento	7,92
Volume de água gastos por dia na queijaria (L)	537,50
Volume de leite produzido por dia (L)	574,17
Custo da cloração durante o experimento	15,52
Número de pastilhas gastas por mês	7,94
Custo médio para a cloração em um mês	15,56
Custo médio de cloração por litro de leite produzido	0,03

O valor pago pelas pastilhas de cloro, mais comumente utilizadas, poderá variar dependendo da fonte e forma de compra, neste estudo o valor médio utilizado foi de R\$ 1,86/pastilha. Com estes dados foi calculado o consumo de cloro e custo do tratamento em relação a unidade de produção de cada um dos itens selecionados.

Para cada litro de leite produzido em 2015, o custo com cloração seria de R\$ 0,03. Estes custo considerou apenas o consumo de pastilhas de cloro para cloração da água, não incluindo o investimento inicial da aquisição do clorador. O custo do clorador pode variar de R\$ 180,00 a R\$ 1.200,00. Não justificando, portanto, há não adoção desta prática normalmente nas propriedades rurais, em detrimento da segurança da produção, qualidade dos alimentos e bem-estar humano e animal.

4. CONCLUSÕES

O clorador de passagem artesanal, independente das versões, realiza de maneira eficiente a desinfecção da água utilizada nas queijarias da região de Medeiros. Após a passagem no clorador, os níveis de cloro livre, de cloretos, pH, cor nitrito, dureza, ferro e nitrato da água permaneceram dentro dos padrões exigidos pela legislação e estáveis, durante todo período avaliado. Os produtores demonstram satisfação em relação ao custo/benefício do equipamento, assim o sistema avaliado mostrou-se com potencial para a utilização no tratamento de água de pequenas comunidades rurais. Pode-se perceber com este projeto que soluções para problemas do tratamento de água em locais de difícil acesso podem surgir a partir de projetos ligados as comunidades locais.

REFERÊNCIAS

- [1] ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 9898: Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores, Rio de Janeiro, 1987.
- [2] AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION-APHA. Standard Methods for the Water and Wastewater. 20 ed. New York: APHA (2001).
- [3] AOAC. Association of official analytical chemists. Official methods of analysis of the AOAC International. 19 ed. Arlington, 2011.
- [4] BRASIL, 2002. Regulamento da lei nº 14.185, de 31 de janeiro de 2002. Dispõe sobre o processo de produção de queijo Minas Artesanal (Aprovado pelo decreto nº 42.645, de 5 de junho de 2002).
- [5] BRITTEN, A.M. The contaminated water can conduct to the beginning of the mastitis. Hoard's Dairyman - December, 2003, p 797 e 798.
- [6] DAMS, S.R. et al. Water intake and quality for a dairy cattle. The Pennsylvania State University Department of Dairy Science, E.U.A. <http://www.das.psu.edu/teamdairy>. Acesso em 25/09/2013.
- [7] EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS/ EMATER-MG. Mapa do Queijo Minas Artesanal. Disponível em: <http://www.emater.mg.gov.br>. Acesso em 12 de out. 2012.
- [8] IRAMAIN, M.S.; NOSETTI, L.; HERRERO, M.A.; MALDONADO MAY, V.; FLORES, M.; CARBÓ, L. Evaluación del uso y manejo del agua en establecimientos lecheros de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Área Agrícola - Universidad de Buenos Aires - <http://www.aguabolivia.org>. Acesso em 20/08/2013.

- [9] MARTINS, J.M. Características físico-químicas e microbiológicas durante a maturação do queijo Minas artesanal da Região do Serro. 2006. 1158 f. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2006.
- [10] NASCIMENTO, A. P. do. et al. Filtração lenta para o tratamento de águas para pequenas comunidades rurais. Revista Eletrônica da Engenharia Civil, nº 4, v.2, p.54-58, 2012.

Capítulo 13

Determinação preliminar da quantificação do teor de compostos fenólicos e atividade antioxidante da polpa da Acerola

Fabíola Ribeiro de Paula

Hanna Santos Muniz

Geovana Costa Aguiar

Álvaro Ventrini Vasconcelos

Maria da Conceição Tavares Cavalcanti Liberato

Resumo: Estima-se que, cerca de 80% da população de países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, são quase completamente dependentes da medicina caseira, utilizando plantas para suas necessidades primárias de saúde (CHADWICK; MARSH, 1990). O consumo de frutas tropicais está aumentando nos mercados nacional e internacional devido ao crescente reconhecimento de seu valor nutricional e terapêutico (RUFINO et al., 2010). Os frutos de clima tropical e subtropical se sobressaem quanto à qualidade e quantidade dos compostos antioxidantes devido a sua forte exposição à radiação solar (HANAMURA; HAGIWARA; KAWAGISHI, 2005).

Palavra-chave: Frutas, valor nutricional, antioxidantes.

1. INTRODUÇÃO

Estudos têm evidenciado a função benéfica do consumo de frutas para a manutenção da saúde e prevenção de doenças, aumentando assim a expectativa de vida dos seus consumidores (HUNG et al., 2004; MARTINEZ-VALVERDE; PERIAGO; ROS, 2000; SUN et al., 2002; TULIPANI et al., 2011) e esta proteção tem sido atribuída aos vários antioxidantes que esses alimentos contém. Entre os mais abundantes presentes em frutos estão os compostos polifenólicos, as vitaminas C, A, B, E e os carotenóides (LIM; LIM; TEE, 2007). Contudo, o conteúdo desses compostos bioativos é influenciado por inúmeros fatores, como condições climáticas, tempo de amadurecimento, genótipo, técnicas de cultivo e principalmente, estágio de maturação (MENICHINI et al., 2009). Foram realizados testes com a fruta acerola obtida em Fortaleza - Ceará. A acerola é uma fruta rica em vitamina C como também carotenoides, tiamina, riboflavina, niacina, proteína e alguns minerais como ferro, cálcio e fósforo, sendo consumida *in natura*, como suco ou em sorvetes.

2. METODOLOGIA

Inicialmente foi preparado um extrato utilizando a casca e a polpa da acerola (50g), em temperatura ambiente. Esse extrato foi colocado em maceração por 7 dias com etanol comercial (96° GL) como solvente orgânico, sendo concentrado em chapa aquecedora, obtendo-se assim, o extrato etanólico da acerola (*M. emarginata* D.C.).

A determinação do teor de fenóis totais foi feita por meio de espectroscopia na região visível pelo método de Folin-Ciocalteu (SOUSA et al., 2007).

Para a quantificação do teor de flavonóides, utilizou-se a metodologia proposta por Funari e Ferro (2006), utilizando como reagente o cloreto de alumínio a 2,5%. Preparou-se uma solução pela dissolução de 20 mg da amostra em 10 mL de etanol. Misturou-se uma alíquota de 2 mL desta solução (concentração de 2mg/mL) com 1 mL de solução de cloreto de alumínio a 2,5% e completou o volume em balão volumétrico para 25 mL com etanol. Após 30 min determinou-se a absorbância da amostra a 425 nm, em espectrofotômetro UV-vis.

Para a determinação de atividade antioxidante, com o método DPPH, utilizou-se a metodologia proposta por Yepez *et. al* (2002) – adaptado. Preparou-se a solução de DPPH (2,2 difenil -1- picril – hidrazila) dissolvendo-se 0,0013 desse radical e solubilizando-se em 50 mL de metanol (envolvendo o balão volumétrico com papel alumínio). Após essa etapa determinou-se a absorbância da solução a 515 nm, em espectrofotômetro. Pesou-se 15 mg (0,015g) da amostra e solubilizou-se em 1,5 mL de metanol para a obtenção da solução mãe (10.000 ppm). Misturou-se, em tubos de ensaio 3,9 mL da solução de DPPH e 0,1 mL da amostra. Realizando triplicatas, e mantendo o teste na ausência de luz por 30 min. Em seguida, determinou-se a absorbância da amostra a 515 nm, em espectrofotômetro UV-vis.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram obtidos os Teores de Fenóis totais, Flavonóides totais e Atividade antioxidante: Na tabela encontram-se os valores obtidos nas avaliações da atividade antioxidante, bem como a quantificação estimada da concentração de fenóis e flavonóides totais do extrato obtido da Acerola (*Malpighia emarginata* D.C.).

Tabela 1: Teor de Fenóis totais, teor de flavonoides e atividade antioxidante

Amostra	Teor fenóis mg EAG (Equivalente ao Ácido Gálico) /g de Extrato	Teor flavonóides mg EQ (Equivalente a Quercetina) / g de Extrato	Atividade antioxidante (Ic50) Mg / mL
Acerola	87,69 ± 0,35	5,77 ± 0,03	12,68 ± 0,20

Fonte: Próprio autor

Como a população, ainda, desconhece a importância das plantas medicinais nas últimas décadas, foram realizadas inúmeras pesquisas para esclarecer o papel dos radicais livres em processos fisiopatológicos como envelhecimento, câncer, aterosclerose e principalmente, inflamação. Ferreira e Matsubara (1997) relataram essa relação positiva com a produção de radical livre e ação anti-inflamatória.

A atividade antioxidante de compostos fenólicos deve-se principalmente às suas propriedades redutoras e estrutura química. Estas características desempenham um papel importante na neutralização ou sequestro de radicais livres e quelação de metais de transição, agindo tanto na etapa de iniciação como na propagação do processo oxidativo (SOUSA *et al.*, 2007)

4. CONCLUSÃO

A determinação preliminar qualitativa mostra que foi possível a identificação de alguns metabólitos secundários presentes e importantes para a acerola dentre eles encontram-se, fenóis, flavonoides, antocianinas e alcalóides entre outros, podendo corroborar com a literatura. Estudos aprofundados sobre a *M. emarginata* D.C vem contribuindo bastante para a farmacologia e indústrias, pois o resultado do teor de fenóis e flavonóides da amostra analisada mostrou-se bastante propício seu uso como preventivo de enfermidades. As propriedades antioxidantes apresentaram-se bastante expressiva relacionando-a aos teores de compostos fenólicos, fazendo com que a acerola seja identificada como uma fruta com um alto potencial antioxidativo e com um elevado valor nutricional para o organismo já que os compostos fenólicos apresentam proteção contra diversos tipos de doenças.

REFERÊNCIAS

- [1] HUNG, H.C.; JOSHIPURA, K.J.; JIANG, R.; HU, F.B.; HUNTER, D.; SMITH-WARNER, S.A.; COLDITZ, G.A.; ROSNER, B.; SPIEGELMAN, D.; WILLETT, W.C. Fruit and vegetable intake and risk of major chronic disease. *Journal of the National Cancer Institute*. v. 96, p. 1577–1584, 2004.
- [2] LIM, Y.Y.; LIM, T.T.; TEE, J.J. Antioxidant properties of several tropical fruits: A comparative study. *Food Chemistry*. v. 103, p. 1003–1008, 2007.
- [3] MARTINEZ-VALVERDE, I.; PERIAGO, M.J.; ROS, G. Significado nutricional de los compuestos fenólicos de la dieta. *Archivos Latinoamericanos de Nutrición*, Caracas. v. 50, n. 1, p. 5–18, 2000.
- [4] MENICHINI, F.; TUNDIS, R.; BONESI, M.; LOIZZO, M.R.; CONFORTI, F.; STATTI, G.; DE CINDIO, B.; HOUGHTON, P.J.; MENICHINI, F. The influence of fruit ripening on the phytochemical content and biological activity of *Capsicum chinense* Jacq. cv Habanero. *Food Chemistry*, v. 114, p. 553–560, 2009.
- [5] Sousa CM, Silva HRE, Vieira-Jr GM, Ayres MCC, Costa CLS, Araújo DS, Cavalcante LCD, Barros EDS, Araújo PBM, Brandão MS, Chaves MH 2007. Fenóis totais e atividade antioxidante de cinco plantas medicinais. *QuimNova* 30: 351–355.
- [6] SUN, J.; CHU, Y.F.; WU, X.; LIU, R.H. Antioxidant and antiproliferative activities of common fruits. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. v. 50, p. 7449–7454, 2002.
- [7] TULIPANI, S.; ALVAREZ-SUAREZ, J.M.; BUSCO, F.; BOMPADRE, S.; QUILES, J.L.; MEZZETTI, B.; BATTINO, M. Strawberry consumption improves plasma antioxidant status and erythrocyte resistance to oxidative haemolysis in humans. *Food Chemistry*. v. 128, p. 180–186, 2011.

Capítulo 14

Fruto camu-camu (Myrciaria Dubia) como nova fonte de nutrientes: Compostos bioativos e atividade antioxidante

Jiuliane Martins da Silva

Kamila de Cássia Spacki

Brenda de Oliveira Gomes

Catarina de Mesquita Oliveira

Marcos Antonio Matiucci

Joice Camila Martins da Costa

Oscar de Oliveira Santos Júnior

Resumo: Camu-camu é um fruto vermelho rico em compostos bioativos, como ácido ascórbico (vitamina C) e antocianinas, importantes antioxidantes naturais. Frutos pertencentes à essa família têm alta acidez, baixo pH e baixa quantidade de açúcares redutores, proteínas e lipídios, características que garantem alta aplicabilidade tecnológica na indústria de alimentos. Diante disso, esta revisão de literatura visa caracterizar o camu-camu (*Myrciaria Dubia*), fruto exótico e nativo da Amazônia, como nova fonte de nutrientes, abordando conceitos acerca dos compostos bioativos, vitamina C e atividade antioxidante.

Palavras-chave: compostos bioativos; antioxidante; *Myrtaceae*.

1. INTRODUÇÃO

A Amazônia Brasileira é a maior reserva de biodiversidade do mundo e o maior bioma do Brasil (IBGE, 2019). Nela concentram-se 44% das 500 espécies de frutas nativas do país e, diversas espécies nativas da região fornecem frutas exóticas com características sensoriais únicas e de alto valor nutricional. Embora essas frutas sejam altamente nutritivas, ainda são desconhecidas por grande parte da população mundial, sendo consumidas muitas vezes somente pela população local, além de serem subvalorizadas em seu aspecto econômico (EMBRAPA, 2016).

O consumo de frutos tem aumentado de forma significativa, não só por fornecerem nutrientes essenciais ao organismo humano, mas também por serem fontes naturais em compostos bioativos, os quais promovem benefícios à saúde e reduzem o risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis (MOREIRA et al., 2017).

Entre os compostos que possuem propriedades funcionais nos alimentos, substâncias com atividades antioxidantes têm ganhado destaque significativo, visto que protegem o corpo humano contra o estresse oxidativo e impedem uma série de distúrbios degenerativos crônicos (KIM et al., 2017).

Assim, vale ressaltar que, a vitamina C é um dos mais importantes antioxidantes solúveis em água presente em alimentos. Além disso, tal vitamina é considerada a mais importante para nutrição humana que é fornecida por frutas e vegetais (CUNHA-SANTOS et al., 2019).

Camu-camu [*Myrciaria dúbia* (H.B.K.) McVaugh], também conhecido como “araçá”, “caçari”, “sarão”, e “socoró”, é conhecido pelo alto teor de vitamina C. O fruto pertence à família *Myrtaceae* e está distribuído ao longo dos lagos e rio na região Amazônica, cobrindo partes da Colômbia, Venezuela, Peru e Brasil (CUNHA-SANTOS et al., 2019). Dessa forma, ressalta-se que o fruto possui propriedades funcionais, como efeitos antioxidantes, anti-hiperglicêmicos, anti-hiperlipidêmicos, anti-hipertensivos, antimicrobianos e neuroprotetores (FIDELIS et al., 2020).

Dessa forma, tem-se que o fruto em questão se torna promissor à medida que pode ser considerado como uma nova fonte de compostos bioativos, principalmente de vitamina C, ainda pouco explorado pela indústria alimentícia.

Portanto, o objetivo do presente estudo foi caracterizar o camu-camu (*Myrciaria Dubia*) como nova fonte de nutrientes, a partir de uma abordagem conceitual dos compostos bioativos e atividade antioxidante.

2. FRUTOS TROPICAIS

Frutos são primordiais para uma alimentação saudável. O consumo de frutos tropicais tem se tornado cada vez mais requerido, tanto pelo consumidor quanto pelo mercado internacional, devido ao crescente reconhecimento de seus valores nutricionais. Dito isso, tem-se que o Brasil possui muitas espécies de frutas nativas e exóticas subexploradas e de grande interesse para a agroindústria (RUFINO et al., 2010; ALASALVAR et al., 2020).

A região Amazônica Brasileira é detentora de uma vasta biodiversidade de espécies frutíferas com aproximadamente 220 espécies de plantas produtoras de frutas comestíveis, representando 44% da diversidade de frutas nativas no Brasil (EMBRAPA, 2016). Essas frutas podem ser caracterizadas como fontes consideráveis de micronutrientes, usadas na nutrição humana para proteger a saúde da população contra inúmeras doenças (MARTINS et al., 2017). Portanto, o conhecimento das espécies e a caracterização das propriedades funcionais desses frutos, em função de sua própria biodiversidade, ainda é um desafio importante para sua valorização, pois muitas dessas espécies ainda não foram estudadas quimicamente (NEVES et al., 2012).

Entre os diversos frutos comestíveis nativos, 52 destes são produzidos pelas espécies da família *Myrtaceae* e desempenham grande importância ecológica (DONADO-PESTANA et al., 2018). A família *Myrtaceae* é composta por 140 gêneros e tem em torno de 3500-5800 espécies, encontrada em florestas tropicais, é um dos grupos predominantes na Mata Atlântica e é considerada uma das famílias mais importantes da flora brasileira, devido à alta prevalência de espécies comestíveis ou utilizadas na medicina tradicional (FRAUCHES et al., 2016).

Sendo assim, torna-se evidente o quão tais frutos são promissores na alimentação humana e o quanto podem desempenhar papéis de destaque na indústria alimentícia.

3. CARACTERIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DO FRUTO CAMU-CAMU

Camu-camu (*Myrciaria dubia* McVaugh) é uma fruta avermelhada de cerca de 2,5 cm de diâmetro normalmente encontrado na região amazônica (Figura 1) (DE ARAÚJO et al., 2018), é uma boa fonte de minerais como sódio, potássio, cálcio, zinco, magnésio, manganês e cobre, além disso, contém pequena quantidade de pectina e amido (AKTER et al., 2011).

Os frutos de camu-camu são globosos, de coloração vermelha ou rósea e roxo escuro no estágio final de maturação (CUNHA et al., 2018). Dada a elevada acidez, estes dificilmente são consumidos na forma natural. Em paralelo, por apresentar um alto teor de vitamina C, é amplamente utilizada nas indústrias alimentícias, farmacêutica e de cosméticos, as quais buscam cada vez mais por técnicas de extração e métodos analíticos para quantificação desse composto (CUNHA-SANTOS et al., 2019).

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, a grande importância do camu-camu como alimento é devido ao seu elevado teor de vitamina C (2606 mg por 100g de fruto), superior ao encontrado na maioria das plantas cultivadas (INPA, 2019). Entretanto, esse não é o principal nutriente presente, podendo também apresentar boa quantidade de β -caroteno e de alguns minerais, como cálcio e potássio (RIBEIRO et al., 2016).

A polpa do camu-camu possui alta acidez, baixo pH e baixas quantidades de açúcares redutores, proteínas e lipídios, além de possuir substâncias antioxidantes caracterizadas por alto teor de polifenóis totais, e a casca possui alto teor de antocianinas, um importante antioxidante e corante natural (FREITAS et al., 2016).

Figura 1. Camu-camu (*Myrciaria dubia* HBK Mc Vaugh, Myrtaceae)

Fonte: Fidelis et al., 2018.

4. COMPOSTOS BIOATIVOS DO FRUTO CAMU-CAMU

Camu-camu (*Myrciaria dubia*) é um fruto nativo da floresta Amazônica conhecido por seu alto teor de compostos bioativos, com uma composição majoritária de ácido ascórbico (DO AMARAL SOUZA et al., 2019); possui uma alta capacidade antioxidante, não apenas por causa do alto conteúdo de vitamina C, mas também por fornecer quantidades consideráveis de compostos fenólicos, o que pode torná-lo um alimento funcional (CHIRINOS et al., 2010). A fruta também tem boa concentração de antocianinas (NEVES et al., 2017).

Estudos relatam que as sementes de camu-camu são compostas por diferentes classes de compostos fenólicos, amplamente conhecidos por seus efeitos funcionais e biológicos. Dentre essas substâncias, destacam-se os ácidos fenólicos (ácidos elágico e sirínico) e os flavonóides, como quercetina, miricetina, rutina e catequina (FIDELIS et al., 2018).

Os compostos fenólicos do camu-camu têm atraído interesse comercial e científico principalmente devido ao seu potencial para serem utilizados como nutracêuticos (compostos isolados) e alimentos funcionais (extratos de camu-camu), atuando para reduzir o risco de doenças não transmissíveis (FIDELIS et al., 2018).

5. VITAMINA C E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE

Esta fruta é considerada uma das fontes mais ricas de vitamina C no Brasil, apresentando maior conteúdo do que na acerola (1125–1790 mg / 100 g de polpa fresca) (ZANATTA & MERCADANTE, 2007).

O ácido ascórbico (AA), também conhecido como vitamina C, é um composto solúvel em água, essencial para uma série de reações metabólicas, incluindo a absorção de ferro e também tem um papel como antioxidante, limitando os danos dos radicais livres (SPÍNOLA, MARTÍNEZ, & CASTILHO, 2014). A vitamina C insuficiente causa escorbuto e anemia e está associada a algumas anormalidades psicológicas (depressão). Por outro lado, o excesso de vitamina C afeta a absorção da vitamina B12, também relacionada à anemia, e também pode levar a distúrbios gastrointestinais, cálculos renais e absorção excessiva de ferro (MORETTI, BUDNI, FREITAS, ROSA, & RODRIGUES, 2014).

Além disso, a vitamina C também participa de muitas funções bioquímicas, como a absorção de ferro, a síntese de colágeno e hormônios (cofator enzimático) e a neutralização de radicais livres resultantes do metabolismo celular (antioxidante). Impede o envelhecimento aparente, formação de catarata, arteriosclerose, câncer e doenças cardiovasculares (SPÍNOLA et al., 2014).

Curiosamente, o camu-camu também é uma boa fonte de outros compostos, como β -caroteno, polifenóis, ácidos graxos, alguns aminoácidos, compostos voláteis e minerais. (DONADO-PESTANA et al., 2018).

REFERÊNCIAS

- [1] AKTER, M.S.; O.H. S.; EUN, J.B. & AHMED, M. (2011). Nutritional compositions and health promoting phytochemicals of camu-camu (*myrciaria dubia*) fruit: A review. *Food Research International*, 44 (7), 1728-1732.
- [2] ALASALVAR, C., SALVADÓ, J. S., & ROS, E. (2020). Bioactives and health benefits of nuts and dried fruits. *Food Chemistry*, 314, 126192.
- [3] CHIRINOS, R.; GALARZA, J.; BETALLELUZ-PALLARDEL, I.; PEDRESCHI, R., & CAMPOS, D. (2010). Compostos antioxidantes e capacidade antioxidante de frutos de camu camu peruano (*Myrciaria dubia* (HBK) McVaugh) em diferentes estádios de maturidade. *Food Chemistry*, 120 (4), 1019-1024.
- [4] CUNHA, E. C. E. (2018). Evaluation and characterization of the bioactive compounds of camu-camu (*Myrciaria dubia* (HBK) Mc Vaugh): Avaliação e caracterização dos compostos bioativos do camu-camu (*Myrciaria dubia* (HBK) Mc Vaugh).
- [5] CUNHA-SANTOS, E. C. E., VIGANÓ, J., NEVES, D. A., MARTÍNEZ, J., & GODOY, H. T. (2019). Vitamin C in camu-camu [*Myrciaria dubia* (H.B.K.) McVaugh]: evaluation of extraction and analytical methods. *Food Research International*, 115(August), 160–166.
- [6] DE ARAÚJO P., C.E.; DE AZEVEDO, J.C.S.; DE SOUSA, F.C.; DE OLIVEIRA, S.D.; SOUZA, D.F. DE S.; DE OLIVEIRA, J.A.; DOS SANTOS, E.S. (2018). Recuperação de polifenóis do resíduo de despolpação de camu-camu (*Myrciaria dubia* HBK McVaugh) por extração de ponto de nuvem. *Revista Brasileira de Engenharia Química*.
- [7] DO AMARAL SOUZA, F. DAS C.; MOURA, L. G. S.; BEZERRA, K. O.; AGUIAR, J. P. L.; MAR, M. J.; SANCHES, E. A.; SANTOS, F. F.; BAKRY, A. M.; PAULINO, B. N.; CAMPELO, P. H. (2019). Thermosonication applied on camu–camu nectars processing: Effect on bioactive compounds and quality parameters. *Food and Bioprocess Technology*.
- [8] DONADO-PESTANA, C.M; MOURA, M.H.C.; DE ARAÚJO, R.L.; DE LIMA SANTIAGO, G.; DE MORAES BARROS, H.R. E GENOVESE, M.I. (2018). Polyphenols from Brazilian native Myrtaceae fruits and their potential health benefits against obesity and its associated complications. *Opinião Atual em Ciência dos Alimentos*, 19, 42–49.
- [9] EMBRAPA. 2016. Amazônia é berço de frutas nativas de alto potencial comercial. Disponível em: < <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/14818376/amazonia-e-berco-de-frutas-nativas-de-alto-potencial-comercial>>. Acesso em: 21/10/2019.
- [10] FIDELIS, M.; SANTOS, J.S.; ESCHER, G.B.; VIEIRA DO CARMO, M.; AZEVEDO, L., CRISTINA DA SILVA, M.; GRANATO, D. (2018). In vitro antioxidant and antihypertensive compounds from camu-camu (*Myrciaria dubia* McVaugh, Myrtaceae) seed coat: A multivariate structureactivity study. *Food and Chemical Toxicology*, 120, 479-490.
- [11] FIDELIS, M., DE OLIVEIRA, S. M., SOUSA SANTOS, J., BRAGUETO ESCHER, G., SILVA ROCHA, R., GOMES CRUZ, A., ARAÚJO VIEIRA DO CARMO, M., AZEVEDO, L., KANESHIMA, T., OH, W. Y., SHAHIDI, F., & GRANATO, D. (2020). From byproduct to a functional ingredient: Camu-camu (*Myrciaria dubia*) seed extract as an antioxidant agent in a yogurt model. *Journal of Dairy Science*, 103(2), 1131–1140.
- [12] FRAUCHES, N.; AMARAL, T.; LARGUEZA, C.; TEODORO, A. Brazilian Myrtaceae Fruits: A Review of Anticancer Properties. *Br J Pharm Res* 2016, 12:1–15.

- [13] FREITAS, C.A.B.; SILVA, A.S.; ALVES, C.N.; NASCIMENTO, O.M.M.; LOPES, A.S.; LIMA, M.O. E MÜLLER, R.C.S (2016). Characterization of the Fruit Pulp of Camu-Camu (*Myrciaria dubia*) of Seven Different Genotypes and Their Rankings Using Statistical Methods PCA and HCA. *Revista da Sociedade Brasileira de Química*.
- [14] IBGE. Biomas brasileiros. Disponível em: <<https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/territorio/18307-biomas-brasileiros.html>>. Acesso em: 16/10/2019.
- [15] INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA. Cultivo do camu-camu. Disponível em:<<http://portal.inpa.gov.br/portal/index.php/ultimas-noticias/215-pesquisa-do-inpa-com-camu-camu-em-po-revelacao-eficiente-na-reducao-de-gordura-e-de-acucar-na-corrente-sanguinea>>. Acesso em: 22/10/2019.
- [16] KIM, M. B., KO, J. Y., & LIM, S. BIN. (2017). Formulation Optimization of Antioxidant-Rich Juice Powders Based on Experimental Mixture Design. *Journal of Food Processing and Preservation*, 41(3).
- [17] MARTINS, T. S.; CASTRO, L. Y.; BASTOS, D.; WICHMANN, F. A.; POLL, F. A. PREVALÊNCIA DE CONSUMO DE FRUTAS E VEGETAIS POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM EXCESSO DE PESO ATENDIDAS EM UM AMBULATÓRIO MULTIPROFISSIONAL. *Anais do Salão de Ensino e de Extensão*, p. 88, 2017.
- [18] MOREIRA, R. M., MARTINS, M. L., LEITE JÚNIOR, B. R. DE C., MARTINS, E. M. F., RAMOS, A. M., CRISTIANINI, M., CAMPOS, A. N. DA R., STRINGHETA, P. C., SILVA, V. R. O., CANUTO, J. W., OLIVEIRA, D. C. DE, & PEREIRA, D. C. DE S. (2017). Development of a juçara and Ubá mango juice mixture with added *Lactobacillus rhamnosus* GG processed by high pressure. *LWT - Food Science and Technology*, 77, 259–268.
- [19] MORETTI, M., BUDNI, J., FREITAS, A. E., ROSA, P. B., & RODRIGUES, A. L. S. (2014). Antidepressant-like effect of ascorbic acid is associated with the modulation of mammalian target of rapamycin pathway. *Journal of Psychiatric Research*, 48(1), 16–24
- [20] NEVES, L.C.; CAMPOS, A.J. DE; BENEDETTE, R.M.; TOSIN, J.M. E CHAGAS, E.A. (2012). Caracterização da capacidade antioxidante de frutas nativas da Amazônia Brasileira. *Revista Brasileira de Fruticultura*, 34 (4), 1165-1173.
- [21] NEVES, L.C.; DE CAMPOS, A.J.; CISNEROS-ZEVALLOS, L.; COLOMBO, R.C. & ROBERTO, S.R. (2017). Postharvest behavior of camu-camu fruits based on harvesting time and nutraceutical properties. *Scientia Horticulturae*, 217, 276-284.
- [22] RIBEIRO, P. F. DE A.; STRINGHETA, P. C.; OLIVEIRA, E. B.; MENDONÇA, A. C.; SANTANA, H. M. P. Teor de vitamina C, β -caroteno e minerais em camu-camu cultivado em diferentes ambientes. *Cienc. Rural*, Santa Maria, v. 46, n. 3, p. 567-572, mar. 2016
- [23] RUFINO, M. DO S. M., ALVES, R. E., DE BRITO, E. S., PÉREZ-JIMÉNEZ, J., SAURA-CALIXTO, F., & MANCINI-FILHO, J. (2010). Bioactive compounds and antioxidant capacities of 18 non-traditional tropical fruits from Brazil. *Food Chemistry*, 121(4), 996–1002.
- [24] SPÍNOLA, V., EJ, & CASTILHO, P.C.(2014). Determination of vitamin C in foods: Current state of method validation. *Journal of Chromatography A*, 1369 (2014) 2–17.
- [25] ZANATTA, C., & MERCADANTE, A. (2007). Carotenoid composition from the Brazilian tropical fruit camu-camu (*Myrciaria dubia*). *Food Chemistry*, 101 (4), 1526-1532.

Capítulo 15

O uso do café como aromatizante na produção de cervejas

Larissa Graziele Rauber Duarte

João Batista de Almeida e Silva

Resumo: As cervejas distinguem-se pelos diferentes ingredientes, métodos de elaboração e características sensoriais. As cervejas artesanais ou especiais, em geral, são cervejas que utilizam receitas ou processos de fabricação diferentes das produzidas em larga escala. Também chamadas de cervejas premium ou gourmet, as cervejas especiais enquadram-se em uma categoria de qualidade superior e de alto valor agregado. Nesta pesquisa, produziu-se uma cerveja gourmet aromatizada com café, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da produção de cervejas especiais. A análise sensorial demonstrou que a cerveja produzida com 45% de café foi a melhor aceita, dentre as cervejas formuladas, em todos os quesitos e intenção de compra. Conclui-se, que o café poderá ser empregado como aromatizante no processo de produção de cerveja com até 45% de café, sem interferir no processo fermentativo.

Palavras-chave: Cervejas Gourmet; Café; Aromatizante.

1. INTRODUÇÃO

Segundo Ghiselli (2000) e Mukamal (2008) o consumo de cerveja, desde que moderado, mostrou-se eficaz na diminuição de riscos de doenças coronárias, ataques cardíacos e diabetes. No Brasil, na última década, a produção de cerveja cresceu 64%, segundo dados do Sicobe (Sistema de Controle de Produção de Bebidas da Receita Federal).

De acordo com Carvalho (2009) nota-se uma necessidade de obtenção de cervejas com novos e variados aromas que atendam diferente grupos de pessoas. E a demanda por cervejas especiais impulsiona o setor a buscar inovações para seus processos, como na busca por novos ingredientes, métodos de elaboração e características sensoriais.

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da produção das cervejas especiais, produziu-se uma cerveja de café (*Coffea arabica*) em escala laboratorial, empregando o café como aromatizante, e após o teste de aceitação sensorial em escala piloto.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A água utilizada para a produção da cerveja foi a da Planta Piloto de Bebidas da USP, analisada por Aizemberg e Almeida e Silva (2012). O malte foi o claro, Pilsen. O lúpulo o Galena, na forma de peletes isomerizados. E, o café (*Coffea arabica*) o moído e torrado tradicionalmente. As leveduras foram *Saccharomyces cerevisiae* de alta fermentação. E, o inóculo preparado a partir da levedura cervejeira liofilizada comercial *Saccharomyces cerevisiae*, tipo *ale*.

Em escala laboratorial foram preparados 5 mostos com diferentes concentrações de café, 45%, 35%, 25%, 15% e 0%. As análises sensoriais foram realizadas pelo teste de aceitação. A melhor cerveja avaliada em escala laboratorial, a aromatizada com 45% de café, foi produzida em escala piloto e comparada a uma cerveja comercial.

Avaliou-se à cor, o aroma, o corpo, o sabor, a impressão global e a intenção de compra da cerveja produzida em escala laboratorial. Foi usado delineamento em blocos completos casualizados. O painel sensorial foi composto por uma equipe de 50 provadores, não treinados e consumidores de bebida alcoólica. A escala utilizada foi a hedônica de 9 pontos.

Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e às médias dos tratamentos aplicado o teste de Tukey ao nível de 5% de significância.

2.1. PRODUÇÃO DE CERVEJA EM ESCALA PILOTO

Para a produção da cerveja em escala piloto, foram produzidos 80L de mosto a 14,21°P, utilizando 19kg de malte com 45% de café. Na mosturação utilizou-se malte e 57L de água. Ao final da mosturação (72°C), foi realizado teste com solução de iodo a 0,2N para verificação da sacarificação do amido do malte. Então, a mistura foi aquecida a 76°C por 10 min para inativação das enzimas do malte. O mosto foi submetido à filtração em tanque de aço inox com agitador, disco filtrante ranhurado Pak Screens, bomba centrífuga e isolamento térmico. O mosto, separado do bagaço do malte, foi transferido para a tina de fervura, 15,5kg de café foram adicionados ao bagaço e uma parte da água secundária à 80°C adicionada sobre a mistura, assim o café foi filtrado pelo bagaço e gerou-se a bebida de café.

O mosto filtrado foi submetido à fervura em tanque de aço inox encamisado, 250L, com aquecimento elétrico e isolamento térmico. Nos 60 min de fervura foram adicionados lúpulo em peletes e café. Foram adicionados durante os primeiros minutos de fervura, 65g do lúpulo Galena e 56g desse lúpulo aos 40 min de fervura, para obtenção do amargor desejado de 36,8IBU. A bebida de café foi adicionada 10 min antes do término da fervura. Após a fervura, o mosto foi submetido à recirculação tangencial por cerca de 60 min para a precipitação de proteínas e polifenóis. O mosto foi resfriado por circulação de água no tanque encamisado e posteriormente mantido em repouso por 60 min, a 30°C. Retirou-se então, o sedimento de proteínas e polifenóis e o mosto foi transferido por bombeamento para o tanque de fermentação, 200L, equipado com controlador, indicador digital de temperatura e registro para retirada de amostras. O inóculo foi adicionado após ajuste de temperatura para 20°C.

As fermentações foram conduzidas à temperatura de 20°C. Foram retiradas amostras a cada 12 horas e determinados os teores de álcool e de extratos por meio do analisador de bebidas *Anton 56 Paar*, modelo *Beer Analyzer 2*. Ao término da fermentação, o excesso de leveduras foi retirado do fermentador e a

temperatura ajustada à 0°C para início da maturação, permanecendo assim por 14 dias. Do processo de fermentação foram determinadas a concentração de células em suspensão e o sobrenadante utilizado para quantificar a quantidade de extratos, álcool, pH e densidade do mosto.

O potencial hidrogeniônico foi medido diretamente em pHmetro digital. O teor e álcool (% v/v), o extrato original (°P), o extrato real (°P), e o extrato aparente (°P), e a determinação do grau aparente de fermentação (%) e do grau real de fermentação (%), foram determinados por meio do equipamento *Beer Analyzer 2*. Foi calculado o rendimento, a eficiência da fermentação e a produtividade em álcool.

As análises microbiológicas foram realizadas em microscópio determinando-se a viabilidade celular. Inicialmente a cada 12 horas, realizou-se contagens em câmara de *Neubauer* (11400 mm² x 1110 mm) e expresso em número de células/mL. As análises de extratos e de álcool também foram realizadas no mesmo período de amostragem.

Após a maturação, o chope foi filtrado em filtro prensa com placas de celulose KS-100, com 2kgf/cm², utilizando terra diatomácea como adjuvante de filtração. O chope filtrado foi armazenado em tanque e iniciou-se a carbonatação para correção da pressão em CO₂ para 2 kgf/cm². Posteriormente foi envasado em garrafas de vidro âmbar de 600 ml. O processo de pasteurização foi conduzido em autoclave por 30 min à 63°C. Após a pasteurização as garrafas foram refrigeradas.

Avaliou-se a doçura, o aroma, o amargor, o sabor, a impressão global e a intenção de compra da cerveja em análise sensorial e comparou-a a uma cerveja comercial. O painel sensorial foi composto por 59 provadores, não treinados, consumidores de bebida alcoólica, com faixa etária entre 18 e 49 anos, 32% mulheres e 83% homens. Os resultados também foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e às médias dos tratamentos aplicado o teste de Tukey ao nível de 5% de significância.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores de extrato real e aparente das cervejas produzidas com 45% de café, podem ser observados na (Tabela 1). O pH variou entre 5,6 e 6,1 aproximando-se do sugerido por Meilgaard (2002).

Tabela 1 – Análises das cervejas produzidas com 45% em Escala Laboratorial e Piloto.

Análises	Escala Laboratorial	Escala Piloto
Extrato Real (% m/m)	6,02	5,60
Extrato Aparente (°P)	4,09	4,17
Extrato Original (°P)	14,50	14,50
Grau Real de Fermentação (%)	60,34	60,64
Grau Aparente de Fermentação (%)	76,29	72,40
Álcool (% v/v)	5,70	5,69
Tempo de fermentação (h)	72	72

Os parâmetros fermentativos, rendimento, produtividade em álcool, eficiência da fermentação e tempo de fermentação calculados, foram apresentados na (Tabela 2). Os graus de fermentabilidade real e aparente garantem uma transformação eficiente dos açúcares fermentescíveis do mosto em álcool.

Tabela 2 – Comparação dos Parâmetros do Processo Fermentativo das cervejas com 45% de café produzidas em Escala Laboratorial e Piloto.

Parâmetros Fermentativos	Escala Laboratorial	Escala Piloto
Rendimento (Y _{p/s}) (g/g)	0,500	0,504
Produtividade em álcool (g.L ⁻¹ .h ⁻¹)	0,625	0,625
Eficiência da fermentação (%)	97,8	98,6
Tempo de fermentação (h)	72	72

O rendimento da cerveja produzida em escala piloto aproxima-se dos valores do rendimento da cerveja produzida em escala laboratorial e do Y_{p/s} teórico.

De acordo com Ros (1980) a composição dos sais dissolvidos em água usada na fabricação da cerveja tem influência direta sobre o pH do mosto da cerveja. Um pH muito elevado pode comprometer a ação das

enzimas na sacarificação do amido, além de propiciar o desenvolvimento de microrganismos indesejáveis, afetando a qualidade da cerveja e prejudicando a clarificação da cerveja.

A eficiência da fermentação da cerveja produzida em escala piloto (98,6%) aproxima-se da eficiência da cerveja produzida em escala laboratorial (97,8%), com mesma concentração de café (45%). A escala de fermentação não influenciou no processo fermentativo.

Os resultados da análise sensorial da cerveja produzida em escala laboratorial podem ser observados na (Tabela 3). Observa-se que a cerveja produzida com 45% de café (Tratamento 5) foi a melhor avaliada em todos os quesitos, sendo, portanto, a escolhida para ser produzida em escala piloto.

Tabela 3 – Médias das notas obtidas para os atributos cor, aroma, aparência, sabor e impressão global na análise sensorial da cerveja aromatizada com café em escala laboratorial.

Tratamentos	Cor	Aroma	Aparência	Sabor	Impressão Global
1	5,54 b	5,28 b	5,66 b	4,56 c	4,98 b
2	6,56 a	5,7 b	6,1 ab	5,0 bc	5,78 ab
3	6,20 ab	6,16 ab	6,08 ab	5,78 ab	5,9 a
4	6,52 a	6,74 a	6,48 ab	5,96 ab	6,2 a
5	6,76 a	6,84 a	6,7 a	6,28 a	6,6 a

Médias seguidas por uma mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de 5% de significância, pelo teste de Tukey. 1 - mosto elaborado com 100% de malte; 2 - mosto elaborado com 15% de café; 3 - mosto elaborado com 25% de café; 4 - mosto elaborado com 35% de café; 5 - mosto elaborado com 45% de café.

Na análise sensorial da cerveja produzida em escala piloto, conforme mostra a (Tabela 4), observa-se que não houve diferença significativa para os atributos doçura, aroma, sabor e impressão global entre as cervejas.

Tabela 4 – Média das notas da análise sensorial da cerveja aromatizada com café.

Amostras	Doçura	Aroma	Sabor	Amargor	Impressão Global
Comercial	6,10 a	6,81 a	6,35 a	6,25 a	6,74 a
Cerveja de Café	5,47 a	6,95 a	5,70 a	5,61 b	6,28 a

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey.

Os provadores apontaram a cerveja produzida em escala piloto, com 45% de café e 36,8 IBU como a mais aromática. A cerveja comercial (40 IBU) foi considerada a mais amarga pelos provadores, ao nível de 5% de significância.

Ambas as cervejas apresentaram notas entre 6 e 7, compreendendo entre “gostei ligeiramente” e “gostei moderadamente” sugerindo aceitação dos produtos, não havendo diferença significativa ($p < 0,05$) entre as amostras, em relação a Impressão Global.

Com relação à intenção de compra para a cerveja aromatizada com 45% de café produzida em escala piloto. Apenas 6% dos provadores certamente a comprariam e a maioria, 37% respondeu que provavelmente compraria. 6% responderam que certamente não comprariam e 23% provavelmente não comprariam. 25% dos avaliadores tiveram dúvida se comprariam a cerveja.

4. CONCLUSÕES

A cerveja aromatizada com 45% de café foi a melhor avaliada em todos os quesitos e na intenção de compra.

O café poderá ser empregado como aromatizante no processo de produção de cerveja com até 45% de café sem interferir no processo fermentativo.

5. AGRADECIMENTOS

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

REFERÊNCIAS

- [1] Almeida, R. B., Silva, J. B. A. E., Lima, U. A., & Assis, A. N. (2001). Evaluation of fermentation parameters during high-gravity beer production. *Brazilian Journal of Chemical Engineering*, 18(4), 459-465.
- [2] Carvalho, G. B. M. (2009). Obtenção de cerveja usando banana como adjunto e aromatizante (Tese de Doutorado). Universidade de São Paulo, Lorena.
- [3] Carvalho, G. B. M., Silva, D. P., Teixeira, J. A., & Almeida e Silva, J. B. (2006). Cerveja a partir de banana como adjunto do malte. In: Venturini Filho, G. W. *Ciência e Tecnologia de Bebidas*. São Paulo: Edgar Blucher.
- [4] Ghiselli, A., Natella, F., Guidi, A., Montanari, L., Fantozzi, P., & Scaccini, C. (2000). Beer increases plasma antioxidant capacity in humans. *The journal of nutritional biochemistry*, 11(2), 76-80.
- [5] Silva, J. B. A. (2005). Cerveja. In: Venturini Filho, W. G. (Coord.). *Tecnologia de Bebidas*. São Paulo: Edgard Blucher, 347-356.
- [6] Meilgaard, M. (2002). Composición del mosto. In: KLIMOVITZ, R. *El cervecero en la práctica*. (3. Ed.). Minnesota: Master Brewers Association of Americas.
- [7] Mukamal, K. J., Rimm, E. B. (2008). Alcohol consumption: risks and benefits. *Current Atherosclerosis Reports*, 10(6), 536-543.
- [8] Ros, J. (1980). Estabilidad coloidal de la cerveza. Pamplona (Espanha): Laboratorio Industrial de Bioquímica S.A. (L.I.B.S.A.).

Capítulo 16

Protease alcalina e ácido tricloroacético na obtenção de hidrolisados de plasma suíno

Eduarda Baggio Paglia

Cristine Vogel

Aniela Pinto Kempka

Resumo: Muitas proteínas animais e vegetais podem ser utilizadas como substrato para a produção de hidrolisados proteicos, provenientes muitas vezes de resíduos de indústrias alimentícias. Estes hidrolisados são obtidos preferencialmente por hidrólise enzimática, utilizando diferentes tipos de proteases, para obtenção de peptídeos e aminoácidos. A hidrólise contribui para a melhoria das propriedades funcionais, organolépticas e nutricionais das proteínas, que podem ser incorporadas na formulação de diversos produtos alimentícios, além de possuírem efeitos benéficos sobre a saúde humana. Nesse estudo foi utilizada uma protease alcalina para hidrólise do plasma suíno desidratado a fim de determinar o grau de hidrólise (GH) em diferentes condições. A hidrólise ocorreu sob condições controladas de pH, tempo e temperatura, variando a relação enzima/substrato de 2% e 4% e a concentração de ácido tricloroacético (TCA) de 6,25% e 10%. Os resultados foram avaliados por análise de variância seguida do teste de Tukey. Na comparação da concentração da protease alcalina com o GH, a concentração de 4% possibilita maiores valores de GH do que concentrações de 2%. Mudanças na concentração de TCA não resultaram em variações significativas no GH, sendo possível o uso da menor concentração testada.

Palavras-chave: plasma suíno desidratado, hidrólise de proteína, precipitação, grau de hidrólise.

1. INTRODUÇÃO

Os hidrolisados podem ser definidos como proteínas clivadas, por reação de hidrólise que promove a despolimerização, que são origem a peptídeos de vários tamanhos e aminoácidos, alterando o número de grupos ionizáveis e causando a exposição de grupos hidrofóbicos que estavam protegidos na estrutura original da proteína. Os principais métodos de hidrólise compreendem a hidrólise ácida, alcalina e enzimática (Korhonen; Pihlanto, 2006).

A hidrólise enzimática vem sendo preferencialmente escolhida por preservar aminoácidos importantes com valor nutricional, além de permitir a obtenção de características específicas para uma determinada aplicação. As enzimas que permitem a hidrólise de proteínas são denominadas proteases e correspondem a, aproximadamente, 60% das enzimas comercializadas (Ivaldo et al., 2013). Proteases ou peptidases são enzimas que catalisam a ruptura de ligações peptídicas em proteínas e estas compreendem um grupo notável de biocatalisadores com um amplo escopo de aplicação, de acordo com suas propriedades bioquímicas e especificidade para o substrato (De Souza Rocha et al., 2015).

Proteínas hidrolisadas podem ocasionar melhoria de propriedades funcionais, como textura, solubilidade e capacidade emulsificante, devido a exposição de grupos lipofílicos e/ou hidrofílicos. Estas propriedades funcionais são importantes para a indústria de alimentos em formulações onde se deseja a formação de géis e espumas, ou emulsões, além disso, proteínas hidrolisadas podem ser aplicadas como ingredientes multifuncionais em alimentos (Polanco-Lugo et al., 2014; Sripokar et al., 2019), sendo requeridas em produtos para fins médicos e nutrição humana (Vidal, 2016).

A utilização de subprodutos como fonte para obtenção de peptídeos é uma alternativa de aproveitamento de proteínas, e os produtos gerados podem apresentar características benéficas para indústrias e para a saúde humana, ao mesmo tempo que colaboram com a reutilização de um material que poderia gerar contaminação do meio ambiente. Nesse contexto o plasma sanguíneo suíno vem sendo estudado como uma possível fonte para obtenção de hidrolisados proteicos, devido as suas características físico-químicas que permitem sua aplicação em diversos setores industriais, bem como na área de alimentos, além de seu teor elevado de proteína, maior que 80%. (Niu et al., 2018).

Peptídeos bioativos, oriundos de processos de hidrólise, possuem usualmente fragmentos proteicos constituídos de 2-20 sequências de aminoácidos, apresentando, além de seu valor nutricional, benefícios fisiológicos e efeitos hormonais em humanos, pois quando consumidos são absorvidos através da parede intestinal e entram na corrente sanguínea influenciando e regulando processos fisiológicos (Onuh & Aluko, 2019). As bioatividades apresentadas por esses peptídeos são inúmeras, como atividades antioxidantes, antiproliferativa, anti-inflamatória, antimicrobiana, imunomoduladora e atividade inibitória da enzima conversora da angiotensina I (Hemker et al., 2020).

O processo enzimático, de acordo com Aluko et al. (2015), é baseado no uso de combinações únicas ou diferentes de proteases como pepsina, tripsina, quimotripsina, bromelina, papaína, protease alcalina, neutrase, Flavourzyme® e muitas outras. Os parâmetros críticos de hidrólise (temperatura, pH, solução aquosa ou tamponada) devem ser otimizados para cada substrato e cada enzima ou combinação de enzimas selecionadas e devem ser mantidos constantes durante a proteólise para assegurar a libertação eficiente de peptídeos. Segundo Kristinsson e Rasco (2000), do grande espectro de enzimas existentes, destaca-se a protease alcalina derivada de *Bacillus licheniformis*.

O grau de hidrólise (GH) expressa a medida do grau de clivagem das ligações peptídicas. Os valores podem variar de 0% a 100% para proteínas intactas e completamente hidrolisadas, respectivamente. O GH é determinado pelas condições do processo (relação enzima/substrato, tempo, temperatura e pH) e influenciado pela natureza da atividade enzimática. A importância de determinar o GH se dá por haver uma relação direta do tamanho do peptídeo com a influência nas propriedades nutricionais, funcionais e sensoriais (Nuthong et al., 2009). Ainda, o GH é o indicador mais utilizado para comparação entre diferentes processos proteolíticos.

Para o monitoramento da extensão de degradação hidrolítica das proteínas, resultantes do processo de hidrólise enzimática, várias técnicas podem ser aplicadas, como pH-stat, osmometria, determinação de nitrogênio-amino por titulação com formol, assim como a determinação da solubilidade em ácido tricloroacético (TCA), que consiste em utilizar concentração variadas para a precipitação de proteínas não hidrolisadas e fragmentos proteicos, resultando em um sobrenadante contendo aminoácidos livres solúveis e pequenos peptídeos (Morais et al., 2013; Nielsen et al., 2001; Kristinsson; Rasco, 2000), sendo, portanto, utilizado no processo após a etapa de hidrólise enzimática, permitindo a posterior determinação.

O presente estudo teve como objetivo avaliar o GH do plasma suíno utilizando uma protease alcalina derivada de *Bacillus licheniformis*, em duas concentrações em relação a massa de substrato e em duas concentrações de TCA, sendo este último, utilizado na etapa de precipitação.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. PLASMA SUÍNO, PROTEASE ALCALINA E REAGENTES

O plasma suíno foi cedido pela empresa APC do Brasil LTDA (Chapecó/SC) e a protease alcalina derivada de *Bacillus licheniformis* (Protezyz APP 300) foi cedida pela Prozyn (São Paulo/SP). Foram utilizados ainda albumina bovina (Sigma-Aldrich Brasil Ltda, São Paulo, SP, Brasil), reagente de *Folin & Ciocalteu* (Sigma-Aldrich Brasil Ltda, São Paulo, SP, Brasil), fosfato de sódio monobásico e fosfato de sódio dibásico (BIOTEC, São Paulo, SP, Brasil) e ácido tricloroacético (Neon Comercial Ltda, São Paulo, SP, Brasil).

2.2. OBTENÇÃO DO HIDROLISADO DE PLASMA SUÍNO E DETERMINAÇÃO DO GH

O processo de obtenção do hidrolisado de plasma suíno seguiu as etapas apresentadas na Figura 1 e as condições de hidrólise da Tabela 1.

Figura 1 - Fluxograma da obtenção do hidrolisado proteico de plasma suíno utilizando a protease alcalina Protezyz APP 300.

Tabela 1 – Condições de hidrólise do plasma suíno utilizando a protease alcalina Protezyz APP 300.

	Enzima	[S/T]* (m/v)	[E/S]** (m/m)	Temperatura (°C)	pH	TCA (%)
Etapa I	Protezyz APP 300	5%	2% e 4%	60	8,0	6,25%
Etapa II	Protezyz APP 300	5%	4%	60	8,0	6,25% e 10%

*[S/T] relação substrato/tampão (m/v); **[E/S] relação enzima/substrato (m/m).

A Etapa I consistiu da avaliação da concentração de enzima: o plasma suíno foi suspenso em solução tampão de fosfato de sódio (pH 8) na relação substrato/tampão de 5% e a enzima adicionada nas concentrações de 2% e 4% (m/m). A suspensão foi incubada a 60°C por 90 min com agitação contínua de 100 rpm. Alíquotas de 1 mL foram coletadas nos tempos de 0, 30, 90 e 120 min e misturadas com 9 mL de TCA 6,25%, conforme Pezoa e Salas-Mellado (1979). Após repouso de 15 min, a amostra foi filtrada em papel filtro (Whatman, nº 1) e o teor de proteínas solúveis foi determinado no filtrado pelo método de Lowry et al. (1951). A concentração de proteínas foi expressa em mg de albumina bovina, através de leitura em espectrofotômetro visível (Biospectro, modelo SP-22) à 660 nm. O GH representa a relação entre as proteínas solubilizadas e as proteínas totais presentes no substrato inicial (determinada por Kjeldahl, utilizando o fator de conversão de nitrogênio para proteína de 6,25) (AOAC 2000).

A Etapa II consistiu na avaliação da concentração de TCA: o plasma suíno foi hidrolisado utilizando as mesmas condições da Etapa I, porém, fixando a relação [E/S] em 4% e variando a porcentagem de TCA em 6,25% e 10%. A hidrólise enzimática foi conduzida durante 390 min, sendo retiradas alíquotas após 30, 90, 150, 210, 270, 330 e 390 min, para determinação do GH.

2.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os resultados obtidos foram analisados através da análise de variância (ANOVA) e as diferenças entre médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o software Statistica 10.0® (Statsoft, Tulsa, Estados Unidos).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O plasma suíno bruto apresentou 82,44% de proteína. Os resultados do GH do plasma suíno, realizado a partir da variação da razão [E/S] correspondentes a Etapa I, estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Médias do grau de hidrólise do plasma suíno utilizando a protease alcalina Protezyna APP 300 em diferentes concentrações em relação a massa de substrato.

Tempo (min)	GH (%)	
	[E/S] 2%	[E/S] 4%
30	7,20 ± 0,33 ^{bB}	9,15 ± 0,21 ^{aA}
90	9,32 ± 0,04 ^{aB}	10,25 ± 0,19 ^{bA}
120	9,70 ± 0,04 ^{aB}	10,46 ± 0,25 ^{bA}

Resultados expressos em média ± desvio padrão. Letras minúsculas diferentes, na mesma coluna, e letras maiúsculas diferentes, na mesma linha, diferem estatisticamente entre si ($p < 0,05$), pelo Teste de Tukey.

Para as duas relações E/S testadas (2% e 4%), verifica-se que o GH teve aumento com o passar de 30 min de reação, sendo obtidos os maiores valores médios para os tempos de 90 e 120 min, sendo estes iguais estatisticamente ($p > 0,05$) pelo Teste de Tukey. Para um mesmo tempo, verifica-se que para 30 min, 90 min e 120 min, houve diferença estatística ($p < 0,05$) para o GH obtido quando utilizado 2% e 4% da relação [E/S], demonstrando que o aumento da concentração de enzima levou ao aumento do GH para todos os tempos. Liu et al. (2010) realizaram a hidrólise de proteína plasmática suína com Alcalase®, uma protease alcalina derivada de *Bacillus licheniformis*, na relação enzima para substrato [E/S] de 2:100 (g/g) e obtiveram, para 30 min de reação, um GH de 6,2%, valor inferior ao encontrado no estudo que foi de 7,20% utilizando as mesmas condições.

Os resultados da Tabela 1 mostram que duplicando a concentração de enzima, houve um baixo incremento no GH (incrementos de 27%, 12,9% e 7,8%, 30 min, 90 min, e 120 min, respectivamente) indicando uma possível ineficiência de precipitação, na etapa de adição do TCA, já que os dados obtidos para 2% estão próximos ao obtido por Liu et al. (2010), indicando que a etapa de hidrólise ocorreu adequadamente.

Os resultados da avaliação da concentração de TCA sobre o GH utilizando a relação [E/S] de 4%, correspondentes a Etapa II, estão mostrados Tabela 3.

Tabela 3 – Médias do grau de hidrólise do plasma suíno utilizando a protease alcalina Protezyna APP 300, determinados a partir da variação do TCA (%).

Tempo (min)	GH (%)	
	TCA 6,25%	TCA 10%
30	9,15 ± 0,21 ^{cA}	8,81 ± 0,10 ^{cA}
90	10,25 ± 0,19 ^{bA}	9,85 ± 0,10 ^{bB}
150	10,46 ± 0,25 ^{bA}	10,37 ± 0,41 ^{bA}
210	12,41 ± 0,18 ^{aA}	12,11 ± 0,05 ^{aA}
270	12,15 ± 0,64 ^{aA}	12,23 ± 0,27 ^{aA}
330	12,68 ± 0,15 ^{aA}	12,52 ± 0,11 ^{aA}
390	12,80 ± 0,28 ^{aA}	12,64 ± 0,37 ^{aA}

Resultados expressos em média ± desvio padrão. Letras minúsculas diferentes, na mesma coluna, e letras maiúsculas diferentes, na mesma linha, diferem estatisticamente entre si ($p < 0,05$), pelo Teste de Tukey.

Os valores de GH para os hidrolisados de plasma suíno precipitados com TCA 6,25% apresentaram uma variação de 9,15 a 12,80%, sendo iguais estatisticamente ($p > 0,05$) aos valores obtidos nos tempos de 210, 270, 330 e 390 min. Para os hidrolisados de plasma suíno precipitados com TCA 10%, os valores de GH

apresentaram uma variação de 8,81 a 12,64%, sendo iguais estatisticamente ($p>0,05$) os valores obtidos nos mesmos tempos do anterior. Para cada tempo, verifica-se que houve diferença estatística apenas nos valores de GH de 90 min, demonstrando que o aumento na concentração de TCA modificou a precipitação e que a hidrólise, nas condições testadas, leva a um GH de até, aproximadamente, 12,8%. Desta forma, verifica-se que o fator a ser considerado pode ser a especificidade da enzima em relação ao substrato e a taxa de reação.

Fu et al. (2018), que também realizaram a hidrólise enzimática utilizando plasma suíno, verificaram rápidas taxas iniciais de reação (1 a 3 h) seguidas por uma fase mais lenta com taxa de hidrólise reduzida até 5 h. Neste estudo, os autores obtiveram um GH de 13,66% utilizando a enzima Alcalase® em 120 min de reação e de 17,62% em 300 min de reação, ou seja, um incremento de 3,96% do GH em um intervalo de 180 min. Os valores de GH obtidos no presente estudo para 210 min (12,41% para TCA 6,25% e 12,11% para TCA 10%), são minimamente inferiores ao obtido por Fu et al. (2018) para 300 min de reação. A reação hidrolítica com duração superior a 5 horas pode favorecer a contaminação microbiana dessas preparações proteicas (AHN et al., 2012).

4. CONCLUSÃO

Para a hidrólise de plasma suíno, o aumento da relação E/S de 2% para 4% não levou a aumento no GH, demonstrado através da análise estatística. Tanto para a relação E/S de 2% como para a relação E/S de 4%, verificou-se que após 90 min de processo não houve aumento do GH. Para as concentrações de TCA, verificou-se que não houve aumento do GH alterando a sua concentração de 6,25% para 10%. Desta forma, através desse estudo foi possível avaliar parâmetros como tempo de hidrólise, bem como da relação enzima/substrato, todavia o estudo de temperatura e pH se faz necessário para maximizar o GH e permitir investigar aplicações bioativas e funcionais.

5. AGRADECIMENTOS

Ao CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (processo 409925/2016-0) e a FAPESC – Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Termo de outorga nº: 2017tr721) pelo aporte financeiro, às empresas Prozyn – Biosolutions for Life e APC do Brasil pela doação da protease alcalina e do plasma, respectivamente e a UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina pela disponibilização de bolsas de estudo.

REFERÊNCIAS

- [1] AHN, C.; JEONB, Y.; KIMC, Y.; JE, J. Angiotensin I converting enzyme (ACE) inhibitory peptides from salmon byproduct protein hydrolysate by Alcalase hydrolysis. *Process Biochemistry*, v. 47, n. 12, p. 2240–2245, 2012.
- [2] ALUKO, R. E.; GIRGIH, A. T.; HE, R.; MALOMO, S.; LI, H.; OFFENGENDEN, M.; WU, J. Structural and functional characterization of yellow field pea seed (*Pisum sativum* L.) protein-derived antihypertensive peptides. *FRIN*, v. 77, p. 10-16, 2015.
- [3] AOAC (2000). Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC.
- [4] DE SOUZA ROCHA, T., HERNANDEZ, L. M. R., MOJICA, L., JOHNSON, M. H., CHANG, Y. K., GONZÁLEZ DE MEJÍA, E. Germination of *Phaseolus vulgaris* and alcalase hydrolysis of its proteins produced bioactive peptides capable of improving markers related to type-2 diabetes in vitro. *Food Research International*, v. 76, p. 150–159, 2015. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2015.04.041>
- [5] FU, Y., LIU, J., HANSEN, E. T., BREDIE, W. L. P., LAMETSCH, R. Structural characteristics of low bitter and high umami protein hydrolysates prepared from bovine muscle and porcine plasma. *Food Chemistry*, v. 257, p. 163–171, 2018. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.02.159>
- [6] HEMKER, A. K., NGUYEN, L. T., KARWE, M., & SALVI, D. (2020). Effects of pressure assisted enzymatic hydrolysis on functional and bioactive properties of tilapia (*Oreochromis niloticus*) by-product protein hydrolysates. *LWT - Food Science and Technology*, 122, 109003. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2019.109003>
- [7] KRISTINSSON, H. G.; RASCO, B. A. Fish Protein Hydrolysates: Production, Biochemical, and Functional Properties. 40:1, 43-81, 2000.
- [8] KORHONEN, H., PIHLANTO, A. Bioactive peptides: Production and functionality. *International Dairy Journal*, v. 16, n. 9, p. 945–960, 2006. <https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2005.10.012>

- [9] LIU, Q.; KONG, B.; XIONG, Y. L.; XIA, X. Antioxidant activity and functional properties of porcine plasma protein hydrolysate as influenced by the degree of hydrolysis. *Food Chemistry*, v. 118, n. 2, p. 403-41-, 2010.
- [10] LOWRY, O. H.; ROSEBROUGH, N. J.; FARR, A. L.; RANDALL, R. J. Protein measurement with the folin phenol reagent. *Journal Biol. Chem.*, p. 265-275, 1951.
- [11] MORAIS, H. A.; SILVE, M. P. C.; SILVA, V. D. M.; SILVA, M. R.; CRISTINA, A. S.; SILVEIRA, J. N. Correlation between the Degree of Hydrolysis and the Peptide Profile of Whey Protein Concentrate Hydrolysates: Effect of the Enzyme Type and Reaction Time. *American Journal of Food Technology*, v. 8, n. 1, p. 1-16, 2013.
- [12] NOMAN, A., XU, Y., AL-BUKHAITI, W. Q., ABED, S. M., ALI, A. H., RAMADHAN, A. H., & XIA, W. (2018). Influence of enzymatic hydrolysis conditions on the degree of hydrolysis and functional properties of protein hydrolysate obtained from Chinese sturgeon (*Acipenser sinensis*) by using papain enzyme. *Process Biochemistry*, 67, 19–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procbio.2018.01.009>
- [13] NIELSEN, P. M.; PETERSEN, D.; DAMBMAN, C. Improved method for determining food protein degree of hydrolysis. *Journal Of Food Sciences*, v. 66, n. 5, p. 642-646, 2001.
- [14] NIU, H.; CHEN, Y.; ZHANG, H.; KONG, B.; LIU, Q. Protective effect of porcine plasma protein hydrolysates on the gelation of porcine myofibrillar protein exposed to a hydroxyl radical-generating system. *International Journal of Biological Macromolecules*, v. 107, n. PartA, p. 654-661, 2018.
- [15] NIU, H.; ZHANG, M.; XIA, X.; LIU, Q.; KONG, B. Effect of porcine plasma protein hydrolysates on long-term retrogradation of corn starch. *Food Chemistry*, v. 239, p. 172-179, 2018.
- [16] NUTHONG, P.; BENJAKUL, S.; PRODPRAN, T. Characterization of porcine plasma protein-based films as affected by pretreatment and cross-linking agentes. *International Journal of Biological Macromolecules*, v. 44, n. 2, p. 143-148, 2009.
- [17] ONUH, J. O., & ALUKO, R. E. (2019). Metabolomics as a tool to study the mechanism of action of bioactive protein hydrolysates and peptides: A review of current literature. *Trends in Food Science & Technology*, 91, 625–633. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.08.002>
- [18] PEZOA, V. G.; MELLADO, M. S.; Obtenção de um concentrado de proteínas de pescado para alimentos pelo método enzimático. FURG: Rio Grande, 1979.
- [19] POLANCO-LUGO, E.; DÁVILA-ORTIZ, G.; BETANCUR-ANCONA, D. A.; CHEL-GUERRERO, L. A. Effects of sequential enzymatic hydrolysis on structural, bioactive and functional properties of *Phaseolus lunatus* protein isolate. *Food Science and Technology*, v. 34, n. 3, p. 441-448, 2014.
- [20] SRIPOKAR, P., BENJAKUL, S., & KLOMKLAO, S. (2019). Antioxidant and functional properties of protein hydrolysates obtained from starry triggerfish muscle using trypsin from albacore tuna liver. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, 17, 447–454. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bcab.2018.12.013>
- [21] VIDAL, A. R. Avaliação das propriedades funcionais e estruturais de hidrolisados de diferentes colágenos bovinos obtidos por hidrólise enzimática assistida por ultrassom. p. 1-137, 2016.

Capítulo 17

Avaliação do teor de desoxinivalenol em farinhas de trigo utilizadas em panificadoras

Rosselei Caiel da Silva

Ionara Regina Pizzutti

Ingrid Duarte dos Santos

Andressa Lanza

Eunice Valduga

Jamile Zeni

Resumo: Os cereais estão constantemente expostos à contaminação de fungos, que pode ocorrer em diversas etapas, desde a lavoura até o processamento final. Nesse estudo, objetivou-se avaliar a presença de desoxinivalenol (DON) em 39 amostras de farinha de trigo, utilizadas em panificadoras da Região do Médio e Alto Uruguai/RS. Foram utilizados 12,5 g de slurry, 5 g MgSO₄ anidro e 10 mL de solução de ácido acético 1% em acetonitrila, e posterior análise em UPLC-MS/MS. Todas as amostras apresentaram contaminação por DON, com concentrações entre 77 e 3630 µg kg⁻¹, sendo esse último valor superior em quase cinco vezes o Limite Máximo Tolerável (LMT) preconizado pela Legislação Brasileira vigente (750 µg kg⁻¹). Observou-se que 36% das amostras apresentaram resultados acima do LMT. Tendo em vista a elevada concentração de DON observada nas amostras, torna-se fundamental o contínuo monitoramento em farinhas de trigo, a fim de se obter produtos de qualidade e seguros para o consumidor.

1. INTRODUÇÃO

O trigo (*Triticum spp*) é o cereal mais produzido no mundo, e um dos mais indispensáveis devido a sua enorme aplicabilidade, destacando-se na produção de farinha de trigo, e, conseqüentemente, os seus derivados como pão e macarrão. No entanto, o trigo está constantemente exposto à contaminação por fungos, e especial atenção deve-se dar àqueles micotoxigênicos, fungos estes, produtores de micotoxinas. Essa contaminação pode ocorrer durante a produção na lavoura, durante a colheita, transporte, armazenamento e no processamento dos alimentos. (Scussel et al. 2011; Zhang et al., 2019). Além disso, cabe ressaltar que esta micotoxina é estável a temperaturas de 120 °C e moderadamente estável a 180 °C. (Rahimi et al., 2018)

As micotoxinas são metabólitos secundários de uma variedade de espécies de fungos, tóxicos para humanos, animais e plantas, sendo atualmente consideradas uma das principais preocupações de segurança alimentar em países tropicais e subtropicais. (Mousavi Khaneghah et al., 2019)

A presença de desoxinivalenol (DON) em *commodities* agrícolas está relacionada a várias espécies do fungo *Fusarium*, principalmente na fase de florescimento, causando a doença conhecida como Giberela do trigo. (Rahimi et al., 2018)

A exposição ao DON pode causar uma ampla gama de efeitos adversos à saúde de animais e humanos, incluindo diarreia, vômitos, diminuição de peso, distúrbios hematológicos e imunossupressão. (Sirot et al. 2013; Marin et al. 2013; Wu et al., 2020).

Como forma de controle dessas substâncias nos alimentos, no Brasil foram estabelecidos os Limites Máximos Tolerados (LMT) de algumas micotoxinas em alimentos, através da RDC nº 07/2011 (Brasil, 2011). Naquele primeiro momento, o LMT foi estabelecido em 1750 µg kg⁻¹, entretanto, em 2017, a RDC nº 138 (Brasil, 2017) alterou o anexo IV da RDC nº 07/2011, e atualmente o novo LMT para DON em farinha de trigo no Brasil é de 750 µg kg⁻¹.

Diante dessas considerações, o objetivo desse estudo foi avaliar a presença da micotoxina DON, em farinhas de trigo utilizadas em panificadoras da Região do Médio e Alto Uruguai/RS, bem como comparar os resultados obtidos frente à Legislação Nacional.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. COLETA

As amostras de farinha de trigo (500 g) foram coletadas na Região do Médio Alto Uruguai, constituída por 34 municípios e com aproximadamente 190 mil habitantes, localizada no Norte do Rio Grande do Sul.

Sortearam-se por meio do Software Estatístico R 3.2.2, 13 municípios da Região do Médio e Alto Uruguai, para realizar as coletas de farinha de trigo do tipo 1, empregada pelas panificadoras na produção de diversos produtos. Em cada um dos municípios foram sorteadas três panificadoras, coletando-se *uma amostra em cada panificadora, totalizando 39 amostras*.

2.2. PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS

Utilizou-se um sistema de Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência (UPLC) acoplado ao Espectrômetro de Massa (Xevo TQS, Waters), com ionização por eletronebulização no modo positivo (ESI⁺). A separação analítica foi realizada utilizando coluna cromatográfica C18 (100 mm x 2,1 mm x 1,7 µm), mantida a temperatura constante de 60 °C. A fase móvel foi composta de acetonitrila (contendo ácido fórmico a 0,1 %) e água (contendo ácido fórmico a 0,1 %), em modo gradiente de eluição e vazão constante de 0,45 mL min⁻¹. O volume de injeção foi de 2 µL e o tempo de retenção da DON foi de 1,38 minutos. A corrida cromatográfica totalizou 13 minutos.

As amostras de farinha de trigo foram homogeneizadas com água, a fim de obter uma suspensão homogênea (slurry). A proporção entre a amostra e a água para a preparação da suspensão foi, respectivamente, de 1:1,5. Pesaram-se 12,5 g de slurry, seguida da adição de 10 mL de acetonitrila (contendo 1% de ácido acético) e do padrão interno do procedimento (P.I.P.) (quinalfós), na concentração de 12,5 µg L⁻¹. Após fechar os tubos, os mesmos foram colocados em mesa agitadora por cerca de 1 minuto. Em seguida, acrescentaram-se 5 g de MgSO₄ anidro e repetiu-se a agitação novamente por um minuto. Posteriormente, efetuou-se uma etapa de centrifugação por 3 minutos, a 4000 rpm.

Por fim, transferiram-se 500 µL deste extrato para o vial e adicionou-se 500 µL de metanol contendo o padrão interno do instrumento (P.I.I.) (propoxur), na concentração de 10 µg L⁻¹. Seguiu-se diretamente para análise por UPLC-MS/MS, onde se monitorou as transições 297,2→249,1 e 297,2→231,2. O procedimento de extração foi realizado em triplicata para cada uma das amostras.

2.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os resultados obtidos foram tratados estatisticamente segundo análise de variância (ANOVA), seguida de comparação das diferenças das médias pelo teste de Tukey, a nível de 95 % de confiança, com auxílio do software *Statistica* versão 8.0.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O método empregado foi previamente validado. O Limite de Detecção obtido para o método foi de 20 µg kg⁻¹ e o Limite de Quantificação de 50 µg kg⁻¹. A curva analítica mostrou-se linear na faixa de 5 a 2500 µg L⁻¹.

Todas as amostras coletadas nas panificadoras dos 13 municípios da região estudada estavam contaminadas com DON (n= 39). As concentrações desta micotoxina variaram de 77 a 3630 µg kg⁻¹, como pode ser visto na Tabela 1. Ressalta-se também o fato do baixo desvio padrão relativo percentual (RSD %) encontrado, inferior a 20%, o que demonstra a homogeneidade do conjunto de dados, com exceção de apenas uma amostra (FT08) que atingiu um RSD de 46,2 %.

Tabela 1 - Concentrações de DON nas amostras de farinha de trigo das panificadoras estudadas.

Município	Panificadora	Amostra	Concentração (µg DON kg ⁻¹)	RSD (%)
1	A	FT01	368	1,3
	B	FT02	538	4,8
	C	FT03	77	2,6
2	A	FT04	687	1,8
	B	FT05	1996	4,3
	C	FT06	155	2,2
3	A	FT07	711	3,3
	B	FT08	1774	46,2
	C	FT09	2243	1,6
4	A	FT10	626	1,5
	B	FT11	138	2,8
	C	FT12	782	0,7
5	A	FT13	412	14,3
	B	FT14	594	17,0
	C	FT15	1155	3,7
6	A	FT16	196	2,7
	B	FT17	100	3,7
	C	FT18	179	4,3
7	A	FT19	381	2,5
	B	FT20	807	5,0
	C	FT21	3630	0,5
8	A	FT22	977	2,5
	B	FT23	274	10,9
	C	FT24	640	0,7
9	A	FT25	1346	1,2
	B	FT26	1144	4,0
	C	FT27	161	1,6

(Continuação)

Tabela 1 - Concentrações de DON nas amostras de farinha de trigo das panificadoras estudadas.

Município	Panificadora	Amostra	Concentração (μg DON kg^{-1})	RSD (%)
10	A	FT28	184	1,1
	B	FT29	308	2,0
	C	FT30	885	3,5
11	A	FT31	115	16,7
	B	FT32	570	1,9
	C	FT33	875	3,6
12	A	FT34	1127	8,4
	B	FT35	409	11,5
	C	FT36	455	1,3
13	A	FT37	750	1,5
	B	FT38	171	3,2
	C	FT39	2226	1,9

A média de concentração por município variou de 158 a 1606 $\mu\text{g kg}^{-1}$. Ao aplicar o teste Tukey para avaliar os resultados médios das 3 panificadoras por município, observou-se diferença significativa entre elas ($p < 0,05$), exceto com relação a média de concentração dos municípios 2, 5, 8, 9, 12 e 13.

Ao comparar a amostra FT21 (Figura 1), cuja concentração foi a mais elevada dentre todas as amostras (3630 $\mu\text{g kg}^{-1}$), ao LMT vigente (750 $\mu\text{g kg}^{-1}$ para farinhas de trigo, massas, biscoitos e produtos de panificação (Brasil, 2017)), pode-se afirmar que a concentração encontrada na amostra ultrapassa quase cinco vezes este limite. Além desta, outras 14 amostras (35,9 %) também se encontraram acima da concentração máxima permitida.

Figura 1 - Cromatogramas das duas transições monitoradas para DON obtidos da análise da amostra FT21.

No Brasil, mais especificamente na região Sul, onde a produção de trigo é maior que o restante do país, diversos estudos vêm demonstrando uma grande contaminação por esta micotoxina. Souza (2014) avaliou farinhas de trigo adquiridas em supermercados nas cidades de Cruz Alta e Santa Maria/RS, e constatou contaminação por DON e ZEN em todas as amostras. As concentrações de DON variaram de 53 a 1834 $\mu\text{g kg}^{-1}$.

Santos e colaboradores (2011) investigaram amostras de trigo do Paraná (21 amostras) e Rio Grande do Sul (15 amostras). Foi observado que 72,2 % ($n = 36$) apresentaram contaminação por DON com níveis variando de 89 a 1592 $\mu\text{g kg}^{-1}$. Onde 35 % das amostras do Rio Grande do Sul apresentaram-se com contaminação entre 750 e 1750 $\mu\text{g kg}^{-1}$.

Vidal (2013) estudou a contaminação de trigo comercializado na Espanha por DON. Os resultados obtidos demonstraram que DON estava presente em 62 % das amostras de trigo com o nível máximo de 1308 $\mu\text{g kg}^{-1}$.

O excesso de umidade do ar, bem como o elevado número de dias com chuva e/ou encobertos, como os que ocorrem durante o inverno no Rio Grande do Sul, podem determinar uma condição ambiente de baixa luminosidade, favorecendo, assim, o desenvolvimento do *Fusarium graminearum*, principal responsável pela produção do DON, o qual possui um crescimento ótimo em ambiente com temperatura em torno de 25 °C e atividade de água acima de 0,9 (Pasinato & Cunha, 2009).

Porém, de modo geral, o uso de fungicidas, agentes de controle biológico e medidas preventivas têm demonstrado contribuir para a manutenção de níveis baixos e aceitáveis de micotoxinas em alimentos. Salienta-se, porém, a importância de levar em consideração todos os estágios, desde o plantio, colheita, transporte, até a estocagem e o processamento do alimento (Iamanaka et al. 2010).

4. CONCLUSÕES

Observou-se a contaminação do DON em todas as amostras analisadas. Em uma das amostras, a concentração máxima ultrapassou quase cinco vezes o LMT pela Legislação Brasileira vigente (750 $\mu\text{g kg}^{-1}$). Observou-se também, que 36 % das amostras apresentaram resultados acima do LMT. Portanto, torna-se fundamental o contínuo monitoramento de DON em farinhas de trigo, visando dessa forma à obtenção de produtos de qualidade, e seguros para o consumo.

REFERÊNCIAS

- [1] Brasil, Ministério da Saúde (2011). Dispõe sobre os Limites Máximos Tolerados (LMT) para micotoxinas em alimentos (Resolução RDC nº 7, de 18 de fevereiro de 2011). Diário Oficial da República Federativa do Brasil.
- [2] Brasil, Ministério da Saúde (2017). Altera a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 7, de 18 de fevereiro de 2011 (Resolução RDC nº 138, de 8 de fevereiro de 2017). Diário Oficial da República Federativa do Brasil.
- [3] Iamanaka, B. T., Oliveira, I. S., & Taniwaki, M. H. (2010). Micotoxinas em Alimentos. Anais da Academia Pernambucana de Ciência Agrônômica, 7(1), 138-161.
- [4] Marin, S., Ramos, A.J., Cano-Sancho, G., & Sanchis, V. (2013). Mycotoxins: occurrence, toxicology, and exposure assessment. Food and chemical toxicology, 60(1), 218-237.
- [5] Mousavi Khaneghah, A., Kamani, M. H., Fakhri, Y., Coppa, C. F. S. C., de Oliveira, C. A. F., & Sant'Ana, A. S. (2019). Changes in masked forms of deoxynivalenol and their co-occurrence with culmorin in cereal-based products: A systematic review and meta-analysis. In Food Chemistry (Vol. 294, pp. 587-596). <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.05.034>
- [6] Pasinato, A., & Cunha, G. R. da. (2009). Informações meteorológicas de Passo Fundo, RS. Passo Fundo: Embrapa Trigo. Disponível em: http://www.cnpt.embrapa.br/biblio/co/p_co266.htm.
- [7] Pereira, V. L.; Fernandes, J.O., & Cunha, S.C. (2014). Mycotoxins in cereals and related foodstuffs: A review on occurrence and recent methods of analysis. Food Science and Technology, 36(2), 96-136.
- [8] Rahimi, E., Sadeghi, E., Bohlouli, S., & Karami, F. (2018). Fates of deoxynivalenol and deoxynivalenol-3-glucoside from wheat flour to Iranian traditional breads. Food Control, 91, 339-343. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2018.04.014>
- [9] Santos, J. S. dos., Oliveira, T. M. de., Martins, L. M., Hashimoto, E. H., Bassoi, M. C., Pires, J. L. F., Miranda, M. Z., Garcia, S., Itano, E. N., Ono, S. E. Y., Kawamura, O., & Hirooka, E. Y. (2011). Monitoramento e nível de ingestão de desoxinivalenol por trigo. Semina: Ciências Agrárias, 32(4), 1439-1450.
- [10] Scussel, V. M.; Beber, M., & Tonon, K. M. (2011). Efeitos da infecção por Fusarium/Gibberella na qualidade e segurança de grãos, farinhas e produtos derivados (1. ed.). Passo Fundo: Berthier.
- [11] Souza, D. M. (2014) Micotoxinas em Matrizes de Milho e Trigo: Validação de Método Analítico por UPLC-MS/MS e Monitoramento em diferentes pontos da cadeia produtiva e comercial (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria.
- [12] Wu, L., Zhang, H., Hu, X., Zhang, Y., Sun, L., Li, W., & Wang, B. (2020). Deacetylation of 3-acetyl-deoxynivalenol in wheat flour is mediated by water-soluble proteins during the making of Chinese steamed bread. Food Chemistry, 303(March 2019). <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.125341>

- [13] Vidal, A., Marín, S., Ramos, A. J., Cano-Sancho, G., & Sanchis, V. (2013). Determination of aflatoxins, deoxynivalenol, ochratoxin A and zearalenone in wheat and oat based bran supplements sold in the Spanish market. In *Food and Chemical Toxicology* (Vol. 53, pp. 133–138). <https://doi.org/10.1016/j.fct.2012.11.020>
- [14] Zhang, Y., Pei, F., Fang, Y., Li, P., Zhao, Y., Shen, F., Zou, Y., & Hu, Q. (2019). Comparison of concentration and health risks of 9 *Fusarium* mycotoxins in commercial whole wheat flour and refined wheat flour by multi-IAC-HPLC. *Food Chemistry*, 275(September 2018), 763–769. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.09.127>

Autores

ADRIELE FERREIRA MATOS

Técnica em Nutrição e dietética pelo Colégio Agrícola Vidal de Negreiros vinculado à Universidade Federal da Paraíba e estudante do curso técnico em enfermagem (em andamento).

ALBERTO SCHWAIGER PACIULLI

Graduado em Zootecnia pela Universidade Federal de Lavras (2002) e mestrado em Zootecnia pela Universidade Federal de Lavras (1997). Atualmente é extensionista agropecuário II da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais. Tem experiência na área de Zootecnia, com ênfase em Avaliação, Produção e Conservação de Forragens, atuando principalmente nos seguintes temas: forrageiras, produtor rural e queijo.

ALLYSON ALLENNON PINHEIRO DO ROSÁRIO

Graduado em Farmácia pela UFPA. Membro do Laboratório de Física Aplicada à Farmácia (LAFFA). Tem experiência em análises de alimentos.

ÁLVARO VENTORINI VASCONCELOS

Estudante do curso de Licenciatura em Química pela Universidade Estadual do Ceará - UECE e bolsista do LABBIOTEC (Laboratório de bioquímica e tecnologia da uece) com bolsa ICT Funcap, com ênfase na área de alimentos.

AMANDA BEZERRA DE SOUSA

Graduacao: Tecnologia em alimentos pela instituição CENTEC- FATEC CARIRI
Pós- Graduada em microbiologia clínica pela Unileão.

AMANDA MARILIA DA SILVA SANT'ANA

Doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos - UFPB (2017), com período sanduíche na Università di Pisa, Itália (2014-2015). Mestra (2013) em Ciência e Tecnologia de Alimentos (UFPB) e Nutricionista pela Universidade Federal da Paraíba (2010). Realizou Estágio Pós doutoral no Programa de Pós-graduação em Ciências da Nutrição (2017 - 2018), UFPB. Tem experiência em pesquisas nas áreas de Nutrição e Ciência e Tecnologia de Alimentos, atuando principalmente nos temas: leites e derivados lácteos, controle de qualidade de alimentos, análises físico-químicas e sensoriais de alimentos, alimentos funcionais. Atualmente, é Professora Adjunta da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial (DGTA), Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA).

ANA KAROLINE NOGUEIRA FREITAS

Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos em andamento. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, atuando principalmente nos seguintes temas: rotulagem, condições higiênico-sanitárias, kombucha, farinha de casca de maracujá e preparados sólidos para refresco. Faz parte do Diretório de Grupo de Pesquisa do CNPq em Ciência do Alimentos (dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4995858874599222).

ANA VITORINO FÉLIX

Tecnóloga em alimentos pela Faculdade de tecnologia Centec- Fatec Cariri

ANDRÉA GOMES DA SILVA

Doutora em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (2010), mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela

Universidade Federal de Viçosa (2001), graduada em Economia Doméstica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (1996/1997). Atualmente é Professora Titular do Departamento de Tecnologia Rural e Animal da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal, atuando principalmente nos seguintes temas: Pigmentos naturais, Processamento de frutas e hortaliças, Segurança do Alimento e Sistemas Agroalimentares, Sistemas da Qualidade. É mãe em tempo integral desde 2000.

ANDRESSA LANZA

Possui graduação em Nutrição pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI-Frederico Westphalen) e mestrado em Engenharia de Alimentos (URI-Erechim). Atualmente é nutricionista na Secretaria Estadual da Saúde/RS.

ANDRYNNE VERAS SOUSA

Graduando em Tecnologia em Alimentos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), campus Sobral. Foi monitor voluntário da disciplina de Química Analítica (2018) do curso de Tecnologia em Alimentos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), campus Sobral, foi Bolsista de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq-2018-2019), com ênfase em extração e aplicação de polissacarídeos de resíduos agroindustriais em alimentos. Atualmente é Bolsista de Iniciação Tecnológica também com ênfase em polissacarídeos de resíduos agroindustriais. Também participa do programa de monitoria na disciplina de Bioquímica de Alimentos, com práticas à docência (2019).

ÂNGELA DA SILVA BORGES

Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará (2002), mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará (2005) e doutorado em Zootecnia pela Universidade Federal do Ceará (2009). Atualmente é professora adjunto da Universidade Federal de Sergipe. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Produtos de Origem Animal.

ANIELA PINTO KEMPKA

Possui graduação em Engenharia de Alimentos (URI - 2006), Mestrado em Ciências Ambientais (Unochapecó - 2008) e Doutorado em Engenharia Química (UFSC - 2012). Atualmente é professora Associada IV da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC OESTE - DEAQ). Docente permanente dos Programas de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos - PPGCTA - UDESC e Ciências Ambientais - PPGCAMB - UDESC). Tem experiência na área de bioprocessos (ênfase em processos fermentativos e enzimáticos) em obtenção de peptídeos com propriedades funcionais e bioativas, aproveitamento de subprodutos e resíduos como meios e indutores de fermentação, produção/extração de enzimas de origem microbiana e vegetal para aplicação em alimentos e no tratamento de efluentes.

ANTONIA ARIANA CAMELO PASSOS

Foi Professora Substituta do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus Sobral (2018 - 2020). Possui doutorado em Biotecnologia em Recursos Naturais pela RENORBIO - UECE (2016 - 2020), possui mestrado Acadêmico em Tecnologia de Alimentos do IFCE - Campus Limoeiro do Norte na área de pesquisa Biopolímeros aplicado em alimentos, possui graduação em Tecnologia em Alimentos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus Sobral (2014), foi responsável técnica do Restaurante Piazza Itália em Sobral-CE (2016), foi professora substituta do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus Camocim (2016), foi bolsista pelo programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa e Estímulo à Interiorização BPI - FUNCAP (2011-2012) e (2012-2013), monitora da disciplina de Bioquímica de Alimentos do curso de Tecnologia em Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus Sobral (2013) e, estagiária do Serviço de Vigilância Sanitária de

Sobral-CE (2013). Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em polissacarídeos aplicados em alimentos, hidrólises enzimáticas e metodologias de análises química e físico-químicas.

ANTONIO ALEF PEREIRA DE OLIVEIRA

Bacharelado em Agroindústria pela Universidade Federal da Paraíba- Campus III- Bananeiras/PB. Ex-Presidente do Centro Acadêmico Bacharelado em Agroindústria do Campus III-UFPB-CCHSA. Ex-Coordenador de Assistência Estudantil-DCE-UFPB. Ex-Bolsista pesquisador do Projeto de Responsabilidade Social-UFPB-CCHSA orientado pelo Professor Dr. Max Rocha Quirino. Atuou como voluntário do projeto de pesquisa e extensão do Campus III-CCHSA-UFPB, orientado pela Professora Dra. Cybelle de Oliveira Dantas. Ex-Bolsista PIVIT Orientado pela Professora Dra. Rita Cristina Barbosa. Ex-Bolsista de monitoria da disciplina de tecnologia de leites e derivados orientado pela Professora Dra. Fabiana Augusta Santiago Beltrão. Ex-Bolsista de iniciação científica PIVIT orientado pela Professora Dra. Fabiana Augusta Santiago Beltrão. Ex-Bolsista de monitoria da disciplina de análises sensorial de alimentos orientado pela Professora Dra. Solange de Sousa. Atualmente é bolsista do projeto Probex 2020 com o tema BPF: Alimento seguro no ambiente escolar orientado pela Professora Dra. Catherine Teixeira de Carvalho. Iniciou-se uma especialização em Vigilância sanitária e qualidade dos Alimentos pela FAVENI. Formado pelo Instituto Federal do Ceará- Campus Iguatu (IFCE/IG), como técnico em Agroindústria (2015). Atuou como pesquisador de projetos de extensão e inovação, bolsista do proext (projeto de pesquisa e extensão) do Campus do IFCE-Iguatu. Trabalhou nas comunidades locais da cidade de Iguatu-CE com projetos de sustentabilidade (Reutilização do óleo de cozinha na produção de produtos de limpeza como redutor de impactos ambientais), Orientado e coordenado pela Professora Dra. e Chefe de Departamento Estudantil do Instituto Federal do Ceará- Campus Iguatu Antonia Barbosa de Lima.

ANTONIO DOS SANTOS SILVA

Físico, Químico e Estatístico formado pela UFPA. Mestre em Física e em Química pela UFPA. Doutor em Química pela UFPA. Professor Adjunto II da Faculdade de Farmácia da UFPA. Coordenador do Laboratório de Física Aplicada à Farmácia (LAFFA).

ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE SOUZA

Graduanda em TECNOLOGIA EM ALIMENTOS do Instituto Federal do Ceará (IFCE), campus Sobral. Foi bolsista de iniciação científica voluntária do INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ (IFCE), PIBIC-1/2018, e bolsista de iniciação científica da EMBRAPA CAPRINO E OVINO (2018.2) no setor de laticínios, participou do programa de MONITORIA nas disciplinas de BIOQUÍMICA GERAL(2018.2), QUÍMICA DE ALIMENTOS (2019.1) e METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO (2019.2), e integrou no projeto de extensão: Plantas medicinais como tema gerador do ensino de química orgânica, no IFCE. Atualmente, estagiária da VIGILÂNCIA SANITÁRIA e BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC-2/2019 na área de carnes e pescados com inovação de novos produtos adicionados de polissacarídeos, Integrante do Grupo de Pesquisa (Química de Macromoléculas) e dos projetos de extensão: A química presente nos Temperos; Saúde no prato alimentos funcionais e regionais e Capacitação para aprimoramento dos rótulos e embalagens, desenvolvidas pelo IFCE.

CATHERINE TEIXEIRA DE CARVALHO

Doutora pelo o Programa de Biotecnologia do Renorbio-UFRN. Mestrado profissional em administração pela Universidade Potiguar (2011), pós graduação em gestão de negócios e qualidade de alimentos (2004), graduação em Nutrição pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2002). Foi Membro do Conselho de Segurança Alimentar (CONSEA) do RN, atuou como docente do curso de Nutrição e de gastronomia da Universidade Potiguar e como consultora na área de boas práticas de fabricação. Atua como docente efetiva EBTT do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros na Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

CLÉLIA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA

Formação: Tecnóloga em Alimentos (IFMG campus Bambuí - 2015); Engenheira de Alimentos (IFMG campus Bambuí - 2019). Especializações: Estuda língua inglesa pela plataforma Mairo Vergara e pós-graduanda em Engenharia da Qualidade pela Faculdade Única. Experiências: Analista de Qualidade II na empresa Bem Brasil Alimentos, Perdizes, MG (2018 até o presente momento)

CRISTIANO MAX CELESTINO NEGRÃO

Graduando em Farmácia pela UFPA. Membro do Laboratório de Física Aplicada à Farmácia (LAFFA). Tem experiência em análises de alimentos.

CRISTINE VOGEL

Engenheira de Alimentos pela UFFS (2017). Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UDESC (2019). Atuou por um período no ramo de alimentos, no segmento lácteo, na qual possui conhecimento teórico e prático em ferramentas de qualidade e processos de produção de queijos e fermentados. Tem conhecimento na área de bioprocessos com foco em processos enzimáticos, para o uso de subprodutos e resíduos agroindustriais, a fim de obter peptídeos com propriedades funcionais e bioativas.

DAYANNE CIPRIANO COSTA DA SILVA

Estudante do curso de Licenciatura em Química pela Universidade Estadual do Ceará - UECE e bolsista do LABBIOTEC (Laboratório de bioquímica e tecnologia da uece) como pesquisadora na área de alimentos e monitora voluntária na cadeira de bioquímica.

DEMILES HENRIQUE SILVA

Discente de tecnologia em alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará -Campus Sobral, bolsista voluntário no laboratório de biotecnologia com ênfase em biopolímeros.

EDUARDA BAGGIO PAGLIA

Possui Graduação, em andamento, no curso de Engenharia Química pela Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC. É monitoria nas disciplinas de Cálculo de Reatores A, Cálculo de Reatores B, Termodinâmica A e Termodinâmica B. Atualmente atua no projeto de pesquisa intitulado: Hidrólise mecânica e enzimática de proteínas para obtenção de peptídeos bioativos, no Laboratório de Bioprocessos da UDESC, onde trabalha desde 2017. Possui experiência na obtenção de peptídeos com propriedades antioxidantes, antimicrobianas, anti-hipertensivas e antidiabéticas.

ELIDA AMÉLIA DE SOUSA COSTA

Tecnóloga em alimentos pela Faculdade de tecnologia Centec - Fatec Cariri. Especialista em Gestão de pessoas e processos.

EUNICE VALDUGA

Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Maria (1992), mestrado em Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Paraná (1994) e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Catarina (2005). Atualmente é professora/pesquisadora/orientadora (Mestrado e Doutorado) do Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões.

EWERTON CARVALHO DE SOUZA

Formado em Química pela UFPA, mestre e doutor em Química Analítica pela UFPA. Professor da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). Colaborador do Laboratório de Física Aplicada à Farmácia (LAFFA).

FABÍOLA RIBEIRO DE PAULA

Estudante do curso de Licenciatura em Química pela Universidade Estadual do Ceará - UECE e bolsista do LABBIOTEC (Laboratório de bioquímica e tecnologia da uece) com bolsa IC CNPq, com pesquisa na área de alimentos.

FRANCISCA KELIA DUARTE DIAS

Possui graduação em Ciências Biológicas(2006),Especialização em Desenvolvimento infantil (2010), Gestão Ambiental (2012)e Mestrado em Ciências Naturais, todos pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte . Doutora em Ciência Animal (2019) pela Universidade Federal Rural do Semiárido- UFRSA e atualmente é professora do ensino técnico e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) campus Apodi. Tem experiência na área de Microbiologia, com ênfase em Microbiologia de alimentos e água, atuando principalmente nos seguintes temas: epidemiologia de doenças transmitidas pela água e alimentos, bactérias do grupo coliformes, leveduras e fermentação de resíduos industriais.

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA

Mestrando em Ciência Animal pela Universidade Federal da Paraíba, Graduado em Bacharelado em Agroindústria pela Universidade Federal da Paraíba (2018). Técnico em Nutrição pelo Colégio Agrícola Vidal de Negreiros (CAVN, UFPB 2018). Estágio extracurricular no laboratório de Microbiologia de Alimentos da Universidade Federal da Paraíba. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Foi diretor de Qualidade do Centro Acadêmico Bacharelado em Agroindústria, gestão (2016-2018). Atualmente trabalha com controle de qualidade de produtos de Origem Animal.

FRANCYELLE GURGEL CASTRO ALVES

Estagiou no setor Avicultura, da Universidade Federal do Ceará (2006 - 2007). Trabalhou como Auxiliar de Laboratório, na Companhia de Alimentos do Nordeste - CIALNE (2007). Atuou nos cursos Técnico em Agropecuária e Técnico em Zootecnia como professora do IFCE - Instituto Federal do Ceará/PRONATEC (2012-2014). Exerce o cargo de zootecnista na Universidade Federal do Semi-árido - UFRSA -, supervisionando o Núcleo Tecnológico do Semi-Árido (NUTESA) e a Fábrica de ração da Instituição (2016).

GABY PATRÍCIA TERÁN ORTIZ

Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado e doutorado em Ciências dos Alimentos pela Universidade Federal de Lavras (1998). Atualmente professora titular no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, atuando principalmente nos seguintes temas: Análise Sensorial, Caracterização físico-química de alimentos; Desenvolvimento de Produtos.

GEOVANA COSTA AGUIAR

Estudante do curso de Licenciatura em Química pela Universidade Estadual do Ceará - UECE e bolsista do LABBIOTEC (Laboratório de bioquímica e tecnologia da uece) como pesquisadora na área de alimentos e monitora da cadeira de Química dos Alimentos.

GLENDIA BARROS MATOS

Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Sergipe (2018). Foi bolsista de Iniciação científica atuando em pesquisas em microencapsulação e obtenção de corantes naturais. Atualmente é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Sergipe.

GUSTAVO OLIVEIRA EVERTON

Mestrado em Saúde e Ambiente: Biotecnologia aplicada à saúde pela Universidade Federal do Maranhão. Graduando em Engenharia Química pela UFMA. Pesquisador em Laboratório de Pesquisa e Aplicação de Óleos Essenciais, Universidade Federal do Maranhão (2015-2020). Possui Graduação em Química Industrial pela UFMA. Técnico em Metalurgia e Materiais pelo Instituto Federal do Maranhão (IFMA). Recebeu honra ao mérito em 2017 pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) por seu desempenho como pesquisador.

HANNA SANTOS MUNIZ

Estudante do curso de licenciatura em Química pela Universidade Estadual do Ceará - UECE, professora na área de Ciências da Natureza e Biologia, pesquisadora na área de Inorgânica com foco em aplicações de barreira de proteção contra corrosão em ligas metálicas e área orgânica com foco em alimentos no LABBIOTEC (Laboratório de bioquímica e tecnologia da Uece).

HERLANE CHAVES PAZ

Administradora formada pela Universidade Estadual do Piauí - UESPI em 2006. Pós Graduada em Gestão Pública pela UFPI/UAPI em 2011. Pós Graduada em Contabilidade e Controle na Administração Pública pela UFPI/TCE PI em 2016, Graduada em Alimentos pelo IFPI em 2015. Mestranda em Administração pela UFPB em 2020. Trabalhou como Assistente Administrativa/Financeira na BEP -Caixa de Previdência Social de 2003 a 2015.

IAN DUQUE PACIULLI

Técnico em Manutenção Automotiva pelo Instituto Federal de Minas Gerais campus Bambuí (2016). Experiência: Desenvolvimento do Clorador de Passagem artesanal, manutenção automotiva e vendas.

INGRID DUARTE DOS SANTOS

Possui graduação em Farmácia (2013) pela Universidade Franciscana. Mestrado em Química pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente é doutoranda no Programa de Pós Graduação em Ciência e Tecnologia dos Alimentos na mesma Universidade. Possui experiência na área de Química Analítica, atuando principalmente no desenvolvimento, validação e otimização de métodos para análise de micotoxinas e agrotóxicos em alimentos, utilizando LC-MS/MS e GC-MS.

IONARA REGINA PIZZUTTI

Professora Associada da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); Membro do corpo docente dos Programas de Pós Graduação em Química e Pós Graduação em Ciência e Tecnologia dos Alimentos da UFSM; Coordenadora do Centro de Pesquisa e Análise de Resíduos e Contaminantes (CEPARC) - UFSM; Mestrado e Doutorado em Química Analítica pela UFSM; Graduação em Química Industrial pela UFSM. Realiza estudos na área de Química Analítica, com ênfase em Cromatografia e atua principalmente em GC-MS/MS, LC-MS/MS, análise de pesticidas e micotoxinas em alimentos em geral e também matrizes ambientais. Mais especificamente, atua no desenvolvimento de métodos (multiresíduos e individuais), validação e aplicação dos mesmos em amostras do cotidiano. Realiza projetos em conjunto com a WUR (Wageningen University and Research - Holanda); com o EURL-FV (European Union Reference Laboratory for fruits and Vegetables - Espanha) e outros renomados laboratórios da Europa.

ISABELLE DE LIMA BRITO

Possui graduação em Nutrição pela Universidade Federal da Paraíba (2004), Especialização em Nutrição Clínica pela Gama Filho (2010), Mestrado (2013) e Doutorado (2017) em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal da Paraíba. Tem experiência na área de Nutrição e Ciência e Tecnologia de Alimentos. Atualmente é Professora Efetiva do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da Universidade Federal da Paraíba - Campus III.

IVAN PEREIRA DA SILVA

Graduando do curso de Farmácia da UFPA. Membro do Laboratório de Física Aplicada à Farmácia (LAFFA). Tem experiência em análises de alimentos.

JAMILE ZENI

Possui graduação em Química Industrial de Alimentos pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul / Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (2006), mestrado (2009) e doutorado (2011) em Engenharia de Alimentos pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI). Atualmente é professora titular da URI-Erechim e professora Permanente no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos (mestrado e doutorado) da mesma instituição.

JANEANNE NASCIMENTO SILVA LOPES

Mestre em Tecnologia Agroalimentar pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB (2012). Especialista em Formação de Professores para o Ensino Superior e Educação Continuada pela Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN (2017), Especialista em Biologia e Química pela Universidade Regional do Cariri - URCA (2008). Pós-graduada em Gastronomia pela Universidade Cândido Mendes (2018). Graduada em Tecnologia de Alimentos pelo Instituto Centro de Ensino Tecnológico (2003). Graduanda em Gastronomia (2018). Atualmente é Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia e da Pós-graduação em Segurança Nutricional e Controle de Qualidade de Alimentos do Centro Universitário de Juazeiro do Norte.

JANYNE PALHETA RAMOS

Graduanda em química industrial tendo como área de interesse química de alimentos e química ambiental

JAQUELINE SANTOS MESQUITA

Bacharel em Química Industrial pela Universidade Federal do Maranhão(2019), minhas áreas de interesses são Química Analítica e Orgânica aplicadas aos conhecimentos da Ciência Forense; e Produção de cervejas artesanais e análise Físico-Químico do produto acabado.

JÉSSICA REIS PEDROSA

Graduação em Tecnologia de Alimentos pelo Instituto Federal de Minas Gerais campus Bambuí (2015).

Graduação em Engenharia de Alimentos pelo Instituto Federal de Minas Gerais campus Bambuí (2018).

Especializações: pós-graduanda em Engenharia da Qualidade pela Faculdade Única. Experiência: Inspetora de Qualidade na indústria de panificação Indústria Delícias do Trigo LTDA, Campo belo, MG (2018 ate o presente momento).

JÉSSICA TAIOMARA MOURA COSTA BEZERRA DE OLIVEIRA

Zootecnista pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). Foi bolsista de Iniciação Científica/PIVIC pela mesma instituição (2013-2014). Atua na área de produção de ruminantes com ênfase em bovinocultura leiteira e qualidade da carne. Foi bolsista do PROEXT/2013 - Capacitação de jovens: manutenção do homem no campo, do PROEXT/2012 - Capacitação Tecnológica em Pequenas Propriedades de Bacias Leiteiras do Rio Grande do Norte.

JOANA D'ARC ALVES DE FREITAS

Tecnóloga em Alimentos, formada pela Faculdade de Tecnologia CENTEC - FATEC Cariri, cursando Técnico em Cozinha, no CVTEC - Crato

JOÃO ANTÔNIO BELMINO DOS SANTOS

Possui Graduação em Química Industrial pela Universidade Estadual da Paraíba (1997), Mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina Grande (2000) e Doutorado em Engenharia de Processos pela Universidade Federal de Campina Grande (2007). Atualmente é professor/ Pesquisador da Universidade Federal de Sergipe ? Departamento de Tecnologia de Alimentos (DTA/UFS), e docente permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência da Propriedade Intelectual (PPGPI - Mestrado e Doutorado). Tem experiência na transferência de tecnologia e inovação para o setor produtivo desenvolvendo projetos de extensão tecnológica. Atua nas áreas de Engenharia de Alimentos, Propriedade Intelectual, Indicadores e Inovação.

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA E SILVA

Professor Doutor do Departamento de Biotecnologia da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo (USP)

JOSÉ DOUGLAS BERNARDINO DOMINGOS

Formado em Nutrição e Dietética (nível técnico) pelo Colégio Agrícola Vidal de Negreiros e graduando em Nutrição pela Universidade Federal de Campina Grande. Experiência em projetos de extensão com alimentação infantil e pesquisador na área de Segurança Alimentar e Nutricional. Colaborador do Núcleo de Pesquisa e extensão em Nutrição e Saúde Coletiva da UFCG-Campus Cuité-PB. Discente no Programa de Iniciação à Docência na Disciplina de Práticas em Saúde Coletiva. Integrante do Programa de Educação Tutorial (PET-Nutrição) da UFCG.

JOSÉ MARCOS NOBRE DE MOURA JÚNIOR

Graduado em Farmácia pela UFPA. Membro do Laboratório de Física Aplicada à Farmácia (LAFFA) Tem experiência em análises de alimentos.

JOYCE PANTOJA BRAGA

Graduanda do curso de Farmácia da UFPA. Membro do Laboratório de Física Aplicada à Farmácia (LAFFA). Tem experiência em análises de alimentos.

KAMILA DE LIMA BARBOSA

Graduada no curso de Licenciatura em Química pela Universidade Estadual do Ceará - UECE e integrante do grupo de pesquisa do LABIOTEC(Laboratório de bioquímica e tecnologia da uece) na área de produtos naturais.

KANANDA LARA SANTOS SALES

Graduada do curso de Licenciatura em Química pela Universidade Estadual do Ceará - UECE e Pós-graduanda em Educação Especial e Inclusiva.

KELIANE DA SILVA MAIA

Possui graduação em Tecnologia em Alimentos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (2010), mestrado em Tecnologia Agroalimentar pela Universidade Federal da Paraíba (2014), Doutorado em Ciência Animal pela Universidade Federal Rural do Semi-árido (2020). Atuou como técnica de laboratório em análise sensorial na Universidade Federal da Paraíba (2011 - 2014) e atualmente é técnica de laboratório/área alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte- Campus Apodi. Possui experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Ciência e Tecnologia de Alimentos de Produtos de Origem Animal.

LAILTON DA SILVA FREIRE

Possui graduação em Geografia, Tecnologia de Alimentos; Especialização em Gestão Ambiental, Especialização em Biodiversidade e conservação. Mestre em Alimentos e Nutrição. Tem experiência na área de Ensino em Geografia. Desenvolve trabalhos relacionados à Geografia Urbana, Transporte Urbano, Organização Espacial, Meio Ambiente Urbano e Aproveitamento Integral de Alimentos, Segurança Alimentar, Desenvolvimento de Novos Produtos alimentares e Gestão Ambiental. Participante do grupo de pesquisa Ciência de Alimentos, do Universidade Federal do Piauí pelo CNPQ (<http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/2001880280207190>) e do grupo de pesquisa Tecnologia e Processamento de Alimentos, do(a) Instituto Federal do Piauí também pelo CNPQ

LARISSA GRAZIELE RAUBER DUARTE

Engenheira de Alimentos pela Universidade Federal de Lavras (UFLA), mestre em Ciências pelo Programa de Biotecnologia Industrial pela Universidade de São Paulo (USP) e atualmente faz doutorado na Faculdade de Engenharia de Alimentos na UNICAMP.

LARYSSE VASCONCELLOS PACHECO

Graduanda do curso de Farmácia da UFPA. Membro do Laboratório de Física Aplicada à Farmácia (LAFFA).

LAYANA MARY FROTA MENEZES

Graduanda em TECNOLOGIA EM ALIMENTOS do Instituto Federal do Ceará (IFCE), campus Sobral. Foi bolsista de iniciação científica voluntária do INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ (IFCE), PIBIC-1/2018, e bolsista de iniciação científica da EMBRAPA CAPRINO E OVINO (2018.2) no setor de laticínios, participou do programa de MONITORIA nas disciplinas de BIOQUÍMICA GERAL(2018.2), QUÍMICA DE ALIMENTOS (2019.1) e METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO (2019.2), e integrou no projeto de extensão: Plantas medicinais como tema gerador do ensino de química orgânica, no IFCE. Atualmente, estagiária da VIGILÂNCIA SANITÁRIA e BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC-2/2019 na área de carnes e pescados com inovação de novos produtos adicionados de polissacarídeos, Integrante do Grupo de Pesquisa (Química de Macromoléculas) e dos projetos de extensão: A química presente nos Temperos; Saúde no prato alimentos funcionais e regionais e Capacitação para aprimoramento dos rótulos e embalagens, desenvolvidas pelo IFCE,

LISA MARIA MENDES DE ALMEIDA SOUZA

Graduanda do curso de Farmácia da UFPA. Membro do Laboratório de Física Aplicada à Farmácia (LAFFA).

MARACÉLIA CARLA VIEIRA DE OLIVEIRA

Possui graduação em Educação Física pelo Instituto de Ensino Superior Múltiplo

MARCOS ANTONIO MATIUCCI

Graduado em Zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá, Mestrando em Ciência de Alimentos através da mesma instituição de graduação, foi bolsista de Iniciação Científica (PIBIC) e Iniciação Tecnológica (PIBITI), onde trabalhou com o desenvolvimento e análises físico-químicas de produtos alimentícios a partir de resíduos do beneficiamento de tilápia, trabalhou também com processos e tecnologias de peles e couros com ênfase em pescado, bem como suas análises de resistência, química, e histológica.

MARCOS ANTÔNIO MOURA DA SILVA FILHO

Graduando do curso de Farmácia da UFPA. Membro do Laboratório de Física Aplicada à Farmácia (LAFFA).

MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES CAVALCANTI LIBERATO

Possui graduação em Química Industrial pela Universidade Federal do Ceará (1973), especialização em Química Orgânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1979), mestrado em Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará (2002). É Doutora em Biotecnologia em Recursos Naturais pela Rede Nordeste de Biotecnologia (RENORBIO). É Professora Associado com dedicação exclusiva da Universidade Estadual do Ceará e Professora Colaboradora do Mestrado Acadêmico em Recursos Naturais (MARENA), do Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual do Ceará e autora de vários livros.

MARIA ÉRICA DA SILVA OLIVEIRA

Mestra em Ciência Animal pela Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA (2019). Especialista em Tecnologia, Higiene e Vigilância Sanitária de Alimentos pela Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA (2020). Graduada em Tecnologia em Alimentos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB, Campus Sousa/PB (2014). Técnica em Gastronomia pelo CENTEC - Cariri/CE (2010). Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Ciência e Tecnologia de Alimentos.

MARIA KLEVYANY NASCIMENTO

2017; Ensino superior em Tecnologia em Alimentos; FATEC-CARIRI; 2017; Pós Graduada em Segurança Nutricional e Controle de Qualidade de Alimentos; FJN.

MIRELLY ALINE MARTINS DE SOUZA

Graduada no curso de Licenciatura em Pedagogia pela UFPB-CAMPUS III, com experiência na área de Educação Infantil. Mestranda como aluna especial na disciplina de Literatura infanto-juvenil pelo Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino da UFCG. Formada em técnica de Nutrição e Dietética pelo Colégio Agrícola Vidal de Negreiros-UFPB.

PABLO HENRIQUE FRANCO SANTOS DE SOUZA

Graduando do curso de Farmácia da UFPA. Membro do Laboratório de Física Aplicada à Farmácia (LAFFA).

PATRÍCIA BELTRÃO LESSA CONSTANT

Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal da Paraíba (1996), mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa (1999) e doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa (2003). Foi professora efetiva da Universidade Federal do Ceará por 5 anos. Atualmente é professora associada da Universidade Federal de Sergipe. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Ciência de Alimentos, atuando principalmente nos seguintes temas: corantes naturais, microencapsulação e alimentos funcionais

PATRÍCIA DE OLIVEIRA LIMA

Graduada em Zootecnia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco com mestrado e doutorado em Zootecnia pela Universidade Federal do Ceará. Atua na área de Produção de ruminantes nas linhas de: alimentos alternativos para ruminantes e qualidade da carne. Atualmente coordena o laboratório de análises instrumentais e sensoriais de carnes/UFERSA, é docente do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal, do Curso de Especialização em Tecnologia, Higiene e Vigilância Sanitária de Alimentos, Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Produção Animal, Tutora do Programa de Educação Tutorial da Zootecnia, Tutora da Empresa Júnior de Zootecnia e membro da Comissão de ética no uso de animais em pesquisa

PAULO ROBERTO GAGLIARDI

Doutorado em Agronomia (Fitopatologia) pela Universidade de São Paulo, Brasil (2008)
Professor Adjunto da Universidade Federal de Sergipe, Brasil

ROSANA MARTINS CARNEIRO

Possui graduação em Nutrição pela Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí (2009). Mestrado em Alimentos e Nutrição pela Universidade Federal do Piauí (2011). Doutorado em Ciência Animal pela Universidade Federal do Piauí (2019). Atualmente Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), na área de Tecnologia em Alimentos. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia em Alimentos, Desenvolvimento de Produtos, Microbiologia dos Alimentos, Segurança Alimentar e Nutricional, Análise Sensorial dos Alimentos, Tecnologia das Fermentações e Nutrição Funcional. Faz parte do Diretório de Grupo de Pesquisa do CNPq em Ciência do Alimentos (dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4995858874599222).

ROSSELEI CAIEL DA SILVA

Possui graduação em Farmácia, com ênfase em Tecnologia de Alimentos (2003), mestrado (2005) e doutorado (2011) em Química, pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Atualmente é pesquisadora no Centro de Pesquisa e Análise de Resíduos e Contaminantes (CEPARC/UFSM), atuando principalmente com GC-MS/MS, LC-MS/MS, análise de pesticidas e micotoxinas em alimentos. Tem experiência em Desenvolvimento de Novos Produtos Alimentícios e Controle de Qualidade em Alimentos.

SARAH GEYSA DE OLIVEIRA RIBEIRO

Estudante do curso de Licenciatura em Química pela Universidade Estadual do Ceará - UECE e bolsista do LABBIOTEC (Laboratório de bioquímica e tecnologia da uece) como pesquisadora na área de alimentos com trabalhos na área de fermentados alcoólicos.

SILVIO CARLOS COELHO

Químico Industrial/Químico Licenciado pela Universidade Federal do Maranhão - UFMA. Especialista no Ensino de Ciências em Química pela Universidade Estadual do Maranhão - UEMA. Especialista em Produção de Cachaça pela Universidade Federal de Lavras - UFLA. Mestre em Saúde

Pública e Meio Ambiente pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ). Técnico de Processos Cervejeiros pela Science of Beer.

SONIA DE OLIVEIRA DUQUE PACIULLI

Graduada em Zootecnia pela Universidade Federal de Lavras (1993), mestrado em Ciências dos Alimentos (1996) pela mesma universidade e doutorado em Fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa (2013). Atualmente é professora de ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal Minas Gerais. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Avaliação e Controle de Qualidade de Alimentos, atuando principalmente nos seguintes temas: controle da qualidade de leite e derivados, desenvolvimento e processamento de alimentos.

SUERLÂNDIO MACEIÓ DE FARIAS

Técnico em Nutrição e dietética pelo Colégio Agrícola Vidal de Negreiros vinculado à Universidade Federal da Paraíba e Bacharelado em Nutrição pela Universidade Federal da Paraíba.

THIAGO MENDES FERNANDES

Possui graduação em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal da Paraíba (2005), Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal da Paraíba (2009).

VICTOR ELIAS MOUCHREK FILHO

Possui Graduação em Química Industrial pela Universidade Federal do Maranhão (1994) e em Ciências Biológicas pela Universidade Cruzeiro do Sul (2018), Graduando em Engenharia Ambiental pela Universidade Cruzeiro do Sul. Especialização em Magistério Superior pela Universidade Federal do Maranhão (2003), Especialização em Engenharia de Bioprocessos pela AVM Faculdade Integrada (2015), Especialização em Engenharia Genética pela AVM Faculdade Integrada (2016), Especialização em Engenharia de Alimentos pela Faculdade Unyleya (2016), Mestrado em Química pela Universidade de São Paulo (1997) e Doutorado em Química pela Universidade de São Paulo (2000).

ISBN: 978-65-86127-66-9

CDL

9 786586 127669